La. C. 1. 15. L.

67162

PLATE I

ORIENTAL MANUSCRIPTS

OF THE LIBRARY OF THE

BRITISH MUSEUM

OF NATURAL HISTORY

AND

1875

NOTTINGHAM

PRINTED BY THE UNIVERSITY PRESS

526
W42
Bot.

PLANTAE CRYPTOGAMICAE FLORAE GOTTINGENSIS

COLLEGIT ET DESCRIPSIT
D. FRIDERICVS GVILIELMVS WEIS
M. D.

Schnitzlein

G O T T I N G A E

SVMTIBVS VIDVAE ABR. VANDENHOECK
MDCCLXX.

PLANTAE
CRYPTOGAMICAE
FLORAE GOTTINGENSIS

COLLEGIT ET DESCRIPSIT
D. FRIDERICVS GAVIELMVS WILS

M. D.

GOTTINGAE
SAMTENSIS AIDAE AER. VANDENHOECK
MDCCCLXX

586
W42
305
W42
1770
Bot
159.32.2
ILLVSTRISSIMO DOMINO

D O M I N O

GERLACO ADOLPHO

L. B.

DE MVNCHHAVSEN

DYNASTAE STRAVSEVRTI REL.

POTENTISSIMI MAGNAE BRITANNIAE REGIS ET

ELECTORIS BRVNSVICO LVNEBVRGICI A

CONSILIIIS SANCTIORIBVS

AC

PRIMARIO STATUS ADMINISTRO

REGIAE REDITVVM CAMERAE

PRAESIDI

ALMAE GEORGIAE AVGVSTAE

CVRATORI INDVLGENTISSIMO

S.

Wais, J. G.

ILLVSTRISSIMO DOMINO

D O M I N O

GERALDO ADOLPHO

L. B.

DE MUNICHIAVSEM

UNIVERSITATIS STRASBURGENSIS

TOTIUSMAGNI MAGISTRI BRITANNICAE REGIS ET

RECTORIS BRASAVIO LATINIS REGI A

CONSENSU BANCIONIBUS

AC

PRIMARIO STATVS ADMINISTRATIO

REGIAE RECTORVM CAMERAE

IN RESIDI

ALMAE GEORGIAE APOSTOLAE

CVRATORI INDVIGENTISSIMO

LIBRARY

NATIONAL MUSEUM

ILLVSTRISIME DOMINE,
DOMINE INDVLGENTISIME,

Humiles et in abditis sylvarum locis latentes plantae, ad purpuram TVAM arreperere, MVNCHHV-SIVM salutare, et indulgentiam Ipsius implorare audent. Neglectae, et a coetu ciuium suorum a viris egregiis, qui Florae nostrae campos lustrarunt, exclusae, desiderabant hominem, qui hanc quasi contemptus maculam ab ipsis abstergeret. Indigenae Gottin-gensi seruatus videbatur hic labor intricata-

intricatissimus et difficilissimus; quem ego
amore patriae ductus, audacter et for-
titer subii. Probarunt consilium
summi botanicae disciplinae patroni,
et magistri, laudarunt etiam; sed o-
mnis labor frustra susceptus, vanus,
ingratusque censebitur, nisi TVVS,
INDVLGENTISSIME DOMINE, nutus
eum probauerit. De hoc vnico prae-
mio certat

ILLVSTRISSIMI NOMINIS TVI

addictus deditusque

D. FRID. GVIEL. WEIS.

PRAELOQVIVM

Qui urbem *Gottingam* ambit, plantarum feracissimus ager, cum vicinis *sylvis Solingensibus*, magna *Muscorum* etiam, reliquarumque plantarum *cryptogamicarum* copia abundat, quarum recens, atque descriptio hucusque deest. Qui enim primates civium *Florae nostrae Gottingensis*, exhibent catalogi, ab *Ill. Hallero*, et *b. Zinnio* editi, (*) paruos hosc, et inferioris conditionis incolas excludunt. Hos minime silentio praeteriri debere ratus, cum multum contribuant ad *Florae nostrae* ornamentum, omni industria collegi, quo accuratam eorum tradere possem descriptionem. Quantumvis vero difficilis erat labor, cum et collectio, praesertim hiemis tempestate, inque locis maxime incultis instituenda, tum accuratum examen, atque distinctio in sua

(*) illius *Enumeratio Plantarum horti regii, et agræ Gottingensis, aucta et emendata. Gotting. 1753. 8.* huius *Catalogus Plantarum horti academici, et agræ Gottingensis. Gotting. 1757. 8.*

sua genera et species, tot tantaque mihi opponerent impedimenta, quae nonnisi pertinaci industria superari poterant; tamen magna illa, quam ex studio rei herbariae semper percepi voluptas, et commodum, quod ex harum plantarum descriptione amatoribus botanices nasci arbitrabar, me permouerunt, vt in peragendo incoepto semel labore persisterem. Tres, et quod superest annos, impendi collectioni plantarum cryptogamicarum huius regionis, in quibus iteratis vicibus, et quidem semper alio anni tempore, visitavi loca, in quibus illae crescebant: cuius laboris aliquando socium mihi se adiunxit D. *Rüling*, Med. Doct. et Practicus in ciuitate Nordheimensi, inter amicos praestantissimus, qui etiam variarum specierum, quas ipse collegerat, specimina mecum communicauit. Vt vero eo certius mutationes illas, quas patiuntur per aetatem hae plantae nostrae, perspicere possem, varia loca, in quibus quandam inueni speciem, certo designaui vestigio, vt post aliquod tempus elapsum, videre possem, an, et quam mutationem interea passa esset? Ita occasionem nactus sum, quorundam generum non modo, sed totius ordinis etiam propriam indolem, et varias mutationes perscrutandi.

Quaedam plantarum cryptogamicarum genera, v. c. *Lichen*, *Iungermannia*, *Hypnum*, *Bryum*, &c. tanta copia abundant specierum, quae haud facile, sine subordinatione quadam

quadam, distingui recte potest, hinc opus fuit, eas in certas quasi phalanges distribuere, secundum notas quasdam, singulis speciebus communes. Quod fecerunt quidem Botanici, qui plantas hasce pertractarunt, at vnico solummodo nomine, vel simplici appellatione subdiuisionis, genera ista ampla, in suas minores phalanges distinxerunt, neglecta diuisionis huius definitione. Sufficit quidem talis appellatio simplex, in re herbaria multum versato, quia iam supponit eius sensum; tironi vero nomen, sine explicatione adiuncta, necessario obscurum erit, quia nonnisi per magnam copiam specierum, quas examinare debet, vltimo demum eo peruenit, vt diuinare possit sensum huiusce appellationis. Sic e. c. in Lichenis quadam specie inuenta, absque manu-ductione docentis, haud statim intelliget tiro, ad quam pertineat subordinationem, quia nondum scit, quid, et quales sint, *Lichenes leprosi, tuberculati, scutellati, imbricati, foliacei, coriacei, &c.* Haud superuacuum inde puto esse breuem illam delineationem proprietatum, cuius subdiuisioni, huius, et similium generum, praemissam, ex qua cum diuisionis, tum nominis quoque patere poterit ratio. Quodsi enim haec nota supponamus, quiuus tiro inuentam sciet speciem, ad suum referre ordinem, et nomen facillimo inuenire negotio. Idem valet, de terminis technicis singularum partium plantarum cryptogamica-

rum. Ipse meo exemplo expertus sum, quantum sit taedium laboris, e libris auctorum inter se comparatis, ediscere veram terminorum significationem omnium istarum partium, absque praeceptoris instructione, praesertim, cum isti insigniter apud auctores variant: quapropter hisce terminis usu nunc receptis, explicationem addidi non solum, sed simul indicavi reliquos auctorum terminos, eiusdem significationis. Cui haec quidem contingit felicitas, ut tali uti possit praeceptore, qui per plura specimina viva, partium singularum terminos illustrat, haec facile praeterire poterit; cui vero deest talis instructio, illi certe haud iniucundum erit, inuenire in nostra tractatione plantarum cryptogamicarum, quas noscere cupit, explicationem terminorum, quos tunc facillime intelliget, et non opus habebit petere sensum illorum e maioribus auctorum, qui de istis plantis commentati sunt, scriptis, pretiosis non solum, sed etiam rarioribus.

In omnibus quidem plantis, ad iustam veramque earum notionem acquirendam, oportet nosse mutationes, quas patiuntur pro aetate sua diuersa. Inprimis vero hoc valet de plantis cryptogamicis, quarum figura externa vnam ab altera specie distinguit; eadem autem ipsa, aetatis et loci natalis diuersitate, in permultis speciebus, ita mutatur, ut eadem planta, quae sub certa quadam forma nobis innotuit, elapsis aliquot mensibus, ignota nobis prorsus

videatur; atque idem etiam accidere potest, si eandem speciem, ex alio accipimus loco natali. Hinc tot specimina, vnius eiusdemque speciei, in aetate diuersa, eque variis locis natalibus, colligenda erant, quot necessaria mihi esse videbantur, ad notabiliores eiusdem, in toto habitu mutationes, rite determinandas. Quam necesse autem sit, scire has mutationes, is facile experietur, qui ex solo caractere specifico auctorum, (quatenus nomine comprehenditur) speciem muscorum determinare conabitur; quantis dubiis ille non immergetur? quia has notas varietatum, apud duces suos non inuenit: quam saepe figuram caractere descriptam, et reliqua plantae propria, longe alia in suo, quod in manu habet specimine, deprehendet? quod tamen illa ipsa auctoris descripta est species, quae aetate solummodo, aut loco natali mutata, sub peregrina incedit forma. Vt exemplo rem illustrem, contempletur aliquis vetusta, et moribunda quasi specimina *Hypni complanati* L. et compareret cum caractere in vegeti aetate; in vetustis inueniet aliquando, mediam costam inter foliola, ad aliquot lineas nudam, exstantem, quae mentiri potest setam quae capitulum amittit; in caractere vero de hac re nihil notatum inueniet. In variis *Bryi* & *Mnii* speciebus, quarum character est, gerere capitula nutantia in setis incuruis, specimina reperire licet setis et capitulis rectis, quod iuniori aetate pro-

prium est. De insigni illa, et maxima varietate, quae proportionem, ratione magnitudinis, colorem, et illam, quae intercedit differentiam, inter siccam et humidam plantam respicit, exempla hic congerere dubito, quippe cuilibet, qui paucas tantum legit species harum plantarum, statim innotescet, quantam ista diuersitatem faciant, in toto habitu plantae. Ideo ad has sedulo attendi mutationes, plurimasque hac propter species, siccas aequae, ac irrigatas descripsi, saltem si mutatio exinde notabilis oriretur.

Tempus florescentiae, omnes fere plantas in summae perfectionis statu ostendit, hinc merito eligitur, ad verum plantae characterem determinandum, ex habitu illo, quo tunc gaudet. At, si plantam ex isto characterem, atque ita in eo statu, quo perfecte floret noscas, quae autem sit eius figura, ante aut post tempus florescentiae nescias, quomodo illam, si in prima aetate, aut senescens sese libere offerat, noscere, aut ab aliis similibus distinguere poteris? Plantae cryptogamicae, et imprimis rariores, multo maiore molestia colliguntur, ac plantae perfectiores. Ob paruitatem etenim suam oculos fugiunt, ideoque colliguntur statim, quando se nobis offerunt, et non facile exspectamus flores, siue perfectum illum statum, qui characterem describitur. Quod si vero talia habemus incompleta, siue floribus destitu-

destituta, an vt inutilia ex herbariis eiicies, quia distinctus deficit character specificus? sane dolendum esset. Colligenda sunt potius specimina in omni aetate, vt inde nobis innotescat planta in omni habitu suo, quem sub quauis ostendit conditione. Ne vero varia haec forma, in statu plantae minus perfecto, nos dubios reddat, quatenam sit ea species, praeter characterem specificum, qui summam exhibet perfectionis ideam, breuibus descripsi notabiliores cuiusuis speciei mutationes, quae pendunt vel ab aetate, vel loco natali, quotiescunque sic variant plantam, vt comparata cum characterem, insigniter ab eo differat. In quibusdam e. c. in *Iungermanniis* omnino conditio earum, quando floribus carent, amplius describenda mihi visa fuit, quia rarius tantum, et solummodo per breue tempus cum floribus inueniuntur, interim tamen per totum annum virentes: sique extra florescentiae tempus colliguntur, e characterem specifico auctorum, qui plerumque a floribus desumitur, cum certitudine distingui nequeant, si nullae aliae circumstantiae, quoad habitum caulis, foliorum &c. nobis notae sunt, e quibus differentia earum elucescat. Quod si forte etiam contingit plantam florentem inuenire, raro tamen in excursionibus botanicis, tempus et occasio est, eas rite examinandi, cum plerumque examen earum, microscopiorum vsum desideret; sique examen in tempus magis opportunum differ-

re velimus, summa fragilitas tenerrimorum filamentorum, et celerrima, quam exsiccatione patiuntur, mutatio, lecta specimina ad ulteriorem indagationem inepta reddit. Hinc eo magis necessarium duxi, notas, e caulis, foliorum, aliarumque partium conditione desumptas adiicere, quibus deficiente flore, cum quadam tamen certitudine species distingui possit.

Varietates, certis regionibus propriae, si praesertim copiosae ibi reperiuntur, nos facile in errorem inducunt, eas pro veris habere speciebus, quales tamen minime sunt; iste vero error, varietates speciebus adscribendi, cognitionem plantarum cryptogamicarum difficilem iam per se, adhuc difficiliorem reddit. Quae difficultas e contrario multum minuta est, quando Botanici, hanc fere innumeram earum multitudinem, in certum verarum specierum gregem reducerunt (*). Attamen et haec reductio nos magis dubios reddere valet, nisi sub speciei recensu, varietates maxime affines simul indicentur, adque suam speciem, e qua pronatae sunt referantur. Ideo non solum species, sed et notabiliores earundem varietates

(*) Sic e. c. III. LINNAEVS, vastam illam DC muscorum, a DILLENIO exacte descriptorum, ad multo minorem numerum reduxit verarum specierum, quod per plures, quas DILLENIVS pro speciebus descripsit, nil sint, nisi merae varietates.

tates indigenas, additis characteri synonymis auctorum, et breui descriptione recensui.

Quod selectum *Synonymorum* attinet, talia praecipue elegi, quae vel genuinum characterem indicant, (sic vt ex his propria pateat a reliquis speciebus differentia) vel talia, quae praeter nomen characteristicum, simul bonam figuram, vel hac deficiente, fusiores adiunctam habent plantae descriptionem. Haec pro scopo huius tractationis sufficere credidi; qui enim vltiorem quaerit *Synonymorum* recensum, DILLENII, aut III. HALLERI adeat scripta, quae hunc in finem ad quamvis speciem allegata reperiens. Cum noua editio operis *Halleriani, de Plantis helueticis*, non omnia synonyma comprehendat prioris editionis, nominaque et characteres valde immutata sint, neque prior in altera vbique allegatur, vnde comparatio harum editionum difficilis facta, in gratiam illorum, qui alterutram possident, laborem comparationis in me suscepi, et nomen prioris editionis, quae sub titulo *Haller, Enum. Helv.* allegatur, et sequentis editionis, sub titulo *Haller. Hist. Helv.* adieci (*).

Quae

(*) *Alberti Halleri Enumeratio methodica Stirpium Heluetiae indigenarum.* Gotting. 1742. Fol.

Alberti v. Haller Historia Stirpium indigenarum Heluetiae. Bernae 1768. Tom. I. II. III. Fol.

Quae ex plantis cryptogamicis nostris, officinas pharmacopoeorum ingrediuntur, harum nomina, vt vocantur *officinalia*, quoque addidi, cum breui recensu, et descriptione virium, quarum efficacia aduersus morbos innotuit; sic etiam illarum vsus adnotaui, quae rebus oeconomicis inferuire possunt.

Quoniam in Germania nunc in morem cessit, plantas indigenas, germanicis nominibus appellare, sequendo exemplum Anglorum, Gallorum, aliarumque gentium; in hisce plantulis cryptogamicis nostrae regionis, talia nomina germanica proponere conatus sum, quae breuibus verbis, genus speciemque, cum nota sua characteristica propria exprimant. Ab initio facillimum hoc mihi videbatur negotium, at re incoepta, tanta se mihi obtulerunt impedimenta, vt de successu pene desperarem. Interim non omnino frustraneum laborem esse credidi, nomina vernacula muscis, et reliquis plantis cryptogamicis imponere, quippe adhuc carentibus methodicis genuinis nominibus; praesertim cum ante oculos versetur exemplum *Cl. Schreberi*, qui indigenis graminum speciebus germanica dedit nomina, quae sic vt alia plura in scriptis oeconomicis iam divulgata, nunc pro notis assumuntur, et allegantur. Sunt quidem nomina germanica quibusdam, at paucis speciebus plantarum cryptogamicarum, quae vero haud commode adhiberi

beri possunt, quia contra omnem methodum, pluribus speciebus, immo adeo pluribus generibus communia sunt, vnde dubia euadit appellatio: oportet autem, vt sint talia, si ad vtilitatem respicias, quae praeter fixum genericum nomen, specifica gaudeant denominatione, qua plures species inter se distinguantur. Cum admodum difficile, quin plane impossibile mihi videretur, pro generibus Plantarum cryptogamicarum, et imprimis iis, quae recentiori tempore constructa sunt, *Byssi*, *Tremellae*, *Conseruae*, *Bryi*, *Hypni*, *Mnii*, *Lichenis* &c. talia genuina germanica nomina inuenire, quae quoad intellectum facilem, et vulgarem vsum, paria sint nominibus botanicis latinis, magis conueniens ratus sum, ista generica nomina in germanica lingua, eadem ratione ac Angli et Galli seruare, quam noua ac barbara nomina fingere, vel quod fere idem, dubias illas voces: *Stein-Moos*, *Erd-Moos*, *Baum-Moos*, et talia plura retinere, quae necessario maximam pariunt confusionem, quia non speciebus vnus generis, sed plurium, et quidem maxime a se diuersorum, communia sunt (*). Quod-

(*) Sic in *Reygeri Flora Gedanensi*, cuius prodiit germanica versio Gedan. 1768. in 8vo, nomina germanica muscorum, et plantarum cryptogamicarum valde dubia sunt; quia nomina generica: *Sumpfs-Moos* speciebus *Sphagni* et *Mnii*, *Wasser-Moos* *Conseruae* et *Fontinalis*, *Baum-Moos* *Bryi*, *Hypni*,

Quodsi vero bene electa illa, et nunc vbique vsu recepta, botanica generum latina nomina, pariter in nostram vernaculam linguam recipiantur, multo facilius esse mihi videtur, clara addere specifica nomina: e contrario vero, si nomen genericum vagum, aut ambiguum est, nulla valere poterit certitudo in speciebus. Sunt fortassis, qui me reprehendent, quod loco germanicorum nominum, mixta proposuerim et hybrida quasi nomina latino-germanica: quam non prorsus iniustam esse reprehensionem fateor. At, cum exiguae vires, meliora proponere impedian, his ipsis quibus mea non placebunt nomina, facile loco cedam, si meliora, ac vsui vulgari plus accommodata, distincta, et simul breuia dederint.

pni, *Lichenis*, et *Iungermanniae* communia sunt: hinc per talia nec species, nec genus certo definitur, sed eadem manet confusio, quae fuit antequam vasta illa copia Muscorum in genera fixa distingueretur.

PLANTAE CRYPTOGAMICAE FLORAE GOTTINGENSIS.

F V N G I.

Prolixa haec *fungorum* familia, ab omnibus Phytologis, vnanimi consensu, ciuibus regni vetetabilis associata hucusque, premi magnis dubiis nunc incipit: et qui institutis experimentis, accuratius in eorum generationis modum inquirunt summi Botanicorum, denegare illis *Florae* certant *ius ciuitatis*.

Iam ante aliquot annos, Vir in scientia Botanica consummatissimus, DAVID SIEGISMYND AVGVST BÜTTNER Profess. nuper Botanic. in Acad. Gotting. quem simul et Praeceptoris, et Fautoris nomine venerari debeo, dum Philosophiam

phiam doceret botanicam, *fungos inter producta artificialia* numerandos, et pro *domiciliis insectorum*, pari ratione ac Corallia, et Sertularias habendos esse, verosimile sibi videri, publice pronunciauit *.

Ean-

* Experimentis, quibus in hanc sententiam deductus fuit, me edocere haud dubitauit Praeceptor, permisitque vt illa publici iuris facerem: haec igitur sicuti ex ore eius accepi, hic recenseo: Anno 1756. mense Septembri, in viuario Berolinensi, collegit varias fungorum species, in eorum naturam atque indolem inquirendi gratia. Separatim fungos singulos, chartae coeruleae superinfratos, fenestrae conclauis exposuit, qui aliquo tempore elapso, omnes sensim resoluti difflexerunt, secedente ex iis puluere albo. Hunc reiecta tabe reliquiarum ex fungis, microscopio subiectum perlustrans, obseruauit constare innumeris globulis, instar ouulorum, minutissimis, pellucidis, leui strepitu dissilientibus a pressione digitorum, et subinde effluente ex his limpida materia. Globuli dicti, post aliquod tempus in puppas conuersi, breui post, innumeram excluderant muscarum progeniem: quas muscas, pro varietate fungorum, e quibus ortae fuerunt, diuersa quoque figura praeditas esse, obseruauit. Vltcrius hisce vero experimentis indagare, variis domesticis impeditus tunc fuit negotiis; nec prius quam anno 1760. cum Gottingae degeret, occasio sese obtulit, ista reiterandi. Collegit vero tunc temporis aliquando, copiam agaricorum campestrium, (*champignons*) quos asseruandi causa cistae immisit ligneae: inter hos iuniores quosdam dehiscere, et iterum vt ante obseruauit, puluerem effundere album, e quibus primo puppas, longitudine 3^{tae} partis vnus lineae, teretes, fuscas, et ex his denum, muscas longis et gracilibus alis insignes, prodire vidit. Exclusionem harum muscarum, melius successisse in umbra, quam sub solis calore obseruauit. Muscae istae, omnino a domesticis diueriae, tam cicures, et tenaciter in sua sede commorantes fuerunt,

Eandem, consentiente Ill. LINNAEO **, sententiam tuetur, Generosiss. Lib. Baro OTTO de MÜNCHHAUSEN, comprobata experimentis in fungis institutis, dum fungorum substantiam dehiscere vidit; in globulos animatos, qui collecti ad se iuicem in glomerulos, sensim

runt, vt Praeceptor has ipsas, auditorum, inter quos et ego fui, oculis subiicere potuerit, transportatas absque turbatione, in auditorium, e conclaui domus summo, a D. Sommer (tunc temporis commilitoni, nunc Professore in Lyceo Brunsvicensi) quem socium in obseruando hocce experimento Praeceptor elegerat.

Hac occasione, alius ab eo circa sic dicta *Semina fungorum* facti experimenti, mentionem facere licet. Anno 1751. globulos *Pezizae cyathiformis* fundo contentos, an semina vera sint inquirens, omni cum cura terrae mandauit, haud vero nouas exinde surgere vidit *Pezizas*. Addo etiam opinionem eius, de propagationis modo agaricorum campestrium, (*champignons*): putat nempe perfici hanc, noua constructione illorum, per animalia, tubulis illis, qui pro radicibus habentur vulgo, (et quibus ad hosce fungos propagandos vtuntur) latentibus, simili ratione, ac fit in Sertulariis, in quarum tubulis extremis, latent animalia, eas construentia.

** Videatur Dissertatio *mundum inuisibilem* breuiter delineatura. auctore Carol. Linnaeo p. 12. quae prodiit Holmiae 1767. vbi asserit „farinam in Lycoperdis, agaricis, et aliis fungis, immo ipsam mucoris farinam, „nihil aliud quam semina fungorum esse, sed semina „haec, tepidae per aliquot dies aquae commissa, veros „germinare in vermiculos. microscopiis perspicue visibiles, tandemque telam contexere exiguam, cui inhaereant immota, atque intumescant in fungos, quibus debeant originem,,.

sim in fungos abeunt: *** huic experimento simile quid obseruauit GE. WILK. Anglus ****.

Haec

*** Experimenta ista descripsit Vir Generosiss. in opere suo oeconomico: der Haus Vater, Tom II. p. 751. cuius verba ipsa hic proponere, haud iniucundum erit sollicitis naturae curiosis; quae imprimis leguntur §. 758. „Schwämme wenn sie alt werden, und insbesondere die „Lycoperda, auch aller Schimmel, streuen einen schwärzlichen Staub von sich: betrachten wir diesen unter guten Vergrößerungs-Gläsern, so finden wir halb durchsichtige, inwendig mit schwarzen Pünctgen angefüllte, und der Substanz eines vorbeschriebenen Polypen, nicht gar unähnliche Kügelgen. Ich habe von diesem Staube in Wasser gegeben, und solches in gelinder Wärme stehen lassen, da denn die Kügelgen allgemählich aufschwollen, und sich in eyrunde, bewegliche, Thiergen ähnliche Kugeln, verwandelten. Diese Thiergen, (wenigstens will sie wegen ihrer Aehnlichkeit so nennen) laufen im Wasser herum; wenn man weiter auf sie Acht giebt, so wird man des andern Tages schon wahrnehmen, daß sich Klumpen von einem härtern Gespinste zusammensetzen, und aus diesen entstehen, entweder Schimmel, oder Schwämme. Wo Schwämme wachsen wollen, zeigen sich erst weisse Adern, welche man zwar für deren Wurzeln zu halten pflegt, in der That aber nichts anders sind, als die Röhren, worinn sich die Polypen hin und her bewegen, welche bald darauf ein grosses Gebäude aufführen. Untersuchen wir die innwendige Substanz von Schwämmen, sonderlich vom aufgetrockneten, und zubereiteten Zunder, so zeigt sich, daß solcher blos aus einem feinen Gewebe, lauter kleiner, durch einander gewachener, und verbundener Röhrgen bestche, welche den Polypen, bey ihren Leben, zu ihren Gängen dienen.“ Plura de fungis occurrunt in citati libri Tom. II. p. 747. Tom. III. p. 203-214.

**** Iste mense Augusto, duos decepsit agaricos campestres, sub moderato tempestatis calore, et quidem tales

Haec obseruata virorum fide dignissimorum me

les quos vulgo innoxios esse putant, bene maturos et apertos. Detracta ex altero inferiori pellicula, hanc vitro immisit, et tantum aquae superinfudit, vt inde tegeretur. Elapsis aliquot minutis, aqua rubicundo tingebatur colore. Huius guttulam vitro exceptam, subiecit simplici microscopio Wilsoniano, et obseruauit hanc guttulam glomerulum esse globulorum agarici, vt vocantur seminalium, *Champignons Rörner*. Figurae erant globoso rotundae, coloris rubri, substantiae semipellucidae, et in quouis globulo nigra occurrebat macula. Altero die reiterauit hanc obseruationem, at in noua quam examini subiecit guttula, nihil apparuit mutationis. Itaque hanc pelliculam adhuc per duas noctes aqua seruauit. Tertio die, in hisce globulis animaduertit languidum quendam motum, qui sequenti die magis distinctus apparuit, et circularis. Concludit exinde, has paruas moleculas materiales, quas pro seminalibus habuit globulis, vera esse animalcula, et post 2 dies per lentem vidit aquam infinita animalculorum copia, ab imo ad summam superficiem repletam. Pellucida erant haec animalcula, et motitabantur instar ranularum, aut paruorum anguillarum, mirabili celeritate, quae hos globulos arripere, et cum impetu hinc et inde protrudere videbantur. Globuli isti vera fuerunt semina, sic dicta agaricorum, (*champignons Rörner*) quos cum accuratius obseruaret *Wilkius*, vidit plures horum congregari, et glomerulos formare, e quibus tenerae quaedam protrudebantur fibrillae, radices referentes. In hac ipsa aqua versus fundum detexit *Wilkius* aliam adhuc speciem animalculorum, prioribus maiorem, figurae ovalis, illis similium vermiculis, qui tempore aestiuo in aqua vi-suntur, in qua flores aut plantae seruatae fuerunt. Tempus anni impediuit plures obseruationes facere. Concludit *Wilkius* similitudinem fungis esse, cum Zoophytis et Coralliis. Legimus haec experimenta descripta in *Altonaer Mercurius* ann. 1768. 7. Stück *Hamburg. Correspondent*. 1768. N. 1.

me permouerut, vt *Fungos* quorum notae quaedam qualitates, longe ab iis, quae veris competunt vegetabilibus diuersae, iam satis dubios fecerunt vegetabilis regni socios, totos ex hac Enumeratione Plantarum cryptogamicarum excluderem.

Quae enim fungos vegetabilibus associauit similitudo, ratione modi crescendi, et externae figurae, dum quaedam eorum species, ex paruis fibrillis, radices externo conspectu referentes, peculiari trunco, adinstar arbusculae, ex terra eleuantur, exigui tantum ponderis praebet argumentum, ex quo concludamus, fungos esse vegetabilia: quod vero totum refutatur, cum fungis deficiat praecipua illa, ac omni vegetabili propria, et characteristica nota, fructificatio nempe et vera semina, quae tamen adesse omnino, et quidem si per analogiam concludere a multo exilioribus vegetabilibus licet, sat distincta oculis et insignis magnitudinis esse deberent, cum in minutissimis algis, filicibus, muscis, (ne dicam de perfectioribus plantis etiam minutissimis) quos centies et pluries adhuc mole superari a fungis videmus, nudis saepe oculis detegi possunt fructificationes, quae microscopiorum ope adhuc distinctius patent. In fungis vero nec analogon fructificationis detegere possumus *****.

Prae-

***** „Fungi, inquit *Ill. Linnæus*, in dissertat. cit.
p. 15.

Praeter haec in fungis obseruamus momenta quaedam, quae contraria sunt indoli vegetabilium. Celerrimum incrementum puto fungorum, quippe vna saepe nocte, ad miram magnitudinem peruenientium, et subitaneum eorum exitium, omnino abssimile a vegetabilibus. Vegetabilia vita annua gaudentes, peritura, vt ita dicam morte sua naturali, non prius (in loco suo natali patrio) destruuntur, quam postquam per semina, vel alio propagationis modo, per bulbos, aut radices, nouam sobolem terrae mandarunt, sequenti anno eadem vt priora gaudentem vita, et eodem etiam modo sese in tertium annum, et sic porro, propagantem.

Mors eorum naturalis, mera est exsiccatio, et reliquiae caulium foliorumue aridae, per aliquod tempus adhuc supermanent, donec iniuriis tempestatis euictae, dissoluuntur, et in terram mutantur. Contrarium obseruamus in fungis terrestribus; hi certo tempore anni quidem, si tempestas eorum generationi fauet, subito quasi proueniunt, (non tam pedetentim, vt vegetabilia ex parua mole ad magnitudinem iustam

p. 15. „certe a ceteris vegetabilibus multum differunt, „radicesque habent, vix hoc nomine dignas, cum tenue „tantum referant tomentum irregulare, quod paucillum „modo humiditatis e terra haurit humida. Nec folia „habent nec analogon fructificationis, vt musci et filices.,,

iustam crescunt) et si per breue tempus locum aliquem occuparunt, pereunt putredine, vel exsiccantur; nec per quandam fructificationis speciem, sobolem suam in alterum annum propagant, sed vltimo in putridam tabem diffiunt, et toti pereunt: obseruatum enim est vulgare plebeiorum et rusticorum hominum, qui Phallos esculentos (*Morcheln*) legunt, se sequenti anno, vel non, vel raro tantum in eodem loco inuenire nouos Phallos, in quo praecedenti anno permultos legerunt. Vegetabilia si essent, necessario in eodem loco altero anno prouenire iterum deberent, quod semper fit in vegetabilibus, nisi ea sit seminum conditio, vt a vento in alia magis remota loca ferri possint, aut radicalis destructio nouam eorum progerminationem impediat. At fungi, etiamsi omnes eorum reliquiae in tabem conuersae sint, etiamsi magna eorum copia sic in vno loco perierit, et terra omne eorum humidum absorbuerit, tamen saepe obseruaui, altero anno cum eodem mense inuestigare haec loca certo vestigio designata, ne vnicum renatum esse fungum, quamuis naturalis conditio loci, ratione humiditatis et vmbrae ne tantillum mutata fuerit. Huius facti rationem reddere impossibile mihi videtur, si fungos pro ciuibus vegetabilis regni habere velim, quippe hoc modo omnino a natura his propria degenerantes, quae tamen facilis erit comprehensu, si ponamus fungos ab animalibus fingi, quibus

quibus tantum non omnibus competit haec qualitas, sese ab vno in alium locum mouendi.

CLASSIS I. PLANTARVM CRYPTOGAMICARVM.

A L G A E.

ALGAE plantae sunt, veris staminibus, et petalis destitutae, solo tantum semine, (licet non semper oculis nudis conspicuo) et corpusculis donatae quibusdam, partibus fructificationis plantarum perfectiorum solummodo analogis.

Partes fructificationis Algarum, nobis adhuc (in plurimis saltem speciebus) valde ignotae, nihil aliud esse videntur, quam sola receptacula pollinis *, et farinae feminalis, siue se-

B 3 minis

* In generibus *Byssi*, *Conseruae*, *Tremellae*, *Vluac* talia distincta receptacula, siue flores, non conspiciuntur nudis oculis, quae patent in generibus *Lichenis*, *Iungermanniae*, *Marchantiae*, et pro varia sua externa figura quam referunt *Capsulae*, *Peltae*, *Orbiculi*, *Capitula*, *Tubercula*, *Scutellae* etc. a variis autoribus vocantur. Hic ipsis *Linnaeus* per analogiam a plantis perfectioribus desum-

minis ipsius. Receptacula pollinis, a LINNAEO, DILLENIO, et MICHELIO, *flores masculi*; receptacula seminum, *flores feminini* dicuntur.

Substantia est vel puluerulenta, vel lanuginosa, vel filamentosa, aut foliacea, aut gelatinosa, calorisque impatiens.

Radices habent vel scutiformes, aut filamentosas.

Caules in plerisque a foliis non sunt distincti *.

Vita gaudent perenni, et pleraequae earum diu iam exsiccatae, affusa aqua, speciem vitae iterum acquirunt.

Omni-

sumptam, nomina *Calycis*, *Corollae*, *Staminum* et *Anthërarum* tribuit.

* Caule foliis ad formam externam saltem distincto, praeditae sunt *Chara*, *Conserua*: et in genere *Iungermanniae* coniunctae occurrunt sub pari structura partium fructificationis, et species foliosae, et tales in quibus caulis cum foliis absque limitibus distinctis cohaeret. Ob folia distincta ad muscos referri possent *Iungermanniae*, sed dissimilis fructificatio id vetat; licet negare non possumus, per species istas *Iungermanniarum* foliosas satis aperte transitum fieri ex *Algis* in *Muscos*.

Omnibus quidem vigere solent anni temporibus, laetius tamen, et pleraeque earum circa decrecentem autumnum, per hiemem, et initium veris.

Praeter eas, quae ipsam incolunt aquam, pleraeque amant loca vda, vmbrosa; quae vero in aridis proueniunt locis, saxisque, ex humiditate aeris, vitae pabulum trahere videntur. Non autem in sola terra, aut saxi tanquam proprio loco natali crescere contentae sunt, sed quaedam etiam parasitico more, aliis adhaerent plantis.

De virtute medica, generatim certi aliquid determinari vix potest, priusquam per plura experimenta, de principiis actiuis earum, plenius edoceamur. Paucae sane sunt species, quae in vsum medicum hucusque trahi consueuerunt; istae vero manifestis gaudent virtutibus deobstruente, purgante, anthelmintica, simulque mucilaginosae, pectorali, etiam roborante per leuem adstrictionem *.

B 4

Quod

* Ista virtutum varia, et sibi non omnino respondens efficacia singularum specierum, a diuersitate pendet structurae partium, et consistentiae, pro qua vnum vel alterum horum principiorum actiuorum, in vna vel altera specie, prae aliis praevalet.

Quod vsum oeconomicum attinet, inter alias vtilitates, variis coloribus pannos harum ope tingendi, insignis censendus est.

BYSSVS. LINN. Gen. n. 1208. DILLEN. Musc. p. 1. HALLER. En. Helv. p. 4. MICHEL. Gen. p. 210. SCOPOL. Flor. Carn. p. 69. HALTER. Hist. Helv. T. III. p. 105. LEPRAE. HALL. l. c. p. 102.

Corpus infimae vegetationis, lanuginosum aut puluerulentum, fibris simplicibus enodis constans, cuius superficiem innumerae fructificationes occupant.

Genus est nondum satis accurate determinatum, et in iis quae illud constituunt speciebus, adhuc sollicite Botanicis inquirendum foret, annon illae potius sint individua vegetabilium non amplius viuientia: vt detritae aut putredine resolutae partes plantarum? annon pulvis lichenum? primordia fungorum? lapidum detritus aut terrarum pulvis?

✻ *Filamentosae.*

BYSSVS *velutina.*

Byssus filamentosa viridis. Linn. Sp. Pl. p. 1638. n. 3. Scopol. Flor. Carn. p. 71. n. 7. Necker. delic. Gallobelg. p. 529. n. 1, †

B. vi-

† Nouissima haec Flora, quam saepe in nostra tractatione allegatam reperies, sequentem habet titulum;

B. viridis filamentis ramosis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 205. n. 2101.*

B. tenerrima viridis velutum referens. *Dillen. musc. p. 7. Tab. I. f. 14.*

B. terrestris viridis herbacea et molissima, filamentis ramosis, et non ramosis. *Michel. Gen. p. 211. n. 7. Tab. 89. f. 5. Hall.-En. Helv. p. 4. n. 1.*

Grüner Seiden Byssus.

H. copiose in terra vda, et opacos humidus ligneos parietes et muros prope terram inuestit.

Filamentis tenuissimis, (at oculis nudis tamen distinguendis) viridibus, splendentibus. pannum holosericum quodammodo refert. A *Byssobotryoide*, cui alias similis est, colore differt saturatius viridi, et structura filamentosa.

BYSSVS aurea.

Byssus capillacea puluerulenta, fructificationibus sparsis,

B 5

filamen-

titulum: *Natalis Iosephi de Necker, Deliciae Gallobelgicae, sylvestres, seu Tractatus generalis plantarum gallo-belgicarum, --- cum animadversionibus, secundum principia Linnaeana. Argentorat. ap. Iac. Francisc. le Roux. 1748. T. I-II. 8uo.* Ob succinctas descriptiones, et optimas accuratasque observationes, *Scopolianis* similes, cuius speciei adiunctas, vtilissimus hic tractatus Botanicis se commendat.

filamentis simplicibus ramosisque, *Linn. Sp. Pl. p. 1638. n. 4.*

B. puluinata crocea, Hall. Hist. Helv. l. c. n. 2106.

B. minima saxatilis aurea, inodora, filamentis partim simplicibus, partim ramosis. Michel. Gen. p. 210. n. 4. Tab. 89. f. 2. Hall. En. Helv. p. 4 n. 4.

B. aureus Derbientis humifusus. Rai. angl. ed. III. p. 56. n. 6.

Safrangelber Faden Byssus.

H. in saxis, v. g. circa Waake

β. Byssus arborea crocea fibrosa. Dill. musc. p. 9. Tab. 1. f. 17.

H. in arboribus putrescentibus.

Distinguitur ista species colore in recenti croco simili, filamentis puluere croceo tam dense conspersis, ut tota quasi ex lanugine aurea constare videatur. Differunt hae duae varietates constantia coloris in posteriori immutabili, in priori per siccitatem canescente, deinde longioribus et brevioribus filamentis, ac loco natali.

❁❁ Puluerulentae.

BYSSVS antiquitatis.

Byssus puluerulenta atra. Linn. Sp. Pl. p. 1638. n. 6.

B. petraea nigerrima fibrosa. Dill. musc. p. 9. Tab. 1. f. 18. Hall. En. Helv. p. 4. n. 3.

B. nigra velutina Hall. Hist. Helv l. c. n. 2104.

Schwarz

Schwarzer Sammet Byffus.

H. ad saxa grandiora et muros antiquos, copiose ad rupes circa Waake.

Filamentis constat tenuibus, pulvere aterrimo vndique conspersis, sic, vt nigrum sericeum pannum illum, quem schwarzen Sammet vocamus, referant. In saxis humidis mollior est tactu, in siccis, durior, magis tenax, et non tam distincte lanuginosa obseruatur.

BYSSVS candelaris.

Byffus puluerulenta flaua, lignis adnascens. *Linn. Sp. Pl. p. 1639. Dill. musc. p. 3. Tab. 1. f. 4, Hall. En. Helv. p. 5. n. 6.*

Lichen crustaceus arboribus adnascens, tenuissimus, puluerulentus, pallide luteus seu ochroleucus. *Michel. Gen. p. 100. n. 70.*

Lichen crusta tenuissima flaua. *Hall. Hist. T. III. p. 104. n. 2096.*

Schwefelgelber körniger Byffus.

H. copiose ad arborum truncos et parietes.

Dignoscitur colore eleganter pallide flauo, aut sulfureo, substantia puluerulenta in rimas et cryptas corticis arborum inspersa, tactu dura et friabili.

BYSSVS botryoides.

Byffus puluerulenta viridis. *Linn. Sp. Pl. p. 1639. n. 10. Necker. delic. Gallobelg. p. 530. n. 2.*

B. botryoides, saturate virens. *Dill. musc. p. 3. Tab. 1. f. 5.*

Lichen crustaceus, verrucosus, viridis. *Hall. Hist. Helv. l. c. n. 2089.*

Grüner körniger Byssus.

Copiose inuenitur in viis sylvarum vdis opacis, et ad latera fossularum, ad parietes quoque septentrioni obuersos, ac tecta vetusta.

Cognoscitur substantia sua puluerulenta viridi in glomerulos aggregatos ad se inuicem collecta, magnitudine seminis tabaci. Saepe *byssō velutina* intermixta reperitur, a qua tamen differt pallidiore colore et structura globulari. In muris, aut parietibus humidis, vnum super alterum accrescit stratum huius byssi, ad crassitiem aliquot linearum, deinde sensim in informem abit purpuream gelatinosam massam, hinc et inde nigro fuscis maculis intermixtam, concretioni fungosae haud absimilem. Hic est vltimus status huius byssi moribundi, ablui enim tunc pluuia solet, et in eius locum noua iterum accrescit.

BYSSVS *incana.*

Byssus puluerulenta incana, farinae instar strata. *Linn. Sp. Pl. p. 1639. n. 11. Dill. musc. p. 3. Tab. 1. f. 3. Scopol. Flor. Carn. p. 69. n. 1.*

Lichen farinaceus mollis albicans, glebis difformibus. *Hall. Hist. Helv. l. c. n. 2094.*

Grauer Mehl Byssus.

H. ad cortices arborum et ad terram.

Sub-

Substantia est puluerulenta, in siccitate albescens, si vero aqua irrigatur, vel recens e terra humida colligitur, e glauco incana. Aliquando parcius terrae instrata, distinctos format paruos globulos, seminis milii magnitudine, qui exsiccati duri fiunt, et non facile leui tactu friabiles.

BYSSVS *lactea*.

Byssus puluerulento-crustacea albissima. *Linn. Sp. Pl. p. 1693. n. 12.*

B. candidissima calcis instar muscos vestiens. *Dill. musc. p. 2. Tab. 1. f. 2.*

Lichen farinaceus mollis albus, glebulis sphaericis. *Hall. Hist. Helv. l. c. n. 2093.*

Weisser Kalck Byssus.

In corticibus ad arborum radices musco obsitas inuenitur copiose.

Constat tenuissimo albissimo puluere, ligna vel alia corpora sic tegente, vt quasi calce dealbata appareant. Leui tactu friabilis est.

BYSSVS *saxatilis*.

Byssus puluerulenta cinerea rupes operiens. *Linn. Sp. Pl. p. 1638. n. 7. Scopol. Flor. Carn. p. 70. n. 3.*

Schwarzgrauer Stein Byssus.

H. in faxis ubique.

Nudis, et tempestatum iniuriis expositis faxis tenaciter adhaerens, pro tegmine inseruit.

BYSSVS aeruginosa.

Byssus lanuginosa aeruginosa. *Dill. musc. p. 4. Tab. I. f. 7.*

Lichen crusta viridissima. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 104. n. 2097.*

Grünspan Byssus.

Ad putrescentes truncos caeduos salicis copiose legi.

Colore elegantissime viridi, aerugini simili, dignosci potest. Constat ex tenuissima crusta, tam arcte adhaerente ut nisi lentis ope minutissimum pulverem distinguere possimus. In meis speciminibus frusta lignea in totum colore viridi imbuta reperi, et in cryptis fibrarum copiosius collecta byssus, glomerulos formavit, exilissimis filamentis puluerulentis, amoene viridibus, constantes.

BYSSVS cellaris.

Byssus niuea filamentosa simplicissima. *Necker delic. Gallobelg. p. 532. n. 10.*

B. longissima tenerrima niuea. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 106. n. 2108.*

B. euanida floccosa niuea. *Dill. musc. p. 5. Tab. I. f. 9.*

Weisser Spinnweben Byssus.

H. in cellis, et ad vasa lignea in humidis locis.

Tenerrima, filis telae araneae similibus, coloris niuei, latos tractus inuestit parietum in cellis. Fila vnciam et ultra longa, simplicia, aggregata sunt, hinc et inde expansa. Leuissimo tactu facillime destruitur,
hinc

hinc fere solummodo in ipso loco natali obseruanda, acgre enim in chartas recipi, hisque seruari se sinit.

Quae ad hoc genus relata est:

Byssus (*Flos aquae*) filamentis plumosis natantibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1637. n. 1.* Byssus latissima, papyri instar super aquam expansa. *Dillen. musc. p. 2. n. 1.*

non pertinet ad viuas plantas, ideoque nec ad hoc genus. Collecta enim est materia e particulis putredine destructarum plantarum aquaticarum, ob leuitatem summam aquae petentibus superficiem.

CONFERVA. LINN. Gen. n. 1207 DILL.
Musc. p. 11. HALLER. Enum. Helv. p. 1.
Hist. Helv. T. III. p. 106, SCOPOL. Flor.
Carn. p. 72.

Corpus herbaceum, e fibris cauliculisue capillaribus, simplicibus, vel in plura filamenta diuisis constans, fructificationis partibus, siue capsulis foecundis (per lentem solummodo conspicuis) instructum innumeris, in puncta gelatinosa collectis, et per totam substantiam inordinate, dispersis.

Semina tam exigua sunt, vt ne per microscopium, diametrum ad summam augens magnitudi-

tudinem, oculis conspici queant; apparent solae tantum capsulae pellucidae.

Quaedam Conferuae fila habent vniformia, siue vacuo continuo canali praedita, quaedam vero habent fila geniculata, siue canali donata, qui per lentem valuulis interruptus esse videtur. Sunt autem istae valuulae, nil nisi merae intersectiones canalis, factae ab aere, per interstitia locorum aqua repletorum illapso, qui hanc aquae columnam, cauum totum alias replente dirimit, pari ratione vt fit in barometro, si forte aer tubum intrauit †. Loca aere distendente plena, ampliora sunt illis, quae aquam continent. Omnes aquam incolunt.

✱ *Filamentis simplicibus aequalibus, geniculis destitutis.*

CONFERVA *riuularis*.

Conferua filamentis simplicissimis aequalibus longissimis.

Linn. Sp. Pl. p. 1633. n. 1. Scop. Flor. Carn. p. 73. n.

2. Hall. Hist. Helv. l. c. n. 2115.

C. flu-

† Hinc explicari potest phaenomenon illud, ad quod ruricolae sedulo attendunt, quod nempe pluuia diuturna imminente, Conferuae per siccam tempestatem fundum paludum occupantes, nunc summae superficiei aquae innatent, et iterum tunc demum dispareant, quam primum tempestas in sicciozem mutari incipit.

C. fluuiatilis sericea, vulgaris et fluitans. Dill. musc. p.

12. Tab. 2. f. 1.

C. filis longissimis et simplicissimis. Hall. En. Helv. p.

2. n. 6.

Conserua Plinii. Rai. angl. ed. III. p. 58. n. 1.

lange Bach Conserve. Wasserschlamm. Wasserschwamm.

H. in riuiulis lentius fluentibus, etiam in stagnis, in Leina fluuiio copiosa.

Cognoscitur filis cubitum et vltra longis, indiuisis, tenuissimis, amoene viridibus, splendentibus, sericeis. Longitudo filorum pendet a loco natali, longiora in riuiulis, breuiora in stagnis reperiuntur. Virtus ei a veteribus tributa est, ossa fracta conglutinandi, si ipsis imponantur, quotiesque inarescerent cespites, iterum aqua irrorentur. vid. *Plin. Hist. nat. L. 27. C. 9. Dill. et Hall. En. Helv. l. c.*

CONFERVA fontinalis.

Conserua filamentis simplicissimis aequalibus, digito breuioribus. Linn. Sp. Pl. p. 1633. n. 2.

C. minima byssi facie. Dill. musc. p. 14. Tab. 2. f. 3.

C. filis breuissimis non ramosis. Hall. En. Helv. p. 3. n. 9.

C. cespitosa, filis rectis vndique diuergentibus. Hall. Hist. Helv. l. c. n. 2114.

Byssus aquatica tenuissima atrouirens, pellem murinam referens, breuissimis et simplicibus filamentis. Michel. Gen. p. 211. n. 15. Tab. 89. f. II. (quae exprimit

*statum iuniorem). Tab. 89. f. 8. et 10. adultiorem vè
praesentat, hinc synonyma l. c. n. 8. et 14. huc refe-
renda.*

pelzige Brunen Conserve.

*H. in fontibus limpidis, circa oras canalium aquas
ducentium, et scaturigines. v. g. vor dem Albaner
Thore, wo aus den Röhren das Wasser in dem Teich
fällt.*

Filamentis simplicibus vncialibus, et minoribus con-
stat, tenaciter limo adhaerentibus, per texturam quan-
dam membranaceam pellucidam, in siccitate, si collu-
vies limosa elota est, fragilem, qua ipsa textura pel-
lem murinam quodammodo refert. In fontibus limpi-
dis, et statu recenti, pluribus circa vnum centrum gle-
bae collectis filamentis, strata efficit semicircularia varia,
quae sibi incumbunt, et figuram agarici quasi referunt;
fungosa quoque ad tactum substantia praedita sunt ista
strata, ex resorbta multa aqua, quae filamenta dense
coaceruata distendit. Margo horum stratorum semicir-
cularium atro virens est, filamenta vero vbi circa cen-
trum conuergunt, lutescunt.

*** *Filamentis ramosis aequalibus.*

CONFERVA *bullosa.*

Conferua filamentis aequalibus ramosis, bullas aereas
includens. *Linn. Sp. Pl. p. 1634. n. 3. Necker. delic.
Gallobelg. p. 528. n. 2.*

C. palustris bombycina, Dill. musc. p. 18. Tab. 3. f. II.

C. filis

C. filis ramosis frequentissime radicatis. *Hall. En. Helv.*

p. 2. n. 5.

C. filis tenerrimis, vellere bombycino. *Hall. Hist. Helv.*

l. c. n. 2120.

Schäumige Conserve.

H. in fossis et lacubus copiose.

Dignoscitur tenuissimis ramosissimis filamentis, variae longitudinis, nunc saturanter viridibus, nunc (imprimis in aetate iuniore) lutescentibus, ramulis varie implicatis, imprimis si aquae superficiei innatat, ex calore radiorum solis, aer irrepens intra tenuissima filamenta, seque expandens, bullas eleuat.

Dillenius refert, hanc speciem praebere stupam tene-ram leuem mappas gossypinas aemulantem, quae iisdem inferuiat vsibus, vestimentis nempe domesticis farciendis. In Thuringia, cum quondam fluuius *Vnstrut* inundauit latum agrorum tractum, recedente intra ripas aqua, conferuae istius maxima copia relictæ, ab incolis collectæ et siccata fuit, ac pro vestimentis farciendis abhibita; qui autem in saeuos inde inciderunt dolores articulares.

CONFERVA *canalicularis.*

Conferua filamentis aequalibus basin versus ramosioribus, *Linn. Sp. Pl. p. 1634. n. 4.*

C. riuulorum capillacea densissime congestis ramulis, *Dill. musc. p. 21. Tab. 4. f. 15.*

C. filamentis fuscis tenuibus ramosis intricatis. *Hall. Hist. Helv. l. c. n. 2118.*

Röhren Conserve.

H. in riuiulis, et canalibus aquam vehentibus.

Constat ex filis, tres quatuorue uncias, et ultra longis, inferne ramosioribus, ramis sic implicatis, ut hinc et inde ad se inuicem adglutinati, membranam constituent tenacem, lapidibus aut lateribus canalium adhaerentibus. Extremitates filorum minus ramosae, sed magis expansae. Color sature viridis. Luci si obuertitur pellucida apparet. Exsiccata radiis solis induratur, alias mollisprehenditur, et flexilis.

CONFERVA *amphibia*.

Conferua filamentis aequalibus ramosis, exsiccatione coeuntibus in aculeos. *Linn. Sp. Pl. p. 1634. n. 5.*

C. amphibia fibrillosa et spongiosa. Dill. musc. p. 22. Tab. 4. f. 17.

Schwamm Conserve.

H. in fossis, et locis vdis ubique.

Constat multis, arcte sibi implicatis teneris, rigidis fibrillis, in lata et crassa strata expansis, contextis in formam spongiae aquam imbibentibus. Superficies superior reticulata apparet, fibrillis undique ad varios angulos sibi superinstratis, et implexis. Color obscure viridis. In siccitate rigida, immo aculeata apparet, sub madefactione flaccescit, et in maius volumen sese expandit. Odor prae aliis mucidus ingratus.

*** *Filamentis anastomosantibus.*

CONFERVA *reticulata*.

Con-

Conferua filamentis reticulatim coadunatis. Linn. Sp. Pl. p. 1635. n. 11.

C. reticulata. Dill. musc. p. 20. Tab. 4. f. 14. Hall. Hist. Helv. l. c. n. 2119.

C. reticulata crispa. Moris. Hist. Ox. III. p. 644. Sect. XV. Tab. 4. f. 4.

C. filis simplicibus, intricatis, ramosis. Hall. En. Helv. p. 3. n. 7.

Nes Conserve.

*H. in aquis stagnantibus et riuulis quibus innatat;
im Graben bey dem Weibergram.*

Facile ab aliis distinguitur, filamentis suis anastomosantibus, in rete alicuius formam ad varios angulos implicatis, vel potius adnatis. Superficie aquae plerumque innatat, aliquando etiam plantis aquaticis adhaeret. Areolae 5 et 6 angulares plerumque sunt. Substantia tenerrima, cum aliqua tamen firmitudine. Color viridis etiam in siccitate, serici instar splendens.

*** *Filamentis geniculatis.*

CONFERVA glomerata.

Conferua filamentis geniculatis ramulis breuioribus multifidis. Linn. Sp. Pl. p. 1637. n. 19.

C. fontinalis ramosissima glomeratim congesta. Dill. musc. p. 28. Tab. 5. f. 31. Hall. En. Helv. p. 3. n. 8.

C. viridis capillacea, breuioribus setis ramosioribus, siue

Conferua minor ramosa. Moris. Hist. Oxon. III. p. 644. Sect. XV. Tab. 4. f. 2.

Büschel Conserve.

H. in fossis rituulisque purioribus, im Graben wo das Wasser aus dem Reinhartsbrunnen abfließt.

Varia ludit figura; dignosci tamen potest cauliculis ad longitudinem semipedalem usque extensis, et in innumeros ramulos minores alternos diuisis, quae ultimo desinunt in paruorum filamentorum capillaceorum corymbos, penicillis similes, late extensos. Inferne, flabelli ad instar, cauliculi magis ad se inuicem coadunati, superius sentim latius se explicant. Et cauliculi et ultimi capillarium filamentorum fines geniculati apparent, imprimis si per lentem aspiciuntur, valvulisque distinctos referunt canales, quorum caua ex aere illapso in distincta pellucida interstitia dirimuntur. Colore gaudet nunc ad luteum vergente, nunc obscurius viridi. Variat praeter diuersam longitudinem, cauliculis magis vel minus ramosis, densioribus laxioribusque, et horum extremis corymbis capillaceis breuioribus aut longioribus. Quodsi extremitates in longiores fibrillas desinunt, optime refert illam *Dillenii* speciem quae audit:

β. *Conferua fluuiatilis trichodes, extremitatibus ramosis. Dillen. musc. p. 27. Tab. 5. f. 28.*

paulloque maior propius adhuc accedit *figurae 29. eiusdem tabulae.*

VLVA. LINN. Gen. n. 1206. HALL. Hist.

Helv. T. III. p. 109. TREMELLA. DILLEN.

Musc.

Musc. p. 41. *LINKIA*. HALL. En. Helv. p. 62.

Genus est admodum *Conseruae* affine, differt tantum cauliculis, cauo instructis ampliori. Constat enim canali cylindraceo, sicuti *Conserua*, et solus maior in *Vlua* diameter ipsam distinguit; cui adde caules non tam ramosos, ut in priori. Caeterum gaudet quoque radice scutiformi, et fructificationes in lineis hinc et inde per totam substantiam dispersas gerit.

Sub huius generis nomine, solae tantum comprehendendi debent species tubulosae, aliae vero foliaceae structurae separandae; qua in re Ill. Hallerum assentientem habeo. vid. Hist. Helv. T. III. p. 109.

VLVA intestinalis.

Vlua tubulosa simplex. Linn. Sp. Pl. p. 1632. n. 1. Necker. delic. Gallobelg. p. 524. n. 1.

V. tubis cylindricis tuberosis. Hall. Hist. l. c. n. 2128.

V. marina tubulosa, intestinorum figuram referens. Rai. angl. ed. III. p. 62. n. 4.

Tremella marina tubulosa intestinorum figura. Dill. musc. p. 42. Tab. 9. f. 7.

Linkia palustris intestini forma tubulosa. Hall. En. Helv. p. 62. n. 3.

Darm Ulve.

H. in fossis et aquis stagnantibus. v. g. im Schützenteich copiose.

E membranis constat tubulosis, variae amplitudinis canales constituentibus, quorum cauum alternatim aere et aqua repletum est, vnde sinuatam figuram, ex sinubus siue cellulis protuberantibus, aere scilicet elastico distensis, faciemque instar intestini coli acquirit. Varia ludit longitudine, et nunc simplex nunc ramosa, et in gyros conuoluta, summae innatat aquae. Post aliquod tempus elapsum, vbi ad longitudinem vlnarem circiter, crassitiemque pollicarem peruenit, lapidibus in aquae fundo adhaerens obseruatur. Colore in iuniori aetate gaudet ex albicante aut lutescente viridi, postea laetius viret. In statu recenti quoque flaccida marcescens, in siccitate vero admodum fragilis est, et colorem habet album aut cinereum.

TREMELLA. LINN. Gen. n. 1204. DILLEN. Musc. p. 41. SCOPOL. Flor. Carn. p. 114. VLVA. LINN. Gen. 1206. LINKIA. HALL. En. Helv. p. 62.

Genus *Conseruae* et *Vluae* maxime affine, quippe sola figura externa distinguendis. Substantia vniformis gelatinosa, aut membranacea, pellucida, figurae ab initio semper globosae, deinde postquam vesiculae ab aere disruptae sunt, aut ad aetatem adultiorem peruenit, foliaceae.

TREMELLA *globosa*.

Tremella sphaerica, vesiculis aggregatis.

T. palustris, vesiculis sphaericis fungiformibus. Dill. musc. p. 55. Tab. 10. f. 17.

Vlua

Vlva (granulata) sphaerica aggregata. *Linn. Sp. Pl. p. 1633. n. 10.*

Rugel Tremelle.

H. ad aggeres terrae humidior in sylvis et ad ripas fluuiorum. v. g. an der alten Leine, auf dem Walle.

Constat multis vesiculis rotundis, ad pisi usque magnitudinem peruenientibus, aqua distentis, sordide e luteo et fusco virescentibus, confertim, veris imprimis initio, in dictis locis nascentibus.

TREMELLA *Noftoc.*

Tremella plicata undulata. Linn. Sp. Pl. p. 1625. n. 2.

Necker. delic. Gallobelg. p. 522. n. 2.

T. *terrestris sinuosa pinguis et fugax. Dill. musc. p. 52.*

Tab. 10. f. 14.

Linkia terrestris gelatinosa membranacea vulgatissima.

Michel. Gen. p. 126. Tab. 67. f. 1. Hall. En. Helv. p.

62. n. 1

Noftoc Tremelle.

H. in pratis, locisque vetustorum murorum gramineis muscosis, post pluuiam imprimis, vere et aestate.

Substantiam habet membranaceam, gelatinosam, variae admodum figurae, rotundae vel angularis, aut aliquando in intestini formam undulatam conuolutam, coloris e luteo sordide virescentis, tactu si recens mollis, siccata fragilis, et tunc coloris nigricantis. Licet saepe

et accurate hanc plantarum perferutatus sum, nunquam tamen deprehendere potui ne vestigium scutellorum, ideo melius illam generi *Tremellae* associari mihi videtur, quam *Lichenibus gelatinosis*, licet Ill. Hallero aliter visum fuerit. vid. ei. *Hist. Helv. Tom. III. p. 96. n. 2041.* nisi forte *fungis* accensenda sit? quod magis vero simile mihi videtur.

Anodynam et vulnerariam ei tribuit *Geoffroy* virtutem. Laudatur aqua eius post trium dierum macerationem destillata, contra dolores articulares. *Hall. En. Helv. l. c.* item in pulveris forma ad aliquot grana exhibitus; porro interne et externe in affectibus cancris, fistulisque et ulceribus. *Dillen. l. c.*

* *Species ex hocce genere excludendae.*

TREMELLA (*Auricula*) membranacea auriformis cinerea. *Linn. Sp. Pl. p. 1625. n. 3.*

H. ad truncos putridos Sambuci aliarumque arborum.

Haec ad fungos merito reducenda est.

TREMELLA (*purpurea*) sessilis solitaria glabra. *Linn. Sp. Pl. p. 1626. n. 7.*

H. in corticibus arborum moribundis.

Initium est agarici cuiusdam.

Porro ab isto genere separandae et ad Lichenes gelatinosos reducendae sunt illae plantulae, quae gelatinosa substantia praeditae sunt quidem, attamen veras praeferrunt scutellas.

CHARA, LINN. Gen. n. 1203. HALL. En. Helv. p. 196. Hist. Helv. To. III. p. 3.
 CONFERVAE NODOSAE. LINN. Sp. Pl. p. 1635. HALL En. Helv. p. 2. Hist. Helv. T. III. p. 108. DILLEN. Musc. p. 36.

Genus est Conferuae vario respectu affine, sequentibus vero notis ab illa diuersum:

Fructificationes, quae constant ex baccis, siue receptaculis globosis sessilibus, et colore praeditis a reliqua plantae substantia diuerso, collectae sunt in peculiare ramulos verticilli in modum caulem cingentes. (In Conferua fructificationes per totam substantiam dispersae.)

Ramuli globulis foecundis ornati, semper ex vno centro circa caulem, quem ambiunt dispositi, in formam foliolorum, nunc magis, nunc minus distinctorum, et vel patulorum, vel in glomerulos, siue nodos articulatos complicatorum. (qui ramuli in Conferuis sine ordine sparsi.)

Substantia Charae, imprimis in iuniori aetate, tota est gelatinosae indolis: hinc ratio petenda, vnde fiat, quod tam facile incrustetur materia arenosa, vel tophacea, et progressu temporis petrefacta quasi reperiatur, perque siccitatem tam fragilis euadat.

Quos

Quos varii Botanici pro charactere assumerunt *flores calyce, anthera, et stigmatibus tribus* instructos, non cuius datum est videre. *Hallerus* haec omnia se non vidisse fatetur in *En. Helv. l. c.* nec ego tales flores detegere potui. Alium itaque proposui characterem, facilius oculo patentibus notis constructum.

❁ *Frondibus siue ramulis foliaceis patulis.*

CHARA *vulgaris.*

Chara caule herbaceo rigido, ramulis foliaceis patulis.

C. caulibus laeuius frondibus interne dentatis. *Linn.*

Sp. Pl. p. 1624. n. 2.

C. vulgaris foetida. *Hall. En. Helv. p. 196. n. 1.*

C. caule laeui fragili. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 4. n. 1681.*

gemeine stinkende Chare.

H. copiose in stagnis lacubus et fossis. v. g. im Schützengraben, in stagno circa Ischinckhausen.

Cauliculis gaudet valde ramosis, in iuniori flexilibus, in adultiori aetate rigidioribus, materia tophacea arenosa aspersis, vnde inter dentes masticata strepit. Fragilissima sunt leuissimo tactu in siccitate. Circa aestatem fecunda est baccis oblongis, per maturitatem luteis, in quibus semina minima atra. Odor valde nauseosus et instar allii, aut cicutae graueolens, hinc venenata putatur.

❁❁ *Frondibus circa caulem complicatis in nodos vel articulos.*

CHIA.

CHARA *batrachosperma*.

Chara caule ramoso filamentoso; ramis foliaceis capillaceis, in glomeres lubricos geniculatos articulati circa caulem dispositis.

Conferua (*gelatinosa*) filis ramosis moniliformibus, articulis globosis gelatinosis. *Linn. Sp. Pl. p. 1635. n. 13.*

Conferua gelatinosa, globulis punctatis concatenatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 108. n. 2124.*

Conferua fontana nodosa, spermatis ranarum instar lubrica, maior et fusca. *Dill. musc. p. 36. Tab. 7. f. 42. Hall. En. Helv. p. 2. n. 3. cum varietatibus. Dill. musc. p. 37. et 38. Tab. 7. f. 45. 46.*

Groschlaichs Chare.

H. ad scaturigines, et in fontibus aut riuis purissimis. v. g. im Reinhartsbrunnen, im Wehnder Papiermühlen Wasser copiose. passim in puteis profundissimis reperi.

Quae externo habitu, et loco natali quodammodo refert Conferuam, minime ad hoc genus pertinet, si accuratori examini microscopico subiicitur, tunc enim, quod primum obseruauit b. *Buttnerus*, genuinis *Charae* characteristicis notis insignita reperitur. Has itaque fusiore descriptione, et subiuncta figura, quam ad viuum pingere et aere incidere curauit optimus Praceptor, mihiq; communicauit, hic plenius illustrabo.

Praecipuus eius character consistit in bacculis luteis, quae ad ramulos, caules verticilli in modum ambientes, affixae conspiciuntur per microscopium, et in quibus, si diameter earum per lentem ad summam magnitudinem augetur, semina apparent fusca, sub minimorum punctorum figura, eodem plane modo, ut visuntur in specie praecedenti. Hoc respectu itaque omnino diuersa est a *Conseruis*, in quibus fructificationes in punctis solummodo gelatinosis, et per totam substantiam sparsis latent.

Caeterum radice gaudet scutiformi, qua lapidibus, aut aliis corporibus sub aqua adhaeret.

Caules fistulosi sunt, et pellucidi, maxime flexiles, quos ambiunt ramuli tenuissimi capillacei, per lentem solummodo conspiciui, ramosis extremitatibus terminati, quibus uti ante dictum est, adhaerent bacculae. Isti ramuli, si nudo oculo aspicitur planta, articulos referunt globosos, atris punctis distinctos, quibus articulis faciem obtinet, similem monilibus illis, quae ex globulis succini ad filum suspensis confecta, gerere solent plebeiae feminae. Facillima haec est externa eius nota, qua ab omnibus et *Charae* et *Conseruae* speciebus distingui poterit.

Quo adultior est, eo plures laterales emittit furculos ramorum, inferne cum caule aequalis crassitie, circa extremitates vero obtuso apice terminatos.

Tota

Tota planta substantiae est gelatinosae, cum firmitate tamen pro ratione teneritudinis satis insigni; hinc magna eius pendet lubricitas, qua, si digitis illam auellere cupimus e loco suo natali, veloci motu per interslitia digitorum aufugit, pari modo ac sperma ranarum.

Colore ludit lutescente, viridi, rubro, coeruleo, nigro, quo scilicet pingitur pro aetate et loco natali diuerso; hinc natae, quas Dillenius perperam pro speciebus diuersis habuit, citatae varietates. Magnitudine quoque ab vnciali ad 2, et vltra variat.

Vigere solet, et fructificationes proferre, media aestate.

Limpidissimas solummodo incolit aquas, hinc forte ex eius praesentia, ad aquae puritatem, valeret conclusio.

Icon *Fig. 1.* exhibet Plantam naturali magnitudine pictam.

A. natua magnitudo ramuli, figura 2. per microscopium aucti.

Fig. 2. repraesentat ramulum *fig. 1.* litera A. notatum.

aaaa. ramulos capillaceos aliquot, quibus adhaerent

bbbb. capsulae luteae.

LICHEN. LINN. Gen. n. 1202. HALL.
 En. Helv. p. 63. Hist. Helv. T. III. p. 70.
 MICHEL. Gen. p. 73. SCOPOL. Flor. Carn.
 p. 73. LICHENOIDES. DILLEN. Musc. p.
 124. CORALLOIDES. p. 75. VSNEA. p.
 56.

Corpus vegetabile, farinaceae, crustaceae, foliaceae, aut filamentosae substantiae, terrae, saxi, vegetabilibus, aliisue adhaerens corporibus. Partes fructificationis continet receptaculis varia praeditis figura; sunt enim vel globosa, vel subrotunda, margine nullo aut eleuato praedita, vel plana: hinc etiam diuersis insignita sunt nominibus, vocantur enim: *Tubercula*, *orbiculi*, *acetabula*, *scutellae*, *pel-
 zae*, *capitula* &c. Radice gaudent Lichenes vel scutiformi, vel filamentosa. Vita eorum perennis est, et substantia eorum exsiccata in aqua iterum reuiuiscit.

Maximas patiuntur Lichenes a loco natali mutationes, variumque obtinent pro aetate diuersa figuram, inde factum est, quod vna eademque species, propter multiplicem aspectum, quem ostendit in iuniori adultiorue aetate, aut in diuerso loco natali, pro tot veris habeatur speciebus, et describatur, cum tamen sint merae varietates.

* *Lichenes tuberculati*. Linn. Sp. Pl. p. 1606.
Lichenoidum Dill. musc. Ord. I. Ser. I. p. 128.
 Liche-

Lichenes crustacei. Michx. Gen. Ord. XXXIII.
p. 96. Hall. En. Helv. Ord. V. p. 82. Scopol. Flor.
Carn. Ord. II. p. 75. Herpetes. Hall. Hist. Helv.
Ord. IX. T. III. p. 97.

Hoc nomine veniunt illae Lichenum species, quae crusta constant inorganice expansa, in aliis aspera, rimosa, in aliis magis laevi, corporibusque quibus innascuntur, tenacius fere omnibus reliquis adhaerescete. Fructificationes gerunt in receptaculis minus distinctis: constant enim haec receptacula, quae *Tubercula* audiunt, expunctis granulosis, paululum supra reliquam crustam eleuatis, figurae non admodum regularis, vt plurimum vero globosae, paululumque in superficie superiori compressae: margine vero carent distincto, quo gaudent receptacula *Lichenum scutellatorum*.

LICHEN *scriptus*.

Lichen leprosus albicans, lineolis nigris ramosis, characteriformibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1606. n. 1. Necker. delic. Gallobelg. p. 500. n. 1.*

L. de rimis efflorescens, bialuis, ater, characteristicus. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 101. n. 2079.

L. crustaceus, tuberculis sessilibus in lineas ordinatis. Scopol. Flor. Carn. p. 77. n. 9.

L. crustaceus, tartaricus, corticibus arborum adnascens, cinereus, receptaculis florum sub cute erumpentibus,

nigricantibus, transuerse oblongis, varie diuargatis.

Michel. Gen. p. 102. n. 9. 10. 11. Tab. 56. f. 3. Hall. En.

Helv. p. 87. n. 147.

Lichenoides crusta tenuissima peregrinis velut litteris inscripta. *Dill. musc. p. 125. Tab. 18. f. 1.*

Schrift Lichen.

H. in truncis arborum, et imprimis ad cortices fagorum, carpinorum, quercuum.

Crusta tenuissima, quae nunc albicans, nunc ad fuluum colorem vergens, arborum obducit cortices. Multis fissuris angulosis hinc et inde distincta est crusta, quae lineas formant inaequales nigras, litteris Sinensium ut *Hallerus* vocat similes. Multum variat ratione coloris crustae, et linearum situ ad varios angulos.

LICHEN *geographicus.*

Lichen leprosus flauescens, lineolis nigris mappam referentibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1607. n. 2. Necker. delie. Gallobelg. p. 500. n. 2.*

L. crusta inseparabili flaua, scutellis nigris confluentibus. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 99. n. 2063.*

L. crustaceus saxatilis, luteus, receptaculis Florum nigris. *Hall. En. Helv. p. 84. n. 123. Michel. Gen. Tab. 54. f. 7.*

Lichenoides nigro-flauum, tabulae geographicae instar pictum. *Dill. musc. p. 126. Tab. 18. f. 5.*

Icon Oederi Tab. 468. f. 1.

gelber Landcharten Lichen.

H. àd saxa vetusta, et rupes grandiores: copiose legi in ruderibus templi antiqui, in sylua inter Adelpsen et Schoningen, die Hegerkirche dicti, ad lapides.

Crusta est late expansa, lapidibus arctissime inhaerens, diuisa in parua quadrata aut rhomboidea segmenta, lineis marginantibus nigris varie intersecta, quae fluuios quasi, aut fines territorii mappae geographicae repraesentant.

Multis punctis atris, planis, variae magnitudinis siue tuberculis potius irregularibus obsita sunt segmenta illa flaua crustae, cuius color tamen magis elucet prae punctis nigris, sic vt e longinquo lapides solo colore flauo obducti appareant. Sensim vero in lapidibus diu tempestati expositis mutatur iste flauus color in albidiorum, post fuscum, ultimo nigrum. Intersectionum quadratarum vestigia quidem remanent, sed sub hacce differentia: tubercula quae in vegeti aetate vnum quasi planum constituerant, magis eleuata, et e contrario intersectiones depressae videntur. Porro tubercula marginem acquirunt, quo prius destituta erant, et in medio depressa videntur. In vetustissimis et moribundis quasi speciminibus autem, intersectiones ultimo oblitterantur et lapides creberrimis solummodo obfuscantur punctis atris. Quodsi vero fusca ista superficies cultro scalpitur, tunc hinc et inde emicant vestigia obsoleti flauo coloris.

LICHEN *fusco-ater.*

Lichen leprosus fuscus tuberculis atris. *Linn. Sp. Pl.*

P. 1607. n. 5.

L. tuberculis nudis sessilibus atris. Scopol. Flor. Carn. p. 80. n. 14. var. β.

L. crusta farinacea inseparabili, cinerea, scutis nigeriis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 99. n. 2062.

L. crustaceus nigerrimus, receptaculis florum concoloribus, seminibus sature cinereis. Hall. En. Helv. p. 85. n. 124.

Schwarzer Krusten Lichen.

H. ad rupes et saxa, quae late obducit maculis nigris: inuenitur quoque in lapidibus in fundo riuulorum limpidiorum iacentibus.

Ex meris atris irregularibus tuberculis, nunc sparsis, nunc magis coadunatis constat, crusta tenuissima atro fusca in extremis solummodo apparet marginibus.

LICHEN calcarius.

Lichen leprosus candidus tuberculis atris. Linn. Sp. Pl. p. 1607. n. 6.

Lichenoides tartareum tinctorium candidum, tuberculis atris. Dill. musc. p. 128. Tab. 18. f. 8.

Weinstein Lichen.

H. in rupibus, in lapicidinis calcareis, v. g. auf dem Heinberge; in rupibus circa Waake.

Crusta est in siccitate dura, rimosa alba, aut e cinereo glauca, imprimis sub madefactione, vbi non adeo dura, sed flexilior e rupibus, quibus alias arcte adhaeret, abradi se finit. Maculis latissimis aliquando rupes inue-

inuestit, immo ad latitudinem aliquot vlnarum vno quasi tegmine eas tegit. Substantia tartaro vini admodum similis, et nunc vnā, nunc ad tres lineas crassa reperitur. Superficies eius rimosa est, aliquando laevis, aliquando eminentiis puluerulentis, sub madefactione glaucis distincta. In aetate adultiori, tubercula atravariae magnitudinis passim enasci observantur, quae a magnitudine seminis milii, quam aequant a primo initio, ad lentis latitudinem increscunt. Per vetustatem, et in iis locis imprimis, vbi pluuiæ valde exposita est crusta, a rupibus secedit in frusta lacera, et decedit. Colore rubro, scarlatino simili tingendo vsurpari dicitur, et quidem hac ratione, vti *Dillenius* l. c. refert: „Siccatus et puluerisatus, per 3 septimanas in vrina vase clauso contenta maceratur, deinde cum rebus tingendis coquitur. Optimus et maturus putatur, si collectus est mense Augusto, et quidem luna decrescente,„

LICHEN *rugosus*.

Lichen leprosus albicans, lineolis simplicibus punctisque nigris confertis. *Linn. Sp. Pl. p. 1607. n. 3. Necker. delic. Gallobelg. p. 501. n. 3.*

Lichenoides punctatum nigrum et rugosum. *Dill. musc. p. 125. Tab. 18. f. 2.*

schwarze rungllicher Lichen.

H. ad cortices arborum imprimis ad fagos et quercus iuniores,

Crustam habet tenuissimam, albicantem, nigris maculis, variae latitudinis distinctam; quae maculae constant ex innumeris parvis tuberculis nigris, in lineas transuersas, varie sinuatas dispositis, arcteque ad se invicem

nicem approximatis, vnde tota crusta rugosam obtinet faciem. Aliquando imprimis in corticibus quercuum, carpinorum, fagorumue, lineae non tam confertae sunt, sed tubercula confluent in lineas sinuosas, indeterminato ordine decurrentes, quae crustam subuirescentem in varias areolas distinguunt, marginibus nigris, similibus confiniis mappae geographicae: in hisce areolis multa sparsa conspiciuntur tubercula atra.

Sub ista forma illam forte exprimit speciem, quae Cl. *Scopoli* audit:

β. Lichen crustaceus subuirescens margine sinuato nigro, tuberculis glabris sessilibus, conuexis atris: *Scopol. Flor. Carn. p. 80. n. 13.*

LICHEN *carpineus*.

Lichen leprosus cinereus, tuberculis albidis rugosis.

Linn. Sp. Pl. p. 1608. n. 11. Necker. delic. Gallobelg. p. 501. n. 5.

L. geographicus, *Linn. It. Scan. p. 48.*

weißer Landcharten Lichen.

H. ad cortices carpinorum copiosissime.

Maculas efformat in corticibus carpinorum, (aliquando etiam fagorum) e cinereo albidas, variae latitudinis, quae si per lentem aspiciuntur, e tuberculis albis proxime sibi appositis constant. Aliquando maiora, et magis a se inuicem remota tubercula e crusta exsurgunt,

Vt plurimum, saltem in omnibus meis, quae legi in carpinorum cortice speciminibus, simul adsunt nigrae quaedam lineae, ad extremas margines macularum albarum

barum huius lichenis, quae hasce maculas confiniis quasi distinguunt; quae lineae nigrae oriuntur a *Lichene rugoso*, et imprimis ab illa, a nobis paullo ante memorata, et a Cl. *Scopoli* descripta varietate (*Flor. Carn. p. 80. n. 13.*) Ex hac commixtione duorum lichenum, oritur in carpiorum corticibus pictura quaedam, mappae geographicae similis, dum in maculis albis, provincias referentibus *Lichenis carpinei*, lineae nigrae *Lichenis rugosi*, fluuios aut terminos fingunt. An forte exinde *Linnaei* *Synonymon Lichenis geographici*?

LICHEN fagineus.

Lichen leprosus albus, tuberculis albis farinaceis. *Linnaeus*
Sp. Pl. p. 1608. n. 10. Necker. delic. Gallobelg. p. 502. n. 6.

L. crustaceus albus tuberculis sessilibus farinaceis. *Scopoli. Flor. Carn. p. 79. n. 11. a.*

L. crustaceus, arboribus adnascens, farinaceus albus, superficie in acetabulis puluerulentis velut efflorescente. *Michel. Gen. p. 99. n. 54. Tab. 53. f. 1. Hall. En. Helv. p. 88. n. 150. cum Synonymis.*

L. verrucosus crustaceus, albus, orbiculis villosis concoloribus. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 102. n. 2086.*

Lichenoides candidum et farinaceum scutellis fere planis. *Dill. musc. p. 131. Tab. 18. f. 11.*

weisser warziger Krusten Lichen.

H. ad arborum praecipue fagorum cortices.

Crusta constat aspera, albicante, e qua paullulum prominent tubercula alba, figurae non admodum regulari

laris, oualis, angulatae, superne plana, nulloque margine distincta, pulvere si per lentem aspiciuntur, farinaceo conspersae, instar tenerrimorum flocculorum. Per vetustatem color albus in fuscum mutatur.

LICHEN *ericetorum*.

Lichen leprosus candidus, tuberculis incarnatis. *Linn.*

Sp. Pl. p. 1608. n. 12. Necker. delic. Gallobelg. p. 502. n. 7.

L. crusta tenace verrucosa albida, fungis carnatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 97. n. 2042.*

L. crustaceus terrestris, crusta granulosa, ex albo subcinerea, receptaculis florum rotundis carneis, pediculo insidentibus. *Michel. Gen. p. 100. n. 1. Tab. 59. Hall. En. Helv. p. 82. n. 107.*

L. crustaceus albicans tuberculis stipitatis carneis. *Sco-pol. Flor. Carn. p. 76. n. 8. var. a.*

Coralloides fungiforme carneum basi leprosa. *Dill. musc. p. 76. Tab. 14. f. 1.*

Fungilli incarnati coloris, musco insidentes. *Mentzel. Morison. Hist. Oxon. III. Sect. XV. p. 641. §. 7. n. 2.*

Icon Oederi *Flor. Dan. Tab. 472. f. 4.*

fleischfarbiger Schwamm Lichen.

H. ad terram, truncos putridos arborum, et super muscos,

Crustalate sparsa, granulosa, fragili, coloris albescentis, cinerei, aut virescentis, instrata vel terrae, vel muscis, vel putridis

putridis frustis lignorum, quae granulis innumeris, (sub madefactione e glauco virescentibus) late incrustat. Ex hac crusta exsurgunt passim tubercula variae magnitudinis, figurae e plano conuexae, irregulariter conicae, fungillis similis; substantiae carnosae. Color tuberculorum in iuniori aetate, laete carneus est, senescente vero, ad fuscum aut ferrugineum tendit, et tunc refert illam, quam pro diuersa specie habuerunt auctores varietatem, cuius synonyma sequentia sunt:

β. Lichen crustaceus cinereo-viridis tuberculis stipitatis fuscis. *Scopol. Flor. Carn. p. 76. n. 8. variet. b.*

Lichen crusta tenace verrucosa fungis fuscis. *Hall. Hist. Helv. l. c. n. 2043.*

L. crustaceus, terrestris, crusta granulosa, ex albo subcinerea, receptaculis florum rotundis, fuscis, pediculo insidentibus. *Michel. Gen. p. 100. n. 2. Hall. En. Helv. p. 82. n. 108.*

Coralloides fungiforme fuscum basi foliacea *Dill. musc. p. 77. Tab. 14. f. 2.*

H. in iisdem locis: reperi ad arborum radices in sylua inter Camerborn et Nienouer.

Varietas prioris in adultiori aetate. Specimina mea non foliaceae sed crustaceae sunt structurae.

❖❖ *Leprosi scutellati.* *Linn. Sp. Pl. p. 1608. Lichenes crustacei. Michel. Gen. Ord. XXXIV. p. 96. Hall. En. Helv. Ord. V. p. 82. Scopol. Flor. Carn. Ord. II. p. 81. Psorae Hall. Hist. Helv. T. III.*

Ord. VII. p. 93. *Lichenoidum* Dill. musc.
Ord. I. Ser. II. p. 128.

His crusta quoque est granulosa, quae vero magis iam est organica, et quodammodo ad structuram accedit foliaceam. Differunt autem maxime in hoc a *leprosis tuberculatis* quod receptacula eorum figuram magis regularem habeant rotundam aut ovalem, marginemque distinctum crenatum, disco medio paullatim depresso aut excavato: ex similitudine quam sub hac forma referunt cum scutis antiquorum militum ista receptacula dicta sunt *Scutellae* a variis auctoribus. Vocantur vero etiam *acetabula*, et *orbiculi*. Crusta eorum praecedentibus *tuberculatis* minus tenaciter adhaeret.

LICHEN *candelarius*.

Lichen crustaceus flavus, scutellis luteis. Linn. Sp. Pl.
p. 1608. n. 13.

L. (*fulvus*) crustaceus flavus, scutellis fulvis, Necker.
delic. Gallobelg. p. 502. n. 8.

L. fronde laciniata rotunde lobata, flava concolore.
Hall. Hist. Helv. l. c. n. 2023.

L. crustaceus saxatilis crusta tenuiore lutea, receptaculis florum saturo aureis. Michel. Gen. p. 97. n. 28.

Lichenoides crustosum orbiculis et scutellis flavis. Dill.
musc. p. 136. Tab. 18. f. 18.

gelber Mauer lichen. Mauerkrähe.

H. ad parietes et muros copiose, imprimis in colatere quod septentrionem spectat, turresque aliquando crusta flaua inuestit ad insignem altitudinem: inuenitur etiam passim ad antiquos arborum truncos.

In prima aetate hic lichen e puluere flauo constat, qui sensim sensimque magis in crustam tenuem flauam se colligit, crassior fit, et late se expandit. Crescente aetate exinde proueniunt scutellae rotundae, flauae, margine distincto praeditae, quarum numerus pedetentim augetur, sic vt totam occupent crustam. Quo magis vero scutellae ad se inuicem appropinquant, eo magis in ambitu se premunt; hinc margo earum distinctus antea obliteratur, et nunc lichen iste crustam refert, ex meris tuberculis coagmentatis, angulatis, irregularibusque compositam.

Color qui primo eleganter flauus fuit, ad croceum tendit, vltimo rubiginosus et fuscus fit. In vetustis muris ex pluribus stratis constat, vbi semper inferiori emortuae crustae, noua iterum super inducta reperitur, vnde crassities eius ad aliquot lineas accedit.

LICHEN *pallefcens.*

Lichen crustaceus albicans scutellis pallidis. *Linn. Sp.*

Pl. p. 15. n. 1608. Necker. delic. Gallobelg p. 503. n. 9.

L. fronde laciniata appressa, ceruina concolore. Hall.

Hist. Helv. l. c. n. 2024.

Lichenoides crustosum orbiculare incanum. *Dill. musc.*

p. 135. Tab. 18. f. 17.

grauer Schild Lichen.

H. in corticibus arborum.

Specimina mea e cortice fagi lecta, constant e crusta valde irregulari, quae irregularis expansio orta est ex fissuris corticis. Colorem habet cinereum, hinc et inde vero albidior, qualis proprius esse videtur aetati iuniori. Crustam ad palmarem longitudinem expansam, permultae obsident scutellae, tam arcte sibi appressae, ut margo earum crenatus, ceteroquin rotundus hinc et inde compressus et angulatus factus sit. Discus scutellarum plurimarum cinereus est, aliarum quae iuniores esse videntur albissimus, aliorum vero paullulum fuscus et ad rufescentem vergens colorem. Margo scutellarum omnium valde crenatus, immo quasi revolutus videtur, et si per lentem conspicitur, albissimo colore distinctus. Scutellae ipsae perlentem visae, elevatae admodum, pedunculo insidere videntur, quod tamen reuera non est. Valde affinis esse videtur sequenti speciei, et forte eius varietas in aetate iuniori, differt enim colore disci pallidiore.

LICHEN *subfuscus*.

Lichen crustaceus albicans scutellis subfuscis, margine cinereo subcrenato. *Linn. Sp. Pl. p. 1609. n. 16. Scop. pol. Flor. Carn. p. 82. n. 16. var. e. Necker. delic. Gallobelg. p. 503. n. 10.*

L. crusta tenace, verrucosa, cinerea, scutellis rufis, marginatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 98. n. 2049.*

L. crustaceus arboribus adnascens, ex cinereo albicans receptaculis florum crebris subfuscis, limbo albo crenato cinctis. *Hall. En. Helv. p. 83. n. III.*

Lichenoides crustaceum et leprosum scutellis subfuscis. *Dill. musc. p. 124. Tab. 13. f. 16.*

brauner Schilb Lichen.

H. ad arborum truncos et virgulta.

Crusta constat e cinereo albicante rugosa, e qua surgunt parua ab initio et rotunda tubercula, in quorum medio punctum apparet fuscum; illa sese colligunt versus centrum, maiora fiunt, et formam obtinent scutellarum, dum limbum acquirunt crenatum, disco medio plano, fusco, qui per lentem carnosus videtur. Scutellae quae centrum crustae occupant, maiores et ampliores sunt, et circum haec in tota peripheria, multae minores, tuberculorum forma exsurgunt. Margo scutellorum sicut in praecedente specie, albus est, et crenatus. Discus vario ludit colore, virescente, ferrugineo, rufo et atro, quem diuersum colorem a iuniore aut adultiore aetate pendere puto. Sequentes ideo huc refero varietates:

α Lichen subfuscus ater.

Lichen (*nigricans*) crustaceus albicans: scutellis atris, margine cinereo laevi. *Necker. delic. Gallobelg. p. 504. n. II.*

Lichen crustaceus saxatilis et arboreus verrucosus, cinereus, receptaculis florum nigricantibus. *Hall. En. Helv. p. 83. n. 12.*

L. crustaceus verrucosus albicans, scutellis atris sessilibus planis, margine albo. *Scop. Flor. Carn. p. 82. n. 16. var. f.*

Lichenoides crustaceum et leprosum scutellis nigricantibus maioribus et minoribus. *Dill. musc. p. 133. Tab. 18. f. 15.*

Schwar.

Schwarzer Schild Lichen.

H. copiosissime ad saxa, etiam ad truncos arborum et virgulta.

Differt a precedenti, scutellis depressis, in medio tumidioribus, colone disci atro immutabili, in siccitate aequae ac irrigatione.

Margo scutellarum albus elucens. Superficies disci, si aqua humectatur, per lentem floccosa quasi apparet, et atrore suo pannum refert sericenum atrum (schwarzen Sammet).

β. Lichen subfuscus rufus.

Lichen crustaceus verrucosus candidus scutellis rubris.

Hall. En. Helv. p. 83. n. 110.

Lichenoides tartareum lividum scutellis rufis margine exili. *Dill. musc. p. 133. Tab. 18. f. 14.*

röthlicher Schild Lichen.

H. ad lapides et arborum truncos.

Colore scutellarum rufo, primum quidem differt; qui vero sub adultiori aetate mutatus in fuscum, et ultimo nigrum.

γ. Lichen subfuscus luteus.

Lichen crustaceus albus, scutellis subluteis sessilibus planis, margine albo. *Scop. Flor. Carn. p. 81. n. 16.*

var. c.

Lichenoides crustaceum et leprosum, acetabulis maioribus luteis, limbis argenteis. *Dill. musc. p. 132.*

Tab.

Tab. 18. f. 13. confer. Hall. En. Helv. p. 83. n.

III.

gelblicher Schild Lichen.

H. ad saxa et arborum truncos.

Scutellae reliquis plerumque maiores, coloris lutei. Per aetatem fuscae fiunt.

*** Gelatinosi. *Lichenes gelatinosi.* Nostoc. Hall. Hist. Helv. T. III. Ord. VIII. p. 94. *Lichenes foliacei gelatinosi.* Scop. Flor. Carn. Ord. IV. Subdiv. 2. p. 111. *Lichenoidum* Dillen. Musc. Ord. II. Ser. I. p. 137. *Tremellae quaedam species.* Linn. Sp. Pl. p. 1625.

His structura est foliacea, substantia in statu recenti, pinguis, gelatinosa, subpellucens, tremula, in ariditate membranacea, friabilis. Folia plerumque laciniata, coloris obscure viridis, fusci vel atrii. Vigent plerumque decrescente autumno, hieme et sub tempestate pluviosa. *Tremellis* admodum affines sunt substantia sua, et externo habitu: a quibus autem omnino seperandi sunt, ob fructificationem diuersam, gerunt enim hi *Lichenes gelatinosi* suas fructificationes in veris distinctis tuberculis aut scutellis, colore a reliqua substantia diuersis, quas proferre solent circa finem Octobris et per hiemem. Figura admodum variat. Substantia plerorumque post

post diuturnam exsiccationem, difficilior reliquis irrigatione aquae reuiuiscit. Nascuntur vt plurimum in locis aridis saxosis, ad terram.

LICHEN *Tremelloides*.

Lichen foliaceus gelatinosus foliorum segmentis capillaceis. *Scop. Flor. Carn. p. 113. n. 59.*

L. atro coeruleus laciniatus et ciliatus. *Hall. Flist. Helv. T. III. p. 95. n. 2032.*

L. terrestris membranaceus mollior fuscus. *Hall. En. Helv. p. 80. n. 90. Michel. Gen. p. 76. Tab. 38.*

Lichenoides pellucidum endiuiae foliis tenuibus crispis. *Dill. musc. p. 143. Tab. 19. f. 31.*

Tremella (*Lichenoides*) frondibus erectis planis margine crispo lacinulato. *Linn. Sp. Pl. p. 1625. n. 4.*

Frausblätteriger fetter Lichen.

H. ad terram, et saxa, muscisque inter textus.

In statu recenti folia subpellucida, atrouirentia, eleganter minutissime laciniata habet, marginibus fimbriatis, vnde lanuginosi apparent quos oblidet muscorum caespites. Saepissime occurrit sine scutellis, aliquoties tamen eum florentem reperi circa finem Octobris ad saxa. Tunc inter lacinias foliorum, hinc et inde, crassae, rotundae, puniceae emergunt scutellae, seminis milii magnitudine, et margines laciniarum extremi, puluere candidissimo, in glomerulos collecto, aspersi erant. Ob illas scutellas eum a *Tremella* seiunxi. Varia admodum ludit figura, pro varia et aetatis et loci natalis indole: hinc optime Ill. *Fallerus* sequentes

tes (quas pro speciebus habuit *Dillenius*) varietates huic vnicae speciei associavit:

β. *Foliis tenuius dinisis.*

Lichenoides tenuissimum crispum et velut aculeatum.

Dill. musc. p. 146. Tab. 19. f. 35.

γ. *Foliolis subrectis et stipatis.*

Lichenoides tenerum crispum foliis exiguis subrectis.

Dill. musc. p. 146. Tab. 19. f. 34.

δ. *Foliis obtusioribus et latioribus.*

Lichenoides pellucidum endiviae folio sinuoso. *Dill.*

musc. p. 145. Tab. 19. f. 32.

**** *Imbricati. Linn. Sp. Pl. p. 1609. Lichenes foliacei. Scopol. Flor. Carn. Ord. IV. p. 106. Lichenes pulmonarii. Michel. Gen. Ord. XXII. p. 90 Hall. En. Helv. Ord. IV. p. 75. Hall. Hist. Helv. T. III. Ord. VI. p. 87.*

Hi loco crustae ex qua constant *Lichenes scutellati*, structura gaudent magis organica et foliacea, componuntur enim e plurimis parvis foliolis, in figuram orbicularem vt plurimum dispositis, quorum vnum alterius semper originem tegit, extremitates vero exstant in modum regularum tecti. In plurimis minora medium occupant centrum, maiora vero foliola versus peripheriam extenduntur. Fructificationes gerunt in distinctis receptacu-

lis, *Scutellae* siue *Peltae* dictis, quae sunt eminentiae conicae depressae, superne margine circulari circumscriptae, et in medio disco paullulum excavatae, puluere seminali referatae: haec MICHELIUS *flores* appellat *femineos*. In iis quibus deficiunt scutellae, in extremitate foliolorum glomeruli, vel tubercula adfunt farinosa exigua, quae MICHELIO *flores mares* audiunt. Pleraeque species vigent et florent per totum annum, habitantque ad saxa et arborum truncos.

LICHEN *centrifugus*.

Lichen imbricatus foliolis multifidis, obsolete laevibus albidis centrifugis, scutellis rufo-fuscis. *Linn. Sp. Pl. p. 169. n. 18.*

L. fronde profunde laciniata, semipinnata, rotunde lobata, crasse villosa, scutellis peramplis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 91. n. 2018.*

Lichenoides imbricatum viridans, scutellis badiis. *Dill. musc. p. 180. Tab. 24. f. 75.*

grünlicher concentrischer Schuppen lichen.

H. ad lapides et saxa copiose circa Neuhaus ad rium.

Ex parvis rugosis foliis, circa medium centrum dense aggregatis constat, sub quibus sensim sensimque maiora sese expandunt, figuramque orbicularem formant, quae gradatim latiora, longioraque, extremitatibus eleganter laciniatis praedita sunt. Color superne e luteo

luteo virens, inferne niger. Scutellas profert circa medium centrum conspiciatas, variae magnitudinis, in diametro vnus ad tres lineas latas, planas, puniceas, aspectu carnosas, margine luteo virescente, et quasi farinoso. Saxi arctissime adhaeret, et nonnisi pluuia probe madefactus, absque dilaceratione cultro auellere se finit.

LICHEN *laciniatus* *α. saxatilis*.

Lichen (*saxatilis*) imbricatus, foliolis sinuatis, scabris, lacunosis, scutellis folio concoloribus. *Linn. Sp. Pl.* p. 1609. n. 19. *Necker. delic. Gallobelg.* p. 504. n. 12.

L. foliaceus repens reticulato lacunofus: inferne villosus ater, scutellis rubris. *Scop. Flor. Carn.* p. 104. n. 37.

Lichen opere phrygio ornatus. *Vaillant. Bot. Paris.* Tab. 21. f. 1. *sine mentione in opere ipso.*

Lichenoides vulgatissimum cinereo-glaucum, lacunosum et cirrhosum. *Dill. musc.* p. 188. Tab. 24. f. 83.

ausgeschweifester Stein: Schuppen: Lichen.

H. ad saxa copiose musco instratus, circa Waake imprimis.

Constat ex multis foliolis laxè sibi incumbentibus, lacunosis, admodum fragilibus in siccitate, planis, in tenues lacinias dissectis, superne puluerulentis cinereis, siquæ aqua irrorantur subglaucis, inferne nigricantibus subuillofis, versus extremitates paullulum crispis et inferne incuruatis siue reuolutis. Color pro aetate diuer-

sa admodum variat, nunc enim albidus est splendens nunc cinereus, nunc ad miniatum vergens, nunc e fusco sordide nigricans. Superficies superior multis obrita est tuberculis farinosis. Scutellae rarius occurrunt desiderantur quoque in meis specimenibus.

Purpureo colore lana eo tingi potest, inde nomen *Lichenis tinctorii*. Linn. It. Scan. p. 409.

β. Lichen laciniatus, arboreus.

Lichen subviridis, fronde semipinnata, rotunde lobata, lineis puluerulentis reticulata, inferne scabra, carbonaria. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 90. n. 2011.

L. pulmonarius, foliis eleganter diuisis, inferne nigrimis et cirrhosis, superne lacunatis e glauco cinereis, receptaculis florum fusco virentibus. Michel. Gen. p. 90. Ord. XXII. Tab. 49 f. 1. Hall. En. Helv. p. 77. n. 76. (confer. n. 73. 74. 75.)

Musco-fungus Lichenoides minor, cinereus, vulgarissimus. Moris. Hist. Ox. III. p. 634. n. 6. Sect. XV. Tab. 7. f. 6.

ausgeschweiffter Baum-Schuppen-Lichen.

H. in truncis arborum copiosissime, praesertim ad fagos.

Differt foliis planioribus, latioribus, minus profunde laciniatis, et minus crispis. Color vt plurimum e glauco albidus, aliquando et imprimis si saepe pluuia aut aqua irroratur, ruber apparet, et quasi rubiginosus. Scutellas profert magnas, amplas, (lentem circiter aequantes) coloris e fusco ad rufum tendentis, margine intro-

intro reuoluto cinereo. Laxe arboribus adhaeret. Colore violaceo hunc licheneim tingere scribit *Hallerus* l. c. In quibusdam speciminibus, apices quorundam foliorum inflatas reperi, quam notam alias *Licheni physode* *Linn.* solo adscriptam video.

γ. *Lichen laciniatus*, *physodes*.

Lichen (*physodes*) imbricatus: laciniis obtusis inflatis.

Linn. Sp. Pl. p. 1614. n. 26. Necker. delic. Gallobelg.

p. 510. n. 23.

L. fronde cinerea, profundius diuisa, laciniata, obtuse lobata, scutellis nigricantibus. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 92. n. 2017.*

L. fronde profunde laciniata, caua, cornibus puluerulentis. *Hall. l. c. n. 2018.*

L. pulmonarius arboribus adnascens: desuper cinereus, subtus anthracinus: segmentis teretibus tubulosis, ad extremitates clausis receptaculis florum subrubentibus. *Michel. Gen. p. 92. Ord. XXV. n. 1. Tab. 50. f. 1.* ad extremitates hiantibus, et veluti cristatis, receptaculis florum rubeis. *l. c. n. 2. Tab. 50. f. 2. Hall. En. Helv. p. 78, n. 79. 80.*

Lichenoides ceratophyllum obtusius et minus ramosum.

Dill. musc. p. 154. Tab. 20. f. 49.

ausgeschweifter aufgeblasener Schuppen: Lichen.

H. ad faxa, etiam ad arborum cortices imprimis fagorum.

Huius folia ^{musa} eleganter laciniata, rasmoa, late expanduntur, superne e cinereo albicant, et puluere farinoso conspersa videntur; inferne nigra sunt, apicibus extremis e nigro ochroleucis, e duabus membranis compositis concavis, et quasi aere inflatis, id quod per sectionem tranuersam optime videri licet. Siccus valde fragilis observatur, aqua vero irrigatus mollescit, foliola multum expanduntur, apicesque tument valde inflati. Copiose eum in vno eodemque loco *Licheni saxatili* Linn. intermixtum inueni, et admodum verosimile mihi videtur varietatem esse dicti Lichenis, inueni enim vtrorumque specimina apicibus inflatis, quam notam Ill. *Linnaeus* solo attribuit *Licheni physode*. Reliquae differentiae, ratione incisurae laciniarum, foliorum plus aut minus ramosorum, coloris magis aut minus albicantis, non subficere mihi videntur, vt hunc *Lichenem physodem* a *saxatili* speciali nomine distinguamus.

LICHEN *oliuaceus*.

Lichen imbricatus, foliolis lobatis, nitidis, liuidis.
Linn. Sp. Pl. p. 1611. n. 21. Necker. delic. Gallobelg. p. 506. n. 15.

L. fronde semipinnata, rotunde lobata, oliuacea, scutellis laeuis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 91. n. 2012.*

L. foliaceus, repens, lobatus, nitidus; superne liuidus verrucosus, inferne fuscus. *Scop. Flor. Carn. p. 106. n. 41.*

Lichenoides oliuaceum scutellis laeuis. *Dill. musc. p. 182. Tab. 24. f. 77.*

ollvenfarbliger Schuppen: Lichen.

H. copiose ad salices, passim etiam ad alias arbores.

Dignoscitur colore fusco virenti, imprimis si madidus est; siccus enim ut plurimum cinereum habet colorem. Foliolis planis, tenuibus, eleganter laciniatis, superne virescentibus, inferne nigricantibus, arctissime adhaeret corticibus arborum. Scutellae foliis insident, maxime circa centrum collectae, eleuatae, margine intus reflexo cinereo, disco obscure viridis coloris. Magnitudo earum multum variat, aliae enim sunt magnitudine seminis milii, aliae ad lentis usque latitudinem increseunt.

LICHEN *parietinus.*

Lichen imbricatus, foliis crispis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Linn. Sp. Pl. p. 1610. n. 25. Necker. delic. Gallobelg. p. 505. n. 13.*

L. fronde rugosa, rotunde lobata, flaua concolore. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 93. 2021.

L. foliaceus repens crispus, foliis et scutellis fulvis. Scop. Flor. Carn. p. 107. n. 44.

Lichen Dioscoridis et Plinii secundus, colore flauescente. *Hall. En. Helv. p. 76. n. 70. 71.*

Lichenoides vulgare sinuosum, foliis et scutellis luteis: *Dill. musc. p. 180. Tab. 24. f. 76.*

goldgelber Schuppen: lichen, gemeine gelbe Baums Krähe.

Copiosissime inuestit arbores, parietes, saxa, aliaque corpora obuia.

β. Lichen foliaceus repens flauus: marginibus adnascens verrucosis. *Scop. Flor. Carn. p. 107. n. 43.*

Varia ludit hic lichen figura, varioque colore. Vt plurimum constat foliolis paruis, in orbem dispositis, obtuse laciniatis, superne aurei coloris, imprimis in iuniori aetate, inferne cinereis, aut nigricantibus, et aliquando coccineis venulis distinctis. Scutellae hinc et inde dispersae sunt, circa centrum vero crebriores, et densius dispositae, coloris sunt lutei, margine concolori; quaedam sordide luteo colore, et fusco quasi praeditae sunt, imprimis in aetate adultiore. Sunt quaedam specimina, quae omnino carent scutellis, harum vero loco, puluere luteo, farinae ad instar, conspersa sunt, foliola eorum latiora rugosa, arctius adhaerent. Per aetatem color aureus sensim abit in virescentem, et ultimo in fusco cinereum: folia verrucosa et quasi leprosa fiunt; quod videre licet ad parietes et tecta vetusta, humido vento exposita, in quibus inter folia lutea, et imprimis ad horum latera, multa inueniuntur foliola cinerea emortua, quae iunioris lichenis *parietini* noua crusta obducuntur.

Incolae Gotlandiae fuluo colore tingunt hoc lichene lanas, quod ex *Actis Holm.* refert *Necker, l. c.*

LICHEN *stellaris*.

Lichen imbricatus, foliolis oblongis laciniatis, angustis cinereis, scutellis pullis. *Linn. Sp. Pl. p. 1611. n. 27*
Necker. delic. Gallobelg. p. 510. n. 21.

L. fronde cinerea, profundius diuisa, laciniata, obtuse lobata, scutellis glaucis nigrescentibus. *Hall. Hist. Helv. p. 92. n. 2017.*

L. fo-

L. foliaceus repens coriaceus crispus, scutellis atris.

Scop. Flor. Carn. p. 107. n. 45.

L. pulmonarius vulgatissimus, superne albo cinereus, inferne nigricans, segmentis angustis et eleganter divisis, receptaculis florum nigricantibus. Michel. Gen.

p. 91. Tab. 43. f. 2, Hall. En. Helv. p. 77. n. 78.

Lichenoides cinereum, segmentis argutis stellatis, scutellis nigris. Dill. musc. p. 176. Tab. 24. f. 70.

weißer sternförmiger Schuppen Lichen.

H. ad cortices arborum.

Foliolis constat eleganter laciniatis, parvis, albescens, in orbem stellatim uti *Dillenius* vocat, dispositis. Scutellae atrii sunt coloris si aqua madent, siccae vero glauco aut cinereo pulvere instratae apparent, dense circa centrum collectae, margini albo distinctae. Foliola et imprimis exteriora, paullo latiora aliquando inveniuntur, quam *Dillenii* figura expressa sunt, propriusque accedunt figurae *Michelii*. Extremi foliolorum margines arborum corticibus arcte appressi cohaerent ope fibrarum cirrhosarum atrium.

***** *Foliacei. Linn. Sp. Pl. p. 1611. Scop. Flor. Carn. Ord. IV. p. 95. Lichenes corniculati compressi. Hall. Hist. Helv. T. III. Ord. IV. p. 82. pulmonarii. Ord. VI. p. 87. Lichenes pulmonarii. Michel. Gen. Ord. I. p. 74. Hall. En.*

Helv. Ord. IV. p. 71. Lichenoidum Dillen. Hist. Musc. Ord. II. Ser. II. p. 147.

Hoc nomine appellantur Lichenes, qui constant ex substantia foliacea continua at varie laciniata. Plerique per simplicem adhaerent radicem scutiformem, et erecti sunt: qui vero radice tali destituuntur copiosis fibrillis infra centrum constipatis se sustinent, extremitates vero liberae exstant. Scutellas plerumque amplas, magnas, et quasi pedunculatas gerunt, vel in laciniis foliorum, aut ad eorum margines.

Quaedam Species horum ad tingendum rubro colore aptae sunt, et imprimis. *Lichen prunastri, farinaceus, calicaris.* vid. Necker. *delic. Gallobelg. p. 514,*

LICHEN *ciliaris. α. viridis.*

Lichen (ciliaris) foliaceus erectiusculus: laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis, crenatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1611. n. 28. Necker. delic. Gallobelg. p. 515. n. 29.*

L. corniculatus, planus, ramulis capillaribus, scutellis petiolatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 83. n. 1980.*

L. foliaceus, laciniatus, cinereus; laciniis suberectis, acutis, pilosis, scutellis pedunculatis. *Scop. Flor. Carn. p. 110. n. 52.*

L. cinereus arboreus, marginibus fimbriatis. *Vaill. Bot.*

Bot. Paris. Tab. 20. f. 4. a. b. Hall. En. Helv. p. 79. n. 85.

Lichenoides hispidum maius, et rigidius, scutellis nigris. Dill. musc. p. 150. Tab. 20. f. 45.

Musco-fungus arboreus, cinereus, scutellatus, marginibus pilosis. Moris. Hist. Ox. III. p. 634. Sect. XV. Tab. 7. f. 6.

grünlicher verbrämter Baum Lichen.

H. copiose ad arbores, praesertim ad salices.

Distinguitur foliis rigidis, late expansis, in angustas lacinias incisis, marginibus pilis nigris instructis, quibus inter se implicantur. Color iu siccitate cinereus, si aqua irrigatur, e glauco virens. Scutellarum discus nigricans, limbus cinereus.

β. *Lichen ciliaris, albidus.*

Lichen foliaceus laciniatus albus: laciniis suberectis obtusis pilosis, scutellis sessilibus. Scop. Flor. Carn. p. 110. n. 51.

Lichen cinereus minor, marginibus pilosis. Vaill. Bot. Paris. Tab. 20. f. 5. Necker. delic. Gallobelg. l. c. var. a. Hall. En. Helv. p. 79. n. 86.

Lichenoides hispidum minus et tenerius, scutellis nigris. Dill. musc. p. 152. Tab. 20. f. 46.

weißlicher verbrämter Baum Lichen.

H. ad arborum cortices passim, praecipue vero ad prunum sylvestrem, cuius ramos niuea quasi veste induit.

Structura praecedenti similis, color vere albus persistens est et immutabilis sub irrigatione cum aqua. Folia paullo minora, teneriora praecedente, pilis incanis, apice nigricantibus, ad margines sitis, arctissime implicantur. Scutellae parvae nigricantes, non tam manifeste quam in priori pedunculatae, sed magis depressae, limbus earum albus.

LICHEN *pulmonarius*.

Lichen foliaceus laciniatus, obtusus, glaber, supra lacunofus, subtus tomentosus. *Linn. Sp. Pl. p. 1612.*

n. 31.

L. lacunatus inferne gibbosus, reticulo farinoso, scutellis lateralibus. *Hall. Hist. Helv. p. 85. n. 1986.*

L. foliaceus laciniatus repens: supra reticulato lacunofus, scutellis sparsis. *Scop. Flor. Carn. p. 101. n. 32.*

Lichen arboreus, siue Pulmonaria arborea. *Hall. En. Helv. p. 73. n. n. 56.*

Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare, marginibus peltiferis. *Dill. musc. p. 212. Tab. 29. f. 113.*

Muscus pulmonarius. *C. B. Pin. p. 361.*

Pulmonaria. *varior auctor.*

OFFICIN. Pulmonariae arboreae herba.

Lungen ähnlicher braunrother Baum Lichen, Lungen Baum Lichen, Baum Lungenkraut, Lungen: Moos.

H. copiose ad antiquos quercus et fagos ubique in sylvis.

Insignem magnitudinem habet hic lichen quoad expansionem foliorum, quae ad palmarem longitudinem et ultra protenduntur. Superne folia rugosa sunt lacunulis depressis, quae lacunulae terminantur venis, parvis verrucis albidis exasperatis. Color in siccitate spadiceus, sub humiditate viridis. Inferne folia bullosa videntur, et circa hasce bullas tomento fusco obsidentur. Scutellae magnitudinem lentis circiter aequantes, atro rubentes, sessiles, sub irrigatione eleuatae, eleganter purpureae, margine subcrenato, ad oras foliorum sitae sunt, et imprimis inter sinus laciniarum, vbi aliquando sic locatae reperiuntur, vt e dimidio superiorem, et e dimidio inferiorem respiciant folii paginam.

Laudatur infusum huius lichenis cum lacte paratum vt specificum in affectibus pectoris, vt tussi, asthma etc. et in ipsa phthysi. In pulueris forma ob vim adstringentem prodesse haemoptoicis ad drachmam vnā quater de die sumptum *Scopoli* refert l. c. minuta prius venae sectione impetu sanguinis. In ictero infusum aquosum frigide sumendum commendatur. *Sibiriaci* vt tradit *Gmelinus* in *Itin. Sibiriaco* T. III. p. 426. eum loco lupuli cereuisiae incoquant.

LICHEN *furfuraceus*.

Lichen foliaceus decumbens furfuraceus; laciniis acutis: subtus lacunosis atris. *Linn. Sp. Pl. p. 1612. n. 32.*

L. foliaceus suberectus laciniatus, laciniis furfuraceis, subtus lacunosis. *Scop. Flor. Carn. p. 97. n. 28.*

L. cornubus planiusculis acutis, superne farinosis, inferne atris, et reticulatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 82. n. 1976.*

L. arboreus leuco melanos, ramulis altera parte anthracinis, altera candidissimis. *Buxbaum. Cent. II. p. 12. Tab. 7. f. 1. Hall. En. Helv. p. 71. n. 50.*

Lichenoides cornutum amarum: de super cinereum, inferne nigrum. *Dill. musc. p. 157. Tab. 21. f. 52.*
 schwarz und grauer flehiger Baum: Lichen.

H. ad arborum truncos.

Folia eius laciniata ramosa sunt instar cornuum cervi, in siccitate rigida, si vero madent flexilia et mollia, margine, laciniarum revoluta, furfuraceo pulvere asperso. Superficies superior convexa, e cinereo fusca, inferior concava, reticulata, nigra. Lacinae foliorum aliae sunt acutae, aliae obtusae. Optime monuit *Scopoli l. c.* non semper decumbere hunc lichenem, quotquot ego inveni specimina, erecta erant, extremis tantum laciniis paullulum retroflexis et depressis, post pluvias vero totus aliquando decumbens reperitur. Sapor valde amarus. Scutellas non vidi.

LICHEN *farinaceus.*

Lichen foliaceus erectus compressus ramosus farinaceus:
 lateribus verrucosis. *Linn. Sp. Pl. p. 1613. n. 35. Necker. delic. Gallobelg. p. 513. n. 27.*

L. foliaceus erectus laciniatus; laciniis rugosis rigidis, verrucis lateralibus. *Scop. Flor. Carn. p. 97. n. 27.*

L. lacunofus complanatus, ramis acutissimis, orbiculis farinosis, marginalibus frequentissimis. *Hall. Hist. Helv. T. III p. 84. n. 1981.*

L. cinereus, angustior, scutis in margine segmentorum. *Vaill. Bot. Paris. p. 115. Tab. 20. f. 14. quo etiam pertinet f. 13. Hall. En. Helv. p. 72. n. 53.*

Lichenoides segmentis angustioribus, ad margines verrucosis, et puluerulentis. *Dill. musc. 172. Tab. 23. f. 63.*

bläulicher warziger Baum Lichen.

H. copiosissime ad salices, passim etiam ad alias arbores.

Varia ludit magnitudine foliorum, quae in longas, tenues, ramosas lacinias secta sunt, et quorum extremitates nodosae a verrucis apparent. Margo eorum revolutus est, sic ut altera superficies concava, in medio quodammodo sulcata, altera vero conuexa sit, eumque innumerae obsident verrucae variae figurae et magnitudinis, coloris albi. Foliorum, si madent, color e cinereo est glauca, adultiora plus albicantia.

Ad rubrum colorem tingendum pariter ut sequens adhiben potest.

LICHEN *calicaris.*

Lichen foliaceus erectus linearis ramosus lacunofus conuexus mucromatus. *Linn. Sp. Pl. p. 1613. n. 36. Necker. delic. Gallobelg. p. 514. n. 28.*

L. foliaceus erectus laciatus: laciniis linearibus acutis rigidis, scutellis terminalibus. *Scop. Flor. Carn. p. 95. n. 34.*

L. vtrique lacunatus, farinosus, et scutellifer. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 84. n. 1983.*

L. cinereus latifolius ramosus. *Vaill. Bot. Paris. p. 115. Tab. 20. f. 6* *Hall. En. Helv. p. 72. n. 52.*

Lichenoides coralliforme rostratum et canaliculatum.

Dill. musc. p. 170. Tab. 23. f. 62. A. B.

Musco-fungus arboreus capitulis rostratis. *Morif. Hist.*

Ox. III. p. 634. Sect. XV. Tab. 7. f. 5.

Geschnäbelter Baum Lichen.

H. ad truncos arborum.

Dignoscitur foliis rigidis, ramosis, acute laciniatis, fuleatis, albidis; e quorum extremitatibus eminent scuta alba, impla, subtumida, sub quorum margine lacinia exsurgit quaedam adunca, rigida, instar rostri: quae nota huic licheni prae omnibus propria est. Pauciora scuta marginem obsident.

Reperitur alia varietas, breuior praecedente foliis latioribus, ramosioribus, rugosis non sulcatis, coloris plus glauci, scutis plerumque summis amplioribus. Hanc exprimit *Dillenius Tab. 23. f. 62. sub lit. C.* cuius synonymon sequens affert,

β. Lichen pyxidatus Damae cornu diuisura, acetabulorum oris crispis. *Vaill. Bot. Paris. p. 115. n. 6. Tab. 21. f. 2.*

LICHEN *islandicus.*

Lichen foliaceus adscendens laciniatus: marginibus eleuatis ciliatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1611. n. 29.*

L. foliis oblongis laciniatis: marginibus conniuentibus, *Linn. Flor. Lapp. p. 339. n. 445. Hall. En. Helv. p. 75. n. 65.*

L. fronde conuexa, ciliata, pustulata, obtuse ramosa, utrinque laevi, ramulis brevissime bicornibus. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 82. n. 1978.

L. terrestris folio Eryngii. Buxbaum. Cent. II. p. II. Tab. 6. f. 12.

L. pulmonarius, minor, angustifolius, spinis tenuissimis ad margines ornatus, receptaculis florum transverse oblongis, rubris, vel ex rubro ferrugineis. Michel. Gen. p. 35. Ord. XII. n. 7. Tab. 44. f. 4.

Lichenoides rigidum, Eryngii folia referens. Dill. musc. p. 209. Tab. 28. f. III.

Icon Oeder. Flor. Dan. Tab. 155.

brauner harter Hirschhorn Lichen. Islands Lichen. Isl. ands Moos. Purgiermoos.

H. sed raro tantum in monte Moosberg circa Neuhaus, copiosissime in sylvis hercynicis, imprimis vero in monte Bruçtero.

Folia eius suberecta, substantiae in siccitate admodum rigidae, instar laminarum cornearum, flexilia tamen absque diffractione; aqua irrigata, mollia sunt. Longitudo duos, tres, quatuor, ad quinque pollicum latitudinem aequat. Versus basin latiora, absque certo ordine fissa sunt, in ramulos tenuiores, brachiatos, quorum quidam eodem modo denuo fissi in lacinulas, apice bifido terminatas. Interior superficies foliorum concava, coloris fusci, (e viridi ad purpureum tendentis) ad basin purpurei aut coccinei, glabra, nitida; exterior superficies pallida, aliquando albicans, glabra nitida item, at lacunosa paullatim, exiguis lacuulis,

et hinc et inde minimis verrucis nigris adspersa. Margo totus foliorum, ab imo ad summas usque lacinias, pilis parvis, (vix linearibus) spinulas duritie aemulantibus, rufis, obsitus est, et versus interiora reflexus. Rarissime florere solet, quodsi autem floret, peltas sine scutellas profert latas, amplas, rotundas, puniceas, aut fuscas, in extremis apicibus extremarum corniculatarum laciniarum. Caeterum colore, longitudine, latitudine, raramorumque (qui tamen ut plurimum ad dichotomiam fissi esse solent) diuisione admodum variat, hinc natae sequentes eius, quas pro diuersis speciebus, habuit *Dillenius*, varietates:

β. Lichenoides Eryngii folia referens, tenuioribus et crispioribus foliis. *Dill. musc. p. 212. Tab. 28. f. 112.*
Linn. Sp. Pl. l. c. var. β.

γ. Lichen islandicus tenuissimus.

Coralloides tenuissimum nigricans, mundi muliebris (Kanten, Spitzen) instar textus. *Dill. musc. p. 213. Tab. 17. f. 32.*

Quod ad usum eius attinet, insignis est varia virtute, quas Ill. HALLERVS sequenti modo describit in *Hist. l. c.*

„Subamarus est, amarore quasi volatili, liquorem
 „stillat subacidum fere, ut frumenti spiritus; hinc inter
 „vulneraria medicamenta censetur, ad fracta etiam consolidanda, cum Symphyto tritus, interno usu idoneus.
 „Infuso theiformi sumpto, de utero hydatides depulsas fuisse legas. Aqua cum recente Lichene decocta, aluum ducit, magis verno tempore, et iuniori cum planta, experimento nuperis etiam periculis confirmato.
 „Siccatus vim istam deponit, farinamque dat Islandis familiarem, et abunde in cibum recipitur, cum lacte
 „potissi-

„potissimum, etiam cum aqua coctus. Ad catarrhos
 „etiam compescendos medica vi inclaruit, et demum eo
 „solo alimento, in iusculo decocto, phthysin sanare ad-
 „grediuntur. Nuper Viennenses hoc Lichene ad tuf-
 „sum infantum, et ad phthysin feliciter vti audio,,.

LICHEN *niualis*.

Lichen foliaceus adscendens laciniiatus, crispus, glaber,
 lacunofus, albus; margine eleuato. *Linn. Sp. Pl.*
p. 1612. n. 30.

L. conuexo concavus, lacunatus et glaber, ramis cri-
spatis subluteis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 82. n.
1977.

Lichenoides lacunofum, candidum, glabrum, endiuiae
 crispae facie. *Dill. musc. p. 162. Tab. 21. f. 56.*

weisser porzellanartiger Hirschhorn Lichen.

H. cum praecedente copiose in monte Bructero.

Folia aliquam, quoad figuram externam, similitudinem
 habent cum *Lichenis islandici* speciminibus latioribus;
 differunt vero magnitudine, quae huic paullo inferior,
 lacinularum foliorum margine obtusiori, defectu pilo-
 rum, superficie interiori lacunulis amplioribus exfulca-
 ta, et colore albo, vel potius candido. Caeterum di-
 uisio in ramulos fere eadem, superficies externa con-
 nexa, interna concava, situs erectus, substantia in sic-
 citate cornea, elastica; habitus glaber nitidissimus, qui
 aspectu *Porcellanum* (vti germanice appellatur) refert.
 Mea specimina colore candido nitido insignita, in me-
 dio purpureo quodam simul fulgent splendore, in su-
 perficie exteriori. Margo intro reuolutus (at non in
 tantum vt in *Lichene islandico*) crenulatus, albus, hinc

et inde punctis ex atro-purpureo fuscis obsitus est. Scutellas non habent mea specimina.

LICHEN *fraxineus*.

Lichen foliaceus erectus oblongus lanceolatus. Linn. Sp.

Pl. p. 1614. n. 37. Scop. Flor. Carn. p. 96. n. 25.

Necker. delic. Gallobelg. p. 512. n. 25.

L. vtrinque lacunofus, fronde latissima scutellis vberimis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. p. 84. n. 1995.*

L. pulmonarius, cinereus, mollior, in amplas lacinias diuisus. Tournef. I. R. H. p. 549. Tab. 325. f. A. B. Hall. En. Helv. p. 72. n. 55.

Lichenoides longifolium, rugosum, rigidum. Dill. musc. p. 165. Tab. 22. f. 59.

Musco-fungus arboreus tenuior, scutellis vel capitulis cauis. Musco-fungus quernus latifolius cinereus.

Morif. Hist. Ox. III. p. 634. n. 2. 3. Sect. XV. Tab. 7. 4. 5. 9. 14. 19.

langblätteriger faltiger Baum Lichen.

H. copiosissime apud nos in salicibus.

Folia sunt longa, profunde laciniata, laciniis oblongis, ridida, profundis scrobiculis rugosa, e cinereo glauca, siue aqua irrigantur mollia. Scuta ampla, albicantia, superne elliptica vel rotunda, paululum excauata; inferne conico pediculo adnata, marginem aequae ac totam reliquam obfident superficiem laciniarum. Iuniorum speciminum laciniae, scutis carentes, similes sunt sequenti *Licheni prunastris*. Color foliorum aequae ac scutorum, imprimis in annosioribus, aliquando ad rufum

rufum tendit, farina viridi etiam aliquando folia inspersa sunt. Sub hac facie illam repraesentant varietatem quae *Michelio* audit:

β. *Lichen pulmonarius* rufescens durior, in amplas lacinias diuisus. *Mich. Gen. p. 74. Ord. I. n. 1. Tab. 36. f. 1. Hall. En. Helv. p. 72. n. 54.*

LICHEN *prunastri*.

Lichen foliaceus erectiusculus lacunofus, subtus tomentosus albus. *Linn. Sp. Pl. p. 1614. n. 37. Neckeredic. Gallobelg. p. 513. n. 26.*

L. complanatus, vtrunque lacunofus, vndique farinosus. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 84. 1984.*

L. pulmonarius mollior, dichotomus, superne cinereus, inferne albus, receptaculis florum interna parte ferrugineis. *Michel. Gen. p. 75. Ord. I. n. 9. Tab. 36. f. 3. Hall. En. Helv. p. 72. n. 51.*

Lichenoides cornutum bronchiale molle, subtus incanum. *Dill. musc. p. 160. Tab. 21. f. 55.*

weisser Hirschhornförmiger Baum Lichen, weisser Schleen, Dorn Lichen, weisses Lungenkraut, weisses Lungen Moos.

H. ad arbores, imprimis vero pruno spinosae familiaris.

Inter omnes lichenum species, hic maxime variat, quoad figuram, magnitudinem, et colorem, pro diuerso loco natali, et aetate. Iunior in paruas acutas lacinias cristatas rariter fissus, colore gaudet glauco: quo

adultior fit, eo plures acquirit lacinias latiusculas, planas, lacunosas, cornua damae referentes, mollis est, superficie superiore e cinereo glauca, inferiore incana lanuginosa. Scutellae in extremis laciniis sitae, e glauco albae, per aetatem rufescunt. Sapore praeditus est fatuo, si vero ad quercus nascitur amaricante. In puluerem redactus, ad puluerem cyprium recipitur.

Ad rubrum colorem tingendum pariter ac *L. Rocella* aptus est.

LICHEN *caperatus*.

Lichen pallide viridis, rugosus, margine undulato. *Linn. Sp. Pl. p. 1614. n. 41. Necker. delic. Gallobelg. p. 511. n. 24.*

L. foliaceus repens lobatus: supra luteo-virescens, infra laevis ater, scutellis verrucosis, sessilibus, umbilicatis, rubris. *Scopol. Flor. Carn. p. 103. n. 34.*

L. fronde rotunde lobata, rugosa, inferne atra, et aspera. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 89. n. 2005.*

L. pulmonarius, saxi et arboribus adnascens maior, inferne nigricans, superne e sulfureo cinereus, receptaculis florum amplioribus, interne fordide et obsolete viridibus. *Mich. Gen. p. 89. Ord. XX, n. 1. 2. Tab. 48. f. 1.*

Lichenoides caperatum rosaceo expansum. *Dill. muse. p. 193. Tab. 25. f. 97.*

gelblich grüner Rosenförmiger Baum Lichen.

H. ad truncos fagorum.

Foliis constat ex oblongo rotunde lobatis, rugosis, in varias lacinias sectis, quarum minores versus centrum reuolutae, longiores in formam rosae, versus extremitatem expansae,) superne glabris, coloris e sulphureo viridis, margine tenui ochroleuco, inferne glabris, qua adhaerent parte media, nigris, versus extremitates vero ochroleucis, punctis albis hinc et inde maculatis, tomento rariori, scabro, corticibus libere adhaerentibus. Vetusiora specimina superne scabra, et rufescentia fiunt. Siccus magis e luteo viret, aliquamdiu vero in aqua maceratus, glaucus euadit. Scutellas non vidi. Odor maderacti, et sapor mucidus, nauseosus.

LICHEN *glaucus*.

Lichen foliaceus depressus lobatus glaber: margine crispo farinaceo. *Linn. Sp. Pl. p. 1615. n. 42.*

L. fronde laciniata, et crispa, inferne atra et aspera. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 89. 2007.*

Lichenoides endiuiæ foliis crispis splendentibus, subtus nigricantibus. *Dill. musc. p. 192, Tab. 25. f. 96.*

Musco-fungus lichenoides crispus, cinereus, subtus nicans. *Moris. Hist. Ox. III. p. 633. n. 4. Sect. XV. Tab. 7. f. 4.*

gekräuselter grauer Baum Lichen.

H. in truncis fagorum.

Constat ex foliis latiusculis, varie laciniatis, superne e glauco albidis, aut cinereis, splendentibus, paullatim lacunosis, inferne anthracinis, rugis parvis asperis, marginibus laciniarum plus vel minus crispis, farinosis, albis. Quodsi isti margines laciniarum per len-

tem aspiciuntur, similitudinem quandam habent cum ramusculis paruarum speciminum *Lichenis rangiferini* Linn. Valde mollis est madefactus, siccus vero durus, attamen lentus, et non facile fragilis. In superficie superiori hinc et inde aliquando maculae pallide purpureae, aut fuscae elucent. Scutellas non vidi.

***** *Coriacei*. Linn. Sp. Pl. p. 1615. *Lichenes foliacei* Scop. Fl. Carn. Ord. IV. p. 95. *Antilyssi*. Hall. Hist. Helv. T. III. Ord. V. p. 85. *Lichenes pulmonarii*. Michel. Gen. Ord. XII. p. 84. Hall. En. Helv. Ord. IV. p. 71. *Lichenoidum* Dill. musc. Ord. II. Ser. III - V. p. 199.

Hi sunt proprie etiam lichenes foliacei, differunt vere in hoc a sic dictis *foliaceis*, ut non semper ex vno folio laciniato, sed etiam ex pluribus consistunt foliis, multum latioribus solitariis, minus argute laciniatis, non ramosis; terrae, aut aliis corporibus arctius plerumque adhaerent, repentes, et plane non, vel parum tantum sunt recti. Radicibus gaudent plerumque filamentosis, per totam inferiorem folii paginam dispersis. Substantia eorum est lenta, tenax, interne in crassioribus quasi fungosa, dura, fragilis in siccitate: aqua in buti mollescunt. Sapor et odor recentium plerumque mucidus, et valde nauseosus. Receptacula fructificationum permagna sunt, et ob similitudinem cum peltis militum antiquorum, *Peltae* dicta sunt. Plerique hasce peltas in
mar-

marginē gerunt foliorum, carnosas, marginē vel non, vel parum crenato.

LICHEN *aquaticus.*

Lichen foliaceus, repens, lobatus, obtusus, lobis marginē integerrimis, superne viridis, inferne ochroleucus, parum lacunofus.

Lichenoides imbricatum luridum. *Dill. musc. p. 224. Tab. f. 128.*

dunkel grüner Wasser Lichen.

H. in lapidibus, in fundo riuuli, circa Neuhaus, et ad saxa circa hunc riuulum obuia.

Folia huius, in semunciales et vniales lobos, subrotundos, marginē integerrimo, aut parum laciniato diuisa, late expanduntur super lapides, in dicto riuulo iacentes. Lobi isti foliorum, varie incuruati, et instar peculiarium foliorum, imbricatum, et imprimis circa centrum constipata sunt. Superficies superior quodammodo glabra est, et nunc laete viridis, nunc e viridi fusca, si recens aut madidus est, siccus vero cinerei coloris, passim tuberculis irregularibus, fuscis, eleuatis, diuersae magnitudinis obsita, et hinc et inde punctis atris, verrucis exiguis similibus, aspersa inueniuntur. Inferior superficies tota ochroleuca, glabra, lacunulis leuibus tantum parumper rugosa, qua adhaeret media parte, maculis paruis atris sed paucis distinguitur. Odorem spirat recens, aut madidus, ingratum, mucidum, urinosum.

sum, saporem habet valde ingratum, leuiter amaricantem.

Cum mihi, forte ob tempus anni incongruum, legi enim specimina mea mense Iulio, haud contigerit peltas videre, non sat certo definire possum an hic Lichen sit etiam idem cum *Lichene aquatico* Linn. *Sp. Pl.* p. 1615. n. 43? sub quo nomine, figuram 44. *Dillenii* Tab. 20. dubie allegatam video: nostrum multo accuratius exprimit *Dillenii* figura 128. Tab. 30. cuius nomen et descriptio sat accurate quadrat, excepta hac solummodo differentia, quod *Dillenius* dicat superficiem inferiorem nigricantem, quae in meis speciminibus maxima ex parte ochroleuca, et circa centrum tantum nigricans est; meus laxe, *Dillenii* vero lichen arctius adhaereat.

LICHEN *caninus* α . *cinereus*.

Lichen (*caninus*) foliaceus repens lobatus obtusus planus; subtus venosus villosus, pelta marginali ascendente. Linn. *Sp. Pl.* p. 1616. n. 48. Necker. *delic. Gallobelg.* p. 516. n. 32.

L. fronde subrotunde lobata, inferne reticulata, peltis conuexo-concauis. Hall. *Hist. Helv.* T. III. p. 85. n. 1988.

L. foliaceus repens cinereus, subtus reticulato-venosus, peltis marginalibus suberectis. Scop. *Fl. Carn.* p. 100. n. 30. var. *a*.

L. terrestris cinereus Raii. *Hall. En. Helv. p. 74. n. 61.*

Lichenoides digitatum cinereum, lactucae foliis sinuosis. *Dill. Musc. p. 200. Tab. 27. f. 102.*

OFFICIN. Mulci canini herba.

aschgrauer Hunds Lichen.

H. in sylvis copiose ad terram. muscis instratus.

Folia lata sunt, sinuata, laciniata, superne e cinereo glauca, aut sordide virescentia, si aqua irrorantur; sicca vero cinerea, inferne incana, nervosa, cirrhis fibrosis obsita. Peltae sunt ex oblongo rotundae, e spadiceo rufescentes, anterieus conuexae, posterius, concavae, cinereae aut fuscae. Aliquando postica facies earum, et extremae foliorum laciniae, laete carneo colore tinguntur. Odor mucidus; sapor valde nauseosus.

Vt specificum medicamentum laudatus est contra rabiem caninam, et D. Mead celebrem suum exinde, addito pipere albo, paravit *pulverem antilyssum*,

β. Lichen caninus, rufescens.

Lichen foliaceus repens, profunde lobatus, marginibus obtusis, introflexis, subtus non venosus, sed villosus, cirrhis nigricantibus, pelta marginali rotundiore ascendente.

L. fronde obtuse lobata, superne verrucosa, inferne villosa. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 86. n. 1990.*

Lichenoides digitatum rufescens, foliis lactucae crispis. *Dill. musc. p. 203. Tab. 27. f. 103.*

bräunlicher Hunds Lichen.

H. in iisdem locis cum priori.

Differt haec varietas, foliorum colore rufescente, et marginibus admodum sinuosis, et crispis, imprimis si peltis caret. Peltarum color, praecedenti obscurior est. Varietas ista admodum frequens occurrit in nostris regionibus.

γ. Lichen caninus aphtosus.

Lichen (*aphtosus*) foliaceus, repens, lobatus, obtusus, planus, verrucis sparsis, pelta marginali ascendente, *Linn. Sp. Pl. p. 1616. n. 46.*

L. fronde obtuse lobata, superne verrucosa. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 86. n. 1992.

L. pulmonarius maximus, verrucosus, superne e cinereo virescens, inferne obscurus, receptaculis florum rubris. Hall. En. Helv. p. 74. n. 59.

Lichenoides digitatum laete virens, verrucis nigris notatum. *Dill. musc. p. 207. Tab. 28. f. 106.*

OFFICIN. Musci cumatilis herba.

warziger grüner Hunds Lichen.

H. in similibus locis.

Differt haec varietas, quae iunioris solummodo aetatis esse videtur, in statu recenti, viridi suo colore, qui vero per aetatem sensim in cinereum abit. Superficies foliorum superior verrucis fuscis obsita est, quae distinctius apparent et maiores sunt in hac varietate, quam

quam in praecedentibus, in quibus tantum obscura occurrunt harum verrucarum vestigia.

Draſtice purgare, et verinibus infeſtus eſſe traditur. vid. *Vogel. Inſtitut. mater. med. p. 114.*

LICHEN *polyrhizos.*

Lichen foliaceus, polyphyllus, vtrinque laevis, polyrhizos.

Linn. Sp. Pl. p. 1618. n. 57.

L. ad marginem radicans alpinus, ex coeruleo nigricans, ſcutellis nigerrimis. *Hall. En. Helv. p. 79. n. 87. Tab. 2. f. 4.*

L. fronde imbricata, ſubrotunda, punctata, inferne villoſa, atris ſcutellis. *Hall. Hiſt. Helv. T. III. p. 88. n. 2000. Tab. 47. f. 4.*

L. pullum ſuperne et glabrum, inferne nigrum et cirrhoſum. *Dill. muſc. p. 226. Tab. 30. f. 130.*

aſchgrauer ſchwarzknöſpig: und haariger Lichen.

In monte Bruſteroprius a D. RÜLING lectum accepi, ſequenti anno ipſe ibi inueni; rariffime circa Neuhaus in monte Moosberg occurrit, ubi ad lapides eum ſemel inueni.

Aliquam habet ſimilitudinem quoad modum creſcendi, ſubſtantiam tenacem coriaceam, foliorumque ſitum cum praecedente *Licheni canino*: inſigniter vero differt, lobis laciniarum multo minoribus, rotundioribus, criſpis, margine vndique pilis nigerrimis ramiſis, *Vſneae*
par-

paruas quasi referentibus, et inter se complicatis obfisto; colore si madet sordide virescenti, si ficcus est e cinereo glauco. Superficies superior admodum lacunosa est, et in siccitate cinerea, ac glauco quodam puluere obducta; radiculis marginalibus crinibus implicatis similibus, tegitur pene, versus extremitates; vbique multis tuberculis irregularibus, a seminis papaueris, ad pisi usque magnitudinem crassis, aterrimis, (per lentem rimosis, rimis orbicularibus,) subpedunculatis, conuexis, distincta est. Praeter haec vero etiam plura minutissima atra puncta, per lentem globulis aemula) passim conspersa visuntur, quae ut vero simile mihi videtur, rudimenta sunt fructificationum, quae successu temporis maiora, et descriptis similia sunt.

LICHEN *venosus*.

Lichen foliaceus repens, ouatus, planus, subtus venosus villosus, peltis marginalibus horizontalibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1615. n. 45. Necker. deliz. Gallobelg. 515. n. 30.*

L. flabelliformis, subtus reticulatus, scutellis marginalibus planis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 87. n. 1993.*

L. pulmononarius minimus, inferne albus et niger, reticulatus, superne e cinereo virescens, receptaculis florum nigricantibus, ad latera, oblongis. *Michel. Gen. p. 85. Ord. XII. n. 12. et 13. Tab. 44. f. 3. et 5. Hall. En. Helv. p. 74. n. 62.*

Lichenoides paruum virescens, peltis nigricantibus planis. *Dill. musc. p. 208. Tab. 18. f. 109.*

grüner abriger Erd Lichen.

H. in terra humida umbrosa, inque locis muscosis sylvarum. v. g. im Wehnderholze copiose.

Dignoscitur foliis semuncialibus, vncialibusque, superne subaotundis planis, inferne cunei ad instar, in radicem scutiformem, cuius limbus tomentosis filamentis terrae adhaeret, decurrentibus. Superne, si recens est lichen, aut madidus, folia laete virent; in siccitate vero cinerea sunt; inferne albicant, et venis violaceis distincta sunt. Peltae exatro rubent, planae sunt, rotundae, aut ouatae, et in margine dispositae foliorum. Aliquando folia singularia prolifera euadunt, dum nempe ex margine maioris folii prorumpunt alia minora. Plerumque hieme peltas profert.

***** *Scyphiferi. Linn. Sp. Pl. p. 1618.*

Lichenes corniculati. Hall. Hist. Helv. Ord. I. T. III. p. 70. Lichenes corniculati et pyxidati, Hall. En. Helv. Ord. I. et II. Michel. Gen. Ord. VII. VIII. p. 89. Lichenes coralloidei. Dillen. Hist. Musc. Ord. II. p. 79. Scopol. Flor. Carn. Ord. III. p. 85.

Vnius solummodo speciei, plures comprehendunt varietates *. Omnes vero constant

e

* Qui recte attendit ad generationem, siue prouentum *lichenum scyphiferorum*, dum nempe aliquoties per annum eadem loca inuestigat, inueni-

et

e crusta granulosa, quae per successum temporis in parua foliola, inordinate laciuiata explicatur. Ex hisce foliolis surgunt tubuli, variae magnitudinis, plerumque conici, et scyphos quasi repraesentantes, margine superne dilatato, integro, aut crenato, puluerulento, in plerisque tuberculis fuscis, aut coccineis praedito; quae ipsa tubercula carnosae fructificationes continere videntur.

Maximas mutationes patiuntur per aetatem, imprimis quod attinet figuram et magnitudinem, fiunt enim e tubulis simplicibus ramosi, vt tandem proliferi, (i. e. surgunt ex vno scypho plures minores.) Substantia eorum duriuscula est, imprimis in siccitate. Vigent per totum annum, imprimis vero autumno et hieme, quo tempore vt plurimum florere solent.

LICHEN *pyxidatus*, *a simplex*.

Lichen coralloides canle simplici pyxidato nudo, marginibus integerrimis. *Scopol. Fl. Carn. p. 86. n. 5.*

L. tubulosus pyxidatus cinereus, *Hall. En. Helv. p.*

64. n. 9.

L. py-

et vnā ex altera varietatem nasci, per mutationem figurae, quae pendet ab aetate. Manifeste exinde apparet, differentias a sola figura externa desumptas, non sufficere ad distinctionem in singulas veras species. Idem experti monent *Ill. Hallerus in En. Helv. p. 63. et Cl. Scopoli in Flor. Carn. p. 95.*

*L. pyxidatus maior. Tournef. l. R. H. p. 549. T. 325.
D. Vaill. Bot. Paris. p. 115. Tab. 21. f. 8. Mich.
Gen. p. 82. Tab. 41. Ord. VIII. f. 1. 6.*

*Coralloides scyphiforme tuberculis fuscis. Dill. musc.
p. 79. Tab. 14. f. 6. A.*

einfacher Becher Lichen.

H. ad terram, inque truncis arborum putridis.

In prima aetate e crusta granulosa constat, quae in parua foliola superne e glauco viridia, inferne albicantia explicatur, e qua demum surgunt scyphuli, sine tubuli conici, variae magnitudinis, margine superne dilatato integro.

b. Lichen pyxidatus, tuberculatus.

Lichen (pyxidatus) scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. Linn. Sp. Pl. p. 1619. n. 60.

L. scypho infundibuliformi simplici. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 72. n. 1912.

L. coralloides, caule simplici pyxidato nudo, marginibus ferratis. Scop. Flor. Carn. p. 87. n. 6. caule pyxidato squamoso: marginibus ferratis. n. 7. marginibus tuberculosis sessilibus fuscis, n. 8. tuberculis stipitatis fuscis. n. 9.

L. pyxidatus, marginibus ferratis. Hall. En. Helv. p. 65. n. 13. verrucosus oris carnosis tumentibus fuscis. n. 12.

L. pyxidatus maior, acetabulo fimbriato et tuberculoso
Vaill. Bot. Paris. Tab. 21. f. 11.

Coralloides scyphiforme, tuberculis fuscis. *Dill. musc.*
p. 79. Tab. 14. f. 6. B. C.

einfacher graufnöpfiger Becher lichen.

H. in iisdem locis.

Varia ludit figura et magnitudine scyphulorum, quorum supremus margo, plus vel minus crenatus ab initio, fenfim tubercula fusca profert; caeterum vero quoad caulem glabra sunt, vel puluerulenta, aut squamulis donata. Iste mutationes pendent ab aetate et varia indole loci natalis.

Laudatur huius lichenis efficacia, in tussi convulsiva. vid. *Hall. Hist. Helv. l. c.*

c. *Lichen pyxidatus, cornutus.*

Lichen (cornutus) scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus integris. *Linn. Sp. Pl. p. 1620. n. 64.*
Necker. delic. Gallobelg. p. 519. n. 38.

L. cornubus simplicissimis acutis farinosis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 70. n. 1902.* *cornubus* subramosis farinosis. *n. 1903.*

L. coralloides caule subulato bifido. *Scop. Flor. Carn. p. 90. n. 18. p. 91. n. 19. 20.*

L. cinereus proboscideus et corniculatus vt plurimum non ramosus. *Mich. Gen. p. 81. n. 12. 13. 14.*

Coralloides vix ramosum, scyphis obscuris. *Dill. musc.*

p. 90. Tab. 15. f. 14. scyphiforme cornutum. p.
92. Tab. 15. f. 16. var. E.

Musculus fistulosus corniculatus. *Barrelier. Obs.* 1286.
Tab. 1277. f. 1.

gehörnter Becher Lichen.

H. passim in sylvis inter reliquas varietates.

Tubulis incurvis simplicibus ut plurimum inuenitur, qui a basi latiores, in apicem incurvatum cornu bubuli adinstar, excurrunt, colore praediti e cinereo albicante, aliquando etiam subglauco. Tali modo se habet in prima aetate, postea varie mutatur, et nunc apices cornuum intumescunt in bulbum irregularem, nunc in scyphos abeunt obscuros, aut manifestos, (qui etiam aliquando exiguis punctis coccineis distinguuntur) nunc e curvatura rectius se protendunt, nunc in duas, nunc in plures lacinias finduntur. Caulibus semuncialibus, vncialibus, et maioribus, praeterea ludit glabris et squamosis, scyphulisque regularibus et irregularibus. Sunt mihi quaedam specimina lecta, quorum apices in lacinias fissas excurrentes, simillima facta sunt, *Lichen subulato* L. crusta inferior cohaerens autem veros simul protulit pyxides cornutos: hinc transitum in *Lichenes fructiculosos* e *pyxidatis* fieri aliquando, observatio me docuit.

d. Lichen *pyxidatus, prolifer.*

Lichen caule simplici, calyce turbinato: centro simpliciter prolifero. *Linn. Sp. Pl.* p. 1619. n. 60.
var. β .

L. coralloides, caule simplici pyxidato: marginibus tuberculosis proliferisque. *Scop, Flor. Carn.* p. 89.

- n. 14. marginibus proliferis ferratis nudis. n. 15.
L. tubulosus pyxidatus prolifer. *Hall. En. Helv. p. 65.*
 n. 15. et 16.
L. pyxidatus margine prolifero. *Vaill. Bot. Paris. p. 115. Tab. 21. f. 5. 9.*
L. infundibulis glabris proliferis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 73. n. 1923.* infundibulis ferratis proliferis, n. 1924.
Coralloides scyphiforme tuberculis fuscis. *Dill. musc. p. 79. Tab. 14. f. 6. D.*
Musco-fungus pyxidatus, calyce altero alteri innato.
Morif. Hist. Ox. III. p. 632 Sect. XV. Tab. 7. f. 4.
 vielfacher graufnöpfiger Becher Lichen.
H. in iisdem cum praecedente locis.

Varietas e praecedente enata, differt scyphulis minoribus, pluribus, e medio vel margine infimi maioris scyphi, (qui trunci speciem quasi refert, in plures ramos expansi) exortis. Ludit vt praecedentes caule glabro et squamoso, marginibus scyphulorum nudis et fuscis tuberculis donatis.

e. **Lichen** *pyxidatus fimbriatus.*

Lichen (*fimbriatus*) scyphifer simplex, denticulatus, stipite cylindrico. *Linn. Sp. Pl. p. 1619. n. 61.*

L. coralloides, caule simplici pyxidato nudo: marginibus ferratis. *Scop. Flor. Carn. p. 87. n. 6.* pyxidato squamoso, n. 7.

L. py-

L. pyxidatus marginibus ferratis. *Hall. En. Helv. p.*
65. *n.* 13.

L. scyphiger, infundibulis ferratis *Hall. Hist. Helv. T.*
III. p. 72. *n.* 1915. infundibulis ferratis coronatis.
n. 1916. infundibulis ferratis proliferis *n.* 1924. in-
fundibulis ferratis foliosis et verrucosis. *n.* 1925.

Coralloides scyphiforme gracile, marginibus ferratis.
Dill. musc. p. 84. *Tab.* 14. *f.* 8. 9.

gezähnter Becher Lichen.

H. ad terram et truncos arborum in sylvis copiose.

Ora pyxidum ferrata, (in quibusdam tam profunde, ut denticulos referant) notam distinctionis praebent,

Multiformi varietate ludit, quod expertus sum in loco certo vestigio designato (in sylva *Wehndensi* sub trunco antiquae fagi) ubi in spatio vnus circiter anni, e speciminibus copiosis, tunc primum e crusta aliquot palmarum latitudine enatis, et sibi omnino quoad totum habitum similibus, pyxides caulesque successu temporis in omnes illas quas ex *Halleri ist. Helv.* citavi varietates mutari vidi. Qui enim ab initio fuerunt caules cylindrici simplices, lato orificio serrato terminati, post mensium spatium quosdam horum prolieros, inferius versus crustam squamosos, siue foliosos reperi; inter hos quidam pyxides, punctis siue globulis sub fuscis, ad apices et inter orae ferraturas, ornati fuerunt: ultima vice qua inuisitavi hunc locum, plurima specimina obsoleti coloris, et verrucis fuscis obsita inueni. Examinatis variis hisce speciminibus, caules quorundam profundius ad fundum usque excavatis, alii minus profunde caui solidioresque fuerunt.

f. Lichen *pyxidatus, cocciferus*.

Lichen (*cocciferus*) scyphifer simplex integerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Linn. Sp. Pl. p. 1618. n. 58. Necker. delic. Gall. belg. p. 519. n. 37.*

L. coralloides, caule simplici pyxidato, marginibus tuberculosis, tuberculis coccineis sessilibus. *Scop. Flor. Carn. p. 88. n. 10. 11. 12.*

L. scyphiger, infundibulorum fungulis coccineis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 73. n. 1918. infundibulorum fungis fuscis. n. 1919. infundibulis proliferis, fungulis coccineis. p. 74. n. 1927. infundibulis proliferis, fungulis atrofuscis n. 1928.*

L. pyxidatus acetabulorum oris coccineis, et tumentibus. *Hall. En. Helv. p. 65. n. 14. et 17. Vaill. Bot. Paris. p. 115. Tab. 21. f. 4. 10. 11. Michel. Gen. p. 82. Ord. VIII. n. 3. Tab. 41. f. 3. 4.*

Coralloides scyphiforme tuberculis coccineis. *Dill. musc. p. 82. Tab. 14. f. 7.*

Musco-fungus pyxidatus, calyce altero alteri innato, apicibus nonnunquam coccineis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 632. Sect. XV. Tab. 7. f. 4.*

OFFICIN. Musci pyxidati herba. Herba ignis.

Echarlachköpfiger Becher Lichen. Feuerkraut.

H. ad terram, imprimis vero ad truncos arborum putridos et ad saxa: copiose reperitur in rupibus circa

circa Waake; et ubique fere in sylva inter Cammerborn et Nienover.

Quod habitum externum multiplici praeditus forma hic Lichen, figuras habet omnium praecedentium varietatum imprimis autem et consuetius *varietati* nostrae *b.* similis est. Tubercula in statu recenti eleganter coccinea, notam praebent distinctionis. Caules plerumque colore gaudent albicante, variant vero etiam fusco, viridi, glauco; glabri sunt ut plurimum, aliquando vero verrucosi quoque, et parvis foliolis siue squamis obfiti.

Color tuberculorum recentium coccineus, mutatur in fuscum per aetatem, aut si specimina a pluvia madida, aut saepe aqua irrorata chartis bibulis asseruantur, immo in atro fuscum abit; in quo statu non amplius distingui possunt huius lichenis specimina, a *vulgari pyxidato tuberculis fuscis*, cuius varietas iunioris aetatis esse mihi videtur.

Specificam virtute commendatur infusum huius lichenis cum lacte paratum in tussi infantum conuulsiva. Tubercula coccinea lixiuio alcalino macerata, tincturam praebere purpuream durabilem asserit *Richard. Reed*, in *Transact. philosophic.* vid. *Dillenium*. l. c. et *Act. acad Vps.* 1745. p. 245.

Varietas huius lichenis alia, tuberculis coccineis pariter insignita, sed non tam distincte scyphifera ramosa vero in summitate, est illa, quae LINNAEO audit:

Lichen (*digitatus*) scyphifer ramosissimus: ramis cy-

lindricis, calycibus integris nodosis *Linn. Sp. Pl. p. 1620. n. 63.*

L. infundibulis palmatis, fungulis coccineis. *Hall. Hist. elv. l. c. n. 1939.*

L. coralloides, caule ramoso; ramis in tubercula coccinea desinentibus. *Scop. Flor. Carn. p. 92. n. 26.*

L. coralloides, tubulosus, cinereus, minor, parum ramosus, receptaculis florum coccineis. *Michel. Gen. p. 80.*

östiger Scharlachköpfiger Becher Lichen.

H. cum praecedente in iisdem locis.

g. Lichen pyxidatus, cristatus,

Lichen scyphifer, caule ramoso, rami, pyxidatis, in extremitates minores, pyxidatos cristatos desinentibus, punctis fuscis vndique terminatis.

L. coralloides, caule ramoso squamoso; ramis congestis in tubercula exigua et fusca desinentibus. *Scopol. Flor. Carn. p. 92. n. 25.*

L. pyxidatus ramosus, acetabulis fimbriatis. *Hall. En. Helv. p. 67. n. 30. addend. p. 766.*

L. infundibulis proliferis palmatis, ferratis, et punctatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 75. n. 1937.*

Coralloides cornucopioides incanum, scyphis cristatis, *Dill. musc. p. 94. Tab. 17. f. 17.*

schwarz verbämter Becher Lichen.

In trunco putrescente fagi, in sylva circa Adelipsen inueni

Rarior haec varietas apud nos est, quae externo habitu similis *Licheni pyxidato prolifero* nostro, differt caule ramosiore, terminato superne in pyxides proliferas, quarum maiores diffformes, in minores protenduntur pyxides, instar ramusculorum, margines priorum obfidentes. Minorum istarum pyxidum laciniatarum extremitates, terminantur in exigua fusca tubercula, quae ob magnam copiam totum lichenem cristatum superius faciunt. Caules speciminum meorum, vti *Dillenius* sua describit, multo pulvere incano intrati sunt.

h. *Lichen pyxidatus, gracilis.*

Lichen (gracilis) scyphifer ramosus, denticulatus filiformis, Linn. Sp. Pl. p. 1619. n. 62. Necker. delic. Gallobelg. p. 518. n. 35.

L. infundibulis proliferis et corniculatis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 76. n. 1946.

L. coralloides, caule simplici subulato nudo. Scop. Flor. Carn. p. 90. n. 15.

L. pyxidatus, corniculis aduncis. Michel. Gen. p. 80. Ord. VII. n. 3. 9. Tab. 41 f. 2. 5.

Coralloides scyphiforme ferratum elatius, caulibus gracilibus glabris. Dillen. musc. p. 84. Tab. 14. f. 14. C. quae ex errore (quod Cel. SCOPOLI monet) signata fuit n. 13. Tab. 15 f. 14. sparsim A. B., nec non fig. 16. E.

Schlankstengelicher Becher Lichen.

H. in sylvis inter alias varietates; copiose eum inueni in via a Kerstlingeroderfelde versus Mackenrode.

Succincte hanc omnino notabilem varietatem describit Ill. HALLERVS in *Hist. elv. l. c.* sequenti modo:
 „Proliferi genus est, per quod transitus ad *Coralloideos*
 „*Lichenes*, (f. *Fruticulosos* Linn.) Crusta foliacea vul-
 „garis *pyxidati*. Tubuli longi, graciles, cylindrici;
 „acetabula perangusta, vix caua. Ex eorum ora, alias
 „praelonga cornua, alias et tubuli, in noua acetabula
 „proliferi. Longus inde et gracilis, et ramosus fit,
 „denique vero *coralloideo Licheni* similis,. Albus fere
 caeterum, et polline dense aspersus.

***** *Fruticulosi*. Linn. *Sp. Pl.* p.
 1620. *Lichenum coralloidum*. Dillen. *Hist. Musc.*
Ord. III. p. 98. Hall. *En. Helv. Ord. III.* p. 68.
Scop. Flor. Carn. Ord. III. Hall. *Hist. Helv. T. III.*
Ord. II. p. 77.

Isti eodem modo vt *Scyphiferi*, e crusta
 surgunt foliacea, et non alio modo, nisi forte
 specie ab iis differunt; quin ne hoc quidem au-
 ctiores admittunt, qui accuratius in origines ho-
 rum *Lichenum* inquisiuerunt: * attamen, cum
 nullos scyphos in his deprehendamus, sed sola
 tubercula: cum substantia tubulosa durior sit
 scyphiferis, multoque ramosior, qua, et figura
 sua, fruticulo aemula sunt; maioris perspicui-
 tatis gratia liceat hos specialibus nominibus di-
 stinguere, quamuis facile concedam, omnes
 vnius

* vid. *Hall. En. Helv. p. 63.* et in *addend. p. 756.*
 (ad pag. 68. lin. 44.) *Scop. Flor. Carn. p. 93.*

vnus speciei, (quod omnino verisimile videtur) varietates esse posse, differentiae enim scyphiferorum a fruticulosis haud adeo magni est momenti.

Quidam horum Lichenum sub axillis ramulorum vt plurimum dichotomorum, ac quasi perforata habent foramina. Caeterum in iisdem locis ac *scyphiferi* nascuntur, saepe illis permixti, parique modo in forma sua variant.

LICHEN rangiferinus, α alpestris.

Lichen fruticulosus perforatus ramosissimus; ramulis nutantibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1620. n. 66.*

L. fruticosus, farinosus, furculis innumeris nutantibus. *Hall. Hist. Helv. p. 78. n. 1956. 1957.*

L. coralloides, caule ramoso candido, extremitatibus patulis rufescentibus radiatis. *Scapol. Flor. Carn. p. 94. n. 31. 32.*

L. coralloides tubulosus maior, ramosissimus, receptaculis florum rufescentibus perexiguus. *Michel. Gen. p. 79 Tab. 40. f. 1. Hall. En. Helv. p. 69. n. 38.*

Coralloides montanum, fruticuli specie, vbique candidans. *Dill. musc. p. 107. Tab. 16. f. 29.*

β. Lichen rangiferinus, syluaticus.

Lichen caule ramoso, alis perforatis, ramis capitatis. *Linn. Sp. Pl. l. c. var. β.*

L. coralloides tubulosus albidus minor, et mollior, caulibus crassioribus, minus ramosis, receptaculis florum perexiguus rufescentibus. *Michel. Gen. p. 79. n. 7. Hall. En. Helv. p. 69. n. 39.*

Coralloides fruticuli specie, candicans, corniculis rufescentibus. *Dill. Musc. p. 110. Tab. 16. f. 30.*

Icon *Oederi Flor. Dan. Tab. 180.*

frauser ästiger Strauch lichen; Kennthier lichen Kennthier Moos.

H. ad terram, ubique in sterilibus locis sylvarum.

Differunt hae duae varietates in habitu, qui in *alpstri* maior ramosior, in *sylvatico* minor et non tam ramosus; colore, qui priori albicantior est, posteriori ad rufum tendens; tuberculis, in priori minoribus, in posteriori amplioribus, extremitatibus in priori minus patulis, sed recurvis plerumque, in posteriori vero magis erectis: substantia, in priori paullo molliore ac in sequenti. Conueniunt vero: figura fruticulo perfecte aemula, pari loco natali, in quo intermixti inter se mihi occurrerunt; prouentus ex vna eademque crusta foliacea; quae vero in priori, quando adultior euadit, perire solet nullo vestigio remanente, hinc factum puto, quod Ill. HALLERVS *l. c.* illi deneget crustam, quae tamen in iuniori aetate, quando semuncialis circiter altitudinis est, copiosa reperitur. Mollities et durities, ab aetate iuniori, et adultiore, itemque a loco natali, pendere videntur. Sunt enim mihi specimina prioris varietatis, aestate lecta ad truncum arboris, sub tempestate diuturna sicca, quae omnino non cedunt alteri duritie, immo fragilia fere sunt.

Hoc Lichene pascuntur Rangiferi, et apud nos cerui quoque, sub hiemis penuria abrasa niue, exinde escam petunt.

LICHEN *subulatus*.

Lichen fruticulosus subdichotomus, ramis simplicibus subulatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1621. n. 68. Necker. delic. Gallobelg. p. 520. n. 40.*

L. caule fruticoso erecto, ramis ascendentibus dichotomis. *Hall. Hist. Helv. p. 78. n. 1955.* caule fruticoso, subfolioso ramis ascendentibus, repetito bifurcatis punctiferis *n. 1954.*

L. coralloides, caule ramoso, extremitatibus furcatis. *Scop. Flor. Carn. p. 93. n. 30.*

L. coralloides, tubulosus, glauco viridis, totus crusta foliacea tectus. *Hall. En. Helv. p. 69. n. 37. addend. p. 766.*

Coralloides aspera, corniculis tenuioribus, bifurcatis. *Vaill. Bot. Paris. Tab. 7. f. 7.*

Coralloides corniculis brevioribus et crebrioribus. *Dill. Musc. p. 104. Tab. 16. f. 27. B. longioribus et rarioribus. Tab. 16. f. 27.*

lang ästiger Strauchy Lichen.

In sylvis copiose, v. g. in Wehndensi.

Magnitudine, et habitu ramosiore, et simpliciore caulium glabrorum, et foliosorum, colore albicante, et glauco variat. Apices ramulorum dichotomi plerumque, aliquando etiam trifurcati. Tubercula fusca.

LICHEN *paschalis*.

Lichen fruticulosus solidus, tectus foliolis crustaceis
Linn. Sp. Pl. p. 1621. n. 69.

L. caule fruticoso fungifero, verrucis calcariis tecto.
Hall. Hist. Helv. T. III. p. 79. n. 1963.

L. alpinus glaucus ramosus botryoides. *Scheuchzeri It.*
II p. 137. Tab. 19. f. 4. Hall. En. Helv. p. 71. n. 48.
Emend. VI. n. 2. Mich. Gen. p. 78. n. 22. Tab. 53. f.
5. 6. 7. 8.

Coralloides crispum et botryforme alpinum. *Dill. musc.*
p. 114. Tab. 17. f. 33.

Musco - fungus coralloides, terrestris, dense ramifica-
tus, cinereus, et veluti incrustatus, noruegicus.
Morif. Hist. Ox. III. p. 633. Sect. XV. Tab. 7. f. 12.

Trauben ähnlicher *Etrauch* lichen.

H. passim in sylvis sterilibus frigidis, inter Lichenem
rangiferinum. v. g. in sylva inter Cammerborn et
Nienouer.

Dignoscitur caulibus crassis (pennam anserinam
aequantibus) materia crustacea vel tophacea obductis,
quae in siccitate albicat, madefacta autem glauca euadit,
punctisque fulcis, quasi parvis tuberculis distincta.

Vesci etiam hoc lichene rangiferos, LINNAEVS refert.

***** *Filamentosi.* *Linn. Sp. Pl. p.*
1622. Lichenes filamentosi. Scop. Flor. Carn.
Ord.

Ord. I. p. 73. *Lichenum* Ord. V. p. 76. *Vsneae*
Hall. En. Helv. Ord. III. p. 70. *Hall. Hist. Helv.*
T. III. Ord. III. p. 80. *Dill. musc. Gen.* IV. p.
 56.

Horum optimam et succinctam tradit sequentem generalem descriptionem DILLENIVS l. c.

„Constant ex meris caulibus, seu funiculis
 „aut filis, teretibus plerumque, solidis et rigidis,
 „dis, quorum extremitates et latera subinde
 „in orbiculos exsuccos, floris aut fructus aemulos
 „desinunt, modice concauos, limbo carentes,
 „basi vero sua, et quandoque per ramulos arborum
 „corticibus innascuntur, Visci instar, cuius more
 „aliena quadra viuunt.,

Cui adde, plurimos gaudere radice scutiformi
 margine tomentoso praedito. Caules, siue
 fili tenues, materia crustacea puluerulenta,
 qua crassiores et rigidiores euadunt, in quibusdam
 speciebus incrustati obseruantur. Haec puluerulenta
 substantia inflammabilem habet naturam, hinc est,
 quod admota candelae flamma extremitatibus filorum,
 subito, et cum leui strepitu percurrat omnes ramulos.

„Species quaedam praeditae sunt vi adstringente,
 „et roborante; quaedam ad tingendum aptae,
 „et quaedam pro esca rangiferis inseruiunt

„viunt., vid. DILLENIVM in Praefat. p. VI. et
in *Hist. Musc.* p. 56. 64. 66.

LICHEN *barbatus*.

Lichen filamentosus pendulus, subarticulatus, ramis
patentibus *Linn. Sp. Pl.* p. 1622. n. 73.

Lichen barbatus, trunco articulofo laevi. *Hall. Hist.*
Helv. p. 81. n. 1970.

Vinea barbata loris tenuibus fibrosis. *Dill. musc.* p. 63.
Tab. 12. f. 6.

lang bärtiger Faden Lichen.

H. frequentissime in sylvis sterilibus, ubi alte de-
pendet ex quercubus fagisque v. g. circa Neuhaus,
circa die Bruck.

Cauliculi eius siue lora ad semipedalem longitudi-
nem protensi, non admodum ramosi sunt, fibris vero
crebris horizontalibus, adnatis secundum totam longitu-
dinem ramorum, inter se implicantur. Pulvere incano
adpersi sunt, qui ad candelam cum leni strepitu subito
deflagrat. Color est e glauco albicans. Si aliquamdiu
in aqua maceratur rubrum accipit vel aurantiacum colo-
rem: hinc in Pensylvania, referente *Dillenio*, pro tin-
gendo colore aurantiaco usurpatur. Scutellas non vidi
in meis specimenibus, quas *Dillenius* dicit minimas,
rufas, caulibus insidentes.

Vi adstrictoria praeditus, commendatur a *Dioscori-*
de, decoctus infessu ad muliebrum locorum vitia. vid.
Dill. l. c. p. 64.

LICHEN *iubatus*.

Lichen filamentosus pendulus; axillis compressis. *Linn.*

Sp. Pl. p. 1622. n. 74.

L. filamentosus pendulus, tuberculis lateralibus innatis.

Scop. Flor. Carn. p. 74. n. 5.

L. barbatus pendulus, filamentis nigris prolixis, Hall.

Hist. Helv. p. 80. n. 1968.

L. capillaceus longissimus, f. Muscus arboreus nigri-

cans, Usnea officinarum. Mich. Gen. p. 77. n. 7.

Hall. En. Helv. p. 70. n. 45.

Usnea iubata nigricans. Dill. musc. p. 64. Tab. 12. f. 7.

schwärzlich lang haariger Faden Lichen.

H. in sylvis sterilissimis. densissimis. v. g. circa Neu-

haus in sylvis Sollingensibus, copiose etiam in hercy-

nicis, ubi arborum truncos septentrioni obuersos co-

matus quasi efficit.

Constat ex filamentis tenuibus, superne compressis, extremitatibus capillaribus, implexis, crispis; colore atrouiridibus, substantia in siccitate subrigidis, elasticis, si aqua irrorantur, flaccidis instar crinium. Scutellae, siue tubercula sparsa sunt passim secundum totam longitudinem filorum, magnitudine seminis papaueris, in siccitate alba, quae humefacta, e viridi luteo polline (quod per lentem conspici potest) plena apparent, vid. *Scopol. l. c.*

Rangiferos hoc lichene pasci refert *Dillenius l. c.*

LICHEN *hirtus*.

Lichen filamentosus ramosissimus erectus, tuberculis sa-

rinaceis sparsis. *Linn. Sp. Pl. p. 1623. n. 78. Scop. Flor. Carn. p. 74. n. 2.*

L. barbatus, teretibus cauliculis, ramis simplicibus parallelis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 81. n. 1973.*

Vinea vulgatissima, tenuior et brevior, sine orbiculis. *Dill. musc. p. 67. Tab. 13. f. 12.*

sträubiger Faden Lichen.

H. copiose ad arbores et sepimenta.

Cauliculis gaudet fibrosis, valde ramosis, vncialibus, bi, tri, et quadriuncialibus, e cinereo virescentibus, arte inter se implexis, tactu rigidis, et elasticis. *Hallerus* cum sequenti coniunxerat in *En. Helv.* nunc vero in *Hist. Helv.* separavit.

Pro sarcotico praestantissimo commendatum sibi *Dillenius* p. 68. refert, et in decocto ad firmandos pillos.

LICHEN *floridus.*

Lichen filamentosus ramosus erectus; scutellis radiatis.

Linn. Sp. Pl. p. 1624. n. 81. Scopol. Flor. Carn. p. 73. n. 1.

L. barbatus, ramis teretibus, furculis parallelis simplicibus, scutellis radiatis. *Hall. Hist. Helv. p. 81. n. 1972.*

L. cinereus, capillaceo folio, minor. *Hall. En. Helv. p. 70. n. 46.*

Vinea vulgatissima tenuior et brevior cum orbiculis. *Dill. musc. p. 69. Tab. 13. f. 13.*

Stern Schildtragender Faden Lichen.

H. ad arborum truncos.

Differt a praecedente, magnitudine insigniore, ramis patentioribus, scutis planis, latis, radiatis in formam stellae, terminalibus.

Qui recensitas hasce Lichenum species colligere cupiunt, in eorum gratiam, praecipua quae magna copia abundant loca, indicabo. In vicinia urbis sylva Wehudenensis, Geismariensis, et sic dicta Heinholtz permultos profert, imprimis Lichenes foliaceos et coriaceos: leprosi, imbricati, coriacei, pyxidati, fruticulosi, filamentosi, quaerendi sunt maxime in sylva pone Kerstlingeroderfeld, auf der Bruck, ad rupes circa Waake, circa Reinhausen. In sylvis Sollingensibus, Lichenum ditissimae sunt, sylvae inter Cammerhorn et Nienpauer, circa Neuhaus auf der Bramburg,

IVNGERMANNIA, LINN. Gen. n. 1196.
MICHEL, Gen. p. 6. HALL. En. Helv. p. 120.
Hist. Helv. T. III. p. 57. SCOPOL. Flor.
Carn. p. 121. MVSCOIDES MICHEL. Gen.
p. 9. HALL. En. Helv. p. 123. LVNVLARIA,
MICHEL. Gen. p. 4. HALL. En. Helv. p. 125.
MARSILEA. MICHEL. Gen. p. 5. HALL. En.
Helv. p. 123.

Vegetabile foliaceae figurae, caulibus aut succulentis nudis, aut ficcioribus, et folioli distinctis ornatis, constans, in aqua reviviscens, fructificationis partibus perfectiorum plantarum analogis, conspicuis instructum.

Istae fructificationes constant e globulo pedunculato, in quatuor valvas diffiliens, intus pulvere farinoso referto; cui Ill. LINNAEVS nomen antherae tribuit, et florem appellat masculum, e perichaetio, siue inuolucro tubuloso, in basi pedunculi sito enascente. Flores vero femineos quos ille vocat sessiles, seminibus plurimis foetos esse dicit.

Radicibus gaudent filamentosis, vndique instar tomenti fusci, villosi, nervis foliosorum, aut secundum longitudinem, in media aut inferiore parte caulium gelatinosorum, adhaerentibus: quibus sese firmiter applicant aut terrae aut, saxi, aut aliis vegetabilibus.

Substantia IVNGERMANNIARVM tessellata, e vesiculis quasi, per lentem composita apparet.

Locis vmbrosis, humidis, crescere gaudent, vigentque per totum annum; florere autem solent, imprimis circa veris initium et autummum.

Odore praeditae sunt, vel nullo, vel parumper

rumper mucido, sapore mucilaginoso, in quibusdam leuiter amaricante, subadstringente.

Vires medicae, et vñs oeconomicus adhuc ignoti.

* *Foliis a caule distinctis destitutae.* Scop. *Flor. Carn.* p. 121. *Acaules frondibus simplicibus.* Linn. *Sp. Pl.* p. 1602. *Lichenastrorum* Dill. *musc. Ord I. II.* 479. *Marsileae et Lunulariae.* Michel. *Gen.* p. 4. 5. *Hall. En. Helv.* p. 124. 125.

Substantiae sunt succulentae, foliaceae ad externam formam, quamvis reuera caulina sit. Quoniam vero folia, quae in aliis speciebus distincto innascuntur caule, in his cum caule ipso confluunt, ob figuram laciniatam, quae foliis veris magis competit, quam caulibus, dictae sunt *acaules*.

Fructificationes quod attinet, cum reliquis conueniunt. Arcius adhaerent terrae et vegetabilibus, quibus innascuntur per tomentosos radices. Reuiuiscunt quidem in aqua, sed reliquis lentius, et quaedam nonnisi per diurnam macerationem; id quod succulentioribus proprium est. Amant praecipue humidissima loca sylvarum, oras riuulorum, saxa arenosa, et arborum truncos, qua humido vento expositae sunt.

IVNGERMANNIA *epiphylla*.

Iungermannia acaulis foliolo frondi innato. Linn. Sp. Pl. p. 1602. n. 24.

I. acaulis, foliis reticulato rugosis, thecis dorsalibus divergentibus glabris. *Scop. Flor. Carn. p. 121. n. 1.*

I. fronde foliacea, obtuse lobata, ex medio florifera. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 63. n. 1883.*

Marsilea maior atrovirens, floribus albicantibus, e foliorum medio egredientibus. Michel. Gen. p. 5. Tab. 4. f. i. Fall. En. Helv. p. 124. n. 1.

Lichenastrum capitulis rotundis e foliorum medio nascentibus, Dill. musc. p. 508. Tab. 74. f. 41.

langblättrige Leberfraut *Jungermannie*.

H. ad fossas et rivulos sylvarum circa Waake, copiose circa Neubaus.

Habitus eius *Marchantiae* similis, at substantia multo tenerior et tessellata, nudis oculis, si luci obvertitur patens, et pellucida. Folia varie laciniata, pallide virentia superne, in medio nigra linea distincta, inferne tomento copioso terrae limosae arcte adhaerent. Lacinae foliorum ut plurimum ex oblongo rotundae, paullatim sinuatae sunt, extremitatibus crispis. „E medio ramorum folio, vaginae cylindricae, quasi lacerae, „subhirsutae (rubrae) e quibus seta caeva, praelonga, „debilis, argentea erigitur, globulum praeferens virentem, qui in quatuor segmenta, flava, cinnamea, glabra, praeter villosum glomerem finditur. Medio ex flore villi nigri erumpunt,„ vid. *Hall. Hist. Helv. T. 6.*

IVNGERMANNIA *pinguis*.

Jungermannia acaulis, fronde oblonga, sinuata pingui.

Linn. Sp. Pl. p. 1602. n. 25. Scop. Flor. Carn. p. 122.

n. 3. Necker. delic. Gallobelg. p. 489. n. 2.

I. fronde foliosa, lacera, ex latere florifera. *Hall. Hist.*

Helv. T. III. p. 63. n. 1884.

Marfilea media pinguis, pallide virens, floribus maioribus nigricantibus, ad foliorum latera egredientibus

Michel. Gen. p. 5. Tab. 4. f. 2.

Lichenastrum capitulis oblongis, iuxta foliorum diuissuras enascentibus. *Dill. musc. p. 509. Tab. 74. f. 42.*

ausgeschweifte sette Jungermannie.

H. copiose ad vias sylvarum vdas umbrosas, ad rupes, in terra; circa die Bruck, circa Niedeck.

Varia ludit magnitudine foliorum, hisque magis aut minus laciniatis: alia longiora sinuata tantum, laciniis extremis amplis, rotundis, alia autem in minora et copiosiora diuisa reperinntur, in lacinias obtusas rotundatas, bi aut trilobatim fissa: qualia foliola pinxit *Dillenius*, citata figura, sub lit. U. sed non satis profunde in hac pictura emarginatae sunt lacinae. Circa mensem Aprilem, minora laciniata foliola, ad margines et interstitia laciniarum, protrudunt capitula parua, oblongo-rotunda, nigra, quae sensim crescunt, et vaginis inferne instruuntur pallide viridibus. Pedunculi (s. setae) albicantes, pellucidi, vnciales, bi, ad triunciales, capitula gerunt oblonga, instar clauae, nigra, lucida, dehiscentia in quatuor oblongas lacinias subhirsutas, puluerem nigro-fuscum eiiculantia. Quaedam longiora specimina, his floribus destituta, viridibus ver-

ruccis obsita sunt, circa mediam longitudinem. Foliorum color nunc obscure, nunc pallidius viridis. Inferior foliorum pagina, linea in medio distincta est, tomentosis fibrillis, quibus arcte terrae adhaeret oblita.

IVNGERMANNIA *furcata*.

Iungermannia acaulis, fronde lineari ramosa, extremitatibus furcatis obtusiusculis. *Linn. Sp. Pl. p. 1602. n. 25. Scopol. Flor. Carn. p. 123. n. 4. Necker. delic. Gallobelg. p. 488. n. 1.*

1. foliis linearibus, dichotomis, inferne floriferis. *Hall. Hist. Helv. p. 63. n. 1885.*

Marsilea minima, angustifolia, floribus nigricantibus ex inferiori foliorum parte, a subhirsuta, et turbinata vagina erumpentibus. *Michel. Gen. p. 5. Tab. 4. f. 4. Hall. En. Helv. p. 125. n. 5.*

Lichenastrum tenuifolium furcatum. *Dill. musc. p. 51. Tab. 74. f. 45.*

zweysach gespaltete sette Jungermannie.

H. copiose ad truncos arborum, septentrioni obverso latere, quod saepe ad pedalem latitudinem tegit, etiam ad terram, inter muscos, et ad saxa.

Cauliculorum repentium siue prostratorum varia ludit magnitudine a 2, 3 linearum ad uncialem longitudinem. Foliola in tenerrima aetate bifida quidem iam sunt, pellucida, coloris pallide sulfurei, nervo per medium folium aequae, ac brachiatis lacinias decurrente, sed friabilia leuissimo tactu in puluerem luteum, farinosum, pinguem: in tali statu saepe eam ad arborum

rum truncos reperi, et inter muscos. In adultiori aetate maiora fiunt folia, laciniis plurimis bifurcatis, (aut trifurcatis, in paucis quibusdam) colore praedita obliquis viridi, neruo medio rubente, magisque distincto. Circa veris initium, pronascuntur ex inferiori foliorum, qua terrae radiculis tomentosis adhaerent parte, vaginae e globoso conicae, hirsutae, quae setas emittunt, 3, 4 lineares, tenues, candidas, reflexas sursum, capitulis parvis subrotundis, fuscis vel rufis instructas.

IVNGERMANNIA *multifida*.

Jungermannia acaulis, fronde bipinnatifida. *Linn. Sp.*

Pl. p. 1602. n. 26. Necker. delic. Gallobelg. p. 489.

n. 3.

Lichenastrum ambrosiae diuisura. *Dill. musc. p. 511.*

Tab. 74. f. 43.

vielfach eingeschnittene fette Jungermaunie.

Hanc alibi raram speciem, copiose et in sylvis Sollingensibus, et circa Grossen Schneen in monte Bocksbeu- ad vias vdas umbrosas reperi.

Foliis Jungermanniae pingui quodammodo similibus sed multo minoribus, in frequentes lacinias pinnatas diuisis, dignoscitur. Substantia in recenti pinguis, pellucida, succulenta. Foliola plana sunt, et in iis quae non florent speciminibus profundius fissa. Color iuniorum (quae densissime ad se inuicem aggregata superne crustam granulosa referunt quasi) e luteo, adultiorum speciminum obscurius viridis. In inferiori extremitate foliorum, ubi plura quasi circa centrum collecta sunt, exoriuntur thecae oblongae rotundae, subluteae, setas proferentes unciales, pellucidas, candidas, quarum

capitula sunt ex oblongo rotunda, coloris e viridi nigricantis. Specimina floribus instructa duo tantum obseruavi, mensis Maii initio. Quamuis parua sint foliola semuncialia circiter (paulloue longiora, sed raro tantum) et inter muscos plerumque abscondita, tamen magna eorum copia dense aggregatorum, oculo vias vdas sylvarum proprius inuestiganti, facile sese produnt. Terrae limosae arctissime adhaerent, quae magno labore et suspenſa manu, ob teneritatem multa aqua elui debet.

*** *Foliis a caule distinctis praeditae Scop. Flor. Carn. p. 123. Iungermanniae Michel. Gen. p. 6. Hall. En Helv. Ord. I-II. p. 120. Muscoides Michel. l. c. p. 9. Hall. l. c. p. 123. Lichenastrorum Dill. musc. Ord. I. p. 479.*

His caulis foliolis multis, distinctis, pinnatim congestis, vel imbricatim sibi incumbentibus praeditus est. Fructificatio vt in reliquis. Substantia non tam succulenta vt praecedentium, per lentem tesselata, in aqua citius reuiuiscens. Surculi siue frondes repentes sunt, rami vero eorum plerumque erecti. Nascuntur in terra, ad truncos arborum, et ad saxa.

(a) *Frondibus pinnatis secundis.*

IUNGERMANNIA *asplenoides.*

Iungermannia frondibus simpliciter pinnatis, foliolis ouatis subciliatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1597. n. 1. Scop. Flor.*

Flor. Carn. p. 126. n. 11. Necker. delic. Gallobelg. p. 492. n. 8.

I. foliis pinnatis, subrotundis, ferratis, ex apice florifera. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 60. n. 1868.*

I. maior, foliis brevioribus et obtusioribus, non dentatis. *Mich. Gen. p. 8. Tab. 5. f. 3. Hall. En. Helv. p. 122. n. 8.*

Lichenastrum Asplenii facie, pinnis laxioribus. *Dill. musc. p. 482. Tab. 69. f. 5.*

β. Jungermannia caule ramoso repente, foliis imbricatis, ovato crenulatis, alternis minoribus. *Linn. Sp. Pl. l. c. var. β.*

I. maior altera, foliis subrotundis, tenuissime denticulatis *Michel. Gen. p. 7. Tab. 5. f. 2. Hall. En. Helv. p. 121. n. 6.*

Hepaticoides Polytrichi facie. *Vaill. Bot. Paris, p. 99. Tab. 19. f. 7.*

Musci trichomanoides, foliis rotundioribus pellucidis, squamatis conjuncte sibi incumbentibus. *Morif. Hist. Oxon. III. p. 627. Sect. XV. Tab. 6. f. 42.*

Lichenastrum Asplenii facie pinnis confertioribus. *Dill. musc. p. 483. Tab. 69. f. 6. Hall. Hist. Helv. l. c. var. β.*

Milzkraut Jungermannie.

Utræque varietates copiose reperiuntur in sylvarum locis vdis, ad vias, et truncos arborum.

Hae duae varietates saepe in eodem loco inter se comixtae reperiuntur. Prior furculos habet digitum circiter longitudine aequantes, simpliciores, foliola magis a se inuicem remota, et latiora: posterior furculos ramosiores, breuiore, foliola magis approximata, minora. Vtrarumque folia in margine superius ciliata sunt paruis, acutis, pellucidis dentibus, nudo oculo conspicuis, licet non adeo magnis quales *Michelius* pinxit. Color utrarumque pallide viridis. In infima furculorum extremitate terrae affixa, radiculae tomentosae observantur. Caeterum caules suberecti, foliorum series alterna, habitus *Asplenio Trichomani* L. similis. E summo apice furculorum mense Decembri circiter, vaginae aliquot linearum longitudine, et setae enascuntur unciales, pellucidae, albicantes, capitulis terminatas ovatis, nigro purpureis, splendentibus, in valvulas quatuor latas dehilcentibus.

IVNGERMANNIA *viticulosa*.

Iungermannia frondibus simplicibus pinnatis, foliolis subulatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1597. n. 2.*

I. foliis pinnatis subrotundis, ex caule florifera. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 60. n. 1869.*

I. terrestris, viticulis longis, foliis perexiguis, densissimis, ex rotunditate acuminatis. *Mich. Gen. p. 3. Tab. 5. f. 4.*

Lichenastrum Trichomanis facie, e basi et medio florens. *Dill. musc. p. 484. Tab. 69. f. 7.*

langranckige *Jungermannie*.

II. ad terram in viis vdis sylvarum. v. g. pone *Kerstlingeroderfeld*, et alibi.

Simi-

Similis quidem praecedenti respectu habitus, differt autem ratione florendi diuersa, surculis ramifloribus copiosioribus, foliis minoribus, et versus apicem surculorum decrefcentibus, ouatis, margine ciliato reuoluto, vt conuexa videantur, et acuminata, in siccitae. Color pallide viridis iunioribus, annosioribus ad rufum vergens. Surculi ad digiti longitudinem protensi repunt, ramis siue viticulis vncialibus, aut biuncialibus distincti. Cauliculorum extremitates inferiores terrae affixae, paucis, minimisque foliis annosioribus fuscis praeditae, filiformes euadunt. Verno tempore, e medio neruo, versus inferiorem vt plurimum extremitatem, et circa ortum ramulorum, euascentur setae tenerrimae vnciales et longiores, e vaginis lacinatis, capitula gerentes subrotunda, nigra, splendentia, in quatuor lacinias spadiceas dehiscentia.

IVNGERMANNIA *polyanthos*.

Iungermannia frondibus simpliciter pinnatis, foliolis integerrimis, imbricatis, conuexis. *Linn. Sp. Pl. p. 1597. n. 3. Necker. delie. Gallobelg. p. 491. n. 6.*

I. foliis pinnatis, ouatis, ex caule florifera *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 60. n. 1870.*

I. palustris repens, foliis densissimis, ex rotunditate acuminatis. *Mich. Gen. p. 8. Tab. 5. f. 5. Hall. En. Helv. p. 122. n. 10.*

Lichenastrum Trichomanis facie, polyanthemum breue et repens. *Dill. musc. p. 486. Tab. 70. f. 9.*

furzranckige Jungermannie.

H. in terra vda, sylvarumque locis umbrosis inter muscos.

Differt

Differt a praecedenti, surculis multo minoribus, foliolis densioribus confertis, et e dimidia parte mutuo se tegentibus, margine integro, nervo medio inter foliola multo tomento obsito, pedunculisque floralibus confertioribus, brevioribus. Arcissime sub tomentum copiosum terrae adhaeret. Cauliculi breves sunt, vix unciam aequantes, pinnati. Foliola pellucida, convexa, ovato obtuse acuminata, serie alterna. Color viridis, junioribus pallidior. Circa ramulorum ortum plurimae, alibi pauciores, at semper e medio nervo, lateraliter paullulum, et inter pinnularum alas, surgunt pedunculi lemunciales, teneri, candidi, pellucidi, cum capitulis nigris, oblongo rotundis, e fusco rufis. Floret circa Aprilem,

IVNGERMANNIA *lanceolata*.

Jungermannia frondibus simpliciter pinnatis lanceolatis, apice floriferis, foliolis integerrimis. *Linn. Sp. Pl. p. 1597. n. 4. Scop. Flor. Carn. p. 126. n. 12.*

I. foliis pinnatis, ovatis, confertis, ex apice florifera *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 61. n. 1871.*

I. palustris minima, repens, foliis subrotundis, densissimis laete viridibus. *Mich. Gen. p. 8. Tab. 5. f. 6, Hall. En. Helv. p. 122. n. 11.*

Lichenastrum Trichomanis facie minus, ab extremitate florens. *Dill. musc. p. 486. Tab. 70. f. 10,*

hellgrüne länglichblättrige Jungermannie.

H. in terra humida, muscosa, et ad truncos caeduos, putrescentes arborum.

Surculis brevioribus (vix enim unciam aequant) simplicioribus, pinnulis planis et non tam frequentibus differt

differt a praecedente. Vt plurimum furculi simplices sunt repentes, aliquando vero etiam superius in duos, aut tres ramos subrectos diuisi, qui vti Ill. HALLERVS in *En. Helv. l. c.* bene monet, ad angulos rectos dispositi sunt. Foliola, siue pinnulae, alternae, ad ramos laxè dispositae, planae, lacte virentes splendentes sunt, et versus apicem densius congestae. Quod si non floret, facie externa sua, quodammodo refert *Hypnum complanatum* Linn. a quo tamen differt substantia tessellata, pelluciditate, dispositione ramorum ad angulum rectum, et colore nitido viridiori. Magnam quoque habet, (quod HALLERVS in *Hist. Helv. l. c.* obseruatum refert) similitudinem cum *Iungermannia albicante* Linn. *Dillenii spec.* 20. a qua tamen foliis rotundioribus, et colore iterum diuersa. In extremitate furculorum superiore subrecta, circa veris initium, surgunt pedunculi tenuissimi, vix semunciales, candidi capitula gerentes e viridi fusca aut nigricantia. Latis cespitibus confertim nascitur.

IVNGERMANNIA *bidentata*, & *maior*.

Iungermannia frondibus simpliciter pinnatis, apice floriferis, foliolis bidentatis. *Linn. Sp. Pl. p.* 1598. n. 5. *Scop. Flor. Carn. p.* 125. n. 9. *Necker. delíc. Gallobelg. p.* 490. n. 4.

Hepaticoides Polytrichi facie, foliis bifidis. *Vaill. Bor. Paris. p.* 99. *Tab.* 19. *f.* 8.

Muscus lichenoides, foliis pennatis, bifidis, minor. *Morif. Hist. Ox. III. p.* 627 *Seç. XV. Tab.* 6. *f.* 47.

I. maior repens, foliis bifidis. *Michel. Gen. p.* 8. *Tab.* 5. *f.* 12. *Hall, En, Helv. p.* 122. n. 12.

Liche-

Lichenastrum pinnulis acutioribus et concauis bifidis.

Dill. musc. p. 487. Tab. 70. f. 11.

große Mondförmig eingeschnittene Jungermannie.

H. in terra ad vias vgas, umbrosas sylvarum copiose.

Dignoscitur foliolis s. pinnulis planis, ex ovato subrotundis, pellucidis, dilute viridibus, apice semilunari sectione in duos dentes acutis apicibus, diuiso, Surculi nunc simplices, nunc ramosi, vnciales, biunciales, ad digiti vsque longitudinem protensi, reclinati. Foliola alternatim opposita, lata basi nervo adnata, subrecta, versus ramulorum fines densius congesta. E summo surculorum simplicium aut ramulorum apice, circa autumnum prodeunt thecae fere triangulares, laciniate, cum pedunculis s. setis pellucidis, et capitulis subrotundis e fusco nigris splendentibus, deque more gentis fissis.

β. Jungermannia bidentata minor.

Jungermannia minor repens, foliis subrotundis, bifidis, vagina florum cylindracea. *Michel. Gen. p. 8. Ord.*

VI. n. 4. Tab. 5. f. 13. Hall. En. Helv. p. 123. n. 15.

I. foliis distichis bicuspidatis, summis ramis globuliferis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 59. n. 1865?*

Lichenastrum pinnulis obtusioribus bifidis, minus. *Dill. Musc. p. 488. Tab. 70. f. 12.*

kleine Mondförmig eingeschnittene Jungermannie

H. ad terram in similibus locis.

Surculis haec varietas a maiore differt, minoribus, s. breuioribus, sed confertioribus et in latos caespites congestis. Color obscurius virens. Foliola vt in priori alterna, versus extremitates surculorum latiora, maiora, pari semilunari sectione in duos dentes acutos fissa, et quidem vt Ill. HALLERVS monet in *En. Helv. l. c.* in eo latere quod neruo caulis opponitur, sed triplo fere minora, sic vt vix nudis oculis dentes conspici queant, qui per lentem vero distincte apparent. Quod ad flores pertinet, pariter vt in maiore, enascuntur e surculorum ramusculis in summo apice, vt *Michelius* cit fig. eos pinxit. Licet admodum teneri sint surculi, et vix vnciam superantes, tamen magna eorum copia, sunt enim dense conferti, in caespites, palmae, immo pedalis latitudinis et color amoene viridis, muscos legentium oculos e propinquo allicit.

IVNGERMANNIA *bicuspidata*.

Iungermannia frondibus simpliciter pinnatis, medio floriferis, foliolis bidentatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1598. n. 6.* *Scop. Flor. Carn. p. 126. n. 10.* *Necker, delie. Gallobelg. p. 490. n. 5.*

- I. foliis bifidis, ex medio caule crebro florifera. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 62. n. 1878.*
- I. minima repens, foliis bifidis, vagina florum cylindracea. *Mich. Gen. p. 8. Tab. 5. f. 17.* *Hall. En. Helv. p. 123. n. 15.*

Lichenastrum pinnulis acutissime bifidis, minimum. *Dill. musc. p. 488. Tab. 70. f. 13.*

zweysach gezähnte Jungermannie.

H. in sylvis ad semitas vdas, umbrosas copiose. v. g. circa Kerstlingerodorf.

A praecedente, cuius varietati minori imprimis, valde in habitu suo similis est, differt furculis flaccidioribus non tam ramosis, foliis minoribus, pallidis, figura quadratis, profunde, et ad angulum acutum in duos apicem cuspides sectis. Copiose floret circa Aprilem, ubi e furculorum ramis, in ipsorum exortu, thecae pronascuntur circiter biliniarès, teretes, cum pedunculis filiformibus, albidis, circiter semuncialibus. Cauliculi semunciam ad unciam fere longi, repunt.

(b) *Frondeb. pinnatis: pinnulis auriculatis superne tectis.*

IVNGERMANNIA *trilobata.*

Iungermannia frondibus subtus bipinnatis, foliolis quadratis, obsolete trilobis. *Linn. Sp. Pl. p. 1599. n. 12.*

I. caulibus convexis, foliis descendentibus, imbricatis, tridentatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 59. n. 1866.*

Lichenastrum multifidum, ab extremitate florens. *Dill. musc. p. 494. Tab. 71. f. 23. a quo non differt secundum Ill. HALLERI observationem:*

Iungermannia foliis latiusculis, obtusis, undulatis, et veluti angulosis. *Mich. Gen. p. 7. Ord. IV. n. 1. Tab. 5. f. 10.*

Lichenastrum pinnulis obtuse trifidis, nervo geniculato. *Dill. musc. p. 493. Tab. 71. f. 22.*

Dreyssach stumpfgezähnte Jüngermannie.

Rarius

*Rarius circa die Bruck ad terram, copiosius in syl-
uis occurrit hercynicis.*

Dignoscitur furculis vncialibus, laxè ramosis, siue
potius brachiatis, procumbentibus, et vt Ill. HALLERVS
eos describit, gallorum pedes referentibus, superne
longe conuexis, deorsum curuis. Foliola lineam cir-
citer lata, quadrata aut trapezia, ad basin latiora, im-
bricatin nervo adnata, eque dimidia parte se tegentia,
superne conuexa, extremitatibus deorsum vergentibus,
et in tres quatuor (et quinque, in quibusdam) obtu-
sissimos dentes emarginatis. Superius foliola vtrinque
aequalis longitudinis, parallelo ordine decurrunt, ver-
sus infimam furculorum extremitatem decrescunt. In
inferiori superficie furculorum concava, nervus parvis
foliolis, velut auriculis, imbricatin tectus, ad distantiam
aliquot linearum, hinc et inde radículas longas, sim-
plices, perpendiculares, fibrosas emittit, quibus ad ter-
ram affigitur. Circa veris initium, vaginae bilineares
circiter, globoso-conicae, cum breuissimis pedunculis,
e ramorum aut furculorum extremitate prodeunt. Co-
lor ex obscuro amoene viridis,

IVNGERMANNIA *reptans.*

Iungermannia frondibus subtus bipinnatis, apice reptan-
tibus, foliolis quadridentatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1599.*

n. 13.

I. minima ramosa, polyanthos, foliis imbricatis trifi-
dis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 62. n. 1879.*

Lichenastrum multifidum exiguum, ad basin florens,
per siccitatem imbricatum. *Dill. musc. p. 494. Tab,
71. f. 24.*

Kleine kriechende Erd Jungermannie.

H. ad vias vdas sylvarum, et inter alias Iungermanniarum, et muscorum species.

Surculis teneris, vncialibus, laxè, et inordinate ramosis repit. Folia perexigua vix semi lineam lata, pellucida, in statu recenti laxa, (per lentem) tribus aut quatuor acutis dentibus prædita sunt. In siccitate imbricatim mutuo sibi incumbunt foliola, ad catenulae quasi imaginem, (vt Ill. HALLERVS se exprimit) inde furculi et rami squamosi apparent; aqua madefacta, crispa fiunt ob dentes recurvatos. Color e viridi albicans, in quibusdam ad rufum tendens. Extremitates ramorum superiorum, et furculorum, fibrosae sunt, hisque fibrillis adhaerent vel terrae, vel aliis muscis. Circa Decembrem profert in extremitatibus inferioribus furculorum, copiosas thecas triangulares, albicantes, laciniatas, setis candidis, tenuibus splendentibus, aliquot linearum longitudine, cum capitulis e fusco purpureis splendentibus, ouato oblongis.

IVNGERMANNIA undulata.

Iungermannia frondibus supra bipinnatis, apice floriferis, foliolis subrotundis integerrimis. *Linn. Sp. Pl. p. 1598. n. 8.*

Lichenastrum pinnulis auriculatis maioribus et non crenatis. *Dill. musc. p. 490. Tab. 71. f. 17.*

Hepatica saxatilis undulata seminifera. *Vaill. Bot. Paris. Tab. 19. f. 6.*

dunkelgrüne krausblättrige Erd Jungermannie.

H. ad arborum radices in sylvis sterilibus Sollingensibus; rarius circa die Bruck; copiose ad abietum radices, in sylvis hercynicis.

Sequen-

Sequenti quoad habitum valde similis est, furculis tamen longioribus, superne ramosioribus, colore foliorum undulatum atrouiridi, neruo longiori rubiginoso, atro, fibroso differt. Foliola subrotunda, conuexa sunt superne, inferne concava, et minori auricula, circa neruum, cum superiori foliolo connatum, tecta; maiora, latiora, atrouiridia in extremitate ramorum, versus finem nerui inferius decrefcentia; minora, atrofusca: vltima exigua, atra, tam exilia sunt, vt non amplius recte distingui possint. A neruo, qui nudus adhuc longius decurrit, et vltimis fibrosis geniculatisque neruis aliorum furculorum inseritur, in parua distantia surgunt pari ratione alii furculi, primo simplices nudi, paullo altius geniculati, dein paruis foliolis praediti, et vltimoramoli. Hinc est, quod furculorum nerui fibrosi, inferius varie contorti et implicati obseruentur. Summa cauliculorum et ramusculorum folia lætius virent. Flores e ramorum extremitatibus profert; surgunt nempe e vaginis oblongis, viridibus, pedunculi candidi, vnciales, cum capitulis subrotundis, fuscis.

IVNGER MANNIA *nemorosa*.

Iungermannia frondibus supra bipinnatis, apice floriferis, foliolis ciliatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1598. n. 9.*
Necker. delic. Gallobelg. p. 493. n. 10.

I. foliis bipartitis, auriculatis imbricatis, supremis punctiferis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 58. n. 1859.*

I. nemorosa, foliis acutioribus auritis, tenuissime denticulatis, flore insidente pediculo breuiore. *Mich. Gen. p. 7. Ord. I. n. 2. Tab. 5. f. 8. Hall. En. Helv. p. 120. n. 2.*

Lichenastrum auriculatum, pinnis minoribus crenatis.

Dill. musc. p. 490. Tab. 71. f. 1.

hellgrüne hohlblättrige Erd Jungermannie.

H in sylvis umbrosis ad arborum radices ad cauas semitas. v. g. pone Kerstlingeroderfeld.

Differt a praecedente, cui quoad externam faciem similis, surculis minoribus, foliis densioribus, conuexis quidem vt in praecedente, sed minoribus, laete viridibus, margine crenato, distincte per lentem apparente. Surculi praeterea minus ramosi sunt, et non tam longo praediti neruo, nec inferne novos emittunt, ac praecedens, minores surculos. Foliola basi lata neruum ambiunt, sic vt nullum interstitium nerui inter foliola, quae inferius, et auriculas illas, s. squamas coloratas, quae foliis paulo minores, superius eum tegunt, conspicuum sit. Surculorum extremitates superiores, ob foliola et auriculas paullo latiores reliquis, et densius coagmentatas, crassae, obtuse terminantur. Ciliae foliorum marginem obsidentes, per lentem e cartilagineis, acutis dentibus constare videntur. Flores proneniunt e summis surculis.

IVNGERMANNIA *albicans.*

Iungermannia frondibus supra bipinnatis, apice floriferis, foliolis linearibus recuruatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1599.*

n. II. Necker. delic. Gallobelg. p. 492. n. 9.

I. surculis pinnatis, foliolis recuruis planis auriculatis. *Scop. Flor. Carn. p. 124. n. 7.*

Lichenastrum auriculatum, pinnulis angustis planis, recuruis. *Dill. musc. p. 492. Tab. 71. f. 20.*

Hepaticoides albescens, foliis pinnatis. *Vaill. Bot. Paris. p. 57. n. 4. Tab. 19. f. 5.*

bleichgrüne länglichblättrige Erd Jungermannie.

H. in sylvis ad vias umbrosas, v. g. in sylva Wehndensi, et alibi copiose.

Habitu suo similis est quodammodo *Iungermanniae lanceolatae* Linn. differt vero ramis ad acutum angulum positis, foliolis magis oblongis, laxius dispositis, conuexis, recurvatis. Surculi unciniales, ad biunciales non repunt, sed tantum reclinati sunt. Color pallide viridis per siccitatem albescent. Flores in extremitatibus furculorum tumidioribus.

IVNGERMANNIA cochleariformis.

Iungermannia foliis amplexicaulibus, subrotundis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 58. n. 1861.

I. alpina palustris, purpurea, Cambrica, foliis rotundioribus auritis, tenuissime denticulatis. *Michel. Gen. p. 6. Tab. 5. f. 16.*

Lichenastrum alpinum, purpureum, foliis auritis, et cochleariformibus. Dill. musc. p. 479. Tab. 69. f. 1.

Mnium (Iungermannia) foliis distichis, pinnis subtus auriculatis, Linn. Sp. Pl. p. 1579. n. 18.

Schlante hohlschuppige Jungermannie.

In sylva inter Cammerborn et Nienover, legi hanc alibi variorem speciem.

Facile ab aliis affinibus distinguitur, furculis subrectis, gracilibus, laevibus, vel nullis omnino, aut paucis tantum ramulis distinctis, foliolisque conuexis, amplexicaulibus, unde furculi teretem fere obtinent faciem, quorum summi apices, et iuniores toti furculi, similes

apparent quodammodo *Hypno puro* Linn. Foliola ex ovato oblonga, obtusa superius, inferius nervum caulis cingentia, extus convexa sunt, intus profunde concava. Nervus valde crassus, subpellucidus, cum foliolis, tum his iunctis auriculis cinctus. In siccitate furculi omnino teretes videntur, ob appressa foliola, quae vero per irrigationem, et in statu recenti distant. Color ut plurimum e pallide viridi ad fusco rufum, et in quibusdam ad purpureum tendens. Longitudo admodum varia: vidi sarculos semunciales, unciales, biunciales et paullo adhuc longiores. Situs, saltem in meis specimenibus, fere perpendicularis. Florentem reperire nondum licuit, legi vero aestate circa mensem Iulium. III. HALLERVS in supremis apicibus furculorum vaginas vidit teretes, atque setas; hinc, et simul etiam ob habitum eius, et aspectum externum, *Iungermanniis* magis, quam *Mniis* proprium, illam prioribus praeunte HALLERO accensui.

(c) *Fronibus imbricatis.*

IVNGERMANNIA *complanata.*

Iungermannia furculis repentibus: foliolis inferne auriculatis, duplicato imbricatis, ramis aequalibus. Linn. Sp. Pl. p. 1599. n. 14. Scop. Flor. Carn. p. 124. n. 6. Necker. delic. Gallobelg. p. 494. n. 11.

I. foliis rotundis, alterne imbricatis, caule plano. multifloro, setis brevissimis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 58. n. 1860.

I. foliis circinnatis auritis, imbricatum dispositis, ex viridi flavescentibus, Mich. Gen. p. 7. Ord. II. Tab. 5. f. 21.

Lichenastrum imbricatum maius, squamis compressis et planis. *Dill. musc. p. 496. Tab. 72. f. 26.*

plattschuppige Baum Jungermannie.

H. ad truncos arborum copiosissime.

Surculis variae longitudinis, ab unciali ad biuncialem longitudinem, planis, inordinate ramosis, ad cortices arborum, latis caespitibus repit. Foliola dense imbricata, alterna, rotunda, subpellucida, plana, furculi nervum superne tegunt; inferne nervo adhaerent parvae, rotundae squamulae. Color pallide e luteo viridis. Recens mollis tactu est, aqua madida tota flaccescit. Ad extremitates, et passim ad exortum ramulorum prodeunt thecae planae, squamis duplo vel triplo longiores, dilute virides, truncatae, e quibus setae breves, lineam non excedentes emergunt, tenuissimae, cum parvulis nigris capitulis, in fulcas lacinulas pilosas diffilientes. Florere solet circa veris initium copiose quidem, at flores citissime marcescunt.

IVNGERMANNIA *platyphylla*.

Jungermannia furculis procumbentibus, subtus imbricatis, foliolis cordatis, acutis. *Linn. Sp. Pl. p. 1600.*

n. 17. Necker. delic. Gallobelg. p. 495. n. 14.

I. foliis imbricatis, lanceolatis, superne planis, alternis, inferne concavis, quinquefariis. *Hall. Hist. Helv.*

T. III. p. 61. n. 1872.

Lichenastrum Arboris Vitae facie, foliis minus rotundis. *Dill. musc. p. 501. Tab. 72. f. 32.*

Hepaticoides, furculis et foliolis *Thuyae* instar compressis maior. *Vaill. Bot. Paris. Tab. 19. f. 9.*

Muscoides squamosum maius, atro virens, foliis subrotundis. *Mich. Gen. p. 9. Ord. I. n. 2. Tab. 6.*

f. 3. 4.

große Lebensbaum Jungermannie.

H. copiose ad truncos arborum prope radicem in sylvis, et ad terram.

Surculis suberectis, digitum circiter longitudine aequantibus, in ramos patulos brachiatis, densis caespitibus, vno furculo alteri apposito, crescit. Foliola ex ovato lanceolata, imbricatum duplici serie a dextra ad sinistram, a sinistra ad dextram alternatim congesta, obscure viridia, conuexa superius, inferne concava, et auriculata. Flores similes praecedenti, e foliolorum alis profert, circa veris initium.

Varietas foliis brevioribus, rotundioribus, cordatis est, cuius sequentia sunt synonyma apud HALLERVM *Hist. Helv. l. c.*

β . Muscoides squamosum, saxatile, maximum, compressum, ex obscuro virescens, foliis subrotundis, nonnihil denticulatis. *Mich. Gen. Tab. 6. f. 1.*

Lichenastrum Arboris Vitae facie, foliis rotundioribus. *Dill. musc. p. 502. Tab. 72. f. 31.*

IVNGERMANNIA *dilatata.*

Jungermannia surculis repentibus, foliis inferne auriculatis, duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus. *Linn. Sp. Pl. p. 1600. n. 15. Scopol. Flor. Carn. p. 123. n. 5. Necker, delic. Gallobelg. p. 494. n. 12.*

I. fo-

I. foliis imbricatis, alternis, orbiculatis, setis brevissimis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 62. n. 1874.*

Lichenastrum imbricatum minus, squamis conuexo-concauis. *Dill. musc. p. 497. Tab. 72. f. 27.*

Hepaticoides, furculis et foliolis Thuyae instar compressis, minor. *Vaill. Bot. Paris. p. 99. Tab. 19. f. 10.*

Muscoides minimum foliis alternis: superioribus circinnatis, inferioribus cucullatis, flore pediculo ferme carente. *Mich. Gen. p. 10. Ord. II. Tab. 6. f. 6.*
Hall. En. Helv. p. 124. n. 2.

Kleine Lebensbaum Jungermannie.

H. passim ad truncos arborum in sylvis.

Cauliculis multo minoribus, ramis angustioribus, apice latioribus, foliolis rotundis, conuexo-concauis, distinctis, minoribus, tumidioribus, squamatum laxè sibi incumbentibus differt a praecedenti. A *Jungermannia complanata*, cui alioquin valde etiam similis est, differt foliis duplo minoribus, magis eleuatis, furculis ramosioribus, ramis inferne gracilioribus, superne dilatatis, densioribus, colore obscurius viridi: et aqua madefacta, non tam flaccida euadit. Inferne neruus auriculis, siue foliolis rotundis, alternis, superioribus foliis paullo minoribus, tectus est, et tantum per intervalla passim in conspectum venit; vnde inferior superficies faciem acquirit crispam. Superficies superior, ex foliolis rotundis, squamosis undulata quasi apparet, si aqua mader, similis foliolis *Eypni crispi*. *Dill. musc. Tab. 36. f. 12.* Color ut plurimum atrouiridis aliquando ad rufescentem vergens. Flores initio veris profert, plerumque e summis

summis ramis, e thecis angulosis tumidis, cum setis linearibus, capitulisque subfuscis, lacinulis pilosis.

IVNGERMANNIA. *tamarisci.*

Iungermannia foliis imbricatis serie duplici, superiori-
bus subrotundis conuexis obtusis, quadruplo - maiori-
bus. *Linn. Sp. Pl. p. 1600. n. 16. Necker. delie.
Gallobelg. p. 495. n. 13.*

I, foliis imbricatis rotundis, superne alternis conuexis,
inferne quadrifariis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 61.
n. 1873.*

Lichenastrum imbricatum, Tamarisci Narbonensis fa-
cie. *Dill. musc. p. 499. Tab. 72. f. 31.*

Hepaticoides, quae Muscus trichomanoides terrestris
minor floridus. *Vaill. Bot. Paris. p. 100. Tab. 23.
f. 10.*

Muscoides squamosum, saxatile, nigro purpureum,
surculis angustioribus, foliis circinnatis minoribus.
*Mich. Gen. p. 10. Ord. I. n. 4, Tab. 6. f. 5. Hall.
En. Helv. p. 124. n. 3.*

Tamariscen Jungermannie,

H. ad arborum truncos, et ad rupes.

Surculis multo longioribus, confertim sibi incum-
bentibus, gracilioribus, ramosioribus, ramis aequalis
latitudinis, obtuso apice desinentibus, liberis, et e cor-
ticibus arborum quasi pendulis, a praecedente differt:
cui adde, foliola duplo fere minora, squamatim sibi
incumbentia, tam arcte, ut vix a se inuicem distingui in sic-
citate possint; in superiori superficie conuexa, et fere ro-
tunda,

tunda, extremitatibus deorsum flexis, nitida, in inferiori concava. Nervus distinctior visu, quam in praecedente, inferne geniculatus apparet, ligulis exiguis per lentem bifidis, per totam longitudinem squamatum tectus, qua nota ut essentiali a priori differentia, distinguere optime poterit. Color in iunioribus obscure viridis, in adultioribus ut plurimum rubiginoso-fuscus, imprimis in iis, quae saxi adnascuntur. Circa Februarium aut Martium mensem flores profert, e summis ramis, setis brevissimis, capitulis e luteo fuscis, laciniis pilosis.

IVNGERMANNIA *ciliaris*.

Iungermannia repentibus foliolis, duplicato imbricatis; inferne auriculatis ciliatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1601. n. 18.*

I. caule pinnato, foliis crispis, capillariter multifidis
Hall. Hist. Helv. T. III. p. 63. n. 1881

I. palustris absynthii folio. *Hall. En. Helv. p. 123. n. 17.*

Lichenastrum filicinum pulchrum villosum. *Dill. musc. p. 503. n. 35.*

Muscus palustris Absynthii folio. *Vaill. Bot. Paris. p. 140. n. 5. Tab. 26. f. II.*

Muscus amarus Absynthii folio. *I. Baub. T. III. p. 164.*
grüne wollige Jungermannie.

*H. in locis vdis umbrosis sylvarum Sollingensium rari-
us circa Neuhaus; copiose in suis hercynicis.*

Surculis constat digiti longitudinem aequantibus,
pinnatis, repentibus vel suberectis, ramosis, ramis alter-
nis,

nis, foliolis imbricatis, tam villosis, vt distingui fere nequeant, prae copiosissimo tomento, lacte viridi. Extremitates ramorum, e pinnis arctius congestis, crispae videntur. Quoad habitum refert externo conspectu *Hypnum crista castrensis* Linn. diuisione ramorum pinnatorum. Specimina mea mense Iulio lecta, floribus carent. DILLENIVS mense Martio florere dicit; enascuntur nempe ad ramorum diuicationes, vaginae villosae, longae, straminei coloris, e quibus oriuntur pedunculi crassi, unciales et biunciales, candidi, pellucidi, cum capitulis oblongis, nigris, aut vt II. HALLERVS habet, atropurpureis, in quatuor lacinias fissilibus. Rarius floret.

(c). *Surculis undique imbricatis foliosis
sparsis.*

IVNGERMANNIA *trichophylla*.

Iungermannia surculis teretibus, foliolis capillaceis aequalibus. Linn. Sp. Pl. p. 1601. n. 22.

I. minima, foliis capillariter multifidis Hall. Hist. Helv. T. III. p. 63. n. 1880.

I. omnium minima, folio capillaceo. Hall. En. Helv. p. 123. n. 16.

Lichenastrum trichodes minimum, in extremitate florens. Dill. musc. p. 505. n. 37.

haarblätterige Jungermannie.

H. ad terram vdam, aliisque Iungermanniarum speciebus interrepat.

Surculis constat exiguis, (aliquot linearum) ramosis,

sis, foliolis capillaribus vndique cinctis, per siccitatem aegre visilibus, et furculis tam arcte appressis, vt inde teretes videantur. Madefacta foliola sese explicant, (quarum per lentem vesiculosa apparet substantia) inque acutum excurrunt mucronem. Colore gaudet e luteo viridi, et quasi albicante. Specimina mea in extremis ramis tumidula sunt, floribus vero carent, quos ex summis ramis, eque thecis cylindricis, longis, bifidis, cum setis teneris globulo nigro, quadrifido terminatis, provenire dicunt DILLENIVS et HALLERVS l. c.

MARCHANTIA. LINN. Gen. n. 1198.

MICHEL. Gen. p. 1. HALL. En. Helv. p.

126. Hist. Helv. T. III. p. 64. SCOPOL.

Flor. Carn. p. 117. LICHEN. DILL. Musc.

p. 515.

Caules, in omnibus huius generis speciebus a foliis non distincti, formam referunt foliorum serpentium, reticulatorum, subtus radices emittentium. Substantia, firma, coriacea.

Fructificationem quod attinet, duplex est:
 „*sessilis* altera, tumores nempe in fronde nascentes, qui aperti, et patuli, folia novella
 „continent scobi similia. (*) *Petiolata* alia ex
 „vagi-

(*) Quam Ill. HALLERVS fructificationem appellat *sessilem*, ab aliis Auctoribus vocantur *flores feminei*, quibus tribuunt, calycem campanulatum, patulum, integrum, ant crenatum, sessilem; et semina

„vagina de fronde prodeunte, quae setam gerit ex apice multifloram: floribus cauis, villo pollinifero plenis. Il flores saepe scuto protéguntur: dantur et scura absque floribus sterilia. vid. *Hall. Hist. Helv.* l. c.

MARCHANTIA *polymorpha*.

Marchantia calyce communi decemfido *Linn. Sp. Pl. p.* 1603. n. 1.

M. linea frondem bipertiente, cyathis scobiferis ferratis, setis umbellatis et stellatis decemfidis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p.* 66. n. 1891. fronde aequabili, cyathis ferratis, bacillis umbellatis et stellatis octofidis. n. 1892.

Hepatica officinarum. *Vaill. Bot. Paris. p.* 97. n. 1.

α. Marchantia polymorpha, stellata.

Marchantia pileo laciniato, laciniis teretibus, apice dilatatis. *Scop. Flor. Carn. p.* 118. n. 1.

M. pi-

mina numerosa subrotunda, in fundo calycis posita. Ob figuram suam, *scyphuli* etiam aut *cyathi* vocantur.

Petiolata fructificatio, apud alios sunt *flores mares*, quos exoriri dicunt, pedunculo longo, recto, e calyculo prodeunte, quibus insistat perianthium, siue calyx communis, integer vel diuisus, conicus vel planus, cuius inferiorem superficiem occupent corollae parvae, monopetalae, in quibus singulis flamen vnum, cuius anthera pollinifera, in tot dehiscat, quot calyx segmenta.

M. pileo stellato, radiis teretibus. Mich. Gen. p. 2.

Tab. 1. f. 2. Hall. En. Helv. p. 127. n. 1.

Lichenis fontani maioris, et Lichenis domestici minoris, *Dill. musc. p. 523. et 527. Varietates stellatae.*

Tab. 76. f. 6. E. F. et Tab. 77. f. 7. B. C. E.

langblätterige Stern Marchantie. Leberkraut, Stein
Leberkraut.

*H. ad loca umbrosa vda, ad riuos, humidusque mu-
ros.*

Foliis gaudet digitum et ultra longis, vnciam circiter latis, variegatis. Superna, laete ex obscuro viridis, splendens superficies, areolis rhomboidalibus albicantibus, et in medio venis e fusco rufescentibus distincta; inferna fusca, radicibus villosis, secundum directionem venarum (superioris superficiei) sitis, terrae arcte adhaeret. Circa ver et initium aestatis, surgunt circa intersectiones loborum, setae vnciales, bi-ad triunciales, teretiusculae, ad basin rubrae, albis et paruis pilis adspersae: quibus insistit capitulum conuexum, virens, (per siccitatem albescens) in octo et decem radios teretes, lineares, apice latiores, fere ad centrum vsque diuisum. Locula pilosa, centro pilei, circa apicem setae circumposita. Scyphuli hinc et inde in superficie superiori sparsi, inferne conici, subpedunculati, superne orificio lato, margine crenato terminati.

β. Marchantia polymorpha, umbellata.

*Marchantia pileo crenato plano, capsulis glabris. Scop.
Flor. Carn. p. 119. n. 2.*

M. calyce communi octopartito, laciniis e plano connexis. Linn. Sp. Pl. p. 1603. n. 1 var. γ.

M. capitulo non dissecto. Mich. Gen. p. 1. Tab. 1. f. 5.

Hall. En. Helv. p. 127. n. 2.

Lichenis fontani maioris, et domestici minoris, Dill.

musc. l. c. Varietates umbellatae. Tab. 76. f. 6. C,

D. Tab. 77. f. 7. D.

furzblätterige Schild Marchantie.

*H. in locis vdis sylvarum, inque areis carbonario-
rum.*

Foliis a praecedente differt minoribus, vncialibus circiter, aut biuncialibus, et plerumque e viridi ad luteum colorem vergentibus. Setae angulatae, ubique rubrae, plerumque minores quam in praecedente. Capitula plana integra, margine in octo, (aliquando novem) crenulas aequales rotundas lobato, verrucoso, subtus imberbi, loculis oblongis, rubris.

Sapor qui priori mucilaginosus, subdulcis, dein paullulum nauseosus et adstringens, huic iners est, cum aliqua insequente dulcedine. Odor priori gravis, huic multo debilior.

Virtute medica commendantur, in decocto cum sero lactis, contra hepatis, aliorumque viscerum abdominalium obstructions; laudantur quoque in ictero, scorbuticisque vitiis humorum, ad libras quotidie per aliquod tempus assumptae.

CLASSIS II. PLANTARVM CRYPTOGAMICARVM

M V S C I.

MVSCI sunt plantae *ALGIS* vario respectu affines, modo scilicet crescendi, et florendi, vita perenni, substantia in aqua reuiuifcente post exsiccationem.

Structura perfectioribus plantis similis: omnibus enim caules competunt a foliis distincti; (a) quorum vel inferiores extremitates in tenues fibrosas abeunt radices, vel quibus hinc et inde tomentum fuscum, radicum vicem subiens, adnascitur. (b)

Modus florendi MVSCORVM, propius accedit plantis perfectioribus, quam *ALGARVM*. Continentur enim MVSCORVM fructificationes, in peculiaribus organis, e caulibus enatis, et structura ab his maxime diuersis.

K 2

Tem-

(a) Occurrunt quidem etiam *Algarum* quaedam species, quarum caules a foliis sunt distincti, e. c. *Iungermanniae*; istae vero iam ex *Algis* transitum faciunt in *Muscos*.

(b) Simile quid etiam in perfectioribus observatur plantis; e. c. in *Hedera arborea*.

Tempore florescentiae, in plerisque surgunt e caulibus eorum peculiare scapi, vel pedunculi, capsulas gerentes ventricosas, in quibus masculum pollen, vna cum seminibus femininis, ex sententia Ill. HALLERI sub forma tenuissimi pulveris continetur. (c) In quibusdam vero etiam hae capsulae, sine notabili pedunculo, inter alas foliorum, vel e medio centro caulis foliosi enascuntur: et in aliis quibusdam, densius ad se inuicem aggregatae fructificationes, *Spicam*, siue *Clauam* constituunt.

Alio-

(c) Haud a vero ab simile esse videtur, *fructificationem Muscorum* perfici intra hanc capsulam, ut nempe pollen masculum fecundet semina feminea, analogo modo, quo idem fit in plantis quibusdam perfectioribus, et quidem claro exemplo in *Ficu*. Magnitudo partium in his fecit, ut hunc abstrusum fructificationis modum, qui peragitur in ficibus intro, (per flosculos, instructos quidem staminibus atque pistillis, externe vero haud conspicuos) sectione detegere potuerimus: quam vero in capsulis *Muscorum*, adeo minutissimis, perspicere, partium subtilitas, et oculorum quamuis armatorum hebetudo vetat. Minime ideo hic culpanda erit, ista in re tam dubia, coniectura e verosimili, et analogia, quae licet non omni ex parte firmissimis constet fundamentis, tam diu tamen valere poterit, donec veritas clarius demonstrata experimentorum feliciore successu, mysteria naturae in operationibus suis, reuelata nobis ostendat.

Aliorum pedunculati flores, siue scapi florigeri, ob similitudinem quam habent cum seta porcina, *Setae* audiunt.

Capsula superne insidens, *Anthera* a variis auctoribus vocatur: in qua notandae sunt variae eius partes, quibus constat, harumque nomina.

Pars inferior crassa, setae insidens, extus conuexa, intus caua pollen continens, in cellulis indeterminatae figurae, (quibus vel solis, vel adhuc columna quadam media diuiditur) *Capsula* in specie dicitur; quae superne non penitus clausa, foramen relinquit, quod *Ora*, *Limbus*, vel *Corona* appellatur, cuius margo vel exiguis pilis, ciliis, aut dentibus cinctus, vel aequalis est, laevis, aut non denticulatus. In quibusdam coarctat hunc orae marginem, *annulus elasticus*. Foramen dictum, peculiari *Operculo*, variae figurae, quod ab aliis *Capitellum* vocatur, in totum clauditur, (d) et in quibusdam peculiari adhuc membrana.

Plerorumque capsulae, praeter operculum, adhuc teguntur superne peculiari tegumento, conico aut mitriformi, quod *Calyptra* audit, quae vel membranacea, glabra est, vel

K 3

pilo-

(d) Operculum in capsulis Muscorum, si parua licet componere magnis, similitudinem refert cum operculo illo, capitula *papaucris* tegente.

pilosa. Turgens iam maturo feminali polline capsula, secedente calyptra et operculo, per foramen elastica vi pollen explodit.

Infra capsulam, in quibusdam adest protuberans quaedam parua eminentia, receptaculi quasi vicem gerens, quae *Apophysis* dicitur. Occurrit ista in *Polytrichis* quibusdam.

Quorundam setae siue pedunculi, inferne vbi caulibus adnascuntur crassiores, tument in nodulum quendam, *Tuberculum* appellatum; in aliis, vt in *Mniis* atque *Bryis*, nudum, in aliis, v. g. in *Hypnis*, inuolucro membranaceo squamoso aut piloso tectum, quod *Perichaetium* audit.

Propagantur MVSCI vel per contentum in capsulis seminale pollen, siue semen ipsum, intra hanc capsulam vi prolifica impraegnatum : (e) vel per gemmas, vel propagines; vel per vtrumque fructificationis modum.

Sur-

(e) Fructificationem intra capsulam perfici, inde vt mihi videtur, probatur, quod Musci aquatici, qui pari modo vt terrestres capsulas proferunt, peracto hocce fructificationis modo, multiplicati reperiuntur, licet non habeant furculos peculiare quicquid gerant *femininarum fructificationis organorum*. Quodsi capsulae *antherarum*, furculi stelligeri *pisillorum* vices gerant, et requiratur ad propagationem Muscorum, mutua duplicium istorum organorum actio, tunc sequeretur, omnes Muscorum

Surculi capsulis destituti, quorum extremitates superiores foliolis paullo latioribus, in formam stellae, aut rosae dispositis, terminantur, et hinc *stelligeri* vocantur, ab Ill. LINNAEO, et aliis auctoribus, pro *femininis plantis* habentur. Haud veros tales proprie esse videntur, sed potius *propagines*.

Si enim accurate ad incrementum horum furculorum stelligerorum attendimus, post explicationem foliorum stelliformium, eos in longius extendi, atque increfcere, et similes fieri illis qui capsulas gerunt, et vltimo ipsos quoque (id quod fit circiter secundo aut tertio anno) capsulas gerere videbimus.

Totum terrarum orbem inhabitant, et vario admodum gaudent loco natali; nascuntur enim in terra, arboribus, saxis, variisque in terra obuiis corporibus aliis, quin adeo in ipsis fluuiis paludibusque. Copiosus autem
K 4 eorum

rum species his duplicibus organis instructas esse; quod tamen non sic se habet in omnibus: porro isti porro isti aquatici Musci, tempore florescentiae superficiem aquae petere deberent, ex pari ratione, ac fit a plantis aquaticis florentibus: notum est enim cuius, pollen humiditate corrumpi, et prolificam suam amittere facultatem. Non autem mutant hi musci suum locum, capsulae non innatant aquae, sed immerfae manent, fructificatio itaque eorum fieri debet vel intra capsulam ipsam, vel quam coniecturam probabilem facit praesentia earum, propagatio fit per gemmas, vel per vtrumque modum.

eorum in terra prouentus, solum ut plurimum indicat sterile.

Tempus florendi plerorumque est autumnus, et ver, imprimis quando niues deliquescere incipiunt: quidam vero, et inter hos praecipue paludosorum incolae, media florere solent aestate. Flores suos plerique usque in alterum annum conseruant, antequam toti pereunt.

Vsus medicus in plerisque adhuc ignotus est. Sunt qui quosdam ob virtutem pectoralem, demulcentem, purgantem, anthelminthicam, emmenagogam interne adhibuerunt: alii propter vim exsiccantem commendantur pro externo usu.

Varium praeter ea hominibus *usum oeconomicum* praestant. Quaedam species ad rem tinctoriam utiles sunt; aliae imprimis mollioris texturae, ut *Sphagnum palustre* Linn. pro cubilibus, et farciendis puluinaribus inseruiunt; idem etiam viis per paludes sternendis aptum: aliae firmioris structurae et compagis, ut *Hypna* varia, tectorum et parietum rimis foraminibusque obturandis, ad frigoris, caloris, pluuiae et niuis iniurias arcendas, dum tegulis supponuntur; pro transmittendis plantis in longinqua loca, dum succulentioris indolis vegetabilia musco arenti, siccioris vero, ut frutices, et arborum furculi, modice humenti inuoluunt.

uoluuntur; pro transportandis vasis omnis generis fragilibus. Quin etiam auibus variis inferuiunt, pro exstruendis nidis, variorumque insectorum constituunt domicilia. Vegetabilia item variam ab iis experiuntur vtilitatem et insigne emolumentum, dum arborum truncos, imprimis in latere septentrioni obuerso ac boreali frigori maxime exposito, denso tegmine (quo ipso plagarum situm cognoscit errans in desertis viator) obducunt, aliarum vero plantarum radices fouent, humidum ad earum nutritionem et incrementum necessarium conseruant, seminum, et tenera surgentium plantarum rudimenta ac turiones, a frigoris et tempestatum iniuriis defendunt. Terrae saxisque tegumentum praebent, quo nudum et tristem eorum aspectum, amoeno virore suo, in iucundum mutant ac laetum.

Antequam ad ipsarum Specierum recensum progredior, sunt quae de diuisione quorundam Generum monenda habeo.

Numerus Indiuiduorum quibus Classis *Muscorum* constituitur, tantus est, vt nemo ea rite cognoscere possit, nisi subordinationi cuidam subiiciantur. Inde est, quod Botanici in varia genera *muscos* distribuere. Qua re quidem optime botanophilis consultum esset, si modo distinctiones istae minus mutationibus obnoxiae essent. Scilicet doctores nondum in characteristicis generum notis constituendis consentiunt. Hinc cognitionis *mu-*

scorum non minor difficultas, quam ambiguitas. Causa vero dissensus quem dixi, inest in magna illa similitudine proprietatum, et affinitate characterum: inde in definitione Generum non omnia ea migrare licet, quae ambiguitatis aliquo vitio laborant.

Naturae leges Genera *Muscorum*, praesertim vero *Polytricha*, *Mnia*, *Brya*, et *Hypna* tam arcta affinitate coniunxerunt, ut separatio eorum solummodo artificialis sit, quin quodammodo Naturae contraria videatur. At est tamen necessaria, nisi tanta specierum copia, sub vno genere comprehensa, vasto characterum specialium gurgite memoriam mergere velis. Huic incommodo ut medelam afferrent, fuerunt qui hanc multitudinem in genera quae dixi, dispertirent: desumpto principio diuisionis a notis quibusdam, alicui numero specierum prae reliquis propriis: licet notae istae, ob mutuam omnium specierum affinitatem, et summam similitudinem, certis limitibus adstringi fere recusent. Hinc in subordinandis speciebus Botanici, etiam contra posita principia diuisionis generum, miscuerunt species variorum generum, quas tamen distinguere annisi fuerant. Quod si autem summi Botanici his difficultatibus sese expedire non possunt, quid mirum si tirones hic haereant.

In definiendis Generibus MNII, POLYTRICHI, BRYI et HYPNI, speciebusque horum subordinandis, ob dissensum Auctorum tot scopulos, tantasque difficultates offendi, ut qui superarem, non viderim; et dum sequerer huius Auctoris sententiam, reprehensionem aliorum incurrerem, adeoque quod aiunt, e Scylla in Charybdim incidere. Re omni ex parte perpensa, et dubius quid opti-

optimum factu esset, ultimo tandem tali diuisioni adhaerere constitui, quae licet non in totum ab omnibus dubiis libera sit, tamen pro tironis intellectu facillima mihi videretur. Assumsi itaque dicta Genera, et species disposui secundum notas sequentes, ut mihi sint:

MNIA, omnes Muscorum species, quae duplices surculos habent, alios stelligeros, alios capsuligeros, capsula calyptra lacui instructa.

POLYTRICHA, quae item gaudent duplicibus surculis aliis stelligeris, aliis capsuligeris, capsula vero calyptra pilosa.

BRYA, quae solas capsuligeras proferunt setas inferne nudas.

HYPNA, quae item solis capsuligeris setis, inferne perichaetio cinctis instructae sunt.

Hac ratione descriptionem *Muscorum* minus difficilem fieri credidi. Cognitam speciem quis deinde referre poterit ad Genus quod illi magis arridebit. Dissensus a summorum Botanicorum sententia eo facilius me consecuturum esse veniam spero, quanto minus ex contradicendi studio ortus est.

MNIVM. LINN. Gen. n. 1193. HALL. Hist. Helv. T. III. p. 50. SCOPOL. Flor. Carn. p. 127. HALL. En. Helv. p. 119. DILLEN. Musc.

Musc, p. 229. BRYI quaedam Species.
 DILL. Musc. p. 338. Ord. I. II. Divis. III.
 Subdiu. 2. Ord. II. Ser. I. II. HALL. En.
 Helv. Ord. II. III.

MNIVM tale dicitur Muscorum genus, cui proprii sunt flores duplices, qui nascuntur vel in iisdem, vel distinctis singulisque plantis: quarum aliae in peculiaribus setis capsulas, siue antheras calyptratas ferunt, quales *Bryis* et *Hypnis* competunt; et MNIORVM flores mares dicuntur; aliae vero in summitate caulium (his modo dictis capsuligeris setis destitutis) stellas gerunt radiatas, e foliolis compositas, in quorum disco corpuscula quaedam observantur globosa, puluerulenta sessilia aut petiolata, quae MNIORVM audiunt flores feminei.

His notis adde setas inferne tuberculatas, nudas, (i. e. nullo perichaetio, siue involuacro squamoso, *Hypnis* proprio, nulla vagina foliacea tubulosa, *Polytrichis* competente instructas) capsulas maturitate inclinatas, calyptra membranacea laevi tectas.

✱ *Mnia rosulis* (siue stellis femineis) foliosis.
 Hall. Hist. Helv. T. III. p. 52. Ord. I. Subdiu. II.

Ista praeter setas capsuligeras, in peculiaribus aliis surculis, versus extremitates, instructa sunt foliolorum nunc patulorum, nunc complicatorum congerie, rosulae puluere colorato aspersae, formam referente. Omnia terram, saxa, et quaedam etiam paludosa et scaturiginosa inhabitant loca.

MNIVM *fontanum*.

Mnium caule simplici, geniculis inflexo. *Linn. Sp. Pl.*
p. 1574. n. 2.

M. caulibus teretibus, erectis, vertice multifidis. *Hall.*
Hist. Helv. p. 55. n. 1851.

M. capsulis subrotundis, pedunculis radicalibus. *Scop.*
Flor. Carn. p. 130. n. 6.

Bryum palustre, scapis teretibus stellatis capsulis magnis subrotundis. *Dill. musc.* p. 340. Tab. 44. f. 2.

Mniscus capillaceus tenuissimus, pediculo longissimo purpurascens, capitulo rotundiore. *Tournef. I. R. H.*
p. 551. *Vaill. Bot. Paris.* p. 134. n. 6. Tab. 24.
f. 10.

Mniscus trichodes, palustris, erectus, coronatus, capitulis sphaericis amplioribus. *Morif. Hist. Ox.* III.
p. 628. n. 8. *Seet. XV.* Tab. 6. *Ser. 3.* f. 8.

Icon *Oederi Flor. Dan.* Tab. 298.

Schlankes Speichensförmig getheiltes Sumpfs Mnium.

In locis vdis / scaturiginosis provenit, raro circa Die-
marden

*marden, inter Hessendreich et Waake: copiose in
surfaceis montis Bructeri, in monte Weisner.*

Facile haec species rigido quodam, et peculiari suo habitu dignoscitur. Insignis longitudinis furculos habet, duarum, trium ad quatuor uncularum. Inferne furculi ad uncialem altitudinem circiter, et saepe adhuc profundius, paludosae terrae immerfi, simplices sunt, et rubiginosi apparent; ubi vero emergunt super terram, longi scapi ramorum, plures ex uno centro, vel in parua a se inuicem distantia exorti, indiuisi, uncialiales, biunciales exsurgunt, quorum plurimi fere aequalis longitudinis, instar setarum penicilli ad se inuicem dispositi, teretes, gracilesque, in siccitate rigidi, coloris sunt lacte viridis, vel e viridi lutescentis, apicibus paullo crassioribus luteis. Foliola, lineam vix longa, angusta, acutissima, carinata, pellucida, quadrifaria scaporum scapos ambientia, tam rariter disposita, ut apex unius, vix excedat originem alterius, et hinc, (si aqua madent) undique inter interstitia emineat nervus furculorum purpureus. In siccitate foliola arctius cauli appressa, furculos teretes, vel quadrangulares quasi efficiunt, similes sericeo funiculo, e quatuor filis cruciatim inter se intertextis.

Setae bi- aut triunciales, inter scapos ramulorum radiatos, ex eodem cum iis puncto ortae, rubentes, erectae, inferne tuberculo oblongo, tereti, (quod ambiunt summae foliorum squamulae) praediti, supernae capsulas gerunt globosas, crassas, pyriformes quasi, striatas, e viridi fuscas, versus unum latus inclinatas, calyptra angusta pallidiori instructas, qua abscedente, operculum apparet conicum, paruum, orificio denticulato, annulo destituto insidens.

Versus summitatem quorundam furculorum, foliola arctius congesta, rosulas efformant stellatim explicatas, plerumque penta-aut hexaphyllas, discum rufum ambi-
entes, et pulvere aurantiaco, aut purpureo adspersas.

MNIVM *hygrometricum*.

Mnium acaule, anthera nutante, calyptra reflexa tetragona. *Linn. Sp. Pl. p. 1575. n. 5. Necker. del. Gallobelg. p. 444. n. 2.*

M. foliis ovato lanceolatis, conniuentibus, capsulis ovatis reflexis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 55. n. 1852.*

Bryum bulbiforme aureum, calyptra quadrangulari, capsulis pyriformibus nutantibus. *Dill. musc. p. 407. Tab. 52. fig. 75.*

Bryum capsulis pendulis obouatis, furculis simplicibus, foliis piliferis ovatis. *Scop. Flor. Carn. p. 146. n. 19.*

Bryum aureum, capitulis reflexis, pyriformibus, calyptra quadrangulari, foliis in bulbi formam congestis. *Hall. En. Helv. p. 115. n. 34.*

Muscus foliis scutellatis, capitulo piriformi nutante. *Vaill. Bot. Paris. p. 135. n. 9. Tab. 26. f. 16.*

goldgelbes schuppigblättriges Mnium.

H. ad loca subhumida, umbrosa, ad vias, v. g. in sylvis circa Kerstlingeroderfeld abunde; in arenis carbona-
bona-

bonariorum; etiam ad muros. v. g. auf dem Walle, an der Stadtmauer, am Schützengraben, in saxis.

Cauliculis gaudet vncialibus, biuncialibusque, qui raro tantum super aliquot lineas exstant, reliquum eorum terrae immersum, radiculis fuscis tomentosis ei arcte adhaeret; caeterum confertim nascuntur, et longa lataque strata efficiunt, nitore coloris e luteo viridi foliorum, et aureo capsularum, e longinquo iam oculos allicientes. Foliola ex ovato acuta, subpellucida carinata, cauliculo purpureo adnata, quantum super terram exstant, in bulbos collecta, similis quodammodo bulbis *Lilii* squamosis, setam singulam amplectentibus, quae vncialis circiter longitudinis, purpurea inferne, superne pallidior, capsulam gerit globosam, irregularem, gibbosam superne, inferne conicam, pyri similem, eleganter aurantiacam, leuiter striatam, nutantem, calyptra laterali, acuminata, perfecte cochleariformi, et operculo paruo, rotundo, obtuso, luteo, annullo coccineo cincto, et versus setam magis directo, tectam; quo abscedente, (quod vero in hac specie aegrius contingit, cum pleraeque exsiccentur clauso operculo) pollinem effundunt luteum. Hic est status maturarum speciminum, quo gaudere solent circa mensem Aprilem et Maium. Postea enim exsiccatae setae, fuscopurpureum colorem acquirunt; capsulae aridae angulosae euadunt, et in posterum annum remanent, donec cauliculi earum a nouis suffocati, putrescant, et ipsae demum ultimo etiam pereant. Iuniorum speciminum setae, circa autumnum copiose occurrentes, capsula gracillima, et subulata instructae, haud nutant, sed erectae, et pallidioris sunt coloris, quae deinde successu temporis crassiores et nutantes euadunt.

MNIVM *hornum* α . *serratifolium*.

Mnium antheris pendulis, pedunculo curvato, furculo simplici, foliolis margine scabris. *Linn. Sp. Pl. p. 1576, n. 10. Necker. delie. Gallobelg. p. 445. n. 4.*

M. foliis lanceolatis, imbricatis, capsulis pendulis, cylindricis, obtusis. *Hall. Hist. Helv. p. 54. n. 1846.*

Bryum stellare *hornum* sylvarum, capsulis magnis nutantibus. *Dill. musc. p. 402. Tab. 51. f. 71.*

Muscus capillaceus maior stellatus. *Tournef. I. R. H. p. 551. Michel. Gen. p. 108. Tab. 59. f. 2. Vaill. Bot. Paris. p. 134. n. 6.*

Muscus polytrichoides humilior, foliis brevioribus raris, pallide viridantibus, et vix pellucidis. *Morison. Hist. Ox. III. p. 630. n. 4. Sect. XV. Tab. 6. Ser. 5. f. 3. Muscus* polytrichoides angustifolius, caule folioso, tenui, reclinante. *l. c. n. 4. Tab. 6. Ser. ult. f. 4.*

longes *weissenblättriges* **Mnium**.

H. ad terram vdam in sylvis, copiose ad aggeres viarum; e. c. ad viam a Kerstlingeroderfeld versus Mackenrade, et Grossenlengen.

Cauliculi suberecti, tres, quatuor ad quinque uncias longi, e dimidio circiter terrae inserti, fuscis radicibus tomentosis, rubiginosis adhaerentes. Confertim nascuntur, longis latisque stratis. Cauliculi plerique simplices; ubi e terra prominent, emittunt unciales, biuncialesve furculos, salicem (si per lentem aspiciun-

tur) viminibus similes, quae foliis vestiuntur salicinis, (si parua componas magnis) haud absimilibus. Surculi ipsi rubri; folia e luteo viridia, pellucida, nervo in medio distincta tenui, duas lineas circiter longa, lanceolata, acuta, ad marginem, (si per lentem conspiciuntur) cartilagineis dentibus, siue serraturis ciliata, in statu recenti, vel irrorata, patentia, sicca vero crispa, cauli magis appressa.

Setae e summis furculis (plerumque annotinis) inter foliola densius congesta, at patentia enatae, biunciales, rubrae, erectae, inferius tuberculo rubro praeditae versus apicem, ut DILLENIVS optime exprimit, colli anserimi in formam incurvatae, capsulas gerunt oblongas, ventricosas, deorsum flexas, virides, in quorum medio apice insidet calyptra incurva, super operculum album, quod per maturitatem circa Aprilem et Maium circiter, a capsulis tunc rufis abscedit, remanente margine ciliato. Surculi isti annotini, coloris rufi, rubiginosi sunt, et inferiorem quandam seriem occupant, inter quos novi furculi, coloris e luteo viridis protruduntur, hos longe superantes, quorum alii apicibus crassis, e foliolis discum purpureum ambientibus, rosularum puluerulentarum, (novos furculos emittentium) forma terminantur; alii capsulas erectas acutissimas, in setis pallidis, vix vncialibus proferunt.

β. *Mnium hornum, integrifolium.*

Mnium foliis lanceolatis, imbricatis, capsulis pendulis, cylindricis, obtusis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 54. n. 1846.*

H. in locis paludosis; mea specimina legi in sylva pone Adelipfen.

Haec varietas a praecedente differt foliis crebrioribus, lanceolatis, obtusioribus, margine integerrimis, subpellucidis. Caeterum caules in reliquo habitu similes, inferne rubiginosi, tomentosi; folia per lentem nervo rubenti in plerisque distincta, summa luteola, inferiora fusca; sicca valde crispa et contorta. Cum capsulae desint in meis speciminibus, vltius ea determinare nequeo. Nomen citatum Ill. HALLERI interim magis ad hanc, quam ad praecedentem pertinere puto, ob folia densiora non ferrata, et descriptionem, quae satis quoad caules et folia quadrat.

MNIVM *annotinum*.

Mnium foliis ovatis, acuminatis, pellucidis; pedunculis subradicalibus, anthera nutante. *Linn. Sp. Pl. p. 1576. n. 9. Necker. delíc. Gallobelg. p. 443. n. 1. Bryum annotinum lanceolatum, pellucidum, capsulis oblongis pendulis. Dill. musc. p. 399. Tab. 50. f. 68. furcrantiges Weidenblättriges Mnium.*

H. in sylvarum locis vdis. v. g. circa die Bruck.

Caules vnciales simplices, vel ab ima parte furculi in viticulos ramorum diuisi, inferne fusco tomento brevi praediti, imprimis in annotinis furculis, superius glabri. Foliola ovato lanceolata, acuta, margine integerrima, pellucida, nervosa, carinata, laete viridia, alterna serie laxius caulem ambiunt, vt nervus caulis rubicundus pelluceat. Annotinorum furculorum folia marcida, e fusco rubiginosa. In sicca folia non tam contorta sunt in hac specie, quam in praecedenti.

Setae circa aestatem oriuntur e furculis annotinis, vnciales circiter, puniceae, cum capsulis oblongis pendulis

dulis, operculo breui, conico, obtuso. Surculi stelligeri foliis latioribus gaudent. Occurrunt etiam adhuc alii surculi, humi repentes, steriles.

MNIVM *pyriforme*.

Mnium antheris pendulis turbinatis; stipite filiformi, floribus femineis setiferis. *Linn. Sp. Pl. p. 1576. n.*

12.

Bryum trichodes aureum, capitulis pyriformibus nuntantibus. *Dill. musc. p. 391. Tab. 50. 60.*

hellgrünes kraushaarblättriges Mnium.

H. ad muros urbis; ad rupes circa Waake, Niedeck, Reinhausen.

Facillime distinguitur foliolis capillaceae tenuitatis, longis, implexis, si (quod plerumque solet) in densis caespitibus nascitur. Foliola ista, coloris elegantissimi viridis, seriei instar splendentia, cauliculum ambiunt vncialem circiter, tenuissimum, viridem, subpellucidum, et si per lentem adspiciuntur, carinata apparent. Cauliculus inferne rubiginosis fibrillis terrae adhaeret.

Setae e summis furculorum apicibus, patulis foliis terminatorum, prodeunt vnciales, et aliquando paullo longiores, capillares, eleganter purpureae, nitentes, inferne tuberculo e fusco viridi praeditae; superne incurvatae, quibus annexae dependent capsulae pyriformes, ab initio virides, deinde ubi circa aestatem maturae fiunt, ex aureo purpurea. Calyptras nullas in iis inveni, sed solo operculo connexo tectas vidi, quo abscedente apparebant cilia e pallido lutea. Surculi stelligeri vnciales circiter, foliolis longioribus capillaceis, ac paullulum crispis terminantur.

Est alia varietas, paullo maior, ratione omnium partium, quae DILLENIO audit:

β. *Bryum trichodes*, laete virens, capitulis cernuis, oblongis. *Dill. musc. p. 392. Tab. 50. f. 61.*

H. in iisdem cum praecedente locis.

Differt capsulis paullo maioribus, magis oblongis, furculis ramosioribus. Caetera eodem modo sese habent ut in praecedente.

MNIUM *serpyllifolium*.

Mnium pedunculis aggregatis, foliis patentibus, pellucidis. *Linn. Sp. Pl. p. 1577. n. 14. Necker. delic. Gallobelg. p. 446. n. 5.*

Mnium capsulis ovatis, pendulis, pedunculo solitario, furculis floriferis erectis, sterilibus humifusis, foliis pellucidis patulis. *Scop. Flor. Carn. p. 131. n. 7.*

α. *Mnium serpyllifolium, punctatum.*

Mnium pedunculis aggregatis, foliis obovatis integerrimis, obtusis, punctatis. *Linn. Sp. Pl. l. c. n. 14. var. α. Necker. l. c. n. 5. var. a.*

M. capsulis ovatis, pendulis, pedunculis aggregatis, furculis floriferis erectis, sterilibus humifusis, foliis pellucidis, patulis, punctatis. *Scop. Flor. Carn. l. c. n. 7. var. b.*

M. foliis ovatis, integerrimis, capsulis pendulis, ovatis, aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 53. n. 1845.*

Bryum nitidum, serpylli rotundis foliis. *Hall. En. Helv. p. 115. n. 33. var. α. β.*

Bryum pendulum, Serpylli folio rotundiore, pellucido, capsulis ouatis. *Dill. musc. p. 416. Tab. 53. f. 81. confer.* *Bryum pendulum*, Serp. folio longiore, pellucido, capsulis oblongis, cuspidatis. *Dill. musc. p. 416. Tab. 53. f. 80.*

Muscus folio lato subrotundo, capitulo singulari nutante, pediculo longo subrubenti insidente. *Vaill. Bot. Paris. p. 136. n. 13. Tab. 26. f. 5.*

Muscus polytrichoides, palustris, maior, Serpylli latiore folio pellucido. *Morif. Hist. Ox. III. p. 627. n. 39. Sect. XV. Tab. 6. Ser. 1. f. 39.* *M. polytrichoides humilior*, alternis foliis pellucidis, subrotundis. *l. c. n. 40. Sect. XV. Tab. 6. Ser. 2. f. 10.*

rundes Quendel Mniium.

H. ubique in sylvis ad loca humida, opaca viarum.

Longis latisque caespitibus crescit, cauliculis copiosissimis, simplicibus, aggregatis, qui inferne rubiginosis, fuscis, tomentosis radiculis adhaerent; super terram vero erecti, coloris amoene purpurei, foliolis cinguntur plurimis, alternis, ouatis, integerrimis, pellucidis, nervo coccineo in medio distinctis, coloris pallide viridis, margine cartilagineo (in extremis praecipue foliolis) purpurea ora cincto. Inter hos, paullo interior, conspiciuntur cauliculi annotini, foliolis e fusco rubris pellucidis obfiti. Sunt adhuc alii furculi repentes, vel suberecti, foliolis maioribus, magisque distantibus, qui virgulorum instar repunt. Per siccitatem foliola corrugantur.

rugantur, hinc crispa apparent; irrigata vero ad statum pristinum redeunt. Per lentem superficies foliorum superior punctata, et reticulata apparet.

Setae plerumque solitariae, aliquando vero etiam binae, ternae, quaternae, e cauliculis summitatae enatae, uncinatae, biuncinatae, e pallide luteo rubentes, inferne tuberculo praeditae oblongo, purpureo, versus basin crassiore; superius deorsum incurvatae capsulas, gerunt ouatas, ventricosas, nutantes, operculo tectas acuminato, quo secedente prorumpit pollen viride, et annulus ciliatus in conspectum prodit. Iuniora specimina setas subluteas primo gerunt rectas, capsula surrecta et subulata, calyptra pallida.

Surculi capsulis destituti, rosulas gerunt foliolas, disco granuloso; quae granula successu temporis in foliola, et surculos novos progerminant.

β. Mnium serpyllifolium, cuspidatum.

Mnium pedunculis aggregatis, foliis alternis, acutis, ferratis. *Linn. Sp. Pl. p. 1577. n. 14. var. β. Necker. delic. Gallobelg. p. 446. n. 5. var. b.*

M. capsulis ouatis, pendulis, pedunculis aggregatis, surculis floriferis erectis, sterilibus humifusis, foliis pellucidis patulis acutis, ferratis. *Scop. Flor. Carn. p. 132. n. 7. var. c.*

M. foliis ouato lanceolatis, confertis, ferratis, capsulis nutantibus, obtusis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 52. n. 1841.*

Bryum nitidum Serpylli rotundo folio. *Hall. En. Helv. p. 115. n. 33. var. γ.*

Bryum pendulum, foliis variis pellucidis, capsulis ovatis. *Dill. musc. p. 413. Tab. 53. f. 79.*

Muscus polytrichoides, polycephalos, *Chamaesyces* folio. *Vaill. Bot. Paris. p. 136. n. 12. Tab. 26. f. 18.*

Muscus polytrichoides, pellucidus fere, foliis denticulatis, ad margines veluti crispis. *Pluckenet. Almagest. Bot. p. 257. Tab. 98. f. 8.*

längliches gezähntes Quendel *Mnium*.

H. in similibus cum praecedente locis vdis umbrosis; v. g. in sylvis circa Kerstlingeroderfeld, et alibi copiosissime.

Valde similis est toto habitu suo, et modo crescendo; differt autem foliis paullo longioribus, ex ovato-lanceolatis acutis, obscurius viridibus, margine non ciliato, sed acutis dentibus serrato; nervo medio pallide viridi, et acuto mucrone eminente terminato. Per siccitatem folia crispa, ut Ill. HALLERVS bene exprimit, similia sunt *Aquifolii*; irrigata vero sese explicant. Surculorum cauliculi plerumque paullo longiores quam in priore, et coloris pallide viridis.

Setae pallidius e luteo rubentes, uncinatae, binariae, nunc solitariae, nunc plures ex vno surculo oriuntur; capsulae pendulae, ovatae, e luteo purpurei coloris.

Caetera omnia priori similia, quod attinet surculorum reclinatorum steriliū habitum, ut et stelligerorum. Juniorum speciminum setae etiam ut prioris ab initio rectae sunt, et capsulae rectae, subulatae.

MNIVM *roscum*.

Mnium furculis simplicibus et proliferis, foliis rosacee congestis, lanceolatis, acutis, tenuissime argute crenulatis, pedunculis aggregatis.

M. foliis ovato lanceolatis, congestis, patulis, setis numerosis, capsulis pendulis, ovatis, acuminatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 52. n. 1839.*

Mnium (*serpyllifolium, proliferum.*) pedunculis aggregatis, foliis rosaceo-congestis, lanceolatis, acutis. *Linn. Sp. Pl. p. 1578. n. 14. var. γ.*

Bryum roseum maius, foliis oblongis. *Hall. En. Helv. p. 117. n. 42.*

Bryum stellare roseum maius, capsulis ovatis, pendulis. *Dill. musc. p. 411. Tab. 52. f. 77.*

Muscus stellaris roseus. *Buxbaum, Cent. II. p. 2. Tab. 1. f. 3.*

Muscus coronatus humilis, foliolis latioribus, stellatim nascentibus donatus. *Morif. Hist. Ox. III. p. 630. n. 9. Sect. XV. Tab. 7. Ser. 2. f. 9.*

rosenförmiges Büschel Mnium.

Copiose reperitur in sylva pone Kerstlingeroderfeld ad viam versus Mackenrode, circa die Bruck, et alibi in locis et viis sylvarum humidis, opacis.

Elegatissimam formam referunt cauliculi variae altitudinis, vnciales, biunciales, et ultra, coloris fusci, inferius nudi, trunci arbutulae instar, superius fasciculos foliorum ex vno centro pronatorum ferentes; quae foliola tres, quinque, ad sex lineas longa, duas lata, graini-

graminei viridis coloris, pellucida, ex ouato lanceolata, acutissima, in medio leuiter sulcata, margine praedita (per lentem) acutissimis crenulis serrato, (saltem in meis quotquot legi speciminibus, licet Ill. HALLE-RVS de suis dicat oras non serratas esse) et acutissimo mucrone terminata. Surgunt ex horum fasciculorum medio, alii solitarii, bini, terni aliquando etiam fasciculi, vel e communi trunco, per gradus prolifero, vel in propriis furculis ex inferiori fasciculo pronatis. Fasciculorum istorum, rosae formam referentium, alii (qui postea nouis furculis proliferi euadunt) puluerulenti videntur, in medio disco, punicei coloris; alii circa medium hiemem setas capsuligeras protrudunt.

Setae purpurae, vncialis sunt, aut biuncialis longitudinis; inferne tuberculo purpureo, superne capsula terminantur tereti, nutante, e luteo pallide crocea, operculo croceo conico. Calyptras haud inueni.

MNIVM *undulatum*.

Mnium furculis erectis, ramis fasciculatis, foliolis ellipticis, undulatis, argute dentatis, pedunculis aggregatis.

M. foliis cordatis, ellipticis, setis aggregatis, capsulis ouatis, obtusis, pendulis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 53. n. 1844.*

Mnium (*serpyllifolium, undulatum.*) pedunculis aggregatis, foliis oblongis undulatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1578. n. 14. var. d. Necker. delic. Gallobelg. p. 446. n. 5. var. d.*

M. capsulis ouatis, pendulis, pedunculis aggregatis, furculis floriferis erectis, sterilibus humifusis, foliis pel-

pellucidis patulis, oblongis, vndatis. *Scop. Flor. Carn. p. 133. n. 7. var. d.*

Bryum nitidum, foliis oblongis, vndatis, capitulis cernuis, arbusculam referens. *Hall. En. Helv. p. 118. n. 44.*

Bryum dendroides polycephalon, *Phyllitidis* folio vndulato, pellucido, capsulis ouatis, pendulis. *Dill. musc. p. 410. Tab. 52. f. 76.*

Muscus roseus, polycephalos, *Linariae* foliis vndulatis, *Vaill. Bot. Paris. p. 135. n. 11. Tab. 24. f. 3.*

Muscus Polygoni folio. *Tournef. I. R. H. p. 555. Tab. 326. Ic. E. Michel. Gen. p. 108. Tab. 59. f. 5.*

Baumförmiges wellenblättriges *Mnium*.

H. fere ubique in sylvis, ad vias humidas. v. g. in sylva Geismariensi, circa Kerstlingeroderfeld; etiam ad riuulos, scaturigines, et circa paludes: v. g. circa das Lichtemeer.

Haec e maximis fere est, et pulcherrimis *Mniorum*. Crescit surculis, primo aspectu, (sique ruditer e terra euelluntur,) solitariis, at si accuratius perscrutantur, pluribus, ad radicem fibrosam, tenacem, tomentosam annexis, quae sub terra horizontalis repit. Super terram cauliculi erecti, subrubentes, ab vna ad quatuor uncias longi, inferius vel nudi; vel tomentosi, deinde singulis foliis vestiti, quae superius maiora, et densius aggregata, ramorum viticulos corymbosos vestiunt; vnde surculi arbusculae faciem acquirunt. Folio-

la lanceolata, aut elliptica, patula, alterna, (triplici aut quadruplici serie caulem ambientia, basi latiore cordata) obtusa, pellucida, coloris nunc pallidius e luteo, nunc obscurius viridia, nitida, neruo crasso distincta, qui ad summam foliolorum extremitatem, breui spinula (per lentem conspicua) terminatur, eleganter undulata sunt, et per lentem minimis acutis crenis in margine serrata, inferius ad caulem 2, 3, 4, 5 lineas longa, vnā vel sesquilineam lata, versus apicem ramulorum gradatim breuiora, atque angustiora fiunt.

Alii furculi, e medio centro 3, 4 setas proferunt, aliquando etiam plures adhuc, quas ambiunt praeter rosulas foliorum extremorum, maiorum, patentium, parua quaedam foliola cuneiformia. Setae inferius purpureae, et tuberculo crasso oblongo, pellucido, viridi insistentes, superius e luteo pallentes, capsulas gerunt virides, pendulas, ouatas, operculo obtuso, et calyptra pallida fusca tectas. Annulus tenuis ciliatus oram cingit.

Alii furculi steriles, plerumque ramosiores, in summo centro rosulacrum foliacearum, inter paruas quasdam disci foliaceas ligulas, corpuscula quaedam parua, per lentem conspicua, oblonga, punicea aggregata habent, in nouos progerminantia furculos, qui proliferi deinde euadunt, et copiosi circa summitates cauliculorum oriuntur. Occurrunt quoque adhuc alii quidam furculi simplices, longissimi, ex vna eademque radice, plerumque circa extremitatem, enati, supra reliquos prominentes.

Siccarum speciminum foliola valde crispantur, et acuta videntur, quo in statu, (fugitiuo aspectu) haud
absimi-

absumilia sunt *Hypno prolifero* Linn. tam quoad habitum ramosum, quam folia crispa, et colorem e viridi (maxime versus summitatem) lutescente.

*** *Mnia caulibus aliis capsuligeris; aliis nudos gerentibus globulos.* Hall. Hist. Helv. T. III. p. 56. Ord. III.

Ista in peculiaribus (praeter setigeras) furculis, globulos gerunt, qui vero per microscopium e foliolis minimis constant, gemmae quasi inuolutis et successu temporis ulterius se explicant, et in novos progerminant furculos.

MNIVM pellucidum.

Mnium caule simplici, foliis ovatis. Linn. Sp. Pl. p.

1574. n. 1. Necker. delie. Gallobelg. p. 447. n. 6.

Scop. Flor. Carn. p. 129. n. 4.

M. caule simplicissimo, foliis ovato lanceolatis, seta fungifera foliola. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 56.

n. 1853. Tab. 45. f. 8.

M. Serpylli foliis tenuibus pellucidis. Dill. musc. p.

232. Tab. 31. f. 2.

Bryum alternans, calyptra variegata, et scyphulis foliosis. Hall. En. Helv. p. 118. n. 45. Tab. 4. f. 8.

Muscus coronatus minimus, capillaceo folio, capitulis oblongis.

oblongis. *Vaill. Bot. Paris. p. 130. n. 8. Tab. 24. f. 1.*
Icon Oeder. Flor. Dan. Tab. 300.

dunkelgrün Myrthen blättriges Minium.

*H. in locis humidis vliginosis; v. g. in sylua pons
 Adelipsen versus Schoningen, passim etiam circa dis
 Bruck.*

Cauliculis crescit confertis, vncialibus, ut plurimum simplicibus, vel parum ramosis, rubris, et pro ratione totius habitus crassis, inferne tomentosiss, fuscis radiculis terrae arcte adhaerentibus: superne foliolis cinguntur alternis, quadruplici serie dispositis, surrectis, patentibus, ex ovato lanceolatis acutis, margine integerrimis, pellucidis, nitidis, laete viridibus, nervo medio purpureo, crasso, mucrone terminato distinctis, et aliquando passim purpureis punctis obsitis. In aliis furculis foliola densius, in aliis rarius disposita sunt, sic ut ad summitatem usque nudi pene sint; extremitates vero eorum foliolis stellatim dispositis cinctae, fuscis globulis, vel ut in quibusdam apparet, parvis conis squamosis terminatae sunt, qui si per microscopium aspiciuntur, e parvis constant foliolis, e purpureo fuscis. Solent ista foliola successu temporis progerminare in novos furculorum ramulos. Versus summitatem superiorem furculorum quorundam, in meis speciminibus siccis, foliola suprema, capitula siue glomerulos fuscos squamosos ambientia, eleganti coeruleo colore tincta vidi.

Ex aliorum furculorum apicibus setae enascuntur vnciales, pellucidae, albicantes, cum capsulis oblongis, teretibus, lutescentibus, calyptra conica, subulata, super-

superne lutea, inferne albicante, longissima, (sic ut aliquando ad setam usque pertingat) et operculo cuspidato, saepe bifido tecta, quo secedente, parua at longissima apparent cilia. Raro cum capsulis inuenitur, quas proferre solet circa finem veris.

MNIVM *androgynum.*

Mnium caule ramoso, androgynum. *Linn. Sp. Pl. p.*

1574. n. 4.

M. caule simplici, cauliculis rosiferis. *Hall. Hist. Helv. p. 56. n. 1854.*

M. perangustis et breuibus foliis. *Dill. musc. p. 230. Tab. 31. f. 1.*

Bryum angustiori folio, capsula longa, pyriformi, inclinata. *Hall. En. Helv. p. 114. n. 29.*

Muscoides, quod Muscus capillaceus minimus, capitulo minimo puluerulento. *Vaill. Prodrom. p. 87. n. 1. Bot. Paris. Tab. 29. f. 6.*

Muscus coronatus humilis, minimus, foliolis, pediculis, et capitulis minimis erectis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 631. n. 20. Sect. XV. Tab. 7. Ser. 2. f. 20.*

Icon Oeder. Flor. Dan. Tab. 299.

hellgrünes Knöpsiges Mnium.

H. apud nos varius ad terram; mea specimina legi ad sepes circa Hardeggen.

Praecedenti quoad habitum et modum crescendi quodammodo similis est; differt vero cauliculis multo
minore

minoribus, ramosis, viridibus; foliis angustioribus, brevioribus, densioribusque, e luteo pallide viridibus, nervo viridi crasso, et non mucronato praeditis, margine integris; Caeterum in statu recenti, aut humefacta foliola patula sunt, lanceolata, in siccitate cauli appressa, linearia, brevissima, crispa. Surculi ipsi superius e summis apicibus setas emittunt bi- tri- quadrilineares, pallide virides, cum capitulis globosis, obscure viridibus, seminis papaveris circiter magnitudine; quae per lentem granulosa apparent, puluerulenta, et (si parva componas magnis) capitulo florum *Adoxae Moschatellinae* Linn. quodammodo similibus. Per siccitatem haec capitula in tantum extenuantur, ut vix ea a setis distinguere possis.

Setas capuligeras non vidi in meis speciminibus, quas praeter descripta capitula in aliis surculis profert, quaeque a DILLENIO describuntur sequenti modo:

„Capsulae figuram habent, ab illis (nempe capitulis globosis) diversam, oblongae nempe sunt, tenui calyptra, inferius alba, superius fulva, ab initio recta, postea aliquantam incurva tectae, qua abscedente operculum conspicitur pyramidatum, et hoc dilapso, capsulae margo multis ciliis incisus conspicitur. Colore sunt ab initio viridi, per maturitatem vero rufae, laeves in recenti, in sicca planta striatae, et nonnihil incurvae, cum antea rectae essent. Caeterum capsulae haec in iisdem nascuntur individuis, et e summis etiam surculis oriuntur, verum longioribus ac puluerulenta capitula, setis insident; utrorumque vero setae nudaе sunt, seu nullis postquam a cauliculis abscesserunt foliis cinguntur. Rariores visu sunt hae capsulae, quam puluerulenti illi globuli,

MNIVM *palustre*.

Mnium caule dichotomo, foliis subulatis. *Linn. Sp.*

Pl. p. 1574. n. 3. Scop. Flor. Carn. p. 129. n. 5.

Necker. delic. Gallobelg. p. 448. n. 8.

M. caulibus rubiginosis bipartitis, foliis lanceolatis, mol-
libus, capsulis cylindricis acuminatis. *Hall. Hist.*

Helv. T. III. p. 56. n. 1855.

M. maius, ramis longioribus bifurcatis. *Dill. musc. p. 233.*

Tab. 31. f. 3. Hall. En. Helv. p. 119. n. 1.

Muscus palustris erectus flavesceus, capillaceo folio.

*Vaill. Bot. Paris. p. 135. n. 8. capillaceus palustris fla-
gellis longioribus bifurcatis. Eiusd. Tab. 24. f. 1.*

Muscus palustris, flagellis erectis luteolis, raro diuisis,
capitulis oblongis Adianti. *Morif. Hist. Oxon. III.*
p. 629. n. 9. Sect. XV. Tab. 6. Ser. 3. f. 9.

Muscus stellaris ramosus, palustris, pediculo aureo ere-
cto, capitulo magno sphaerico. *Buxbaum. Cent. I.*
p. 45. Tab. 65. f. 1. 2. 3. 4.

braun und gelblich ästiges Sumpf: Mnium.

*H. in locis paludosis sylvae pone Adelipsen, versus
Schoningen.*

Caules bi- et triunciales, conferti; inferne simpli-
ces, superius in duos, tres, quatuorue ramos brachiat.
Foliola inferiora minora, fusca, et tomento copioso,
inter horum axillas internascente, fusco praedita; supe-
riora luteola, lanceolata, acuta, pellucida, margine
integerrima, neruo crasso distincta; in summis ramulis

M

furcu-

furculisue plana, patentia, magnas latasque stellas efformant, quarum quaedam et inprimis annosiores, rubiginoso tomento inter foliola stelliformia obsita, squamularum glomerulos in medio disco gerunt.

In annosioribus speciminibus plures stellas comprehendimus, e quibus sensim ramuli prodeunt, qui iterum stelligeri, denuo nouis furculis proliferi sunt. Inferiores harum stellularum ex obscuro viridi fuscae sunt, et tomentosae, superiores e luteo virent. Folia in statu recenti, aut aqua irrigata patula sunt, sic ut passim caulis rubicundus, tomentosus per interstitia videri possit: in siccitate cauli magis appressa, eum tegunt, et crispa apparent.

Specimina mea capsulis destituta inueni, hinc, cum propria earum observatio mihi desit, statum florescentiae verbis DILLENII describam:

„E ramorum medio, et eorum diuaricationibus,
 „e basi stellata annotina, et semiconsumpta, setae primo vere enascuntur subrubentes, biunciales, et longiores, calyptra oblonga, angusta, recta, subfusca, tectae; quae simul ac capsula intumescit, decidit.
 „Capsulae vero oblongae sunt, tumidae, leniter incuruae, virides, laeues, per maturitatem (Iunio et Iulio) striatae, subfuscae, leniter nutantes, operculo breui, parum cuspidato, lutescente praeditae, quo abscedente ora tenuiter denticulata apparet. Setae ad basin nudae sunt, tuberculo oblongo praeditae.”

Quasdam species a variis auctoribus *Mniis* accensitas, nominatim vero *Mnium purpureum* Linn. quod rectius ad *Bryum* pertinere videtur, ob defectum

fectum et rosularum scobiferarum; *Mnium* *setaceum* Linn. quod ob manifestum perichaetium *Hypnii*, monente Ill. HALLERO, accenseri debet: et *Mnium polytrichoides* Linn. quod ob distinctam calyptram pilosam, quae characterem *Polytrichi* constituit, secundum auctorem generis huius DILLENIVM, verum est *Polytrichum*, sub dictis generibus recensitas reperiens.

POLYTRICHVM. LINN. Gen. n. 1198. DILL. Gen. XII. p. 419. HALL. En. Helv. p. 106. SCOPOL. Flor. Carn. p. 134. MNIA capsula villosa. HALL. Hist. Helv. T. III. p. 50. Ord. I. LINN. Spec. Plant. p. 1576. BRYA calyptra villosa. HALL. Hist. Helv. Ord. I. p. 42. LINN. Spec. Plant. p. 1579.

Genus praecedenti admodum affine, imprimis ob rosulas foliaceas, quibus pari modo ac *Mnia* gaudet.

Insignis vero, ob quam commode POLYTRICHA separari possunt a *Mniis*, distinctionis nota, consistit in calyptra villosa, reeta: quae vel e meris constat pilis, vel membranacea est, et crebris pilis, rigidis, arrectis tecta.

Capsulae vel angulares vel subrotundae; aliae *Apophysi* (quae est eminentia quaedam protuberans infra capsulam, receptaculi quasi vices subiens, ab Ill. HALLERO nomine *disci* insignita) insidentes, aliae hac destitutae.

Setarum inferior extremitas in plerisque involucri foliaceo tubuloso, cylindrico, (quod ab Ill. LINNAEO *Perichaetium* appellatur, et in aliis magis, in aliis minus distinctum est) cincta.

Surculorum stelligerorum rosulae foliaceae in his adhuc magis quam in *Maiis* distinctae, quae a variis auctoribus pro femininis floribus pistillis articulatis instructis habentur, „squamae foliaceae; et ipsae rosulae gemmarum „genus esse videntur, e quo novi rami germinant, etiam repetito. „ vid. Ill. HALLERI En. Helv. p. 107. Hist. Helv. T. III. p. 50. Discus rosularum quae etiam calyces audiunt, coloratus esse solet.

* *Polytricha capsulis quadrangularibus, per apophysin circularem cum seta connexis.* Dill. Ord. I. p. 420. *Mniorum* Ord. I. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 50.

POLYTRICHVM commune, & maius.

Polytrichum caule simplici, anthera parallelepipedata

Linn.

Linn. Sp. Pl. p. 1573. n. 1. Scop. Flor. Carn. p. 135. n. 3.

P. quadrangulare vulgare, Iuccae foliis ferratis. Dill. Musc. p. 420. Tab. 54. f. 1.

P. vulgare et maius, capsula quadrangulari. Hall. En. Helv. p. 106. n. 1.

Mnium calyptris villosis, foliis ferratis, capsulis quadrangularibus, disco insidentibus. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 50. n. 1835.

Muscus iuniperifolius, capitulo quadrangulari. Vaill. Bot. Paris. p. 131. n. 15. Tab. 23. f. 8.

Synonyma furculorum stelligerorum:

Muscus capillaceus maior, pediculo et capitulo crassioribus, capitulo in calycem expanso. Vaill. Bot. Paris. Tab. 23. f. 8. a. b. Mich. Gen. p. 108. Tab. 59. f. 1. E. M. O. P. Q. R.

Muscus capillaceus, stellatus prolifer. Buxbaum. Cent. I. p. 42. Tab. 62. f. 4.

OFFICIN. Adianthi aurei herba.

langes Alceblättriges Polytichum, gülben Wiedertod; Wiedertyon.

H. ubique fere in sylvis.

Caules aliquot uncias longi, conferti; ut plurimum simplices, recti, in radicem repentem ad spithamæ immo vlnæ longitudinem protensam; quantum terræ immerfi sunt, squamulis fulvis, lanceolatis, undique neruum purpureum medium tegentibus, obsiti; emerfi

vero e terra, foliis semuncialibus circiter, sparsis, lanceolatis, acutis, apice rigido recuruo, laete viridibus cincti. Sicca folia obscurius viridia, per vetustatem fusca, magis incuruantur et crispantur, margine inuoluta, qui in statu recenti denticulatus est, unde, imprimis si per lentem aspiciuntur, *Aloes* foliis similia apparent. Setae e summis furculis prodeunt solitariae, bi, tri, quadriunciales, ex aureo purpureae, inferne viridi basi terminatae, foliolisque furculorum summis, membranaceis, pallidioribus, et tubuloso purpureo fusco inuolucro, siue *Perichaetio* cinctae: quibus superne insident capsulae quadrangulares, virides ab initio, dein flavae, ultimo purpureae, apophysi fuscae aut viridi innitentes, operculo plano in medio cuspidato, et sub hoc peculiari adhuc membrana albicante tectae, quibus abscedentibus ora crocea, eleganter ciliata (ciliis albis, per lentem conspicuis) in conspectum prodit. Calyptra tota pilosa, super capsulam longe propendens, lacera, acuta, aurei coloris superne, inferius albicans.

Alii furculi confertim nascentes, setis capsuligeris destituti, rosulas gerunt e foliolis brevioribus, at latioribus, ovato acutis compositas, calycis aut pyxidis forma, e quarum medio in quibusdam novus alius furculus, inferiori similis enascitur, denuo prolifer.

A quibusdam inter herbas capillares numeratur, vires ei adscribuntur adstringentes, et traumaticae. In decocto cum vino rubro ad fluxum mensium nimium, aqua eius destillata ad pleuritidem commendatur; vid. *Vogel. Inst. mat. med. p. 97.* sudorifica habetur. vid. *Hall. Hist. Helv. l. c.*

In locis valde vdis nascens, caules ad cubitalem usque longitudinem increseunt, qui in Belgio et Anglia ad

ad scopas inde parandas adhiberi solent, excutiendo pulveri, vestibisque purgandis idoneas. Lappones lectos et stragula inde conficere, DILLENIVS refert.

β. *Polytrichum commune, minus.*

Polytrichum quadrangulare, Juniperi foliis brevioribus, et rigidioribus. *Dill. musc. p. 464. Tab. 54. f. 2. Linn. Sp. Pl. p. 1573. n. 1. var. β. Hall. Hist. Helv. l. c. var. α. γ.*

P. montanum et minus, capsula quadrangulari. *Hall. En. Helv. p. 167. n. 2.*

Muscus erectus Juniperi folio glauco rigido, calyptra longissima. *Vaill. Bot. Paris. p. 131. n. 17. Tab. 23. f. 6.*

Muscus coronatus humilis rigidior, capitulis longis, acutis, sessilibus, erectis. *Morif. Hist. Oxon. III. p. 630. n. 8. Sect. XV. Tab. 7. Ser. 1. f. 8. coronatus medius pileolo villosio tenuiore. ibid. n. 6. Tab. 7. Ser. 2. f. 6*

Icon Oederi Flor. Dan. Tab. 295.

büscheliges Aiseblättriges *Polytrichum*.

H. rarius circa Waake, frequentius in sylvis occurrit hercynicis.

Differt furculis multo brevioribus, plerumque bifariam et trifariam diuisis, foliis rigidioribus, magis confertis, et erectis, apice minus incuruo, in siccitate haud crispis, sed cauli tantum appressis. Quod setas cauliculosque stelligeros attinet, similes sunt praecedenti.

γ. *Polytrichum commune, pilosum.*

Polytrichum quadrangulare minus, Juniperi foliis pilosis. Dill. musc. p. 426. Tab. 54. f. 3. Linn. Sp. Pl. p. 1573. n. 1. var. γ.

Mnium calyptra villosa, foliis ferratis, pilo aristatis, capsula quadrangula, infidente disco. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 51. n. 1836.

Muscus medius, foliis iuniperinis glaucis, non ferratis, in longum et canescentem pilum desinentibus, capitulo tetragono, calyptra tomentosa rubra. Mich. Gen. p. 109. n. 2.

Muscus capillaceus stellatus prolifer. Vaill. Bot. Paris. Tab. 23. f. 7.

Haarigblattriges Wacholder: Polytrichum.

H. passim in ericetis, sylvisque sterilibus: mea specimina legi in sylva inter Cammerborn et Nienover.

Similis est quodammodo praecedenti, at multo exilioribus cauliculis gaudet, confertis, semunciam vix longis, simplicibus, inferne nudis, et in radiculam tomentosam desinentibus, superne corymbo terminali foliorum vestitis, quae linearia, rigida, surrecta, crassa, margine integerrima, obtuso apice excurrunt in pilum canescentem, in siccis contortum, in humidis rectum, per lentem pellucidum, articulatum. Color foliorum recentium e glauco viridis, per siccitatem in rufum mutatur. Setae vnciales circiter, surgunt e medio foliorum corymbo, rubentes, cum capsula quadrangulari parua, simili praecedentium varietatum capsulis.

Rosulae foliaceae furculorum stelligerorum, capsuligeris longiorum, et foliis magis sparsis vestitorum, etiam similes sunt illis praecedentium varietatum, aliquando quoque proliferae reperiuntur.

*** *Polytricha capsulis subrotundis apophysi carentibus.* Dill. musc. Ord. II. p. 427. *Mnii Species* Hall. Hist. Helv. T. III. p. 51. Linn. Sp. Pl. p. 1576. *Brya calyptra villosa.* Hall. Hist. Helv. p. 42. Ord. I. Linn. Sp. Pl. p. 1579.

POLYTRICHVM *nanum.*

Polytrichum capsula cylindrica erecta; furculis simplicibus, brevissimis, foliis ferrulatis.

P. caule simplici capsula cylindrica, foliis ferratis. Scop. Flor. Carn. p. 134. n. 1.

P. paruum Aloes folio ferrato, capsulis oblongis. Dill. musc. p. 429. Tab. 55. n. 7.

P. minus, capsulis subrotundis, calyptra velut lacera coronatis. Hall. En. Helv. p. 107. n. 4.

Mnium (*polytrichoides*) calyptra villosa. Linn. Sp. Pl. p. 1577. n. 13. var. β .

Mnium calyptra villosa, acaulon, foliis ferratis, capsulis cylindricis, erectis. Hall. Hist. Helv. p. 51. n. 1837.

Adiantum aureum medium in ericetis proueniens. Vaill. Bot. Paris. p. 131. Tab. 29. f. II.

Museus Adianti aurei facie, humilis, capitulo rotundo, turgido, calyptra villosa. *Buxbaum. Cent. 1. p. 43. Tab. 63. f. 1.*

gezähntblättriges Zwerg: *Polytrichum.*

H. in locis sterilibus ad terram, in ericetis; v. g. in sylva inter Cammerborn et Nienouer.

Cauliculi aliquot lineas, ad semunciam longi, ut plurimum simplices, rarius in paucos ramulos diuisi, ad aliquot lineas tantum e terra prominentes. Foliola sparsa inferius, superius densius collecta, linearia, obtusa, teretia quasi, crassa, rigida, ad margines serrulata, ex obscuro viridia; in statu recenti patula, surrecta, apice non recurua, sicca vero contorta, e fusco glauca, cauli appressa. Setae ab initio breuissimae, dein vnciales, eleganter e luteo purpureae, inferius summis aliquot foliis furculorum membranaceis, et ad setam ipsam perichaetio, siue vagina pro ratione partium longa, purpurea, arcte appressa cinctae, superius capsulam gerunt cylindricam (apophysi destitutam) ab initio rectam, viridescentem, dein per maturitatem paullulum incuruam, crassiorem imprimis versus basin, e luteo incanam; quae superne membrana incana, punctata clauditur, qua abscedente margo multis ciliis per lentem oblitus apparet. Calyptra irregularis, conica, capsulas longe superans, tota e pilis conflata, coloris flauescentis ad incanum vergentis.

Surculi stelligeri, similes caeterum capsuligeris, squamosas ferunt rosulas, e paullo latioribus foliis compositas, medio disco piloso,

Varietas huius alia, quae differt foliis integris, est, cuius sequentia Auctorum synonyma exstant:

β. Polytrichum nanum, capsulis subrotundis galeritis, Aloes folio non serrato. *Dill. musc. p. 428. Tab. 55. f. 6.*
 P. caule simplici, capsula subrotunda, foliis integerrimis.
Scop. Flor. Carn. p. 134. n. 2.

Mnium acaulon, calyptra villosa, capsula cylindrica, foliis integerrimis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 41. n. 1838.*

Mnium (*polytrichoides*) calyptra villosa. *Linn. Sp. Pl. p. 1576. n. 13. α.*

Mulcus capillaceus minor, calyptra tomentosa. *Vaill. Bot. Paris. p. 131. Tab. 26. n. 12. f. 15.*

Muscus coronatus rigidus minor et humilior, capitulis villosis brevioribus. *Morif. Hist. Ox. III. p. 630. n. 7. Sect. XV. Tab. 7. Ser. 2. f. 7.*

POLYTRICHVM *bryoides*, α *striatum*.

Polytrichum caule ramoso, pedunculis brevissimis sparsis, calyptris sursum pilosis. *Scop. Flor. Carn. p. 136. n. 5. var. a.*

Polytrichum Bryi ruralis facie, capsulis sessilibus maius. *Dill. musc. p. 430. Tab. 55. f. 8.*

P. capsulis subrotundis, pediculis brevissimis infidentibus, calyptra striata, arboreum, ramosum, et maius. *Hall. En. Helv. p. 108. n. 5.*

Bryum (*striatum*) antheris subsessilibus sparsis, calyptris striatis,

striatis, sursumue pilosis. *Linn. Sp. Pl. p. 1579.*

n. 2.

Bryum setis brevissimis, alaribus, calyptris villosis, conicis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 42. n. 1799. var. β.

Muscus apocarpus arboreus ramosus. Vaill. Bot. Paris. p. 129. n. 6. Tab. 25. f. 5.

Magnitudine paullo insigniore diuersum a sequenti, cuius Synonyma sunt:

Polytrichum Bryi ruralis facie, capsulis sessilibus minus. Dill. musc. p. 431. Tab. 55. f. 9. Linn. Sp. Pl. p. 1580. var. β.

Polytrichum capsulis subrotundis, pediculis brevissimis infidentibus, calyptra striata, arborescens et terrestre, minus, ramosum et breue. Hall. En. Helv. p. 108. n. 7.

Bryum setis brevissimis, alaribus, calyptris villosis, conicis. Hall. Hist. Helv. l. c. n. 1799.

Muscus capillaceus minimus acaulos, calyptra striata. Vaill. Bot. Paris. p. 130. n. 10. Tab. 27. f. 10.

Muscus humilis tectorum subfuscus, capitulis breuibus, pileolis erectis, pedunculis curtis. Moris. Hist. Ox. III. p. 629. n. 13. Sect. XV. Tab. 6. Ser. ult. f. 13.

gestreift Huth *Polytrichum.*

H. ad parietes ligneos, muros, saxa, et truncos arborum copiose, inque densis caespitibus crescit.

Cauliculis ludit maioribus, vel minoribus, semuncialibus, vncialibus, biuncialibus, ramosis, ramis nunc laxio-

laxioribus, nunc densioribus, confertioribusque. Folia densa, lanceolata, acuta, (aliquando, imprimis in iuniori aetate, pilo laterali candido distincta) laete viridia in quibusdam, in aliis, praesertim annosioribus, magis fusca, rubiginosa; in statu recenti, aut madida planta, patula, in sicca appressa et hirsuta apparent. Surculorum quidam stellis foliosis terminantur, alii in summitate, ad latus mediorum centri foliorum stelliformium, setas proferunt breves, duarum nempe aut trium circiter linearum, luteas, cum capsulis luteis, calyptra conica, membranacea, striata, pilis surrectis rigidiusculis hinc et inde distincta praeditis. Capsulae ovatae oras habent longis cilis distinctas, operculo tectae luteo, aristato. Per aetatem pili calyptrae decidunt, et ipsa dein striata apparet.

β. *Polytrichum bryoides, capillaceum.*

Polytrichum caule ramoso, pedunculis longioribus sparsis, calyptris sursum pilosis. *Scop. Flor. Carn. p. 136. n. 5. var. b.*

P. capillaceum crispum, calyptris acutis, pilosissimis. *Dill. musc. p. 433. Tab. 55. f. 11.*

P. capsulis oblongo rotundis, calyptris pilosissimis. *Hall. En. Helv. p. 108. n. 6.*

Bryum (striatum) antheris subsessilibus sparsis, calyptris striatis, sursumue pilosis. *Linn. Sp. Pl. p. 1579. n. 2. var. γ.*

Bryum setis brevissimis alaribus, calyptris cylindricis villosissimis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 42. n. 1798.*

Muscus capillaceus minimus, calyptra villosa. *Vaill. Bor. Paris. p. 433. n. 11. Tab. 27. f. 9.*

fraus:

Frausblättriges gestreift Huth: Polytrichum.

H. ad arborum truncos, praesertim ad fagos ubique in sylvis.

Quoad habitum praecedenti adeo similis, ut eius varietas solummodo esse videatur, quae differt tantum foliis tenuioribus, acutioribus, in siccitate crispis, inferioribus fuscis, superioribus lutescentibus; figura capsularum magis pyriformi, ab initio viridium, calyptra magis pilosa.

BRYVM. LINN. Gen. n. 1194. DILL.

Musc. Gen. XI. p. 338. HALL. En. Helv.

p. 108. Hist. Helv. T. III. p. 42. Ord. II.

SCOP. Flor. Carn. p. 137.

Huius praecipuus character consistit in capsulis, calyptra laevi instructis; setisque inferne nudis, et solo tuberculo, siue nodo oblongo, (in plerisque colorato) adnexis.

Setae plerumque ex apicibus summis furculorum, ramorumque, vel ad radices, e furculis annotinis prodeunt, qui priori anno superiores fuerunt cauliculi. Rosulae foliaceae disco colorato praeditae, quales *Mniis* competunt, & *Polytrichis*, huic generi nullae.

Caules plerorumque simplices, vel laxe tantum ramosi, surrecti; vel paullulum reclinati, haud vero repentes.

✱ *Antheris sessilibus.*

BRYVM *apocarpum.*

Bryum antheris sessilibus, terminalibus, calyptra minima. Linn. Sp. Pl. p. 1579. n. 1. Necker, del. Gall. belg. p. 460. n. 18.

Bryum antheris erectis terminalibus, subsessilibus, surculis ramosis. Scop. Fler. Carn. p. 140. n. 8.

Sphagnum subhirsutum, obscure virens, capsulis rubellis. Dill. musc. p. 245. Tab. 32. f. 4.

Sphagnum cauliferum & ramosum, saxatile, hirsutum, et virescens, capitulis obscure rubris. Hall. En. Helv. p. 96. n. 4.

Hypnum caulibus ramosis, foliis lanceolatis, hirsutis, operculo aristato. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 40. n. 1793.

Muscus apocarpos, hirsutus, saxi adnascens, capitulis obscure rubris. Vaill. Bot. Paris. p. 129. n. 4. Tab. 27. f. 15.

Icon Oederi Flor. Dan. Tab. 480.

Scharlachköpfiges Bryum.

H. ad terram, ad saxa, ad arborum truncos, abunde in sylvis.

Cauliculi vnciales plerumque, aliquando biunciales, recti, in ramulos aliquot brachiati; inferius foliis rubiginosis, annotinis, superius e gramineo obscure viridibus, perangustis, acutissimis, ac capillaribus quasi, laxius vestiti. In statu recenti, aut humida foliola patula

tula sunt, (per lentem carinata, pellucida) incurua, et versus alterutrum latus magis directa; sicca caulibus appressa, ut furculi inde teretes quasi, eque contortis foliis subhirsuti appareant. In summis apicibus furculorum, ramorumque, oriuntur e centro foliolorum pallidiorum, longiorum, et pilo incano terminatorum, capsulae oblongae, glabrae, ab initio virides, dein subluteae, aurantiacae, ultimo purpurascens, brevissimo infidentes pedunculo purpureo, tuberculo luteo terminato. Superius ora purpurea, late hians, eleganter ciliata, operculo conico, paruo, rostrato, coccineo tecta, cui insidet calyptra brevissima, pallide lutea, caduca. Capsulae istae, summis foliolis extremorum furculorum, maxima ex parte sic obteguntur, ut nec pedunculus, nec capsulae, sed solum fere coccineum eminens operculum conspici queat. Ill. HALLERVS in *Hist. Helv.* ob ista foliola summa pilosa, quae pro Perichaetio habet, hanc speciem *Hypnis* associavit: videntur autem ista non Perichaetium verum proprie esse, quia setam non arcte amplectuntur, sed laxius ambiunt, nec ut in aliis *Hypnis* cum seta abscedunt, sed ipsam, eiusque tuberculum nudum sub separatione facillime dimittunt: hinc a *Bryis* separare dubitavi.

Ill. LINNAEVS ut varietatem huic speciei associat:

β. *Sphagnum nodosum hirsutum incanum.* *Dill. musc.*
p. 246. Tab. 32. f. 5.

Sphagnum cauliferum, et ramosum, faxatile, hirsutum, incanum, capitulis virentibus. *Hall. En. Helv.* p. 96.
n. 5.

Hypnum caulibus teretibus, ramosis, foliis ovato lanceolatis, pilo aristatis, operculo conico. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 40. n. 1792.*

Muscus

Musculus saxatilis, tortuosus, et nodosus. *Vaill. Bot. Paris. p. 128. n. 3. Tab. 27. f. 18. quae statum repraesentat iuniorem.*

H. item ad saxa et arborum truncos.

III. HALLERVS pro diuersa habet specie, et sequenti modo describit l. c. „Ramosi caules, et magnos in cespites congesti. Folia ouato lanceolata, pilo aristata, totos ramos imbricata tegunt, redduntque teretes, mucrone reflexo. Eodem modo tota viridia vidi, ut gemmae (siue summorum foliorum fasciculi, caules annotinos praesertim terminantes) solae incanae essent, alias omnia incana, albo pilo lanuginosa: et summis in ramis imprimis tota folia alba rosulam faciunt. In vetustioribus cauliculis, ad ortum rami quo noui surculi germinabunt, gemmae pilosae ponuntur, in quorum plusculis tecta latet, sessilis in breuissimo pedunculo, capsula ouata, sub initio viridis coloris, operculo breui, fere plano. Calyptra acuta, breuissima, caudata, aurea maturae capsulae aurantiae fiunt, et ampliter patent. „

*** *Antheris pedunculatis erectis.*

BRYVM *pomiforme.*

Bryum antheris erectis sphaericis. *Linn. Sp. Pl. p. 1580. n. 3.*

B. capsulis erectis sphaericis, pedunculatis, lateralibus, folio longioribus, surculis ramosis, foliis linearibus. *Scop. Flor. Carn. p. 142. n. 12. var. B.*

B. foliis subulatis, fetis verticalibus, capsulis sphaericis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 43. n. 1803.*

B. trichodes virescens, erectis, minusculis, capitulis maliformibus. *Hall. En. Helv. p. 108. n. 1.*

B. capillaceum, capsulis sphaericis. *Dill. musc. p. 339. Tab. 44. f. 1.*

Muscus capillaceus medius, capitulis globosis. *Tournef. I. R. H. p. 551.*

Muscus trichoides minimus, sericeus, capillaceus, capitulis sphaericis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 628. n. 6. Sect. XV. Tab. 6. Ser. 4. f. 6. Vaill. Bot. Paris. p. 129. n. 1. Tab. 24. f. 9. 12.*

Apfelsförmiges Capseln Bryum.

H. ad terram in viis sylvarum; ad rupes copiose circa Waake.

Caules unciales, inferne tomentosi, rubiginosi, latis densisque caespitibus nascentes, iuniores simplicis, annosiores ramosi. Folia densa, surrecta, longa, angusta, acuta, ac fere capillaria, inferiora fusca, superiora e luteo viridia, corymbosa, ac versus vnum latus paullatim inflexa, per lentem carinata, apicibus ferratis; sicca contorta. Setae semunciales, vel paullo longiores, e summis nouellis exortae furculis, singulares, vel plures in vno furculo, pallide rubentes, inferne tuberculo oblongo fusco (per lentem aliquot exiguis pilis contortis praedito) innitentes, superne capsulas gerunt, ab initio graciles, dein globosas, subluteas, (per vetustatem

statem aurantiacas) striatas, orificio amplo hiantē, ciliato, quod operculo obtuso ex aurantiaco purpureo tegitur. Calyptra alba, subulata, in capsula angusta iuniori praesertim obuia, per maturitatem capsulae facillime caduca. Florere solet circa initium veris.

BRYVM *pyriforme*.

Bryum antheris erectis, obouatis, calyptra subulata, furculis acaulibus, foliis ouatis muticis. *Linn. Sp. Pl. p. 1580. n. 4. Necker. delic. Gallobelg. p. 459. n. 15.*

B. caule breuissimo, foliis ouato lanceolatis, capsulis erectis, ouatis, operculo breui. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 49. n. 1832.*

B. capsulis erectis obouatis, furculis simplicibus, foliis pellucidis, ouatis, glabris. *Scop. Flor. Carn. p. 139. n. 5.*

B. paruum erectum, pyriformibus maiusculis capitulis, foliis serpylli pellucidis. *Hall. En. Helv. p. 113. n. 4.*

B. serpillifolium pellucidum, capsulis pyriformibus. *Dill. musc. p. 345. Tab. 44. f. 6.*

Muscus capillaceus minimus, capitulis pyriformibus, turgidis. *Vaill. Bot. Paris. p. 129. n. 3. Tab. 29. f. 13.*

Muscus minimus latifolius, capitulis erectis turgidis. *Buxbaum. Cent. p. 44. Tab. 64. f. 1.*

Muscus coronatus humilis, stellaris, foliis latiusculis, capitulis pyriformibus erectis, turgidiusculis. Morif. Hist. Ox. III. p. 631. n. 16. Sect. XV. Tab. 7. Ser. 2. f. 16.

Birnförmiges Capsein Bryum.

H. copiose ad aggeres viarum humidarum, ad latera fossularum; v. g. vor dem Albaner Thor am Graben.

Exiguus confertis cauliculis, sessilibus, crescit. Folia in rosulas circa setam congesta, ovata, lata, acuta, pellucida, pallide viridia, per lentem nervo medio crasso, pellucido distincta, qui in mucronem capillaceum, pellucidum, valde caducum terminatur. E medio centro cauliculorum, circa Nouembrem, surgunt setae singulares, breues, vix semunciales, (in speciminibus in loco humido natis) aliquando unciales, ab initio e luteo viridi pallidae, dein per maturitatem e luteo rubentes, splendentes, rectae, cum capsulis rectis, pyriformibus, crassis, ab initio magis oblongis, glabris, pallide viridibus, (per siccitatem glaucis) operculo cartilagineo, pellucido, breui albicante conico, apice in statu recenti paullulum versus vnum latus inclinato, in sicco breviori, e media capsula protuberante, instar clavi, et calyptra fusca laterali, apice longo paullulum inclinato, tectis. Maturae capsulae tumidiore, coloris e fulvo ad aurantiacum vergentis; annosiores striatae, orificio amplo non ciliato hiant. Tubercula setarum atrovirentia, oblonga, in iunioribus pallide viridia, pellucida, margine superiori aurantiaco, et per lentem aliquot incanis pilis exilissimis distincta. Calyptrae fere nonni-

nonnisi in iunioribus occurrunt speciminibus, quales DILLENIVS describit a primo exortu quadrangulares; rumpuntur enim deinde a turgescente capsula, vnde lateralem acquirunt situm.

BRYVM exstinctorium.

Bryum anthera erecta, oblonga, minori, calyptris laxis, aequalibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1581. n. 5. Necker. delic. Gallobelg. p. 460. n. 17.*

B. caule breuissimo, calyptra cylindrica, longe arislata. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 48. n. 1829.*

B. calyptra exstinctorii forma, minus. *Dill. musc. p. 349. Tab. 45. f. 8. Hall. En. Helv. p. 113. n. 23.*

B. capsulis erectis cylindraceis, furculis simplicibus, foliis piliferis. *Seep. Flor. Carn. p. 138. n. 3.*

Muscus capillaceus minimus, calyptra longa conoide, nitida. *Vaill. Bot. Paris. p. 137. n. 10. Tab. 26. f. 1.*

Muscus coronatus humilis, tenuifolius, pileolo magno acuto, infra aperto, exstinctorium referente. *Morif. Hist. Ox. III. p. 630. n. 12. Sect. XV. Tab. 7. Ser. I. f. 12.*

Häutig Tutenförmiges Huth Bryum.

H. ad rupes, muros, et terram, in locis arenosis. v. g. auf dem Walle, an der Stadtmauer.

Surculis ludit semuncialibus, vncialibus, in densis caespitibus nascentibus, inferius simplicibus, superius
N 3 paullu-

paullulum ramosis, ab imo ad summum foliosis, inferne tomentosis radiculis, arcte terrae adnatis. Folia inferiora e rubiginoso fusca, superiora gramineo viridia, lanceolata, acuta, submutica, pellucida, nervo per lentem crasso, viridi (aliquando rubicundo) distincta, apice, in meis specimenibus, non pilifero, in summis furculis congesta in formam rosulae.

Setae semuncia breuiores, pallide rubentes, nitidae, rectae, inferius tuberculo viridi, (per lentem pilis tenuissimis in quibusdam asperso) oblongo praeditae, superne capsulas gerunt breues, cylindricas, virides, operculo longo aristato mucrone, per lentem pellucido, albicante, terminato. Calyptra permagna infidet cylindrica, recta, laxa, membranacea, pellucida, pallida, super capsulas longe propendens, inferius orificio lato, margine per lentem, in aliquot crenas irregulares fissio, superius in angustum longum mucronem desinens. Per siccitatem calyptrae subangulatae apparent. Capsulae siccae superius valde extenuantur, et facillime abscedunt, remanente ad setam basi, paruam aliquam apophysin quasi, siue capitulum cauum, superius apertum mentiente. Inter omnes Bryi species, haec maxima, pro ratione reliquarum partium, calyptra gaudens, facillime exinde distinguitur, quod ista figura sua referat instrumentum quoddam, conicum oblongum, (baculo longo adnexum) *extinctorium* dictum, quo vtuntur imprimis in templis, ad candelas cereas in altaribus extinguendis.

Aliam, maiorem ratione omnium partium, ramosioremque, a DILLENIO et Ill. HALLERO distinctam speciem, huic vero, imprimis quod calyptras attinet, simillimam, vt varietatem modo descriptae associat
Ill.

III. LINNAEVS, cuius sequentia sunt Auctorum synonyma:

β. *Bryum calyptra extinctorii forma maius et ramosum.* *Dill. musc. p. 350. Tab. 45. f. 9. Linn. Sp. Pl. p. 1581. n. 5. var. β.*

B. erectis longis et obtusis capitulis, calyptra laxa, conica, foliis Serpylli pellucidis latioribus. *Dill. Cat. Giffens. p. 223.*

B. calyptra extinctorii forma maius. *Hall. En. Helv. p. 113. n. 22.*

B. caule folioso, calyptra cylindrica ciliata, longe aristata. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 42. n. 1828.*

BRYVM *subulatum*.

Bryum antheris erectis subulatis, furculis acaulibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1581. n. 6. Necker. delic. Gallobelg. p. 456. n. 16.*

B. antheris erectis, subulatis, furculis simplicibus, foliis imberbibus. *Scop. Flor. Carn. p. 137. n. 1.*

B. erectis, longis acutis et falcatis capitulis, calyptra subfusca, foliis Serpylli pellucidis. *Hall. En. Helv. p. 112. n. 20.*

B. caule breuissimo, foliis lanceolatis, capsulis longissimis, operculo praelongo. *Hall. Hist. Helv. p. 42. T. III. n. 1827.*

B. capsulis longis subulatis. *Dill. musc. p. 350. Tab. 45. f. 10.*

Muscus capillaris, corniculis longissimis incurvis. *Raii. Vaill. Bot. Paris. p. 133. n. 6. Tab. 25. f. 8.*

Psriemensförmiges Capseln: Bryum.

H. ad terram subhumidam, in sylvis passim, v. g. circa Kerstlingeroderfeld, in cauis semitis, circa die Bruck, circa Waake, in fissuris rupium.

Quoad caules & folia similis est praecedenti, sunt enim caules subsessiles, dense coaceruati, simplices, vel subramosi, foliis lanceolatis, patulis, in rosulas patentes superne congestis, acutis, pellucidis, nervosis, integris, nunc pallide e luteo, nunc obscurius viridibus vestiti,

Setae vnciales, purpureae, nitentes, rectae quidem, at varie contorti, fili sericei instar. Capsulae maturae e fusco virides, cylindricae, angustae, tres ad quatuor lineas longae, operculo longo, conico, pallidiori, margine aurantiaco praedito tectae; annotinae e fusco purpureae, e quarum medio prominet trunculus exsuccus operculi remanens, qui per lentem visus, mutica latiori, tomentosa terminatur extremitate. In siccitate capsulae, cornu bubuli instar incurvae apparent. Inniorum speciminum capsulas vidi crassiores, at multo breviores, ac pyriformes quasi, pallide e luteo virides, operculo obtuso, e media capsula, instar clavi aut rostri prominente, margine crassiori distincto, qui in adultioribus, si in longius se extendunt haud tam distinctus est. Calyptrae flavae laterales, acutissimae, facile deciduae. Floret vernò tempore, aestate maturat capsulas. Folia
sicca

ficca valde incurua et crispa apparent, ad terram reclinata. Ludit foliis piliferis, et non piliferis.

BRYVM *murale.*

Bryum antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, furculis simplicibus caespitosis. *Linn. Sp. Pl. p. 1581. n. 8. Necker. delic. Gallobelg. p. 458. n. 14.*

B. capsulis erectis, oblongis, furculis simplicibus, foliis rectiusculis, piliferis, ouatis. *Scop. Flor. Carn. p. 138. n. 4.*

B. cauliculis breuissimis, foliis ouato lanceolatis, patulis, pilo terminatis, capsulis aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 48. n. 1825.*

B. minus, erectis, minus falcatis capitulis, foliis latiusculis congestis, in pilum canescentem desinentibus. *Hall. En. Helv. p. 112. n. 18.*

B. tegulare humile pilosum et incanum. *Dill. musc. p. 355. Tab. 45. f. 14.*

Muscus muralis, omnium vulgatissimus, villosus. *Vaill. Bot. Paris. p. 133. Tab. 24. f. 15.*

Muscus capillaris minor, capitulis erectis. *Mich. Gen. p. 108. Tab. 59. f. 7.*

Muscus minimus, foliis acutis, in pilum canescentem desinentibus. *Buxbaum Cent. I. p. 45. Tab. 64. f. 4.*

niedriges grauhaariges Mauer: Bryum.

H. ad muros, ad parietes ligneos hortorum, in tegulis, et ad saxa copiosissime.

Cauliculis densis, humilibus, (vix enim quatuor aut quinque lineas superant) vix ramosis, in caespites latos, aliquando orbiculares, in medio tumidos, siue conuexos, collectis, crescit. Folia laxa, lanceolata, obtusa, pellucida, extus paullatim conuexa, laete viridia, neruo per lentem conspicuo, distincta, crasso, virente, aliquando rubicundo, qui in summo apice, pilum longitudine folia aequantem, incanum emittit, superius in rosulas patentes congesta.

E plurimis harum rosularum, iuniorum aequae ac annotinorum furculorum, surgunt setae vnciales, e luteo purpureae, (per aetatem magis e fusco rubentes) cum capsulis rectis, fere cylindricis, coloris ab initio obscure viridis, per maturitatem e fusco rubri, splendentibus. Operculum conicum, subulatum, rubicundum. Calyptra fusca, acuta, paullulum incurua, lateralis. Ora capsularum, abscedente operculo, pallide crocea, protuberans, per lentem pilosa, pilis longis, (contortis in sicca) tenuissimis.

Folia in siccis speciminibus sic corrugantur, vt vix ea distinguas prae superfuso copioso tomento pilorum, qui dense tegunt caespitum superficiem, eamque incanam faciunt; irrigata vero, sese iterum explicant, et faciem pristinam acquirunt. Magnam habet similitudinem cum *Bryo puluinato*, a quo autem setis multo longioribus, rectis, differt.

Est alia quaedam, in iisdem locis proueniens, ac priori intermixta aliquando, quae iunioris forte aetatis esse videtur varietas, cuius folia pilis carent, sed quorum neruus in paruum terminatur acutum mucronem. Cauliculi, setae, capsulae, et reliqua omnia praecedenti

ti sumilima, at paullo minora. Sicca folia non incana, sed viridia, at valde quoque corrugata, crispa. III. HALLERVS specie eam distinxit, in noua pariter ac priori operis sui editione, et appellat:

β. *Bryum cauliculo breuissimo, foliis ouatis, lanceolatis, patulis, capsulis aristatis.* *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 48. n. 1826.*

B. angustis viridibus foliis, capitulis erectis, breuibus pediculis insidentibus, calyptra falcata, vel auium vnguiculas referente. *Hall. En. Helv. p. 112. n. 19.*

B. humile pilis carens, viride, et pellucidum. *Dill. musc. p. 356. Tab. 45. f. 15.*

Muscus vulgaris, omnium vulgatissimus, non villosus. *Vaill. Bot. Paris. p. 133. n. 3.* Muscus muralis, omnium vulgatissimus, non villosus. *Eiusd. Tab. 24. f. 14.* Muscus capillaris minor, capitulis erectis, vulgatissimus, non villosus. *Eiusd. Ibid. Tab. 25. f. 4.*

Muscus minimus latifolius, capitulis erectis longioribus. *Buxbaum. Cent. I. p. 44. Tab. 25. f. 4.*

BRYVM truncatulum.

Bryum antheris erectis subrotundis operculo mucronato. *Linn. Sp. Pl. p. 1584. n. 18. Necker. delic. Gallobelg. p. 455. n. 9.*

B. foliis ouato lanceolatis, capsulis erectis, ouatis, aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 49. n. 1833.*

B. capsulis erectis, ouatis, furculis simplicibus, foliis piliferis, oblongis. *Scop. Flor. Carn. p. 139. n. 6.*

B. ex-

B. exiguum, erectis parvis, subrotundis capitulis rufis, foliis serpilli angustis, pellucidis. *Hall. En. Helv. p. 113. n. 25.*

B. exiguum, creberrimis capsulis rufis. *Dill. Musc. p. 347. Tab. 45. f. 7.*

Muscus capillaceus omnium minimus. *Vaill. Bot. Paris. p. 130. n. 5. Tab. 26. f. 2.*

Muscus coronatus minimus, foliolis et capitulis oblongis, in pediculis brevissimis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 631. n. 18. Sect. XV. Tab. 7. Ser. 1. f. 18.*

Muscus stellaris minimus, pediculo brevissimo capitulis turgidis. *Buxbaum. Cent. II. p. 4. Tab. 2. f. 2.* *Muscus capillaris*, capitulis rotundis, angustifolius. *Eiusd. Cent. II. p. 6. Tab. 2. f. 7.*

abgestumpftes Capseln; *Bryum.*

H. ad terram argillosam, ad vias, muros, et fossarum latera; v. g. auf dem Walle, auf der Stadtmauer, vor dem Albaner Thor an den Gräben.

Haec e minimis est Muscorum; cauliculi enim vix tres aut quatuor lineas aequant, simplices sunt, at densis caespitibus confertim nascuntur. Folia brevia, furrecta, ovato lanceolata, acuta, pilo pellucido albo per lentam tantum conspicuo terminata, laete viridia, splendentia, nervosa, pellucida, carinata; in sicca caulem
arcte

arcte tegentia, in recenti laxiora, ut nervus purpureus caulis per interstitia, imprimis inferne conspicuus sit.

Setae e summis furculorum rosulis, circa hiemem prodeunt singulares, aliquando binae, trium quatuorue linearum, e luteo purpureae, cum capsulis ovatis, satis crassiss, e pallide luteo fuscis, operculo longe aristato pallidiore, et calyptra tectis, ab initio recta, dein laterali, albicante, rostrata. Capsulae abscedente operculo valde truncatae apparent, et quodammodo longiores, et orificio amplo hiant.

Variat furculis, foliis, setis, capsulisque brevioribus et longioribus, pro ratione loci natalis, in sicco enim brevior et minor, in humidiori longior est, et colore obscurius viridi gaudet.

BRYUM viridulum. *Weissia - Hedw. Grimia - Schrad.*
St. controversa Wm.

Bryum antheris erectis ovatis, foliis lanceolatis acuminatis, imbricato patulis. *Linn. Sp. Pl. p. 1584. n. 19.*
Necker. delic. Gallobelg. p. 455. n. 9.

B. capsulis erectis ovatis, furculis simplicibus foliis imberbibus lanceolatis. *Scop. Flor. Carn. p. 140. n. 7.*

B. trichodes exile, erectis capitulis, in pediculis brevissimis. *Hall. En. Helv. p. 110. n. 9.*

B. foliis capillaribus, capsulis ovatis, aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 45. n. 1809.*

B. capillaceum breve, pallide et laete virens, capsulis ovatis. *Dill. musc. p. 380. Tab. 48. f. 43.*

Musculus capillaceus omnium minimus, foliis longioribus et angustioribus. *Vaill. Bot. Paris. p. 130. n. 9. Tab. 29. f. 5.*

blaßgrünes kraushaarblättriges Zwerg-Bryum.

H. in pratis, in sylvis ad vias copiose.

Exiguum valde, ac nisi in latis stratis cresceret confertis, vix conspicuum. Cauliculi unus, duarum, trium, ad summum linearum longitudine, erecti, simplices plerumque, aut parum tantum ramosi. Foliola perangusta, capillaria, in iunioribus pallide viridis coloris, (in annosioribus graminei) acutissima, apicibus in sicca reflexis, contortis.

Setae e summis caulibus annotinis, solitariae, aliquando binae, pallidae, cum capsulis ouatis, e fusco lutescentibus, nitidis, oris ciliatis; operculo rubente aristato, calyptra acuta.

BRYUM paludosum. *Weisia-Hedw. Grimia pusilla Lhond. Wm.*

Bryum acaulon, foliis setaceis, antheris obtusissimis patulis. *Linn. Sp. Pl. p. 1584. n. 20. Necker. delic. Gallobelg. p. 454. n. 7.*

B. foliis capillaribus, cauliculo sessili, capsulis ouatis, aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 45. n. 1810.*

B. trichodes acaulon, palustre minimum, setis et capsulis brevissimis. *Dill. musc. p. 387. Tab. 49. f. 53.*

dunkelgrünes haarblättriges Sumpf-Bryum.

H. in pratis vdis paludosis ubique.

Minimum est inter Brya; cauliculi adeo exiles, ut vix eos nisi confertim crescerent distinguas, e simplici tantum fasciculo foliorum exilissimorum, capillarium, patulorum, constant, e quorum medio prodeunt setae pallidae, vix duas aut tres lineas aequantes. Capsulae ouatae, lato orificio (per lentem argute ciliato) hiantes, abscedente operculo subaristato. Calyptra gracilis, erecta, pallida. A praecedente, cui simillimum, differt colore foliorum obscurius viridi, foliis tenuioribus, in sicca non crispis, capsulis minoribus fuscis.

BRYVM aestivum.

Bryum antheris erectis, subrotundis axillaribus, foliis subulatis distantibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1585. n. 23.*

Necker. delic. Gallobelg. p. 453. n. 5.

B. cauliculis subnudis, ramosis, foliis subulatis breuibus, capsulis ouatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 45. n. 1811.*

B. palustre aestivum, Conferuae facie. *Dill. musc. p. 375. Tab. 47. f. 36.*

Schlankstäiges Sumpf-Bryum.

H. in locis paludosis; v. g. in prato paludoso sylvae pone Adelipfen, ad sinistra viam versus Schoninghen; pone Hessendreich, ad sinistra viae versus Waake.

Peculiarem habet strigosam faciem haec Bryi alibi rarior species, quae nonnisi in locis paludosis provenit. Sureculi triuncialis, quadriuncialis longitudinis, aliquando (si profundius effoditur e terra) adhuc longiores, conferti, admodum graciles, et quasi filiformes, recti, inferne tomento copioso cum terra limosa cohaerente, pellis

pellis instar implicati, ad semuncialem altitudinem circiter liberi e terra exstant. Ramuli terni, quaterni, et plures, profunde ex furculis annotinis, paludosae terrae immerfis, fuscis exorti, omnes aequalis sunt longitudinis, et ad aliquam distantiam in dichotomos ramorum viticulos gracillimos, erectos, arcte ad se inuicem appressos, iterum quoque aequalis longitudinis diuisi. Foliola breuissima, exigua (in sicca vix conspicua) neruo quem tegunt arctissime appressa, in statu recenti, aut humido, paullulum patentia, per lentem lanceolata, subulata, alterna; superiora densius congesta, lutescentia, media laxiora, e luteo magis viridia, inferiora rarius disposita, fusca.

Inter viticulorum superiorum dichotomias, oriuntur setae semunciales, ad unciales, e luteo purpureae, cum capsulis cylindricis, ab initio viridibus, dein e luteo purpureis, nitentibus, ultimo fuscis, operculo paruo, conico, acuto, aurantiaco tectis. Ora in meis speciminibus, per lentem pilosa, pilis pallidis.

Aliquam habet similitudinem cum *Mnio fontano* Linn. a quo autem differt, furculis multo gracilioribus, foliolis minoribus, capsulis tenuioribus, et defectu rofularum stelliformium.

*** *Antheris subnutantibus, siue inclinatis.*

BRYVM undulatum.

Bryum antheris erectiusculis, pedunculis subsolitariis, foliis lanceolatis, carinatis, undulatis patentibus. Linn. Sp. Pl. p. 1582. n. 10. Necker. delic. Gallobelg. p. 457. n. 12.

B. ca-

B. capsulis subnutantibus, furculis simplicibus, foliis lanceolatis, vndatis, ferratis. *Scop. Flor. Carn. p. 143. n. 13.*

B. foliis lanceolatis ferratis, capsulis cylindricis, inclinatiss, aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 47. n. 1823.*

B. capitulis oblongis, rubentibus, foliis oblongis, angustis, pellucidis, rugosis. *Hall. En. Helv. p. 114. n. 27.*

B. Phyllitidis folio rugoso, acuto, capsulis incurvis. *Dill. musc. p. 360. Tab. 46. f. 18.*

Musculus erectus, Linariae folio maior. *Vaill. Bot. Paris. p. 132. n. 1.* Musculus capillaceus minor, capitulo longiore falcato. *Eiurd. Tab. 26. f. 17.*

Wellenblättriges Bryum.

H. ubique fere in sylvis, ad vias vdas, umbrosas; praecipue vero copiose reperitur in sylvis circa Kerstlingerodersfeld.

Caules vnciales, biunciales, ad triunciales, erecti, simplices, inferne radiculis tomentosis arcte adhaerent terrae, cui aliquantum immersi sunt, vbi vero emergunt supra terram, purpurei, nudi, vel aliquot passim ligulis marcidis, et paullo altius, parvis foliolis, cauli appressis, alternis, angustis, vestiti sunt, versus summmitatem, maiorum foliorum terminantur corymbo. Folia ista maiora, lanceolata 2, 3 lineas longa, vnam lata, acuta, obscure viridia, vndulata, et ad marginem parvis dentibus, per lentem solummodo conspicuis serrata, pellucida,

lucida, neruo crasso, medio, distincta; infusca valde crispata et corrugata sunt, irrigata vero se iterum perfecte explicant.

Setae e summis caulibus, vnciales, biunciales, plerumque solitariae, aliquando binae, erectae, inferne purpureae, superius lutescentes, cum capsulis oblongis, incurvis, subnutantibus, spadiceis, operculo, (coccineo annulo distincto, et in longum aristatum mucronem protenso) tectis; iuxta furculos maiores capsuligeros, alii minores reperiuntur, foliosi, qui sequenti aestate setas virides, breves, (vix semunciales) proferunt, cum capsulis rectis tenuissimis, et calyptra longa conica pallida instructis. Hae setae, circa autumnum vel hiemem vnciales, biunciales euadunt, capsulae e situ recto inclinatae fiunt, crassiores, et calyptrae ad latus versus apicem protrusae, decidunt.

BRYVM *purpureum*.

Bryum antheris subnutantibus axillaribus, caule dichotomo, foliis carinatis.

B. foliis lanceolatis subulatis, capsulis erectis, operculis conicis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 46. n. 1816.*

B. tenue stellatum, setis purpureis. *Dill. musc. p. 386. Tab. 49. f. 51.*

Mnium (*purpureum*) caule dichotomo: axillis pedunculiferis, anthera erecta foliis carinatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1575. n. 6. Necker. delíc. Gallobelg. p. 449. n. 9.*

Muscus trichodes parvus, foliis Musci vulgaris, capitulis longis acutis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 628. n. 4. Sect. XV. Tab. 6. Ser. 4. f. 1.*

pur:

purpurfarbiges Blüthstiel Bryum.

*H. ubique ad muros, copiose etiam ad terram in syl-
uis, ad saxa.*

Caespitibus densissimis crescit. Cauliculi inferius terrae arcte adhaerentes, erecti, plerumque dichotomi, superius ramulos, aut viticulos iuniores binos emittentes, foliis angustis, lanceolatis, subulatis, laete viridibus, patulis cincti, quae versus quorundam furculorum et ramulorum dictorum extremitates, in stellulae, aut rosulae patentis formam disposita, *Mnii* rosulis similis, disco autem puluerulento squamoso destituuntur, quo alia *Mnia* gaudent.

Setae (quarum magna copia e longinquo iam oculos allicit) vnciales, eleganter purpureae, pellucidae, nitentes, circa hiemem inter furculorum axillas oriuntur. Capsulae ovatae, primum erectae, virides, dein, quando maturescunt, (quod fit circiter mense Aprili) rufae, paullulum inclinatae, sub lente striatae observantur. Operculum acutum, conicum, coccineum. Calyptra in iunioribus erecta, dein lateralis, obliqua, e fusco purpurea.

*** *Antheris nutantibus.*

BRYVM *argenteum.*

Bryum antheris pendulis, furculis cylindricis, imbricatis, laevibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1586. n. 27. Necker delic. Gallobelg. p. 452. n. 2.*

B. capfulis pendulis, pedunculis subradicalibus, furculis teretibus ramosis. *Scop. Flor. Carn. p. 147. n. 20.*

B. cauliculis teretibus, capsulis ouatis, acuminatis, pendulis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 47. n. 1821.

B. capitulis subrotundis, reflexis, cauliculis teretibus, argenteis. Hall. En. Helv. p. 117. n. 41.

B. pendulum iulaceum argenteum et sericeum. Dill. muse. p. 392. Tab. 50. f. 62.

Muscus squamosus argenteus, Ericae folio. Vaill. Bot. Paris. p. 134. n. 2. Tab. 26. f. 3.

Muscus minimus e viridi argenteus, capitulis oblongis cernuis. Moris. Hist. Ox. III. p. 629. n. 17. Sect. XV. Tab. 6. Ser. ultim. f. 17.

Silberblättriges Bryum.

H. ad muros, tecta, rupes, v. g. auf dem Walle an der Stadtmauer, circa Waake.

Conferunt nascitur cauliculis sessilibus, semuncialibus, in ramulorum aliquot furculos teretes, (duarum trium linearum) diuisis. Foliola ouato lanceolata, acuta, pilo terminata, quadruplici alterna serie disposita, tam arcte cauli appressa sunt, ut nonnisi per lentem distinguere possint, pilis creberrimis, sericeis, argenteis, tenerimis, imprimis versus summum caulis, dense obiecta.

Setae circa hiemem surgunt e basi cauliculorum, ab aliquot lineis, ad semunciam longae, inferne purpureae, superne pallidiores. Capsulae ouatae nutantes, luteae, versus setam rubicundae, quae ab initio virides, et rectae ante maturitatem fuere. Operculum breue, obtusum, aurantiacum. Ora ciliata. Calyptra e viridi fusca,

fusca, quae nonnisi in iunioribus capsulis reperitur, in nutantibus enim, maturisque, ea iam delapsa esse solet.

In iisdem locis, alia eius reperitur varietas, cuius folia viridia sunt, et sequenti nomine insignita:

- β *Bryum pendulum*, furculis teretibus viridibus. *Dill. musc. p. 394. Tab. 50. f. 63. Linn. Sp. Pl. p. 1586. n. 27. var. β. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 47. n. 1821. var. β. B. trichodes*, capitulis reflexis, viridissimum, holosericum. *Dill. Cat. Giffensf. p. 226. Append. p. 86. Tab. 2. sub lit. F.*

BRYVM puluinatum.

- B. antheris subrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis. *Linn. Sp. Pl. p. 1586. n. 28. Necker. delic. Gallo-belg. p. 453. n. 4.*
- B. capsulis pendulis ouatis, pedunculis reflexis, furculis ramosis, foliis piliferis. *Scop. Flor. Carn. p. 148. n. 22.*
- B. foliis lanceolatis, pilo terminatis, capsulis pendulis, ouatis, aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 47. n. 1822.*
- B. trichodes, hirsutiae canescens, capitulis subrotundis reflexis, in perbreuib. pediculis. *Hall. En. Helv. p. 117. n. 40.*
- B. orbiculare puluinatum, hirsutiae canescens, capsulis immersis. *Dill. musc. p. 395. Tab. 50. f. 65.*
- Muscus capillaceus*, lanuginosus, minimus. *Vaill. Bot. Paris. p. 133. n. 1. Tab. 29. f. 2.*

Muscus trichodes hirsutiae canescens, capsulis subrotundis, reflexis, in perbreuibus pediculis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 629. n. 21. Sect. XV. Tab. 6. Ser. ult. f. 21.*

grauhaarig Polsterförmiges Bryum.

H. ad muros, tecta, parietes ligneos.

Surculi conferti, ramosi, ramis versus summum crassioribus, semunciam circiter longi, caespites formant densos, latos, orbiculares, conuexos. Folia in recenti statu, aut humida, lanceolata sunt, carinata, surrecta, sub lente subpellucida, apicibus in pilos longos, incanos, vagos terminatis, superiora sordide e luteo virescentia, inferiora fusca, et pilis destituta. Sicca folia valde contracta sunt, vix distinguenda, prae superfusa magna pilorum exstantium copia, quae totam caespitum tegit superficiem, eamque incanam facit.

Setae e summis furculorum ramulis ortae, breuissimae, pallide flauae coloris, ab initio rectae sunt, et capsulas gerunt calyptratas, tenues, pallidas, quando vero hae capsulae crassiores fiunt et maturae, setae deorsum arcuatae incuruantur, sic ut capsulas abscondant quasi inter folia. Maturae capsulae pendulae sunt, globosae, sub lente striatae, fuscae, operculo breui aristato tectae. Ora denticulata. Calyptra iuniorum capsularum, rectarum conica, mucrone fusco praedita, integra, deinde sensim lacera fit, et decidit. Hieme floret.

HYPNVM LINN. Gen. n. 1125. DILLEN.

Musc. Gen. X. p. 261. HALL. En. Helv.

p. 97. Hist. Helv. T. III. p. 26. SCOPOL.

Flor.

Flor. Carn. p. 148. MNII et BRYI quaedam Species LINN. aliorumque Auctorum.

Genus praecedenti admodum affine. Perichaetium, siue vagina squamosa, foliacea, setae basin cingens, praecipuam praebet differentiae notam.

Inter alas foliorum, in quibusdam speciebusprehenduntur globuli sessiles, quos profemineis floribus habet Ill. LINNAEVS; gemmarum autem vices gerere videntur.

I. *Hypna Bryodea*. Hall. Hist. Helv. Ord. V. T. III. p. 36. *Mnii et Bryi Linn. quaedam Species*.

Illustris HALLERI vestigia premens, huc refero quasdam Species *Bryis* et *Mniis* ab Auctoribus accensitas, eas scilicet, „quibus habitus erectus, parum ramosus, qui Bryo, sed „setae e vaginis prodeuntes. „

HYPNVUM *caespiticiu*m.

Hypnum foliis ovato lanceolatis, aristatis, patulis, capsulis ovatis, obtusis, pendulis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 39. n. 1790.

Bryum (*caespiticiu*m) antheris pendulis foliis lanceolatis, acuminato-setaceis, pedunculis longissimis. Linn.

Sp. Pl. p. 1586. n. 29. Necker. delic. Gallobelg. p. 451. n. 1.

Bryum capitulis reflexis, foliolis latiusculis congestis. Pall. En. Helv. p. 116. n. 37.

Bryum pendulum ouatum, caespiticiu et pilosum, seta bicolori. Dill. musc. p. 396. Tab. 50. f. 66.

Muscus capillaceus minimus, capitulo nutante, pediculo purpureo. Vaill. Bot. Paris. p. 134. n. 3. Tab. 29. f. 7.

Muscus trichodes, capitulo paruo reflexo, pediculo ima medietate rubro, summa luteo-viridi. Moris. Hist. Ox. III. p. 629. n. 15. Tab. 6. Ser. 5. f. 15.

niedriges zweifärbiges Blüthstiel: Hypnum.

H. ad muros, ad terram; v. g. auf dem Walle, an der Stadtmauer, etiam ad tecta vetusta.

Cauliculis in densos caespites congestis, lata strata efficit, super muros imprimis, et in terra glareosa. Surculi ipsi breues, et ad aliquot tantum lineas super terram eminentes, subramosi, inferius multo tomento fusco obfiti. Folia exigua, dense congesta, ouato lanceolata, pilo incano terminata, pallide e luteo viridia, sericea, splendentia, sub lente, in humida planta pellucida.

Circa hiemem setae vnciales, inferne purpureae, superne luteae, e furculorum annotinorum rosula terminali prodeunt, inter ramulos, siue potius furculos iuniores, bulbosa latiori foliosa extremitate terminatos. A ultiores furculi superius foliolis in stellae formam dispositis terminantur. Inferius setae foliacea vagina distincta

stricta amplectuntur. Capsula ex ovato cylindrica, ab initio erecta, tenuior, deinde sensim crassescens, pendula, sublutea, (aliquando quoque bicolor, viridis nempe et lutea) operculo tecta papilliformi, miniato, nitido: quo secedente, ora apparet leuiter ciliata. Calyptra in iunioribus erecta, gracilis, conica, fusca, in adultioribus rufa, inclinata. Ludit foliis latioribus, fetis longioribus et brevioribus.

HYPNUM *capillare*.

Hypnum foliis ovato lanceolatis, aristatis, capsulis ovatis, pendulis, operculis conicis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 40. n. 1791.*

Bryum (*capillare*) antheris pendulis, foliis ovatis seriferis, carinatis, pedunculis longissimis. *Linn. Sp. Pl. p. 1586. n. 30.*

Bryum capsulis pendulis oblongis, furculis ramosis: ramis annotinis pedunculiferis, foliis piliferis carinatis. *Scop. Flor. Carn. p. 147. n. 21.*

Bryum capitulis reflexis, foliolis latiusculis congestis. *Hall. En. Helv. p. 116. n. 37.*

Bryum foliis latiusculis, congestis, capsulis longis, nutantibus. *Dill. musc. p. 398. Tab. 50. f. 67.*

Muscus capillaris, foliis latiusculis congestis, capitulis longis reflexis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 629. n. 19. Sect. XV. Tab. 6. Ser. 5. f. 19.*

Muscus capillaceus maior, capitulis crassioribus cylin-

draceis nutantibus. *Vaill. Bot. Paris. p. 134. n. 5. Tab. 24. f. 6.*

niedriges purpurrothes Blüthstiel: *Hypnum.*

H. ad muros, et in similibus cum praecedente locis.

Quoad totum habitum praecedenti simillimum est; differt vero magnitudine insigniori omnium partium, foliis latioribus, non splendentibus, setis purpureis, capsulis longioribus, operculo acuminato, quasi subaristato. Floret circa ver.

HYPNUM *setaceum.*

Hypnum cauliculis teretibus, foliis lanceolatis, repandis, capsulis erectis, cylindricis, aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 39. n. 1788.*

Mnium (setaceum) antheris erectis, operculis filiformibus, longitudine antherarum. *Linn. Sp. Pl. p. 1575. n. 7.*

Bryum stellare nitidum pallidum, capsulis tenuissimis. *Dill. musc. p. 381. Tab. 48. f. 44.*

niedriges haarblättriges Mauer: *Hypnum.*

H. ad muros et saxa copiosissime; v. g. auf dem Walle, an der Stadtmauer; passim quoque in sylvis ad terram.

Cauliculi densi, caespitosi, semunciales, et per aetatem aliquando uncialiales, inferne plurimo tomento fusco terrae adnati; superius in ramulos, siue iuniores furculos, e nodulis crassioribus progerminantes, qui extremitatibus latioribus desinunt, quasi stelliformibus.

Folia

Folia laxius disposita, angusta, lanceolata, acuta, pilo terminata; inferiora annotina fusca, superiora iuniora, aut pallide viridia, aut lutescentia. In sicca planta cauliculi teretes apparent, ob folia arcte appressa, et crispa; in recenti aut humida autem, folia magis patentia sunt, et laxe distant.

Setae oriuntur e furculis annotinis, vnciales, ab initio pallidae, dein flavae, ultimo e luteo purpureae, nitentes, cum capsulis erectis, teretibus, gracilibus, ab initio viridibus, dein per maturitatem e liuido fuscis, splendentibus. Operculum earum oblongum, acutum, croceum, in maturis capsulis fuscum. Calyptra in iunioribus setis erecta, tenuissima, fusca, in maturis lateralis, obliqua. Inferius setae manifesto cinguntur perichaetio pallido, e foliolis pilosis subulatis composito. Floret circa ver.

HYPNUM *cirrhatum*.

Hypnum foliis capillaceis congestis, crispescentibus, capsulis ovato cylindricis, brevissime ciliatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 38. n. 1786.*

Mnium (*cirratum*) foliis arefactione reuolutis. *Linn. Sp. Pl. p. 1576. n. 8.*

Bryum cirratum et stellatum, tenuioribus foliis. *Dill. musc. p. 379. Tab. 48. f. 42.*

Bryum unguiculatum et barbatum tenuius, et stellatum. *Hall. En. Helv. p. III. n. 13.*

niedriges krausblättriges Mauer-Hypnum.

H. ad muros copiosissime, v. g. auf dem Walle, an der Stadtmauer.

Multa

Multa similia habet cum praecedente, quoad modum crescendi in caespitibus latis, densis, furculis superne stelliformibus, inferne tomentosis, fuscis: differt vero cauliculis ramosioribus, ramis haud in nodulos congestis, sed magis patulis, foliis longioribus, per siccitatem non appressis, ut in praecedente, sed contortis, crispis.

Setae semunciales ad unciales, iuniores e summis furculis, vetustiores ad ramorum exortum prodeunt, tenues, pallidae. Capsulae erectae, ovatae, ab initio pallide virentes, in sicca subfuscae. Operculum subrubens, acuto, tenuissimo, ac facile caduco mucrone instructum. Calyptra pallida, apice gracili fusco. Ora breviter ciliata. Floret circa ver.

HYPNVM *glaucum*.

Hypnum caulibus erectis teretibus, foliis imbricatis fragilibus, capsulis inclinatis aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 38. n. 1785.*

Bryum (*glaucum*) antheris erectiusculis: operculo arcuato, foliis erectis imbricatis, furculis ramosis. *Linn. Sp. Pl. p. 1582. n. 11.*

Bryum capsulis subnutantibus: operculo arcuato; furculis ramosis, foliis fragilibus, erectis, glaucis. *Scop. Flor. Carn. p. 144. n. 16.*

Bryum trichodes, erectis capitulis, albidum, fragile. *Hall. En. Helv. p. 114. n. 28.*

Bryum albidum et glaucum, fragile maius, foliis erectis,

etis, setis brevioribus. *Dill. musc. p. 362. Tab. 46. f. 20.*

Muscus erectus capillaceus densissimus, glauco folio. *Vaill. Bot. Paris. p. 131. n. 1. Muscus trichodes montanus albidus fragilis. Eiusd. Tab. 26. f. 13. Moris. Hist. Ox. III. p. 630. n. 22. Sect. XV. Tab. 6. Ser. ult. f. 22.*

weiß und bleichgrün brüchig blättriges Hypnum.

H. in sylvis Sollingensibus circa Neuhaus, in ericetis copiose; abunde etiam in sylvis hercynicis.

Surculi conferti, in densos caespites collecti, variae altitudinis, ab unciali ad tres quatuorue uncias, undique densis foliis tecti, inferne simplices, superius in breves crassos ramulos divisi, peculiarem rigidam quandam habent faciem, et aliquam habitu referunt similitudinem cum *Sphagno palustri* quod Ill. LINNAEVS etiam monuit. Nervus cauliculorum medius, fulcus, tenerrimus est, hinc aridi leuissimo franguntur tactu: humentes vero molles, flexiles sunt. Folia aliquot lineas longa, angusta, subulata, surrecta, teretia quasi apparent et rigida, densa, imprimis versus summitates furculorum et ramorum; inferiora coloris albicantis, superiora e glauco viridia; sicca albidiora, et summe fragilia.

Florentem nondum reperire licuit, hinc breuiter statum florescentiae verbis Ill. HALLERI describam: „Ex supremis ramis setae, manifestissima cylindrica vagina susceptae, breues, intra unciam. Capsulae ovatae,

„tae, per aetatem inclinatae, longissimis, ex conico
„operculo eductis. „

HYPNVM *rurale*.

Hypnum caulibus erectis, foliis lanceolatis, pilo fluitante terminatis, capsulis erectis, longe rostratis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 39. n. 1789.*

Bryum (*rurale*) antheris erectiusculis, foliis piliferis recurvis. *Linn. Sp. Pl. p. 1581. n. 7. Necker. delic. Gallobelg. p. 457. n. 13.*

Bryum capsulis subnulantibus, pedunculis annotinis lateralibus, foliis supra medium dilatatis, piliferis, patulis. *Scop. Flor. Carn. p. 145. n. 17.*

Bryum maius, erectis falcatis capitulis, foliis latiusculis exstantibus, in pilum canescentem desinentibus. *Hall. En. Helv. p. 112. n. 17.*

Bryum rurale, vnguiculatum hirsutum, elatius et ramosius. *Dill. musc. p. 352. Tab. 45. f. 12.*

Muscus capillaris tectorum, densis caespitibus nascens, capitulis oblongis, foliis in pilum oblongum desinentibus. *Vaill. Bot. Paris. p. 133. n. 5. Tab. 25. f. 3.*

Muscus erectus, hirsutus, capitulis longis, acutis, vnguiculis auicularum similibus, vulgatissimus. *Morif. Hist. Ox. III. p. 628. Sect. XV. Tab. 6. Ser. 3. f. 1.*

Haarigblättrig Sternförmiges Büschel: Hypnum.

H. ad tecta, muros, sepes, arborum truncos, et aggeres sylvarum ubique copiosissime.

Denfi.

Denſi caespites furculorum, aliquando orbiculares. Surculi vnciales, biunciales, ramiſi, erecti. Folia crebra, latiufcula, lanceolata, acuta, pilo terminata vago, incano: recentia aut humida patula, incuruata, ſuperius verſus furculorum aut ramorum extremitates ſtellata; ſicca contracta, vt cauliculi teretes appareant: ſuperiora latiora, coloris in recenti aut humida planta e luteo laete viridis, in ſicca obſcurioris, ad ſuſcum vergentis; inferiora anguſtiora, ſuſca et rubiginofa.

Setae vnciales circiter, ab initio pallide rubentes, dein magis rufae, vel e ſummis ramis iunioribus, vel iuxta hos, paullo inferius, ex annotinis oriuntur furculis, inferne manifeſto perichaetio cinctae. Capsulae erectae cylindricae, ab initio virides, dein e ſuſco rubentes, operculo conico, longo, paullulum incuruo rubicundo tectae, quo abſcedente ex ora eminent cilia longa. Calyptra ab initio recta, fulua, dein incurua, ſuſca. Floret per hiemem et ver.

Reperitur etiam alia eius varietas, cuius folia pilis carent, reliquus habitus tamen ſimillimus.

HYPNVM *canefcens*, & *hirsutum*.

Hypnum caulibus ſuberectis, ramis alternis breuibus, foliis piliferis, pilis longis, vagis, ſetis breuibus, erectis.

H. ramis alternis breuioribus, foliis pilofis, petiolis breuibus, flexuoſis. *Hall. Hiſt. Helv. T. III. p. 37. n. 1750. Tab. 46. f. 4.*

H. tri-

H. trichoides, capitulis plurimis erectis, lanuginosum.

Hall. En. Helv. p. 102. n. 24. Tab. 3. f. 4.

Bryum (Hypnoides) antheris erectis, caule erectiusculo, ramis lateralibus, breuibus, fertilibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1584. n. 21.*

Bryum hypnoides polycephalon, lanuginosum montanum. *Dill. musc. p. 372. Tab. 47. f. 32.*

Muscus terrestris, vulgari similis, lanuginosus. *Morif. Hist. Ox. III. p. 625. Sect. XV. Tab. 5. Ser. 2. f. 7.*

lang graubaariges Büschel: *Hypnum*.

H. passim circa die Bruck; copiosius vero reperitur in montibus altioribus, ad saxa et terram; v. g. in sylvis Sollingensibus, circa Neuhaus, in monte Moosberg; abunde in monte Bructero.

Caules suberecti, vnciales biunciales, et pro varietate loci natalis, digiti, immo palmae longitudinem aequantes, dense coaceruati in caespites, nunc simplices, nunc in aliquot maiores ramos diuisi, copiosos emittunt minores ramulos, breues, alternos, versus extremitates crassiores. Folia perangusta, lanceolata, acuta, longo pilo incano, splendente, terminata, caules ramosque arcte protegentia, inferiora annosiora fusca, superiora e viridi ad luteum vergentia, ad extremitates furculorum et ramusculorum densiora, veluti corymbosa, versus vnum latus paullatim incuruata.

Setae breues, quatuor aut quinque linearum circiter, erectae, lutescentes, circa autumnum prodeunt e pe-

e perichaetio pallido, conico, iuxta extremitates ramusculorum. Capsulae erectae, ouatae, subfuscae. Operculum acuminatum, rubicundum.

β. HYPNVM *canescens, pilosum.*

Hypnum caulibus suberectis, ramis sparsis longioribus, foliis pilosis, setis longioribus erectis.

Bryum hypnoides, hirsutiae canescens, vulgare. *Dill. musc. p. 368. Tab. 47. f. 27. Necker. delic. Gallobelg. p. 454. n. 6. var. a.*

furç grauhhaariges Büschel: Hypnum.

H. copiose ad saxa, in agris, ad rupes, in sylvis; v. g. circa Waake, pone Adelipsen.

Caulibus differt plerumque breuioribus, at ramis sparsis, longioribus, distinctis. Folia latiora, pilo breuiori terminata, in statu recenti, aut humida, patentia, deorsum recurua, coloris imprimis versus extremitates, pallide e luteo viridis; sicca tam arcte appressa, vt furculi inde teretes, et ob pilos eminentes, incani appareant.

Setae pallidae, vnciales circiter, e manifesto perichaetio, circa ramorum extremitates oriuntur. Capsulae rectae similes. Ludit foliis densioribus, laxioribus, plus minusue recuruis, colore obscuriore, et pallidiore.

HYPNVM *scoparium.*

Hypnum foliis falcatis heteromallis, vaginis multifloris
Hall. Hist. Helv. T. III. p. 36. n. 1777.

H. furculis erectiusculis, foliis secundis linearibus, recuruis. Scop. Flor. Carn. p. 160. n. 24.

H. erectum luteo viride, foliis vno versu dispositis. Hall. En. Helv. p. 103. n. 26.

Bryum (scoparium) antheris erectiusculis, pedunculis aggregatis, foliis secundis, recurvatis, caule declinato.
Linn. Sp. Pl. p. 1582. n. 9.

Bryum reclinatum, foliis falcatis, scoparum effigie. *Dill. musc. p. 357. Tab. 46. f. 16.*

Muscus capillaceus maior, pediculo et capitulo tenuioribus. *Vaill. Bot. Paris. p. 132. n. 3. Tab. 28. f. 12.*

Muscus coronatus medius, foliis tenuissimis pallidis, longioribus, capitulis erectis, acutis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 630. n. 11. Sect. XV. Tab. 7. Ser. 1. f. 11.*

einseitigblättriges Besenförmiges Hypnum.

H. copiosissime ad arborum radices, in sylvis ubique.

Cauliculi variae longitudinis, vncialis, biuncialis, et ultra, suberecti, ramosi, in densos caespites collecti, infra multo tomento fusco obsiti. Folia linearia, longa, in acutissimum longum mucronem terminata, versus vnum latus caulis spectantia, patula, vt nervus caulis ruber per interstitia conspici queat: inferiora fusca, sparsa, media pallide viridia, summa in fasciculos aliquot, penicillis fimiles collecta, magis adhuc pallida, et ad luteum colorem vergentia.

Setae circa novorum ramorum ortum prodeunt, e manifesto perichaetio (membranaceis foliis, apice piloso terminatis, conflato) vtplurimum solitariae, aliquando plures, vnciales ad biunciales, crassae, e luteo purpurascetes, splendentes. Capsulae crassae, cylindricae, paullulum incurvae et obliquae, striatae, nunc e luteo purpureae, nunc magis fuscae, spadiceae, immo nigricantes. Operculum rostratum, longitudine capsulam aequans,

aequans, purpureum, nitens, quo abscedente, ora apparet denticulata. Calyptra longa, falcata, pallidior.

HYPNVM heteromallum.

Hypnum foliis capillaribus heteromallis, capsulis ouatis, operculis aristatis.

Bryum (*heteromallum*) antheris erectis, foliis setaceis secundis. *Linn. Sp. Pl. p. 1583. n. 16.*

Bryum foliis capillaribus heteromallis, capsulis ouatis, operculis aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 44. n. 1807.*

Bryum trichodes, reclinatis cauliculis, capitulis erectis acutis. *Hall. En. Helv. p. 109. n. 6.*

Bryum heteromallum. *Dill. musc. p. 375. Tab. 47. f. 37:*

Muscus trichodes, foliis capillaceis, capitulis minoribus.

Morif. Hist. Ox. III. p. 628. n. 5. Sect. XV. Tab. 6.

Ser. 3. f. 5.

Icon Oederi Flor. Dan. Tab. 479.

einseitig haarblättriges *Hypnum*.

H. ad terram, ad truncos arborum in sylvis, copiose circa Plesse.

Ob vaginam setam amplectentem, ad *Hypna* refero. Praecedenti valde simile est, quoad habitum et directionem foliorum; differt vero, furculis longe minoribus, vix enim unciam excedunt, parum ramosis, ramis breuib, foliis magis capillaribus, e gramineo viridibus, setis brevioribus, singularibus, aliquando tamen etiam binis, capsulis magis erectis, non cylindricis, sed

ouatis, (per maturitatem laete rubentibus, in siccitate subfuscis, striatis, splendentibus) operculo breviori aristato. Floret per hiemem et ver.

II. *Hypna* LINNAEI, DILLENII, et reliquorum auctorum.

✻ *Frondebis pinnatis.*

HYPNVM taxifolium.

Hypnum fronde simplicissima pinnata lanceolata, basi pedunculifera. *Linn. Sp. Pl. p. 1587. n. 2. Necker. delic. Gallobelg. p. 465. n. 3.*

H. foliis planis pinnatis, parium duodecim, setis radicalibus. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 36. n. 1775.

H. fronde pinnata simplici, pedunculis subradicalibus. Scop. Flor. Carn. p. 149. n. 2.

H. repens filicifolium, non ramosum, pediculis brevioribus, ad radices exeuntibus. Hall. En. Helv. p. 106. n. 37.

H. taxiforme minus, basi capsulifera. Dill. musc. p. 263. Tab. 34. f. 2.

Muscus pennatus, capitulis Adianti. Vaill. Bot. Paris. p. 136. n. 2. Tab. 24. f. 11.

Icon Oederi Flor. Dan. Tab. 473. f. 1.

einfaches grosses Tax: *Hypnum.*

H. ad vias vdas, umbrosas, et aggeres in sylvis, v.g. circa Kerstlingeroderfeld.

Frondes

Fronde planae, indiuisae, ex vna basi plures, ascendentes, pinnatae, pinnis lanceolatis, imbricatis, pellucidis, et nervo medio crasso, per lentem conspicuo, distinctis. Pinnarum in plerisque duodecim paria sunt, quarum extrema maiora; numerus vero earum per aetatem multiplicatur: sic legi inter plura iuniorum frondium specimina, duodecim pinnarum paribus instructa, aliquot annosiores frondes, duplici, quin triplici numero pinnarum gaudentes, in quibus repetita serie, e summo apice annotinae frondis prolifero, iuniores frondes pronatae fuerunt, teneritate et colore pallidiore ab inferioribus annotinis fuscis diuersae.

Setae semunciales, tenerae, subrubentes, circa basin frondium in centrum quasi collectarum, e perichaeo crasso, foliaceo, squamoso, oriuntur. Capsulae fere cylindricae, nutantes, e fusco virides, versus oram denticulatam paullulum latiores. Operculum aristatum, pallidum. Calyptra subuirens, lateralis, apice sursum spectans. Floret circa ver.

HYPNUM *bryoides*.

Hypnum fronde simplicissima pinnata lanceolata, apice pedunculifera. *Linn. Sp. Pl. p. 1588. n. 4.*

H. foliis planis pinnatis, parium septem, setis ex summitate. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 36. n. 1776.*

H. fronde pinnata simplici, pedunculo terminali. *Scop. Flor. Carn. p. 148. n. 1.*

H. repens filicifolium non ramosum, pediculis brevissimis, versus foliorum summitates egredientibus. *Hall. En. Helv. p. 106. n. 38.*

H. taxiforme exiguum, versus summitatem capsuliferum.

Dill. musc. p. 262. Tab. 34. f. 1.

Muscus polytrichoides, exiguis capitulis in summis furculis, seu foliis subrotundis erectis. *Morif. Hist. Ox.*

III. p. 629. n. II. Sect. XV. Tab. 6. Ser. 4. f. II. Vaill.

Bot. Paris. p. 136. n. 1. Tab. 24. f. 13.

Icon *Oederi Flor. Dan. Tab. 473. f. 1.*

einfaches kleines *Tax. Hypnum.*

H. ad terram vdam, circa arborum radices, in umbrosis sylvarum locis, ubique copiosissime.

Exilissimum est inter omnes Hypnorum species. Frondes duarum triumue linearum, simplices, congestae, paullulum reclinatae, pinnatae, pinnis lanceolatis, inferioribus laxioribus, superioribus densioribus, coloris pallide viridis. Pinnarum plerumque septem, aut octo paria sunt. Circa apicem frondis, et inter summa foliola, e medio neruo oriuntur setae, nunc aequales cum frondibus longitudine, nunc eas superantes, interdum binae, purpureae, nitentes. Capsulae erectae, subouatae, carneae, operculo rubro, apice recto mucronato praedito, tectae. Calyptra tenerrima, pallida. Floret autumno.

HYPNVM *complanatum.*

Hypnum fronde pinnata, ramosa: foliolis imbricatis acutis complicatis, compressis. *Linn. Sp. Pl. p. 1588. n. 7.*

H. caule disticho, foliis ovatis planis, capsulis ovatis, aristatis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 36. n. 1771.

H. re-

H. repens filicifolium, ramosum, ramulis adpressis, et magis complanatis. *Hall. En. Helv. p. 105. n. 34.*

H. pennatum compressum et splendens, capsulis ouatis. *Dill. musc. p. 268. Tab. 34. f. 7.*

Muscus trichomanoides filicifolius splendens. *Vaill. Bot. Paris. p. 139. n. 4. Tab. 23. f. 4.*

Muscus terestris repens, primae speciei similis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 625. n. 16. Sect. XV. Tab. 5. Ser. 2. f. 5. et Ser. 3. f. 15.*

plattes âstiges Mülkraut: Hypnum.

H. ad arborum truncos ubique in sylvis.

Lata strata, copiosarum frondium sibi incumben-
tium, ad arborum truncos efficit. Frondes variae lon-
gitudinis, ab vnciali ad bi, tri, quadriuncialem proten-
sae, pinnatae, repentes, ramosae. Pinnulae siue folia
disticha, alterna, elliptico-acuta, sursum conuexa, deor-
sum concava, pellucida, pallide viridia, splendentia,
imbricata, in nervo medio frondis longiora, latiora, ad
ramos breviora, angustiora, in summis apicibus ramu-
lorum iuniorum fere capillacea. In furculis annosiori-
bus, nerui emortuorum ramorum copiosi remanent, sub
fibrillarum forma, fugitiuo aspectu setas mentientes.
Iuniorum speciminum folia tam arcte imbricata, et sibi
superimposita reperi, vt margines eorum vix distingui pos-
sint, sed vnum quasi frondis planum constituere viderentur.

Setae semunciales copiosae, tenues, purpureae,
nunc ad furculorum diuarcationes, et inter pinnarum
axillas, nunc secundum longitudinem medii nerui oriun-
tur, inferne perichaetio crasso, piloso, cinctae, superius

capsulas gerentes ouatas, e fusco lutescentes, per vetustatem rufas, operculo conico, rostrato, luteo tectas. Calyptra incurua, pallida. Florere solet vere.

✻✻ *Surculis vagis.*

HYPNVM undulatum.

Hypnum surculis ramosis, frondibus subpinnatis; foliis undulatis complicatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1589. n. 10.*

H. caule plano, foliis distichis, obiter rugosis, nitidis, operculo conico. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 35. n. 1770.*

H. fronde subpinnata, foliis undatis crispis, pedunculis subradicalibus, longissimis, capsulis oblongis. *Scop. Flor. Carn. p. 151. n. 6.*

H. pennatum undulatum, Lycopodii instar sparsum. *Dill. musc. p. 271. Tab. 36. f. II.*

Muscus Adianti capitulis, Lycopodii in modum per terram se spargens. *Morif. Hist. Ox. III. p. 626. n. 33. Sect. XV. Tab. 6. Ser. I. f. 33.*

gesiedert Wellenblättriges Hypnum.

H. in cauernosis saxosis locis, circa die Bruck, passim quoque circa Neuhaus.

Rarior alibi species est. Surculi, siue frondes pinnatae, digitales, spithameae, planae, parum ramosae, ramis siue viticulis longis, gracilioribus. Pinnulae siue folia lanceolata, acuta, undulata, pellucida, pallide viridia, alterna, dense imbricata, duplici vel aliquando triplici

plici serie, neruum frondis crassum, pallidum, pellucidum tegunt. Color in sicca eleganter pallide viridis, et serici instar splendens, in humida obscurior, et tunc furculi etiam valde flaccidi euadunt. Inferne furculi multo tomento, et marcidis foliis obsidentur. Copiosae ex alis pinnarum, observantur gemmae, crassae, complicatorum foliorum, e quibus sensim novi protruduntur ramorum furculi.

Florentem haud reperi, hinc sequentem DILLENII huc transfero descriptionem: „Versus inferiorem, et „subinde mediam partem, e pinnarum alis, setae Aprilis „initio enascuntur, longae, tenues, rubentes, calyptra „recta straminea, cum puncto fulco in extremitate, te- „ctae: capsulae dein sequuntur oblongae, operculo cu- „spidato terminatae, quo abscedente, capsulae coronam „ciliatam monstrant, magis incurvae, et per siccitatem „striatae fiunt, coloris ferruginei: perichaetium e squa- „mis angustis, breuibus, reflexis constat.,

HYPNVM *crispum*.

Hypnum furculis ramosis, frondibus subpinnatis: folio-
lis undulatis, planis. *Linn. Sp. Pl. p. 1589. n. 12.*

H. caule plano, foliis distichis, ovatis, nitidis, trans-
uersim undulatis, operculis aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 35. n. 1769. Tab. 45. f. 5.*

H. fronde subpinnata ramosa, foliis undatis crispis, ca-
psulis ovatis. *Scop. Flor. Carn. p. 150. n. 5.*

H. repens crispum, ramis compressis, filicinorum more
dispositis. *Hall. En. Helv. p. 105. n. 33. Tab 3. f. 5.*

H. pennatum vndulatum crispum, fetis et capsulis brevibus. Dill. musc. p. 273. Tab. 36. f. 12.

Musculus terrestris maior, ramulis compressis, foliis superficie crispis. Moris. Hist. Ox. III. p. 625. n. 10. Sect. XV. Tab. 5. Ser. 3. f. 10.

gesiedert frausgewässertes Hypnum.

H. ad arborum truncos copiose circa die Bruck.

Elegantissimum inter Hypna. Surculi ad spithamæ longitudinem protensi, densis caespitibus, ad arborum truncos, confertim in latis stratis crescunt: caeterum plani sunt, semisuberecti, lati, ramosi, ramis vagis. Folia dense imbricata, disticha, alterna, lanceolata, obtusa, splendentia, rugis aliquot semicircularibus, profundis, transversalibus, concentricis, vndulata: iuniora et superiora, pallide viridia, inferiora annotina, marcida, e rufo fusca.

Setae perbreues, "pro ratione longitudinis viticulorum, (sunt enim circiter semunciales) pallidae, oriuntur sparsim inter foliorum siue pinnarum alas, e perichaetio pallidiori. Capsulae suberectae, ovatae, e viridi lutescentes, operculo longe aristato tectae. Calyptra longa, apice fusco. Raro apud nos florens reperitur, floret vero circa Martium aut Aprilem.

HYPNUM *triquetrum.*

Hypnum ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis, patulis. Linn. Sp. Pl. p. 1589. n. 12. Necker. delic. Gallobelg. p. 466. n. 5.

H. furculis repentibus, ramis vagis, suberectis, apice dilata-

dilatatis, ramulis recurvis. *Scop. Flor. Carn. p. 157. n. 18.*

H. foliis hispida, ovato lanceolata, aristata. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 26. n. 1729.

H. repens, triangularibus maioribus et pallidioribus foliis. Hall. En. Helv. p. 98. n. 1.

H. vulgare, triangulum, maximum et pallidum. Dill. musc. p. 293. Tab. 38. f. 28.

Muscus ramosus maior, spermophorus. Vaill. Bot. Paris. p. 137. n. II. Muscus squamosus maior, siue vulgaris. Tournef. I. R. H. p. 553. Vaill. l. c. Tab. 28. f. 9.

langes breylantigblättriges Hypnum.

H. ubique in sylvis ad truncos arborum, et in pascuis.

Caules ad dodrantalem longitudinem protensi, rigidi, elastici, suberecti, purpurei, inferne in fibrosas aliquot radículas desinentes, ramosi superne, ramis vagis, apice recurvatis, ad angulum rectum dispositis, per tomentosas fibrillas inter se, et ad locum natalem adnexis. Folia triangularia, lata, pellucida, patentissima, (sic ut neruus caulis purpureus distincte pelluceat) acuto mucrone terminata, leuiter striata, in humida, aut recenti, eleganter e pallido viridia, in sicca magis albicantia, aut lutescentia, in medio principali furculo maiora, imprimis versus apicem, ad ramos minora.

Setae unciales, ad biunciales, e perichaetio squamoso, oblongo, subrufo, inter axillas ramorum, foliorumque oriuntur, eleganter purpureae, tenues, splendentes. Capsulae obliquae, ab initio graciles, calyptra recurua

recurua tectae, dein crassiores, incuruae, nutantes, subrubentes, post fuscae, striatae, operculo obtuso brevissimo fusco praeditae, quo abscedente, ora capsulae ciliata, et annulo praedita apparet.

Gemmas quae semina quibusdam videntur, et granorum rufescentium ad instar, seminis Tabaci magnitudine, in alis foliorum a VAILLANTIO primum observatas, in meis haud reperi.

Ob longitudinem, et summam furculorum cum elasticitate quadam coniunctam flexilitatem, frequenter adhibetur, ad vasa porcellana, et vitrea transmittenda.

HYPNVM *rutabulum*.

Hypnum ramis vagis subrepentibus, foliolis ovatis, mucronatis, imbricatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1590. n. 13.*
Necker. delic. Gallobelg. p. 467. n. 7.

H. furculis repentibus, ramis vagis, suberectis, foliis acutis, ovatis, capsulis obtusis. *Scop. Flor. Carn. p. 159. n. 21.*

H. foliis ovato lanceolatis, patulis, striatis, breuiter aristatis, operculis conicis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 26. n. 1730.*

H. repens, triangulis angustioribus, potius minoribus foliis. *Hall. En. Helv. p. 98. n. 2.*

H. dentatum vulgatissimum, operculis obtusis. *Dill. musc. p. 295. Tab. 38. f. 29.*

Muscus myosuroides, rutabuli fructu. *Vaill. Bot. Paris. Tab.*

Tab. 27. f. 8. Muscus erectus maior, foliis angustioribus, acutis. *Eiusd. Tab. 23. f. 2.*

Muscus terrestris vulgaris minor, Adianti aurei capitulis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 625. n. 3.* Muscus denticulatus minor, sericeus nostras, capitulis Adianti. *Eiusd. l. c. p. 626. n. 35. Sect. XV. Tab. 5. Ser. I. f. 35.* Muscus minor, pallidus, foliis angustissimis, acutis, corniculis tenuissimis. *Eiusd. l. c. p. 629. n. 18. Sect. XV. Tab. 6. Ser. 4. f. 18.*

Krückenformiges Blüthen: Hypnum.

H. ad arborum truncos.

Praecedenti aliquomodo similis, sed caulibus differt multo brevioribus, non rubris, sed lutescentibus, repentibus, ramis erectioribus, teretibus, implicatis, foliis triangularibus minoribus, obscurius viridibus, splendentibus, in acutum mucronem terminatis. Setae similes, purpureae, sed breviores, copiosiores. Capsulae nutantes, iuniores lutescentes, annotinae e purpureo fuscae, operculo acuminato lutescente tectae. Ora ciliata. Circa autumnum et per hiemem floret.

HYPNUM rusciforme.

Hypnum foliis ovato lanceolatis, acutissimis, operculis aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 26. n. 1731.*

H. foliis rusciformibus, capsulis subrotundis. *Dill. musc. p. 298. Tab. 38. f. 31.*

plattästiges Myrthenblättriges Hypnum.

H. ad

H. in riuulo ad molendinam chartaceam Wehndensem, ad saxa.

Cauliculi repentes, fibrosi, latis stratis arcte saxis adhaerentes sub aqua, vnciales, biunciales, et vltra longi, pro ratione celeritatis aquae superlabentis; ramosi, ramis erectis, inferne subteretibus, superne planis. Folia ouato lanceolata, breuia, lata, neruosa, pellucida, pro varia aetate obscure, aut e luteo viridia, dense imbricata, alterna, serie triplici, quadruplici, ad inferiores ramos, (qui inde teretes quasi apparent) superius disticha, laxa.

E medio annosiori furculo inter ramos, eque foliorum alis surgunt setae semunciales, erectae, purpureae, cum capsulis breuib, crassis, nutantibus, spadiceis, operculo rostrato tectis. Ora longa ciliata, ciliis subluteis.

Vt plurimum in materia tophacea incrustati reperiuntur furculi, quae copiose in huius Musci caespitibus collecta, sensim sensimque in dicto loco, grandia efformat saxa, 20 ad 30 librarum.

HYPNVM fluitans.

Hypnum foliis lanceolatis, alternis remotis. Linn. Flor.

Succ. ed. II. p. 399. n. 1034. Necker. delic. Gallobelg.

p. 480. n. 29.

H. caule fluitante, praelongo, foliis raris lanceolatis, adscendentibus. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 33. n. 1761.

H. erectum aut fluitans, foliis oblongis, angustis, peracutis. Dill. musc. p. 299. Tab. 38. f. 33.

Muscus

Muscus fluitans, foliis et flagellis longis tenuibusque.

Vaill. Bot. Paris. p. 139. n. 26. Tab. 33. f. 6.

plattes breit und spißblättriges Wasser: Hypnum.

H. in riuis passim, v. g. in riuulo circa Neuhaus.

Rarior est haec species, quae habitu *Fontinali minori* Linn. simillima. Caules dodrantaes et longiores, parum ramosi, ramis vagis. Folia alterna, lanceolata, vel potius triangularia, acuta, plana, patentia, pellucida, surrecta, versus apicem furculorum approximata, densiora; inferiora, remotiora; coloris nunc pallidius e luteo, nunc obscurius viridis. Setas et capsulas quas nec DILLENIVS nec Ill. HALLERVS viderunt, in meis quoque desunt speciminibus: solus est Ill. LINNAEVS, qui earum sequentem tradit descriptionem in *Flor. Suec.* l. c. „Pedunculi tenuissimi, rubri, in aliis longissimi, in „aliis vero vix pollicares. Anthera falcata, breuissima: ore ciliato.„ In *Speciebus Plantar.* nulla huius speciei fit mentio.

Duas alias huic descriptae simillimas reperi varietates, sed vtrasque capsulis destitutas: aliam caulibus et foliis multo minoribus, obscure viridibus, arundini copiose adhaerentem inueni in *Lichtenmeer*: aliam cum priori in eodem loco natali inueni, quae caulibus differt fibrosis, hinc et inde ad aliquam distantiam nudis, ramis breuibus, (pinnae quasi referentibus) foliisque angustioribus, apice quasi in pilum extenuato, (in ramis autem pene capillaribus) paullulum in siccitae reflexis. Folia summa furculorum latiora, prioris simillima in quibusdam speciminibus vidi. Optime refert icon quod sub sequenti nomine exhibuit DILLENIVS:

β. Hy-

β. Hypnum fluitans, foliis tenuissimis, capsulis exilibus.
Dill. musc. append. p. 548. Tab. 83. f. 7.

H. caulibus fluitantibus praelongis, foliis lanceolatis,
 capsulis inclinatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 32. n.*
 1760.

H. erectum aut fluitans aquaticum. *Hall. En. Helv. p.*
 100. n. 12?

*** *Surculis pinnatis.*

HYPNVM *filicinum*, α *spicatum*.

Hypnum surculis pinnatis: pinnis foliosis, simplicibus, distantibus, versus apicem approximatis in spicam; foliis imbricatis, falcatis.

Hypnum (*filicinum*) surculis pinnatis: ramulis distantibus, foliolis imbricatis incurvis, acutis secundis. *Linn. Sp. Pl. p. 1590. n. 14. Necker. delic. Gallobelg. p. 470. n. II.*

H. caulibus pinnatis, pinnis distantibus alterne longioribus, ex apice confertis, foliis cincinnatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 34. n. 1766.*

H. surculis et ramis pinnatis, seta brevioribus, ramulis remotis: apicibus foliisque recurvis. *Scop. Flor. Carn. p. 153. n. 9.*

H. repens filicinum crispum. *Dill. musc. p. 282. Tab. 36. f. 19. Hall. En. Helv. p. 104. n. 30.*

Muscus

Museus filicius palustris. *Vaill. Bot. Paris. p. 138. n. 18.*

Tab. 29. f. 9. cum synonym. et descriptione aliena.
 krausblättriges langes Farn Hypnum.

*H. in pratis paludosis passim. v. g. circa Adelipfen,
 circa Diemarden.*

Surculi digitalis, palmaris longitudinis, et ultra, plerumque simplices pinnati. Pinnae foliosae simplices, ad angulum rectum dispositae, nunc laxiores, nunc magis confertae, ad surculi neruum crassum, subrigidum, copiosis foliolis imbricatis tectum, rubicundum; superius densius collectae, spicam quasi efformant. Folia angusta, falcata, deorsum flexa, crispa, coloris e rufo lutescentis; suprema spicae, e pallido viridia.

Setae unciales biunciales, passim e medio surculi neruo oriuntur, (nunc solitariae, nunc plures congestae) purpureae, e perichaetio pallido, conico, oblongo, piloso. Capsulae inclinatae, oblongae, ab initio virides, dein rufescentes. Operculum conicum, breue, obtusum. Calyptra, (in iunioribus) recta, pallida. Floret circa aestatem.

β. Hypnum filicinum, ramoso-pinnatum.

Hypnum surculis pinnatis: pinnis foliosis, subramosis, laxis, inordinatis, apice crispatis; foliis imbricatis, falcatis.

H. ramis pinnatis, pinnis ramosis, foliis cincinnatis.
Hall. Hist. Helv. T. III. p. 34. n. 1767.

H. filicinum fericeum molle, et pallidum, mucronibus aduncis. *Dill. musc. p. 286. Tab. 36. f. 22.*

Frausblättriges furzes Farn Hypnum.

H. circa rivum molae chartariae Wehndensis, in saxis, aqua a rotis adpersa madidis.

Praecedenti quoad habitum crispum foliorum, caules pinnatos, coloremque e viridi lutescentem, similis; differt autem, cauliculis multo brevioribus, ramosioribus, ramis vagis repentibus, directione pinnarum ad angulum acutum, pinnis subramosis, versus apicem cincinnatis; foliolis falcatis quidem, at apice vaga directione modo sursum, modo deorsum spectante, et in pilum tenuem terminato.

Setae breviores, (vnciales) purpureae; capsulae crassae, ovatae, nutantes, e luteo rubentes. Operculum breve conicum. Floret circa aestatem.

HYPNUM *proliferum.*

Hypnum furculis proliferis, plano pinnatis, pedunculis aggregatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1590. n. 15. Necker. delic. Gallobelg. p. 470. n. 12.*

H. furculis rugosis, nudis, frondibus bipinnatis; ramulis decurrentibus. Scop. Flor. Carn. p. 155. n. 13.

H. ramis teretibus pinnatis, pinnulis pinnatis, foliis adpressis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 33. n. 1764.

H. re-

H. repens filicinum minus, luteo virens. Hall. En. Helv. p. 103. n. 28.

H. filicinum, Tamarisci foliis minoribus, non splendentibus. Dill. musc. p. 276 Tab. 35. f. 14.

Muscus filicinus maior. C. B. Vaill. Bot. Paris. p. 140. n. 1. Tab. 25. f. 1. Moris. Hist. Ox. III. p. 625. n. 20. Sect. XV. Tab. 5. Ser. 3. f. 20. secundum DILLENIVM.

Muscus filicinus minor. Vaill. Bot. Paris. p. 140. n. 3. Tab. 23. f. 9. Moris. Hist. Ox. III. p. 625. n. 21. Sect. XV. Tab. 5. Ser. ult. f. 21. (quae signata fuit Tab. 6. f. 21. ex errore) secundum Ill. HALLERVM neutra autem Vaillantii et Morisoni figura, ab Ill. HALLDRO aequae ac DILLENIO citata, satis accurate exprimit huius Hypni faciem: figura tamen DILLENII 14. satis bona.

gelbliches büschelig gesiedertes Farn Hypnum.

H. ad arborum truncos imos, et ad terram ubique in sylvis.

Caules spithamam et ultra longi, pinnati, repentes, in aliquot ramos fere oppositos, pinnatos, minores, maioribus similes proliferi. Pinnae pinnatae, confertae, foliolis exilissimis, ac per lentem solummodo conspicuis, densissime imbricatis tectae: quodsi enim nudis oculis aspiciuntur furculi, pinnulae granulosae tantum apparent. Color foliorum recentium superiorum,

vel eleganter e pallido viridis, vel quod frequentius, lutescens, inferiorum e luteo rufus, infimorum fuscus, absque omni splendore, vel saltim leuissimo.

Setae e medio furculorum et ramorum neruo, plerumque binae, ternae, aliquando vero solitariae, e perichaetio crasso, conico, piloso, vnciales, purpureae, splendentes, pellucidae; cum capsulis ab initio e pallide fusco virentibus, dein purpurascens; operculo conico, aristato, subaurantiaco tectis. Calyptra obliqua, rostrata. Floret per hiemem et ver.

HYPNVN *parietinum.*

Hypnum furculis plano pinnatis, continuatis, pedunculis aggregatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1590. n. 17. Scop. Flor. Carn. p. 156. n. 14. Necker. delic. Gallobelg. p. 470. n. 12.*

H. caule suberecto, flexuoso, rami teretibus, pinnatis, pinnulis pinnatis, operculis aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 33. n. 1765.*

H. repens filicinum, veluti spicatum. *Hall. En. Helv. p. 103. n. 27.*

H. filicinum, Tamarisci foliis maioribus splendentibus. *Dill. musc. p. 274. Tab. 35. f. 13.*

Muscus filicinus flauescens maior, ramosus. *Vaill. Bot. Paris. p. 140. n. 3. Muscus filicinus maior sericeus. Eiusd. Tab. 29. f. 1. Muscus vulgaris pennatus maior, C. B. Eiusd. Tab. 28. f. 1.*

Muscus

Muscus filicinus maior. *Morif. Hist. Ox. III. p. 625. n. 20. Sect. XV. Tab. 5. Ser. 3. f. 20. Buxbaum, Cent II. p. 2. Tab. 1. f. 2.*

bläßgrünes büschelich gefiedertes Farn Hypnum.

H. ad terram in sylvis, ad loca subhumida, v. g. circa Kerstlingeroderfeld.

Praecedenti quoad modum crescendi, diuisionemque furculi proliferi in minores furculos simile. Differt vero facie planissima, cauliculis duplo fere maioribus, fibrosis, hinc et inde ad aliquam distantiam nudis, ramis dendroidibus, fasciculatis, confertis, e furculi apice enatis, quorum neruus aequae ac principalis furculi, purpureus, longe pellucet, qui ad cuiusuis ramuli ortum directionem suam mutat. Pinnulae laxiores, neruus earum quoque purpureus; folia magis distincta, laxiora, e pallido viridia, cum laeto sericeo splendore.

Setae et capsulae similes praecedentis, at paullo breuiores. Floret circa ver.?

HYPNUM *crista castrensis.*

Hypnum furculis pinnatis: ramulis approximatis: apicibus recuruis. *Linn. Sp. Pl. p. 1591. n. 19. Necker. delic. Gallobelg. p. 468. n. 9.*

H. furculis et ramis pinnatis: ramulis approximatis, apicibus foliisque recuruis. Scop. Flor. Carn. p. 153. n. 8.

H. foliis pinnatis, pinnis simplicibus, aequalibus, foliis cincinnatis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 34. n. 1768.

H. repens filicinum pennatum, minus, ramosum. *Hall. En. Helv. p. 104. n. 29.*

H. filicinum, cristam castrensem repraesentans. *Dill. musc. p. 284. Tab. 36. f. 20.*

Muscus terrestris repens, subflauus, foliolis crispis, minoribus, ramulisque densius confertis. *Vaill. Bot. Paris. p. 141. n. 10. Tab. 27. f. 14.*

Muscus cristam castrensem repraesentans, flauescens, nemorosus, ramosus, Cassubicus. *Morif. Hist. Ox. III. p. 625. n. 8. nomen. Sect. XV. Tab. 5. Ser. 3. f. 8. citata haud respondet.*

gebliches Federbusch: *Hypnum*.

H. ad truncos arborum copiose, ad terram quoque in sylvis.

Aliquam habet similitudinem cum *Hypno filicino* eiusque varietate *spicata*: differt autem furculis multo brevioribus, tenerioribus, valde ramosis, pinnis densissime confertis, crispis, apicibus furculorum et ramorum cristae plumosae similibus, capsulis multo brevioribus, (sunt enim vix semunciales,) purpureae, cum capsulis obliquis e fusco lutescentibus, operculo miniato, conico, striato, brevissime aristato tectis. Caeterum caules latis caespitibus nascentes, reclinati, planissimi, copiosas frondes pinnatas, vna super alteram decumbente ostendunt, varie se implicati sunt, et colore gaudent e lutescente pallide viridi. Foliola falcata, acutissima; pinulae extremae furculorum aequae ac omnium ramorum, cristam repraesentantes, omnes sibi contiguae, semper descrecendo marginem describunt perfecte triangularem,

rem, extremitatibus contortis, inuolutis, crispis. Floret vere, sed rarius.

HYPNVM *praelongum*.

Hypnum furculis subpinnatis decumbentibus: ramulis remotis, foliolis ouatis, antheris cernuis. *Linn. Sp.*

Pl. p. 1591. n. 18. Necker. delic. Gallobelg. p. 471. n. 13.

H. foliis distichis, lanceolatis, pilo terminatis, capsulis ouatis, inclinatis, aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 32. n. 1758.*

H. repens, breuissimis foliis, operculo aristato. *Hall. En. Helv. p. 98. n. 3.*

H. repens, triangularibus parvis foliis, praelongum. *Dill. musc. p. 278. Tab. 35. f. 15.*

Muscus filicinus minor. *C. B. Vaill. Bot. Paris. p. 140. n. 2. Tab. 23. f. 9.*

langbärtiges gesiedertes Hypnum.

H. ad arborum truncos, copiosissime, praesertim ad fagos.

Facile dignoscitur ab omnibus aliis *Hypnis*, furculis densissime confertis, longissimis, inque caespitibus latis, planis, arborum truncos inuolutescentes, a quibus capillorum, aut barbae pectinatae instar, dependent. Caeterum furculi decumbentes, valde teneri, fragilissimi, (in statu recenti, aut humido, valde flaccidi, molles) ad spithamae longitudinem et ultra excresecunt, pinnati, pinnis laxis alternatim oppositis, ramosis, sibi inuicem dense instrati, coloris superna facie, eleganter e pallido viridis, inferne truncos arborum respicientes (quibus

per copiosissimum tomentum adhaerent) e fusco rufae. Folia parua, triangularia, pilo terminata adunco, imbricata, duplici serie alterna, neruos furculorum et ramorum ambientia, pellucida.

Rarissime apud nos floret, nec hucusque setas cum capsulis inueni, hinc ex DILLENIO descriptionem earum addam: „Setae tenues, vnciales, purpureae, Decembri „et Ianuario ex inuolucro squamoso egrediuntur, ca- „lyptra tenui, e viridi pallecente, recta, tectae, dein „capsula intumescence, ea deorsum plerumque vergit: „capsulae tumidae fiunt, obscurae virides, per maturi- „tatem subfuae, breues, nutantes: operculum paruum, „in cuspidem subito tenuem, deorsum (subinde sursum) „falcatam desinit, quo Februario et Martio mense de- „cidente, corona tenuiter denticulata fit, „

HYPNVM *abietinum*.

Hypnum furculis pinnatis, teretiuseculis, remotis, inaequalibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1591. n. 20. Necker, delic. Gallobelg. p. 468. n. 8.*

H. furculis et ramis pinnatis: ramulis distantibus, subulatis, rectis. *Scop. Flor. Carn. p. 154. n. 11.*

H. ramis duris, teretibus, foliis appressis, ovato lanceolatis, pilo aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 33. n. 1762.*

H. lutescens, alis subulatis, tenacibus. *Dill. musc. p. 280. Tab. 35. f. 17.*

Muscus pennatus minor, caulibus ramosis, in summitate velut spicatus. *Vaill. Bot. Paris. Tab. 29. f. 12.*

Muscus

Musculus terrestris, furculis filamentosis, tenacibus, abietinis, semel tantum diuisis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 626. n. 22.*

Tannenförmiges gefiedertes Hypnum.

H. passim ad saxa circa Waake; copiosissime legi ad muros urbis Mühlhausen, quos latis inuestit stratis.

Surculi plerumque simplices, semisuberecti, bi, tri, quadriunciales, in aliquot maiores viticulos diuisi, pinnati, pinnis foliosis, laxis, inferne alternis, superne oppositis versus apicem decrescentibus acutis, abietis formam quasi referunt. Folia ouato lanceolata acuta, striata, pilo terminata, dense imbricata, in statu recenti aut humida patula; sicca tam arcte appressa ut furculi et rami perfecte teretes appareant. Color furculorum versus infimam et mediam partem, e fusco viridis, superius e rufo lutescens; iuniorum autem viticulorum e luteo viridis. Sicci furculi pinnas habent contortas, et tactu rigidi sunt, humidi elastici.

Florentem nunquam vidi, licet in tam magna copia ad muros *Mühlhusanos* inuenerim; nullam quoque florum apud DILLENIVM descriptionem (quoniam ipse eas non vidit) reperio: Ill. LINNAEVS in *Spec. Plant. l. c.* breuiter eas sic delineat: „Pedunculi e media rachi „furculi, solitarii, purpurei, recti, longitudine furculi; „Calyptra erecta, subulata, pallida. Anthera ruffa, re- „curuata, magis quam in villo alio, margine oris integro, „intra quem Cilia breuia, patula.“

HYPNUM plumosum.

Hypnum furculis pinnatis, repentibus, ramis confertis;

foliis imbricatis, subulatis, antheris erectis. *Linn. Sp. Pl. p. 1592. n. 21.*

H. furculis pinnatis radicatis: pinnis confertis suberectis, foliis piliferis rectis. Scop. Flor. Carn. p. 155. n. 12.

H. repens filicinum plumosum. Dill. musc. p. 280. Tab. 35. f. 16. Hall. En. Helv. p. 104. n. 31.

haarblättriges gesiedertes Hypnum.

H. ad arborum radices, et saxa, in sylvis copiosa.

Surculi pinnati, ad spithamam longi, repentes, subramosi, tenui fibroso tomento fusco, nigricante, copioso, ad arborum truncos et saxa se sustentantes. Pinnae, siue ramuli breues, alterne oppositi, suberecti, approximati, liberi. Folia exilia, sub lente lanceolata, angusta, concaua, subrecta, imbricata, crebra, pilo tenuissimo terminata, vnde facies plumosa. Color aut e luteo viridis, aut paullo obscurior, cum splendore sericeo.

Setae exiguae, (vix semunciales) subrubentes; capsulae ouato oblongae, fuscae, operculo paruo, conico; Calyptra pallide fusca. Ora ciliata. Floret circa ver.

*** *Foliis reflexis.*

HYPNUM *cupressiforme.*

Hypnum furculis subpinnatis, foliis secundis, recuruis, apice subulatis. Linn. Sp. Pl. p. 1592. n. 22. Necker. delic. Gallobelg. p. 471. n. 14.

H. furculis et ramis pinnatis, foliis secundis: apicibus recuruis. Scop. Flor. Carn. p. 154. n. 10.

H. cau-

H. caule compresso, foliis imbricatis, falcatis, pilo aristatis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 27. n. 1737.

H. repens crispum, cupressiforme. Hall. En. Helv. p. 104. n. 32.

H. crispum cupressiforme, foliis aduncis. Dill. musc. p. 287. Tab. 37. f. 23.

Muscus squamosus, ramosus, minor, et crispus. Vaill. Bot. Paris. p. 139. n. 2. Tab. 27. f. 13.

Muscus terrestris aureus minor, flagellis, clauisque brevibus. Moris. Hist. Ox. III. p. 624. n. 8. Sect. XV. Tab. 5. Ser. 2. f. 8.

Frausblättriges Cypressen: Hypnum.

H. ubique in sylvis ad arborum radices copiosissime.

Caules bi, tri, quadriunciales, prostrati, repentes, vagi, passim ad neruum tomentosis fibrillis obfiti, ramosi, ramis variae longitudinis, valde implicatis, frequentissimis, vagis, subramosis, undique creberrimis foliis vestiti. Folia dense imbricata multiplici serie, ovato lanceolata, conuexo concava, in vncum reflexum piliferum terminata, pellucida; coloris e pallide viridi lutescentis, cum sericeo splendore, inferiora et rufescentia; summa iuniora, e pallido virefcentia. Medius principalis furculus, ramis latior, vt et maiores rami, extremitate crassiore, (clauae ad instar) terminantur. Surculi et rami peculiarem quandam faciem planam, catenulatam referunt superne, imprimis in siccitate.

Setae sparsim e medio oriuntur furculo, vnciales, e flauo purpureae, tenues, cum capsulis ab initio erectis, dein inclinatis, cylindricis, incuruis, ochrei coloris,

ris, sensim e purpureo fuscis, operculo breui, conico, aristato tectis. Calyptra in iunioribus obuia, recta, oblonga, flauescens. Floret autumnno.

HYPNVM *aduncum*.

Hypnum furculis erectiusculis, subramosis, foliis secundis, recuruatis, subulatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1592. n. 23. Necker. delic. Gallobelg. p. 472. n. 15.*

H. caule erecto, foliis falcatis, pilo aristatis, operculis conicis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 27. n. 1736.*

H. palustre erectum, summitatibus aduncis. *Dill. musc. p. 292. Tab. 37. f. 26. Hall. En. Helv. p. 100. n. 13.*

einseitig gekrümmtblättriges Sumpf: Hypnum.

H. in pratis vdis, paludosis; v. g. circa Adelipfen, circa Hessendreisch.

Praecedenti quodammodo simile, at furculis rectioribus, minus ramosis, foliis falcatis, longioribus, apicibus omnibus vnā partem spectantibus, facie non plana, setis e furculo medio, aequae ac ramorum dinaricationibus egredientibus, duplo longioribus differt. Circa extremitates furculorum et ramorum superiorum, in cincinnum quasi conuolutas, folia crebrius congesta sunt, et valde adunca, inferius laxiora, minus curua. Peculiarem quendam in furculis obseruari rigiditatem. Color ut plurimum ex obscuro viridis, si in loco minus paludoso, aut puriori aqua scatente nascitur; in limosis vero, e lutescente viridi, ad purpureo fuscum tendens: in iuniori aetate pallidus, albicans, cum sericeo splendore.

Setae biunciales, purpureae, e perichaetio gracili, breui, squamoso: Capsulae ouatae, tumidae, fuscae, inclinatae, operculo conico, breui, obtuso. Floret circa aestatem.

HYPNVUM *viticulosum*.

Hypnum furculis repentibus, ramis vagis teretibus, foliis patulis acuminatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1592. n. 25.*

Necker. delic. Gallobelg. p. 473. n. 17.

H. foliis lanceolatis, crispis, capsulis erectis, operculo conico. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 28. n. 1739.*

H. repens arboreum maius, capitulis et furculis erectis, minus ramosis. *Hall. En. Helv. p. 162. n. 25.*

H. subhirsutum, viticulis gracilibus erectis, capsulis teretibus. *Dill. musc. p. 307. Tab. 39. f. 43.*

Muscus squamosus, viticulis longioribus glabris. *Vaill. Bot. Paris. p. 137. n. 7. Tab. 23. f. 1.*

Muscus montanus, flagellis longis, tenuibus, cupressinis, ut plurimum indiuisis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 624. n. 7. Sect. XV. Tab. 5. Ser. I f. 7.*

schlankästig Wacholderblättriges Hypnum.

H. copiosissime ubique in sylvis ad arborum truncos.

Cauliculi fibrosi, repentes praelongi, confertim latis longisque stratis arborum truncos inuestientes, ramosi; ramis erectis, simplicibus, (vel in aliquot ramusculos denuo diuisis) longis, per siccitatem teretibus, crispis, instar funiculi contortis; foliis in siccitate capillaceis,

laceis, crispis appressis, humore irrigatis expansis, non crispis, sub lente fere triangularibus; superioribus longioribus latioribus, inferioribus brevioribus, acutioribus, apice recurvo, (vnde crispa facies) plerumque versus unum latus spectantibus. Color ex obscuro viridis, versus summum luteus, inferne e rufo ochreus. Aliquando inter foliorum alas granula reperiuntur dura, rotunda, quae e parvis foliolis (per lentem visa) conflata, gemmarum vices gerere videntur.

Setae pro ratione longitudinis viticulorum breves, vix unciales, e luteo pallidae ab initio, sensim purpurascens, inter alas ramulorum, e squamoso piloso, exiguo perichaetio. Capsulae parvae, ovatae, aut cylindricae, e luteo purpurascens, (per aetatem fuscae) nitentes. Operculum brevissimum, conicum, acutum. Ora glabra, nudo oculo, sub lente levissime ciliata.

HYPNUM *squarrosum*, & *maius*.

Hypnum ramis vagis, foliis ovatis, apice subulatis, vndique reflexis, *Linn. Sp. Pl. p. 1593. n. 26. Necker. delic. Gallobelg. p. 478. n. 16.*

H. furculis repentibus, ramis suberectis, vagis, foliis subulatis, reflexis, carinatis. *Scop. Flor. Carn. p. 158. n. 19.*

H. foliis patulis, subulatis, operculis conicis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 27. n. 1732?*

H. repens, triangularibus reflexis foliis, *maius. Dill. musc. p. 303. Tab. 39. f. 38.*

Muscus

Muscus terrestris erectior, foliis reflexis, *Morif. Hist.*

Ox. III. p. 624. n. 2. Sect. XV. Tab. 5. Ser. 2. f. 2.

Streubig blättriges Hypnum.

H. in sylvarum locis vdis; v. g. im Heinholz, circa Kerstlingeroderfeld, et alibi copiose.

Caules insignis longitudinis, ad semipedem vsque protensi, repentes, in aliquot viticulos ramosos diuisi, implicati, ramis vagis, laxis. Nervus caulis eleganter purpureus, per foliorum interstitia translucens. Folia multiplici serie caules ambientia, ovato lanceolata, in acutissimum mucronem, pilum quasi referentem terminata, reflexa, pellucida; coloris nunc e pallido viridi lutescentis, nunc obscurius viridis: in sicca paullulum crispa, apicibus vagis, in recenti aut humida patentiora, apicibus reflexis, vnde caules angulosam obtinent faciem.

Setae unciales, sesquiunciales, passim e perichætio tereti, squamoso, piloso ortae, purpureae, rectae; Capsulae subovatae, spadiceae, nutantes; ora late hians, ciliis luteis oblita; operculum obtusum. Rarius floret, et aliquot tantum reperi specimina cum capsulis, mense Julio.

β. *Hypnum squarrosum, minus.*

Hypnum repens triangularibus reflexis foliis, minus.

Dill. musc. p. 304. Tab. 39. f. 39.

H. foliis cinnatis, patulis, reflexis. Hall. Hist. ! elv.

T. III. p. 27. n. 1733.

Muscus erectus, foliis reflexis. Vaill. Bot. Paris. p. 139.

n. 27. Tab. 37. f. 27.

H. in

H. in iisdem locis.

Haud multum differt, nisi foliis minoribus, magis adhuc reflexis, densioribus, pallidioribus. Setae et capsulae similes.

HYPNVM *loreum.*

Hypnum furculis reptantibus, ramis vagis erectis, foliis secundis, antheris subrotundis. *Linn. Sp. Pl. p. 1593. n. 28. Scop. Flor. Carn. p. 157. n. 17.*

H. loreum montanum, capsulis subrotundis. Dill. musc. p. 305. n. 40.

Muscus squamosus maior, foliis angustioribus, acutissimis. *Vaill. Bot. Paris. p. 138. n. 12. Tab. 25. f. 2.*

Muscus repens maior, foliis et flagellis longis, et tenuibus donatus. *Morif. Hist. Ox. III. p. 626. n. 24. Sect. XV. Tab. 5. Ser. ult. f. 24.*

langranckig haarblättriges Hypnum.

H. copiose circa Neuhaus; circa Waake ad terram.

Magnam habet similitudinem cum *Hypno squarroso*, eiusque varietate *maiori*; et forte etiam specie non diuersum: distingui tamen poterit furculis multo longioribus, tactu rigidis, magis ramosis, foliis longioribus, falcatis, reflexis quidem etiam, at non in tantum ut in *squarroso*. Color e luteo viridis, cum splendore. Summorum furculorum apices crassiores recurui. Setas nullas in meis speciminibus, mense Iulio lectis reperi.

***** *Sur-*

***** *Surculis dendroidibus, siue fasciculatis.*

HYPNVM *dendroides.*

Hypnum furculo erecto, ramis fasciculatis terminalibus, simpliciusculis, antheris erectis. *Linn. Sp. Pl. p. 1593. n. 29.*

H. furculis erectis, ramis terminalibus teretibus, imbricatis, radice repente. *Scop. Flor. Carn. p. 159. n. 23.*

H. caule nudo inclinato, ramis teretibus confertis, capsulis erectis, aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 29. n. 1747.*

H. erectum, arbusculam referens, ramulis subrotundis, confertim nascentibus. *Hall. En. Helv. p. 101. n. 18.*

H. dendroides sericeum, setis et capsulis longioribus erectis. *Dill. musc. p. 313. Tab. 40. f. 48.*

Muscus squamosus, ramosus, erectus, alopecuroides. *Vaill. Bot. Paris. p. 137. n. 4. Tab. 26. f. 6.*

Muscus dendroides elatior, ramulis crebris, minus furculosis, capitulis pedunculatis, breuib, insidentibus. *Morif. Hist. Ox. III. p. 626. n. 31. Sect. XV. Tab. 5. Ser. 5. f. 31.*

geradästiges baumförmiges Hypnum.

H. in sylvis ad truncos arborum; sed non ubique frequens; in sylva Mündensi tamen, et circa die Bruck copiose reperi.

Facile se ab omnibus aliis distinguit, cauliculis den-

se confertis, facie arbusculam referentibus, bi, tri, quadriuncialibus, superne ramorum foliosorum corymbum gerentibus, inferius nudo trunculo, ad horizontalem repentem, copioso fusco tomento obsitam radicem adnexus. Rami corymbosi, densissime conferti, omnes surrecti, teretes, glabri, apice acuto terminati; folia eos ambiunt ovato lanceolata, acuta, surrecta, plana, imbricata, densa, sub lente pellucida, et nervo medio distincta, coloris e luteo viridis, cum sericeo splendore. Truncus ramorum dendroideorum atro purpureus, fuscis, marcidis, imbricatis squamulis tectus. Observantur ad vnam eandemque radicem fibrosam, annotinam, simul cum dictis fasciculatis ramis, intermixti iuniorum stolones, spicae aut clavae similes, successu temporis se euoluentes.

Setas haud reperi in meis speciminibus, quas viciales, (et paullo ultra) e perichaetio modice longo, squamoso, ad furculorum basin, circa Februarium enascenti, et capsulas proferre purpureas, erectas, graciles, oblongas, operculo conico, breui, aristato et Calyptra tenui straminea tectas, referunt Ill. HALLERVS et DILLENIVS l. c.

HYPNVUM *alopecurum*.

Hypnum furculo erecto, ramis fasciculatis, terminalibus, subdivisis, antheris subnutantibus. Linn. *Sp. Pl.* p. 1594. n. 30. Necker. *delic. Gall. belg.* p. 481. n. 31.

H. caule nudo, confertim ramoso, ramis et capsulis inclinatis, aristatis. Hall. *Hist. Helv.* T. III. p. 30. n. 1748.

H. pallu-

H. palustre erectum arbusculam referens, ramulis subrotundis. *Hall. En. Helv. p. 101. n. 19.*

H. dendroides obscurius, setis et capsulis brevioribus, subnutantibus. *Dill. musc. p. 315. Tab. 41. f. 49.*

Muscus squamosus alopecuroides, flagellis recurvis. *Vaill. Bot. Paris. p. 123. n. 3.* Muscus dendroides elatior, radice repente. *Eiusd. Tab. 23. f. 5.*

Muscus dendroides sylvarum erectus, ramulis Kali aemulis, radice repente. *Morif. Hist. Ox. III. p. 626. n. 30. Sect. XV. Tab. 5. Ser. ult. f. 30. 31.*

gekrümtästiges baumförmiges Hypnum.

H. passim in sylvarum locis subhumidis: e. g. im Heineholz, ad sinistra viae versus Kerstlingeroderfeld; circa die Bruck.

Quod modum crescendi, et habitum dendroideum attinet, praecedenti simillimum; differt autem furculis longioribus, truncis dendroideis altioribus, ramis patentibus longioribus, frequentius ramosis, extremitatibus non rectis, sed paullulum reflexis, foliis patentibus, sic ut nervus caulis inter ea conspici possit, maioribus, latioribus, praecipue in mediis ramorum furculis. Color ex obscuro viridis, in annosioribus ad luteo fusum tendens absque splendore. In sicca peculiarem crispam catenulatam habent faciem, ob foliola apice recurvata, alternata serie quadruplici ramulos ambientia; qualis in praecedente non est, ob folia ibi, in sicca, arcte cauli appressa, surrecta.

Setas quoque in meis desidero speciminibus, quas

III. HALLERVS dicit vnciales, e parua vagina, cum capsulis inclinatis, cylindricis, operculo longe aristato tectis. Obseruauit etiam grana in foliorum alis, germina referencia.

***** *Surculis teretiusculis.*

HYPNVM curtispendulum.

Hypnum furculis vagis teretibus, foliis ouatis, acutis, patulis, antheris pendulis. *Linn. Sp. Pl. p. 1594. n. 31.*

H. ramis teretibus, foliis ouato lanceolatis, pilo aristatis, capsulis ouatis, pendulis, operculis aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 28. n. 1740.*

H. dentatum curtispendulum, viticulis rigidis. *Dill. musc. p. 333. Tab. 43. f. 69.*

stumpfstiges starres borstiges Hypnum.

H. ad arborum truncos, praesertim ad fagos, copiose in syluis.

Cauliculi reclinati, copiosi, implicati, fibrosi, rigidi, variae longitudinis, bi, tri, quadriunciales, et longiores, late diffusi, in varios ramos, siue viticulos, pariter vt furculi ipsi, in minores ramos, furcatim ad angulum obtusum subdiuisi. Folia ouato lanceolata, in acutum pilum terminata, dense imbricata, in sicca appressa, pilis tamen exstantibus, in humida, patula; densiora et latiora circa furculorum et ramulorum apices, qui inde obtuso sine, clauae instar terminantur. Color sordide e luteo virescens, cum sericeo splendore.

Setae

Setae pro ratione longitudinis furculorum admodum breues, (vix enim semunciam aequant, et absconditae quasi inter ramos latent) e luteo rubeutes, nitentes, (plerumque binae circa eundem locum) erectae. Capsulae luteae, cylindricae, erectae ab initio, dein pendulae, ovatae, operculo breui aristato tectae. Perichætia longissima, squamola, pilosa, tertiam fere setae partem excipientia, squalida, residua post secessum setarum, et spinas quasi mentientia.

HYPNVM *purum*.

Hypnum furculis pinnato-sparsis, subulatis, foliis ovatis, obtusis, conniuentibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1594. n. 32. Scop. Flor. Carn. p. 156. n. 15. Necker. delic. Gallobelg. p. 476. n. 22.*

H. ramis teretibus, foliis ovato lanceolatis, setis praelongis, capsulis inclinatis, aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 29, n. 1743.*

H. cupressiforme vulgare, foliis obtusis. *Dill. musc. p. 309. Tab. 40. f. 45.*

Muscus squamosus, cupressiformis. *Vaill. Bot. Paris. p. 138. n. 15. Tab. 28. f. 3.*

rundglattschuppig schlankes Hypnum.

H. ubique in sylvis ad terram, in locis subhumidis, umbrosis; inque pascuis.

Longis, teretibus, pinnatis, squamosis, nitentibus, subrectis furculis, purissimis ab omni squalore terrae, et peculiari quadam lubrica facie se distinguit. E

furculis annotinis, pinnatis, circa superiorem extremitatem plures noui protruduntur furculi teretes, ramosi, ramis non tam regulariter dispositis, plerumque paullulum recuruis, apicibus crassioribus, inflar clauae tumidioribus, terminatis. Folia ouato lanceolata, acuta, pellucida, per lentem neruo medio distincta, dense imbricata; in inferioribus furculis et ramulis laxiora, patula, lutescentia; in superioribus iunioribus viticulis densiora; ad caulem squamatim appressa, qui inde teretes euadunt, e pallido viridia, cum insigni sericeo nitore: suprema medii furculi principalis, latissima, in obtusum, lateralium ramorum in acutiorem apicem conspata. Longitudine admodum diuersa ludit, pro vario loco natali; in humidioribus locis, ad spithameam longitudinem excrescit, in siccioribus breuius est.

Setae (quae rarius apud nos reperiuntur) vnciales, biunciales, purpureae, e medio neruo furculorum ramorumque enascuntur, erectae, splendentes. Capsulae cylindricae, inclinatae, operculo aristato, (quo secedente ora distincte ciliata apparet) tectae. Perichaetium squamosum, oblongum. Floret hieme.

Adhibere hunc muscum piscatores Lancastrienses, ad purgandos vermes DILLENIVS refert l. c.

HYPNUM *riparium*.

Hypnum furculis teretibus, ramosis, foliis acutis, patulis, distantibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1595. n. 34. Necker. delíc. Gallobelg. p. 475. n. 21.*

H. ramis teretibus et pinnatis, foliis ouato lanceolatis, pilo terminatis, setis caulinis breuib. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 29. n. 1746.*

H. aqua-

H. aquaticum fluitans, capitulo tenui inclinato. *Hall.*

En. Helv. p. 100. n. 11.

H. aquaticum, flagellis teretibus et pennatis. *Dill. musc.*

p. 380. Tab. 40. f. 44.

rund und gefiedert stengeliches Hypnum.

H. in rivulis ; v. g. in rivulo molae chartariae

Wehndensis ; im Springmühlen Wasser circa Gronde.

Caules inferne nervosi, fibrosi, ad longitudinem quatuor, quinque, sex uncularum protensi, laxè ramosi, furculis et ramis longis, vagis, teretibus, si paullo supra aquam eminent; pinnatis si intra aquam fluitant. Folia dense imbricata, ovata, acuta, non vero in pilum terminata, in furculis teretibus; laxiora, lanceolata, acutiora, in pilum quasi desinentia, in furculis pinnatis. Color ex obscuro viridis, cum splendore.

Setae breves, pro ratione longitudinis furculorum, unciales, eleganter purpureae, splendentes, erectae. Capsulae ovatae, tumidae, spadiceae, splendentes, per aetatem obscure virides, subnutantes, operculo conico, brevi, rostrato, pallidiori tectae; setae secundum mediorum furculorum longitudinem enatae e perichaetio brevissimo, tuberculum earum crassum viride amplectente. Ora capsulae ciliata. Calyptra in iunioribus capsulis erecta, pallida, conica, capsulas totas operiens. In ipsa aqua capsulas profert, quod etiam DILLENIVS adnotavit. Floret exeunte aestate.

HYPNUM cuspidatum, α pungens.

Hypnum furculis vagis: apice foliis convolutis, acuminatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1595. n. 36.*

R 4

H. foliis

H. foliis ovato lanceolatis, ramis teretibus, supremis conicis acuminatis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 28. n. 1741.

H. repens palustre, foliis triangularibus, per caulem expansis, extremitatibus conuolutis, et acuminatis. Hall. En. Helv. p. 100. n. 14.

H. palustre, extremitatibus cuspidatis et pungentibus. Dill. musc. p. 300. Tab. 39. f. 34.

Muscus saxatilis repens, coma sparsa. Buxbaum. Cent. II. p. 6. Tab. 3. f. 1. 2. 3. 4. Dilleniana multo deteriores figurae.

stechendes Sumpf-Hypnum.

H. in vdis paludosis pratis, ad riuulorum oras; inque humidis, opacis locis sylvarum ubique.

Mediorum furculorum, et summorum lateralium ramulorum extremitates cuspidatae, pungentes, optimam differentiam praebent. Caeterum furculi erecti, uncialis, bi, tri, quadriuncialis longitudinis, subramosi, ramis vagis, et *filicinorum Hypnorum* more quasi pinnatis; pinnis absque certo ordine dispositis, nunc laxioribus, nunc densioribus; summis pariter ut apex medii furculi, in acutum pungentem, durum mucronem, et dense conuolutis foliis conflatum, spinarum instar cutem penetrantem acuminatis. Folia ovato lanceolata, acuta, pellucida, patula, laxius imbricata, nervum caulis, et pinnarum crassum, purpureum versus summitatem, ambiunt, qui per ea pellucet. Reperi etiam quosdam furculos, quorum caulis loco mucronis pungentis, in rosulam latis subrotundis foliis efformatam, terminantur, lateralibus ramis apice pungente instructis. In sicca caules

caules et rami subteretes, folia magis appressa, quae in recenti et humida plus distant, et patentia sunt. Color pro varietate loci natalis variat; in paludosis e luteo rufescens, in paullo ficcioribus ex obscuro viridis, cum sericeo splendore.

Setae praelongae, bi, ad triunciales erectae, eleganter e lutescenti purpureae, longo squamoso perichaetio, ad medium furculi neruum ortae. Capsulae crassae ouatae, paullulum gibbosae, subnutantes, coloris viridescantis, dorso gibbo, subaurantiaco. Operculum obtusum, breue, miniatum. Ora ciliata.

β. *Hypnum cuspidatum, inerme.*

Hypnum ramis teretibus, foliis ouato lanceolatis, setis praelongis, capsula crassa, operculo conico. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 28. n. 1742.*

H. longum, erectum, foliis angustis, caulibus appressis. *Hall. En. Helv. p. 100. n. 15.*

H. cupressiforme, tenuius et compressius. *Dill. musc. p. 312. Tab. 40. f. 47.*

H. in sylvis, ad similia loca,

Praecedenti adeo affine, ut separari nequeat, ob furculorum mediorum apices extremos in cuspides, (ad exteruum aspectum pungentes) terminatos, qui vero e mollioribus foliis compositi, cutem non penetrant. Differt praeter haec, furculis longioribus, ad filicinam formam accedentibus, magis ramosis, et teretibus, (imprimis in siccitate) pinnis, superioribus exceptis, (quae ut in praecedente in mucronem exeunt) omnibus paullulum reflexis. Folia densius imbricata, coloris e luteo viri-

descendentis, cum insigni sericeo splendore. Nervi cauliculorum purpureus, pellucens. Setae, capsulae et reliqua similia.

***** *Surculis confertis.*

HYPNUM sericeum, & curvatum.

Hypnum surculo repente, ramis confertis, erectis, foliis subulatis, antheris erectis. *Linn. Sp. Pl. p. 1595. n. 36.*
Necker. del. Gallobelg. p. 478. n. 25.

H. ramis teretibus, foliis pilo praecipitatis, capsulis cylindricis, erectis, aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 30, n. 1750.*

H. repens trichodes, terrestre, luteovirens, vulgare, inane, capitulis erectis. *Hall. En. Helv. p. 98. n. 6.*

H. vulgare sericeum recurvum, capsulis erectis cuspidatis. *Dill. musc. p. 323. Tab. 42. f. 59.*

Muscus arboreus splendens sericeus. *Vaill. Bot. Paris. p. 123. n. 2. Tab. 27. f. 3. humidum statum exprimit.*

Muscus terrestris, luteo viridans, sericeus repens. *Morrif. Hist. Ox. III. p. 626. n. 25. Sect. XV. Tab. 5. Ser. 4. f. 25. siccum delineat.*

frumäßig Seidenblättriges Hypnum.

H. ad truncos arborum, ad saxa: vulgatissimum est, et ubique reperitur.

Caules siue viticuli longi, repentes, fibrillis copiosis, tomentosis adhaerentes, valde ramosi, in densos caespites

spites congesti, ramis creberrimis, surrectis, breuibus, subteretibus, in siccitate incuruis, tactu rigidis, in humiditate rectis, mollibus. Folia angusta, in pilum longum terminata, densissime imbricata; in siccitate appressa, capillaria; humida latiora, patula, ex obscuro viridia, cum sericeo splendore ad luteum vergente.

Setae semunciales, vnciales, purpureae, perichae- tio breui, crasso, squamoso cinctae, confertae, circa medium furculi et ramorum neruum ortae. Capsulae longae, teretes, inferne paullulum incrassatae, siue lageniformes, erectae, ochreae; ora tenui ciliata, ciliis albis. Operculum miniatum rostratum. Calyptra pal- lida. Floret vere.

β. Hypnum sericeum, praelongum.

Hypnum sericeum furculis longioribus, et rectioribus, capsulis incuruis. *Dill. musc. p. 35. Tab. 42. f. 60.*

H. ad arborum truncos.

Varietas praecedentis, viticulis praedita longissimis, (sunt enim mihi specimina ad semipedalem longitudi- nem protensa) ramis confertis quidem etiam, densis in- ter se implicatis, at multo longioribus, et iterum ramo- sis expansis, obtusis versus apicem, siccitate haud incur- vis sed rectis,

Setae et capsulae paullo minores, incuruae, oliua- cei coloris. Operculum acutissime rostratum. Folia similia et fulgente etiam sericeo splendore insignita, in sicca aequae ac humida; at magis patentia.

HYPNVM velutinum.

Hypnum furculo repente, ramis confertis erectis, foliis subu-

subulatis, antheris subnutantibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1595.*
n. 37.

H. ramis teretibus, foliis pilo terminatis, capsulis ouatis, inclinatis, mucronatis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 31. n. 1754.

H. repens trichodes terrestre viridius, minus, capitulis tumidioribus, cernuis. Hall. En. Helv. p. 98. n. 7.

H. velutinum, capsulis ouatis, cernuis. Dill. musc. p. 326. Tab. 42. f. 61.

M. squamosus, ramosus, tenuior, capitulis incurvis. Vaill. Bot. Paris. p. 138. n. 13. Tab. 26. f. 9.

Erleehendes haarblättriges Rasen: Hypnum.

H. ad arborum truncos, et terram copiose.

Cauliculi variae longitudinis, repentes, copiosos ramorum furculos emittentes, simplices, ad terram aut cortices arborum, multo tomento ferrugineo fibroso annexos. Ramuli isti densi, copiosi, implicati, surrecti. Folia tenuia, in siccitate capillaria, appressa; humida patula, lanceolata, acuta, pilo terminata, coloris nunc obscure viridis, nunc ad luteum vergentis; ad medium furculi neruum latiora, ad ramos angustiora, versus extremitates capillaria, minima, cum sericeo splendore, multo minori tamen, quam in specie praecedente.

Setae passim e medio repente caule enatae, unciales, purpureae, perichaetio cinctae squamoso, crassum viride tuberculum setae ambiente. Capsulae nutantes, cylindricae, aut ouatae, splendentes, subpurpureae per aetatem

aetatem fuscae. Operculum conicum, breue, e viridi acutum. Floret per hiemem.

HYPNUM *serpens.*

Hypnum furculis repentibus, ramis filiformibus, foliis oblitteratis. *Linn. Sp. Pl. p. 1596. n. 38. Scop. Flor. Carn. p. 156. n. 16. Necker. delic. Gallobelg. p. 477. n. 24.*

H. caulibus prostratis, foliis minimis, pilo terminatis, capsulis cylindricis, erectis, mucronatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 32. n. 1756.*

H. repens trichodes, terrestre minimum, capitulis maiusculis, obliquis erectis. *Hall. En. Helv. p. 99. n. 10.*

H. trichodes serpens, setis et capsulis longis erectis. *Dill. musc. p. 329. Tab. 42. f. 64.*

Muscus terrestris omnium minimus, capitulis maiusculis, obliquis erectis. *Vaill. Bot. Paris. p. 138. n. 21. Tab. 28. f. 2.*

faseriges kriechendes Hypnum.

H. ubique ad terram vdam, ad arborum truncos, et saxa, in locis vdis, umbrosis sylvarum ubique.

Surculis copiosis densissime fibrosis, et terrae infratis, tenerrimis, ac pene filiformibus, *Byssi* quasi e longinquo faciem refert. Cauliculi repentis, caespitosi, late diffusi, terrae per copiosum tomentum arcte adhaerentes, ramosi; foliis valde exilibus, paullo distinctioribus, maioribus furculorum triangularibus, in pilum

lum (per lentem conspicuum) desinentibus, minoribus ramorum capillaceis vestiti. Color laete gramineus.

Setae admodum frequentes, praelongae, pro ratione teneritatis furculorum, biunciales, erectae, purpureae, nitentes, cum capsulis inclinatis, cylindricis, ochreis, operculo acuto tectis. Ora ciliata. Floret per aestatem.

HYPNVM *sciuroides*.

Hypnum furculis erectis ramosis incuruatis. *Linn. Sp.*

Pl. p. 1596. n. 39. Necker. delic. Gallobelg. p. 474. n. 18.

H. furculis erectis, ramosis, ramis subradicalibus, foliis subouatis, capsulis erectis. *Scop. Flor. Carn. p. 159. n. 22.*

H. caulibus teretibus ramosis, foliis adpressis, pilo aristatis, operculis conicis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 30. n. 1749.*

H. arboreum sciuroides. *Dill. musc. p. 319. Tab. 41. f. 54.*

Muscus arboreus splendens myosuroideus. *Vaill. Bot. Paris. Tab. 27. f. 12.*

Muscus repens, ferici modo lucens, viticulis longioribus erectis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 626. n. 26. Sect. XV. Tab. 5. Ser. ult. f. 27.*

frumastiges Eichhorn: Schwanz: Hypnum.

H. ad arborum truncos passim in sylvis, praesertim vero antiquarum fagorum amat truncos.

Cauliculi repentes, tres, quatuor uncias longi, fibrosi, passim aliquot ramorum viticulos emittunt unciales,

les, sesquiunciales, simplices vel parum tantum subdivisi, in siccitate graciles, teretes, subrigidos, et plerumque cornu instar incuruos, in humiditate laxos, tumidos, flexiles. Folia dense imbricata, multiplici serie disposita, ovato lanceolata, acuta, in pilum terminata; sicca arctissime caulibus appressa, apicibus velut versus unum latus quasi inclinata; humida patentia, laxa, unde cauliculi graciles antea, nunc tumidi et caudae *Sciuri* valde similes evadunt. Color ex obscuro viridis, per aetatem e rubiginoso fuscus.

Setae ad originem ramulorum, semunciales, croceae, erectae, e perichaetio gracili, squamoso. Capsulae oblongae, ovato cylindricae erectae, spadiceae. Operculum conicum, acutum. Ora albidis ciliis obsita. Calyptra pallida, apice supremo lutescente. Floret hieme, sed rarius apud nos. Observantur in quibusdam viticulis tumidioribus, innumera granula fusca, sub lente e minimis foliolis composita.

HYPNVM *myosuroides*.

Hypnum furculis ramosissimis, ramis subulatis vtrinque attenuatis teretibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1596. n. 40. Necker. delic. Gallobelg. p. 474. n. 19.*

H. ramis teretibus, foliis pilo terminatis, capsulis ovatis inclinatis, mucronatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 31. n. 1752.*

H. repens triangularibus angustis foliis, ramulis subrotundis. *Hall. En. Helv. p. 100. n. 16.*

H. myosuroides, tenuius, capitulis nutantibus. *Dill. muse. p. 317. Tab. 41. f. 51.*

Muscus

Muscus trichodes, humilis, ramosus, capitulis obliquis tumidiocaulis donatus. *Morif. Hist. Ox. III. p. 628. n. 3. Sect. XV. Tab. 6. Ser. 3. f. 3.*

Muscus squamosus minor, myosuroides, capitulis incurvis. *Vaill. Bot. Paris. p. 137. n. 1. Tab. 27. f. 6.*

Fruchtstängel Mäuse Schwanz: Hypnum.

H. ad truncos arborum, ad terram et ad saxa ubique in sylvis.

Surculi fibrosi, reptantes, bi, tri, quadriunciales, versus summum diuisi in viticulos aliquot irregulariter pinnato ramosos, ramis copiosis, densis, paullulum reflexis, incurvis, teretibus. Folia arcte imbricata, ovato lanceolata, in pilum terminata, e laete gramineo viridi splendentia.

Setae circa ramorum originem uncialles, biunciales erectae, croceae, e perichaetio breui, gracili, squamoso; Capsulae cylindricae, erectae, aut subnutantes, ochreae. Ora ciliata. Floret vere.

FONTINALIS. LINN. Gen. n. 1190. DILL.

Musc. Gen. IX. p. 254. SCOP. Flor. Carn.

p. 162. HALL. En. Helv. p. 95. HYPNA

capsulis sessilibus. HALL. Hist. Helv. T. III.

Ord. V. p. 40.

Capsula sessilis, aut breuiter pedunculata, operculo et calyptra tecta, perichaetio squamoso, membranaceo inclusa.

III.

III. HALLERVS in *Hist. Helv. l. c.* nullum verum discrimen huius generis ab HYPNO se reperire dicit, ideo coniunxit; et sane diuersitas quae sola consistit in capsulis sessilibus, aut subpedunculatis quae *Fontinali*, et longiori pedunculo instructis, quae *Hypnis* competunt, haud omnino seiungere iubet *Fontinalem* ab *Hypno*. Interim cum Genus *Hypni* iam satis numerosa constet specierum copia, species capsula sessili, aut breuissimo pedunculo instructas, liceat *Fontinali*, vt generi *Hypno* proxime affini, associatas manere.

FONTINALIS *antipyretica.*

Fontinalis foliis complicato-carinatis, trifariis, acutis, antheris lateralibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1571. n. 1.*

F. capsulis lateralibus, foliis lancolatis, trifariam versis. *Scop. Flor. Carn. p. 162. n. 1.*

F. maior, foliis triangularibus, complicatis, capitulis in foliorum alis sessilibus. *Hall. En. Helv. p. 95. n. 1.*

F. triangularibus maioribus complicatis, e foliorum alis capsulifera. *Dill. musc. p. 254. Tab. 33. f. 1.*

Hypnum foliis complicatis, ouato lanceolatis, capsulis ex alis petiolatis, ouatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 40. n. 1794.*

Muscus squamosus, foliis acutissimis, in aquis nascens. *Vaill. Bot. Paris. p. 140. n. 5. Tab. 35. f. 5. Michel. Gen. p. 108. Tab. 59. f. 9.*

Muscus aquaticus, viticulis longis, minus ramosis, lucidis foliis, acutis, triangularibus cinctis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 626. n. 32. Sect. XV. Tab. 6. Ser. 1. f. 32.*

Musculus aquaticus, terrestri vulgari similis, sed maior.

Buxbaum. Cent. III. p. 29. Tab. 69. f. 2.

große dreyeckigblättrige Fontinalis.

*H. in stagnis, fluuiis, fontibus, v. g. im Schützen-
graben; in der alten Leine, sub ponte, in via versus
Grohnde.*

Caules fibrosi, purpurei, dodrantales, immo pedales, nunc simpliciores, nunc crebros ramorum viticulos longos emittentes, fluitantes, vagos, simplices, vel iterum etiam subdiuisos. Folia triplici alterna serie ad caules laxius disposita, (sic vt neruus purpureus inter ea conspici queat) surrecta, ex ouato lanceolata, acuta, (duas aliquando ad tres lineas longa, vnā lata) subpellucida, glabra, margine integerrima, coloris in limpidis fontibus ex obscuro amoene viridis, in stagnis fordide ex obscuro viridi lutescentis.

Capsulae laterales, ex axillis foliorum, subpedunculatae, perichaetio siue inuolucro foliaceo, squamoso, crasso inuolutae, ouatae, (a perichaetio liberatae, quasi pyriformes) superne lato orificio, ciliis coccineis, pilosis, longis obsito, terminatae. Operculum conicum, obtusum, spadiceum, quo leuissimo in capsulis maturis motu elastico secedente, cilia mediam quandam cuspidem cingentia, in conspectum veniunt, et pollen erumpit viride, intra capsulam contentum. Calyptra conica. Floret circa autumnum.

„Infarctus musculus inter caminum et parietem ligneum, incendium penetrare non sinit. Coctus cum cereuisia secundaria, pro pediluuiio in febre pectorali.
„Dalis.“ *Linn. Fl. Suec. edit. II. p. 379.*

SPHA-

SPHAGNVN LINN. Gen. n. 1187. DILL.
Musc. Gen. VIII. p. 240. HALL. Hist. Helv.
T. III. p. 28. En. Helv. p. 95. SCOP. Flor.
Carn. p. 161.

„Capsulae fere ouatae, membranaceae,
„spongia plenae, superne operculo obtuso te-
„ctae, quod discedit, et capsulam ampliter a-
„pertam relinquit. Ciliorum corona caret,
„et calyptra, eaque nota ab HYPNO et BRYO
„distat. „ HALL. Hist. Helv. l. c.

III. LINNAEVS addit *apophysin* marginatam, ob-
soletam, quae *antherae* est *receptaculum*; deinde
etiam meminit *membranae fugacis*, inter anthe-
ram, et receptaculum, (sive inter capsulam et pe-
dunculum superne incrassatum.)

SPHAGNVN *palustre*, & *latifolium*.

Sphagnum ramis deflexis. Linn. Sp. Pl. p. 1569. n. f.

S. ramis deflexis, pedunculis terminalibus, capsulis sub-
rotundis. Scop. Flor. Carn. p. 161. n. 2.

S. cauliferum, ramis teretibus, pendulis. Hall. Hist.
Helv. T. III. p. 23. n. 1724.

S. cauliferum, ramosum, palustre, molle, candicans,
reflexis ramulis, foliis latioribus. Hall. En. Helv.
p. 92. n. 1.

S. palustre, molle, deflexum, squamis cymbiformibus.
Dill. musc. p. 240. Tab. 32. f. 1.

Muscus palustris in ericetis nascens. *Vaill. Bot. Paris.*
p. 139. n. 24. Tab. 23. f. 3.

breitblättriges Sumpf: Sphagnum; Sumpf: Moos;
Torf: Moos.

H. in pratis paludosis circa Adelipfen, in sylva ver-
sus Schoningen; copiosius in monte Moosberg, circa
Neukaus, in montibus Bructero et Weisner.

Caules ad insignem excrescunt longitudinem, pedalem, bipedalem, in terra spongiosa, paludosa maxima ex parte haerentes, supra quam ad digiti, palmae, immo dodrantis longitudinem eminent, simplices, aliquando vero etiam subdivisi, e nervo tenui, (fragili in siccitate, lignae quasi substantiae, sed spongiosae) foliis densis cincti, inordinatos emittunt ramos simplices, inferius remotiores, foliis imbricatis cinctos, deorsum flexos, superne in densum corymbum aggregatos, radiati quasi floris speciem referentem, ut III. HALLERUS se exprimit. Rami exteriores huius corymbi, (non raro e duobus, tribusue corymbis minoribus aggregatis constantis) longiores, exstantes, et pariter ac inferiores rami, laxioribus foliis vestiti; inferiores breviores, et densius congestis foliis cincti, teretes, obtuso apice terminati, breves inexplicatas gemmas, aut clauas quasi referentes, medium corymbi occupant discum. Folia ovata, sub lanceolata, exterius convexa, intus concava, membranacea, quadruplici serie alterna, imbricata; mollia sunt in statu recenti, in siccitate membranacea, tactu elastica, et strepentia; inferiora coloris sunt albicantis, superiora et imprimis media corymbi sordide e glauco lutescentia: aliquando ad purpureum colorem vergentia; qualis varietas imprimis in monte *Bructero* frequens occurrit.

Circa

Circa aestatem e medio congestorum ramorum summo corymbo, inter foliaceas squamulas, capsulae subrotundae protruduntur, sub forma baccarum succulentarum, spadiceae, splendentes, sessiles ab initio et profundius inter foliola locatae, dein sensim pediculo crasso, albido eleuantur, qui ad duas tresue lineas excrescit, ad capsulam crassior, inferiu coni in modum extenuatus, et acetabuli quasi instar excavatus, capsulam sustinet. Ora capsulae, operculo conuexo aristato delapso, aequalis, haud denticulata. Pollen viride. Vetusulae et delapsae capsulae, duplici foramine instar margaritae, perforatae sunt, superiori ab operculo, inferiori a pedunculo.

Primariam turfi constituit materiam. Siccatum cubilibus infantum substernunt Lappones, et ad pedes oedematosos humidum et frigidum imponi a vetulis, Ill. LINNAEVS habet. Rangiferos eo vesci DILLENIVS tradit.

β. Sphagnum palustre, capillaceum.*

Sphagnum ramis deflexis, gracilibus, acutioribus, foliis angustioribus, acutioribus, caule breuissimo. *Hall. Hist.*

Helv. T. III. p. 24. n. 1724. var. β.

S. palustre molle deflexum, squamis capillaceis. *Dill. musc. p. 243. Tab. 32. f. 2. Linn. Sp. Pl. p. 1569. n. 1. var. β.*

S. cauliferum et ramosum, palustre, candicans, reflexis ramulis, foliis angustioribus. *Hall. En. Helv. p. 96. n. 2.*

haarblättriges Sumpf: Sphagnum.

H. in iisdem cum praecedente locis.

Differt teneritate foliorum, ramis copiosioribus, densioribus, gracilioribus. Capsulae et reliqua similia. Color ut plurimum e glauco viridis. Varietas, frequens imprimis in monte *Bructero* occurrit, elegantissime purpurea.

PHASCVM LINN. Gen. n. 1189. NECKER. delic. Gallobelg. p. 438. SPHAGNVN DILL. Musc. p. 251. HALL. Hist. Helv. T. III, p. 24. En. Helv. p. 97.

Praecedenti Generi admodum affine, huic enim aequae ac illo capsula est sessilis, vel brevissime pedunculata; sed in PHASCO ora ciliata operculo acuminato tecta.

„Calyptram, quae ab aliis Auctoribus praetermissa, aut negata est, Cl. NECKERVS describit „membranaceam, conicam, fugacem, „quandoque basi fissam. „cui sententiae assentitur Cl. OEDERVS, vid. *Flor. Dan. Fasc. V. p. 4.*

Ill. HALLERVS cum DILLENIO, coniunxerunt Genus SPHAGNI cum PHASCO; Ill. LINNAEVS separavit, ob dictam orae et operculi differentiam, ac absentiam receptaculi.

PHASCVM *acaulon.*

Phascum acaule, anthera sessili, foliis ovatis, acutis, con-

nienti-

niuentibus. *Linn. Sp. Pl. p. 1570. n. 1. Necker. delie. Gallobelg. p. 439. n. 1.*

Sphagnum acaulon, foliis ouato lanceolatis, pilo aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 24. n. 1726.*

Sphagnum acaulon, foliis in bulbi formam congestis. *Hall. En. Helv. p. 97. n. 6.*

Icon Oederi Flor. Dan. Tab. 249. f. 3.

β. *Sphagnum acaulon bulbiforme minus.* *Dill. musc. p. 252. Tab. 32. f. 12. Hall. Hist. Helv. l. c. var. β. Linn. Sp. Pl. l. c. var. β.*

Sphagnum acaule, foliis in bulbum congestis minus. *Hall. En. Helv. p. 97. n. 6. var. β.*

Breitblättriges Zwiebelförmiges Erd: Phascum.

H. ad terram vdam, ad fossarum latera; in cauis semitis.

Caespitulos bulbosos, e foliis ouato lanceolatis, concavis, in pilum quasi acuminatis, in rosulas congestis efformat, quorum exteriora patula, interiora con-niuentia, in medio includunt, et quasi abscondunt cap-sulam ouatam, aurantiacam, per aetatem fuscam, mi-nimam, (vix enim granum milii aequat) ac vix nisi per lentem distincte patentem, operculo aristato praeditam. „Calyptra leuiter striata, ab vno latere antheram tegens „ita vt sit dimidiata, ad apicem obtusa, coloratiuscula, „*Necker. delic. Gallobelg. l. c. Tab. 1. f. 2.* Color folio-rum pallide e luteo viridis. Floret per hiemem et ver

PHASCVM *subulatum*.

Phascum acaule, anthera sessili, foliis subulato-setaceis patulis. *Linn. Sp. Pl. p. 1570. n. 2.*

Sphagnum acaulon trichodes. *Dill. musc. p. 251. Tab. 32. f. 10. Hall. En. Helv. p. 97. n. 8.*

Icon Oederi *Flor. Dan. Tab. 249. f. 2. quae statum recentem, f. 1. quae aridum exhibeat.*

borstiges Erd Phascum.

H. ad aggeres fossarum, primo vere frequens.

Tenuissima, ac omnium fere minima plantula, nisi confertim cresceret, vix conspicua, cauliculis constat simplicibus, aliquando bipartitis, ad duarum triumve linearum longitudinem super terram eleuatis; rosula foliolorum bilinearum, subulorum, apice recuruo praedictorum, capsulas includit subrotundas, sessiles, seminis papaueris magnitudine, flauas, operculo, in siccis aristato, in recentibus sub lente papillari. „Calyptra „operculum, antheramque fere omnino tegens, fugacissima, striata, conica, ad apicem obtusa, margine „quandoque in 3, 4 lacinulas diuisa, secundum observationem Cl. NECKERI vid. *eius delic. Gallob. p. 440. Tab. 1. f. 1.*

LYCOPODIVM. LINN. Gen. n. 1185. DILL.

MVSC. Gen. XIV. p. 441. HALL. Hist. Helv.

T. III. p. 19. HALL. En. Helv. p. 92. SCOP.

Flor. Carn. p. 163. LYCOPODIODES. DILL.

Gen. XVII. p. 462. HALL. En. Helv. p. 93.

SELAGO. DILL. Gen. XIII. p. 435. HALL. En.

Helv.

Helv. p. 94. *SELAGINOIDES*. DILL. Gen.
XVI. p. 460. HALL. En. Helv. p. 94.

Capsulae subrotundae, vel reniformes; nudaе, vel in alis foliorum sessiles, vel pedunculatae, in spicam congestae, calyptra, ciliis et operculo destitutae, bivalves, elastice diffilientes, et pollinem inflammabilem fundentes.

Flores femineos, quibus perianthium tri, tetraphyllum, cum plumula calyci connata, attribuitur, Ill. HALLERVS pro veris gemmulis habet. Capsulae in spicam congestae, similes fructificationibus *Osmundae*, magnam ostendunt inter haec duo genera affinitatem.

LYCOPODIVM *clauatum*.

Lycopodium foliis sparsis, filamentosis, spicis teretibus, pedunculatis, geminis. *Linn. Sp. Pl. p. 1594. n. 4.*
Scop. Flor. Carn. p. 163. n. 1.

L. ramis prolixis, spicis petiolatis, gemellis, foliis linearibus, pilo aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 22. n. 1722.*

L. caule repente, foliis patulis, pedunculis spica gemina terminatis. *Hall. En. Helv. p. 92. n. 1.*

L. vulgare pilosum, anfragosum et repens. *Dill. musc. p. 441. Tab. 58. f. 1.*

Muscus terrestris, repens, pediculis foliaceis, binis clavis in altum se erigentibus. *Plukenet. Almag. Bot. p.*

258. *Tab. 47. f. 8. Moris. Hist. Ox. III. p. 623. n. 2.*

Seet. XV. Tab. 5. Ser. 1. f. 2.

Icon Oederi Flor. Dan. Tab. 126. Blackwell. ed. Trew.

Tab. 535.

OFFICIN. Musci clauati herba, Lycopodii Semen, Sulphur Lycopodii dictum.

gemeiner zweifolbiger Bärlapp; gemeine Wolfsklauen; Barentappen; S. Johannis Gürtel; Gürtelkrant. Neunheil. Druten-Fuß. Teufelsklau. Löwenfuß. Weintraut.

H. in sylvis densioribus; v. g. circa die Bruck; im Göttinger Walde, circa Adelipfen, Reinhausen et alibi copioso.

Surculi pedales, bipedales, quin aliquando ad duarum trium, quatuor vlnarum longitudinem protensi, ramosi, passim radiculis ligneis, duris, longis, fibrosis, glabris ad terram affixi. Rami patentes, remoti, repentes, inferiores denuo in minores ramulos, plerumque ad dichotomiam subdiuisi; supremi simpliciores. Folia dense imbricata, arcte caules ramosque cingentia, lanceolata, linearia, acuminata, apice introrsum recuruo, et longo albo pilo terminata; ad inferiores furculos laxiora, versus apices vero, et ramulorum iuniorum gemmas densiora, in quarum summitate densissima sunt, et ob pilorum rufescentium, apice candidorum copiam, pedem ungulae lupi, aut vrsi referunt. Substantia foliorum rigida, glabra, nitentia. Color e pallide luteo viridis.

Passim circa aestatem, ex apice ramulorum prodeunt pedunculi crassi, subnudi, et squamulis inordinatis tantum

tantum oblongi, articulati, recti, rigidi, (lignae quasi substantiae) bi, tri, quadrivnciales, superne bifidi, spicas duas cylindricas floriferas gerentes. Spicae istae e copiosis constant squamulis, siue glumis imbricatis, ovato lanceolatis, acutis, pilo terminatis, ad marginem laceris, crenatis; in iunioribus immaturis, arcte appressis; in adultioribus patulis, repandis, e luteo viridescentibus: quarum singulae continent capsulam reniformem, luteam, elastice per maturitatem disrumpentes, et pollen luteum, leuissimum, (sic vt aqua irrorari aegerrime se patiat) ad candelam afflatum, cum leui strepitu inflammabile, fundentes.

Pollen ob insignes virtutes medicas, adhibetur externe adpersum, ad puerorum intertriginem, ad vulnera, ad papillarum fissuras; interne ad tabem, diarrhoeam, dysenteriam, ischuriam, tormina puerorum, nephritidem. Decoctum herbae ex aqua, vel cereuisia a Polonis adhibetur vt specificum aduersus plicam, calide cum linteis, bis terue applicatum capiti, quo fotu spasmi et dolores sopiuntur, cutis, arida emollitur, et pori obstructi referantur. Vinosum vero decoctum ad inflammationes et dolores sistendos vtile. Ipsam herbem, in mensium fluxu nimio, doloribus et strangulationibus vterinis, cingulum ex ea faciendo (vnde nomen *Gürtelkraut*) conferre refert DILLENIVS. l. c. vid. Ill. VOGELII Instit. mater. medic. p. 114 et 173. Pollinis vsus quoque frequens in officinis, ad pilulas gummosas laeuigandas, et earum conglutinationem impediendam. Ad artificiales ignes etiam vsurpatur. Herba suspensa in vase, vinum corruptum restituit. „Sueci stoeas inde faciunt, ante ianuas deponendas, ne conspurcantur pavimenta.,, vid. Ill. LINNAEI *Flor. Suec. ed. II. p. 375.*

LYCOPODIVM *annotinum*.

Lycopodium foliis sparsis, quinquefariis, subserratis, furculis annotino-articulatis, spicis terminalibus, glabris erectis. *Linn. Sp. Pl. p. 1566. n. 11. Scop. Flor. Carn. p. 164. n. 2.*

L. ramis prolixis, spicis sessilibus, foliis linearibus, subserratis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 21. n. 1720.*

L. caule erecto, spica glabra terminato. *Hall. En. Helv. p. 93. n. 2.*

L. elatius juniperinum, clavis singularibus sine pediculis. *Dill. musc. p. 455. Tab. 63. f. 6.*

Muscus clauatus, juniperinis foliis reflexis, clavis singularibus sine pediculis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 624. n. 3. Sect. XV. Tab. 5. Ser. 1. f. 3.*

Muscus terrestris repens, clavis singularibus erectis. *Plukenet. Almag. Bot. p. 248. (loco 258.) Phytogr. Tab. 205. f. 5.*

Icon Oederi Flor. Dan. Tab. 127.

Wacholderblättriger Bärclapp.

H. passim in sylvis densis, et montibus altis: in sylva pone Adelipsen versus Schoninghen, et in monte Moosberg inueni; ibidem et circa Neubaus legit D. HENZEN conciuus et amicus; in sylua pone Reinhausen D. RÜLING.

Caules

Caules paris cum praecedente longitudinis, et eodem etiam modo repentes, sarmentosi, sed rami longiores, in plures minores, dichotomos, inaequales, vagos ramulos subdivisi, erecti. Folia laxiora quam in praecedente, lanceolata, acuminata, sed non in pilum terminata; plana, margine subserrato, nervo in medio distincta, decurrentia; substantia rigida et colore nitente, imprimis in iunioribus vbi obscurius virent, juniperinis admodum similia, in annosioribus e viridi lutescentia. Directionem eorum admodum variam observaui, nunc enim surrecta, patula, nunc horizontalia, nunc tota reflexa vidi, et quasi deponentia. Sicca folia tantam duritiem acquirunt, vt apicibus eorum fortius cuti applicatis, eam penetrent.

Extremitates furculorum et ramulorum tumidiores, e densis foliis compactis, nunc novos iuniores ramusculos dichotomos, nunc spicas emittunt praecedenti similes, sed absque omni pedunculo, et perfecte sessiles, squamae vero, siue glumae, paullo maiores, latiores sunt, triangulares, et rigidiores. Floret aestate.

Ad colorem flauum tingendum adhiberi potest.
vid. Linn. Syst. nat. ed. 12. p. 697. n. II.

LYCOPODIVM *Selago.*

Lycopodium foliis sparsis, octifariis, caule dichotomo, erecto, fastigiato, floribus sparsis. *Linn. Sp. Pl. p. 1565. n. 9. Scop. Flor. Carn. p. 165. n. 5.*

L. spica sessili, foliis linearibus, lanceolatis, confertis.
Hall. Hist. Helv. T. III. p. 19. n. 1716.

Selago foliis et facie abietis. Hall. En. Helv. p. 94. n. I.
Selago vulgaris, Abietis rubrae facie. Dill. musc. p. 435. Tab. 56. f. I.

Muscus

Muscus erectus abietiformis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 624.*
n. 9. Sect. XV. Tab. 5. Ser. 2. f. 9.

Icon *Oederi Flor. Dan. Tab. 104.*

Zannenförmiger Bärlapp.

*H. varius apud nos: circa die Heger-Kirche in sylua
 pone Adelipsen versus Schoningen D. HENZEN inue-
 nit; ego in monte Moosberg: copiosissime prouenit in
 montibus Bructero et Weisner.*

Caules erecti, ramosi, variae longitudinis, a tri-
 bus, quatuorue vnciis, ad spithamam, duri, sublignosi,
 inferne vna trunco, in perplures radices fibrosas, albi-
 cantes, dichotomas fisso, terminati; superne in ramos
 dichotomos, (qui pari ratione iterum in minores abeunt)
 ad angulum acutissimum dispositos, diuisi, vndique den-
 sis foliis tecti. Folia lanceolata, acuta, imbricata, le-
 uiter concaua, membranacea, rigida, glabra, nitentia,
 (in siccitate quasi vndulata) margine cartilagineo, sub
 lente crenato, aut serrato, sensim in acutum inacro-
 nem pungentem decresciente; ad ramos, et versus ex-
 tremitates imprimis, densissime congesta, surrecta, im-
 bricata, sibi arcte appressa, versus radicem laxiora, et
 magis patula. Color e pallide luteo viridis.

In alis foliorum, imprimis versus summitates capsu-
 lae locantur complanatae, reniformes, luteae, duabus
 laminis constantes, instar testarum ostreae horizontaliter
 dehiscentes, et puluerem tenuissimum pallide luteum fun-
 dentes.

Gemmas a variis Auctoribus obseruatas, in meis haud
 vidi,

vidi, de quibus Ill. HALLERVS sequentia habet: „In iisdem superioribus alis, mistae quasi cum capsulis gemmae, primum a SCHEVCHZERO detectae, inde a DILLENIO et LINNAEO, denique a Cl. OEDERO repetitae, in quibusdam exemplis abunde sedent. Foliis fiunt rigidis, durisque, tum breui quasi stipula et lata, porro maximo, ovato lanceolato, concauo foliolo, et quatuor foliis lanceolatis, fere incurvis. Haec quinque folia caueam intercipiunt. Nihil fructus simile, aut tubae, neque adeo haec corpuscula a me pro fructu, floreue habentur femina. Floret medio aestatis.,

Viribus purgandi, vomitum mensesque ciendi, foetum pellendi, vermes uecandi, sub forma decocti, commendatur. Aduersus pediculos etiam vsurpatum est, sed caput inde grauius affectum. Equorum quoque pharmacum vsitatissimum.

LYCOPODIVM *alpinum*.

Lycopodium foliis quadrifariam imbricatis, acutis, surculis erectis dichotomis, spicis sessilibus teretibus.

Linn. Sp. Pl. p. 1567. n. 15.

L. spicis sessilibus, foliis lanceolatis, adpressis, utrinque ternatis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 21. n. 1719.

L. Sabinae facie. Dill. musc. Tab. 58. f. 2.

Icon Oederi Flor. Dan. Tab. 79.

Friechender Cypressenförmiger Bärlapp.

H. rarius in monte Moosberg, circa Neuhaus, copiosius in monte Bructero.

Caules

Caules repentes horizontales, ad pedis, immo duorum triumue longitudinem protensi, subnudi, (squamus imbricatis, laxis, tantum vestiti) per iutervalla aliquot vnciarum, ramos emittentes fasciculatos, in crebros minores, dichotomos, ramulos foliosos, inaequalis longitudinis subdiuisos. Folia quadrifaria serie disposita, arcte imbricata, ovato lanceolata, incurua, acutissima, rigida, sursum directa, in inferioribus ramulis, alterne opposita, superiorem paginam eorum triangularem, inferiorem planiorem reddunt; in summis ramulis crassiora, arctius imbricata, senario versu (foliolis tribus sibi oppositis, inter quorum interstitia, ad summum apicem, iterum tria foliola opposita locantur) disposita, eosdem teretes, vel potius multangulos faciunt, et peculiarem quandam concatenulatam faciem conciliant. Color foliorum laete viridis, per aetatem lutescens, maridorum cinericeus, aut candidus.

E summis ramulorum apicibus surgunt spicae simplices, sessiles, teretes, e latis squamulis, ovato lanceolatis, acutis, membranaceis, margine crenatis, imbricatis, (sed laxius quam in praecedentibus) in quarum alis capsulae locantur luteae, maiores quam in praecedentibus. Floret circa aestatem, sed rarius.

CLASSIS III. PLANTARVM
CRYPTOGAMICARVM.*F I L I C E S.*

Classis ista naturalis, quae quidem ob defectum variorum floris perfectioris attributorum, etiam ad Cryptogamicas pertinet plantas; propius tamen iam ad perfectiores appropinquat, quam illa *Algarum* et *Muscorum*. Scilicet veris distinctis feminibus se propagant **FILICES**, ut per summorum Virorum, **TOVRNEFORTII**, **MORISONI**, **STAEHELINI** experimenta euictum est, qui ex disseminato feminali polline novas prodire viderunt plantas,

Sequentia quoad praecipuas earum qualitates generales notanda veniunt; Plurimae sunt suffrutices, non desunt tamen etiam quaedam annuae, et arborecentes. Maxima pars exterarum et calidiores regiones Indiae vtriusque incolit; pauciores Europaeae, quarum aliquae ad usus medicos adhibentur. Amant praecipue obscura, umbrosa sylvarum loca, et frequentissime in spongiosa, saxa lapidesque antiquorum murorum interiacente terra, crescere gaudent.

E radice firma, sublignosa surgunt frondes foliaceae, solitariae, aut plures, cauliculo in-nitentes, qui proprie *Stipes* vocatur, satis longo, in plurimis triquetro, interius sulcato, inferne squamulis furfuraceis, marcidis, imprimis in iunioribus obrito, per aetatem enim in quibusdam decidere solent.

Frondes nunc ex vno simplici folio, integro, (*Frondes simplicissimae*) vel in lobos plures, (*Frondes lobatae*) aut pinnulas basi cohaerentes dissecto; (*Frondes pinnati fidae, subpinnatae*) nunc e pluribus foliis, quae pinnae dicuntur, constant, (*Frondes pinnatae*) nunc in minores frondes laterales lobatas, aut pinnatas ramorum instar diuisae, (*Frondes sub-bipinnatae, semi-bipinnatae, bipinnatae*) quae iterum aliquando in minores lobos aut pinnulas distinctae sunt, (*Frondes compositae*) et vltius repetita ramificatione (*Frondes decompositae, supradecompositae*). Noui atque tenelli surculi harum frondium, vbi e terra prorumpunt, spirali modo in glomerem intro reuoluti sunt, successu temporis demum se explicantes.

Fructificationes e copiosis constant bacculis, siue potius capsulis, quae vel in auersa parte loborum aut pinnarum frondis collectae, sub forma punctorum, aut linearum distinctarum; vel totam occupant posteriorem partem,
siue

siue dorsum frondis; * vel peculiarem spicam sub nomine *Scapi florigeri* formant, proprio pedunculo eleuatam. Sunt etiam quae praeter frondes foliosas, ad basin earum, eque centro medio protrudunt singulares quasdam frondes fructificantes, a foliosis structura et habitu diuersas.

Capulae si accuratius per lentem vitream examinantur, subrotundae sunt, petiolatae, in quibusdam peculiari *inuolucro*, vel squama lata, (*Peltae* aut *disci* nomine insignita) calycis quasi vices subeunte, exceptae. Plurimas capulas *annulus elasticus* ambit.

Annulus iste articulatus, ** e paruis quasi

* Hinc nominis patet ratio, cur *Tergiferae*, *Dorsteriae*, *Epiphyllispermae*, *Hypophyllispermae* vocatae sunt Filices.

** Optime, etiam per vitrum haud adeo conuexum; *annulus* conspici potest in *Asplenio*, *Ruta muraria* L. et *Acrosticho septentrionali* L. Icones praecipuas hic recenseo: in *Acrosticho* OEDERI Elem. bot. Tab. 13. f. 137. in *Thelypteride*, SCHMIEDEL. Icon. Tab. XIII. f. 9. 10. 13. 14. vbi simul etiam dipingitur ruptura capulae, f. 16. 17. 18. TOURNEFORT. Inst. rei herb. Tab. 312. 317. 318. in *Polypodio vulgari*, von GLEICHEN Microscopische Untersuchungen. p. 24. Tab. III. f. 2. 3. in *Ruta muraria*: p. 29. 31. Tab. XXIV. f. 4. II. depicta sunt

si globulis, sphaerulas precatorias (Nosenfranz, Paternoster) similitudine referentibus, constare apparet, propius autem et sub microscopio maiori aspectus, triangularibus alterne se excipientibus valuulis, siue rugis, praeditus, quae vi sese contrahendi et expandendi donatae, nunc propius ad se inuicem accedunt, nunc recedunt. Arcte amplectitur capsulam annulus, qua arescente liberatur, et vim elasticam, e flexura circulari in rectitudinem sese extendendi, exserit, quo facto capsula rumpitur, et alterna contractione et extensione annuli exinanitur †.

Semina vel solitaria, vel plura, quin ob multitudinem vix distinguenda, in quavis capsula contenta, sub forma tenuissimi pollinis colorati. Post explosionem seminum annulus iterum aliquantum contrahitur, et capsula ad pristi-

etiam semina: in *Lingua ceruina*, du HAMEL Physique des arbres. p. 289. Tab. II. Lib. III. f. 288. 289. 290. et in *Filice mari* ead. Tab. f. 293. 294. ubi simul quoque accuratissime depingitur disruptio capsularum: in *Filice arboreo pinnulis dentatis*, (*Polypodio arboreo* Linn. Sp. Pl. p. 1554. n. 55.) PLUMIER Filic. Americ. p. 3. Tab. 2.

† Vis ista extensionis et contractionis post aliquot annos superstes in siccatis speciminibus durare, et obseruari solet, praesertim si aqua tepida capsulae irrigantur.

pristinam quodammodo redit formam. Dehiscentia capsularum vel horizontalis, vel perpendicularis.

Quod ad interiores FILICVM qualitates, saporem nempe, odorem, viresque medicas pertinet, sequentia praecipua momenta in iis observata sunt:

Sapor varius, quarundam austerus, subadstringens, amaricans, aliarum subdulcis, plerarumque nauseosus.

Odor permultarum specierum, praecipue recentium gravis, nauseosus, foetens, sensus breui obstupefaciens, cephalalgiam producens. Hinc non mirum, ob summum hoc quarundam specierum narcoticum principium, dirissima symptomata, lethargum mortemque subsequuta esse iis, qui copia, recentium imprimis frondium, collecta, loco straminis vti fuerunt.

Vi medica generali gaudent pituitam incidendi, et eliminandi, nervorum sensibilitatem nimiam infringendi et placandi; sed in hac indicatione, ubi nempe anodyna vel antispasmodica requiruntur, recentibus utendum. Hinc speciatim adhibentur in morbis pituitosis, ut asthma, ob expectorationem facilitandi, hydrope incipiente, ob viscidum lentumque serum corrigendi, et urinam pellendi virtutes. Quae amaro principio praeditae sunt, conveniunt

niunt, vbi amara et simul narcotica requiruntur, vt contra vermes, quibus necandis et expellendis efficacia obseruata sunt. Optima eas exhibendi forma est Apozematis.

Incaute in rhachitide et podragicis affectionibus externe applicatae, valde noxae fieri possunt; et prostant exempla infantum rhachiticorum, quibus recentes frondes cubilibus instrauerunt, inde lethali somno correptorum.

Experimentis variis probatum est, FILICES insignem copiam salis alcalini praebere, rebus oeconomicis variis, imprimis parando vitro, sapone coquendo utilis, vt alios plures taceam vsus, haud leuioris momenti.

OPHIOGLOSSVM. LINN. Gen. n. 1171.
TOVRNEFORT. Inst. rei herb. Gen. II. p. 548.
HALL. Hist. Helv. T. III. p. 5. En. Helv. p. 131. WERNISCHECK. Gen. n. 1138. GLEDITSCH
apud BOEHMER. Flor. Lips. p. 298.

Frons spicata. Spica † pedunculata, lingulata, articulata, disticha, articulis siue cellulis vtrinque numerosis; capsulis unilocularibus, membranaceis transuersim dehiscentibus. Semina ouata, minima instar pulueris.

† Hanc Ill. HALLERVS in *Hist. Helv. l. c. Scapum*
flori-

florigerum vocat, *aphyllum*, aliquando *bifidum* aut *trifidum*. *Axis* huius *scapi*, ad *pectinis* modum, *apophyses* utrinque *transuersas* exigit, *superius* *excauatas* et *inferius*, quae *recipiunt capsulas seminales*, quarum *duplex* ad *scapum* *ordo*. *Seminales* *particulae subrotundae*.

OPHIOGLOSSVM *vulgatum*.

Ophioglossum fronde ouata. *Linn. Sp. Pl.* p. 1518. n. 1.

O. folio vnico ouato, lanceolato, obtuso, *Hall. Hist.*

Helv T. III. p. 5. n. 1685.

O. vulgatum C. B. *Morif. Hist. Ox. III. p. 595. Sect.*

XIV. Tab. 5. Ser. ult. f. 1. Plumier, Filic. Americ.

p. XXVI. Tab. B. f. 5.

Ophioglossum Matthioli. p. 231. (*) *Hall. En. Helv. p.*

131. n. 1. Hall. En. Gotting. p. 1. Blackwell. Ed. Trew.

Tab. 416.

Icon Oeder. Flor. Dan. Tab. 147.

OFFICIN. Ophioglossi herba.

gemeine Natterzungen. Schlangenzungen.

H. apud nos parcius; reperiuntur tamen rara eius specimina in prato circa Hessendreich, in valle irrigua.

T 4

Altitu-

(*) Intelligenda semper vbi MATTHIOLVM citatum hic inueniet Lector, editio germanica, cui titulus: *Neu Kräuterbuch - - - gedruckt zu Prag durch Georg Melantrich von Aventin. 1563. fol.*

Altitudine admodum variat, a digiti, ad spithamæ immo pedis longitudinem. E radice crassiore, fibrosa, fusca, fibris subluteis surgit cauliculus, ad aliquam distantiam nudus, qui superius fronde siue folio vnico ovato, oblongo, subearnoso, glabro, (aliquando nervoso, nervis fere parallelis, et passim anastomosantibus) erecto, duas uncias longo, vnam lato, cingitur; dein terminatur in scapum fructificantem longissimum (folio duplo, quin triplo aliquando maiorem) teretem, glabrum, sensim sensimque gracilesceniem, et spicam eleuantem subulatam compressam.

Spica ista linguae serpentis similis, uncialis, biuncialis, ab initio virens, gracillima, articulata, (articulis arcte contiguis, sic vt imbricata appareat) dein sensim rubens, et crassior euadit, articulisque dehiscentibus pectinatam formam acquirit. Variat spica bifida et trifida. Floret mense Maio, et Iunio.

Vires siccandi ei adscribuntur a MATTHIOLO, TRAGO aliisque; externe ad recentia vulnera consolidanda, et vlcera purganda, aduersus tumores calidos, ad sphacelum impediendum, si illinatur cum axungia porcina, ad ophthalmiam rubro vino incocta. et interne contra hæmoptysin, et fluorem album adhibita est olim.

OSMVNDA LINN. Gen. n. 1172. TOURNFORT. Inst. rei herb. Gen. I. p. 547. Tab. 324. HALL. Hist. Helv. T. III. p. 6. En. Helv. p. 130. SCOPOL. Flor. Carn. p. 171. WERNISCHECK Gen. n. 1140. GLEDITSCH apud BOEHMER. Flor. Lips. p. 297.

Frons

Frons variae figurae. Spica floralis ramosa, pedunculata, vel sessilis, cui racemi instar vtrinque adhaerent capsulae globosae, oblongae, uniloculares, bivalves, secundum longitudinem dehiscentes. Annulus dimidius eas capsulas succingit, intus multa semina minima, pulverulenta, sub lente ouata.

OSMVNDA *Lunaria*.

Osmunda scapo caulino solitario, fronde pinnata, solitaria. *Liun. Sp. Pl. p. 1519. n. 2. Scop. Flor. Carn. p. 172. n. 1.*

O. foliis pinnatis, flabelliformibus, lunatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 6. n. 1686.*

O. foliis lunatis. *Hall. En. Helv. p. 130. n. 1. En. Gott. p. 1.*

Lunaria Blackwell. Ed. Trew. Tab. 420.

Lunaria botrytis. Matthiol p. 375.

Icon Oederi Flor. Dan. Tab. 18.

Pleine Mondraute.

H. in collibus siccis apricis, v. g. auf dem Einzelberge, circa Grossen Schneen abunde, parcius circa die Lith, prope Bouenden, circa Lütgenlengden.

E radice fibrosa surgit cauliculus biuncialis, digiti ad duorum digitorum longitudinem et ultra aequans, inferne nudus, deinde frondem emittens siue folium unicum, pinnatum, pinnis latis, alternis, parium 3, 4, 5, 6, ad

6, ad 8, vltima impare minore, subreniformibus, vel flabelliformibus, fibris radiatis, distinctis, succulentis, crassiusculis.

Circa originem folii, prodit e cauliculo continuatus scapus floralis vnicus, vncialis, biuncialis, ramosus, ramis plerumque oppositis, tribus, quatuor, ad sex septemue et plures in vtroque latere, simplices, vel iterum subramosi; quibus racemi instar affixae sunt capsulae subrotundae, serie duplici dense congestae, ab initio virides, per maturitatem luteae, et late ab apice versus basin hiantes. Floret mense Maio et Iunio.

Variat fronde ramosa, siue foliis pluribus in aliquot lacinatas pinnas diuisis.

STRVTHIOPTERIS HALL. En. Helv. p. 132. Hist. Helv. T. III. p. 6. GLEDITSCH. apud BOEHMER. Flor. Lips. p. 296. SCOPOL. Flor. Carn. p. 168. *OSMVNDAE* species. LINN. Sp. Pl. p. 1522.

Frondes aliae steriles, latiores; aliae fructificationes gerentes, angustiores, pinnis totis capsulis floralibus in superficie interna obstitis; in iuniori planta duae tantum lineae sunt parallelae, toti longitudini pinnae, in quas capsulae florales coaceruantur. HALL. l. c.

Inuolucrum commune vix vllum, vel breuissimum. Capsulae vniloculares, membranaceae,

naceae, tenuissimae. Semen vnicum, globosum. GLEDITSCH.

STRUTHIOPTERIS *Spicant*.

Struthiopteris frondibus sterilibus pinnatifidis, pinnulis densis, oblongis, falcatis; fructificantibus maioribus, laxius pinnatis, angustioribus.

Struthiopteris. *Hall. En. Helv.* p. 132. n. 1. *Hist. Helv. T. III.* p. 6 n. 1687. *Scop. Flor. Carn.* p. 168. n. 1.

Struthiopteris foliis feminalibus planis. *Hall. En. Gott.* p. 2.

Osmunda (*Spicant*) frondibus lanceolatis, pinnatifidis; laciniis confluentibus, integerrimis, parallelis. *Linn. Sp. Pl.* p. 1522. n. 16.

Lonchitis aspera. *Matthiol.* p. 374. *Camerar. Epitom.* p. 665.

Spicant Tragi, et Germanorum. *Rupp. ed. Hall.* p. 346. *Icon Oederi Flor. Dan.* Tab. 99.

Kamm: Faren. Spicant. Kraft: Faren, groß Milzfraut. *H. circa Waake, Hardeggen, in sylvis Sollingensibus, v. g. inter Cammerborn et Nienover, in monte Bramburg, et hercynicis abunde.*

Frondes steriles plures ex vna radice fibrosa, in orbem dispositae, semierectae, aut reclinatae, spithamae, immo pedis longitudinem aequantes, *Polypodio vulgari* similes, simplices nempe, pinnatifidae, pinnis densis, alternis, lanceolatis, oblongis, 2 lineas circiter latis,

latis, integerrimis, cum nervo confluentibus, sursum curvis, mediis maximis, (uncialibus, sesquiuncialibus) supernis et infernis brevioribus, nervosis, margine cartilagineo, subcrenato, retrorsum flexo. Nervus medius, siue stipes, inferne fuscis squamulis obsitus.

E medio centro harum frondium surgunt frondes fructificantes aliae, etiam pinnatae, at duplo illis longiores, graciliores, atro purpureae, pinnis laxis alternis, lineam latis, mediis quoque longioribus, superioribus et inferioribus sensim decreascentibus, capsulis refertis. Istae capsulae dense coagmentatae, duas lineas distinctas, marginibus parallelas efformant, et ab initio coloris sunt lutescentis, sensim per maturitatem fusci. Clar. GLEDITSCH observavit, frondes steriles perennes, fructificantes autem annuas esse.

Vires vulnerariae ei adscribuntur. Cerevisiae additur a quibusdam, referente Ill. HALLERO in Rupp. Flor. len. l. c.

PTERIS LINN. Gen. n. 1174. WERNISHECK Gen. n. 1147. **PTERIDIUM** GLEDITSCH. apud BOEHMER. Flor. Lips. p. 295. **FILIX**. HALL. Hist. Helv. T. III. p. 7. En. Helv. p. 132.

Frons simplex, vel diuisa. Fructificationes digestae in lineam, subtus cingentem marginem frondis,

Inuo-

Inuolucrum ab epidermide breuissimum, vniualue, membranaceum, in vno latere dehiscens, et pro pinnularum situ et figura varie inflexum, elatum, et in longitudinem extensum. Capsulae globosae vniualues, membranaceae. Semen vnicum, subrotundum, exiguum. GLED. l. c.

Differt hoc Genus a pracedente, cui quoad dispositionem capsularum in lineas margini pinnularum parallelas, simile est, praecipue in hoc momento, quod non peculiares frondes fructificantes a sterilibus diuerfas proferat, sed omnes pinnulae frondium in auersa parte capsulis foetae sunt.

PTERIS aquilina.

Pteris frondibus supradecompositis, pinnis linearibus: infimis basi pinnato dentatis: terminalibus longissimis. *Linn. Sp. Pl. p. 1533. n. 13.*

Pteridium fronde decomposita, foliolis pinnatis, lanceolatis, imparibus, minoribus. *Gleditsch. ap. Boehm. Flor. Lips. p. 295. n. 713. Scop. Flor. Carn. p. 169. n. 1.*

Filix foliis triplicato pinnatis, pinnis neruosis, integerrimis, vltimis lanceolatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 7. n. 1688.*

Filix pinnis ramorum pinnatis, pinnulis non dentatis. *Hall. En. Helv. p. 132. n. 1. En. Gott. p. 2.*

Filix ramosa maior, pinnulis obtusis, non dentatis. C.B. *Plumier. Filic. Americ. p. XXIII. Tab. A. f. 1.*

Filix

Filix femina. *Matthioli p. 539. Blackwell. ed. Trew. Tab. 325.*

gemeine ästige Flügel-Faren. Groß Farnkraut. Farnkraut Weiblein. Jesus-Christ Wurzel.

H. in ericetis, et locis sylvarum asperis circa Waake, copiosissime vero in hercynicis, et sylvis Sollingenibus, imprimis circa Neuhaus, versus montem Moosberg.

Maxima est nostrarum Filicum. Caules enim siue stipites pedales, ad bi, tri, quatuor, quinque pedalem altitudinem crescunt, ramosi, pinnati, ramis iterum ramosis, pinnatifidis. Pinnulae foliaceae variae figurae, oblongae, basi cohaerentes, alternae, aut oppositae, lanceolatae, obtusae, nervosae, durae, integerrimae, aut obtusissime crenatae; supremae impares longiores, latioresque, et cuspidi lanceae similes, in vnum folium semipinnatum inaius confluentes (vt Ill. HALLERVS se exprimit) aliquando alatae, vel auriculatae. Petioli siue nervi frondis profunde fulcati, angulati, tenaces.

Fructificationes ad margines pinnularum lineas parallelas asperas, tomentosas, rufescentes, formant. Capsulae peculiari membranaceo inuolucro superne tectae. Margo pinnularum in foecundis valde reuolutus, capsulas fere includens. Floret aestate.

Radix crassa, flaua, quae transuersim oblique secta crucis, siue vt alii volunt aquilae imperialis (vnde nomen *triuiale* L.) refert imaginem, tam profunde repit sub terra, vt vix, ac nonnisi summo labore aratro extirpari possit haec agricolis inuisa planta.

Variae medicae radices, quæ saporis est viscidæ, subamari, nauseosæ, extolluntur virtutes, imprimis contra vermes, immo ipsam taeniam, ad obstructions viscerum soluendas, in decocto vinoso, et contra calculi dolores; ad ambusta succus eius confert mucilaginosus, ut specificum, sic quoque aqua destillata laudatur. Semina ulceribus inspersa ea exsiccant. Recens pueris rha-chiticis substernitur.

Vsus oeconomicus varius: ob vim adstringentem decocto huius Filicis utuntur, ad coria præparanda, quæ Corbuan appellantur. Sal ad saponem coquendum, et vitra ductilia illa paranda adhibetur, quæ Gallis in frequenti usu sunt, et *fougere* appellantur. Plura de his vide ap. HALLER. *Hist. l. c.*

ASPLENIVM LINN. Gen. n. 1178. HALL. *Hist. Helv. T. III. p. 8. En. Helv. p. 134. WERNISCHECK. Gen. n. 1145. GLEDITSCH apud BOEHMER. Flor. Lips. p. 289. SCOP. Flor. Carn. p. 167. TOURNEFORT. Inst. rei herb. Gen. VIII. p. 544. Tab. 318. LINGVA CERVINA Gen. IX. p. 544. Tab. 319. 320. PHYLLYTIS. GLED. ap. BOEHM. Flor. Lips. p. 290. SCOP. Flor. Carn. p. 71. TRICHOMANES TOURN. I. R. H. Gen. III. p. 539. Tab. 315. GLED. ap. BOEHM. Flor. Lips. p. 291. SCOP. Flor. Carn. p. 167. RUTA MYR-
RARIA*

RARIA TOURN. I. R. H. Gen. V. p. 541.
 Tab. 817. ACROSTICHUM GLED. ap.
 BOEHM. Flor. Lips. p. 288. SCOP. Flor. Carn.
 p. 167.

Frons integra aut varie diuisa. Fructificationes in lineas rectas, disco frondis subiectas, oblique decurrentes, siue vt Ill. HALLERVS describit, ad acutum cum neruo folii angulum dispositae, vt versus eum conuergant.

Inuolucrum aliis ab epidermide, persistens, per longitudinem, aut a latere dehiscens, aliis vix vllum. Capsulae subgloboae, vniloculares. Semen vnicum in quauis capsula, subrotundum, exiguum. GLED.

* *Fronde simplici Linn. Sp. Pl. p. 1536. Foliis indiuisis. Hall. Hist. Helv. T. III. Ord. IV. p. 10. Foliis integris. Hall. En. Helv. Ord. I. p. 134. Lingua ceruina. Tournef. l. c. Phyllitis. Gled. Scop. l. c.*

ASPLENIUM *Scolopendrium.*

Asplenium frondibus simplicibus, cordato lingulatis, integerrimis, stipitibus hirsutis. Linn. Sp. Pl. p. 1537.
 n. 3.

A. frondibus linearibus integris, basi cordatis inflexis,
 petiolis

petiolis hirsutis. *Hall. En. Helv. p. 134. n. 1. En. Gott. p. 2.*

A. petiolis hirsutis, folio longe lineari lanceolato, integerrimo, circa petiolum excisso. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 10. n. 1695.*

Phyllitis. *Matthioli p. 349. Camerar. Epit. p. 579. Gleditsch. apud Boehm. Flor. Lipf. p. 290. Scop. Flor. Carn. p. 171. n. 1.*

Lingua ceruina Phyllitis. *Blackw. ed. Trew. Tab. 138.*

Lingua ceruina officinarum. C. B. *Plumier. Filic. Americ. p. XXXIV. Tab. A. f. 4. Tournef. I. R. H. Tab. 319.*

Lingua ceruina vulgaris. *Morif. Hist. Ox. III. p. 556. n. 1. Sect. XIV. Tab. 1. Ser. 1. f. 1.*

OFFICIN. Scolopendrii herba.

gemeines Hirschzungen Wllztraut, Hirschzungen.

H. passim in montosis, asperis, saxosis opacis locis; circa Reinhausen, Niedek; in monte Bramburg, in sylvis Sollingensibus, circa den Steinkrug; etiam passim in fontibus et puteis muro inclusis, et ad muros aqua irriguos.

E radice dura, sublignosa, fibrosa, plures surgunt frondes simplices, lanceolatae, linguaeformes, membranaceae, subpellucidae, digiti ad pedis altitudinem aequantes, vnciam, duas, ad tres latae, nervosae, nervis transuersis parallelis, acuto angulo versus stipitem medium directis, margine leuiter undulato, circa basin stipitis cordata, siue semilunari sectione excissae, coloris

pallide e luteo viridis. Stipes angulatus, fulcatus, et per totam longitudinem frondis, copiosis fuscis nitentibus squamulis hirsutus.

Circa aestatem prorumpunt in aversa frondis parte lineae fructificantes, vtrunque secundum nervos obliquos, transversos, parallelos, sub epidermide decurrentes, fuscae, ab initio graciles, et inuolucro membranaceo, pallido, pellucente, nitente obductae, quo recta per medium linea dehiscente per maturitatem, capsulae tumidae prorumpunt, copiosae, fuscae, semina exigua, atrofusca fundentes.

Frondes ramosae, siue folia per aetatem fissa reperiuntur (hinc plures varietates polyschidae) et crispantur; quarum praecipua sunt auctorum Synonyma sequentia :

- β. Phyllitis crispa. *I. Baub. Hist. III. p. 757.*
- γ. Phyllitis siue lingua Ceruina maxima, undulata, folio auriculato per basin. *Plukenet. Phytogr. Tab. 248. f. 1. Moris. Hist. Ox. III. p. 557. Sect. XIV. Tab. 1. Ser. 1. f. 5.*
- δ. Lingua ceruina, medio folii obtusi nervo in aculeum desinente. *Moris. Hist. Ox. III. p. 557. n. 9. Sect. XV. Tab. 1. f. 9.*
- ε. Lingua ceruina multifido folio C. B. *Moris. Hist. Ox. III. p. 557. n. 2. Sect. XIV. Tab. 1. Ser. 1. f. 2. Tournef. I. R. H. Tab. 320.*
- ζ. Phyllitis s. Lingua Ceruina crispa, folio multifido ramosa. *Plukenet. Phytogr. Tab. 248. f. 2.*

Phyl.

Phyllitis minor crispa, vno pediculo trifolia. *Morif. Hist. Ox. III. p. 557. n. 8.* Lingua ceruina ramosa minor, crispa, vno pediculo trifolio. *Seef. XIV. Tab. 1. Ser. 2. f. 8.*

Sapor subnauseosus, masticata herba et radix salinam ducit. Quod ad virtutes medicas pertinet, insignes laudes obtinuit, interne adhibitum in morbis chronicis, et affectibus hypochondriacis: ob vim saponaceam, pertinaces obstructions lienis resoluit, et coagula, in forma infusi vinosi, aut decocti cum vino, aceto vel ceruicia parati; hinc ad infusiones vulnerarias cum helueticis herbis, (*Schweizerthee, Gallstranf*) admisceri refert *III. HALLERVS.* Ad haemoptysin et sugillationes internas pro potu adhibetur. Rubro vino incocta herba, aduersus diarrhoeam et dysenteriam commendatur. Externe aqua cum herba decocta, culide ori detenta, dolores dentium tollit; prolapsam vulvam, gingivas cruentas, et alia similia oris vitia corrigit; vlcera sordida mundificat, vulnera consolidat, ad ambusta utilis est. A veterinariis quoque multum vsurpantur in quadrupedibus, diarrhoea aut dysenteria affectis, sub forma decocti.

*** *Fronde pinnata. Linn. Sp. Pl. p. 1538.*
Foliis pinnatis. Hall. Hist. Helv. T. III. Ord. II. p. 99. Pinnis coniugatis. Hall. En. Helv. Ord. III. p. 135. Trichomanes. Tournef. I. R. H. p. 539. Gled. ap. Boehm. Flor. Lips. p. 291. Scop. Flor. Carn. p. 169.

ASPLENIVM *Trichomanes*.

Asplenium frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1540. n. 19.*

A. fronde pinnata foliolis subrotundis crenatis. *Hall. En. Helv. p. 135. n. 3.*

A. foliis pinnatis, pinnis ovatis crenatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 9. n. 1693.*

Trichomanes fronde pinnata, foliolis subrotundis, crenatis. *Gled. ap. Boehm. Flor. Lips. p. 291.*

Trichomanes Matthioli p. 520. *Camerar. Epit. p. 925. Blackw. ed. Trew. Tab. 370. Scop. Flor. Carn. p. 169. n. 1. Tournef. I. R. H. Tab. 315.*

Trichomanes, seu *Polytrichum officinarum* C. B. *Plumier. Filic. Americ. p. XXVI. Tab. B f. 1. Moris. Hist. Ox. III. p. 591. n. 10. Sect. XIV. Tab. 3. Ser. I. f. 10.*

Leon Oederi Flor. Dan. Tab. 119.

OFFICIN. *Adianti rubri*, siue *Trichomanis herba*.

Stein-Milzkraut, Steinbrech, rother Steinbrech, Steinbruch, Abthon, Wiedertod, Stein-Farlen, Steins-Feder, rothe Mauerrauten.

H. ad muros et rupes ubique; v. g. circa Waake, Reinhausen copiose, occurrit quoque in puteis muris inclusis, e. c. im Reinhartsbrunnen.

E radicibus densissimis, fibrosis, fuscis, cauliculi f. stipites copiosi, in densos caespites collecti, simplices, ab initio virides teneri, dein rubentes, ultimo fusci nigricantes, splendentes, fragiles, simpliciter pinnati, digiti,

giti, immo semipedalem longitudinem, aequantes, sub-reclinati. Pinnulae, f. foliola, opposita vel alterna, ovata, subcrenata, dense congesta, nervosa, coloris pallide e luteo viridis.

Fructificationum lineae, in aversa pinnularum latere oblique versus harum nervulum medium directae, plerumque tres, quatuor, quinque, ab initio subluteae, et inuolucro pallido membranaceo tectae, quo per maturitatem disrumpente, insignis multitudo capsularum fuscarum propullulat, quae sese ultimo per totam inferiorem paginam foliorum expandunt, eamque dense obtegunt.

Elegantes huius speciei varietates vide apud Ill. HALLERVM l. c.

Quoad virtutes medicas par censetur *Adianto Capillo veneris*, et *Asplenio Ceterach*, ideo etiam inter sic dictas herbas capillares censetur. In tussi, affectibus pectoris et calculosis, melancholia, suppressione urinae, interne adhibitum est cum successu. In obstructionibus viscerum, cum hydromelide aut vino cocta, in ictero et spirandi difficultate; ob vim adstringentem etiam contra diarrhoeam utilis censetur.

*** *Fronde pinnata ramosa. Foliis repetito diuisis.* Hall. Hist. Helv. T. III. Ord. I. p. 8.
Pinnis ramosis. Hall. En. Helv. Ord. V. p. 136. *Ruta muraria.* Tourn. I R. H. p. 541.
Acrostichon. Gled. ap. Boehm. Flor. Lips. p. 288. Scop. Flor. Carn. p. 167.

ASPLENVM *Ruta muraria.*

Asplenium frondibus alternatim decompositis: foliis cuneiformibus crenulatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1541. n. 22.*

A. foliis laxè ramosis, ramis secundis trifoliis, superioribus semitrilobis, lobis rhomboideis, circumferratis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 9. n. 1691.*

A. ramis duplicato ramosis, pinnis ferratis aequalibus, et laxè dispositis. *Hall. En. Helv. p. 137. n. 7. En. Gott. p. 3.*

Acrostichum fronde ramose diuisa, foliis subrotundis, ternato connexis. *Gled. ap. Boehm. Flor. Lipsf. p. 288. Scop. Flor. Carn. p. 167. n. 1.*

Ruta muraria C. B. *Plumier. Filic. Americ. p. XXI. Tab. A. f. 3. Gleichen microscop. obs. p. 29. 31. Tab. 24. Tournef. I. R. H. Tab. 317.*

Filicula petraea foliis rutaceis, f. *Ruta muraria* C. B. *Morif. Hist. Ox. III. p. 585. n. 22. Sect. XIV. Tab. 5. Ser. 1. f. 22.*

Paronychia. *Camer. Epit. p. 785.*

Adiantum album. *Blackwell. ed. Trew. Tab. 219.*

Icon Oederi Flor. Dan. Tab. 190.

OFFICIN. *Rutae murariae*, f. *Paronychiae* herba.

kleines Rauten: Milzkraut, Mauerraute, Steinraute, weiße Steinraute, Frauenhaar.

H. in muris ubique, e. c. in muris urbis, ad templa, ad rupes circa Waake copiosissime.

Radices

Radices densae fibrosae. Frondes digitum circiter aequantes, aut etiam longiores, ramosae; ramis primis pinnatis vel potius lobatis, secundis trilobatis. Pinnulae siue foliola cuneiformia, vel rhomboidea, irregulariter incisa, aut dentata; coloris pallide graminei viridis: petioli virides sulcati, ad basin sulci.

Fructificationes in aversa parte lobulorum, in aliquot lineas radicas ab initio digestae, postea per maturitatem totam paginam occupantes. Capsulae numerosissimae, inniores subluteae, postea fuscae, globosae, nitentes, annulo distincto praeditae, semina fusca minima fundentes.

Variat foliolis longioribus, et acutioribus, crenatis.

Censetur inter herbas capillares. Viribus cum praecedente conuenit, sed debilius est: interim Cl. SCOPOLI contumacem hepatis obstructionem ex diuturno vsu foliorum in iusculis decoctorum sanata vidit. Laudatur caeterum vt tonicum et pectorale medicamen in tussi, asthmate, ictero, obstructionibus lienis, doloribus renum et vesicae, in scorbuticis affectibus, ad menses pellendos, sub forma decocti cum aqua aut vino, vel syrupi cum melle parati. Externe contritam herbam, et emplastri in modum applicatam, contra dolorem stomachi, quem extemplo sanet, imprimis viridem vtilem esse PLUMIER e veteri quodam Manuscripto refert. Ill. HALLERVS vero haud tam magnam fidem tribuit his laudibus.

ASPLENIVM *germanicum*.

Asplenium caule pinnato, superioribus simpliciter dentatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 8. n. 1690.*

A. ramis duplicato ramosis, pinnis aequalibus laxe dispositis, apice incis. Hall. En. Helv. p. 137. n. 8.

Acrostichum radice cirrosiore, fronde ramosa diuisa, angustiore et longiore, foliolis ternato connexis. Gled. ap. Boehm. Flor. Lipsf. p. 289.

Ruta muraria procerior Germanica. Tourn. I. R. H. p. 541.

Adiantum nouum Germanicum, Rutae murariae facie. Breyn. Cent. 1. p. 189. Ic. 97.

großes Rau en Wiltkraut, große Mauerraute.

H. ad templum in monte S. Nicolai, ad templum pagi Hassiaci Eichenberg.

Caules multo longiores, quam in praecedente, inferne nigricantes et quasi adusti, ad aliquot uncularum distantiam nudi, dein in duos tresue ramos fissi; ramulorum pinnae tri et bilobatae, lobis oblongis irregularibus, serratis, haud cuneiformibus sed inaequaliter incis, et multo longioribus quam in praecedente. Fructificationes similes ac in praecedente, sed lineae longiores.

ACROSTICHVM LINN. Gen. n. 1173.

HALL. Hist. Helv. T. III. p. 17. En. Helv.

p. 134. WERNISCHECK. Gen. p. 1141. GLE-

DITSCH. apud BOEHMER. Flor. Lipsf. p. 287.

Frons diuersae figurae. Fructificationes sessiles, totum auersum frondis discum obtegentes,

gentes, accumulatae in vnum acruum, WERNISCH.

ACROSTICHVM *septentrionale*.

Acrostichum frondibus nudis linearibus laciniatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1524. n. 6.*

A. fronde lineari lanceolata. *Hall. En. Helv. p. 134. n. 1. En. Gott. p. 2.*

A. caule bis bifurcato. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 17. n. 1714.*

A. fronde lineari, ramosa diuisa, foliolis acutis, trifurcato connexis. *Gled. ap. Boehm. Flor. Lips. p. 287.*

Filicula saxatilis quinta siue corniculata, C. B. *Pin. p. 358.*

Filix nuda, siue saxatilis. *Tragi ed. germ. p. 429. **

Grasstengeliches gespaltenes Acrostichum, Steinsarn.

H in rupium fissuris abunde circa Waake, ad sinistra viae versus Ebergötzen.

E radice tenui fibrosa, copiosi frondium furculi conferti, caespitiosi, erecti, fugitino aspectu graminis iuncea caespites quodammodo referentes. Frondes vnciales, ad digitum et ultra longae, inferne simplices nudaepro maxima parte, superius in duos tresue lacinias longas corniculatas incisae. Laciniae istae ab initio angustiores, in medio latiores, versus apicem in aliquot incurua segmenta irregulariter fissae aut furcatae, profundis

V 5

firi-

- * Huic editioni titulus est: Kräuterbuch weiland des weitberühmten und Hoherfahrnen Herrn Hieronymi Tragi genannt Bock - - - gemehrt und gebessert durch Melchior Seibitz, M. D. Strassburg 1630. fol

striis longitudinalibus fulcatae. Color pallide gramineo viridis.

Fructificationes densissime congestae, in tota posteriore facie laciniarum frondis; ab initio membranaceo, pallido, fusco involucrio penitus reclusae, quo per mediam longitudinem dehiscente, capsularum insignis propullulat copia, latitudinem laciniarum exsuperans, sic ut frondes in anteriore facie aspectae margo capsulis, instar tomenti fusci cinctus appareat.

Capsulae globosae cinnamei, coloris, nitentes, per lentem mediocrem aspectae, annulo medio coercentur subpurpureo. Semina tenuissima fusca.

Quoad vires par censetur Capillo veneris.

POLYPODIVM LINN. Gen. n. 1179. HALL. Hist. Helv. T. III. p. II. En. Helv. p. 137. WERNISCHECK. Gen. n. 1143. GLEDITSCH ap. BOEHM. Flor. Lipsf. p. 292. SCOPOL. Flor. Carn. p. 166. TOVRNEFORT. I. R. H. Gen. IV. p. 540. Tab. 316. **LONCHITIS** TOVRN. Gen. II. p. 538. Tab. 314. **FILIX** TOVRN. Gen. I. p. 536. Tab. 310. 323. **FILICVLA** TOVRN. Gen. VI. p. 541. **PTERIS** GLED. ap. BOEHM. Flor Lipsf. p. 294. SCOP. Flor. Carn. p. 170. **ACROSTICHI** Species. LINN. Spec. Pl. p. 1528.

Frons

Frons integra vel diuisa. Fructificationes in punctis subrotundis, per discum frondis auersum dispersis sitae. WERNISCH.

Inuolucro aliae species carent, aliae praeditae sunt membranaceo persistente. Capsulae membranaceae tenuissimae, uniloculares, horizontaliter dehiscentes, semen unicum subglobosum continentes.

✿ *Fronde pinnatifida, lobis coadunatis. Linn. Sp. Pl. p. 1544. Foliorum pinnis subrotundis integris, aut obiter dentatis. Hall. Hist. Helv. T. III. Ord. I. p. 11. Folio non auriculato: simpliciter pinnato. Hall. En. Helv. Ord. I. Subdiv. I. p. 137. Polypodium Tournefortii et omnium auctorum.*

POLYPODIVM *vulgare.*

Polypodium frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subferratis obtusis, radice squamata. *Linn. Sp. Pl. p. 1544. n. 13.*

P. foliis pinnatis lanceolatis, radice squamata. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 11. n. 1696.*

P. pinnatum, pinnis lanceolatis, radice squamata. *Hall. En. Helv. p. 137. n. 1. En. Gott. p. 3.*

Poly-

Polypodium vulgare C. B. *Plum. Filic. Americ. p. XXVII. Tab. A. f. 2. Tourn. I. R. H. Tab. 316. Moris. Hist. Ox. III. p. 562. n. 1. Sect. XIV. Tab. 2. Ser. 1. f. 1.*

Polypodium Filicula. Matthiol. p. 541 Trag. ed. germ. p. 430.

Polypodium quercinum. Blackw. ed. Trew. Tab. 215.

Filicula seu Polypodium. Camer. Epit. p. 993.

OFFICIN. *Polypodii quercini radix.*

Engelsüß *Polypodium*, Engelsüß, Süßfarn, Roßfarn, Baumfarn, Steinfarn, Eichenfarn, Süßwurzel, wilde Süßwurzel, wild Süßholz, Tropswurz.

H. ad arborum, imprimis quercuum truncos, copiosius ad muros; v. g. an dem Ausflufs der Leine, ad rupes circa Waake, Niedeck, Reinhausen copiose.

E radice crassa, tuberosa, externe spadicea, interne subviridi, squamis fuscis tecta, copiosas fibrillas fusco tomento obsitas emittente, frondes surgunt, semipedis ad pedis longitudinem aequantes, pinnatifidae. Pinnae siue laciniae, alternae, lanceolatae, obtusae, vnciam ad sesquiunciam longae, semunciam pene latae, basi ad neruum frondis confluentes, glabrae, nervosae, margine leuiter crenato, coloris laete viridis.

Fructificationes in punctis rotundis, lentis circiter magnitudine, duplici serie iuxta neruulum pinnulae, medium inter ea decurrentem, coloris aurei. Capsulae subglobosae, seminis papaueris pene magnitudine per maturitatem, annulo croceo cinctae, ab initio exiliores, palli-

pallidae, dein ex aureo lutescentes, ultimo fuscae. Aestate floret.

De radicis huius qualitatibus sequentia Ill. HALLE-
RVS in Hist. l. c. habet: „Radix nauseosa, dulcis, gum-
„mosi extracti multum dat, ad tres octauas, resinosi
„paullo minus. Gummosum dulce, substypti-
„cum, gratum, infusum dulce: Tinctura Spiritu vini
„facta, cum dulcedine acris, extractum ingratum, nau-
„seosum. Gratia in extracto aquoso primo est, quod
„NEVMANNVS praefert, vt tamen Extractum resinosum
„magis aluum ducat.,,

Vis laxans, quam tantopere Veterum quidam lauda-
runt, haud adeo magni censenda est, secundum hodie-
norum medicorum experientiam: qui potius hac radice
vtuntur scopo alterandi, ob vim saponaceam, resoluen-
tem. Hinc succus in hypochondriacis malis, ad vnam
alteramue drachmam a BOERHAAVIO exhibitus fuit, re-
ferente Ill. HALLERO; sic quoque in ptisanis pectorali-
bus, in tussi falsa, aduersus arthritidem, ad hepatis ma-
la; in decocto aquoso cum lino, aduersus gonorrhoeam,
et dolores urinae commendatur. Ob saluentiam deco-
cti, addi solent semina quaedam aromatica, vt carui,
foeniculi, anisi. Radix cum Zingibere, et vetulo gallo
gallinaceo decocta, et inde parato iusculo, contra do-
lores colicos laudatur a TRAGO. In substantia ad drach-
mam cum aqua mulsa exhibita, iisdem viribus pollere
ac decoctum, Idem refert. Puluerisata, cum melle in
formam emplastri contrita, et externe applicata, fissu-
ris medetur manuum et pedum; polypos narium quo-
que auferre creditum est, si inspergatur pulvis:

*** *Fronde sub-bipinnata, Linn. Sp. Pl. p.*

1550.

1550. *Foliis non auriculatis; bis diuisis, siue ramis pinnatis.* Hall. *En. Helv. Ord. II. Subdiv. II. p. 138.*

POLYPODIUM *Phegopteris.*

Polypodium frondibus sub-bipinnatis: foliolis imis reflexis, paribus plumula quadrangulari coadunatis.
Linn. Sp. Pl. p. 1550. n. 36.

P. foliis pinnatis, reflexis, pinnis ouatis hirsutis, primis cum neruo confluentibus. Hall. *Hist. Helv. T. III. p. 12. n. 1698.*

P. pinnatum, pinnis lanceolatis, pinatifidis, integris, inferioribus nutantibus. Hall. *En. Helv. p. 138. n. 2.*

P. pinnis pinnatis, imis reflexis, pinnulis cum neruo confluentibus. Hall. *En. Gott. p. 3.*

Phyllitis minor hirsuta, pinnis variis. Amman. *Act. Petropolit. T. X. p. 298. Tab. 21.*

Filix minor Britannica, pediculo pallidiore, alis inferioribus deorsum spectantibus. Moris. *Hist. Ox. III. p. 575. n. 17. Sect. XIV. Tab. 4. Ser. I. f. 17.*

schief gesiedert rauhes Polypodium.

H. copiose ad rupes circa Waake, Reinhausen, Niedeck.

Radix fibrosa. Frondes semipedales, pedales, aliquando paullo adhuc longiores. Stipes ad dimidiam aut

ant duas tertias partes nudus, dein pinnas emittens 20. ad 30. et ultra, ex ordine decrescentes; quae oblique oppositae, pinnatifidae, primis laciniis latioribus, vtrunque cum caulis s. stipitis neruo, vbique squamulis fuscis sparsis obfito, perfecte confluentibus, et irregulare quadrangulum ibi formantibus. Pinnularum lacinae lanceolatae, obtusae, nervosae, vndique et imprimis ad margines et mediam costam, albo pilorum tenui tomento oblitae. Color pallide viridis. Inferiores duae pinnae reflexae, siue dependentes, obliquae; reliquae apice sursum spectantes, gradatim minores, ultimis pinnarum paribus connatis, et vnum quasi laciniatum folium constituentibus, et densioribus, frondem pyramidalem efficiunt.

Fructificationes in punctis rotundis distinctis, secundum marginem lacinarum dispositae, quatuor ad sex paria in quavis lacinia. Capsulae minimae, ac nonnisi per lentem distinguendae, subrotundae, coloris e pallido flavescentis. Floret aestate.

POLYPODIVM *Thelypteris*.

Polypodium frondibus pinnatis; pinnarum laciniis cum neruo connatis, ouatis, integerrimis, prima maiore.

P. pinnis pinnatis, pinnulis ouatis integerrimis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 12. n. 1697.*

P. pinnis ramorum integris, frequentibus, ordinatim decrescentibus. *Hall. En. Helv. p. 139. n. 4.*

Acrostichum (*Thelypteris*) frondibus pinnatis: pinnis pinnatifidis integerrimis. *Linn. Sp. Pl. p. 1528 n. 25.*

Thely-

Thelypteris palustris non ramosa. Rupp. Flor. len. ed. Hall. p. 342. Schmiedel. Icon. p. 45. Tab. II. 13.

Filix non ramosa minor, syluatica, repens. Moris. Hist. Ox. III. p. 550. n. 17. Filix palustris repens, pinnulis non dentatis. Sect. XIV. Tab. 4. Ser. 1. f. 17.

Filix palustris pumila Virginiana. Plukenet. Almag. bot. p. 151. Phytogr. Tab. 284. f. 1. ex auctoritate Ill. SCHMIEDELIi hac referenda, quae optime habitum plantae exprimit, et accuratius eae respondet, quam sequens, ab Ill. HALLERO citata figura:

Filix saxatilis foliis non serratis C. B. Plukenet. Phytogr. Tab. 179. (quae ex errore signata fuit 159.) f. 3.

rund ungeferbt blättriges Polypodium.

H. passim in syluis Sollingensibus, v. g. circa Neuhaus; in montibus Weisner et Bructero copiosius occurrit.

Quoad habitum *Polypodio Filiei mari L.* valde simile, differt vero pinnis confertioribus ad angulum rectum cum stipite frondis dispositis, breuioribus; laciniis ovato rotundis, cum nervio confluentibus etiam, at non tam profunde incis, magis obtusis, et profundius nervosis, primis arcte ad stipitem laeuem appressis, longioribus, latioribus; fructificationes quidem etiam in puncta, sed copiosiora et marginem laciniarum obsidentia digesta, per maturitatem, et in summis imprimis pinnulis, confluentibus in lineas marginales fuscas. Membrana

brana illa reniformis, qua in praecedente puncta teguntur, hic abest.

Caeterum frondes, ab unius duorumve digitorum longitudine, spithamam ad duas aequant. Radice gaudent repente, tereti, filiformi, calamus scriptorium in parte crassiori aequante, nigro fusca, fibrosa; per intervalla stipites frondium emittente, ab initio squamis fuscis obsitas, dein laeves. Frons superne spectata, irregularem rhomboideam figuram describit, pinnis infimis summisque brevioribus, mediis longissimis. Pinnarum 28-40. paria; lacinae siue folia in infimis pinnis 10-15. mediis 20-25, versus apicem numero decrefcentibus: summa pinnarum tandem paria integra, et irregulariter tantum crenata, lanceolata euadunt, ob lacinias confluentes. Margo laciniarum, fructificationes gerentium, revolutus sic, ut easdem quodammodo includat pro parte, et tegat.

Puncta fructificationum rotunda, feminis milii circiter magnitudine, per maturitatem se extendunt, et confluunt fere perfecte in lineas marginales. Proprio quodam ac singulari laciniato involuero continentur, disci aut calycis vicem subeunte, quod optime delineant Ill. SCHMIEDELI *Icon. Tab. 13. figurae 4. 6. 7. 8. 9.* Capsulae nudo oculo facile distinguendae, in adultioribus et pene marcescentibus frondibus splendentes, ochreae subfuscae, per lentem mediocris conuexitatis spectatae, annulo cinguntur articulado, ex atro purpureo, fusco, splendente. Florere solet media aestate. Frondes steriles minores, molliores, pinnulis latioribus planis praeditae, coloris dilutius virentis,

POLYPODIVM *Filix mas.*

Polypodium frondibus bipinnatis: pinnis obtusis, crenulatis, stipite paleaceo. Linn. Sp. Pl. p. 1551. n. 43.

Gunneri Flora Noruegica P. I. p. 4. Tab. 1. f. 4.

P, pinnis pinnatis, obtuse dentatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 13. n. 1701.*

P. fronde duplicato pinnata, foliolis obtusis, crenulatis, petiolo strigoso. *Hall. En. Helv. p. 139. n. 5. En. Gott. p. 3.*

Pteris fronde duplicato pinnata, foliolis obtusis, crenulatis, petiolo strigoso. *Gleditsch. ap. Boehm. Flor. Lipsf. p. 292.*

Filix mas. Matthioli p. 539. Camerar. Epit. p. 901. Blackw. ed. Trew. Tab. 323. (sed pinnulae non crenatae sunt.)

Filix mas, non ramosa, dentata. C. B. Pin. p. 358. Tournef. I. R. H. Tab. 311.

Filix non ramosa dentata. Vaill. Bot. Parisf. p. 53. n. 2. Merisf. Hist. Ox. III. p. 578. n. 6. Sect. XIV. Tab. 3. Ser. 2. f. 6. Filix mas, pinnulis cristatis. Vaill. Bot. Parisf. Tab. 9. f. 2.

OFFICIN. *Filicis radix, herba.*

rundgekerbtblättriges Polypodium; Farnkraut. Waldsarn. Farnkraut Männlein. Waldsarn Männlein.

H. in sylvis ubique, ad sepes in pagis frentissime.

Radix densa, e laminis carnosis compacta, fibrosa. Frondes pedales et ultra longae, plures ex vna radice, in circularibus caespitibus nascentes, pinnatae. Pinnae pinnatis

pinnatifidae, alternae, ad acutum angulum versus stipitem directae, apicibus sursum spectantibus. Pinnarum paria 30-40. quarum imae breuiores, sequentes maximae, (4-5-6 unciales) reliquae ordine triangulari decrescen-tes. Stipes rectus, subteres; antèr sulcatus, postèr-rius laevis, crassus, aequè ac costae pinnarum vndi-que copiosis fuscis squamulis obsiti. Pinnarum laciniae basi cohaerentes, lanceolatae, nervosae, toto margine leui-ter dentatae. Color pallide viridis.

Fructificationes in puncta subrotunda s. potius re-niformia, si per lentem adspiciuntur, congestae, quorum tria, quatuor ad quinque paria, duabus lineis quas me-dius percurrit nervulus, laciniarum auersam paginam occupant. Puncta ista ab initio seminis papaveris ma-gnitudine, pallide lutea, dein sensim maiora, latiora, lemen milii magnitudine superantia, subrubentia. Te-git illa quaedam reniformis squamula, primum pallida, integra, dein per maturitatem spadea, quae in toto ambitu dehiscens, margine a capsulis turgentibus sur-sum protruso, media parte s. hilo firma adhaerens, caua, infundulibuli formam referens, capsulis sub margine pro-pullulantibus, ultimo decuritur. Capsulae exiguae, sub-rotundae, pallidae, annulo croceo cinctae. Floret per aestatem.

Aetate admodum variat. Reperiuntur specimina iuniora, minora, digiti circiter longitudine, quorum frondes pinnatae, pinnulae autem latae, crenatae, ner-uosae, pene cum caule confluunt, et hac facie folia *Ca-pilli Veneris* quodammodo referunt; quoad habitum si-milia *Plukenetii Phytogr. T. 179. f. 4.* Ludit quoque pinnularum laciniiis apice obtusissimo, et quasi truncato, tribusque aut quatuor dentibus inciso, sic vt laciniae quadratum oblongum quasi referant: porro pinnis, et

harum etiam laciniis densioribus, et laxioribus, lenius et profundius dentatis.

Sapor radices nauseosus, subadstringens, ex amaro dulcis. Pulverem eius, ad vnciam semis ex aqua mulsa propinatum, lumbricos expellere, additis autem Scammonio et Helleboro nigro, eo fortius agere DIOSCORIDES refert, addit vero ante usum huius medicamenti allium comedi debere. Decoctum vinosum convenit hypochondriacis, et obstructione hepatis et lienis laborantibus. In arthriticis morbis atque cachecticis, infusum Mj. radices, ad V. pintas vini, contra tumorem, hydrophem minantem laudatur. Radices in cereuisia coctae, contra calculum adhiberi a Noruegis, Cl. GUNNERUS in *Flora Noruegic. p. 5.* testatur.

Herba ab Anglis et Batauis, referente BOERHAAVIO, pueris rhachiticis substernitur; in cataplasmatibus forma cocta, ulceribus vetustis applicata medetur. Asparagi (siue iuniores frondium turiones, cincinni in modum inflexi) cocti, esculenti sunt, et aluum molliorem reddunt. In Noruegia stipitum bases, siue lacinae ungiformes et carnosae, concisae, tertia polentae parte addita, a pauperibus cereuisiae incoquantur, ex relatione GUNNERI, qui etiam panem inde confici posse putat.

Fronde aestate collectas, sub dio probe siccatas, loco straminis, et aqua calida infusas, foeno substitui, et pro egregio in hieme pabulo inferuire capris, ouibus, vitulis, etiam bobus adultis, Idem narrat; hinc in foeni penuria egregium remedium esse, quo rite adhibito, pecora non tantum ab interitu seruari, sed etiam saginari, quin adeo morbo et languore probumbentium pecorum vires refocillari possint. Colore brunneo vestes tingi a Noruegis, quoque testatur.

Elegan-

Elegantissimam et quodammodo monstrosam varietatem, in sylvis hercynicis circa *Elbingerode* lectam, mihi communicavit D. HENZEN. Haec quoad totum habitum, et diuisionem frondium in pinnas, ad acutum angulum stipiti adnatas, pinnarum lacinias oblongas, crenatas, stipitem crassum, squamis fuscis aspersum, omnino ad *Polypodium Filix mas* pertinet: variat vero magnitudine frondis insigniori, pinnis crebrioribus, tam arcte congestis, vt laciniae earum se mutuo contingant. Singulare autem hoc est: Pinnarum et imprimis superiorum neruus, in duas partes versus apicem fissus, latis foliis laciniatis quibusdam terminatur. Aliarum pinnarum extremitates latiores, et laciniatae, instar *Linguae ceruinæ polyschidae*. Supremae pinnae vel simplices, integrae, vel haud tam profunde quam reliquae pinnatifidae, sed tantum laciniatae, perfecte referunt pinnulam folii *Potentillae Anserinae* L. Laciniae pinnarum siue foliola, ab angusto principio incipiunt, varie et irregulariter lobatae, versus extremitates autem latiores sunt, ad marginem dentatae, dentibus irregularibus, maioribusque adhuc semel incisus.

POLYPODIVM *Filix femina* *α crenata*.

Polypodium frondibus bipinnatis: pinnulis lanceolatis, obtuse crenatis, primis maioribus, subpinnatifidis.

P. pinnis pinnatis, pinnulis ovatis, obtusis, dentatis, dentibus imis bifidis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 14. n. 1703.*

P. ramorum pinnis obtusis ellipticis, crenis imis pinnarum bifidis. *Hall. En. Helv. p. 139. n. 6. En. Gott. p.*

P. frondibus bipinnatis, foliolis lanceolatis. pinnulis ovatis, laciniatis, obtuse ferratis. *Müller. Flor. Friedrichsdal. p. 193. n. 844. Tab. 2. f. 3.*

Filix mollis, siue glabra, vulgari mari non ramosae accedens. *I. Bauh. Hist. III. p. 730. Moris. Hist. Ox. III. p. 579. n. 7. Tab. 3, Ser. 2. f. 7. Vaill. Bot. Paris. p. 53. n. 3. Tab. 9. f. 3.*

Filix non ramosa alpina, foliolis quae ad alas rotundioribus, omnibus autem dentatis. *Seguier. Supplem. Flor. Veron. p. 53. n. 2. Tab. 1. f. 1.*

Schmalblättrig rundgeferbt s *Polypodium*,

H. ubique in sylvis; ad sepes.

Statura, magnitudine, habitu *Polypodio Filici mari* quodammodo simile, sed stipes plerumque flexuosus, et nervi pinnarum multo teneriores, glabri; pinnarum laciniae, excepta prima superiori cuiusvis pinnae, (quae arcte ad stipitem appressa, reliquas longitudine superat) breviores, graciliores, plures, (in mediis pinnis longissimis a 15-20-25 paria, extremis confluentibus, in inferioribus summisque gradatim paucioribus) oblongae, lanceolatae, profunde obtuse crenatae, crenis maioribus bifidis. Caeterum distinctius nervosae, siue potius venosae, pellucidae, tenerae sunt hae laciniae, per lentem aspectae, folium quercus laciniatum perfecte referunt, Color e lutescente pallide viridis. Pro varia aetate, pinnarum laciniae profundius, aut levius incisae, in adultioribus quibusdam, pene subpinnatifidae sunt.

Fructificationum puncta, insignis magnitudinis sub
rotun-

rotunda, inuolucro non reniformi, persistente, ut in *Filice mari*, sed subrotundo eualde deciduo tecta ab initio, obscurius ochrea, matura fusca; 3-6 paria in quavis lacinia ad medium neruum locata, in summis pinnulis sensim confluentia. Floret aestate.

β. *Polypodium Filix femina, dentata.*

Polypodium frondibus bipinnatis; pinnis pinnatis confertis, pinnulis pinnatifidis, primis maioribus, lacinulis acute bifidis.

Polypodium (Filix femina) frondibus bipinnatis, pinnulis lanceolatis, pinnatifidis acutis. *Linn. Sp. Pl. p. 1551. n. 44. Müller. Flor. Fridrichsdal. p. 193. n. 843.*

P. pinnis pinnatis, pinnulis lanceolatis, semipinnatis, lobis acute bisectis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 15. n. 1704.*

P. duplicato pinnatum, pinnulis lanceolatis, acutis, pinnatifidis. *Hall. En. Helv. p. 139. n. 7.*

Filix mas non ramosa, pinnulis angustis rarioribus: profunde dentatis. *Plukenet. Phytogr. Tab. 180. f. 4. Moris. Hist. Ox. III. p. 579. n. 8. Sect. XIV. Tab. 3. Ser. ult. f. 8.*

Schmalblättrig spitzgekerbtes Polypodium.

H. copiose in sylvis, locisque opasis, muscosis, ad arborum radices; v. g. circa die Wehnder Papiermühle, circa Kerstlingeroderfeld, et alibi.

Praecedenti simillimum, quoad stipitem flexuosum, pinnas confertas, pinnulasque angustas copiosas, totumque praeterea habitum, teneritudinem, pelluciditatem foliorum. Differt uitem frondium insigniori magnitudine, pinnis longioribus, non pinnatifidis, sed perfecte pinnatis, harumque pinnulis longioribus, densioribus, omnibusque pinnatifidis, in 4-9 lacinulas oblongas; quae si obiter aspiciuntur, truncatae apparent, accuratius autem lustratae, in duos acutos dentes, saepius irregulares, fissae sunt. Pinnarum infimae, plerumque oppositae, (reliquae alternae) ut et summae, breuiores sunt, pinnulas gerunt 10-15-20: mediae longiores, 20-30. Color ut praecedentis e lutescente pallide viridis.

Fructificationum, (in puncta subrotunda lutescentia, per maturitatem ex ochreo ferruginea digestarum) 6-8 paria, secundum longitudinem medii pinnularum nervi locata; ante maturitatem inuolucro membranaceo, pallide fusco, deciduo recta. Floret aestate.

γ. *Polypodium' Filix femina, spinosa.*

Polypodium frondibus bipinnatis: pinnis summis subpinnatis, infimis pinnatis; pinnulis pinnatifidis, latiusculis, apice denticulis leuiter spinosis terminato.

P. frondibus sub-bipinnatis: foliolis ovato oblongis: pinnis ovatis incis; laciniiis apice acute serratis. *Müller, Flor. Fridrichsdal. p. 193. n. 841. Tab. 2. f. 2.*

Breitblättrig scharfgezähnt Polypodium.

H. circa Waake; copiosus in sylvis Sollingen/sibus et bercynicis; montibus Weisner et Bructero.

Admo-

Admodum varie quoad magnitudinem, a spithamæ ad pedalem, immo bipedalem ludit; porro pinnulis laxioribus confertioribus, pluribus, paucioribus. Differt a præcedentibus pinnarum numero minori, (vix enim supra 20. paria sunt) magis remotis; pinnulis latioribus, laciniatis, in summis pinnis cum nervo connatis, in infimis plerumque pinnatifidis; quavis lacinia lanceolata, margine integra, apice in 3 vel 4 dentes leuiter spinulos, paulatim incuruos secta; colore saturatius viridi, in auersa parte paullo pallidiore; stipite nunc glabro, nunc aliquot squamulis rubiginosis obsito. Pinnarum situs pene oppositus, stipite ad exortum cuiusvis pinnae paullulum latiore, vel quasi geniculato. Pinnulae, siue potius laciniae superiorum pinnarum, confluentes, nervum quasi alatum efficiunt. Numerus in longissimis pinnis a 12-15.

Fructificationum puncta quoad figuram, colorem, numerum, involucrium deciduum, præcedentibus similia, in aliis supremas pinnas tantum occupant; (duabus, tribus, quatuorve inferiorum pinnarum paribus sterilibus,) in aliis omnes floriferae sunt, quod bene quoque adnotavit Cl. MÜLLERVS.

♂ Polypodium *Filix femina, cristata.*

Polypodium frondibus subtripinnatis; pinnis summis pinnatifidis, imis pinnatis; pinnulis repetito pinnatifidis, omnibus vndique serratis, ferraturis spinosis.

P. frondibus subtripinnatis: pinnis oblongis, subpinnatis: pinnulis vtrinque serratis. *Müller. Flor. Fridrichsdal. p. 193. n. 845. Tab. 2. f. 4.*

P. pinnulis pinnatis, lobis semipinnatis, dentatis, aristatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 14. n. 1705.*

P. pinnis ramorum pinnatis, pinnulis laxis, acute sectis, spinulosis. Hall *En. Helv.* p. 141. n. 13. *En. Gott.* p. 4.

Filix mas ramosa, pinnulis dentatis. Plukenet. *Phytogr. Tab.* 181. f. 2.

An *Polypodium (cristatum)* frondibus sub-bipinnatis: foliolis ovato oblongis: pinnis obtusiusculis: apice acute ferratis. *Linn. Sp. Pl.* p. 1551. n. 42? *ob figuram Plukenet: sed descriptio non respondet, cum frondes subtripinnatae sint.*

Filix ramoso dentata, ramulis et pinnulis longius ab se inuicem distantibus. Mappi *Hist. plant. Alsat.* p. 106. f. VIII. b.

schmal Rammförmig gezähntes Polypodium.

H. passim circa Waake, copiosus in monte Bramburg, in sylvis Sollingensibus, et bercynicis.

A praecedente cui quoad habitum, pinnarum situm fere oppositum, stipites geniculatos squamosos, simile; differt pinnulis omnibus pinnatifidis, laciniisque harum per totum ambitum argute ferratis, ferraturis sub-spinosis. Frondes cubitales, et ultra longae, pinnarum gerunt circiter 20 paria, quarum inferiora 3, 4, 5 paria denuo pinnata, pinnulis utrinque in 8 ad 10 lacinias, basi cohaerentes, fissis. Incisurae istae in aliis magis profundae, in aliis minus, dentesque in harum lacinarum margine longiores, breviores, acutiores, obtusiores, molliores, rigidiores; substantia tenerior in aliis et subpellucida, in aliis rigidior. Color ut in praecedente saturate viridis, in aversa parte paullo pallidior.

Fructu.

Fructificationes similes praecedentium, in punctis, vel secundum nervos pinnularum semipinnatarum, in 8-10 paria, vel ad harum lobulos in 2-3 paria congestis, omnes frondium pinnae obsident.

Quatuor hasce Filices, unius solummodo speciei notabiliores varietates esse, pene persuasum habeo. Licet unum alterumue specimen paullo magis, quin adeo specificè diuersum videatur, tamen in magna quantitate collecta, et inter se comparata specimina, in varia aetate, eque variis locis natalibus, tantam affinitatem, per gradus ab una ab alteram varietatem descendentem, ostendunt, ut separatio in distinctas species valde dubia euadat, quia certis legibus adstringi nequeunt. Hinc non mirum, Auctores circa Synonyma adeo dissentire. Pinnarum transitus in lobos semipinnatos, aut perfecte pinnatos, harumque laciniae integrae, aut iterum pinnatifidae, quin denuo pinnatae, margines acute aut obtuse fissi, accidentales saepe sunt notae, a loco natali pinguiori, aridiori, opaco, aut solis radiis magis exposito pendentes. Fructificationes autem in omnibus conueniunt, et simillimae sunt. Proposui itaque coniunctas sub uno speciali nomine, attamen sic simul distinxi, ut quivis easdem facillimo negotio separare possit in species, cui ista coniunctio haud arridet.

POLYPODIVM *fumarioides, & lobatum.*

Polypodium frondibus bipinnatis: pinnis remotis suboppositis; pinnulis obtuse lobatis, fructificationibus dense confertis.

Polypodium (fragile) frondibus bipinnatis; foliolis remotis:

motis: pinnis subrotundis incis. *Linn. Sp. Pl. p. 1553. n. 51.*

P. pinnis pinnatis, laxe diuisis, pinnulis semipinnatis, lobulis subrotundis dentatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 15. n. 1707.*

P. fronde duplicato pinnata, pinnis remotis, foliolis subrotundis incis. *Hall. En. Helv. p. 140. n. 9.*

P. pinnis pinnatis, pinnulis semipinnatis, obtusioribus. *Hall. En. Gott. p. 4.*

Filicula regia fumariae pinnulis. *Vaill. Bot. Paris. p. 52. Tab. 9. f. 1.*

Filix saxatilis, caule tenui fragili. *Plukenet. Phytogr. Tab. 180. f. 5.*

Adiantum filicinum aquaticum, mollius minimum. *Barrelier. Icon. p. 432. f. 2.*

rundgeschweiftes Erdbrauch: Polypodium.

H. ad rupes circa Waake, Reinhausen, copiose; passim etiam ad vetustorum murorum rudera.

Fronde bipinnatae, copiosae, (ex vna crassa caespitola fulca radice) variae altitudinis, spithameae, ad semipedem et ultra longae. Cauliculi tenerrimi, fragilissimi, laeues, inferne rubicundi, superius pallidi, circa exortum pinnarum paullulum dilatati. Pinnae suboppositae (10-15 paria) plerumque ad angulum rectum dispositae; infimae breuiiores, mediae longiores, supremae gradatim decrescetes, pinnatae remotae. Pinnulae (6-8 paria in quavis pinna) distinctae, laxae, in tres pluresue lobos instar foliorum *Fumariae* diuisae, venosae;

venosae; lobulis nunc arctius, laxiusue dispositis. Color e pallide luteo viridis.

Fructificationum puncta, ex ochreo fusca, pro ratione lorum insignis magnitudinis, in quavis pinnula 4, 6, ad 8, quae ultimo confluentes, totam paginam auersam ut in *Acrosticho* occupant. Capsulae subrotundae, pallidae, sub lente annulo croceo, pellucido cinctae. Floret aestate.

β. Polypodium fumarioides, laciniatum.

Polypodium frondibus bipinnatis: pinnis remotis, suboppositis; pinnulis acute laciniatis, fructificationibus laxioribus.

P. pinnis pinnatis, laxè diuisis, pinnulis semipinnatis, acutis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 15. n. 1708.

P. pinnis ramorum laxè pinnatis, pinnulis acute dentatis. all. En. Helv. p. 140. n. 10.

P. pinnis duplicato pinnatis, pinnulis acute dentatis. all. En. Gott. p. 4.

Filix pumila saxatilis altera. Clus. Plukenet. Phytogr. Tab. 179. f. 5.

Filix saxatilis, ramosa, nigris maculis punctata. C. Bauh. Pin. p. 358. Rupp. Flor. 1on. ed. Pall. p. 344. Moris. Hist. Ox. III. p. 585. n. 19. Sect. XIV. Tab. 4. Ser. 1. f. 28.

An *Polypodium (regium)* frondibus bipinnatis: folioli suboppositis: pinnis laciniatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1553. n. 52? ob pinnulas laciniatas: vel potius*

Poly-

Polypodium (rhaeticum) frondibus bipinnatis: foliolis pinnisque remotis, lanceolatis, ferraturis acuminatis.

Linn. Sp. Pl. p. 1552. n. 46.

spitzig eingeschnittenes Erdrauch: *Polypodium.*

H. in similibus locis: passim quoque ad arborum radices; copiose in sylvis Sollingensibus, v. g. in monte Bramburg: et hercynicis: ad sepes etiam quandoque occurrit v. g. circa Hardeggen.

Haec adeo affinis praecedenti planta, ut vix nisi pro varietate eam habere possis. Sunt tamen quaedam notae distinctivae: Frondes pene duplo maiores, pedalis et ultra longitudinis, latiores; pinnae numero plures (15-20 paria) ad acutorem angulum dispositae; pinnulae latiores, longiores, et acutius laciniatae, lacinulis acutis aliquot dentibus (in plurimis) incisis, in quibusdam adeo laxae, ut pinnatifidae dici possint. Color pallide at saturatius quam praecedentis viridis, substantia foliorum tenerior, subpellucida. Cauliculi interne ad tertiam fere partem, colore ex purpureo aureo splendentes. Fructificationes in plurimis non tam dense congestae, et magis distinctae sunt, at in summis pinnis per maturitatem confluentes etiam observantur.

Caeterum vero pariter ut praecedens, copiosas ex una radice emittit frondes, quarum aliae et quidem plurimae, pinnulas acute laciniatas habent, aliquae tamen rotundiores, et fere tantum lobatas, quas a praecedentibus separare vix poteris. Floret quoque aestate.

POLYPODIUM aculeatum.

Polypodium frondibus bipinnatis: pinnis lanulatis, ciliato-

- liato-dentatis, stipite strigoso. *Linn. Sp. Pl. p. 1552. n. 45.*
- P. pinnis pinnatis, ciliatis, ferratis, appendiculatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 16. n. 1720.*
- P. pinnis ramorum plerisque distinctis, auriculatis, oris ciliaribus. *Hall. En. Helv. p. 142. n. 16.*
- P. pinnis ramorum auriculatis, oris ciliaribus. *Hall. En. Gott. p. 4.*
- Filix mas, (non ramosa) pinnulis latis auriculatis spinosis. *Morif. Hist. Ox. III. p. 580. n. 15. Sect. XIV. Tab. 3. Ser. ult. f. 15. Plukenet. Phytogr. Tab. 179. f. 6.*
- Filix mas, aculeata nostras, alis expansis, muscosa lanugine tectis. *Plukenet. Phytogr. Tab. 180. f. 1.*
- Filix aculeata Lonchitidi aemula. *Plukenet. Phytogr. Tab. 180. f. 3.*

Stachelich blättriges Polypodium.

H. rarius circa die Bramburg, crebrius in sylvis hercynicis.

Frondes bipinnatae, variae altitudinis, spithameae, pedales, et paullo longiores, figuram oblongo rhomboideam describunt, pinnis mediis longioribus, superioribus et inferioribus decrefcentibus. Stipes crassus, a radice ad mediam frondis partem usque, latis squamis membranaceis fuscis, dense stipatis, ac fere imbricatis, versus apicem vero, et quandoque nervos pinnularum, tomento similis coloris obtecti. Pinnae confertae, densae, (ad 30 paria) sursum incurvatae.

Pinnulae

Pinnulae pinnarum primae, distinctae, maiores, auricularum instar, latissimae, irregulariter ouatae, dentatae vel potius emarginatae, dentibus acutis, spinosis; reliquae sensim basi confluentes, omnes spinosae, nervosae. Color saturate viridis, in auersa parte pallidior; substantia membranacea, rigida.

Fructificationes ad oras pinnularum dispositae, in puncta orbiculata, innolucro membranaceo peltato tecta. Capsulae subglobosae, pedunculatae, monospermae.

*** *Fronde supra decomposita. Linn. Spec. Pl. p. 1555.*

POLYPODIVM *Dryopteris*.

Polypodium frondibus supra decompositis; foliolis ternis, bipinnatis. *Linn. Sp. Pl. p. 1555. n. 63.*

P. pinnis pinnatis, coniugatis, pinnulis ouatis obtusis, crenatis. *Hall. Hist. Helv. T. III. p. 12. n. 1699.*

P. pinnis ramorum pinnatis, pinnulis confertis, (coniunctis) oblongis integerrimis. *Hall. En. Helv. p. 141. n. 11. En. Gott. p. 3.*

Thelypteris minor, pinnulis dentatis. *Amman. Comment. Acad. Petrop. T. X. p. 301. Tab. 22. f. 2.*

Filix ramosa minor. *I. Bauh. Hist. III. p. 733.*

Filix ramosa saxatilis, nigris maculis punctata. *Morif. Hist. Ox. III. p. 585. n. 19. Sect. XIV. Tab. 4. Ser. 2. f. 19.*

Filix arborea f. *Dryopteris*. *Tragi ed. germ. p. 429.*

Dreistängiges Baumsförmiges Polypodium; Eichelsarn, Baumfarn.

H. ubi-

H. ubique in sylvis ad truncos arborum, et ad rupes; v. g. circa Waake, Reinhausen, Kerstlingeroderfeld, et alibi copiose.

E radice horizontali, crassiuscula, squamosa, frondes surgunt a sex unciarum longitudine, pedales, sesquipedales, ramosae: Stipes nempe gracilis, tenuis, fragilis, ad duas tertias partes nudus, duos emittit utrinque laterales oppositos ramos, (i. frondes minores, ad angulum acutum dispositos, medio stipite tertiam maiorem, et summam frondem ferente. Media illa frons 8 ad 10 pinnae oppositas habet, quarum infimae maiores, apice sursum incurvae, reliquae versus apicem frondis, trianguli instar decrescientes, subpinnatae: pinnulae latae, longae, (sic ut attingant pinnulas superiorum pinnarum) subalternae, integrae, vel crenatae, venosae, basi lata ad nervum subrubentem plerumque, vel e violaceo fuscum adnexae, extremis versus apicem confluentibus. Duae laterales frondes, 6-8 paria pinnarum, opposita, vel aliquando subalterna gerunt, figura caeterum et toto habitu mediae simillimae, qua, separatim spectatae, ad *Polypodium Filix mas* accedunt. Color pallide virens, aliquando ad medium pinnarum nervum subluteus vel etiam ferrugineus; in aversa parte pallidior.

Fructificationum puncta aurei coloris distincta ab initio, secundum marginem pinnularum disposita, quae ubi sensim sensimque se expandunt per maturitatem, totam deinde aversam occupant paginam.

Specimina quaedam reperi, paullo diversa; in his enim laterales frondes ad angulum rectum dispositae, pinnae laxissimae, pinnulae breviores tenerrimae, remotae, pellucidae. Quia nunquam puncta fructifica-

tionum in iis vidi, iunioris aetatis specimina esse putavi, licet magnitudine aequalia sint adultis, speciei modo descriptae.

E FILICVM numero hic exclusa sunt *EQVISETA*, quae non potui commode ad hunc ordinem referre. Affine quidem videtur *EQVISETVM*, ob spicas florales a reliquo caule distinctas, *OSMVNDAE*, et crura florum *EQVISETI* mobilia, pollen alterna contractione et dilatatione explodentia, similitudinem quandam habent cum annulis elasticis capsularum quarundam Filicum, sed reliquus habitus tam diuersus, vt immediata coniunctio locum non habeat. Spicae florales *LYCOPODIORVM*, semina *EQVISETI*, familia seminibus *LYCOPODII Selaginis* a Clariss. Viris obseruata, magnam quoque horum generum affinitatem monstrare videntur. Praeceptor b. BÜTTNERVS, proximum ponit *EQVISETVM* Generi *EPHEDRAE*, et ordini Plantarum aquaticarum adnumerat, cui sententiae assentire cogor tam diu, donec forte intermedia quadam detecta planta, affinitas inueniatur, et certi aliquid de loco huius generis decernatur a summis Botanicis.

Hic habes B. L. recensum Plantarum cryptogamicarum, quas in regione Gottingensi, et vicinis syluis Sollingensibus a me ipso collectas, vel ab amicis communicatas, ex propria obseruatione descripsi. Licet omni cura in iis conquirendis adhibita, tamen non in totum exhaustas diuitias nostras credo, et plures adhuc supersunt species, quae vel teneritate oculos subterfugientes, a me praeteruisae, vel in tam incompleto statu inuentae sunt, vt nihil certi de his determinare potuerim. Plurimas tamen easque praecipuas, Synonymis notabilioribus, et descriptione (quae
in

in quibusdam, dum notionem illarum faciliorem reddere studui, ut ingenue fatear, forte nimis diffusae factae sunt) illustratas, hic reperiēs, quibus facillimo negotio addere poteris paucas illas plantulas omissas. Quae unice sylvas hercynicas solummodo incolunt, ut ciues a Flora nostra paullo remotiores, cum temporis spatio, et occasione, eo quo par est studio eas colligendi exclusus, completam earum historiam tradere non potuerim, silentio potius praeterire, quam mancas describere malui.

Errata praecipua.

P. 13. nota lin. 5. lege 1768. p. 30. lin. 1. lege *plantulam*. p. 58. lin. 16. l. *sufficere*. p. 64. l. 23. *olivenfarbiger*. p. 84. lin. 13. l. *et*. p. 87. lin. 23. l. *fruticulosos*. p. 102. lin. 16. l. *pilos*. p. 109. lin. 17. l. *Bocksbeutel*. p. 139. nota lin. antepenult. dele posterius *vel*, lin. penult. l. *vel propagatio*. p. 160. lin. 21. l. *rosularum*. p. 164. lin. 15. l. *capsuligeras*. lin. 22. l. *aliquantum*. p. 167. lin. 1. dele *et*.

OMISSA ET ADDENDA.

Pag. 103. post LICHEN.

RICCIA. LINN. Gen. n. 1200. MICHEL. Gen. p. 106. WERNISCHECK. Gen. n. 1169. HALL. Hist. Helv. T. III. p. 67. SCOP. Flor. Carn. p. 116.

Frons coriacea, pulposa, repens, *Iungermanniis acaulibus*, vel *Marchantiae* similis, fructificationes globosas, punctorum fuscorum instar gerens.

Tribuuntur huic generi ab Auctoribus *Flores mares* et *feminei* distincti. *Flores mares* sessiles, apetalae, monandri; siue antherae subulatae, truncatae, apice dehiscentes. *Flores feminei* in eadem vel distincta planta: Capsula globosa, unilocularis, polysperma.

RICCIA *cristallina*.

Riccia frondibus superficie papillofis. Linn. Sp. Pl. p. 1605. n. 1. Scop. Flor. Carn. p. 116. n. 1.

R. fronde reticulata, aequabili, lobis denticulatis obtusis, simplicibus & cordatis. Hall. Hist. Helv. T. III. p. 67. n. 1896.

R. minor, pinguis, aspergine crystallina perfusa. Mich. Gen. p. 107. n. 1. Tab. 57. f. 7.

Lichen

Lichen palustris, Rutae folio. *Dill. musc. p. 535. Tab. 78. f. 12.*

rundgeschweift blättrige Riccie.

H. in agris vdis: legi primo vere in agris ante portam Wehndanam.

Frondes orbiculares, per radículas tomentosas terrae affixae, tres quatuor lineas ad semunciam latae, ex vno centro in lobos aliquot cordatos sectae. Substantia pulposa, exsiccata membranacea, aqua vero macerata, iterum ad pristinum statum redit: superficies papillosa, inaequalis, sub lente imprimis apparet. Color eleganter e pallido gramineo viridis. Margo in cordatos lobulos sectus, plicatus. Circa centrum puncta subrotunda nigra aliquot observantur, quae sub lente granulosa apparent, et fructificationes continere videntur.

Pag. 64. post lin. 20.

Musculus pulmonarius. *Blackwell. ed. Trew. Tab. 335.*

Pag. 69. post lin. 12. adde.

OFFICIN. Musci cathartici herba.

Pag. 71. lin. 5.

De insigni huius Lichenis usu in phthysi, legi merentur *Observationes XII. Clar. SCOPOLI in Anno Historico naturali II. (Lips. 1769 8vo.) pag. 107. sqq.* Consummatis phthysicis decoctum cum lacte vel aqua paratum exhibuit, qui exinde convaluerunt. *Nullum damnum, inquit, unquam experti sunt ii, qui hoc decocto lichene vsti sunt. Certissime prodest macilentis, tussiculosis, ad phthysin et cachexiam pronis, siue lacti, siue iusculis, siue aquae incoctus fuerit Lichen. Facilius tamen assumitur cum lacte, quam cum aqua, ob summam et plerisque intolerabilem amaritiam.*

Pag. 79. lin. 5.

Lichen cinereus terrestris. *Ertleber: Kraut, Aschfarbig Leber: Kraut. Blackwell. ed. Trew. Tab. 336.*

Pag. 106. lin. 12.

Icon *Oederi Flor. Dan. Tab. 359.*

Pag. 139. post notam sequentia adde:

De propagatione MUSCORVM legi meretur Cl. NECKERI *Commentatio de Muscorum et Algarum generatione*, inserta *Actis Academiae Theodoro-Palatinae Tom. II. p. 423.* (prodiit iste Tomus II. *Manhemii 1770.* in 4to), Hac in tractatione Vir Clarissimus sententiam suam: *ad algarum et muscorum generationem non requiri duplicem sexum*, quam iam pridem in *Flora sua Gallobelgica p. 422.* proposuit, vltius probat. Distincta organa mascula et feminea, seminaque vera, quae ab aliis auctoribus iis tribuuntur, negat. Experimenta varia cepit in quibusdam speciebus Muscorum, etiam talibus, quibus duplex adscribitur sexus, et obseruauit propagationem factam esse, licet fructificationum organa illa, quae tali *copulatiuae*, vt appellat, *generationi* inseruire putantur, destructa fuerint. In *Polytricho communi L.* experimentum sequenti modo describit:

„Anno 1766. postquam *Polytrichi communis* tam capsulas quam adollescentes stellulas, omni diligentia multauissemus: anno sequenti ex utroque indiuiduo abscisso aliae prognatae sunt plantae. Hae capsulis stellulisque destitutae, prolem continuarunt. Vtrumque distinctum indiuiduum ab altero separatum, ita, vt inter se inuicem communicatio nulla esse potuerit, absolutam genuit plantam: gemmula quae in centro stellulae, in furculum verum conuersa fuit.

„Dupliciter propagatur *Polytrichum*, per superiores inferioresque furculos. Priores nuda sunt primordia, semper praesentia, sessilia, quae pristinis insident plantis, euoluendorum furculorum compendium. Inferiores furculi, tenellae propagines plumuliformes, vel obductae, ad pristinorum furculorum radicantium basin germinantes, e terra proditae, alios furculos produunt

„munt, et vegetationis progressu, in praecedentium lo-
 „cum succedunt. Species plurimae stellifero individuo
 „carentes, radicalibus lateralibusque propaginibus gi-
 „gnuntur. *Polytrichi* stellifera alia individua sunt, in
 „quibus stellulis, oculis nudis armatisque, nullum rudi-
 „menti vestigium occurrit. Immo squamae potius ob-
 „seruantur nudaе, imbricatae quandoque coloratiusculae.
 „Setacea foliola si quae adsint, quae pistillum mentiun-
 „tur, proditurum furculum constituunt. In vna spe-
 „cie, furculos e centro stellulae suae quemque exstantes
 „quingies numerauimus repetitos: sesquicubitum lon-
 „gitudine adaequabat planta. In caeteris hoc nunquam
 „aduenit. Superiores ac inferiores *Polytrichorum* pro-
 „pagines continuo plantam propagare: primordia stel-
 „lularum centro locata, proliferam reddere distincte vi-
 „demus., *vid. Act. Theod. Palat. T. II. p. 425. sqq.*
 „Pistilla falso credita, continuorum 6 annorum obser-
 „uatione, veras plantulas fixas esse, quae in furculos
 „nouos resoluuntur, didicimus., *l. c. p. 431.*

„*Lycopodium Selago* in Muscis est, quod *Targio-*
 „*nia* in Algis. Cum primum prioris gemmaceum pri-
 „mordium a ramo discessit, absque foecundatione radi-
 „cat, inque plantam conuertitur. *Targionia* e lateribus
 „foliacea corpuscula emittit: haec cum a plantula adul-
 „ta soluantur, vegetant, crescuntque, quis hinc conclu-
 „dat corpuscula illa pistilli analogae, polline foecundata
 „esse?, *l. c. p. 430.*

Meram statuit *generationem euolutiuam* vt appellat,
 quam ex autopsia probat: „Per tres annos, inquit (*Flor*
Gallobelg. p. 424. sqq. nota) „continuos, in certo terri-
 „torio *Hypnorum* diuersorum (vt *rutabulum, serpens,*
 „*murale, cupressiforme, parietinum* etc.) congestorum
 „antheras adollescentes sedulo diiunxi, at per temporis
 „hocce spatium furculos nouos iterum produxere: prae-
 „terea *Hypnorum* varietas, vulgo *triquetrum, taxifer-*

„*me, praelongum, viticulosum, aduncum, serpens, lycopodioides*, et singulariter species *abietinum* et *fluitans*, quae in hacce provincia capsulas polliniferas certe nunquam producunt, nihilominus hi musci varietatesque nominatae, tanquam alii antheriferi, quotannis germinant, eorumque speciem perpetuant, quod nobis docet autopsia ac experientia., — —

„*Mniorum (serpyllifolium, undulatum, cuspidatum, hornum)* et *Polytrichorum* omnium utraque indiuidua distincta, quae apud nos vulgatissima, profecto per se regenerantur. Nam horum furculi bini, trimi, radices agunt, ex quibus alios vidimus tenellos, filiformes, squamulosos, albidos, siue rubellos natos, qui accrescendo plantas subministrant perfectas.,

„Vltcrius assertum suum probat experimento in siccis et vetustis plantis capto. „In horto regio *Trianensi* Ao. 1765. fortuito reperi inter plantas exoticas ex *Aueruia* nuper allatas, *Muscum*, nomine *Mnii maioris minus ramosi, capitulis crebrioribus, puluerulentis* insignitum, (huius mas etiamnum ignotus) ac in *Musc. Dilleniana* eximie delineatum; vide *Tab. XXXI. fig. 4.* absque fructificatione, et semicorruptum; illico in solum vliginosum collocatum: vidique aliquanto post, cum oblectatione, furculos novos ex semicorruptis enatos: capitulo terminali nudo., — —

„*Brya, rurale, striatum, Hypna, abietinum, parietinum; Lichenes, acetabulum, perlatus*, in pyxide per biennium asseruati, in solo humido, umbrosoque, bi trimestri spatio circiter expositi fuere, quo elapso mirati sumus, quod germinarint., *Aëtæ Theod. Palat. T. II. p. 444.*

„Semina et pollen antherarum negat: „*Muscorum, et Algarum* particulae germinantes *semina* abusive vocantur. Hae per solam generationem euolutinam educuntur

„cuntur plantae. — Capsularum puluisculus, genitalem farinam simulans, absolute vanus. *L. c. p. 445.*

Omnes Muscos et Algas, vt Plantas viuiparas, secundum sua principia, (quae omnia huc transferre, breuitatis studens, nequeo, et quae melius ex ipso indicato fonte hauriuntur) ad IV Ordines reducit, quae sunt:

- a) Gemmiparae, *nudas in adulto furculo gemmulas protrudunt. Huc pertinent Lycopodia, Hypna, Sphagna, Brya, etc.*
- b) Bulbiparae, *propagines bulbiformes euoluunt, quibus propagatur proles: vt Elia, quaedam Brya, Mnia, etc.*
- c) Plumuliparae, *furculos e pristinis nouellos plumuliformes, sub terra reconditos emittunt. In hoc ordine comparent Polytricha, plura Mnia, Brya, etc.*
- d) Frondiparae, *puluerulentas particulas ad superficiem, aut frondium primordia ad marginem, inque cauitate promunt, e. g. Marchantiae, Lichenes, Iungermanniae acaules, Ricciae, Anthocerotes, etc. vid. Act. cit. p. 445, et 446.*

Tractatui de Muscorum et Algarum generatione adiunxit Vir Cl. Enumerationem Stirpium Palatinarum, annis 1768-1769. collectarum, in qua plures easque rariores stirpes obseruationibus, et quaedam figuris aere incisus illustrauit. Synonyma ac loca natalia, hic neglecta, vt et plura de difficiliorum cognitu generum plantarum, imprimis cryptogamicarum, obseruata, ad *Floram Palatinam*, quam meditatur, reseruat.

Pag. 169. lin. II.

Polytrichum aureum. *Blackwell. ed. Trew. Tab. 375.*

INDEX

- Acrostichum* 300.
Acrostichum 292. 298. 300. 302.
 307
Adiantum 172. 298. 300. 320
Asplenium 291. 300

Bryum 178. 203
Bryum 145. 163. 167. 173. 178.
 203 215
Byssus 12. 19
Byssus 21

Chara 31. 35.
Conserua 19. 26
Conserua 31. 33
Coralloides 36. 44. 45. 70. 83. 98

Dryopteris 324

Filicula 298. 301. 302. 304. 320
Filix 289. 300. 302. 306. 324
Fontinalis 260

Hepatica 120. 132
Hepaticoides 111. 128
Hypnum 202. 260
Hypnum 179. 180. 260. 261

Jungermannia 103. 130

Lichen 36. 103
Lichen 15. 18. 131. 133
Lichenastrum 105. 130
Lichenoides 36. 83
Lingua ceruina 291. 293
Linkia 27. 28. 29
Lonchitis 287. 302
Lunaria 285
Lunularia 103. 105
Lycopodium 268. 276
Lycopodioides 268

Marchantia 131. 134
Marfilea 103. 105
Mnium 143. 167
Mnium 123. 167. 168. 172. 175.
 198. 203. 206
Muscoides 103. 110. 126. 128

Ophioglossum 282
Osmunda 284
Osmunda 286

Paronychia 298
Phascum 266. 268
Phyllitis 291. 293. 295. 306.
Polypodium 302. 326
Polytrichum 167. 178
Polytrichum 296
Pteridium 288
Pteris 288
Pteris 302. 310
Pulmonaria 64

Riccia 328
Ruta muraria 291. 297. 298. 300

Selaginoides 259
Selago 268. 273
Sphagnum 263. 267
Sphagnum 179. 180. 266. 268
Spicant 287
Struthiopteris 286

Thelypteris 308. 224
Tremella 28. 30
Tremella 26. 27. 52
Trichomanes 291. 296

Vlua 26
Vlua 28. 29
Vsnea 36. 99. 103