4. 65

Bibl. Greener.

a 3.

Bibliothecæ

*M. Hyacinthi Theodori Baron,
Antiqui Facultatis Medicinæ
Parisiensis Decani, nec non
Castrorum Regis et Exercituum
Protomedici.*

X

4

e/

9th de m. 1660

HORTVS ACADEMICVS
LVGDVNO-BATAVVS
APVD
CORNELIVM BOVTESTEYN
MDCLXXXVII

G. R. +

Collegij Parisiensis Societatis 1687.

HORTI ACADEMICI
LUGDUNO-BATAVI
CATALOGUS

exhibens

Plantarum omnium Nomina, qui-
bus ab anno MDC LXXXI ad annum
MDCLXXXVI Hortus
fuit instructus

ut &

Plurimarum in eodem cultarum & à nemine
hucusque editarum

DESCRIPTIONES

&

ICONES

Auctore

PAULO HERMANNO

Medicinae & Botanices Professore.

LUGDUNI BATAVORUM,
Apud CORNELIUM BOUTESTEYN.
MDC LXXXVII.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

2U

Boydell

1876

April

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1876

April

1876

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1876

April

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1876

Illustribus & Magnificis

Academiae Lugduno-Batavae

CURATORIBUS

D. DANIELI VAN WYNGAERDEN

Baroni de Wyngaerden, Benthuyfen, Ruybroeck &c. Toparchæ de Werckendam, Moermond, Renesse, Zuydlant, Noordwelle &c. Equestris Hollandiæ Ordinis nomine ad Confessum Celsissimorum Fœderati Belgii Ordinum Generalium Deputato, Aggerum Urbis Woerdanæ & Aquæductuum totiusque Territorii Præfecto & Satrapæ, in supremâ Aggerum Delflandiæ Curia Assessori, ad Serenissimum Daniæ Regem Exlegato.

D. HIERONYMO DE BEVERNING, JC.

Theilingæ Toparchæ, Reipublicæ Goudanæ Viro Consulari, multis pro Fœderato Belgio Legationibus Illustri, ac rerum gestarum Gloria Claro.

D. CONRADO VAN BEUNINGEN, JC.

Reipublicæ Amstelodamensis Viro Consulari, Legationum pro Patriæ salute ad Potentissimos Reges Inclyto.

Eorumque Collegis

Nobilissimis & Amplissimis

Reipublicæ Lugduno-Batavæ

CONSULIBUS

D. J A C O B O V A N D E R M A E S
In supremâ Aggerum Rhenolandiaë Curiâ
Assessori, Ærarii Academiaë Lugd. Batav.
Præfecto & p. t. Coss. Præsidi.

D. JOHANNI VAN VESANEVELT, JC.

D. JOHANNI VAN BANCHEM,

D. CORNELIO PAATS, JC.

ut &

Amplissimo Consultissimoque Viri.

D. PETRO BURGERSDICIO, JC.
Reipublicæ Lugduno-Batavæ Syndico &
Illustribus D. D. Curatoribus à Secretis.

DE-

DEDICATIO.

HA est Nominis Vestri Auctoritas atque Gloria, ut quâ latè patet orbis religiosa Veneratione suspiciatur. Hic verò cultus *Illustrissimi Proceres* Jure quodam Vobis debetur. Sive enim Vestra in Bono publico moderando respiciatur Prudentia, sive Vestra in liberales artes & doctrinas perpendantur merita, nemo gentium est, quin Vobis sit postponendus. Hoc inter innumera illa Virtutum Vestrarum facta atque miracula vel Academia nostra testatur, divino prorsus con-

DEDICATIO.

filio vestrisque faustis auspiciis
ad illud maturitatis fastigium
evecta, ut, quod olim pro-
pria laus fuit Romæ & Athe-
nis, Divinarum Humana-
rumque rerum Patria & Pro-
ma conda plenâ omnium con-
cione celebretur. Fulgent in
hac ubivis amplissima vestra
monumenta & clarissima de-
cora, quibus omnium Artium
Disciplinas magnificè exor-
nastis, & exornatas indies
novis auctibus amplificatis.
Ut silentio præteream publi-
cum vestrum *βιβλιοθηκον*, sump-
tuosam Bibliothecam, am-
plissima Theatra, Anatomica,
Chemica, Physica, Astrono-
mica coeterosque apparatus,
ad

D E D I C A T I O.

ad usum decorem & commoda
Docentium Discentiumque
instructa. Satis sit, si ad Hor-
tum Vestrum provocem, Aca-
demiæ & Urbis Vestræ præ-
fulgentissimum jubar, cui,
tàm quoad loci dignitatem &
amoenitatem, quàm Stirpium
ubertatem & perelegantem
seriem, nullibi unquam Sol
aspexit parem. Non Hortum,
sed cultissimum Paradisum
quispiam dixerit, in quo,
quicquid eximii habet vel hic
vel alter orbis, uno quasi in-
tuitu contemplari licet. Hu-
jus splendorem & admira-
tionem augent augustæ in eo
exstructiones, Ambulacra,
Aquagia, vitrea Hypocausta,
* 5 Fo-

DEDICATIO.

Foculorum subterraneorum
vaporaria, aliique magnifici ad
plantarum cultum & ornatum
compositi apparatus, quorum
interventu cœli nostri rigidior
intemperies ad votum no-
strum temperatur, & stirpes
delicatâ superbiâ contumaces
nullas nec hyemis nec æstatis
sentiunt vicissitudines, sed in
perpetuò virente fertilitate
custodiuntur, & ad summam
maturitatem perducuntur. O
quàm jucundum oculis & in-
tellectui capiunt pabulum, O
quàm saluberrimam frugem
reportant, qui hâc famâ
perciti, Horti vestri miracu-
la spectatum hûc appellant.
Nihil porrò amplius superes

DEDICATIO.

se rectè existimastis, *Illustrissimi*
Moecenates, quàm ut Flo-
reæ vestræ opes in seram po-
steritatis memoriam & per-
petuum vestrum monumen-
tum tabulis inscriberentur
cartaceis, & per omnes or-
bis incolas, quibus vel Corin-
thum Vestram propiùs adire
non contingit, distraheren-
tur & disseminarentur. Quod
munus cùm ex prudenti ve-
stro decreto mihi sit commis-
sum, pro eâ quâ debui erga
Vos observantiâ & quâ potui
ingenii solertiâ conficere, &
Vestro Illustrissimo Nomini con-
secrare & debui & volui.
Hoc meum studium, si Vo-
bis vel mediocriter probari
sen-

D E D I C A T I O.

senfero , ingens beneficium
agnoscam, quod omni cultu
pleno obsequio & jugi labo
re demereri conabor. Coete
rum Venerabor , Optimum
Maximum, ut Academiae Ur
bisque Vestrae Majestas

Crescat occulto velut arbor ævo
& Gloria Vestra amplissimis
Virtutibus aucta, per omnem
seculorum seriem feliciter de
ducatur. In his definit votis

Illustris & Magnifici Nominis vestri,

Lugduni Batavorum
ipsis Kal. Decemb.
M DC LXXXVI.

Cultor humillimus.

PAULUS HERMANNUS.

ADMONITIO

AD

REI HERBARIÆ STUDIOSOS.

Antequam cartaceum hunc ingrediari Hortum, paucis Te moneri cupio, quid in studiorum tuorum gratiam præcipuè præstiterim vel saltem præstare voluerim: Stirpes omnes, quibus Hortus Lugduno-Batavus ab integro sexennio, quo ejusdem curam sustinui, instructus fuit, serie Alphabeticâ recensui, & singulas, in quantum ordinis ratio permisit, suis legitimis generibus aptavi, argumento desumpto à fructificatione, hoc est seminum eorumque capsularum dispositione, ceu parte plantarum præcipuâ & constantissimâ.

ADMONITIO.

tissimâ. Hoc vero illico Tibi apparebit
ex literarum varietate & linearum
intercapedine. In Nomenclaturis se-
quutus sum ductum præcipuorum no-
stri ævi Botanographorum CASTA-
RI & JOHANNIS BAU-
HINI ut & ROBERTI MO-
RISONII, aliorumque apud quos
plantas, à laudatis auctoribus omissas
invenire licuit. Quas verò à nemini-
busque divulgatas, in Horto colui-
aptis nominibus (paucissimis forte
exceptis) adornavi, plurimam partem
descripsi, & delineavi, simul
nonnullos autorum defectus, à Bota-
nophylis hætenus desideratos, supplevi.
Singulis Titulis seu Periodis utpluri-
mum illud nomen præmisi, quod ju-
re naturalis Characteris magis videba-
tur appositum; Cætera verò tanquam

ADMONITIO.

*Synonyma postposui, factâ tamen ubi-
vis mentione auctoris libri & paginae.
Inspecturus itaque Plantæ cujusdam
nomen, illico agnosces ejus genus, &
ex cujusnam auctoris libro & pagina
Plantæ facies, Synonymia, Virtutes
aliaque ad plenariam Plantæ cogni-
tionem spectantia sint petenda: Vide-
licet Morisonius Te docebit imprimis
Plantæ Characterem, Casparus Bau-
hinus in Pinace Synonymiam, Jo-
hannes Baubinus in tribus suis Volu-
minibus Historiam naturalem & me-
dicam. Quid ex aliorum & nostris
descriptiunculis capere possis emolu-
menti, ipse videbis. Optassem equi-
dem (maxime enim è re tuâ fuisset)
ut Historiam Plantarum naturali
methodo digestam JOHANNIS
RAFI huc conferre, ejusque placita
nostris*

ADMONITIO.

nostris accommodare potuissem, sed quoniam desideratissimus ille liber nimis serò, postquam hic Catalogus typis ferme excessisset, ad manus nostras pervenit, votum meum explere non licuit. Quod demum expleri posse confido, si Hortum rarioribus stirpibus auctum & mendis, quæ irrepsere, purgatum, de novo prælo commisero. Cæterùm, quas plantas in Belgico nostro solo sponte nascentes ipse reperi, & in Hortum transtuli, iis Asteriscum * præfixi, Annuis verò notulam ANN. subjeci. Reliqua à me præstita ex attentâ lectione facilè apparebunt. Vale, & laboribus nostris fave.

Præcipuorum nominum ab-
breviatorum dilucidationes.

Act. Haffn. Barth. Thomæ Bartholini Acta
Medica & Philosophica Hafniensia.

Aldin. Hort. Farn. Exactissima descriptio ra-
riorum quarundam Plantarum Horti Far-
nesiani Tobiaë Aldini.

Alpin. Exot. De Plantis exoticis libri duo Pro-
speri Alpini.

Alpin. Pl. Egypt. De Plantis Ægypti liber
ejusdem.

Ambros. Phyt. Hyacinthi Ambrosini Phytolo-
giæ partis primæ tomus primus.

Amm. Char. Character Plantarum naturalis
Pauli Ammanni.

Boccon. Ic. & Descr. Pauli Bocconis Icones &
Descriptiones rariorum Plantarum Siciliae.

Boccon. Epist. Epistola 21. en Recherches &
Observations Ejusdem.

Bod. à Stap. Theophrasti Eresii de Historia
Plantarum libri decem Johannis Bodæi à
Stapel.

Bont. Hist. Jacobi Bontii Historia naturalis &
Medica Indiae Orientalis cum commentario
Pisonis.

Breyn. Cent. Jacobi Breynii Exoticarum Plan-
tarum Centuria prima.

Breyn. Prod. Prodromus fasciculi rariorum
ejusdem.

Boym. Fl. Sin. Boymii Flora Sinica.

* *

C. B.

C. B. Matth. Andreae Matthioli Opera, Caspari Bauhani.

C. B. Phyt. Phytopinax Caspari Bauhini.

C. B. P. Pinax ejusdem.

C. B. Prod. Prodrumus Theatri Botanici ejusdem.

Cat. Hort. Reg. Par. Hortus Regius, Parisiis.

Cat. Hort. Oxon. Catalogus Horti Oxoniensis Philippi Stephani & Guilielmi Brounei.

Clus. cur. post. Caroli Clusii Curæ posteriores.

Column. Explor. Fabii Columnæ minus cognitæ Plantarum Ecphrasis.

Column. Not. Ejusdem in Nardi Antonii Rechi volumen annotationes.

Column. Phytob. Phytobasanus ejusdem.

Comel. Johannis Commelini Catalogus Plantarum indigenarum Hollandiæ.

Corn. Jacobi Cornuti Canadensium Plantarum aliarumque nondum editarum Historia.

Dod. Mem. Memoires pour servir a l'Histoire des plantes Dodart.

Ferrar. Flor. Cult. Johannis Baptistæ Ferrarii Flora seu Florum cultura.

Ferr. Hesp. Ejusdem Hesperides.

Frid. Cæs. Tab. Phytosophicarum Tabularum Principis Friderici Cæsii Lyncei pars prima.

Gerhard. Herball Histori of Plantes Johannis Gerhardi Thomæ Johnson.

Hern. Hist. Mex. Nova Plantarum Animalium & Mineralium Mexicanarum Historia Francisci Hernandez.

Hofman. Flor. Floræ Altdorffinæ deliciæ hortens.

tenfes Mauritiï Hofmanni.

Hort. Eyst. Hortus Eystettensis Basilii Bessleri.

Hort. Malab. Horti Indici Malabarici Henrici van Rheede à Drackenstein pars 1. 2. 3. 4. 5. 6.

J. B. t. l. Historiæ Plantarum universalis Johannis Bauhini tomus 1. 2. 3.

Jonqu. Hort. Dionysii Jonquet Hortus.

Jonst. de Arb. it Mantiss. Historia Naturalis de Arboribus, Libri sex Johannis Jonstonii.

Lugdun. Historia generalis Plantarū. Lugduni.

Magnol. Bot. Botanicum Monspeliense Petri Magnoli.

Marckgr. Hist. Georgii Marckgravii Historia rerum naturalium.

Mentz. Ind. it. Pugil. Index nominum Plantarum Multilinguis Christiani Mentzelii cum Pugillo rariorem Plantarum ejusdem.

Merret. Pin. Pinax rerum naturalium Britannicarum Christophori Merret.

Moris. Hist. Plantarum Historiæ universalis Oxoniensis pars secunda Roberti Morison.

Moris. Hort. Bles. Hortus Regius Blesensis auctus ejusdem.

Moris. Umbel. Plantarum umbelliferarum distributio nova ejusdem.

Munt. Prax. Waare Oeffening der Planten Abrahami Munting.

Munt. Brit. Vera herba Britannica ejusdem.

Munt. Al. Aloidarium ejusdem.

Mus. Zeyl. Musæum Zeylanicum continens Plantarum Animalium & Mineralium, quæ Zeylona Insula suppetit, Historiam, in quâ

adornandâ subcivivis horis defudat Autor.
Park. Theatr. Theatrum Botanicum Johannis
 Parkinsonii.
Pison. Hist. Guilielmi Pisonis de Indiæ utrius
 que re naturali & medicâ.
Pison. Mantiss. Ejusdem Mantissa aromatica.
Raj. Catal. Catalogus Plantarum Angliæ Jo-
 hannis Raji.
Raj. Hist. Historia Plantarum ejusdem.
Sim. Paul. Quadr. Bot. Quadripartitum Bo-
 tanicum Simonis Pauli.
Sterbeeck citr. cult. Francisci Sterbeeck Citri-
 cultura.
Sterb. Theatr. Fung. Theatrum Fungorum
 ejusdem.
Sutherl. Hort. Edinb. Hortus Medicus Edin-
 burgenfis James Sutherland.
Swert. Flor. Florilegium Emanuelis Swertii.
*Tab. Jacobi Theodori Tabernæmontani Krau-
 terbuch.*
Triumpf. Observ. Observationes de Ortu ac
 Vegetatione Plantarum Johannis Baptista
 Triumfetti.
Tur. Hist. Pl. Historia Plantarum Georgii
 Turre.
Vesling. Obs. Johannis Vesslingii de plantis Æ-
 gyptiis Observationes.
Zanon. Hist. Bot. Historia Botanica Jacobi Za-
 noni.
 * Plantas in Belgio sponte provenientes de-
 notat.
 ANN. Annuas indicat.

H O R T U S

ACADEMICUS

LUGDUNO-BATAVUS.

A.

Abelmosch. V. Althæa.

ABIES conis fursum spectantibus,
 five Mas C.B.P. 505. Taxi foliis.
 Abies alba, five Fœmina C.B.P. 505. Abies
 Fœmina, five ἐλάτη θήλεια I. B. tom. 1. l. 9. 231.
 Abies rubra, five Picea major prima C.B.P.
 493. Picea Latinorum, five ἐλάτη ἄρρεν Abies
 Mas Theophrasti I. B. tom. 1. l. 9. 238.

ABROTANUM Mas angustifolium majus
 C.B.P. 136. Abrotonum vulgare I B. tom.
 3. l. 26. 192. Cauliculis viridantibus.
 Idem cauliculis rubentibus.

Abrotanum Mas angustifolium maximum C.B.
 A P. 16.

2 HORTUS ACADEMICUS

P. 136. Abrotanum camphoratum *vulgò*.
Abrotanum Mas angustifolium minus *C. B. P.*

136. Abrotonum cum pulchris corymbis
B. tom. 3. l. 26. 194.

Abrotanum campestre *C. B. P.* 136. Artemisi
tenuifolia, sive leptophyllos, aliis Abroto
num sylvestre *I. B. tom. 3. l. 26. 194.* Inodo
rum, cauliculis ex viridi albicantibus.

Idem cauliculis rubentibus *C. B. P. Var.* 136.

Abrotanum campestri simile Tingitanum.

Formâ & crescendi modo priori confimile
videtur, odoris & saporis aromatici non
omnino expers; ubi verò adoleverit, acqui
rit virgulta magis lignosa & fruticosa. Foli
sunt tenuiora, hilari virore nitentia, inferio
ra ut plurimum trilobata, superiora integra
Semina exigua, cinereo-spadicea more con
generum. Habemus ex Anglia, ubi semina
bus Tingide missis prodiit.

A B R O T A N U M Fœmina foliis teretibus *C.*
B. P. 136. Chamæcyparissus *I. B. tom. 3. l.*
26. 133. Santolina *vulgò*.

Abrotanum Fœmina flore majori, foliis villosis
& incanis *C. B. P.* 137.

Abrotanum Fœmina viride *C. B. P.* 137.

Abrotanum Fœmina foliis Rorismarini majus
C. B. P. 137.

Abrotanum Fœmina canescens foliis Stœcha
dis citrinæ *Breyn. Pr. I.*

Abrus Alpin. v. Phaseolus.

LUGDUNO-BATAVUS.

3

ABROTANUM CAMPESTRI SIMILE TINGITANUM.

4 HORTUS ACADEMICUS

ABSINTHIUM arborefcens Lobelii I. B. tom. 3. l. 26. 173. Abrotanum latifolium arborefcens C. B. P. 136.

* Absinthium ponticum, feu Romanum Officinarum, feu Dioscoridis C. B. P. 138. Absinthium vulgare majus I. B. tom. 3. l. 26. 167. Foliis latioribus.

Idem foliis anguftioribus.

Absinthium infipidum, Absinthio vulgari fimile C. B. P. 139. Absinthium infipidum I. B. tom. 3. l. 26. 138.

Absinthium ponticum Creticum grati odoris C. B. P. 138. Absinthium ponticum & Romanum quibusdam, aliis Seriphium I. B. tom. 3. l. 26. 167.

Absinthium ponticum tenuifolium incanum C. B. P. 138. Absinthium ponticum vulgare folio inferius albo I. B. tom. 3. l. 26. 175.

Idem planè incanum C. B. P. 139. Foliis anguftioribus.

Idem odoratifsimum.

Hoc ab Absinthio planè incano differt folio odore.

Absinthium ponticum tenuifolium Austriacum C. B. P. Absinthium Austriacum tenuifolium I. B. tom. 3. l. 26. 179.

Absinthium maritimum Lavendule folio C. B. P. 149. Absinthium maritimum latifolium Matthioli I. B. tom. 3. l. 26. 174.

* Absinthium Seriphium Belgicum C. B. P. 180.

I. B. tom. 3. l. 26. 178.

Abfinthium Seriphium Gallicum C. B. P. 139.

*Abfinthium Seriphium tenuifolium mari-
num Narbonense I. B. tom. 3. l. 26. 177.*

*Abfinthium Alpinum umbelliferum latifolium
C. B. P. v. Ptarmica.*

*Abfinthium albis floribus, capitulis squarosis I. B.
V. Ptarmica.*

Absus I. B. v. Senna.

Abutilon ejusque species I. B. v. Althæa.

ACACIA Ægyptiaca foliis Scorpioides legumi-
nosæ filiquis albis compressis, isthmo interce-
ptis, floribus luteis. Acacia foliis Scorpioi-
des leguminosæ C. B. P. 392. Acacia vera I. B.
tom. 2. l. 12. 429. Acacia. Sant Akakia *Alpin.
de Plant. Ægypt. 9.* Acacia *Vesling. Observ.*
6. Acacia Ægyptia *Colum. in Rech. 866.*

Eadem floribus albis *Alpin. de Plant. Ægypt.*
10. *Descr.*

Acacia Indica foliis Scorpioides leguminosæ
filiquis fuscis teretibus resinosis. Acacia Indi-
ca Farnesiana *Aldin. Hort. Farnes. 2.*

ACACIA Americana foliis Coluteæ Monococ-
cos filiquis echinatis. Acacia Americana Ro-
bini. *Cornut. 272.*

Acacia trifolia C. B. P. v. Cytisus.

Acacia Germanica vulgò. v. Prunus Sylvestris.

Acajou Pison. v. Anacardium.

Acanthium vulgò. v. Carduus.

Acanthium Illiricum. I. B. v. Carduus.

ACANTHUS fativus vel mollis Vergilii C. B. P. 383. Carduus Acanthus, five Branca urfina I. B. tom. 3. l. 25. 75.

Acanthus aculeatus C. P. B. 383. Carduus Acanthus, five Branca urfina spinosa I. B. tom. 3. l. 25. 77.

Acarina flore luteo patulo C. P. B. v. Carlina.

Acarina major caule folioso C. B. P. v. Carduus.

Acarina Theophrasti vulgò v. Carduus.

Acarinae similis flore purpureo I. B. v. Carduus.

* **A**CER montanum candidum C. B. P. 430. Acer majus multis falsò Platanus I. B. tom. 1. l. 8. 868.

Acer montanum flavum, five crispum C. B. P. 431.

* Acer campestre & minus C. B. P. 431. Acer vulgare minori folio I. B. tom. 3. l. 8. 166.

Acer trifolia C. B. P. 431. Acer Monspeffulanum I. B. tom. 1. l. 8. 167.

* **A**CETOSA pratensis C. B. P. 114. *Moris. Hist.* 582. Oxalis vulgaris I. B. tom. 2. l. 23. 989.

* Acetosa crispa *Moris. Hist.* 2. 582. Oxalis crispa I. B. tom. 2. l. 13. 900.

Acetosa montana radice rectâ pedali aut fequipedali, Lapathi instar, absque fibris *Moris. Hist.* 2. 583.

Acetosa tuberosâ radice C. B. P. 114. Oxalis tuberosâ radice I. B. tom. 2. l. 23. 991. Acetosa Ragufina radice tuberosa *Moris. Hist.* 2. 583. *Zanon. Hist. Bot.* 12.

Acetosa Americana foliis longissimis pediculis donatis C. B. P. 114. *Moris. Hist. 2. 583.* An *Oxalis Africana* I. B. *tom. 2. l. 23. 992.* ANN.

Acetosa vesicaria Tingitana perennis repens, foliis longis sinuatis *Moris. Hist. 2. 583.* *Acetosa dentata perennis Tingitana Zanon. Hist. Bot. 14.*

Acetosa rotundifolia hortensis C. B. P. 114. *Moris. Hist. 2. 583.* *Oxalis folio rotundiore repens* I. B. *tom. 2. l. 23. 991.*

Acetosa rotundifolia repens Eboracensis folio in medio deliquium patiente *Moris. Hist. 2. 583.*

* *Acetosa arvensis lanceolata* C. B. P. 114. *Moris. Hist. 2. 584.* *Oxalis parva auriculata repens* I. B. *tom. l. 23. 992.*

* *Acetosa lanceolata angustifolia repens* C. B. P. 114.

Acetosa Cretica semine aculeato C. B. P. 114. *Moris. Hist. 2. 584.* *Oxalis minor aculeata Candiaë* I. B. *tom. 2. l. 23. 993.* ANN.

Acetofella vulgò. v. Oxis.

Achillea millefolia odorata I. B. *v. Millefolium.*

Acinos multis I. B. *v. Clinopodium.*

ACONITUM *Lycoteronon luteum* C. B. P. 183.

Aconitum folio Platani, flore luteo pallescente I. B. *tom. 3. l. 34. 652.*

Idem ampliore caule & foliis C. B. P. *Var. 183.*

Idem humiliore caule & minoribus foliis C. B. P. *Var. 283.*

Aconitum lycoctonon luteum, foliis in acumen
luteum desinentibus.

Aconitum salutiferum, seu *Anthora* C. B. P. 184.

Antithora flore luteo *Aconiti* I. B. tom. 3. l. 34.
669.

Aconitum cæruleum, seu *Napellus* I. C. B. P. 183.

Aconitum magnum purpureo flore, vulgo

Napellus I. B. tom. 3. l. 34. 555.

Aconitum cœruleum *Napelli* flore C. B. P. 183.

Aconitum lycoctonon autumnale, *Napello*

simile I. B. tom. 3. l. 34. 656.

Idem flore cœruleo & albo variegatum C. B. P.

Var. 183.

Aconitum violaceum, seu *Napellus* secundus

C. B. P. 183. *Aconitum* *Napello* simile, sed mi-

nus cœruleum præcocius I. B. tom. 3. l. 34. 656.

Aconitum purpureum, seu *Napellus* tertius

C. B. P. 183: *Aconitum* *Lycoctonon*, seu *Na-*

pello simile *Neubergense*, foliis latioribus,

flore purpureo I. B. tom. 3. l. 34. 657.

Aconitum cœruleum minus, seu *Napellus* mi-

nor C. B. P. 183. *Aconitum lycoctonon*, flo-

re cœruleo, galeâ elatiori, radice bulbosâ I. B.

tom. 3. l. 34. 659.

Aconitum cœruleum hirsutum, flore *Consoli-*

dæ *regalis* C. B. P. 183. *Aconitum lycoctonon*

cœruleum, *calcar* magno I. B. tom. 3. l. 34. 657.

Aconitum unifolium luteum bulbosum C. B. P.

V. Helleborus.

Aconitum racemosum C. B. P. v. *Christophoriana.*

Aco-

Aconitum baccis niveis Corn. v. Christophor.

Aconitum Pardalianches C. B. P. v. Ranunculus.

* **A** CORUS verus, five Calamus aromaticus Officinarum C. B. P. 34. Calamus aromaticus vulgaris, multis Acorum I. B. tom. 2. l. 19. Europæus radice crassiori.

Idem Asiaticus radice tenuiore. Calamus aromaticus *Garziæ ab Horto Aramat. H. I. l. I. c. 22*

Acorus hic omnibus partibus convenit cum Europæo, exceptâ solâ radice, quæ tenuior est & compactior, superficie crebrius geniculatâ, odore & sapore gratiori. Sponte suâ luxuriat in Malabarâ & Insulâ Zeylan, unde à me anno M. DC. Lxxv. ad Clarissimum Dominum Arnoldum Syen Medicinæ & Botanices, dum viveret, in hâc Academiâ Professore dignissimum transmissus, & in hortum plantatus, in hunc usque diem lætissimè viret. Incolis Vazabu & Vazumbo audit. Ejus virtutes videantur apud *Garziam ab Horto. l. c.*

Acorus adulterinus C. B. P. v. Iris.

Actæa Plinio C. B. P. v. Christophoriana.

Adami Poma I. B. v. Malus Limonia.

A DIANTHUM foliis Coriandri C. B. P. 355.

Adiantum, five Capillus Veneris I. B. tom.

2. l. 37. 751.

Adiantum foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro C. B. P. 355. Adiantum nigrum officinarum I. B. tom. 3. l. 37. 742.

* Adian-

- * *Adiantum album murarium. Ruta muraria.*
C. B. P. 356. I. B. tom. 3. l. 37. 753.
- * *Adiantum album Filicis folio* I. B. tom. 3. 471.
Filicula fontana major C. B. P. 358.
- * *Idem minus. Filicula fontana minor* C. B. P.
358.

Adiantum aureum vulgò. v. Muscus.

A DONIS hortensis flore minore atrorubente
C. P. B. 178. ANN.

- * *Adonis sylvestris flore phoeniceo, ejusque fo-*
liis longioribus C. B. P. 178. *Flos Adonis*
vulgò, aliis Eranthemum I. B. tom. 3. l. 26.
125. ANN.

Eadem flore luteo C. B. P. *Var.* 178. ANN.

Adonis Hellebori radice Buphthalmi flore.
Helleborus niger tenuifolius Buphthalmi flo-
re C. B. P. 187. *Buphthalmum Dodonæi, aliis*
Confiligo tenuifolia I. B. tom. 3. l. 34. 637.

Eadem caule geniculato, flore magno instar
Tulipe. *Helleborus niger Ferulaceus, sive*
Pseudo-helleborus caule geniculato flore in-
star Tulipe *Menz. Pugil.*

Adrachne Theophrasti I. B. v. *Arbutus.*

Æg ylops ejusque species I. B. v. *Festuca.*

Æg ylops Aspris Theophrasti I. B. v. *Quercus.*

Æschinomene mitis Americana foliis Acacia
angustioribus, siliquis longis angustis, semine
quadrangulari *Breyn.* v. *Herba mimosa.*

Æthiopis folio sinuoso C. B. P. v. *Horminum.*

Agem Lilac Persarum Corn. v. *Syringa.*

AGE.

AGERATUM foliis ferratis C. B. P. 221.
 Ageratum plerisque, Herba julia quibus-
 dam I. B. *tom.* 3. *l.* 26. 142.

Idem corymbis longioribus & magis compa-
 ctis C. B. P. *Var.* 221.

AGNUS CASTUS Vitex foliis angustioribus
 Cannabis modo dispositis C. B. P. 475. Agnus
 folio non ferrato I. B. *tom.* 1. *l.* 8. 205. Flori-
 bus purpureis.

Idem floribus albidis *Cat. Hort. Reg. Paris.* 186.

Idem floribus coeruleis.

Agrifolium vulgò I. B. v. *Aquifolium*.

AGRIMONIA inodora, seu minus odora *Moris.*
Hist. 2. 614. Eupatorium Veterum, seu A-
 grimonia C. B. P. 321.

Eadem maximè odorata. Eupatorium maximè
 odoratum *Moris. Hist.* 2. 615. Eupatorium
 odoratum C. B. P. 321.

Agrimoniæ similis C. B. P. *Moris. Hist.* 2. 615.

Agrimonioides *Column. Ecphr. part.* 1. 145.

Algul I. B. v. *Genista*.

Aizoon vulgò. v. *Sedum*.

Aizoon palustre I. B. v. *Stratiotes*.

ALATERNUS latifolia, Celastrus dicta. Cela-
 strus Theophrasti *Clus. Cur. Post.* 2.

Alaternus, seu Phylica elatior C. B. P. 476. Spina
 Burgi Monspeliensium I. B. *tom.* 1. *l.* 1. 542.

Alaternus, seu Phylica humilior C. B. P. 477.

Ala

Alaternus, seu Phylica foliis angustioribus & profundius ferratis.

Alaternus, seu Phylica aurea, sive foliis ex luteo variegatis *Cat. Hort. Reg. Par. 6. Moris. Hort. Bles. 227.*

Eadem argentea, seu foliis ex albo variis *Cat. Hort. Reg. Par. 6. Moris. Hort. Bles. 227.*

Alcanna vulgò. v. Phillyrea.

ALCEA frutescens folio rotundiori incano *Moris. Hist. 2. 526.* Althæa frutescens folio rotundiori incano *C. B. P. 316.* Althæa arborescens. *I. B. tom. 2. l. 23. 956.*

Alcea vulgaris major *C. B. P. 316. Moris. Hist. 2. 527.* Alcea vulgaris *I. B. tom. 2. l. 23. 953.* Flore purpureo.

Eadem flore albo, vel candidiore *C. B. P. Var. 316.*

Alcea Cannabina *C. B. P. 316. Moris. Hist. 2. 527.*

Alcea Pentaphylli folio, vel Cannabino *I. B. tom. 2. l. 23. 958.*

Alcea hirsuta, seu villosa *C. B. P. 317. Moris. Hist. 2. 528. I. B. tom. 2. app. 1067.*

Alcea Pernambuccana Carpinifolio, flosculis minimis luteis, semine simplici rostro donato *Moris. Hist. 2. 528.* Althæa peregrina semine rostrato flore luteo minimo *Moris. Hort. Bles. 229. Bocc. de Plant. Sic. 11. Zanon. Hist. Botan. 132. ANN.*

Eadem Zeylanica folio latiori cordiformi.

Hujus folia summis marginibus cordis figuram

ram referunt; Caules rubent; Radix perennat, Cætera cum priori conveniunt.

Alcea Virginiana Carpini folio flosculis minimis luteis, semine duplici rostro seu aculeo prædito *Hist. Moris. 2. 528. ANN.*

Eadem *Zeylanica* flosculis fasciculatim congestis *ANN.*

Sunt huic flores admodum exigui fasciculatim seu in racemo densissimè dispositi; cæteræ verò partes præcedenti omnino similes.

Alcea vesicaria C. B. P. v. *Althæa*.

Alcea Indica magno flore C. B. P. v. *Althæa*.

Alcea Indica parvo flore C. B. P. v. *Althæa*.

Alcea Ægyptia villosa C. B. P. v. *Althæa*.

Alcea arborescens Syriaca C. B. P. v. *Althæa*.

* **A**LCHIMILLA vulgaris C. B. P. 319. Alchimilla perennis viridis major foliis ex luteo virescentibus *Moris. Hist. 2. 195. Pes Leonis, sive Alchimilla I. B. tom. 2. l. 17. 598.*

Alchimilla perennis incana argentea seu sericea satinum provocans Moris. Hist. 2. 195. Tormentilla Alpina folio sericeo C. B. P. 326. Pentaphyllum sive potius heptaphyllum argenteum, flore muscoso I. B. tom. 2. l. 17. 398.

* *Alchimilla annua minima hirsuta foliis infernè albicantibus Moris. Hist. 2. 195. Choerophyllo non nihil similis C. B. P. 152. Alchimilla montana minima Column. Ecphr. 145. Perchepier Anglorum quibusdam I. B. tom. 3. l. 27. 74. ANN.*

Alchimilla rotundifolia aurea hirsuta. Saxifraga rotundifolia aurea C. B. P. 309. Saxifragia aurea Dod. I. B. tom. 3. l. 37. 707.

Albara Pis. v. Canna Indica.

Alhagi I. B. v. Genista.

Alisma C. B. Phyt. v. Gentiana.

Alkekengi vulgò. v. Solanum.

Alliaria C. B. P. v. Hesperis.

ALLIUM sylvestre bicorne flore obsoleto C. B. P. 74. Moris. Hist. 2. 385.

Allium montanum bicorne flore exalbido C. B. P. 75. Moris. Hist. 2. 385.

Allium montanum capite rotundo C. B. P. 75. Moris. Hist. 2. 386.

Allium montanum bicorne angustifolium flore purpureo C. B. P. 74. Moris. Hist. 2. 386. Allium sylvestre bicorne purpureum proliferum I. B. tom. 2. l. 19. 561.

Allium sphoerocæphalum bifolium Italicum Moris. 2. 386. I. B. tam. 2. l. 13. 565.

* Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens majus C. B. P. 74. Allium sphoerocæphalum purpureum sylvestre I. B. tom. 19. 562.

Allium fativum C. B. P. 73. Moris. Hist. 2. 387.

Allium vulgare & fativum I. B. tom. 2. l. 19. 554.

Allium fativum alterum : sive Allioprasum caulis summo circumvoluto C. B. P. 73. Moris. Hist. 2. 787. Allii genus, Ophioscorodon dictum

etum quibusdam *I. B. tom. 2. l. 19. 559.*

Allium sativum radice simplici *C. B. P. 74. Moris. Hist. 2. 387.* Allium vulgare & sativum *I. B. tom. 2. l. 19. 554.*

Allium maximum multis Porraceis foliis latioribus sphærico capite ex floribus albis conflato *Moris. Hist. 2. 387.* Allium sphoericeo capite folio latiore five Scorodoprasum alterum *C. B. P. 74.* Scorodoprassum dictum *I. B. tom. 2. l. 19. 558.*

Allium montanum foliis Narcissi majus *C. B. P. 75. Moris. Hist. 2. 388.* Allium umbelliferum pratense *I. B. tom. 2. l. 19. 564.*

Allium montanum Narcissinis foliis minus *C. B. P. 75. Moris. Hist. 2. 388.*

* Allium latifolium palustre *Moris. Hist. 2. 388.*

Allium sylvestre latifolium *C. B. P. 74.* Allium ursinum bifolium vernum sylvaticum *I. B. tom. 2. l. 19. 569.*

Allium latifolium montanum maculatum *C. B. P. 74. Moris. Hist. 2. 388.* Allium Alpinum *I. B. tom. 2. l. 19. 566.* Victoralis *Mas Tab.*

A L N U S rotundifolia glutinosa viridis *C. B. P.*

Alnus vulgaris *I. B. tom. 1. l. 8. 151.*

Alnus folio oblongo viridi *C. B. P. 428.*

Alni effigie lanato folio major C. B. P. v. Mespilus.

Alni effigie lanato folio minor C. B. P. v. Mespilus.

Alnus nigra baccifera C. B. P. v. Frangula.

Aloe vulgaris C. B. P. 286. *Morif. Hist.* 2. 414.

Aloe I. B. tom. 3. l. 35. 696.

Aloefolio in oblongum aculeum abeunte C. B. P. 286. *Morif. Hist.* 2. 415. *Aloe Americana muricata* I. B. tom. 3. l. 35. 701.

Aloe Americana minor foliis per margines frequentissimis & molliusculis spinis armatis
Aloe vera minor *Munt. Aloedar.* 2.

Aloe Americana sobolifera.

Ex crassâ fibrosâ pallescente radice prodeunt folia, facie vulgaris *Aloes* *Americanae* junioris, carnosâ, succulenta, modò plana & humi procumbentia, modò canaliculata & arcuatim sursum vergentia, latè viridia, in mucronem minus pungentem abeuntia, & in ambitu crebrioribus exiguis, fuscis, rigidiusculis spinulis armata. Ex horum medio, quinto aut sexto à satione anno, assurgit caulis, sex septemve pedum altitudine, striatus, compressus, solidus, durus, herbaceus, raris aliquot foliis inferioribus longè angustioribus & tenuioribus, caulem firmiter amplectentibus, vestitus, spargens circa fastigium sex septemve plures vel pauciores ramos, palmares, sustentantes ex brevibus crassis petiolis capitula oblonga, striata, trigona, capsularum seminalium rudimenta; E quorum cimis eriguntur flores oblongi, sex luteo viridantibus crassis obtusis petalis constructi, prominent

ALOE AMERICANA SOBOLIFERA.

17

medio stylo flavescente, cum sex brevioribus concoloribus staminibus, longis transversis apicibus donatis. His emarcidis, perficiuntur subjectæ capsulæ, includentes semina parva, angulosa, fusca; duplici serie tribus loculamentis disposita. Ad singulorum capsularum exortus, aliquando etiam ad ramorum & foliorum in caule sinus progerminant novæ soboles, quæ avulsæ & in terram depactæ, nullo negotio excrescunt. Hanc Aloem ex America advectam possidemus ex liberalitate Domini Philippi de Filines, in cujus prædio, quod Harlemi est, superioris anni floruit.

Aloe Africana, folio triangulo longissimo angustissimo, floribus luteis foetidis. In Uvaria Promont. Bon. Sp. *Stapel in not.* *Theophr.* 336.

* *Aloe palustris* C. B. P. v. Stratiotes.

* *ALSINE* altissima nemorum C. B. P. 251. *Moris. Hist.* 2. 550.

* *Alsine* major C. B. P. 250. *Moris. Hist.* 2. 450. *Alsine* marina Dodonæi I. B. tom. 3. l. 29. 364.

* *Alsine* media C. B. P. 250. *Moris. Hist.* 2. 550. *Alsine* vulgaris sive *Morsus Gallinæ* I. B. tom. 3. l. 29. 363. ANN.

* *Alsine* minor multicaulis C. B. P. 250. *Moris. Hist.* 2. 550. *Alsine* minima I. B. tom. 3. l. 29. 364. ANN.

* A

- * *Alfine minor foliis rotundis C.B.P. 251. ANN.*
Alfine minor Lini capitulis C. B. P. 251. Moris.
Hist. 2. 550. ANN.
- * *Alfine aquatica major C. B. P. 251. Moris. Hist.*
2. 550.
- * *Alfine aquatica media C. B. P. Moris. Hist. 2.*
550. Alfine longifolia uliginosis proveniens
locis I. B. tom. 3. l. 29. 365.
- * *Alfine aquatica minor & fluitans C. B. P. 251.*
- * *Alfine palustris exigua, flosculis albis foliis*
lanceolatis plantaginellæ aquaticæ instar
Mentz. pugill. ANN.
- * *Alfine hirsuta major foliis subrotundis dilutè*
virentibus Moris. Hist. 2. 551. Alfine hirsu-
ta magno flore C.B. P. 251. ANN.
- * *Alfine hirsuta altera viscosa foliis longis satu-*
ratiùs virentibus Moris. Hist. 2. 551. Alfine
hirsuta altera viscosa C. B. P. ANN.
- * *Alfine tenuifolia C. B. P. 251. Moris. Hist. 2.*
251. I. B. tom. 3. l. 29. 365. ANN.
- * *Alfine Spergula dicta major C.B.P. 251. Moris.*
Hist. 2. 251. Spergula I. B. tom. 3. l. 36. 722.
ANN.
- Alfine Spergulæ facie marina perennis flore*
violaceo Moris. Hist. 2. 551. Alfine Spergulæ
facie media C.B.P. 251. Spergula marina I. B.
tom. 3. l. 36. 723.
- * *Alfine Spergulæ facie minima I. Commelin.*
Catal. 6. ANN.
- Alfine procumbens Gallii facie Africana. ANN.*

Etiamſi hæc planta primâ facie Gallium videatur, nemo tamen ambiget Alſinæ ſpeciem eſſe, qui capſulam & ſemina ceu partes plantarum principes & conſtantiores, inſpexerit. Spargit per terram ex tenui capilari radice cauliculos graciles, rotundos glabros, geniculatos, ramosos; Folia ad genicula ſex ſeptemve ſtellatim, Gallii modo, expanſa; Intra hæc exeunt aliquot pedicelli tenuiſſimi, ſuſtinentes flores nudos ſtellatos, exiguos, pentapetalos, foris viſcentes, intus pallidos, ſubſequentibus ſeminibus fulvis in capſulis Alſinæ proximis. Annua eſt, ex Africâ advecta, florens Auguſto, propullulans quotannis ex ſeminibus deciduis. Sapor apparuit muricatus & ingratus.

* Alſine maritima flore rubente C. B. P. 251 ANN.

* Alſine tridactylites tectorum. Sedum tridactylites tectorum C. B. P. 285. Tridactylites tectorum flore albo I. B. tom. 3. l. 37 762. ANN.

Alſine Hederulæ folio C. B. P. v. Veronica.

Alſine Veronicæ foliis floſculis cauliculis adhaerentibus C. B. P. v. Veronica.

Alſine Chamædrifolia floſculis oblongis cauliculis inſidentibus C. B. P. v. Veronica.

Alſine triphyllos cærulea C. B. P. v. Veronica.

Alſine ſcandens baccifera C. B. P. v. Solanum.

ALSINE PROCUMBENS GALLII FACIE AFRICANA.

Alfine affinis Androsace C. B. P. v. *Auriculæ* m
fi Affinis.

Alfine littoralis Portulacæ foliis C. B. P. v. R.
biæ Affinis.

A LTHÆA arborescens glabra, Ketmia Sy
rorum dicta *Moris. Hist. 2. 530.* Alcea ar
borescens Syriaca C. B. P. 316. Alcea arbo
tescens glabra, Ketmia dicta *I. B. tom. 2.*
23. 956.

Eadem flore candido C. B. P. *Var. 316.*

Eadem flore purpureo violaceo *Cat. Hort. Ro*
Paris. 6.

Eadem floribus ex rubro & albo variis *ibid.*

Eadem flore flavo.

Althæa arborea Rosea Sinensis flore multiplici

Althæa arborea Sinensis *Moris. Hist. 2. 530.*

Rosa Sinensis *Ferrar. Flor. cult. 479.*

Althæa arborea Rosea Sinensis flore simplici

Hæc præcedenti confimilis est, nisi quod
flores sint simplices, ex quinque tantum pe
talis constructi.

Althæa arborea Indica Populi folio flore eph

mero. Bupariti *Hort. Malab. tom. 1. 51.* S.

righaghas vel Arbor Solis *Zeylonensium.*

Althæa Ricini folio Virginiana.

Enata est feminibus ex Virginiâ delat

Planta humanam altitudinem multum ex

cedens, ex cujus radice Ibisco simili, pa

lidâ, longè latèquè repente, perenni, gustu

viscosi, assurgunt coliculi glabri, viridat

te

tes, frequentibus alis subindè divisi. His adstant folia longis suffulta petiolis. Ricinæmula, ternis quinisvè mucronatis & ciliatis marginem crenatis lobis dissecta. Ad herbarum exortus ab imo caulis ad summum usque prodeunt simul pediculi longiores & graciliores, in aliquot pedicellos tenuissimos divaricati, quorum singuli sustinent ex caliculo viridante quinquefarium crenatis petalis in basi junctis constructum, medium occupante columellâ racemosâ innumeris violaceis apiculis exornatâ. Flore discusso sequitur capitulum, quinque exiguis, membranaceis, angulosis, arctè invicem junctis, & in acuminatum apicem coeuntibus thecis efformatum, quibus singulis includitur semen unicum parvum spindiceum reniforme. Radicis virtutes eadem sunt, quæ Radici Ibisci.

Althæa Theophrasti flore luteo C. B. P. 316. *Moris. Hist. 2. 531.* Althæa Theophrasti flore luteo quibusdam Abutilon *I. B. tom. 1. l. 23. 958. ANN.*

Althæa Theophrasti similis C. B. P. 316. *Moris. Hist. 2. 531.* Abutilon Indicum *I. B. tom. 3. l. 23. 959. ANN.*

Eadem flore luteo minori. Abutilon Indicum flore luteo *Breyn. Prodr. 1. ANN.*

Priori humilior est, & partibus omnibus minor.

Althæa Rosea peregrina, forte *Rosa Moscheutos* Plinii, *Corn.* 144. *Moris. Hist.* 2. 532.

Althæa Indica magno flore petalis latis & obtusis *Moris. Hist.* 2. 532. *Alcea Indica* magno flore *C. B. P.* 317. *Bammia* aliquatenus affinis, *Sabdariffa* *I. B. tom.* 2. l. 23. 960. *Cattugasturi Hort. Mal. tom.* 2. 71. ANN.

Althæa Indica flore parvo petalis angustis & obtusis *Moris. Hist.* 2. 532. *Alcea Indica* parvo flore *C. B. P.* 317. *Bammia* *I. B. tom.* 2. l. 23. 959. ANN.

Althæa Ægyptia villosa *Moris. Hist.* 2. 533.

Alcea Ægyptia villosa *C. B. P.* 533. *Belmoscus Ægyptia* *Honorio Bellio I. B. tom.* 2. l. 23. 962. *Abel Mosch vulgò.* ANN.

Althæa Indica Gossipii folio Acetosæ sapore *Alcea acetosa trifido folio Indiæ Orientalis* *Breyn. Prodr.* 1. ANN.

Radicem habet fibrosam, albicantem, singulis annis pereuntem; Caulem tripedalem, viridem, glabrum aliquando angulosum, ramosum, in fila ductilem; Folia trilobata, lætè viridia, formâ & magnitudine ad *Gossipii* folia accedentia, longis innixa petiolis; Ad horum sinus prodeunt flores ex brevissimis petiolis ampli, rosei, incarnati, ex quinque petalis in basi arctè, junctis &

intermedio pistillo, racemoso, concolori ex-
 tructi. His subjicitur caliculus quinque fo-
 liatus, ex quo post florum exanthesein pro-
 dit capsula membranacea, oblongo-rotun-
 da, pentagona, quinis intus loculamentis
 donata, in quibus semina compressa ex ru-
 fo spadicea congenerum more. Folia sub-
 acidum & leviter viscosum præbent sa-
 pore & vel sola vel cum cæteris oleribus
 cocta ab Indis comeduntur. Caules, no-
 minus quàm apud nos Cannabini, in fili-
 ducuntur, & ad funes texendos usur-
 pantur; Hinc in agris & hortis Indo-
 rum quotannis feruntur. Hujus & ali-
 datur species foliis Cannabinis, à Ga-
 zia ab Horto BANGUE dicta, cujus
 integra historia tractabitur in Musæo Zey-
 lanico, quod in lucem aliquando prod-
 bit.

Althæa Indica Vitis folio, flore amplo flavo
 pendente. Althæa Indica non spinosa flo-
 re amplo pendulo flavo. *Breyn. Prod. 2.*

Ex feminibus, in Insulâ Zeylonâ collectis
 germinavit nobis hæc elegantissima planta
 quæ ex radice albâ, lignosâ protrudit caules
 modò unicum, modò plures, bicubitales
 lignosos, rectos, glabros, aliquando sub-
 hirsutos, imâ parte rubentes, summâ viri-
 dantes, in multos ramos brachiatos; Cum
 his simul exurgunt folia longis infidentis

petiolis , tribus quinive segmentis divisa, foliis Vitis haud abfimilia, sed rigidiora, crassiora, aliquot venis ac insignibus nervis donata ; Ad alarum summitates prodeunt breves tenuissimi pedicelli , quibus nolarum instar appendent flores ampli Rosæ minoris magnitudine, ad solem aperti, cæteroquin clausi, quinque petalis flavescentibus, unguibus violaceis holosericis, in fundo junctis , conflati , prominente è medio pistillo, copiosis apiculis puniceis eleganter paniculato; Floris basin tegit caliculus parvus in quinque profundas acuminatas viridantes crenas, quasi totidem foliola, dissectus; Huic verò incumbunt quina aut septena angustissima setacea foliola stellatim decussata. Floribus emarcidis succedunt vascula membranacea, duriuscula, subhirsuta, ex quinque sulcis vel alis, totidemque loculamentis constantia , in quibus continentur semina compressa , fusca, reniformia, congenerum more. Viribus convenit cum Alcea nostra vulgari. Iisdem in locis, ubi hæc provenit, invenitur & alia species foliis asperis profundè laciniatis , foliorum Cannabis instar, saporis acidi ; Caulibus, ad uncis hamis undique armatis, ceteris verò partibus superiori simillimis. Videatur *Bontius l. 6. 113.* qui hanc alteram speciem videtur descripsisse.

ALTHÆA INDICA FOLIO VITIS, FLORE
AMPLO FLAVO PENDENTE.

Althæa vesicaria Veneta Moris. Hist. 2. 533. Alcea Vesicaria C. B. P. 317. Alcea solifera, multis Veneta I. B. tom. 2. l. 21. app. 1068. ANN.

Althæa vesicaria Capitis Bonæ Spei Moris. Hist. 2. 533. ANN.

Althæa Diosc. & Plinii C. B. P. v. Malva.

Althæa frutescens folio rotundiori incano C. B. P. v. Alcea.

Althæa frutescens folio acuto parvo flore C. B. P. v. Malva.

Althæa peregrina semine rostrato flore luteo minimo Bocc. v. Alcea.

Alysson siliquâ latâ asperâ I. B. v. Leucojum.

Alyssum verticillatum foliis profundè incisis C. B. P. v. Marrubium.

Amara dulcis I. B. v. Solanum.

A MARANTHUS foliis variegatis, seu tricoloribus, seu variè coloratis Psittaci plumas referentibus *Moris. Hist. 2. 602. Amaranthus folio variegato C. B. P. 121. Symphonia Dalechamptio, sive Amaranthus tricolor I. B. tom. 2. l. 23. 970. folio colore hilariori extremo flavo, medio puniceo, reliquo viridi C. B. P. var. 121. ANN.*

Idem folio colore obscuriori C. B. P. Var. 121.

Serotinus Cat. Hort. Reg. Pars. 11. ANN.

Amaranthus paniculis propendentibus, semine rubro, flore serotino elegantis coccinei coloris Moris. Hist. 2. 602. ANN.

Ama-

Amaranthus maximus C. B. P. 120. panicul
erectis semine albo. Blitum maximum

Amaranthus major, semine albo *I. B. tom.*
l. 23. 968. ANN.

Idem Semine rubello: qui granis rubris Pe
Cicræ C. B. P. *Var. 121. ANN.*

Idem Semine fusco. ANN.

Idem paniculis viridantibus seu herbace
ANN.

Amaranthus major paniculis surrectis rub
Moris. Hist. 2. 602. Amaranthus simp
paniculâ C. B. P. 121. Amaranthus purp
reus *I. B. tom. 2. l. 23. 968. ANN.*

Idem paniculis coccineis seu phœniceis Mo
Hist. 2. 602. ANN.

Idem paniculis viridibus *Moris. Hist. 2. 5*
ANN.

Idem paniculis flavescentibus. ANN.

Amaranthus spicatus sericus, flore luteo vi
scente *Cat. Hort. Reg. Par. 16. ANN.*

Amaranthus spicis carneis interfusâ flavedi
micantibus. *ibid. ANN.*

Amaranthus singularibus paniculis flamm
colore lucentibus. *ibid. ANN.*

Amaranthus paniculis obsoletè violace
ANN.

Amaranthus paniculis ex fusco purpurasc
tibus. ANN.

Amaranthus minor paniculis surrectis,
stramineis spicis cristatis *Moris. Hist. 2. 6*
ANN.

Amaranthus paniculâ incurvâ *C. B. P.* 121.

Paniculis purpureis. ANN.

Idem paniculis luteis. ANN.

Idem paniculis coccineis. ANN.

Idem paniculis luteo pallidis. ANN.

Amaranthus cristatus rubicundissimo flore

Cat. Hort. Reg. Paris. 10. purpureus paniculâ speciosâ cristatâ *I. B. tom. 2. l. 23.* 969.

ANN.

Amaranthus reticulatus seu corniculatus serotinus minor

Cat. Hort. Reg. Paris. 10.

ANN.

Amaranthus paniculâ conglomeratâ majori

puniceo colore splendidâ *Cat. Hort. Reg.*

Paris. ANN.

Amaranthus Indicus spinosus spicâ herbaceâ

Blitum monospermum Indicum aculeatum

Breyn. Prodr. 18. Kathutampala *Zeylonensis.* ANN.

Satis amplâ pro plantæ ratione nititur radice, albente lignosâ & parùm fibrosâ, ex cujus capite oriuntur caules quàmplures, duorum triumvè pedum longitudine, succulenti, lucidi, rotundi, leviter striati, viridantes, parte quâ solem respiciunt rufescentes, frequentibus inæqualibus ramis & foliis intra binos herbaceos breves pungentes aculeos prodeuntibus, vestiti. Folia longis adhærentia pediculis Bliti foliis sunt longiora & angustiora, obtusè

tusè mucronata, sinuata, rugosa, circa margines sæpe, undulatâ, parte infernâ ex viridi candicantia, supernâ verò atro-viridi in sinu aliquandò obscuris maculis affectâ. Flores tùm è summo caulis tùm è foliorum alis emicant in spicas vel simplices vel multiplices quasique paniculatas densissimè congesti, exiguis quinque angustissimis & tenuissimis petalis herbacei coloris conflati, quibus subjicitur capsula rotunda parva, in quâ semen nigrum lucidum compressum more affinium. Annua hæc planta provenit passim in India, locis cultis & incultis sese propagans ex seminibus deciduis. In hortis nostris perficitur autumnæ. Hujus folia una cum reliquorum Amaranthorum in India nascentium foliis comeduntur. Zeylonensibus audit Kathampala, hoc est, Pala sive Amaranthus spinosus.

Amarantho adfinis Breyn. v. Gnaphalium.

Ambervalis flos vulgò. v. Polygala.

Ambrette vulgò. v. Cyanus.

AMBROSIA maritima C. B. P. 138. Ambrosia quibusdam I. B. tom. 3. l. 26. 190. Folia Absinthii odoratis humilior ANN.

Eadem foliis Artemisiæ inodoris elatior. ANN.

Hujus virgultis trium quatuorve pedum altitudine assurgentibus adhærent folia prior

AMARANTHUS INDICUS, SPINOSUS,
SPICA HERBACEA.

33

C

priori ampliora', Artemisiæ foliis proximè
 profundius laciniata, supernè viridia, infè-
 nè pallescentia, odoris nullius evidente
 Flores in summis spicis apparent minore
 foris viridantes, intus nigricantes, quos
 gulos excipit semen unicum, muricatum
 vulgari simillimum. Prodiit nobis ex
 minibus à Nobilissimo Domino Johanne B.
 ptista Ciaffi Venetiis hùc transmissis.

*Ambrosia campestris repens C. B. P. v. Nastu-
 tium.*

AMMI majus C. B. P. 159. Ammi annuum M.
ris. Umbellif. 21. Ammi vulgare majus
 tioribus foliis, semine minus odorato
tom. 3. l. 27. 27. ANN.

Ammi perenne Moris. Umbellif. 22. Eryngiu
 arvense, foliis ferræ similibus C. B. P. 38
 Crithmum quartum Matthioli umbellif.
rum I. B. tom. 3. l. 27. 195.

*Ammi semine tenuissimo & odoratissimo I.
 tom. 3. l. 27. 25.* Ammi alterum semine
 Apii C. B. P. 159. ANN.

Amomum Plinii vulgò. v. Solanum.

AMYGDALUS fativa C. B. P. 441. putamine
 duro C. B. P. var. 442. Amygdalus dulce
I. B. tom. 1. l. 2. 174.

Amygdalus dulcis putamine molliore C. B.
 var. 442.

Amygd

AMBROSIA MARITIMA ARTEMISIÆ FOLIIS
INODORIS ELATIOR.

55

Amygdalus amara C. B. P. *Var.* 441. I. B. *tom.* 1.
l. 2. 174.

Amygdalus Indica nana. *Cat. Hort. Reg. Paris.* 11.

Arbustula est fruticosa, radice tenui, albâ, reptatrice; Caudice digitum crassitrium quatuorve pedum altitudine, Ramis crebris, gracilibus, quos pallidè flavescentegit cortex; Foliis, Floribus, & Fructibus ab *Amygdalo sativa*, non nisi parvitate differentibus. Frequens occurrit in Belgarum hortis, Flores Vere, Fructus autumnum perficiens, veluti cæteræ hujus sortis species.

Amygdalus Africana flore simplici plenove vulgò. v. *Persica malus.*

Anacardosus I. B. *ejusque species.* v. *Tellurium.*

ANACARDIUM occidentale Cajous dictum ossiculo reni leporis figurâ. *Anacardii* species C. B. P. 512. *Cajous* I. B. *tom.* 1. 336. *Kapa-Mava Hort. Mal. tom.* 3. Arbor Acajou, vulgò Cajou. *Pis. Marti arom.* 193.

* **A**NAGALLIS flore phoeniceo C. B. P. 21. *Moris. Hist.* 2. 568. *Anagallis phoenicea* I. B. *tom.* 3. l. 29. 369. ANN.

* *Anagallis flore purpurascente* C. B. P. *var.* 21. ANN

* Anagallis flore cœruleo C. B. P. 252. Moris.
Hist. 2. 569. Anagallis cœrulea Fœmina I. B.
tom. 3. l. 369. ANN.

Anagallis flore carneo *Park. Theatr.* 558. ANN
Anagallis cœrulea, foliis binis ternisve ex ad-
verso nascentibus C. B. P. 252. Moris. Hist. 2.
569. ANN.

Eadem foliis quaternis ex adverso nascenti-
bus, flore ampliore. ANN.

Anagallis lutea nemorum C. B. P. 252. Moris.
Hist. 2. 569. Anagallis lutea Nummulariæ
similis I. B. tom. 3. l. 29. 370.

Anagallis aquatica major ejusquæ species C. B. P.
v. Veronica.

Anagallis aquatica minor ejusquæ species C. B. P.
v. Veronica.

A NAGYRIS foetida C. B. P. 391. Anagyris
vera foetida I. B. tom. 2. l. 11. 364.

Anagyris non foetida major vel Alpina C. B. P.
391. Laburnum arbor trifolia, Anagyridi
similis I. B. tom. 1. l. 11. 361.

Eadem folio variegato.

Anagyris non foetens minor C. B. P. 391.

A NANAS Acoftæ & Linscotti I. B. tom. 3. l.
25. 95. Ananas fructus Bonti l. 6. 145.
Ananas *Pifon.* l. 4. 195. Matzatli seu Pinea
Indica *Hernand.* 311. Carduus Brasiliæ
foliis Aloes C. B. P. 384.

ANCHUSA prima Matthioli C. B. Ma
703.

Eadem Cretica perennis foliis asperis bu
tis verrucosis. Borrigo sylvestris per
nis Candia, flore puniceo Zanon.
Bot. 49.

Anchusa lanuginosa incana, pullo flore.
chium sylvestre lanuginosum C. B. P.
Echium pullo flore I. B. tom. 3. l. 33.
ANN.

* Anchusa angustifolia procumbens, Litho
mi flore albo. Lithospermum arvense
radice rubra C. B. P. 258. Lithospermum
grum quibusdam, flore albo, semine
I. B. tom. 3. l. 33. c. 8. 592. ANN.

* Eadem latifolia, flore purpureo. Litho
mum minus repens latifolium C. B. P.
Lithospermum majus Dodonæi, flore
pureo, semine Anchusæ I. B. tom. 3. l.
592.

* Anchusa Scorpioides hirsuta arvensis. Ech
Scorpioides arvense C. B. P. 254. Ech
Scorpioides Solifsequum, flore minore
tom. 3. l. 33. 589. ANN.

* Eadem glabra palustris. Echium Scorpio
palustre C. B. P. 254. Echium Scorpio
solifsequum, flore majore I. B. tom. 3. l.
589.

Androsace Matthioli altera I. B. v. Auric
urfi adfinis.

Androsæmum ejusque species. v. Hypericum.

A N E M O N E sylvestris alba major C.B.P. 176.
Moris. Hist. 2. 425. Anemone magna alba,
 plurimâ parte anni florens I. B. tom. 3. l. 30.
 411.

Anemone Geranii rotundo folio, purpura-
 scens C.B.P. 173. *Moris. Hist. 2. 425.*
 Anemone Italica latiusculis spinosis foliis,
 3. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 402.

Eadem dilutè purpurascens C.B.P. 173. Ane-
 mone latifolia ex purpurâ dilutiore albican-
 te flore, 4. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 402.

Eadem dilutè rubens C.B.P. 173. Anemone
 latifolia flore ad carneum colorem tenden-
 te, albicantibus unguibus 5. Clusii I. B. tom.
 3. l. 30. 402.

Anemone latifolia simplici carneo flore C.B.P.
 173. *Moris. Hist. 2. 425.* Anemone latifolia
 purpurei ferè coloris, unguibus albicanti-
 bus, Byzantina, 6. Clusii I. B. tom. 3. l. 30.
 403.

Eadem flore purpureo saturo C.B.P. 173. Ane-
 mone latifolia, flore coloris purpurei saturi,
 magnis unguibus, albis, infimâ parte purpu-
 reis, 8. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 403.

Eadem flore purpureo violaceo C.B.P. 173.
 Anemone latifolia violacea, unguibus ar-
 genteis, 12. Clusii I. B. tom. 3. l. 30. 403.

Eadem flore carneo C.B.P. 173. Anemone

latifolia flore veluti carneo, unguibus albis

14. Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 403.*

Eadem flore variegato C. B. P. 173. Anemone
colore saturatiùs ex purpureo rubens, o
coccineis, unguibus albis magnis, Byzanti
na, 7. Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 403.*

Eadem flore coccineo C. B. P. 174. Anemone
latifolia flore coccineo, itemquè unguibus
16. Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 404.*

Ejusdem variæ species, floris colore invicem
discrepantes.

Anemone tenuifolia, flore multifido dilu
purpurascente C. B. P. 174. Anemone
tenuifolia, flore pluribus foliis constante, ca
nei quasi coloris, 9. Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 406.*

Eadem Oenanthæ foliis, flore violaceo hex
phyllo C. B. P. 174. *Moris. Hist. 525.* An
emone tenuifolia purpurea, foliis, oris in ac
tum desinentibus, 2. Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 400.*

Eadem coccineo flore hexaphyllo C. B. P. 175.
Anemone tenuifolia coccinea, unguibus
pallido fusco & albo coloribus mixtis,
Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 400.*

Ejusdem varietates aliæ, mirâ colorum in flo
ribus elegantia se commendant.

Anemone latifolia maxima versicolor C. B. P.
176. Anemone hortensis pleno flore ver
sicolor *Moris. Hist. 2. 426.* Anemone latifolia

lia, flore pleno variegato *I. B. tom. 3. l. 30.*

404.

Eadem flore coccineo *C. B. P. 176. Moris. Hist.*

2. 426. *Anemone latifolia, pleno flore coccineo, sive Pavo major. 2. Clusii I. B. tom. 3. l.*

30. 405.

Ejusdem species variae, coloris in flore diversitate invicem discretæ.

Anemone tenuifolia multiplex rubra C. B. P.

167. *Anemone tenuifolia, flore coccineo pleno. Eyst. Moris. Hist. 2. 426.*

Eadem flore cœruleo *C. B. P. Var. 176.*

Eadem flore albo *C. B. P. Var. 176.*

Eadem flore purpureo, seu multiplex purpurea *C. B. P. 176.*

Eadem flore ex atro purpurascente, seu multiplex atro purpurascens *C. B. P. 176.*

Eadem Byzantina, flore carneo vivacissimo *Moris. Hist. 2. 426.*

Ejusdem varietates plurimæ, petalorum numero, magnitudine, colore & formâ, pro vario lascivientis naturæ lusu inter se certantes.

Anemonæ affinis Æthiopica, fibrosâ radice, flore Asteris, Taraxaci foliis subincanis.

Chrysanthemum, Stoebes foliis latioribus.

Breyn. Prod. 23. Aster Jacobææ foliis latioribus vulgò. ANN.

Eadem foliis angustioribus. *Chrysanthemum*

Africanum, Stoebes foliis angustioribus

Breyn. Prod. 23. ANN.

42 ANEMONÆ AFFINIS ÆTHIOPICA, FIBROSA
RADICE, FLORE ASTERIS, TARAXACI
FOLIIS SUB INCANIS.

Prior spargit per terram folia digito longiora, formâ inter Taraxacum & Stoebem mediâ, pronâ parte pallidè virentia, supinâ incana & subhirsuta, in aliquot lacinias, situ modò opposito, modò alterno, intercedentibus longioribus intervallis, dissecta; Inter hæc prodeunt cauliculi terni, quaterni, pluresve, dodrонтales, molleculi, succo aquoso pleni, angulosi, viridantes, atro puniceis latiusculis, per longitudinem excurrentibus, striis inscripti, quæ caules eâ potissimùm parte, quâ humi procumbunt, penitus videntur obliterare; ita ut nihil aut parùm viriditatis in iis appareat. E medio caulis eriguntur aliquot alæ, digito longiores, sustinentes è capitulo rotundo squamato florem amœnum, amplum, radiatum, discoideum, facie Asteris, radiis interioriùs omninò aureis, exterioriùs pallidè puniceis striis inscriptis; medio verò disco expuniceo nigricante, qui cœlo sereno croceum spirat odorem. Post hujus exanthemum sequuntur capitula facie Anemonum rotunda, nuda, tomentosa, pallida, quibus involvuntur semina parva, spadicea, dura, quæ autumnò fata, subsequente vere progerminant, Radice fibrosâ albâ tenui quotannis pereunte. Nascitur aridis, montosis, apricis, ad Promontorium Bonæ Spei, unde semina ad nos sunt delata.

Po.

Posterior iisdem locis reperitur; Fo-
priori angustioribus; cætera, verò simi-
lis. De utriusque viribus nihil certi co-
stat. Turgent succo aquoso, nullo evidē-
ti prædito sapore.

Anemone trifolia Dodonæi Moris. I. B. v. R.
nunculus.

Anemone nemorosa flore majori C. P. B. v. R.
nunculus.

Anemone nemorosa flore carneo C. B. P. v. R.
nunculus.

Anemone nemorosa flore pleno albo C. B. P.
Ranunculus.

Anemone nemorosa flore pleno purpureo C. B.
v. Ranunculus.

Anemone nemorosa flore pleno roseo C. B. P.
Ranunculus.

Anemone nemorosa adfinis peregrina, 2. Cl.
herbacei coloris C. B. P. v. Ranunculus.

ANETHUM hortense C. B. P. 147. Anethum
Moris. Umbellif. 36. I. B. tom. 3. l. 27.
ANN.

Anethum Pernambuccense. ANN.

Convenit cum præcedenti, nisi quod
mina sint minora, sapore & odore gratiori.

ANGELICA fativa C. B. P. 155. I. B. tom.
l. 27. 140. Angelica fativa, seu Officinaria
Moris. Umbell. 9. ANN.

* *Angelica sylvestris major, & Angelica aquatica* C. B. P. 155. *Angelica sylvestris magna vulgarior* I. B. tom. 3. lib. 27. 144. *Angelica sylvestris Moris. Umbell. 9. ANN.*

Angelica sylvestris montana C. B. P. 156. *Moris. Umbell. 9. Archangelica* I. B. tom. 3. l. 27. 143. ANN.

Angelica Acadiensis flore luteo *Dodart. Mem.* 55.

* *Angelica sylvestris minor sive erratica* C. B. P. 155. *Angelica Podagraria dicta Moris. Umbell. 9. Angelica sylvestris repens* I. B. tom. 3. l. 27. 145.

Angelica lucida Canadensis Cornuti 97. *Moris. Umbell. 9. ANN.*

Angelica baccifera Canadensis *Park. v. Christophoriana.*

A NGURIA *Citrullus dicta* C. B. P. 312. *Moris. Hist. 2. 28. Citrullus folio Colocynthis secto, semine nigro, quibusdam Anguria* I. B. tom. 3. l. 16. 235. ANN.

Eadem Indica maxima. ANN.

Anil, seu Anir. v. Colutea.

A NISUM *herbariis* 159. C. B. P. *Moris. Umbell.* 25. I. B. tom. 3. l. 27. 92. ANN.

Anisum dulce Melitense Moris. Umbell. 75.

Cuminum semine rotundiore & minore, dulce Melitenfibus C. B. P. 146.

* ANO-

* *ANONIS* purpurea vulgaris spinosa, flore purpureo, filiquis erectis, lentiformibus *Moris. Hist. 2. 169.* *Anonis* spinosa flore purpureo C. B. P. 389. *Anonis* five *Restia* bovis vulgaris, purpurea, spinosa I. B. tom. 2. l. 17. 391.

* Eadem albido flore C. B. P. *Var.* 389. *Anonis* five *Restia* bovis vulgaris, alba, spinosa I. B. tom. 2. l. 17. 391.

Anonis non spinosa, cauliculis procumbentibus. An *Anonis* non spinosa repens *Moris. Hist. 2. 169.*

* *Anonis* purpurea, spicata, erecta, perennis, latifolia, filiquis erectis lentiformibus *Moris. Hist. 2. 169.* *Anonis* spinis carens purpurea C. B. P. 389. *Anonis* non spinosa, purpurea flore I. B. tom. 2. l. 2. 17. 393.

Anonis purpurea procumbens verna seu perennis, fruticosa, annua, viscosa, filiquis erectis, trifloribus, lentiformibus, rarius dispositis *Moris. Hist. 2. 169.* ANN.

Anonis lutea sylvestris minima, filiculis lentiformibus, erectis, bivalvibus *Moris. Hist. 2. 170.* *Anonis* spinosa lutea minor C. B. P. 389.

Anonis purpurea perennis, foliis latioribus, rotundioribus, profundè ferratis *Moris. Hist. 2. 170.* *Cicer* sylvestre latifolium trypholium C. B. P. 34. *Cicer* sylvestre trifolium I. B. tom. 2. l. 17. 295.

Omnibus partibus major & elatior est priori.

Anonis purpurea verna seu præcox perennis, frutescens, flore rubro amplo *Moris. Hist. 2. 170.* Cicer Arboreum Indicum perenne. *Zanon. 66.* Annonis purpurea frutescens, non spinosa. *Dodart. Mem. 57.*

Anonis lutea, annua, recta, hirsuta, viscosa, siliquis hirsutis brevioribus *Moris. Hist. 2. 171.* Trifoliis adfinis Anonis minima, hirsuta Cherleri *I. B. tom. 2. l. 17. 394.* ANN.

Anonis lutea annua siliquâ glabrâ longiore & crassiore *Moris. Hist. 2. 171.* Anonis viscosa, spinis carens, lutea minor, flore pendulo *C. B. P. 389.* Trifoliis adfinis Anonis pusilla, glabra, fruticans Cherleri *I. B. tom. 2. l. 17. 394.* ANN.

Anserina vulgò. v. Pentaphylloides.

Anthora C. B. P. v. Aconitum.

ANTIRRHINUM majus rotundiori folio *C. B. P. 21. ANN.*

Antirrhinum majus longiore folio *Moris. Hist. 2. 505.* Antirrhinum majus alterum, folio longiore *C. B. P. 211.* Antirrhinum vulgare *I. B. tom. 30. l. 30. 462.* flore roseo. ANN.

Idem flore rubente *C. B. P. Var. 211. ANN.*

Idem ex candido dilutè purpurascente *C. B. P. Var. 211. ANN.*

Idem flore albo, oris rubris *C. B. P. Var. 211. ANN.* Idem

Idem oris rubentibus *C. B. P. Var. 211. A.*

Idem oris luteis *C. B. P. Var. 211. ANN.*

Antirrhinum longifolium majus Italicum
re amplo, niveo, lactescente *Cat. Hort. Paris. 21. ANN.*

Antirrhinum angustifolium, flore rubro.

tirrhinum arvense majus C. B. P. 212. ANN.

rhinum arvense minus Moris. Hist. 2.

Antirrhinum angustifolium sylvestre
tom. 3. l. 30. 464. ANN.

Idem flore albo. *Cat. Hort. Reg. Paris. ANN.*

Antirrhinum arvense minus C. B. P. v. L.
ria.

ANTHYLLIS leguminosa Loto affinis, Vul
raria pratensis *Moris. Hist. 2. 182. Loto*

finis *Vulneraria pratensis C. B. P. 332. V.*

neraria rustica I. B. tom. 2. l. 17. 362.

Eadem, hirsuta herba, flore suavè rubente

ris. Hist. 2. 181. Loto affinis hirsuta

subrubente *C. B. P. 333.*

Anthyllis leguminosa Loto affinis major

caria, Hispanica Hist. Moris. 2. 181. Lo

pentaphyllos vesicaria C. B. P. 332. Tri

lium Halicacabum, sive vesicarium I. B. to

2. l. 17. 361. ANN.

Anthyllis nivea I. B. v. Polygonum.

Anthyllis maritima Alsine foliis C. B. P. v. P.

lygonum.

Anthyllis Chamæpithyides frutescens C. B. P.
v. Kali.

Anthyllis maritima Lentifolia C. B. P. v. Ti-
thymalus.

APARINE vulgaris C. B. P. 334. I. B. tom.
3. l. 36. 713.

Aparine femine levi *Cat. Hort. Reg. Paris.* 21.

Aparine levis *Park. Theat.* 567. ANN.

Aphaca vulgò. v. Lathyrus.

Aphyllantes Monspeliensibus I. B. v. Caryo-
phyllus.

Apios Americana Corn. v. Astragalus.

APIUM hortense maximum C. B. P. 153.
ANN.

Apium hortense, seu Petroselinum vulgò
C. B. P. 153. Apium fativum, seu hortense
vulgatius, latifolium planum *Moris. Umbell.*
23. Apium hortense, vulgò Petroselinum
planum I. B. tom. 3. l. 27. 97. ANN.

Apium, vel Petroselinum crispum C. B. P. 153.
Moris. Umbell. 23. Apium hortense vulgò
Petroselinum crispum I. B. tom. 3. l. 27. 97.
ANN.

Apium montanum, folio tenuiori C. B. P. 153.

Apium fativum hortense angustifolium
Moris. Umbell. 23. ANN.

Apium hortense latifolium C. B. P. 153. Apium
latifolium, seu hortense maximum *Moris.*

D

Um-

Umbell. 21. Apium hortense magnum, gari hortensi seu Petroselino vocato, fere idem, sive Anglicanum quibusdam *tom.* 3. *l.* 27. 99. ANN.

* Apium palustre & Apium Officinarum *C. B. P.* 154. Apium palustre, Paludapium etum *Moris. Umbell.* 21. & 23. Apium vulgare ingratius *I. B. tom.* 3. *l.* 27. ANN.

* Apium palustre minus cauliculis procumbentibus, ad alas floridum. ANN.

Hoc præcedenti est conforme; ast omnibus partibus minus & gracilius, cauliculi humi procumbentibus, alis quàm pluribus donatis, ad quarum sinus oriuntur parvi florum albicantium umbellæ, quos exasperant semina exigua, striata. Facultate nihil aut parum differt à vulgari. Luxuriosius locis undosis, & aquosis Belgicæ.

Apium dulce Celeri Italorum *Hort. Reg. 21. Moris. 22.* Apium palustre Seleri dictum *Moris. 21.* Apium Italicum Seleri dictum. *22.* ANN.

Apium Macedonicum *C. B. P.* 154. Apium semine villoso seu incano Macedonicum *Moris. Umb.* 21. Apium, sive Petroselinum Macedonicum *I. B.*

Apium peregrinum foliis subrotundis *C. B. P.* 153. Apium semine villoso, seu incano

peregrinum 1. *Clusii. Moris. Umbell.* 21.
ANN.

Apium montanum, folio ampliore C. B. P. v.
Oreofelinum.

Apium sylvestre, lacteo succo turgens C. B. P.
v. Thysselinum.

Apium peregrinum, *Cicutæ* folio C. B. P. v.
Oreofelinum.

APOCYNUM folio subrotundo C. B. P. 302.
Apocynum folio rotundiore, flore ex albo
palescente *I. B. tom. 2. l. 15.* 134.

Apocynum folio oblongo C. B. P. 303, Apo-
cynum, sive *Periplocca scandens*, folio lon-
go, flore purpurante *I. B. tom. 2. l. 15.*
133.

Apocynum *Scammonia* facie *Monspeliacum*,
foliis rotundioribus. *Scammonia Monspe-*
liaca, foliis rotundioribus C. B. P. 294.
Scammonea Monspeliaca, flore parvo *I. B.*
tom. 2. l. 15. 136.

Apocynum *Scammonia* facie, *Monspeliaco*
affine, foliis acutioribus. *Scammonia Mon-*
speliacæ affinis, foliis acutioribus C. B. P. 294.
Apocynum latifolium, amplexicaule *I. B.*
tom. 2. l. 15. 135.

Apocynum *Asclepiadis* folio, flore nigro.
Asclepias nigro flore C. B. P. 303. *Ascle-*
pias flore nigro quorundam *I. B. tom. 2. l. 15.*
140.

Apocynum rectum latifolium Americanum
majus *Park. Theatr.* 385.

Apocynum latifolium Ægyptiacum, in-
num, erectum, floribus spicatis maximis
pallidè violaceis, filiquis folliculatis rugu-
fis. Apocynum Ægyptiacum lactescens
filiquâ Asclepiadis *C. B. P.* 303. Beidel-
Alpini, sive Apocynum Syriacum *I. B. t.*
2. l. 15. 136. *Beidelossar. Alpin. de Pl.*
Ægypt. 85. *Ericu Hort. Malab. tom.*

53.

Apocynum latifolium Syriacum incarnum
erectum, floribus umbellatis minoribus
obsoletè purpurascentibus, filiquis follicu-
latis rugosis. Apocynum majus Syriacum
rectum *Corn.* 91. *Beidelossar. Observ. V.*
lin. in Alpin. 28.

Apocynum angustifolium Canadense virgatum
erectum, floribus umbellatis minoribus
bicundis. Apocynum minus rectum Cana-
dense *Corn.* 93.

Idem humilius folio angustissimo.

Apocynum Americanum, foliis Androsæ-
majoris, floris Lili convallium suave rube-
tis, *Cat. Hort. Reg. Paris.* 22. *Boccon*
Pl. Sic. 32. *Dodart. Mem.* 59.

Apocynum humile Aizoides filiquis erectis
Africanum. Fritillaria crassa Promonto-
Bonæ Spei *Stapel. in not. ad Theophr.*
335.

Hu

APOCYNUM HUMILE AIZOIDES, SILI-
QUIS ERECTIS, AFRICANUM.

Hujus Plantæ iconem inepto nomine Fritillariæ crassæ à Justo Heurnio in Belam transmissam, exhibet Bodæus à Stapel notis ad Theophrastum; Quoniam vero icon & eidem subnexa descriptio imperfecta & mendosa est, placuit, accuratiorē plantæ historiam hîc proponere. Locis montosis, saxosis, præruptis, aridis ad Promontorium Bonæ spei luxuriant è radice albâ ex fibrosâ, cauliculi, modo humi prostrati, modo obliquè ascendentes, spithamum & amplius longi, valdè ramosi, digitum crassum aphylli, læte viridantes, ingruente vètempestate rigidiori, ex livore ad purpureum vergentes, propemodum trigonodenticulati, & circumquaque brevibus, crassissimis, obtusis quasi aculeis, seu prominentibus dentibus, angulorum præruptorum rupium instar, stipati, succo viscido acri amaricant viroso & nauseoso turgentes. Ad dentium sinus prodit pediculus digito brevior, tenuis, pallidè virescens, vel ex livido purpureo rufescens, communiter in tres, rarò in quinque foliaceos cuspides abiens, sustinens florem amplum, planum, monopetalum, crassum quinque acuminatis laciniis expansum; foris glabrum viridantem, quinque purpureo rufescentibus per longirudinem striis intersectum; intus tenacem, coriaceum, rugulosum, flavescentem, puniceis maculis

eleganter conspersum, odoris foetidi, viperini; ex hoc protuberat umbilicus orbicularis, ejusdem cum flore consistentiæ & coloris, occupans ferme mediam floris partem, cujus centrum concavum tegit stella quinque radiis compressis puniceis in extremo bifidis lividisque constructa, huic insidet breuissima crassiuscula columella, emittens in imo radios quinque, teretes rigidos, pallide punicantes, in summo totidem alios brevissimos concolores. Florem deciduum sequuntur, siliquæ gemellæ erectæ virides spithamum longæ, digiti crassitie, includentes Apocynorum more semina orbiculata, compressa, tenuia, marginibus crassiusculis, castanei coloris, imbricatim invicem incumbentia, quibus singulis insident flocci sericei candidi, ad solem aureis micis fulgentes. Culturam exigit quam Opuntia spinosa; Solem auramque calidiorem amat, Septentrionalem verò & , hyemale frigus in tantum reformidat, ut illicò livescat, are scat & pereat. Propagatur tam semine, quàm avulsis ramulis, in terram depactis. Virtutem possidere cum Apocynis communem, indicant acris, amarus, nauseosus sapor & virosus odor.

AQUIFOLIUM baccis rubris. Ilex aculeata
baccifera, folio sinuato C. B. P. 425. A.
folium, sive Agrifolium vulgò I. B. tom.
l. 7. 114.

Idem foliis ex luteo variegatis, *Cat. Hort. Paris.* 22.

Idem foliis ex albo variegatis.

Idem foliis oblongis, spinis & limbis argenteis.

Idem foliis subrotundis, spinis & limbis argenteis.

Idem foliis oblongis, spinis & limbis aureis.

Idem foliis subrotundis, spinis & limbis aureis.

Aquifolium baccis luteis.

Hoc à vulgari differt baccis luteis, & foliis ex viridi nigricantibus. Luxuriat in Angliâ cum cæteris suæ fortis.

* **A**QUILEGIA sylvestris C. B. P. 144. Aquilegia flore simplici I. B. tom. 3. l. 30. 484.

Aquilegia hortensis simplex C. B. P. 144. I. B. tom. 3. l. 30. 484.

Aquilegia flore albo simplici C. B. P. 144. I. B. tom. 3. l. 30. 484. *Descr.*

Eadem castanei coloris C. B. P. 144.

Aquilegia montana magno flore C. B. P. 144. I. B. tom. 3. l. 30. 484.

Aquilegia hortensis multiplex, flore magno C. B. P. 144. Aquilegia flore pleno, sive m.

tiplici *I. B. tom. 3. l. 30. 485.* flore coeruleo
pleno *C. B. P. Var. 145.*

Eadem flore pleno albo *C. B. P. Var. 145.*

Eadem flore pleno incarnato *C. B. P. Var. 145.*

Eadem flore purpureo *C. B. P. Var. 145.*

Eadem flore rubro *C. B. P. Var. 145.*

Eadem flore pleno, castanei coloris *Cat. Hort.*

Reg. Paris. 23.

Eadem variegata *C. B. P. Var. 145.* flore variè
mixto, maculato *ibid. 144.*

Aquilegia hortensis multiplex, flore (parvo
C. B. P. 145.

Aquilegia hortensis, multiplici flore inverso
C. B. P. 145. *Aquilegia flore pleno inverso*
I. B. tom. 3. l. 30. 485.

Aquilegia flore roseo multiplici C. B. P. 245.

Stellata, flore purpureo *C. B. P. Var. 245.*

Aquilegia flore simplici & pleno, non cor-
niculato *I. B. tom. 3. l. 30. 485.*

Eadem stellata, rubescens *C. B. P. Var. 245*

Eadem stellata, flore violaceo *C. B. P. Var. 245.*

Eadem stellata, flore albo, minutissimis nigris
punctis ornata *C. B. P. Var. 245.*

Eadem stellata, flore cinereo, punctis purpu-
reis asperso, *Cat. Hort. Reg. Paris. 23.*

Eadem stellata, flore carneo *C. B. P. Var. 145.*

Aquilegia degener, virescens *C. B. P. 245.*

Aquilegia degener I. B. tom. 3. l. 30. 485.

Archidna vulgò. v. Lathyrus.

Aracus, sive Arachus vulgò. v. Vicia.

Arantia vulgò. v. *Malus Arantia*.

Arbor Fraxini folio C. B. P. v. *Azadarach*.

Arbor Judæ vulgò. v. *Siliqua sylvestris*.

Arbor lanigera Bontii v. *Gossampinus*.

Arbor Platani folio, fructu Peponum magnitudine C. B. P. v. *Pepo arborescens*.

Arbor Solis. v. *Althea*.

ARBUTUS folio ferrato C. B. P. 560. *Arbutus* : *Comarus Theophrasti* I. B. tom. I. 83. *Unedo Plinii* vulgò.

Arbutus folio non ferrato C. B. P. 460. *drachne Theophr.* I. B. tom. I. l. I. 87.

Arbutus non Arbutus Virginiana vulgò. v. *Sambucus*.

Archangelica I. B. v. *Archangelica*.

Arenaria I. B. v. *Alfina*.

Argemone vulgò ejusque species. v. *Papaver*.

Argentina I. B. v. *Pentaphylloides*.

Aria Theophrasti vulgò. v. *Mespilus*.

Arisarum latifolium & angustifolium C. B. P. v. *Arum*.

ARISTOLOCHIA rotunda, flore ex purpureo nigro C. B. P. 307. *Aristolochia rotunda* I. B. tom. 3. l. 32. 559.

Aristolochia longa vera C. B. P. 307. *Aristolochia longa* I. B. tom. 3. l. 32. 560.

* *Aristolochia Clematidis recta* C. B. P. 307.

Aristolochia Clematitis vulgaris I. B. *tom.* 3. l. 32. 560.

Aristolochia Pistolochia dicta C. B. P. 307.

Aristolochia polyrrhizos I. B. *tom.* 3. l. 32. 561.

Aristolochia Pistolochia dicta Cretica, *Smilacis folio*, *semper virens*. *Pistolochia Cretica* C. B. P. 307. *Aristolochia Pistolochia altera* I. B. *tom.* 3. l. 32. 563.

ARMENIACA *malus*, *fructu majori ex luteo rubefcente*. *Mala Armeniaca majora* C. B. P. 442. I. B. *tom.* 1. l. 2. 167.

Eadem fructu minori. *Malus Armeniaca minor* C. B. P. 442. *Armeniaca mala minora* I. B. *tom.* 1. l. 2. 167.

Armeniaca Malus, *fructu majori albescente*, *nucleo dulci*. *Mala Armeniaca majora*, *nucleo dulci* C. B. P. 442.

Armoracia multis I. B. v. *Rhaphanus rusticanus*.

ARTEMISIA *vulgaris major* C. B. P. 137.

Artemisia vulgaris I. B. *tom.* 3. l. 26. 184.

Caule ex viridi albicante C. B. P. *var.* 137.

Eadem caule subpurpurascente C. B. P. *Var.* 137.

Artemisia foliis ex luteo variegatis, *Cat. Hort. Reg. Paris.* 24.

Artemisia tenuifolia, *sive leptophyllos* I. B. v. *Abrotanum*.

ARUM

Arum maximum Ægyptiacum, quod
gò Colocasia C. B. P. 195. Colocasia
tom. 2. l. 19. 790. Culcas Vesling. in
38.

Idem cauliculis nigricantibus Zeylanicum.

Arum Æthiopicum, flore albo odorato,
fchum redolente.

Arum venis albis C. B. P. 195.

* Arum maculatum, maculis candidis C. B. P.

* Arum maculatum, maculis nigris C. B. P.

Arum I. B. tom. 2. l. 19. 783.

* Arum vulgare non maculatum C. B. P. 195.

Arum humile Arisarum dictum, latifolium
pistillo brevi, incurvo, obfuso. Arisarum
latifolium C. B. P. 196. I. B. tom. 2. l.
786.

Idem angustifolium, pistillo longissimo,
nui, inflexo, mucronato. Arisarum ang
stifolium Dioscoriis fortè C. B. P. 196. l.
tom. 2. l. 19. 787.

Arum polyphyllum, Dracunculus & Serpe
taria dictum, caule maculato, majus & e
tius. Dracunculus polyphyllus C. B. P. 195.

Dracunculus major vulgaris I. B. tom. 2.
19. 789. Erva de Sancta Maria Pison. l.
c. 57.

Arum polyphyllum, Dracunculus & Serpe
taria dictum, caule non maculato, minus
humilius.

Arum triphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, Indicum. *Dracunculus*, five *Serpentaria triphylla*, *Brasiliana* C. B. P. 135. *Dodart. Mem.* 81.

Arum palustre, radice *Arundinaceâ*. *Dracunculus palustris*, five radice *Arundinaceâ* C. B. P. 195. *Dracunculus aquaticus* I. B. tom. 2. l. 19. 789.

ARUNDO vulgaris, five *φραγμίτης* Diosc. C. B. P. 17. *Arundo vulgaris palustris* I. B. tom. 2. l. 18. 485.

Arundo sativa, quæ *δόναξ* Diosc. & *Theophr.* C. B. P. 17. *Arundo maxima* & *hortensis* I. B. tom. 2. l. 18. 486.

Arundo Indica variegata, seu *Laconica* *Theophrasti* *Corn.* 55. *Arundo Laconica* à *Petro Mullerio* *Stapel.* 440.

Arundo Sacharifera C. B. P. 18. *Arundo Saccharina* I. B. tom. 2. l. 18. 531.

Arundo Indica latifolia ejusque species C. B. P. & I. B. v. *Canna Indica*.

ASARUM C. B. P. 197. I. B. tom. 3. l. 32. 548.

Afarum Canadense *Corn.* 24. *Afarum Americanum majus* *Cat. Hort. Reg. Paris.* 25.

Ascyrum C. B. P. ejusque species. v. *Hypericum*.

ASCLE-

ASCLEPIAS flore albo C. B. P. 303. Apias five Vincetoxicum, cum multis
bus albicantibus *I. B. tom. 2. l. 15. 138.*
Asclepias angustifolia, flore flavescente
Hort. Reg. Paris. 25.

Asclepias nigro flore C. B. P. v. Apocynum

* **A**SPARAGUS fativa C. B. P. 489. Asparag
domesticus *Moris. Hist. 2. 3. Asparagus*
tensis I. B. tom. 3. l. 36. 725.

Asparagus sylvestris, tenuissimo folio C.
490. Asparagus pratensis *I. B. tom. 3. l.*
725.

Asparagus maritimus, crassiore folio C.
490. Asparagus marinus *I. B. tom. 3. l.*
726.

Asparagus foliis acutis C. B. P. 490. *M.*
Hist. 2. 3. Corruda I. B. tom. 3. l. 36. 72

Asparagus aculeatus, maximus, farment
Zeylanicus.

Huic subsunt radices longæ, fusiformes
plures ex uno capite propendentes, a
cantes, carnosæ, pollicem crassæ, sap
subdulci, grato, ad Scorzoneram nostram
cedente. Ex hac pullulant aliquot farment
ta longissima, in multas alas divisa, brev
pungentibus aculeis, modò sursum m
deorsum spectantibus, armata, vicina
bores scandentia easque amplectentia.
adhærent folia reliquis hujus familiæ spe

ASPARAGUS ACULEATUS MAXIMUS,
SARMENTOSUS ZEYLANICUS.

bus omnibus latiora, longiora & robustiora; Ad quorum sinus prodeunt ex calice exiguis flores parvi, pallidi, hexapetali, citi brevibus tenuissimis pedicellis. Hæc excipiunt baccæ rubentes, in quibus continentur ut plurimum terni angulosi nigrescentes acini, velut in speciebus consimilibus. Sponte nascitur in sylvis Insule Zeylonæ, Indigenis Hatawarija; Europæis rariò ibidem degentibus, Scorzonera dicta. Radices vel cum lacte aut brodio carni coctæ, vel sale, aceto & pipere conditæ, incolis habentur in delitiis.

Asparagus aculeatus Africanus.

A *Corrudâ* vulgari nihil discrepat, radicibus crassioribus, rotundioribus, bulborum instar, ex uno cespite dependentibus, sapore cum *Asparago Zeylanico* consimili. Attuli in Hortum ex Capite Borneæ Spei, ubi ad rivulorum margines luxuriantem offendi.

Asperula 1. B. v. *Rubia*.

Asphalatus secunda trifolia 1. B. v. *Cytisus*.

Aspalatus secunda Monspeliensium 1. B. v. *Cytisus*.
nista.

ASPHODELUS albus ramosus *Morif. Hist.* 330. *Asphodelus albus ramosus* mas C. P. 28. *Asphodelus major*, flore albo ramosus 1. B. tom. 2. l. 19. 626.

- Idem non ramosus *Moris. Hist. 2. 330. C. B. P. 28. Asphodelus major, flore albo non ramosus I. B. tom. 2. l. 19. 625.*
- Asphodelus folio fistuloso striato, non ramosus, luteus & flore & radice Moris. Hist. 2. 331. Asphodelus luteus & flore & radice C. B. P. 28. Asphodelus luteus I. B. tom. 2. l. 19. 632.*
- Asphodelus Allobrogicus, magno flore Lili. Phalangium magno flore C. B. P. 29. Phalangium Allobrogicum, magno flore Lili Moris. Hist. 2. 333. Phalangium Lili flore I. B. t. 2. l. 19. 636.*
- Asphodelus minimus luteus palustris, Acori folio Moris. Hist. 2. 332. Pseudo Asphodelus palustris Scoticus C. B. P. 29. Asphodelus luteus, Acori foliis, palustris, Anglicus Lobelii I. B. tom. 2. l. 19. 633.*
- Asphodelus bulbosus Dodonæi I. B. v. Ornithogalum.*
- Asphodelus foliis fistulosis C. B. P. I. B. Moris. v. Phalangium.*
- Asplenium I. B. v. Ceterach.*

ASTER Novæ Belgiae latifolius paniculatus, floribus saturatè violaceis.

Elegantissimus hic Aster humanam altitudinem longè superans, fundit radicem albam, lignosam, perennantem, innumbris tenuissimis fibris capillatam, ex quâ as-

E

fur-

furgunt virgulta quàm plurima, glabra, purascentia, calami crassitie, infirma, ca fastigia in frequentes furculos, quâ speciosam paniculam collectos, subdi. His strictè adherent folia absque petiolum longum, digitum longa, duosque transversos, plana, crassiuscula, mucronata, alterâ glabra, lætè viridia; alterâ ex viridi purascentia, numerosis exiguis venulis, è costa oriundis, inscripta, ad extimos limbo purpurascentia, & aliquando levissimis conspicuis crenulis exasperata; quæ immediate ex radice prodeunt, superioribus ampliora sunt, fulta petiolis digitalibus alatis, ex viridi rufescentibus. Juxta culorum fastigia eminent capitula parva, vibis angustissimis foliolis, squamatim positis, vestita, quibus singulis insidet stellatus Asteris Attici facie, inodorus, diatus, discoideus, radiis purpureo viridibus, disco parvo flavescente, abeuntia semina papposa cinerea, more congestorum.

Aster Novæ Belgicæ latifolius, umbellatus, ribus dilutè violaceis.

Formâ & crescendi modo cum superiori congruit, ferens radicem longè late repentem, albam parùm fibrosam, ex prodeunt folia, præcedenti haud absimilia.

ASTER NOVÆ BELGIÆ LATIFOLIUS, PANICULA-
TUS, FLORIBUS SATURATE VIOLACEIS.

at paulò angustiora, rigidiora, minus
bra, & quadantenus sinuata; intrà hoc
guntur caules bicubitales, viridantes,
radicem nihil aut parùm rubentes, in
superioribus rigidiores, duriores, & ro-
stiores, circa summa fastigia in frequen-
tes foliosas alas magis expansas, umbel-
mentientes, divisi, sustinentes in capitulis
parvis, ex longioribus foliolis squamis
dispositis, flores priori paulò majores
dilutâ purpurâ violaceos, petalis du-
serie sibi invicem incumbentibus, disco
teo, fatifcente in semina cinerea pap-
priori simillima. Utriusque Asteris spe-
anno superiori in Horto excrevère, sem-
bus ex Novâ Belgiâ transmissis à Dn. D.
hanne Kerfpyl Medicinæ Practicæ felici-
mo.

Aster autumnalis Americanus, foliis latis
natis, parvo purpurascens flore. Aster
latifolius autumnalis *Corn* 4

Aster Virginianus serotinus, parvo alb-
flore *Park. Theatr.* 132.

Aster Æthiopicus, Stoechadis foliis flore
reo.

In montosis aridis ad Caput Bonæ
perrara & speciosa hujus Asteris specie
peritur. Constat radice parvâ, lignosa
brofâ, fuscâ; Caule itidem lignoso,
drontali, modò simplici, modò multip-

ASTER NOVÆ BELGIÆ LATIFOLIUS, UMBELLATUS, FLORIBUS DILUTE VIOLACEIS.

candicante, in ramulos divaricato, u
què foliis fetaceis tenuissimis incanis, S
chadi citrinæ æmulis, vestito. Horum
mitatibus infidet é capitulo oblongo sq
mato, flos luteus, stellæ instar, cujus
dium umbonem, pallidè flavescente
cingunt foliola, radiorum instar, aureo
lore fulgentia. His senescentibus, fu
dunt semina papposa, velut in congen
bus. Viget & floret per totum annum, du
modo ab aëris frigidioris injuriis vind
tur.

Aster maritimus, folio tereti crasso, in su
mo tricuspidato. *Crithmum maritimu*
flore *Asteris Attici* C. B. P. 288. *Cl*
thmum marinum tertium Matthiolo, fl
luteo *Buphthalmi* I. B. tom. 3. l. 26. 106.

Idem folio in summo obtuso.

Aster Atticus luteus montanus villosus, m
gno flore C. B. P. 267. *Aster montanus*, fl
luteo magno, hirsutus, quibusdam *Ocu*
Christi I. B. tom. 2. l. 24. 1046.

Aster luteus, hirsuto Salicis folio C. B. P. 268.

Aster tertius Pannonicus Clusii luteus,
lio hirsuto *Salicis* I. B. tom. 2. l. 24. 1047.

Aster montanus luteus, Salicis glabro fol
C. B. P. 266. *Conyza media Monspeli*
fis, quibusdam *Asteris Attici* genus, fol
glabro rigido I. B. tom. 2. l. 24. 1049.

LUGDUNO-BATAVUS.

71

ASTER ÆTHIOPICUS, STOECHADIS
FOLIIS, FLORE AUREO.

Aster Atticus cœruleus vulgaris C. B. P.

Aster Atticus, purpureo flore I. B. tom.

24. 1044.

Aster Pyrenæus præcox, flore cœruleo ma

Dodart. Mem. 63.

Aster jacobææ folio vulgò. v. Anemonæ aff

Aster luteus, foliis ad florem rigidis C. B. P.

Chrysanthemum.

Aster Atticus, foliis circa florem mollibus C.

v. Chrysanthemum.

Aster luteus major, foliis Succisæ C. B. P.

Chrysanthemum.

Aster luteus supinus C. B. P. v. Chrysan

mum.

Aster supinus Conyzoides, Africanus Park

Chrysanthemum.

Asteri montano hirsuto magno similis I. B.

Conyza.

Aster Canadensis annuus, flore papposo H

Paris. v. Conyza.

Aster luteus alatus Cornut. v. Chrysan

mum.

Aster latifolius, Tripolii flore Dodart. v. T

polium.

Aster Aizoides Prom. Bon. Sp. Zan. 35

Ficoides.

Asteriscus latifolius autumnalis Corn. v. A

ASTRAGALUS perennis spicatus Amer
nus scandens caulibus, radice tuberosa

natus *Moris. Hist. 2. 102.* Apios Americana
Cornuti 201.

Astragalus purpureus annuus peregrinus, filiquis utrinquè ferræ similibus Moris. Hist. 2. 107. Securidaca, filiquis planis utrinquè dentatis C. B. P. 349. *Lunaria radiata Robini I. B. tom. 2. l. 17. 348.*

Astragalus luteus perennis, procumbens vulgaris sylvestris Moris. Hist. 2. 107. Glyzyrrhiza sylvestris, floribus luteo pallescentibus C. B. P. 352. Fœnum græcum sylvestre, five Glyzyrrhiza sylvestris quibusdam *I. B. tom. 2. l. 17. 365.*

Astragalus luteus perennis, filiquâ gemellâ rotundâ, vesicam referente Moris. Hist. 2. 108. Cicer sylvestre, foliis oblongis hispidis majus C. B. P. 347. Cicer sylvestre, folliculis rotundis C. B. P. *Matth. 336.* Cicer sylvestre multifolium *I. B. tom. 2. l. 1. 7. 294*

Astragalus luteus annuus Boëticus maritimus rectus Moris. Hist. 2. 108. Vicia Sefamea Apula *Column. Ecphr. p. 1. 301.* Securidaca Sicula, filiquis foliaceis *Bocc. ic. & descr. 7. ANN.*

Astragalus perennis spicatus, floribus pallidis, nigris radiis notatis Moris. Hist. 2. 107. Onobrychis spicata, floribus pallidis nigris radiis notatis C. B. P. 350

Astragalus Canadensis flore viridi flavescente. Dod. Mem. 65. ANN

Astragalus Africanus luteus odoratus *Magn.*
Botan. 285.

Astragalus humilis Buxifolius. *Chama-*
xus, flore *Colutæ C. B. P.* 471. *C.*
mæbuxus, sive *Chamæbixos I. B. tom.*
l. 5. 24.

Astragalus Hispanicus, siliquâ epiglottidi-
mili, flore purpureo major, *Turnefor.*
ANN.

Ex parvâ fibrosâ albente radice, spa-
per terram cauliculos non nihil hirsutos
viridi rubentes, dodrantis longitudine
quibus sunt folia *Lenti* similia, subhirsuta
conjunctim ex opposito sita, unico in sinu
mo impari; Ad horum sinus exit petio-
lula tenuis, sustinens, ex caliculis parvis vi-
sis quinquifidis, flosculos purpurascen-
tissimos pluresve in capitulum congesti
ritu *Trifolii pratensis*, quos singulos
comprehenduntur siliculæ gemellæ, incanæ, depressæ
in duos lobos divisæ, formam complicatam
epiglottidis, in oblongum apicem pro-
tractæ, referentes, quorum valva superior
externa est coriacea, crassa, hirta, villosa
inferior verò & interna, tenuis & glabra
Lobis, singulis includuntur semina, rari-
tibus bina, frequentius unicum, Lenticulæ mag-
nitudine, depressum, orbiculatum, profundum
in ambitu sinu inscriptum.

STRAGALUS HISPANICUS, SILIQUA EPIGLOT-
TIDI SIMILI, FLORE PURPUREO MAIOR,
TURNEFORTII.

Astragalus Hispanicus filiquâ epiglottidis
mili, flore albo minor Turnefortii. An.

Hujus exigua candicans radícula em-
coliculum digitale, erectum, subincan-
in aliquot tenellos ramulos divisum;
liâ superiori minora, non nihil incan-
subhirsuta, novena aliquando septena
costæ ex adverso hærentia; Flores pa-
dos exiguos papilionaceos, sex septem
in perbrevis racemulo junctos. Hos ex-
unt siliculæ depressæ, rigidæ, hirtæ, inca-
mucrone brevi, siliculis superioris Astragali
triplo minores, epiglottidem perfectius
primentes, ex maturitate in duos locos
dehiscentes, qui condunt semen, solâ e-
tate à superiori distinctum. Utrumque
Astragalum nomine Epiglottidis legumi-
nifera vel Astragali filiquâ epiglottidi simi-
inter alia curiosissima ex Galliis ad nos tra-
misit Clarissimus Dominus Josephus To-
nefortius.

*Astragalus Boëticus lanuginosus, radice am-
plissima* C. B. P. v. Orobus.

Astragalus Romanus I. B. v. Onobrychis.

ASTRANTIA major Moris. Umbell.
& 10. Helleborus niger, Saniculæ fo-
major C. B. P. 186. Sanicula Fœmina
busdam, aliis Elleborus niger I. B. tom. 3
34. 638.

ASTRAGALUS HISPANICUS SILIQUA EPIGLOT-
TIDI SIMILI, FLORE ALBO MINOR
TURNEFORTII.

Eadem minor *Moris. Umbell. 7. & 10. H.*
leborine *Saniculæ folio minor C. B. P. 18.*

Atragene quibusdam I. B. v. Clematitis.

* **A**TRIPLEX sylvestris latifolia C. B. P. 119.
Moris. Hist. 2. 604. Atriplex dicta Pes
ferinus I. B. tom. 2. l. 23. 975. ANN.

* Atriplex sylvestris latifolia, acutiori fo-
C. B. P. 119. *Moris. Hist. 2. 604. Atriplex*
dicta Pes Anserinus, altera sive ramo-
I. B. tom. 2. l. 23. 976.

* Atriplex sylvestris, folio sinuato candida
C. B. P. 119. *Moris. Hist. 2. 604. ANN*

* Atriplex sylvestris, folio sinuato saturate
rente, spicâ rubrâ *Moris. Hist. 2. 604. A*
plex sylvestris altera C. B. P. 119. *Atriplex*
sylvestris *I. B. tom. 2. l. 23. 972. ANN.*

Atriplex procumbens, folio sinuato luc-
crasso *Moris. Hist. 2. 605. ANN.*

Atriplex foetida C. B. P. 119. *Moris. Hist. 2. 605.*
I. B. tom. 2. l. 23. 974. ANN.

Atriplex odora, sive suaveolens *Moris. Hist. 2. 605.*
Botrys Ambrosioides vulgaris C. B. P. 138. ANN.

Atriplex odorata suaveolens Americana Me-
canave *Moris. Hist. 2. 605. Botrys Ambrosioides*
Mexiocana C. B. P. 138. Epazo
Atriplex odorata Mexicana. *Rech. H. Mexic. p. 159. ANN.*

Atriplex Mori fructu major, seu fragifera

jor *Moris. Hist.* 2. 606. *Spinachia fragifera Horti Farnesiani Aldin.* 85. ANN.

Atriplex Morifructu minor, seu fragifera minor, *Moris. Hist.* 2. 604. Atriplex sylvestris, Mori fructu C. B. P. 119. ANN.

Atriplex, Mori fructu, minima *Moris. Hist.* 2. 607. Atriplex sylvestris, lappulas ferens C. B. P. 119. ANN.

Atriplex hortensis alba, seu pallidè virens C. B. P. 119. *Moris. Hist.* 2. 606. Atriplex. alba *I. B. tom.* 2. l. 23. 670. ANN.

Eadem nigricans C. B. P. *Var.* 119. *Moris. Hist.* 606. ANN.

Atriplex sylvestris annua, folio deltoide triangulari sinuato & mucronato, hastæ cuspidi simili *Moris. Hist.* 2. 607. ANN.

Atriplex, angusto oblongo folio C. B. P. 119 *Moris. Hist.* 2. 607. Atriplex vulgaris angustifolia, cum folliculis *I. B. tom.* 2. l. 23. 973. ANN.

Eadem angustissimo & longissimo folio. ANN.

Atriplex angusti folia laciniata minor *I. B. tom.* 2. l. 23. 972. *Moris. Hist.* 2. 607. Atriplex sylvestris, folio oblongo glauco aut coesio *Moris. ib.* 604. ANN.

Atriplex maritima laciniata C. B. P. 120. *Moris. Hist.* 2. 607. Atriplex maritima *I. B. tom.* 2. l. 23. 974. ANN.

Atriplex maritima, folio integro angustissimo. Atriplex minima, angustifolia maritima.

tima. *Bocc. de Pl. sic.* 29. *Moris. Hist.* 2. 607. ANN.

Atriplex latifolia, seu *Halimus fruticosus*, *Moris. Hist.* 2. 607. *Halimus folius*, five fruticosus *C. B. P.* 120. *Halimus Clusii I. B. tom.* 1. l. 8. 227.

Atriplex maritima angustifolia procumbens, *Moris.* 2. 608. *Halimus angustifolius procumbens* *C. B. P.* 120. *Portulaca maritima* *Clusii I. B. tom.* 1. l. 8. 228.

Atriplex maritima, angustissimo folio *Moris. Hist.* 2. 608. *Halimus*, seu *Portulaca maritima* *C. B. P.* 120.

ATRIPLICI affinis *Linariae* foliis, *Belvidere dicta*. *Linaria scoparia* *C. B. P.* 120. *Linaria Belvidere dicta* *I. B. tom.* 3. l. 462. ANN.

Attractylis lutea *C. B. P.* v. *Cnicus*.

Attractylis *I. B.* v. *Cnicus*.

Atzoyatl. Rech. v. *Mirabilis Peruviana*.

Avellana vulgò *ejusque species*. v. *Corylus*.

AVENA vulgaris, seu alba *C. B. P.* 23. *Avena alba* *I. B. tom.* 2. l. 18. 432. ANN.

Avena nigra *C. B. P.* 23. *I. B. tom.* 2. l. 18. ANN.

* *Avena nuda* *C. B. P.* 23. *I. B. tom.* 2. l. 18. ANN.

Avena pilosa I. B. v. *Festuca*.

Avicularia Sylvii quibusdam I. B. v. *Campanula*.

Aurantia poma. v. *Malum Aurantium*.

Auricula leporis I. B. *ejusque species*. v. *Bupleurum*.

Auricula muris, *pulchro flore albo* I. B. v. *Lychnis*.

AURICULA urfi lutea. *Sanicula Alpina lutea* C. B. P. 242. *Moris. Hist.* 2. 557. *Auricula urfi flore luteo* I. B. tom. 3. l. 30. 499. flore simplici.

Auricularum plurimæ varietates; Folio vel viridi, vel quasi farinâ asperso, eoque vel ferrato, vel non ferrato; Flore vel parvo, vel magno; Ejusque umbone vel angusto, vel amplo, vel plano vel stellato; Petalis vel marginibus integris, cordiformibus, vel undulatis, modò simplicibus, modò multiplicibus, vel unicoloribus vel multicoloribus, variis elegantissimis, interquas formâ maximè excellentes in horto sunt sequentes:

Auricula urfi, flore magno atropurpureo holoserico simplici, umbone candido amplissimo.

Eadem flore magno undulato obsoletè incarnato, umbone pallido amplissimo.

Eadem flore magno undulato colore vario, umbone amplissimo flavescente.

Eadem umbone triplici vario.

Eadem umbone amplissimo radiato aureo.

Eadem umbone amplissimo stellato aureo.

Auricula urfi flore magno pleno flavo.

Eadem flore magno pleno albo.

Eadem flore magno pleno purpureo.

Eadem flore magno pleno atropuniceo
ferico.

Eadem flore magno pleno coccineo.

Eadem flore magno pleno, ex aureo albo &
niceo variegato.

Eadem flore magno pleno, ex flavo & co
neo variegato.

Auricula urfi alpina, minima carnea. S

cula alpina minima carnea. C. B. P. 243.

Auricula urfi minima, folio inferius ven
& incano, flore suave rubente Ciasfi.

Discriminatur à præcedente, foliis
gioribus infernè venosis, non nihil inca
supernè viridibus, summis marginibus
natis; Floribus quinis vel septenis, co
ris suavè rubentis, quasi in umbellâ ca
fastigio insidentibus. Hanc Dominus
assii Venetiis transmisit ad honestissimam
matronam Agnitam de Block, cujus libe
litate accepimus.

Auriculæ urfi affinis, Androface dicta ma

Saniculæ affinis planta, Androface dicta

ior *Moris. Hist.* 2. 556. Alfine affinis,

droface dicta major C. B. P. 251. And

face Matthioli altera *I. B. tom. 3. l. 29. 368.*

Auricula ursi Mycon. v. Verbascum.

A ZEDARACH *Dod. Pempt. 6. l. 4. c. 26. Arbor Fraxini folio, coeruleo flore C.B.P. 415. Azadaracheni arbor I. B. tom. 1. l. 5. 554.*

B.

B accharis quibusdam *I. B. v. Conyza.*

Bala Hort. Mal. v. Ficus.

B alaustia flore pleno majori *C. B. P. v. Malus Punica.*

Ballote Diosc. C. B. P. v. Marrubium.

Balsamina rotundifolia repens seu Mas C. B. P. v. Cucumis.

B ALSAMINA, Herba impatiens, seu Noli me tangere, flore patulo eleganter dilutè rubente *Moris. Hist. 2. 281. Balsamina Fœmina C. B. P. 306. Balsamina Fœmina, Perfici folio, vel Salicis folio I. B. tom. 2. l. 21. 909. flore incarnato. ANN.*

Eadem flore candido. ANN.

Eadem flore partim candido, partim rubro. ANN.

Balsamina, Herba impatiens, seu Noli me tangere flore, patulo luteo Moris. Hist. 2. 282. Balsamina lutea, five Noli me tangere C. P. B. 306. Noli me tangere I. B. tom. 2. l. 21. 903. ANN.

Bamia I. B. v. *Althæa*.

Bananiera *Pison*. v. *Ficus*.

BARBA capræ floribus oblongis C. B. P.
Barba capræ I. B. tom. 3. l. 30. 488.

* Barba capræ floribus compactis C. B. P.
Vlmaria I. B. 3. l. 30. 488.

BARBA JOVIS C. B. P. 397. Jovis barb
chrè lucens I. B. tom. 1. l. 11. 385.

Barbarea C. B. P. v. *Eruca*.

Bardana I. B. v. *Lappa*.

Basilicum vulgò. v. *Ocimum*.

Batatas C. P. B. & I. B. v. *Convolvulus*.

Beccabunga vulgò. v. *Veronica*.

Beidelssar *Alpini* I. B. v. *Apocynum*.

Been album I. B. v. *Lychnis*.

Behen rubrum I. B. v. *Limonium*.

Bella donna I. B. v. *Solanum*.

Belle videre I. B. v. *Atriplici affinis*.

* **B**ELLIS sylvestris, caule folioso major
261. Bellis major I. B. tom. 3. l. 26.

Caule glabro C. B. P. Var. 261.

* Eadem caule hirsuto C. B. P. Var. 261.

Bellis Alpina major, rigido folio C. B. P.

Bellis Alpina major, foliis angustis
I. B. tom. 3. l. 26. 115.

Eadem folio breviori & latiori.

Hæc præcedente humilior est & ten

Foliis latioribus, brevioribus, magis reflexis; Floribus minoribus. Floret in hybernaculo totâ hyeme.

Bellis Americana procerior serotina ramosa, flore amplissimo. An Aster serotinus procerior ramosus, Bellidis sylvestris flore *Cat. Hort. Reg. Paris. 27?*

Bellis ramosa umbellifera *Cornuti 194.* Bellis major ramosa umbellifera Americana *Park. Theatr. 528.*

Bellis leucanthema, Tanaceti foliis inodoris, flore majori *Moris. Hort. Bles. 362.* Tanacetum inodorum, flore majori *C. B. P. 132.* Tanacetum album, flore ampliore *I. B. tom. 3. l. 29. 133. Descr.*

Eadem flore minori *Moris. Hist. Bles. 362.* Tanacetum montanum inodorum, minori flore *C. B. P. 132.* Tanacetum album *I. B. tom. 3. l. 26. 133.*

Bellis sylvestris media, caule carens *C. B. P. 261.* Bellis sylvatica *I. B. tom. 3. l. 26. 114.*

Bellis sylvestris minor *C. B. P. 261.* Bellis minor sylvestris spontanea *I. B. tom. 3. l. 26. 111.* Petalis albis *C. B. P. Var. ibid.*

Eadem petalis ex candido rubris *C. B. P. Var. 261.*

Eadem petalis ex albo & rubro mixtis *C. B. P. Var. 261.*

Eadem petalis intus rubris, in ambitu albis *C. B. P. Var. 261.*

Bellis hortensis, flore pleno, eoquè ma
vel parvo C. B. P. 261. Bellis hortensis
flore multiplicato I. B. tom. 3. l. 26.
flore albo.

Eadem flore incarnato C. B. P. *Var.* 261.

Eadem flore rubro C. B. P. *Var.* 261.

Eadem flore vario ex candido & rubro C.
Var. 261.

Eadem pediculo folioso : quæ 7. in Pr
C. B. P. 262.

Bellis hortensis prolifera C. B. P. 262. B
hortensis, flore multiplicato five prol
I. B. tom. 3. l. 26. 113.

Bellis spinosa, foliis Agerati C. B. P. 264. B
spinosa *Prosp. Alpin. Exot.* 372. Cap
aphyllo luteo.

Eadem foliis non spinosis.

Bellis Africana capitulo aphylo luteo, C
nopi folio, cauliculis procumbent
Chrysanthemum capitis Bonæ Spei re
flore aphylo *Dn. Syens Breyn. Gen.*
156.

Eadem foliis & cauliculis juncis erectis.
Nata est ex feminibus Bonæ Spei, p
similis; Ast foliis & cauliculis tenuiori
erectis & juncis. Sapore & odore, v
præcedens, fatuo.

Bellis lutea, foliis profundè incisis major C
v. Chrysanthemum.

Bellis lutea, foliis profundè incisis minor. v.
Chrysanthemum.

Bellis lutea, foliis subrotundis C. B. P. v. Chry-
santhemum.

Belmoscus Ægyptia Honorio Bellio. v. Al-
thæa.

BERBERIS dumetorum C. B. P. 454. Berbe-
ris vulgò, quæ & Oxyacantha putata I. B.
tom. 1. l. 6. 52.

Berberis sine nucleo C. B. P. 454.

BETA spontanea maritima communis viridis
Moris. 596. Beta sylvestris maritima C. B. P.
ANN.

Beta alba, vel pallefcens, quæ Sicula & Cicla
Officinarum *Moris. Hist. 2. 596. C. B. P. 118.*
ANN.

Beta communis five viridis C. B. P. 118. ANN.

Beta rubra vulgaris C. B. P. 118 *Moris. Hist. 2.*
596. ANN.

Beta Sicula, seu Syriaca platineuros alba
Moris. Hist. 2. 596. Beta pallidè virens ma-
jor C. B. P. 118. ANN.

Eadem lutea *Moris. Hist. 2. 596.* Beta pallidè
flavens major C. B. P. 118. ANN.

Eadem rubra *Moris. Hist. 2. 596.* Beta rubra
major C. B. P. 118. ANN.

Eadem aurantiaca *Moris. Hist. 2. 596.* ANN.

Beta rubra, radice Rapæ C. B. P. 188. *Moris.*
F 4 *Hist.*

Hist. 2. 596. Beta, radice rubrâ crassâ
tom. 2. *l.* 23. 901. ANN.

Beta Cretica, semine spinoso seu aculeato
Moris. Hist. 2. 597. *C. B. P.* 118. *I. B.* *tom.* 2. *l.* 23. 963. ANN.

BETONICA major Danica *Park. Theatr.* 614.

* Betonica purpurea *C. B. P.* 235. Betonica
vulgaris purpurea *I. B. tom.* 3. *l.* 38. 302.
Eadem alba *C. B. P.* 235. Betonica, flore
I. B. tom. 3. *l.* 28. 302.

Betonica minima alpina Helvetica
Theatr. 614.

Betonica Coronaria ejusque species I. B. tom. 3. *l.* 38. 302.
ryophyllus.

* **B**ETULA *C. B. P.* 427. Betula Theophrasti
I. B. tom. 1. *l.* 8. 148.

Eadem virgulis pendulis *J. Lôsel. Moench.*
Ind. 47.

Bifolium majus I. B. v. Orchis.

Bintamburu Zeylonensium. v. Convolvulus.

Bismalva I. B. v. Malva.

* **B**ISTORTA major, radice minus intorta
C. B. P. 192. *Moris. Hist.* 2. 585. Bistorta
major, rugosioribus foliis *I. B. tom.* 3. *l.* 38. 538.

Bistorta major, radice magis intortâ *C.*

192. *Moris. Hist. 2. 585.* Bistorta media, folio minus rugoso *I. B. tom. 3. l. 31. 531.*

Bistorta Alpina minima sobolifera *Moris. Hist. 2. 585.* Bistorta minima *I. B. tom. 3. l. 31. 539.* An Bistorta Alpina media *C. B. P. 192?*

Blattaria perennis, Verbasci folio, flore luteo, amplo *Moris. Hort. Bles. 239.* capsulis minoribus.

Blattaria perennis, flore violaceo *Moris. Hist. 2. 488.* Blattaria purpurea, radice perenni *Moris. Hort. Bles. 240.* Blattaria purpurea *C. B. P. 241.* Blattaria flore cœruleo vel purpureo *I. B. tom. 3. app. 875.* Folio subrotundo.

Blattaria flore gilvo seu obsoleti coloris *Moris. Hist. 2. 488.* Blattaria lutea folio longe laciniato *C. B. P. 240.* Folio oblongo.

Eadem Anglicana perennis, flore obsoletè phœniceo *Cat. Hort. Reg. Paris. 31.*

Eadem flore ferrugineo *Cat. Hort. Reg. Paris. 31.*

Eadem flore flavo.

Blattaria annua ramosa, floribus luteis staminibus purpureis *Moris. Hist. 2. 498.* Blattaria vulgaris lutea *I. B. tom. 3. appen. 874.* ANN.

Eadem flore albo. Blattaria alba *C. B. P. 241. I. B. tom. 3. app. 874.* ANN.

Eadem flore purpureo. ANN.

Eadem obsoleto colore purpurascente

Var. 241. ANN.

Eadem nigro Violæ eleganti colore niten

P. Var. 241. ANN.

Eadem obsoleto flavescente colore. ANN.

Blattaria annua flore majore luteo, ca

item majore *Moris. Hist.* 2. 498. Flo

longioribus infidentibus petiolis. Bla

magno flore C. B. P. 241. I. B. tom. 3.

875. ANN.

Eadem flore intus albo, extus incarnato.

Blattaria Zeylanica, flore amplo miniato.

Blattaria rubra spicata major glabra com

folio acuto Moris. v. Lyfimachia sp

purpurea.

Blattariæ adfinis planta, major flore luteo

ris. v. Lyfimachia.

Eadem minor, foliis nigris punctis notatis

ris. v. Lyfimachia.

Blattariæ adfinis planta, bifolia lævis flor

bo. Ephemeron Moris. v. Lyfimachia.

* **B** L I T U M perenne, Spinachia facie M

Hist. 2. 599. Lapathum unctuosum,

triangulo seu Bonus Henricus C. B. P.

Bonus Henricus I. B. tom. 2. l. 23. 965.

Blitum rubrum majus C. B. P. 118. *Moris.*

2. 599. Blitum pulchrum rectum mag

rubrum I. B. tom. 2. l. 23. 966. ANN.

Blitum album majus C. B. P. 118. *Moris. Hist.* 2. 599. *Blitum pulchrum magnum album* I. B. tom. 2. l. 23. 967. ANN.

Blitum rubrum minus C. B. P. 118. *Moris. Hist.* 2. 599. I. B. tom. 2. l. 23. 967. ANN.

Blitum album minus C. B. P. *Moris. Hist.* 2. 599. I. B. tom. 2. l. 23. 967. ANN.

Blitum minus polyspermum, à seminis copiâ C. B. P. 118. *Moris. Hist.* 2. 599. *Blitum erectius* five 3. *Tragi* I. B. tom. 2. l. 23. 967. ANN.

Blitum monospermum Indicum aculeatum, capsulâ rotundâ *Breyn. Pr.* v. *Amaranthus*.

Blitum spinosum Americanum *Sutherl. Catal. Edinb.* v. *Amaranthus*.

Blitum maximum I. B. v. *Amaranthus*.

Bona major *Dod. Moris.* v. *Faba*.

Bonus Henricus I. B. v. *Blitum*.

BORRAGO floribus cœruleis I. B. tom. 3. l. 33. 574. *Buglossum latifolium* *Borrigo* C. B. P. 256.

Eadem floribus albis I. B. tom. 3. l. 33. 574. Floribus candidis C. B. P. *Var.* 256.

Eadem folio & flore albo.

Borrigo Cretica vulgò. v. *Buglossum*.

Borrigo minima *Herbariorum* I. B. v. *Buglossum*.

Borrigo sylvestris perennis *Candia*, flore puniceo *Zan.* v. *Anchusa*.

Botrys Ambrosioides vulgaris C. B. P. v. *Atriplex*.

Botrys Ambrosioides Mexiocana C. B.
Atriplex.

Botrys verticillata I. B. v. *Chamædris*.

Botrys Chamædrioides C. B. P. v. *Chamæ*

Branca ursina I. B. v. *Acanthus*.

BRASSICA capitata alba C. B. P. III
Moris. Hist. 2. 206. I. B. tom. 2. l. 21.
ANN,

Brassica capitata rubra C. B. P. III. *Moris.*
2. 207. I. B. tom. 2. l. 21. 831. ANN.

Brassica capitata polycæphalos *Lugd. M.*
Hist. 2. 207. Brassica ex capitulis plu
conglobata C. B. P. capite clauso pe
ANN.

Brassica alba, capite oblongo non pe
clauso C. B. P. III. *Moris. Hist. 2. 207.*
fica Italica tenerima glomerosa, flore
I. B. tom. 2. l. 21. 827. ANN.

Brassica alba crispa C. B. P. III. *Moris. H.*
207. Brassica Sabauda rugosa I. B. tom.
21. 828. ANN.

Brassica fativa alba vel viridis vulgaris,
ta lævis Moris. Hist. 2. 207. Brassica alb
viridis C. B. P. III. *Brassica alba vul*
I. B. tom. 2. l. 21. 829. ANN.

Brassica fativa rubra, aperta lævis Moris.
2. 207. Brassica rubra C. B. P. III. B
ca rubra vulgaris I. B. tom. 2. l. 21.
ANN.

Brassica fimbriata C. B. P. 112. *Moris. Hist.* 2.

207. *Brassica tophosa* I. B. *tom.* 2. l. 21. 830.

ANN.

Ejusdem varietates colore insignes. ANN.

Brassica fimbriata pumila C. B. P. 112. *Moris.*

Hist. 2. 207. ANN.

Brassica cauliflora C. B. P. 111. *Moris. Hist.* 2.

208. *Brassica multiflora* I. B. *tom.* 21. 828.

ANN.

Brassica Asparagodes crispa C. B. P. 111. *Moris.*

Hist. 2. 208. *Brassica thyrsoides* I. B. *tom.* 2.

l. 21. 833. ANN.

Brassica Gongylodes C. B. P. 111. *Moris. Hist.* 2.

208. *Brassica caulorapa* I. B. *tom.* 2. l. 21.

829. ANN.

Brassica lato Apii folio C. B. P. 112. *Moris. Hist.*

2. 208. ANN.

Brassica angusto Apii folio C. B. P. 112. *Moris.*

Hist. 2. 208. *Brassica tenuissimè laciniata*

I. B. *tom.* 2. l. 21. 832. ANN.

Brassica maritima arborea, seu procerior ramosa *Moris. Hist.* 2. 208.

Brassica maritima major repens, multiflora alba monospermos *Moris. Hist.* 2. 209. *Bras-*

sica maritima monospermos C. B. P. 112.

Brassica monospermos Anglica I. B. *tom.* 2.

l. 21. 830.

Brassica sylvestris, Crambe dicta *Dod. Moris.*

Hist. 2. 209. *Brassica arvensis* C. B. P. 112,

& *Brassica sylvestris* *Diosc. Dod. C. B. P.*

ibid.

ibid. Brassica fylvestris I. B. tom. 2. l. 21.

ANN.

- * Brassica campestris perfoliata, flore albo
P. 112. Moris. Hist. 2. l. 210. Perfoliata filia
sa I. B. tom. 2. l. 21. 835. ANN.

Brassica fylvestris, Napobrasica dicta
Hist. 2. 210. Napobrasica C. B. Prod.
P. III. ANN.

- * Brassica fylvestris, foliis circa radicem cor-
raceis, asperis, caulibus autem adhæren-
bus planis seu glabris Moris. Hist. 2.
Brassica fylvestris, foliis circa radicem
choraceis C. B. P. Glastifolia Cichorei
I. B. & Turritis secunda Clusii I. B. tom.
l. 2. 837.

Brassica fylvestris hispida non ramosa C.
v. Leucojum.

Britannica antiquorum vera Munt. v. L.
thum.

BRUNELLA Lusitanica, flore & spicâ
re Dodart. Mem. 67. Foliis Scrophulariæ
Brunella, cœruleo magno flore C. B. P.
Prunella magno folio non laciniato I. B.
3. l. 30. 429.

- * Brunella major, folio non dissecto C. B. P.
Prunella flore minore vulgaris I. B. tom.
l. 30. 428.

- * Eadem flore albo Cat. Hort. Reg. P.
32.

Eadem flore purpurascence *Cat. Hort. Reg.*

Paris. 32.

Brunella folio laciniato C. B. P. 261. Prunella laciniata, flore magno purpureo I. B. tom. 3. l. 30. 429.

Eadem flore albo. An Prunella flore albo parvo, folio laciniato I. B. tom. 3. l. 30. 429?

Bromos vulgò. v. Festuca

BRYONIA aspera five alba, baccis rubris C. B. P. 297. Bryonia aspera incana alba, baccis rubris *Moris. Hist. 2. 4.* Vitis alba, five Bryonia I. B. tom. 2. l. 15. 143.

Bryonia levis, five nigra racemosa C. B. P. 297. *Moris. Hist. 2. 5.* Vitis nigra quibusdam, five Tamnus Plinii, folio Cyclaminis I. B. tom. 2. l. 15. 147.

Bryonia Zeylanica, foliis profundè laciniatis.

Ingenium catharticum, congeneribus haud disfimile, probat hæc Bryonia tam gustu suo acri amaro & nauseoso, quàm etiam usu, Zeylanensibus in Hydrope frequenti, penes quos in parietinis rudibus aliisque incultis fordidis, sua sponte luxuriat. Spargit à radice albicante fibrosâ in modicum ventrem extumescente, flagella tenera flexibilia, longo varioque reptatu circinnatis suis claviculis vicina quævis apprehendentia; Folia atro viridia, asperiuscula, quinque vel sex profundis laciniis di-

vifa; Flores ad foliorum sinus folia
 aliquando binos ternosve, parvulos
 quinque petalis reflexis pallide flavo-
 tibus & subhirsutis compositos;
 Cerasi magnitudine, oblongo rotundo
 primùm virides, postmodum rubelli
 quot lacteis striis perbellè inscriptas
 tinentes in pallido lentoque succo
 fuscis, duros, asperos, subrotundos,
 in medio, quasi fasciâ, in obtusum ap-
 protuberante. Radix ad multos annos
 perennat in Zeylona; sub nostro ven-
 tiori climate facilè perit.

BUGLOSSUM latifolium semper virens
 256. Buglossum folio Borriginis, Hil-
 cum I. B. tom. 3. l. 33. 577.

Buglossum angustifolium majus C. B. P.
 flore cœruleo C. B. P. Var. 256. Buglo-
 vulgare majus I. B. tom. 3. l. 33. 578. A.

Idem flore rubeo C. B. P. Var. 256. flore
 pureo I. B. Deser. tom. 3. l. 33. 578. AN.

*Buglossum angustifolium minus C. B. P.
 Buglossum vulgare minus I. B. tom. 3.
 578. ANN.

Buglossum sylvestre majus nigrum C. B. P.
 ANN.

*Buglossum sylvestre minus C. B. P. 256. Ech-
 Fuchsi, five Borrigo sylvestris I. B. tom.
 l. 33. 581. ANN.

BRYONIA ZEYLANICA FOLIIS PROFUNDE
LACINIATIS.

* Buglossum sylvestre minus alterum & rius C. B. P. 256. ANN.

* Buglossum sylvestre, cauliculis procumbentibus C. B. P. 257. Cynoglossa fortè Tria Plinio, Echium lappulatum quibus I. B. tom. 3. l. 33. 590. ANN.

Buglossum minus Symphyti foliis. Symphytum pumilum repens, Borruginis C. B. P. 259. Symphytum pumilum re five Borrigo minima herbariorum I. B. tom. 3. l. 33. 597.

Buglossum Creticum, cauliculis procumbentibus, flore variegato, odorato, Echium verrucosis. Borrigo sylvestris annua dicitur Zanon. Hist. 48. Buglossum Creticum verrucosum, perlatum quibusdam Hort. Reg. Paris. 33. Borrigo Creticum gò. ANN.

Buglossum marinum incanum cœruleo Cynoglossum flore cœruleo Park. Th. 13.

Buglossum latifolium C. B. P. v. Borrigo Bugula quibusdam I. B. v. Consolida medica

* BULBOCASTANUM majus, folio Apocyni P. 162. Bulbocastanum Moris. Umbell. 5. I. B. tom. 3. l. 27. 31.

Bulbocodium ejusque species I. B. v. Narcissus Bulbus eriophorus Orientalis C. B. P. v. Cinthus.

Bulbus sylvestris Fuchsi I. B. v. *Ornithogalum*.

Bunias Moris. v. *Napus*.

Bupthalmum Creticum, *Cotulae facie Breyn.* v. *Chrysanthemum*.

Bupthalmum Cotulae folio C. B. P. v. *Chrysanthemum*.

Bupthalmum Dod. I. B. v. *Adonis*.

Bupthalmum Tanacetii minoris foliis C. B. P. v. *Chrysanthemum*.

BUPLEURUM folio rigido C. B. P. 278. *Bupleurum perenne*, latifolium *Moris. Umbell.* 26. *Auricula leporis altera*, five rigidior I. B. tom. 3. l. 27. 200.

Bupleurum folio subrotundo, five vulgatissimum C. B. P. 278. *Bupleurum perenne*, angustifolium *Moris. Umbell.* 26. *Auricula leporis*, umbellâ luteâ I. B. tom. 3. l. 27. 200.

BURSA pastoris major, capsulâ cordatâ, foliis non sinuatis *Moris. Hist.* 2. 304. *Bursa pastoris major*, folio non sinuato C. B. P. 108. ANN.

Eadem foliis laciniatis *Moris. Hist.* 2. 304.

Bursa pastoris major, folio sinuato C. B. P. 108. *Bursa pastoria* I. B. tom. 2. l. 22. 936.

ANN.

Eadem folio eleganter dissecto, instar *Coronopi repentis* C. B. P. Var. 108. ANN.

- * Eadem minor capsulâ brevi cordatâ,
nuatis *Moris. Hist. 2. 305.* Bursa
media C. B. P. 108. ANN.
- * Bursa pastoris minor, foliis alatis, costa
è regione adhærentibus, uno imp
tremum claudente *Moris. Hist. 2. 30*
pastoris minor, foliis incisfis C. B.
Bursa pastoris parva, folio glabro, sp
tom. 2. l. 22. 137. ANN.
- * Bursa pastoris major hirsuta, capsulâ
Moris. Hist. 2. 305. Bursa pastoris
loculo oblongo C. B. P. 108. Bursa
riæ sublongo loculo affinis, pulchra
B. tom. 2. l. 22. 938. ANN.
- * Bursa pastoris minor, loculo oblongo
108. *Moris. Hist. 2. 305.* Bursa pasto
nima oblongis filiquis, verna, loculo
go I. B. *tom. 2. l. 22. 937.* ANN.
- * Bursa pastoris minor, foliis trifidis, a
do multifidis, florum petalis bifidis
lo oblongo *Moris. Hist. 2. 306.* Bursa
ria minima, oblongis filiquis, verna
oblongo I. B. *tom. 2. l. 22. 937.* ANN.
Bursæ pastoris similis filiquosa major,
v. Draba.
Eadem minor C. B. P. v. Draba.

BUXUS arborescens C. B. P. 471. Bux
tom 1. l 4. 496.

Buxus foliis rotundioribus C. P. B. 471.

Buxus foliis ex luteo variegatis *Hort. Reg.*

Paris. 34. Buxus auratus Park.

Buxus major, foliis per limbum aureis *Hort.*

Reg. Paris. 34.

Buxus longioribus foliis, in acumen luteum
desinentibus *Hort. Reg. Paris. 34.*

C.

aachira Pison. v. Colutea.

CACALIA foliis cutaneis acutioribus &
glabris *C. B. P. 198. Cacalia* quibusdam
I. B. tom. 3. l. 32. 569.

CACHRYS, seu Libanotis *Cachryphoros*,
semine fungoso levi *Moris. Umb. 1. Liba-*
notis Ferulæ folio, semine anguloso *C. B. P.*
150. Libanotis Cachryophoros quibusdam,
floribus luteis *I. B. tom. 3. l. 27. 40.*
adem semine fungoso sulcato aspero *Moris.*
Umb. 2.

acubalum quibusdam *I. B. v. Solanum.*

akile quibusdam *I. B. v. Eruca.*

CALAMINTHA incana, *Ocymi* foliis *C. B.*
P. 228. Calamintha folio & flore parvo in-
cana I. B. tom. 3. l. 28. 230.

Calamintha Pulegii odore, sive *Nepeta C. B.*

- P. 228. Calamintha flore minore,
 Pulegii *I. B. tom. 3. l. 28. 229.*
- Calamintha vulgaris vel Officinarum
 niæ *C. B. P. 228.* Calamintha flore
 vulgaris *I. B. tom. 3. l. 28. 228.*
- Calamintha magno flore *C. B. P. 229.*
 Calamintha montana, flore magno ex
 longo *I. B. tom. 3. l. 28. 229.*
- Eadem Pulegii odore, foliis latioribus.
- Calamintha cattaria, seu Nepeta vulga
 major. Mentha cattaria vulgaris &
C. B. P. 228. Mentha cattaria *I. B. tom.*
28. 225.
- Eadem minor. Mentha cattaria minor *C.*
228.
- Calamintha cattaria latifolia *C. B. P. Me*
 cattaria Hispanica, olim Sideritis alti
 flore albo *I. B. tom. 3. l. 28. 226. ANN.*
- Eadem angustifolia. Mentha cattaria ang
 folia *C. B. P. 228.* Mentha cattaria H
 nica, angustioribus foliis *I. B. tom. 3.*
226. ANN.
- Calamintha tuberosâ radice. Mentha tub
 sâ radice *C. P. P. 227.* Menthastrum t
 rosâ radice *I. B. tom. 3. l. 28. 227.*
- Calamintha arvensis verticillata *C. B. P.*
 Mentha.
- Calamus Aromaticus Officinarum *C. B. P.*
 vulgaris *I. B. v. Acorus.*
- Calcatrippa vulgò. v. Consolida Regalis.

Calceolus D. Mariae I. B. v. Helleborine.

CALENDULA vulgaris, flore citrino simplici. Caltha vulgaris C. B. P. 275. Caltha flore simplici I. B. tom. 3. l. 26. 101. ANN. Eadem flore pallido simplici C. B. P. Var. 275. ANN.

Eadem flore ruffo, seu luteo medio ruffo C. B. P. Var. 275. ANN.

Calendula polyanthos maxima. Caltha polyanthos maxima C. B. P. 275. ANN.

Calendula flore luteo, vel aureo pleno. Caltha polyanthos major C. B. P. 275. Caltha flore pleno I. B. tom. 3. l. 26. 101. ANN.

Eadem flore melino pleno C. B. P. Var. 276. ANN.

Calendula flore aureo pleno minor. Caltha polyanthos flore aureo Tab. ANN.

Calendula floribus reflexis. Caltha floribus reflexis C. B. P. 276. ANN.

Calendula prolifera, majoribus floribus. Caltha prolifera, majoribus floribus C. B. P. 276.

Caltha prolifera I. B. tom. 3. l. 26. 102. ANN.

Calendula minor arvensis. Caltha arvensis C. B. P. 176. ANN.

Eadem Hispanica. ANN.

Minore arvense gracilior & humilior est, quotannis, ritu congenerum, ex semine deciduo propullulans.

Calendula Hieracii flore, Chondrilla
verrucaria. Cichorium verrucarium
Hort. Bles. 361. Cichorium verruco
five Zazinta, Hieracii annueran
I. B. tom. 2. l. 24. 1013. Chondrilla v
caria, foliis Cichorii viridibus C. B. P.
ANN.

Calendula Hieracii flore, semine falcato
chorium falcatum *Moris. Hort. Bles.*
Hieracium filiquâ falcatâ C. B. P. 128.
racium stellatum *I. B. tom. 2. l. 24.*
ANN.

Calendula procumbens, Hieracii flore
pitulum inclinans semine adunco. C
rium semine adunco *Moris. Hort. Bles.*
Hieracium capitulum inclinans, se
adunco C. B. P. 128. Hieracium florem
clinans *I. B. tom. 2. l. 24.* 1042. ANN.

Calendula humilis Africana, flore intus
foris violaceo simplici. ANN.

Sequentes potius florum & semi
dispositionem, quàm foliorum coetera
quæ partium affinitatem, Calendulis
rendam censuimus hanc plantam. Mitt
albente parvâ radice cauliculos multos
mosos, dodrantem rarò superantes,
erectos nunc reclinatos; Folia pingui
fuscula, glabra, aliquot laciniis incisa, E
maritimæ non adeò disparia; Flores in
lorum summitate, petalis simplicibus, C

ALENDULA HUMILIS AFRICANA, FLORE INTUS
ALBO, FORIS VIOLACEO SIMPLICI.

dulâ vulgari longioribus, intus lacteis, violaceis, ad solem radiatæ stellæ in m
expansis, cœteroquin clausis, ad se
ctis & in gyrum revolutis, medium
pante orbiculo croceo, aliquot purp
nigricantibus granulis, in tenuissimo
los fatiscentibus, insperso. Semina
in parvis capitulis disposita, ritu C
dulæ duplicis speciei; alia orbiculata
branacea compressa, instar Oreoselin
fii, coloris dilutè castanei; alia, quæ h
ganti ordine, interjacent, teretia
ceo-fusca, superficie granulatâ. Ut
fœcunditatem probant suo partu, q
vel autumnno decidua, vel vere studio
feliciter excludunt. Alumna est arid
collium ad Promontorium Bonæ Spe
turæ sub nostro climate patientissima.
sapor percipitur fatuus aliquando sub
ricans; Odor medii disci crocinus, c
lis.

Cali. v. Kali.

CALTHA palustris, flore simplici C.B.P.
Caltha palustris I. B. tom. 3. l. 3. 470.
Caltha palustris flore pleno C. B. P. 276.
tha palustris flore multiplicato I. B. tom.
l. 30. 471.

Camelina I. B. v. Myagrum.

CAMPANULA major lactescens Lobelii
Moris. Hist. 2. 452. Rapunculus hortensis, folio latiori, seu pyramidalis *C. B. P. 93.*
 Pyramidalis lævis *I. B. tom. 2. l. 20. 808.*

Campanula Perficæfolia Lobelii, flore cœruleo *Moris. Hist. 2. 452.* Rapunculus Perficifolius, magno flore *C. B. P. 93.* Campanula angustifolia, cœrulea *I. B. tom. 2. l. 20. 803.*

Eadem flore albo *Moris. Hist. 2. 452.* Rapunculus Perficifolius, magno flore albo *C. B. P. Var. 93.* Campanula angustifolia alba *I. B. tom. 2. l. 20. 803.*

Campanula minor Americana, foliis rigidis, cœruleo patulo. Trachelium minus Americanum, flore cœruleo patulo. *Dodart. Mem. 119.* Trachelium minus Americanum, foliis rigidioribus, flore cœruleo patulo *Cat. Hort. Reg. Paris. 177.*

Eadem flore albo. Trachelium idem, flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 177.*

Campanula radice esculentâ, flore cœruleo. Rapunculus esculentus *C. B. P. 92. Moris. Hist. 2. 455.* Rapunculus vulgaris campanulatus *I. B. tom. 2. l. 20. 795.*

Eadem flore candicante. Rapunculus esculentus, flore candicante *C. B. P. Var. 92.*

Campanula vulgaris minor, foliis imis rotundioribus sinuatis non ferratis, floribus cœruleis *Moris. Hist. 2. 456.* Campanula minor

rotundifolia vulgaris C. B. P. 93. Campanula
parva. Anguillaræ Cantabrica I. B. tom. 2. l. 20. 798.

Eadem floribus candidis C. B. P. Var. 93.
ris. Deser. Hist. 2. 456.

Campanula arvensis erecta. Onobrychis
arvensis C. B. P. 215. Campanula arvensis
minima Dodonæi *Moris. Hist. 2. 457.* A
laria Sylvii quibusdam I. B. tom. 2. l. 800.

Campanula pentagonia perfoliata *Moris. Hist. 2. 457.* Onobrychis peregrina perfoliata
folio rotundiori *Cat. Hort. Reg. 132.*

Campanula minor annua, foliis incisifolia
Hist. 2. 458. Rapunculus minor, foliis
cisis C. B. P. 92. Erinos Fabii Columnæ
minor I. B. tom. 2. l. 20. 799. ANN.

Campanula minima Africana, Erini folia
flore violaceo cauliculis procumbentibus
ANN.

Erino Fabii Columnæ accedens p
tula in pascuis aliisque irriguis locis
Promontotium Bonæ Spei reperitur, cu
semina hûc advecta lætè progerminant
Nititur radicè exiguâ, pallidâ, emittit
cauliculos tenues, humi procumbentes,
aliquot ramulos divisos, quibus adstant
liola Erino Columnæ longiora, angustiora
pinguia, crassiuscula, hilari virore nite

CAMPANULA MINOR AFRICANA, ERINI FA-
CIE, FLORE VIOLACEO, CAULI-
CULIS PROCUMBENTIBUS.

sinuata, per margines leviter crenata
 horum alas prodit tenuissimus pediculus
 sustinens ex caliculo exiguo sub
 quinque partito flosculum parvum,
 gum monopetalum campanulatum
 que profundioribus crenis dissectum
 ris in purpurâ violacei; Hoc defluxo,
 dit more congenerum vasculum oblongum
 exiguum, trigonum, tricapitulare,
 foraminulis vix conspicuis pertusum
 tinens, semina minutissima rubiginosa
 ta plantula lacte tenui, aquoso, succulentum
 turget. Floret ab Augusto in median-
 nem usque, seminibus deciduis sepe
 pagans.

Eadem cauliculis erectis.

Hæc antedictæ adeo similis est,
 tequam adolescit, vix ab illâ discerni
 Cauliculos acquirit robustiores recta
 gentes, dodrantes; Folia longiora
 gustiora; Flosculos minores in pediculis
 longioribus. Cætera verò conveniunt
 fendi cum superiori locis humentibus
 Promontorium Bonæ Spei.

Campanula maxima, foliis latissimis
 94. *Moris. Hist.* 2. 459. flore cœruleo.
 panula pulchra, à Tosano Carolo
I. B. tom. 2. l. 20. 807.

Eadem flore albo *C. B. P. Var.* 94.

LUGDUNO-BATAVUS

III

CAMPANULA MINOR AFRICANA, ERINI FACIE,
FLORE VIOLACEO, CAULICULIS
ERECTIS.

112 HORTUS ACADEMICUS

Campanula vulgatioꝛ, foliis Urticæ,
 jor & asperior C. B. P. 94. *Moris. Hist.*
I. B. tom. 2. l. 20. 805. Flore cœruleo
 P. *Var.* 94.

Eadem flore candido C. B. P. *Var.* 94.

Eadem flore dilutè purpurascente C. B. P.
 94.

Eadem flore duplici cœruleo, interdum
 plici aut quadruplici *Cat. Hort. Reg.*
ris. 36.

Eadem flore duplici albo *Cat. Hort. Reg.*
ris. 36.

Campanula Urticæ foliis oblongis, minus
 ris C. B. P. 94. Flore cœruleo.

Eadem flore albo. An Campanula sive
 vicaria major lævior, flore magno albo
tom. 2. l. 20. 806?

Campanula hortensis, flore & folio ob
 C. B. P. 94. *Moris. Hist. 2. 459.* flore cœ
 leo. Viola Mariana Dodonæi, quibus
 Medium *I. B. tom. 2. l. 20. 804.* ANN.

Eadem flore subalbido C. B. P. *Var.* 94. *M.*
Hist. 2. Descr. 495. ANN.

Campanula hortensis, Rapunculi radice
 P. 94. Campanula hortensis, Rapunculi
 dice repente *Moris. Hist. 2. 460.* Can
 nula repens, flore minore cœruleo *I. B.*
2. l. 20. 706.

Campanula foliis Echii C. B. P. 94. *Moris.*
 2. 460. Trachelium altissimum hirsutum

asperius, foliis angustis, floribus parvis *I. B. tom. 2. l. 20. 801.*

Campanula pratensis, flore conglomerato *C. B. P. 94. Moris. Hist. 2. 461.* *Trachelium minus* multis *I. B. tom. 2. l. 20. 800.* Flore coeruleo.

adem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 47.*

Campanula Indica. I. B. v. Convolvulus.

CAMPHORIFERA arbor, ex quâ *Camphora Officinarum.* Arbor *Camphorifera Japonica Breyn. Cent. 1. 11. Prodr. 4.* *Camphora Officinarum C. B. P. 500.* *Camphura*, quæ *Salicis folio* dicitur *I. B. tom. 1. l. 9. 338.*

Rarissimum & elegantissimum hoc arbutum, Horti nostri decus & ornamentum, acceptum referimus Illustrissimo Dn. Hieronymo Beverningio, rariorum plantarum æstimatori incomparabili, cui pro hoc splendidissimo munere & innumeris aliis in Rempublicam herbariam meritis laudes & gratias summas habendas esse censemus.

anella C. B. P. & I. B. v. Cassia.

CANNA Indica latifolia maxima. *Arundo Indica latissimo folio, flore rutilo Cat. Hort. Reg. Paris. 25.*

anna Indica latifolia humilior, flore satu-

H

ra-

ratius rubente. Arundo Indica latifolia
B. P. 19. I. B. tom. 2. l. 18. 489.

Stapel 334.

Eadem Americana, flore fulgenti coccineo
dente.

Inter alia pulchra semina à D^{no} Meiero, Rei herbariæ studiosissimo
Surinamâ ad nos transmissa, prodest
planta, quæ non nisi adulta à se
dignoscitur. Stipites edit superiores
lò humiliores; Flores hilari coccineo
fissimè rubentes; Semina minora in
nigricantia; Cætera paria.

Eadem flore luteo punctato. Arundo
ca latifolia, flore luteo punctato C. B. P.
I. B. tom. 2. l. 18. 490.

Canna Indica angustifolia, flore flavo
ra Pison. l. 5. 21.

Cannabina aquatica C. B. P. v. Chrysanthemum.

CANNABIS fativa C. B. P. 320. C.
Mas. I. B. tom. 3. l. 30. 447. ANN.

Cannabis erratica C. B. P. 320. Cannabina
I. B. tom. 3. l. 30. 448. ANN.

Cannabis sylvestris quorundam, Urtica
affinis I. B. v. Sideritis.

Cantabrica Anguillaræ I. B. v. Campanula

aphura, quæ Salicis folio dicitur I. B. v. Camphora.

apillus Veneris I. B. v. Adiantum.

CAPPARIS spinosa, fructu minore, folio rotundo C. B. P. 480. *Moris. Hist. 2. 284.*

Capparis spinosa I. B. tom 2. l. 14. 63.

Capparis Portulacæ folio C. B. P. 480. Capparis Fabaginea, five Peplios Lutetianorum I. B. tom. 2. l. 14. 66.

aprifolium perfoliatum & non perfoliatum I. B. v. Periclymenum.

apsicum vulgò. v. Solanum.

aracalla vulgò. v. Phaseolus.

archichec Turcarum Moris. v. Primula veris.

ardamine ejusque species I. B. v. Nasturtium.

CARDIACA Africana perennis, foliis Sideritidis, floribus longissimis phœniceis villosis. Leonurus perennis Africanus vulgò. Leonurus Capitis Bonæ Spei *Breyn. Cent. 1.* Sideritis Cannabina Æthiopica frutescens, phœniceo flore maximo villoso *Breyn. Prodr. 47.*

cardiaca Americana annua, Nepetæ folio, floribus brevibus phœniceis villosis. Leonurus annuus Americanus vulgò

Si à florum & seminum, ceu
potiorum & magis constantium,
li dispositione plantæ reducendæ
consimilia genera & species, existi-
trumquè Leonurum Africanum &
canum nullibi aptius, quàm ad Car-
esse referendum, & consimili nomi-
pellandum. Uterquè enim produc-
ticillatâ serie, veluti vulgaris Cardiac-
res galeatos, labro exiguo trifido, &
na quaterna oblonga angulosa. Afri-
curiosissimè descripsit Dn. Jacobus
nius in Centuriâ Plantarum exot-
primâ, ut & in Prodromo fasciculi
rum rariorum. Americanus verò ad
caule tricubitali & altiori, herbaceo
dicante, quadrangulo, striato, solidi
medullâ farcto, quem per remotiora
valla, verticillato ambitu, amplexu
utriculi densâ numerosâquè congerie
cem incumbentes, tubulosi, quinqu-
striati, superiore longiores, ex bre-
pedunculis deorsum flexi, & qua-
nus falcati, orificio ampliori, septem-
leculis aculeis, sex brevioribus, u-
summo longiori & robustiori, armati
his exeunt flores galeati vix labiati
cedente Africanâ triplo breviores
ciliores, villosi, phœnicei coloris,
dentibus quaternis feminibus ob-

CORDIACA AMERICANA ANNUA NEPETÆ FOLIO,
FLORIBUS BREVIBUS PHOENICEIS VILLOSIS.

angulosis, spadiceis, superiore itide
vioribus & angustioribus. Ad sing
nicula ab imo caulis ad summum
nascuntur folia bina ex opposito
tim, Nepetæ haud multum absimili
pliora tamen, non nihil incana, mo
in ambitu magis crenata. Radix fu
gnosa albicans fibrosa, pro plantæ
fat parva; Nata, semine, ex Surina
vecto, eo, quo floruit, anno per
ribus non multum abludere à co
ribus, propter consimilem saporem
rem non dubitandum arbitror.

Cardiaca I. B. tom. 3. l. 28. 320. Mart

Cardiaca dictum C. B. P. 230.

Eadem foliis eleganter crispis Cat.
Oxon. 38.

Hæc à præcedenti *Cardiaca* vulgari
tantum foliis imis mollioribus, am
bus, profundius & crebrius laciniatis
ginibus pallidis, undulatis & incrispa

Carduncellus montis Lupi I. B. v. Cnicus

CARDUUS pratensis latifolius *C. B. P.*

Carduus pratensis Tragi I. B. tom. 3.
42.

Carduus vinearum repens, folio Som

Carduus in avenâ proveniens C. B. P.

Ceanothus Column. Ecphr. p. 1. 45.

duus serpens lævicaulis I. B. tom. 3. l. 1.

dem floribus albis, caule tuberoso, qui Hæ-
morrhoidalis Parisiensium *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 37.

Carduus albis maculis notatus, vulgaris C.B.P.
381. Carduus Marianus, five lacteis ma-
culis notatus I. B. *tom. 3. l. 25. 52. ANN.*

Carduus albis maculis notatus, exoticus C. B.
P. 381. Carduus lacteus peregrinus Camer
I. B. *tom. 3. l. 25. 53. ANN.*

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 38.*
ANN.

Carduus tomentosus latifolius, sylvestris, Spi-
na alba vel Acanthium dictus. Spina alba
tomentosa latifolia, sylvestris C.B.P. 382.
Spina alba sylvestris Fuchfio I. B. *tom. 3.*
l. 25. 54. Flore purpureo C. B. P. Var. 382.
Ann.

Idem flore albo C. B. P. *Var. 382. ANN.*

Idem Illyricus spinosior, capitulis majoribus.
Spina tomentosa altera spinosior C.B.P. 382.
Carduus quibusdam dictus Acanthium Il-
lyricum, aliis verò Onopordum I. B. *tom. 3.*
l. 25. 55. ANN.

Carduus spinosissimus latifolius sphæroce-
phalus, vulgaris C. B. P. 385. Carduus lan-
ceolatus five sylvestris Dodonæi I. B. *tom.*
3. l. 25. 58. ANN.

Carduus spinosissimus angustifolius, vulgaris
C. B. P. 385. Carduus caule crispo I. B. *tom.*
3. l. 25. 59.

Carduus nutans *I. B. tom. 3. l. 25. 56.*

* Carduus lanceatus latifolius *C. B. P.*
purpureo. ANN.

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris.*
ANN.

Carduus lanceolatus ferocior *I. B. tom.*
25. 58. ANN.

Carduus stellatus, foliis Papaveris
C. B. P. 387. Carduus stellatus, sive
trappa *I. B. tom. 3. l. 25. 89. ANN.*

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 38.*

Carduus Chrysanthemus Africanus. *Scot.*

Chrysanthemus annuus *Dodart. Mem.*

Carduus Polyacanthus, folioso caule,
dictus. Polyacanthus Casabonæ,
similis *I. B. tom. 3. l. 25. 92.* Acarna
phraſti vulgò. ANN.

Carduus Salmanticensis, Acarnæ foliis in
Acarna major caule folioso *C. B. P. 378.*
carnæ similis, flore purpureo, Chamæleon
Salmanticensis Clusio *I. B. tom. 3. l. 25.*
ANN.

Carduus humilis, minore flore, Carlini
liis. Carlina acaulos, minore purpureo
re *C. B. P. 380.* Chamæleon exiguus
I. B. tom. 3. l. 27. 62. ANN.

CARLINA acaulos, magno flore *C.*
380. Carlina caulifera vel acaulos
tom. 3. l. 25. 64.

Carlina sylvestris quibusdam, aliis *Attractylis* *I. B. tom. 3. l. 25. 81.* *Cnicus sylvestris spinosior* *C. B. P. 378. ANN.*

Eadem flore aureo, perennis. *Cnicus sylvestris spinosior, flore aureo, perennis* *Cat. Hort. Reg. Paris. 54.*

Carlina minor sylvestris Clusii, flore luteo *I. B. tom. 3. l. 25. 84.* *Acarna flore luteo patulo* *C. B. P. 379.*

Carlina acaulos, minore purpureo flore *C. B. P. v. Carduus.*

Carota ejusquè species *I. B. v. Pastinaca.*

CARPINUS *Matt. in lib. 1. Diosc. c. 95.* *Ostrya Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis* *C. B. P. 427.* *Fagus sepium, vulgò Ostriis Theophrasti* *I. B. tom. 1. l. 8. 146.* & *C. B. P. in Matth. l. 1. c. 95.*

Carthamus ejusquè species *I. B. v. Cnicus.*

CARUM, five *Carvi Moris. Umbell. 24.* *Cuminum pratense, Carvi Officinarum* *C. B. P. 158.* *Caros* *I. B. tom. 3. l. 27. 69. ANN.*

CARYOPHYLLATA vulgaris *C. B. P. 321.* *Moris. Hist. 2. 430.* *Caryophyllata vulgaris, flore parvo luteo* *I. B. tom. 2. l. 17. 398.*

Caryophyllata Virginiana, albo flore minore radice inodorâ.

Huic sunt folia longiuscula, attenuata, aspera, crenata, inferiora palmam amplexantia, superiora angusta, rarius laciniata, leviter mucronata; Caules ad duo cubitos elevati, non nihil villosi & asperi, in triplices furculos divisi; Flores Caryophyllatae vulgaris effigie, petalis pallidis, staminibus herbaceis, apiculis pallide flavescentibus. Stigmata ritu superioris nuda, in capitulum congesta, brevioribus & minus rigidis filamentis caudata. Radix subest alba, multis caementis fibrata, sapore & odore fatua. Hic fit ad nos Dn. Jacobus Bobartus Oxoniensis Custos, Vir in studio simplicium exercitissimus.

Caryophyllata Alpina lutea major *Moris.*
2. 430. Caryophyllata Alpina lutea
P. 322. Caryophyllata montana, flore
gno luteo *I. B. tom. 2. l. 17. 398.*

Caryophyllata Alpina longifolia, sinuata
profundè incis foliis *Moris. Hist. 2.*

Caryophyllata Alpina minor *C. B. P. 321.*

Caryophyllata montana lutea, nutante
Cat. Hort. Reg. Paris. 39.

Caryophyllata aquatica, nutante flore
pureo, calathi effigie *Moris. Hist. 2.*

Caryophyllata aquatica, nutante flore
P. 321. Caryophyllata aquatica, flore
striato *I. B. tom. 2. l. 17. 398.*

*Caryophylleus flos aphyllocaulos vel juncens
ejusque species I. B. v. Scabiosa.*

CARYOPHYLLUS maximus ruber C.B.P. 207.
Moris. Hist. 2. 561.

Caryophyllus maximus variegatus C.B.P. 207.
Moris. Hist. 2. 561. Betonica coronaria,
flore pleno, maxima, punctis rubris varie-
gata I.B. tom. 3. l. 29. 327.

Caryophyllus maximus & plenissimus, colo-
re mixto carneo, quibusdam corniculis la-
cteis du Bry C. B. P. Var. 207. *Moris. Hist. 2.*
561.

Caryophyllus maximus & plenissimus, colore
vario in diversis petalis scarlatino, dilutius
rubente, albo, du Bry C. B. P. Var. 707. *Mo-*
ris. Hist. 2. 561.

Caryophyllus maximus & plenissimus, colore
rubro saturationi, staminulis tribus niveis in
medio, du Bry C. B. P. Var. 207. *Moris. Hist.*
2. 561.

Ejusdem variæ differentiae, mirâ florum ele-
gantiâ inter se certantes.

Caryophyllus altilis, major C. B. P. 207. *Moris.*
Hist. 2. 561. Betonica coronaria, sive Ca-
ryophylleus flos I. B. tom. 3. l. 29. 327.

Idem multiplex, flore albo Eyft. C. B. P. Var.
207.

Idem flore carneo Eyft. C. B. P. Var. 207.

Idem flore rubro Eyft. C. B. P. Var. 207.

Idem

Idem coloris albi, mixtâ & sparsâ rubedine
C. B. P. *Var.* 207.

Idem flore albo, flammulis ruberrimis
207.

Idem flore albo, lineis rubris subtilissimis
stincto C. B. P. *Var.* 207.

Ejusdem plures species, pro vario pingui
naturæ lusu, varios præ se ferentes colores.

Caryophyllus attilis medius C. B. P. 208.
Hist. 2. 561. Flore albo lineis cermesinatis
coloris C. B. P. *Var.* 208. & *Moris.* *Hist.* 2.

Idem flore miniato, medio albescente
208. *Moris.* *ibid.*

Ejusdem plures differentiæ, colorum varietate
elegantia sese commendantes.

Caryophyllus pleno flore, Mali aurantiorum
re C. B. P. 208. *Moris.* *Hist.* 2. 561. Betonica
coronaria rara, flore phoeniceo pleno
tom. 3. l. 29. 327.

Caryophyllus pleno flore minor C. B. P. 208.
Moris. *Hist.* 2. 561.

Caryophyllus supinus, pleno flore rubro,
genteis micis asperfo C. B. P. 208. *Moris.*
Hist. 2. 561.

Caryophyllus multiplex laciniatus C. B. P. 208.
Moris. *Hist.* 2. 561. Betonica coronaria
perba, sive Caryophylleus flos, folio
nuissimè dissecto, flore pleno purpureo
te I. B. *tom.* 3. l. 29. 331.

Idem flore incarnato C. B. P. *Var.* 208. *Moris.*
Hist. 2. 561.

Caryophyllus hortensis simplex, flore majore
C. B. P. 208. *Moris.* *Hist.* 2. 561. Betonica
coronaria, five Caryophyllus flore simplici,
fativus *I. B. tom.* 3. *l.* 29. 325.

Ejusdem varietates multæ, variis in florum
petalis coloribus notatæ.

Caryophyllus simplex, flore minore pallidè
rubente C. B. P. 208.

Caryophyllus simplex minor, flore punctato
C. B. P. 208. Betonica coronaria minima,
micis aureis aspersa *I. B. tom.* 3. *l.* 29. 329.

Caryophyllus simplex supinus, latifolius C. B.
P. 208. Betonica coronaria, five Caryo-
phyllus minor, folio viridi nigricante, re-
pens, flore argenteis punctis notato *I. B. tom.*
3. *l.* 29. 329.

Caryophyllus sylvestris vulgaris, latifolius C.
B. P. 209. Betonica coronaria, five Caryo-
phyllus sylvestris, vulgatissimus *I. B. tom.* 3.
l. 29. 334. Flore simplici suaverubente, seu
purpureo odorato C. B. P. *Var.* 209.

Idem flore simplici purpureo inodoro C. B. P.
Var. 209.

Idem flore purpureo odoro pleno C. B. P. *Var.*
209.

Caryophyllus vulgaris, sylvestris angustifolius
C. B. P. 208.

Idem unguibus purpureis insignis. Betonica
CO-

coronaria, five Caryophyllea, corollâ
pureâ insignis *I. B. tom. 3. l. 29. 329.*

Idem crispante flore incarnato, unguibus
tis purpurascens insignis. *Betonica*
coronaria five *Caryophyllea*, ex rubello
cante & crispante flore cum corollâ *I. B.*
3. l. 29. 329.

Caryophyllus sylvestris pusillus omnium
nimus, unico flore *Moris. Hist. 2. 562.*
ryophyllus sylvestris humilis, flore
C. B. P. 209. *Betonica coronaria*, five
ryophyllea repens rubra I. B. tom. 3.
328.

Idem flore albo. *Betonica coronaria*, five
ryophyllea repens alba I. B. tom. 3.
328.

Caryophyllus sylvestris juncifolius cœ-
Monspeliensium Moris. Hist. 2. 562. *C.*
phyllus cœruleus Monspeliensium C.
209. *Aphyllantes Monspeliensibus I. B.*
3. l. 29. 335.

Caryophyllus plumarius, flore inodori-
nuissimè secto *Moris. Hist. 2. 562.* *C.*
phyllus flore tenuissimè secto C. B. P.
Betonica coronaria tenuissimè dissecta,
Caryophyllea superba elatior, vulgaris
tom. 3. l. 29. 330.

Idem flore dilutius rubente *C. B. P. Var.*
Moris. Hist. 2. 562.

Caryophyllus plumarius, floribus odor

staminulis corniculatis *Moris. Hist. 2. 562.*

Caryophyllus sylvestris tertius, flore laciniato, staminulis corniculatis odoratis C. B.

P. 210. Betonica coronaria minus ramosa, flore tenuiter fimbriato albo, corniculis duobus emergentibus *I. B. tom. 3. l. 29. 332.*

Caryophyllus plumarius, floribus odoratis sine corniculis *Moris. Hist. 2. 562.* Caryophyllus sylvestris, flore laciniato sine corniculis, odore C. B. P. 210. Betonica coronaria minus ramosa, flore tenuiter fimbriato planè albo sine corniculis *I. B. tom. 3. l. 29. 332.*

Caryophyllus floribus odoratis lanuginosis hirsutis *Moris. Hist. 2. 562.* Caryophyllus sylvestris, floribus lanuginosis hirsutis C. B. P. 210. Betonica coronaria minus ramosa, flore tenuiter fimbriato albo cum corollâ purpurascente hirsutâ *I. B. tom. 3. l. 29. 332.*

Idem floribus purpurascentibus sine hirsutie. Betonica coronaria minus ramosa, flore tenuiter fimbriato purpurascente cum corollâ fuscâ & penè rubente sine hirsutie *I. B. tom. 3. l. 29. 332.*

Caryophyllus barbatus hortensis, flore multiplici C. B. P. 208. *Moris. Hist. 2. 563.* Betonica coronaria latifolia petræa, pleno flore rubro vel ad purpureum accedente *I. B. tom. 3. l. 29. 333.*

Idem

Idem flore albo C. B. P. *Var.* 208.
 coronaria latifolia petræa, pleno
I. B. tom. 3. l. 29. 333.

Caryophyllus barbatus, flore roseo
 208.

Caryophyllus barbatus hortensis sim-
 plicifolius *Moris. Hist.* 2. 563. Beton-
 ionaria latifolia petræa, flore pun-
 do bis notato *I. B. tom.* 3. l. 29. 333.

Idem flore albo, maculis lactei coloris
 C. B. P. *Var.* 208.

Idem flore carneo.

Idem flore versicolore rubro & carneo
 to in eodem ramulo, seu diversico-
 albo rubro & medio C. B. P. *Var.* 208.
 ionica coronaria latifolia, flore pi-
 Vesuntina *I. B. tom.* 3. l. 29. 334.

Caryophyllus barbatus hortensis simp-
 licifolius C. B. P. 209. *Moris. Hist.* 2.
 Betonica coronaria minus latifolia
 profundo dissecto *I. B. tom.* 3. l. 29. 333.

Idem flore omnino niveo C. B. P. *Var.* 209.

Idem flore purpurascente, oris albis
Var. 209.

Idem flore versicolore in eodem ra-
 C. B. P. *Var.* 209.

Caryophyllus barbatus sylvestris annu-
 gustifolius, perpaucis capitulis de-
Moris. Hist. 2. 563. Caryophyllus bar-
 sylvestris C. B. P. 209. Viola barbata

latifolia I. B. *tom.* 2. *l.* 29. 335. ANN.
caryophyllus barbatus sylvestris annuus lati-
folius, multis capfulis simul junctis dona-
tus Moris. Hist. 2. 563. *Caryophyllus sylve-*
stris prolifer C. P. B. 209. *Betonica corona-*
ria squamosa sylvestris I. B. *tom.* 3. *l.* 29. 335.
 ANN.

caryophyllus arvensis hirsutus, flore majore,
ejusque species C. B. P. v. Lychnis.

caryophyllus arvensis glaber, flore majore, ejus-
que species C. B. P. v. Lychnis.

caryophyllus arvensis umbelliferus I. B. v.
Lychnis.

caryophyllus holosteus tomentosus latifolius C.
B. P. & I. B. v. Lychnis.

caryophyllus minimus muralis C. B. P. v. Lych-
nis.

caryophyllus montanus, flore globoso, ejusque
species C. B. P. v. Scabiosa.

caryophyllus pratensis, flore laciniato, ejusque
species C. B. P. v. Lychnis.

CASSIA fistula Alexandrina C. B. P. 403.

Cassia purgatrix I. B. *tom.* 1. *l.* 12. 416.

Conna Hort. Mal. *tom.* 1. 37.

CASSIA Cinamomea. Cinamomum five
 Canella Zeylanica C. B. P. 408. Canella fi-
 ve Cinamomum vulgare I. B. *tom.* 1. *l.* 4.

ne aspero hispido I. B. tom. 3. l. ANN.

* *Caucalis lato Apii folio* C. B. P. 152.
lides Matthioli I. B. tom. 3. l. 27. 82

Caucalis maxima, Sphondilii aculeato
C. B. P. v. *Tordilium*.

Cauda muris I. B. v. *Holosteo* affinis.

Ceanothos Column. v. *Carduus*.

Cauda pavonis Zeylanensibus. v. *Cr*
vonis.

CEDRUS conifera, foliis Laricis C. B.
Cedrus magna, sive Libani conife
tom. 1. l. 9. 277.

Cedrus folio Cupressi major, fructu flavo
C. B. P. v. *Juniperus*.

Cedrus Phœnicea Bellonio I. B. v. *Junip*

Cedrus Lycia retusa Bellonio dicta I. B.
perus.

Cedrus Bormudiana vulgò. v. *Juniperu*

Cedrus Virginiana vulgò. v. *Juniperus*.

Cedrus novæ Angliæ vulgò. v. *Juniperu*

Celastrus Theophrasti Clus. v. *Alaternu*

CENTAURIUM majus, folio in laciniis
diviso C. B. P. 117. *Centaurium majus*

glandis folio I. B. tom. 3. l. 25. 38.

Centaurium foliis Cinaræ Cornut. 72.

Centaurium Alpinum luteum C. B. P.

Centauroides glabro flore flavescenti

tom. 3. l. 25. 40. Centaurium majus luteum
Cornuti.

Centaurium majus, Rha capitatum, folio E-
nulæ subtus hirsuto & incano *I. B. tom. 3. l.*
25. 41.

Centaurium capitatum ciliare annuum, foliis
laciniatis ferratis *Moris. Hort. Bles. 362.*

Chondrilla foliis laciniatis ferratis, purpura-
scente flore *C. B. P. 130.* Cyanus pulchro fe-
mine Centaurii majoris *I. B. tom. 3. l. 25. 24.*

Crupina Belgarum vulgò. ANN.

CENTURIUM luteum perfoliatum *C. B. P.*
278. Moris. Hist. 2. 565. Perfoliatum Cen-
taurium luteum *I. B. tom. 3. l. 29. 355.*
ANN.

Centaurium minus rubrum *Moris. Hist. 2. 566.*

Centaurium minus *C. B. P. 278.* Flore è pu-
niceo colore in purpurâ rubente *C. B. P. Var.*

278. Centaurium minus, flore purpureo *I. B.*
tom 3. l. 29. 353. ANN.

Idem album *Moris. Hist. 2. 566.* Centaurium
minus, flore albo *C. B. P. Var. 278. I. B. tom.*
3. l. 29. 353. ANN.

Centaurium minus adulterinum quibusdam I.
B. v. Lychnis.

Centimorbia I. B. v. Nummularia.

Centinodia, I. B. v. Polygonum.

- C**EPA vulgaris C. B. P. 71. *Moris.*
 383. Floribus & tunicis purpura
 bus C. B. P. *Var.* 71. Cœpe five Cep
 rotunda I. B. *tom.* 2. l. 19. 547.
 Eadem floribus & tunicis candidis C. B.
 71. Cœpe five Ceba alba rotunda I.
 2. l. 19. 547.
 Ceba oblonga C. B. P. 71. *Moris. Hist.*
 Cœpe five Ceba longa I. B. *tom.* 2.
 547.
 Ceba radice candidâ dulci C. B. P. 71.
 Ceba Aſcalonica Matthioli *Moris. Hist.*
 Ceba ſterilis, Tragi C. B. P. 72. Ceba
 lonica, five fiſſilis I. B. *tom.* 2. l. 19. 55
 Ceba ſectilis juncifolia perennis Mo
 383. Porrum ſectivum juncifolium C
 72. Porrum ſectivum & Schoenop
 quibuſdam I. B. *tom.* 2. l. 19. 553.
 Ceba C. B. P. v. Sedum.

- C**ERASA fativa rotunda, rubra &
 quæ noſtris Ceraſa fativa C. B. P. 449.
 raſus I. B. *tom.* 1. l. 2. 216.
 Ceraſa fativa majora C. B. P. 450. Ceraſa
 racena oblonga I. B. *tom.* 1. l. 2. 221.
 Ceraſa acidiffima ſanguineo ſucco C. B. P.
 Ceraſa acida rubella I. B. *tom.* 1. l. 2. 221.
 Ceraſa craſſa carne durâ C. B. P. 450.
 Ceraſa carne tenerâ & aquoſâ C. B. P. 450.
 Ceraſa alba dulcia C. B. P. 450.

Cerasa acida nigricantia solidiora, tardius matrescentia *I. B. tom. 1. l. 2. 121.*

CERASUS major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente *C. B. P. 450.* Cerasus sylvestris, fructu nigro *I. B. tom. 1. l. 2. 208.*

Eadem rubro colore *C. B. P. Var. 450.* Cerasus sylvestris, fructu rubro *I. B. tom. 1. l. 2. 208.*

Cerasus hortensis, flore roseo *C. B. P. 450.*

Cerasus hortensis, flore pleno *C. B. P. 450.*

Cerasus flore pleno *I. B. tom. 1. l. 2. 223.*

Cerasus hortensis, fructu sine ossiculis.

Cerasus folio Laurino *C. B. P. 450.* Laurocerasus *I. B. tom. 1. l. 4. 420.*

Cerasus pumila *C. B. P. 450. I. B. tom. 1. l. 2. 222.*

Cerasus racemosa hortensis *C. B. P. 450.* Cerasus uno pediculo plura ferens, & Cerasus racemosa *I. B. tom. 1. l. 2. 223.*

Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli *C. B. P. 451.* Cerasus racemosa quibusdam, aliis Padus *I. B. tom. 1. l. 2. 228.*

Ceraso affinis *C. B. P. 451.* Cerasus sylvestris amara, Mahaleb putata *I. B. tom. 1. l. 2.*

CERATONIA. Siliqua edulis *C. B. P. 402.* Siliquæ arbor, sive Ceratia *I. B. tom. 1. l. 12. 413.*

Cerese folium sativum *Moris. v. Chærophillum.*
I 4 Ce-

*Cereus Peruanus spinosus, fructu r
magnitudine C. B. P. v. Ficus.*

CERINTHE five Cynoglossum m
majus C. B. P. 258. Cerinthe qu
major, versicolore flore *I. B. tom.*
602. ANN.

Eadem flore ex rubro purpurascen
258. Cerinthe quorundam major,
rubro purpurascen *I. B. tom. 3. l.*
ANN.

Eadem flore luteo C. B. P. *Var.* 258. A

Eadem flore flavo asperior C. B. P. 25
rinthe quorundam major, spinos
flavo flore *I. B. tom. 3. l. 33, 602. A*

Cerinthe minor C. B. P. 258. Cerint
rundam minor, flore flavo *I. B. tom. 3.*
603. ANN.

Cerrus I. B. v. Quercus.

Cervaria nigra I. B. v. Libanotis.

Cervaria alba I. B. v. Laserpitium.

CETERACH Officinarum C. B. P. 3
splenum five Ceterach *I. B. tom. l. 37*

CHÆROPHYLLUM fativum C.
152. Cerefolium fativum *Moris. U*
46. Chærephyllon *I. B. tom. 3. l. 27*
ANN.

*Chærophyllum seu Cerefolium sylvestre

- renne, feminibus lævibus nigris *Morif.*
Umbel. 46. Myrrhis sylvestris, feminibus
 lævibus C. B. P. 160. Cicutaria vulgaris I. B.
tom. 2. l. 27. 181.
hærophyllo sylvestre C. B. P. v. Myrrhis.
hærophyllo nonnihil similis C. B. P. v. Alchy-
 milla.
hamæbalanus leguminosa I. B. v. Lathyrus.
hamæbuxus flore Coluteæ C. B. P. v. Astra-
 galus.
hamæcerasus ejusquæ species C. B. P. v. Peri-
 clymenum rectum.
hamæcistus ejusquæ species C. B. P. v. Cistus
 humilis.
hamæcrista pavonis Brasiliana siliquâ singu-
lari Breyn. v. Senna.
Eadem Americana siliquâ multiplici Breyn.
 v. Senna.

CHAMÆDRYS major repens C. B. P. 249.
 Chamædrys vulgò vera existimata I. B.
tom. 3. l. 28. 288.

Chamædrys minor repens C. B. P. 249.
 Chamædrys foliis laciniatis, Botryos facie.
 Botrys Chamædrioides C. B. P. 138. Botrys
 verticillata I. B. *tom.* 3. l. 28. 298. ANN.

hamædrys spuria major altera frutescens C. B.
 P. v. Veronica.

hamædrys spuria major angustifolia C. B. P.
 v. Veronica.

Chamædrys spuria minor rotundifolia
v. Veronica.

Chamægenista ejusque species C. B. P.
nista humilis.

Chamæiris ejusque species C. B. P. v.
milis.

CHAMÆLÆA tricoccus C.B.P. 462.
I. l. 5. 584.

Chamæleagnus Dod. I. B. v. Rhus.

Chamæleon Salmaticensis Clusii I. B.
duus.

Chamæleon exiguus Tragi I. B. v. Card

* **C**HAMÆMELUM vulgare, five Leu-
cum Diosc. C. B. T. 135. Chamæ-
vulgare amarum I. B. tom. 3. l. 26.

Chamæmelum nobile, five Leucanth-
odoratius C. B. P. 135. Chamæmelu-
ratissimum repens, flore simplici I. B.
l. 26. 118.

Chamæmelum Leucanthemum Hispal-
magno flore, quod i. est in prodromi
P. 135.

Chamæmelum nobile, flore multiplici
135. Chamæmelum repens odorati
perenne, flore multiplici I. B. tom. 3
119

Chamæmelum luteum, capitulo aphyll-
P. 135. Chamæmelum aureum p

num, capitulo sine foliis *I. B. tom. 3. l.*

26. 119.

hamæmelum inodorum *C. B. P. 135.* Chamæmelum inodorum, five Cotula non foetida *I. B. tom. 3. l. 26. 120. ANN.*

em flore pleno Sutherland *Hort. Edenburg. 79. ANN.*

hamæmelum foetidum *C. B. P. 135.* Chamæmelum foetidum, five Cotula foetida *I. B. tom. 3. l. 26. 120. ANN.*

hamæmelum Æthiopicum lanuginosum *Breyn. Cent. 1. 148. ANN.*

hamæmespilus Cordi *C. B. P. v. Mespilus.*

hamæmespilus *I. B. v. Mespilus.*

hamænerion ejusque species *C. B. P. v. Lysimachia.*

CHAMÆPITYS moschata, foliis ferratis

C. B. P. 249. Chamæpitys, five Iva moschata Monspeliensium *I. B. tom. 3. l. 28. 296.*

hamæpitys lutea vulgaris, five folio trido *C. B. P. 249.* Chamæpitys vulgaris odorata, flore luteo *I. B. tom. 3. l. 28. 295. ANN.*

hamæpitys cærulea Austriaca *C. B. P. 250, v. Hyssopus.*

hamæpixos *I. B. v. Astragalus.*

hamæriphes *I. B. v. Palma humilis.*

hamærhododendron *Breyn. v. Cistus.*

Cha-

Chamaesyce Matth. C. B. P. I. B. v. Tithy

* **C**HELIDONIA rotundifolia minor
309. Scrophularia minor, five C
nium minus vulgò dictum *I. B. tom.*
30. 468. Ranunculus præcox rot
lius granulatâ radice *Moris. Hist. 2.*

* Eadem rotundifolia minor, folio m
C. B. P. Var. 309.

Eadem rotundifolia minor, flore ple
merarii *C. B. P. Var. 309.*

CHELIDONIUM maximum Canaden
λον Cornuti 212. Moris. Hist. 2. 257.

* Chelidonium majus vulgare *C. B. P. 144.*
ris. Hist. 2. 257. Chelidonia I. B. tom.
30. 482.

Chelidonium majus, laciniato flore,
quernis *Moris. Hist. 2. 257. Chelid*
majus, foliis quernis *C. B. P. 144.*

Idem floribus & foliis tenuissimè disse
maria Myconii instar *Moris. Hist. 2.*

Chelidonium majus flore & foliis mi
mè laciniatis *Cat. Hort. Reg. Paris. 4.*

Chicallot l. Hernand. v. Papaver spinos.

Chimalatl Hernand. v. Chrysanthemu

CHONDRILLA juncea viscosa arven
prima Diosc. *C. B. P. 130. Chondr*
minca *I. B. tom. 2 l. 24. 1021.*

Chondrilla viscosa humilis C. B. P. 130.

ANN.

Chondrilla cœrulea latifolia laciniata C. B. P. 130.

Eadem flore incarnato.

Chondrilla cœrulea altera, Cichorii sylvestris foliis C. B. P. 130. *Chondrilla* vel *Chondrilla cœrulea* I. B. *tom.* 2. l. 24. 1019.

Chondrilla verrucaria, foliis Cichorii viridibus C. B. P. v. *Calendula*.

Chondrilla foliis laciniatis serratis, purpurascente flore C. B. P. v. *Centaurium capitatum*.

Chondrilla cœrulea, Cyani capitulo C. B. P. v. *Cichoreum*.

CHRISTOPHORIANA Americana racemosa, baccis niveis *Moris. Hist.* 2. 8. *Aconitum baccis niveis* *Corn.* 76.

Eadem baccis rubris *Moris. Hist.* 2. 8. *Aconitum baccis rubris* *Corn.* 76.

Christophoriana vulgaris nostras racemosa & ramosa *Moris. Hist.* 2. *Aconitum racemosum*: An *Actæa* *Plinio* C. B. P. 183? *Aconitum racemosum Actæa* quibusdam I. B. *tom.* 3. l. 35 660.

Christophoriana Canadensis racemosa & ramosa *Moris. Hist.* 2. 8. *Panaces* *Κάρπιμον*, sive *Christophoriana Canadensis* *Park. Theatr.*

950. Angelica baccifera Canadensis
Theatr. 950.

CHRYSANTHEMUM Indicum, flore
 mine maximis, annuum. Chrysan-
 thum Peruvianum *Moris. Hort. Bles.* 3.
 Helenium Indicum maximum C. B.
 Herba maxima I. B. tom. 3. l. 1.
 Chimalatl Peruina, Flos folis H.
 228. ANN.

Idem ramosum. Helenium Indicum
 ramosum C. B. P. 277. ANN.

Idem semine cinereo. Helenium Indi-
 cum ramosum, semine albo, cinereo striato
Reg. Paris. 84. ANN.

Idem flore minore melino. Helenium
 Indicum minus C. B. P. 277. Herbae
 species minor, florum multitudine
 tatem compensans I. B. tom. 3. l. 2.
 ANN.

Helenium Indicum, flore & semine
 perenne.

Chrysanthemum Americanum, lacini-
 atum, majus *Moris. Hort. Bles.* 251.
 Chrysanthemum Americanum laciniato folio
app. 516.

Chrysanthemum Americanum, lacini-
 atum folio obscurius virente, minus *Moris.*
Bles. 251.

Chrysanthemum Indicum radice tuberosa

Helianthemum Indicum tuberosum C. B. P.
 277. *Helenium Indicum tuberosum Cat.*
Hort. Paris. 85. Flos solis Farnesianus,
 sive Aster Peruanus tuberosus *Colum.*
Ecphras. part. 2. 11. Aldin. Hort. Farnes.
 191.

Chrysanthemum Canadense latifolium altis-
simum Moris. Hort. Bles. 251. *Chrisanthe-*
um Canadense latifolium elatius Bocc. lc.
& descr. 52. An *Helenium Canadense al-*
tissimum, Vosacan dictum *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 85?

idem humilius *Moris. Hort. Bles. 251.* *Chry-*
santhemum Canadense humilius Bocc. lc.
& descr. 52.

Chrysanthemum Canadense bidens, alato
 caule *Moris. Hort. Bles. 253.* An *Hele-*
nium Canadense elatius, alato caule *Cat.*
Hort. Paris. 85.

Chrysanthemum Canadense, Rapunculi ra-
 dice, strumofum vulgò.

Multis firmatur radicibus albis, carnofis,
 fusiformibus, Rapunculo vel Asphodelo
 haud disparibus, quæ caules attollunt com-
 plures, novem decemvè pedum altitudi-
 ne, rotundos, asperos nonnihil hirsutos,
 & striatos, in numerosos ramos subdivisos.
 Hos sine ordine cingunt folia palmam lon-
 ga, pollicem & amplius lata, in acumen
 desinentia, aspera, atroviridia, per ambi-
 tum

tum leviter crenata. Ramorum caeci
occupant flores lutei corymbosi, Chry-
themo Canadensi humiliori simillimum
quod petala dilutiùs flavescant, in m-
nem bifidum terminentur, & foliola
substrata, longius producantur. Hi-
scentibus succedunt semina angulosa
affinium, Radices subamarum aroma-
non ingratum habentes saporem, à
densibus parantur in fercula, velut a-
ropæis Rapunculi, Rapæ & similes.
Chrysanthemum Canadense minus,
alato *Moris. Hort. Bles. 252.* Aster
alatus *Corn. 62.*

Chrysanthemum Asteris facie supinum
jus. Aster luteus supinus *C. B. P. 266.*
Atticus luteus supinus, spinosus *I. B.*
L. 24. 1045.

Idem minus. Chrysanthemum Conyzoides
Lusitanicum *Breyn. Cent. 1. 157.* Aster
pinus Conyzoides Africanus *Park. T.*
131.

Chrysanthemum Asteris facie, foliis cir-
rem mollibus. Aster Atticus, foliis
florem mollibus *C. B. P. 266.*

Chrysanthemum Asteris facie, foliis a-
rem rigidis. Aster luteus, foliis ad-
rigidis *C. B. P. 266.*

Chrysanthemum Asteris facie, foliis Su-
Aster luteus major, Succisæ foliis *C. B.*

Chrysanthemum foliis Matricariæ C. B. P. 134.

Chrysanthemum majus, folio valdè laciniato, flore croceo I. B. tom. 3. l. 26. 112. ANN.

dem flore partim candido, partim luteo C. B. P. 134. Chrysanthemum Creticum I. B. tom. 3. l. 26. 112. ANN.

dem majus, folio profundius laciniato, flore magno C. B. P. 134. Chrysanthemum Creticum I. B. tom. 3. l. 26. 112. ANN.

Chrysanthemum Alpinum incanum, foliis laciniatis C. B. P. 134.

Chrysanthemum Tanaceti minoris foliis. Bupthalmum Tanaceti minoris foliis C. B. P. 134. Chamæmelum Chrysanthemum quorundam I. B. tom. 3. l. 26. 122.

Chrysanthemum Cotulæ folio. Bupthalmum Cotulæ folio C. B. P. 134. Bupthalmum tenuifolium, folio Millefolii ferè I. B. tom. 3. l. 26. 124.

Chrysanthemum Creticum, Cotulæ facie. Bupthalmum Creticum, Cotulæ facie Breyn. Cent. 1. 154. ANN.

Chrysanthemum segetum, facie Bellidis sylvestris, foliis glaucis, Papaveris hortensis instar, profundè incisis majus. Bellis lutea, foliis profundè incisis major C. B. P. 262. ANN. dem minus. Bellis lutea, foliis profundè incisis minor C. B. P. 262. ANN.

dem foliis glaucis minùs sectis. Bellis lutea foliis subrotundis C. B. P. 262. Chrysanthe-

K

mum

mum folio minùs secto glauco *I. B.* 26. 113.

* *Chrysanthemum aquaticum* Cannabina folio tripartito diviso. Cannabina ca, folio tripartito diviso *C. B. P.* 321. *besina* sive *Canabina aquatica*, flore pulchro, elatior ac magis frequens *2. app.* 1073. ANN.

* *Idem* folio non diviso. Cannabina ca folio non diviso *C. B. P.* 321. *Ve* pulchriore flore luteo *I. B. tom. 2. app.* ANN.

Idem Cannabinum Americanum *Mor* *Bles.* 254. *Eupatorium aquaticum* *Theatr. descr.* 596. ANN.

Chrysanthemum aquaticum, foliis multis *Cicutæ* nonnihil similibus, *Virginia* *Venustissimam* hanc *Chrysanthemum* ciem concessit nobis *Dn. Watsius*, *Plantarum* cognitione peritissimus, *ti Botanici*, celeberrimi *Collegii P* *ceutici Londinensis* impensis exstructus dignissimus. Fibris radicatur rosis pallidis; Caules tollit tripedales quando altiores, ramosos, glabros, angulos, geniculatos, subinde ex viriditate; Folia ad singulos nodos promittuntur adverso, multifida, *Cicutæ* nonnihil similia, ast minora & robustiora; Flores eriguntur ex ramorum fastigiis, discoidei

diati, Chrysanthemo superiore duplo minores, parte extimâ multis viridantibus foliolis squamarum instar obvallati, medio verò orbe ex minutis aureis fistulosis tubulis, apiculos fuscis exerentibus, compacti. Semina succedunt oblonga, depressa, aspera, in duos apices definentia, more antecedentium. An radix sit perennis, an annua, pro certo nobis non constat. Eo ipso enim, quo hæc scripsimus, apud nos florere incepit.

Chrysanthemum Aizoides Africanum ejusque species Breyn. v. Ficoides.

Chrysanthemum Capitis Bonæ Spei repens, flore aphylo Dn. Syens Breyn. Seu Chrysanthemum Africanum procumbens, flore cernuo, nudo, luteo Suther. v. Bellis.

CICER fativum C. B. P. 343. Moris. Hist. 2.

75. Cicer arietinum I. B. tom. 2. l. 17. 292.

Floribus & seminibus candidis C. B. P. Var. 347. ANN.

dem floribus & seminibus ex purpurâ rubescentibus C. B. P. Var. 347. ANN.

dem floribus rubris & seminibus nigris, minoribus & angulosioribus Moris. Hist. 2. 76. descr. ANN.

Cicer sylvestre, foliis oblongis hispidis majus C. B. v. Astragalus.

Cicer arboreum Indicum perenne Zan. v. Anonis.

Cicer sylvestre latifolium triphyllon C. B. P. 125. I. B. v. Anonis.

CICHORIUM fativum C. B. P. 125. 2. l. 24. 1011. Coeruleum Lob. ANN. Idem album. Tab. ANN.

* Cichorium sylvestre five Officinarum 124. Cichorium sylvestre I. B. tom. 1. 1007. ANN.

* Idem floribus candidis C. B. P. Var. 125.

* Idem flore roseo C. B. P. Var. 126. ANN.

Idem folio prorsus integro C. B. P. Var. 127.

Cichorium Cyani capitulo Moris. Hort.

361. Chondrilla coerulea Cyani C. B. P. 131.

Catanance Dalechampii

Coronopi I. B. tom. 3. l. 25. 26. Sefan

parvum Matth. vulgò. ANN.

Cichorio affinis, Lamprolana domestica

Hort. Bles. 359. Soncho affinis, Lat

domestica C. B. P. 124. Lamprolana

næi I. B. tom. 2. l. 24. 1028. ANN.

Cichorium verrucarium C. B. P. seu verru

I. B. v. Calendula.

Cichorium semine adunco C. B. P. seu flori

clinans I. B. v. Calendula.

Cichorium falcatum Moris. Calendula

Cichoreum pratense luteum lævius C. B.

Hieracium.

Cichoreum pratense luteum hirsutum

C. B. P. v. Hieracium.

Ciciliana I. B. v. *Hypericum*.

CICUTA latifolia foetidissima *Moris. Umbell.* 18. *Cicutaria* latifolia foetida C. B. P. 161. *Seseli* Peloponense *Matthioli*, five *Cicutaria* quorundam I. B. tom. 3. l. 27. 184.

Cicuta major C. B. P. 160. *Moris. Umbell.* 18.

Cicuta I. B. tom. 2. l. 26. 175. ANN.

Cicuta minor *Petroselino* similis C. B. P. 160.

Moris. Umbell. 18. *Cicutaria* *Apii* folio I.

B. tom. 3. l. 27. 179. ANN.

Cicutaria palustris tenuifolia C. B. P. 161. *Mo-*

ris. Umb. 18. *Phellandrium*, five *Cicutaria*

aquatica quorundam I. B. tom. 3. l. 27. 183.

ANN.

Cicutaria odorata C. B. P. v. *Myrrhis*.

Cicutaria odorata bulbosa C. B. P. v. *Myrrhis*.

CINARA hortensis, foliis non aculeatis,

Anglica maxima. *Cinara* maxima Anglica

Lob. C. B. P. 383. *Carduus* five *Scolymus*

maximus non spinosus I. B. tom. 3. l. 25. 51.

Cinara hortensis, foliis non aculeatis C. B. P.

383. *Carduus* five *Scolymus* sativus non spi-

nosus I. B. tom. 3. l. 25. 48.

ad eadem capite subrotundo *Cat. Hort. Reg. Pa-*

ris. 51.

Cinara hortensis aculeata C. B. P. 383. *Car-*

duus five *Scolymus* sativus spinosus I. B.

l. tom. 3. l. 25. 44.

Cinara spinosa, cujus pediculi esitanti
P. 383.

CIRCAEA major. Solani folia Circae
major C. B. P. 168. Ocimastrum ve
rium I. B. tom. 2. l. 23. 977.

Eadem Alpina minor. Solanifolia Cir
pina C. B. P. 168.

CIRSIUM maximum, Asphodeli radi
P. 377. Cirsium maximum, foliis
fis, bulbosâ radice, fortè Lutetian
B. tom. 3. l. 25. 44.

*Cirsium majus, singulari capitulo magn
incanum variè dissectum C. B. P. 377
fium Anglicum, radice Hellebori nig
do fibrosâ, folio longo I. B. tom. 3. l. 25.
Idem folio viridi.

Superioris folia alterâ parte virent
râ incanâ lanugine pubescunt; Hu
rò omnino virent. Accepimus ex
ubi sponte nascitur.

Cirsium singularibus capitulis parvis
377. Cirsium foliis non laciniatis, C
Brassicæ, & macrocaulon I. B. tom. 3. l. 25.
45.

Cirsium foliis non hirsutis, floribus com
C. B. P. 377. Carduus Cirsium Mon
cum, folio longo glabro Matthioli I. B.
3. l. 25. 44.

Cirsium angustifolium, in Prodr. C. B. P.

Cistus Ladanifera Hispanica C. B. P. 467. Cistus Ledon, flore maculâ nigricante notato *I. B. tom. 2. l. 13. 8.*

adem flore emaculati candoris.

Cistus Ledon, foliis Laurinis C. B. P. 467.

Cistus Ledon, foliis Populi nigræ major C. B. P. 467. Cistus Ledon foliis Populi nigræ major *I. B. tom. 3. l. 13. 9.*

Cistus Ledon hirsutum C. B. P. 367. Cistus Ledon *IV. Clusii*, flore candido *I. B. tom. 2. l. 13. 10.*

Cistus Ladanifera, Monspeliensium C. B. P. 467.

Cistus Ladanifera, sive Ledon Monspeliacum, angusto folio nigricans *I. B. tom. 2. l. 13. 10.*

Cistus Ledon, foliis Rorismarini subtus incanis C. B. P. 467. Cistus Ledon foliis Rorismarini coronariæ *Clusii*, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 13. 11.*

Cistus Ledon, foliis Rorismarini ferrugineis C. B. P. 467. Rosmarinus sylvestris quorundam *I. B. tom. 2. l. 13. 23.*

Cistus Ledon, foliis Salicis angustifoliæ C. B. P. 468. Rosmarinus sylvestris *ῥοσμεος Clusio* *I. B. tom. 2. l. 13. 24.*

Cistus Ledum Alpinum hirsutum C. B. P. 468.

Nerium Alpinum quibusdam, aliis Ledum hirsutum, *I. B. tom. 2. l. 13. 21.* Balsamum Alpinum hirsutum vulgò.

Cistus Ledum Alpinum, foliis ferreâ rubigine

nigricantibus *C. B. P.* 468. Nerium
num quibusdam, aliis Ledum glabrum
tom. 2. l. 13. 21. Balsamum Alpinu
brum vulgò.

Cistus Indicus, Ledi Alpini foliis & fl
amplis. Chamærhododendron exo
amplissimis floribus Liliaceis *Breyn.*
23.

Inter utriusquè Indiæ miracula, c
florido Theatro Illustrissimi Beve
vigent, eminet speciosissimus hic C
Jaccatrâ advectus, cujus florum exim
chritudo quemlibet intuentem in
mam rapit admirationem. Fruticat
rum cubitorum altitudine, trunco
cem crasso; Cortice scabro, inæqua
fusco cinereo; Ligno duro, solido,
scente; Ramis brevibus, contortis, i
natis, circa fastigia foliis, Balsamo A
non disparibus, sed rigidioribus & vi
densissimâ serie perpetuoquè virore
tis. Intra hæc prodeunt flores quo
modo Liliacei, monopetali, quinque
ti, structurâ Balsami Alpini, amplitu
Narcissi Gareti, colore fulgentis dilu
cocci; Iunio verò & Augusto tantâ ub
te luxuriant, ut superiorem fruticis
tem quasi elegantissimâ coccineâ vesti
deantur cooperire. His nisi odor de
diceres naturam nihil amabilius, nihil

CISTUS INDICUS, LEDI ALPINI FOLIIS ET
F'ORIBUS AMPLIS.

admirabilius unquam produxisse; Ammen odoris desiderium rependere videtur florum congeries numerosa, amcenissima Liliacea structura, & vivacitas exquisitissimi coloris. Cæterum ex singulis floribus sese exerunt quaterna apiculata stammina incurvata pallidè coccinea, unico intermedio longiori, infidente futuri fructus rudimento; His unà cum flore defluxis, perficiuntur in parvis oblongis villosis quicquid utriculis, conceptacula villosa veluti in Cisto Ledo vulgò Balsamo Nerio Alpino, quinque intus carinulas habentia, in quibus semina exigua flavescentia. Quò contumaciùs est Balsamum Alpinum locis mitioribus, in quibus vivere refragatur; tantò sequacior est hic Cistus qui hortensem culturam in laudatissimo Beverningiano Theatro jam ad duodecimum annum innoxie sustinuit. Facultas ad congeneres Cistos accedere, putamus adstringente gustu, quem cum illis habere communem.

Cistus Mas, folio rotundo hirsutissimo C. B. P. 464.

Cistus mas major folio rotundissimo C. B. P. 464.

I. B. tom. 2. l. 13. 2.

Cistus Mas, folio oblongo incano C. B. P. 464.

Cistus Mas iv. Monspeliacus folio oblongo

albido I. B. tom. 2. l. 13. 3.

Cistus Mas, angustifolius C. B. P. 464. Cistus

M.

Mas 11. folio longiore *I. B. tom. 2. l. 13. 2.*

Cistus Mas, folio brevior C. B. P. 464. Ci-

stus Mas 111. foliis dilutiùs virentibus *I. B.*

tom. 2. l. 13. 3.

Cistus Mas, foliis Chanædrys C. B. P. 464.

Cistus Mas v. Foliis crispis, & quodam-
modo sinuosis *I. B. tom. 2. l. 13. 3.*

Cistus Fœmina, folio Salviæ C. B. P. 464. Ci-

stus Fœmina Monspeliana, flore albo *I. B.*

tom. 2. l. 13. 4.

Eadem flore luteo, ochræ colore C. B. P. *Var.*

465. Cistus Fœmina Hispanica, flore luteo

I. B. tom. 2. l. 13. 4.

CISTUS humilis, seu Chamæcistus vulgaris,

flore luteo C. B. P. 465. Helianthemum vul-

gare, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 13. 15.*

Cistus humilis, seu Chamæcistus vulgaris, flo-

re albo majore C. B. P. 466. Helianthemum

foliis majoribus, flore albo. *I. B. tom. 2. l.*

13. 16.

Cistus humilis, seu Chamæcistus foliis mi-

noribus & incanis C. B. P. 466. Cistus hu-

milis Clusio, sive Helianthemum omnino

candicans, flore nunc albo, nunc pallido

I. B. tom. 2. l. 13, 16.

Cistus humilis seu Chamæcistus Frisicus, fo-

liis Nardi Celticæ C. B. P. 466.

Cistus humilis seu Chamæcistus, foliis Thy-

mi incanis C. B. P. 466. Helianthemum

flore

flore albo, folio angusto hirsuto *I. B. tom. 1. l. 13. 17.*

Cistus humilis seu *Chamæcistus Erica* luteus *C. B. P. 466.* *Helianthemum* folium glabrum, luteo flore, *I. B. tom. 13. 18.* Caule elatiori, & longioribus *C. B. P. Var. 466.*

Idem caule humiliore *C. B. P. 466.*

Cistus humilis seu *Cistus folio Plantagin* *B. P. 464.* *Tuberaria major Myconi* *I. B. tom. 2. l. 13. 12.*

Cistus humilis seu *Cistus Fœmina*, *Portul* folio latiore obtuso *C. B. P. 465.* *Cistus* lio, *Halimi* flore luteo. *I. B. tom. 2. l. 13.*

Cistus humilis seu *Cistus folio Sampfuchi* cano *C. B. P. 465.* *Cistus folio Sampf* *Clusii*, cui macula in flore *I. B. tom. 13. 6.*

Cistus humilis seu *Cistus folio Majorana* *465.*

Cistus humilis seu *Cistus folio Salicis* *C. B. P. 465.* *Cistus annuus* *I. Clusio*, folio rotundo *I. B. tom. 2. l. 13. 13. ANN.*

Cistus humilis seu *Cistus Ledi* folio *C. B. P. 465.* *Cistus annuus*, folio *Ledi*, flore luteo *tom. 2. l. 13. 14. ANN.*

Cistus humilis Aizoides, maritimus *Afri* nus, flore rubello.

Botanosophi recentiores, insister
principiis, à fructificatione, seu fine *Pl*
tar

LUGDUNO-BATAVUS.

157

ISTUS HUMILIS AIZOIDES, MARITIMUS AFRI-
CANUS FLORE RUBELLO.

tarum ultimo petitis, dispescunt C
in tria genera: Primum includit fe
conceptaculo octagono, octo intus car
diviso, & ex maturitate in totidem p
diffiliante: Alterum perficit semina
sculo pentagono, quinque loculam
distincto: Tertium producit capsulam
vam trigonam, quæ mediante tripartit
nui membranulâ, instar parietis inter
ni, in ternas cellulas dividitur, & ju
maturitatem adepta, in totidem corti
veluti cotylas dehiscit. Cisti primi &
cundi generis, vocantur majores; T
generis, minores, humiliores seu Cha
cisti. Huic ultimo inferendum cense
Cistum hunc Africanum, quem ob ca
& folia succulenta, Sedis haud absim
Aizoidem vocavimus. Nititur radice
vâ ex ruffo albescente; Caule conco
dodrontali, rotundo, nunc bifido, n
quadrifido; Foliis teretibus, glabris,
do minori luteo acutifolio, Trinque
dame dicto, æmulis, sed crassioribus,
quadruplo longioribus; Inter hæc erig
pediculus gracilis, tenuis, nudus, su
bens, semipalmaris, circa fastigium in
quot tenuissimos ramulos divaricatus, su
nentes florem pentapetalum parvulum,
bellum, fugacem, qui ad solem meridian
expanditur; hoc verò recedente, clau

tur, vel omnino marcescit, relinquens conceptaculum rotundum, trigonum, in ter-
na foliola carinata diffiliens, fundensquè
semina exigua, compressa, nigra. Frequens
occurrit maritimis locis ad Promontorium
Bonæ Spei inter species Ficus aizoidis, &
proinde eandem exposcit culturam; Solum
amant arenosum siccum, aëris rigidioris in-
jurias ægrè ferens, progerminans non mi-
nùs seminibus, quàm ramulis resectis, & in
terram depactis, virens toto anno. Sapor
percipitur aqueus, odor nullus.

*Citreum malum ejusquè species I. B. v. Malus
citrea.*

Citrullus C. B. & I. B. v. Anguria.

Citrus vulgò ejusquè species. v. Malus Citrea.

CLEMATIS Hederacea Indica Iasmini foliis.

CGelseminum Ederaceum Indicum *Corn.*

103. Gelseminum Indicum flore phœni-
ceo. *Fer. Flor. Cult.* 199.

Clematis Americana filiquosa tetraphyllos
Dodart. Memor. 71. *Breyn. Prodr.* 30.

Clematis Daphnoides major C. B. P. 302. Cle-
matis Daphnoides major, flore cœruleo
I. B. tom. 2. l. 15. 132.

Eadem flore albo *I. B. tom. 2. l. 15. 132.*

Eadem folio & flore variegatis.

Clematis Daphnoides minor C. B. P. 301. Cle-
matis Daphnoides minor flore cœruleo *I. B.
tom. 2. l. 15. 130.* Ea-

Eadem flore candido C. B. P. Var. 301.
tom. 2. l. 15. 130.

Eadem flore rubente vel subpurpureo
C. B. P. Var. 301. I. B. tom. 2. l. 15. 130.

Eadem flore duplici, seu flore alium flo-
medium continente C. B. P. Var. 1301.

Eadem folio & flore variegatis. Clematis
phnoides minor foliis maculosis, Sw.
Cat. Edinburg. 88.

Clematis flore pleno C. B. P. 302. Clem.
Daphnoides flore pleno I. B. tom. 2. l.
130.

Clematis pentaphylla, flore roseo clavato
rif. v. Cucumis.

Eadem latifolia. v. Cucumis.

Clematis passionalis triphyllos flore luteo M.
v. Cucumis.

Clematis trifolia, flore roseo clavato C. B. P.
Cucumis.

Eadem flore clavato ex nigro punicante H.
Reg. Paris. v. Cucumis.

CLEMATITIS sylvestris latifolia C. B. P.
Clematis latifolia, sive, Atragene qu-
dam I. B. tom. 2. l. 15. 125.

Eadem dentata I. B. tom. 2. l. 15. 125.

Clematitis sive Flammula repens C. B. P.

Clematis sive Flammula scandens ten-
lia alba I. B. tom. 2. l. 15. 127.

Clematitis seu Flammula recta C. B. P.

Clematis five Flammula surrecta alba *I. B.*

tom. 2. l. 15. 127.

Clematitidis coerulea repens *C. B. P. 390.* Clematis five Flammula, flore coeruleo scandens *I. B. tom. 2. l. 15. 128.*

Eadem purpurea *C. B. P. 300. I. B. tom. 2. l. 15. 128.*

Clematitidis coerulea, flore pleno *C. B. P. 301.*

Clematis purpurea, flore pleno scandens *I. B. tom. 2. l. 15. 129.*

Clematitidis coerulea erecta *C. B. P. 300.* Clematis Pannonica, flore coeruleo surrecta *I. B. tom. 2. l. 15. 129.*

CLINOPodium Canadense fistulosum. *Moris. Hort. Bles. 382.* Origanum fistulosum Canadense *Cornut. 14.*

Clinopodium Virginianum angustifolium, flore luteo.

Caulibus exit humilioribus & gratilioribus. Foliis angustioribus, pallidioribus, contactu mollioribus, & odoratioribus. Floribus in caulis fastigio paucioribus, tenuioribus, flavescentibus. Cæteris partibus Canadensi simillimis. Possidemus ex munere Reverendi Dni de Marees sacrorum dogmatum Præconis fidelissimi & florum rariorum cultoris præstantissimi.

Clinopodium Origano simile *C. B. P. 224.* Clinopodium Origani facie *I. B. tom. 3. l. 28. 250.*

L

Cli-

Clinopodium Mari Syriaci foliis, odor
stiches. Clinopodium quorundam,
china Gallorum I. B. l. 28. tom. 243.
rum Mastichen redolens, five Samp
C. B. P. 224.

CLINOPODIUM arvense, Ocymi facie
P. 225. Acinos multis I. B. tom. 3. l. 2.
Foliis hirsutissimis C. B. P. Var. 225.
Idem foliis angustioribus pene levibus
Var. 225.

Clinopodium Creticum Prosp. Alpin.
265. ANN.

CLITORIUS Flos cœruleus Breyn. C.
76.

Idem albus.

Cneoron Matth. v. Thymelea.

Cneorum album, folio Oleæ argenteo molli
P. v. Convolvulus.

CNICUS fativus, five Carthamum Offi
cium C. B. P. 378. Carthamus five C.
I. B. tom. 3. l. 25. 79. ANN.

Cnicus cœruleus asperior C. B. P. 378.
thamus, five Cnicus, flore cœruleo I. B.
l. 25. 80.

Cnicus perennis cœruleus Tingitanus.

Planta hæc, naturâ totoquæ habitu
cum referens, agit radicem albam, lon

NICUS PERENNIS COERULEUS, TINGITANUS.

tenuem, absquè fibris, modò obliquè
 dò rectâ in terram depactam, emittit
 folia rigida crassiuscula, spithamo longiora
 pollice angustiora, circa margines ciliata
 & simul exiguis aliquot spinulis, ob
 ferè fugientibus, armata; Intra hæc
 caulis ut plurimum simplex, aliquando
 tim à radice in binos ternosvè ramo
 divisus, sustinens ex capitulo oblongo
 nato, & aliquot rigidis brevibus
 circumvallato, flores cœruleos, fistu
 oris laciniatis, quos excipiunt semina
 sca, barbata, more congenerum. Hanc
 ca Tingidem collectam, ad nos misit
 Robertus Morison, dum viveret, Botanici
 Professor in Academiâ Oxoniensi longè
 leberrimus.

Cnicus, *Attractylis lutea* dicta. *Attractylis*
lutea C. B. P. 379. *Attractylis vera* flo
 reo I. B. tom. 3. l. 25. 83. ANN.

Cnicus sylvestris hirsutior, sive *Carduus*
nedictus C. B. P. 378. *Carduus Bene*
 I. B. tom 3. l. 25. 75.

Cnicus cœruleus humilis montis Lupi.
gium montanum minimum, capitulu
 gno C. B. P. 386. *Carduncellus montis*
 pi I. B. tom. 3. l. 25. 92.

Cnicus sylvestris spinosior C. B. P. v. *Carlina*

Cnicus sylvestris spinosior, flore aureo, per
Cat. Hort. Reg. Paris. v. Carlina.

COCHLEARIA major Batavica erecta, folio oblongo. ANN.

A vulgari majori Cochleariâ differt tantum cauliculis rectâ assurgentibus, dodrontalibus, aliquando cubitalibus, & foliis oblongis. Reperi in udosis circa Catwick.

Cochlearia major Batavica, subrotundo folio *Moris. Hist. 2. 308.* Cochlearia folio subrotundo C. B. P. 110. Cochlearia I. B. tom. 2. l. 22. 942. ANN.

Cochlearia Britannica, folio sinuato *Moris. Hist. 2. 308.* Cochlearia folio sinuato C. B. P. 110. ANN.

Cochlearia Danica procumbens *Moris. Hist. 2. 309.* Cochlearia Danica repens quæ 2. in Prodromo C. B. P. 110. *Sim. Paul. Quadr. Bot. 269.* An Cochlearia minima I. B. tom. 2. l. 22. 942? ANN.

Coggygia I. B. v. *Cotinus.*

COLCHICUM commune C. B. P. 67. *Moris. Hist. 2. 340.* Colchicum I. B. tom. 2. l. 19. 648.

Idem albo flore C. B. P. Var. 67.

Idem florum foliis rubris & albis alternatim dispositis C. B. P. 68.

Idem folio lineis albis picto. *Moris. Hort. Bles. 55. Hort. Reg. Paris. 54.*

Colchicum vere & autumno florens C. B. P. 68. *Moris. Hist. 2. 340.* Colchicum biflorum I. B. tom. 2. l. 19. 652.

Colchicum floribus Fritillariæ instar tessellatis, foliis planis *Moris. Hist. 2. 340.*
 Colchicum flore Fritillariæ instar tessellatis
P. 68. Colchicum Neapolitanum, seu
chico vulgari similis bulbus I. B. tom. 2.
655.

Colchicum Chioense, floribus Fritillariæ
 tessellatis, foliis undulatis *Moris. Hist. 2.*

Colchicum variegatum *Corn. 137.*

Colchicum latifolium variegatum *C.*
68.

Colchicum ex albo & purpurascente va
C. B. P. 68. Colchicum ποικιλάνθης
I. B. tom. 2. l. 19. 656.

Colchicum candidum multiflorum *C. B. P.*
Moris. Hist. 2. 341. Colchicum polyan
album I. B. tom. 2. l. 19. 653.

Colchicum polyanthes, lato albo Ellebo
 lio *C. B. P. 68. Moris. Hist. 2. 341.*
 Colchicum latifolium Bizantinum, polyan
I. B. tom. 2. 19. 655.

Colchicum montanum angustifolium *C.*
68. Moris. Hist. 2. 341. Colchicum
tanum, flore purpureo I. B. tom. 2.
656.

Colchicum vernum Hispanicum *C. B. P.*
 Colchicum vernum Clusii *I. B. tom. 2.*
652.

Colchicum pleno flore *C. B. P. 69. I. B. to*
l. 19. 654. Flore purpurascente.

Colchicum pleno flore, variegatum, C. B. P. 68.

Moris. Hist. 2. 342. Colchicum polyanthes candidum, eleganti rubore varium *I. B. tom. 2. l. 19. 653.*

Colchicum polyanthes multiplex C. B. P. 68.

Moris. Hist. 2. 342. Flore purpureo.

Idem flore albo.

Idem flore tessellato.

Colchico-Narcissus autumnalis luteus major

Moris. Hist. 2. 342. Colchicum luteum majus C. B. P. 69. Colchicum flore luteo quorundam *I. B. tom. 2. l. 19. 661.* Narcisso-Colchicum vulgò.

Colocassia I. B. & C. B. v. Arum.

COLOCYNTHIS fructu rotundo, major C. B. P.

313. *Moris. Hort. 2. 27.*

Eadem fructu rotundo, minor C. B. P. 313.

Colocynthis *I. B. tom. 2. l. 232.*

Eadem oblonga C. B. P. 313. Cucurbita aspe-

ro folio, amara grandis rotunda viridis *I. B. tom. 2. l. 16. 229.*

Eadem pyriformis, seu Pepo amarus C. B. P. 313.

Eadem pyriformis, cortice maculato C. B. P.

313. Cucurbita sive Colocynthis amara, pyriformis variegata *I. B. tom. 2. l. 16. 230.*

COLUTEA vesicaria C. B. P. 396. I. B. tom. I. l. II. 380.

Eadem vesiculis rubentibus I. B. tom. I. l. II. 380.

Colutea Æthiopica, flore phœniceo, B. jovis foliis Breyn. Prodr. 30. Cent. 70.

COLUTEA Scorpioides elatior & major tescens Moris. Hist. 122. Colutea siliqua seu Scorpioides major C. B. P. 397. Colutea Scorpioides I. B. tom. I. l. II. 381.

Colutea Scorpioides humilior & minor Moris. Hist. 2. 122. Colutea siliquosa minor C. B. P. 397. Colutea Scorpioides humilis I. B. tom. I. l. II. 382.

Colutea sive Polygala Valentina prima Moris. Hist. 2. 12. Polygala major Mastica C. B. P. Coluteæ parva species, Polygala Valentina Clusii I. B. tom. I. l. II. 382.

Colutea sive Polygala altera fruticosior, elatioribus. Polygala altera C. B. P. 349. Colutea Scorpioides quædam, sive Polygala Cortusi similis planta, sed major I. B. tom. I. l. II. 382.

Colutea siliquosa minor coronata C. B. P. Moris. Hist. 2. 122.

Colutea Scorpioides Cretica odorata Pers. Alpin. Exot. 17, Moris. Hist. 123.

Colutea Indica herbacea, ex quâ Indigo. Anil sive Indigo Indica Moris. Hist. 2. An Isatis Indica, foliis Rorismarini, Gl.

affinis C. B. P. 113? Anil sive Nil, Indorum color *I. B. tom. 2. l. 22. 945.* Caachira *Pison. l. 4. 198.*

Colutea herbacea dumetorum major, filiquis articulatis, flore vario. Coronilla, seu Polygala dumetorum major, filiquis articulatis, flore vario *Morif. Hist. 2. 119.* Securidaca dumetorum major, flore vario, filiquis articulatis C. B. P. 349.

Colutea herbacea enneaphyllos *Morif. Hist. 2. 120.* Ferrum equinum Gallicum, filiquis in summitate C. B. P. 349. Polygalon Cortusi *I. B. tom. 2. l. 17. 751.*

Colutea Zeylanica argentea tota. Mundu-Murungu Zeylanensibus.

Colutea est bifaria: Vesicaria & Siliquosa. Vesicariæ innotuerunt tres species: Vulgaris, Africana, & Syriaca. Siliquosa dividitur in duas classes; Prima continet species numero plurimas tam frutescentes quam herbaceas, ferentes semina cylindracea oblonga in filiquis bivalvibus articulatis; Alterius quatuor in Oriente offendi differentias frutescentes, quare semina sunt globosa, & filiquæ bivalves ventriosæ, quasi isthmo interceptæ. Ex his Horti alumna facta est, maritima argentea, ab incano & tomentoso habitu ita nominata. Fruticat altitudine humanâ; Radice pallescente, brachiatâ, lignosâ; Cau-

Caule simplici, aliquando multiplici;
 mis non incomptis, incano molli ton
 to obsitis; Foliis perpetuis, subro
 dis, crassis, albentibus, lanuginosis
 plurimum septendecim costam median
 natim cingentibus, unico in summo in
 ri; Floribus papilionaceis, luteis, G
 stæ Hispanicæ amplitudine, in spica
 mari, affatim coacervatis; pendentibus
 gulis ex caliculis parvis, incanis, marg
 bus crenatis. Siliquis coriaceis, biva
 bus, teretibus, digitum longis, ventric
 aliquot quasi isthmis inscriptis, deor
 spectantibus, intus & extus incani albe
 coloris, & in molleculum mucronem p
 ductis, cludentibus parte, quæ protu
 rat, semen globosum, durum, fusco
 magnitudine Ciceris. Abundat in vep
 maritimis Insulæ Zeylan, dicta ab ind
 nis Mundu Murunga, id est Murungu
 ritima. Videtur enim habere quandam
 finitatem cum Moringa Christ. à Costa
Arom. c. 35. quam Zeylanenses Wattu M
 rungu, hoc est Murungu hortense voca
 Cæterum gustanti deprehenditur ac
 amara, ingrata & nauseosa, virtute p
 gandi prædita; sed ob ignaviam & m
 lignitatem è foro medico pro scrip
 Propagatur facilè per novos stolones
 radice assurgentes, per submersionem a

COLUTEA ZEYLANICA ARGENTEA TOTA.

circumpositionem, ut & per semina
terræ commissa. Frigori subducta tota
me viget & viret.

Coma Hort. Mal. v. Cassia fistula.

Consiligo tenuifolia I. B. v. Adonis.

Consolida major C. B. P. v. Symphytum.

* **C**ONSOLIDA media pratensis coerulea
C. P. 260. Consolida media quibusdam
gula I. B. tom. 3. l. 30. 340.

* Eadem flore albo C. B. P. *Var.* 260.

* Eadem purpurea C. B. P. 260.

Consolida media Genevensis I. B. tom. 3. l. 432.
Consolida media pratensis hirta
Hort. Reg. Par. 55.

CONSOLIDA regalis hortensis, flore ma
& simplici C. P. B. 142. Delphinium

Consolida regalis erectior, purpureo
violaceo flore majore I. B. tom. 3. l. 26.

Calcatrippa vulgò. ANN.

Eadem flore simplici rubro C. B. P. *Var.* 142.
ANN.

Eadem seu Delphinium elatius, purpuro-
laceum C. B. P. *Var.* 142.

Eadem seu Delphinium elatius flore incan-
to C. B. P. *Var.* 142. ANN.

Eadem flore cineratio C. B. P. *Var.* 142. ANN.

Eadem seu Delphinium elatius, flore albo C.
P. *Var.* 142. ANN.

Consolida regalis hortensis, flore minore C. B.

P. 142. Flore cœrulèo. ANN.

Eadem flore cinereo C. B. P. *Var.* 142. ANN.

Eadem flore albo C. B. P. *Var.* 142. ANN.

Eadem flore incarnato C. B. P. *Var.* ANN.

Consolida regalis flore majore & multiplici

C. B. P. 142. *Consolida regalis erectior*, flo-

re purpureo sive violaceo pleno *I. B. tom. 3.*

l. 26. 211. ANN.

Eadem flore pleno incarnato C. B. P. *Var.* 142.

ANN.

Eadem multiplici flore argenteo C. B. P. *Var.*

142. ANN.

Eadem flore multiplici cinereo C. B. P. *Var.*

142. ANN.

Eadem flore pleno rubro C. B. P. 142. ANN.

Eadem flore pleno variegato, præcox. *Cat.*

Hort. Reg. Paris. 56. ANN.

Eadem rosea flore pleno variegato, serotina.

Cat. Hort. Reg. Paris. 56. ANN.

Eadem rosea flore punctato. ANN.

Eadem flore fusco obsoleto. ANN.

* *Consolida regalis arvensis* C. B. P. 142. Con-

solida regalis, flore minore *I. B. tom. 3. l.* 26.

210. ANN.

CONVOLVULUS major rectus Creticus ar-

genteus *Moris. Hist.* 2. 11.. Cneorum al-

bum folio Oleæ argenteo molli C. B. P. 463.

Dorycnium Imperati *I. B. tom. 1. l.* 5. 598.

Con-

Convolvulus maritimus Zeylanicus,
 crasso cordiformi. *Bintamburu Zeylanicus*
 sibus *Pes capræ Lusitanis*.

Vegetabilia, quæ simili inter se gaudeant
 fructificatione, & proinde generis societate
 conjunguntur, ut plurimum inter se con-
 nire principiis activis atque virtute, con-
 nente duntaxat secundum magis & minus
 prout sapor vel odor est intensior, vel
 remissior, pervulgatum est Botanicorum
 axioma, quod experientiae non omnino
 repugnat. Inter alia innumera testes
Scammoneum, *Jalappa*, *Mechoacan*,
Soldanella, cæteraquæ hujus familiae,
 singula florem gerunt monopetalum, cor-
 paniformem & post horum exantheseos
 mina quaterna in capsulis subrotundis
 modo planis, modo in parvum abeuntibus
 mucronem. Quotquot verò hac nota
 notuerunt, fundunt lac pungitivum & ac-
 reosum, nunc dilutius nunc spissius, mo-
 parcius modò copiosius, acredine vel
 intensiore vel remissiore, ac proinde don-
 tur sale purgante aut potentiore aut de-
 liore. Consimili purgativo sale conficitur
Convolvulum maritimum Zeylanicum
 colligo non tantum ex lacte acri lingua
 & fauces pungente; sed & experientia
 multijurâ experientiâ comprobatis. Reliquum
 enim radice drachmæ pondere cum vi-

LUGDUNO-BATAVUS

174

CONVOLVULUS MARITIMUS ZETLANICUS
FOLIO CRASSO CORDIFORMI.

lo ovi, lacte Coccineo, aliavè conve
te emulsione data, hydropicorum a
blandè subduxit. Idem officium pra
radicis extractum cum spiritu Vini
tum. Quanquàm verò Convolvuli
radix à Lusitanis & nunc quoquè à m
Indis censeatur diaphoretica ejusque
coctum hoc nomine in lue Gallicâ ali
morbis chronicis in frequenti sit usu
tamen persuasus ratione & experientia
stimo, hanc virtutem esse meram imag
riam, adscriptam radici, fortè ex non
pari facie, quam habet cum Salsapa
Luxuriat locis maritimis Malabaræ,
lan, aliarumquè regionum & Insula
Orientalium, cujus radix, Salsaparilla
absimilis, in obliquum longè latequè
repat, fusco crassoquè cortice tecta, &
tenui, in resinam concrecente, re
Ex quâ sparguntur sarmenta herba
glabra, infirma, humi strata, trium
tuorvè ulnarum longitudine; His a
natim adhærent folia subrotunda, car
lucida, glabra, expansa, aut compli
quasiquè bifida, imitantia figuram co
seu ut Zeylanensibus placet, figuram p
caprini, unde accessit plantæ nomen
tamburu seu Pedis Capræ. Flores prod
ex parvis quinquèfoliaceis caliculis,
nopetali, ampli, pentanguli, campanifor

roseo vivaci colore, umbone medio atropurpurascente. Semina sequuntur quaterna, angulosa, hirsuta, locata in vasculis subrotundis, in parvum desinentibus mucronem. Licet in censum purgantium reputatur radix, tamen ejus folia cedunt in pabulum cuniculis, cervis, damis, capris tam domesticis, quam sylvestribus. Hujus semina cum multis aliis curiosissimis transmissit ad nos Dns Thomas à Rhee mercium Insulæ Zeylan p. t. Administrator primarius, quæ, anno superiori telluri commissa, germinarunt & in plantam adoleverunt.

Convolvulus maritimus rotundifolius Moris. Hist. 2. 11. Soldanella maritima minor C. B. P. 2. 295. Brassica marina sive Soldanella I. B. tom. 2. l. 15. 166.

Convolvulus Indicus Orientalis Inhame seu Battatas, Sifarum Peruvianorum, seu Battata Hispanorum Moris. Hist. 2. 11. Battatas C. B. P. 91. I. B. tom. 2. l. 19. 792.

Convolvulus Indicus alatus maximus, foliis Ibisco non nihil similibus angulosis. Turbith Officinis. Turpethum repens, foliis Althææ, vel Indicum C. B. P. 149. Tirastawalu Zeylanensibus.

Quàm negligenter & perfunctoriè descripserit Turbith Garzias ab Horto l. 1. *Arom. c. 36.* cujus tamen plantam virentem

LUGDUNO-BATAVUS. 179

CONVOLVULUS IND. ALAT9 MAX. FOL. IBISCO
NONNIHIL SIMIL. TURBITH OFF.

tem & floribus exornatam se vidisse
tur, manifestum fiet ex brevi meâ de-
ptione & delineatione, quam, propri-
fervatione collectam, hic subjungere
ræ pretium duxi. Vario longoquē re-
ad tria quatuorvè cubita descendit
pollicem & ampliùs crassa, lignosa,
quot ramos divisa, crasso fuscoquē co-
tectâ, qui ruptus, stillat succum lac-
glutinosum in pallidè flavescentem
nam illico concrefcentem, gustus
subdulcis, postmodum pungitivi, vom-
minantis. Ex hâc prodeunt sarmenta
mosa, quatuor alis donata, varios in
se contorquentia, prope radicem lig-
diti crassitie, rufescentia, in pro-
verò viridia, sex septemvè ulnarum
gitudinem aliquando superantia, qu-
nonnulla humi procumbunt, alia vi-
arbores fruticesquē scandunt, iisque
plici plexu se involvunt. His adsta-
carinatis alatisquē pedunculis folia
non nihil paria, mollia, incanâ rarâ
nugine obsita, angulosa, in ambitu
ta, leviter mucronata, ad quorum
circa ramorum summitates exeunt
superioribus longiores, robustiores,
carinâ omnino destituti, sustinentes
aut quaterna capitula oblonga, mucro-
quinquē viridantibus in rubro foliolis

flata, quæ singula excludunt florem monopetalum Convolvuli vulgaris magnitudine & formâ, candidum, intus quinque pallentibus apiculatis staminulis, cum sexto intermedio subjectæ feminali capsulæ impacto, refertum. Flore excusso capitula expanduntur, in quorum centro conspiciuntur quaterna rotundo-angulosa nigricantia semina, Piperis magnitudine, inclusa vasculo tenui, membranaceo, subrotundo, depresso, plano intus quadripartito. Confimilia semina, florum seminumquæ involucri memini quoque me observasse in Mechoacannâ, cujus expansum involucrium una cum capsulâ feminali falso pro flore proposuit Monardes, & ex eo Dalechampius, Johannes Bauhinus, aliique. Turbith frequens offendi locis opacis, humidis, ad fossarum margines, retro hortorum sepes, aliisque sylvestribus à mare longe dissitis in Zeylan & Malabarâ. Colliguntur in usum medicum, non caules ut perhibet Garzias, sed radices crassiores, turgentes lacte & resina copiosiore. Quæ ad nos transmittuntur radices, fodiuntur in Guzarattâ, ubi proventus luxuriosus. Virtutes chatharticas Vide sis apud autores. Viguit Planta, à me ex Zeylan in Hortum advecta, ad tertium usquè annum, quò, antequam flores & semina perfecerat, interiit.

Convolvulus Syriacus & Scammonea Syriaca

Morif. Hist. 2. 12. Scammonia Syriaca

P. 295. Scammonia Syriaca, flore albo

Convolvuli I. B. tom. 2. l. 15. 163.

* Convolvulus vulgaris major albus, seu

maior albus *C. B. P. 294. Morif. Hist. 2. 13.*

Convolvulus major I. B. tom. 2. l. 15. 157.

* Idem purpureus *Comel. Cat. 26.*

Convolvulus purpureus, folio subrotundo

Prod. C. B. P. 295. Morif. Hist. 2. 13. C.

panula Indica I. B. tom. 2. l. 15. 165. A.

Idem flore albo. ANN.

* Convolvulus vulgaris, flore minore purpureo

Morif. Hist. 2. 13. Convolvulus n.

arvensis C. B. P. 294. Helxine Cissamp.

multis, five Convolvulus minor I. B.

2. l. 15. 157.

* Idem flore albo *C. B. P. Var. 294.*

* Idem flore roseo *C. B. P. Var. 294.*

Convolvulus coeruleus Hederaceus, seu

lium Park. *Morif. Hist. 2. 13. Convolv.*

coeruleus, Hederaceo anguloso folio C.

295. Nil Arabum seu Convolvulus co.

eruleus I. B. tom. 2. l. 15. 164. Folio angul.

ri. ANN.

Idem latiori folio. ANN.

Convolvulus Indicus villosus, Hederaceus

tripartito, flore coeruleo ANN.

Gaudet radice exili, pallidâ modicâ

brosâ; Viticulis longis, tenuibus, pilis

infirmis, quæ vel vicinis stipitibus impli-
cantur, vel terræ incumbunt & ex viticu-
lorum nodis novas radículas defigunt; Fo-
liis pariter pilosis supernè viridibus, subtus
pallidioribus, in tres lobos Nil Arabum in-
star divisis, at angustioribus; Floribus mo-
nopetalis, campaniformibus, pentangulis,
pallidè cœruleis fugacibus, ad solem ex-
pansis, cæteroquin clausis, tribus quatuor-
vè in hirsutum capitulum congestis, singu-
lis insidentibus caliculis, villosis quinque
foliatis. His includuntur vascula rotunda,
plana, crustacea, in quibus quaterna fe-
mina triangula, fusca, hirsuta. Madet te-
nui lacte subacri ingrato, suspecto virtutis
purgantis. Hujus semina ex Indiâ advexi,
ubi locis aridis incultis uberrimus proven-
tus.

*Convolvulus Americanus villosus pentaphyl-
lus & heptaphyllus major.* ANN.

A radice non adeo magnâ albente fibro-
sâ emittit sarmenta hirsuta, herbacea, in-
firma, in ramulos quam plures divaricata,
sex aut plurium ulnarum longitudine, vici-
nis quibusvis adminiculis multivario am-
plexu sese involventia. Folia palmam am-
pla, hirsuta digitata, quinque vel septem
profundis laciniis inscripta, alterâ parte vi-
ridia, alterâ subincana, longis pilosis petiolis
adhærent. Ad horum exortum prodeunt

capitula hirsuta, veluti in præcedentibus quibus sunt flores pallidè flavescentes & horum exanthesin semina, præcedentibus nino simillima. Lacte quoque dilutione get subacri ingrato. Ex Americâ transfertur hic elegantissimus Convolvulus adstrissimum Virum, DN^m Casparum Illiolum, in cujus Viridario, exoticarum & rarissimarum arborum & herbarum feracissimo, luxuriat. Vide Convolvulum Asiatium Vesslingii, cum quo Americanus ster non multum differt.

Idem Zeylanicus minor, Pes Tigrinus dicitur. Convolvulus heptaphyllus Indicus villi. *Breyn. Prodr.* 33. Diwipahuru Zeylanicis. ANN.

Hic alumnus est Horti Beverningiani me olim ex Zeylan ad Illustrissimum Virum transmissus. Præcedenti simillimus, sed minor & hirsutior; Foliorum incisura sunt latiores & obtusiores, pedem Tigrinum exprimentes. Hinc à Zeylanensibus accipit nomen Diwipahuru, sive pedis Tigrinis. Flores candidi quini aut septeni deunt alternatim ex capitulis hirsutis propositâ figurâ à pictore minus appropinquè expressis. Seminum medulla, in aqua pipidam projecta, peramœno spectaculo solvitur in tenuissima candida folia, plantæ foliis exactè respondentia.

LUGDUNO-BATAVUS. 185

CONVOLVULUS AMERICANUS VILLOSUS PEN-
TAPHYLLUS ET HEPTAPHYLLUS MAIOR.

Convolvulus peregrinus cœruleus, folio longo, flore peramæno triplici colore gnito *Moris. Hist. 2. 17.* *Convolvulus grinus cœruleus*, folio oblongo *Prodr. 134. I. B. tom. 2. l. 15. 166. ANN.*

Convolvulus Siculus annuus cœruleus mus, capsulâ floris binis foliolis cincta *ris. Hist. 2. 36.* *Convolvulus Siculus* flore parvo auriculato. *Bocon Pl. Sic. ANN.*

Convolvulus argenteus, *Althææ* folio *295. Moris. Hist. 2. 13.* floribus ex purp candicantibus. *C. B. P. Var. 295.* *Convolvulus peregrinus pulcher*, folio *Beton. I. B. tom. 2. l. 15. 159.*

Idem floribus omnino purpurascens *P. Var. 295.* Foliis magis incis & incan

Convolvulus minimus, *Spicæfolius* *Moris. Hist. 2. 17.* *Convolvulus Linari* lio *C. B. P. 295.* *Convolvulus terrestris.* *tom. 2. l. 15. 160.*

Convolvulus exoticus annuus, foliis *My* phylli seu *Millefolii* aquatici, flore sa neo. *Moris. Hist. 2. 20.* *Jasminum Mille* lii folio *C. B. P. 398.* *Quamoclit. I. B. 2. l. 15. 177. ANN.*

Convolvulus major, semine triangulo v. *Frumentum Saracenicum.*

Idem minor, semine triangulo *B. P. v.* *Frumentum Saracenicum.*

LUGDUNO-BATAVUS. 187

CONVOLVULUS ZEYLANICUS VILLOSUS PENTAPHYL-
LUS ET HEPTAPHILLUS MINOR.

- CONYZA Mas Theophrasti, major Dioscoridis C. B. P. 265. Conyza major Monspeliensis odorata I. B. tom. 2. l. 24. 1054.
- Conyza Fœmina Theophrasti, minor Dioscoridis C. B. P. 265. Conyza minor velut I. B. tom. 2. l. 24. 1054.
- * Conyza Pannonica lanuginosa C. B. P. 265. Asteri montano hirsuto magno flore Oculo Christi similis, sive Conyza Clusi I. B. tom. 2. l. 24. 1047.
- Conyza media, Asteris flore luteo, velut Dioscoridis C. B. P. 265. Conyza media Matth. flore magnoluteo, humilis proveniens I. B. tom. 2. l. 24. 1050.
- Conyza palustris ferratifolia C. B. P. 266. Conyza aurea angustifolia ferrata, sive Solana Saracenica I. B. tom. 2. l. 24. 1063.
- * Conyza aquatica laciniata C. B. P. 266. Conyza Helenitis mellita incana Lobelii I. B. tom. 2. l. 24. 1052.
- Conyza major vulgaris C. B. P. 265. Conyza major Matthioli, Baccharis quibusdam I. B. tom. 2. l. 24. 1051.
- * Conyza cœrulea acris C. B. P. 265. Sive Erigeron cœruleus, aliis Conyza cœrulea I. B. tom. 2. l. 24. 1043.
- Conyza Canadensis annua acris alba. Bonpl. Sicul. 86. Aster Canadensis annuus papposo Hort. Reg. Paris. 27. ANN.
- Conyza media Monspeliensis I. B. v. Aster

Conyza Africana incana arborescens, odore Salviae & Rosmarini vulgò. v. Elichrysum.

CORAL, arbor filiquosa I. B. *tom. 1. l. 12.*
426. Siliqua sylvestris spinosa arbor Indica C. B. P. 402. Arbuscula Corallii Ferr. Flor. Cult. 381. Arbor Fabifera. Boa-Tsink-King dicta Bont. l. 5. 134. Erabudu Zeylanensibus. Spinis ex albo virentibus & seminibus rubentibus.

Eadem minor spinis & seminibus nigricantibus. Jacerabudu Zeylanensibus.

Coral, arbor Americana maxima.

Seminibus, anno superiori ex America illatis, prodiit in Horto Dni Philippi de Flines hæc arbor, foliis amplissimis, quasi cineraceo pulvere aspersis, cujus flores favente cœlo hæc æstate videre licebit.

Coralloides ejusquæ species C. B. P. v. Dentaria.

CORCHORUS Plinii *Moris. Hist. 2. 283. C. B. P. 317. Corchorus sive Melochia I. B. tom. 3. 983. ANN.*

CORIANDRUM majus C. B. P. 158. Coriandrum fativum majus *Moris. Umbell. 48.*

Coriandrum I. B. *tom. 3. l. 27. 89. ANN.*

Coriandrum minus testiculatum C. B. P. 158.

Coriandrum minus odorum I. B. *tom. 3. l.*

27. 91. ANN.

COR

COR Indum, five Halicacabum per
num multis *I. B. tom. 2. l. 15. 173.*
Hist. 2. 19. Pisum vesicarium, fructu
gro, albâ maculâ notato *C. B. P. 343.*
nus. ANN.

Idem majus. ANN.

Coris Matth. C. B. P. v. Hypericum.

CORNUS hortensis Mas *C. B. P. 447.*
nus fativa, seu domestica *I. B. tom. 1.*
202.

Eadem fructu albo *C. B. P. Var. 447.*

Cornus Fœmina *C. B. P. 447.* Cornus Fœ
na putata, Virga sanguinea *I. B. tom. 1.*
214.

Eadem foliis variegatis.

Cornu Cervinum vulgò spicâ Plantaginis.
v. Coronopus.

Corona Imperialis I. B. v. Lilium.

Coronilla ejusquè species Moris. v. Colutea.

* **C**ORONOPUS hortensis *C. B. P. 190.* Co
nopus, five Cornu cervinum vulgò, fructu
Plantaginis *I. B. tom. 3. l. 31. 509.* ANN.

* **Coronopus** maritima major *C. B. P. 190.*
ronopus maritima nostras *I. B. tom. 1. l.*
511.

Coronopus Ruellii I. B. v. Nasturtium.

Corruda I. B. v. Asparagus.

Cortusa I. B. v. Primula Veris.

CORYLUS fativa, fructu albo minore, sive
vulgaris C. B. P. 417. Corylus fativa I. B.
tom. 1. l. 3. 266. Nux avellana vulgò.

Corylus fativa, fructu rotundo maximo C. B.
P. 418.

Corylus fativa, fructu oblongo rubente C. B.
P. 418.

Eadem fructu pelliculâ albâ tecto *Cat. Hort.*
Reg. Paris. 58.

Corylus sylvestris C. B. P. 418.

Corylus Byzantina. Avellana peregrina hu-
milis C. B. P. 418. Avellana Byzantina I. B.
tom. 1. l. 3. 270.

Costus hortensis I. B. v. Tanacetum.

CORINUS Matth. C. B. P. 415. Coccigria, si-
ve Cotinus putata I. B. tom. 1. l. 4. 494.

Cotonea malus ejusque species C. B. P. v. Malus
Cydonia.

Cotoneaster. I. B. v. Mespilus.

Cotula non foetida & foetida I. B. v. Chamæ-
mælum.

COTYLEDON flore luteo maxima. Coty-
ledon flore luteo, radice repente. *Da-*
dart. Mem. 73.

Eadem media.

Superiori humilior est, & quoad omnes
partes minor.

Ea-

Eadem minor. Cotyledon major C. B. P.

Cotyledon vera, radice tuberosâ I. B.

3. l. 35. 683. Umbilicus Veneris vulg.

Cotyledon media, foliis subrotundis C. B. P.
Sanicula.

Cotyledon media, foliis oblongis serratis C.
v. Sanicula.

Cotyledon media subhirsuta, floribus purpureis
C. B. P. v. Sanicula.

Cotyledon stellata B. P. v. Sedum.

Coum Herbariorum Cat. Hort. Reg. Paris.

Cyclamen.

Crista galli v. Pedicularis.

CRISTA Pavonis five Frutex Pavonis
Breyn. Cent. 1. 61. Monarakudimb
ve Cauda Pavonis Zeylanensibus. Flos
voninus Lusitanis.

CRITHMUM five Foeniculum maritimum
majus, odore Apii C. B. P. 288. *Morif.*
Umbell. 20. Crithmum five Foeniculum
marinum grandius, cui succus luteus
tom. 3. l. 27. 199.

* *Crithmum seu Foeniculum maritimum*
C. B. P. 281. *Morif. Umbell. 20. Crithmum*
multis, five Foeniculum marinum I. B.
3. l. 27. 174.

CRITHMUM maritimum spinosum C. B. P.
288. *Moris. Umbell. 20.* Pastinaca mari-
na quibusdam, Secacul, & Crithmum spi-
nosum I. B. tom. 3. l. 27. 176.

Crithmum maritimum, flore Asteris Attici C.
B. P. v. After.

Crithmum quartum Matthioli umbelliferum I.
B. v. Ammi.

Crithmum Chrysanthemum vulgò. v. After.

Croco-colchicum vulgò. v. Crocus.

CROCUS autumnalis fativus, floridus &
sine flore *Moris. Hist. 2. 335.* Crocus fati-
vus C. B. P. 65. Crocus I. B. tom. 2. l. 19.
637.

Crocus autumnalis Alpinus C. B. P. 65. *Moris.*
Hist. 2. 336. Crocus montanus autumnalis
I. B. tom. 2. l. 19. 636.

Crocus vernus latifolius, flore purpureo ma-
gno *Moris. Hist. 2. 336.* C. B. P. 65. Cro-
cus vernus latifolius purpureus, flore majo-
re I. B. tom. 2. l. 19. 642.

Crocus vernus latifolius purpureus variegatus
C. B. P. 65. *Moris. Hist. 2. 336.* Crocus ver-
nus latifolius purpureus, versicolore flore
I. B. tom. 2. l. 19. 642.

idem variegatus pallidus.

Crocus vernus latifolius purpureo-violaceus
C. B. P. 66. Crocus vernus latifolius

N

pur-

purpureus, flore minore *I. B. tom. 2. l. 12. 640.*

Idem cœruleus, lineis violaceis variegatus *B. P. Var. 66.* Crocus vernus latifolius, re purpurascens venis vario *I. B. tom. 2. l. 19. 640.*

Crocus vernus Janthinus, latiore folio, mediâ albâ, & margine flavescente *Hort. Reg. Paris. 59.*

Crocus vernus latifolius albus variegatus *C. B. P. 65. Moris. Hist. 2. 336.* Crocus vernus latifolius, albo flore *I. B. tom. 2. l. 19. 640.*

Idem foliorum mucronibus purpurascens *C. B. P. Var. 65.*

Idem fundo violaceo. *Hort. Eystett.*

Idem supernè purpureus, infernè flavus *C. B. P. Var. 66.*

Idem floribus albo & violaceo colore mixtis, basi cœruleâ *Cat. Hort. Reg. Paris. 59.*

Crocus vernus minor albicans *C. B. P. 66.* Crocus vernus latifolius, albo flore simplici *I. B. tom. 2. l. 19. 640.*

Crocus vernus latifolius *C. B. P. 66. Moris. Hist. 2. 336.*

Crocus vernus latifolius flavus *C. B. P. 66. Moris. Hist. 2. 337.*

Idem flavo flore, virenti basi *Cat. Hort. Reg. Paris. 60.*

- Crocus vernus latifolius aureus C. B. P. 66.
Idem pallidus C. B. P. 66.
Crocus vernus latifolius flavo-varius C. B. P.
66. *Moris. Hist. 2. 336.*
Idem sulphureo-varius.
Idem aureo-rutilo-varius. Crocus vernus latifolius flavo-varius, alter C. B. P. 66. Crocus vernus latifolius flavus, vario flore I. B. tom. 2. l. 19. 644.
Crocus vernus angustifolius, magno flore C. B. P. 67. *Moris. Hist. 2. 337.* Crocus vernus angustifolius, floribus cœruleis sive violaceis, Hispanicus I. B. tom. 2. l. 19. 645.
Idem flore toto candido C. B. P. Var. 67. Crocus vernus angustifolius, floribus candidis I. B. tom. 2. l. 19. 645.
Crocus vernus angustifolius, parvo flore C. B. P. 67. *Moris. Hist. 2. 337.* Crocus vernus angustifolius tertius Clusio, flore multo minore cœruleo I. B. tom. 2. l. 19. 645.
Crocus vernus angustifolius serotinus, parvo argenteo versicolore flore.
Crocus vernus juncifolius serotinus caulescens, floribus violaceis, ad solem aureis micis fulgentibus. Croco-colchicum vulgò.
Hic adeò similis est Croco verno angustifolio Clusii *Rar. l. 2. 207.* ut penè idem videatur. Sed dubium movet cauliculus semipalmaris, è cujus apice prodeunt tres quatuorvè flores violacei, ad solem expansi.
- N 2

fi, aureisque micis nitentes.

Crocus Indicus, Arabibus Curcum Bon.
Curcuma.

CROTALARIA Asiatica frutescens trifloribus luteis amplis. Laburnum Zanicum, floribus ex luteo & rubro variis, siliquis bullatis. *Breyn. Prodr.* 40.

Crotalariae species inter crepundia puerilia ludicra reponuntur apud Indictae vulgò Kiligilippe, quod crepundium seu κρόταλον audit. Harum enim triflorae siliquae, è ramis summis in tenuissimis strobilis pendentes, collisu tum ad se invicem tum seminum ad illarum valvas, stridentem emittunt, ludentibus pueris, non invidendum. Quatuor verò innotuerunt species in Horto nostro familiares, quos Crotalaria nomine producere libet. Quanquam non ineptè fecissem, si sub nomine Anagyridum, ad quarum classem alteram siliculis pendentibus pertinere videntur, pertuissem. Prima Asiatica trifolia dicta frutescit in caulem bipedalem, glaucum, crassum, digitis, varios ad latera spargentem ramis. Folia concoloria glabra terna ab uno terminali petiolo in obtusum mucronem gra- scunt Anagyridi proxima. Caulium spiculantur floribus luteis papilionaceis, Anagyridi pariter similibus, singulis ex calyce

LUGDUNO-BATAVUS. 197

CROTALARIA ASIATICA FRUTESCENS TRIEOLIA
FLORIBUS LUTEIS AMPLIS.

quefariam secto longis gracilibus p
 dependentibus. Hos siliquæ excipiu
 valves, teretes, membranaceæ, r
 glabræ, ex basi angustiori in ampli
 quasi ampullam cum longiori proter
 lamento caudæ instar terminantes, f
 Anonidis similes, sed longiores & an
 res, quæ includunt semina parva,
 pressa, flava, renalia, brevissimis tre
 petiolis affixa, facie & sapore Geni
 mula. Radix subest lignosa, albican
 aliquot ramos & paucas fibras diduct
 vax ad tertium quartumvè annum.
 tanea reperitur in sylvis Malabaræ, Ze
 aliarumquè Orientalis Indiæ regio
 Hactenus non nisi seminibus propaga
 tuit, quicquid etiam industriæ & la
 fuit impensum. Semina quamvis apu
 dos in usu non sunt, suspicionem pra
 falis purgantis, quòd statim, ut ex l
 aquæ calidæ assumpta sunt, minentur
 mitum.

Crotalaria Asiatica folio singulari verruc
 floribus cœruleis. ANN.

Altera extollit è radice albente pa
 lignosâ raris fibris conspersâ, annu
 pereunte, caulem herbaceum, cubita
 aliquando altiore, nodosum, angulo
 in progressu quadrangulum, & prop
 dum alatum, frequentibus ramis in or

CROTALARIA ASIATICA FOLIO SINGULARI VER-
RUCOSO FLORIBUS COERULEIS.

dispositis ornatum, quibus per uncia-
 terstitia ex brevissimis petiolis adhæren-
 tia semidigitum longa, duos ungues
 in summo obtusa, parte supernâ diluta
 ridia, infernâ ex viridi candicantia, ne-
 fa, modo pro foli & climatis ingenio
 bra, modo verrucosa, & ad margines
 dulata. Ramorum apices fastigiantur
 spicam, quam ambiunt flores papilion-
 superiori multò minores, coloris cœ-
 vel in cœruleo pallescentis, numero
 que septem non rarò etiam triginta, uni-
 cæ adhærentes, qui ex parvis quinqu-
 caliculis in tenuissimis tremulis petiolis
 læ instar dependent. His defluxis
 dunt siliquæ præcedenti confimiles, al-
 gricantes, minus glabræ, sed rarioribus
 obsitæ cum filamento ad extremum bre-
 ri, claudentes semina velut in priori,
 quo & iisdem natalibus perficiuntur.
 liorum sapor est oleraceus, seminum
 subacris & ingratus, quidpiam cathart-
 portendens.

Crotalaria Asiatica, floribus luteis, folio sin-
 lari cordiformi. ANN.

Tertia cum superioribus pares agno-
 natales, faciem, crescendi modum &
 res. Ast foliis omnino glabris, ex basi
 gustâ sensim in latiore obtusam & cor-
 formem aciem desinentibus, & sex septem

PROTALARIA ASIATICA, FOLIO SINGULARI COR-
DIFORMI, FLORIBUS LUTEIS.

vè per transversum nervis inscripti-
bus flavis & seminibus in siliquis glab-
tu congenerum.

Crotalaria hirsuta minor Americana her-
caule ad summum sagittato. ANN.

Quarta ex America hùc allata em-
radice pallidâ fibrosâ cauliculum gra-
nunc simplicem nunc multiplicem,
sum, spithameum, hirsutum, ad radice-
tundum, in progressu verò prope fi-
rum foliorum exortus alatum, qu-
fimbriatum, alis faciem sagittæ, ut i-
mægenistâ peregrinâ Clusii, exp-
tibus. Folia cæteris speciebus mino-
guem lata leviter mucronata hirsuta
siuscula pallidè virentia cauli sine pe-
pressius adhærent. Flores ex spicâ pr-
dent papilionacei dilutè flavescente
hirsuti, Cythisi floribus haud majores
sequuntur semina reniformia in siliquis
latis parvis hirsutis.

Cruciata quibusdam flore luteo I. B. v. R.

Crupina Belgarum vulgò. v. Centaurium
pitatum.

CUCUMIS sativus vulgaris C. B. P. 310.
Cris. Hist. 2. 31. Cucumis vulgaris v.
I. B. tom. 2. l. 16. 245.

Idem albus C. B. P. *Var.* 310. I. B. tom. 2.
245.

CROTALARIA HIRSUTA MINOR AMERICANA
SAGITTATA.

Idem maturus totus albus C. B. P. *Var.*
Fructu maturo albo *Cat. Hort. Reg.*
60.

Cucumis flexuosus C. B. P. 310. Cucum
gissimus I. B. *tom. 2. l. 16. 247.*

Cucumis Ægyptius reticulatus Vesling
ris. Hist. v. Pepo.

*CUCUMIS sylvestris asininus dictus
314. *Moris. Hist. 2. 33. I. B. tom. 2. l. 16.*

CUCUMIS puniceus Cordi *Moris. Hist.*
Balsamina rotundifolia repens seu
C. B. P. 306. Balsamina Cucumerari
tom. 2. l. 16. 251. vulgò Momor
ANN.

Idem Zeylanicus. Maragosa Lusitanis.

Fert sarmenta longiora & crassiora,
ampliora, profundius laciniata, fructus
riformes, ex flavo-rubentes, superficie
rucosâ. Cætera cum priori conveniunt
ritur in Zeylan & Malabarâ ad hortos
sepes, quos circinnis suis implicat. I
amarissimi gustus sunt instar Lupuli,
loco a Belgis, in Oriente degentibus
coquendam Cerevisiam adhibentur. I
genæ commendant decoctum & expre
succum in morbis chronicis à sale
adusto, quod subvertit sal alcalicum.

CUCUMIS Flos Passionis dictus pentaphyl-
lus, flore clavato. Clematis pentaphylla,
flore roseo clavato. *Moris. Hist. 2. 6.* Mu-
rucuja 11. *Pison. Hist. 247.* Clematis passi-
flora pentaphylla flore coeruleo punctato.
Munting. Prax. 421.

Idem foliis latioribus.

Idem Hederaceo folio, flore ex luteo viridan-
ti. Clematis passionalis triphyllos, flore lu-
teo *Moris. Hist. 2. 6.* Clematis passi-flora,
flore luteo *Munting. Prax. 422.*

Idem triphyllos, flore roseo, clavato. Cle-
matis passionalis triphyllos flore roseo *Mo-
ris. Hist. 2. 7.* Clematis trifolia flore roseo
clavato C. B. P. 301. Clematis passiflora, flo-
re roseo triphylla *Munting. Prax. 423.*
Murucuja 111. *Pison. Hist. 247.* Maracot
Indicum *Aldin. Hort. Farnes. 50.*

Idem flore ex purpura nigricante. Clematis
trifolia altera, flore clavato ex nigro puni-
cante. *Hort. Reg. Paris. 53.*

Idem Quajavas folio majori. Murucuja IV.
Pison. 247.

Idem folio minori. Murucuja V. *Pison. 248.*

CUCURBITA lagenaria, flore albo *Moris.
Hist. 2. 23.* Cucurbita lagenaria, flore al-
bo, folio molli C. B. P. 313. Cucurbita la-
genaria I. B. tom. 2. l. 16. 216.

Cucurbita major sessilis, flore albo, folio mol-
li

li *Moris. Hist. 2. 23.* Cucurbita major
albo, folio molli C. B. P. 312. Cucurbita
tior, folio molli, flore albo I. B. tom.
215.

Cucurbita oblonga, flore albo, folio
B. P. 313. *Moris. Hist. 2. 24.* I. B. tom.
16. 214.

Cucurbita sylvestris fungiformis. *Ger. Hist. 3. 39.* Cucurbita capitata C. B. P.
313.

Cucurbita Indica parva *Moris. Hist. 2. 30.*
tom. 2. l. 16. 227. Cucurbitæ parvulus,
fructu pugni magnitudine, cortice
bro, maculis asperso, & semine rubro
P. 313.

Cucurbitæ variæ species, fructus formæ
gnitudine, pro vario naturæ lusu, in
differentes.

*Cucurbita aspera, folio non fisso, fructu
maximo sessili* I. B. v. Pepo.

Cucurbita foliis asperis, sive Zucha flore
I. B. v. Pepo.

Cucurbita major rotunda flore luteo folio
C. B. P. v. Pepo.

Cucurbita verrucosa C. B. P. v. Pepo.

Cucurbita clypeiformis, sive Siciliana
Pepo.

Cucurbita capitata Tabernæmontani I. B.
Pepo.

Cucurbita aspera pyriformis, parva alba I. B. v. Pepo.

Cucurbita aspera, Cortice molli alba, magnitudine Arantiæ I. B. v. Pepo.

Culcas Vesling. v. Arum.

CUMINUM *Moris. Umbell. 6.* Cuminum semine longiore C. B. P. 146. Cyminum sativum I. B. tom. 3. l. 27. 21.

Cuminum sylvestre, capitulis globosis C. B. P. & *Cuminum sylvestre primum valde odoratum globulosum* I. B. v. Pastinaca.

Cuminum semine rotundiore & minore, dulce Melitensibus C. B. P. v. Anisum.

Cuminum pratense, Carvi Officinarum B. P. v. Carum.

Cunila bubula Plinii C. B. P. v. Origanum.

Cunila gallinacea Plinii C. B. P. v. Origanum.

CUPRESSUS ramis expansis Mas. Cupressus C. B. P. 488. I. B. tom. 1. l. 9. 282.

Cupressus ramis in metæ fastigium convolutis Fœmina. Cupressus Fœmina Dodon.

Cupressus Virginiana foliis Acaciæ deciduis.

Nomine Cupressi Virginianæ attuli ante aliquot annos ex Angliâ hanc arborem, quam in Virginiâ suâ sponte luxuriare accepi. Ad altitudinem humanam vix apud nos assurgit, caudice scabro, pollicis crassitiem superante, absquè spinis, ligno solido

do durissimo, ramis rubentibus in
tem coronam expansis, foliis Acaci
gyptiæ similibus, circa autumnum
entibus De floribus & fructibus nih
hi hætenus est compertum. Nasci
locis irriguis, & depangi patitur pe
cumpositionem vel ramorum subm
nem.

CURCUMA radice longâ. Cyperi gen
Indiâ Matth. C. B. P. 37. Curcuma
Terra merita Offic. radice croceâ I. B. t.
l. 19. 746. Crocus Indicus, Arabibus
cum, Officinis nostris radix Curcuma
ta. *Iacob. Bont. Hist. Nat. l. 6. c. 30.*

Inter varias, quas ex Oriente in Hor
transvexi plantas, hospitatur in hunc
diem Curcuma, Arabibus & Indis de
tatissima. Constat radice tuberosâ, te
in transversum actâ, Zingiberis facie
sitie digiti, ex multis propaginibus
circularibus in superficie zonis genicul
conflatâ, aliquot crassiusculas fibras ex
niculis demittente, ponderosâ, foris
dâ & modicè scabrâ, intus croceâ ac
poris decursu in puniceum inclinante,
dâ quasi ex condensato croceo succo
sius compactâ, gustus acris amaricantis
matici pinguis, odoris fragrantis. H
singula genicula protrudunt folia læte

dia, plana, spithamum longa, unam
 vè palmas lata, in modicum acumen
 nentia, foliis Cannæ Indicæ junioris
 similia, ut à rudioribus non facile ab
 cem discerni queant. Hoc errore du
 video Bontium, qui *Hist. Nat. & M.*
 7. c. 30. loco Curcumæ delineavit Can
 Indicam in India frequentem & h
 nostris satis familiarem. Cæterum è m
 lis & robustioribus radicis tuberibus
 tur scapus dodrantalis, teres, succule
 scriptorii calami crassitudine, ex viridi
 lescens, inferiori parte nudus à medio
 ad cacumen usquè in crassam rotun
 spicam fastigiatus, quam formant folio
 exortu pallidè viridia, postmodum ex
 vo rubentia vel ex pallido flava, duo
 gues lata, sensim in recurvum mucro
 abeuntia, squamatim disposita, intra
 rum commissuras delitescit tenax
 scosus humor, collectus ex nocturno
 ciduis rore. Insuper ex singulis squ
 successivè prodeunt flores oblongi, C
 Indicæ facie, ast triplo minores, qu
 ut plurimum pallidè flavescentibus
 purpurascentibus petalis constructi,
 superiori obliquè sursum vergente, bi
 ferioribus rectâ protensis, intermedio
 quadantenus intorto & fimbriato. Qu
 excussis succedunt vascula parva, me

nacea, tricapfulariâ, quæ continent semina
rôtunda, fusca, seminibus Cannæ Indicæ
minora. Simili omnino fructificatione gau-
dent Bangala Indorum, Cardamomum ma-
jus & minus, Costus Arabicus, utraqûe Ga-
langa, Zedoaria, Zerumbeth Garziæ, Zin-
gibèr, & proinde unâ cum Curcumâ sub
uno & eodem genere summo merentur re-
poni. Indis adeò familiaris est Curcuma, ut
vix hortus in Oriente reperire liceat, in
quo non colatur. Maturescit foditurquè
radix, postquam flores exaruerunt. Propa-
gatur tam seminibus quàm nodulis seu ge-
niculis à radice resectis. Donatur sale oleo-
so volatili, partibus blandis viscosis immer-
so, cujus virtutes recensent Bontius aliique.

CUSCUTA major C. B. P. 219. Cussuta, five
Cuscuta I. B. tom. 3. l. 28. 266. ANN.

Cuscuta minor, five Epithymum C. B. P. 219.
ANN.

Cuordo Pison. v. Cassia.

Cyamos leguminosa I. B. v. Faba.

CYANUS floridus odoratus Turcicus, five
Orientalis major Parkins. Theatr. 482.

Ambrette vulgò. Flore purpureo. ANN.

dem flore albo Cat. Hort. Reg. Paris. 62.
ANN.

dem flore incarnato. ANN.

dem flore luteo. ANN.

Cyanus Orientalis alter : seu Constantinianus, flore fistuloso candicante *Cat. Hort. Reg. Paris. 63. ANN.*

Idem fistuloso purpureo flore *Cat. Hort. Paris. 63. ANN.*

Idem flore luteo fistuloso *Dodart Mem. ANN.*

Cyanus montanus latifolius : vel Verbasco Cyanoides *C.B.P. 273. Cyanus Alpinus dice perpetuâ I. B. tom. 3. l. 25. 23.*

Idem angustifolius. Cyanus montanus, a minore folio & longiore Belgicus *Cat. Hort. Reg. Paris. 61.*

Folia exhibet longiora, angustiora, mento rariori obsita, cætera proximè æqualia.

* Cyanus segetum *C. B. P. 273. & Cyanus tenensis, flore simplici C. B. P. 273. Cyanus I. B. tom. 3. l. 25. 21. Flore cœruleo C. B. P. Var. 273. ANN.*

* Idem flore albo *C. B. P. Var. 273. ANN.*

* Idem flore purpureo *C. B. P. Var. 373. ANN.*

Idem flore incarnato *C. B. P. Var. 273. ANN.*

* Idem flore violaceo *C. B. P. Var. 273. ANN.*

Idem flore carneo, fundo immaculati candore *Cat. Hort. Reg. Paris. 62. ANN.*

Idem flore ex albo violaceo *C. B. P. Var. 273. ANN.*

Idem flore albo, umbilico cœruleo, violaceo purpureo. *Eystet. ANN.*

Idem flore albo, fundo purpureo *C. B. P. Var.*

274. ANN.

Idem flore albo, fundo carneo *Cat. Hort. Reg.*

Paris. 62. ANN.

Idem flore atro purpurascente *Cat. Hort. Reg.*

Paris. 62. ANN.

Cyanus hortensis, flore pleno *C. B. P. 274. Cya-*

nus pleno flore *I. B. tom. 3. l. 25. 22. flore*

purpureo *C. B. P. Var. 274. ANN.*

Idem flore albo multiplici, medio pupureus

C. B. P. Var. 274. ANN.

Idem flore coeruleo multiplici *C. B. P. Var. 274.*

ANN.

Cyanus pulchro semine Centaurii majoris I. B.

v. Centaurium Capitatum.

CYCLAMEN orbiculato folio infernè pur-

purascente *C. B. P. 308. Cyclaminus folio*

rotundiore vulgatiore *I. B. tom. 3. l. 32. 551.*

Flore dilutiùs purpurascente *C. B. P. Var.*

308.

Idem flore saturatiùs purpurascente *C. B. P.*

Var. 308.

Idem flore pleno.

Cyclamen orbiculato, folio infernè ex viridi

pallente *C. B. P. 308.*

Cyclamen autumnale, orbiculato circumrofo

folio, subtus rubente, odoratissimo flore

carneo: *Corcyrarum Cat. Hort. Reg. Pa-*

ris. 62.

Cyclamen autumnale, folio subrotundo
do molliori & crenato, suavè rubente.

Syriacum *Cat. Hort. Reg. Paris.* 63.

Cyclamen hyemale orbiculatis foliis in
rubentibus, purpurascente flore: Coum-

bariorum *Cat. Hort. Reg. Paris.* 63.

Cyclamen hyeme & vere florens, folio
loso, amplo flore albo, basi purpureâ:

sicum dictum *Cat. Hort. Reg. Paris.* 63.

Idem carneo flore, basi purpureâ *Cat.*

Reg. Paris. 63.

Cyclamen vernum, anguloso folio, tri-
viriditatis serie vario, maximis floribus

bis, imo osculo purpurascente: Antio-

num Nuperorum, *Cat. Hort. Reg. Pa.*

Idem floribus maximis omnino niveis.

Cyclamen latifolium auriculatum, flore
rubente. *Cat. Hort. Reg. Paris.* 63.

Cyclamen Aprili florens, cordato folio, a-
nâ viriditate & albedine picto, minimo

re *Cat. Hort. Reg. Paris.* 63. Cyclaminus

orientale, Katmer Bouhour Turcarum
nut. 48.

Cyclamen folio longiore anguloso, & ling-
serpentis mentiente: Regium *Cat.*

Reg. Paris. 36. *Sim. Paul. Quadr. Bot.*

Cyclamen folio anguloso *C. B. P.* 308.

intensiùs quàm in vulgare rubente *C.*

Var. 308. Cyclaminus flore rubro gra-

ri vernus *I. B. tom. 3. l. 32.* 554.

Idem floribus omnino albescentibus C. B. P.
Var. 308.

Cyclamen Hederæ folio C. B. P. 308. Cyclaminus folio anguloso *I. B. tom.* 3. *l.* 32. 553.

Cyclamen vernum album C. B. P. 308. Cyclaminus flore graciliori albo vernus *I. B. tom.* 3. *l.* 32. 554.

Cyclamen odoratum æstivo solstitio florens, folio maculato C. B. P. 308.

Idem folio paulò longiore, vix dum maculato, flore dilute purpurascente: Romanum recentiorum *Cat. Hort. Reg. Paris.* 63.

Cyclamen radice exigua C. B. P. 308. Cyclaminus parva radice *I. B. tom.* 3. *l.* 32. 552.

Cydonia malus ejusque species Hort. Reg. Par.
v. Malus Cydonia.

Cymbalaria C. B. P. *v. Linaria.*

Cynocrambe Mas & Faemina *I. B. v. Mercurialis.*

Cynosorchis ejusque species C. B. P. & *I. B. v. Orchis.*

Cynoglossa fortè topiaria *Plinio* *I. B. v. Buglossum.*

Cynoglossum majus vulgare C. B. P. 257.

Cynoglossum vulgare *I. B. tom.* 3. *l.* 33. 598.
 Flore rubente. ANN.

Idem flore albo C. B. P. *Var.* 257. ANN.

Idem flore ex albo & rubro variegato. *Cynoglossum subrubente versicolore flore* *Park. Theatr.* 512. ANN.

*Cynoglossum sylvaticum, rubente caule
257. ANN.

Cynoglossum Creticum, argenteo angu-
lio C. B. P. 257. Cynoglossum Creticum
mum Clusii I. B. tom. 3. l. 33. 600. ANN.

Cynoglossum Creticum latifolium, foetu-
C. B. P. 257. Cynoglossum Creticum
dum Clusi I. B. tom. 3. l. 33. 601. ANN.

Cynoglossum semper virens in Phyt. & P.
C. B. P. 257. Cynoglossa folio virente
tom. 3. l. 33. 600. ANN.

Cynoglossum minus C. B. P. 257. & C.
glossum medium C. B. P. 257. Cyno-
sum minus I. B. tom. 3. l. 33. 600. ANN.

Cynoglossæ affinis Linifolia, semine umbi-
to. Linum umbilicatum Park. Theat.
1687. ANN.

Cynoglossum flore cæruleo Parkin. v. Bugloss

*Cynoglossum folio molli, incano, flore cæ-
striis rubris variegato Moris. v. Bugloss*

*Cynoglossum montanum majus C. B. P. v.
rinthe.*

*CYPERUS rotundus inodorus German
C. B. P. 14. Cyperus aquaticus septen-
nalis Lobelio I. B. l. 18. tom. 2. 503.

*Cyperus rotundus inodorus Anglicus C.
14. Cyperus rotundus littoreus inod
I. B. tom. 3. l. 18. 503.

Cyperus rotundus esculentus angustifolius

B. P. 14. Trafi I. B. tom. 3. l. 18. 504.

Cyperus odoratus, radice longâ : five Cyperus
Officinarum C. B. P. 14.

Cyperus longus inodorus Germanicus C. B. P.
14. Cyperus longus inodorus sylvaticus
Lobelio I. B. tom. 3. l. 18. 503.

Cyperus genus ex Indiâ Matth. C. B. P. v. Cur-
cuma.

CYTISUS incanus, folio oblongo Austria-
cus C. B. P. 391. Cystifus Clusii Pannoni-
cus alter, foliis omnino incanis I. B. tom. 1.
l. 11. 369.

Cytifus incanus, folio medio longiore C. B. P.
389. Cytifus tertius Hispanicus cum brevi
pediculo I. B. tom. 1. l. 11. 372.

Cytifus foliis subruffâ lanugine hirsutis C. B. P.
390. Cytifus hirsutus I. B. tom. 1. l. 11. 371.

Cytifus glabris foliis subrotundis, pediculis
brevissimis C. B. P. 390. Cytifus glaber, si-
liquâ latâ I. B. tom. 1. l. 11. 373.

Cytifus glaber nigricans C. B. P. 390. Cytifus
glaber, five filiquâ angustâ I. B. tom. 1. l. 11.
373.

Cytifus flore primùm incarnato, postmodum
rubello.

Pedali nonnunquam cubitali assurgit al-
titudine, virgis gracilibus lignosis, foliis gla-
bris, ternis in brevi pediculo, floribus in spi-
câ coacervatis, papilionaceis, ab exortu
O 5 can-

candidis, post incarnatis gratè rubell
quis & seminibus velut in anteallato

Cytisus spinosus. Acacia trifolia C. B. P.

Asphalatus secunda trifolia, quæ

secunda Matthiolo trifolia I. B. tom. 1.

575.

Cytisus incanus, siliquis falcatis C. B. P. 87.
dica.

D.

actylus vulgò. v. Palma.

Damasonii species quibusdam
v. Helleborine.

Datura vulgo I. B. v. Stramonium

Daucus vulgò ejusque species. v. Pastinaca

Daucus Alpinus multifido longoque folio

montanus, umbellâ candidâ C. B. P. v.

rhis.

Daucus montanus, Apii folio major C.

v. Libanotis.

Daucus Creticus, semine hirsuto I. B.

Myrrhis.

Daucus pratensis, Millefolii palustris folio

P. v. Oenanthe.

Delphinium I. B. v. Consolida Regalis.

DENS canis, latiore rotundioreque

C. B. P. 87. Flore purpurascente M.

Hist. 2. 344. Satyrion, quorundam

thronium bifolium, flore unico radiato
purpureo *I. B. tom. 2. l. 19. 680.*

Idem maculis lacteis variegatus, albo flore
C. B. P. Var. 87. Satyrion, quorundam Eri-
thronium bifolium, flore unico radiato al-
bo *I. B. tom. 2. l. 19. 680.*

Dens canis angustiore longiore folio *C. B. P. 87.*
Flore albo *Moris. Hist. 2. 344. I. B. tom. 2.*
l. 19. 680.

Idem flore suavè rubente *Cat. Hort. Reg. Pa-*
ris. 65.

DENS leonis, latiore folio *C. B. P. 126.*
Hedypnois, sive Dens leonis Fuchsi *I. B.*
tom. 2. l. 24. 1035.

Idem angustiori folio *C. B. P. 126.*

DENTARIA triphyllos *C. B. P. 322. Moris.*
Hist. 2. 254. Coralloides enneaphyllos
Clusii *I. B. tom. 2. l. 21. 902.*

Dentaria pentaphyllos *C. B. P. 322. Moris. Hist.*
2. 255. Coralloides prima quinquèfolia *I. B.*
tom. 2. l. 21. 900.

Dentaria heptaphyllos *C. B. P. 322. Moris. Hist.*
255. Coralloides altera, sive septifolia *I. B.*
tom. 2. l. 21. 901.

Dentariae affinis, Ecchii flore, capsulâ Anagal-
lidis *Dodart. & Moris. v. Echio affinis.*

DENTILLARIA Rondeletii *I. B. tom. 2. l. 22.*
941. Lepidium Dentillaria dictum *C. B.*
P. 97.

P. 97. Flore albo minore.
Eadem flore albo majore.

DIAPENSIA, sive Sanicula Mas Fuch
tom. 3. l. 34. 639. Sanicula Offici
C. B. P. 319. Moris. Hist. 2. 616.

DICTAMNUS Creticus C. B. P. 222. D
nus Cretica seu vera I. B. *tom. 3. l. 28.*

DICTAMNUS spurius inodorus, acer
Moluccæ majoribus. Pseudodicta
acetabulis Moluccæ C. B. T. 223.
Idem acetabulis Moluccæ minoribus.
dodictamnus verticillatus inodorus C
222. Dictamnium adulterinum quibus
verticillatum vel potius Gnaphalium
rum I. B. *tom. 3. l. 28. 255.*

Dictamnus Officinis I. B. v. Fraxinella.

DIGITALIS purpurea, folio aspero C
243. *Moris. Hist. 2. 478. Digitalis p*
rea I. B. tom. 2. l. 20. 812.

Digitalis alba, folio aspero C. P. B. 242. *M*
Hist. 2. 478. Descr. I. B. tom. 2. l. 20.
Descr.

Digitalis latifolia, flore ferrugineo *Moris*
2. 478. Majore.

Eadem flore ferrugineo minore *Cat.*
Reg. Paris. 68.

- Digitalis angustifolia*, flore ferrugineo C. B. P. 244. *Morif. Hist.* 2. 478. *Digitalis furruginea*, folio angustiori I. B. tom. 2. l. 20. 813.
- Digitalis lutea*, magno flore C. B. P. 244. *Morif. Hist.* 2. 479. *Digitalis lutea*, flore majore, folio latiore I. B. tom. 2. l. 20. 813.
- Digitalis lutea*, minore flore. *Morif. Hist.* 2. 479.
- Digitalis major lutea vel pallida*, parvo flore C. B. P. 244. *Digitalis flore minore*, subluteo angustiori folio I. B. tom. 2. l. 20. 814.
- Digitalis minima*, *Gratiola dicta*. *Morif. v. Gratiola*.
- Digitalis Americana purpurea*, folio serrato Dodart. v. *Gratiolæ affinis*.
- Dipcadi vulgò*. v. *Hyacinthus*.

- D**ISACUS fativus C. B. P. 385. I. B. tom. 3. l. 25. 73. ANN.
- Dipsacus sylvestris*, aut *Virga pastoris major* C. B. P. 385. *Dipsacus sylvestris*, sive *Labrum Veneris* I. B. tom. 3. l. 25. 74.
- dem folio laciniato I. B. tom. 3. l. 25. 75. *Dipsacus folio laciniato* C. B. P. 385. ANN.
- Dipsacus sylvestris*, capitulo minore, vel *Virga Pastoris minor* C. B. P. 385. *Virga Pastoris vulgaris* I. B. tom. 3. l. 25. 75. ANN.
- Diptamus*. v. *Dictamnus*.
- Dora*. I. B. v. *Milium*.
- Doria* I. B. v. *Virga aurea*.

DORONICUM maximum Americ
latissimo anguloso folio, radice tr
rente.

Hoc nomine accepimus à Dno
Bobarto, Horti Academici Oxonien
stode, Viro in plantarum scientia
tissimo. Flores & semina videre no
contigit.

Doronicum maximum, foliis caulem a
xantibus C. B. P. 185. Doronicum
mum, foliis Hyoscyami Peruani mod
lem amplexantibus. I. B. tom. 3. l. 25.

Doronicum latifolium, flore magno C.
185. Doronicum folio lato, flore
I. B. tom. 3. l. 25. 17.

Doronicum Plantaginis folio C. B. P. 18
ronicum folio ferè Plantaginis ob
I. B. tom. 3. l. 25. 18.

Doronicum radice dulci C. B. P. 184. D
nicum folio subrotundo serrato. I. B.
3. l. 25. 17.

Doronicum radice Scorpii C. B. P. 184.

Doronicum Americanum, laciniato folio
v. Chrysanthemum.

Dorycnium Monspeliensium vulgò. v.
tus.

Dorycnium Imperati I. B. v. Convolv

DRABA lutea, filiquis strictissimis C.
110. Moris. Hist. 2. 234. Drabæ seu A

alia Icon *Chabr.* 296. ex *I. B. tom. 2. l. 22.*

939.

Draba Erysimi flore & siliquis C. B. P. 109. Draba lutea, Erysimi flore & siliquis Moris. Hist.

2. 234. Hesperidi Alpinae murariae vè similis surrecta & magna I. B. tom. 2. l. 21. 881.

Draba alba filiquosa procumbens. Draba alba filiquosa repens C. B. P. 109. Moris. Hist. 234.

Hesperis Alpina, five muralis minor repens I. B. tom. 2. l. 21. 880.

Drabæ filiquosæ similis, planta præcox annua Moris. Hist. 2. 235. Bursæ pastoris similis filiquosa major, seu majoribus foliis C. P. B. 108.

Bursa pastoria, five Pilosella filiquosa I. B. tom. 2. 21. 870. Major ANN.

Eadem minor. Bursæ pastoris similis filiquosa minor, seu minoribus foliis C. B. C. 109. ANN.

Draba coerulea annua, folio virente crassiusculo Moris. Hist. 235. Leucojum marinum parvum, folio virente crassiusculo I. B. tom. 2. l. 21. 877. ANN.

DRABA filiculosa repens major, foliis magis incanis, spanospermos vulgaris *Moris. Hist. 2. 313. Draba umbellata, vel Draba major, capitulis donata C. B. P. 109. Draba multis, flore albo I. B. tom. 2 l. 22. 939.*

Dracocæphalon Breyn. v. Gratiolæ affinis.

DRA-

DRACUNCULUS hortensis C. B. P. 98.
 cunculus hortensis, sive Tarchon I. B.
 3. l. 26. 148.

Dracunculus pratensis, serrato folio C.
 v. Ptarmica.

Dracunculus pratensis, flore pleno C.
 v. Ptarmica.

Dracunculus pratensis alter Alpinus, foliis
gerati Cat. Hort. Reg. Paris. v. Ptarmica.

Dracunculus palustris, sive radice Arum
ceâ C. B. P. v. Arum.

Dracunculus aquaticus I. B. v. Arum.

Dracunculus polyphyllus C. B. P. Major
maculato. v. Arum.

Idem minor caule non maculato. v. Arum.

Dracunculus sive Serpentaria triphylla
liana C. B. P. v. Arum.

Dudaim. Gen. 30. & Cant. 7. Ludov. v. I.
 des

Dulcamara C. B. P. v. Solanum.

E.

Ebulus I. B. v. Sambucus.

Ecapatli altera Hernand. v. Scabiosa.

Echinopus major I. B. v. Scabiosa.

Echinopus minor I. B. v. Scabiosa.

* **E**CHIUM majus & asperius, flore albo
 P. 254. *Echium albo flore majus I. B.*
 3. l. 33. 588. ANN.

Echium vulgare C. B. P. 254. I. B. tom. 3. l. 33.

556. ANN.

Echium Creticum latifolium rubrum C. B. P.

254. ANN.

Idem angustifolium rubrum C. B. P. 254. ANN.

Echium Auchusæ facie flore luteo minus.

Anchusa lutea minor C. B. P. 255. I. B. tom.

3. l. 33. 583.

Echium latissimo folio, Lycopsis dictum, flore dilutè purpurascente. Lycopsis C. B. P.

255. Lycopsis Dioscoridis quibusdam I. B.

tom. 3. l. 33. 584. ANN.

Idem flore albo. ANN.

Echium Lycopsis facie, Africanum perenne.

Producit cauliculos bipedales, asperos, nonnihil pilosos, ramosos, ex ruffo viridantes; Folia pingua crassiuscula lycopsis vulgaris angustiora, breviora, aspera, hirta, qualiquè verrucosa, & obtusa; Flores in cœruleo purpurascens; Semina triangula, nigricantia; Coetera superiori simillima. Hoc primum educavit ex feminibus Africanis Dns Wilhelmus Lesier, rariorum Plantarum æstimator & cultor curiosissimus, cujus liberalitate nobis est concessum.

Echium lappulatum quibusdam I. B. v. Buglossum.

P

Echium

Echium sylvestre lanuginosum C. B. P. chufa.

Echium Scorpioides arvense C. B. P. chufa.

Echium Scorpioides palustre C. B. P. chufa.

Echio adfinis Dentariae foliis vulgò. drophylum.

Elatine folio subrotundo C. B. P. v. Lin.

Elatine folio acuminato C. B. P. v. Lin.

Elaphoboscum I. B. v. Pastinaca.

Eleagnus Cordi I. B. v. Rhus.

ELICHRYSON foliis Abrotani C. B. P. Heliochryson quorundam, folio tani I. B. tom. 3. l. 26. 150.

Elichrysum seu *Stoechas citrina* angul C. B. P. 264. *Stoechas citrina tenuifolia bonensis* I. B. tom. 3. l. 26. 154.

Elichrysum Orientale C. B. P. 264. *Stoechas citrina*, floris, & magnitudine, & speciosa I. B. tom. 3. l. 26. 154.

Elichrysum sive *Stoechas citrina latifolia* 264. *Stoechas citrina Germanica*, latifolio I. B. tom. 3. l. 26. 153.

* *Elichrysum sylvestre latifolium*, cap. conglobatis C. B. P. 264. *Gnaphalium Stoechadem citrinam accedens* I. B. tom. 3. l. 26. 160.

ELICHRYSUM INODORUM GLABRUM, CORONOP
FOLIO ANNUUM MAGNOLI.

Idem angustifolium C. B. P. 264. Stœchadinæ affinis, capitulis parvis, raris, squamis, in pappos evanescentibus *I. B. tom. 156.*

Elichrysum sylvestre, flore oblongo C. B. Stœchadi citrinæ affinis, capitulis longibus *I. B. tom. 2. l. 26. 156.*

Elichryso sylvestri flore oblongo similis *P. 265.*

Elichrysum inodorum glabrum, Coronario annuum Magnoli. ANN.

Huic sunt cauliculi palmares, viridiores, infirmi, angulosi, striati; Folia talia, glabra, crassa, aliquot incisuris, nono non absimilibus, dissecta; Florum ramorum cimis rotundi, squamati, corymbos Agerati æmulantes, in dorem quasi umbellam conglomerati; Stamina fusca, oblonga, parva cum tenui pappo, Radix subest tenuis, albicantibus. Sapor & odor nullus manifestus. Prodiit nobis ex seminibus, nomine Elichrysi Magnoli à Nobilissimo Dno Jo. Battista Ciasii transmissis.

Elichryso affinis Africana arborescens, capitulis purpuro-violaceis, foliis Salviæ, Rosmarini. Conyza Africana incarnata, rescens, odore Salviæ & Rosmarini vulgò.

LUGDUNO-BATAVUS. I

226

ELICHRYSO AFFIN. AFRIC. ARBOR. FLOR. PURP.
VIOL. FOL. SALV. ODORE ROSMARINI.

Quamquam hæc arbuscula nomen
 focomæ non mereri videatur, quod ei
 res aureâ luce non refulgeant; Attamen
 florum squamatam corymbaceamque
 Eturam, & seminum papposam dispo-
 nem, ceu primariam plantarum pa-
 Chryfocomæ haud dissimilem, huic a-
 gendam esse existimavi. Sponte nasci
 reperi locis saxosis & salebrosis ad ra-
 montis Tabulati Capitis Bonæ Spei,
 in Hortum translata lætâ fertilitate ge-
 navit. Figit radicem longam, obli-
 pallidam, in brachia divaricatam, ex
 virgulta assurgunt complura (nonnun-
 unum) sex septemvè pedum procer-
 lignosa, ramosa, candida, incano to-
 fo cortice vestita. His adstant folia
 viæ quadantenus similia, rigida, crassa
 petua, supra viridia, infra candida, in-
 numerosis obliquis nervis, è costâ me-
 margines exporrectis, saporis acris
 aromatici, odoris fragrantissimi ex
 marino & Salviâ mixti. Ad ramorum
 cumina pullulant multi ramuli, in quibus
 apparent parvi squamati tomentosi flo-
 Elichrysi vulgaris effigie, barbulis
 angustissimis purpuro-violaceis cingen-
 orbiculum pallidum, fatiscentem in te-
 sima pappescentia semina. Mensibus
 tio & Aprili floret in Hyemali; L

mensibus perficitur quoque ad Promontorium Bonæ Spei. Vegetat ramulis vel in terram deflexis, vel penitus resectis, & feraci solo infixis. Virtutibus respondet Rosmarino. Oleum ex destillatione prolectum utero obstructo præstantissimum esse deoppilativum, experientia nos edocuit.

Elleborine ejusque species I. B. v. Helleborine.

Elleborus ejusque species I. B. v. Helleborus.

Endivii vulgaris C. B. P. v. Intybus.

Epazatl Rech. v. Atriplex.

EPHEMERUM Virginianum Joh. Tradescanti Parkius. Allium seu Moly Virgianinum C. B. P. 516. Phalangium Virginianum, foliis latioribus, radice repente, flore tripetalo coeruleo *Moris. Hist. 2. 334.* Hallucin.

Idem flore purpureo. *Cat. Hort. Reg. Paris. 139.*

Idem flore albo. *Cat. Hort. Reg. Paris. 139.*

Ephemerum Virginianum ramosum procumbens, foliis amplis *Zanon. Hist. Botan. 90.*

Idem Africanum annuum, flore bipetalo. ANN.

Hoc ab antedicto Ephemero, nomine Phalangii Virginiani à Zanonio curiosissime descripto & depicto, distinguitur tantum radice annuâ, & floribus minoribus duobus petalis constructis. Luxuriat in testis & ad margines rivulorum, circa Promontorium Bonæ Spei, in horto se ipsum

propagans feminibus deciduis. Si
speciem aut multò minorem observa
Zeylan & Malabar, quæ in locis ulig
aliisque herbidis abundabat. A Medi
ponebatur inter aquea & refrigeranti
dicamenta.

*Ephemeron Matthioli vel potius Ephemer
spurium. v. Lyfimachia.*

EPIMEDIUM Anguil. & Lunaria qu
dam C. B. P. 323. I. B. tom. 2. l. 17.
Hist. Moris. 2. 196.

Epithymum C. B. P. v. Cuscuta.

* **E**QUISETUM palustre, longioribus setis
B. P. 15. Equisetum majus aquaticum
I. B. tom. 3. l. 36. 729.

* Equisetum palustre, brevioribus setis
15.

* Equisetum palustre, brevioribus foliis
spermon C. B. P. 15. Equiseti facie Po
num Fœmina I. B. tom. 3. l. 36. 732.

* Equisetum palustre, tenuissimis & longis
setis C. B. P. 16. I. B. tom. 3. l. 36. 729.

* Equisetum sylvaticum, tenuissimis setis
16. Equisetum sive Hippuris tenuiss
non aspera I. B. tom. 3. l. 36. 730.

* Equisetum pratense, longissimis setis
16. Equisetum minus terrestre I. B. tom.
l. 36. 730.

Equisetum arvense, longioribus fetis *C.B.P.* 16.
Equisetum foliis nudum, non ramosum sive
juncum C.B.P. 16. *Equisetum majus a-*
quaticum l. 1. I. B. tom. 3. l. 36. 728.

Equisetum foliis nudum, ramosum *C.B.P.* 16.

Equisetum foetidum sub aquâ repens C.B.P. 16.
I. B. tom. 3. l. 36. 731.

Eranthemum I. B. v. Adonis.

E*ERICA vulgaris glabra C.B.P.* 485. *Erica*
vulgaris, humilis semper virens, flore pur-
 pureo *I. B. tom. 1. l. 10. 354.*

Eadem flore albo *C.B.P. Var. 485. I. B. tom. 1.*
l. 10. 354.

Erica Myricæ folio hirsuta C.B.P. 485. *Erica*
Myricæ folio, tomentosis & incanis foliis
I. B. tom. 1. l. 10. 355.

Erica maxima alba C.B.P. 485. *Erica foliis Co-*
rios flore albo I. B. tom. 1. l. 10. 355.

Erica maxima purpurascens longioribus foliis
C.B.P. 485. *Erica*, foliis *Corios* quaternis,
 flore purpurascente *I. B. tom. 1. l. 10. 356.*

Erica humilis, cortice cineraceo, *Arbuti* flore
C.B.P. 486. *Erica ramulis ternis*, floribus sa-
 turatioribus purpureis *I. B. tom. 1. l. 10. 357.*

Eadem flore albo *Hort. Reg. Paris.*

E*ERICA baccifera procumbens nigra C.B.P.*
 486. *Erica baccifera Matth. I. B. tom. 1. l.*
5. 526.

Ericu Hort. Malab. v. Apocynum.

Erigerum I. B. v. Senecio.

Erigeron caeruleum I. B. v. Conyza.

Erinos Colum. I. B. v. Campanula.

Erinus Matth. v. Hieracium.

*Erithronium bifolium, flore unico radiato
pureo & albo I. B. v. Dens Canis.*

Erva de St. Maria Pison. v. Arum.

ERUCA major fativa annua, flore albo
to *Moris. Hist. 2. 228. I. B. tom. 2. l. 19.*

Eruca latifolia alba fativa C. B. P. 98.

*Eruca sylvestris latifolia, folio integro, folio
teo minore Moris. Hist. 2. 229. Myag.*

siliquâ longâ C. B. P. 109. Myagro.

planta, siliquis longis I. B. tom. 2. l. 21.

Eadem siliquâ longissimâ.

Eruca latifolia lutea seu Barbarea major

Hist. 2. 230. Eruca lutea latifolia, sive B.

rea C. B. P. 98. Barbarea I. B. tom. 2. l. 21.

Eadem minor Moris. Hist. 2. 230.

Eruca maxima Canadensis Cornut. 15.

Hist. 2. 230.

**Eruca sylvestris major vulgatioꝝ foetens*

Hist. 2. 231. Eruca sylvestris major

caule aspero C. B. P. 98. Eruca tenuis

perennis, flore luteo I. B. tom. 2. l. 21. 86.

**Eruca sylvestris seu palustris minor pro*

bens & repens, luteo parvoquẽ flore

Hist. 2. 231. Eruca sylvestris minor

parvoquè flore C. B. P. 98.

*Eruca palustris & Nasturtii folio, siliquâ oblongâ C. B. P. 98. Eruca quibusdam sylvestris repens flosculo luteo I. B. tom. 2. l. 21. 866.

Eruca cœrulea in arenosis crescens C. B. P. 99. Moris. Hist. 229. Eruca purpurea aliis cœrulea, sive Viola petræa I. B. tom. 2. l. 21. 865.

Eruca maritima Anglica, siliquâ fungosâ porosâ rotundâ, foliis crassis latioribus Moris. v. Raphanistrum.

Eruca maritima Italica, siliquâ hastæ cuspidi simili C. B. P. v. Raphanistrum.

Eruca Monspeliaca, siliquâ quadrangulâ echinâtâ C. B. P. v. Raphanistrum.

Ervum semine anguloso Moris. v. Orobus.

*ERYNGIUM maritimum C. B. P. 386. Eryngium marinum I. B. tom. 3. l. 25. 86.

*Eryngium vulgare C. B. P. 386. I. B. tom. 3. l. 25. 86.

Eryngium montanum amethystinum C. B. P. 386. Eryngium cœruleum I. B. tom. 3. l. 25. 86. quoad descriptionem.

Eryngium Alpinum cœruleum, capitulo Disfaci C. B. P. 386. Eryngium Alpinum, latis foliis, magno capite oblongo cœruleo I. B. tom. 3. l. 25. 88.

Eryngium capitulis Psylli ex Sicilia Bocon. lc. & descr. 87.

Eryn-

Eryngium latifolium planum C. B. P.

Eryngium planum, latifolium, capitulum parvo I. B. *tom.* 3. *l.* 25. 88. coeruleo.

Idem flore albo C. B. P. *Var.* 386.

Eryngium Americanum foetidum. Itubrinamenfibus. ANN.

Hoc Eryngium prodiit, in floreo P. cheo Illustissimi Fagelii Seminibus, e rinamâ huc illatis, pedis altitudinem nunquam superans, & Eryngio mopumilo Casp. & Joh. Bauhini non m diffimile. Surinamenfibus audit Itub est fuga serpentum, eo quod Eryngii auram serpentes fugiant, nec eò loci germinat unquam reperiantur. Nitit diculis tenuibus, fibrosis, pallidè flavetibus, caulibus ternis quaternisvè virgatis, rectis, firmis, striatis, in frequenter ramos divaricatis quibus insident capitula oblonga echinata herbacea, Psyllii crassiusculis subtus aliquot rigidis aculeatis foliolis cumvallata; Intra echinos capitula absconduntur flosculi exigui, pallidi, conspicui, fatiscentes in semina parva, fortis paria. Folia circa radicem humiliter cumbunt, in orbem digesta, digiti longitudinem & latitudinem aliquando excedunt, molliora, obtusa, in ambitu crenata, singulis crenis in molleculas spinas

ERTINGIUM AMERICANUM FOETIDUM.

mentibus ; Ast quæ caulium genicul
intervalla adnascuntur, sunt rigidiora
cronata, & laciniata, marginibus pro
dius ferratis, & robustioribus aculeis
tis. Tota planta est nigrati fragrantis
ris, ad Coriandri recentioris folia acco
tis; Gustus verò acris, & subdulcis
salem volatilem, quem obtinet, repo
ab Americanis inter alexipharmaca
stantissima. In uteri vitiis tantæ efficac
ut solus odor, naribus exceptus, hys
passione correptas restituere valeat.

ERYNGIUM luteum, facie Cardui. S
mus Chrysanthemus C. B. P. 384. S
lutea I. B. tom. 3. l. 25. 84.

*Eryngium montanum minimum, capitulu
gno C. B. P. v. Cnicus.*

*Eryngium arvense, foliis serræ similibus C.
v. Ammi.*

* **E**RYSIMUM vulgare C. B. P. 100. Mori
218. Erysimum Tragi flosculis luteis,
muros proveniens I. B. tom. 2. l. 21.
ANN.

Erysimum polyceration vel corniculatum
B. P. 101. Erysimum alterum Matthioli
quis parvis, quibusdam Dentaria I. B.
2. l. 21. 864. ANN.

* Erysimum latifolium majus glabrum C.

101. *Moris. Hist. 2. 218. ANN.*

Erysimum montanum, *Irionis vulgaris folio*
λεπτομακροκέραλον Moris. Hist. 2. 219. Erysi-
um angustifolium majus C. B. P. 101. &
Rapistrum Italicum, *filiquis longissimis*
C. B. P. 95. ANN.

Erysimum Cereale & Theophrasti C. B. P. v.
Frumentum Saracenicum.

Esula vulgò ejusquè species. v. Tithymalus.

EVONYMUS vulgaris, *granis rubentibus C. B.*
P. 428. Evonymus multis : Aliis Tetra-
gonia I. B. tom. 1. l. 8. 202.

Evonymus latifolius C. B. P. 428. I. B. tom. 1.
l. 8. 202.

Evonymo adfinis Æthiopica semper virens,
fructu globoso scabro, foliis Salicis rigidis
ferratis. Lauro ferratæ odoratæ Stapelianæ
similis inodora Capitis Bonæ Spei Breyn.
Prodr. 42. Laurus non odorata, fructu glo-
boso Africana Sterbeeck Citricult. 248.

EUPATORIUM Cannabinum C. B. P. 320. Eu-
patorium adulterinum I. B. tom. 2. l. 14.
1065.

Eupatorium foliis Enulæ Cornuti 191.

Eupatorium Urticæ foliis Canadense, flore
Violaceo. Valeriana Urticæ folia flore Vio-
laceo Corn. 22. Moris. Umbell. 51.

Eupatorium veterum C. B. P. v. Agrimonia.

Eupa-

Eupatorium odoratum C. B. P. v. Agrim.

Eupatorium aquaticum Americanum
v. Chrysanthemum

Euphorbium Dodonæi Lobelii C. B. P.
thymalus.

* **E**UPHRASIA Officinarum C. B. P. 233.
Euphrasia I. B. tom. 3. l. 30. 432. Flo.
cœruleo purpurascete C. B. P. 134. A.

* Eadem flore ex luteo albicante C. B. P.
134. ANN.

* Euphrasia pratensis rubra C. B. P. 234.
Euphrasia parva purpurea I. B. tom. 3.
427. ANN.

* Euphrasia pratensis lutea C. B. P. 234.
Monspessulana lutea I. B. tom. 3. l. 30.
ANN.

F.

FABA C. B. P. 338. Faba, Cy.
leguminosa I. B. tom. 2. l. 17.
Faba, major, sive Bona major
Moris. Hist. 2. 83. Semine rubro
Moris. Hist. 2. 83. ex rubro purpurascete
P. Var. 388. ANN.

Eadem semine albo Moris. Hist. 2. 83. C.
Var.

Faba minor, seu equina C. B. P. 348.
Hist. 2. 84. Semine rubro Moris. Hist.

nigro C. B. P. *Var.* 338. ANN.
 Eadem semine albo *Moris. Hist.* 2. 83. C. B. P.
Var. 338. ANN.
Faba sylvestris, fructu rotundo atro C. B. P. v.
 Vicia.
Fagopyrum vulgò. v. Frumentum Saraceni-
 cum.

FAGUS C. B. P. 419. Fagus Latinorum: Oxya
 Græcorum I. B. tom. 1. l. 7. 217.
Fagus sepium I. B. v. Carpinus.

FERRUM equinum, siliquâ singulari C. B. P.
 349. *Moris. Hist.* 2. 117. Solea equina I. B.
 tom. 2. l. 17. 347. ANN.

Ferrum equinum, siliquâ multiplici C. B. P.
 349. *Moris. Hist.* 2. 118. ANN.

Ferrum equinum Germanicum, siliquis in
 summitate C. B. P. 346. Ferrum equinum
 capitatum seu comosum Columnæ *Moris.*
Hist. 2. 118. Ornithopodio affinis, vel potius
 Soleæ vel Ferro equino, Herba I. B. tom. 2.
 l. 12. 348.

Ferrum equinum Gallicum, siliquis in summi-
 tate C. B. P. v. Colutea.

FERULA major seu Fœmina *Moris. Umbell.*
 35. Ferula Fœmina Plinii C. B. P. 148. Fe-
 rula folio Fœniculi, semine latiore & rotun-
 diore I. B. tom. 3. l. 27. 43.

Q

Fe-

Ferula minor, tenuiore folio *Morif. Um.*

35. Ferulago tenuiore folio c. B. P.

Narthecium Theophrasti, Ferulago

I. B. tom. 3. l. 27. 44.

Ferula Tingitana, folio latissimo lucido

therl. Hort. Edinb. 119.

Eadem folio angusto lucido.

Ferula Libanotidis odorem & succum

dens, seu Panax Asclepium *Morif. Um.*

Libanotis Ferulæ folio & semine c.

158. Libanotis quibusdam, flore luteo

mine Ferulæ *I. B. tom. 3. l. 27. 41.*

* **F**ESTUCA graminea, glumis hirsutis c.

Gramen GrosMontbelgardenfium *tom.*

2. l. 18. 438. Spicis dispersis C. B. P. V.

Bromos vulgò. ANN.

* Eadem spicis in fasciculum comprehens

P. Var. 9. ANN.

* Festuca graminea, glumis vacuis c. B. P.

tom. 2. l. 18. 479. ANN.

* Festuca Avenacea sterilis elatior c. B. P.

gilops Matthiolo fortè *I. B. tom. 2. l. 18.*

ANN.

* Festuca utriculis lanugine flavescens

P. 10. Ægilops quibusdam aristis rec

sive Avena pilosa *I. B. tom. 2. l. 18.*

ANN.

Festuca altera, capitulis duris c. B. P. 10.

Festuca longissimis aristis, glumis variis

dicei coloris C. B. P. 10. Gramen Ægilops,
Bromoides Tabern. longissimis aristis I. B.
tom. 2. l. 15. 513.

FICUS communis C. B. P. 457. Ficus I. B. *tom.*
1. l. 1. 128. Fructu purpureo C. P. B. *Var.*
457.

Eadem fructu albo C. B. P. *Var.* 457.

Eadem fructu viridi C. B. P. *Var.* 457.

Eadem fructu cœruleo C. B. P. *Var.* 457.

Ficus nunquam maturescens *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 71.

Ficus foliis robustioribus & ramis erectiori-
bus.

Ficus humilis C. B. P. 457. Chamæficus I. B.
tom. 1. l. 1. 129.

FICUS Indica seu Opuntia major, folio spi-
nis longissimis & validissimis armato *Breyn.*
Prodr. 35.

Eadem folio minori, rotundiori & compres-
siori.

Ficus Indica seu Opuntia maxima, folio spino-
so, latissimo & longissimo.

Eadem folio spinoso longissimo & angusto.

Eadem folio oblongo media *Cat. Hort. Reg.*

Paris. 70. An Nocheznopalli seu Zopal-
nocheztli, in quo Coccus Indicus nascitur
Hernand. Hist. Mex. p. 78?

Eadem minor. Ficus Indica humilis C. B. P.

458. Ficus Indica minima, folio subro
Cat. Hort. Reg. Paris. 70.

FICOIDES, seu Ficus Aizoides Africana
 procumbens, triangulari folio, fructu
 mo eduli. Ficus Hottentottorum vul

Quas Plantas Clarissimus Paulus
 mannus in plantarum charactere n
 Kalia Africana, & peritissimus I
 Breynius in Centuriâ Chrysanthem
 zoidea, ac in Prodromo Chrysanthe
 miles, vulgus verò Asteres Aizoideo
 da triangularia appellant, placuit nu
 ducere sub titulo Ficoides, seu Ficus
 des Africanæ, ad cuius species veriùs
 tur accedere, quàm ad Kali, Chry
 mum, Asterem aut Sedum. Etenim
 omnium floribus subjicitur fructus, a
 dum Ficus Indicæ, vulgò Opuntia
 qui, cujuscunquè etiam sit magnitudo
 figuræ, includit pulpam succosam, d
 Ficui Indicæ similem, quamquàm
 te in fungosam aridam membranacea
 stantiam degenerantem & varios fer
 loculos describentem. Dispersuntur
 in *quinquè capsulares*, quarum du
 fructu pyriformi majori, quinque
 pyriformi minori, tres verò fructu
 culato: & *multicapsulares*, quarum
 est fructu majori, altera minori. Prim
 ctum maximum edulem Ficui simil

LUGDUNO-BATAVUS.

245

FICUS AIZOID. AFRIC. MAI. PROCUMB. TRIANG.
FOL. FRUCT. MAXIM. EDULI.

proferens, spargit ab radice crassâ fibro
pente multifquè fibratâ capillamentis
liculos multos, humi stratos, digitum
duos tresvè cubitum & ampliùs longos
cosos, ex viridi pallefcentes, penes ra
aliquando rubentes, ad quorum ge
exeunt folia bina ex adverso, digiti lo
dine & crassitie, triangularia, viridia,
lenta, cum totidem ex opposito ramuli
his aliis atque aliis, sustinentibus in ca
nibus fructuum rudimenta pyriformia
quangula, quinquè trigonis foliolis in
ribus multò minoribus circumvallata
tra quæ emicat flos stellæ vel solis
radiatus, Asteris flore amplior, ex mo
lis tenuibus numerosis petalis quasi
ad Solem aureo fulgore micantibus
structus, cingentibus multa concolor
mina farinacis flavescentibus apicul
nata, quorum medium occupant se
octovè cornicula ex luteo viridantia
bem diffusa. His marcescentibus, m
tur fructus, adæquans nonnunquam
vulgarem, viridis, pulposus, granis mi
simis, veluti in Icone incisi fructus
est, refertus, saporis dulcis aquosi ha
grati, summo umbilico quinquè stel
decussatis radiis inscripto, pulpâ ve
putrescente vel intensiori solis æstu in
gosam substantiam transeunte, quæ

scitur in quinque loculos, includentes semina exigua angulosa fusca. Luxuriat cum cæteris subsequenter hujus sortis locis maritimis aridis sabulosis ad Promontorium Bonæ Spei, ubi fructus tam à Belgis ibidem hospitantibus, quàm ab Indigenis Hottentottis esitantur. Hujus propagatio fit vel per avulsos ramulos terræ commissos, vel per radices, quas caulium genicula terræ proxima demittunt. Toto anno in Belgiâ viget & viret, ast præservanda est à brumæ injuriis. Conspicitur triplici florum colore, albo, purpureo, & flavo.

Eadem folio triangulari ensiformi.

Crevit ex seminibus Africanis in horto Dni Hemskerck, florum rariorum cultoris solertissimi. Priori omnibus notis respondet, exceptis foliis nonnihil brevioribus, ensem falcatum latiori dorso imitantibus.

Ficoides seu Ficus Aizoides Africana minor erecta, folio triangulari glauco, flore luteo. An Chrysanthemum Aizoides Africanum, triangulari folio minus, flore flavo *Breyn. Cent. 1. 165?* & Chrysanthemo similis Aizoides Africana media, triangulari folio, flore flavo *Ejusdem Prodr. 26?*

Partium exilitate neutiquam dispositione & formâ ab antè allatis differt: Frutescit cauliculis cubiti altitudine, rectis, te-

FICUS AIZOIDES AFRICANA MINOR ERECTA,
FOLIO TRIANGULO VIRIDI.

nuibus, lignosis, albentibus; Foliis
 plo brevioribus, digiti minimi cra-
 vix adæquantibus, glaucis, triangulis
 ribus intra quinque foliola luteis, ad
 expansis, superiore minoribus; His
 ciuntur fructus Avellanæ nuclei ma-
 dine, pyriformes, quinquanguli, succu-
 dulces, vetustate fungosi, tenaces, quæ-
 coriacei, in summo plani, quinis ste-
 decussatis radiis notati, claudentes in-
 dem oblongis loculis semina, pallidè
 scentia, angulosa, dura, exigua. In
 eadem, quâ superior, culturâ. Folioru-
 por observatur nunc falsus, nunc aquil-
 dus, prout fert ingenium foli, in quo
 tur.

Eadem triangulari folio viridi, flore intus
 reo, foris purpureo. An Chrysanthe-
 Africanum triangulari folio, flore ca-
Breynii Cent. 1. 164? & Chrysan-
 mo similis Aizoides Africana major, tri-
 gulari folio, flore carneo. Ejusdem
dr. 26?

Totâ æstate floret cum proximè
 scriptâ, cujus situm & figuram omni-
 imitatur; sed videtur paulò minor & ge-
 lior. Folia edit viridia, flores aureos in-
 extus purpurascens, eminus colorem
 dammodo incarnatum mentientes.

Eadem folio tereti procumbens flore pur-

FICUS AIZOIDES AFRICANA, FOLIO TERETI
PROCUMBENS, FLORE PURPUREO.

re. Chrysanthemum Aizoides Africana
 triangulari folio, flore purpureo *B.*
Cent. 1. 164. Chrysanthemo similis A
 des Africana minor, triangulari folio,
 purpureo *Breyn. Prodr. 26.*

Caliculis est infirmis, herbaceis, re
 nis, dodrantalibus; Foliis viridibus,
 tibus, angustis, gracilibus, digito long
 bus; Floribus purpureis; Coëteris an
 denti paribus.

Eadem flore coccineo.

Hæc à modo dictâ differt foliis non
 longioribus, & floribus elegantissimo
 cинеo colore comantibus, educata in h
 laudati Dni Heemskerck.

Eadem Neapolitana flore candido. Kali C
 fulæ minoris foliis C. B. P. 289. *Moris. H.*
 610.

Ficoides seu Ficus Aizoides Africana ma
 flore flavo, folio plano latiori. Chrysanthemum Aizoides Africanum primum seu
 tifolium *Breyn. Cent. 1. 160.* Chrysan
 mo similis Aizoides Africana major lat
 lia. Ejusdem *Prodr. 24. ANN.*

Hujus flori subjicitur fructus orbicula
 succulentus, dulcis, ex vetustate fungo
 candidus imâ parte convexus, summa
 nus, medio umbilico barbato, ex quo
 què stellatim decussatæ lineæ ad extrem
 ambitum ducuntur, dividentes fructum

LUGDUNO-BATAVUS.

253

FICUS AIZOID. AFRIC. FOL. PLAN. MINOR, MUL-
TICAUL. FLORE INTUS RUB. EXTUS INCARN.

quatuor cellulas, seminibus exiguis
pallidis refertas. Cætera satis curiosè
scripsit & depinxit laudatus Jacobus B
nius loco citato.

Eadem folio angustiori. ANN.

Omnibus partibus minor & grac
conspicitur.

Eadem minor multicaulis, flore intus rube
extus incarnato. ANN.

Spargit cauliculos numerosos succule
geniculatos, resupinos ab radice pallid
brosâ; Folia bina ex adverso, superior
multò minora, Portulacæ inter & Ha
folia media, incana bullataquè asper
perfusa; Flores densis in ambitu ba
lis radiatos, intus gratè rubentes, ex
incarnatos, serò & manè congenerum
tu clausos, medio verò die sole illu
to expansos, aspectu jucundissimo;
mina pallida exigua in fructu superiori
nore.

Ficoides seu Ficus Aizoides Africana, tri
gulari folio longissimo, fructu multica
lari, flore luteo major. Chrysanthem
Aizoides Africanum secundum sive ter
folium *Breyn. Prodr.* 161. Chrysanthem
similis Aizoides Africana major secunda
ve teretifolia Ejusdem *Prodr.* 26. A
Aizoides Capitis Bonæ Spei *Zanon. H
Bot.* 35.

Hanc eandem esse existimo, quam laudatus Breynius in *Prodr.* 25. nomine Chrysanthemi similis Aizoides Africanæ majoris, triangularifoliæ, flore luteo majore, descripsit. Etenim pro ratione foli, & ætatis, modò amplior & robustior, modò minor & gracilior observatur. Fructus amplitudine nunc Cerasum nunc Nucem juglandem æquat, succulentus, sub dulcis, in fungosam membranaceam substantiam transiens, communiter septendecim pluribus vel paucioribus oblongis membranaceis loculis favis apum similibus partitus, ex cujus summo ambitu eriguntur totidem radii fungosi fusci acuminati, duas tresvè uncias longi, effigiem Coronulæ exprimentes. Radix perennat, coliturquè veluti species superiores.

Eadem minor. Chrysanthemum Aizoides Africanum, triangulari folio, flore aureo *Breyn. Cent.* 1. 163. Chrysanthemo similis Africana major tertia, sive triangulari folio, flore aureo Ejusdem *Prodr.* 26.

Hæc antecedente minor profert fructus Cerasi magnitudinem vix excedentes, quindecim aut sedecim membranaceis loculis totidemquè radiis brevioribus (veluti semina Malvæ) in orbem junctis & in mucronatum capitulum terminantibus, constructos, quibus includuntur semina exigua dura

ra, angulosa, rufescentia. Reliqua
apud Breynium loco citato.

FICOIDES seu Ficus Americana, cereie
spinosa & angulosa. Cereus Peruanus,
fructu rubro Nucis magnitudinis
P. 485.

Eadem spinosior & angulosior.

FICOIDES seu Ficus Indica, longissimo
fimoquè folio, fructu longissimo, Mu-
rapioni dicta. Palma humilis, longis la-
foliis C. B. P. 507. Bananiera Pison
Bala Hort. Malab. tom. 1. 27. Musa
tom. 1. l. 1. 148. Mauz, Musa Alp
Plant. Egypt. 80. Dudaim Ludol-
c. 9.

Ficuum specie fructus Peruanus C. B. P.
po arborescens.

Filicula fontana major C. B. P. v. Adiant

Filicula fontana minor C. B. P. v. Adiant

* **F**ILIPENDULA vulgaris, an Molon
C. B. P. 163. Filipendula I. B. tom. 3.
189.

Filipendula montana, flore Pedicularie
v. Pedicularis.

* **F**ILIX ramosa non dentata florida C. B. P.
Filix floribus insignis I. B. tom. 3. l. 37.
Osmunda vulgò

Filix Indica, Osmundæ facie. *Bod. à Stap. in Theophr. 320. Sim. Paul. Quadrip. Bot. 302.*

Filix Polypodii facie *Mentz. pugill.*

Filix montana florida perelegans, seu Adiantum album floridum *Raji Cat. 109.*

Filix ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis *C. B. P. 357. Filix major & prior Trago, sive ramosa repens I. B. tom. 3. l. 37. 735.*

Filix ramosa minor, pinnulis dentatis *C. B. P. 358. Filix ramosa minor I. B. tom. 3. l. 37. 741.*

Filix non ramosa dentata *C. B. P. 358. Filix vulgo mas dicta, sive non ramosa I. B. tom. 3. l. 37. 737.*

Eadem non ferrata *C. B. P. Var. 358.*

Eadem in orbem, nidum avis exprimentem, excrescens.

Filix mas non ramosa, pinnulis angustis raris profundè dentatis *Ger. emac. Filix mollis sive glabra, vulgari mari non ramosæ accedens I. B. tom. 3. l. 37. 738.*

Filix mas non ramosa, pinnulis latis auriculatis spinosis *Ger. emac.*

Filix non ramosa, petiolis tenuissimis, & tenuissimè dentatis *C. B. P. 358.*

Filix saxatilis, foliis non ferratis *C. B. P. 358. Filix minor non ramosa I. B. tom. 3. l. 37. 740.*

Filix palustris, seu aquatica. *Raji Cat. 108.*

R

Filix

Filix saxatilis ramosa, nigris maculis punctata
C. B. P. 358.

Filix saxatilis, caule tenui fragili. Raji
108. An Filicula Alpina crispa C. B. P.

*Filix querna C. B. P. 358.

*Filix Polypodium dicta. Polypodium
re C. B. P. 359. I. B. tom. 3. l. 37. 746.

Filix aculeata major C. B. P. 358.

Flammula I. B. v. Ranunculus.

Flos Africanus ejusque species C. B. P.
getes.

Flos Mexicanus ejusque species I. B. v.
bilis Peruviana.

Flos Ambervalis vulgò. v. Polygala.

Flos Cardinalis Barberini Column. v. Ranunculus.

Flos cuculi ejusque species C. B. P. v. Lycopodium.

Flos Constantinopolitanus I. B. v. Lychium.

Flos Passionis ejusque species vulgò. v. Cuculus.

Flos clitorius Breyn. v. Clitorius flos.

FOENICULUM vulgare Germanicum
147. Moris. Umbell. 3. Foeniculum vulgare
minus, acriori & nigriori semine I. B. tom.
l. 27. 2.

Idem foliis subnigricantibus C. B. P. Var.

Foeniculum vulgare Italicum, semine
go gustu acuto C. B. P. 147.

Foeniculum foliis atro-rubentibus S.

Hort. Edinb. 122. An *Foeniculum* foliis subnigrantibus C. B. P. *Var.* 147?

Foliorum summitates atro-rubescunt, semina sunt angusta & longiora, coetera congeneribus respondent. Germinavit ex seminibus Africanis.

Foeniculum dulce C. B. P. 147. *Moris. Umb.* 3.

Foeniculum vulgari simile, dulce I. B. *tom.* 3.

l. 27. 4. *Foeniculum dulce, majori & albo* femine *ibid.*

Foenum Burgundiacum vulgò. v. *Medica.*

FOENUM Græcum sativum C. B. P. 348. *Moris. Hist.* 2. 166. I. B. *tom.* 2. *l.* 17. 363. ANN.

Foenum Græcum sylvestre C. B. P. 348. *Fœ-*

num Græcum sylvestre Dalechampii I. B.

tom. 3. *l.* 17. 365. *Foenum Græcum sylve-*

stre *μονοήμερον*, filiquâ brevior & latior

Moris. Hist. 2. 166. ANN.

dem minus Arabicum. ANN.

Exilitate partium à superiori differt. Accepimus à Dno Iacobo Bobarto, ad quem inter alia ex Arabiâ erat missum.

Foenum Græcum sylvestre I. B. v. *Astragalus.*

Fontalis seu Fontinalis I. B. v. *Potamogeton.*

FRAGARIA vulgaris C. B. P. 326. *Moris. Hist.*

2. 186. *Fragaria ferens fraga rubra* I. B.

tom. 2. *l.* 17. 394.

adem fructu albo C. B. P. 326. *Fragaria ferens*

fraga alba I. B. *tom.* 2. *l.* 17. 394.

Eadem fructu parvi Pruni magnitudine C.

227. *Moris. Hist. 2. 186.*

Fragaria fructu rotundo suavissimo, flore

plici *Cat. Hort. Reg. Paris. 72.*

Fragaria foliis hispidis C. B. P. 327.

Fragaria flore luteo C. B. P. 327.

Fragaria Virginiana, fructu coccineo M.

Hist. 2. 186.

Fragaria sterilis C. B. T. 327. Fragaria

fragifera, vel non vesca I. B. tom. 2. l. 17.

Fragaria sterilis seu minimè vesca h.

minimè incana *Moris. Hist. 2. 186.*

Fragaria Pentaphylli fructu Moris. Hort.

v. *Pentaphylloides.*

Fragaria Pentaphylli fructu Moris. v. Pe

phylloides.

FRANGULA Matth. Alnus nigra bacc.

C. B. P. 428. I. B. tom. 1. l. 5. 560.

FRAXINELLA, sive Dictamnus albus

gò C. B. P. 222. Fraxinella, Officinis D.

mnus I. B. tom. 3. l. 30. 494. elatior, ob

giore spicâ saturatiore, foliis nigricant

C. B. P. Var. 222. Floribus purpureis.

Eadem floribus albis. Fraxinella niveo

Clus. Hist. Rar. Plant. l. 1. 100.

Fraxinella, sive Dictamnus albus humilio

viore spicâ, flore & foliis dilutioribus

pureis. C. B. P. Var. 222. An Fraxinella

nor purpurea Belgarum *Cat. Hort. Reg. Paris.* 72?

Eadem floribus albis.

FRAXINUS excelsior C. P. B. 416. Fraxinus
vulgatior I. B. tom. 1. l. 8. 174.

Fraxinus Alepensis.

Superiori minor & humilior est, foliis-
què rotundioribus. Transmisit Dnus Wat-
sius ex Angliâ,

FRITILLARIA præcox purpurea, variegata
C. B. P. 64. *Moris. Hist.* 2. 402. Meleagris
sive Fritillaria saturatior & dilutior I. B. tom.
2. l. 19. 681.

Fritillaria polyanthos flavo viridis C. B. P. 64.
Moris. Hist. 2. 403.

Fritillaria ramosa C. B. P. 64.

Fritillaria flore magno pleno C. B. P. 64. *Mo-
ris. Hist.* 2. 403.

Fritillaria umbellifera C. B. P. 64.

Fritillaria alba præcox C. B. P. 64. Fritillaria
alba altera I. B. tom. 2. l. 19. 684.

Fritillaria alba variegata C. B. P. 64.

Fritillaria serotina atro-purpurea C. B. P. 64.

Fritillaria serotina, floribus ex flavo virenti-
bus C. B. P. 64. Meleagris sive Fritillaria
aquitana, reflexis oris I. B. tom. 2. l. 19. 683.

Eadem flore pleno *Cat. Hort. Reg. Paris.* 72.

Fritillaria Isabella dicta, floribus ex pallidè
rubicundo-virentibus.

Fritillaria flore sulcato & anguloso obliquo
puniceo.

Fritillaria Indica maculato caule *Viperina*
Et Cat. Hort. Reg. Paris. 73.

Fritillaria flava, rubris maculis distincta
64.

Fritillaria angustifolia lutea variegata, m
flore C. B. P. 64. *Moris. Hist. 2. 403.*

Fritillaria flore minore C. B. P. 64. *Mele*
siue *Fritillaria Pyrenæa*, flore minore
tom. 2. l. 19. 683.

Fritillaria minima pluribus floribus C. B. P.

Fritillaria polyanthos non descripta *Su*
Moris. Hist. 2. 403.

Fritillariarum variæ species, florum colo
magnitudine insignes, vario è fatu p
Etæ.

Fritillaria crassa *Prom. Bonæ Spei St*
v. *Apocynum.*

FRUMENTUM Indicum Mays dictum
P. 25. *Triticum Peruvianum* album
gum *l. B. tom. 2. l. 18. 454. Tlaolli* seu Ma
Rech. Hist. Mexic. 242. ANN.

Idem granis rufescentibus C. B. P. *Var. 26. A*

Idem granis crocantibus C. B. P. *Var. 26. A*

Idem granis nigricantibus C. B. P. *Var. 26. A*

Idem granis cœruleis *Cat. Hort. Reg. P*
73. ANN.

Idem granis variegatis *Cat. Hort. Reg. Paris.*
73. ANN.

Frumentum Indicum Mays dictum, alterum
C. B. P. 26. I. B. tom. 2. l. 18. 455. ANN.

FRUMENTUM Saracenicum Matth. Erysi-
mum Cereale *C. B. P. 26* Fagotriticum. *I. B.*
tom. 2. l. 23. 393. Fagopyrum vulgò. ANN.

Frumentum Saracenicum alterum, Convol-
vuli modo scandens, semine triangulo mi-
nori nigro. *Moris. Hist. 2. 590.* Convolv-
lus minor, semine triangulo *C. B. P. 295.*
Helxine semine triangulo *I. B. tom. 2. l. 15.*
157. ANN.

Idem maximum Americanum. ANN.

Amplitudine antedictum vel sextuplo
superat, cœteroquin convenit.

Frutex Pavoninus Breyn. v. Crista Pavonis.

FUMARIA filiquosa semper virens *Cornuti*
Hist. Canad. 57. Moris. Hist. 2. 261. ANN.

Fumaria filiquosa bivalvis, radice fibrosâ, la-
tifolia perennis humilior sine claviculis, flo-
realbo *Moris. Hist. 2. 260.*

Fumaria claviculis donata *C. B. P. 143. Moris.*
Hist. 2. 260. Fumaria cum capreolis *I. B.*
tom. 3. l. 26. 204.

Fumaria lutea *C. B. P. 143.* Fumaria lutea
montana *Park. Moris. Hist. 2. 260.* Fuma-

ria, quæ Split dicitur *I. B. tom. 3. l. 26. 204.*
ANN.

Fumaria bulbosa, radice cavâ major *C. B. P.*

Fumaria tuberosa major, radice cavâ *Morif. Hist. 2. 261.*

Fumaria bulbosa, radice
vâ, flore purpurascens *I. B. tom. 3. l. 204.*

Eadem flore albo *C. B. P. Var. 261. I. B. tom. 3. l. 26. 204.*

Fumaria bulbosa, radice non cavâ major *C. B. P.*

P. 262. Fumaria tuberosa minor, radice

non cavâ *Morif. Hist. 2. 261.* Fumaria

bulbosa, radice solidâ, calcari & folio cristato

I. B. tom. 3. l. 26. 205.

Eadem flore albo. *Eyst.*

*Fumaria bulbosa, radice non cavâ minor *C. B. P.*

P. 144.

*FUMARIA Officinarum & Diosc. *C. B. P. 143.*

Morif. Hist. 2. 261. Fumaria vulgaris

folia, siliquis curtis non bivalvibus *Morif. Hist. 2. 261.*

Fumaria vulgaris *I. B. tom. 3. l. 26. 201.*

ANN.

Eadem circa Monspelim nascens, foliis

nuissimis, floribus albis *C. B. P. Var. 261. AN.*

Fumaria minor tenuifolia *C. B. P. 143.* Fumaria

vulgaris minor tenuifolia *Morif. Hist. 2. 261.*

Fumaria minor, sive tenuifolia *furcata*

et I. B. tom. 3. l. 26. 203. ANN.

- FUNGUS porosus C. B. P. 370. Fungus rugosus, vel cavernosus, sive Merulius niger & albus *I. B. tom. 3. l. 40. 836.*
- *Fungus orbiculatus exalbidus, pratenfis C. B. P. 370. Fungus D. Georgii, coloris exalbidum cum paucâ flavitie, esculentus pratenfis *I. B. tom. 3. l. 40. 824.*
- *Fungus semicircularis durus Merett *P. Rer. Nat. Brit. 42.*
- *Fungus pileo lato orbiculari candicante C. B. P. 370. Fungus piperatus albus, lacteo succo turgens *I. B. tom. 3. l. 40. 825.*
- *Fungus pileo lato longissimo, pediculo variegato C. B. P. 371. Fungus longissimo pediculo candicans, sed maculatus & esculentus *I. B. tom. 3. l. 40. 826.*
- *Fungus albus, pileo inverso *I. B. tom. 3. l. 40. 847.*
- *Fungus minor flavescens, infundibuli formâ C. B. P. 373. Fungi infundibulum referentes, flavescences, perniciosi *I. B. tom. 3. l. 40. 847.*
- *Fungus angulosus & velut in lacinias sectus C. B. P. 371. Fungus luteus sive pallidus, Chantarelle dictus, se contorquens, esculentus *I. B. tom. 3. l. 40. 832.*
- *Fungus membranaceus, auriculam referens sive Sambuccinus C. B. P. 372. Fungus Auriculæ Iudæ, coloris ex cineraceo nigricantis, perniciosus, in Sambucci caudice nascens *I. B. tom. 3. l. 40. 840.*

- *Fungus Lariceus, aurei coloris C. B. P. 372.
Fungus Laricum maximus, luteus, esculentus I. B. tom. 3. l. 40. 836.
- *Fungus Ceraforum imbricatim alter alter natus, variegatus C. B. P. 372. Fungus Ceraforum, coloris varii perniciosus I. B. tom. 3. l. 40. 848.
- *Fungus Coryleus orbicularis C. B. P. 372. Fungus sub Corylis, orbicularis figuræ I. B. tom. 3. l. 40. 842.
- *Fungus Salignus, Lichenis formâ variegatus C. B. P. 372. Fungus Salicum, coloris varii perniciosus I. B. tom. 3. l. 40. 842.
- *Fungus putridis arborum ramis inhaerens plurimis simul cohærentibus C. B. P. 372. Fungus Spongia lignorum dictus I. B. tom. 3. l. 40. 842.
- *Fungus durus arborum, sive igniarius P. Th. 1323.
- *Fungus Casearius Sterbekin. *Theatr. Fung.*
- *Fungus oris laceris, & in lacinias divisus C. B. P. 373.
- *Fungus clypeiformis major C. B. P. 373. Fungi multi, ex uno pede clypeiformes, & rubri I. B. tom. 3. l. 40. 835.
- *Fungi dumetorum, ex uno pede prodeuntes C. B. P. 374. Fungi multi, ex uno pede perniciosi I. B. tom. 3. l. 40. 835.
- *Fungus foetidus, penis imaginem referens C. B. P. 374.

C. B. P. 374. Fungus Phalloides *I. B. tom. 3.*
l. 40. 843.

*Fungus rotundus orbicularis C. B. P. 374.

*Idem capitis pueri magnitudine C. B. P. *Var.*
 375. Fungus maximus rotundus pulveru-
 lentus, dictus Germanis Pofist *I. B. tom. 3.*
l. 40. 848.

*Fungus niger, culicis figuram referens C. B. P.
 375. Fungus pulverulentus, dictus Crepi-
 tus Lupi *I. B. tom. 3. l. 40. 848.*

G.

Gale *I. B. v. Rhus.*

GALEGA vulgaris C. B. P. 352. *Moris. Hist.*
2. 91. tom. 2. l. 17. 342. Floribus coeruleis
C. B. P. Var. 352.

Eadem floribus penitus candicantibus C. B. P.
Var. 352.

Galega Ægyptiaca, filiquis propendentibus
 longissimis & angustissimis. Galega Ægy-
 ptiaca, filiquis articulatis C. B. P. 352. Sesban-
 Ægyptiacum, seu Securidaca Ægyptiaca ar-
 ticulata, *Park. Moris. Hist. 2. 79.* Taxaco
 quamoclit Indicum *I. B. tom. 1. l. 11. 384.*
 ANN.

Galega nemorensis verna & huic affines *I. B. v.*
 Orobus

Ga-

Galega adfinis Sophora dicta C. B. P. v. Ser

Galeopsis ejusque species I. B. v. Lamium

Gallitrichum ejusque species I. B. v, Ho
num.

* **GALLIUM** luteum C. B. P. 335. Gall
verum I. B. tom. 3. l. 36. 720.

Gallium album latifolium, vel Mollugo
tana angustifolia C. B. P. 334.

Gallium montanum latifolium, ramo
Mollugo montana latifolia, ramosa C.
334 Rubia sylvatica lævis I. B. tom. 3.
716.

* Gallium palustre album C. B. P. 335. Gall
album I. B. tom. 3. l. 36. 721.

* Gallium palustre, luteo flore C. B. P. in Tab
433. Gallium flore pallido. I. B. tom.
36. 721.

Gallium album minus C. B. P. 335.

Gallium latifolium, Cruciata quibusdam,
luteo I. B. v. Rubia.

Gelseminum Indicum flavum, odoratissim
Ferr. v. Jasminum.

Gelseminum Ederaceum Indicum Corn. v.
matis.

Gelseminum Indicum maximum, flore phœn
Ferr. v. Clematis.

GENISTA - Spartium spinosum majus
mum, flore luteo C. B. P. 394. Aspa

tus secunda Monspeliensis I. B. tom. I. l. II.

402.

Genista-Spartium spinosum foliis Polypodii
C. B. P. 394. Agul & Alhagi Arabibus,
Planta spinosa Mannam resipiens I. B. tom.
I. l. II. 405.

Genista spinosa major, brevibus aculeis C. B. P.
394.

Genista spinosa major, longioribus aculeis C.
B. P. 394. Genistellæ spinosæ affinis, Ne-
pa quibusdam I. B. tom I. l. II. 400.

Genista spinosa minor Germanica C. B. P. 395.

Genista aculeata foliosa I. B. tom. I. l. II.
401.

Genista minor Asphalathioides C. B. P. 395.

Genistella minor Aspalathioides I. B. tom. I.
l. II. 401.

Genista Hispanica, floribus luteis amplis, se-
minibus Lenti similibus. Spartium arbore-
scens, seminibus Lenti similibus C. B. P. 396.

Genista juncea I. B. tom. I. l. II. 305.

Genista Hispanica floribus luteis parvis mono-
spermos, semine reni simili C. B. P. 396.

Spartium Hispanicum, lobis rotundiuscu-
lis, flore luteo I. B. tom. I. l. II. 397.

Eadem floribus candidis. Spartium tertium,
flore albo C. B. P. 396. Spartium Hi-
spanicum, flore candido I. B. tom. I. l. II.
398.

Ge-

Genista argentea *I. B. tom. 1. l. 11. 398.*

Genista tinctoria Germanica. *C. B. P. 395.*

ctorius flos *I. B. tom. 1. l. 11. 391.*

Genista humilis, seu Chamægenista foliis
nista vulgaris *C. B. P. 395.* Genistella
I. B. tom. 1. l. 11. 193.

Eadem foliis lucidis glabris.

Genista humilis, seu Chamægenista faginæ
C. B. P. 396. Genistella herbacea, sive
mæspartium *I. B. tom. 1. l. 11. 393.*

*Genista angulosa & Scoparia *C. B. P. 395.*
nista angulosa trifolia *I. B. tom. 1. l. 11. 393.*

GENISTA arborescens Africana, Sty-
folio. *Breyn. Prodr. Cœruleo flore.*
bor filiquosa Africana Genistæ fer-
Barth. Act. Hassn. Ann. 1673. observ.
Crotalaria arbor Africa Styracis folio
incano, flore cœruleo *Amm. Charact. Pl.*
241.

Malo Cotoneæ seu Styraci arbori
lis videtur hæc [Genista; Radice lignosa
bâ, caudice recto pollicem crassiori, lig-
so, cortice in viridi pallescente, ram-
frequentibus vimineis obsequiosis ad ca-
mina incanis, quos denso alternatoque
dine ambiunt folia Styracis facie rotun-
crassiuscula, candidâ sericeâ lanugine pu-
scentia, intra quæ erumpunt flores pleni

LUGDUNO-BATAVUS. 271

GENISTA ARBORESCENS AFRICANA STYRACIS
FOLIO, FLORE COERULEO.

quæ singulares rarò] bini ternivè pap
 nacei cœrulei, exiguis fulti petiolis
 excipiunt filiquæ bivalves breves ro
 diusculæ incanæ, claudentes semina
 formia fusca depressa. Gaudet irrigui
 Promontorium Bonæ Spei. Vires æm
 tur Genistæ vulgaris.

GENISTÆ Affinis Arbor Africana mo
 spermos, flore cœruleo, foliis pinn
 Genista - Spartium cœruleum African
 foliis pinnatis *Breyn. Prodr.* 36. Ge
 Ruteri vulgò.

In tesquis & marginibus rivulorum
 montorii Bonæ Spei luxuriat hic frutex
 cum Genista - Spartio cœruleo *Æthio*
Breyn. Cent. 1. 66. à quo & facie & cre
 di modo non multum abludit. Folia
 fert in principio terna uni petiolo adsta
 in progressu verò pinnata viridia ang
 asperiuscula, ramulos densissimo ordine
 stientia, quibus & ab imo ad summum
 quæ circumstant flores coacervatim pap
 nacei pallidè cœrulei, prodeuntes ex
 culis oblongis membranaceis quinqu
 subhirsutis, cludentibus singulis fer
 unicum nigrum lucidum reniforme, te
 fuscâ membranâ, quasi peculiari siliculâ
 ctum.

LUGDUNO-BATAVUS.

273

GENISTÆ AFFINIS ARBOR AFRICANA MONO-
SPERMOS FLORE COERUL. FOL. PINNATIS.

GENTIANA major lutea C. B. P. 187.
Gentiana vulgaris major, Ellebori albi
I. B. tom. 3. l. 31. 520.

Gentiana Asclepiadis folio C. B. P. 187.
Gentiana folio Asclepiadis vulgò creditur
tom. 3. l. 31. 523.

* Gentiana Cruciata C. B. P. 188. Gentiana
minor, seu vulgi Cruciata I. B. tom. 3. l. 31.

Gentianella Alpina angustifolia, magniflora
C. B. P. 187. Gentiana Alpina magniflora
I. B. tom. 3. l. 31. 523

* Gentianella Alpina verna major C. B. P.
Gentianula quæ Hippion I. B. tom. 3. l. 31. 527.

* Gentiana angustifolia autumnalis major
P. 188. Gentianæ species, Calathiana quædam,
radice perpetuâ sive palustris I. B. tom. 3. l. 31. 524.

* Eadem minor floribus ad latera pilosis
P. 188. Gentianula lanugine ad singula
foliorum floris lacinias donata, flore quædam
partito I. B. tom. 3. l. 31. 525.

Gentiana palustris latifolia flore purpurea
C. B. P. 188. Alisma folio glabro C. B. P.
520. Gentiana punctato flore subcælesti
Pennæi I. B. tom. 3. l. 31. 528.

Gentiana folio convuluto I. B. v. Lychma

GERANIUM Africanum arborescens
folio rotundo, Carlinæ odore.

LUGDUNO-BATAVUS.

275

GERANIUM AFRICANUM ARBORESCENS, IBISCE
FOLIO ROTUNDO, CARLINÆ ODORE.

Ad radices montis Tabulati Pro-
 torii Bonæ Spei frutescit hoc Ge-
 radice lignosâ albente crassâ fibrosâ
 le rotundo hirsuto tres & amplius
 des alto, aliquando statim à radice
 plures ramos diviso, quibus ex longi-
 sis crassisquè petiolis circumstant
 ambitu rotunda, leviter crenata, mo-
 na modò sinuata, crassiuscula mollis-
 ta Ibisci instar, dilutè virentia, odor-
 grantis Carlinam æmulantis; Cir-
 gia prodeunt palmares ramuli, qui
 oblongis quinquifidis subhirsutis
 infident flores ex incarnato rubente
 pli, quinque petalis constructi, duobus
 rioribus amplioribus galeæ instar ere-
 nisquè sanguineis in basi striis insigni-
 bus inferioribus minoribus quasi la-
 prominentibus è medio aliquot stam-
 cum stilo longiori in quinque sangui-
 lingulas divaricato. His defluxis,
 dunt more congenerum quinque
 membranaceæ, arctè sibi invicem at-
 & in longum acutum mucronem ter-
 tes, ex quibus, præ maturitate debi-
 bus, profiliunt totidem semina oblon-
 dicea, rostrata, contorta, incanâ la-
 pubescentia, cum stilo intermedio
 vo, è cuius apici semina hærent.
 planta imprimis folia subacrem &

ticum præbent saporem cum levi visciditate; Hinc reponi meretur inter carminantia & emollientia. Folia leviter exiccata non infelici effectû adjeci clysteribus contra ventris tormina, passionem Colicam, Iliacam, Nephriticam præsertim Calculum, cœterasquè Urinæ difficultates. In Belgia de facili propagatur seminibus, ramulis, & viviradicibus.

Geranium Africanum frutescens, Malvæ folio laciniato odorato. Geranium Malvæ folio odoratum, flore purpurascens Capitis Bonæ Spei. *Breyn. Prodr. p. 36.*

Fundit radicem crassam candicantem fibrosam, cauliculos cubitales geniculatos nodosos resupinos, folia digitalibus petiolis Malvæ paria subrotunda angulosâ crenata undulata nonnunquam laciniata odoris grati & aromatici, flores facie antecedentis, aut paulò minores sex septemvè plures vel pauciores quasi in capitulo seu umbellâ simul junctos, cui subjiciuntur quinque in orbem radiata hirsuta subrotunda foliola ambitu rubente & in exiguum molleculum mucronem abeunte. Sequuntur semina superiora tenuiora. Tota planta pilosâ hirsutaquè facie est, gaudens cum præcedenti iisdem natalibus culturâ & virtutis remissiori.

Geranium Africanum Coriandri folio, floribus incarnatis, majus. Geranium Æthiopicum, Myrrhidis folio tertium, flore magno striato *Breyn. Cent. 1. 129.*

Idem flore incarnato minus.

Hujus & præcedentis folia prima seminalia sunt subrotunda, brevia, modicè laciniata, in progressu verò elongantur, & frequentioribus segmentis dissecantur, quæ in hac minori specie apparent tenuiora angustiora haud quaquam hirsuta. Flores prodeunt paulò minores, semina cœteraque omnia superiori simillima.

Geranium Africanum, Betonicæ folio laciniato & maculato, floribus incarnatis.

Prioribus accedit & hæc species, cujus folia inferiora radici proxima referunt effigiem foliorum Betonicæ, quæ verò in progressu cauli adstant, sunt majora, profundioribus laciniis incisa, & medio sinu ex fusco rubenti maculâ insignita, aliquando omnino viridia. Cauliculos spargit sphithamum longos geniculatos, ex viridi nonnihil rubentes, resupinos, sustinentes flores pentapetalos, in carnatos Geranio Africano Coriandri folio majori perquàm similes, quos excipiunt semina quina rostellis contortis lanuginosis, ritu priorum & subsequentium.

280 HORTUS ACADEMICUS
GERANIUM AFRICANUM, CORIANDRI FOLIO
RIBUS INCARNATIS MINUS.

GERANIUM AFRICANUM BETONICÆ FOLIO MA-
CULATO ET LACINIATO.

Geranium Africanum, Alchimillæ
folio, floribus albidis.

Cauliculos emittit bicubitales ex
rubentes pilosos geniculatos procumbentes
& ex singulis nodis novas radículas de-
tentes, quibus ex longis pediculis ad-
folia rotunda, Alchimillæ foliis non
paria, pilosa, in viridi candicantia,
diâ sui parte nonnunquam maculata
ambitu crenata & laciniata; Flores
multos simul junctos superioribus
ciebus minores albidos & pro inge-
foli & climatis in pallido vel flaves-
tes vel in carnatos, subsequenter
minibus quinque dispositione & facie
generum.

Geranium Americanum, noctu olens,
ce tuberosâ, triste Cornuti. 109. *Morif.*
2. 517.

Geranium Africanum, noctu olens, ra-
tuberosâ, foliis Pastinacæ incanis lan-
nosius latioribus, flore pallidè flavesce-
Geranium Æthiopicum, noctu olens
dice tuberosâ, foliis Myrrhidis latioribus
Breyn. Cent. 1. 126.

Idem foliis angustioribus *Breyn. Cent.*
127.

GERANIUM AFRICANUM, ALCHIMILLÆ HIRSUTO
FOLIO, FLORIBUS ALBIDIS.

Geranium Africanum, noctu olens tuberosum
& nodosum, Aquilegiæ foliis. Geranium
Æthiopicum noctu olens, radice tuber-
osa, Aquilegiæ foliis. *Breyn. Cent. 1. 127.*

Constat radice longâ tuberosâ crassâ
nihil lignosâ ex viridi pallescente, sub
aliquot fibris capillatâ; Caulibus sursum
bipedalibus cineraceis glabris lignosis
genicula crassescens; Foliis utrinque
oppositis, Aquilegiæ facie, crassiusculis
segmentis tamen paucioribus & amplius
dissectis; Floribus pentapetalis in
bellam congestis, nunc sursum nunc deorsum
spectantibus, coloris buxci, non
quam obsolete purpurascens vespere
auroram usque jucundissimum spirantem
odorem; Seminibus antecedentium
quinis rostratis, candidâ sericeâ modice
nugine pubescentibus. propagatur semini-
bus, tuberibus seu geniculis.

Geranium Bartrachiodes, Gratia Dei Geranium
norum C. B. P. 318. Geranium Batrach-
iodes *Morif. Hist. 2. 514. I. B. tom. 3. 113.*
Grandius floribus cœruleis C. B. P. 318.

Idem floribus albis C. B. P. *Var. 318.*

Idem flore variegato C. B. P. 318. Ex
cum cœruleo colore varium *I. B. tom. 3. 476. Morif. Hist. 2. 514.*

Geranium Batrachiodes odoratum C. B. P.

LUGDUNO-BATAVUS. 285

GERANIUM AFRICANUM, NOCTU OLENS, TUBEROSUM ET NODOSUM, AQUILEGIÆ FOLIIS.

Morif. Hist. 2. 514. Geranium Batrachoides
longius radicum, odoratum *I. B. tom. 3. l. 30. 477.*

Geranium Batrachoides, folio Aconiti c.
318. *Morif. Hist. 2. 514.* Geranium Batrachoides aliud, folio Aconiti nitente C.
I. B. tom. 3. l. 30. 476.

Geranium sanguineum, maximo flore C.
318. *Morif. Hist. 514.* Geranium sanguineum sive Hæmathodes, crassa radice
tom. 3. l. 30. 478. Cauliculis procumbentibus.

Idem cauliculis erectis, flore minore.

Discrepat ab antecedente cauliculis
assurgentibus, foliis obscure virentibus
floribus paulo minoribus.

Geranium Phœum sive fuscum, petalis reflexis
Morif. Hist. 2. 515. Geranium monanthum fuscum C.B.P. 318. Geranium phœum
flore reflexo *I. B. tom. 3. l. 30. 477.* Folio
maculato.

Idem folio non maculato.

Geranium phœum seu fuscum, petalis reflexis
seu planis *Morif. Hist. 2. 515.* Geranium phœum
phœo sive pullo flore Clusii *I. B. tom. 3. l. 30. 477.* Folio non maculato.

Idem folio maculato.

Geranium radice Asphodeli *Morif. Hist. 2. 515.* Geranium nodosum C. B. P. 318.

ranium magnum, folio trifido *I. B. tom. 3. l.*

30. 478.

Geranium tuberosum majus *C. B. P. 318. Moris. Hist. 2. 516.* Geranium tuberosum *I. B. tom. 3. l. 30. 474.*

Geranium argenteum Alpinum longius radicatum Ponæ *Moris. Hist. 2. 516. C. B. P. 318.*

Geranium argenteum montis Baldi *I. B. tom. 3. l. 30. 474.*

Geranium Romanorum versicolor, sive striatum *Park. Moris. Hist. 2. 516.*

Geranium Muscoviticum purpureum *Park. Moris. Hist. 2. 516.*

Geranium foetidum *Park. Moris. Hist. 2. 517.*

Geranium Africanum, Uvæ crispæ folio, cauliculis procumbentibus, floribus exiguis rubellis.

Germinavit nobis ex feminibus Africanis hæc pusilla Geranii species, radice tenui fibrosâ, cauliculis plurimis ramosis gracilibus geniculatis humi jacentibus, pronâ parte rubicundis, supinâ viridantibus, singulis geniculis adstant folia, interdum bina è regione, glabra lætè viridia, Uvæ crispæ foliis similia, sed quadruplo minora & frequentius incisa. Penes horum exortum exit tenuis pedunculus circiter longitudine digiti, sustinens flosculos unum tres quatuorvè exiguos pentapetalos rubellos, quibus singulis subjicitur

tur pediculus tenuis cum caliculo quin
partito, includente vasculum pentaco
rostratum, in quo quina semina exigua
re congenerum.

Geranium annuum minus Batrachiodes
hæmicum purpuro-violaceum *Moris.*

2. 511. ANN.

*Geranium folio Malvæ rotundo majus
Hist. 2. 511. Geranium folio Malvæ ro
do C. B. P. 318. Geranium folio ro
multum serrato, sive columbinum I. B.

3. l. 30. 473. ANN.

*Idem minus C. B. P. *Var.* 318. ANN.

Geranium columbinum majus, foliis imis
gis usquè ad pediculum divisis *Moris.*

2. 511. ANN.

*Idem flore minore cœrulescente *Raji*
130. ANN.

*Geranium columbinum tenuius lacinia
C. B. P. 318. *Moris. Hist.* 2. 512. ANN.

*Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Parl.*
ANN.

Idem flore pediculo longissimo insistente
Moris. Hist. 2. 512. Geranium columbinum
diffectis foliis, pediculis florum longiss
Raji Cat. 130. ANN.

Geranium annuum rotundifolium montan
faxatile lucidum *Moris. Hist.* 2. 512. G
nium lucidum faxatile C. B. P. 318. G
nium lucidum I. B. *tom.* 3. l. 30. 481. A

GERANIUM AFRICANUM, UVÆ CRISPÆ FOLIO,
FLORIBUS EXIGUIS RUBELLIS.

Geranium Althææ folio C. B. P. 310. *Hist.* 2. 512. Geranium Malvaceum
tom. 3. l. 30. 472. Floribus dilutiùs ru-
tibus. ANN.

Idem floribus saturatiùs rubentibus. ANN.
Flores saturatiori & lætiori rubore
dent, folia verò virore dilutiore, lac-
què profundioribus donata sunt.

Geranium minimum procumbens, foliis
tonicæ *Moris. Hist.* 2. 512. Geranium
lum supinum maritimum, Betonicæ
Raji Catal. 131. ANN.

Geranium Cicutæ folio, acu longissimâ
319. ANN.

Geranium latifolium annuum, cœrule-
re, acu longissimâ *Moris. Hist.* 2.

Geranium latifolium longissimâ acu
319. Geranium speciosum annuum, l-
simis rostris, Creticum I. B. tom. 3.
479. ANN.

* Geranium Cicutæ folio, moschatum
319. Geranium moschatum *Eyst.*
Hist. 2. 513. Geranium moschatum
ad Myrrhidem accedente majus I. B.
3. l. 30. 479. ANN.

* Idem minus. Geranium moschatum, fo-
Myrrhidem accedente, minus I. B.
l. 30. 479. ANN.

* Idem inodorum C. B. P. 319. Geranium

num, Cicutæ folio, inodorum *Moris. Hist. 2.*
512. ANN.

Geranium Cicutæ folio, minus & supinum C.
B. P. 319. Flore bresilici coloris C. B. P. *Var.*
319. ANN.

dem flore albo C. B. P. *Var.* 319. ANN.

Geranium Robertianum, flore dilutè rubello
Moris. Hist. 2. 513. Geranium Robertianum
murale I. B. *tom.* 3. l. 30. 480.

Geranium Robertianum, flore rubello majori,
folio tenuiter dissecto. Geranium gruina-
le, folio tenuiter diviso I. B. *tom.* 3. l. 30.
474. ANN.

Geranium Coriandri folio odorum C. B. P. 319.

Geranium Apulum, Coriandri folio, alte-
rum odorum *Colum. Moris. Hist. 2.* 513.
ANN.

GINGIDIUM umbellâ longâ C. B. P. 151.

Visnaga seu Gingidium *Moris. Umbell.* 6.

Gingidium *Matth. I. B. tom.* 3. l. 27. 79.
ANN.

Gingidium foliis *Pastinacæ latifoliæ* C. B. P. v.
Tordilium.

LADIOLUS maximus Indicus C. B. P. 41.
Moris. Hist. 2. 343.

diolus major Byzantinus C. B. P. 41. *Moris.*
Hist. 2. 344.

diolus major, radice oblongâ, flore albo
T 2 *Moris.*

Morif. Hist. 2. 343.

Gladiolus floribus uno versu dispositis,

C. B. P. 41. Morif. Hist. 2. 343. Gladiolus

Xyphion I. B. tom. 2. l. 19. 701.

Idem flore candicante *C. B. P. Var. 41.*

Idem Narbonensis, flore incarnato *C. B. P.*

41.

Gladiolus utrinquè floridus *C. B. P. 41.*

Hist. 2. 443. Flore rubro.

Idem flore incarnato *C. B. P. Var. 41.*

Gladiolus floribus uno verso dispositis,

C. B. P. 41. Floribus eleganter rubell.

Idem floribus incarnatis.

Gladiolus Æthiopicus, flore miniato

Hort. Reg. Paris. 78.

Gladiolus Æthiopicus, flore coccineo

Morif. Hist. 2. Icon.

Gladiolus fœtidus *C. B. P. v. Iris.*

Glastum sativum, & spontaneum *I. B. 701.*

Glastifolia Cichoroides *I. B. v. Brassica.*

*GLAUX maritima *C. B. P. 215. Gla-*
gua maritima *I. B. tom. 3. l. 29. 373.*

GLYZYRRHIZA filiquosa vel Ger-
C. B. P. 352. Morif. Hist. 2. 89. Gly-
za, radice repente, vulgaris Germani-
tom. 2. l. 17. 328.

Glyzyrrhiza capite echinato C. B. P. v. Ono-
brychis.

Glyzyrrhiza sylvestris, flore luteo pallescente
C. B. P. v. Astragalus.

GNAPHALIUM maritimum C. B. P. 263. I. B.
tom. 3. l. 26. 157.

Gnaphalium latifolium Americanum C. B. P.
263. *Gnaphalium Americanum* I. B. tom. 3.
l. 26. 162.

Gnaphalium vulgare majus C. B. P. 263. *Gna-*
phalium Germanicum I. B. tom. 3. l. 26. 158.
ANN.

Gnaphalium medium C. B. P. 263. *Gnapha-*
lio vulgari similis I. B. tom. 3. l. 26. 159.
ANN.

Gnaphalium minus repens C. B. P. 263. *Gna-*
phalium minimum I. B. tom. 3. l. 26. 159.
ANN.

Gnaphalium roseum sylvestre C. B. P. 263.
Gnaphalium umbellatum minimum I. B.
tom. 3. l. 16. 162.

Gnaphalium majus, lato oblongo folio C. B. P.
ANN.

Gnaphalium majus, angusto oblongo folio
C. B. P. 263. *Gnaphalium vulgare tenuifo-*
lium I. B. tom. 3. l. 26. 159. ANN.

Gnaphalium majus, angusto oblongo flore al-
terum C. B. P. 263. *Gnaphalium rectum*
I. B. tom. 3. l. 26. 160. ANN.

* *Gnaphalium montanum*, flore rotundo

*B. P. Var. 263. Pilosella minor quibus
aliis Gnaphalii genus I. B. tom. 3. l. 16.*

Floribus candidis C. B. P. Var. 263.

Idem floribus subpurpureis C. B. P. Var.

I. B. tom. 3. l. 16. 162. desc.

Idem floribus ex candido & rubro m.

B. P. Var. 263. I. B. tom. 3. l. 16. 162.

Idem floribus luteis.

Idem floribus sulphureis.

Gnaphalium Veterum I. B. v. Dictamn.

Gnaphalium Tragi I. B. v. Gramen.

GNAPHALIO affinis *Ocymastri* folio
Gex purpureo violaceo. *Amarantho*

Indiæ Orientalis, floribus congl.

tis, Ocymoidis folio Breyn. Cent. 1.

ANN.

GOSSIPIUM arboreum Orientale, foliis
glicis digitatis latioribus. *Gossipium*

nense, Salicis folio C. B. P. 430. Lal.

arbor peregrina I. B. tom. 3. l. 3. 347.

lanigera Bont. Hist. l. 6. c. 14. Panja.

jala Hort. Malab. tom. 3. 59.

Idem foliis angustioribus Javanense.

Gossipium arboreum, flore atro purp.

Gossipium arboreum, caule levi C. B. P.

Xylon arboreum I. B. tom. 3. l. 3. 346.

Idem flore flavo.

offipium herbaceum five Xylon I. B. tom. 1.
l. 3. 343.

GRAMEN caninum arvense, five Gramen
Diosc. C. B. P. 1. Gramen repens Officina-
rum fortè Triticeæ spicæ aliquatenus simile
I. B. tom. 2. l. 18. 457.

Gramen caninum longiùs radicatum majus
C. B. P. 1. Gramen canarium longiùs radi-
catum, latiore paniculâ I. B. tom. 2. l. 18. 457.

Idem minus C. B. P. 1. Gramen canarium, la-
tiore paniculâ minus I. B. tom. 2. l. 18. 457.

Gramen caninum supinum paniculatum dul-
ce C. B. P. 1. I. B. tom. 2. l. 18. 459.

Gramen caninum supinum minus C. B. P. 1.

Gramen parvum repens, purpureâ spicâ I. B.
tom. 2. l. 18. 459.

Gramen caninum maritimum spicatum C. B.
P. 1. & I. B. tom. 2. l. 18. 467. Et Gramen repens

marinum, spicâ exiguâ I. B. tom. 2. l. 18. 478.

Gramen caninum maritimum, spicâ foliaceâ

C. B. P. 2. Gramen longiùs radicatum mari-

num, utriculos pro spicâ gerens I. B. tom. 2.

l. 18. 978.

Gramen murorum, radice repente C. B. P. 2.

I. B. tom. 2. l. 18. 468.

Gramen nodosum Avenaceâ paniculâ C. B. P. 2.

Gramen nodosum I. B. tom. 2. l. 18. 456.

Gramen nodosum, spicâ parvâ C. B. P. 2. Gra-

men cum parvâ caudâ muris, radice nodo-

sà, repens *I. B. tom. 2. l. 18. 472.*

Gramen bulbosum ex Alepo *C. B. P. 2. l. 18. 431.*

Gramen tremulum maximum *C. B. P. 2. tom. 2. l. 18. 470. ANN.*

Gramen tremulum majus *C. B. P. 2. tremulum I. B. tom. 2. l. 18. 469. ANN.*

Idem perenne.

Gramen tremulum minus paniculâ parvâ *P. 2. Gramen tremulum minus I. B. tom. 2. l. 18. 470. ANN.*

Gramen paniculis elegantissimis, sive *515, majus C. B. P. 2. Gramen amoris I. B. tom. 2. l. 18. 470.*

* Gramen pratense paniculatum molle *C. B. P. 2. Gramen lanatum Dalechampii I. B. tom. 2. l. 18. 466.*

* Gramen pratense paniculatum majus, *folio: m^a Theoph. C. B. P. 2. Gramen pratense vulgare, spicâ ferè arundinaceâ I. B. tom. 2. l. 18. 461.*

Gramen pratense paniculatum majus, *stifiore folio C. B. P. 2. I. B. tom. 2. l. 18.*

* Gramen pratense paniculatum medium *P. 2.*

* Gramen pratense paniculatum minus *C. B. P. 2. Paniculâ & culmis purpurascens Var. 3. Gramen paniculatum minus I. B. tom. 2. l. 18. 465.*

* Idem paniculâ & culmis albis *C. B. P. 2. Var. 4.*

- Gramen paniculatum minus album *l. B. tom.*
2. l. 18. 465.
- * Gramen arvense, paniculâ crispâ *C. B. P. 3.*
- * Gramen segetum altissimum, paniculâ sparsâ
C. B. P. 3. Gramen capillatum l. B. tom. 2.
l. 18. 462.
- * Gramen segetum paniculâ Arundinaceâ *C. B. P.*
3. Gramen agrorum Lob. l. B. tom. 2. l. 18.
461.
- Gramen paniculatum odoratum *C. B. P. 3.*
- Gramen Mariæ odoratum *l. B. tom. 2. l. 18.*
478.
- * Gramen palustre paniculatum, altissimum *C.*
B. P. 3. Gramen aquaticum Harundinace-
um, paniculatum Tab. l. B. tom. 2. l. 18.
488. & tom. 2. l. 18. 542.
- Gramen aquaticum paniculatum, latifolium
C. B. P. 3. Gramen majus aquaticum Lobe-
lii l. B. tom. 2. l. 18. 481.
- Gramen aquaticum fluitans, multiplici spicâ
C. B. P. 3. Gramen aquaticum cum longissi-
mâ paniculâ l. B. tom. 2. l. 18. 490.
- Gramen aquaticum geniculatum spicatum *C.*
B. P. 3.
- Gramen pratense cristatum, sive Gramen spicâ
 cristatâ, læve *C. B. P. 3. Gramen cristatum*
l. B. tom. 2. l. 18. 468.
- Gramen Typhoides maximum, spicâ lon-
 gissimâ *C. B. P. 4. Gramen cum caudâ muris*
majoris longâ, majus l. B. tom. 2. l. 18. 472.

- * Gramen Typhoides molle C. B. P. 4. I. B. tom. 2. l. 18. 442. Gramen Alopecuroides, & Phalaridi, spicâ longiusculâ lanuginoso I. B. tom. 2. l. 18. 474.
- * Gramen Typhoides asperum, primum C. B. P. 4. Gramen cum caudâ muris minus I. B. tom. 2. l. 18. 471.
- * Gramen Typhoides spicâ angustiore C. B. P. 4. Gramen cum caudâ muris purpureâ I. B. tom. 2. l. 18. 473. ANN.
- * Gramen Typhoides, culmo reclinato C. B. P. 4. Gramen Alopecuroides, spicâ rotundior C. B. P. 4. Gramen Alopecuros altera Lobe I. B. tom. 2. l. 18. 475. ANN.
- * Gramen Alopecuros minor, spicâ longior C. B. P. 4. Gramen Alopecuros, spicâ longior I. B. tom. 2. l. 18. 474. ANN.
- * Gramen pratense tomentosum, panicula sâ C. B. P. 4. Gnaphalium Tragi, sive cus Bombycinus I. B. tom. 2. l. 18. 514.
- * Gramen Sparteum spicatum, foliis mucosis longioribus, vel spicâ Secalinâ C. B. P. 5. Spartium spicatum pungens, Oceanum I. B. tom. 2. l. 18. 511.
- * Gramen Sparteum spicatum, foliis mucosis brevioribus C. B. P. 5. Gramen Sparteum, primum Tab. I. B. tom. 2. l. 18. 512.
- * Gramen Sparteum spicatum, latifolium C. B. P. 5. Spartum maritimum, sive Oceanicum latifolium I. B. tom. 2. l. 18. 512.

- Gramen Spartheum juncifolium C. B. P. 5.
 Spartum parvum Lobel. I. B. tom. 2. l. 18.
 513.
- Gramen Spartheum minus, vel Hollandicum
 C. B. P. 5. I. B. tom. 2. l. 18. 513.
- Gramen Spartheum pennatum C. B. P. 5. Gra-
 men pennatum, aliis Spartum I. B. tom. 2. l.
 18. 512.
- Gramen Spartheum variegatum C. B. P. 5. I. B.
 tom. 2. l. 18. 512.
- Gramen foliis juncis oblongis, radice albâ
 C. B. P. 5.
- Gramen foliis juncis brevibus, minus C. B. P.
 5. Gramen tenue duriusculum & pene jun-
 ceum I. B. tom. 2. l. 18. 463.
- Gramen junceum polystachion C. B. P. 5. Gra-
 men junceum aquaticum, majus, Tab. I. B.
 tom. 2. l. 18. 543.
- Gramen junceum, folio articulato, sylvaticum
 C. B. P. 5. Gramen junceum sylvaticum Tab.
 I. B. tom. 2. l. 18. 543.
- Gramen junceum, folio articulato, aquaticum
 C. B. P. 5. Juncus foliaceus capsulis triangu-
 lis I. B. tom. 2. l. 18. 521.
- Gramen junceum, foliis & spicâ junci C. B. P.
 5. Juncus parvus cum pericarpis rotundis
 I. B. tom. 2. l. 18. 522.
- Gramen junceum, foliis, & spicâ junci, minus
 C. B. P. 6. Gramen junceum marinum den-
 se stipatum I. B. tom. 2. l. 18. 508.

* Gra-

* Gramen junceum minimum maritimum
C. B. P. 6.

* Gramen junceum spicatum seu trigloch
C. B. P. 6. Gramen triglochin I. B. tom.
18. 508.

* Gramen spicatum cum pericarpiis rotatis
I. B. tom 2. l. 18. 508. Gramen spicatum
alterum C. B. P. 6.

* Gramen Cyperoides latifolium, spicatum
sive caule triangulo C. B. P. 6. Gramen
cyperoides cum paniculis nigris I. B. tom.
18. 494.

* Gramen Cyperoides angustifolium,
longis erectis C. B. P. 6. I. B. tom. 2. l. 18.

* Gramen Cyperoides spicâ pendulâ brevibus
C. B. P. 6. Graminis Cyperoidis genus,
docyperus Lobelio, spicis vel paniculis
pendentibus ex longis pediculis I. B. tom.
l. 18. 496.

* Gramen Cyperoides, paniculâ sparsâ,
C. B. P. 6. Gramen Cyperoides vulgare
aquaticum I. B. tom. 2. l. 18. 495.

* Gramen Cyperoides palustre majus,
compactâ C. B. P. 6. Gramen Cyperoides
palustre triquetrum, spicâ integrâ I. B. tom.
2. l. 18. 497.

* Gramen Cyperoides palustre majus, spicâ
visâ C. B. P. 6. Gramen Cyperoides ex
te Ballon, spicâ divulsâ I. B. tom. 2.
497.

- Gramen nigro-luteum vernum *I. B. tom. 2. l. 18. 494.* Gramen Caryophyllatæ foliis, spicâ divulsâ *C. B. P. 3:*
- Gramen Cyperoides minus, paniculâ sparsâ subflavescente *C. B. P. 6.*
- Gramen Cyperoides Miliaceum *C. B. P. 6.*
- Gramen Arundinaceum, spicâ multiplici καλαμοχώρας *Diosc. C. B. P. 6.* Gramen Harundinaceum majus *Tabern. I. B. tom. 2. l. 18. 380.*
- Gramen Arundinaceum, spicatum *C. B. P. 6.*
- Gramen Harundinaceum minus cum spicâ *I. B. tom. 2. l. 18. 481.*
- Gramen Arundinaceum, paniculâ molli spadicâ majus *C. B. P. 7.* Gramen plumosum Lobelii spicâ candidâ & Serici modo lucente *I. B. tom. 2. l. 18. 476.*
- Gramen nemorosum, caliculis paleaceis *C. B. P. 7.* Gramen Matthioli junceum *I. B. tom. 2. l. 18. 510.*
- Gramen nemorosum hirsutum latifolium majus *C. B. P. 7.* Gramen rore lucidum nemorense, sive Luzulæ *I. B. tom. 2. l. 18. 492.*
- ANN.
- Gramen hirsutum, capitulis Pysyllii *C. B. P. 7.*
- Gramen exile hirsutum Cyperoides Lobelii *I. B. tom. 2. l. 18. 493.* ANN.
- Gramen palustre aculeatum Germanicum, vel minus *C. B. P. 7.* Gramen palustre echinatum *I. B. tom. 2. l. 18. 497.*

* Gra-

- * Gramen dactylon maximum Americanum
Cat. Hort. Reg. Paris. 82. Gramen dactylon Indicum esculentum, spicâ articulatâ
Ambrosin. Phytol. 546. Sesamum perianthato Indicum *Zanon. Hist. Baton. 181.*
- * Gramen dactylon folio Arundinaceo, acutifolium fortè Plinii *C. B. P. 7.* Gramen repens cum paniculis Graminis Mannæ *I. B. tom. 2. l. 18. 459.*
- * Gramen dactylon, folio latiore *C. B. P. 8.*
 Gramen dactylon angustifolium, spicis vix articulatâ *C. B. P. 8.* Gramen digitatum hirsutum *I. B. tom. 2. l. 18. 445.*
- Gramen dactylon scoparium *C. B. P. 8.*
 Gramen scoparium, Ischæmi paniculis Graminis cum *I. B. tom. 2. l. 18. 460.*
- Gramen dactylon esculentum *C. B. P. 8.*
 Graminis genus Dens caninus tertius, sive Gramen primum vel Galli crus *I. B. tom. 2. l. 18. 444.* Gramen Mannæ vulgo. *ANN.*
- Gramen dactylum Ægyptiacum *C. B. P. 7.*
 Gramen crucis, sive Neiemelm salib. *I. B. tom. 2. l. 18. 460.*
- * Gramen Paniceum, spicâ divisâ *C. B. P. 8.*
 Graminis genus quibusdam, Gallis Dens caninus 2. sive Panicum sylvestre, spicâ divisa *I. B. tom. 2. l. 18. 443.*
- * Gramen Paniceum, spicâ aristis longis armatis *C. B. P. 8.*
- * Gramen Paniceum spicâ simplici: *Ελυμπος*

- 76 C. B. P. 8. Panicum sylvestre dictum, &
 Dens caninus I. I. B. tom. 2. l. 18. 443.
 Gramen Paniceum, spicis nigris C. B. P. 8. Gra-
 minis Dentis canini, spicâ divulsâ tenuiori
 nigrâ, species. I. B. tom. 2. l. 18. 491.
 Gramen sylvaticum, paniculâ Miliaceâ spar-
 sâ, C. B. P. 8. Gramen Miliaceum Lobelii I. B.
 tom. 2. l. 18. 462.
 Gramen Sorghi paniculâ erectâ C. B. P. 8. Gra-
 men Sorghi effigie Lobelii I. B. tom. 2. l. 18.
 467.
 Gramen latifolium, spicâ triticeâ latiore com-
 pactâ C. B. P. 8. I. B. tom. 2. l. 18. 477.
 Gramen spicâ Brizæ majus C. B. P. 9. I. B. tom. 2.
 l. 18. 477.
 Gramen incanum marinum spicâ Secalinâ.
 Gramen Hordeaceum minus & vulgare C. B. P.
 9. Hordeum murinum I. B. tom. 2. l. 18.
 431. ANN.
 Gramen Loliaceum, spicâ longiore C. B. P. 9.
 Lolium Gramineum spicatum, caput ten-
 tans, I. B. tom. 2. l. 18. 437. ANN.
 Gramen Loliaceum angustiori folio & spicâ
 C. B. P. 9. Phoenix Lolio similis I. B. tom. 2.
 l. 18. 436. ANN.
 Gramen Loliaceum Vlielandicum. ANN.
 Gramen Loliaceum supinum C. B. P. 9. Gra-
 men Phalaroides exile, supinum, humi spar-
 sum, Danicum Lobelii I. B. tom. 2. l. 18.
 468. ANN.

Gra-

* Gramen montanum Avenaceum, locustis
bris C. B. P. 10. Gramen locustis rubris
tom. 2. l. 18. 434. ANN.

* Gramen Avenaceum capillaceum, minoribus
glumis C. B. P. 10. ANN.

* Gramen nemorale Avenaceum alterum
fusco xerampelinum & lucidum Dan
I. B. tom. 2. l. 18. 463. ANN.

Gramen Fuchsii seu Leucanthemon ejusque
cies I. B. v. Lychnis.

Gramen Gros Mompelgardensium I. B. v.
stuca.

Gramen Parnassi, albo simplici flore C. B.
Cistus humilis in App.

* GRATIOLE Centauroides C. B. P.
Gratiola I. B. tom. 3. l. 30. 435. Digitalis
nima, Gratiola dicta Moris. Hist. 2. 479.
Gratiola caerulea. C. B. P. v. Scutellaria.

* GRATIOLE affinis Americana, pur-
purea Perficæ folio ferrato. Digitalis Am-
ericana purpurea, folio ferrato Dodart. 78.
cocæphalon Americanum Brein. Prod.
Pseudo digitalis Perficæ foliis Bocc. Sic.
Granata vulgò v. Malus Punica.

* GROSSULARIA simplici acino, ve-
nosa sylvestris C. B. P. 455. Uva crispa
Grossularia I. B. tom. 1. l. 6. 47.
Grossularia spinosa fativa, C. B. P. 455.

Grossularia spinosa sativa altera, foliis latioribus C. B. P. 455. Grossularia spinosa, fructu obscure purpurascens. I. B. tom. 1. l. 6. 48.

Eadem hirsuto fructu C. B. P. Var. 455.

Grossularia multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra, sive Ribes Officinarum C. B. P. 455. Ribes vulgaris acidus ruber I. B. tom. 2. l. 15. 97.

Eadem majore fructu rubro C. B. P. 455. Ribes flore rubente I. B. tom. 2. l. 15. 98.

Grossularia hortensis, fructu margaritis simili C. B. P. 455. Ribes vulgaris acidus, albas baccas ferens I. B. tom. 2. l. 15. 98.

Eadem majore fructu albo Cat. Hort. Reg. Paris. 83

Eadem fructu albo, acinis rubentibus.

Grossularia vulgaris, fructu dulci C. B. P. 455.

Ribes Alpinus dulcis I. B. tom. 2. l. 15. 98.

Grossularia non spinosa, fructu nigro C. B. P. 455. Ribes nigrum vulgò dictum, folio olente I. B. tom. 2. l. 15. 98.

Guajacum Patavinum. v. Lotus Arbor.

Guajacana I. B. v. Lotus Africana latifolia.

GUAJANA alba dulcis. Guajabo pomifera

Indica C. B. P. 437. Guajaba Pison. Hist.

152. Xalxochotl, seu Pomum arenosum

Hern. Hist. 84. Pela Hort. Mal. tom. 3. 31.

Pyra Indica seu Granatensia vulgò.

Eadem rubra acida.

V

H. Ha-

H.

æmanthus Africanus. Tulipa
pensis, sive Promontorii Bonae
Bod. à Stapel. 334. Narcissus
cus puniceus, gemino latiori
Ferr. Flor. Cult. 137. Narcissus Indicus
pentarius παχύφυλλον & πιλύναρον
Column. in Hern. 885. & 899.

Halicacabum peregrinum multis I. B. v.
Indum.

Hædipnois Monspeffulana I. B. v. Hierac.

Halimus latifolius sive fruticosus C. B. P.
triplex.

Halimus seu Portulaca marina C. B. P.
triplex.

Halimus angustifolius procumbens C. B.
Atriplex.

Harmala I. B. v. Ruta.

* *HEDERA* arborea C. B. P. 305. *H.*
communis major I. B. *tom. 2. l. 15. 11.*

* *Hedera* major sterilis C. B. P. 305. *H.*
communis minor I. B. *tom. 2. l. 15. 11.*

Hedera Virginiana Clementis facie radice
vescente. *Clementis Hederæ folio*
Hort. Bles. 255.

Hedera quinquefolia Canadensis Cornuti.
Vitis Hederacea Indica Bod. à Stap. 364.

Hedera trifolia Canadensis Cornuti. Ap.
num trifolium Indicum vulgo Epime-
Bod. à Stap. 364. Virgultis procumbent.

Eadem virgultis erectis. An Hederæ trifoliæ
 Canadensi affinis planta Indica: Arbor ve-
 nenata quorundam *Cat. Hort. Reg. Paris.*
 84.?

HEDERA terrestris vulgaris C. B. P. 306.
 Chamæcissus five Hedera terrestris I. B.
tom. 3. App. 853.

Eadem minor elegantior C. B. *Var. 306.*

Hedypnois, five Dens Leonis Fuchsi I. B. v.
 Dens Leonis.

Hedysarum clypeatum, siliquâ asperâ I. B. v. O.
 nobrychis.

Hedysarum triphyllum Canadense Corn. v. O.
 nobrychis.

HELENIMUM vulgare C. B. P. 276. Helenium,
 five Enula campana I. B. *tom. 3. l. 26. 208.*

Helenium Indicum maximum ejusque species
 C. B. P. v. Chrysanthemum.

Helenium Indicum tuberosum C. B. P. v. Chry-
 santhemum.

Helenium Canadense ejusque species *Cat. Hort.*
Reg. Paris. v. Chrysanthemum.

Helianthemum ejusque species I. B. v. Cistus
 humilis.

Elichrysum. v. Elichrysum.

JELIOTROPIUM Americanum coeruleum,
 foliis Hormini *Dodart. Mem. 83.* Latifo-
 lium. ANN.

em foliis angustioribus. Jacua-Acanga *Pis.*

l. 4. c. 31. p. 229. ANN.

Heliotropium majus Dioscoridi C. B.

Heliotropium majus, flore albo I. B.

l. 33. 604. ANN.

Heliotropium tricoccon C. B. P. 253. I.

3. l. 33. 406. ANN.

* **H**ELLEBORINE *latifolia montana*
186. *Helleborine Dodonæi I. B. tom.*
31. 416.

* *Helleborine angustifolia palustris, fr.*
tensis C. B. P. 187. Damasonium flo.
baceo intus nonnihil candicante I. B.
l. 31. 517.

* *Helleborine flore carneo C. B. P. 187.*
borine flore carneo I. B. tom. 3. l. 31.

* *Helleborine montana angustifolia pu.*
scens C. B. P. 187. Damasonium
reum dilutum, sive Elleborine IV.
I. B. tom. 3. l. 31. 517.

HELLEBORINE *flore rotundo, sive*
ceolus C. B. P. 187. Damasonii
quibusdam sive Calceolus D. Martii
tom. 3. l. 31. 518.

Eadem flore duplo majore C. B. P. Var.

Helleborine Saniculæ folio minor C. B. P.
strantia.

HELLEBORUS albus, flore subviridi *C. B. P.*
 186. *I. B. tom. 3. l. 34. 633.*
 dem flore atro rubente *C. B. P.* 186. Ellebo-
 rus albus, flore nigro *I. B. tom. 3. l. 34. 634.*

HELLEBORUS niger trifoliatus *Aldin.*
Hort. Farnes. 93.

elleborus niger foetidus *C. B. P.* 185. Helle-
 borus niger sylvestris adulterinus, etiam
 hyeme virens *I. B. tom. 3. app. 880.*

elleborus niger hortensis, flore viridi *C. B. P.*
 185. Elleborus niger vulgaris, flore viridi
 vel herbaceâ radice diuturnâ *I. B. tom. 3. l.*
34. 636.

elleborus niger, flore roseo *C. B. P.* 186.
 Elleborus niger, flore albo, interdum
 etiam valde rubente *I. B. tom. 3. l. 34. 634.*
 dem minor Belgicus *Moris. Hort. Bles. 92.*

HELLEBORUS Ranunculoides hyemalis, ra-
 dice tuberosâ, flore in medio folio. Aco-
 nitum unifolium luteum bulbosum *C. B. P.*
 183. Ranunculus cum flore in medio folio,
 radice tuberosâ *I. B. tom. 3. l. 30. 414.*

elleborus Ranunculoides, flore globoso.
 Ranunculus Aconiti folio, flore globoso
C. B. P. 182. Ranunculus flore globoso, qui-
 busdam Trollius flos *I. B. tom. 3. l. 30. 419.*
 elleborus Ranunculoides, flore albo multi-
 plici. Ranunculus Aconiti folio, flore albo
 multiplici *C. B. P.* 179.

Helleborus niger, *Sanicula folio* C. B. P.
strantia.

Helleborus niger tenuifolius, *Bupthala*
C. B. P. v. Adonis.

Helxine cissampelos I. B. v. *Convolvulus*

Hemerocallis Chalcedonica quibusdam
Lilium.

HEPATICA nobilis, flore simplici
Trifolium hepaticum flore simplici
330. *Moris. Hist.* 2. 433. Trifolium
cum five Trinitatis herba, flore coer
tom. 2. l. 17. 389.

Eadem flore pleno. C. B. P. 330. I. B. tom. 2. l. 17. 390. *Moris. Hist.* 2. 433.

Eadem flore rubro simplici C. B. P. v.
Moris. Hist. 2. 433.

Eadem flore pleno.

Eadem flore albo simplici C. B. P. 330.
Hist. 2. 433. I. B. tom. 2. l. 17. 390.

Eadem flore carneo simplici *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 180.

Eadem flore cinereo *Cat. Hort. Reg.*
108.

Hepatica stellaris I. B. v. *Rubia.*

Hepaticus flos quibusdam I. B. v. *Cist.*
milis in App.

Hepatorium. v. *Eupatorium.*

HERBA *Mimosa major* frutescens
foliis angustis & pediculis non per

stantibus, sed in orbem collectis *Moris. Hist.*
 2. 199. An Mimosa altera spinis horri-
 diuscula & sensitiva magis *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 122? *Æschynomene* spinosa tertia,
 five foliis *Acaciæ* angustioribus, filiquis par-
 vis echinatis *Breyn. Cent.* 1. 40.

Herba Mimosa λεπτομακρονέρα , caulibus &
 filiquis spinosis *Moris. Hist.* 2. 199. Mimosa
 spinosa di Pernambuco *Zanon. Hist. Bot.*
 144.

Herba Mimosa non spinosa λεπτομακρονέρα ,
 five spuria de Pernambuco *Moris. Hist.* 2.
 200. Mimosa spuria de Pernambuco, dicta
 Mimosa Italica *Zan. Hist. Bot.* 151. Mimo-
 sa Italica five Herba viva spuria. *Ambrosin.*
Phyt. 360. *Æschynomene* mitis Ameri-
 cana, foliis *Acaciæ* angustioribus, filiquis
 longis angustis, semine quadrangulati
Breyn. Cent. 1. 48.

Herba Mimosa, non spinosa πλατυκέρρα seu
 βραχυπλατίλοβος de Jamaica Patavina dicta
Moris. Hist. 2. 200. Mimosa de Jamaica di-
 cta Patavina *Zanon. Hist. Bot.* 149.

Herba Mimosa non spinosa major Zeylanica
Breyn. v. Onobrychis.

terniaria glabra *Moris. v. Polygonum.*

terniaria I. B. *v. Polygonum.*

erva di Bidscho Lusitanis *Pison. v. Senna.*

HESPERIS hortensis C. B. P. 202.

Hist. 2. 251. Hesperis flore albo I. B.

2. l. 21. 877. Viola matronalis vulgo

Eadem flore purpureo C. B. P. *Var.* 202.

Hist. 2. 251. I. B. *tom.* 2. l. 21. 877.

Eadem flore vario I. B. *tom.* 2. l. 21. 877.

Eadem flore pleno albo odoratissimo

Hist. 2. 251. *Cat. Hort. Reg. Par.*

Viola matronalis flore multiplici Cornu

Eadem flore purpureo pleno odoratissimo

Moris. Hist. 2. 251. *Cat. Hort. Reg.*

86.

Eadem flore vario pleno.

Hesperis hortensis, flore viridi C. B. 202.

tom. 2. l. 21. 879. Hesperis hortensis

viridi seu abortivo *Moris. Hist.* 2. 251.

Hesperis montana pallida odoratissima

202. *Moris. Hist.* 2. 252. Hesperis colo-

eleganti I. B. *tom.* 2. l. 21. 879. ANN.

Hesperis peregrina, filiquis corniculatis

sis, Melancholica dicta. Hesperis pe-

na, filiquis articulatis C. B. P. 202.

Hist. 2. 252. Hesperis Syriaca I. B. *tom.*

21. 879. ANN.

* Hesperis Allium redolens *Moris. Hist.* 2.

Alliaria C. B. P. 110. I. B. *tom.* 2. l. 21.

ANN.

HIERACIUM Dentis leonis folio, flore

vè rubente C. B. P. 127. ANN.

Hieracium Dentis leonis folio monoclonon
glabrum C. B. P. 126.

Hieracium Dentis leonis folio, monoclonon
subasperum C. B. P. 127.

Hieracium Dentis leonis folio, hirsutie aspe-
rum minus laciniatum C. B. P. 127.

Idem magis laciniatum C. B. P. 127.

Hieracium Dentis leonis folio obtuso majus
C. B. P. 127. Hieracium Macrocaulon jun-
ceum, five minus, primum Dodonæo *I. B.*
tom. 2. l. 24. 1031.

Hieracium minus Dentis leonis folio oblongo
glabro C. B. P. 127. Hieracii parva species,
Hyoferis angustifolia aspera *I. B. tom. 2. l.*
24. 1032.

Hieracium minus, folio subrotundo C. B. P.
127. ANN.

Hieracium maximum, Chondrillæ folio, aspe-
rum C. B. P. 127.

Hieracium Chondrillæ folio glabrum, radice
succisâ majus C. B. P. 127. Hieracium minus,
præmorsâ radice, five Fuchsi *I. B. tom. 2. l. 24.*
1031.

Idem minus C. B. P. 127.

Hieracium hirsutum, foliis caulem ambi-
bus: Cichoreum pratense luteum, hirsutie
asperum C. B. P. 126. Hieracium multis,
aliis. Cichoreum luteum hirsutum *I. B. tom.*
2. l. 24. 1025. & Hieracium asperum, ma-

jori flore, in agrorum limitibus *I. B.*
l. 24. 1029.

*Idem lævius. Cichorium pratense
 lævius *C. B. P. 126.* Hieracium luteu-
 brum, seu minus hirsutum *I. B. tom. 2.*
1029.

Hieracium lanatum, Sonchi seu Erige-
 facie. Sonchus villosus luteus major
124. Sonchus lanatus Dalechampii *I. B.*
2. l. 24. 1026.

Hieracium incanum, lanuginosum, ram-
 Lusitanicum. An Hieracium pulchre-
 mosum Sprengerianum *I. B. tom. 2.*
1025?

Hieracium Intybaceum, flore magno
C. B. P. 128. Chondrillæ Creticæ
 missa, semine crispo *I. B. tom. 2. l. 24.*

Hieracium Castorei odore Monspeliensis
Raji Catal. 161. Hieracium foliis
 sylvestris villosis, odore Castorei *M.*
Botan. 129. ANN.

Hieracium barbatum medio-nigrum
Hort. Reg. Paris. 87. Majus. *ANN.*

Idem minus. Hieracium proliferum fal-
C. B. P. 128. Hieracium calyce barbato
 lumnæ Ecphr. 2. 27. *ANN.*

Hieracium Echioïdes, capitulis Cardui
 dicti *C. B. P. 128.* Hieracium capitulis
 diu benedicti maximum, Buglossum *E.*
 des quibusdam *I. B. tom. 2. l. 24. 1029.*

Hieracium Echioides, capitulis Cardui benedicti majus Arabicum, folio sinuato *Hort. Edinburg. Sutherl.* 152. ANN.

Hieracium Alpinum latifolium villosum, flore magno C. B. P. 128. Hieracium Alpinum, hirsuto folio quodammodo incano Clusio I. B. tom. 2. l. 24. 1027.

Hieracium montanum latifolium glabrum minus C. B. P. 129. Hieracium latifolium glabrum, ex valle Griesbachianâ I. B. tom. 2. l. 24. 1033.

Hieracium murorum, folio pilosissimo C. B. P. 129. Pilosella major quibusdam, aliis Pulmonaria, flore luteo I. B. tom. 2. l. 24. 1033.

Idem folio minus piloso non maculato *Cat. Hort. Reg. Paris.* 89. *Hort. Bles. Moris. Hist.* 2. 95. & 271.

Idem angustiore folio.

Hieracium murorum laciniatum minus pilosum C. B. P. 129. Pilosellæ majoris sive Pulmonariæ luteæ species magis laciniata I. B. tom. 2. l. 24. 1034.

Hieracium latifolium pilosum coccineum umbellatum Indicum. Pilosella Indica *Cornuti* 209.

Hieracium fruticosum latifolium, foliis dentatis, glabrum C. B. P. 129. Hieracii Sabaudi varietas altera I. B. tom. 2. l. 24. 1030.

Hieracium fruticosum latifolium hirsutum
C. B. P.

C. B. P. 129. Hieracii Sabaudi varietas
 rinus quibusdam Matthioli dicta 1. B.
 2. l. 24. 1000.

* Hieracium fruticosum angustifolium
 C. B. P. 129. Hieracium rectum rigidum
 quibusdam Sabaudum 1. B. tom. 2.
 1030.

Hieracium fruticosum, angustissimo
 folio.

Ex fibrosis candidis radicibus fruticosa
 singulis annis novi furculi sesquicubiti
 tenues in viridi albentes lactescentes,
 concoloribus longis angustis pene setosis
 ab uno ad summum usque dense fastigiatis
 quorum fastigia in complures abeunt
 lobos, sustinentes è calyce oblongo
 modicè hirsuto & squamato flores luteos
 multis petalis planis, in gyrum dispositis
 confarctos, qui marcidi facessunt in senectute
 atro-rubentia, gracili pappo cristata.

Hieracium perfoliatum, flore sulphureo.
 dipnois Monspessulana, sive Dens Leonum
 Monspessulanus 1. B. tom. 2. l. 24. 1036.

Hieracium perfoliatum singulare Cretae
 Cat. Hort. Patav. Turr. 45?

Hieracium majus, folio Sonchi C. B. P. v.
 Sonchus.

Hieracium majus, foliis Sonchi, semine
 C. B. P. v. Sonchus.

Hieracium capitulum inclinans, semine
 C.

IERACIUM FRUTICOSUM, ANGUSTISSIMO IN-
CANO FOLIO.

C.B.P. & florem inclinans I. B. v. Calendula.
Hieracium siliquâ falcatâ C. B. P. v. C.
dula.

Hieracium stellatum I. B. v. Calendula.

Hiposelinum Theophr. C. B. P. v. Smyrna.

Hippoglossum Matth. v. Laurus Alexand.

Hirundinaria vulgò. v. Asclepias.

HOLOSTEUM hirsutum albicans majus
P. 190. Holostium Plantagini simile
tom. 3. l. 3 l. 508.

Holosteum hirsutum albicans minus
190. Holostium Monspeffulanum I. B.
3. l. 3 l. 508.

* Holosteum affinis, caudâ muris *C. B. P.*
Myosuros I. B. tom. 3. l. 31. 512. ANN.

HORDEUM polystichum hybernum
22. I. B. tom. 2. l. 18. 429. ANN.

Hordeum polystichum vernum *C. B. P.*

Hordeum hexastichum pulchrum *I. B.*
2. l. 18. 429. ANN.

Hordeum distichon *C. B. P. 23. I. B. tom.*
18. 429. ANN.

* Hordeum nudum *Cat. Hort. Edinb. Sc.*
156. ANN.

Hordeum murinum I. B. v. Gramen.

HORMINUM Æthiopicum incanum,
sinuosis, Æthiopis dictum. Æthi.

- folio sinuoso *C. B. P.* 241. *Æthiopis* multis
I. B. tom. 3. l. 28. 107. ANN.
- Idem foliis in profundas lacinias divisis *C. B.*
P. 241. ANN.
- Horminum Syriacum *C. B. P.* 238. Gallitri-
 chum exoticum, flore magno albo *I. B. tom.*
 3. l. 28. 310. ANN.
- Horminum majus, amplo flore violaceo lobis
 florum punctis aureis notatis *Moris. Hort.*
Bles. 272. An Horminum Indicum maxi-
 mum, flore variegato *Cat. Hort. Reg. Paris.*
 89? ANN.
- Horminum fativum *C. B. P.* 238. Horminum
 comâ purpureo-violaceâ *I. B. tom.* 3. l. 28.
 309. ANN.
- Idem comâ rubrâ *I. B. tom.* 3. l. 28. 309. ANN.
- Idem foliis totis viridibus *Cat. Hort. Reg. Paris.*
 88. ANN.
- Horminum Sclarea dictum *C. B. P.* 238. Galli-
 trichum fativum *I. B. tom.* 3. l. 28. 309.
- Horminum luteum glutinosum *C. B. P.* 238.
 Galliopsis species lutea, viscida, odorata
 nemorensis *I. B. tom.* 3. l. 28. 304.
- Horminum sylvestre latifolium verticillatum
C. B. P. 238. Gallitricho affinis planta, Hor-
 minum sylvestre latifolium *Clusio I. B. tom.*
 3. l. 28. 14.
- Horminum pratense, foliis ferratis *C. B. P.* 238.
 Gallitrichum sylvestre vulgo, sive sylve-
 stris Scralea, flore purpureo, coeruleove ma-
 gno

gno *I. B. tom. 3. l. 28. 311.*

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 89.*

Idem flore minore rubro *C. B. P. Var.*

Horminum pratense, foliis ferratis, floribus
lutè coeruleis omnium minimis. *An*

trichi varietas *I. B. tom. 3. l. 28. 311.*

Horminum folio Betonicae *Cat. Hort.*

Sutherl. 157. An Horminum parvum

Betonicae, flosculis exiguis coeruleis,

nicum *Mentz. pugil.*

Horminum sylvestre Lavendulae flore

239. Gallitrichis affine Maru, si non

aliquod, Sclarea Hispanica Taberna

tani *I. B. tom. 3. l. 28. 313.* Horminum

tellariae folio vulgò.

Idem folio crassiori & rugosiori.

HYACINTHUS comosus major purpureus
C. B. P. 42. Moris. Hist. 2. 371. Hyacinthus

maximus Botryoides, comâ coeruleâ

tom. 2. l. 19. 574.

Idem ruber *C. B. Var. 42. Moris. Hist. 2.*

Idem albus Belgicus *C. B. P. 42. Moris.*

371.

Hyacinthus comosus paniculâ coeruleâ

42. *Moris. Hist. 2. 371.*

Hyacinthus calamistratus comâ paniculâ

breviore *Cat. Reg. Paris. 89.* Hyacinthus

comosus calamistratus *Cornut.* 210. Coma
ampliori.

Hyacinthus coma racemosâ strictiori. An
Hyacinthus calamistratus coma racemosâ
breviori *Cat. Hort. Reg. Paris.* 89.

HYACINTHUS racemosus, major latifolius
spetiosior, Arbuteo flore coeruleo *Moris.*
Hist. 2. 372. Hyacinthus racemosus coeruleus
major *C. B. P.* 42.

Idem minor *Moris. Descr. Hist.* 2. 372. Hya-
cintus racemosus coeruleus minor latifo-
lius *C. B. P.* 43. Hyacinthus Botryoides ver-
nus: minor latifolius coeruleus inodorus
I. B. tom. 2. l. 19. 572.

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 89. Flore
niveo aut lacteo *Moris. Descr. Hist.* 2. 372.

Hyacinthus racemosus coeruleus, minor
juncifolius *C. B. P.* 43. *Moris. Hist.* 2. 372.

Hyacinthus vernus Botryoides minor coe-
ruleus, angustioribus foliis, odoratus *I. B.*
tom. 2 l. 19. 571.

Idem flore exalbido *C. B. P. Var.* 43.

Idem flore carneo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 89.

Hyacinthus racemosus moschatus *C. B. P.* 43.

Hyacinthus racemosus seu Botryoides ma-
jor, seu Muscari majus obsoleto albo flore

Moris. Hist. 2. 372. Hyacinthus odoratissi-
mus, dictus Tibcadi & Muscari *I. B. tom.* 2.

l. 19. 578. Dipcadi vulgò.

X

Idem

Idem gryseo flore obsoleto *Cat. Hort. Paris.* 89.

Hyacinthus racemosus Moschatus C. B. P. 43. Hyacinthus odoratissimus cadiluteus I. B. *tom.* 2. l. 19. 579.

Hyacinthus luteus, præcox. C. B. P. 43. Hyacinthi Tibcadi lutei varietas, five Muscari præcox I. B. *tom.* 2. l. 19. 579.

Hyacinthus oblongo cœruleo pendulo *Moris. Hist.* 2. 373. Hyacinthus oblongore, cœruleus major C. B. P. 43. Hyacinthus Anglicus five Belgicus I. B. *tom.* 2. l. 19.

Idem flore incarnato C. B. P. *Var.* 43.

Idem flore rubro *Moris. Descr. Hist.* 2. 373.

Idem flore albo. Hyacinthus Anglicus *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 160.

Idem flore Amethystino C. B. P. *Var.* 43.

Idem flore ex cœruleo & albo mixto.

Hyacinthus ferotinus albicans, facie Orientali C. B. P. 44.

Hyacinthus obsoleto flore æstivus. Hyacinthus obsoleto flore C. B. P. 44. Hyacinthus obsoletior Hispanicus, Anglico similis *tom.* 2. l. 19. 587.

Hyacinthus oblongo cœruleo flore, minor C. B. P. 44. Hyacinthus minor Hispanicus angustifolius cœruleus I. B. *tom.* 2. l. 19.

Hyacinthus floribus Campanulæ utrinque oppositis C. B. P. 44. *Moris. Hist.* 2. 373.

HYACINTHUS Orientalis, caule maculato
C. B. P. 44. Moris. Hist. 2. 373.

Idem flore argentei coloris *Cat. Hort. Reg. Paris. 90.*

Idem flore violaceo *Cat. Hort. Reg. Paris. 90.*

Hyacinthus Orientalis purpureus C. B. P. 44.

Hyacinthus Orientalis, flore majore I. B. tom. 2. l. 19. 575.

Hyacinthus Orientalis exalbidus C. B. P. 44.

Hyacinthus Orientalis albus, primus C. B. P. 44.

Idem albore splendido *Cat. Hort. Reg. Paris. 90.*

Hyacinthus Orientalis Brumalis, flore coeruleo, foliis infernâ parte maculis purpureis notatis.

Idem flore albo. Hyacinthus Orientalis albus, alter C. B. P. 44. Hyacinthus Brumalis albus I. B. tom. 2. l. 19. 577.

Hyacinthus Orientalis maximus C. B. P. 44.

Hyacinthus minor πολυάνθης I. B. tom. 2. l. 19. 576.

Idem flore albo *Cat. Hort. Reg. Paris. 91.*

Idem flore incarnato.

Idem caliculis suavè rubentibus *Cat. Hort. Reg. Paris. 91.*

Idem polyanthes, flore cinerei coloris *Cat. Hort. Reg. Paris. 91.*

Idem flore argenteo *Cat. Hort. Reg. Paris. 91.*

Idem flore violaceo odoratissimo *Cat. Hort. Reg. Paris. 91.*

Ejusdem multiplices, quoad florum colorem
seriem, figuram, magnitudinem & odorem
differentiæ.

Hyacinthus præcox albus C. B. P. 45.

Hyacinthus Orientalis latifolius C. B. P.

Hyacinthus Orientalis, polyanthes foliis
tom. 2. l. 19. 576.

Hyacinthus Orientalis latifolius, Polyanthes
maximus, flore in cœruleo purpureo-
laceo.

Ejusdem quoad floris colorem magnitudinem
& elegantiam miræ varietates, cultorum
industria vario è fatu productæ.

Hyacinthus Orientalis ramosus C. B. P. 45.

Hyacinthus Orientalis, caule folioso C. B. P.

Hyacinthus Orientalis, flore duplici, seu
ro alteri innato, ex colore albo & cœruleo
ad pediculum parum virescenti Moris.

2. 474. Hyacinthus Orientalis, flore dup-

C. B. P. 46.

Hyacinthus Orientalis, flore cœruleo, dup-
oblongo.

Idem flore duplici cœruleo, Romanus dictus

Hyacinthus Orientalis, flore cœruleo pleno

C. B. P. 45.

Idem flore purpureo pleno.

Hyacinthus Orientalis, flore subcœruleo

no, maximus Belgarum Cat. Hort.

Paris. 91.

Idem flore purpureo violaceo, caliculis turg-

Hyacinthus Orientalis albus, multiplici flore
C. B. P. 45.

Idem pallidè incarnatus.

Hyacinthus Orientalis roseus, Italicus dictus,
multiplici flore candidissimo.

Idem flore duplici, Capucinus dictus.

Idem flore elegantiori.

HYACINTHUS stellaris Germanicus, præ-
cox bifolius *Morif. Hist. 2. 474.* Hyacin-
thus bifolius stellaris Germanicus C. B. P. 45.
Hyacinthus stellatus vernus dumetorum,
flore coeruleo *I. B. tom. 2. l. 29. 579.*

Idem ex albido flore C. B. P. *Var. 45.* Flore albo
I. B. tom. 2. l. 19. 579.

Idem flore suaviter rubente C. B. P. *Var. 45.*

Idem flore ad carneum vergente C. B. P. *Var.*
45.

Hyacinthus stellaris Germanicus præcox tri-
folius *Morif. Hist. 2. 474.* Hyacinthus stella-
ris trifolius C. B. P. 46. Hyacinthus stellatus
trifolius vernus dumetorum, flore coeruleo
I. B. tom. 2. l. 19. 584.

Hyacinthus stellatus monophyllos Lusitani-
cus *Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 162.*

Hyacinthus stellaris albus C. B. P. 46. Hyacin-
thus stellaris albicans ferotinus *I. B. tom. 2.*
l. 19. 584.

Hyacinthus stellaris spicatus seu fastigiatus,
latâ depressâ spicâ *Morif. Hist. 2. 474.* Hya-

cinthus stellaris spicatus cinereus C. B. P.

Hyacinthus stellatus multiflorus, cinereus
coloris I. B. *tom.* 2. l. 19. 583.

Hyacinthus stellaris, caulibus pluribus ex
dem bulbo ortis, singulis pluribus flo-
neratis *Moris. Hist.* 2. 474. Hyacinthus
laris coeruleus amoenus C. B. P. 46. Hy-
thus stellatus Bizantinus alter, elegans
mus ferotinus bullatus I. B. *tom.* 2. l. 19.

Hyacinthus stellaris Byzantinus, Bortius
flore *Cat. Hort. Reg. Paris.* 91.

Hyacinthus stellaris obsoletè coeruleus, ve-
lor C. B. P. 46.

Hyacinthus stellaris æstivus coeruleo-pur-
rascens, major C. B. P. 46. Hyacinthus
latus æstivus I. B. *tom.* 2. l. 19. 583.

Hyacinthus stellaris autumnalis major
Hist. 2. 474. C. B. P. 46. Hyacinthus
mnalis major I. B. *tom.* 2. l. 19. 574.

Idem minor C. B. P. 47. *Moris. Hist.* 2. *Desc.*

Hyacinthus stellatus Peruvianus multiflorus
floribus coeruleis, in rotundum metamor-
giatus *Moris. Hist.* 2. 375. Hyacinthus
cus bulbosus stellatus C. B. P. 47. Hy-
thus Peruvianus I. B. *tom.* 2. l. 19. 585.

Idem flore albicante *Cat. Hort. Reg. Paris.*
Floribus niveis, visu per amoenis *Moris.*
2. *desc.* 375.

HYACINTHUS Eriophorus Orientalis
Hist. 375. Bulbus Eriophorus orientalis
C. B.

C. B. P. 47. I. B. tom. 2. l. 19. 585.

Hyacinthus stellaris, foliis & radice Lili *C. B. P. 46. Moris. Hist. 2. 375.* Hyacinthus Lilifolius stellatus *I. B. tom. 2. l. 19. 489.* Floribus cœruleis.

Idē flore niveo *Mor. Hist. 2. 376. C. B. P. Var. 46.*

HYACINTHUS Indicus tuberosus, flore Hyacinthi Orientalis *C. B. P. 47.* Hyacinthus Indicus, tuberosâ radice *Mor. Hist. 2. 376. I. B. tom. 2. l. 19. 588.*

Hyacintho affinis Africana, tuberosâ radice, umbellata cœrulea inodora.

Hydropiper I. B. v. Perficaria urens.

HYDROPHYLLON Morini *Fonqu. Hort. 43.* Dentariæ affinis, Echii flore, capsulâ rotundâ *Moris. Hort. Bles. 259.* Dentariæ affinis Echii flore, capsulâ Anagallidis *Dod. Mem. 77.* Echio affinis, Dentariæ foliis vulgò

***H**YOSCYAMUS vulgaris vel niger *C. B. P. 169. Moris. Hist. 2. 494. I. B. tom. 3. l. 34. 627.*

Hyoscyamus albus major vel 3. Diosc. & 4. Plinii *C. B. P. 169. Moris. Hist. 2. 494.* Hyoscyamus albus *I. B. tom. 3. l. 34. 627.*

Hyoscyamus albus minor *C. B. P. 169. Moris. Hist. 2. 494. I. B. tom. 3. l. 34. 628.*

Hyoscyamus Creticus luteus major *C. B. P. 169. Moris. Hist. 2. 494. I. B. tom. 3. l. 34. 628. desc.*

Hyosiris angustifolia aspera I. B. v. Hieracium.

HYPECOUM filiquis erectis articulatis incurvis *Mor. Hist. 2. 579.* Hypecoum *C. B. P. 172.*

Hypecoum filiquosum I. B. tom. 2. l. 21.

* **H**YPERICUM vulgare C. B. P. 179. *Moris. Hist.* 2. 469. Hypericum vulgare, sive *rata* caule rotundo, foliis glabris I. B. tom. 3. l. 29. 381.

* Hypericum minus supinum, vel supinum glabrum C. B. P. 279. *Moris. Hist.* 2. 569. Hypericum minimum supinum I. B. tom. 29. 384.

Hypericum seu Coris legitima *Ericæ* *Moris. Hist.* 2. 469. Coris lutea C. B. P. 279. Hypericoides Coris quorundam, & Cretica I. B. tom. 3. l. 29. 384.

Hypericum supinum tomentosum majus, Hispanicum C. B. P. 279. *Moris. Hist.* 2. 470.

Hypericum supinum tomentosum minus, Monspeliacum C. B. P. 279. Hypericum tomentosum I. B. tom. 3. l. 29. 384.

* Hypericum seu Androsæmum perfoliatum & perforatum C. B. P. 280. *Moris. Hist.* 2. 470.

Hypericum minus glabrum erectum pycnanthum *Moris. Hist.* 2. 470. Hypericum minus erectum C. B. P. 179. Hypericum pycnanthum Tragi I. B. tom. 3. l. 29. 383.

Hypericum seu Androsæmum foetidum, pitulis longissimis filamentis donatis C. B. P. 279. *Moris. Hist.* 2. 471. Ruta Hypericoides quibusdam Sicilianæ affinis, sive Tragi I. B. tom. 3. l. 29. 384.

* Hypericum seu Androsæmum bifolium glabrum

brum perfoliatum, non perforatum *Moris.*
Hist. 2. 471. Ascyrum sive Hypericum bifo-
 lium glabrum non perforatum *C. B. P.* 280.
 Hypericum elegantissimum non ramosum,
 folio lato *I. B. tom.* 3. l. 29. 383.

*Hypericum seu Androsæmum Ascyrum di-
 ctum, caule quadrangulo glabro *Moris. Hist.*
 2. 471. Androsæmum hirsutum *C. B. P.* 280.
 Hypericum Ascyrum dictum caule qua-
 drangulo *I. B. tom.* 3. l. 29. 132.

Hypericum seu Androsæmum Ascyrum di-
 ctum, caule rotundo hirsuto *Moris. Hist.* 2.
 471. Hypericum Androsæmum dictum *I.*
B. tom. 3. l. 29. 382.

*Hypericum seu Androsæmum maximum
 (quasi frutescens) bacciferum *Moris. Hist.* 2.
 472. Androsæmum maximum frutescens
C. B. P. 280. Siciliana, aliis Ciciliana vel An-
 drosæmon *I. B. tom.* 3. l. 29. 385.

Hypericum seu Androsæmum flore & thecâ
 quinquecapsulari omnium maximis *Moris.*
Hist. 2. 472. Ascyrum magno flore *C. B. P.*
 280.

Hypericum frutescens Americanum fl. albo.
v. Pruno affinis.

HYSSOPUS Officinarum cœrulea sive spi-
 cata *C. B. P.* 217. Hyssopus vulgaris spica-
 tus angustifolius, flore cœruleo *I. B. tom.* 3.
 l. 28. 274.

Idem flore rubro C. B. P. 217. I. B. tom.
28. 274.

Idem flore purpureo I. B. tom. 3. l. 28. 274.

Idem flore albo, Hyssopus vulgaris
C. B. P. 218.

Hyssopus Anglica C. B. P. 218. ab unâ par-
tea alterâ viridis.

Hyssopus hirsuta C. B. P. 219.

Hyssopus umbellata C. B. P. 219.

Hyssopus angustifolia spicata C. B. P. 219.

Hyssopus Austriacus, magno flore, foliis
mæpitydis. Chamæpitys coerulea Aust.
C. B. P. 250.

Hyssopifolia C. B. P. v. *Lyfimachia*.

I.

* **J**ACEA nigra pratensis, latifolia C.
271. Jacæa nigra pratensis vul-
& squammosa I. B. tom. 3. l. 25. 29.
* Eadem flore albo C. B. P. 271.

Jacæa nigra, squammoso capite, major C.
271. Jacæa montana squammosa major
mine nigro I. B. tom. 3. l. 25. 29.

Jacæa latifolia, capite hirsuto C. B. P. 271.
Jacæa cum squamis pennatis, sive capite
lofo, elatior I. B. tom. 3. l. 25. 29.

Jacæa Lusitanica semper virens Moris. H.
Bles. 276. Jacæa elatior Lusitanica sem-
virens Boccon. Ic. & Desc. 72. Jacæa

fitanica maxima, semper virens *Dod. Mem.*

85.

Jacæa integri folia humilis C. B. P. 271.

Jacæa nigra laciniata C. B. P. 271. Centaurium
Collinum Gesneri, flore purpureo *I. B. tom.*

3. l. 25. 32.

Eadem flore albo.

Jacæa incana, Cyani folio, fibris in capite nigris.

Jacæa humilis alba, Hieracii folio C. B. P. 271.

Jacæa Monspeffulana, cui in squammis fi-
bræ nigre, interdum acaulis *I. B. tom. 3. l. 25.*

29. Flore purpureo.

Jacæa latissimo laciniato folio C. B. P. 272.

Jacæa Arborea argentea Ragusina *Zan. Hist.*
Bonon. 107. Floribus luteis.

Jacæa montana candidissima, Stoebes foliis
C. B. P. 272. Floribus purpureis, foliis an-
gustioribus.

Eadem foliis latioribus.

Jacæa montana incana, capite Pini C. B. P. 272.

Jacæa montana, capite magno strobili *I. B.*
tom. 3. l. 25. 30.

Jacæa capite longis aculeis spinoso C. B. P. 272.

Eadem capite brevioribus aculeis spinoso.

Jacæa spinosa Cretica *Zanon. Hist. Bo-*
tan. 105.

Jacæa laciniato Sonchi folio, sive Jacæa lati-
folia purpurea, capitulo spinoso C. B. P.
272.

Ja-

Jacea Sphærocephala spinosa Tingitana
Hort. Edinb. Suntherl. 167.

Planta est Jaceæ spinosæ Creticæ Zæ-
 persimilis; Ast omnibus partibus maj-
 amplior, raraque hirsutie pubescens; Ra-
 rectâ crassâ albidâ ventriosâ aliquando
 chiatâ; Caulibus cubitalibus neutiquam
 tis; Foliis in profundiores lacinias rig-
 què crenas divisis, formâ ad Sonchi foli-
 cedentibus; Capitulis Sphæricæ rotun-
 tis, quorum spinosis squamis interjacet
 albidum tomentum, telis araneorum fu-
 Floribus purpureis magis expansis; Sepa-
 bus cinereis, congenerum more barba-
 flatis. Collegi ex Horto Dni Petri
 Wolff Plantarum rariorum cultoris ex
 qui ex seminibus, Tingide acceptis,
 caverat.

Jacea lutea capite spinoso C. B. P. 272. M.
 Centaurium Collinum, sive Jacæa spi-
 flore luteo I. B. tom. 3. l. 25. 34. ANN.

Jacea lutea, capite spinoso minori. Car-
 stellatus luteus, foliis Cyani C. B. 387.
 na solstitialis I. B. tom. 3. l. 25. 90. ANN.

Jacea Sicala Erucæ folio lutea echinata
 Mem. 87. ANN.

Jacea Melitensis capitulis conglobatis Boc-
 & Desc. 65. Spinis erectis longioribus. ANN.

Eadem spinis recurvis brevioribus. ANN.

Jacea lutea spinosa Centauroides C. B. P. 272.

LUGDUNO-BATAVUS.

333

FACEA SPHOEROCÆPHALA SPINOSA TINGI-
TANA SUTHERL.

Jacea incana Cretica, flore luteo medio
reo, squamis in molliores spinas abeun-

Levi tomento in viridi canescit tota

Planta, attollens ex radice crassâ brachy-
caules plures, sesquicubitum exceden-

angulosos, lignosos, duros, valde rami-
Folia radici proxima conspiciuntur pal-

lata, spithamum longa, modo per am-
leviter crenata, modo profundis aliquo-

cifuris præcipuè versus pediculum dis-
superiora verò minora & omnino inter-

suaquè basi caulem amplectentia. Sin-
rami sustinent capitulum ex squamis

dis in brevissimas aliquot flavescen-
spides desinentibus compactum, cui in-

flores vulgari similes, exteriores rube-
interiores flavescen- sequentibus

nibus coeteris hujus tribus similibus. Ex
ex Cretâ delatam nobis concessit D. Ni-

cobus Zanoni, Vir, dum viveret, in na-
lium scientia pertissimus.

Jacea Cyanoides, echinato capite C. B. P.
Flore purpurascen-

Eadem flore albo C. B. P. *Var. 272.*

JACEÆ & Serratulæ affinis, capitulis
charidis, foliis Trachelii, Zeylanica Br.
Prodr. 39.

Jacea Oleæ folio ejusquè species C. B. P. v.
ranthemum.

LUGDUNO-BATAVUS. 335

ACEA INCANA CRETICA . FLORE LVTEO MEDIO PURPUREO, SQVAMIS IN MOLLIORES SPINAS ABEVNTIBVS.

Facea tricolor ejusque species I. B. v. Vio

JACOBÆA maritima C. B. P. 131. Jacobæa
rina five Cineraria I. B. tom. 3. l. 24. 1057.

* Jacobæa vulgaris laciniata C. B. P. 131.
bæa vulgaris I. B. tom. 3. l. 24. 1057.

Eadem foliis, Quercus tenuifoliæ instar
visis C. B. P. Var. 131.

Jacobæa Alpina, laciniato flore Bupthala
B. P. 131. Jacobæa Pannonica latifolia
tom. 3. l. 24. 1057.

Jacobæa Senecionis folio incano, per
Raji Catal. 170.

Jacobæa montana lanuginosa angustifolia
non laciniata C. B. P. 131. Jacobæa Pa
nica, folio non laciniato I. B. tom. 3.
1056.

JASMINUM flavum odoratum Cat. Hort.
Reg. Paris. 94. Moris. Hort. Bles.
Gelseminum Indicum flavum odoratum
mum Ferrar. Flor. Cultur. 393.

Jasminum humilius luteum C. B. P. 397.
minum luteum I. B. tom. 2. l. 15. 102.

Jasminum luteum, vulgò dictum baccifera
C. B. P. 398. Trifolium fruticans quibus

Polemonium flore luteo I. B. tom.
II. 575.

Jasminum Virginianum Cat. Hort. E
Sutherl. 169.

Jasminum vulgatius, flore albo C. B. P. 397.
Jasminum sive *Jelseminum* flore albo I. B.
tom. 3. l. 15. 101.

Jasminum humilius, magno flore C. B. P. 398.
Jasminum Hispanicum, flore majore exter-
 nè rubente I. B. *tom. 2. l. 15. 101.*

Jasminum Arabicum Clus. v. *Syringha*.

Jasminum Indicum, flore phæniceo Ferrar.
 v. *Clematis*.

Jasminum Millefolii folio I. B. v. *Convolvulus*.

Jasminum Persicum Cat. Hort. Edinb. Sutherl.
 v. *Syringha*.

Jasminum Mexicanum I. B. v. *Mirabilis Pe-*
ruviana.

IBERIS latiore folio serrato Moris. Hist. 2. 311.
Iberis latiore folio C. B. P. 97. *Iberis* I. B. *tom.*
2. l. 22. 918.

Iberis humilior annua Virginiana ramosior,
Moris. Hist. 2. 311. ANN.

Iberis Nasturtii folio C. B. P. 97. *Moris. Hist.*
2. 311.

Iberis Fuchsii I. B. v. *Nasturtium*.

Iberidi Fuchsii adfinis I. B. v. *Nasturtium*.

Ilex aculeata baccifera, folio sinuato C. B. P. v.
Aquifolium.

ILEX oblongo serrato folio C. B. P. 423. *Ilex*
arborea I. B. *tom. 1. l. 7. 95.*

Ilex folio rotundiorè molli modiceque si-
 Y nua-

nuato, five Smilax Theophrasti C. B. P. 42.
 Ilex aculeata Cocci glandifera C. B. P. 42.
 coccigera I. B. tom. 1. l. 7. 106.

IMPERATORIA major C. B. P. 56. Imperatoria I. B. tom. 1. l. 7. 106.
 Imperatoriæ affinis umbellifera maritima
 tica Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 366.
 Indigo Indica Moris. v. Colutea.

INTYBUS fativa latifolia, five Endivia vulgaris C. B. P. 125. Intybum fativum latifolium I. B. tom. 2. l. 24. 1011. ANN.

Intybus fativa angustifolia C. B. P. 125. Intybum fativum angustifolium I. B. tom. 2. l. 24. 1011. ANN.

Intybus crispa C. B. P. 125. Intybum fativum crispum I. B. tom. 2. l. 24. 1011. ANN.

IRIS tuberosa, folio anguloso, flore ovato viridi colore Moris. Hist. 2. 348. Iris tuberosa, folio anguloso C. B. P. 40. Iris tuberosa Belgarum I. B. tom. 2. l. 19. 730.

Iris agria foetida vel Xyris Moris. Hist. 2. 349. Gladiolus foetidus C. B. P. 30. Spatula foetida, plerisque Xyris I. B. tom. 2. l. 19. 730.

Iris vulgaris Germanica, five sylvestris C. B. P. 30. Moris. Hist. 2. 350. Iris vulgaris violacea five purpurea sylvestris I. B. tom. 2. l. 19. 730.

Iris hortensis latifolia C. B. P. 31. Iris vulgaris

- violacea, five purpurea hortensis *I. B. tom.*
2. l. 19. 709.
- Iris hortensis pallidè cœrulea C. B. P. 31.*
- Iris hortensis alba Germanica C. B. P. 31. Iris*
flore albo I. B. tom. 2. l. 19. 719.
- Iris alba Florentina C. B. P. 31. Moris. Hist. 2.*
351. Iris flore albo I. B. tom. 2. l. 19. 719.
- Iris Sufiana, flore maximo ex albo nigricante*
C. B. P. 31. Moris. Hist. 2. 351. Iris latifolia
major Sufiana, vel Chalcedonica, flore ma-
jore variegato, Clusio prima I. B. tom. 2. l.
19. 721.
- Iris Asiatica cœrulea polyanthos C. B. P. 31.*
- Iris Asiatica cœrulea five 2. Clusii Moris. Hist.*
2. 352. Iris Asiatica cœrulea omnium Iri-
dum amplissima, Dalmaticæ affinis I. B. tom.
2. l. 19. 716.
- Iris Dalmatica major C. B. P. 30. Iris Dalmati-*
ca major, flore vulgari minus violaceo I. B.
tom. 2. l. 19. 715.
- Iris latifolia Germanica ochroleucos C. B. P. 31.*
- Iris major latifolia ochroleucos Clus. I. B.*
tom. 2. l. 19. 721.
- Eadem labris dilutè purpureis, bifidis & ere-*
ctis obsoletè flavescentibus.
- Iris latifolia gloriosa Belgarum, labris candi-*
dis, oris purpurascens, petalis erectis
violaceis.
- Iris latifolia Pannonica, colore multiplici*
C. B. P. 31.

Iris latifolia Belgica, odore Sambucci C. B. P.

Iris Lusitanica verna violacea & Clusio

jor latifolia nona, cum venis purpureis

tom. 2. l. 19. 717.

Iris biflora, flore minore, odore Lilii co-

lium C. B. P. 32. Iris biflora Lusitanica,

violaceo Clusio 22. I. B. tom. 2. l. 19. 717.

* Iris palustris lutea, sive Acorus adulter

I. B. tom. 2. l. 17. 732. Moris. Hist. 2.

Acorus adulterinus C. B. P. 34. Foliis

gioribus viridibus.

* Eadem foliis glaucis brevioribus.

Iris lutea sativa C. B. P. 32. Iris lutea,

florum repandis variegatis I. B. tom.

19. 721.

Iris lutea variegata Lobelii C. B. P. 32.

Iris media, longissimis foliis, lutea C. B. P.

Iris Tripolitana, foliis longissimis, flore

I. B. tom. 2. l. 19. 730.

Iris tuberosa pratensis angustifolia, folio

do Moris. Hist. 2. 353. C. B. P. 32.

Iris tuberosa pratensis angustifolia non fo-

altior Moris. Hist. 2. 254. C. B. P. 32. Iris

nuifolia major flore coeruleo & striato,

stifolia 2. I. B. tom. 2. l. 19. 727.

Iris angustifolia Prunum redolens ma-

B. P. 33.

Iris angustifolia hortensis versicolor C. B. P.

Iris angustifolia, flore violaceo, reflexo,

liis lacteis, & purpureis venis variis C.

5. I. B. tom. 2. l. 19. 731.

Iris humilis, seu Chamæiris variegata C. B. P.

^{32.} Iris humilis, seu Chamæiris, flore saturo-vio-
laceo C. B. P. 32.

Iris humilis, seu Chamæiris minor, flore pur-
pureo C. B. P. 33. Moris. Hist. 2. 354. Iris
humilis latifolia minor I. B. tom. 2. l. 725.

Eadem flore atro-purpureo.

Eadem flore variè picto C. B. P. 33. Iris humi-
lis latifolia minor elegantissimè variè picta,
Clusio Chamæiris 7. I. B. tom. 2. l. 19. 725.

Eadem flore purpureo flavescente C. B. P. 33.
Iris humilis latifolia minor, flore vario,
ejus foliis valde incurvis: Clusio Chamæi-
ris 8. I. B. tom. 2. l. 19. 725.

Eadem flore pallido & albo C. B. P. 33.

Eadem flore ochroleuco.

Ejusdem variæ species, floris colore inter se di-
cretæ.

Iris humilis seu Chamæiris angustifolia Gra-
minea. Chamæiris Tab. Moris. Hist. 2. 355.

Iris angustifolia, Prunum redolens minor
C. B. P. 33. Iris Graminea, cui quotannis
pereunt folia. I. B. tom. 2. l. 19. 727.

IRIS bulbosa latifolia præcox, acaulos odora
Moris. Hist. 2. 357. C. B. P. 38. Iris bulbosa
latifolia, flore coeruleo I. B. tom. 2. l. 19. 703.

Eadem flore lactei coloris C. B. P. Var. 38. Iris
bul-

bulbosa latifolia, flore candido I. B. tom.
l. 19. 703.

Iris bulbosa præcox minus odora, Persica
riegata *Moris. Hist. 2. 357.* Iris Persica
riegata præcox *Ferr. Flor. Cult. 152.*
Persica bulbosa variegata præcox *Do
Mem. 83.*

Iris bulbosa latifolia ferotina, caule dor
Moris. Hist. 2. 357. C. B. P. 38.

Iris bulbosa latifolia candida C. B. P. 38.

Eadem Porcellana dicta.

Iris bulbosa major, flore coeruleo, variegata
sive Chamoletta Joh. Rea. *Cat. Hort.
Edinb. Sutherl. 174.*

Eadem flore Lavendulaceo. Chamoletta
vendulacea Belgarum.

Eadem flore purpureo versicolor Joh.
Cat. Hort. Edinb. Sutherl. 174. Chamo
ta purpurea Belgarum.

Iris bulbosa latifolia Hispanica, caule in
Serpentariae maculato *Cat. Hort. Reg. P.
96.* Serpentina Americana Belgarum,
g o

Iris bulbosa angustifolia tricolor C. B. P.
Moris. Desc. Hist. 2. 358.

Eadem foliis albis, ligulâ luteâ, velis sub
ruleis *Cat. Hort. Reg. Paris. 96.*

Iris bulbosa angustifolia, foliis repandis et
teo virescentibus, velis obsoletè xeranthem
linis *Cat. Hort. Reg. Paris. 96.*

Iris bulbosa angustifolia, labris virescentibus, maculâ aureâ, bifidis pallidè cœruleis, erectis, saturatè cœruleis *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.*

Iris bulbosa cœruleo-violacea C. B. P. 40.

Iris bulbosa angustifolia alba C. B. P. 40.

Iris bulbosa alba, oris cœruleis Swertii.

Iris Bulbosa lutea inodora major C. B. P. 39. *Moris. Hist. 2. 358.* *Iris bulbosa lutea* I. B. tom. 2. l. 19. 705.

Iris bulbosa lutea versicolor major & elatior C. B. P. 39. *Moris. Hist. 2. 358.* *Iris bulbosa versicolor flavo-varia*, prima Clusio I. B. tom. 2. l. 19. 706.

Iris bulbosa angustifolia tota aurea *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 175.

Iris bulbosa angustifolia, labris luteis, maculâ aureâ bifidis & erectis pallidè cœruleis *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 175.

Iris bulbosa tricolor surrecta major, multiplici flore *Cat. Hort. Reg. Paris.* 97.

Iris bulbosa angustifolia, pleno flore cœruleo Batavorum *Cat. Hort. Reg. Paris.* 97.

Idum Bulbosarum vario è fatu educatarum varietates plures, versicolore in floribus picturâ mirificè lascivientes.

Iris Uvaria *Prom. Bonæ Spei Stap. v. Apocynum.*

ISATIS fativa vel latifolia C. B. P. 113. *Morif. Hist.* 2. 286. Ifatis, five Glaſtum fativum
I. B. tom. 2. l. 21. 909.

Ifatis ſylveſtris vel anguſtifolia C. B. P. 113.

Ifatis ſylveſtris *Morif. Hist.* 2. 286. Ifatis

Glaſtum ſpontaneum I. B. tom. 2. l. 21. 909.

Ifatis Indica, foliis Roriſmarini, Glaſto

C. P. B. v. Colutea.

Iſchæmum vulgò. v. Gramen daſtylum.

Iva moſchata Monſpeliënſium I. B. v. Chama
pitys.

JUJUBÆ majores oblongæ C. B. P. 446.

Jzipha fativa I. B. tom. 1. l. 6. 40.

* **J**UNCUS acutus maritimus, capitulis rotundis
C. B. P. 11.

Juncus acutus, paniculâ ſparsâ C. B. P. 11.
cus foliaceus I. B. tom. 2. l. 18. 228.

* *Juncus maximus, five Scirpus major* C. B. P. 12.
Juncus maximus holofchænos I. B. tom. 2. l. 18. 525.

* *Juncus five Scirpus medius* C. B. P. 12.

* *Juncus lævis, paniculâ ſparsâ major* C. B. P. 12.
Juncus paniculâ arundinaceâ I. B. tom. 2. l. 18. 520.

* *Juncus lævis paniculâ non ſparsâ* C. B. P. 12.
Juncus Matthioli I. B. tom. 2. l. 18. 520.

* *Juncus capitulis Equiſeti major* C. B. P. 12.
Juncus capitulis longis, five clavatus

tom. 2. l. 18. 525.

Juncellus capitulis Equiseti minor & fluitans
C. B. P. 12. I. B. tom. 2. l. 18. 525.

Juncus Bombycinus I. B. v. Gramen.

JUNCUS floridus major C. B. P. *Juncus* floridus I. B. tom. 2. l. 18. 525.

JUNIPERUS vulgaris fruticosa C. B. C. 488.
Juniperus vulgaris, baccis parvis purpureis
I. B. tom. 2. l. 9. 293.

Juniperus minor montana, folio latiore fructuquè angustiore C. B. P. *Juniperus Alpina*
I. B. tom. 1. l. 9. 301.

Juniperus major, baccâ ruffefcente C. B. P. 489.
Cedrus Phœnicea Bellonio, five *Oxycedrus*, quibusdam *Juniperus* major baccâ rubrâ I. B. tom. 1. l. 9. 297.

Juniperus foliis Cupressi major, fructu flavescente. *Cedrus foliis Cupressi* major, fructu flavescente C. B. P. 487. *Cedrus Lycia*, retusa Bellonio dicta I. B. tom. 1. l. 9. 300.

Juniperus Bormudiana.

In metam fastigiatam suâ sponte excrefcit hæc arbor junipero vulgari tam facie quàm virtutibus similis; Est verò foliis angustioribus tenuioribus in rigidas & leviter pungentes cuspides desinentibus, denso ele-

gantiquè ordine ramulos ambientibus,
pernè glaucis, infernè hilari perpetuo
re nitentibus; Flores fert exiles am-
ceos purpuro-croceos; Baccas rotundas
vellanæ magnitudine, ex fusco phœni-
squamatis aliquot tuberculis obsitas, in
bus tres quatuorvè angulosi arilli, ritu
generum, continentur. Excrevit in An-
feminibus ex Bormudos Insulâ delatis.
Belgia feliciter propagatur per subme-
nem, circumpositionem vel ramulos
fos, & terræ infixos.

Juniperus Virginiana.

Eandem requirit culturam, quam
mudiana, cui & formâ & crescendi mo-
respondet; Ast folia edit angustiora
liora & omnino viridia. Hanc acceptam
ferimus munificentia maximè Rever-
Episcopi Londinensis, stirpium ratio-
æstimatoris incomparabilis, cui ob
gnia hortensia munera in nos collata
tùm debemus.

Juniperus ex Goa.

Hujus propaginem hoc ipso mense tra-
misit ad nos ex Angliâ Dnus Watfius
mine, Cedri ex Goa. Ramis est magis
panfis gracilibus foliis glaucis, tenuissimis
& brevissimis. Coeteroquin superiori
detur similis.

LUGDUNO-BATAVUS.

347

UNIPERUS BORMUDIANA.

K.

KALI majus, cochleato semine
C. B. P. 289. Moris. Hist. 2. 609.
Kali vulgare I. B. tom. 3. 35.
ANN.

Kali minus album, semine splendente
289. Moris. Hist. 2. 607. Kali minus,
Sedum minus arborescens vermiculatum
I. B. tom. 3. l. 35. 705. ANN.

* Kali geniculatum majus C. B. P. 289. Moris.
2. 611. Kali geniculatum, sive Salicornia
I. B. tom. 3. l. 35. 704. ANN.

Kali fruticosum minus, flore minore
Hist. 2. 611. Sedum minus fruticosum
P. 284. Sedum minimum arborescens
miculatum, flore luteo I. B. tom. 3. l. 35.

* Kali species, sive Vermicularis marina
arborescens I. B. tom. 3. l. 35. 705.

* Kali spinoso affinis C. B. P. 289. Kali
spinosa Planta Moris. Hist. 2. 611. Kali
spinosa Matthioli, sive Kali spinosum
tom. 3. l. 35. 706. Anthyllis Chamædrys
des frutescens C. B. P. 282.

Kali Crassulæ minoris folio C. B. P. & M.
v. Ficoides.

Kapamava Hort Mal. v. Anacardium.

Katmer Bouhour Turcarum Corn. v. Cornu
men.

Ketmia Syrorum Moris. & I. B. v. Althæa.
Knawel Tragi Moris. v. Polygonum.

L.

Lablab *Alpini. v. Phaseolus.*
Labrum Veneris I. B. v. Dipfacus.
Luburnum I. B. v. Anagyris.
Laburnum Zeylanicum. v. Cro-
alaria.

Lachryma Jobi multis, sive Milium Arundina-
ceum I. B. v. Milium.

LACTUCA *fativa C. B. P. 122. Lactuca fativa*
vulgaris non capitata I. B. tom. 2. l. 24. 997.
 ANN.

Lactuca foliis Endiviæ C. B. 122. ANN.

Lactuca maculosa C. B. P. 123. Lactuca rubra
I. B. tom. 2. l. 24. 998. ANN.

Lactuca folio obscurius virente semine nigro
C. B. P. 123. Lactuca Romana longa dulcis
I. B. tom. 2. l. 24. 998.

Lactuca Italica laciniata C. B. P. 123. ANN.

Lactuca capitata C. B. P. 123. Lactuca fativa
vulgaris capitata I. B. tom. 2. l. 24. 997. ANN.

Lactuca fativa maxima Austriaca capitata va-
riegata Lactuca Caryophyllacea vulgò.
 ANN.

Refert variegato colore Caryophyllum
hortensem.

Lactuca crispa C. B. P. 123. Lactuca crispa &
tenuiter dissecta I. B. tom. 2. l. 24. 999. ANN.
 Lactuca

Lactuca crispa altera C. B. P. 123. *Lactuca*
crispa laciniata I. B. *tom.* 2. l. 24. 999. ANN.

* *Lactuca sylvestris*, costâ spinosâ C. B. P.
Lactuca sylvestris, sive *Endivia* mul-
ta, folio laciniato, dorso spinoso I. B.
 2. l. 24. 1003. ANN.

Lactuca sylvestris, odore viroso C. B. P.
Lactuca sylvestris, lato folio, succo vi-
 1. B. *tom.* 2. l. 24. 1002. ANN.

Lactuca montana purpureo-cærulea C. B. P.
Sonchus.

Ladanum segetum, flore rubro quorundam
 v. *Sideritis*.

Lagopus ejusquè species I. B. v. *Trifolium*.

L A M I U M Arboreum perenne Canad.
Zan. Hist. Botan. 112.

* *Lamium purpureum foetidum*, folio fo-
tundo, sive *Galeopsis* Dioscoridi c.
 230. *Galeopsis* sive *Urtica iners*, flore
purascens majore, folio non maculato
tom. 3. l. 28. 321. ANN.

* *Idem minus*. ANN.

* *Lamium album non foetens*, folio oblo-
 C. B. P. 231. *Galeopsis*, sive *Urtica in-*
floribus albis I. B. *tom.* 3. l. 28. 324.

* *Idem minus* *Cat. Hort. Reg. Paris.* 99.

Lamium folio oblongo luteum C. B. P.
Galeopsis, sive *Urtica iners*, flore luteo
tom. 3. l. 28. 325.

Idem maculis albis respersum. An Lamium luteum folis maculatis *Sutherl. Cat. Edinb.* 181.

Lamium albâ lineâ notatum *C.B.P.* 231. Galeopsis folio maculato *I. B. tom. 3. l. 28.* 324.

* Lamium foliis caulem ambientibus, majus *C.B.P.* 231. Galeopsis, five Urtica iners minor, folio caulem ambiente *I. B. app. tom. 3.* 853, ANN.

* Lamium folio caulem ambiente minus *C.B.P.* 231. ANN.

Lamium maximum sylvaticum foetidum *C.B.P.* 231. Galeopsis, five Urtica iners magna foetidissima *I. B. App. tom. 3.* 853.

Lamium maximum sylvaticum alterum *C.B.P.* 223. Galeopsis maxima, flore magno rubro *I. B. tom. 3. App.* 853.

Idem folio variegato.

* Lamium paludosum Belgicum, Melissæ folio. ANN.

Exilem albicantem fibrosam gerit radicem, cauliculum palmarem aliquando longiorem, quadrangulum, geniculatum, subhirsutum, in ramos divisum, quorum geniculis adstant folia ex longioribus petiolis binæ ex adverso, Melissæ foliis paria, sed graciliora. Summitates ambiunt verticillatâ serie flosculi exigui, pallide purpurascens, galeâ angustiori minori & integrâ, labello majori latiori & trilobato. Hos excipiunt semina

mina fusca quaterna in utriculis folia
quinq̄uifidis. Sponte suâ luxuriat in
dosis Belgiæ, foetido & gravi odore ad
generes species accedens.

Lamium montanum Melissæ folio C. B. P.
Melissa.

Lamium Astragalodes Corn. V. Scutella

Lamium peregrinum C. B. P. Scutellaria.

Lanigera arbor peregrina I. B. v. Gossamp

Lantana I. B. v. Viburnum.

L APATHUM præstantissimum, Rhaba

rum Officinarum dictum *Moris. Hist.*

677. Rhabarbarum Officinarum C. B. P.

Rhaponticum folio Lapathi majoris

bro, Rha & Rheum Dioscoridis C. B. P.

Rhabarbarum I. B. tom. 2. l. 23. 989.

ponticum I. B. l. 23. 984. Rha & Rhapo

cum I. B. App. tom. 2. 1069.

Lapathum Alpinum, folio subrotundo M

Hist. 2. 578. Lapathum hortense rotund

lium, five montanum C. P. B. 115. Lapath

folio rotundo Alpinum I. B. tom. 2. l. 23. 9

Lapathum hortense latifolium C. P. B.

Lapathum majus, five Rhabarbarum

nachorum I. B. tom. 2. l. 23. 985.

* Lapathum folio acuto plano C. B. P. 115.

pathum acutum. *Moris. Hist.* 2. 578.

pathum acutum, five Oxylapathum

tom. 2 l. 23. 983.

* Lapathum folio minùs acuto C. B. P. 125.

LAMIUM MELISSÆ FOLIO, PALUDOSUM BELGICUM.

pathum vulgare, folio obtuso *I. B. tom. 2. l. 23. 984.*

Lapathum hortense, folio oblongo, sive secundum Dioscoridis *C. B. P. 114. Moris. Hist. 2. 579.*

Lapathum sativum Lapas *I. B. tom. 2. l. 23. 985.*

* Lapathum aquaticum, folio cubitali *C. B. P. 116. Lapathum maximum aquaticum Hydrolapathum I. B. tom. 2. l. 23. 986. Britannica antiquorum vera Munting. Vera Herba Britan. 1.*

* Lapathum folio acuto rubente *C. B. P. 115. Lapathum sanguineum, sive Sanguisconis, Herba I. B. tom. 2. l. 23. 988.*

* Lapathum folio acuto crispo *C. B. P. 115. Moris. Hist. 2. 579. Lapathum acutum crispum I. B. tom. 2. l. 23. 988. & Lapathum aquaticum minus C. B. P. 116. I. B. tom. 2. l. 23. 987.*

* Lapathum minimum *C. B. P. 115. Moris. Hist. 2. 579. Lapathum acutum minimum I. B. tom. 2. l. 23. 985.*

* Lapathum sylvestre, folio subrotundo, foliis involucris dentatis *Moris. Hist. 2. 580.*

* Idem folio oblongo paludosum Belgicum

* Lapathum ramis procumbentibus, foliis involucri dentato, foliis inferioribus fide instar *Moris. Hist. 2. 580. Lapathum Boniense sinuatum I. B. tom. 2. l. 688. Lapathum Parisiense sinuatum Hort. Reg. Paris. 100.*

Lapathum hortense, semine spinoso, non spinoso
& sterile. v. Spinachia.

Lapathum unctuosum folio triangulo C. B. P.
v. Blitum.

*LAPPA major C. B. P. 198. Personata, five
Lappa major. An Bardana? I. B. tom. 3.
l. 32. 570. ANN.

*Lappa major montana, capitulis tomentosis,
five Arctium C. B. P. 198. Personata altera,
cum capitulis villosis I. B. tom. 3. l. 32. 571,
ANN.

Lappa minor C. B. P. v. Xanthium.

Lappula canaria latifolia, ejusque species I. B.
v. Caucalis.

LARIX C. B. P. 493. Larix folio deciduo, co-
nifera I. B. tom. 1. l. 9. 265.

LASERPITIUM foliis latioribus lobatis Mo-
ris. Umbell. 28. Libanotis latifolia altera,
five vulgator 157. Libanotis Theophrasti
quorundam, five Sefeli Æthiopicum Mat-
thiolo, Cervaria alba I. B. tom. 3. l. 27. 164.
LasERPITIUM Daucoides Prutenicum, viscoso
semine Breyn. Cent. 167. Prodr. 40.

LasERPITIUM foliis angustioribus saturatè vi-
rentibus & lucidis Moris. Umbell. 28.

LasERPITIUM foliis angustioribus dilutè viren-
tibus Moris. Umbell. 28. LasERPITIUM Gal-
licum

licum C. B. P. 156. Laserpitium è re

Massiliæ allatum I. B. tom. 3. l. 27. 137.

Laserpitio Lobelii similis, angustifolia I. B.

3. l. 27. 137.

Lathyrus major C. B. P. & *minor* I. B. thymalus.

* **L**ATHYRUS radice tuberosâ repente
Hist. 2. 51. *Lathyrus arvensis repens*
rosus C. B. P. 344. *Chamæbalanus legu-*
nosa I. B. tom. 1. l. 17. 324.

* *Lathyrus sylvestris & dumetorum*, flore
Moris. Hist. 2. 344. *Lathyrus luteus*
stris dumetorum I. B. tom. 2. l. 17. 304.

Lathyrus latifolius C. B. P. 344. Moris. Hist. 2. 51. *Lathyrus major latifolia*, flore
purpureo speciosior I. B. tom. 3. l. 17. 307.

Lathyrus angustifolius Narbonensis major
tom. 3. l. 17. 307. Moris. Hist. 2. 50. *Lathyrus*
angustifolius, alter Moris. Hist. 2. 51. *Lathyrus*

major sylvestris, alter C. B. P. 344.

Lathyrus ἀμφίκαρπος, seu supra infraque
ram filiquas gerens Moris. Hist. 2. 51. *Lathyrus*
similis supra infraque terram fructum
C. B. P. 345. *Arachidna* vulgò.

Lathyrus sativus minor, semine anguloso
Moris. Hist. 2. 52. *Lathyrus sativus*, flore

ctuque albo C. B. P. 343. *Lathyrus angustifolius*
semine I. B. tom. 2. l. 17. 307. ANN.

Idem flore purpureo Moris. Hist. 2. 54. *Lathyrus*

- rus sativus, flore purpureo *C.B.P.* 344. ANN.
Lathyrus Narbonensi similis annuus. ANN.
Lathyrus arvensis, filiquis Pisi minoris *Moris. Hist.* 2. 52. ANN.
Lathyrus arvensis annuus luteus, filiquis hirsutis *Moris. Hist.* 2. 52. Lathyrus filiquâ hirsutâ *I. B. tom.* 2. l. 17. 305. Lathyrus angustifolius filiquâ hirsutâ *C. B. P.* 394. ANN.
Lathyrus annuus flore coeruleo Ochri filiquâ. ANN.
Lathyrus Boeticus, flore luteo *Moris. Hist.* 2. 51. ANN.
Lathyrus Hispanicus, flore luteo. ANN.
Lathyrus luteus annuus, foliis Convolvuli minoris *Moris. Hist.* 2. 52. Vicia sylvestris lutea, foliis Convolvuli minoris *C. B. P.* 345.
Vicia quæ Pitina Anguillaræ, latâ filiquâ, flore luteo *I. B. tom.* 2. l. 17. 317. Aphaca vulgò. ANN.
Lathyrus Tingitanus, filiquis Orobi, flore amplo ruberrimo *Moris. Hist.* 2. 55. ANN.
Lathyrus Vicioides, floris vexillo phœniceo, foliis labialibus subalbescens, filiquis Orobi *Moris. Hist.* 2. 55. ANN.
Lathyrus Vicioides vexillo rubro, labialibus petalis rostrum ambientibus coeruleis *Moris. Hist.* 2. 56. ANN.
Lathyrus angustifolius leptomacrolobus, semine rotundo, flore rubello *Moris. Hist.* 2. 56. ANN.

358 HORTUS ACADEMICUS.

Lathyrus angustifolius leptomacrolobus
mine anguloso, flore cœruleo *Morif.*
2. 56. ANN.

Lathyrus sylvestris C. B. P. 344. *Morif.*
2. 56. *Catanance leguminosa* quorundam
I. B. tom. 2. l. 17. 309. ANN.

Lathyrus folio integro, producente bina
liola, capreolos emittentia *Morif. Hist.*
58. *Ochrus folio integro*, capreolos emittentia
C. B. P. 343. *Lathyri species quarundam*
vilis sylvestris Dodonæi I. B. tom. 2. l. 17. 305. ANN.

Idem fructu hispido ex cœruleo nigricante
semine pullo *Cat. Hort. Reg. Paris.*
Semine pullo C. B. P. *Var.* 343. ANN.

LAVANDULA latifolia C. B. P. 216. *Pseudonardus*, quæ vulgo Spica *I. B. tom. 3. l. 28. 280.*

Lavandula angustifolia C. B. P. 216. *Pseudonardus*, quæ *Lavendula* vulgò *I. B. tom. 3. l. 28. 281. Flore violaceo.*

Eadem flore albo C. B. P. 217. *I. B. tom. 3. l. 28. 381.*

Lavandula folio dissecto C. B. P. 216. *Lavendula multifido folio* *I. B. tom. 3. l. 28. 281. ANN.*

LAUREOLA semper virens, flore viridi, quæ
busdam *Laureola* Mas C. B. P. 462. *Laureola semper virens*, flore luteolo *I. B. tom. 3. l. 5. 564.*

- Laureola folio deciduo, flore purpureo C. B. P.
 462. Laureola folio deciduo, five Mezereum
 Germanicum I. B. tom. 1. l. 5. 566.
 Eadem flore sub purpureo C. B. P. Var. 462.
 Eadem flore albo C. B. P. Var. 462.
 Eadem folio deciduo variegato Cat. Hort. E-
 dinb. Suntherl. 189.

- L A U R U S Indica Hort. Farnes. Aldin. 60.
 Laurus Americana Sterb. Citr. cultur. 257.
 Laurus Regia Cat. Hort. Paris. 102.
 Laurus latifolia *πλατυπύρα* Diosc. C. B. P. 460.
 Laurus vulgaris C. B. P. 460. Laurus I. B. tom.
 1. l. 4. 405.
 Laurus vulgaris, folio undulato Cat. Hort. Reg.
 Paris. 102.
 Laurus tenuifolia mas Tab. 1361.
 Lauro serrata odorata Stapelianæ similis in-
 odora Capitis Bonæ Spei Breyn. Prodr. v.
 Evonymo adfinis.
 Lauro Cerasus I. B. v. Cerasus.
 Laurus non odora fructu globoso Africana Ster-
 beck. v. Evonymo adfinis.

- L A U R U S sylvestris, Corni Fœminæ foliis
 subhirsutis C. B. P. 461. Laurus Tinus five
 sylvestris I. B. tom. 1. l. 4. 419.
 Laurus sylvestris, foliis venosis C. B. P. 461.
 Tinus altera I. B. tom. 1. l. 4. 419.
 Laurus sylvestris, folio minori C. B. P. 461.

LAURUS Alexandrina, fructu pediculo
fidente C. B. P. 304. Bonifacia sive Bis-
gua I. B. tom. 1. l. 5. 557.

Laurus Alexandrina, fructu folio infidente
B. P. 305. Laurus Alexandrina I. B. tom.
l. 5. 574. Hippoglossum Matth.

Laurus Alexandrina ramosa, fructu è sum-
mate caulium prodeunte Cat. Reg. Paris.
Ledon ejusque species I. B. v. Cistus.

LENS vulgaris minor Moris. Hist. 2.
Lens vulgaris C. B. P. 346. Lens I. B.
2. l. 17. 317. ANN.

Lens major C. B. P. 346. Moris. Hist. 2. 59.
tom. 2. l. 17. 317. ANN.

Lens monanthos. ANN.

* **L**ENTICULA palustris vulgaris C. B. P.
Lens palustris I. B. tom. 3. l. 38. 785.

* Lenticula palustris major Cat. Plant. Holl.
Camel. 63.

* Lenticula aquatica trifulca C. B. P. 362.
tom. 3. l. 38. 786.

* Lenticula palustris quadrifolia C. B. P.
Lens palustris quadrifolia I. B. tom.
38. 385.

LENTISCUS vulgaris C. B. P. 399. Le-
scus I. B. tom. 1. l. 3. 283. Foliis ampli-
bus & viridioribus.

Eadem foliis minoribus & pallidioribus.
Lentiscus Peruana C. B. P. 399. Molle
tom. 1. l. 5. 535.

LEONTOPETALON C. B. P. 324. *Moris. Hist. 2. 285. I. B. tom. 3. l. 30. 489.*
Leonurus Breyn. v. Cardiaca.
Leonurus annuus Americanus vulgò. v. Cardiaca.

LEPIDIUM latifolium ferratum *Moris. Hist. 2. 312.* Lepidium latifolium C. B. P. 97.
 Lepidium Pauli I. B. tom. 2. l. 22. 941.
 Lepidium Glaustifolium C. B. P. 97. Lepidium Glaustifolium perenne *Moris. Hist. 2. 312.* Lepidium non repens I. B. tom. 2. l. 22. 941. ANN
Lepidium Dentillaria dictum C. B. P. v. Dentillaria.
Leucanthemum Dioscoridis C. B. P. & vulgare amarum I. B. v. Chamæmælum.
Leucanthemum I. B. v. Lychnis.
Leucanthemo Affinis I. B. v. Lychnis.

LEUCOJUM bulbosum minus præcox, tribus petalis albis minoribus, cingentibus terna minora herbacei coloris *Moris. Hist. 2. 364.* Leucojum bulbosum trifolium minus C. B. P. 56. Leucojum bulbosum minus, triphyllon I. B. tom. 2. l. 19. 591.
 Leucojum bulbosum majus præcox, Bizantinum, tribus petalis albis majoribus, terna minora herbacea seu viridia cingentibus *Moris. Hist. 2. 364.* Leucojum bulbosum trifolium, majus C. B. P. 56. Leucojum bul-
 Z 5 bo-

bosum præcox, Byzantinum I. B. tom. 2. l. 19. 591.

Leucojum bulbosum præcox majus, sex perianthis æqualibus & albis *Moris. Hist. 2. 364.* Leucojum bulbosum vulgare C. B. P. 55. Leucojum bulbosum hexaphyllum cum unico perianthe, rarius bino I. B. tom. 2. l. 19. 590.

Leucojum bulbosum serotinum majus, multiflorum *Moris. Hist. 2. 364.* Leucojum bulbosum majus, sive multiflorum, quod aliqui Acrocorion Plinii statuunt C. B. P. 55. Leucojum bulbosum polyanthemum tardius florens, floribus minoribus I. B. tom. 2. l. 19. 562. Floribus simplicibus.

Idem floribus plenis.

L E U C O J U M incanum majus C. B. P. 200. *Moris. Hist. 2. 240.* Leucojum hyemale, diu durans album I. B. tom. 2. l. 21. 874. ANN.

Idem roseum I. B. tom. 2. l. 21. 874. ANN.

Idem purpureum I. B. tom. 2. l. 21. 874. Leucojum purpureum vel rubrum C. B. P. 200. ANN.

Idem coccineum *Moris. Hist. 2. 240.* ANN.

Idem variegatum. Leucojum incanum majus variegatum, simplici flore *Moris. Hist. 2. 240.* C. B. P. 240. Vario colore. ANN.

Leucojum incanum majus multiplex C. B. P. 200. flore multiplici plenovè *Moris. Hist. 2. 240.* Purpuro-violaceo C. B. P. *Var.* ANN.

Idem

Idem flore rubro C. B. P. *Var.* 200. *Moris. Hist.*
2. 240. ANN.

Idem flore purpureo C. B. P. 200. *Moris. Hist.*
2. 240. ANN.

Idem flore albo C. B. P. *Var.* 200. Flore candi-
do *Moris. Hist.* 2. 240. ANN.

Idem flore variegato. *Leucojum incanum* ma-
jus variegatum, pleno flore C. B. P. 201. *Mo-*
ris. Hist. 2. 241. Vario colore. ANN.

Idem foliis in ambitu argenteis. ANN.

Leucojum maritimum latifolium, annuum
Moris. Hist. 2. 241. *Leucojum maritimum*
latifolium C. B. P. 201. *Leucojum mariti-*
um latifolium, flore cœruleo-purpurante
I. B. tom. 2. l. 21. 880. ANN.

Leucojum maritimum, sinuato folio C. B. P.
201. *Moris. Hist.* 2. 241. *Leucojum mariti-*
um magnum latifolium I. B. tom. 2. l. 21.
875. ANN.

Leucojum maritimum angustifolium C. B. P.
201. *Moris. Hist.* 2. 241. *Leucojum maritimum*
angustifolium I. B. tom. 2. l. 21. 876. ANN.

Leucojum maritimum, foliis & filiquâ hirsu-
tis, eaque tribus in summo apicibus donatâ
Moris. Hist. 2. 242. *Leucojis* affine *Tripo-*
lium Anguillare, & *Leucojum maritimum*
Camerarii I. B. tom. 2. l. 21. 876. ANN.

Leucojum flore albo, filiquis uno versu dispo-
sitis & reflexis *Moris. Hist.* 2. 243. *Brassica*
sylvestris, foliis integris per terram stratis,
& in

& in caulibus hispidis *Moris. Hist. 2. 211*

Brassica sylvestris hispida, non ramola C.

P. 112. Turritis vulgatio I. B. tom. 2.

21, 836.

Leucojum Africanum coeruleo flore, latifolium hirsutum. ANN.

Ex radiculâ tenui albente fibrosâ exoritur caules singulares vel ramosi, bipalmati

graciles hirsuti, atro-virentes, quibus ad

morum sinus adstant folia non nihil sinuosa

pilosa, crassiuscula, integra, rarò laciniis incisa,

digitum lata, unguem nunc latiora nunc

angustiora, nervis venisvè nullis inscriptis.

Flores brevibus insident petiolis formâ

colore Lini sativi floribus æmuli, ast quatuor

tantum petalis constructi, totidemque

subtus viridantibus parvis foliolis muniti.

Hos excipiunt siliquæ digitum longæ, angustæ,

compressæ, bivalves & bicapsulæræ

quarum septo intermedio ab utraqûe parte

hærent semina exigua, rufescentia, oblonga,

paululùm compressa. Incola est Præmontorii

Bonæ Spei, amans saxosa, incultis sole illustrata.

Seminum sapor deprehenditur subacris; Odor florum nullus.

Leucojum Africanum, coeruleo flore, angustifolium

Coronopi folio, majus. ANN.

Hoc altiùs assurgit, cauliculis, foliisque

glabris, angustis, Coronopi in modum dissectis,

rarò integris; Floribus amplioribus

LEUCOIUM AFRICANUM COERULEO
FLORE, LATIFOLIUM HIRSUTUM.

bus; Siliquis torosis angustissimis; Cat.
superiori respondent. Nacti sumus ex
ralitate supra laudati Petri de Wolff in
jus viridario ex seminibus Africis pro
tum, retro acto anno offendimus.

Idem minus. ANN.

Ab antecedente differt partium
um exilitate.

*Leucojum maritimum parvum folio viri
crassiusculo I. B. v. Draba.*

LEUCOJUM flore albo odoratissimo, fo
lucidè virente *Moris.* 243. *Leucojum*
bum odoratissimum, folio viridi C. B. P. 202.
Leucojum hyemale diu durans, flore al
folio viridi & livido glabro I. B. tom. 2.
21. 875. ANN.

* *Leucojum luteum vulgare* C. B. P. 202. *M*
Hist. 2. 243. *Leucojum luteum* vulgò, Cl
flore simplici. I. B. tom. 2. l. 21. 874.

Leucojum luteum sylvestre angustifolium
B. P. 202. *Moris. Hist.* 244. *Leucojum*
teum sylvestre Clusii I. B. tom. 2. l. 21. 874.

Leucojum luteum, pleno flore majus C. B.
202.

Idem flore ex purpureo colore & aureo vari
Cat. Hort. Reg. Paris. 114.

Leucojum pleno flore minus C. B. P. 202.
ris. Hist. 2. 244. *Leucojum luteum, pl*
flore I. B. tom. 2. l. 21. 873.

LUGDUNO-BATAVUS.

367

LEUCOIUM AFRICANUM, COERULEO FLORE, CO-
RONOPI ANGUSTO FOLIO, MINUS.

LEUCOJUM lunatum seu lunarium
folium majus annuum, filiquâ rotundâ,
violaceo seu subcœruleo *Moris. Hist. 2.*
Viola lunaria major, filiquâ rotundâ c.
203. Lunaria major, filiquâ rotundiore
tom. 2. l. 21. 881. Flore purpureo. ANN.

Idem flore variegato. ANN.

Leucojum majus perenne filiquâ lunatâ
Coronatâ *Moris. Hist. 2. 246.* Viola luna
major, filiquâ oblonga. C. B. P. 203. Luna
major, filiquâ longiore *I. B. tom. 2. l. 21.*
Flore ex albo subcœruleo.

Idem flore purpureo.

Leucojum asperum, filiquis asperis clype
mibus *Moris. Hist. 2. 246.* Leucojum
foides clypeatum majus. C. B. P. 201. A
son filiquâ latâ asperâ, quibusdam Luna
flore luteo *I. B. tom. 2. l. 22. 934.* ANN.

Leucojum montanum flore pedato, *Col. M.*
Hist. 2. 247. Thlaspi biseutatum villos
flore calcari donato. C. B. P. 107. ANN.

Leucojum incanum, filiquis tumidis subro
dis *Moris. Hist. 2. 247.* Leucojum incan
filiquis rotundis C. B. P. 202.

Leucojum biseutatum asperum, Hieracifol
majus *Moris. Hist. 2. 249.* Thlaspi bise
tum asperum Hieracifolium & majus.
P. 107. Lunaria biseutata. *I. B. tom. 2. l.*
935. ANN.

Leucojum biseutatum asperum minus C.

Moris. Hist. 2. 249. ANN.

Levisticum vulgò. v. *Ligusticum*.

LIBANOTIS nigra, seu Saxifragia Vene-
torum. Lob. Moris. Umbell. 42. Daucus
montanus, Apii folio, major C.B.P. 150. Li-
banotis altera quorundam, aliis dicta Cerva-
ria nigra I. B. tom. 3. l. 27. 165.

Libanotis latifolia altera sive vulgatio C. B. P.
v. *Laserpitium*.

Libanotis latifolia, Aquilegiæ foliis C. B. P. v.
Siler.

Libanotis Ferulæ folio, semine anguloso. C. B. P.
v. *Cachrys*.

Libanotis Ferulæ folio & semine C. B. P. v.
Ferula.

Libanotis cachryophoros quibusdam floribus
luteis I. B. v. *Cachrys*.

Libanotis quibusdam flore luteo, semine Ferulæ
I. B. v. *Ferula*.

LICHEN petræus latifolius, sive Hepatica
fontana C. B. P. 362. Lichen sive Hepatica
fontana I. B. tom. 3. l. 37. 758.

Lichen petræus stellatus C. B. P. 362.

Lichen petræus umbellatus C. B. P. 362.

Lichen petræus, caliculo calceato C. B. P. 362.

Lichen petræus minimus, fructu Orobi C. B. P.
362.

Lichen cinereus terrestris J. Raii Cat. Plant.
Angl. 185.

* Lichen capillaceus, ex plurimis capillamentis
nigricantibus constans *Merett. Pin.* 72.
Lichen Arboreus I. B. v. Muscus.

* LIGUSTICUM *Moris. Umb.* 7. Ligusticum
cum vulgare, an Libanotis fertilis C. B. P.
157? Ligusticum vulgare, foliis Apii I. B. P.
3. l. 27. 122. Levisticum vulgò.

Ligusticum quod Seseli Officinarum C. B. P.
Siler.

Ligusticum Rauwolffi, foliis Aquilegiae I. B. P.
Siler.

LIGUSTRUM Germanicum C. B. P. 475.
Ligustrum I. B. *tom.* 1. l. 5. 529.

Idem foliis argentatis *Breyn. Prodr.* 41.

Idem foliis auratis *Breyn. Prodr.* 41.

Ligustrum foliis laciniatis C. B. P. v. Syringa.

Idem foliis integris C. H. R. P. v. Syringa.

LILIUM Persicum C. B. P. 79. *Moris. Hist.*
406. Lilium Persicum sive Susianum
tom. 2. l. 19. 699.

Lilium, sive Corona Imperialis C. B. P.

Moris. Hist. 2. 406. Corona Imperialis

Tusai aliis I. B. *tom.* 2. l. 19. 697.

Idem foliis variegatis *Moris. Hist.* 2. 407.

lilium sive Corona Imperialis Sinensium

foliis variegatis *Cat. Hort. Reg. Paris.*

Lilium sive Corona Imperialis flore rubro

te aut Sandaracæ Sandycisve colorem refe-
rens, instar astaci elixi chelarum ferè *Moris.*
Hist. 2. 402.

Lilium sive Corona Imperialis, flore multipli-
ci *Joh. Rea. Flor. Cat. Hort. Edinb. Sutherl.*

199. Lilium sive Corona Imperialis, flore
pleno *Cat. Hort. Reg. Paris.* 107.

Lilium sive Corona Imperialis, flore luteo
Joh. Rea. Flor. Cat. Hort. Edinb. Sutherl.
199.

Idem flore luteo striato *Cat. Hort. Edinb. Su-
therl.* 199.

Lilium, sive Corona Imperialis duplici coro-
na C. B. P. 79. *Moris. Hist.* 2. 407.

Idem triplici corona, seu triplici florum ordi-
ne *Cat. Hort. Lugd. Schuyli* 23.

Lilium, sive Corona Imperialis multiflora la-
toquè caule C. B. P. 69. *Moris. Hist.* 2. 407.

Lilium, sive Corona Imperialis ramosa C. B. P.
97. *Moris. Hist.* 2. 407.

Lilium, sive Corona Imperialis per omnia
major *Cat. Hort. Reg. Paris.* 106.

LILIIUM Martagon montanum majus flori-
bus reflexis *Moris. Hist.* 2. 408. Lilium flo-
re nutante maximum I. B. tom 2. 19. 694.

Idem minus. Lilium floribus reflexis monta-
num C. B. P. 77. Lilium flore nutante fer-
rugineo majus I. B. tom. 2. l. 19. 692.

Idem flore carneo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 106.

flore albicante C. B. P. 77. *Moris. Hist. 2. descr. 408.*

Lilium Martagon, floribus reflexis rubris punctatum *Moris. Hist. 2. 408.* *Lilium* floribus reflexis alterum, lanugine hirsutum.

Idem non punctatum *Moris. Hist. 2. 408.* Floribus dilutè purpurascens, maculis purpureis C. B. P. *Var. 78.*

Lilium Martagon, floribus reflexis albis punctatis *Moris. Hist. 2. 408.* C. B. P. 78.

Idem non punctatis *Moris. Hist. 2. 408.* C. B. P. 78. *Lilium* flore nutante albo I. B. tom. 2. l. 19. 694.

Lilium floribus reflexis polyanthos albis punctatum C. B. P. 78. *Moris. descr. Hist. 2. 408.*

Lilium Martagon Canadense maculatum *Park. Moris. Hist. 2. 408.*

Lilium angustifolium purpureo-fanguineum flore reflexo *Moris. Hist. 2. 408.* *Lilium* purpureo-fanguineum, flore reflexo C. B. P. 78. *Lilium* flore miniato nutante, sive hemerocallis Chalcedonica quibusdam I. B. tom. 2. l. 19. 695. *Præcox.*

Idem serotinum *Moris. Hist. 2. 409.*

Lilium Byzantinum miniatum C. B. P. 78. *Moris. Hist. 2. descr. 408.*

Lilium brevi & Gramineo folio C. B. P. 78. *Lilium præcox*, nutante flore rubro, tenuius *I. B. tom. 2. l. 19. 696.*

Lilium miniatum angustifolium odorum C. B.
P. 79. Martagon Pomponii Clusii *Moris.*
Hist. 2. 409.

Lilium Martagon flavum angustifolium C. B.
P. 79. *Moris.* *Hist.* 2. 409. Martagon flore
luteo præcox I. B. tom. 2. l. 19. 697.

Idem serotinum, foliis latioribus, atro-viren-
tibus, flore saturè phœniceo Lob. C. B. P.
Var. 79.

LILIUM album vulgare & odoratum, flo-
re erecto *Moris.* *Hist.* 2. 409. *Lilium* album
vulgare, flore erecto & vulgare C. B. P. 76.

Lilium album vulgare I. B. tom. 2. l. 19. 685.
Lilium lato caule, multiflorum *Cat. Hort.*
Reg. Paris. 405. *Lilium* album Syriacum
Rauwolfii I. B. tom. 2. l. 19. 697.

Lilium album, flore pleno *Cat. Hort. Lugd.*
Schuyl. 42.

Lilium album floribus dependentibus five pe-
regrinum C. B. P. 76. *Lilium* album peregri-
num, floribus albis, & foliis angustioribus
Moris. *Hist.* 2. 409. *Lilium* album Constan-
tinopolitanum, Sultan Zambach dictum
Clusii I. B. tom. 2. l. 19. 697.

Lilium Canadense, imperfectis floribus & ir-
regularibus multis albis *Moris.* *Hist.* 2. 410.

Lilium purpureo croceum majus C. B. P. 76.
Moris. *Hist.* 2. 411. *Lilium* rubens croceum
majus I. B. tom. 2. l. 19. 688.

Idem flore pleno C. B. P. 77.

Lilium purpuro-croceum minus C. B. P.

Lilium rubens vel croceum minus I. B. tom.

2. l. 19. 689.

Lilium bulbiferum latifolium majus C. B. P.

Moris. Hist. 2. 411.

Idem bulbiferum minus C. B. P. 77. *Moris. Hist.*

2. 411. Lilium bulbiferum repens I. B. tom.

2. l. 19. 691.

Lilium bulbiferum incanum C. B. P. 77. *Moris.*

Hist. 2. descr. 411. I. B. tom. 2. l. 19. 691.

Lilium Africanum, Narcissinis foliis, poly-

thos saturo colore purpurascens. *Liliona-*

cissus Indicus, saturato colore purpurascens

Moris. Hist. 2. 367. Narcissus Indicus

ceus, saturo colore purpurascens *Fer. Flor.*

cult. 119.

Idem diluto colore purpurascens. *Narcissus*

Indicus liliaceus, diluto colore purpur-

ascens *Fer. Flor. cult. 121.*

Lilium Indicum, Narcissinis foliis, monanth-

rubrum. *Lilio-narcissus Jacobæus latifolius*

Indicus, rubro flore *Moris. Hist. 2. 367.*

Narcissus Indicus totus ruber C. B. P. 49.

Narcissus Indicus latifolius, rubro flore

tom. 2. l. 19. 609.

Idem ex albo rubrum. *Narcissus ex albo rub-*

ascens C. B. P. 49.

Lilium Africanum sphaericum, floribus pho-

niceis majoribus, bulbo rotundo *Lilio-na-*

cissus

cissus Indicus maximus sphœericus, floribus plurimis rubris Liliaceis *Moris. Hist. 2. 368.*
Narcissus Indicus, flore Liliaceo, sphœericus *Ferr. Flor. cult. 129.*

Lilium Africanum sphœericum, floribus obsoletè puniceis minoribus, foliis guttatis, ad margines ciliî instar pilosis, bulbo oblongo. Bulbus oblongus Æthiopicus, foliis guttatis & ciliî instar pilosis *Breyn. Cent. 1. 89.*

LILIUM luteum, radice Asphodeli C. B. P. 80. *Moris. Hist. 2. 412.* Lilium Asphodeli radice luteum, sive Lilio-asphodelus quorundam, flore luteo I. B. tom. 2. l. 19. 700.

Idem minus *Moris. Hist. 2. descr. 412.*

Lilium rubrum Asphodeli radice C. B. P. 80. *Moris. Hist. 2. 412.* Lilium radice Asphodeli, phœniceum, sive Lilio-asphodelus quibusdam I. B. tom. 2. l. 19. 701.

Idem minus.

Lilium Indicum puniceum, gemino latiori folio. *Moris. v. Hæmanthus Africanus.*

Lilium Alexandrinum I. B. v. Ornithogalum.

Lilionarcissus albus maritimus minor. *Moris. v. Narcissus.*

Lilionarcissus albus maritimus major. *Moris. v. Narcissus.*

Lilio-narcissus jacobæus latifolius Indicus, rubro flore. *Moris. v. Lilium.*

*Lilio-narcissus Indicus, saturo colore purpureo
scens Moris. v. Liliū.*

*Lilio-narcissus Indicus maximus Sphaeranthus
Moris. v. Liliū.*

* **L**ILIUM convallium album C. B. P. 304.
Lilium convallium vulgò I. B. tom. 3.
31. 531.

* Idem flore rubente. C. B. P. 304. I. B. tom. 3.
l. 31. 533.

* Lilium convallium minus C. B. P. 304. U.
folium five Ophris unifolia I. B. tom. 3.
535.

Lilium convallium Virginianum, Polygonati
foliis, racemosum. Polygonatum
mosum. Corn. 36.

*Limonia malus C. B. P. seu Limon ejusque
cies I. B. v. Malus Limonia.*

* **L**IMONIUM maritimum majus C. B. P. 192.
Limonium majus multis, aliis
hen rubrum I. B. tom. 3. app. 876.

Limonium maritimum minus, Oleæ folio
B. P. 192. Limonium minus I. B. tom. 3.
877.

Limonium peregrinum, foliis Asplenii C. B. P. 192.
Limonium quibusdam rarum I. B. tom. 3.
app. 877. ANN.

LINARIA Americana maxima, purpurea
flore.

Triplex constituitur Linariarum classis desumpta à triplici seminum formâ. Prima exhibet semina orbiculata compressa foliacea; secunda angulosa vel rugosa; tertia rotunda. Priori annumeratur Linaria Americana, cui sunt caules rotundi læves & ramosi, humanâ altitudine quandoque superiores; Folia quina quaterna ternave ex verso, absque petiolis ordinatim disposita consimili ferè facie Gentianæ cruciata, basi latâ in acutum mucronem tendentia supernè glabra lætè viridia, infernè pallida aliquot per longitudinem excurrentibus nervis inscripta: Summas virgas occupant flores monopetali, in fundo intus purpurei, reliquis omnibus Linariæ specibus ampliores, anterius rictum, postea calcar habentes; His defluxis succedunt vascula rotunda, sursum versus bifaria dehiscentia, in quibus semina nigra orbiculata compressa foliacea, quæ globulo folioso pallido tanquam septo intermedio imbricato ordine circumstant. Radix est alba, tenuis, fibrosa, vario reptatu longe latèque sese diffundens, & singulis annis nova germina protrudens. Ex America nos transfluxit curâ & operâ Dni Philippi de Flines.

* Linaria vulgaris, luteo flore majore Mor.
Hist. 2. 499. C. B. P. 212. Linaria lutea

- vulgaris *I. B. tom. 3. l. 30. 456.*
Linaria flore pallido, rictu purpureo *C. B. P. 213. Hist. Moris. 2. 500.* *Linaria Pannonica*,
 flore luteo, minore quam in vulgari *I. B. tom. 3. l. 30. 458.*
Linaria flore pallido, rictu aureo *C. B. P. 213. Moris. Hist. 2. 500.*
 Eadem foliis incanis, *Maldavica* dicta.
Linaria purpurea major odorata *C. B. P. 213. Moris. Hist. 2. 500.* *Linaria* purpurea magna
I. B. tom. 3. l. 30. 460.
Linaria triphylla minor lutea *C. B. P. 212. Moris. Hist. 2. 502.* *Linaria* trifolia *I. B. tom. 3. l. 30. 458. ANN.*
Linaria annua *Chalepensis* minor erecta, flore albo, lineis violaceis notato, calyci, ex quinque foliolis uncialibus constructo, infidente
Moris. Hist. 2. 502. ANN.
 Eadem flore omnino albo. *ANN.*
Linaria minima, foliis hirsutis, floribus obsolete fusci coloris *Moris. Hist. 2. 502.* *Anthirrhinum arvense* minus *C. B. P. 212.* *Anthirrhinum* minimum *I. B. tom. 3. l. 30. 465. ANN.*
 Eadem foliolis brevibus reflexis. *ANN.*
Linaria hirsuta folio subrotundo, flore ex herbido flavescente *Moris. Hist. 2. 503.* *Elatine* folio subrotundo *C. B. P. 212.* *Elatine* Mas folio subrotundo *I. B. tom. 3. l. 29. 372. ANN.*

Linaria hirsuto folio acuminato, in basi auriculato *Moris. Hist. 2. 503.* *Elatine folio acuminato, in basi auriculato, flore luteo* *P. 253.* *Elatine Fœmina, folio anguloso* *tom. 3. l. 29. 372.* ANN?

* *Linaria folio glabro subrotundo, Hederae folio Clematidis* *Moris. Hist. 2. 503.* *Cymbalaria C. B. P. 306.* *Cymbalaria flosculis purascentibus* *I. B. tom. 3. l. 35. 685.* *Ann?*
Linaria Scoparia C. B. P. v. Atriplici affinis
Linaria folioso capitulo luteo maj. C. B. P.
Virga aurea.

LINGUA cervina *Officinarum C. B. P.*
Phyllitis, sive Lingua cervina vulgi I. B.
3. l. 37. 756.

Lingua cervina, majore folio, in duas lacinias & profundius dissecto *Cat. Hort. Reg. Par. 108.*

Lingua cervina maxima, undulato folio auriculato per basin *Cat. Hort. Reg. Par.*
Phyllitis crispa I. B. tom. 3. l. 37. 357.

Lingua cervina multifido folio C. B. P.
Phyllitis polyschides I. B. tom. 3. l. 37. 357.

Eadem laciniis singulis cruciatim decussatis
Hujus copiam nobis fecit Dnus Jacobus Bobartus à quo in sylvis Angliæ reperta est.

Lingua cervina angustifolia major, sua lacinie foliorum lacinias involvente

Hort. Reg. Paris. 109.

Lingua cervina, medio folii nervo in aculeum desinente *Cat. Hort. Reg. Paris.* 109.

Lingua cervina minima Anglica Bobarti.

Lingua cervina, seu Phyllitis minima, undulato folio *Cat. Hort. Reg. Par.* 109.

Lingua cervina ramosa Cretica, angustissimo folio. Phyllitis ramosa *Alpin. in Eox.* 67.

Lingua *Plinii* I. B. v. Ranunculus.

LINUM annuum cœruleum fativum *Morif.*

Hist. 2. 572. Linum fativum C. B. P. 214.

Linum I. B. tom. 3. l. 30. 450. ANN.

Linum arvense C. B. P. 214. *Morif. Hist.* 2. 573.

Linum sylvestre, fativum planè referens I. B. tom. 3. l. 30. 452. ANN.

Linum perenne majus cœruleum, capitulo majore *Morif. Hist.* 2. 573.

Linum perenne minus cœruleum, capitulo majore.

Partium omnium teneritate & parvitate à Præcedente cognoscitur. Provenit ex seminibus à Dno Jacobo Bobarto transmissis.

Linum maritimum luteum C. B. P. 214. *Morif.*

Hist. 2. 374. Linum luteum Narbonense I. B. tom. 3. l. 30. 454.

Linum sylvestre angustifolium, flore magno C. B. P. 214. *Morif. Hist.* 2. 574.

Li.

Linum sylvestre angustifolium, floribus
tè purpurascens vel carneis C. P. B.
Moris. Hist. 2. 214. *Linum sylvestre angustifolium album*, lineis in umbilico purpureis
I. B. tom. 3. l. 30. 455. ANN.

Linum umbilicatum Park. v. *Cynoglossum*.

Liliasphodelus I. B. v. *Lilium*.

Liquiritia vulgò. v. *Glycyrrhiza*.

LITHOSPERMUM majus erectum C. P. B. 258. *Lithospermum*, sive *Milium*
I. B. tom. 3. l. 33. 590.

Lithospermum Arundinaceum C. B. P. v. *Milium*.

Lithospermum Arundinaceum aliud Herbarum
v. *Milium*.

Lithospermum Gramineum spicatum I. B.
Gramen.

Locusta herba I. B. v. *Valerianella*.

LONCHITIS aspera C. P. B. 359. *Lonchitis*
altera cum foliis denticulatis, sive
chitis altera Matthioli I. B. tom. 3. 745.

Lonchitis minor C. B. P. 359. *Lonchitis*
altera, foliis Polypodi I. B. tom. 3. 745.

Lotus fructu Cerasi C. B. P. 447. Lotus,
 Larbor, fructu Cerasi I. B. tom. 1. l. 2. 229.
 Lotus Africana latifolia C. B. P. 447. Guaia-
 cana I. B. tom. 1. l. 2. 238. Guajacum Pata-
 vinum vulgò.

Lotus annua ὀλιγοκέρατος, filiquis singulari-
 bus binis ternisvè Moris. Hist. 2. 175. Lo-
 tus corniculata, filiquis singularibus binis
 ternisvè I. B. tom. 2. l. 17. 356. ANN.

Lotus ὀλιγοκέρατος τετραγινόλοβος perennis
 Monspeliensis flore luteo Moris. Hist. 2. 176.
 Lotus pratenfis filiquosus luteus C. B. P. 332.
 filiquosa lutea Monspeliensis I. B. tom. 2.
 l. 17. 359.

Eadem maritima, folio pingui glabro. Lotus
 maritima filiquosa, folio pingui glabro.
 Magnol.

Lotus ὀλιγοκέρατος τετραγινόλοβος annua Cretica
 flore saturate rubro seu holoserico cocci-
 neo Moris. Hist. 2. 176. Lotus ruber filiquâ
 angulosâ C. B. P. 332. Lotus filiquosa, flore
 fusco tetragonolobus I. B. tom. 2. l. 17. 359.
 ANN.

Lotus πολυκέρατος annua procumbens latifolia,
 filiquis Ornithopodii Moris. Hist. 2. 176.
 Lotus filiquis Ornithopodii C. B. P. 332. I. B.
 tom. 2. l. 17. 359.

Lotus πολυκέρατος, filiquis recurvis, pedes
 corvinos referentibus C. B. P. 332. Moris.
 Hist.

Hist. 2. 177. Loto filiquoso aliquomodo
similis; Coronopus ex Cod. Cas. I. B. tom.
2. l. 17. 359.

Lotus πολυκέραλος lutea minor, foliis & filiquis
glabris brevioribus, & crassioribus Moris.

Hist. 2. 177. Lotus sive Melilotus pentaphyllos minor glabra C. B. P. 332. Lotus corniculata glabra minor I. B. tom. 2. l. 17. 355.

Eadem major, flore splendente. Lotus pentaphyllos, flore majore luteo splendente

C. B. P. 332. Loti corniculatae major speciosa I. B. tom. 2. l. 17. 355.

* Lotus πολυκέραλος lutea minor, foliis & filiquis
hirsutis longioribus & tenuioribus Moris. *Hist.* 2. 177. An Lotus corniculata hirsuta minor I. B. tom. 2. l. 17. 355.

Lotus πολυκέραλος fruticosa Cretica argentea
filiquis longissimis propendentibus rebus
Moris. *Hist.* 2. 177.

Lotus πολυκέραλος frutescens hirsuta alba
major latifolia, filiquis curtis tenuibus erectis

Moris. *Hist.* 2. 177. An Lotus pentaphyllos
filiquosus villosus C. B. P. 332? sive Lotus
filiquosus glaber, flore rotundo C. B. P. 332.

An Trifolium rectum Monspeffulanum I. B. tom. 2. l. 17. 359. Lotus Lybicae
champii vulgò.

Lotus πολυκέρατος frutescens incana alba
filiquis curtis crassioribus & brevioribus erectis
Moris. *Hist.* 2. 177. Trifolium album

- etum hirsutum valdè *I. B. tom. 2. l. 17. 360.*
 Lotus hæmorrhoidalis major, sive Trifolium
 hæmorrhoidale majus *Park. Theatr. 1102.*
 Eadem minor.
 Lotus πολυκέρατ & frutescens incana, filiculis
 subrotundis erectis *Moris. Hist. 2. 178.* Tri-
 folium album angustifolium, floribus velut
 in capitulum congestis *C. B. P. 329.* Do-
 rycnium Monspeliensium vulgò.
 Lotus hortensis odora *C. B. P. v. Melilotus.*
 Lotus sativa odorata annua, flore cæruleo *I. B.*
v. Melilotus.
 Lotus pentaphyllos vesicaria *C. B. P. v. An-*
thyllis.
 Loto affinis vulneraria pratensis *C. B. P. v.*
Anthyllis.
 Eadem flore suavè rubente *Moris. v. Anthyllis.*
 Loto affinis major vesicaria Hispanica *Moris.*
v. Anthyllis.
 Loto affinis *Ægyptiaca C. B. P. v. Senna.*
 Luffa Arabum *Vesling. v. Pepo.*
 LUNARIA racemosa minor, vel vulgaris *C.*
B. P. 354. Lunaria Botrytis *I. B. tom. 3.*
l. 35. 709.
 Lunaria racemosa, multifido folio *C. B. P. 355.*
 Lunaria Botrytis racemosa Silesiaca *I. B.*
tom. 3. l. 35. 711.
 Lunaria radiata *Robini I. B. v. Astragalus.*
 Lunaria flore luteo *I. B. v. Leucojum.*
 Lunaria major ejusquè species *I. B. v. Leucojum.*

LUPINUS peregrinus major, vel villosus
cœruleus major C. B. P. 348. *Moris. Hist.*

87. Lupinus exoticus hirsutissimus I. B. tom.

2. l. 17. 289. Lupinus Indicus *Corn.* 207 *Ann.*

Idem incarnatus. *ANN.*

Lupinus sativus, flore albo C. B. P. 347. *Lup.*

nus vulgaris, seu sativus albus *Moris. Hist.*

86. Lupinus vulgaris, semine & flore

sativus I. B. tom. 2. l. 17. 288. *ANN.*

Lupinus flavo flore *Moris. Hist.* 2. 87. *Lup.*

sylvestris, flore luteo C. B. P. 348. *Lup.*

luteo flore, semine compresso vario I. B. tom.

2. l. 17. 291. *ANN.*

Lupinus sylvestris angustifolius *Moris. Hist.*

Lupinus sylvestris, flore cœruleo C. B. P.

Lupinus sylvestris, purpureo flore,

ne rotundo vario I. B. tom. 2. l. 17. 291. *Ann.*

Lupinus Indicus, angustissimo folio. *Ann.*

pinus Indicus minor *Cat. Hort. R.*

Paris. III. *ANN.*

Lupinus Aegyptius sylvestris Vesting.

Sinapistrum.

LUPULUS Mas C. B. P. 298. I. B. tom. 2.

151. Convolvulus perennis heteroclitus

floribus herbaceis, capsulis foliaceis

instar *Moris. Hist.* 2. 37.

Lupulus Foemina C. B. P. 298. I. B. tom. 2.

152. Lupulus sylvestris minor sine

Moris. Hist. 34.

LUTEOLA herba, Salicis folio C. B. P.
v. Reseda.

Luteola Cretica C. B. P. v. Reseda.

*LYCHNIS sylvestris perennis, quæ Been al-
 bum vulgò Moris. Hist. 2. 535. Lychnis syl-
 vestris, quæ Been album vulgò C. B. P. 205.
 Been album Officinarum I. B. tom. 3. l. 29.
 357. Papaver spumeum vulgò.*

*Lychnis sylvestris perennis latifolia hirsuta
 Moris. Hist. 2. 535. Lychnis Papaver spu-
 meum latifolium vulgare hirsutum Moris.
 Hort. Bles. 284. An Lychnis sylvestris, quæ
 Been album vulgò, foliis hirsutis Cat. Hort.
 Edinb. Sutherl. 211?*

*Lychnis sylvestris perennis angustifolia gla-
 bra, flore albo, seu foliis acutioribus & angu-
 stioribus C. B. P. Var. 205.*

*Eadem flore pallidè incarnato. An Lychnis
 Papaver spumeum angustifolium, glabrum,
 flore purpureo Moris. Hort. Bles. 124?*

Eadem flore ex luteo pallecente.

*Eadem flore ex viridi rubente. An Eadem
 montana flore ex viridi purpurascete C. B.
 P. Var. 205?*

*Lychnis sylvestris perennis angustifolia gla-
 bra, flore pleno odorato albo Clus. Hist.
 l. 1. c. 3. p. 239.*

*Lychnis perennis angustifolia marina Anglica
 procumbens Moris. Hist. 2. 535. Lychnis ma-
 ritima*

ritima repens C. B. P. 205. *Lychnis maritima*
Anglicana I. B. tom. 3. l. 29. 357.

Lychnis sylvestris, plurimis foliis simul jun-
ctis C. B. P. 205. *Moris. Hist.* 2. 535. *Lychnis*
sylvestris, foliis angustis, & pluribus ex
nuculis singulis Clusio I. B. tom. 3. l. 29. 347.

Lychnis sylvestris seu montana latifolia visco-
sa, florum petalis suprà albis, subtus vi-
scentibus interdiu se contrahentibus *Mor-*
Hist. 2. 535. *Lychnis montana viscosa*
latifolia C. B. P. *Polemonium Petraeum* Ge-
neri I. B. tom. 3. l. 29. 351.

Eadem florum petalis suprà albis, subtus pu-
rascentibus.

**Lychnis viscosa*, flore muscoso C. B. P. 205.
Moris. Hist. 2. 536. *Muscipula muscosa* flore
sive *Ocymoides belliforme* I. B. tom. 3. l. 29.
350. *Otites* vulgò.

**Lychnis pratensis*, flore laciniato simplici
Moris. Hist. 2. 537. *Caryophyllus pratensis*
flore laciniato simplici, sive *Flos cuculi* C.
P. 210. *Flos cuculi*, *Odontis* quibusdam
tom. 3. l. 29. 347.

*Eadem flore albo C. B. P. *Var.* 210.

Lychnis pratensis, flore laciniato pleno
Hist. 2. 537. *Caryophyllus pratensis*, flore
pleno C. B. P. 210. *Flos cuculi*, flore mu-
plicato purpureo I. B. tom. 3. l. 29. 348.

Eadem flore albo I. B. tom. 3. l. 29. 348.

Lychnis

Lychnis foliis glabris, calyce duriore Boccon.
Ic. & Desc. 27. Moris. Hist. 2. 537.

Lychnis frutescens noctiflora Moris. Hist. 2. 538.

Lychnis noctiflora C. B. P. 205. Ocymoides
non speciosum I. B. tom. 3. l. 29. 344.

Lychnis frutescens Myrtifolia, Been albo si-
milis C. B. P. 205. Moris. Hist. 2. 538. Flore
carneo.

Eadem flore albo.

Lychnis Chalcedonica, flore miniato seu au-
rantiacono simplici Moris. Hist. 2. 338. Lychnis
major hirsuta, flore coccineo C. B. P. 203.
Flos Constantinopolitanus miniatus I. B.
tom. 3. l. 29. 344.

Eadem flore incarnato Moris. Hist. 2. 538. C. B. P.
Var. 203.

Eadem flore albo Moris. Hist. 538. C. B. P.
Var. 203.

Eadem flore vario I. B. tom. 3. l. 29. 344.

Lychnis Chalcedonica, flore pleno miniato
seu aurantiacono Moris. Hist. 2. 538. Flos Con-
stantinopolitanus, flore pleno C. B. P. 203.

Lychnis coronaria fativa, flore rubro Moris.
Hist. 2. 540. Lychnis coronaria Dioscori-
dis fativa C. B. P. 203. Lychnis coronaria
vulgò I. B. tom. 3. l. 29. 340.

Eadem flore ruberrimo seu coccineo.

Eadem flore albo Moris. Hist. 2. 540. C. B. P.
Var. 203.

Eadem flore incarnato Moris. Hist. 2. 540.

Eadem flore albo, lineis vel punctis rubris
variegato C. B. P. 203. Flore punctato *Moris.*
Hist. 2. 540.

Eadem flore ex carneo candidoque mixto *Moris.*
Hist. 2. 540. Eadem incarnato punctato
C. B. P. 203.

Eadem flore intus rubro, extus albo.

Lychnis coronaria sativa, flore coccineo pleno
Moris. *Hist.* 2. 540. *Lychnis coronaria sativa*
va multiplex C. B. P. 204. *Lychnis coronaria*,
flore pleno I. B. *tom.* 3. l. 29. 341.

Lychnis coronaria sylvestris C. B. P. 204. *Moris.*
Hist. 2. 540. *Lychnis umbellifera montana*
Helvetica Zan. *Hist.* *Bon.* 128. *An Verbas-*
cum acuto Salviæ folio C. B. P. 240? *Ver-*
basum Lychnites Syriacum incarnato
summitate floris Hierosolymitani I. B. *Ap-*
tom. 3. 876?

**Lychnis sylvestris hirsuta perennis alba* *simplex*
Moris. *Hist.* 2. 541. *Lychnis sylvestris*
alba simplex C. B. P. 204. *Ocymoides alba*
multis I. B. *tom.* 3. l. 29. 342. *Ocymastrum*
vulgò.

Eadem multiplex *Moris.* *Hist.* 2. 541. *Lychnis*
alba multiplex C. B. P. 204. *Ocymoides*
album, flore pleno I. B. *tom.* 3. l. 29. 343.

**Lychnis sylvestris minus hirsuta, flore rubra*
simplici *Moris.* *Hist.* 2. 541. *Lychnis syl-*
vestris sive aquatica purpurea simplex C. B.
204. *Ocymoides purpureum multis* I. B. *tom.*

tom. 3. l. 29. 343.

Eadem flore rubello eleganter multiplici *Morif. Hist. 2. 541.* *Lychnis purpurea multiplex C. B. P. 204.*

Lychnis Chalepensis annua, foliis parùm hirtis & angustis, flosculis carneis pediculis infirmis biuncialibus insistentibus, capsulis ferè rotundis *Morif. Hist. 2. 541. ANN.*

Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis C. B. P. 205. Morif. Hist. 2. 542. Centaurium minus adulterinum, quibusdam *Lychnidis viscidæ* genus *I. B. tom. 2. l. 29. 355.* *Muscipula* vulgò. ANN.

Eadem flore albido *Morif. Hist. 2. 542.* Seu albo *C. B. P. Var. 205. ANN.*

Lychnis segetum, Vaccaria dicta Morif. Hist. 2. 542. *Lychnis segetum rubra*, foliis Perfoliatæ *C. B. P. 204.* *Vaccaria I. B. tom. 3. l. 29. 357. ANN.*

Lychnis sylvestris lanuginosa major C. B. P. 206. Morif. Hist. 2. 543. *Lychnis sylvestris lanugine canescens*, flore majusculo rubescente *Clusii 5. I. B. tom. 3. l. 29. 348.*

Lychnis hirsuta segetum major Morif. Hist. 2. 543. *Lychnis segetum major C. B. P. 204.* *Pseudomelanthium I. B. tom. 3. l. 29. 341.* *Nigellastrum* vulgò. ANN.

Eadem flore albo *C. B. P. Var. 204. ANN.*

Lychnis Pseudomelanthio similis Africana glabra angustifolia. Lychnis segetum

Nigellastrum minus glabrum dicta, flo-
elegantior rubello *Moris. Hist. 2. 543. ANN.*

Collegimus in Promontorio Bonæ Spei
& Clarissimo Morisonio, qui eandem
Historiâ Oxoniensi descripsit transmissimus

* *Lychnis sylvestris latifolia*, caliculis stratis
turgidis *C. B. P. 205. Moris. Hist. 2. 543.*

Muscipula major, calyce turgido ventriculo
l. B. tom. 3. l. 29. 349. ANN.

Lychnis sylvestris lanuginosa minor *C. B. P. 206. Moris. Hist. 2. 544. ANN.*

Eadem flore rubro *Moris. Hist. 2. 544. ANN.*

Eadem flore mixto, ex albo & pulcherrimo
rubro *Moris. Hist. 2. 544. ANN.*

Eadem flore variegato, seu maculis rubellis
nigredinem vergentibus notato *Moris. Hist. 2. 544. Lychnis hirsuta minor, flore variegato Dodart. Mem. 99. ANN.*

Lychnis segetum meridionalium annua
ta, floribus albis uno versu dispositis *Moris. Hist. 2. 544. ANN.*

Lychnis vel Ocymoides montanum hirsutum
procumbens *Moris. Hist. 2. 544. Lychnis*

Ocymoides repens montanum *C. B. P. 205.*

Saponaria minor quibusdam *l. B. tom. 3. l. 29. 344.*

Lychnis minima rigida Cherleri *l. B. tom. 3. l. 29. 352. Moris. Hist. 2. 544.*

* *Lychnis arvensis minor vulgaris hirsuta*
Hist. 2. 545. Caryophyllus arvensis hirsutus

LUGDUNO-BATAVUS.

393

LICHNIS PSEUDOMELANTHIO SIMI-
LIS AFRIC. GLAB. ANGUSTIF.

tus flore majore C. B. P. 210.

Lychnis incana & tomentosa cauliculis
cumbentibus, foliis latioribus & brevioribus. Lychnis incana repens C. B. P. 210.
Moris. Hist. 2. 537. Ocymoides Lychnis
reptante radice I. B. tom. 3. l. 29. 353.

Lychnis maritima incana & tomentosa
Hist. 2. 546. Caryophyllus holostius tomentosus
latifolius C. B. P. 210. Caryophyllus
holostius tomentosus I. B. tom. 3. l. 29. 353.
Foliis longioribus & angustioribus.

Lychnis caulibus ad genicula foliosis
Hist. 2. 546. Auricula muris, pulchro
albo I. B. tom. 3. l. 29. 360.

Lychnis Graminea hirsuta umbellifera
Hist. 2. 546. Caryophyllus arvensis umbellatus,
folio glabro C. B. P. 210. Caryophyllus
arvensis umbelliferus I. B. tom. 3. l. 29. 361.

* Lychnis arvensis glabra, flore majore
Hist. 2. 546. Caryophyllus arvensis glaber,
flore majore C. B. P. 210. Gramen Fuchsi
five Leucanthemon I. B. tom. 3. l. 29. 361.

* Eadem flore minore *Moris. Hist. 2. 546. Caryophyllus*
arvensis glaber, flore minore C. B. P. 210. Gramini Fuchsi
Leucanthemon affinis, & similis herba I. B. tom. 3. l. 29. 361.

Lychnis minima muralis *Moris. Hist. 2. 546. Caryophyllus*
minimus muralis C. B. P. 210.
ANN.

Lychnis

Lychnis, *Saponaria* dicta major vulgaris simplex *Moris. Hist.* 2. 547. *Saponaria* major lævis C. B. P. 206. *Saponaria* vulgaris, I. B. tom. 3. l. 29. 346.

Eadem multiplex *Moris. Hist.* 2. 547. *Saponaria* flore pleno *Cornut.* 209.

Saponaria concava Anglica C. B. P. 206. *Moris. Hist.* 2. 548. *Gentiana* folio convoluto I. B. tom. 3. l. 21. 521.

LYCIUM Hispanicum, folio oblongo C. B. P. 478.

Lycium Hispanicum, folio Buxi C. B. P. 478.

Lycium quorundam, folio Myrti Tarentinæ aut Buxi I. B. tom. 1. l. 6. 61.

Lycopsis ejusquæ species C. B. P. v. *Echium*.

Lycopsis Africana. v. *Echium*.

LYSIMACHIA latifolia, dicta Chamænerion C. B. P. 245. *Moris. Hist.* 2. 269. *Lyfimachia* speciosa, quibusdam *Onagra* dicta, filiquosa I. B. tom. 2. l. 21. 906. Flore purpureo si-
ve cœruleo C. B. P. *Var.* 245.

Eadem flore albo C. B. P. *Var.* 245.

Lyfimachia, Chamænerion dicta angustifolia C. B. P. 245. *Moris. Hist.* 2. 270. *Lyfimachia* speciosa filiquosa angustifolia I. B. tom. 2. l. 21. 907.

Lyfimachia filiquosa hirsuta, magno flore C. B. P. 245. *Moris. Hist.* 2. 270. *Lyfimachia*
fili-

filiquosa hirsuta, majore flore purpureo
B. tom. 2. l. 21. 905.

* *Lyfimachia filiquosa hirsuta, parvo flore C. B. P. 245. Moris. Hist. 2. 270. Lyfimachia filiquosa hirsuta, flore minore I. B. tom. 2. 21. 906.*

* *Lyfimachia filiquosa glabra major C. B. P. 245. Moris. Hist. 2. 270. Lyfimachia laevis I. B. tom. 2. l. 21. 907.*

* *Lyfimachia filiquosa glabra minor C. B. P. 245. Moris. Hist. 2. 271.*

* *Lyfimachia filiquosa glabra minor latifolia I. Raj. Catal. 194.*

* *Lyfimachia filiquosa glabra angustifolia C. B. P. 245.*

LYSIMACHIA lutea corniculata non papposa Virginiana major *Moris. Hist. 2. 271. Lyfimachia lutea corniculata C. B. P. 245. ANN.*

Eadem flore sulphureo. ANN.

Lyfimachia lutea corniculata non papposa Virginiana minor Moris. Hist. 2. 271. ANN.

Lyfimachia Indica non papposa, flore lutea minimo filiquis Caryophyllum aromaticum æmulante. Carambu. Hort. Malab. tom. 2. 95.

LYSIMACHIA lutea major, quæ Diosc. C. B. P. 245. *Lyfimachia lutea I. B. tom. 2. l. 21. 903.* Blattariæ affinis planta major, flore luteo *Moris. Hist. 2. 491.*

Lyfimachia lutea minor, foliis nigris punctis notatis C. B. P. 245. Lyfimachia lutea minor I. B. tom. 2. l. 21. 904. Blattariæ affinis planta minor, flore luteo, foliis nigris punctis notatis *Moris. Hist. 2. 491.*

Lyfimachia semper virens spicata, Ephemeron dicta, Blattariæ flore. Ephemeron Matthioli vel potius Ephemeron spurium C. B. P. 244. Blattariæ affinis, planta bifolia lævis, flore albo, Ephemeron Moris. Hist. 2. 491.

Lyfimachia bifolia, flore globoso luteo C. B. P. 245. Lyfimachia lutea altera Lobelio, flore quasi spicato I. B. tom. 2. l. 21. 904.

Lyfimachia spicata purpurea fortè Plinii C. B. P. 246. Lyfimachia purpurea quibusdam spicata I. B. tom. 2 l. 21. Blattaria rubra spicata major glabra communis, folio acuto Moris. Hist. 2. 490.

Eadem folio subrotundo *Ocymi* facie.

Omnibus notis præcedenti respondet, exceptis foliis subrotundis *Ocymi* facie. Habemus ex Angliâ ubi sponte nascitur.

Lyfimachia spicata purpurea affinis Hyssopi folia. Hyssopifolia C. B. P. 219. Hyssopi folia aquatica I. B. tom. 3. l. 38. 792.

Lyfi-

Lysimachia spicata cœrulea C. B. P. v. Veron.

Lysimachia cœrulea galericulata C. B. P.

Scutellaria.

M.

abaleb I. B. v. *Ceraso* affinis.

MAJORANA tenuifolia C. B. P. 224.
 jorana tenuior & lignosior I. B. tom.
 28. 241.

Majorana vulgaris C. B. P. 224.

Majorana latifolia aurea Park. Theatr. 12.

Majorana sylvestris perennis C. B. P. 224.

ganum Heracleoticum Ruellii, sive

rana major I. B. tom. 3. l. 28. 257.

Majorana rotundifolia scutellata exotica

Hort. Reg. Paris. 114. Origano cogn.

Zatarhendi C. B. P. 223. Zatarhendi

I. B. Zatarhendi Origanum Indicum

Observ. 31.

Majorana Syriaca vel Cretica. v. Marum.

MALVA hirsuta, folio cordato Moris.
 2. 520. ANN.

Malva annua trimestris, flore cum ungu

purpureis, seminibus multis nigris ro

dis, subter membranaceis duplicatis orb

lis latentibus Moris. Hist. 2. 320. Malva

mestris, flore cum unguibus purpureis

tom. 2. l. 23. 950. ANN.

Malva annua, foliis crispis *Moris. Hist. 2. 520.*

Malva foliis crispis *C. B. P. 314. Malva crispa*

I. B. tom. 2. 23. 952. ANN.

Malva annua rotundifolia, floribus omnium minimis albis, pentapetalis, verticillatim genicula ambientibus, & seminibus arctè iisdem verticillatim adhærentibus *Moris. Hist.*

2. 521. ANN.

Malva annua hirsuta, foliis Hederæ instar angulosis *Moris. Hist. 2. 521. ANN.*

Malva sylvestris perennis procumbens, flore minore albo, folio rotundo *Moris. Hist. 2.*

521. Malva sylvestris, folio rotundo C. B. P.

314. Malva vulgaris, flore minore, folio rotundo I. B. tom. 2. l. 23. 949.

Eadem variegato folio *Cat. Hort. Reg. Paris.*

114.

Malva sylvestris procerior seu elatior rectavè, flore majore subrubente aut purpureo, venis saturatè purpureis picto, folio sinuato *Moris. Hist. 2. 521. Malva sylvestris, folio sinuato C. B. P. 314. Malva vulgaris, flore majore, folio sinuato I. B. tom. 2. l. 23. 949.*

Eadem flore albo *Cat. Edinb. Sutherl. 219.*

Malva perennis Hispanica, flore carneo amplo *Moris. Hist. 2. 522.*

Eadem flore incarnato, vel eleganter rubello colore *Moris. Hist. 2. 522. descr.*

Malva sylvestris Betonicæ folio *Boccon. desc. & Ic.*

& *Ic.* 15. *Zanoa. Hist. Botan.* 130. *Moris. Hist.* 2. 522.

Malva sylvestris, vel *palustris*, aut *Ibiscus* *Moris. Hist.* 2. 523. *Althæa Dioscoridis* & *P. niii C. B. P.* 315. *Althæa*, sive *Bismalva* *I. B. tom.* 2. l. 23. 954.

Eadem folio rotundiori, sive minus acuminato *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 19.

Eadem folio angulofiori.

Malva Hispanica, foliis mollibus undulatis, margine superius micis sulphureis ad solen splendentibus donatis *Moris. Hist.* 2. 523.

Malva maritima Arborea Veneta dicta, parvo flore *Moris. Hist.* 2. 523. *Malva Arborea Veneta dicta*, parvo flore *C. B. P.* 315.

Malva Arborea *I. B. tom.* 2. 952? *ANN.*

Malva maritima Arborea Britannica *Moris. Hist.* 2. 523. *ANN.*

Malva frutescens, folio auriculato, *Hederæ* instar *Moris. Hist.* 2. 523. *Althæa frutescens* folio acuto, parvo flore *C. B. P.* 316.

Malva Rosea, folio subrotundo, flore simplici *Moris. Hist.* 2. 524. *Malva Rosea*, folio subrotundo *C. B. P.* *Malva Rosea*, sive hortensis *I. B. tom.* 3. l. 23. 951. Floribus candidis *C. B. P. Var.* 315.

Eadem floribus saturatiùs rubentibus *C. B. P. Var.* 315.

Eadem floribus dilutiùs rubentibus *C. B. P. Var.* 315.

Eadem

Eadem floribus purpuræ modo relucens
C. B. P. *Var.* 315.

Eadem floribus ex rubro nigricantibus C. B. P.
Var. 315.

Eadem floribus incarnatis C. B. P. *Var.* 315.

Eadem floribus sulphureis *Moris. Hist.* 2. 524.

Eadem floribus luteis *Cat. Hort. Reg. Paris.*
115.

Eadem floribus violaceis *Cat. Hort. Reg. Pa-*
ris. 115.

Malva Rosea, folio subrotundo, flore pleno
C. B. P. 315. *Moris. Hist.* 2. 524. Flore albo
C. B. P. *Var.*

Eadem flore incarnato C. B. P. *Var.* 315.

Eadem flore rubro C. B. P. *Var.* 315.

Eadem flore puniceo C. B. P. *Var.* 315.

Eadem flore nigricante C. B. P. *Var.* 315.

Eadem flore luteo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 115.

Eadem flore subluteo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 115.

Malva Rosea peregrina, folio Ficus obscure vi-
ridi *Moris. Hist.* 2. 524. Malva Rosea, folio
Ficus C. B. P. 315. Flore simplici atro-pur-
pureo.

Eadem flore luteo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 115.

Eadem flore violaceo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 115.

Eadem flore carneo *Cat. Hort. Reg. Paris.* 115.

Eadem flore nigricante *Cat. Hort. Reg. Pa-*
ris. 115.

Malva peregrina folio Ficus flore pleno atro-
purpurante *Fonqu. Hort.* 81.

Eadem flore incarnato pleno *Cat. Hort. Porst.*
Hoffm.

Eadem flore luteo pleno *Cat. Hort. Alt. Hort.*

Eadem flore albo pleno *Cat. Hort. Alt. Hort.*

Malva Rosea, folio Ficus altera C. B. P. 331

Flore nigricante.

Eadem flore rubro.

MALUS sylvestris major, fructu
Ionston. de Arbor. 2. Mala sylvestria
majora C. B. P. 435.

Eadem fructu rubente *Ionst. de Arbor. 2.*
sylvestria rubra majora C. B. P. 435.

Malus sylvestris minor *Ionst. de Arbor. 3.*
sylvestria minora C. B. P. 435. Malus syl-
vestris, fructu parvo flavescente I. B. tom.
I. 26. descr.

Eadem fructu rubente I. B. tom. I. l. I. 26. descr.

Malus domestica vulgaris *Ionst. de Arbor.*

Pomus sive Malum C. B. P. 434. Malus
tom. I. l. I. I.

Eadem flore pleno C. B. P. 435.

Malus prægrandis præcox tenerrima
Hort. Med. Paris. 115.

Mala Porstorfiana I. B. tom. I. l. I. 5. C.
pendula I. B. tom. I. l. I. 21. Redolens
vulgò.

Mala Prasomela C. B. P. descr. I. B. tom. I. l. I.
Renetica vulgò.

Mala Oenomela vinosa I. B. tom. I. l. I. 9.

Mala pentagona perelegantia acido dulcia
utrinque sessilia *I. B. tom. 1. l. 1. 10.*

Mala duracina alba *I. B. tom. 1. l. 1. 5.*

Mala duracina striata seu Mala D. Matthiæ
I. B. tom. 1. l. 1. 14.

Mala Presiliana *I. B. tom. 1. l. 1. 6.*

Mala Vitrea *I. B. tom. 1. l. 1. 6.*

Mala turbinata dulcia *I. B. tom. 1. l. 1. 19.*

Malorum domesticorum, præcocium, medio-
rum, ferotinorum, dulcium, acidorum, vi-
nosorum, variæ diversitates, multiplicæ in-
sitionis ingenio productæ.

Malus pumila, quæ potius frutex, quàm ar-
bor *C. B. P. 435.*

Eadem fructu candido *C. B. P. Var. 435.*

Eiusdem aliæ differentiæ, fructuum magnitu-
dine, figurâ, colore, sapore & tempore ma-
turescendi inter se discretæ.

Malus non florens fructificans tamen *C. B. P.*

435. Malus fructifera, fugaci flore *Cat.*
Hort. Reg. Paris. 115. Malus non florida
dicta *I. B. tom. 1. l. 1. 21.*

MALUS Cydonia, fructu brevior & rotun-
diorè *Cat. Hort. Reg. Paris. 115.* Mala
Cotonea minora *C. B. P. 434.*

Malus Cydonia, fructu oblongo & læviori
Cat. Hort. Reg. Paris. 116. Mala Cotonea
majora *C. B. P. 434.* Cotonea malus *I. B.*
tom. 1. l. 1. 27.

Malus Cotonea sylvestris C. B. P. 435. Cotonea sylvestris *I. B. tom. I. l. I. 35.*

MALUS Citria, fructu mediocri *I. B. tom. I. l. I. 94.* Malus Medica C. B. P. 435. Malum Citreum vulgare *Ferr. Hesp. 56.* Citria vulgò.

Malus Citria, fructu magno *I. B. tom. I. l. I. 95.* Malus Medica, fructu ingenti tuberoso *P. 435.*

Malus Citrea, dulci medullâ *Fer. Hesp. 73.*

MALUS Limonia acida C. B. P. 436. Limonia malus *I. B. tom. I. l. I. 96.* Limonia garis *Fer. Hesper. 191.*

Malus Limonia major dulcis C. B. P. 436. Limonia dulci medullâ *Ferr. Hesp. 227.*

Malus Limonia, fructu rotundo orbiculato *B. P. 436.*

Malus Limonia Sbardonii. Limon Sbardonii *Fer. Hesp. 251.*

Malus Limonia pusilla Calabrica. Limonia pusilla Calaber. *Fer. Hesp. 209.*

Eadem minor, foliis Phillyrea *Fer. Hesp. desc. 209.*

Malus Limonia Spatafora dicta *Cat. Hort. Reg. Par. 116.* Limon Spatafora *Rheg. Fer. Hesp. 239.*

Malus Limonia Ligustica. Limon Ligustica seu St. Remi *Fer. Hesp. 195.*

Malus Limonia, fructu pyriformi. *Ligustica*

Pyri effigie, vulgò Peretta, sive Spatafora
Fer. Hesp. 231.

Eadem fructu longiori. Limon Perettæ con-
similis *Fer. Hesp. 237.*

Malus Limonia, fructu superficie Aurantii.
Adami pomum *Fer. Hesp. 313.* Malus Adami

C. B. P. 437. Poma Adami *I. B. tom. 1. l. 1. 99.*

Malus Limonia minor acida *Cat. Hort. Reg.*

Par. 331. Limon, qui Lima nuncupatur,
acris *Ferr. Hesp. 331.*

Eadem dulcis. Limon, qui Lima nuncupatur,
dulcis *Ferr. Hesp. 331.*

Malus Limonia Citrata. Limon Citratus pri-
mæ notæ lævior *Ferr. Hesp. 265.*

Eadem fructu fructum includente. Limon Ci-
tratus alterum includens *Fer. Hesp. 269.*

Limones prægnantes, alium fructum mino-
rem in se continentes *C. B. P. 436.*

MALUS Arantia Indica, fructu omnium
maximo, Pumpelmus dicto medullâ pal-
lescente.

Eadem medullâ rufescente.

Utraque hæc Arantia partium omnium
prodigiosâ magnitudine à cœteris conge-
neribus discriminatur, imprimis fructu hu-
manum caput aliquando excedente, pulpâ
intus vinosâ sapidissimâ, coloris vel rufe-
scentis vel pallescentis. Colitur in Poma-
riis Javæ Zeylonæ aliarumque Indiæ O-
rien-

rientalis regionum. Sub nostro climate, licet ex satis seminibus facili negotio in elegantem arborem adolescat, hactenus tamen fructus nullos peperit, quicquid etiam artis & industriæ à nobis adhibitum.

Malus Arantia major *C.B.P.* 436. Arantia malus *I.B. tom.* 1. l. 1. 97. Aurantium vulgare *Fer. Hesp.* 474. Medulla acida.

Eadem acri dulciquè medullâ. Aurantium acri dulciquè medullâ vulgare *Fer. Hesp.*

377.

Malus Arantia sylvestris *I. B. tom.* 1. l. 1. Aurantium sylvestre, medullâ acriori *Fer. Hesp.*

Malus Arantia, folio crispo. Aurantium crispum folio *Fer. Hesp.* 387.

Malus Arantia, fructu stellato & roseo. Aurantium stellatum & roseum *Fer. Hesp.* 395.

Malus Arantia, foliis & fructu variegatis *Cat. Hort. Reg. Par.* 116. Aurantium virgatum striatumquè *Fer. Hesp.* 397. Foliis latioribus.

Eadem foliis angustioribus.

Malus Arantia, fructu corniculato. Aurantium Hermaphroditum dictum, five corniculatum *Fer. Hesp.* 407. Fructu majori.

Eadem fructu minori *Cat. Hort. Reg. Paris.* 116.

Malus Arantia Lusitanica *Cat. Hort. Reg. Paris.* 116. Aurantium Olyssiponense *Fer. Hesp.* 407.

425. Pomum Sinense Belgis.

Malus Arantia, fructus cortice dulci. Aurantium dulci cortice *Fer. Hesp.* 430.

Malus Arantia, Lauri angustis foliis *Boccon. Ic. & descr.* 3.

Malus Arantia, fructu Arantii malo Citrio prægnantis. Malum Aurantium malo Citrio prægnans *Bocc. Ic. & descr.* 3.

Malus Arantia hermaphrodita, fructu medio Citrio, medioquè Arantio, odoratissimo.

Inter hortensia miracula, multivario cultu & insitionis artificio producta, annumerandum est hoc Arantium, quod tam fructus suavissimâ fragrantia, quam mirificâ conformatione sese commendat. Arbor est ramosâ densitate, staturâ ab Arantia non multum abhorrens. Ramorum duplex conspicitur facies. Alii foliis floribus & fructibus Arantiam omnino æmulantur; Alii mediam obtinent naturam inter Citrum & Arantiam: Folia angusta longula, superficie inæquali scabrâ, viridi sulphureoque colore subinde maculata, marginibus aliquando leviter in crispatis aut nonnihil serratis: Flores ex albo modestè rubent: Fructus gemello partu foecundi parte altera Arantium alterâ Citrum exprimunt, distinguente hunc geminum foetum commissurâ utribiquè callosâ scabrâ productiori.

Malus Arantia humilis C.B.P. 436. Aurantium
Sinenfe Fer. Hesp. 430.

MALUS Punica fativa C.B.P. 438. Malus Punica I. B. tom. 1. l. 1. 76. Granata vulg.
Eadem fructu dulci Cat. Hort. Reg. Paris.
Malus Punica, flore pleno Cat. Hort. Reg.
Par. 117. Balauſtia flore pleno n. ajore C.B.P.
P. 438. Balauſtia Hispanica I. B. tom. 1.
l. 82.

Malus Punica, flore pleno majore variegata
Cat. Hort. Reg. Par. 117.

Malus Persica C.B.P. v. Persica.

Malus Armeniaca C.B.P. v. Armeniaca.

Mamœra Fœmina Clus. v. Pepo arboreſcens.

MANDRAGORA, fructu rotundo C.B.P.
169. Mandragora Mas I. B. tom. 3. l. 34. 617.
Mandragora, fructu Pyri C.B.P. 169. Mandra-
gora Fœmina I. B. tom. 3. l. 34. 618.

Mannæ Gramen. v. Gramen dactylon.

Maracot Indicum Aldin. v. Cucumis.

Maragosa Luſitan. v. Cucumis.

* **M**ARRUBIUM paluſtre glabrum C.B.P.
230. Marrubium aquaticum quorundam
I. B. tom. 3. l. 28. 318.

* Idem foliis tenuiùs diſſectis Morif. Hiſt. Belg.
131. & 286.

* Idem foliis profundiffimè diſſectis.

Marrubium nigrum foetidum. Ballote Dioscoridis C. B. P. 230. Marrubium nigrum five Balote I. B. *tom.* 3. l. 28. 318.

Marrubium nigrum, rotundifolium C. B. P. 230.

Marrubium nigrum longifolium C. B. P. 230. Herba venti Monspeliensibus vulgò.

Marrubium album vulgare C. B. P. 230. Marrubium album I. B. *tom.* 3. l. 28. 316.

Marrubium album latifolium peregrinum C. B. P. 230. Marrubium candidum, folio subrotundo I. B. *tom.* 3. l. 28. 317.

Marrubium album angustifolium peregrinum C. B. P. 230. Marrubium album, angustiore folio I. B. *tom.* 3. l. 28. 317.

Marrubium Alysson dictum, foliis profundè incis. Alysson verticillatum, foliis profundè incis. C. B. P. 232.

MARUM Syriacum vel Creticum. Majorana Syriaca vel Cretica C. B. P. 224.

Marum Mastichen redolens C. B. P. v. Clinopodium.

Mastichi a Gallorum I. B. v. Clinopodium.

MATRICARIA sylvestris, flore toto luteo C. B. P. 133.

Matricaria vulgaris, seu fativa C. B. P. 133.

Matricaria vulgo, minus Parthenium I. B. *tom.* 3. l. 26. 129.

Eadem caulibus rubentibus.

Eadem floribus nudis bullatis. *Matricaria* nuda *Moris. Hort. Bles. 131.* *Matricaria* flor. aphylo *Cat. Hort. Reg. Paris. 118.*

Eadem florum petalis fistulosis.

Matricaria flore pleno C. B. P. 134. I. B. tom. 2. l. 26. 130. Petalis planis.

Eadem petalis fistulosis. *Matricaria* foliis florum fistulosis *Cat. Hort. Reg. Par. 118.*

Eadem petalis marginalibus planis, discoidibus fistulosis.

Maizio seu Mays. v. Frumentum Indicum.

Medica cochleata major *διναρπ* Ⓞ, fructus capsulâ compressâ orbiculatâ, nigrâ planâ, oris crispis *Moris. Hist. 2. 152.* *Trifolium* cochleatum vel scutellatum, fructu latiore folio minuto obtuso C. B. P. 329. *Medica* orbiculata I. B. tom. 2. l. 17. 384. ANN.

Eadem capsulâ lævi sine oris crispis *Moris. Hist. 2. 152.* ANN.

Medica cochleata major *διναρπ* Ⓞ, fructus capsulâ compressâ orbiculatâ rugosâ albâ *Moris. Hist. 2. 152.* ANN.

Medica cochleata major *διναρπ* Ⓞ, fructus capsulâ rotundâ globosâ scutellatâ *Moris. Hist. 2. 152.* *Trifolium* cochleatum fructu latiore C. B. P. 329. *Medica* scutellata I. B. tom. 2. l. 17. 384. ANN.

Medica cochleata major *διναρπ* Ⓞ, fructus capsulâ turbinatâ planâ *Moris. Hist. 2. 343.* ANN.

Medica cochleata major *δικαρπ* , fructus capsulâ turbinatâ rugosâ *Moris. Hist. 2. 153.*

Medica magna turbinata *I. B. tom. 2. l. 17.*

385. An Trifolium cochleatum turbinatum, five fructu compresso oblongo *C. B. P. 329?* ANN.

Medica cochleata major *δικαρπος* spinosa, seu capsulâ rotundiore majore, spinis paucioribus & rigidioribus *Moris. Hist. 2. 153.* ANN.

Medica cochleata major *δικαρπος* spinosa, capsulâ seu spinis longioribus, fursûm & deorsûm tendentibus *Moris. Hist. 2. 153.* ANN.

Medica cochleata, echinis omnibus erectis *Park. Ic. Cat. Hort. Reg. Par. 129.* ANN.

Medica cochleata *δικαρπος*, capsulâ spinosâ rotundâ minore, rarius spinis crassioribus & levioribus armatâ *Moris. Hist. 2. 153.* Medica hirsuta, echinis rigidioribus *I. B. tom. 2. l. 17. 385.* Trifolium fructu compresso, spinis horrido *C. B. P. 329?* ANN.

Medica cochleata *δικαρπος*, capsulâ spinosâ crassiore, & spinulis brevibus & rarius dispositis armata *Moris. Hist. 2. 154.* Medica echinata magna hirsuta *I. B. tom. 2. l. 17. 385.* ANN.

Medica cochleata *πολύκαρπος*, capsulâ spinosâ minore, perennis, incana maritima *Moris. Hist. 2. 154.* Trifolium cochleatum maritimum tomentosum *C. B. P. 329.* Trifolium cochleatum maritimum, five medica marina

na *I. B. tom. 2. l. 17. 378. ANN.*

Medica cochleata δύνκαρος, capsulâ rotundâ spinosâ, foliis eleganter dissectis. *Trifolium echinato capite* *Dod. Mem. 123. Trifolium cochleatum spinosum Syriacum, foliis laciniatis* *Breyn. Cent. 1. 81. ANN.*

Medica cochleata minor πολύκαρος annua, capsulâ majore albâ, folio cordato maculâ fuscâ notato *Morif. Hist. 2. 144. Trifolium cochleatum, folio cordato maculato C. B. P. 329. Medica echinata glabra cum maculis nigricantibus* *I. B. tom. 2. l. 17. 384. ANN.*

Eadem sine maculis nigricantibus *I. B. tom. 2. l. 17. 384. & descr. 385.*

Medica cochleata minor πολύκαρος annua capsulâ nigrâ hispidiore *Morif. Hist. 2. 144. Trifolium cochleatum, fructu nigro hispido C. B. P. 329. ANN.*

Medica cochleata πολύκαρος annua, capsulâ minimâ rotundâ *Morif. Hist. 2. 144. Trifolium echinatum arvense C. B. P. 329. Medica echinata minima* *I. B. tom. 2. l. 17. 386. ANN.*

Medica cochleata πολύκαρος annua, capsulâ minima, coronatâ *Morif. Hist. 2. 154. Trifolium echinatum arvense C. B. P. 230. Medica echinata minima* *I. B. tom. 2. l. 17. 386. ANN.*

Medica cochleata πολύκαρος annua, capsulâ minima coronatâ *Morif. Hist. 2. 145. Medica*

dica coronata Cherleri parva I. B. *tom.* 2. l. 17. 386. ANN.

Medica sylvestris frutescens, filiquâ cornutâ tortili *Moris. Hist.* 2. 157. Trifolium sylvestre luteum, filiquâ cornutâ, vel Medica frutescens C. B. P. 330. Medica sylvestris I. B. *tom.* 2. l. 17. 383.

Eadem flore coeruleo C. B. P. *Var.* 330.

Eadem flore violaceo C. B. P. *Var.* 330.

Eadem flore fusco.

Eadem flore viridi.

Eadem flore ex luteo & violaceo mixto C. B. P. *Var.* 330.

Medica sativa, filiquâ cornutâ magis tortili *Moris. Hist.* 2. 158. Trifolium filiquâ cornutâ sive Medica C. B. P. 330. Medica major erectior, floribus purpurascens I. B. *tom.* 2. l. 17. 382. Fœnum Burgundiacum vulgò.

Medica annua filiquâ falcatâ, crenatâ *Moris. Hist.* 2. 258. Trifolium filiquâ falcatâ C. B. P.

Medica lunata I. B. *tom.* 2. l. 17. 386. ANN.

Medica frutescens incana, seu Trifolium frutescens incanum, filiquâ falcatâ planâ *Moris. Hist.* 2. 158. Cytisus incanus, filiquis falcatis C. B. P. 389. Cytisus filiquâ incurvâ, folio candicante I. B. *tom.* 1. l. II. 366.

Medium I. B. v. Campanula.

- * **M**ELAMPYRUM purpurascens comâ
 C. B. P. 234. Melampyrum multis, sive
 Triticum vaccinium I. B. tom. 3. l. 40. 439.
 Melampyrum cœruleâ comâ C. B. P. Melam-
 pyro affinis, Parietaria cœrulea quorun-
 dam I. B. tom. 3. l. 30. 440. Parietaria Li-
 psiensium vulgò. ANN.
 Melampyrum luteum latifolium C. B. P. 234.
 Melampyrum sylvaticum, flore luteo, sive
 Satureia lutea sylvestris I. B. tom. 3. l. 30.
 441. ANN.
 Melampyrum cristatum, flore albo & purpu-
 reo I. B. tom. 3. l. 30. 440. ANN.
 Melanthium ejusque species I. B. v. Nigella.
 Meleagris I. B. v. Fritillaria.

MELIANTHUS Africanus. Pimpinella spi-
 cata maxima Africana Barthol. Act. Hafn.
 An. 1673. Vol. 2. p. 58.

Mellifera hæc Africana planta, cujus so-
 bolem Anno M. DC. LXXII. ex Promontorio
 Bonæ Spei Hafniam ad Cl. Bartholinum
 transmiseram, superiori demum anno ope-
 râ Cl. Viri Petri Hotton inde in Belgiam
 reducis huc delata & Curiosorum Hortis
 familiaris facta est, Radice nititur vivaci
 lignosâ crassâ pallidâ brachiatâ longo pro-
 fundoquè reptatu hinc inde diffusa. Scapo
 multiplici supra viri altitudinem assurgente,
 viroris & vigoris perpetui, pollicem crasso

LUGDUNO-BATAVUS.

415

MELIANTHUS AFRICANUS.

rotundo, striato, scabro, geniculato, ad radicem lignoso, solido, in progressu ex ruffo virente, & ubi in floriferam spicam fastigiatur, punicante, facile ex geniculis in terram demissis sese propagante. Foliis pinnatis, facie Pimpinellæ, albis sextuplo amplioribus, rigentibus, nervosis, per ambitum profundius serratis, colore in glauco virente, costâ mediâ ad summum usque, cui folia ex adverso strictius adherent, alatâ & crenatâ, parte verò imâ & pronâ contactâ folio, digitum longo concolori integro, latâ suâ carinataquè basi, quâ ad scapi genicula prorumpit, in mucronem porrecto, & costæ, instar lingulæ, incumbente. Odore foetido narcotico gravi, sapore herbaceo parùm adstringente. Floribus in summo numerosis, nudis, ex nigro puniceis, in spicam congestis, hærentibus ex petiolis longulis punicantibus tenui rarâquè concolori lanugine pubescentibus, quibus singulis subjicitur foliolum nunc puniceum nunc ex puniceo virescens, unguem adæquans & in deltoideam effigiem gracilescens. Flos ut plurimum quinque construitur petalis ex floris fundo ampliori, cui arctè junguntur, in longum protensis, duobus supernis latioribus & longioribus, binis lateralibus brevioribus & angustioribus, unico infero brevissimo carinato, Hoc in flore constat.

stantur deprehenditur, reliquorum verò
numerus & amplitudo variant. Ex his pro-
fluunt decem stamina punicei saturati colo-
ris, quinque longiora & tenuiora apicibus
flavescentibus parvis, totidemque breviora
apicibus rubustioribus, levissimâ concussi-
one deciduis. Inferiori petalo includitur
receptaculum cartilagineum cariniforme,
refertum liquore melleo diluto puniceo, sa-
poris vinosi juncundissimi. Hunc à Belgis
ad Bonæ Spei Promontorium degentibus
non inepto nomine Melianthus sive Flos
mellis apellatur. Mellea verò hæc substan-
tia, neutiquam videtur productum roris
seu aëris in flore collecti, sed eo ipso, quo
flos perficitur, incipit ex porulis & villulis
internæ floris baseos, instar subtilissimi va-
poris emanare & in hiantem hanc carinulam
deponi. Sive enim plantam mox flores pa-
rituram aëre liberiori exposueris, sive in
conclavi diligenter custodiveris, æquam
mellis proportionem observabis, tantâ u-
trobique ubertate, ut in subjecta folia stilla-
tim defluat. Melle floreque exarescente se-
quitur vasculum ventriosum membraneum,
facie & magnitudine Nigellæ fructum adæ-
quans, tetragonum, quaternis dissepimen-
tis distinctum, quasi ex totidem vasculis
esset compactum, singula continent semen
ovale nigrum lucidum, semini Pæoniæ sup-

par. Sponte sua luxuriat locis udosis & paludosis ad Promontorium Bonæ spei. Transposita in hortos mirum in modum multiplicatur, brumam rigidiusculam quamvis patienter ferat, tamen custodienda est in commodo hybernaculo, ne flores, quos mediâ sæpe hyeme suppetere solet, vitium capiant & pereant. Floris Nectar uti vinoso & suavi suo sapore melli vulgari nihil cedit, ita virtutibus, ni illud superet, saltem adæquat. Eo adeò delectantur Hottentotti & nunc quoque Belgæ, ut Melianthum nunquam prætereant, quin Melleam ejus dulcedinem avidè resorbeant.

* **M**ELILOTUS fruticosa candida major. *Moris. Hist. 2. 161.* Melilotus Officinarum Germaniæ, flore albo. *C. B. P. 331.* Trifolium odoratum sive Melilotus vulgaris, flore candido *I. B. tom. 2. l. 17. 370.* ANN.

* Melilotus fruticosa lutea vulgaris, vel Officinarum. *Moris. Hist. 2. 161.* Melilotus Officinarum Germaniæ *C. B. P. 331.* Trifolium odoratum, seu Melilotus vulgaris, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 17. 370.* ANN.

Eadem humilior, foliis & floribus minoribus pallidè flavescens. ANN.

Eadem filiculis longioribus. *Dodonæi Moris. Hist. 2. 161.* ANN.

Melilotus lutea, seminis pericarpio magno rugoso rotundo albo. *Moris. Hist. 2. 161.* Melilotus Italica, folliculis rotundis C. B. P. 331. Melilotus magno semine rotundo rugoso. I. B. tom. 2. l. 17. 371. ANN.

Melilotus lutea minor, floribus & siliculis minoribus, spicatim & densè dispositis *Moris. Hist. 2. 161.* ANN.

Melilotus lutea minima procumbens palmaris & sesquipalmaris, folio minore & angustiore *Moris. Hist. 2. 162.* Melilotus vulgari nostrati affinis, folio minore & angustiore I. B. tom. 2. l. 17. 371. ANN.

Melilotus lutea minima hirsuta procumbens, spicâ breviori densissimè disposita, seminis pericarpio renali nigro *Moris. Hist. 2. 162.* Trifolium pratense luteum capitulo breviori C. B. P. 328. Trifolium pratense luteum mas, flore minore semine multo I. B. tom. 2. l. 17. 380. ANN.

Melilotus minima recta lutea, siliquis crassis, curtis, in capitulum congestis, semine Fœnugræci *Moris. Hist. 2. 162.* ANN.

Melilotus major odorata violacea *Moris. Hist. 2. 162.* Lotus hortensis odora C. B. P. 331. Lotus fativa odorata annua, flore cœruleo I. B. tom. 2. l. 17. 368.

Melilotus lutea major, corniculis inflexis ex eodem centro ortis *Moris. Hist. 2. 162.* Melilo-

tus corniculis reflexis major C. B. P. 331.
 Trifolium Italicum, five Melilotus Italica
 corniculis incurvis I. B. tom. 2. l. 17. 372.
 ANN.

MELISSA hortensis C. B. P. 229. Melissa
 vulgaris odore Citri I. B. tom. 3. l. 28. 232.
 Melissa peregrina, folio oblongo C. B. P. 229.
 Melissa Turcica multis dicta I. B. tom. 3. l. 28.
 234. Flore cœruleo C. B. P. Var. 229. ANN.
 Eadem flore albo C. B. P. Var. 229. I. B. descr.
 tom. 3. l. 28. 234. ANN.
 Melissa Moluccana odorata. C. B. P. v. Mo-
 lucca.

Melissa Moluccana fœtida C. B. P. v. Molucca.

MELO Hispanicus I. B. tom. 2. l. 16. 244.
 Moris. Hist. 2. 29. ANN.

Melo vulgaris C. B. P. 310. Moris. Hist. 2. 29.

Melones I. B. tom. 2. l. 16. 242. ANN.

Idem reticulatus I. B. tom. 2. l. 16. 244. ANN.

Idem turbinatus I. B. tom. 2. l. 16. 244. ANN.

Idem sessilis C. B. P. Var. 310. ANN.

Ejusdem aliæ varietates fructus formâ colore,
 sapore & odore discretæ.

Melo Moschatellinus rotundus parvus seu Me-
 lo sacharinus dictus I. Bauhino Moris. Hist.

2. 40. Melo rotundus parvus C. B. P. 311.

Melo Moschatellinus rotundus parvus I. B.
 tom. 2. l. 16. 244. ANN.

Idem pyriformis I. B. tom. 2. l. 16. 244. ANN.
 Melo

Melo-pepo clypeiformis C. B. P. v. Pepo.

Melo-pepo compressus C. B. P. v. Pepo.

Melochia I. B. v. Corchorus.

Melacotonea quorundam I. B. v. Persica.

MENTHA hortensis verticillata, Ocymi
Modore C. B. P. 227. Mentha verticillata
minor acuta non crispa, odore Ocymi I. B.
tom. 3. l. 28. 216.

Mentha arvensis verticillata hirsuta I. B. tom.
3. l. 28. 217. Calamintha arvensis verticil-
lata C. B. P. 229.

Mentha crispa verticillata C. B. P. 227. Mentha
crispa verticillata, folio rotundiore I. B. tom.
3. l. 28. 216.

Mentha crispa Danica aut Germanica specio-
sa *Parkins. Theatr.* 32.

Mentha rotundifolia crispa spicata C. B. P. 227.
I. B. tom. 3. l. 28. 218.

Eadem foliis rotundioribus rugosis. Mentha
rotundifolia spicata altera C. B. P. 227. Men-
thastrum spicatum cultum, folio rotundiore
rugoso I. B. tom. 3. l. 28. 219.

Mentha spicata, folio variegato C. B. P. 227.

Menthastrum spicatum, folio crispo rotun-
dior, colore partim albo, partim cinereo
vel virente I. B. tom. 3. l. 28. 219.

Mentha angustifolia spicata C. B. P. 227. Men-
tha spicata, folio longiore, acuto glabro ni-
griori I. B. tom. 3. l. 28. 220.

* *Mentha sylvestris*, rotundiore folio C. B. P. 227.
Menthastrum folio rugoso rotundiore spontaneum, flore spicato odore gravi, I. B. tom. 3. l. 28. 219.

* *Mentha sylvestris* longiore folio C. B. P. 227.
Menthastrum spicatum, folio longiore candidante I. B. tom. 3. l. 28. 221.

* *Mentha rotundifolia palustris*, seu *aquatica* major C. B. P. 227. *Mentha aquatica* sive *Sisymbrium* I. B. tom. 3. l. 28. 223. Foliis glabris.

Eadem floribus conglomeratis, Foliis hirsutis.
Mentha aquatica, sive *Sisymbrium* hirsutius I. B. tom. 3. l. 28. 224.

* *Mentha palustris*, folio oblongo. C. B. P. 228.
Menthastrum aquatici genus hirsutum, spicali-
 tiore I. B. tom. 3. l. 28. 222.

Mentha hortensis corymbifera C. B. P. v. *Tanacetum*.

Mentha tuberosa radice C. B. P. v. *Calamintha*.

Mentha cattaria ejusque species C. B. P. & I. B. v. *Calamintha*.

Menthastrum ejusque species I. B. v. *Mentha*

Menthastrum tuberosa radice I. B. v. *Calamintha*.

* **M**ERCURIALIS testiculata, sive *Mas*
Dioscoridis & Plinii C. B. P. 121. *Morif.*
Hist.

- Hist.* 2. 612. Mercurialis Mas I. B. *tom.* 2. l. 23. 677. ANN.
- Mercurialis spicata, five Foemina, Dioscoridis & Plinii C. B. P. 121. *Moris. Hist.* 2. 612. Mercurialis Foemina I. B. *tom.* 2. l. 23. 677. ANN.
- Mercurialis montana testiculata C. B. P. 122. Cynocrambe Mas, five Mercurialis repens. I. B. *tom.* 2. l. 23. 979.
- Mercurialis montana spicata C. B. P. 122. *Moris. Hist.* 2. 613. Cynocrambe Foemina, five Mercurialis repens. I. B. *tom.* 2. l. 23. 979.
- Mercurialis perennis maritima incana, Phyllon dicta testiculata. *Moris. Hist.* 2. 613. Phyllon testiculatum. C. B. P. 122. Phyllon Arrhenogonon, folio incano Monspefful. I. B. *tom.* 2. l. 23. 981.
- Merulus I. B. v. Fungus.

MESPILUS Germanica, folio Laurino non ferrato C. B. P. 453. Mespilus vulgaris I. B. *tom.* 1. l. 1. 69.

Mespilus folio Laurino major C. B. P. 453.

Mespilus spinosa five Oxyacantha maxima Virginiana.

Mespilus spinosa five Oxyacantha Virginiana nigra.

Mespilus Apii folio laciniato C. B. P. 453. Mespilus Aronia Veterum I. B. *tom.* 1. l. 1. 67.

Spinosa flore simplici.

Eadem flore pleno.

Mespilus Apii folio sylvestris non spinosa, sive

Oxyacantha C. B. P. 454. Sorbus torminalis & Crataegus Theophrasti I. B. tom. 1. l. 1. 63.

* Mespilus Apii folio sylvestris spinosa sive

Oxyacantha C. B. P. 454. Oxyacantha vulgaris sive Spinus albus I. B. tom. 1. l. 6. 44.

Mespilus spinosa Pyri folio. Oxyacantha Dioscoridis sive Spina acuta Pyri folio C. B. P.

454. Pyracantha quibusdam I. B. tom. 1. l. 6. 51.

Mespilus Alni lanato folio minor. Alni effigie

lanato folio minor C. B. P. 452. Dyopsyrus I. B. tom. 1. l. 1. 75.

Mespilus Alni lanato folio major. Alni effigie

lanato folio major C. B. P. 452. Sorbus Alpina I. B. tom. 1. l. 1. 65. Aria Theophrasti

vulgò.

Mespilus humilis, folio mali Cydoniæ rotundo

non ferrato. Cotoneaster folio rotundo non

ferrato C. B. P. 452. Chamæmespilus Cordi

C. B. P. 432. Cotoneaster I. B. tom. 1. l. 1. 73.

Idem folio oblongo ferrato C. B. P. Chamæ-

mespilus I. B. tom. 1. l. 1. 72.

MEUM foliis Anethi C. B. P. 148. Meum

Athamanticum Moris. Umbell. 4. Meum

vulgare, sive Radix ursina I. B. tom. 3. l.

27. II.

Meum spurium Moris. Umbell. 5. Meum lati-

folium

folium adulterinum C. B. P. 148. Meum Al-
terum Italicum quibusdam I. B. tom. 3. l.
27. 15.

Mezereum Germanicum I. B. v. Laureola.

MILIUM semine luteo C. B. P. 26. Milium
semine fulvo vel aureo I. B. tom. 2. l. 18.
446. descr. ANN.

Milium semine albo C. B. P. 26. I. B. tom. 2. l. 18.
446. descr. ANN.

Milium semine nigro C. B. P. 26. I. B. tom. 2.
l. 18. 446. ANN.

Milium Indicum Arundinaceo caule, granis
flavescentibus. ANN.

In septenum pedum altitudinem assur-
git, culmo Arundineo, digitum crasso, quem
a geniculo ad geniculum involvunt folia
frumento Indico angustiora & longiora, li-
nea albâ per mediam longitudinem notata.
In summitate erigitur juba dodrantalis pu-
gni crassitudine, multis paniculis strictius
invicem junctis coacervata, flores lanu-
gineos pendulos Milii instar flavescentes
proferens, quibus defluentibus succedunt
grana copiosa rotunda nitida dura pallida
farinacea magnitudine Orobi, singula insi-
dent caliculis bifidis, parvis nigris splen-
dentibus. Consulatur Casparus Bauhinus,
qui hoc in *Theatro Botanico* 488. ex Hi-
storiâ Indiæ Orientalis, nomine Frumenti

Indici, quod Milium Indicum vocant, videtur proposuisse.

Milium Indicum, Arundinaceo caule, granis nigris. ANN.

Hoc cum priori convenit crescendi modo & formâ, ita tamen, ut grana ferat nigra lucida, in summo non nihil tomentosa. Utrumquè Milium, quanquam in Vtraquè India omnium frugum fertilissimum sit, factum tamen in hortis nostris difficulter ad frugem perducitur.

Milium Arundinaceum, subrotundo semine, Sorgo nominatum C.B.P. 2. Sorghi I. B. tom. 2. l. 18. 447. ANN.

Milium Arundinaceum, plano alboquè semine C. B. P. 26. Sorghi album, Milium Indicum. Dora I. B. tom. 2. l. 18. 448. ANN.

Milium Arundinaceum, semine Lithospermum facie maximo durissimo. Lithospermum Arundinaceum fortè Dioscoridis & Plinii C. B. P. 258. Lachryma Iobi multis sive Milium Arundinaceum I. B. tom. 2. l. 18. 449. ANN.

MILLEFOLIUM maximum, umbellâ albâ C. B. P. 140.

* Millefolium vulgare album C. B. P. 140. Millefolium Stratiotes pennatum terrestre I. B. tom. 3. l. 26. 136.

* Millefolium purpureum majus C. B. P. 140. Mil.

Millefolium purpureum minus C. B. P. 140.

Millefolium Alpinum incanum, carneo flore.

C. B. P. 140.

Millefolium tomentosum luteum C. B. P. 140.

I. B. tom. 3. l. 26. 131.

Millefolium incanum Creticum C. B. P. 140.

Millefolium Creticum I. B. tom. 3. l. 26. 139.

Millefolium odoratum minus, Monspeliensium *Cat. Hort. Reg. Paris.* 122.

Millefolium majus album, odore Camphoræ.

Tanacetum minus album odore Camphoræ,

sive Achyllæa Diosc. C. B. P. 132, A-

chillæa Millefolia odorata I. B. tom. 3.

l. 26. 140.

MILLEFOLIUM aquaticum umbellatum, cappillaceo breviquè folio C. B. P.

141. Millefolium aquaticum, Fœniculo simile, umbelliferum I. B. tom. 3. l. 27. 8.

Millefolium aquaticum, flosculis ad foliorum nodos C. B. P. 141. Millefolium aquaticum minus I. B. tom. 3. l. 38. 783.

Millefolium aquaticum, sive Viola aquatica, caule nudo C. B. P. 141. Millefolium aquaticum dicta Viola aquatica I. B. tom. 3. l. 38. 782.

Millefolium aquaticum, Equiseti folio, caule nudo C. B. P. 141. Millefolium aquaticum, dictum Viola aquatica, secundum, I. B. tom. 3. l. 38. 783.

* Mil.

* *Millefolium aquaticum pennatum spicatum*
C. B. P. 141. *Millefolium pennatum aqua-*
ticum I. B. tom. 3. l. 38. 783.

* *Millefolium aquaticum cornutum* C. B. P. 141.
I. B. tom. 3. l. 38. 784.

Millefolium aquaticum, foliis Abrotani, Ra-
nunculi flore & capitulo C. B. P. v. *Ranun-*
culus.

Millefolium aquaticum, foliis Fœniculi flore &
capitulo C. B. P. v. *Ranunculus.*

Millegrana major Moris. v. *Polygonum.*

Mimosa ejusque species. v. *Herba viva.*

Mimosa non spinosa major Zeylanica Breyn.
v. *Onobrychis.*

MIRABILIS Peruviana, purpureo flo-
re. *Solanum Mexiocanum*, flore magno
C. B. P. 168. *Jesminum Mexicanum*, sive
Flos Mexicanus multis I. B. tom. 2. l. 20.
814. *Atzoyatl* vel *Mirabilis Mexicana* Her-
nand. p. 176. ANN.

Eadem flore flavo C. B. P. *Var.* 168. ANN.

Eadem flore ex albido C. B. P. *Var.* 168. ANN.

Eadem flore ex rubro luteo & albo tam virga-
tim quàm punctatim mixto C. B. P. *Var.*
168. ANN.

Mirabilis Peruviana, flore parvo. *Solanum*
Mexiocanum, flore parvo C. B. P. 168. *Mi-*
rabilis Peruviana minor *Muntingh.* 213.
ANN.

Molle I. B. v. *Lentiscus*.

Mollugo montana latifolia ramosa C. B. P. v. *Gallium*.

Mollugo montana angustifolia C. B. P. v. *Gallium*.

Molon Plinii C. B. P. v. *Filipendula*.

MOLUCA I. B. tom. 3. l. 28. 234. *Melissa*
Moluccana odorata C. B. P. 228 ANN.

Molucca asperior foetida I. B. tom. 3. l. 28. 235.
Melissa Moluccana foetida C. B. P. 229. ANN.

MOLY *Hispanicum purpureum* *Moris.*
Hist. 2. 392. *Moly latifolium Hispani-*
cum C. B. P. 75.

Moly latifolium luteum, odore *Allii primum*
C. B. P. 75. *Moris. Hist.* 2. 393. *Moly luteum*
Botanicorum latifolium, *Allii odore* I. B. tom.
2. l. 19. 562.

Moly angustifolium umbellatum C. B. P. 75.
Moris. Hist. 2. 393. *Moly Dioscoridis par-*
vum quibusdam I. B. tom. 2. l. 19. 568.
Idem flore carneo.

Moly album angustifolium Pefarense parvum,
caule triangulo *Moris. Hist.* 2. 394. *Moly*
parvum, *caule triangulo* C. B. P. 75.

Moly Virginianum C. B. P. v. *Ephemerm.*

Moly latifolium Liliflorum C. B. P. v. *Ornitho-*
galum.

Momordica vulgò. v. *Cucumis.*

Monarakudimbija Zeylonensibus. v. *Crista Pa-*
vonis.

Mor-

Morsus Diaboli I. B. v. Scabiosa.

Morsus gallinæ I. B. v. Alfine.

Morsus ranæ I. B. v. Nymphæa.

MORUS fructu nigro C. B. P. 459. Morus nigra I. B. tom. I. l. I. 118.

Morus fructu albo C. B. P. 459. Morus alba I. B. tom. I. l. I. 118. descr.

Muralis minor repens I. B. v. Draba.

Muraria similis I. B. v. Draba.

Murucuja Marcgr. v. Cucumis.

Musa I. B. v. Ficoides.

Muscari I. B. v. Hyacinthus.

Muscipula major, calyce turgido ventricosol I. B. v. Lychnis.

Muscipula muscoso flore I. B. v. Lychnis.

* **M**USCUS vulgatissimus C. B. P. 360. Muscus terrestris & hortensis I. B. tom. 3. l. 38. 764.

* Muscus Filicinus major C. B. P. 360. Muscus Filicinus I. B. tom. 3. l. 37. 764.

* Muscus Abietis facie C. B. P. 360. I. B. tom. 3. l. 37. 765.

* Muscus denticulatus major C. B. P. 360. Muscus pulcher parvus repens I. B. tom. 3. l. 37. 765.

* Muscus denticulatus minor C. B. P. 360. Muscus terrestris Lusitanicus I. B. tom. 3. l. 37. 765.

* Muscus terrestris clavatus C. B. P. 360. Muscus

scus terrestris repens, à Trago pictus *B. I. tom. 3. l. 37. 766.*

Musculus pyxioides terrestris *C. B. P. 361. Mus-*

scus pyxidatus *I. B. tom. 3. l. 37. 767.*

Musculus terrestris capillaris, capsulâ longâ *Com- melyn. Catal. 75.*

Musculus faxatilis Sericoides *Commel. Cat. 75.*

Musculus Coralloides, sive cornutus montanus *C. B. P. 361.*

Musculus Coralloides faxatilis, cervi cornu re- ferens *C. B. P. 361.*

Musculus Arboreus, Usnea Officinarum *C. B.*

P. 361. Musculus arboreus villosus I. B. tom. 3. l. 37. 763.

Musculus Arboreus Coralloides *C. B. P. 361.*

Musculus Arboreus cum orbiculis *C. B. P. 361.*

Musculus arboreus peltatus & scutellatis *I. B. tom. 3. l. 37. 764.*

Musculus pulmonarius *C. B. P. 361. Lichen Ar- boreus, sive Pulmonaria arborea. I. B. tom. 3. l. 37. 759.*

Musculus crustæ modo Arboribus adnascens *C. B. P. 361.*

Musculus amarus, Absinthii folio *I. B. tom. 3. l. 37. 764.*

Musculus ex cranio *I. B. tom. 3. l. 37. 764.*

Musculus aureus capillaris medius. Polytrychon- aureum majus *C. B. P. 356. Polytrichum*

Apuleji majus quibusdam *I. B. tom. 3. l. 37. 760.*

Mu-

* Muscus aureus capillaris minor. Polytrichon aureum minus C. B. P. 357. Polytrichon Apuleji minus quorundam I. B. tom. 3. l. 37. 760.

* Muscus aureus capillaris minimus, capitulo longo subflavo. Polytrichon aureum minimum, capitulo longo, subflavi coloris Com. meley. Cat. 89.

* Muscus aureus capillaris minimus, capitulo oblongo rotundo subviridi. Polytrichon aureum minimum capitulatum oblongo rotundum, colore subviridi Commel. Cat. 89.

MYAGRUM majus, seu fativum Moris. Hist. 2. 315. Myagrum fativum C. B. P. 109. Myagrum dictum Camelina I. B. tom. 2. l. 21. 892. ANN.

Myagrum siliqua longâ C. B. P. v. Eruca.

Myagrum monospermum latifolium C. B. P. v. Raphanistrum.

Myagro similis siliqua rotundâ C. B. P. v. Raphanistrum.

Myosuros I. B. v. Holosteo affinis.

Myrica vulgò. v. Tamariscus.

MYRRHIS annua, semine rostrato striato aspero oblongo, nodosa. Moris. Umbell. 44. & 67. ANN.

* Myrrhis annua, semine striato aspero brevibus asperis C. B. P. 160. ANN.

Myr-

Myrrhis annua, semine striato lævi *Moris. Umbell. 44. & 67.* Chærophyllo sylvestre *C. B. P. 152.* Antriscus Plinii quibusdam, semine longo *Cicutariæ vel Chærephylli. I. B. tom. 3. l. 27. 71. ANN.*

Myrrhis annua, semine striato lævi, tuberosa, nodosa, coniophyllum. *Moris. Umbell. 44. & 67.* *Cicutaria bulbosa C. B. P. 161.* *Cicutaria odorata bulbosa I. B. tom. 3. l. 27. 183. ANN.*

Myrrhis annua, semine striato villosa incano *Moris. Umbell. 44. & 67.* *Daucus Alpinus multifido longoque folio, five montanus umbellâ candidâ C. B. P. 150.* *Daucus Creticus semine hirsuto I. B. tom. 3. l. 27. 57. ANN.*

Myrrhis perennis, semine striato, alba major odorata. *Moris. Umbell. 44.* *Myrrhis major vel Cicutaria odorata C. B. P. 160.* *Myrrhis magno semine longo sulcato I. B. tom. 3. l. 27. 77.*

Myrrhis perennis, alba minor foliis hirsutis, semine striato aureo. *Moris. Umb. 44. & 66.*

Eadem foliis hirsutissimis *Moris. Umb. 44. & 66.*

Myrrhis sylvestris seminibus lævibus C. B. P. v. Chærephyllum.

MYRTUS communis Italica *C. B. P. 468.*

Myrtus latifolia Romana C. B. P. 468.

Myrtus latifolia Belgica, fortè Romana I. B. tom. 1. l. 5. 512.

Myrtus latifolia Boetica i. vel foliis Laurinis

E e

C. B. P.

C.B.P. 469. *Myrtus Boetica latifolia domestica* *I. B. tom. 1. l. 5. 511.*

Myrtus latifolia Belgica *C. B. P.* 469. *Myrtus vulgaris* *I. B. tom. 1. l. 5. 510.*

Eadem foliis in acumen luteum desinentibus

Myrtus foliis odore Nucis moschatae, cauliculis rubentibus, vulgò odore Citri *Schuyl. Cat. 49.*

Myrtus flore pleno *Corn. 203.*

Myrtus folio Buxi. *Schuyl. Cat. 49.*

Myrtus balsamica, folio mali Granatae.

Tres perpulchras Myrti varietates nuper in Angliâ detectæ sunt curâ Dni Watf. *Myrtus foliis Buxi contortis, minima foliis splendidibus, & balsamica foliis mali Granatae, quæ à congeneribus distinguitur foliis, facie mali Granatae, crassiusculis, pinguis, lucidis.*

Myrtus foliis minimis & mucronatis. *C. B. P.* 469. vulgò *Rorismarini foliis* *Schuyl. Cat. 49.* *Myrtus angustifolia minor.* *I. B. tom. 1. l. 5. 513.*

Myrtus minor vulgaris. *C. B. P.* 469. *Myrtus Tarentina* *I. B. tom. 1. l. 5. 512.*

Eadem foliis ex luteo variegatis.

Myrthus Africana humilis, foliis Myrtilli crenatis, cauliculis nigricantibus. Frutex Æthiopicus baccifer, foliis Myrtilli *Breyer Cent. 1. 9.*

Myrtus Zeylanica odoratissima, baccis nivalibus monococcis. Maranda Zeylanensibus

LUGDUNO-BATAVUS. 435

MYRTUS ZEYLANICA ODORATISSIMA, BACCIS
NIVEIS MONOCOCCIS.

Locis glareosis & sabulosis Insulæ Zeylan frequens est hoc speciosissimum Myrtus genus, quod fragranti suo Citrato odore prætereuntibus sese commendat. Toto verò habitu Myrtum pleno flore Canadensem Cornuti æmulatur; Ligno est candidissimo nitido Eboris instar, solido ponderoso; Cortice scabro tenui; Ramis numerosis, fornicato ambitu perpulchrè orbiculatis; Foliis rigidis mucronatis digitum longis, jucundo viridi levore nitentibus, odore Citri fragrantè, sapore aromatico leviter adstringente. Ad summos ramos prodeunt urceoli candidi diaphani globosi, florum Unedonis instar, è quorum umbilico profluunt innumera apiculata concoloris stamina. His emarcidis urceoli transeunt in baccas Pisi majoris magnitudine, mollescentes, niveas, dulcis aromatici saporis, includentes acinum unicum fuscum angulosum. Baccas pueruli esitant. Foliorum decoctum, observatâ tenui diætâ, Luem Gallicam vigorosè expugnat. Lignum ad capsulae scrinia aliaquè utensilia expetitur.

Myxa domestica L. B. v. Sebestena.

N.

apellus ejusquè species C. B. P. v. Ac
nitum.

NAPUS fativa C. B. P. 95. Napus fativus
Bunias *Moris. Hist. 2. 114.* Napus I. B. tom.
2. l. 21. 842. ANN.

Napus sylvestris. C. B. P. 95. *Moris. Hist. 2.*
114. I. B. tom. 2. l. 21. 843. ANN.

Napobrassica C. B. P. v. Brassica.

NARCISsus albus, magno odorato flo-
re, circulo pallido C. B. P. 48. Narcissus
medio-purpureus, magno flore: folio latio-
re I. B. tom. 2. l. 19. 601.

Narcissus niveus odoratus, circulo rubello C. B.
P. 48. Narcissus medio-purpureus minor I. B.
tom. 2. l. 19. 601.

Narcissus albus, circulo purpureo C. B. P. 48.
Narcissus flore simplici uno, medio purpu-
reo *Moris. Hist. 2. 361.* Narcissus medio-pur-
pureus. I. B. tom. 2. l. 19. 600.

Narcissus albus, circulo croceo vel luteo C. B.
P. 49. Narcissus medio croceus tenuifolius
I. B. tom. 2. l. 19. 602.

Narcissus albus circulo croceo minor C. B. P.
49. Narcissus medio-purpureus minor. I. B.
tom. 2. l. 19. 601.

Narcissus Orientalis major polyanthos totus
albus *Eyst. Moris. Hist. 2. 362.* Narcissus
Orientalis major albus C. B. P. 49.
idem medius. Narcissus Orientalis medius al-
bus. C. B. P. 49.

438 HORTUS ACADEMICUS.

Narcissus Orientalis albus, calice stellato C. B. P. 49.

Narcissus totus albus major C. B. P. 49. Narcissus cum pluribus floribus totus albus, major. I. B. tom. 2. l. 19. 606.

Idem minor C. B. P. 49. Narcissus foliis candidantibus cum pluribus floribus totus albus, minor I. B. tom. 2. l. 19. 606.

Narcissus albus flore minore, jasmini odore C. B. P. 50.

Narcissus Orientalis albus, calice luteo, campanulæ simili maximus C. B. P. 50. Narcissus campanularis vulgò.

Narcissus Orientalis albus calice luteo medius C. B. P. 50.

Narcissus Orientalis albus, calice luteo minor C. B. P. 50.

Narcissus Orientalis calice aureo, pluribus foliolis pleno, seu pluribus foliolis tortilibus pleno C. B. P. 50.

Narcissus pallidus medio-croceus C. B. P. 50. Narcissus medio-luteus Pisanus, plures flores ferens. I. B. tom. 2. l. 19. 608.

Narcissus pallidus medio-aureus C. B. P. 50.

Narcissus albus, circulo croceo polyanthos C. B. P. 50. Narcissus medio-croceus serotinus cum aliquot floribus I. B. tom. 2. l. 19. 604.

Narcissus pallidus, circulo luteo C. B. P. 50. Narcissus albidus medio-luteus cum aliquot flori-

- floribus *I. B. tom. 2. l. 19. 504.*
- Narcissus pallidus, circulo aureo alter *C. B. P. 50.* Narcissus pallido flore medio-aureus *I. B. tom. 2. l. 19. 607.*
- Narcissus ferotinus montanus Musart dictus *Fer. Fl. Cult. 113.* Flore niveo, calice croceo fimbriato.
- Narcissus medio-luteus, copioso flore, odore gravi *C. B. P. 50.* Narcissus Constantinopolitanus minor, calyce fimbriato medio-croceus *Eyst. Moris. Hist. 2. 392.* Narcissus multos ferens flores, medioluteus Narbonensis *I. B. tom. 2. l. 19. 603.*
- Narcissus medio-luteus, majoribus floribus *C. B. P. 50.* Narcissus plures ferens flores majores præcocior, medio-luteus *I. B. tom. 2. l. 19. 603.*
- Narcissus niveus, calyce flavo, odoris fragrantissimi *C. B. P. 50.*
- Narcissus luteus polyanthos Lusitanicus *C. B. P. 50.* Narcissus de Argiers polyanthos totus luteus *Eyst. Moris. Hist. 2. 362.*
- Narcissus angustifolius flavus, magno calice *C. B. P. 51.* Narcissus juncifolius flavus amplo calice *I. B. tom. 2. l. 19. 608.*
- Narcissus juncifolius oblongo calice luteus major *C. B. P. 55.* Narcissus major juncifolius *Eyst. Moris. Hist. 2. 362.* Narcissus juncifolius, flore luteo *I. B. tom. 2. l. 19. 607.*

Narcissus juncifolius luteus minor C. B. P. 51.
Moris. Hist. 2. 362. I. B. tom. 2. l. 19. 607. Ic.

Narcissus juncifolius, flore pallidior calice
 flavo C. B. P. 51. Narcissus angustifolius mi-
 nor, flore pallido I. B. tom. 2. l. 19. 609.

Narcissus juncifolius, flore rotundo Roseo
 C. B. P. 51.

Narcissus juncifolius totus albus C. B. P. 51.
 Narcissus juncifolius omnino albus, calice
 oblongo I. B. tom. 2. l. 19. 598.

Narcissus latifolius maximus albus, calice bre-
 vi luteo C. B. P. 51. *Hist. Moris. 2. 362.*

Narcissus latifolius, pallidus calice amplo &
 aureo, caule striato C. B. P. 51.

Idem calice amplo alter C. B. P. 52.

Narcissus latifolius sulphureus vel albus, brevi
 calice C. B. P. 52.

Narcissus maximus pallidè luteus C. B. P. 52.

Narcissus subflavus, tubo sexangulo C. B. P. 52.
Moris. Hist. 2. 362.

Narcissus flavus, tubo rotundo C. B. P. 52.

Narcissus albus, tubo luteo C. B. P. 52.

Narcissus latifolius pallidus, calice longo au-
 reo creanto *Moris. Hist. 2. 362.* Narcissus al-
 bus, calice flavo Moscari odore C. B. P. 52.

Idem alter C. B. P. 52. Præcocior.

Narcissus sylvestris pallidus, calice luteo C. B.
 P. 52. *Moris. Hist. Ic.* Bulbocodium vulga-
 tius

- tius *I. B. tom. 2. l. 19. 593.*
 Narcissus major totus luteus, calice prælongo
C. B. P. 52. Bulbocodium Hispanicum I. B.
tom. 2. l. 19. 594.
 Narcissus totus luteus, foliis florum reflexis
C. B. P. 53.
 Narcissus parvus totus luteus *C. B. P. 53. Bul-*
bocodium minus I. B. tom. 2. l. 19. 59. Cali-
ce simplici.
 dem calice pleno. Narcissus minor luteus, ca-
 lice oblongo pleno *Cat. Hort. Reg. Paris.*
127. Pseudonarcissus pleno flore Fer. Flor.
Cult. 110.
 Narcissus albus, oblongo calice *C. B. P. 53.*
 Pseudonarcissus albo flore Clusii *I. B. tom.*
2. l. 19. 597. Altior flore longiore & tubo
angustiore C. B. P. Var. 53.
 dem humilior, flore brevior & tubâ laxiore
C. B. P. Var. 53.
 Narcissus albus, foliis reflexis, calice brevi au-
 reo *Cat. Hort. Reg. Paris. 127.*
 Narcissus totus albus petalis reflexis *Moris. Hist.*
2. 263. Narcissus angustifolius albus, calice
oblongo floreque reflexo C. P. B. 53. Narcis-
sus foliis floris albis, oblongo calice luteo
I. B. tom. 2. l. 19. 597.
 Narcissus minimus, calice amplo plano *Moris.*
Hist. 2. 422. Narcissus montanus juncifo-
lius, calice flavo C. B. P. 53. Bulbocodium
tenuifolium, flore luteo I. B. tom. 2. l. 19. 596.
 E e 5 Nar-

Narcissus montanus alter, flore fimbriato C.
B. P. 53. Bulbocodium tenuifolium aliud,
flore luteo fimbriato I. B. tom. 2. l. 19. 597.

Narcissus juncifolius omnium minimus, flore
omnino albo, calice fimbriato Moris. Hist. 2.
421. Narcissus montanus albus minimus C.
B. P. 53. Bulbocodium minimum tenuifo-
lium album I. B. tom. 2. l. 19. 598.

Narcissus montanus juncifolius, calice aureo
C. B. P. 53. Moris. Hist. 2. 363.

Narcissus minimus, calice pleno, petalis sex
reflexis luteis Moris. Hist. 2. 422. Narcissus
montanus coronatus C. B. P. 53. Bulboco-
dium minimum coronatum I. B. tom. 2. l.
19. 596.

Narcissus Orientalis flore multiplici & pleno
albo luteo C. B. P. 53. Moris. Hist. 2. 363.

Narcissus Constantinopolitanus polyanthos
major, melino pleno flore Cat. Hort. Reg.
Par. 128.

Narcissus latifolius albus medio-luteus C. B. P.
53. Narcissus cum pluribus floribus plenis,
corollâ luteâ I. B. tom. 2. l. 19. 605.

Narcissus albus coronâ multiplici luteâ C. B. P.
53. Narcissus amplo flore, coronâ aureâ
plenâ I. B. tom. 2. l. 19. 605.

Narcissus bulbo anguloso C. B. P. 54. Narcissus
Constantinopolitanus, quem ZidenSari vo-
cant I. B. tom. 2. l. 19. 606.

Narcissus multiplex totus flavus C. B. P. 54.

Moris. Hist. 2. 363.

Narcissus incomparabilis flore pleno, partim flavo, partim croceo *Cat. Hort. Reg. Par.*

127. Narcissus totus niveus multiplex C. B. P. 54.

Moris. Hist. 2. 363. Narcissus flore singulari albo pleno I. B. tom. 2. l. 19. 602.

Narcissus sylvestris multiplex, calice carens C. B. P. 54. *Moris. Hist. 2. 363.* Bulbocodium flore pleno I. B. tom. 2. l. 19. 594.

Idem involucro inclusus permanens C. B. P. Var. 54. Seu flore clauso virescente *Schuyl. Cat. Lugd. 49.*

Narcissus flore pleno variegato C. B. P. 54. *Moris. Hist. 2. 363.*

Narcissus luteus sylvestris duplici & triplici, tubo aureo C. B. P. 54. *Moris. Hist. 2. 363.*

Narcissus luteus, tubo diviso C. B. P. 54. Bulbocodii pleno flore speciosum genus *Venerii I. B. tom. 2. l. 19. 595.*

Narcissus latifolius luteus multiplex C. B. P. 54.

Narcissus juncifolius aureus multiplex, Anemones formâ C. B. P. 54. Narcissus juncifolius luteus, flore pleno *Eyst. Moris. Hist. 2. 363.*

Narcissus Cyprius luteus polyanthes, flore pleno I. B. tom. 2. l. 19. 595.

Narcissus maritimus C. B. P. 54. Lilionarcissus albus maritimus minor *Moris. Hist. 2. 365.*

Pancratium Monspeulanum multis Scylla alba

alba parva *I. B. tom. 2. l. 19. 611.*

Narcissus Illyricus Liliaceus *C. B. P. 55. Lilio*
narcissus albus maritimus major *Moris. Hist.*
2. 366. Pancratii Monspeliani, vel Heme-
rocallidis Valentinae facie Lilio-narcissus,
vel Narcissus tertius *Matth. I. B. tom. 2. l.*
19. 613.

Narcissus Indicus Liliaceus, saturo colore pur-
purascens Fer. v. Lilium.

Narcissus Indicus Liliaceus, diluto colore purpu-
rascens Fer. v. Lilium.

Narcissus Indicus, flore Liliaceo Sphoericus Fer.
v. Lilium.

Narcissus bifolius Promontorii Bonae Spei. v.
Hæmanthus.

Narcissus Jacobeus latifolius Indicus. v. Li-
lium.

Narcissus Indicus totus ruber C. B. P. v. Lilium.

Narcissus ex albo rubescens C. B. P. v. Lilium.

Narcisso-colchicum. v. Colchicum.

Nardus Celtica Dioscoridis C. B. P. v. Vale-
riana.

Narthecium Theophrasti I. B. v. Ferula.

NASTURTIIUM minimum annuum, flore al-
bo *Moris. Hist. 2. 221. Sium minimum Prosp.*
Alpin. Exot. 321. An Sisymbrii Cardami-
nes species quædam insipida I. B. tom. 2. l.
21. 886. ANN.

* Nasturtium sylvestre tenuissimè divisum seu
Nastur-

Nasturtium *μυρτόφυλλον*, flore luteo minimo
Moris. Hist. 2. 223. Nasturtium sylvestre te-
 nuissimè divisum C. B. P. 105. Seriphium
 Germanicum, Sophia quibusdam I. B. tom.
 2. l. 21. 886. Foliis angustioribus C. B. P.
 Var. 105. ANN.

Idem foliis latioribus C. B. P. Var. 105. ANN.

Nasturtium pumilum Belgicum. ANN.

Nasturtium pratense, magno flore simplici
Moris. Hist. 2. 223. Nasturtium pratense, ma-
 gno flore C. B. P. 104. Iberis Fuchsi, sive Na-
 sturtium pratense I. B. tom. 2. l. 21. 889.

Idem flore prorsus albo C. B. P. Var. 104.

Nasturtium pratense, flore pleno C. B. P. 104.
Moris. Hist. 2. 223. *Descr.* Iberis Fuchsi, si-
 ve Nasturtium pratense, flore pleno I. B. tom.
 2. l. 21. 889.

Nasturtium aquaticum supinum, flore albo
Moris. Hist. 2. 223. Nasturtium aquaticum
 supinum C. B. P. 104. Sisymbrium Carda-
 mine, sive Nasturtium aquaticum I. B. tom.
 2. l. 21. 884.

Nasturtium aquaticum majus & amarum C.
 B. P. 104. *Moris. Hist.* 2. 224. Sisymbrium
 Cardamine, sive Nasturtium aquaticum I. B.
 tom. 2. l. 21. 884.

Nasturtium aquaticum majus & amarum C. B.
 P. 104. *Moris. Hist.* 2. 224. Sisymbrium Car-
 damine, sive Nasturtium aquaticum, flore
 majore elatius I. B. tom. 2. l. 22. 885.

* Na-

*Nasturtium aquaticum minus C. B. P. 104. *Morif. Hist. 2. 224.* Sisymbrium Cardamine
hirsutum minus, flore purpureo I. B. tom. 2.
l. 21. 888.

Nasturtium Alpinum trifoliatum *Morif. Hist. 2. 224.* Nasturtium Alpinum trifolium C. B. P. 104. Iberidi Fuchsi affinis trifolia Cardamine I. B. tom. 2. l. 21. 800.

NASTURTIIUM vulgare, sive hortense tenuiter divisum *Morif. Hist. 2. 300.* Nasturtium hortense vulgatum C. B. P. 102. Nasturtium vulgare I. B. tom. 2. l. 22. 912. ANN.

Nasturtium hortense latifolium C. B. P. 103. *Morif. Hist. 2. 301.* ANN.

Nasturtium hortense crispum latifolium *Morif. Hist. 2. 301.* C. B. P. & Var. 104. Nasturtium crispum I. B. tom. 2. l. 22. 913. ANN.

Idem angustifolium C. B. P. Var. 104. ANN.

*Nasturtium pumilum vernal C. B. P. 105. *Morif. Hist. 2. 301.* ANN.

*Nasturtium sylvestre, Oxyridis folio, capsulis minimis *Morif. Hist. 2. 301.* Nasturtium sylvestre, Oxyridis folio C. B. P. 105. Thlaspi angustifolium Fuchsi, Nasturtium sylvestre I. B. tom. 2. l. 22. 914. ANN.

Nasturtium sylvestre, Erucae affine *Morif. Hist. 2. 301.* C. B. P. 105. Nasturtium sylvestre, Valentinum Clusio I. B. tom. 2. l. 22. 920. ANN.

Nasturtium verrucosum, capsulâ bivalvi aspe-
râ seu hirsutâ *Moris. Hist. 2. 302.* Ambrosia
campestris repens *C. B. P. 138.* Coronopus
Ruellii, sive *Nasturtium verrucosum I. B.*
tom. 2. l. 22. 919. ANN.

Nasturtium Indicum majus C. B. P. v. Viola
Indica.

Nejemelimsalib I. B. v. Gramen.

Nepa quibusdam I. B. v. Genista.

Nepeta ejusquè species C. B. P. v. Calamintha.

NERION floribus rubescentibus *C. B. P. 464.*
Nerium, sive *Rhododendron*, flore ru-
bro *I. B. tom. 2. l. 15. 140.* Oleander vul-
gò.

Nerion floribus albis C. B. P. 464. *Nerion* sive
Rhododendron flore albo *I. B. tom. 2. l. 15.*
140.

Nerion Indicum angustifolium, floribus odo-
ratis simplicibus.

Huic sunt folia angusta, flores incarnati,
nonnunquam rubentes, odoris grati, cœte-
ra vulgari Nerio omnino paria. In Belgiam
advexit Vir Nobilissimus Dns de Reede cui
ob publica in Rem Botanicam merita im-
mensum debet noster orbis.

Nerion Indicum latifolium, floribus odoratis
plenis.

Vulgare *Nerium* per omnia æmulatur,
nisi

LUGDUNO-BATAVUS.

449

ARIUM INDICUM LATIFOLIUM, FLORIBUS PLE-
NIS ODORATIS.

nisi quod flores multiplici petalorum serie sint constructi, ad amplitudinem Rosæ Moschatæ, coloris incarnati, propitioris cœlo, dilutè rubelli, odoris suavissimi, ob quem de collo gestantur ab Indis. Colitur in hortis Zeylonensium aliorumquè Orientalium, ex quibus hûc transferri curavit Illustrissimus Beverningius, in cujus nitidissimo viridario inter cœtera ornamenta luxuriat.

Nerium Alpinum ejusquè species I. B. v. Cistus.

NICOTIANA major latifolia C. B. P. 169. *Moris. Hist. 2. 492.* Nicotiana major sive Tabacum majus I. B. tom. 3. l. 34. 629. ANN.

Nicotiana major lato & rotundofolio. Pyciet seu Tabacum *Hernand. 173.* ANN.

Nicotiana major angustifolia C. B. P. 170. *Moris. Hist. 2. 492.* Nicotiana sive Tabacum, folio angustiore I. B. tom. 3. l. 34. 630. ANN.

Nicotiana minor C. B. P. 170. *Moris. Hist. 2. 493.* Nicotiana latifolia, seu folio subrotundo minor, capsulâ rotundâ Priapi formâ, floribus luteis, minoribus, foliis rotundis, obscure virentibus, glutinosis *Moris. Hist. 2. 492.* Priapeja quibusdam Nicotiana minor I. B. tom. 3. l. 34. 630. ANN.

NIGELLA *larvensis* cornuta C. B. P. 145.
Melanthium *sylvestre*, sive *arvense* I. B.
tom. 3. l. 26. 205. ANN.

Nigella *latifolia*, flore majore simplici coeruleo C. B. P. 145. ANN.

Nigella *angustifolia*, flore majore simplici coeruleo C. B. P. 145. **Melanthium** capite & flore majore I. B. *tom.* 3. l. 26. 207. ANN.

Nigella flore majore pleno coeruleo C. B. P. 145. **Melanthium** capite vel calice & flore majore pleno I. B. *tom.* 3. l. 26. 209. ANN.

Nigella flore minore simplici candido C. B. P. 145. **Melanthium** calice & flore minore femine nigro & luteo I. B. *tom.* 3. l. 26. 208. ANN.

Nigella flore minore pleno & albo C. B. P. 146. **Melanthium** capite minore, flore multiplicato I. B. *tom.* 3. l. 26. 209. ANN.

Nigellastrum *vulgò*. v. *Lychnis*.

Arabum I. B. v. *Convolvulus*.

Boheznopalli *Hernand.* v. *Ficus*.

Noli me tangere *vulgo*. v. *Balsamine*.

NUMMULARIA *lutea* major C. B. P. 309.

Nummularia major, flore luteo *Moris.*
Hist. 2. 567. **Nummularia** sive *Centimorbia*
 I. B. *tom.* 3. l. 229. 370.

*Nummularia minor, flore purpurascente C. B.
P. 309. Moris. Hist. 2. 567. Nummularia ru-
bra I. B. tom. 3. l. 29. 371.

Nux Avellana vulgò. v. Corylus.

NUX JUGLANS, sive Regia vulgaris C. B.
P. 417. Nux juglans I. B. tom. 1. l. 3. 241.

Nux juglans, fructu maximo C. B. P.
417.

Nux juglans, fructu tenero, fragili putamine
C. B. P. 417.

Nux juglans, fructu serotino C. B. P. 417.

Nux juglans Virginiana nigra.

Caudice vasto, cortice per senium hiul-
co, lignoque nitido & crispatim undulato
Nuci juglandi Europææ haud absimilis est,
Foliis autem angustioribus brevioribus per
ambitum leviter crenatis, superficie non
nihil rugosa, odoreque debiliore. Flores
quoque & julos, quos quidem hactenus
nondum licuit conspicere, nec quicquam
à vulgari discrepare accepi. Nuces à Re-
verendissimo Episcopo Londinensi nobis
transmissæ, Nucem juglandem commu-
nem adæquant, duplici tectæ muni-
mento, exteriori crasso fungoso viridi
interiori ligneo nonnihil depresso, du-
rissimo, crassissimo, nigricante, cre-
bris profundisque sulcis seu scrobicul-

LUGDUNO-BATAVUS. 453
UX JUGLANS VIRGINIANA NIGRA.

per longitudinem inscripto, & ex duabus carinis pressissimè junctis, nullâ apparente commissurâ, compacto. Nucleus includitur dulcis, edulis, quadripartitus, juglandi nuci per omnia similis, intercussante tamen membranâ lignosâ, durâ, crassâ. Patriam agnoscit Virginiam, ex quâ in Angliam indequè in Belgiam est adve-
cta.

* **N**YMPHÆA alba major C. B. P. 193. Nym-
phæa alba I. B. tom. 3. l. 28. 771.

* Nymphæa alba minor C. B. P. 193. I. B. tom. 3.
l. 38. 773.

* Nymphæa alba minima C. B. P. 193. Nym-
phæa minor, sive Morsus ranæ I. B. tom. 3.
l. 38. 773.

* Nymphæa lutea major C. B. P. 193. Nym-
phæa lutea I. B. tom. 3. l. 38. 771.

* Nymphæa lutea minor, parvo flore C. B. P.
193. Nymphæa minor lutea I. B. tom. 3. l.
38. 772.

O.

chrus folio integro, capreolos emitten-
te C. B. P. v. Lathyrus.

Ocimum latifolium maculatum, vel crispum C.B.P. 225. Ocimum Sancto, Mauritani, latum, crispum, maximum I. B. tom. 3. l. 28. 249. Basilicum vulgò. ANN.

Ocimum viride, foliis bullatis C. B. P. 225. ANN.

Ocimum foliis fimbriatis viridibus C.B.P. 225. ANN.

Idem foliorum fimbriis ad Endiviam accedentibus maximum. ANN.

Ocimum Caryophyllatum maximum C. B. P. 225. Ocimum Ægyptium, longioribus foliis, Rihau dictum I. B. tom. 3. l. 28. 250. ANN.

Ocimum Caryophyllatum majus C. B. P. 226.

Ocimum odoratum, sive Basilicum I. B. tom. 3. l. 28. 245. ANN.

Ocimum Citri odore C. B. P. 226. Ocimum magnum I. B. tom. 3. l. 28. 246. ANN.

Ocimum vulgatius C. B. P. 226. I. B. tom. 3. l. 28. 247. ANN.

Ocimum foliis ex nigro virescentibus, flore albo Cat. Hort. Reg. Par. 131. ANN.

Idem violaceo flore Cat. Hort. Reg. Par. 131. ANN.

Ocimum nigrum majus, acuto Rutæ odore ANN.

Ocimum medium crispum, conglomeratâ brevique spicâ Cat. Hort. Reg. Paris. 131. ANN.

Idem bullatis foliis *Cat. Hort. Reg. Paris.*
131. ANN.

Ocimum tricolor Cat. Hort. Reg. Par. 131.
ANN.

Ocimum angustifolium, foliis ferratis. ANN.

Ocimum minimum C. B. P. 226. *I. B. tom. 3. l.*
28. 247. ANN.

Idem crispum *Brunsf.* ANN.

Oculus Christi I. B. v. Aster.

Ocymastrum vulgò. v. Lychnis.

Ocymastrum verrucarium I. B. v. Circea.

Ocymastrum Valentinum Clusii vulgò, v. Mar-
rubium.

Ocymoides ejusque species C. B. P. & I. B. v. Ly-
chnis.

Ocymoides repens montanum C. B. P. v. Ly-
chnis.

Odontis quibusdam I. B. v. Lychnis.

OENANTHE *Aprii folio maxima, succo, vi-*
roso, Cicutæ facie Moris. Umbell. 16. 19.

20. *Oenanthe Cherephylli foliis C. B. P.* 162.

Eadem latiori folio Cretica prolifera. Oenan-
the prolifera Apula C. B. P. 163.

Oenanthe Aprii folio, caule firmiori Moris.
Umbell. 16. *Oenanthe Aprii folio C. B. P.*

162. *Oenanthe sive Filipendula Monspe-*
fulana, folio Aprii I. B. tom. 3. l. 27. 190.

Eadem caule flexuoso & fistuloso Moris. Um-
bell. 16.

* *Oeno-*

Oenanthe aquatica C. B. P. 162. Oenanthe, si-
ve Filipendula aquatica I. B. tom. 3. l. 27. 191.
Radice bulbillis donatâ.

Eadem radice bulbillis carente C. B. P. Var.
162. An Oenanthe siue Filipendula folio
Rutæ I. B. tom. 3. l. 27. 192.

Oenanthe Millefolii aquatici foliis Moris. Hist.
16. Daucus pratensis, Millefolii palustris
folio C. B. P. 150.

Oenanthe Hederæ foliis C. B. P. v. Ranun-
culus.

Oenanthe Myconii I. B. v. Ranunculus.

OLEA fativa C. B. P. 472. I. B. tom. 1.
l. 6. 1.

Olea maxima Hispanica C. B. P. 472.

Olea sylvestris, folio duro subtus incano C. B. P.
472. Oleaster, siue Olea sylvestris I. B. tom.
2. l. 6. 21.

Olea sylvestris, folio molli incano C. B. P. 472.

Zizyphus Cappadocia, quibusdam Olea Bo-
hæmica I. B. tom. 1. l. 6. 27.

Oleander ejusque species vulgò. v. Nerium.

ONOBRYCHIS major perennis, filiculis ar-
ticulatis asperis clypeatis rectâ junctis,
flore ruberrimo Moris. Hist. 2. 129. Onobry-
chis semine clypeato aspero major C. B. P.
350. Astragalus Romanus, siue Hedyfa-
rum clypeatum filiquâ asperâ I. B. tom. 3. l.
17. 315.

Eadem flore albo *Moris. Hist. 2. 129. Boccon. Epist.*

Onobrychis major annua, filiculis articulatis asperis clypeatis undulatim, id est, antrosum & retrorsum junctis flore purpureo rubente *Moris. Hist. 2. 130. ANN.*

Onobrychis annua Zeylanica, Mimosa foliis, filiquis articulatis asperis major. Mimosa non spinosa major Zeylanica *Breyn. Cent. 51. ANN.*

Eadem minor. *ANN.*

Onobrychis major perennis Canadensis triphylla, filiculis articulatis asperis triangularibus *Moris. Hist. 2. 130. Hedyfarum triphyllum Canadense Corn. 44.*

Onobrychis major, filiculis echinatis cristatis in spicâ digestis *Moris. Hist. 2. 131. Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato major C. B. P. 350. Polygonon Gesneri I. B. tom. 2. l. 17. 315.*

Onobrychis minor, filiculis echinatis, cristatis, majoribus & crassioribus aculeis præditis, donata *Moris. Hist. 2. 131. Onobrychis fructu echinato minor C. B. P. 350.*

Onobrychis flore coeruleo, filiculis hirsutis seu asperis, ad imum Platani pilulæ modo junctis *Moris. Hist. 2. 133. Glyzyrrhiza capite echinato C. B. P. 352. Glyzyrrhiza Dioscoridis echinata, non repens I. B. tom. 2. l. 17. 327.*

Onobrychis spicata, floribus pallidis, nigris radiis notatis C. B. P. v. Astragalus.

Onobrychis arvensis C. B. P. v. Campanula.

Onobrychis pentagonia peregrina perfoliata, folio rotundiori Hort. Reg. Par. v. Campanula.

Ononis. v. Anonis.

Onopordum I. B. v. Carduus.

OPHIOGLOSSUM vulgatum C. B. P. 187.

Ophioglosson I. B. tom. 3. l. 35. 708.

Ophioscorodon quibusdam I. B. v. Allium.

Ophris bifolia C. B. P. v. Orchis.

Ophris minima C. B. P. v. Orchis.

Opuntia, ejusque species. v. Ficus.

Oquichtli Cocaxochitl Hern. v. Tagetes.

ORCHIS seu Cynosorchis latifolia, hiantе cucullo major C. B. P. 80. Cynosorchis galea & alis ferè cinereis I. B. tom. 2. l. 19. 735.

Orchis seu Cynosorchis latifolia, hiantе cucullo altera C. B. P. 81. Cynosorchis prior Dodonæi I. B. tom. 2. l. 19. 759.

Orchis morio Mas, foliis maculatis C. B. P. 81.

Orchis major tota purpurea, maculoso folio I. B. tom. 2. l. 19. 763.

Orchis morio Foemina C. B. P. 82. Orchis minor purpurea cum alis virentibus I. B. tom. 2. l. 19. 761.

* Ea-

- * Eadem flore niveo *Cat. Hort. Reg. Par.* 133.
 * Eadem flore roseo *Cat. Hort. Reg. Par.* 132.
 Eadem flore versicolore *Cat. Hort. Reg. Par.*
ris. 132. Ex albo & rubro variegato.
 Orchis flore nudi hominis effigiem repræsen-
 tans, Mas C. B. P. 82. Orchis antropophora,
 Oreades altera *Column. Ecphr.* 316.
 Orchis flore nudi hominis effigiem repræsen-
 tans, Fœmina C. B. P. 82. Orchis antropho-
 ra, Oreades *Column. Ephr.* 318.
 Orchis barbata, odore hirci, brevior latiore-
 què folio C. B. P. 82. Orchis barbata foetida
I. B. tom. 2. l. 19. 754.
 * Orchis alba bifolia minor, calcare oblongo C.
B. P. 83. Orchis alba, calcari longo *I. B. tom.*
2. l. 19. 771.
 Orchis muscæ corpus referens minor, vel ga-
 leâ & alis herbidis C. B. P. 83. Orchis myo-
 des, galeâ & alis herbidis *I. B. tom. 2. l. 19.*
 757.
 Orchis fucum referens major, foliolis supe-
 rioribus candidis, & purpurascentibus C. B.
P. 83. Orchis fuciflora, galeâ & alis purpu-
 rascentibus *I. B. tom. 2. l. 19.* 756.
 Orchis muscam referens lutea C. B. P. 82. Or-
 chis myodes lutea *I. B. tom. 2. l. 19.* 768.
 Orchis apem referens Lusitanica *Breyn. Cent.*
1. 98.
 Orchis muscam majorem cœruleam repræsen-
 tans *Breyn. Cent. 1.* 100.

Orchis scarabæum exprimens *Breyn. Cent. 1.*
Breyn. Cent. Ic. 45.

Orchis spiralis alba odorata I. B. tom. 2. l. 19.
 769. *Triorchis alba odorata* C. B. P. 84.

Orchis Lilifolia minor Zabuletorum Zelan-
diæ & Bataviæ I. B. tom. 2. l. 19. 770.

Orchis palmata pratensis latifolia, longis calca-
caribus C. B. P. 85. *Palmata non maculata*
 I. B. tom. 2. l. 19. 774.

Orchis palmata pratensis maculata C. B. P. 85.
Palmata maculata I. B. tom. 2. l. 19. 775.

Orchis palmata palustris latifolia C. B. P. 86.
Palmata five Serapias palustris latifolia, flo-
re albo subpurpurascente I. B. tom. 2. l. 19.
 775.

Orchis bifolia, herbaceo flore major. Ophris
bifolia C. B. P. 87. *Bifolium majus, five Or-*
chis major quibusdam I. B. tom. 2. l. 31. 533.
Eadem minima. Ophris minima C. B. P. 87.
Bifolium minimum I. B. tom. 2. l. 31. 534.

OREOSELINUM *Moris. Umb. 41. Apium*
montanum, folio ampliore C. B. P. 153.
Apium montanum Dalechampii I. B. tom. 3.
 l. 27. 103.

ORIGANUM *sylvestre: Cunila bubula Pli-*
nii C. B. P. 223. *Origanum vulgare spon-*
taneum I. B. tom. 3. l. 28. 236.
Origanum sylvestre album C. B. P. 223.

Ori-

Origanum sylvestre, foliis variegatis *Sutherland*.
Cat. 253.

Origanum Heracleoticum: Cunila gallinacea
Plinii *C. B. P.* 223. Origanum Heracleoti-
cum Matthioli, aliis fortè Creticum *L. B.*
tom. 3. l. 28. 257.

Origanum Onites *C. B. P.* 223. Origanum Mon-
speliensium pulchrum Camerarii *L. B. tom.*
3. l. 68. 238.

Origanum montis Sipyli.

Perpulchrum hoc Origanum, Sipyli
montis incola, nunc quoquè sedem fixit
in nostro Horto. Hujus radícula, numero-
sis fibrata capillamentis, emittit cauliculos
ramosos dodrantes nonnunquam altio-
res, quadrangulos infrà subhirsutos & pur-
purascens, suprà glabros, in glauco viri-
dantes. Hos vestiunt foliola, bina ex ad-
verso, Origano vulgari minora, graciliora
glauca, glabra, penes radicem nonnihil
hirsuta, odoris jucundi languidi. Ramo-
rum summitates gracilescunt in capitula
squamosa ex parvis foliolis, pressius invi-
cem junctis, & Dictamni Cretici aceta-
bula mentientibus, compacta, è quibus
exeunt flosculi purpurei quinquifidi Ori-
gano ampliores cum prominentibus sta-
minibus longulis concoloribus. Semina se-
quuntur quaterna fusca in utriculis exi-
guis quinquifidis apertis more congene-
rum.

rum. Quamvis tenella hæc planta per abscissos ramulos de facili propagetur, at tamen imbribus & coelestibus injuriis minus oportuna diligentem exposcit culturam.

Origano cognata C. B. P. v. Majorana.

Organum fistulosum Canadense Corn. v. Clinopodium.

ORLEANA seu Orellana folliculis lappaceis. Urucu *Pison. l. 4. 133.* Achiot, seu Medicina tingendo apta. *Hern. 74.*

ORNITHOGALUM umbellatum maximum Arabicum, umbilico interiore nigro *Moris. Hist. 2. 378.* Ornithogalum umbellatum maximum C. B. P. 69. Liliun Alexandrinum, sive Ornithogalum magnum Syriacum I. B. tom. 2. l. 19. 629.

*Ornithogalum umbellatum minus candidum vulgare *Moris. Hist. 2. 378.* Ornithogalum umbellatum medium angustifolium C. B. P. 70. Ornithogalum pallido flore I. B. tom. 2. l. 19. 625.

Ornithogalum spicatum maximum, floribus albis innumerabilibus *Moris. Hist. 2. 378.* Ornithogalum latifolium & maximum C. B. P. 70. Ornithogalum maximum, floribus profusis niveis I. B. tom. 2. l. 19. 628.

Ornithogalum spicatum majus angustifolium, flo.

floribus ex albo virescentibus *Moris. Hist. 2.*
 379. Ornithogalum angustifolium majus,
 floribus ex albo virescentibus C. B. P. 70.
 Asphodelus bulbosus Dodon, sive Ornitho-
 galum flore virente I. B. tom. 2. l. 19. 627.
 Ornithogalum spicatum majus, lacteo flore
Moris. Hist. 2. 379. Ornithogalum majus spi-
 catum, flore albo C. B. P. 70. Ornithogalum
 spicatum, albo flore Monspeffulanum I. B.
 tom. 2. l. 19. 628.
 Ornithogalum spicatum majus Pannonicum,
 flore albo, lineâ viridi in dorso prædita
Moris. Hist. 2. 379. Ornithogalum spicatum,
 flore viridi lactescente C. B. P. 70.
 Ornithogalum exoticum, seu Neapolitanum
 flore minore, majori innato *Moris. Hist. 2.*
 379. Ornithogalum exoticum, magno flore,
 minore innato C. B. P. 70. Ornithogalum
 Neapolitanum I. B. tom. 2. l. 19. 631.
 Ornithogalum Neapolitanum, flore pendente,
 priori valde affine *Moris. Hist. 2. 380.* Hya-
 cinthus arborum, Ornithogali flore *Column.*
 Ornithogalum Indicum latifolium florife-
 rum Sphœricum, colore colossino aut albo
Moris. Hist. 2. 380. Moly Latifolium Lili-
 florum C. B. P. 75. Moly Theophrasti ma-
 gnum I. B. tom. 2. l. 19. 569.
 Ornithogalum spicatum album Æthiopicum
 seu Promontorii Bonæ Spei. Ornithoga-
 lum latifolium alterum C. B. P. 70.

Ornithogalum Africanum luteum odoratum
foliis Cepaceis, radice tuberosâ.

Huic subest radix ampla, tuberola
nonnihil depressa, sessilis, pugni magnitudi-
dine, coloris flavescentis, Folia promem-
brata longa, fistulosa, Cepacea, flores in spicam
congestos, hexapetalos, luteos, odoratos
à quibus profluunt stamina concoloria la-
nuginoso tomento, obsita. Sequuntur se-
mina more congenerum in vasculis tri-
capsularibus. Transtuli in Hortum ex ari-
dis petrosis Promontorii Bonæ Spei.

* Ornithogalum luteum majus floriferum Mo-
ris. *Hist.* 2. 381. Ornithogalum luteum C.
B. P. 91. Bulbus sylvestris Fuchsi, flore lu-
teo, sive Ornithogalum luteum *I. B. tom.* 2.
l. 19. 623.

Ornithogalum luteum minus C. B. P. 71. *I. B.*
tom. 2. *l.* 19. 624.

* ORNITHOPODIUM majus C. B. P. 350. *Moris.*
Hist. 2. 124. Ornithopodium flore fla-
vescente *I. B. tom.* 2. *l.* 17. 350. ANN.

* Idem minus C. B. P. 350. ANN.

Ornithopodium αἰγανέριον *Moris. Hist.* 2.
125. Ornithopodio affinis hirsuta Scorpioides
C. B. P. 350. Scorpioides leguminosa
I. B. tom. 2. *l.* 17. 349. ANN.

Ornithopodio affinis hirsuta, fructu stellato
C. B. P. v. Stella leguminosa.

LUGDUNO-BATAVUS.

467

ANITHOGALUM AFRICANUM LUTEUM ODORATUM,
FOL. CEPACEIS, RADICE TUBEROSA,

Ornithopodio affinis I. B. v. Ferrum equinum.

* **O**ROBANCHE major, Caryophyllum olens
C. B. P. 87. Orobanche flore majore I. B.
tom. 2. l. 13. 780.

* Orobanche ramosa C. B. P. 88. Orobanche mi-
nor, purpureis floribus, sive ramosa I. B.
tom. 2. l. 19. 781.

OROBUS sativus, sive Ervum semine an-
gulofo, filiquis inter grana & grana jun-
ctis *Moris. Hist. 2. 74.* Orobus filiquis arti-
culatis, semine majore C. B. P. 346. Orobus
sive Ervum multis I. B. *tom. 2. l. 17. 321.*

Orobus Creticus, semine minore *Moris. Hist. 2.*
74. Orobus semine minore C. B. P. 346.

Orobus sylvaticus latifolius, filiquis propen-
dentibus, parvo flore purpureo *Moris. Hist.*
2. 77. Orobus latifolius, parvo flore purpu-
reo 351. Galegæ nemorensi vernæ similis
multiflora, flore purpureo I. B. *tom. 2. l. 17.*
345.

Orobus sylvaticus, Viciæ foliis, filiquis pro-
pendentibus, floribus purpurascens
Moris. Hist. 2. 78. Orobus sylvaticus Viciæ
foliis C. B. P. 352. Astragalus major Fuch
I. B. *tom. 2. l. 17. 334.*

Idem cauliculis rubentibus.

Orobus sylvaticus perennis vernus, filiquis
erectis, flore purpureo *Moris. Hist. 2. 93.*
Oro

Orobus sylvaticus purpureus vernus C. B. P. 351. Galega nemorensis verna I. B. tom. 2. l. 7. 343.

Orobus sylvaticus annuus, siliquis erectis, flore pallido Moris. Hist. 2. 93. Orobus sylvaticus, pallido flore C. B. P. 351. Galegæ nemorensi vernæ similis, flore albo I. B. tom. 2. l. 17. 344.

Orobus sylvaticus & Boeticus lanuginosus, radice amplissimâ Moris. Hist. 2. 96. Astragalus Boeticus lanuginosus, radice amplissimâ C. B. P. 351.

ORYZA Italica C. B. P. 24. Oryza I. B. tom. 2. l. 18. 451.

Osmunda vulgò. v. Filix.

Ostria Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis C. B. P. v. Carpinus.

Ostrya Theophrasti I. B. v. Carpinus.

Otites vulgò. v. Lychnis.

Oxalis ejusquæ species I. B. v. Acetosa.

OXYS, five Trifolium acetosum vulgare Moris. Hist. 2. 183. C. B. P. 330. Oxis, five Trifolium acidum, flore albo I. B. tom. 2. l. 17. 387. Acetosella vulgò.

Eadem flore purpurascens I. B. tom. 2. l. 387. C. B. P. Var. 330.

Oxys Africana, flore purpureo magno, radice bulbosâ. Oxys affinis planta bulbosa Africana,
Gg 3

cana, flore purpureo magno *Breyn. Cent.*
102. Trifolium bulbosum, flore albo *Pro-*
montorii Bonæ Spei. Stapel. in Theoph.
336.

Oxys, five Trifolium acetosum corniculatum
luteum minus repens & etiam procumbens
Morif. Hist. 2. 183. Oxis lutea I. B. tom. 2.
l. 17. 387. Trifolium acetosum cornicula-
tum C. B. P. 330.

Oxys, five Trifolium acetosum corniculatum
majus rectum, seu Virginianum *Morif. Hist. 2.*
184.

Oxya Græcorum I. B. v. Fagus.

Oxyacantha Dioscoridis C. B. P. v. Mespilus.

Oxyacantha vulgaris I. B. v. Mespilus.

Oxyacantha Virginiana. v. Mespilus.

Oxycedrus I. B. v. Juniperus.

P.

adus I. B. v. Cerasus.

POEONIA folio nigricante splendido
quæ Mas *C. B. P. 323. Pœonia Mas proce-*
rior I. B. tom. 3. l. 30. 492.

Eadem foliis in latiora segmenta divisis *C. B. P.*
323.

Eadem flore incarnato *C. B. P. Var. 323.*

Pœonia communis vel Fœmina *C. B. P. 323.*
Pœo-

Pœonia Fœmina vulgatio*r* I. B. tom. 3. l. 30. 492.

Pœonia Fœmina altera C. B. P. 323. Pœonia promiscua strictiore folio I. B. tom. 3. l. 30. 493.

Pœonia tenuius laciniata subtus pubescens, flore purpureo C. B. P. 323.

Pœonia folio subtus incano, flore albo C. B. P. 323.

Pœonia peregrina, flore saturatè rubente C. B. P. 324. I. B. tom. 3. l. 30. 494. descr.

Eadem flore dilutè rubente C. B. P. 324. I. B. tom. 3. l. 30. 494. descr.

Pœonia Fœmina, flore pleno rubro majore C. B. P. 324. Pœonia flore pleno rubro I. B. tom. 3. l. 30. 493.

Pœonia flore pleno rubro minore C. B. P. 324. I. B. tom. 3. l. 30. 494.

Pœonia flore exalbido pleno major C. B. P. 324. Pœonia albo flore pleno, sive Polyanthos alba Fœmina I. B. tom. 3. l. 30. 494.

Eadem minor C. B. P. 324.

Pajomarioba ejusquè species Pison. v. Senna.

PALIURUS Dodonæi. Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso C. B. P. 477. Rhamnus sive Paliurus, folio Jujubino I. B. tom. 1. l. 6. 35.

PALMA major C. B. P. 506. Palma I. B. tom. 1. l. 3. 351. Palma Dactylifera seu Dactylus vulgò.

PALMA prunifera Japonica. Todda pan-na Hort. Mal. tom. 3. 9.

PALMA Indica Coccifera angulosa C. B. P. 508. Palma Indica nucifera I. B. tom. 1. l. 3. 375. Tenga Hort. Mal. tom. 1. 1.

Palma minor C. B. P. Chamæriphe seu Palma humilis Hispanica spinosa I. B. tom. 1. l. 3. 370.

Palma humilis longis latisque foliis C. B. P. v. Musa.

Palmata ejusque species I. B. v. Orchis.

Paludarium. v. Apium.

Panaces καρπύρον Corn. v. Christophoriana.

PANAX Pastinacæ folio, an Syriacum Theophr. C. B. P. 156. Panax seu Panaces peregrinum Moris. Umbell. 40. Sphondylium vel potius Pastinacæ Germanicæ affinis, Panax seu Pseudocostus flore luteo I. B. tom. 3. l. 27. 156.

Panax Sphondylii folio, sive Heracleum C. B. P. 157. Sphondylium majus sive Panax Heracleum quibusdam I. B. tom. 3. l. 27. 161.

Panax Asclepium Moris. v. Ferula.

Pancratium Monspelianum I. B. v. Narcissus.

Pancratii Monspeliani facie I. B. v. Narcissus.

Panja Hort. Mal. v. Gossampinus.

PANICUM Germanicum, sive paniculâ minore C. B. P. 27. Panicum vulgare I. B. tom. 2. l. 18. 440.

Panicum Italicum sive paniculâ majore C. B. P. 27. Panicum spicâ divulsâ I. B. tom. 2. l. 18. 440. Panicum sylvestre, spicâ divulsâ I. B. v. Gramen.

Papas Americanum I. B. v. Solanum.

PAPAYER corniculatum luteum, C. B. P. 171. Moris. Hist. 2. 273. I. B. tom. 3. l. 30. 398. Papaver corniculatum phoeniceum hirsutum C. B. P. 171. Moris. Hist. 2. 273. I. B. tom. 3. l. 30. 399.

Papaver cornutum violaceum C. B. P. 172. Moris. Hist. 2. 274. I. B. tom. 3. 30. 399.

PAPAYER capitatum vulgare, seu spontaneum simplex, semine incano, vicens in segetibus Moris. Hist. 2. 274. Papaver vulgare, cujus capitula foraminibus hiant, semine incano ἀργυρότερον Dioscoridi C. B. P. 170.

Papaver hortense simplex, semine albo Moris. Hist. 2. 275. Papaver hortense semine albo C. B. P. 170. Papaver album I. B. tom. 3. l. 30. 390. Papaver hortense flore cinereo, ungue purpureo C. B. P. 170.

Papaver hortense simplex, semine nigro Moris. Hist. 2. 275. Papaver hortense, nigro semine C. B. P. 170.

Papaver flore pleno albo *Moris. Hist. 275. C. B. P. 171.*

Papaver flore pleno nigro *Hist. Moris. 275. C. B. P. 171.*

Papaver hortense, flore pleno violaceo *Cat. Hort. Reg. Paris. 136.*

Papaver flore dilutè violaceo *Cat. Hort. Reg. Paris. 136.*

Papaver cristatum, flore & semine album *Moris. Hist. 2. 275. C. B. P. 171.* Papaver fimbriatum, flore albo *I. B. tom. 3. l. 30. 391.*

Papaver cristatum, floribus rubris, semine nigro *Moris. Hist. 275. C. B. P. 171.* Papaver fimbriatum, flore purpureo *I. B. tom. 3. l. 30. 391.*

Idem floribus ex albo & rubeo mixtis *C. B. P. Var.*

Idem flore simplici purpurascente, unguibus plumbeis *Cat. Hort. Reg. Paris.*

Idem flore multiplici incarnato *C. B. P. Var. 171.*

Idem flore multiplici purpurascente *C. B. P. Var. 171.*

Idem flore miniato pleno *C. B. P. Var. 171.*

Idem flore argentei coloris *C. B. P. Var. 171.*

Idem multiplex album, oris rubicundis *C. B. P. Var. 171.*

Papaver laciniatis floribus *C. B. P. 171.*

Papaver flore pleno laciniato eleganter striato *Sutherl. Cat. Edenburg. 260.*

Papaver spinosum luteum, foliis albis venis notatis *Hist. Moris.* 2. 277. Papaver spinosum C. B. P. 171. I. B. tom. 3. l. 30. 397. Chiaccolt seu Papaver spinosum *Hernand.* 215.

PAPAYER erraticum, majus five ποίος *Moris.* *Hist.* 2. 277. C. B. P. 171. Papaver erraticum rubrum campestre I. B. tom. 3. l. 30. 395. Idem florum unguibus albis *Sutherl. Cat. Edinburg.* 260.

Idem flore carneo *Sutherl. Cat. Edinb.* 260. Papaver erraticum, pleno flore *Moris. Hist.* 2. 277. C. B. P. 171.

Papaver erraticum, flore phœniceo pleno, unguibus albis *Cat. Hort. Reg. Paris.* 137.

Idem flore miniato *Cat. Hort. Reg. Paris.* 137.

Idem flore igneo *Cat. Hort. Reg. Par.* 137.

Idem flore igneo marginibus candidis.

Idem flore purpurascete *Cat. Hort. Reg. Paris.* 137.

Papaver erraticum minus *Moris. Hist.* 2. 277. C. B. P. 171.

PAPAYER erraticum Pyrenaicum, flore flavo C. B. P. 171.

Papaver erraticum majus, capitulis oblongis hirsutis.

Papaver Argemone dictum, capitulo hirsuto rotundo torulis canaliculato *Moris. Hist.* 2. 278. Argemone capitulo brevior C. B. P. 172.

172. Argemone capitulo brevioris hispido
I. B. tom. 3. l. 3. 396.

Papaver Argemone dictum, capitulo tenuiore longiore hirsuto *Moris. Hist. 2. 278.* Argemone capitulo longiore C. B. P. 172. Argemone capitulo longiore spinoso I. B. tom. 3. l. 30. 396.

Papaver Argemone dictum, capitulo longiore glabro *Moris. Hist. 2. 279.*

Papaver Argemone dictum Cambrobritannicum luteum, capite longiore glabro, paucis spinulis ad loculamentorum juncturas ornato *Moris. Hist. 2. 279.*

PAPAVERI affinis montana Aconitifolia, Ranunculi nemorensis radice. Aconitum humile bifolium, sive Aconitifolia flore albo unico Leucoji campanulato, fructu Cynosbati *Menz. pugil.*

Papaver spumeum, vulgò ejusque species. v. Lychnis.

Papaya Hernand. v. Pepo arborescens.

PARIETARIA Dioscoridis & Officinarum C. B. P. 121. *Moris. Hist. 2. 600.* Parietaria I. B. tom. 2. l. 23. 976.

Parietaria minor Ocymi folio C. B. P. 121. Parietaria Sicula, Alsines folio *Boccon. 47. Moris. Hist. 2. 600.*

Parietaria cœrulea quorundam I. B. v. Melampyrum.

Parietaria Lipsiensium vulgò. v. *Melampyrum*
Paronychia Hispanica Clusii I. B. v. *Polygo-*
num.

Paronychia Alsinesolia incana I. B. v. *Poly-*
gonum.

Parthenium I. B. v. *Matricaria.*

PASTINACA tenuifolia fativa seu hortensis,
 radice albâ *Moris. Umbell.* 31. C. B. P. 151.
 Pastinaca fativa, five Carota alba I. B. tom. 3.
 l. 27. 64. *Daucus* vulgò.

Eadem radice luteâ *Moris. Umb.* 31. C. B. P.
 151. Pastinaca fativa, five Carota lutea
 I. B. tom. 3. l. 27. 64.

Eadem radice rubrâ *Moris. Umbell.* 31. Pesti-
 naca tenuifolia fativa, radice atrorubente
 C. B. P. 151. Pastinaca fativa, five Carota ru-
 bra I. B. tom. 3. l. 27. 64.

Pastinaca tenuifolia sylvestris genuina Diosco-
 ridis vel, *Daucus Officinarum Moris. Umb.*
 31. C. B. P. 151. Pastinaca sylvestris, five Sta-
 phylinus Græcorum I. B. tom. 3. l. 27. 62.

Pastinaca tenuifolia sylvestris lucida *Moris.*
Umbell. 31. & 56.

Pastinaca tenuifolia sylvestris, radice & um-
 bellâ luteâ *Moris. Umb.* 31. & 56. *Cat. Hort.*
Reg. Paris. 137.

Pastinaca tenuifolia Cretica, capitulis globo-
 sis *Moris. Umb.* 31. 32. *Cuminum* sylvestre,
 capitulis globosis C. B. P. 146. *Cuminum*
 fyl-

sylvestre primum, valdè odoratum globu-
losum *I. B. tom. 3. l. 27. 23.*

PASTINACA latifolia fativa *Moris. Umbell.*
38. *C. B. P. 155.* Pastinaca fativa latifolia
Germanica, luteo flore *I. B. tom. 3. l. 27. 151.*
* Pastinaca latifolia sylvestris *Moris. Umbell.* 39.
C. B. P. 155. Pastinaca Germanica sylve-
stris, quibusdam Elaphoboscum *I. B. tom. 3.*
l. 27. 149.

Pecten Veneris I. B. v. Scandix.

* **P**EDICULARIS pratensis purpurea *C. B. P.*
163. Pedicularis quibusdam, Crista galli,
flore rubro & albo *I. B. tom. 3. l. 30. 437.*
ANN.

* Pedicularis pratensis lutea, vel Crista Galli
C. B. P. 193. Crista Galli Foemina *I. B. tom.*
3. l. 30. 436. ANN.

Pedicularis palustris rubra elatior *I. Raj. Cat.*
226. ANN.

Pedicularis bulbosa *I. B. tom. 3. l. 30. 438.* Fi-
lipendula montana, flore Pediculariæ *C. B. P.*
163.

PENTAPHYLLOIDES majus erectum, flore
albo, foliis alatis & hirsutis ternis *Moris.*
Hist. 2. 192. Pentaphylloides erectum *I. B.*
tom. 2. l. 17. 398. Quinquefolium Fragife-
rum *C. B. P. 326.*

Pentaphylloides majus erectum flore luteo,
ternis foliis Fragariæ instar hirsutis *Moris.*
Hist.

- Hist.* 2. 193. Pentaphylloides Fragariæ folio *Moris. Hort. Bles.* 292. Fragaria Pentaphylli fructu *Moris. Hort. Bles.* 265.
- Pentaphylloides minus supinum seu procumbens, foliis alatis Geranii supini instar *Moris. Hist.* 2. 193. Quinquefolio Fragifero affinis *C. B. P.* 326. Pentaphylloides supinum *I. B. tom.* 2. l. 17. 398.
- Pentaphylloides minus supinum seu procumbens, foliis alatis argenteis & ferratis, flore luteo *Moris. Hist.* 2. 193. Potentilla *C. B. P.* 321. Potentilla sive Argentina *I. B. tom.* 2. l. 17. 398. Anserina vulgò.
- Pentaphylloides rectum fruticosum Ebora-cense *Moris. Hist.* 2. 193. Pentaphylloides fruticosum *Raji Cat.* 228.

PENTAPHYLLUM, seu potius Heptaphyllum majus luteum montanum, flore majore *Moris. Hist.* 2. 188. Pentaphyllum rectum majus *I. B. tom.* 2. l. 17. Quinquefolium rectum luteum *C. B. P.* 325.

Pentaphyllum, seu Heptaphyllum albo-pallidum, seu flore ochroleuco, petalis singulis cordatis *Moris. Hist.* 2. 188. Quinquefolium rectum subluteum *C. B. P. Var.* 325.

Pentaphyllum, seu Heptaphyllum majus erectum rubrum palustre *Moris. Hist.* 2. 189. Quinquefolium palustre rubrum *C. B. P.* 326. Pentaphyllum vel potius Heptaphyllum

lum flore rubro *I. B. tom. 2. l. 17. 398.*

Pentaphyllum minus rectum subtus incanum
flore albo *Moris. Hist. 2. 189.* Quinquefo-
lium album majus alterum *C. B. P. 325.* Pen-
taphyllon album *I. B. tom. 2. l. 19. 398.*

Pentaphyllum minus erectum hirsutum, flore
albo *Moris. Hist. 2. 189.* Quinquefolium al-
bum minus alterum *C. B. P. 325.*

*Pentaphyllum minus procumbens, flore lu-
teo, vulgare, radículas emittens ex genicu-
lis *Moris. Hist. 2. 189.* Quinquefolium ma-
jus repens *C. B. P. 325.* Pentaphyllum, sive
Quinquefolium vulgare repens *I. B. tom. 2.
l. 17. 397.*

Pentaphyllum foliis profundè sectis subtus
argenteis, flore luteo *Moris. Hist. 2. 190.*

Pentaphyllum rectum, foliis profundè se-
ctis, subtus argenteis, flore luteo *I. B. tom.
2. l. 17. 398.* Quinquefolium folio argenteo
C. B. P. 325.

*Pentaphyllum aut potius Heptaphyllum, flo-
re aureo tetrapetalo Tormentilla dictum
Moris. Hist. 2. 190. Tormentilla sylvestris
C. B. P. 236. Tormentilla *I. B. tom. 2. l. 17.
598.*

*Idem minus, flore pentapetalo.

Peplios Lutetianorum I. B. v. Capparis.

Peplus C. B. P. v. Tithymalus.

PEPO Indicus compressus maximus *Moris.*
Hist. 2. 25. Pepo compressus major C. B. P.
 311. Cucurbita aspera folio non fisso, fru-
 ctu albo maximo sessili *I. B. tom.* 2. l. 16.
 221. ANN.

Pepo compressus minor *Moris.* *Hist.* 2. 25. C. B. P.
 311. ANN.

Pepo oblongus *Moris.* *Hist.* 311. ANN.

Pepo major rotundus, flore luteo, folio aspe-
 ro. Cucurbita major rotunda, flore luteo,
 folio aspero C. B. P. 312. Cucurbita foliis
 asperis, sive Zucha flore luteo *I. B. tom.* 2. l.
 16. 218. ANN.

Pepo minor verrucosus *Moris.* *Hist.* 2. 26. Cu-
 curbita verrucosa C. B. P. 313. *I. B. tom.* 2. l.
 16. 222. ANN.

Pepo seu Melopepo latus clypeiformis abs-
 que capreolis *Moris.* *Hist.* 2. 39. Melopepo
 clypeiformis C. B. P. 312. Cucurbita clypei-
 formis sive Siciliana, Melopepo latus à
 nonnullis vocata *I. B. tom.* 2. l. 16. 224. ANN.

Pepo clypeatus minor *Moris.* *Hist.* 2. 26. C. B. P.
 310. Cucurbita capitata Tabernæmontani,
 sive clypeiformis *I. B. tom.* 2. l. 16. 225. ANN.
 Pepo Pyriformis *Moris.* *Hist.* 2. 26. An Cucur-
 bita aspera Pyriformis parva alba *I. B. tom.*
 2. l. 16. 223. ANN.

Pepo Pomiformis *Moris.* *Hist.* 2. 26. Pepo ro-
 tundus Arantii formâ C. B. P. 311. Cucur-
 bita aspera, cortice molli, alba, magnitudine

Arantii I. B. tom. 2. l. 16. 226. ANN.

Pepo Indicus minor angulosus Tabernæmontani I. B. tom. 2. l. 16. 226. Moris. Hist. 2. 33.

Pepo minor angulosus C. B. P. 311. ANN.

Pepo Indicus reticulatus, seminibus albis major. Cucumis Ægyptius reticulatus, sive Luffa Arabum Vesling. in Alpin. 48. Moris. Hist. 2. 35. Wæthakolu Zeylonensibus.

Idem minor Tittawætha Zeylonensibus. ANN.

Idem seminibus nigris, minor. ANN.

Reticulati Peponis, seminibus rhomboideis depressis, in ambitu membranacea alâ fimbriatis, species tres ex Oriente advexi, quæ flores & fructus perfecerunt in Horto. Prima à Veslingio in observationibus ad Alpinum eleganter est expressa. Secunda & tertia priori accedunt, sed folia ferunt integra & fructus triplo minores; Illi sunt semina alba; Huic nigra. Licet verò Veslingius Peponem suum cibis inutilem pronunciaverit, tamen prioris utriusque fructus, antequam ad maturitatem pervenerunt, adsumuntur in India ad rem culinariam. Dempto enim cortice, coquitur interior tenella pulpa in aquâ, exempta vel in butyro seu oleo frigitur, vel cum lacte aliisque jusculis paratur. Hunc in usum conferuntur in hortis. Posterior seminibus nigris sylvestris est, in declivibus humidis pro-

provenit & ob intensam suam amaritiem è
culinis proscribitur.

PEPO arborescens *Column. in Hernand. 870.*
Arbor Platani folio, fructu Peponis magni-
tudine eduli *C. B. P. 431.* Ficuum specie
fructus Peruanus *C. B. P. 457.* Papaye Peru-
vianis *I. B. tom. 1. l. 1. 147.* Mamæra Fœmi-
na *Clus. Cur. post. 79.* Papaya *Hernand. 99.*
Papayamaram *Hort. Mal. tom. 1. 23.* Pino-
guacu Fœmina *Pis. 159.* Fanyaycu *Boym.*
Flor. Sinens. Ions-ton. Mantif. de Arbor
474.

Perchepier *Anglorum I. B. v. Alchimilla.*

PERFOLIATA vulgatissima, sive arvensis
C. B. P. 277. Moris. Umb. 26. Perfoliata sim-
pliciter dicta vulgaris annua *I. B. tom. 3. l.*
27. 298. ANN.

Perfoliata annua longioribus foliis *Moris.*
Umb. 26. I. B. tom. 3. l. 27. 298. Perfoliata
montana latifolia *C. B. P. 277. ANN.*

Perfoliata minima, Bupleuri folio *Mo-*
ris. Umb. 26. perfoliata minor angustifolia,
Bupleuri folio *C. B. P. 277.*

PERICLYMENUM non perfoliatum Germa-
nicum *C. B. P. 322.* Periclymenum, sive Ca-
prifolium non perfoliatum *I. B. tom. 2. l. 15.*

Periclymenum perfoliatum C. B. P. 302. I. B. tom. 2. l. 15. 104.

Periclymenum perfoliatum Virginianum
semper virens & florens.

Frutex hic Virginianus eleganti perpetuâ comâ viget & floret. Periclymeno perfoliato præcedenti videtur conformis, sed omnibus partibus minor & gracilior. Folia sunt paulo rotundiora, lucida, internâ parte magis incana. Flores ad summos viticulos ordine quasi verticillato prodeuntes, odore equidem nullo evidenti sunt; ast colore amœnissimo, fulgenti cocco splendente, effigiequè tubum venatorium perbelle exprimunt, orificio in quinque æquales crenas laciniato. E medio profluunt stamina lutea apiculata cum stylo pallido longiori. Singulis floribus subjicitur capitulum parvum herbaceum lucidum, fructus inchoamentum, quod in baccam abit more congenerum.

Periclymenum rectum Alpinum, fructu rubro gemino duobus punctis notato. Chamæcerasus Alpina, fructu rubro gemino, duobus punctis notato C. B. P. 451. Chamæcerasus Gesneri, vel Chamæpericlymenon quoddam Alpinum I. B. tom. 2. l. 15. 107.

Periclymenum rectum, fructu cœruleo I. B. tom. 2. l. 15. 106. Chamæcerasus montana, fructu singulari cœruleo C. B. P. 451.

LUGDUNO-BATAVUS. 485

PERICLIMENUM PERFOLIATUM VIRGINIANUM
SEMPER VIRENS ET FLORENS.

Periclymenum rectum, fructu rubro I. B. tom.
2. l. 15. 107. Chamæcerasus dumetorum
fructu gemino rubro C. B. P. 451.

PERSICA malus I. B. tom. 1. l. 2. 157. Per-
fica molli carne & vulgaris & alba C. B. P.
440.

Perfica malus vulgaris, flore pleno *Cat. Hort.*
Reg. Paris. 117.

Perfica malus, fructu succo quasi sanguineo
turgente. Perfica fructu quasi sanguineo
C. B. P. 440.

Perfica malus Duracina Ruell. *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 117.

Perfica malus odoro fructu, sanguineo succo
turgente *Cat. Hort. Reg. Paris.* 177.

Perfica malus, Amygdalo insita *Cat. Hort.*
Reg. Paris. 117. Perfica Amygdaloides.

Perfica malus juglandi insita *Cat. Hort. Reg.*
Paris. 117. Nuci-Perfica *Matth.*

Perfica malus, Pruno insita, Pruno-perfica
vulgò.

Perfica malus fructu rubro & viridi eleganter
variegato *Munting. prax.* l. 1. 43.

Perfica malus fructu ex viridi luteo *Munting.*
Prax. l. 1. 43.

Perfica malus fructu toto luteo *Munting. Prax.*
l. 1. 43. Perfica Hispanica, Melacotonea
quorundam I. B. tom. 1. l. 2. 162.

Perfica malus montana *Munting. Prax.* l. 1. 43.
Per-

Perfica malus Swollana *Munting. Prax. l.*
1. 43.

Perfica malus nana, fructu præcoci odorato
Munting. Prax. l. 1. 43. An malus Perfica
præcoci fructu, Præcoqua dicta *Cat. Hort.*
Reg. Paris. 117.

Perfica malus Africana nana, flore incarnato
simplici. Amygdalus Africana vulgò.
Eadem flore incarnato pleno.

Complures emittit virgulas lignosas fle-
xiles rubentes, quibus alternatim hærent
folia semidigitalia in obtusum tendentia
mucronem, Malo Perficâ angustiora, pallidè
virentia per ambitum leviter ferrata, cre-
brioribus venis & rugis inscripta, prodeun-
tibus ad singulorum exortum binis ex ad-
verso tenuissimis corniculatis villis, velut
in communi Perficâ. Ad summitates vir-
gularum oriuntur flores parvi incarnati ro-
sei coloris, insidentes quinque radiatis cali-
cibus modo multiplici, aliquando simplici
petalorum serie referti, coloris incarnati
rosei jucundissimi, odoris languidi. Hos ex-
cipiunt fructus rotundi subhirsuti Perficæ
quidem haud absimiles, sed triplo minores,
saporis non adeò grati. Reperi hoc Arbu-
stum sponte luxurians ad Promontorium
Bonæ Spei; Inde vero in Europam redux,
offendi in Anglorum hortis frequens, ex
quibus in Belgiam adferri curavi. Virgulis
junio-

junioribus solo submersis, de facili propagatur.

PERSICARIA mitis non maculosa *Moris. Hist.* 2. 588. C. B. P. 101.

Eadem maculosa *Moris. Hist.* 2. 588. C. B. P. Persicaria mitis.

Persicaria frutescens maculosa Virginiana, flore albo & carneo, Parkinsonii *Moris. Hist.* 2. 589.

Persicaria Salicis folio perennis.

Persicaria acris sive Hydro-piper *Moris. Hist.* 2. 588. I. B. tom. 3. l. 38. 580. Persicaria urens, sive Hydropiper C. B. P. 101.

Pes anserinus I. B. v. Atriplex.

PETASITES major & vulgaris C. B. P. 197. Petasites vulgaris rubens, rotundiori folio I. B. tom. 3. l. 31. 566.

Petasites minor C. B. P. 197. Petasites albus anguloso folio I. B. tom. 3. l. 31. 568.

Petasites minor alter, Tussilaginis folio *Cat. Hort. Reg. Paris.* 139.

Petasites Africanus, Calthæ palustris folio.

Novum hoc Petasitidis, genus ex palustribus Bonæ Spei in hortum translatum, foliis est rotundis, rigidis, crenatis, Calthæ palustris facie, radice flavescente crassâ, cetera vulgari simile.

ERSICA MALUS AFRICANA NANA, FLORE IN-
CARNATO PLENO.

Petromarula Cretica Belli. v. *Rapunculus.*
Petroselinum vulgò C. B. P. v. *Apium.*

PEUCEDANUM majus Italicum C. B. P. 149.
Moris. Umbell. 36. I. B. tom. 3. l. 27. 36

Peucedanum Germanicum C. B. P. 149. *Peu-*
cedanum Germanicum Moris. Umbell. 36.
 I. B. tom. 3. l. 27. 36.

PHALANGIUM parvo flore non ramosum
 C. B. P. 29. *Moris. Hist.* 2. 333. *Phalangium*
pulchrius non ramosum I. B. tom. 2. l. 19.
 635.

Phalangium parvo flore, ramosum C. B. P. 29.
Moris. Hist. 2. 333. *Phalangium parvo flo-*
re, quibusdam ramosius I. B. tom. 2. l. 19.
 635.

Phalangium parvo flore, ramosum, foliis fistu-
lofis, annuum. Asphodelus folio fistuloso
plano minor ramosus, flore albo *Moris. Hist.*
 2. 331. *Asphodelus foliis fistulosis* C. B. P. 29.
Asphodelus minor, folio fistuloso I. B. tom. 2.
 l. 19. 631. ANN.

Phalangium magno flore C. B. P. v. *Asphode-*
lus.

Phalangium Allobrochicum, magnoflore Lili-
 I. B. *Moris.* v. *Asphodelus.*

Phalangium Virginianum ejusque species. v.
Ephemerum.

PHALARIS major, semine albo C. B. P. 28.
Phalaris *I. B. tom. 2. l. 18. 442.*

Phalaris major, semine nigro C. B. P. 28. *I. B. tom. 2. l. 18. 443.*

PHASEOLUS major, five Smilax hortensis
Moris. Hist. 2. 68. C. B. P. 339. Smilax hor-
tensis I. B. tom. 2. l. 17. 253. Fructu albo. ANN.

Idem fructu nigro *I. B. tom. 2. l. 17. 253. def. ANN.*

Idem fructu flavo *I. B. tom. 2. l. 17. 253. def. ANN.*

Idem fructu rubro *I. B. tom. 2. l. 17. 253. def. ANN.*

Idem fructu livido. ANN.

Idem fructu pallido. ANN.

Idem fructu violaceo *I. B. tom. 2. l. 17. 253. descr. ANN.*

Idem fructu ex rubro & nigro variegato. ANN.

Idem fructu albo, nigris venis & lituris distin-
cto *I. B. tom. 2. l. 17. 253. ANN.*

Idem fructu purpurascente, orbibus albis va-
riegato. ANN.

Ejusdem alia species, floris & fructus colore &
magnitudine differentes.

Phaseolus hortensis, fructu albo minore ovi-
formi Venercus dictus *Hoffm. Cat. Alt. ANN.*

Phaseolus Indicus, flore coccineo seu puniceo
Hist. Moris. 2. 69. Phaseolus puniceo flore
Corn. 185. ANN.

Phaseolus Æthiopicus lobis flavescentibus
fructu nigro C. B. P. 341. ANN.

Phae

Phaseolus peregrinus hortensi affinis, semine lato albo, multis nigris venis striato C. B. P. 340. Phaseolus lato striato, sive radiato semine: alter punctatus cupulâ atrovirente I. B. tom. 2. l. 17. 267. ANN.

Phaseolus Ægyptius nigro semine C. B. P. 341. Phaseolus Lablab Alpini I. B. tom. 2. l. 17. 26.

Idem spadiceus, hilo albo C. B. P. Var. 341. Phaseolus Leblab spadiceus, hilo longo albo I. B. tom. 2. l. 17. 27.

Phaseolus Surattensis filiquâ hirsutâ pungente Moris. Hist. 2. 69.

Phaseolus Africanus hirsutus bituminosus, filiquis bullatis, flore flavo.

Hujus semina ex declivibus irriguis montis Mensalis seu Tabulati Promontorii Bonæ Spei hûc advexi. Proferebant autem plantam sarmentosam circiter trium ulnarum longitudine more Phaseoli hortensis, emittentem ex radice lignosâ albâ fibrosâ sarmenta tenuia terna quaternave valde ramosâ, folia subrotunda obtusè mucronata, subhirsuta, glutinosa bitumen quadantenus redolentia, flores papilionaceos flavos aliquando lineolis purpureis inscriptos, semina rotunda nigra parva hilo albo exiguo, in filiquis parvis tumidis villosis. Diligenter custoditâ viget totâ hyeme multosque annos durat.

LUGDUNO-BATAVUS. 493

ASEOLUS AFRICANUS HIRSUTUS BITUMINO-
SUS, SILIQUIS BULLATIS, FLORE FLAVO.

Phaseolus minor, fructu albo, umbilico maculâ nigrâ notato, vel fructu renali parvo albo, umbilico circa hilum maculâ nigrâ insignito *Moris. Hist. 2. 69.* Phaseolus peregrinus, minore fructu albo, nigrâ maculâ insignito *C. B. P. 340.* Phaseolus niveus minor, circa hilum nigrâ maculâ insignitus *I. B. tom. 2. l. 17. 260. ANN.*

Phaseolus minimus, fructu rubro, filiquis longissimis erectis *Moris. Hist. 2. 69. ANN.*

Phaseolus minimus, fructu viridi exiguo ovato, filiquis longis rotundis rectis *Hist. Moris. 2. 70. ANN.*

Phaseolus orthocaulis, Mungo dictus *Fab. Column. in Hernand. 887. ANN.*

Phaseolus Americanus perennis, flore cochleato odorato, seminibus fuscis orbiculatis, Caracalla dictus. Phaseolus Indicus, cochleato flore *Triumfetti Obsev. 92.*

PHASEOLUS alatus, sive Abrus minor, fructu coccineo, maculâ nigrâ notato *Moris. Hist. 2. 67. & 71.* Pisum Indicum minus coccineum *C. B. P. 343.* Pisum Americanum coccineum, aliis Abrus *I. B. tom. 2. l. 17. 263.* Abrus *Alpin. de Plant. Egypt. 76.* Glyzyrrhiza Indica vulgò.

Phaseolus alatus Indicus, fructu fusco orbiculato maximo, lobis latissimis & longissimis. Pus-

Puswæl Zeylonensibus Mus. Zeyl.
Phaseolus alatus arboreus, fructu orbiculato
compresso coccineo. Mandhathija seu Mara
Mus. Zeylan. . . .
Phellandrium I. B. v. *Cicutaria.*

PHILLYREA latifolia lævis C. B. P. 476.
Phillyrea arbor Lobelio I. B. tom. 1. l. 5.
 531.

Phillyrea latifolia spinosa C. B. P. 476. *Philly-*
rea folio Ilicis I. B. tom. 1. l. 5. 532. Folio
 ampliori.

Eadem folio angustiori.

Phillyrea folio leviter ferrato C. B. P. 476. An
phillyrea folio Alaterni I. B. tom. 1. l. 5. 532?

Phillyrea folio Ligustri C. B. P. 476. *Phillyrea*
latiusculo folio I. B. tom. 1. l. 5. 539.

Phillyrea angustifolia prima C. B. P. 476. *Phil-*
lyrea angustifolia I. B. tom. 1. l. 5. 538.

Phœnix Lolio similis I. B. v. *Gramen.*

Phyllica ejusquæ species C. B. P. v. *Alaternus.*

Phyllitis ejusquæ species I. B. v. *Lingua cervina.*

Phyllum testiculatum C. B. P. v. *Mercurialis.*

Phyllum arrhenogonon, folio incano Monspessu-
lanum I. B. v. *Mercurialis.*

Phyteuma I. B. v. *Reseda.*

Picea major prima C. B. P. v. *Abies.*

Picea Latinorum, sive Mas Theophrasti I. B.
 v. *Abies.*

PILOSELLA major repens hirsuta C.B.P. 262.
 Pilosella majori flore, sive vulgaris I.B.
tom. 2. l. 24. 1039.

Eadem minus hirsuta C.B.P. 262. Pilosella
 minor, folio angustiore, minus piloso re-
 pens I.B. *tom. 2. l. 24. 1040.*

Pilosella incana ramosa Ragusina. v. Hieracium.

Pilosella Indica Cornuti. v. Hieracium in App.

Pilosella siliquosa I.B. v. Draba.

PIMPINELLA maxima Canadensis alba spi-
 cata Corn. 175. *Moris. Umb. 57.*

Pimpinella spicâ brevi rubrâ *Moris. Umb. 57.*

Pimpinella Sanguisorba major C.B.P. 160.

Sanguisorba major, flore spadiceo I.B. *tom. 3. l. 27. 120.*

Pimpinella spicâ brevi minor, lævis non pi-
 losa *Moris. Umb. 57.* Pimpinella Sanguisor-
 ba minor lævis C.B.P. 160. Sanguisorba mi-
 nor I.B. *tom. 3. l. 27. 113.*

Eadem hirsuta. Pimpinella Sanguisorba mi-
 nor hirsuta C. B. P. 160.

Pimpinella spinosa, seu sempervirens *Moris. Umbell. 57.* Poterio affinis, foliis Pimpinellæ, spinosa C. B. P. 388.

Pimpinella Agrimonoides *Moris. Umb. 57.*

Pimpinella Saxifraga ejusquè species C. B. P. v. Saxifraga.

Pinoguaçu Pison. v. Pepo arborescens.

PINUS sativa C. B. P. 491. Pinus officulis duris, foliis longis *I. B. tom. 1. l. 9. 248.*

Pinus maritima major C. B. P. 492. Pinus sylvestris maritima, conis firmiter ramis adherentibus *I. B. tom. 1. l. 9. 245.*

Pinus maritima minor C. B. P. 492. Pinaster tertius Hispanicus pumilus *I. B. tom. 1. l. 9. 246.*

Piper Indicum ejusque species. v. Solanum.

PISTACIA peregrina, fructu racemoso, sive Therebinthus Indica Theoph. C. B. P. 401.

Pistacia *I. B. tom. 1. l. 3. 275.*

Pistacia sylvestris C. B. P. v. Staphylodendron.

Pistacia sylvestris trifolia Virginienfis Cat. Hort. Reg. Paris. v. Staphylodendron.

Pistolochia. v. Aristolochia.

PISUM majus, flore albo *Moris. Hist. 2. 46.*

Pisum majus quadratum C. B. P. 342. An

Pisa rubra variegata *I. B. tom. 2. l. 17. 298?*

dem fructu candido C. B. P. Var. 342. Pisa

majora alba *I. B. tom. 2. l. 17. 299.*

Pisum umbellatum C. B. P. 342. *Moris. Hist. 2.*

46. Pisum erectius comosum *I. B. tom. 2. l.*

15. 299.

Pisum ramulare, hilo nigro *Moris. Hist. 2. 47.*

Pisum hortense majus C. B. P. 342.

Pisum leptolobum, five sine cortice duriore
Camer. Moris. Hist. 2. 47. C. B. P. 343. Pisum
 sine tunicis durioribus, in filiquâ magnâ albâ
I. B. tom. 2. l. 17. 300.

Idem minus.

Pisum spontaneum perenne repens humile
Moris. Hist. 2. 47.

Pisum spontaneum nanum inter Triticum Mo-
ris. Hist. 2. 47. Pisum arvense *C. B. P. 342.*
 Pifa arvensia *I. B. tom. 2. l. 17. 267.* Fructu ro-
 tundo albo *C. B. P. Var. 343.*

Idem fructu viridi *C. B. P. Var. 343.* Pifa par-
 va viridia *I. B. tom. 2. l. 17. 298.*

Idem fructu ex luteo virente *C. B. P. Var. 343.*

Pifa nana rotunda, sine adminiculis, recta *Cat.*
Hort. Reg. Paris. 143.

Pisum vesicarium, fructu nigro, albâ maculâ
notato C. B. P. v. Cor Indum.

Pisum Indicum minus coccineum C. B. P. v.
Phaseolus.

Pitine Anguillare I. B. v. Lathyrus.

* **P** L A N T A G O latifolia sinuata *C. B. P. 189*
 Plantago major, folio glabro non lacinia-
 to, ut plurimum *I. B. tom. 3. l. 31. 503.*

* Plantago latifolia incana *C. B. P. 189.* Plantago
 major hirsuta, media à nonnullis cognomi-
 nata *I. B. tom. 3. l. 31. 504.*

Plantago latifolia Rosea, flore expanso *C. B. P.*
 189.

189. I. B. tom. 3. l. 31. 703.

Plantago latifolia Rosea, floribus quasi in spicâ
dispositis C. B. P. 189. Plantago Rosea I. B.
tom. 3. l. 31. 503.

Plantago latifolia hirsuta minor C. B. P. 189.

Plantago latifolia minor I. B. tom. 3. l. 31. 505.

Plantago angustifolia major C. B. P. 189. Plan-

tago lanceolata I. B. tom. 3. l. 31. 505.

Plantago angustifolia, paniculis Lagopi C. B. P.

189. Plantago quinquenervia, cum globulis
albis pilosis I. B. tom. 3. l. 31. 504.

Plantago trinervia, folio angustissimo C. B. P.
189.

PLANTAGO aquatica latifolia C. B. P. 190.

Plantago aquatica I. B. tom. 3. l. 38. 787.

Plantago aquatica angustifolia C. B. P. 190.

Plantago aquatica humilis angustifolia I. B.
tom. 3. l. 38. 788.

Plantaginella palustris C. B. P. v. Ranunculus.

PLATANUS Matth. C. B. P. 431. I. B. tom. 1.

l. 8. 170. Platanus Orientalis verus Par-
kins. Theatr. 1427. Pilulis majoribus.

Platanus Occidentalis aut Virginienfis Par-
kins. Theatr. 1427. Pilulis minoribus.

Platanus falsò multis I. B. v. Acer.

plemonium Gesneri. v. Lychnis sylvestris.

plemonium flore luteo I. B. v. Jasminum.

Posit Germanis I. B. v. Fungus.

POLIUM Lavendulæ folio C. B. P. 120.

Polium montanum luteum C. B. P. 120.

Polium montanum album C. B. P. 221. An Po-

lium Monspessulanum I. B. tom. 3. l. 28. 299.

Polium maritimum supinum Venetum C. B. P.

221. Polium Venetum I. B. tom. 3. l. 28.

300.

***P**OLYGALA vulgaris C. B. P. 215. Polygala
tetrapetala, filiculosa bicapsularis, longo &

angusto folio, minor Moris. Hist. 2. 326.

Polygonon multis I. B. tom. 386. Flos Am-

bervalis vulgò. ANN.

*Eadem flore albo C. B. P. Var. 215. Moris. Hist.

2. 326. ANN.

*Eadem flore violaceo C. B. P. Var. 215. Moris.

Hist. 2. 326. ANN.

*Eadem flore albo C. B. P. Var. 215. Moris. Hist.

2. 326. ANN.

Polygala frutescens Capitis Bonæ Spei Breyn.

Cent. 1.

Polygala altera fruticosior, foliis latioribus

v. Colutea.

Polygala major Massiliotica C. B. P. v. Colutea.

Polygala altera C. B. P. v. Colutea.

Polygala Valentina Clusii. v. Colutea.

Polygala dumetorum major, flore vario, siliquis

articulatis, Moris. v. Colutea.

Poly

Polygala enneaphyllos I. B. v. Colutea.

Polygalæ similis Cortusi I. B. v. Colutea.

POLYGONATUM latifolium vulgare C. B. P.
303. Polygonatum, vulgò Sigillum Salo-
monis I. B. tom. 3. l. 31. 529. Cauliculis vi-
ridantibus.

Idem cauliculis rubentibus.

Polygonatum latifolium, flore duplici odore.
Cat. Hort. Reg. Paris. 144. Sigillum Salo-
monis flore pleno *Dod. Mem.* 115.

Polygonatum latifolium maximum C. B. P. 303.

Polygonatum majus, vulgari simile I. B. tom.
3. l. 31. 529.

Polygonatum latifolium, Ellebori albi foliis
C. B. P. 303.

Polygonatum latifolium, flore majore odore
C. B. P. 303. Polygonatum floribus ex sin-
gularibus pediculis I. B. tom. 3. l. 31. 529.

Polygonatum latifolium minus, flore majore
C. B. P. 303.

Polygonatum angustifolium non ramosum
C. B. P. 303. Polygonatum angustifolium
I. B. tom. 3. l. 31. 531.

POLYGONATUM ramosum, flore luteo majus
Cornuti 38. Sigillum Indicum, flore luteo
Stapeli 1067.

Polygonatum racemosum *Corn.* v. Liliū con-
vallium.

Polygonon multis I. B. v. *Polygala*.

* **P**OLYGONUM latifolium C. B. P. 281. *Moris. Hist. 2. 591.* Polygonum, five Centinodia I. B. tom. 3. l. 29. 375. ANN.

* Idem angustifolium, folio oblongo *Moris. Hist. 2. 51.* C. B. P. 281. Polygonum angustifolium I. B. tom. 3. l. 375. ANN.

POLYGONUM montanum minimum niveum & sericeum *Moris. Hist. 2. 592.* Polygonum minus candicans C. B. P. 281. Paronychia Hispanica Clusii, five Anthyllis nivea I. B. tom. 3. l. 19. 374. ANN.

* Polygonum litoreum minus, flosculis spadiceo albicantibus *Moris. Hist. 2. 593.* C. B. P. 281. ANN.

* Polygonum minus, five Millegrana major C. B. P. 281. Herniaria glabra *Moris. Hist. 2. 593.* Herniaria I. B. tom. 3. l. 19. 378. ANN.

* Polygonum minimum, seu Millegrana minima *Moris. Hist. 2. 593.* C. B. P. 282. An Polygonum vel Linifolia per terram sparsa, flore Scorpioidis I. B. tom. 3. l. 29. 379. ANN.

* Polygonum parvum, flore albo verticillato I. B. tom. 3. l. 29. 378. *Moris. Hist. 2. 594.* ANN.

* Polygonum angustifolium, vel Gramineo folio minus repens C. B. P. 281. Polygonum Germanis Knawel Tragi *Moris. Hist. 2. 591.* poly-

Polygonum tertium Dodonæi, sive tenuifolium *I. B. tom. 3. l. 29. 377. ANN.*

Polygonum maritimum, folio *Alfines Moris. Hist. 2. 594.* Anthyllis maritima, *Alfine foliis C. B. P. 282.* Paronychia *Alsinefolia incana I. B. tom. 3. l. 29. 367. ANN.*

Polygonum perenne procumbens, folio breviori, floribus in capitulum congestis *Moris. v. Pyrolæ affinis.*

Polygonum Gesneri *I. B. v. Onobrychis.*

Polygonum multis *I. B. v. Polygala.*

POLYPODIUM vulgare *C. B. P. 359. Polypodium I. B. tom. 3. l. 37. 746.*

Polytrichon aureum ejusque species C. B. P. & Comel. v. Muscus capillaris.

Poma Adami I. B. v. Malus Limonia.

Ponnam Tangera Hort. Mal. v. Senna.

POPULUS alba *C. B. P. 429. Populus alba, Λύκη I. B. tom. 1. l. 8. 160.*

Populus nigra C. B. P. 429. Populus nigra, sive αἴγλε & I. B. tom. 1. l. 8. 159.

Populus tremula C. B. P. 429. Populus Lybica κέρκισ Theoph. I. B. tom. 1. l. 8. 163.

PORRUM commune capitatum *C. B. P. 72. Moris. Hist. 2. 393. Porrum I. B. tom. 2. l. 19. 551.*

Porrum sectivum latifolium C. B. P. 72. Moris. Hist. 2. 390.

Porrum vitigineum, caule folia perforante
Moris. Hist. 2. 391.

Porrum sectivum juncifolium C. B. P. v. Ceba.

PORTULACA latifolia sativa C. B. P. 288. *Moris. Hist. 2. 570.* Portulaca hortensis latifolia
I. B. tom. 3. l. 35. 678. ANN.

Eadem foliis flavis *Moris. Hist. 2. 570.* Flavescens seu foliis aureis *Cat. Hort. Reg. Par. 146. ANN.*

* Portulaca angustifolia, sive sylvestris C. B. P. 288. *Moris. Hist. 2. 571.* Portulaca sylvestris minor, sive spontanea *I. B. tom. 3. l. 35. 678. ANN.*

* **P**OTAMOGETON rotundifolium C. B. P. 193. *Moris. Hist. 2. 586.* Potamogeton rotundiori folio *I. B. tom. 3. l. 38. 776.*

* Potamogeton Salicis folio C. B. P. 193. *Moris. Hist. 2. 587.* Potamogeton sive Fontalis Persicariæ folio *I. B. tom. 3. l. 38. 777.*

* Potamogeton foliis latis splendentibus C. B. P. 193. *Hist. Moris. 2. 587.* Potamogeton altera Dodonæi *I. B. tom. 3. l. 38. 778.*

* Idem foliis angustis splendentibus C. B. P. 193. *Moris. Hist. 2. 587.* Fontinalis major lucens *I. B. tom. 3. l. 38. 777.*

* Potamogeton foliis crispis, sive Lactuca ranarum C. B. P. 193. *Moris. Hist. 2. 587.* Fontinalis crispa *I. B. tom. 3. l. 38. 778.*

Poten-

Potentilla C. B. P. v. *Pentaphylloides*.
Potero affinis, foliis *Pimpinellæ spinosæ* C. B. P.
 v. *pimpinella*.
Povist I. B. v. *Fungus*.
Priapeja quibusdam I. B. v. *Nicotiana*.

PRIMULA veris, five *Verbasculum pratense* odoratum C. B. P. *Moris. Hist.* 2. 554. *Primula veris odorata*, flore luteo simplici I. B. tom. 3. l. 30. 495.

Primula veris, seu *Verbasculum pratense*, vel *sylvaticum inodorum* C. B. P. 241. *Moris. Hist.* 2. 554. *Primula veris caulifera*, pallido flore inodoro aut vix odore I. B. tom. 3. l. 30. 496.

Eadem flore niveo C. B. P. *Var.* 241.

Primula veris hortensis, seu *Verbasculum Alpinum umbellatum majus* C. B. P. 242. *Moris. Hist.* 2. 555.

Eiusdem varietates plurimæ, variis è vario fatu coloribus descriptæ

Primula veris hortensis umbellata, caule & flore foliosa major coccinea.

Eadem flore foliosa minor lutea.

Prior videtur varietas *Primulæ veris vulgaris hortensis umbellatæ*, ex cujus seminibus in Angliâ natam referebat Dns Bobartus Horti Oxoniensis Præfectus, a quo ante aliquot annos hæc planta mihi est transmissa. Producit autem in superiori caulis par-

te, quâ florum pediculi exeunt, folia omnino similia iis, quæ radici proxima sunt, ast angustiora & breviora, ut plurimum quina, aliquando septena; Paria quoque foliola ungue vix ampliora subjiciuntur singulis floribus coccineis amplis, loco calicis. Coetera omnia vulgari respondent.

Posterior à supra laudato Petro de Wolff nobis concessa, floribus est minoribus luteis, quibus singulis subsident folia oblonga angusta; Coetera cum vulgari conveniunt.

Primula veris, seu Verbasculum Alpinum umbellatum minus C. B. P. 242. Primula veris minor rubra Eboracensis, foliis parvis glabris Auriculæ urfi instar *Moris. Hist. 2. 555.*

Primula veris minor purpurascens I. B. tom. 3. l. 30. 499.

Primula veris montana laciniata. Sanicula montana latifolia laciniata C. B. P. 243. Sanicula montana latifolia laciniata *Moris. Hist. 2. 558.* Cortusa I. B. tom. 3. l. 30. 499.

Eadem Americana flore squallidè purpureo. Primula veris, seu Verbasculum hortense proliferum C. B. P. 242. *Moris. Hist. 2. 555.* Primula veris caulifera prolifera odorata I. B. tom. 3. l. 30. 496.

Ejusdem differentiaë variæ, floribus modò geminis, modò trigeminis, vel majoribus, vel minoribus diversorum colorum insignes.

PRIMULA VERIS HORTENSIS UMBELLATA, CAU-
LE ET FLORE FOLIOSA, MAIOR.

Primula veris, seu Verbasculum hortense
multiplex C. B. P. 242. Primula veris cauli-
fera maxima, flore pleno I. B. tom. 3. l. 30.
496.

Primula veris, seu Verbasculum sylvaticum
majus, singularibus floribus, singularibus
cauliculis insistentibus Moris. Hist. 2. 555.
Verbasculum sylvestre minus, singulari flore
C. B. P. 242. Primula veris, floribus singula-
ribus pallidis majoribus simplicibus I. B.
tom. 3. l. 30. 497.

Eadem flore viridi. Primula veris, floribus ob-
scure virentibus fimbriatis I. B. tom. 3. l. 20.
498.

Primula veris, seu Verbasculum Turcicum,
seu Carchichec Turcarum Moris. Hist. 2.
555. Primula veris Constantinopolitana
Corn. 55. Flore simplici.

Eadem flore pleno. Verbasculum sylvestre
magno plenoque flore C. B. P. 242. Primula
veris, floribus plenis ex singularibus pedicu-
lis I. B. tom. 3. l. 30. 497.

Utriusque differentiae plurimae, florum um-
bone, petalorum numero, magnitudine &
colore variantes.

Prunella. v. Brunella.

PRUNUS C. B. P. 443. I. B. tom. 1. l. 2.
184.

Eadem flore pleno Cat. Hort. Reg. Par. 146.
Pruna

Pruna magna dulcia atro-coerulea C. B. P. 443.

Pruna parva dulcia, atro-coerulea Damascena dicta C. B. P. 443.

Pruna magna crassa subacida C. B. P. 443.

Pruna oblonga coerulea C. B. P. 443.

Pruna nigra, carne durâ C. B. P. 443.

Pruna coloris ceræ, ex candido in luteum pallescente C. B. P. 443. Præcocia majora C. B. P. Var. 443.

Eadem ferotina minora C. B. P. Var. 443.

Pruna rotunda flava dulcia, Mali amplitudine C. B. P. 443.

Pruna magna rubra rotunda C. B. P. 443.

Prunus fructu rotundo nigro-purpureo dulci C. B. P. 444.

Ejusdem aliæ species fructu differentes, varia insitione ablactatione inoculatione aut factione productæ.

Prunus sylvestris C. B. P. 444. I. B. tom. 1. l. 2.

193. *Acacia Germanica vulgò.*

PRUNO sylvestri affinis Canadensis C. B. P.

app. 517. Hypericum frutescens Americanum flore albo Park. Theatr. 575.

Pseudocostus flore luteo I. B. v. Panax.

Pseudo-cyperus Lobelio I. B. v. Gramen.

Pseudo-dictamnus verticillatus inodorus C. B. P. v. Dictamnus.

Pseudo-digitalis Persicæ folio Bocc. v. Gratiolæ affinis.

Pseudo-

Pseudo-narcissus. v. *Narcissus*.

Pseudo-nardus I. B. v. *Lavandula*.

PSYLLIUM Dioscoridis vel Indicum, crenatis foliis I. B. tom. 3. l. 31. 514.

Psyllium majus supinum C. B. P. 191. I. B. tom. 3. l. 31. 513.

Psyllium majus erectum C. B. P. 191. I. B. tom. 3. l. 31. 513.

* **P**TARMICA vulgaris, folio longo ferrato, flore albo I. B. tom. 3. l. 26. 147. *Dracunculus pratensis*, ferrato folio C. B. P. 98. Major & elatior.

Eadem minor & humilior.

Ptarmica pratensis, ferrato folio, flore pleno. *Dracunculus pratensis*, ferrato folio, flore pleno C. B. P. 98.

Ptarmica incana humilis, foliis laciniatis *Ab-sinthii æmulis*. *Absinthium Alpinum umbeliferum latifolium* C. B. P. 134. *Absinthium albis floribus*, capitulis squarosis I. B. tom. 3. l. 26. 183.

Ptarmica Austriaca vulgò *ejusquè species* v. *Xeranthemum*.

Pthora major Moris. v. *Ranunculus*.

PULEGIUM latifolium C. B. P. 222. *Pulegium* I. B. tom. 3. l. 28. 256.

Pulegium angustifolium C. B. P. 222. *Pulegium* Cer-

Cervinum angustifolium I. B. tom. 3. l. 28.
257. Flore purpureo.

Idem flore albo.

Pulmonaria arborea I. B. v. Muscus.

Pulmonaria flore luteo I. B. Hieracium.

Pulmonariæ luteæ species magis laciniata I. B.
v. Hieracium.

Pulmonaria latifolia C. B. P. & *Pulmonaria Italorum* I. B. v. Symphytum minus.

Pulsatilla folio crassiore, flore majore dilu-
tiore Moris. Hist. 2. 428. *Pulsatilla folio*
crassiore & majore C. B. P. 177. *Pulsatilla*
purpurea coeruleavè I. B. tom. 3. l. 30. 409.

Pulsatilla flore minore saturatiore, & quasi ni-
gricante, folio magis & tenuiùs inciso Mo-
ris. Hist. 2. 428. *Pulsatilla flore minore ni-*
gricante C. B. P. 177. *Pulsatilla flore clauso*
I. B. tom. 3. l. 30. 410.

Pulsatilla Apii folio vernalis, flore majore
C. B. P. 177.

Puvetti Hort. Mal. v. Solanum.

Pyracantha quibusdam I. B. v. Mespilus.

Pyramidalis lævis I. B. v. Campanula.

PYRETHRUM Bellidis flore C. B. P.
148.

PYROLA rotundifolia major C. B. P. 191.

Pyrola I. B. tom. 3. l. 31. 535.

Pyrola folio mucronato ferrato C. B. P. 191.
I. B.

I. B. tom. 3. l. 31. 536.

Pyrola frutescens Arbutifolia C. B. P. 191.

PYRUS *fativa C. B. P. 439. Pyrus I. B. tom. 1. l. 1. 35.*

Eadem flore pleno Cat. Hort. Reg. Paris. 148.

Pyri fativæ variâ arte & mangonio productæ species multivarix.

* *Pyrus sylvestris C. B. P. 439. Pyrafter seu Pyrus sylvestris I. B. tom. 1. l. 1. 57.*

Pyzielt Hernand. v. Nicotiana.

Q.

uadrifolium hortense album C. B. P. v. Trifolium.

Quamoclit I. B. v. Convolvulus.

* **Q**UERCUS *latifolia Mas, quæ brevi pediculo est, C. B. P. 419. Quercus vulgaris brevibus pediculis I. B. tom. 1. l. 7. 71.*

* *Quercus cum longo pediculo C. B. P. 420. Quercus vulgaris longis pediculis I. B. tom. 1. l. 7. 71.*

Quercus calice echinato, glande majore C. B. P. 420. Cerrus, Ægilops Aspris Theophrasti putatata I. B. tom. 1. l. 7. 77.

Quercus pedem vix superans C. B. P. 420. Robur VIII. Clusio I. B. tom. 1. l. 7. 77.

Quin-

*Quinquefolium ejusque species v. Pentaphyl-
lum.*

*Quinquefolium siliquosum Alpini v. Sinapi-
strum.*

*Quinquefolium Lupini folio C. B. P. v. Sinapi-
strum.*

R.

Radix ursina I. B. v. Meum.

Radix Rhodia C. B. P. & I. B. v. Te-
lephium.

RANUNCULUS nemorosus, flore majore
*Moris. Hist. 2. 437. Anemone nemorosa,
flore majore C. B. P. 178. Ranunculus phra-
gmities albus vernus I. B. tom. 3. l. 30. 412.*

*dem flore ex purpurâ rubente. Anemone ne-
morosa, flore majore ex purpurâ rubente.
C. B. P. Var. 178. Ranunculus phragmites
purpureus vernus I. B. tom. 2. l. 30. 412.*

*Ranunculus nemorosus, flore majore albo
pleno. Anemone nemorosa, flore pleno al-
bo C. B. P. 177.*

*dem flore pleno purpureo. Anemone ne-
nemorosa, flore pleno purpureo C. B. P.
Var. 177.*

*Ranunculus nemorosus luteus C. B. P. 178. Mo-
ris. Hist. 2. 437. Ranunculus phragmites lu-
teus nemorosus I. B. tom. 3. l. 30. 413. Fo-
lis latioribus & flore unico C. B. P. Var. 178.*

K k

Idem

Idem foliis angustioribus, floribus duobus
& tribus. C. B. P. *Var.* 178.

Ranunculus nemorosus trifolius. Anemo-
ne trifolia C. B. P. 317. *Morif. Hist.* 2. 424.
Anemone trifolia, flore albo I. B. *tom.* 3. l.
30. 412.

Ranunculus nemorosus, flore herbacei coloris
foliofo. Anemonæ nemorosæ affinis pere-
grina secunda, flore herbacei coloris C. B. P.
177.

Ranunculus Thalictri folio, Asphodeli radice
Morif. Hist. 2. 438. Oenanthe Hederæ foliis
C. B. P. 163. Oenanthe Myconii I. B. *tom.* 3.
l. 27. 192.

Ranunculus nemorosus, Moschatellina dictus
C. B. P. 178. *Morif. Hist.* 2. 438. Moschatellina
foliis Fumariæ bulbosæ, de quâ Cordus I. B.
tom. 3. l. 26. 207.

Ranunculus nemorosus seu sylvaticus, folio
subrotundo C. B. P. 178. *Morif. Hist.* 2. 438. Ra-
nunculus rotundifolius vernus sylvaticus
I. B. *tom.* 3. *App.* 841. An Ranunculus ro-
tundifolius vernus sylvaticus major, sive
Cassubicus, foliis Thoræ seu Calthæ *Breyn.*
Prodr. 45?

Idem Virginianus parvo flore, molliori folio.
Ranunculus hic Virginianus à superiore
haud abhorret; sed flosculis & seminibus val-
de exiguis est, cæterisque partibus omnibus
tenerior & gracilior. Nominè Ranunculus
auri-

auricomi Virginiani à Dno Bobarto accepti-
mus.

Ranunculus pratensis erectus acris C. B. P. 178.
Morif. Hist. 2. 439. Ranunculus rectus non
repens, flore simplici luteo I. B. tom. 3. l. 30,
416.

Ranunculus hortensis, erectus flore pleno C. B.
P. 179. An Ranunculus pratensis erectus a-
cris, flore pleno. *Sutherl. Catal. Edinb. 284.*
Ranunculus pratensis erectus dulcis C. B. P.
129. *Morif. Hist. 2. 439.*

Ranunculus dulcis, flore pleno C. B. P. 139. Ra-
nunculus rectus non repens, pleno flore I. B.
tom. 3. l. 30. 416.

Ranunculus pratensis procumbens aut incli-
nans hirsutus *Morif. Hist. 2. 439.* Ranuncu-
lus pratensis repens hirsutus C. B. P. 129.
Ranunculus repens, flore luteo simplici I. B.
tom. 3. l. 30 419.

Ranunculus hortensis inclinans C. B. P. 179.
Ranunculus repens, flore pleno I. B. tom.
3. l. 30. 420. Ranunculus magnus hirsutus
repens, flore pleno I. B. tom. 3. app. 857.

Ranunculus magnus valdè hirsutus, flore
luteo I. B. tom. 3. l. 30. 417.

Ranunculus pratensis, radice verticilli modo
rotundâ C. B. P. 179. *Morif. Hist. 2. 439.*
Ranunculus tuberosus major I. B. tom. 3. l.
30. 417.

Ranunculus bulbosus, flore pleno C. B. P. 179.

Ranunculus radice tuberosâ, flore pleno & prolifero C. B. P. Ranunculus maximo tubere, flore magno pleno I. B. tom. 3. l. 30. 418.

*Ranunculus echinatus arvensis C. B. P. 179. Moris. Hist. 2. 440. I. B. tom. 3. App. 859.

Ranunculus echinatus stellatus Creticus C. B. P. 280. Moris. Hist. 2. 440. Ranunculus stellatus palustris echinatus I. B. tom. 3. App. 858.

*Ranunculus palustris, Apii folio, lævis C. B. P. 180. Moris. Hist. 2. 341. Ranunculus palustris, flore minimo I. B. tom. 3. App. 858.

*Ranunculus aquaticus Hederaceus Moris. Hist. 2. 441. Ranunculus aquaticus Hederaceus luteus C. B. P. 180. Ranunculus Hederaceus rivulorum, sed extendens, atrâ maculâ notatus I. B. tom. 3. l. 38. 782.

*Ranunculus aquaticus, Cotyledonis folio C. B. P. 180. Moris. Hist. 2. 442. Cotyledon aquatica I. B. tom. 3. l. 38. 781.

*Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo C. B. P. 180. Moris. Hist. 2. 442. Ranunculus aquatilis albus I. B. tom. 3. l. 38. 781.

*Ranunculus aquaticus capillaceus C. B. P. 180. Moris. Hist. 2. 442. & Millefolium aquaticum, foliis Abrotani, Ranunculi flore & capitulo C. B. P. 141. Ranunculus aquaticus omnino tenuifolius I. B. tom. 3. l. 38.

Ranunculus aquatilis albus fluitans, Peucedan-

cedani foliis. Ranunculus, five Polyanthemum aquatili albo affine, five Millefolium maratriphyllum fluitans *I. B. tom. 3. l. 38. 782.* Millefolium foliis Fœniculi, Ranunculi flore & capitulo *C. B. P. 141.*

Ranunculus longifolius palustris major *C. B. P. 180. Moris. Hist. 2. 443.* Ranunculus longo folio maximus, Lingua Plinii *I. B. tom. 3. App. 865.*

Ranunculus longifolius palustris minor *C. B. P. 180. Moris. Hist. 443.* Ranunculus longifolius, aliis Flammula *I. B. tom. 3. App. 865.*

Ranunculus palustris longifolius minor ferratus *Moris. Hist. 2. 443.* Ranunculus palustris ferratus *C. B. P. 180.*

Ranunculus palustris minimus, Plantaginis folio. Plantaginella palustris *C. B. P. 190.*

Ranunculus montanus, Plantaginis folio *C. B. P. 180. Moris. Hist. 2. 444.* Ranunculus Pyrenæus foliis sublongis non laciniatis, albo flore *I. B. tom. 3. App. 864.*

Ranunculus montanus, Gramineo folio *C. B. P. 180. Moris. Hist. 2. 444.* Ranunculus pumilus Gramineis foliis *I. B. tom. 3. App. 566.*

Ranunculus montanus, Gramineo folio, multiplex *C. B. P. 181.* Ranunculus Gramineus, pleno flore *I. B. tom. 3. App. 265.*

Ranunculus lanuginosus, grumosa radice minor *C. B. P. 181. Moris. Hist. 2. 446.* Ranunculus Illirycus, radicibus bulbosis, foliis

longis *I. B. tom. 3. App. 863.*

Ranunculus lanuginosus, grumosa radice major *C. B. P. Moris. Hist. 2. 446.*

Ranunculus latifolius bullatus autumnalis parvo flore *C. B. P. Var. 181. Moris. Hist. 2. 447.* *Ranunculus autumnalis*, folio rotundo ferrato *I. B. tom. 3. App. 866.*

Ranunculus latifolius bullatus autumnalis, *Asphodeli* radice *C. B. P. 181. Moris. Hist. 2. 447.* *Ranunculus Lusitanicus bullatus* *I. B. tom. 3. App. 867.* Magno flore *C. B. P. Var. 181.*

Idem flore pleno & prolifero *Moris. Hist. 2. 447.* *Ranunculus latifolius multiplex serotinus* *Corn. 95.*

Ranunculus Rutaceo folio, flore suavè rubente *C. B. P. 181. Moris. Hist. 2. 448.* *Ranunculus Rutaceo folio* *I. B. tom. 3. l. 30. 414.*

Idem flore pleno. *Ranunculus Rutæ folio* serotinus, flore aureo pleno *Catal. Hort. Reg. Par. 152.* *Ranunculus flavus multiplex*, folio *Rutæ* *Ferr. Fl. Cult. 340.*

Idem flore sanguineo *C. B. P. 181. Moris. Hist. 2. 436.* *Ranunculus Constantinopolitanus*, flore sanguineo pleno *I. B. tom. 3. App. 864.*

Idem flore pleno flavescente & rubris lineis elegantissimè variegato *Cat. Hort. Reg. Par. 152.*

Idem prolifer miniatus *C. B. P. 181. Moris. Hist. 2. 436.*

Idem

Idem Constantinopolitanus Gigas, flore coc-
cineo *Cat. Hort. Reg. Paris. 152.*

Ranunculorum Asphodeli radice, flore simpli-
ci & pleno multę species alię petalorum nu-
mero magnitudine figurâ & colorum pul-
cherrimorum concursu discrepantes.

*Ranunculus præcox rotundifolius, radice gra-
nulatâ Moris. v. Chelidonia.*

*Ranunculus montanus, Aconiti folio, flore glo-
boso C. B. P. v. Helleborus.*

*Ranunculus Aconiti folio, flore albo multiplici
C. B. P. v. Helleborus.*

*Ranunculus cum flore in medio folio, radice
tuberosâ I. B. v. Helleborus.*

RAPHANISTRUM filiquâ articulatâ glabrâ
majore & minore *Moris. Hist. 2. 265.*

Rapistrum luteum, filiquâ glabrâ articulatâ
Raji 251. ANN.

Raphanistrum flore albo striato, filiquâ articu-
latâ striatâ minore *Moris. Hist. 2. 266.* Ra-

pistrum flore albo, filiquâ articulatâ C. B. P.
95. Rapistrum flore albo striato. Sinapi

agreste album *Trago I. B. tom. 2. l. 21. 851.*
ANN.

RAPHANISTRUM maximum monosper-
mum rotundifolium, capsulâ glabrâ *Moris*

Hist. 2. 265. Rapistrum maximum mono-
spermum rotundifolium *Corn. 147. ANN.*

Raphanistrum monospermum latifolium, sili-

quis fungosis glabris articulatis *Moris. Hist.* 2. 267. Myagrum monospermum latifolium C. B. P. 109. Myagrum monospermum I. B. tom. 2. l. 21. 894. ANN.

Raphanistrum filiculâ minore rotundâ rugosâ asperâ *Moris. Hist.* 2. 267. Myagro similis, filiquâ rotundâ C. B. P. 267. Myagro affinis herba, capitulis rotundis I. B. tom. 2. l. 21. 895. ANN.

***R**APHANISTRUM filiquosum monospermum maritimum Anglicum, foliis crassis latioribus. Eruca maritima Anglica, filiquâ fungosâ, torosâ, rotundâ, foliis crassis latioribus *Moris. Hist.* 2. 231. Cakile sive Eruca marina latifolia I. B. tom. 2. l. 21. 868. ANN.

*Idem dispermum maritimum Italicum, filiquâ hastæ cuspidi simili. Eruca maritima Italica, filiquâ hastæ cuspidi simili C. B. P. 99. *Moris. Hist.* 2. 231. Cakile quibusdam, aliis Eruca marina, & Raphanus marinus I. B. tom. 2. l. 21. 868. ANN.

Raphanistrum dispermum Monspeliacum, filiculâ quadrangulâ echinatâ. Eruca Monspeliaca, filiquâ quadrangulâ echinatâ C. B. P. 99. *Moris. Hist.* 2. 232. Sinapi echinatum I. B. tom. 2. l. 21. 858. ANN.

RAPHANUS niger major rotundus *Moris. Hist.* 2. 265. Raphanus niger C. B. P. 96. ANN. Idem

Idem radice longâ pyramidali *Moris. Hist. 2.*
265. ANN.

Raphanus magnus fativus C. B. P. 96. *Moris. Hist. 2.* 265. ANN.

Raphanus minor oblongus C. B. P. *Moris. Hist. 2.* 69. Raphanus I. B. tom. 2. l. 21. 846. ANN.

RAPHANUS rusticanus C. B. P. 96. *Moris. Hist. 2.* 237. Raphanus sylvestris, sive Armoracia multis I. B. tom. 2. l. 21. 851.

Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacini-
as divisus C. B. P. 97. *Moris. Hist. 2.* 237. Ra-
phanus aquaticus Tabernæmontani I. B.
tom. 2. l. 21. 867.

Raphanus aquaticus alter, foliis ferratis *Moris. Hist. 2.* 237. Raphanus aquaticus, Rapistri fo-
lio C. B. P. 97. Radicula sylvestris, sive pa-
lustris I. B. tom. 2. l. 21. 867.

Rapistrum flore luteo C. B. P. v. Sinapi.

Rapistrum flore albo, siliquâ articulatâ C. B. P.
v. Raphanistrum.

Rapistrum maximum monospermum rotundi-
folium Corn. v. Raphanistrum.

Rapistrum Italicum, siliquis longissimis. v.
Erysimum.

Rapistrum flore albo striato I. B. v. Sinapi.

RAPUM fativum rotundum I. B. tom. 2. l.
21. 838. Rapa fativa rotunda C. B. P. 89.
Moris. Hist. 2. 213. ANN.

Idem radice obsoletè nigricante *Var. C. B. P.*
909. ANN.

Rapum fativum oblongum *I. B. tom. 2. l. 21.*
838. ANN.

Rapa fativa oblonga, seu Fœmina *C. B. T. 90.*
Moris. Hist. 2. 213. ANN.

Idem radice ad nigrum inclinante *Cat. Hort.*
Reg. Par. 153. ANN.

Rapum sylvestre, Rapa sylvestris *C. B. P. 90.*
Rapum sylvestre Matthioli *I. B. tom. 2. l.*
21. 841. ANN.

RAPUNCULUS corniculatus spicatus, seu Alo-
pecuroides *Moris. Hist. 2. 463.* Rapuncu-
lus spicatus *C. B. P. 92.* Rapunculus spi-
catus, five comosus coeruleus *I. B. tom. 2. l.*
20. 809.

Idem spicâ albâ *C. B. P. Var. 92.* Rapunculus
spicatus, five comosus albus *I. B. tom. 2. l.*
20. 809.

*Rapunculus ramosus corniculatus, Scabiosæ
capitulo coeruleo *Moris. Hist. 2. 464.* Ra-
punculus Scabiosæ capitulo *C. B. P. 92.* Scabio-
sa globularis, quam Ovinam vocant *I. B. tom.*
3. l. 25. 12.

Rapunculus, seu Rapuntium Virginianum seu
Americanum, coccineo flore majore *Moris.*
Hist. 2. 466. Flos cardinalis Barberini *Co-*
lumn. in not ad Hernand. 880.

Rapunculus galeatus Virginianus, flore vio-
laceo

laceo majore *Moris. Hist. 2. 466.* Rapun-
tium Americanum, flore dilutè coeruleo
Dod. mem. 105.

Rapunculus galeatus Creticus, seu Petro-
marula Cretica Parkinsonii. *Moris. Hist.*
2. 467. Rapunculus Creticus, seu Py-
ramidalis altera C. B. P. 93. Rapunculus
Creticus, Petromarula I. B. tom. 2. l.
20. 811.

Rapunculus seu Rapuntium Æthiopicum, coe-
ruleo, galeato flore, foliis dentatis *Breyn.*
Cent. 175.

Rapunculus hortensis, latiori folio, seu Pyrami-
dalis C. B. P. v. Campanula.

Rapunculus Persicifolius, magno flore C. B. P. v.
Campanula.

Rapunculus esculentus C. B. P. v. Campanula.

Rapunculus minor, foliis incisiss C. B. P. v. Cam-
panula.

RESEDA maxima C. B. P. 100. ANN.

Reseda vulgaris C. B. P. 100. Reseda lu-
tea I. B. tom. 3. l. 30. 467. ANN.

Reseda alba I. B. tom. 3. l. 30. 467. ANN.

Reseda Tinctorum, Salicis folio, Luteola di-
cta. Luteola herba Salicis folio C. B. P. 100.

Luteola Plinii quibusdam I. B. tom. 3. l. 30.
466. ANN.

Reseda maxima Cretica. Luteola Cretica
C. B. P.

C. B. P. 100. Luteola maxima Cretica Honorii Bellii I. B. tom. 3. l. 30. 466.

Reseda Phyteuma dicta. Resedæ affinis phyteuma dicta C. B. P. 100. Phyteuma I. B. tom. 3. l. 29. 386. ANN.

Rha C. B. P. & I. B. v. Lapathum.

Rhabarbarum Officinarum C. B. P. & Moris. v. Lapathum.

RHAMNUS spinis oblongis, flore candicante C. B. P. 477. Rhamnus cortice albo Monspeliensium I. B. tom. 1. l. 6. 31.

* Rhamnus Salicis folio angusto, fructu flavescente C. B. P. 477. Rhamnus vel Oleaster Germanicus I. B. tom. 1. l. 6. 33.

Rhamnus catharticus C. B. P. 478. I. B. tom. 1. l. 6. 55.

Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso C. B. P. v. Paliurus.

Rheum Diosc. C. B. P. v. Lapathum.

Rhodia radix C. B. P. & I. B. v. Telephium.

Rhododendron ejusque species I. B. v. Nerion.

RHUS folio Ulmi C. B. P. 414. Rhus, sive Sumach I. B. tom. 1. l. 5. 555.

Rhus Virginianum C. B. P. 517.

Rhus Virginianum humile.

Rhus Myrtifolia Monspeliaca C. B. P. 414.

Rhus Plinio putata I. B. tom. 1. l. 5. 559.

RHUS

RHUS Myrtifolia Belgica C. B. P. 414. Gale,
frutex odoratus Septentrionalium, Elæ-
agnus Cordo, Chamæleagnus Dod. I. B.
tom. 1. l. 8. 225.

Ribes ejusquæ species I. B. v. Grossularia.

RICINUS Africanus maximus caule genicu-
lato rutilante *Cat. Hort. Reg. Par.* 156. ANN.
Idem totus ruber Indicus. ANN.

Ricinus Americanus major, caule virescente
Cat. Hort. Reg. Par. 156. ANN.

Ricinus vulgaris C. B. P. 432. I. B. tom. 3. l.
34. 642. ANN.

Ricinus vulgaris minor C. B. P. 432. ANN.

Ricinus Americanus, tenuiter diviso folio
Breyn. Cent. 1. 116. ANN.

Ricinus Americanus major, semine nigro
C. B. P. 432. Ricinus Americanus, Curcas
dictus & Faba purgatrix Indiæ occidentalis
I. B. tom. 3. l. 34. 643. ANN.

Riban I. B. v. Ocymum.

Robur VII. *Clus.* I. B. v. Quercus.

ROSA rubra C. B. P. 481. Simplex C. B. P.
Var. 481. I. B. tom. 2. l. 14. 34.

Eadem multiplex C. B. P. *Var.* 156. Rosa ru-
bra flore valde pleno I. B. tom. 2. l. 14. 34.

Rosa rubra pallidior C. B. P. 481.

Eadem saturatiùs rubens C. B. P. 481.

Rosa purpurea C. B. P. 481. Rosa rubello flore
ma-

maiore multiplicato sive pleno, incarnata
vulgo *I. B. tom. 2. l. 14. 36.*

Eadem flore simplici *Cat. Hort. Reg. Par.*
156.

Rosa omnium Calendarum *Cat. Hort. Reg.*
Par. 156. Rosa Italica, flore suaviter ru-
bente, perpetua *Fer. Flor. Cult. 203.*

Rosa versicolor *C. B. P. 481.*

Rosa maxima multiplex *C. B. P. 482.* Rosa
Hollandica rubella plena, quibusdam centi-
folia, spinoso frutice *I. B. tom. 3. l. 14. 37.*

Eadem flore albo *C. B. P. Var. 482.*

Rosa multiplex media *C. B. P. 482.*

Rosa alba vulgaris major *C. B. P. 482.* Rosa
candida semiplena *I. B. tom. 2. l. 14. 44.*

Eadem flore multiplici *C. B. P. Var. 482.* Rosa
candida plena *I. B. tom. 2. l. 14. 44.*

Rosa alba minor *C. B. P. 282.* Rosa lacteola *I. B.*
tom. 2. l. 14. 45.

Rosa moschata simplici, flore *C. B. P. 482.*
Major *C. B. P. Var. 482.* Rosa moschata ma-
jor *I. B. tom. 2. l. 14. 45.*

Eadem minor *C. B. P. Var. 482.* Rosa moscha-
ta minor *I. B. tom. 2. l. 14.*

Eadem flore pleno *C. B. P. 482.* Rosa moschata
minor flore pleno *I. B. tom. 2. l. 14. 47.*

Rosa spinis carens, flore majore *C. B. P. 482.*
Rosa acanthos, flore pleno, coloris rubelli
I. B. tom. 2. l. 14. 35.

Rosa moschata semper virens *C. B. P. 482.*

Rosa

- Rosa spinis carens, flore minore C. B. P. 482.
Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato C. B. P. 483. Rosa sylvestris alba cum rubore glabro I. B. tom. 2. l. 14. 43.
Rosa sylvestris, flore majore & rubente C. B. P. 483.
Rosa sylvestris, flore pleno C. B. P. 483. Rosa Eglentina, flore pleno I. B. tom. 2. l. 14. 43.
Rosa sylvestris, foliis odoratis C. B. P. 483. Rosa foliis odoratis, sive Eglentina dicta I. B. tom. 2. l. 14. 41.
Rosa sylvestris odorata, albo flore C. B. P. 483.
Rosa humilis, flore albo Clusii I. B. tom. 2. l. 14. 45.
Rosa odore Cinamomi simplex C. B. P. 483.
Rosa Cinamomea, floribus subrubentibus, spinosa I. B. tom. 2. l. 14. 39.
Rosa minor rubello flore, quæ vulgo à mense majo Majalis dicitur C. B. P. 483. Rosa rubello flore parvo simplici, non spinosa I. B. tom. 2. l. 14. 39.
Rosa odore Cinamomi, flore pleno C. B. P. 383.
Rosa minor rubello multiplicato flore, asperis spinis armata I. B. tom. 2. l. 14. 38.
Rosa lutea simplex C. B. P. 483. Rosa lutea I. B. tom. 2. l. 14. 47.
Rosa lutea multiplex C. B. P. 483. Rosa lutea, flore pleno I. B. tom. 2. l. 14. 48.
Rosa campestris spinosissima, flore albo odore C. B. P. 483. Rosa pumila spinosissima, foliis pim-

Pimpinellæ glabris, flore albo *I. B. tom. 2. l. 14. 40.*

Rosa moschata semper virens *C. B. P. 183. Rosa semper virens Clusio I. B. tom. 2. l. 14. 48.*

Rosa sylvestris Pomifera major *C. B. P. 848.*

Rosa Pomo spinoso, folio hirsuto *I. B. tom. 2. l. 14. 48.*

Rosa sylvestris Pomifera minor *C. B. P. 484.*

Rosa sylvestris Pomifera Lobelio, flore rubello sine spinis, pumila *I. B. tom. 2. l. 14. 40.*

Rosa punicea *Cornuti 11.*

Rosa Sinensis *Ferrar. v. Althæa.*

ROSMARINUS hortensis, angustiore folio *C. B. P. 217. Rosmarinus coronarius fruticosus I. B. tom. 2. l. 13. 25.*

Rosmarinum striatum sive aureum *Parkins. Theatr. 74.*

Rosmarinus hortensis, angustiore folio, argenteus *Cat. Hort. Reg. Par. 158.*

Rosmarinus spontaneus, latiore folio *C. B. P. 217.*

Rosmarinus sylvestris quorundam *I. B. v. Cistus.*

Rosmarinus sylvestris αόσμη *Clus. I. B. v. Cistus.*

* **R**os solis, folio rotundo *C. B. P. 357. Ros solis I. B. tom. 3. l. 37. 761.*

* Ros solis, folio oblongo *C. B. P. 357.*

Ru-

Rubeola montana odorata C. B. P. v. Rubia.

RUBIA tinctorum sativa C. B. P. 333. Rubia sativa I. B. tom. 2. l. 36. 715.

Rubia sylvestris lævis C. B. P. 333. Rubia angulosa, aspera & parva Genuensis I. B. tom. 2. l. 36. 715.

Rubia quadrifolia asperrima lucida peregrina.

Folia ex nigro virore lucent, flores albicant, quos singulos excipiunt baccae gemellæ nigrae. Cætera non differunt à vulgari.

Rubia quadrifolia, semine duplici hispido I. B. tom. 2. l. 36. 718. Rubia semine duplici hispido, latis & hirsutis foliis Boccon. 11.

Rubia montana odora. Asperula sive Rubeola montana odora C. B. P. 334. Rubiis accedens, Asperula quibusdam, sive Hepatica stellaris I. B. tom. 3. l. 36. 719.

Rubia procumbens hexaphyllos purpurea. Asperula hexaphyllos purpurea C. B. P. 334. I. B. tom. 3. l. 36. 720.

Rubia cœrulea erectior elatiorvè I. B. tom. 3. l. 36. 719. Asperula cœrulea arvensis C. B. P. 334.

Rubia Cynanchica C. B. P. 333. I. B. tom. 3. l. 36. 723.

Rubia pratensis lævis, acuto folio C. B. P. 333.

Rubia cruciata hirsuta dicta C. B. P. 334. Galium latifolium, Cruciata quibusdam flore luteo I. B. tom. 3. l. 36. 717.

Rubia latifolia spicata C. B. B. 334. Rubia spicata I. B. tom. 3. l. 36. 721.

Eadem angustifolia *Cat. Hort. Reg. Par.* 158.

Rubiæ affinis maritima, Portulacæ foliis. Alfine littoralis, foliis Portulacæ C. B. P. 251.

* RUBUS vulgaris, sive Rubus fructu nigro C. B. P. 479. Rubus major, fructu nigro I. B. tom. 2. l. 14. 57.

Rubus repens, fructu cæsius C. B. P. 479. Rubus minor, fructu cœruleo I. B. tom. 2. l. 14. 59.

Rubus monococcus.

Baccis est solitariis; Coetera vulgari similis.

Rubus Idæus spinosus C. B. P. 479. Fructu rubro I. B. tom. 2. l. 14. 59.

Idem fructu albo I. B. tom. 2. l. 14. 59. C. B. P. 479.

Rubus Idæus lævis C. B. P. 479. Rubus Idæus, non spinosus I. B. tom. 2. l. 14. 60.

Rubus odoratus *Cornuti* 149.

RUSCUS C. B. P. 470. I. B. tom. 1. l. 5. 579.

RUTA hortensis major latifolia *Moris. Hist.* 2. 507. C. B. P. 336. Ruta sativa, vel hortensis I. B. tom. 3. l. 26. 197.

Ruta hortensis minor tenuifolia *Moris. Hist.* 2. 507.

507. *Ruta hortensis* altera C. B. P. 336.
Ruta sylvestris major C. B. P. 336. *Moris. Hist. 2.*
 507. *I. B. tom. 2. l. 26. 199.*
Ruta sylvestris minor C. B. P. 336. *Moris. Hist. 2.*
 508. *I. B. tom. 3. l. 26. 200.*
Ruta Chalepensis latifolia, florum petalis villis
 scatentibus.
idem angustifolia *Moris. Hist. 2. 508.*
Ruta sylvestris, flore magno albo C. B. P. 336.
Moris. Hist. 2. 508. *Ruta*, quæ dici solet Har-
 mala *I. B. tom. 2. l. 26. 200.*
Ruta Hypericoides *I. B. v. Hypericum.*
Ruta muraria C. B. P. *v. Adiantum.*
Ruta canina *I. B. C. B. P. & Moris. v. Scro-*
phularia.

S.

abdariffa *I. B. v. Althæa.*

- SABINA folio Tamarisci Diosc. C. B. P. 487.
Sabina sterilis *I. B. tom. 1. l. 9. 288.*
Sabina folio Cupressi C. B. P. 487. *Sabina* bac-
 cifera *I. B. tom. 1. l. 9. 288.*
barifera arundo. v. Arundo.

- SAGITTA aquatica major C. B. P. 194. *Sagit-*
ta major *I. B. tom. 3. l. 38. 790.*
Sagitta aquatica minor latifolia C. B. P. 194.

L1 2

Sagit-

Sagitta I. B. tom. 3. l. 38. 789.

* Sagitta aquatica minor angustifolia C. B. P. 194.

Sagitta minor angustifolia I. B. tom. 3. l. 38. 789.

Sagittaria cordialis Markgr. v. *Crotalaria*.

Salicornia I. B. v. *Kali*.

* **S**ALIX vulgaris alba arborescens C. B. P. 473.
Salix maxima fragilis, alba hirsuta I. B. tom. 1. l. 8. 213.

* Salix vulgaris rubens C. B. P. 473.

* Salix fativa lutea, folio crenato C. B. P. 473.

Salix lutea tenuior, fativa viminea I. B. tom. 1. l. 8. 215.

Salix fragilis C. B. P. 474. Salix spontanea fragilis, Amygdalino folio, auriculata & non auriculata I. B. tom. 1. l. 8. 214.

* Salix Perficæ folio non auriculato *Comelin Catalog.* 99.

* Salix angustis & longissimis foliis crispis subtus albicantibus I. B. tom. 1. l. 8. 212.

* Salix tenuior, folio minore utrinque glabro fragilis. I. B. tom. 1. l. 8. 213.

* Salix latifolia rotunda C. B. P. 474. Salix latifolia infernè hirsuta I. B. tom. 1. l. 8. 215.

* Salix folio ex rotunditate acuminato C. B. P. 474.

Salix montana major, foliis Laurinis *Cat. Hort. Reg. Par.* 160. Salix folio laureo, sive latifolio glabro odorato I. Raj. *Catal.* 261.

* Salix

Salix latifolia repens C. B. P. 774. *Salix pumila latifolia* I. B. tom. 1. l. 8. 216.

Salix pumila foliis utrinquè candicantibus & lanuginosis C. B. P. 474.

Salix pumila, brevi angustoque folio incano C. B. P. 474.

Salix humilis, corticem abjiciens *Raj. Catal.* 261.

SALVIA maxima foliis & floribus amplissimis. *Salvia major peregrina*, amplissimis floribus *Breyn. Prodr.* 46.

Salvia major, an *Sphacelus Theophrasti* C. B. P. 237. *Salvia latifolia* I. B. tom. 3. l. 28. 305.

Flore purpureo C. B. P. *Var.* 237.

Eadem floribus albidis C. B. P. *Var.* 237.

Eadem foliis ex purpureo & albo variis *Cat. Hort. Reg. Par.* 160.

Eadem foliis ex luteo & viridi variegatis *Cat. Hort. Reg. Paris.* 160.

Eadem perelegans tricolor argentea *Belgarum Cat. Hort. Reg. Par.* 160.

Salvia minor aurita & non aurita C. B. P. 237.

Salvia minor auriculata I. B. tom. 3. l. 28. 305.

Salvia minor altera, odore & sapore *Abfinthii*, C. B. P. 237.

Salvia latifolia serrata C. B. P. 237. *Salvia serrata crispa* I. B. tom. 3. l. 28. 305.

Salvia baccifera C. B. P. 237. *Salvia gallifera*

536 HORTUS ACADEMICUS

Sanicula Aizoides Alpina, trifido folio. *Sedum* Alpinum, trifido folio C. B. P. 284. *Sedum* affinis trifulca Alpina, flore albo I. B. tom. 3. l. 35. 696.

Sanicula Aizoides Alpina, trifido folio major alba. *Sedum tridactylites* Alpinum majus album C. B. P. 284.

Sanicula Aizoides Alpina pallidè lutea. *Sedum tridactylites* Alpinum pallidè luteum C. B. P. 284.

Sanicula Aizoides Alpina, angustissimo folio, *Saxifragiæ* albæ flore luteo. *Sedum* Alpinum *Saxifragiæ* albæ flore, vel grandiflorum C. B. P. 284. *Sedum* minimum Syriacum, luteolo flore, *Saxifragiæ* albæ I. B. tom. 3. l. 35. 696.

Sanicula Aizoides, acuto angusto folio, *Ericæ* facie, flore albo.

Sanicula Officinarum C. B. P. v. *Diapensia*.

Sanicula Alpina ejusque species C. B. P. v. *Auricula urfi*.

Sanicula montana latifolia laciniata C. B. P. v. *Primula veris*.

Sanicula Alpina, foliis *Borraginis* villosa. C. B. P. v. *Verbascum*.

Santolina vulgò. v. *Abrotanum*.

SAPONARIA arbor Indica trifolia Mus. Zeyl.

Saponaria ejusque species C. B. P. v. *Lychnis*.
SAS

SASSAFRAS *Hernand.* 61. Anhuiba *Pison.*
 146. Sassafras sive Lignum Pavanum *I. B.*
tom. 1. *l.* 4. 483. Arbor ex Floridâ, Ficul-
 neo folio *C. B. P.* 431.

SATUREJA hortensis, seu Cunila fativa *Pli-*
onii C. B. P. 218. Satureja fativa. *I. B. tom.* 3.
l. 28. 272.

Satureja montana *C. B. P.* 218. Satureja durior
I. B. tom. 3. *l.* 28. 272.

Satureja spicata *C. B. P.* 218. Satureja foliis te-
 nuibus, sive tenuifolia seu Juliani quorun-
 dam. *I. B. tom.* 3. *l.* 28. 273.

Satureja floribus in summitate dispositis.

Hanc superiori Autumno ad nos tramisit
 Dns Watfius.

Satyrium vulgò. v. Orchis.

SAXIFRAGIA major, umbellâ candidâ. Pim-
 pinella Saxifragâ major, umbellâ candi-
 dâ *C. B. P.* 159. Pimpinella Saxifraga major
Moris. Umbell. 12. Saxifraga hircina major
I. B. tom. 3. *l.* 27. 109.

Eadem umbellâ rubente. Pimpinella Saxifraga
 major, umbellâ rubente *C. B. P.* 159.

Saxifraga minor, foliis Sanguisorbæ. Pimpi-
 nella Saxifraga major altera *C. B. P.* 159.

Pimpinella Saxifraga minor *Moris. Umbell.*
 12. Saxifraga hircina minor, foliis Sangui-
 sorbæ *I. B. tom.* 3. *l.* 27.

Saxifragia minor crispa, umbellâ candidâ.
 Pimpinella Saxifraga minor C. B. P. 160.
Moris. Umbell. 12. Saxifragia hircina minima,
 Pimpinella crispa Tragi I. B. tom. 3. l. 27. 113.

Saxifragia rotundifolia alba C. B. P. v. Sanicula.

Saxifragia ad folia bulbos gerens C. B. P. v. Sanicula.

Saxifraga rotundifolia aurea C. B. P. v. Alchimilla.

* SCABIOSA pratensis hirsuta, quæ Officinarum C. B. P. 269. Scabiosa major communior hirsuta, folio laciniato I. B. tom. 3. l. 25. 2.

* Eadem folio non laciniato I. B. tom. 3. l. 25. 2.
 Scabiosa integrifolia glabra, radice præmorsâ. Succisa glabra C. B. P. 269. Succisa sive Morsus Diaboli I. B. tom. 3. l. 25. 11. Flore coeruleo.

Eadem flore albo C. B. P. Var. 269.

Scabiosa fruticans angustifolia alba C. B. P. 270.

Scabiosa montana calidarum regionum major Lobelii I. B. tom. 3. l. 25. 8.

Scabiosa prolifera, folio latiore C. B. P. 270.

Scabiosa prolifera I. B. tom. 3. l. 25. 5.

Scabiosa Alpina, foliis Centaurii majoris C. B. P. 270. Scabiosa Centauroides *Alpin.*
Exot. 205.

Scabiosa altissima annua, foliis Agrimoniae nonnihil similibus. ANN.

Supra viri altitudinem affurgit hæc Scabiosa, caulibus rotundis cavis geniculatis pilosis ramosis, quibus ad singula genicula hærent folia bina ex adverso, pinnata crenata, instar foliorum Agrimoniae, nonnihil hirsuta. Summis ramis insident capitula ex multis flosculis pentapetaloidibus pallidis composita, singulis subjiciuntur semina oblonga parva, in summo umbilicata, seu stellata, ritu congenerum. Radix subest alba lignosa fibrosa annua. Hujus semina ad Clarissimum Antecessorem meum D^Nm Arnoldum Syenium transmisit quondam Jacobus Breynius Botanicorum hujus seculi facile Princeps.

Scabiosa Carduifolio, sphærocephala elatior, Carduus sphærocephalus latifolius vulgaris C. B. P. 381. Echinopus major I. B. tom. 3. l. 26. 69.

Scabiosa Carduifolio sphærocephala humilior. Carduus sphærocephalus coeruleus minor C. B. P. 381. Echinopus minor I. B. tom. 3. l. 25. 72.

Scabiosa montana latifolia non laciniata rubra & prima C. B. P. 270. Scabiosa latifolia, purpurante ex nigro flore I. B. tom. 3. l. 25. 9.

Eadem secunda C. B. P. 270. Scabiosa latifolia, rubro flore I. B. tom. 3. l. 25. 9.

Sca-

Scabiosa glabra, foliis rigidis virentibus *I. B. tom. 3. l. 25. 8.* An Scabiosa latifolia glabra alba *C. B. Phyt. 526?*

Scabiosa argentea angustifolia *C. B. P. 270.*
Scabiosa Graminea argentea *I. B. tom. 3. l. 25. 12.*

Scabiosa maritima parva *I. B. tom. 3. l. 25. 7.*

Scabiosa peregrina rubra, capitulo oblongo *C. B. P. 270.* Scabiosa rubra peregrina, quibusdam Indica *I. B. tom. 3. l. 25. 6. ANN.*

Eadem flore carneo, atro-purpureo, variegato *Cat. Hort. Reg. Par. 163. ANN.*

Eadem Indica prolifera *Sutherl. Hort. Edinburg. 309. ANN.*

Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, flore albo Promontorii Bonæ Spei *Sutherl. Hort. Edinburg. 309. ANN.*

Scabiosa stellata, folio laciniato major *C. B. P. 271.* Scabiosa major cum pulchro semine *I. B. tom. 3. l. 25. 9. ANN.*

Scabiosa stellata, folio non dissecto *C. B. P. 271.*
Scabiosa fruticosa, folio non dissecto *I. B. tom. 3. l. 25. 11.*

* Scabiosa montana, globoso flore, Gramineis foliis latioribus. Caryophyllus montanus major, flore globoso *C. B. P. 211.* Caryophylleus flos aphyllorcaulos vel Junceus major *I. B. tom. 3. l. 29. 336.*

* Eadem Gramineis foliis angustioribus. Caryophyllus montanus minor *C. B. P. 211.* Ca-

LUGDUNO-BATAVUS.

541

CABIOSA ALTISSIMA ANNUA, FOLIIS AGRIMONIAE NONNIHIL SIMILIBUS.

*Caryophylleus flos aphylocaulos vel Juncus minor I. B. tom. 3. l. 29. 336. Floribus rubris.

Eadem floribus albis.

Eadem minima, floribus rubris, foliis angustissimis Caryophyllus montanus minimus, flore globoso Cat. Hort. Reg. Par. 42.

Scabiosa globularis, quam ovinam vocant I. B. v. Rapunculus.

Scammonia Syriaca C. B. P. & I. B. Convolvulus.

Scammonia Monspeliaca, foliis rotundioribus C. B. P. v. Apocynum.

Scammoniae Monspeliensi affinis, foliis acutioribus C. B. P. v. Apocynum.

Scammonea Monspeliaca, flore parvo I. B. v. Apocynum.

SCANDIX semine rostrato vulgaris C. B. P. 152. Sandix Moris. Umb. 48. Pecten veneris, folio tenuiori, paucioribus rostris I. B. tom. 3. l. 27. 74. ANN.

Scandix Cretica major C. B. P. 152. Pecten veneris Creticum I. B. tom. 3. l. 27. 74. ANN.

SCILLA vulgaris, radice rubra C. B. P. 73. Moris. Hist. 2. 395. Scilla ruffa magna vulgaris I. B. tom. 2. l. 19. 615.

Eadem radice albâ C. B. P. 71. Moris. Hist. 2. 395.

395. Scilla magna alba I. B. tom. 2. l. 19.
619.

Scilla Africana, flore viridi parvo, bulbo amplissimo.

Scirpus ejusquè species C. B. P. v. Iuncus.

Sclarea C. B. P. v. Horminum.

Scolymus Chrysanthemus C. B. P. v. Eryngium.

Scolymus Chrysanthemus annuus Dodart.
Mem. v. Carduus.

Scolymus maximus non spinosus I. B. v. Cinara.

Scolymus sativus spinosus & non spinus I. B. v.
Cinara.

Scoparia C. B. P. v. Genista.

SCORDIUM C. B. P. 247. I. B. tom. 3. l.
28. 292.

Scordium folio Salviæ, sive Scorodotis I. B.
tom. 3. l. 28. 292. Scordium alterum, sive
Salvia sylvestris C. B. P. 247.

Scorodoprasum I. B. v. Allium.

SCORPIOIDES Bupleuri folio, corniculis
asperis, hirsutis, minùs contortis Moris Hist.

2. 172. Scorpioides Bupleuri folio C. B. P.

287. Scorpioides filiquâ campoide hispida
I. B. tom. 2. l. 21 899. ANN.

Eadem corniculis asperis, magis in se contortis
& convolutis Moris. Hist. 2. 127. ANN.

Eadem corniculis crassioribus & magis spino-
sis, litui instar contortis & in se con-

volutis *Moris. Hist. 2. 127. ANN.*

Scorpioides Portulacæ folio, corniculis longioribus tenuioribus ac articulatis *Moris. Hist. 2. 127. Scorpioides Portulacæ folio C. B. P. 287. Telephium Dioscordis, seu Scorpioides C. B. P. 217. Telephium Scorpioides I. B. tom. 2. l. 21. 889. ANN.*

SCORZONERA latifolia finuata *C. B. P. 275. Tragopogon Hispanicum, sive Escorzonera, aut Scorzonera I. B. tom. 2. l. 24. 1060.*

Scorzonera foliis nervosis *C. B. P. 275.*

Scorzonera folio laciniato. Tragopogon laciniatum luteum *C. B. P. 278. Tragopogon folio lacinato Monspeliense, flore luteo I. B. tom. 2. l. 24. 1059. ANN.*

SCROPHULARIA annua, folio Urticæ *Moris. Hist. 2. 481. C. B. P. 236. Scrophularia flore rubro Camerarii I. B. tom. 3. l. 30. 422. ANN.*

Scrophularia annua, folio Lamii, flore luteo *Moris. Hist. 2. 482. Scrophularia flore luteo C. B. P. 236. Scrophularia lutea magna, amplis foliis I. B. ANN. I. B. tom. 3. l. 30. 422.*

Scrophularia radice nodosâ foetidâ *C. B. P. 235. Moris. Hist. 2. 482. Scrophularia vulgaris & major I. B. tom. 3. l. 421.*

Scrophularia radice fibrosâ *Moris. Hist. 2. 482. SCRO*

Scrophularia aquatica major C. B. P. 235.

Scrophularia maxima, radice fibrosâ I. B.
tom. 3. l. 30. 421.

Scrophularia Scorodoniæ foliis Moris. Hist.
2. 482.

Scrophularia peregrina frutescens, foliis *Teu-*
cri crassiusculis Breyn. Prodr. 46.

Hęc ob elegantiam & perpetuò virentem
comam coeteras omnes *Scrophulariæ* spe-
cies antecellit, ideoque inter amœniores
plantas à Floræ cultoribus reponi meretur.
Erigit namquē ex radice pallidâ, in contor-
tas fibrillas abeunte, caules rectos firmos,
frutescentes, altitudinis fœsquebitulis,
quadrangulos virides striatos geniculatos,
frequentes in ramos divisos, quos ad sin-
gula genicula cingunt folia crassiuscula sub-
rotunda crenata, unguem vix excedentia,
vulgaris *Teucris* facie, parte inferiori bi-
na adversa, superiori verò solitaria. Flosculi
insident exiguis quinquifidis caliculis *Scro-*
phulariæ, *Ruta canina* dictæ, simillimi, mo-
nopetali subrotundi, in quinque lacinias
quasi totidem petala dissecti, petalo supe-
riori purpurascente bifido galeæ instar, bi-
nis lateralibus auriculatis pallidis, imo la-
biato exiguo purpurascentē, profluenti-
bus è medio rictu staminibus candidis, api-
culis purpurascentibus donatis. Flores
excipit vasculum subrotundum acumina-

M m

tum

tum bicapsulare, in duas carinulas dehis-
cens, continens semina exigua fusca. Pro-
pagatur felicius ramulis quam seminibus.

Scrophularia major, *Ruta canina* vulgo dicta
Moris. Hist. 2. 483. *Scrophularia*, *Ruta ca-*
nina dicta, vulgaris *C. B. P.* 236. *Scro-*
phularia tertia *Dodonæo tenuifolia*, *Ruta*
canina quibusdam vocata *I. B. tom.* 3. l.
30. 423.

Scrophularia minor *I. B.* v. *Chelidonia*.

* *SCUTELLARIA* aquatica, vulgo *Tertianaria*
dicta. *Lyfimachia coerulea galericulata*, vel
Gratiola coerulea C. B. P. *Tertianaria*, aliis
Lyfimachia galericulata I. B. tom. 3. l. 30.
435.

Scutellaria aquatica major Americana.

Novo Plantarum generi *Scutellato* an-
numeratur & hæc Americana Planta, *Scu-*
tellariæ aquaticæ vulgari, *Tertianaria* dicta,
facie & sapore haud absimilis, cui radices
sunt fibrosæ albæ repentes; cauliculi cubi-
tum alti quadrati geniculati, emittentes ad
singula genicula folia gemina adversa, se-
midigitum longa, *Tertianariâ* vulgari am-
pliora, per ambitum profundius crenata &
longioribus petiolis fulcita? ex iisdem geni-
culis emicant flores bini tubulosi galericu-
lati violacei velut, in *Tertianariâ* vulgari
cui quoque respondent capsulæ seminales
in

LUGDUNO-BATAVUS.

547

PROPHULARIA PEREGRINA FRUTESCENS, FO-
LIIS TEUCRII CRASSIUSCULIS BREXNII.

inferius talum, qui mulierum calceis sub-
pingitur, superius galeam cassidam seu scu-
tellam adumbrantes, in quarum alveolo
continentur semina parva rotunda fusca
Hanc cum multis aliis rarioribus concessi-
nobis Botanicorum Dux & Oculus Rober-
tus Morisonius.

Scutellaria peregrina, folio Lamii. Lamium
peregrinum, five Scutellaria C. B. P. 231.
Cassida *Fab. Column. Ecphr. part. 1. 187*
Lamium Astragaloides *Corn. 129.*

SEBESTENA domestica C. B. P. 446. Myxa
domestica, five Sebesten *I. B. tom. 1. l. 2. 197.*

SECALE hybernum vel majus C. B. P. 23. Se-
cale *I. B. tom. 2. l. 18. 416.*
Secale vernum vel minus C. B. P. 23.
Secacul I. B. v. Crithmum.

SECURIDACA vera plurimis flosculis luteis
scorymbi modo dispositis, filiquis latis com-
pressis inter granum & granum junctis, se-
minibus quadratis *Moris. Hist. 2. 80.* Se-
curidaca lutea major C. B. P. 348. Securida-
ca flore luteo, filiquâ latâ oblongâ *I. B. tom. 2. l. 17. 346.*

SECURIDACA Indica angustissimis & longis-
simis filiquis. Galega Ægyptiaca, filiquis
articulatis

articulatis C. B. P. 452. Sesban Ægyptiacum
 seu Securidaca Ægyptiaca articulata Park.
Moris. Hist. 2. 79. Sesban foliis Hedyfari
1. B. tom. 1. l. 11. 386.

Securidaca Ægyptia Park. Moris. v. Senna.

Securidaca siliquis planis utrinquè dentatis C.
B. P. v. Astragalus.

Securidaca dumetorum major, flore vario,
siliquis articulatis C. B. P. v. Colutea.

SEDUM Africanum frutescens incanum, fo-
 liis orbiculatis. Sedum arborescens Pro-
 montorii Bonæ Spei *Stapel. 335. Breyn.*
Prodr. 47. Item Sedum majus Arborescens
 Africanum alterum, foliis rotundioribus,
 glaucis, limbo purpureo cinctis *Breyn.*
Prodr. 47.

Locis maritimis aridis glareosis ad Pro-
 montorium Bonæ Spei fruticis altitudine
 assurgit: radice succosâ longâ brachiatâ ro-
 bustâ rufescente nonnunquam albidâ, fre-
 quentes fibras emittentē: caudice pollicem
 crasso ramoso in viridi canescente, qui par-
 te infernâ cingitur foliis, densissimo stipatu
 absque petiolis congestis, orbiculatis, crassis,
 succulentis, aliquando volæ manus ampli-
 tudine, glaucis, ambitu nunc rubente,
 nunc pallescente; parte verò superiori con-
 spicitur nudus, in tenue geniculum protu-
 berans, quo mediante divaricatur in aliquot

ramulos digitales & palmares, quibus ex calice quinquefoliato dependent flores oblongi pentanguli, quinque rubentibus seu incarnatis petalis, oris fursum reflexis, cum totidem è medio sese exerentibus staminibus apiculatis flavescentibus, constructi. His evanidis succedunt more congenerum quinque filiculæ corniculatæ, oblongæ, pressius invicem junctæ, includentes semina exigua ruffa. Tota Planta aquoso viscidoque gaudet succo, consimilique virtute, quæ cœteræ Sedi species. De facili vero propagatur ramulis abscissis & aridiori solo impactis.

Sedum Africanum umbellatum album.

Exilem fibrosam albam habet radicem: caules complures, ramosos succosos sphithamo altiores: Folia viridia angusta mucronata, caulem ab imo ad summum usque cruciato positu, velut in *Gentiana*, ambientia: Flores albos pentapetalos quasi in muscario seu umbellâ dispositos: Semina exigua in filiculis quinis invicem junctis.

Sedum Africanum annuum, Centaurii minoris facie, flore aureo. ANN.

Altitudinem palmæ vix attingit hæc Planta, figens radiculam tenuem fibrosam albam, ex quâ assurgit cauliculus simplex, rotundus, pallidè virescens, ad summitates ramo-

LUGDUNO-BATAVUS. 551
DUM AFRICANUM FRUTESCENS INCANUM
ORBICULATIS FOLIIS.

552 HORTUS ACADEMICUS
SEDUM AFRICANUM UMBELLATUM ALBUM.

LUGDUNO-BATAVUS. 553

EDUM AFRICANUM ANNUUM, CENTAURII MI-
NORIS FACIE, FLORE AUREO.

ramosus, cui per intervalla adstant folia
crassiuscula succulenta, bina ex adverso,
Centaurio minori non nihil similia: Ra-
morum summitates sustinent perianthium
quinquefolium, quod dehiscens excludit
florem pentapetalum, stellæ instar expan-
sum, foris purpurascentem, intus aureum
staminulis in medio apiculatis flavescenti-
bus, singulisque petalis ad fundum maculâ
cordiformi sanguineâ inscriptis.

Sedum majus arborescens *I. B. tom. 3. l. 35. 686.*
flosculis ex flavo pallescentibus. An Sedum
majus arborescens, flosculis candidis *C. B. P.*
282?

*Sedum vulgare maximum.

Sedum majus vulgare *C. B. P. 283. I. B. tom. 3.*
l. 35. 687. Sempervivum seu Aizoon vul-
go.

Sedum vulgari magno simile *I. B. tom. 3. l.*
35. 688.

Sedum majus montanum, foliis non dentatis,
floribus rubentibus *C. B. P. 283.* Sedum mon-
tanum latifolium, flore purpureo *I. B. tom.*
3. l. 35. 688.

Sedum montanum tomentosum *C. B. P. 284.*
Sempervivum rubrum montanum *ναφθα-
λῶδες Fab. Column. Ecph. p. 1. 292.*

Sedum echinatum vel stellatum, flore albo
I. B. tom. 3. 35. 680.

LUGDUNO-BATAVUS. 555

Sedum Alpinum roseum luteum, cauliculis
rubentibus *Cat. Hort. Reg. Par.* 165.

Sedum minus teretifolium album C. B. P. 283.

Sedum minus, folio longiusculo tereti, flo-
re candido I. B. *tom.* 3. l. 35. 690.

Sedum minus teretifolium alterum C. B. P. 283.

I. B. *tom.* 3. l. 35. 691.

Sedum minus, folio circinnato C. B. P. 283.

Sedum parvum, folio circinnato, flore albo
I. B. *tom.* 3. l. 35. 691.

Sedum minus luteum, folio acuto C. B. P. 283.

Sedum minus, flore luteo I. B. *tom.* 3. l. 35.
692.

Sedum minus à rupe S. Vincentii *Raji Ca-
talog.* 270.

Sedum minus vermiculatum acre C. B. P. 283.

Sedum parvum acre, flore luteo I. B. *tom.* 3.
l. 35. 694. 270.

Sedum minus vermiculatum insipidum C. B.

P. 284. Sedum minimum luteum non acre
I. B. *tom.* 3. l. 35. 695.

Sedum Alpinum luteum minus *Raji Cat.* 269.

Sedum Alpinum Ericoides cœruleum C. B. P.

284. I. B. *tom.* 3. l. 35. 694.

Sedum minus, lato & crasso caule, Portlandi-
cum Belgarum *Cat. Hort. Reg. Par.* 166.

Sedum Cepæa dictum. Cepæa C. B. P. 288.

I. B. *tom.* 3. l. 35. 679.

Se-

556 HORTUS ACADEMICUS

Sedum serratum, flore albo multiflorum Dodart.
v. Sanicula.

Sedum serratum I. B. v. Sanicula.

Sedum minus fruticosum C. B. P. v. Kali.

Sedum Alpinum, trifido folio ejusque species.
v. Sanicula.

Sedum tridactylites tectorum C. B. P. v. Alsine.

Seleri Moris. v. Apium.

Sempervivum ejusque species. v. Sedum.

SENECIO incanus pinguis C. B. P. 131. Senecio hirsutus viscidus, major odoratus I. B. tom. 2. l. 24. 1042. ANN.

*Senecio Jacobææ folio Moris. Hort. Bles. 309. ANN.

*Senecio minor vulgaris C. B. P. 131. Senecio vulgaris, sive Erigeron I. B. tom. 2. l. 24. 1041. ANN.

Senecio, *Africanus perennis*. v. Conyza in App.

SENNA Italica, sive foliis obtusis C. B. P. 397. Sena Florentina, foliis per extremum pene cordatis I. B. tom. 1. l. 11. 377. descr. ANN.

Senna Occidentalis, odore Opii viroso, Orobi Pannonici foliis mucronatis, glabra. Pajomirioba & Herva do Bidscho Lusitanis Pison. 185.

Eadem hirsuta.

Senna Occidentalis, odore Opii, minus viroso.

fo, foliis glabris obtusis. Pajomirioba 11.
Pison. 184. ANN.

Senna Orientalis fruticosa, Sophera dicta.
 Galegæ affinis Sophera dicta *C. B. P.* 352.
 Securidaca Ægyptia *Park. Moris. Hist.* 2. 78.
 Sophera Indiæ Orientalis *Breyn. Prod.* 51.
 Ponnam Tangera *Hort. Mal. tom.* 2. 101.
 Ecapatli altera *Hernand.* 376.

Senna Orientalis hexaphylla. Tala Zeylonen-
 sibus ANN.

Octo plantas ex utròque Indiâ delatas
 aluit hætenus noster hortus, quas tum ob
 stamina falcata, quæ ex flore exeruntur, tum
 etiam ob semina in siliquis bivalvibus uni-
 capsularibus quasi per articulos junctis Sen-
 næ subjungi, similique nomine nominari de-
 bere autumavi. Quam verò hexaphyllam
 vocavi, radicem fert albam tenuem fibro-
 sam annuam: cauliculos dodrantes herba-
 ceos, primùm erectos, postmodum recli-
 natos: Folia in qualibet costâ sex, bina sibi
 opposita, subrotunda unguem lata, pingua,
 saporis subacris ingrati, cocta verò oleracei
 haud ingrati: Flores congeneribus simi-
 les, ast minores, aureos pentapetolos sta-
 minibus in medio concoloribus & stylo fal-
 cato longiori: Siliquas compressas angustas
 recurvas unicapsulares bivalves quasi arti-
 culatas seu isthmis interceptas, in quibus
 semina oblonga teretia lucida fusca.

Sen-

Senna Orientalis tetraphylla , Absus dicta.
Loto affinis Ægyptia C. B. P. 332. Absus fo-
liis Trifolii , foliis Orobi glabris I. B. tom.
2. l. 17. 361. ANN.

Senna Occidentalis , filiquâ multiplici, foliis
Herbæ mimosæ. Chamæcrista Pavonis A-
mericana, filiquâ multiplici Breyn. Cent. 1.
66. ANN.

Eadem filiquâ singulari. Chamæcrista Pavo-
nis Brasiliana , filiquâ singulari Breyn. Cent.
1. 64. ANN.

Seriphium I. B. v. Absinthium.

Seriphium Germanicum I. B. v. Nasturtium.

Serpentaria triphylla Brasiliana Dodart. v.
Arum.

SERPILLUM vulgare majus C. B. P.
220.

*Serpillum vulgare minus C. B. P. 220. Serpil-
lum vulgare I. B. tom. 3. l. 28. 269. Flore
purpureo.

Serpillum minus flore albo C. B. P. Var. 220.

Idem folio ex albo & viridi vario.

Serpillum angustifolium hirsutum C. B. P. 220.

Serpillum angusto lanuginosoque folio I. B.
tom. 2. l. 28. 270.

Serpillum foliis Citri odore C. B. P. 220. Ser-
pillum Citri odore I. B. tom. 2. l. 28. 270.

Serpillum folio Thymi C. B. P. 202. Serpillum
sylvestre, Zygis Clusio, Thymo vulgari rigi-
diori

diori simile *I. B. tom. 2 l. 28. 271.*

SERRATULA C. B. P. 235. I. B. tom. 3. l. 25.

S₂₃. Flore purpureo.

Eadem flore candido C. B. P. Var. 235.

Sesamoides parvum Matth. v. Cichorium.

SESAMUM C. B. P. 27. I. B. tom. 2, l. 21. 896.

Semine fusco.

Idem semine albo.

Sesamum perenne Indicum Zanoni. v. Gramen dactylon.

Sesban Ægyptiacum Alpini Park. Moris. v. Galega.

SESELI Æthiopicum Salicis folio C. B. P.

S₁₆₁. Sefeli frutex Æthiopicum Moris.

Umbell. 17. Sefeli Æthiopicum fruticosum, folio Periclymeni I. B. tom. 3. l. 27. 197.

Sefeli pratense, Silaus fortè Plinii C. B. P. 162.

Sefeli pratense Moris. Umb. 17. Silaum quibusdam, flore luteolo I. B. tom. 3, l. 27. 170.

Sefeli montanum, Cicutæ folio glabrum C. B.

P. 161. Sefeli herba montanum Pannoni-

cum I. Clus. Moris. Umbell. 17. Sefeli Alpi-

num, five montanum primum Clusio, fo-

lio splendente, flosculis albis I. B. tom. 3.

l. 27. 168.

Sefeli pratense lactescens C. B. P. v. Thyf-

selinum.

Sefeli palustre lactescens acre, foliis Ferulaceis

flore

flore albo, semine lato I. B. v. Tyffelinum.
Seseli Æthiopicum Matthiolo I. B. v. Laserpitium.

Seseli Officinarum C. B. P. v. Siler.

Seseli Creticum majus C. B. P. v. Tordylium.

Seseli Peloponense Matthioli, sive Cicutaria
quorundam I. B. v. Cicutaria.

Siciliana I. B. v. Hypericum.

SIDERITIS arvensis aculeata, foliis Cannabinis, floribus purpureis. Urtica aculeata, foliis ferratis C. B. P. 232. Cannabis sylvestris quorundam, Urticæ inertis affinis I. B. tom. 3. app. 855.

Eadem floribus candidis C. B. P. Var. 232.

Sideritis arvensis angustifolia rubra C. B. P. 233.

Ladanum Segetum, flore rubro quorundam
 I. B. tom. 3. app. 855.

Sideritis Scordioides tomentosa alba. An Sideritis foliis hirsutis profundè crenatis C. B. P. 213. Et Sideritis Montpeffulana I. B. tom. 3. l. 30. 426? ANN.

Caulis huic est dodrante longior quadrangulus tomentosus incanus, quem ambiunt conjugatâ serie folia parva incana mollia graveolentia, rugis & marginalibus crenis ad Scordii folia quadantenus accedentia, hinc Scorodotis appellata. Ad horum sinus exeunt flosculi galeati & labiati, pusilli pallidi, caulem per intervalla verticillatim

latim cingentes, quibus succedunt utriculi quinquefariam denticulati, nullis aut per quàm exiguis pedicellis fulciti, claudentes femina quaterna rotunda fusca. Renovatur singulis annis ex seminibus deciduis. An hæc planta sit eadem vel diversa à Sideritide Monspessulana I. B. judicet lector ex nostra descriptione quam una cum accuratâ iconè ad vivum expressâ hîc proponere non abs re fore existimavi.

*Sideritis hirsuta procumbens C. B. P. 233.

Sideritis vulgaris hirsuta erecta C. B. P. 233.

Sideritis vulgaris hirsuta I. B. tom. 3. l. 30. 425.

Sideritis Alpina, Hyssopifolia C. B. P. 233. Sideritis Valerandi Dourez, brevi spicâ I. B. tom. 3. l. 30. 427.

Sideritis arvensis latifolia glabra C. B. P. 233.

Sideritis glabra arvensis I. B. tom. 3. l. 30. 427.

Sideritis foliis oblongis glabris C. B. Prodr. I. I. Sideritis glabra, oblongo splendente folio C. B. P. 233.

Sideritis Romana, utriculis spinosis. Sideritidis genus, spinosis verticillis I. B. tom. 3. l. 30. 428.

Sideritis spinosa I. B. tom. 3. l. 30. 428. Sideritis Cretica viscosa, odore Bituminis Zan. Hist. Bot. 186. Stachys spinosa Cretica C. B. P. 236.

Side-

Sideritis altissima, flore albo I. B. v. Calamintha Cattaria.

gillum Salomonis. v. Polygonatum.

gillum Indicum, flore luteo Stapel. v. Polygonatum.

SILER montanum majus Moris. Umb. 7. 8.

Ligusticum quod Sefeli Officinarum C. B. P.

162. *Siler montanum vulgare I. B. tom. 3.*

l. 27. 168.

Siler Aquilegiæ foliis Moris. Umb. 7. 8. Liba-

notis latifolia, Aquilegiæ foliis C. B. P. 157.

Ligusticum Rauwolffi, foliis Aquilegiæ I. B.

tom. 3. l. 27. 148.

Silqua edulis C. B. P. v. Ceratonia.

SILQUA sylvestris rotundifolia C. B. P. 402.

Judaica arbor I. B. tom. 1. l. 12. 433.

Eadem flore albo, & cortice candicante C. B. P.

Var. 402.

Silqua sylvestris spinosa, arbor Indica C. B. P.

v. Coral.

Silquastrum. v. Solanum.

SINAPI Rapæ folio C. B. P. 99 Moris. Hist. 2.

215. *Sinapi filiquâ latiusculâ glabrâ, femi-*

ne ruffo, sive vulgare I. B. tom. 2. l. 21. 855.

ANN.

Sinapi Apii folio, filiquâ hirsutâ, semine albo

aut ruffo Moris. Hist. 2. 216. Sinapi hortens-

fe, femine albo C. B. P. 99. Sinapi album, filiquâ hirsutâ, femine albo & ruffo I. B. tom. 2. l. 21. 856. ANN.

*Sinapi Erucae folio C. B. P. 99. Moris. Hist. 2. 216. Sinapi Eryfimo Tragi cognatum, five simile I. B. tom. 2. l. 21. 857. ANN.

Sinapi sylvestre Monspeffulanum, lato folio finuato & laciniato, flosculo luteo minimo, filiquâ longissimâ I. B. tom. 2. l. 21. 858. Moris. Hist. 2. 216. ANN.

Sinapi arvense præcox, femine nigro Moris. Hist. 2. 216. Rapistrum flore luteo C. B. P. 95. Rapistrum flore albo striato. Sinapi agreste album Tragi I. B. tom. 2. l. 21. 851. Sinapi echinatum I. B. v. Raphanistrum.

SINAPISTRUM Ægyptium heptaphyllum, flore carneo, majus spinosum. Pentaphyllum peregrinum filiquosum bivalve majus Moris. Hist. 2. 288. Tareriaya Brasiliensibus Markgr. l. 33. Lupinus Ægyptius sylvestris Veslingii Obs. in Alpin. 69. ANN.

Sinapistrum Indicum pentaphyllum, flore carneo, minus non spinosum. Pentaphyllum peregrinum filiquosum bivalve minus Moris. Hist. 2. 288. Quinquefolium Lupinifolio C. B. P. 326. Quinquefolium filiquosum Alpini Exot. 322. ANN.

Idem triphyllum.

Novæ Plantarum Familiæ, filiquis bival-

LUGDUNO-BATAVUS. 565
NAPISTRUM INDICUM TRIPHYLLUM, FLORE
CARNEO, NON SPINOSUM.

valvibus unicapfularibus sine septo intermedio duplicem seminum seriem in se continentibus, floribus tetrapetalis longis staminulis donatis, Robertus Morifonius tres adscripsit plantas, quibus nunc quartam, Horti nostri incolam, adjungere, eamque cum ceteris congeneribus nomine Sinapistri indicare placuit. Namquè harum semina sapore & virtute Sinapi non tantum æmulantur, ejusque loco substituuntur; verum etiam à Lusitanis, in Indiis degentibus, Mustardo demato hoc est Sinapi sylvestre appellantur. Erigit autem nova hæc species à radice tenui albente parvâ cauliculum cubitalem, in paucos divisum ramos, ad tactum glutinosum, cui adnectuntur folia terna, petiolo modo longiore, modo brevissimo ramis cauliculoquè pressius juncto, suffulta. Flores modo albicant, modo ex flavo pallescunt. Cætera Sinapistro Indico pentaphyllo omnino paria, videantur ex apposita icone. Locis aridis siccis cultis & in cultis utriusquè Indiæ mirabili foecunditate luxuriat.

Sinapistrum Lusitanicum triphyllum, flore rubro, siliquis corniculatis. Trifolium Lusitanicum bivalve, flore rubro *Moris. Hist.* 2. 289. Trifolium Lusitanicum corniculatum, flore rubro *Park. Th.* 1193. & 1687.

ANN.

SION five Apium palustre, foliis oblongis
C. B. P. 154. Sion umbelliferum I. B. tom. 3.
l. 27. 172. An Sion aquaticum angustifo-
lium Moris. Umb. 12?

Sion aquaticum latifolium Moris. Umbell. 12.

Sion maximum latifolium I. B. tom. 3. l. 27.
175.

Sion medium I. B. tom. 3. l. 27. 174. Sium la-
tifolium C. B. P. 154.

Sion Erucæ folio C. B. P. 154. Sium aquati-
cum, rugosis foliis multifidis & dentatis
Moris. Umb. 12. Cicuta aquatica Gesneri
I. B. tom. 3. l. 27. 175.

SISARUM Moris. Umbell. 12. Sifarum Ger-
manorum C. B. P. 155. Sifarum multis I. B.
tom. 3. l. 27. 153.

SISON Moris. Umb. 12. Sison, quod Amo-
mum Officinis nostris C. B. P. Sison five
Officinarum Amomum I. B. tom. 3. l. 27.
ANN.

Sisymbrium ejusque species I. B. v. Nasturtium.

SISYNRICHIMUM ex Phoeniceo suavè rubente
flore Æthiopicum Breyn. Cent. 1. 83.
Idem flore albo.

Sisynrichium Æthiopicum, foliis Gladioli
parvis, pallefcente flore.

Sisynrichium ramosum Æthiopicum, foliis
pli-

plicatis nervosis & incanis, radice tuberosâ
phœniceâ *Breyn. Cent. 1. 85.*

Sifynrichium majus, flore luteâ maculâ notato
C. B. P. 40. *Sifynrichium spurium majus*,
flore luteâ maculâ notato, seu Ἰριδοφύλλον
Moris. Hist. 2. 346. *Iridi Bolbusæ* af-
fine, *Sifynrichium majus I. B. tom. 2. l. 19.*
708.

Sifynrichium minus angustifolium, flore ma-
jore variegato *C. B. P. 41.*

SMILAX aspera, fructu rubente *C. B. P. 296.*
Smilax aspera I. B. tom. 2. l. 15. 115.

Smilax aspera minus spinosa, fructu nigro
C. B. P. 296. I. B. tom. 2. l. 15. 116. *Smilax*
levis vulgò.

Smilax hortensis ejusque species. v. Phaseolus.

SMYRNIUM majus *Moris. Umbell. 11.* Hip-
poselinum Theophrasti, vel *Smyrni-
um Diosc. C. B. P. 154.* Macerone, quibus *Smyr-
nium semine magno nigro I. B. tom. 3. l. 17.*
126. ANN.

*Smyrni-
um Creticum Moris. Umb. 12.* *Smyr-
nium peregrinum*, rotundo folio *C. B. P.*
*Smyrni-
um Creticum perfoliatum I. B. tom.*
3. l. 27. 125. ANN.

Solanifolia Circea dicta major & minor C. B. P.
v. Circea.

Solanum vesicarium C. B. P. 166. Solanum Halicacabum vulgare I. B. tom. 3. 34. 609.

Solanum vesicarium Indicum C. B. P. 166. Solanum five Halicacabum Indicum I. B. tom. 3. l. 34. 609. ANN.

Solanum vesicarium Americanum, caule quadrangulo, foliis Strammoniaë, Tomatl, seu Planta acinosa *Hernand.* 295. Camaru *Pison.* l. 4. 223. ANN.

Solanum vesicarium Indicum minimum. Halicacabum, seu Alkekengi Arabibus dictum *Bont.* l. 6. 149. ANN.

Quanquam nullus dubitem, quin hoc Solanum sit idem, quod Iacobus Bontius *Hist. Nat. l. vi. cap. LIII.* nomine Halicacabi seu Alkekengi Arabici proposuit; at tamen quoniam ejusdem descriptionem reperi nimis debilem & iconem minùs accuratam, ideò in gratiam Botanophylorum paulò plenior descriptionem & iconem adjungere decrevi. Namque inter cœteras hujus sortis species omnium minimum est hoc Solanum, facie quidem ad Indicum Camerarii & I. B. accedens; partibus tamen omnibus tenuius & gracilius. Radice nititur tenui albâ fibrosâ: Coliculis dodrantalibus rotundis tenuibus glabris, crebros in ramos diductis, mediâ sui parte humi procumbentibus: Foliis

Solano vulgari similibus, sed multò minoribus, atroviridibus acuminatis, in margine aliquando integris, nonnunquam leviter crenatis. Ad horum sinus prodeunt subinde in caliculis quinquifidis flores parvi, pallidè flavescentes, monopetali in quinque angulos acutos dissecti, & ad fundum fuscis maculis inscripti. Hos excipiunt vesiculæ herbaceæ angulosæ, Solano prædicto duplo minores, quibus includitur bacca concolor, referta seminibus de pressis pallidis, in pulpâ virenti acri & amarâ. Collectum ex incultis sordidis aridis Malabaræ & Zeylonæ invexi in Hortum, ubi ex seminibus deciduis quotannis se ipsum propagat. Virtutes videantur apud Bonitium loco citato.

Solanum somniferum verticillatum C. B. P. 167. Solanum verticillatum I. B. tom. 3. l. 34. 610. Alkekengi Mexicanum *Column. ad Hernand.* 296. Solanum somniferum antiquorum *Alpin. Exot.* 71. Peevetti *Hort. Mal. tom. 4.* 113.

Solanum quadrifolium bacciferum C. B. P. 167. Herba Paris I. B. tom. 3. l. 34. 613.

* Solanum Officinarum C. B. P. 166. Solanum hortense, sive vulgare I. B. tom. 3. l. 34. 608.

Acinis nigricantibus C. B. P. *Var.* 166. ANN.

* Idem acinis ex luteo virescentibus. ANN.

* Idem acinis rubris C. B. P. *Var.* 166. ANN.

Sola-

LUGDUNO-BATAVUS. 371

SOLANUM VESICARIUM INDICUM MINIMUM.

572 HORTUS ACADEMICUS

Solanum μελανοκέρασ C. B. P. 166. Solanum
maniacum mulis, five Bella donna I. B.
tom. 3. l. 34. 611.

Solanum fruticosum bacciferum C. B. P. 166.
Strychnodendros I. B. tom. 3. l. 34. 614.
Amomum Plinii vulgò.

Solanum scandens, five Dulcamara C. B. P.
167. Glycypicros five Amara dulcis I. B.
tom. 2. l. 15. 109.

Idem flore albo C. B. P. Var. 167.

Idem foliis ex albo variegatis Moris. Hort.
Bles. 194.

Solanum tuberosum esculentum C. B. P. 167.
Papas Americanum I. B. tom. 3. l. 34. 621.

Solanum Pomiferum, fructu rotundo striato
molli C. B. P. 167. Mala aurea, odore fœ-
tido, quibusdam Lycopersion I. B. tom. 3.
l. 34. 621. Fructu luteo C. B. P. Var. ANN.

Idem fructu aureo C. B. P. Var. ANN.

Idem fructu pulchrè rubente C. B. P. Var. 167.
ANN.

Idem fructu albo C. B. P. Var. 167. ANN.

Solanum Pomiferum, fructu rotundo striato
duro C. B. P. 167. ANN.

Solanum Pomiferum, fructu oblongo C. B. P.
167. ANN.

Idem fructu oblongo albo C. B. P. Var. 167.
ANN.

Idem fructu incurvo C. B. P. 167. I. B. tom. 3. l.
34. 619. ANN.

Idem

Idem fructu nigro spinoso C. B. P. 167. *l. B. tom.*

3. *l.* 34. 619. ANN.

Solanum Pomiferum Indicum spinosum, Borriginis flore, fructu croceo. Solanum spinosum, fructu rotundo C. B. P. 167. Pomum de Hiericho Melongenens congener *l. B. tom.*

3. *l.* 34. 619. Chunda *Hort. Mal. tom. 2.*

69. ANN.

Idem spinis violaceis. ANN.

Idem spinis ex albo virentibus. ANN.

Idem candicans maximè tomentosum. Solanum spinosum maximè tomentosum *Bocc. Ic. & Descr. 8.* Anachunda *Hort. Mal. tom. 2.* 65. ANN.

Idem Americanum, floribus ex lacteo & coeruleo mixtis. Juripeba Foemina *Pison. l. 4.* 181. ANN.

Solanum Pomiferum frutescens Africanum, spinosum, nigricans Borriginis flore, foliis profundè laciniatis. Solanum spinosum arborescens Capitis Bonæ Spei *Breyn. Fascic. 25.*

Huic Solano suppingitur radix alba lignosa perennis, longo & obliquo reptatu dispersa. Ex hac fruticat caulis lignosus sesquicubitalis ramosus, in viridi nigricans aculeis mordacibus undiquè armatus: Folia promit atro-viridia oblonga profundè laciniata, costis ab utraqùe parte superparibus spinis obsessis: Flores ad ramorum cacu-

caecumina pentapetaloides, Borraginis facie, ex coeruleo pallentes: Baccas Pomamoris amplitudine & formâ, primum virides, dein flavos, & ex maturitate in nigrum degenerantes colorem, foventes semina compressa, orbiculata, fusca, in pulpâ flavescente viscidâ, acris, amarâ, nauseosâ & virosâ. Ad fossarum margines locisque aliis incultis Promontorii Bonæ Spei sponte provenit. In Hortis tam per semina quam ramorum circumpositionem vel submersionem commodissimè propagatur. Hujus radicem, quam acrem & subamaramprehendi, exemplo Hottentottorum, ad Hydropicorum aquas per urinam educendas, ex decocto præscripsi magno semper ægrotantium levamine; pulpam verò baccarum virulentam reperi, inducentem capitis gravedines, torpores, dolores, furorem denique ipsamque necem.

Solanum racemosum tinctorium Americanum, foliis & seminibus Amaranthi. Solanum racemosum Indicum *Hort. Reg. Par.* 167. Solanum magnum Virginianum rubrum *Park. Theatr.* 347.

SOLANUM Capsicum dictum vulgatissimum: Piper Indicum vulgatissimum C. B. P. 102. Idem propendentibus filiquis oblongis recurvis C. B. P. 102.

LUGDUNO-BATAVUS:

575

OLANUM POMIF. FRUTES. AFRICAN. SPINOS.

NIGRIC. FOLIS PROFUNDE LACIN.

Solanum Capficum dictum, propendentibus filiquis oblongis recurvis. Piper Indicum propendentibus filiquis oblongis recurvis C. B. P. 102. Piper Indicum, five Calecuticum, five Capficum oblongius I. B. *tom.* 2. l. 22. 934.

Idem filiquis aureis C. B. P. *Var.* 102.

Solanum Capficum dictum, propendentibus filiquis rotundis. Piper Indicum propendentibus filiquis rotundis C. B. P. 102. Capficum filiquâ latiore & rotundiore I. B. *tom.* 2. 22. 943.

Idem filiquis cordatis C. B. P. *Var.* 102.

Solanum Capficum dictum, propendentibus filiquis minimis & angustissimis.

Solanum Capficum dictum, filiquis surrectis & oblongis C. B. P. 202. Rubris.

Idem filiquis aureis *Cat. Hort. Reg. Par.* 142.

Idem filiquis cordatis.

Idem filiquis rotundis C. B. P. 103.

Idem filiquis bifurcatis C. B. P. *Var.* 103.

Solanum Pomo spinoso rotundo, longo flore C. B. P. v. Stramoniam.

Solanum fœtidum, Pomo spinoso oblongo C. B. P. v. Stramoniam.

Solanum fœtidum, Pomo spinoso rotundo, semine pallido C. B. P. v. Stramoniam.

Solanum fœtidum, Pomo aculeis crassioribus & longioribus donato Moris. v. Stramoniam.

Solanum Mexiocanum, flore magno ejusque species I. B. v. Mirabilis.

Goldanella maritima minor C. B. P. v. Con-
volvulus.

Colea equina I. B. v. Ferrum equinum.

Coleæ affinis herba I. B. v. Ferrum equinum.

Solidago Saracenica ejusque species I. B. v. Co-
nyza & Virga aurea.

SONCHUS asper laciniatus, & non laciniatus
C. B. P. 123. Sonchus minus laciniosa mi-
tior, sive minus spinosa & asperior sive
spinofior I. B. tom. 2. l. 24. 1014. ANN.

Sonchus asper arborescens C. B. P. 124.

Sonchus asper arborescens palustris, Hieracii
facie. Hieracium Sonchites majus, folio Son-
chi, vel Hieracium Sonchites C. B. P. 126.

Sonchus repens, multis Hieracium majus
I. B. tom. 2. l. 24. 1017.

Sonchus lævis laciniatus latifolius C. B. P. 124.

Sonchus laciniatus non spinosus I. B. tom. 2.
l. 24. 1015. ANN.

Idem laciniatus spinosus I. B. tom. 2. l. 24.
1016. ANN.

Sonchus Creticus, semine recurvo. Hie-
racium majus, folio Sonchi, semine re-
curro C. B. P. 127. Chondvillæ Creticæ no-
mine missa semine crispo I. B. tom. 2. l.
24. 1022.

Sonchus lævis laciniatus muralis, parvis flori-
bus C. B. P. 124. Lactuca sylvestris muro-
rum, flore luteo I. B. tom. 2. l. 24. 1004.

Sonchus angustifolius maritimus C. B. P. 124.

Sonchus montanus purpureo-coeruleus major

Lactuca montana purpureo-coerulea major

123. *Lactuca sylvatica purpurea* I. B. tom.

2. l. 24. 1005.

Sonchus villosus luteus major C. B. P. v. Hieracium.

Sonchus lanatus Dalechampii I. B. v. Hieracium.

Soncho affinis, Lampsana domestica C. B. P. v. Cichorium.

Sophera Alpini C. B. P. v. Senna.

Sophera Indiæ Orientalis Breyn. v. Senna.

Sophia quibusdam I. B. v. Nasturtium.

SORBUS fativa C. B. P. 415. *Sorbus* I. B. tom. 1. l. 1 59.

* *Sorbus sylvestris*, foliis domesticæ similis C. B. P. 415. *Sorbus aucuparia* I. B. tom. 1. l. 1. 62.

Sorbus Virginiana, foliis *Arbuti* Breyn. Prod. 51.

Sorbus torminalis & Alpina I. B. v. *Mespilus*.

Sorghum I. B. v. *Milium*.

Sorgo C. B. P. v. *Milium*.

* **S**PARGANIUM ramosum C. B. P. 15. *Spar-*
ganium quibusdam I. B. tom. 2. l. 18. 541.

* *Sparganium non ramosum* C. B. P. 15. *Spar-*
ganium alterum I. B. tom. 2. l. 18. 541.

Spar-

partium arborescens, seminibus Lenti simili-
bus C. B. P. v. Genista.

partium Hispanicum, lobis rotundiusculis,
flore luteo I. B. v. Genista.

partium Hispanicum flore candido I. B. v. Ge-
nista.

partium alterum monospermum, semine reni
simili C. B. P. v. Genista.

patula foetida I. B. v. Iris.

pergula I. B. v. Alfine.

pergula marina I. B. v. Alfine.

phacelus Theophrasti C. B. P. v. Salvia.

phondylium ejusque species I. B. v. Panax.

pina alba tomentosa latifolia sylvestris ejus-
que species C. B. P. v. Carduus.

pina alba sylvestris Fuchsi I. B. v. Carduus.

pina lutea I. B. v. Eryngium.

pina solstitialis I. B. v. Jacæa.

pina Burgi Monspeliensium I. B. v. Alaternus.

SPINACHIA semine spinoso Moris. Hist. 2. 598.

Lapathum hortense, seu Spinachia semine
spinoso C. B. P. 114. Spinachia Foemina I. B.
tom. 2. l. 23. 963.

Eadem semine non spinoso Moris. Hist. 598.

Lapathum hortense, seu Spinachia semine
non spinoso C. B. P. 114. Spinachia semine
non pungente folio majore & rotundiore
I. B. tom. 2. l. 23. 964.

Spinachia sterilis Moris. Hist. 2. 598. Lapa-
thum

thura hortense, seu Spinachia sterilis C. B. P.
 114. Spinachia Mas I. B. tom. 2. l. 23. 963.
Spinachia fragifera Aldin. v. Atriplex.]

SPIRÆA Theophrasti fortè Clusio I. B. tom.
 1. l. 5. 559. Frutex spicatus, foliis Salignis
 ferratus C. B. P. 475.

Split I. B. v. Fumaria.

Spongia lignorum I. B. v. Fungus.

STACHYS major Germanica C. B. P. 236.
S Stachys Fuchsi I. B. tom. 3. l. 18. 319.
 Stachys Betonicæ folio subincano.

Hujus Plantæ seminibus, ex Italia delatis,
 nos donavit olim honestissimus & integer-
 rimus senex, Franciscus Sevenhuyfen, re-
 rum naturalium imprimis verò Plantarum
 scientissimus, quæ, decenter sata, adoleve-
 runt in plantam bicubitalem, radice pallidâ
 digitum crassâ carnosâ, multis fibris capil-
 latâ, caulibus tribus quatuorvè, ramosis
 rectis solidis quadrangulis rigidis, in spi-
 cam desinentibus palmarem, quam undi-
 que cingebant densissimâ verticillatâque
 serie flores dilutè purpurascens, galea bi-
 fidâ erectâ, labio promisso amplo scutellum
 exprimente, & ad collum augustiorem
 utrinquè auriculato, singulis verò subjicie-
 bantur utriculi oblongi quinquifidi, nullis
 vel brevissimis fulciti petiolis, continen-
 tes

tes femina quaterna fusca. Insuper caulibus ac ramis adnata erant folia rugosa, ferrata, pallidè virentia, Betonicæ facie, bina adverso cruciatoquè situ disposita, saporis subacris, odoris debilis, aromatici quidpiam redolentis. Ob spicam strictiorem Stachidi conformem malui Stachidem quàm Calamintham sive Mentastrum, à quo equidem non multùm abluere videtur, appellare.

Stachys palustris foetida C. B. P. 236. Galeopsis angustifolia foetida I. B. tom. 3. app. 854. Stachys spinosa Cretica C. B. P. v. Sideritis.

STAPHYLODENDRON sylvestre & vulgare. Pistacia sylvestris C. B. P. 401. Staphylo-dron I. B. tom. 1. l. 3. 275.

Idem Virginianum trifoliatum. Pistachia Virginiana sylvestris trifolia Moris. Hort. Bles. 295.

STAPHISAGRIA C. B. P. 324. I. B. tom. 3. l. 34. 641. ANN.

STELLA leguminosa Moris. Hist. 2. 81. I. B. tom. 2. l. 17. 350. Ornithopodio affinis hirsuta, fructu stellato C. B. P. 350.

STOEBE major, foliis Cichoraceis mollibus lanuginosis C. B. P. 273. Stoebe Salamanti-cen-

centis prior Clusii, five Jacæa Intybacea I. B. tom. 3. l. 25. 36.

Stoebe major, caliculis non splendentibus C. B. P. 273. Centaurii majoris species tenuifolia I. B. tom. 3. l. 25. 31.

Stoebe major, caliculis argenteis C. B. P. 273.

Scabiosa squamata argentea I. B. tom. 3. l. 25. 30.

STOECHAS purpurea C. B. P. 216. Stoechas

Arabica vulgò dicta I. B. tom. 3. l. 28. 277.

Stoechas cauliculis non foliatis C. B. P. 216.

Stoechas citrina ejusque species I. B. v. Elichrys-
sum.

STRAMONIA, seu Datura, pomo spinoso
rotundo longo flore. Stramonium multis di-

cta, five Pomum spinosum I. B. tom. 3. l.

34. 624. Solanum pomo spinoso rotundo,

longo flore C. B. P. 168. Humatu Hort. Mal.

tom. 2. 47. ANN.

Stramonium, seu Datura major foetida, pomo

spinoso oblongo. Stramonium altera major,

five Tatura quibusdam I. B. tom. 3. l. 34.

624. Solanum foetidum, pomo spinoso ob-

longo C. B. P. 168. ANN.

Stramonium, five Datura ferox, pomo crassiori-

bus & robustioribus aculeis donato. Sola-

num foetidum, pomo aculeis crassioribus &

robustioribus donato Moris. Hort. Bles. 310.

Solanum foetidum, pomo grandiore spino-

fissimo *Cat. Hort. Reg. Par.* 168. Stramonium ferox *Bocc. Plant. Sic.* 50. Datura Cochinchensis spinosissima *Zanon. Hist. Bot.* 76. Datura fructu spinosissimo *Garz. ab Hort. l. I. Arom.* ANN.

Stramonia Ægyptiaca foetida, semine pallido, pomo spinoso rotundo, flore violaceo simplici duplici triplicive. Solanum foetidum, pomo spinoso rotundo, semine pallido *C. B. P.* 168. ANN.

Eadem flore pleno, extrinsecus purpurascen-
te, intrinsecus albente, punctis purpureis
asperso *Catal. Hort. Reg. Par.* 168. Solanum Ægyptium, flore pleno *C. B. P.* 169.
Datura Ægyptia *Vesling. Obs.* 50. ANN.

Stramonia foetida Malabarica, semine pallido,
pomo glabro, flore simplici violaceo. Nilahumatu *Hort. Mal. tom. 2.* 49. ANN.

Eadem flore duplici triplicive. Mudela-Nilahumatu *Hort. Mal. tom. 2.* 51. ANN.

STRATIOTES aquaticus Belgicus *Stapel.* 436.
Aloë palustris *C. B. P.* 286. Aloe sive, Aizoon palustre *I. B. tom. 3. l.* 38. 787.

Strychnodendron *C. B. v.* Solanum.

STYRAX folio mali Cotonei *C. B. P.* 452.
Styrax arbor *I. B. tom. 1. l.* 9. 341.

SUBER latifolium perpetuò virens *C. B. P.* 424. Suber latifolium *I. B. tom. 1. l.* 7. 103.

SUC-

Succisa flore cœruleo & albo C. B. P. v. Scabiosa.

Sultan Zambach Clusii I. B. v. Lilium.

Sumach I. B. v. Rhus.

Surighaghas Zeylanens. v. Althea.

SYMPHYTUM majus, five *Consolida major*
C. B. P. 259. *Symphytum magnum* I. B. tom.
3. l. 33. 593. *Fœmina flore albo* C. B. P.
Var. 259.

Idem Mas, flore purpureo vel purpuro cœruleo C. B. P. Var. 259.

Idem flore variegato.

Symphytum majus tuberosâ radice C. B. P.
259. *Symphytum tuberosum* I. B. tom. 3.
l. 33. 594.

Symphytum minus maculosum, five Pulmonaria latifolia C. B. P. 259. *Pulmonaria Italicorum ad Buglossum accedens* I. B. tom. 3.
l. 33. 595. *Floribus cœruleo rubentibus*
C. B. P. Var. 260.

Idem floribus albis C. B. P. Var. 260.

Symphytum minus non maculosum, five Pulmonaria latifolia, albis punctis carens, floribus cœruleo rubentibus C. B. P. Var. 260.

Idem floribus albis C. B. P. Var. 260.

Symphytum, minus five Pulmonaria angustifolia, rubente cœruleo flore C. B. P. 260.
Pulmonaria rubro flore, foliis Echii I. B.
tom. 3. l. 33. 597.

Symphytum minus, *Borraginis facie* C. B. P.
v. *Buglossum*.

Symphonia Dalechampia I. B. v. *Amaranthus*.

SYRINGHA coerulea C. B. P. 398. *Syringha*
flore coeruleo, five *Lilac* I. B. *tom.* 1. l. 8. 204.
Eadem purpurea. *Syringha* five *Lilac* flore sa-
turatè purpureo *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.*
328.

Eadem lactea, seu floris colore quasi argenteo
C. B. P. *Var.* 398.

Syringha Persica foliis laciniatis. *Ligustrum*
foliis laciniatis C. B. P. 476. Agem *Lilag*
Persarum, inciso folio *Corn.* 188. *Jasminum*
Persicum, foliis laciniatis *Cat. Hort. Edinb.*
Sutherl. 169.

Eadem foliis integris *Cat. Hort. Reg. Par.*
105. Agem *Lilag Persarum*, folio integro
Corn. 190. *Jasminum Persicum* foliis non
laciniatis *Cat. Hort. Edinb. Sutherl.* 169.

Syringha alba, five *Philadelphus Athenæi* C. B.
P. 398.

Syringha Arabica, foliis *Mali Aurantii* C. B. P.
398. *Jasminum* five *Sambach Arabum*, Al-
pino I. B. *tom.* 2. l. 15. 102.

T.

abacum ejusquè species I. B. v. *Ni-*
cotiana.

TAGE-

TAGETES Indicus maximus rectus, flore simplici ex luteo pallido *I. B. tom. 3. l. 26. 100.* Tanacetum Africanum majus, simplici flore *C. B. P. 133.* Cempoalxochitl, Caryophylli Mexicani planta *Hernand. 154. ANN.*

Idem flore maximo multiplicato *I. B. tom. 3. l. 26. 100.* Tanacetum, sive Flos Africanus major, flore pleno *C. B. P. 132.* Cempoalxochitl seu Giuhnaxochitl, Teneycepo-huol, Caryophyllus Mexicanus *I. Hern. 154. ANN.*

Tagetes Indicus medius, flore simplici luteo pallido *I. B. tom. 3. l. 26. 99.* Oquichtli Co-caxochitl, Caryophyllus Mexicanus *I. I. Hern. 155. ANN.*

Idem flore luteo multiplicato. Tlapalte Ca-cayatl, Caryophyllus Mexicanus *I. I. I. Hernand. 155. ANN.*

Tagetes Indicus minor, simplici flore, sive Caryophyllus Indicus, sive Flos Africanus *I. B. tom. 3. l. 26. 98.* Tanacetum Africanum, Flos Africanus minor *C. B. P. 133. ANN.*

Idem multiplicato flore *I. B. tom. 3. l. 26. 99.* Macuilxochitl, seu Maon Caryophyllus Mexicanus *I. V. Hern. 155. ANN.*

Tagetes Indicus minimus, flore sericeâ hirsutie obsito. Tanacetum Africanum sericeâ hirsutie obsitum *C. B. P. 133.* Tlapalcoçatli Coaxo-

Coaxochitl Caryophyllus Mexicanus v.
Hern. 156. ANN.

Tagetes Indicus, flore fistuloso simplici. Tanacetum, five Flos Mexicanus, flore fistuloso simplici C. B. P. 133. ANN.

Idem flore fistuloso duplicato. Tanacetum, five Flos Mexicanus, flore fistuloso pleno C. B. P. 133. ANN.

Tala Zeylanens. v. Senna.

TAMARINDUS. Tamarindi I. B. tom. 1. l. 12. 422. Siliqua Arabica, quæ Tamarindus C. B. P. 403. Balam-pulli seu Maderam-pulli *Hort. Mal. tom.* 1. 39. Tamarindus & Caranda *Bont. l.* 6. 94. Tamarindus *Hern.* 83.

TAMARIX fruticosa, folio crassiore, five Germanica C. B. P. 485. Tamarix Germanica, five minor fruticosa I. B. tom. 1. l. 10. 351. Myrica vulgò.

Tamarix altera folio tenuiore, five Gallica C. B. P. 485. Tamarix major, five arborea Narbonensis I. B. tom. 1. l. 10. 351.

Tamnus Plinii, folio Cyclamini I. B. v. Bryonia.

* TANACETUM vulgare luteum C. B. P. 132. Tanacetum vulgare, flore luteo I. B. tom. 3. l. 26. 131.

Tanacetum foliis crispis C. B. P. 132. Tanacetum crispum, flore luteo I. B. tom. 3. l. 26. 132.

Tana-

LUGDUNO-BATAVUS: 589

Tanacetum montanum inodorum, minore flore
C. B. P. v. Bellis.

Tanacetum inodorum, flore majore C. B. P.
v. Bellis.

Tanacetum minus, odore Camphoræ C. B. P.
v. Millefolium.

Tanacetum Africanum ejusque species C. B. P.
v. Tagetes.

Tarchon I. B. v. Dracunculus.

Tareriaja Brasiliensibus Markgr. v. Sinapi-
strum.

Taxoquamolita I. B. v. Galega.

TA X U S C. B. P. 505. I. B. tom. 1. l. 9.
241.

TELEPHIUM vulgare C. B. P. 287. Anacam-
pseros, vulgò Faba crassa I. B. tom. 3. l.
35. 681.

Telephium purpureum majus C. B. P. 287.
Anacampseros purpurea I. B. tom. 3. l. 35.
682.

Telephium radice Rosam spirante majus.
Rhodia radix C. B. P. 286. I. B. tom. 3. l. 35. 683.
Idem minus. *Rhodia radix minor* Cat Hort.
Reg. Paris. 155.

Telephium latifolium peregrinum C. B. P. 287.
Anacampseros maxima I. B. tom. 3. l. 35. 682.
Idem minus.

*Telephium Lusitanicum hæmatodes maxi-
mum*

mum *Cat. Hort. Reg. Paris. 173.* An *Telephium peregrinum rubrum Moris Hort. Bles. 201.*

Telephium repens, folio deciduo C. B. P. 287. *Anacampseros minor*, rotundiore folio, semper virens I. B. tom. 3. l. 53. 682.

Telephium repens folio non deciduo C. B. P. 287. *Polygonum perenne procumbens*, folio brevior, floribus in capitulum congestis *Moris. Hist. 2. 592.*

Telephium Portulacæ folio *Moris. Hort. Bles. 311.*

Telephium Dioscoridis, seu Scorpioides C. B. P. & I. B. v. *Scorpiodes.*

TEREBINTHUS vulgaris C. B. P. 400. *Terebinthus* I. B. tom. 1. l. 3. 279.

Terra merita Officin. I. B. v. *Curcuma.*

Tertianaria I. B. v. *Scutellaria.*

Tetragonium I. B. v. *Frangula.*

TEUCRIUM C. B. P. 247. *Teucrium* multis I. B. tom. 3. l. 28. 290.

Teucrium peregrinum, folio sinuoso C. B. P. 247. *Teucrium Boeticum & Creticum Clusii* I. B. tom. 3. l. 28. 291.

Teucrium Regium purpureum Mor. Hort. Bles. 311. An *Teucrium Creticum odoratum*, flore purpureo *Cat. Hort. Reg. Paris. 173?*

Teucrium Americanum procumbens Veronicæ aquaticæ foliis subrotundis.

Cum

LUGDUNO-BATAVUS.

591

TEUCRIUM AMERICANUM PROCUMBENS, VERO-
NICÆ AQUATICÆ FOLIIS SUBROTUNDIS.

Cum floribus & seminibus à Teucris vulgaribus parum vel nihil distare videatur hæc exotica planta ; hic locorum opportunè inferi posse existimavimus. Firmatur radice tenui fibrosâ pallidâ, spargente colliculos spithameos quadrangulos, humi stratos, quos per intervalla ambiunt folia bina sibi, adversa subrotunda glabra pingua, in ambitu levissimè denticulata, Veronicæ aquaticæ rotundifoliæ nonnihil similia; Ad horum exortus prodeunt flores, utrinque unus, parvi pallidi labiati vix galeati, labio trifido, galeâ simplici exiguâ vix conspicuâ. Singulis subsidet utriculus quinquifidus, sustinens semina subrotunda fusca quaternaria. An sit annua vel perennis determinare nondum licet. Floruit primum hoc ipso anno ex seminibus Americanis ad Illustrissimum Fagelium missis, cujus munificâ liberalitate in nostrum migravit Hortum.

THALICTRUM Canadense *Cornuti*
186.

Thalictrum majus, filiquâ angulosâ aut striatâ C. B. P. 336. Thalictrum nigrius, caule ex semine striato I. B. tom. 3. l. 30. 486.

Thalictrum majus flavum, staminibus luteis, vel glauco folio C. B. P. 336. Thalictrum speciosissimum glaucum, semine & caule striato I. B. tom. 3. l. 30. 486.

Tha-

Thalictrum pratense angustifolium C. B. P. 337.
I. B. tom. 3. l. 30. 487.

Thalictrum minus C. B. P. 337. Thalictrum
 minus, sive Rutæ pratensis genus minus,
 semine striato *I. B. tom. 3. l. 30. 487.*

Thalictrum minimum foetidissimum C. B. P.
 337. *I. B. tom. 3. l. 30. 388.*

THAPSIA latifolia villosa C. B. P. 148. *Mor-*
ris. Umb. 29. Thapsia prima Clusii latifo-
 lia, flore luteo, semine lato, similis Sefeli
 Peloponensi Lobelii *I. B. tom. 3. l. 27.*
 186.

Thapsia foliis Libanotidis foetidissima C. B. P.
 148. Thapsia quarta Clusii, tuberosa
 vocata, foliis glutinosis, radice nigra fo-
 ris *I. B. tom. 3. l. 27. 186.*

Thapsia Carotæ folio C. B. P. 149. Thapsia mi-
 nor Carotæ effigie *Moris. Umb. 29.* Thapsia
 Carotæ facie *I. B. tom. 3. l. 27. 187.*

THLASPI Alyssum dictum campestre mi-
 nus C. B. P. 291. *Moris. Hist. 2. 291.* Thla-
 spi minus quibusdam, aliis Alysson minus
I. B. tom. 2. l. 27. 928. ANN.

Thlaspi fruticosum spinosum C. B. P. 108.
Moris. Hist. 1. 192. Levcojum spinosum,
 Thlaspi spinosum aliis *I. B. tom. 2. l.*
 22. 931.

P p

Thlaspi

Thlaspi Halimi folio, semper virens.

Formâ & magnitudine à præcedente Thlaspi spinoso fruticoso non multum abludit; Verum cauliculis est herbaceis, spinis omnino destitutis, pallidis, glabris, incumbantibus humi & in aliquot alas divaricatis: Foliis brevioribus incanis splendentibus Halimi de more: Floribus nunc in spicâ nunc in umbellâ dispositis, candidis tetrapetalis, quos excipiunt filiculæ orbiculatæ depressæ, septo intergerino per transversum, hoc est antrorsum & retrorsum, eas in binos loculos dividente, quibus singulis includitur semen unicum orbiculatum depressum rufum acre.

Thlaspi montanum incanum luteum majus, Serpilli folio C. B. P. *Moris. Hist.* 2. 292. Thlaspi luteum I. B. *tom.* 2. l. 22. 928.

Thlaspi incanum, flore albo, capsulis oblongis *Moris. Hist.* 2. 192. Thlaspi fruticosum incanum C. B. P. 108. Thlaspi capsulis sublongis incanum I. B. *tom.* 2. l. 22. 929.

* Thlaspi arvense, filiquis latis C. B. P. 105. *Moris. Hist.* 2. 293. Thlaspi cum filiquis latis I. B. *tom.* 2. l. 22. 923. ANN.

* Thlaspi arvense majus, Vaccariæ folio incano C. B. P. 106. *Moris. Hist.* 2. 294. Thlaspi vulgarius I. B. *tom.* 2. l. 22. 921. ANN.

Thla-

LUGDUNO-BATAVUS.

595

HALAPI HALIMI FOLIO SEMPER VIRENS.

Thlaspi spicatum Persicum perfoliatum maximum, foliis inferioribus tenuiter incisissimis Hypocotyle modo, superioribus à caule Perfoliatæ modo penetratis *Moris. Hist. 2, 294.* Thlaspi verum primum Dioscoridis *Zan. Hist. Bot. 191. ANN.*

Thlaspi umbellatum Creticum, Iberidis folio c. B. P. *Moris. Hist. 2. 295.* Flore purpureo. ANN.

Idem flore albo c. B. P. *Var. 106. ANN.*

Thlaspi umbellatum Monspeliacum, Nasturtii folio c. B. P. 106. *Moris. Hist. 2. 295.*

Thlaspi umbellatum, tenuiter diviso folio, amarum Narbonense *I. B. tom 2. l. 22. 925. ANN.*

Thlaspi fruticosum umbellatum Persicum, foliis Leucoji instar semper virentibus *Moris. Hist. 2. 296.* Thlaspi fruticosum Persicum, foliis Keiri, flore odorato *Zan. Hist. Bot. 196.* Thlaspi semper virens & florens *Dodart. Mem. 115.* Thlaspi latifolium platycarpon, Leucoji foliis *Bocc. Pl. Sic. 51.*

Thlaspi montanum semper virens c. B. P. 106. *Moris. Hist. 2. 297.* Thlaspi semper virentis species candida *I. B. tom. 2. l. 22. 230.*

Thlaspi villosum, capitulis hirsutis c. B. P. 106. *Moris. Hist. 2. 297.* Thlaspi capitulis hirsutis *I. B. tom. 2. l. 22. 922. ANN.*

Thlaspi peregrinum, capsulâ cordata *Moris. Hist.*

Hist. 2. 297. I. B. tom. 2. l. 22. 927. ANN.

Thlaspi biscutatum villosum, flore calcari donato C. B. P. v. Leucojum.

Thlaspi biscutatum asperum Hieracifolium majus & minus C. B. P. v. Leucojum.

Thlaspi angustifolium Fuchsi I. B. v. Nasturtium.

THUYA Theophrasti C. B. P. 488. Arbor Vitæ, five Paradisiaca vulgò dicta, odorata ad Sabinam accedens I. B. tom. 1 l. 9. 286.

Tymbra Græcorum I. B. v. Satureja.

THYMELÆA foliis Lini C. B. P. Thymelæa Monspeliaca I. B. tom. 1. l. 5. 591.

Thymelæa foliis acutis, floribus odoratis purpureis, Cneoron Matthiolo dicta. Thymelææ foliis acutis affinis facie externâ C. B. P. 463. Cneoron Matth. suffrutex I. B. tom. 1. l. 5. 570.

Thymelæa foliis acutis, capitulo Succisæ C. B. P. v. Alypum.

THYMUS vulgaris, folio tenuiore C. B. P. 219. Thymum vulgare rigidius, folio cinereo I. B. tom. 3. l. 28. 263. Foliis candidis, & grave olentibus C. B. P. Var. 335.

Idem foliis virentibus & suavè odoratis C. B. P. Var. 335.

Idem folio variegato *Cat. Hort. Reg. Paris.*
175.

Thymus vulgaris, folio latiore C. B. P. 219.

Thymus durior vulgò.

Thymus capitatus, qui Dioscoridis C. B. P.
219. Thymum Creticum, sive antiquorum
I. B. tom. 3. l. 28. 262.

* **T**HYSSELINUM *Moris. Umbell. 42.* Apium
sylvestre, lacteo succo turgens C. B. P. 153.
Apium sylvestre Dodonæi, Thysselinum
quorundam, planta lacteo succo turgens,
locis humidis proveniens *I. B. tom. 3. l. 27.*
188.

* Thysselinum palustre, foliis Ferulaceis. Se-
feli palustre lactescens C. B. P. 162. *Moris.*
Umbell. 43. Sefeli palustre lactescens acre,
foliis Ferulaceis, flore albo, semine lato
I. B. tom. 3. l. 27. 188.

Tibadi & Tibcadi I. B. v. Hyacinthus.

* **T**ILIA Mas, folio Ulmi C. B. P. 426. Tilia
folio minore *I. B. tom. 1. l. 8. 137.*

* Tilia Fœmina, folio majore C. B. P. 426. Tilia
vulgaris platyphyllos *I. B. tom. 1. l. 8. 133.*

Tinctorius flos I. B. v. Genista.

Tirasta Walu Zeylanensibus. v. Convolvulus.

TITHYMALUS Mauritanicus aphyllus,
angulosus & spinosus, ex quo Euphor-
bium

bium Officinarum. Euphorbium Dodonæi
Lobellii C. B. P. 387.

Nobilissimam hanc plantam Everhardi
Vorstii tempore viguisse in nostro Horto;
nigruente verò hyeme duriore iterum per-
iisse, testatur Bodæus à Stapel in Com-
mentariis ad Theophrastum 1057. Nunc
defectum ejus feliciter explevit Vir Am-
plissimus Dns Herbertus à Beomont, Stir-
pium omnium exoticarum admirator &
æstimator eximius, qui eam propriis sum-
tibus ex Mauritaniâ hûc transferri curavit,
ejusque sobolem nobis benignè concessit.

Tithymalus latifolius, Cataputia dictus. La-
thyris major C. B. P. 293. Lathyris, five
Cataputia minor I. B. tom. 3. App. 880.

Tithymalus Characias rubens peregrinus C.
B. P. 290. Tithymalus Amygdaloides, five
characias I. B. tom. 3. l. 34. 672.

Tithymalus Characias, folio ferrato C. B. P.
290. Tithymalus ferratus Dalechampii I. B.
tom. 3. l. 24. 673.

Tithymalus Amygdaloides five Characias
arborescens, floribus atro-puniceis, major.
Idem floribus flavescentibus minor.

Tithymalus Myrsinites latifolius C. B. P. 290.

Tithymalus Myrsinites I. B. tom. 3. l. 24.
674.

Tithymalus maritimus C. B. P. 290. Tithyma-
lus paralius I. B. tom. 3. l. 34. 677.

Tithymalus palustris fruticosus C. B. P. 292.

Tithymalus magnus multicaulis, five *Efula major* I. B. *tom.* 3. *l.* 34. 671.

* *Tithymalus arvensis latifolius Germanicus* C. B. P. 291. *Tithymalus platyphyllos Fuch-
sii* I. B. *tom.* 3. *l.* 34. 670. *Efula minor*
vulgò.

* *Tithymalus subrotundis foliis majoribus cre-
natis.* *Tithymalus Helioscopius* C. B. P. 291.
Tithymalus helioscopius, five *Solisequus*
I. B. *tom.* 3. *l.* 34. 663. ANN.

* *Tithymalus rotundis foliis non crenatis.* *Pe-
plos*, five *Efula rotunda* C. B. P. 692. I. B.
tom. 3. *l.* 34. 669. ANN.

Tithymalus tuberosâ Pyriformi radice C. B. P.
292. *Apios* I. B. *tom.* 3. *l.* 34. 666.

Tithymalus Tingitanus, *Linariæ foliis*, lunato
flore. An *Tithymalus Linariæ folio*, luna-
to flore *Moresf. Hort. Bles.* 313? ANN.

Tithymalus Ragusinus, flore luteo pentape-
talo.

Perrarum & venustum hoc *Tithymali*
genus, seminibus ex *Ragusâ* missis nobis na-
tum, promit radicem lignosam tenuem
pallidam: Cauliculos dodrantaes ramosos
quasi fruticosos, graciles tamen glabros sub-
rubentes, aliquando exiguis ferrugineis pun-
ctis & tuberculis adspersos; His adstant
folia rara, *Linariæ paria*, sed triplo breviora,
insigni per longitudinem nervo inscripta;

Ra-

LUGDUNO-BATAVUS. 601
THYMALUS RAGUSINUS FLORE LU-
TEO PENTAPETALO.

Ramorum cimis insident flores exigui, quinque orbiculatis flavescentibus petalis totidemquè concoloribus staminulis, singulis duobus apicibus donatis, constructi, è quorum medio prominet vasculum parvum trigonum tricapsulare, ceu arenularum minutissimarum congestu, aut verrucarum instar asperatum, tribus è summo exeuntibus staminulis bifidis; In singulis capsulis continetur semen rotundum fuscum. Exactam postulat culturam, imprimis hyeme, cujus rigidiores injurias minimè sustinet. In nostrate solo cœloquè semina rarò perficiens per ramulos se propagari patitur.

*Tithymalus foliis Pini, fortè Dioscoridis Pityusa C. B. P. 222. Tithymalo Cyparissiae similis, Pityusa multis I. B. tom. 3. l. 34. 665.

*Tithymalus exiguus erectus. Tithymalus exiguus, sive Esula exigua C. B. P. 291. Tithymalus minimus angustifolius annuus I. B. tom. 3. l. 34. 664. ANN.

*Tithymalus exiguus procumbens, Chamæfyce dictus. Chamæfyce C. B. P. 293. I. B. tom. 3. l. 34. 667. ANN.

Tithymalus Lentifolius minimus. Anthyllis maritima Lentifolia C. B. P. 282. Anthyllis Lentifolia, Peplios effigie, maritima I. B. tom. 3. l. 29. 374.

Tlaolli Hern. v. Frumentum.

Tlapalcoçatli Hern. v. Tagetes.

Tlapalte Cacayatl Hern. v. Tagetes.

Tomatl Hern. v. Solanum.

Topiaria Plinio l. B. v. Buglossum.

TORDILIUM maximum, Sphondylii semine aculeato *Moris. Umbell. 40.* Tordilium majus vulgare, feminibus limbo quasi lævi *Moris. Umbell. 66.* Caucalis maxima, Sphondylii semine aculeato *C. B. P. 152.* An Sefeli Creticum majus *C. B. P. 161?* Caucalis major, semine minùs pulchro hirsuto *l. B. tom. 3. l. 27. 85.* An Caucalis major Clusio *l. B. tom. 3. l. 27. 85?*

Tordilium minus, limbo granulato Syriacum *Moris. Umbell. 37. & 40.* Gingidium foliis Pastinacæ latifoliæ *C. B. P. 151.* Caucalis Syriaca cum maximo semine *l. B. tom. 3. l. 27. 86.*

Tormentilla l. B. seu sylvestris C. B. P. v. Pentaphyllum.

Tormentilla Alpina, folio sericeo C. B. P. v. Alchynilla.

Trachelium minus Americanum, flore patulo cœruleo & albo Dodart. v. Campanula.

Trachelium hirsutum altissimum asperius, foliis angustis, floribus parvis l. B. v. Campanula.

TRAGACANTHA *C. B. P. 338.* Tragacantha Massiliensis, foliis incanis perseverantibus
seu

feu non deciduis, flore albo *Moris. Hist. 2.*
 113. *Tragacantha Massiliensibus I. B. tom.*
1. l. 11. 407.

Tragium I. B. v. Hypericum.

* **T**RAGOPOGON pratenſe luteum majus C.
B. P. 274. Tragopogon flore luteo I. B. tom.
2. l. 24. 1058. ANN.

Tragopogon purpuro-cœruleum, Porri folio
C. B. P. 274. Tragopogon flore purpureo
I. B. tom. 2. l. 24. 1058. ANN.

Tragopogon laciniatum luteum C. B. P. ſeu fo-
lio laciniato Monſpeliense, flore luteo I. B.
v. Scorzonera.

Tragoriganum Alpin. v. Satureja.

Tragus spinosus Matth. v. Kali.

Trasi I. B. v. Cyperus.

TRIBULUS terreſtris, Ciceris folio, ſemi-
 num integumento aculeato *Moris. Hist. 2.*
 102. *Tribulus terreſtris, Ciceris folio, fru-*
ctu aculeato C. B. P. 350. Tribulus terreſtris
I. B. tom. 2. l. 17. 352. ANN.

* *Tribulus aquaticus C. B. P. 194. I. B. tom. 3. l.*
38. 775.

* **T**RICHOMANES, ſive Polytrichon Officina-
 rum C. B. P. 356. *Trichomanes, ſive Po-*
lytrichum I. B. tom. 3. l. 37. 754.

TRI-

TRIFOLIATA paludosa *Moris. Hist. 2. 149.*
 in halluc. Trifolium palustre *C. B. P. 327.*
 Trifolium palustre *I. B. tom. 2. l. 17. 389.*

TRIFOLIUM bituminosum, seu Trifolium
 cœruleum, aut violaceum, bitumen redo-
 lens *Moris. Hist. 2. 136.* Trifolium bitumen
 redolens *C. B. P. 327.* Trifolium Asphalti-
 tes, five bituminosum odoratum & non
 odoratum *I. B. tom. 2. l. 17. 366.*

Trifolium pratense album vulgare odoratum
Moris. Hist. 2. 137. Trifolium pratense al-
 bum *C. B. P. 327.* Trifolium pratense, flo-
 re albo minus, & Fœmina, glabrum *I. B.*
tom. 2. l. 17. 380.

Idem amplioribus foliis & floribus, non odo-
 ratum.

Trifolium phœum fuscum, luxurians quater-
 nis quinis & senis foliis *Moris. Hist. 2. 135.*
 Quadrifolium hortense album *C. B. P. 327.*
 Trifoliis affinis, Quadrifolium phœum Lo-
 belii *I. B. tom. 2. l. 17. 380.*

Trifolium pratense purpureum vulgare *Moris.*
Hist. 2. 138. Trifolium pratense purpu-
 reum *C. B. P. 327.* Trifolium purpureum
 vulgare *I. B. tom. 2. l. 17. 374.*

Trifolium album tricoccon subterraneum
 Gastonium reticulatum *Moris. Hist. 2. 138.*

Trifolium purpureum montanum majus, spi-
 cā oblongā *Moris. Hist. 2. 139.* Trifolium
 spicā

spicâ oblongâ rubrâ C. B. P. 328. Trifolium majus tertium purpureum Clusii *I. B. tom. 2. l. 17. 375.*

Trifolium purpureum montanum pinnatum Lagopoides, spicâ longissimâ *Moris. Hist. 2. 140.* Trifolium montanum, spicâ longissimâ rubente C. B. P. 328. Trifolium purpureum majus, folio & spicâ longiore *I. B. tom. 2. l. 17. 375.*

Trifolium purpureum Lagopoides hirsutum annum angustifolium spicâ dilute rubente *Moris. Hist. 2. 140.* Trifolium angustifolium Hispanicum, sive Lagopus angustifolius, flore dilutè rubente *I. B. tom. 2. l. 17. 377.* Trifolium Hispanicum angustifolium, spicâ dilutè rubente C. B. P. 328. ANN.

Idem rotundifolium *Moris. Hist. 2. 140.* ANN.

Trifolium Lagopoides hirsutum angustifolium Hispanicum, flore ruberrimo *Moris. Hist. 2. 141.* ANN.

* Trifolium Lagopoides purpureum arvense humile annum, seu Lagopus minimus vulgaris *Moris. Hist. 2. 141.* Trifolium arvense humile spicatum, sive Lagopus C. B. P. 328. Lagopus Trifolius quorundam *I. B. tom. 2. l. 17. 379.* ANN.

* Idem latioribus foliis C. B. P. *Var. 328.* ANN.
Trifolium Alpinum, flore magno, radice dulci C. B. P. 328. Trifolium Glyzyrrhyzites Parkinsonii *Moris. Hist. 2. 146.*

TRIFOLIUM agrarium luteum, capitulo
Lupuli majus *Moris. Hist. 2. 142.* Trifo-
lium pratense luteum, capitulo Lupuli, vel
agrarium C. B. P. 328. Trifolium pratense
luteum Fœmina, flore pulchriore, sive Lu-
pulino I. B. tom. 2. l. 17. 381. ANN.

Trifolium purpureum pratense folliculatum
C. B. P. 329. *Moris. Hist. 2. 144.* Trifolium
folliculaceum, sive vesicarium minus pur-
pureum I. B. tom. 2. l. 17. 384. ANN.

Trifolium Fragiferum Friscum, folio corda-
to, flore rubro *Moris. Hist. 2. 144.* Trifo-
lium Fragiferum Friscum C. B. P. 144.

Trifoliis affinis Anonis ejusquè species I. B. v.
Anonis.

*Trifolium album angustifolium, floribus velut
in capitulis dispositis* C. B. P. v. Lotus.

Trifolium album rectum hirsutum valdè I. B.
v. Lotus.

Trifolium rectum Monspessulanum I. B. v.
Lotus.

Trifolium hæmorrhiodale majus Parkins. v.
Lotus.

Trifolium pratense luteum, capitulo breviorè
C. B. P. v. Melilotus.

*Trifolium pratense luteum Mas, flore minore,
semine multo* I. B. v. Melilotus.

Trifolium odoratum ejusquè species I. B. v. Me-
lilotus.

Tri-

Trifolium cochleatum & echinatum ejusque species C. B. P. v. Medica.

Trifolium sylvestre siliquâ cornutâ ejusque species C. B. P. v. Medica.

Trifolium siliquâ falcatâ C. B. P. v. Medica.

Trifolium Halicacabum sive vesicarium I. B. v. Anthyllis.

Trifolium acetosum ejusque species C. B. P. & I. B. v. Oxys.

Trifolium hepaticum ejusque species C. B. P. & I. B. Hepatica nobiles.

Trifolium palustre C. B. P. v. Trifoliata paludosa.

Trifolium Lusitanicum bivalve, flore rubro Moris. v. Sinapisrum.

Trifolium Lusitanicum corniculatum, flore rubro Park. v. Sinapisrum.

* **T**RIPOLIUM majus cœruleum C. B. P. 267.
Tripolium majus I. B. tom. 2. l. 24. 1064.

* Idem flore albo Breyn. Prodr. 52. Comelin. Cat. 110.

Tripolium altissimum Americanum, caulibus viridantibus. Aster latifolius, Tripolii flore Mem. Dodart.

Idem caulibus rubentibus.

Tripolium Anguillaræ I. B. v. Leucojum.

TRITICUM hybernum, aristis carens C. B. P. 21. Triticum vulgare, glumas tritu-
rando

rando deponens *I. B. tom. 2. l. 18. 407.*
Triticum æstivum C. B. P. 21. Zea verna I. B.
tom. 2. l. 18. 413.
Triticum spicâ multiplici C. B. P. 21. Triticum
cum multiplici spicâ, glumas facile depo-
nens I. B. tom. 2. l. 18. 408.
Triticum aristis longioribus, spicâ albâ C. B. P. 21
Triticum Polonicum.
Triticum Peruvianum album longum I. B. v.
Frumentum.
Triticum vaccinium I. B. v. Melampyrum.
Trollius flos I. B. v. Helleborus.
Tuberaria major Myconii I. B. v. Cistus.

TULIPA præcox lutea *C. B. P. 57. Moris.*
Hist. 2. 398. Tulipa præcox flava I. B. tom.
2. l. 9. 666.
Tulipa præcox rubra C. B. P. 57. Moris. Hist. 2.
398. I. B. tom. 2. l. 19. 666.
Tulipa præcox purpurea C. B. P. 57. Moris. Hist.
2. 398. I. B. tom. 2. l. 19. 667.
Tulipa præcox alba C. B. P. 57. Moris. Hist. 2.
398. I. B. tom. 2. l. 19. 666.
Tulipa ferotina lutea C. B. P. 60. Moris. Hist. 2.
399. Tulipa ferotina, flava cui quatuor fo-
lia in caule I. B. tom. 2. l. 19. 671.
Tulipa ferotina alba C. B. P. 60. Moris. Hist.
2. 399.
Tulipa ferotina rubra C. B. P. 60. Moris. Hist. 2.
399. I. B. tom. 2. l. 19. 671.

Tulipa ferotina coccinea Moris. Hist. 2. 399.

Tulipa coccinea holosericea I. B. tom. 2. l. 19. 671.

Tulipa ferotina, viridis coloris Eyst. Moris. Hist. 2. 399. Tulipa ferotina, Brassicæ floridæ similis, vel Tulipa viridis prima C. B. P. 61.

Tulipa dubia major C. B. P. 61. Tulipa dubia I. B. tom. 2. l. 19. 671.

Tulipa dubia major altera C. B. P. 61. I. B. tom. 2. l. 19. 671.

*Tuliparum præcocium ferotinarum & dubiarum pene innumeræ varietates, pulcherri-
mis florum coloribus jucundè ridentes.*

Tulipa ferotina ramosa major C. B. P. 61. Moris. Hist. 2. 399. Flore simplici, rubro, flavo, vario.

Tulipa ferotina ramosa major, flore pleno, ex rubro flavo & viridi variegato.

Tulipa miniata, flore pleno Eystett. Moris. Hist. 2. 399. Tulipa Pœonia vulgò.

Tulipa ferotina ramosa maxima, flore simplici fimbriato flavo-vario. Psittacus vulgò.

Eadem flore pleno.

Hujus bulbus emittit caulem pede altio-
rem robustum incano madore pubescen-
tem, & in tres quatuor pluresve ramos di-
visum, singulis insidet flos amplus in viridi
rubro aureoque eleganter variegatus, &
multiplicibus petalis modo planis modo fim-

LUGDUNO-BATAVUS.

611

IPA SEROTINA RAMOSA MAXIMA, FLORE
PLENO FLAVO-VARIO.

fimbriatis, Rosæ vel Pœoniæ in modum dispositis, refertus. Huic æstate ferventior succedit aliquando capitulum oblongum trigonum, cœteris Tulipis majus & robustius, quod dehiscens in tribus loculis se-
 minum seriem ostendit more congenitorum. Cauli verò ac ramis adstant, folia lata firma erectiora, qualia fert Tulipa serotina πολυκλαδής Clusii, cum quâ hæc Planta foliis exceptis floribus omnino convenit.

Tulipa minor lutea Italica πολύκλον Moris Hist. 2. 400. Tulipa minor lutea Italica C. B. P. 63.

Tulipa Persica major, flore rubro, foliis longissimis.

Tulipa Persica minor, foliis angustissimis, variegato flore. Tulipa variegata Persica C. B. P. 64. Moris. Hist. 2. 399.

Tulipa pumilio latifolia, flore extus rubro intus flavo. An Tulipanana, sive Pumilio flore luteo Camerarii C. B. P. 63?

Tulipa Capensis Stapel. v. Hæmanthus.

Tulipifera Arbor Virginiana.

Cui Stirpium familiæ inferenda sit hæc Arbor, nunc determinare non audeo. Nec dum enim flores nec fructus conspiciere licuit. Equidem nonnullis Alnum aliis Acer, quibusdam etiam Populum vocari subinde audio; Quò verò fundamen-

LUGDUNO-BATAVUS.

613

LIPIFERA ARBOR VIRGINIANA.

to non audio. Flores formosissimos Tulipis similes proferre, asserunt omnes ex Virginia reduces, de fructibus autem minus solliciti nihil certi affirmant. A duobus ab hinc annis mittebat ad me Jacobus Bobartus Horti Oxoniensis p.t. Præses inter multa alia curiosissima ex Virginia delata nonnulla semina, nomine Arboris Tulipiferae, quæ in quantum conjicere poteram, videbantur semina cujusdam Arboris coniferæ. Erant enim ex duabus membranaceis longis rigidisque alis constructa, è quorum medio sinu protuberabat futuri germinis primordium formâ oblongæ nukulæ, veluti in feminibus Cedri; sed quoniam illa semina decenter sata non prodierunt, nec ab eo, qui laudato Dno Bobarto donaverat, propria manu erant collecta, hæremus, an fuerint legitima Arboris nostræ Tulipiferae semina. Cæterum quam hoc titulo in Horto colimus, Arbor est humanâ altitudine superior, trunco pollicem crasso, cortice lævi fusco, aliquot cineraceis maculis asperato, odoris ignavi aromatici, nonnihil ad Sassafras accedentis, materie pallidâ molli, medullâ paucâ ruffâ. Ramos spargit inæquales ordine inconcinno, ad quorum nodos è digitalibus pediculis prodeunt folia instar Aceris minoris trilobata nitida, quasi forfice essent circumsecta, palmam

am.

ampla, supernè viridia infernè incana, aliquotquè nervis ex dorso crassiori prodeuntibus inscripta, superiori & intermedio lobo productiori frontato, binis lateralis in parvum obtusum mucronem abeuntibus. Singulos verò ramos & folia excludit parva oblonga theca in duas foliaceas pinnas dehiscens, quæ ramis & foliis adolescentibus exarescunt & decidunt. Consimilem arborem Juglandis nucis amplitudine observavi anno CIO IO CLXXXIII in splendidissimo prædio Nobilissimi Dni Nortfolckii ad quinque vel sex millia passuum distante Londino, quæ etiam si aliquot viginti annos ibidem esset exulta, flores tamen fructusquè nondum ediderat.

Turbith Officinis. v. *Convolvulus.*

Turpethum repens, foliis Althææ, vel Indicum
C. B. P. v. *Convolvulus.*

Turritis vulgatiore I. B. v. *Leucojum.*

Turritis secunda Clusii I. B. v. *Brassica.*

Tusai I. B. v. *Lilium.*

TUSSILAGO vulgaris C. B. P. 197. *Tussilago* I. B. tom. 3. l. 32. 563.

Tuwakaruwila Zeylanensium. v. *Cucumis.*

TYPHA palustris major C. B. P. 20. I. B. tom. 2. l. 18. 539.

- *Typha palustris, clavâ gracili C. B. P. 20. Typha palustris media I. B. tom. 2. l. 18. 540.
 *Typha palustris minor C. B. P. 20. Typha minor I. B. tom. 2. l. 18. 540.

V.

accaria I. B. v. Lychnis.

- V**ALERIANA major hortensis Moris. Umbell. 52. Valeriana hortensis: Phu Olu-fatri folio C. B. P. 164. Valeriana major, odoratâ radice I. B. tom. 3. l. 27. 209.
 *Valeriana major sylvestris, foliis latioribus Moris. Umbell. 50. Valeriana sylvestris major C. B. P. 164. Valeriana sylvestris magna aquatica I. B. tom. 3. l. 27. 210.
 *Eadem foliis angustioribus Moris. Umbell. 50. Valeriana sylvestris major montana C. B. P. 164.
 Valeriana minor annua, æstiva Moris. Umbell. 50. Valeriana foliis Calcitrappæ C. B. P. 164. ANN.
 *Valeriana minor perennis palustris Mor. Umb. 50. Valeriana palustris minor C. B. P. 164. Valeriana minor pratensis vel aquatica I. B. tom. 3. l. 27. 211.
 Valeriana marina latifolia, seu major rubra Moris. Umb. 50. Valeriana rubra C. B. P. 165. Valeriana latifolia rubra I. B. tom. 3. l. 27. 211.
 Eadem alba Moris. Umbell. 50.

Va-

Valeriana peregrina seu Indica I. B. v. *Valerianella*.

Valeriana semine stellato. v. *Valerianella*.

Valeriana campestris inodora major C. B. P. v. *Valerianella*.

Valeriana Canadensis, flore albo Cornut. v. *Eupatorium*.

VALERIANA Græca violacea *Moris. Umbell. 55.* *Valeriana cœrulea* C. B. P. 164. *Valeriana Græca quorundam, flore cœruleo* I. B. tom. 3. l. 27. 212.

Eadem alba *Moris. Umbell. 55.* C. B. P. Var. 164. *Valeriana Græca quorundam, flore albo* I. B. tom. 3. l. 27. 252.

Eadem ex albo & cœruleo variegata.

VALERIANELLA Cornucopioioides rubra, seu *Indica Clusii Moris. Umbell. 53.* *Valeriana peregrina seu Indica* I. B. tom. 3. l. 27. 212.

Valerianella semine Scabiosæ major, Lusitanica Moris. Umbell. 53. *Valerianella semine stellato* C. B. P. 165.

Valerianella arvensis præcox humilior, semine depresso Moris. Umbell. 53. *Valeriana campestris inodora major* C. B. P. 165. *Locusta herba* I. B. tom. 3. l. 28. 325. *Lactuca agnina vulgò. Foliis integris.*

Eadem foliis dissectis. Locusta altera foliis
ferratis I. B. tom. 3. l. 28. 324.

Verbasculum pratense Alpinum & hortense
C. B. P. & *Moris. eorumque species.* v. *Pri-*
mula Veris.

Verbasculum Cyanoides C. B. P. v. *Cyanus.*

* **V**ERBASCUM foliis incanis, Mas latifo-
lium, floribus luteis arctè caulibus adhæ-
rentibus, sine foliis angustis inter flores
emanantibus *Moris. Hist. 2. 484.* Verbasculum
Mas latifolium luteum C. B. P. 239. Verba-
scum vulgare, flore luteo magno, folio
maximo I. B. tom. 3. App. 871. ANN.

Verbasculum foliis incanis maximum odo-
ratum Meridionalium, floribus luteis ar-
ctè caulibus adhærentibus, & foliis mul-
tis angustis inter flores emanantibus *Mo-*
ris. Hist. 2. 485. Verbasculum Fœmina, flo-
re luteo magno C. B. P. 239. Verbasculum
maximum Meridionalium odoratum lu-
teum I. B. tom. 3. App. 871. ANN.

Verbasculum foliis viridibus perenne, floribus
luteis racema-tim provenientibus, stami-
nulis purpurascentibus *Moris. Hist. 2. 486.*
Verbasculum nigrum, flore ex luteo purpu-
rascente C. B. P. 240. Verbasculum nigrum,
flore parvo apicibus purpureis I. B. tom. 3.
App. 873.

Idem annuum floribus luteis. Verbasculum ni-
grum

grum Dioscoridis *Lobel.* 664.

Idem annum floribus albis. An Blattaria flore albo *Lobel.* 664?

Verbascum humile Alpinum villosum Borraginis flore & folio. Sanicula Alpina, foliis Borraginis villosa C. B. P. 234. *Moris.* Hist. 2 558.

Verbascum latis *Salviæ foliis* C. B. P. v. *Salvia* in App.

Verbascum sylvestre *Salvisolium* exoticum, folio rotundiore I. B. v. *Salvia* in App.

Verbascum acuto *Salviæ folio* C. B. P. v. *Lychnis.*

Verbascum Lychnites *Syriacum incanum*, summitate floris *Hierosolymitani* I. B. v. *Lychnis.*

* **V**ERBENA communis, flore coeruleo C. B. P. 269. *Verbena vulgaris* I. B. tom. 3. l. 30. 443.

Verbena tenuifolia C. B. P. 269. *Verbenaca supina* I. B. tom. 3. l. 30. 444.

Verbena peregrina, foliis *Urticæ* *Mem. Dordart.* 125. *Verbena Urticæ folio* *Canadensis* *Cat. Hort. Reg. Paris.* 183. *Zanon. Hist. Bot.* 203.

Verbesina flore minus pulchro, elatior ac magis frequens I. B. v. *Chrysanthemum.*

Verbesina pulchriore flore luteo I. B. v. *Chrysanthemum.*

Vermicularis marina arborescens I. B. v. *Kali.*

VERO-

VERONICA spicata major recta coerulea
Moris. Hist. 317. Lyfimachia spicata coe-
 rulea C. B. P. 246. Veronica spicata recta,
 profundè ferrata, quam Lyfimachiam coe-
 ruleam quidam vocant *I. B. tom. 3. l. 28.*
 284.

Veronica major latifolia erecta *Moris. Hist. 2.*
 317. Veronica spicata latifolia C. B. P. 246.
 Veronica major latifolia, foliis splendenti-
 bus & non splendentibus *I. B. tom. 3. l. 28.*
 283.

Veronica angustifolia recta minor vulgaris
Moris. Hist. 2. 318. Veronica spicata angu-
 stifolia C. B. P. Veronica major angustifo-
 lia, caulibus viridibus *I. B. tom. 3. l. 28. 284.*

Veronica spicata, flore purpureo *Moris. Hort.*
Bles. 321.

* Veronica Mas supina vulgaris, foliis ferratis
Moris. Hist. 2. 318. Veronica Mas supina &
 vulgatissima C. B. P. 246. Veronica vulga-
 tior, folio rotundiore *I. B. tom. 3. l. 38. 274.*

Veronica pratensis Serpillifolia C. B. P. 247.
Moris. Hist. 2. 319. Veronica Fœmina qui-
 busdam, aliis Betonica Pauli Serpillifolia
I. B. tom. 3. l. 28. 285.

Veronica major frutescens altera *Moris. Hist.*
 2. 319. Chamædrys spuria major altera
 frutescens C. B. P. 319. Chamædrys spuria
 latifolia *I. B. tom. 3. l. 28. 286.*

Veronica supina, facie Teucris pratensis *Mo-*
ris.

ris. Hist. 2. 319. Chamædryas spuria major angustifolia C. B. P. 249. Chamædryas spuria angustifolia I. B. tom. 3. l. 28. 285.

* *Veronica minor, foliis imis rotundioribus Moris. Hist. 2. 320. Chamædryas spuria minor rotundifolia C. B. P. 249. Chamædryas spuria latifolia I. B. tom. 3. l. 28. 286. Flore coeruleo.*

Eadem flore albo.

Veronica minor virgulosa, seu multicaulis Pannonica Moris. Hist. 2. 320. Chamædryas spuria minor latifolia C. B. P. 249. Chamædryas falsa species. Teucrium 2. aut 5. Clusii I. B. tom. 3. l. 28. 287.

* *Veronica Hederulæ folio Moris. Hist. 2. 322. Alsine Hederulæ folio C. B. P. 250. Alsines genus Fuchsis, folio Hederulæ hirsuto I. B. tom. 3. l. 29. 368. ANN.*

* *Veronica flosculis cauliculis adhærentibus Moris. Hist. 2. 322. Alsine Veronicæ foliis, flosculis caulibus adhærentibus C. B. P. 250. Alsine ferrato folio hirsutiori, floribus & loculis cauliculis adhærentibus I. B. tom. 3. l. 19. 367. ANN.*

* *Veronica flosculis oblongis pediculis insidentibus, Chamædryos folio Moris. Hist. 2. 322. Alsine Chamædryfolia, flosculis oblongis pediculis insidentibus C. B. P. 250. Alsine ferrato folio glabro I. B. tom. 3. l. 29. 367. Foliis conjugatis. ANN.*

*Ea-

- * Eadem foliis alternis. ANN.
- * Veronica cœrulea triphyllos, nunc pentaphyllos, seu trifida & quinquifida *Morif. Hist. 2. 323.* Alsine triphyllos cœrulea C. B. P. 250. Alsine folio profundè secto, flore purpureo, sive violaceo I. B. *tom. 3. l. 28. 367.* ANN.
- * Veronica aquatica major, folio subrotundo C. B. P. 252. Anagallis aquatica, folio rotundiore major I. B. *tom. 3. l. 38. 791.*
- * Eadem minor. Anagallis aquatica minor, folio subrotundo C. B. P. 252. Anagallis aquatica, flore purpurascente, folio oblongo minor I. B. *tom. 3. l. 38. 791.*
- * Veronica aquatica major, folio oblongo *Morif. Hist. 2. 323.* Anagallis aquatica major, folio oblongo C. B. P. 252. Anagallis aquatica, flore cœruleo, folio oblongo I. B. *tom. 3. l. 38. 791.*
- * Veronica aquatica, folio subrotundo non crenato *Morif. Hist. 2. 323.* Anagallis aquatica minor, folio rotundo non crenato C. B. P. 252. Samolus Valerandi I. B. *tom. 3. l. 38. 791.*
- * Veronica aquatica angustifolia minor Polygoni instar *Morif. Hist. 2. 323.* Anagallis aquatica angustifolia C. B. P. 252. Anagallis aquatica angustifolia I. B. *tom. 3. l. 38. 791.*

VIBURNUM Math. C. B. P. 316. Lantana
vulgò, aliis Viburnum *I. B. tom. 1. l. 5. 557.*

VICIA perennis multiflora spicata cœru-
lea sepiaria *Moris. Hist. 2. 61.* Vicia mul-
tiflora C. B. P. 61. Vicia multiflora perennis
nemorensis, five dumetorum *I. B. tom. 2.
l. 17. 314.*

Vicia sylvatica multiflora maxima *P. B. 7.
Raj. Catal. 304.*

Vicia perennis maxima dumetorum, flore
obscurè rubente *Moris. Hist. 2. 61.* Vicia ma-
xima dumetorum C. B. P. 345. Vicia sepium
perennis *I. B. tom. 2. l. 17. 313.*

Vicia multiflora Cassubica frutescens, Lentis
filiquâ *Breyn. Prodr. 52.*

Vicia Narbonensis maxima, fructu rotundo
atro, foliis ferratis *Moris. Hist. 2. 61.* Faba
sylvestris, fructu rotundo atro C. B. P. 338.
ANN.

Eadem foliis integris *Moris. Hist. 2. 61.* ANN.

Vicia Benghalensis hirsuta & incana, filiquis
Pisi. ANN.

Ob elegantem florum purpuram inter
hortenses ornatus recepta quoque est exo-
tica hæc Vicia, constans radice fibrosâ albâ,
cauliculis bicubitalibus aut tricubitalibus
ramosis viticulosis angularibus striatis, è
quorum geniculis prodit costa in tortilem
capreolum desinens, cui à dextris & fini-
stris

stris adhærent folia cœteris Viciis longiora, subincana, parte aversâ modicè pilosa. Ad costarum sinus oritur pediculus digitalis, sustinens aliquot flores papilionaceos oblongos puniceos, extremis oris nigriori purpurâ splendentibus. Hos excipiunt filiquæ, Pisifimiles, ast breviores & compressæ undique sericeis incanis pilis obductæ, continentes semina subrotunda nigro-fusca granis Piperis paulo minora. Passim provenit intractu Benghalensi, unde in Hortum transvecta est.

Vicia flore luteo-pallido, filiquis hirsutis crassius brevibus erectis *Morif. Hist. 2. 62. ANN.*

Eadem filiquis propendentibus *Morif. Hist. 2. 62. descr. ANN.*

Vicia major vulgaris sativa *Morif. Hist. 2. 62.*

Vicia sativa vulgaris, semine nigro C. B. P.

344. Vicia vulgaris sativa I. B. tom. 9. l. 17. 310. ANN.

*Vicia sylvestris, semine nigro & variegato, folio acutiore *Morif. Hist. 2. 63.* Vicia vulgaris, acutiore folio, semine parvo nigro C. B. P. 345. An Vicia semine rotundo nigro? & Vicia vulgaris sylvestris, semine parvo & nigro frugum I. B. tom. 2. l. 17. 312. ANN.

*Vicia sepium, folio rotundiore acuto C. B. P. 345. *Morif. Hist. 2. 63. ANN.*

*Vicia

Vicia BENGHALENSIS HIRSUTA ET INCANA,
SILIQVIS PISI.

* *Vicia multiflora spicata coerulea annua minor procumbens* *Moris. Hist. 2. 63. descr.*

* *Vicia minima, radice granulosa* *Breyn. Cat. Hort. Amstel. Comelyn. Catal. 113.*

Vicia minor segetum cum filiquis pluribus hirsutis *C. B. P. 345. Moris. Hist. 2. 63. Vicia parva, sive Cracca minor cum multis filiquis hirsutis* *I. B. tom. 2. l. 17. 315.*

Vicia minor segetum cum filiquis plurimis glabris *Moris. Hist. 2. 345. Vicia segetum, singularibus filiquis glabris* *C. B. P. 345.*

Viciae sive Craccae minimae species cum filiquis glabris *I. B. tom. 2. l. 17. 315.*

Vicia sylvestris lutea, foliis Convolvuli minoris *C. B. P. v. Lathyrus.*

Vicia latâ siliquâ, flore luteo *I. B. v. Lathyrus.*

Vicia Sesamacea Apula Columnae. *v. Astragalus.*

Viciae similis, supra infraque terram fructum edens *C. B. P. v. Lathyrus.*

Victorialis *Mas Tab. v. Allium.*

Vincetoxicum cum multis floribus albicantibus *I. B. v. Asclepias.*

* **V**IOLA Martia purpurea, flore simplici odoro *C. B. P. 199. Moris. Hist. 2. 474.*

Viola Martia purpurea *I. B. tom. 3. l. 32. 542.*

Viola Martia alba *C. B. P. 199. Viola Martia, flore albo odorato* *I. B. 543.*

Viola Martia multiplici flore *C. B. P. Viola Martia purpurea flore multiplicato majore* *I. B. tom. 3. l. 32. 542.*

Eadem multiplici flore candido *C. B. P. Var.* 199.

Eadem multiplici flore cinereo *Catal. Hort. Reg. Paris.* 185. *Sutherl. Cat. Edinb.* 357.

Viola Martia inodora sylvestris C. B. P. 199. *Moris. Hist.* 2. 474. *Viola cœrulea Martia inodora sylvatica, in cacumine semen ferens I. B. tom.* 3. l. 32. 543.

Viola Martia major hirsuta inodora Moris. Hist. 2. 475.

Viola Alpina rotundifolia lutea C. B. P. 299.

Mor. Hist. 2. 475. *Viola Martia lutea I. B. tom.* 3. l. 32. 544. Foliis & floribus minoribus.

Eadem foliis & floribus majoribus.

Viola Martia arborescens purpurea C. B. P.

199. *Viola erecta flore cœruleo Moris. Hist.*

2. 475. *Jacæa tricolor surrectis cauliculis quibusdam arborea dicta I. B. tom.* 3. l. 32. 547.

Eadem flore albo *C. B. P. Var.* 199. *Viola ere-*

cta flore albo Moris. Hist. 2. 475.

Viola tricolor erecta, An Jovis flos Theophrasti C. B. P. 199? *Moris. Hist.* 476. ANN.

Viola montana tricolor odoratissima C. B. P.

199. *Jacæa tricoloris, sive Floris trientalis genus, flore luteo & purpureo magno, repens non annuum I. B. tom.* 3. l. 32. 548. ANN.

Viola tricolor hortensis repens C. B. P. 199.

Moris. Hist. 2. 476. *Jacæa tricolor, sive Trinitatis flos I. B. tom.* 3. l. 32. 547. Flore minore violaceo puniceo & flavo. ANN.

Qq 2

*Ea-

Er

* Eadem flore albo & luteo C.B.P. *Var.* 199. ANN.

* Eadem flore cum pallidè coeruleo purpureo & luteo C. B. P. *Var.* 200. ANN.

* Eadem flore Violaceo holoserico purpureo & aureo. ANN.

Viola tricolor hortensis repes, fl. magno duplo majore, coloris unius, nigræ purpuræ & instar holoserici nitentis C.B.P. *Var.* 200. ANN.

Eadem flore pallido C. B. P. *Var.* 200. ANN.

Eadem flore ex aureo & pallido. ANN.

* Viola bicolor arvensis C. B. P. 200. *Morif. Hist.* 2. 476. Jacæa bicolor frugum & hortorum vitium I. B. *tom.* 3. l. 32. 548. ANN.

VIOLA Indica scandens Nasturtii sapore & odore, flore flavo. Acriviola *Frid. Cas. Tab.* 935. Nasturtium Indicum majus C.B.P. 306. Nasturtium Indicum, folio peltato scandens I. B. *tom.* 2. l. 15. 175. Pelon Mexiquilitl. Pelon Chilli, seu Nasturtium Peruvianum *Hernand.* 161.

Eadem flore sulphureo. Nasturtium Indicum flore luteo dilutiore *Cat. Hort. Reg. Par.* 129.

Viola Indica scandens, Nasturtii sapore, maxima odorata.

Si unquam amoënioris Floræ cultoribus, tum varietate, tum insigni florum elegantia sese commendavit Planta, hæc profecto scandentis Violæ, vulgò Nasturtii Indici, nova species est, cujus amplitudinem & majestatem quilibet intuentes merito suspiciunt & ad-

LUGDUNO-BATAVUS. 629
COLA INDICA SCANDENS, NASTUR-
TII SAPORE MAXIMA ODORATA.

& admirantur. Eam primus omnium Anno MDC LXXXIV. ex novo Orbe in Belgiam devehì curavit Illustrissimus Beverningius, cujus munificentia postmodum in Principum Magnatumquè Paradisos, deinde etiam in Academicum nostrum transfluxit Hortum. Multò verò feracior & omnibus sui partibus amplior est Nasturtio Indico vulgari. Etenim è crassa pallida fibrosa repente radice admirabili fertilitate luxuriant viticuli longissimi herbacei succulentì glabri, qui vel solo incumbunt, vel vicinos stipites bacillosve suis complexibus involvunt. Horum genicula emittunt tortiles sesqui dodrantaes pediculos, sustinentes folia orbiculata peltata, Hederæ instar angulosa, vulgari Nasturtio duplo ampliora, medio pallente umbone, cui pediculus inferitur, in aliquot concolores radios ad ambitum usque diducto. Ad singulas foliorum alas prodit alter petiolus brevior & gracilior, qui terminatur in florem amplissimum odoratum extus croceo, intus nunc cinabarino nunc coccineo, nunc simul ex utroque colore pulcherrimè variegato, superbientem, quem si solis radiis illustratum inspexeris, gracili holoserica pube, aurato pulvere perfusa, diceres interpolatum. Flos quinque contexitur petalis sesqui pollice latioribus, quorum duo superiora

rioria surrecta è basi angustâ coccineis fulgentibus virgulis striatâ sensim in rotundam latitudinem expanduntur. Tria inferiora fulciuntur angustissimo crassiusculo crocato cervice, & ubi in latum orbem se diffundere incipiunt, concoloribus ad margines barbulis capillantur, unguibus holosericâ maculâ modo coccineâ modo intensius miniatâ inscriptis. Medium occupant aliquot brevia rigida recurva flavescentia stamina oblongis striatis concoloribus apiculis ornata; Flori verò subjicitur flavescentis calix, parte anticâ, quâ floris petala complectitur, in quinque mucronatas crenas, posticâ verò in longissimum calcar purpurascens per longitudinem striis insignitum, productus, quo una cum flore delapso, sequuntur vascula subrotunda rugosa & verrucosa ut plurimum terna, rarius bina, pressius invicem juncta, quibus singulis involvitur semen oblongo-rotundum fuscum crassum solidum rugosum striatum seu angulosum, nonnihil incurvatum. Quamvis hæc planta circa finem autumnii exarescere ejusquæ radix subsequente hyeme perire soleat, adeoque non nisi seminibus regerminare videatur; Attamen vulgaris Nasturtii more multiplicari patitur per furculos, qui autumnii principio terræ commissi & in convenienti hybernâ locati, totâ hyeme vernant, & mox,

succedente vere, flores & semina numerosa
fertilitate largiuntur.

Viola aquatica I. B. v. Millefolium.

Viola lunaria major, siliquâ oblongâ & rotundâ C. B. P. v. Levcojum.

Viola Mariana Dod. I. B. v. Campanula.

Viola Matronalis vulgò ejusquè species v. Hesperis.

Viola Petræa I. B. v. Eruca.

VIRGA aurea major, vel Doria C. B. P.
268. Alisma Monspeliensium, sive Doria I. B. tom. 2. l. 24. 1064.

Virga aurea latifolia ferrata C. B. P. 268. Virga aurea, sive Solidago Saracénica latifolia ferrata I. B. tom. 2. l. 24. 1063.

* Virga aurea angustifolia ferrata C. B. P. 268.
Virga aurea angustifolia ferrata, sive Solidago Saracénica I. B. tom. 2. l. 24. 1063.

* Virga aurea angustifolia minùs ferrata C. B. P. 268. Virga aurea vulgaris latifolia I. B. tom. 2. l. 24. 1062.

Virga aurea foliis lævibus non ferratis Moris.
Hort. Bles. 322. An Virga aurea angustifolia, paniculâ speciosâ Canadensis Cat.
Hort. Reg. Par. 186?

Eadem foliis non nihil crenatis.

Virga aurea Americana hirsuta, radice odoratâ, foliis ferratis Moris. *Hort. Bles.* 323.
An Virga aurea Canadensis hirsuta, paniculis minùs speciosis Cat. *Hort. Reg. Paris.* 186?

186? Virga aurea Virginiana, foliis magis rugosis & nonnihil incisiss *Stap. in Theoph.* 365. *descr. & fig.*

Virga aurea Limonii folio, paniculâ uno versu dispositâ *Moris. Hort. Bles.* 220. Virga aurea Mexicana C. B. P. 517. Virga aurea Virginiana *Stapel. in Theophr.* 365.

Virga aurea, foliis Linariæ *Moris. Hort. Bles.* 379. Linaria folioso capitulo luteo major C. B. P. 213. Heliochrysos Tragi, sive Linaria tertia I. B. *tom.* 3. l. 26. 151.

Virga pastoris ejusque species I. B. v. *Dipsacus.*

Virga sanguinea I. B. v. *Cornus.*

Visnaga *Moris.* v. *Gingidium.*

Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis ejusque species C. B. P. v. *Agnus castus.*

VITIS Idæa, foliis oblongis crenatis, fructu nigricante C. B. P. 470. Vitis Idæa, fructu nigro I. B. *tom.* 1. l. 5. 519. Myrtillus vulgò.

Vitis Idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris C. B. P. 470. Vitis Idæa semper virens, fructu rubro I. B. *tom.* 1. l. 5. 522.

*Vitis Idæa palustris C. B. P. 471. Oxycoccus sive Vaccinia palustris I. B. *tom.* 1. l. 5. 227.

VITIS vinifera C. B. P. 299. I. B. *tom.* 2. l. 15. 67.

Vitis Corynthis I. B. *tom.* 2. l. 15. 72. Uvæ

Passæ Indicæ, gigartis carentes C. B. P. 298.

Vitis muscato sapore, quæ Apiana Plinio C. B. P. *Var.* 298. Vitis

634 HORTUS ACADEMICUS

Vitis acinis oblongis magnitudine & formâ
Prunorum, quæ Pergulana dici potest C. B.
P. Var. 298.

Vitis Allobrogica Plinii *Carol. Steph. Cat. Hort.*
Reg. 186.

Vitis alba dulcis I. B. *tom.* 2. *l.* 15. 73.

Vitis folio Apii I. B. *tom.* *l.* 15. 75. Vitis laci-
niatis foliis *Corn.* 182.

Vitis Viniferæ diversitates plurimæ, fructuum
magnitudine colore & sapore discretæ.

Vitis alba & nigra I. B. v. Bryonia.

Vitis Hederacea Indica *Stap.* v. Hedera.

Ulmaria I. B. v. Barba capræ.

* **U**LMUS campestris C. B. *P.* 426. Ulmus
I. B. *tom.* 1. *l.* 1. 239.

Umbilicus Veneris vulgò v. Cotyledon.

Unedo Plinii vulgò v. Arbutus.

Unifolium I. B. v. Lilium convallium.

Vosacan *Cat. Hort. Reg. Paris.* v. Chrysan-
themum.

Volubilis terrestris I. B. v. Convolvulus.

* **U**RTICA urens maxima C. B. *P.* 232. Ur-
tica vulgaris major I. B. *tom.* 3. *l.* 30. 445.

* Urtica urens minor C. B. *P.* 232. Urtica mi-
nor annua I. B. *tom.* 3. *l.* 30. 446. ANN.

Urtica urens pilulas ferens prima Dioscori-
dis, semine Lini C. B. *P.* 232. Urtica Ro-
mana, sive Mas cum globulis I. B. *tom.* 3. *l.*
30. 445. ANN.

Eadem Parietariæ foliis *Dodart. Mem.* 131.
Cat.

Cat. Hort. Reg. Paris. 187. ANN.

Urtica racemosa Canadensis Dodart. Mem.

129. *Moris. Hort. Bles.* 323.

Urtica aculeata, foliis serratis ejusque species
C. B. P. v. *Sideritis.*

X.

ANTHIUM majus Canadense. Lappa Canadensis, minori congener, sed procerior *Cat. Hort. Reg. Paris.* 110. ANN.

Xanthium five Lappa minor *I. B. tom. 3. l. 33.*

572. Xanthium Dioscoridis, Lappa minor
C. B. P. 198. ANN.

XERANTHEMUM flore simplici purpureo
majore. Xeranthemum aliud Ptarmica
quorundam *I. B. tom. 3. l. 25. 25.* Jacea
Oleæ folio, capitulis simplicibus C. B. P. 272.
Ptarmica Austriaca vulgò. ANN.

Idem flore pleno. ANN.

Xeranthemum flore simplici albo. ANN.

Idem flore pleno. ANN.

Xeranthemum flore simplici purpureo minore.
Jacea Oleæ folio, flore minore C. B. P. 272.
ANN.

Xeranthemum flore simplici minimo dilutè
purpurascete. ANN.

Xiphium I. B. v. Gladiolus.

Xiris Moris & Xyris I. B. Iris.

Y. YUCCA

Y.

UCCA foliis Aloe C. B. P. 91. Moris.
Hist. 2. 419.

Z.

at arhendi Alpin. v. Majorana.

Zazintba I. B. v. Cichorium.

ZEA Briza dicta vel monococcos Germanica C. B. P. 21. Zea monococcos, Briza quibusdam I. B. tom. 2. l. 18. 413. ANN. Zea dicoccos vel major C. B. P. 22. Zea, five Spelta I. B. tom. 2. l. 18. 412. ANN.

Zeopyrum seu Tritico-speltum C. B. P. 22. Hordeum nudum, five Gymnocrithon I. B. tom. 2. l. 18. 430. ANN.

Zea verna I. B. v. Triticum.

ZEDOARIA Zeylanica Camphoram redolens Mus. Zeylan. Harankaha Zeylanensium.

Zerumbeth Garz. v. Zingiber.

ZINGIBER latifolium sylvestre. Zerumbet Garz. ab Hort. l. 1. c. 43. Walinghuru five Zingiber sylvestre Zeylanensibus.

An hoc Indicum Aroma sit Zerumbeth Arabum quod Garzias ab Horto adstruit, & an Zerumbeth sit Idem cum Zedoaria, Geiduar, Arnabo, Been albo vel rubro aut Car-

pe-

LUGDUNO-BATAVUS. 637

INGIBER SYLVESTRIS.

pefio, an verò ab his diverfũ, id ex Veterum
 Codicibus difficulter colligi poteft. Quippe
 non tantũ in his, fed & innumeris aliis
 describendis tam breves & incerti reperiun-
 tur Arabes, & quod maximum inter fe adeò
 diffidentes, ut non fine ratione dubitetur,
 an Arabibus accurata dictorum fimplicium
 fuerit notitia. Itaque fatius fore judico in
 præfentiarum, genuinam Aromatis noſtri
 Hiftoriam proponere, quàm de inextrica-
 bili hâc quæſtione ulteriorem facere moram.
 Spontaneo autem proventu luxuriat in fyl-
 vis locisque aliis umbroſis Inſulæ Zeylan,
 Malabaræ, cœterarumquæ Orientalium Re-
 gionum, Malabaris Kua, Zeylanenſibus
 Walinghuru hoc eſt fylveſtre Zingiber di-
 ctum, cujus radix prælonga brachium craſ-
 ſa inæqualis, nonnihil depreſſa, ex crebris
 prominentibus tuberibus ceu apophyſibus
 per genicula junctis compacta, alba, non-
 nunquam flaveſcens, carnoſa ſucculenta, te-
 nacibus craſſioribus filamentis intertexta,
 modo in ſoli ſuperficie hærens, modo al-
 tius demiſſa pauciſquæ albentibus fibris ca-
 pillata, guſtus acris amaricantis aromatici
 ad Zingiber accendentis, ſed magis terre-
 ſtris & minùs grati, odoris fragrantis. Ex
 hujus tuberculis eriguntur caules ſeſquicu-
 bitales craſſitudine digitali herbacei depref-
 ſi, viridante medullâ pleni, quos alterno or-
 dine

dine ab imo ad summum usque vestiunt folia spithamum longa, tres quatuorve transversos digitos lata, in mucronem abeuntia glabra polita, alterâ parte lætè viridia, alterâ in viridi pallentia, fulcita pediculo crasso brevissimo, qui lato ac folioso suo principio, Arundinum Graminumve ritu, caulem involvit & in nervum per folii mediam longitudinem excurrentem, terminatur. His in caulibus flores nulli conspiciuntur, sed ex peculiaribus radicum tuberculis, veluti in Curcumâ coëterisque hujus fortis aromatis, singularis erigitur scapus prælongis aliquot foliaceis squamis, scapum strictissimè ambientibus, obtectus, aspice in oblongo-rotundû squamatû rufescens caput ex multis obtusis foliolis imbricum modo hærentibus constructum, fastigiato, è cujus squamarum interstitiis profilit flos oblongus ut plurimum pentapetalus Curcumæ aut Zingiberi similis, petalo superiori oblongo pelucido galeæ instar erecto, duobus inferioribus conformibus instar labii protensis, intermedio flavescente sinuato ad marginem fimbriato, ex angustâ cervice in rotundam latitudinem diffuso. Huic demum ligulæ instar incumbit petalum crassum albidum reliquis angustius, crassius tamen & robustius, desinens in parvum leviter inflexum mucronem. His omnibus marcescentibus
suc-

succedit vasculum pene trigonum continens in tribus loculamentis semina rotunda fusca Cannæ Indicæ paulæ minora coetereoquin valde similia. Culturam poscit eandem, quam Curcuma, de quâ supra actum. Sale volatili oleoso aromatico abundare huius aromatis radicem probat inter alia ejus destillatio. Transmittit enim per alembicum aquam fragrantem cum sufficienti oleo, cui, si recens fuerit destillata, innatat sal volatilis paucus, formâ nivis aut Camphoræ. Hic in spiritu vini solutus conditis electuariis aliisve debitè remixtus, acidis ventriculi cruditatibus & ex iisdem obortis flatibus ac doloribus mirabiliter conducit. Idem, sed cum blandâ alvi dejectione, præstat succus ex radice recenti expressus. Conscissa siccata & in farinam trita plurimam acredinem amittit, quâ ratione conficiuntur ex eâ panes, quibus annonâ duriorē vescuntur Indi. Mucilago squamati capitis interstitiis inhærens, aromatis huius virtutem nonnihil redolet & propterea doloroso & debilitato ventriculo censetur utilissima.

Zizyphus sativa L. B. v. Jujubæ.

Zopal nochetzli Hernand. v. Ficus.

Zucha flore luteo. I. B. v. Pepo.

Zygis Clusio v. Serpillum.

F I N I S.

HORTI ACADEMICI LUGDUNO BATAVI.

A P P E N D I X.

Proposueram mihi Stirpium omnium nomina, quæ ab anno millesimo sexcentesimo octuagesimo ad præsentem octuagesimum sextum usque in Horto Academico Lugduno Batavo viguerunt, præmissis huic Catalogo inferre; verum cum eandem denuo percurrens reperissem, nonnullas stirpes vel omisas, vel hoc ipso anno, quo Catalogus prælo erat commissus, variis è regionibus ad nos delatas esse; Ideo Batanophilis non ingratum nec inutile fore existimavi, si illas in ordinem congererem, & sub titulo Appendicis in lucem proferrem, insimul adiciendo, quæ ad emendationem seu illustrationem Catalogi spectare viderentur.

p. 2. l. 5. præfig. *

p. 7. l. 18. subjung.

Acer Virginianum odoratum.

p. 7. l. 23. add. post I. B. & Dioscoridis

C. B. P.

S s

P. 7.

p. 7. l. 23. subjung:

Achiotl Hern. v. Orleana.

p. 9. l. 2. subjung.

Aconitum humile bifolium, sive *Aconitifolia* flore albo unico *Leucoji* campanulato, fructu *Cynosbati* Menz. v. *Papaver*.

Aconitum Helianthemum Canadense Cornut. v. *Chrysanthemum*.

p. 9. l. 23. subjung:

A DHATODA *Zeylanensium* Mus. Zéyl. Hoc est, Medicina foetum mortuum expellens, Græcis *Ecbolium*. Wanæpala Malab.

p. 10. l. 7. subjung:

Adiantum floridum album Raji. v. *Filix*.

p. 11. l. 21. subjung:

Ahate de Panucho Hern. v. *Anona*

p. 11. l. 27. subjung:

Alaternus cristata.

p. 12. l. 17. subjung:

Alcea laciniato folio rotundo C.B.P. 316. *Moris.* Hist. 2. 527.

p. 13. l. 14. subjung:

Alcea Moschata Pison. v. *Althæa*.

p. 14. l. 7. subjung:

Alisma Monspeliensium I. B. v. *Virga aurea*.

p. 14. l. 8. subjung:

Alkekengi Mexicanum Column. v. *Solanum*.

p. 15. l. 22. subjung:

Allium seu Moli Virginianum C. B. P. *Ephemerum*.

AD HATODA ZEYLANENSIIUM.

p. 19. l. 9. subjung.

* *Alfine aquis innatans*, foliis longiusculis I. B. tom. 3. l. 38. 787.

p. 20. l. ultim. subjung.

Alfine verna glabra, flosculis albis I. B. v. Linum.

p. 22. l. 17. post 479. add. *Hinna pæretti Hort. Mal. tom. 6. 69.*

p. 22. l. 24. subjung.

Althæa arbor Indica, Tiliæ folio, flore ephemero. Pariti, seu Tali pariti *Hort. Mal. tom. 1. 53.*

p. 24. l. 27. post 959. add. *Beloere. Hort. Mal. tom. 6. 77.*

p. 25. l. 18. post 962. add. *Quingombo sive Alcea Muscata Pison. l. 4. 210.*

p. 29. l. 13. subjung.

ALYPUM Monspelianum, sive Frutex terribilis I. B. tom. 1. 5. 598. Thymelæa foliis acutis, capitulo Succisæ, sive Alypum Monspeliensium. C. B. P. 463.

p. 31. l. 18. add. post 18. *Blitum Spinosum Americannm Sutherl. Cat. Edimb. 51.*

p. 34. l. 11. subjung.

Ameri Hort. Mal. v. Colutea.

p. 34. l. 23. subjung.

Amomum Officinarum I. B. v. Sison.

p. 36. l. 24. subjung.

Anachunda Hort. Mal. v. Solanum.

p. 39. l. 5. subjung.

Anemone Virginiana, tertiæ Matthioli similis, flore parvo.

Folia fert trilobata ampla, flores parvos in viridi pallentes, cœtera tertiæ Matthioli paria.

p. 45. l. 22. subjung.

Anhuiba Pison. v. Saflafras.

p. 45. l. ultim. subjung.

ANONA Indica, fructu parvo violaceo. Pyro similis fructus alter in novâ Hispaniâ C.B.P. 439. Ate vel Ahate de Panucho Hern. 348. 454. Evautzapotl seu Anona Hern. 90. Anona maram. *Hort Mal. tom. 3. 23.* Anona Americana, fructu majori. Soortfack parvum vulgò.

Nomine Soortfack parvi ex Americâ huc invec̃ta sunt semina oblonga angulosa non nihil depressa flavescentia Anonâ Indicâ majora, quæ hac æstate in horto fata protulerunt sobolem, pedalis longitudinis, cui alterno ordine adstabant folia Lauri amplitudine, lætè viridia lucida glabra. Cætera quæ ad arboris hujus plenariam cognitionem spectant in altera Horti nostri Appendice curioso lectori proponentur.

p. 47. l. 7. subjung.

Anonis lutea perennis major, Natrix dicta *Moris. Hist. 2. 171.* Anonis viscosa, spinis carens, lutea major. C.B.P. 389. Anonis lutea

non spinosa, Dalechampsio Natrix I. B. tom.
2. l. 17. 393.

p. 50. l. 11. post floridum add. An
Sium aquaticum, ad alas floridum *Moris.*
Umbell. 63?

p. 49. l. 12. subjung.

Apios I. B. v. Tithymalus.

p. 52. l. 25. subjung.

Apocynum maritimum erectum Venetum,
flore albo. Tithymalus maritimus, seu Esu-
la rara è Lio Venetorum Infula, flore albo.

Cat. Hort. Reg. Par. 176.

Apocynum Virginianum, flore herbaceo, fi-
liquâ longissimâ *Moris. Hort. Bles.* 232.

Apocynum Americanum arborescens, filiquâ
maximâ.

Prodiit hœc demum anno seminibus à
Dno Henrico Meyero ex Surinama trans-
missis; Foliis palmam amplis mucronatis
binis è regione oppositis, longis pediculis
appensis. Semina erant membranacea com-
pressa fusca cum albâ lanuginosâ cœsarie.

Apocynum Novæ Angliæ subhirsutum, tube-
rosâ radice, floribus aurantiis. An *Apocy-*
num Canadense angustifolium, flore auran-
tio *Moris. Hort. Bles.* 232.

Speciosissimum hoc *Apocynum* ex Novâ
Angliâ huc invecum, idem esse opinor cum
eo, quod Morisonius in Horto Blesensi sub
nomine *Apocyni* Canadensis angustifolii
flore

APOCYNUM NOVÆ ANGLIÆ TUBEROSA RADICE, FLORIBUS AURANTIIS.

flore aurantio prodidit; verum cum ejusdem descriptio sit admodum brevis & imperfecta; ideo hic subnectere volui quæ in ea videntur desiderari. Constat verò radice tuberosâ pugni magnitudine carnosâ nodosâ, paucis fibris vestitâ, solo aridiori commissâ hyemem superante, ex quâ sub æstatis initium assurgunt aliquot stolones altitudine pedali aut cubitali rotundi hirsuti, herbacei, parte quâ sole illustrantur subrubentes. His adhærent folia sine ordine, modo bina sibi opposita modo solitaria, semidigitum longa, unguem lata, ad radicem minora, in progressu verò majora, rigidiuscula, in parvum obtusum mucronem abeuntia, suprâ è virore nigro splendentia, infrâ pallida subhirsuta venosa. Ramorum fastigia sustinent flores in umbellam congestos Apocyno Canadensi Syriaco minori Cornuti formâ & magnitudine similes, elegantissimi aurantii coloris. Hi antequam perficiuntur exigua crocata oblonga angulosa striataque capitula mentiuntur; Dehiscentes verò in decem petala finduntur quinque externa longiora tenuiora deorsum flexa, totidemque interna breviora crassiora erecta, è quorum singulorum basi exit staminulum concolor tenuissimum, apiculo destitutum, medium occupat pallidè flavescens capitulum oblongum striatum quin-

quinquangulum structurâ valde eleganti. Quanquam verò, hujus Apocyni fructus videri nobis nondum contigit, attamen haud dissimiles esse congeneribus suis, ex omnibus notis colligere licet. Turget succo viscido lento in viridi pallecente, sapore acri amaro nauseoso.

p. 58. l. 7. subjung.

Arbor venenata quorundam Cat. Hort. Reg. Paris. v. Hedera.

Arbor vitæ seu Paradisiaca vulgo I. B. v. Thuja.

p. 59. l. 9. subjung.

Arabis Chabr. v. Draba

p. 61. l. 5. præfig. *

p. 63. inferatur Asparagi aculeati maximi farmentosi Zeylanici, radicum imago.

p. 64. l. 22. subjung.

Asperula montana odorata C. B. P. v. Rubia.

Asperula hexaphyllos purpurea C. B. P. v. Rubia.

p. 68. l. 18. subjung.

Aster Americanus latifolius maximus puniceis caulibus.

Altior assurgit hic Aster quàm Asteres Novæ Angliæ, caulibus robustis puniceis in breves concolores ramos divisis; Foliis Tripolii facie, sed rigidioribus crassioribus per ambitum non nihil dentatis, inferioribus palmam æquantibus, superiori-

*ASPARAGI ACULEATI SARMENTOSI ZETLANI-
CI RADICES.*

ASTER AMERICANUS LATIFOLIUS MAXIMUS
PUNICEIS CAULIBUS.

bus verò brevioribus & angustioribus; Floribus amplis violaceis, medio disco purpureo flavescente & in albertem pappum fatifcente. Subest radix fibrosa vivax, numerosa fertilitate sese propagans. Domina Agnita de Block scientiæ Botanica peritissima nobis hunc Asterem communicavit.

p. 73. l. 3. subjung.

Astragalus purpureus perennis Monspeliensis *Moris. Hist. 2. 106.* Astragalus Monspessulanus *I. B. tom. 2. l. 17. 338.* Securidaca lutea minor, corniculis recurvis *C. B. P. 389.*

p. 74. l. 2. post 285. add. Astragalus Africanus, flore luteo odoratus *Breyn. Cent. 1. 72.*

p. 78. l. 3. subjung.

Ate Herq. v. Anona.

p. 83. l. 5. subjung.

Azedarach floribus albis semper virens. Arbor Indica Fraxino similis, Oleæ fructu *C. B. P. 416.* Aria-Bepoli se Nimbo Acoftæ & *Garz. Hort. Mal. tom. 4. 107.*

p. 83. l. subjung.

Balam pulli *Hort. Mal. v. Tamarindus.*

p. 84. l. 16. subjung.

BELAMODAGAM *Hort. Mal. tom. 2. 121.* Takada Zeylanenf.

p. 84. l. 22. post 261. add. Bellis sylvestris maxima, caule rubente hirsuto *Sutherland. Cat. Edimb. App. 365.*

p. 87. l. 6. subjung.

Beloere Hort. Mal. v. Althæa

p. 88. l. 15. subjung.

Betonica paoli Serpillifolia I. B. v. Veronica.

p. 88. l. 17. subjung.

Bislingua I. B. v. Laurus Alexandrina.

p. 93. l. 17. subjung.

Boa Tsingking Bont. v. Coral arbor.

Bonifacia I. B. v. Laurus Alexandrina.

p. 94. l. 19. subjung.

Briza C. B. P. & I. B. v. Zea.

p. 95. l. 7. subjung.

Brunella minor, folio rigido integro C. B. Phy-

top. 503. Brunella Hyssopifolia C. B. P. 261.

Prunella angustifolia I. B. tom. 3. l. 30. 430.

p. 99. l. 3. subjung.

Bupariti Hort. Mal. v. Althæa.

p. 101. ad l. 6. Propter characterem quem *Cacalia* habet communem cum *Eupatorio*, rectius *Eupatorium Tussilaginis* foliis cutaneis acutioribus & glabris meretur vocari.

p. 102. l. 16. post *latifolia* add. *Menta cataractaria latifolia C. B. P. 228.*

p. 106. l. penult. subjung.

Camara Marckgr. & Camara Tinga Pison. v. Viburnum.

Camaru Pison. v. Solanum.

p. 108. l. 6. præfig. *

p. 18. l. 18. post 799. add. *An Alsine oblongo*

654 HORTUS ACADEMICUS

longo folio ferrato, flore coeruleo I.B. tom.
3. 19. 367?

p. 113. l. 9. subjung.

Campanula exotica Aldini v. *Convolvulus*.

p. 114. l. 20. subjung.

Cannabina Indica Stap. v. *Eupatorium*.

p. 115. l. 12. subjung.

Caranda Bontj. v. *Tamarindus*.

p. 120. l. 26. subjung.

Carduus stellatus, *Leucoji lutei foliis Dodart.*

Mem. 69. Carduus humilis aculeatus, *Parmicæ foliis Austriacæ Triumph. Observ. 96.*

Carduus Brasiliensis, *foliis Aloes C. B. P. v. Ananas*.

p. 129. l. 21. subjung.

Caryophyllus Mexicanus ejusque species Hernand. v. Tagetes.

Caryophyllus Indicus ejusque species I. B. v. Tagetes.

p. 130. addantur *Cinamomi Icones ad vivum expressi.*

p. 131. l. 12. subjung.

Cattuchiragam Hort. Mal. v. Jaceæ & Serratulæ affinis.

p. 132. l. 20. subjung.

Cedrus ex Goa vulgo v. Juniperus.

p. 132. l. 21. subjung.

Celeri Italorum Hort. Reg. Par. v. Apium.

p. 133. l. 23. subjung.

Centaurii

CASSIA CINAMOMEA SIVE CINAMOMUM.

ASSIA CINAMOMEA SIVE CINAMOMUM.

Centaurii majoris species tenuifolia I. B. v. Stoebe.

p. 134. l. 14. post 551. add. Scarlotte vulgò.

p. 135. l. 15. subjung.

Cerasus folio Laurino variegato.

p. 137. l. 18. subjung.

Chamaeficus I. B. v. *Ficus*.

p. 140. l. 1. subjung.

Chanterelle I. B. v. *Fungus*.

p. 141. l. 8. subjung.

Chondrilla Tingitana, floribus luteis, *Papaveris hortensis folio*. ANN.

Patriam agnoscit Tingidem hæc Chondrilla, figens radicem digiti crassitie pallidam, fibrosam, annuam, è quâ prodeunt folia, Papaveri hortensi nonnihil similia, duos transversos digitos lata, palmam longa, glauca, levia, carnosâ, albentibus venis insignita per ambitum crenata. Intra hæc assurgunt caules cubito longiores in aliquot alas divaricati leves pallidè virentes solidi, circa cacumina vero fistulosi. Horum singulis nodis hærent folia sine ullis petiolis auriculata inferioribus latiora & profundioribus crenis incisa; Apices verò exornant capitula Sonchi effigie squamata, quæ Augusto mense explicant florem congeneribus affinem ex numerosis petalis planis flavis ad basin purpurascens, radiantem stel-

T t

lam

lam imitantibus, congestum, succedentibus feminis oblongis albis fungosis sulcatis denticulatis candidissimo sericeo pappo cristatis. Tota Planta scatet lacte acri amaro ingrato.

p. 142. l. 25. post 516. add. Aconitum Helianthemum Canadense Cornut. 178.

p. 143. l. 6. subjung.

Eo ipso quo Appendicem hanc compono venit in manus meas Historia Plantarum CL. Johannis Raji, in quâ, incidens in Chrysanthemum Indicum radice tuberosâ, reperi, DN. Rajum in notis MSS. DNI. Josuæ Palmer invenisse, me Chrysanthemum hujus flores in pappum abire asseruisse. Tantùm autem abest, ut Plantæ huic unquam papposa semina adscripserim, ut potius professus sim, me ullibi locorum ejus semina hætenus observasse, in quantùm tamen ex floris disco cæterisque notis mihi apparuit, conjecisse, semina fore solida non papposa, & propterea veriùs Chrysanthemis minimè verò Asteribus debere adjungi.

p. 144. l. 28. subjung.

Chrysanthemum Asteris facie, foliis ad florem rigidis, flore sulphureo.

Chrysanthemum Asteris facie, foliis ad florem rigidis flore minore elatius. ANN.

Idem flore minimo humilior. ANN.

Prius

HONDRILLA TINGITANA, FLORIBUS LUTEIS,
PAPAVERIS HORTENSIS FOLIO.

Prius erigit, caules pedales aliquando altiores, rigidos, duros, ramosos, tenui tomento obsitos, quibus hærent folia Asteri supino Clusii paria, rigida, deorsum inflexa, medio nervo in brevem aculeum abeunte. Flores fert Bellide minores luteos radiatos discoideos, denis foliis supradictis similibus quinque majoribus totidemque minoribus circumvallatos. Disco marcescente defluunt semina exigua fusca solida, ex quibus annuatim planta renovatur. Huic simile est posterius, ast humilius & omnibus partibus minus.

p. 147. l. 16. subjung.

Chunda Hort. Mal. v. Solanum.

p. 149. l. 14. subjung.

Cicuta aquatica Gesneri I. B. v. Sion.

p. 149. l. 17. subjung.

Cieuku Boym. v. Guajava.

Cinamomum C. B. P. v. Cassia.

p. 160. l. 21. subjung.

Clematis Hederæ folio Moris. v. Hedera.

p. 169. l. 3. post 198. add. Ameri Hort.

Mal. tom. I. 101.

p. 177. l. 2. post purpurascete add. cum stylo intermedio quinque staminulis cincto.

p. 182. l. 4. subjung.

Convolvulus Siriacus minor.

Hunc Convolvulum, duplo minorem & speciosiore, quàm Scammonea vulgaris, pos-

possidemus ex munere honestissimæ Matronæ de Block.

p. 184. l. 12. post differt add. Confer etiam Herbam innominatam primam *Markgr. l. 1. c. 25. p. 54.*

p. 186. l. 5. post 166. add. Campanula exotica *Aldini Hort. Farnes. 89.*

p. 188. l. 29. subjung.

Conyza Africana, Senecionis flore, retusis foliis.

Hæc à *Conyza Melitensi* retusis foliis *Bocc. Plant. Sic. 26.* abludit tantum floribus, qui in Bocconianâ radiati sunt, in nostrâ verò discoidei nudi non radiati Senecionis facie & modo in umbellam dispositi; cætera conveniunt.

p. 189. l. 7. add. *Mouricou Hort. Mal. tom. 6. 13.*

p. 190. l. 27. subjung.

CORTUSA Americana, flore spicato, petalis integris. *Sanicula montana Americana* repens peregrina, seu *Cortusa Indica*, vel *Hedera terrestris Bod. à Stap. 366. Cat. Hort. Reg. Paris. 161.*

Cortusa Americana spicato flore, petalis fimbriatis. *Sanicula* seu *Cortusa Americana* altera, flore minuto fimbriato *Cat. Hort. Reg. Paris. 161.*

CONYZA AFRICANA SENECTIONIS FLORE, RETUSIS FOLIIS.

p. 191. l. 19. subjung.

Cotoneaster folia rotundo non serrato C. B. P.
v. *Mespilus*.

p. 192. l. 9. subjung.

Cotyledon aquatica l. B. v. *Ranunculus*.

p. 192. l. 12 subjung.

Cracca minor ejusque species l. B. v. *Vicia*.

Crataeus Theophrasti l. B. v. *Mespilus*.

Crepitus lupi l. B. v. *Fungus*.

p. 292. l. 17. post *Lusitanis* add. *Tsetti*
Mandaram Hort. Mal. tom. 6. 1.

p. 196. l. 4. post *trifolia* add. *Anagyri-*
dis facie glabra, filiquis è longioribus pedi-
culis.

p. 198. l. 22 subjung.

Crotalaria Asiatica trifolia subhirsuta ANN.

Crotalariae quintam speciem offendimus
nuper in Horto Honestissimæ de Block;
Præcedenti non multum dissimilis est, ast
tota subhirsuta & quoad omnes partes
minor & tenerior, caules fert herbaceos,
quorum cacumina flores & filiquæ strictius
ambiunt, facie *Crotalariae secundæ & ter-*
tiæ.

p. 202. l. 21. post *hirsutis* add. Hanc
eandem esse existimo, quam *Marckgravius*
l. 1. 55. nomine *Sagittariae cordialis* propo-
suit.

p. 204. l. 15. post. *Zeylanicus* add. Ma-
jor, feminibus albis. ANN.

p. 204. l. 19. post verrucosa add. Semina alba majora.

p. 204. l. ult. subjung.

Cucumis Zeylanicus minor, seminibus nigris. ANN.

Cucumeris punicei Zeylanici, Maragosa Lusitanis dicti, duæ inveniuntur species, prima producit fructus palmam longos sativi Cucumeris crassitie, in obtusum mucronem desinentes, cute crassâ veluti in flavo virente, spinosis bullis seu tuberculis exasperatâ, carne pulposâ ex flavo rubente, dulci gratâ quasi sacharo conditâ, Hi per maturitatem finduntur in tres partes, ostendentes semina alba, superficie granulatâ Momordicæ vulgari similia, ast majora. Secunda, omnibus suis partibus minor est, fructubus digiti longitudinem vix excedentibus in mucronem recurvum terminantibus, seminibus Momordicâ vulgari minoribus nigris. Utræque species viguerunt hac æstate in Horto, suaque semina perfecerunt.

p. 205. l. 6. post 421. add. Passiflora Frid. Cæs. in Tab. 935.

p. 205. l. 18. post 50. add. Granadilla Hispanica Flos Passionis Italica Colum. in not. ad. Hern. 888.

p. 208. l. 8. subjung.

Curcas l. B. v. Ricinus.

p. 208. l. 14. post 30. add. Kaha Zeylanensibus id est Crocus.

p. 223. l. 27. subjung.

Draba Chalepensis repens humilior, foliis minus cinereis quasque viridibus *Moris Hist.* 2. 314.

p. 214. l. 20. subjung.

Dyopsyrus l. B. v. *Mespilus*.

p. 214. l. 22. subjung.

Ecbolium. v. *Adhathoda*.

p. 224. l. 22. subjung.

Echinomelocactus vulgò. v. *Ficoides*.

p. 225. l. 3. post C. B. P. add. 254.

p. 225. l. 5. post C. B. P. add. 254.

p. 225. l. 15. post aspera add. crassiuscula.

p. 225. l. 28. post 77. add. *Hydrophyllum Morini* Jonq. Hort. 43.

Cum hæc planta peculiarem, habet tesseram à coeteris plantis hætenus descriptis planè diversam, ideo mallet ut ad mentem Morini peculiari nomine, scilicet *Hydrophylli* quàm *Echii* feu *Dentariæ* appellaretur.

p. 228. l. 11. post Magnoli add. *Chrysanthemum corymbiferum Africanum* Triumf. Observ. 85.

Paucis antè diebus per literas mihi significavit Nobilissimus Dns. Ciaffi, plantæ hujus semina omnino convenire cum semi-

nibus Bellidis majoris, adeoque nec Chrysanthemum nec Elichrysum sed Bellidem Africanam, Coronopi folio, flore nudo seu non radiato esse appellandam.

p. 231. l. 7. subjung.

Elichryso affinis Peruana frutescens.

Hanc arbusculam perpetuâ fronde virentem produxit, Hortus Beverningianus seminibus ex Peru invectis. Surrexit verò ad altitudinem sexseptemve pedum, viticulis lignosis pallidis lentis geniculatis valde ramosis; foliis binis ex opposito nascentibus, formâ & magnitudine nescio quid affinitatis cum foliis Costi hortorum sive etiam Scabiosæ Hispanicæ stellatæ habentibus, per margines tamen crebrius ferratis, tribusque per longitudinem excurrentibus nervis inscriptis; Floribus ad foliorum exortus circa ramorum cacumina corymbosis parvis ab Elichryso non multum abludentibus, pendulis herbaceis discoideis, modo solitariis, modo tribus quatuorve simul junctis; Seminibus exiguis, ut conjicere potui, papposis, ad perfectam tamen maturitatem hucusque nondum perductis; Sapore & odore nullo evidenti.

p. 231. l. 23. post Hoc add. à Georgio Marcgravio l. 1. c. 4. p. 8. sine nomine propositum.

p. 234. l. 12. præfig: *

LUGDUNO-BATAVUS. 669

EUPHRASIÆ AFFINIS INDICA ECHIOIDES.

p. 240. l. 16. subjung.

Euphrasie affinis Indica Echioides. Kawatu-
wa Zeylonensibus. ANN.

Assurgit ab radice albente, lignosâ, digitali crassitie, multisque fibris capillatâ, cauliculus pedalis statim ab radice in aliquot ramos divisus, geniculatus quadrangulus asper villosus. E singulis geniculis ab imo ad summum usque exeunt folia latè viridia subaspera villosa digitum longa unguem lata obtusa bina ex adverso posita, saporis fatui, ad quorum sinus prodeunt ramuli tenues biunciales, quibus ex angustissimis herbaceis quinquifidis caliculis insident flores quini septeni, aliquando plures ad basin candidi, cœtera purpurascens, consimili fere ordine, quo Echii Alcibiadici flores, dispositi. Formâ tubulum sesquiunciam expriment, qui in amplum orificium quasi galeâ trifidâ & labio integro obtuso constructum desinit, profluentibus è medio duobus capillaceis atropurpureis, tenuique albente lanugine pubescentibus staminulis, cum stylo corniculato concolori & longiori. His discussis succedunt vascula bicapsularia oblonga quadrangula membranacea granum hordei imitantia quæ semina continent quaterna ex fusco flavescentia, singulis in loculis bina. Frequens occurrit locis sordidis incul-
tis

p. 293. l. 4. subjung.

Glyzyrrhiza Indica vulgò. v. *Phaseolus*.

p. 304. l. 14. subjung.

Granadilla Hispanis Colum. v. *Cucumis*.

p. 305. l. 28. post 31. add. fructu longiori. Cieuku Boym. Flor. Sinens. Jonst. de arb. Mantis. 475.

p. 305. l. 30. post acida add. fructu rotundiori Malacka Pelà *Hort. Mal. tom.* 3. 33.

p. 306. l. 7. post 899. add. *Narcissus Africanus bifolius* sive *exoticus* *I. B. tom.* 2. l. 19. 679. *Lilium Indicum puniceum* gemino latiori folio *Moris. Hist.* 2. 410.

p. 309. l. 10. subjung.

Halicacabum vulgare & Indicum *I. B.* v. *Solanum*.

Halicacabum Arabibus Bont. v. *Solanum*.

p. 306. l. 27. post Cornut. add. 96.

p. 307. l. 8. subjung.

Hedera terrestris Stap. v. *Cortufa*.

p. 307. l. 25. subjung.

Heliochrysos Tragi, sive Linaria tertia *I. B.* v. *Virga aurea*.

p. 311. l. 25. subjung.

Herba Paris *I. B.* v. *Solanum*.

Herba venti Monspeliensium vulgò. v. *Marrubium*.

670 HORTUS ACADEMICUS

tis Insulæ Zeylonæ. Floruit in Horto Anno 1684.

p. 241. l. 5. subjung:

Faba purgatrix I. B. v. Ricinus.

p. 241. l. 10. subjung:

Faniaicu Boym. Flor. Sin. v. *Pepo arborescens.*

p. 254. l. 21. subjung:

Ficoides minor multicaulis flore pallido.

p. 256. l. 7. subjung:

*Ficoides occidentale spinosum Melonis facie
fulcis rectis. Melocactus Indiæ occidentalis*

C. B. P. 384. Echinomelocactus vulgò.

Idem fulcis obliquis.

Idem minus absque tomento.

p. 256. l. 11. post 154. add. *Bacoba*

Marcgrav. l. 4. c. 27. p. 75.

p. 259. l. 10. subjung.

*Fœniculum marinum majus & minus C. B. P. &
I. B. v. Chrithmum.*

p. 263. l. 17. subjung.

*Frutex spicatus, foliis Salignis serratis C. B. P.
v. Spiræa.*

Frutex terribilis I. B. v. Alypum.

p. 268. l. 3. subjung.

Galeopsis angustifolia foetida I. B. v. Stachys.

p. 62. l. 23. post simul add. *Spar-
tium alterum monospermum, semine reni
simili.*

p. 292. l. 23. subjung.

Glycypicros I. B. v. Solanum.

HIERACIUM INCANUM LANUGINOSUM RAGU-
SINUM, PILOSELLÆ FLORE.

p. 314. l. 14. subjung.

Hieracium incanum lanuginosum Ragusinum,
Pilosellæ flore. Pilosella incana Ragusina
I. B. Ciaffi.

Quod Discriminis Hieracium inter & Pilosellam intercedit parvi est momenti. Hieracium enim cauliculos fert ut plurimum erectos & ramosos, Pilosella verò pediculos procumbentes nunquam vel rarissime in ramos minores alios divaricatos; Cæteris notis nempe floribus planipetalis naturâ plenis, seminibus citrinis albente pappo cristatis, & lacte & huminifido invicem conveniunt. Adeoque Plantam hæc Ragusinam, cujus semina nomine Pilosellæ incanæ Ragusinæ transmisit Nobilissimus Johannes Battista Ciaffi, sive Hieracium sive Pilosellam appellaveris, parùm interest. Nacta est hæc planta radicem fibrosam gracilem albidam, cauliculos multos cubitales, ramosos, tenues incanos, humi procumbentes, foliâ ad singula genicula & ramorum exortus Lecojo incano filiquis rotundis C. B. P. paulo latiora nonnihil crenata, candido tomento obducta, flores in ramorum cacuminibus Pilosellæ minoris faciè & formâ aureos, semina citrina candido lanuginoso pappo donata. An annua sit an perennis determinare non audeo. Eodem enim anno quo floruit, putredine

dine correpta interiit.

p. 314. l. 17. subjung.

I. B. dubitat an *Chondrillæ Creticæ* nomine missa semine recurvo sit eadem cum *Hieracio Intybaceo* flore magno albido *C. B. P.* Quia vero utrisque rite collatis, reperi plantas omnino esse diversas, itaque lineæ 16. & 17. expungendæ sunt.

p. 318. l. 4. subjung.

Hina paretî Hort. Mal. v. Althæa.

p. 318. l. 24. subjung.

Hordeum nudum sive Gymnocrithon I. B. v. Zea.

p. 319. l. 27. add. *Horminum Scutellariæ foliis.*

p. 319. l. 18. subjung.

Horminum Scutellariæ facie, foliis crassioribus & rugosioribus.

p. 320. l. 16. subjung.

Humatu Hort. Mal. v. Stramonia.

p. 327. l. 13. add. *Hyacinthus Africanus* tuberosus, flore coeruleo umbellato. *Breyn. Prodr. 39.*

Hujus flores profluunt ex bifidâ membranaceâ thecâ, quos excipiunt semina in vasculis oblongis trigonis & tricapsularibus, de more *Hyacinthorum*. Cætera vid. *ap. Breyn. l. c.*

p. 327. l. 16. subjung.

Hydrophyllon Morini Ionqu. v. Echio adfinis.

p. 331.

LUGDUNO-BATAVUS. 677

ACEÆ ET SERRATULÆ AFFINIS BREYNII.

p. 331. l. ultim. subjung.

Quoniam Jaceam laciniatam Sonchi folio admodum nervosè descripsit Casparus Bauhinus in Prodromo p. 128. Hinc satis esse patavimus tantum adjungere ejus iconem.

p. 334. l. 23. add. ANN.

p. 334. l. 24. add. ANN.

p. 334. l. 27. add. Cattu-Schiragam
Hort. Mal. tom. 2. 39.

p. 334. l. 27. subjung.

Æquum duxi spectatorem monere, hanc plantam pro vario solo, variâ quoque prodire facie, modo majori & ampliori, modo minori. Quæ enim in Horto Malabarico exponitur, nata est solo letiori & fertiliori, quæ verò in hac Appendice, loco steriliori.

p. 334. l. ultim. subjung.

Jacea Intybacea I. B. v. Stoebe.

p. 336. l. 16. subjung.

Jacobæa Africana, radice tuberosâ. Jacobææ affinis, radice tuberosâ Capitis Bonæ Spei
Breyn. Cent. 1. 138.

p. 336. l. 20. præfig.

Jasminum Americanum trifolium odoratissimum, flore albo.

Hoc à Jasmino flavo odorato distingui-
mus tantum flore albo. Acceptum referi-
mus Dno. Johanni van Riedt, rariorum
florum Cultori industrio, qui inter multa
alia curiosissimâ ex America acceperat.

p. 336.

p. 348. l. ultim. subjung.

Kayan vulgò. v. *Phaseolus*.

p. 350. l. 11. subjung.

Lactuca agnina vulgò. v. *Valerianella*.

p. 352. l. 3. subjung.

Lamium Parietariæ foliis D. Bruyner *Ionq.*

Hort. 69. *Lamium Parietariæ* facie *Moris.*

Aist. Bles. 278.

Radice gaudet vivaci pallentibus suis fibris latè diffusâ, cauliculis multis erectis cubitalibus, quadrangulis subhirsutis geniculatis, Folia è radice primùm erumpentia, similia sunt *Parietariæ* minori, per margines integra, quæ vero cauli adhærent, *Urticæ* paria & crenata, bina semper ex adverso posita, odoris gravis. Caulis genicula cingunt flores serie simplici, omnino albentes, ex galeâ concavâ labioque bifido amplo constructi, quos excipiunt vascula aperta oblonga cum quinque in summo cuspidibus, continentia infundo semina quaternaria rotunda fusca, ritu congenerum.

p. 355. l. 2. post sterile add. *C. P. B. & I. B.*

p. 360. l. 8. subjung.

Laurus hæc *Alexandrina* fruticat virgulis multis cubitalibus flexilibus obsequiosis ramosis, quos ornant folia hilari virore lucida mucronata ad *Myrtina* accedentia. Septembri mense exeunt è ramorum cimis capitula parva rotunda herbacea ad basin

p. 337. l. 6. post 101. add. *Pitsiegam-*
mulla *Hort. Mal. tom. 6. 91.*

p. 337. l. 23. subjung.
Ibiscus Moris. v. Malva.

p. 338. l. 27. subjung.
Iris angustifolia, Prunum redolens minor
C. B. P. 33. Iris tuberosa humilis, seu Cha-
mæiris angustifolia Moris. Hist. 2. 355. Iris
Graminea, cui pereunt quotannis folia
I. B. tom. 2. l. 19. 727.

Iris angustifolia candida, lineis rubentibus
donata C. B. P. 33. Iris angustifolia, flore
albo I. B. tom. 2. l. 19. 728.

p. 343. l. 26. subjung.
Iridi bulbosæ affinis I. B. v. Sifynrichium.

p. 344. l. 3. post 909. add. ANN.

p. 344. l. 6. post 909. add. ANN.

p. 344. l. 6. subjung.

Isatis sylvestris minor Lusitanica. ANN.

Folia protulit Myagro quodammodo
paria, sed paulò ampliora, cauliculos spitha-
meos ramosos graciles, flosculos luteos te-
trapetalos exiguos, siliculas compressas
fungosas avis linguam referentes, in qua-
rum medio semen unicum flavum oblon-
gum acre, more congenerum.

p. 346. l. ultim. subjung.

Juripeba Fœmina Pison. v. Solanum.

p. 348. l. ult. subjung.

Kawutuwa Zeylonensibus. v. Euphrasia.

LAURUS ALEXANDRINA FRUCTU E SUMMITATE
CAULIUM PRODEUNTE HORT. REG. PARIS.

flore monopetalo in viridi pallescente sex
exiguis crenis diviso vestita, quo marce-
scente, transeunt capitula in fructus globo-
sos pulchrè rubentes baccis Asparagi simi-
les, includentes sub pelliculâ tenui & par-
câ pulpâ nucleum unicum rotundum palli-
dum durum. Subsunt radices fibrosæ albæ
longæ multæ, facie Asparagi ex uno cespite
promissæ. Vide an hæc sit eadem quam
Morisonius in *Hort. Bles.* 279. descripsit no-
mine Lauri Alexandrinæ, fructu longis pe-
diculis, caulibus alligato?

p. 360. l. ultim. post 335. add. Arveira
Pison. l. 4. 132.

p. 368. l. 24. subjung.

Leucojum clypeatum, Serpilli folio *Morif. Hist.* 2. 248. *Thlaspi clypeatum*, Serpilli folio *C. P. B.* 107. *Lunaria peltata minima* quibusdam *I. B. tom.* 2. l. 22. 935. ANN.

p. 369. l. 2. subjung.

Leucojum spinosum *I. B. v. Thlaspi.*

p. 370. l. 17. subjung.

Lilac Persarum *Corn. v. Syringha.*

p. 573. l. 13. subjung.

Lilium album vulgare, foliis ad limbos flave-
scentibus.

Idem foliis flaventibus maculis inscriptis.

p. 374. l. 17. post 119. add. *Lilionarcif-
sus rubeus Indicus Aldin. Hort. Farns.* 83.

p. 374. l. 20. subjung.

LILIUM ZETLANICUM UMBELLIFERUM ET BUL-
BIFERUM.

Lilium Africanum humile longissimis foliis
polyanthos, saturato colore purpurascens.
Idem diluto colore purpurascens.

Nuspian magnificentiùs florulentam
suam purpuram explicavit Lilium Africa-
num humile, quàm in Pandocheo Fagelia-
no, nitidioris Floræ amœnitatibus instru-
ctissimo. Utrique subjungitur bulbus ro-
tundus magnitudine & formâ Lilium
Sphœricum adæquans, cujus duris mem-
branaceis corticibus, ex quibus totus com-
pactus videtur, lanosa pallida filamenta
intertexta sunt. Foliis viget totâ æstate
Sphœrico paribus, sed proventu prolixiori
humi jacentibus. Septembri mense erigi-
tur scapus prope palmaris in viridi puni-
ceus, è cujus bifidâ membranaceâ vaginâ
funduntur deni aliquando viceni flores in
orbem diradiati hexapetali, formâ & colore
Narcisso Liliaceo Ferrarii pares, magni-
tudine verò inferiores, odore Hyacinthum
racemosum Muscari seu Dipcadi dictum
æmulantes, Alterius flore purpurâ satura-
tione, alterius verò dilutior gratissimè ru-
bente. A floris interitu apparent vascula
oblonga trigona tricapsularia, foeta semini-
bus more cœterorum.

p. 375. l. 9. jung.

Lilium Zeylanicum umbelliferum & bulbife-
rum. Tolabo Zeylanensibus *Mus. Zeylan.*

Ex

nore *Moris. Hist.* 2. 553.

p. 381. l. ultim. subjung.

Lunaria peltata minima I. B. v. *Leucojum*.

p. 385. l. 21. subjung.

Lunala Zeylanensium. v. *Narcissus*.

p. 387. l. 27. add. *Papaver spumeum*,
sive *Lychnis sylvestris*, quæ Been album
flore pleno *Breyn. Prodr.* 43.

p. 388. l. 18. subjung.

Lychnis sylvestris angustifolia, viscosa præ-
cox rubra, foliis *Caryophyllaceis* *Moris.*
Hist. 2. 536. *Lychnis sylvestris viscosa ru-*
bra angustifolia C. B. P. 205. *Odontidi*, sive
Flori cuculi affinis, *Lychnis sylvestris* 1.
Clusii in Pannon. 4. in *Hist.* post I. B. 3. l.
29. 348.

p. 392. l. 5. add. descripta quoque vi-
detur à *Boccone* in *Ic. & Desc. Pl. Sic.* 27.
sub nomine *Lychnidis foliis glabris*, calyce
duriore.

p. 398. l. 3. subjung.

Macerone I. B. v. *Smyrnum*.

Madaram-pulli Hort. Mal. v. *Tamarindus*.

p. 398. l. 18. subjung.

Malacka-pela Hort. Mal. v. *Guajavas*.

p. 408. l. 19. subjung.

Mandsjadi Hort. Mal. v. *Phaseolus*.

Maon Hernand. v. *Tagetes*.

p. 409.

Ex hujus bulbo oblongo albido lanuginoso assurgunt folia Narcissina lata glabra plana carinata & flexuosa, inter quæ attollitur thyrsus nudus rotundus bipalmis, cujus summum coronatur floribus senis novenis (pro plantæ ætate aut foli vel climatis ubertate) modo paucioribus modo pluribus in umbellam congestis, omnibus simul è vaginâ membranaceâ bifidâ prorumpentibus; Singuli verò sex candidis angustis longulis petalis construuntur, in quorum medio prominet stylus cum sex albidis staminibus, in versatiles flavescentes farinaceos apices desinentibus. His defluxis succedunt in conceptaculis trigonis tricapsularibus semina fusca angulosa, quæ in bulbos grandescunt, conceptacula dirumpunt, & germina protrudunt. Eadem semina bulbacea observantur in Liliis Sphæricis, Sifynrichiis nonnullis, aliisque hexapetalis bulbosis Indicis Africisque.

p. 375. l. 22. subjung.

Lilium Zeylanicum superbum vulgò. v. Methonica.

p. 379. l. 19. post albo add. Linaria annua angustifolia, flosculis longis albis caudatis Triumph. Obs. 87.

p. 381. l. 17. subjung.

Linum perenne minus cœruleum, capitulo minore

MERCURIALIS ZETLANICA TRICOCCOS CUM
ACETABULIS.

p. 409. l. 30. post 230. add. Ocimastrum
Valentinum Clusii vulgò.

p. 239. l. 11. subjung.

Matzatli Hernand. v. Ananas.

p. 420. l. 4. subjung.

Melilotus Lusitanica, rotundo crenato folio
procumbens, corniculis reflexis longis, ex
eodem centro ortis. ANN.

Quibus notis hæc Melilotus ab Italica
corniculis incurvis *I. B.* differat, vel solum
nomen indicabit.

p. 420. l. 11. subjung.

Melissa adulterina quorundam, amplis foliis &
floribus, non grati odoris *I. B. tom. 3. l. 28.*
233. Lamium montanum, Melissæ folio *C.*
B. P. 223.

p. 421. l. 4. subjung.

Melocactos C. B. P. v. Ficoides.

Melongena vulgò. v. Solanum.

p. 423. l. 17. subjung.

Mercurialis Zeylanica tricoccos cum acetabu-
lis. Kupamenija Zeylanensibus. ANN.

E radice annuâ albente modicè fibrosâ
furriguntur caules, nunc unicus, nunc plu-
res, ramosi rotundi pedales striati, ad quo-
rum genicula hærent folia ex longis pedi-
culis, Mercurialis effigie, subrotunda glabra
levissimè crenata, ex horum sinubus verò
oriuntur teneræ semidigitales alæ, quos al-
terno ordine cingunt parva herbacea ace-
ta-

tabula cum parvis è medio prodeuntibus pulchellis brevissimis thirfulis, multis herbaceis villosis & cirrosis flosculis vestitis, quibus subsunt lappacei rotundi globuli terni simul juncti, singulis continentibus semen parvum congeneribus suppar. Crevit in Horto ex seminibus anno millesimo sexcentesimo octuagesimo quarto. In Zeylona & Malabara luxuriat in fimetis, Hinc Kupamenija hoc est stercoreis seu fimi amans appellatur. Virtutes obtinet similes cum cæteris suæ fortis.

p. 424. l. 24. subjung.

METHONICA Malabarorum. Nienghala Zeylonensium *Mus. Zeyl.* Lilium Zeylanicum superbum vulgò.

Sustinetur hæc planta radice oblongâ ex rotundo nonnihil compressâ, formâ anconem seu literam T ex duobus quasi brachiis cohærentem, referente, foris fuscâ intus albâ carnosâ, gustus amari nauseosi, è cujus medio superiori angulo prodeunt sarmenta herbacea rotunda nodosa ramosa, altitudine trium quatuorve pedum, quæ vel humi incumbunt, vel vicinas arbores scandunt varioque flexu illas comprehendunt; Cuilibet nodo adhæret folium glabrum planum politum, latitudine duorum triumve digitorum, longitudine verò prope dodrantali in longum recurvum capreolatum mucronem des-

p. 430. l. 7. subjung.

Mouricon Hort. Mal. v. Coral arbor.

Mudela-Nila-Hamatu Hort. Mal. v. Stramo-
nia.

p. 431. l. ult. post 760. add. *Adiantum*
aureum vulgò.

p. 433. l. 25. subjung.

Myrtillus vulgò. v. Vitis Idæa.

p. 434. l. 23. subjung.

Myrtus tenuifolia Belgica vulgò.

p. 436. l. 25. subjung.

Nalla mulla Hort. Mal. v. Syringha.

p. 444. l. 7. subjung.

Narcissus Zeylanicus, flore albo hexagono
odorato. Lunala Zeylanensibus.

Huic substernitur bulbus oblongo rotun-
dus pallidus, sub corticibus suis lanugino-
sus, folia promens Narcissina, ast breviora;
Ad horum latera assurgit thyrsus levis, cras-
situdine calami, proceritate dodrantali, in
cujus apice turget vagina membranacea, ex-
cludens florem unicum hexagonum mo-
nopetalum candidum odoratissimum, sex
foliaceis deorsum flexis circinnatisque la-
ciniis dissectum. Medium occupat calix,
duodecim per oras crenis incisus, ex
quo producitur stylus cum sex subalbidis
falcatis staminibus in luteos apices desinen-
tibus. Sequuntur semina fusca angulosa in
vasculo tricapsulari, de more congenerum.

desinens. Ex summis ramis aliquando etiam foliorum alis oritur petiolus, sustinens florem nudum, odore quidem vacuum, sed structuræ raritate & coloris pulchritudine cæteros flores omnes, quos Zeylona & Malabara suppetunt, longè superantem. Constat verò sex angustis semidigitum longis, elegantissimè fimbriatis petalis, totidem apiculatis staminibus, & stilo intermedio tricuspidato. Primis ab exortu diebus in viridi flavescit & Fritillariæ ritu propendet, dehinc expanditur, ejusque petala stamina & stylus sursum retroque vertuntur & sensim in aureum, tandemque exquisitissimum coccineum colorem faciunt. His omnibus defluxis perficitur seminarium amplitudine Nucis Juglandis, subrotundum trigonum tricapsulare, quod in tres coriaceas tenaces membranas dehiscit, refertum seminibus parvis angulosis rubris, duplici serie dispositis. Luxuriavit olim in Horto Beverningiano, nunc quoque superbit in Fageliano. De radicis viribus & usu cæterisque huc pertinentibus, tractabitur in Musæo Zeylanico.

p. 426. l. 23. subjung.

Milium maximum Indicum. Lithospherum Arundinaceum aliud Tozcuitlapilxochitl *Hern.* 282. Milium solis *Bont. l.* 4. 152.

p. 430.

NARCISSUS ZEYLANICUS FLORE ALBO HE-
XAGONO ODORATO.

Minor hujus Narcissi species à majori differt partium omnium parvitate aliquando etiam florum laciniis minus contortis, & per oras pallidè cœruleâ, lineâ virgatis.

Narcissus Africanus bifolius sive exoticus L. B. v. *Hæmanthus*.

p. 447. l. 7. subjung.

Natrix Moris. Dalech. I. B. v. Anonis.

p. 451. l. 21. subjung.

Nila-humatu Hort. Mal. v. Stramonia.

p. 452. l. 4. subjung.

Nux Been Zeylanica, siliquâ triangulâ seminibus alatis. *Moringeros Lusitan. Katu Murungha Zeylanensium Mus. Zeyl.*

p. 458. l. 10. post 51. add. *Securidaca clypeata*, flore luteo, *Lentis folio*, *Zeylanica Breyn. Prodr. 46.*

p. 472. l. 5. add. *Palma Vinifera Belgarum Breyn. Prodr. 43.*

p. 477. l. 6. subjung. *Passiflora Cas. Tab. v. Cucumis.*

p. 478. l. 22. subjung. *Pelon Mexiquilitl & Pelon Chilli Hernand. v. Viola.*

p. 480. l. 26. subjung. *Pentaphyllum peregrinum siliquosum bivalve majus & minus Moris. v. Sinapistrum.*

p. 484. l. 2. subjung. *Periclymenum perfoliatum*, folio variegato *Dni Marefanti.*

Ptarmica Rhabhani aquatici folio, flore amplo rubello Dni Watfii.

p. 512. l. 9. subjung.

Pyro similis fructus alter in novâ Hispaniâ C. B. P. v. Anona.

p. 512. l. 12. subjung.

Quadrifolium phæum fuscum Lobelii I. B. v. Trifolium.

p. 512. l. 13. subjung.

Quautzapotl Hern. v. Anona.

p. 514. l. 22. subjung.

Ranunculus Cassubicus, foliis Thoræ Breyn. Prod. 45. Planè diversus est à Ranunculo sylvatico, folio subrotundo, & propterea ab hoc separandus.

p. 525. l. 19. post 643. add. *Ricinus Americanus Aldin. Hort, Farnes. 87.*

p. 528. l. 12. subjung.

Rosa de Hiericho I. B. v. Thlaspi.

p. 513. l. 23. post 334. add. ANN.

p. 513. l. 23. subjung.

Rubia arvensis, flore albo humilior. Asperula arvensis, sive annua, flore albo Sutherl. Cat. Edinb. 37. ANN.

p. 531. l. 15. subjung.

Rutæ pratensis genus minus, semine striato I. B. v. Thalictrum.

p. 534. l. 3. subjung.

Salvia sylvestris, Verbaſci latis foliis Moris. Hort. Bles. 388. Verbaſcum latis Salviæ fo-

X x 4

liis

p. 490. l. 7. subjung.

Peuvetti Hort. Mal. v. Solanum.

p. 494. l. 20. subjung.

Phaseolus arbor Indica incana, filiquis torosis.
Kayan dicta. Thora paerou Hort. Mal.
tom. 6. 23. Cajan Arbor Indica foliis Tri-
folii bituminosi, filiquis Orobi Breyn. Prod.
20. Kayan vulgò.

p. 495. l. 4. post Zeylan, add. Mandsjadi
Hort. Mal. tom. 6. 25. Mangili vulgò.

p. 495. l. 5. subjung.

Phu Olusatri folio C. B. P. v. Valeriana.

p. 496. l. ultim. subjung.

Pinea Indica Hern. v. Ananas.

Pino Brasiliensibus Marcg. & Pison. v. Urtica.

p. 496. l. 21. subjung.

Pitsiegam mulla Hort. Mal. v. Jasminum.

Pityusa multis I. B. v. Tithymalus.

p. 503. l. 11. subjung.

Polygonum Faemina I. B. v. Equisetum.

p. 503. l. 15. subjung.

Polytrichon Officinarum C. B. P. v. Trichomanes

p. 509. l. 20. subjung.

Prunus Zeylanica spinosa, foliis & fructibus
rotundis. Ilanda Zeylonensibus Mus. Zeyl.

p. 510. l. 12. subjung.

Ptarmica foliis profundius ferratis, lætè viri-
dibus, elatior.

p. 10. l. 16. subjung.

Ptarmica Alpina, incanis ferratis foliis.

Ptar-

Securidaca lutea minor, corniculis reflexis C.
B. P. v. *Astragalus*.

p. 558. l. 6. post 631. add. *Abfus Pro-*
speri Alpini Moris. Hist. 2. 146.

p. 562. l. 26. subjung.

Sideritis Alsine Trixaginis folio C. B. P. 233.

p. 572. l. 26. post 167. add. *Solanum*
Pomiferum, fructu rotundo I. B. tom. 3. l.
34. 618. *Curbisolanum* Frid. Cæs. in Tab.
935. *Melongena* vulgò.

p. 578. l. 21. Inferatur Ico *Sorbi Vir-*
ginianæ, descriptæ à Breynio in Pr. 51.

p. 584. l. 13. subjung.

Soortsack parvum vulgò. v. *Anona*.

p. 579. l. 9. subjung.

Spelta I. B. v. *Zea*.

p. 586. l. 24. post 102. add. *Nalla mulla*
Hort. Mal. tom. 6. 87.

p. 504. l. ult. subjung.

Tanacetum hortense, foliis & odore Menthæ.
Menta hortensis corymbifera C. B. P. 226.
Mentha corymbifera sive Costus hortensis
I. B. tom. 3. l. 26.

p. 589. l. 14. subjung.

Taxus foliis variegatis Cat. Hort. Reg. Par. app.

p. 593. l. 23. subjung.

Thlaspi fruticosum de Jericho majus Moris.
Hist. 2. Icon. Thlaspi Rosa de Hiericho di-
ctum Moris. Hist. 2. 328. *Rosa Hiericho*
I. B. tom. 2. l. 16. 204.

liis C. B. P. 240. Verbascum sylvestre, Salvifolium exoticum, folio rotundiore I. B. tom. 3. l. 28. 307.

p. 534. l. 4. subjung.

Sambach Alpino I. B. v. *Syringa*.

p. 534. l. 20. subjung.

Samolus Valerandi I. B. v. *Veronica*.

p. 536. l. 25. subjung.

Sanicula montana Americana repens peregrina
Cat. Hort. Reg. Paris. v. *Cortusa*.

Sanicula Americana altera, flore minuto fimbriato *Cat. Hort. Reg. Paris.* v. *Cortusa*.

p. 537. l. 12. subjung.

Satureja Cretica C. B. P. 223. *Thymbra Græca* I. B. tom. 3. l. 28. 273. *Tragoriganum Alpin. Exot.* 79.

p. 540. l. 17.

Scabiosa capitulo globoso minor C. P. B. 271.

Scabiosa minor vulgaris I. B. tom. 3. l. 25. 3.

Foliis nunc latioribus, nunc angustioribus;
Floribus modo purpureis modo cœruleis.

p. 540. l. 20. subjung.

Scabiosa stellata, folio laciniata minor, five maritima C. B. P. 271. *Scabiosa cum pulchro semine minor* I. B. tom. 3. l. 25. 7.

p. 543. l. 18. post 247. add. *Scorodonia* vulgò.

p. 549. l. 9. subjung.

Securidaca clypeata, flore luteo, Lentis folio Zeylanica Breyn. v. *Onobrychis*.

p. 597. l. 5. subjung.

Thlaspi clypeatum Serpilli folio C. B. P. v. Leucojum.

p. 597. l. 7. subjung.

Thera-Paerou Hort. Mal. v. Phaseolus.

p. 603. l. 1. subjung.

Tolabo Zeylanensium. v. Lilium.

p. 603. l. 21. subjung.

Tozcuilapilxochitl Hern. v. Milium.

p. 609. l. 12. subjung.

Tsetti mandarum Hort. Mal. v. Crista Pavonis.

p. 619. l. 24. subjung.

Verbena Americana, Urticæ foliis angustioribus, flore cœruleo.

p. 623. l. 2. subjung.

Viburnum Americanum odoratum, foliis Urticæ, floribus miniatis. Camara Marcgr. l. 1.

c. 4. 5. Camara Tinga Pison. l. 4. c. 30. 176.

p. 626. l. 13. subjung.

Vicia minor hirsuta, flore minimo rubente Cat. Edinb. Sutherl.

p. 635. l. 5. subjung.

Wanapala Malabarorum. v. Adhatoda.

p. 365. l. 3. post 323. add. Pino Brasiliensibus Marckgr. l. 1. c. 23. 48. Pino, sive Urtica Pison. l. 4. c. 54. 235.

FINIS.

698 HORTUS ACADEMICUS
SORBUS VIRGINIANA, FOLIIS ARBUTI BRETN.

MENDÆ CORRIGENÆ

P. 10. l. 3. add. l. 37. P. 30. l. 1. leg. *Paniculis*. P. 30. l. 6. leg. *Cieca*. P. 46. l. 1. leg. *purpureo*. P. 54. l. 24. leg. *foliaceas*. P. 54. l. 28. leg. *longitudinem*. P. 58. l. 14. leg. *Angelica*. P. 60. l. 14. leg. *Obscuro*. P. 60. l. 17. leg. *pistillo*. P. 60. l. 19. leg. *Dioscoridis*. P. 62. l. 20. leg. *subfunt*. P. 62. l. 24. leg. *his*. P. 66. l. 27. leg. *late quo*. P. 73. l. 19. leg. 17. P. 74. l. 14. leg. *conjugatim*. P. 83. l. 7. leg. *Ficoides*. P. 84. l. 2. leg. *Ficoides*. P. 89. l. 17. leg. *longo*. P. 94. l. 13. add. 112. P. 101. l. 19. pro *Eruca* leg. *Rhaphanistrum*. P. 102. l. 6. leg. *Calamintha*. P. 107. l. 14. add. *flore*. P. 121. l. 15. leg. *Ostryi*. P. 128. l. 21. leg. *Profunde*. P. 131. l. 11. pro *Lathyrus* leg. *Tithymalus*. P. 133. l. 2. add. 69. P. 135. l. 3. pro *CERASUS* leg. *Cerasus*. P. 143. l. 8. leg. *Chrysanthemum*. P. 145. l. 12. præf. *. P. 145. l. 13. leg. *Bupthalamum*. P. 146. l. 14. add. *Americanum*. P. 148. l. 5. leg. *album*. P. 148. l. 17. præf. *. P. 154. l. 6. leg. *quina*. P. 160. l. 26. 27. 28. comprehendantur sub uno paragrapho. P. 162. l. 24. leg. *quarum*. P. 174. l. 29. leg. *multijuga*. P. 210. l. 21. leg. *deciduo*. P. 212. l. 22. leg. 273. P. 217. l. 10. leg. *Cytisus*. P. 221. l. 16. leg. *Dipsacus*. P. 225. l. 3. add. 254. P. 225. l. 5. add. 254. P. 236. l. 9. leg. *Illustrissimi*. P. 246. l. 19. leg. *farinaceis*. P. 261. l. 18. leg. *Fritillaria*. P. 277. l. 26. leg. *superiori*. P. 277. l. 28. leg. *Virtute*. P. 298. l. 29. leg. *Oceanicum*. P. 302. l. 1. deleatur *. P. 305. l. 25. leg. *GUAIANA*. P. 306. l. 23. leg. *Clematidis*. P. 321. l. 9. leg. *HYACINTHUS*. P. 343. l. 27. pro *Apocynum* leg. *Aloe*. P. 350. l. 25. leg. 322. P. 350. l. 29. leg. 323. P. 354. l. 28. leg. *Bononiense*. P. 360. l. 3. leg. 575. P. 361. l. 11. deleatur *ANN*. P. 388. l. 6. leg. 348. P. 388. l. 11. add. 205. P. 409. l. 23. leg. *Mastichina*. P. 416. l. 24. leg. *Deltoideam*. P. 417. l. 1. leg. *constanter*. P. 433. l. 2. leg. 977. P. 423. l. 5. leg. 977. P. 434. l. 25. leg. *Myrtus*. P. 442. l. 24. leg. *lutea*. P. 445. deleantur lineæ 22. 23. 24. 25. P. 454. l. 5. leg. *intercurfantibus*. P. 416. l. 8. deleantur in *App*. P. 503. deleatur linea prima. P. 503. l. 8. pro *Pyrola affinis* leg. *Telephium*. P. 510. l. 29. leg. *Umbelliferum*. P. 537. l. 14. leg. *transmisit*. P. 543. l. 11. leg. *spinosus*. P. 544. l. 15. leg. *laciniato*. P. 545. l. 2. leg. *radice*. P. 545. l. 14. leg. *sesquicubitatis*. P. 577. l. 24. leg. *recurvo* item *Chondrilla*. P. 568. l. 6. leg. *Bulbosæ*. P. 576. l. 25. leg. *Solanum*. P. 580. l. 6. leg. *ferratis*. P. 492. l. 24. leg. et. P. 599. l. 5. leg. *ingruente*. P. 615. l. 4. leg. *lateralibus*. P. 631. l. 51. leg. *purpurascens*. P. 638. l. 26. leg. *accedentis*. P. 641. l. 11. leg. *eundem*. P. 641. l. 15. leg. *Botanophilis*. P. 645. l. 13. *Quantzapotl*. P. 652. l. 17. leg. *Hern*. P. 652. l. 19. leg. *Azadarach*. P. 658. l. 2. leg. *seminibus*. P. 658. l. 25. add. *Semina quoque Flori solis similia, sed minora admodum, nigrescente cortice, medullâ sapore & odore ingrata, se observasse fatetur Fabius Columna in Annot. ad Rech. p. 881.* P. 668. l. 18. add. *sunt*. P. 670. l. 62. leg. 262. P. 672. l. 13. deleatur et. P. 672. l. 23. leg. *Leucojo*. P. 679. l. 8. leg. *Hort*. Cetera quæ irreperunt vitia B. L. suocorrigat genio.

2122

AN 140

FD 31-

Front 106 plate

CAP

cancel on 508

and 743

R.H.

41-183