581.947
K26d
pt.2-6

REGAL

DESCRIPTIONES PLANTARUM
NOVARUM ET MINUS COGNI-
TARUM

BIOLOGY

MAR 1 1957
BIOLOGY

DESCRIPTIONES

PLANTARUM NOVARUM ET MINUS COGNITARUM IN REGIONIBUS
TURKESTANICIS A CL. P. ET O. FEDSCHENKO, KOROLKOW,
KUSCHAKEWICZ ET KRAUSE COLLECTIS.

CUM

adnotationibus ad plantas vivas in horto Imperiali botanico
Petropolitano cultas.

FASCICULUS II.

AUCTORE

E. Regel.

Изъ «Трудовъ Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго
Сада» Т. III.

581.947

R 26d

Pl. 2.-6

Bunge

Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum in regionibus turkestanicis a Cl. P. et O. Fedschenko, Korolkow, Kuschakewicz et Krause collectis. Cum adnotationibus ad plantas vivas in horto Imperiali botanico Petropolitano cultas.

Fasciculus II. Auctore E. Regel.

1. ACANTHOLIMON KOKANDENSE BGE (mss.) *).

A. (Staticopsis, androsaceum) laete-virens, totum hispidulum; foliis omnibus subulatis undique hispidulis, scapis folio duplo longioribus monostachyis patulo-hispidis, spicis confertis 5 — 6- spiculatis, rhachi pubescente, bracteis glabris interioribus obtusis tubum calycis (5" longi) subsuperantibus.

In descensu inter Isfairam et Alei leg. O. Fedschenko. A. alata vico proximum, foliis et indumento distinctum.

2. ACANTHOLIMON ERYTHRAEUM BGE (mss.).

A. (Tragacanthina, Erythrostoma) viride, glaberrimum, confertifolium, scapis monostachyis folio brevioribus, spicis confertis secundis sub-5-spiculatis, rhachi glaberrima, bractea exteriori late ovata dimidio brevior interioribus obtusis muticis glaberrimis tubum calycis (5¹/₂" longi) superantibus, tubo superne hispido, limbo rubello mutico.

Prope Kech, incolis Kampyr murusch. Leg. O. Fedschenko.

3. ACANTHOPHYLLUM SQARROSUM BOISS. β . GLABERRIMUM BOISS.

A. squarrosum Boiss. habitu robustiore, caulium internodiis longioribus, foliis rigidioribus, calycis dentibus lanceolatis in spinam brevem excurrentibus ab A. spinoso dignoscitur.

α . *typicum*, crispulo-pubescentibus, calycibus dense pubescentibus.

*) Die mit Bge (mss.) bezeichneten Arten sind von A. von Bunge aufgestellt und die Beschreibungen uns vom Autor mitgetheilt.

Botany 20 Nov 23 Wiegand Face. 2-10 and 21 mss.

C. M. A. C.

A. squarrosus Boiss. diagn. ser. II. I. pag. 81.—Boiss. et Buhse pl. transc. pag. 39.—Boiss. fl. or. I. pag. 562.

β. *glaberrimum*; caule foliis calycibusque glaberrimis. Boiss. fl. or. I. c.

4. AGAVE PUBESCENS RGL. ET ORTG.

Amaryllideae.

A. pubescens; humilis, acaulis; foliis lorato-lanceolatis, undulatis, coriaceis, recurvo-patentibus et deinde dependentibus, integerrimis, utrinque dense pubescentibus, supra opaco-viridibus, subtus pallidioribus, utrinque fusco-maculatis; scapo erecto, tripedali et ultra, bracteato; bracteis lanceolato-subulatis, erecto-patentibus; spica simplici, laxiflora; floribus sessilibus; bracteolis parvis, subulatis; perianthii tubo recto, subaequilato, ovarium duplo superante, limbi laciniis revolutis, tubo brevioribus; staminibus corollam plus duplo superantibus, stylum circiter aequantibus; stigmatibus breviter trilobo. — Flores virides. Perigonium incluso ovario circ. 35 m. m. longum. — Plantas vivas cl. Roezli e Mexico misit.—*A. pubescens* Rgl. Grtfl. tab. 804.

Agave maculosa Hook. (Bot. Mag. tab. 5122) foliis lanceolato-subulatis denticulatis glabris, staminibus perigonii laciniis erecto-patentibus circiter aequantibus, *A. maculata* Rgl. (Grtfl. 1857 pag. 158) foliis planiusculis (nec undulatis) glabris, perigonii tubo supra ovarium coarctato infundibuliformi apicem versus ampliato, ovarium circiter aequante, limbi laciniis erecto-patentibus tubum circiter aequantibus, facile dignoscuntur. A caeteris speciebus hujus sectionis, species nostra foliis utrinque dense pubescentibus integerrimis maculatis florumque structura longe distat.

5. AMARYLLIS (HIPPEASTRUM) ROEZLI RGL.

Amaryllideae.

A. Roezli; spatha tetraphylla, phyllis exterioribus oppositis anguste lanceolatis erectis, interioribus filiformibus recurvis sepalisque an-

gustioribus ab *A. equestri* diversa. — *A. Roezli* Rgl. Grtfl. tab. 809. — Bulbus ovato-oblongus. Folia ensiformia, obtusiuscula, glabra, striata. Scapus ante folia evolutus, iisdem lateralis, fistulosus, teres, glaber, viridis, rore glauco tectus, suberectus, circiter 30 c. m. altus. Spathae phylla exteriora dorso carinata, rubescentia, pedunculos germinaque superantia; interiora filiformia, albida, mox recurva, pedunculos paullo superantia. Flores gemini, nutantes. Pedunculi teretes, erecti et apice paullo curvati, 2—2½ c. m. longi. Perigonium infundibulare; tubus cylindricus, fere calamum crassus, cylindricus, sulcatus, lurido-purpurascens, circiter 2 c. m. longus; limbus sexpartitus, infundibularis, irregularis, subringens, superne patentissimus, miniatus, basi interiore albidus; laciniae margine undulatae, apice recurvae, exteriores oblongo-lanceolatae ex apice rotundato-apiculatae, interiores laterales paullo minores oblongo-lanceolatae obtusae, interior infima anguste lanceolata porrecta obtusa exteriores aequans; laciniae tres superiores fauce utrinque fimbriatae. Genitalia declinato-adscendentia, perigonio concolora et eodem paullo breviora. Antherae oblongae, incumbentes, flavae.

6. *ASTRAGALUS CORYDALINUS* BGE (mss.).

A. (Euodmus) foliolis 6—10-jugis ellipticis obtusis, racemis longe pedunculatis, floribus cernuis, calyce tubuloso campanulato *basi calcarato-saccato!* bibracteolato parcissime basi nigro alboque setuloso; vexilli ungue hamato-curvato, alis carinaque persistentibus, ovario semibiloculari glabro 13—15-ovulato.

Hab. in montibus Irtasch Turkestaniae (Krause!). Calycis structura distinctissima species, forsitan melius ad *Calycocystis* referenda, si calyx tunc demum turgescit, quod e specimine juvenili judicari nequit.

7 *ASTRAGALUS CYRTOBASIS* BGE (n. 950 b.).

Astragali subgenus *Calycocystis*, sectio nova *Cyrtobasis* (99 b.). Herba caulescens, caulibus brevibus erectis, pube patula medio fixa mere

alba hirsuta. Stipulae lanceolatae inter se liberae breviter petiolo adhaerentes. Folia impari—pinnata, petiolus marcescens. Spicae ovatae capitatae dense multiflorae sessiles. Bractae lineares elongatae, bracteolae nullae. Calyx basi compressus transverse dilatatus, ventre basi tenuissime membranaceus valde gibbus, sursum angustatus dentibus elongatis herbaceis lanceolato-subulatis conico-conniventibus. Corolla purpurascens persistens petalis longe unguiculatis calycem vix excedentibus. Vexilli lamina subpanduriformis apice integra basi obtusangula. Alae vexillum subaequantes. Carina alis paulo brevior, lamina minuta acutiuscula. Vaginae filamentorum subaequaliter connatorum basis transverse calycis basi adnata, ita ut ovarium et vexillum cum stamine solitario in angulo calycis interno inserta apparent, alae vero et carina cum filamentorum vagina basi unguium connatae ex angulo externo calycis oriuntur. Ovarium subsessile subbiloculare 8—10-ovulatum. Stigma nudum. Legumen (juvenile) hirsutissimum, esulcatum, subbiloculare calyci inclusum oligospermum.

Habitat in Turkestaniae montibus centrasiaticis Mogol-tau, unica species, habitu *A. chaetodontis*, a quo differt calycis structura singulari et ovario biloculari. Specimina collecta duo tantum, quorum alterum nondum florens, alterum florere incipiens. (Coll. Sewerzow).

8. *ASTRAGALUS CYTISOIDES* BGE (mss.).

A. (Erioceras) suffruticosus, stipulis petiolo brevissimo longe adnatis, foliolis ternatis obovatis subpungentibus, racemis abbreviatis pedunculatis, leguminibus rectis cuspidatis.

Specimina duo in jugo Karatau occidentali collegit Sewerzow.

Nulli aliae sectioni adjungendus nisi *Eriocerati*; *A. arcuato* et *eriocerati* evidenter affinis, attamen signis in diagnosi indicatis distinctissimus. Fruticulus, ut videtur in rupium fissuris crescens et solo adpressus. Caulis lignosus ramosissimus; rami abbreviati conferti, juniores sericeo-cani. Stipulae inter se liberae, quamvis amplexicaules, membranaceae, basi glaberrimae, apice extus molliter sericeo-villosae. Foliola e basi cuneata obovata, cuspidato-subpungentia, utrinque pube prostrata

cana, medium paullo majus ad summum 5" longum superne fere 2" latum. Pedunculi axillares pollice vix longiores, racemum brevem etiam fructiferum confertum 6—10-florum ferentes, patulo-albo-villosi pube nigra parca brevior immixta. Bracteae majusculae persistentes membranaceae oblongae obtusae albo nigroque villosae. Legumen oblongo-lineare, 14—16" longum, 2" latum, rectum rarius modice curvatum, in cuspidem rectum attenuatum, dense et longe villosum, esulcatum, complete biloculare.

9. ASTRAGALUS EREMOSPARTOIDES RGL.

Pilis simplicibus adpressis subsericeus; suffruticosus, caespitosus, basi ramosissimus; ramis abbreviatis; petiolis *aphyllis*, teretibus, filiformibus, persistentibus, acutis (non spinescentibus); stipulis parvis, subrotundis breviter acuminatis v. e basi late ovata lanceolato-acuminatis, petiolo adnatis; pedunculis nudis, tereti-filiformibus, petiolos usque duplo superantibus, apice remote 2-plurifloris; floribus brevissime pedicellatis, remotis; bractea minima, lanceolata, pedicello duplo brevior; calyce tubuloso-subcylindrico, non vesicario; corolla calycem plus duplo superante; legumine sessili, recto, subcylindrico, in rostrum breve acuminato, calyce triplo longiore.

Species defectu foliolorum, petiolis pedunculisque filiformi junciformibus excelsa. Radix caules abbreviati ramulique lignosi. Petioli 8—12 c. m. longi, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ m. m. lati, pedunculi 15—25 c. m. alti. Pedicelli 1 m. m. longi. Calyx 3 m. m. longus, 2 m. m. latus. Corolla ut videtur pallide flava, circiter 8 m. m. longa. Legumen immaturum 1 c. m. longum.

Habitat in desertis inter fluvium Syr Darja et Taschkentem. Legit O. Fedschenko Majo 1871.

10. *ASTRAGALUS KRAUSEANUS* RGL.

A. pilis bipartitis adpressis adpersus, virescens; caule erecto, angulato-sulcato; stipulis liberis, e basi dilatata submembranacea in apicem linearem herbaceum excurrentibus; pedicellis foliolo brevioribus; foliolis anguste lanceolato-linearibus, saepissime 4-jugis; pedunculo stricto, erecto, folium superantibus; floribus laxe racemosis, brevissime pedicellatis; racemis elongatis, laxis, folio triplo longioribus; bracteis lineari-lanceolatis, pedicellum superantibus; calycis tubo subinflato-cylindrico, pilis bipartitis dense vestito; calycis dentibus² subulato-subsetaceis, pilis simplicibus hirtis, subaequilongis, tubo 3—4 plo brevioribus; petalis flavis.

Astr. pallescenti M. B. affinis, differt autem caule erecto, pedicellis foliolo brevioribus, foliolis 4-jugis, calycis tubo-subinflato pilis bipartitis adpressis dense vestito, dentibus subaequilongis.

Turkestaniae in montibus Irtaschtsche leg. Krause.

11. *ASTRAGALUS LEIOPHYSA* BGE (mss.).

A. (*Eremophysa* Bge) glabratus; caule simplici erecto glabro, foliolis 6—8 jugis suborbiculatis ovatisve subtus ad nervos marginemque parvissime puberulis denique glabratis, spicis axillaribus abbreviatis sessilibus, calyce denique glabro, vexilli lamina integra ovata, legumine glaberrimo.

Hab. in deserto Kisil-kum a monte Karak usque ad Korshun. Majo 1871. (O. Fedschenko).

Proxime affinis A. *sphaerophysae*, sed abunde distinctus videtur caule glabro foliolisque multo minoribus plurijugis utrinque viridibus glabratis, calycibus etiam junioribus fere glabris, dentibus neququam villosis ut in illo, sed ciliatis tantum, tum vexilli lamina, quae in illo fere orbicularis, emarginata, supra latior.

Uni-bi-pedalis; folia inferiora usque ad 8 pollices longa; foliola semipollicem longa et lata, vel paulo minora. Calyx sub anthesi cum dentibus 6''' parum excedens, fructifer ambitu pollicaris. Vexillum $7\frac{1}{2}$ ''' lon-

gum. Alae 8''' parum excedentes; carina vexillum aequans. Ovarium 12 ovulatum.

12. ASTRAGALUS MUCIDUS BGE (MSS.).

Mogol-tau. 28, 29 April leg. Sewerzow.

A. (Erionotus) molliter albo-lanatus, subacaulis vel caulescens; caulibus adscendentibus, stipulis petiolo breviter adnatis membranaceis, foliis 15—20-jugis ellipticis supra dense patulo albo-lanatis, racemis breviter pedunculatis subradicalibus axillaribusve 3—5 floris, bracteis pedicellum superantibus, calycis tubulosi denique recurvati molliter longe lato-villosi dentibus tubum vexillumque subaequantibus subulatis, vexillum extus sericeo-villoso, alis carinaque parce pilosis, ovario longe stipitato 8—10-ovulato, legumine ovato-trigono semibiloculari farto.

Trope A. lanuginosum Kar. et Kir. ponendus, cui valde affinis, sed magis lanatus, flores multo minores, calycis dentes ratione tubi multo longiores, legumen multo brevius; a caeteris speciebus sectionis longius distat. Specimina juniora, attamen jam leguminibus immaturis instructa, subacaula A. erionotum et sisyrodytem referunt; alia vero nondum fructifera jam caulem tripollicarem ostendunt. Folia 3—4 $\frac{1}{2}$ pollicaria. Foliola 3—4'' longa, 1 $\frac{3}{4}$ '' lata. Calyx cum dentibus 7''' longus, vexillum 7 $\frac{1}{2}$ —8'', alae 7'', carina 6''' longa, cum in A. lanuginoso calyx 9'', tubus 6'', vexillum 12 $\frac{1}{2}$ '' alae 11 $\frac{1}{2}$ '', carina 10 $\frac{1}{2}$ '' longa. Carinae lamina ratione longitudinis totius carinae brevior et latior. Legumen, quamvis omnino maturum ignotum, 5''' (nec 9''' ut in illo) longum, ratione longitudinis latius.

13. ASTRAGALUS NEMATODES BGE (MSS.).

Mogol-tau. (11 März, 25. 29. April) Dshun bulak (20 April) coll. Sewerzow.

A. (Corethrums) subacaulis, canus; stipulis brevissime petiolo adnatis inter se liberis, foliis 1—3-jugis lineari-filiformibus longissimis, scapis racemoque laxo longatis, floribus nutantibus, bracteis pedicellum

aequantibus, calycis pube mere alba cani laciniis subulatis tubum aequantibus, corollae vexillo valde resupinato suborbiculari bilobo, alis obovato-oblongis subintegris, ovario 8—10-ovulato, legumine calycem quadruplum aequante lineari-oblongo obtuso abrupte cuspidato.

Habitus A. taurici, praesertim varietatis scopaeformis, sed affinior A. Semenovii et scopario, quibus in sectione Corethrum associandus est, abunde signis in diagnosi indicatis ab illis distinctus. Cum inflorescentia semipedalis. Foliola tenuissima saepe pollice longiora. Racemi minus laxi quam in affinibus, 10—18 flori. Vexillum brevius, latius, $4\frac{1}{2}$ " longum, 3" latum. Alae aequilongae, unguibus valde curvatis. Carina 3" parum excedens. Legumen nondum maturum sine mucrone 7" longum.

14. ASTRAGALUS SEWERZOWI BGE (mss.)

A. (Myobroma; Psilostigma) acaulis, exscapus, praeter ovarium glaberrimus, foliolis sub-15-jugis ovatis acutis, calycis lacinis tubo suo duplo longioribus alas superantibus, ovario villosio.

Unicum frustulum florens collectum in montibus Karatau a Sewerzowio. Species glabritie omnium partium et calycis laciniis subulato-iliformibus fere vexillum aequantibus ab omnibus speciebus sectionis huiusque notis facillime distinguenda. In folio unico completo e cicatricibus numeravi juga circiter 15; alterius folii pars superior abrupta. Foliola majora 5—6" longa, $2\frac{1}{2}$ " lata, vel paullo latiora, ovata, acuta. Pedunculi radicales brevissimi racemos abbreviatis 7—10-flos gerunt cogenitos ad basin foliorum. Calycis membranacei albidus tubus 3" longus, dentes inferiores paullo longiores, 6" longi. Vexillum subspathulato-oblongum, infra medium parum dilatatum, in unguem brevem latum abiens, subrectum emarginatum 10" longum, $3-3\frac{1}{2}$ " latum; alae $4\frac{1}{2}$ " longae, lineari-oblongae. Carina 7" longa. Ovarium cum styli basi sericeo-villosum, 16—18 ovulatum biloculare. Fructus ignotus.

15. *ASTRAGALUS SISYRODYTES* BGE (mss.).

A. (*Dasyanthus*) *acaulis*, *exscapus*; foliis 11 — 13-jugis, floribus subradicalibus subsolitariis, sessilibus, petalis omnibus extus sericeis, ovario sessili.

Frustulum speciei distinctissimae collectum cum praecedentibus, affine A. *pellito* Bge. et *erionoto* Bth., a priore differt praeter alia foliorum multo minorum numero multo majori, ab altero ovario sessili, foliorum numero multo minori, floribusque sessilibus. E rudimento planta videtur humilis caespitosa, radice crassa multicipite. Foliola minuta orbiculari-oblonga, utrinque molliter patule breviter villosa. Flores minuti, inter foliorum bases fere occulti.

16. *ASTRAGALUS TURKESTANUS* BGE (mss.).

Mogol-tau 29. April. coll. Sewerzow.

A. (*Christiana*) *erectus*, *strictus*, *virens*, albo nigroque hispidulus; foliolis 15—28-jugis complicatis ovato-oblongis retusis supra glabris subtus parce prostrato-pubescentibus, racemis axillaribus subsessilibus 2—4 floris laxis, calycis pube prostrata nigra brevi pilis albis subnullis hispiduli dentibus subulatis tubum dimidium vix superantibus, vexillo infra medium subconstricto basi obtusangulo, alis carinam antice retusam apice obtuse productam superantibus, ovario hirsuto 7-ovulato, legumine . . . ?

Ad calcem seriei *Christianarum* ponendus, solummodo cum A. *retamocarpo* et *leucomelano* comparandus. A priore differt praesertim ovario hirsuto, foliorum forma et indumento calycis foliorumque, ab altero indumento, foliorum forma et alis carinam superantibus. Specimina juniora florida tantum collecta. Caules ex una radice videntur plures usque ad 10-pollicares, tunc demum altius excrescentes, angulati. Folia 5-pollicaria, foliolis plerumque ultra 50 sat densis $3\frac{1}{2}$ —4" longis diu complicatis. Calyx cum dentibus 5''' longus. Vexillum $8\frac{1}{2}$ ''' . Alae fere 8'' . Carina 6''' longa.

17. *CALOCHORTUS PULCHELLUS* β *PARVIFLORUS* RGL.

C. pulchellus α . *typicus*; floribus majoribus campanulato-subglobosis. *C. pulchellus parviflorus* Grtfl. tab. 802 — *Cyclobothra pulchella* Benth. in hort. trans. nov. ser. I pag. 415. tab. 14 fig. 1.—Bot. reg. tab. 1662.

β . *parviflorus*; floribus campanulatis minoribus.—Glaber. Caulis erectus, teres, apice dichotome — v. trichotome-corymbosus, corymbo 4 plurifloro. Folia plana, late linearia v. inferiora lineari-lanceolata, supra laete viridia, subtus glauca; superiora breviora flores fulcrantia, pedunculos subaequantia v. iis longiora. Flores campanulati; sepalis ovato-lanceolatis, acuminatis, glabris, 10—12 m. m. longis, virescenti-luteis; petalis aequilongis, ovatis, obtusis, aureis, extus glabris, intus-margineque papillis elongatis obtusis simplicibus v. rarius ramosis barbatis. Germen angulato-trigonum, stigmatibus tribus recurvis coronatum. *C. pulchellus* β Grtfl. tab. 802.

18. *COLEUS MICRANTHUS* Maxim.

(*Solenostemon* Benth.). Annuus, caule crasso ramoso alato-quadrangulo retrorsum hispidulo, foliis longe petiolatis ad axillas petiolorum et basi subtus ad costam paleaceo-longe pilosis superne molliter adpresse, subtus ad reticulum substrigoso puberulis, rugulosis, herbaceis, ovatis acutis crenatis basi in petiolum cuneo angusto decurrentibus; racemis terminalibus elongatis ob folia floralia minuta mox decidua nudis, interruptis; cymis in quovis verticillastro binis oppositis sessilibus 10 floris; floribus minutis (3 mill. longis) pedicello strigoso pubescente brevioribus; calycis similiter pubescentis lacinia summa oblongo-ovata inflexa in labium acute bidentatum connatas aequante, laterales quadratas superante; corollae tomentellae coerulescentis calyce duplo longioris tubo arcuatodeflexo limbo parvo labiis subaequilongis: superiore trilobo, inferiore anguste oblongo concave; staminibus parum inaequalibus styloque corollam aequantibus.

Hab. in Abyssinia, unde semina accepimus a cl. Schimpero a. 1872.

Proximus *C. latifolius* Hochst. a nostro distinguendus pube diversa, foliis membranaceis brevioribus et latoribus, floribus triplo majoribus, calycis dentibus infimis supremo longioribus, corollae labio inferiore superius duplo superante et latiore, stylo breviter, in nostro longiuscule bifido. — Frons in nostro obscure subcinereoviridis. Planta tripedalis, racemis palmaribus, valde graveolens. Folia omnia acuta crenis crebrioribus et minoribus, ceterum illis *C. latifolii* subaequimagna. Calyx florifer tantum notus herbaceus, intus glaber. Antherae violaceae ovoideae, rarius duae superiores minores. Calyx defloratus deflecti videtur.

19. CONYZA SPATHULIFOLIA Maxim.

(*Dimorphanthes* DC.) herbacea erecta tota molliter pubescens viscidoque punctata, foliis spathulatis obtusis basi breviter auriculatis a medio apicem versus pauciserratis, summis integerrimis; panicula ramosa corymbosa polycephala, capitulis parvis, involucri squamis linearilanceolatis acuminatis disco brevioribus; floribus femineis numerosissimis exterioribus obsolete ligulatis, achaenio pubescente.

Hab. in Abyssinia, unde semina, altit. 7—8000 pedum collecta, misit cl. Schimper a. 1872.

Ab affini *C. absinthifolia* DC. differt punctis viscidis caulis, foliorum et involucri, foliis rite spathulatis versus basin sensim lateque attenuatis et basi auriculata sessilibus, pappo sordide albido neque rufo, achaenio pubescente neque glabro. Sed habitus idem et capitula aequimagna.

Annua, 1—2-pedalis. Folia media $3\frac{1}{2}$ cent. longa, 1 cent. an-

gustiora. Flores flavi, feminei stylo breviores 3-dentati, extimi hinc breviter fissi, ceteri regulares. Flores hermaphroditi 2—4, triplo saltem crassiores, 5-dentati. Stigmata floris hermaphroditi lanceolata plano-compressa. Antherae basi rotundatae ecaudatae, a se invicem fere liberae. Achaenium compressum submarginatum pallidum, illi *C. absinthiiifoliae* aequae magnum et consimile.

Ad *Conyzam* sensu Lessing et Bentham pertinet ob flores femineos, antheras et achaenium.

Maxim. (*).

20. CRASSULA COOPERI.

C. perennis, multicaulis, caespitosa; caulibus decumbentibus, pilis patentibus rigidis diaphanis hirtulis; foliis oppositis, oblongo-lanceolatis, acutis, utrinque glabris, margine setuloso-ciliatis; cyma pauciflora, terminali; floribus breviter pedicellatis; calycis laciniis lanceolatis, acutis, margine ciliatis, caeterum glabris, quam petala duplo brevioribus.

Caules spithamaei, filiformes, flexuosi, vix ramulosi. Folia remota, 5—10 m. m. longa, basi tantum connata, crassiuscula, supra planiuscula, punctis impressis paucis, infra convexa, sub lente impresso-punctulata. Flores 5 v. 4. meri, parvi, 3 m. m. in diametro; flos inferior saepissime in dichotomia inflorescentiae alaris, pedicello florem subsuperante suffultus; flores superiores breviter pedicellati, corymbos 3—5 flores formantes. Petala basi connata, nivea, ovata. Carpella stylo brevissimo coronata. — Nomine «Crassulae Cooperi» ex horto «Haage et Schmidt» accepimus. — *C. Cooperi* Gartenfl. tab. 786.

Crassula expansa Ait., cui planta nostra habitu affinis, differt foliis lineari-lanceolatis glabris, floribus longe pedicellatis, calycis laciniis obtusis glabris corollam subaequantibus.

(*) № 18 et 19 auctore C. J. Maximowicz.

21. ENCEPHALARTOS VERSCHAFFELTI RGL.

E. trunco ovato-conico (deinde verosimiliter cylindraceo), apice ad squamas cinereo-tomentoso; petiolo tomento detergibili denso cinereo vestito, rhachique semitereti; rhachi initio laxo cinereo-tomentosa; deinde glabra, foliolisque saturate viridibus; foliolis oppositis v. subalternis, 11—13 nerviis, lineari-lanceolatis, subfalcatis v. rectis, planis, basi in lineam paullo elevatam obtusam decurrentibus, apice acuminato-pungentibus, margine integerrimis.

Folia (frondes) 70—80 c. m. longa, pinnata. Foliola usque 6—7 c. m. longa et 11 m. m. lata, margine initio villosula, demum totidem glabra, valde decrescentia, inferiora minima vix $\frac{1}{2}$ c. m. longa, omnia rhachi oblique denseque inserta et conniventi-adscendentia (nec horizontaliter patentia). Petiolus 5—10 c. m. longus.

E. cycadifolius hort. J. Versch.

Affinis *E. cycadifolio* Lehm. et *E. Lehmanni* Lehm.; alter foliolis linearibus margine revolutis 3—5 nerviis; alter trunco foliisque glabris, foliolis glaucis basi non decurrentibus, in latere inferiore convexis, latere superiore marginibus subcanaliculato incurvatis, usque 40 c. m. longis et 8 m. m. latis, 18—20 nerviis, basilaribus vix quam intermedia dimidio brevioribus facile dignoscuntur.

GENERIS ENCEPHALARTI

conspectus specierum adhuc cognitarum.

A. Foliola linearia, margine revoluta, pungenti-acuta.

1) *Encephalartos cycadifolius* Lehm. (D. C. 531) (*).

Foliola pungenti acuta; integerrima, 8—10 c. m. longa, circ. 4 m. m. lata, 3—5 nervia.

α . *glaber.*, truncoglabro, petiolo rhachique initio laxo tenuiterque tomentosus mox glabris. *E. cycadifolius* Lehm.

*) Wir citiren im Allgemeinen nur Decandolle Prodr., XVI. II. pag. 530—533. Nur wo die Arten in De Candolle nicht aufgenommen oder wo es der Deutlichkeit halber nothwendig, haben wir mehr Citate gegeben.

Cyc. pag. 13.—*Zamia cycadifolia* Jacq. fragm. tab. 25 et 26.

- β. *Friederici-Guilielmi.*, trunco apice lanuginoso, petiolo. rhachique initio tomento detergibili denso vestitis, demum subglabris.—E. *Friederici Guilielmi* Lehm. Cyc. pag. 8. tab. 1—3.—E. Ghellincki Lem. Ill. hort. 1867 pag. 80. et anno 1868 tab. 567.

B. *Foliola linearia, plana, pungenti-acuta.*

- 2) *E. pungens* Lehm. (D. C. 533) (mihi ignotus).

C. *Foliola lineari-lanceolata, pungenti-acuta.*

a. *Folia saturate viridia.*

- 3) *E. Verschaffelti* Rgl., foliolis integerrimis, 7-plo longioribus quam latis.

- 4) *E. elongatus* Miq., foliolis integerrimis v. versus apicem unidentatis, 14-plo longioribus quam latis. (Cfr. D. C. 533. (Mihi ignotus).

- 5) *E. villosus* Lem., foliolis spinoso-dentatis, 14-plo longioribus quam latis, dentibus subulatis erectis v. subadpressis. — *E. villosus* Lem. Ill. hort. 1867 pag. 80. — 1868 tab. 557. Truncus apice cinereo-tomentosus. Petiolus et rhachis initio laxo tomentosi, demum glabri. Foliola laete viridia 20 c. m. longa et circ. $1\frac{1}{3}$ c. m. lata.

b. *Folia glauca.*

- 6) *E. Lehmanni* Lehm. (D. C. 531).

α. *typicus.*, foliolis integerrimis.

β. *spinulosus* Miq., foliolis spinuloso-dentatis. (Cfr. D. C. l. c.).

D. *Foliola lanceolata v. rarius elliptico-lanceolata.*

a. *Foliola inferiora pungenti-acuta, superiora obtusa v. hamuloso-obtusa.*

- 7) *E. longifolius* Lehm., (Cfr. D. C. 531).

Folia viridia. Variat:

α. typicus; foliolis lanceolatis, planis.

E. longifolius γ. angustifolius et *δ. Hookeri* D. C. l. c. — *Zamia longifolia* Jacq. fragm. tab. 29. — *E. caffer* Hook. bot. mag. tab. 4903. — Foliola 12—16 c. m. longa, $2\frac{1}{4}$ —3 c. m. lata.

β. revolutus; foliolis lanceolatis, margine revolutis. (Cfr. D. C. 531).

γ. latifolius; foliolis elliptico-lanceolatis, margine revolutis. — Foliola 12—13 c. m. longa et 4 c. m. lata, margine inferiore obtuse 1—2-dentata, rarius integerrima. — *E. Almasianus* h. Paullowsk.

b. Foliola omnia pungenti-acuta.

* Folia viridia. Foliolola integerrima v. obtuse dentata.

8. *E. caffer* Miq.

(Cfr. D. C. pag. 532). Variat:

α. integrifolius; foliolis glabris integerrimis.

β. unidentatus; foliolis glabris saepe unidentatis.

γ. brachyphyllus; rhachi paginaque inferiore foliolorum arachideo-pubescentibus. (Cfr. D. C. l. c.).

** Folia viridia. Foliola acute lobato-dentata.

9. *E. lanuginosus* Lehm., foliolis margine inferiore 1—4-lobato-acuteque dentatis.

Foliola oblonga v. elliptico-lanceolata. *E. lanuginosus* Lehm. Cyc. pag. 14. — D. C. 533. — *Zamia lanuginosa* Jacq. fragm. tab. 30, 31. — *E. horridus β. lanuginosus* Miq. Ann. sc. nat. ser. II pag. 367. — *E. horridus latifrons* Miq. monogr. pag. 59.

*** Folia glauca.

10. *E. horridus* Lehm., foliolis pungenti lobato-dentatis, lobis saepe divaricatis. — D. C. prodr. 532. excl. var. — *Zamia horrida* Jacq. fragm. tab. 27 et 28. — *E. Van Halli* Vriese teste Miq. — *E. nanus* Lehm. Tijdschr. IV 421 tab. 8 fig. C. — *E. horridus trispinosus* Hook. bot. mag. tab. 5371.

**** Folia viridia. Foliola lanceolata spinoso-dentata, dentibus subulatis erectis..

11. *E. Altensteini* Lehm.

α . *typicus*; trunco glabro, foliolis densis, utrinque spinoso 1—3-dentatis rarius integerrimis, usque 17 c. m. longis et $2\frac{1}{2}$ —3 c. m. latis. — *E. Altensteini* Lehm. Cyc. pag. 11 et 13 tab. 4 et 5. — D. C. prodr. XVI. II. 531. — *E. Altensteini* et var. *angustifolia* Miq. monogr. pag. 51 et 52.—*Zamia spinosa* Lodd. cat.

β . *paucidentatus*; foliolis aut in margine superiore aut in margine inferiore 1—3-dentatis aut utrinque integerrimis. Cetera ut var. α . — *E. Altensteini* var. *semidentata* Miq. monogr. pag. 52.—*E. Murumi* Vriese in Tijdschrift V. 188.

γ . *distans*; foliolorum jugis 3—4 c. m. distantibus. Cetera ut var. α . — *Zamia vernicosa* hort. Jean Versch.

δ . *parvifolius*; trunco glabro, foliolis densis, 7—8 c. m. longis et vix 2 c. m. latis, utrinque 2—4—5 dentatis.—*Zamia elegantissima* et *Z. Van den Hecke* h. Jean Versch. — *Enceph. Vromii* h. Jean Versch.

ϵ . *eriocephalus* Vriese; trunco sursum lanuginoso. Cetera ut var. α . — *E. Altensteini* *eriocephalus* Vriese descr. pl. nouv. Jard. de Leyde pag. 1. tab. 1 et 2.

SPECIES EXCLUSA.

E. tridentatus Lehm. = *Macrozamia Miqueli* A. D. C.

22. *HELIOTROPIMUM OLGAE* BGE (mss.).

H. (Agoraea Bge.) *annuum*, *ramosissimum*, *virens*; foliis petiolatis superioribus suborbiculatis rugosis supra viridibus, subtus densius strigulosis, spicis ebracteatis subternis confertis secundis, calycis sessilis

persistentis profunde 5-partiti laciniis linearibus acutis denique incurvopatulis tubi trientem aequantibus, corollae tubo elongato intus aequabiliter pubescente, limbi patentis laciniis late orbicularibus intercalaribus nullis, antheris subbasilaribus longe a fauce remotis obtusis, stylo glaberrimo quam stigma conicum glanduloso-hirsutum vix brevius, nuculis laevissimis glabris.

Hab. in regno Kokand prope Usgent, et inter Jaipan et Isfara 18 Juni et 14 August 1871. (Olga Fedschenko.) Habitus fere *H. europaei*, *Eichwaldi* et *lasiocarpi*, a quibus facillime distinguitur corollae multo majoris tubo elongato intus pubescente, stylo distincto et defectu laciniarum intercalarium. Ab. *H. suaveolenti* et affinibus jam stigmate conico elongato differt. *H. cinerascens* longius distat. Spicis quodammodo accedit ad species sectionis *Hedyosma*, recedit vero nuculis a calyce seorsim deciduis, calyce diutius persistente sessili.

23. EREMURUS KOROLKOWI RGL.

Eremurus. B. Sepala omnia nervo unico intermedio crasso apice subexcurrente. a. Folia glabra, bracteae margine villosociliatae.

(Rgl. *Eremurus* in Труды Имп. Бот. Сада. tom. II. pag. 425).

E. robustus Rgl.; foliis elongato-lanceolato-linearibus; bracteis lineari-subulatis, margine hyalino-albido angusto involuto, pedicellum dimidium circiter aequantibus. — Folia basi 3—5 c. m. lata, quam inflorescentia breviora.

E. Korolkowi Rgl; foliis ligulato-linearibus; bracteis anguste lineari-lanceolatis, hyalino-albis, planis, nervo intermedio valido instructis, pedicellum initio superantibus, deinde eo paullo brevioribus. — Folia $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ c. m. lata, inflorescentiam saepissime superantia.

E. Aucherianus Boiss; bracteis pedicellos circiter aequantibus. — Folia basi circiter $2\frac{1}{2}$ c. m. lata.

E. KOROLKOWI RGL.

E. caule inclusa inflorescentia 20--40 c. m. alto foliisque glaucis integerrimis; racemo initio denso, deinde laxiore, 5--25 c. m. longo; pedicellis filiformibus, continuis, patulis, bracteas anguste lineari-lanceolatas planas hyalino-albas margine villosas deinde $\frac{1}{3}$ superantibus, initio iisdem brevioribus: perigonii rosei foliolis patulis, omnibus uninnerviis, post florescentiam rectis; capsulis globosis, ut videtur rugosis.

*E. robusto in habitu simillimus, statura humiliore, foliis plus triplo angustioribus, bracteis planis eximie albo-hyalinis ante florescentiam pedicellum alabastrumque superantibus, florescentiae temporis $\frac{2}{3}$ longitudinem pedicellorum circiter aequantibus,—facile dignoscitur. — Flores pulchre rosei, magnitudine *E. robusti*. — Habitat Turkestaniae prope puteum Sultan-Bibi in collibus Kuldschuk-Tau in arenosis lutosi. (Korolkow).*

24. HEDYSARUM SEWERZOWI BGE (mss.).

H. pube patula griseum, radice lignosa multicipiti, caulibus abbreviatis, stipulis connatis oppositifoliis, foliolis 4—5-jugis lineari-oblongis complicatis utrinque acutis supra glabratis impunctatis, pedunculis folio brevioribus, capitulis ovato-globosis confertis, bracteolis subulato-setaceis calycis tubum longe superantibus, calycis dentibus lanceolato-subulatis tubo suo longioribus, vexillo glabro obcordato carinam angulo obtuso infractam parum alas plus duplo superante, ovario quadriovulato muriculato-puberulo.

Quamvis e specimine unico vix florere incipiente tantummodo nota, sine dubitatione species nova, habitu quodammodo affinis *H. microptero*, speciei persicae novae, sed jam indumento, calyce, vexilli et carinae forma diversa; magis forsán fructu discrepat. Ab omnibus caeteris speciebus longius distat. In Turkestanía leg. Sewerzow.

25. *MIMOSA PROSTRATA*.

(*Eumimosa* § 3 *Castae* Benth. in Walp. rep. I. 866).

Fruticosa, ramosa, prostrata, inermis; caule petiolis pedunculisque patentim setoso-hispidis; petiolo brevissimo.—Folia bipinnata; pinnae unjugae, terminales; foliola 7—25 juga, elliptico-oblonga, acuta, marginata, utrinque glabra, margine villosa-ciliata. Capitula subglobosa. Flores 5-meri. Sepala minuta, ciliata. Corolla virescens. Stamina 5, longe exserta, lilacina. Stipulae lanceolatae, persistentes. Pedunculi axillares, folia pluries superantes.

M. oblonga Benth., cui proxime affinis: «aculeis tenuibus recurvis, caule pedunculisque patentim setoso-hispidis et pube brevi intermixta canescentibus, foliolis 25—35-jugis linearibus» facile dignoscitur. —
M. prostrata hort.—Patria ignota.

26. *OXALIS ORTGIESI* RGL.

O. pilis adpressis laxè vestita; radice fibrosa perenni; caule suffruticoso, carnoso, erecto, purpureo; foliis petiolatis, ternatis, exstipulatis, trifoliatis; foliolis breviter pedicellatis, ovato-triangularis, apice late exciso-truncatis, lateralibus inaequilateris; pedunculo folia duplo superante; cyma dichotoma, multiflora, sepalis lanceolato-oblongis, obtusiusculis, corolla flava subduplo brevioribus; filamentis stylisque subaequilongis breviterque hispidulis.

Petioli teretes 6—8 c. m. longi, purpurei. Pedicelli patente-pubescentes. Folia supra saturate viridia nitentia, infra purpureo-violacea, apice $1\frac{1}{2}$ —2 c. m. lata, subaequilonga quam lata, nervo intermedio ex incisura paullo excurrente; nervis lateralibus utrinque 3 v. rarius 2.

Pedunculus basi purpurascens, apice virescens. Sepala circiter 6 m. m. longa, basi viridia, apice leviter virescentia. Petala obverse oblonga, 5-nervia, apice truncato-rotundata v. leviter emarginata, citrina.

Habitat in America tropica.

27. *OXYTROPIS GYMNOGYNE* BGE (mss.).

O. dense caespitosa multiceps griseo-canescens; caudiculis brevissimis confertis, stipulis inter se liberis petiolo ad medium adnatis ovato-lanceolatis membranaceis extus praeter apicem glabris ciliatis, foliolis 5—7-jugis diu complicatis, oblongis obtusis utrinque prostrato-pilosis, scapis laxis folium superantibus patentim villosis superne nigrescentibus, capitulis laxis sub 5-floris, bracteis linearibus calycis tubo brevioribus, calycis campanulati albo nigroque villosuli dentibus tubum dimidium superantibus, vexilli lamina latissime orbiculari retuso-subemarginata, alis oblique retuso-subbilobis vexillum aequantibus, carinae alis brevioris acumine brevi recurvo, ovario longe stipitato glabriusculo 21-ovulato; legumine. . . . ?

Mogol-tau. 15 März. Legit Sewerzow.

O. humifusae affinis, sed stipulae a basi glabrae, latiores breviores acutiusculae, nec basi adpresse sericeae acuminatissimae lanceolatae, inter ramos caudicis occultae, nec longe imbricatae nitidae, foliola obtusa nec acutissima, praesertim vero corollae structura diversa, cum in *O.* humifusa vexillum obcordatum et alarum unguis ratione laminae multo longiores, et ovario 21, nec 8—10-ovulatum. Specimina duo collecta cum scapis capitulisque sub anthesi 2—3 pollicaria. Calyx $2\frac{1}{2}$ " longus. Vexillum vix 6" longum, in parte inferiore laminae 5" latum. Alarum unguis $1\frac{1}{2}$ ", lamina $4\frac{1}{2}$ " longa. Carina cum mucrone lato brevi vix 5" longa.

28. *OXYTROPIS INTEGRIPETALA* BGE (mss.).

O. e caudice brevi lignescente multicipite acaulis, sericeo-villosa; stipulis basi inter se connatis petiolo ad medium adnatis parte libera lineari-subulatis hirsutis, foliolis 15—20 jugis oblongo-lanceolatis acutissimis prostrato-sericeo-villosis, scapo adscendente folia superante patulo-piloso, racemo abbreviato 10—12 floro, bracteis linearibus pedi-

cello duplo longioribus, floribus patulis, calycis tubuloso-campanulati pube alba longiore nigraque minuta villosuli dentibus subulatis tubum dimidium aequantibus, vexilli lamina late ovata integerrima, alis multo brevioribus lineari-oblongis integerrimis, carinae mucrone elongato-lanceolato porrecto alas aequante, ovario stipitato villosissimo 18—20-ovulato, legumine. . . . ?

In promontoriis jugi Kcharly-tau; 7 Mai (leg. Sewerzow). Ex affinitate *O. coeruleae*, *brevicaulis*, *Semenovii* etc., praesertim carinae structura; attamen ovario distincte stipitato, racemo densiore abbreviato, indumento ab omnibus recedit. Caudices subterranei lignosi crassi reliquiis stipularum tecti. Folia bipollicaria. Scapus sine racemo tripollicaris, racemus ipse sub anthesi pollicaris tantum. Calyx cum dentibus $4\frac{1}{2}$ " longus. Vexillum 8" longum, versus basin laminae ultra 4" latum. Alae semipollicares, apice linea parum latiores; carinae cuspis fere $1\frac{1}{2}$ " longus.

29. *OXYTROPIS SEWERZOWI* BGE (mss.).

O. multiceps, caespitosa, molliter patulo-cano villosa, subacaulis; caudicibus ramosissimis elongatis laxis gemmiferis, stipulis petiolo adnatis inter se liberis ovatis acutissimis extus sericeo-villosis, foliolis 9—12 jugis ovato-oblongis acutis planis utrinque molliter patule cano-villosis, scapis folium superantibus patule albo-villosis pubeque nigra sursum densiore brevior nigricantibus, capitulis globosis 10—16 floris, bracteis linearibus calycem subaequantibus albo-nigroque villosis, calycis campanulati albo nigroque sericeo-villosi dentibus subulatis tubo vix brevioribus, vexilli lamina ovato-suborbiculari apice bilobo-emarginata, alis vexillum subaequantibus apice ventre obtuse productis, carinae alis brevioris acumine recurvo brevi, ovario stipitato villosa 6—7-ovulato, legumine. . . . ?

Prope Wernoje 30 Mai leg. Sewerzow. Ex affinitate *O. albanae*, *cyanae*, *humifusae* etc., ab omnibus vero distincta jam indumento, calyce ovarioque villosa. — E radice crassa lignescente prodeunt caudiculi laxi numerosi, ramosissimi, gemmulas numerosas imbricato-squamatas ferentes,

caespitem amplum foliorum, scaposque emittentes. Folia 2—2 $\frac{1}{2}$ pollicaria. Foliola 2—2 $\frac{1}{2}$ ''' longa, vix ultra 1 $\frac{1}{2}$ ''' lata. Scapi graciles, sub anthesi vix tripollicares. Vexillum 5''' longum, medio 3''' latum; carina vix 4''' longa.

30. OXYTROPIS TRICHOCALYCINA BGE (mss.).

O. acaulis, caespitosa, sericeo-cana, stipulis ad medium petiolo adnatis, foliis 6—8 jugis, scapis folia subaequantibus, floribus globoso-capitatis, calycis breviter campanulati laciniis longissimis plumosis corollam aequantibus, ovario sexovulato, legumine (juniore) uniloculari oligospermo calyci incluso oblongo depresso sericeo.

Speciei nulli e notis vere affinis, habitu quodammodo ad O. pumilam accedens, sed jam foliolis conjugatis nec verticillatis diversa; inter omnes species calycis et leguminis structura insignis. In Turkestan leg. O. Fedschenko.

31. PENTSTEMON GLABER PURSH. ♂. STENOSEPALUS.

α. *typicus*; foliis caulinis sessilibus subamplexicaulibus lanceolatis, sepalis late ovatis margine membranaceis, filamento sterili antherisque hirsutis. P. glaber Pursh. fl. am. septr. II. 738.—Bot. mag. tab. 1672.—P. eriantherum Fras ex Nutt. gen. II. pag. 53.—Benth. in D. C. prodr. X. 321.—Corolla purpurea.

β. *speciosus*; glaucus, glaberrimus, fol. caulinis lanceolatis, sessilibus; calycis segmentis ovato oblongis acuminatis margine membranaceis; filamento sterili antherisque glabris. — P. speciosus Dougl. in Lindl. bot. reg. tab. 1270.—Benth. in D. C. prodr. X. 323.—P. glaber β occidentalis Asa Gray rev. Pentst. in proceed. Am. Acad. VI. 59. — S. Wats. Bot. pag. 217. — Flores cyanei.

γ. utahensis Wats; glaber, fol. caulinis oblanceolatis sessilibus basin versus attenuatis, sepalis ovatis acuminatis membranaceis v. nonnullis totidem herbaceis, filamento sterili antherisque hirsutis. S. Watson Botany of the Geolog. explor. pag. 217.

δ. stenosepalus; viridis, caule foliisque glabris; fol. caulinis e basi amplexicauli latiore lanceolatis, sepalis lanceolatis acuminatis pedicellisque minute glanduloso-puberulis, totidem herbaceis, filamento sterili antherisque breviter hirsutis.

In den Gärten ist in den letzten Jahren ein Pentstemon, ziemlich allgemein als *P. speciosus* verbreitet worden, das sich, wenn man Bentham's Diagnose und die von Lindley im Botanical Register gegebene Abbildung vergleicht, durch nicht blaugrüne, sondern grüne mit breitem Grunde sitzende Blätter, lanzettlich lang zugespitzte kurzdrüsige behaarte Kelchblättchen, welche nicht häutig gerandet sind, und durch den kurz behaarten sterilen Staubfaden und Antheren unterscheidet. Wir würden diese Pflanze für eine neue noch unbeschriebene Art gehalten haben, wenn nicht S. Watson in der Beschreibung der bei Gelegenheit der Geologischen Erforschung der 5. Parallele der Nordamerikanischen Staaten gesammelten Pflanzen, schon auf pag. 217, (indem er Asa Gray theilweise folgt) in erster Linie *P. speciosus* Dougl. zu *P. glaber* als Form gezogen hätte und in 2. Linie noch eine andere Form beschrieben hätte, die unserer Pflanze schon näher steht. Dagegen ist S. Watson in so fern nicht Asa Gray gefolgt, als er *P. cyananthus* Hook. nicht zu den Formen von *P. glaber* zieht, sondern wie auch uns scheint, mit vollem Rechte als eigne Art festhält.

32. PHILODENDRON MELINONI.

Caudex abbreviatus, crassus, vaginis (stipulis?) deinde in fibras solutis involutus. Petiolus crassus, semiteres, latere interiore eximie canaliculatus, 40—80 c. m. longus, 2—3 c. m. in diametro, initio purpureus, deinde olivaceus, basi vaginis stipulaceis oppositis membranaceo-

scariosis deinde in rete fibrarum solutis involutus. Lamina maxima, e basi cordato-hastata ovato-oblonga, apice breviter acuminata integerrima, margine undulata, 40—60 c. m. longa, basi 25—40 c. m. lata; costa intermedia lateralibusque alternantibus in pagina inferiore valde prominentibus rufescentibusque; lobis basilaribus apice rotundato-obtusis. Pedunculus brevissimus. Spatha cylindrica, apice cuspidata, marginibus involutis spadice omnino occultans, extus rufescens. Spadicis cylindrici spatha brevioris mascula pars quam foemina plus duplo longior. Ovaria stigmatibus fusco-purpureis. — Crescit in Cayenne.

Philodendron spec. de Cayenne et Ph. Melinoni Brongn. in hortis. — Spatha circiter 18—20 c. m. longa.

Affinis *Philodendro* pinnatifido Knth. et Ph. pinnatisecto Schott.

33. *PIRONNEAVA MORRENIANA* RGL.

Bromeliaceae.

Pironneava. Panicula terminalis, simplex vel ramosa; scapus foliis bracteiformibus non coloratis (viridibus v. subscariosis) vestitus. Bracteolae flores fulcrantes integerrimae, in acumen pungentem acuminatae. Calyx a basi ad medium ovario adnatus, 3-lobus, lobis imbricatis, carinatis, in acumen pungens acuminatis. Corolla supera, tripetala; petalis erectis, valvatis, annulo styli basin cingenti insertis. Stamina sex, tria cum petalis alternantia, cum petalis inserta, libera; tria petalis totidem adnata. Antherae oblongae, biloculares, supra basin dorso affixae. Germen inferum, triloculare, annulo epigyno coronato; stylus filiformis; stigma capitato-clavatum, spiraliter tortum. Ovula anatropa, supra chalazam in appendiculum oblongum producta.

P. Morreniana; robusta; foliis urceolum magnum formantibus, elongato-oblongis, 60—80 c. m. longis, 6—9 c. m. latis, a basi sub apicem sensim latoribus, ex apice obtuso breviter acuminatis, canaliculatis, margine spinuloso-serratis, glabris, sub lente albido-punctulatis, utrinque laete viridibus, erecto-patentibus et apicem versus plus minus

recurvis; scapo foliis brevior, albo-floccoso, foliis bracteiformibus oblongis acutis albido-scariosis vestito; panicula simplici; paniculae ramulis abbreviatis, inferioribus distantibus brevissime stipitatis, superioribus dense glomeratis sessilibus; floribus ramulorum brevissimorum glomeratis, basi bracteola colorata calycem aequante fulcratis; bracteis bracteolis calycibusque glabris, petalis coeruleis, basi squama duplici oblonga; staminibus exterioribus liberis, interioribus petalo adnatis; ovulis appendice oblongo, ovulo ipso triplo brevior.

Florum glomeruli inferiores brevissime stipitati, superiores sessiles, bractea ovata acuminata scariosa fulcrati. Bracteae flores fulcrantes seminamplexicaules, late ovatae, in acumen spinescens acuminatae, roseo-purpureae, calycem vix aequantes, excavatae, dorso vix carinatae. Calycis lobi laterales dorso acute carinati, dorsali dorso rotundato, marginibus sese amplexentes, in acumen spinescens exeuntes, basi virescentes, medio rosei, apice coerulei, flore coeruleo sesqui breviores. Petala oblonga, apice spathulato-dilatata, coerulea.

Pironneava glomerata Gaudichaud, cui planta nostra satis affinis dignoscitur: foliis scapi viridibus, paniculae ramis inferioribus elongatis iterato ramosis, bracteis bracteolisque viridibus hirtulis, petalis flavescens, ovulis cuspidi lineari ovulum aequante.

Die schöne Bromeliacee welche Gartenflora tab. 805 abgebildet wird, gehört zu der von «Gaudichaud in Vaillant, Voyage de la Bonite» aufgestellten Gattung *Pironneava*. Leider gab Gaudichaud-Beaupré in diesem Werke nur die Abbildungen eines Theils der auf jener Reise gesammelten Pflanzen, die Beschreibungen sind aber nie veröffentlicht worden. C. Koch hat in der Wochenschrift (III. 1860 pag. 337) nach jenen Abbildungen die Gattung *Pironneava* als eine gute festgehalten und wir stimmen da mit unserm geehrten Freunde ganz überein und gaben im Obigen den Gattungscharakter. Zunächst steht diese Gattung den von Beer aufgestellten Gattungen *Hoplophytum* und *Lamprococcus*. Gaudichaud hat 2 Arten abgebildet, nämlich tab. 63. *P. glomerata*, welche unserer Pflanze nahe kommt. Nehmen wir nun auch an, dass unsere Pflanze (ob-

gleich solche sehr üppig entwickelt ist) auch einen ähnlichen stärker verästelten Blütenstand entwickeln könnte, so bleiben in erster Linie die ganz anders gestalteten Eier unserer Pflanze und ferner der gänzliche Mangel einer Behaarung an Brakteen und Kelch, während solche auf Gaudichauds Abbildung als behaart angegeben. Ausserdem hat C. Koch (l. c.) nach einer lebenden Pflanze des Berliner Gartens eine Beschreibung von *P. glomerata* gegeben und sagt da, dass deren Schaftblätter Brakteen und Kelche grün und die Blumenblätter gelblich.

P. platynema Gaud. l. c. tab. 64 unterscheidet sich ebenso wie die von C. Koch aufgestellte *P. spectabilis* durch eine verästelte Rispe. Vergleichen wir aber C. Kochs Beschreibung mit Gaudichauds Abbildung, so scheint es uns unzweifelhaft, dass Kochs Pflanze zu *P. platynema* als Synonym gehört. Wir hätten damit also 3 Arten der Gattung *Pironneava*, welche sich in folgender Weise unterscheiden.

a. Flores paniculati, paniculae rami racemosi,

P. platynema Gaud. in Vaill. voyage de la Bonite tab. 64. — *P. spectabilis* C. Koch in Wochenschr. III. pag. 338. — Bracteae calycisque lobi subito in acumen spinescentem desinentes. Ovulorum appendix linearis ovulum aequans.

B. Flores paniculati, flores ramulorum dense glomerati.

P. glomerata Gaud. in Vaill. voyage de la Bonite tab. 63; bracteis calycibusque hirtulis, appendice ovulorum lineari ovulum aequante.

P. Morreniana; bracteis calycibusque glabris, appendice ovulorum oblongo ovulo triplo brevior.

34. PITCAIRNIA (POURRETIA) FLOCCOSA.

P. floccosa; caulescens, foliis longissimis circiter 1 m. et ultra longis, basi circiter 2 c. m. latis, sensim in apicem filiformem attenuatis; e basi ad medium erecto-patentibus, apicem versus recurvato-de-

pendentibus, margine spinuloso-serratis, spinulis sursum versis, supra glabris nitentibus atroviridibus, *infra albidis strigosoque pilosis*; scapo 1 m. et ultra alto, usque ad paniculam terminalem foliis remotis decrescentibus vestito, *rhachique griseo-floccoso*; *paniculae simplicis* pyramidatae 50 c. m. altae ramis horizontaliter patentibus, spicato 7—10-floris, basi bractea ovato-lanceolata acuminata spinuloso-serrulata suffultis; bracteolis ovatis, acuminatis, quam calyx $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ brevioribus, bracteis calycibusque albido-floccosis; *floribus sessilibus*; calycis laciniis lanceolatis, acutis, canaliculatis, erectis, 3 c. m. longis, quam petala $\frac{1}{3}$ brevioribus; petalis erectis, ovato-oblongis, basi nudis, marginibus sese amplectentibus, acutis, 4 c. m. longis, apice saturate caeruleis, dorso et basin versus ex albido-virescentibus; staminibus saturate caeruleis, initio inclusis, mox exsertis; antheris oblongis polline aurantiaco; *ovario sublibero*, basi tantum calycis tubo connato, trigono, triloculari; styli exserti stigmatibus tribus convolutis; ovulis anatropis, raphi lata, *ovuli tegumento exteriori quam interiori rostelliforme porrectum brevior*; capsula septicida.

Pourretia floccosa C. Koch. Wochenschr. III. pag. 251. — Pourretia lanuginosa hort. — Pourretia violacea h. Laurentius.

Die Gattung *Pourretia* ward ursprünglich durch gänzlich überständigen Fruchtknoten und fächerspaltende Capsel von *Pitcairnia* getrennt. Ob es ächte Pourretien mit fächerspaltender Capsel wirklich giebt, ist bis jetzt nicht nachgewiesen.

Für die in Rede stehende Art, wies schon C. Koch in dem Jahrgange 1858 p. 266 der Allgemeinen Gartenzeitung nach, dass solche gleich *Pitcairnia* eine scheidewandspaltige Capsel besitzt, was schon am Fruchtknoten der Blume beim Querdurchschnitt zu erkennen ist. Der zweite Charakter, nämlich ein vollständig freier Fruchtknoten, der *Pourretia* von *Pitcairnia* unterscheiden soll, ist ebenfalls bei unserer Pflanze so undeutlich und zweifelhaft ausgebildet, dass wir darin keinen trennenden Charakter von *Pitcairnia* erblicken können, denn der Fruchtknoten ist bei *P. floccosa* mit seinem untersten Theil in den aus Verwachsung

der Kelchröhre mit dem Fruchtboden gebildeten untersten Theils des Blütenbodens etwas eingesenkt, also auch nicht vollständig frei, wie überhaupt dieses Verhältniss auch bei den zu *Pitcairnia* gerechneten Arten mehrfachen Abänderungen unterworfen ist (*).

Da nun ferner auch die Tracht der in Rede stehenden Art, mit den mit *P. ramosa* verwandten Arten übereinstimmt, so glauben wir, dass wir nicht fehlen, wenn wir solche einfach zu *Pitcairnia* stellen, indem wir derselben den Speciesnamen lassen, den unser im Gebiete der Gartenpflanzen unermüdlich thätiger Freund C. Koch dieser Art gegeben hat. Dieselbe fand sich früher unter dem Namen *Pourretia lanuginosa* R. et P. in den Gärten, schon ein flüchtiger Blick auf die von Ruiz et Pavon in der Flora Peru's gegebene Abbildung jener letzteren Pflanze genügt, um zu zeigen dass diese mit *P. floccosa* C. Koch gar nichts zu thun hat. — Ein eigenthümlicher Charakter der *P. floccosa* liegt in der Bildung der Eier, bei denen die innerste Eihaut die äussere bedeutend überragt und sich schnabelförmig vorstreckt.

Unsere *P. floccosa* unterscheidet sich schon durch den rispenförmigen Blütenstand mit wagerecht abstehenden Aesten, durchaus sitzende Blumen, vorn dunkelblaue Blumenblätter, die langen grazil überhängenden schmalen scharf stachelig gezähnten Blätter, die auf ihrer untern Seite weiss und ausserdem mit angedrückten steifen Haaren besetzt, wie endlich auch durch den graulich weissen flockigen Ueberzug von Blüthenschaft, Blüthenspindel, Brakteen und Kelch, von allen andern bekannten *Pitcairnien* und gehört zu den stattlichsten Arten dieser Gattung, denn die Blätter werden über ein Meter lang und der beblätterte Blüthenschaft mit der Blüthenrispe erhebt sich ebenfalls über einen Meter. Blühete im Kais. Botanischen Garten im November und December 1873. Die Blumen-

(*) Mehrere verglichene Abbildungen ächter *Pitcairnien* geben in dieser Beziehung keine Aufklärung, dagegen zeigten im trocknen Zustande verglichene *Pitcairnien*, wie z. B. *Pitcairnia albiflos*, einen noch freieren Fruchtknoten als unsere Art.

blätter, welche um $\frac{1}{3}$ länger als die Kelchblätter, sind anfangs tief blau, nach dem Abblühen färben sie sich röthlich.

35. PRIMULAE SPECIES IMPERIUM ROSSICUM MANDSCHURIAMQUE
HABITANTES.

I. *Conspectus specierum.*

A. Folia petiolata, cordato-ovata v. cordato-oblonga.

1. *P. cortusoides* L., foliis crenato-lobulatis, lobulis crenatis.
2. *P. Meyeri* Rupr., foliis inaequaliter crenato-dentatis, corollae lobis obcordato-bifidis.
3. *P. grandis* Trautv., foliis inaequaliter crenato-dentatis; corollae lobis obtusis vix emarginatis.

B. Folia cordato-orbicularia.

4. *P. Kaufmanniana* Rgl., foliis lobatis; lobis grosse crenato-dentatis v. grosse duplicato-dentatis.

C. Folia in petiolum attenuata v. rarius basi rotundata.

a. *Calyx argute angulatus.*

5. *P. officinalis* Jacq., corollae limbo concavo.
6. *P. elatior* Jacq., corollae limbo plano, umbella pedunculata multiflora.
7. *P. acaulis* Jacq., corollae limbo plano, pedunculis radicalibus unifloris.

b. *Calyx cylindricus v. campanulatus angulis destitutus.*

* *Corollae lacinae obtusae integerrimae.*

+ *Calyx subcampanulatus, 5-dentatus, dentibus tubum subaequantibus v. superantibus.*

α. *Involucrum brevissimum, florescentiae tempore pedicellis duplo brevius.*

8. *P. Fedschenkoi* Rgl., corolla calycem subtriplo superante.
- β . *Involucri foliola subulato-acuminata, florescentiae tempore pedicellos aequantia v. superantia.*
9. *P. nivalis* Pall., corollae tubo calycem aequante usque duplo superante.
- ++ *Calyx tubulosus, 5-dentatus, dentibus tubo plus duplo brevioribus.*
10. *Pr. Maximowiczii* Rgl.
- ** *Corollae laciniae emarginatae.*
11. *P. stricta* Hornm; calycis dentibus obtusis tubo brevioribus; corollae tubo calycem subduplo superante. —
- Folia utrinque glabra, subdenticulata.
- *** *Corollae laciniae obcordato-bifidae.*
- + *Involucri foliola basi exauriculata v. subgibba.*
- α . *Folia subtus farinosa.*
12. *P. farinosa* L., calycis tubulosi dentibus tubum subaequantibus v. eo brevioribus.
- Folia obovato-oblonga v. oblonga, crenulata v. subintegerima v. eroso-denticulata. Umbella saepissime densa, pedunculis erectis flore brevioribus v. longioribus.
13. *P. farinifolia* Rupr.; calycis campanulati dentibus tubum superantibus.
- Folia obovata, in petiolum longum attenuata, argute serrato-dentata. Umbella laxa, pedunculis longissimis filiformibus flexuosis.
- β . *Folia utrinque glabra.*
0. *Folia argute denticulata. Flores lutei.*
14. *P. luteola* Rupr.
00. *Folia argute denticulata. Flores lilacini, rosei v. purpurei.*
15. *P. auriculata* Lam; pedunculis quam flores plus duplo pre-

brevioribus, corollae tubo calycem sesqui-duplo superante, calycis laciniis tubum aequantibus v. superantibus.

16. *P. darialica* Rupr., pedunculis flores aequantibus v. superantibus, calycis sub campanulati dentibus tubum aequantibus, corollae tubo calycem paullo-sesqui superante

17. *P. algida* Adams., pedunculis flores saepissime plus duplo brevioribus rarius flores subaequantibus, calycis tubulosi laciniis tubo paullo brevioribus, corollae tubo calycem aequante v. paullo superante.

000. *Folia integerrima* v. *crenulata*, v. *obtusae*, — v. *erosae* *paucidenticulata*.

18. *P. longiscapa* Ledb., foliis obverse lanceolato-oblongis v. obovato-oblongis, in petiolum sensim angustatis.

19. *P. borealis* Duby., foliis obovatis v. spatulatis, subito in petiolum lamina saepissime longiorem attenuatis.

0000. *Folia apice grosse dentato-serrata*.

20. *P. cuneifolia* Ledb.

++ *Involucri foliola basi appendiculato-saccata*.

21. *P. sibirica* Jacq., foliis elliptico-orbiculatis v. oblongo-ellipticis in petiolum ipsis longiorem attenuatis, pedicellis floriferis involucrum 2—3 plo superantibus rarius subaequantibus.

22. *P. Olga* Rgl., foliis obovato-oblongis, in petiolum brevem membranaceo-alatum attenuatis; pedicellis floriferis involucri brevioribus.

II. Enumeratio specierum.

1. *Primula cortusoides* L.

L. spec. 206. — Lehm. monogr. gen. Prim. pag. 23. —

D. C. prodr. VIII. 36. — Ledb. fl. ross. III. 8.

Variat: α . *typica*: foliis subtus ad nervos plus minus villosis, calycibus glabris v. subglabris.

Hab. in Sibiria uralensi, altaica, baicalensi et in regione amurensi.

β. *tomentella*; foliis subtus calycibusque canescenti-tomentosis.

In Sibiria altaica (Karelin et Semenow.)

2. *Primula Meyeri* Rupr., foliis cordato-ovatis v. cordato-oblongis v. inferioribus basi in petiolum attenuatis, obtusis, inaequaliter dentato-crenatis v. crenato-repandis, subtus glabris v. dense cinereo-tomentosis; petiolo glabro; scapo glabro, stricto; umbella pluriflora; calycis glabri angulato-cylindrici dentibus lanceolatis, acutis v. obtusiusculis, tubo brevioribus, margine ciliolatis; corollae tubo calycem paullo—sesqui superante, limbi laciniis obcordato-bifidis.

Involucri foliola lanceolato-subulata, pedicellis duplo—pluries breviora v. eos subaequantia, basi exauriculata. Flores rosei v. flavi. — Variat:

α. *typica*; foliis subtus cinereo-tomentosis, floribus roseis.

Pr. *Meyeri* Rupr. Cauc. Prim. in Melang. biol. Ac. Petr. 1863. pag. 284.

Hab. in prov. caucasicis in monte Elbrus (C. A. Meyer) et prope Pari 5—9000' s. m.

β. *cordifolia*; foliis subtus glabris, floribus flavis (?).—

Pr. *cordifolia* Rupr. l. c. pag. 286. — Hab. in provinciis caucasicis prope Kasbk et Kobi (Ruprecht), in Somchetia et Bambaki (C. Koch).

Ruprecht vergleicht diese noch wenig bekannte Art des Caucasus, wegen der auf der Rückseite filzigen Blätter der Form α., mit der Pr. *amoena* M. B., welche wir als Form mit unterhalb filzigen Blättern zu Pr. *elatior* nach Ledebours Vorgange ziehen. Mehr oder weniger unterhalb behaarte Blätter kommen bei vielen Arten von *Primula* vor. Die mit unterhalb dünn filzigen Blättern versehenen Form von Pr. *cortu-*

soides, die wir im Vorhergehenden aufführten, ist eine parallele Form. Ebenso verhält sich *Pr. amoena* zu *Pr. elatior* und *Pr. cordifolia* zu *Pr. Meyeri*.

Die *Primula Meyeri* steht gleichsam zwischen *Pr. cortusoides* und *Pr. elatior*. Von *Pr. cortusoides* unterscheidet sie sich durch lappig-gekerbte Blätter, sowie ferner durch die fast kahlen Blattstiele die bei *Pr. cortusoides* stets zottig behaart. *Pr. elatior* mit seinen Formen unterscheidet sich dagegen leicht durch am Grunde niemals herzförmige und in den Blattstiel verschmälerte Blätter.

3. *Primula grandis* Trautv., foliis cordato-ovatis, irregulariter duplicato-dentatis, supra glabris, subtus pulveraceo-puberulis, petiolo longissimo anguste alato suffultis; umbella terminali, amplissima; calycis glabri campanulati dentibus ovatis v. lanceolatis, acutis v. obtusiusculis, tubum vix aequantibus; corollae tubo calycem circiter aequante v. paullo superante, limbi laciniis oblongis, obtusis, apice minute emarginatis.

Subglabra. Folia maxima, 11 c. m. longa, 8 c. m. lata. Petioli 26 c. m. longi. Scapus 25 c. m. longus. Involucris foliola lanceolato-subulata pedicellis elongatis filiformibus pluries breviora, basi exauriculata. Flores lutei.

Hab. in prov. cauc. in montium jugo Dadiash 6—9500 alt. (Radde).

P. grandis Trautv. Bull. Ac. Petr. 1866 pag. 395. —

4. *P. Kaufmanniana* Rgl., foliis petiolatis, cordato-orbiculatis, lobatis; lobis $\frac{1}{3}$ laminis dimidii attingentibus, grosse duplicato-dentatis v. iterato lobatis, lobulis apice dentatis; umbella v. racemo pluri — multifloro; calycis cylindrici v. demum subcampanulati dentibus lanceolatis, acutis v. obtusiusculis, tubum subaequantibus, erectis; corollae tubo tenui cylindrico, calycem duplo v. plus duplo superante, limbi laciniis obcordato-bifidis.

Cortusae Matthioli habitu valde similis. Petioli anguste alati,

villosi, laminam saepissime superantes, 1 $\frac{1}{2}$ —12 c. m. longi. Lamina in pagina superiore atroviridis glabra v. ad nervos sparsim pilosa, infra pallidior ad nervos plus minus villosa, 2—8 c. m. lata et longa. Scapus folia superans, breviter sparsimque pilosulus, exclusa in florescentia 8—20 c. m. altus, erectus. Inflorescentia v. umbellata v. verticillato-racemosa. Involucri foliola bracteeaeque lineari-lanceolatae v. lanceolatae, acutae, integerrimae v. apice paullo dilatato-dentatae, initio pedicellos filiformes glabros superantes, demum iis duplo longiores, 5—9 m. m. longae. Calyx glaber, 4—6 m. m. longus. Corollae saturate violaceae tubus 10—12 m. m. longus et 1—2 m. m. latus, limbus explanatus 8—16 m. m. in diametro.

In regionibus cisiliensibus prope Kopal et in trajectu Zauku (Thian-Shan) leg. Semenow, in Turkestaniam prope Wernoje (Semenow) et prope Dschasyl-Kul (Kuschakewicz).

Pr. cortusoides Herder pl. Semenow. n. 682 ex parte.

Wir haben diese ebenso schöne als ausgezeichnete neue Art, dem General-Gouverneur von Turkestan, dem Herrn General von Kaufmann, gewidmet; auf dessen Veranlassung die reiche Flora und Fauna Turkestans gründlich erforscht wird.

Charakterisirt ist diese Art durch die kreisrunden gelappten Blätter, mit abermals doppelt gezähnten oder gelappten Lappen, die grazilen dünnen Röhren der Blumenkrone, die mindestens noch einmal so lang als der Kelch und den Blüthenstand, der bald eine einfache Dolde bildet, bald durch Auswachsen zur quirligen Traube wird.

5. *Primula officinalis* Jacq.

Jacq. misc. I. 157. — D. C. prodr. VIII. 36. — Ledb. fl. ross. III. 8.

β . *inflata* Ledb. l. c.

Pr. inflata Lehm. monogr. pag. 26. tab. 2. —

Pr. macrocalyx Bunge in Ledb. fl. alt. I. pag. 209. —

Rupr. Cauc. Prim. in Melanges biol. Ac. Petr. 1863
p. 287.

Pr. uralensis Fisch. in Rehb. pl. crit. VII. fig. 861.

Hab. a Rossia occidentali ad Sibiriam altaicam, in Cau-
caso Turkestanica et Soongoria.

6. *Primula elatior* Jacq.

Jacq. misc. I. pag. 158. — D. C. prodr. VIII. 36. —
Ledeb. fl. ross. III. pag. 9. — Pr. elatior et P. Pallasii Lehm.
monogr. pag. 33 et 38 tab. 3.

Hab. in Rossia, in provinciis caucasicis, in Sibiria uralensi et altaica.

. *amoena*; foliis subtus tomentosis. — Variat floribus purpureis et flavis. Pr. amoena M. B. fl. taur. cauc. I. pag. 138. — Lehm. monogr. 33. tab. 3. — Rupr. Cauc. Pr. l. c. pag. 284.

Die zur Stammart citirte Pr. Pallasii bildet in Bezug auf die Behaarung den Uebergang. Ruprecht führt noch als Unterscheidungszeichen der Pr. amoena die schmalere Kelchröhre auf, welche auf dem von Lehmann abgebildeten Exemplar allerdings sehr auffallend ist, bei der gelbblumigen Form des Caucasus aber vollständig übergeführt zum Kelch der gewöhnlichen Form wird.

7. *Primula acaulis* Jacq.

Jacq. misc. I. pag. 158. — Ledeb. fl. ross. III. 10. — Lehm. monogr. p. 30. — Pr. grandiflora Lam. et D. C. fl. fr. II. 248. — D. C. prodr. VIII. 37.

Hab. in Rossia australi et in prov. caucasicis.

In Kultur finden sich häufig Uebergänge von Pr. acaulis zu Pr. elatior, unter den wild gesammelten Exemplaren finden sich diese nicht. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass jene in der Kultur entstandenen Mittelformen durch gegenseitige Befruchtung beider Arten hervorgegangen sind.

8. *P. Fedtschenkoi* Rgl., foliis obovato-oblongis, in petiolum alatum attenuatis v. subsessilibus, rotundato-obtusis, crenato-

dentatis, glabris; umbella pauci-pluriflora; involucri foliolis paucis, ovato-lanceolatis v. lanceolatis, obtusis v. breviter acuminatis, initio pedicellos dimidios circiter aequantibus, demum iis 2—4-plo brevioribus; calycis breviter campanulati laciniis lanceolatis, acutis v. obtusiusculis, tubum subaequantibus v. brevioribus; corollae tubo apicem versus ampliato, calycem 2—3-plo superante, limbi plani laciniis ellipticis obtusis integerimis v. vix conspicue emarginatis.

Folia utrinque viridia, glaberrima v. subtus farina sparsa virescenti vestita, 3—6 c. m. longa, 7—20 m. m. lata. Scapus erectus, saepe curvatus, glaber v. apice sub involucri albo-farinosus, folia superans, 7—14 c. m. altus. Involucri foliola 2—3 m. m. longa, basi coalita et exauriculata. Pedunculi florescentiae temporis 4—6 m. m. longi, demum magis elongati, glabri v. sparsim albo-farinosi. Calyx virescens et apicem versus purpurascens, glaber v. margine intusque albo-farinosus, 3—4 m. m. longus. Corolla ut videtur purpureo-violacea, tubo 8—11 m. m. longo, limbo 12—14 m. m. in diametro.

In Turkestanica montibus Tschupanata, leg. A. et O. Fedtschenko.

Wir nannten diese Art nach unserm für die Wissenschaft viel zu früh dahingegangenen geehrten Freund Alexei Pawlowitsch Fedtschenko, der dieselbe gemeinsam mit seiner Gemahlin am 18 März 1869 blühend sammelte. Nah verwandt der *Pr. nivalis* Pall., aber kleiner in allen Theilen, sowie durch vorn stumpf abgerundete Blätter, die wenigen sehr kurzen Hüllblättchen und den kleinen Kelch der meist fast 3 mal kürzer als die Blumenröhre, gut unterschieden.

9. *P. nivalis* Pall., foliis ovato-oblongis v. oblongis v. lanceolatis, in petiolum alatum sensim attenuatis, argute dentatis v. crenatis v. subintegerrimis; umbella multiflora v. rarius pauciflora; involucri foliolis numerosis, e basi coadunata acuminato-subulatis, florescentiae tempore pedicellos superanti-

bus, demum iis brevioribus; calycis laciniis lanceolatis, acutis v. obtusiusculis, tubum subaequantibus v. superantibus; corollae tubo calycem aequante v. usque duplo superante; limbi laciniis oblongis v. elliptico-oblongis, obtusis, integerrimis.—Capsula saepissime calycem plus duplo superans v. rarius vix superans. Umbella simplex v. proliferatione in racemum e verticillis duobus compositum transiens.

Variat:

α. typica; robusta, elata, farina destituta; foliis oblongo-lanceolatis v. rarius anguste lanceolatis, crenato-dentatis; involucrio virescente; calycibus viridi-purpurascentibus.

Folia acuta v. obtusiuscula, 7—20 c. m. longa. Scapus robustus, folia superans. Calycis 8—10 m. m. longi dentes saepe acuti, saepissime tubum subaequant, rarius eo breviores v. longiores. Corolla purpurea, maxima, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{4}$ c. m. in diametro; tubo calycem paullo-duplo longiore.

Habitat in Sibiria altaica et baicalensi et in insula St.-Georg ad fretum Beringianum. — *P. nivalis* Pall. III. app. n. 81. tab. G. fig. 2. — D. C. prodr. VIII. pag. 39. — Ledeb. fl. ross. III. pag. 10.

β. farinosa; robusta, elata; foliis elliptico-oblongis, in petiolum attenuatis, acutis v. rarius obtusis, crenato-dentatis, in latere inferiore marginem versus v. margine tantum albo-farinosi; pedicellis saepissime farinosi; calycibus plus minus purpurascentibus, margine et intus saepissime farinosi. Cetera ut var. *α*.

P. nivalis β. farinosa Schrenk. enum. pl. nov. I. 22. — Ledeb. fl. ross. III. 10.

Hab. in Soongoriae montibus Alatau (Schrenk) et in alpi-
bus sajanensibus Transbaicaliae (Radde); in montibus Alatau
transiliensis 7500—9000' alt. (Semenow); in Turkestan

prope Wernoje (Semenow), in trajectu Zauku montium Thian-Shan (Semenow).

γ. *longifolia*; foliis anguste lanceolatis v. lanceolato-oblongis, crenato-dentatis. — Folia usque 25 c. m. longa et 2—3 c. m. lata. — Cetera ut var. β.

Hab. in montibus Alatau (Schrenk).

δ. *colorata*; foliis elliptico-lanceolatis, subacutis, crenato-dentatis; involucris calycibusque atrovioleaceis. — Folia 6—14 c. m. longa, saepissime nervo intermedio violaceo picta. — Cetera ut var. β. — In Turkestaniae trajectu Sujuk, 10—12000' alt. leg. Scharnhorst, in trajectu Kok-tau leg. Kuschakewicz.

ε. *Bayerni*; foliis elliptico-oblongis v. lanceolatis, crenato-dentatis v. argute dentatis, subtus margine plus minus late denseque albo-farinosus; involucris calycibusque virescentibus; floribus albis.

Folia 4—20 c. m. longa, initio scapum subaequantia, demum eo valde breviora. Pedunculi saepe albo-farinosi. Calycis dentes lanceolati, tubum aequantes v. superantes, margine intusque plus minus albo-farinosi. Corollae tubus calycem paullo superans, limbi circ. $1\frac{1}{2}$ c. m. lati laciniis obovatis.

Hab. in Caucaso in regio alpina ad fontes fluvii Archot (Bayern), in distr. Alagir et Rodscha (Ruprecht). —

Pr. Bayerni Rupr. Cauc. Pr. in Mel. biol. Ac. Petr. 1863, pag. 306.

ζ. *subintegerrima*; robusta, foliis anguste lanceolatis v. rarius elliptico-lanceolatis, subtus initio tenuiter farinosus demum glabris, margine integerrimis v. obsolete crenulatis; involucri calycibusque virescentibus; pedunculis saepe farinosus; calycis dentibus margine intusque farinosus.

Folia calyces floresque purpurei magnitudine var. α.

Habitat in alpinis Dahuriae (Radde), in Sibiria orientali ad fluvium Engate (Stuebendorff) et in Kamtschatka (Rieder).

γ. purpurea; robusta, foliis lanceolatis, repando-crenatis, subtus luteo-farinosis, involueris calycibusque atroviridibus; pedunculis calycibusque intus luteo farinosis; calycis laciniis lineari-lanceolatis, obtusiusculis, tubum superantibus; corolla atrovioleacea.

Folia 8—12 c. m. longa, obtusiuscula. Corollae tubus calycem sesqui—duplo superans, limbi usque $2\frac{1}{2}$ c. m. lati laciniæ ovato-oblongae. — *P. purpurea* Royle ill. 311, tab. 377, fig. 2. — D. C. prodr. VIII, pag. 40. — *P. atrovioleacea* Jacquem. teste D. C. l. c. —

Hab. in montibus altioribus Nepaliae.

δ. *pumila*; humilis, foliis oblongis v. obverse oblongis, acutis v. obtusiusculis, subtus glabris, integerrimis v. crenatis v. apicem versus crenato-dentatis; umbella pauciflora; calycis laciniis tubum saepe superantibus; corollae tubo calycem sesqui—duplo superante.—Folia 2—6 c. m. longa, $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ c. m. latae. Scapus 4—12 c. m. altus. Calyx 4—5 m. m. longus, intus ut pedicelli saepe albo farinosi. Corollae limbus 8—10 m. m. in diametro.

Habitat in terra Tschuktschorum, ad sinum St. Laurentii et in Unalaschka (Eschscholtz), in Aleutorum insulis et in Kamtschatka.

P. nivalis γ. pumila Ledb. fl. ross. VIII pag. 10.

Die *Primula nivalis* ist von den Alpen des Caucasus durch das Alpengebiet Turkestans und der Soongarei, dann nördlich nach dem Altai, Transbaikalien, Dahurien, Ostsibirien bis Kamtschatka und dem nordöstlichsten Asien und nordwestlichen Gebiete Amerikas, sowie südlich bis zu den Alpen Nepals verbreitet. Dieselbe kommt mehr oder weniger weiss- oder gelb-bestäubt und auch durchaus kahl vor. Die Blätter wechseln von der länglich-ovalen Gestalt bis zur länglichen oder lanzettlichen Form, dieselben sind spitz oder stumpf, ganz

randig, schwach oder deutlich gekerbt-gezähnt oder selbst scharf gezähnt.

Vom hohen robusten Wuchs sinkt dieselbe im Hochnorden bis zur kleinen nur einige Zoll hohen Pflanze hinab und ebenso die vielblumige Dolde, welche häufig eine zweite Dolde aus ihrer Mitte entwickelt, bis zur armblumigen Dolde. Der Kelch ist bald bis fast zur Mitte, oft aber auch bis zu $\frac{2}{3}$ in Lappen gespalten und die purpurrothe, violette oder weisse Blumenkrone besitzt eine Röhre, die bald fast ebenso lang oder bis fast noch einmal so lang als der Kelch wird.

Als der Referent die zahlreichen, in unsern Herbarien befindlichen Exemplare durchmustert hatte, glaubte er anfänglich, dass wirklich mehrere getrennte Arten unter *P. nivalis* zusammengefasst seien, überzeugte sich aber dann, dass keines der genannten Merkmale konstant sei und dass weder nach der tiefern oder flachern Theilung des Kelchs, noch nach der verhältnissmässigen Länge der Blumenröhre, noch nach Vorhandensein oder Fehlen des Puders an Blättern, Blütenstielen und Kelch, noch endlich nach Gestalt und Zahnung der Blätter, Arten abgetrennt werden könnten. Es giebt endlich noch ein auffallendes Merkmal bei den Formen dieser Art, nämlich eine Kapsel, die bei ihrer Reife noch einmal so lang oder noch länger als der Kelch, die aber bei einzelnen Exemplaren auch nur eben so lang als der Kelch vorkommt. Es kommt aber bei sonst durchaus übereinstimmenden Exemplaren des gleichen Bezirks die kurze und lange Kapsel vor, so z. B. bei der Form des Caucasus mit schmalern scharf gezähnten Blättern, beobachteten wir die kurze Kapsel, die so lang als der Kelch und die lange Kapsel die noch einmal so lang als derselbe.

Wir haben nun im Obigen die verschiedenen Formen, welche uns von *P. nivalis* vorlagen charakterisirt, wollte man

einzelne charakteristische Exemplare jeder dieser Formen herausgreifen, so hätte man scheinbar ebenso viele leicht zu trennende Arten.

10. *P. Maximowiczii* Rgl.; glabra, foliis elliptico-oblongis, in petiolum membranaceo-alatum sensim attenuatis, rotundato-obtusis v. subacutis, obtuse v. acute crenulato-denticulatis; scapo folia duplo v. plus duplo superante; umbella pauci-multiflora v. proliferatione subracemosa; involucri foliolis numerosis, basi coadunatis exauriculatis, lineari-lanceolatis, acuminatis, initio pedicellos subaequantibus, demum iis duplo—pluries brevioribus; calyce tubuloso, 5-dentato, dentibus ovato-lanceolatis acutis tubo plus duplo brevioribus; corollae tubo calycem sesqui—duplo superante, limbi laciniis oblongis obtusis integerrimis v. rarius obsolete emarginatis.

Folia 4—11 c. m. longa, $1\frac{1}{2}$ —3 c. m. lata. Scapus erectus, 12—22 c. m. altus. Involucri foliola 3—5 m. m. longa. Calyx 6—8 m. m. longus, 3—4 m. m. latus. Corolla purpurea, limbo 13—15 m. m. in diametro.

Habitat in China boreali (Tatarinow), in montibus Buchuautschau prope Pekinam (Bretschneider).

Primula nova spec. aff. *P. nivali* Maxim. ind. Pekinensis in Prim. fl. amur. pag. 474.

11. *P. stricta* Hornm.; glabra, foliis oblongis v. obovato-oblongis, subintegerrimis v. paucicrenulato-denticulatis, in petiolum attenuatis; scapo folia longe superante; umbella pauciflora, erecta; involucri foliolis lanceolatis, basi vix gibbis, pedunculos initio subaequantibus, demum iis pluries brevioribus v. rarius ab initio brevioribus; calycis campanulato-tubulosi dentibus obtusis, tubo brevioribus, intus et margine farinosis; corollae tubo calycem sesqui—duplo longiore, limbi laciniis cuneato-obovatis emarginatis.

P. stricta Hornm. fl. dan. tab. 1385. — D. C. prodr.

VIII. 44. — Ledb. fl. ross. III. pag. 13. — Pr. Hornemania Lehm. monogr. Pr. p. 55. tab. 4. — P. farinosa β . stricta Wahlbrg. fl. Lapp. p. 60.

Hab. in Russia septentrionali et arctica.

Von der Pr. longiscapa Ledb. eigentlich nur durch die flachere Ausrandung der Blumenkronenlappen, sowie durch stumpfe Kelchzähne, die nur ungefähr halb so lang als die Kelchröhre, verschieden. Die meisten der uns aus dem Norden Russlands vorliegenden Exemplare besitzen Blütenstiele, die zur Zeit der Blüthe kürzer oder so lang als die Hüllblättchen der Dolde. Nur bei einem Exemplare sind die Blütenstiele schon zur Zeit der Blüthe mehrmals länger als der Kelch.

12. *P. farinosa* L., foliis infra farinosis, obovato-oblongis v. oblongis v. obverse lanceolatis, in petiolum late alatum brevem v. magis elongatum attenuatis, obtusis v. acutis, crenatis v. obtuse v. acute denticulatis v. subintegerrimis; umbella multiflora; involucri foliolis e basi subgibba lineari-lanceolatis; pedunculis flore saepissime plus duplo brevioribus, rarius magis elongatis florem superantibus; calycis tubulosi dentibus obtusis v. acutis; tubo paullo — $\frac{1}{3}$ brevioribus; corollae tubo calycem aequante v. usque sesqui superante; limbi laciniis obcordato-bifidis. —

Pr. farinosa L. spec. 205. — D. C. prodr. VIII. p. 44. — Ledb. fl. ross. III. pag. 13.

- α . *typica*; foliis subtus albo-farinosis, crenulatis v. subintegerrimis v. subargute denticulatis. Scapus humilis v. usque 20 c. m. altus, folia saepissime pluries superans v. rarius ea subaequans. Folia subtus dense albo-farinosa v. initio tenuiter albo-farinosa demum sub-glabra. Pedicelli plus minus albo-farinosi v. glabri. Corolla rosea v. lilacina v. rarius alba.

A Russia septentrionali ad Sibiriam orientalem et Kamtschatkam.

Aus Turkestan liegt uns eine Form von Frau O. Fedtschenko gesammelt vor, mit oval-länglichen kurz gestielten und regelmässig klein aber scharf gezähnelten Blättern, die unterhalb dicht weiss mehlig und mit sehr kurz gestielten, eine kopfförmige Dolde bildenden Blumen, deren Kelche wie bei var. β . a. kahl und nach oben violett gefärbt sind. Es ist das also die Parallellform von *P. farinosa* β . a. nur mit weisser Bestäubung. Vom Fluss Utschur in Ostsibirien besitzen wir eine andere Endform mit verkehrt-länglichen sehr dünnhäutigen fast ganzrandigen oder ausgeschweift gekerbten Blättern, die nach unten in einen langen dünnen Stiel verschmälert und nur anfangs auf der untern Seite mit einem schwachen weisslichen Reif belegt sind, der bei den ältern Exemplaren ganz verschwindet. Die Blumen sind von dünnen Blütenstielen getragen, die 2 mal so lang als die Hüllblättchen und auch länger als die Blumen. Diese letztere stellt daher die Parallellform von var. γ . c. vor. Zwischen diesen beiden Extremen bewegen sich eine Masse von Mittelformen, die ganz allmählig von der einen zur andern überführen. Ebenso wechselt die Höhe des Schaftes von $1\frac{1}{2}$ c. m. bis 20 c. m. — *Pr. caucasica* C. Koch teste Rupr. Cauc. Pr. l. c. 301. — *Pr. algida* γ . *albo-farinosa* Rupr. l. c. *quoad spec. cauc.*

luteo-farinosa; foliis subtus dense luteo-farinosis, saepissime subargute denticulatis v. crenulato-denticulatis v. rarius subintegerrimis. — Scapus $1\frac{1}{2}$ —12 c. m. altus, sub involuacro saepe farinosus. Umbella densa, multiflora. Pedicelli saepissime floribus plus duplo breviores, rarius longiores. Calyx virescens v. apicem versus violaceus. Crescit in regionibus alpinis Caucasi, Turkestaniae, Transbaicaliae et in Sibiria orientali.

P. algida β . *luteo-farinosa* Rupr. Cauc. Prim. in Mel.

biol. Ac. Petr. 1863 pag. 301, quoad formam foliis sub acute denticulatis calyce apicem versus violascente.

Ruprecht zieht die gelbbepuderte *Primula farinosa* des Caucasus als Form zu *Pr. algida*, weil deren Blätter unterhalb dicht gelb bepudert und schärfer gezähnt und deren Kelch kahl und nach der Spitze zu violett gefärbt seien. Uns liegen aber aus dem Caucasus auch Formen mit unterhalb dicht und solche mit schwach bepuderten Blättern vor, die am Rande allerdings meist scharf kleinzähmig; die von Kolenati auf dem Kaepe-Dagh gesammelten Exemplare haben Blätter mit gelbem Puder und theils scharf, theils stumpf kerbartig klein gezähntem Rande und die von Wilhelms in der Provinz Iberien gesammelten Exemplare haben nur gekerbt-gezähnte Blätter. Ebenso wechselt die Färbung der Kelchzähne von der violetten bis zur grünen bei den Exemplaren des Kaukasus. Wer daher die gelbpuderige *Primula* des Caucasus als Form von *Pr. algida* betrachten wollte, der müsste consequenter Weise *Pr. algida* und auch *Pr. longiscapa* einfach als Formen zu *Pr. farinosa* ziehen, wogegen wir nicht blos nichts einzuwenden hätten, sondern dieses sogar für das Richtigere halten würden. Wir erwähnen noch schliesslich der folgenden Unterformen von *Pr. farinosa* luto-farinosa:

Lusus a. caucasica; foliis saepissime subacute denticulatis, calycis glabri dentibus saep. violascentibus. — Folia in petiolum brevem latum attenuata. Flores saepissime brevissime pedunculati; petiols involucri brevioribus v. rarius id excedentibus. Corollae tubus calycem circiter aequans. — Hab. in Caucaso et in Turkestanica (Kerolkow).

Lusus b. turkestanica; foliis obovato-oblongis in petiolum brevem late alatum attenuatis, margine erculato-denticulatis v. subintegerrimis. — Flores brevissime

pedunculati. Involucri foliola petiolos superantia. Calyces virides, glabri v. paullo farinosi. Corollae tubo calycem circiter aequante.

Hab. in Turkestan (Korolkoff) et in Iberia (Wilhelms).

Lusus c. sibirica; foliis obverse oblongis v. subspathulatis, saepissime in petiolum magis elongatum attenuatis; integerrimis v. crenulato-denticulatis v. singulis subacute denticulatis. — Involucri foliola pedunculos aequantia v. saepe superantia. Calyces virescentes, saepe farinosi. Corollae tubo calycem aequante v. usque sesqui superante.

Habitat in Baicalia prope Irkutiam (Turczaninow), in Transbaicaliae alpibus (Radde), in Dahuria ad fluv. Schilkam (Maximowicz), in Sibiria orientali prope Ajan (Tiling).

13. *Pr. farinifolia* Rupr; foliis infra farina candida vestitis, obovatis v. spathulatis, in petiolum laminam saepissime superantem anguste alatum v. rarius quam lamina brevior et plus minus late alatum attenuatis, obtusis v. ex apice rotundato apiculatis, argute serrato-dentatis; involucri foliolis numerosis, e basi exauriculata lineari-lanceolatis, mox recurvis; pedunculis filiformibus, longissimis, plus minus curvatis, flores involu-
crumque pluries superantibus; calycis campanulati laciniis lanceolatis, acutis, tubo longioribus; corollae tubo calycem demum longe superante; limbi laciniis obcordato-bifidis.

Folia incluso-petiolo $2\frac{1}{2}$ —13 c. m. longa, 1— $3\frac{1}{2}$ c. m. lata. Scapus glaber, folia subaequans v. plus duplo superans. Umbella laxa. Pedunculi 1—5 c. m. longi, laterales curvato-adscendentes v. rarius recti. Calyx circiter 3 m. m. longus et latus, saepe farinosus. Corolla rosea; tubo calycem duplo superante.

In Caucaso orientali leg. Ruprecht.

P. farinifolia Rupr. Cauc. Pr. in Melanges biol. Ac. Petr. 1863 pag. 303.

Ruprecht sammelte diese in Habitus bedeutend abweichende Art an halbdunkeln nassen Felsenhöhlen und an Quellen im östlichen Caucasus. Nach Ruprecht ist die Blume zur Zeit der Blüthe ungefähr 6 m. m. lang, rosenroth, am Schlunde gelb und der Saum hat nur 3—4 m. m. in Durchmesser. Wir sahen die zahlreichen im Herbarium der K. Academie aufbewahrten Exemplare, welche aber alle nach der Blüthe gesammelt sind. Die Röhre der verblüheten Blumen ist ungefähr 7 m. m. lang.

14. *P. luteola* Rupr., foliis utrinque glabris, obverse lanceolatis v. elliptico-oblongis in petiolum membranaceo-alatum attenuatis, rotundato-obtusis v. subacutis, inaequaliter v. subduplicato argute serrato-dentatis; umbella multiflora: involucri foliolis numerosis, e basi gibba lineari-lanceolatis, pedicellos initio subaequantibus, demum iis pluries brevioribus; pedicellis filiformibus; florentiae tempore flores aequantibus usque iis duplo longioribus; calycis initio tubulosi demum campanulati laciniis lineari-lanceolatis, acutis, tubum superantibus, corollae luteae tubo calycem sesqui-duplo superante, limbi laciniis obcordato-bifidis.

Elata. Folia incluso petiolo 10—30 c. m. longa, 2—5½ c. m. lata, utrinque laete viridia. Scapus 25—50 c. m. altus, apicem versus albo-farinosus. Umbella speciminum caucasicorum simplex, speciminum cultorum proliferatione saepe verticillato-racemosa. Involucrum, pedunculi et calycis margines glabri v. plus minus albo-farinosi. Calyx 5—7 m. m. longus. Corollae tubus, 9—11 m. m. longus, limbus circ. 12—15 m. m. in diametro, pallide sulphureus, fauce aureus.

In Caucaso orientali (Ruprecht).

P. luteola Rupr. Cauc. Pr. in Mel. biol. Ac. Petr. 1863

pag. 298. — Rgl. Grtfl. 1867 pag. 129 tab. 541.

15. *P. auriculata* Lam. Lam. ill. n. 1931. — Ejusd. encl. meth. V. pag. 625. — D. C. prodr. VIII. pag. 38. — Vent. hort. Cels. tab. 42. — Rupr. Cauc. Pr. I. c. pag. 288. — *P. auriculata* α . et *P. pycnorhiza* Ledeb. fl. ross. III. pag. 10. — *P. longifolia* Curt. bot. mag. tab. 392. — Lehm. monogr. pag. 50. — *P. pycnorhiza* Rgl. Grtfl. 1863. tab. 391. — *Pr. macrophylla* C. Koch Linnaea XXIII. pag. 615 (?).

Habitat in regionibus alpinis Caucasi. — Glabra v. scapus apice calycesque paullo farinosi, saepisse elata. Folia obovato-oblonga v. obverse lanceolata v. rarius subelliptica, obtusa v. acuta, argute denticulata, 3—15 c. m. longa.

Scapus folia paullo—pluries superans. Umbella multiflora, densa. Involucri foliola numerosa, basi gibba, pedunculos florigeros superantia. Calycis lacinae lanceolatae, obtusiusculae, tubum paullo superantes. Corolla rosea v. violacea, tubo calycem sesqui—duplo superante, limbi laciniis obcordato-bifidis.

Von *Pr. luteola* nur durch die Blütenfarbe, etwas kürzere Blütenröhre und den an Stengel und Kelchen selten auftretenden Puder, — von *Pr. algida* durch üppigeren Wuchs, grössere Blumen, tiefer getheilten Kelch, längere Röhre und grössere dichtere Blüthendolde verschieden. Die von Ledebour als var. β . *sibirica* hierher gezogene, von Karelin und Kirolow im Alatau der Soongorei gesammelte Pflanze, welche C. A. Meyer *P. Bungeana* genannt hat, gehört zu *Pr. algida*.

16. *P. darialica* Rupr., glabra, foliis obovato-lanceolatis v. obverse lanceolato-oblongis, in petiolum cuneato-attenuatis, obtusis v. acutis, argute denticulatis; involucri foliolis basi exauriculatis, lineari-lanceolatis, quam pedicelli paullo—pluries brevioribus; umbella laxa, pauci—pluriflora; pedicellis filiformibus, florem aequantibus v. usque plus duplo longioribus, flexuosis; calycis campanulati dentibus lanceolatis, acutis, tubum circiter

aequantibus; corollae tubo calycem paullo usque sesqui superante, limbi laciniis obcordato-bifidis.

Habitu *P. farinifoliae* Rupr. valde affinis, folia autem glabra et sensim in petiolum breviorē attenuata, 2—8 c. m. longa. Scapus folia paullo usque subduplo superans. Involucri foliola saepissime numerosa, rarius pauca, florescentiae tempore saepissime patula v. recurva. Calyx 4—5 m. m. longus, virescens. Corollae limbus 12—14 m. m. in diametro, e roseo kermesinus.

Habitat in Caucaso ad fontes fl. Terek. (Ruprecht).

P. darialica Rupr. Cauc. Pr. l. c. p. 302.

Ruprecht, der diese Art entdeckt hat, hat solche unweit Darial gefunden und darnach den Namen gegeben.

17. *P. algida* Adams. Adams in Web. et Mohr Beitr. I. pag. 46. — Lehm. monogr. Pr. p. 68, tab. 7. — D. C. prodr. VIII pag. 39. — Pr. *algida* et Pr. *auriculata* β . *sibirica* Ledb. fl. ross. III. pag. 11 et pag. 12. — *P. Bungei* C. A. Mey. in Beitr. z. Pflzk. d. R. R. 22. — *P. auriculata* Ledb. fl. alt. I. pag. 211. — Ejusd. ic. pl. fl. ross. tab. 243. — Pr. *algida* α . *denudata* Rupr. Cauc. Pr. l. c. pag. 299. — Pr. *glacialis* Adam?

Foliis glabris argute dentatis a Pr. *farinosa* distinguitur.

Hab. in regionibus alpinis Caucasi, Turkestaniae (Kuschakewicz, Krause), regionum cis- et transiliensium (Semenow), Soongariae (Kar. et Kiril., Schrenk) et in Sibiria altaica (Ledeb.).

Der weniger tief getheilte Kelch und kleinere Blumen deren Röhre nur so lang als der Kelch oder nur wenig länger, sowie weniger hoher und üppiger Wuchs, scheiden diese Art von *P. auriculata*.

Von den zahlreichen Formen der folgenden Art unterscheidet sie sich nur durch die schärfere Zahnung des Blattrandes.

Eine Form mit besonders spitzen und lang vorgezogenen Zähnen des Blattrandes, ward von mir aus turkestanischen Samen

erzogen und in der Gartenflora als *Pr. algida cuspidens* abgebildet. Wir unterscheiden demgemäss als Formen:

α. typica; foliis argute denticulatis, calycibus viridibus.

β. cuspidens; foliis cuspidato-denticulatis, calycibus viridibus. — Hab. prope Wernoje et in montibus Alatau Soongoriae.

γ. colorata; foliis argute denticulatis, calycibus apicem versus atrovioleaceis. — Hab. in Turkestan (Kuschakewicz et Krause).

18. *P. longiscapa* Ledb.; foliis utrinque farina destitutis. — Cetera ut *P. farinosae*. — Ledb. in Mem. Ac. Petr. V. 520. — (Anno 1814). — Variat:

α. typica; foliis integerrimis v. obsolete-crenulatis.

Folia obverse lanceolato-oblonga v. obovato-oblonga, 2—8 m. m. longa, obtusa v. subacuta. Scapus folia semper superans, saepissime elongatus, 10—30 c. m. longus, rarius humilis, glaber v. sub apice albo-farinosus. Involucri foliola pedicellos floriferos subaequantia v. superantia v. iis rarius 2—3-plo breviora. Corollae tubus calycem aequans v. usque sesqui superans. Flores rosei, limbo 5—10 m. m. in diametro.

Hab. in Sibiria altaica et baicalensi, in montibus editioribus Soongoriae et regionum cis — et transiliensium in Dahuria, inque in Caucaso (Bayern).

P. longiscapa Ledb. l. c. — Ejusd. ic. pl. ross. IV. tab. 348. — Ejusd. fl. ross. IV. pag. 12. — *P. exaltata* Lehm. monogr. Prim. pag. 57. — *P. davurica* Lehm. monogr. pag. 58. — *Pr. intermedia* Curt. bot. mag. tab. 1219. — *P. altaica* Lehm. monogr. pag. 59. tab. V. — D. C. prodr. VIII. 43.

β. undulata Fisch.; foliis crenulato-denticulatis.

Scapus 7—14 c. m. altus. Umbella pauci—multiflora.

Pedicelli floriferi flore plus duplo breviores v. usque plus duplo longiores. Corollae tubus calycem aequans v. usque sesqui superans.

Lus. a. *parviflora*; corollae limbo 6—8 m. m. in diametro.
— b. *grandiflora*; corollae limbo 10—14 m. m. in diametro.

Hab. in Dahuria, in regione amurensi, in Sibiria orientali, inque in Curonia.

P. undulata Fisch. herb. et Rehb. ic. crit. v. tab. 468.

Längere und kürzere Blumenröhre, länger und kürzer gestielte Blumen, ganzrandige und mehr oder weniger deutlich gekerbte Blätter mit kurzem oder langem Stiele, kommen bei Exemplaren der gleichen Lokalität vor, so dass alle die von Lehmann aufgestellten Arten, nicht einmal Formen darstellen. Ledebour (Fl. ross. III. 12), unterscheidet noch eine Form β . *grandiflora*, mit fast gekerbten Blättern, armblumigeren Blüthendolden und einer Röhre der Blumenkrone die halbmal länger als der Kelch. Wollte man alle diese Merkmale genau berücksichtigen, dann müsste man eine Menge von Formen aufstellen.

Wir halten daher nur die Formen mit fast ganzrandigen oder undeutlich gekerbten Blättern, — und andererseits die mit deutlicher kerbzähnigen Blättern aus einander. Die letzteren sind grösstentheils mehr im Osten Sibiriens heimisch, gemeinlich von niedrigerem Wuchs, mit kurz- oder langgestielten Blumen und im letzteren Falle mit lockerer Blüthendolde.

Pr. *farinosa* L. ist nach unserer Ansicht, die Stammart von Pr. *algida*, Pr. *longiscapa* und Pr. *borealis*. In den Alpen und dem Norden Europas tritt dieselbe nur mit weisser Bepuderung auf der Rückseite der Blätter auf; im Caucasus kommt die weiss-

und gelbbepuderte Form vor und ist die letztere ausserdem durch schärfere Blattsäbhnung und theils gefärbte Kelche ausgezeichnet. In Turkestan kommen weiss- und gelbbepuderte Formen vor, die weiss bepuderte ebenfalls mit gefärbtem Kelch, gelb bepuderte ganz von der Gestalt der Pflanze des Caucasus, aber mit stumpfen kleinen Kerbzäbhnchen des Blattrandes. Bei den gelbbepuderten Formen Baicaliens und Sibiriens, sind die Zäbhnchen des Blattrandes meist stumpf und die Blätter und Blüthenstielen meist mehr gestreckt.

Die nicht mit Pudermebl auf der Rückseite der Blätter versehenen Formen, stellen, wenn sie scharfe Blattsäbhnchen haben, die *P. algida* dar, welche zu *Pr. longiscapa* β . den Uebergang bilden und die *Pr. longiscapa* ist einfach als die Form mit nicht bepuderten Blättern von *Pr. farinosa* zu deuten, welche Form bekanntlich nicht blos in Sibirien, sondern zuweilen auch in Europa einzeln zwischen den normalen Pflanzen vorkommt. So liegen uns z. B. Exemplare der *Pr. farinosa* mit nicht bepuderten Blätter aus Kurland vor.

Wir haben trotz dieser unserer Ueberzeugung, dass *Pr. algida*, *longiscapa* und *borealis* nur Formen der *Pr. farinosa* sind, diese Arten vorläufig noch festgehalten, weil wir solche erst noch in der Cultur beobachten möchten, bevor wir eine Vereinigung derselben definitiv proponiren wollten. F. v. Herder hat in Труды И. Б. С. I. 390 schon *Pr. longiscapa* mit *Pr. farinosa* vereinigt, trennt aber noch die ganz zu *Pr. farinosa* übergehende gelbbepuderte Form.

19. *P. borealis* Duby.

Duby in D. C. prodr. VIII, pag. 43. — Ledb. fl. ross. III, pag. 15. — *Pr. mistassinica* Cham. et Schl. Linnaea I. 213. — *P. gigantea* Jacq. misc. I. pag. 160. — Lehm. monogr. Prim. p. 61 tab. 6. — *P. parvifolia* Duby in D. C. prodr. VIII. 42.

Hab. in Terra Tschuktschorum, in Kamtschatka et in America boreali.

Ist wohl nur die hoch nordische Form der *Pr. longiscapa* und unter den Exemplaren der var. β . b. der letzteren, befinden sich Exemplare mit lang und dünn gestielten Blättern, die schon ganz zu *P. borealis* hinneigen. *Pr. gigantea* wird von Ledebour zu *Pr. sibirica* gezogen, die von Lehmann (l. c.) gegebene Abbildung ist ein üppiges Exemplar von *Pr. borealis*. Zu *Pr. sibirica* kann dieselbe schon deshalb nicht gehören, weil den Blättchen der Hülle die sackartigen Anhängsel gänzlich fehlen.

20. *P. cuneifolia* Ledb.

Ledb. Mem. Ac. Petr. V. 522. (1844). — Ejusd. fl. ross. III. 15. — *P. saxifragifolia* Lehm. monogr. Pr. pag. 89. tab. 9. (anno 1817). D.C. prodr. VIII. p. 39. — Hab. in Sibiria orientali et in Kamtschatka.

21. *P. sibirica* Jacq.

Pr. sibirica Jacq. misc. I. pag. 161. — D. C. prodr. VIII. 43.

Glabra. Folia elliptico-suborbiculata v. elliptico-oblonga, integerrima v. obsolete denticulata, in petiolum saepissime laminam superantem attenuata. Involucris foliola basi saccato-appendiculata, saepissime pedicellis 2—3-plo breviora v. rarius eos subaequantia. Umbella pauci—pluriflora. Calycis tubulosi dentes subacuti v. obtusi, tubo 2—3-plo breviores, margine brevissime glanduloso-puberuli. Corollae roseae tubus calyce paullo—duplo superans, limbi lacinae obcordato-bifidae.

α . *grandiflora*; florum limbo 1—1½ c. m. in diametro.

a. *genuina* Trautv.; tubo corollae calycem parum superante.

P. sibirica α . genuina Trautv. imag. pl. fl. ross. pag. 44. tab. 30. — Ledb. fl. ross. l. c. — *P. rotundifolia* Pall. it. III. 223. — *P. nutans* Georgi it. I. p. 200.

b. *brevicalyx*; corollae tubo calyce subduplo longiore. — *P. sibirica* β . *brevicalyx* Trautv. l. c. fig. g—i. — *P. sibirica* Lehm.

monogr. Pr. tab. V. — Bot. mag. tab. 3167 et tab. 3445. —
P. norwegica Retz fl. scand. n. 240.

Habitat a Rossia septentrionali ad Sibiriam orientalem.

β. parviflora; corollae limbo 6—8 m. m. in diametro, tubo calycem paullo—duplo superante. — *P. finnmarchica* Jacq. misc. p. 160. — *P. sibirica β. finnmarchica* Rupr. fl. Samoj. n. 203. — *P. intermedia* Ledeb. in Mem. Ac. Petr. V. 519. — *P. egallicensis* Wormsk. in Lehm. monogr. Pr. pag. 64. tab. 7. — *P. longiscapa* Herd. pl. Semenow. n. 686.

Habitat in Rossia septentrionali, in Turkestan, in regionibus cisiliensibus, in Sibiria orientali et in Kamtschatka.

Die zahlreichen uns aus den Gebirgen Turkestans, (in einer Höhe von 7500' von O. Fedschenko in verschiedenen Lokalitäten, sowie von Scharnhorst bei noch bedeutenderer Höhe gesammelten vorliegenden Exemplare, gehören meistens zur Form *β*. Nur von 2 Lokalitäten des Kokanischen Bezirks, liegen uns Exemplare der Form *α*. a. von Baron Kaulbars und von O. Fedschenko gesammelt, vor. Beide haben ein eigenthümliches Ansehen, indem sie von kräftigern, aber nicht höhern Wuchs, ferner mit länglich-elliptischen schwach gekerbten Blättern und vielblumigem Blütenstand, so dass sie schon eine nach der folgenden Art hinüber neigende Form bilden.

23. *P. Olgaе Rgl*; glabra; foliis obovato-oblongis, in petiolum late membranaceo—alatum brevem attenuatis, obtusis v. subacutis, crenulato-denticulatis v. subintegerrimis; involucri foliolis lanceolatis, acutis, basi appendiculato-saccatis, pedicellos floriferos superantibus; umbella pluri—multiflora, densa; pedicellis brevibus, quam flores plus duplo brevioribus; calycis breviter campanulati laciniis lanceolatis acutis tubum subaequantibus; corollae tubo calycem duplo v. plus duplo superante, limbi laciniis obcordato-bifidis.

Folia $1\frac{1}{2}$ —3 c. m. longa. Scapus folia saepissime plus duplo superans, rarius initio subnidulans, usque 7 c. m. altus. Involucri foliola 5—7 m. m. longa. Calyx 3—4 m. m. longus, viridis, saepissime striolis brevibus purpureis pictus. Corollae tubus pallidus, circiter 8 m. m. longus, limbo ut videtur e roseo-lilacino, 10—14 m. m. in diametro.

P. sibirica Jacq. cui proxime affinis, facile distinguitur: «foliis elliptico-orbiculatis v. oblongo-ellipticis, in petiolum laminam superantem attenuatis; involucri foliolis pedicellis saepissime plus duplo brevioribus, rarius subaequantibus; calycis tubulosi dentibus tubo plus duplo brevioribus.»

Habitat in Turkestaniae valle Sarawschansk 7—12000' alt. (O. Fedschenko).

36. SEEMANNIA BENARYI RGL.

Seemannia Rgl. cfr. Grtfl. 1865, pag. 183 tab. 122.

S. Benaryi Rgl., pilis adpressis brevibus dense hirtula, foliis caulibus floriferi saepissime verticillato-quaternis v. rarius quinternis; floribus in axillis foliorum superiorum binis. — Tota planta pilis brevibus adpressis hirtula. Herba rhizomate squamoso, perennante. Caules erecti, purpurascens, a basi supra medium quadranguli, apicem versus teretiusculi. Folia lanceolata, acuminata, integerrima, brevissime petiolata, supra viridia, infra pallidiora, opposita v. terna, caulium florum quaterna v. quaterna. Flores racemum foliatum elongatum a medio ad apicem caulibus formantes, in foliorum superiorum axillis bini, in fol. inferiorum axillis saepe solitarii. Pedunculi folio breviores, altero longiore, altero brevior, purpurascens. Calyx, corolla, annulum perigynum, germen et stigma ut generis. Corolla oblique adnata, purpurea, basi aequalis, subtus ventricosoinflata, fauce vix constricta, $1\frac{1}{2}$ c. m.

longa, 1 c. m. in diametro, limbo brevi erecto aequaliter quinque dentato. Legit cl. Roezl in America tropica.

37. STANGERIA KATZERI RGL.

St. Katzeri Rgl., foliis usque 11-jugis; foliolis obverse oblongis, ex apice rotundato-mucronato acutis, margine leviter undulato-repandis, apicem versus repando-crenatis, sub apice interdum dente uno alterove subspinescente.

Planta humilis, caudice brevi rapiformi, vix cicatricato; foliis paucis, ex apice caudicis evolutis, pinnatis, glaberrimis. Petioli teretes, 28—37 c. m. longi, apice tantum in latere superiore canaliculati, basi squamis tomentosis parvis suffulti. Lamina 32—40 c. m. longa, rhachi semitereti. Foliola subopposita, obverse-oblonga, acuta, decrescentia; inferiora in petiolum gracilem v. rarius brevem attenuata, cum petiolo 12—19 c. m. longa, supra medium 4—6 c. m. lata; intermedia brevius petiolata, suprema tantum sessilia decurrentia; omnia venis costae perpendicularibus creberrimis passim furcatis, margine leviter undulato-repanda v. apicem versus crenato-repanda, ex apice rotundato apiculato-acuta, sub apice hinc inde denticulo subspinescente instructa. Amentum masculinum oblongo-cylindricum, petiolo crasso apicem versus incrassato circiter 6 c. m. longo suffultum; squamis arcte imbricatis, apice inflexo trapezoideo ferrugineo-tomentoso terminatis. Stamina numerosa superficie inferiore squamae adnata.—*St. Katzeri Rgl. Grtfl.* tab. 798.

Stangeria paradoxa Hook. «foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis a medio ad apicem v. rarius apicem versus tantum spinuloso-serratis» facile dignoscitur.

38. *TILLANDSIA JUNCIFOLIA* RGL.

Tillandsia L. Perigonii liberi sexpartiti laciniae exteriores calycinae aequales, basi cohaerentes, rectae v. spiraliter tortae, duo altius inter se connatae, tertia supra basin libera, saepe paullo minor; laciniae interiores petaloideae, in tubum convolutae v. connatae, superne patentes v. erectae, basi nudae v. squamosae. Stamina 6, hypogyna, omnia libera v. alterna perigonii laciniis interioribus adhaerentia; antherae incumbentes, basi sagittato-emarginatae v. subintegrae. Ovarium liberum, triloculare. Ovula in loculorum angulo centrali affixa, bi—pluriseriata, ascendencia, anatropa, apice saepissime appendice lineari. Stylus filiformis; stigma trifidum, nunc lobis abbreviatis dilatatis subcapitatum, nunc lobis filiformibus aut apice dilatatis rectis v. contortis. Capsula cartilaginea, linearis v. ovata, trilocularis, loculicido-trivalvis. Semina plurima, e basi dissepimentorum erecta, lineari-clavata, stipitata; stipite pilis papposis cincto. — Herbae lepidotae, caulibus foliosis simplicibus v. rarius ramosis, foliis saepe angustis lanceolato-linearibus v. linearibus v. junciformibus, floribus spicatis v. paniculatis v. rarius solitariis.

Sectio Calypstrosperma Rgl. Folia junciformia. Panicula coarctata, e spiculis compressis distichis composita. Calycis segmenta recta. Petala ad apicem recta. Filamenta omnia libera. Antherae basi integrae. Ovula apice appendice filiformi.

T. juncifolia Rgl. Caulis simplex, basi dense rosulato-foliatus; caule florifero foliis inferioribus brevior, descescente laxe foliato; bracteis foliisque in pagina inferiore albido—lepidotis. — Folia e basi dilatato-vaginata fusca mox subulato-semiteretia et in apicem setaceum attenuata, infra albido-lepidota, supra canaliculata viridia glabra, 25—30 c. m. longa. Caulis floriferus (scapus) rufescens, circ. 16 c. m. altus, foliis brevior, apice spicis plurimis (circiter 6) compressis sessilibus congestis erecto-patentibus paniculam congestam formantibus terminatus. Folia caulina iis rosulae similia, breviora autem, superiora rufescentia,

suprema bracteiformia quam inflorescentia breviora, rosea, e basi ovata in apicem subulatum exeuntia. Spiculae compressae, distichae, circiter 6 florum, 3 c. m. longae, dense congestae. Spicularum bractee pergameneae, virides, solitariae, distichae, carinatae, calycem amplectentes, e latere lanceolato-oblongae, acutiusculae, dorso dense albido-lepidotae, circiter 2 c. m. longae. Calyx (perigonii laciniae exteriores) bracteam paullo superans, viridis; laciniis duabus in unam bicostatam ventre marginibus inflexis sub apicem connatis, lacinia tertia basi tantum adnata, caeterum libera, lineari-lanceolata, acuta, laciniis lateralibus coalitis quadruplo angustiore et vix brevior. Petala (perigonii laciniae interiores) oblonga, caerulea, a basi ad apicem erecta, in tubum convoluta, basi nuda, calycem duplo superantia, apice obtuso vix reflexo. Filamenta 6, omnia ad basin libera, filiformia, sub apice paullo dilatata, corolla $\frac{1}{6}$ longiora; antherae incumbentes, versatiles, oblongae, biloculares, rimis longitudinalibus rumpentes, basi subintegrae. Ovarium oblongo-trigonum. Stylus stamina aequans; stigmatibus breviter trifido, lobis apicem versus dilatatis et inter se subcoalitis. Ovula in loculorum angulo affixa, ascendentia, pluriserialia, oblongo-linearia, anatropa, apice appendice lineari terminata. — Capsula seminaeque ignota. — *T. juncifolia* Rgl. Grtfl. tab. 811. — *T. staticiflora* hort. Par. nec. Morren. — *T. filiformis* hort. Belg. — Habitat verosimiliter in arborum truncis Americae tropicae regionum elevatiorum.

Affinis *Tillandsiae* (Bonaparteae) *junceae* Ruiz et Pav. (*Platystachys juncea* Beer. Brom. 86) et *Tillandsiae divaricatae* Benth.

T. juncea Ruiz et Pav. (Fl. peruv. IV. pag. 38. tab. 262 sub Bonaparteae) caule elatiore foliato, antheris basi sagittatis, stigmatibus lobis linearibus facile dignoscitur. — *T. divaricata* Benth. (Botany of the voyage of Sulphur pag. 174) spiculis 12—15 floris divaricatis breviter pedunculatis, foliis caulinis pilosiusculis diversa videtur. (Stigmatibus antherarum et ovulorum figuratio ignota).

Die Gattung *Tillandsia* umfasst eine Masse von noch sehr unvollkommen bekannten Arten. Die sehr wechselnde Form des Blütenstandes,

der Staubbeutel, die Einfügung der Staubfäden, die Form der Narbe und der Eichen, scheinen gute Charaktere zur Abtheilung und Unterscheidung in mehrere Gattungen zu bieten. Der nicht gedrehte Kelch, die bis zum Grunde freien Staubfäden, die am Grunde nicht zweitheilige Anthere, die nach oben verbreiterten in eine kopfförmige Narbe verwachsenen Lappen derselben, durchaus aufrechte Blumenblätter und die mit einem langen linearen spitzenständigen Anhängsel versehenen Eichen, sowie endlich die aus zusammen gehäuften zweizeiligen kurzen Aehrchen bestehende Rispe, scheinen unsere oben beschriebene Art von dem Gattungscharakter, wie solcher gemeiniglich von *Tillandsia* gegeben wird, zu unterscheiden und zum Typus einer Gattung oder Untergattung zu machen. So lange aber nicht die vielen andern sogenannten *Tillandsia*-Arten genauer bekannt sind, so lange muss man sich begnügen, die wenigen besser bekannten Arten als Sectionen aufzuführen, wie wir dies mit *Wallisia* und der in Rede stehenden Art gethan haben.

39. TULIPA EICHLERI RGL.

Bulbi tunicis externis apice intus strigoso-pilosis; caule elato sesquipedali et ultra, sub lente pedunculoque dense puberulo; foliis loriformi-lanceolatis, attenuato-acuminatis, supra dense minutissime puberulis, caulem superantibus, glaucis; sepalis elliptico-lanceolatis, apice convoluto apiculatis, interioribus obovatis ex apice subtruncato vix apiculatis, omnibus purpureis, basi staminibusque glaberrimis, maculaque nigra luteo-marginata ad basin notatis.

Stamina purpurea, antheram linearem circiter aequantia. Germen cylindricum, antheras subaequans, stigmate trilobo germinis diametro latiore coronatum.

Corollae petala patentissima. — *T. Eichleri* Grtfl. tab. 799. Prope Baku legit cl. Eichler. Affinis *Tulipae Greigi* et *T. Didieri*, *T. Oculi solis*, *T. Borszczowi*, *T. Julia* et *T. montana*, quae subaequantibus notis dignoscuntur :

T. Greigi; caule spithamaeo, foliis inferioribus ovatis undulatis cartilagineo-marginatis, sepalis ovatis v. cuneato obovatis.

T. Didieri; pedunculo glabro, sepalis ovato-ellipticis.

T. Oculus solis, *T. Borszczowi*, *T. Julia* et *T. montana* bulbi tunicis intus lanatis v. lanuginosis.

Nachträgliche Bemerkungen zu meiner Aufzählung der Arten der Gattung Tulipa (Труды II. 389) und *Vitis*. (Труды II. 437).

Es ist mir von verschiedenen Botanikern, deren Stimme von bedeutendem Gewicht ist, der Vorwurf gemacht worden, die Arten der Gattungen *Tulipa* und *Vitis* zu sehr zusammen gezogen zu haben. Eine erneute Durchsicht beider Gattungen überzeugte mich, dass im Gegentheil noch theils zu viel Arten, namentlich bei der Gattung *Tulipa*, aufgestellt wurden.

Die Ansicht was Art,—was Form,—richtet sich bei vorurtheilsfreier Untersuchung wesentlich nach dem Material, was der Untersuchung zu Grunde liegt. Liegen die verschiedenen Arten nur von einem oder wenigen Standorten vor, — dann sind die verschiedenen im Begriff der Art sich bewegenden Endformen, nicht bloß scharf ausgeprägt, sondern es fehlen auch die Uebergänge nach den andern Formen der gleichen Art und so müssen diese Formen consequenter Weise vom betreffenden Autor noch für gute Arten genommen werden.

Liegt dagegen die Art von zahlreichen Standorten aus einem weiten Verbreitungsbezirk vor, dann treten auch bei den wild gesammelten Pflanzen alle jene zahlreichen Abänderungen auf, die auch bei der Cultur unter verschiedenartigen Bedingungen und stets erneuter Anzucht aus Samen, so häufig zu beobachten sind. Deshalb schlossen die Systematiker des alten Schlages, Kulturexemplare bei Entwerfung ihrer Diagnosen und der Beschreibung der Arten gänzlich aus, oder bildeten wie Schrader z. B. bei der Gattung *Berberis*, aus jedem Individuum eine besondere Art. Es herrschte ferner früher ziemlich allgemein die Ansicht, dass eine in Nordamerika heimische Pflanze, mit einer in Europa oder Asien heimischen Art nicht identisch sein könne. Es war dies nicht nur ein früher

von allen Systematikern angenommenes Prinzip, sondern es gehört diese Ansicht trotz der zahlreichen von Asa Gray, Maximowicz, sowie von mir und andern gegebenen Beispielen, in gewissen Kreisen die vor den vorhandenen Thatsachen die Augen zu schliessen belieben, immer noch nicht zum überwundenen Standpunkte. Zunächst nun auf die Gattung *Tulipa* eintretend, lag mir aus dem Kreise der mit *Tulipa sylvestris* verwandten Arten, ein ausserordentlich reiches Material vor. Dies berechtigte mich die aus der Verwandschaft v. *Tulipa sylvestris* zahlreich aufgestellten Arten, die eigentlich zum Theil nur auf die bei den Tulpen so veränderliche Färbung der Blumen, sowie deren Grösse fusste, als Formen zu *T. sylvestris* zu ziehen. Zu diesen Formen dürfte unter andern wohl auch die von mir noch als *T. saxatilis* Sieb. fest gehaltene Art gehören, während meine *T. sylvestris* L. γ *turkestanica* nach erneuter Untersuchung richtiger zu den Formen von *T. biflora* L. gestellt werden dürfte.

Zu *Tulipa Gesneriana* L. habe ich einen Irrthum zu verzeichnen. Es lagen mir zur Untersuchung grossentheils kultivirte Exemplare vor, an denen die äussern Zwiebelhäute entfernt waren. Ich habe in Folge dessen irrthümlich alle Zwiebelhäute von *T. Gesneriana* als innen kahl beschrieben, dies ist aber nur bei den inneren Zwiebelschuppen der Fall, während an den äussern auf der innern Seite nach oben zu, sich eine zerstreute oder auch dichtere steife angedrückte Behaarung findet. Damit fällt der Unterschied der zwischen *T. Gesneriana* und der von mir *T. Schrenkiana* genannten Art fort. Allerdings besitzt letztere kleinere Blumen und eine stets dichter gestellte fast die ganze innere Seite der äussern Zwiebelschuppen bekleidende steife angedrückte Behaarung, — aber doch ist solche sicherlich nur die von mir verkannte wild wachsende Stammform der *T. Gesneriana*.

Zu *T. suaveolens* Roth. ist zu bemerken, dass ich dieselbe nachträglich auch in im Caucasus wild gesammelten Exemplaren sah und dass ich gegen eine Vereinigung von *T. strangulata* Reboul und *T. altaica* Pall. mit *T. suaveolens*, durchaus keinen Protest einlegen würde. Ferner

sah ich *T. Didieri* Jord., *T. Lehmanniana* Merklin, *T. soogdiana* Bge., *T. armena* Boiss., *T. Sibthorpiana* Sm., entweder gar nicht oder nur in mangelhaften Exemplaren, so dass ich mir über diese Arten noch keine feste Ansicht bilden konnte.

Endlich habe ich von Th. v. Heldreich in Athen kürzlich die Abbildung und Beschreibung einer neuen Tulpe (*Tulipa Haageri*) erhalten, welche in der Gartenflora Tafel 790 publicirt worden ist. Es ist das eine der schönsten Formen von *T. sylvestris*, die unmittelbar neben *T. sylvestris* ζ *Orphanidea* gestellt werden muss. Blumen purpur, die einzelnen Blumenblätter mit gelbem Mittelstreifen und mit blauschwarzem Flecke am Grunde der Blumenblätter.

Zur Gattung *Vitis* übergehend, ist mir in erster Linie entgegen gehalten worden, dass die in America heimischen Arten dieser Gattung sicherlich gut spezifisch von den in Asien heimischen Formen verschieden seien. Schon Asa Gray, der tüchtigste Kenner der Pflanzen Nordamerikas, der auch die Flora Japans gründlich studirt hat, zog mit vollster Berechtigung *V. Thunbergi* einfach zu *V. Labrusca* und ich kann nur auf's Neue bestätigen dass nicht nur zwischen dieser ersteren Art, sondern auch zwischen den asiatischen Formen der *Vitis vulpina* und denen Nordamerikas sicherlich kein spezifischer Unterschied stattfindet, — sondern dass wenn ich einen Zweifel habe, dieser nur darin besteht, — ob nicht *V. amurensis* und *V. aestivalis*, richtiger als Uebergangsformen von *V. vulpina* zu *V. Labrusca* zu betrachten sind.

Der zweite mir gemachte Vorwurf besteht darin, dass die buchtig gelappte Form von *Vitis heterophylla* (*V. heterophylla* β Maximowicz), ferner von *V. Labrusca* (*V. Labrusca* c. *ficifolia* und d. *sinuata*), schon deshalb gut verschiedene Arten seien, weil solche im Garten kultivirt, ihre Form nicht veränderten. Wer aber, frage ich, ist im Zweifel darüber ob die schlitzblättrigen Formen von *Alnus incana* und *A. glutinosa*, von *Betula alba*, *Tilia parvifolia*, *Sambucus nigra* u. a. m. nur Formen oder gute Arten sind und dennoch bleiben auch diese ungeschlechtlich vermehrt, sich unter allen Verhältnissen in der Kultur treu.

Die buchtig lappigen Formen von *V. heterophylla* und *V. Labrusca*,

werden in Kultur aber ebenfalls nur ungeschlechtlich fortgepflanzt und behalten in Folge dessen ihre spezielle Gestalt bei. Herr C. Maximowicz, der diese buchtiglappigen Formen beider Arten in Japan beobachtete, theilte mir mit, dass an sonnigen Standorten die buchtig lappige, an schattigen Standorten die gewöhnliche Form vorherrsche und dass man an Ort und Stelle sich leicht überzeugen könne, dass ein spezifischer Unterschied da nicht existire. Bei *V. heterophylla* ist die buchtig lappige Form, wahrscheinlich nur die Form der spätern Entwicklung, welche dann durch die ungeschlechtliche Fortpflanzung festgehalten wird, wie dies z.B. auch bei den ganzblättrigen Formen des Epheu der Fall ist.

Bei *V. Labrusca* und *V. aestivalis* geht dagegen die Form mit ungetheilten oder eckiglappigen Blättern ganz allmählig bis zur Form mit buchtig-lappigen Blättern über. Bei *Vitis vinifera* L. endlich, sind seit alten Zeiten verschiedene schlitzblättrige Formen bekannt, welche seit Jahrhunderten ungeschlechtlich fortgepflanzt werden, ohne ihre Blattform zu verändern und keiner denkt daran solche zu eignen Arten erheben zu wollen.

Wenn ich also bei meiner Zusammenstellung der Tulpen und Weinreben gefehlt habe, so ist nach meiner Ansicht dieser Fehler nicht in der Aufstellung und Annahme von zu wenig Arten, — sondern im Gegentheil in der Annahme von noch zu viel Arten begangen worden, indem ich bei meiner Bearbeitung vom Grundsatz ausging, noch alle die Arten zu halten, wo nicht unmittelbar Uebergänge von der einen Art zur andern vorlagen. Da, wo also das mir vorliegende Material mangelhaft war, musste ich manche wahrscheinlich unhaltbare Art, noch als Art beibehalten. Jeder der je an die vorurtheilsfreie Bearbeitung einer Gattung oder Familie gegangen ist, der weiss es, wie leichtes ist, zwischen nah verwandten Arten scharfe Unterschiede fest zustellen, sofern nur einzelne Exemplare zur Vergleichung und Untersuchung vorliegen, — dass aber solche scharfe Unterschiede sich um so schwerer auffinden lassen, je reicher das vorliegende Material an Exemplaren von verschiedenen Florengebieten und Standorten, wo dann bei genauer Vergleichung

zuletzt viele sogenannte Arten zu den Formen einer einzigen weit verbreiteten und vielgestaltigen Art vereinigt werden müssen.

Hieran scheint es mir nothwendig einige Worte über die bedeutende Verwandtschaft der Florengebiete des Ostens des mittlern und südlichen Asiens mit denen der Vereinigten Staaten Nordamerika's, sowie über das was ich für Art halte, anzureihen.

Schon im Jahre 1861 bei der Bearbeitung der von Maack im Ussurigegebiete gesammelten Pflanzen (Tentamen Florae Ussuriensis, Mém. de l'Ac. St. Pétersb. tom. IV n. 4, pag. 220—221), gab der Referent ein Verzeichniss von 156 Pflanzenarten, welche dem Ussurigebiet und den Vereinigten Staaten Nordamerikas gemeinsam. Von diesen waren allerdings nur 27 diesen beiden Gebieten ausschliesslich eigenthümliche Pflanzenarten, während der Rest die überhaupt weit verbreiteten gemeinen Pflanzen repräsentirt. Ich sprach mich damals dahin aus, dass von den 27 ersteren, 15 im Ussuri-Gebiet ihre Nordgränze erreichen und also entweder nur in Folge einer südlichen in frühern Perioden bestandenen Verbindung zwischen den Staaten Nordamerikas und Ostasien übergetreten sein könnten,—oder dass sie als Reste aus der Tertiärzeit zu betrachten seien, indem sie in dem zu jener Epoche noch verbundenen Norden Asiens und Nordamerikas lebten und sich von da aus bis zu den südlichen Breitegraden beider Welttheile verbreiteten, später aber im Norden in Folge des veränderten Klimas ausstarben und nur in den südlichen Breitegraden beider Welttheile erhalten blieben.

Seitdem ist vieles geschehen was zur Begründung der letztern Ansicht beiträgt, dass nämlich alle der alten Welt und Nordamerika gegenwärtig gemeinsamen Arten, soweit solche nicht durch den Menschen eingebürgert wurden, als Reste der Tertiärzeit betrachtet werden müssen. Die Polarländer waren damals sehr wahrscheinlich untereinander verbunden und besaßen die Flora des kalten gemässigten oder warmen gemässigten Klimas unserer Epoche. Bei der allmäligen Umänderung des Klimas in den späteren Epochen der Tertiärzeit, während der Diluvialzeit und der allmäligen Vergletscherung des Nordens, mussten dieselben immer mehr

nach dem Süden beider Continente fortwandern, wo uns solche jetzt erhalten geblieben sind.

Heer's Untersuchungen über die Flora der Polarländer der Tertiärzeit, hat dort eine grössere Zahl der Typen nachgewiesen, die als die Stammältern mancher jetzt in Nordamerika und dem südlichen Ostasien heimischen Pflanzenformen angesehen werden müssen. Die Flora Japans ist durch *C. Maximowicz* und *Asa Gray* viel genauer bekannt geworden und letzterer hat kürzlich wieder in seiner Adresse an die «American Association for the advancement of science», die Uebereinstimmung vieler Pflanzentypen der Flora Ostasiens und des Mississippi-Gebietes der Vereinigten Staaten nachgewiesen und gleichfalls diese Uebereinstimmung aus der Pflanzenwanderung in der auf die Tertiärzeit folgenden und zu unseren Jetztwelt übergehenden Periode erklärt. Asa Gray hat jene Adresse eigentlich an diejenigen Systematiker gerichtet, welche jetzt noch annehmen, dass alle in Amerika heimischen Pflanzen, von den durchaus ähnlichen Formen Asiens oder Europas specifisch verschieden seien, — eine Annahme die vor 40 Jahren unter den Systematikern als allgemein gültiges Gesetz galt und jetzt noch von manchem der ältern hochstehenden Systematiker vertreten wird.

In der von uns angezogenen Schrift hat *Asa Gray* noch auf ein anderes sehr interessantes Faktum hingewiesen, — dass nämlich die Flora Californiens und des Oregon-Gebietes, welche beiden Gebiete dem Osten Asiens ja am nächsten liegen, viel weniger Typen aufzuweisen hat, welche mit Pflanzentypen Ostasiens nahe verwandt sind, (wie z. B. die Gattung *Philadelphus* eins dieser wenigen Beispiele ist), als die westlicheren Gebiete Nordamerikas.

Die weit grössere Annäherung und Verwandtschaft zeigen nämlich die Mandschurei, Japan, China und der Himalaya einerseits und die atlantischen südlichen Staaten Nordamerikas inclusive des Mississippi-Gebiet andererseits, in vielen gemeinsamen oder nahe mit einander verwandten Typen ihrer gegenwärtigen Pflanzenwelt. Wahrscheinlich haben die hohen Gebirgsketten, welche die Küstengebiete des Westens der Ver-

einigten Staaten auch für die Jetztwelt abschliessen und seiner ganzen Pflanzenwelt ein vom Osten durchaus verschiedenes Gepräge verliehen haben, die Pflanzenwanderung der Tertiärflora auch damals schon nur partiell zugelassen, während die östlichen ebenen Theile Nordamerikas dieser Pflanzenwanderung nach den Süden keine Hindernisse entgegen stellten.

So sind z. B. wie das Asa Gray in jener Schrift zeigt, die beiden Sequoia-Arten Californiens aus der Tertiärzeit nur dort erhalten worden, das über den grössten Theil des Gebietes der alten Welt und Nordamerikas in der Tertiärzeit verbreitete *Taxodium distichum*, ist dagegen in Californien nicht mehr vorhanden, sondern nur in den westlichen Staaten Nordamerikas bis Texas hin erhalten geblieben. *Torreya* macht eine Ausnahme, (*Taxites*, der Tertiärflora) indem diese Gattung jetzt noch in Californien, den Oststaaten Nordamerikas und in Japan und China seine Vertreter hat. Den atlantischen Staaten Nordamerikas und dem Osten Asiens, sind aber viel zahlreichere Gattungen und Arten gemeinsam geblieben, von denen die Stammeltern auch schon in der Flora der Tertiärzeit der Polarländer nachgewiesen sind, so *Platanus*, *Acer*, *Liquidambar* etc. — Wir führen dies hier an, weil Asa Gray damit gezeigt hat, dass die Annahme einer Wanderung von Osten nach Westen mittelst einer versunkenen Landverbindung, unmöglich ist.

Der Begriff was *Art* im Pflanzenreiche wird sehr verschieden gefasst und hängt wie ich oben sagte theils von dem Material was der betreffende Autor zur Untersuchung vor sich hatte, theils von dem was er selbst in der Natur im Freien beobachtete und wie er den einzelnen Pflanzenarten auf feuchtem und nassen Boden, (z. B. *Ranunculus aquatilis*) in der Sonne und im Schatten, oder auf verschiedene Standorte in der Ebene und in der Höhe der Gebirge, auf verschiedenen Bodenarten, — ja selbst über weitere Ländergebiete nachging, theils endlich ob er Gelegenheit hatte das Verhalten der Pflanzenart im Kulturzustande bei fortgesetzter Fortpflanzung aus Samen, oder endlich die scheinbare Verbin-

dung zweier an sich gut getrennter Pflanzenarten durch Erzeugung von Bastarden und Mischlingen, zu beobachten.

Nur wer alles das in unbefangener Weise zu beobachten Gelegenheit hatte und von der Eitelkeit fern ist, eine Menge neue Arten auf Formen der gleichen Art zu gründen, oder der im Falle des Irrthums gern seinen Irrthum zurück nimmt, um so mehr als es keinen Systematiker giebt, der in dieser Beziehung nicht zahlreiche Irrthümer begangen hätte, — kann ein freies unbefangenes Urtheil, über das was Art, was Form, was Bestand, was Mischling, was Race im Pflanzenreich ist, beanspruchen.

Es ist eine bekannte Sache, dass unter den Milliarden von Blättern der gleichen Pflanzenart, wohl kaum ein Paar gefunden werden, die einander vollkommen gleich. Noch weniger gleichartig bilden sich die Individuen der gleichen Art unter ganz gleichartigen Verhältnissen aus. Diese Verschiedenheit der Individuen nimmt natürlich zu, wie Boden, Standort, Klima etc. sich ändern. Letztere Verschiedenheiten werden unter fortdauernd gleichartigen Verhältnissen von Generation zu Generation gleich den Racen der Kultur, mehr oder weniger fixirt, so dass selbst unter veränderten Verhältnissen derartige Formen einige Generationen hindurch zuweilen ihre Eigenthümlichkeiten behalten, wie z. B. die von *Larix europaea* (Die Form mit niederliegendem Stamme oder mit hängenden Zweigen, welche als *Larix pendula* beschrieben ist) ferner *Larix dahurica* Trautv., (in den Gebirgen Dahuriens als niederliegender Strauch, im hiesigen Garten und den mandschurischen Waldungen als hoher mächtiger Baum).

Nehmen wir nur im Allgemeinen diesen Gang der Veränderung der Art innerhalb ihres Artbegriffes an, so musste auch die von der Tertiärzeit auf unsere Jetztwelt übergegangne Pflanzenart, sich unter den jetzt ganz veränderten Wohnplätzen und Verhältnissen etwas verändern, weshalb die unsern Pflanzen der Jetztwelt ähnlichen Pflanzen der Vorwelt, meist einen andern Namen erhielten. Dass diese Veränderungen welche die Pflanzenart in jenem immens langen Zeitraume erlitt, eine so ge-

ringfügige ist, so dass sich jetzt noch die Identität nachweisen lässt, — spricht für die Beständigkeit der Art und nicht für die Entstehung der einen Pflanzenart aus einer andern. Sehen wir doch ähnliche unbedeutende Abänderungen bei den Pflanzenwanderungen über weite Strecken, auch jetzt noch entstehen. So wird, wenn wir bei dem Beispiel der Gattung *Ranunculus* bleiben wollen, bei der Wanderung von dem Westen nach Osten der alten Welt, aus *Ranunculus auricomus* L. der *R. cassubicus* L. — aus *Ranunculus Flammula* L. der *R. reptans* L. Ich habe hier absichtlich Beispiele aus dem Bereich der vom Vater der Systematik aufgestellten unhaltbaren Arten herausgegriffen. Ich brauche blos die Gattungen *Hieracium*, *Rubus*, die auf *Ranunculus aquatilis* und *Scleranthus annuus* gestützten Arten zu nennen, um daran zu erinnern, in welcher unbegreiflicher Weise und mit welcher absichtlichen Blindheit gesündigt worden ist und wie mancher Autor da seine ganze Weisheit aufgeboden hat, um zu zeigen wie scharf er noch das unterscheiden könne, was gewöhnliche Augen und Urtheil unbedingt als das Gleichartige erklären müssen.

Wenn ich so einerseits auf die Wandelbarkeit der Art innerhalb ihres Artbegriffes unter verschiedenartigen Verhältnissen hingewiesen, wenn ich andererseits die Abstammung einer grossen Zahl der Pflanzenarten unserer Jetztwelt aus denen der Tertiärzeit vertreten und wenn ich endlich das allmälige Aufbauen des Pflanzen- und Thierreiches im Laufe der verschiedenen Epochen die unsere Geologen in der Bildungsgeschichte unseres Erdballes unterscheiden, von dem Unvollkommenen zum Vollkommenen als eine Thatsache anerkenne, — so halte ich andererseits auch ebenso entschieden meine mehrfach in frühern Schriften ausgesprochene Ansicht fast, *dass mit dem Entstehen des ersten Individuums irgend einer Art, auch deren Artbegriff geschaffen ward*, der in den folgenden Generationen sich consequent fortpflanzt und bei den untergegangenen Arten von Pflanzen und Thieren auch mit dem letzten Gliede für immer verloren ging, ohne sich aus den noch vorhandenen niederen Organismen wieder erzeugen zu können.

Wenn die Pflanzenart sich innerhalb ihres Artbegriffes in einer Menge von Formen bewegt und diese Formen fälschlich als Arten beschrieben werden und dadurch nur die falschen Beispiele für das Uebergehen der einen Art in die andere geliefert werden, — wenn in der Kultur durch Bastard- und Mischlings-Erzeugung Racen hervorgebracht werden, die für die speciellen Zwecke des menschlichen Haushaltes von grössern Nutzen sind, — so sind damit wohl Beispiele einerseits der Veränderlichkeit der Art innerhalb ihres Begriffes, andererseits für das Entstehen neuer Mittel-Formen durch geschlechtliche Vermischung zweier Arten hingestellt; aber damit ist auch nicht im Geringsten der Beleg für die allmälige Umbildung vom einfacheren zum vollkommeneren Organismus gegeben.

40. VERONICA NUDICAULIS KAR. ET KIR.

Annua, humilis, puberula, superne glandulifera; foliis oblongis v. lanceolato-oblongis, basi attenuatis, pedicellis calycem superantibus, initio erecto-patentibus, deinde plus minus recurvatis, calycis segmentis quatuor, basi per paria breviter connatis, oblongis v. lanceolatis, obtusiusculis v. subacutis, margine sub lente ciliolatis, *capsula immatura longioribus, matura paullo brevioribus, uninerviis v. obscure trinerviis; capsula tranverse latiore, profunde biloba, glanduloso-pilosa ciliataque, lobis obtusis; seminibus oblongo-cylindricis, tranverse elevato-rugulosis.*

α. simplex; caule erecto, simplici, 4—6 c. m. alto, basi nudo, foliis integerrimis. — V. nudicaulis Kar. et Kir. enum. pl. Soong. n. 608. — Ledb. fl. ross. II. 252.

β. ramosa; caule erecto v. adscendente v. e basi procumbente adscendente; foliis inferioribus grosse-v. crenato-dentatis, superioribus integerrimis. — V. nudicaulis Rgl. in plant. Semenov. n. 801.

Habitat in desertis soongoro-kirghisicis, in regionibus iliensibus et in Turkestanien.

Die *V. nudicaulis* ist von Karelin und Kirilow nach mageren dürftigen aufrechten nicht verästelten Exemplaren fast gestellt worden, welche noch keine reifen Früchte besaßen, weshalb sowohl von diesen Autoren, wie nach denselben von Ledebour, diese Art als einfach und vom Grunde aus kahl (ohne Blätter) und die Kelchlappen als etwas länger als die Capsel, beschrieben wurde, was aber nur bei den noch jungen unreifen Früchten der Fall ist. Schon aus dem Ili-Gebiet lagen uns verästelte, aber noch grossentheils aufrechte oder schwach aufsteigende Exemplare vor, deren untere Blätter gekerbt-gezähnt. Jetzt endlich haben wir aus Samen, die Oberst Korolkow und Krause auf der Chiwa-Expedition gesammelt haben, Pflanzen erzogen, die stark verästelt, aus niederliegendem Grunde aufsteigen und deren untere Blätter scharf und fast grob gezähnt. Diese lebenden Pflanzen trugen auch reife Kapseln, wonach wir die eigenthümlichen Samen beschrieben, sowie feststellen konnten dass die Fruchtsielchen sich zuletzt zurück biegen und auch die Kelchlappen länger als die reife Capsel werden.

V. nudicaulis ist der *V. biloba* sehr nahe verwandt, unterscheidet sich aber durch meist nur einnervige, selten am Grunde undeutlich 3-nervige Kelchlappen, die kürzer als die reife Capsel, ebenso durch der Queere nach stark erhaben geringelte Samen.

41. SUPPLEMENTUM AD PIRONNEAVAM MORRENIANAM (n. 33).

Es ist uns bei der zerstreuten Literatur entgangen dass diese Art schon wiederholt beschrieben ward.

1864 im «Journal de la Société centrale d'horticulture, pag 385, wird sie von Brongniart als *Hohenbergia erythrostachys* beschrieben und abgebildet. Ob nun *Pironneava* als Gattung mit *Hohenbergia*, wie solche Brongniart definirt, zusammen fallen muss, das vermögen wir jetzt noch nicht zu entscheiden, es scheint uns aber *Pironneava* gut begründet, auch war diese letztere Gattung schon aufgestellt,

bevor Brongniart die von Schultes zu *Hohenbergia* gebrachten Arten in mehrere Gattungen vertheilte. Brongniart war die von Gaudichand aufgestellte Gattung *Pironneava*, bei seiner Vergleichung der mit *Aechmea* und *Hohenbergia* verwandten Gattungen, entgangen und so dürfte *Pironneava* Gaudich. jedenfalls als Gattung aufrecht erhalten werden müssen, die sich durch den Blumenblättern ganz angewachsene Staubfäden und die Form der Kelchblätter von *Hohenbergia* unterscheiden würde.

Ferner ward unsere Pflanze von Hooker (Bot. Mag. tab. 5668) als «*Aechmea glomerata*» beschrieben und fälschlich für eine mit *Pironneava glomerata* Gaudich., identische Art gehalten. Auch Hooker waren weder Brongniarts noch C. Koch's Arbeiten in dieser Richtung bekannt.

C. Koch hat nämlich schon in der *Wochenschrift* 1861 pag. 189 eine *Pironneava roseo-caerulea* beschrieben, welche sofern sie mit unserer *Pironneava Morreniana* identisch sein sollte, in Bezug auf Benennung die Priorität haben müsste. Diese letztere Art müsste aber bevor man eine solche Vereinigung vornehmen könnte, noch mit unserer Pflanze genau vorglichen werden, indem sich dieselbe z. B. nach Kochs Beschreibung durch gelbliche Brakteen (die unserer Pflanze sind weisshäutig) und gelbliche Brakteolen (die unserer Pflanze rosa-purpur) unterscheidet, wozu bei genauer Vergleichung wohl noch andern Merkmale treten möchten.

Wir halten daher auch jetzt noch den unserer Pflanze, nach dem Monograph der Bromeliaceen Herrn E. Morren, gegebenen Namen fest, bis die Identität unserer Pflanze mit *P. roseo-coerulea* C. Koch, unzweifelhaft bewiesen ist. Herr E. Morren, der auch die Bromeliaceen der Herbariums unseres Gartens behufs seiner monographischen Bearbeitung erhalten hat, wird diese Frage am Besten beantworten können. Seine uns brieflich gegebenen Notizen sind die Veranlassung dieses Nachtrages.

DESCRIPTIONES
PLANTARUM NOVARUM

ET

MINUS COGNITARUM.

Fasciculus III.

AUCTORE

E. REGEL.

PETROPOLIS.

1875.

BOGUSLAWSKI
1875

DESCRIPTIONES PLANTARUM NOVARUM

ET

MINUS COGNITARUM.

Fasciculus III.

AUCTORE

E. REGEL.

PETROPOLIS.

1875.

W. K. Schell
Chayer

Типографія Братсвъ Шумахеръ, Вас. Остр., Загйбенинъ пер., № 1.

A. DESCRIPTIONES PLANTARUM IN HORTO IMPERIALI BOTANICO
PETROPOLITANO CULTARUM.

1. *Billbergia Brongniarti* Rgl.

B. Brongniarti Rgl., foliis elongatis, initio erectis, demum a medio recurvato-dependentibus, late ligulatis, ex apice obtuso subito acuminatis, margine spinuloso-serrulatis, scapum longe superantibus; foliis caulinis bracteiformibus, persicinis, scapum glabrum arcte involventibus, apice breviter acuminatis; spica oblongo-cylindrica, densa; bracteis magnis, ellipticis, acutis, concavis, erectis, adpressis, persicinis, flores subaequantibus: floribus simplicibus, axillaribus, breviter pedunculatis, superioribus solitariis, inferioribus geminis, infimis in ramulum brevem triflorum bracteolatum dispositis, calyceque glaberrimis; calyce supero, trilobo; lobis ovatis, spiraliter sese amplectentibus, apice obtusis, sursum sub apice arista setacea auctis.

Folia glabra, margine et apicem versus in latere inferiore leviter purpurascentia v. utrinque purpurascentia, basi late amplectente inermia, caeterum spinuloso-serrata, usque 70 c. m. longa et 4—5 c. m. lata. Calyx basin versus germinaeque roseus, apice albus. Sepala caerulescentia, anguste oblonga, obtusa, initio erecta et conniventia, post anthesin patula. Stigmatis magni capitati lobis spiraliter contortis. — *B. Porteana* h. Makoy. — *Portea kermesina* Brongn. (?) — *Revue hort.* 1870. p. 230. — Rgl. *Grtfl.* 1875. tab. 829.

Ab omnibus affinis speciebus «bracteis erecto-adpressis, floribus omnibus bractea magna stipitatis infimis in ramulum brevem dispositis, calycis lobis arista setiformi laterali auctis», facile dignoscenda.

2. *Calathea Körnickeana* Rgl.

Acaulis; petiolis longis, cylindraceis, basi vaginantibus, minutissime puberulo-scabriusculis; lamina elliptica, acuta v. apice breviter acuminata, glaberrima, supra nitida, margine undulata; spicis ovato-cylindricis floribusque glaberrimis, breviter pedunculatis; bracteis coloratis, latoribus quam longis, obtusis, crateriformi-patentibus, margine undulatis, quam flores paullo brevioribus; floribus albis, petalis oblongo-lanceolatis.

Petoli 10—20 c. m. longi, virides, apice geniculo compresso-cylindraceo lateraliter utrinque violascente. Lamina 12—20 c. m. longa, 7—12 c. m. lata, supra lucida, laete viridis, infra pallidior. Scapus 4—5 c. m. altus, basi foliis tribus congestis distiche dispositis vestitus. Bractee imbricatae, inferiores rubicundae, superiores albae. Bracteolae dorso utrinque alatae, florum geminum tubum circiter aequantes. Sepala 3, oblongo-lanceolata. Petala cum staminodiis in tubum angustum sepalis paullo longiorem connata, oblongo-lanceolata. Staminodium externum cucullatum, explanatum, subdeltoideum. Staminodia interna cum stamine fertili 3: externum magnum, ovato-oblongum, semibilobum, lobo callo terminato: internum cucullatum, apice capitatum rostratumque stylum involvens; stamen fertile petaloideum, oblique truncatum; anthera ovato-oblonga, lateralis. Stylus apice rectangule infractus, stomate truncato. — *C. Riedeliana* h. PaulloWSK. — *C. propinqua* h. Petr.

Affinis *C. grandifoliae* et *C. propincae*. Prima foliis petiolisque omnino viridibus duplo majoribus, scapo elato 1—2 pedali foliis magis disjunctis vestito, bracteis viridibus, floribus majoribus luteis, — altera petiolis glaberrimis, spica sessili, bracteis acutis viridibus piloso-puberulis, corolla longe exserta tubo bipollicari villosulo, — facile dignoscuntur. — Patria verosimiliter Brasilia.

3. *Calochortus glaucus* Rgl.

Liliaceae.

Caule unifolio; folio glauco, lineari-lanceolato, umbellam superante; umbella triflora; bracteis foliaceis, oppositis, lineari-lanceolatis, pedunculis florentibus brevioribus, umbellae basin fulcrantibus; sepalis exterioribus lanceolatis, acuminatis, albidis, calvis, quam interiora brevioribus; sepalis interioribus ovato-subrotundis, breviter abrupte acuminatis, extus albidis calvis, intus basi tantum roseis calvis, caeterum albis setisque eglandulosis dense barbatis; setis exterioribus albis, interioribus basi plus minus purpurascentibus. — Sepala interiora circiter 15 m. m. longa. Ovarium oblongum, acute trigonum; stigmata 3, linearia, patentia; stylus nullus.

Cyclanthera caerulea h. Ellwes.

4. *Rubus Roezli* Rgl.

Inermis. Caules erecti, lignosi, decorticantes, ramosi. Rami teretes, juniores minute puberuli. Folia cordato-reniformia, obtuse 3—7 loba, duplicato-dentataque, utrinque pilis minutis simplicibus glanduliferisque pubescentia, supra laete viridia, subtus pallidiora; petioli folium subaequantes, minute pubescentes. Stipulae scariosae, lanceolatae, ima basi interiore coadhaerentes. Flores albi. Petiolus terminalis, solitarius, uniflorus, minute glanduloso-puberulus. Calyx glanduloso-puberulus; sepala petalis subduplo breviora, e basi ovata in cuspidem linearem acuminata. Petala e basi connata obovata, obtusa, antice grosse crenato-dentata.

Folia sub anthesi 3—3½ c. m. longa et 3½—4 c. m. lata.

Habitat in America boreali-occidentali in terra Colorado. Roezl semina misit. — Affinis *R. nutkano*, differt autem integumento minute puberulo, foliis minoribus, pedunculis unifloris, sepalis antice crenato-dentatis.

5. *Schlimia* Rgl.

(Gentianearum genus novum.)

Calyx tubulosus, 5-lobus; lobis imbricatis planiusculis. Corolla tubo valde elongato, medio clavato-inflato, utrinque attenuato, apice constricto;

limbi 5-partiti lobis erecto-patentibus. Stamina 5, corollae tubo supra basin inserta; filamenta longissima, tubum subaequantia. Antherae lineari-oblongae, biloculares, dorso supra basin affixae. Ovarium liberum, annulo basilari destitutum, valvulis introflexis bilocularè, multiovulatum. Stylus filiformis, elongatus; stigma bilamellatum.

Schlimia princeps.

Lisianthus princeps Lindl. in Gard. Chron. 1849. pag. 628. — Fl. des serres tab. 557. — Karst. fl. columb. tab. 141.

6. *Staphylea colchica* Steven.

Foliis pinnato 3—5 phyllis; foliolis ellipticis, acuminatis, argute serratis; floribus racemosis; sepalis petalisque lineari-oblongis; staminibus corolla paullo brevioribus, glabris; stylis filiformibus, apice in stigma trilobum coalitis; capsula obovata, apice divergenti-triloba, lobis stylo filiformi acuminatis.

Frutex ramis fuscis, ramulis viridibus teretibus laevibus glabris. Folia longe petiolata, opposita; petiolus glaber, basi utrinque stipula lineari-filiformi mox caduca fultus; foliola subtus basin versus ad nervum medium pilosa v. subbarbata, caeterum glabra, elliptica v. oblongo-elliptica, acuminata, in una eadem planta terna usque quina, lateralia sessilia stipellata; stipellis linearibus mox caducis. Florum racemus terminalis, nutans, foliis brevior. Flores albi. Sepala 5, alba, petaloidea, lineari-oblonga, obtusa, circiter 12 m. m. longa et 3 m. m. lata. Petala 5, oblonga, obtusa, sepalis vix longiora. Stamina 5, corollam stylosque subaequantia; filamenta filiformia glabra.

St. pinnata, cui planta Steveni satis affinis: «foliolis 5—7, racemis folia superantibus, floribus brevioribus, sepalis petalisque ovatis, capsulae globosae lobis conniventibus, stylis persistentibus rectis coronatis» facile dignoscitur. St. colchica Steven in Ann. sc. nat. ser. III. tom. XII. pag. 375. — C. Koch. dendr. I. pag. 517 (?).

Habitat in provinciis caucasicis.

Steven beschreibt diese Pflanze theils unvollkommen, theils in Folge der Verwechslung der bald aus einander tretenden Griffel mit den Narben-

lappen, folgendermassen: «foliis ternatis; foliolis ovatis, serratis, ima basi subtus puberulis; floribus racemosis; stigmatibus subulato-filiformibus; capsulae lobis apice divergentibus».

C. Koch hat entweder gar kein Exemplar, oder noch wahrscheinlicher eine falsche Pflanze bei der Entwerfung seiner Beschreibung in der Den-drologie vor sich gehabt, denn von den charakteristischen Merkmalen, die diese Art von *St. pinnata* unterscheiden sagt er nichts, giebt dagegen Cha-raktere die gar nicht vorhanden, wie z. B.: «Nebenblättchen länger als Stiele, Staubfäden mit langen Haaren besetzt». Nun sind aber die Staub-fäden kahl und die Nebenblättchen viel kürzer als die Blattstiele und selbst die Nebenblättchen am Grunde der Blättchen, können deshalb nicht länger als die Blattstiele sein, weil die seitlichen Blättchen, an deren Grunde diese Nebenblättchen stehen, gar keinen Stiel haben, sondern sitzen.

7. *Thibaudia Hendersoni* Rgl.

T. Hendersoni; caule fruticoso, ramosissimo, ramis diffusis sub-scandentibus; ramulis teretibus, viridibus, dense pubescentibus; foliis breviter petiolatis, ellipticis v. elliptico-oblongis, basi obtuse rotundatis, superne in apicem obtusum acuminatis, tripli-quintuplinerviis, integerri-mis, initio utrinque breviter puberulis, demum supra nitidis et ad nervos sub lente breviter hirtulis, subtus pallidioribus nigroque punctulatis; ra-cemis terminalibus, breviter paniculatis; pedicellis flore brevioribus, pu-bescentibus, bractea ovata membranacea corollam dimidiam circiter ae-quante leviter roseo-colorata fultis; calycis glabri depresso-subglobosi limbo 5-dentato, dentibus brevibus late triangularibus acutis; corolla tubulosa, sub limbo constricta, limbi 5-dentati dentibus erecto-patentibus triangu-laribus; filamentis 10 complanatis, basi corollae tubo adnatis; antheris elongato-linearibus, bilocularibus, loculis in tubulos vacuos subulatos co-rolla $\frac{1}{3}$ breviores elongatis.

Folia 5—6 c. m. longa, $2\frac{1}{4}$ —3 c. m. lata. Petioli pubescentes, 3—4 m. m. longi. Flores circiter $1\frac{1}{2}$ c. m. longi, tubo purpureo, limbo luteolo.

T. acuminata h. Henderson.

T. acuminata Hooker (Ic. pl. II. tab. III.), ramulis glabris, foliis lanceolatis basi acutis apice attenuato-acutis, antheris corollam aequantibus, — *T. acuminata* Benth. (Benth. pl. Hartw. p. 223. — *Proclesia* Benthamiana Kl. in Linnaea tom. XXIV), ramis foliisque glabris, foliis in apicem acutum acuminatis, racemis basi bracteis imbricatis fultis, antheris corollam aequantibus, — et *T. acuminata* DC. (prodr. VII. pag. 565), foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis, racemis axillaribus bracteisque oppositis minutissimis — dignoscuntur.

B. DESCRIPTIONES PLANTARUM NOVARUM IN REGIONIBUS TUR-
KESTANICIS CRESCENTIUM.

8. *Gagea* Schult.

CONSPECTUS SPECIERUM FLORAM ROSSICAM INCOLENTIUM.

I. *Bulbi tres horizontales.*

1. *G. stenopetala* Rchb., (cfr. Ledb. fl. ross. IV. 137).

II. *Bulbi solitarii v. bini v. gregarii.*

A. *Folia caulina opposita, umbellam fulcrantia. Pedunculi simplices, nudi v. basi foliis paucis bracteiformibus vestiti.*

a. *Sepala obtusa. Pedunculi nudi.*

2. *G. lutea* Schult., folio radicali lineari-oblongo, pedunculis glabris. *G. lutea* Ledb. fl. ross. IV. 138.

— *G. rufescens* Rgl. in ind. sem. h. Petr. 1862 p. 28. — Posterior formam intermediam (hybridam?) inter *G. luteam* et *G. pusillam* exhibit.

3. *G. pusilla* Schult., folio radicali anguste-lineari, pedunculis glabris.

G. pusilla et *G. emarginata* Ledb. fl. ross. IV. p. 138. 139.

4. *G. Liotardi* Schult., pedunculis villosis.

Ledb. fl. ross. IV. 146. — *G. intermedia* Rchb. ic. fl. germ. X. tab. 476.

b. *Sepala acuta v. subacuta. Pedunculi basi nudi v. foliis paucis vestiti.*

5. *G. filiformis Knth.*, foliis caulinis quam pedunculi brevioribus (*G. filiformis* Ledb. l. c. 139.)

6. *G. arvensis Schult.*, foliis caulinis pedunculos superantibus.

G. arvensis et erubescens cfr. Ledb. fl. ross.

IV. p. 141.

B. *Folium caulinum solitarium, umbellam fulcrans. Pedunculi simplices v. ramosi, basi foliis linearibus saepe vestiti.*

7. *G. minima Schult.*, sepalis acuminatis. (Ledb. fl. ross. IV. 139).

8. *G. spathacea Schult.*, sepalis obtusis. (Ledb. l. c. 140).

C. *Folia caulina 3-plura, subverticillata, umbellam 1-multifloram fulcrantia, — rarius caulis nullus et folia omnia radicalia.*

9. *G. reticulata Schult.*, sepalis acuminato-cuspidatis. Ledb. l. c. 142. — *G. sarmentosa* C. Koch in Linnaea XXII. 230. — *G. triphylla* C. Koch l. c. p. 229. — *G. rigida* Boiss. et Spr. in Boiss. diagn. or. ser. I. fasc. VII. p. 108. — *G. taurica* Stev. in Bull. Mosc. 1857. III, 83.

D. *Caulis foliis alternis vestitus, simplex v. ramosus 1-pluriflorus. Flores speciminum pluriflororum racemoso-corymbosi. Stigma subtrilobum.*

a. *Folia omnia in axillis bulbifera.*

10. *G. bulbifera Schult.*, foliis superioribus paucis erectis laxè dispositis, bulbillis in foliorum axillis solitariis. — Ledb. l. c. 142.

11. *G. amblyopetala Boiss. et Heldr.*, foliis superioribus numerosis patulis, bulbillis in foliorum axillis 2-pluribus. Boiss. et Heldr. in pl. Tayg. exs. Febr. 1845. — Boiss. diagn. ser. I fasc. VII pag. 107. — *G. thesioides* C. A. M. in pl. Szovits. exs.

b. *Folia omnia basi bulbillis carentia v. caule imo v. foliis infimis basi bulbilliferis.*

α. *Sepala minima, trinervia, nervis lateralibus sepalo-
rum interiorum vix conspicuis. Folium caulinum in-
fimum e basi elliptico-lanceolata acuminatum.*

12. *G. minutiflora Rgl.*

β. *Sepala 3-plurinervia. Folia caulina infima e basi
lineari-lanceolata v. late lineari sensim attenuata.*

* *Bulbi tunicae apice parce laciniatae, bulbum
vix superantes.*

† *Ovarium sessile.*

13. *G. chlorantha Schult.*, ovario oblongo. *G. chlo-
rantha Ledb. l. c. 142. — G. polyphylla Stev. in
Bull. Mosc. 1857. III. p. 83. — G. chlorantha
Rehb. ic. fl. germ. X. tab. 488. fig. 1047 ad speciem
alteram pertinet.*

14. *G. bohémica Schult.*, ovario obovato. *G. bohémica
Ledb. l. c. 141. — G. saxatilis Koch syn. fl. germ.
p. 824. — G. Billardieri Knth. enum. IV. 242. —
G. polymorpha Boiss. voyage Esp. p. 611. — G.
anisanthos C. Koch Linnaea XXII. 230 et Ledb. l. c.
p. 140. — G. triflora Schult. cfr. Ledb. fl. ross.
IV. 141.)*

†† *Ovarium stipitatum.*

15. *G. stipitata Merckl.* (cfr. Bnge. reliq. Lehm. n. 1385.)

** *Bulbi tunicae fibroso-subreticulatae, caulis
basin cingentes.*

16. *G. Olgae Rgl.*

E. *Caulis foliis alternis vestitus, simplex v. ramosus 1-pluri-
florus. Stigma tripartitum, lobis lineari-oblongis.*

17. *G. pauciflora Turcz.*

(Ledb. l. c. 143.)

9. *Gagea minutiflora* Rgl.

Bulbo minuto, subgloboso, solitario; caule tenui, flexuoso, humili, glabro, simplici v. superne dichotomo-ramoso, foliato; folio radicali solitario, filiformi, quam inflorescentia brevior v. longior, glabro; foliis caulinis alternis: caulino infimo e basi elliptico-lanceolata lineari-acuminato, glabro, inflorescentiam subaequante v. ea brevior, ad basin inflorescentiae sessile v. ab ea paullo remoto: caulinis superioribus bracteiformibus, glabris v. margine laxe piloso-ciliatis; floribus minimis, in racemum pauciflorum v. corymbum racemosum pluriflorum dispositis; sepalis oblongis, obtusis.

Caulis 3—6 c. m. altus. Folia caulina superiora pauca-plura, linearia, bracteiformia. Flores virescenti-luteoli. Sepala $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ m. m. longa, exteriora satis conspicue trinervia, interiora nervis lateralibus vix conspicuis. Stamina inclusis antheris ovatis quam sepala paullo breviora. Ovarium ovatum, stylo staminibus brevior coronatum; stigma vix incrassatum, truncatum, vix conspicue trilobum.

Habitat in Turkestan in montibus Karatau. (Krause.)

10. *Gagea Olgae* Rgl.

Bulborum ovato-oblongorum saepissime gregariorum tunicis infra apicem subreticulato-fibrosis, caulis basin involventibus; foliis radicalibus 1—2, lineari-filiformibus, inflorescentiam saepissime superantibus; caule humili, simplici, 1—3 floro., foliis caulinis alternis, anguste linearibus v. subfiliformibus, decrescentibus; floribus in caulis apice solitariis v. in racemum simplicem corymbosum 2—3-florum dispositis; pedunculis praecipue apicem versus minute pulverulento-puberulis; sepalis oblongis v. elliptico-oblongis, obtusis, interioribus trinerviis; ovario lineari-oblongo.

Caulis $1\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ c. m. altus, brevissime puberulus v. glabrescens. Folia caulina inflorescentiam superantia v. ea breviora, initio saepe laxè minuteque puberula v. ciliolata, demum glabra. Sepala 5—9 m. m. longa, intus aurea, extus pallide lutea, dorso virescentia v. plumbea, exteriora 5—7-nervia. Stamina perigonio circiter $\frac{1}{3}$ breviora; antherae ovato-

oblongae. Stylus stamina superans, stigmate capitato vix trilobo. — *G. persica* Boiss. et *G. damascenae* Boiss. affinis, ab ambabus autem bene diversa.

G. persica Boiss. «foliis caulinis lanceolato-linearibus pedunculisque glaberrimis, caule dichotome ramoso-corymboso, foliorum axillis saepe bulbilliferis et praecipue ovario obovato» facile dignoscitur. *G. damascena* Boiss. et Noë differt: «foliis caulinis margine villosis, floribus majoribus, sepalis usque 15 m. m. longis interioribus 5-nerviis.»

Habitat in Turkestaniam prope Samarkand (O. Fedschenko) et prope puteum Ajak in desertis inter Turkestaniam et Khiwam (Korolkow et Krause).

44. *Kaufmannia* Rgl.

(Genus novum Primulacearum.)

Calyx campanulato-tubulosus, 5-fidus. Corollae tubus cylindricus, subaequalis; limbus profunde 5-fidus, erecto-patulus. Stamina 5, corollae fauci inserta; filamenta totidem monadelphica, in anulum cupuliformem coalita; antherae biloculares, e basi cordata lanceolato-oblonga, connectivo excurrente acuminatae, exsertae. Stylus 1, filiformis, corollam duplo superans. Capsula 5-valvis, apice dehiscens, polysperma.

Herba perennis, foliis radicalibus longe petiolatis, floribus umbellatis luteis. «Corollae tubo aequali, limbo planiusculo profunde quinquefido, filamentis monadelphis, antheris exsertis, stylo longissime exserto» ab affinibus generibus *Primulae* et *Cortusae* facile dignoscitur.

K. Semenovi.

Cortusa Semenovi Herder pl. Semenov. n. 694.

Folia longe petiolata; petioli laxè villosuli, 9—15 c. m. longi, laminam plus duplo superantes; lamina orbiculato-reniformis, lobata duplicatove-dentata, utrinque ad nervulos hirtula, caeterum glabra. Scapi folia paullo superantes, laxè villosi. Umbella pluriflora, fastigiata. Involucrum initio pedicellos aequans, demum iis plus duplo brevius; foliolis flabellato-cuneatis, apice inciso-dentatis. Pedicelli glanduloso-puberuli, floriferi circiter 1½ c. m. longi apice leviter nutantes, fructiferi stricti 2—3 c. m. longi. Calyx glanduloso-puberulus, 5-fidus; lobis lanceolatis, tubo paullo

brevioribus. Corolla lutea, tubo calyce paullo brevior, limbo ad $\frac{2}{3}$ longitudinis 5-lobis; lobis oblongo-ovatis, obtusis. Stamina, stylus et capsula generis.

Habitat in Turkestan in Alatau transiliensi in trajectu Schaty (Semenow).

12. *Rhinopetalum stenanthum* Rgl.

Caule pedicellisque pilis brevissimis crassiusculis hirtulis; foliis inferioribus binis, suboppositis, ovatis v. ovato-oblongis, superioribus (si adsunt) paucis alternis angustioribus; bracteis linearibus geminis, flores superantibus; pedicellis flore brevioribus v. eum paullo superantibus, per anthesin patentibus et apice plus minus recurvis, post anthesin erectis; antheris lineari-oblongis; capsula hexagona, apice truncata, ad angulos alata, alis apice in dentem productis.

Bulbus subglobosus. Caulis simplex, incluso racemo saepissime 6—10 c. m. v. rarius usque 20 c. m. altus, basi nudus. Folia glabra, saepissime tantum bina et subopposita; rarius plura et inferiora subopposita, superiora alterna v. rarissime omnia sparsa, infima ovata v. ovato-lanceolata v. lanceolata; superiora angustiora. Bractee lineares, geminae, foliaceae. Flores subnutantes v. erectiusculi. Sepala ut videtur lilacina basi macula violacea picta, ovata usque oblongo-lanceolata, 3—5-nervia, nervis lateralibus plus minus ramosis, obtusa, basi apiceque margine plus minus puberula, 12—18 m. m. longa, superiorum trium fovea nectarifera profundius excavata in sacculum gibbum prominente. Filamenta filiformia, perigonio duplo v. plus duplo breviora, basin versus hirtula. Stylus stamina circiter aequans. Capsula breviter stipitata subglobosa.

Species altera adhuc cognita R. Karelini Fisch. differt » foliis inferioribus oblongis v. oblongo-lanceolatis; antheris subrotundis v. ovatis, sepalo supremo tantum basi saccato, capsula obtusangula apice rotundata, loculis dorso sub apice denticulo auctis ».

Habitat in Turkestan prope Bugun (Sewerzow), in montibus Boroldai a. 2500—3500', (Korolkow), prope Taschkent et in valle fluvii Sarawshan (O. Fedschenko).

13. *Scilla puschkinoides* Rgl.

Foliis late linearibus, obtusis; racemo erecto, 2—5 floro; pedicellis floribusque erectis, flore 3—4-plo brevioribus, basi bracteolis duobus suffultis.

Bulbus ovatus, tunicis fuscescentibus vestitus. Folia radicalia 2—4, glabra, late linearia, obtusa, glabra, 15—20-nervia, 6—7 c. m. longa, usque 5 m. m. lata. Scapus humilis, glaber, 6—8 c. m. altus. Pedicelli erecti, stricti, 4—5 m. m. longi, basi bibracteati; bracteolae scarioso-hyalinae, pedicellis 2—3-plo breviores, apice saepe truncatae erosaeque, dentatae, rarius acuminatae. Perigonium campanulatum. Sepala lanceolato-oblonga, ima basi coalita, apice obtusiuscula v. cucullato-subacuta, circ. 12 m. m. longa, pallide caerulea, nervo medio intensiore. Stamina perigonio circiter $\frac{1}{3}$ breviora; filamenta basi inter se et cum perigonio coalita, e basi latiore subulata; antherae lineari-oblongae. Ovarium ovatum triloculare, loculis triovulatis. Stylus filiformis, stamina subaequans, stigmatem capitato. Capsula depresso-globosa.

Pedicellis brevibus basi bibracteolatis a *Sc. bifolia*, — pedicellis strictis floribusque erectis, sepalis angustioribus, filamentis basi in annulum brevem coalitis a *Sc. cernua* facile dignoscenda.

Turkestaniae in montibus Alatau (Krause).

14. *Tulipa Korolkowi* Rgl.

Bulbi tunicis intus apicem versus adpresse strigoso-pilosis, caulis basin longe involucentibus; caule humili, 2—3-folio, glabro, unifloro; foliis anguste lineari-lanceolatis usque lanceolatis, florem superantibus, glabris, undulatis, immarginatis; pedunculo glabro; sepalis patentissimis, cuneato-obovatis, apice rotundato breviter apiculatis filamentisque glabris: stigmatem capitato, breviter trilobo, diametro ovarii paullo angustiore.

Caulis supra terram incluso petiolo vix 4 c. m. altus, infra terram 2—10 c. m. longus. Sepala purpurea, basi macula parva nigrescente, 3—3½ c. m. longa, infra apicem usque 2 c. m. lata. Filamenta basin versus dilatata, antheras oblongas v. lineares subaequantia v. iis breviora, inclusis antheris perigonio 2—3-plo breviora.

Ab affini *T. Eichleri* Rgl. (Grtflora tab. 799. — Труды Имп. Бот. Сада III. 156) «statura humiliore, caule foliis pedunculisque glabris sepalorumque configuratione» nostra species facile dignoscitur.

Habitat in solo luto in desertis inter Turkestaniam et Khiwam prope Farisch. (Korolkow et Krause.)

15. *Tulipa tetraphylla* Rgl.

Pusilla; caule terra sepulto, unifloro; foliis 4, in caulis apice confertis, subverticillatis, linearibus v. lineari-oblongis, florem superantibus, angustissime cartilagineo-marginatis, plus minus curvatis v. subcircinnato-curvatis; pedunculo glabro, unifloro; sepalis obovatis, obtusis; staminibus glabris.

Bulbus ignotus. Caulis totidem subterraneus, 2—3½ c. m. longus. Folia margine piloso-ciliata v. glabra. Pedunculus erectus, 2½—3 c. m. altus, solitarius, glaber. Sepala cuneato-obovata, interiora pallide flava, exteriora violaceo-variegata, circiter 1½ c. m. longa. Stamina perigonium dimidium circiter aequantia. Filamenta medio dilatata, utrinque attenuata, antheras oblongo-lineares paullo superantia. Ovarium oblongum, apicem versus sensim attenuatum, filamenta circiter aequans.

Filamentis glaberrimis a sectione *Tulipae silvestris*, — caule ad apicem terra sepulto tetraphyllo et praecipue filamentis utrinque attenuatis a *T. sogdiana* Bnge. et omnibus alteris speciebus facile dignoscenda.

Turkestaniae in valle Kotschkura leg. liber Baro a Kaulbars.

16. *Tulipa turkestanica* Rgl.

Bulbi tunicis intus praecipue apicem versus pilis longis villosis; caule bifolio, 1—6-floro; foliis linearibus usque lineari-lanceolatis, falcatis, recurvis v. suberectis; floribus erectis; sepalis apice glabris, interioribus staminibusque basi dense pubescentibus; stigmatibus subtrilobis; capsulae valvis cuspidato-acuminatis.

Caulis glaber, bifolius v. rarissime triphyllus, inclusis pedunculis 8—30 c. m. altus. Folia pedunculos saepissime superantia, laxè minuteque puberula v. glabra, 4—13 m. m. lata. Pedunculi saepissime mi-

nute laxaeque pubescentes v. glabrescentes. Sepala lineari-lanceolata usque ovato-lanceolata, acuta v breviter acuminata, intus flava, extus saepe plus minus violascentia, 15—28 m. m. longa, exteriora interioribus angustiora. Stamina perigonio plus duplo breviora; filamenta linearia, basin versus paullo latiora, antheris linearibus paullo breviora v. longiora. Capsulae ovatae v. subrotundae valvis apice cuspidato-acuminatis.

T. silvestris ⁊ *turkestanica* Rgl. in Труды Имп. Бот. Сада II. 443.

Bulbi tunicis intus villosis, caule saepe 2-plurifloro, capsulae valvis apice cuspidato-acuminatis a *T. silvestri* et *T. biflora* diversa.

Habitat satis frequenter in Turkestaniae provinciis. (O. Fedschenko, Korolkow, Krause, Kuschakewicz.)

АСТА
HORTI PETROPOLITANI.

TOMUS IV.
Fasciculus II.

ТРУДЫ
ИМПЕРАТОРСКАГО
ПЕТЕРБУРГСКАГО БОТАНИЧЕСКАГО САДА.

ТОМЪ IV.
ВЫПУСКЪ II.

СОДЕРЖАНИЕ:

- Regel,** Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum. Fasciculus IV. Pag. 273—340.
- R. a Trautvetter,** Plantæ a Dr G. Radde in isthmo caucasico anno 1875 lectæ. Pag. 341—406.
- Регель,** Извлеченіе пзъ отчета ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада за 1875 г. Pag 407—420.
-

DESCRIPTIONES PLANTARUM
NOVARUM ET MINUS COGNITARUM.

Fasciculus IV.

AUCTORE

E. REGEL.

581.947

R 26d

Pt. 4

A. CYCADEARUM

GENERUM SPECIERUMQUE REVISIO.

I. EINLEITUNG.

Alphons De Candolle hat im XVI. Bande II. Abtheilung des Prodrömus erst vor einigen Jahren, eine vollständige Aufzählung der Gattungen und Arten der Familie der Cycadeen gegeben, so dass eine erneuerte Zusammenstellung derselben überflüssig erscheinen könnte. Es veranlasste mich aber die reiche Sammlung der Cycadeen des hiesigen Botanischen Gartens und die nicht minder vollständige Sammlung, welche der Herr Garten-Inspector Katzer, in den letzten Jahren in dem Garten Sr. Kaiserlichen Hoheit des Grossfürsten Constantin Nicolajewitsch in PaulloWSk bei St. Petersburg, zusammengebracht hat, diese interessante Familie von Neuem zu studiren.

Die Feststellung der Arten und Gattungen wird wesentlich dadurch erschwert, dass es nur wenige Arten giebt, die häufig blühen, weshalb ebensowohl in den Sammlungen lebender Pflanzen, sowie in den Herbarien sich nur ein sparsames Material in dieser Beziehung findet. Dagegen ist die Zahl der in den letzten Jahren in lebenden Exemplaren aus dem Süden Asiens, aus Afrika, aus dem tropischen und subtropischen Amerika und aus Neuhollland in unsere Gärten importirten Cycadeen sehr bedeutend gewesen und wächst jährlich noch. Dazu kommt, dass die grössern Handels-Etablissements Englands und Belgiens, welche diese Einführungen vermitteln, um deren Absatz zu ermöglichen und dabei ihre Kosten zu decken, den importirten Pflanzen nothwendiger Weise irgend einen Namen beilegen

II. CONSPECTUS GENERUM.

A. *Foliola nervo intermedio unico, nervis lateralibus nullis.*

1. *Cycas* L.

B. *Foliola nervo intermedio unico penninervio.*

2. *Stangeria* Th. Moore.

C. *Foliola nervis longitudinalibus pluribus instructa.*

a. *Folia in verticillos (nec unum post alterum) terminales provenientes.*

* *Perulae persistentes. Petioli basi exauriculati.*

3. *Encephalartos* Lehm. — Squamae strobili foeminei stipitatae, pelta mutica glabra terminatae.

4. *Lepidozamia* Rgl. — Foliola flaccida, acutissima. Squamae strobili foeminei stipitatae, pelta sensim in acumen planiusculum attenuata glabra terminatae.

5. *Dioon* Lindl. — Foliola rigida, spinescentia. Squamae strobili foeminei stipitatae, lamina plana lanceolata acuminata lanata basi cordata terminatae.

** *Perulae persistentes. Petioli basi vaginato-dilatata utrinque auriculati.*

6. *Ceratozamia* Brongn. — Strobilorum squamae apice bicornutae.

*** *Perulae marcescentes, caducae.*

7. *Aulacophyllum* Rgl. — Foliola sulcato-nervosa.

8. *Microcycas* Miq. — Foliola laevia.

b. *Folia unum post alterum provenientes.*

* *Perulae demum marcescentes deciduae.*

9. *Zamia* L. — Folia pinnata.

10. *Bowenia* Hook. — Folia bipinnatisecta.

** *Perulae persistentes, demum in fibras truncum vestientes soluti.*

11. *Macrozamia* Miq.

III. ENUMERATIO GENERUM SPECIERUMQUE.

I. Cycas L.

Arbores trunco cylindrico. Perulae caducae. Folia in verticillos terminales provenientia, pinnata, vernatione rhachidis recta, segmentorum circinata. Foliola linearia v. anguste lineari-lanceolata, numerosa, integerrima, nervo intermedio unico percursa, nervis lateralibus nullis. Strobili masculi squamae imbricatae, cuneatae, apice saepe acuminatae subtus antheriferae. Florum foemineorum spadices (squamae, carpidia) in comun terminalem laxiuscule imbricati, singuli elongato-spathulati, plani, crenati; ovulis in crenaturis solitariis, sessilibus.

Conspectus specierum.

A. *Foliola margine revoluta, inferiora sensim ad spinas trans-euntia.*

1. *C. revoluta* Thbrg.

B. *Foliola margine revoluta. Petiolus inermis.*

2. *C. inermis* Lour.

C. *Foliola margine plana v. vix revoluta, inferiora subito ad spinas transmutata.*

a. *Petoli basi v. ad medium inermes, caeterum margine spinulis armati.*

3. *C. circinalis* L., spinulis diametro petioli plus duplo brevioribus; foliolis $1\frac{1}{2}$ c. m. latis, in apicem vix spinescentem sensim attenuatis.

4. *C. glauca* Miq., spinulis diametro petioli plus duplo brevioribus; foliolis 2 c. m. et ultra latis, sensim in apicem vix spinescentem attenuatis.

5. *C. media* R. Br., spinulis diametro petioli plus duplo brevioribus; foliolis rectis, circiter 7 m. m. latis, apice subito in spinulam subulatam acuminatis.

6. *C. gracilis* Miq., spinulis diametro petioli $\frac{1}{3}$ brevioribus usque eum aequantibus v. superantibus.

b. *Petoli ad basin spinulosi.*

7. *C. siamensis* Miq., foliolis apice subito in spinulam acuminatis, usque 7 m. m. latis.
8. *C. Riuminiana* Rgl., foliolis sensim in apicem non spinescentem attenuatis, 10—12 m. m. latis.
- c. *Petioli inermes*.
9. *C. celebica* Miq.

Enumeratio specierum.

1. *Cycas revoluta* Thbrg. (v. v.)

Thbrg. fl. jap. pag. 229. — Sm. trans. Linn. soc. VI. pag. 312. tab. 29. 30. — Bot. mag. tab. 2963 et 2964. — Miq. monogr. pag. 23. — Ann. sc. nat. XVI tab. 20. 21. — Miqu. in N. Verh. Ned. Ac. XII. tab. 1. — Denkschr. schl. Ges. 1853 tab. 10. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 526. — Arbor catappoides sinensis Rumph Amb. tab. 24 (folium). — Variat caudice monstroso cristato. (*C. revoluta cristata* et *C. revoluta nana* hort.).

Foliola plantarum juniorum saepe planiora et laxius disposita. (*C. revoluta planifolia* Miq. mon. pag. 25).

2. *Cycas inermis* Lour.

Lour. fl. cochin. II. 776. — Miq. ann. bot. ind. 2 (1851.) pag. 28. tab. 3 et 4. — D. C. prodr. XVI. II. 526. — Hab. in Cochinchina. —

Simillima *C. revolutae* et solummodo petiolis inermibus diversa.

3. *Cycas circinalis* L. (v. v.)

L. spec. pag. 1658. — Bot. mag. tab. 2826 et 2827. — Miq. monogr. pag. 27. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 526. — *C. Rumphii* hort. — *Olus catappoides* Rumph Amb. I. pag. 86. tab. 22 et 23. — Blume *Rumphia* pag. 176^b et 176^c. — *C. circinalis* et *Rumphii* hort. — *C. circinalis*, *C. Rumphii*, *C. Wallichii* et *C. madagascariensis* Miq. mon. p. 22, 23 et 32. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 527 et 528. — *C. undulata* Desf. cat. hort. Par. 1820. teste D. C. prodr. l. c. p. 529.

Truncus elatus, cylindricus. Folia demum glabra, incluso petiolo usque 2 m. longa. Petiolus infra semiteres, supra triangulus, basi v. usque ad medium inermis, ceterum margine spinulosus. Spinulae dentiformes v. subsubulatae, rectae v. paullo recurvatae, diametro petioli duplo usque pluries breviores. Rhachis teres. Foliola dense disposita (unum ab altero 1—1½ c. m. remotum), patentissima, numerosa, utrinque 50—70, anguste lineari-lanceolata, recta v. falcata, plana v. paullo undulata, margine vix revoluta, in apicem non v. vix spinescentem sensim attenuata, basi plus minus decurrentia, usque 25 c. m. longa et 1½ c. m. lata, inferiora subito in spinulas transmutata. — Folia viridia, juniora minute fasciculato-fusco-pulverulento-pilosula, mox glabra. Strobilus masculus ovoideus, sessilis; squamis e basi obovato-deltaeae longe acuminatis, acumine pubescente. Strobili fem. cfr. D. C. l. c. — Habitat in India orientali.

4. *Cycas glauca* Miq. (v. v.)

Miq. mon. Cyc p. 30. — D. C. prodr. XVI. II. 528. — C. glaucophylla hort.

Antecedenti simillima, differt autem: «Foliis glaucis; foliolis minus numerosis, utrinque 18—20, 2—2⅓ c. m. latis, uno ab altero 2—4 c. m. remoto, inferioribus recurvo-patentibus, superioribus patentissimis; petiolis teretibus.

5. *Cycas media* R. Br. (v. v.)

R. Br. prodr. fl. Nov. Holl. 348. — Miq. mon. pag. 26. tab. 3. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 527.

Truncus elatus, 3—4 m. altus. Folia initio tomento tenui pulverulento ferrugineo detergibili vestita, demum glabriuscula, numerosa, ¾—1¼ m. longa. Petiolus 25—30 c. m. longus, teres, initio satis dense ferrugineo-tomentellus, basi vel ad medium inermis, superne utrinque spinulis diametro petioli subtriplo brevioribus armatus. Rhachis teres, initio ferrugineo-tomentella, inermis. Foliola linearia, plana, numerosissima, utrinque 70—120, circiter 7 m. m. lata, 6—12 c. m. longa, (teste De Candollio usque 20 c. m. longa) apice in acumen spi-

nescens cuspidata, satis dense disposita, superiora basi deorsum decurrentia, inferiora vix decurrentia. Strobili fem. cfr. D. C. l. c. — Habitat in Nova Hollandia tropica.

6. *Cycas gracilis* Miq. (v. v.)

Miq. over de Cyc. Nieuw. Holl. p. 15. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 528. — *Cycas* spec. Queensland h. Haage et Schm.

Truncus cylindricus. Folia 50—70 c. m. longa. Petiolus teres, circiter 20 c. m. longus, initio puberulus, basi tantum v. ad medium inermis, caeterum utrinque spinulosus; spinulae subulatae, rectae v. vix recurvae, diametrum petioli subaequantur v. superantes, 3—4 $\frac{1}{2}$ m. m. longae. Foliola utrinque 20—40, late linearia, plana, recta v. vix falcata, sensim v. subito in apicem cuspidatum subspinescentem attenuata, 9—17 c. m. longa, 5—8 m. m. lata, superiora basi deorsum decurrentia, inferiora vix decurrentia et subito in spinulas transmutata. — Rhachis teres, initio puberula, demum glabra. — Strobili masc. et fem. cfr. D. C. l. c.

α *glauca*; foliis glaucis, spinulis diametrum petioli subsuperantibus. — C. media h. Van Houtte. — C. Boddami h. Haage et Schm. — *Macrozamia latifrons* h. Bull. — C. Normanbyana h. Belg.

β . *viridis*; foliis viridibus, spinulis diametro petioli paullo brevioribus. — C. gracilis h. Paull. — C. Riumiana h. Turic.

Habitat in Nova Hollandia tropica.

7. *Cycas siamensis* Miq. (v. v.)

Miqu. in Bot. Zeitung 1863 pag. 334. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 528. — C. aurea h. Verschaffeltianus.

Folia 60—80 c. m. longa, juniora hirtula, aetate glabrescentia. Petiolus compresso-teres, ad basin utrinque spinulosus. Spinulae remotae, recurvae, diametro petioli pluries breviores. Rhachis infra convexa, supra in carinam producta. Foliola late linearia, plana, apice subito in spinulam brevem acuminata, usque 16—20 c. m. longa et circiter 7 m. m. lata, omnia basi deorsum decurrentia, inferiora subito in spinulas

transmutata. — Truncus humilis, 2—3 pedes altus. Foliola utrinque circiter 40 et plura, glaucescentia. Petiolus et rhachis luteola.

Habitat in regno Siam.

8. *Cycas Riuminiana* Rgl. (v. v.)

Rgl. Grtfl. 1864. pag. 63, tab. 405. — Lem. ill. hort. tab. 405. — D. C. prodr XVI. II. pag. 428.

Truncus cylindricus, 1—3 m. altus. Folia laete viridia, $1\frac{1}{4}$ —2m. longa, glabra. Petiolus depresso-teres, glaber, a basi ad apicem utrinque spinulosus; spinulae satis dense disticheque dispositae, rectae, diametro petioli plus duplo breviores. Foliola numerosa (utrinque 60 vel plura), anguste lineari-lanceolata, recta v. paullo falcata, sensim in apicem non spinescentem attenuata, margine vix revoluta, plana v. saepe undulata, 10—12 m. m. lata et 20—25 c. m. longa, superiora basi deorsum decurrentia, inferiora non decurrentia et subito in spinulas transmutata. Strobili masculi oblongo-cylindrici, basi breviter stipitati. Strobili squamae extus fusco-pubescentes; infimae steriles, lanceolatae, longe acuminatae; ceterae subtus antheriferae, cuneato-obovatae; inferiores et superiores ex apice rotundato in cuspidem subulatam rostriformem sursum versus subito excurrentes, intermediae tantum breviter acuminatae.

Foliorum juniorum rhachis pilis fuscis laxè vestita, caeterum folia glaberrima. Trunco tenuiore humiliore, petiolis ad basin spinulosis, statura squamarum strobilorum masculorum facile a *C. circinali* dignoscitur.

Habitat in India orientali.

9. *Cycas celebica* Miq. (v. v.)

Miq. comm. p. 126. — Miq. mon. p. 31. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 528. — Olus catappoides Rumph. Amb. I. p. 87, tab. 20 et 21. — *C. neocaledonica* hort.

Truncus cylindricus. Petiolus inermis, teres; rhachis semiteres, supra planiuscula. Foliola anguste lineari-lanceolata, sensim in apicem non spinescentem attenuata, basi deorsum decurrentia. Squamae strobi-

lorum masculorum (cfr. ic. Rumphii) ex apice rotundato subito in acumen subulatum rostriforme excurrentes.

Folia speciminis nostri initio glaucescentia, demum viridia, 40—100 c. m. longa. Petiolus et rhachis initio laxe fusco-pilosa, demum glabra. Foliola utrinque 10—30, recta v. vix falcata, 15—22 c. m. longa, 10—12 m. m. lata.

II. *Stangeria* Th. Moore.

Truncus humilis, napiformis, nudus, vix cicatricatus. Perulae caducae. Folia pinnata. Foliola 4—13 juga, saepissime opposita, penninervia, inferiora petiolata, superiora sessilia decurrentia. Strobili masculi oblongo-cylindrici squamae ovatae, basi late cuneatae, apice steriles acutae. Squamae (carpophylla) strobili foeminei ovato-oblongi, structura muscularum, breviores autem, magis concavae, basi utrinque in cavitate ovulum recondentes.

Arbuscula in Africa australi indigena.

Foliorum vernatio plicata. Foliola nervo intermedio crasso; nervis lateralibus e nervo intermedio egredientibus tenuibus, crebris, subperpendicularibus, semel v. bis furcatis, juxta marginem anastomosantibus.

Conspectus specierum.

1. *S. paradoxa* Th. Moore., foliolis oblongo-lanceolatis acuminateis, margine plus minus spinuloso-serrulatis.

2. *S. Katzeri* Rgl., foliolis obverse oblongis, ex apice rotundato mucronato-acutis, margine undulato-repandis v. repando-crenatis, sub apice interdum dente uno alterove.

Enumeratio specierum.

1. *Stangeria paradoxa* Th. Moore. (v. v.)

Th. Moore. Natal Ferns in Hook. Journ. of bot. V. p. 228. — Hook. bot. mag. tab. 5121. — D. C. prodr. XVI. II. 530. — Lomaria coriacea Knze. in Linnaea X. p. 506. — Lom. eriopus Knze. in Linnaea X. pag. 152 et XVIII. pag. 116. — *Stangeria schizodon* hort.

Truncus circiter 30 c. m. altus. Folia 50—70 c. m. longa; petiolus 20—25 c. m. longus, semiteres, ima basi tomentosus, caeterum glaber. Foliola 4-13 juga, oblongo-lanceolata, acuminata, 7—15 c. m. longa, $2\frac{1}{2}$ —4 c. m. lata, glabra, saepissime a medio ad apicem, rarius apicem versus tantum v. a basi ad apicem serrata.

α . *typica*; foliolis a medio v. apicem versus tantum serratis.

β . *schizodon*; foliolis a basi ad apicem serratis. Habitat prope Porte Natal.

2. *Stangeria Katzeri* Rgl. (v. v.)

Rgl. Grfl. 1874 pag. 163 tab. 798. — *Stangeria* spec. h. Paulowsk. —

Truncus humilis, vix 30 c. m. altus. Petiolus teres 20—37 c. m. longus, apicem versus in latere superiore canaliculatus. Lamina 32—40 c. m. longa. Foliola oblonga, 8—12 juga, 12—19 c. m. longa, 4—6 c. m. lata, glabra, margine leviter undulato-repanda v. apicem versus crenato-repanda, ex apice rotundato apiculato-acuta, sub apice interdum denticulo unico v. alterove spinescente instructa.

III. *Encephalartos* Lehm.

Truncus crassus, demum cylindricus, initio globosus v. ovatus, perulis persistentibus (nunquam fibroso-laciniatis) onustus. Folia in verticillos terminales (nec unum post alterum) provenientia, vernatione recta imbricatave, pinnata. Foliola parallele pluri-multinervia, linearia usque oblongo-elliptica, integerrima v. varie dentata v. sublobata, basi exarticulata et ibidem non calloso incrassata, breviter v. non decurrentia, inferiora immutata v. sensim v. subito ad spinas partitas v. simplices reducta. Flores in strobilos crassos dispositi. Squamae strobili masculi patentes, subtus antheriferae, extremitate sterili pingui non latiore obtusa v. conico-truncata subquadrata. Squamae (carpophylla) strobili masculi pedunculato-peltatae, sub peltis crassis rhombeo-quadrangulis biovulatae.

Conspectus specierum.

- A. *Foliola linearia*, omnia pungenti-acuta integerrimaque.
1. *E. cycadifolius* Lehm., foliolis margine revolutis.
- B. *Foliola omnia pungenti-acuta*, integerrima v. margine inferiore 1—3 dentata.
- a. *Foliola viridia*, circiter 5—8-plo longiora quam lata.
 2. *E. brachyphyllus* Lehm., foliolis lineari-lanceolatis, 7—11 nerviis, margine revolutis integerrimisque.
 3. *E. caffer* Miq., foliolis lanceolatis, multinerviis, margine planis integerrimis v. margine inferiore dente-unico obtuso.
 - b. *Foliola glauca*, circiter 10—14-plo longiora quam lata.
 4. *E. Lehmanni* Lehm.
- C. *Foliola lineari-lanceolata* v. *lanceolata*, omnia pungenti-acuta, utrinque spinoso-dentata, dentibus erectis.
- a. *Foliola utrinque* 3—5 dentata.
(*E. Altensteini* occurrit rarissime foliolis subintegris v. paucidentatis).
 5. *E. villosus* Lem., foliolis 12—16-plo longioribus quam latis, nervis 20—25 facile conspicuis, inferioribus ad spinas partitas paucas sensim reductis.
 6. *E. Hildebrandti* A. Br., foliolis 5—6-plo longioribus quam latis, nervis circiter 16 difficile conspicuis; inferioribus sensim sensimque ad spinas numerosas 2—3 fidas reductis.
 7. *E. Altensteini* Lehm., foliolis 5—7-plo longioribus quam latis, nervis 20—30 facile conspicuis, inferioribus ad spinas partitas paucas v. nullas mutatis.
 - b. *Foliola utrinque* 8—10 dentata.
 8. *E. septentrionalis* Schweinf.
- D. *Foliola inferiora pungenti-acuta*, superiora obtusa v. hamuloso-obtusa, omnia integerrima v. margine inferiore 1—2 dentata.
9. *E. longifolius* Lehm.

E. Foliola lanceolata v. elliptico-lanceolata, omnia pungenti-acuta, margine inferiore lobato-dentata.

10. *E. lanuginosus* Lehm., foliolis viridibus margine inferiore lobato 1—4-dentatis, dentibus breviter spinescentibus.

11. *E. horridus* Lehm., foliolis glaucis, margine inferiore lobato-dentatis, dentibus 1—3 in spinam pungentem elongatam acuminatis.

Enumeratio specierum.

1. *Encephalartos cycadifolius* Lehm. (v. v.)

Lehm. pug. VI. pag. 13. — Miq. mon. p. 43. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 531. — Rgl. Труды III. I. pag. 111. — Ejusd. Grtfl. 1875 pag. 37.

Folia 1 c. m. et ultra longa, multijuga; rhachis semiteres, canaliculata, initio pubescens. Foliola anguste linearia, pungenti-acuta, integerrima, margine revoluta, 3—5 nervia, 8—10 c. m. longa, 4 m. m. lata, mox glabra. Florum strobili glabri.

Habitat in Africa australi.

Variat:

α. *typica*; trunco glabro, petiolo rhachique initio pubescentibus, demum glabris. — *E. cycadifolius* Lehm. l. c. — *Zamia cycadifolia* Jacq. fragm. tom. I. pag. 27 n. 91. — *E. cycadifolius* α. Rgl. l. c.

β. *Friderici Guillelmi*; trunco laxo tomentoso, petiolis rhachibusque initio tomento detergibili vestitis. — *E. cycadifolius* β. Rgl. l. c. — *E. Friderici Guillelmi* Lehm. pug. VI. pag. 8. — *E. Ghellincki* Lem. ill. hort. 1867 p. 80 et 1868 tab. 567 et xyl.

2. *Encephalartos brachyphyllus* Lehm. et de Vriese. (v. v.)

Lehm. et de Vriese in de Vriese nov. spec. Cyc. Afr. austr. pag. 6 tab. I et II et in Lehm. et de Vriese Tijdschr. nat. Gesch. IV, p. 414 tab. VI et VII. — Miq. mon. p. 49. — *Zamia cycadifolia* Lodd. cat.—Pl. Dreg. exs. — Miq. in Bull. des sc. phys. et nat. 1838 p. 38. —

E. Royeni Miq. manuscr. — *E. caffer* β . *brachyphyllus* D. C. prodr. XVI. II. pag. 532. — *E. Verschaffelti* Rgl. in Труды том. III. fasc. I. pag. 111. — Ejusd. Gartenfl. 1875 pag. 35 tab. 822. — *E. cycadifolius* h. Versch.

Truncus apice perulis tomentosis vestitus, caeterum glaber. Folia 70—80 c. m. longa. Petiolus initio laxe tomentosus, demum glaber. Rhachis semiteres, demum glabra, initio laxe tomentosa. Foliola multijuga, saturate viridia, 11—13 nervia, lineari-lanceolata, pungenti-acuta, plana, integerrima, 6—7 c. m. longa, 8—11 m. m. lata.

Habitat in Africa australi.

3. *Encephalartos caffer* Miq. (v. v.)

Miq. monogr. p. 53. — D. C. prodr. XVI. II. p. 532 excl. syn. — Rgl. Труды III. I. 113. — *Cycas caffra* Thbrg. in nov. act. soc. Ups. II. 283. — *Zamia Cycadis* L. fil. suppl. 443. — *Zamia caffra* Thbrg. fl. cap.

Truncus crassus, glaber; perulis initio villosulis, mox glabris. Folia initio tomento tenui detergibili vestita, mox glabra, 1 m. et ultra longa. Petiolus rhachisque obtuse tetragona. Foliola multijuga, anguste lanceolata, 25—35 nervia, omnia pungenti-acuta, integerrima v. latere inferiore 1- v. rarissime 2-dentata, 12—18 c. m. longa, 15—25 m. m. lata, dentibus (si adsunt) rectangulo-patentibus obtusis. Foliola inferiora ad spinas nunquam transmutata. Squamae strobili masc. subtriquetrae, obtusissimae, umbilicato-rugosae, glabrae. Squamae strob. foeminei subquadrangulae, obtusae.

Habitat in Africa australi.

Variat:

α . *integerrimus*; foliolis integerrimis.

β . *unidentatus*; foliolis margine inferiore saepissime unidentatis, rarius nonnullis ibidem bidentatis v. integerrimis. — Rgl. Труды I. c.

4. *Encephalartos Lehmanni* Lehm. (v. v.)

Lehm. pug. 6 p. 14. — Miq. mon. pag. 47. — Grtfl. 1865 p. 197. tab. 477. — D. C. prodr. XVI. II. 531. — *Zamia Lehman-*

niana Eckl. et Zeyh. in Otto et Dietr. Grtztg. 1833 p. 158. — *Cycas glauca* Van Royen miss. — *E. mauritianus* Miq. monogr. p. 48. — *E. spinulosus* Lehm. et Vriese in Tijdsch. nat. Gesch. IV. 420 tab. VIII fig. B. ? — De Vriese nov. spec. Cyc. p. 12 tab. III fig. B. ? *) — *E. elongatus* Miq. in Bull. Neerl. 1838 p. 11. — Ejusd. comm. phyt. pag. 110 tab. 113. — De Vriese nov. spec. Cyc. pag. 11 tab. III. fig. A. — Lehm. et de Vr. Tijdsch. nat. Gesch. IV, pag. 420 tab. VIII fig. A. — D. C. prodr. XVI, II 533.

Truncus initio ovatus, demum cylindricus, glaber. Folia circiter 1 m. longa, glauca, glabra. Petiolus rhachisque obtuse-tetragona v. teretia. Foliola multijuga, lineari-lanceolata, integerrima v. latere inferiore paucidentata, 14—18-nervia, pungenti-acuta, longiora 18—22 c. m. longa, 10—12 m. m. lata. Strobili masculi breviter pedunculati oblongi squamae inaequaliter rhomboideo-quadrangulares.

Habitat in Africa australi.

Variat:

α. *typicus*; foliolis integerrimis.

β. *dentatus*; foliolis latere inferiore 1—2 dentatis, dentibus pungenti-acutis.

E. Lehmanni β. *spinulosus* Rgl. in Труды Имп. Бот. сада III. II pag. 112 (nec *E. spinulosus* Lehm.).

5. *Encephalartos villosus* Lem. (v. v.)

Lem. ill. hort. 1867 p. 80 et 1868 tab. 557. — Rgl. in Труды Имп. Бот. сада III. II. p. 112. — Grtfl. 1875 p. 41.

Truncus apice dense cinereo-tomentosus. Folia 1—2 m. longa, multijuga, viridia. Petiolus et rhachis subteretia, initio cinereo subvillosa, demum glabrescentia. Foliola multijuga, elongato lineari-lanceolata, 12—16-plo longiora quam lata, nervis 20—25 facile conspicuis percursa, recta v. subfalcata, pungenti-acuta, margine utrinque dentibus

*) Abgebildet ist ein Blatt. Es kann das aber ebensowohl ein junges Blatt eines *E. Lehmanni*, als vielleicht von *E. villosus* oder *E. Altensteinii*,—oder selbst von einer *Zamia* sein.

3—5 erectis pungenti-acutis satisque distantibus, 20 c. m. et ultra longa, 12—15 m. m. lata, inferiora sensim ad spinas partitas reducta.

Habitat in Africa australi.

6. *Encephalartos Hildebrandti* A. Br. et Bouché. (v. et s.)

A. Br. in ind. sem. h. Berol. 1874 p. 18.

Truncus demum cylindricus, 1 m. et ultra altus, perularum rudimentis dense vestitus. Folia prima juventute lanugine obducta, demum praeter basin rhachis glaberrima, $\frac{1}{2}$ —1 m. longa. Rhachis latere inferiore convexa, latere superiore carinata et juxta carinam utrinque sulco levi exarata. Foliola multijuga, (utrinque 36—50), anguste lanceolata, 5—6-plo longiora quam lata, nervis 15—18 difficile conspicuis percursa, pungenti-acuta, utrinque ad marginem dentibus 3—5 erecto-patentibus pungenti-acutis armata, 8—10 c. m. longa, 14—16 m. m. lata, laete viridia; inferiora sensim sensimque ad spinas palmatas 3—5 fidas reducta. — Videtur varietas E. villosi.

Habitat ad oram Sansibar.

7. *Encephalartos Altensteini* Lehm. (v. v.)

Lehm. pug. IV. pag. 11, tab. 4 et 5. — Miq. mon. p. 51. — Linnaea XIX pag. 420, tab. 5. — D. C. prodr. XVI. II. 532. — E. Murumi Vriese Tijdschr. nat. Gesch. V, pag. 188. — *Zamia spinosa* Lodd. cat. — *Z. spinulosa* et *spinosissima* hort.

Truncus cylindricus, glaber v. apice tomentosus. Folia laete viridia, mox glabra, $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ m. longa. Petiolus et rhachis tereti-3—4-gona. Foliola multijuga lanceolata, 5—7-plo longiora quam lata, nervis 20—30 facile conspicuis percursa, pungenti-acuta, margine utrinque dentibus 1—6 pungenti-acutis erecto-patentibus armata v. interdum integerrima, 7—17 c. m. longa, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ c. m. lata, inferiora subito v. rarius sensim ad spinas palmato-partitas paucas v. nullas reducta. Squamae strobili masculi ovoideo-elongati patentes, quadrangulares et in conum truncatum sterilem desinentes, squamae superiores ovato-elongatae obtusae. Strobili foeminei squamae obovatae, extremitate omnium pubescente. — Habitat in Africa australi.

Variat:

α. typicus; foliolis usque 17 c. m. longis, utrinque 1—4 dentatis v. rarius nonnullis integerrimis, inferioribus subito ad spinulas paucas v. nullas reductis. — E. Altensteini et Altensteini *β. angustifolia* Miq. mon. p. 51 et 52. — E. Altensteini *α. typicus* et *γ. distans* Rgl. in Труды III, fasc. I, pag. 114. — Rgl. in Grtfl. 1875 p. 40. — *Zamia vernicosa* h. Versch.

β. semidentatus; foliolis margine superiore v. margine inferiore 1—3 dentatis v. utrinque integerrimis. Cetera ut praecedentis. — Miq. monogr. p. 52. — E. Altensteini *β. paucidentatus* Rgl. Труды et Grtfl. l. c. — E. Murumi Vriese l. c.

γ. spinosior; petiolo inermi; foliolis 5—10 c. m. longis, $1\frac{1}{2}$ —2 c. m. latis, utrinque 2—6 dentatis. — E. Altensteini *δ. spinosior* Grtfl. 1875 p. 40. — E. Altensteini *δ. parvifolius* Rgl. Труды III. I. 114. — *Zamia elegantissima* h. J. Versch. — *Encephalartos Vromii* h. J. Verschaff.

δ. macrophyllus; petiolo ad basin spinis palmato-partitis vestito; foliolis 10—12 c. m. longis, usque 3 c. m. latis, utrinque 2—5 dentatis. — E. Altensteini *ε. grandis* et *ζ. macrophyllus* Rgl. Grtfl. 1875 p. 40, 41. — E. grandis h. Haage et Schm. — *Zamia Van den Heckeii* h. J. Versch. — *Bombas Encephalartos* h. PaulloWSk.

ε. eriocephalus. De Vriese; trunco apice tomentoso. Cetera ut var. *α*.

E. Altensteini var. *eriocephala* De Vriese descr. pl. nouv. Jard. Leyd. pag. 1, tab. 1 et 2.

8. *Encephalartos septentrionalis* Schweinf.

Schweinf. bot. Zeit. 1871 pag. 332. — Al. Br. in ind. sem. h. Berol. 1874 p. 18.

Truncus plurima parte terra immersus, semper globosus. Folia

pubescentia. Foliola utrinque dentibus 8—10 magis erectis et minus pungentibus. Cetera ut praecedentis.

Habitat in Africae septentrionalis regione Niam-Niam.

9. *Encephalartos longifolius* Lehm. (v. v.)

Lehm. pug. VI, pag. 14, — Miq. mon. pag. 54. — *Zamia longifolia* Jacq. fragm. II, pag. 28 tab. 20. — *E. longifolius* D. C. prodr. XVI. II. 531. — Rgl. Труды III. I. 113. — Grtfl. 1875 p. 38. —

Truncus crassus, cylindricus. Folia $1\frac{1}{2}$ m. longa, juventute laxe tomentosa, mox glabra. — Petiolus inermis, obtuse tetragonus; rhachis teres. Foliola multijuga, viridia v. vix glaucescentia, lanceolata, multinervia, stricta v. subfalcata, 12—16 c. m. longa, $2\frac{1}{4}$ —4 c. m. lata, integerrima v. margine inferiore 1—2 obtuse dentata; inferiora pungenti-acuta, superiora obtusa v. apice ipso calloso-hamato obtuso. Strobili masculi sessilis cylindrici squamae usque ad $\frac{2}{3}$ longitudinis cucineatae, apice conico-quadrangulo fusco truncato terminatae.

Habitat in Africa australi.

Variat:

α . *typicus*; foliolis lanceolatis planis. Foliola 12—16 c. m. longa, $2\frac{1}{4}$ —3 c. m. lata, saepissime integerrima. — *E. longifolius* γ . *angustifolius* et δ . *Hookeri* D. C. prodr. XVI. II. 531. — *E. caffer* Hook. bot. mag. tab. 4903. — *Zamia longifolia* Jacq. l. c.

β . *revolutus*; foliolis lanceolatis, margine revolutis. D. C. l. c.

γ . *latifolius*; foliolis elliptico-lanceolatis, margine revolutis. — Foliola 12—13 c. m. longa, 4 c. m. lata, margine inferiore obtuse grosseque 1—2 dentata, rarius integerrima.

E. longifolius γ . *latifolius* Rgl. in Труды III. I. pag. 113. — Grtfl. 1875 p. 39. — *E. Almasianus* h. PaulloWSk.

10. *Encephalartos lanuginosus* Lehm. (v. v.)

Lehm. pug. VI pag. 14. — Miq. monogr. pag. 56. — D. C. prodr. XVI. II. 533. — Rgl. in Труды Имп. Бот. сада III. I. 113.

Grtfl. 1875 p. 39. — *Zamia lanuginosa* Jacq. fragm. tab. 30, 31. — *E. horridus* β . *lanuginosus* Miq. in Ann. d. sc. nat. ser. II, tom. 10 pag. 367. — *Enceph. latifrons* Lehm. in de Vriese nov. spec. Cyc. p. 16, tab. 4 (IX) A. B.

Truncus crassus, humilis, demum subcylindricus, plus minus laxe albido-tomentosus. Folia saturate viridia, 1—1½ m. longa. Petiolus inermis, tereti-subtrigonus, initio laxe tenuiterque tomentosus, mox glaber. Rhachis petiolo similis. Foliola multijuga oblongo- v. subelliptico-lanceolata, pungenti-acuta, margine inferiore dentibus 1—4 grossis lobuliformibus patentissimis subito in acumen breve pungens acuminatis, multinervia, 12—16 c. m. longa, 3—4 c. m. lata.

Africa australis.

Foliis viridibus, foliolorum majorum dentibus in spinulam brevem subito acuminatis ab *E. horrido*, foliorum latiorum dentibus lobuliformibus pungenti-acutis ab *E. caffro* dignoscitur.

11. *Encephalartos horridus* Lehm. (v. v.)

Lehm. pug. VI pag. 14. — Miq. mon. pag. 57. — D. C. prodr. XVI. II. 533, excl. syn. β . — Rgl. in Труды III. I. 113. — Grtfl. 1875 p. 40, — *Zamia horrida* Jacq. fragm. tab. 27, 28. — *E. nanus* Lehm. in Lehm. et De Vriese Tijdschr. nat. Gesch. IV, pag. 414, 421 tab. VII fig. c — De Vriese nov. spec. Cyc. pag. 13 tab. III, fig. c. — E. Van Hallii De Vriese in Lehm. et De Vr. Tijdschr. IV, p. 422, tab. X et De Vr. nov. sp. Cyc. pag. 14 tab. V. — *E. horridus* var. *trispinosa* Hook. bot. mag. 5371. — *E. tricuspidatus* hort. in Verh. z. Bef. Grtb. V, p. 186.

Truncus humilis, demum subcylindricus, glaber. Folia glauca, 40—80 c. m. longa. Rhachis petiolusque tereti-subtetragona, posterior inermis. Foliola lanceolata v. subelliptico-lanceolata, in spinam pungentem acuminata, multinervia, latere inferiore dentibus 1—3 lobuliformibus in spinam sensim acuminatis saepissime simplicibus v. rarius bifidis, nunc horizontaliter nunc erecto- v. divaricato-patentibus, 8—12 c. m. longa, 2—4 c. m. lata; foliola inferiora saepe integerrima. Strobilus masculus

elongato-cylindraceus; strobilus foemineus ovatus; squamis pelta quadrangulari, fusca, utroque latere hamata terminatis.

Habitat in Africa australi.

Species exclusae.

Encephalartos pungens Lehm. = *Macrozamia spiralis* Miq. — *E. tridentatus* Lehm. = *Macrozamia tridentata* Rgl.

IV. *Lepidozamia* Rgl.

(Rgl. Bull. de la Soc. de Mosc. 1857 I, p. 182 tab. IV fig. 20, 21. — Rgl. Grtfl. 1857 pag. 11 tab. 186 fig. 23 et 31. — Ibidem 1870 pag. 227 tab. 660. — Ibid. 1875 pag. 42. — Ibidem 1876 p. 4. — D. C. prodr. XVI, II. 547.

Truncus demum elatus cylindricus, initio ovatus, perulis persistentibus (nunquam fibroso-laciniatis) onustus. Folia in verticillos terminales (nec unum post alterum) provenientia, vernatione recta imbricatave, pinnata; petiolus inermis. Foliola anguste lineari-lanceolata, integerrima longitudinaliter-nervosa, acutissima, numerosissima, basi neque articulata neque incrassata et ibidem deorsum ad rhacheos marginem decurrentia. Foliorum rhachis in latere superiore canaliculata.

Flores foeminei in conum subsessilem crassum maximum ovato-globosum dispositi. Carpophylla arcte imbricata, basi stipitata; stipite terminato pelta cordato-ovata, crassa et apice sensim in acumen planiusculum attenuata. Ovula pendula, utrinque ad peltae basin interiorem foveolae insidentia.

Patria: Nova Hollandia orientalis.

Conspectus specierum.

1. *L. Peroffskyana*; petiolis semiteretibus, latere superiore costa elevata subtriangulis, initio tenuiter eburneo-tomentellis, demum glabris; foliolis 10—14 m. m. latis, 11—13 nerviis.

2. *L. Denisoni*; petiolis semiteretibus, supra planis et apicem versus subcanaliculatis, basi tenuiter fusco-tomentosis, caeterum glabris; foliolis circiter 10 m. m. latis, 11—15 nerviis.

3. *L. Hopei*; petiolis ut antecedentis; foliolis usque 30 m. m. latis, nervis 20—30 alteris validioribus alteris tenuioribus percursis.

Enumeratio specierum.

1. *Lepidozamia Peroffskyana* Rgl. (v. v.)

Rgl. Bull. Mosc. et Gartenfl. l. c. — D. C. prodr. XVI, II. 547. — *Macrozamia Denisoni* Moore et Müll. ex parte. — *Zamia Macleayi* h. Van Houtte. — *Macrozamia Peroffskyana* et *Denisoni* hort.

Folia incluso petiolo usque 2½ m. longa, interiora erecto-patentia, intermedia recurvo-patentia, exteriora recurvo-dependentia. Petiolus circ. 70 c. m. longus. Foliola usque 100-juga, anguste lineari-lanceolata, subfalcata, usque 30 c. m. longa et 12—14 c. m. lata. Specimina juniora omnibus partibus minora foliolisque minus numerosis.

2. *Lepidozamia Denisoni* Rgl. (v. v.)

Rgl. Grtfl. 1845 p. 43. — Ibidem 1876. p. 5. — *Macrozamia Denisoni* Moore et Müll. fragm. austr. I. pag. 417. — D. C. prodr. XVI, II. 536. — *Encephalartos Denisoni* F. Müll. in Quart. Journ. pharm. Vict. II. 90.

Truncus demum elatus, cylindricus, usque 20 ped. altus. Folia teste Miquelio 7—12 pedes longa, petiolo 2—3 pedali; foliolis usque 120 jugis, lineari-lanceolatis, falcatis, 12—15 nerviis, usque 10 poll. longis et 6 lin. latis. Foliola speciminum juniorum cultorum incluso petiolo usque 110 c. m. longa, laete viridi-nitentia; petiolus usque 68 c. m. longus; foliola circiter 20 juga, 18 c. m. longa, 1 c. m. lata, 10—12 nervia.

3. *Lepidozamia Hopei* Rgl. (v. v.)

Rgl. Grtfl. 1876. p. 6. — *Katakidozamia Hopei* h. Haage et Schm.

Dignoscitur foliolis 26 c. m. longis et 20—30 m. m. latis, nervis longitudinalibus inaequalibus 20—30 percursis.

V. *Dioon* Lindl.

Lindl. bot. reg. 1843 app. 59. — Miqu. epicr. pag. 289; in Linnaea XIX 414, XXI 576; in Verh. Ned. Inst. 1851 tab. 3 et 4. — Lem. ill. hort. II pag. 91 cum tab. — *Platyzamia* Zucc. in Abh. Bayr. Ac. pag. 23. tab. 4.

Truncus initio ovatus, demum cylindricus, perulis persistentibus dense lanatis (nunquam fibroso-laciniatis) onustus. Folia in verticillos terminales (nec unum post alterum) provenientia, vernatione stricta imbricatae. Rhachis latere inferiore semiteres, latere superiore costa elevata semitereti. Foliola parallele nervosa, numerosissima, anguste lineari-lanceolata, rigida, apice spinescentia, basi non incrassata et ibidem deorsum decurrentia, utrinque ad costae basin insertae. Strobili squamae planae, imbricatae, obovato-cuneatae, apice sterili ovato inflexo extus lanato terminatae. Strobili foeminei squamae imbricatae, stipite trigono elongato suffultae, lamina lanceolata acuminata plana basi cordata terminata. Ovula pendula, utrinque ad stipitis apicem solitaria.

Arbores humiles regno mexicano indigenae.

Dioon edule L. (v. v.)

Lindl. Miq. Lem. l. c. — D. C. prodr. XVI, II p. 537. — *Platyzamia rigida* Zucc. l. c. — *Zamia Maeleni* Miq. Linnaea XVIII. pag. 97. — D. imbricatum Miq. teste D. C. — D. aculeatum Lem.

Truncus demum 1—2 m. altus, apice lanatus. Folia circiter 1 m. longa, glabra. Petiolus semiteres, inermis, latere superiore carina trigona, basi dense lanatus et paullo tantum dilatatus. Rhachis semiteres, latere superiore costa elevata semitereti. Foliola valde spinescentia,

marginem incrassato paullo revolutum, circiter 8—10 nervia, usque 11 c. m. longa, 4—6 m. m. lata. Strobili foeminei elliptici squamis apice glabris, basi lanatis.

VI. Ceratozamia Brongn.

Truncus abbreviatus, saepe decumbens et basi proliferus, rarius suberectus, perulis persistentibus (nunquam fibroso-laciniatis) onustus. Folia pinnata in verticillos terminales (nec unum post alterum) provenientia, vernatione circinata; petioli sparsim aculeati v. inermes, basi subvaginato-dilatata utrinque auriculati. Foliola parallela multinervia, lanceolata usque anguste lineari-lanceolata, integerrima v. rarius apicem versus denticulata, basi articulata, nascentia imbricata. Strobili cylindrici; squamae strobili masculi ultra medium obovato-cuneatae, superne steriles, apice bicornutae; squamae strobili foeminei stipite crasso utrinque ovulifero, peltatae, peltis transverse hexagonis e medio bicornutis.

Arbusculae regiones mexicanas incolentes.

Conspectus specierum.

A. *Foliola* 2—5 c. m. lata, lanceolata v. lineari-lanceolata, in statu vivo non transparente striato-nervosa.

1. *C. mexicana* Brongn., petiolo plus minus aculeato; rhachi inermi, foliolis integerrimis, 3—4¹/₃ c. m. latis.

2. *C. Katzeriana* Rgl., petiolo aculeato; rhachi inermi; foliolis apicem versus spinescenti-dentatis, circiter 5 c. m. latis.

3. *C. longifolia* Miq., petiolo aculeato; rhachi saepe aculeolis raris armata; foliolis integerrimis, 17—30 m. m. latis.

B. *Foliola* lanceolata, 3—5 c. m. lata, in statu vivo transparente striato-nervosa.

4. *C. robusta* Miq., petiolo inferne dense aculeato; foliolis subito acuminatis, integerrimis.

5. *C. Miqueliana* H. Wendl., petiolo inermi v. basi vix aculeato; foliolis subito acuminatis, saepe sub apice dente unico magno obtuso.

C. Foliola anguste lineari-lanceolata, circiter 1 c. m. lata.

6. *C. Küsteriana Rgl.*

Enumeratio specierum.

1. *Ceratozamia mexicana Brongn.* (v. v.)

Brongn. in Ann. sc. nat. ser. III tom. 5 pag. 8 tab. 1. — Miq. prodr. Cyc. pag. 11 et 23. — D. C. prodr. XVI, II pag. 546. — *C. brevifrons* Miq. in Tijdschr. nat. Wet. I pag. 41. — *C. mexicana* et *C. longifolia* hort.

Truncus humilis, foliorum basibus perulisque acuminatis saltem apicē cinereo tomentosus onustus. Folia speciminum juniorum 80—90 c. m. longa, 2—3 juga; speciminum satis evolorum usque 2 m. longa, 7—16 juga, erecto-patentia et apice graciliter recurvata. Petiolus basi subvillosus, viridis, teres, a basi ad apicem v. inferne tantum aculeis sparsis raris brevibus armatus, quam lamina saepissime longior. Rhachis viridis, laevis, teres, supra leviter sulcata. Foliola lanceolata; recta v. leviter falcata, sensim v. subito acuminata, integerrima, 20—35 nervia, 3—4½ c. m. lata, 15—35 c. m. longa.

2. *Ceratozamia Katzeriana Rgl.* (v. v.)

Zamia fusca h. PaulloWSk.

Folia 8—10 juga. Petiolus teres, fuscus, aculeatus, initio leviter tomentosus, demum glaber. Rhachis inermis, fusca. Foliola lanceolata, leviter falcata, acuminata, margine a medio ad apicem dentibus spinulentibus erectis vestita, 5 c. m. lata usque 32 c. m. longa, multinervia, juniora e rubro fusciscentia, vetustiora obscure viridia, nitentia.

3. *Ceratozamia longifolia Miq.* (v. v.)

Miq. Wis. en Nat. Tijdschr. I. pag. 42. — Ejusd. prodr. Cyc. pag. 11 et 21. — D. C. prodr. XVI, II. 547. — *C. intermedia* Miq. mss. — *C. longifolia* b. minor. — Miq. prodr. l. c. — *C. mexicana* et *C. robusta* hort.

Truncus initio globosus, demum cylindricus flexuosus, foliorum basibus dilatatis perulisque onustus; perulae latissimae, in acumen patens

strigoso-pilosum excurrentes. Folia patentissima, apicem versus graciliter recurvata, 1—2 m. longa. Petioli teretes, 60—70 c. m. longa, virides, aculeolis brevibus raris armati. Rhachis teretiuscula, latere superiore bisulcata, 60—140 c. m. longa, aculeolis rarissimis armata. Foliola 10-multijuga, anguste lanceolata, recta v. subfalcata, 17—20 nervia, sensim attenuato-acuta, integerrima, 18—25 v. rarius usque 30 m. m. lata, 22—35 c. m. longa, utrinque lacte viridia.

4. *Ceratozamia robusta* Miq. (v. v.)

Miq. in Wis. en Nat. Tijdschr. I p. 42. — D. C. prodr. XVI. II. p. 547.

Truncus ut *C. longifoliae*. Folia erecto-patentia, apice leviter recurvata, 80—120 c. m. longa. Petiolus teres, inferne aculeis diametrum dimidium petioli superantibus satis dense armatus, lutescente-viridis v. basin versus paullo purpurascens. Rhachis teretiuscula, supra bisulca, inermis. Foliola 13-multijuga, lanceolata, subito acuminata, recta v. subfalcata, in statu vivo eximie transparente-striato-nervosa, 3—4½ c. m. lata, 16—22 c. m. longa, pallide viridia.

5. *Ceratozamia Miqueliana* H. Wendl. (v. v.)

H. Wendl. ind. Palm. p. 68. — Miq. prodr. Cyc. pag. 11. 22. — D. C. prodr. XVI. II. 547. — *C. latifolia* Miq. Tijdr. l. c. I. pag. 206. — D. C. l. c. p. 547. — *C. mexicana* et *C. Ghiesbreghtii* hort.

Truncus ut *C. mexicanae*. Folia initio breviora, demum usque 1¾ m. longa, erecto-patentia et apicem versus graciliter recurvata. Petiolus cylindricus, laevis v. aculeis sparsis rarissimis armatus, initio purpurascens, demum luride virescens, basin versus saepissime albido-pruinatas, laminam aequans v. ea longior. Rhachis laevis, teres, purpurascens v. viridis, supra leviter sulcata. Foliola 5—11 juga, opposita v. alterna, lanceolata, recta v. subfalcata, subito acuminata, integerrima v. sub apice dente satis magno obtuso aucta, supra atroviridia, subtus pallidiora, 35—40-nervia, transparente striato-nervosa, 3½—7 c. m. lata, 14—32 c. m. longa.

6. *Ceratozamia Küsteriana* Rgl. (v. v.)

Rgl. in Bull. Mosc. 1857 p. 187 cum iconc. et tab. III. fig. 6. tab. IV. fig. 22. — Rgl. Grtfl. — D. C. prodr. XVI. II. 546.

Truncus initio globosus, demum subcylindricus et basi plus minus ramoso-proliferus, foliorum basibus perulisque ovatis sensim acuminatis subglabris onustus. Folia erecto-patentia, apice leviter recurvata, 60—80 c. m. longa. Petiolus teres, inermis, basi tomentosus, fusco-viridis, 20—25 c. m. longus. Rhachis teretiuscula, latere superiore bisulcata. Foliola multijuga (usque 40 jуга), satis dense disposita, anguste lineari-lanceolata, sensim sensimque attenuato-acuminata, integerrima, 8—10 nervia, utrinque lacte viridia, recta v. leviter falcata, 11—13 m. m. lata, 15—25 c. m. longa. Strobili masculi breviter pedunculati, subcylindrici, attenuato-acuti.

VII. *Aulacophyllum* Rgl.

Truncus cylindricus, apice tantum perulis caducis onustus. Folia in verticillos terminales (nec unum post alterum) provenientia, pinnata. Petiolus sparsim aculeatus. Foliola lanceolata usque elliptico-lanceolata, praecipue apicem versus serrulata, multinervia, nervis latere superiore immersis et latere inferiore prominentibus v. utrinque prominentibus sulcata, basi articulata. Strobili foeminei cylindrici squamae pedicellato-peltatae; peltis hexagonis, externe convexis, transverse elongatis, in latere inferiore utrinque uniovulatae. Semina maxima, obovato-oblonga; matura rubra (an semper?).

Arbores humiles in Nova Granada, Panama et Ecuador indiginae, foliolis nervis immersis a generibus *Zamia* et *Microcycas* satis distinctae.

Cfr. Grtfl. 1876. p. 140.

Dispositio specierum.

A. *Foliola oblongo-lanceolata*.

a. *Rhachis glabra. Foliola erecto-patentia.*

1. *A. Roezli.*

b. *Rhachis initio fusco-tomentella v. subhirsuta. Foliola horizontaliter patentia.*

2. *A. Lindeni*.c. *Rhachis glabra. Foliola horizontaliter-patentia.*3. *A. montanum*; foliolis 20—22-nerviis.4. *A. Ortgiesi Rgl.*; foliolis 9—13-nerviis.B. *Foliola elliptico-lanceolata v. elliptica.*5. *A. Skinneri*; foliolis sessilibus.6. *A. Wallisii*; foliolis in petiolum attenuatis.1. *Aulacophyllum Roezli.* (v. v.)

Zamia Roezli Rgl. in Linden. cat. 1873 n. 90. — Illustr. hort. 1873 tab. 133—134. — Rgl. Grtfl. 1874 pag. 55. — *Aulacophyllum Roezli* Rgl. Grtfl. 1876. p. 141.

Truncus cylindricus, 1—3 m. altus, nudus, foliorum perularumque cicatricibus notatus. Folia pinnata, speciminum satis evolutorum usque 2 m. longa, multijuga, speciminum juniorum duplo-quadruplo minora pauci-plurijuga. Petiolus glaber, speciminum non satis evolutorum teres inermis v. subinermis, speciminum satis evolutorum aculeis sparsis armatis teres et in latere superiore sulcatus. Rhachis aculeis sparsis raris armata, semiteres, in latere superiore costa prominente. Foliola erecto-patentia, opposita v. rarius alterna, oblongo-lanceolata, acuminata, basi manifeste articulata, margine spinuloso-erecto-que-dentata, basin versus integerrima, 12—18-nervia, laete viridia, 20—40 c. m. longa, 2—4 c. m. lata; nervis in latere superiore valde immersis, in latere inferiore costato-prominentibus.

Habitat in Nova Granada.

2. *Aulacophyllum Lindeni.* (v. v.)

Zamia Lindeni Rgl. in Linden. cat. 1875. — Linden et André Illustr. hort. 1875 tab. 195. — A. Lindeni Rgl. Grtfl. 1876. p. 141.

Petiulus rhachisque teretia, aculeis satis numerosis rigidisque armata, initio ferrugineo-tomentella v. subhirsuta, demum glabra. Foliola horizontaliter patentia, anguste lanceolata, nervis longitudinalibus

minus profunde immersis 22 et ultra percursa, 20—25 c. m. longa, 2½—3½ c. m. lata. Cetera ut praecedentis.

Habitat in Ecuador.

3. *Aulacophyllum montanum*. (v. v.)

Zamia montana A. Br. in Monatsbericht. d. Ac. der Wiss. in Berl. 1875 pag. 376. — *A. montanum* Rgl. Grtfl. 1876. p. 141.

Pedunculi dense aculeati, basin versus fusco-tomentosi, caeterum rhachique glabri. Foliola horizontaliter patentia, 20—22 nervia, usque 35 c. m. longa et usque 4 c. m. lata. Caeterum satis similis *A. Roezli*.

Habitat in Nova Granada.

4. *Aulacophyllum Ortgiesi* (v. v.)

A. Ortgiesi Rgl. Grtfl. 1876. p. 141.

Folia multijuga, glabra. Foliola basi articulata, horizontaliter patentia, anguste lanceolata, apicem versus attenuato-acuminata, 9—13-nervia, supra basin circ. 1 c. m. lata, circiter 12 c. m. longa, nervis utrinque prominentibus sulcata.

E Nova Granada a Cl. Wallisio introducta.

5. *Aulacophyllum Skinneri*. (v. v.)

Zamia Skinneri Warszew. in Otto et Dietr. Allg. Grtztg. XIX. pag. 146. — Hook. bot. mag. tab. 5242. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 539. — *A. Skinneri* Rgl. Grtfl. 1876. p. 143.

Truncus cylindricus, 1 m. et ultra altus. Petiolus rhachisque tertia, aculeata, glabra. Foliola pauci-plurijuga (2—11 juga), elliptico-lanceolata, acuminata, multinervia, superne spinuloso-dentata, 20 c. m. et ultra longa, 4—8 c. m. lata, nervis immersis insigniter sulcata.

Habitat in Guatemala.

6. *Aulacophyllum Wallisi*. (v. v.)

Zamia Wallisii A. Br. Monatsb. der Berl. Ac. d. Wiss. 1875 pag. 376. — *Aulacophyllum Wallisi* Rgl. Grtfl. 1876. p. 143.

Truncus crassus, humilis, semisubterraneus. Petiolus teres, minute aculeatus, basi laxe tomentosus, caeterum rhachique glaber. Folia pauci-

plurijuga (2—8juga). Foliola elliptico-lanceolata, basi in petiolum usque 4 c. m. longum attenuata, acuminata, superne denticulata, 12—45 nervia, 35 c. m. et ultra longa, 9 c. m. et ultra lata, nervis immersis profunde sulcata.

Habitat in Nova Granada.

VIII. *Microcycas* Miq.

D. C. prodr. XVI. II. pag. 538.— *Zamia* sectio *Microcycas* Miq. — Flore des serres VII. pag. 141.

Truncus cylindricus, demum nudus, foliorum perularumque deciduorum cicatricibus pictus. Folia pinnata in verticillos terminales (nec unum post alterum) provenientia. Petiolus inermis. Foliola anguste lineari-lanceolata, parallele nervosa, integerrima, basi insigniter articulata, nervis paullo immersis lineata. Squamae strobili masculi planae, crassiusculae, a basi ad mediam partem cuneatae et subtus antheriferae, a medio ovatae steriles. Squamae strobili foeminei laxè juxtapositae, axi perpendiculares, superiore majore parte drupam irregulariter sulcatam simulente, nempe ellipsoideo-costatae et sulcatae, extremitate truncata v. obtusa, inaequaliter bullata, basi in stipitem brevem angustata; stipite utrinque in apice semen ellipsoideum sessile gerente.

Arbusculus antillana.

Microcycas calocoma D. C. (v. v.)

D. C. prodr. XVI. II. pag. 538. — *Zamia calocoma* Miq. prodr. pag. 26. — Grisb. cat. pl. Wright. pag. 217. — Rgl. in Bull. Soc. Mosq. 1857. I. pag. 191.

Folia 60—90 c. m. longa, initio ubique pube tenui conspersa, demum (exclusa rhachi utrinque inter foliola villosula) glabra. Petiolus teres, demum glaber, usque 10 c. m. longus. Foliola multijuga, utrinque usque 80, horizontaliter patentia, satis dense disposita (5—10 m. m. distantia), anguste lineari-lanceolata, in apicem obtusulum sensim

attenuata, margine crassiora et revoluta, integerrima, nervis 9—14 supra leviter immersis, infra leviter prominentibus, 9—18 c. m. longa, 7—8 m. m. lata.

Habitat in insula Cuba et in insula Pinorum.

IX. *Zamia* L.

Arbusculae humiles v. humillimae; trunco simplici subcylindrico v. saepe pluri-multicipiti, nudo, cicatricibus perularum petiolorumque mox deciduorum ornato. Folia pinnata, unum post alterum provenientia. Petioli saepe sparse aculeati. Foliola linearia usque ovata, margine praecipue apicem versus denticulata v. rarius integerrima, omnia basi manifeste articulata, parallelinervia. Strobili masculi foemineique squamae pedicellato-peltatae; peltis hexagonis, transverse longioribus, adpressis; strobili masculi squamae in latere inferiore peltae et ad stipitem antheriferae, foeminei in latere inferiore peltae biovulatae.

Conspectus specierum.

I. *Petioli aculeati*.

- A. *Foliola longe linearia, acuminata, apice 3—4 denticulata, 7—10 nervia.*
 1. *Z. spartea* D. C.
- B. *Foliola lineari-lanceolata, apicem obtusum v. acutum versus denticulata.*
 2. *Z. Loddigesii* Miq., trunco 2-pluricipite, foliis 3—5 jugis.
 3. *Z. Leiboldi* Miq., trunco subcylindrico saepissime simplici; foliis 7—22 jugis.
- C. *Foliola lineari-lanceolata, integerrima v. apice obsolete denticulata.*
 4. *Z. Chigua* Seem.
- D. *Foliola oblongo-lanceolata, acuminata, basi nuda.*
 5. *Z. muricata* Willd., foliolis 4—11 jugis, sub 40 nerviis.

6 *Z. Baraquiniana hort.*, foliolis 20—30 jugis, sub 30 nerviis.

E. *Foliola obovato-oblonga v. obverse lanceolata, obtusa v. subacuta, apicem versus denticulata, basi nuda.*

7. *Z. furfuracea Ait.*, foliolis multijugis.

8. *Z. latifolia Lodd.*, foliolis paucijugis.

F. *Foliola elliptica, acuminata, basi in petiolum manicatum attenuata.*

9. *Z. manicata Linden.*

II. *Petioli inermes.*

A. *Foliola plus quam 10-nervia.*

a. *Foliola lineari-lanceolata v. anguste lineari-lanceolata.*

10. *Z. Boliviana D. C.*, foliolis 10—18 jugis, acuminatis.

11. *Z. media Jacq.*, foliolis usque 24 jugis, acutis.

12. *Z. tenuis Willd.*, foliolis plurijugis, obtusiusculis.

b. *Foliola oblongo-obovata v. oblonga, obtusa.*

13. *Z. pumila L.*, foliolis 12—24 jugis, oblongis v. obverse oblongis, integerrimis v. apice obsolete crenulato-serrulatis.

14. *Z. Ottonis Miq.*, foliolis 3—6 jugis, obovatis, apice crenulato-serrulatis. — Folia 30—90 c. m. longa.

15. *Z. pygmaea Sims.*, foliolis 3—10 jugis, oblongo-lanceolatis, a medio ad apicem crenato-serrulatis. — Folia 10—20 c. m. longa.

16. *Z. Kickxii Miq.*, foliolis 24 jugis, oblongo-lanceolatis, a medio ad apicem crenato-serrulatis. — Folia 30—35 c. m. longa.

c. *Foliola lanceolata v. elliptico-lanceolata, acuta v. acuminata.*

17. *Z. pseudo-parasitica Yates.*, foliolis sinuoso-falcatis, integerrimis, cuspidatis.

18. *Z. Pöppigiana Mart. et Eichl.*, foliolis falcato-lanceolatis, acutis, ab apice ultra medium argute serrulatis.

19. *Z. Fischeri* Miq., foliolis lanceolatis, acutis, a medio ad apicem serrulatis.
20. *Z. obliqua* A. Br., foliolis elliptico-lanceolatis, caudato-acuminatis, a medio ad apicem spinuloso-serrulatis.
- B. *Foliola 3—10 nervia, linearia.*
- a. *Foliola 46—61 juga.*
21. *Z. multifoliata* D. C.
- b. *Foliola 2—24 juga.*
22. *Z. angustifolia* Jacq.

Enumeratio specierum.

1. *Zamia spartea* A. D. C.

DC. prodr. XVI. II. 539.

Petoli 4—5 c. m. longi, crebre aculeati, teretes, pube demum evanescente vestiti, perulis lanceolatis 2—3 c. m. longis fulvo-tomentosis mixti. Folia incluso petiolo circiter 30 c. m. longa, circiter 20 jugo-pinnata. Foliola longe linearia, acuminata, apice denticulis 3—4 munita, glabra, rigida, 7—10 nervia, 5—30 c. m. longa, 4—5 m. m. lata, margine revoluta. Strobili pedunculati; pedunculis $3\frac{1}{2}$ —7 c. m. longis, tomentosis.

Habitat in regno mexicano.

An varietas *Z. angustifoliae* Jacq. petiolis aculeatis?

2. *Zamia Loddigesii* Miq. (v. v.)

Miq. in Tijdschr. nat. Gesch. 10 pag. 73. — Miq. in Linnaea XIX. pag. 425 tab. 7, fig. b. c. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 541 excluso synonymo. — *Z. Loddigesii* α . typica Rgl. Grtfl. 1856 pag. 14, tab. 186 fig. 26 (foliolum). — *Z. serrulata* et *Z. carasana* Lodd. cat. teste Miq. — *Z. Loddigesii* β . obtusifolia et γ . angustifolia Rgl. Grtfl. 1857 tab. 186 fig. 27, 28 et 29 (foliola). — *Ceratozamia* Miq. h. Versch. — *Z. eriolepis*, *Z. terrestris*, *Z. media*, *Z. debilis*, *Z. nigra* hort. — *Z. mexicana* Miq. prodr. Cyc. pag. 13, 28.

Truncus mox nudus, crassus, saepissime 2-pluriceps, Perulae e basi latiore acuminatae, fusco-tomentosae, mox caducae. Petioli teretes, glabri, parce aculeati v. rarius subinermes, rhachin inermem superantes, 12—25 c. m. longi. Foliola 3—5 juga, lineari-lanceolata, in apicem acutum v. obtusiusculum acuminata, a medio ad apicem spinuloso-denticulata, 20—25-nervia, 10—20 c. m. longa, $1\frac{1}{2}$ —2 c. m. lata.

Habitat in regno mexicano.

3. *Zamia Leiboldi* Miq. (v. v.)

Miq. in Linnaea XIX. pag. 427. — Z. Loddigesii β . Leiboldi DC. prodr. XVI. II. pag. 541.

Truncus subcylindricus, usque 20 c. m. altus, saepissime simplex. Perulae fusco-tomentosae, e basi valde dilatata longe acuminatae, trunci nudi apicem coronantes. Petioli teretes v. latere superiore planiusculi, sparse aculeati v. rhachique inermi v. aculeolis raris vestita tomento fusco demum evanescente vestiti, lamina breviores. Folia incluso petiolo 50—90 c. m. longa, 7—22 jugo-pinnata. Foliola valde variabilia, lineari-lanceolata v. anguste lineari-lanceolata, in apicem acutum v. obtusiusculum v. obtusum attenuata, a medio ad apicem spinuloso-serrulata, 20—32-nervia, 1 — $2\frac{1}{2}$ c. m. lata, 15—30 c. m. longa. Strobili breviter pedunculati, cinereo-tomentelli.

Habitat in India occidentali.

Variat:

α . *typica*; foliolis 14—22 jugis obtusis, 15—25 m. m. latis, 25—30 nerviis. — Z. Leiboldi Miq. l. c.

β . *latifolia*; petiolo tereti; foliolis 7—12 jugis, 25—32 nerviis, 15—25 m. m. latis, acutis v. obtusiusculis.

γ . *angustifolia*; foliolis 10—16 jugis, 10—12 m. m. latis, 20—25 nerviis, acutis v. obtusiusculis.

4. *Zamia Chigua* Seem. (v. v.)

Seem. Bot. Herald. pag. 201 tab. 43. — DC. prodr. XVI. II. 539. — *Zamia Lindleyi* Warsz. in Otto et Dietr. Allg. Grtztg. XIX.

pag. 146. — Miq. prodr. Cyc. pag. 24. — *Zamia imbricata* Roezl. (in hortis).

Truncus cylindricus, simplex, 12—30 c. m. altus. Folia usque 120 c. m. longa; petiolo crebre rhachi parce aculeatis, junioribus tomento tenui evanescenti-vestitis. Foliola pluri-multijuga (7—66 juga), lineari-lanceolata, 10—16 nervia, sensim in apicem subspinescentem attenuata, integerrima v. apicem versus obsolete denticulata, subhorizontaliter patentia, 12—20 c. m. longa, usque 18 m. m. lata. Strobilus masculus elongato-cylindricus, 13—16 c. m. longus, tomentosus, pedunculatus.

Habitat in Panama et in insulis ostii fl. St. Juan isthmi Darien.

5. *Zamia muricata* Willd. (v. v.)

Willd. spec. IV. 847. — Miq. mon. p. 65 et 66, tab. 7. — DC. prodr. XVI. fasc. II. pag. 541. — Karsten in Abh. Ac. Berol. 1856 tab. 1—3.

Truncus subcylindricus, simplex v. divisus. Petiolus teres, basi tenuiter tomentosus, caeterum glaber, parce aculeatus v. rarius inermis. Rhachis inermis, teres, supra leviter sulcata. Foliola multinervia, 3—12 juga, lanceolata v. oblongo-lanceolata, acuminata v. rarius singula obtusiuscula, a medio ad apicem spinuloso-denticulata, 12—25 c. m. longa, 2—4 c. m. lata. Strobili pedunculati, cylindrici, tomentosi, 8—10 c. m. longi.

Habitat in America meridionali.

Variat:

β. *picta*; foliolis albo-maculatis. — *Z. picta* hort. — *Z. muricata* β. *picta* Miq. in Wiss. Tijdschr. I. p. 198. — D. C. prodr. l c. p. 541. — Folia incluso petiolo majis aculeata, 2 m. et ultra longa. Foliola usque 25 juga et usque 40 c. m. longa. An species propria?

6. *Zamia Baraquiniiana* hort. (v. v.)

Truncus cylindricus, simplex, usque 90 c. m. altus. Folia usque 1 $\frac{1}{4}$ m. longa. Petiolus teres, paullo angulatus, sparsim aculeatus, basi

fusco-tomentosus, caeterum glaber. Rhachis teres, latere superiore sulco destituto, aculeis raris armata. Foliola 20—30 juga, anguste lanceolata, saepe falcata, acuminata, a medio ad apicem spinuloso-denticulata, usque 35 c. m. longa, circiter 3 c. m. lata, circiter 30 nervia.

Patria verosimiliter America tropica.

Trunco elatiore, rhachi aculeata, foliolorum angustiorum longiorumque jugis numerosioribus a *Z. muricata* typica dignoscitur.

7. *Zamia furfuracea* Ait. (v. v.)

Ait. hort. Kew. ed. I. tom. III. pag. 477. — Bot. mag. tab. 1969. — Miq. mon. pag. 66. — D. C. prodr. XVI. II. 540. — Palmifolia fructu clavato polyspermo Trew. pl. sel. tab. 26. — *Z. crassifolia* hort. et *Z. fusca latifolia* hort.

Truncus cylindricus, apice foliis perulisque e basi valde dilatata lanceolato-acuminatis coronatus. Folia incluso petiolo 100—120 c. m. longa. Petiolus teres, aculeatus, 40—55 c. m. longus, initio breviter tomentellus, demum glaber. Rhachis 46—66 c. m. longa, teres, inermis. Foliola 10—13 juga, obverse lanceolata, rigida, crassa, multinervia, basin versus attenuata, apice saepe rotundato-obtusa v. rarius subacuta, apicem versus crenulato-denticulata, saepe inaequilatera, 15—20 c. m. longa, 4—5 c. m. lata. Strobili pedunculati, tomentosi, foemineus oblongo-ovoideus apice sterilis.

Habitat in Mexico.

8. *Zamia latifolia* Lodd. (v. v.)

Lodd. cat. n. 687. — *Zamia muricata* var. *obtusifolia* Miq. in Tijdschr. nat. Gesch. X. pag. 21 et in Linnaea XVII. pag. 733 et XIX pag. 425 tab. 7 fig. a. — *Encephalartos latifolius* Steud. nom. — *Z. latifolia* D. C. prodr. XVI. II. 541.

Truncus crassus, saepe pluriceps, usque 20 c. m. altus. Petioli teretes, aculeis raris armati v. subinermes, juniores ut rhachis et foliorum pagina inferior fusco-pilosula, demum glabra. Foliola 2—4 juga, ob-

ovato-oblonga, 25—35 nervia, usque 8 c. m. longa et $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ c. m. lata.

Habitat in regno mexicano.

9. *Zamia manicata* Linden.

Linden in horto Lindeano.

Truncus cylindricus. Petioli sparsim aculeati. Folia pauci-plurijugopinnata. Foliola elliptica, acuminata, undulata, apicem versus obsolete crenulato-denticulata, basin versus in petiolum annulo prominente manicatum attenuata.

10. *Zamia boliviana* D. C.

D. C. prodr. XVI. II. 540. — *Ceratozamia boliviana* Brongn. in Ann. sc. nat. ser. III. tom. V. p. 9. — Z. Brongniarti Wedd. in Ann. sc. nat. ser. III. tom. XIII. pag. 249 tab. 4. — Eichl. in Mart. fl. bras. tom. IV. pag. 413 tab. 108.

Truncus hypogaeus, cylindraceus. Perulae e basi latiore lanceolatae, sensim attenuato-acutae. Folia 35—60 c. m. longa. Petiolus inermis, 15—35 c. m. longus, teres, juxta axillam tomentosus. Rhachis obtuse triquetra, supra leviter carinata, circiter petioli longitudine. Foliola 10—18 juga, anguste lineari-lanceolata, subfalcata, circiter 12 nervia, sensim in apicem acutum attenuata, integerrima v. apice utrinque obsolete 3—5 denticulata, 15—25 c. m. longa, circiter 8 m. m. lata. Strobili pedunculati, cylindracei; masculi 7—9 c. m. longi; foeminei quam masculi subduplo longiores et quadruplo crassiores, ferrugineo-virescentes, apice acuminati.

Habitat in Bolivia inque Brasilia.

Vix ac ne vix quidem a sequenti specie differre videtur.

11. *Zamia media* Jacq. (v. v.)

Jacq. hort. Schönbr. tab. 397 et 398. — Miq. monogr. pag. 68. — D. C. prodr. XVI. II. 542. — Z. integrifolia Rich. Conif. et Cyc. pag. 191 tab. 27 et 28.

Perulae e basi valde dilatata in cuspidem acuminata. Folia glabra, incluso petiolo usque 60—70 c. m. longa, 12—24 juga. Petiolus inermis, teres. Foliola anguste lineari-lanceolata, sensim in apicem acutum attenuata, integerrima v. apicem versus obsolete crenulata, 12—20 c. m. longa, 8—16 m. m. lata, 12—24 nervia. Strobili pedunculati; masculi cylindrici et apicem versus attenuati (cfr. Jacq. tab. 398), circiter 11 c. m. longi; foeminei subelliptici, 9—10 c. m. longi (cfr. Jacq. tab. 397), acuminati.

Habitat in India occidentali.

Perulis e basi valde dilatata triangulari subito in cuspidem elongatam attenuatis, strobilis masculis quam foeminei longioribus a praecedenti diversa videtur.

12. *Zamia tenuis* Willd.

Willd. spec. pl. IV. 846. — Miq. mon. pag. 72 et in Linnaea XIX. p. 428 tab. 6. — D. C. l. c. pag. 544.

Videtur varietas *Z. mediae* foliolis 6—7 m. m. latis apice ipso obtusiusculis.

13. *Zamia pumila* L. (v. v.)

L. spec. pag. 1650. — Bot. mag. tab. 2006. — Miq. monogr. pag. 69. — D. C. prodr. XVI. II. 543. — *Z. media* Bot. mag. tab. 1838. — *Z. integrifolia* Ait. hort. Kew. ed. I. tom. I. pag. 478. — Jacq. ic. pl. rar. III. tab. 635. — Bot. mag. tab. 1851. — Miq. mon. pag. 67. — D. C. prodr. XVI. II. 541. — Pursh. fl. am. II. pag. 648. — Rich. comm. Conif. et Cyc. tab. 27. — *Z. debilis* Willd. spec. pl. tom. IV. pag. 846. — Miq. mon. p. 71. tab. VIII. fig. b. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 542. — *Z. concinna* h. Booth. — *Encephalartos pumilus* Steud. nom. — *Z. cylindrica* h. Booth.

Truncus humilis. Perulae e basi latiore lanceolatae, apicem versus sensim attenuatae tomentosae, saepe dentatae. Folia incluso petiolo 35—70 c. m. longa, 6—16 juga, pinnata. Petiolus inermis, teres, su-

pra leviter sulcatus, initio furfuraceo-tomentosus, demum glaber. Foliola oblonga v. lanceolato-oblonga v. obverse oblonga, 20-multinervia, integerrima v. apicem obtusum v. obtusiusculum versus minute denticulata, circiter 10—35 m. m. inter se distantia, 7—20 m. m. lata, 6—14 c. m. longa. Strobili pedunculati, fusco-tomentosi; masculi cylindrici, usque 11 c. m. longi; foeminei ellipsoideo-cylindrici, subaequilongi, apice steriles et ibidem rotundato-obtusi v. in conum obtusulum attenuati.

Habitat in India occidentali, idemque in Florida.

Z. pumila auct. foliolis angustioribus 7—10 m. m. latis strobilisque obtusis, — Z. integrifolia Ait. foliolis latoribus usque 20 m. m. latis strobilisque foemineis cono sterili superatis dignoscuntur. Vidi specimina florentia in horto bot. Petropolitano foliolis usque 20 m. m. latis strobilisque foemineis apice sterili conoideo v. obtuso.

14. *Zamia Ottonis* Miq. (v v.)

Miq. in Linnaea XVII. p. 740. — D. C. prodr. XVI. II. p. 544. — Miqu. Cyc. quaedam am. pag. 4 tab. II. — Z. furfuracea Roezl. mss. —

Truncus humilis, crassus, simplex et subovatus v. biceps. Perulae e basi valde dilatata in cuspidem satis elongatam margine dentatam acuminatae, apicem versus fusco-tomentosae. Folia 30—90 c. m. longa, 3—6 jugo-pinnata, initio fusco-furfuraceo-tomentella, demum glabra. Petiolus inermis, teres, supra leviter sulcatus. Foliola cuneato-obovata, superne rotundato-obtusa v. rotundata et in apicem obtusum producta, a medio ad apicem v. apicem versus tantum obsolete v. manifeste crenulata v. rarius sub apice crenis 2—3 majoribus, multinervia, 5—13 c. m. longa, $2\frac{1}{2}$ —5 c. m. lata, circiter, 2—3-plo longiora quam lata; specimen non satis evolutorum 3—5 juga et satis dense disposita (10—15 m. m. inter se distantia), specimen satis evolutorum laxe disposita (usque 5—13 c. m. inter se distantia). Strobili foeminei elliptici, acuminati, circiter 5 c. m. longi et $2\frac{3}{4}$ c. m. lati.

Habitat in Guatemala unde in hortum Petropolitanum a Cl. Roezl introducta, idemque in Cuba.

15. *Zamia pygmaea* Sims. (v. v.)

Sims. bot. mag. tab. 1741. — Miq. mon. pag. 70. — D. C. prodr. XVI. II. 543. — *Z. pumila* hort.

Pygmaea, glabra. Folia incluso petiolo inermi 10—12 c. m. longa, 3—10 jugo-pinnata. Foliola satis dense disposita, oblongo-lanceolata, obtusa, inaequilatera, a medio ad apicem crenato-dentata v. duplicato-crenato-dentata, $1\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ c. m. longa, 10—12 m. m. lata. Strobili pedunculati, tenuiter fusco-tomentosi, masculi elliptico-oblongi, $2\frac{1}{2}$ —3 c. m. longi.

Habitat in India occidentali.

16. *Zamia Kikxii* Miq.

Z. Kikxii Miq. mon. pag. 71 tab. 8 fig. A. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 542.

Foliis usque 32 c. m. longis, foliolis 24 jugis, 4 c. m. longis, 10—12 m. m. latis a praecedenti differre videtur.

Habitat in insula Cuba.

17. *Zamia pseudo-parasitica* Yates.

Yates in Seem. bot. Herald pag. 282. — D. C. prodr. XVI. II. 543.

Truncus cylindricus. Foliola elongato-lanceolata, sinuoso-falcata, integerrima, glabra, apice acuminata, 18-nervia, 35—52 c. m. longa, 3—4 c. m. lata.

Habitat in Panama et in latere orientali Andium Peruviae.

18. *Zamia Pöppigiana* Mart. et Eichl.

Mart. et Eichl. in fl. bras. IV. p. 414 tab. 109. — DC. prodr. XVI. II. pag. 540. — *Zamia parasitica* Pöpp. mss.

Truncus prostratus, radicans. Folia 12—14 jugo-pinnata. Petiolus inermis, acute triqueter, glaberrimus. Foliola falcato-lanceolata, apicem versus attenuato-acuta, utrinque ultra medium argute serrulata, 30—40 nervia, usque 34 c. m. longa et circiter 4 c. m. lata. Strobili pedunculati; masculi cylindracei, 20 c. m. longi et 4 m. m. in diametro.

Habitat in Peruvia orientali.

19. *Zamia Fischeri* Miq. (v. v.)

Miq. in horto Van Houtteano pag. 20 et in Linnaea pag. 428 tab. VII. fig. d. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 542.

Truncus humilis, crassus, multiceps. Folia usque 40 c. m. longa, 10—16 jugo-pinnata. Petiolus inermis rhachique initio laxe pilosus, demum glaber. Foliola lanceolata, acuta, a medio ad apicem argute serrulata, 10—16 nervia, 4—6 $\frac{1}{2}$ c. m. longa, 7—15 m. m. lata. Strobili breviter petiolati, tenuiter fusco-tomentosi; masculi subcylindrici, obtusi, circiter 3 $\frac{1}{2}$ c. m. longi; foeminei elliptici, 2 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{3}{4}$ c. m. longi, ex apice rotundato subito in conum brevem sterilem excurrentes.

Habitat in Mexico.

20. *Zamia obliqua* A. Br. (v. v.)

A. Br. in Monatsber. d. Ac. d. Wiss. Berl. 1875 pag. 376.

Truncus cylindricus. Petiolus inermis, teres, glaber. Foliola 2—6 juga, elliptico-lanceolata, basi in petiolum brevem attenuata, apice caudato-acuminata, a medio ad apicem spinuloso-denticulata, 25—30 nervia, 16—18 c. m. longa, 5 c. m. lata.

Habitat in Nova Granada, unde a cl. Wallisio in hortum Veitchianum allata.

21. *Zamia multifoliata* A. D. C.

D. C. prodr. XVI. II. pag. 545. — Z. stricta Griesb. cat. pl. Wright. pag. 217.

Folia cum petiolo et rhachi pilis demum evanescentibus pilosa, 43—61 jugo-pinnata. Perulae sericeae, acuminatae. Petiolus inermis, semiteres, supra canaliculatus, 25—30 c. m. longus. Foliola anguste linearia, subaequilonga, 3 nervia, acuminata, integerrima 11—12 c. m. longa, 1 $\frac{1}{2}$ —2 m. m. lata, rigida, patentia. Strobili pedunculati, tomentosi; masculi cylindrici, 6 c. m. longi, 1 $\frac{1}{2}$ c. m. in diametro; foeminei aequilongi et duplo crassiores, obtuse acuminati.

Habitat in Cuba orientali.

22. *Zamia angustifolia* Jacq. (v. v.)

Jacq. coll. III. pag. 263. — Jacq. ic. pl. rar. III. tab. 636. — Miq. mon. pag. 73. — Ejusd. Cyc. quaed. am. p. 1, tab. I. fig. A. — D. C. prodr. XVI. II. p. 544. — *Z. angustissima* Miq. Cyc. quaedam americ. pag. 4. tab. I. fig. 13. — D. C. prodr. XVI. II. 545. — *Z. linifolia* h. Pawl. — *Z. floridana* D. C. prodr. XVI. II. 544. — *Z. Yatesii* Miq. Cyc. quaed. am. pag. 2. tab. I. fig. C. — D. C. l. c. pag. 545. — *Z. stricta* Miq. Cyc. quaed. am. p. 3. — D. C. l. c. p. 545. — *Z. debilis* Lodd. bot. cab. tab. 155. (?)

Truncus humilis, subcylindricus v. plantarum juniorum ovoideo-conicus. Perulae e basi latiore in acumen villosum excurrentes. Folia glabra v. initio pilosa, 10—60 c. m. longa, 6—24-jugo-pinnata. Foliola anguste linearia, 3—10-nervia, integerrima v. apice denticulis parvis v. dentibus 1—3 manifestis, acuta v. obtusiuscula, 1½—6 m. m. lata, 5—24 c. m. longa.

Species valde variabilis. Specimina juniora v. non satis evoluta foliolis paucijugis angustissimis 3-nerviis integerrimis; specimina satis evoluta foliolis (foliorum interiorum) usque 24 jugis, 2—6 m. m. latis, 3—10-nerviis, apice minute denticulatis v. manifeste 2—3-dentatis. Strobili pedunculati; masculi cylindrici usque 7 c. m. longi et 2 c. m. in diametro; foeminei duplo crassiores, elliptici, in acumen obtusum conoideum attenuati.

Habitat in India occidentali et in Florida.

Variat:

α. *typica*; foliolis 4—20-jugis, 4—8-nerviis, apice obsolete denticulatis, 15—20 c. m. longis, 3—4 m. m. latis. *Z. angustifolia* Jacq. l. c.

β. *floridana*; foliolis 14-jugis, apice 4—5-dentatis, 7—10-nerviis, 8—9 c. m. longis, 3—5 m. m. latis. — *Z. floridana* D. C. l. c.

γ. *Yatesi*; foliolis 5—7-jugis, apice obsolete 2—3-dentatis, 5—6-nerviis. — *Z. Yatesii* Miq. l. c.

δ. *stricta*; foliolis 12—14-jugis, apice 1—2-dentatis, 3—5-

nerviis, 4—12 c. m. longis, 2 m. m. latis. — *Z. stricta* Miq.

ε. *angustissima*; foliolis 12-jugis, 3-nerviis, integerrimis. — *Z. angustissima* Miq. l. c.

X. *Bowenia* Hook.

Hook. bot. mag. tab. 5398. — F. Müll. fragm. phyt. austr. V. pag. 171. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 524.

Arbusculae humiles, Novae Hollandiae indigenae. Truncus nudus, humilis, crassus, subcylindraceus, lenticellis cicatricibusque petiolorum (perularumque) mox caducorum vestitus. Folia bipinnatisecta, unum post alterum provenientia, longe gracileque petiolata; lamina circumscriptione suborbiculari; segmenta primaria 1—3-juga, patentia, petiolata, simpliciter pinnata, inferiora bina usque quinata, superiora opposita; foliola pauci-plurijuga, parallelinervia, in petiolum brevem attenuata, cum rhachi non articulata. Strobili masculi parvi ovoidei squamae obovato-cuneatae, vix stipitatae, apice dilatato-truncatae et tomentosae, subtus ad medium antheriferae. Strobili foeminei squamae deltoideo-rhomboideae, peltatae, longe stipitatae.

Bowenia spectabilis Hook. (v. v.)

Hook. l. c. — *Dracontium polyphyllum* A. Cunningh. in pl. exs.

Petiolus teres, ima basi lanuginosus. Foliola glabra, multinervia, subdimidiata, lanceolata v. elliptico-lanceolata v. elliptica, integerrima, basin versus sensim in petiolum brevem attenuata, acuminata, 8—16 c. m. longa, 2—4 c. m. lata.

Petiolus laminam superans. Rhachis segmentorum primariorum 15—30 c. m. longa. Foliola 5—7-juga, nervis 15—30 curvatis furcatoque ramosis percursa.

XI. Macrozamia Miq.

Truncus humilis, crassus, specierum elatiorum 1—1½ m. altus, elliptico-cylindraceus, perulis persistentibus demum saepissime fibrosis onustus. Petiolus basi dilatatus exauriculatus. Folia unum post alterum provenientia, pinnata. Foliola lineari-lanceolata v. linearia, integerrima v. apice paucidentata, parallelinervia, basi non articulata et in axilla plus minus calloso-incrassata, suprema basi decurrentia. Squamae strobili masculi subtus antheriferae, apice acuminatae v. acutae sterilesque. Strobili foeminæ squamae basi pedunculatae, medium versus incrassatae et utroque latere uniovulatae, superne subito in acumen corniforme acuminatae.

Arbusculae Novam Hollandiam incolentes.

Conspectus specierum.

A. *Foliola integerrima, anguste lineari-lanceolata.*

1. *M. spiralis* Miq., rhachi nunquam torta, foliolis 6—10-nerviis.
2. *M. Preissii* Lehm., rhachi nunquam torta, foliolis 10—15-nerviis.
3. *M. corallipes* h. Bull., rhachi plus minus torta, foliolis 3—6-nerviis.

B. *Foliola integerrima anguste linearia.*

4. *M. Paulli-Guilelmi* E. Müll., foliorum rhachi torta.

C. *Foliola saepissime apice acute 2—3-dentata, linearia v. anguste lineari-lanceolata, 3—5-nervia.*

5. *M. tridentata* Rgl.

1. *Macrozamia spiralis* Miq. (v. v.)

Miq. mon. pag. 36. tab. 4. 5. — D. C. prodr. XVI. II. 535. — *Zamia spiralis* Salsb. prodr. pag. 401. — *Encephalartos spiralis* Lehm. pug. VI. pag. 13. — *Macrozamia Oldfieldii* D. C. prodr. XVI. II. pag. 535. — *Enceph. Oldfieldii* Miq. Cyc. Nieuw. Holl. pag. 8. — *Macroz.*

Macdonnellii F. Müll. fragm. austr. II. pag. 179. — D. C. prodr. XVI. II. 537. — Enceph. pungens Lehm. pag. 6. pag. 13. — Miqu. monogr. pag. 42 et in Linnaea XIX pag. 419. tab. 4. — Zamia pungens Ait. teste Miqu. prodr. pag. 18. — Macrozamia Hillii, M. eximia, M. pulchra, M. cylindrica, M. Fraseri, M. elegantissima, M. amabilis h. Bull.

Truncus humilis, initio ovatus v. ovato-conoideus, demum oblongo-subcylindricus, perularum foliorumque rudimentis fibrosis persistentibus subtomentosus. Folia usque 1 m. longa; petiolo rhachique subtus convexis, supra planiusculis, initio brevissime pilosis, mox glabris. Foliola multijuga (utrinque usque 30—60 et ultra), anguste lineari-lanceolata, integerrima, apice pungenti-acuta, basi in axilla plus minus calloso-in-crassata, 12—30 c. m. longa, 4—10 m. m. lata, 6—10-nervia, inferiora immutata v. rarius ad spinas reducta. Strobili glabri, masculi squamae cuspidato-acuminatae, foeminei squamae in acumen lanceolatum productae.

Habitat in Nova Hollandia australi et austro-occidentali.

Variat:

- α. *Hillii*; foliolis 4—8 m. m. latis, 6—7-nerviis, basi viridilutescentibus. M. Hillii h. Bull. — M. amabilis h. Bull.
- β. *eximia*; foliolis basi initio rubro-flavescentibus, demum viridiflavescentibus. Cetera ut var. α. M. eximia h. Bull.
- γ. *cylindrica*; foliolis usque 10 m. m. latis, 8—10-nerviis, basi flavo-viridibus. — M. cylindrica h. Bull. — M. elegantissima h. Bull.
- δ. *Fraseri*; trunco vix lanato, foliolis basi luteis. Cetera ut var. α. — Zamia Fraseri h. Van Houtte. — Macroz. pulchra h. Bull.

2. *Macrozamia Preissii* Lehm. (v. v.)

Lehm. in cat. horti Hambrg. 1842. — D. C. prodr. XVI. II. 535. — M. Fraseri Miqu. mon. pag. 37. — Encephalartos spiralis Miqu. mon. — Cycas Riedeli Gaudich. Freyc. p. 437. — Enceph. Preissii F. Müll. in Quart. journ. Pharm. Vict. II. p. 60. — Enceph. Fraseri

Miq. Cyc. Nieuw. Holl. p. 6. — *Macrozamia Preissii* Heinzel in Nov. Act. nat. cur. XXI. I. 203. tab. 10—13. — *Macrozamia grandis* h. Bull.

Praecedenti simillima, differt tantum foliis latioribus (usque 12 m. m. latis) 10—15-nerviis, strobilo masculino juniore fusco-lanato.

Habitat in Nova Hollandia austro-occidentali.

3. *Macrozamia corallipes* h. Bull. (v. v.)

W. Bull. cat. 1873. cum icone. — Hook. bot. mag. tab. 5943.

Truncus crassus, ovato-conicus, lanatus. Petiolus rhachisque initio puberula, mox glabra. Rhachis plus minus torta; supra planiuscula, bisulca. Foliola glauca, late linearia, integerrima, spinescenti-acuta, usque 20 c. m. et ultra longa, 5—8 m. m. lata, basi in axilla paullo callosocrassata et ibidem rubra v. rubro-lutescentia; intermedia 6-nervia, inferiora 3-nervia. Strobilus masculus glaucus, glaber, cylindraceus, 13—18 c. m. longus, squamis basilaribus muticis, intermediis mucronatis, superioribus acumine suberecto rigido ornatis, omnibus latere inferiore antheriferis. Strobilus foemineus ovoideus 9—12 c. m. longus; squamis inferioribus acutis, superioribus subito longeque acuminatis.

Habitat in Novae Hollandiae provincia New South Wales.

4. *Macrozamia Paulli-Guilelmi* F. Müll. (v. v.)

F. Müll. fragm. phyt. austr. I. pag. 86. 243 et II. pag. 179. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 536. — M. plumosa h. Bull. — Enceph. Paulli Guilelmi F. Müll. in Quart. journ. pharm. soc. Vict. II. pag. 91. — Miq. Cyc. Nieuw. Holl. pag. 12.

Truncus ovato-conoideus, lanatus. Folia usque 1 m. longa, glauca. Petiolus supra planus, basi lanatus. Rhachis spiraliter torta. Foliola multijuga, anguste linearia, pungenti-acuta, integerrima, usque 25 c. m. longa, 2 m. m. lata, saepissime 4-nervia, rarius 3—5-nervia. Strobili glabri; squamae strobili foeminei semilunato-reniformes, subito in acumen patens brevis productae.

Habitat in Nova Hollandia austro-occidentali.

5. *Macrozamia tridentata* Rgl. (v. v.)

Encephalartos tridentatus Lehm. pug. 6. pag. 13. — Miq. mon. pag. 45. tab. 6. — D. C. prodr. XVI. II. pag. 533. — *Zamia tridentata* Willd. spec. IV. 845. — *Macrozamia* Miqueli D. C. prodr. XVI. pag. 545. — *Encephalartos* Miqueli F. Müll. frag. phyt. austr. III. pag. 38.

Truncus? Petiolus et rhachis teretia. Folia plantarum juniorum 40—50 c. m. longa, plurijuga. Foliola basi vix callosa, linearia v. anguste lineari-lanceolata, subpungenti-acuta, 2—6 m. m. lata, 6—10 c. m. longa, 3—5-nervia, sub apice 2—3-dentata, dentibus subspinescenti-acutis. Folia speciminum satis evolutorum longiora, multijuga, foliolis usque 16 m. m. latis et 25—40 c. m. longis (teste Müllero). Rhachis torta v. non torta. Foliola inferiora immutata v. ad spinas paucas reducta. Strobili masculi 6—10 poll. longi, 1—1½-poll. lati, cylindrici, glabri; squamis inferioribus submuticis, mediis breviter cuspidatis, superioribus subito longeque cuspidatis.

Variat:

α. *typica*; foliolis late linearibus, 2—6 m. m. latis, 6—12 c. m. longis, 3—4-nerviis. — *Zamia* Miqueli et *Ceratozamia* Miqueli hortus Adelaidensis. — *Macroz.* tenuifolia hort.

β. *oblongifolia*; foliolis anguste lineari-lanceolatis, 4—5-nerviis, 6—16 m. m. latis, 25—40 c. m. longis. — M. Miqueli D. C. l. c.

II. GENERIS EVONONYMI SPECIES FLORAM ROSSICAM INCOLENTES.

A. *Folia linearia*.

1. *E. nana* M. B.

B. *Folia lanceolata usque ovalia*.

a. *Rami laeves*.

2. *E. europaea* L., capsula 4-v. rarius 3-v. 5-loba.

3. *E. latifolia* Scop., capsula 5-v. rarius quadrialata, alis latioribus quam latis.

4. *E. alata* Thunbrg., capsula 1—3 alata, alis oblongis plus duplo longioribus quam latis.

b. *Rami verrucosi*.

5. *E. verrucosa* Scop.

1. *E. nana* M. B. Cfr. Ledb. fl. ross. I. 499.

E. angustifolia hort.

2. *E. europaea* L. spec. 286.

α. *typica*: glabra v. subglabra; foliis lanceolatis v. ovato-lanceolatis v. rarius obovatis v. ovatis.

E. europaeus Ledb. fl. ross. I. 497. — *E. vulgaris* Gardn. dict. n. 1. — *E. europaea angustifolia* et *macrophylla* Rehb. ic. fl. germ. VI. tab. 360. — *E. Maakii* Rupr. Bull. Ac. Petr. XV. 358. — Maxim. prim. p. 75.

β. *Semenovii*; foliis lanceolatis, parvis, incluso petiolo 3—4 c. m. longis; pedunculis tenuibus post anthesin nutantibus. *E. Semenovi* Herder in pl. Semenov. n. 202.

γ. *puberula*; foliis laxè puberulis.

δ. *velutina*; ramis foliis pedunculis capsulisque dense puberulis.

E. velutinus Fisch. Mey. in Hoh. enum. Talüsch. p. 101. — Ledb. fl. ross. I. 497.

ε. *fimbrillifera*; foliis subtus puberulis, florum disco margine interdum fimbrillifero.

E. fimbrillifera Fisch. Mey. l. c. p. 102. — Ledb. l. c. pag. 498.

3. *E. latifolia* Scop.

Scop. fl. carn. I. pag. 165. — Ledb. fl. ross. I. 498. — *E. Sieboldianus* Schmidt. fl. sachal. n. 99. (lusus foliis subtus laxè pilosis). — *E. latifolius* β. *sacchalinensis* Schmidt fl. sachal. n. 98. (lusus capsularum alis capsulam subaequantibus). — *E. macropterus* Rupr. pl. Maak. n. 24. (lusus capsularum alis capsulae diametro paullo longioribus).

4. *E. alata* Thbrg.

Thbrg. fl. jap. p. 98. — Maxim. prim. fl. amur. p. 73. —
Rgl. fl. uss. pag. 487. — *E. Thunbergiana* Blume Bjdr.
1147.

5. *E. verrucosa* Scop.

Scop. fl. carn. I. 166. — Ledb. fl. ross. I. 498.

III. RHAMNI SPECIES IMPERIUM ROSSICUM INCOLENTES.

Rhamnus cathartica L. γ . *coriacea*.

Frutex humilis, ut videtur $1\frac{1}{2}$ —3 pedalis, spinosissimus, ramis patentissimis rigidis. Folia cuneato-spathulata, acutiuscula v. saepissime rotundato-obtusa, argute serrulata, nervis lateralibus utrinque 2—3 arcuato sub ad apicem adscendentibus percursa, demum coriacea, glabra, excluso petiolo 10—17 m. m. longa, serraturis glandula subulata terminatis.

Calyx tubo campanulato, latiore quam longo; limbo quadrifido. Druparum immaturarum exsuccarum subglobosarum pyrenae cartilagineae, dehiscentes, facile a druparum tegumento secedentes; druparum maturarum nigro-carnosarum pyrenae carne seminibusque adglutinatis. Semina oblonga, sulco lato longitudinali aperto.

Habitat in alibis turkestanicis, 2000—12000' alt. supra mare.

Um die in Rede stehende Form des *R. cathartica* L. mit Sicherheit festzulegen, habe ich eine genaue Revision aller der nah verwandten *Rhamnus* Asiens und Europas vornehmen müssen. Dabei bin ich zu dem Resultate gekommen, dass fast alle gemeinlich zur Unterscheidung der Arten dieser ausserordentlich schwierigen Gattung benutzten Charaktere entweder durchaus wandelbar, oder so künstlicher Natur sind, dass durchaus gleichartige Formen durch dieselben zu verschiedenen Arten getheilt werden.

Die *Rhamnus* nehmen je nach Standort und Klima verschiedene Gestalten an. So z. B. ist *R. cathartica* auf gewöhnlichem nahrhaften Boden und freiem Standort ein hoher Strauch, dessen Aeste in Dornen ausgehen. Auf üppigem Waldboden und zwischen andern Sträuchern wachsend ver-

lieren sich die Dornen. Auf magerm felsigen Boden und freiem Standort unter dem Einfluss der trockenen heissen Sommer des südlichen Europas und des mittlern Asiens, bleibt der Strauch klein, bekommt ein sehr sparriges Wachsthum und viele starre Dornen, — und die Alpen hinaufsteigend sinkt er bis zum zwergigen Strauch hinab. Einen ähnlichen Unterschied im Wachsthum zeigt *R. alpina* unter gleichen Einflüssen, nur dass diese Art nie Dornen trägt und auf den Alpen bis zum niederliegenden Strauch herabsinkt.

Die Blätter geben einen guten sichern Charakter, der die ächten *Rhamnus* von den *Frangula*-Arten unterscheidet. Bei den ächten *Rhamnus* steigen die Seitennerven nämlich bogig aufwärts fast bis zur Spitze des Blattes, bei den *Frangula* verlaufen sie parallel und schief nach dem Blattrand und anastomisiren da. Die Blattform ist dagegen sehr wechselnd und geht z. B. bei *R. cathartica* und *R. alpina* von der lanzettlichen oder keilförmig-spathelförmigen Gestalt, bis zur ovalen oder rundlichen Form über. Dagegen habe ich die lineare oder schmal länglich-lineare Gestalt der Blätter von *Rhamnus Erythroxylon* und verwandten Arten, nicht zu der breitem Blattform übergehen sehen, ebenso dürfte der nichtgezähnte Blattrand einen guten Unterschied gegenüber dem gezähnelten Blattrand gewähren. Die Behaarung der Blätter wechselt bei den Formen des *R. alpina* sehr bedeutend. Das gleiche ist bei dieser vielgestaltigen Art mit der Grösse der Blätter der Fall, die bei den Formen der Hochalpen nur einige Centimeter lang, während sie im Garten und unter dem Einfluss des warmen feuchten Climas bis 18 C. M. lang werden.

Die Blumen bieten keine haltbaren Charaktere. In der Form der Kelchröhre, ob dieselbe breiter als lang oder wie bei *R. tinctoria* W. et K. mehr kreiselförmig und länger als breit, glaubte ich erst einen guten Unterschied gefunden zu haben, später überzeugte ich mich aber, dass das selbst beim gleichen Exemplare nicht constant ist.

Als der wichtigste Charakter zur Unterscheidung der Arten, gilt gemeiniglich die Vier- oder Fünffzahl der Blumen und ob der Griffel vorn in Aeste getheilt oder die Griffel bis zur Spitze lose mit einander verwachsen und sonach der Griffel ungetheilt erscheint.

Leider können wir auch in diesen Charakteren keine Unterschiede für die Arten erkennen. Denn die *Rhamnus* sind meist polygamisch, die unvollkommen ausgebildeten Fruchtknoten tragen auch bei *R. cathartica* ungetheilte Griffel und die 4 und 5 Theilung der Blume wechselt bei den ganz übereinstimmenden Formen von *R. alpina*. So unterscheidet unser scharfer deutscher Diagnostiker Koch, *R. rupestris* Scop. durch 5-zählige Blumen von *R. alpina* und *R. pumila*. Scopoli selbst beschreibt aber seinen *R. rupestris* mit 4—5-zähligen Blumen und charakterisirt denselben nur durch Blattform und Behaarung. Wie bei *Primula*, *Oxalis* und andern, finden sich in Bezug auf Zahl und Theilung des Griffels dimorphe Formen bei ganz der gleichen, vom Standort und Klima bedingten Form.

Noch auffallender war es mir, dass ein anderer noch auffallenderer Charakter, durchaus unbeständig ist. Fischer hat eine hochwachsende grossblättrige Form des Caucasus von *R. alpina*, nach der Grösse der Blätter, besonders aber dadurch unterschieden, dass dieselbe nicht einblumige in den Blattachseln gehäufte Blüthenstiele, sondern von besonderm allgemeinen Blüthenstiel getragene Blüthendolden besitzt. Aber auch das hält nicht Stand. Wir besitzen ganz genau die gleiche Form aus dem Caucasus mit einblumigen gehäuften achselständigen Blüthenstielen, während an andern Exemplaren, ein entweder sehr kurzer oder längerer deutlicher allgemeiner Blüthenstiel, die bündelförmigen Blüthenstielchen als Dolde emporträgt.

Die Samen der *Rhamnus* besitzen eine Längsfurche, die entweder geschlossen, oder etwas oder stärker geöffnet ist und zuweilen noch einen kurzen flügelartigen durchgehenden oder unterbrochenen Rand trägt. Hier nach hat Koch mehrere Arten von *R. cathartica* zu unterscheiden gesucht. Es ist mir aber nicht gelungen hierin einen andern als einen rein künstlichen Charakter zu finden, der natürlich zusammen gehörige Formen wieder scheiden würde.

C. Maximowicz hat in seiner höchst exacten und genauen Arbeit über die *Rhamnus* Ostasiens, noch auf einen andern auffallenden Unterschied in der Frucht der Formen von *R. cathartica* aufmerksam gemacht.

Es wächst nämlich von Dahurien an durch China bis zu den Hochgebirgen Ostindiens, eine mit unserm gewöhnlichen *R. cathartica* übereinstimmende Form. Die uns vorliegenden nicht ganz gereiften Früchte sind trocken. Die Früchtchen lösen sich leicht aus der Fruchthülle und springen mit einem Längsspalt auf und auch die Samen lösen sich leicht aus den Früchtchen heraus, während bei unserer *R. cathartica*, die Fruchthülle mit den Früchtchen (*pyrenae*) ziemlich verwachsen, so dass sie schwer loszulösen und die Früchtchen auch nicht aufzuspringen scheinen. Maximowicz unterscheidet diese erstere Form Asiens als *Rh. virgata Roxbrg.* und auch ich glaubte, dass man hiernach und wie es schien, darnach dass die Früchte derselben nicht fleischig würden, diese *R. virgata* trotz ihrer ausserordentlichen Aehnlichkeit mit der gemeinen *R. cathartica*, dennoch spezifisch unterscheiden müsse. Die von mir oben beschriebene Form Turkestans, hat mich eines anderen belehrt, denn es liegen mir von derselben Exemplare mit nicht ganz reifen Früchten vor, die sich ganz verhalten wie die Früchte von *R. virgata* und solche mit reifen Früchten, die sich verhalten wie die Früchte von *R. cathartica*.

Nach diesen vorausgesendeten Bemerkungen lassen wir die Uebersicht der *Rhamnus*-Arten der Flora des Russischen Reiches folgen, wobei wir die dazu gehörigen Formen Europas und Nordamerikas berücksichtigt haben. Um Missverständnisse zu vermeiden, erkläre ich, dass ich dagegen nichts einzuwenden habe, wenn andere Botaniker die von mir aufgeführten Formen für gute Arten annehmen, meine persönliche Ueberzeugung ist es aber, dass *R. cathartica* und *R. alpina* zu denjenigen Pflanzenarten einer sehr weiten Verbreitung gehören, die bei ihren Wanderungen von den Alpen durch verschiedene Zonengebiete, eben jene grosse Zahl von Formen gebildet haben.

Conspectus specierum Rhamni Imperium rossicum incolentium.

A. *Foliorum nervi laterales arcuato sub ad apicem folii adscendentes.*

1. *R. cathartica* L., foliis oblongo-spathulatis usque ovatis v. subrotundis.

2. *R. Erythroxylon* Pall., foliis oblongis usque linearibus.
 B. *Foliorum nervi laterales oblique paralleli et ante marginem anastomosantes.*
 3. *R. Frangula* L., foliis integerrimis.
 4. *R. alpina* L., foliis margine serrulatis.

Enumeratio specierum generis *Rhamni*.

1. *R. cathartica* (L. spec. 279.)

Frutex humilis v. pygmaeus usque ad 15 pedes altus, ramis ramulisque spinescentibus v. rarius inermibus. Folia elliptica v. ovato-subrotunda usque oblongo-spathulata, apice saepe acuminata v. rarius obtusa, utrinque nervis 2—6 lateralibus arcuato sub ad apicem adscendentibus percursa, serrulatis, initio breve laxaque pilosulis, demum glabris; serraturis obtusis v. glandula subulata terminatis. Calyx quadrifidus. Stylus florum fertilium apice 2—4 fidus. Drupa globosa, baccata, nigra, 2—4-pyrena.

Conspectus varietatum *Rh. catharticae*.

- A. *Frutices saepissime spinosi, 10—15 pedes alti.*
 a. *Folia ovato-subrotunda usque lanceolata.*
 * *Pyrenae ad drupae integumenta adhaerentes, indehiscentes.*
 α. *typica*; foliis utrinque 3—4-nerviis.
 β. *intermedia*; foliis utrinque 4—6-nerviis.
 ** *Pyrenae cartilagineae, a drupae integumentis facile secedentes, rima longitudinali dehiscentes.*
 γ. *virgata*; foliis utrinque 4—6-nerviis.
 B. *Frutices inermes, 10—15 pedes alti. Folia elliptica v. oblongo-elliptica, utrinque 4—6-nervia.*
 δ. *dahurica.*
 C. *Frutices humiles 1—5-pedales, divaricato-ramosi, spinosissimi v. spinis rarioribus armati.*

a. *Calycis tubus campanulatus, latior quam longus. Pyrenae ad drupae integumenta adhaerentes, indehiscentes.*

ε. *infectoria*; foliis oblongo-ellipticis usque ovato-subrotundis, utrinque 2—4-nerviis.

ζ. *spathulifolia*; foliis spathulato-oblongis, utrinque 3—4-nerviis.

b. *Calycis tubus campanulatus, latior quam longus. Pyrenae cartilagineae, a drupae integumentis facile sedentes, rima longitudinali dehiscentes.*

η. *parviflora*; foliis ellipticis v. ovatis, acuminatis, utrinque 3—4-nerviis.

θ. *coriacea*; foliis cuneato-spathulatis, saepissime rotundato-obtusis, utrinque 2—3-nerviis.

c. *Calycis tubus turbinatus, longior quam latus.*

ι. *saxatilis*; foliis lanceolatis usque ovatis, utrinque 2—4-nerviis.

Enumeratio varietatum *Rh. cathartici*.

R. cathartica α. *typica* (Maxim. Rhamneae orientali-asiaticae pag. 8).

Frutex 10—15 pedes altus, saepissime valde spinosus. Folia elliptica v. ovato-rotundata v. rarius lanceolato-elliptica, saepe acuminata, utrinque 3—4 nervia. Calycis tubus campanulatus, latior quam longus. Pyrenae druparum integumento seminibusque adhaerentes, indehiscentes. Semina sulco clauso v. anguste aperto.

Habitat in Europa et in Asia media.

R. cathartica L. et auct. — Ledb. fl. ross. I. pag. 508. — DC. prodr. II. p. 24. — Guimpel deutsche Holzgew. tab. 13. — Engl. bot. tab. 1629. — Lam. encycl. tab. 128. — Fl. dan. tab. 850 etc. *R. Wilhorr* Lucé fl. os. p. 62. (*R. Wikklus* hort.)—*R. spinosus* Gilib. fl. lithuan. V. p. 132. — *R. solutivus* Erndt. virid. waraw. pag. 104. — *R. petiolaris* Boiss. et Balansa.

Folia majora 5—7 c. m. excluso petiolo longa, omnia simpliciter v. duplicato crenato-serrulata, serraturis saepe mucrone glanduliformi brevi fusciscenti v. nigrescenti inverso terminatis.

- β. *intermedia* (Maxim. l. c.). Folia elliptica usque ovata v. rotundato-ovata, majora excluso petiolo usque 9 c. m. longa; nervis lateralibus utrinque 4—6. — Cetera ut praecedentis.

Habitat in regione amurensi.

- γ. *virgata*. Folia elliptica usque rotundato-ovata; lamina usque 7 c. m. longa, nervis lateralibus 4—6 percursa. Pyrenae cartilagineae, a drupae integumentis facile secedentes, rima longitudinali dehiscentes. Semina libera, sulco apice clauso a medio hiant. Cetera ut var. α. — R. *virgata* α. *sylvestris* R. Rhamn. pag. 13. — Rh. *virgatus* Roxb. fl. ind. II. 551. teste Maxim. — R. *globosus* Bnge. enum. Chin. p. 14. — R. *polymorpha* Turcz. fl. baic. dah. I. p. 269. ex parte. — R. *davurica* var. Turcz. pl. exs. dah.

Habitat in regione amurensi, in China et India orientali.

Habitu foliorumque statura etc. omnino cum var. α. congruit.

- δ. *davurica* (Maxim. Rhamn. pag. 9). Inermis. Folia oblongo-elliptica v. rarius elliptica, saepissime acuminata, utrinque nervis lateralibus 4—6 percursa, saepissime acuminata, majora usque 9 c. m. longa.

Habitat in Sibiria transbaicalensi, in Dahuria, in regio amurensi et in China boreali.

R. *davurica* Pall. it. III. app. n. 77. — Ejusd. fl. ross. II. 24 tab. 61. — D. C. prodr. II. 24. — Ledeb. fl. ross. I. tab. 502.

- ε. *infectoria*. Frutex 3—5-pedalis, spinosissimus, divaricato-ramosissimus. Folia elliptica, oblongo-elliptica v. ovato-subrotunda, obtusa v. acuta v. breviter acuminata; lamina 8—23 m. m. longa, utrinque nervis lateralibus 2—4 percursa. Cetera ut var. α.

Habitat in Europa australi, in Caucaso et in Oriente.

R. infectoria L. mant. 49. — D. C. prodr. II. p. 24. — Ledb. fl. ross. I. 502. — *R. minor* Mill. dict. n. 2. — *R. tinctoria* Guimpel fr. Holzgew. tab. 97. — *R. saxatilis* Guimpel l. c. tab. 98.

- ζ. *spathulifolia*. Frutex 4—5-pedalis, spinis raris armatus. Folia oblongo-spathulata v. oblongo-lanceolata, basin versus cuneata, acuta v. obtusa; lamina $1\frac{1}{2}$ —6 c. m. longa, nervis lateralibus utrinque 3—4 percursa. Cetera ut var. α.

Habitat in Caucaso.

R. spathulaefolia Fisch. et Mey. ind. sem. h. Petr. IV. p. 46. — Ledb. fl. ross. I. 502.

- η. *parviflora*. Frutex humilis, valde spinosus. Folia elliptica v. ovata v. ovato-subrotunda, acuminata v. acuta v. rotundato-obtusa, utrinque 3—4-nervia, excluso petiolo 1— $3\frac{1}{2}$ c. m. longa, crenulato-serrulata; serraturis glandula mucroniformi brevi saepissime terminatis. Calycis tubus campanulatus, latior quam longus. Drupa ut var. γ. Semina libera, sulco plus minus hiant.

Habitat in Dauria et in China boreali.

R. parvifolia Bnge. enum. Chin. p. 14. — Maxim. Rhamnus p. 16. — *R. virgata* β. aprica Maxim. Rham. p. 14. — *R. polymorpha* Turcz. fl. baic. dah. I. 269 ex parte.

- θ. *coriacea* Rgl. Cfr. supra. Dignoscitur a varietate praecedenti foliorum demum coriaceorum cuneato-spathulorum serraturis glandula subulata terminatis, seminibus sulco lato aperto.

- ι. *saxatilis*. Frutex humilis, spinosissimus, divaricato ramosus. Folia lanceolata v. anguste lanceolata v. rarius ovata, utrinque 3—4-nervia. Calycis tubus turbinatus, longior quam latus. Cetera ut var. ε.

Habitat in Europa media et australi.

R. saxatilis L. spec. 1671. — D. C. prodr. II. 24. — *R. tinctoria* W. et K. pl. hung. rar. III. tab. 255. — *R. longifolia* Mill. gardn. dict. n. 3. — *R. infectoria* Guimpel fr. Holzgew. tab. 99.

2. *R. Erythroxylon* Pall.

Pall. it III. app. p. 72. n. 78. tab. T. fig. 1. — Ledb. fl. ross. I. 503. — Pall. fl. ross. II. pag. 26. tab. 43. — R. Pallasii Fisch. Mey. ind. sem. h. Petr. IV. pag. 46. — Ledb. fl. ross. I. 503. — R. lycioides Pall. it. III. pag. 591.

Habitat in Caucaso et in Sibiria australi.

Foliis linearibus v. oblongo-linearibus serrulatis eximia. R. lycioides L. et R. velutina Boiss. foliis integerrimis facile dignoscuntur.

3. *R. Frangula* L.

L. spec. 280. — D. C. prodr. II. p. 26. — Ledb. fl. ross. I. 503. — Guimpel deutsch. Holzg. tab. 14. — Schrank fl. monac. tab. 109. — Fl. dan. tab. 278. — Engl. bot. IV. tab. 250.

Habitat in Europa et in Sibiria.

4. *R. alpina* (L. spec. ed. I. pag. 193).

Frutex polymorphus, inermis, nunc 4—8-pedalis erectus, — nunc pygmaeus ramis terram appressis. Folia lanceolata usque late ovata v. ovato-subrotunda, margine serrulata, glabra v. praecipue subtus ad nervos plus minus fusco-pilosa, utrinque nervis oblique parallelis 5—30 ante marginem anastomosantibus percurta. Pedunculi saepissime uniflori et in foliorum axillis fasciculati, — rarius flores in pedunculorum solitariorum axillarium apice in umbellas pauci-pluriflores collocati. Calyx tubo campanulato, limbo 4—5 fido. Petala staminaque tot, quot calycis segmenta. Stylus apice indivisus v. 2—3-fidus. Semina sulco clauso. Foliis serrulatis a R. Frangula differt.

Variat:

α. *pygmaea*. Frutex pygmaeus, glaber, ramosissimus, dense caespitosus; ramis terram adpressis; foliis lanceolatis v. elliptico-lanceolatis, utrinque 4—6-nerviis. Folia 1—4 c. m. longa. Pedunculi uniflori.

Habitat in alpihus Europae occidentalis.

R. pumila L. mant. 49 ex parte.

β. *rupestris*. Frutex humilis, ramosissimus, usque 2 pedes altus; foliis ovatis v. ovato-subrotundis, saepissime obtusis, 2—3½ c. m. longis, utrinque 4—7-nerviis, junioribus subtus ad nervos dense breviterque ferrugineo-pilosis, demum saepe glabrioribus.

Habitat in alpibus austriacis.

R. rupestris Scop. fl. carn. p. 164. tab. 5. — *R. rumeliaca* Friv. in Fl. XVIII. 332.

γ. *pumila*. Frutex humilis, ramosissimus, usque 2 ped. altus; foliis ovatis v. oblongo-ovatis, saepissime acutis, utrinque 6—9-nerviis. — Folia subtus glabra v. ad nervos ferrugineo-hirtula, usque 4½ c. m. longa.

Habitat in alpibus Europae australis et in Caucaso.

R. pumila L. mant. I. 49. — Wulff in Jacq. collect. II. 141. tab. 11. — *R. Wulffeni* Sprgl. syst. I. 768. — *Frangula Wulffeni* Rehb. fl. exc. II. 488. — *R. rupestris* Vill. hist. dauph. II. 531. — Ledb. fl. ross. I. 503 et herb. — *R. Villarsii* Sk. Handb. II. 120. — *Frangula rotundifolia* Mill. dict. n. 3.

δ. *alpina*. Frutex 4—6 ped. altus; foliis ovatis v. oblongo-ovatis, saepe paullo acuminatis, rarius obtusis, 4—13 c. m. (excluso petiolo) longis, utrinque 9—16-nerviis, subtus v. omnino v. ad nervos tantum breviter ferrugineo-pilosis v. demum glabris; pedunculis unifloris.

Habitat in montibus Europae mediae et australis, idem in Caucaso.

R. alpina L. spec. I. 193 et auct. — *Frangula latifolia* Mill. gardn. dict. n. 3. — *Alaternus alpinus* Mœnch. meth. 344. — *R. cornifolia* Boiss. et Hoh., *R. libanotica* Boiss., *R. fallax* Boiss., *R. Sibthorpiana* D. C. (cfr. Boiss. fl. or. II. p. 19 et 20, et *R. Crini* Orph. pl. exs. mea sententia varietates plus minus dense pubescentes v. tomentellas exhibent.

ε. *grandifolia*. Frutex 6—8 pedalis; foliis maximis usque 18 c. m. longis, ovatis v. oblongo-ovatis, utrinque 15—30-nerviis, subtus saepe pubescentibus; pedunculis unifloris, glomeratis v. pedunculo solitario apice umbella pauci-pluriflora terminato. — Folia subtus totidem v. ad nervos tantum pilosa.

Habitat in Caucaso, in insulis azoricis et in America boreali.

R. grandifolia Fisch. Mey. in Hoh. enum. Talüsch. p. 99. — Ledb. fl. ross. I. 504. — *R. latifolia* seurt. angl. V. tab. 8. — *R. Purshiana* DC. prodr. II. 25. — *R. alnifolia* Prsh. fl. am. septr. I. 166.

IV. REVISIO SPECIERUM VARIETATUMQUE GENERIS FUNKIA.

Funkia Sprgl.

(Baker Journ. of Linn. Soc. XI. pag. 366.)

A. *Bracteae geminatae, bractea interiore minore.*

1. *F. subcordata Sprgl.*

B. *Bracteae solitariae.*

2. *F. Sieboldiana Hook.*, foliis late cordato-ovatis, glaucis, coriaceis.

3. *F. ovata Sprgl.*, foliis e basi rotundata v. subcordata ovatis v. late ovatis, viridibus, herbaceis.

4. *F. lancifolia Sprgl.*, foliis lanceolatis, basin versus sensim attenuatis, viridibus, herbaceis.

1. *Funkia subcordata Sprgl.* Cfr. Baker l. c.

2. *Funkia Sieboldiana Hook.* bot. mag. tab. 3663. — Bot. reg. 1839. tab. 50. — Hemerocallis Sieboldiana Bot. cab. tab. 1869.

α. *typica*, floribus pallide violaceis, 5—5½ c. m. longis, tubo limbum aequante. — Folia late cordato-ovata v. basi rotundata, infra ad nervos laevia v. scaberula. — *F. Sieboldiana* hort. — *F. glauca* hort. — *F. grandiflora* hort.

β. *Fortunei*; floribus albidis, 3—3½ c. m. longis, tubo quam limbus brevior. — Folia rotundato-cordata, pruina alba eximie glauca. — F. *Fortunei* h. Leichtl. — F. *Sieboldiana* β. *Fortunei* Grtfl. tab. 867.

3. *Funkia ovata* Sprgl. syst. II. 40. — Hemerocallis coerulea Andr. bot. rep. tab. 6. — Bot. mag. tab. 894.

α. *typica*; foliis viridibus, e basi rotundata ovatis, utrinque 5—6-nerviis; floribus violaceis. (Bot. mag. tab. 894.)

β. *latifolia*; foliis viridibus, e basi cordata v. subcordata late ovatis v. subcordatis, plus minus undulatis, utrinque 7—9-nerviis.

γ. *aureo-variegata hort. Sieb.*, foliis var. β. similibus sed flavo-viridi — pictis v. flavo-viridibus et atroviridi striatis.

δ. *albo-marginata*; foliis ut var. β. attamen margine anguste argenteo-marginatis.

ε. *latemarginata*; foliis maximis, e basi rotundata ovatis, valde undulatis, utrinque latere 9-nerviis, late argenteo-marginatis.

ζ. *discolor*; foliis maximis, ovato-lanceolatis, paullo undulatis, utrinque 9—10-nerviis, flavo-viridibus et atroviridi pictis.

4. *Funkia lancifolia* Sprgl. syst. II. 41.

α. *typica*; folius lanceolatis v. undulatis, viridi-nitentibus.

β. *lutescens*; foliis lanceolatis, vix undulatis, viridibus, luteo-viridi pictis.

γ. *albo-marginata*; foliis ut var. α. attamen anguste argenteo-marginatis.

F. *albo-marginata* Hook. bot. mag. tab. 3657. — F. *cucullata albo-marginata* h. Haage et Schm.

δ. *undulata*; foliis ut var. α., valde undulatis autem striaque intermedia latissima argentea percursis.

F. *undulata* Otto et Dietr. Gartzt. 1833. pag. 120. — Knth. enum. IV. 592.

ε. *angustifolia*; foliis anguste-lanceolatis, viridibus, planiusculis, sensim ad petioli basin angustatis.

V. DESCRIPTIONES PLANTARUM IN HORTO BOTANICO PETROPOLITANO CULTARUM.

1. *Anthurium cristallinum* Linden.

A. regale Linden et André in Lind. cat. 1873 n. 90. — Illustr. hort. 1873 tab. 128.

Caudice crasso, brevissimo; petiolis e basi vaginante teretibus, laminam subaequantibus, apice geniculo paullo incrassato cylindrico curvato; lamina ampla, cordato-ovata, paullo acuminata, basi sinu angusto saepissime clauso, palmato 7—9-costata; costis supra prominentibus; costa intermedia utrinque nervis tribus lateralibus non prominentibus; costis basilaribus mox a margine remotis, simplicibus, non prominentibus; scapo folia plus duplo superante; spatha lineari-oblonga, acuminata, viridi, reflexa; spadice cylindrico, basi stipitato, a basi ad apicem obtusum paullo attenuato.

A. regale Linden cat. 1866 (n. 20) pag. 2, foliorum sinu basilari late aperto, costae intermediae nervis lateralibus supra prominentibus, costis basilaribus sinum marginantibus latisque unilateraliter nervosis, nervis supra prominentibus facile dignoscitur.

2. *Begonia* (*Rosmannia*) *Ræzli* Rgl.

Caule crasso, erecto; ramis paucis, apice foliatis; foliis oblique cordato-ovatis, angulato-sublobatis, palmato 8-nerviis, petiolum glabrum superantibus, margine irregulariter-dentatis, utrinque glabris dentibus in pilum brevem excurrentibus; pedunculo folia superante, glabro, apice iterato-trichotomo; floribus masculis sepalis duobus reniformi-subrotundis, petalis nullis; antheris oblongis, truncato-obtusis, filamenta subaequantibus; floribus foemineis dipetalis, petalis reniformi-subrotundis; stylis tribus, profunde bifidis; ramis linearibus, spiraliter flexuosis, fascia stigmatosa marginali continua. — Folia supra laete viridia, basi ad petioli insertionem macula rubra. Flores ex albido carnei. — Semina misit cl. Ræzl e Peruvia.

3. *Calathea undulata*.

Rgl. Grtfl. 1876 tab. 852. — *Maranta undulata* Linden et André in Linden cat. № 87 anno 1871 pag. 4.

Herba perennis, pumila, caespitosa. Folia petiolata; petiolus apice latere inferiore puberulus, caeterum glaber, 4—5 c. m. longus, a basi supra medium in vaginam ampliatus; lamina oblongo-elliptica v. subelliptica, obtusa, undulata, glabra, inaequilatera, supra nitida, viridis et ad costam mediam alba, infra purpurascens, 8—10 c. m. longa, 4 c. m. et ultra lata. Spicae pedunculus pallide viridis, basi puberulus, caeterum glaber, 5—7 c. m. altus. Spica terminalis, solitaria, obconoidea, capitata, circiter 1½ c. m. longa. Bracteae circiter 5, vaginantes, glabrae, limbo patente ovato-subrotundo acutiusculo. Flores gemini, ad bractearum basin internodii inserti, basi bracteolis crebris albidis involuti. Bracteola exterior vaginata, dorso bicarinata, interiores ovatae usque lineares. Sepala 3, anguste lanceolato-lineariter, acuta, corolla subduplo breviora. Petala cum staminodiis in tubum angustum glabrum sepalis paullo longiorem connata, glabra, alba, ovato-oblonga, acuta. Stamina externum lanceolatum, interna cum stamine fertili connata.

Habitat in Ecuador.

Affinis *C. micanti* Körnck. et *C. microcephalae* Körnck. Prior foliis minoribus angustioribus acutis v. acuminatis, bracteis ad basin capitularum tantum duabus atque non vaginantibus, — altera foliis concoloribus superne breviter acuminatis, — dignoscuntur. *Calathea micans* (*Maranta cinerea* Linden cat. n. 87 anno 1871 pag. 22) species adhuc indescripta, cui species nostra valde similis, differt «foliis stria intermedia destitutis striisque pallidioribus lateralibus ornatis, brevissime obsoleteque puberulis v. supra in nervo medio pilositate barbata, bracteis tribus ad basin capitulorum, vaginatis, pilosis».

4. *Calochortus venustus* Benth.

Benth. in hort. trans. nov. ser. I. 412, tab. 15. fig. 3. — Lindl. bot. reg. tab. 1669. — Knth. enum. IV. 233. — Flore d. serr. II. Mai tab. 1 (tab. 40) fig. 3. — Baker in Journ. of Linn. Soc. XIV. pag. 310.

β. *brachysepalus*; sepalis interioribus sepala exteriora $\frac{1}{3}$ superantibus, supra basin fusco-purpureo-pictis, superne carneo-albidis macula purpurea destitutis. — California. Cfr. Grtfl. tab 865.

5. *Choisya grandiflora* Rgl.

C. ternata H. B. Knth., filamentis subulatis, quam petala duplo brevioribus.

C. grandiflora; filamentis carnosis, lineari-lanceolatis, acuminatis, quam petala plus quadruplo brevioribus.

Frutex ramosus, ramulis teretibus petiolis pedunculisque breviter puberulis. Folia opposita, petiolata, ternata. Foliola subsessilia, obovato-oblonga, obtusa, basi cuneata, penninervia, margine et in nervo medio breviter puberula, caeterum glabra, glanduloso-punctulata, petiolo communi subaequilonga. Pedunculi in ramorum apice axillares, subverticillati, simplices v. medio paullo ramosi, basi bractea unica v. bracteis oppositis suffulti, medio bracteolis nonnullis vestiti. Flores erecti. Sepala 5, elliptica, submembranacea, mox caduca, quinquenervia, glanduloso-punctulata, apicem versus ciliolata. Petala 5, alba, oblonga, circiter 20 c. m. longa, nervis tribus ramosis percursa. Stamina 10, hypogyna, 5 exteriora longiora, 5 interiora subduplo breviora. Filamenta alba. Antherae biloculares, cordato-subrotundae, luteae. Discus glandulosus nullus. Stylus unicus; ovarium subglobosum, 5-loculare, ovulis in quolibet loculo 2, axi centrali affixis. Stylus unicus, terminalis, stigmate capitato quinquelobo terminatus. Capsula quinesulcata, quinquerostrata.

6. *Dorstenia erecta* Vellozo.

(Flor. flum. I. tab. 142. — DC. prodr. XVII. 267.)

δ. *variegata*; caule apicem versus petiolis pedunculis foliisque molliter pilosis; foliis oblongo-ellipticis, margine repandocrenato-denticulatis, supra utrinque ad nervum medium argenteo pictis. — D. nervosa h. Berol. — D. urceolata β. variegata L. cfr. Bureau in DC. prodr. XVII. pag. 266.

7. *Hibiscus insignis* Mart. (ex horto Municensi).

Fruticosus, breviter denseque hirtulus. Folia longe petiolata, cordata, saepissime profunde v. rarius breviter triloba, rarissime subintegra, inaequaliter crenato-dentata; sinu inter lobos rotundato; lobis e basi angustiore ovato-cuspidatis, cuspidate integerrima. Involucellum brevissimum, breviter 8-dentatum, quam calyx multoties brevius. Calycis dentes lanceolati, erecti.

Corolla maxima, lutescens, apicem versus roseo-suffusa, supra basin macula annulari purpurea. Capsula ovata, conica, polysperma, hirsuta. — Brasilia. (Cfr. Gartenfl. tab. 368).

8. *Meconopsis quintuplinervia* Rgl.

Patentim hispido-pilosa; scapo unifloro, setis horizontaliter v. erecto-patientibus vestito; foliis omnibus radicalibus, lanceolatis, quintuplinerviis; pistillo staminibus brevioribus.

Folia lanceolata, in petiolum attenuata, integerrima, nervis 5 longitudinalibus percursa, setis subferrugineis patentissimis hispida, circiter 6 c. m. longa. Scapus humilis usque spithameus, erectus, uniflorus, setis subhorizontaliter patientibus hispidus. Flos nutans. Calyx disepalus, extus hispidus, ante anthesin deciduus. Petala, breviter unguiculata, rhombo-ovata, subacuta v. subemarginata, pallide violacea, concava, erecto-patientia, circiter $3\frac{1}{2}$ c. m. longa et $2\frac{1}{2}$ c. m. lata. Stamina pluriserialia, numerosa, exteriora breviora, interiora subduplo longiora, quam petala breviora. Pistillum staminibus brevioribus brevius. Ovarium ovato-oblongum, setis erecto-patientibus dense vestitum, stylo brevi terminatum. Stigma capitatum, 8 radiatum. Capsula?

Mandshuria occidentali-australis (Przewalski).

9. *Sempervivum patens* Griseb. α . *typicum*.

S. patens; foliis rosularum obovato-oblongis, abrupte cuspidato-mucronatis, margine dense minuteque ciliatis, utrinque hirtulis v. subglabris, caulinis oblongo-lanceolatis acutis semiamplexicaulibus; cyma densa; petalis 6, ochroleucis, oblongis, hirtis, apice tridentatis, dente

intermedio in mucronem excurrente; calycis hirti lobis lanceolatis, acutis, petalis subduplo brevioribus; squamis hypogynis brevibus, ovatis, apice truncatis.

α. *typicum*; foliis glaucis, ex apice rotundato subito acuminato-mucronatis, utrinque hirtis. (Cfr. Gartenfl. tab. 858).

S. patens Griseb. it. Hung. p. 315. — Boiss. fl. or. II. p. 797. — S. hirtum Sm. prodr. fl. graec. pag. 235 non L. — S. Reginae Amaliae hort.

β. *Heuffelii*; foliis viridibus, superne cuneato-attenuatis, apice ipso in mucronem acuminatis, utrinque glabris v. sparse hirtulis.

S. Heuffelii Schott. Oestr. Wochenbl. 1852 pag. 18.

10. *Sida glochidiata* Rgl.

Fruticosa, glabra v. pilis minutissimis stellatis asperula. Rami teretes. Folia breviter petiolata, ovata, acuminata, duplicato-crenato-dentata. Stipulae parvae, subulatae, vix puberulae. Pedunculi axillares, solitarii, continui, folium subaequantes v. paullo superantes. Involucelli sub ad basin partiti laciniae obverse lineari-oblongae, calycem paullo superantes. Corolla aurea, calycem plus duplo superans. Carpella 5, rostro dorsali binisque lateralibus basilaribus glochidiato-pilosis vestita.

Sida carpinifolia hort.

VI. LEGUMINOSARUM GENUS NOVUM AUCTORE A. BUNGE.

Smirnowia Bnge.

Calyx bilabiato-quinquefidus bibracteolatus? Vexilli lamina valde resupinata, basi ecallosa. Carina obtusa. Stamina diadelpa. Ovarium brevissime stipitatum, multiovulatum, ovulis biseriatis? Stylus subulatus, inflexus, apice dorso dense barbatus. Stigma terminale, subcapitatum. Legumen vesicarium utrinque ventre profundius sulcatum, sutura dorsali convexa ventralem in dissepimentum incompletum productam rectam multo superante, polyspermum. Semina complanata reniformia laevia.

Frutex ramosissimus, ramis longissimis filiformibus sparse foliosis.

Folia exstipulata, basi articulata, decidua, unifoliolata. Racemi breves? pauciflori. Flores . . . ? Legumina magna inflata. Genu styli stigmatisque structura cum Eremosparto fere congruum et habitu praeter folia omnino evoluta simillimum, sed distinctum legumine poly- nec submonospermo, utrinque sulcato neque utrinque compresso carinato, brevissime quidem at distincte stipitato nec omnino sessili, praesertim vero sutura ventrali intus in dissepimentum fere 2 lineas latum producta. Longius distat a Colutea et Sphaerophysa, a priore stigmate terminali et stylo tereti nec ventre sulcato, ab utraque barba styli dorsali, ut in Eremosparto, nec ventrali.

Species hucusque nota unica.

Smirnowia turkestanica.

Habitat in arenosis deserti transaralensis Kisil-kum (Smirnow!).

Plantae curiosissimae specimina incompleta collecta *), floribus jam omnino orbata et leguminibus omnibus delapsis, fere sine inflorescentiae vestigiis; floris rudimenta perpauca fructibus adhaerebant. Frutex erectus, bi-tripedalis, virgato-ramosissimus, trunco recto, circiter crassitiae pennae anserinae, tecto cortice tenui glabrescente stramineo lucido; rami graciles ramulique longissimi simplices fere filiformes teretes, moliter breve-villoso-canescens. Folia sparsa, omnino exstipulata, unifoliolata, basi articulata, decidua, breviter petiolulata, cuneato-obovata vel obcordata, apice nempe vel truncato-rotundata, vel leviter emarginata, fere carnosula, utrinque pube brevi simplici basifixa patula villosa-canescens, cum petiolulo vix unquam 4''' excedens, superne 2''' lata. Inflorescentiae bractearumque vestigia vix ulla. Calyx albo-tomentosus, turbinatus, longitudine 3''' parum excedens; dentes duo superiores paulo profundius sejuncti fere triangulares acuti, tres inferiores paulo altius connati angustiores, medio paulo magis producto. Vexillum ex ungue complicato 2''' longo subito dilatatum, lamina 4''' alta et explanata 5''' lata; callorum vestigia ad basin vix ulla. Alarum rudimenta deerant. Carina circiter 5''' longa, unguibus tenuibus 3''' longis. Laminae dorso con-

*) Omnia attuli specimina quae inveni. Smirnow.

vexo-curvatae, apice vix productae, obtusae, ventre concavae. Stylus et stigma generis. Legumen longiuscule pedicellatum, intra calycem brevissimè crasse stipitatum, stipite vix calycis tubum aequante, vesicarium, oblongum, tenue, membranaceum, molliter dense breve patulo - villosulum, ad suturam dorsalem multo longiorem convexum, leviter sulcatum, apice adpresse-inflexum, stylo incurvo in sulco obscondito terminatum, ad suturam ventralem brevior rectam profunde sulcatum, sutura intus in dissepimentum duplex placentigerum fere duas lineas latum producta. Nervus suturae dorsalis impressus, a legumine macerato facile solutus, 3-pollicaris, sutura ventralis 16''' longa. Semina numerosa, reniformia, complanata, radícula rimalis cotyledonum dimidio brevior.

In der Gattung *Eremosparton* enthält das Ovarium gewöhnlich 8 Samenknochen, die einander paarweise gegenüberstehen. Letzteres scheint auch für die viel zahlreicheren Samenknochen von *Smirnowia* der Fall zu sein, weshalb, besonders da bei *Smirnowia* auch die Bauchnaht in eine schmale Scheidewand nach innen vordringt, diese beiden Gattungen den *Astragaleen* beizuzählen sein möchten. Sie stehen der Abtheilung *Pogonophace* zunächst.

30 Janvier
11 Février 1879.

Enumeratio Salsolacearum omnium in Mongolia hucusque collectarum. Auctore Al. Bunge, membro honario Academiae Petropolitanae etc.

Clavis diagnostica tribuum.

1. Embryo periphericus cyclicus vel hippocrepicus albumen cingens, rarissime plicatus exalbuminosus. 2.
Embryo spiralis exalbuminosus vel albumine parco laterali. 6.
2. Flores glomerati in paniculas vel spicas dispositi. 3.
Flores simpliciter spicati. 5.
3. Folia plana herbacea, saepius sinuato-dentata. 4.
Folia linearia integerrima III. *Camforosmeae.*
4. Flores homomorphi plerumque omnes hermaproditi I. *Chenopodeae.*
Flores heteromorphi sexu distincti II. *Atripliceae.*
5. Folia linearia herbacea planiuscula. IV. *Corispermeae.*
» nullavelsquamaeformia, rarius carnosa. V. *Salicornieae.*
6. Seminum saltem praecociorum testa semper crustacea, albumen laterale parcum. VI. *Suaedeae.*
Seminum omnium testa membranacea, albumen nullum 7.
7. Semen horizontale. VII. *Salsoleae.*
» verticale. VIII. *Anabaseae.*

Clavis diagnostica generum.

1. *Chenopodeae*: Semen horizontale *Chenopodium.*
» verticale. *Blitum.*
2. *Atripliceae*: 1. Seminis testa crustacea vel coriacea, albumen copiosum. Embryo albidus. 2.

- Seminis testa tenue membranacea,
albumen parcum. Embryo viridis. 3.
2. Calyx floris feminei tripartitus in fructu scariosus *Axyris*.
Calyx floris feminei bifidus a dorso compressus, increscens lobis liberis vel plus minusve connatis.. *Atriplex*.
3. Calyx fl. feminei semibifidus bicornis villosissimus *Eurotia*.
Calyx fl. feminei cuneatus compressus biaristatus *Ceratocarpus*.
3. *Camforosmeae*: 1. Semen verticale; flor. quadridentati *Camforosma*.
Semen horizontale, calyx plerumque 5-dentatus. 2.
2. Calyx fructifer exappendiculatus lana involutus *Londesia*.
Sepala dorso in alam vel in aculeum excrescentia *Kochia*.
4. *Corispermeae*: Semen e pericarpio aperto seorsim deciduum *Agriophyllum*.
Semen cum pericarpio clauso deciduum *Corispermum*.
5. *Salicornieae*: 1. Folia opposita, caulis articulatus. 2. Folia alterna, caulis continuus... *Kalidium*.
2. Embryo plicatus exalbuminosus, herba annua *Salicornia*.
Embryo hippocrepicus albumen cingens, frutex *Halostachys*.
6. *Suaedeae*: Ovarium basi calyci adnatum *Schanginia*.
» liberum, stamina subhypogyna *Suaeda*.
7. *Sodeae*: Staminodia nulla *Salsola*.
Staminodia 5. cum filamentis plus minusve connata *Haloxydon*.
8. *Anabaseae*: 1. Folia opposita. 2. Folia sparsa. 4.
2. Staminodia distincta, fruticulosae vel caudice lignoso. 3.
Staminodia nulla, planta annua, folia elongata *Petrosimonia*.
3. Calyx fructifer alatus *Anabasis*.
» » immutatus exalatus *Brachylepis*.
4. Herbae annuae, sepala in fructu late alata *Halogeton*.
Fruticulosae. 5.

5. Sepala exalata, flores tunc demum
distincti..... *Nanophytum*.
Sepala alata, flores in capitulum
conferruminati..... *Sympegma*.

Enumeratio Salsolacearum omnium hucusque in Mongolia collectarum.

I. Cyclolobeae.

Trib. I. Chenopodieae.

Chenopodium L.

Clavis specierum.

1. Embryo perfecte annularis. 2.
» hippocrepicus. 6.
 2. Folia integra et integerrima *Ch. acuminatum*.
» sinuato-dentata. 3.
 3. Semina margine acuta laevissima. 4.
» margine obtusa. 5.
 4. Sepala carinata..... *Ch. album*.
» ecarinata..... *Ch. glaucum*.
 5. Sepala ecarinata. *Ch. urbicum*.
» carinata, semina laevigata..... *Ch. opulifolium*.
 6. Folia lanceolato-linearia glabriuscula integerrima..... *Ch. aristatum*.
Folia sinuato-pinnatifida glanduloso-pubescentia..... *Ch. Botrys*.
1. *Ch. acuminatum* Willd. Led. fl. ross. III. p. 694.
Maxim. Ind. mongol. p. 484.
Hab. in lapidosis vallis Irtysch nigri in montibus Kitschkene-Tau, 27. Juni. 76. (Potanin), prope Kiachta (Basilewski), in jugo Han-hai, in collibus arenosis vallis fluvii Schuryk, 23. Juli 1877. (Potanin), in siccis ad tractum mercatorium (Bunge, Kirilow. 1831.)
2. *Ch. opulifolium* Schrad.? Fl. ross. l. c. p. 696.
Hab. in Mongoliae australis terra Ordos, in valle fl. Hoangho, solo argilloso frequens. 5. Sept. 71. (Przewalski).

Fructu nondum maturo haud rite determinandum, nec tamen ad aliam speciem amandandum.

3. *Ch. album* L. Led. l. c. p. 697. Ind. mong. l. c.

Hab. in Mongolia boreali: secus fl. Kungess, affluentem Ili, sub finem mens. Aug. et ad medium Septbr. 1877. (Przew.), in valle Irtysch nigri ad fortalitium Saissan 27. Juli 76, in via inter Kinderlyk et Assu Syr-bulak. 4. Aug. 76, in campis Dürbeldjin, 24. Aug. 76 (Potanin), Arschain-gol et Bogdyn gol in lapidosis jugi Han-hai, Urten-gol Altaï australis 2. Juli 1877. Forma pygmaea (Potanin), in Mongolia australi: Siwan-tse prope Chalgan (Pat. Artselaer, 1876), inter Thianschan et murum magnum, in ipsa urbe Ssu-tscheu (Piassezki).

Speciei polymorphae formae variae collectae, certis characteribus haud limitandae, omnes calyce 5-costato, fructifero firmiter clauso, seminibusque laevissimis margine acutis inter se convenientes.

4. *Ch. glaucum* L. fl. ross. l. c. p. 700.

Hab. in Mongolia (Turczaninow, Piassezki.)

5. *Ch. urbicum* L. fl. ross. p. 701. Ind. mong. l. c.

Hab. in Mongolia boreali ad Irtysch nigrum (Potanin) et orientali ad tractum mercatorium (Tatarinow. 1840.)

6. *Ch. aristatum*. L. *Teloxys aristata* Moq. Led. fl. ross. l. c. p. 693. Ind. mong. l. c.

Hab. in siccis Mongoliae borealis: ditione jugi Tannuola, ad lacum Schar-nor in ripa fl. Tess, 1 Novbri 1877. Mongolis «Ssoli», cibo inservit. (Potanin.), ad tractum mercatorium (Kirilow, Bge.), nec non parte australi: Siwan-tse prope Chalgan (Pater Artselaer).

Teloxys nulla re a *Chenopodiis* sectionis *Botryois* distincta; iterum *Chenopodiis* associanda.

7. *Ch. Botrys* L. Led. fl. ross. l. c. p. 704.

Hab. Mongolia boreali-occidentali, in desertis ad fl. Kungess inferiorem et Ili superiorem, Juni—Juli 1877. (Przewalski), ad Irtysch nigrum, in montibus Kitschkene-tau in lapidosis. (Potanin 27. Juli 1876.)

Blitum Tourn.

8. *Bl. virgatum* L. Led. fl. ross. l. c. p. 706.

Mongolia borealis: in montosis Altyn-tschetsche, inter Chobdo et fines Sibiriae (Kalning), Altai australi, in alveis siccis rivulorum Ssakssa et Tatal, 7. et 8. Juli 1877 (Potanin) et in valle Bogdyn-gol jugi Han-hai 7. Aug. 77 (Potanin), in Mongolia (Piassezki.)

Trib. II. Atripliceae.

Axyris L.

Erecta, foliis ovatis..... *A. amarantoides*.

Diffusa, foliis obovatis..... *A. prostrata*.

9. *A. amarantoides* L. Led. fl. ross. III. p. 713. Ind. mong. l. c.

Hab. in Mongolia boreali, jugo Han-hai, ad fl. Schuryk, 23. Juli 77. (Potanin), ad tractum mercatorium (Bunge, Kirilow 1831, Tatarinow 1840), in Mongolia austro-orientali: Siwan-tse pr. Chalgan (Pat. Artselaer, 1876).

10. *A. prostrata* L. Led. l. c. p. 714. Ind. mong. l. c.

Hab. in lapidosis tractus mercatorii Mongoliae orientalis (Bunge, Kirilow 1831.)

Atriplex L.

1. Folia subintegerrima ovato-lanceolata, virentia..... *A. lenticulare*.
Folia sinuato-dentata, subtus albida. 2.
2. Flores feminei fructificantes cuneato-subglobosi muricati..... *A. sibiricum*.
Flores feminei fructificantes sessiles rhombeï vel triangulari-subhastati margine dentati..... *A. laciniatum*.

11. *A. laciniatum* L. Led. l. c. p. 718.

Hab. in Mongolia boreali: ad Irtim nigrum, 15. et 26. Aug. 1876 (Potanin), in desertis ad fl. Tekess ditione Kungess, locis olim habitatis, 3. Juli 1877. (Przewalski). Mongolia australis: deserto inter Anssi-tscheu et Hami, 20—22. Aug. 75. (Piassezki.)

12. *A. lenticulare* C. A. M. ex Turcz. Cat. Baical. n. 958. *Obione fera* Moq. Led. l. c. p. 733. Ind. mong. l. c.

Hab. in Mongoliae orientalis salsis (Bunge, Kirilow, 1831.)

13. *A. sibiricum* L. Led. fl. alt. IV. p. 315. *Obione muricata* Gärtn. in Led. fl. r. l. c. p. 734. Ind. mong. l. c.

Hab. in Mongolia boreali: ditione jugi Tannu-ola, ad lacum Schar-nor in ripa fl. Tess, 1 Novbr. 1877., incolis: «Chamgul» (Potanin), in valle fl. Kran, 28. Aug. 76. (Potanin), ad tractum mercatorium orientale, frequens (Bunge, Kirilow, 1831., Tatari-now 1840.), in ditione Ordos australis inter Porobalgassun et Wousjen, a muro magno et urbe Ninghia-fu orientem versus, autumnno 1877 (Pat. Verlinden), nec non in valle fl. Hoang-ho, in solo arenoso frequens, 24. Aug. 1871. (Przewalski), in Mon-

goliae occidentali-borealis terra Chalcha, 20. Aug.
1873. (Przew.)

Eurotia Adans.

14. *E. ceratoides* L. Led. fl. ross. l. c. p. 738. Ind.
mong. l. c. *Axyris rosmarinifolia* Turcz. Ind. mong.
l. c. *Axyris sericea* Turcz. pl. exs.

Frequens per Mongoliam orientalem (Bunge 1831,
Kirilow 1840., Tatarinow), in Mongoliae australis
montibus Alaschan, in valle fl. Hoang-ho, in arena
mobili, 16. Aug. 1871 (Przewalski), in Mongolia
boreali ad Irtin nigrum (Potanin).

Ceratocarpus Buxb.

15. *C. arenarius* L. Led. fl. ross. l. c. p. 739.
In Mongolia boreali-occidentali in desertis ad fl.
Tekess ditone Kungess, vulgaris, Juli 1877. (Prze-
walski).

Tribus III. Camforosmeae.

Londesia F. et M.

16. *L. eriantha* Fisch. et Meyer. Led. fl. ross. III.
p. 745.

Hab. in Mongolia boreali-occidentali, in itinere ad
Chobdo (Kalning).

Camforosma L.

17. *C. ruthenicum* M. Bieb. Led. fl. ross. l. c. p. 743.
Hab. in desertis vallis fl. Irtysch nigri prope forta-
litium Saissan, 1876. Julio (Potanin).

Kochia Roth.

1. Annuae. 2.

Perennis basi lignosa suffruticosa, calyx
alatus..... *K. prostrata*.

2. Calyx in alas 5 minutas tuberculiformes
exrescens..... *K. scoparia*.

Calyx in spinas 5. exrescens. 3.

3. Spinae calycis fructiferi apice hamato in-
flexae..... *K. hyssopifolia*.
Spinae calycis fructiferi apice rectae. 4.
4. Molliter patentim villosa *K. mollis*.
Pube adpressa sericeo-villosa *K. divaricata*.

18. *K. scoparia* Schrad. Led. fl. r. l. c. p. 746. Ind.
mong. l. c.

Hab. in ditione Ordos australi inter Poro-balgassun
et Wousjen, autumno 1877. (Pater Verlinden,
Mongolis: «Sapan» audit); ibidem, in valle fl. Hoang-
ho, medio Julio 1871. (Przewalski), in Mongolia
austro-orientali: Siwan-tse prope Chalgan (Pater
Artselaer 1876.) et alibi in locis subarenosis (1831.
Bunge, Kirilow, forma humilis subsimplex). Var. γ .
in Mong. occ. terra Ordos, in valle fl. Hoang-ho
in uliginosis limosis rara (Przew.)

19. *K. prostrata* Schrad. Led. fl. ross. l. c. p. 747. Ind.
mong. l. c.

In Mongoliae borealis aridis in faucibus Dzussylyk
Altai australis, 29. Juni 77. (Potanin), in siccis ad
tractum mercatorium, frequens (Bunge, Kirilow
1831. Kirilow 1841).

20. *K. hyssopifolia* (*Salsola*) Pall. Led. fl. ross l. c. 751
(sub *Echinopsilo*.)

In urbe Ssu-tscheu inter murum magnum et Hami,
ad vias, 2. Aug. 75. vixdum florens (Piassezki).

21. *K. dasyphylla* F. et M. in Schrenk Enum. I. p. 12
in adnot. *Echinopsilon divaricatus* Kar. et Kir. Led.
fl. ross. l. c. p. 752.

In borealibus, ad lacum Uliungur, ad Salburta, 17.
Aug. 76. (Potanin.) Huc etiam spectare videntur
duo specimina valde juvenilia a cl. Piassezki col-
lecta; tum in terra Ordos in valle fl. Hoangho in

arenosis frequens, et in regione Chalcha, in alveolis arenosis exsiccatis vallium frequens, Aug. 73. florere incipiens (Przewalski).

22. *K. mollis* Bge. F. et M. l. c. *Echinopsilon mollis* Fenzl. in Led. fl. ross. l. c. p. 754.

Hab. in arena mobili in medio deserto Gobi pr. Chadatu, Schara-budurghana et Durma (Bunge 1830 et 1831), in itinere ad Chinam (Tatarinow 1840), in Mongoliae occidentalis montibus Alaschan (Przewalski 1871), in Ordos australi, inter Poro-balgassun et Wousjen, Autumno 1877 (Pater Verlinden: Plante médicinale dans les accouchements difficiles, «Patang-hambei» en Mongol).

Praecedenti proxime affinis et forsitan aptius cum illa specie jungenda. Discrimina a cl. F. et M. l. c. allata ex parte ab aetate pendent, nam *K. dasyphyllum* juniorem tantum observabant, cum fructus omnino maturos alterius a m. collectos cl. Fischero communicaveram. Habitus tamen tantisper discrepans. Indumentum in illa densius fere adpressum, caulis rarius a basi atque laxius ramosus, in hac dense ramosissimus in globum excrescens. Spinae calycis fructiferi in illa tenuiores, in utraque vero occurrunt calyces fructiferi quorum sepalum unum praeter spinulam insuper in alam spinula brevioris lateralem excrescit, ita ut discrimen inter *Kochiam* et *Echinopsilon* omnino nullum, annuente etiam cl. Fenzl. in fl. ross. l. c. p. 751.

Tribus IV. Corispermeae.

Agriophyllum M. Bieb.

Fructus ala sensim in rostrum attenuata an-

gusta dentata *A. arenarium*.

Fructus ala apice dilatata lacera *A. gobicum*.

23. *A. gobicum* Bge. pl. exs. in hb. Acad. et Horti petrop.
Przewalski it. I. 157. *Agr. arenarium* Ind. mongol.
l. c.

A. foliis sessilibus lanceolatis 5—7 nerviis pungentibus, spiculis axillaribus numerosissimis, bracteis rigidis pungentibus squarroso-reflexis, fructu basi anguste apicem versus latius alato, ala superne dilatata lacera stigmatibus erectis saepius hinc dente auctis.

Hab. in arenosis Mongoliae mediae australioris prope Durma (Bunge) et Kobur (Tatarinow!, Kirilow); in ditione Ordos: in valle fl. Hoang-ho in arena mobili vulgare et gregarium, etiam in montibus Alaschan vulgatissimum, a Mongolis «Ssulchir» dictum, e cuius seminibus farinam parant, 16 Aug. 1871. (Przewalski), ejusdem regionis parte australi, «sauvage et cultivée, Soulkhir en Mongol» (Pater Verlinden).

Valde affine *Agr. arenario*, nec ab illo nisi fructu maturescente distinguendum; sub anthesi omnino congruum, sed fructus major superne latius alatus, ala apice dilatata lacera; stigmata etiam in *Agr. arenario* hinc inde lateraliter dente aucta.

24. *Agriophyllum arenarium* M. B. — Led. fl. ross.
III. p. 756.

A. foliis sessilibus lanceolatis 5—7 nerviis pungentibus, spiculis axillaribus numerosissimis, bracteis rigidis pungentibus squarrosis, fructu anguste alato, ala apicem versus attenuata denticulata, stigmatibus junioribus divaricatis, saepius hinc dente auctis.

Hab. in arena mobili ad fl. Irtysch nigrum (Potanin, 1876.), deserto ab urbe Gutschen et jugo

Thianschan boream versus, 18. Sept. 1875. (Piassezki.)

Corispermum L.

1. Fructus villosulus exalatus..... *C. Gmelini*.
» glaberrimus. 2.
2. Fructus apterus..... *C. orientale*.
» in alam distinctam expansus. 3.
3. Fructus apice integer stylosum basi bidentatus..... *C. hyssopifolium*.
Fructus apice emarginatus; sepala nulla. *C. Marschalli*.

25. *C. orientale* Lam. Led. fl. ross. l. c. p. 758. *Corispermum spec.* Ind. mong. l. c.

Hab. parte orientali ad tractum mercatorium (Tatarinow), parte australi, ditione Ordos, in valle fl. Hoang-ho, in arenosis Kusuptschi dictis, 1. Sept. 1871. florens, nec non in montibus Alaschan, Sept. 71. fructificans (Przewalski).

Planta a Przewalskio collecta distincta foliis latioribus carnosulis, bracteis fructum tegentibus latissimis, sed ob flores pentandros et fructum omnino immarginatum convexo-concavum huc spectans.

An *C. Stauntoni*, mihi ignotum?

26. *C. Marschallii* Steven. Led. l. c. p. 762.

Hab. in Mongoliae terra Ordos australi (Pat. Verlinden, autumnus 1877.)

27. *C. hyssopifolium* Juss. Led. l. c. p. 759.

Hab. in Mongolia boreali: ad ripam fl. Irtysch nigri, nec non ad fl. Kran, 28. Aug. 1876. fructif. (Potanin); jugo Han-hai, in collibus arenosis vallis fl. Schuryk fl., 20. Juli 77. (idem).

28. *C. Gmelini* m. in hb. Acad. petrop.

C. elongatum divaricato-ramosum, junius canescens, fructiferum rubens; foliis oblongo-linearibus, spi-

cis elongatis tenuibus laxis, bracteis ovatis acuminato-cuspidatis, floribus monosepalis 1—3, 4-andris, fructu pube stellata pubescente oblongo immarginato³ vel ala angustissima cincto.

Hab. in Mongoliae terra Ordos australi, autumnno 1877 fr. maturo (Pat. Verlinden), nec non in Chinae occidentalis prov. Kansu, 23. Juli 1875., florens et c. fr. immaturo (Piassezki).

Ab omnibus speciebus notis, praeter *C. Redowskii* et *ulopterum*, facile distinctum fructu pube stellata canescente, ab his vero fructus ala nulla vel angustissima integra. — Planta a Piassezki lecta junior tota canescit, serius, ut in speciminibus Verlindenianis, calvescit, caule ramisque intense rubescentibus. Elatior, fere pedalis, cum *C. Redowskii* semper humile vidi. Folia in caule primario saepe 8''' longa, basi attenuata, supra medium usque ad 3''' lata, obtusa, ramealia minora. Bractee inferiores sub anthesi oblongo-lanceolatae, superiores breviores ovatae herbaceae, denique fructu maturo marcescentes, fere ex toto membranaceae, pungenti-mucronatae. Sepalum unicum oblongum apice rotundatum hyalinum. Stamina saepius plura, filamenta sepalum multo superantia, nec tamen illo duplo longiora, antherae mox caducae, suborbiculares, didymae. Fructus immaturus pube stellata densa tectus, canus, denique rufescens et in dorso saepe calvescens, tenuiter papulosus, 1,6''' longus, $\frac{3}{4}$ ''' latus, oblongus acutus, vix ac ne vix quidem marginatus, apice acutus vel basi stylorum persistente biapiculatus, facie interna convexus.

C. Gmelini dixi, quia frustulum in herbario Aca-

demiae Petrop. asservatum verosimiliter e herb. Gmeliniano ortum est.

Tribus V. Salicornieae.

Salicornia Moq.

29. *S. herbacea* L. Led. l. c. p. 767. Ind. mong. l. c.
Hab. in salsis Mongoliae orientalis (1831. Bunge, Kirilow), in Mongoliae australis montibus Alaschan, in lutoso-salsis ad ripam lacus Zagan-nor vulgaris, 21. Sept. 1871. (Przewalski)

Kalidium Moq.

1. Folia subnulla, seu potius foliorum lamina libera brevissima. 2.
Foliorum lamina libera elongata *K. foliatum*.
2. Flores in spica ternatim dispositi..... *K. caspicum*.
» » solitarii..... *K. gracile*.
30. *K. gracile* Fenzl. in Led. fl. ross. l. c. p. 769 in adnot. Ind. mong. l. c.
Hab. in Mongoliae orientalis deserto Gobi pr. Chailassutu, Boroldshi etc. (Bge. 1830, 31., Tatarinow. 1840. Kirilow. 1841), in Mongoliae australis terra Ordos et ad montes Alaschan in desertis aridissimis boream versus, in argilloso-salsis vulgare et gregarium, camelorum pabulum gratissimum. Augusto 1873. (Przewalski)
31. *K. caspicum* L. Ung. Sternb. in Atti del Congr. Firenz. p. 317. *K. arabicum* Ind. mong. l. c. Led. fl. ross. l. c.
Hab. in Mongolia orientali (Bunge, 1830) et boreali, in salsis ad lacum Uliungur, 11. Aug. 1876. (Potanin), *Var. γ. cuspidata*: in Mongoliae australis

terra Ordos, in valle fl. Hoang-ho, locis arenosoluto-
sis vere inundatis vulgare et gregarium, 2. Aug.
1871. (Przewalski).

32. *K. foliatum* Pall. Led. fl. ross. III. p. 770. Ind.
mong. l. c.

Hab. in Mongolia orientali (Bunge, 1831. Kirilow,
1841) et boreali, regione Chalcha, in limoso-salsis,
quoad formam simile *K. gracili*, quocum iisdem
locis crescit, 20. Aug. 1873. (Przewalski), *var.*
brevifolium in Mongoliae borealis ditione Urot, in
deserto Golbyn-Gobi sparse, solo argilloso-lapidoso
(idem), nec non ad lacum Uliungur, 15. Aug. 1876.
et ditione Tannu-ola, ad lacus Schar-nor et Ubsa,
1., 7. Novbr. 1877. (Potanin.)

Halostachys C. A. Mey.

33. *H. caspia* Pall. Ung. Sternb. l. c. p. 334. Id. Ver-
such eines Syst. d. Salicorn. p. 77—79. *Halocne-*
num caspicum Fenzl. in fl. ross. l. c. p. 772.

Hab. in Mong. austro-occid. in desertis ad fl. Ta-
rym superiorem, haud procul a Lob-nor, Nov. et
Decbr. 1876. (Przewalski) et boreali, ad lacum
Uliungur (Potanin.)

II. Spirolobeae.

Tribus VI. Suaedae.

Schanginia C. A. Mey.

34. *S. linifolia* Pall. in Led. fl. ross. l. c. p. 755.

Hab. in Mongolia boreali, in pratis ad fl. Kran, affl.
Irtin, 29. Aug. 76. (Potanin.)

Suaeda.

1. Fruticosa, foliis elongatis, calyce fructifero
inflato..... *S. physophora.*

Annuae herbaceae. 2.

2. Florum glomeruli petiolares vel subpetiolares. 3.

Florum glomeruli exacte axillares. 4.

3. Erecta elata, foliis filiformibus confertis, seminibus praecocibus globosis granulatis, serotinis horizontalibus in calyce depresso. *S. glauca*.

Prostrata, foliis carnosis spathulatis, seminibus praecocibus globosis laevissimis, serotinis in calyce globoso-inflato verticalibus..... *S. ampullacea*.

4. Folia lineari-teretia. 5.

» obovata carnosa, semina planiuscula tenuissime striata..... *S. Przewalskii*.

5. Sepala apice tuberculata in calycem substellatum excrecentia..... *S. corniculata*.

Sepala ecarinata rotundata. 6

6. Folia acuta vel in setam terminata *S. setigera*.

» obtusa. 7.

7. Semina granulata vel punctato-striata..... *S. maritima*.

» laevissima nitida *S. salsa*.

35. *S. physophora* Pall. in Led. fl. ross. l. c. p. 777.

Hab. in Mongolia boreali: in deserto salso ad fl.

Tekess infer., frequens, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ ped. alta, 7 Juli

1877. (Przewalski) et prope Kertsch ad rivulum

Tschakyrta, ditionis Irtysch nigri, 5. Aug. 1876.

(Potanin).

Praeunte cl. Fenzl. l. c. *Chenopodinam* Moq. Tand.

non solum, sed et plurima genera ab illo constituta

a *Schoberia* C. A. M. sejuncta, ad genus *Suaedam*

reducenda censeo; seminum nempe et fructuum

fabrica in omnibus his plantis tam variabilis, ut

nullos certos fines inter illas invenire possim. In

plurimis semina serotina a praecocibus omnino

diversa, haec testa crustacea albumineque prae-

dita, illa vero testa membranacea albumineque

nullo; semina fere omnium tum horizontalia tum

verticalia, calycis structura aequae varia unde *Scho-*

beria, *Brezia*, *Calvelia* et *Belowia* nullo modo a *Chenopodinis*, quibuscum habitu optime congruunt, removendae. Denique et *Helicilla* Moq., infauste ad *Sodeas* relata, nil nisi *Suaeda* (*Schoberia*) *glauca* m., vel si mavis *Suaeda Stauntoni* Moq.

36. *S. Przewalskii* n. sp.

S. annua a basi divaricato-ramosa, foliis carnosulis omnibus obovatis obtusissimis, floribus exacte axillaribus glomeratis, sepalis laevibus ecarinatis clausis, pericarpio semini arcte adhaerente, semine horizontali tenuissime striato-granulato planiusculo nec turgido.

Hab. in Mongoliae australis regione Alaschan, ripa limoso-salsa lacus Zagan-nor, vulgaris et gregaria 21 Sept. 1871. (Przewalski), nec non in prov. Kansu Chinae occidentalis, 23. Juli 1875. (Piassezki.)

Affinis *S. maritimae*, sed facillime distincta foliis omnibus obovatis, pericarpio semini arcte adhaerente et semine planiusculo supra concavo, subtus convexo. Viva laete virens, exsiccata flavescens, caulis a basi solutus in ramos ut videtur prostratos, ad summum 10—11-pollicares, saepius multo breviores. Folia infima maxima ex parte emarcida 4—5''' longa, subfloralia $2\frac{1}{2}$ ''' longa, sub apice $1\frac{1}{2}$ ''' lata, basi cuneiformia, subarcuato-surrecta, summa minora. Glomeruli exacte axillares 5—7-flori, flore primario vel tribus fertilibus, laterali-bus sterilibus vel fructum serotinum maturantibus. Sepala convexa arcte conniventia carnosula, in flore fructificante planiuscula. Antherae minutae flavae inclusae(?). Styli duo brevissimi. Semen

vix $\frac{3}{4}$ ''' in diametro, nigro-brunneum, difficillime a pericarpio solvitur, planiusculum, sed margine obtusum, tenuiter concentrice punctato-striatum. Fructus serotini desunt. Planta Piassezkii omnino congrua, sed vix florens.

37. *S. ampullacea* n. sp.

S. annua, a basi in ramos soluta; foliis carnosissimis spatulatis obtusissimis glabris, glomerulis subpetiolaribus paucifloris, floribus primariis hermaphroditis semen horizontale crustaceum turgidum a pericarpio facile solutum gerentibus, sepalis floris serotini (feminei?) ampullaceo-inflatis clausis tenerrimis, pericarpio ovato tenue membranaceo semine multo ampliore, seminis verticalis exalbuminosi testa tenue membranacea, rostello infero.

Hab. in Mongolia occidentali, deserto Gobi, ad austrum urbis Hami, 28. Aug. 75. (Piassezki.)

Planta singularis, cujus unicum specimen collectum autumnale, habitu foliisque omnino simile *S. Przewalskii*, sed quamvis jam Augusto mense collecta, tamen fructus nisi serotinos ferens, seminibus primariis crustaceis in calyce haud ampliato perpauca jam a caule solutis, magnitudine, forma et superficie ab illis *S. Przewalskii* omnino distinctis.

Folia inferiora lineari-clavata 6''' vix longiora, $\frac{3}{4}$ ''' crassa, carnosissima, superiora subfloralia paulo latiora et breviora, obtusissima. Flores rudimentis in glomerulo pauci fere axillares. Bracteolae ovatae acutae scarioso-hyalinae. Flores primarios hermaphroditos perpauca superstites rite examinare haud licuit. Semen in illis majusculum tur-

gidum nitide nigrum laevissimum. Calyces fructiferi florum ut videtur femineorum, nam staminum ne vestigium quidem detegere potui, ampullacei, usque ad 4''' ampli, tenuissime membranacei, videntur omnino clausi. Pericarpium amplum, videtur inflatum, exsiccatione vero compressum, fere 3''' longum totidemque latum, fovet semen multo angustius, in diametro vix ultra lineam magnum, testa tenue membranacea rufescente. Embryon exalbuminosum rostello lutescente, cotyledonibus brevioribus viridibus. Plumula vix conspicua.

38. *S. salsa* Fenzl in Led. fl. ross. III. p. 785, excl. syn. Pall. ill. p. 46., quoad descriptionem.

Hab. in Mongolia orientali (Tatarinow 1840), boreali-occidentali, in terra Urot, in luto salso humido arenoso, 10. Aug. 1873. (Przewalski), Mong. australi, in valle Hoang-ho, ad pedem m. Muniula, Julio 1873. (Idem.)

Icon Pallasiana tab. 39. forsan huc spectat, non vero descriptio, quae disertis verbis sequentem speciem indicat: «Calyces facti e foliolis quinque carnosissimis viridibus, supra semen arcte conniventibus, apice gibbis, extrorsumque angulo insigni prominulis, unde substellati apparent», quod certe ad amussin in *Schoberiam corniculatam* C. A. M. quadrat, non vero in *Sch. salsam*. Nec credibile, plantam characteribus his insignem et in regionibus ab oculatissimo Pallasio perlustratis frequentem illum effugisse. Quid sit *Salsola salsa* L., qui plantam prope Astrachan collectam hoc nomine insignivit, vix eruendum. *S. salsa* C. A. M. a *S. maritima* abunde diversa vi-

detur caule robustiore elato, ramis elongatis fastigiatis, colore glauco seminibusque minoribus laevissimis nec punctulatis, a Pallasio forsitan ut a Biebersteinio pro forma proceriore *S. maritimae* sumpta est.

39. *S. corniculata* (*Schoberia*) C. A. M.

Hab. in Mongoliae orientalis salsuginosis (Tatarinow 1840.)

40. *S. glauca* (*Schoberia*) Bge. Enum. chin. n. 310. *Helicilla altissima* Moq. in DC. prodr. XIII. p. 170. *Suaeda Stauntoni* Moq. Chenop. Enum. p. 31.

Hab. in Mongoliae australis terra Ordos, frequens in pratis vere inundatis vallis fl. Hoangho, 21 Juli 1871 fl. incip. (Przewalski).

Ambigit inter *Suaedam* et *Schanginiam*, nam calyx basi ovarii, quamvis breviter, adnatus vel adhaerens. Habitus vero omnino specierum annuarum *Suaedae*, facile vero ab omnibus notis distinguenda: caule elato foliosissimo, erecto, glomerulis petiolaribus, floribus polygamis, et seminis testa subtiliter at eleganter granulata.

Annua. Caules stricte erecti, parce fastigiato-ramosi, aetate proveciores 3—5 pedes alti. Folia filiformia 12—15''' longa, $\frac{1}{3}$ ''' crassa, praesertim versus apicem ramorum steriliū conferta, erecta, glauca, acutissima. Glomeruli primarii 5—7 flori, petiolo supra basin inserti, sessiles, flore medio hermaphrodito, lateralibus multo minoribus abortu femineis, in summo caule et in ramulis supremis flores subsolitarii omnes abortu feminei, staminibus cum antheris effoetis brevissimis squamulaeformibus ad basin ovarii subperigynis; ex his in-

feriores fructiferi parum depressi obtuse pentagoni, profunde 5-sulcati, quinquedentati, dentibus invicem marginibus dilatatis obtusissimis incumbentibus et arcte cohaerentibus, nec tamen vere connatis, ita ut foramen tantum minutum stylo stigmatibusque perforatum remaneat. Sepala dorso convexa omnino ecarinata, denique in floribus summis in cornicula subalaeformia carnosula stellatim patentia excrescunt. Semina horum florum inferiora testa crustacea, summa serotina testa membranacea praedita, haec omnino exalbuminosa. Haec tantum cl. Moquin investigavit, neglectis inferioribus.

41. *S. maritima* Dumort? Led. fl. r. l. c. p. 786. *Schoberia glauca* Turcz. pl. exs. Ind. mong. l. c.

Hab. in Mongolia orientali (Turcz. pl. exs. a Kirilow an. 1831 collectae.)

Specimina nimis juvenilia, vix florentia, nec rite determinanda.

42. *Suaeda setigera* Moq. Led. fl. ross. l. c. p. 783.

Hab. in Mongolia boreali, inter fines Sibiriae et oppidum Chobdo (Kalning 1870.)

Hujus quoque specimen valde juvenile et incompletum collectum, ob folia acuminata huc relatum.

Collecta insuper specimina vel nondum florentia, vel primos flores expandentia, ideoque indeterminabilia, a Przewalskio sub № 249 in regione Urot, ad fontem uliginosum, in luto salso humido, et omnino similia ad fl. Tschakyrta prope Kertsch, a D. Potanin, 5. Aug. 1876; a D. Kalning in itinere ad Chobdo sub № 180, nec non aliud in montibus Alaschan in deserto aridissimo boream versus frequens (Przewalski № 229. a. 1873.)

Tribus VII. Sodeae.

Salsola Gaertn.

1. Annuae. 2.
Fruticosae. 12.
2. Folia ramique sparsi. 3.
» » oppositi, antherae appendiculatae..... *S. brachiata.*
3. Folia spinuloso-mucronata rigescentia. 4.
» mutica vel submutica carnosae. 7.
4. Styli breves stigma simplex mentientes, flores remote glomerati..... *S. ulicina.*
Stigmata elongata filiformia, flores subso-
litarii. 5.
5. Flores superiores feminei, sepalum anticum
alatum, caetera dorso gibba..... *S. monoptera.*
Flores omnes hermaphroditi, sepala omnia
alata vel dorso gibba. 6.
6. Sepala basi membranacea dorso gibba, alis
nempe minutis spongiosis..... *S. collina.*
Sepala basi indurata omnia alata, alis mem-
branaceis..... *S. Kali.*
7. Antherae omnino exappendiculatae. 8.
» appendiculatae vel saltem apice pictae. 10.
8. Stigmata brevissima, calyx fructifer aper-
tus, utriculus baccatus..... *S. clavifolia.*
Stigmata subulata elongata, utriculus sic-
cus. 9.
9. Alae reniformes membranaceae..... *S. rosacea.*
» subnullae transverse carinaeformes.. *S. Soda.*
10. Antherae appendicula distincta membrana-
cea. 11.
Anthera vix apiculata, nervo apice viridi-
picto..... *S. spissa.*
11. Alae reniformes imbricatae, antherae ap-
pendicula subulata acuta..... *S. affinis.*
Alae obovatae sinu rotundato interstinctae,
anth. app. ovata obtusa..... *S. sclerantha.*
12. Virides, folia elongata linearia. 13.
Cana, prostrata, folia breviter semiamplexi-
caulia *S. gemmascens.*
13. Folia basi membranaceo marginata, axillae
villosae *S. abrotanoides.*
Folia basi in petiolum brevem angustata,
axillae glabrae..... *S. Arbuscula.*

43. *S. ulicina* (*Horaninowia*) F. et M. in Led. fl. ross.
l. c. p. 794.

Hab. in Mongolia boreali - occidentali. (Piassezki
1875.)

44. *S. monoptera* n. sp.

S. annua, ramosissima, brevissime patulo-hispidula,
dense foliosa; foliis subulato-triquetris spinuloso-
acuminatissimis basi tenuissime dentato-spinellosis,
floralibus florem axillarem solitarium longe supe-
rantibus, floribus polygamis inferioribus ♀ supe-
rioribus femineis, sepalo calycis fructiferi antico
minute alato, caeteris immutatis, antheris vix api-
culatis.

Hab. in Mongolia orientali australiore (Tatarinow
1840.)

Caulis circiter pedalis crassitie fere pennae anseri-
nae, ut videtur prostratus, dense ramosus, ramis
patentissimis, imo inferioribus reversis semipeda-
libus, iterum ramulosis, undique setulis patulis
hispidus. Folia triquetra basi parum dilatata su-
bulata apice in spinulam tenuem pungentem pro-
ducta versus basin muriculato ciliolata subsemi-
pollicaria. Flores fere in omnibus axillis ramulo-
rum minutissimi, folio subflorali, bracteisque ge-
minis occulti, illisque multo breviores, inferiores
hermaphroditi, superiores mere feminei. Bractee
e basi oblonga membranaceo dilatata, in cuspidem
triquetrum pungentem contractae, $2\frac{1}{2}'''$ longae.
Flos vix linea dimidia amplior 5-partitus, sepala
nempe 5 basi breviter connata membranacea
acuta, exterius anticum in fructu in alam minutam
subcartilagineam interdum bilobam excrescens,

apice in fructu utriculū tegens; caetera, quamvis etiam uninervia, immutata, vel medio gibbere minuto (an forsā serius etiam in alā excrecente?) aucta. Discus hypogynus inconspicuus cum basi calycis et ovarii breviter coalitus. Stamina 5 vel pauciora perigyna, filamentis exsertis filiformibus enerviis. Antherae oblongae vix apiculatae concolores. Ovarium globosum, stylus brevis, stigmata duo elongata filiformia papillosa. Utriculus suburceolatus. Semen horizontale. Embryo spiralis sub-turbinatus. Flos etiam fructifer vix auctus.

Ob flores polygamos, et sepalum unum tantum in alā excrecens olim generice hanc speciem a veris *Salsolis* sejungendam esse credidi, *Monopterygium minutiflorum* illam nuncupans; ob affinitatem vero proximam cum *Salsola collina* potius in genere retinendam esse censeo.

45. *S. Kali* L. Led. fl. r. l. c. p. 797.

Hab. in Mongolia orientali frequens (Bunge, Kirilow, Tatarinow, Rosow, alii), australi: in valle fl. Hoangho in lotis lutoso-arenosis terrae Ordos frequens, 24. Aug. 1871., in montibus Alaschan, in desertis aridissimis boream versus, frequens, 26. Juli 1873 (Przewalski) occidentali (Piassezki), boreali: rara in lutosiis humidis in terra Chalcha, 31. Aug. 1873 et ibidem in parte australi frequens, 29. Aug. 1873. (Przewalski), ad lacum Uliungur, 16. Aug. 76., Bulun-tochoi in arvis derelictis, 19. Aug. 76., ad fl. Urungu in pratis, 21. Aug. 76., ad fl. Irtysch nigrum, 28. Aug. et 27. Juni 76. Han-hai, ad fl. Schuryk, 23. Juli 77, ad fl. Telgir-morin, 19. Sept. 1877 (Potanin).

46. *S. rosacea* L. Led. fl. r. l. c. p. 801.

Hab. Mongolia boreali, in lapidosis pr. Djurbeldshin ad fl. Irtysch nigrum, 24. Aug. 1876. (Potanin.)

47. *S. collina* Pall. Led. fl. r. l. c. p. 800.

Hab. in locis subarenosis ad tractum mercatorium orientalem (Turcz. pl. exs. a Kirilow collectae, Bge, 1831., Kirilow, 1841., Tatarinow, 1840), in Mongoliae meridionalis deserto ad pedem australem jugi Muni-ula, in agris Sinensium vulgaris, 22. Juli 1871. (Przewalski), ditione Ordos australis, inter Poro-balgassun et Wousjen, autumnus 1877. Mongolis «Sapan» (Pater Verlinden), boreali in arvis derelictis pr. fortalitium Saissan, nec non prope Djurbeldshin (Potanin, 1876.)

48. *S. clavifolia* Pall. Led. fl. r. l. c. p. 802, non Ind. mong. l. c.

Hab. in Mongolia boreali occidentali (Piassezki.)

49. *S. Soda* L. Led. fl. r. l. c. p. 803.

Hab. in Mongolia boreali prope Kertsch ad fl. Tschakyrta (Potanin.)

50. *S. affinis* C. A. Mey. Led. fl. ross. l. c. p. 805.

Hab. in Mongolia borealis valle fl. Kran, 29. Aug. 76. (Potanin), in Mongolia occidentali (Piassezki).

51. *S. brachiata* Pall. Led. fl. ross. l. c. p. 806.

Hab. in Mongolia boreali prope Djurbeldshin et ad fl. Kran (Potanin).

52. *S. sclerantha* C. A. M. Led. l. c. p. 807.

Hab. in Mongolia occidentali (Piassezki.)

53. *S. spissa* M. B. Led. fl. ross. l. c. p. 808.

Hab. in Mongolia boreali ad lacum Uliungur prope Salburta (Potanin.)

54. *S. gemmascens* Pall. Led. 1. c. p. 815. *Halimocnemis microphylla* Turcz. pl. exs. Mong. *Salsola Passerina* Bge. in Linn. 1843. pag. 4.

Hab. in salsis Mongoliae orientalis mediae deserto Gobi (Bunge, Kirilow 1830. Kirilow 1841.), boreali: in deserto Golbyn-Gobi in terra Urot, in lapidosis rarius, 14. Aug. 1873. (Przewalski), australi: in montibus Alaschan, in planitiibus argillosis trans arenas Tyngeri sitis gregaria (Przewalski).

55. *S. abrotanoides* n. sp.

S. fruticosa humilis tortuoso-ramosa glabriuscula glauca; foliis sparsis sessilibus teretibus obtusis vel mucronatis, axillis villosis, floribus in ramis terminalibus gracilibus confertim spicatis, bracteo-
lis flore brevioribus, sepalis ovatis obtusis membranaceo-marginatis, (tunc demum supra medium alatis) glabris, antheris minute obtuse apiculatis mox deciduis, filamentis brevissime exsertis hyalinis; fructu?

Collecta specimina pauca valde juvenilia in valle deserta secus pedem borealem jugi Thian-schan expansa, solo limoso circa vicum Adak, 17. Juni 1877. et ad fl. Koschöty, in deserto salso boream versus a montibus Taischir-ola Altai australis sito, 16. Juli 77. (Potanin.)

S. Arbusculae affinis, attamen diversissima. Fructu ignoto locus in systemate dubius. Villi crispatis in axillis foliorum affinitatem cum nonnullis *Anabaseis*, sed ovarii conformatio et ovuli situs semen horizontale *Sodearum* indicant.

Truncus saepe digito multo crassior nigricans, dis-

torte breviter ramosus, ramulis hornotinis aliis foliigeris, aliis mere florigeris gracilibus, illis sub anthesi ad summum tripollicaribus. Folia tere-
tiuscula carnosa 3 — 5''' longa, exsiccata vix $\frac{1}{3}$ '''
crassiora, vel saepius obtusissima, vel rarius ju-
niora mucronulata, recta vel curvata, in axilla
crispato-villosula, basi non in petiolum angustata,
ut in *S. Arbuscula*, sed saepius anguste membra-
naceo dilatata, in axillis subinde fasciculata. Rami
floridi sub anthesi $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$ pollicares graciles, laxi
nec rigidi, recti ut in *S. Arbuscula*; sub anthesi
dense imbricato-florigeri, floribus contiguis. Folia
subfloralia caulinis similia, at sensius breviora,
summa flore breviora. Flores solitarii. Bracteolae
ovatae minutae flore breviores. Sepala 5 late ovata
late hyalino marginata obtusa, medio intense vi-
ridia, jam supra medium alarum vestigia osten-
dunt, nec infra medium ut in *S. Arbuscula*. Sta-
mina 5 filamentis linearibus extus cyathulo minu-
tissimo insertis, parum supra sepala prominulis,
hyalinis, nec ut in *S. Arbuscula* fusciscentibus.
Antherae cordatae ad mediam fissae, apice minu-
tissime obtuse apiculatae. Ovarium ovatum in sty-
lum attenuatum, stigmata mox recurva nigricantia.
Semen ?

56. *S. Arbuscula* Pall. Led. fl. ross. l. c. p. 816. *Halimocnemis laricifolia* Turcz. pl. exs. Ind. mong.
l. c.

Hab. in montosis lapidosis Mongoliae borealioris
mediae (Bunge, Kirilow, 1831., Kirilow 1841),
in regione Chalcha, in lutosi lapidosis rara, 29.
Aug. 1873. (Przewalski), in sabulosis ad lacum

Uliungur, 15. Aug. et ad fl. Kran, 28. et 29. Aug. 1876. (Potanin), in Mongolia occidentali (Piassezki.)

Valde polymorpha, sed facile recognoscenda in omnibus formis foliorum structura, quae semper versus basin in petiolum brevem albidum attenuata, supra illum facile rupta, ipso petiolo maxima parte adnato-decurrente et basi in gibbum minutum incrassato persistente. Sepalorum parte infra alas sita vix indurata haec species distinguitur a *S. subaphylla*, *glauca* et affinibus.

Haloxylon Bge.

Folia brevissima in cupulam connata opposita, rami articulati..... *H. Ammodendron*.
Folia elongata sparsa, rami continui..... *H. Regelii*.

57. *H. Ammodendron* C. A. M. (sub Anabasi) Led. fl. alt. I. p. 373. Led. fl. ross. I. c. p. 820.

Hab. in Mongolia australi: in montibus Alaschan borealibus, 1. Juni 1872. (Przewalski: «Arbor «10—14 pedalis, trunco vix 5 pedes longo, sed interdum ultra pedem crasso, tortuoso, ligno fragili, «cortice albido laevi cum fossulis longitudinalibus; «florere dicitur Aprili, floribus luteis, fide incolarum» Prz. in schedula). In Mongolia boreali: in trajectu inter Kenderlyk ad Assu-ssary-bulak, 7. Aug., Semis-tschij, 10. Aug., in litore austro-orientali lacus Uliungur, 15. Aug., in valle Kran, 29. Aug. 1876., deserto Gobi inter Thian-schan et Altai, fauce Gaschiun-dsuch, 23. Juni 77. (Potanin) et ibidem occidentem versus (Piassezki.)

58. *H. Regelii* n. sp.

H. fruticosum, caudice brevi crasso lignoso ramosissimo, ramis hornotinis ramosis, foliis fere omnibus sparsis carnosulis lineari-clavatis, floribus axillaribus solitariis minutissimis, staminodiis 5. brevibus carnosulis, filamentis sepalis aequantibus, stylo brevissimo, stigmatibus duobus divaricatis.

Hab. Altai australi, in deserto lapidoso inter lacum salsum Burá et fl. Tugurjuk, 5. Juli 77. (vix florere incipiens), in deserto Gobi inter Altai et Thian-schan sito, septentrionem versus a vico Nom, 21. Juni 77. (vix florens); in itinere a Hami versus trajectum jugi Thian-schan, in limite australi deserti sterilissimi limosi, 4. Juni 77. nondum florens sed vegetius (Potanin.)

Specimina nondum vel vixdum florida in nostris regionibus collecta, plantae distinctissimae, nec tamen rite definiendae, nisi in regionibus conterminis a cl. Alb. Regel sine ulla dubitatione eadem planta fructificans collecta esset, quae de affinitate illius dubia solvere licuit. Quamvis habitus a caeteris *Haloxylis* longe abhorreat, attamen certe huic generi adnumeranda, mediantibus *H. Griffithii* et *H. Thomsonii* m.

Caudices saepe pollice crassiores tortuosi fusci ramosi abbreviati. Rami hornotini graciles incipiente anthesi 3—6 pollicares, rarius pedales, nec fructiferi longiores, in parte lignescente cortice laevi tecti, foliosi, foliis sparsis exsiccatione nigricantibus. Folia carnosula clavata 2— $3\frac{1}{2}$ ''' longa, rarius in planta vegetiore nondum alabastra ferente semipollicaria, juniora exsiccata vix ultra $\frac{1}{3}$ ''' crassa, tunc demum paulo crassiora, glaberrima

patentissima teretiuscula obtusa, plerumque apice paulo crassiora. Flores in axillis superioribus exacte sessiles solitarii minutissimi, incipiente anthesi vix ultra $\frac{1}{2}'''$ magni, bibracteolati. Bracteolae flore breviores crassiusculae, breviter ovatae membranaceo marginatae obtusae. Sepala 5 suborbiculata concava latiuscule membranaceo marginata obtusissima, ima basi connata. Staminodia 5 rotundata carnosula margine glandulosa. Filamenta brevia inter ovarium et staminodia inserta et brevissime cum his connata inclusa. Antherae cordato-reniformes obtusissimae vix exsertae. Ovarium subglobosum in stylum brevissimum attenuatum, stigmatibus 2 vel 3 brevibus divaricatis. Sepala fructigera longe supra medium alata, parte inferiore concava latiuscula, parte supra alam sita brevi incurva, alis tenuibus flabellatis patulis $2\frac{1}{4}'''$ latis et $1\frac{1}{2}'''$ altis. Pericarpium carnosulo-coriaceum nigrum, tenuissime subpapulosum, a semine facile solutum. Seminis horizontalis integumentum fuscescens membranaceum. Embryo spiralis exalbuminosus, rostello flavicante, cotyledonibus multo brevioribus intense viridibus. Plumula vix conspicua.

Tribus VIII. Anabaseae.

Anabasis L.

1. Caules annui herbacei a trunco articulato-secedentes *A. cretacea*.
 Caules basi persistente lignescentes. 2.
2. Sepala tria tantum alata, folia obsoletissima truncata *A. aphylla*.
 Sepala 5 omnia alata, folia distincta apice setigera *A. brevifolia*.

59. *A. cretacea* Pall. Bge. Anab. rev. p. 36.

Hab. in Mongolia boreali, prope Kok-bucha, 10. Aug. 1876. (Potanin.)

60. *A. aphylla* L. Bge. l. c. p. 40.

Hab. in Mongolia boreali, in trajectu inter Kenderlyk ad Assu-Ssary-bulak, 4. Aug. 1876 et prope Kran, 28. Aug. 1876. (Potanin), in Mongolia occidentali (Piassezki.)

61. *A. brevifolia* C. A. M. Bge. l. c. p. 42. Ind. mong. l. c.

Hab. in deserto Gobi Mongoliae orientalis mediae (Bge., Tatarinow, Kirilow), Mongolia australi, in arenosis montium Alaschan frequens, 25. Sept. 1871. et in desertis ad boream montium horum, in argillosis rarius, 28. Juli 1873., boreali: in terra Chalcha, ad rupes et in lutosus lapidosus vulgaris, 25. Aug. 1873. (Przewalski), in rupestribus pr. Kran, 29. Aug., pr. Kok-bucha, 10. Aug. 76; Altai australi, inter lacum Burá et fl. Tugurjuk, 5. Juli 77., et pr. Zagan-derissu, 2. Juli 77. (Potanin.)

Brachylepis C. A. Mey.

62. *B. salsa* C. A. M. Bge. l. c. p. 48.

Hab. ad litus austro-orientale lacus Uliungur, 15. Aug. 76, et pr. Kertsch ad fl. Tschakyrta, Mongoliae borealis (Potanin.)

Nanophytum Less.

63. *N. erinaceum* Pall. Bge. l. c. p. 51.

Hab. in Mongolia boreali, prope Assu-ssary-bulak, in argilloso-salsis, 5. Aug. 76. et prope Kertsch ad fl. Tschakyrta (Potanin), in Mongolia occidentali (Piassezki.)

Petrosimonia Bge.

64. *P. sibirica* Pall. Bge. l. c. p. 60.

Hab. in Mongolia boreali in itinere a fl. Ulasty ad fl. Tumandy, 7. Aug. 76 et ad fl. Tschakyrta, 5. Aug. 76. (Potanin.)

Halogeton C. A. Mey.

Semen verticale..... *H. glomeratus*.

» horizontale..... *H. arachnoideus*.

65. *H. arachnoideus* Moq. Bge. l. c. p. 98. Ind. mong. l. c.

Hab. in Mongoliae orientalis australioris arenosis (Bunge, 1831., Tatarinow, 1840., Kirilow 1841), et australi, in montibus Alaschan, Sept. 71. (Przewalski fructif.), boreali: in ditone Chalcha, lapidosis nudis deserti aridissimi Golbyn-gobi frequens, 15. Aug. vix florens (Przewalski), in litore austro-orientali lacus Uliungur prope Salburta (Potanin), in Mong. occid. (Piassezki).

Collecta insuper in terra Chalcha, 20. Aug. 73, specimina duo sub N. 267 a. D° Przewalski, quae forsan ad speciem novam pertinent; distincta habitu multo robustiore, caule pedali annuo quidem sed lignescente, cortice alutaceo-albo, flores saltem medii in glomerulo pentandri, sed staminodia detegere haud potui, fructu deficiente seminum situs haud eruendus; affinis etiam *H. tibetico* m.

66. *H. glomeratus* M. B. Bge. l. c. p. 95.

Hab. in Mongolia boreali, pr. Kertsch ad fl. Tschakyrta, 5. Aug. 1876. (Potanin) et occidentali (Piassezki).

Sympegma Bge.

67. *S. Regelii* Bge. Salsol. turkest. ined.

Hab. in Mongolia boreali: in trajectu Udsjur-Ming-
gan, montibus Altai parallelo, ad fontem Tomi-
bulyk, 28. Juni 77. (Potanin), occidentali (Pias-
sezki.)

LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO
1786

DESCRIPTIONES PLANTARUM

NOVARUM ET MINUS COGNITARUM.

Fasciculus V.

5. AUCTORE

E. REGEL.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Братевъ Шумахеръ, Вас. Остр., Загребенинъ пер., № 1.

1877.

LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
NATURAL HISTORY
AND
ZOOLOGY
OF THE
CITY OF
NEW YORK

581.947

R 26d

pt. 5

LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO
BOTANY

**A. PLANTAE REGIONES TURKESTANICAS INCOLENTES,
SECUNDUM SPECIMINA SICCA
A REGELIO ET SCHMALHAUSENIO
DETERMINATAE.**

auctore E. Regel.

5.

I. Ranunculaceae *).

Anemone biflora D. C. prodr. I. p. 19. — Rgl. et Herd. pl. Semenov. n. 11. — R. Gortschakowi Kar. et Kir. enum. pl. song. n. 14. — Ledb. fl. ross. p. 727.

β. *parviflora*; flore duplo minore, sepalis 5—6 Mm. longis. In Turkestaniae montibus Arganakatty-tau. (Kuschakewicz.)

Ranunculus L.

Sectio. Euranunculus. (Flores lutei, calyx 5-sepalus, carpella inflata v. plano-compressa).

Subdivisio I. Grumosae. (Radix perennis, e fibris fasciculatis incrassatis grumosis constans).

Cohors I. Dissecti longirostri. (Folia pinnati- v. bipinnatisecta v. iterato-trisecta. — Carpella in rostrum carpello ipso longius desinentia, basi in appendicem compressam producta).

*) Die Beschreibungen der neuen von Frau Olga Fedtschenko gesammelten Pflanzen werden im Bulletin der Gesellschaft der Freunde der Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie in Moskau gedruckt, durch welche Gesellschaft auch die Fortsetzungen der Flora Turkestan's erscheinen werden.

2. *R. orientalis* L., carpellis sensim in rostrum recurvatum lineari-lanceolatum desinentibus. — Folia subpinnatisecta. — L. spec. 781.

α. typicus; adpresse villosus.

Hab. in Caucaso, in Asia minore, Persia.

β. villosus; patule villosus.

In Turkestan leg. Sewerzow *).

3. *R. linearilobus* Bnge; pube adpressa v. ad caulis basin paullo patenter villosa-canescens; foliis trisectis lobatisque v. iterato-trisectis v. segmento terminali magis elongato pinnatisecto bipinnatisectis; carpellis demum in spicam cylindricam dispositis, subito in rostrum filiforme recurvatum v. apice hamatum desinentibus. — Stolones nulli. Caulis humilis v. spithameus usque pedalis, plus minus ramosus. Folia radicalia trisecta v. iterato-trisecta v. bipinnatisecta (in uno eodem scimitimine occurrunt folia trisecta et bipinnatisecta), caulina decrescentia minus dissecta; foliorum segmenta linearia v. rarius oblonga integra v. bi-trifida. Sepala patula, extus patule villosa. Carpelli saepissime glabra v. basi vix pubescentia.

R. linearilobus Bnge. in reliq. Lehm. n. 22. — Rgl. in pl. Semenov. suppl. II. n. 206. (Bull. soc. mosq. 1870 n. 2). — Boiss. fl. or. I. pag. 33 **).

In Turkestan satis frequens occurrit.

*) *R. orientalis* *β. heterophyllus* Boiss. ad *R. oxyspermum* Willd. pertinet

**) Boissier in seiner exakten Bearbeitung der Pflanzen des Orients (Flora orientalis l. c.) stellt diese Pflanze zu den Arten mit kurzem Schnabel. Wahrscheinlich sah derselbe von dieser, nur in Turkestan an den verschiedensten Standorten häufig vorkommenden Art, nur ein unvollkommenes Exemplar, wie solche von Lehmann vorliegen. Unsere Pflanze stimmt mit dem Original von Bunge genau überein. Im Habitus stimmt unsere Pflanze mit *R. dasycarpus* Stev. überein, der aber rauh behaarte Früchtchen besitzt, die allmählig in den Schnabel verschmälert sind. Die Formen mit wiederholt 3-theiligen Blättern kommen *R. platyspermus* Fisch. nahe, deren Früchtchen ein kurzes rostrum besitzen.

4. *R. Sewerzowi Rgl.*, patule villosus; foliistrisectis lobatisque v. iterato-trisectis v. pinnatisectis; segmentis late obverse oblongis, apice bi- v. trifidis v. bi- trilobis v. rarius integris; carpellis demum in spicam cylindricam dispositis, subito in rostrum gracile apice hamatum excurrentibus. — Basi stolonibus filiformibus radicanibus. Caulis elatus, 1—2 pedalis. Carpella glabra, rostro glabro v. sub lente vix hirtulo. — Cetera ut praecedentis.

Habitat in Turkestan.

Sewerzow legit in montibus karatavicis Kcharli-tau et Mogol-tau; — Korolkow in montibus alatavicis Kumsana (3000'); — O. Fedtschenko prope Taschkent, et in valle fluvii Sarawschan (3—4000'); A. Regel in montibus Karatau.

5. *R. Meinshauseni Schrenk.*

Schrenk in Bull. Ac. Petrop. III. 309. — Trautv. in Bull. Mosc. 1860 p. 65. — Affinis *R. linearilobo*, differt: caule basi patule, apicem versus adpresse villosus; foliis patule villosis; floribus iis affinium specierum majoribus; carpellis in capitulum ovatum v. subglobosum collectis, apice in rostrum tenue filiforme apice recurvatum carpellum subaequans v. superans desinentibus. — Carpella glabra v. hirtula.

R. Meinshauseni Schrenk in Bull. Ac. Petr. III. 309. — Trautv. in pl. Schrenk. n. 25 in Bull. Mosc. 1860 I. p. 64.

Hab. in Turkestan.

Subdivisio II. Nivales. Radix perennis fibrosa. Folia radicalia integra v. lobata v. 3—5 secta; caulina palmato-partita. Caules uni- vel rarius biflori.

6. *R. altaicus Laxm.*, caule unifloro v. rarissime bifloro; foliis radicalibus cuneiformibus usque suborbiculatis, saepissime apice tantum incis, rarius subcircum grosse crenatis v. ad $\frac{2}{3}$ longitudinis trilobis; caulinis palmatifidis, lobis oblongis integerrimis v. minus profunde incis; pedunculis versus apicem calycisque saepissime fusco-villosis v. rarius albido-subhirsutis; calyce patulo, quam corolla

duplo brevior; carpellorum rostro tenui lineari recto v. apice recurvo carpello glabro subito imposito, quam carpellum circiter duplo brevior.

Affinis *R. nivali* Gunn. et *R. sulphureo* Soland. (Fries summa veg. I. p. 142). Posterior cui cl. Trautvetter plantam altaicam adjunxit: «carpellis in rostrum porrectum carpellum aequans sensim attenuatis» dignoscitur.

R. altaicus Laxm. in nov. comm. Ac. Petr. XVIII. p. 533 tab. 8. (1774). — Ledb. fl. ross. I. p. 37. — Variat:

α. typicus; foliis radicalibus cuneatis v. ovatis v. subrotundis, apice tantum grosse crenatis v. varie inciso-lobatis; pedunculis apicem versus calycibusque extus insigniter fusco-villosis.

R. sulphureus var. *altaica* Trautv. pl. Schrenk. (Bull. Mosq. 1860 pag. 69. n. 33. — *R. altaicus* Laxm. l. c. — Ledb. fl. ross. I. 37. — *R. frigidus* Willd. spec. II. p. 1312. — D. C. prodr. I. 37. — Rgl. pl. Radd. n. 64.

Habitat in Sibiria altaica et baicalensi et in provinciis turkestanicis. —

β. pubescens; pedunculis apicem versus calycibusque extus albedo-pubescentibus. Cetera ut praecedentis.

Hab. in Turkestaniae montibus Alatau (Kuschakewicz) et Thianschan (Kaulbars).

γ. fraternus; foliis radicalibus ovatis v. subrotundis, supra basin ad apicem grosse crenatis; pedunculis apicem versus calycibusque extus fusco- v. albedo-villosis.

R. fraternus Schrenk enum. pl. nov. I. p. 103. — *R. sulphureus* var. *fraterna* Trautv. pl. Schrenk. Bull. Mosq. 1860 p. 70. In montibus Turkestaniae satis frequens.

δ. trilobus; foliis radicalibus subreniformibus, ad medium trilobis, lobis apice grosse dentatis. — Cetera ut var. *α*.

R. sulphureus var. *triloba* Trautv. l. c.

Hab. in montibus Tarbagatai.

7. *Ranunculus lasiocarpus* C. A. Meyer.

C. A. M. in Ledeb. fl. alt. II. 323. — Ledeb. fl. ross. I. p. 37.

Satis affinis *R. altaico*, differt autem: foliis radicalibus trisectis, segmentis breviter petiolatis varie lobatis, carpellis pubescentibus rostro brevi apice uncinato.

Pedunculi calycesque saepissime fusco-villosi.

Satis frequens in montibus editioribus alatavicis (8—10000'). (Kuschakewicz et Korolkow.)

8. *Ranunculus Alberti* Rgl. et Schmalh.; caule simplici unifloro v. supra basin bifido bifloro; foliis radicalibus reniformibus v. subrotundis, grosse crenato-dentatis; folio caulino inferiore saepissime petiolato, ovato, crenato-lobato v. palmato-3—5-fido, lobis oblongis; caulino supremo sessili palmatifido, lobis 3—5 lineari-oblongis; pedunculis calycibusque glabriusculis v. vix pilosulis; receptaculo glabro; carpellis glabris, subrotundis, rostro brevi hamato coronatis.

Glaber. Caulis humilis usque spithameus, tenuis, erectus v. adscendens, simplex v. supra basin bifidus, ramis subaequilongis unifoliis unifloris. Flos parvus, magnitudine *R. auricomi*, aureus.

Caule simplici v. bifido gracili, foliis pedunculis calycibusque glabris, foliis caulinis saepissime 2 minusque incisis, floribus minoribus, carpellorum rostro breviora a *R. altaico* facile dignoscitur. *R. auricomus* L. differt caule elatiore multifloro, foliis caulinis digitato-partitis, carpellis velutinis.

In Turkestaniae montibus Alatau in valle Karakol et in trajectu Kumbel (6—9000') leg. A. Regel.

9. *R. songoricus* Schrenk; radice fasciculata, fibrosa; caule glabro, humili usque pedali, simplici v. bifido, ramis simplicibus unifloris; foliis glabris: radicalibus supra basin v. ad basin tripartitis: segmentis obovatis, intermedio trilobo, lateralibus in latere exteriori varie lobatis dentatisque; foliis caulinis superioribus palma-

tim in lobos 3—5-lineares oblongos divisis; pedunculo apicem versus calyceque patulo latere exteriori pilosis v. subglabris; carpellis glabris subito in rostrum breve porrectum apice hamato-recurvum desinentibus.

Affinis species *R. polyrhizos* Steph. differt: radicis fasciculatae fibris crassioribus, caule 1—5 floro, carpellis rostro brevissimo subito a carpelli apice uncinato-recurvo. *R. lasiocarpus* C. A. M. pedunculo apicem versus calyceque ferrugineo-villosis, floribus duplo majoribus, foliis magis dissectis, carpellorum pubescentium rostro brevissimo apice uncinato facile dignoscitur.

R. songoricus Schrenk. enum. pl. nov. II. p. 67.

Habitat in montibus editioribus Turkestaniae.

10. *Trollius patulus* Salisb. δ . *sibiricus* Rgl.

Rgl. et Tiling fl. ajan. p. 38. — Tr. americanus Mühlbg. et Gaissh. in Donn. cat. h. cantabr. — D. C. prodr. I. p. 46. — Ledeb. fl. ross. I. p. 734. — Rgl. et Tiling fl. ajan. p. 34. — Tr. pumilus D. Don. fl. nepal. p. 195.

In montibus editioribus prope Wernoje (Kuschakewicz), — Alatau in montibus Alexander in trajectu Kumbel (9000') leg. A. Regel, — in valle Sarawschan in angustiis Saratat (7—12,000') O. Fedtschenko.

Specimina turkestanica pygmaea 2 $\frac{1}{2}$ —7 Cm. alta, foliis caulinis saepissime 1—2 sessilibus v. in vagina petioli sessilibus, rarius petiolatis.

Wir haben in der Flora ajanensis Tr. americanus Mühlbg. et Gaissh. in Berücksichtigung des Vaterlandes, von der in Rede stehenden Form, unterschieden. Seitdem haben wir uns aber sowohl durch Beobachtung an cultivirten, wie an den zahlreich wild gesammelten Exemplaren überzeugt, dass die in Rede stehende, im Osten Sibiriens und in den Hochalpen Turkestans und Chinas wachsende Form, von der Amerika's gar nicht verschieden ist.

11. *Eranthis longistipitata* Rgl. (Plantae Semenov. suppl. II. p. 8 n. 39 b. (Bull. Mosq. anno 1870 *).

*) Bei Beschreibung dieser Art lagen uns seiner Zeit nur wenige Exemplare vor, so war dieselbe nach den damals vorliegenden Exemplaren mit einem Blütenstiel, der länger als die Involucralblätter und 5 Kelchblättern

Turkestaniae in montibus Karatau (prope Bugun et in Mogol-tau) leg. Sewerzow et Krause, prope Taschkent, Tschupanata (O. Fedtschenko), — prope Timir-Kabuk inter Taschkent et Karak-ati (Korolkow).

12. *Delphinium rugulosum* Boiss., in Ann. sc. nat. 1841. p. 361. — Ejusd. fl. or. I. p. 76. — *D. camptocarpum* γ. *rugulosum* Bnge. reliq. Lehm. n. 37 in Mem. Ac. Petr. VII (1854). — Rgl. pl. Semenov. suppl. II. n. 44 b. in Bull. Mosq. anno 1870.

Foliis floralibus florem superantibus, floribus in spicam laxam foliosam dispositis, capsulis villosis subsessilibus v. pedunculo quam capsula plus duplo brevior suffultis, facile a *D. camptocarpum* dignoscitur.

Capsulae elevato-rugulosae.

In regionibus turkestanicis frequens.

13. *Delphinium barbatum* Bnge. (reliq. Lehm. n. 38 in Mem. Ac. Petr. VII. 188). — Variat: Puberulum v. pedicellis tantum glan-

beschrieben, Charaktere, welche nach den uns jetzt vorliegenden Exemplaren keinen Werth haben. Wir geben daher im Nachstehenden die Charaktere der *Eranthis*-Arten Mittelasien's:

a. *Flores fructusque sessiles.*

1. *E. hiemalis* Salisb.

Carpella breviter stipitata, oblongo-elliptica, demum horizontaliter patentia. Involucri foliola palmatim in lobos lineari-oblongos integros v. apice paucidentatos divisa, stylo recto coronata.

b. *Flores breviter, fructus longius pedunculati.*

* *Carpella oblongo-elliptica breviter stipitata.*

2. *E. sibirica* D. C., carpellis erecto-patentibus, stylo recto coronatis. —

Involucri foliola in lobos paucos integros v. parce dentatos divisa.

3. *E. uncinata* Turcz., carpellis maturis horizontaliter patentibus, stylo apice plus minus uncinato coronatis. — Involucri foliola palmatim lobata v. dentata v. rarius ad medium in lobos lineari-oblongos partita.

** *Carpella lineari-oblonga, demum longe stipitata.*

4. *E. longistipitata* Rgl.

Pedunculi floriferi involucri breviores v. rarius longiores, fructiferi involucrum superantes. Carpella erecto-patentia, in statu maturo stipite circiter 15 Mm. longo suffulta, stylo recto v. recurvato coronata. — Involucri foliola iterato palmatilobata, lobis lineari-oblongis. Flos 6- v. rarius 5-sepalus.

duloso-villosis v. breviter puberulis. Proxime accedit ad *D. divaricatum* Ledb., sepalis apice barbatis, calcar brevius apice paullo inflato obtuso parceque recurvo bene distinctum.

In regionibus turkestanicis frequentissime occurrit.

14. *Delphinium hybridum* W. ε . *sulphureum*, racemo elongato densiusculo v. laxo, calcar sepalis glabris longiore, floribus sulphureis. In regionibus turkestanicis satis frequens.

15. *Delphinium longipedunculatum* Rgl. et Schmalh.

Perenne; caule subdivaricato-ramoso, basi foliisque hirtis, apicem versus glabro; foliis cordato-subrotundis, palmatilobatis, lobis incisis, lobulis late oblongis obtusis; racemis laxis; pedunculis quam flores duplo-pluries longioribus; floribus azureis; petalis superioribus breviter bilobis, glabris, in calcar glabrum rectum ad apicem sensim attenuatum sepala demum superans abeuntibus; petalis inferioribus bilobis, unguiculatis, barbatis; carpellis saepissime tribus, glabris.

Affine *D. hirtum*, caule subdivaricato-ramoso, pedunculis elongatis flores 2-pluries superantibus, foliis palmatilobatis (nec palmatisectis) etc. satis differt.

In montibus Karatau inter Turkestan et Tschemkent legit A. Regel.

II. Berberideae.

16. *Berberis heteropoda* Schrenk. enum. pl. nov. p. 102. — Ledb. fl. ross. I. 742. — Rgl. *Berberis* in Acta h. Petr. II. 418. — *B. sphaerocarpa* Kar. et Kir. enum. pl. alt. n. 46. *)

Variet: α . *typica*; baccis magnis globosis v. ovato-subglobosis, atropurpureis, immaturis pruina glauca vestitis, maturis epruinosis. — *B. heteropoda* Schrenk. l. c. — Kar. et Kir. l. c.

*) Haec species a *B. vulgari* facile dignoscitur: „foliis magis coriaceis; racemis corymbosis, ex alabastro 2-plures egredientibus, alio plurifloro, altero v. alteris 1—3 floris; baccis caeruleis v. e caeruleo atropurpureis, saepissime glauco-pruinosis“.

Habitat in montibus alatavicis cisiliensibus (Schrenk, Kar. et Kirilow) et in montibus thianschanicis (Scharnhorst).

β. caerulea; baccis magnis, globosis v. ovato-globosis, caeruleis, glauco-pruinosis. — *B. heteropoda* Rgl. l. c.

Hab. in montibus alatavicis prope Wernoje (A. Regel, Kuschakewicz) et in Kokania (O. Fedtschenko).

γ. elliptica; baccis ellipticis glauco-pruinosis.

Kokania, in valle fluvii Sarawschan (O. Fedtschenko), in montibus alatavicis cisiliensibus in valle fluvii Tschotkal (A. Regel).

δ. oblonga; baccis elliptico-oblongis, caerulescenti-atropurpureis, glauco pruinosis v. epruinosis.

In Turkestaniae montibus alatavicis transiliensibus in valle Tschotkal, 4—6000' alt. (A. Regel).

ε. densiflora; racemis valde densifloris, ex alabastro saepissime pluribus egredientibus, alteris unifloris; baccis minoribus, globosis, ex atropurpureo caeruleis, initio glauco-pruinosis.

Turkestaniae, in faucibus Magian. (O. Fedtschenko).

17. *Berberis integerrima* Bnge.

(Cfr. Rgl. Berb. in Acta h. bot. Petr. II. 418).

A specie affini *B. vulgaris* L. differt: «ramis floriferis junioribus teretibus laevibus v. vix sulcatis; foliis subcoriaceis subtus reticulato-venosis, integerrimis v. vix spinuloso-serratis; baccis subglobosis».

Variat: *α. typica*; baccis globosis v. ovato-subglobosis, atropurpureis, glauco-pruinosis. — Racemi folia aequantes usque duplo superantes, nunc laxi nunc densi, breviter v. longe pedunculati.

B. integerrima Bnge. reliq. Lehm. n. 44 (lusus racemis densifloris breviter pedunculatis). — *B. densiflora* Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transc. und Pers. in Mem. soc. Mosq. XII. p. 9, tab. III. fig. 2 (lusus racemis densifloris sub anthesi folia subaequantibus). — *B. nummularia* Bnge. reliq. Lehm. n. 45 (lusus racemis laxifloris longe petiolatis folia subduplo superantibus).

Specimina ab O. Fedtschenko et Kuschakewicz in Turkestanicae regionibus occidentalibus collecta ad lusum racemis pedunculatis laxifloris folia paullo-duplo superantibus pertinent.

β. *pyrocarpa*; baccis minoribus, globosis v. ovato-subglobosis, rubris. — Racemi pedunculati, laxi, folia paullo usque duplo superantes.

In Turkestanicae regionibus orientalibus. (Kuschakewicz, A. Regel). *)

III. Papaveraceae.

18. *Roemeria hybrida* D. C.

D. C. syst. II. 93. — Ejusd. prodr. I. 122. — Ledb. fl. ross. I. 92. — *Chelidonium hybridum* M. B. fl. taur. cauc. II. 3. — *Glaucium violaceum* M. B. l. c. III. 363.

Hab. in Tauria, in Caucaso, in Oriente et in provinciis turkestanicis ubi frequentissime in variis formis occurrit.

Variat:

* *Folia bi-tripinnatisecta, laciniae saltem foliorum caulnorum lineares.* (Calyces glabri v. plus minus hispidi).

α. *typica*; capsulis setis sparsis hispidis, caeterum glabris v. pube minima vestitis; pedunculis rectis.

R. hybrida D. C. et auct.

β. *refracta*; pedunculis fructiferis demum recurvis. Cetera ut praecedentis.

R. refracta D. C. syst. II. 93. — Ejusd. prodr. I. 122. Ledb. fl. ross. I. 92.

γ. *bicolor*; capsulis setulis erectis dense hispidis.

R. bicolor Rgl. pl. Semenov. suppl. 2. n. 57 c. (Bull. soc. Mosq. 1870).

*) Die erneuerte Vergleichung der zahlreichen in Central-Asien vorkommenden Formen von *Berberis*, lässt es mir jetzt fast richtiger erscheinen, auch *B. integerrima* und *B. sinensis* noch zu dem Formenkreis von *B. vulgaris* zu stellen. (E. R.)

δ. *rhoeadiflora*; capsulis glabris. — Ludit pedunculis fructiferis rectis v. plus minus recurvis, petalis 14—50 Cm. longis.

In regionibus turkestanicis frequentissime occurrit.

R. *rhoeadiflora* Boiss. diagn. ser. I. fasc. VI. p. 7. — Ejusd. fl. or. I. p. 119.

** *Folia 1—3 pinnatisecta, segmentis ovato-oblongis.*

ε. *orientalis* siliquis setis sparsis hispidis.

R. *orientalis* Boiss. in Ann. sc. nat. 1841, p. 374. — Ejusd. fl. or. I. p. 118. *)

IV. Cruciferae.

Diptychocarpus Trautv. (pl. Schrenk. n. 116 in Bull. Mosq. 1860 p. 108) **).

*) Schon bei der Aufstellung von R. *bicolor* sprachen wir es aus, dass wahrscheinlich diese und die andern Roemeria-Arten, richtiger als Formen von R. *hybrida* betrachtet werden müssten. Die zahlreichen, uns aus Turkestan vorliegenden Formen bestätigen diese Ansicht vollkommen.

Nach Grösse der Blumen, Auftreten eines kurzen Flaumes zwischen den Borsten der Schote, abstehender oder theils angedrückter bald starker, bald schwacher Beharung, könnte man die Zahl der Formen noch bedeutend vermehren.

**) Die Gattung *Diptychocarpus* unterscheidet sich von *Malcolmia* durch die unteren Schoten, welche fast stielrund sind und so verkorken, dass die Klappen derselben schwierig sich ablösen, so dass man die Schoten leichter in Stücke brechen als die Klappen trennen kann. Letzteres ist jedoch in allen mir vorgekommenen Fällen möglich, so dass dieselben nicht zu wirklichen Gliederschoten werden. Ausserdem sind die oberen Schoten flach gedrückt und stimmen vollständig mit *Malcolmia* überein, zu welcher Gattung auch die Art, nach der von Trautvetter die Gattung aufgestellt ward, von Bernhardt gerechnet worden ist. Man könnte daher *Diptychocarpus* auch als Untergattung zu *Matthiola* ziehen, wenn nicht alle hierher gehörigen Arten schon darum eine ganz abweichende Tracht besäßen, dass sie niemals die angedrückte weisse dichte Behaarung zeigen, welche die Arten der Gattung *Matthiola* auszeichnen. Junge Exemplare mit noch nicht entwickelten Früchten zeigen vielmehr den Habitus von *Chorispora*, zu welcher Gattung denn auch Fischer den *D. strictus* und ich selbst den *D. hispidus* gestellt hatten.

Conspectus specierum florae turkestanicae.

- D. strictus* Trautv. Pilis simplicibus saltem basin versus molli-
ter villosus; pedicellis calyce duplo brevioribus; petalis lineari-
oblongis; rostro siliqua glabra 3—6-plo brevior.
- D. hispidus* Rgl. Pilis simplicibus longioribus minutisque glanduliferis hispidus; pedicellis calycem subaequantibus; petalis oblongis; rostro glabro, siliqua hispida 3—6-plo brevior.
- D. sarawschanicus* Rgl. et Schmalh. Pilis simplicibus satis laxè dispositis subhispidus; pedicellis calyce duplo brevioribus; petalorum lamina obverse oblonga; rostro siliqua glabra v. hirtula multoties brevior.
- D. Olgae* Rgl. et Schmalh. Pilis simplicibus dense hispidovillosus; pedicellis calyce subduplo brevioribus; petalorum lamina lineari; rostro conico, brevissimo, siliqua multoties brevior.

19. *Diptychocarpus strictus*. Trautv. l. c.

Chorispora stricta Fisch. et Mey. ind. sem. hort. Petr. I. p. 24. — Matthiola Fischeri Bernh. ind. sem. h. Erfurt. anno 1835. — Ledeb. fl. ross. I. p. 110. — Raphanus strictus M. Bieb. fl. taur. cauc. III. 452.

In Turkestaniam frequentissime occurrit. — Folia linearia v. lineari-oblonga, dentata v. grosse sinuato-dentata.

20. *Diptychocarpus hispidus* Rgl.

Chorispora hispida Rgl. pl. Semenov. suppl. II n. 93. 6. (Bull. Mosq. 1870.)

Annuus v. biennis. Caules erecti, 20—40 Cm. alti, basin versus ut folia hispidopilosa pilis minutis glanduliferis intermixtis, apice minute glanduloso-hirtuli v. glabri. Sepala plus minus glandulis breviter stipitatis munita, apice saepissime hispidobarbata. Petala pallide rubra. Siliquae plus minus dense hispidae. Stigma bilobum, lobis secus stylum decurrentibus.

In Turkestaniae montibus Karatau prope Boroldai legit Korolkow.

21. *Diptychocarpus sarawschanicus* Rgl. et Schmalh.

Radix annua v. biennis, caulem unicum v. plures erectos basi v. a basi ad medium foliatis simplices v. ramosos pilis simplicibus sparsis subhispidos vestitos, protrudens. Folia oblongo-lanceolata, dentata usque runcinato-pinnatifida, pilis simplicibus subhispida. Pedicelli plus minus hispidi, calycem dimidium sparse hirtum vix aequantes. Petalorum lamina obverse oblonga, ut videtur pallide rubra, calycem vix duplo superans. Siliquae strictae, sparse hirtulae v. glabrae, usque 10 Cm. longae, $1\frac{1}{2}$ —2 Mm. latae, valvis superiorum planis nervo medio prominente percursis; rostro 2—6 Mm. longo. — Stigmatis lobi arcte conniventes, secus rostrum decurrentes. Semina complanata, circum alata.

In Kokaniae valle fluvii Sarawschan leg. O. Fedtschenko.

(Ex Bull. Имп. Общ. Люб. естеств. антр. и этног. hic iterum publicatum.)

22. *Diptychocarpus Olgaе* Rgl. et Schmalh.

Perennis multicaulis, caulibus foliis pedicellis calycibusque dense villosis-hispidis. Folia oblonga, petiolata; radicalia runcinato-dentata v. sinuato- v. subruncinato-pinnatifida, lobis oblongis integerrimis v. obtuse dentatis; caulina pauca, runcinato-dentata. Caules erecti, humiles, florum racemo terminati, incluso racemo 5—10 Cm. alti, basi tantum foliati. Pedicelli satis robusti, erecto-patentes, densissime albo-villosi, siliquae diametro circiter triplo longiores, calyci basi subbisaccato plus duplo breviores. Petalorum unguiculatum lamina exserta, lineari-oblonga, ut videtur lurido-purpurea, calycem dimidium circiter aequans. Stigmatis lobi erecti, secus stylum decurrentes. Siliquae erecto-patentes, lineares, pilis simplicibus hirtae, stylo conico siliquae diametro duplo longiore terminatae, 4—5 Cm. longae, $1\frac{1}{2}$ —2 Mm. latae; valvis nervo medio elevato percursis. Semina complanata, ala scariosa circumdata; cotyledones accumbentes.

Habitu Hesperidi secundiflorae affinis.

Habitat in Kokaniae valle Sarawschan. (O. Fedtschenko.)

(Ex Bull. Имп. Общ. Люб. естеств. антр. и этног. hic iterum publicatum.)

23. *Arabis* (?) *Korolkowi* Rgl. et Schmalh. Annuua v. biennis; caule humili usque subspithamaeo, simplici, glabro; foliis glabris, inaequaliter repando-dentatis; radicalibus obovato-oblongis, in petiolum attenuatis; caulinis 2—4, sessilibus, e basi cordata oblongis v. elliptico-oblongis, supremis margine laxe piloso-ciliolatis; pedunculis florem aequantibus v. paullo superantibus calycibusque laxe patule pilosis; petalis unguiculatis, lineari-oblongis, calycem subduplo superantibus, albis, circiter 4 Mm. longis.

Folia latere inferiore saepe purpurascentia. Ovarium lineare. Stylus brevis, stigmate indiviso punctiformi coronatus. Specimina fructifera desunt. Affinis *A. hirsutae*, habitu alieno, caule humili flexuoso 2—4 folio, foliis majoribus cauleque glabris, diversa.

In Turkestaniae arenosis inter Taschkent et Karak-Ati in itinere ad Chiwam leg. Korolkow.

Parrya R. Br.

Conspectus specierum imperium rossicum incolentium *).

I. Perennes, rhizomate subterraneo ramoso multicipiti; ramulis epigaeis nunc brevissimis, nunc magis elongatis ad basin foliis emortuis persistentibus dense vestitis.

A. Florum racemi nunc pedunculati, nunc nidulantes, aphylli; pedicelli elongati pedunculos radicales unifloros aemulantes. Folia omnia radicalia.

a. *Racemi nidulantes* (Pedicelli subradicales uniflori).

P. excapa C. A. M., calyce glabro.

P. ericalyx Rgl. et Schmalh., calyce lanato.

*) In der Enumeratio plantarum in regionibus cis- et transiliensibus a Cl. Semenovio collectarum, supplementum II sub n. 71 a (in Bull. Soc. Mosq. 1870), habe ich eine Uebersicht der Arten dieser Gattung gegeben. Mehrere neue Arten, die mir jetzt aus Turkestan vorliegen, veranlassten mich zu einer erneuerten Durchsicht dieser Gattung, wobei ich auch die früher von mir eingezogene *P. stenocarpa* Kar. et Kir. wieder herstelle, da sich diese durch die viel längeren und schmäleren Schoten von *P. nudicaulis* gut unterscheidet.

b. *Racemi pedunculati, nudi, radicales v. ex rhizomatis ramulis egredientes.*

* *Folia integerrima v. dentata v. irregulariter runcinato-lobata.*

P. nudicaulis L., petalorum ungue calycem aequante v. paullo usque sesqui superante; siliquis lineari-lanceolatis, irregulariter constrictis, 5—8-plo longioribus quam latis.

P. stenocarpa Kar. et Kir., petalorum ungue calycem sesqui-duplo superante; siliquis elongato-linearibus, multoties longioribus quam latis.

** *Folia regulariter runcinato-pinnatifida.*

P. pinnatifida Kar. et Kir.

II. *Perennes, rhizomatis ramulis omnibus brevissimis. Caulis humilis pauci-plurifolius, simplex, florum racemo v. corymbo composito terminatus.*

P. microcarpa Ledb., foliis oblongo-lanceolatis, integerrimis, setis bipartitis adpressis strigosis; racemis simplicibus; siliquis glabris, brevibus, 5—6-plo longioribus quam latis.

P. Ermani Ledb., foliis cuneato-obovatis, apice crenatis 3—5, utrinque tomentosis; racemis simplicibus; siliquis glabris.

P. flabellata Rgl., foliis cuneato-obovatis, apice crenatis v. flabellato-incisis, siliquisque utrinque tomentosis; racemo ramoso, corymboso.

III. *Fruticuli humiles ramosi, ramis nudis, ramulis hornotinis foliatis, foliis hieme caducis.*

P. fruticulosa Rgl. et Schmalh.

24. *Parrya excapa* C. A. M. in Ledb. fl. alt. III. p. 28. — Ledb. ic. pl. fl. ross. tab. 86. — Ejusd. fl. ross. I. 132. — Rgl. pl. Semenov. suppl. II. n. 71 a. — Hook. et Th. fl. of brit. Ind. p. 131.

Dense caespitosa. Folia omnia radicalia, petiolata; petiolo glabro v. rarius laxe ciliato; lamina cuneato-oblonga usque subrotunda, rotundato-obtusa, integerrima v. obtuse dentata, glabra. Racemus sessilis v. breviter pedunculatus, nudus, saepissime glaber v. rarius laxe pilosus. Pedicelli graciles, florem paullo-pluries superantes. Calyx glaber v. apice barbulatus. Petalorum unguis calycem aequans v. superans. Siliquae late lineares, compresso-planae, glabrae, usque 8 Cm. longae et 6 Mm. latae, stylo brevi apiculatae; valvae nervo intermedio prominente notatae. Semina compresso-plana, ovata, immarginata v. margine angusto circumdata.

Habitat in alpinis altaicis, turkestanicis et tibetanis.

25. *P. eriocalyx* Rgl. et Schmalh.

Humilis, dense caespitosa. Folia omnia radicalia, spathulato-lanceolata, in petiolum latum attenuata, integerrima, praecipue ad petiolum pilis setosis horizontaliter patentibus ciliata. Pedicelli radicales, graciles, flores pluries superantes, setis sparsis vestiti, folia aequantes v. superantes. Calyx bisaccatus, albido-setoso-villosus. Petala obovata, apice rotundata, ungue calycem aequante v. paullo superante. Antherae lineari-elongatae. Pistillum lineare. Siliqua ignota *).

In Turkestaniae tractu Terekti legit Kaulbars.

25. *P. nudicaulis* (Arabid.) L. spec. p. 913. — *P. macrocarpa* R. Br. in Parry voyag. I. app. 270. — Hook. et Thoms. fl. of brit. Ind. p. 131. — *P. Linneana* et *P. macrocarpa* Ledeb. fl. ross. I. 131. — *P. arctica* R. Br. in Parry 1. voyag. app. tab. 13. — *Hesperis arabidiflora* D. C. syst. II. 454. — *Neurolooma arabidiflorum* D. C. prodr. I. 156. — *Arabid. grandiflora* W. spec. III. p. 534. —

*) Wir haben diese Art, von der wir nur ein blühendes Exemplar besitzen, nach dem Habitus hierher gestellt, vielleicht gehört dieselbe zu einer andern Gattung, doch spricht auch die Bildung des Pistills für Parrya.

Arabis nudicaulis D. C. syst. II. 240. — *Hesperis scapigera* D. C. syst. II. 454. — *Neuroloma nudicaule et scapigerum* D. C. prodr. I. 156. — *Cheiranthus scapiger* Adams in Mem. Mosq. V. 112. — *P. nudicaulis* (exclusa *P. stenocarpa* Rgl.) in pl. Semenov. suppl. II. sub. 71 a.

Habitat in America et Asia boreali et in montibus editioribus Asiae mediae et in alpihus tibetanis himalaicisve.

27. *P. stenocarpa* Kar. et Kir. enum. pl. song. n. 70. — Ledb. fl. ross. I. p. 751. — *P. nudicaulis* ε. *stenocarpa* Rgl. in pl. Semenov. suppl. II. sub n. 71 a et 71 b. — *P. stenoloma* Schrenk. in ind. sem. h. Petr. VIII. p. 19.

Hab. in alpihus turkestanicis.

28. *P. pinnatifida* Kar. et Kir. enum. pl. song. n. 69. — Ledb. fl. ross. I. 751. — Rgl. pl. Semenov. suppl. II. sub n. 71 a.

Dense caespitosa, rhizomatis ramis subterraneis demum subnudis, epigaeis abbreviatis v. magis elongatis et iterato breviter denseque ramulosis, ramis ramulisque ad basin foliis emortuis dense vestitis. Folia petiolata, lineari-oblonga, regulariter runcinato-pinnatifida, glabra v. sub lente setulis brevissimis glanduliferis hispidula. Pedunculi folia superantes ut pedicelli saepissime glandulis stipitatis hispiduli. Petalorum purpureorum obovatorum unguis calycem sesqui usque subduplo superans. Siliquae lineares, strictae v. curvatae, stylo siliquae latitudinem superante coronatae, 3—4¹/₄ Cm. longae, 3 Mm. latae, juniores interdum glandulis breviter stipitatis hispidulae, maturae semper glabrae. Semina margine scarioso transparente lato circumdata.

Habitat in alpihus turkestanicis (Karelin et Kirilow, Schrenk, O. Fedtschenko).

29. *P. microcarpa* Ledb. fl. ross. I. p. 132. — Rgl. pl. Semenov. suppl. II. sub n. 71a. — *Draba grandiflora* C. A. M. in Ledb. fl. alt. III. p. 74. — Ledb. ic. fl. ross. I. 267. — *Eutrema piliferum* Turcz. cat. baic. — *Pachyneurum grandiflorum* Bunge ind. sem. h. Dorp. anno 1839.

Dense caespitosa. Caules erecti, 3—5 Cm. alti, foliis 4—5 alternis vestiti. — Racemus corymbosus. Antherae ovatae. Siliquae glabrae, 1—1½ Cm. longae, 1½—2 Mm. latae, stylo brevissimo diametro siliquae duplo usque pluries brevior coronatae. Stigma subcapitatum, breviter bilobum. Semina ovata, immarginata.

Habitat in alpinis altaicis.

30. *P. Ermani* Ledeb. fl. ross. I. 132. — Rgl. pl. Semenov. suppl.

II. sub. n. 71 a.

Humilis, dense caespitosa. Folia caules calycesque pilis simplicibus stellatisque dense albo-tomentosa, siliquae glabrae. Folia radicalia obovato-cuneata, apice grosse 3—5-crenata; caulina angustiora, nunc subtrifida lobis lineari-oblongis, nunc integerrima obverse oblonga. Racemus lanatus, simplex, initio corymbosus, demum magis elongatus. Flores pro genere parvi, ut videtur albidii. Siliquae glabrae, stylo brevissimo latitudine siliquae pluries brevior coronatae, 8—10 Mm. longae, 1½—2 Mm. latae. Semina ovata, immarginata.

Habitat in montibus editioribus Kamtschatkae.

31. *P. flabellata* Rgl. in pl. Semenov. suppl. II. n. 71 c.

Caespitosa, ubique pilis simplicibus stellatisque cinereo-tomentosa, multicaulis, caulibus e basi procumbente adscendentibus, foliatis. Folia cuneato-obovata, apice grosse crenata v. crenato-lobata v. flabellato-incisa. Flores in racemum dense lanatum corymbosum simplicem v. saepissime ramosum densum congesti. Petalorum caeruleo-roseorum obovatorum unguis calycem circiter sesqui superantes. Siliquae tomentosae, lineari-oblongae, rectae v. subfalcatae, stylo brevi latitudine siliquae circiter duplo brevior coronatae, 4—5 Cm. longae, 3—3½ Mm. latae; valvae nervo intermedio nervisque lateralibus prominentibus notatae. Stigma capitatum, breviter bilobum. Semina ovata, immarginata (nec marginata).

Habitat in alpinis kokanicis Dshaman-Daban (Sewerzow), in tractu Dschiptik et Karakasuk (O. Fedtschenko).

32. *P. fruticulosa* Rgl. et Schmalh.

Ubique glabra. Fruticulus humilis, ramosus, vix spithameus usque pedalis et ultra; rami nudi; ramuli hornotini foliati. Folia caduca, lineari-oblonga, v. rarius lineari-lanceolata, integerrima v. paucidentata v. runcinato-pinnatifida. Pedunculi folia superantes, racemo trifloro v. rarius 1—2 floro terminati. Pedicelli flore breviores. Calyx bisaccatus, purpurascens. Petala obcordata, ut videtur pallide rubra, ungue calycem circiter aequante. Antherae lineari-elongatae. Siliquae juniores lineari-elongatae, stylo brevi coronatae; stigma breviter bilobum.

Variat: α . *subintegra*; foliis lineari-oblongis, integerrimis v. paucidentatis.

In Kokania, in valle fl. Sarawschan 3—7000' in monte Aksai. (O. Fedtschenko.)

β . *runcinata*; foliis lineari-lanceolatis, grosse runcinato-dentatis v. runcinato-subpinnatifidis.

Kokania, in valle fl. Sarawschan in tractu Kadschraga (10900') leg. O. Fedtschenko.

Glabritie omnium partium, caule fruticuloso, ramis nudis (nec foliis emortuis dense vestitis), foliis caducis, petalorum ungue calycem aequante, stylo breviora a *P. pinnatifidae* varietatibus ramulis epigaeis magis elongatis dignoscitur.

(Ex Bull. Имп. Обществ. антроп. и этног. hic iterum publicatum).

33. *Draba Alberti* Rgl. et Schmalh.

Dense caespitosa, caudiculis valde elongatis procumbentibus ramosis, usque 10—14 Cm. longis, apicem versus foliis dense vestitis. Folia obverse oblonga, integerrima, obtusa, pilis minoribus majoribusque stellatis intermixtisque simplicibus dense tomentoso-canescencia. Scapi nudi, incluso racemo fructifero 3—4 Cm. alti, pedicellisque pilis mollioribus ramosis tomentosi. Racemus abbreviatus, corymbosus. Siliculae ellipticae v. elliptico-lanceolatae, circiter 7 Mm. longae, 3 Mm. latae, stylo tenui 1—1½ Mm. longo coronatae. Stigma capitatum. Siliculae loculi (ut videtur) utrinque 5—6 ovulati.

In Turkestaniae montibus Alexander, in tractu Karabura 8—10000' alt. leg. A. Regel.

Anmerkung. Die oben beschriebene Art liegt uns nur mit Fruchtständen, deren Fruchtklappen und Samen schon abgefallen sind, vor. In der Tracht gleicht dieselbe einer in breiten grossen Rasen wachsenden *Aretia glacialis*. Dieselbe scheint der *Draba glacialis* Adams zunächst zu stehen. Im ersten Bande der Aufzählung der Pflanzen Ost-Sibiriens, Band I. (Bull. Mosq. anno 1861, sub n. 204) in einer Anmerkung über die Abtheilung *Chrysodraba*, haben wir die Russischen Arten dieser Section besprochen. Nach erneuerter Durchsicht bei Bearbeitung der Pflanzen Turkestans, haben wir aber uns überzeugt, dass von den zu *Dr. pilosa* Adams gerechneten Formen, die *Dr. polytricha* Ledb. und von den zu *Dr. glacialis* Adams gerechneten Formen, die *Dr. mollissima* Steven als gute Arten zu betrachten sind.

34. *Draba nemorosa* L. γ . *Hueti*. (D. Hueti Boiss. diagn. ser. II. fasc. V. p. 31. — Ejusd. fl. or. I. p. 302).

Pedicellis siliculam subaequantibus dignoscitur, transiit ad *Dr. nemorosam* hebecarpam Ledb. (*Dr. nemorosa* genuina Boiss. l. c.).

In Turkestan prope Dschasyl-kul leg. Kuschakewicz.

Chorispora D. C.

Sectio I. *Flores purpurascentes*. (Cfr. Rgl. pl. Semenov. suppl. II. sub n. 92 in Bull. Mosq. 1870.)

Ch. Bungeana Fisch. et Mey. Perennis, acaulis v. subcaulescens.

Ch. tenella D. C. Annua, petalorum lamina obverse elliptico-oblonga, siliquis glabris, in rostrum iis paullo brevius abeuntibus. — Saepissime glandulis breviter stipitatis hispida v. rarius pilisque simplicibus adspersa.

Ch. stenopetala Rgl. et Schmalh. Annua, petalorum lamina lineari, ovario glabro rostrum aequante. — Glaberrima *).

*) *Ch. hispida* Rgl. ad *Diptychocarpum* pertinet.

35. *Chorispora tenella* D. C. (syst. II. 435 — Ledb. fl. ross. I. 169.)
 α . *typica*; caule foliis pedicellis siliquisque glandulis breviter stipitatis plus minus dense vestitis.
 β . *pilosa*; caule pedicellisque glandulis breviter stipitatis raris pilisque elongatis simplicibus vestitis, siliquis glandulis breviter stipitatis raris.

Inter Taschkent et Karak-ati leg. Korolkow,

36. *Chorispora stenopetala* Rgl. et Schmalh. Annua, glaberrima. Caulis erectus. Folia inferiora lineari-oblonga, superiora anguste linearia. Petala linearia, calycem subduplo superantia, e roseo violacea. Ovarium glabrum, stylo rostriforme ovarium subaequante terminatum.

Specimina nostra caule simplici 8—10 Cm. alta. Flores terminales solitarii v. in racemum foliosum 2—3 florum dispositi.

In hortis prope Taschkent, sponte (Krause).

37. *Chorispora macropoda* Trautv. (pl. Schrenk. n. 119).

Nil nisi varietatem *Ch. songoricae* Schrenk (enum pl. nov. II. 97) pedicellis longioribus floribus majoribus sistere mihi videtur.

In Kokania, Ktschi-Alai et in tractu Psfairam (O. Fedtschenko), in Turkestanicae montibus Thian-Shan 8—12,000' alt. (Kuschkewicz).

38. *Malcolmia africana* L. γ . *intermedia*. (Cfr. Rgl. pl. Semenov. suppl. II. sub. n. 95 in Bull. Mosq. 1876. — M. *intermedia* C. A. Mey. ind. cauc. p. 186. — Ledb. fl. ross. I. 170.)

Variat foliis omnibus subintegerrimis v. dentatis v. inferioribus runcinato-dentatis. Basi tantum pube 2—3-fida hispidula v. exclusis siliquis omnino plus minus dense hispidula.

Satis frequens in regionibus turkestanicis occurrit.

39. *Malcolmia Bungei* Boiss.

(Boiss. fl. or. p. 222. — Rgl. in pl. Semenov. suppl. II. sub. n. 95.) — *Dontostemon grandiflorus* Bunge reliq. Lehm. n. 98.

In regionibus turkestanicis satis frequens.

α . *typica* ; siliquis glabris.

β . *lasiocarpa* ; siliquis pilis ramosis simplicibusque hirtis.

M. Bungei β . *lasiocarpa* et γ . *macrantha* Rgl. l. c.

40. *Sisymbrium (Arabidopsis) hirtulum* Rgl. et Schmalh.

Annuum, erectum. Caulis, folia, pedunculus, pedicelli, calyces et siliquae pilis stellatis hirtula. Caulis simplex v. apice ramosus, foliatus, usque pedalis. Folia elliptico-oblonga v. elliptica, sinuato-dentata v. sinuato-pinnatifida, radicalia in petiolum attenuata, caulina basi cordato-sagittata sessilia. Racemus congestus, simplex vel basi ramosus. Flores parvi, petalis calycem sesqui superantibus, albis. Pedicelli florem circiter aequantes, siliquis 3—4-plo breviores. Siliquae dense hirtulae, flexuosae, stigmate subsessili capitato coronatae, valvis convexis trinerviis.

Affine *S. kokanico* Rgl. et Schmalh. (cfr. Bull. Имп. Общ. естеств. l. c.) caule unico erecto usque pedali, foliis latioribus, racemo corymboso etc. dignoscitur.

In Kokania prope Samarkand et Tschupanata leg. O. Fedtschenko.

41. *Sisymbrium (Arabidopsis) Korolkowi* Rgl. et Schmalh.

Pube ramosa ubique (siliquisque) satis dense pubescens. Caules plures e collo simplici egredientes, erectiusculi, circiter spithamaei, foliati. Folia radicalia caulinaque oblongo-lanceolata, dentata, radicalia in petiolum attenuata, caulina exauriculata, basin versus attenuata. Florum racemi initio corymbosi, post florescentiam elongati laxi. Flores albi. Petala calycem duplo superantia. Pedicelli erecti, flore breviores. Siliquae erectae, breves, pedicellum 2—4-plo superantes, teretes, molliter pubescentes, stylo brevi glabro terminatae; stigmate bilobo.

S. contortuplicatum D. C., cui species nostra valde affinis, siliquis stigmate sessili integro petalisque roseis dignoscitur.

In Turkestaniae tractu Dolon legit Korolkow.

Braya Sternbrg. et Hoppe.

Calyx clausus v. patulus. Siliqua brevis, linearis v. lineari-conica v. subelliptica, teres v. a dorso v. a latere subcompressa, valvulis convexis herbaceis non transparentibus, rigidis, uninerviis v. enerviis. Stigma obtusum. Ovula in quovis loculo 4- vel plura. Semina 1—2 serialia. Stamina libera, edentula.

Taphrospermum C. A. M. siliquis abbreviatis lineari-tetragonis, valvulis membranaceis pellucidis trinerviis dignoscitur.

42. *Braya rosea* Bnge. in Ledb. fl. ross. I. 195. — Variat foliis linearibus v. lineari-oblongis in petiolum attenuatis.

α. *typica*; scapo canescenti-puberulo v. villosa-canesciente, foliis plus minus pilis simplicibus furcatisque ciliatis v. adpersis.

B. rosea et B. aenea in Ledb. fl. ross. I. 195.

β. *glabra*; foliis scapisque glabris.

In Turkestan in tractu montium Thian-Schan Terekti (Kaulbars).

43. *Braya Scharnhorsti* Rgl. et Schmalh.

Perennis, caespitosa, ubique pilis simplicibus hirsuta-incana. Folia linearia, integerrima, radicalia rosulata, caulina sparsa. Florum racemus initio corymbosus, demum laxis elongatus. Calycis patuli sepala viridia et late hyalino-marginata, dorso hirsuta. Petala ungue cuneato rubro calycem subaequante, limbo exserto ovato-subrotundo lutescente. Siliqua conica, teretiuscula, a latere compressa, utrinque 2—3-sperma; valvis convexis, enerviis, hirsutis. Septum lineari-lanceolatum, hyalinum, stylo brevi glabro coronatum. Stigma breviter bilobum.

In Turkestan, in valle montium Thian-Schan Jak-Tama et in tractu Sujuk, Sart et Baskaun, 6—1200' alt. leg. Scharnhorst. *)

*) Eine ausgezeichnete Form, welche durch die kurzen Schoten mit wenigen Samen in den Fächern und wegen des abstehenden Kelches, an Taphrospermum angränzt und gleichsam eine Mittelform zwischen Taphrospermum und Braya darstellt. Am nächsten steht sie der Br. glabella Richards., die aber durch schwächere Behaarung, von dem Rücken zusammengedrückte Schoten und von einem Mittelnerven durchzogene Klappen, sowie auch angedrückte Kelchblättchen, welche der breiten häutigen durchsichtigen Umrandung entbehren, leicht zu unterscheiden ist.

44. *Capsella Bursa pastoris* Mönch.

Variat subglabra usque villosa-hispida, foliis radicalibus subintegrissimis usque duplicato-runcinato-pinnatifidis, siliculis cuneato-triangularibus usque late obcordatis.

Vulgatissima in omnibus provinciis turkestanicis, in montibus editioribus usque ad 10,000' altitudinem adscendens.

45. *Lepidium karataviense* Rgl. et Schmalh. Caespitosum, humile. Folia hirtulo-cana; radicalia congesta, pinnatisecta, laciniis distantibus subulato-linearibus oppositis v. alternis; caulina saepissime integra, subulato-linearia, distantia. Caulis tenuis, ramosus, vix spithameus et ultra, glaber. Pedicelli erecto-patentes, filiformes, glaberrimi, floribus paullo, siliculis subduplo brevioribus. Calyx patulus; sepala viridia apice albo-marginata, petalis obovatis albis subduplo breviora. Siliculae ovato-subrotundae, apice leviter emarginatae, glabrae; stylus brevissimus, emarginaturam vix superans.

Affine L. caespitoso Desv. et L. Meyeri Claus. (Localflore der Wolga-gegenden in Beiträge z. Kenntn. d. Russ. Reichs, 8. Lief. p. 286. — Primum, foliis radicalibus integris, caule simplici, siliculis ovatis acutis reticulatis stylo emarginaturam superante coronatis, — alterum foliis glabris, pedicellis pubescentibus, siliculis subcordato-ovatis acutis stylo brevi apiculatis dignoscuntur.

In Turkestan, in montibus Karatau, Balakschi-ata (leg. A. Regel).

46. *Eruca sativa* Lam.

Variat piloso-hirta v. glabrescens, siliquis glabris v. rarius setoso-pilosis, rostro quam siliqua 2—3-plo brevior, floribus pallide luteis v. sulphureis.

E. sativa Lam. fl. fr. II. 496. — E. cappadocica Reut. h. Genev. 1857 (lusus floribus sulphureis rostro saepe brevior).

In regionibus turkestanicis vulgatissima.

47. *Stroganovia paniculata* Rgl. et Schmalh.

Glabra. Folia caulina oblongo-lanceolata, integerrima v. crenato-denticulata; inferiora in petiolum attenuata, nervo intermedio apicem

versus trifido percursa; superiora angustiora, sessilia. Caulis paniculato-ramosissimus. Pedicelli graciles, florem siliculasque superantes, in apice ramulorum corymbosi. Silicula obovata, glabra, apice rotundato stigmate sessili coronata; valvulis uninerviis, carinato-convexis, loculis monospermis. Semina ovata cotyledonibus conduplicatis.

Ab omnibus speciebus Stroganoviae (Stroganovia Kar. et Kir. enum. pl. fl. alt. n. 123. — Ledeb. fl. ross. I. 770) stigmate sessili diversa. Species proxime affinis *S. intermedia* Kar. et Kir. foliis caulinis semamplexicaulibus, floribus in ramulis racemosis styloque brevi dignoscitur.

In Turkestaniae valle fl. Sarawschan (specimen dubium ante anthesin collectum) O. Fedtschenko, in valle fluvii Tschirtschik (specimina fructifera) A. Regel 8—9000' alt.

48. *Crambe Sewerzowi* Rgl. (Rgl. in pl. Semenov. suppl. II. n. 120).

Caulis elatus, paniculatus, pedunculis pedicellisque pilis sparsis setiformibus hirsutis. Folia petiolata, utrinque et praecipue subtus hirta, petiolis hirsutis; inferiora cordato-reniformia; superiora rhombo-ovata v. ovato-oblonga; omnia repando-sublobata crenatoque dentata; panicula ramosissima. Ovarium biarticulatum; articulo inferiore post anthesin articulum superiorem subaequante. Silicula globosa, glabra, articulum inferiorem pluries superans.

Petala alba, obovata, 4—5 Mm. longa.

In Turkestaniae promontorio Kcharli-tau (Karatau) leg. Sewerzow, in deserto inter fluv. Syr-darja et Taschkent, in valle fluvii Sarawschan satis frequens, inter Karakasuk et Schagimardan. (O. Fedtschenko, Korolkow).

Foliis utrinque petiolis pedunculis pedicellisque hirtis v. hirsutis, ovarii articulo inferiore post anthesin articulum superiorem subaequante a *C. cordifolia* Stev. dignoscitur.

49. *Crambe palmatifida* Rgl. et Schmalh. Caulis elatus, paniculatus, laxè hirsutus. Folia caulina (radicalia desunt) petiolata, petioloque utrinque hirta v. subhirsuta, palmatilobata, lobis brevibus breviter acuminatis duplicato-dentatis. Pedunculi, pedicelli calycesque

hirsuti. Flores albi, pro genere maximi, in ramorum apice corymbos densos formantes. Petala obovata, usque 12 Mm. longa. Ovarium glabrum, biarticulatum, articulo inferiore post anthesin quam superior sesqui longiore.

Affinis Cr. Kotschyanae Boiss. (diagn. ser. I. fasc. VI. p. 91. — fl. or. I. 406), diversa autem: foliorum caulinorum cordatorum utrinque hirtorum lobuli breviter acuminati (nec rotundati), panicula hirsuta (nec glabra), ovarii articulo inferiore longiore.

In Turkestan, ad fluvium Ters in montibus Abraschan leg. Krause.

V. Sileneae.

50. *Dianthus Seguieri* Vill. β . *sylvaticus* (Cfr. Rgl. pl. Radd. n. 275).

Lusus γ . *macrosepalus*; caule humili 3—5 pollicari, uni v. paucifloro; squamis calycinis exterioribus calycem sesqui superantibus.

In montibus Alatau, Suok-dschailaju, leg. Kuschakewicz.

51. *Dianthus crinitus* Sm. (act. soc. Linn. II. p. 300. — Ledeb. fl. ross. I. 283. — Boiss. fl. or. I. 496). Caules simplices v. ramosi.

Variat.: α . *scaber*; caule folisque plus minus scabris.

β . *glaber*; caule folisque glabris.

In regionibus turkestanicis vulgatissimus.

52. *Dianthus Tabrisianus* Bienert (in Bunge pl. Pers. exs. 1859. — Boiss. fl. or. I. 496).

Petalis saepe profundius laciniatis a planta persica differt.

In valle fluvii Tschirtschik (Sewerzow), in valle fl. Talas (A. Regel), Alatau transiliensis (Kuschakewicz), in regionibus kokanicis Alai (O. Fedtschenko), Karatau prope Boroldai (A. Regel).

53. *Dianthus Kuschakewiczi* Rgl. et Schmalh. Glaber, multicaulis. Caules e basi procumbente adscendentes, flexuosi v. geniculati, plus minus ramosi, ramis unifloris. Folia linearia, flaccida, triner-

via, integerrima, basi in vaginam brevissimam connata. Squamae 4, adpressae, exteriores oblongo-ellipticae, interiores ellipticae, omnes in aristam squamam subaequantem v. superantem excurrentes, calycem dimidium subaequantes. Calyx cylindricus, 3 Cm. et ultra longus, ad 4 Mm. latus, dentibus lineari-subulatis. Petalorum lamina glabra, oblonga, in lacinias capillares latitudine areae multo longiores multifida.

Caulibus adscendentibus geniculato-flexuosis ramosis, foliis latioribus flaccidis, squamis longioribus in aristam excurrentibus, ab affini specie *D. crinito* facile dignoscitur.

Alatau transiliensis, in angustiis montium borealium Kastek (*Kuschakewicz* legit).

54. *Gypsophila fastigiata* L. (am. III. p. 23. — *G. fastigiata* L. et *G. altissima* L. et auct.).

α. *typica*; foliis linearibus. — Flores paniculato-corymbosi.

β. *cephalotes*; foliis lineari-oblongis v. obverse lineari-oblongis v. lineari-lanceolatis, 1—3-nerviis; florum paniculae corymbis glomeratis paucis-multis composita. — *G. congesta* Turcz. in herb. h. Petrop. — *G. fastigiata* β. *cephalotes* Schrenk. enum pl. nov. I. p. 92. — *G. fastigiata* Trautv. pl. Schrenk. n. 200. — *G. altissima* Kar. et Kir. enum. pl. alt. n. 137.

In alpinis alatavicis transiliensibus (*Kuschakewicz*, A. Regel), in alpinis kokanicis (O. Fedtschenko).

γ. *altissima*; foliis lineari-oblongis v. obverse lineari- v. lanceolato-oblongis, 1—3-nerviis; floribus corymboso-paniculatis.

G. altissima L. spec. pl. ed. II. p. 582 et auct.

In desertis uralensibus (E. Borszczow).

Die obigen Formen zeigen Uebergänge von der einen zur anderen. Linné unterschied *G. fastigiata* und *G. altissima* nur durch die Breite der Blätter. Fenzl in seiner ausgezeichneten Bearbeitung der Sileneen in Ledebours Flora rossica, unterscheidet ausserdem diese beiden Arten noch durch die Länge der Blüthenstielchen im Verhältniss zum Kelche, einem

vor und nach der Blüthezeit am gleichen Exemplar sehr wechselnden Charakter, der aber doch unsere beiden habituell sehr verschiedenen Formen β . und γ . unterscheidet. Wollte man Breite der Blätter und Länge der Blütenstielchen als unterscheidende Charaktere benutzen, so müssten aus *G. fastigiata* und *G. altissima* sogar 4 Arten aufgestellt werden, während wir vollständig überzeugt sind, dass es nur Formen der einen weit verbreiteten Art sind.

55. *Saponaria Sewerzowi Rgl. et Schmalh.* Caulis erectus, humilis, nanus, a basi dichotome ramosus, angulatus, glaber, florum corymbo coarctato glanduloso-hirto terminatus. Folia glabra, semiamplexicauli-sessilia, integerrima, e basi subcordata lanceolata v. lanceolato-oblonga, acuta, nervo intermedio apicem attingente nervisque lateralibus tenuioribus e folii basi egredientibus et apicem non attingentibus utrinque 1—2 instructa. Pedicelli erecti, calyce breviores. Calyx cylindricus, fructifer anguste oblongus, dentibus oblongis obtusis. Petala cuneato-lineari-oblonga, calycem duplo superantia, apice rotundato-obtusa, integra, nuda, in unguem sensim angustata.

Pedunculi pedicelli et calyces dense glanduloso-hirti. Calyx 15-nervius, nervis obscure areolato-anastomosantibus.

Habitus *G. viscosae* satis affinis, caule ramisque angulatis foliisque glabris, foliis 3—5-nervis semiamplexicauli-sessilibus, calycis dentibus oblongis sessilibus, petalis nudis integris — facile dignoscitur.

Karatau, in promontorio Kcharli-tau legit Sewerzow.

56. *Silene Kuschakewiczi Rgl. et Schmalh.* Perennis, basi suffruticosa. Caules spithamaei usque pedales, simplices, adscendentes, geniculato-flexuosi, pilis brevissimis retrorso-puberuli. Folia obverse-oblonga, acuta, integerrima, pilis brevissimis rigidis asperula, ramulorum steriliū in petiolum ima basi ciliatum attenuata, caulina basi ipsa tantum connata. Flores in cymam bifidam v. trifidam paucifloram dispositi, initio subsessiles, demum longe pedicellati. Pedunculi pedicelli calycesque pilis tenuibus albis, confervoides-

crispis eglandulosis dense albido-villosuli. Calyx cylindrico-clavatus, albido-membranaceus, nervis 10 purpurascentibus apicem versus lateraliter anastomosantibus instructus, 20—25 Mm. longus, limbi dentibus elliptico-lanceolatis, obtusis, late albo-marginatis. Petala alba unguibus calycem circiter aequantibus; lamina circiter 6—8 Mm. longa, late-obovata, bifida, lobis obovato-oblongis obtusis, appendicibus binis emarginatis. Carpophorum capsula 2—3-plo longius.

Affinis *S. depressae* M. B. et ejusdem varietatibus (Ledeb. fl. ross. I. 321. — Rorb. mon. p. 133. — *S. depressa* et *S. Meyeri* Boiss. fl. or. I. p. 622 et 623), differt autem caulibus altioribus, pedicellorum calycumque indumento, floribus majoribus, cyma 3-pluriflora. Prope Wernoje legit Kuschakewicz.

Acanthophyllum C. A. M. (Benth. et Hook. gen. I. 145).

Calyx tubulosus, 5-nervius, 5-dentatus v. rarius apice truncatus integerrimus. Petala 5, lamina esquamata. Stamina 10. Ovarium 1-loculare, 4-ovulatum; ovulis erectis in columellae apice affixis; styli 3. Capsula abortu 1—2 sperma, nunc indehiscens, nunc apice 2—4 valvis dehiscens.

Sect. I. *Euacanthophyllum*. *Folia acerosa, apice in spinam desinentes.*

57. *Acanthophyllum pungens* Boiss.

Bunge in Ledeb. fl. alt. II. 132 sub *Saponaria*. — *A. pungens* et *squarrosum* Boiss. in fl. or. I. 561, 562. — *A. spinosum* C. A. M. ind. cauc. p. 210. — Ledeb. fl. ross. I. pag. 333.

Variat ubique crispule puberulum v. caule glabro corymbis parce hirtulis v. omnino glabrum (*A. Stocksianum* Boiss. diagn. ser. II. fasc. 1. pag. 81), petalorum lamina oblongo-elliptica v. oblongo-lanceolata (*A. squarrosum* Boiss. diagn. ser. II. fasc. I. pag. 81), obtusa vel subacuta.

Die zahlreichen Exemplare, welche wir von dieser Art aus der Flora Turkestans besitzen, gehen in den oben genannten Charakteren in

einander über. Es giebt sehr dicht kurzbeharte, weniger dicht und noch kürzer beharte, solche mit kahlem Stengel und schwach behartem Blütenstande und endlich ganz kahle Formen. Die Kelchzähne bieten gar keinen Unterschied und die Platte der Blumenblätter ist bald etwas breiter, bald etwas schmaler und länger, bald deutlich stumpf, bald spitzlich oder deutlich spitz. Boissier sagt von *A. pungens*, dass es rothe Blumen und dass *A. squarrosus* weisse am Schlunde rothe Blumenblätter besitze. Nach den uns vorliegenden trockenen Exemplaren sind die Blumen entweder anfangs schön roth und bleichen nach dem Abblühen immer mehr aus oder sie sind blassrosa und bleiben später am Schlund rosa oder bleichen auch hier allmählig aus, — oder sie sind endlich vom Aufblühen an rein weiss. Wir unterscheiden hiernach 4 Formen.

α. *typicum*; undique crispule puberulum, floribus roseis v. persicinis. — *Petula obtusa* v. *acuta*.

β. *glabriusculum*; caule glabro, corymbis glabris v. parce puberulis. *A. Stocksianum* Boiss. l. c.

γ. *squarrosus*; undique crispule-puberulum, floribus initio pallide roseis, demum albis fauce roseis v. totidem albidis. *A. squarrosus* Boiss. ex parte.

δ. *album*; undique crispulo-puberulum, floribus albis.

Sect. II. *Allochrusa Bunge* (in Boiss. flor. or. I. 559.)

Folia inermia.

58. *A. versicolor* F. et M. Pubescenti- v. hirtoglandulosum. Folia obverse oblongo-linearia. Flores racemosi v. racemoso-paniculati. Petalorum lamina obovata.

A. versicolor F. et M. ind. sem. horti Petrop. p. 31. — Ledeb. fl. ross. I. 334. — *A. versicolor* et *persica* Boiss. fl. or. I. p. 559 et 560.

Habitat in Caucaso.

59. *A. Bungei* Trautv. Patule pubescens. Folia obverse lineari-oblonga v. oblongo-spathulata. Flores in paniculam simplicem terminalem laxam dispositi. Petalorum lamina obovata.

Allochrysa Bungei Boiss. fl. or. I. 560. — *Acanthophyllum Bungei* Trautv. β. *latifolium* Trautv. in act. h. Petrop. II. p. 511.

Hab. in Persia et in provinciis caucasicis.

61. *A. paniculatum* Rgl. Puberulo-hirtulum. Folia linearia, stricta. Flores in caulis ramorumque apice cymosi, in paniculam simplicem pauci-plurifloram dispositi. Calycis canescenti-hirtuli dentes acuti immarginati. Petalorum lamina obverse oblonga.

A. paniculatum Rgl. pl. Sem. n. 155. tab. II. fig. 1 et 2. — (Bull. Mosq. anno 1866.).

In Turkestan, Alatau transiliensis prope Sary-bulak (Semenow); in valle fluvii Tschirtschik (Krause).

62. *A. gypsophiloides* Rgl. (Cfr. Rgl. in Bull. Имп. Общ. естеств.).

Glaberrimum. Folia anguste linearia, subfalcata. Flores in paniculas effusas ramosissimas multifloras dispositi. Calycis dentes acutiusculi, albo-marginati. Petalorum lamina obverse oblonga.

In desertis inter Taschkent et fluvium Syr-Darja (O. Fedtschenko, Korolkow), in valle fluvii Sarawschan, in angustis prope Oalinsk et in montibus Dashti-kasi (O. Fedtschenko), in montibus Karatau prope Boroldai et in valle fluvii Tschirtschik (A. Regel).

63. *A. Korolkowi* Rgl. et Schmalh. Fruticulus erectus, ramosus; caules primarii demum glabri, foliorum emortuorum nervis intermediis persistentibus spiniformibus oppositis vestiti.

Rami cum foliis minute denseque hirtulo-glandulosi; florum corymbo denso, e corymbulis tribus breviter pedunculatis composito. Folia ramorum sessilia, lineari-oblonga, obtusa, setulis glanduliferis brevissimis basi tuberculum insidentibus scabra. Pedunculi dense hirtoglandulosi. Bractee ad basin florum oppositae, late ovatae, obtusae, minute puberulae, late albedo-scarioso marginatae, calycem dimidium superantes. Calyx cylindricus, 6-costatus, apice truncatus et obsolete 5-dentatus, minute glanduloso-hirtulus, 5 Mm. longus. Petala obverse

lineari-oblonga, obtusa, calycem sesqui superantia, trinervia; nervis petalorum apicem non attingentibus; nervo medio sub apice furcato tecum lateralibus anastomosante.

Inter Chalati et Amu-Darja ad lacum Sardeba-kul in arenosis (Korolkow).

Speciem valde affinem (*A. Alexandrae* Smirnow) ad fluvium Amu-Darja legit Smirnow. Foliis latioribus minus asperis, ramis corymbis ternis terminatis, pedunculis corymbulos superantibus differre videtur.

Anmerkung. A. Bunge unterscheidet in Boissier's Flora orientalis I. p. 559 die Gattung *Allochrysa* durch nicht in Stacheln ausgehende Blätter und Staubfäden, die nicht lang vorsehen, von *Acanthophyllum*. Der letztere Charakter findet sich wohl bei *A. versicolor*, nicht aber bei *A. paniculatum*, *gypsophiloides* und *Korolkowi*. Unter den von uns zur Section *Allochrysa* gezogenen Arten, sind *Acanthophyllum paniculatum* und *A. gypsophiloides* Rgl. sehr nahe verwandt. Ausser der charakterischen Beharung von *Acanth. paniculatum*, trägt dasselbe auf der Spitze der Stengel nur einfache arnblumige Blütenrispen, während gegentheils *A. gypsophiloides* in seinem Habitus der *Gypsophila paniculata* ähnlich ist, denn die Stengel desselben sind stark verästelt und die auf der Spitze aller Zweige stehenden Blütenrispen überspinnen den ganzen grossen dichten Busch mit einer leicht gebauten Blütenmasse, ähnlich wie das bei *Gypsophila paniculata* der Fall ist. Die Fruchtknoten enthalten dagegen nur 4 Eier und so muss auch diese Art, trotz ihrer habituellen Aehnlichkeit mit *Gypsophila* zu *Acanthophyllum* gerechnet werden.

VI. Alsineae.

64. *Arenaria Meyeri* Fenzl. (Ledeb. fl. ross. I. 368). Differt caule ramosissimo suffruticoso, sepalis acuminatis ab *A. capillari* Poir.

Occurrit dense caespitosa v. caespites laxiores formans, foliis erectis v. patentibus, 10—25 Mm. longis semiteretibus v. margine inflexis subteretibus, margine scabris v. glabris.

Huc *A. Ledebouriana* Fenzl. in Russeg. Reise II. I. p. 89.

In valle fluvii Sarawschan (O. Fedtschenko), in montibus Alatau (Korolkow, A. Regel).

65. *Stellaria humifusa* Rottb. in act. Ac. hafn. X. 447 — Fenzl. in Ledb. fl. ross. I. p. 384.

δ. *caespitosa*; caudiculis abbreviatis, ramosis, dense caespitosis; foliis oblongis internodia subaequantibus v. superantibus.

Lus. *amblyosepala*; sepalis obtusis.

Kokaniae in tractu Kawuk (O. Fedtschenko).

Lus. *oxysepala*; sepalis acutis.

Karatau, in montibus Alexander 9000' alt. (A. Regel).

66. *Cerastium davuricum* Fisch. in Sprgl. pug. pl. minus cogn. II. p. 65. — Sprgl. in Ledb. fl. ross. I. pag. 401.

α. *glabrum*; glaberrimum v. caule basi tantum pilis sparsis vestito.

In Turkestan (Kuschakewicz, Scharnhorst).

β. *pilosum*; caule ramisque pilis patentibus hirsutis v. subhirsutis, pedicellis sparse pilosis, calycibus glaberrimis.

Karatau in tractu Karakia leg. A. Regel.

67. *Stellaria rigida* Bunge.

Dense glanduloso-hirta. Caules angulati, simplices v. apice parcedichotomo-ramosi, in cymam pauci-plurifloram soluti. Folia copiosa, oblongo-lanceolata usque subcordato-ovata, sessilia, bractealia herbacea caeteris similia, omnia carnosula cinereo-glauculentiae. Calycis lacinae ovatae, obtusae v. subacutae, quam corolla duplo breviores, plus minus purpurascens. Petala semibifida, lobis oblongis obtusis. Capsula 5-sperma. Semina compressa, subrotunda, laevia.

Stellaria dichotoma ε. *rigida* Bunge Verz. der Pfl. des Altai pag. 34. — Fenzl. in Ledb. fl. ross. I. 380.

St. *dichotoma* facile dignoscitur caule tereti a basi dichotomo-ramosissimo in cymam multifloram soluto, calycis laciniis lanceolatis acutissimis viridibus, petalis calycis lacinias subaequantibus v. paullo superantibus, seminibus obtuse granulatis.

α. typica; foliis oblongo-lanceolatis.

In regione altaica ad Tschugam superiorem legit Bunge.

β. latifolia; foliis ovatis v. subcordato-ovatis.

In Kokania prope Dschityk et Karakasuk legit O. Fedschenko.

VII. Geraniaceae.

68. *Geranium collinum* Steph. Willd. spec. pl. III. 705. — Ledb. fl. ross. I. 467. — Trautv. pl. Schrenk. n. 260.

Pedunculis elongatis ex foliorum axillis saepissime a basi ad apicem caulis egredientibus pedicellisque post florescentiam refractis ab affinibus speciebus dignoscitur. In regionibus turkestanicis satis commune et in innumeris varietatibus occurrit.

α. eglandulosum Ledb.; caule petiolis pedunculis pedicellisque pilis brevibus adpressis deorsum versis pubescenti-subcanescentibus; calycibus puberulis. — Flores satis magni, violacei v. albidii. Variat caule humili usque bipedali, foliis plus minus dissectis.

G. Londesii Fisch. in Lk. enum. h. Berol. II. 196. et auct. — G. longipes D. C. prodr. I. 642. — G. collinum eglandulosum Ledb. fl. ross. I. 468. — Trautv. pl. Schrenk. n. 260. — G. rectum villosulum Herder pl. Semenov. — G. saxatile Kar. et Kir. enum. pl. song. p. 195. — Ledb. fl. ross. I. 195.

β. glandulosum Ledb.; caulibus petiolisque pilis brevibus adpressis v. recurvis eglandulosis; pedunculorum pedicellorumque pilis patentibus brevibus glandulosis; calyce nunc pilis adpressis sparsis eglandulosis, nunc magis patentibus glanduliferis eglandulosisque vestito. — Flores violacei.

G. collinum glandulosum Ledb. fl. ross. I. c. — Trautv. l. c. — G. longipes *β. adenotrichum* Schrenk. pl. nov. I. p. 90. — G. collinum D. C. prodr. I. 642.

γ. saxatile; caule petiolis pedunculisque pilis adpressis eglandulosis; pedicellis pilis patentibus glanduliferis; calyce ut praecedentis.

G. saxatile Kar. et Kir. pl. exs. ex parte.

δ. *hirsutum* Trautv.; caulis petiolorum pedunculorum pedicellorumque pilis patentibus, plerisque glanduliferis.

G. collinum hirsutum Trautv. l. c.

ε. *viscosum*; ubique pilis mollibus patentibus glanduliferis dense subvillosa-viscosum. — Humile, vix spithamaeum. Vidi specimen unicum a Cl. Sewerzowio in montibus prope Wernoje, alterumque a Cl. Semenowio in trajectu Kurmety (Alatau) lecta.

G. saxatile Herder in pl. Semenov. n. 189.

ζ. *alpinum*; caulibus nullis v. brevibus, foliis parvis minus divisis. — Indumentum valde variabile, ad varietates α. β. γ. accedens.

In alpinis turkestanicis altitudine 6—11,000' satis frequens.

Anmerkung. Die letztere Form ist genau genommen, die Alpenform der Varietäten α—δ, obgleich solche als fast stengellos und durch die kleineren weniger getheilten Blätter sehr verschieden erscheint.

Das *G. collinum* mit seinen Formen ist oft von den angrenzenden Arten schwer zu unterscheiden. Unter diesen ist *G. rectum* Trautv. durch den aufrechten Wuchs und nach der Blüthe gerade aufgerichtete Blütenstiele und Blütenstielchen, sowie durch das Auftreten langer drüsenloser Haare verschieden. *G. palustre* L., scheint mir gar nicht verschieden zu sein, so dass ich gegen eine Vereinigung beider Arten nichts einzuwenden hätte, *G. sylvaticum* L., *G. pratense* L. und *G. affine* Ledb. (letzteres von *G. pratense* kaum spezifisch zu scheiden) unterscheiden sich nur durch den auf der Spitze der Stengel mehr bouquetartig vereinigten Blütenstand.

69. *Geranium erectum* Trautv.

Trautv. pl. Schrenk. n. 261.

α. *glabratum* Trautv. (l. c.); caule glabro, pedunculis pedicellisque deorsum adpresse pilosulis, calycibus glabris v. albo-villosis.

Prope Wernoje leg. Kuschakewicz.

β. *villosulum* Trautv.; caule albo-villosulo v. villosulo. Cetera ut praecedentis.

Prope Wernoje (Kuschakewicz), in valle superiore fluvii Talas (A. Regel).

γ. villosum; caule pedunculis pedicellis calycibusque patente albo villosis.

Dschasyl-kul, Alatau, leg. Kuschakewicz.

VIII. Umbelliferae.

70. *Peucedanum dasycarpum* Rgl. et Schmalh.

Caule tereti, stricto, sulcato, hirtulo; foliis radicalibus caulisque inferioribus bipinnatisectis, superioribus simpliciter pinnatisectis, omnibus glabris: segmentis ovatis v. ovato-lanceolatis, lobulatis dentatisque v. praecipue apicem versus irregulariter et subduplicato-dentatis, lateralibus basi dimidiato-cordatis v. dimidiato-subcuneatis, terminali basi cuneata decurrente cum lateralibus plus minus confluyente; vaginis inflatis, omnibus foliiferis; involucri polyphylli foliolis lineari-lanceolatis v. lanceolatis acuminatis, erecto-patentibus, hirtulis; umbellae radiis teretibus, sulcato-strictis, hirtulis; fructibus omnino hirtulis.

Caulis robustus, ramosus, usque 1—1¼ M. altus, basi circiter 1 Cm. in diametro. Radicis perpendicularis simplicis collum fibris foliorum emarcidorum vestitum. Umbella multiradiata, radiis 3—5½ Cm. longis. Umbellulae multiradiatae densae; involucellum polyphyllum; foliolis lanceolatis v. lineari-lanceolatis, hirtulis, umbellulae radiis adpressis, eos subaequantibus, hirtulis, dorso viridibus, late albido-marginatis, 5—7 Mm. longis. Calycis margo manifestus. Fructus a dorso compressus, ovatus, 4 Mm. longus, 3 Mm. latus; mericarpiis margine lato diaphano; valliculae univittatae; commissura 4-vittata.

Dignoscimus a specie proxime affine *P. latifolio* D. C. «caule radiis fructibusque dense hirtulis, foliorum vaginis omnibus foliiferis».

In Turkestaniae valle fluvii Karakol legit A. Regel.

IX. Lonicereae.

71. *Lonicera turcomanica* Fisch. et Mey. Foliis ovato-ellipticis, obtusis v. acutis, basi rotundatis, glabriusculis v. subvillosis; pedun-

culis petiolo duplo brevioribus, quam flores pluries brevioribus; corollis basi aequalibus; baccis distinctis.

Frutex erectus. Ramuli glabri v. apicem versus brevissime puberuli. Petioli puberuli v. subvillosi. Folia glabra v. parce flosculoso-puberula v. pubescentia. Baccae parvae, nigrescentes, apice nudae.

Pedunculis petiolo brevioribus, baccis duplo minoribus a *L. Xylosteo* *L.* dignoscitur.

L. turkomanica F. et M. in Bull. Mosc. 1839. II. 156 (sine descriptione). — Trautv. in Act. h. Petr. I. 274. — *L. nummularia* Fisch. et Mey. Bull. Mosc. I. c. — *L. Xylosteum* β . *macrocalyx* Rgl. et Herd. pl. Semenov. n. 472.

Var. α . typica; petiolis pedunculisque breviter puberulis, foliis subglabris v. parce floccoso-puberulis.

β . *subvillosa*; petiolis pedunculis foliisque subvillosis. — *L. Xylosteum* β . Rgl. et Herd. I. c.

Habitat in Turcomania (Karelin et Kirilow), in Turkestaniae montibus Alatau (Semenow, A. Regel).

X. Compositae.

72. *Tanacetum trichophyllum* Rgl. et Schmalh.

Radicis verticalis simplicis collo dense lanato; caule recto simplici, solido, lanato-villoso; foliis inferioribus ambitu elongato-oblongis, lanato-villosis, bi-tripinnatisectis, segmentis lineari-setaceis, confertissimis, mucronato-acutis; corymbo composito, umbelliformi; pedunculis pedicellisque bracteis filiformibus lanato-villosis vestitis, caeterum glabriusculis; capitulis hemisphaericis, satis magnis; involucri foliolis dorso virescentibus, late albo-hyalino marginatis, villosulo-ciliatis, caeterum glabris, exterioribus obovato-oblongis obtusis, interioribus angustioribus acutis; receptaculo elevato-hemisphaerico, punctato, nudo; floribus tubo elongato filiformi glanduloso, limbo omnium campanulato 5-dentato; acheniis linearibus, curvatis, 4—5 costatis, glanduloso-tuberculatis, — apice nudis.

Caulis usque 20 Cm. altus, foliosus; foliis decrescentibus, inferioribus medio 10—12 Cm. latis, superioribus sensim sensimque ad bracteas desinentibus. Involucrum circiter 1 Cm. in diametro. Foliorum lacinulae confertissimae, 1—2 Mm. longae.

Facie Achilleam trichophyllam referens, affine Tanaceto (Pyrethro) umbellifero Boiss. Prima receptaculo nudo, capitulis subglobosis, acheniis apice margine membranaceo-denticulato coronatis, — alterum caule pedunculisque fistulosis, foliorum laciniis lanceolatis, rhachi spinulosa, capitulis minutis, floribus marginalibus limbo 3-dentato, — facile dignoscuntur.

Habitat in Turkestaniae montibus Karatau prope Boroldai. Legit A. Regel.

73. *Echinops karatavicus* Rgl. et Schmalh.

Caule plus minus laxo albo-tomentoso; foliis subcoriaceis, pinnatifidis, supra glandulis breviter stipitatis hirtulis, infra albo-tomentosis, lobis in spinam satis rigidam luteolam cuspidatis spinosoque dentatis; involucri partialis penicillo quam involucri squamae intimae 4—5-plo brevior; squamis glabris, e viridi amethystinis, infimis 8—10 parvis penicillum vix aequantibus, e basi pauciciliata in apicem triangulari-spathulatum spinuloso-denticulatum dilatatis; superioribus 15—20, omnibus liberis, lineari-lanceolatis, canaliculatis, spinoso-acutis, setoso-ciliatis; acheniis lineari-subclavatis, setis appressis dense vestitis; pappi setis in coronam brevem membranaceam margine ciliolatam connatis.

Caulis robustus, 60—80 Cm. altus, foliis decrescentibus vestitus. Folia inferiora ambitu elliptico-lanceolata v. lanceolata, 15—25 Cm. longa. Capitula uniflora, in glomerulum globosum terminalem collocata. Involucrum circiter 20 Cm. longum, florem solitarium circiter aequans.

Echinops chantavicus Trautv. sect. Ritro (Trautv. pl. Schrenk. n. 645), cui species nostra satis affinis, differt «foliis supra glabris v. paullo scabridis (nunquam glandulosis), involucri squamis inferioribus penicillum subduplo superantibus ex apice spathulato in cuspidem satis elongatam excurrentibus». *E. sphaerocephalus* L. «caule canescente setulosoque glanduloso, foliis mollibus, penicilli setis dimidio involucri sublongioribus, involucri squamis viscido-puberulis etc. longe distat.

In Turkestan in valle fluvii Tschirtschik prope Saylik 3—5000' alt.
leg. A. Regel.

74. *Cousinia Trautvetteri* Rgl.

Cousinia, series A. (receptaculi setae laevissimae).

Subseries I. (achenia ecostata laevia v. striata apice rotundato minute areolata edentula v. obsolete marginulata). §§ 2. Serratuloideae (capitula mediocra v. majuscula multiflora, involucri phylla numerosa) ** (phylla saltem inferiora squarroso-patentia v. reflexa). Boiss. fl. or. III. pag. 459.

Perennis; caule elato, simplici v. paullo ramoso, araneoso-albo-lanato, nudo; foliis oblongo-lanceolatis, utrinque attenuatis, coriaceis, sinuato-pinnatifidis dentatisque lobis dentibusque omnibus in spinam rigidam excurrentibus, supra laxè araneoso-lanatis, infra dense niveo-tomentosis; radicalibus caulinisque inferioribus in petiolum attenuatis, caulinis superioribus decrescentibus, basi angusta sessilibus; capitulis maximis, subnutantibus, plus 200-floris, subsessilibus, depresso-globosis; involucri squamis numerosissimis, exterioribus reflexis, interioribus imbricatis erectis, glabrescentibus v. laxè villosis, e basi lanceolata margine fimbriato-lacera (praecipue squamarum interiorum) in spinam subulatam rectam denudatam virescenti-luteam exeuntibus; acheniis obovato-oblongis, complanatis, laevibus, striatis; pappi setis numerosis, pro genere elongatis, flores subaequantibus, sub lente scabris, basi in fasciculis coalitis mox caducis; styli ramis angustis, brevibus.

Habitu, capitulis maximis, pappo elongato *Carduorum*, — caule nudo, antherarum caudis setosis, pappi setis nunquam in annulum conatis ad *Cousiniam* pertinere videtur *Cousinia Chamaepeuce* Boiss. cui species nostra proxima, differt foliis caulinis basi subcordata sessilibus, capitulis pedunculatis 70—80-floris, involucri squamis e basi dense lanata in spinam denudatam purpurascentem excurrentibus, pappo flore quadruplo brevior.

Habitat in Turkestaniae valle fluvii Karakol in tractu Karakia montium Alexander. Legit A. Regel.

XI. Campanulaceae.

75. *Cylindrocarpa* Rgl.

Calycis tubo cylindrico, limbo 5-fido. Corolla tubo brevissimo; limbo 5-partito; laciniis lineari-oblongis, initio cohaerentibus, demum liberis erecto-patentibus. Stamina 5; filamentis brevissimis, ovato-triangularibus, in filum brevissimum excurrentibus; antheris elongato-linearibus, filamento multo longioribus, liberis, erectis. Stylus apice 2—3-fidus. Capsula lineari-cylindrica, apice in collum constricta, 2—3-locularis, sub apice poris dehiscens.

Radix perennis, collo multicauli. Caules foliosi, ramosi, ramulis filiformibus apice flore solitario terminatis. Habitus Campanulae, corolla Phyteumatis, capsula Speculariae.

Cylindrocarpa Sewerzowi Rgl.

Glabra, radice perenni, collo multicauli; caulibus simplicibus v. plus minus ramosis, erectis v. adscendentibus, tenuibus, foliatis; ramis simplicibus v. simpliciter v. iterato ramosis; ramulis filiformibus, flore solitario terminatis; foliis lineari-lanceolatis, decrescentibus, remote denticulatis, basin versus sensim attenuatis; calycis tubo lineari-cylindrico, limbi lobis linearibus erectis, tubo plus duplo brevioribus; corolla caerulea, supra basin quinquefida, lobis demum inter se liberis, anguste oblongis, erecto-patentibus, quam calycis lobi circiter triplo longioribus; antheris elongato-linearibus, quam corollae lobi paullo brevioribus, filamento basi triangulari-dilatato in filum brevissimum excurrente suffultis; stylo filiformi, stigmatibus linearibus 2—3-coronato; capsula lineari-cylindrica, apice in collum constricta, sub apice poris dehiscens. Caules $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ pedales. — Calycis tubus 5—6 Mm. longus, 1 — $1\frac{1}{2}$ latus. Capsula 12—18 Mm. longa, 3 Mm. lata. Calycis lobi 3 Mm. longi. Corolla 10 Mm. longa, lobis 1 — $1\frac{1}{2}$ Mm. latis. — Phyteuma Sewerzowi Rgl. pl. Semenov. n. 671.

Habitat in Turkestanicae montibus Karatau prope Dschie, inter Kultschuk et Dschaman-Tasch — Alatau, ad fluv. Tschotkal (4—6000' alt.), Kara-Tschok (A. Regel).

XII. Borragineae.

76. *Arnebia guttata* Bnge.

Bnge. ind. sem h. Dorp. 1840 p. 7. — Ledb. fl. ross. III.

139. — Flores flavi, fauce maculis purpureis 5 ornati.

Radice perenni, caulibus ramosis 2—4 pollicaribus, calyce fructifero tubo ecornuto, calycis lobis linearibus folia floralia (bracteas) superantibus, coryopsibus in conum acuminatis subspinuloso tuberculatis ab *A. cornuta* Fisch. et Mey., cui proxima facile dignoscitur.

Ad montium declivibus prope Kutmaldy ad lacum Issikkul et in montibus alatavicis prope Dschil-Aryk leg. A. Regel.

XIII. Plumbagineae.

77. *Statice alata* Rgl. et Schmalh.

Foliis oblongo-lanceolatis, in petiolum attenuatis, acutis, viridibus, subcoriaceis, margine planis, glabris, 15—25 Cm. longis; scapo erecto, paniculato, 40—60 Cm. alto, glabro; ramis angulatis, patule hirtis; florum fasciculis 3—4 floris, confertis, in spicas breves dispositis; bracteis membranaceo-marginatis, exterioribus late ovatis, in mucronem cuspidatis, interioribus obcordatis ex emarginatura in mucronem rigidum aristiformem excurrentibus; calycis tubo patule hirtulo, limbo explanato quinquelobo scarioso, lobis acuminatis nervo excurrente breviter mucronatis.

Affinis *St. speciosae* L. et *St. Sewerzowi* Herder. Prima differt foliis obovatis acuminato-mucronatis, ramis ancipitibus triquetrisve alatis glabris v. glabriusculis, bracteis interioribus totis membranaceis obtusis v. acuminatis, calycis limbo obsolete obtuseque quinquelobo; — altera scapi ramis glabris v. ramulis basi vix hirtulis, spiculis in spicas elongatas imbricatis, bractea intima obtusa, calycis tubo basi hirtulo, limbo obtuse quinquelobo.

In Turkestaniae montibus Alatau legit A. Regel.

78. *Statice Höltzeri* Rgl.

Glabra; caulibus pluribus, erectis, divaricato-ramosis; ramis filiformibus, teretibus, inferioribus sterilibus, superioribus apice floriferis; foliis radicalibus oblongo-spathulatis, obtusis, in petiolum attenuatis, caulinis

ad squamas lanceolato-deltoideas apice scariosas reductis; florum fasciculis 2—3-floris, in corymbos capituliformes terminales congestis; bracteis ovato-orbiculatis, exterioribus dorso rubro-fuscis margine lato membranaceo-hyalino cinctis, interioribus totis hyalinis; calycis tubo ad nervos piloso-hirtulo, limbo quinquesfido, initio carneo-roseo, demum albidohyalino, laciniis oblongo-lanceolatis, leviter crenulatis.

Rhizoma crassum, multiceps. Caules ramosissimi, 14—20 Cm. alti. Folia radicalia 2—2½ Cm. longa, sub apice 2—2½ Mm. lata.

St. congesta, cui species nostra proxime affinis, differt caulibus ascendentibus oligophyllis, ramis sterilibus paucis, florum fasciculis in spicas breves congestis.

Habitat ad Turkestaniae fluvium Tschu prope Tokmak et prope Dschil-Arik inter Tokmak et lacum Issyk-kul. Legit A. Regel.

Dedicavimus plantarum perennium horti botanici Imperialis Petropolitani cultivatori eruditissimo H. Höltzer.

XIV. Irideae.

Iris L. Sect. III. Barbatae.

Perigonii lacinae exteriores intus barba instructae.

79. *I. Alberti Rgl.*

Caulis pluriflorus, foliis ensiformibus glaucis brevior v. ea subaequans. Spathae ovato-lanceolatae, perigonii tubum superantes, a basi ad medium herbaceae, apicem versus scariosae. Perigonii tubo ovarium vix aequante; laciniis exterioribus juxta costam barbatis, caeterum glabris; laciniis interioribus exteriorum longitudine, obovatis, sensim in unguem attenuatis: filamentis antheram subaequantibus; stigmatibus bilobis, lobis apice rotundatis crenulatis, marginibus sese tegentibus.

Rhizoma *I. germanicae*. Perigonii lacinae 4—4½ Cm. longae, saturate caeruleae, basin versus lutescentes.

In Turkestan prope Wernoje et in valle fluvii Almatinka (4000'). Legit A. Regel.

Iris germanica, cui species nostra affinis, differt: caule foliis longiore, perigonii laciniis subito in unguem contractis, stigmatis lobis divaricatis acutis, floribus majoribus.

XV. Liliaceae.

80. *Orithyia dasystemon* Rgl.

Bulbi oblongo-conici tunicae pallide fuscae, intus pilosae. Caulis glaber, incluso flore 15—18 Cm. altus, diphyllus. Folia alterna v. subopposita, glabra, acutiuscula, inferiore lanceolato v. lineari-lanceolato, superiore sublineari. Perigonii phylla erecto-patentia, lanceolata usque lineari-lanceolata, exteriora glabra intus lutea extus virescentia, interiora lutea apice basi-que puberula. Stamina inclusis antheris pistillum superantia; filamenta e basi lanceolata in apicem subulatum glabrum excurrentia, hirsuta. Pistillum in stylum germen subaequans sensim attenuatum; stigma capitatum.

Filamentis basi hirsutis ab omnibus speciebus hujus generis facile dignoscitur.

In montibus prope Wernoje ad fluvium Almatinka 5500—6000' (A. Regel).

B. PLANTAE REGIONES TURKESTANICAS ET CENTRO-ASIATICAS INCOLENTES,

SECUNDUM SPECIMINA VIVA IN HORTO BOTANICO
IMPERIALI PETROPOLITANO CULTA DESCRIPTA.

auctore E. REGEL.

1. *Allium globosum* Redouté. (Cfr. Rgl. *Allium* pag. 197.)

γ) *albidum*; spatha umbellam paucifloram vix superante, pedicellis perigonium vix superantibus, perigonii phyllis albidis nervo viridi percursis.

Legit A. Regel in Turkestanicae montium Alexander tractu Karabura.

2. *Allium stramineum* Rgl. (Grtfl. 1876. tab. 886).

Bulbis solitariis, ovatis; tunicis membranaceis, exterioribus parallele laciniato-fibrosis. albidis; caule inferne 3—4-folio, foliis fistulosis bre-

viore v. subaequilongo; umbella globosa v. hemisphaerica, multiflora, capsulifera; spathae valvis quam flores brevioribus; pedicellis perigonio brevioribus usque paullo longioribus, basi nudis; sepalis exterioribus ovato-lanceolatis, eximie carinatis, quam interiora oblonga $\frac{1}{4}$ brevioribus, laevissimis, nitido-stramineis; filamentis perigonio paullo brevioribus, subulatis, simplicibus, ima basi in annulum connatis.

Glaberrimum. Caulis teres, 25—30 Cm. altus, usque ad quartam partem vaginis foliorum involutus. Folia e viridi-glauescentia, linearia v. filiformia, bulborum sterilium teretia, bulborum fertilium semiteretia, supra eximie canaliculata. Umbella densa. Spatha in valvas duas ovato-subrotundas subscariosas apice subacutas v. laciniatas rumpens. Flores eximie trigoni. Sepala erecta; exteriora carinato-navicularia, ovato-lanceolata, subacuta, uninervia, 5—6 Mm. longa, apice tantum patentia. Ovarium ovatum, basi sacculis tribus immersis, apice stylo subulato ovario subaequilongo coronatum; stigmate punctiformi.

Semina Cl. Przewalsky ex Mandschuria occidentali-australi attulit.

3. *Crocus alatavicus* Semenov et Regel *).

Vernalis, tunicis membranaceis demum a basi bulbi ad medium in fibras tenues parallelas superne anastomosantes discedentes; foliis linearibus, glabris, medio stria alba ornatis, corollae tubum aequantibus usque florem superantibus; spatha diphylla, membranacea; perigonii fauce glabri phyllis oblongis, obtusis, antheras lineares subduplo superantibus; stigmatibus erectis, subclavatis, quam antherae subduplo brevioribus. — Corolla intus alba, basi crocea; sepalia exteriora extus colore plumbeo dense tenuissimeque striolata, margine luteola. — Affinis *C. reticulato* et *L. verno*. Primus tunicarum radicalium structura, alter tunicis bulborum demum a basi ad apicem in fibras solutis sepalisque latioribus dignoscuntur.

*) *Cr. alatavicus* Rgl. et Semenov. in Rgl. pl. Semenovianae IV. n. 1036 (Bull. de Mosc. 1869). Die citirte Beschreibung ist theils nach nicht gut getrockneten Exemplaren gemacht, theils durch Druckfehler entstellt, weshalb wir dieselbe hier nach lebenden Exemplaren, die wir durch A. Regel's Vermittelung erhielten und die kürzlich im Botanischen Garten blüheten, im Obigen wiederholten und verbesserten. Eine Abbildung findet sich Gartenflora 1877 tab. 906.

4. *Iris (Xiphion) Kolpakowskiana* Rgl.

Tunica bulborum fibroso-reticulata, fibris satis crassis lutescentibus. Scapus brevissimus, humilis, uniflorus, teres, simplex, basi vagina solitaria scapum superante. Folia glauca, linearia, erecta, supra canaliculata, subtus carinata v. rarius subtricarinata, florem superantia. Flos vaginis duabus oppositis floris tubum superantibus involucratus, caeruleus. Perigonii tubus limbum subaequans; phylla exteriora elliptico-oblonga, ex apice rotundato obtusa, subito in acumen lineare excurrentia, ungue margine caeruleo, in mediano croceo nervo medio virescente, apice albo, variegato, lamina caerulea; phylla interiora exterioribus longiora, caerulea, cuneato-oblonga, ad tertiam partem bifida, lobis subdivergentibus, longe cuspidatis. Filamenta antheras aequantia. Stigmata biloba, lobis oblongis integerrimis. Ab omni-bus speciebus sectionis *Xiphion*, perigonii laciniis interioribus cuspidato-bifidis diversa.

Prope Wernoje in Turkestanica legit Fetisow.

Wir erhielten von dieser ausgezeichneten Art einige Zwiebeln, welche im Kalthause im März zur Blüthe kamen. Im freien Lande dürfte diese Art gleich *I. reticulata* zu den ersten Blumen des Frühjahrs gehören.

Wir nennen diese schöne neue Art nach dem Herrn General Kolpakowski, Gouverneur des Semiretschinskischen Gebietes, der alle Unternehmungen zur Erforschung der östlichen Gebiete Turkestans mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln und mit dem lebhaftesten Interesse für die Naturwissenschaften befördert und unterstützt.

5. *Sedum umbilicoides* Rgl.

Folia carnosa, glauca; radicalia dense rosulata, oblongo-lanceolata, acuta, utrinque convexo-plana, margine sub lente ciliolata, ceterum glabra; caulina sparsa, oblongo-linearia, utrinque convexa, glabra v. cileolis paucis munita, basi soluta, acuta v. obtusiuscula. Caulis ascendens v. decumbens, glaber, infra foliorum rosulam erumpens, apice in cymam biradiatam paucifloram transiens. Flores pedicellati, initio terminales, demum in axillis foliorum floralium solitarii, pedicellis breviores, heptameri. Calycis 7-partiti sepala lanceolata, mucronato-acuta. Petala 7, calycem duplo superantia, lanceolato-elliptica, mucronato-acuta,

intus alba, extus alba rubroque striolata, basi inter se subconnata, apice patentia. Stamina 14, petalis breviora. Carpella 7, capsularia, polysperma, conniventia. Squamae hypogynae 7, parvae, semicirculares.

Species insignis, Umbilici Crassulaeque habitu affinis.

In Turkestaniae valle superiore fluvii Tschotkal 5—6000' alt. in montibus alatavicis legit A. Regel.

6. *Tulipa Alberti* Rgl. *)

Pertinet cum subsequentibus ad sectionem generis Tulipae «sepalis ima basi glabris, supra basin macula magna nigrescente notatis, staminibus glabris, pedunculo sub lente minute puberulo, bulbi tunicis intus pilis appressis strigoso-pilosis, Rgl. act. h. Petr. II. 438».

T. Greigi Rgl., foliis virescentibus maculatis; sepalis omnibus acutis, a basi v. a medio v. apice tantum patentibus; filamentis antheris pollineque flavis; stylo sub anthesi antheris duplo brevior. — *T. Greigi* Rgl. Grtfl. 1873 tab. 773. — Acta h. Petrop. II. p. 428 et 448.

α. *typica*; sepalis sub anthesi a basi v. a medio patentibus.

(Cfr. Grtfl. tab. 773.)

β. *campanulata*; sepalis sub anthesi apice tantum patentibus.

Variat floribus plus minus intense purpureis v. lutescentibus.

T. Alberti Rgl., foliis glaucis (pruina albida vestitis), immaculatis; sepalis exterioribus acutis v. acuminatis v. subito in cuspidem excurrentibus, interioribus conniventibus rotundato-obtusis v. saepissime emarginatis v. mucrone minimo inflexo in emarginatura; filamentis antheris pollineque fla-

*) Von den zahlreichen von Herrn A. Regel in dem Alatau gesammelten Zwiebeln von *Tulipa*, die alle in gänzlich verblühtem Zustande gesammelt worden sind, kamen in diesem Frühjahr viele in Blüthe und lieferten uns den Beweis, dass gerade dieser Theil Central-Asiens, die Heimath einer zahlreichen Menge von Arten dieser Gattung ist. *Tulipa Greigi* ist dort in zahlreichen Formen vertreten. Zwei andere verwandte Arten sind uns seitdem bekannt geworden, die eine in der Umgegend Baku's heimische, ward von mir (Acta h. Petrop. III I. p. 156) als *T. Eichleri* beschrieben, die andere ward jetzt nebst *T. Kaufmanni* von A. Regel im Alatau gesammelt und unterscheidet sich durch nicht gefleckte blauweiss bereifte Blätter und mehr glockig urnenförmige Blumen mit innern zusammen neigenden stumpfen Blumenblättern.

vis; stylo sub anthesi antheris paullo brevior. — Caulis brevis usque pedalis, triphyllus, sub lente minute puberulus. Folia anguste lanceolata usque elliptico-lanceolata, attenuato-acuta, plus minus undulata, florem superantia, hyalino-marginata. Flores coccinei v. purpurei v. e coccineo flavescentes.

In montibus Alatau fluvium Tschirtschik adjacentibus legit A. Regel.

T. Eichleri Rgl.; filamentis antherisque atroviolaceis, polline violaceo; stylo sub anthesi antheras subaequante. — Rgl. in Acta horti Petropolitani II. I. p. 156. — Grtfl. tab. 799.

7. *Tulipa Kaufmanniana Rgl.*

Bulbi tunicae intus praecipue apicem versus appresse strigoso-pilosa. Caulis diphyllus. Folia erecta, immarginata, lanceolato-oblonga v. elliptico-lanceolata, florem circiter aequantia, superius inferiore angustius. Pedunculus sub lente minutissime puberulus. Perigonii foliola campanulato-conniventia, elliptico- v. anguste elliptico-oblonga, obtusa v. interiora emarginata, omnia basi apiceque glabra. Filamenta antheras subaequantia, totidem glabra. Antherae lineares; loculis ab apice ad basin sensim dehiscentibus. Ovarium brevissimum, filamentis duplo-triplo brevius, stigmate sessili trigono.

Circiter 20 Cm. alta. Folia glabra, glaucescentia. Variat sepalis albis, intus basin versus croceis, exterioribus dorso rubris, — vel sepalis pallide flavis intus infra medium macula carminea notatis, exterioribus dorso rubris, — v. sepalis omnino purpureis.

In Turkestaniae montibus fluvium Tschirtschik adjacentibus, legit A. Regel.

Affinis *T. suaveolenti* et *altaicae*, ab ambabus ovarii constructione, praeterea caule bifolio a *T. suaveolente*, foliis immarginatis petalis obtusis a *T. altaica* diversa.

Blühet im freien Lande früher als alle andern Tulpen, kommt mit weiss und gelbgrundigen Blumen vor, deren äussere Blätter auf dem Rücken roth und mit weissem oder gelbem Rand, innen am Grunde gelb und der gelbe Fleck oben häufig roth gesäumt, oder die Blumen sind ganz purpur und nur im Grunde gelb.

8. *Tulipa Kolpakowskiana* Rgl.

Bulbi tunicae intus apicem versus strigoso-pilosae, fuscae. Caulis triphyllus, uniflorus. Folia erecto-patentia v. patentia, undulata, obsolete cartilagineo-marginata, margine laevia v. scaberula, inferiora anguste-lanceolata v. lineari-lanceolata, superiora sublinearia. Pedunculus glaber. Perigonium erectum; sepala patentia, elliptico-lanceolata, usque lanceolata, omnia acuta v. rarius obtusiuscula flava, exteriora dorso saepissime rubescentia v. virescentia v. in varietate omnia purpurea, apice basique glabra. Stamina glabra. Filamenta antheris breviora v. eas subaequantia, omnino glabra. Pistillum filamenta subaequans v. iis brevius, stigmatе parvo capitato vix trilobo coronatum.

Species proxime affinis *T. Gesneriana* L., differt caule 3—4-phylo, foliis immarginatis latioribus, perigonii phyllis campanulato-conniventibus saepissime obtusis, pistillo filamenta superante v. antheras subaequante usque superante, stigmatе magno trilobo.

In Turkestaniam prope Wernoe et in valle fluvii Almatinka. (A. Regel).

**C. PLANTARUM IN HORTO BOTANICO IMPERIALI
PETROPOLITANO CULTARUM DESCRIPTIONES,
auctore E. REGEL.**

1. *Allium Elvesi* Rgl.

Glaberrimum. Bulbi depresso-globosi tunicis membranaceis, integerrimis, reticulo cellularum minuto regulari; caule spithamaeo, adscendenti, tereti, supra basin bifolio; foliis linearibus, succulentis, supra canaliculatis, subtus convexis, caulem superantibus; umbella capsulifera, hemisphaerica, pluriflora; spatha membranaceo-hyalina, irregulariter bifida; spathae valvis late ovatis, breviter acuminatis, pedicellos superantibus; pedicellis initio flores aequantibus demum superantibus, basi nudis; sepalis

ovatis, obtusis, roseis, stamina $\frac{1}{3}$ superantibus; filamentis e basi latiore subulatis, simplicibus, inter se aequalibus, basi inter se et cum sepalorum basi in anulum brevem coalitis.

Caulis usque 17 Cm. altus. Umbella circiter 15-flora. Sepala 10—12 Mm. longa, exteriora 6 Mm. lata, interiora angustiora. Capsula globosa, loculis apice biapiculatis.

Recepimus ex horto Cl. Elwes. Patria verosimiliter Californiae alpes.

A. nevadensi Wats. (Rgl. All. p. 113) simillimum, differt autem «bulbi tunicis rete minuto regulari, caule bifolio, sepalis ovatis obtusis, filamentis basin versus magis dilatatis.»

2. *Arabis lilacina* Schrad. in ind. sem. h. Gött. 1832 p. I. (et in herb. Schraderi). (Foliis caulinis lineari-lanceolatis, sagittato-amplexicaulibus, serratis, glabris, glaucescentibus; racemis subsecundis; siliquis reflexis; seminibus subbiseriis. Schrad. l. c.)

Biennis. Folia radicalia lanceolata, in petiolum attenuata, canescentia, integerrima v. paucidentata. Folia caulina glabra, plus minus serrata. Semina siliquarum juniorum subbiseriis, maturarum uniseriis. — Huc pertinent.

Turritis retrofracta Hook. fl. bor. am. I. pag. 41. — Torr. et Gray fl. of N. Am. I. 79. — *Arabis Turczaninowii* Ledeb. fl. ross. I. pag. 123. — Habitat in America boreali et in Sibiria orientali.

3. *Begonia metallica* (in G. Smith Floral Magazine Febr. 1876. tab. 197).

Caule erecto, ramoso, pilis setosis albis hirsuto; stipulis persistentibus, ovato-lanceolatis, acuminatis, subtus margineque setosis; foliis longe petiolatis, oblique cordato-ovatis, palmato-5-nerviis, irregulariter lobato-dentatis, utrinque petioloque hirsutis, supra metallice olivaceo-nitentibus, subtus purpurascentibus; pedunculis quam folia longioribus, puberulis; cyma dichotoma, multiflora; bracteis scariosis, persistentibus, setoso-fimbriatis hirsutisque; florum masculorum sepalis rotundato-ovatis, supra carneis, subtus ad basin setis purpureis barbatis hirsutisque; petalis nullis v. unico alterove oblongo; floribus foemineis 5-petalis, pe-

talibus obovatis, ciliolatis; ovario inaequaliter 3-alato, fusco-hirsuto; alis duabus brevissimis, tertia elongato-ovato-oblonga, omnibus hirsutis.

A. specie proxime affini B. (*Gireoudia*) *sericoneura* Liebm. (D. C. prodr. XV. I. 336) foliis quinquenerviis, pedunculis puberulis, sepalis flor. masc. subtus fusco-barbatis etc. facile dignoscitur. — Patria ignota sed verosimiliter ex America tropica in hortos Angliae introducta.

4. *Calathea leopardina* (*Maranta*) h. Bull.

Calathea Körn. in mon. Marant. prodr. pars altera p. 111. sect. 3.

Grandiflorae. Flores magni, staminodia duo extima maxima; spicae subbasilares.

C. leopardina (Rgl. Grtfl. 1877 p. 35. tab. 893), acaulis; foliis acuminatis; spicis sessilibus, subovatis; bracteis imbricatis, glaberrimis, e basi ovato-oblonga subvaginata in apicem patulum lanceolatum herbaceum excurrentibus; floribus in bractearum axilla saepissime binis, glaberrimis; corollae tubo gracili, bracteolam dorso bicarinatam paullo superante; staminodiis externis petaloideis, flavis, ovato-subrotundis, apice emarginatis. — Folia elliptico-lanceolata v. elliptica, acuminata, glaberrima, nitentia, supra laete viridia, fasciis a nervo medio lateralibus atroviridibus lanceolatis acuminatis picta. Petiolus a basi sub apicem vaginatus, apice geniculo tereti terminatus. Staminodium intimum cucullatum, auricula subrostri-formi. Appendix petaloidea staminis parva; anthera adnata. Stylus curvatus, stomatis truncati margo inferne non productus. — *Maranta leopardina* cat. horti W. Bull. 1876 p. 46. cum. icone. — *M. concinna* h. Bull.

Affinis *C. excapae* Koern. (Ph. excapum Poepp. Nova Gen. p. 18. tab. 25), quae foliis abrupte acuminatis, bracteis puberulis, stylo villosa etc. facile dignoscenda.

Variat: α . *typica*; foliis elliptico-lanceolatis. (*M. leopardina* h. Bull.)

β . *concinna*; foliis ellipticis. (*M. concinna* h. Bull.)

Habitat in Brasilia.

5. *Epidendrum Allardti* Rgl. (§ 6, *Osmophytum* Lindl. in bot. reg. 1839 misc. 135. — Rehb. in Müll. ann VI. p. 354).

Pseudobulbis subcompressis, laevibus, elongato-oblongis, apicem versus attenuatis, apice 2—3-phyllis; foliis lanceolatis, obtusis v. sub-acutis, racemum terminalem 5—6-florum circiter aequantibus; floribus pedicellatis; sepalis petalisque horizontaliter patentibus, obverse lanceolatis, acutis, virescenti-flavidis, basi punctis sparsis purpureis notatis; labello adnato, late cordato, acuminato, albo, medio tantum purpureo striato.

Affine *E. radiato*, cochleato et lancifolio; — pseudobulborum figuratione, labello acuminato, sepalis petalisque angustioribus ab *E. radiato*, — petalis sepalisque horizontaliter patentibus nunquam acuminatis ab *E. lancifolio*, pseudobulborum configuratione, sepalis petalisque latoribus horizontaliter patentibus, labello acuminato ab *E. cochleato*, facile dignoscitur.

Patria verosimiliter Mexico.

Accepimus nomine *E. tigrino* ex horto Allardtiano.

6. *Homalonema* Schott. (Schott Melet. 20).

A. *Euhomalonema*.

Herbae caulescentes Indiam orientalem incolentes.

(*Homalonema* Schott. l. c. — Endl. gen. pl. pag. 238. — Knth. enum. IV. 56. — Schott. prodr. Ar. p. 308).

Huc pertinent exceptione *H. Wendlandi* species omnes a Cl. Schottio l. c. enumeratae.

B. *Curmeria*.

Herbae acaules Americam tropicam incolentes.

(*Curmeria* Linden et André in ill. hort. 1873. p. 45 tab. 121).

a. *Folia cordato-hastata*.

1. *H. Wendlandi* Schott. (prodr. Ar. p. 308); petiolo tereti, puberulo, vaginam plus duplo superante.

2. *H. picturata* (*Curmeria picturata* Linden et André l. c.); petiolo supra canaliculato, dense ferrugineo-tomentoso, vaginam aequante v. subaequante.

b. *Folia elliptica, basin versus attenuata*.

3. *H. Roezli* (Curmeria Roezli Masters in Gardn. Chron. 1874. II. p. 804, fig. 159, 160); foliis acuminatis, basi acutis et ibidem in petiolum breviter decurrentibus; petiolo vaginam superante. — Glabra.
4. *H. Wallisii* Rgl. (Grtfl. 1876. p. 320); foliis breviter apiculato-acuminatis, in petiolum non decurrentibus, basin versus rotundatis et ima basi subemarginatis; petiolo vagina brevior. — Curmeria Wallisii Bull. cat. 1877. p. 4 cum. xyl. — Masters gardn. Chron. 1877. p. 108 cum. xyl.

In Venezuela legit Wallis.

7. *Lilium concolor* Salsb.

(Salsb. Parad. tab. 47. — Knth. enum. IV. 259. — Bot. mag. tab. 1165. Baker in Journ. of Linn. Soc. XIV. 237.)

Variat:

α . *typicum*; bulbis solitariis; foliis oblongo-lanceolatis, obscure 7-nerviis, 10—15 Mm. latis; sepalis intus obscure coccineis immaculatis, extus pallidioribus, apice paullo recurvis.

L. concolor cfr. auct. supra cit. — *L. sinicum* Lindl. in Paxt. fl. gard. II. tab. 193. — Lem. ill. hort. tab. 100. — *L. concolor* var. *sinica* Bot. mag. tab. 605. — Hab. in Japonia.

β *pulchellum*; bulbis solitariis; foliis late linearibus, 5—8 Mm. latis, 3- v. obscure plurinerviis; sepalis coccineis, intus plus minus punctatis, apice vix recurvis.

L. pulchellum Fisch et Lallemand in ind. sem. h. Petr. 1840. pag. 56. — Grtfl. tab. 284. — Ledeb. fl. ross. IV. 152. — Turcz. cat. baic. n. 1134. — Knth. enum. IV. 266. 676. — *L. Buschianum* Lodd. bot. cab. tab. 1628. — *L. concolor* Buschianum Baker in Journ. of Linn. soc. XIV. 236. — *L. concolor pulchellum* Baker l. c. 237. — Hab. in Davuria et Mandschuria.

γ . *partheneion*; bulbis demum caespitosus; foliis anguste lanceolatis, 5—7 nerviis, 8—10 Mm. latis; sepalis pallide coccineis v. flavo-variegatis, intus punctatis.

L. partheneion Sieb. et de Vriese in Tuinb. fl. II. p. 341 cum ic.

Varietas culturae.

♂. *Coridion*; sepalis acuminatis, sulphureis, intus purpureo-punctatis. Cetera ut praecedentis.

L. Coridion Sieb. et De Vr. l. c. p. 341. cum ic.

Varietas culturae.

ε. *luteum*; bulbis demum caespitosis; foliis lineari-lanceolatis, 5—7 Mm. latis, 3-nerviis; sepalis obtusis v. apice submarginatis, luteis, intus purpureo-maculatis.

L. concolor luteum Maxim in herb. Petrop. — Grtfl. 1876. tab. 885. — *L. concolor pulchellum flaviflorum* Baker in Journ. of Linn. soc. XIV. 237. — Habitat in China et Japonia.

8. *Niphaea Roezli* Rgl. (Grtfl. 1877. Gesneriaceae).

Caule humili, ramoso, nunc albido, nunc rufescenti hirsuto; propagulis cylindricis, squamis imbricatis glandulosis vestitis; foliis petiolatis; petiolis albido-hirsutis; lamina ovata, obtusa v. subacuta, basi rotundata, margine simpliciter crenata, supra rugosa, dense breviter pilosa, saturate viridis, subtus subvillosa, nervis elevatis plus minus rubescentibus reticulata; pedunculis in axillis petiolorum superiorum aggregatis, folium superantibus, glanduloso-pileosis, purpureis; calycis hirsuti tubo brevi purpureo, lobis oblongis viridibus; corollae parvae albae lobis ovatis, apice rotundatis.

Ab affine specie «*N. rubida*» caule petiolisque viridibus, foliis margine simpliciter crenatis (nec grosse duplicato-crenatis), corollae plus duplo minoris lobis apice rotundatis, facile dignoscitur.

Roezl misit semina ex America tropica.

9. *Torenia exappendiculata* Rgl.

T. exappendiculata; hirtula, caule erecto ramisque diffusis quadrangularibus; foliis petiolatis, e basi subcordata ellipticis, acutis, nervis lateralibus latere superiore insigniter immersis subplicatis, dentatis; dentibus breviter mucronatis; floribus in apice ramorum umbellato-fasciculiformibus; calycibus ovato-oblongis, subaequaliter quinquecostato-alatis,

basi obtusis, bilabiatis; labio superiore apice breviter 2—3-dentato, labio inferiore integerrimo v. apice breviter bidentato; corolla calyce circiter duplo longiore; filamentis exappendiculatis.

Corolla alba, circiter 22 Mm. longa, limbi vix 15 Mm. lati lobis lateralibus caeruleis, lobo antico albo, lobo inferiore leviter caerulescente fauce luteo. —

Affinis *T. asiaticae* et *hirsutae*, calyce quinquealato ovato-oblongo, corolla plus duplo minore, filamentis anticis basi exappendiculatis facile dignoscitur. —

Nomine *T. ciliatae* ex horto Parisiensi accepimus. Patria verosimiliter India orientalis.

10. *Pentas carnea* Benth. (in Bot. reg. XXX. tab. 32.)

α. *typica*; filamentis brevissimis antherisque tubo inclusis; stylo exserto. (Benth. l. c.)

β. *macrostemon*; filamentis elongatis e tubo exsertis; stylo incluso.

Semina legit Hildebrandt in insula St. Johanna Africae boreali-orientalis.

11. *Zamia muricata* Willd. (Cfr. Acta h. Petr. IV. pag. 308.)

γ. *Katzeri*; petiolis aculeis crebris armatis, rhachibus basi parce aculeatis, perulis lanceolatis in acumen elongatum attenuatis, strobilis masculis acutis. — *Ceratozamia Katzeriana* Rgl. Acta h. Petr. IV. p. 298 *).

*) Die von uns am angezogenen Orte beschriebene Pflanze hat jetzt geblüht und Herr Katzer hatte die Freundlichkeit das betreffende Exemplar uns zuzusenden. Dasselbe blühet mit 5 männlichen Zapfen, welche diese Pflanze als eine *Zamia* dokumentirten, die in den Formenkreis von *Zamia muricata* gehört und namentlich mit der im Jahrgang 1856 der Verhandlungen der Berliner Academie der Wissenschaften von Karsten gegebenen Abbildung gut übereinstimmt, jedoch mit den oben in der Diagnose festgestellten Abweichungen. Auch der jetzt besser entwickelte Stamm stimmt mit dem Gattungscharakter von *Zamia* vollständig überein.

DESCRIPTIONES PLANTARUM

NOVARUM ET MINUS COGNITARUM.

Fasciculus VI.

AUCTORE

E. REGEL.

PETROPOLI.

1878.

W. Schacht

J. Berger

DECEMBER 1907

DECEMBER 1907

DECEMBER 1907

DECEMBER 1907

DECEMBER 1907

DECEMBER 1907

v

DECEMBER 1907

Типографія Братьевъ Шумахеръ, В. О., Загребенихъ переулокъ № 1.

581.947
R 26d
Pl. 6

**A. PLANTAE REGIONES TURKESTANICAS INCOLENTES,
SECUNDUM SPECIMINA SICCA
A REGELIO ET SCHMALHAUSENIO DETERMINATAE,
auctore E. Regel.**

Rosaceae.

1. *Geum (Sieversia) karatavicum* Rgl. et Schmalh.

Caules adscendentes, pedales et ultra, pilis brevibus intermixtisque longioribus subpubescentes, apice simpliciter v. iterato dichotomo-ramosi, floribus alaribus terminalibusque. Folia pubescentia v. subhirsuta; radicalia lyrato-pinnata; foliolis lateralibus paucijugis, subsessilibus, cuneato-ovatis v. subcordato-ovatis v. subrotundis, superne sublobatis duplicato-dentatis: terminali maximo, cordato-ovato, sublobato, duplicato-dentato; caulina pauca, foliolis lateralibus foliorum radicalium similia v. inferiora petiolata foliis radicalibus similia. Flores ignoti. Calyx fructifer extus pubescens, tubo turbinato, lobis elongatis lineari-lanceolatis acutis integris v. paucidentatis, bracteolis similibus minoribus. Achaenia 10—15, carpophoro stipitato tubo calycis brevioris insidentia, lineari-oblonga, in rostrum rectum subulatum achaenium subduplo superans excurrentia, a basi ad medium patenter hirtula, medio glabra, apice setis reflexis dense barbata.

Habitat in Turkestanicae montibus Karatau (Sewerzow), prope Karagus in montibus karataviciis (A. Regel).

Leguminosae.

2. *Trigonella orthoceras* Kar. et Kir., annua; florum umbellis axillaribus sessilibus v. pedunculatis, 1—4-floris; leguminibus linearibus, compressiusculis, longis, rectis v. saepius plus minus arcuatis, irregulariter reticulato-areolatis, areolis longitudinalibus, apice stylo brevi paullo curvato terminatis.

T. orthoceras Kar. et Kir. in Bull. Mosq. XV. 339. — *T. incisa* Benth. in Royl. ill. Him. 197. — *T. geminiflora* Bunge in reliq. Lehm. p. 247 n. 306. — *T. Noëana* Boiss. diagn. ser. II. fasc. II, p. 11. — *T. monantha* C. A. M. ind. cauc. p. 137. — *T. dicarpa* C. A. M. in herb. h. Petrop. — *T. anatolica* Boiss. diagn. ser. II, fasc. VI, p. 46. — Satis frequens in regionibus turkestanicis.

3. *T. polycerata* L., areolis leguminis transversis a praecedenti dignoscitur.

In Turkestanicae regionibus orientalibus.

4. *Psoralea drupacea* Bnge.

Bnge. reliq. Lehm. n. 320. — Boiss. fl. or. II. p. 187.

Perennis, herbacea, (nec fruticosa) caulibus 2—3-pedalibus, simplicibus v. apice parce ramosis. Folia simplicia v. trifoliata, foliolo superiore majore.

In regionibus turkestanicis satis frequens, inter Katta-kurgan et Pentschakent (Lehmann), in montibus karatavicis prope Boroldai et in deserto prope Taschkent (A. Regel), — in deserto inter fluvium Syrdarja et Taschkent, prope Samarkand (O. Fedtschenko), — in deserto inter Taschkent et Toi-Tiube (Korolkow).

Didymo *Dipelta* Rgl. et Schmalh. (Genus novum).

Calycis campanulato-tubulosi dentes subulati, superiores minores. Petala unguiculata; vexillum erectum, apice bilobum, lobis rotundatis; alae oblongae; carina recta, obtusa, mutica, alas paullo superans, vexillo brevior. Stamina 10, vexillare liberum, caetera connata. Ovarium stipitatum, 4-ovulatum. Stylus filiformis, ovarium superans, stigmatibus capitato terminatus. Legumen didymum, stipite filiformi suffultum, sub-

compresso-planum, septo angusto duplicato e sutura dorsali intruso in loculos duos ovato-subquadratos bispermis divisum; valvis navicularibus, quadrato-ovatis, compressis, nunc subaequalibus, nunc inaequalibus, margine integris, a legumine maturo saepe secedentibus et deciduis. Semina reniformia, compressa; cotyledones planae, radicula rimali adscendenti accumbentes.

Herba annua, pusilla, ramosa, pilis subadpressis simplicibus strigoso-hirta. Folia simpliciter impari-pinnata. Flores racemosi.

Habitu Astragali speciebus annuis affinis «leguminibus aequaliter v. inaequaliter didymis, compressis, loculis demum delapsis» insignis.

5. *D. turkestanica*.

Caulis erectus v. adscendens, 5—7 Cm altus, ramosus. Folia 3-juga cum impari, foliola lineari-oblonga, obtusa, utrinque strigoso-hirta. Stipulae liberae, subulatae. Racemi axillares, folia superantes, pauciflori. Flores subsessiles, parvi, 3—4 Mm. longi, bracteola subulata suffulti. Calycis pilis nigrescentibus hirti dentes tubum plus duplo superantes, quam carina breviores.

Habitat in Turkestaniae montibus karatavicis prope Karagus. (A. Regel).

Sewerzowia Rgl. et Schmalh. (Genus novum).

Calycis tubulosi dentes subulati, ad faucis latus inferius congesti. Petala longiuscule unguiculata; vexillum erectum, apice truncatum; alae oblongae; carina recta, obtusa, alis paullo brevior. Stamina 10, vexillare liberum, caetera connata. Ovarium sessile, pluriovulatum. Stylus brevis, crassiusculus, stigmate capitato terminatus. Legumen ellipticum, brevis, crassiusculus, stigmate capitato terminatus. Legumen ellipticum,

trigonum, dorso planum, ventre carinatum, intus septo duplicato e sutura dorsali intruso in loculos duos longitudinaliter divisum; septi membranæ initio arcte connatae, in fructu maturo a sutura dorsali secedentes; valvis navicularibus, carinis (leguminis margines mentientibus) dentibus spinosis ciliatis. Semina compressa, reniformi-ovata.

Herba annua, erecta. Folia impari-pinnata, alterna, stipulata; stipulae liberae subulatae; foliola exstipulata. Flores parvi, in racemos axillares, pauci-plurifloros dispositi.

Genus novum, calycis leguminisque structura ab Astragalo et Biserrula facile dignoscendum.

6. *S. turkestanica* Rgl. et Schmalh.

Puberula. Caulis erectus, simplex v. basi ramosus, spithamaeus usque 40 Cm. altus. Foliola 8—10-juga, lineari-oblonga, apice truncato-emarginata. Racemi pedunculati, folium subaequantes v. superantes.

In regionibus turkestanicis ad fluvium Tschajan leg. Sewerzow, in deserto Kisilkum et in deserto inter Taschkent et fluvium Syr-Darja legit O. Fedtschenko.

7. *Alhagi camelorum* Fisch. (ind. h. gorenk. 1812. p. 72. — Ledb. fl. ross. I. pag. 715). — A. kirghisorum Schrenk enum. pl. nov. p. 84.

α. *typica*; omnino glabra.

β. *canescens*; caule foliisque utrinque v. foliis subtus tantum pilis brevibus adpressis subcanescentibus.

In regionibus turkestanicis satis communis.

Variat foliis angustioribus v. latioribus, spinas subaequantibus v. paullo superantibus v. iis duplo-pluries brevioribus, calyce manifeste v. obsolete dentato.

Pomaceae.

8. *Pyrus heterophylla* Rgl. et Schmalh.

Fruticosa, glabra, ramis divaricatis v. horizontaliter patentibus, demum saepe in spinam brevem v. elongatam mutatis. Gemmae glabrae. Folia petiolo gracili filiformi suffulta, nunc integra v. bi- v. trifida, basi in petiolum plus minus decurrentia, nunc impari-pinnatifida v. subpinnatifida; foliola 1—3 juga, nunc omnia basi confluentia, nunc inferiora ad basin sessilem libera, superiora basi confluentia, omnia lanceolata v. lineari-lanceolata v. linearia crenato-serrulata; crenis glandula acuta demum

decidua terminatis. Flores ignoti. Fructus terminales, pomacei, ut videtur satis duri, calyce persistente cupuliformi coronati, 5-loculares; loculis 2-spermis, endocarpio cartilagineo. Fructus basi in petiolum apice incrassatum subattenuati, usque 2 Cm. longi, $2\frac{1}{2}$ Cm. in diametro transversali.

In regionibus turkestanicis satis frequens occurrit.

In Kokania in trajectu Kindir-daban, in valle fluvii Sarawschan in montibus Aksai et inter Dscham et Aksai (O. Fedtschenko); in montibus alatavicis Turkestaniae, ad fluvium Maili (Krause), ad fluvium Tschirtschik (Sewerzow, Kuschakewicz), ad fluvium Tschotkal (A. Regel); in montibus karatavicis prope Bugun (Sewerzow), prope Boroldai et Kultschek (A. Regel).

Tamariscineae.

9. *Tamarix polystachya* Ledb. (fl. ross. II. 132) var. *cerifera*.

Ramuli juniores, folia et praecipue racemorum pedunculi rhaches et pedicelli globulis minutis ceraceis dense asperata.

Inter Taschkent et Karak-ata ad montes Manam-djan (Korolkow).

10. *Tamarix Korolkowi* Rgl. et Schmalh.

Glaucæ, glabra, cortice rufescenti-fusca. Folia ovata, subsemiamplexicaulia, acuminata, ramulorum imbricato-adpressa. Racemi in ramulis hornotinis creberrimi, solitarii, terminales racemosique, longissimi, gracillimi, latitudine sua multoties longiores. Bractee lanceolatae, coloratae, pedicellum subaequantes v. eo breviores. Pedicelli calycem superantes. Flores pentandri; petalis roseis, ovatis v. ovato-oblongis, calycem triplo superantibus, mox deciduis; filamentis filiformibus, exsertis; antheris exapiculatis; disco quinquelobo. Ovarium e basi latiore in collum sensim sensimque attenuatum, stylis 3 obovatis patentibus coronatum.

T. leptostachys cui planta nostra habitu proxima, differt: «bracteis herbaceis e basi latiore subulatis calycem (incluso pedicello) aequantibus v. superantibus, petalis calycem duplo superantibus.

In regno chivensi ad fluvium Amu-Darja prope Chasar-aspa in sepulcreto frequentissima (Korolkow).

Crassulaceae.

11. *Umbilicus paniculatus* Rgl. et Schmalh.

Perennis, glaberrimus. Caulis erectus, simplex. Folia plana; radicalia rosulata, spathulato-obovata v. spathulato-oblonga, saepissime acuta; caulina sparsa, spathulato-oblonga v. lanceolata, acuta. Flores in paniculam spiciformem v. subpyramidatam terminalem dispositi, pedicellis florem subaequantibus v. eo brevioribus suffulti. Calycis 5-partiti laciniae ovato-lanceolatae, acutae, corolla circiter triplo breviores. Corollae ad medium 5-fidae laciniae lanceolatae, acuminatae, nervo supra basin trifido percursae. Caulis inclusa panicula 20—35 Cm. altus. Paniculae rami breves, pauci-pluriflori, floriferi patentes, fructiferi erecti. Bractae lanceolatae v. lineari-lanceolatae, pedunculo pedicellisque breviores. Corolla circiter 6 Mm. longa, ut videtur pallide flava nervis rubicundis picta. Folia exsiccata eximie reticulato-nervosa.

Species proxime affinis *U. platyphyllo* Schrenk «foliis caule calycibusque pilis crassiusculis ubique adspersis, floribus racemoso-corymbosis, calycis corollaeque laciniis obtusis» facile dignoscitur.

In Kokaniae valle fluvii Sarawschan inter Varsaminor et Peti, 4500—6000 ped. alt., in montibus prope Daschty-Kasy, 4000 ped. alt., prope Van Sarvada, 6300 p. alt. (O. Fedtschenko), — in Turkestaniae montibus alatavicis in valle fluvii Tschirtschik, 4—6000 ped. alt., et in valle fluvii Tschotkal, 4—6000 ped. alt. (A. Regel).

12. *Sedum Rhodiola* L. var. *linifolia*. Foliis lineari-lanceolatis subintegerrimis v. plus minus grosse argute serratis, floribus purpureis.

Valde affine *S. Rhodiolae* var. *Stephani*, dignoscitur autem foliis minus profunde argute serratis v. subintegerrimis, floribus purpureis.

In montibus alatavicis prope Wernoje leg. Kuschakewicz et Sewerzow.

13. *Ribes heterotrichum* C. A. Meyer. (Cfr. Ledb. fl. ross. II. 197).

Variat:

α. *typicum* Rgl. et Schmalh.; foliis suborbiculato-renifor-

mibus, subtus petiolis racemisque setuloso-pilosis glandulosisque.

In Turkestaniae montibus Alexander (A. Regel), in montibus thianschanicis Jak-tasch 12000 ped. alt. (Scharnhorst).

β. glabriusculum Rgl. et Schmalh.; foliis e basi rotundata v. rarius subcordata subrotundis, glabriusculis, eglandulosis, petiolis racemisque setuloso-pilosis.

In montibus alatavicis ad fluvium Almatinka prope Wernoje, in tractu Karakia 8000 ped. alt., in montium Alexander tractu Karabura 8000 ped. alt. (A. Regel).

γ. cuneatum Rgl. et Schmalh.; foliis e basi cuneata subrotundis. Cetera ut praecedentis. — Habitus *R. saxatilis*, inerme autem et indumento *R. heterotrichi* var. *β*.

In Kokania prope Isphairan (O. Fedtschenko).

14. *Ribes rubrum L.* (Cfr. Maxim. diagn. pl. decas VI in Bull. Ac. Petr. 1873 tom. IX. p. 233).

Var. *intermedia Rgl. et Schmalh.*, sepalis minute ciliatis, stylo cylindrico.

Stylo cylindrico (nec conico) solummodo a *R. petraeo* differt.

In regionibus turkestanicis et kokanicis satis frequens occurrit.

Saxifragaceae.

15. *Saxifraga Alberti Rgl. et Schmalh.*

Caudiculi suffruticulosi, foliis densissime vestiti, columniformes, caespitem densum magnum efformantes. Caules floriferi pilis glanduliferis hirtuli. Folia caudiculorum dense imbricata, lingulato-oblonga, supra concava, infra convexa et subcarinata, subaequilata, in apicem obtusiusculum attenuata, fere horizontaliter patentia, apice juxta marginem serie fovearum 3—5 minutissimarum v. subobsoletarum notata v. peltis calcareis nonnullis foveas tegentibus instructa, sub lente a basi supra medium denticulato-ciliolata, caeterum glabra; folia caulium floriferorum sparsa, pilis setiformibus glanduliferis ciliata, lineari-lanceolata, apicem versus sensim attenuata. Flores in racemum corymbiformem 4—5-florum ter-

minalem glanduloso-hirtum collocati. Bractae bracteolaeque lineares, pedicellum superantes. Calycis tubus late campanulatus, brevissime glanduloso-hirtulus; lobi tubum superantes, corolla plus duplo breviores; ovato-oblongi, coriacei (nec transparentes), dorso glandulis paucis breviter stipitatis hirtuli, margine vix glanduloso-ciliati. Petala obovata, obtusa, trinervia, ut videtur alba. — Caulis floriferus circiter 2 Cm. altus.

Affinis *S. valdensi* D. C. et *S. ramulosae* Wall., una differt, «foliis caudiculorum basi erectis, a medio recurvis, margine et in disco foveis numerosis, calycis laciniis apicem versus dorso glabris transparentibus, — altera foliis caudiculorum oblongo-spathulatis juxta marginem 5—9 fovearum serie satis conspicuarum notatis, foliis caulium floriferorum apicem versus spathulato-dilatatis, floribus in caulium apice solitariis vel rariis binis».

In Turkestaniae montibus Alexander in tractu Karabura 8000 ped. alt. leg. A. Regel.

Umbelliferae.

16. *Carum chaerophylloides* Rgl. et Schmalh. *)

Glaberrimum. Bulbus depresso-globosus. Folia bi-tripinnatisecta; laciniis linearibus v. anguste lineari-lanceolatis, acutis. Umbella pluri-radiata, involucri involucelloque nullo. Flores albi, petalis acumine inflexo obcordatis. Fructus lineari-cylindrici.

*) *Carum* Koch.

Conspectus specierum in Imperio Rossico crescentium.

A. *Involucrum nullum* v. 1-2-phyllum.

a. *Involucellum nullum*.

1. *C. Carvi* L., radice fusiformi, fructibus ovato-oblongis.

2. *C. chaerophylloides* Rgl. et Schmalh., bulbo depresso-globoso, fructibus lineari-cylindricis v. cylindricis.

b. *Involucellum* 1-4-phyllum.

3. *C. atrosanguineum* Kar. et Kir., foliis radicalibus pinnatisectis v. bipinnatisectis, foliolis oppositis sessilibus v. breviter petiolatis; umbellae radiis valde inaequalibus; involucelli phyllis oblongo-lanceolatis; stylis recurvis stylopodio brevioribus. — Variat:

a. *typicum*; foliolis sessilibus trisectis, segmentis lateralibus laciniatis, terminali pinnatifido-5-lobo

C. atrosanguineum Kar. et Kir. enum. pl. song. n. 362.

Caulis 1—2-pedalis, plus minus ramosus, teres, laevis, striatus. Folia radicalia longe petiolata, trisecta; segmentis petiolatis, bipinnatisectis; foliorum caulinarum petiolis a basi ad apicem in vaginam inflatam margine scariosam mutatis. Umbella 10—16 radiata. Involucrum nullum v. monophyllum. Involucellum nullum. Calyx nullus. Fructus lineari-cylindricus, pedicello filiformi brevior, maturus ab apice ad basin partitus;

β. *alpestre*; foliolis brevissime petiolatis v. sessilibus, pinnatisectis, segmentis inferioribus 2—5-lobis. — *C. indicum* β. *alpestre* Herder in pl. Semenov. n. 433.

In montibus alatavicis in salto Tubulgaty (Semenov), in angustiis Sulu-kastek prope Wernoje (A. Kuschakewicz).

γ *kokanicum*; foliolis omnibus petiolatis. Cetera ut praecedentis.

In regionibus kokanicis prope Alai (O. Fedtschenko).

4. *C. lomatocarum* Boiss., foliis radicalibus bipinnatisectis; foliolis petiolatis, segmentis integris v. lobatis, laciniis linearibus; umbellae radiis subaequalibus; involucelli phyllis capillaribus; stylis recurvis stylopodium superantibus. — *Seseli alpinum* M. B. fl. taur. cauc. I. p. 236. — *Lomatocarum alpinum* Fisch. et Mey. ind. sem. h. Petrop. VI. p. 17. — *Carum lomatocarum* Boiss. fl. or. II. p. 879.

c. *Involucellum polyphyllum*.

5. *C. heterophyllum* Rgl. et Schmalh., foliorum caulinarum laciniis capillaribus; involucelli phyllis capillaribus; stylis recurvatis stylopodio vix longioribus. — Habitat in regionibus kokanicis (Cfr. pl. Fedtschenkoanae).
6. *C. elegans* Fenzl., foliorum laciniis capillaribus; involucelli phyllis oblongis, scarioso-marginatis; stylis erectis v. patulis, stylopodio 3-pluries longioribus. — *C. elegans* Fenzl. pug. n. 54. — Ledeb. fl. ross. II. p. 883. — In Turkestaniae montibus karatavicis in promontorio Kcharli-tau (Sewerzow), prope Karnak (A. Regel), in Kokaniae valle fluvii Sarawschan inter Ulus et Dscham (O. Fedtschenko).

B. *Involucrum et involucellum 4-polyphyllum*.

a. *Involucelli phylla late scarioso-marginata, uninervia*.

C. apiculatum Kar. et Kir. enum. pl. song. n. 360. — Ledeb. fl. ross. II. 260. — Foliorum bipinnatisectorum laciniis ovato-oblongis in mucronem acuminatis, involucri involucellique phyllis oblongis acutis. Fructus maturi compressi ala cincti, ideo justa ratione Cl. Trautvetter hanc speciem generi *Peucedano* sub nomine *P. rapiferi* adnumeravit.

7. *C. trichophyllum* Schrenk. (Ledeb. fl. ross. II. 250); radice globosa;

mericarpia semicylindrica, 5-juga; jugis filiformibus prominentibus albis; valleculis vitta unica lata fusca; commissura concava. Styli recurvi stylopodio paullo longiores. Carpophorum bipartitum.

A. C. Carvi L. bulbo depresso-globoso fructuumque configuratione aliisque notis facile dignoscitur. Valde affine etiam Chaerophyllo bulboso, differt autem: semine non sulcato, involucri involucellique defectu.

foliorum supradecompositorum laciniis setaceis acutis; involucri involucellique phyllis oblongis obtusis; fructibus elliptico-oblongis.

In Turkestaniae montibus alatavicis in valle fluvii Talas (A. Regel)

8. *C. chaerophylloides* Rgl. et Schmalh., radice lignosa crassa subcylindrica, foliorum oblongorum tripinnatisectorum laciniis setaceis brevibus in acumen tenue excurrentibus, involucri involucellique phyllis lineari-oblongis, fructibus (immaturis) cylindricis quadruplo longioribus quam latis.

In Kokaniae valle fluvii Sarawschan, alt. 4000' (O. Fedtschenko).

9. *C. Sewerzowi* Rgl., radice (ut videtur) cylindrica, foliorum oblongorum supradecompositorum laciniis lineari-setaceis brevibus in callum tumidum acuminatum excurrentibus, involucri involucellique phyllis oblongis v. ovato-oblongis, fructibus immaturis oblongis duplo longioribus quam latis *).
- b. *Involucri involucellique phylla ovata, obtusissima, late scarioso-marginata, plurinervia.*
11. *C. bupleuroides* Schrenk. (Cfr. Ledeb. fl. ross. II. 250).
- c. *Involucri involucellique phylla subulata usque lineari-lanceolata, herbacea, immarginata v. vix scarioso-marginata.*
12. *C. Bulbocastanum* L. (Cfr. Ledeb. fl. ross. II. 248), foliis trisectis, segmentis pinnati- v. bipinnatisectis, laciniis remotis anguste lineari-lanceolatis v. lineari-oblongis; pedicellis fructiferis erectis quam fructus lineari-oblongi subaequilongis v. longioribus.
13. *C. buriaticum* Turcz. (cfr. Ledeb. fl. ross. II. 249); foliis bipinnatis usque tripinnatisectis, laciniis linearibus; pedicellis fructiferis erectis v. patentibus fructu ovato-oblongo duplo-pluries longioribus.
14. *C. cylindricum* Boiss., foliis bi- tripinnatisectis, laciniis linearibus brevibus. — *C. cylindricum* Boiss. et Hoh. diagn. ser. I. fasc. 10. pag. 23. — Boiss. fl. or. II. 885. — *Chaerophyllum tuberosum* C. A. M. in herb. horti Petrop.
15. *C. setaceum* Schrenk. (Cfr. Ledeb. fl. ross. II. p. 249); foliorum supracompositorum laciniis setaceo-capillaribus.

*) Species n. 8 et 9 adhuc fructibus immaturis tantum notae.

In Turkestaniae montibus karatavicis in promontorio Mogol-tau et prope Jani-kurgan (Sewerzow), inter Taschkent et Keles, in hortis urbis Taschkent (O. Fedtschenko et Krause), in Kokaniae valle fluvii Sarawschan, in deserto Karak, prope Samarkand (O. Fedtschenko).

Species nostra cum *C. cylindrico* Boiss., sectionem intermediam inter genera *Carum* et *Chaerophyllum* sistere videtur; fructibus figuratione *Chaerophylli*, albumine esulcato ut in *Caro*.

17. *Carum Sewerzowi* Rgl.

Glabrum. Foliorum 3-pinnatisectorum laciniis lineari-subulatis, apice callo tumido acuminato terminatis; involueris involucellisque polyphyllis, phyllis albido-scariosis; involueri phyllis ovato-oblongis, acutis v. obtusis, uninerviis v. basi tantum trinerviis; involucelli phyllis oblongo-lanceolatis, acutis, uninerviis.

Radix ignota, collo fibris foliorum emortuorum vestito. Caulis e basi ramosissimus, 1—2 pedes altus. Folia caulina saepe ad vaginas reducta. Umbellae 10-multiradiatae. Flores albi, petalis ovato-subrotundis, in caudam involutam productis. Fructus juniores elliptico-oblongi, stylis recurvis stylopodio longioribus terminati. Mericarpia jugis 5-linearibus. Fructus maturi ignoti.

Carum bupleuroides Herd. pl. Semenov. n. 432 ex parte.

In Turkestaniae montibus karatavicis in promontorio Mogol-tau, legit Sewerzow.

18. *Conopodium allioides* Rgl. et Schmalh. (Scaligeria sect. II. Elaeostica).

Glabrum. Bulbus depresso-globosus. Caulis erectus, ramosus, teres, foliosus, albido-striatus, 1½—2½ pedes altus. Folia tripinnatisecta; laciniis lineari-setaceis, petiolo brevi vaginato suffulta. Umbella pluri-radiata, radiis 1—1½ Cm. longis. Involucra involucellaque polyphylla. Involueri phylla lineari-lanceolata, acuminata, albido-scariosa, medio 3—5-nervia, initio radios circiter aequantia, demum iis breviora. Involucelli phylla 5—6, demum conniventia, flores superantia et post anthesin occultantia, lanceolata v. ovato-lanceolata v. ovata, cuspidata, albido-

hyalina et saepe roseo tineta, medio 1—3-nervia, florem Allii aemulans, 4—5½ Mm. longa. Flores numerosi, breviter pedicellati, quam involucelli phylla subduplo-breviores; petala late ovato-subrotunda, acumine inflexo subemarginata, alba v. rosea. Fructus parvi, ovato-oblongi, sub lente minute hirtuli, stylis recurvis stylopodio paullo longioribus terminati; mericarpia dorso convexa, 5-juga; jugis filiformibus; valleculae vittaeque obsoletae; commissura profunde sulcata. Carpophorum bipartitum. Semen facie profunde sulcatum, sulco leviter bisulcato.

Affine *Conopodio glaucescenti* (*Bunium glaucescens* D. C. — *Scaligeria glaucescens* Boiss. fl. or. II. 877. — *Butinia glaucescens* Boiss. in Ann. sc. nat. 1844. pag. 61. — *Elacosticta glaucescens* Boiss. diagn. ser. I. fasc. 10. pag. 51), differt autem toto coelo «bulbo depresso-globoso, involucelli phyllis demum conniventibus (nec reflexis) flores fructusque occultantibus, pedicellos duplo superantibus, fructibus sub lente hirtulis». — *Carum bupleuroides* Schrenk, cui planta nostra similis est, non solum semine non sulcato, sed etiam radiis involucri duplo triploque longioribus, involucelli phyllis obtusis demum reflexis flores fructusque circiter aequantibus, fructibus glabris oblongis, facile dignoscitur.

In Turkestanicae montibus alatavicis inter Bugun et Boroldai, in montibus alatavicis prope Kokschar (6—7000' alt.), prope Aischmara in valle fluvii Tschotkal (6000' alt.) leg. A. Regel.

19. *Deverra Korolkowi* Rgl. et Schmalh. (*Deverra* sect. II. *Pithuranthus* Viv. cfr. D. C. prodr. IV. 144).

Caulis erectus, ramosus, foliosus, teres, striato-subangulatus, sub lente minutissime laxèque viscido-hirtulus, demum glaber. Folia minute viscido-hirtula, inferiora bipinnatisecta, superiora decrescenti-minora pinnatisecta, laciniis lineari-subulatis. Umbellae 8—16 radiatae; radiis subaequalibus, patentibus, involucri 2—4-plo longioribus, sub lente minutissime laxèque viscido-hirtulis. Involucrorum involucellorumque 5—6-phyllorum phyllis viridibus, lineari-lanceolatis, viscidis. Pedicelli involucellum circiter aequantes. Fructus ovatus, a latere compressus. Mericarpia tuberculis squamuliformibus omnino vestita; jugis 5, filifor-

mibus, paullo elevatis; valleculis univittatis; commissura plana, bivittata. Styli duo, recurvi, stylopodio paullo longiores. Carpophorum bivittatum. Semen teres.

Radix et folia radicalia ignota. Flores albi; petala subrotunda, acumine inflexo emarginata. Calycis dentes obsoleti. Fructus sapore eorum Pimpinelli Anisi.

In hortis urbis Chiva cultum sub nomine Mumuk. (Korolkow).

20. *Angelica songorica* Rgl. et Schmalh. (Sectio III. Archangelica) *).

Caulis cavus, glaber, elevato-striatus. Folia pinnatisecta v. bipinnatisecta, v. tripinnatisecta, foliolis e basi subcordata v. rotundata v. cuneata ovatis v. late ovatis v. subrotundis, obtusis v. acutis, crenato-dentatis, supra glabriusculis v. hirtulis, subtus praecipue ad rete venarum hirtulis, inferioribus saepe breviter petiolatis, superioribus sessilibus vix v. non decurrentibus, omnibus integris v. terminalibus confluentibus et plus minus lobatis. Umbella multiradiata, involucrum nullum. Umbellula multiflora, hirtula; involucelli polyphylli phyllis lineari-subulatis, pedicellos subaequantibus, hirtulis. Calycis margo obsoletus. Petala oblongo-lanceolata, acuminata, acumine incurvato, dorso plus minus hirtula. Stylopodii plano-depressi margo elevatus, undulatus, subcrenatus. Styli

*) *Angelica* L.

(Vittae pericarpii endocarpio instructae).

SECTIO I. *Euangelica*. Endocarpium pericarpii stratis exterioribus adhaerens. Valleculae univittatae.

A. montana Schleich., *A. pachyptera* Lallem., *A. sylvestris* L., *A. saxatilis* Turcz., *A. dura* C. Koch., *A. ursina* Rupr., *A. refracta* F. Schmidt.

SECTIO II. *Mesangelica*.

Endocarpium semini adhaerens, a pericarpii stratis exterioribus dissolutum, vittis 4 instructum, quae valleculis oppositae sunt.

A. tornata Rgl. et Schmalh.

SECTIO III. *Archangelica*.

Endocarpium semini adhaerens, a pericarpii stratis exterioribus dissolutum, vittis multis instructum.

A. decurrens Ledeb., *A. officinalis* Hoffm., *A. songorica* Rgl. et Schmalh.

demum recurvi stylopodium superantes. Fructus ovato-oblongus, a dorso subcompressus. Mericarpii jugis alatis, marginalibus latioribus, sub hiantibus. Endocarpium semini adhaerens, a pericarpii stratis exterioribus dissolutum, vittis numerosis instructum. Semen dorso convexum, latere interiore commissurae opposito subreniformi excavatum. — Caulis 8—35 Cm. altus.

Foliola 4—10 Cm. longa, 3—6 Cm. lata. Petioli foliorum caulium basi v. totidem saccato-inflati.

Archangelica decurrens β . alpina Herder in pl. Semenov. n. 452.

Angelica (Archangelica) decurrens Ledb. cui species nostra proxima, «foliorum laciniis oblongis v. ovato-oblongis acuminatis longe decurrentibus terminali trilobo, petalis ellipticis acuminatis, stylopodio conico» dignoscitur *).

α . *ovalifolia*; foliis pinnatisectis v. bipinnatisectis, foliolis ovatis obtusis v. acutiusculis, 5—10 Cm. longis.

In promontoriis jugorum Tarbagatai et Alatau (Schrenk), in jugis montium Alexander in trajectu Karabura 8000' alt. (A. Regel), in montibus Thianschan in valle fluvii Kok-djar, 8000' alt. (Semenow).

β . *rotundifolia*; foliis bi- v. tripinnatisectis, foliolis omnibus subrotundis obtusis, $1\frac{1}{2}$ —6 Cm. longis.

In Kokania inter juga Isphairan et glacies Tentis-bai, 8—11,000 alt., ad glacies Tschzurowski, 8—10,000' alt. et in trajectu Dschiptik, 8—12,000' alt. (O. Fedtschenko).

21. *Ferula penninervis* Rgl. et Schmalh. **)

Glabra. Caulis elatus, crassus, teres, medulla faretus, apice paniculato-ramosissimus. Folia maxima, decrescentia; inferiora et intermedia

*) Ledebour nennt den Kelchrand bei Archangelica 5-zählig, es ist hier aber kein Kelchrand vorhanden, sondern offenbar der stark wellige und meist etwas aufgerichtete Rand des Stylopodiums dafür genommen worden.

**) *Ferula* L.

SECTIO I. *Ferulae legitimae*.

Foliorum lobi v. foliola angusta, linearia v. lineari-lanceolata.

α . *Vittae in valleculis solitariae. Calycis margo obsoletus.*

F. penninervis Rgl. et Schmalh.

petiolo tereti elongato basi vagina amplexicauli suffulta; superiora petiolo totidem vaginato instructa, suprema petiolo vaginato aphylla. Foliorum inferiorum lamina trisecta; segmentis petiolatis, 4—5 tuplicato-pinnatisectis; laciniis planis, anguste lineari-lanceolatis, utrinque attenuatis margine repando-subcrenatis, *eximie penninerviis*, $1\frac{1}{2}$ —5 Cm. longis, 3—4 Mm. latis. Umbellae multiflorae, in caule ramisque terminales; centrales breviter v. longiuscule pedicellatae, foemineae, sub apice proliferae; laterales longius pedunculatae, saepissime 2, masculae. Involucrum nullum. Involucellum umbellarum mascularum polyphyllum, phyllis parvis, mox deciduis, umbellarum foeminearum nullum. Umbellula multiflora, pedicelli fructum aequantes v. paulo superantes.

b *Vittae in valleculis solitariae. Calycis margo dentatus.*

F. karatarica Rgl. et Schmalh.

F. ceratophylla Rgl. et Schmalh.

F. Olga Rgl. et Schmalh. (Cfr. pl. Fedtsch.).

F. Schair Borszcz.

c. *Vittae in valleculis 2—5.*

F. Karelini Bnge.

SECTIO II. *Asa foetida*. (Foliorum laciniae amplae lanceolatae usque ovatae).

A. *Scorodosma* Bnge.

Fructus vittis numerosis minutissimis oculo forte armato tantum conspicuis v. subobsoletis instructus.

F. foetida Bnge. (Reliq. Lehm. n. 549. — Borszczow über die *Asa foetida* Pflanzen in Mem. Ac. Petrop. ser. VII. tom. III. tab. 1 et 2); foliorum laciniiis integerrimis, umbellulis villosis, petalis umbellarum foeminearum magnis albis obtusis, diu persistentibus, mericarpii dorso puberuli albis semine paullo tantum angustioribus, vittis numerosis oculo forte armato tantum conspicuis. Turkestan.

F. Asa foetida Boiss. (Fl. orient. II. p. 994 exclusis synonymis); foliorum foliolis integerrimis; petalis luteis mox deciduis, pedicellis villosis brevissimis demum incrassatis, fructu ovato v. suborbiculato puberulo v. glabrescente, ala dimidio semine sublato cinctis, mericarpii vittis numerosis oculo forte armato tantum conspicuis. Persia.

F. alliacea Boiss. (Fl. orient. II. p. 995); foliorum cinereo-tomentellorum foliolis obtuse dentatis, pedicellis brevissimis incrassatis, fructus ovato-oblongi margine semine quintuplo angustiore, mericarpii vittis obsoletis indistinctis. — *F. Asa foetida* Boiss. et Buhse Aufzählung pag. 100 (mihi ignota). — Persia.

F. rubricaulis Boiss. (Fl. orient. II. 995); differt secundum adumbrationem Cl. Boissieri solummodo «pedicellis fructiferis vix incrassatis (an glabris), mericarpii vittis numerosis tenuissimis» a *F. Asa foetida* Boiss. — Persia.

Calycis margo obsoletus. Petala ovato-oblonga, acuminata, apice incurva, lutea. Stylopodium carnosum, cyathiforme, margine crenulatum. Styli recurvi stylopodium paullo superantes. Fructus ovato-oblongus, ala semen dimidium subaequante cinctus. Mericarpia plano-compressa, dorso 3-juga; jugis filiformibus vix elevatis; commissura plana; vallecularum vittae latae solitariae; commissura vittis duabus latis maximis, alae vittis duabus parvis.

Gigantea; caulis inclusa panicula 5—6-pedes altus, basi usque 4 Cm. in diametro, striatus. Folia inferiora incluso petiolo usque 3-pedes longa.

Affinis species *Ferula songorica* Pall. differt, «caule minus robusto

B. *Euferula*.

Mericarpia vittis vallecularum dorsalium 1—3-jugis evittatis, commissura 6-vittata. Umbellae in uno eodem specimine aut omnes terminales pedunculatae, aut centralis sessilis foeminea lateralibus e basi v. infra basin umbellae centralis egredientibus pedunculatis polygamis.

F. foetidissima Rgl. et Schmalh., foliorum minute hirtulorum foliolis simpliciter v. duplicato crenato-serratis, pedicellis brevibus glabris non incrassatis, fructus ovato-oblongi foetidissimi ala semine quadruplo brevior. Turkestan.

C. *Ferulago*.

Mericarpia valleculae 4—5-vittatae; commissura 12—14-vittata, vittis dorsalibus pericarpio tectis, commissuralibus superficialibus.

F. kokanica Rgl. et Schmalh., foliorum laxe hirtulorum foliolis serratis. Kokania.

D. *Juga vittata*.

Mericarpia valleculae jugaeque univittata, vallecularum vitta diametro longitudinali suo semini parallela, jugorum vitta diametro longitudinali in semine perpendiculari.

Ferula diversivittata Rgl. et Schmalh., foliorum foliolis integerrimis. — Turkestan.

E. *Doremoides*.

Mericarpia valleculae 3—4-vittatae. Umbellae terminales pauciradiatae, umbellulae laterales plus minus numerosae breviter pedunculatae in racemum dispositae.

F. Tschzurowskiana Rgl. et Schmalh. *)

In Kokaniae montibus.

*) Ad honorem praesidis societatis mosquensis amicorum scientiarum naturalium viri illustris Tschzurowski eam nominavimus.

humiliore, foliorum laciniis angustioribus 1—1½ Mm. latis uninerviis (nec penninerviis) margine integerrimis, umbellulis foemineis masculisque involucello polyphylo fultis.

In Turkestaniae montibus karatavicis prope Karagus, in montibus alatavicis in valle fluvii Tschirtschik 4—6000' alt. (A. Regel).

22. *Ferula karatavica* Rgl. et Schmalh.

Glabra. Caulis elatus, teres, laevis, glaber, paniculato-ramosus, ramis saepe verticillatis. Folia inferiora ampla, biternato-supradecomposita, petiolata; petiolus teres, basi vaginatus; segmenta primaria et secundaria petiolata; secundaria oblonga, bipinnatisecta; lacinae lineari setaceae, marginibus involutis teretes, elongatae, mucronato-acutae; folia caulina intermedia minus dissecta, petiolo inflato-vaginato amplexicauli v. brevi tereti vagina inflata insidente; folia superiora ad vaginam inflatam amplexicaulem reducta. Paniculae aphyllae rami ramulique verticillati, oppositi v. alterni. Umbellae 6—10-radiatae, omnes pedunculatae, centrales pedunculo paullo brevioribus suffultae. Involucrum nullum. Umbellulae multiflorae; involucelli pleiophylli phyllis minimis brevissimis late triangulari-ovatis demum obsoletis; pedicellis fructu 3-plo longioribus. Calycis margo 5-dentatus, dentibus brevissimis subobsoletis. Stylopodii depressi margo undulatus elevatus. Styli recurvi stylopodium superantes. Fructus ovato-oblongi, plano-compressi. Mericarpiis jugis tribus dorsalibus carinatis, lateralibus obsoletis in marginem dilatatum abeuntibus; valliculae vitta solitaria magna instructae; commissura plana 4—6-vittata.

Planta perennis, 3—4-pedes alta, basi foliata, superne valde paniculato-ramosa, nuda. Foliorum lacinae teretes, 1—1½ Cm. longae, 1/3—1/2 Mm. latae. Umbella centralis fertilis, pedunculo 5—8 Cm. longo suffulta; umbellae laterales 2—3, longius pedunculatae, masculae v. polygamae. Pedicelli fructiferi circiter 2 Cm. longi. Fructus 7 Mm. longus.

F. anatolicae Boiss. ut videtur valde affinis, secundum descriptionem Cl. Boissieri diversa videtur: «ramis inflorescentiae basi nudis

(nec basi vaginatis), involucelli phyllis brevissimis late ovato-triangularibus (nec lineari-lanceolatis), calycis dentibus brevissimis subobsoletis (nec triangulari-subulatis)». Fructus F. anatolicae ignotus.

In Turkestaniae montibus karatavicis prope Boroldai. (A. Regel).

23. *Ferula ceratophylla* Rgl. et Schmalh.

Glabra. Caulis 2—3-pedes altus, paniculato-ramosus, teres, striatus, medulla farctus, basi fibris foliorum emortuorum vestitus, usque ad florum paniculam nudam foliatus. Folia rigida; inferiora iterato-trisecta, petiolo communi tereti supra medium in vaginam inflatam amplexicaulem mutato; superiora minus dissecta, in vaginae amplexicaulis inflatae apice sessilia; suprema ad vaginam reducta; foliorum segmenta petiolo semitereti suffulta; lobi lineares, canaliculato-carinati, apice ipso saepissime dentibus corniformibus tribus v. rarius duobus, caeterum integerrimi v. sub apice dentibus similibus nonnullis. Umbellae 4—10-radiatae; centralis sessilis, fertilis; laterales pedunculatae, saepissime 2, masculae v. polygamae. Involucra involucellaque nulla. Calycis dentes florum masculorum ovati, satis conspicui, reflexo-patentes, florum foemineorum minuti. Petala flava, ovata, incurva. Stylopodium depresso-conicum, parvum. Styli recurvi, breves, stylopodium subaequantes. Fructus glabri, elliptico-oblongi, plano-compressi; mericarpiis jugis dorsalibus tribus filiformibus vix elevatis, lateralibus obsoletis in marginem dilatatum abeuntibus. Valliculae univittatae; commissura 4—6-vittata; vittis latis, in sectione transversali lineari-oblongis.

Species foliorum forma insignis. Folia et vaginae valde rigida, coriacea, glauca, nervis albis prominentibus parallelis striata. Foliorum lobi $1\frac{1}{2}$ —3 Cm. longi, $1\frac{1}{2}$ —2 Mm. lati, a basi ad apicem corniformidentatum aequilati. Umbellarum radii 2—3 Cm. longi, patentes. Pedunculi umbellarum lateralium 4—5 Cm. longi. Pedicelli florum foemineorum masculorumque 2—4 Mm. longi. Fructus 1 Cm. et paullo ultra longus et $3\frac{1}{2}$ Mm. latus.

In Turkestaniae montibus Karatau prope Kultschek et ad montem Kara-Tschokla prope Bala-kschiata, 5000' alt. (A. Regel).

Es ist diese ausgezeichnete Art auch noch dadurch interessant, dass sie an den Blättern und zwischen den Blüthendolden, einen durchsichtigen, dem Gummi galbanum ähnlichen Gummi ausscheidet.

24. *Ferula Schair Borszcz.* (Borszczow in Mem. Ac. Petrop. ser. VII. tom. III. Abhandl. n. 8 pag. 37 tab. VII.)

Diese in der Wüste Kisil-Kumi, Karaksk, Tschardara etc. von O. Fedtschenko und in den Steppen auf der Reise nach Chiwa von Korolkow gesammelte Pflanze, weicht von Borszczow's Beschreibung nur dadurch ab, dass sie blaugrün und nicht wie der Autor sagt purpurviolett ist, ferner sind die Blattlappen unserer getrockneten Exemplare flach und nicht medio sulcata wie Borszczow angiebt. Auf der Abbildung giebt Fig. 8 c. Borszczow den Durchschnitt einer Frucht, der vom Rücken zusammengepresst oval und ohne seitliche flache Flügel und deren vittae im Durchschnitte rundlich sind. Bei unserer Pflanze sind die Früchte ziemlich flach zusammengepresst und die vittae im Querdurchschnitt länglich und viel weniger geöffnet. Da aber Borszczow's Beschreibung gerade mit der Form der Frucht und der vittae übereinstimmt, wie solche sich bei unserer Pflanze vorfinden, so scheint hier ein Versehen des Zeichners der sonst vorzüglich guten Tafeln vorzuliegen und wir zweifeln nicht, dass die uns vorliegenden Exemplare die ächte *Ferula Schair Borszcz.* darstellen.

25. *Ferula Karelini Bnge.* (reliq. Lehm. n. 544).

Fructuum valleculae 3—5-vittatae, commissura 6—10-vittata.

In deserto aralensi in regione fluvii Syr-Darja (Borszczow), in desertis arenosis inter Orsk et Taschkent, Karak et Kisil-kum (O. Fedtschenko), in deserto inter Karak-ati et Adam-kirullan in exped. ad Chiwam (Korolkow), prope Orenburg (A. Regel).

26. *Peucedanum Renardi Rgl. et Schmalh. *) Sectio. Eupeucedanum.* (Boiss. fl. or. II. 1014. Foliorum laciniae planae.

*) Dedicavimus hanc speciem Cl. viro «Renard» Societatis Scientiarum naturalium Imperialis Mosquensis praesidi secundo.

Mericarpi anguste alata. Valleculae univittatae. involucrum oligophyllum v. nullum).

Glabrum. Radix perennis, pluricaulis, collo fibris foliorum emortuorum vestito. Caules 30—40 Cm. alti, ramosi. Folia petiolata; petiolus foliorum inferiorum basi vaginatus, foliorum supremorum in vaginam linearem v. anguste lineari-lanceolatam (nec inflatam) foliiferam v. supremorum aphyllam mutatus. Folia inferiora trisecta; segmenta petiolata, bipinnatisecta; intermedia trisecta, segmentis pinnatisectis; suprema ad vaginam reducta; foliorum laciniae anguste lineari-lanceolatae, in mucronem attenuatae, 5—8 Mm longae, 1—2 Mm. latae. Involucra et involucella nulla. Umbellae 6—10-radiatae, polygamae; radiis inaequalibus. Umbellulae pluriflorae; pedicelli fructu sesqui-duplo longiores. Petala flava, subrotunda, acumine incurvo. Fructus plano-compressi, ala angusta quam semen quintuplo angustiore cincti. Calycis laciniae lanceolatae, satis conspicuae. Stylopodii cyathiformis margo erectus, crenatus. Styli recurvi, stylopodium vix aequantes. *Mericarpi* jugis dorsalibus tribus filiformibus, apicem versus tantum prominentibus. Valleculae univittatae; juga evittata. Commissura apice tantum bivittata, a basi sub apicem evittata. Vittae omnes superficiales.

Peucedanum transiliense Herd. pl. Semenov. n. 455, cui species nostra proxima «caule 40—90 Cm. alto, foliis glaucis, vaginis foliorum superiorum inflatis et imprimis stylopodii depresso-conici margine deflexo nec erecto», facile dignoscitur.

P. Meyeri Boiss. (fl. or. II p. 1018. — *P. paucifolium* Ledeb.) cui *P. Renardi* habitu proximum, differt, «involucello polyphylo, valleculis univittatis, jugis univittatis, jugorum vitta magna orbiculari supra fasciculum vasorum posita, fructu ala semine triplo angustiore cincto,

Peucedanum Meyeri Boiss. ist im Habitus unserer Pflanze sehr ähnlich. Wir haben die Analyse der Frucht desselben sowohl nach von Boissier, als von Ledebour stammenden Original Exemplaren gemacht. Beide Autoren erwähnen nichts von der grossen vitta in jeder Rippe, die oberhalb des kleinen Gefässbündels liegt. Boissier sagt von der Zahl der vittae in jedem Thälchen nichts, und Ledebour giebt 2—3 vittae für jedes Thälchen an, während stets nur eine vitta vorhanden ist.

commissura ab apice ad basin bivittata, stylopodii conici margine deflexo (non erecto), calycis dentibus subobsoletis».

In Turkestaniae montibus Alexander in trajectu Karabura 8,000' alt.

27. *Peucedanum karataviense* Rgl. et Schmalh.

Radix perennis. Caules glabri, a basi ramosi, teretes, laeves, 10—15 Cm. alti. Folia radicalia petiolo brevi basi vaginato suffulta, dense cano-hirta, trisecta; segmentis tripinnatisectis; laciniis lineariblongis, acutis, 2—4 Mm. longis, vix 1 Mm. latis; folia caulina nunc omnia ad vaginam inflatam cano-puberulam v. demum glabram reducta, nunc folium v. folia infima radicalibus multo minora et minus dissecta, petiolo inflato-vaginato cano-puberulo suffulta. Involucra involucellaque nulla. Umbellae 3—6-radiatae glabrae radii subaequilongi, tenues, circiter 2—2½ Cm. longi. Umbellulae pluriflorae, pedicellis petala subduplo superantibus. Calycis laciniae lanceolatae, satis conspicuae. Stylopodii conici margo cyathiformi-erectus, dentatus. Petala lutea, glabra, acumine ovato-inflexo. Styli recurvi, stylopodium plus duplo superantes. Fructus immaturus subturbinatus, glaber. — *P. vaginatum* Ledeb. cui species nostra proxima «foliis glabris, involucello pleiophyllo» dignoscitur. Fructus maturi ignoti.

In Turkestaniae montibus karatavicis prope Ischtübe, legit A. Regel.

28. *Pastinaca dasycarpa* Rgl. et Schmalh.

Perennis. Caulis gracilis, teres, striatus, glaber, subsimplex, 30—40 Cm. altus. Folia glabra, pinnatisecta; foliolis ovatis, reticulato-venosis, duplicato-dentatis, dentibus in mucronem attenuatis. Umbella 8—12-radiata. Involucra involucellaque polyphylla, pubescentia; phyllis involucri demum caducis, quam radii pluries brevioribus; involucelli phyllis persistentibus, anguste lineari-lanceolatis, pedicellos puberulos circiter aequantibus. Fructus plano-compressus, tenuiter tomentoso-puberulus, ala angusta cinctus. Calycis margo conspicuus, undulatus, obsolete dentatus. Stylopodii conici margo deflexus crenatus. Styli recurvi, stylopodium subduplo superantes. Mericarpia jugis 5, vix prominentibus. Vallecularum vittae solitariae, latae. Commissura bivittata.

Pastinaca armena, cui species nostra proxima «caule angulato, foliis plus minus pubescentibus, involuero nullo v. oligophyllo, umbella 5—7-radiata, involucelli phyllis lineari-setaceis caducis, fructibus glabris v. vix hirtulis, calycis margine obsoleto» facile dignoscitur.

In Turkestanicae montibus Alexander in trajectu Karabura, 8,000' alt. (A. Regel).

29. *Daucus Golickeanus Rgl. et Schmalh.*

Caules erecti, ramosi, teretes, canaliculato-costati, glabri v. ad costas minute scaberuli. Folia caulina petiolo brevi basi vaginato-semiamplexicauli suffulta, glabra, circuitu oblonga, bi-tripinnatisecta; laciniis anguste-linearibus, in mucronem acuminatis, usque 5 Mm. longis, vix $1\frac{1}{2}$ Mm. latis. Umbella multiradiata; radiis inaequalibus, minutissime scaberulis. Involucra et involucella polyphylla; phyllis involucri valde inaequalibus, nunc omnibus lineari-setaceis quam radii brevioribus, nunc nonnullis modo foliorum pinnatisectis v. subbipinnatisectis radios subaequantibus; phyllis involucelli saepissime omnibus lineari-subulatis, integris, pedicellos floriferos minute hirtulos subaequantibus v. superantibus, — v. nonnullis apicem versus parce dentatis. Calycis dentes lanceolati, acuminati, satis magni. Petala alba, omnia aequalia, obovato-subrotunda, lobulo inflexo emarginata. Stylopodium conicum basi crenatum. Styli erecti, stylopodium superantes. Ovarium latius quam longum, a latere compressum. Ovarii mericarpia semiteretia, dorso jugis tribus secundariis magis prominentibus, bifariam aculeolatis, jugis primariis 4 aculeolis minoribus. Fructus ignotus.

Habitu *D. bessarabico* *D. C.*, crinito *D. C.* et gracili *Steinh.* affinis, quorum unus «involucro nullo, foliis ternato-supradecompositis», — alter «caule radiisque retrorso-asperis, involucri phyllis aequalibus apice multifidis, ovarii jugis setis elongatis hispidis», — posterior «foliorum vaginis longe ciliatis, involucri phyllis omnibus pinnatisectis, floribus radiantibus» facile dignoscuntur.

Ad fluvium Syr-Darja legit Golicke.

30. *Torilis heterotricha* Trautv. (pl. Schrenk. n. 513).

Folia petiolo lineari vaginato brevi suffulta, glabra, trisecta; segmenta tri- v. bisecta; laciniae lineari-filiformes.

Cl. Trautvetter hanc speciem in regionibus turkestanicis satis vulgarem secundum specimina fructifera foliis delapsis descripsit. In Turkestaniae montibus karatavicis (Sewerzow et A. Regel), in desertis Karak Ati et Adam Kirullan (Korolkow), in deserto inter Taschkent et fluvium Syr-Darja, in deserto Kisil-kumi, in deserto Karask, prope Keless et in valle fluvii Sarawschan. (O. Fedtschenko).

31. *Torilis Borszczowi* Rgl. et Schmalh.

Biennis, glabra. Caules ramique teretes, foliosi. Folia iterato-ternatisecta, petiolo brevi amplexicauli vaginato margine hyalino-membraceo suffulta; laciniis lineari-filiformibus. Umbellae 5—12-radiatae. Involucrum 4—5-phyllum; phyllis lineari-lanceolatis, initio radios subaequantibus, demum iis duplo brevioribus, albido-membranaceis. Umbellulae multiflorae involucellum pleiophyllum; phyllis lineari-lanceolatis, albo-membranaceis, ciliolatis, flores fructusque subaequantibus. Calycis dentes e basi latiore cuspidati. Petala e basi unguiculata obverse oblonga, obtusa, rosea. Stylopodium conicum. Styli erecti, elongati, ovarium et demum fructum circiter aequantes. Fructus oblongus, a latere paullo compressus. Mericarpia jugis primariis 5, pilis ramosis brevibus canescentibus, secundariis vallecule occupantibus setis aculeiformibus dense vestitis, aculeis diametrum seminis duplo usque pluries superantibus non glochidiatis. Commissura bivittata.

Species pulcherrima affinis *T. heterotrichae* Trautv., posterior differt autem, «umbellis 2—3-radiatis, involucri 2—3-phylo, umbellulis 2—6-floris, involucelli phyllis lineari-subulatis basi tantum anguste hyalino-marginatis nervo excurrente viridi subulato longissimo terminatis, jugis fructus primariis glabris, jugis secundariis pilis brevioribus et praeterea setis longissimis dense hispidis, stylis brevibus ovario fructuque pluries brevioribus».

In deserto aralo-caspico Ust-Ürt (Borszczow), in deserto inter Taschkent et fluvium Syr-Darja (O. Fedtschenko).

32. *Cachrys Herderi* Rgl. *)

Folia tripinnatisecta, laciniis linearibus sub lente hirtulis. Involucra involucellaque pleiophylla. Calycis margo obsoletus. Stylopodium planum, disciforme. Petala glabra. Fructus ellipsoidei, teretes, ad suturam non constricti, glabri, laeves, ecostati.

C. macrocarpa Ledb., cui planta nostra proxima, «foliorum laciniis glabris, fructibus costatis» dignoscitur.

C. macrocarpa Herder pl. Semenov. n. 466.

In Turkestaniae orientalis montibus alatavicis cisiliensibus Kara Tschek. (Semenow).

33. *Cachrys didyma* Rgl.

Caulis erectus, teres, minute hirtulus, apice verticillato-paniculatus, 20—50 Cm. altus. Folia dense hirtula; radicalia petiolata, trisecta;

*) *Cachrys* L.

Specierum imperium rossicum incolentium conspectus.

Sectio I. *Eucachrys* D. C. *Fructus costati v. ecostati laeves glabri.*

* *Foliorum laciniae oblongae v. obverse oblongae v. sublineares.*

1. *C. odontalgica* Pall., fructibus oblongo-cylindricis, apice truncatis, ad commissuram non constrictis, ecostatis.
2. *C. macrocarpa* Ledb., fructibus ellipticis, ad commissuram non constrictis, costatis.
3. *C. Herderi* Rgl., fructibus ellipticis, ad commissuram non constrictis, ecostatis.
4. *C. didyma* Rgl., fructibus ellipticis v. ovato-subrotundis, ecostatis, ad commissuram constrictis et igitur didymis.

** *Foliorum laciniae elongato-lineari-filiformes.*

5. *C. alpina* M. B.

Sectio II. *Aegomarathrum* D. C. (ex parte).

Fructus costis crassis papilloso-undulatis glabris.

6. *C. crispa* Pall., foliorum laciniis lineari-filiformibus, involucri phyllis lanceolato-linearibus.
7. *C. amplifolia* Ledb., foliorum laciniis rigidis subulatis pungentibus, involucri phyllis lanceolatis.

Sectio III. *Dasycarpae.*

Fructus tomentosi.

8. *C. Korolkowi* Rgl. et Schmalh., foliorum laciniis lanceolatis.
9. *C. eriantha* D. C., foliorum laciniis lineari-subulatis.

segmenta 2 – 3 plicato-pinnatisecta; laciniae obverse oblongae, obtusae; folia caulina bi- v. tripinnatisecta, breviter petiolata. Umbella 3—5-radiatae; radiis subaequilongis, glabris v. parce hirtulis, involucrum pleiophyllum demum caducum multoties superantibus. Umbellulae 3—8-florae; pedicelli glabri v. hirtuli involucellum pleiophyllum hirtum superantes, quam fructus breviores v. longiores. Calycis dentes obsoleti. Stylopodium explanatum, planum, margine undulato-crenatum. Petala lutea, ovata, dorso minute hirtula, acumine inflexo. Styli recurvati, stylopodium superantes, 2 v. abortu 1. Fructus elliptici v. ovato-subrotundi, ad commissuram constricti et igitur didymi. Mericarpia ecostata, laevia, abortu subinde solitaria.

Cachrys odontalgica Herder pl. Semenov. n. 465.

Dschus-agatsch ad ostia fluvii Bukon in regione fluvii Irtysh in desertis arenosis (Potanin), in montibus karatavicis Mogol-tau (Severzow), in deserto prope Keles, Karak et Tschardara (O. Fedtschenko).

β. *glabra*; foliis glabris.

In deserto aralensi in regione fluvii Syr-Darja. (Borszczow).

34. *Cachrys Korolkowi* Rgl. et Schmalh.

Caulis erectus, teres, apice paniculato-ramosus, subglaber. Folia plus minus papilloso-hirtula v. glabriuscula, radicalia petiolata, bipinnatisecta; lacinii inferioribus plus minus laciniatis, superioribus integris lobisque anguste lanceolatis, petiolo a basi supra medium vaginatis; foliis caulinis petiolo brevi vaginato suffultis, inferioribus bipinnatisectis, superioribus pinnatisectis v. subsimplicibus, omnibus dense papilloso-hirtulis. Umbella 3—6-radiata; radiis subaequalibus, glabris, involucrum pluries superantibus. Involucra involucellaque polyphylla; phyllis linearibus, hirtis. Umbellulae multiflorae; pedicellis quam involucelli phylla brevioribus, sub lente minute glandulosis. Flores monoici. Calycis margo obsoletus. Petala lutea, subrotunda acumine brevi inflexo, dorso minute hirtula. Stylopodium explanatum, disciforme, florum masculorum margine subintegerrimum, florum foemineorum margine crenato-undulatum. Styli recurvi, stylopodium superantes. Fructus immaturi dense tomentoso-hirsuti.

Planta 30—70 Cm. alta, parce ramosa. Radii umbellarum masculinarum abbreviati, $\frac{1}{2}$ —1 Cm. longi, umbellarum foeminearum usque 3 Cm. longi. Pedicelli $1\frac{1}{2}$ —2 Mm. longi.

In expeditione ad Chiwam inter Chala-ati et Adam Kir-Ullan in solo arenoso legit Cl. Korolkow.

35. *Hippomarathrum crispum* Koch.

Cachrys crispa Ledb. fl. ross. II. 357.

In Turkestaniae montibus karatavicis legit A. Regel. *)

Albertia Rgl. et Schmalh. **)

Calycis margo 5-dentatus (v. nullus). Petala ovata v. obcordata, acumine inflexo. Fructus a latere compressus. Mericarpia 5-juga; jugis

*) Ledebour vereinigte die Gattung *Hippomarathrum* mit *Cachrys*. Boissier stellt in seiner *Flora orientalis* II. p. 931, diese Gattung wieder her, indem sie sich durch den deutlichen Kelch mit verhältnissmässig grossen Zähnen von *Cachrys* und *Prangos* gut unterscheidet. Ausserdem sind bei *Hippomarathrum* die 5 breiten Rippen der Halbfrüchtchen mit Warzen oder mit flügel-förmigen Auswüchsen dicht bedeckt oder dieselben stehen weitläufiger und nehmen mehr die Gestalt von Borsten oder Stacheln an. Boissier führt 5 Arten dieser Gattung für den Orient auf, vereinigt, wie es uns scheint unbegründet Ledebour's *Cachrys amplifolia* mit *H. crispum* und ausserdem treten zu diesen 2 *Hippomarathrum* des Russischen Asiens noch 2 neue von Fedtschenko in Turkestan gesammelte Arten, welche wir in der Aufzählung der neuen von Fedtschenko gesammelten Pflanzen beschrieben haben. Hiernach wäre die Gattung *Hippomarathrum* in der Flora des Russischen Asiens mit 4 Arten vertreten, die sich folgendermassen unterscheiden:

A. *Folia ternatim dissecta*.

1. *Hippomarathrum crispum* Koch (Umb. p. 136.); foliorum laciniis lineari-filiformibus, erecto patentibus, plus minus elongatis, supra canaliculatis, infra carinatis.
2. *Hippomarathrum amplifolium* C. A. M. (ind. cauc. pag. 131. — *Cachrys amplifolia* Ledb. fl. ross. II. 358); foliorum segmentis laciniisque divaricatis; laciniis linearibus, brevibus, rigidis, supra canaliculatis, tri-pentagonis.

A. *Folia pinnatisecto-multifida*.

3. *Hippomarathrum Fedtschenkoi* Rgl. et Schmalh., foliorum tripinnatisectorum laciniis anguste lineari-lanceolatis planis.
4. *Hippomarathrum sarawschanicum* Rgl. et Schmalh., foliorum 4—5-pinnatisectorum laciniis anguste linearibus, supra canaliculatis, infra convexis v. subcarinatis.

**) Hoc genus dedicavimus Cl. viro Albert Regel, collectori diligentissimo plantarum, regionem turkestanicam incolentium.

alatis; alis margine crenato-dentatis v. paleaceo-dentatis, valleculisque verrucis bullatis v. margaritaceis v. paleis plus minus dense vestitis, lateralibus marginantibus. Valleculae commissuraque evittatae. Semen sulco exaratum. — Affinis Pleurospermi et Aulacospermi, «fructuum jugis crenato-dentatis verrucis vestitis, vittis nullis» facile dignoscitur.

36. *A. commutata* Rgl. et Schmalh.

(*Aulacospermum anomalum* Kar. et Kir. enum. pl. song. n. 392. — Herder pl. Semenov. n. 468 ex parte); perennis, foliis circuitu oblongis, involucri erecto, fructibus minute verruculosis.

Radix perennis, 1-pluricaulis. Glaber. Caules 10—25 Cm. alti, foliosi et apice ramosi, v. simplices et saepe aphylli. Folia petiolata, oblonga, bipinnatisecta; laciniis obverse oblongis v. oblongo-ellipticis, acutis, integerrimis v. apice acute dentatis v. iterato subpinnatisectis. Umbellae 5—8-radiatae, nunc in caulium v. ramulorum apice terminales, nunc sessiles et radios elongatos subradicales exserentes; radiis striato-angulatis, inaequilongis, sub lente minute hirtulis.

Involucra involucellaque saepissime 5-phylla; phyllis lineari-lanceolatis, albido-scarioso-marginatis, quam radii duplo-quadruplo brevioribus, pedicellos floriferos fructiferosque superantibus. Pedicelli numerosi, breves, $1\frac{1}{2}$ —3 Mm. longi. Petala subrotunda cum acumine inflexo, albida v. roseo-tincta. Stylopodium planum, disciforme, atroviride, margine subintegrum. Styli initio erecti, demum recurvi stylopodio breviores v. demum id subaequantes. Fructus late ovato-subrotundus. Mericarpii juga valleculaeque verruculosa.

In montibus alatavicis cisiliensibus (Karelin), in montium alatavicorum jugo Kurmety et Keskelen (Semenow), in jugo Ketmen montium Thian-Schan (Kuschakewicz), in Kokaniae montium jugo Karakasuk et Kawuk (O. Fedtschenko).

Aulacospermum anomalum Ledb., cui habitu affinis facile dignoscitur: «caule elatiore, foliorum laciniis lineari-lanceolatis, phyllis involucelli pedicellos floriferos circiter $\frac{3}{4}$ Cm. longos aequantibus, quam

pedicelli fructiferi usque 2 Cm. longi brevioribus, mericarpii jugis in alam integram nec verruculosam exeuntibus; valleculis univittatis, commissura bivittata».

37. *A. margaritifera* Rgl. et Schmalh., annua, foliis circuitu deltoideis, involucri demum reflexo, fructibus dense margaritifera.

Annua, glabra. Caulis elatus, 40—60 Cm altus, ramosus. Folia petiolata, circuitu deltoidea, pinnatisecta; pinnis inferioribus majoribus saepe petiolatis, superioribus decurrentibus, omnibus pinnatifidis, oblanceolatis usque lineari-oblongis, integerrimis v. apice dentatis v. iteratopinnatifidis. Umbellae pauci-multiradiatae; radiis inaequalibus. Involueri 5—6-phylli phyllis anguste lanceolatis, albido-scarioso-marginatis, initio erectis radios subaequantibus v. superantibus, demum reflexis, quam radii longiores 2—3-plo brevioribus v. interdum in appendicem foliaceam integram v. modo foliorum sectam exerescentibus Umbellulae multiflorae; pedicelli initio involucellum 5-phyllum circiter aequantes, demum eo duplo longiores; involucelli phyllis anguste lanceolatis albido-scarioso-marginatis, pedicellos floriferos aequantibus, fructiferis brevioribus. Calycis margo manifestus, dentibus brevibus triangularibus v. longioribus lanceolatis. Petala alba, obcordata, acumine oblongo apice emarginato inflexo. Stylopodium conicum. Styli plus minus recurvi, stylopodium plus duplo superantes. Fructus late-ovato-subrotundus, a

latere compressus. Mericarpium juga alata margine bullato-crenata, praeterea verrucis oblongis v. reniformibus albido-margaritaceis dense vestita.

In deserto montes karatavicos Mogol-tau adjacente (Sewerzow), prope Karnak in montibus karatavicis (A. Regel), in deserto ad fluvium Syr-Darja (Golicke), prope Taschkent (Krause), in deserto inter Taschkent et fluvium Syr-Darja, in Kokania in valle fluvii Sarawschan (O. Fedtschenko).

Explicatio figurae.

- a. Flos, auctus.
- b. Fructus, auctus.
- c. Mericarpium cum carpophoro, auctum.
- d. Fructus, in sectione transversali.
- e. Mericarpium in sectione transversali.
- f. Semen.
- g. Flos masculus.
- h. Flos junior fertilis.

38. *A. paleacea* Rgl. et Schmalh., annua, petiolis vaginato-inflatis, foliis ternatisectis, segmentis pinnatifidis, involuero nullo, fructibus paleis vestitis. Descriptionem cfr. in pl. Fedtschenkoanis. Fructus maturi nondum vidimus, habitu tantum Albertiae adnumeravimus.

39. *Schrenkia involucrata* Rgl. et Schmalh. *)

Radix perennis, lignosa, 1-pluriceps, collo foliorum emortuorum vaginis laceratis dense vestito. Caulis erectus, humilis v. usque 40 Cm. altus, glaber, teres, sulcato-subcostatus, simplex v. apice ramosus,

*) *Schrenkia* Fisch. et Meyer.

A. Hippomarathro cui Benthamus et Hookerus adnumeraverunt fructu didymo, mericarpium subglobosi jugis 5 semicircularibus vix prominentibus, vittis nullis, dignoscitur. Herbae perennes, foliis pinnato-decompositis; floribus umbellarum centralibus subsessilibus, lateralibus pedicellatis.

S. vaginata Fisch. et Mey., involuero nullo, pedunculis radiis fructibusque glaberrimis, calycis dentibus parvis. (Fisch. et Mey. in Schrenk enum. pl. nov. pag. 63. — Ledeb. fl. ross. II. p. 366).

S. involucrata Rgl. et Schmalh., involuero pleiophyllo, radiis fructibusque sub lente plus minus papillis asperulis, calycis dentibus magnis, folii laciniis acutis v. apiculatis.

ramis alternis v. supremis verticillatis, glabris v. asperulis. Folia caulina petiolo vaginato-inflato suffulta, glabra; inferiora tripinnatisecta; laciniis linearibus usque elliptico oblongis, acutis v. in mucronem excurrentibus. Umbellae multiradiatae; radiis inaequalibus, sub lente aculeolis minimis asperulis, involucrum pleiophyllum aequantibus v. usque pluries superantibus. Involucri involucellique phylla linearia, erecto-patentia v. demum reflexa, ea involucelli pedicellos exteriores subaequantia. Flores centrales subsessiles; laterales pedicellati, floriferi usque 4 Mm., fructiferi usque 10 Mm. longi. Calycis dentes lanceolati, acuminati, satis magni. Petala alba, ovata, acumine inflexo. Stylopodium dilatatum, depresso-conicum. Styli divaricati v. recurvi, stylopodium superantes. Fructus didymus, latior quam longus, a latere compressus. Mericarpia subglobosa, 5-juga; jugis vix prominentibus, obtusis, papillis oblongis parvis integris obtusis nunc raris, nunc plus minus dense vestitis. Commissura ovata, excavata. Vittae nullae. Carpophorum integrum v. bifidum.

In Songoria ad Balkasch, in vallibus fluviorum Chontau, Bektautu et Kahlasu (Schrenk), in Turkestanicae montibus karatavicis (Sewerzow), inter Taschkent et Orsk lusum foliorum laciniis anguste linearibus in mucronem tenuem excurrentibus O. Fedtschenko legit.

40. *Schrenkia pungens* Rgl. et Schmalh.

Glabra. Radix praecedentis. Caulis erectus, humilis, 3—5-pollices altus, teres, sulcato-striatus, a basi ramosus. Folia petiolata, rigida; radicalia petiolo compresso, aequilato, basi vaginato, amplexicauli, adpresso; caulina petiolo vaginato-inflato: inferiora tripinnatisecta, segmentis elliptico-oblongis v. lanceolatis integris v. pinnatifido-laciniatis in acumen pungens transparens excurrentibus. Umbellae multiradiatae.

S. pungens Rgl. et Schmalh., involuero pleiophyllo, radiis fructibusque glabris, calycis dentibus lanceolatis acuminatis, folii laciniis in acumen pungens transparens excurrentibus.

S. papillaris Rgl. et Schmalh., involuero pleiophyllo, pedunculis radiisque asperis, fructibus papillis elongatis sinuato-crenatis lobatisve dense vestitis.

Involucra et involucella praecedentis. Flores, calyx, petala, stylopodium et styli praecedentis. Fructus omnino glabri.

In Turkestaniae montibus karatavicis prope Kulotschek. (A. Regel).

41. *Schrenkia papillaris* Rgl. et Schmalh.

Laciniae foliorum omnes lineares, acutae. Calycis dentes parvi. Mericarpia papillis elongatis complanatis sinuato crenatis lobatisve dense vestitis. Cetera ut Schrenkiae involucratae.

In Turkestaniae montibus karatavicis prope Boroldai. (A. Regel).

Lonicereae.

42. *Abelia corymbosa* Rgl. et Schmalh.

Fruticosa, ramosissima; ramulis puberulis. Folia petiolata, elliptico-lanceolata, acuta, saepissime omnia integerrima v. nonnulla crenis v. laciniis obtusis paucis lateralibus, ciliolata, utrinque laxè hirtula et demum plus minus glabrata. Flores in corymbes terminales multiflores dense congesti, bracteis foliaceis ovato-oblongis calycis tubum superantibus v. aequantibus stipitati. Calycis tubus demum elliptico-oblongus, costatus, puberulus; limbi quadripartiti laciniae lanceolatae, utrinque attenuatae, reticulato-penninerviae, villosa-ciliatae, tubum plus duplo superantes. Flores ignoti.

Abelia triflora R. Br., cui planta nostra proxima: «foliis acuminatis calycisque 5-partiti laciniis anguste linearibus villosa-ciliatis» facile dignoscitur.

Ad ripas fluvii Mailo in Turkestan leg. Krause.

43. *Lonicera Semenovi* Rgl. *)

L. hispida γ. *alpina* Rgl. pl. Semenov. n. 474 γ. — Frutex pygmaeus, ramosissimus, caespitosus. Folia breviter petiolata, oblonga, margine minute denticulata, denticulis in setulam rigidam porrectam

*) *L. humilis* Kar. et Kir. ist bis jetzt in nur einigen Bruchstücken von Exemplaren bekannt. Die von Semenow im blühenden Zustande gesammelten Exemplare, die ich in meiner Bearbeitung der Pflanzen Semenow's

excurrentibus et hac ex re rigide ciliata. Flores sessiles. Bracteae ovatae, ciliatae, ovaria superantes et involucrantes, baccis rubris breviores. Corolla tubo elongato, apicem versus sensim ampliato. Ovaria baccaeque omnino discreta.

Frutex vix 2—3-poll. altus. Folia 8—12 Mm. longa, 4—5 Mm. lata, subcoriacea, lacte viridia, infra pallidiora et reticulato-venosa. Flores usque $2\frac{1}{2}$ Cm. longi, ut videtur lutei. Baccae ovatae, rubrae.

In tractu Zauku montium Thian-Schan, 8,000 ped. alt. (Semenow), in albis kokanicis ad moles glaciales Schurowski. (O. Fedtschenko).

44. *Lonicera micrantha* Trautv.

L. tatarica β . *micrantha* Trautv. pl. Schrenk. n. 521. — Affinis *L. tataricae*, differt «foliis floribusque subduplo minoribus, foliis ovatis basi rotundatis (nec cordato-ovatis) ramulisque tenuiter puberulis (nec

mit *L. humilis* vereinigte, halte ich jetzt, wo ich die gleiche Form auch aus den Alpen Kokand's vor mir habe, für eine eigne Art. Im Folgenden gebe ich eine Uebersicht, der in Turkestan wachsenden *Loniceren*.

Lonicerae species in regionibus turkestanicis crescentes.

I. *Ovaria baccaeque discreta*

A. *Pedunculi brevissimi v. nulli.*

a. *Bracteae minutae, lineares.*

L. nummulariifolia Jaub. et Spach.

b. *Bracteae lanceolatae v. ovatae, ovaria involucrantes.*

L. Semenovi Rgl., corollae tubo apicem versus sensim ampliato; foliis oblongis, utrinque glabrescentibus, margine rigide ciliatis.

L. humilis Kar. et Kir., corollae tubo cylindrico; foliis ovatis, utrinque subhispidis v. demum subglabrescentibus, margine rigide ciliatis.

B. *Pedunculi calycem plus duplo superantes, florem subaequantes v. paullo superantes.*

a. *Bracteae ovatae v. ovato-lanceolatae, ovaria involucrantes*

L. hispida Pall., foliis ellipticis, utrinque glabris. margine setoso-ciliatis; bracteis maximis, membranaceis; corollarum tubo a basi ad apicem sensim ampliato.

L. Olga Rgl. et Schmalh., foliis elliptico-oblongis, utrinque hispidis, setoso-ciliatis; bracteis herbaceis; corollarum glabrarum tubo tenui, cylindrico.

glabris) margine ciliolatis (nec glabris), corollae tubo tenui basi aequali (nec gibboso)».

In montibus Arkat (Schrenk), — in Kokania prope Schaginardan et Ak-bura (O. Fedtschenko).

45. *Lonicera humilis* Kar. et Kir.

L. humilis Kar. et Kir. enum. pl. song. n. 396. — Ledb. fl. ross. II. 388. — Rgl. pl. Semenov. n. 477.

Frutex humilis, ramosus; ramis procumbentibus adscendentibus v. speciminum elatiorum divaricatis v. subvirgatis, cortice griseo secedente vestitis; ramulis pilis patentibus plus minus hirtis. Folia parva, ovata, acuta, in petiolum brevissimum attenuata, utrinque hirta-pilosa rigideque ciliata, demum reticulato-venosa utrinque hirta v. plus minus glabrescentia, margine semper rigide ciliata. Flores sessiles, ut videtur flavi,

L. Altmanni Rgl. et Schmalh., foliis ovatis, utrinque plus minus hirtis; bracteis herbaceis; corollarum hirsutarum tubo apicem versus ampliato.

b. *Bracteae lineares.*

L. Xylosteum L., foliis ellipticis, villosis; corollarum tubo basi gibboso.

L. tatarica L., foliis cordato-oblongis, glabris; corollarum tubo basi gibboso.

L. micrantha Trautv., foliis ovatis ramulisque tenuiter puberulis; corollarum tubo basi aequali.

c. *Pedunculi flores duplo-triplo superantes.*

L. Karelini Bnge., foliis ovato-oblongis, utrinque acutis, glabris v. subtus laxè adpresse pilosis; baccis rubris. — (*L. nigra* Ledb. fl. ross. II. 389).

II. *Ovaria totidem v. ad medium connata.*

A. *Pedunculi folium dimidium superantes.*

L. microphylla Willd., baccis luteis v. fuscis. *)

B. *Pedunculi folio dimidio breviores.*

L. caerulea L., baccis atrocaeruleis pruina alba vestitis.

*) *L. Bungeana* et *L. microphylla* Ledb. fl. ross. II. p. 391. — *L. Sieversiana* et *L. Bungeana* Kir. *Lonic.* p. 56 et 58.

extus pubescentes; tubo gracili, cylindrico, 8—9 Mm. longo, supra basin gibbo satis magno subcalcariformi. Ovaria omnino distincta, glabra, calycis lobis rotundatis ciliatis coronata. Bracteae ovatae, hirtulae, ciliatae, ovaria occultantes. Baccae subglobosae, rubrae, bracteas aequantes.

In montibus alatavicis ad fluvium Sarchan (specimina fructifera) leg. Karelin et Kirilow, — in montibus alatavicis cisiliensibus in alpinis prope lacum Djassyk-kul, 8,000 ped. alt., (specimina florifera) leg. Semenow, in alpinis kokanicis in angustiis Chodja Tschiburgan (specimina fructifera) leg. Fedtschenko; — in montibus Alexander in tractu Karabura, 8,000 ped. alt., leg. A. Regel.

46. *Lonicera nummulariifolia* Jaub. et Spach.

Jaub. et Spach. Ill. pl. or. I. tab. 70. — Boiss. fl. or. III. p. 7. — *L. persica* Jaub. et Spach. l. c. tab. 69. — Kirilow *Lonic.* p. 21. — *L. arborea* Boiss. voy. esp. (quoad pl. orientalem). — *L. kurdistanica* Schlecht. — *L. Xylosteum* fl. graeca tab. 223. — *L. turkomanica* Fisch. in herb. — *L. Xylosteum* L. β . macrocalyx Rgl. pl. Semenow. n. 473. —

Variat ramulis foliisque utrinque plus minus dense puberulis v. pubescentibus v. subglabris, foliis e basi rotundata v. truncata v. subcordata ellipticis v. late ovatis, obtusissimis v. subacutis. — Pedunculis brevissimis, bracteis linearibus, ovariis discretis a speciebus sequentibus dignoscitur. Baccae parvae, flavescenti-fuscae.

In regionibus turkestanicis satis frequens; in montibus karatavicis in valle Bugun (Sewerzow), inter tractum Dschaman-Tasch et Balasuschi-ata et prope Karagus (A. Regel); in montibus alatavicis in valle fluvii Talas et Karakol, in valle fluvii Tschirtschik prope Saylik (A. Regel); in regionibus kokanicis in tractu Torpa-bel, in valle fluvii Sarawschan in angustiis Makschewat, in montibus Aksai, in vicinitate lacus Iskander-kul et in angustiis Tschiburgan (O. Fedtschenko), — inter Ak-tagtau et Ak-Sagoty (Korolkow).

Rubiaceae.

47. *Asperula azurea* Jaub. et Spach.

Jaub. et Spach III. fl. or. I. pag. 151 tab. 82. a. — *A. orientalis* Boiss. et Hohenacker in Kotschy pl. exs. — Boiss. diagn. ser. I. fasc. III. p. 30. — Ejusd. fl. or. III. p. 31. — *A. arvensis* Ledeb. et auct. ross. quoad specimina caucasica.

In montibus karatavicis prope Boroldai (*A. Regel*).

48. *Galium davuricum* Turcz.

Turcz. cat. baic. n. 568. — Ledeb. fl. ross. II. pag. 509. Caulibus retrorsum aculeolatis, foliis senis margine antrorsum ciliolato-setoso-denticulatis, pedunculis lateralibus 1—3-floris a Galio trifido, saturejifolio et uliginoso facile dignoscitur *).

In regionibus turkestanicis et kokanicis satis frequens.

Valerianeae.

49. *Valerianella cymbicarpa* C. A. Meyer.

C. A. M. ind. cauc. p. 49. — Ledeb. fl. ross. II. 433.

Specimina omnia a nobis examinata fructibus dorso hirtis gaudent. **)

In regionibus turkestanicis satis frequens.

50. *Valerianella hamata* Bast.

Bast. in DC. fl. fr. V. 494. — DC. prodr. IV. 648. — Rehb. ic. fl. germ. XII. tab. 715. fig. 1410.

*) Das ächte *G. davuricum* sahen wir bis jetzt nur in einigen von Turczaninow gesammelten Exemplaren und diese gemischt mit Exemplaren der üppigen breitblättrigen Form von *G. uliginosum*. Von diesen letzteren irregeführt, haben C. Maximowicz (Prim. fl. amur. pag. 141) und ich selbst (Fl. ussur. p. 77) die gleiche grossblättrige Form von *G. uliginosum*, für *G. davuricum* genommen.

**) In Form des Kelches, ist diese Art der *V. oxyrhyncha* sehr ähnlich und ist in Folge dessen auch von Hohenacker und selbst von C. A. Meyer in den Pflanzen von Talüsch für *V. oxyrhyncha* genommen worden. Während aber *V. oxyrhyncha* 2 sehr schmale fädliche sterile Fruchtfächer besitzt, sind diese bei *V. cymbicarpa* noch grösser als das fruchtbare Fach der Frucht.

Specimen unicum legit C. Sewerzow in Turkestanica montibus Mogol tau (Karatau).

Planta nostra omnino cum icone citata et cum speciminibus in herbario horti Imperialis botanici asservatis congruit, a descriptione Cl. De Candollii «fructus loculis sterilibus filiformibus fertili multo angustioribus» differt.

Compositae.

51. *Erigeron eriocephalus* Rgl. et Schmalh.

(*Erigeron*, Sectio IV. *Heterochaeta* Boiss. fl. or. III. 163. — *Heterochaeta* D. C. prodr. Flores foeminei omnes ligulati. Pappus biserialis, serie exteriori brevissima in achaenii pilos abeunte). — Caespitosus, pluricaulis v. rarius caule solitario; caule foliisque lineari-oblongis v. linearibus, integerrimis v. paucidentatis, glabris. Caulis flexuosus v. substrictus, apicem versus paniculato-ramosus v. apice subumbellato-ramosus; ramis minute hirtulis, foliis linearibus sparsis paucis vestitis, capitula terminalia solitaria v. capitula pauca racemoso-disposita gerentibus. Capitula multiflora; involucri albido-villosi phyllis laxè imbricatis, linearibus, attenuato-acutis, discum subaequantibus; ligulis anguste linearibus, discum pappumque paullo superantibus, albidis v. roseis; achaeniis pilosis, pappi serie externa multisetosa brevi.

Habitu *Erigero* acri affinis, «caule foliisque linearibus glabris pappique constructione» diversus.

Erigeron acris var. *serotina* Herder pl. Semenov. n. 515.

Ad lacum Issyk-kul, Tüb, (Semenow), ad fluvium Tekes et Musart (A. Regel).

52. *Linosyris punctata* Rgl. et Schmalh. *)

Perennis, herbacea. Caules adscendentes, flexuosi, basi et apice ramosi, foliati, sub lente saepissime minute asperuli, 20—40 Cm. alti.

*) *Conspectus specierum Linosyris Imperium rossicum incolentium.*

A. *Folia omnia uninervia, impunctata.*

1. *L. vulgaris* Cass., foliis anguste linearibus, acutis, glabris v. glabriusculis; capitulis corymbosis; involucri squamis lineari-lanceolatis, acutis, glabris. — Cfr. Ledeb. fl. ross. II. 495.

Folia lineari-oblonga, acuta, omnia uninervia; decrescencia, sub lente saepissime minute asperula v. rarius glabra. Rami superiores caulis divaricati, 2—7, saepissime simplices monocephali, rarius ramulos 1—3 secundarios monocephalos gerentes, corymbum laxum 2—10-cephalum formantes. Involucrum campanulatum, floribus pappoque subduplo brevius; involucri squamis exterioribus ellipticis acutis dorso apiceque fusco-purpureis margine ciliatis, interioribus subduplo longioribus oblongis obtusis ciliatis. Flores omnes tubulosi hermaphroditi.

2. *L. scoparia* Kar. et Kir., foliis anguste linearibus, initio floccoso-tomentosis, demum glabriusculis, acutis; ramis divaricatis, plerumque unifloris; involucri turbinati squamis floccoso-tomentosis, inferioribus ellipticis acutis, superioribus obverse oblongis obtusis. Cfr. Ledb. l. c. II 496.

3. *L. villosa* D. C., foliis oblongo-lanceolatis, obtusiusculis v. subacutis, cinereo-tomentosis; capitulis corymbosis; involucri turbinati squamis floccoso-tomentosis, exterioribus ovatis acutis, interioribus obovato-oblongis v. oblongis obtusis v. acutiusculis.— Cfr. Ledb fl ross II. 495.

B. *Folia omnia uninervia, punctata*

4. *L. glabrata* Lindl., foliis oblongo-linearibus, obtusis, glabriusculis, supra compresso-punctatis; capitulis dense corymbosis; involucri turbinati squamis inferioribus ellipticis obtusis laxe tomentellis, superioribus obverse oblongis obtusis ciliatulis caeterum glabris. — Cfr. DC. prodr. V. pag. 353. — Rossia australis (Becker), Songoria (Schrenk), — in montibus karataviciis (Kuschkewicz). — Planta perennis nec fruticosa ut Cl. De Candolle dixit.
5. *L. punctata* Rgl. et Schmalh., foliis lineari-oblongis acutis, supra impresso-punctatis, glabriusculis; caulibus adscendentibus, apice ramulis paucis monocephalis v. rarius 2—3 cephalis, corymbum laxum formantibus; involucri campanulati squamis glabriusculis, exterioribus ellipticis acutis, interioribus oblongis obtusis.

C. *Folia inferiora 3—5 nervia, superiora uninervia.*

6. *L. divaricata* DC., foliis acutis, adpresse pubescentibus, inferioribus oblongis; caulibus simplicibus monocephalis v. parce ramosis, ramis elongatis monocephalis; involucri campanulati squamis elliptico-lanceolatis, acuminatis, parce puberulis. — Cfr. Ledb. fl. ross II. 496.
7. *L. Grimmi* Rgl. et Schmalh., foliis lineari-oblongis, acutis, glabriusculis; capitulis in caule ramoso paniculatis; involucri cylindrico-turbinati squamis superioribus obovato-oblongis, ex apice rotundato-obtusis minute apiculatis, ciliatis, caeterum glabris.

Linosyris glabrata Lindl., cui species nostra affinis: «foliis obtusis, involucri turbinati squamis inferioribus laxè tomentellis omnibus obtusis, corymbis polycephalis confertis» facile dignoscitur.

In valle fluvii Tekes prope Aksu et ad ostia fluvii Musart in montibus thianschanicis. (A. Regel).

53. *Linosyris Grimmi* Rgl. et Schmalh.

Caulis e basi suffruticosa ramosissimus, glabriusculus v. sub lente minutissime hirtulus, ut rami costato-angulati, 20—40 Cm. altus. Folia lineari-oblonga, acuta, sub lente minutissime hirtula, in latere inferiore glandulis sessilibus munita; inferiora trinervia, superiora uninnervia, decrescentia. Capitula in ramorum ramulorumque apice paniculata. Involucri cylindrico turbinati squamae inferiores ellipticae acutae; superiores obovato-oblongae, ex apice rotundato-obtuso apiculatae, scarioso-marginatae ciliataeque, caeterum glabrae; intimae angustiores acutae. Flores omnes tubulosi, hermaphroditi, involucrum paullo usque sesqui superantes Stylus inclusus, stigmatibus breviter exsertis.

L. divaricata DC, cui species nostra foliis inferioribus trinerviis proxima, differt «caulis ramis elongatis monocephalis, involucri campanulati squamis omnibus acuminatis».

In Turkestaniae montibus alatavicis in valle fluvii Tschirtschik prope Packrak. (A. Regel).

Specimen unicum in Kokaniae valle fluvii Sarawschan ab O. Fedtschenko collectum stylo exserto differt, sine dubio autem hujus speciei.

Viro clarissimo Richardo Grimm, amico intimo filii mei A. Regel, dedicavimus hanc speciem.

54. *Diplopappus turkestanicus* Rgl. et Schmalh.

Minute plus minus dense cinereo-hirtulus. Radix lignosa, collo pluricipiti v. in rhizoma crassum lignosum iterato ramosum ut videtur subterraneum transiens; rhizomatis rami abbreviati, caespitosi. Cauliculi erecti v. adscendentes, simplices v. rarissime parce ramosi, monocephali, 3—4 pollices alti. Folia inferiora (folia radicalia aemulantia) anguste lanceolato-spathulata v. lineari-lanceolata, in petiolum attenuata, saepis-

sime integerrima, rarius parce minuteque dentata; caudiculorum sparsa, pauca, lineari-lanceolata v. linearia; folia infima ad squamas imbricatas obtusas transeuntia. Involucri triseriati phyllis lineari-lanceolatis, acutis, glanduloso-hirtulis, disco $\frac{1}{3}$ brevioribus. Flores marginales ligulati, pluriseriales; ligulis unguiculatis obovatis v. spathulato-oblongis, apice bi-tridentatis v. rarius integris, discum superantibus, in statu sicco flavis v. rarius caerulescentibus. Flores disci hermaphroditi, tubulosi, quinque-dentati, flavi. Receptaculum nudum. Achaenium erostre, oblongum, compressum, hirtum. Pappus setosus, duplex, scaber, achaenium subaequans, setis exterioribus brevibus, interioribus discum circiter aequantibus.

Affinis *Psychrogetoni* (*Diplopappi* spec. cfr. Benth. et Hook. gen. II. pag. 1233) cabulico Boiss. (fl. orient. III. pag. 156) diversus autem ut videtur «involucro triseriato disco pappoque brevior, ligulis discum superantibus, achaenio pappo subaequante, caudiculis 3—4 pollicaribus».

In alpinis thianschanicis 8—12000' alt. (*Kuschakewicz*), in alpinis kokanicis 7—12000' alt. ad fluvium Isphairam, in trajectu Kadschrage et Dschiptik, ad glacies Tschitschikti. (O. Fedtschenko).

55. *Conyza Krausseana* Rgl. et Schmalh.

Biennis v. perennis. Caulis elatus, erectus, breviter glanduloso-hirtulus v. asperulus, in paniculam elongatam abiens. Folia radicalia oblongo-lanceolata, in petiolum longum attenuata, minute hirtulo-asperula, acuta, integerrima v. apicem versus dentata; folia caulina multo minora, sessilia v. in petiolum brevem attenuata, acuta, dentata v. integerrima. Paniculae valde elongatae rami abbreviati, nunc brevissimi cyma 3-pluriflora terminati, nunc praecipue superiores racemoso-cymosi. Involucri phylla triseriata, lineari-lanceolata, acuta, dorso glanduloso-hirtula, pappo subduplo breviora. Flores disci tubulosi hermaphroditi, radii filiformes neutri v. foeminei. Receptaculum convexum, subalveolatum. Achaenia lineari-oblonga, compressa, minute pubescentia. Pappi setae biseriales, scabrae; serie exteriori quam interior pluries brevior.

Bi-tripedalis. Folia radicalia cum petiolo usque 5 pollices longa. Capitula parva. Involucri phylla circiter 3 Mm. longa.

Species proxime affinis *C. (Erigeron) khorassanica* Boiss., secundum descriptionem *C. Boissieri* dignoscere videtur «indumento pubescenti-canescenti-puberulo, foliis inferioribus incluso petiolo $3\frac{1}{2}$ poll. longis, capitulis majusculis magnitudine *Erigeronis acris*, involucri phyllis biseriatis dorso dense spinuloso-scabris longeque acuminatis, achaeniis dense hirsutis».

Prope Taschkent (Krause), in montibus alatavicis ad fluvium Tschirtschik prope Saylik, 4—6000' alt. s. m. (A. Regel).

Trichanthemis Rgl. et Schmalh.

Capitula homogama, discoidea. Involucrum late campanulatum; phyllis 3—4-seriatis, imbricatis, adpressis, margine apiceque scariosis, exterioribus gradatim brevioribus. Receptaculum convexum, alveolatum; alveolis margine dense setoso-pilosis; setis quam achaenia brevioribus. Flores omnes tubulosi, hermaphroditi, involucrum circiter aequantes; tubo tereti-cylindrico; limbo vix ampliato, 5-fido. Antherae basi obtusae. Styli apice truncati, papilloso. Achaenia oblonga, teretia, subcostata, dense strigoso-hirsuta, pappo paleaceo coronata; paleis elliptico-oblongis, obtusis, achaeniorum exteriorum achaenium dimidium subaequantibus, achaeniorum centralium achaenio pluries brevioribus.

Fruticulus pygmaeus, ramosissimus; ramis ramulisque brevibus, erectis v. procumbentibus, caespitem densum formantibus, foliosis; ramulis apice pedunculum elongatum erectum nudum monocephalum edentibus. Folia alterna, pinnatisecta, lobis linearibus. Capitula mediocria. Genus novum *Anthemi* affine, «receptaculo alveolato-fimbrillifero, floribus homogamis, achaeniis strigoso-hirsutis» satis diversum.

56. *Trichanthemis karataviensis Rgl. et Schmalh.*

Cauliculi ramuli foliaque hirsuta. Folia breviter petiolata, dense congesta, circuitu oblonga, $1\frac{1}{2}$ —2 Cm. longa, pinnatisecta; segmentis arrectis, imbricatis, saepissime tripartitis; lobis linearibus, integerrimis, mucronato-acutis, medio viridibus, hyalino-marginatis. Pedunculi 10—15 Cm. alti, hirtuli, canaliculato-subangulati. Involucri phylla lineari-lanceolata, dorso dense pubescentia, interiora usque 8 Mm. longa.

In montibus karatavicis ad saxa prope Bala-ksehi-ata et prope Turtschi. (A. Regel).

57. *Pyrethrum transiliense*.

Tanacetum transiliense Herd. pl. Semenow. n. 543. — *Richteria pyrethroides* Kar. et Kir. in Bull. Soc. Mosc. 1842 p. 126. — Ledeb. fl. ross. III. 518. — Herder pl. Semenow. n. 527. — Variat:

α. *tomentosum*; tomentoso-lanatum, caule humili usque spithamaeo, basi dense foliato, foliis 2—3-pinnatisectis, capitulo pedunculato.

Richteria pyrethroides Herder l. c.

β. *subsessile*; capitulis sessilibus v. subsessilibus, caule humili. Cetera ut praecedentis.

γ. *subvillosum*; laxe villosum v. canescenti-villosum v. demum glabrescens; caulibus spithamaeis et ultra, foliosis; foliis bi-tripinnatisectis; capitulis pedunculatis.

P. transiliense Herd. l. c.

Habitat in alpinis alatavicis cis- et transiliensibus, in alpinis kokanicis et in alpinis thianschanicis. — (Schrenk, Karelin et Kirilow, Korolkow, Kuschakewicz, O. Fedtschenko, A. Regel).

Bentham und Hooker haben *Pyrethrum* nebst vielen andern Gattungen, als Untergattung mit *Chrysanthemum* vereinigt. Der aus kurzen Spreublättchen bestehende Pappus unterscheidet *Pyrethrum*, wenn auch hier Abänderungen vorkommen, doch im Allgemeinen als gute, allerdings künstliche, — aber doch allgemein angenommene Gattung, von *Chrysanthemum*. Nachdem Schultz bip. alle *Pyrethra* und viele andere Gattungen mit *Tanacetum* vereinigt hat, — so würden durch Vereinigung (nach Bentham und Hookers jedenfalls richtiger begründeten Ansicht) von *Pyrethrum* etc. mit *Chrysanthemum*, wieder eine Masse neuer Synonyme entstehen, so dass wir es um so mehr für richtiger halten, die Gattung *Pyrethrum* beizubehalten, da ja auch Bentham und Hooker dieselbe als eine gute Untergattung oder Abtheilung betrachten.

Die Formen des *P. transiliense*, die wir hier aufführten, sehen in ihren von einander entferntesten Gestaltungen, so verschieden aus, dass man solche für verschiedene Arten hält, so z. B. die dicht weisswollige Form mit lang gestielten Blüthenköpfen und am Grunde des Stengels zusammengedrängten Blättern und die hohe lose beharte oder später ganz

kahle höher am Stengel hinauf beblätterte Form. Die von den mannigfaltigsten Standorten uns vorliegenden Exemplare, führen aber die 3 angenommenen Formen so allmählig in einander über, dass man die Mittelformen ebenso gut zu der einen, wie zu der anderen Form stellen kann.

58. *Pyrethrum mucronatum* Rgl. et Schmalh.

Virescens, minute laxequae patenter hirtulum v. glabrescens. Folia tripinnatisecta; lobis oblongo-linearibus, in apiculum mucroniformem acuminatis. Capitula longe pedunculata, in racemum laxum v. basi simpliciter ramosum disposita. Involucri subhemisphaerici glabriusculi phyllis imbricatis; exterioribus brevioribus; interioribus longioribus, oblongis, hyalino sublaceroque marginatis, discum circiter aequantibus. Flores omnes tubulosi. Achaenia glabra. satis conspicue angulata, pappo coroniformi dentato-lobato corollae tubum dimidium subaequante coronata.

Valde affine *Pyrethri millefoliati* W. varietatibus, constanter ut videtur diversum «indumento, inflorescentia, pappi paleis corollae tubum dimidium subaequantibus et foliorum lobis in mucronem acuminatis».

In Turkestanica montibus karatavicis prope Karagus et Dschie, in montibus alatavicis ad fluvia Tschirtschik et Tschotkal, 4600—6000' alt. (A. Regel), prope Taschkent (Korolkow); in Kokania ad fluvium Saraw-schan inter Varsaminor et Peti (O. Fedtschenko).

59. *Tanacetum Herderi* Rgl. et Schmalh.

Humile usque spithamaeum, cinereo-tomentosum, suffruticosum, caespitosum. Caules floriferi simplices, adscendentes v. erecti, apice dense v. rarius laxe corymbosi, 2—6 cephal. Folia ad ramulorum basin dense conferta, petiolata; lamina deltoideo-ovata usque elliptico-oblonga, biternati- v. bipinnatisecta v. rarius pinnatisecta, lobis obverse oblongis obtusis v. acutis, integris v. 2—3-dentatis; folia caulina pauca, decrescentia, suprema linearia integra. Corymbi pedunculi capitulo hemisphaerico saepissime breviores v. rarius longiores. Involucri pluriserialis discum aequantis phylla imbricata, cinereo-tomentella, nigro-marginata, exteriora breviora lanceolata acuta, interiora cuneato-obovata v. cuneato-oblonga rotundato-obtusa. Flores homogami, omnes tubulosi, herma-

phroditi, 5-dentati. Achaenia lineari-oblonga, compressa, dorso 1—2-costata, apice omnino calva

Caules fleriferi 5—18 Cm. longi Involucri phylla 6—8 Mm. longa. Flores luteoli.

Tanacetum tomentosum Herder in pl. Semenow. n. 539. — T. tomentosum DC. differt «capitulis subtriplo minoribus, involucris phyllis biserialibus disco brevioribus, foliorum lobis linearibus».

In montium alatavicorum cisiliensium jugo Alaman, 8000' alt., (Semenow.), in Kokaniae alpinis ad fluvium Isphairam in jugo Ktschi-Alai, 10—13000' alt. (O. Fedtschenko).

60. *Tanacetum Scharnhorsti* Rgl. et Schmalh.

Fruticulus pygmaeus, e basi ramosus, albo-tomentosus. Rami brevissimi, $1\frac{1}{2}$ —2 Cm. longi, dense foliosi. Folia brevipetiolata, deltoideo-obovata, flabellatim tripartita v. trifida; lobi obverse oblongi, obtusi, integerrimi. Capitula brevia pedunculata, in ramorum apice solitaria, pedunculo quam capitulum breviora. Involucris campanulatis phylla imbricata, ovata, obtusa, late fusco-scarioso-marginata. Flores omnes homogami, hermaphroditi, tubulosi, 4- v. rarius 5-dentati, involucrum aequantes. Receptaculum convexo-conicum, nudum. Achaenia angulata, epapposa.

Fruticulus $1\frac{1}{2}$ —3 Cm. altus, imbricato-foliatus. Folia 3—7 Mm. longa. Involucris phylla 4—5 Mm. longa, exteriora interioribus paullo breviora.

In alpinis thianschanicis occidentalibus Jack-tascha, Sujok, Sart et Baskaun (Scharnhorst).

«Indumento albo-lanato, foliis flabellato-trifidis, lobis integerrimis, ramis monocephalis, statura pygmaea» ab omnibus adhuc cognitis speciebus generis Tanacetum facile dignoscitur.

B. PLANTAE TURKESTANICAE
A REGELIO ET SMIRNOWIO DETERMINATAE
auctore E. Regel.

Borragineae.

61. *Nonnea picta* M. B.

Fl. taur. cauc. I. pag. 127. sub *Anchusa*. — Boiss. fl. orient.

IV. 166. —

Variat:

α. *typica*; corollis calycem paullo superantibus rubro-violaceis.

N. *picta* Fisch. Mey. ind. sem. h. Petrop. II. pag. 43. —

Ledb. fl. ross. III. 110.

β. *caspica*; corollis calycem subduplo superantibus violascen-

tibus. N. *caspica* G. Don gen. syst. IV. p. 336. — Ledb.

fl. ross. III. p. 110.

γ. *sordida*; corolla flavescente, calycem paullo usque sesqui

superante. N. *sordida* Fisch. et Mey. ind. sem. h. Petrop.

II p. 43. — Ledb. fl. ross. III. p. 110.

In regionibus turkestanicis et kokanicis satis communis.

62. *Nonnea melanocarpa* Boiss.

Boiss. diagn. ser. I, fasc. 11. pag. 96. — Ejusd. fl. or. IV.

p. 165. — N. *philistaea* Boiss. diagn. ser. I. fasc. 11. pag. 96. —

EjUSD. fl. or. IV. pag. 166.

Differt solummodo a N. *picta* «calycis ad tertiam partem quinquefidi dentibus triangularibus acutis (nec calycis ad medium quinquefidi dentibus acuminatis), foliis floralibus oblongis acutis (nec attenuato-acuminatis)».

Habitat in regionibus turkestanicis et kokanicis satis frequens.

63. *Lithospermum arvense* L. — L. spec. 190.

α. *album*; floribus albis. L. *arvense* L.

β. caeruleum; floribus caeruleis. L. Sibthorpiatum Griseb. —
L. incrassatum Guss. — L. tenuiflorum L. — Cfr. Boiss. fl.
orient. IV. fasc. 1. pag. 216. 217.

Nuculae variant dense v. laxe tuberculatae v. scrobiculatae tuberculis subnullis.

Forma floribus caeruleis in regionibus turkestanicis frequentior quam forma typica floribus albis.

64. *Arnebia cornuta* F. et M.

Ind. sem. h. Petrop. I. p. 22. — Ledb. fl. ross. III. 139. —
Trautv. pl. Schrenk. n. 787. — Boiss. fl. or. IV. 213.

Species valde variabilis, variat caule humili v. pedali et ultra, a basi ramoso v. subsimplici, setis rigidis patulis laxè usque densissime vestito; corollae tubo calyce sesqui-triplo longiore, limbo quam tubus duplo—5-plo latiore; antheris ad faucem insertis v. in tubo dispersis; tubi squamis basilaribus brevibus v. magis elongatis, glabris v. ciliatis v. subhirsutis.

A Clarissimo Trautvettero varietates subsequentes dignoscuntur:

α. parviflora; corollae limbo tubo vix duplo ampliore
(Trautv. l. c.)

β. grandiflora; corollae limbo tubo 3—5-plo ampliore.
(Trautv. l. c.).

In regionibus turkestanicis satis frequens.

65. *Echinospermum rupestre* Schrenk.

Schrenk in Bull. Ac. Petr. II. 194. — Ledb. fl. ross. III. 161. —
E. microcarpum *β. rupestre* Rgl. pl. Semenov. n. 753.

Variat calycis laciniis quam caryopses longioribus v. brevioribus, caryopsium marginibus saepissime serie simplici aculeorum brevissimorum armatis v. rarius omnino laevibus.

α. typicum; caryopsibus margine serie aculeorum brevissimorum armatis.

E. rupestre Schrenk. l. c.

Hab. in regionibus turkestanicis orientalibus.

β. laeve Rgl. et Smirnow.; caryopsibus margine omnino laevibus.

In regionibus turkestanicis, Alatau (Schrenk) (lusus calycis laciniis quam caryopses brevioribus v. aequilongis), in valle Talas montium Alatau (A. Regel) (lusus calycis laciniis caryopses superantibus).

66. *Heterocaryum minimum* A. DC.

H. minimum et *H. rigidum* A. DC. prodr. X. p. 144 et 145. — Ledb. fl. ross. III. pag. 163. — *Echinosperrum minimum* Lehm. Asp. p. 126. — *Rochelia echinophora* Röm. et Schult. syst. IV. 110. — *Myosotis echinophora* Pall. it III. app. 717.

Variat caryopsium disco varie tuberculato (*H. minimum* A. DC.) v. in uno eodem specimine tuberculis disci praecipue in mediano in aculeos breves v. longiores transeuntibus. Caulis nunc pygmaeus pollicaris, nunc elatior pedalis et ultra.

In regionibus turkestanicis satis frequens.

67. *Cynoglossum macranthum* Rgl. et Smirnow. *)

Caulis erectus, ramosus, patente-hispidus. Folia oblongo-lanceolata, acuta, utrinque strigilloso-hispida, omnia basin versus attenuata,

*) *Cynoglossum* L.

SECTIO II. Corollae tubus calycem sesqui-duplo superans. Stamina fauce v. sub fauce inserta, plus minus e tubo exserta. (*Lindelofia* Lehm. in Hambrg. Grtztg. 1850. p. 352. — Benth. et Hook. gen. plant. II. p. 848).

Dispositio specierum.

- a. Nuculae margine serie simplici aculeorum glochidiatorum basin versus valde dilatatorum armatae, disco parce tuberculatae.

C. longiflorum Lehm., foliis superioribus basi cordato-amplexicaulibus. — *C. longiflorum* Lehm. in bot. reg. XXVI. tab. 50. — *Lindelofia spectabilis* Lehm. l. c. — Hab. in montibus elatioribus Indiae orientalis.

- b. Nuculae margine seriebus pluribus aculeorum glochidiatorum majorum basin versus valde dilatatorum, disco aculcolis brevibus glochidiatis sparsis armatae.

inferiora petiolata, superiora breviter petiolata v. sessilia. Florum racemi in apice ramulorum divaricato-geminati, secundi, laxiflori, ebracteolati, albido hirtulo-villosi, fructiferi erecti. Pedicelli calycem aequantes usque eo duplo longiores. Calycis lobi oblongi, obtusiusculi, corollae tubo sesqui usque duplo breviores, latere exteriori albido-lanati. Corollae limbus campanulatus, tubum aequans v. superans, quinquelobus. lobis rotundatis; fornices fauci inserti, oblongi, antherae superantes; stami cum fornicibus alternantia, sub tubi apice inserta; filamenta brevissima, antherae e basi sagittata lineares, e tubo exsertae. Stylus longissimus, florem superans.

In Turkestan prope Taschkent floribus caeruleis (A. Regel), ad fluvium Syr-Darja floribus ut videtur albis (Golicke).

68. *Macrotomia onosmoides* Rgl. et Smirnow.

Pilis setosis patulis tuberculo insidentibus hispida. Collum pluricaule, squamis fuscis oblongo-lanceolatis vestitum. Caules erecti v. adscendentes, folia radicalia circiter duplo superantes pedales et ultra. Folia oblongo-linearum, obtusiuscula; radicalia caulinis 3—4-plo longiora, in petiolum angustata; caulina sessilia, basin versus paullo angustata. Panicula terminalis, contracta, e racemis 4—5 composita; racemis brevibus, paucifloris, fructiferis vix elongatis, bracteatis. Bractee foliaceae, calycibus longiores. Calycis 5-partiti lacinae lineares, longissimae, acutae, dense hirsutae, corollam (demum) superantes, calycis fructiferi 2 Cm. et ultra longae. Corolla tubulosa, intus inter lobos plicata; tubo glabro circiter 1 Cm. longo, limbo extus strigoso-piloso circiter 5 Mm. longo; limbi erecti 5-lobi lobis ovato-oblongis obtusis concavis. Stamina

C. macrostylum Bnge., foliis omnibus in petiolum attenuatis, racemis paucifloris bracteolatis, pedicellis calycem duplo-usque triplo-superantibus. — *C. macrostylum* Bnge. reliq. Lehm. n. 942. — Habitat inter Buchara et Samarkand et in valle superiore fluvii Sarawschan (Lehmann).

c. Nuculae margine seriebus pluribus aculeorum glochidiatorum basin versus vix dilatatorum, disco aculeis similibus satis dense dispositis armatae.

C. macranthum Rgl. et Smirnow.

5, tubo sub fauce inserta; filamenta brevissima; antherae lineari-oblongae, obtusae, erectae, medio dorsi affixae, limbi lobis alternae, e tubo breviter exsertae. Ovarium 4-lobum. Stylus filiformis, simplex, stigmate capitato bilamellato terminatus. Nucula abortu solitaria, ad styli basin lateralis, erecta, areola basilari plana, rugulosa, ovata, in apicem brevem ancipitem excurrentes.

Taldi-usen in montibus alatavicus legit Cl. Kuschakewicz.

Affinis *M. perenni* Boiss. (fl. or. IV. p. 212 in adn. — *Arnebia perennis* A. DC. prodr. X. p. 95. — Ledb. fl. ross. III. p. 139. — *Stenoselenium perenne* Schrenk enum. pl. nov. p. 34. — *Lithospermum euchromum* Royle et Benth. ill. p. 305. — DC. prodr. X. p. 82. — Royle pl. exsicc.) et *M. cyanochroae* Boiss. (Boiss. fl. or. IV. p. 212). Una «corolla calycem superante limbo explanato, antheris in medio v. infra medium tubi insertis» — altera «caulibus pumilis folia radicalia vix superantibus, foliis caulinis e basi latiore oblongo-lanceolatis, corolla calycem superante, nuculis cristato-tuberculatis» dignoscuntur.

Die Wurzel dieser Art wird von dem Kirghisen, ganz wie die Wurzel von *M. perennis* zum Färben von Baumwolle, zum Schminken u. s. f. verwendet.

Kuschakewiczia Rgl. et Smirnow.

Calyx profunde quinquefidus, segmentis oblongis, fructifer vix auctus. Corolla tubulosa, sub fauci 5-squamata, limbi lobis 5 erectis parvis obtusis. Stamina fauce inserta, longe exserta, filamentis filiformibus; antherae parvae, ovatae, obtusae, dorso insertae, versatiles. Ovarii lobi 4, distincti; stylus filiformis, stigmate parvo. Nuculae juniores abortu binae v. solitariae, maturae semper solitariae, compresso-globosae, erectae, aculeis glochidiatis omnino armatae, monospermae. Semina immatura obovata, plano-compressa.

Solenanthus, cui genus nostrum habitu proximum, differt «staminibus medio tubi v. inferius affixis, nuculis 4 depressis facie antice areola concava saepe marginata praeditis».

69. *K. turkestanica*. Perennis, radice crassa perpendiculari, collo multicipite. Herba tota pilis adpressis v. vix patulis hirtulo-incana. Caules erecti v. adscendentes, pedales et ultra, foliati. Folia oblongo-lanceolata, integerrima v. rarius obsolete paucidenticulata. Florum corymbus terminalis, pedunculatus, initio subcapitatus, demum subumbellato-ramosus, racemis sub anthesi capitato-scorpioideis, demum magis elongatis. Calycis segmentis obtusis, tubum corollae circiter aequantibus circiter 2 Mm. longis.

In Turkestanica prope urbem Tashkent (Kuschakewicz), in montibus karatavicis prope Ak-su (Sewerzow).

70. *Rochelia leiocarpa* Ledeb. fl. alt. 172.

α. *typica*; setis adpressis hirta, pedicellis calycem circiter aequantibus, calycis laciniis fructu vix longioribus.

In Turkestanicae regionibus satis frequens.

β. *major*; setis erecto patulis patentissimis hirta, pedicellis calycem duplo majorem paullo usque duplo superantibus, calycis laciniis fructu subduplo longioribus.

Ad fluvium Koldjir in regione Saissan (Potanin), prope Wernoje (Kuschakewicz).

C. PLANTAE TURKESTANICAE A REGELIO ET

SCHMALHAUSENIO DETERMINATAE

auctore E. Regel.

Scrophulariaceae.

71. *Veronica argute serrata* Rgl. et Schmalh.

Prostrata, hirsuta. Folia breviter petiolata; inferiora opposita, cuneato-lanceolata usque cuneato-ovata, acuta, argute subinciso-serrata; floralia subconformia. Pedunculi filiformes, axillares, folium sub-

aequantur v. paullo superantes, post anthesin plus minus recurvati. Calycis fructiferi 4-partiti segmenta divaricata, elliptica, acuminata, integerrima, capsulam superantia. Corolla calycem circiter aequans. Capsula compressa, hirsutissima, profunde (usque ad $\frac{2}{3}$) biloba, sinu acuto; loculis ovatis, erecto-patentibus, stylum duplo superantibus, saepissime 3-spermis. Semina ovato-oblonga, facie concava, dorso convexa, laevia.

Proxima species *Veronica Buxbaumii* Ten. facile dignoscitur «pilositate laxiore, foliis basi rotundatis v. subcordatis grosse crenato-serratis (dentibus obtusis nec acutis), pedunculis folium usque duplo superantibus, capsulae lobis subhorizontaliter patentibus pilis brevioribus hirtis, stylo emarginaturam capsulae superante, seminibus tuberculatis, corolla calycem duplo superante». Calyce capsulae *V. bilobae* L., habitu foliisque *V. Buxbaumii* et *V. agresti* affinis.

In Turkestaniae montibus alatavicis in valle fluvii Karokol leg. A. Regel.

Selaginaceae.

72. *Gymnandra Korolkowi* Rgl. et Schmalh.

Glabra, estolonifera. Folia omnia radicalia, lineari-lanceolata, utrinque attenuata, usque $3\frac{1}{2}$ Cm. longa et $\frac{1}{2}$ Cm. lata, superne irregulariter dentata, apice et a basi ad medium integra. Spica densa subcapitata, incluso caule florifero brevissimo foliis brevior. Bractaeae anguste lineari-lanceolatae, corollis breviores. Corollae tubus calyce spathaceo triplo longior. Stamina 2, antherae maximae subexsertae. Stylus limbo paullo brevior. — Flores rubri, tubo 8 Mm. longo.

G. stolonifera C. Koch, cui species nostra valde affinis, differt: «stolonibus foliatis, foliis oblongis, bracteis oblongis flores subaequantibus, corollae tubo 5 Mm. longo limbum vix duplo superante, stylo limbum superante».

In Turkestaniae montibus alatavicis Aktag-tau 8—11,000 ped. alt. leg. Korolkow.

Die Verwandtschaft obiger Art mit *G. stolonifera* C. Koch ist so bedeutend, dass wenn nicht bei allen uns vorliegenden Exemplaren auch jede Andeutung der Bildung von Stolonen fehlen würde, wir unsere Pflanze als Form mit schmaleren Blättern und Brakteen und längerer Blumenkrone zu *G. stolonifera* genommen haben würden. Die fernere Beobachtung der bis jetzt uns in wenigen Exemplaren bekannten *G. stolonifera* und unserer neuen Art, kann da erst später entscheiden.

**D. PLANTAE REGIONES TURKESTANICAS INCOLENTES
SECUNDUM SPECIMINA VIVA
IN HORTO IMPERIALI BOTANICO CULTA DESCRIPTA.**

Auctore E. Regel.

1. *Allium talassicum* Rgl.

Bulbis oblongo-cylindricis, rhizomati oblique descendenti insidentibus, aggregatis: tunicis fuscis, nervis parallelis demum prominentibus instructis, integris v. apice plus minus laciniatis; caule erecto, tenui, tereti, laevi, supra medium foliato; foliis semitereti-filiformibus, margine sub lente tenuissime serrulato-scabris, caeterum vaginisque glabris, caulem subaequantibus v. superantibus; spatha umbellam aequante usque triplo superante; umbella capsulifera, multiflora, hemisphaerica; pedicellis subaequalibus, perigonium paullo superantibus, omnibus rectis, basi bracteolatis; sepalis elliptico-lanceolatis, acutis; filamentis simplicibus, e basi paullo latiore subulatis, sepala aequantibus, basi inter se breviter connatis; ovario subgloboso; stylo stamina vix superante.

Bulborum tunicae exteriores saturate fuscae, nervis parallelis prominentibus pallidioribus notatae, interiores fusco-stramineae. Caules 15—25 Cm. alti. Folia supra canaliculata. Spatha univalvis, e basi latiore membranacea integra v. vix bifida in rostrum subulatum attenuata.

Pedicelli 4—5 Mm. longi. Sepala $3\frac{1}{2}$ —4 Mm. longa, alba, nervo medio viridi instructa. Ovarium ovato-subglobosum (nec angulatum).

Affine *A. subgloboso*, facile autem dignoscitur «staminibus perigonium aequantibus (nec sesqui-duplo superantibus), caule supra medium (nec infra medium) foliato, spatha univalvi (nec bivalvi), sepalis albis nervo viridi notatis, ovario ovato-subgloboso (nec acute trigono)».

In Turkestaniae montibus alatavicis Kara-Tschok in valle fluvii Irtys legit A. Regel.

2. *Allium teretifolium* Rgl.

Bulbo rhizomati descendenti insidente, oblongo; tunicis exterioribus caulis basin alte involucrantibus, fusciscentibus, demum reticulato-fibrosis; caule tereti, glabro, sub ad medium foliato, folia subulata teretia glaberrima superante v. subaequante; spatha univalvi v. rarius bivalvi pedicellos superante, quam flores brevior; umbella capsulifera, pluriflora, fastigiata; pedicellis perigonio subduplo brevioribus, basi bracteolatis; sepalis oblongis, in tubum subcampanulatum conniventibus, in apicem obtusum sensim attenuatis, stamina paullo superantibus; filamentis simplicibus, subulatis, ima basi inter se et cum sepalis brevissime connatis, alternis basi latioribus.

Caulis erectus v. adscendens, flexuosus, 20—30 Cm. altus. Folia glaberrima, teretia, latere superiore non sulcata. Spatha saepissime univalvis, scariosa, e basi lata ovata in apicem linearem acuminata. Pedicelli erecti, 4—5 Mm. longi. Sepala albida, nervo intermedio viridi percursa, 8—9 Mm. longa et vix 3 Mm. lata. Ovarium conicum, subhexagonum, album et ad angulos stria fusca notatum, stylo subulato quam stamina brevior coronatum.

A. moschatum L., cui species nostra satis affinis, differt «bulbi tunicis exterioribus brevioribus, foliis supra canaliculatis margine saepissime ciliolato-scabris, spatha bivalvi pedicellis brevior, pedicellis perigonium plus minus superantibus, staminibus basi inter se aequalibus».

Habitat in Turkestanica austro-orientali in jugo Altigimel ad fluvium Ili. Bulbos legit A. Regel.

3. *Allium schönoprasoides* Rgl.

Omnino glabrum. Bulbi globosi tunicis albo-membranaceis; caule elatiore, infra medium foliato, foliis tereti-filiformibus fistulosis brevioribus; spatha quam umbella brevior, scariosa, initio univalvi, breviter acuminata; umbella capsulifera, subglobosa; pedicellis flore evoluti paullo usque duplo brevioribus, basi nudis; sepalis ovato-oblongis, nitentibus, pallide roseis, obtusiusculis; filamentis perigonio $\frac{1}{2}$ brevioribus, basi tantum connatis; exterioribus e basi latiore sensim in apicem subulatum attenuatis; interioribus valde dilatatis, rectangulis, sub apice utrinque unidentatis et subito in filamentum breve subulatum excurrentibus; ovario globoso, apice minute 6-dentato, stylo brevi inter dentes immerso coronatum.

Sepala 6—7 Mm. longa. Habitu A. Schönopraso, characteribus A. caesio affine, unum «staminum ovarique configuratione», alterum «foliis semiteretibus, floribus albidis plus duplo minoribus, ovario apice stylo terminato» facile dignoscuntur.

Prope Wernoje. (Fetisow).

4. *Allium semiretschenskianum* Rgl.

(Allium, sect. Schönoprasum, subdivisio 2. B. b. α . cfr. Rgl. Allium).

Glabrum. Bulbi globosi tunicis membranaceis, integris; caule erecto, tereti, ad medium foliato, folia linearia supra canaliculata infra convexa subaequante; umbella capsulifera, multiflora, hemisphaerica; pedicellis filiformibus, flores pluries superantibus, basi minute bracteolatis; sepalis lineari-oblongis v. lanceolato-oblongis, obtusiusculis, carneis, subconcoloribus; filamentis perigonium subduplo superantibus, ima basi tantum coalitis, exterioribus filiformibus initio brevioribus demum aequilongis, interioribus e basi dilatata ovata v. ovato-oblonga integra v. obscure dentata filiformibus.

Bulbi tunicae hyalino-scariosae. Caulis 40—45 Cm. altus, ut folia subfistulosa glaucescentia. Spatha hyalino-scariosa, quam umbella plus

duplo brevior, biloba, lobis suborbicularibus in acumen breve productis. Pedicelli usque 2 Cm. longi. Sepala 4 Cm. longa, concolora v. nervo medio paullo intensiore notata. Ovarium subglobosum, stylo filiformi initio brevi demum sepala subaequante coronatum, stigmatē minuto acuto.

Allium Pallasi Murr. cui valde simile, «bulbo ovato, floribus basi nudis minoribus, sepalis latioribus nervo purpureo notatis, filamentis inter se subaequalibus edentulis omnibus e basi dilatata in filum attenuatis petala paullo-sesqui superantibus, stigmatē subcapitato» differt.

Prope Wernoje (A. Regel).

5. *Allium Fetisowi* Rgl.

(*Allium*, sect. V. *Molium*. B. Umbella capsulifera, cfr. Rgl. *Allium*).

Bulbi depresso-globosi tunicis albo-membranaceis, integris; caule erecto, tereti, laevi, basi 2—3 folio, folia superante; foliis oblongo-vel lineari-lanceolatis, planis; umbella capsulifera, multiflora, initio hemisphaerica, demum subglobosa; pedicellis subaequalibus, 2—3-plo perigonium superantibus, basi nudis; sepalis lineari-subulatis, acutis, nervo concolore parum conspicuo percursis, initio erecto-patentibus, demum reflexis, ima basi coalitis, initio stamina superantibus, demum ea subaequantibus v. paullo superantibus; filamentis ima basi coalitis, interioribus basi utrinque dentatis, dentibus subulatis elongatis simplicibus v. bifidis; ovario subgloboso, obtuse trigono, loculis apice rotundatis; stylo stamina subaequante, stigmatē indiviso non incrassato, acuto. — Glabrum. Caulis laete viridis, circiter 60 Cm. altus. Folia $3\frac{1}{4}$ —2 Cm. lata, 25—40 Cm. longa, plana v. leviter concava, flaccida, striata, sensim attenuata, margine glabra v. sub lente tenuissime serrulato-scabriuscula. Spatha scariosa, albida, bifida; valvis ovato-subrotundis, quam pedicelli brevioribus.

Pedicelli $1\frac{1}{2}$ —2 Cm. longi. Sepala 6—7 Mm longa, circiter 1 Mm. lata, e roseo lilacina, concolora. Stamina roseo lilacina; antherae cinereo-caerulescentes.

Bulbos misit cl. Fetisow e Wernoje in Turkestaniam orientalem.

Affine *A. sarawschanico* Rgl. (All. mon. n. 243), dignoscitur autem «sepalis angustioribus concoloribus nervo medio parum conspicuo instructis (nec lineari-lanceolatis nervo purpureo instructis), filamentis interioribus basi utrinque dentatis, dentibus subulatis elongatis simplicibus v. bifidis (nec filamentis interioribus utrinque brevissime unidentatis), ovarii trigoni loculis apice rotundatis (nec ovarii hexagoni loculis apice obtuse bidentatis)».

6. *Allium Alberti* Rgl.

(Sectio II. Schönoprasum. Subdivisio II. Folia teretia v. semiteretia. B. Bulbi tunicae demum reticulato-fibrosae. Cfr. Rgl. All. monogr.).

Bulbi ovati tunicis exterioribus tenuibus totis reticulato-fibrosis; caule tereti, laevi, glabro, ad tertiam partem foliato, folia filiformi-semiteretia supra canaliculata superante. Spathae albido-scariosae bifidae valvis ovato-subrotundis, breviter acuminatis, quam pedicelli triplo-quadruplo brevioribus; umbella capsulifera, subhemisphaerica, multiflora; pedicellis subaequilongis, basi nudis, florum abortivorum rudimentis minimis intermixtis; sepalis lineari-lanceolatis, obtusiusculis, erecto-patentibus, quam stamina sesqui brevioribus; filamentis subulatis, liberis, interioribus basi paullo dilatatis.

Bulbi tunicae interiores membranaceae, albae, integrae. Caulis flexuosus, 20—30 Cm. altus. Folia glabra. Pedicelli filiformes, teretes, 12—17 Mm. longi, rosei. Sepala pallide rosea, dorso nervo medio intensiore roseo, circiter 4 Mm. longa et 1 Mm. lata. Ovarium depressoglobosum, stylo brevi quam filamenta pluries brevius terminatum, stigmate indiviso acuto.

Affine *A. sindjarensi* Boiss. et Hauskn. et *A. moschato*. Unum «sepalis ovato-lanceolatis acuminatis filamenta paullo — $\frac{1}{3}$ superantibus» — alterum «sepalis stamina $\frac{1}{3}$ superantibus, spathae valvis in mucronem setaceum saepe elongatum acuminatis, pedicellis saepissime valde inaequalibus» dignoscuntur.

In collibus arenosis prope Suidun ad fluvium Ili (*A. Regel*).

7. *Corydalis Kolpakowskiana* Rgl.

Bulbosa, glauca, glaberrima. Caulis basi unisquamatus, ramosus; ramis basi 1-pleiophyllis, infra medium monophyllis. Folia trisecta, segmentis petiolatis subternato-pinnatisectis, segmentulis cuneato-obovatis antice bi-5-lobatis, lobis oblongis obtusis. Bracteae oblongae, integrae, pedicello breviores. Flores in racemum elongatum laxum dispositi, bilabiati, labio superiore et inferiore ovatis explanatis apice emarginatis. Calcar subrectum, pedicellum subsesqui superans, apice gibbo obtuso subrecurso. Siliquae pendulae, subelliptico-oblongae.

Species proxime affinis *C. longiflorae*, dignoscitur autem «caule subsimplici, bracteis pedicellum aequantibus v. superantibus, corollae labio utroque naviculari (nec explanato), calcari subulato acuto pedicellum 2 — 3-plo superante, leguminibus lineari-oblongis».

Habitat in Turkestaniae locis urbem Wernoje ambientibus, ad fluvium Almatinka, in jugo Altigimel, (A. Regel).

Variat floribus pallide roseis v. albidis purpureo-variegatis v. purpureis fauce albidis.

8. *Iris Eulefeldi* Rgl.

Foliis ensiformibus scapo, basi subfoliato caeterum aphylo bifloro sub anthesi brevioribus, post anthesin eum superantibus, circiter $1\frac{1}{2}$ Cm. latis, glaucis, rectis v. leviter falcatis; spathis herbaceis, margine membranaceis obtusis v. acutis (nec acuminatis) perigonii tubum subaequantibus; floribus breviter pedunculatis; perigonii tubo ovario subduplo longiore; limbi laciniis obtusissimis, emarginatis; exterioribus cuneato-obovatis, eximie recurvis, pallide violaceis, intus a basi supra medium barbatis, sensim in unguem fusco-venosum attenuatis, — interioribus spathulato-oblongis, erectis, basi flavescentibus fusco-venosis, medio fusciscentibus, apice pallide violaceis; stigmatibus oblongis quam petala subduplo brevioribus, apice bifidis, lobis acutis grosse serratis; antheris quam filamenta paullo brevioribus.

Affinis species *J. Bludovii* Ledeb. «spathis acuminatis v. subacumi-

natis, perigonii tubo ovarium subaequante, limbi laciniis latioribus obovatis flavis purpureo-venosis» dignoscitur.

Habitat in montibus thianschanicis in angustiis fluvii Talki (A. Regel).

9. *Iris (Xiphion) Kolpakowskiana* Rgl.

Tunica bulborum fibroso-reticulata, fibris satis crassis irregulariter anastomosantibus (nec ut in *I. reticulata* pinnato-anastomosantibus). Scapus brevissimus, humilis, uniflorus; vagina basilari solitaria aphylla scapum foliorumque basin involuerante (nec ut in *I. reticulata* vaginis nonnullis aphyllis patulis). Folia circiter 4, glauca, linearia, erecta v. recurva, subtus carinata, sub anthesi floris tubum circiter aequantia, post anthesin magis elongata. Flos vaginis duabus oppositis ovarium florisque tubum supra medium involucrantis. Perigonii tubus limbum aequans v. superans; phylla exteriora, e basi late lineari-unguiformi in apicem ellipticum acutum v. acuminatum v. obtusiusculum excurrentia, ungue margine caeruleo, in mediano croceo, lamina caerulea; phylla interiora exterioribus longiora, caerulea, erecta, cuneato-oblongo-elliptica, acuta v. subobtusata, integra v. monstrositate ad tertiam partem bifida.

In Turkestanica prope Wernoje in pratis frequentissima. (Fetisow, A. Regel). *)

Kolpakowskia Rgl.

(Amaryllidearum genus novum).

Perigonium superum, corollaceum, persistens; tubo angusto, cylindrico, apice paullo tantum ampliato; limbo sexpartito; laciniis 2—3 nerviis, angustis, erecto-patulis v. demum patulis recurvis, aequilongis. Stamina 6, tubo adnata; tribus brevioribus e tubo vix exsertis, tribus

*) Die früher von uns gegebene Beschreibung (Cfr. acta h. Petrop. V. fasc. I. p. 263) war nach einem im Topfe im Gewächshause blühenden monströsen Exemplar gemacht worden. Zweitheilige innere Blumenblätter sahen wir dieses Jahr an keinem der zahlreichen Exemplare die im freien Lande zur Blüthe kamen.

longioribus exsertis quam laciniae perigonii duplo-triplo brevioribus; filamentis staminum breviorum filiformibus, staminum longiorum duplo latioribus compresso-planis. Antherae biloculares, oblongae, erectae, latere interiore rimis duabus longitudinalibus dehiscentes, dorso in incisura basali fixae. Ovarium inferum, oblongum, obtuse trigonum. Ovula in loculis crebra, angulo interno per duas series inserta. Stylus filiformis, stamina longiora circiter aequans, stigmatibus tribus subulatis.

Planta perennis bulbosa habitu *Ixiolirionis*, subsequenteribus characteribus autem dignoscitur: «Caulis simplex, foliatus, apice racemoso-subumbellato-pauciflorus. Folia linearia, inferne vaginantia, decrescentia, superiora bracteiformia flores stipantia. Perigonii gamophylli tubus cylindricus, gracilis; filamentis tribus longioribus latioribus compresso-planis; antheris latere interiore rimis duabus longitudinalibus dehiscentibus».

In itinere ad lacum Sairam legit A. Regel Viro Clarissimo Kolpakowskio, protectore scientiarum naturalium, hoc genus dedicavimus.

10. *Kolpakowskia ixiolirioides* Rgl.

Bulbus oblongus, basi bulbillos solitarios breviter petiolatos exserens; tuniceis membranaceis, fuscis, arcte imbricatis. Caulis glaber, teres, 20—25 Cm. altus, foliatus. Folia glabra, anguste linearia, latere superiore canaliculata, latere inferiore convexa, caule breviora; inferiora in verticillum 3—4-phyllum disposita; folium intermedium solitarium; folia superiora bracteiformia, flores stipantia, plus minus hyalino-marginata. Flores erecto-patentes, pedunculati; pedunculo glabro, flore brevior, inferior solitarius remotus, superiores subumbellati. Perigonium pallide violascens, circiter 3 Cm. longum; laciniis tubum subaequantibus, lineari-oblongis, in mucronem acuminatis, in mediano 2—3-nerviis, initio erecto-patentibus, demum patenti-recurvis.

11. *Scorzonera tragopogonoides* Rgl. et Schmalh.

Radix perennis, fusiformis. Caulis solitarius, erectus, 20—60 Cm. altus, plus minus dense floccoso-lanatus, foliatus. Folia plurinervia,

late linearia v. anguste lineari-lanceolata; radicalia et caulina inferiora in petiolum attenuata; superiora basi semiamplexicauli sessilia; omnia apicem versus attenuata, margine scaberula. Capitula plura, racemosa v. corymbosa, lateralia axillaria. Pedunculi breves v. magis elongati, foliis paucis brevibus v. elongatis instructi. Involucri cylindrici imbricati tenuiter floccoso-tomentosi phylla ovata, abbreviata, acuminata; interna anguste lineari-lanceolata, floribus carneis purpureo striatis paullo breviora. Receptaculum planum, nudum. Achaenia elongata, rostrata, incluso pappi involucrum aequantia, costato-striata, praecipue apicem versus scaberula. Pappus achaenium subaequans, setis conformibus plumosis, plumulis intricatis.

Folia decrescentia, inferiora 15—25 Cm. longa. Involucri phylla interiora usque 5 Cm. longa.

Affinis *S. macrospermae* Turcz. et *S. cilicicae* Boiss. Una «caule foliis involucris glabris, pedunculis subnudis (squamulis paucis parvis instructis), involucrio breviora» — altera «indumento sericeo-canesciente, pedunculis nudis v. squamula lineari instructis, capitulis brevibus, achaenio cum pappo pollicari, floribus luteis» dignoscuntur.

Semina misit Cl. Korolkow e regionibus turkestanicis.

12. *Tulipa triphylla* Rgl.

Bulbi ovato-oblongi tunicae atrofuscae, latere interiore apice tantum strigoso-pilosae v. totidem glabrae. Caulis 6—10 pollices altus (pars subterranea 1—2 Cm. longa), uniflorus, a basi ad apicem nudus, apice triphyllus, glaber. Folia subverticillata, canaliculata, late linearia, florem superantia, immarginata, 15—20 Cm. longa, 5—7 Mm. lata, margine ciliolata v. totidem glabra. Pedunculus glaber, suberectus. Sepala ovato-oblonga, erecto-patentia, glaberrima, flava; interiora ex apice rotundata apiculata; exteriora subacuta, dorso virescentia; omnia circiter 3 Cm. longa et 1¼ Cm. lata. Stamina quam corolla triplo breviora; filamenta medio latiora, utrinque attenuata, glaberrima, antheram lineari-oblongam subaequantia. Pistillum filamenta paullo superans, stigmate trigono terminatum.

Glabritate sepalorum filamentorumque a varietatibus *T. sylvestris* diversa. Proxime affinis *T. soogdianae* Bunge, *T. armenae* Boiss. et *T. tetraphyllae* Rgl. (acta horti Petr. III. p. 296). Una et altera bulbi tunicis intus dense pilosis dignoscuntur; posterioris bulbus ignotus, differt tamen «caule terra sepulto tetraphyllo, foliis cartilagineo-marginatis, floribus dimidio minoribus, sepalis exterioribus violaceo-variegatis».

Bulbos legit A. Regel in collibus arenosis inter Kuldscha et lacum Sairam.

13. *Tulipa Kesselringi* Rgl.

Tulipa, sectio B, **, †, cc. (cfr. Rgl. *Tulipa*).

Bulbi tunicae intus apicem versus strigoso-pilosae, coriaceae. Folia 4, supra terram ad caulis basin conferta, erecto-patentia, anguste lineari-lanceolata, pedunculo glabro nudo breviora, usque 18 Cm. longa, $\frac{3}{4}$ —1 $\frac{1}{4}$ Cm lata, canaliculata, subundulata, glaberrima, immarginata. Perigonium erectum; sepala erecta, patentia, oblongo-lanceolata, subaequalia, basi et apice glabra. Stamina glabra, inclusa anthera pistillo breviora. Filamenta ovata, antheris linearibus paullo breviora. Pistillum trigonum, stigmate trilobo quam diameter pistilli angustiore coronatum.

Perigonium flavum; sepala usque 4 $\frac{1}{2}$ Cm. longa, 14 Mm. lata, exteriora ante marginem stria purpurea notata, interiora apice albida, omnia basi immaculata.

Affinis *T. Kolpakowskianae* et *Gesnerianae*, una et altera «foliis sparsis, filamentis linearibus» dignoscuntur, praeterea *T. Kolpakowskiana* «pistillo filamenta subaequante» et *T. Gesneriana* «foliis latioribus stigmateque parvo» diversae.

Bulbos misit A. Regel e regionibus turkestanicis. Dedicavi cultivatori eruditissimo J. Kesselring.

E. PLANTARUM DIVERSARUM IN HORTO BOTANICO
IMPERIALI PETROPOLITANO CULTARUM DESCRIPTIONES

auctore E. Regel.

1. *Bulbocodium Eichleri* Rgl.

Bulbus oblongo-ovatus, triphyllus, biflorus, flore altero hermaprodito, altero masculo. Folia lineari-ligulata, canaliculata, sub anthesi flores triplo superantia, acutiuscula. Perigonii hexaphylli foliola longissime unguiculata, in tubum conniventia, omnia ad basin laminae ungue plus triplo brevioris sagittata. Stamina 6, perigonii foliolis supra ungues inserta. Filamenta filiformia, quam lamina breviora. Antherae sagittatae, biloculares, erectae; loculis rima longitudinali marginali dehiscentibus. Ovarium triloculare, superum. Styli 3, ad basin liberi, stigmatibus parvis terminati, perigonii foliolorum unguem subsuperantes. — Flores albi, leviter carneo tincti. Perigonii foliolorum lamina plurinervia, recurvato-patens.

Bulbocodium trigynum Adam, cui planta nostra proxima, differt: «foliis sub anthesi flore lilacino brevioribus, perigonii foliolorum exteriorum lamina basi in unguem attenuata (nec sagittata)».

In Caucaso orientali prope Baku legit Cl. Eichler.

2. *Calathea Lietzi* E. Morr.

Glaberrima. Caules circiter 40 Cm. alti, teretes, violascentes, basi foliorum vaginis involuti, apice articulo florifero foliiferoque instructi. Folia basilaria longe petiolata, terminalia brevius petiolata; omnia oblongo-lanceolata v. elliptico-oblonga, undulata, supra laete viridia metallice nitentia fasciis penniformibus saturate viridibus picta, subtus violaceo-purpurascens, 10—14 Cm. longa, 3—5 Cm. lata. Florum spica in articulo terminali caulis solitaria, axillaris, breviter pedunculata, compressiuscula, e bracteis 3 distichis herbaceis amplexantibus in

apicem patente-subrecurvum breviter acuminatis composita. Flores in bractearum axillis gemini. Sepala 3, anguste lanceolata, medio virescentia, margine transparente-albida, corollae tubum subaequantia. Corolla alba, bracteam superans, tubo gracili, limbi triparti lobis lanceolatis acutis. Stamina externum unicum. Ovarium triloculare, loculis omnibus fertilibus.

C. Lietzi E. Morr. in Belg hort. 1875. p. 273. tab. XV—XVII. fig. 8. (folium tantum sine descriptione).

3. *Calathea medio-picta*.

Acaulis. Folia omnia radicalia. Petiolus 8—16 poll. longus, sub lente pilis brevissimis vix conspicuis bifidis v. stellatis adpressis munitus, inferne in vaginam compresso-teretem ampliatus, apice articulo 1—1½ pollicari terminatus. Lamina oblongo-elliptica, breviter acuminata, basi acuta glaberrima, 8—12 poll. longa, 3½—5 poll. lata; supra laete viridis, nitida, nervis lateralibus numerosis prominentibus subplicata, stria albida utrinque secundum costam mediam ornata; subtus pallide viridis. Pedunculus radicalis, aphyllus, glaber, 5—6 pollices longus, spica densa subglobosa subpollicari terminatus. Bractee albae violaceo suffusae, late orbiculatae, in apicem squarroso-patentem acuminatae, glabrae. Flores violacei, bracteam superantes. — *Maranta medio-picta* h. Makoy. — Crescit in Brasilia.

Keitia Rgl.

(Iridearum genus novum). Tribus Galaxideae Baker. (Perianthium regulare, segmentis interioribus exterioribus consimilibus. Herbae bulbosae staminibus aequilateris basi connatis).

Perianthium regulare, supra basin sexpartitum; phyllis patentibus obovatis, interioribus paullo minoribus caeterum consimilibus. Stamina 3, ima basi corollae inserta; filamenta e basi latiore sensim attenuata, plano-compressa, basi tantum connata, sursum libera; antherae lineari-oblongae, biloculares, basi bifidae, erectae, basifixae; loculis rima lon-

gitudinali dehiscentibus. — Ovarium inferum, triloculare; loculis multiovulatis. Styli supra basin trifidi rami lineares, plani, glabri, integri v. rarius ramulus unicus ad medium bifidus. — Herba bulbosa glabra natalensis, caulescens. Caulis vix spithamaeus, 4—5-phyllus; folia ensiformia, decrescentia, inferius v. dua inferiora solitaria, superiora tria in apice caulis conferta alterna subspathiformia, supremum minimum. Flores dense spicati. Spicae pedunculatae, axillares, ovatae, spathae bivalvi suffultae. Spathae phylla herbacea, ovata, amplexicaulia, spicam involventia. Bractee ovato-lanceolatae, membranaceo-hyalinae, pedicellos paullo superantes. Pedicelli uniflori, in bractearum axilla solitarii.

4. *Keitia natalensis* Rgl.

Folium inferius 16—20 Cm. longum, circiter $1\frac{1}{2}$ Cm. latum, basi in vaginam amplexicaulem attenuatum, apice attenuato-acutum. Folia superiora valde inter se approximata, subopposita, spathiformia, inferioribus pluries minora, supremum minimum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Cm. longum. Spathae phylla circiter $1\frac{1}{2}$ Cm. longa. Bractee arcte imbricatae, spatham paullo superantes. Flores exserti; sepalis albis, tenuissimis, obovatis, circiter 1 Cm. longis et $\frac{1}{2}$ Cm. latis.

Ex Africae provincia Natal a Haage et Schmidt introducta.

5. *Spathiphyllum Walisi* Rgl.

Petiolo vaginato, apice tantum tereti; lamina oblongo-lanceolata, basi rotundata v. cuneata in geniculum longiusculum decurrente, apice sensim cuspidata, margine plus minus crispulo-crenulata; venis arcuato-adscendentibus, intervenio univenuloso; spatha oblongo-elliptica, basi rotundata in pedunculum decurrente, apice longe acuminato-cuspidata; spadice cylindrico, brevi, quam spatha triplo brevior, stipite subpollicari sub ad apicem spathae adnato suffulto, parte florigera stipitem circiter aequante; ovario conico sepala inter se libera apice truncata longe superante.

Petioli 12—20 Cm. longi. Lamina 13—24 Cm. longa, 4—6 Cm.

lata, laete viridis. Pedunculus teres, foliis paullo brevior. Spatha 14 Cm. longa, $4\frac{1}{2}$ Cm. lata, laete viridis. Pars florigera spadiceis vix 3 Cm. longa.

Affinis species *S. lanceaefolium* Schott, differt: «foliis angustioribus margine crispule crenulatis, intervenio univenuloso (nunquam trivenuloso), spadice quam spatha triplo brevior».

Plantam vivam Cl. Wallis e Venezuelae regionibus montanis attulit.

F. SALSOLACEARUM NOVARUM IN TURKESTANIA

INDIGENARUM DESCRIPTIONES,

auctore A. Bunge.

1. *Atriplex serpyllifolium*, n. sp

A. annuum, canescens, a basi ramosum, ramis gracilibus erectis adscendentibus, foliis subsessilibus integerrimis, inferioribus minutis orbiculato-obovatis cartilagineo marginatis cuspidatis, superioribus majoribus oblongis cuspidatis, summis linearibus muticis saepe complicatis, floribus femineis axillaribus paucis minutis, sepalis herbaceis laevibus integris utriculorum aequantibus, masculis in spicas basi interruptas glomeratis, rostello adscendente

Hab. in deserto Kirghisorum ad litora salsuginosa fl. Tschu (Schrenk!), in deserto aralo-caspico Ust-urt in argillosis ad fl. Tschegon (Borsczow. no. 506!).

Herba 8—12 pollices alta, basi in ramos plures interdum oppositos divisa, ramis superne parce ramulosis. Folia inferiora circiter 2''' longa, 1³/₄''' lata, circumcirca margine tenui cartilagineo cincta, basi breviter attenuata subsessilia, intermediis ramis sensim majora 5—6''' longa medio 3''' lata utrinque angustata, summa et ramulorum linearia usque ad 7''' longa et vix lineam lata. In speciminibus Schrenkianis flores femineos frustra quaesivi; in Borsczowiano sub finem mensis Septembris collecto perpaucos calyces fructiferos vidi in axillis foliorum sub spiculis masculis solitarios minimos, sepalis ut videtur integerrimis fere ad medium connatis obtusis et vix utriculorum superantibus. Styli breviter exserti. De

rostelli situ in unico fructu maturo certioreme facere haud contigit. Florum masculorum glomeruli in spicas semipollicares vel parum longiores dispositi, globosi, linea in diametro paulo majores, 2—3 infimi remotiusculi, caeteri arcte congesti

Borsczowia. n. gen. Suedearum.

Flores abortu monoici; masculi parvissimi, quinquepartiti, sepalis obtusis vix cucullatis. Stamina perigyna 5. Antherae subglobosae didymae; ovarium abortivum liberum elongato-lagenaeforme, apice dilatatum; stigmata duo rudimentaria. Flores feminei numerosissimi, heteromorphi. Calyx florum minorum subpyriformis, minutissime obtuse 3—5-dentatus, ovario adnatus, plus minusve increscens obovoideo — subpyriformis compressissimus. Staminum vestigia nulla. Ovarium fere ex toto calyci adnatum. Styli tres, breves, exserti. Pericarpium cum calyce coalescens, tenuissimum. Semen florum minorum erectum, verticale, obovatum, margine acutum, tumidum, integumento crustaceo vix conspicue areolato. Embryon flavescens-albidum, albumine parvissimo utrinque lateribus applicato. Semen florum majorum valde compressum, verticale, integumento membranaceo duplici opaco. Embryon spirale viridulum, vix albumosum, rostello cotyledonibus duplo longiore.

2. *B. aralo-caspica* Buge. Hab. in deserto aralensi. (Borsczow!).

Glaberrima, annua. Caulis albescens, lucidus, fragilis a basi ramosus, ramis inferioribus oppositis, caeteris sparsis, omnibus apice florigeris. Folia crassa semiteretia, inferiora pollicaria, vix lineam crassa, basi parum attenuata obtusa. Glomeruli axillares, omnino sessiles. Bracteolae minutae, hyalinae. Flores in glomerulo 3—5 vel plures, masculi et feminei minores erecti, feminei majores nutantes; rarissime occurrunt flores intermedii inter has duas formas, at semen in his omnino ut in floribus minoribus, testa crustacea lucida.

3. *Halimocnemis longifolia* Buge. H. macranthecae affinis, sed antherae loculi lineam tantum longi, appendicula arcuata $\frac{1}{4}$ longa.

Hab. prope Taschkent. (Kuschakewicz).

Scheint mir eine neue Art zu sein, ist aber noch viel zu jung, um genau bestimmt zu werden, passt aber zu keiner der bekannten Arten. Wegen des jugendlichen Zustandes kann aber keine Diagnose und keine genügende Beschreibung gegeben werden.

4. *Halimocnemis Smirnowii* Bnge.

Breviter villosa-canescens, bracteolis flore 4-mero (?) multo longioribus a calyce fructifero basi profunde impresso-truncato liberis, calycis parte indurata glaberrima, antheris ?

Hab. ad fl. Amu-Darja cum Alhagi camelorum. 30 Julii fructifera. (Smirnow).

Frustula collecta pauca, fructifera, sine antheris haud rite determinanda. Affinis Halim. macrantherae, sed distincta floribus ut videtur tetrameris multo brevioribus, et parte calycis indurata glaberrima.

5. *Piptoptera*. nov. gen.

Anabaseae, Halimocnemideae, Halarchontes, Physandreae (*Bunge*. Anabasearum revisio p. 19 in Mém. Acad. Pétersb. VII. ser. IV. № 11). Clavis generum dichotoma l. c. data, ad novum genus recipiendum ita disponenda :

9. Rostellum suprum. 10.

10. Sepala calycis fructiferi basi indurato-connata 11.

11 a. Duo exteriora appendiculata. 11 b.

11 b. Sepala 2 latissime alata, alis articulatim deciduis. *Piptoptera*.

Sepala 2 auriculato-gibba, gibbis cartilagineis persistentibus. *Halotis*.

Character essentialis: Sepala 5, anticum et posticum trinervia, interiora tria enervia, omnia basi tunc indurata connata, in fructu duo exteriora latissime membranaceo-alata, alis tunc demum articulatim secedentibus, thecam relinquentibus a latere subcompressam 6-costatam

supra medium biauriculatam sepalorum apicibus conniventibus coronatam, diutius persistentem. Staminodia nulla. Antherae membranaceo-appendiculatae. Stylus bicuris, cruribus subulatis conniventibus. Rostelli apex superus.

Char. naturalis: Flores omnes hermaphroditi, bibracteolati, solitarii, sparsi. Sepala 5, parum incrementum et duo exteriora valde indurata, basi connata, in alas duas latissimas supra medium excrecentia, alis articulatim solutis, parte basilari cum fructu diutius persistente. Staminodia nulla, discus vix ullus. Stamina 5, filamenta linearia. Antherae minutae loculis basi discretis, connectivo producto in vesiculam conicam acutiusculam loculos subaequantem. Frutex habitu Salsolae, ramosissimus, pubere brevi hispidulus, foliis ramisque sparsis.

Species unica: *P. turkestanica* Bnge.

Hab. in argilloso-salsis Schurachan, prope fortalitium Petro-Alexandrowsk (Korolkow et Krause!) Aug. 1873 fructifera.

Prostant specimina pauca ut videtur rami unius fruticuli $1\frac{1}{2}$ —1 pedales fructibus maturis et maturescentibus onusti. Rami basi 2—3''' in diametro crassi, ligno durissimo, medulla conspicua, hispiduli, parum flexuosi, ramosissimi. Ramuli tripollicares vel summi breviores, a basi florigeri, divaricato-patentes, saepe iterum ramulosi. Folia superiora subtrigona, carnosa, ad summum 3''' longa, reversa, subpungenti-acuminata; subfloralia breviora, e basi late ovata, late membranaceo-marginata, acutata et pungentia, tunc demum saepius hebetata. Bracteolae illis longiores, caeterum similes, e basi late ovata concava acuminato-trigonae, apice intus sulcatae, extus carinatae, pungenti-acutatae, arcte calyci applicitae nec cum illo connatae persistentes. Calyx peracta anthesi 3''' longus, a lateribus parum compressus, parce praesertim apice sericeo-pubescent, basi fere glabratus. Sepala anticum et posticum subnavicularia, tenuissime trinervia, tria interiora multo angustiora plana, omnia acuta. In dorso sepalorum exteriorum vix peracta anthesi oriuntur alae, in planta exsiccata atrofuscae, initio profunde bilobae cum nervo medio formam literae v ostendunt, tunc valde excrecentes tenue membranaceae subhyalinae 6—7''' in diametro,

fructu maturo deciduae, nempe a basi cartilaginea auriculam circularem in calyce fructifero formante articulatis semi circulo solutae nec disruptae. Pars sepalorum inferior basi coalescens in thecam clausam, basi truncatam obscure 5-foveolatam, longitudinaliter acute sexcostatam, sepalorum apicibus liberis in conum conniventibus superatam. Filamenta tenue linearia, ad basin usque libera, disco saltem in flore deflorato vix ullo. Antherae (e rudimentis tantum notae) cum appendicula vix ultra $\frac{3}{4}$ ''' longae, anthera ipsa oblique cordata basi breviter oblique biloba 0,4''' longa, appendicula anthera angustior sublanceolata obtusiuscula 0,3''' l. Ovarium a latere compressum, orbiculari-ovatum, sensim in stylum ad basin usque bipartitum attenuatum. Styli rami stricti, subulati invicem appliciti. Utriculus cum stylis persistentibus 3''' longus, $1\frac{1}{2}$ ''' latus, fusco-violaceus, succo violaceo parco repletus. Rostellum duplicem fere gyrum absolvens apice adpresso basi styli approximato. Cotyledones breves. Plumula minuta diphylla.

s
d
d
a

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA

581.947R26D

C001

DESCRIPTIONES PLANTARUM NOVARUM ET MINUS
PT.2-6

3 0112 009945517