A-C[ollin]
1877-95

a-c

09-

11

HARVARD UNIVERSITY.

LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

78,226, 78,227, 78,228

GIFT OF

John C. Phillips

December 10, 1935.

DEC 10 1935

*fr. Ind. mag. Knud Andersen
mauligt for
Fog*

78,226 FAUNISTISKE OG BIOLOGISKE
MEDDELELSER

OM

DANSKE FUGLE.

SAMLEDE AF
JONAS COLLIN.

UDGIVET SOM 3^{DE} SUPPLEMENT TIL
„SKANDINAVIENS FUGLE“.

KJØBENHAVN.
GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG.

FR. BAGGES BOGTRYKKERI.

1895.

FAUNISTISKE OG BIOLOGISKE
MEDDELELSER

OM

DANSKE FUGLE.

SAMLEDE AF

JONAS COLLIN.

UDGIVET SOM 3^{DE} SUPPLEMENT TIL
„SKANDINAVIENS FUGLE“.

KJØBENHAVN.

GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F. HEGEL & SØN).

FR. BAGGES BOGTRYKKERI.

1895.

YRARBIL
800.000 SEK. 2000
100.000.000

Udgivet med Understøttelse
af
Kultusministeriet.

Hyppigt anvendte Forkortelser.

- Arct. (Praktiserende Læge H. Arctander i Storehedinge).
Bg. (Apotheker J. Baagøe i Næstved).
Bidr. t. Kundsk. (J. Collin: „Bidrag til Kundskaben om Danmarks Fuglefauna“ 1888).
Jagtt. („Jagttidende“).
K. (Kaptain H. A. Kalkau).
Kn. A. (Stud. mag. Knud Andersen).
N. F. („Næstvedegnens Fugle“. Viborg 1893).
N. L. (Kjøbmand N. Larsen i Eistrup v. Nørre Snede).
Orn. Bidr. (J. Collin: „Ornithologiske Bidrag til Danmarks Fauna“. 1877).
P. (Telegrafbestyrer Petersen i Stege).
Sch. (Konservator v. Univ. Zool. Museum J. E. C. Scheel).
W. (Vice-Inspektør v. Univ. Zool. Museum Herluf Winge).

Planen, hvorefter dette lille Skrift er udarbejdet, afviger ikke fra den, som laae til Grund for de to af mig tidligere udgivne Supplementer til „Skandinaviens Fugle“. Jeg har beholdt den samme Nomenklatur, fordi jeg har ment, at der let vilde kunne fremkaldes Forvirring ved nu at anvende en anden, og jeg har navnlig, skjøndt modstræbende, hvad enkelte større Slægtgrupper (f. Ex. Sylvierne) angaaer, ikke ment at burde optage de moderne Slægtnavne. Efter Anmodning fra forskellige Sider har jeg i dette Supplement tilføiet de danske Artsnavne.

De Vanskeligheder, der ifølge Sagens Natur have været forbundne med at konstatere Rigtigheden af alle de mangfoldige Angivelser, som ere komne mig i Hænde, har jeg ikke formaaet at overvinde. Jeg har ofte været i Tvivl om, hvorvidt jeg kunde stole paa Bestemmelserne, og naar Tvivlen forekom mig at være særlig berettiget, har jeg som Regel undladt at optage Meddelelsen. Forøvrigt maa Ansvarret i saa Henseende vel nærmest paa hvile mine Kilder.

For den store Interesse, der fra mange Sider er viist den Opgave, jeg har sat mig, kan jeg kun være taknemlig, og for den velvillige Assistance, der er ydet mig i Henseende til Indsamling af Materiale, maa jeg herved bringe min oprigtige Tak til de Mange, som have

været mig behjælpelige. Jeg maa særligt henvende min Tak til de Herrer Kapt. H. A. Kalkau, Cand. pharm. A. Pirtzel, Kjøbmand N. Larsen i Eistrup og Arkitekt A. Hagerup, men først og fremmest dog til Hr. Apotheker J. Baagøe i Næstved, der med en utrættelig Energi har arbeidet paa at indsamle Oplysninger til mig fra alle Dele af Landet og derved paany har givet Vidnesbyrd om den levende Interesse, hvormed han omfatter vort Fædrelands Fuglefauna. Hr. Vice-Inspektor H. Winge har med den største Forekommenhed stillet det zool. Museums Tilvæxt-Journal til min Disposition og har paa mange andre Maader ydet mig værdifuld Støtte under mit Arbeide. Det er mit Haab, at dette maa blive modtaget med den Overbærenhed, hvortil det trænger.

Pax v. Lyngby i November 1895.

J. C.

Aquila fulva, (L.)

Kongeørn.

Skudt i Vinteren 18⁶⁵/₆₆ ved Svenstrup pr. Borup. (Jagtt. 1886). — I 1866 og 67 bleve adskillige Exemplarer skudte v. Nakskov, Maribo og Knuthenborg (Propr. Suhr til Svenstrup). — Ved Maribo 1871 (Suhr). — Samme Aar ved Engestofte paa Lolland (Jagtt. 1885). — D. 16. April 1874 skudt i Gjorslevs Bøgeskov (Arcanders Samling. Bg.). — 28. Januar 1878 ved Nysø (N. F.). — I Dec. 1880 ved Ørebæklunde paa Fyen (Helsingørs Dgbl. ⁸/₁₂ 80). — 3. Januar 1881 i Ravnholt Dyrehave*) (Berl. Tid. ⁵/₁ 81.) — 6. Januar 1881 ved Engestofte (Jagtt. 1885). — April 1883 i Veilø Skov (N. F.). — Janaur 1885 ved Holbæk Fjord (Hørsholm Avis). — I Tidsrummet fra 3. Dec. 1884 til 20. Dec. 1885 blev der skudt 9 Stkr. ved Christiansholm (Jagtt. 1886). — D. 26. Dec. 1885 skudt af Hjulmager Peter Mogensen i Klemensker paa Lyngen V. f. Almindingen (L. P. Nielsens Sml. i Aakirkeby. Bornholms Avis). — Ved Aalholm 15. Marts og 24. Okt. 1885 (Jagtt.). — 4. Febr. 1886 i Saltø Skov (N. F.). — I Dec. 1886 ved Lillehedinge, Stevns (Valentiners Sml.). — Nov. 1887 ved Gaunø (N. F.) — Fra 1. Sept. 1887 til 31. Aug.

*) Sandsynligvis det samme Expl., som i Helsingørs Avis af ¹⁴/₁ 81 angives at være skudt sammesteds d. 4. Januar 1881.

1888 bleve 16 Stkr. skudte ved Christiansholm (Jagtt.). — 30. Okt. 1888 en Han skudt ved Flade pr. Frederikshavn (Hedwig Claussen, Fugleudstopperske). — 21. Nov. 1888 paa Fænø af Skytten paa Hindsgavl (Nationalt. $\frac{4}{12}$ 88). — I N. Larsens Sml. fandtes et Expl., som d. 14. Sept. 1889 var blevet skudt ved Vrads pr. Nørre Snede med en Hare i Kløerne. — 31. Okt. s. A. ved Swebølle pr. Kallundborg (Jagtt.). — 16. Nov. 1889 ved Aalholm (Jagtt.). — 8. Mai 1890 ved Helsted i Jylland (Kgl. Skovf. Christiansen, — Bg.). — 16. Okt. s. A. paa Kalvø (Therkildsens Sml. — Bg.). — 15. Dec. s. A. ved Gunderslevholm (Baagøes Sml.), hvor den endvidere er skudt 22. og 27. Nov. 1890 og fanget 7. Dec. s. A. (N. F.). — 22. Febr. 1891 en Han skudt ved Holstenshus pr. Faaborg (Kropskelettet i Zool. Mus.). — 23. Okt. 1891 skudt ved Lundby Bakker pr. Aalborg (Pastor Kristen Barfod). — 7. Dec. 1891 sk. i en Have ved Arnbjerg Skov pr. Vordingborg; Ørnen havde grebet en levende Kat. men blev skræmmet fra den (Skovfoged Juul). — Okt. 1891 Asnæs (Kropskelettet i Zool. Mus. — 2. Nov. 1893, Han, Lerchenborg (Lehnsgr. Lerche, — Pirtzel). — 23. Nov. s. A. Hun, Lerchenborg (Pirtzel). — 20. Nov. s. A. ved Espe (Grev Moltke). — 23. Okt. 1895, Han, skudt ved Birkendegaard pr. Vørslev (Pirtzel). — 24. Okt. s. A. Ulkerup Skov i Odsherred („Dannebrog“ $\frac{29}{10}$ 95).

Ifølge N. F. forekommer Kongeørnen jevnligt i Træktiderne i Næstved Egnen, især i Skovene ved Gaunø og Dybsø Fjord. Ogsaa i Skovene omkring Tjustrup- og Bavelse-Sø træffes den temmelig hyppigt.

***Aquila nævia*, (Gm.)**

Skrigørn.

I Okt. 1868 skudt ved Bindsbøll (Baagøes Sml.)

Det i mine „Ornith. Bidrag t. Danm.s Fauna“ S. 5 omtalte Expl. fra Ulfshale er ifølge Baagøes Meddelelse

indlemmet i Hr. Partikulier Ladhoffs Sml. i Vordingborg. — I Grev Raben-Levetzaus Sml. paa Aalholm findes det i samme Arbeide omtalte Expl. fra Aalebæk ved Stege. — Fuglsang-Expl. (9. Juni 1881), der fandtes i Alfr. Benzons Sml. („Bidr. t. Kundsk. om D.s Fuglef.“ S. 8), er senere erhvervet af Zool. Mus. — Dyrlæge Larsen har meddelt mig, at en Skrigørn d. 25. Okt. 1885 blev skudt af Skytten paa Glorup paa Fyen.

Pandion haliaëtus, (L.)

Flodørn.

Min Angivelse i „Bidr. t. Kundsk.“ S. 8 om denne Arts formentlige Aftagen her i Landet har jeg fundet bekræftet ved de forholdsvis faa Meddelelser, som jeg siden den Tid har modtaget om Fiskeørnens Forekomst i Danmark efter 1888.

Den er skudt ved Gaunø 4. Mai 1877. (Bg.s Sml.) — I Foraaret 1883 saaes den fiskende i Susaa ved Abbednæs ved Næstved (N. F.). — 19. Mai 1885 skudt ved Vesteregitsborg ved Næstved (N. F.). — 20. Sept. 1885 fanget paa Pælesax ved Gaunø (Bg.s Sml.). — 11. Mai 1886 skudt paa Reden i Kongeskoven ved Stevns (Valentiners Sml.). — 12. Mai 1886 Gjorslev „Bøgeskov“ (Valentiners Sml.). — 9. Juni 1886 Frænderupgaard paa Møen (Tuteins Sml.) — 14. Nov. 1887 ved Silkeborg (N. L.s Sml.). — 29. Marts 1888 ved Vallø (Arct.s Sml.) — 6. April 1888 Valbygaard ved Slagelse, Han, (Adj. O. Zoffmann). — 20. April 1888 fanget i Sax ved Oremandsgaard ved Præstø (Juul's Sml.). — 10. Juni 1888 Enø ved Næstved (N. F.). — I Juni 1888 Gunderslevholm (Scheel). — 24. Aug. 1888 Vindebæk paa Møen (Chr. Rasmussen. — Bg.). — 29. Aug. 1888 en Han skudt ved Vallø (Arct.). — 10. Sept. 1888

ved Eistrup (N. L.s Sml.). — 11. Sept. 1888 v. Odense. Vingefang 62" (Fyens Stifttid.). — I Foraaret 1889 fanget i Sax i Næsager Skov ved Tissø (Møhl-Hansen. — Bg.). — I Efteraaret 1889 skudt i Rosenholm-Hestehave pr. Hornslet og fanget i Sax i Karlby Skov (Bg.). — I Zool. Mus. findes Knoklerne af et Expl., skudt i Kallebodstrand i Begyndelsen af Sept. 1890. — 16. Mai 1891 en Han skudt mellem Farø og Sjælland (Therkelsen, Bg.). — Okt. 1891 Lundeskov v. Møgeltønder (Rosenvinge, Bg.). — 17. April 1892 blev den seet fiskende i Non Møllesø (Hagerup). — 17. Sept. 1892 Han ved Lerchenborg (Lehnsgr. Lerche.) — 18. Sept. 1892 Rønne ved Dybsø pr. Næstved (Tvede, Bg.). — I 1893 forekom den hyppigt i Tidsvilde Sogn, (Skovrider N. P. Hansen, Bg.) — 20. Mai 1893 seet ved Hover pr. Ringkjøbing (Hagerup). — Mai 1894 iagttaget paa Reden i Nærheden af Kjøge (Jernbaneassistent Rob. Olsen, Bg.) — 15. Sept. 1894 skudt ved Aalholm (Bg.). — Ved Bredden af Skjernaa træffes den næsten hvert Aar i Mai og Juni (N. L.). — 20. Mai 1895 en Hun skudt ved Bregentved (Pirtzel).

Den yngler ikke mere ved Holsteinborg.

Pastor Barfod fandt Flodørnens Rede med 3 friske Æg d. 5. Mai 1888 i Rudbjerggaard Skov ved Nakskov; den var anbragt i Toppen af en gammel udgaaet Eg, ca. 30 Alen over Jorden, og havde været benyttet i mange Aar. Ved den aarlige Udbedring og Tilførsel af nyt Redemateriale var den bleven omtrent 3 Al. høi. I umiddelbar Nærhed af Træet fandtes en Heirekoloni, hvis Beboere flere Gange saaes at nærme sig det høit oppe i Luften kredsende Pandion-Par og der karambolere med det. Ved hvert Sammenstød udstødte Heirerne et høit, trompetagtigt Skrig og flygtede ud over Havet; men kort efter vendte de tilbage, og hver Gang gjentog den samme Manøvre sig.

Haliaëtus albicilla, (L.)**Havørn.**

I Næsbyholm Skov har den ynglet i en Del Aar indtil 1883. Efter den Tid er den ikke truffet ynglende i Næstved-Eggen, hvor den dog ikke sjældent træffes om Vinteren (Skovr. Hansen, N. F.).

I Sommeren 1881 skudt ved Visborggaard Skov ved Mariager. Fuglen havde en Fisk i Næbet og et Lam i Klørerne (Dagbl. K.). — I Palsgaard Skov ved Horsens, hvor den, som bekjendt, har ynglet i en længere Aarrække, fandt A. H. Faber 1890 dens Rede i c. 30 Alens Høide i en Bøg; d. 16. Marts indeholdt Reden 2 noget rugede Æg. — I Stensballe Skov ved Horsens fandt han dens Rede c. 80 Fod over Jorden i en mægtig Bøg; Reden var 6 Fod bred og c. 4 Fod høi.

Blandt de Steder, hvor Havørnen i de senere Aar er forekommet hyppigst her i Landet, maa nævnes Petersværfts store Skove ved Vordingborg, hvor der hvert Aar skydes adskillige Exemplarer (Dyrlæge Larsen). — Ligeledes forekommer den næsten hvert Aar ved Svenstrup pr. Nakskov (F. Suhr). — I Helsingørs Dagbl. f. $\frac{3}{1}$ 83 omtales en Kamp mellem en Havørn og en Kat, hvilken sidste gik af med Seiren. — I Vinteren 1892 iagttog Skovr. F. Mols 11 Havørne siddende i en Bøg i Nysø Strandskov (Møhl-Hansen).

Circaëtus Gallicus, (Gm.)**Slangeørn.**

I den Sophiendalske Sml. i Jylland findes ifølge Bg.s Meddelelse et Expl., som af Baron H. Rosenkranz angives at være skudt ved Glorup i Okt. 1885 af Skytte Madsen.

Af et Brev fra Telegrafbestyrer Petersen til Bg. af ²⁰/₆ 94 fremgaar det, at det i „Skand. Fugle“ S. 20 omtalte Expl. (en gl. Han) fra Hanneved Skov blev skudt d. 10. Juli 1859 af Forvalter Wittenberg. Hunnen blev ved samme Leilighed anskudt, men saaes dog senere flyvende omkring i Skoven. Hannen, der blev udstoppet, findes i Hr. Ladhoffs Samling i Vordingborg. Ungen, som efter nogen Tids Forløb kom til Kjærbøllings Zool. Have, døde efter et halvt Aars Ophold der.

Milvus regalis, Briss.

Alm. Glente.

Er i de senere Aar aftaget stærkt i Antal. I adskillige Egne, hvor den tidligere forekom temmelig almindeligt og aarligt ynglede, træffes den nu enten slet ikke eller kun undtagelsesvis. Siden 1885 er den saaledes ikke fundet ynglende i Tidsvilde Sogn, (Bg.), i Skovene ved Gunderslevholm ynglede den sidste Gang i 1888, og i Næstvedegnen træffes den ikke længer ynglende (N. F.).

I Foraaret 1892 blev en næsten hvid Varietet skudt i Hammev-Rislev (Bg.).

Milvus niger, Briss.

Sort Glente.

I Juni 1891 blev et ungt Individ skudt ved Thurebyholm af Fasanjæger Joachim Nielsen. Fuglen er opstillet i Sorø Akademiets Sml. (Zoffmann. Bg.). — 12. Mai 1895 iagttog H. Winge i længere Tid et Exemplar over Søborg Mose pr. Kbhvn. Fuglen fløi først temmelig lavt fra S. V. mod N. Ø., steg derefter meget høit tilveirs og fløi derefter uden Vingeslag i nordlig Retning.

Buteo vulgaris, Bechst.

Alm. Musevaage.

I Propr. F. Suhr's Sml. findes fire hvidbrogede Varieteter og en gulagtig, skudt 1. Januar 1867 ved Maribo. Den førstnævnte Varietet forekommer ikke sjældent i Egnen ved Svenstrup. Pastor Barfod har i Jylland ofte fundet 4 Æg i Rederne. I „Røddet“, en lav Skovstrækning under Godset Store Restrup, yngler hvert Aar et næsten hvidt Par, hvis Rede sjældent sidder mere end 3 a 4 Al. over Jorden. I Lundbæk Skove, der ligge umiddelbart ved Limfjorden, benytte de ynglende Musevaager Tang til Udforing af Rederne. Kun en enkelt Gang har Barfod fundet Reden i et Naaletræ. Af Varieteten *B. desertorum*, der navnlig udmærker sig ved sin noget ringere Størrelse og den rødlige Farve paa „Buxerne“, findes i Arctanders Sml. et ungt Expl., skudt 7. Sept. 1889 i Stevns, og i Kons. Scheels Sml. en Han fra Vallø (1891) og en Hun, skudt i Kongelunden 20. Sept. 1893. Kropskelettet af denne sidste opbevares i Zool. Mus.

Buteo lagopus, (Brünn.)

Laadenbenet Musevaage.

Skudt paa Storgaarden ved Frederikssund 17. Okt. 1886. Cand. jur. C. Becker, som har sendt mig Meddelelse derom, tilføier som Bevis paa Fuglens Dristighed, at den paa aaben Mark slog ned paa en anskudt Hare og fortærede en Del af denne, uagtet der knap 200 Al. derfra samtidigt fandt en livlig Skyden Sted paa en stor Flok Agerhøns.

Den blev funden død paa en Mark ved Sørup pr. Ringsted (1884. K.) og skudt 10. Januar 1878 ved Abbednæs (Bg.), 4. Dec. 1884 og i Sommeren 1886 ved

Næstved, 9. Jan. 1885 paa Clausholm (Jagtt.), 11. Mai 1888 ved Rønne (Adj. Tryde, Zool. Mus.). -- 26. Okt. s. A. en Hun skudt paa Bornholm (Zool. Mus.). — 15. Dec. s. A. modtog Zool. Mus. fra Grev Schulin en mørk Varietet, skudt ved Tølløse. — I Museet opbevares fremdeles Knoklerne af en Han, skudt ved Skibby i Dec. s. A., og af en anden Han, skudt ved Nybrogaard pr. Bagsværd 6. Dec. 1889. — Ved „Friheden“ pr. Næstved 23. Okt. 1891, i Stenskov 21. Febr. 1891, ved Fodby 2. Aug. 1891 (N. F.). Skudt paa Grejs Østermark i Nov. 1889 (K. Kristensen, Hesselballe).

Buteo ferox, (Gm.)

Ørnevaage.

Af denne for den danske Fauna nye Art. hvis egentlige Hjem er det sydøstlige Europa og det sydvestlige Asien, blev en gl. Hun skudt d. 8. Dec. 1892 af Fasanjæger Hirsch i Lønnede Skov ved Gaunø. Exemplaret findes i Bg.s Sml. [Nærmere Oplysninger om Fuglen ere meddelte i N. F.]

Pernis apivorus, (L.)

Hvepsevaage.

Ved Herlufsholm forekommer den endnu hvert Efteraar i store Flokke. Ved Midsommertid træffes den sjældnere der, men er dog nogle Gange bleven skudt paa denne Aarstid, saaledes d. 30. Juni 1867 ved „Friheden“ (Skovr. Wind). — Ifølge Jagtt. blev der d. 10. Sept. 1885 skudt ikke færre end 12 Stkr. (for største Delen Hanner) ved Gaunø. — Skudt ved Overberg pr. Frederikssund 14. Sept. 1886 (Cand. jur. C. Becker). — Ved Karrebæk i Sommeren 1886, ved Lundbygaard i Efteraaret 1887 (Hun). ved Gjeddesdal 4. Sept. 1887 (Hun).

— I Kjøbmand Larsens Sml. fandtes et Expl., skudt ved Nymindegab d. 29. April 1887. — I zoolog. Mus. findes Knokler af en Han fra Dragsholm pr. Svinninge (19. Mai 1889) og af et Individ (ligeledes Han) fra Brandshus pr. Kjøge (27. Mai 1889). — Ved Bakkegaard i Næstvedegnen 31. Aug. 1889 (Bg.). — I Efteraaret 1890 blev en Hun skudt ved Roeskilde (Kropskelettet i Zool. Mus.). Ifølge Brev til Zool. Mus. iagttog Stud. J. C. E. Christiansen i Forening med sin Fader d. 19. Mai 1890 et Træk paa 30—40 Stkr., som i østlig Retning trak over Viborg Plantage. Sammesteds blev en Hun skudt 9. Juli s. A. (Christiansen). 17. Juli s. A. saae han et Expl. i Kalbygaards Skov pr. Laven. — I 1891 blev den skudt 23. Juni ved Rønnebæksholm (N. F.), 3. Sept. en Han ved Herlufsholm (Pirtzel) og 20. Okt. ved Nørre Snede (N. L.). — I samme Maaned blev der skudt flere Explr. i Omegnen af Horsens (N. L.). — Dueodde Hovedfyr, 22. Sept. 1892 (Zool. Mus.).

Forstelev G. Kauslund fandt d. 5. Jnni 1892 dens Rede med 2 Æg i et Bøgetræ i Gunnerup Kohave ved Vallø (Møhl-Hansen). — 26. Mai 1894, Han fra Lerchenborg (Lehnsgr. Lerche, — Pirtzel). — 11. Sept. s. A. en Han og en Hun skudt ved Søborggaard pr. Kbhvn. (Schiøler, — Pirtzel).

Falco gyrfalco, L.

Jagtfalk.

Den 5. Okt. 1867 skudt ved Ulfshale paa Møen (Telegrafbest. Petersen i Stege). Expl. findes i Ladhoffs Sml. i Vordingborg. — 2. Okt. 1885 skudt ved Svenstrup pr. Borup (Jagtt.). — En ung Hun dræbtes 26. Nov. 1890 ved at flyve mod en Telegraftraad i Nærheden af Kallundborg; den blev indlemmet i Kjøbmand

Ole Lunds Sml. — 11. Nov. 1893, Hun, Lerchenborg (Lehnsgr. Lerche, — Pirtzel).

Falco peregrinus, Briss.

Vandrefalk.

Prop. Suhr skjød den ved Maribo 1861 og 1869 og senere flere Gange ved Svenstrup. Skudt 1. Januar 1865 ved Rosenfeldt paa Møen (Telegr. Petersen). — 7. Okt. 1867 ved Frænderupgaard paa Møen (Samme). — 16. Okt. 1873 ved Ulfshale paa Møen (Samme). — 28. April 1874 ved Stevnsklint (Anthon). — 22. Mai 1874 Ulfshale (P.). — 14. April 1876 ved Gaunø (Jagtt.). — 14. Nov. 1876 ved Grimstrup pr. Næstved (Bg.). — 17. Sept. 1878 Ulfshale (P.). — I Januar 1879 ved Middelfart (Hun. K.). — 23. Jan. 1879 i Raadmandshaven ved Næstved (N. F.). — 21. Nov. 1879 ved Vester Egitsborg pr. Næstved (Bg.s Sml.). — I 1880 blev et Expl., som paa det ene Ben havde Mærker af en Ring, skudt ved Ringsted (Bøving, — K.). — 27. Nov. 1881 Sigerslev ved Storehedinge (Arct.s Sml.). — I April 1884 havde Bruun i Fredericia et Expl. fra Viborgegnen til Udstopning. — 24. Juni 1885 ved Gaunø (Sch.). — 7. Aug. 1886 ved Næsbyholm (Skovr. Hansen). — 17. Aug. 1887 blev et vingeskudt Expl. fanget ved Næstved (Sch.). — I April 1887 gl. Han ved Kallundborg (K.). — 6. April 1888 ved Gaunø (N. F.). — I Foråret 1888 v. Vallø (Arct.). — I Sept. 1888 ved Karrebæk (Sch.). — I Okt. s. A. Skovhusvænget ved Vallø (Møhl-Hansen). — 2. Febr. 1889 ved Taarnborg pr. Korsør (Godseier Bech). — 3. Okt. 1889 ved Vestervig (Postmester Bendixen). — Okt. s. A. Almissevænget ved Vallø (Møhl-Hansen). — 5. Okt. 1889 ved Færgegaard (Sjöring); Knoklerne i Zool. Mus. — 11. Nov. 1889 ved Svebølle (Jagtt.). — 13. Nov. 1889 Bakkegaard ved

Næstved (Bg.). — 19. Jan. 1890 ved Bregentved (Slotsgartner Kellers Sml. Bg.). Denne Samling er senere købt af Grev A. W. Moltke-Bregentved. — 20. Dec. 1890 ved Oremandsgaard pr. Præstø (Godseier Alfr. Hage). — 4. Jan. 1891 skudt ved Aarhus (Pirtzel). — 10. Okt. 1891 ved Klintholm paa Møen (P.). — 12. Okt. 1891 Hun, Nordfeldt paa Møen (Pirtzel). — Samme Dag ved Næstved (N. F.). — 15. Okt. 1891 ved Herlufsholm (Skovr. Wind). — 18. Jan. 1892 ved Rønnebæksholm (Bg.). — 20. Jan. s. A. ung Han ved Lerchenborg (Pirtzel). — 30. Juli 1892 Gjorslev Bøgeskov, Stevns (Valentiners Sml.). — 6. Sept. 1892 Hammerthorup pr. Næstved (Bg.). En Hun, Oxholm d. 1. Okt. 1892 (Pirtzel). — 16. Okt. 1893 ung Fugl skudt i Tidsvilde Hegn (Forst-assistent Joh. Helms, Zool. Mus.). — 17. Okt. 1893 ved Frederiksværk (Christiansen, Bg.). — I Slutningen af April 1894 Nykjøbing paa Mors (Apotheker Teilman-Friis). — 11. Nov. 1894 en Han fra Lystrup pr. Rønnede (Grev Eiler Moltke, — Pirtzel). — 19. Dec. 1894 en Han skudt ved Løvenborg (Schiøler, — Pirtzel). — 13. Sept. 1895 Han, Lerchenborg (Lehnsgr. Lerche, — Pirtzel). — 19. Juni 1892 fandtes den ynglende paa Dronningestolen i Møens Klint lidt ovenfor „Klintekongens Hule“. I Reden var der 3 flyvefærdige Unger, og nedenfor Reden fandtes 3 Raagevinger 10 Allikevinger, 10 Vadefuglevinger og 55 Duevinger (Møhl-Hansen, Bg.).

Falco æsalon, (L.)

Dværgfalk.

Temmelig almindelig i Eistrup-Eggen Foraar og Efteraar. Kjøbm. Larsen har derfra faaet 10 à 11 Stkr. især unge Individuer. — I Tidsvilde Hegn forekommer den ogsaa ret hyppigt i Træktiderne (Skovr. Hansen, Bg.). — I Næstved-Eggen, hvor den ifølge N. F. nu og

da træffes paa Trækket, er den skudt i Kohaven 7 Aug. 1875, ved Herlufsholm 25. Sept. 1876, ved Friheden 11. Juli 1881, ved Bøgesø (ung Han) i Efteraaret 1885. — I Efteraaret 1886 fandtes paa Næstved Station en gl. Han, der havde slaaet sig ihjel ved at flyve mod Telegraftraadene. — Paa Sprogø er en Hun skudt 23. Sept. 1881 (K.s Sml.). — Fremdeles skudt ved Holbæk i Efteraaret 1888 (K.), ved Nykjøbing p. S. Sept. 1889 (K.) og ved Lystrup pr. Rønnede, ung Han 22. Sept. 1890 (Grev E. Moltke, — Pirtzel).

Tinnunculus alaudarius, (Briss.)

Taarnfalk.

Den 31. Aug. 1884 fandtes dens Rede med tre, kun faa Dage gamle Unger i Nørre Omme-Kirke i Herring-Eggen (Jagtt. 1884). — I Herlufmagle Kirketaarn blev der i 1886 ligeledes kun fundet 3 Unger. — I 1889 yngede den i en gammel hul Bøg i Skovløkken ved Tidsvilde (Christiansen, Bg.). — I Himmerland, hvor Taarnfalken er yderst almindelig, har Pastor Barfod fundet den ynglende i en Mængde Kirker, hyppigt ogsaa i forladte Krage- og Skadereder; endog i Reder, som benyttes af Krager eller Skader, yngler den, efterat den har fordrevet de egenlige Besiddere. Saaledes fandt Barfod d. 21. April 1890 i Røddet ved Store Restrup en Skaderede med 6 Æg, men da han d. 27. tilsaae Reden, fandtes der 7 Skadeæg og 1 Taarnfalkeæg, og d. 14. Mai var der 5 Taarnfalkeæg i Reden. Ifølge hans Iagttagelser varierer Æggenes Antal mellem 4 og 7.

Tinnunculus tinnunculoides, (Natt)

[*F. cenchris*, *Frisch*]

Lille Taarnfalk.

Et Expl. af denne, hidtil ikke i Danmark trufne Art blev af Boghandler C. Reitzel jun. købt af Konditor

Bjerrum i Ribe. Efter dennes Opgivelse er det paa-gjældende Individ skudt i Juli 1861 paa Gram af Skov-rider M. Rosendal. Fuglen er senere indlemmet i den Sophiendalske Sml. (Rosenkrantz, Bg.).

Tinnunculus vespertinus, (L.)

Rødfodfalk.

Fra Bjerrum har C. Reitzel jun. modtaget en gl. Han, skudt ved Warmingby (Seen Sogn) ved Ribe i Foraaret 1878. — Det i „Orn. Bidrag“ S. 7 omtalte Expl. fra Stege-Eggen er — ifølge Meddelelse fra Telegrafbest. Petersen — skudt 6. Sept. 1872 (Bg.).

Astur palumbarius, (L.)

Hønsehøg, Duehøg.

I de senere Aar er den ganske forsvundet fra Fredericia-Eggen (Bruun, Bg.). I Himmerland er den, ifølge Pastor Barfods Meddelelse, meget sjelden; i Lunde-gaards Skov, 1 Mil S. f. Løgstør, yngler den dog. I Silkeborg Skovene yngler den hvert Aar (Stud. J. C. E. Christiansen).

Circus æruginosus, (L.)

Rødbrun Kjærhøg.

I Tjustrup- og Bavelse-Søer yngle flere Par (N. F.). — I Gaunø Fjord opholder den sig hele Sommeren ved den røromvoxede Gjødesholm og yngler sandsynligvis der (N. F.). — 1865 fandt Kalkau dens Rede mellem Siv i Sorø Sø, umiddelbart op til Jærnbanedæmningen. — Den yngler aarligt i Gundsømaglesø ved Roeskilde (K.) og i Borup Sø (Jagtt. 1886). — Tidligere har den ynglet i Susaaen ved Gjerdrup (N. F.). — I Bussemark

Mose paa Høie Møen yngler hvert Aar et Par (Møhl-Hansen). — I Maribo Sø yngle flere Par hvert Aar. Pastor Barfod fandt der Reden med 5 friske Æg d. 22. Mai 1894.

Det er meget beklageligt, at denne eiendommelige og smukke Fugl, der ikke anretter nogen nævneværdig Skade, gaaer sin Udryddelse her i Landet imøde paa Grund af „Jægeres“ Forfølgelse.

Circus cyaneus, (L.)

Blaa Kjærhøg.

Skudt i Maglemose paa Møen 1. Okt. 1869 (Albrecht. Bg.). — Marienborg paa Møen 28. Sept. 1874 (P.—Bg.). — Glumsø Vesterskov 12. Okt. 1874 (Bg.). — Engestofte 16. Dec. 1880, gl. sølvgraa Han (K.). — Møen 9. Jan. 1881 (P.—Bg.). Holmegaards Mose*) ved Næstved 19. Jan. 1884 (Bg.) og 27. Okt. 1885 (Sch.). — Raaby paa Møen 1. Dec. 1885 (Sophiendals Sml. — Bg.). — Lille Taarøie ved Faxe, Han, funden død 30. Sept. 1886 (Arct.s Sml.). — Kongeskoven ved Stevns, ung Hun, Nov. 1886 (Valentiners Sml.). — Den udtørrede Sjørring Sø Nov. 1886 (Forpagter Madsen, Bg.). — Færgegaard-Klit, Thisted 15. Okt. 1887 (Madsen, Bg.). — Fredsholm pr. Nakskov, Efteraaret 1887, gl. Hun skudt af Gowertz Jensen, som Dagen efter saae to Explr.**) K. — Herschends Sml.). — Saltø ved Næstved 1. Dec. 1887, gl. Han (Zool. Mus.). — Vester-Egesborg ved Næstved 17. Okt. 1888 (Bg.s Sml.). — Holstenhus ved Faaborg 20. Okt. 1888, gl. Han og gl. Hun (Baron Berner-Schilden. — Hjeronimus). — Lundbygaard, 3. Nov. 1889, Hun; Knoklerne i Zool. Mus. — Leire, Okt. 1890, ung Hun, (K.). — Eistrup, 14. Nov. 1890, gl. Han

*) Ifølge N. F. Pag. 10 indfinder den sig hvert Aar der i Egnen.

**) I Jagtt. f. April 1888 omtalt som C. pygargus.

(N. L.). — Kallundborg, 28. Nov. 1890, ung Hun (O. Lunds Sml.). — Næstved 1. Dec. 1890, ung Han (Bg.). — Paabøl Plantage ved Tarm, 10. Marts 1891 (Lunds Sml. Bg.) og Febr. 1892 (K). — Eistrup*) 21. Sept. 1891. — Kjøge, Okt. 1891 (Jernbaneassist. Stub, Bg.). — Herlufsholm 1. Nov. 1891, ung Han (Knud Andersens Sml. N. F.). — Rønnebæksholm 12. Okt. 1891 ung Fugl (Bg. Colletts Sml.). — Geel Skov, en Hun 27. Sept. 1891 (Pirtzel). — Vordingborg 23. Jan. 1892 (Therkildsens Sml. Bg.). I Zool. Mus. findes en gl. Han, skudt omtrent d. 20. Febr. i Paabøl Plantage v. Tarm og indsendt af O. Lund i Kallundborg. — Kongeskoven ved Stevns, gl. Han April 1892 (Arct.s Sml.). — Ribe, gl. Hun 1892 (Clausens Sml. Bg.). — En udfarvet Han ved Lerchenborg 24. Jan. 1893 (Lehnsgr. Lerches Sml. — Pirtzel). — En udfarvet Han fra Nibe, 24. Sept. 1893 (eies af Cand. pharm. Erichsen i Holbæk. Pirtzel). — Kjærhave ved Ringsted, gl. Hun, 17. Sept. 1894 (O. Bocks Sml. Bg.). — 23. Sept. 1894 ung Han skudt ved Herlufsholm (Schiøler. — Pirtzel). — Holløse Mølle, gl. Hun, 8. Okt. 1894 (O. Høyer, Bg.). — Herlufsholm Skov, 23. Okt. 1894, skudt af Jørgen Wind (Bg.). — 11. Febr. 1895 ung Hun skudt ved Lystrup pr. Rønnede (Grev Eiler Moltke, — Pirtzel). — 16. April s. A. udfarvet Han skudt sammesteds (Pirtzel). — Skudt ved Rudkjøbing 28. Febr. 1895 (Zool. Mus.).

Circus pygargus, (L.)

Graa Kjærhøg, Enghøg.

En gl. Han skal i Efteraaret 1887 være skudt af Hr. Gowertz Jensen paa Fredsholm ved Nakskov. Fuglen

*) Hr. Kjøbm. Larsen har meddelt mig, at Arten forekommer meget hyppigt der i Egnen.

kom til Herschends Sml. Ifølge Jagtt. (April 1888) saae samme Jæger Dagen efter 2 Explr.

Propr. F. Suhr meddeler, at han i 1861 har seet den ved Sørup pr. Ringsted, og Kjøbm. Larsen i Eistrup skriver i Brev af ¹⁹/₁₁ 91, at baade den blaa og den graa Kjærhøg „sees daglig her“, en Meddelelse, der i alt Fald for den graa Kjærhøgs Vedkommende maa modtages med alt Forbehold. Overhovedet tør man neppe tillægge Angivelserne om, at denne eller hin Kjærhøg er „seet“, synderlig Betydning, thi Bestemmelsen af Circus Arterne er som bekjendt ofte forbunden med stor Vanskelighed.

I Zool. Mus. er opstillet en ung Hun, som den 16. el. 17. Aug. 1892 blev skudt i Langebjerg Plantage under Palsgaard Skovdistrikt af Forstkandidat Wøldike. I Forening med Skovrider Fabricius havde Hr. Wøldike allerede d. 9. s. M. seet to Individer sammesteds, og da de d. 15. paany passerede Plantagen, bemærkede de 5 Stkr., som stadigt holdt sig paa samme Sted. — I Mai 1893 blev en gl. Han skudt paa Langeland. Expl. findes i Scheels Samling.

Ifølge Beretning fra Forstk. Wøldike har denne hos os sjeldne Art i de senere Aar ynglet i Palsgaard Plantage, dog ikke i 1894 (Bg.).

Det i „Skand. Fugle“ omtalt Expl. fra Gisselfeldt (1823), som ifølge Melchior blev indlemmet i den Herlufsholmske Sml., findes ikke mere i denne (N. F.). Enten maa det saaledes være gaaet tabt (og da rimeligvis allerede i 1837), eller Angivelsen skyldes en feilagtig Artsbestemmelse.

Nyctea nivea, (Thunb.)

Sneugle.

Skudt ved Maribo 1869 (F. Suhrs Sml.). — Fladsaagaard Nov. 1870 (N. F.). — Hjælm paa Møen 28.

Nov. 1871 (P. — Bg.). — Herlufsholm 1873 (Herlufsholms Sml.). — Gjerdrup pr. Næstved 1873 (Skovr. Wind, Bg.). — Fæmø 24. Febr. 1874 (Bg.s Sml.). — Raaby paa Møen 15. Marts 1875 (P.). — Vorgaard 28. Dec. 1875 (Bg.s Sml.). — Serg. Bruun havde den til Udstopning fra Fyen (25. Nov. 1882), fra Mors (Dec. 1884), fra Kolding, en Han, (Febr. 1888) og fra Aalborg (Sept. 1888). — Fanget paa en Mark ved Brøndbyøster 21. Okt. 1884 og sendt til Zool. Have (Dagbl.). — Skudt i Odsherred 22. Okt. 1888 (Sch.). — Aalholm 26. Okt. 1888 (Bg.s Sml.). — Bremersvold 2. Nov. 1888 (Skytte Iversen, — K.). — Frederikssund (samme Dag. Bg.s Sml.). — Bøtø Nov. 1888 (Plantør Andersen, K.). — Vordingborg Nov. 1888 (K.). — Nykjøbing paa S. 8. Dec. 1888 (Isenkr. Hansen, Bg.). — Kjeldby paa Møen 20. Dec. 1888 (P.). — Lungholm ved Rødby 22. Dec. 1888 (Frederiksen, Bg.). — Nyrup Mark, Refsnæs 23. Dec. 1888 2 Stkr. (K.) og samtidigt paa Vollerup Mark, ligeledes paa Refsnæs (O. Lund). — Lille Rørbæk pr. Roeskilde 22. Dec. 1888 (en Hun, skudt af Husmand P. Olsen. Nationalt. f. $\frac{26}{12}$ 88*). Et andet Individ blev samtidigt seet der og et tredje skudt ved Jersi (Tune Herred). Omtrent en Maaned tidligere blev et Expl skudt sammesteds af Ungkarl P. Nielsen. — Klemensker paa Bornholm Dec. 1888, 2 Stkr. (K.). — Fanget i Rovfuglesax i Lerchenborg Dyrehave paa Asnæs Dec. 1888. — I Slutningen af 1888 modtog Bjerrum til Udstopning en smuk Hun fra Herning og samme Vinter to Hunner, der vare skudte tæt ved Vemb Station. — Ved Næs og ved Bakkebølle i Vinteren 1888 — 89. — Ved Juletid 1888 en Han ved Kallundborg og en Hun ved Jersi (Tune Herred). (Knoklerne af de to sidstnævnte Expl. findes i Zool. Mus.). — I Begyndelsen af 1889 traf en Gaardmand i Meelløse ved Frederiksborg en Sneugle i Gaar-

*) Knoklerne af dette Expl. opbevares i Zool. Mus.

dens Lade (Berl. Tid. $\frac{4}{1}$ 89). — Mellem Svinø og Knudsskov (Sydsjælland) 17. Jan. 1889 (Gaardeier Fr. Christensens Sml. Bg.). — Lungholm ved Rødby 13. Febr. 1889 (P. — Bg.). — Garbas(?)Gaard 3 Mil fra Frederikshavn 10. April 1889 (Hedwig Claussen). — Bollerup Thy 14. April 1889 (Forp. Madsen, Bg.). — Asan ved Sæby Nov. 1889 (J. Christensen, Bg.). — Oreby ved Vordingborg 20. Dec. 1889 (P. — Bg.). — Frederiksborg Dec. 1889 (C. F. Andersen, Bg.). — I Thorsø Mose, Sjørlev Sogn blev et Individ anskudt 24. Dec. 1889 (J. C. E. Christiansen. Brev til Zool. Mus.). — Ellegaard, Refsnæs, Jan. 1890 (O. Lunds Sml.). — I Vinteren 1889—90 blev der skudt 2 Explr. i Nyrup Mose ved Kallundborg (O. Lunds Sml.), 2 Explr. paa Asnæs og 3 Stkr. Ø. f. Kallundborg (O. Lund). — I 1891—92 saae Skovr. Kaas Sneugler ved Strids Mølle, ved Tokkeruphus og ved Gunderslevholm (N. F.). — I 1892 skudt S. f. Sæby i Jylland (J. Christensen, Bg.) og 15. Juni s. A. ved Marienborg paa Møen (P.). — Ved Ribe blev der i Aarene 1890—93 skudt 5 Explr. (Bjerrum). — I Vinteren 1893 ved Herning (N. L.), ved Holstebro og Vemb (Bjerrum). — 27. Jan. 1894 Anholt, hvor den havde opholdt sig i flere Maaneder (Zool. Mus.). — I Begyndelsen af April 1894, Hun, Lerchenborg (Lehnsgr. Lerche, — Pirtzel). — Skraverup pr. Næstved 2. Dec. 1894 (Bg.s Sml.). — Sparresholm 17. Jan. 1895 (Skytte Johansen, Bg.).

Surnia ulula, (L.)

Høgeugle.

I 1881 blev en Hun fanget af en Fuglefænger paa Amager. Expl. kom senere til Zool. Mus. — Afd. Oberst Falkenberg skal omtrent samtidigt have havt et Expl. her fra Landet; nærmere ubekjendt (K. ifølge Meddelelse

fra Kons. Conradsen). — I April 1886 skudt ved en Klapjagt paa Benzon ved Grenaa og opstillet i Samlingen dersteds (Rosenkrantz, Bg.). — Det i „Orn. Bidr.“ S. 8 omtalte Expl. fra Dec. 1875 blev af Godsinspektør Sidenius paa Kjærstrup sendt Telegr. Petersen til Udstopning og findes nu i Godseier Jægermester Friederichsens Sml. paa Kjærstrup (Bg.).

Glaucidium passerinum, (L.)

Spurveugle.

Ifølge Meddelelse fra Propr. F. Suhr er den i 1872 skudt ved Kjærstrup pr. Maribo. — Ved Gyldenholm blev et Expl. skudt i 1875 (N. F.). — I Okt. 1877 blev et Individ, som var faldet ved Hirtsholm Fyr, indbragt levende til Zool. Mus., hvor det døde 7. Nov. s. A. (Kn. Andersen). — Det i „Bidr. t. Kundsk.“ S. 20 omtalte Expl. fra Stege er senere som Arv efter Hofjægermester A. Brun tilfaldet det Zool. Mus.

Syrnium aluco, (L.)

Natugle.

Trafikassistent Fahrenholtz fandt i Foraaret 1895 en Aluco-Rede ved Haslev med 4 nys udklækkede Unger og 3 Æg (Bg.). — Ligeledes fandt Kjøbmand Ferslew i Kjøge Reden med 7 Æg ved Svansbjerg Smedie; den var anbragt i den „blinde Tud“ paa et Dueslag (Bg.).

Athene noctua, (Retz.)

Minervas Ugle.

Paa Sjælland, hvor denne Art kun sjældent forekommer, blev den i Efteraaret 1892 funden død ved

Kjøbenhavn, hvor den var fløiet mod en Telegraftraad (Bg.). — D. 26. April 1893 fandtes den ynglende i et hult Bøgetræ i Sørup Vang (Arresødal-Skov) ved Frederiksværk (Christiansen, Bg.).

Den yngler hvert Aar i Eistrup Kirke i Selskab med *Corvus monedula*. Disses Hanner ere meget indladende med Uglerne, som med stor Ro modtage Allikernes Kur (N. L.).

Pastor Barfod har fundet den ynglende i Sønder Tranders-, Nørholm-, Ferslev-, Voxlev-, Store Aistrup- og Sønderholm-Kirker og antager sikkert, at den yngler i de allerfleste Kirker i Himmerland og Vendsyssel.

Denne Art og Natuglen (*Syrnium aluco*) kaldes i Silkeborgegnen „Malongus“ (J. C. E. Christiansen).

Nyctale funerea, (L.)

Tengmalms Ugle.

I Valentiners Sml. findes et Expl., som i Nov. 1884 blev ihjelslaaet med en Stok under en Klapjagt i Kongeskoven ved Stevns (Bg.). — 31. Dec. 1884 skudt ved Skovbygaard pr. Maribo (P. — Bg.). — 26. Jan. 1885 ved Hardenberg (Holck-Hardenbergs Sml. Bg.). — 5. Febr. 1885 ved Brandshus pr. Vallø (Skovr. Rosenstand, Bg.). — 16. Febr. 1885 Kirkebjerg ved Vordingborg (Skovfoged Th. Juul, Bg.). — 14. April 1885 Hagested Skov (Hun), og samme Maaned en Han ved Viborg Krathus (Bruun. K.). — I Dec. 1886 fanget paa Amager (K.). — I Marts 1888 en Han ved Askov (Bruun, K.). — Paa Industriudstillingen i 1888 fandtes 2 Explr. fra Frederikshavn. — 22. Okt. 1888 Marienborg (Gr. Moltke, Bg.). — 20. Dec. 1888 Gunderslevholm, sk. af Skovr. Kaas, som ligeledes har skudt den sammesteds 16. Dec. 1892 og oftere har seet den der (N. F.). — 20. Okt. 1892 skudt ved Engestofte, Lundholm og Maribo (Konservator

Chr. Nielsen, Bg.). — 8. Nov. 1892 ved Kallundborg. Hun (Bruun, Bg.). — I samme Maaned erholdt Bg. den levende fra Raadegaard i Præstøegnen. — Høistrup Skov ved Rødvig, 26. Nov. 1892 (Zool. Mus.). — En Hun skudt i Kbhvns. Omegn i Dec. s. A. (Kropskeltet i Zool. Mus.). — I Foraaret 1880 fandt Skovr. Kaas nogle endnu tildels dunklædte Unger i Kastrup Overdrev i Gunderslevholms Dyrehave (N. F.).

Bubo maximus, (Sibb).

Bjergugle.

1871 Hegnsholt Krat (N. F.). — 20. Okt. 1873 Møllerup ved Silkeborg (Bg.s Sml.). — 25. Mai 1874 Virklund ved Silkeborg (Bg.s Sml.) — 1875 Glentholm*) ved Ry i Jylland (van Deurs's Sml. dersteds. Rosenkrantz, Bg.). — 8. Okt. 1875 Østerild Klit, skudt medens den fortærede en Agerhøne (K.). — 3. Marts 1880 Nordfeldt paa Møen (P. — Bg.). — 1882 Rønnebæksbakkerne ved Næstved (Propr. Gasmann. N. F.). — Nov. el. Dec. 1884 gl. Han skudt paa Amager. Expl. kom i C. Reitzels Besiddelse og eies nu af Knud Andersen. — Fra 1886 til 1893 er den hvert Aar iagttaget i Tidsvilde Hegn. (A. P. Hansen. Bg.). — I Marts 1891 blev der skudt 2 unge Individier sammesteds, hvor den rimeligvis yngler hvert Aar (Christiansen). — 24. Aug. 1888 Engestofte paa Lolland (Skovr. N. Møller. Bg.). — I Dec. 1889 blev en Han skudt ved en Kongejagt i Kongelunden paa Amager (Kn. Andersen). — I Januar 1892 Klosterskovgaard ved Stege (Sch.). — 1893 Stenskovene ved Næstved (Skovr. Wind, Bg.).

*) Sandsynligvis identisk med det i „Bidr. t. Kundsk.“ S. 24 omtalte Expl. fra Ry-Mølle.

Otus brachyotus, (Gm.)

Sump-Hornugle.

Meget almindelig hvert Aar i Egnen ved Svenstrup paa Lolland (F. Suhr). — Ifølge Skovr. Winds Angivelse „blader“ den som en Raa (Bg.).

Strix flammea, (L.)

Slørugle.

I Sommeren 1886 blev et Expl. fundet paa Banelinien ved Rønnebæk i Næstved-Egnen; det var dræbt ved at flyve mod Telgraftraadene (N. F.). — Paa Lolland, hvor Sløruglen synes at forekomme temmelig hyppigt, ere flere Explr. skudte eller fangede i Høgesax i Aarene 1872, 1880 og 1887 (F. Suhr). — I Efteraaret 1887 blev et Expl. fanget i en Rottesax ved Raaby, Høiemøen (Møhl-Hansen). — 3. Sept. 1891 en Hun skudt ved Herløv (Pirtzel). — Den er i de senere Aar enkelte Gange skudt eller fanget paa Sax i Egnen ved Gunderslevholm. — 5. Juni 1892 fandt Faber fire Unger i Hedensted Kirke pr. Veile og 14. Mai 1893 sammesteds Reden med 2 Æg og 3 Dununger. — 20. August 1892 blev den fanget paa et Loft i Hammer-Rislev (N. F.). — 8. Okt. 1893 en Hun, Rolsegaard pr. Rønde (Frk. F. Bense, — Pirtzel). — En hvid Varietet (Han) skudt ved Søborggaard pr. Khvn. 18. Dec. 1893 (Schiøler, — Pirtzel). — En Han skudt ved Lystrup 16. Januar 1895 (Gr. Eiler Moltke, — Pirtzel).

Cuculus canorus, L.

Gjøg.

I Næstvedegnen hørtes den

i 1889 første Gang	8. Mai.
i 1890 — —	6. —
i 1891 — —	12. —

paa Bornholm

i 1862	første	Gang	?	Mai,	sidste	Gang	23.	Juli,
i 1863	—	—	?	—	—	—	16.	—
i 1865	—	—	12.	—	—	—	19.	—
i 1866	—	—	17.	—	—	—	14.	—
i 1867	—	—	26.	—	—	—	23.	—
i 1868	—	—	10.	—	—	—		—
i 1869	—	—	11.	—	—	—		—
i 1872	—	—	2.	—	—	—		—

ved Frederikssund

i 1889 første Gang 7. Mai.

ved Ordrup

i 1888 — — 15. —

I Aarene 1890—94 har Pastor Barfod fundet dens Æg eller Unger 21 Gange i Jylland, deraf 9 Gange i den gule Vipstjerts Rede, 12 Gange i Engpiberens. — Stud. I. C. E. Christiansen fandt den 29. Juni 1891 et Gjøgeæg i en Sanglærkes Rede; af en Hyrdedreng fik han at vide, at dette Æg oprindeligt var blevet lagt i en Engpibers Rede, men da en Ko havde traadt i Reden og knust Æggene med Undtagelse af Gjøgeægget, havde Drengen taget dette og lagt det i Lærkens Rede. Der havde det nu ligget i nogle Dage, uden at Lærken havde fjernet det.

Picus viridis, L.

Grønspeette.

Den synes at være i stærkt Aftagende her i Landet. I Næstved-Egnen vides den ikke at være bemærket. Paa Als og i Flensborg-Egnen, hvor den tidligere forekom temmelig almindeligt, og hvor der indtil Slutningen af Halvtredserne hvert Aar blev skudt flere Exemplarer,

træffes den i de senere Aar yderst sjældent. Kapt. Kalkau eier en Han, skudt paa Als i April 1878. — I Bg.s Sml. findes et Exemplar, skudt i Rustrup Skov ved Silkeborg. — I 1884 havde Bruun et Expl. fra Nordsjælland til Udstopning (K.). — I Aug. 1884 modtog Bg. et Expl. fra Langeland. — Ifølge Jagtt. f. $\frac{7}{85}$ har Grønspetten taget fast Ophold i Bjørnemose Skov under Ravnholt. — I Veile Nørreskov synes den ogsaa at forekomme temmelig regelmæssigt. Cand. pharm. Faber traf den der 21. Febr., 23. Marts, 4. og 8. April 1889 og 6. Mai 1890. — Hagerup saae den i Rold Skov ved Arden i Jylland 4. Mai 1890. — Samme Aar skudt ved Struer. Expl. er opstillet i Kjøbm. Weilings Sml. i Eshjerg. (Duus. Bg.). — I Haven ved Rugballegaard pr. Veile yngede, ifølge Faber, et Par i 1892, og 25. April 1893 fandt han den ynglende i en Bøg i Store Grundet Skov pr. Veile. Hullet sad 30 Fod over Jorden og var $1\frac{1}{2}$ Fod dybt. — En Han skudt ved Aarhus i Begyndelsen af Novbr. 1890. (Korpslæge Høgh-Guldberg, Pirtzel).

I Palsgaards Plantage sees den hvert Aar, og i Randers-Egnen er den ligeledes endnu ikke ualmindelig. 8. Okt. 1894 blev den skudt ved Byens Gasværk, og den yngler hvert Aar paa den nærliggende Fussingø. (Konservator Thuesen, Bg.). — Ifølge Baagøes Meddelelse træffes den ogsaa hvert Aar i Juli og August i Gjøddinggaards Have ved Veile.

I Silkeborgs Vester- og Sønderskov yngle hvert Aar enkelte Par (I. C. E. Christiansen).

Picus major.

Stor Flagspette.

En Han med kastaniebrune Baand over Forhalsen og kastaniebrun Pande blev skudt ved Hellerupgaard 2. April 1894 (Schiøler, — Pirtzel).

Jynx torquilla, L.

Vendehals.

Sjelden i Eistrup-Eggen, hvor Kjøbm. N. Larsen i Løbet af 20 Aar kun har bemærket den tre Gange. D. 16. Mai 1891 skjød han et Expl. der. — I Næstved-Eggen er den almindelig i Træktiden (N. F.). — 2. Mai 1888 en Han fra Nordre Røn (Zool. Mus.). — 17. Aug. 1888 skudt paa „Kløvermarken“ ved Amagerbro (Boghandler H. Andersen, i hvis Besiddelse Fuglen er). — 2. Sept. s. A. funden død i Agersøgaards Have paa Agersø i Storebelt (Læge Fiedler — Zool. Museum.). — Propr. Suhr har i sin Samling et Expl., skudt ved Svenstrup 1884. Han angiver at have faaet den sammesteds i 1873 og i Sandby 1886. — Til Helsingør-Eggen, hvor den forekommer temmelig almindeligt, ankom den i 1883 d. 29. April, i 1885 d. 26. April (K.). — Stevns 4. Mai 1889 (Zool. Mus.) — I 1890 ynglede 3 Par i Viborg Plantage, det ene Par i en Meisekasse. (Stud. I. C. E. Christiansen).

Skovr. Møhl-Hansen fandt i 1890 dens Rede med 9 Æg i en hul Pil $1\frac{1}{2}$ Mil fra Odense. D. 25. Juni 1891 fandt han dens Rede sammesteds i et hult Pæretre. — Paa Trækket, baade Foraar og Efteraar forekommer den hyppigt, og fra Fyrene indsendes næsten hvert Aar flere eller færre Expl. til Zool. Mus. I Aug. 1890 modtog dette et Expl. fra Skjørpinge pr. Slagelse og et fra Gjedser Rev; endvidere findes i Museet et fra Hammershus Fyr, faldet 3. Mai 1891, et fra Hesselø Fyr, faldet 10. Mai s. A., et fra Skagens Fyr (30. Aug. s. A.), et fra Gjedser (1. Sept. s. A.) og et fra Bovbjerg (4. Sept. s. A.). I 1892 indkom den til Museet fra Hirtsholm 14. Mai, fra Æbelø 26. Aug., fra Bovbjerg 30. Aug. (2 Explr.) og fra Anholt 3. Sept.

Skovrider Wind skriver, at Vendehalsen skriger som en Spurvehøg, dog lidt svagere.

Sitta Europæa, L.

Spetmeise.

I N. F. har Apotheker Baagø meddelt en interessant iagttagelse angaaende Spetmeisens Levemaade. Udenfor Hesede Planteskole ved Gisselfeldt er Barken af en amerikansk Lind (*Tilia superba*) gjennemboret af en Masse Smaahuller, der med regelmæssige Mellemrum af $\frac{1}{2}$ Tomme gaa ind til Kambiallaget. Ved anstillede Undersøgelser viste det sig, at disse Huller bleve huggede af Spetmeiser, der flere Gange daglig hjemsøgte Træet og drak af den udflydende Saft, saa snart denne havde fyldt Hullerne. Uagtet disses Antal allerede ved iagttagelsens Publikation løb op til 50—60000, synes det ikke, at det derved foranledigede store Safttab har havt nogen hæmmende Indflydelse paa Træets Væxt. Senere har Baagø meddelt mig, at der ved Jonstrup Seminarium findes to Lindetræer (*Tilia parvifolia*), der ere angrebne paa samme Maade, og at det ved senere Observationer ved Hesede Planteskole har vist sig, at der — foruden Spetmeisen — ogsaa færdedes en *Picus major* i det angrebne Lindetræ. I Analogi med de iagttagelser, der fra Amerika foreligge for den gulnæbbede Spettes Vedkommende, fra Finland for Sortspettens og fra Tydskland for Flagspettens, er der nogen Sandsynlighed for, at *Picus major* i alt Fald har en Del at Hullerne i Hesede-Linden paa sin Samvittighed. — I Nyhave ved Kjøge fandt R. Olsen en Spetmeise-Rede med 8 Æg i et hult Bøgetræ. Aabningen i Stammen havde oprindelig en Diameter af 22" og 24", men Fuglen havde tilmuret den saaledes, at der kun var blevet et Indgangshul med en Diameter af c. 3" tilbage.

Spetmeisen vides ikke at være bemærket paa Høiemøen (Møhl-Hansen, Bg.).

Upupa epops, L.

Hærfugl.

I Hanneved Skov ved Flensborg blev den i 1859 seet gjentagne Gange (Petersen, Bg.). — I Propr. Suhrs Sml. findes et Expl., skudt ved Rødby 1865. — 13. Mai 1871 skudt ved Vollerup paa Møen (P.). — 30. Aug. 1871 Landslevgaard pr. Stege (P., Bg.). — I 1875 saae Propr. Suhr den ved Svenstrup. — Skudt ved Overberg pr. Frederikssund i Aug. 1867 (Cand. jur. C. Becker). — Ved Tokkeruphus og i Gunderslevholms Dyrehave har Skovr. Kaas flere Gange truffet den, saavel Foraar som Efteraar; i den nævnte Dyrehave blev den skudt 24. Mai 1877 (N. F.). — 19. Aug. s. A. ved Fuglsang pr. Nykjøbing p. F. (P., Bg.). — 27. Aug. s. A. Krusesminde pr. Korsør (Bech, Bg.). — 13. Sept. s. A. Rubjerggaard ved Nakskov (Schmidt, Bg.). — I April 1880 skjød Jægermester Qvistgaard den i Danstrup Hegn ved Helsingør (K.). — I 1881 havde Conradsen et Expl. til Udstopning fra Storehedinge. — 20. Aug. s. A. Knudskov i Sydsjælland (Therkildsens Sml., Bg.). — I April 1882 havde Bruun et Expl. fra Thisted til Udstopning. — 29. April 1883 skudt paa Engestofte (Jagtt.). — 31. Dec. 1884 Bregentved (Slotsgartner Keller, Bg.). — 6. Mai 1885 Ulfshale paa Møen (Sophiendals Sml., Bg.). — 17. Juni s. A. Møen (Rosenkrantz, Bg.). 11. Sept. s. A. Taarnborg ved Korsør (Sophiendals Sml., Bg.). — 14. Sept. 1886 Moshjerggaard pr. Hjørring (Sophiendals Sml.). — 20. April 1888 blev en Han skudt i Krageskoven ved Vallø af Skovfoged Rasmussen (Zool. Mus.). — I April eller Mai s. A. havde Bruun en Hun fra Kallundborg-Egnen til Udstopning. — 27. Mai s. A. blev den iagttaget i Galtø Skov (Sch.). — 1. Mai 1889 Stege (Sophiendals Sml., Bg.). — 4. Mai 1889 blev en Han skudt ved Faxe Ladeplads (Konserv. Hansen). — 1890 Lindskov ved Møgeltønder (Rosenvinge, Bg.).

-- 26. April s. A. Allinge paa Bornholm (Cand. pharm. Grønbech, Bg.). Exemplaret blev saa ødelagt ved Skuddet, at det ikke kunde udstoppes, og det blev da bortkastet. — I Mai s. A. Liselund (Rosenkrantz, Bg.). — 3. Mai s. A. Koster paa Møen (P.). — 4. Mai s. A. Nyord paa Møen (P., Bg.). -- Samme Dag ved Liselund paa Møen (Rosenkr., Bg.). — I Foraaret 1890 seet ved Friheden pr. Næstved (N. F.). — I Sommeren s. A. fanget i Høgesax i Stenvad Plantage (Jagtt. $\frac{5}{90}$, K.). — I Efteraaret s. A. skudt i Magleby paa Langeland af Forpagter Fabricius (Øland.s Dagbl.), sandsynligvis det samme Expl., af hvilket Kroppen blev skjænket til Zool. Mus. af Jfr. Anna Hansen med Angivelse af, at Fuglen var skudt d. 27. Sept. — 27. April 1891 gl. Han skudt ved Friheden (N. F.) — I Efteraaret s. A. Lyngby pr. Grenaa (Nationalt. f. $\frac{25}{11}$ 91). — 1892 Gjorslev Bøgeskov (Skovrider Anthon, Bg.). — 8. April s. A. Sørup Vang ved Tidsvilde, hvor den har været bemærket hvert Aar siden 1889 (Skovbrugselev C. Christiansen, Bg.). — Okt. 1892 Søholt paa Lolland (Konservator Chr. Nielsen, Bg.). — 27. April 1893 Amager, Gr. Bille Brahe-Selby paa Hvedholm (Pirtzel). — I Sommeren 1893 blev der skudt 2 Explr. ved Ulfshale, 1 ved Liselund, 1 ved Frendrup pr. Stege og 1 ved Vollerup paa Møen (P., Bg.).

Alcedo ispida, L.

Isfugl.

2. Sept. 1873 Bregentved (Gr. Moltkes Sml. N. F.).
14. Sept. 1873 Kjærstrup (Sidenius, Bg.). — 12. Febr. 1874 Stubbekjøbing (P.). — 3. Sept. 1878 Mattrup pr. Horsens (Rossings Sml., Bg.). — 3. Febr. 1879 Han ved Kolding (K.'s Sml.). — 1882 Søbygaards Sø (Jagtt. K.). — 3. Jan. 1883 Hardenberg (Holck-Hardenbergs Sml., Bg.). — 25. Mai 1883 Vrangsgaard i Sydsjælland

(P., Bg.). — 26. Aug. 1883, 5. Sept. s. A. og 26. April 1884 fløiet mod Stevns Fyr (Arct.). — Ved Maribo Sø er den ifølge Propr. Suhrs Meddelelse oftere skudt. — Fra Kolding havde Bruun i Nov. 1884 ikke færre end 8 Stkr. til Udstopning. — 26. Okt. s. A. Taarnholm ved Korsør (Bech, Bg.). — I Nov. s. A. iagttoges den daglig i Plantagen ved Nykjøbing paa Mors. — Samme Aar bleve 2 Individer fangede ved Uldum pr. Veile. — 14. Novbr. s. A. Herlufsholm (N. F.). Expl. findes i Grev Brockenhus-Schacks Sml. paa Gissegaard. — I Nov. s. A. Langebro ved Kbhvn. (Helms). — 1. Dec. s. A. en Han skudt ved Broksø (N. F.). — 4. Dec. s. A. en Han ved Herlufsholm (K.). — 10. Dec s. A. en Han ved Næstved. — 7. Febr. 1885 Kolding (Bg.). — I Aug. 1885 fandtes Reden med 4 Unger i Rathlousdals Have (Helsingørs Dagbl. f. $\frac{2}{9}$ 85). — 11. Sept. 1885 en Hun ved Aalholm. — 25. Okt. s. A. Strandmøllen ved Kbhvn. (Helms). — 14. Jan. 1886 Liselund (Gowertz Jensen, Bg.). — I Jan. 1886 en Han ved Hammel i Aarhus Amt (Sch.s Sml.) — I Vinteren 18⁸⁶/₈₇ forekom den i usædvanlig Mængde ved Næstved, hvor flere Stkr. bleve skudte ved Magle Mølle (N. F.). — I Nov. 1886 Oremandsgaards Strand (Juul, Bg.). — 12. Nov. 1886 Vindt Mølle pr. Viborg (Faber, Bg.). — 20. Jan. 1887 Vemmetofte (Arct.). — 22. April 1887 Storehedinge (Arct.s Sml., Bg.). — 5. Mai s. A. fløiet mod Stevns Fyr (Arct.). — 7. Juni s. A. Susaa ved Næstved (Told-assistent Jeppesen, Bg.). — 10. Marts 1888 en Hun ved Næstved Havn; den havde udviklede Æg i Ægestokken (Jeppesen, Bg.). — 18. Marts s. A. Næstved (Sch.). — 4. Nov. s. A. Amager (Helms). — 10. og 24. Dec. 1889 Susaaen ved Næstved (Bg.s Sml.). Ifølge N. F. forekommer den hver Vinter ved Susaaen og opholder sig hele Aaret ved Holløse Mølle. — I Fladsaagaards Have (i Næstved Egnen) opholdt 1 à 2 Isfugle sig hver Vinter fra Begyndelsen af Halvfjerdserne indtil 1889;

efter den Tid ere de ikke bemærkede der (N. F.). — 26. Aug. 1890 Sønderaa ved Veile (Faber). — 9. Okt. 1890 Brabandt Sø ved Aarhus (Korpslæge Høgh-Guldbergs Sml., Skelettet i Kn. Andersens Sml., Bg.). — 14. Dec. 1890 Næstved Havn; i Maven fandtes Rester af Hundesteiler (N. F.). — Kjøbm. Larsen har under 30. Jan. 1891 meddelt mig, at han har modtaget 3 Explr. fra Lystrupaa-Spadefabrik pr. Nørre Snede, hvor den i mange Aar har havt fast Ophold og formodes at yngle. — I 1892 ved Aaløbene omkring Aalborg (Jeppesen, Bg.). — 11. Sept. 1892 Herlufsholm (Adjunkt Chr. Hansen — Pirtzel). — 28. Nov. 1892 Rindsholm i Jylland (Hagerup). — Dec. s. A. Kjerteminde Havnefyrr (Grønbech, Bg.). — 17. Dec. s. A. Arresødalskov ved Tidsvilde (Christiansen, Bg.). — 27. Dec. s. A. Hømb Mølleaa ved Ringsted (Samme). — 23. Aug. 1895 dræbtes en Han ved Lyngbygaard pr. Aarhus ved at flyve mod en fiskende Karls Medestang (Schiøler — Pirtzel). — Ved Odense Aa træffes den ikke sjældent (Møhl-Hansen), og ved Veng Sø (Sophiendal) opholder den sig hvert Aar (Rosenkrantz, Bg.).

Coracias garrula, L.

Ellekrage.

I Halvtredserne skudt ved Kronborg af General Renouards ældste Søn (K.). — I 1866 blev en Ellekrage anskudt i Haven ved Rughavevænget ved Roeskilde (K.). — 24. Mai s. A. Møen (P., Bg.). — I Suhrs Sml. findes et Expl., skudt sammesteds, uvist naar. — 2. Mai 1867 Lindersvold (Hornemann, Bg.). — 1870 Kronborg Vold (I. F. Donner. — Bg.). — 15. Mai 1880 iagttog Kapt. Kalkau to Individer paa ganske nært Hold i Teglstruphegn, medens de vare optagne af Kamp med en Krage. — Skovfoged Johansen ved Teglstruphegn

har meddelt, at Ellekragen næsten hvert Foraar træffes i den nævnte Skov. I 1881 skjød han et Expl. der opstillet i Kapt. Smiths Sml. i Aarhus), og Kapt. K. har flere Gange bemærket den sammesteds, hvor den i 1884 blev truffet endnu den 1. Juni (K.). — I Mai 1881 fik Bruun et Expl. til Udstopning fra Kallundborg-Egnen. — 28. Mai 1883 Dyrehaven ved Kbhvn. (Helms, Bg.). — I Sept. 1884 Rømersdal paa Bornholm (K.). — 4. Mai 1885 Hølev paa Fyen (Bg.). — Det i „Bidr. t. Kundsk.“ S. 37 omtalte Expl. fra Bornholm (1885) blev skudt i Seiersgaards Have. — I Sommeren 1887 Gunderslevholm (Sch. — Bg.). — 27. Aug. s. A. Storehedinge (Arct. — Bg.). — 5 Juni 1888 Gunderslevholm (Bg.s Sml.). — 28. Mai 1889 Kolding (Hjeronimus. Bg.). — 20. Aug. 1889 Faxe Ladeplads (Hjeronimus. Bg.). — 3. Sept. 1889 Skovbakken ved Tidsvilde, 2 Explr. (Christiansen — Bg.). — I Vinteren 18⁸⁹/₉₀ skal et Expl. være skudt i Sandagergaards Skov ved Kolding og være kommet til en Samling i Kolding (Nationalt. 18¹/₂ 90). — 3. Maj 1890 en Han ved Raaby pr. Storehedinge (Arct. — Bg.). — Samme Dag i Søholm Dyrehave ved Stevns (Valentiners Sml. — Bg.) og i Gjorslev Dyrehave (Arct.). — 6. Mai bleve endnu to sete sammesteds (Arct. — W.). — 13. Mai s. A. Bussemarke paa Møen (P. — Bg.). — Juni s. A. Næsbyholm (N. F.). — Okt. s. A. Engestofte paa Lolland (Konservator Chr. Nielsen. — Bg.). 8. Mai 1891 en Han ved Gjorslev; der blev seet 2 Explr. (Arct.). — I Mai s. A. saae Skovr. Kaas Han og Hun ved Gunderslevholm (N. F.). — 12. Mai s. A. skudt i Knudsskov ved Vordingborg (Therkildsens Sml. — Bg.). — 7. Mai 1892 Uglerupskov ved Tidsvilde (Christiansen, Bg.). — I Juni og Sept. 1893 Almindingen paa Bornholm (Grønbech. Bg.). — 1. Juni 1893 en Hun sammesteds fra, skudt af Bryggeri-Elev Hauberg (Pirtzel). — 22. Mai 1894 to Explr. skudt i en lille Skov ved Hammerthorup pr. Næstved (Bg.). —

28. Mai s. A. bemærket ved Søholm ved Gjorslev, hvor den opholdt sig i flere Dage (Arct.). — 20. Juni 1894 skudt paa Møen (Chr. Nielsen. Bg.). — 31. Aug. 1895 Hun skudt ved Lerchenborg af Overskovfoged Hansen (Lehsgr. Lerche). Ifølge Meddelelse fra Sekretær C. Iversen paa Lerchenborg har han selv skudt en Ellekrage der for 8 à 9 Aar siden, og Overskovfoged Hansen skjød et Expl. sammesteds i August Maaned for 6 à 7 Aar siden.

Pastor roseus (L.)

Rosenstær.

Det i „Skand. Fugle“ S. 150 omtalte Expl. fra Eistrup blev, ifølge senere Meddelelse fra Kjøbm. N. Larsen skudt af ham selv i hans Have d. 1. Juni 1875. Det var en gl. Han, der var i Følge med to andre gl. Hanner. — 21. Sept. 1889 blev en ung Han skudt paa en Mark S. f. Frederikshavn (Hedwig Claussen). — 15. Okt. 1889 en Hun skudt i Viborg. Konserv. Hansen, der fik Fuglen til Udstopning, leverede Knoklerne til Zool. Mus. — I April 1890 blev en Rosenstær fanget i en Have ved Randers; flere Individuer vare sete (H. S. Thuesen — W.). — 22. Juni 1893 Harrested Skov ved Ringsted (O. M. Bock — Bg.). — 9. Aug. 1893 skudt i Haven ved Færgegaard pr. Thisted (opstillet i Forpagter Madsens Sml.).

Foruden det i „Bidr. t. Kundsk.“ S. 35 omtalte Expl. fra Færøerne (1853) har Sysselmand Müller erholdt et Expl. fra Nolsø d. 19. Sept. 1855.

Oriolus galbula, L.

Guldpirol.

I Hansted Skov ved Horsens sees den af og til om Foraaret (N. L.). — 2. Aug. 1880 Hardenberg (Holck-

Hardenbergs Sml. Bg.). — I 1885 blev en Han skudt paa Thorseng af Skovf. Illermann, der angiver den som ynglende paa Hjortholm ved Langeland (Bg.). — 15. Mai 1886 Hardenberg (Holck-Hardenb.s Sml. Bg.). — 10. Okt. 1886 Klintholm paa Møen (Scavenius's Sml. Bg.). — 1887 Engestofte pr. Maribo (Sophiendals Sml. Bg.). — Pastor K. Barfod har i Marts 1888 meddelt mig, at Guldpirolen i flere Aar har ynglet paa Engestofte Gods (kfr. „Bidrag t. Kundsk.“ S. 32.). — Ved Ribe ynglede atter i 1888 to Par. Det ene af disse, som hver Dag i Kirsebærtiden indfandt sig paa bestemt Tid i Sparekassens store Have for at æde Kirsebær, var saa lidet sky, at det end ikke lod sig fordrive ved Stenkast (Bjerrum). — I Efteraaret 1888 opholdt flere Piroler sig i Lønnede Skov (N. F.). — S. A. skudt paa Falster (N. F. Andersen, Bg.) og i Stevns Bøgeskov (Anthon, Bg.). — I 1889 blev den paany truffet ynglende ved Aalholm (C. Nielsen. Bg.). — 5. Aug. 1889 Drejø (Bruun, Bg.). — 1890 Lindeskov ved Møgeltønder (Rosenvinge, Bg.). — 14. Mai 1891 Nørre Alslev (Rosenkrantz, Bg.). — I Sept. 1892 Bötö v. Falster (Plantør Andersen, Sophiendals Sml. Bg.). — Justitsraad A. G. Juel har meddelt mig, at han en Eftermiddag i Sommeren 1893 iagttog 3 fuldt udfarvede Pirolhanner, der sad i Toppen af en fritstaaende Lærk i Færgelunden ved Jægerspris. Foruden disse var der sammesteds en Pirol til, men om denne var en Han, kunde Hr. J. ikke afgjøre. Arten vides ikke tidligere bemærket der i Eggen. — 5. Jun 1893 skudt ved Ribe (Zool. Mus.). — 18. Aug. 1893 blev en Hun skudt paa Møen (Knud Andersen). — Pastor Barfod har meddelt mig, at Gartner Christensen i de første Dage af Juni 1894 iagttog et Par ved Scheelslund pr. Aalborg.

Ifølge „Dimmalætting“ er Pirolen skudt paa Færøerne i 1893 (Bg.).

Sturnus vulgaris, L.**Stær.**

I Næstvedegnen er den flere Gange truffet ynglende i Træhuller, der fandtes i en Høide af kun 1 Fod over Jorden (N. F.).

Undtagelsesvis nærer Stæren sig ogsaa af andre Fugles Æg. I N. F. berettes saaledes, at den er seet flyvende ind under et Hustag, hvor der fandtes en Mængde Spurvereder, og at den kort efter vendte tilbage med et Spurveæg i Munden og fortærede det.

Fyrinester A. Lorentzen (Blaavandshuk) meddeler, at han d. 11. Marts 1888 samlede ikke mindre end 134 ihjelfrosne Stære i 4 Stærkasser. De vare ankomne den foregaaende Dag sammen med en Del Viber og Brokfugle, men om Aftenen gik Vinden om fra S. V. til O. N. O., og om Natten frøs det 8 à 9°.

Den 6. Sept. 1879 skjød Skovr. Wind et renhvidt Expl. paa Kalby Mark ved Næstved; det opbevares i Bg.s Sml. — Propr. Suhr, der eier en hvid Varietet, har iagttaget to lignende Individuer, det ene ved Maribo 1870, det andet ved Binnitzegaard i samme Egn 1871. En hvidlig Varietet indsendtes i Sept. 1893 fra Gilleleie til Zool. Mus. — En hvidgul Varietet (Hun) skudt ved Kalø i Slutningen af August 1894 (Pirtzel). — 5. Okt. 1894 skjød Kjøbm. Larsen en smuk hvidbroget Stær ved Eistrup. Ifølge Kapt. Kalkaus Optegnelser ankom Stæren

til Helsingør.
1882—18. Febr.
1883—24. —
1884—16. Januar.
1885—13. Febr.

til Kjøbenhavn.
1887—4. Marts.
1888—14. —
1889—6. —
1890—13. —
1891—18. Febr.
1892—5. —

Nucifraga caryocatactes, (L.)**Nøddekrige.**

Bortseet fra de talrige Tilfælde, i hvilke Nøddekrigen blev bemærket eller skudt her i Landet i Efteraaret 1887 og den paafølgende Vinter, kunne følgende yderligere Oplysninger om dens Forekomst meddeles: Ved Gunderslevholm optraadte den i større Antal i Vinteren 1863. Den er skudt paa Møen 1864 og ved Maribo 1869 (Suhr). I Eggen omkring Næstved forekom den almindeligt i Vinteren 1868—69. — Fra 1870 til 1873 har den hver Vinter viist sig i Rislev Skov (N. F.). — Skudt ved Engestofte i Nov. 1879 (K.). — I Efteraaret 1885 synes et større Træk at være kommet her til Landet. Foruden de i „Bidr. t. Kundsk.“ S. 36 anførte ere for det nævnte Aars Vedkommende følgende Tilfælde komne til min Kundskab: Fodbygaard pr. Næstved (30. Sept.), Sallerupgaard pr. Vordingborg (10. Okt.), Holløse Mølle og Grevens Vænge ved Næstved (13. Okt.), Svendstrup og Sorø (Okt.) (N. F. og K.).

Blandt de talrige i Vinteren 1887—88 optrædende Individuer fandtes saavel den brednæbbede (Var. pachyrhynchus) som den smalnæbbede (Var. leptorhynchus)*). Det store Træk ved Storehedinge tilhøre næsten udelukkende den smalnæbbede Form; at den brednæbbede blev kun et enkelt Expl. skudt ved Storehedinge i hin Vinter (Arct. — Bg.).

I 1889 forekom Nøddekrigen i overordenlig stor Mængde i Nordfeldts Skove paa Møen (Møhl-Hansen, Bg.). — 13. Sept. s. A. skudt ved Gjorslev (Arct.s Sml.). — 18. Sept. s. A. ved Faxe (Arct. — Bg.). — I Vinteren

*) Formen leptorhynchus har sit Hjem i det nordlige og østlige Asien og den nordlige Del af det europæiske Rusland. Varieteten pachyrhynchus hører hjemme i Nord-Skandinavien og Mellem europas østlige Egne

1890—91 iagttoges et stort Træk over Refsnæs (Kjøbm. O. Lund Kallundborg). — I 1893 optraadte den talrig ved Tidsvilde (Skovr. N. P. Hansen, Bg.). — I Sept. 1893 Engestofte (Chr. Nielsen, Bg.). — 27. Sept. s. A. skudt ved Magleby ved Stevns (Var. leptorhynchus). — 29. Sept. en seet og en skudt ved Gjorslev. — I Begyndelsen af Okt, s. A. 20—30 Stkr. bemærkede i Nørreskov ved Frøslev; en af dem blev skudt (Arct., — W.). — 2. Okt. 1893 Gjorslev (Sch.s Sml.). — Samme Dag en Han skudt ved Lerchenborg (Pirtzel). — Samme Dag truffet flokkevis ved Allinge (Grønbech, Bg.) og skudt ved Nivaagaard (Godseier J. Hage, — Pirtzel). — 3. Okt. s. A. Lyngby (Sch.s Sml.). — 7. Okt. s. A. en Hun i Hareskov ved Ballerup (Sch.s Sml.). — 9. Okt. saae Winge Var. leptorhynchus i Bot. Have ved Kbhvn. — 12. Okt. s. A. Grubberholms Nyhave pr. Kjøge (Møhl-Hansen, Bg.). — 15. Okt. s. A. en Han skudt paa Saltholm (Overretssagfører Sinding, — Pirtzel). — 16. Okt. s. A. indsendtes Var. leptorhynchus til Zool. Mus. fra Nakskov. — 17. Okt. modtog Zool. Mus. Var. leptorhynchus fra Rudkjøbing. — 18. Okt. s. A. Eistrup (N. L.). — 20. Okt. s. A. (Var. leptorhynchus) Møens Klint (Kn. Andersen). — Okt. s. A. Skovbyhus paa Lolland (Chr. Nielsen, Bg.).

Ifølge R. Olsens iagttagelser udgjøre Møgbillerne (Aphodius) en ikke uvæsenlig Del af dens Næring om Sommeren.

Corvus corax, L.

Ravn.

I de fleste Egne af Landet er den fremdeles i stærkt Aftagende*). I Tidsvilde-Hegn har den ikke ynglet siden

*) Dette hidrører udentvivl for en væsenlig Del fra den Forfølgelse, for hvilken den uden Grund er Gjenstand fra Men-

1885 (Christiansen, Bg.). — I Næstvedegnen, hvor den tidligere ynglede i alle Skovene, træffes den nu næsten kun om Vinteren og i Træktiderne. I Kalbyris ynglede den sidste Gang i 1876, ved Broksø endnu i 1881 (N. F.).

I Modsætning hertil forekommer den endnu meget almindeligt i Kolding-Egnen, hvor Hagerup i August og September 1893 traf den i Flokke paa indtil 50 Stkr. (Bg.). — 16. og 18. Mai 1885 skjød Skovf. Mols to Ravne ved Reden i Krageskov ved Vallø, og 29. Mai 1887 skjød han to gamle og to unge Individer ved Reden i Almisseskoven i samme Egn (Møhl-Hansen). — 8. Mai 1890 fandt Faber Reden med to næsten flyvefærdige Unger i Store Grundet Skov, 9. Mai 1892 i Lerbæk Skov og i 1893 fandt han Reden sammesteds allerede d. 13. Marts med 1 Æg (23. Marts var der 6 Æg i samme Rede). — I Purrelund ved Vallø ynglede et Par i April 1892 (Møhl-Hansen). — Indtil de sidste Aar har den hvert Foraar ynglet i Lyngbyskoven ved Arresø, og i Tirsdagskoven ved Hillerød yngler den endnu hvert Aar (Møhl-Hansen). — 15. April 1894 fandt samme Meddeler dens Rede i et Bøgetræ i Christian d. Niendes Hegn i Dyrehaven ved Klampenborg. — Ynglede i 1892 i Oxholm Skov pr. Aabybro (Pirtzel). — Et Par yngler aarligt i Kyø Skov ved Nibe (Barfod). — I Restruphave fandt Barfod Reden med tre smaa Unger og tre Æg 28. Marts 1894. Efterat Æggene vare borttagne, byggede Parret en ny Rede, som d. 18. April indeholdt fem Æg. Samme Aar fandtes den, efter R. Olsens Angivelse, ynglende i Nørreskov ved Farum, Bog-næs Skov ved Roeskilde og i Grib Skov. — I en Op-

neskets Side. De mange Paastande om Ravnens Skadelighed ere ugrundede eller i høi Grad overdrevne, da den for største Delen lever af Aadsler og Affald.

gylpning under Reden i Bognæs (April 1893) fandtes hele Kraniet af en Ilder (R. Olsen).

Corvus cornix, L.

Alm. Krage (Graakrage).

Paa Gaardeier Lars Larsens Mark i Hømb paa Sjælland fandtes d. 5. Juni 1888 en Kragerede, som var bygget paa den flade Jord. Den var foret med Uld fra Faarene paa Marken og indeholdt 5 Æg. Hunnen laa paa Reden og rugede. Da der rundt om i Nærheden fandtes Træer, maa det vel antages, at Fuglen har været anskudt eller paa anden Maade forhindret i at flyve, da Redebygningen fandt Sted (Dyrlæge Larsen*).

En Graakrage, parret med en Sortkrage (*C. corone*) byggede Rede i Kalbyris ved Næstved i 1886(?) og fik Unger. Træet blev senere fældet, og lagttageren (Skovrider Vind) saa det følgende Aar flere Gange Parret i samme Skov, men fandt ikke nogen Rede (Bg.). — En ensfarvet graa Varietet skudt ved Rønnebæksholm pr. Næstved 8. Juli 1894 (Hofjægerm. Collets Sml. — Bg.).

Af Formen *corone*, L. findes 1 Expl. i Suhrs Sml., skudt 1869 i Maglemer pr. Maribo. — I Næstved Eggen er der skudt flere Explr., saaledes ved „Friheden“ 19. April 1876, i Lønnede 10. April 1886 og 3. Mai 1891 [3 Explr.] (N. F.). — 11. April 1887 skudt ved Guleskov (K.).

Corvus frugilegus, L.

Raage (Kornkrage).

I Skoven „Raaen“ ved Sørup pr. Ringsted findes en meget stor Koloni paa et ganske lille Areal. Rederne ere anbragte høit oppe i de største Træer, og i et af disse fandt Kapt. Kalkau i 1881 nitten Reder. For nogle Aar siden fik Omegnens Folk Lov til at skyde saa

*) Kfr. „Skand. Fugle“ S. 165. Anm.

mange af Raagerne de vilde, og der blev da fældet c. 600 Stkr., men Kolonien holdt sig ikke desto mindre i god Stand. En mindre Aflægger af denne Koloni har senere nedsat sig i Sørup. — I Ydernæs Lund i Næstvedegnen yngle c. 400 Par, i en lille Egeskov v. Fladsaagaard i samme Egn c. 300 Par og paa Glænø to Kolonier med tilsammen c. 800 Par (N. F.). Ifølge Iagttagelser, som ere anstillede ved de sidstnævnte Kolonier, ere Rederne udforede med Græs, Halm og vissent Løv eller (ifølge Olsen) med Bast, men aldrig med Haar eller Fjer. — Paa Møens Klint findes en Koloni paa c. 150 Par (Møhl-Hansen). Et hvidplettet Individ blev i 1888 seet ved Svenstrup pr. Nakskov (Suhr). — Saadanne Varieteter træffes hyppigt blandt de unge Fugle. I Juni 1888 fandtes der saaledes mellem c. 150 Individuer, skudte ved Ydernæs, 10 Explr. med hvid Strube, og i Jan. s. A. blev der ved Broksø skudt en ung Fugl, der havde to hvide Svingfjer i hver Vinge og hvide Fjer omkring Næbbet (N. F.)*). — En ung Han, ligeledes med 1 à 2 hvide Svingfjer i hver Vinge og hvid Strube blev i Slutningen af Mai 1891 skudt ved Kallundborg; den blev af O. Lund indsendt til Zool. Mus. Sammesteds opbevares en helt graa Kornkrage (ung Fugl) skudt 8. Aug. 1892 ved Gudhjem paa Bornholm.

Corvus monedula, L.

Allike.

D. 5. Marts 1888 blev en hvidbroget Varietet skudt ved Herlufsholm (Zool. Mus.). — I Januar 1893 modtog Pirtzel en Albino til Udstopning fra Hvedholm; Expl. findes i Grev Bille Brahes Samling. I Eistrup Kirke yngler Alliken Side om Side med Kjøbm. Larsens Duer, hvis Hanner gjøre stærkt Kur til Allikerne. Disse følge

*) Om Næbfjerenes Forsvinden se anførte Skrift S. 18.

Duerne ned i Gaarden og søge Føde sammen med dem (kfr. *Athene noctua*). — Ved Kronborg yngle Allikerne i Mængde i Hullerne paa Voldenes Beklædningsmure, i Filsofgangen ved Sorø derimod i hule Træer (K.). — R. Olsen har adskillige Gange fundet 6 Æg i dens Reder og har engang truffet Reden anlagt dybt inde i en beboet Storkerede. (Bg.)

***Pica caudata*, Flem.**

Skade.

I Assens-Egnen, hvor Skaden ellers er sjælden, forekommer den hyppigt i Præstegaardsskoven ved Gamtofte (Pastor P. A. Holm). — I Omegnen af Ringkjøbing findes den ikke (Hagerup, Bg.). — En hvid Varietet skudt 16. Nov. 1869 ved Vindebæk paa Møen (P. — Bg.). — Det er muligvis det samme Expl., som opbevares i Propr. Suhrs Sml., og som i Følge hans Angivelse er skudt paa Møen 1870. — I Samlingen paa Aalholm findes ligeledes et renhvidt Expl. (Bg.), muligvis det samme, som Hr. Suhr angiver at have truffet ved Aalholm i 1866. — Paa Falster saae samme Meddeler en Albino-Varietet i 1872.

I Arctanders Samling findes et Expl. med smudsig-hvid Krop og Hale og lyst chokoladefarvet Hals og Bryst. Det blev skudt ved Holtug pr. Storehedinge i Begyndelsen af 1888. I de to foregaaende Aar havde det været parret med en Skade af almindeligt Udseende, og begge Gange havde to af de fire Unger samme Farvetegning som ovennævnte Individ. De to af første Kuld bleve skudte som voxne og findes i Baagøes og Valentiners Samlinger; de to af sidste Kuld bleve som smaa tagne af Reden til Opdrætning, men døde.

I Zool. Mus. findes en brunlig Varietet, skudt i

Januar 1893 ved Veflinge paa Fyen. Pastor Barfod fandt Reden med ni Æg i Restrup Have 21. April 1890.

Paa Møen kaldes den „Heister“ (Møhl-Hansen).

Garrulus glandarius, (L.)

Skovskade.

Ifølge „Thisted Avis“ fandtes Skovskaden i 1889 allerede d. 22. Marts ynglende i Tvorup-Plantage. Ungerne, som laa døde i Reden, vare temmelig udviklede, saa Æglægningen maa have fundet Sted senest lige i Maanedens Begyndelse.

I Efteraaret 1893 forekom den i usædvanlig Mængde, i Flokke paa c. 70 Stkr., i Egnen omkring Ringsted (Bock, — Bg.) — Barfod fandt Reden med 8 Æg i Røddet 19. Mai 1894.

Ampelis garrulus, (L.)

Silkehale.

I Egnen ved Helsingør, hvor den — ligesom næsten overalt paa Øerne — træffes saa godt som hver Vinter, forbliver den ofte til ind i April (K.).

Caprimulgus Europæus, L.

Natravn.

I Næstvedegnen forekommer den talrig paa Trækket i Mai og September. I Maven paa en Han fra „Friheden“ ved Næstved (sk. 12. Mai 1890) fandtes 4 Oldenborrer, 4 Skarnbasser, 4 store Natsværmere samt en Del mindre Natsommerfugle o. a. Insekter (N. F.).

D. 8. Juni 1890 ved Middagstid fløi en Natravn ombord paa en engelsk Damper ved Skagen og blev fanget; Expl. blev indsendt til Zool. Mus., hvor der

ogsaa findes et Expl., som den 26. Mai 1892 blev skudt paa Kobbergrundens Fyrskib.

I 1893 saaes den i talløs Mængde i Klitterne ved Svinkløv Klitplantage (Christiansen, Bg.). — I Tidsvilde Hegn er den meget hyppig (Møhl-Hansen). — I Molbjerg Mose ved Nibe fandtes den ynglende 31. Mai 1894; to friske Æg (Barfod). — Paa flere af Hedebakkerne ved Silkeborgs Skove yngler den i ikke ringe Antal (Stud. I. C. E. Christiansen).

Cypselus apus, (L.)

Murseiler.

Ankom til Kjøbenhavn	til Helsingør (K.)
1888—15. Mai (Ordrup)	1884— 6. Mai.
1890—19. —	til Næstved (Sch.)
1891—19. —	
1892—21. —	
	1888—12. Mai.

I Juli 1893 fandt Pastor Barfod den ynglende i en Svalerede (*H. rustica*) paa en Villa ved Strandveien ved Kbhvn. — Winge saae den i 1889 flyve over Kbhvn. endnu d. 12. Okt., skjøndt den pleier at forlade os sidst i August eller først i Sept.

Hirundo rustica, L.

Landsvale (Forstuesvale).

En Albino-Varietet skudt i Ringkjøbing 20. Aug. 1886 af Kjøbm. Rosenvinge (Dyrl. F. Larsen). — En lignende Varietet, som dog havde et let graabrunt Anstrøg paa de Steder, hvor Fuglen ellers er sort, blev skudt 16. Okt. 1886 i Hardenberg Park af Grev Haugwitz-Hardenberg-Reventlow (K.). — En Albino skudt 17. Juli 1890 ved Laven Station (Stud. I. C. E. Christi-

ansen. Brev til Zool. Mus.). — I Herlufsholms Samling findes en renhvid Varietet (Han), skudt 4. Okt. 1890 ved Herlufsholm af Skovrider Wind (Pirtzel). Samme-
steds opholdt et næsten hvidt Expl. sig i Sommeren 1886 (N. F.). Ifølge Meddelelse fra Pirtzel er en Albino (Hun) skudt ved Bregentved 26. Sept. 1893 (Baron H. Rosenkrantz). I Okt. 1890 modtog Zool. Mus. en Albino fra Æbeltoft.

Paa Enø blev der den 3. Juni 1888 fundet en Rede med 7 Æg. (N. F.).

Ifølge Kalkaus Optegnelser ankom den til

Kjøbenhavn	til Helsingør (K.)
1881— 2. Mai (afreist 29. Sept.)	1883—29. April
1882—25. April	1884— 1. Mai
1886—29. —	1885—25. April
1887—29. —	til Næstved (N. F.)
1888—18. — (saaes endnu 21. Okt.)	1888—22. April
1889— 1. Mai	1891— 4. Mai
1890— 6. —	
1891—28. April (afreist 20. Okt.)	
1892—10. Mai.	

Hirundo urbica, L.

Bysvale.

Ankom til Kjøbenhavn (ifølge K.)

1889— 6. Mai
1890— 8. —
1891— 5. —
1892—14. —

til Næstved (N. F.)

1888— 3. Mai
1890—28. April.

Stud. I. C. E. Christiansen saae endnu d. 4. Okt. 1891 et Kuld Unger blive madet af de Gamle i Istedgade i Kbhvn.

Hirundo riparia, L.

Digesvale.

Et renhvidt Expl. seet i Sommeren 1890 ved Banelien v. Næstved (Wind, — Bg.).

Hydrobata cinclus, (L.)

Vandstær.

En Han, skudt ved Vemmetofte 15. Marts 1882, findes i K.s Sml. — 25. Okt. 1886 fløi to Individer af Varieteten melanogaster mod Anholt Fyr (Jagtt. K.). — I Dec. 1886 skudt ved Esrom Mølleaa (K.) — I Nov. og Dec. 1887 gjentagne Gange bemærket ved Sorø Sø (Adj. Zoffmann). — 19. Okt. 1889 Hesselø Fyr (Zool. Mus.). — 31. Dec. 1890 skudt i Ring ved Randers (Faber) — 1. April 1891 Anholt Knob (Zool. Mus.) — 2 Stkr. 14. Okt. 1894 Schultz's Grund (Zool. Mus.) — I Eistrup-Egnen opholder den sig hver Vinter ved Vandløbene. Kjøbm. N. Larsen har i de sidste 14 Aar erholdt 10 à 12 Stkr. derfra. — I F. Suhrs Sml. findes et Expl. fra Møen. — 1. Januar 1891 en Han skudt ved Aarhus (Høgh-Guldberg, — Pirtzel). 6. Dec. s. A. en Han skudt ved Herlufsholm (Pirtzel). Den træffes næsten hver Vinter ved Hømb Mølleaa ved Ringsted (K.). — Skudt i Aarhus-Egnen 27. Okt. 1894 (Pirtzel). — Ved Farum 10. Febr. 1895 (Hørring jun.). — I Næstved-egnen er den almindelig om Vinteren og træffes ved alle Vandløbene der. I Raadmandshaven ved Næstved saaes den i 1889 sidste Gang d. 17. Marts, i 1890 d. 12. Marts (N. F.). — Ved Aaen, der løber gennem Frederiksværk, træffes den ikke saa sjældent (Møhl-Han-

sen.). — 14. Nov. 1892. Gisselfeldt (Pirtzel). — 14. Marts 1895, Han og Hun skudte ved Bjergsted pr. Jyderup (Lehnsgr. Lerche. — Pirtzel).

Muscicapa atricapilla, L.

Broget Fluesnapper.

I Næstvedegnen, hvor den forekommer særdeles hyppigt og ikke sjældent yngler, blev dens Rede funden 2 Gange med 7 Æg (i Raadmandshaven 1890) (N. F.). Om et ret interessant Tilfælde, i hvilket en Musvit bemægtigede sig en Fluesnappers Rede, ombyggede denne og lagde sine Æg i den samtidigt med, at Fluesnapperen selv fortsatte Æglægningen, indtil den omsider fortrak, berettes udførligt i N. F. — Angivelsen i „Bidr. t. Kundsk.“ S. 47 om, at den fandtes ynglende 3. Mai 1887, maa, ifølge senere Meddelelse, rettes til 3. Juni.

Den ankom — ifølge Kalkaus Optegnelser
til Helsingør

1884—7. Mai (Han). 11. Mai (Hun).

1885—2. — (Han). 5. — (Hun).

til Næstved ankom den ifølge N. F.

1888—29. April

1889—30. —

1890— 5. Mai

1891— 1. —

Muscicapa collaris, Bechst.

Hvidhalset Fluesnapper.

I Januar 1862 skudt ved Stege (P.). Expl. opbevares i Ladhoffs Sml. i Vordingborg (Bg.). — 20. April 1890 Stege (Sophiendals Sml. Bg.). — 20. Mai 1891 skudt

sammesteds (P.) — 17. Mai 1892 en Han skudt i Gjest-giver Pultz's Have i Ribe (Zool. Mus.).

Muscicapa grisola, L.

Graa Fluesnapper.

Denne saa godt som overalt her i Landet almindelige Art var indtil 1889 kun nogle enkelte Gange bemærket i Næstvedegnen. Siden den Tid er den bleven mere og mere almindelig der og yngler nu mange Steder i Egnen (N. F.).

Muscicapa parva, Bechst.

Lille Fluesnapper.

Det i „Skand. Fugle“ S. 204 omtalte Expl. fra Almindingen (Juni 1858) er indlemmet i Baagøes Samling. — I Zool. Mus. findes et Expl. (Han i Efteraarsdragt), faldet ved Anholt Fyr 10. Okt. 1888.

Lanius excubitor, L.

Stor Tornskade.

I Univ. Zool. Mus. findes bl. a. Exemplarer under Benævnelsen *Var. major Pall.**) en Han, skudt 23. Jan. 1874 i Lerchenborg Have, en Hun, skudt 8. April 1875 ved Katballegaard pr. Viborg og en Hun, skudt 8. Okt. 1880 ved Holte.

I Uldum-Egnen (Veile) synes den i de senere Aar at blive almindeligere. Hr. K. Kristensen (Hesselballe)

*) Udtørlige Oplysninger om denne Forms Forhold til den typiske excubitor findes i Rob. Colletts Afhandling: „Om Lanius excubitor og dens forskjellige Formers Optraeden i Norge“ (Arch. f. Mathematik og Naturv. 16. Bd 1893. S. 50—64.)

traf den for en halv Snes Aar siden — ifølge Brev til Prof. Lütken — i et Krat der paa Egnen midt i Ruge-tiden.

Kapt. Kalkau, som har havt temmelig rig Leilighed til at iagttage denne Fugl i Naturen, har meddelt mig, at den ingenglunde er sjelden i Helsingørs Omegn, og at han i Okt. og Nov. saa godt som aldrig har færdedes der i Egnen uden at træffe et eller flere Exemplarer. En enkelt Gang har han truffet den der i Juni Maaned (ved Borupgaard). I Løbet af faa Aar (i 1880 og fra Juli 1882 til Foraaret 1885) skjød han fem Explr., dels paa Grønnehave udenfor Helsingør, dels paa det til Exerцерplads benyttede (c. 50 Tdr. Land store) Areal ved Teglstruphegn. Af disse henfører han de to til Varieteten *major*, nemlig en gl. Hun (skudt 3. Nov. 1880) og en Han (skudt 8. Nov. 1882); de tre andre, som alle tilhørte den typiske Form, vare Hanner.

I Dec. 1880 skudt ved Esrom Mølle; Expl. eies af Kapt. Smith (K.). — April 1881 en Han skudt i Grib Skov (K.). — Sammesteds blev et dødt Expl. fundet i Vinteren 1882 (K.). — Ifølge N. F. er den skudt 8. Nov. 1881 ved Karrebæk, i 1883 tre Explr. ved Bregentved (Gr. Moltkes Sml.), 31. Okt. 1885 ved Holsteinsminde, i Juli 1886 ved Næstved, i 1887 ved Hammer-Enghave, i Okt. s. A. ved Gaunø og d. 17. Okt. 1889 en Hun af Varieteten *major* ved Grimstrup. — Ved Storehedinge skudt 30. Marts og 26. April 1888 og seet 6. Dec. s. A. (Arct.). — I Jagtt. angives den bl. a. St. at være skudt 3. Nov. 1886 ved Svenstrup*), 24. Nov. s. A. i en af Skovene under 6. Kronborgske Skovdistrikt og i Jan. 1889 ved Jyderup. — 21. Okt. 1889 skudt ved Rønne (Knoklerne opbevares i Zool. Mus.). — Sammesteds findes et Expl., skudt ved Søvertorp pr. Rudkjøbing i

*) I Propr. Suhrs Sml. findes et Expl. fra denne Lokalitet (mulig vis ovennævnte).

Dec. 1889. Fuglen vides ikke at være seet tidligere paa Langeland. — 7. Febr. 1890 skudt i Nærheden af Kbhvn. (Helms, Bg.). — 27. Marts 1890 en Han ved Vordingborg (Bg.) og 27. Dec. 1891 i Dyrehaven ved Kbhvn. (Helms, Bg.). — Ifølge Baagøes Meddelelse skydes den hvert Aar ved Herlufsholm. — 18. Febr. 1891 Store Grundet Mark ved Veile (Faber). — 25. Marts 1891 en Han skudt ved Frydendal pr. Mørkøv (Kropskelettet i Zool. Mus.). — 4. Okt. 1891 saae Møhl-Hansen to Individer paa Høie Møen, og 13. Okt. s. A. erholdt han et Expl., der var skudt paa Klinten. — I Efteraaret 1891 og i Begyndelsen af Vinteren 18⁹¹/₉₂ forekom den hyppigt i Egnen ved Eistrup, hvor N. Larsen skjød den d. 22. Jan. 1892. — 6. Febr. 1892 skudt ved Engesholm pr. Veile (Faber). — Konservator Sørensen i Horsens havde samme Vinter nogle og tyve Stkr. til Udstopning (N. L.). — Under en Snestorm d. 20. Jan. 1891 saae Hr. Larsen to Individer af denne Art i sin Gaard, hvorfra de dog hurtigt forsvandt, den ene forfølgende en Spurv. — 1 Januar 1893 saae Student Christiansen den flere Gange i Jægersborg Dyrehave. — Forstelev G. Kauslund traf den d. 3. April 1893 i Gunnerup Kohave og 12. Okt. s. A. (2 Explr.) i Almissevænget. — Møhl-Hansen saae den samme Dag i Tibirke Mose i Nordsjælland. — 25. Marts 1892 en Hun skudt ved Løvenborg (Bg.). — 16. Okt. 1892 iagttaget paa Amager Fælled (Bg.). — 1 Febr. 1895 skudt ved Lerchenborg (Han). Expl. sendtes til Stud. med. J. Collin.

Ved Vemmetofte forekommer den, ifølge Skovr. Müffelmanns Angivelse, ikke sjældent.

Lanius collurio, L.

Alm. Tornskade.

Bemærkningen i „Skand. Fugle“ S. 211 om, at Arten er sjelden i Ringstedegnen, maa udgaa. Efter

Kapt. Kalkaus Meddelelse forekommer den, i alt Fald nu, ingenlunde ualmindeligt der i Egnen. — I de senere Aar er den ogsaa fundet ynglende tæt ved Ringsted (O. M. Bock, Bg.).

Justitsr. Juel har for mange Aar siden truffet den i et af Lystanlæggene ved Aalborg i Færd med at udhakke Brystet paa en Tornirisk, som den havde spiddet paa to Torne af en Slaaenbusk.

Møhl- Hansen iagttog i nogen Tid, at et Par, som havde Rede i Klintholm Allé paa Møen, daglig spiddede Unger af *Emberiza citrinella* og *Sylvia cinerea* paa en Tjørn, der stod lige over for deres Rede paa den anden Side af Veien. Nogle Drenge tog da Tornskadeungerne og spiddede dem paa samme Tjørn; kort efter indfandt Forældrene sig og aad deres egne Unger.

Denne Fugls Evne til at efterligne andre Fugles Stemmer er meget stærkt udviklet. Møhl-Hansen har hørt den gjengive Rørsangerens, Stillidsens, Svalens, Vibens og Allikens Stemmer ganske skuffende.

Ankom til *Næstved* (N. F.)

1890 — 8. Mai.

1891 — 10. —

***Lanius rufus*, Briss.**

Rødhovedet Tornskade.

I Baagøes Samling er opstillet et Expl., skudt i Bregningegaards Have ved Svebølle d. 27. Marts 1877.

***Turdus viscivorus*, L.**

Misteldrossel.

I August 1888 saae Helms Flokke paa indtil 40 Individuer i Vaar Skov ved Løgstør (Bg.). — Faber fandt den fast rugende paa tre Æg i Store Grundet Skov d. 25. April 1893. I Silkeborg Skovene, hvor den er almindelig, træffes den ikke sjældent ynglende (Stud. I. C. E. Christiansen).

Turdus fuscatus, Pall.

Brundrossel*).

Af denne for den danske Fauna nye Art blev en ung Han fanget ved Hvidkilde pr. Svendborg d. 14. Okt. 1888 og indsendt af Baron Rosenørn-Lehn til Univ. zool. Museum.

Denne Drossel, som kun enkelte Gange er bemærket i Europa, hører hjemme i det nordlige Asien.

Turdus torquatus, L.

Ringdrossel.

I Eistrup-Egnen er denne den almindeligste Drossel i Træktiden (N. L.).

Turdus merula, L.

Solsort. Sortdrossel.

Et Par, som bestandigt opholder sig i Pastor Barfods Have i Sønderholm ved Nibe, ynglede i 1894 tre Gange: 29. April indeholdt Reden 4 Æg, hvoraf de 3 udrugedes; Ungerne forlode Reden i Slutningen af Mai. 9. Juni fandtes 6 Æg i Reden, og Ungerne forlode denne d. 23. s. M. 4. Juli indeholdt Reden paany 5 Æg.

Turdus pilaris, L.

Sjagger (Kramsfugl).

I Slutningen af Januar 1893 indfandt en umaadelig Masse Sjaggere sig i Selskab med enkelte Vindrosler ved

*) Jeg har ikke kunnet finde noget bedre dansk Navn for denne Art. Den udmærker sig ikke ved noget som helst særligt iøjnefaldende Kjendetegn, og Benævnelsen „Brundrossel“ har ialtfald det Fortrin for saa mange andre saakaldte danske Navne, at det er kort og ikke vildledende.

Eistrup, hvor Arten ellers træffes temmelig sjældent. I omtrent 1 Mils Udstrækning til alle Sider vare Markerne som oversaaede med dem. Skarerne ankom d. 27. og forbleve der kun til d. 31. Ved deres Ankomst fortrak de store Sværme af *Plectrophanes nivalis* og *Otocoris alpestris*, som havde opholdt sig der fra Maanedens Begyndelse (N. L.).

Motacilla alba, L.

Hvid Vipstjert.

Ankom til Helsingør (K.).

1883 — 2. April

1884 — 2. —

1885 — 3. —

Var. Yarellii, Gould.

D. 20. Jan. 1885 blev en Han skudt ved Ribe (Hjeronimus, Bg.). — I zool. Mus. er opstillet et Expl. (ifølge Angivelse fra Bjerrum: en Han), skudt 30. Mai 1891 ved Egebæk pr. Ribe af Gartner Pultz.

Motacilla sulphurea, Bechst.

Graa Vipstjert (Bjergvipstjert).

D. 13. Nov. 1878 iagttog Brødrene Oluf og H. Winge en Han (?) i Vinterdragt paa Strandkysten tæt Nord f. Kbhvn. (Winge: Aarsber. f. 1890 S. 131). — I Mai 1887 blev en Han iagttaget paa Næstved Bymark (N. F.). — I April 1892 paa Hospitals-Engen v. Ribe (Bjerrum, Bg.).

Motacilla flava, L.

Gul Vipstjert.

Ankom (ifølge K.s Optegnelser)

til Roskilde 1882—4. April

til Helsingør . . 1884— 2. Mai
 - Kjøbenhavn 1888—29 April.

Paa Enø kaldes den „Guldfugl“ (N. F.) (kfr. „Bidr. t. Kundsk.“ S. 63).

Var. borealis, Sundev.

Fra Kjøbm. Larsen har jeg modtaget Meddelelse om, at han atter d. 18. Mai 1889 har skudt denne Varietet paa sin Eiendom i Eistrup. Denne Gang skjød han 3 Hanner og 1 Hun ud af en Flok paa 12 à 14 Stkr.

Anthus obscurus, (Lath.)

Skjærpiber.

En Han, skudt ved Fredericia 23. Marts 1867, findes i K.s Sml. — Abbednæs ved Næstved 12. April 1879 (Bg.s Sml.). — Skagens Fyrtaarn 1. og 2. Okt. 1886. — Anholt Fyr 25. Okt. 1886. — Ved Rødvig blev en Han skudt 9. Januar 1887 af Bundtmager Græser i Storehedinge (Arct.s Sml. Bg.). — 24. Okt. 1888 Læsø Rende (Zool. Mus.). — 11. Januar 1892 traf Faber den paa søndre Mole ved Veile Havn. — 6. Juni 1893 skudt paa Deget ved Frederikshavn (Stud. mag. E. Bay. — Zool. Mus.). 14. Okt. s. A. tre Stkr. fra Horns Rev (Zool. Mus.).

Anthus pratensis, (L.)

Engpiber.

Ifølge K.s Meddelelse ankom den
 til Helsingør

1882—26. Febr.

1883—26. Marts

1884—14. —

Barfod meddeler, at denne Art i hans Egn kaldes „Graaspurv“, „Kjærgraaspurv“, „Vandfugl“ og „Graairisk“.

Saxicola oenanthe, (L.)

Graa Digesmutte.

Pastor Barfod har iagttaget, at den undertiden benytter fjorgamle Digesvalehuller til Ynglested.

En Albino blev skudt 5. Aug. 1890 ved Viborg af Dr. Hallager (Stud. I. C. E. Christiansen).

Saxicola rubicola, (L.)

Sortstrubet Digesmutte.

D. 11. Febr. 1889 blev en gl. Han i Vinterdragt fundet død i Sneen ved Ribe og af nogle Elever i Borger-skolen bragt til Bjerrum. Exemplaret blev indlemmet i den nævnte Skoles Fuglesamling. Senere er det erhvervet af Zool. Mus. Arten viser sig — ifølge Bjerrum — næsten hvert Aar der i Egnen.

Saxicola rubetra, (L.)

Brunstrubet Digesmutte.

Ankom til Helsingør (K.)

1883—13. April

1884—11. Mai

1885— 8. -

til Næstved (N. F.)

1888— 2. -

1890— 3. -

Sylvia trochilus, (L.)

Løvsanger.

Af denne lille Sanger, der ellers altid forlader os i Slutningen af September, blev et Expl. skudt i Giese-

gaards Have (ved Ringsted) d. 9. Dec. 1888 og indsendt frisk til Zool. Mus. for at udstoppes (W.).

Sylvia rufa, Lath.

Gransanger.

30. Sept. 1886 fløi 4 Stkr. mod Hanstholm Fyr
 — — — - 4 — — Anholt Fyr
 2. Okt. — - 1 — — Fyrskibet p. Schultz's
 Grund
 20. — — - 1 — — — i Læsø Rende.

D. 17. Mai 1888 blev et Expl. iagttaget paa Rønnebæksbakkerne ved Næstved (N. F.). — 11. Okt. s. A. Ramløse Præstegaardsskov ved Helsingø (Møhl-Hansen). Træffes hvert Aar paa Trækket, navnlig om Efteraaret. Fra de senere Aar skal saaledes anføres, at Zool. Mus. i 1891 modtog et Expl. fra Læsø-Trindel (faldet 29. Sept.), et fra Fyrskibet paa Schultz's Grund (faldet 6. Okt.), og et fra Skjoldnæs (13. Okt.). I 1892 fra Hesselø (29. April), fra Gjedser Rev (24. Sept.), i 1893 fra Schultz's Grund (8. Okt.), fra Hirtshals (9. Okt.) og fra Refsnæs (10. Okt.), i 1894 fra Seirø (26. April), Skagen (30. Sept.), Lodbjerg (6. Okt.) og Hjelm (9. Okt.).

A. Hagerup fandt dens Rede i Slutningen af Mai 1893 tæt ved Kolding. Den 8. Juni forlode Ungerne Reden. Denne og en af Ungerne findes nu i Zool. Mus. Saavidt vides er dette det eneste hidtil bekjendte Tilfælde, i hvilket Gransangeren er fundet ynglende her i Landet.

7. Okt. 1895 skjød Skovrider Christiansen et Expl. ved Kongshus pr. Silkeborg (Stud. J. C. E. Christiansen).

Sylvia turdoides, Mey.

Drosselsanger.

I Næstvedegnen opholdt den sig i Begyndelsen af Firserne hele Sommeren ved Susaaen og maa antages

at have ynglet der. Ligeledes i 1877, da to Explr. bleve skudte i Nærheden af Næstved 20. Juni, endvidere i 1879 og i 1887, da den hørtes syngende ved Abbednæs d. 6. Juni (N. F.).

***Sylvia aquatica*, (L.)**

Vandsanger.

Faldet ved Hammershus Fyr den 5. Aug. 1888 (Han?) og 2. Okt. 1889 (Zool. Mus.). — Ved Gjedser Rev 8. Okt. 1894 (Zool. Mus.).

***Sylvia locustella*, Penn.**

Busksanger.

D. 10. Okt. 1893 faldet ved Lodbjerg Fyr og indsendt til Zool. Mus.

***Sylvia nævia*, Bodd.**

[*Locustella nævia*]

Græshoppesanger.

En ung Fugl af denne hidtil ikke i Danmark trufne Art faldt ved Lodbjerg Fyr d. 10. Okt. 1893.

[Fra 1883 synes den at have bosat sig i det sydligste Norge. Collett, — W.].

***Luscinia phoenicurus*, (L.)**

Rødstjert.

Ligesom Herschend (kfr. „Bidr. t. Kundsk.“ S. 55) har Kapt. Kalkau gjort den iagttagelse, at Rødstjerten færdes meget i Selskab med *Musc. atricapilla*, især i Begyndelsen af Træktiden, da den næsten altid træffes sammen med denne Art.

Ifølge K. ankom den til Helsingør
 1884—30. April (Han). 11. Mai (Hun).
 1885—26. — (Han).
 til Kjøbenhavns Omegn
 1888—30. April (Han).
 Ved Næstved saaes den første Gang (N. F.)
 1889—25. April
 1890— 3. Juni
 1891— 2. --

Luscinia tithys, (Scop.)

Sortbrystet Sanger.

Den 25. Juni 1881 saae O. og H. Winge Han og Hun paa Koldinghus Ruiner, hvor de efter Alt at dømme havde Rede.

I Begyndelsen af April 1884 blev et halvdødt Individ fundet i en Have ved Fredericia. Det opbevares nu i Zool. Mus. — Ved Allinge blev den i 1886 iagttaget i Dagene fra d. 15. til d. 17. Juni af Alexand. v. Homeyer (Hagerup).

Et Expl. fra Ribe Mark, skudt 4. Sept. 1887 (Bjerrum), fandtes i C. Reitzels Sml. — I Zool. Mus. findes en smuk Han, skudt ved Ribe 14. April 1891. — I Mai 1893 opholdt et Par sig ved Uglehuset i zool. Have (Hofman-Bang). — I Mai 1894 paany skudt ved Ribe (Bjerrum, Bg.), hvor flere Par, ifølge Bjerrum, yngle hvert Aar, og hvorfra Hagerup har modtaget dens Æg (Bg.).

Luscinia vera, Sundew.

Sydlig Nattergal.

Efter 1888 er den helt forsvundet fra Egnen ved Storehedinge, hvor den tidligere efter Arctanders Angivelse („Bidr. t. Kundsk.“ S. 55) yngede almindeligt, ligesom

L. Philomela, der ligeledes er taget stærkt af i Antal i de senere Aar (Arct., Bg.).

Det er vel overhovedet tvivlsomt, om de Angivelser, der hidtil foreligge om denne Arts Forekomst i Danmark, kunne betragtes som paalidelige.

Luscinia Philomela, (Bechst.)

Alm. Nattergal.

Ved Næstved hørtes den (ifølge N. F.) første Gang

1888—8. Mai

1890—1. —

1891—6. —

Erithacus Suecicus, (L.)

Blaahals.

I Juni 1859 bleve tre Explr. skudte ved Batteriet ved Flensborg (P. — Bg.). — Propr. Suhr iagttog den ved Svenstrup 19. Mai 1880. — I Arct.s Sml. findes en Han med gul Strubeplet fra Stevns Fyr 18. Mai 1881 [kfr. „Bidr. t. Kundsk.“ S. 57 (m. Anm.)]. — Fra Bjerrum erholdt C. Reitzel et ungt Individ med meget svag brun Strubeplet, skudt paa Ribe Mark 22. Sept. 1887. — Skudt 17. Mai 1889 ved Kousted pr. Randers (Konservator Thuesen, Bg.). — Sept. 1890 Hun ved Vester Skjerlinge paa Fyen (Sch.s Sml.). — N. Larsen i Eistrup fangede d. 21. og d. 25. Mai 1891 to smukke Hanner i sin Have, den ene med bleggrød Strubeplet og lysbrunt Underbryst. — 23. Mai 1891 en Hun ved Brøndshøj pr. Kbhvn. (Kn. Andersen). — 26. Sept. 1891 skjød Hr. A. Hechmann en Han med blaa Strubeplet ved Kallebodstrand i Nærheden af Frederiksholms Teglværk (Br. t. Prof. Lütken). — Samme Aar(?) blev et Expl. med rustrød Strubeplet skudt ved Ussinggaard pr. Hor-

sens (K. Kristensen, Hesselballe). — 15. Mai 1892 ved Brøndshøi, 3 Hanner (K. A.). — 24. Sept. 1892 ung Han faldet ved Gjedser Fyr (Zool. Mus.). — I Mai 1893 fløiet mod en Telegraftraad ved Aalbæk S. f. Skagen (Sch.s Sml.). — 13. Mai s. A. Schultz's Grunds Fyrskib, gl. Han med rød Strubeplet og med Blaat over Næbbet foran Øiet (Zool. Mus.). — Samme Dag 2 gl. Hanner fra Hesselø Fyr. Den ene havde rød og hvid Strubeplet og lidt Blaat over Næbbet, den anden rød Strubeplet og intet Blaat over Næbbet. Begge Explr. opbevares i Zool. Mus., det første udstoppet, det andet i Spiritus. — I Efteraaret 1893 sk. paa en Kartoffelmark ved Valby (Hechmann, Bg.).

Troglodytes parvulus, Koch.

Gjærdesmutte.

Af et Brev fra Stud. J. C. E. Christiansen til Bg. anføres:

„I December 1890, da det frøs stærkt, samledes 7—10 Stkr. om Aftenen ved Krathuset (Viborg), hvorpaa hele Skaren stuede sig sammen for Natten i en gammel Vipstjert-Rede, der var anbragt i et Espaliertræ paa Stuehuset — formodentlig for at holde hverandre varme. — Ved Thor Sø ved Silkeborg fandt jeg i Juni 1892 flere Reder, af hvilke dog ingen havde tjent som Rugeplads, da de vare meget tynde og ikke udforede med Fjer. Ikke destomindre foer der dog et Par Gange en Skare halvvoxne Unger ud af Rederne, da jeg rørte ved disse. Det faldt mig ved denne Leilighed ind, om ikke de tynde og ufuldstændige Troglodytes-Reder, man saa tidt finder, ere bestemte til at være et Tilflugtssted for de halvvoxne Unger, saa længe som disse, selv om de kunne flytte sig fra Sted til andet, dog muligvis endnu trænge til at have let tilgængelige Skjulesteder.“

Parus major, L.

Musvit.

Som Exempler, paa hvor lidet nøieregnende Musvitten er med Hensyn til Valget af Redeplads, kan anføres (efter N. F.), at den paa Enø byggede Rede i et tomt Øltræ, som havde henligget nogen Tid i en Gaard, at den paa Næstved Station i flere Aar ynglede i en hul Lygtepæl, og at den i Ydernæslunden udbedrede og benyttede en gammel Rede, (der formentlig havde tilhørt en Grønirisk), som var bygget frit mellem Grenene paa et lille Grantræ kun 2 Alen over Jorden. — 24. Mai 1890 blev der i et tomt Bistade ved Rindsholm fundet en Musvitrede, der maalte $10\frac{1}{2}$ " i Diameter (c. 33" i Omkreds), men kun 3" i Høide (Stud. J. C. E. Christian- sen). — I Uldum-Eggen ved Veile kaldes den „Kjød- fugl“ (K. Kristensen [Hesselballe]).

Parus ater, L.

Sortmeise.

I de senere Aar synes den at forekomme langt almindeligere her i Landet end tidligere. I Næstved-Eggen er den fundet ynglende i Hovedmoseskoven og i Kalbyrisskov (N. F.).

Saavidt mig bekjendt vides den endnu ikke at være bemærket i Thy eller paa Mors.

I Skovene ved Helsingør er den meget almindelig om Efteraaret og om Vinteren; den træffes da i Regelen sammen med Fuglekonger, og hyppigt vil man i Nærheden af dette Selskab træffe den store Tornskade, som vistnok forsyner sig rigeligt med Bytte blandt disse Smaafugle. Enkelte Par træffes nu og da om Sommeren (K.). — Den 8. August 1890 blev Reden med 5 smaa Unger fundet i en Meisekasse i Viborg Plan-

tage (Stud. J. C. E. Christiansen). — Møhl-Hansen fandt dens Rede med ni nys udklækkede Unger i et Stengjærde ved Liselund 4. Mai 1894.

Parus cristatus, L.

Topmeise.

D. 30. Okt. 1890 skudt ved Kolding (Bruun). Expl. er opstillet i Hr. Høsts Sml. i Kolding (Bg.). — 1. Nov. 1893 saaes tre Stkr. i Zool. Have (Hofman-Bang).

Stud. J. C. E. Christiansen iagttog d. 16. Juli 1895 fire Individer i Silkeborg Vesterskov. De færdedes i kun faa Skridts Afstand fra ham, og efterat han i sit Hjem havde hentet en Bøsse, lykkedes det ham at gjenfinde dem ved Hjælp af deres eiendommelige Skrig, der minder om Halemeisens snerrede Lyd men har en høiere og renere Klang. Han skjød den ene af dem. Dette Exempler er undersøgt af Bg. og af ham erkjendt som en ung Fugl fra iaar. D. 30. Juli traf han i Nærheden af samme Sted en Flok paa ca. 20 Stkr., der i Løbet af den Times Tid, i hvilken han iagttog dem, holdt sig indenfor en Omkreds af et halvt Hundrede Alen (Brev til Bg.).

Parus caudatus, L.

Halemeise.

I 1863 fandt Kalkau dens Rede med Æg i Hol-skoven ved Rosengaard pr. Ringsted. Reden var frit hængende og befæstet til en ung Gren kun halvanden Alen over Jorden. — Samme Meddeler fandt 8. Mai 1880 Reden med 13 Æg i Teglstrup Hegn; den sad tæt op til Stammen i en Grengaffel 5 à 6 Alen over Jorden. I 1885 traf han Fuglen med Unger i samme Skov. —

8. Mai 1890 fandt Faber Reden med 11 stærkt rugede Æg i Veile Nørreskov. — I Slutningen af Mai 1891 fandt Møhl-Hansen dens Rede i et lavt Frugttræ ved Brændekilde pr. Odense; Zool. Mus. modtog i 1895 fra Kn. Andersen en Unge fra Komark Busk pr. Kolding (27. Mai).

I Næstvedegnen yngler Halemeisen hvert Aar og optræder stundom i meget stort Antal; saaledes i Vinteren 1889—90 og den paafølgende Sommer. — Undertiden er Reden anbragt i betydelig Høide, (i Raadmandshaven ved Næstved fandtes den i en Ask 45 Fod over Jorden); den er meget tyndvægget, udvendigt beklædt med Ler, indvendigt foret med en utrolig Mængde Fjer og Dun (N. F.). — Assistent R. Olsen har oftere fundet Reden i Jægersborg Dyrehave, Ermelunden, Valby- og Højbjerg Hegn pr. Helsing.

Regulus cristatus, Koch.

Gultoppet Fuglekonge.

I Granskovene N. f. Helsingør træffes den hele Sommeren (K.). — I Gyrstinge Skov ved Sorø fandt K. dens Rede i Treserne. — I Forsommeren 1890 ynglede den temmelig talrig i Viborg Pantage, hvor dens Rede kun er fundet en Gang tidligere. Den ene af Rederne var anbragt i selve Toppen af et lille Grantræ, hvis Topskud var afbrækket (Stud. I. C. E. Christiansen).

Alauda arvensis, L.

Sanglærke.

En renhvid Varietet skudt paa Bøtø (Falster) 10. Okt. 1894 af Uhrmager Smith (Bg.). — En hvid Han med røde Øine, skudt paa Mølgaard i Himmerland d.

8. Okt. 1893, findes i zool. Mus. — En Rede med 6 Æg fandtes ved Freilev Teglværk 7. Juni 1893 (Barfod). 27. Juni 1894 fandt Barfod en Rede med 3 Æg, af hvilke de to vare næsten renhvide.

Efter Meddelelse fra en anonym Brevskriver ankom den til Bornholm:

1863 — 4. Febr.	1867 — 11. Febr.
1864 — 1. Marts	1868 — 29. —
1865 — 18. Febr.	1869 — 18. —
1866 — 11. Marts	1871 — 26. —

Til Helsingør ankom den (K.)

1883 — 11. Febr.
1884 — 27. Januar.
1885 — 1. Febr.

***Alauda cristata*, L.**

Toplærke.

Den breder sig fremdeles i Jylland og forekommer næsten overalt paa Halvøen. Under forrygende Snestorm 1. Marts 1889 iagttoges et Expl. paa Næstved Station. Ellers er den kun bemærket et Par Gange i denne Egn (N. F.). — Ved Storehedinge blev en Han skudt 4. Jan. 1890 (Arct.s Sml.). — 10. Jan. 1891 iagttog Møhl-Hansen nogle Stkr., der færdedes mellem Spurveene paa Gaden i Odense (Bg.). — 28. Juni 1891 fandt Faber dens Rede med flyvefærdige Unger ved Løsning Station i Jylland (Bg.). — Barfod angiver den som ynglende hist og her i Landsbyerne i Himmerland. 14. April 1892 fandtes dens Rede med 6 Æg ved Ellidshøj pr. Aalborg (Barfod).

I Egnen omkring Helsingør er den, saavidt vides, aldrig bemærket.

***Alauda arborea*, L.**

Hedelærke.

Den er sjelden i Eistrup-Eggen, hvor N. Larsen i Løbet af en Snes Aar kun har seet den tre Gange.

Til *Helsingør*, hvor den i Træktiden meget almindeligt forekommer i store Flokke, ankom den ifølge K.

1883 — 4. Marts

1884 — 10. —

1885 — 5. —

I Næstvedegnen er den, saavidt vides, hidtil ikke bemærket.

***Otocoris alpestris*, (L.)**

Bjerglærke.

Almindelig i Eistrup-Eggen fra midt i Sept. indtil April. I Januar 1893 forekom den der i usædvanlig store Sværme, der vare stærkt medtagne af det haarde Veirig og af Mangel paa Næring (N. L.). — Under 30. Jan. 1893 skriver Sagfører N. C. Christiansen i Sæby: „Bjerglærken var for nogle Aar siden ikke ualmindelig her i Eggen fra Dec. til Mai. Nu sees den, saavidt mig bekjendt, ikke“ (Bg.). — I Propr. Suhrs Sml. findes et Expl., skudt paa Møen i 1871, og et andet fra Svenstrup, skudt 7. Novbr. 1876. — Kalkau eier en Han, skudt ved Fredericia 23. Dec. 1878, og har selv skudt en Hun ved Helsingør 29. Nov. 1884. — 5. Febr. 1886 Lillehedinge (Arct. — Bg.). — I Efteraaret 1886 Høirønnen ved Vordingborg i Flok med Snespurve (Juuel. Bg.). — 1. Marts 1886 skudt af en Flok ved Storehedinge (Græser — Bg.). — 28. Sept. 1887 Vester Lyng ved Seierø Bugt, Jylland (Faber, Bg.). — 30. Dec. 1887 blev paa Amager Fælled en skudt af en Flok paa fire Stkr. (Helms). — I Jan. 1888 fik Kalkau Fuglen fra Valby, skudt af Kpt. L. Howitz.

— 18. Jan. 1892 iagttog Møhl-Hansen en Flok paa ca. 25 Stkr. paa en Pløiemark ved Magleby paa Møen (Bg.). — Paa Gisselør ved Kallundborg og ved Saltbæk Vig træffes den hver Vinter (O. Lund).

Emberiza miliaria, L.

Kornverling, Bomlærke.

I Propr. Suhrs Sml. findes tre hvide Varieteter, skudte ved Maribo (1865), ved Binnitze (1871) og ved Svenstrup (1886). — Et Individ med renhvid Ring om Halsen skudt i Sept. 1888 ved Søgaard pr. Næstved (N. F.). — I zool. Mus. findes et næsten ganske hvidt Expl. skudt 2. Okt. 1889 ved Pillemark pr. Koldby paa Samsø. — I Nov. 1893 blev en isabellafarvet Varietet med hvid Bug og Undergump skudt i Ørslev Underskov ved Ringsted (O. Bock. — Bg.). — Hvid Varietet (Han) skudt ved Jørsby paa Mors 16. Jan. 1895 (Schiøler — Pirtzel).

Emberiza hortulana, L.

Hortulan-Verling.

Skudt i Mai 1885 mellem Røde Mølle og Nymølle ved Aarhus (K. — Sandsynligvis det samme Expl., som nævnes i „Bidr. t. Kundsk.“ S. 68). — En Han fra Ribe Mark, skudt 11. Mai 1885, blev af Bjerrum sendt til Reitzel. — I 1889 og 1890 forekom den overalt i Eistrup-Egnen, dog kun i mindre Flokke paa 3—10 Stkr.; den antages at have ynglet der, da den endnu i Juni Maaned færdedes i Krattene. I Slutningen af April og Begyndelsen af Mai 1891 viste en Del Explr. sig paany i samme Egn. I 1892 blev den ikke bemærket der, men i Foraaret 1893 indfandt den sig atter ved Eistrup (N. L.). — Hen-

imod Midten af Mai 1891 modtog zool. Mus. en i Nærheden af Nakskov skudt Hortulan fra Propr. Suhr.

Plectrophanes nivalis, (L.)

Sneverling.

I Jan. 1893 viste ualmindeligt store Flokke sig ved Eistrup. De vare saa medtagne af det haarde Veirlig, at Kjøbm. Larsens Børn fangede dem i Mængde med Hænderne og fodrede dem. — I Paaskedagene 1894 færdedes Sneverlingerne endnu i Mængde omkring paa Markerne ved Eistrup, trods det milde Veir (N. L.).

Coccothraustes vulgaris, Steph.

Kjærnebider.

I Næstved-Eggen, hvor den er ret almindelig i Kirsebærtiden, ynglede den i Mai 1883 i Raadmandshaven kun 2 Al. over Jorden; den antages forøvrigt at yngle i hele Eggen. Ogsaa om Vinteren, selv naar denne er stræng, træffes den ikke sjældent der (N. F.). — Det Samme gjælder forøvrigt om adskillige andre Egne her i Landet. — Ifølge Skovrider Winds lagttagelse forblive mange Kjærnebidere her om Vinteren, naar Avnbøgen bærer rigelig Frugt (Bg.). — I Sommerne 1892, 93 og 94 (men ikke i 1895) ynglede mindst eet Par i Silkeborg Vesterskov (I. C. E. Christiansen).

Passer domesticus, (L.)

Graaspurv.

I Suhrs Samling findes en Del hvide og hvidbrogede Varieteter samt et gult Expl., alle skudte ved Svenstrup pr. Nakskov. — En hvidbroget Varietet, skudt ved Herlufsholm 9. Aug. 1880, eies af Baagøe. — Zool. Mus.

modtog fra Hr. Viale d. 7. Nov. 1889 et isabellafarvet (lysebrunt) Skind af en Graaspurv, skudt ved Linaa i Jylland. — 22. Juli 1891 skjød Møhl-Hansen et næsten renhvidt Expl. ved Ramløse pr. Helsing. Vinger og Hale havde et svagt brunligt Anstrøg, Næb og Fødder vare hvide. Samme Meddeler har ved Brændekilde pr. Odense ofte iagttaget, at Husspurven byggede Rede i unge Graner, og at disse Reder, der vare løse og dannede af Ærtehalm, kun anvendtes til at overnatte i. Spurveene benyttede dem hele Aaret rundt.

Passer montanus, (L.)

Skovspurv.

En renhvid Varietet skudt i Glumsø 20. Dec. 1893 (Anders Petersen — Bg.). — Gjennem Bg. har jeg erholdt Meddelelse om følgende Iagttagelse af Gartner Rud. Jacobsen (Frederikseg ved Næstved): I Slutningen af April eller Begyndelsen af Mai 1894 blev Hr. J. Vidne til heftige Kampe mellem Graaspurve og Skovspurve (eller „Pilfinker“ som de — lige som i Norge — kaldes i Næstved-Eggen). Kampen gjaldt Besiddelsen af en Redeplads i et gammelt Æbletræ. Der maa have fundet en Fredslutning Sted, og denne er bleven beseglet ved en ægteskabelig Forbindelse mellem en Skovspurvehan og en Graaspurvehun. Iagttageren observerede nogen Tid efter, at begge Forældrene skiftedes til at flyve ud efter Føde til Ungerne og hjembragte Larver o. lign. Af Ungerne havde nogle Hætter som Skovspurve, dog med lidt mattere Farve, medens en eller maaske et Par af dem var mere graafarvet og ikke afveg væsenligt fra almindelige Graaspurveunger i Farvetegning.

Fringilla coelebs, L.

Bogfinke.

D. 19. Dec. 1891 fangedes en ret mærkelig Varietet i Lersøen ved Kjøbenhavn. Vingerne mindede i Farvetegning ikke lidt om Kvækerfinken, forøvrigt lignede den en almindelig Bogfinkehan. Fuglefængereren, som fangede den, erklærede, at 4 lignende Exemplarer bleve fangede samme Dag paa samme Sted. Kn. Andersen, som eier det først omtalte Individ, anser det for utvivlsomt, at det er en ægte Bogfinke og ikke en Bastardform. En lysegul Varietet skudt 21. Dec. 1891 ved Bidstrupgaard pr. Laurbjerg (Honnens de Lichtenberg — Pirtzel).

Fringilla montifringilla, L.

Kvækerfinke.

I Juni 1892 blev et Expl. i ren Sommerdragt skudt ved Ribe (Gartner Pultz's Sml. Bg.).

Acanthis linaria, (L.) [Var. alnorum, Brehm].

Langnæbet Graasidsken.

D. 29. Okt. 1893 blev en Han skudt paa Amagerfælled (Kn. Andersen).

Chlorospiza Sinica, (L.)*(Ligurinus Sinicus).*

Brunsvenske*).

I de sidste Dage af Nov. 1892 blev et Expl. (en Hun eller ung Han) fanget paa Lim af en Fuglefænger

*) Hr. Kn. Andersen har gjort mig opmærksom paa, at Navnet „Svensker“ neppe er rigtigt, og at det bør hedde „Svenske“.

paa Mariendals Jorder tæt udenfor Kjøbenhavn. Den færdedes, efter Fuglefængerens Udsagn, sammen med en Flok af den almindelige Svenske. Fuglen kom i Kn. Andersens Besiddelse og blev holdt i Fangenskab, indtil den døde i Juli 1893. Angaaende yderligere Oplysninger henvises til Kn. Andersens Afhandling „*Ligurinus sinicus* i Danmark“ (Vid. Medd. fra d. naturh. Foren. i Kbhvn. f. 1893 S. 166—172).

Efter Publikationen af Hr. Andersens Beretning dukkede der nogle Rygter op om, at Fuglen sammen med flere andre Explr. af samme Art var bleven sendt hertil fra China pr. Skib. Senere omhyggelige Undersøgelser have imidlertid fuldstændigt slaaet de derved opstaaede Tvivl til Jorden. og det tør nu betragtes som sikkert, at der her foreligger et Tilfælde, i hvilket denne østasiatiske Fugl, der hidtil aldrig er truffet i Europa, uden Indgriben fra Menneskets Side har viist sig som Gjest hos os.

***Dryospiza serinus*, (L.)**

Gulirisk.

I zool. Mus. er opstillet et Expl., som blev skudt 9. Marts 1889 i Hjørring Plantage.

Allerede Naumann har udtalt den Mening, at Navnet er dannet efter Fuglens Skrig. Da den her omhandlede Art er meget nær beslægtet med den alm. Svenske (Grønirisk), vil der neppe kunne indvendes Noget mod Navnet „Brunsvenske“, som Hr. A. foreslaar mig at kalde den. Benævnelsen „Brunirisk“ vilde ikke være heldigt af den praktiske Grund, at hos Tornirirken (*Linota cannabina*) er den brune Farve endnu mere fremtrædende.

Pinicola enucleator, (L.)

Krognæb.

I 1890 iagttoges flere store Flokke ved Gunderslevholm (N. F.). — Samme Aar bleve to Explr. (Han og Hun) skudte i Klintholmskov paa Møen (Møhl-Hansen). — 3. Okt. s. A. Rønnebæksholm (Bg.s Sml.). — 8. Okt. s. A. Faxe Ladeplads (Bruun, Bg.). — 21. Okt. s. A. blev der i Granplantagen ved Næstved fanget 4 Stkr. i Done (N. F.). — 26. Okt. s. A. en Hun skudt ved Slagslunde (Overretssagfører Ulrik, — Pirtzel), — I Slutningen af Okt. s. A. bleve 5 Hanner og 3 Hunner tagne i Doner ved Holløse Mølle (N. F.). — 24. Okt. s. A. bleve 4 Individier fangne i Doner i „Hugningen“ ved Hardenberg; det ene blev af Skovrider Bornebusch indsendt til zool. Mus. — 25. Okt. s. A. modtog Museet fra Hofjægermester Al. Brun en Han og en Hun, fangne ved Humlebæk, hvor der i Alt var fanget 2 Hanner og 5 Hunner (eller unge Fugle). — 30. Okt. s. A. gl. Han ved Renge pr. Storehedinge (Arct.s Sml.). — 3. Nov. s. A. Rødvig (Chr. Olsen, Bg.). — 1. Nov. s. A. Holløse (Høyer, Bg.). — 4. Nov. s. A. et Expl. fanget i Done i Tvorup Klitplantage i Thy, hvor den optraadte i Mængde (Forpagter Madsen, Bg.). — 8. Nov. s. A. Kallundborg (Bundtmager Rasmussen, Bg.). — 19. Nov. en Hun skudt ved Haarlev (Arct. — W.). — 22. Novbr. 4 Stkr. skudte ved Rungsted (Dinesen. 2 af dem kom til zool. Mus.). — 12. Nov. s. A. Hørsholm (Sch.s Sml.). — 30. Nov. og 7. Dec. s. A. Aggersø ved Skjelskør (Bg.). — 10. Dec. s. A. Storehedinge (Valentiners Sml. Bg.). — 12. Dec. s. A. Hun ved Herlufsholm (N. F.). — 15. Dec. s. A. modtog Kjøbm. Larsen en smuk gl. Han fra Horsens-Eggen. — 18. Dec. s. A. 2 Hanner ved Lystrup (Grev E. Moltke, — Pirtzel). — 30. Dec. s. A. Aggersø (Bg.). — I Vinteren 1890—91 fanget ved Liselund (Møhl-Hansen). — I Januar 1891 Ulriksholm Skov ved Kjerte-

minde (Prop. Wenegaard, Bg.). — 2. Jan. s. A. Næstved (Bg.s Sml.). — 3. Jan. s. A. Rudeskov ved Holte (Kn. Andersen). — 6. Febr. s. A. Stokket pr. Vordingborg (Juul, Bg.). — Under den store Indvandring, der fandt Sted her i Landet i Vinteren 1890—91, opholdt mange Krognæb sig i Anlæggene og Haverne i og om Kjøbenhavn, navnlig i Botanisk Have, indtil 21. Nov. — Ved Fortunen og Klampenborg iagttoges de ligeledes i større Antal (Kn. A.), ogsaa længere Nord paa, ved Rungsted o. a. St.

***Loxia pityopsittacus*, Bechst.**

Stor Korsnæb.

I de senere Vintere er den paa adskillige Steder her i Landet optraadt i større Mængde. Saaledes i 1887—88 i Næstved-Eggen (Bg.), ved Herschendsgave (Herschend) og i Petersværfts Skove (Dyrl. Larsen); 1891, 1893 og 1894 i Rude- og Geels Skov, i 1893 ved Allinge (Grønbech, Bg.). — 24. Jan. 1894 Han og Hun skudte i Storskoven pr. Flauenskjold (Det danske Hedeselskab. — Pirtzel).

***Loxia leucoptera*, Gm.**

Hvidvinget Korsnæb.

Det synes, at denne Art i de senere Aar (fra 1889) har indfundet sig langt hyppigere her i Danmark end tidligere, og at der navnlig i 1889 fandt en større Indvandring Sted. I det nævnte Aar modtog Bruun otte Stkr. til Udstopning fra Viborg-Eggen. — I s. A. blev den flere Gange dels seet, dels skudt i Kjøbenhavns Anlæg og Omegn, saaledes i Frederiksberg Have og Kongens Enghave (Sept. — K.), ved Bülow's Vei i Sept. og Dec., i Ørstedsparken 26. Nov. og 5. Dec. (Kn. A.). —

Ifølge N. F. blev en Flok paa c. 20 Stkr. seet i Hæsede Planteskole ved Gisselfeldt d. 6. Sept. s. A., og 2 Hanner og 1 Hun bleve skudte. Flokken opholdt sig kun nogle faa Dage der i Eggen, men viste sig kort efter i Omegnen af Vordingborg, hvor flere Explr. bleve skudte; ved Bækkeskov blev der sk. tre Explr. — Omtrent samtidigt blev en Flok paa c. 25 Stkr. iagttaget i Nørre-Alslev Skov paa Falster (Cand. jur. Wilhjelm, Bg.) og en Flok paa 11 Stkr. ved Svenstrup pr. Nakskov; tre af disse (alle Hanner) indsendtes 9. Sept. af Hr. Suhr til Zool. Mus. — Ved Frederiksholm pr. Kbhvn. bemærkedes i de samme Dage en mindre Flok (6 à 7 Stkr.), af hvilken to (en Han og en Hun) indsendtes af Hr. Hechmann til Zool. Museum. De angaves at have ernæret sig af Bladlusgallerne paa Popler. — Endvidere er den skudt 20. Sept., 8. Okt. og 15. Dec. s. A. ved Viborg Krathus (Skovr. Christiansen, Bg.), 10. Nov. s. A. Han og Hun ved Nudalslund pr. Viborg (Hagerup, Bg.), 17. Nov. s. A. i Fortunens Indelukke i Dyrehaven v. Kbhvn. (Kn. A.), 16. Dec. s. A. en Han ved Viborg (Knoklerne i Zool. Mus.), i Jan. 1890 ved Kjøbenhavn (Sophiendals Sml., Bg.), og 8. Marts s. A. ved Holstebro (Borgmester d'Auchamp, Bg.). — Ved Viborg Krathus bemærkedes den hyppigt enkeltvis eller i mindre Flokke i Marts, April og Begyndelsen af Mai s. A. (Stud. J. C. E. Christiansen, Bg.). — I Stenskovene ved Næstved bemærkede Skovr. Wind sex Explr. i 1893 (Bg.).

***Loxia curvirostra*, L.**

Lille Korsnæb.

D. 23. Marts 1889 fandtes, ifølge „Silkeborg-Avis“ to Par ynglende i Østerskoven ved Seis pr. Silkeborg; i den ene af Rederne var der Æg, i den anden Unger.

Fra Skovr. J. D. Christiansen ved Viborg (Kratlund) modtog Zool. Mus. d. 25. Marts 1889 tre

Kuld Æg af denne Art, tagne i Viborg Plantage, hvor den i hin Vinter ynglede temmelig talrigt. Det første Kuld paa tre Æg fandtes den 10. Januar, de andre ere tagne d. 27. Januar (3 Stkr.) og den 14. Marts (4 Stkr.). Den 6. Januar fandtes et Kuld Unger, der vare omtrent 8 Dage gamle (Zool. Mus. Journ.). — Fra Redaktør Wulff i Hjørring modtog Zool. Mus. d. 5. Febr. 1890 en Unge. — Ifølge „Hjørring Amtstidende“ ynglede Fuglen i Vinteren 1889—90 i Tværsted Klitplantager (Zool. Mus. Journ.).

15. Juli 1892 saae Hr. A. Hechmann (ifølge Brev til Prof. Lütken) en Flok paa 5—6 Stkr. ved Vestre Kirkegaard v. Kbh. Det lykkedes ham lidt efter at iagttage to af dem (begge Hunner) paa ganske nært Hold; de vare ivrigt beskjæftigede med Behandlingen af Bladlusgaller paa et Piletræ.

I Næstvedegnen er Arten aldrig bemærket.

Columba oenas, L.

Skovdue.

Skovr. Möhl-Hansen fandt den ynglende i en Uglekasse i Klinteskoven paa Møen d. 30. April 1892 og i samme Kasse d. 11. Mai 1893.

Columba palumbus, L.

Ringdue.

Yngletiden, som i „Skand. Fugle“ S. 388 angives at være i Begyndelsen af Mai, maa vistnok som Regel sættes noget tidligere. I N. F. anføres nogle Tilfælde, i hvilke Reden er fundet med stærkt rugede Æg eller nys udklækkede Unger i Midten af April.

Skovrider Wind skjød Unger, som neppe vare flyvefærdige, d. 5. Okt. 1875 (Bg.).

[*Columba livia*, Briss. (domestica) Husdue. I Skiveegnen døde Aug. 1888 en Handue, der opnaaede en Alder af 23 Aar; den

mistede Livet ved, at en Ko lagde sig paa den (Dyrlæge F. Larsen)].

Turtur auritus, Ray.

Turteldue.

Propr. Suhr angiver, at han i Sept. 1873 saae den paa en Mark v. Svenstrup, og at han var den ganske nær. — Reitzel har fra Bjerrum modtaget en Han, skudt 7. Mai 1875 ved Lustrupholm pr. Ribe, og ifølge Meddelelse fra Bg. findes der i Sophiendals Samling et Expl., ligeledes skudt ved Lustrupholm 27. Mai s. A. — 28. Okt. 1879 Skjæve Præstegaard pr. Hjørring (Forpagter Bojesen, — Dybvad, Bg.). — I Sept. 1885 seet i Pallesbjerg Have v. Ulvborg pr. Ringkjøbing (K.). — S. A. skudt ved Faarup pr. Jellinge (K.). — I Sommeren 1886 skudt ved Skjern pr. Ringkjøbing (K.). — 15. Sept. 1887 Førsløv Kohave; Expl. findes i Dyrlæge Brachers Sml. i Fuglebjerg (N. F.). — I Zool. Mus. opbevares en Hun, skudt af Skovfoged Andresen i Juli 1888 ved Taagerød pr. Kjøge. — Den 3. Mai 1891 skudt i Skagens Plantage (Michael Ancker, — Zool. Mus.). — I 1892 skudt ved Skagen (Aarhus Mus. K.). — 26. Mai s. A. en ung Fugl skudt ved Birkelse (Christiansens Sml., Bg.). — 27. Juli s. A. blev en gl. Hun fanget ved Ribe, efterat have fløiet mod en Telefontraad (M. Clausen, — Bg.). — 18. Okt. s. A. en ung Han skudt ved Ribe (Sch.s Sml.). — 28. Okt. s. A. en Han skudt paa en Roemark ved Stavsø (Staversø) pr. Nørre Nebel i Varde-Egnen (Skovrider M. P. Haahr, — Bg.). — 16. Mai 1893 Gjelballe Skov, en Mil fra Kolding (Hagerup, — Bg.). — I Midten af Mai 1893 skudt ved Birkebæk pr. Herning (O. Lund i Kallundborg, — Pirtzel). — 25. Mai s. A. Lem Præstegaardshave, Ringkjøbing (Hagerup — Bg.). — 15. Juni s. A. Bjørsløv pr. Ringkjøbing (O. Lund, Bg.). — 10. Okt. 1894 ung Fugl skudt paa Refshale

Mark ved Engestofte paa Lolland; Expl. findes i den Sophiendalske Sml. (H. Rosenkrantz, Bg.). — 18. Okt. 1894 en ung Han skudt i en Have paa Refshale ved Maribo af Gaardeier Jensen (Bg.).

Syrrhaptēs paradoxus, (Pall.)

Steppehøne.

I 1888 fandt en ny større Indvandring Sted heri Danmark. Som Vidnesbyrd om, hvor mange Steppehøns der i dette Aar ankom hertil, kan nævnes, at Bruun i Fredericia fik sendt ikke mindre end 115 Stkr. til Udstopning, og at der til de københavnske Vildthandlere alene fra Jylland blev sendt c. 1500 Stkr. til Forhandling. — I „Vid. Medd. fra d. naturhistoriske Foren. i Kbhvn.“ f. 1889“ S. 57—100 har H. Winge leveret en udførlig Beretning om alle de Tilfælde, der vare komne til Museets Kundskab angaaende Steppehønsenes Forekomst her i 1888. Jeg skal derfor indskrænke mig til at henvise til denne Afhandling og kun meddele de Tilfælde, som jeg ikke har fundet optagne i denne.

I 1888 opholdt Steppehønsene sig i stor Mængde i Egnen ved Eistrup; de færdedes flokkevis og kastede sig navnlig over de nylig tilsaaede Boghvede- og Kløvermarker, som paa flere Steder ganske ødelagdes af dem. Kjøbm. Larsen skjød flere og fandt i Maven især Rød-kløverfrø (hos enkelte i et Antal af over 1000), hos andre 500 à 600 Boghvedekjærner, hos en enkelt noget over 2000 Frøkorn af forskellige Planter. Efter Regnveir i kolde Nætter havde Fuglene ondt ved at flyve, og flere fangedes da med Hænderne. De ynglede overalt i de omliggende Heder, paa nøgne Sandpletter, hvor den rugende Fugl neppe kunde skjelnes fra det gule Sand. Hr. Larsen saae den første Flok d. 27. April, og bemærkede den sidste Gang d. 20. Novbr. — I Sept. s. A.

traf Dyr læge F. Larsen et Par mindre Flokke (30 à 40 Stkr. i hver) først paa Havelse Mark. c. 1 Mil fra Frederikssund og nogle Dage senere paa en Strandmark ved Jægerspris. De vare meget sky og opholdt sig kun et Par Dage paa hver af Stederne. — Ifølge Meddelelse fra Baagøe bemærkedes Steppenhønen endvidere 6. April s. A. v. Nykjøbing paa Falster (P.), 10. Mai paa Hundslevmark v. Kjerteminde (N. F. Andersen), 16. Mai v. Lou pr. Næstved (2 Stkr., Sch.), — 10. Mai p. Ærø (Expl. som findes i Bg.s Sml., blev skudt ud af en Flok paa 50 à 60 Stkr.), 20. Mai paa en Mark v. Lille Næstved (en Flok), 7. Okt. ved Bregentved (Keller), 22. Okt. p. Omø, en Hun (Ollendorfs Sml. i Holbæk).

I den strænge Vinter i Begyndelsen af 1889 bjærgede en Steppenhøne Livet ved at slutte sig til Folkene paa Bryggeriet „Langeland.“ Den opholdt sig næsten hele Dagen lige i Nærheden af Bryggeriet, var kun meget lidt sky og nærrede sig af de Affaldskorn, som Folkene dagligt strøede ud til den („Langelandstidende“). — 18. Febr. 1889 v. Krusesminde pr. Korsør (Bech, Bg.). — 20. Juni 1889 tre Flokke, hver paa c. 40 Stkr. mellem Aalbæk og Skagen (Jagtt. — W.) — I Begyndelsen af Aug. s. Å. saaes nu og da Smaaflokke paa Refsnæs (O. Lund, — W.) — 13. Aug. s. A. en lille Flok (c. 10 Stkr.) ved Rosenborg pr. Struer (W.). — I Sommeren s. A. bleve enkelte bemærkede i Klitterne v. Gaardbo, hvor to Stkr. saaes d. 29. Sept. (Nationalt. 10. Okt.). — 8. Okt. s. A. 5 Stkr. sete v. Skarbygaard pr. Holstebro (Jagtt. Okt. 1889. — W.) — 19. Okt. falbødes 2 Stkr. i Aalborg; de vare skudte i Klitterne ved Blokhús (Nationalt. ²⁶/₁₀ 89. — W.) — 19. Jan. 1890 Bregentved (Keller — Bg.). — Midt i Marts s. A. Refsnæs, 5 Stkr. (O. Lund). — 6. Mai 1890 sk. 3 Stkr. v. Glerup v. Hadsund pr. Mariager (Jagtt. Aug. 1890, K.) — 15. og 16. Mai nogle faa Stkr. iagttagne paa Vest-

siden af Fanø (Th. Schiøtz. — W.). Midt i August nogle mindre Flokke paa Refsnæs (O. Lund).

17. Mai 1891 Hjørring (K.). — Kjøbmand O. Lund i Kallundborg har under 13. Juli 1892 meddelt Prof. Lütken, at hans Søn, cand. phil. P. Lund nogle Dage tidligere havde seet 6 Steppenhøns paa Heden ved Birkebæk-Plantage. Muligheden af en Feiltagelse tør dog i dette Tilfælde neppe betragtes som udelukket.

Perdix cinerea, Briss.

Agerhøne.

I den Sophiendalske Samling er opstillet to helt hvide Varieteter (Han og Hun), som i 1861 bleve skudte i Thy (Rosenkrantz. — Bg.). — En lignende hvid Varietet skudt 9. Aug. 1884 af Gaardeier Laust Arnum i Bovlund (Dyrl. F. Larsen). — Et sjældent smukt, graahvidt Expl., skudt paa Endelave 23. Okt. 1888, er opstillet i Zool. Mus. Ifølge Indsenderens, Propr. G. Hoes Meddelelse fandtes der flere lignende Explr. paa Øen. — 20. Sept. 1894 blev et næsten renhvidt Individ skudt paa Gaunø af Baron Otto Reedtz-Thott, i hvis Samling det opbevares (Bg.).

Coturnix communis, Bonnat.

Vagtel.

I Næstvedegnen forekommer den ikke almindeligt, men den er dog skudt der en halv Snes Gange i de sidste 30 Aar (N. F.). — Ved Stevns ynglede den i 1888 (Arct.). — Ved Gjettrup pr. Vestervig fandtes ved Meining af en Rugmark dens Rede med 10 nylagte Æg d. 1. Sept. 1892 (R. Olsen, — Bg.). — Til Zool. Mus. indsendtes d. 2. Juli 1892 en Vagtel, der ved Slangerup

var dræbt med Le paa en Græsmark, hvor den rugede 17 Æg. I Efteraaret 1893 fandtes paa samme Maade dens Rede med 6 Æg ved Helsing i Nordsjælland. Fuglen fløi først af Reden, da Hesteriven gik hen over denne (R. Olsen, Bg.). — 22. Juni 1893 fandtes Reden med 15 Æg paa Stensballegaards Mark ved Horsens (Faber).

Tetrao tetrrix, L.

Urfugl.

Forsøgene paa at værne denne Art mod Udryddelse og udbrede den til nye Egne her i Landet synes at skulle krones med Held. I Tidsvilde Sogn, hvor den indførtes i 1885, har den formeret sig godt og træffes nu ret hyppigt der og paa Asserbro Overdrev (Møhl-Hansen). — Et lignende Forsøg, der i 1889 blev foretaget af Grev Danneskjold i Holmegaards Mose ved Næstved, er ogsaa lykkedes (N. F.) — I Eistrup-Eggen har den i de senere Aar formeret sig stærkt, og der træffes ikke sjældent Flokke paa 20 à 30 Stkr., men Ræven er den en slem Fjende (N. L.). — 25. Sept. 1891 en Han skudt ved Blaavandshuk (Pirtzel). — I Holstebro-Eggen skydes den ikke sjældent. — I Store- og Lille Vildmose breder den sig nu stærkt (Barfod).

Lagopus Scotica, (Lath.)

Skotsk Rype.

I Efteraaret 1893 købte „Dansk Jagtforening“ 30 „Grouse“ i England for at indføre dem her til Landet. Paa Overreisen døde imidlertid de 23, og kun de resterende 7 bleve udsatte i Palsgaard Plantage Distrikt i Jylland. D. 8. Okt. 1894 modtog Skovrider Fabricius paa Palsgaard 17 Stkr. fra England, men ved Ankomsten vare kun 11 af dem i Live: de befandt sig imidlertid saa vel, at de øieblikkeligt fløi afsted, da de bleve satte i Frihed, og forsvandt i Skoven (Bg.).

Phasianus Colchicus, L

Ædelfasan.

I Næstved-Eggen har denne Fugl udbredt sig fra Fasanerierne paa Gaunø, Gunderslevholm og Fodbygaard til alle de omliggende Skove, hvor den træffes ynglende i større Antal (N. F.).

Otis tarda, L.

Stor Trappe.

D. 24. (efter en anden Angivelse d. 26.) Juli 1890 blev en Han skudt paa Sildestrup Strandmark paa Sydfalster af Parcellist Hans Madsen. Expl. blev kjøbt af Kjøbmand Vald. Benzon og af ham overladt til Baron H. Rosenkrantz. Fuglen blev udstoppet af Telegrafbestyrer Petersen og findes opstillet i den Sophiendalske Sml. (Bg.).*) — Fra senere afdøde Stabssergent Bruun i Fredericia har Bg. erholdt Meddelelse om, at en Hun blev skudt d. 16. Mai 1892 ved Hanstholmen af Mads Petersen; men trods anstillede Efterforskninger er det ikke lykkedes ham at faae oplyst hvor Fuglen senere er bleven af. — 18. Jan. 1893 blev en Han skudt paa Manø og af Apoth. Lind i Ribe overladt til Univ. Zool. Museum. — I Tandlæge Kjærs Samling i Næstved er opstillet en ung Han, som han selv skjød 14. Sept. 1894 ved den saakaldte „Hattepul“, en lille Holm i Karrebækfjord, S. f. Gaunø (Bg.).

Otis tetrax, L.

Dværgtrappe.

I December 1878 skjød Fisker Peter Hildebrandt en Dværgtrappe paa Spidsen af Refsnæs. Desværre spiste han Fuglen, men Fødderne og Vingerne kom senere i Kjøbm.

*) Maalene opgives af Hr. Petersen til: Længde $36\frac{1}{2}$ “, Vingefang 77“, Halens Længde $12\frac{1}{2}$ “. Fuglen veiede 12 Pd.

O. Lunds Besiddelse. Disse Rester indsendtes til Prof. Reinhardt, for at han kunde konstatere, at der ingen Feiltagelse havde fundet Sted m. H. t. Bestemmelsen.

D. 15. Nov. 1889 blev en Hun skudt ved Brovst i Øster-Hanherred. Konservator Hansen modtog Fuglen til Udstopning, uvist for hvem. Kropskelettet opbevares i Zool. Mus.

Otis Macquenii, Gray

Kravetrappe.

Af denne meget sjeldne Art, der hidtil kun vides skudt een Gang heri Landet (1843), modtog vor Zool. Have fra Apotheker I. Nagel i Høyer et Expl. (Han), som blev skudt 7. Okt. 1892 af P. Toft paa Emmelev Mark i Sønderjylland. — Fuglen blev skjænket til Zool. Mus.

Charadrius curonicus, Besecke

Lille Strandpiber.

I Aarene 1888—92 traf Helms hver Sommer flere Individer paa Amagerfælled og ved Kalkbrænderihavnen (v. Kbhvn.), hvor de, efter hans Overbevisning, ynglede (Bg.). — 11. Mai 1893 to Individer paa Amagers Østkyst (Kn. A.) — Bruun fandt den ynglende paa „Sandrevler“ i Randsfjorden ved Fredericia (Bg.). — Ved Kallebodstrand, lidt S. f. Kbhvn. blev Reden med fire svagt rugede Æg fundet 23. Mai 1894. Den var omkranset med Smaastene og smaa Træstykker (Rob. Olsen — Bg.).

Charadius morinellus, L.

Pomerantsfugl.

Fra Lolland, hvor den er sjelden, har Propr. Suhr i sin Samling to Explr., skudte ved Svenstrup 27. Aug.

1876. — Sammesteds bleve tre Individer skudte i 1880 (K.).

Squatarola Helvetica, (L.)

Strandbrokfugl.

I Baagøes Samling findes et Expl. i Sommerdragt, skudt 15. Aug. 1891 ved Karrebæk pr. Næstved. — Et lignende Expl. skudt 16. Aug. 1894 ved Førslev (Neergaard — Bg.). — I Sept. s. A., ligeledes i Sommerdragt, skudt ved Dybsø (Tandlæge Kjær — Bg.)

Vanellus cristatus, Mey & Wolf.

Vibe.

Ifølge K.s Optegnelser ankom den til

Amager 1881—26. Marts

1882—27. —

til Helsingør 1884—14. — (til Skagen s. A. i Febr.)

1885— 8. —

Streptilas interpres, (L.)

Stenvender.

Yngler næsten hvert Aar paa Vindsholm, en c. 20 Tdr. Land stor Ø i Bæltet udfor Svenstrup (Suhr, — K.). — Baa Øen Vrøyt i Kallundborg-Egnen, hvor den indtil for faa Aar siden forekom i Mængde og hvert Aar ynglede, træffes den nu meget sjældent (O. Lund). — Det Samme gjælder om dens Forekomst paa Dybsø ved Gaunø, hvor den tidligere ynglede (N. F.). — Paa Salt-holm er den endnu ret hyppig og blev fundet ynglende der 17. Juni 1893, — Den synes at have Forkjærlighed

for Lokalteter, som ere bevoxede med Strandmalurt (R. Olsen, — Bg.).

Grus cinerea, Bechst.

Alm. Trane.

Et Træk forbi Rosenfeld observeredes 27. April 1867 (Suhr). — Et Expl., skudt paa Møen s. A., findes i Suhrs Sml. — 15. April 1874 to Individer truffne ved Svenstrup (Suhr — K.). — 23. Okt. 1875 skudt paa Veilø Mark i Næstvedegnen (N. F.). — I Slutningen af April 1876 opholdt en lille Flok sig paa Engen ved Broksø, hvor de ligeledes indfandt sig det følgende Aar paa samme Tid (N. F.). — I 1880 skudt ved Veilø Bro (N. F.). — I Slutningen af April 1888 iagttoges en Flok paa 30 Stkr. paa Søgaards Marker ved Herlufmagle (K.). — I Begyndelsen af Sept. s. A. blev et Expl. skudt ud af en Flok paa c. 50 Stkr. paa det inddæmmede Areal ved Lungholm paa Lolland (K. Jagtt. ¹¹/₈₈). — 8. Sept. s. A. et Expl. skudt ud af en Flok ved Nedervindinge i Sydsjælland (Therkildsens Sml. Bg.). — I 1889 trak en Flok paa c. 50 Stkr. over Møens Fyr (Møhl-Hansen. — Bg.). — 8. Mai 1889 iagttoges en Flok paa 20 Stkr. over Næstved Bymark (N. F.). — 20. April 1890 trak en betydelig Flok over Dyrehaven ved Klampenborg (Kn. A.). — 1 Okt. 1889 skudt paa Bøtø af Plantør Andersen (Sophiendals Sml. Bg.). — 19. April 1893 en Flok over Liselund (Bg.). — 23. April s. A. en Flok over Amager (Kn. A.). — 27. April s. A. en Flok over Møens Klinteskov (Bg.). — 22. Mai s. A. Bussemarke paa Møen (Bg.). — 3. Juni s. A. trak en Flok mod Nord over Høie Møen (Møhl-Hansen — Bg.). — I Juli s. A. skudt ved Lungholm paa Lolland (Chr. Nielsen — Bg.). — 20. Marts 1894 en Flok over Broksø (Ritmester Nielsen. — Bg.). —

15. April s. A. en Flok over Klampenborg Dyrehave (Møhl-Hansen, Bg.). — 12. Juli s. A. skudt ved Næstved (Bg.).

Ciconia alba, Briss.

Hvid Stork.

Den synes endnu stadigt at aftage i Antal her i Landet. I Næstvedegnen, hvor der indtil 1870 ynglede en Koloni paa c. 20 Stkr. i en Skov ved Gunderslevholm, er den nu sjelden (N. F.). — I Modsætning hertil kan anføres, at Faber 12. Juni 1894 talte 21 beboede Reder i Landsbyen Ølholm i Veile-Egnen.

Ifølge K. ankom den til Helsingør

1883 — 14. April

1884 — 7. —

I „Silkeborg Avis“ f. $\frac{11}{3}$ 89 meddeles, at Storken allerede da var ankommen til Egnen og seet paa Engene ved Funder og Moselund. — Trods den strænge Vinter 1892—93 ankom den, ifølge forskellige Blades Meddelelser, inden Midten af Marts til flere Steder her i Landet (Fyen, Jægersborg o. a. St.).

Ciconia nigra, (L.)

Sort Stork.

I Jylland yngler den fremdeles paa en Mængde Steder. Foruden de tidligere nævnte Lokalteter kan anføres Sophie Amalies Skov ved Hornslet pr. Aarhus, hvor den hvert Aar yngler (Klem, — Bg.), Sophiendal-Skov [„Voerbjergene“], hvor den fredes (Rosenkrantz, — Bg.) og Velling Skov i Vester Palsgaard Skovdistrikt, hvor den har ynglet i over 20 Aar (N. L.).

D. 4. Marts 1884 skudt ved Holckenhavn paa Fyen (Holck-Hardenbergs Sml. — Bg.). — I Sept. 1887 fundet

død paa en Eng ved Borre paa Møen (Sophiendals Sml. — Bg.). — Indtil 1889 saaes den ofte i Gunderslevholm Dyrehave (N. F.). — I Kastrup Storskov ved Bavelse Sø ynglede den indtil 1888 (N. F.). — I 1890 skudt sammesteds (Juul — Bg.). — I Silkeborg Egnen yngler den nu kun i Rustrup Skov (J. C. E. Christiansen).

Cursorius Gallicus, (Gm.)

Ørkenløber.

Af denne Art, der hidtil kun een Gang er truffet her i Landet, blev et Expl. skudt 1. Nov. 1888 paa en sandet Brakmark ved Liseby paa Møen af Gaardmand P. O. Jensen. Fuglen blev kun anskudt, men fandtes to Dage senere endnu i Live, men i en elendig, udmagret Tilstand. I dens Mave fandtes Regnorme. Den blev udstoppet af Telegrafbest. Petersen i Stege og indlemmet i Rosenkrantz's Samling paa Sophiendal.

Ardea cinerea, L.

Fiskeheire.

I Skovene ved Holsteinborg yngle c. 100 Par. Rederne ere anbragte i en Høide af 70—80 Fod over Jorden (N. F.). — I Store Lyngby Skov ved Arresø og Jonstrup Vang yngler den ligeledes (R. Olsen. — Bg.). — Faber fandt den ynglende i Lerbæk Skov ved Veile 1891—93 (Bg.). — I det zool. Mus. findes en hvid Varietet, skudt ved Svenstrup i 1880.

Ardea comata, Pall.

Topheire.

Skudt ved Ribe 1885. Expl. kom i Grosserer Magnus Kjærs Besiddelse, men er nu opstillet i Tand-

læge Duus's Sml. i Holstebro (Bg.). — I zool. Mus. findes et Expl., skudt i Mai 1889 i Andebøl Kaag S. f. Tønder.

Ardea purpurea, L.

Purpurheire.

Ifølge Jagtt. blev et Expl. skudt 11. Nov. 1889 ved Sennels pr. Thisted. Det eies af Forpagter F. Madsen paa „Færgegaard“. — Fra Dr. William Sørensen har jeg erholdt Meddelelse om, at Kadetaspirant Krogh i Grenaa eier en Purpurheire, der er skudt (uvist naar) ved Rambes Mølle i Nærheden af Frijsenborg. Den blev i Foraaret 1891 købt hos Bundtmager Kjølbye i Aarhus.

Ardea minuta, (L.)

Dværgheire.

Paany skudt i Bjørnekjærmose ved Ribe 7. Juli 1881 (Bjerrum — Reitzel). Expl. eies nu af Kn. Andersen. Foruden dette Exemplar har Bjerrum siden 1878 modtaget 4 à 5 Stkr. fra den nævnte Lokalitet, skudte til forskjellige Tider (Bg.). — I Efteraaret 1891 blev et ungt Individ sendt til Udstopning til Bruun i Frederica fra Bundtmager W. Timm i Skive. Nærmere Oplysninger have ikke kunnet faaes (Bg.). — Herschends Expl. fra Bjørnekjærmose (1878) findes nu i den Sophiendalske Sml., og Fischers Expl. fra Sæby (1865) eies af Knud Andersen.

Ardea stellaris, L.

Rørdrum.

Skudt ved Rørby 1866 (Suhr). — 2 Explr. s. A. fra Maribo (Suhrs Sml.). — 8. Nov. 1871 ved Nordfeld paa Møen (P. — Bg.). — 30. Marts 1874 Bussemarke

paa Møen (P. — Bg.). — 29. Sept. s. A. Nyraad pr. Vordingborg (Theisen, — Bg.). — 17. Juni 1877 Ulfshale paa Møen (P.). — 1878 Assens (Bruun, — K.). — Juli 1879 Lidsø pr. Rødby (skudt af Propr. Kryger paa Andetræk, K.s Sml.). — 22. Okt. 1879 Kjøge (Bg.). — 1880 Rørby (Suhr). — Sept. 1881 Fiilsø (Haahr — Bg.). — 1882 havde Conradsen et Expl. til Udstopning fra Lolland og et fra Holstebro (K.). — Juli 1884 Holstebro (udst. af Bruun, — K.). — 17. Febr. 1885 Kolding (Theisen, — Bg.). — 8. Sept. 1886 Han skudt ved Valbygaard pr. Slagelse (Sorø Akad.s Sml.). — Ifølge Meddelelse fra K. blev en Hun skudt sammesteds Dagen efter og samme Dag et Expl. ved Vordingborg. — 1886 Lønnede Mose i Næstvedegnen (N. F.). — I „Berl. Tid.“ f. 12. Juli 1887 angives det, at en Rørdrum er skudt i Juni s. A. paa Færøerne (Gribshøj ved Thorshavn). — I Juli s. A. Han og Hun fra Varde (udst. af Bruun, — K.). — 1888 Frederiksborg (Weitzmann, — Bg.). — Samme Aar(?) fandtes et dødt Expl. i Søborg Mose ved Gilleleie (Møhl-Hansen). — 12. Jan. 1889 Gaunø (N. F.). — I Foraaret 1890 Oxeby Hø ved Varde (Plantør Eskesen, — N. L.). — 7. Nov. 1890 Holstebro (Bruun, — Bg.). — 1891 Lindskov Mølledam ved Møgeltønder (Rosenvinge, — Bg.). — Birkendegaard Okt. 1891 (Kropskelettet i Zool. Mus.). — 25. Okt. 1891 en Hun Mørkhøj ved Herlev (Pirtzel; Kn. Andersen eier Kropskelettet, Fotograf Weller den udstoppede Fugl). — 14. Nov. s. A. ved Nymindesø, skudt af Marius Pedersen Give (N. L.). — 28. Nov. s. A. fanget levende paa Enø ved Næstved (N. F.). — Nov. s. A. Refshale ved Engestofte paa Lolland (Sphiendals Sml., — Bg.). — 3. Dec. s. A. Lodbjerg Fyr (Zool. Mus.). — 28. Dec. s. A. Sønderkov ved Ribe (Bg.). — 1892 Ballerup paa Sjælland (Wellers Sml., — Bg.). — Mai s. A. Oxeby Hø ved Varde (Plantør Eskesen, — N. L.). — Aug. s. A. Engestofte (Chr. Nielsen, — Bg.). — 4. Aug. s. A. Aar-

hus (Bruun, — Bg.). — 11. Aug. s. A. Glumsø Sø (Howden-Rønnenkamp, — Bg.). — Sept. s. A. Søholm pr. Maribo (K.) og Fiilsø (M. P. Haahr, — Bg.). — 3. Sept. s. A. skudt ved Taulov Sø ved Fredericia (Faber). — 6. Sept. s. A. Viborg (Christiansen, — Bg.). — Nov. s. A. Nakskov (Chr. Nielsen, — Bg.). — 1893 Engestofte (Rosenkrantz, — Bg.). — 26. Okt. 1893 „Jylland“ (kjøbt i en Vildthandel i Kbhvn., — Sch.). — 27. Okt. s. A. Bjørnekjær Mose (M. Claussen, — Bg.). — Ved Lerchenborg blev der skudt 2 Hunner d. 7. og 9. Okt. 1894 (Lehnsgr. Lerche, — Pirtzel).

Platalea leucorodia, L.

Skeheire.

Den tilsyneladende Uoverensstemmelse, der herskede mellem Beretningerne angaaende de ved Bullerup pr. Odense erholdte Skeheirer (kfr. „Bidr. t. Kundsk.“ S. 84—85), er hævet ved en senere Oplysning fra Konservator Hjeronimus. Ifølge denne er der d. 13. Mai 1884 skudt 3 Explr., af hvilke de to faldt paa Land, det tredie saa langt ude i Vandet, at han ikke kunde faae fat i det. Af de to førstnævnte Exemplarer solgte Skytten (Gaardeier Krist. Jørgensen) det ene til Bundtmager Carl Rasmussen i Odense, der lod det udstoppe og endnu er i Besiddelse af det. Det andet Expl. blev kjøbt af Hjeronimus, udstoppet af ham og opstillet i Odense Museum. Det tredie Expl. fandtes Dagen efter ilanddrevet, men uden Hoved. Det blev ikke opbevaret. Flere end disse 3 Exemplarer er der ikke skudt ved den omhandlede Leilighed. — Fra Baagøe, der ogsaa har søgt Oplysning angaaende denne Sag, har jeg modtaget en med ovenstaaende Redegjørelse ganske overensstemmende Beretning.

Ibis falcinellus, (Gm.)

Europæisk Ibis.

Den 21. Sept. 1882 blev et ungt Individ skudt i Aggersø Enghave i Næstved-Egnen. Fru Brun de Neergaard købte det af en Bundtmager og skjænkede det til Grev Brockenhus-Schack, i hvis Fuglesamling paa Giesegaard det er opstillet (N. F. og Bg.). — I Forp. Madsens Sml. findes et Expl., skudt 11. Sept. 1889 ved Sennels pr. Thisted (Bg.).

Numenius arquata, (L.)

Stor Regnspove.

I Foraaret 1886 trak en saa stor Flok hen over Horsens, at Forbitrækket varede i 1½ Time. („Dagbl.“ f. 27. April 1886 o. fl. a. Bl.).

Tringa canutus, L.

Islandsk Ryle.

En Han i Sommerdragt blev den 2. Aug. 1891 skudt paa Dybsø (N. F.). Expl. findes i Zool. Mus. — 10. Aug. s. A. skudt, ligeledes i Sommerdragt paa Høirønnen ved Vordingborg (Juul, Bg.).

Tringa maritima, Brünn.

Sortegraa Strandløber.

Cand. pharm. Faber skjød den paa Veile Fjord 2. Dec. 1888 (Zool. Mus.). Sammesteds findes et Expl., skudt ved Rørvig Strand i Begyndelsen af Nov. 1890 af Jagtjunker Bauditz.

Tringa cinclus, L.

Alm. Ryle.

En renhvid Varietet skudt paa Kallundborg-Lyng i Aug. 1890 (Sekret. Iversen). Expl. findes i zool. Mus. — En lignende Varietet skudt 2. Juli 1893 ved Hede-gaard i Eistrup Sogn (N. L.).

Af Varieteten Schinzii blev en Hun skudt ved Ny-mindegab 21. Marts 1891, og en ved Orehoved 31. Marts s. A. (Pirtzel).

Tringa Temminckii, Leisl.

Temmincks Ryle.

Paa Amagerfælled iagttoges nogle Smaaflokke 8. Mai 1888 og en enkelt lille Flok 21. Mai. Samme Aar blev et Expl. skudt 2 Sept. paa Øens Østkyst af Dr. Krabbe (Helms).

Tringa minuta, Leisl.

Dværgryle.

I Sept. 1893 forekom den almindeligt ved Kolding Havn (Hagerup). — Den blev skudt 2. April 1894 paa Gisselør i Kallundborg Fjord, hvor den sees hvert Efteraar (O. Lund. — Bg.). — Træffes hvert Aar i større Antal paa Vindsholm ved Lolland (Suhr). — Zool. Mus. modtog den fra Æbelø d. 26. Aug. 1892, fra Skjoldnæs 21. Sept. 1893, fra Hammershus 8. Okt. 1894 og fra Kobbergrundens Fyrskib 9. Okt. s. A.

Tringa subarquata, Gyldenst.

Krumnæbet Ryle.

D. 3. Aug. 1888 en Hun skudt ved Jægerspris (Reitzel). — 5. Sept. 1888 Seirø Fyr (Zool. Mus.). —

15. Aug. 1889 skudt paa Veile Fjord (Faber). — Sept. 1889 en ung Fugl skudt paa Dybsø (N. F.).

Limicola pygmæa, (L.)

Kjærløber.

D. 13. Mai 1892 bleve tre Explr. skudte ud af en Flok sammen med Charadrius cantianus paa Taarnby Overdrev, Amager (Kn. A. — Bg.).

Calidris arenaria, (L.)

Sandløber.

23. Sept. 1877 skjød Skovfoged Christiansen 2 Stkr. af en Flok paa 6 Stkr. ved Stranden en halv Mil S. f. Sæby i Jylland (Bg.). — Skudt i Vinterdragt paa Egø-Fed N. f. Aarhus 29. Sept. 1888 (Cand. pharm. E. Petersen. — Zool. Mus.). — 20. Sept. 1889 skudt af Juul paa Bøtø, Falster (Bg.s Sml.). — Af Forstkandidat, Jagtjunker Bauditz modtog zool. Mus. 3 Explr., skudte d. 17. Sept. 1891 paa Nordstranden ved Rørvig (pr. Nykjøbing paa S.) i Selskab med Ryler. — 30. Aug. 1893 en Han skudt paa Bornholm (Sch.s Sml.). — 28. Aug. 1894 to Hanner skudte paa Mors (Schjølær, Pirtzel). — 27. Aug. 1895 fire Stkr. skudte ved Nymindegab (Pirtzel).

Philomachus pugnax, (L.)

Brushane.

Yngler i stor Mængde i Tørring- og Uldum Moser samt paa Engene ved Skjern (N. L.).

Totanus hypoleucus, (L.)

Muddersneppe.

Ifølge Möhl-Hansens Angivelse træffes den nu og da i Yngletiden ved Arresø. — I Juni 1890 fandtes to

Reder paa en Hedebakke ved Hald Sø pr. Viborg. De indeholdt hver fire Æg (I. C. E. Christiansen). — 27. Juli 1891 blev der ved Krarup Aa fundet en Rede med fire Æg (Samme). — Ved Thorsø og flere Steder ved Silkeborg er den almindelig hele Sommeren og er oftere truffet ynglende der (Samme).

Totanus fuscus, (L.)

Sortegraa Klire.

D. 12. Sept. 1867 blev der, ifølge Meddelelse fra Propr. F. Suhr, skudt 4 Stkr. ved Krannitze paa Lolland. — 17. Aug. 1888 ung Fugl skudt ved Voor Strand (Helms — Bg.). — 5. Aug. 1894 Han, Lerchenborg (Pirtzel).

Totanus ochropus, (L.)

Graabenet Klire.

Ifølge N. F. er den skudt 17. Juni 1861 i Kalby Mose, 3. Aug. 1866 i Skade Mose, 24. Aug. s. A. i Susaa ved Herlufsholm, 26. Juni 1868 i Spragelse Mose, i Efteraaret 1883 ved Ulse Sø pr. Bregentved og i Sommeren 1886 ved Gunderslevholm. — Kapt. Kalkau, som den 13. April 1884 skjød et Expl. ved Gundsøgaard ved Roskilde, har meddelt mig, at denne Klires Rede undertiden findes indtil 15 Al. over Jorden.

I Lützens „Jahresbericht.“ II. (for 1884) [Ornis II. 1. 1886. S. 89. Særtr. S. 41] angiver daværende Stud. med. Krabbe, at han nogle Gange i Sommeren 1884 har truffet den i Thy, f. Ex. i Hillerslev Kjær og i Hjardemaal Klit, hvor han skjød et Expl. d. 14. Aug. *) Ogsaa Knud Andersen har skudt den i Thy, nemlig

*) I P. Heibergs „Thylands Fugle“ Viborg 1886 nævnes denne Art ikke.

18. Juli 1890 ved Mørkaa pr. Snedsted St., og faaet et Exemplar tilsendt derfra 25. Aug. s. A. — I Begyndelsen af August s. A. skudt ved Lystrup pr. Rønnede (Greve Eiler Moltke. — Pirtzel). — 4. Aug. 1893 traf R. Olsen fem Explr. i Udkanten af Valby Sogn ved Helsingø og skjød to af dem, begge gl. Hanner.

Totanus glottis, (Bechst.)

Grønbenet Klire.

D. 4. Sept. 1892 blev et abnormt Individ (Han) med lang, opretstaaende Fjertop skudt paa Amager (Kn. A.)

Limosa ægocephala, (L.)

Sorthalet Kobbersneppe.

I Pintsen 1894 fandt Hagerup flere Par ynglende ved Skjernaaens Udløb.

Limosa Lapponica, (L.)

Rødbrun Kobbersneppe.

Paa Lolland, hvor denne Art kun undtagelsesvis forekommer, blev der ved Vindsholm skudt et Expl. i 1880 og et i 1884. — 10. Sept. 1887 skudt paa Vester Lyng ved Seirøbugt (Faber — Bg.). — 20. Aug. 1888 og 23. Aug. 1889 Anholts Knob (Zool. Mus.). — 4. Sept. og 2. Okt. 1887 skudt paa Amager (Helms — Bg.). — 21. Okt. 1888 ung Fugl skudt ved Holbæk Fjord (Sch.). — I Sept. 1889 blev der paa Dybsø skudt 5 unge Individier (N. F.) og d. 15. s. M. iagttaget flere Flokke paa Amager (Helms — Bg.). — I Eftersommeren s. A. iagttoges to Explr. i Sommerdragt under Møens Klint; det ene blev skudt af Fyrmester Thaarups Søn. Samtidigt bemærkedes flere andre Individier langs Kysten (Møhl-Hansen). — Ifølge N. F. træffes Arten hvert

Aar paa Holmene og langs Kysterne ved Gaunø- og Dybsø Fjorde, hvor den blandt Jægerne gaaer under Navnet „Lille Sneppe“. — 3. Sept. 1892 sk. v. Helholm ved Skjelskør (Zool. Mus.). — 30. Juli 1893 modtog Kjøbm. Larsen i Eistrup et Expl. i ren Sommerdragt; det var skudt tæt ved Byen og er det første Expl., som vides at være truffet der i Egnen.

Macrorhamphus griseus, (Gm.)

Var. scolopaceus, Say

Sneppeklire*) (Kliresneppe)

Af denne for den skandinaviske Fauna nye Art blev en Han skudt d. 1. Aug. 1894 paa Ribe-Territoriet udfor Manø Hølade af Handelslærling Niels Pultz i Ribe. Hr. Pultz meddeler, at han ved Ebbetid, da man kunde gaa langt ud paa Flakken, traf Fuglen gaaende sammen med en lille Flok Ryler; den var ikke sky og lod sig komme nær paa et lille Bøsseskuds Afstand. Konditor Bjerrum erhvervede Fuglen og overlod den senere til Baagøe, i hvis Samling den nu er opstillet. Nogle Lemmeknokler af dette Individ opbevares i Zool. Mus. Fuglen, som er i Sommerdragt, ligner *Limosa Lapponica*, men de rustfarvede Partier ere mindre rødlig, hele Issen er næsten sort og Benene mørkt smudsiggrønne. Næbet er ganske som Bekkassinernes, fladtrykt mod Spidsen og glat, men saa snart Fuglen er død, rynkes Næbets Overhud som en Fil ligesom hos Bekkasinerne.

Arten har hjemme i de nordlige Egne af Nordamerika og i Siberien. I England er den skudt nogle Gange, og i Grønland er den skudt i 1824 (Bg.). — [kfr. Maanedsskriftet „Flora og Fauna“ 1895 Nr. 7 S. 49.]

*) Da Slægten staaer nærmere ved Klirerne end ved Snepperne, vil Benævnelserne „Sneppeklire“ være at foretrække for det tidligere benyttede „Kliresneppe“.

Scolopax rusticola, (L.).

Skovsneppe.

Ifølge Meddelelse fra cand. jur. C. Becker blev Skovsnuppen seet i Overberg Skov ved Frederikssund d. 24. Dec. 1888.

Gallinago media, Leach

Dobbelt Bekkasin.

Som Regel er den dobbelte Bekkasin noget mindre haardfør end den enkelte og pleier i alt Fald at forlade os saa snart Frosten indtræder. Foruden de i „Bidr. t. Kundsk.“ S. 89—90 meddelte Tilfælde, i hvilke den er truffet her om Vinteren, kan anføres, at cand. jur. C. Becker skjød et Expl. i Overberg Mose ved Frederikssund d. 10. Dec. 1887, uagtet det havde frosset stærkt i flere Nætter og der var faldet en Del Sne.

Skovrider Wind skjød d. 1. Nov. 1865 en næsten hvid Varietet i Rislev Mose (N. F.). — Et lysgult Expl. blev skudt i Efteraaret 1887 ved Skytteskoven (N. F.). — I Møller Høyers Sml. i Holløse findes en ganske lys Varietet, skudt i Nørrejylland 1893 (Bg.).

Den aberrante Form, *Gallinago Brehmii*, Kaup, med 16 Styrefjer blev skudt i 1878 ved Nykjøbing paa Mors (Teilman-Friis).

Ifølge K. Kristensen (Hesselballe) kaldes den i Uldum-Egnen „Skronnig“, fordi den Lyd, som Hannen frembringer i Parringstiden ved Svingfjerernes dirrende Bevægelse, ligner en Geds „Skronnien“ (Brægen).

Gallinago gallinula, (L.)

Enkelt Bekkasin.

Cand. jur. C. Becker skjød d. 1. Aug. 1885 et ganske ungt Expl. i Overberg Mose ved Frederikssund

og anser det for meget sandsynligt — efter Fuglens Udseende at dømme — at den var udruget her i Landet.

Naar denne Art træffes her om Vinteren, er det næsten altid enkeltvis. Cand. Becker iagttog imidlertid et formeligt Træk (10 à 12 Stkr.) i Overberg Mose 2. Juledag 1888*), efter at han Dagen forud havde afsøgt Mosen og kun truffet eet Individ. Den følgende Dag vare de alle forsvundne, men nogle Dage senere (2. Januar) blev der paany seet et Exemplar. De vare alle meget trætte og holdt usædvanligt haardt.

Rallus aquaticus, L.

Vandrixe.

I Sommeren 1887 ynglede den i Overberg Mose ved Frederikssund, hvor to af de unge Fugle bleve skudte. Den følgende Sommer blev den paany truffet der i Egnen, men om den ynglede der, vides ikke (C. Becker). — Ved Maribo Sø yngler den (F. Suhr.) Ved Assens, hvor et Expl. blev skudt 22. Januar 1885, overvintre hvert Aar flere Individer (K.) — I Næstved-Egnen er den truffet overvintrende 23. Dec. 1885 (en lille Flok paa fire Stykker, hvoraf een blev skudt), og 8. Januar 1891, i stærkt Frostveir (N. F.). — 1. Febr. 1894 modtog Kjøbm. Larsen i Eistrup en Vandrixe, der var fanget i en Kostald ved Vester Mølle pr. Nørre Snede.

Ortygometra pygmæa, (Naum.)

Lille Sumphøne*)

Kapt. Kalkau har meddelt mig, at en Han af denne her i Landet hidtil kun een Gang trufne Art (kfr. „Bidr.

*) Angaaende dette Bekkasintræk har Cand. jur. Bauditz givet en Meddelelse i Jagtt. f. Febr. 1889.

**) Benævnelsen „Dværgsumphøne“ vilde være bedre, men da dette Navn allerede tidligere er benyttet f. O. minuta, kan det ikke anvendes for O. pygmæa saaledes som i N. F. Side 43.

t. Kundsk.“ S. 87) d. 30. Sept. 1893 blev sk. paa „Fladet“ paa Østerøen ved Nyborg af Kapt. Howitz. Fuglen, der blev sendt i Kjødet til Kn. Andersen, for at faa Bestemmelsens Rigtighed konstateret, var saa forskudt, at den ikke kunde udstoppes, men Skelettet opbevares i Kapt. Kalkaus Samling (kfr. Jagtt. f. Nov. 1893 S. 125).

Efter Kn. Andersens Mening er det ikke helt usandsynligt, at denne Art af og til skydes her i Landet, men at Exemplarerne ikke blive bevarede, fordi de — trods den ikke ubetydelige Forskjel i Størrelse mellem denne og *O. porzana* — forvexles med unge Individer af sidstnævnte Art. Det turde derfor maaske være heldigt at henlede Opmærksomheden paa, at *O. pygmæa* er let at kjende fra begge vore to andre danske Arter ved det ene Mærke: *den hvide Yderfane paa yderste Haandsvingfjer*.

Ortygometra porzana, (L.)

Plettet Sumphøne.

I en delvis utilgængelig Mose i Nærheden af Skyttehuset ved Veile traf Faber Fuglen d. 12. Juni 1893 under Forhold, der tydede stærkt paa, at den har ynglet der.

Gallinula chloropus, (L.)

Rørhøne.

Ved Maribo Sø fandtes den ynglende i 1869 (Suhr). — I Næstvedegnen yngler den flere Steder, saaledes v. Holløse og i Skjelby Mose (N. F.). — Paa Ærø yngler endnu fra gammel Tid en Koloni i Borrenæs Mølle­dam (Bg.). — D. 10. Aug. 1891 modtog Kjøbm. Larsen et

Expl., det første, der vides at være truffet i Egnen ved Eistrup.

Rørhønen overvintrer ikke sjældent her i Landet. Ved Assens træffes den næsten hver Vinter (ifølge K. skudt der den 24. Jan. 1885), og ved Holløse Mølle overvintrer hvert Aar nogle Stykker; 3. Jan. 1891 blev en ung Fugl og 10. Jan. s. A. en gammel Han fanget der, og i Jan. 1892 blev en ung Fugl skudt samme-steds (N. F.). — 1. Nov. 1885 skudt ved Abbednæs pr. Næstved (N. F.).

Fulica atra, L.

Vandhøne.

Som en Berigtigelse af en Passus i „Skand. Fugle“, hvor det S. 557 hedder, at Vandhønen er hyppig paa Færøerne, men at den derimod ikke er bemærket i vore andre nordlige Bilande, bør anføres, at den — ifølge Reinhardts Angivelse („Overs over d. vid. Mød. i Nat. Foren. 1877“. S. II. Mødet d. 19. Okt.) — er truffet tre Gange paa Island og een Gang i Grønland.

Paa Ærø er Vandhønen, saavidt vides, hidtil ikke bemærket. (Bg.).

Phalaropus hyperboreus, (L.)

Odinshane.

12. Nov. 1872 skudt ved Sæby Havn (Christiansens Sml. — Bg.). — 3. Sept. 1884 skudt af Hr. I. Suhr ved Svenstrup; Fuglen svømmede i en Mergelgrav og blev saa forskudt, at den ei kunde udstoppes (F. Suhr). — 2. Juni 1889 skudt i ren Sommerdragt ved Oxby pr. Varde af Poul Eskildsen (N. Larsens Sml.). — 1 Okt. 1890 Drejø (Pastor Hansen — Bg.). — 1891 Randers Fjord ved Udbyhøi (Thuesen — Bg.) — 23.

Sept. 1891 Udby pr. Stege (Bg.s Sml.) 18. Sept. 1892 skudt af Premierlieutenant Lassen paa et Stenrev mellem Fyen og Langeland (K.s Sml.) — 4. Okt. 1893 skjød Kapt. Howitz en Hun paa Østerøen ved Nyborg (Jagtt. Nov. 1893 K.) Skeletdelene af dette Expl. eies af Kn. Andersen.

Phalaropus fulicarius, (L.)

Thorshane.

D. 20. Okt. 1891 skudt mellem Manø og Ribe (M. Claussen — Bg.).

Himantopus candidus, Bonn.

Stylteløber.

Paa Klodskov Enge (Falster) blev et Expl. skudt i Efteraaret 1882 af Gaardeier Anders Rasmussen. Det opbevares i den Sophiendalske Samling ved Skanderborg (Rosenkrantz — Bg.).

Recurvirostra avocetta, L.

Klyde.

Propr. Suhr traf den i 1868 ynglende paa Hyldekrogen S. f. Lolland. — Sammesteds fandt Barfod 29. Mai 1887 4 Reder, hver med 4 Æg. — En lille Koloni yngler endnu paa Handrup Odde i den delvis udtørrede Ørum Sø ved Agger. Som Underlag i Reden benytter den Muslingeskaller ligesom Strandskaden (R. Olsen). Paa Dybsø og Lindholmen yngler den i temmelig stort Antal. En enkelt Gang (30. Mai 1891) blev der paa Dybsø fundet 5 Æg i Reden (N. F.). — Et enkelt Par yngler aarligt paa Vaar- og Kyø Holme ved Nibe (Barfod.).

Procellaria pelagica, L.

Lille Stormsvale.

Angivelsen i „Skand. Fugle“ S. 574, at den ikke er bemærket i Grønland, er urigtig. I Museet i Leyden findes et Expl. fra Grønland, modtaget direkte fra Holbøll (Nat. For. vid. Medd. f. 1874. S. 187).

19. Jan. 1886 blev et Expl. dræbt ved Drogdøns Fyrskib. — 31. Okt. 1888, Horns Rev (Zool. Mus.). — 29. Okt. 1889, Horns Rev (Zool. Mus.). — 22. Nov. 1889 fløi en Stormsvale mod Fyret paa Vyl-Fyrskib. Skelettet findes i Zool. Mus. — 15. Dec. 1890 Horns Revs Fyrskib (W.). — 21. Okt. 1890 blev et ungt Expl. fundet død paa en Mark ved „Nøisomhed“ pr. Nakskov (F. Suhr). — 18. Sept. 1891 skudt af Gaardmand Jens Knudsen ved Udby pr. Stege. Fuglen opholdt sig en hel Dag i en Dam nær ved Gaarden mellem de tamme Ænder, men var stadigt meget urolig og vild. Exemplaret er opstillet i den Sophiendalske Samling (H. Rosenkrantz, — Bg.). — I 1892 modtog Zool. Mus. 1 Expl. fra Fyrskibet paa Horns Rev d. 1. Nov. og 2 Explr. d. 22. Nov., i 1893 sammesteds fra d. 15. Nov. (2 Explr.); 1894 1 Expl. fra Vyl d. 28. Nov.

Procellaria Leachii, Temm.

Stor Stormsvale.

I Odense Museum findes en gl. Han, skudt af Etatsr. Dreier paa Odense Fjord d. 20. Nov. 1887 (Hjeronymus). — I Nov. 1888 blev et Expl. fanget i Vester Vedsted 1 Mil fra Ribe (Bjerrum). — Af Maleren Mich. Ancher blev et Expl., som var fundet død paa Skagens Strand d. 4. Dec. 1888, indsendt til Zool. Mus. — I Skovf. Juuls Sml. findes et Expl., der blev fanget paa

Jyllands Vestkyst 20. Dec. 1890 (Bg.). — Kjøbm. Larsen eiede et Expl., som var fanget i Hjerting Bugt i Vinteren 1891—92 (N. L.). — Kjøbm. O. Lund eier et Expl., skudt 9. Dec. 1892 ved Svenstrup Strand i Kallundborg-Egnen (Bg.). — 18. Febr. 1894 fundet død paa Svanesøen ved Skanderborg med det ene Ben fastfrosset i Isen (Nic. Bruun, Bg.).

Fulmarus glacialis, (L.)

Stormfugl.

I Juli 1881 fandt O. og H. Winge Dele af en indtørret Stormfugl paa Holmslands Klit ved Ringkjøbing (W.). — I Slutningen af Sept. 1889 fanget i Arenborg Sogn ved Skjern Aa (Postmester Theill i Herning. Expl. er i Bg.s Besiddelse). — I Zool. Mus. findes et Expl., skudt ved Manø Hølade i Okt. 1890 i stærkt udmagret Tilstand*), og et fra Blaavandshuk, skudt i Begyndelsen af Marts 1891. — 4. Nov. 1893 fanget ved Esbjerg og udstoppet af Konserv. A. Sørensen i Horsens (N. L.). — I Nov. 1893 erholdt Sagfører Christiansen en ung Fugl fra Lyngsaa 1½ Mil S. f. Sæby (Bg.).

Puffinus Anglorum, Ray

Skrofe.

Propr. Suhr eier et Expl., skudt paa Møen 1867.

Sterna Caspia, Pall.

Rovterne.

Den 9. Juni 1880 traf Propr. Suhr et Par ved Svenstrup pr. Nakskov. — I Næstvedegnen, hvor den

*) Vistnok det samme Expl., som i Wings 8de Aarsberetning (f. 1890) S. 127 nævnes som skudt ved Mundingen af Ribe Aa.

tidligere — ifølge Melchiors Angivelse (kfr. „Skand. Fugle.“ S. 586) — forekom paa Enø, træffes den nu aldrig (N. F.). — Paa de sønderjydske Vesterhavsøer synes den at være aftaget betydeligt i Antal, ligeledes paa Øerne i Kattegat. I Aug. 1891 blev en Han skudt mellem Manø og Ribe (M. Claussen), og i Sommeren 1892 iagttog samme Meddeler en Flok paa 8 Stkr., der hver Morgen Kl. 5 fløi op ad Nipsaa og om Aftenen Kl. 8 vendte tilbage til Havet. — 8. Aug. 1893 blev der paany skudt et Expl. ved Ribe (Claussen, — Bg.).

Sterna Cantiaca, Gm.

Kentisk Terne.

I Næstvedegnen er den meget sjelden og vides kun to Gange bemærket der, nemlig 4. Aug. 1887, skudt ved Karrebæksminde, og 4. Okt. 1890, skudt paa Gaunø Fjord (N. F.).

I 1893 fandt R. Olsen en meget stor Koloni (1 à 2000 Par) ynglende paa en Holm i Ørum Sø. Samme Aar lykkedes det Hagerup at opdage en endnu større Koloni (2—4000 Par) paa de saakaldte Klægbakker ved Ringkjøbing Fjord. Paa Tipperne i samme Egn yngler den i mindre Antal.

Om denne og følgende Arts Ynglesteder i Jylland findes en Række interessante lagttagelser af Hagerup i hans Afhandling: „Vorkommen der Seeschwalben und Möwen in Jütland“ (i „Ornith. Monatsschr. d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt“ XIX. Jahrg. 1894. S. 149—59. Særtr. S. 1—11), hvortil henvises.

Sterna Anglica, Montagu

Engelsk Terne.

I Mai 1885 ynglede den endnu i Mængde paa den af Heiberg i „Thylands Fugle“ omtalte Lokalitet, Madsted-

borg i Ove Sø i Thy. I 1893 besøgte R. Olsen Holmen og fandt da, at Kolonien ganske havde forladt sin tidligere Yngleplads. — De gamle Kolonier fra Flade- og Ørum-Sø ere ikke vendte tilbage, og for Tiden synes det, at denne Terneart har trukket sin Hovedstyrke ganske bort fra Thy, og at kun et mindre Antal endnu yngler paa enkelte af de i Limfjordens vestlige Del spredte Øer og Holme. Nærmere Oplysninger herom findes i Hagerups ovenfor nævnte Afhandling.

Paa Vaar- og Kyøholmene ved Nibe yngle c. 50 Par (Barfod).

D. 10. Juli 1891 blev en gl. Hun skudt af Gaard-eier H. C. Andersen ved Kjelstrup pr. Skalbjerger, Odense Amt (Hjeronymus, — Bg.).

Larus minutus, Pall.

Dværgmaage.

D. 7. Okt. 1867 skudt ved Stege (P. — Bg.). — 10. Mai 1878, ung Hun skudt paa Skallingen ved Esbjerg. Expl. eies af Kapt. Kalkau. — I Slutningen af Aug. 1878 saaes en lille Flok paa 6 unge Fugle ved Gjødesholm i Næstvedegnen (N. F.). — I Sorø Akademiets Samling findes en Hun, skudt i Okt. 1882 ved Petersborg pr. Sorø (O. Zoffmann). — I Mai 1883 gl. Fugl skudt paa Vindsholm (Suhr). — 7. Okt. 1888 ung Han skudt paa Amager (Konserv. Hansen). — I Nov. 1888 skudt ved Fladesøens Udløb i Limfjorden (Bendixen, — Bg.). — En Han fra Københavns Omegn, skudt 20. Nov. 1888, er opstillet i Zool. Mus. — I Dec. 1889 skudt ved Assens (Bruun, — Bg.). — 15. Okt. 1893 ung Han skudt paa Amager (Sch.s Sml.).

Larus tridactylus, L.

Tretaaet Maage.

D. 16. Okt. 1881 ung Fugl skudt paa Horsens Fjord (Helms). — 27. Okt. 1888 Rødvig ved Stevns (Valentiners Sml. — Bg.). — 11. Nov. s. A. talrig — baade gamle og unge Individder — ved Læsø og Anholt (A. Hagerup — Winge). — 24. Jan. 1890 blev en yngre Fugl funden døende paa Isen paa Viborg Søndersø (W.). — 8. Nov. 1890 Ørum ved Viborg (Hagerup). — 6. Marts og 13. Marts 1891 to Hunner skudte ved Nørre-Nebel (Pirtzel). — 3. Juni 1891 Nymindegab (Kn. A.). — 15. Marts 1892 skudt paa Amager (Helms, Bg.). — 12. Okt. 1893 Amagers Vestkyst, skudt af Portrætmaler Rosenfalk (Kn. A.). — 28. Okt. s. A. Klapløbet paa Amager, ung Hun (Sch.s Sml.). — 30. Okt. 1893 saaes den „almindelig hele Kattegattet over, saavel gamle som unge“ (Helms. — Bg.). — 2. Nov. s. A. gl. Hun i Vinterdragt, Palsgaard (Sch.s Sml.). — 13. Nov. s. A. gl. Hun, Frederikshavn (Sch. — Bg.). — I Januar 1894 to unge Fugle fangede ved Ribe (M. Claussen. — Bg.). — 21. Febr. s. A. blev et gammelt Individ fundet død paa Isen paa Viborg Søndersø (W.). — 5. Januar 1895 blev en Hun fanget med Hænderne af en Brændehugger i Julianelyst Skov pr. Horsens (Schiøler. — Pirtzel).

En Angivelse, som jeg i Marts 1889 modtog fra Hr. Cand. jur. Carl Becker om, at han i 1876 traf den ynglende paa Eskildsø i Roskilde Fjord, meddeles med alt Forbehold.

Larus leucopterus, Faber

Hvidvinget Maage.

D. 12. Aug. 1889 blev — ifølge Meddelelse fra Konservator Hjeronimus — en ung Hun skudt paa Odense

Fjord af Gaardeier H. C. Rasmussen. Expl. er opstillet i Odense Museum (Bg.).

Larus glaucus, Brünn.

Graamaage.

Et Expl., skudt paa Møen 1868, findes i Propr. F. Suhrs Samling. — 4. Jan. 1888 skudt ved Rødvig (Arct. — Winge). — I Efteraaret 1888 skudt paa Nyord (Møen) og opstillet i den Sophiendalske Samling (Rosenkrantz, — Bg.). — En gl. Fugl fundet anskudt paa en Mark ved Storehedinge (Arct. — W.).

Larus fuscus, L.

Sildemaage.

D. 4. Mai 1867 blev der skudt 4 Explr. ved Hegnede paa Møen; det ene findes i F. Suhrs Sml. — 3. Jan. 1888 skudt ved Dybsø (N. F.). — 20. Sept. 1891 ung Hun skudt ved Æbelø (Hjeronimus — Bg.). — 20. Okt. 1893 skudt ved Assens af Fisker Nic. Meier. Expl. er opstillet i Odense Museum (Hjeronimus — Bg.).

Xema Sabini, Leach.

Kløfthalet Maage.

D. 27. April 1893 blev et Expl. af denne sjeldne Maage, som hidtil ikke vides at være truffet i Skandinavien, fundet i Præstø Bugt, død af et Skudskaar i Underlivet. Finderen solgte Fuglen til Skovfoged Juul i Stokket ved Vordingborg, som senere overlod den til Baagøe, i hvis Samling den nu er opstillet. — I zool. Mus. findes en Overarmsknokkel af dette Individ. — [Nogle nærmere Oplysninger om Arten findes i „Skand. Fugle“ S. 605].

Stercorarius pomarinus, (Temm.)

Middelkjove.

Et Expl., skudt paa Møen 1868, findes i Propr. Suhrs Sml. — 3. Okt. 1877 fundet død ved Viborg. Expl. opbevares i Sorø Akademiets Sml. (O. Zoffmann). — 5. Juni 1885 Bøgsted Rende, Thorup Klit i Jylland (Forpagter Madsen — Bg.). — 11. Sept. 1887 Bjelkerup Mark ved Storehedinge (Arct.s Sml. — Bg.). — 12. Sept. s. A. ved Eistrup (N. L.s Sml.). — 19. Okt. 1887 Vester Vedsted Strand ved Ribe (Sch. — Bg.). — I Juli 1888 Agger Kanal (Bruun — Bg.).

Afdøde Pastor P. A. Holm har i Brev af ¹⁸/₁₁ 90 tilskrevet mig, at han „for nogle Dage siden fik et smukt Expl., en ung Han fra Lillebelt“; den blev sendt til Bruun i Fredericia for at udstoppes. — 28. Okt. 1892 ung Han skudt i Klapløbet paa Amager (Sch.s Sml.). — 10. Dec. 1892 ung Han fra Bagsværd (Jernbane-assistent Fischer — Rob. Olsen). — I Efteraaret 1893 Gisselør i Kallundborg Fjord (O. Lund). — Fra Baagøe har jeg faaet Meddelelse om, at Skovfoged Juul i Stokket ved Vordingborg har udstoppet 2 Explr., som vare sendte til ham fra Vestervig (Jylland), hvor de bleve skudte 13. Okt. 1895. — Et Expl. skudt 29. Okt. 1895 i Kjøgebugt (Ferslev. Bg.).

Stercorarius parasiticus, (L.)

Spidshalet Kjove.

D. 20. Aug. 1876 skudt ved Kjærstrup paa Møen (Sidenius's Sml. — Bg.). — 26. Jan. 1885 Hardenberg (Holck-Hardenbergs Sml. — Bg.). — 11. Sept. 1885 ung Hun ved Ribe (Hjeronimus — Bg.). — En mørk Varietet skudt s. A. ved Hals (K.). — 9. Okt. 1890 Eistrup (Larsens Sml.). — 28. Okt. s. A. Ulfshale paa Møen

Bg.s Sml.). — S. A. paa Vindsholm (Suhr). — I Efteraaret 1892 Vestervig (Madsen — Bg.) og Oddesund (Kjøbm. Weilings Sml. i Holstebro — Bg.). — I Mai 1893 Stege Nor (Tandlæge Kjær — Bg.). — 17. Sept. s. A. Lillebælt, N. f. Assens; Expl. opstillet i Odense Museum (Hjeronymus). — 22. Sept. s. A. købt i en Vildthandel i Kbhvn. (Sch.).

Stercorarius cepphus, (Brünn.)

Lille Kjove.

I Sept. 1888 ung Fugl skudt ved Struer (Konserv. Hansen). — 3. Okt. 1890 Holløse pr. Næstved (Møller O. Høyer — Bg.). — 5. Okt. s. A. fanget i Fladskov paa Løvenborg Gods (Kn. A.) og opstillet i d. Sophiendalske Sml. (Rosenkrantz — Pirtzel). — 6. Okt. s. A. indsendtes fra Baron Rosenørn-Lehn et ungt Individ, skudt nogle Dage før ved Stensøre, Guldborgland, til Zool. Mus. — 7. Okt. s. A. Eistrup (Larsens Sml.). — 22. Okt. s. A. købt i en Vildthandel i Kbhvn., hvortil det, efter Sigende, var sendt fra Jylland (Kn. A.). — Okt. s. A. skudt ved Holsted pr. Næstved (Bg.s Sml.). — 30. Sept. 1891 fanget ved Eistrup (Larsens Sml.).

Cygnus Bewickii, Yarr.

Pibsvane.

Ifølge Meddelelse fra Propr. Suhr blev der i Okt. 1873 seet en Flok paa 48 Stkr., flyvende over Svenstrup paa Lolland. — Ved Vindsholm blev den truffet d. 23. Febr. 1881 (Samme). — I Baagøes Sml. findes et Expl. fra Ringkjøbing, skudt 3. April 1881. — 9. Okt. 1890 Han skudt ved Rønne (Kn. A.s Sml.).

Anser erythropus, (L.)

Dværggaas.

D. 9. Okt. 1880 blev en ung Han skudt ved Holbækgaard pr. Randers af Gartner Jørgensen. Den var i Selskab med en Flok Sædgjæs. Af Etatsraad Mourier-Petersen blev den sendt til zool. Mus. (Bg.). — En Han, skudt ved Ulfshale paa Møen 4. Okt. 1886, kom i C. Reitzels Besiddelse.

Bernicla brenta, (Pall.)

Knortegaas.

Propr. Suhr har meddelt mig, at et hvidt Exemplar blev seet ved Olmsevig i 1880.

Bernicla leucopsis, (Bechst.)

Bramgaas.

I Aarene 1850—54 forekom den i stort Antal ved Enø; nu er den sjelden saavel der som andetsteds i Næstvedegnen; i Okt. 1887 blev den skudt ved Karrebæk (N. F.). — I Nov. og Dec. 1891 to Stkr. skudte ved Ribe; det ene Expl. findes i Bjerrums Sml., det andet i Zool. Mus.

Bernicla ruficollis, (Pall.)

Rødhalset Gaas.

De i „Skand. Fugle“ S. 649 omtalte Explr. fra Ourø (1855) og fra Amager (1862) findes nu i Zool. Mus.

D. 11. Nov. 1894 blev en Han, der opholdt sig sammen med en Flok Knortegjæs, skudt paa Venning Mark ved Nørreaa pr. Randers af Gaardeier Jens Clausen. Fuglen blev udstoppet af Bundtmager H. S. Thuesen i Randers

og blev erhvervet af Grev Bille Brahe, i hvis Samling paa Hvedholm i Fyen den findes (Pirtzel, — Bg.).

Anas acuta, L.

Spidsand.

I Næstvedegnen yngler den ifølge N. F. paa flere Steder (Dybsø, Nylandsmosen). — Paa Saltholm yngler den almindeligt (R. Olsen, — Bg.). — Propr. Suhr traf den i Mai 1868 med 14 Ællinger paa Hyldekrog paa Lolland. — Ifølge samme Meddeler ynglede den i 1888 ved Svenstrup.

I Eistrup-Eggen synes den at være meget sjelden. Kjøbm. Larsen har kun bemærket den een Gang der, nemlig d. 22. Jan. 1892, da han skjød en Han.

Anas clypeata, L.

Skeand.

I Næstvedegnen er den i 1890 fundet ynglende paa Dybsø og i Rettestrup Sø (N. F.). — 17. Mai 1893 traf R. Olsen en kun faa Dage gammel Ælling p. Saltholm.

Anas querquedula, L.

Atlingand.

Prop. Suhr skjød 6 netop flyvefærdige Ællinger d. 4. Aug. 1868 ved Svenstrup. — Paa Asnæs yngler den i Lerchenborg Dyrehave.

Tadorna vulpanser, Flem.

Gravand.

Paa Store Restrup mellem Aalborg og Nibe udgravedes d. 23. Mai 1894 en Rævegrav i en Lyng-

bakke. Side om Side med de fem Ræveunger, der fandtes dybt nede, laa en Gravand paa 15 noget rugede Æg (Barfod).

Tadorna rutila, (Pall.)

Rustand.

Den 1. Sept. 1866 modtog Konserv. Hjeronimus en Rustand, der var fundet død ved Faaborg i fordærvet Tilstand. Fuglen blev desværre ikke opbevaret. — 26. Juni 1893 blev en Flok paa 10—12 Stkr. bemærket paa Stensby Skovstrand under Petersgaards Skovdistrikt ved Vordingborg. Et Expl. (Han) blev skudt og af Forstkandidat Aage Holten indsendt til Zool. Mus., hvor det findes opstillet.

Kjøbm. P. Nielsen, Eyrarbakki paa Island, angiver under 27. Jan. 1893 at have skudt tre Stkr. paa nævnte Lokalitet i Juli 1892. Det ene Expl. er opstillet i Museet i Reykjavik, det andet blev skjænket til Museet i Kbhvn., det tredie var saa forskudt, at det ikke blev opbevaret. Konsul Havsteen i Akureyri (Akreyri?) havde, ifølge samme Kilde, to Explr. tilbage af nogle, han havde skudt deroppe (Sch., — Bg. kfr. Winge, Aarsberetn. f. 1892. S. 77 og 1893. S. 68).

Fuligula rufina, (Pall.)

Rødhovedet And.

En gl. Han af denne Art, som ikke med Sikkerhed vides at være truffet tidligere i Danmark (kfr. „Skand. Fugle“ S. 677), blev d. 15. Jan. 1892 skudt paa Feldskov Rev, lidt S. f. Rødvig af Gaardmand Lars Olsens Søn i Lund. Fuglen eies af Toldassistent Jeppesen, men Kropskellettet er afgivet til Zool. Mus.

Erismatura 'leucocephala, (Scopoli).

Hvidhovedet And.

En Meddelelse fra Propr. F. Suhr om, at et dødt Expl. af denne Art, der hidtil ikke vides at være truffet i Danmark, i Vinteren 1871 blev fundet af to Fiskere paa Isen udfor Taars i Langelandsbæltet, gjengives her med alt Forbehold i Hens. til Bestemmelsens Rigtighed. Hr. Suhr støtter ikke sin Angivelse paa Selvsyn, men paa Fiskernes bestemte Paastand efter at de havde udpeget Figuren i Atlaset til „Skand. Fugle“, der blev dem forelagt.

Oidemia fusca, (L.)

Fløielsand.

Da jeg i 1877 sluttede Udgivelsen af „Skandinaviens Fugle“, kjendtes intet Tilfælde af denne Fugls Forekomst i Grønland eller paa Island (kfr. l. c. S. 680). I Efteraaret 1878 skjænkede dav. Cand. polyt. Kornerup til d. Zool. Mus. et smukt Skind af en Han, som i Begyndelsen af Mai s. A. var skudt et Par Mil S. f. Godthaab af en Grønlænder, som solgte Fuglen til Lieuten. Jensen, der var Chef for den til Grønland udsendte Expedition.

Harelda glacialis, (L.)

Havlit.

I Valentiners Sml. findes en Albino, skudt i Kjøgebugt udfor Gjorslev Bøgeskov 21. Jan. 1891 (Bg.).

Stelleria dispar, (Sparrm.)

Stellers And.

To Exemplarer af denne prægtige Art, begge Hanner, bleve skudte 14. Dec. 1887 i Kjøgebugt udfor Gjorslev Bøgeskov. Den ene af dem blev spist, den anden opbevares i C. Valentiners Samling paa Christine-

lund pr. Præstø (N. F.). — I Begyndelsen af Januar 1888 blev en Hun skudt ved Bøgeskov, Stevns (Arct.). — 14. Jan. 1892 blev en gl. Han (ifølge Winge, Aarsberetn. f. 1892 S. 76 var det en Hun) skudt paa Faldskov Rev, S. f. Rødvig af Toldassistent Jeppesen, i hvis Samling den findes. Kropskelettet af dette Expl. blev afgivet til Zool. Mus. — Samme Dag blev et andet Expl. fanget sammesteds og spist, men Hovedet og Vingerne undgik Ødelæggelsen (Sch. — N. F.). — 9. Nov. 1894 modtog Bjerrum i Ribe en gl. Han, som Aftenen forud var skudt paa Andetræk af en Bonde ved Udløbet af Ribe Vesteraa. Expl. kom til Zool. Mus.

Somateria mollissima, (L.)

Ederfugl.

Af Varieteten V-nigrum, hvis egenlige Hjemstavn skal være de nordligste Egne af det vestlige Nordamerika, og som udmærker sig ved en mere eller mindre tydeligt fremtrædende sort V-formig Tegning paa Struben, købte zool. Mus. i Januar 1894 en Han i en københavnsk Vildthandel. Den karakteristiske Strubetegning var dog kun svagt antydet (W.).

Mergus merganser, L.

Stor Skallesluger.

I 1866 ynglede den i et hult Træ paa Knudshoved ved Vordingborg (Suhr). — Skovr. Møhl-Hansen meddeler, at ikke faa Par yngle paa Klinteskrænterne paa Møen; saaledes fandt han dens Rede med 9 Æg i en hul Bøg ved Abildgaardsfaldet d. 13. Mai 1892 (Æggene vare ganske dækkede med Dun), og paa samme Lokalitet en Rede med 10 Æg d. 7. Mai 1893; — 30. April s. A. blev en Rede med 12 Æg fundet i et hult Træ i Stubberup-

have. Sammesteds skal den (ifølge Møhl-Hansen) i 1891 have ynglet i en Uglekasse*), og ved Liselund 1. Mai 1892.

Mergus serrator, L.

Toppet Skallesluger.

Baagøe fandt den ynglende paa 'en lille Holm i Præstø Fjord 17. Juli 1893. Fuglen laae saa fast, at han maatte løfte den med Haanden af Reden. — Paa Saltholm yngler den almindeligt. — Skovrider Kaas angiver at have fundet den ynglende i hule Træer i Gunderslevholm Dyrehave, hvor den ogsaa, ifølge Skovr. Winds Angivelse, hvert Aar yngler paa en gammel Bøgs kullede Stamme (N. F.).

Mergus albellus, L.

Hvid Skallesluger.

I 1865 blev der skudt flere Explr. paa Maribo Sø (Suhr). — 15. Febr. 1875 Silkeborg (Bg.s Sml.). — Dec. 1880 Kronborg (Kapt. Smiths Sml. i Aarhus — K.). — I Vinteren 1880—81 en Han ved Stevns Klint (Arct.s Sml. — Bg.). — 13. Marts 1886 en Hun ved Bissrup pr. Næstved, og 17. Marts s. A. en Han sammesteds (Sorø Akad.s Sml. — O. Zoffmann). — 10. Febr. 1887 en Han i Grønsund (P. — Reitzel). — I Febr. 1888 fik Bruun en Han fra Faxe til Udstopning (K.). — 12. Febr. s. A. Masnedsund (K.). — 18. Marts og 10. April s. A. Holløse ved Næstved (N. F.). — I Marts s. A. forekom den i større Antal ved Vordingborg (Therkildsen, — Bg.).

*) Overalt i Skovene paa Høie Møen er der anbragt saadanne, for at Natuglerne, der gjøre stor Nytte ved at udrydde Musene, skulle have lettere ved at finde Ynglepladser.

— 16. Febr. 1889 skudt ved Eistrup pr. Nørre-Snede (K. Kristensen, Hesselballe). — 3. Jan. 1890 Sjørring Sø (Madsen, — Bg.). — 19. Dec. 1890 Rødvig, ung Fugl (Arct.s Sml. — Bg.). — I Vinteren 1890—91 Han og Hun ved Nyborg, skudte af Kapt. Howitz (K.s Sml.). — 14. Febr. 1891 Karrebæk Fjord (N. F.). — 15. Jan. 1892 Holløse (N. F.). — 27. Dec. s. A. Hømb Mølleaa ved Ringsted (I. Christensen, — Bg.). — I 1892 modtog zool. Mus. fra Konserv. Scheel Kroppen af en Han, skudt ved Nivaa pr. Humlebæk. — 14. Jan. 1893 Aaen ved Ribe (M. Claussen, — Bg.). — 24. Jan. 1893 Jægerspris (R. Olsen, — Bg.).

[I Odense Museum findes et Expl. af Bastardformen af *Mergus albellus* og *Clangula glaucion*: **Anas mergoides**, Kjærbo. skudt 14. Marts 1888 paa Odense Fjord (Hjeronimus)].

Sula bassana, (L.)

Sule.

26. April 1871 Hindsgavl (Bg.). — 10. Okt. 1875 Voraa (Christiansens Sml. — Bg.). — 5. April 1881 fundet død udfor Tolbøl Klit i Thy (K.). — I Vinteren 1882 havde Bruun et Expl. fra Skive til Udstopning (K.). — 6. Mai 1883 fanget af Fiskere paa Havet udfor Lønstrup; Expl. kom til Hjørring Realskoles Sml. (Dyrlæge Larsen). — I Efteraaret 1883 skudt ved Fredericia (K.). — I Begyndelsen af Nov. 1886 skudt i en Mergelgrav i Nærheden af Bovbjerg; Expl. blev sendt til en Privatsamling i Kbhvn. (Dyrl. Larsen). — En gl. Hun skudt ved Frederikshavns Havn 2. Okt. 1889 (Hedwig Claussen). — I Marts 1890 fundet død ved Sæby Strand (Christiansen, — Bg.). — I det zool. Mus. er opstillet en Han fra Skagens Fyr (9. Jan. 1891). — Sammesteds findes Spiritus-Præparater af et Individ. ligeledes fra Skagen

(28. Jan. 1893). — 11. Okt. 1891 gl. Han fanget i Egnen ved Eistrup (N. L.). — 12. Sept. 1891 modtog O. Lund i Kallundborg en Havsule, som nogle Dage forud var fanget i Kallundborgfjord paa Kysten af Refsnæs. — 20. Sept. 1893 fanget i Haa Bugt, opstillet i Gaardeier Peter Jensens Sml. i Fredtofte pr. Varde (Christiansen, — Bg.). — 24. Sept. s. A. gl. Han, Harboøre (Juuls Sml. i Stokket ved Vordingborg, — Bg.). — 29. Sept. s. A. fanget ved Esbjerg (Christiansen, — Bg.). — I Sept. s. A. fanget paa Hindsholm ved Fyen, opstillet i Kjerteminde Realskoles Sml. (Christiansen, — Bg.). — 29. Okt. s. A. to Explr. skudte ved Ribe (M. Claussen, — Bg.). — 30. Okt. s. A. iagttoges fra Skib tre gamle Individer et Par Mile N. V. f. Skagen (Helms, — Bg.).

Diomedea melanophrys, Boie.

Sulekonge*).

I „Vid. Medd. fra d. naturhist. Foren. i Kbhvn.“ f. 1894 S. 241—64 har Kn. Andersen publiceret en Række Oplysninger om et Exemplar af denne Albatros-Art, som i over 30 Aar har opholdt sig paa Myggenæsholm (Færøerne), indtil den blev skudt der 11. Mai 1894.

Graculus carbo, (L.)

Kormoran Skarv.

I 1874 skudt i Klintholm Have paa Møen (Møhl-Hansen). — 7. Okt. 1875 fanget ved Horsens (K.). — I 1886 blev et Expl. skudt ved Karrebæk (N. F.). — En ung Skarv blev skudt 16. Febr. 1890 ved Frederikshavn, og i Efteraaret 1889 bemærkedes en større Flok

*) Denne Benævnelse er valgt, fordi det ovenomtalte Expl. i mange Aar gik under dette Navn blandt Færingerne.

sammesteds, hvor en gl. Han blev skudt (Hedwig Claussen). — 25. Jan. 1893 skudt ved Lerchenborg (Lehnsgr. Lerches Sml. — Pirtzel). Ifølge Lehns greve Lerches Meddelelse var den ikke skudt der i de sidste 20 Aar. — 10. Nov. 1893 blev en Han skudt i Nærheden af Rønne. Expl. findes i Grev H. Bille Brahes Sml. paa Hvedholm (Pirtzel).

Alle dens tidligere Ynglepladser her i Landet synes nu at være forladte af den, og Meddelelser om nye ere ikke indkomne.

Graculus cristatus, (Gunn.)

Topskarv.

D. 13. Febr. 1892 ung Hun fra Aggertangen (Arbejdsmand Thomas Bang), opstillet i Postmester Bendixens Sml. (Bg.). Sandsynligvis er dette det samme Expl., om hvilket Kapt. Kalkau har meddelt mig, at det i Vinteren 1891—92 blev fundet dødt ved Vestervig. — 10. Jan. 1894 modtog zool. Museum en Han, der nogle Dage tidligere var fanget paa et Skib udfor Bovbjerg; den blev sendt til zool. Have, men døde strax der.

Podiceps cristatus, (L.)

Toppet Lappedykker.

Fra 1858 til 1862 ynglede den hvert Aar i Sorø Sø, i 1865 i Maribo Sø (Suhr). — I Eistrup-Egnen træffes den ynglende i flere af Søerne (N. L.). — 16. Mai 1886 fandt Faber den ynglende i Hald Sø, 25. Juni s. A. og 17. Juni 1887 i Viborg Sø og 4. Juni 1887 en Rede med 6 Æg i Ved Sø (Bg.). — 7. Juni 1891 fandt Kn. A. dens Rede med 6 Æg i Furesøen. — I Tjustrup Sø yngler den ifølge N. F.

Podiceps auritus, (L.)

Øret Lappedykker.

Et ungt Expl. skudt ved Lerchenborg 8. Aug. 1895
(Lehnsgr. Lerche, — Pirtzel).

Podiceps cornutus, Lath.

Hornet Lappedykker.

Udenfor de sædvanlige Træktider, paa hvilke denne Art træffes temmelig almindeligt, ere følgende Tilfælde af dens Forekomst komne til min Kundskab: Skudt ved Vemmetofte d. 13. Marts 1888 og fanget ved Storehedinge 14. Marts s. A. (Arct.). — Skudt i Sortsø ved Stubbekjøbing d. 17. i samme Maaned (Barfod). — I Mai s. A. modtog Bruun et Expl. fra Æbeltoft i fuldstændig Sommerdragt med stor Top og Krave (Bg.). — Kjøbm. Larsen erholdt et Expl. skudt ved Eistrup 20. Jan. 1891.

Den angives som ynglende paa Fussingø ved Randers (Thuesen, — Bg.). — En Forvexling med en anden Podiceps Art er vel neppe utænkelig.

Podiceps nigricollis, Sundew.

Sorthalset Lappedykker.

En Skovfoged i Viborg-Egnen sendte i April 1884 en Han og tre Hunner til Udstopning hos Bruun (K.). — I Mai 1888 skudt ved Æbeltoft (K.) og ved Varde (Bruun, Bg.). — 28. Mai 1890 skjød Skovf. Christiansen tre Stkr. i Sommerdragt ved Kollerød pr. Vinderup (Bruun, — Bg.); det ene Expl. (gl. Han) eies af Kapt. Kalkau. — Et Expl., skudt 8. Aug. 1890 i Sigerslev Mose ved Stevns, findes i Valentiners Sml. (Bg.). — 13. Aug. 1893 Nibe Bredning (Bg.).

Podiceps minor, Gm.

Lille Lappedykker.

I 1883 ynglede den i en Mergelgrav ved Svenstrup (Suhr). — Ifølge N. F. yngler den i Tjustrup Sø.

Colymbus glacialis, L.

Islom.

I Vinteren 1864—65 skudt ved Svenstrup pr. Borup (Jagtt. 1886). — Okt. 1867 ved Ry Aa ved Birkelse (Mariager). — I Bg.s Sml. findes et Expl. i Vinterdragt, skudt 1886 mellem Langeland og Ærø. — 1. Marts 1888 fanget af nogle Drenge under en stærk Snestorm mellem Lou og Næstved. Fuglen var kort forinden bleven angrebet af en Rovfugl og var derfor noget for-
tumlet. — 12. Marts 1888 ung Han skudt ved Frederikshavn (Zool. Mus.). — Fra Frederikssund modtog Zool. Mus. en ung Islom, skudt 10. Juni 1888 af Brofoged Oluf Jensen ved Kronprins Frederiks Bro. — 21. Juni 1891 et Expl. i ren Sommerdragt, Løgstør (Bruun, — Bg.). — Febr. 1893, i Overgangsdragt, Præstø (Juul, — Bg.). — 15. Febr. 1893 under en Snestorm fanget ved Bækkeskov pr. Rønnede (Kammerraad Carlsens Sml. — Bg.). — I Marts 1893 skudt i Præstø Bugt (Juul, — Bg.).

Colymbus arcticus, L.

Polarlom.

I Sorø Akademiets Samling findes en Han, der i Vinteren 1867—68 blev fanget i Sorø Sø. — 18. Febr. 1876 Østermark paa Møen (Gaardm. H. Nielsen, — P.). — I Okt. 1887 fanget i en Kaalmark ved Lerchenborg og sendt til Grev Schack paa Spanager. — 20. Nov. 1887 ung Fugl skudt ved Karrebæk (N. F.). — I Marts 1888

skjød Brofoged Oluf Jensen en gl. Han paa Issefjord N. f. Kronprinds Frederiks Bro. — 4. Marts 1888 ung Fugl skudt ved Høirup (Arct.). — 11. Marts s. A. gl. Fugl i Vinterdragt skudt ved Rødvig (Arct.). — Paa Industriudstillingen 1888 fandtes to Explr. fra Frederikshavn. — 27. Marts s. A. Knudsskov i Sydsjælland (Olsen, — Bg.). — Samme Dag skudt ved Karrebæk (N. F.). — 18. Marts s. A. ved Holløse (N. F.). — 16. April s. A. udfor Stevns skudt af Fisker Chr. Petersen (Bg.). — Juli s. A. Grenaa (Bruun, — Bg.). — Nov. s. A. Faxe Ladeplads (Bruun, — Bg.). — I Midten af Marts 1889 gl. Han fanget i et Fiskegarn udfor Glatved Strand. Fuglen blev udstoppet og eies af en Gaardmand i Aalsrode pr. Grenaa (Dyrl. Larsen). — Dec. 1889 Flade Sø (Madsen, — Bg.). — I Slutningen af April 1890 2 Hunner og 16. Mai en Han, alle fra Bornholm (Pirtzel). — 24. Okt. 1890 skudt paa Frederikssunds Fjord (A. Torp, Zool. Mus.). — 13. Nov. 1890 Stevns (Toldassistent Jeppesen, — Bg.). — Pastor P. Alberg Holm i Gamtofte har i Brev af 18. Nov. 1890 meddelt mig, at han „for nogle Aar siden i August Maaned“ fik en meget smuk gl. Han fra Lillehelt, og at Expl. blev sendt til daværende Kultusminister Fischer. — 20. Dec. 1890 Horsens Fjord; Expl. kom i Kjøbm. Larsens Sml. i Eistrup. — I Dec. 1891 Samsø (Weitzmann, — Bg.). — 22. Dec. s. A. Rødvig ved Stevns, Sommerdragt*) (Arct.s Sml. — Bg.). — I Juli 1892 Mølle dammen ved Gjorslev Bøgeskov (Valentiners Sml.). — 3. Juli s. A. iagttog Helms tre gamle og to yngre Individer ved Skagens Sydstrand. — 2. Dec. s. A. sk. i ren Sommerdragt ved Bøtø paa Falster (Juul, — Bg.). — 9. Dec. s. A. ligeledes skudt i ren Sommerdragt i Lillebelt v. Fredericia

*) Ifølge Arct.s Meddelelse fandtes der i Underlivet en stor Svulst af kræftagtigt Udseende, og Fuglen var udmagret og syg. Muligvis staaer den sene Fældning i Forbindelse dermed.

(Bruun, — Bg.). — 15. Febr. 1893 dræbt ved Bækkeskov pr. Rønnede (Godsforvaler Carlsen). Skelettet findes i Zool. Mus. — 19. Febr. s. A. gl. Han i Sommerdragt skudt paa Sydpynten af Amager (Sch.s Sml.). — 20. Febr. s. A. fanget ved Silkeborg (Juul, — Bg.). — 14. Jan. 1894 skudt af Faber paa Veile Fjord (Bg.).

Uria Brünnichii, Sabine

Brünnichs Teiste.

Skudt 13. Jan. 1886 ved Bregentved (Slotsgartner Keller — Bg.).

Uria troile, (L.)

Langnæbet Teiste.

I Okt. 1884 bleve to isabellafarvede Varieteter skudte ud af en Flok paa 5 Stkr. ved Brandsø i Lillebelt (K.).

Af Varieteten *U. hringvia*, *Brünn.* findes i Kolding Realskoles Samling et Expl., skudt 1. Okt. 1885 paa Møen (P. — Bg.). — I Okt. 1885 skudt ved Ringkøbing (Jagtt.). — 18. Nov. 1890 skudt udfor Rødvig (Arct. — Bg.). — I Febr. 1891 Rønne (Madsen — Bg.). — I Efteraaret 1892 Birkendegaard ved Kallundborg; Exemplaret blev af Grev Vilh. Lerche skjænket til Zool. Mus.

Af den typiske Form blev et Expl. fanget 1. Nov. 1893 ved Eistrup, hvor Arten hidtil ikke er truffet; samtidigt blev et andet Expl. fanget ved Vester Mølle i samme Egn, og d. 11. Nov. saaes en Flok paa 6 Stkr. sammesteds (N. L.). — I Vinteren 1893—94 fanget paa Stranden ved Blaavandshuk (Skelettet i Zool. Mus.).

Fratercula arctica, (L.)

Nordisk Lunde (Søpapegøie)

Kapt. Kalkau eier en Han, skudt i Lillebelt Okt. 1878. — I Baagøes Sml. findes et Expl., skudt ved Ringkjøbing 20. Okt. 1880. — I 1881 udstoppede Bruun to Explr. (Han og Hun), der vare fangede i det nordlige Jylland (Brev fra Bruun til K.). — I Jan. 1890 fanget i Limfjorden ved Thisted. Samtidigt blev der fanget og skudt flere Exemplarer i Limfjorden, og ved Vesterhavskysten drev mange døde Individer i Land (Madsen — Bg.). — Fanget i Begyndelsen af 1890 ved Sulsted pr. Aalborg, efter at være fløiet mod en Telegraftraad (Nat. Tid. $\frac{4}{90}$ — K.). — 6. Marts 1890 modtog Frk. Hedwig Claussen i Frederikshavn et Exemplar fra Hr. Wulff i Hjørring til Udstopning. Kjøbm. Larsen modtog s. A. et Expl., skudt 29. Okt. ved Oxby Ho pr. Varde. — 16. Nov. s. A. ung Fugl skudt ved Fyens Hoved af Gros-serer Esmann i Odense (Hjeronimus — Bg.) — I Efter-aaret 1891 Thorup Strand i Nordsjælland (Sophus Jensen Asserbo — Bg.). — 24. Nov. 1893 ung Fugl fanget af Lods Krausgaard i Frederikshavn (Bg.). — I Dec. s. A. Gl. Skagen 2 Explr. (Zool. Mus.) — Sammesteds findes Skelettet af et ungt Individ, sandsynligvis fra Jylland (kjøbt i en Vildthandel i Kbhvn. i Dec. 1893). — 4. Jan. 1894 Aalbæk Station ved Skagen (Hedwig Claussen. — Bg.). — 25. Marts 1894 fanget i Fiskegarn ved Agger Th. Juul — Bg.s Sml.) — 27. Okt. 1895 skudt paa Veile Fjord, ung Fugl. Expl. opbevares i Spiritus i Zool. Mus. (Faber, — W.).

Alca torda, L.

Alk.

Det synes, at et større Træk af denne Art, der ellers holder sig til Kystegnene, i Febr. 1894 har forvildet sig

længere ind over Land paa den jydsk Halvø. Kjøbm. Larsen modtog saaledes 20. Febr. et Expl., der var fundet dødt i Nærheden af Herning, og Dagen efter et andet Expl. fra Omegnen af Nørre Snede. Samtidigt fik Konservator A. Sørensen i Horsens tilsendt en hel Del Explr. fra forskellige Egne af Jylland.

Alca impennis, L.

Geirfugl.

Om det Expl., der findes i Fuglesamlingen paa Aalholm, har Assist. Herluf Rosenkrantz meddelt Baagø følgende: Fuglen er i sin Tid bragt dertil af Grev Christian Raben. Der er budt den nuværende Besidder en meget betydelig Sum for den, men han har afslaaet Tilbudet og ved Gavebrev skjænket Fuglen til Grevskabet saaledes, at den ei kan afhændes eller bortgives. Exemplaret er udmærket konserveret.

Register.

<i>Acanthis linaria</i> (Var. <i>al-</i> <i>norum</i>)	67	<i>Bernicla leucopsis</i>	106
<i>Alauda arborea</i>	63	— <i>ruficollis</i>	106
— <i>arvensis</i>	61	<i>Bubo maximus</i>	21
— <i>cristata</i>	62	<i>Buteo ferox</i>	8
<i>Alca impennis</i>	120	— <i>lagopus</i>	7
— <i>torda</i>	119	— <i>vulgaris</i>	7
<i>Alcedo ispida</i>	28	<i>Calidris arenaria</i>	89
<i>Ampelis garrulus</i>	41	<i>Caprimulgus Europæus</i>	41
<i>Anas acuta</i>	107	<i>Charadrius curonicus</i>	79
— <i>clypeata</i>	107	— <i>morinellus</i>	79
— <i>querquedula</i>	107	<i>Chlorospiza Sinica</i>	67
<i>Anser erythropus</i>	106	<i>Ciconia alba</i>	82
<i>Anthus obscurus</i>	52	— <i>nigra</i>	82
— <i>pratensis</i>	52	<i>Circaëtus Gallicus</i>	5
<i>Aquila fulva</i>	1	<i>Circus æruginosus</i>	13
— <i>nævia</i>	2	— <i>cyaneus</i>	14
<i>Ardea cinerea</i>	83	— <i>pygargus</i>	15
— <i>comata</i>	83	[<i>Clangula mergoides</i>]	112
— <i>minuta</i>	84	<i>Coccothraustes vulgaris</i>	65
— <i>purpurea</i>	84	<i>Columba oenas</i>	72
— <i>stellaris</i>	84	— <i>palumbus</i>	72
<i>Astur palumbarius</i>	13	<i>Colymbus arcticus</i>	116
<i>Athene noctua</i>	19	— <i>glacialis</i>	116
<i>Bernicla brenta</i>	106	<i>Coracias garrula</i>	30
		<i>Corvus corax</i>	36

<i>Corvus cornix</i>	38	<i>Hirundo riparia</i>	44
— <i>frugilegus</i>	38	— <i>rustica</i>	42
— <i>monedula</i>	39	— <i>urbica</i>	43
<i>Coturnix communis</i>	76	<i>Hydrobata cinclus</i>	44
<i>Cuculus canorus</i>	22	<i>Ibis falcinellus</i>	87
<i>Cursorius Gallicus</i>	83	<i>Lynx torquilla</i>	25
<i>Cygnus Bewickii</i>	105	<i>Lagopus Scotica</i>	77
<i>Cypselus apus</i>	42	<i>Lanius collurio</i>	48
<i>Diomedea melanophrys</i>	113	— <i>excubitor</i>	46
<i>Dryospiza serinus</i>	63	— <i>rufus</i>	49
<i>Emberiza hortulana</i>	64	<i>Larus fuscus</i>	103
— <i>miliaria</i>	64	— <i>glaucus</i>	103
<i>Erismatura leucocephala</i>	109	— <i>leucopterus</i>	102
<i>Erithacus Suecicus</i>	57	— <i>minutus</i>	101
<i>Falco æsalon</i>	11	— <i>tridactylus</i>	102
— <i>gyrfalco</i>	9	<i>Limicola pygmæa</i>	89
— <i>peregrinus</i>	10	<i>Limosa ægocephala</i>	91
<i>Fratercula arctica</i>	119	— <i>Laponica</i>	91
<i>Fringilla coelebs</i>	67	<i>Loxia curvirostra</i>	71
— <i>montifringilla</i>	67	— <i>leucoptera</i>	70
<i>Fulica atra</i>	96	— <i>pityopsittacus</i>	70
<i>Fuligula rufo</i>	103	<i>Luscinia Philomela</i>	57
<i>Fulmarus glacialis</i>	99	— <i>phoenicurus</i>	55
<i>Gallinago gallinula</i>	93	— <i>tithys</i>	56
— <i>media</i>	93	— <i>vera</i>	56
<i>Gallinula chloropus</i>	95	<i>Macrorhamphus griseus</i>	92
<i>Garrulus glandarius</i>	41	<i>Mergus albellus</i>	111
<i>Glaucidium passerinum</i>	19	— <i>merganser</i>	110
<i>Graculus carbo</i>	113	— <i>serrator</i>	111
— <i>cristatus</i>	114	<i>Milvus niger</i>	6
<i>Grus cinerea</i>	81	— <i>regalis</i>	6
<i>Haliaëtus albicilla</i>	5	<i>Motacilla alba</i>	51
<i>Harelda glacialis</i>	109	— <i>flava</i>	51
<i>Himantopus candidus</i>	97	— <i>sulphurea</i>	51
		<i>Muscicapa atricapilla</i>	45
		— <i>collaris</i>	45

Muscicapa grisola	46	Podiceps cornutus	115
— parva	46	— cristatus	114
Nucifraga caryocatactes .	35	— minor	116
Numenius arquata	87	— nigricollis	115
Nyctale funerea	20	Procellaria Leachii	98
Nyctea nivea	16	— pelagica	98
		Puffinus Anglorum	99
Oidemia fusca	109	Rallus aquaticus	94
Oriolus galbula	32	Recurvirostra avocetta . .	97
Ortygometra porzana . .	95	Regulus cristatus	61
— pygmæa	94		
Otis Macquenii	79	Saxicola oenanthe	53
— tarda	78	— rubetra	53
— tetrax	78	— rubicola	53
Otocoris alpestris	63	Scolopax rusticola	93
Otus brachyotus	22	Sitta Europæa	26
		Somateria mollissima . .	110
Pandion haliaëtus	3	Squatarola Helvetica . .	80
Parus ater	59	Stelleria dispar	109
— caudatus	60	Stercorarius cepphus . .	105
— cristatus	60	— parasiticus	104
— major	59	— pomarinus	104
Passer domesticus	65	Sterna Anglica	100
— montanus	66	— Cantiaça	100
Pastor roseus	32	— Caspia	99
Perdix cinerea	76	Strepsilas interpres . . .	80
Pernis apivorus	8	Strix flammea	22
Phalaropus fulicarius . .	97	Sturnus vulgaris	34
— hyperboreus	96	Sula bassana	112
Phasianus Colchicus . .	78	Surnia ulula	18
Philomachus pugnax . .	89	Sylvia aquatica	55
Pica caudata	40	— locustella	55
Picus major	24	— nævia	55
— viridis	23	— rufa	54
Pinicola enucleator . . .	69	— trochilus	53
Platalea leucorodia . . .	86	— turdoides	54
Plectrophanes nivalis . .	65	Syrnium aluco	19
Podiceps auritus	115	Syrnhaptes paradoxus . .	74

T adorna rutila	108	Tringa Temminckii . . .	88
— vulpanser . . .	107	Troglodytes parvulus . .	58
Tetrao tetrix	77	Turdus fuscatus	50
Tinnunculus alauda-		— merula	50
rius	12	— pilaris	50
Tinnunculus tinnuncu-		— torquatus	50
loides	12	— viscivorus	49
Tinnunculus vespertinus	13	Turtur auritus	73
Totanus fuscus	90	Upupa epops	27
— glottis	91	Uria Brünnichii	118
— hypoleucus . . .	89	— troile	118
— ochropus	90	— — Var. hringuia	118
Tringa canutus	87	Vanellus cristatus	80
— cinclus	88	Xema Sabini	103
— maritima	87		
— minuta	88		
— subarquata	88		

Efterskrift.

Det Haab, med hvilket jeg sluttede mit Forord til denne lille Bog: at den maatte „blive modtaget med den Overbærenhed, hvortil den trænger“, var ikke en tom Frase; det udsprang af Bevidstheden om, at de i flere Henseender høist vanskelige Forhold, hvorunder Skriftet var udarbejdet, og hvorunder navnlig Korrekturlæsningen havde fundet Sted, nødvendigvis maatte have medført Feiltagelser i et ikke ringe Maal. Jeg søger ikke nogen Undskyldning for disse Feil, men jeg anseer det for rigtigst at bøde saa vidt muligt paa dem ved nu at meddele nedenstaaende

Rettelser.

- S. 5. Angivelsen om *Circaëtus Gallicus* i den Sophiendalske Sml. beroer ifølge senere modtagen Meddelelse fra Baagøe paa en Feiltagelse. Hvorfra denne stammer, er endnu ikke oplyst.
- 6. L. 15 f. n. „Sogn“ læs „Hegn“.
- 15. Ved en Uagtsomhed er den urigtige Angivelse fra „Jagtt.“ om *Circus pygargus* blevet staaende, uagtet den er berigtiget under *C. cyaneus*.
- 17. L. 5 f. n. *Nyctea nivea* fra Jersi er aabenbart det samme Expl., som er nævnt nogle Linier ovenfor.
- 19. L. 14 f. o. „Zool. Mus.“ læs „Zool. Have“.
- 25. Möhl-Hansen er her og et Par andre Steder urigtigt betegnet som Skovrider.
- 27. L. 4 f. n. „Galtø“ læs „Saltø“.
- 36. L. 7—8 f. n. Ordene „om Sommeren“ gaa ud.
- 38. L. 16 f. o. „Vind“ læs „Wind“.
- 49 nederst. Der tilføies: Yngler i Skovene omkring Tjustrup- og Bavelse-Søer i Næstvedegnen (N. F.).

- S. 55 Lodbjerg-Exemplaret af *Sylvia nævia* er ved Uagtsomhed opført to Gange, den ene Gang under Navnet *S. locustella*. Dette sidste maa altsaa slettes.
- 61. L. 5 f. o. „Kn. Andersen“ l. „Hagerup“.
 - 61. L. 13 f. o. „Ler“ l. „Lav“.
 - 66. L. 11—12 f. n. Parenthesen gaaer ud. Meddelelsen be-
roer paa en senere oplyst Misforstaaelse.
 - 84. *Ardea minuta* fra $\frac{7}{7}$ 81 eies ikke af Kn. Andersen.
 - 86. L. 10 f. o. „Hunner“ l. „Hanner“.
 - 90. L. 9 f. n. „undertiden findes“ l. „er fundet“.
 - 91. L. 1 f. o. „Mørkaa“ l. „Nørhaa“.
 - 91. L. 5 f. o. „Sogn“ l. „Hegn“.
 - 95. L. 15 f. o. „begge vore to andre danske Arter“ læs „O.
pusilla“.
 - 96. L. 13—14 f. n. „er truffet tre Gange paa Island“ l. „er i
de senere Aar jevnlig truffet paa Island, hvor den endog
er fundet ynglende. (W. Aarsber. f. 1894).“
 - 97. L. 7 f. n. „benytter“ l. „benyttede“.
 - 115. *Podiceps auritus* udgaaer; det paagjældende Expl. henføres
under Artsnavnet *P. cornutus*, Lath.

J. C.

Skandinaviens Fugle,

med særligt Hensyn til Danmark og de nordlige Bilande,
udgivet
af

Jonas Collin.

(2. fuldstændigt omarbejdede Udgave af Kjærbølling: „Danmarks Fugle“.)
(Udsolgt).

Ornithologiske Bidrag til Danmarks Fauna

af

Jonas Collin.

(1ste Supplement til „Skandinaviens Fugle“.)

Pris 45 Øre.

Bidrag til Kundskaben om Danmarks Fuglefauna

af

Jonas Collin.

(2det Supplement til „Skandinaviens Fugle“.)

Pris 1 Kr. 75 Øre.

Limfjordens tidligere og nuværende marine Fauna

med 1 Tavle,

af

Jonas Collin.

Pris 3 Kr.

Skildringer af Naturvidenskaberne for Alle

med talrige Afbildninger,

udg. under Redaktion af Jonas Collin.

Pris 15 Kr. — Eleg. indb. 19 Kr.

(Udsolgt).

Berlepsch: Alperne,

paa Dansk

ved

Jonas Collin.

Pris 4 Kr. 50 Øre

MCZ ERNST MAYR LIBRARY

3 2044 128 443 439