A-C [ollin]
1877-95

a-c

09-
7-

HARVARD UNIVERSITY.

LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

78,226, 78,227, 78,228

GIFT OF

John C. Phillips

December 10, 1935.

DEC 10 1935

F. C. Andersen
3/10 70.

78,227

BIDRAG TIL KUNDSKABEN

OM

DANMARKS FUGLEFAUNA

AF

JONAS COLLIN.

Udgivet som 2det Supplement til
„SKANDINAVIENS FUGLE.“

KJØBENHAVN.

GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG.

FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI.

1888.

BIDRAG TIL KUNDSKABEN

OM

DANMARKS FUGLEFAUNA

AF

JONAS COLLIN.

Udgivet som 2det Supplement til
„SKANDINAVIENS FUGLE.“

KJØBENHAVN.

GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG.

1888.

YERRE
ODASSTODAD
EDSCOTDAS

LIBRARY
MUSEUM OF ZOOLOGY
CAMBRIDGE

Efterat jeg i Aaret 1877 havde sluttet Udgivelsen af „Skandinaviens Fugle“, udgav jeg samme Aar „Ornithologiske Bidrag til Danmarks Fauna“ som Supplement til det nævnte større Værk. Det var min Hensigt ogsaa senere at meddele lignende Bidrag til denne Del af vor Fauna, og jeg havde allerede indsamlet et ikke ubetydeligt Materiale, da Dr. Lütken i 1885 (i Tidsskriftet „Ornis“) publicerede „I. Jahresbericht (1883) über die ornithologischen Beobachtungsstationen in Dänemark.“ Det er en Selvfølge, at en meget stor Del af de Bidrag, hvis Offentliggørelse jeg allerede havde forberedt, var optaget i dette Arbejde, og jeg fandt ikke, at de Meddelelser, som ikke vare komne til Dr. Lütkens Kundskab, vare tilstrækkeligt talrige eller vigtige til at publiceres alene.

Det følgende Aar fremkom Dr. Lütkens II. Jahresbericht (for 1884) i samme tyske Tidsskrift, og i det sidst forløbne Aar (1887) har endelig Cand. mag. O. Winge udgivet den 3^{die} Aarsberetning (f. 1885) paa Engelsk under Titel: „III. Report on Birds in Denmark in 1885“ (ligeledes i „Ornis“, Jahrg. 1886).

Efter Udgivelsen af mit første Supplement har jeg fra forskellige af Ornithologiens Venner her i Danmark vedblivende modtaget saavel nye Oplysninger som Anmodninger om at samle hvad der efter mine „Ornithologiske Bidrag“ var kommet frem paa den danske Fugleverdens Omraade, og at udgive disse Bidrag som et nyt Supplement til „Skandinaviens Fugle.“ Da jeg ogsaa selv har erkjendt det — navnlig for Lægfolk — Hensigtsmæssige i, at Kundskaben om vor Fuglefauna kan søges i ét Værk istedetfor i spredte Afhandlinger, i Særdeleshed naar disse ere vanskeligt tilgængelige, publicerede i udenlandske Tidsskrifter og skrevne i fremmede Sprog, har jeg anset det for rigtigt at imødekomme de Opfordringer, der ere stillede til mig, og forelægger herved saavel en Række nye Bidrag som en større Del af de Iagttagelser, der ere meddelte i **Lützens** og **Winges** ovennævnte Arbejder, i **P. Herschends** „Iagttagelser over Danmarks Fuglefauna med særligt Hensyn til Egnen mellem Horsens og Aarhus“, Horsens, 1884 (trykt som Manuskript), i **P. V. Heibergs** „Thyllands Fugle“, Viborg 1886, og i **A. H. Fabers** „Morsøs Fugle“, Viborg 1887.

Idet jeg udgiver dette lille Arbejde, er det mig kjært at maatte bringe min Tak til dem, der i de forløbne Aar have støttet mig i mine Bestræbelser efter at samle nye Oplysninger angaaende vor Fuglefauna. Ligesom tidligere maa jeg ganske særligt henvende denne min Tak til d'Hrr. Dyrlæge Grill i Otterup og Apotheker Baagøe i Næstved, som begge med usvækket Interesse

og Iver have meddelt mig deres værdifulde Iagttagelser og Erfaringer. Det skyldes desuden for en væsenlig Del Apotheker Baagøe, at Billedværket til „Skandinaviens Fugle“ i den nærmeste Fremtid vil blive forøget med en ny Tavle, paa hvilken de fire i nærværende Arbeide omtalte, for vor Fauna nye Arter ere afbildede ved velvillig Bistand af den dygtige Tegner og Fuglekjender, Hr. H. Grønvold.

For Kortheds Skyld betegnes de Mænd, fra hvem de fleste Iagttagelser og Oplysninger hidrøre, ved følgende Bogstaver:

- A.* Praktiserende Læge **H. Arctander**, Storehedinge v. Stevns.
- B.* Hofjægermester **A. Brun**, Louisiana ved Humlebæk pr. Helsingør.
- Bj.* Konditor **C. C. Bjerrum**, Ribe.
- Bg.* Apotheker **J. Baagøe**, Næstved.
- F.* Cand. pharm. **A. H. Faber**, Nykjøbing paa Mors.
- G.* Cand. phil. **F. V. Galschiøt**, Vesterborg pr. Nakskov.
- Gr.* Dyrlæge **C. Grill**, Otterup pr. Odense.
- H.* Arkitekt **A. T. Hagerup**.
- Hbg.* Dr. med. **P. Heiberg**, Distriktslæge, Viborg.
- Hs.* Godseier **P. Herschend**, Herschendsgave pr. Skanderborg.

- J.* Branddirektør, Prokurator **Justesen**, Redaktør af
„Dansk Jagttidende“, Ringkjøbing.
- K.* Stud. med. **T. N. Krabbe**, Kjøbenhavn.
- L.* Professor **C. F. Lütken**.
- P.* Landvæsenselev **S. C. Petersen**, Christiansminde
pr. Nykjøbing p. Falster.
- S.* Overlærer **V. Strøm** i Forening med Cand. pharm.,
Brygger **T. Schiøtz**, Odense.
- W.* Cand. mag. **O. Winge**, Kjøbenhavn.
-

Aquila fulva, (L.)

I Efteraaret 1870 blev et Individ fanget ved Hodsager pr. Holstebro (J.); d. 17. Nov. 1881 blev der paa Amager skudt en Kongeørn, i hvis Mave fandtes Levninger af et Pindsvin (L.). Telegrafbestyrer Petersen i Stege har havt 3 Explr., der alle vare skudte i Nov. 1883, de to ved Taarnholm pr. Korsør, det tredie ved Hardenberg paa Lolland (F.). En yngre Han blev skudt ved Nislevgaard pr. Odense d. 4. Nov. 1877; den havde ædt en Kat, hvis Hale fandtes hel i Kroen (Gr.). D. 7. Januar 1880 blev en Han fanget i en Rævesax i Roden Skov v. Nystad. Expl. findes i Dyr læge Grills Samling (Gr.). Fra Bornholm (Poulsker Sogn) indsendtes til Un. zool. Museum et Expl., skudt henimod Midten af Nov. 1884, og i Nov. 1885 modtog Konservator Hansen til Udstopning to Hanner, af hvilke den ene var skudt i Fyen. I Apotheker Baagøes Samling findes et Expl., skudt ved Nysø d. 28. Januar 1878. Skovrider Hansen paa Juellinge vingeskjød en Kongeørn, der sad paa Ryggen af et Raadyr (G.). I Thy er den, saa vidt vides, kun én Gang skudt, nemlig ved Vang i 1869 (Hbg.). Hr. Galschiøt har meddelt mig, at den om Vinteren er temmelig almindelig paa Lolland, hvor hans Broder har skudt flere, saaledes ved Gammelgaard 3 Stkr. i Løbet af én Vinter; den ene af disse findes udstoppet hos Møller Lützen, Tvede Mølle pr.

Vesterborg. En Han skudt v. Saltø pr. Næstved d. 4. Febr. 1886 (Jernbaneassistent Scheel — Bg.). Stabs-sergeant E. Bruun i Fredericia havde i Nov. 1886 en Han til Udstopning fra Kolding-Eggen og i Nov. 1887 en Han fra Grenaa-Eggen. Ved Nytaarstid 1888 blev et Expl. skudt i Brænderup Vænge ved Glorup (Fyen) af Skovfoged P. Larsen, der tidligere sammesteds har skudt to Kongeørne („Morgenbadet“ f. d. 4. Januar 1888). D. 1. Januar 1888 blev et Expl. skudt paa Møen (Telegrafbestyrer Petersen — Bg.).

Aquila nævia, (Gm.)

Ifølge Kataloget over afd. Apotheker A. Benzons Fuglesamling fandtes der i denne et Skind af en Hun fra Maribo (død i zool. Have d. 12. Sept. 1881) og en Hun fra Fuglsang, skudt d. 9. Juni 1881.

Haliaëtus albicilla, (L.)

Blandt dens Ynglesteder her i Landet kan anføres Rathlousdal Skov v. Aarhus (Hs.), Stenderup Skov v. Kolding og Gyllingnæs i Jylland (B.). Endnu i 1878 ynglede den i Hald Bøgeskov v. Viborg, men senere er den ikke truffet ynglende der (Hbg.). I Bigum Skov v. Tjele yngler der hvert Aar 1 à 2 Par (Hbg.); ligeledes i Stensballe- og Palsgaard Skove. I sidstnævnte Skov fandtes der i 1882 allerede d. 12. Marts Æg i Reden; ifølge den derværende Skovriders Angivelse har Havørnen bygget i denne Skov i over 40 Aar (F.).

Pandion haliaëtus, (L.)

Denne Art synes i de senere Aar at være bleven noget sjældnere her i Landet. Paa den lille skovbevoxede Ø i Skarritsø ved Jyderup (Sjælland) skal den for faa

Aar siden have ynglet (F.). Forstassistent Falkenberg har fundet dens Rede med 2 Æg i Grib Skov i Nord-sjælland (L.). Flodørnen yngler fremdeles i Skoven v. Vallø (Skovrider Rosenstand), i Christianssæde Skov paa Lolland og ved Faxe Ladeplads (G.). I Præstevangen sammesteds havde to Flodørne tidligt om Foraaret 1881 bemægtiget sig en Storkerede, før Storkene kom tilbage. Ved deres Ankomst opstod der en heftig Kamp om Reden, og den endtes først efter otte Dages Forløb, da Skovrider Schou paa Rosendal skjød begge Flodørnene (G.).

I „Skandinaviens Fugle“ har jeg udtalt en Tvivl om Rigtigheden af Prof. Reinhardts Angivelse om, at Prof. Steenstrup i 1834 havde faaet en Flodørn, der var skudt paa Reden, som fandtes inde mellem Rørene i en Sø ved Hillerslev (Thy), og jeg fremsatte den Formodning, at Reden havde tilhørt en *Circus æruginosus*. Denne Antagelse har jeg fundet bestyrket ved Dr. Heibergs Meddelelse om, at det lokale Navn „Gleie“, som Kjærbølling i „Danmarks Fugle“ tillægger Flodørnen, i Virkeligheden gjælder den nævnte Kjærhøg.

Milvus regalis, Briss.

Nævnes hverken af Faber blandt Morsøs Fugle, af Heiberg blandt Thylands eller af Herschend blandt de i Egnen mellem Horsens og Aarhus observerede Arter. Hvad den sidste Egn angaar, maa Udeladelsen vistnok bero paa en Forglemmelse, thi i Wings „Report“ f. 1885 opgives Dagen for Glentens Ankomst til Herschends-gave i det nævnte Aar.

Som Supplement til de i „Skand. Fugle“ anførte Ankomsttider kan tilføies:

Ankom til

Storehedinge	1884—14. Marts (A.)
—	1885— 5. — -
Faxe Ladeplads	1879— 6. — (G.)

Faxe Ladeplads	1881—20.	Marts	(G.)
Vesterborg	1883—20.	—	-
—	1884—	2.	— -
—	1885—13.	—	-
Herschendsgave	1885—21.	—	(Hs.).

Milvus niger, Briss.

I Mai 1878 opholdt et Par sig i Margaards øverste Fredskov (i Odense-Egnen), hvor de begyndte at bygge Rede, men d. 28. i s. M. forsvandt de og indfandt sig ikke senere (Gr.).

Tinnunculus alaudarius, (Briss.)

[*Cerchneis tinnunculus*, (L.)]

Yngler fremdeles i en Mængde Kirketaarne rundt om i Landet, saavel paa Øerne som i Jylland. — Ifølge de nyere lagttagelser synes det at være ikke ualmindeligt, at den lægger 6 Æg. Heiberg angiver endog, at dette Tal er det sædvanlige for Thisted-Egnens Vedkommende, og at kun yngre Fugle lægge 4—5 Æg. A. H. Fabers i mine „Ornithol. Bidr.“ 1877 (p. 10) omtalte Fund af 6 Æg har desuden senere faaet adskillige andre Sidestykker saavel igjennem hans egne som ved Andres lagttagelser, saaledes i Thisted- og Løgstør-Egnen (H.), Ølsted Kirke (1883), Hjerik Kirke i Salling og Hjørdemaal Kirke (1884) (F.) o. s. v. Enkelte Gange er der endog fundet 7 Æg i dens Rede, saaledes ved Egebæksande i Nærheden af Sjørring Sø, i Thisted (Hbg.) og Vedslet Kirke (Hs.). Ved at tage Æggene fra Reden hver Gang et helt Kuld var lagt, fik Heiberg en og samme Hun til at lægge 18 Æg, der ikke frembød nogen Forskjel i Henseende til Form og Størrelse.

I Kjøbenhavn ynglede den i 1880 paa Frue Kirke,

Rundetaarn, i en Ventil paa Kancellibygningen og sandsynligvis ogsaa paa Petri Kirketaarn (F.). — Dens Yngletid maa sættes til Slutningen af April og første Halvdel af Mai.

Ved Edelgave (Sjælland) er Taarnfalken i de senere Aar ofte funden ynglende i Træer, hvor den i Regelen benyttede gamle Krage- eller Raagereder (H.). Undertiden findes dens Rede meget nær ved Jorden. I Nærheden af Løgstør fandt Arkitekt Hagerup den saaledes i en Fordybning paa en Mur, kun 6 Fod over Jorden.

Paa Skarreklit, den i Vesterhavet udfor Bolbjerg fritstaaende Kalkstensklippe, yngler den aarligt; ligeledes i de bratte Molersbrinker ved Vilsund (Limfjorden) (Hbg.).

Paa Lolland synes den i de sidste Decennier at være i Aftagende. Galschiøt har ikke iagttaget den der i de sidste tyve Aar og har overhovedet aldrig truffet den paa Lolland om Sommeren.

I 1882 ankom den til Horsens-Egnen d. 18. Febr. og i 1885 til Storehedinge d. 27. Febr. (A.). I milde Vintere (f. Ex. 18^{77/78}) overvintre undertiden enkelte Individer (Hbg.).

De thylandske Bønder kalde Taarnfalken „Ugle“, naar de se den ved Kirken, men „Lærkhøg“, naar de træffe den paa Marken (Hbg.).

Tinnunculus vespertinus, (L.)

Apotheker Benzon havde dens Æg fra Bornholm (1860. Rosen).

Falco æsalon, L.

[*Hypotriorchis æsalon*, Tunstall.]

I Apoth. Benzons Samling fandtes to gamle Hunner, den ene skudt ved Vissing, (Jylland) d. 11. April 1863, den anden ved Randers d. 2. Mai 1874.

Skudt i Thisted Plantage d. 4. Dec. 1877 og ved Kjølbysgaard d. 12. Apr. 1879 (Hbg.), fremdeles ved Aagaard i Øster-Hanherred d. 1. Okt. 1884 (Zool. Mus.), ved Kjøbenhavn d. 6. Marts 1885 (W.), ved Gjeddesdal pr. Taastrup d. 27. April 1886 (gl. Han) (Konservator Hansen) og ved Frederiksborg (en Hun) d. 24. Sept. 1887. Det sidste Expl. tilhører Hr. cand. pharm. A. Pirtzel.

Ifølge Meddelelse fra Grill opholder Dværgfalken sig regelmæssigt hvert Efteraar og hver Vinter i Bederslev Dale (Odense-Eggen), dog kun yngre Individuer. Den eneste ældre Fugl, han har erholdt derfra (en Han), blev skudt af Skovfoged Petersen d. 30. Okt. 1876.

Falco subbuteo, L.

D. 21. Mai 1876 fandtes i en Skaderede i „Kongens Enghave“ v. Kjøbenhavn 2 Æg af Lærkefalken. I de følgende Aar benyttedes Reden snart af Krager, snart af Skader (F.). D. 11. Mai 1878 iagttog Faber i en Skov ved Serritslevgaard pr. Horsens, at et Par Lærkefalker fløi omkring mellem en Koloni af *Corvus frugilegus* og stjal disses Æg af Rederne; flere af de undersøgte Æg havde trekantede Huller og vare tømte af Lærkefalkene.

Ifølge Stud. Hilkiers Iagttagelse udgjøre Sommerfugle et vigtigt Næringsmiddel for Lærkefalken. Navnlig har han ved Søborg Mose bemærket, at saavel unge som gamle Individuer om Aftenen vare ivrigt beskæftigede med at fange Sommerfugle. I et Expl., der blev skudt d. 24. Juli 1874, var Maven helt fuld af ituplukkede Sommerfugle (K.).

Ved Kjøbenhavn bemærkedes den i 1885 første Gang d. 6. Mai (W.).

Falco peregrinus, Briss.

I Apoth. Benzons Samling fandtes to unge Hunner fra Saltholm, skudte resp. d. 7. Juli 1876 og d. 28. Aug.

s. A., en gammel Han fra Holbækgaard, skudt d. 19. Aug. 1869, en anden, (ligeledes gammel Han) skudt samme steds d. 15. Sept. 1882, og en gl. Hun, skudt v. Raaballegaard pr. Randers d. 27. Febr. 1871. Ved Storehedinge træffes den hvert Efteraar (A.). Den er skudt i Hillerslev Kjær d. 24. Sept. 1876 og d. 9. Sept. 1877 samt i Bedsted Kjær (Thy) d. 9. Januar 1878 (Hbg.) og ved Randers d. 12. Dec. 1883 (Bg.). En gammel Han skudt i Eistrup (Vrads Herred) d. 6. Aug. 1885 (Kjøbm. N. Larsen — Bg.). Ved Vallø er der i de sidste to Aar skudt 3 Explr. (Skovrider Rosenstand).

Ved Kjøbenhavn saaes den i Foraaret 1885 sidste Gang d. 13. April og indfandt sig paany om Efteraaret d. 12. Okt. (W.). I Egnen ved Otterup pr. Odense skydes der ikke saa sjældent yngre Vandrefalke. Den eneste gamle Fugl, som Grill har erholdt derfra, var en Hun, som blev skudt i Emmelev d. 23. Nov. 1884. Stabs-sergeant E. Bruun i Fredericia havde i Nov. 1886 en gammel Han til Udstopning fra Odder-Egnen, i April 1887 en gammel Han fra Kallundborg-Egnen og i Januar 1888 en gammel Hun fra Hobro-Egnen.

Falco gyrfalco, L.

I Thisted Realskoles Fuglesamling findes en gammel Han, der er skudt i Thy i Febr. 1868 og udstoppet af Konservator Conradsen. Den 2. Dec. 1878 blev en Hun skudt ved Kjølbysgaard, og d. 29. Okt. 1885 skjød Post-expeditør A. Bendixen en Hun ved Vestervig. De to sidstnævnte Exemplarer bleve (ligesom den i „Ornithol. Bidr.“ omtalte Hun fra Glæde Klitbakker) udstoppede af Konservator Hansen (Hbg.). Den 23. Sept. 1885 blev et mørktfarvet ungt Individ (Hun) skudt paa Kirkeby Hede i Nærheden af Svendborg af Baron Rosenørn-Lehn t. Hvidkilde og af ham indsendt til Univ. zool. Mus. Konservator Hansen erholdt i de første Dage af November 1885

et ganske lignende Individ (ligeledes en Hun) til Udstopning for en privat Samling. Det var skudt i Jylland uvist hvor, (W.). I Apoth. Benzons Samling fandtes en ung Han, skudt ved Jægerspris d. 17. Okt. 1877.

Astur palumbarius, (L.)

Som et Sidestykke til den i „Ornithol. Bidr.“ p. 7 meddelte Iagttagelse af H. Faber kan anføres, at en Hun i Marts 1881 fløi ind i Dueslaget paa Herschendsgaves Drivhus, hvor den dræbte 13 Duer; den blev forstyrret og maatte flygte uden at faa nogen af Duerne med sig, men indfandt sig paany Dagen efter. Da Gartneren kom til, netop da den vilde flyve ind i Dueslaget, maatte den vende, men fangede derefter en af Duerne, som fløi omkring i Flok. Den satte sig nu paa Jorden og vilde til at fortære sit Bytte, men blev da skudt (Hs.).

Fra Skovene ved Herschendsgave, hvor Duehøgen er temmelig almindelig, drager den bort ved Yngletidens Begyndelse (Hs.).

Paa Lolland var den for 40—50 Aar siden meget almindelig og anrettede store Ødelæggelser blandt Fjerkræet, men er nu stærkt i Aftagende. Hr. Galschiøt har meddelt mig, at han i flere Aar kun har set en eneste (ved Vesterborg), medens der tidligere hver Vinter blev fanget adskillige i Høgebure. Duerne, der tjente som Lokkefugle, vare anbragte saaledes, at Høgen ikke kunde naa dem, men de fandtes altid døde af Skræk, naar Høgen havde været der.

I Midten af April 1864, da Korvetten „Dagmar“ og Fregatten „Niels Juel“ under en østlig Storm seilede Nord paa i Vesterhavet, omtrent 10 Mile fra den jydske Kyst, kom en Duehøg ud til Skibene og satte sig i Fregattens Rigning, men blev forskrækket for Kulrøgen og fløi hen mod Korvetten, hvor den flere Gange søgte

at sætte sig paa Forremerseraaen, uden at det dog lykkedes den i den stærke Blæst; den drev agter ud og faldt i Søen c. 300 Alen fra Skibet (G.).

Astur nissus, (L.)

[*Accipiter nissus*, Briss.]

Det synes ikke, at denne almindelige Høg yngler paa Mors; idetmindste har H. Faber aldrig fundet dens Rede der, men ofte set selve Fuglen; dog har han en Formodning om, at den yngler i Høiris Skov. I Thy anføres den kun som skudt tre Gange, og den vides ikke at have ynglet der (Hbg.). I Nærheden af Løgstør er den derimod truffet ynglende d. 6. Juni 1885 (H.).

I Herschendsgaves Skove yngler den meget almindeligt. Herschend meddeler, at han, efter at have taget de to Æg, der fandtes i dens Rede, atter lagde disse tilbage efter to Dages Forløb forat se, om Fuglen paany vilde tage Reden i Besiddelse. Nogle Dage senere var Kuldet voxet til fire, saa at Fuglen altsaa ikke havde ladet sig skræmme.

Paa Lolland er Spurvehøgen nu langt hyppigere forekommende end tidligere, maaske paa Grund af, at Smaafuglene i de senere Aar fredes mere end før (G.).

Kapt. Bay i Rudkjøbing har i sin Samling en mærkelig, næsten ensfarvet brun Spurvehøg, som han har modtaget fra Skovrider Schou paa Rosendal (Sjælland) (Bg.).

Pernis apivorus, (L.)

I de store Skovstrækninger i den østlige Del af Mellemjylland træffes den ikke sjældent ynglende, navnlig i Eggen omkring Viborg. Den 10. Juni 1866 fandt prakt. Læge Rossen dens Rede med to nylig lagte Æg i Skoven ved Aunsbjerg; Apoth. Benzon havde dens Æg fra

Thoreby Skov paa Lolland (13. Juni 1868); den 18. Juni 1883 blev den af Skovrider Lund fundet ynglende i Parken ved Frijsenborg, og d. 3. Juli 1883 af Læge Rossen i Ulstrup Skov *). I Begyndelsen af Juni 1882 blev den set ved Reden i Viskum Skov v. Viborg (Hbg.).

Ved Vestervig blev en Hvepsevaage skudt d. 16. Aug. 1882 (Hbg.). I Juni 1883 blev den skudt paa Amager og i Mai 1884 ved Frijsenborg (J.). I Grills Samling findes et Expl., der blev skudt af Skovfoged Petersen d. 19. Sept. 1882 i Bederslev Dale. Skovrider Rosenstand skjød et Expl. ved Vallø d. 11. Juni 1883.

Den 16. Sept. 1877 traf Herschend i Fredskoven ved Herschendsgave en Hvepsevaage i Færd med at æde Larverne i en Hvepserede, som den havde kradset op af Jorden. Med Voxkagen som Lökkemad anbragte han en Rottesax paa Stedet, og faa Timer efter havde han fanget en smuk gammel Hun i Saxen. Fra Kallundborg-Egnen modtog Stabssergeant E. Bruun i Fredericia en ung Hun til Udstopning i Sept. 1886.

Buteo vulgaris, Bechst.

Den hvidbrogede Varietet forekommer ifølge Stud. Hilkiers Angivelse temmelig hyppigt ved Søborg Mose i Nærheden af Kjøbenhavn, hvor han to Gange har skudt den (K.). Fra 1876—82 opholdt en hvidbroget Varietet sig i Skovene ved Herschendsgave, hvert Aar fra August til Marts (Hs.).

Ankomsttiden for de Individer, der (i milde Vintere)

*) Forf. benytter denne Leilighed til at gjøre opmærksom paa det Uheldige i, at Meddelelserne ofte undlade at betegne Lokalteterne saaledes, at enhver Tvivl udelukkes. Der gives i Danmark ikke mindre end 17 forskellige Landsbyer og større Gaarde med Navnet „Ulstrup“. Ved den ovennævnte menes vistnok Ulstrup pr. Randers.

ikke have overvintret, angives for Odense-Egnens Vedkommende at være midt i Februar (S.).

Til Storehedinge ankom den i 1884 d. 13. Marts; sammesteds bemærkedes den 25. Sept. 1885 mange Hundrede Individer, trækkende mod S.W. (A.). Den 29. Marts 1880 indfandt en Flok sig ved Faxe Ladeplads. Sammesteds iagttoges d. 28. og 29. August 1881 store Flokke, trækkende Syd paa. Selv i temmelig strænge Vintere træffes den undertiden paa Lolland, saaledes i 18^{84/85}, da den flere Gange blev bemærket, skjøndt der laa dyb Sne og Temperaturen var 8° R. under Frysepunktet (G.).

Paa Mors træffes den kun nu og da, men er dog baade i 1884 og 1885 fundet ynglende i Høiris Skov (F.) I Thy synes den at være temmelig sjelden; den angives kun at være skudt der to Gange, nemlig ved Kjølbysgaard d. 15. Okt. 1878 og ved Koustrup d. 17. April 1879 (Hbg.).

Herschend anfører, at Reden som oftest er smykket enten med en udsprungen Bøgegren eller med Granris.

Buteo lagopus, (Brünn.)

Ved Lersøen, tæt udenfor Kjøbenhavn, forekommer den, ifølge Stud. Hilkiers Angivelse hyppigt. Han skød den der d. 29. Okt. 1873 (K.). I de senere Aar er den skudt adskillige Gange her i Landet, saaledes d. 10. Dec. 1876 ved Rindom pr. Ringkjøbing (J.), i Færgesborg Plantage (Jylland) d. 14. Nov. 1877 (Hbg.), ved Holbæk d. 6. Febr. 1877 (gl. Han) (Benzons Samling), ved Johannesbjerg (Jylland) d. 17. Nov. 1879 (L.), ved Løvenborg (Sjælland) og ved Frijsenborg i Dec. 1883 (J.). Den 22. Dec. 1881 saae H. Faber et Expl., skudt ved Brande, V. f. Veile. Til Bederslev Dale v. Odense kommer den regelmæssigt om Efteraaret og opholder sig der enkeltvis hele Vinteren over (Gr.).

Circus æruginosus, (L.)

Stud. Hilkier angiver den som almindeligt forekommende i Søborg Mose v. Kjøbenhavn, hvor den ogsaa yngler (K.). I Juli 1884 ynglede den i Astrup Dam v. Ryom i Jylland (F.). I Thy er den truffet ynglende i Gyrup Sø, Tanderup Sø og Koldkjær Sø (Hbg.). I den vestlige Del af Vesterborgsø paa Lolland yngler den hvert Aar, men Stedet er utilgængeligt, saa at det ikke er lykkedes at se eller erholde Æggene (G.).

Medens Kjærhøgen har fordrevet en Mængde Maager, Terner og andre Vandfugle fra Nors Sø i Thy (cfr. „Skand. Fugle“ p. 51), har den, ifølge Dr. Heibergs Meddelelse, flere Gange forgjæves søgt at tage Bolig i den nu udtørrede Sperring Sø i Thy, der frembød ypperlige Lokalteter for den. De derværende Hættemaager, som i Tusindvis sværmede over Søen og ynglede paa en Holm, fordrev Kjærhøgen saa eftertrykkeligt, at den end ikke vovede at udstrække sine Røverier til den af Maagerne optagne Del af Søen.

Circus cyaneus, (L.)

Ved Ringkjøbing, hvor denne Art nu og da skydes paa Andejagterne, fandtes den i 1880 ynglende paa to Steder, nemlig Von Aa og Stadilfjord (J.). — Den 14. Sept. 1880 blev en Hun skudt ved Holte, N. f. Kjøbenhavn (L.). Paa en Mark ved Skaarup saae Herschend d. 28. Mai 1884 en blaa Kjærhøg flyvende ganske lavt over Jorden langs Bredden af Skanderborg Sø. I den sidste Halvdel af Sept. 1885 modtog Konservator Hansen en gammel Han til Udstopning; den var skudt ved Gyldenholm pr. Næstved (L.). I afdøde Apoth. A. Benzons Samling fandtes en gammel Han, skudt d. 27. Marts 1874 i Geel Skov. Apotheker Baagøe har i sin store

Fuglesamling en gammel Hun, som, mærkeligt nok, blev skudt d. 19. Januar 1884 i Holmegaards Mose ved Næstved; muligvis har det paagjældende Individ været sygt, saa at det nødtvungent har maattet blive her om Vinteren. I Grev A. Brockenhuus-Schacks Samling findes en gl. Han, skudt ved Kallundborg i Slutningen af Febr. 1886 (Konserv. Hansen). Den 20. Sept. 1887 blev en ung Han, skudt ved Frederiksborg. Expl. eies af Cand. pharm. A. Pirtzel. I Grills Samling findes en ung Han, skudt af Skovfoged Petersen i Bederslev Dale d. 24. Marts 1884. Den var i Følge med et rent lyseblaat Individ, som det ikke lykkedes at skyde. En gammel Hun, skudt ved Eistrup d. 22. Sept. 1885 af Husmand Erik Andersen, ejes af Kjøbm. N. Larsen (Bg.). D. 13. Sept. 1887 blev et Expl. skudt af H. Jørg. Jensen ved Rasby paa Møen (Telegrafbestyrer Petersen. Bg.). D. 1. Dec. 1887 blev, ifølge Meddelelse fra Samme, et Expl. skudt ved Tjørne-mark paa Møen. Skovrider Heger skjød d. 1. Nov. 1887 et Expl. paa Rappenborg Tørvemose v. Saltø pr. Næstved (Bg.). Fra Kallundborg-Egnen modtog Stabs-sergeant E. Bruun i Fredericia et ungt Individ til Ud-stopning i Okt. 1887.

Circus macrurus, (Gm.)

[*Circus pallidus*, Sykes.]

Den 6. Nov. 1884 modtog Univ. zool. Mus. en Han, skudt ved Birkendegaard i det nordvestlige Sjælland (L.).

Circus pygargus, (L.)

En gammel Han blev d. 20. Okt. 1885 skudt af Gaardeier Hans Jensen ved Thorlund i Eistrup Sogn (Kjøbmand N. Larsens Samling. — Bg.).

Nyctea nivea, (Thunb.)

I afd. Sekretær Friis's Samling paa Lille Kjøbelevgaard fandtes en Hun, skudt d. 6. April 1855 paa Amager. Apotheker Benzon havde i sin Samling to gl. Hunner, den ene skudt ved Lynetten d. 21. Dec. 1865, den anden fra Skagen, skudt 1866. I Febr. 1870 blev en Sneugle skudt ved Idom pr. Holstebro (J.). I 1884 blev den skudt ved Møllerup paa Mors d. 1. Dec., og d. 17. Okt. s. A. modtog Un. zool. Mus. et Expl., der var skudt paa Søen, saa vidt vides, i Nærheden af Kjøbenhavn (L.). Ved Uggerslevgaard pr. Kappendrup (i Odense-Egnen) blev den skudt i Dec. 1882 (Bg.). Paa den under Hofmansgave hørende Hals Odde er der siden 1866 iagttaget 3 Sneugler til forskjellige Tider. Grill saae den der d. 17. Marts 1878.

Til Thy ankommer den næsten hver Vinter og er skudt der adskillige Gange, saaledes i Østerild Klit d. 15. Dec. 1870 (Han) og d. 14. Febr. 1871 (to Hanner), i Hjørdemaal Klit d. 6. Januar 1876 (Hun), i Hundborg d. 22. Januar 1877 (Hun) og i Østerild Klit d. 14. Marts 1878; dette sidste Expl. blev kun ubetydeligt vingeskudt og oversendtes til den zoologiske Have v. Kjøbenhavn (Hbg.). De Individuer, som Heiberg har havt Leilighed til at undersøge, havde alle holdt Maaltid paa Agerhøns.

I Thy kaldes den „Bakugle“ (Hbg.).

Glaucidium passerinum, (L.)

[*Athene passerina*, Boie.]

Hofjægermester A. Brun angiver at have skudt den ved Aalborg og at være i Besiddelse af et Expl., skudt ved Stege p. Møen. Un. zool. Mus. modtog d. 23. Nov. 1884 et Expl., skudt i Hassager Skov i Nordsjælland (L.). Cand. polyt. F. Søltoft angiver at have set Spurveuglen i Tyrrestrup Skov i Egnen ved Herschendsgave (Hs.).

Athene noctua, (Retz.)

Yngler i næsten alle Kirkerne i Viborg-Egnen (Hbg.) og i adskillige Kirker omkring Horsens og Veile, ligeledes paa Mors, i Salling og Thy (F.) samt Øster-Hanherred (H.).

Ifølge Heiberg yngler denne Ugle, der i Thy ogsaa kaldes „Katugle“, i Stendiger, især i Kirkegaardsdigerne, sjældnere i Murhuller paa Kirkelofterne. Nogle Gange er den fundet ynglende under Tagstenene paa afsides liggende Smedier, en enkelt Gang i en Tørvestak paa Loftet af et lille Bondehus. Reden er som oftest meget vanskelig at finde, og hvor et Uglepar har levet længe og uforstyrret i et Stengjærde, har det i Regeln indrettet sig en større Leilighed med Forraadskammer o. s. v. Heiberg har aldrig fundet mere end 5 Æg i denne Ugles Rede.

Nyctale funerea, (L.)

[*Strix Tengmalmi*, Gm.]

I 1881 blev et Expl. skudt af Proprietær Dons til Sæbygaard i Holbæk Ladegaards Have (Bg.). I Sept. s. A. skjød Landskabsmaler M. Ancker den ved Skagen (Hs.), og d. 25. Okt. s. A. modtog Un. zool. Mus. et Expl. fra Nørreskov ved Furesø (L.). Den 22. Febr. 1882 skudt i Viborg Krat af Forstbetjent Christiansen, som sammesteds havde skudt et andet Expl. nogle Dage tidligere (Hbg.). Den 20. Nov. 1884 indsendtes til Un. zool. Mus. et Expl. fra Grev Moltke til Nørager, og samme Aar blev den skudt d. 21. Dec. ved Damhuset i Nærheden af København (L.) samt d. 25. Nov. ved Engestofte paa Lolland (J.). I 1885 blev en Han skudt ved Gjorslev pr. Storehedinge d. 14. April af Skovrider Anthon (A.), og samme Aar modtog Konservator Hansen til Udstopning en Han, der i Januar var fundet død i Kongelunden paa Amager, d. 6. April en Hun fra Øst-

kysten af Vendsyssel og nogle Dage senere en Han fra Midten af Østsjælland.

Syrnium aluco, (L.)

Ved Føllesløv pr. Holbæk fandt H. Faber dens Rede med 6 dunklædte Unger d. 13. Mai 1883; han har gjen- tagne Gange fundet Reder med 5 Æg eller Unger. Ved Edelgave er der ligeledes oftere fundet 6 Æg i dens Rede, saaledes d. 16. Marts 1880, d. 8. April 1881 og d. 22. Marts 1883 (H.).

I Thy vides den kun at være truffet én Gang, idet den i Januar 1875 blev fundet næsten død i en Skorsten i Thisted (Hbg.). Paa Mors er den hidtil ikke bemærket.

I Foraaret 1882 fandt Proprietær Siboni dens Rede paa et Høloft paa Thestrup. En Høne havde lagt sine Æg i samme Rede, og et af dem blev udruget af Uglen, som ikke fortærede Kyllingen, da den kom ud af Ægget, men lod den løbe.

Forpagter Lange paa Hellebæk-Teglværk har med- delt mig, at der ved høilys Dag i Forsommeren 1887 indfandt sig en Natugle i hans Have, hvor den satte sig paa en Græsplæne. Lidt efter kom Husets to Katte ud til den, gik rundt om den, strøg sig op ad den og endte med at slikke den i Ansigtet. Uglen sad ganske stille under denne Behandling i en halv Snes Minutter og syntes at befinde sig vel derved. Heller ikke viste den nogen Frygt, da Hr. Lange kom hen til den og klappede den paa Ryggen, men da han vilde tage den med Hænderne, fløi den pludseligt bort og viste sig ikke senere.

Strix flammea, (L.)

I Sekr. Friis's Samling fandtes en Han, skudt d. 5. Febr. 1871 ved Svendstrup (Kjøbelev Sogn p. Lolland), idet den ved høi lys Dag fløi hen over Gaarden, og en

Hun, skudt d. 12. Januar 1861 ved Dallund i Fyen af Forpagter Thiele.

I 1870 bleve flere Slørugler skudte ved Stokkemarke paa Lolland (P.). Fire à fem Aar senere indfandt der sig paany nogle Individer sammesteds, hvor de tog Ophold i Kirketaarnet og fordrev Natuglen derfra (G.). Den yngler i adskillige Landsbykirker i Horsens-Egnen. H. Faber fandt saaledes dens Reder i Hansted Kirke d. 27. April 1878 (5 Æg), i Ølsted Kirke (sammen med *Athene noctua*) d. 14. Mai 1878 (3 Æg) og d. 3. Mai 1879 (5 Æg). I Ølsted Kirke fandt han atter d. 6. Mai 1880 Reden med 4 Æg, i 1882 med 6 Æg og i 1883 med 7 Æg, i Hansted Kirke paany i 1882 (4 Æg) og i Væhr Kirke (4 Æg).

Den 25. Januar 1878 erholdt Un. zool. Mus. et Expl. fra Dronninglund i Jylland (L.). H. Faber modtog d. 7. April 1879 et Par Slørugler, der vare fangne i et Due-slag ved Horsens; det følgende Aar fandtes et Par døde Individer paa Loftet i Ølsted Kirke (F.). D. 8. April 1884 fandtes Reden med 5 Æg i Vedslet Kirke og d. 28. April s. A. i Thyrsted Kirke pr. Horsens (6 Æg) (Hs.). Grill har i Odense-Egnen oftere fundet 6 Æg i Reden, to Gange endog 7, nemlig i Vigerslev Kirke d. 16. Mai 1878 og i Bederslev Kirke d. 15. Mai 1880.

I Thy, hvor den, saavidt vides, ikke yngler, fangedes en Slørugle d. 30. Novemb. 1874 i en Lade i Tilsted, og et Par Dage senere en anden i Sjørring (Hbg.).

Paa Mors vides den hidtil ikke at være bemærket.

Bubo maximus, (Sibb.)

Sekretær Friis eiede i sin Samling en Hun, skudt d. 9. Januar 1853 ved Liselund paa Møen. I Thisted Realskole findes et Expl., skudt ved Thisted i Efteraaret 1858 (Hbg.).

Skudt ved Ulvborg pr. Ringkjøbing d. 10. Jan. 1875 (J.). Skovrider Magius fandt d. 2. Mai 1877 to store Unger af denne Ugle i en gammel Musevaage-Rede i Toppen af et høit Bøgetræ i Fousingø Vesterskov pr. Randers. I Skovene ved Bigum og Lindum (Tjele) ynglede mindst to Par i 1882 og 83. Fra Tjele modtog Un. zool. Mus. d. 15. Sept. 1883 et Expl. (L.). I Vinteren 1884 blev den truffet i Nærheden af Helsingør (B.). I 1885 erholdt det zool. Mus. nogle Skeletdele af en Han, der var skudt i Tjele Skov d. 4. Okt. s. A. (W.). Herschend, i hvis Samling der findes et Expl., skudt i Marts 1877 i den skovløse Egn ved Eistrup, 5 Mile V. f. Horsens, meddeler, at Bjerguglen er skudt i Skovene ved Himmelbjerget, Gyllingnæs og Rathlousdal, samt at Propr. van Deurs omtrent i 1874 skjød et Expl., der sad paa Taget af Ry Mølle. I Apoth. Benzons Samling fandtes en gammel Han fra Værum Skov, skudt i Nov. 1873, og en gl. Hun, skudt i Dronninglund Storskov d. 12. April 1865.

Otus vulgaris, Flem.

Forekommer ikke sjældent ynglende i Viborg-Eggen, hvor den næsten altid benytter gamle Kragereder i smaa, isolerede Granbevoxninger (Hbg.). Det synes, at den undertiden yngler to Gange om Aaret (H.).

Apotheker Benzon havde dens Æg fra Bognæs (27. April 1857 og 28. April 1862), Palsgaard (1. April 1870), Roeskilde (27. April 1857), Helsingør-Eggen (25. April 1860) og Amager (1855).

I Thy angives der kun at være skudt to Exemplarer, begge i Tvorup Klitplantage d. 4. Nov. 1875 (Hbg.).

Paa Mors vides den ikke at være bemærket.

Otus brachyotus, (Gm.).

[*Brachyotus palustris*, Forster].

D. 25. Okt. 1879 skjød H. Faber den paa „Klapperne“ i Kallebodstrand, medens den var i Færd med at fortære en død *Larus marinus*. Forøvrigt er den ogsaa i de senere Aar skudt adskillige Gange her i Landet, saavel i Jylland som paa Øerne.

Paa Mors er den hidtil kun skudt én Gang, nemlig den 24. Januar 1885 ved Damsgaard (F.). I Thy er den derimod yderst almindelig om Efteraaret og træffes da navnlig i Kartoffelmarkerne, i Klitterne og paa Hederne (Hbg.). Om den yngler der, er endnu uvist, om end sandsynligt. Heiberg, som vel ikke selv har fundet dens Æg eller Unger der, nævner som Lokalteter, der ere ham angivne som dens Ynglesteder: Tvorup Klit og Nors Klit, paa afsidesliggende, øde Steder, temmelig høit og tørt paa Jorden mellem Porsbuske og Lyng. Yngletiden angives at være i Begyndelsen af Juni (Hbg.), men dette gjælder dog sandsynligvis kun for 2det Kuld.

Un. zool. Mus. modtog i 1878 et Expl. fra Island (L.).

Caprimulgus Europæus, L.

I Hellebæk-Eggen (N. f. Helsingør) er den temmelig almindelig; navnlig sees den ofte ved Midsommertid om Aftenen flyvende langs Stranden ved Ellekilde og Hornbæk Plantage.

Paa Kyholm ved Samsø traf H. Faber et Par d. 6. Juni 1881. Sandsynligvis have de ynglet der. Heiberg fik d. 23. Juli 1876 dens Æg fra Glæde (Lild Sogn) i Thy, hvor den yngler sparsomt i Klitterne og paa Hederne. Paa Mors er den hidtil ikke iagttaget. I Eggen ved Herschendsgave er den kun bemærket en enkelt Gang, nemlig ved Landsbyen Hvolbæk i Sept. 1878. Ved Nis-

sumgaard pr. Skanderborg blev den skudt i Sept. 1876 og ved Glibinggaard pr. Horsens i Okt. 1877 (Hs.). Paa Lolland synes den at være temmelig sjelden. Galschiøt har kun truffet den der to Gange, nemlig i Stensgaard Skov (Stokkemarke) og 1884 ved Brunsvang (Vesterborg).

Cypselus apus, (L.)

I Thy synes den at være sjelden. Et Expl. blev i halvdød Tilstand fanget i Thisted Kirketaarn d. 17. Aug. 1877, og i Sommeren 1878 saae Heiberg to Individer flyvende høit i Luften i Nærheden af Lild. Den angives af Postexpeditør A. Bendixen at yngle ved Vestervig (Hbg.).

Den ankom til Amager

1883—15. Mai (K.)

1884—13. — -

til Storehedinge

1883—14. Mai (A.)

1884—13. — (K.) (afreist $22/8$).

1885—20. — (A.)

til Kjøbenhavn

1884—12. Mai (K.)

1885— 9. — (men først i større Antal d. 17.).

til Odense

1883—16. Mai (S.).

til Faxe Ladeplads (G.)

1880—12. Mai.

1881—16. —

1882—21. — (afr. $27/7$).

til Vesterborg

1884—16. Mai (G.).

Hirundo rustica, L.

Et næsten renhvidt Expl. skudt i Sept. 1884 ved Lyngaa i Jylland (J.). D. 12. Nov. 1885 blev et ungt Individ skudt paa Østkysten af Amager (K.).

Ankom til Amager

1883—11. Mai (afr. $^{27}/_9$) (K.)

1884—10.—13. Mai -

1885—23. April (indtil 7. Mai) (K.)

til Odense

1883—ult. April (S.).

til Otterup v. Odense (Gr.)

1876— 6. Mai

1877— 7. —

1878—29. April

1879—11. Mai

1880— 3. —

1881—30. April

1882—27. April

1883— 5. Mai

1884— 1. —

1885—21. April

1886—28. —

1887— 4. Mai

til Faxe-Ladeplads (G.)

1880—26. Apr. -

1881— 4. Mai -

til Stokkemærke

1882— 7. Mai -

til Vesterborg

1884—30. Apr. -

til Storehedinge

1883—28. Apr. (afr. $^{1}/_{10}$) (A.)

1884— 1. Mai -

1885 - 27. Apr.—5. Mai -

til Mors

1884—2.—10. Mai

1885—3. Mai

til Herschendsgave (Hs.)

1877— 2. Mai

1878—28. April

1879—25. —

1880—29. —

1881— 2. Mai

1882—30. April

1883—29. —

1884—30. —

1885—27. —

(Afreise sædvanligvis 1ste Uge af Okt.)

Heiberg gjør med Rette opmærksom paa, at der altid er benyttet Hestehaar (foruden Fjer og tørt Græs) til

Udfodring af Reden, og at disse Haar ere sammenflettede omhyggeligt saaledes, at Enderne paa flere Steder ere indklæbede i Redemassen. Han har gjentagne Gange bemærket, at Hestehaarene vare slyngede om Fødderne paa Ungerne, hvilket muligvis kan have været tilfældigt, men det ligger ikke fjernt at antage, at Haarene netop ere anbragte for at hindre Ungerne i at falde ud, naar de flokke sig paa Kanten af Reden for at faa den Føde, som Forældrene bringe dem. Hos Bysvalen findes der ikke Hestehaar i Reden.

Hirundo urbica, L.

Ankom til Kjøbenhavn	til Odense
1883—11. Mai (K.)	1883— 9. Mai (S.)
1885— 1. — (W.)	til Herschendsgave
til Amager	1884— 8. Mai (Hs.)
1884—15. Mai (K.)	1885— 3. — -
1885— 7. — -	til Nykjøbing p. Mors
til Storehedinge	1884—13. Mai (F.)
1885—28. April (A.)	1885—16. — -
til Helsingør-Eggen	til Aaby (d. sydl. Vendsyssel)
1884—11. Mai (B.)	1885— 2. Mai (H.)

Fra Faxe-Ladeplads afreiste Bysvalerne i 1881 Natten mellem d. 28. og 29. Aug., men der kom andre Nord fra d. 26. Sept., d. 8. Okt. og d. 13. Okt. Efter en stærk Nattefrost i Mai samme Aar fandtes en stor Mængde ihjelfrosne Bysvaler i Kirketaarnet sammesteds (G.)

Hirundo riparia, L.

Ankom til Odense	til Herschendsgave
1883— 9. Mai (S.)	1884—12. Mai (Hs.)
	1885—10. — -

til Amager	til Nykjøbing p. Mors
1884—13. Mai (K.)	1884—10. Mai (F.)
1885—29. — -*)	1885—15. — -
til Kjøbenhavn	
1885—24. April (W.)	
Afreiste, fra Amager: 1883 d. 9. Sept. — 1885 d. 10. Okt. (de sidste) (K.)	

Cuculus canorus, L.

De ældre Individer drage bort tidligere end de unge. Hoffægermester Brun har oftere skudt unge, men aldrig ældre, Gjøge i Slutningen af September.

Den ankom (o: hørtes første Gang)

til Herschendsgave (Hs.)	til Nykjøbing p. Mors
1877—14. Mai	1884—12. Mai (F.)
1878—12. —	1885—14. — -
1879—14. —	til Kjøbenhavns Omegn
1880—10. —	1885—14. Mai (W.)
1881—16. —	til Faxe-Ladeplads
1882—16. —	1881—16. Mai (G.)
1883—10. —	til Vesterborg
1884—11. —	1884—10. Mai (G.)
1885—27. April	
til Otterup (Gr.)	
1876— 6. Mai	1882— 5. Mai
1877— 1. —	1883— 8. —
1878— 5. —	1884— 6. —
1879—12. —	1885—30. April
1880— 7. —	1886—12. Mai
1881—15. —	1887— 5. —

*) Det er kun lidet sandsynligt, at denne Angivelse om dens sene Forekomst til Amager er rigtig, saa meget mere som Bysvalen netop i samme Aar kom tidligere end sædvanligt til det nærliggende Kjøbenhavn.

Det synes efter de foreliggende Beretninger, at den paa flere Steder her i Landet er i Aftagende.

Heiberg, som gjentagne Gange har erholdt dens Æg fra Thy, oplyser, at de alle ere tagne i Reder af *Motacilla flava*.

Alcedo ispida, L.

Yngler paa flere Steder i Omegnen af Viborg (Hald Sø, Vindsmølle Sø, Vinds Sø) (Hbg.). Ved Lyngbygaard pr. Aarhus er den fundet ynglende af Joh. Friis (Hs).

I Sekretær Friis's Samling fandtes en Han, skudt d. 15. Januar 1853 ved Frederiksværk, og i Apotheker Benzons Samling to Hanner, skudte ved Saxkjøbing d. 10. Dec. 1866 og d. 23. Dec. s. A. I 1878 blev Isfuglen set ved en Aa i Nærheden af Nykjøbing paa Falster d. 25. Mai, d. 2. Juni og d. 20. Sept. (P.) Om Efteraaret træffes den ikke sjældent paa samme Sted (P.)

Ved Rindsholm, Hald og Høibjerg i Viborg-Egnen er den skudt om Vinteren; Exemplarer derfra findes i Heibergs Samling. D. 17. Nov. 1883 truffet i Skoven v. Vellinggaard pr. Veile, d. 7. Nov. 1880 ved Veile Havn. Ved Egebjerg pr. Horsens forekom den oftere i Vinteren 1877—78, og i den efterfølgende Vinter opholdt 4 à 5 Explr. sig der (F.) Skudt ved Arresø paa Sjælland d. 18. April 1879 (K.), ved Ørholm pr. Lyngby i Januar 1879 (en Han. Benzons Samling), ved Thureby p. Sjælland d. 5. Febr. 1883*) (Hun) (L.), ved Gudhjem paa Bornholm d. 3. Okt. 1883, ved Løvenborg p. Sjælland d. 3. Febr. 1883, ved Fredericia (flere Gange) (J.), ved Nørresundby d. 8. Januar 1879 (Hun) (L.). H. Faber har oftere truffet den om Efteraaret og Vinteren paa Mors.

*) eller 1884. Expl. nævnes saavel i Beretningen („Jahresber.“) for 1883 som i den for 1884.

Skudt ved Taarnborg pr. Korsør d. 8. Sept. 1884, ved Broksø paa Sjælland d. 3. Nov. 1884, i Nærheden af Frederiksborg d. 15. Okt. s. A. Ved Randsfjord i Jylland blev „en hel Familie“ iagttaget samme Aar. Ved Ribe og Bogense er den oftere bemærket (J.). D. 15. Okt. 1885 blev den set i Søndermarken (Hechmann. K.) og d. 20. Marts 1885 skudt ved Herschendsgave (Hs.). Sammesteds fløi i Vinteren 1866 under et stærkt Snefog en Isfugl ind ad en aabenstaaende Dør (Hs.). I sidst nævnte Egn ynglede den efter al Sandsynlighed i Sommeren 1884. Herschend traf nemlig gjentagne Gange i Slutningen af Juli flere Individuer, af hvilke nogle syntes at være unge, samlede langs en lille Bæk. I Januar 1885 forekom flere Isfugle enkeltvis i samme Egn, hver med sit Jagtrevier (Hs.). Ifølge Hofjægerm. Bruns Beretning er den set ved Lyngby, medens den fodrede sine Unger. I Eggen ved Vallø træffes den jevnlig om Vinteren (Skovrider Rosenstand).

I Thy er den hidtil ikke truffet.

I „Skand. Fugle“ p. 128 har jeg nævnt, at Un. zool. Mus. i Vinteren 1874—75 modtog 4 Hunner, hvoraf 2 fra Jylland; den ene af disse var skudt ved Aalborg d. 26. Januar (Juel), den anden ved Dalsgaard i Marts.

Merops apiaster, L.

I Skovrider Anthons Samling findes en Biæder, skudt i Gjorslev Bøgeskov 1839 (Bg.). I „Skand. Fugle“ er nævnt, at der d. 5. Juni 1840 blev skudt to Individuer ved Gjorslev, og at det ene af disse, en Han, findes i Un. zool. Mus. Da disse to Tilfælde ligge saa langt tilbage i Tiden, forekommer det mig ikke usandsynligt, at Aarsangivelsen for det ene af dem kan være noget usikker, og at begge de omtalte Individuer ere skudte samtidigt. Begivenheden maa vel snarest antages at have fundet Sted i 1840, for hvilket Aar der nævnes en bestemt Dag.

Oriolus galbula, L.

For hen imod en halv Snes Aar siden har den ynglet i Haven ved Krogsdal pr. Holstebro (Propr. Leunbach). Ifølge en Notits i „Dansk Jagttidende“ træffes den hver Sommer i Engestofte Skov paa Lolland, sandsynligvis ynglende (Skovrider Steenberg. — W.). Ved Ribe, hvor Pirolen i mange Aar har hørt til de stadige Gjæster, blev den ikke iagttaget i Sommeren 1885; det følgende Aar indfandt den sig imidlertid paany. Ogsaa i 1887 kom den dertil, og to Par ynglede, det ene i Plantagen, det andet i en privat Have inde i Byen (Bj.). I et Brev til Skovrider Kann af 1. Dec. 1877 meddeler Hr. F. Sparre i Nysted, at han og flere Andre i Juli og August 1874 saae Guldpirolen i Aalholms Have og i „Hestehaven“ paa Lolland. Senere „viste det sig, at der var et Par, som havde ynglet i Haven og var set af Gartner Poulsen og Skovrider Didriksen.“ I 1876 traf Hr. Sparre den paany samme Sted. D. 4. Juli 1886 blev en Han skudt sammesteds og nogle Dage senere en Hun (Jernbane-assistent Scheel. — Bg.).

I Sekret. Friis's Samling fandtes en Han, skudt paa Als d. 20. April 1851 (Konserv. Scheel). Ved Herschends-gave er den kun set én Gang, d. 9. Okt. 1879. Paa Jyllands Vestkyst forekommer den derimod næsten hver Sommer (Hs.). D. 29. Mai 1880 skudt ved Gjorslev paa Sjælland (J.)*). En død Pirol (gammel, udfarvet Han) fandtes d. 22. Juni 1887 ved Gaarden Bussemarke paa Møen (Bg.). Skovrider Rosenstand saae for nogle Aar siden et Expl. paa Foraarstrækket ved Vallø.

Fra Thy og Mors haves ingen Beretning om dens Forekomst.

*) Ifølge Meddelelse fra Baagøe var det d. 29. Mai 1881. Expl. (en Han) findes i Skovrider Anthons Samling.

Sturnus vulgaris, L.

Overvintrer ofte her i Landet, selv om Vinteren er temmelig stræng. Den er saaledes set eller skudt i Nærheden af Kjøbenhavn d. 28. Dec. 1877, d. 2. Januar 1878, d. 17. Januar 1884, d. 3. Febr. s. A. (stor Flok) (K.), ved Haslev i Sydsjælland d. 9. Dec. 1883 (F.). I hele Vinteren 1872—73 opholdt en Flok sig ved Strandbredden ved Frederikshavn (G.). I den strænge Vinter 1878—79 opholdt ikke faa Stære sig i Thisted, og samme Vinter traf Forf. flere Individer ved Nykjøbing p. Mors. Ved Odense forekom den enkeltvis hele Vinteren 1882—83, en Flok saaes der d. 25. Januar og en større Mængde i Midten af Februar (S.). Samme og følgende Vinter fandtes den stadigt ved Storehedinge, men Hovedmassen ankom dog i 1883 først i Begyndelsen af Febr. (A.). Ved Vesterborg paa Lolland blev en Flok truffet d. 30. Januar 1883; sammesteds saaes den d. 8. Febr. 1884 og d. 2. Febr. 1885 (G.). I hele Vinteren 1884—85 fandtes den i stor Mængde ved Nykjøbing p. Mors; naar Kulden var stræng og Sneen dækkede de frosne Marker, kom Stærene i stort Antal ind i Byen for at søge Føde paa Møddinger og lignende Steder (F.). I 1883—84 opholdt et eller nogle faa Par sig hele Vinteren ved Herschendsgave (Hs.). I Kjøbenhavn saaes den d. 18. Januar 1885 (H.), og blev ligeledes truffet der i Slutningen af Dec. s. A. (W.). D. 1. Januar lod den sin Kviddren høre ved Storehedinge (A.).

Af nedenstaaende Angivelser om Stærens Ankomst-tider til Herschendsgave og til Otterup fremgaar det ogsaa, at den ofte, eller vel endog i Regelen, træffes her i Vinterens allerstrængeste Tid.

Den ankom til Herschendsgave (Hs.)

1867—1. Febr.	1870—31. Januar
1868—8. —	1871—17. Febr.
1869—6. —	1872— 1. —

1873—25. Januar

1874—20. —

1875— 2. Febr.

1876— 2. —

1877—23. Januar

1878— 7. Febr.

1879— 9. —

1880—13. Febr.

1881— 9. Marts

1882—13. Febr.

1883— 5. —

1884—15. Januar

1885—31. —

til Otterup v. Odense (Gr.)

1877—13. Febr.

1878—17. —

1879— 3. Marts

1880—20. Febr.

1881— 6. Marts

1882—21. Febr.

1883—12. Febr.

1884—17. —

1885—13. —

1886—28. —

1887—11. —

Det vil formentlig fremgaa af de her meddelte Iagttagelser, at man ikke med Rette tør betragte Stæren som en virkelig Trækfugl, men snarere som en Standfugl, der kun lader sig fordrive en kort Tid af særligt ugunstige Veirforhold.

Hofjægermester Brun meddeler, at en stor Mængde Stære gik tilgrunde i den strænge Eftervinter 1882, og at den efter den Tid er aftaget betydeligt i Mængde. Dette Sidste modsiges af Beretninger andetsteds fra og kan i alt Fald vel kun gjælde for den Egn af Nordsjælland, i hvilken Meddeleren fortrinsvis har anstillet sine Iagttagelser.

D. 2. Aug. 1876 blev en Varietet med renhvid Hale og Gump set ved Vemb i Jylland (J.). D. 11. Juli 1880 blev en renhvid Stær skudt i Nymose ved Vangede pr. Lyngby. Expl. findes i Forstkandidat Hechmanns Samling (K.). Ved Ribe blev i Efteraaret 1884 skudt en Albino (J.).

Naar Stæren forekommer i usædvanligt stort Antal, hænder det undertiden, at den, sandsynligvis af Mangel paa passende Redehuller, anlægger aabne Reder paa

Trægrene. Rederne ere da byggede temmelig kunstløst af grove, tørre Materialier (Kvikrødder, visne Kartoffel-ranker, Halm, større Fjer o. lgn.). Herschend og H. Faber have iagttaget dette i Fredskoven ved Herschendsgave, saavel i 1878*) som i 1884.

Pastor roseus, (L.).

Proprietær Dons til Søgaard har i 1854 skudt en Rosenstær i Holbæk Ladegaards Have**) (Bg.). I Feldborg Plantage v. Skive blev for 6 à 7 Aar siden fanget et Expl. (J.).

I Apotheker Benzons Samling fandtes en Han, skudt ved Kollefjord paa Færøerne i Okt. 1853.

Nucifraga caryocatactes, (L.).

Ved Stensgaard (Stokkemarke p. Lolland) blev et Expl. fanget levende i 1842 (?) (G.). I Sekret. Friis's Samling fandtes en Han, skudt d. 25. Okt. 1850 ved Lerchenborg (Grev V. Lerche) og en anden Han, skudt d. 3. Okt. 1868 ved Rolykke (Lollands Nørreherred) af Gaardeier Chr. Jakobsen. I Efteraaret 1879 skudt i Sennels pr. Thisted (Hbg.). D. 22. Okt. 1884 blev en Nøddekriige set i Hovedskoven ved Herschendsgave, og d. 14. Dec. s. A. bemærkedes Fuglen i en anden, nær-

*) I „Jahresbericht“ I. p. 20 angives Redens Høide over Jorden til 10 Fod, men i Herschends Afhandling (p. 8) til 15 Alen.

**) I „Skand. Fugle“ har jeg, efter Angivelse af Konservator Conradsen, meddelt, at en gammel Han blev skudt ved Holbæk d. 26. Juni 1855. Om der muligvis i det ene af Tilfældene skulde foreligge en fejlagtig Angivelse af Aaret, og om begge Meddelelser saaledes kunne referere sig til samme Begivenhed, kan jeg ikke afgjøre.

liggende Skov. Sandsynligvis har det været det samme Individ (Hs.). I 1885 bleve flere Explr. skudte her i Landet. Konservator Hansen modtog saaledes til Udstopning følgende: en Hun fra Herlufsholm d. 1. Okt., en Hun fra Ledreborg d. 20. Okt., en Hun fra Spanager p. Sjælland d. 27. Okt., en Hun fra Skaføgaard i Jylland d. 31. Okt., en Han fra Frijsenborg d. 13. Nov., en Hun (uvist hvorfra) d. 17. Nov.; samme Efteraar (d. 31. Okt.) købtes en Hun i København (W.). Ifølge „Jagttidende“ blev der samme Aar skudt tre Expl. ved Skjelskør „om Efteraaret“, et ved Vindebæk paa Møen d. 26. Sept., et ved Liselund paa Møen d. 12. Okt., et ved Taagerød (Østsjælland) d. 15. Nov. og et paa Lolland (W.).

Aldrig før har Nøddekrigen dog, saavidt vides, optraadt i saa stort Antal her i Landet som i Efteraaret 1887. Fra mangfoldige Steder rundt om i Landet er der indløbet Meddelelser om dens Forekomst, især fra Øerne, og Alt tyder paa, at et ganske usædvanligt stort Træk har fundet Sted fra nordligere Egne. Blandt de Tilfælde, der ere komne til min Kundskab skal kun anføres følgende: d. 20. Sept. blev en Han skudt ved Lindersvold i Præstø Amt (Expl. eies af Fabrikant Sødring), d. 30. Sept. en Han ved Herlufsholm (eies af Cand. phil. Chr. Mortensen), d. 3. Okt. to Hanner i Kallundborg-Eggen (den ene eies af Cand. Mortensen, den anden af Cand. pharm. A. Pirtzel). Omtrent midt i Okt. saa Apotheker Alfr. Benzon (jun.) et Par ved Kapellet i Dyrehaven; d. 11. Okt. blev en Han skudt ved Slagslunde pr. Frederikssund; dette Expl., der var sammen med tre andre, tilhører Cand. Pirtzel. I samme Maaned skød Skovfoged Petersen et Expl. i Bederslev Dale v. Odense (Gr.).

Paa Mors vides Nøddekrigen hidtil ikke at være bemærket.

Coracias garrula, L.

I Sekret. Friis's Samling fandtes en Hun, skudt d. 20. Mai 1849 v. Lerchenborg af Grev V. Lerche. Proprietær Dons til Søgaard skjød i 1865 to Ellekrager i Holbæk Ladegaards Have. Den er fremdeles skudt d. 5. Juni 1881 i Skoven ved Ulfshale paa Møen, d. 21. Sept. 1881 ved Gaunø paa Sjælland (F.), i Mai s. A. i Bondeskoven ved Bagsvær (K.), d. 4. Mai 1885 (en Han) ved Gaunø (Jernbaneassistent Scheel. — Bg.), d. 5. Mai 1885 ved Gjorslev pr. Storehedinge, hvor den, ifølge „Jagttidende“ træffes temmelig hyppigt (J. og A.), d. 4. Mai s. A. ved Lerchenborg, sammesteds i Slutningen af Mai s. A., ved Lystrup paa Sjælland i Begyndelsen af Mai s. A. (Konservator E. Hansen), ved Bjørnagerskov i det nordlige Vendsyssel d. 2. Mai s. A., i en Have paa Bornholm s. A. (Nærmere ubekjendt), i Fasaneriet paa Gaunø i Marts s. A. (Bg.), og set d. 24. Mai s. A. ved Sophiendal pr. Skanderborg (H. Rosenkrantz) samt d. 27. Mai s. A. ved Hessel pr. Grenaa (G. Lichtenberg). For nogle Aar siden iagttog Skovrider Rosenstand et Expl. paa Foraarstrækket ved Vallø.

Fra Mors kjendes hidtil intet Exempel paa dens Forekomst, og i Thy vides den ikke at være truffet i de sidste halvhundrede Aar (cfr. „Skand. Fugle“ p. 135).

D. 22. Juli 1882 blev et Expl., som havde opholdt sig nogle Dage ved Thorshavn paa Færøerne, skudt der og af Sysselmand Müller indsendt til Un. zool. Mus. (L.). Bemærkningen, hvormed denne Angivelse ledsages („Jahresbericht“ I. Særtr. S. 17): „wo sie früher nie gesehen worden“, er ikke rigtig. I „Skand. Fugle“ p. 140 er anført, at der i det zool. Mus. findes opstillet en Hun, som blev truffet ved Thorshavn d. 22. Juli 1836 og indsendt til Museet af nuværende Geheime-raad Tillisch.

Corvus monedula, L.

[*Lycos monedula*, Boie].

Paa Mors er den, saavidt vides, hidtil ikke truffet ynglende. Ifølge H. Faber forekommer den der kun som Streiffugl, i Regelen sammen med *C. cornix*.

I Thy synes Alliken, efter Heibergs Beretning, først at have indfundet sig i Foraaret 1875, da nogle smaa Flokke iagttoges paa Markerne ved Thisted. I Slutningen af April s. A. forsøgte nogle Alliker at fæste Bo paa Kirketaarnet i Thisted og kæmpede i flere Dage med Taarnfalkene, der vare meget forbittrede over dette Indgreb i deres Rettigheder, men dog tilsidst bleve tvungne til at overlade et af Taarnhullerne til et Par Alliker, som derefter byggede en meget stor Rede af Grene og lagde Æg. Kort Tid efter blev Reden imidlertid forstyrret ved en Bygningsreparation, og Fuglene forlod da Egnen uden senere at vende tilbage. Ogsaa i Østerild Kirketaarn indfandt sig samme Foraar et Par Alliker, som begyndte at bygge Rede, men kort efter bleve skudte. Efter den Tid er Alliken ikke bemærket i Thy (Hbg.).

I Herschends Afhandling om Fuglene i Egnen mellem Horsens og Aarhus nævnes denne Art ikke.

Paa Lolland er den meget almindelig i Egnen ved Stokkemarke og Vesterby. Førstnævnte Sted yngler den i Mængde i Kirketaarnet, men ikke i Skovene; ved Vesterborg bygger den derimod aabne Reder i Skoven (G.).

Fra Edelgave meddeles, at den, i Mangel af bedre Redepladser, tager til Takke med Skorstene (H.).

I 1869 skjød Propr. Hansen til Kjøbeløv en Allike med teglstensrød Hale og Vinger af samme Farve („Farven omtrent som Halen hos *Luscinia phoenicurus*“) ved Gammelgaard paa Lolland (Bg.).

Corvus corax, L.

Paa Grund af den stærke Forfølgelse bliver Ravnen sjeldnere og sjeldnere her i Landet. Endnu yngler den dog paa mangfoldige Steder, saavel i Jylland som paa Øerne. Paa Mors yngler den ikke (F.). I en lille Skov ved Edelgave ynglede den i 1876; det følgende Aar benyttedes den samme Rede af Taarnfalkene og i 1881 af Graakragen (Hs.).

Corvus cornix, L.

En ensfarvet graa Krage blev skudt ved Horsens d. 20. Nov. 1882 og indsendt til Un. zool. Mus. (L.). I Apoth. Benzons Samling fandtes en hvid Varietet (Hun), skudt v. Stensby Mølle d. 15. Januar 1864 af Hr. Malling.

Herschend erholdt d. 27. April 1884 et Kuld Æg, bestaaende af 7 Stkr. H. Faber fandt 6 Æg i en Rede ved Nykjøbing p. Mors, hvor Graakragen kun yngler meget sparsomt (Høiris Skov og Nykjøbing Plantage). I Thy yngler den kun et Par Steder, nemlig i Haverne ved Herregaardene Kjølbygaard og Tanderup (1878); om Vinteren er den derimod meget almindelig (Hbg.).

Skovrider Wind paa Herlufsholm har i Aarene 1873-75 iagttaget en Graakrage, parret med en *C. frugilegus*.

Af *Corvus corone*, L., hvis Berettigelse som selvstændig Art vel neppe kan siges at være utvivlsom, fandtes i Sekret. Friis's Samling et Expl., der af Propr. G. Jessen var skudt ved Asserstrup paa Lolland d. 25. Dec. 1850. Expl. er senere kommet til Un. zool. Mus. D. 1. Febr. 1885 blev et Expl. skudt i Vester Palsgaard Plantage, hvor et andet Individ, parret med en *C. cornix*, har ynglet i flere Aar (Bg.). Skudt paa Gaunø d. 10. April 1886 (Jernbaneass. Scheel. Bg.). I Un. zool. Mus. findes

en Bastardform af *C. cornix* og *C. corone*, skjænket af Cand. phil. Mortensen d. 29. Marts 1886. Et lignende Expl. (10 Aar gammelt Individ), skudt d. 20. Febr. 1875 ved Vrangsgaard pr. Vordingborg, fandtes i Apoth. Benzons Samling.

Corvus frugilegus, L.

I Horsens-Egnen, hvor der tidligere fandtes store Kolonier af Kornkrager, navnlig paa Vaarsø i Horsens-fjord, ere de fleste nu udryddede. Kolonien ved Bygholm pr. Veile bestaar dog endnu, hvorimod Serritslevgaard-Kolonien er udryddet (F.). I Søndermarken ved Kjøbenhavn yngler den aarligt (K.). Ved Edelgave findes en stor Koloni (H.), ligeledes ved Skaarup paa Fyen (P.).

Paa Mors er Kornkragen kun bemærket et Par Gange, nemlig i Marts 1884 og i Januar 1885 (F.).

Bemærkningen i „Skand. Fugle“ om, at den bestandigt ligger i Strid med Ravne og Graakrager, er i alt Fald hvad den sidstnævnte Fugl angaar urigtig. Kornkragen træffes jevnligt i Selskab og, som det fremgaar af ovenstaaende lagttagelse, undertiden endog i Parring med den, uden at der mærkes noget fjendtligt Forhold.

Pica caudata, Flem.

I Egnen mellem Veile, Horsens og Skanderborg, hvor Skaden tidligere kun forekom sjældent, er den i den sidste halve Snes Aar bleven mere almindelig. I 1883 ynglede saaledes tre Par i Hansted Skov ved Horsens, ét Par i Urlev Skov, enkelte Par i Landsbyen Vinding ved Veile og flere ved Rosenlund og Marienborg pr. Horsens. Ved Herschendsgave, hvor H. Faber tidligere kun havde truffet ét Par ynglende (i 1877), optræder den nu i stort Antal og yngler paa mange Steder, saavel i Skovene som ved selve Gaarden (F. og Hs.).

I Thy synes Forholdet at være det modsatte. I Aarhundredets Begyndelse var Skaden meget almindelig der og ynglede overalt, hvor de naturlige Forhold tillod det, men nu træffes den der saa godt som aldrig. Kun i det sydlige Thy ynglede for 2 à 3 Aar siden et enkelt Par i Herregaarden Tanderups Have (Hbg.), og i Thisted Plantage saaes for nogle Aar siden et Par om Sommeren (K.). Fremdeles angiver H. Faber, at han d. 13. April 1884 fandt den ynglende ved Snedsted og d. 21. Mai s. A. ved Østerild, (begge i Thy).

Paa Fejø forekommer Skaden ikke (G.).

Ved Storehedinge opholdt et perlegraat Individ sig i 1884—85 og ynglede der. Ungernes Farve frembød ingen Afvigelse fra den sædvanlige (A.).

Garrulus glandarius, (L.).

Hofjægermester A. Brun anser Skovskaden for en snarere nyttig end skadelig Fugl, idet den efter hans Erfaring bidrager særdeles meget til Egens Udbredelse. Den gemmer nemlig en Mængde Agern i Jorden for senere at fortære dem, men glemmer sine Gjemmesteder, saa at Egefrøene faa Leilighed til at spire.

I Thy forekom den undtagelsesvis i Okt. 1876 i stort Antal; i de foregaaende og efterfølgende Aar er den ikke bemærket der (Hbg.). I Foraaret 1885 optraadte den i usædvanligt stort Antal i Egnen ved Vesterborg paa Lolland (G.).

Herschend har oftest fundet dens Rede i Graner 10 à 12 Al. fra Jorden.

Picus viridis, L.

[*Gecinus viridis*, Boie.]

Den er i de senere Aar bleven meget sjelden i Egnen omkring Vesterborg, hvor den tidligere (for ca. 40

Aar siden), da der endnu fandtes Egeskove, var temmelig almindelig og ynglede baade i Stokkemarke-Hestehave og Ugleholt. Paa Lolland kaldes den „Skovhane“ (G.).

I Thy og paa Mors vides den ikke at være truffet (Hbg. og F.).

Picus major, L.

Den er den eneste Spette-Art, som Heiberg har bemærket i Thy, hvor den dog ingenlunde er almindelig; den angives kun som skudt der et Par Gange (i Haver ved Thisted), men i Slutningen af Sept. 1876 iagttoges et ikke ubetydeligt Træk af denne Fugl i Klitten, hvor den færdedes mellem Marehalmen og Klitgræsset og leilighedsvis afsøgte Tagene paa Fiskernes Hytter (Hbg.).

Picus medius, L.

I Skovene omkring Kjøbenhavn, hvor denne Art ogsaa i Fr. Fabers Tid ynglede, har afd. Kgl. Skuespiller Ferslev oftere fundet dens Æg (Hs.).

Jynx torquilla, L.

I 1881 blev et Expl. skudt allerede d. 18. April ved Bispebjerg Mølle pr. Kjøbenhavn (K.). D. 1. Okt. 1855 fandtes et dødt Individ i en Have ved Kjøbenhavn; det havde været dødt i nogle Dage (W.).

Fra Mors og Thy have ingen Exempler paa dens Forekomst.

Den ankom til Odense-Egnen 1883 — d. 6. Mai (S.).

- — - Stevns - — 1884 — d. 26. April (A.).

Sitta Europæa, L.

Om Vinteren anretter den, ligesom Parus major, en Del Ødelæggelse mellem Bierne (B.).

I Thy vides den ikke iagttaget.

Upupa epops, L.

Skudt i Foraaret 1862 ved Slagelse (J.). Ved Landsbyen Sondrup, N. f. Horsens Fjord, blev en gammel Han skudt d. 23. April 1878 (Hs)*). D. 19. Okt. 1870 blev der ved Landsbyen Vium pr. Viborg skudt en Hun, der, ligesom Sondrup-Individet, er i Godseier Herschends Besiddelse. Cand. polyt. F. Søltoft har oftere iagttaget Hærfuglen om Foraaret i Omegnen af Kjøge (Hs.). D. 18. April 1879 blev den skudt ved Gjorslev (paa Sjælland), hvor den ikke saa sjældent træffes (J.). D. 1. Mai 1881 blev et Expl. skudt ved Vallø af Skovrider Rosenstand, og d. 25. Aug. s. A. skjød Hr. Ladhoff i Vordingborg et andet i Knudskov (F.). D. 5. Mai 1883 blev den skudt ved Gudhjem paa Bornholm (J.). D. 16. Mai 1883 blev en Han skudt i Lundfod $\frac{1}{2}$ Mil V. f. Eistrup (Vrads Herred) af Snedker Mart. Petersen (Kjøbm. N. Larsen. Bg.). Fra Øen Egholm i Storebelt indsendtes d. 11. Aug. 1884 en Hærfugl til Un. zool. Mus. (L.).

For nogle Aar siden blev et Expl. skudt ved Ribe i September (J.). I April 1884 blev en Han skudt ved Thisted, og d. 12. Sept. 1885 skjød Hr. C. Simonsen et Expl. ved Frederikshavn (Bg.). Skovrider Rosenstand skjød en Hærfugl ved Vallø d. 1. Mai 1881 (Expl. findes i Grev Brockenhuus-Schaks Samling paa Spanager) og meddeler, at et Expl. blev set sammesteds i Efteraaret 1887.

*) I Brev af 16. Aug. 1878 har Hr. H. Faber meddelt mig, at „en Upupa epops d. 24. Mai blev skudt i Sondrup, 2 Mil Ø. f. Horsens, hvor den i nogen Tid havde opholdt sig sammen med en anden“. Formodentlig er dette andet Individ det ovenfor nævnte, men da der ikke foreligger nogen Oplysning om det sidst skudte Individs senere Skjæbne (April-Expl. findes i Herschends Samling), er der Mulighed for, at begge Angivelserne gjælde Herschends Exemplar.

***Certhia familiaris*, L.**

Ifølge Galschiøt er Træpikkeren sjelden paa Lolland. Han kjender kun to Exempler paa dens Forekomst der, idet den er skudt i Stensgaardsskoven og Stokkemarke Præstegaardshave.

***Lanius excubitor*, L.**

I Sekret. Friis's Samling fandtes en Han, skudt ved Kallundborg d. 15. April 1849 (Bölling), og en Hun, skudt d. 29. Nov. 1849 ved Lerchenborg (Gr. V. Lerche). I Frijsenborg-Egnen, hvor et Expl. blev skudt i Marts 1884 (J.), er den temmelig almindelig, og Skovrider Lund formoder, at den yngler der (L.). Skudt i Paradisskoven ved Rudersdal (Sjælland) d. 24. Nov. 1878 af Forst-studerende Hechmann, ved Fruergaard (Eistrup Sogn) d. 19. Okt. 1882 (Kjøbm. N. Larsen i Eistrup, Bg.) paa Lyngby Kongevei ved Lundehus-Bommen d. 6. Nov. 1883 (K.), ved Gudhjem paa Bornholm i Juni 1883 (J.) og set ved Ringkjøbing i Sommeren 1882 (J.). I Egnen ved Herschendsgave var den indtil 1884 temmelig sjelden og kun truffet faa Gange (i Okt. 1882 paa Skaarup Mark og i Nov. 1883 ved Hovedgaard Station); men i 1884 bemærkedes der om Efteraaret paafaldende mange Individer, af hvilke to bleve skudte (Hs.). I Skanderborg-Egnen angives den ogsaa af Justesen at være bleven hyppigere i de senere Aar. I Vallø-Egnen træffes den jevnligt om Vinteren (Skovrider Rosenstand). Ved Fæstningsgravene paa Østsiden af Amager blev den i 1884 bemærket d. 16. og d. 18. Marts og, efter Sigende, noget senere skudt (K.). D. 25. Sept. 1884 blev en ung Han skudt ved Stevns (A.). I Begyndelsen af Febr. 1885 modtog Un. zool. Mus. en Hun fra Kjøbmand O. Lund i Kallundborg, hvor flere Explr. omtrent samtidigt bleve skudte (W.). I Thy træffes den nu og da om Vinteren.

Heiberg har set den i Færgeborg Plantage i den udtørrede Sjørring Sø, og i Teglgaardens Have i Vestervig er den, ifølge hans Angivelse, skudt d. 3. Dec. 1876, d. 24. Okt. 1877 og d. 3. Januar 1879. I Egnen ved Otterup synes den at forekomme temmelig almindeligt. Grill har saaledes erholdt den fra Nislefgaard d. 6. Okt. 1880, fra Hofmansgave d. 10. Okt. 1880, fra Egense d. 15. Okt. 1883, fra Norup d. 22. Okt. 1884, fra Baardesø d. 22. Nov. 1884, fra Klintebjerg d. 2. Januar 1887 og desuden i de nævnte Aar selv set den paa mange andre Steder.

Paa Mors vides den ikke at være bemærket.

Hofjægermester Brun meddeler, at den i 1884 forekom hyppigere end tidligere (i Egnen S. f. Helsingør), og at han i dette Aar saae den angribe Fugle, som kun vare lidet mindre end den selv, samt at han midt i Nov. ved 14^o Kulde saae den flyve med en Bogfinke.

Varieteten major, Cab. er skudt ved Vellinggaard pr. Veile d. 2. Nov. 1882, ved Silkeborg d. 18. Nov. 1880, ved Viborg (en Hun) d. 19. Dec. 1881 og ved Ringsted d. 15. Dec. 1881 (L.).

Lanius collurio, L.

Ankom til Odense

1883—21. Mai (S.)

til Kjøbenhavn

1885—10. Mai (W.)

til Mors

1885—15. Mai (F.)

til Otterup (Gr.)

1877—14. Mai

1879—10. Mai

1878—11. —

1880—16. —

1881—11. Mai

1882—15. —

1883—15. —

1884—11. —

1885— 7. —

1886—21. Mai (kun faa

indfandt sig denne

Sommer)

1887 ankom den slet

ikke til denne Egn.

Paa Lolland synes den at være i stærkt Aftagende, sandsynligvis paa Grund af, at de mange Tjørnekrat og Tjørnehegn, som tidligere fandtes der, nu ere ryddede (G.).

Hofjægermester Brun saae en ung Tornskade fange Bier. Da han havde skudt den, undersøgte han dens Mave-Indhold og fandt, at den kun havde taget Droner.

H. Faber meddeler, at en Rede af *Sylvia nisoria*, som han i 1884 fandt med Unger i Anlægget ved Nykjøbing p. Mors, i 1885 blev udbedret og benyttet af et Par Tornskader, hvis Æg han fandt i Reden d. 1. Juni.

***Muscicapa grisola*, L.**

Paa Mors har H. Faber kun iagttaget den et Par Gange. I Thy er den hidtil ikke bemærket.

Ifølge en Iagttagelse af Hofjægerm. Brun synes det, at den graa Fluesnapper undertiden flere Aar itræk (i det meddelte Tilfælde 5 Aar) benytter samme Redeplads, at Hannen baade forsværer Hunnen og bringer hende Føde under Rugningen, og at den selv deltager i dette Arbeide.

***Muscicapa atricapilla*, L.**

[*M. luctuosa*, Temm.]

Hannerne ankomme i Regelen henimod en Uge tidligere end Hunnerne (Hs. og B.)

Ankom til

Faxe Ladeplads

1881—6. Mai (G.)

til Stokkemarke

1883—4. Mai (G.)

til Humlebæk

1884—10. Mai (B.)

til Herschendsgave

1884—4. Mai (Hs.)

til Odense

1883—4. Mai (S.)

til Nykjøbing p. Mors

1885—30. April (F.)

til Kjøbenhavn

1885—20. April (W.)

I 1885 blev der d. 17. Okt. dræbt to Individer ved Stevns (A. og W.). Paa Mors er den sjelden og vides kun iagttaget to Gange inden 1885, nemlig d. 6. og d. 11. Mai 1884 (F.).

Afd. Kgl. Skuespiller Ferslev har oftere fundet den ynglende i Dyrehaven v. Kjøbenhavn (Hs). Ved Taaning pr. Skanderborg har den i flere Aar ynglet i en hul Bøg (J.). Jernbaneassistent Scheel har meddelt Baagøe, at han d. 3. Mai 1887 fandt dens Rede i Raadmandsskoven v. Herlufsholm, og at den der yngler almindeligt.

Saa godt som alle Iagttagelser angaaende dens Forekomst her i Landet tyde paa, at den er langt hyppigere her paa Foraarstrækket end paa Efteraarstrækket.

Muscicapa collaris, Bechst.

I 1871 blev en stor Mængde Individer af denne her i Landet sjeldne Fluesnapper iagttaget i en Hasselskov ved Grænge paa Lolland (P.).

Ampelis garrulus, (L.).

[*Bombycilla garrula, Vieill.*]

Det synes, at denne Fugl kun i ringere Antal og mindre regelmæssigt indfinder sig om Vinteren i det nordlige og nordvestlige Jylland end paa Øerne. Heiberg angiver saaledes kun, at den i Vinteren 1875—76 optraadte enkeltvis i Haverne ved Thisted, og H. Faber nævner den slet ikke mellem de af ham paa Mors iagttagne Arter.

Hydrobata cinclus, (L.).*[Cinclus aquaticus, Bechst.]*

I Apotheke Benzons Samling fandtes 3 Hanner og 1 Hun fra Næstved, skudte i Nov. 1864 af Fencker, en Han, fanget ved Benzons Fabriker v. Kallebodstrand d. 28. Nov. 1869, en Han fra Røntved pr. Frederikshavn (5. Febr. 1865) og en Hun fra Hareskov ved Furesøen, skudt d. 16. Okt. 1870 af Hr. Seeger.

Iagttaget ved Kanalen i Sjørring Sø d. 4. Nov. 1875 (3 Expl.) (Hbg.), ved Herschendsgave d. 10. Febr. 1876 (Hs.), ved Kanalen i Flade Sø d. 15. Dec. 1878 (Hbg.), ved Christiansminde paa Lolland i Efteraaret 1879 (flere Individer) (P.).

I Efteraaret 1879 erholdt Stud. Hilkie et Expl. fra Viemose v. Husum pr. Kjøbenhavn (K.). Den er endvidere truffet ved Storaas i Nærheden af Holstebro (J.), ved Rosenvold i Jylland i Efteraaret 1881 (en Hun), ved Holte N. f. Kjøbenhavn d. 23. Dec. 1880 (L.), ved Kjøbenhavn d. 10. Nov. 1885 (sandsynligvis Varieteten melanogaster, Brehm) (W.); ved Aaen, som løber igjennem Ledreborg Have, opholder den sig baade Sommer og Vinter. D. 16. Dec. 1887 bleve to Explr. set i Raadmandsskoven ved Herlufsholm af Jernbaneassistent Scheel (Bg.). Ved Bro Mølle, ved Aarup Mølle og i Hillerslev Kjør forekommer den ikke sjældent om Vinteren (Hbg.); ligeledes i Vallø-Eggen (Skovrider Rosenstand). Paa Mors vides den ikke at være set.

Accentor modularis, (L.).

I Plantagen ved Nykjøbing p. Mors træffes den enkeltvis hele Aaret igjennem, og H. Faber tror, at den yngler der. Ved Herschendsgave, hvor dens Rede i 1885 blev fundet allerede d. 12. April med 6 Æg, forekommer den ligeledes jevnligt om Vinteren (Hs.). I Thy ses den der-

inod kun paa Trækket om Foraaret (Hbg.). Paa Lolland er den, ifølge Galschiøt, meget sjelden. Han har kun truffet den én Gang, nemlig ved Stokkemarke (i 1845?).

Troglodytes parvulus, Koch.

Herschend meddeler, at han meget hyppigt har fundet forladte (o: ikke benyttede) Reder af denne Fugl paa de mest forskellige Steder, „i Skrænten af Damme, Sauggrave, i Tagskjægget af Bygninger eller befæstet til Lægterne i aabenstaaende Skur, i hule Træer og ofte frit anbragte paa Grenene saavel af Naale- som af Løvtræer.“ At den yngler 2 Gange om Aaret, er bekjendt, men om man tør slutte, at den yngler tre Gange om Aaret, deraf, at han fandt dens Rede med friske Æg d. 18. Juli 1884, er vel tvivlsomt.

Parus ater, L.

Meget almindelig i Viborg-Eggen, hvor den yngler i Viborg Krat (Hbg.). Ligeledes i Margaards Skove i Otterup-Eggen, hvor den hvert Aar yngler (Gr.). I Granplantagerne omkring Næstved er den ligeledes almindelig om Vinteren, og adskillige Par yngle der (Bg.). Skudt ved Bagsvær d. 29. Okt. 1871 og d. 20. Febr. 1881, hvor den færdedes i Selskab med *P. palustris*, og i en Naaleskov ved Ørholm pr. Lyngby d. 19. April 1879, ligeledes sammen med *P. palustris* (Stud. Hilkier). Ofte set i Geel Skov af Samme; paa Christianshavns Vold i Efteraaret 1882 (K.). D. 23. Marts 1880 blev i Herschends-gaves Fredskov set en Flok paa 10 à 12 Stkr. Propr. Siboni skjød to Explr. paa Konstantinsborg ved Aarhus i Vinteren 18^{62/63}. I Foraaret 1878 iagttoges et Par Sortmeiser i Selskab med flere Meiser og Fuglekonger „i en Grantykning paa Lolland“ (P). Ved Gammelgaard

paa Lolland er den en Sommer (uvist naar) bemærket af Galschiøt. I 1886 var den hyppig i Vester Palsgaard Plantage (Bg.). D. 24. Mai 1887 fandt Jernbaneassistent Scheel Reden paa Rønnebækbakkerne ved Næstved, hvor Fuglene derefter opholdt sig hele Efteraaret og Vinteren over (Bg.). I en Granplantage ved Fredericia opholdt adskillige Individer sig i Efteraaret 1887 (Stabssergeant E. Bruun).

Hverken fra Thy eller Mors haves Meddelelse om dens Forekomst.

Parus major, L.

Om Vinteren er Musviten en slem Fjende for Bierne; ved at banke udenfor Flyvehullet lokker den dem ud og fortærer dem i Hundredevis, idet den dog ikke sluger dem hele, men piller dem i Stykker, saa at Jorden under Staderne ofte er tæt bestrøet med Benene og Vingerne af de dræbte Bier. Hofjægerm. Brun, hvem ovenstaaende lagttagelse skyldes, mener dog, at Musviten forarsager endnu større Skade mellem Bierne derved, at de paa denne Aarstid saa ofte foruroliges.

Parus caudatus, L.

[*Acredula caudata*, Koch.]

D. 30. April 1884 fandtes dens Rede med 11 Æg i et Elletræ ved Herschendsgave, kun 4 Fod over Jorden. D. 4. Mai s. A. blev en anden Rede fundet sammesteds i et Æbletræ, omtrent 12 Fod over Jorden, og endeligt sammesteds d. 24. Mai s. A. i et lille Grantræ; i den sidste Rede fandtes der smaa Unger (Hs.). I Præstevænget ved Faxe-Ladeplads fandt Galschiøt d. 4. Mai 1882 dens Rede med 3 Æg et Par Alen over Jorden i en ung Gran. I Apoth. Benzons Samling fandtes dens

Æg fra Jægersborg Dyrehave (1870, 1878 og 1880), fra Fuglsang p. Lolland (Mai 1859) og en Rede fra Sydsjælland.

Regulus cristatus, Koch.

Yngler almindeligt i alle Granplantninger omkring Viborg (Hbg.). I 1884 ynglede den ved Herschendsgave (Hs.).

Paa Mors har H. Faber kun bemærket den én Gang, nemlig d. 1. April 1884 i Plantagen ved Nykjøbing.

Sylvia trochilus, L.

[*Phyllopneuste trochilus, Mey.*]

Ankom til Odense . . . 1883— 1. Mai (S.)

— - Kjøbenhavn 1885—23. April (W.)

Vides ikke hidtil bemærket paa Mors.

Sylvia rufa, Lath.

[*Phyllopneuste rufa, Mey.*]

Stevnsfyr d. 18. Mai 1882 (1 Individ) og d. 11. Okt. 1883 (2 Individer) (A.). Fra Stud. med. Busse modtog Un. zool. Mus. et Expl., der dræbtes ved at flyve mod Lanternen paa Bovbjerg Fyr omtr. d. 18. Okt. 1885 (W.). I Apoth. Benzons Samling fandtes 2 Explr. fra Randerseggen, skudte d. 22. April 1867 (Fencker), og en Han fra Thyrsbæk, skudt d. 2. Mai 1878.

Sylvia hypolais, (L.).

[*Hypolais salicaria, Bonap.*]

Ankom til Odense . . . 1883—15. Mai (S.)

— - Kjøbenhavn 1885—17. — (W.)

Mærkeligt nok anføres den ikke af Heiberg blandt

Thylands Fugle; i Vendsyssel og paa Mors er den almindelig.

***Sylvia palustris*, Bechst.**

[*Acrocephalus palustris*, Naum.]

Stud. Hilkie har skudt den og fundet den ynglende mellem Nelder ved Utterslev pr. Kjøbenhavn (K.). Ved Edalgave blev den fundet ynglende i 1875, 1878 og 1881 (H.). Benzon havde dens Æg fra Ordrup-Mose, Ermelunden, Enighedsværn, Kjøge, Flensborg og Stubbekjøbing.

***Sylvia arundinacea*, (L.).**

[*Acrocephalus arundinacea*, Naum.]

Ankom til Odense 1883—13. Mai (S.)

— - Kjøbenhavn 1885— 9. — (W.)

Denne Rørsanger, der ellers er saa almindelig her i Landet, er — mærkeligt nok — hidtil ikke truffet i Thy og paa Mors, uagtet der begge Steder findes fuldt op af fortrinlige Ynglesteder for den.

***Sylvia turdoides*, Mey.**

[*Acrocephalus turdoides*, Naum.]

Stud. Hilkie skjød d. 17. Juni 1873 en Han i Søborg Mose (Kjøbenhavns Omegn), hvor han ligeledes fandt Reden (K.).

Den 20. Juni 1882 blev Reden med 5 Æg fundet af Boghandlerelev Schaarup ved Bygholm pr. Veile (Hs.).

***Sylvia fluviatilis*, Mey & Wolf. „Flodsanger.“**

[*Locustella fluviatilis*, Kaup.]

Af denne for vor Fauna nye Art har Un. zool. Mus. modtaget et Expl. fra Stevnfyr, hvor det d. 5. Sept.

1883 fandtes dræbt (A.). Flodsangeren hører hjemme i det sydøstlige Europa, Vestasien og Østafrika, men forekommer ikke ualmindeligt i Polen, Ungarn og Galizien, hvorimod den i Tydskland hører til Sjeldenhederne.

Afbildn. Ny Tavle til „Skand. Fugle“.

Sylvia schoenobænus, (L.).

[*Calamoherpe phragmitis*, Bechst.]

Ankom til Odense 1883—13. Mai (S.)

— - Herschendsgave . 1884— 4. — (Hs.)

— - — 1885— 2. — -

— - Nykjøbing p. Mors 1884—10. — (F.)

Truffet v. Stevns 1882— 9. — (A.)

Yngler almindeligt i alle Kjær og Moser paa Mors (F.); i Thy ligeledes almindeligt ynglende (Hbg.).

Sylvia aquatica, L.

[*Calamoherpe aquatica*, Bechst.]

Heiberg antager, at den yngler ikke saa ganske sjældent i Thy, idet han flere Gange der har erholdt Æg, som neppe kunde tilhøre nogen anden Art. Det er dog aldrig lykkedes ham at faa noget Expl. af selve Fuglen.

Sylvia cinerea, Lath.

Ankom til Odense 1883—20. Mai (S.)

— - Stevns 1882—18. — (A.)

— - — 1884—15. — -

— - Kjøbenhavn. 1885—17. — (W.)

— - Nykjøb. p. M. 1885— 8. — (F.)

Heiberg nævner den ikke blandt de i Thy forekommende Fugle.

Sylvia curruca, L.

Ankom til Odense 1883— 8. Mai (S.)
 — - Kjøbenhavn . 1885— 29. April (W.)
 — - Stokkemarke 1883— 6. Mai (G.)
 — - — 1884— 1. — -

I Thy synes den kun at forekomme paa Foraars-trækket; paa Mors vides den ikke bemærket.

Sylvia nisoria, Bechst.

Paa Mors, hvor denne Art er sjelden, har H. Faber i 1884 og 85 fundet den ynglende baade i Høiris Skov og i Plantagen ved Nykjøbing. I Thy er den, saavidt vides, aldrig truffet.

Sylvia atricapilla, L.

Ved Stevns blev den i 1883 truffet endnu d. 4. Okt. og i 1885 d. 11. Okt. (A.).

I Thy vides den ikke hidtil at være iagttaget, og paa Mors har H. Faber kun set den én Gang (d. 6. Mai 1885 i Nykjøbing Plantage).

Sylvia hortensis, (Gm.).

Ankom til Odense 1883—1. Mai (S.)
 — - Stevns 1884—1. — (A.)

Ikke truffet i Thy; paa Mors er den derimod temmelig almindelig og yngler flere Steder (F.).

Luscinia phoenicurus, (L.).

[*Ruticilla phoenicura*, Brehm.]

Ankom til Odense 1883—10. Mai (S.)
 — - Vesterborg . . . 1884— 8. — (G.)

Ankom til Kjøbenhavn . . 1885—26. April (W.)

— - Herschendsgave — —28. — (Hs.)

— - Nykjøbing p. M. — —27. — (F.)

Herschend har iagttaget, at denne Art færdes meget i Selskab med *Muscicapa atricapilla*, og at dens Foraars-træk i Regelen falder sammen med sidstnævnte Arts.

I Thy og paa Mors er den temmelig hyppig paa Trækket, navnlig om Foraaret, men ynglende er den ikke truffet noget af Stederne (Hbg. og F.).

Luscinia vera, Sundew.

[*Luscinia minor*, Chr. L. Br.]

I Egnen ved Humlebæk er den truffet indtil d. 8. Sept. (B.). I Storehedinge-Egnen yngler den, ligesom *L. philomela*, i næsten alle Smaaskovene (A.).

Hverken denne eller *L. philomela* forekommer N. f. Limfjorden eller paa Øerne i denne.

Luscinia philomela, (Bechst.)

Ved Herschendsgave, hvor Nattergalen tidligere ikke fandtes, har den i de senere Aar indfundet sig temmelig regelmæssigt. Dens Sang hørtes der første Gang:

1880—14. Mai (Hs.)

1881—21. — -

1882—15. — -

1883—14. — -

1885—14. — -

Hørtes første Gang v. Otterup (Gr.)

1876— 8. Mai

1882— 3. Mai

1877—10. —

1883— 8. —

1878— 6. —

1884—10. —

1879— 6. —

1885— 7. —

1880—11. —

1886— 6. —

1881— 9. —

1887—13. —

ved Vesterborg

1884—15. Mai (G.)

ved Humlebæk

1884—22. — (B.)

Ankom til Odense

1883— 7. — (S.)

til Stevns

1882—11. — (A.)

1885— 6. — -

til Storehedinge

1883— 9. -- -

1884—11. — -

Ved Skaarup i Omegnen af Herschendsgave fandtes dens Rede i 1880 umiddelbart paa Jorden (Hs.)

Ved Storehedinge yngler den i Mængde (A.); cfr. foregaaende Art.

Luscinia tithys, (Scop.).

[Ruticilla tithys, Brehm.]

Fra Konditor Bjerrum har Un. zool. Mus. modtaget en Han, skudt ved Ribe d. 30. Marts 1885. I Herschends Samling findes en Han, der er skudt samme Sted som førstnævnte d. 25. Apr. 1879, og som ligeledes skyldes Hr. Bjerrum. Endeligt har Bjerrum meddelt mig, at han d. 3. Juli 1876 i Alleen ved Cathrine-Kirken i Ribe saae to gamle Individer, som madede deres fire store, flyvefærdige Unger. Han fik Leilighed til at iagttage dem i længere Tid og bemærker, at Forældrene fangede Insekter til Ungerne paa en Maade, der mindede dels om Fluesnapperne, dels om Vipstjerternes Insektfangst.

Erithacus rubecula, (L.).

[*Dandalus rubecula*, Boie].

Adskillige Individer blive her i Landet Vinteren over, selv om denne er temmelig stræng.

Erithacus Suecicus, (L.).

[*Cyanecula Suecica*, Brehm].

I Apotheker Benzons Samling fandtes der Æg fra Stege (8. Mai 1865. Erichsen). I 1880 bleve flere Individer truffet i Skovene omkring Brahetrolleborg paa Fyen, navnlig i en Ellemose lidt Ø. f. Egneborg (P.). D. 18. Mai 1881 blev et Expl. fanget paa Stevns Fyr*) (K.). Sammesteds truffet d. 5. Sept. 1883 (A.). I Sept. 1882 bemærkede Propr. Siboni i flere Dage en Blaakjælk (med brun Strubeplet) i Thestrup Have i Jylland (Hs.). I Okt. 1883 blev en Hun dræbt ved at flyve mod Telegraftraaden ved Skive (Bg.). Samme Meddeler har underrettet mig om, at et Expl. blev skudt ved Middelfart d. 12. April 1886 (Rossing). En Han fra Randers-Egnen blev i Mai 1886 sendt Stabssergeant E. Bruun i Fredericia til Udstopning. Kjøbmand N. Larsen i Eistrup meddeler, at Blaakjælken ingenlunde er sjelden i hans Egn. Han har selv skudt adskillige (nogle af dem findes i hans Samling), altid i Mai; de fleste vare Hanner, og disse havde alle rød Strubeplet. Hans Karl skjød i Foraaret 1886 Han og Hun i Give pr. Herning. Den yngler fremdeles hvert Aar i Vedby Mose ved Margaard, men aldrig

*) I Lützens I. Jahresbericht p. 33 angives, at dette Individ havde „blaa Halsplet“. Da denne Charakter er fælles for alle Hannerne, tør det formentlig deraf sluttes, at Talen er om Varieteten Erith. Wolfii, Brehm, hos hvem Strubepletten mangler.

mere end et enkelt Par, og altid Individder med hvid Strubeplet (Gr.). D. 12. Mai 1884 sad en Han med rød Strubeplet i længere Tid i en Poppel i Grills Have i Otterup og sang, men den forsvandt derefter fra Egnen.

Turdus merula, L.

[*Merula vulgaris*, Leach].

Efter de nyere lagttagelser synes det, at Solsorten overveiende maa betragtes som Standfugl her i Landet, i alt Fald forekommer den hos os i temmelig stort Antal om Vinteren, selv om denne er stræng, men sandsynligvis forøges da Antallet ikke ubetydeligt af de fra nordligere Egne ankommende Individder.

Turdus atrigularis, Natt.

Det i „Skand. Fugle“ (p. 224) omtalte Expl. fra Feldborg Plantage er nu opstillet i Baagøes Samling.

Turdus torquatus, L.

[*Merula torquata*, Boie].

En Varietet med renhvidt Hoved og med hvide Pletter overalt paa Kroppen blev i Okt. 1883 fanget i Feldborg Skovdistrikt ved Skive (J.).

Turdus viscivorus, L.

Yngler fremdeles talrigt i Viborg-Egnen (Hbg.). I Skoven ved Rathlousdal pr. Horsens fandtes dens Rede d. 7. Mai 1882 i en Gran, kun 3 Alen over Jorden; yngler v. Sorø (K.).

I Thy forekommer den sjældent; et Expl. blev skudt

ved Thisted d. 15. Nov. 1875. Paa Mors vides den ikke at være bemærket.

Turdus musicus, L.

Ankom til Odense 1883—16. April (S.).

Hørtes første Gang ved Herschendsgave (Hs.)

1878—28. Febr.

1879— 6. Marts

1880— 1. —

1882— 4. —

1883— 2. —

1884— 6. —

Turdus iliacus, L.

I Anledning af en Bemærkning i „Skand. Fugle“ p. 222 om, at den hidtil ikke er bemærket paa Bornholm, skal her kun anføres, at der d. 26. April 1879 blev dræbt to Expl. (Hunner) paa Christiansø (L.).

Paa Mors er den kun bemærket én Gang af H. Faber, nemlig d. 1. Apr. 1884 i Nykjøbing Plantage. Ved Københavns iagttoges en Flok paa ca. 20 Stkr. d. 6. Dec. 1885; endnu d. 26. s. M. saaes enkelte.

I Apoth. Benzons Samling fandtes en spættet Varietet (ung Han), skudt ved Glorup d. 25. Okt. 1880.

Saxicola oenanthe (L.).

Ankom til Otterup (Gr.)

1876—31. Marts

1877— 5. April

1878— 6. —

1879—10. —

1880—28. Marts

1881— 1. April

1882— 5. April

1883— 3. — *)

1884—31. Marts

1885—13. April

1886—31. Marts

1887—12. April

*) I Ltk. Jahresber. I. p. 33 angives dens Ankomst til Odense til Slutningen af April (S.).

til Herschendsgave (Hs.)

1879—13. April	1883— 4. April
1880—27. Marts	1884— 1. — *)
1881—17. April	1885— 6. —
1882—10. —	

til Kjøbenhavn 1885—12. April (W.)

- Amager	— —11. — (K.)
- Storehedinge	— —10. — (A.)
- Nykjøbing p. Mors. . .	— —16. — (F.)

Ved Stevns Fyr blev den truffet

1882—14. April (A.)
1883— 6. — (-).

Paa Lolland er den „meget sjelden“ om Sommeren, muligvis som Følge af, at der findes saa faa Stengjærder eller andre passende Ynglesteder for den (G.).

Saxicola rubetra, (L.).

[*Pratincola rubetra*, Koch].

Ankom til Otterup (Gr.)

1876—15. Mai	1882—26. April
1877—11. —	1883— 5. Mai
1878— 4. —	1884— 5. —
1879— 6. —	1885— 1. —
1880—28. April	1886—28. April
1881— 6. Mai	1887— 4. Mai

til Herschendsgave (Hs.)

1878— 4. Mai	1882— 7. Mai
1879—30. April	1883— 4. —
1880— 9. Mai	1884—10. —
1881—12. —	1885—26. April

**) Ifølge Ltk. Jahresber. II. p. 21: d. 8. April.

- til Mors 1884—11. Mai (F.)
 - — 1885—14. — -
 - Kjøbenhavn . . 1885—29. April (W.)
 - Vesterborg . . . 1884—11. Mai (G.)

Kaldes paa Lolland „Plovkjører“ (G.).

Motacilla alba, L.

Ankom til Otterup (Gr.)

1876—23. Marts	1882—25. Marts
1877—30. —	1883— 5. April
1878— 6. April	1884—16. Marts
1879—29. Marts	1885—22. —
1880—19. —	1886—29. —
1881—31. —	1887— 8. April

til Herschendsgave (Hs.)

1878—31. Marts	1882—24. Marts
1879—27. —	1883— 3. April
1880—20. —	1884—20. Marts
1881—22. —	1885—17. —

- til Nykjøbing p. Mors . . . 1884— 2. April (F.)
 - — — — . . . 1885—15. Marts -
 - Amager 1884—30. — (K.)
 - — 1885— 6. April -
 - Storehedinge — — 4. — (A.)
 - Kjøbenhavn — —29. Marts (W.)
 - Faxe Ladeplads. 1880— 7. April (G.)

Paa Lolland træffes den saa godt som aldrig om Sommeren, sandsynligvis fordi der findes saa faa af de Lokalteter, som den fortrinsvis vælger til Redeplads (G.).

En Hun fra Christiansø d. 26. April 1879 (L.).

I Thy kaldes den „Havresæd“ eller „Kongfovl“ (Kongefugl) (Hbg.).

Motacilla alba, L. — *Var. Yarrellii*, Gould.

I Herschends Samling findes et Expl., som d. 27. Marts 1883 blev skudt ved Testrupgaard mellem Horsens og Skanderborg af Propr. Siboni (F.)*). Fra Hr. Bjerrum i Ribe har jeg modtaget følgende Beretning: D. 18. Mai 1882 skjød han et Expl. af *M. Yarrellii* ved Stenpavillonen udenfor Ribe Sønderport. Af Gartner Pultz, til hvem han viste Fuglen, erfarede han da, at det skudte Exemplar tilligemed sin Mage havde opholdt sig i Pultz's Have fra det tidlige Foraar, og at de havde bygget Rede i et Stengjærde bag den derværende Kalkovn. — En gammel Han blev i Marts 1885 skudt i Nærheden af Silkeborg (Kjøbmand N. Larsen i Eistrup pr. Horsens, Vrads Herred. Bg.).

Apotheker Teilmann Friis i Nykjøbing p. M. har underrettet mig om, at det Expl., der i mine „Ornith. Bidr.“ omtales som værende i hans Besiddelse, — saavidt han mindes — af ham er skjænket til Ribe Skole.

Motacilla alba, L. — *Var. lugubris*, Temm.

Hr. Bjerrum har under 27. Okt. 1887 meddelt mig, at „den sortryggede Vipstjert“ (*M. lugubris*) er set d. 3. Marts s. A. paa et Stykke gravet Havejord ved Ribe. Uagtet Veiret efter den Tid blev vinterligt med Sne og Kulde, blev den atter set d. 29. s. M. og fremdeles d. 5. Mai. Meddelelsen antager, at det var én og samme Fugl, og tilføier, at han ganske vist tror, at den har ynglet der senere paa Sommeren.

*) Lütken: Jahresber. I. p. 34. — I Herschends „Iagttagelser“ (p. 11) angives Aarstallet 1880.

Motacilla sulphurea, Bechst.

I Begyndelsen af Juni 1881 iagttog Brygger Schiøtz og Dr. Heiberg to Par af denne Art paa Meilø ved Fyenshoved. Fuglene løb omkring i Græsset og søgte Næring (S.).

Forsaavidt der ikke i dette Tilfælde foreligger en Forvexling, vil det være første Gang, at Arten sikkert vides truffet i det egenlige Danmark.

Motacilla flava, L.

[*Budytes flavus*, Cuv.].

Ankom til Otterup (Gr.).

1876— 6. Mai	1882—27. April
1877— 7. -	1883—28. - *)
1878— 3. -	1884—30. -
1879— 5. -	1885—27. -
1880—27. April	1886—21. -
1881—21. -	1887—29. -

til Herschendsgave (Hs.).

1878— 7. Mai	1882— 8. Mai
1879— 6. -	1883— ? -
1880—30. April	1884— 7. -
1881— 2. Mai	1885—25. April

til Nykjøbing p. M. — 1884—29. April (F.).

- — - -	1885—23. — -
- Kjøbenhavn	— —26. — (W.).
- Amager	— —21. — (K.).

Afreist fra Amager 1883—21. Septemb. (K.).

Paa Lolland er den i de senere Aar aftaget saaledes i Mængde, at det nu hører til Sjældenhederne at træffe den der (G.).

Kaldes i Thy „Gulfovl“ (Hbg.).

*) til Odense 1883—6. Mai (S.).

Motacilla flava, L. — *Var. borealis*, Sundew.

Fra ovennævnte Kjøbmand N. Larsen i Eistrup har jeg gennem Baagø modtaget Meddelelse om, at han d. 20. Mai 1884 skjød „en sorthovedet gul Vipstjert“ paa sin Eiendom i Eistrup, at han d. 8. Maj 1885 skjød et andet Expl. sammesteds, og at der efter den Tid er skudt flere Individer af samme Slags, saaledes et af Ungkarl C. P. Petersen Ramskov (Give Sogn pr. Jelling) og et af Ungkarl Hans Andersen i Arreskov pr. Nørre Snede. Det tilføies, at den omhandlede Varietet overhovedet ikke er sjelden der om Foraaret. Konservat. Hansen modtog d. 15. Mai 1886 til Udstopning for Dr. Heiberg en Han, skudt ved Viborg. Stabssergeant E. Bruun i Fredericia har havt tre Explr. til Udstopning; de vare alle skudte af Skovfoged Christiansen ved Viborg Krathus.

Anthus obscurus, (Lath.).

[*A. rupestris*, Nilss.].

I Apoth. Benzons Samling fandtes et Expl. fra Randers (Fencker) og et fra Als. Skudt paa Amager Fælle d. 31. Marts 1878 og paa Tømmerup Overdrev d. 1. Okt. 1882 (K.), ved Kjøbenhavn d. 25. Januar, d. 27. Marts og d. 20. Dec. 1885 (W.). Grill har iagttaget den paa Veirø og fundet den ynglende paa Bosserne ved Samsø d. 9. Juni 1878. Reden var bygget af Tang og anbragt imellem Stenene i Sandet; den indeholdt 5 stærkt rugede Æg. Den 11. Mai 1886 fandt han dens Rede i en lille Fordybning paa en Jordvold paa det til Daugstrup hørende Overdrev ved Odense Fjord; den var bygget af Græsstraa, foret med enkelte Hestehaar og lignede Engpiberens, men var større. Reden indeholdt 4 kun lidt rugede Æg.

Anthus pratensis, L.

Ankom til Herchendsgave 1884—10. Marts (Hs.).

— - — 1885— 8. — —

— - Nykjøbing p. M. 1884—29. Febr. (F.).

— - — - - 1885— 4. April -

— - Kjøbenhavn 1885—15. Marts (W.).

Afreist fra Amager 1883—28. Okt. (K.).

— - — 1884—12. - -

I Vinteren 1883—84 overvintrede mange Engpibere paa Amager; den følgende Vinter blev et Expl. skudt sammesteds d. 13. Dec. (K.).

Anthus arboreus, Bechst.

Ankom til Odense 1883—4. Mai (S.).

Heiberg nævner den ikke mellem Thylands Fugle, og paa Mors er den af H. Faber kun truffet én Gang, nemlig d. 8. Mai 1885 paa Gjennemtrækket. Paa denne ene Dag opholdt et betydeligt Antal Træpibere sig i Plantagen ved Nykjøbing.

Alauda cristata, L.

[*Galerita cristata*, Boie].

I de senere Aar er den temmelig almindelig næsten overalt i Jylland, især paa Trækket og om Vinteren. I Otterup Eggen er den, siden den nordfynske Jernbane blev anlagt, ligeledes blevet temmelig almindelig. Om Sommeren træffer man kun faa Individder der, altid i Nærheden af Jernbanen, men om Vinteren færdes den i større Antal omkring paa Veiene og i Gaardene; den er da meget lidt sky. Un. zool. Mus. har fra prakt. Læge Bølling modtaget et Expl., som blev skudt i Begyndelsen af Nov. 1885 ved Ringsted.

Alauda arvensis, L.

Ved Otterup hørtes den første Gang synge (Gr.).

1877—16. Febr.

1884— 3. Febr.

1878—10. —

1885— 5. —

1879— 5. Marts

1886—24. Marts*) ved-

1880—10. Febr.

varende Frost med

1881— 9. Marts

Sne indtil d. 20.

1882— 8. Febr.

Marts.

1883— 4. —

1887— 2. Febr.

Stud. med. Krabbe har meddelt, at han i Forening med Stud. Kløcker har hørt Lærkerne synge af fuld Hals paa Amager midt om Natten mellem d. 4. og 5. Juni 1884; det var ganske stille og maanelyst. H. Faber har oftere hørt den synge midt om Natten paa Mors.

Paa Lolland overvintrer den altid og træffes da stadigt i Flokke; først hen i April færdes den parvis (G.).

En hvid Varietet blev skudt d. 24. Sept. 1877 ved Hornumbro i Jylland (L.).

Et isabellafarvet Expl. blev indsendt til Un. zool. Mus. d. 24. Okt. 1884 fra Thy (L.).

Alauda arborea, L.

[*Lullula arborea*, Kaup].

Saavidt vides er denne Art hidtil ikke iagtaget i Thy og paa Mors.

Otocoris alpestris, L.

[*Phileremos alpestris*, Brehm].

D. 23. Nov. 1883 blev der bemærket nogle mindre

*) cfr. *Vanellus cristatus*.

Flokke af Bjerglærker paa Markerne ved Finnerup i Jylland. Skovfoged Christiansen skjød 7 Stkr. af dem (Bg. & Hbg.). H. Faber skjød flere Explr. ved Horsens i Dec. 1878 og angiver, at Arten hver Vinter forekommer i smaa Flokke paa Vester Lyng ved Seirø Bugt, hvor han ofte har skudt den; han traf den saaledes der d. 31. Dec. 1882, d. 2. Januar, 11. Okt., 16. Okt., 29. Okt., 13. Dec. og 29. Dec. 1883.

D. 24. Dec. 1874 blev der ved Bispebjerg Mølle pr. Kbhvn. skudt 4 Explr. ud af en Folk paa c. 14 Stkr. D. 25. Nov. 1883 bleve tre Hanner skudte paa Tømmerup Overdrev. D. 6. Dec. s. A. iagttoges 3 Bjerglærker paa Forstranden S. f. Kjøbenhavn, og d. 25—27 Januar bleve 2 (af dem?) skudte af Stud. Hechmann (K.). Endvidere angives Bjerglærken at være set ved Slagelse og ved Feldborg pr. Skive (J.). D. 9. Nov. 1884 skjød Stud. Busse og Stud. Ramm paa Tømmerup Overdrev 10 Stkr. af 3 Flokke, der tilsammen bestod af c. 22 Individier. D. 30. Nov. s. A. skjød Stud. med. Krabbe 4 Explr. paa Østkysten af Amager, og langs Kysten ved Kastrup saae han samme Dag 19 Stkr. D. 29. Dec. s. A. skjød Stud. Busse en Bjerglærke ved Vangede pr. Lyngby (K.). Ifølge „Jagttidende“ bleve 2 Hanner skudte ved Sophiendal pr. Skanderborg d. 25. Januar 1885 af H. Rosenkrantz. Herschend traf i Dec. 1878 flere Explr. paa Lottenborg Mark v. Aarhus, og d. 25. Januar 1879 skjød Propr. Søltoft et Explr. paa Glibinggaard Mark v. Horsens (Hs.). I Vinteren 1881 blev et Expl. skudt ved Utterslev pr. Nakskov (P.).

Det synes at fremgaa af ovenstaaende Meddelelser i Forening med hvad der i „Skand. Fugle“ er anført om Bjerglærkens Forekomst her i Landet, at denne Fugl, ligesom Toplærken, er i Færd med at tage fast Ophold i Danmark.

Emberiza miliaria, L.[*Miliaria Europæa, Swains.*]

Et næsten renhvidt Expl. blev skudt ved Feldborg Plantage (pr. Skive) d. 18. Nov. 1878 (L.). Et lignende (Hun) blev fanget d. 13. Mai 1884 ved Bækkeskov pr. Rønnede paa Sjælland (L.). Dr. Heiberg skjød en ren hvidgul Varietet med brun Iris d. 18. Marts 1877 i Hjarde-maal Klit; den var bemærket der i Egnen flere Vintere itræk. En lignende hvidgul Varietet blev skudt ved Horsens d. 6. Nov. 1884. (Kjøbm. N. Larsen, Bg.). I Apoth. Benzons Samling fandtes et renhvidt Expl. fra Tjæreby v. Randers (30. Okt. 1867).

I Thy, hvor den yngler meget almindeligt, kaldes den „Baandspærri“ (Hbg.).

Emberiza citrinella, L.

Ifølge Heiberg yngler Gulspurven neppe i Thy, hvor den overhovedet er sjelden. Han selv har kun én Gang truffet den der, nemlig d. 12. Dec. 1878 i Thisted. Paa Mors er den derimod almindelig overalt.

Paa Lolland bygger den altid sin Rede i Fordybninger i Jorden (G.).

En rødlig Varietet (Hun), skudt paa Møen i Januar 1855, fandtes i Apoth. Benzons Samling.

Emberiza hortulana, L.

I Slutningen af April 1881 blev en Han skudt i Haven ved Bispebjerg Mølle v. Kbhvn. (K.).

D. 11. Mai 1882 ved Stevnfyr, 2 Stkr. (?) (L.). Sammesteds d. 6. Mai og d. 8. Sept. 1885 (A.). Ifølge „Jagttidende“ har Hr. H. Rosenkrantz skudt den i Midten af Mai 1885 i Nærheden af Aarhus. Hofjægerm. Brun

angiver, at et Par har ynglet i hans Have ved Louisiana ved Humlebæk.

Emberiza schoeniclus, L.

[*Schoenicola* *) *schoeniclus*, Bonap.]

Ankom til Odense 1883—16. Mai **) (S.).

—	-	Mors (Lødderup Kjær)	1884—21. Marts (F.).
—	-	Amager	— — 16. — (K.).
—	-	Stevns	1885—16. — (A.).
—	-	Kjøbenhavn	— — 1. — (K.).

Paa Lolland er Rørverlingen sjelden. — Saavel Heiberg som H. Faber have fundet enkelte Reder med lyst farvede blaa eller grønne Æg, der kun havde faa mørke Prikker og Snirkler eller endog ganske manglede saadanne.

Plectrophanes nivalis, L.

I Thy, hvor den kaldes „Snefovl“, har Heiberg truffet den endnu i Begyndelsen af Mai.

Passer montanus, (L.).

Paa flere Steder i Jylland (omkring Veile og Kolding) bygger Skovspurven store, runde Fællesreder i Tjørnehegnene om Markerne. En saadan Fællesrede er saa stor som et Menneskehoved eller større og indeholder 2 à 3 Enkeltreder.

*) Slægtsnavnet „*Schoenicola*“ er anvendt af Blüth for en Gruppe af Timaliidernes Familie.

**) Tidligere ankomne Individuer ere vist undgaaede Iagttagerens Opmærksomhed (medmindre Angivelsen — Jahresber. I. p. 37 — beror paa en Trykfeil).

I Thy, hvor den er temmelig sjelden, men dog hist og her findes ynglende, kaldes den „Møllsparri“*) (Hbg.).

Passer domesticus, (L.).

Et renhvidt Expl. blev skudt paa Ringkjøbings Kirkegaard i Juli 1876 (J.). Et lignende Expl. blev i Efteraaret 1884 skudt i Ribe (J.). I Baagøes Samling findes et aldeles snehvidt Expl., skudt ved Mantzhøi pr. Nykjøbing p. Sjælland d. 12. Okt. 1877 af Forstassistent Krohn.

I Thy kaldes den „Sparv“, „Sparri“ og „Rygsparri“ eller „Røgsparri“ (Hbg.).

Fringilla coelebs, L.

Paa Un. Zool. Mus. findes en Albino, skudt v. Kjøbenhavn d. 24. Febr. 1878 (L.). I Apotheker Teilmann-Friis's Have i Nykjøbing p. M. opholdt en eiendommeligt farvet Varietet sig i Begyndelsen af Firserne tre Aar itræk. Det var en Han med lysebrunt Hoved og Bryst (med mørkere Partier paa Kinderne), næsten hvid Bug med lys, brunlig Tone, hvide Vinger, hvide Styrefjer, lyst gulgrøn Overgump og lysegraa Undergump (F.).

Fringilla montifringilla, L.

I Sommeren 1886 ynglede et Par Kvækerfinker i Ribe Plantage i Slutningen af Juni Maaned (Bj.) Dette er, saavidt vides, det eneste hidtil kjendte Tilfælde, i hvilket denne Fugl har ynglet her i Danmark.

Coccothraustes vulgaris, Steph.

Er hidtil ikke truffet i Thy og kun en enkelt Gang

*) Sparri = Spurv.

paa Mors, nemlig i Okt. 1886, da en gammel Han blev fanget i en Done i Nykjøbing Plantage (F.).

Chlorospiza chloris, (L.).

[*Ligurinus chloris*, Koch].

Yngler i ringe Antal paa Mors (F.). Heiberg angiver den som forekommende almindeligt paa Trækket i Thy. Bemærkningen i „Skand. Fugle“ om, at den kun én Gang er truffet i den vestlige Del af det N. f. Limfjorden liggende Parti af Jylland, er saaledes urigtig.

Paa Lolland skal den, ifølge Galschiøt, være meget sjelden om Sommeren; kun én Gang har han bemærket den der i Yngletiden, nemlig d. 16. Juni 1884, da han traf tre Individer ved Vesterborg.

Dryospiza serinus, (L.).

En ung Hun blev d. 28. Febr. 1887 indsendt fra Hjørring (Hr. Wulff) til Un. zool. Mus. Det er første Gang, at denne Art med Sikkerhed vides truffet i det egenlige Danmark, idet Rigtigheden af Mecklenburgs Angivelse om, at Hage havde skudt den ved Nordskov, ikke er hævet over Tvivl (cfr. „Skand. Fugle“ p. 371—72).

Acanthis spinus, (L.).

[*Chrysomitris spinus*, Boie].

Den eneste Gang denne Art er bemærket paa Mors, var d. 8. Mai 1885, da H. Faber traf 5 Individer i Nykjøbing Plantage. I Thy er den ikke iagttaget.

Acanthis carduelis, (L.).

[*Carduelis elegans*, Briss].

Yngler hist og her paa Mors (F.), hvorimod den i Thy kun synes at forekomme paa Trækket.

Linota cannabina, (L.).

[*Cannabina sanguinea*, Landb.].

Yngler to Gange aarligt (sidste Gang i Juni) og bygger meget ofte sin Rede paa Jorden, i Lyng, Græstuer, Tang o. lgn. Steder.

Linota flavirostris. (L.).

[*Cannabina flavirostris*, Degl.].

Træffes om Vinteren ikke sjældent i Selskab med nærmere eller fjernere Slægtinge. H. Faber saae den saaledes sammen med *Plectrophanes nivalis*, og Stud. Krabbe iagttog den sammen med *Acanthis linaria*.

Loxia leucoptera, Gm.

Skudt d. 20. Febr. 1887 i Palsgaard Plantage af Havebrugskandidat Bruun. Den færdedes i Selskab med en Flok *L. curvirostra* (Kjøbm. N. Larsen i Eistrup. — Bg.).

Loxia pityopsittacus, Bechst.

D. 10. Aug. 1885 blev en Flok paa 10 à 12 Stkr. truffet ved Herschendsgave (Hs.). Ved Gjorslev pr. Stevn er den i indeværende Vinter (18^{87/88}) optraadt i Mængde (Bg.). I Sekr. Friis's Samling fandtes, blandt andre danske Explr., en Han, skudt i Søndermarken v. Kbhvn. d. 5. Sept. 1855.

Columba palumbus, L.

Hofjægerm. Brun antager, at den undertiden yngler tre Gange aarligt. Det er, i Modsætning til den af Andre gjorte Erfaring, lykkedes ham at gjøre nogle Ring-

duer saa tamme. at de, naar han kaldte paa dem ude i Skoven, kom flyvende og satte sig paa ham. At denne Due skulde forlade sine Æg ved den mindste Forstyrrelse, modsiges af H. Fabers Iagttagelser.

Columba oenas, L.

I Thy er den, saavidt vides, kun én Gang skudt, nemlig ved Sundbygaard d. 14. April 1876 (Hbg.).

Paa Lolland er den, ifølge Galschiøt, meget sjelden; han har kun truffet den én Gang (d. 26. Marts 1865 i Vandmølleskoven i Vesterborg Sogn). I Otterup-Eggen har Grill ikke fundet den ynglende siden 1870. Han angiver, at der hvert Aar i Marts Maaned gaar et betydeligt Træk over de til Einsidelsborg hørende Skove, hvor de opholde sig nogle Dage og da navnlig færdes paa de tilstødende Marker.

Turtur auritus, Ray.

I Foraaret 1879 blev et Expl. fanget ved Lem pr. Ringkjøbing (J.). D. 4. Juni 1879 blev et andet Expl. fanget ved Landsbyen Rindum, ligeledes i Ringkjøbing-Eggen; dette sidste findes nu i Herschends Samling (Hs.). I Sekret. Friis's Samling fandtes en Han, skudt i Nærheden af Flensborg d. 23. April 1849.

Tetrao tetrix, (L.).

Lovbestemmelsen om Fredning af denne Fugl har bidraget betydeligt til at standse dens Aftagen. Paa adskillige Steder i Jylland forekommer Urhønen nu igjen flokkevis.

I Thy synes det imidlertid at gaa langsomt med dens Tiltagen. Siden 1860 har den, som det synes,

ikke ynglet der, og senere er der kun nu og da truffet et enkelt omstreifende Individ (Hbg.). Paa Mors er den ikke bemærket.

I Sekret. Friis's Samling fandtes en ung Han, skudt ved Helsingør. Exemplaret, som Friis havde erholdt af Enkefru Steenberg i 1863, har sandsynligvis hørt til den Flok, der omtales i „Skand. Fugle“ (p. 411) som udgaaet fra det mange Aar tidligere foretagne Kolonisationsforsøg ved Tidsvilde.

Perdix cinerea, Briss.

[*Starna cinerea*, Bonap].

Ved en Jagt paa Gunderstedgaard ved Nibe blev der, ifølge „Nordj. Folkebl.“ i Begyndelsen af Okt. 1887 set 6 hvide Agerhøns sammen med en Flok af almindelig Farve. To af de hvide bleve skudte.

Syrrhaptis paradoxus, (Pall.).

I Herschends Samling findes en Hun, som d. 21. Dec. 1863 blev fundet død ved Landsbyen Gredsted pr. Ribe, og som formodes at være omkommen ved at flyve mod en Telegraftraad *).

I Sekret. Friis's Samling fandtes en Han, skudt i 1863 i Ringkjøbing-Egnen.

Coturnix communis, Bonnat.

[*Coturnix dactylisonans*, Meyer].

Sjelden i Thy, hvor den dog af og til er fundet ynglende (Hbg.). I Egnen ved Herschendsgave synes den

*) Sandsynligvis det samme Expl., der i „Ornithol. Bidr.“ (p. 19) omtales som skudt ved Gredsted.

at være stærkt i Aftagende. Ifølge Herschends lagttagelser yngler den paa meget ubestemte Tider, fra Midten af Juni indtil Midten af September. Paa Nissumgaard Mark blev saaledes dens Rede fundet d. 14. Sept. 1881 med 9 friske Æg (Hs.).

I Kataloget over Benzons Æggesamling findes anført 5 Æg, som i 1866 vare tagne paa en Græsslette mellem Qvalvig og Thorsvig paa Færøerne*), samt 3 Æg fra Færøerne (1870).

Otis tetraz, L.

I Apotheke Benzons Samling fandtes en Hun, som angives at være skudt paa Amager Fælle d. 20. Dec. 1863. Om det er dette Expl., der i „Skand. Fugle“ (p. 435) omtales som en Han fra Amager (Conradsen 1864), kan jeg ikke afgjøre.

Oedicephus crepitans, Temm.

Fuldmægtig C. J. Iversen paa Lerchenborg skjød d. 8. Juli 1881 et Expl. (Han) af denne her i Landet meget sjeldne Fugl ved Hedevislyst Nordstrand paa Asnæs. Exemplaret, som blev udstoppet af Konservator Hansen, findes i Grev A. Brockenhuus-Schacks Fuglesamling paa Spanager.

Cursorius Gallicus, (Gm.).

Syn. Charadrius Gallicus, Gm. — Cursor Europæus, Naum. — Cursorius Europæus, Lath. — Cursorius Isabellinus, Mey. — Tachydromus Gallicus, Illig.

Den 26. Nov. 1881 blev en Ørkenløber (Han) skudt ved Trelde pr. Fredericia. Exemplaret blev senere af

*) Muligvis er det dette Tilfælde, til hvilket der sigtes i „Skand. Fugle“ p. 408.

Stabssergeant E. Jacobsen skjænket til Univ. zool. Mus., hvor det findes opstillet. Det er første Gang, at denne, selv i Syd-Europa kun tilfældigt forekommende, Art er truffet her i Landet. Dens Hjem er Vest-Asiens og Nord-Afrikas Sandørkener.

Afbildn. Ny Tavle til „Skand. Fugle“.

Squatarola Helvetica, L.

[*Charadrius squatarola*, Naum.]

Optræder ofte paa Trækket som Fører for Flokke af *Tringa cinclus* (K. & Hbg.).

Charadrius pluvialis, L.

Om det end kan siges, at Brokfuglen som oftest forlader os hen i Oktober Maaned, foreligger der dog fra de senere Aar adskillige Beretninger om, at den er truffet langt ind i December; saaledes skjød H. Faber endnu d. 28. Dec. 1882 sex Stkr. V. f. Veile.

Den træffes hyppigt i Selskab med Viber.

Paa Lolland, hvor den tidligere var meget almindelig, er den i de sidste 10 Aar aftaget betydeligt i Mængde (G.).

I Thy kaldes den — foruden Brakfovl og Hjeile — ogsaa „Hedelav“ (Hbg.).

Charadrius morinellus, L.

[*Eudromias morinellus*, Boie].

Heiberg antager, at den yngler ved Karup pr. Viborg og muligvis ved Daugbjerg i samme Egn, idet han har truffet den der i Yngletiden. I 1883 og 1884 skal den have ynglet i Vinding Sogn i Nærheden af Holstebro (J.).

I Sekret. Friis's Samling fandtes en Han, skudt d. 11. Mai 1859 ved Asserstrup (?) af Propr. G. Jessen.

Expl. findes nu i Un. zool. Mus. —. I Otterup-Eggen er den meget sjelden. Grill har kun én Gang erholdt den derfra, d. 27. Aug. 1880 (Odense Fjord).

Charadrius cantianus, Lath.

[*Ægialites cantianus*, Boie].

Yngler paa Avedøre Holmene i Kalleboderne (F.). Den lægger som Regel kun 3 Æg. Grill fandt blandt mere end 50 Reder kun to, som indeholdt 4 Æg.

Charadrius hiaticula, L.

[*Ægialites hiaticula*, Boie.]

Ankom til Nykjøbing p. M. 1884—12. Marts (F.)

— - — - 1885—1. — -

— - Skanderborg Sø — —18. — (Hs.)

— - Amager. 1884—16. — (K.)

Yngletiden synes at indtræffe temmelig uregelmæssigt. Saaledes har H. Faber fundet friske Æg paa Avedøre Holmene d. 25. April, 2. Mai og 16. Mai 1880, paa Vorsø d. 28. Mai 1878, paa Tipperne i Ringkjøbing Fjord d. 9. Juni 1878, paa Vestre Lyng d. 30. Juni 1880 og paa Veirø v. Samsø endog d. 8. Juli s. A.

Charadrius curonicus, Besecke.

[*Ægialites minor*, Mey. & Wolf.]

I Slutningen af Mai og Begyndelsen af Juni 1884 opholdt nogle Stykker sig paa Amager Fælle; flere af dem bleve skudte. Senere, i Slutningen af Juni og Begyndelsen af Juli iagttoges de paany sammesteds. Om de have ynglet der, er uvist. Ogsaa i Sommeren 1885 indfandt nogle Individer sig paa samme Sted (K.).

Konserv. Hansen modtog d. 8. Sept. 1886 to unge Hunner, skudte sammesteds af Stud. med. Krabbe; det ene Expl. findes paa d. zool. Mus.

Naar Fuglen staar paa Jorden, gjør den jevnlig nikkende og hurtige Bevægelser med hele Forkroppen. Dens Flugt er mere tumlende end de andre Strandpiberes (K.).

Vanellus cristatus, Mey. & Wolf.

Ankom til Herschendsgave (Hs.)

1870— 4. Marts	1878— 1. Marts*)
1871—25. Febr.	1879—11. Febr.
1872—27. —	1880—29. —
1873— 9. Marts	1881—10. Marts
1874— 4. —	1882— 3. Febr.**)
1875— 5. —	1883—22. —
1876— 5. —	1884—28. —
1877—22. Febr.	

til Mors	1884—23. Febr. (F.)
- —	1885—22. — -
- Kjøbenhavns Omegn . . .	1885—24. — (W.)
- Amager	1884—18. Marts (K.)
- Storehedinge	1883— 2. — (A.)
- —	1884—13. — -
- —	1885—25. Febr. -

til Otterup (Gr.)

1876—21. Febr.	1879— 2. Marts
1877—23. —	1880—28. Febr.
1878—16. —	1881— 7. Marts

*) H. Faber traf den i samme Egn (v. Horsens) d. 16. Febr. 1878.

**) Ltk. „Jahresber.“ I. p. 45. — I Herschends „Iagttagelser“ (p. 16) hedder det, at Ankomsttiden i Aarene 1870—84 falder fra 11. Febr. til 10. Marts. Angivelsen i „Jahresber.“ skyldes saaledes formodentlig en Trykfeil (13?).

1882— 1. Marts

1883—24. Febr.

1884— 6. Marts

1885—24. Febr.

1886—22. Marts

(vedvarende Frost
med Sne indtil d.
20. Marts*).

1887—24. Febr.

Viben forbliver ikke sjældent her i Landet til ind i November. Herschend traf i 1883 en Flok paa 10 à 12 Stkr. i Horsens Egnen d. 3. Dec. Om Efteraaret træffes den meget ofte i Selskab med Brokfuglen.

H. Faber fandt d. 15. Mai 1884 dens Rede med 5 Æg ved Faarup paa Mors.

Hæmatopus ostralegus, L.

I Thy, hvor den kaldes „Suder“, yngler den paa Holmene i Flade Sø og paa Madsteborg i Ove Sø. Naar Reden findes ved Strandbredden, er den næsten altid belagt med smaa Stene eller Stykker af Muslingeskaller; naar den findes ved Ferskvandssøer, er den kun udfodret med lidt tørt Straa eller bestaar blot af en Fordybning i Jorden (Hbg.).

Strepsilas interpres, (L.).

Enkeltvis yngler den paa alle Holmene i Samsø Beltet; kun paa et Par af de mindre Holme i Stevnsfjord paa Samsø yngle flere Par (Gr.).

Grus cinerea, Bechst.

D. 23. Aug. 1878 trak en Flok paa 4 Stkr. hen over Karrebæksbugten, kommende Nord fra. Den ene, en gammel Han, blev skudt og opbevares i Baagøes Samling.

*) cfr. *Alauda arvensis*.

(Bg.). D. 13. April 1880 iagttog H. Faber en Flok paa 40 Individer, flyvende i nordlig Retning over Søndermarken v. Kbhvn.; de fløi meget lavt og udstødte deres eiendommelige trompetagtige Skrig. Samme Meddeler traf d. 20. Juli 1880 og d. 13. Januar 1881 smaa Flokke paa 10 à 15 Stkr., vadende i det lave Vand i Saltbæk Vig (Isefjord). Den er skudt ved Torpelund paa Sjælland d. 19. Juli 1880. (L.). I Eftersommeren 1880 opholdt 3 Individer sig ved Thorsted pr. Ringkjøbing (J.). D. 24. April 1884 bemærkedes en Flok paa 100 à 200 Stkr., flyvende over Storehedinge (A.). I Egnen ved Vallø ses der hvert Foraar (i April) større eller mindre Flokke paa Trækket (Skovrider Rosenstand). I Efteraaret 1887 modtog Stabssergeant E. Bruun i Fredericia et Expl. til Udstopning for Dr. Friis i Tønder.

Ciconia alba, Briss.

Synes fremdeles at være i Aftagende her i Landet, navnlig i Jylland.

Ankom til Herschendsgave (Hs.)

1865— 7. April	1877— 4. April
1866—10. —	1878—11. —
1867—12. —	1879—10. —
1868—18. —	1880—29. —
1869—29. Marts	1881— 2. Mai
1870— 9. April	(kun et ungt
1871— 8. —	Individ)
1872—30. Marts	1882—16. Mai
1873—27. —	1883—11. April
1874— 9. April	1884— 3. —*)
1875—13. —	1885—24. —
1876— 3. —	

*) Kun ganske faa Individer ankom saa tidligt. Endnu i Begyndelsen af Mai indtraf flere.

til Nykjøbing p. M. 1884—6. April (F.)

- — 1885—2. — -

- Otterup (Gr.)

1877— 2. April

1883— 7. April

1878— 4. —

1884— 1. —

1879— 2. —

1885— 2. —

1880— 5. —

1886— 2. —

1881—12. —

1887—10. —

1882— 4. —

til Faxe Ladeplads . . 1880— 8. April (G.)

- — — 1881— 5. — -

- Vesterborg (Lolland) 1883—10. — -

- — — 1884—15. — -

- Storehedinge 1885— 3. — (A.)

I 1884 indfandt to unge Storke sig i Horsens, hvor de tog en Rede i Besiddelse. De forbleve der, efter at de andre Storke vare dragne bort, og uagtet der i Slutningen af November indtraadte stærk Kulde (om Natten indtil ÷ 14^o R.), forlode de ikke Egnen; dog maatte der lægges Føde ud til dem. I Januar tog de en anden Rede og forbleve der hele Vinteren over (Hs.).

D. 28. Febr. 1878 saaes 4 Storke flyvende over Vesterbro (Kbhvn.) („Dagbladet“ f. 1. Marts 1878).

Ciconia nigra, (L.).

I Viborg-Egnen yngler den (foruden paa de i „Skand. Fugle“ angivne Lokalteter) i Bigum-, Lindum-, Løvskal- og Viskum-Skove, dog kun ét Par i hver Skov (Hbg.). I Horsens Egnen er den i en længere Aarrække fundet ynglende i Møgelkjær Skov og Starup Skov (F.). Endvidere angives den af Herschend som ynglende i Gyllingnæs Skov og Ulfskov ved Rathlousdal. I April 1885 ynglede den i en Skov i Øster Hanherred (H.). Indtil for 5 à 6 Aar siden ynglede den i en gammel Eg i Ry

Nørreskov, saa langt nede, at Reden kunde naaes med en Stang. Da nogle Drenge benyttede sig heraf, forlode Storkene Skoven.

D. 2. Sept. 1877 saaes to Individer paa Tømmerup Overdrev v. Kallebodstrand. Ved Søborg Mose blev den truffet i Efteraaret 1871 af Stud. Hilkier (K.), og ved Rudeskov pr. Holte blev en ung Hun skudt d. 28. Aug. 1880 (L.). I Hjardemaal Klit saae Heiberg den i Selskab med en hvid Stork og tre Fiskeheirer d. 31. Aug. 1876. I Aug. 1878 blev et Expl. skudt sammesteds (Hbg.). I Sommeren 1873 skudt ved Frederikshavn Strand (G.). I Sekret. Friis's Samling fandtes en ung Hun, skudt ved Søvertorp pr. Rudkjøbing d. 19. Sept. 1855. En gammel Han blev skudt paa Halsgrunden i Odense Fjord d. 4. Juni 1886. Expl. findes i Grills Samling.

***Ardea cinerea*, L.**

I „Skand. Fugle“ omtales Kolonien paa Vorsø (Vaarsø) i Horsens Fjord, og i „Ornithol. Bidrag“ (1877) nævnes det, at den er fordrevet derfra og senere har nedsat sig i den nærliggende Tyrrestrup Skov. I den Anledning oplyser Herschend („Iagttagelser“ p. 18), at Kolonien oprindeligt havde sin Yngleplads paa Æbleøen i Skanderborg Sø, hvorfra den i Aaret 1845 blev fordrevet og tog Ophold paa Vorsø. Kolonien i Tyrrestrup Hestehave tæller nu ca. 100 Reder. Adskillige af disse Heirer blive til langt ud paa Efteraaret, og i 1880 blev et Individ iagttaget der endnu d. 19. Dec.

I Ugleholt Skov ved Ørbygaard (Stokkemarke Sogn p. Lolland) har Fiskeheiren i mange Aar ynglet kolonivis (G.). I Vinteren 18⁸²/₈₃ overvintrede to Individer ved Vesterborg Sø, og d. 26. Febr. 1884 saaes en Heire sammesteds (G.).

I Thy er den, saa vidt vides, kun to Gange skudt (Hbg.), og paa Mors er den ikke hidtil iagttaget.

Ardea stellaris, L.[*Botaurus stellaris*, Briss.]

D. 25. Aug. 1883 blev et Individ skudt i Borremose paa Møen (F.). I Ringkjøbing Egnen er den skudt d. 12. Juli 1874, d. 18. Aug. 1882, i Dec. 1883 og i April 1884 (Han og Hun). I samme Egn angives den at yngle ved Stadilfjord og Von Aa (J.)

Paa Stadilø i Ringkjøbing Fjord blev et Individ fanget i April 1885 og sendt til Zool. Have ved Kbhvn. (J.). Skudt ved Nymindesø i Begyndelsen af Mai 1886 af Aabo Sørensen fra Silkeborg (Kjøbm. N. Larsen i Eistrup. — Bg.).

Ifølge Heiberg har Rørdrummen tidligere ynglet i i Hillerslev Kjær (Thy), men efter 1870 er den ikke iagttaget der. D. 1. Sept. 1876 blev en gammel Han skudt i Gyrum Sø (Hbg.). Propr. Siboni har for nogle Aar siden set Rørdrummen paa Konstantinsborg Enge ved Brabrand Sø (Hs.). I Baagøes Samling findes en gammel Han, skudt d. 4. Dec. 1883 ved Ringkjøbing*), og en gammel Hun, skudt d. 26. Okt.**) 1883 i Broxø Mose ved Næstved (Bg.). Fra Varde-Egnen modtog Stabs-sergeant E. Bruun i Fredericia en Han og en Hun til Udstopning i Juli 1887:

Ardea comata, Pall.

Heibergs Angivelse i „Thylands Fugle“ (p. 29—30) om, at der i Thisted Realskoles Samling findes et af Konservator Conradsen udstoppet Expl., skudt i Hillerslev Kjær i Nov. 1867, maa bero paa en eller anden Forvexling. Den nævnte Samling har aldrig indeholdt noget

*) muligvis det samme Expl., til hvilke der sigtes i Hr. Justesens ovenstaaende Meddelelse.

**) I „Jahresber.“ II angives Datum til d. 6. Okt.

Expl. af Topheiren, men derimod findes der en *A. stellaris* fra den angivne Lokalitet.

***Ardea minuta*, (L.).**

I Herschends Samling findes et Expl., skudt i Bjørnkjærmose v. Ribe d. 21. April 1878 og sendt af Konditor Bjerrum.

***Platalea leucorodia*, L.**

I en Anmærkning af Lütken i „Jahresbericht II p. 37 hedder det: „Einer Notiz in „Jagdzeitung“ *) zu Folge sollte ein Trupp von 11 Stücken von *Platalea leucorodia*, L. „am Strande von Ballerup“ (wo?) wahrgenommen und 3 St. geschossen worden sein. Diese Nachricht scheint unrichtig zu sein (L.).“

I Anledning heraf skal jeg oplyse Følgende:

Fra Hr. N. C. Hjeronymus i Odense har jeg under 15. Mai 1884 modtaget følgende Meddelelse: „Igaar var jeg saa heldig at erholde et overordenligt smukt Exemplar af *Platalea leucorodia*, gammel Han; jeg købte den af en Strandskytte, der havde skudt den ved Bullerup pr. Odense d. 12. Mai efter Solnedgang. Han saae en Flok paa 4 à 5 Stkr. og skjød de 2, af hvilke destoværre den ene gik til en Bundtmager, før jeg saae dem.“

Der kunde vel neppe — trods den ikke ringe Forskjel i Angivelserne om Flokkens Størrelse — være Tvivl om, at den i „Jagttidenden“ meddelte Beretning refererede sig til den af Hr. Hjeronymus omtalte Flok, og at Bullerup skulde være Bullerup. For yderligere Sikkerheds Skyld tilstillede jeg imidlertid „Jagttidendens“ Redaktion en Anmodning om at indrykke en Forespørgsel i Bladet til den ukjendte Indsender af Notitsen; denne Anmodning

*) 1884. Nr. 7.

blev velvillig opfyldt, og jeg har derefter under 8. Jan. 1888 modtaget følgende Oplysninger: „De omskrevne 3 Skeheirer bleve skudte af Gaardeier Kristoffer Jørgensen i Bullerup (ikke Ballerup). Det ene af Explr. fik Hr. Carl Rasmussen i Odense, det andet Odense Museum, hvorimod det tredie Expl. først fandtes Dagen efter i ødelagt Tilstand.“

Endeligt har jeg fra Grill erholdt Meddelelse om det samme Tilfælde, men med Datum angivet til d. 13. Mai og oplysende, at det 3die Expl. blev fundet nogle Dage efter, halvt fortæret af Kragerne. Der hviler imidlertid endnu lidt Uklarhed over Begivenheden, idet Fordelingen af de to skudte Explr. frembyder Vanskeligheder. Odense Museum fik det ene; Hr. Hjeronimus har det andet. Hr. Carl Rasmussen har ligeledes et, en Bundtmager ligesaa. Den Omstændighed, at Grill angiver Datum til d. 13. Mai, lader endnu den Mulighed tilbage, at de to sidste Explr. ere blevne skudte Dagen efter de første.

Rallus aquaticus, L.

Fra de senere Aar haves adskillige Exempler paa, at enkelte Individuer overvintre her i Landet. Den er saaledes skudt ved Herschendsgaves Mølledam d. 13. og 15. Dec. 1877 og i Midten af Januar 1879 (Hs.), ved Feldborg Plantage d. 30. Dec. 1878 (en Hun) (L.), ved Ringkjøbing i Begyndelsen af Dec. 1877 (Bg.), ved Taaning pr. Skanderborg d. 28. Nov. 1882 (J.), i Lødderup Kjær paa Mors d. 15. Januar 1885 (F.). Fra Otterup-Egnen, hvor den forekommer almindeligt paa Efteraarstrækket, har Grill erholdt den d. 15. Nov. 1875, d. 25. Nov. 1877, d. 28. Marts 1878, d. 18. Dec. s. A., d. 24. Dec. s. A. og d. 3. Nov. 1883. Et Expl. blev fanget levende i en Kostald paa Thorlund i Eistrup Sogn d. 16. April 1885. (Kjøbm. N. Larsen. — Bg.) Paa Nordre Røn ved Læsø

blev et Individ fanget d. 20. Januar 1885, og fra paa-lidelig Kilde meddeles, at mindst to Vandrixer havde tilbragt baade Sommer og Vinter der i et Par Aar (K.). Heiberg nævner otte Tilfælde, i hvilke den er skudt i Thy sent om Efteraaret eller om Vinteren i Tidsrummet 1874—78. Ved Herschendsgave ses den aldrig paa Foraarstrækket (Hs.). — I Begyndelsen af September (!) 1883 blev en Unge i Dundragt skudt i Søborg Mose ved Kbhvn., hvor den altsaa efter al Sandsynlighed maa være udklækket (Stud. Hilkier. — K.)

Det i „Skand. Fugle“ anførte thylandske Navn, „Knårkand“, tilhører ikke denne Art, men *Crex pratensis* (Hbg.).

***Crex pratensis*, Bechst.**

Paa Lolland har den altid været sjelden, og i de sidste 20 Aar har Hr. Galschiøt slet ikke bemærket den der. Paa Mors synes den ikke at forekomme. I Thy, hvor den kaldes „Knarand“, „Knarkand“, „Knerkand“ og „Skræpand“, er den derimod ikke ualmindelig og yngler hist og her (Hbg.).

Den ruger meget fast, og det hænder derfor nu og da, at den rugende Fugl dræbes ved Hug af Leen, naar Græsset aflugges. Ved et saadant Tilfælde, som indtraf paa Herschendsgave i Juli 1876, iagttog Eieren, at den efterlevende Mage udrugede Æggene.

***Ortygometra porzana*, (L.).**

Gallinula porzana, Lath.

Antages at yngle i Søborg Mose (K.) og i Legind Veile Kjær p. Mors (F.). Fundet ynglende i den tørlagte Gjedved Sø i Skanderborg-Egnen (J.), paa Hygildgaarde-

Enge i Eistrup Sogn (Kjøbm. N. Larsen — Bg.), i Hillerslev Kjær i Thy (Hbg.), i Espelykke Mose ved Bederslev og i Hasmark Mose (Otterup-Eggen) (Gr.). Kaldes i Thy „Dyndskvat“, „Dugskvat“, „Terrishøne“ (Hbg.).

Ortygometra pygmæa, (Naum.).

Syn. Crex pygmæa, Naum. — Rallus Bailloni, Vieillot, — Porzana pygmæa, Gould, — Porzana Bailloni, Dresser. — Ortygometra Bailloni, Gray.

D. 4. Mai 1887 blev denne her i Landet ikke tidligere trufne Art bemærket paa Søholm Møllesø ved Gjorslev (Stevns Herred) af Forpagter Valentiner fra Gjorslev. Dagen efter saae han den paany sammesteds, men først den paafølgende Dag (d. 6.) skjød hans Søn Fuglen. Den blev derefter indlemmet i Hr. Valentiners Samling og af Apotheker Baagøe rigtigt bestemt som *Ortygometra pygmæa*. Nærmere Oplysninger om Fuglen ere meddelte af Baagøe i „Dansk Jagttidende“) 1887, Nr. 5.

Arten hører hjemme i Sydeuropa og i den sydlige Del af Mellemeuropa. Mod Øst træffes den lige til China, mod Syd til Andamanerne, Madagaskar og Kaplandet.

Afbildn. Ny Tavle til „Skand. Fugle“.

Gallinula chloropus, (L.).

I Dec. 1882 blev den skudt i Madum ved Ringkjøbing (J.), og d. 14. Dec. s. A. blev en Hun skudt ved Frederikshavn (L.).

Den formodes at yngle i Alsted Kjær paa Mors (F.).

*) Ifølge senere modtagen Meddelelse er Fuglen skjænket til Baagøe, i hvis store Samling den nu findes.

Fulica atra, L.

D. 1. Mai 1883 blev en Han fanget ved Myremøllen i Aakersogn paa Bornholm (L.), hvor den ikke vides at være truffet tidligere.

I Baagøes Samling findes en mærkelig Varietet, skudt i 1877 ved Gaunø. Den er hvid paa Overgumpen og stærkt hvidplettet paa hele Kroppen, saavel paa Ryggen som paa Brystet og Bugen.

Vandhønen beskyldes for at forjage Vildænderne ved at fortære deres Æg og smaa Ællinger (Hbg.).

I Thy kaldes den bl. A. „Dyhøne“ (Hbg.).

Numenius arquatus, (L.).

I Slutningen af Nov. 1887 saaes endnu adskillige Explr. hos de københavnske Vildthandlere. — Da denne Fugl kun sjældent fjerner sig langt fra Kysterne, fortjener det at anføres, at Herschend d. 6. Aug. 1883 traf en Flok paa 20 Stkr. i Herschendsgaves Tørvemose.

I Thy kaldes den „Regnsparv“ (Hbg.).

Ved Kysterne af Møen træffes den kun sjældent. Telegrafbestyrer Petersen har kun én Gang (i 1887) erholdt den derfra (2 Explr. fra Nyord) (Bg.).

Limosa ægocephala, (L.).

Sjelden i Thy, hvor den kun vides skudt én Gang (v. Hoxer d. 23. Mai 1876). Ifølge Heiberg har den dog et eget Navn blandt den thylandske Landbefolkning, nemlig „Stor Snippe“. Paa Mors er den, saavidt vides, ikke bemærket.

Limosa Lapponica, (L.).

Skudt ved Saltbæk Vig d. 2. Aug. 1880 (Han) og ved Asminderupgaard d. 26. Aug. 1881 (L.). Paa Mors fore-

kommer den ikke ofte. H. Faber saae der to Explr. ved Legind Veile d. 10. Mai 1884 og angiver, at tre Explr. i Sommerdragt bleve skudte ved Jordsby d. 2. Juni 1885.

Kaldes i Thy „Lille Snippe“ (Hbg.).

Scolopax rusticola, (L.).

I Vinteren 1878—79 overvintrede en Del Individuer i Egnen ved Herschendsgave. I Hovedskov ved Hovedgaard (Horsens-Egnen) blev i Juni 1865 set et Par, som formodes at have ynglet der (Hs.). — D. 13. Nov. 1883 skjød H. Faber. et Expl. ved Vellinggaard pr. Veile. Samme Meddeler saae i Plantagen ved Nykjøbing p. Mors en Skovsneppe d. 28. Nov. 1884 og en d. 26. Dec. s. A. I Vendsyssel, navnlig i Frederikshavns Omegn, overvintrer den ikke sjeldent ved de af høie, kratbevoxede Brinker begrændsede Aaløb (G.).

Ifølge Propr. Goverts Jensens Meddelelse skal der i Begyndelsen af indeværende Decennium flere Aar være truffet ynglende Skovsnepper i Ry Nørreskov (Hs.). Fra Hofjægermester, Overførster P. E. Müller har jeg modtaget Meddelelse om, at der i Kongelunden paa Amager regelmæssigt yngler 1 à 2 Par.

Et Expl. med fire hvide Svingfjer i hver Vinge blev skudt paa Eistrup Hede (Vrads Herred) d. 25. Okt. 1887. (Kjøbm. N. Larsen i Eistrup. — Bg.).

Gallinago media, Leach.

[*Gallinago scolopacina*, Bonap.].

Er i de senere Aar oftere truffet her om Vinteren. Saaledes blev et Par skudt ved Horsens d. 22. Dec. 1878 (stræng Kulde med Sne). Ved Veile blev den truffet i Vinteren 1881—82 d. 14. Dec., d. 26. Januar, d. 2. og d. 9.

Febr. (Hs.). I 1884 traf Faber flere Explr. ved Legind Veile d. 9. og d. 21. Nov.

Paa Amager er den truffet nogle Gange af Stud. med. Krabbe i Nov. 1884 og 1885.

I Stendiget omkring Vedslet Kirkegaard fandtes dens Rede (nogle faa tørre Græsstraa i en lille For- dybning i Jorden) med 3 Æg d. 28. Mai 1878 (Hs.).

I Thy kaldes den „Horsegumme“ (Hbg.).

Gallinago gallinula, (L.).

Hofjægerm. Brun har d. 3. Januar (1883?) skudt to Explr. (Stedet angives ikke), der, trods den barske Aarstid udmærkede sig ved deres overordenlige Fedme. Af andre Meddelelser om dens Forekomst her om Vinteren skal nævnes følgende: Skudt ved Holbækgaard d. 9. Dec. 1865, (ung Han) (Benzons Samling), ved Horsens d. 22. Dec. 1878, ved Vellinggaard pr. Veile d. 13., 14. og 17. Nov. 1883 og ved Legind Veile to Explr. d. 9. Nov. 1884 (F.); paa Østkysten af Amager bleve to Explr. skudte ud af en Flok paa 10 Stkr. d. 12. Nov. 1885 (K.).

Saavel paa Mors som i Thy er den almindelig om Efteraaret, hvorimod den paa Foraarstrækket kun forekommer enkeltvis.

Totanus fuscus, (L.).

Forekommer regelmæssigt i temmelig stort Antal om Efteraaret ved Skals ved Hjarbæk Fjord (Limfjorden) (Hbg.). I Thy har Heiberg kun én Gang skudt den (i Hjardemaal Klit d. 31. Aug. 1876). I Sekret. Friis's Samling fandtes en Han, der angives som skudt d. 19. Aug. 1849 ved Lerchenborg af Bølling*). I Otterup-

*) Muligvis det samme Expl. der i „Skand. Fugle“ (p. 522) omtales som skudt i Sept. 1849 ved Breininge Aaens Udløb i Viskinde Veile.

Eggen træffes den nu og da om Efteraaret i Vinterdragt; den eneste Gang Grill har beholdt den derfra i ren Sommerdragt, var d. 8. Aug. 1881, da et Expl. blev skudt paa Odense Fjord.

Totanus ochropus, (L.).

Skudt i Lundby Mose 2 Mil S. f. Næstved d. 26. Juni 1885 (Bg.) I Benzons Samling fandtes blandt andre Explr. en gl. Han fra Holbækgaard, skudt d. 13. Aug. 1871, og et Expl. fra Nyborg, skudt d. 3. Febr. 1880.

Totanus calidris, (L.).

I Thy kaldes den, foruden „Tjalder“, ogsaa „Tamsensfovl“ (Hbg.).

Totanus hypoleucus, (L.).

[*Actitis hypoleucus, Boie.*]

I Sommeren 1882 opholdt flere Par sig ved Bækkene mellem Skanderborg og Mos, hvor de efter al Sandsynlighed have ynglet. (J.).

Philomachus pugnax, (L.).

[*Machetes pugnax, Cuv.*]

Fra Thorshavn paa Færøerne, hvor denne Art ikke tidligere er bemærket, blev en Han indsendt til Un. zool. Mus. d. 23. Sept. 1882 af Sysselmand Müller (L.).

Navnet „Bruskok“ (Endelave) anvendes ogsaa i Thy for denne Fugl (Hbg.).

Tringa canutus, L.

[*T. cinerea*, Temm.].

D. 13. Okt. 1879 skjød H. Faber den i Sommerdragt paa Vester Lyng ved Seirø Bugt. D. 3. Sept. 1882 skjød Stud. med. Krabbe et Expl., ligeledes i Sommerdragt, i Kallebodstrand. Ved Arup Veile (Thy) er den, ifølge Krabbe, almindelig hver Sommer, hvorimod Heiberg angiver, at den af og til sees paa Trækket. Paa Mors vides den ikke at være truffet.

Tringa minuta, Leisl.

I Otterup-Egnen træffes den nu og da om Efteraaret sammen med de andre Ryler, men er dog ingenlunde almindelig (Gr.).

Tringa subarquata, Gyldenst.

Ved Horsens Fjord bleve flere Individuer skudte i Efteraaret 1878 (F.). D. 26. Aug. 1881 blev en Han skudt ved Asminderupgaard (L.). I de senere Aar er den desuden skudt adskillige Gange om Efteraaret ved Kallebodstrand o. a. St. her i Landet, saaledes i Otterup-Egnen, hvor den om Efteraaret indfinder sig temmelig regelmæssigt og i ikke ringe Antal sammen med den almindelige Ryle. Grill har endvidere flere Gange set den der i Juli Maaned i Sommerdragt, men altid kun enkeltvis, og har ligeledes fra Strandskytterne modtaget Exemplarer i denne Dragt.

Paa Mors er den hidtil ikke bemærket.

Tringa Temminckii, Leisl.

Skudt ved Flade Sø d. 19. Mai 1878 af Hbg. Paa Amagerfælled opholdt en Flok paa c. 20 Stkr. sig i

Slutningen af Mai 1884 ved Gaaseparken; adskillige af dem bleve skudte. Ogsaa det følgende Aar i Mai bleve flere Individer bemærkede sammesteds og nogle af dem skudte (K.). D. 23. Aug. 1885 blev et ungt Individ skudt paa Vestkysten af Amager (K.). D. 31. Aug. 1885 skudt ved Aarhus af Hr. Busse (K.). Samme Aar bleve to Explr. sete i Selskab med fire Individer af *T. minuta* ved Sundet udenfor Kjøbenhavn (W.). H. Faber skjød et ungt Expl. ved Legind Veile paa Mors d. 4. Sept. 1885 og saae 3 Stkr. paa Strandbredden v. Nykjøbing d. 11. s. M.*). I Egnen ved Fredericia forekommer den hvert Aar paa Foraarstrækket i Mai (E. Bruun).

Tringa maritima, Brünn.

Skudt d. 2. Nov. 1878 ved Thisted (Hbg.). Samme Aar skjød Grill 11 Explr. paa Hatterevet.

Limicola pygmæa, (L.).

[*L. platyrhyncha*, Temm.].

Univ. zool. Mus. modtog i 1885 fra Hr. Busse en Han og en Hun, som tilligemed et tredje Individ vare skudte d. 20. Mai af en Flok paa c. 40 Stkr. paa Avedøre Holmene i Kallebodstrand. D. 23. Aug. s. A. bleve 7 Explr. skudte paa Vestkysten af Amager (K.). I Baagøes Samling findes et ungt Individ, skudt paa Østkysten af Amager d. 11. Aug. 1887 af Stud. med. Krabbe (Konserv. Hansen).

Calidris arenaria, (L.).

Et Expl. i ren Vinterdragt blev skudt paa Odense Fjord d. 4. Okt. 1882; det opbevares i Grills Samling.

*) I Wings Report on birds in 1885 (p. 36) angives d. 15. Sept.

Recurvirostra avocetta, L.

Yngler hvert Aar kolonivis ved Stauning pr. Ringkjøbing (J.). Ved Saltbæk Vig fandtes d. 15. Juni 1881 c. 50 Par ynglende (L.). Kolonien fra Flade Sø forlod Egnen, da Søen udtørredes. Da Udtørringsforetagendet mislykkedes, vendte enkelte Par (i 1885) tilbage til Holmene (Hbg.). I 1885 fandt Grill to Par ynglende paa Østrupgaards Inddæmning ved Kanten af den derværende Sø; i 1886 fandtes der kun 1 Par, og i 1887 udeblev den ganske.

Paa Færøerne, hvor den tidligere ikke er truffet, blev en Hun skudt d. 30. Mai 1882 (paa Sandø). Exemplaret blev af Sysselmand Müller nedsendt til Un. zool. Mus.

Himantopus candidus, Bonn.

[*H. rufipes*, Bechst.].

D. 11. Okt. 1882 blev et Expl. skudt ved Søndervig Holmsland v. Ringkjøbing (J.).

Anser erythropus, (L.).

Fra Grev V. Lerche til Birkendegaard pr. Kallundborg modtog Konserv. Hansen en Han, skudt i Midten af Okt. 1886, og fra Adj. Tryde i Rønne en Hun, skudt i Begyndelsen af Okt. 1887.

Bernicla leucopsis, (Bechst.).

I Sekret. Friis's Samling fandtes en Han, skudt paa Amager d. 30. April 1853 og en Hun, skudt i Kalleboderne d. 20. April 1857. — Den skydes jevnligt paa Efteraars-trækket ved Fyenshoved, men viser sig meget sjældent i Odense Fjord. (Gr.).

Paa Møen, hvor den tidligere forekom temmelig regelmæssigt paa Trækket, har den i flere Aar ikke været bemærket, indtil en gammel, udfarvet Han blev skudt paa Nyord d. 10. Okt. 1887 af Styrmand L. Hansen (Telegrafbestyrer Petersen. — Bg.).

Bernicla brenta, (Pall.).

[*Bernicla torquata*, Bechst.]

Ankom paa Efteraarstrækket til Odense Fjord (Gr.).

1878— 8. Sept.

1881—15. Sept.

1879—12. —

1882—23. —

1880— 7. —

Cygnus olor, (Gm.).

Har for en Del Aar siden ynglet i Vesterborg Sø paa Lolland (G.).

Heiberg har ikke truffet den i Thy. — Hofjægerm. Bruns Angivelse (Ltk. „Jahresber. I. p. 58), at den skydes i Mængde i Limfjorden, beror uden Tvivl paa en Forvexling med *C. musicus*.

Anas clypeata, L.

[*Spatula clypeata*, Boie.]

En Han blev d. 19. Juli 1881 skudt ved Asminde-rupgaard pr. Kallundborg (L.). I Thy yngler den paa adskillige Steder, saaledes — foruden de i „Skand. Fugle“ nævnte — i Gyrup Sø, Hundborg Mose og Hillerslev Kjær (Hbg.); ligeledes i Salling og vistnok ogsaa paa Mors. Grill har dens Æg fra Skovmosen ved Einsidelsborg i Fyen.

Anas boschas, L.

I Thy, hvor Stokanden tidligere forekom i overordenligt stort Antal, er den i de senere Aar i Aftagende, dels paa Grund af, at Søerne udtørres og Moserne opdyrkes, dels paa Grund af Bestemmelserne i Jagtloven af 1. April 1871, hvorefter denne Fugl er fredløs.

Hannen af denne som af andre Andearter kaldes i Thy „Drage“ (Hbg.). Hr. Galschiøt har meddelt mig, at 5 tamme Ænder blandede sig mellem de vilde Stokænder i Vesterborg Sø paa Lolland og levede Sommeren igjennem sammen med dem. Om Efteraaret trak de bort i Forening med Vildænderne, men vendte ikke tilbage med dem næste Foraar.

Anas acuta, L.

D. 25. Mai 1884 blev en Rede med 3 Æg fundet paa Avedøre Holmene (H.). Foruden de i „Skand. Fugle“ nævnte Ynglesteder i Thy, angiver Heiberg endvidere Hillerslev Kjær. Grill fandt den ynglende paa Meilø i Korshavn d. 22. Mai 1887.

Paa Mors er den kun truffet en enkelt Gang, nemlig ved Skarre Sø i Sept. 1884 (F.).

I Thy kaldes den „Strekand“ (Hbg.).

Anas crecca, L.

[*Querquedula crecca*, Steph.]

H. Faber har truffet den parvis i Yngletiden ved Skarre Sø paa Mors og formoder, at den yngler der.

Æggene have ofte en lys rødlig Farve (Hbg.).

Kaldes i Thy ogsaa „Tagand“ (Hbg.).

Anas querquedula, L.[*Querquedula circia, L.*]

D. 16. Juni 1882 skudt i Saltbæk Vig (L.). — Paa Mors er den hidtil ikke bemærket.

Kaldes i Thy ogsaa „Atlanand“.

Anas discors, L.[*Querquedula discors, Steph.*]

I Un. zool. Mus. findes opstillet en Han af denne Art, skudt ved Sæby i Jylland i Midten af April 1886. Gjennem Hr. Wulff, Lærer ved Hjørring Realskole, lykkedes det Museet at komme i Besiddelse af Exemplaret, det eneste, der vides at være truffet her i Danmark.

Arten hører hjemme i Nordamerika.

Afbildn. Ny Tavle til „Skand. Fugle“.

Anas penelope, L.

Yngler ved Stauning og Skjern i Ringkjøbing-Eggen (J.). Kaldes i Thy „Blyand“ (Hbg.).

Ankom paa Efteraarstrækket til Odense Fjord (Gr.).

1878—22. Aug.

1881—30. Aug.

1879— 1. Sept.

1882—26. —

1880— 3. —

1883—24. —

Fuligula ferina, L.

Fra Kallundborg indsendtes d. 16. Sept. 1883 en ung Hun til Un. zool. Mus. (L.). Ifølge en Notits i „Dansk Jagttidende“ bleve 3 Explr. truffet den 27. Juni 1885 ved Maribo Sø. De to af dem bleve skudte af Hr. Steenberg. Heiberg har, efterat Taffelandens tidligere Ynglested i Thy (Sperring Sø) blev udtørret i 1877, fundet den yng-

lende i Gyrrup Sø og Ove Sø. Blandt Æggene fandtes nogle graasorte, sodfarvede Varieteter.

Paa Mors vides den ikke at være truffet.

Fuligula rufina, (Pall.).

I Lützens „Jahresbericht“ I. (p. 61) hedder det:

„Auf Hindø in Stadilfjord d. 22. Juli 1872 geschossen (J.). — (Sonst nicht aus Dänemark bekannt; das Exemplar ging leider ins Ausland. Der Berichterstatter ist von der Richtigkeit der Bestimmung ganz überzeugt“).

Jeg har i den Anledning henvendt mig til „Jagt-tidendens“ Redaktion og fra Hr. Prokurator Justesen modtaget den Erklæring, at han indestaar for Angivelsens Paalidelighed, men at hans Bestræbelser efter at erholde nærmere Oplysninger om Fuglens senere Skjæbne have været frugtesløse, da den Eneste, der kunde have givet saadanne Oplysninger, nemlig Kjøbmand Rosenvinge, som havde sendt Fuglen til Udlandet, senere er afgaaet ved Døden.

Fuligula marila (L.)

Heiberg angiver, at den i Thy kun meget sjældent forekommer paa Trækket. Hermed stemme dog ikke H. Fabers og andre lagttageres Meddelelser, ifølge hvilke den om Efteraaret og Vinteren regelmæssigt træffes i Smaaflokke i Limfjorden.

Fuligula nyroca, Gyldenst.

Ifølge Meddelelse fra Baagøe har han fra Konditor Bjerrum i Ribe havt til Eftersyn et Expl. af denne Art, skudt i Haderslev Slotsmøllese d. 2. April 1856. I Benzons Samling fandtes et Expl., skudt i Storebelt i April 1863.

Glaucion clangula, (L.).*[Clangula glaucion, Boie.]*

I Thy kaldes den gamle Han „Splitdykker“, Hunnen og den unge Fugl „Brunnakke“ (Hbg.).

Harelda glacialis, (L.).

I Juli 1877 opholdt et Par sig flere Uger itræk ved Strandbredden nær ved Skovshoved N. f. Kjbhvn. (K.). Heiberg har kun to Gange erholdt den fra Limfjordens vestlige Del; ifølge H. Faber forekommer den derimod regelmæssigt om Vinteren i Flokke omkring Mors.

Oidemia nigra, (L.).

D. 20. Juni 1877 fik Heiberg en gammel Han, som var skudt ud af en større Flok ved Skjærbæk i Limfjorden (Thisted Bredning). Han antager, at gamle Hanner af og til tilbringe Sommeren flokkevis i Limfjorden uden at drage Nord paa.

Somateria mollissima, (L.).

Ifølge Grill yngler den paa Morup Hede.

Somateria spectabilis, (L.).

Un. zool. Mus. modtog d. 1. Marts 1881 en Han fra Sprogø (L.).

Mergus merganser, L.

Hofjægerm. Brun meddeler, at han d. 4. Juni 1843 fandt dens Rede i et hult Træ i Nærheden af Helsingør.

Forstassistent Falkenberg fandt den ynglende i Esrom Sø; det paagjældende Par havde allerede d. 26. Mai en omtrent 14 Dage gammel Unge.

Mergus serrator, L.

H. Faber fandt den talrigt ynglende under lave Tjørnebuske paa Lindholm ved Samsø i Juni og Juli 1880 og 1881. Tre af Rederne indeholdt (d. 6. Juni 1881) tillige Æg af Tadorna vulpanser. Sandsynligvis have Skalleslugerne fordrevet Gravænderne fra deres Reder og taget disse i Besiddelse.

I Thy og paa Mors yngler den paa flere Steder, foruden den i „Skand. Fugle“ angivne Lokalitet (mellem Thisted og Vilsund), saaledes ved Sennels, i Hillerslev Kjær (Hbg.) og paa Fegge Klit (F.).

Mergus albellus, L.

I Sekret. Friis's Samling fandtes to Hanner, den ene fra Møen, skudt d. 2. Marts 1853 (Scheel), den anden fra Pederstrup paa Lolland, hvor den var fanget levende d. 28. Febr. 1865 (Kmr. Lützen). Apoth. Benzon var i Besiddelse af to gamle Hanner, den ene skudt ved Helsingør d. 23. Januar 1864, den anden ved København d. 8. Marts 1875, samt en ung Han fra Københavns Omegn, skudt d. 21. Dec. 1862. D. 12. Dec. 1879 blev en Han indsendt fra Ribe til Un. zool. Mus. (L.). Samme Aar blev en Hun skudt d. 2. Febr. i en Isvaage ved Bygholms Veile i Limfjorden (Hbg.). I Odense Fjord blev en Han skudt d. 15. Dec. 1879, en Han og en Hun d. 27. Dec. s. A. og en gammel og en ung Han d. 8. Januar 1887 (Gr.).

Uria troile, L.

To isabellafarvede Varieteter bleve i Okt. 1884 skudte ud af en Flok paa 5 Stkr. ved Brandsø i Lillebelt (J.). I Baagøes Samling findes et Expl. (skudt af Jernbane-assist. Scheel ved Karrebæk d. 25. Sept. 1887), som synes at maatte være en Bastard af denne Art og U. Brännichii, Sab.

Uria grylle, L.

H. Faber fandt den ynglende i Juni 1881 paa Lindholm ved Samsø og paa Kyholm i et Hul i den stensatte Havnemole. Grill fandt den i Juni 1887 talrigt ynglende, ligeledes paa Lindholm, og fem Par paa Kullen i Stauns Fjord.

Fratercula arctica, (L.).

[*Mormon fratercula*, Temm.]

Un. zool. Mus. modtog d. 28. Januar 1884*) en Hun fra Løkken pr. Hjørring og d. 20. Nov. 1878 en Han fra Gammel Estrup i Jylland (L.). Træffes hver Vinter i Ringkjøbing Fjord (J.); skudt d. 22. Nov. 1874 paa Stadilø (J.). En ung Han fandtes d. 3. Nov. 1878 død paa Stranden ved Klitmøller (Hbg.). Fra Kolding-Egnen modtog Stabssergeant E. Bruun i Fredericia et Expl. til Udstopning i Juli 1886.

Arctica alle, (L.).

Apotheker Benzon havde i sin Samling en gl. Han, skudt ved Randers d. 10. Nov. 1863, og en gl. Hun fra

*) Formodentlig det samme Expl., som af Lütken („Jahresber.“ II.) nævnes som skudt ved Løkken d. 24. Januar.

Kastrup paa Amager, skudt d. 3. Nov. 1869. En gammel Han blev fanget i Korsø (Thy) d. 17. Nov. 1874, og en Hun blev skudt i Januar 1877 ved Thisted (Hbg.). Et Expl., der blev skudt i Lundfod, Brande Sogn, d. 29. Okt. 1885 af Snedker Martinus Petersen, opbevares i Kjøbmand N. Larsens Samling i Eistrup (Bg.).

Alca torda, L.

D. 14. Jan. 1882 blev en Han fanget i en Have paa Nørrebro (Kbhvn.) (L.).

Podiceps cristatus, (L.).

Til de i „Skand. Fugle“ anførte Ynglesteder kan føies: Ove Sø, Torme Sø, Rosholm Sø, Hule Sø (Tvorup Klit), Flade Sø, Ørum Sø, alle i Thy (Hbg.), fremdeles Voldum Sø (Thy) (F.) og Vilsted Sø ved Løgstør (H.).

En Han i ren Vinterdragt blev skudt i Odense Fjord d. 4. Febr. 1879 (Gr.).

Paa Mors er hverken denne Art eller nogen anden Lappedykker (med Undtagelse af *P. rubricollis*) truffet af H. Faber (cfr. „Skand. Fugle“ p. 720—21).

Ifølge Heiberg lægger den indtil 5 Æg. Den svømmende Rede rager kun ubetydeligt op over Vandfladen, og Æggene ligge ofte omgivne af Vandet. Naar Fuglen forlader Reden, tildækker den dem med Vandplanter (Hbg.).

Kaldes i Thy „Søraaber“ og „Høiand“ (Hbg.).

Podiceps cornutus, Lath.

[*P. arcticus*, Boie.]

Heiberg tror sikkert, at den ikke yngler i Thy, og har forgjæves søgt at finde den paa de af Steenstrup for mange Aar siden angivne Ynglesteder („Skand. Fugle“

p. 720). Det eneste Expl., han kjender fra Thy, blev fanget i Voldum Sø d. 4. Okt. 1877.

Angaaende Lützens Meddelelse i „Jahresber.“ I. p. 64 om et Expl., fanget ved Stevns i Dec. 1883, cfr. følgende Art.

Podiceps nigricollis, Sundew.

Ifølge prakt. Læge Arctanders bestemte Erklæring er den af Ltk. som *P. arcticus*, Boie anførte Lappedykker, der d. 26. Dec. 1883 blev fanget i et Fiskegarn ved Stevns, en *P. nigricollis*. Exemplaret er i Hr. Arctanders Besiddelse, Kropskelettet i Hr. cand. mag. O. Winges. Kjøbmand N. Larsen i Eistrup eier et Expl., som d. 7. Juli 1887 blev skudt i Eistrup Sø (Bg.).

Denne Art, som første Gang med Sikkerhed blev indført i vor faunistiske Literatur i Aaret 1877 („Ornith. Bidrag“ p. 27), synes nu at have taget fast Ophold i den Del af Danmark, hvor den først indfandt sig. Den optræder nemlig nu som almindeligt ynglende i Hjørdemaal Klits Søer, Nors- og Nebel Søer, Torme Sø og Flade-Ørum Søer. I Benzons Samling fandtes desuden dens Æg fra Koldkjær Sø og Glæde Sø (1878). Heiberg, som oftere har undersøgt dens Rede paa de nævnte Steder, meddeler, at denne ikke er meget stor og ikke svømmende, men anlagt paa fast Underlag umiddelbart ved dybt, klart Vand, enten aldeles aaben eller skjult af Siv og Vandplanter. Æggene, der dækkes, naar Fuglen forlader Reden, findes i første Halvdel af Juni og variere i Farve fra blaa-hvide, lysegule, mørkegule til svagt chokoladefarvede.

Podiceps grisegena, Bodd.

[*Podiceps rubricollis*, Lath.]

H. Faber fandt den ynglende i Tranebjerg Mose (Samsø) d. 10. Juli 1880 og d. 4. Juni 1881. I Apotheker

Benzons Samling fandtes et betydeligt Antal af dens Æg fra Søborg Mose (1860—81).

Den yngler ikke i Thy (Hbg.). Paa Mors saae Faber et Par svømme i Skarre Sø d. 11. Mai 1884; muligvis har det ynglet der. Forøvrigt er dette Tilfælde det eneste, i hvilket Lappedykkere vides at være trufne paa den nævnte Ø.

Podiceps minor, Gm.

Skal hver Vinter forekomme ved en lille Bæk ved Hover og Thorsted pr. Ringkjøbing (J.). I Begyndelsen af Januar 1888 blev et Expl. skudt ved Holløse Mølle pr. Næstved (Jernbaneassist. Scheel. — Bg.). I Un. zool. Mus. findes Skelettet af en Han, indsendt fra Dueodde Fyr d. 8. Sept. 1886 (Konserv. Hansen). Apoth. Benzon havde i sin Samling to gamle Hanner, den ene skudt ved Slagelse d. 21. Nov. 1862, den anden ved Hobro i 1872, samt en gl. Hun fra Ribe-Egnen, skudt d. 25. Okt. 1883.

Heiberg, som har fundet dens Reder i Nors Sø, angiver, at disse stode paa tørt Land i Tuer mellem Siv og Græs, og at Æggene ikke vare dækkede. Grill, som har et Expl., skudt i Odense Fjord d. 11. Dec. 1878, og et andet, skudt i Hasmark Mose (ved Odense) d. 24. Dec. 1881, har selv set den paa sidstnævnte Lokalitet om Sommeren og antager, at den yngler der. I Benzons Samling fandtes dens Æg fra Skaarup Bøges Dam i Fyen (d. 20. Mai 1865) og fra Vrangsgaard ved Vordingborg (d. 3. Juni 1875).

Colymbus glacialis, L.

I Januar 1878 modtog Heiberg et Expl., der var skudt ved en i Skanderborg Sø udløbende Bæk. I April

1886 blev et Expl. skudt ved Sydspidsen af Langeland. Kapt. Bay i Rudkjøbing er i Besiddelse af Fuglen (Bg.).

Colymbus arcticus, L.

I Apoth. Benzons Samling fandtes en Hun, skudt i Nærheden af København d. 6. Nov. 1865, og en ung Fugl fra Randers-Eggen, skudt d. 20. Juni 1875. Skudt i Veile Fjord d. 12. Januar 1882 (F.), paa Refsnæs d. 18. April 1883 (Hun) og indsendt til Un. zool. Mus. (L.), i Ringkjøbing Fjord i Vinteren 1875—76 (J.), ved Hede-husene (mellem Kbhvn. og Roeskilde) d. 31. Januar 1879 (ung Hun) (L.), ved Aalborg (en Han i ren Sommerdragt) i Sept. 1883 (Bg.), i Kallebodstrand d. 17. Dec. 1885 (K.), ved Nørre Snede pr. Horsens (gammel Han) af Forstkandidat E. Hornemann d. 12. Dec. 1887 (Cand. pharm. A. Pirtzel), ved Dybsø d. 20. Nov. 1887 (ungt Expl.) af Jernbaneassistent Scheel (Bg.). I Nov. 1881 opholdt et Par sig i nogen Tid ved Udløbet fra Østrupgaards Inddæmning i Odense Fjord. De vare begge i Vinterdragt. Hunnen blev skudt d. 3. Dec. og findes i Grills Samling. I Nov. 1883 blev et Expl. fanget i en Fiskeruse i Øst-Stadilfjord (J.). I Sekret. Friis's Samling fandtes en Han, skudt ved Lerchenborg d. 25. Okt. 1851 (Grev V. Lerche).

Colymbus septentrionalis, L.

I Baagøes Samling findes et Expl. i Sommerdragt, skudt d. 28. Juni 1873 ved Tostenæs paa Møen. Et andet Expl., ligeledes i Sommerdragt, blev skudt d. 5. Okt. 1887 i Skandsen mellem Faxe og Præstø af Dyrlæge Nielsen (Bg.).

Graculus carbo, (L.).

[*Carbo cormoranus*, Mey. & Wolf.]

Paa Eierslev Røn i Livø Bredning (Limfjorden) har der i adskillige Aar, i alt Fald fra 1870, hver Sommer opholdt sig en større Flok. I Slutningen af Fyrrerne fandtes der en Skarv-Koloni i Torrig Skov i Birket Sogn (Lolland) (G.).

Graculus cristatus, (Gunn.).

[*Carbo graculus*, Mey. & Wolf.]

I Januar 1883 blev et Expl. skudt i Stauning pr. Ringkjøbing (J.). Sandsynligvis er det dette Expl., der findes i Baagøes Samling, og som ifølge hans Meddelelse er en Hun, skudt d. 3. Januar 1883 i Nærheden af Ringkjøbing.

Sula bassana, (L.).

En gammel, udfarvet Han blev i Dec. 1875 fanget ved Velling pr. Ringkjøbing (J.). I Midten af Okt. 1885 modtog Un. zool. Mus. fra Lieutenant E. Andersen to fuldvoxne Explr., der vare skudte nogle Dage tidligere paa Kobbergrunden i det østlige Kattegat, hvor adskillige andre Individier samtidigt vare iagttagne (W.). En ung Fugl blev fanget ved Gjersbøl i Thy d. 28. Sept. 1878, og en gammel, udfarvet Hun blev taget levende i Limfjorden ved Struer d. 5. Januar 1879. I Efteraaret 1873 blev en Sule grebet af en Dreng paa en Mark ved Bangsbo pr. Frederikshavn og i nogen Tid holdt i Fangenskab (G.). Fisker Villumsen indsendte i 1879 til Zoologisk Have et Expl., der samme Efteraar var fanget ved Snedkersten S. f. Helsingør. En gammel Han

blev skudt ved Hjørring i Nov. 1886 af Aabo Sørensen fra Silkeborg (Kjøbm. N. Larsen. — Bg.). Sammesteds fra modtog Stabssergeant E. Bruun i Fredericia et Expl. til Udstopning i April 1887.

Fulmarus glacialis, (L.).

Stabssergeant E. Bruun i Fredericia fik i 1887 tilsendt en ung Han fra Hobro-Egnen til Udstopning.

Procellaria pelagica, L.

[*Thalassidroma pelagica*, Vigors].

Ved Ulfshale paa Møen blev et dødt Expl. skyllet i Land d. 18. Okt. 1881 (F.). D. 3. Nov. 1884 blev en Stormsvaler fanget af en Fisker i Draaby Vig (Mors); den havde kastet sig udmattet i Vandet, tæt ved hans Baad, saa at han kunde tage den med Hænderne. I de foregaaende Dage havde det blæst en stærk nordlig Storm. Fuglen, som døde samme Dag, blev af H. Faber indsendt til Un. zool. Mus. — Den 14. Nov. s. A. erholdt Museet et Expl., som var fundet dødt ved Korselitze paa Falster (L.). Det følgende Aar, ligeledes d. 14. Nov., blev et nylig dødt Expl. fundet ved Gyllingnæs v. Horsens Fjord (Hs.). I Odense-Museum findes et Expl., skudt i Efteraaret 1887 i Odense Fjord (Gr.).

Procellaria Leachii, Temm.

[*Thalassidroma Leachii*, Vigors.]

Fra Stabssergeant E. Jacobsen i Fredericia har Un. zool. Mus. modtaget et Expl. af denne sjeldne Fugl, som var dræbt ved den nævnte By d. 23. Nov. 1885.

Et Expl. blev d. 12. Januar 1886 skudt ved Nørre-skovgaard i Nærheden af Funder pr. Silkeborg. Exem-

plaret opbevares i Kjøbmand N. Larsens Samling i Eistrup (Bg.). Ifølge Meddelelse fra Konserv. E. Hansen har Un. zool. Mus., foruden ovennævnte Expl., modtaget følgende: en Han fra Læsø Rende d. 3. Okt. 1886, et Expl. fra Skagen d. 6. Okt. 1886, en Han fra samme Sted (indsendt af Hr. Ancker) d. 8. Nov. 1886, en Han fra Læsø d. 29. Januar 1887 (Skelet) og et Expl. fra Schulz's Grund d. 27. Januar 1887.

Stercorarius parasiticus, (L.).

[*Lestris parasitica*, Illig.]

D. 8. Sept. 1883 indsendtes en Hun fra Frederikshavn til Un. zool. Mus. (L.). Et Expl. blev skudt ved Esbjerg d. 11. Sept. 1883 (Bg.).

Stercorarius pomarinus, (Temm.).

[*Lesiris pomarina*, Illig.]

Skudt ved Viborg d. 21. Okt. 1874 (gl. Hun), ved Ringkjøbing 1875 (begge Explr. i Benzons Samling) og i Kjøgebugt d. 11. Nov. 1879 (L.). Et Expl. fandtes i Foraaret 1875 drivende i Vilsund i Limfjorden (Hbg.). Skudt i Harrild (Eistrup Sogn) d. 12. Sept. 1887 (Kjøbm. Larsen. — Bg.) og i Odense Fjord (ung Han) d. 24. Okt. 1887 (Gr.).

Stercorarius catarrhactes, (L.).

[*Lestris catarrhactes*, Illig.].

D. 11. Nov. 1875 blev et gammelt Individ skudt ved Holmestrands Klit ved Vesterhavet (J.).

Fiskerne ved Vesterhavskysten af Thy angive, at denne Fugl ikke saa sjældent viser sig ved Kysten; de have endogsaa et eget Navn for den, nemlig „Pibemaage“ (Hbg.).

Larus minutus, Pall.

Skudt d. 8. Sept. 1881 paa Heden en halv Mil Vest f. Eistrup pr. Horsens af Husmand. Jens Petersen af Lundfod. Expl. findes i Kjøbm. N. Larsens Samling i Eistrup (Bg.). Fra Hr. J. Larsen i Kjerteminde modtog Un. zool. Mus. en Han d. 20. Okt. 1886 (Konserv. Hansen).

Larus tridactylus, L.

[*Rissa tridactyla*, Steph.].

Et dødt Expl. fandtes paa Aagaards Mark (Brande Sogn pr. Jelling) d. 1. Januar 1882 (Kjøbm. N. Larsen. — Bg.). Et andet, ligeledes dødt Individ blev d. 17. Marts 1882 fundet paa Harrild Mark (Eistrup Sogn) pr. Nørre Snede. Begge Explr., som ere i Kjøbm. Larsens Besiddelse, vare ubeskadigede af Skud eller anden Vold. Det er overhovedet ikke sjældent at finde forskellige Søfugle, navnlig Maager, liggende døde paa Heden uden Skudsaar eller anden ydre Beskadigelse.

Fra Skagen modtog Un. zool. Mus. en Hun d. 27. Okt. 1887 (Ancker).

Larus marinus, L.

Forekommer hele Aaret rundt ved Agger og Thyborøn, men uagtet Lokalteterne synes at egne sig særdeles godt til Ynglepladser, er det ikke lykkedes at finde dens Æg paa disse Steder (Hbg.).

I Thy kaldes den „Havgase“ (Hbg.).

Larus argentatus, Brünn.

Yngler almindeligt paa Bosserne og Lindholm ved Samsø (F.).

Larus fuscus, L.

Stud. med. Krabbe mener at have set den nogle Gange over Sundet ved Østkysten af Amager. D. 28. Febr. og d. 19. Nov. 1885 blev den iagttaget i Sundet udfor København, nær ved Kysten (W.). Et gammelt Individ blev skudt ved Rødvig (Stevns) d. 20. Sept. 1881 (A.). Fra Hr. Hjeronymus i Odense har jeg modtaget Meddelelse om, at Forvalter Mackeprang har skudt den i 1882 (uden Angivelse af Aarstiden) ved Nakkebølle pr. Faaborg. Jernbaneassist. Scheel skjød en Han ved Dybsø d. 3. Januar 1888 (Bg.).

Larus glaucus, Brünn.

En Hun, skudt d. 24. Dec. 1880 ved Hjørring (L.)*). I Efteraaret 1887 blev et Expl. skudt ved Storehedinge (Bg.). Unge Individder træffes ikke sjældent i Lille Belt ved Fredericia (E. Bruun).

Larus ridibundus, L.

[*Xema ridibundum*, Leach.]

Da Hættemaagen vistnok kun yderst sjældent træffes her i Landet om Vinteren, fortjener det at anføres, at Kapt. C. P. Bay i Rudkjøbing d. 3. Februar 1888 erholdt en gammel Fugl i ren Vinterdragt, skudt samme Dag ved Rudkjøbing Havn (Bg.), og at Stud. Krabbe d. 2. Nov. 1887 skjød tre Individder (ligeledes i Vinterdragt) paa Tømmerup Overdrev (Konserv. Hansen).

Som nævnt i „Skand. Fugle“, yngler denne Maage paa mangfoldige Steder her i Landet, om end ikke overalt saa talrigt som paa Holmene i Limfjorden og i

*) I Lützens „Jahresbericht.“ I. p. 67 opført som *L. leucopterus*, Faber.

de thylandske Søer. Den store Nytte, som den stifter ved at fortære umaadelige Masser af Oldenborrelarver, burde medføre, at den blev fredet, men dette er saa langt fra Tilfældet, at man tværtimod mange Steder forfølger den ved at røve Æg og Unger efter en stor Maalestok. Ifølge Heibergs Meddelelse samles der paa Hindsels Holm i Limfjorden hvert Aar c. 14,000 Æg. Antallet af dens Reder i Flade- og Ørum Søer angives for Aaret 1885 til c. 6000.

Den ankom til Vigelsø i Odense Fjord (Gr.)

1877—28. Marts

1884—16. Marts

1882—14. —

1886—23. —

1883— 1. April

1887—20. —

Sterna Caspia, Pall.

D. 8. Juli 1880 traf H. Faber et Par paa Bosserne ved Samsø. Dyrlæge Grill har fundet den ynglende sammesteds og har endvidere fundet 4 Par ynglende paa Knopen ved Tunø d. 6. Juli 1876*).

Sterna Anglica, Mont.

[„Sandterne“.]

I Apothek. Benzons Samling fandtes dens Æg fra Boel pr. Frederikshavn (1873 og 1875) og fra Fil Sø ved Varde (1873 og 1874). H. Faber fandt dens Æg paa Tipperne i Ringkjøbing Fjord d. 9. Juli 1878. En lille Koloni yngler paa Kalvø i Skanderborg Sø, hvor Herschend første Gang fandt Reden d. 28. Mai 1878. Paa Buxer (Buksør) Odde paa Mors fandtes nogle faa Par ynglende d. 2. Juni 1884 og paa Fegge Røn i Limfjorden (Livø

*) De to ovennævnte Ynglesteder ere i „Skand. Fugle“ (p. 587) urigtigt anførte for St. Anglica.

Bredning) d. 20. Juni s. A. (F.). I August 1884, og ofte ellers, skjød og jagttog Faber en Del Individer med Unger i Nærheden af samme Sted (ved Legind Veile). I den østlige Del af Limfjorden opholdt en Koloni paa omtrent 70 Par sig i 1885. I 1884 kunde man i Juli og August daglig træffe ældre og yngre Individer paa Markerne i Omegnen af Løgstør (H.). Angaaende den engelske Ternes Optræden som Ynglefugl i Thy giver Heiberg følgende Oplysninger: Den ynglede tidligere kolonivis paa Holmene i Sjørring- og Sperring Sø (c. 30 Par), i Flade- og Ørum Sø (70—100 Par) og i Ove Sø (50—70 Par). Efterat de tre førstnævnte Søer vare tørlagte (1867, 1877 og 1878), fandtes der i Thy kun én større Koloni paa Holmen i Ove Sø, den saakaldte Madstedborg. I 1879 var denne Koloni voxet til c. 100 Par, saa at det maa antages, at adskillige af Fuglene fra Flade- og Ørum Sø vare flyttede hertil. Enkeltvis yngler den ved Gyrup- eller Nørsaa Sø, i Lars Klits Sø i Hjørdemaals Klit og ved Bromølle. Heiberg oplyser endvidere, at i Yngletiden indeholde de gamle Fugles Maver næsten udelukkende Rester af den almindelige Skarnbasse (*Scarabæus vernalis*, L.), medens Ungerne, saa længe de makes af de Gamle, saa godt som alene fodres med Firben (*Lacerta agilis*). I Juni 1878 fandt han, at paa Madstedborg havde ikke faa af Fuglene benyttet gamle tørre Kokasser til Redeunderlag.

***Sterna Cantiaca*, Gm.**

D. 8. Juli 1880 fandt H. Faber store Kolonier ynglende paa Bosserne og Lindholm; det følgende Aar søgte han dem forgjæves paa først nævnte Lokalitet, hvorimod Kolonien paa Lindholmen var meget talrig. I Slutningen af Mai 1884 traf han den ynglende paa „Madstedholm“ i Ove Sø (Thy).

Ifølge Heiberg findes der i Thy tre større Kolonier af denne Art, nemlig paa Hindselsholm, paa „Madstedborg“ og paa Handrup Odde i Ørum Sø; en mindre Koloni findes paa en lille Holm i Lars Klits Sø i Hjarde- maals Klit. Enkeltvis yngler den paa flere Steder i Thy, saaledes ved Nors Sø, paa Fegge Røn og paa Tangen ved Agger. Apoth. Benzon havde dens Æg fra Hjelm, Læsø, Anholt o. fl. St. Æggene lægges paa den blotte Jord, uden Antydning til Rede.

Paa selve Mors er den, saavidt vides, ikke iagttaget.

Telegrafist Nyborg skjød en Han og en Hun i Lillebelt ved Fredericia d. 23. Mai 1883 og sammesteds en Han i Vinterdragt d. 10. Sept. s. A. (Bg.).

Sterna paradisea, Brünn.

De i „Skand. Fugle“ (p. 590) omtalte Æg, som Heiberg i 1874 fandt paa Holmen i Sperring Sø og antog for at tilhøre oven nævnte Art, bleve indlemmede i Apotheker A. Benzons Samling, men ved senere Undersøgelser har det viist sig, at de vistnok snarere maa ansees for Dværgæg af St. Anglica. — Siden hint Aar har Heiberg ikke bemærket Arten i Thy.

I 1872 bleve tre Individuer skudte paa Skalø i Stokke- marke Sogn paa Lolland, men ingen af dem bleve op- bevarede (P.).

Sterna hirundo, L.

[*S. fluvialis*, Naum.]

Paa Mors synes denne ellers her i Landet saa almindeligt forekommende og næsten allevegne ynglende Terneart kun at vise sig enkeltvis nu og da; ynglende er den, saavidt bekjendt, aldrig fundet der paa Øen.

Sterna minuta, L.

Yngler i Mængde paa Vorsø og Alvø i Horsens Fjord, paa Tipperne i Ringkjøbing Fjord, paa Samsø og de om-
liggende Smaaøer (F.). Enkeltvis eller dog i ringere Antal
yngler den paa Eierslev Røn, Buxer Odde og Fegge Røn
(Livø Bredning) (F.) samt paa Lindholmen (Limfjorden),
Hanstholm og Bolbjerg (Hbg.). I 1884 og 1885 fandtes
den ynglende i Nærheden af Løgstør (H.).

Sterna nigra, L.

[*Hydrochelidon nigra*, Boie].

Ankom til Østrupgaards Inddæmning v. Odense
Fjord (Gr.)

1878—3. Mai

1882—26. April

1880—4. —

1884—28. —

Register.

De med Kursiv trykte Navne ere Synonymer. Af saadanne har jeg, paa et Par Undtagelser nær, kun anført dem, der anvendes af Lütken og Winge (i »Jahresbericht« I og II og i »Report«). Flere af disse vilde jeg helst have benyttet, især hvad Slægten *Sylvia* angaar, idet en stærkere Spaltning af denne og enkelte andre Slægter havde været mere tidsvarende end at henhøre de forskjellige mindre Grupper under én Slægt, men af let forstaaelige praktiske Grunde har jeg foretrukket at beholde de i »Skandinaviens Fugle« anvendte systematiske Navne.

	Pag.		Pag.
<i>Acanthis carduelis</i>	71	<i>Anas acuta</i>	96
— <i>spinus</i>	71	— <i>boschas</i>	96
<i>Accentor modularis</i>	48	— <i>clypeata</i>	95
<i>Accipiter nisus</i>	15	— <i>crecca</i>	96
<i>Acredula caudata</i>	50	— <i>discors</i>	97
<i>Acrocephalus arundinacea</i>	52	— <i>penelope</i>	97
— <i>palustris</i>	52	— <i>querquedula</i>	97
— <i>turdoides</i>	52	<i>Anser erythropus</i>	94
<i>Actitis hypoleucos</i>	91	<i>Anthus arboreus</i>	65
<i>Aegialites cantianus</i>	77	— <i>obscurus</i>	64
— <i>hiaticula</i>	77	— <i>pratensis</i>	65
— <i>minor</i>	77	— <i>rupestris</i>	64
<i>Alauda arborea</i>	66	<i>Aquila fulva</i>	7
— <i>arvensis</i>	66	— <i>nævia</i>	8
— <i>cristata</i>	65	<i>Arctica alle</i>	101
<i>Alca torda</i>	102	<i>Ardea cinerea</i>	82
<i>Alcedo ispida</i>	30	— <i>comata</i>	83
<i>Ampelis garrulus</i>	47	— <i>minuta</i>	84

	Pag.		Pag.
<i>Ardea stellaris</i>	83	<i>Circus pallidus</i>	19
<i>Astur nisus</i>	15	— <i>pygargus</i>	19
— <i>palumbarius</i>	14	<i>Clangula glaucion</i>	99
<i>Athene noctua</i>	21	<i>Columba oenas</i>	73
— <i>passerina</i>	20	— <i>palumbus</i>	72
<i>Bernicla brenta</i>	95	<i>Colymbus arcticus</i>	105
— <i>leucopsis</i>	94	— <i>glacialis</i>	104
— <i>torquata</i>	95	— <i>septentrionalis</i>	105
<i>Bombycilla garrula</i>	47	<i>Coracias garrula</i>	37
<i>Botaurus stellaris</i>	83	<i>Corvus corax</i>	39
<i>Brachyotus palustris</i>	25	— <i>cornix</i>	39
<i>Bubo maximus</i>	23	— <i>corone</i>	39
<i>Buteo lagopus</i>	17	— <i>frugilegus</i>	40
— <i>vulgaris</i>	16	— <i>monedula</i>	38
<i>Calamoherpe aquatica</i>	53	<i>Coturnix communis</i>	74
— <i>phragmitis</i>	53	— <i>dactylisonans</i>	74
<i>Calidris arenaria</i>	93	<i>Crex pratensis</i>	86
<i>Cannabina flavirostris</i>	72	— <i>pygmæa</i>	87
— <i>sanguinea</i>	72	<i>Cuculus canorus</i>	29
<i>Caprimulgus Europæus</i>	25	<i>Cursor Europæus</i>	75
<i>Carbo cormoranus</i>	106	<i>Cursorius Europæus</i>	75
— <i>graculus</i>	106	— <i>Gallicus</i>	75
<i>Carduelis elegans</i>	71	— <i>Isabellinus</i>	75
<i>Cerchneis tinnunculus</i>	10	<i>Cyanecula Suecica</i>	57
<i>Certhia familiaris</i>	44	<i>Cygnus olor</i>	95
<i>Charadrius cantianus</i>	77	<i>Cypselus apus</i>	26
— <i>curonicus</i>	77	<i>Dandalus rubecula</i>	57
— <i>Gallicus</i>	75	<i>Dryospiza serinus</i>	71
— <i>hiaticula</i>	77	<i>Emberiza citrinella</i>	68
— <i>morinellus</i>	76	— <i>hortulana</i>	68
— <i>pluvialis</i>	76	— <i>miliaria</i>	68
— <i>squatarola</i>	76	— <i>schoeniclus</i>	69
<i>Chlorospiza chloris</i>	71	<i>Erithacus rubecula</i>	57
<i>Chrysomitris spinus</i>	71	— <i>Suecicus</i>	57
<i>Ciconia alba</i>	80	<i>Eudromias morinellus</i>	76
— <i>nigra</i>	81	<i>Falco æsalon</i>	11
<i>Cinclus aquaticus</i>	48	— <i>gyrfalco</i>	13
<i>Circus æruginosus</i>	18	— <i>peregrinus</i>	12
— <i>cyaneus</i>	18	— <i>subbuteo</i>	12
— <i>macrurus</i>	19		

	Pag.		Pag.
<i>Fratercula arctica</i>	101	<i>Larus fuscus</i>	110
<i>Fringilla coelebs</i>	70	— <i>glaucus</i>	110
— <i>montifringilla</i>	70	— <i>marinus</i>	109
<i>Fulica atra</i>	88	— <i>minutus</i>	109
<i>Fuligula ferina</i>	97	— <i>ridibundus</i>	110
— <i>marila</i>	98	— <i>tridactylus</i>	109
— <i>nyroca</i>	98	<i>Lestris catarrhactes</i>	108
— <i>rufina</i>	98	— <i>parasitica</i>	108
<i>Fulmarus glacialis</i>	107	— <i>pomarina</i>	108
<i>Galerita cristata</i>	65	<i>Ligurinus chloris</i>	71
<i>Gallinago gallinula</i>	90	<i>Limicola platyrhyncha</i>	93
— <i>media</i>	89	— <i>pygmæa</i>	93
— <i>scolopacina</i>	89	<i>Limosa ægocephala</i>	88
<i>Gallinula chloropus</i>	87	— <i>Laponica</i>	88
— <i>porzana</i>	86	<i>Linota cannabina</i>	72
<i>Garrulus glandarius</i>	41	— <i>flavirostris</i>	72
<i>Gecinys viridis</i>	41	<i>Locustella fluviatilis</i>	52
<i>Glaucidium passerinum</i>	20	<i>Loxia leucoptera</i>	72
<i>Glaucion clangula</i>	99	— <i>pityopsittacus</i>	72
<i>Graculus carbo</i>	106	<i>Lullula arborea</i>	66
— <i>cristatus</i>	106	<i>Luscinia minor</i>	55
<i>Grus cinerea</i>	79	— <i>philomela</i>	55
<i>Hæmatopus ostralegus</i>	79	— <i>phoenicurus</i>	54
<i>Haliaëtus albicilla</i>	8	— <i>tithys</i>	56
<i>Harelda glacialis</i>	99	— <i>vera</i>	55
<i>Himantopus candidus</i>	94	<i>Lycos monedula</i>	38
— <i>rufipes</i>	94	<i>Machetes pugnax</i>	91
<i>Hirundo riparia</i>	28	<i>Mergus albellus</i>	100
— <i>rustica</i>	27	— <i>merganser</i>	99
— <i>urbica</i>	28	— <i>serrator</i>	100
<i>Hydrobata cinclus</i>	48	<i>Merops apiaster</i>	31
<i>Hydrochelidon nigra</i>	114	<i>Merula torquata</i>	58
<i>Hypolais salicaria</i>	51	— <i>vulgaris</i>	58
<i>Hypotriorchis æsalon</i>	11	<i>Miliaria Europæa</i>	68
<i>Lynx torquilla</i>	42	<i>Milvus niger</i>	10
<i>Lanius collurio</i>	45	— <i>regalis</i>	9
— <i>excubitor</i>	44	<i>Mormon fratercula</i>	101
<i>Larus argentatus</i>	109	<i>Motacilla alba</i>	61
		— <i>Var. borealis</i>	64
		— <i>flava</i>	63
		— <i>Var. lugubris</i>	62

	Pag.		Pag.
Motacilla sulphurea	63	Podiceps arcticus	102
— Var. Yarrellii	62	— cornutus	102
Muscicapa atricapilla	46	— cristatus	102
— collaris	47	— grisegena	103
— grisola	46	— minor	104
— luctuosa	46	— nigricollis	103
		— rubricollis	103
Nucifraga caryocatactes	35	Porzana Bailloni	87
Numenius arquatus	88	— pygmæa	87
Nyctale funerea	21	Pratincola rubetra	60
Nyctea nivea	20	Procellaria pelagica	107
		— Leachii	107
Oedienemus crepitans	75		
Oidemia nigra	99	Querquedula circia	97
Oriolus galbula	32	— crecca	96
Ortygometra porzana	86	— discors	97
— Bailloni	87		
— pygmæa	87	Rallus aquaticus	85
Otis tetrax	75	— Bailloni	87
Otocoris alpestris	66	Recurvirostra avocetta	94
Otus brachyotus	25	Regulus cristatus	51
— vulgaris	24	Rissa tridactyla	109
		Ruticilla phoenicura	54
Pandion haliaëtus	8	— tithys	56
Parus ater	49		
— caudatus	50	Saxicola oenanthe	59
— major	50	— rubetra	60
Passer domesticus	70	Schoenicola schoeniclus	69
— montanus	69	Scolopax rusticola	89
Pastor roseus	35	Sitta Europæa	42
Perdix cinerea	74	Somateria mollissima	99
Pernis apivorus	15	— spectabilis	99
Phileremos alpestris	66	Spatula clypeata	95
Philomachus pugnax	91	Squatarola Helvetica	76
Phyllopneuste rufa	51	Starna cinerea	74
— trochilus	51	Stercorarius catarrhactes	108
Pica caudata	40	— parasiticus	108
Picus major	42	— pomarinus	108
— medius	42	Sterna Anglica	111
— viridis	41	— Cantiaea	112
Platalea leucorodia	84	— Caspia	111
Plectrophanes nivalis	69	— fluviatilis	113

	Pag.		Pag.
<i>Sterna hirundo</i>	113	<i>Thalassidroma pelagica</i> . . .	107
— <i>minuta</i>	114	<i>Tinnunculus alaudarius</i> . . .	10
— <i>nigra</i>	114	— <i>vespertinus</i> . . .	11
— <i>paradisea</i>	113	<i>Totanus calidris</i>	91
<i>Streptilas interpres</i>	79	— <i>fuscus</i>	90
<i>Strix flammea</i>	22	— <i>hypoleucus</i>	91
— <i>Tengmalmi</i>	21	— <i>ochropus</i>	91
<i>Sturnus vulgaris</i>	33	<i>Tringa canutus</i>	92
<i>Sula bassana</i>	106	— <i>cinerea</i>	92
<i>Sylvia aquatica</i>	53	— <i>maritima</i>	93
— <i>arundinacea</i>	52	— <i>minuta</i>	92
— <i>atricapilla</i>	54	— <i>subarquata</i>	92
— <i>cinerea</i>	53	— <i>Temminckii</i>	92
— <i>curruca</i>	54	<i>Troglodytes parvulus</i>	49
— <i>fluviatilis</i>	52	<i>Turdus atrigularis</i>	58
— <i>hortensis</i>	54	— <i>iliacus</i>	59
— <i>hypolais</i>	51	— <i>merula</i>	58
— <i>nisoria</i>	54	— <i>musicus</i>	59
— <i>palustris</i>	52	— <i>torquatus</i>	58
— <i>rufa</i>	51	— <i>viscivorus</i>	58
— <i>schoenobæus</i>	53	<i>Turtur auritus</i>	73
— <i>trochilus</i>	51		
— <i>turdoides</i>	52	<i>Upupa epops</i>	43
<i>Syrnium aluco</i>	22	<i>Uria grylle</i>	101
<i>Syrrhaptus paradoxus</i>	74	— <i>troile</i>	101
<i>Tachydromus Gallicus</i>	75	<i>Vanellus cristatus</i>	78
<i>Tetrao tetrix</i>	73		
<i>Thalassidroma Leachii</i>	107	<i>Xema ridibundum</i>	110

Skandinaviens Fugle,

med særligt Hensyn til Danmark og de nordlige Bilande,

udgivet

af

Jonas Collin.

(2. fuldstændigt omarbejdede Udgave af Kjærbølling: »Danmarks Fugle«.)

Nedsat Pris 5 Kr.

Ornithologiske Bidrag til Danmarks Fauna

af

Jonas Collin.

(1ste Supplement til »Skandinaviens Fugle«.)

Pris 45 Øre.

Limfjordens tidligere og nuværende marine Fauna,

med 1 Tavle,

af

Jonas Collin.

Pris 3 Kr.

Skildringer af Naturvidenskaberne for Alle,

med talrige Afbildninger,

udg. under Redaktion af Jonas Collin.

Pris 15 Kr. — Eleg. indb. 19 Kr.

Berlepsch: Alperne,

paa Dansk

ved

Jonas Collin.

Pris 4 Kr. 50 Øre.

MCZ ERNST MAYR LIBRARY

3 2044 128 443 439