retum

3 2044 106 471 543

MH

138

2345.3

Digitized by the Internet Archive
in 2016

<https://archive.org/details/dissertatiobotan1753berg>

1912
Miss Topham and company
112

21070
#DISSERTATIO BOTANICA
DE
A L O I D E

AVCTORE
CAROLO AVGVSTO DE BERGEN

MED. DOCT. ET PROF. PVPL. ORD.

HAEREDITARIO IN ROSENGARTHEN.

FRANCOFVRTI ad VIADRVM
IMPENSIS JOH. CHRISTIANI KLEYB
MDCCLIII.

Dec. 1913
28995-

1000
1000
1000
1000

Q. F. F. Q. S.

§. I.

Rei herbariae studium polyhistoris **MORHOFFII** tempore ad superstitionem usque jam excultum, his nostris in diebus per totam fere Europam rapidis adeo progressibus crescit, ac læta capit incrementa, ut jure dixerim, quodvis hujus saeculi decennium, priorum temporum integris saeculis, uberiores longe fructus ferre, testantibus id ipsum numerosissimis botanicorum scriptis, praeclarisque inventis, quibus, quantum historia naturalis indies promovetur, inter omnes constat. Haud itaque ingratum fore existimo, in commodum botanophilorum meas qualescunque circa *Aloidem* institutas observationes cum publico communicare, tum maxime, quod planta hæc, utcunque vilis, et ulibus medicis hætenus destituta, plenior cognitionem requirat, mirusque inter auctores, etiam gravissimos, circa genericam ejus descriptionem inveniatur dissensus.

§. II.

Cum ante biennium *Floram Francofurtanam* publicarem aloidem nostram ab auctore *Hodegi botanici* plantis generis adhuc ignoti adscriptam, duce *Cel. LINNAEO Gener. plant. Ed. II. Lugd. Bat. 1742. n. 543.* ad classem genusque suum reruli, ut videre est in praedicto libello p. 205. ratus descriptionem hujus plantae adeo esse completam et veritati consonam, ut nihil his, quae legeram, vel addi, vel detrahi possit. Posteaquam autem ab eo tempore forte incideram in *Incomparabilis BOERHAVII* et *Clariss. TREVVII* descriptiones, quarum prior exstat in *Indice plantarum hort. Lugd. Bat. T. II. p. 132.* et posterior in *Commercio Litterario Norimbergensi Ann. 1731. p. 166.* merito dubitare coepi, cuinam hujus incomparabilis trigae virorum potiores partes deferendae sint, nihil itaque mihi relictum erat, quam manum operi admoveere, et ipsam, nudam prodentem veritatem, naturam consulere.

§. III.

Ante vero quam ea, quae ex examine hujus plantae didici expono, operae pretium erit descriptiones Boerhavio - Trevvio - Linnaeanas praemittere, atque ex earundem comparatione illud, quod incertum est in fructificationis historia, eruere.

Immortalis BOERHAVII l. c. p. 132. haec sunt:

Caulis crassus, fungosus, compressus, explicatur in *calycem* bifolium, compressum, crassum, fungosum, viridem, qui constat binis *vaginis*, ita excavatis in carinam, ut forment quasi chelas cancrorum. Hae vaginae arte invicem complicat sollicitè tegunt florem, ovariumque.

Ex centro calycis descripti et sine medio pedunculi affurgit *pedunculus* alius crassus, fungosus, sustinens,

Ovarium

Ovarium oblongum, divisum, in VI. loculos per septimenta fungosa, distinctos, quorum singuli gerunt *semen* unum forma avenae.

Ex apice producto ovarii emergit *calyculus* monophyllus, crassus, explicatus in tria magna segmenta longa, viridia.

Flos tripetalus oritur intra calycem illum ex margine apicis ovarii, habens petala tria, alba, magna, instar rosae expansa, intra quae *stamina* nascuntur multa, usque ad viginti.

Ex eodem apice ovarii assurgunt *tubae* sex incurvae, extorsum flexae, ita ut fallant incautos specie duodecim tubarum.

Clariss. TREVVIS l. c. Gedani quondam sequentem fructificationem notavit.

Ex *folliculis* apertis surgunt *cauliculi* duplicis generis, singuli tamen ante eruptionem in peculiari theca tenui, ac quasi membranacea reconditi. Alii horum duo, vel tres longiores, ad tres circiter digitos transversos calycem superantes, albicantes, teretes, teneri, pellucidi, *florem* gestantes album, rosaceum, tripetalum, permultis *staminibus*, apicibus flavis, instructis, fartum, *calyce* triphylo munitum, sed sterilem: alii *cauliculi* multo breviores et extra calycem vix conspicui duo, tres, subinde plures, sustinent ovarium cui insidet *flos*, priori similis, sed absque calyce.

Ovarium abit in *fructum* oblongum, angulosum, magnitudine prunum minusculum aequantem, sexcapsularem, mucilagine repletum, *feminibusque* foetum longis incurvis, parum alatis, fuscis.

Celeb. LINNAEI character genericus *l. c.* (§. 2.) sequentia docet.

Cal. Spatha diphylla, compressa, obtusa, connivens, utrinque carinata, persistens.

Perianthium monophyllum, trifidum, erectum, deciduum.

Cor. petala tria, obverse cordata, erecto-patentia, calyce duplo majora.

Stam. filamenta viginti longitudine perianthii, styli sex bipartiti, longitudine staminum, stigmata simplicia.

Per. Bacca capsula tecta, ovalis, utrinque attenuata hexaëdra, sexlocularis.

Sem. plurima, oblonga, incurva, fere alata.

§. IV.

Ex his vero observationibus invicem collatis tanta fructificationis differentia patet, ut concludi necesse sit, aut dari ejusdem hujus plantae species diversissimas, aut Viros hosce ingenuos eodem plantas diversas nomine comprehendisse. Nam quae primo loco BOERHAVIUS de calyculo trifido, corollam tripetalam sustinente, et ex ovario emergente tradit, hac ratione nunquam invenire potui, potius hic flos ante formatum ovarium et fructum, suo pedunculo suffultus, et extra spatham emergens, jam adest, naturae adeo fugacis, ut paucorum dierum intervallo marcescat, nec tum adhuc sese manifestante ovario. Spatham enim si quis ovarium appellat fallitur, manifeste enim formato jam fructu haec calycis officio fungitur. Neque tubas ex apice ovarii productas observare licet, sed potius inveni in staminum medio haerere organa quaedam, pistillorum vices habentia, sed quae in fructum non mutantur, qui quippe a
flore

flore remotus est per aliquod digitos transversos et ex fundo spathae suo pedunculo instructus emergit. In descriptione *Clariff. TREVVII* sequentia desidero: Nunquam ego duplices flores, steriles et foecundos ex spatha emergentes, sed unicum duntaxat florem hermaphroditum scil. infra fufius describendum, et formationem ovarii praecedentem observare potui, nisi forsan germina ista de quibus infra dicam, et quae flores nondum evolutos repraesentant, hos suos foemininos constituent, sed tamen et hoc esse nequit, cum hi flosculi sint hermaphroditi. Propius experientiis meis consentaneam invenio descriptionem *Celeb. LINNAEI*, sed in eo duntaxat anceps haereo, quid per receptaculum perianthii, sub quo germen ponit, intelligat Vir illustris, cum, si spatham diphyllam existimat, equidem verum sit, germen in eo latere, sed styli ab ipso descripti ab hoc germine sunt remotissimi, nec cohaerent cum ovario, imo dudum ante formationem ovarii una cum flore cadunt. Neque etiam reperio Cel. virum alterius istius spathae mentionem fecisse, quae reclusionem suarum carinarum novam pusillamque plantam, antiquae, exceptis floribus et fructibus, in omnibus simillimam, largitur. Quae cum ita sint, paucis jam nunc enarrabo, qua ratione fructificationem hujus plantae hac aestate repetitis vicibus observavi et contemplatus sum.

§. V.

Ineunte Julio mense has plantas in piscinis per canales communicantibus, et quadantenus aquam fluentem continentibus, aliisque aquis stagnantibus passim circa Francofurtum nascentes inveni, jam jam spathas (g fig.) inter folia gerentes, sed adhuc dum clausas, et nullum floris vestigium exhibentes,

Otiduo vix elapso efflorescunt spathae propellentes pedunculum florem sustinentem, cujus

Perian-

Perianthium (f) rite descriptum a LINNAEO pallidi coloris est, segmentis alterne cum petalis in orbem cohaerentibus.

Petala (e) a LINNAEO bene descripta sunt nivei coloris, venosa, venis convergentibus ad figuram petali, fugacia supra modum, ut intra paucos dies una cum perianthio, staminibus, stylis decidant, marcescente etiam pedunculo florali.

Stamina (c) filamentis circiter xx. l. x x i v. brevissimis, antheris filiformibus luteis, duplo filamentis longioribus.

Pistillum (c) format stylos circiter duodecim in centro staminum circumpositorum, cum totidem filamentosis stigmatibus, coloris longe pallidioris, quam ipsae antherae, longitudinis circiter perianthii, cum stamina una cum antheris dimidio breviora sint.

Perianthium, corolla, stamina et styli insident *Cauliculo* tereti (b) pallido, succoso ex spatha hiantе emergenti, tres circiter digitos transversos longo, quorum unus, aliquando duo ex spathae fundo prorumpunt.

Spathae (h) omnino sunt diphyllae, compressae, et carinatae, sed praeter caulem continent quatuor *loculamenta* tenuissima instar vitri Moscovitici pellucida, quorum bina sunt concentrica et sibi opposita, ejusdem cum carinis spathae figurae, ex fundo spathae surgentia, et caulem florigerum intra spatham amplectentia, quasi vesiculas repraesentantia.

Apertis hisce vesiculis (h) *substantiam mucosam* albam, quasi medullarem, levissima agitatione diffluentem reperi, quae fatiscente flore et caule florigero, fusca et emarcida fit.

In fun-

In fundo spathæ eodem tempore intra has vesiculas latent quatuor *grana* (i) lutea, quorum duo majora sunt, quae quasi totidem germina repraesentant. Haec a quibusdam pro seminibus plantae, sed perperam sunt habita, ut ex synonymo *PLVCKNETII* colligo. Aperta enim et per lentem vitream visa, nihil minus sunt, quam semina, sed potius vestigia floris futuri, quippe in his granis (l. m.) deteguntur folia perianthii, petala corollae, stamina et pistillorum vestigia. Insident porro haec grana suis curtis pedunculis, qui ex parenchymate caulis spathæ surgunt, ut nullum dubium sit, plures alios flores, emarcidis jam prioribus successively efflorescere; sed omni licet cura adhibita hos expectare non potui, quod si factum fuisset, certius de floribus masculinis et foemininis, sibi succedentibus, a *Cl. TREWIO* descriptis, iudicium ferre potuissem. Interea toto hujus intervalli decursu nondum ovarii vestigium reperitur.

Elapsis duabus vel tribus septimanis, hiantibus spathæ carinis, *fructus* crasso pedunculo suffultus exsurgit sexangularis, sexlocularis, utrinque attenuatus, ad cujus *receptaculum* fungosum in pulposa tela jacent *semina* granorum secalis figura, sed majora, in cortice recludentia nucleum album, saporis mucidi et corrupti, quæ tamen minime sunt alata, sed duntaxat lanuginosa ista pulpa tecta, quorumque numerus incertus est, duobus, tribus, quinque, aliquando unico in quavis cellula sexlocularis capsulae inclusis, et omnibus plus minus maturis.

Atque haec breviter est fructificationis a me observatae metamorphosis, quam unius et dimidii mensis spatio penitus absolvi existimo.

§. VI.

Praeter recensitas partes fructificationis (§. 5.) aliquo tempore transacto, mense sc. Augusto et Septembri in hisce plantis ex radice inter folia nascuntur tenebrae gemmae, nucleorum pyri magnitudine, quae grandiores factae excrescunt pariter in similes spathas (q) suo pedunculo praeditas, sed spathis florigeris paulo minores, quae nunquam florent, aut folliculos vesiculares (h) ferunt, sed cultro apertae, rudimenta novae plantae (r. s.) continent, et totae foliaceae sunt. Sponte carinis hujus spathae hiantibus, pusilla planta, foliis suis tenerrimis, sed jam jam aculeatis, cito se explicat, tota per caulem pendula a materna planta. Grandescens autem proles, caule putrescente, ab adulta separatur planta, novas pellit radículas, hisque se ipsa nutrit. Hoc etiam addere visum est, me hactenus nunquam in eadem planta, quae flores fert gemmas hasce, e contra semper plantas gemmiparas spathis florigeris destitutas conspexisse; quod mihi dubium movet an ne peculiaris speciei vel potius varietatis sit planta gemmas ferens, quam, si bene memini, semper toto habitu, et in omnibus partibus graciliorem deprehendi.

§. VII.

Absolutis fructificationis organis nunc etiam folia et radices describendae sunt, et quidem priora, ubi planta ad justam suam maturitatem pervenit, ultra cubitum longa sunt, pollicem circiter lata, et in medio, dum ad margines modice gracilescunt duas lineas crassa, secundum longitudinem carinata, exterioribus in orbem expansis et majoribus, interioribus, confertis, minoribus. Serrata proprie non dixerim, sed potius aculeata, aculeis in planta fructigera, obtusis et brevibus, in gemmipara (§. 5.) (§. 6.) longioribus, acutioribus.

Color

Color non ubique viridis est, sed saepe in medio foliorum inter extremitates puniceus, vel obsolete purpureus. Saepe etiam folia, et caules spatharum striis luteis, picta et variegata deprehendi, admotaque lente vitrea cognovi, colorem non aliunde proficisci, nisi a consumta et exesa epidermide, quae ubi deficit, pallidum et succosum caulium parenchyma translucet. In causam hujus excoriationis inquirens mox inveni hanc provenire ab insectis aquaticis copiose folia obsidentibus, quae nihil aliud sunt, quam limaces aquatici minimi, seminis avenae magnitudine, pellucidi, rostro nigro praediti, quos in sequentibus entomographis *Fauna Suecica Cel. LINNAEI. III. REAMVRII* Opere, *Biblis Naturae SCHWAMMERDAMMII*, et scriptis vernaculis *FRITSCHII* et *LESSERI* descriptos haecenus invenire non potui. Praeter istos vermes buccina flaviatilia minima, testa admodum fragili his foliis hinc inde ad haerentia inveni. Integram aliquando lustravi piscinam, ubi omnia hujus plantae exemplaria, qua folia, qua folliculos, vermibus exesa erant.

Aliquando etiam variegatam coloris conditionem non inveni dependere ab excoriatione, sed ab arcta cohaesione foliorum lenticulae palustris, et pinnarum millefolii aquatici, quae plantae sub aquis confuse aloidi adhaerent.

Consistentia foliorum non quidem est friabilis, ut vult *Clariss. TREWIVS*, interim fragilia admodum sunt, ut vix planta integra uno comprehensa folio ex aquis sine ruptura extrahi possit.

Caules spathae florigeræ (§. 5.) et gemmiparae (§. 6.) non sunt rotundi sed compressi ab una, plani ab altera parte, differunt vero magnitudine, dum posteriores graciliores et breviores sunt.

Tandem concursus foliorum et spatharum format sui generis thalamum carnosum, qui tamen nihil esse videtur,

nisi confluens foliorum et caulium parenchyma, quique a parte ima, ubi planus est, profert multas radices filiformes, tenues, instar chordarum pandurae majoris, nudas, teretes, triplo vel quaduplo ipsa planta longiores, incerti numeri, et diversae maturitatis, dum aliae longiores et crassiores, aliae exiliores et breviores reperiuntur. Hae in aquis profundis fluctuant, nec ad fundum pertingunt, in vadosis vero cum alveo cohaerent et limosae sunt.

Quoad habitum expansio foliorum, stellatim ex centro communi sese expandentium aliquam similitudinem habet cum aloe vulgari, non tamen adeo rigida sunt folia, quam in speciebus aloes, sed magis flaccida.

Turiones quae ex radice inter folia emergunt, ubi ulterius progerminant, vel in spathas florigeras vel gemmiparas mutantur, diversae semper maturitatis et magnitudinis.

§. VIII.

Tota caeteroquin nostra planta annua est et aquatica, quae non nisi circumfusus undis crescit et vegetat, cujusque vegetationem ex haecenus observatis sequenti modo concipio. Plantae, quae Iunio mense ex aquis emergunt, non sunt eadem cum plantis anni praeteriti adultis, sed sunt vel proles et pusillae plantae (§. 6.) elapsi autumnii vel etiam sunt juniores plantulae, ex maturis seminibus, ruptis capsulis feminalibus, in fundo aquae progerminantes. Ratio emersionis versus hoc tempus in eo latet, quod utraque planta adhuc pusilla specificae gravior sit aquis et ideo in fundo maneat, crescentibus et sensim se explicantibus foliis ad eandem cum aqua gravitatem specificam redigitur, sicque ad superficiem emergit, maxima foliorum parte eminente, reliquis partibus sub aquis conditis, cujus rei ratio ex principiis hydrostaticis patet. Hoc autem emersionis tempore nullae nec spathae, nec turiones apparent, donec instante

stante florescentia spathae florigeræ cum suis pedunculis
 paucos intra dies subito prodeant, et laete efflorescant.
 Post florem sequitur fructus qui intra quatuordecim circi-
 ter dies maturus fit, et cum maturitate tantam gravitatem
 acquirit, ut trahendo perpetim pedunculum suum, ipsum
 sensim ad marcescentiam et corruptionem disponat, qua
 subsequente fructus sponte, vel ad minimum gelu ingru-
 ente, una cum antiqua planta ad fundum decedit. Augusto
 mense planta, alterius nifallor speciei, largitur spathas gem-
 miparas, atque ex his pusillas novas plantas (§. 6.), quarum
 separatio eodem modo contingit. Reliquo hyemis tempore
 planta hæc instar aliarum aquaticarum v. g. potamogeto-
 nis, nymphaeae utriusque, myriophylli etc. in alveis fos-
 sarum et stagnantium aquarum recondita latet, ita tamen,
 ut adulta planta propter frequentia omnium suarum par-
 tium vulnera, et corrosiones ab insectis facta computrescat,
 et in humum vertatur, semina autem in suis capsulis, nec
 non tenellæ, et non corrosæ plantæ superstitæ maneant.
 Approximante sequente æstate plantæ pusillæ crescunt,
 explicantur, donec in conspectum iterum veniant, gemmi-
 feris spathis unice destinatæ. Ex seminibus autem tum
 temporis, ut quidem ego existimo, similes progerminant
 plantulæ sensim ad superficiem aquæ adscendentes spathis
 floriferis destinatæ.

§. IX.

Differendi hic quoque locus est, cujusnam classis et
 generis sit hæc planta in systemate TOVRNEFORTII, et
 an plures species revera dentur. Quod primum attinet
 momentum, non dubitavi hanc liliaceorum familiæ inse-
 rere in *Flora Francofurtana*, solius enim perianthii prae-
 sentia et magnus staminum numerus, quæ rarissima sunt in
 liliaceis, nondum obstant, quo minus hoc congrue fieri
 possit. Essentia enim plantæ liliaceæ consistit in fructu

triloculari, qui modo in nostra planta in tantum abludit, quod numerus loculorum duplicatus sit. Quod si vero erraverim, per me etiam licet novum creare ordinem et classi rosaceae inferere. Quo usque vero sexuale systema hic valeat in multiplicatione hujus vegetabilis jam non disquiram, id saltem patet, plantas hasce partim per spathas gemmiparas sine flore et fructu, partim cum flore et fructu propagari, sed tali, cujus styli et stigmata cum ovario non cohaerent, imo ante formationem hujus jam destructa sunt.

§. X.

Circa pluralitatem specierum ita sentio: videri quasi duas esse species diversas, alteram gemmiparam, alteram fructigeram, sed cum mihi non constet, dari in rerum natura plantam, quae sine flore, fructu, et feminibus unice per flagella propagatur, malo potius reum me facere observatorem, dubiique hujus discussionem repetitis curis committere, interea quas binas *IOH-RENVIS* species in *Plantis generis ignoti* ex mente *GVNDEL-SHEIMERI* recenset; *Stratioten foliis aloes semine longo*, et *stratioten foliis asari, semine rotundo*, harum prima ipsa nostra planta est, altera vero, morsus ranae s. nymphaea minima, quae, quam incongrue ad hoc genus trahatur, sequentibus rationibus evincam. Primo enim hydrocharis s. morsus ranae, est planta monoecia, s. flores masculinos et foemininos ferens, quod in aloide, excepto *TREWIO*, negat *BOERHAVIVS* et *LINNAEVS*, deinde si aloides vel maxime monoecia esset, flores foeminini non exsurgunt ex spatha sed sunt solitarii, et tertio ab aloide toto habitu mirum quantum differt nymphaea. Mihi quoque videtur *PLVCNAETIVM* nostrae plantae vera semina non vidiſſe, quae non sunt crocei sed fusci et obsoleti coloris, sed potius deceptum fuisse
germi-

germinibus luteis in fundo spathae floriferae, intra vesiculas concentricas reconditis, quae tamen ut supra docui (§. 3.), sunt rudimenta florum nondum explicatorum.

§. XI.

Patriam quidem et locum natalem habet hæc planta in Belgio, Anglia, Germania et Suecia ut scite notavit, *Cel. LINNAEVS Hort. Cl. 221.* non vero crediderim per totam Germaniam crescere sed saltem per inferiorem. Ex libro germanico *D. ELSHOLZ de Horti cultura* patet, in fundo Spreae fluminis copiose crescere, et ex *CHEMNITII Indice* ducatus Brunswicensis indigenam esse. Extra Germaniam in Polonia communissima est planta circa Warsawiam, teste *ERNDELIO in Warsavia physice illustrata*, et in Prussia teste *LOESELIO*. Circa Aboam nasci liquet, ex synonymis *Cel. LINNAEI Florae Suecicae*, qui catalogum plantarum *D. TIL-LAND* Professoris Aboënsis citat, ubi *jucca palustris septentrionalium* vocatur. Pariter aloidem in Sibiria in Pischmae fluvii paludosis ripis detexit, *Clar. GMELINVS Flor. Sibir. T. I. Petrop. 1744. p. 2.* Sed si aliorum celeberrimorum botanicorum scripta c. *CLVSIVM, TABERNEMONTANVM, MAPPI Historiam plantarum Alsaticarum, VOLCKHAMERI Floram Norimbergensem, VAILLANTII Botanicon Parisiense*, ejusdemque plantas aquaticas in *Act. Soc. Reg. Paris. 1719.* accurate descriptas, *P. A. MICHAELII nova plantarum Genera, Ill. de HALLER Enumerationem stirpium Helveticarum* sedulo evolvo, altum ubique de hac planta est silentium, imo ne quidem *RUPPIVS*, videtur hanc plantam vidisse, alias hanc ipsam in *Flora Jenensi nymphaeae minimae folius IOHRENI* fide non junxisset. Quae cum ita sint conjecturari licet plantam nostram, in aquis dulcibus globi terraquei, quae aequatori et quin-

quagesimo latitudinis septentrionalis gradui interjacent, non nasci, sed a quinquagesimo primo vel secundo ad circulum usque Polarem, in Europa et Asia reperiri. Quod enim BAVHINI fratres hujus mentionem faciant, non praebet indicium eam nasci in Germania superiori vel Helvetia, quum alter in *Historia*, alter in *Pinace* totius mundi, tunc temporis plantas cognitatas, congesserint.

§. XII.

Praemissa plantae historia nunc etiam auctorum synonyma, quos ipse possideo, recensebo, post habitis iis, qui ad manus meas non pervenere. Sequentem ideo exhibeo synonymiam.

Stratiotes f. militaris aizoides. LÖB. *Adv.* 904.

Sedum aquatile f. stratiotes potamicos. DOD. *Pempt.* 588.
CHEMNIZ. *Ind. pl. circa Brunswig. nasc.* 89. ERN-
DEL *Warsaw. phys. illustr.* 119.

Planta foliis aloes quae stratiotes non est. ANGVILLAR.

Aloe palustris. CASP. BAVH. *Pin.* 256. I. S. ELSHOLZ *Gartenbau. Coln.* 1672. VI. IV. Idem *Flora Marchica Berolini.* 8. 1663. p. 17. LOESELIVS *Flora Prussica.* p. 11.

Aloe f. aizoon palustre. IOH. BAVHIN. *Hist. plant.* III. 786.

Aloe-folia palustris Anglicana, spinifera flore albo tripetalo seminibus croceo colore. PLVCKNET. *Almag.* 19.

Stratiotes foliis aloes. GVNDELISH. *ap. HODEG.* IOH-
RENII.

Aloides. BOERHAVII, *Ind. Hort. L. B.* II. 132. et *Flor. Francof.*

Stratiotes. LINNAEI. *Hort. Cliffort.* 221. *Flor. Lap.* 222. *Flor. Suec.* 162.

Sira-

*Stratiotes foliis ensiformi- triangulis, ciliato- aculeatis. LINN.
Spec. pl. T. I. 535.*

Gemanice vocatur, Wasser-Aloe, Hechtfraut, Sichel-
fraut.

Aloidis nomen retinui defectu alterius magis congrui, et naturae plantae propius accedentis, neque hic disquiro, an in *oides* plantarum denominationes ad unum omnes ex foro botanico sint relegandae? imprimis cum ΣΡΑΤΙΩΤΗΣ veterum teste VAL. CORDO, in *Annot. ad DIOSCORIDEM*, plane ignota hodie sit planta, et ignoretur an militis cognomen huic ipsi tribuatur ex eo, quod radice careat, ut milites, genus hominum nulli adstrictum domicilio, an forsan idéo, quod Marti sacra et vulneribus consolidandis, iisque ab inflammatione praecavendis apta nata sit. Quam porro DIOSCORIDES *de Medicinal. mater. L. IV.* ex versione V. CORDI 341. tradit descriptionem plantae, in aquis nascentis, iisdem supernatantis, et sine radice viventis, semper vivo similis, sed majora folia habentis, hanc quidem quodam modo nostrae plantae competere largior, sed qui PEDANIVS in Graecia et Italia quondam vivens, plantam a me pluribus descriptam, in calidis regionibus, ubi minime cre- scit, observare unquam potuit, concipere nequeo. Ut ta- ceam stratiotem terrestrem veterum esse achilleae speciem, et cum millefolio aquatico ratione foliorum, longe mayo- rem habere convenientiam, quam cum aloide. Non igitur possum non, quin cum VAILLANTIO sentiam, qui huic millifolio stratiotes nomen imposuit.

§. XIII.

Quo vero clarius elucescat, quid in descriptione hujus plantae, ratione fructificationis et vegetationis prae- stiterim, operae pretium erit quorundam scriptorum bo-
C tanico-

tanicorum de hac planta observationes recensere. **LOBELIUS** in *Stirpium adversariis* Lond. 1571. Fol. 334. ita scribit: „ Est vero illa quae multis fluentis pigre et ferme stagnantibus rivulis in Belgio provenit, sempervivi majoris figura, majoribus multo foliis mucronatis, angustae lanceolae plantaginis longioribus, sed extremo angustiori stylo. E medio autem foliorum, et ad latera exortis pediculis, non longis; insident flores, ternis foliolis, quadantenus ranunculi albi, sed medio lutei, et pilis hirsuti, e carinula aut forcipula cancri marini trifida emergentes, ei subest contractior radix foliorum sessili, latiori et basi radicem compressam obtegente, sed indidem tenuissime et pene aciem fallentes, fidiculae trans aquam humi dimittuntur, alimentumque latenter sugunt, vermiculorum speciem emementes.

DODONAEVS *loc. cit.* eandem propemodum descriptionem habet additque; „ maximam foliorum partem una cum floribus aquas superare, reliquis stirpis partibus sub aquis conditis.

JOH. BAVHINI *Hist. plant. T. III.* 786. sequentia sunt: „ Folia habet aloes herbae similia sed breviora et minor - - duris quibusdam brevibus aculeis spinosa, inter quae vaginae quaedam erumpunt, cancrorum forcipulis per similes, quibus dehiscentibus flores exeunt candidi, trium foliorum ranae morsus per similes, luteola, exigua stamina in medio gerentes. Pro radicibus sunt, fibrae rotundae, candidae, longae, crassioribus lyrarum fidibus per similes - - quae aquae fundum petunt, quem rarius assequuntur. Exeunt ab eodem et aliae obliquae fibrae, quibus uti ranae morsus multiplicatur. Junio, Julio et subinde Augusto floret.

JOH. RAIVS *Hist. plant. l.c.* totam relationem ex **JOH. BAVHINO** suis ipsissimis verbis mutuatus est.

Largiun-

Largiuntur hae descriptiones sat evidentes notas, quibus ab aliis plantis aquaticis, sat commode distingui potest, et IOH. BAVHINVS, suis additis testatur, ipsi non ignotas fuisse spathas gemmiferas. Frustrificatio negotium non clare interim, ex omnibus hisce intelligitur.

§. XIV.

In figuris ordinandis veteres botanici non admodum felices sunt. DODONAEVS *l. c.* duas exhibet cum et sine floribus cujus posterior tolerabilior est, prior enim radices filiformes et multifidas ad finem depingit, cum tamen sint integrae, ac non divisae. Petioli florales nimis hic longi sunt, dimidio ut plurimum foliis breviores, neque flos tam proxime forcipulae adhaeret, sed per tres pollices distat. Figura IOH. BAVHINI est eadem cum hac secunda DODONAEI, imo rudior et a naturali conditione magis abludens. Et cum inter recentiores nullum inveniam quantum memini, qui icone hujus plantae, hos meos praesentes conatus irritos fecerit et praeripuerit, grato ut spero animo, novam et e typo naturae, ad amissim respondentem, figuram botanophili suscipient, cujus itaque explicationem sequentibus subjungo.

- a. a. *Planta integra quousque aquis communiter immersa invenitur.*
- b. b. *Flores plantae cum suis pedunculis et spathis.*
- c. d. *Flos in magnitudine naturali a parte prona et supina.*
- e. *Floris petala.*
- f. *Floris calyx.*
- g. *Spatha floralis clausa.*

- h. *Spatha floralis aperta* (g) *conniventibus loculamentis vesiculosis, minoribus, pellucidis, tenuissimis.*
- i. *Granula semina vel germina repraesentantia.*
- l. m. *Germina* (i) *ipsa aperta et per microscopium visa.*
- n. *Fructus ex spatha hianthe* (h) *propendens.*
- o. *Cellula fructus aperti situm seminum manifestans.*
- p. *Semen unicum naturali magnitudine.*
- q. *Spatha gemmipara, floralis* (h) *minor, pusillam plantam recondens.*
- r. *Eadem superne connivens et folia explicans.*
- s. *Eadem magis adhuc ad similitudinem adultae plantae accedens.*

§. XV.

Tandem ne quid intactum relinquam, quod hujus esset tractationis, quosdam exoticarum plantarum scriptores evolvi, eo scilicet fine, ut similem cum praesenti vegetabili plantam alicubi reperirem, talem etiam quoad habitum foliorum et fructum spataceum inveni, apud PISONEM *Hist. nat. utr. Indiae. Amst. 1658. p. 192.* quam *caraguatam* vocat, sed floris structura, crescendi modo, virtutibusque medicis adeo differt, ut neutiquam pro planta congenere habenda sit. Neque stratiotes Aegypti ab ALPINO *de plant. Aegypti* 41. descriptus cum aloide nostra, ullam convenientiam habet, foliorum rosulis, carnosiss, crassis et rotundatis, maxime discrepans. Primi etiam nominis Botanicus Cel. LINNAEVS in *Horto Malabarico T. XI. p. 95. T. 46.* plantam invenit, quam non dubitavit stratio-

stratiotis generi in *Flora Zeilanica*, sub nomine stratiotis foliis cordatis, inferere, sed quum undecimum splendidi hujus operis tomum nondum possideam, et characterem genericum ad examen haud revocare possim, rem ipsam in medio relinquo.

§. XVI.

De usibus medicis steriles sunt materiae medicae, scriptores, neque enim multas vires possidere pollicetur, insipida et aquosa planta. Analysin ejus chemicam a quopiam institutam esse ignoro, sed analogia suadet, ipsam pariter, ut portulacae, sedi non acris species, antiphlogisticis et refrigerantibus pollere viribus, nisi forsan floris structura obstet, quorum qui ad *polyandria* pertinent, *Celeber*. LINNAEVS plerosque venenatos esse designat. DIOSCORIDES quidem *l. c.* de suo testatur stratiote, „folia „refrigerare, sanguinem qui defluit a renibus sistere, vul- „nera quae inflammationes minantur, ab intumescencia „praecavere. Idemque propemodum iisdem verbis tradit AETIVS *Tetrab. III. S. III. c. 2.* apud STEPHANVM p. 545. „sistit vero sanguinis ex renibus eruptio- „nes stratiotae aquae innascentis succus potatus: nec non DODONAEVS *l. c.* „erysipelati et oedemati impositum „prodest, et LOBELIVS *l. c.* 334. „huic temperamen- „tum est potamogetonis siccandi et refrigerandi, unde fa- „cultas ejus contrariatur millefolio etc. Sed miror hos omnes auctores coeco quodam impetu, et culpanda reverentia erga DIOSCORIDEM omnes hasce vires tribuere aloidi, quas venerandae antiquitatis scriptor suo stratioti tribuit, cum tamen sub judice lis sit, quae sit planta DIOSCORIDIS. Denique apud AETIVM *Tetr. II. S. IV.* collyrii stratiotae, et apud MARCELLVM collyrii stratiotici psorici, STEPHANI *collectionis* p. 234. mentio fit, sed quaenam hujus denominationis ratio sit, cum utram-

que compositionnem non ingrediatur stratiotes, penitus ignoro.

§. XVII.

Colophonis loco de usibus mechanicis et oeconomicis haec paucula subjungo. Scribunt LOBELIVS, DODONAEVS, RAIVS circumforaneos et agyras, radicumaloidis filiculas immittere phyalis aqua plenis, quo majores spectentur, quas mulierculis ostentatas impudenter mentiuntur vermes esse, quos medicamentis suis ex intestinis eduxerint. Hic locorum homines, qui pecora et jumenta faginant, folia hujus plantae conquirunt, et porcis objiunt, qui inde faginantur. Nostrates etiam piscatores affirmarunt mihi, se toties vidisse, anguillas exuvias veteres deposituras, has ingredi plantas, et scabram cutim ad aculeos foliorum vulnerare, ut tanto promitius cadat. Quod reliquum est non despero plures forte usus medicos et oeconomicos perspecta magis plantae natura innotescere posse, sed a pluribus abstineo, ne in objecto haecenus vili et vix aliqua commentatione digno habito, nimium dixisse videar, optatum laboris pretium affatim reportaturus, si intellexero, qualescunque has meas observatiunculas Publico penitus non displicuisse.

T A N T V M.