W. G. FARLOW.

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
BHL-SIL-FEDLINK

<https://archive.org/details/sverigesatligaoc1861frie>

SVERIGES

ÄTLIGA OCH GIFTIGA SVAMPAR

tecknade efter naturen

under ledning af

E. FRIES

utöfna af

Kongl. Wetenskaps. Akademien.

*This is a copy of the original manuscript
and is found at the original.*

Stockholm. Lith. och tr. hos A. J. Salomon.

F. 11. 11.

SVERIGES

ÄTLIGA OCH GIFTIGA SVAMPAR

tecknade efter naturen

under ledning af

E. FRIES

utgifna af

Kongl. Vetenskaps-Akademien.

STOCKHOLM, 1861.
P. A. NORSTEDT & SÖNER,
Kongl. Boktryckare.

111260

Collection of seeds 10p. p45-1-1860.

11-15 " 1-17 1861

2. 15-20 " 18-19 1861

4 21-24 " 27-30 1861

5. 25-28 " 36-41 1861

6. 29-30 " 42-43 1861

7 31-40 " 54-60 1861

8 41-42 " 61-62 1861

9 43-44 " 7-8 1861

10 45-46 " 9-10 1861

11 47-48 " 11-12 1861

12 49-50 " 13-14 1861

13 51-52 " 15-16 1861

14 53-54 " 17-18 1861

15 55-56 " 19-20 1861

Systematisk förteckning på de afbildade arterna.

1. Flugsvampar (<i>Amanita</i>).....	tabb. 1, 2, 74, 84.
2. Fjällskiflingar (<i>Lepiota</i>).....	» 3, 18.
3. Honungsskiflingen (<i>Armillaria</i>).....	» 36.
4. Musseroner (<i>Tricholoma</i>).....	» 9, 57.
5. Platt- och Tratt-skiflingar (<i>Clitocybe</i>).....	» 45, 85, 86.
6. Stoeckskiflingar (<i>Pleurotus</i>).....	» 37, 46.
7. Mjölkskiflingar (<i>Clitopilus</i>).....	» 19, 20.
8. Tofsskiflingar (<i>Pholiota</i>).....	» 47.
9. Fränskiflingar (<i>Hebeloma</i>).....	» 64.
10. Champignoner (<i>Psalliota</i>).....	» 4, 5, 38, 39.
11. Bläcksvampar (<i>Coprinus</i>).....	» 87.
12. Spindelsvampar (<i>Cortinarius</i>).....	» 58.
13. Pluggsvampar (<i>Pasillus</i>).....	» 75.
14. Vaxskiflingar (<i>Hygrophorus</i>).....	» 30, 48, 65, 77.
15. Mjölkskiflingar (<i>Lactarius</i>).....	
a. Pepparlingar (<i>Piperites</i>).....	» 27, 28, 29, 60.
b. Riskau (<i>Dapetes</i>).....	» 6.
c. Brötlingar (<i>Russulares</i>).....	» 10, 11, 61, 78.
16. Kremlor (<i>Russula</i>).....	» 21, 40, 49, 59, 63.
17. Chantareller (<i>Antharrelus</i>).....	» 7, 79.
18. Brosksvampar (<i>Marasmius</i>).....	» 31, 32.

19. Rörsooppar (<i>Boletus</i>).....	
a. med ockragult fröstoff.....	
1. Klubbiga (<i>Versipelles</i>).....	tabb. 22, 23, 50, 67, 76.
2. Luddiga (<i>Subtomentosi</i>).....	» 66, 68, 69.
3. Giftiga (<i>Luridi</i>).....	» 12, 41.
4. Läckra (<i>Ehules</i>).....	» 13, 42, 43, 51.
b. med rostfärgadt fröstoff.....	» 14.
c. med rosenfärgadt fröstoff.....	» 52.
d. med hvitt fröstoff.....	» 80.
20. Tickor (<i>Polyporus</i>).....	» 8, 24, 44, 53, 62, 88.
21. Träfrätare (<i>Merulius</i>).....	» 70.
22. Oxtungsvampen (<i>Fistulina</i>).....	» 25.
23. Taggsvampar (<i>Hyalum</i>).....	
a. på jorden växande, med fot.....	» 15, 33, 81, 89, 90.
b. på träd växande, utan fot.....	» 16, 34, 71.
24. Trumpetsvampar (<i>Craterellus</i>).....	» 91.
25. Blomkålsvampen (<i>Sparassia</i>).....	» 17.
26. Fingersvampar (<i>Clavaria</i>).....	» 26, 35, 92.
27. Röksvampar (<i>Lycoperdon</i>).....	» 72, 73.
28. Murklor (<i>Morchella</i>).....	» 54.
29. Stenmurklor (<i>Gyromitra</i>).....	» 55, 82.
30. Möss-svampar (<i>Hebelia</i>).....	» 83.
31. Disksvampar (<i>Dicinia</i>).....	» 56.
32. Tryffel (<i>Terfezia</i>).....	» 93.

Svenskt Namn-Register.

Blomkålsvampen, Kruksiga.....	sid. 15, tab. 17.
Bläcksvampen, Allmänna.....	» 50.
Fjälliga.....	» 50, » 87.
Brosksvampen, Lök.....	» 22, » 32.
Milda.....	» 22, » 31.
Brötlingen, Bleka.....	» 37, » 61.
Braudgula.....	» 46, » 78.
Giftiga.....	» 12, » 11.
Milda.....	» 11, » 10.
Champignonen, Allmänna.....	» 8, » 4.
Läckra.....	» 26, » 39.
Praktiga.....	» 25, » 38.
Akta.....	» 9, » 5.
Chantarellen, Braudgula (Falska).....	» 46, » 79.
Ätliga.....	» 10, » 7.
Disksvampen, Breda.....	» 35, » 56.
Fingersvampen, Druf.....	» 24, » 35.
Fruasade.....	» 53, » 92.
Höggula.....	» 19, » 26.
Koral.....	» 53, » 92.
Fjällskiflingen, Fruasiga.....	» 15.
Milda.....	» 15, » 18.
Stolta.....	» 8, » 3.
Flugsvampen, Allmänna.....	» 7, » 1.
Fläckiga.....	» 7.
Gråa.....	» 49.
Offäckade.....	» 7, » 2.
Rödande.....	» 44, » 74.
Stinkande.....	» 49, » 84.
Stora.....	» 49.
Vår.....	» 49.
Fränskiflingen, Allmänna.....	» 39, » 64.
Hofsvampen = Läckra Musseroner.....	
Honungsskiflingen.....	» 24, » 36.
Kremlo, Blodröda.....	» 31.
Brokiga.....	» 38.
Gröna.....	» 38.
Milda.....	» 36, » 59.

Kremlan, Mörkröda.....	sid. 31, tab. 49.
Skarpa.....	» 17, » 21.
Stinkande.....	» 26, » 40.
Ätliga.....	» 17.
Ätliga.....	» 38, » 63.
Lökugalsvampen = Lökbrosksvampen.	
Mjölkskiflingen, se Brötling, Pepparling, Riska!	
Mjölkskiflingen, Gråhvita.....	» 16, » 19.
Gulhvita.....	» 16, » 20.
Murklan, Allmänna.....	» 33, » 54.
Läckra.....	» 34.
Uppblåsta.....	» 34.
Musseronen, Falska.....	» 11.
Höst.....	» 35, » 57.
Läckra.....	» 11, » 9.
Svafvelfärgade.....	» 11.
Sår.....	» 11.
Möss-Svampen, Biskops-M.....	» 48, » 83.
Nagelskiflingen.....	» 32.
Oxtungsvampen, Allmänna.....	» 19, » 25.
Pepparlingen, Bistra.....	» 37, » 60.
Gropiga.....	» 20.
Lulna.....	» 20.
Rödande.....	» 21, » 29.
Skarpa.....	» 20, » 27.
Skägga.....	» 20, » 28.
Ätliga.....	» 37.
Plattskiflingen, Pudrade.....	» 29, » 45.
Välluktande.....	» 49, » 85.
Pluggsvampen, Allmänna.....	» 44, » 75.
Riskau, Allmänna.....	» 9, » 6.
Falska = Skägga Pepparlingen.....	
Röksvampar: Allmänna (kärngröken).....	» 43, » 72.
Föränderliga.....	» 43, » 73.
Stora.....	» 43.
Rörsooppen, Bittra.....	» 32, » 52.
Bländande.....	» 47, » 80.
Bruna.....	» 31, » 50.

Rörsoppen, Finludna	sid. 32, tab. 51.	Taggsvampen, Dubbeltandade	sid. 42, tab. 71.
<i>Flockiga</i>	» 41, » 66.	<i>Pjälliga</i>	» 23, » 83.
<i>Frånliga</i>	» 40, » 66.	<i>Fransade</i>	» 42, » 71.
<i>Gryniga</i>	» 18, » 23.	<i>Gyttrade</i>	» 14, » 16.
<i>Höggula</i>	» 45, » 76.	<i>Korall-</i>	» 23, » 34.
<i>Ludna</i>	» 41.	<i>Sista</i>	» 47, » 81.
<i>Läckra</i>	» 27, » 42.	Tiekan, <i>Björk-</i>	» 51.
<i>Lömska</i>	» 12, » 12.	<i>Eld-</i>	» 38.
<i>Mörkgula</i>	» 17, » 22.	<i>Fär-</i>	» 10, » 8.
<i>Purpurfärgade</i>	» 27, » 41.	<i>Fnösk-</i>	» 37, » 62.
<i>Skarpa</i>	» 40, » 67.	<i>Jätte-</i>	» 28.
<i>Sköna</i>	» 41, » 69.	<i>Rutiga</i>	» 33, » 53.
<i>Snylt-</i>	» 40.	<i>Svafvelgula</i>	» 51, » 88.
<i>Sträva</i>	» 13, » 14.	<i>Talk-</i>	» 38.
<i>Tidiga</i>	» 28, » 43.	<i>Tufviga</i>	» 18, » 24.
<i>Tjocka</i>	» 41, » 68.	<i>Uplattade</i>	» 58.
<i>Ätliga</i>	» 13, » 13.	<i>Yppiga</i>	» 28, » 44.
Safts kifling = Skarlakansröda m. fl. Vaxskiflingen.		Tofsskiflingen, Föränderliga	» 30, » 47.
Snäcks vampen = Allmänna Stocks kiflingen.		Tratts kiflingen, Jätte-	» 50, » 86.
Spindels vampen, Blå	» 36, » 58.	<i>Stora</i>	» 50.
Stenmurklan, Allmänna	» 48, » 82.	Trumpets vampen, Klubblika	» 52, » 31.
<i>Lilla</i>	» 34, » 55.	Tryffeln, Hvita	» 53, » 93.
Stocks kiflingen, Allmänna	» 29, » 46.	Träfrätaren, Allmänna	» 42, » 70.
<i>Runda</i>	» 25, » 37.	Vaxskiflingen, Bleka	» 39, » 48.
"Svamp i hus" = Allmänna Träfrätaren.		Rodnande	» 30, » 65.
Taggs vampen, Bleka	» 14, » 15.	Skarlakansröda	» 45, » 77.
Brandgula	» 52, » 90.	Ängs	» 21, » 30.
Bräckliga	» 51, » 89.		

Register öfver de afbildade arternas Latinska namn.

Agaricus arvensis	tab. 4.	Boletus luridus	tab. 12.	Hygrophorus pratensis	tab. 30.
augustus	» 38.	pachypus	» 68.	panicus	» 77.
campestris	» 5.	piperatus	» 67.	Lactarius controversus	» 29.
cretaceus	» 39.	purpurascens	» 41.	deliciosus	» 6.
crustuliniformis	» 64.	scaber	» 14.	mitissimus	» 78.
excoriatus	» 18.	vaccinus	» 51.	pallidus	» 61.
gambosus	» 9.	variegatus	» 66.	piperatus	» 27.
giganteus	» 86.	Cantharellus aurantiacus	» 79.	rufus	» 11.
melleus	» 36.	cibarius	» 7.	terminosus	» 28.
muscarius	» 1.	Clavaria Botrytes	» 35.	turnipis	» 60.
mutabilis	» 47.	coralloides	» 92.	volemus	» 10.
nebularis	» 45.	cristata	» 92.	Lycoperdon Bovista	» 72.
odorosus	» 85.	flava	» 26.	excipuliforme	» 73.
Orcella	» 20.	Coprinus comatus	» 87.	gemmatum	» 73.
ostreatus	» 46.	Cortinarius violaceus	» 58.	Marasmius Orades	» 31.
personatus	» 57.	Craterellus clavatus	» 91.	scorodonius	» 32.
phalloides	» 2.	Discina perlata	» 56.	Merulius lacrimans	» 70.
procerus	» 3.	Fistulina hepatica	» 25.	Morchella esculenta	» 54.
Prunulus	» 19.	Gyromitra cortipes	» 55.	Paxillus involutus	» 75.
rubescens	» 74.	esculenta	» 82.	Polyporus confusus	» 24.
ulmarius	» 37.	Helvella Infula	» 83.	fomentarius	» 62.
virens	» 84.	Hydnum cirrhatum	» 71.	frondosus	» 41.
Boletus aestivalis	» 43.	coralloides	» 34.	ovinus	» 8.
badius	» 50.	corrugatum	» 16.	subsquamosus	» 53.
calopus	» 69.	diversidens	» 71.	sulfureus	» 88.
cyaneus	» 80.	fragile	» 89.	Russula emetica	» 21.
edulis	» 13.	imbricatum	» 33.	foetens	» 40.
elegans	» 76.	levigatum	» 81.	lepida	» 52.
felleus	» 52.	politum	» 90.	rubra	» 49.
granulatus	» 23.	repandum	» 15.	vesca	» 63.
impolitus	» 42.	Hygrophorus erubescens	» 65.	Sparassis crispa	» 17.
luteus	» 22.	penarius	» 48.	Terfezia Leonis	» 93.

INLEDNING.

§ 1.

Från äldsta tider hafva bland de flesta Europeiska folk svamparne blifvit räknade icke blott bland närande födoämnen, utan äfven till läckerheter. Redan af Grekiska och Romerska författare omtalas de som en allmänt begagnad och eftersökt spis¹⁾. Så är förhållandet ännu i södra och östra delarne af Europa, der de icke blott värderas som en läckerhet på de rikares bord, utan äfven i stora landsträckor af de fattigare folkklasserna begärligt uppsökas som ett sundt och födande näringsmedel. I Ungern och alla af den Slaviska folkstammen bebodda Europeiska länder utgöra de nästan en daglig spis; det gifves trakter, f. ex. i Böhmen och flerstädes, der de en stor del af året äro de fattigare folkklassernas nästan enda föda. »Den, som genomvandrar en stor del af våra landsbygd», säger BULLIARD om Frankrike, »och uppsöker de fattigas hyddor, skall finna, att dessa till lön för sitt mödosamma arbete endast lefva af ett uselt bröd, hvilket de dela med sina barn, jemte det de under flera månader förtäro en fast otrolig mängd af svampar — och likväl äro dessa de friskaste och starkaste bland dessa landskaps inbyggare.» Att de för Ryssarne, hvilka icke äro kända för bristande fysisk styrka, äro en begärlig spis, är allmänt bekant; enligt BUXBAUMS uppgift skola desse, utom den årstid svamparne växa, under fastlagstiden hufvudsakligen lefva af insaltade svampar — och nämnde författares uppgift, att man utan åtskillnad begagnar äfven annorstädes för giftiga ansedda arter, bestyrkes äfven af PALLAS.

Deremot synes detta födoämne ursprungligen varit försämdt af de egentligen Germaniska folken. Af dessa finner man svampar endast använda der de antingen lärt deras begagnande af andra folkstammar, som förut bebott de länder, i hvilka de sjelfva invandrat, eller och der de blifvit upplandade med invandrande Slaviska folk. I Skandinavien, England och vissa delar af Tyskland är deras bruk af de lägre folkklasserna, om icke alldeles okänt, nästan afskydt; endast vissa läckrare arter förekomma på de förnämares bord. Anmärkas bör härvid, att flera af de från äldsta tider som synerliga läckerheter ansedde, såsom »*Kaiserlingo*» (*Agaricus Amanita caesareus*²⁾), flera arter af *Truffel* m. fl., saknas i denna region (först i senaste åren är en art *Tryffel* sparsamt funnen i Sverige). Men vi ega deremot öfverflödigt förråd af många ganska smakliga, deribland flera, som saknas i de sydliga länderna. De, som hos oss användas på bättre bord, köpas vanligen dyrt betalda utifrån, ehuru de hos oss finnas växande i större mängd än i de länder, hvarifrån de hemtas. Just den omständigheten, att en eljest i arktiska och subarktiska länderna

njogg natur begäfvat dem med rikligare förråd af ättiga svampar, än andra länder, synes antyda den vikt, naturen sjelf lagt på dessa nu förkastade växter i vårt land. Vi kunna icke underlåta fästa uppmärksamheten på det besynnerliga förhållandet, att man i ett torftigt land nästan alls icke använder ett näringsmedel, som naturen sjelf anvisar och nästan slösar med, då detsamma sorgfälligt insamlas och begagnas i för öfrigt rikare länder, der naturen är mindre frikostig i dess frambringande. Man torde likväl finna det öfverdrifvet, kanske löjligt, då vi på fullt allvar påstå, att världsölandet af ett så smaktigt, födande, rikligt förekommande näringsmedel är en stor ärlig stats-ekonomisk förlust.

§ 2.

Att flera svamparter kunna ätas och äro ganska födande, är en genom årtusendens och hela nationers erfarenhet så bestyrkt sanning, att derom väl icke tvifvel kan uppstå. Vigtigare är likväl den frågan: utgåro de dock någon sund föda? I de länder, der svamparne icke begagnas till födoämne, är en allmän folktrö, att alla svampar äro giftiga eller omöjliga kunna vara ett sundt näringsmedel. I de länder åter, der de användas till dagligt bruk, till och med uteslutande till föda en god del af året, hyllar man en motsatt åsigt; de anses icke blott för en sund, utan tillika för en särdeles kraftig spis. De författare, som förkasta svampar som näringsmedel, äro, så vidt vi känna, sådana, som aldrig smakat dem. Vi veta dessutom, att en mängd födoämnen af enskilda efter fördöm eller ovana från ungdomen förkastas, under det de af tusende dagligen utan olägenhet användas³⁾. Så var förhållandet med Potäterna; efter deras införande kunde den äldre generationen aldrig hvarken finna dem smakliga eller öfvertygas om deras oskadlighet (sjelfve LINNÉ delade denna fördöm!), under det den yngre och ännu mer efterkommande generationer i båda afscenden funno dem ovärdeliga. Alldeles samma erfarenhet har jag haft i frågan om svamp-spis; äldre personer utan större fördömsfrihet finna sig sällan dervid, då deremot de, hvilka som barn blifvit vaude dervid, anse dem samma som en högt värderad läckerhet. Den sundaste föda kan vid vissa tillfällen eller omättligt begagnad blifva skadlig; hvad en konstitution för sin diet finner högst välgörande, kan af en annan ej utan olägenhet förtäras, f. ex. Smultron. Vi tilltro oss icke i strängt vetenskaplig mening afgöra, hvarken om Potates eller Svampar som näringsmedel äro skadliga eller icke, men vi veta, att tusentals människor befunnit sig väl af båda, och förlita oss på vitsorden af personer, som jemte theoretiska insigter och praktisk erfarenhet i medicinen haft speciellt tillfälle att studera deras verk-

¹⁾ Huru högt de af Romarne voro uppskattade, vittnar följande epigram af Martialis:

*Argentum et aurum facile est laonanie toganque
mittere; Boletus mitlere difficile est.*

Sjelfve stoikern Cicero skall så högt värderat dem, att eu art, *Elebella Ciceronie*, efter honom fått sitt namn, — och traditionen förmåder icke, att han ätit sig sjuk af dessa, men väl af Malva på ett kalas.

²⁾ Deuna är de gamle Romares *Boletus*, deras förnämsta läckerhet, af en hekatat kejsrerlig gastronom kallad »*Cibus Decurionum*» (Guda-spis). Endast på de dyrbaraste kärl, *Boletaria*, kunde en så kostelig spis serveras, — och det måste varit endast en synerlig god vän, som dermed undfågades, då det hos Juvenalis heter:

*Vilbus ancipites Fungi ponuntur amicis,
Boletus domino,*

och en gäst hos Martialis beklagar sig:

*Cui mihi non eadem qua tibi coena datur?
Sunt tibi Boleti, fungos ego sumo Sinitos.*

Smaken var dock i Rom som annorstädes olika; Horatius satte Champignonen högst:

*— Pratensibus optima fungis
natura est, alius male creditur.*

Huru efterlängtd den gyllene svamptiden var, vittnar följande vers af Aquinas:

Et facient laetas optata tonitrua coenas!

Plinius, en prosaisk och välförståndig man, kunde icke gilla detta svampfrosseri, utan utropar:

»per voluptas tanta ancipitis cibi!»

³⁾ Skulle man nu de fattigare folkklassernas visthus vilja utmönstra allt, som efter strängaste dietetiska regler anses för hårdsmält föda, frukta vi, att dessa ofta skulle alldeles tömmas.

ningar som dagligt födoämne⁴⁾. Utom nedanför anförda yttrande af KROMBOLZ skola vi blott anförä intyg af tvenne utmärkte vetenskapsmän, som tala af egen erfarenhet. »På en resa», säger nu mera aflidne Professor SCHWÆGRICHEN, »som jag företog genom en del af Tyskland och Österrike, anmärkte jag först i trakten af Nürnberg, hvarest jag tillbragte en del af sommaren, att böndernas dagliga föda endast bestod af ett svart med anis och kummin kryddadt bröd, som förtärdes jemte råa svampar. Då jag den tiden sysselsatte mig med undersökning af de kryptogamiska växterna, så beslöt jag på mig själv göra försök öfver verkningarne af detta födoämne. Jag följde dessa raska laudtmäns exempel och vaude mig inom några veckor att intet annat förtära än råa svampar med bröd och att dricka friskt vatten. Långtifrån att deraf erfara minsta skadliga inflytande på min helse, kände jag i motsatt förhållande mina krafter stärkas till nya vaudringar. Jag har funnit, att svamparne, då de måttligt förtäras, äro ganska födande, men att de genom kokning förlora sin naturliga smak och en del af sina goda egenskaper.» Doctor LENZ gick ännu längre i försök på sig själv; under flera månader förtäro han endast svampar jemte friskt vatten, samt intygar, att han aldrig känt sig mera frisk och liflig till kropp och sinne, än just under denna tid, utau att deraf känna några obehagliga följder. Sjelfve, mer än vanligt känslige för hårdsmälta födoämnen, hafva vi aldrig känt någon olägenhet af svampars förtärande. Vunne Svenska folket denna öfvertygelse, skulle aldrig under den genom hungersnöd svåraste årstiden brist på födoämnen blifva kännbar. — Oparktheten fordrar likväl att äfven anförä motsatta åsigtter. »I Ryssland», säger GEORGI, »steker, bryner och förtär man svampar på alla möjliga sätt, och aldrig hör man af annat genom svampars ätande försäskadt ont än förderfvade mager.» Visserligen nog af; men härvid bör anmärkas, att dåliga mager lika ofta, om ej oftare, förekomma bland andra än Ryssar, äfveu bland dem, som aldrig smakat någon svamp; att han häufor följderna af bränvinets öfverfödiga bruk till svamparne; vidare att Ryssarne utan åtskilnad insamla och förtära erkänt giftiga arter; att dessa för att begagnas under fastlagstiden om hösten värdslost insaltas i stora fastager, der de undergå en förruttelse, som skulle göra hvilket födoämne som helst skadligt. PALLAS, som aflade sin från hemlandet, liksom af GEORGI, medförda fördom mot denna spis, har efter GEORGI afhandlat svamparnes vikt för Ryssarnes ekonomi.

§ 3.

Emot svamparnes användande som födoämnen anför man vanligen, att åtskilliga äro verkliga giftiga⁵⁾. Detta är ock en sanning, som vi anse lika nödvändig att inskärpa, som att ännu flera äro sunda och välsmakande. Derföre varna vi ock hvar och en att icke förtära andra arter, än man med full visshet känner såsom oskadliga. Det gifves verkligen långt flera goda och ätliga arter, än vi nedanför ämnat upptaga, utesluta just derföre, att de utan vandare öga lätt kunna förblandas med snarlika giftiga f. ex. bland Russule. Men detta förhållande bevisar lika litet emot de öfrigas goda egenskaper, som giftiga växter bland phanerogamerna emot de öfrigas användande. Förvechling af Palsternackor och Bolmört o. d. sker lättare än af ätliga och giftiga svampar och är fullt ut lika vådlig.

Just den stora uppmärksamhet, som olyckshändelser, vållade genom okunighet och bedrägeri vid giftiga i stället för ätliga arters insamlande, väcka i de länder, der de begagnas som vanligt födoämne, vittnar, att dessa äro mera sällsynta än förgiftningar genom bränvins missbruk hos oss. Huru många tusende familjer genom ätliga svampar endast uppehållit sitt lif, förtiger historien, men den känner noga namnen på dem, synnerligen högt uppsatte personer, som genom uppsätligen förgiftade svampprättar eller omåttligt förtärande deraf tillsatt lifvet⁶⁾. Att äfven genom misstag af giftiga arter flera olyckshändelser inträffat, alltifrån Euripidis maka och trenne barn intill våra dagar, är också visserligen sant, men detta bevisar endast, att försigtighet och eu säker kännedom af de arter, som användas, är af nöden. Från äldsta tider har man väl sökt uppgifva några alla-männas kännetecken, hvarigenom man skulle kunna skilja de ätliga från de giftiga, och ehuru dessa upprepas i snart sagt alla läroböcker, kunna vi försäkra, att de samtliga äro opålitliga. Vi afråda hvar och en att som födoämne begagna andra arter än dem, hvilka man af säker tradition eller ytterst noggrann vetenskaplig bestämning vet vara oskadliga. Man har således trott sig af yttre färgen kunna bestämma, hvilka som äro giftiga eller icke; men då hvarje allmänare art förekommer i snart sagt alla färgskiftningar, inses lätt, huru osäkert detta kännetecken är. Än mera vikt har man lagt på köttets, d. v. s. inre massans, färgvechling, då det blottas för luftens inverkan. Man har påstått detta vara ett säkert tecken till giftighet, men Giftiga Rössoppen, *Boletus luridus*, som ligger till grund för detta påstående, finnes äfven med oföränderlig färg hos köttet; andra utan minsta fara ätliga af samma släkte skifta lika mycket färg; till och med af Champignonen finnes en art, vars kött vid luftens beröring genast rodnar. Att de ätliga arterne skulle utmärka sig genom en angenäm eller ingen lukt, de giftiga åter med en oangenäm, eger i vissa fall sin riktighet; men lukten är något så subjectivt, att man omöjlig kan antaga den som säker ledare i en så viktig sak, och flera ganska giftiga f. ex. Flugsvampen hafva alldeles ingen lukt. Flera med eu ganska stark lukt af hvitlök berömmas som matkryddor, af vida finare och delikatere natur än vanlig lök. Bland de arter, som sprida en lukt lik den af nymalet mjöl, känner man likväl ingen skadlig. Att till föda begagna så stinkande arter som *Phallus impudicus*, *Agaricus Amanita virosa*, *Russula foetens* o. s. v. lärar väl icke falla någon med vanliga luktorganer in, men exempel saknas icke, att enskilda personer funnit deras lukt angenäm⁷⁾. Ännu mera subjectiv är smaken; som svamparnas skärpa är af en flyktig natur, äro flera, i friskt tillstånd ganska skarpa, f. ex. *Riskan* (*Lactarius deliciosus*), ansedda bland de bästa. De ätliga *Polypori* hafva isynnerhet unga en syrlig både lukt och smak, men intaga likväl ett utmärkt rum bland ätliga arter. Flugsvampen deremot har ingen ovanlig smak. Huru osäkra kännetecken på en arts giftighet en klibbig yta eller en ihålig fot äro, ehuru dessa från äldsta tider upprepas till och med af eu så berömd Toxicolog som ORFÈLE, vittna *Fistulina hepatica* och *Boletus luteus*, *Morchella* och *Lactarius deliciosus*. Att alla mjölksaftiga svampar skulle vara giftiga, har man endast slutat till af analogien med *Euphorbiaceer*, *Asclepiadeer* o. s. v.; flera af dessa, helst med en mild mjölk,

trots de från äldsta tider kända giftiga egenskaperna hos *Boletus luridus* genom förtärande af eu bland dess underarter rikade i lifsfara, bestyrker mer än försvagar hans erfarenhet om andra arters oskadlighet.

⁴⁾ Genom en på sin gemål Agrippinas anstiften förgiftad svampprätt förlorade Tiberius Claudius Cesar livet, hvarpå Martialis hänsyftar i följande strof: *Quid dignum tanto ventrique guleque precabor;*

Boletum, qualem Claudius edit, edat.

Prefekten för Neros Garde, Annæus Serenus, och vid samma tillfälle flera Tribuner och Centurioner, Pfäven Clemens VII, Konung Carl VI, Czar Alexis' efterkomande gemål hafva äfven dött af förgiftade eller giftiga svampar.

⁵⁾ Lektor ROTMANN, som först beskref *Phallus* som Svensk, säger att den luktar väl och liflig, som en Orchis.

⁴⁾ KROMBOLZ, f. d. Professor i Politia medica, sedermera i Praktiska Medicinen i Prag, således bland ett af de mest vapnande folk, vederlägger den ansettades gängse fördomen emot svamparne som födoämne: »Die Schwämme sind für den Menschen ein wichtiges, gesundes vegetabilisches Nahrungsmittel, welches vermöge mehrerer Sticksstoff-haltiger Bestandtheile der thierischen Substanz am nächsten ist, durch Pflanzin und Osmaum nährt und durch ein flüchtiges riechendes Princip, welches beim Kochen dem Wasser oder andern Flüssigkeiten sich leicht mittheilt, eine angenehme Würze der Speisen abgibt. — Der armen Volksklasse dient als sättigendes, ergebüges, gesundes Nahrungsmittel in rohen und zubereiteten, frischen und getrockneten Zustände eine Menge Arten von Schwämmen.

⁵⁾ Att Dr LENZ under sina många försök med förit oförsökta arter och

kunna förtäras råa utan all fara. Frånvaro af injöksaft utvisar än mindre oskadlighet. De kännetecken mau till en arts åtlighet och giftighet velat finna i närvaro eller saknad af hylle, ring, lökformig fot o. s. v. sakna all giltighet. Mer sanning ligger till grund för den uppgiften, att de åtliga äga ett fast kött, de giftiga ett löst eller rättare vesiculöst kött; att de åtliga blifva genom kokning mjukare, de skadliga åter hårdare (*onoxii fungi*, qui in coquendo duriores Plinius), men som allmän regel gäller det visst icke; flera giftiga, åtminstone med skäl misstänkta, äga ett ganska fast kött och genom ägghvit-ämnets stelning blifva *Riskor* m. fl. under kokning fastare. Uppgiften, att de ntan våda kunna förtäras, som man finner anfrätta af sniglar och insekt-larver, är rent af falsk; flera af de sundaste, f. ex. *Chantarelle*, *Oxtungsvampen* (*Fistulina*), finner man aldrig angripna af insekt-larver, och af dem angripna exemplar böra alltid förkastas*). Detta gäller och om hvarje svampart, när den börjar öfvergå till förruttelse, att sönderflyta, och ogera begagnar man sig af sådana, som växa på sumpiga eller för solljuset aldeles otillgängliga ställen²⁾. Vi skola i det följande närmare utveckla detta ämne, då vi komma att afhandla de försigtighetsmått, som äro nödvändiga vid svampars insamlande.

§ 4.

Oaktadt svamparne utgjort föremål för många kemiska undersökningar, hafva likväl derigenom icke några särdeles upplysande resultat blifvit ännu lagda i dagen. Redan omkring år 1805 angaf BRACCONOT, att de mera allmänna uti svamparne förekommande kemiska beståndsdelar utgjordes af ett eget kristalliniskt fett, en smörartad olja, ett albuminartadt ämne, svampsocker, svampsyra, boletsyra, fungin, ett qväfhaltigt, i vatten och alkohol lösligt ämne, ett annat qväfhaltigt, men i alkohol olösligt och i vatten lösligt ämne, ättiksyra, gummi, växtslem, vatten, fosforsyra, svafvelsyra, saltsyra, ammoniak, kali, natron och kalk.

Emedlertid hafva sednare kemisters undersökningar för ingen del bekräftat flera af dessa ämnen och särdeles just dem, hvilka man länge ansåg såsom egendommiga för svamparne. Sålunda har man nu visat, att den såkallade *fungin* icke är annat än cellulosa, som ett förenadt af ett qväfhaltigt och svafvelhaltigt ämne, hvarifrån det dock är svårt att fullkomligt befria den, likasom det ännu ej lyckats att isolera det qväfhaltiga ämnet för sig och framställa det i rent skick. Att svampsockret är identiskt med den i mannans förekommande sockerarten, som fått namn af mannit, är genom LIEBIGS och PELOUZES undersökningar ådagalagd, likasom BOLLEY 1853 gjort mer än sannolikt, att boletsyran är identisk med den inom andra växter förekommande fumarsyran. DESSAIGNES har åter 1855 meddelat, att den såkallade svampsyran icke är annat än en blandning af äplesyra, citronsyra och fosforsyra.

Svamparne förlora betydligt i vikt vid torkning, hvarvid endast omkring $\frac{1}{10}$ af deras ursprungliga vikt återstår. Nästan alla svampar inne-

hålla, enligt SCHLOSSBERGER och DÖPPING (1846), jäsbart socker förutom den sockerart, mannit, hvilken icke kan försättas i jäsning medelst jäst. Till följe af deras betydliga qväfvehalt, som för Champignonen, enligt LEFORT, uppgår till nära 3 procent af den vid 100° torkade svampens vikt³⁾, äro svamparne att anse såsom varande ibland de mest närande af växt-rikets alster.

Att uppräknade de olika kemiska ämnen, hvilka af skiljaktiga kemister blifvit i särskilda svampar iaktagna, vore att fördjupa sig uti onödiga vidlytigheter, särdeles som en del af dessa ämnen äro ganska problematiska. Förutom de nti det föregående omnämnda olika ämnen, ause vi oss likväl böra anföra, att man såsom beståndsdelar uti svamp funnit stärkelse, harz, vax, agaricin (ett valrathlikt fett), qväfhaltigt slem, oxalsyra, hvartill slutligen må läggas LETELLIERS iakttagelse 1830 af ett i flugsvampen förekommande eget giftigt ämne, som han kallade amanitin. Emedlertid har APAIGER 1851 angifvit, att det uti flugsvampen icke är LETELLIERS amanitin, som karakteriseras af temligen indifferent kemiska egenskaper, hvilken är orsaken till flugsvampens giftighet, utan att det är en egen deruti befintlig syra, muscarsyra, hvilken är giftig. Dessutom har APAIGER angifvit, att en egen organisk alkaloid skall i flugsvampen finnas för handen.

SCHÖNBEIN har iakttagit ett märkvärdigt förhållande, som tillkommer vissa svampar, särdeles *Boletus luridus* och *Agaricus sanguineus*. Han fann nemligen, att dessa svampar innehålla ett eget uti alkohol lösligt ämne, som förhåller sig lika med guajaktinktur emot ozon och deraf färgas blå, under det att den af nämnde svampar utpräddade saften innehåller ett ämne, som förvandlar luftens inactiva syre nti ozon och dervid binder denna ozon.

Den giftiga principen hos en del svampar har man ännu icke lyckats att kemiskt ren eller isolerad afsondra och undersöka. Allt efter olika arter verka giftiga svampar invärdes dels som drastiska, dels som döfvande och narkotiskt skarpa gifter. Efter förtärande af de förra följa häftiga magplågor, törst, kräkningar, ständiga stolträngningar, uppsväldt underliv o. s. v., hvilka plågor i värsta fall eller då hjälp ej tillkommer slutas med inflammation och döden. De mera narkotiska svampgifterna förorsaka allmän matthet, sömnsjuka, yrsel, darning i lederna, kramp, fänighet o. s. v. hvilka symptomter likväl upphöra, sedan det narkotiska ämnet blifvit afledt ur kroppen. Så verka de giftiga flugsvamparne⁴⁾ (Amanite); Russula åter och de giftiga *Mjölksvamparne* (Lactarii) verka mer som drastiskt skarpa ämnen⁵⁾. Det är af vikt att känna de mest bepröfvade medel emot giftiga svampar, i fall någon genom okunnighet eller vårdslöshet förtärt dylika och deraf erfar några obehagliga eller farliga symptomter. Naturligtvis är tillkallande af läkare det medel, som alltid bör begagnas, när tillgång till sådan finnes, men som fara åtföljer minsta dröjsmål, så bör man ihågkomma, att hälfvandet af det onda beror helt och hållet på att,

¹⁾ Lika litet som man genom yttre sinnen kan i allmänhet afgöra en svamps större eller mindre användbarhet till födoämne, lika osäkra äro ock de kemiska reagentia, man der till hithills föreslagit. Som dessa dessutom icke lära begagnas af allmänheten, förbigå vi dem. Det har varit en allmän tro, att de giftiga arterna genom torkning skulle förlora sina skadliga egenskaper, men KROMBOLZ har funnit, att flugsvampen torkad och pulveriserad är lika giftig som färsk.

²⁾ De äldste skriftställare öfver åtliga svampar, såsom ARTHAUS, PLINIVS och alla dessus *Commentatorer* ända till Clusii tid, hvilka utan bestämd terminologi icke kunde beskriva en art så, att den derigenom skildes från andra, hade synnerligt vikt vid, uppå och inunder hvilka trädslag en svamp växte. De som växte på Poplar o. s. v. ansågos för de bästa, deremot för förkastliga de som insamlades på Fikonträd, Olivträd, Bok, Cypress o. s. v. Numera inser man, att de dervid haft afseende på något viss i S. Europa förekommande art, som vanligen icke finnes hos oss (ty de som växa på träd hafva var uskränkt utbredning, än de som växa på jorden) och att växistället ringa eller intet in-

flytande har på hvarje arts egenskaper. — Hvad verkan olika klimateriska förhållanden kunna äga på samma art, är ännu outredt, ehuru man velat antaga, dels af analogi med de fullkomligare växterna, dels af det kända faktum, att Ryssarne utan fara äta sådana arter, som i S. Europa anses för giftiga, ja dödande, att de i de kallare länderna skulle förlora sina giftiga egenskaper. Vore detta påstående fullt tillförlitligt, så vore det en fördel för oss i Norden.

³⁾ SCHLOSSBERGER och DÖPPING angifva, att vissa svampar hålla ända till 7 procent qväfve af den torkade massans vikt.

⁴⁾ Hvad derför Opium, som berusande medel, är för Orientens folk, är flugsvampen för Kamtschkatlarne. De bereda af denna art en rusgivande dryck, som bibehåller denna egenskap äfven sedan den passerat genom människokroppen — och skall efter denna ovaliga destillations-process äfno begagnas af de fattigare. Utöfeligare underrättelser härom lemnar LANGSDORFF i sin resa kring jorden.

⁵⁾ I Toxicologiska arbeten, f. ex. ORFILA, finnes detta utöfeligare och mera vetenskapligt afhandlad än här kan vara vår afsigt.

så hastigt som möjligt, afsondra giften ur kroppen. Kräkmedel¹²⁾ äro derföre det hufvudsakligaste botmedlet; ofta infinner sig kräkning af sjelfva giften, hvilken påskyndats och underhålls genom ymnig dryck af ljumt, helst med feta ämnen blandadt, vatten och mekanisk retning i svalget f. ex. med en pennfjäder. I flera fall är kräkmedel tillräckligt, men för större säkerhet förenar man kräkmedel med afförande¹⁴⁾ (emetico-cathartica), och då giftets verkningar först erfaras efter 10—12 timmar, föredrager man afförande medel¹⁵⁾. Förr än allt giften blifvit uttömdt, må icke ättika, koksalts-lösning, svafvel-ether och syrliga safter gifvas, emedan dessa endast frigöra det giftiga ämnet och förvärra det onda. Koloquint och andra drastiska medel anses äfven skadliga.

§ 5.

Alla dessa faror kunna lätt undgås, om nedaunnämnda försighets-mått iakttagas:

1. Är det nödvändigt att med full säkerhet urskilja de ätliga arterna. Endast beskrifningar kunna icke för en större allmänhet vara tillfylligstgörande; blott i förening med trogna, färglagda figurer är detta möjligt. Men som en del arter utan speciell botanisk kännedom lätt kunna förväxlas, hafva vi ansett oss heldre höra utesluta dem i följande arbete än upptaga något, som hos mindre uppmärksamma kunde leda till misstag. Utomdessa skola vi vid hvarje art uppgifva, om några finnas, hvarmed den kan förväxlas och emellan dem uppgifva bestämda skiljemärken. Men ännu viktigare är att känna alla verkligen giftiga arter, och derföre hafva vi ansett lika nödigt att af dessa lemna figurer, som af de ätliga.

2. Böra de insamlas i klart och torrt väder, dels derföre, att de då äro smakligare (mindre vattenhaltiga), dels lättare förvaras. De böra afskäras med knif och icke uppreckas med händerna, hvarigenom jord och smuts gerna medföljer. De stånd böra helst väljas, som äro nyss utvecklade, dels såsom smakligare, dels derföre att äldre ofta äro angripna af maskar (insekt-larver); sådana förkastas alltid.

3. Före användandet bortrensas hos de större hattsvamparne fröednings-lagret på under sidan, då det utbildats till tunna skivor, pipor, taggar, äfvensom hattens öfverhud, då denna är klibbig och lätt lossnar, såsom hos *Gula Rörroppen* (*Boletus luteus*). De sköljas derefter i vatten eller, om man i tvifvelaktiga fall för större säkerhet vill, uppkokas först med salt i vatten, som hortslas, och sköljas sedan, ehuru de derigenom förlora en del af sin smak. Att skölja eller uppkoka dem i ättika är ett osvikligt medel (redan omtaladt af *ATHENÆUS* och *PLINIUS*), ty äfven de giftigaste uppgifvas derigenom blifva oskadliga, men ättikan, hvarmed de behandlas, blir ganska giftig — ehuru detta med arter, som man säkert känner, är en öfverdrifven försigtighet.

4. Anrättningar af svampar böra icke eu längre tid eller öfver dygnet förvaras, emedan de derunder möjligen kunna undergå någon jäsningsprocess. Den, som icke är van vid denna spis, torde också för yttermera säkerhet först försöka med en mindre portion, om den bekommer väl.

Man kan äfven torka svampar och således förvara dem hela året om. Torkningen sker antingen på ett torrt ställe eller lättast i en bakugn, som dock ej bör vara för mycket upphetad. Smärre svampar, såsom *Murklor*,

Negligsvampen (*Marasmius oreades*), *Lökessvampen* (*Marasmius scorodionis*) torkas hela, större åter, såsom *Rörropp-arterna* (*Boleti*) skurna i skivor. De förvaras sedan på torrt, luftigt ställe. För den finare matlagningen insyltas de, hvilket äfven hos oss är allmänt brukligt med *Champignoner*; i stort insaltas de till vintern, hvilket är brukliga sättet bland folket, der de i stort begagnas.

§ 6.

Sätten att anrätta svampar äro mångfaldiga, dels efter deras olika art, dels efter särskilda nationer och personers smak¹⁶⁾. Flera arter kunna ätas alldeles färska och oberedda, liksom trädfrukter. Personer, som blifvit vana dervid, föredraga detta sätt (liksom graf-lax) framför alla andra. Vi sjelfve och de som på vår uppmaning i detta tillstånd förtärt *Milda Brötlingen* (*Lactarius volemus*), *Förtickan* (*Polyporus ovius*), *Blomhållssvampen* (*Sparassis crispa*) och *Druftsavampen* (*Clavaria hotrytis*) m. fl., öfver hvilka alla mindre kända arter afbildningar i det följande skola lemnas, hafva funnit dem ganska välsmakliga. På samma sätt ätas i Tyskland m. fl. orter äfven *Champignoner*, *Chantareller* och synnerligast flera *Rörropp-arter*, såsom *Ätliga Rörroppen* (*B. edulis*). Vanligen rostas de likväl och stufvas bland köttreter eller och enbart. Äfven kokar man dem, men en del blifva derunder genom ägghvit-ämnets stelning sega. Många finna dem smakligast tillagade som sallat med peppar.

Vi skulle allt för långt fördjupa oss i kokkonstens finesser, om vi här ville beskifva alla konstlade och mera läckra anrättningar af svampar eller uppgifva alla saucer, frikasser m. m., hvaruti de i Frankrike och annorstädes ingå; man finner derom utförliga beskrifningar i alla tillständigare tyska och franska kokböcker. Det enklaste och hland fattigare folkklasserna vanligaste är att, sedan de blifvit rensade och skurna i tunna skivor, antingen utan all tillblandning eller och med tillsats af något smör och peppar, rosta dem öfver sakta eld¹⁷⁾. Äfven knådas de till en deg och bakas som bröd, eller och stufvas de, sedan de vattenaktiga delarne i en serviett blifvit utpressade, med något smör, salt, peppar och persilja. — En del smärre arter användas endast som kryddor för att gifva soppor och andra anrättningar en fin kryddsmak. Vi skola vid de särskilda arterna närmare utmärka deras användande.

Slutligen må anmärkas, att de verkligen giftiga arterna äro få, de ätliga flera, men det ojemförligt största antalet, äfven med uteslutande af alla de lägre klasserna, äro hvarken giftiga eller ätliga; men de äro osmakliga, eller af en så lös eller seg, ja trähård beskaffenhet, att de icke kunna som näringsmedel begagnas. Det är ett eget anmärkningsvärt förhållande, att alla grupper, som innehålla giftiga arter, tillika framvisa de bästa ätliga arter, då deremot de, som icke hafva några ätliga arter, tillika sakna giftiga, utan hafva hvad man kallar *indifferent* (likgiltiga) egenskaper. Både de läckraste och giftigaste arterna finnas bland *Flugsvamparna*, *Pepperingarna*, *Brötlingarna*, *Russulerna*, *Rörropp-arterna*; äfven hland *Murklorna* finnas mistänkt arter. Endast blaud *Champignonerna* finnes ingen giftig art.

§ 7.

Årstiden för de olika svamparternas förekommande är olika för olika arter, men för hvarje bestämd med få undantag¹⁸⁾. Det gifves ingen års-

¹²⁾ Vanligast gifvas åt fullväxte 3—4 gran kräkin eller ock ett kräkpulver. *ORFILA*.

¹⁴⁾ Jemte den uppgifna dosis kräkmedel gifves 2 lod Glaubersalt, hvilken dosis förnyas, om efter en fjerdedels timma ingen verkan skulle infinna sig. *KROMBOLZ*.

¹⁵⁾ En matsked reinolja hyar fjerdedels timma tills verkan följer jemte klistir af dekokt på Semblad eller i värsta fall af 2 lod tobak, kokta i ett skålp. vatten. *ORFILA*, *KROMBOLZ*. Skulle kräkningarna längre fortvara, rekommenderas kaffe och krampstillande medel. Skulle congestioner efteråt inställa sig, har man tid att rådfråga läkare.

¹⁶⁾ Den, som önskar underrättelse om Romarnes bruk att anrätta svampar, finner 12 olika slag uppgifva hos *COELIUS APICIUS*. Men hvad har icke kokkonsten sedan den tiden stigit!

¹⁷⁾ Det är detta sätt, man tillskriver, att bland lägre folkklasserna man aldrig bör förföringningar inträffa, ehuru arterna ofta utan urskiljning insamlas. Så är ock *Manihot* (*Euphorbia Manihot*), hvarn man i Amerika allmänt bereder ett sandt och välsmakande bröd, i friskt tillstånd ett gift både för människor och djur; men genom saftens utpressning och rotens rostning öfver eld förstöres alldeles dess giftiga egenskaper.

¹⁸⁾ En utförlig framställning af Svamparnes Calendarium finnes i »Öfversigt af Kongl. Vet. Akad. Förhandlingar» 1857.

tid, som icke har sina egendomliga arter; äfven hos oss finnas en mängd arter, som hafva sin högst utbildning om vintern eller tidigt om våren. Här skola vi dock endast fästa oss vid de ädliga och giftiga, hvilka antingen är vär- eller höst-svampar. Tidigast om våren är den lilla *Ätliga Nagelsvampen* (*Agaricus esculentus*), ofta i April; derefter följa i Maj *Märklor*, *Stenmärklor*, *Höfsvampen* (*A. gambosus*), *Snickersvampen* (*Ag. ostreatus*). Bland vårsvamparne är ingen bekant som giftig; de under denna årstid nr gödselsamlingar frambringande *Blacksvamparne* (*Coprin*) lärt det ej falla någon in att använda till föda, ehuru de icke hafva några giftiga egenskaper. Efter de första sommarregnen framkomma *Chantarellen*, *Bleka Taggsvampen* (*Hydnium repandum*), *Mjölkskiflingen* (*Ag. Prunellus*) och flera *Rörsopp-arter* (*Boleti*). Detta släkte är i afseende på hatens köttighet och både arternas och individernas mängd det viktigaste. Längre fram på hösten framkomma *Blombäls-svampen*, flera arter af *Bock-skäggs-svamparne* (*Clavarie*), *Fjälliga Taggsvampen* (*Hydnium imbricatum*) m. fl. arter af detta släkte, flera utmärkta arter af *Tiekornas* släkte, *Ris-korna* jente flertalet af *Skiflingen*. Den äkta (svarta) Tryffeln, som utbildas under jordytan vintertiden i S. Europa, kan naturligtvis ej förekomma hos oss, då marken denna tid är frusen, men en hvit Tryffelart finnes, ehuru sparsamt, hos oss om hösten.

I afseende på varaktigheten finnas svamparter, hvilkas frukt eller hvad man i vanlig mening kallar svamp, endast varar några timmar, andra som synas tillväxa flera år. Hvad de ätliga beträffar, så vara de vidpass 8 dagar innan de förfälla. En del Tiekor vara längre.

Champignoner och *Ätliga Rörsoppen* äro de enda, som man i Sverige odlar för matlagning. De förstnämnda odlas på trädgårds-sängar, beredda som sparris-sängar, på hvilka man ginter vatten, i hvilket man sköljt de bortrensade skifvorna af Champignoner. Man kan plantera Champignoner på vanliga sparris-land, utan att dessa båda, äfven till skördetid så olika, växer skada hvarandras tillväxt. Ätliga Rörsoppens odling har jag icke sjelf haft tillfälle iakttaga. — En utländsk art af Tiekornas släkte, *Poly-porus tuberaster*, bildar genom sitt svamplager stora stenhårda klumpar. Dessa klumpar (bestående af jord, stenar, trädrötter o. s. v., hvilka genom svamplagret blifvit hopklumade till en hård, fast massa) läggas i kallare klimat (den härstammar från Italien) i källare och begyntas flitigt med vatten, hvarigenom friska svampar uppväxa hela året om. Framl. Professor GADD i Åbo odlade den på detta sätt i Norden.

Någon svampodling i stort synes likväl icke kunna ifrågakomma, då de flesta fordra egendomliga platser f. ex. fuktiga skogar. De flesta växa ock till den mängd af sig sjelfva, att man endast behöfver afhålla boskapen, som begärligt förtär de bästa, från de platser man ännu har skörda. Det bland de högre växterna vanliga förhållandet, att de vissa år äro vida talrikare och andra mera sällsynta, gäller i ännu högre grad om Svamparne. Detta beror af högre värmeegrad i förening med ynnigare nederbörd. Stör-ska ynnighet inträffar under långvarigare fuktig väderlek efter tillräckligt regn. Vissa arter framträda endast vissa år under särdeles gynnande omständigheter. I samband härmed står en annan fråga, om nya svamparter invandra och naturalisera sig i landet, som förhållandet är bland de högre växterna. Vi ega deruppå ett märkvärdigt exempel i den sköna *Boletus elegans*, som jag aldrig fann under de 30 år jag afbrutet sökte svampar (1810—1840); först i början af 1840-talet började den visa sig i enstaka stånd här kring Upsala, och sednare åren har den varit särdeles ynnig,

der lärkträd blifvit utifrån införda. På samma sätt har den inkommit till Stockholmstrakten, Degeberg i Vester göthland o. s. v.

Förslaget att utrota giftiga svampar i en trakt, likasom man utrotar andra giftväxter, synes alltid förblifva overkställbart. De flesta svampar äro så allmänna och deras rika fröstoft sprider sig så lätt genom vinden och insekter, hvilka lefva af dem, att vi anse försöket ändamålslost.

§ 8.

Innan vi afsluta denna inledning, anse vi oss äfven böra tillägga några allmänna anmärkningar öfver svamparnes uppkomst, tillväxt och fortplantning, då öfver dessa ämnen de mest oriktiga åsigtar i allmänhet äro gängse. Liksom folktron i forna tider och äldre geografer antogo de mest vidunderliga naturfenomener int ökända länder — och i den mån kunskapen om dessa utvidgades, förlade dem till allt aflägsnare, tilldess de slutligen ingestades befurnas i verkligheten, så har äfven allmänhetens och de flesta äldre naturforskare tro på en tillfällig och af yttre förhållanden beroende uppkomst af en del växter och djur (*generatio aquivoa*), om det ena naturlagsträts förändring till ett annat, och flera dylika sagor, i den mån kunskapen om naturlagsträts utvidgades, måste draga sig tillbaka till de lägsta och minst kända, bland hvilka man lemnat naturen eller rättare sin fantasi fritt spelrum. Vi anse oss vetenskapligt förpligtade, att beriktiga så falska åsigtar af naturn, hvilken, i det högsta som lägsta, är lika bunden vid eviga och oföränderliga lagar. Att vilja förklara okända och onödiga företeelser genom dunkla och än mindre kända naturkrafter (qualitates occulte) är ingen förklaring. När ordet till gatan är funnet, är förklaringen enklare än man förut kunnat föreställa sig. Så har man af den förvä-nande hastighet, med hvilka en del svampar uppväxa och ofta äfven försvinna, icke trott detta fenomen kunna eller böra förklaras af lagarne för den öfriga organiska naturen¹⁹⁾, utan väntat sig både till himmel och jord (sideriska och telluriska krafter), fäfängt besvurit alla elementer och miasmer, att förklara denna gåta, som endast genom klar insigt af livets en-samt skapande förmåga löses. Man har tvistat om, antingen de tillhörde djur- eller växtriket eller utgjorde ett eget rike; men att de äro organiska naturalster och således måste utvecklas efter dess lagar, kan ingen betvifla, emedan de måste alstras ur frön och endast genom uppsugande af närings-safter kunna utbildas. Att genom oorganiska naturens krafter vilja fram-tvinga lif förbli alltid ett fruktlöst försök, som i sig innebär en förnekelse af den organiska naturens sjelfständighet. Svamparne forplantas genom frön, liksom de öfriga växterna; det fina stoft, som från deras undre sida affaller eller från deras öfre sida uppstiger som en rök, är dessa växters frön. Dessa stoftkorn, som lätt kringföras af vinden, förlängas groende till fina trådar, som tillväxa till ett vanligen ull-likn lager, hvilket motsvarar roten och örtstämnet hos de fullkomligare växterna. Men detta svamplager ligger sällan i dagen, utan utbreder sig i jorden, i gamla trädstammar²⁰⁾ o. s. v. och fortlevver vanligen flera år, fast omärkligt för den, som ej närmare undersöker tingens sammanhang. Hvad man vanligen kallar svamp är dessa växters frukt. Af samma grund, som träden vid en viss värmeegrad utveckla sina blad, örterna sina blommor, af samma orsak uppskjuta svamparne vid bestämda temperatur-förhållanden (olika för olika arter) nr nämnda svamplager, hvars både blomma och frukt de äro. När gynnande väderlek, för de flesta rik nederbörd i förening med värma, inträffar, utvecklas de derföre hastigt och i mängd; vid missgynnade åter sparsamt eller förvisna de före utbildningen. Att de derföre efter några dagars regn hastigt

¹⁹⁾ Bland insekterne ega samma förhållanden rum; de framkomma ofta till förvånande mängd lika oförmodadt, som de hastigt försvinna. Allmänheten, som icke inser möjligheten, huru efter naturens lagar dessa fenomen skola kunna förklaras, omfattar derföre helst det mest underbara. Att väderlekens beskaffen-

het gynnar både svamparnes och insekternas utbildning är visserligen klart, men att den icke är orsaken till deras uppkomst är ännu säkrare.

²⁰⁾ Hvad man benämner *svampständer*, *nyglövel*, *möjlig ved* o. s. v. är just detta svamplager. Bland nedfallna löf, barr och ofta i jorden finner man ett utbredt, sammanväffat ludd, som likaledes är svamplager.

framkomma, är icke mera besynnerligt, än att träden efter några dagars värmärma på en gång utveckla sina löf; att en del hastigt försvinna är samma förhållande, som att mången blomma efter några timmar förvisna och affaller. Af ofvannämnda fröstoft har hvarje individ så stort förråd (ofta uppgående till millioner), att det synes lättare att förklara, huru deras frökorn kunna sprida sig till hvarje passande växtställe, än uppgifva orsaken, hvarför de icke förekomma öfver allt, hvilken är den, att de endast under bestända yttre förhållanden hinna till utveckling. Att nämnda frön gro och frambringa individer af sin art, är genom mångfaldiga exempel bestyrkt. Man har uppgifvit, att efter deras frön skulle uppkomma helt andra arter, men detta grundar sig belt och hållet på ett missförstånd, nemligen deraf, att efter fröstoftet icke omedelbart utvecklar sig dess frukt eller egentliga svampen utan dess svampager, på samma sätt, som af haselnötter icke uppväxa hasselnötter, utan hasselbuskar, som i sin tid bära nötter.

§ 9.

Att här lemna någon systematik öfver svamparna synes mindre lämpligt, då en mindre del af denna klass tillhör föremålet för närvarande arbete. Vi skola derför anvisa endast några allmänna, genast i ögonen fallande skiljaktigheter. Största antalet af de ätliga svamparne tillhöra de så kallade *Hatt-svamparne* (Hymenomycetes), hos hvilka fröredningen vanligen utbildas till tunna, från foten strålväs utgående skifvor (lameller) eller mer eller mindre runda pipor (porer) eller ock sylfika taggar. Till dessas afdelning höra äfven klubb- och fingersvamparne, utan hatt, liknande klubbor eller greniga koraller, med fröredning rundt kring svampens yta. Andra afdelningen innefattar de så kallade *Disksvamparne*, hvilkas fröredning är på öfre sidan af en uppblåst mössa eller vanligare en skål. Då de förras fröstoft från hattens undre sida nedfaller till jorden, uppstiger de sedan elastiskt (ur egna säckar) som en rök. Tredje afdelningen bilda *Röksvamparne*, hos hvilka fröstoftet bildar svampens inre massa, såsom hos *Bovisterna*. — *Flugsvampen* kan tjena till exempel på en Hattsvamp och Murklan på en Disksvamp. Af svamparnas öfriga afdelningar finnes ingen användbar till födoämne, men desto flera skadliga, såsom *Mögelsvamparne*, till hvilka *Peronospora Solani*, som förstör Potatesbladen, *Vindruftssvampen*, Rost, Brand o. s. v. höra.

§ 10.

På Svenska språket sakna vi alldeles någon på egna studier och erfarenhet grundad afhandling, jemte nödiga plancher, öfver de hos oss så

rikliga förekommande svamparne. Men icke mindre viktig är kännedom af de giftiga arterna, så att vi ansett nödigt äfven upptaga dessa för att undvika alla misstag. Detta är anledningen till utgifvandet af detta verk. Den mängd afhandlingar på främmande språk, som utkommit och är tillämplig utkomma, äro för vårt land mindre lämpliga och förra ofta en lika oförlätlig okunnighet i svamparnes kännedom, som opålitlighet i uppgifterna om deras användande. Vi skola efter sorgfälligt granskning utvälja de arter, vi anse mest tjenliga, och till en början upptaga de allmänast förekommande. Inga upptagas, som vi icke af inhemsk erfarenhet kunna såsom användbara (med undantag af de giftiga).

De författare, som afhandlat de ätliga svamparne, förhålla sig vanligen, att allt, som utan olägenhet kan ätas, icke derför förtjänar upptagas bland födoämnen, då det för öfrigt hvarken genom smak eller närande egenskaper är utmärkt. Utan ändamål anse vi äfven att bland ätliga upptaga dem, som för sin litenhet eller sällsynthet aldrig kunna löna sig insamla. Bland de bästa och brukbaraste arbeten öfver svamparnes användande kunna vi rekommendera LENZ' *nützliche und schädliche Schwämme* för dess tillförlitlighet och populära framställning, ehuru figurerna äro alltför små och i artistiskt hänseende mindre lyckade.

I länder, der svampar allmänare begagnas och i större quantiteter införas till salu i städerna, finnas många författningar, ordnande denna handel. Då man i städerna vunnit den obehagliga erfarenheten, att landtfolket dels af okunnighet, dels af vinningslystnad försålt giftiga arter för ätliga, haiva icke blott de så kallade »Marktrichter» blifvit ålagde lära sig urskilja de ätliga och giftiga arterna (innan någon dertill i Wien antages, skall han häröfver förete bevis af Botanices Professorn) samt hafva noga uppsigt på de arter, som utbjudas till salu, utan har ock handel med dem på andra än bestämda platser blifvit förbjuden. Enligt Regeringens i Milano dekret af den 28 Juli 1823 är försäljaren af torkade svampar, hvilka till sin art icke kunna bestämmas, personligen ansvarig för deras oskadlighet. I Wien tillåtes icke mer än klyfva i tu de svampar, som till salu utbjudas. Att en offentlig tillsyn hos oss redan är nödig, kan jag som åsyna vitne intyga. Under mitt vistande ett par höstar i Stockholm, granskade jag ofta de arter, som på Munkbron till salu utbjodos. Flertalet af dem var visserligen goda arter, men jag fann äfven hela korgar af giftiga f. ex. *Russula foetens*; men då jag fäste uppmärksamheten deruppå, erhöjll jag till svar: »Åh, det förstår sig Herrn icke på.»

Tab. I. ALLMÄNNA FLUGSVAMPEN.

(Agaricus Amanita muscarius L.)

Linn. Fl. Suec. n. 1235. Fries Epicr. p. 5. Monogr. p. 7.

Bland Skifflingarne eller de på undre sidan af hatten med tunna skifvor (lameller) beklädda svamparterna stå *Flugsvamparne* (Amanite) såsom de högst utbildade fränst, emedan de icke blott hafva en hinnaktig ring på foten, hvilken till en början betäcker skifvorna, utan tillika ett allmänt, från svampens öfverhud skildt hylle, som före utvecklingen omgifver hela svampen, men under dennas tillväxt antingen öppnar sig i spetsen och derefter som en slida nedtill omgifver svampens fot eller oek brister sönder i värtlika rutor, som qvarsitta på hattens yta. Hattens kött skiljes lätt från foten; fröstoftet, som lätt utfaller och blir synligt, om man lägger hattens undre sida på en mörkare botten, är till färgen hvitt. Till denna grupp höra flera så väl af de läckraste som giftigaste arter; af de förra, tillhörande sydliga Europa, finnes ingen af de utmärktare i Skandinavien; af de sednare åter *Allmänna Flugsvampen* och *Ofläckade Flugsvampen* (A. phalloides) jente några med dessa närbeslägtade. Då de giftiga arternas kännedom är, för undvikande af förvexling, lika nödvändig som de ätliga, hafva vi först ansett lämpligt framställa dessa begge, äfven af det skäl, att allmänna Flugsvampen är den redan af allmänheten bäst kända svamparten och för urskiljande af obekanta föremål intet mer underlättar än att utgå från något redan bekant och känt.

Allmänna Flugsvampen liknar outvecklad, innesluten i sitt hylle, ett hvitt ägg, men under tillväxten sönderspränges hyllet och bildar hvita vårtor på den vanligen högröda hattens

yta, från hvilken de dock lätt kunna lossas. Hattens färg är dock föränderlig, stundom höggul, stundom mera brun, men köttet är alltid hvitt med en gul rand nära öfre ytan, som beklädes af en fastväxt, i fuktig väderlek något klibbig öfverhud. Äldre och urblekt blir den ofta alldeles hvit. Skifvorna, liksom hos alla hos oss inhemska Flugsvampar, äro oföränderligt hvita. Den hvita foten är nedtill lökformigt uppsvälld, med i krans ställda fjäll, upptill försedd med en stor hängande ring, inuti ihålig, men fylld med en lösare, spindel-nätlik väfnad.

Denna art förekommer mycket allmänt öfver hela riket, äfven i Lappland, helst i löfskogar, men äfven i barrskogar, mera sällan på öppna fält. Ehuru både lukt och smak äro milda, är den en af de mest giftiga svampar. Af allmogen användes den att förgifta mjölk till flugors dödande, hvaraf den erhållit sitt svenska namn. Men så väl för människor, som de flesta djur är den ett häftigt, narkotiskt gift, som förorsakar yrsel, raseri och i värsta fall slutar med döden. Kamtschatkialarne bereda deraf en rusgifvande dryck, och man har yttrat den förmodan, att man genom Flugsvampen fordom hos oss försatte sig uti det s. k. berserka-raseriet. Lyckligtvis finnes ingen ätlig art, som med vanliga Flugsvampen kan förvexlas.

Planchen framställer svampen i naturlig storlek i olika åldrar samt i genomskärning. Öfversta figuren till venster föreställer yngre svampen innesluten i sitt allmänna hylle.

Tab. II. OFLÄCKADE FLUGSVAMPEN.

(A. Amanita phalloides FRIES.)

Fries Syst. Myc. p. 13. Epicr. p. 4. Monogr. p. 4.

Denna art, som tillhör samma naturliga afdelning som föregående, skiljes lätt från densamma genom sitt hylle, som öppnas i toppen och derföre som en slida omgifver den utväxta fotens nedre del, hvarföre äfven den allmänna Flugsvampens värtlika fläckar saknas. Foten blir oek derigenom mindre fjällig; endast upptill är den ihålig. Vanligen är hela svampen hvit, men hattens färg öfvergår äfven i gult, grönt, brungrönt (olivfärg). Köttet är alltid hvitt. Lukten mer eller mindre från.

Denna art finnes mest i södra Sveriges löfskogar; i medelsta Sverige är den mycket sällsynt och förekommer troligen icke i norra landskapen. Deremot finnes öfverallt, ehuru sällan talrik, en annan mycket närbeslägtad art, den *Fläckiga Flugsvampen* (A. Am. Mappa), hos hvilken hyllet rundtomkring uppspringer på midten (*volva circumscissa*), så att nedre delen med tydlig kant omgifver foten, med hvilken den lökformigt är sammanväxt, men den öfre bildar oregelbundna fläckar på hatten, icke regelbundna vårtor, som på allmänna flugsvampen. Hattens färg är hvit eller blekgul; för öfrigt är den

oföränderligt hvit. För närvarande hafva vi icke ansett lämpligt att af denna gifva särskild figur.

Båda dessa arter äro i hög grad giftiga, och genom förvexling med Champignonerna hafva ofta svåra sjukdomsfall med till och med dödlig utgång inträffat. Denna förvexling är likväl endast förklarlig genom oförsvarlig värdsloshet. Utom yttre färg och storlek hafva de intet gemensamt. Flugsvamparne hafva hvitt fröstoft, Champignonerna brunt; skifvorna hos Flugsvamparne äro alltid oföränderligt hvita, hos Champignonerna öfvergå de snart till rödaktig eller mörkbrun färg. Champignonerna sakna det allmänna hylle, som omgifver Flugsvamparne. Slutligen är hos Champignonerna lukten och smaken mild och angenäm. Ehuru vigtig kännedom af dessa verkliga giftiga arter är, kan man icke med minsta uppmärksamhet befara någon förvexling med ätliga arter.

Figuren föreställa svampen i naturlig storlek i olika färgförändringar samt i genomskärning.

Tab. III. STOLTA FJÄLL-SKIPLINGEN.

(Ag. *Lepiota procerus* Scop.)FRIES *Syst. Myc.* p. 20, *Epicr.* p. 12, *Monogr.* p. 19.

Fjäll-skiflingarne äro närmast beslägtade med Flugsvamparne, men hafva icke något vid foten märkbart eller från hatten skildt hylle, utan detta är med hatten sammanväxt, utgörande dess öfverhud, som under tillväxten vanligen sönderdelas i fjäll på hattens yta. Flera af dessa arter, och bland dem den här framställda, hafva en egendomlig ring, som är alldeles skild från foten och ursprungligen fästad vid hattens kant, från hvilken den under utvecklingen lossnar, så att den fri omgifver foten. Den *Stolta Fjäll-skiflingen* utmärker sig från närbeslägtade arter genom sin höga, broskartade, af tilltryckta fjäll brunfläckiga fot, som vid jorden är lökformigt uppsvölld, sin fria, i inre kanten broskartade ring, sin brunfjälliga hatt med upphöjning i midten, sina från foten långt skilda skifvor. Hattens kött är mjukt (floceöst) och hvitt samt har svag men angenäm lukt.

Stolta Fjäll-skiflingen finnes öfver hela riket temligen allmän i skogslundar, mera sällan på öppna fält, i Augusti och

September månader. Hattens kött, bäst yngre, erbjuder en sund och smaklig spis; men icke blott skifvorna, utan äfven den sega foten måste bortrensas. Den användes på lika sätt som Champignonner och kan utan åtskilnad insamlas och anrättas jemte dessa. — Vi ega utom denna tvenne beslägtade mindre arter, läckrare än den här beskrifna, hvilka i fortsättningen af detta verk komma att upptagas; men vi hafva ansett lämpligt att först upptaga de mest framstående och lättast urskilda arterna.

Med någon giftig art kan denna icke förväxlas. Bland Fjäll-skiflingarne finnas dock några mindre arter, med obehaglig lukt och smak lik rättikors, hvilka anses skadliga och därför förkastas. Hos dessa är ringen fästad vid foten.

Tab. framställer svampen i olika åldrar och i naturlig storlek samt i genomsnitt.

Tab. IV. ALLMÄNNA CHAMPIGNONEN.

(Agar. *Psalliota arvensis* SCHAEFF.)FRIES *Epicr.* p. 253, *Monogr.* p. 405.

Champignonerna utgöra en högst naturlig grupp af närbeslägtade arter, som lätt skiljas från alla öfriga skif-svampar genom mörkbrunt fröstoff, hvaraf de från foten alldeles fria skifvorna utväxta erhålla en rödbrun, slutligen nästan svart färg, genom köttig, finluden eller fjällig hatt samt ring på foten. Något eget hylle finnes icke, hvarigenom de lätt skiljas från de giftiga Flug-svamparne, som dessutom hafva hvita skifvor och hvitt fröstoff. Allmänna Champignonen skiljes från sina samslagningar genom hvit, silkes-luden, stundom fjällig hatt, i början hvita, sedan rödbruna skifvor och genom sin med en lösare mærg fyllda fot. Hattens kött är hvitt, oföränderligt. Utmärktast är den genom fotens ring, som egentligen är dubbel genom tvennes förening, hvaraf den ytre är i omkretsen strålförmigt klufven och ofta fri i kanten. Lukt och smak äro angenäma.

Denna art, som hos oss är den allmännast förekommande arten af Champignonerna, anträffas mest på öppna fält, af-

vensom på odlad jord. Från äldsta tider har den varit räknad bland synnerliga läckerheter och användes redan hos oss allmänt på de rikares och förnämares bord. Det är verkligen sorgligt, att de fattigare folkklasserna icke begagna ett så förträffligt och ofta i stor mängd för intet sig erbjudande näringsmedel. Dess tillredning är enkel och lätt, blott skifvorna på undre sidan bortrensas. Äfven rå fortärd är den, efter någon vana, smaklig och mycket närande.

På mulrika, gödslade trädgårds-sängar är denna arts odling lätt. Man sköljer nemligen de bortrensade skifvorna i vatten, som man utgjuter på för densamma beredda sängar, men först följande åren får man skörda utväxta svampar. Man har likväl anmärkt, att de på öppna, gräsbeväxta fält äro smakligare.

Tab. framställer i naturlig storlek en form deraf med fjällig mörkare hatt. Vanligen är den helt vit och på ytan mera slät, silkesluden.

Tab. V. ÄKTA CHAMPIGNONEN.

(Ag. Psalliota campestris LINN.)

FRIES *Epicr.* p. 213. *Monogr.* p. 406.

Denna art är så närbesläktad med föregående, att den af flera (äfven i System. Mycol.) med densamma förenas till en art. Den är dock lätt skild genom tät fot, enkel, ofta trasig ring, brunaktig och oftast småfjällig hatt, köttfärgade, äldre bruna skifvor. Köttet är mera saftigt än föregående och rodnar genast efter brytning i beröring med luften.

Den Äkta Champignonen förekommer så väl på öppna fält som i skogar, men är mindre allmän än föregående. Dess användande är alldeles lika med dennas. Den anses tillika såsom saftigare, smakligare än densamma, ehuru vi icke kunnat finna någon väsentlig skilnad.

Utom ofvan anförda tvenne arter af Champignoner finnas ännu några mindre allmänt förekommande, hvilka vi icke ansett nödigt särskildt upptaga, då de efter kännedomen af de allmänare lätt kunna urskiljas, och utomdess genom deras förväxling ingen skada är skedd. De äro:

Den *präktiga* Champignonen (Ag. Augustus Fries) liknar till storlek den *Stolta Fjäll-skiflingen*; foten är öfver kvartershög, alldeles tät och mycket fast; ringen mycket vid; på undre

sidan fjällig; hatten slät, brungul; skifvorna skilda från foten, först hvitaktiga, slutligen brunaktiga, men aldrig stötande i rött. Den är hittills endast funnen i skogar vid Upsala.

Den *läckra* Champignonen (A. eretaeus Fries) är helt och hållet vit, och äfven skifvorna bibehålla denna färg till dess svampen blir gammal, då de blifva bruna; foten är ihålig med vid, enkel ring, hatten merendels slät. Förekommer mest på skånska slätten ända fram i October. Den anses vara en af de mest smakliga.

Skogs-Champignonen (Ag. silvaticus Schaeff.) åter är onekligen den sämste bland dessa; den har en tunnare hatt med ulligt-småfjällig, rödbrun yta, smälare fot med tunn, lätt försvinnande ring, smala, något i kanelbrunt stötande skifvor. Den växer i skogar, men temligen sällsynt.

Tabellen framställer svampen i naturlig storlek och färg, jemte genomskärning.

Tab. VI. ALLMÄNNA RISKAN.

(Lactarius deliciosus FR. Agaricus L.)

FRIES *Syst. Myc.* p. 67, *Epicr.* p. 341.

Mjolk-skiflingarne (Laetarii), till hvilka Riskan, Pepperling, Brötling m. fl. utmärkta svamparter höra, skiljas lätt från alla öfriga genom den färgade mjölksaft som utflyter, synnerligast från lamellerna, då de brytas eller säras. De hafva hvarken hylle eller ring; hatten är oftast nedtryckt i midten; skifvorna mer eller mindre nedlöpande på foten. Fröstoftet, som hos de egentliga Skiflingarne är slätt, är hos dessa under mikroskop fintagigt.

Allmänna Riskan skiljer sig från alla andra svampar genom den brandgula saft, som utflyter från de sårade skifvorna och kvarlemnar grönaaktiga fläckar. (Några Mjolk-skiflingars saft blir visserligen i beröring med luften gul men ljusare, och är ursprungligen hos dessa alltid vit). Foten är i början tät, men blir äldre ihålig, med fläckiga gropar på ytan. Hatten köttig, i midten nedtryckt, glatt men i fuktig väderlek något klabbig, med mer eller mindre tydliga cirkelformiga mörkare ringar eller bälten. Färgen är tegelfärgadt gul, men bleknar med åldern och får ofta en grönaaktig anstrykning.

På något fuktiga, gräsbevuxna platser i barrskogar förekommer Riskan öfver hela landet, helst efter regnväder i Augusti och September månader, men icke så ymnigt som önsk-

ligt vore, ty den är en af våra mest närande och välsmakliga svampar. För egen del föredraga vi dem framför Champignoner. Dess insamlande borde därför aldrig uraktlätas, men då den blir lätt maskstungen, måste alla äldre förkastas. Enklaste sättet för dess tillredning är att, sedan den blifvit rensad och afsköld, *rosta den långsamt öfver sakt eld*, i en panna eller kastrull *med lock öfver*, hvaruti förut något smör blifvit smält. Sedermera utflyter svampens mjölksaft, som sjelf bildar en smaklig sås till densamma. Hvarken tiden för rostningen tilltages för knapp eller värmen för stark, emedan den då lätteligen vidbrännes.

Med ingen annan art kan den förväxlas, utom med falska Riskan (*Lactarius torminosus*), hvars egenskaper ännu icke med visshet äro utrönta. Då en del funnit den smaklig och oskadlig, uppgifves den af andra förorsaka magplågor. Den är mycket lätt skild genom sin hvita mjölksaft och i kanten skaggiga hatt.

Tabellen framställer arten i naturlig storlek och färg; denna är dock icke alltid så hög och ren, som på plachen, utan mera urblekt.

Tab. VII. ÄTLIGA CHANTARELLEN.

(Cantharellus cibarius FRIES. *Agaricus Cantharellus* L.)*Syst. Myc. p. 318, Epicr. p. 365.*

Chantarelerna äro närmast beslägtade med Skiflingarna, men hafva icke på hattens undre sida dessas tunga skifvor, utan mera smala, uppsvällda, greniga, i kanten trubbiga ådror, som mer eller mindre förgrena sig och nedlöpa på foten. Fröstoftet är hvitt. Af detta slägte eger man endast en ätlig art (*C. cibarius*), hvilken lätt skiljes från alla samsläktningar genom sin starkt äggula färg, sin köttiga, glatta och äldre i kanten vågigt-böjda hatt, sina åtskilda, på foten långt nedlöpande greniga ådror, smaken mild, lukt ingen.

Ätliga Chantarellen är en af de allmännast, tidigast och i stor mängd förekommande arter öfver hela riket. Så väl härigenom, som derigenom att den nästan aldrig angripes af maskar och insekt-larver och intet af densamma behöfver bortrensas, är den en af de viktigaste för de fattigare folkklassemna, churu den ingalunda försmås på bättre bord. Den är

både smaklig och ganska närande och användes såväl stekt som stufvad på flerfaldiga sätt. Som smaken är mild, tillsätas vanligast några kryddor såsom salt och peppar. Den kan äfven knådas tillsammans med mjöl till en deg och på detta sätt anrättas.

Den enda art, med hvilken den kan förvexlas är *Brandgula Chantarellen* (*C. aurantiacus* Fr.), hvilken räknas till de skadliga arterne och icke bör användas. Den har en mera brandgul färg, köttet är mycket lösare och mjukt, smaken något skarp. Lättast urskiljes den genom sin finludna hatt och mycket tätt sittande ådror, hvilka mera likna skifvor än den ätliga Chantarellens.

Tab. framställer svampen i naturlig storlek.

Tab. VIII. FÄR-TICKAN.

(Polyporus ovinus FR. *Boletus* SCHAEFF.)*Syst. Myc. p. 346, Epicr. p. 428.*

Tickornas slägte (Polyperi) innefattar en mängd till utseende, växtsätt och substans olika arter. En del hafva tydlig hatt och fot, andra hafva blott half hatt, med andra sidan fastväxt vid trädens stammar såsom Fnösk-svanparne, andra äter äro skorplikt utbredda, utan all hatt. En del äro köttiga och spröda, andra äter sega eller läderartade och slutligen andra trädhårda. Alla dessa åtskiljas mycket lätt derigenom, att de på den mot jorden vända sidan hafva små runda hål (porer), från hvilka fröstoftet utfaller. Endast med *Rörsopp-arterna* (Boleti) kunna de förvexlas, men dessa äro alltid köttiga, med tydlig hatt och fot, undra sidans fröredningslager är af aman substans och lätt skildt från hatten, och bildas af smala pipor, som kunna åtskiljas från hvarandra.

Färtickan, liksom alla de ätliga arterna af detta slägte, tillhöra de köttiga, med fot försedda arterna, hvilka växa på jorden. Färgen är mer eller mindre hvit, stundom gulaktig; hatten är köttig, fast, men icke seg, och dess yta sönderspricker till fjäll; porerna äro små, runda, foten kort, hvit. Med

någon giftig eller skadlig art är det icke fara, att den kan förvexlas.

Färtickan växer i bergiga barrskogar, ofta till största mängd, synnerligast i September månad. I mellersta Sverige är den mycket allmän, men i södra eller vestra provinserna såg jag den aldrig. Den har rå en mycket angenäm smak af mandel eller kokt potates, hvarföre den i detta tillstånd gerna förtäres. Under mina verksammare år, då jag årligen, åtföljd af talrika lärjungar, företog längre utvandringar för svamparnes kännedom, gjorde vi oss alltid ett godt mål af denna svamp i skogen. Den eftersökes begärligt af får, hvaraf namnet härledes; i Tyskland är den känd under namn af Schafeuter.

På denna arts införande bland allmogens näringsmedel lägger jag stor vikt, då den både finnes i stor mängd, med ingen skadlig art kan förvexlas och dessutom är mindre benägen än de flesta att under förvaring förskämmas.

Figuren framställer Svampen i naturlig storlek.

Tab. IX. LÄCKRA MUSSERONEN*).

(Agaricus Tricholoma gambosus. FRIES.)

FRIES Syst. Myc. I. p. 50, Epicr. p. 43.

Musseronernas flock (*Tricholoma*) innefattar icke blott de talrikaste utan tillika de mest utmärkte och vackra former. I Sverige äro icke mindre än 80 väl skilda arter deraf funna. De skiljas från alla öfriga Skifflingar genom hvitt fröstoff, köttig, vahligen kullrig, hatt och fot och säkrast genom en liten inskränning vid lamellernas anhängning vid foten, hvarföre de icke med en jemnt afsmalande spets nedlöpa på denna. Ring saknas alltid; men spår till hylle erbjuder ofta ett glesludd på hattens kant eller foten. Alla hithörande arter växa på jorden.

De flesta stora och utmärkte arterna af denna flock äro ännu till sina egenskaper okända, ehuru flera genom sin köttiga hatt och ymniga förekomst synas böra blifva af stor vikt. Några med egendomlig stinkande lukt, *Såp-Musseronen* (*Agaricus saponaceus*), *Sjåfelfärgade Musseronen* (*Agar. sulfureus*) och dess förvandter, äro bestämde skadliga och oanvändbara. Deremot rekommenderas till undersökning de större arterna med lukt af nymalet mjöl. De i alla afseenden utmärktaste äro de äkta och egentliga *Musseroner*, hvilka, utom nämnde lukt, afvika från alla öfriga genom sitt framträdande värtiden (de öfrige tillhöra företrädesvis senhösten); genom fullkomligt slät och glatt, ehuru äldre vanligen sprickig eller fläckad hatt; genom tunna lameller och sitt hvita, mjuka kött.

Den *Läckra Musseronen*, som här afbildas, är en stor art, med tjock och tät fot, som i toppen är flutuden; hatten, mycket köttig, öfvergår från hvit till gult, ofta fläckig och sprucken, uppnående stundom ett quarters bredd och derofter; skivorne mycket tunna, tät sittande, hvitgula, på midten bredast. Smaken mild; lukten angenäm.

Denna art urskildes först den 6 Juni 1816 vid Limhamn i Skåne, der den växte i stora tuftor eller ringar och benämndes *Hästhofvar*, *Hofsvamp*, sannolikt af hattens form. Den fans sedermera vid Lund och flerstädes på Skånska slätten och är i senare tider funnen vid Tvetaberg i Södermanland, vid Carlsberg, Haga m. fl. st. i Stockholmstrakten, samt förekommer troligen i de flesta slättlands provinser.

Med flera närbeslägtade arter af de *Äkta Musseronernas* grupp är den lätt att förväxla, men som dessa hafva alldeles samma goda egenskaper är detta fullkomligt likgiltigt. Deremot måste den noga skiljas från den *Falska Musseronen* (*Ag. albus*); men den är en höstsvamp, fullkomligt hvit eller endast gulnande på hatten, af mera seg, elastisk substans och har bitter smak. Den kan icke användas såsom näringsmedel.

Alla äkta *Musseroner* äro synnerligen välsmakande och närande; i alla afseenden jemförliga med, om ej öfverträffande, *Champignonerna*. De användas och anrättas alldeles som dessa. Då så väl deras förekommande i vårt land som användande intill senare ären varit fullkomligen ohekan, anse vi oss höra på det högsta rekommendera deras insamlande. De äro af desto större värde, som de ofta i stor mängd framkomma den ärtid (från medlet af Maj till midsommar), då andra åttliga arter vanligen saknas.

Om denna arts egendomliga växesätt, ofta i fullkomliga kretsar eller långa lit och dit böjda linier, skola vi nedanföra tala vid beskrifningen af någon annan på samma sätt växande art.

Tabellen föreställer svampen i naturlig storlek.

Tab. X. MILDA BRÖTLINGEN.

(Lactarius volemus. FRIES.)

FRIES Syst. Myc. I. p. 69, Epicr. p. 344.

Under *Äkta Riskan* hafva vi redan uppgifvit Mjolk-Skifflingarnas kännetecken; det mest i ögonfallande är den mjölksaft, som utflyter från de sårade skifvorne. De fördelas i trenne naturliga flockar, som hvardera erhållit eget namn i folkspråket, hvarföre vi bibehålla dessa. *Riskorne* skiljas genom sin brandgula mjölksaft; *Peppartlingarne* och *Brötlingarne* hafva båda ursprungligen hvit mjölksaft, ehuru den hos olika arter i beröring med luften öfvergår till gult, rött eller violett. *Peppartlingarne* skiljas derigenom, att lamellernas färg är oföränderlig, och att dessa alltid förblifva bara, då lamellerna hos *Brötlingarne* skifta färg och äldre öfverdragas med ett fint puder. De båda här nedanför anförde arterna tillhöra *Brötlingarne*.

Milda Brötlingen är den största och fastaste bland sina förvandter. Den igenkännes af sin tjocka, på ytan pudrade fot, som inuti är tät; sin tjocka, styfva men spröda hatt, som aldrig hvarken är kläbbig eller liden i kanten; sina tättsittande, hvitgula skifvor och i synnerhet af sin ymniga mjölksaft, som har en mild smak, närmast lik Mandelmjöl. Den förekommer under tvenne, temligen skarpt begränsade färgförändringar, en med rödbrun hatt, den andra med gullgul. Poten får hos hvardera anstrykning af hattens färg.

Den Milda Brötlingen är en, synnerligast i medlersta Sverige, mycket sällsynt art och är derstädes endast den rödbruna hittills funnen. I Smålands skogar förekommer mera allmänt den brandgula formen. Då den i Bayerns högre bergsskogar är ymnigast, förmodar jag, att förhållandet är lika hos oss.

Namnet härledes af tyska ordet *Brot*, emedan den i Bayern m. fl. st. rå förtäres som bröd. Så förtärd har jag alltid funnit den, och synnerligast dess mjölksaft, smaklig. Den ringare tillgången har ej medgifvit närmare pröfva den; men att den är en af de mest värderade arter är säkert. Jag tvekar likväl icke att man flerstädes i landet skall finna den i mängd, hvilket vore en stor vinst.

Åtskilliga andra arter af denna grupp, som med Milda Brötlingen hafva någon likhet och således möjligen kunna förväxlas, äro alla mindre, af lösare byggnad, lamellerna mörkare, skiftande i rött. Smaken, som hos en del till en början kännes mild, blir efteråt brännande och äcklig. Dessa böra, som skadliga alltid förkastas. Den verkligen giftiga och ganska farliga Giftiga Brötlingen medföljer särskildt afbildad.

Tabellen framställer den rödbruna förändringen i naturlig storlek.

*) Af svårigheten att finna någon passande svensk benämning, hafva vi antagit den franska, i likhet med det allmänt kända *Champignon* på en grupp, med hvilken de äkta *Musseroner* till sina egenskaper fullkomligt öfverens-

stämma. Men franska orden *Moucron* och *Champignon* betyda äfven svamp i allmänhet; i inskränkare bemärkelse afser namnet *Moucron* likväl endast de nedanför särskilda äkta *Musseroner*.

Tab. XI. GIFTIGA BRÖTLINGEN.

(Lactorius rufus (Scop.) FRIES.)

FRIES Syst. Myc. I. p. 71, Epicr. p. 347.

Ikke blott bland Brötlingarna, utan i hela Mjölkskiffingarnas släkte, hvilka bådas kännemärken ofvan äro angifna, är denna art den giftigaste.

Foten är tät, men mycket lösare i sin byggnad än föregående arts, mer eller mindre rödaktig. Hatten något köttig, i början med en upphöjd puckel i midten, äldre trattformig, fullkomligt glatt, nästan glänsande, rödbrun, men den yngre inrullade kanten är alltid finluden. Lamellerna öfvergå från ockragult till rödaktig färg. Mjölksaften utmärkt skarp, hvit.

I alla våra barrskogar är denna en af de vanligaste arterna. På dess giftiga egenskaper har jag sjelf sett prof. En af mina närmaste bekanta svälde ned blott en mindre munsbitt af densamma, hvarefter han under 4 dygn erfor brännin-

gar och smärtor i underlifvet. Att den i större mängd verkar dödande har man i Frankrike haft erfarenhet af.

En med föregående närbesläktad art är *Lactorius helvus*, som växer på mera fuktiga ställen. Den är till alla delar lösare, blekare; hatten är platt nedtryckt, icke uppstående i midten, i början finluden, sedan småfjällig, blekt tegelfärgad; foten finluden, äldre ihålig, lamellerna från blekt öfvergående till ljus ockra-färg. Mjölken hvit, men mera sparsam. Den är väl mindre skarp än föregående, men likväl med skäl ansedd för giftig.

Planchen föreställer arten i olika åldrar.

Tab. XII. LÖMSKA RÖRSOPPEN *).

(Boletus luridus. SCHAEFF.)

FRIES Syst. Myc. I. p. 391, Epicr. p. 418.

Rørsopp-släktet (*Boletus*) liknar genom sina porer på hattens undre sida mest Tickorna, men är från desamma lätt skildt derigenom, att undre sidans fruktlager är af helt olika substans med hatten och bildas af tätt sammanpackade pipor eller rör, som lätt skiljas både från hatten och från hvarandra. Hos Tickorna är fröedningslagret af samma substans som hatten, och de icke fränkiljbara porerna äro endast insänkningar i detsamma. Likaledes skiljas de lätt genom sin alltid mjuka och köttiga substans, regelbundna hatt med fot i midten.

Som näringsmedel är detta släkte det vigtigaste bland alla, så väl genom de ätliga arternas som individernas talrikhet. Ehuru flertalet äro ätliga (en del äro verkliga läckerheter), finnas likväl flera giftiga. Bland dessa är den *Lömska Rørsoppen* den allmänaste och giftigaste, af hvilken vi derför först lemna teckning. Den tillhör en särskild grupp, hvars alla arter lätt urskiljas från de öfriga genom porernas röda mynning, mer eller mindre nätadrig eller grynnig fot samt vid

brytning i luften blånande kött. Samtliga dessa äro giftiga och så mycket farligare, som de icke hafva någon skarp eller obehaglig smak.

Den egentliga *Lömska Rørsoppen* har dock ett misstänkt utseende och icke de präktiga färger, som den *Purpurfärgade*. Hatten är mörkt olivfärgad, yngre finluden, äldre något klibbig; porerna inuti gula, i mynningen röda och blåna liksom köttet i beröring med luften. Den växer öfver största delen af landet i löfskogar.

En annan i Tyskland under namn af *Satans-Pilz* (*Boletus Satanas* Lenz) bekant art är icke funnen hos oss; den har sämskfärgad hatt och mörkrödare, mindre lifligt färgade porer. Som allmän regel ihågkommes, att *alla arter med porer, hvilkas mynning är röd, förkastas som giftiga*.

Planchen föreställer svampen i naturlig storlek i åtskilliga former och genomsknitt.

*) *Sopp*, Isl. Sveppr, är den ursprungligt nordiska benämningen på svampar och den ännu i vissa landsorter brukliga. Namnet *svamp* (Mesog. Swams af Svimman, svam o. s. v.) tillhör ursprungligen Hafs-svamparna (Spongiae).

Tab. XIII. ÄTLIGA RÖRSOPPEN.

(Boletus edulis. BULL.)

FRIES Syst. Myc. 1. p. 392, Epicr. p. 420.

Efter att hafva framställt den giftigaste arten i Rørsoppssläktet, hvars skiljemärken under föregående blifvit uppgifna, öfvergå vi till en något snarlik art, som tillhör de mest sunda, valsmaktiga och födande, utomlands känd och högt värderad under namn af *pied de boeuf*.

Den *ätliga Rørsoppen* urskiljes lätt från alla genom sin tjocka, dynlika, släta, glatta, icke klubbiga, vanligen bruna hatt, sitt hvita i luftens beröring oföränderliga kött, sin mycket tjocka bleka fot med nätformiga ådror samt i början hvita, sedan gula porer, förenade till ett lager, som rundt kring foten lemnar en fördjupning, så att det ej är fastväxt med densamma. Fröstoftet är gult, smaken mild och angenäm.

Den *ätliga Rørsoppen* växer öfver hela landet både i barr- och löfskogar, vanligen i Augusti månad. Stundom växer den truppvis, oftast likväl spridd. Som den har en utmärkt köttig hatt och den mycket tjocka, yngre lökformiga foten tillika är användbar, så att endast porernas lager bortrensas, äro redan 4—5 stånd tillräckliga för en anrättning. Den kan användas både färsk och insyltad, aldeles som Champignonen; i min och fleras smak är den att föredraga framför dessa. Den tillredes

dels stekt, dels stufvad i ragouter o. s. v.; äfven rå kan den förtäras. Det är att beklaga, att de fattiga folkklasserna ej förstå att använda ett så lätt, utan all kostnad tillgängligt, födoämne. Arten har hos oss äfven med framgång blifvit odlad i likhet med Champignonen. Ragouten af denna svamp var en af H. M. Konung CARL JOHANS favorit-rätter, fast väl ingen torpare i Sverige f. n. anser sig så arn, att han skulle vilja förtära densamma.

Af denna art förekommer mera sällsynt en förändring med vit hatt, hvilken på lika sätt användes, äfvensom en mycket närbeslägtad art, Tyskarnes *Königs-pilz* (Boletus regius KROMBHOLTZ), hvilken utmärker sig tillika genom sin skönhet med rosenfärgad hatt. Den är hittills hos oss funnen på Rådaås i Westergöthland af framl. S. J. LINDGREN, som tecknat den vackra planeh deraf, som förvaras i Kongl. Vet. Akad. dyrbara samling. Några andra närbeslägtade arter skola i det följande afbildas och beskrifvas.

Tabellen framställer svampen i naturlig storlek.

Tab. XIV. STRÄFVA RÖRSOPPEN.

(Boletus scaber. (BULL.) FRIES.)

FRIES Syst. Myc. 1. p. 393, Epicr. p. 424.

Af samma släkte med föregående framställa vi här en art, som hvarken är giftig eller kan räknas till läckerheter, men likväl är sund och födande — och som vi anse för de fattigare för en af de aldri vigtigaste, emedan den af alla svampar är den snart sagdt allmänast och ymnigast förekommande under hela sommaren och hösten.

Den *Sträfva Rørsoppen* skiljes lätt från alla öfriga arter genom sin upptät afsmalande fot, som är mycket skroflig eller sträf af upphöjda värtor eller tilltryckta fjäll, sin kullriga, vanligen glatta och i regnväder något klubbiga hatt; dock utan den slenhinna, som hos flera andra betäcker densamma, och framför allt af dess hvita porer, som äldre blifva smutsfärgade af det rostbruna fröstoftet, hvilket icke återfinnes hos någon annan art. Porernas lager är tillika mera kulbrigt än någon annan arts, med en djup försänkning rundt kring foten.

Hattens färg hos denna art är mycket föränderlig, vanligen grå eller brun, men äfven helt hvit med grön anstrykning, gulaktig, nästan svart o. s. v. En mera utmärkt underart (*B. versipellis*) har rödbrun hatt, som alltid är finluddig, äldre fjällig, med en tydlig hinna, svarande mot andra arters ring, kring

de yngres hattkant. Den är till substansen äfven fastare och har fotens fjäll vanligen röda. Ehuru den otvifvelaktigt sammanflyter med den vanliga, har den så utmärkta karakterer och eget utseende, att den vanligen upptages som egen art, helst den flerstädes eger eget namn i Tyska folkspråket: *Rotterbulz*. I Syst. Myc. förenades de af mig, men KROMBHOLTZ och senare författare hafva ånyo åtskilt dem.

Arten förekommer, som redan nämnt är, öfver hela riket, i synnerhet i bergs- och skogstrakter och går högt upp på fjällen ofvan trädgränsen. Den insamlas derför med lätthet i stor mängd, men angripes lätt af insekt-larver.

Ehuru sund och födande, har denna art för den ovande en något sträf eller grof smak i jennuförelse med den föregående. Den kan derför icke räknas till läckerheter, men för fattigare folkklasserna erbjuder den hela sommaren ett ymnigt födoämne, ofjorligt bättre än andra så kallade nödrödsämnena. En af mina vänner, Mag. C. P. Laestadius, som sommaren 1858 vistades i Torneå Lappmarks obygd, beredde af denna art, kokad tillsammans med Renkött, en anrättning, som under en längre tid utgjorde hans hufvudsakliga näringsämne.

Tab. XV. BLEKA TAGGSVAMPEN.

*(Hydnum repandum. LINN.)*FRIES *Syst. Myc. 1. p. 400, Epicr. p. 506.*

Taggsvamparnes släkte (*Hydnum*) urskiljes vid första anblicken af sina syllika taggar på hattens undre sida, men hos några på träd växande arter öfvergår denna till korallika grenar eller oformliga klumpar eller oek utbreda de sig skorpligt utan hatt. Hos alla dessa återfinnas likväl taggarne, alltid vända ned eller mot jorden. Till substansen äro de likaledes mycket olikartade; alla ätliga äro köttiga, men flera arter äro kork- eller läderartade, några utmärkta af en egen vållukt, andra äro helt och hållet slemmiga (gelatinösa).

Bleka Taggsvampen, som är den allmänaste i släktet, urskiljes lätt genom sin bleka, mer eller mindre i gult stötande färg, sin köttiga, vanligen oregelbundna, i kanten vågiga hatt, som på ytan är slät (utan sprickor eller fjäll) och glatt. Taggarne vanligen olikformiga, ofta inskurna. — En underart häraf (*Hydnum rufescens* Pers.) har smalare fot, tunnare, mera regelbunden, på ytan finluden hatt, alltid likformiga taggar. Färgen är brandgul, stötande i rödt. Den upptages vanligen särskildt, men någon skarp gräns mellan denna och den vanliga finnes icke.

Ehuru Bleka Taggsvampen finnes öfver hela riket, förekommer den, utom i Bokskogar, ingenstädes i mängd. Den framkommer tidigt om sommaren och fortfar långt in på hösten eller samtidigt med Ätliga Chantarellen och insamlas vanligen jemte denna. Men då Chantarellen är fullkomligen mild, har denna en något skarp, pikant smak, hvarföre de oek lämpligen anrättas tillsammans. Så väl hatt som fot äro användbara, endast taggarne afskrapas, om man så behagar; oundgängligt nödigt är det icke.

I likhet med Chantarellen angripes den sällan eller aldrig af insekt-larver. Den kan derföre äfven torkad förvaras och ehuru då mera seg återvinner den sin sprödhet genom kokning. I likhet med flera andra svampar kan den i detta tillstånd användas pulveriserad. Som ingen bland Taggsvamparne är giftig, är ingen fara att förväxla den med någon annan. Af detta släkte skola i det följande lemnas afbildningar af de öfrige användbara arterna.

Tab. XVI. GYTTRADE TAGGSVAMPEN.

*(Hydnum corrugatum. FRIES.)**Syst. Myc. 1. p. 414, Epicr. p. 512.*

Till samma släkte som föregående art hörer äfven denna, men till en helt annan grupp, hvars arter endast förekomma på gamla trädstammar och sakna fot och tydlig hatt. Närvarande art bildar vanligen stora klumpar, bildade af flera, öfver hvarandra liggande, sammanväxta balkar eller outbildade hattar, hvilka sakna heständ, skarp kant. På öfre sidan äro dessa finludna, skrofliga eller knottriga, på undre sidan täckte af mycket långa, likformiga taggar. Färgen är hvit. Köttet är mjukt, ej fast och hårdnande, som hos en del förvandta arter. Storleken är mycket föränderlig; stundom bildar den tufvor af ett barnhufvuds storlek, men vanligen är den mindre, stundom enkel af ett äpples storlek. I allmänhet äro både formen och storleken mera föränderliga bland träd- än jordsvamparne.

Taggsvamparne tillhöra företrädesvis Skandinavien; Sverige ensamt har, enligt hvad man ännu känner, flera egna och högst egendomliga arter än alla öfriga jordens länder tillsammans. Närvarande art, som växer på gamla björkstöckar, är icke funnen utom Sverige. Den upptäcktes först i Småland på flera olika trakter och är sedermera funnen flerstädes, äfven i medlersta Sverige.

Bland ätliga Svamparter har denna hittills icke blifvit upptagen. Men redan rå utmärker den sig genom mild smak och ingen oangenäm lukt, så att man redan af dess yttre förhållanden kan anse den för användbar. Herr Brukspatron TAMM på Tvetaberg och Mag. C. P. LAESTADIUS, som ätit denna, hafva funnit den god och smaklig.

Tab. XVII. KRUSIGA BLOMKÅLS-SVAMPEN.

(Sparassis crispa FRIES.)

Syst. Myc. 1, p. 464. Epicr. p. 570.

Detta slägte, som först i Systema Mycologicum blef urskildt, är ett af de utmärktaste och mest egendomliga i svamparnas hela klass. Det har ingen latt, utan från en gemensam bas förgrenar det sig till en oräknelig mängd tunna, platta, jemte hvarandra liggande skifvor, som här och der sammanväxa med hvarandra. Det mest egendomliga är likväl, att fröredningen ntbildas på båda sidorna af dessa skifvor, hvilka således till sin bildning äro likartade med lamellerna på Skifflingarne.

Af detta slägte förekomma tvenne närförvandta arter, af hvilka den här afbildade Krusiga Blomkåls-svampen är den allmännaste. Den utmärker sig genom större grenighet, hvars skifvor äro mera intrasslade och gallerlikt med hvarandra sammanväxta (anastomosera); i spetsen äro de vanligen krusiga och nedböjda. Den växer för öfrigt mera på höjden, har ofta tydlig fot och uppnår storleken af ett källhufvud. Den förekommer uti barrskogar, helst nära gamla trädrötter, sällan mera än två, tre tufvor tillsammans, men är så stor, att en enda kan blifva tillräcklig för en mindre familj.

Den andra arten, *Sparassis laminosa*, eller Skifviga Blomkåls-svampen, är blott en gång hos oss funnen bland spånor af Ek i Skåne. Den växer mera utbredd och mindre på höjden, har aldrig fot, skifvorna ligga raka jemte hvarandra, ehuru äfven denna arts sammanväxa och slutas i en rak, helbräddad spets.

Båda arterna äro hvita, äldre något gulnande, färska spröda, men torkade eller kokta blifva de något sega. Smaken af den rå svampen är mild och angenäm. Äfven lukten egendomlig och inbjudande. Som födoämne räknas de med skäl till de mest sunda, närande och välsmakande. De stufvas vanligen jemte köttträtter och kunna äfven förtäras råa.

Som de med ingen annan svamp hafva någon yttre likhet, kunna de ieke med någon förveklas. I naturlig förvandtskap komma de greniga *Fingersvamparne* (*Clavarie*) närmast, hvilka i det följande skola afbildas.

Tabellen framställer ett större exemplar af den krusiga Blomkåls-svampen i naturlig storlek.

Tab. XVIII. MILDA FJÄLL-SKIFFLINGEN.

(Agaricus Lepiota exoriatuS SCHAEFF.)

FRIES Syst. Myc. 1, p. 21. Epicr. p. 13.

Redan under *Stolta Fjäll-skifflingen* hafva vi uppgifvit Fjäll-skifflingarnes skiljemärken. Med ofvannämnda art är den *Milda Fjäll-skifflingen* nära förvandt. Båda ega en fast, broskartad ring kring foten, som i början är fästad vid hattens kant, men sedermera lossnar, så att den kan föras upp och ned på foten utan att sönderslitas. Men närvarande art åtskiljes likväl latt genom mindre storlek, kortare och ofläckad, nedtill knappt uppsvallad fot och i synnerhet genom hattens tunna beklädnad, hvars yta är hvit, vanligen slät, silkesluden eller spricker sönder i föga märkbara fjäll. Skifvorna likna alldeles den *Stolta Fjäll-skifflingens*, men äro något mindre aflägsnade från foten.

Milda Fjäll-skifflingen växer i början af hösten på öppna, gräsväxta fält, i vissa trakter ymnig, men sparsamt i magrare bergstrakter. Den är utan lukt, har mild smak; dess egen-

skaper och användande äro alldeles lika med den *Stoltas*. Den eger till och med företräde för denna, genom sitt mindre mjuka (floccösa) kött. Foten, såsom seg, måste äfven hos denna förkastas.

En annan art af Fjäll-skifflingarnes flock, den *Fnasiga* (*A. L. nacinus*) liknar mycket föregående art, men den är väsentligen skild genom tunn, *foten vidfästad* hängande ring och tätt intill foten näende lameller, hvilka äldre stöta i rött. Den upptäcktes först på Skånes öppna fält, är sedermera funnen vid Stockholm, Tvetaberg i Södermanland m. fl. st. Enligt Herr Brkspatron TAMMIS försök är den i godhet fullt jemförlig med Champignonen.

Tab. XVIII föreställer svampen i naturlig storlek jemte genomsnitt.

Tab. XIX. GRÅHVITA MJÖL-SKIPLINGEN.

(Agaricus Clitopilus Prunellus Scop.)

FRIES Syst. Myc. 1, p. 193. Epicr. p. 148.

Närvarande flock hörer till den afdelning af Skifflingarnas atrika slägte, som utmärker sig genom blekrödt eller rosenfärgadt fröstoff, som nedfaller från skifvorna. Ut i denna afdelning skiljas Mjöl-skifflingarne lätt genom köttig hatt och fot samt på foten nedlöpande skifvor; de mera utmärkta arterna uti densamma hafva derjemte en angenäm lukt af färskt mjöl. Det är likväl blott tvenne arter bland dessa, som förtjena förordas som näringsmedel.

Gråhvita Mjöl-skifflingen har tät, vanligen nedtill uppsvälld fot af $1\frac{1}{2}$ —2 tum långd, $\frac{1}{2}$ tum tjocklek. Hatten är i början rund, kullrig, sedan plattare, mera sällan nedtryckt, på ytan hvit-pudrad eller glatt, af hvit-grå färg. Skifvorna på foten långt nedlöpande, hvita, af fröstoffet äldre rödlätta. Köttets hvita färg är oföränderlig.

Arten synes vara spridd öfver hela landet, men förekommer ingenstades i mängd. Vanligast träffas den i barrskogar, mera sällan i löfskog redan tidigt på hösten. Till egenskaper och användande kommer den närmast Musseronerna, från hvilka den i äldre tider ej särskildes. Af denna anledning är det mycket oviss och numera omöjligt att afgöra, om Scopoli verkligen menat med *A. Prunellus* närvarande art eller någon af Musseronerna. Detta är förhållandet med en mängd äldre arter, som icke genom plancher blifvit fastställda, hvarföre de ofullständiga beskrifningarne kunna hänföras till flera vida skilda arter.

Tab. XIX framställer arten i naturlig storlek.

Tab. XX. GULHVITA MJÖL-SKIPLINGEN.

(Agaricus Clitopilus Orcella BULL.)

FRIES Epicr. p. 149. Monogr. p. 280.

Denna art, hvars väsentliga kännetecken äro gemensamma med föregående, skiljer sig från densamma endast genom kortare (knappt tumshög), nedtill afsmalande, finluden fot; tunnare, i midten nedtryckt, oregelbunden eller i kanterna vågig hatt af hvitgul färg, mera tät sittande skifvor. Hattens yta kännes i våt väderlek något klibbig, i torr synes den nästan silkesluden och har oftare mörkare fläckar eller bälten. De kunde derföre gerna betraktas som förändringar af en art, men då de från äldre tider upptagits skilda, hafva vi bibehållit dem. Det torde här förtjena anmärkas, att då de flesta svampkännare sökt ätliga arter, har man ofta till ytterlighet särskilt dessa, under det att man bland de icke användbara sammanlagit de mest olikartade.

Gulhvita Mjöl-skifflingen förekommer mest i löfskogar och

är allmänare i de sydliga landskapen än i de norra. I medlersta Sverige är den dock, ehuru sparsamt, insamlad kring Upsala, Stockholm o. s. v. Hos oss har den knappast blifvit begagnad såsom näringsmedel. Men i S. Europa är den mycket värderad och insamlas under namn af *Orcella*. Sjelfve hafva vi icke haft tillfälle begagna den, men smaken och lukten äro inbjudande.

De öfriga arterna af denna flock äro alltför obetydliga och tunna att kunna användas. Den svartnande Mjöl-skifflingen (*A. Clit. immdulus*) kommer föregående arter nära, men skiljes lätt af sitt småningom svartnande kött.

Tab. XX framställer arten i naturlig storlek.

Tab. XXI. SKARPA KREMLAN.*)

(Russula emetica Fr.)

FRIES Syst. Myc. 1, p. 56. Epicr. p. 357.

Kremlorna (*Russulae*) utgöra en mycket naturlig, lätt igenkänlig och i våra skogar ytterst allmän grupp bland Skifsvamparna; men det är mycket svårt, utan att begagna mikroskopiska, för allmänheten obrukbara, uppgifva deras skiljemärken. De närma sig mest Pepparlingarne, men sakna alltid dessas mjölksaft. Skifvorna, som hafva ett mellanslag af hattens substans, äro ovanligt spröda och vanligen lika långa, utan talrika kortare inblandade emot kanten. Alla sakna ring eller spår till hylle; foten inuti mjuk med lösare väfnad. Hatten köttig, mer eller mindre nedtryckt i midten.

Bland Kremlorna finnas några åtliga arter, men äfven många giftiga och misstänkta, och, då deras säkra åtskiljande är synnerligen svårt, varnar man heldre för, än förordar deras användande. Släktets kännedom är likväl af vägt, så väl för dess ynniga förekomst, som giftiga arters utbudande till salu, hvilket jag haft tillfälle se i Stockholm.

Till de giftigaste arterna hör den här afbildade *Skarpa*

Kremlan, hvilken renast framställer släktets karakter, ehuru mindre allmän än en del andra arter. Den är mycket spröd, alla skifvorna äro lika långa och alldeles snöhvita (ej gulnande); hatten är högröd (äldre urblekt), i kanten strimmig, betäckt af en i våt väderlek lätt afskild slemaktig hinna. Fröstoftet hvitt. Smaken är skarp och brännande. Den växer vanligen bland mossor på fuktiga ställen i skogarne.

Den *äckliga Kremlan* (*R. integra*) är med föregående nära besläktad, men är mindre skarp, i början till och med mild, skifvorna öfvergå till gult och blifva äldre af det gulaktiga fröstoftet mjöliga. Den är mycket misstänkt. — Den *karmosinröda* (*R. rubra*) och *stinkande Kremlan* (*R. foetens*) skola i fortsättningen afbildas, såsom synnerligen giftiga, innan vi våga upptaga några af de säkert oskadliga.

Tab. XXI föreställer svampen i naturlig storlek.

Tab. XXII. MÖRKGULA RÖRSOPPEN.

(Boletus luteus LINN.)

FRIES Syst. Myc. 1, p. 386. Epicr. p. 409.

Trenne arter af Rørsoppar äro redan afbildade och släktets kännemärken uppgifna. Denna och följande tillhöra likväl en annan afdelning af släktet, hvilken från alla andra afviker genom en seg slemhinna, som betäcker hatten och lätt låter aflösa sig. De äro derföre i våt väderlek mycket slemmiga. Fröstoftet är mer eller mindre ockragult.

Mörkgula Rørsoppen skiljes mycket lätt genom sin ring på foten, hvilken på de yngre är tillika fästad vid hattens kant, och således helt och hållet betäcker det yngre fruktlagret. Foten är för öfrigt jemntjock, upptill fint grygig men icke nätadrig, till färgen blekare än hatten och fruktlagret. Ringen är hvit, med brunaktig anstrykning. Hatten är mycket köttig, kullrig eller dynlik, yngre betäckt af en tjock, brun slemhinna, som med åldern likväl upplöses och försvinner, då hatten blir mera gul med smutsiga fläckar. Köttet mjukt, nästan hvitt. Pipornas lager är jemnt fastväxt vid foten, gult, med små runda öppningar (porer). — En med denna närbesläktad art är den *'gulgula Rørsoppen* (*B. elegans*), som

är mycket vackrare, har renare höggul färg, gult kött o. s. v. Den är isynnerhet märkvärdig derigenom, att den först under senare årtionden blifvit införd hos oss, har sedan mycket spridit sig, men förekommer endast i närheten af Lärkträd.

Den *mörkgula Rørsoppen* är en af våra allmännaste och ynnigast förekommande svamparter öfver hela riket, äfven i Lappland, hela eftersommaren och hösten. Den växer på mera öppna ställen, vid vägar o. s. v., helst i barrskogar.

Genom sin ynnighet och lätthet att i stor mängd insamlas är *mörkgula Rørsoppen* en af de viktigare arter. Det är förträdessvis denna art, som användes af landtfolket i Ryssland, Böhmen o. s. v. Dervid bör likväl noga iakttagas, att så väl *hattens slemhinna först aflöses*, som pipornas lager på undre sidan bortrensas. Smaken är mild, men lös och slemmig, hvarföre den före anrättningen något torkas. Ehuru icke tillhörande de läckrare arterna är den en af de mest födande.

Tab. XXII föreställer svampen i naturlig storlek.

*) Namnet är bildadt efter det Tyska *Kremling*.

Tab. XXIII. GRYNIGA RÖRSOPPEN.

(Boletus granulatus LINN.)

FRIES Syst. Myc. I, p. 387. Epicr. p. 410.

Närbeslägtad med föregående; äfven dennes hatt är beklädd med lätt afflädd slemhinna, ehuru tunnare och mindre kläbbig. Föröfrigt är den lätt skild genom fullkomlig saknad af ring på foten, som är kort, fingrymig, icke nätadrig. Hatten är mindre kullrig, icke dynlik, rostfärgad, äldre gulaktig. Hattens kött är blekgult. Piporna fastväxta, stundom nedlöpande på foten, i mynningen små, runda, enkla, yngre gryniga.

Närbeslägtad med föregående och till sina egenskaper med denna öfverensstämmande är *Bol. bovinus* L., men den skiljes lätt genom piporna, som äro större, kantiga, inuti sammansatta af mindre pipor, i kanten icke gryniga.

Båda dessa arter äro likaledes mycket allmänna öfver

hela landet, likväl så att de synas utesluta hvarandra. *Bol. granulatus* förekommer der älfven är tallmosand, *B. bovinus* åter der älfven är rullstensgrus. Således finnes i Småland vid Femsjö endast den senare; vid Upsala finnes denne i Norbysko-gen, den förra åter i Parken o. s. v. Båda dessa arter växa vanligen truppvis tillsammans, hvarigenom de afvika från öfriga arter af detta släkte.

Båda dessa arters egenskaper och användande äro lika med den mörkgula Rørsoppens. Af dessa torde dock företrädet böra lemnas åt den *gryniga Rørsoppen*.

Tab. XXIII framställer arten i naturlig storlek.

Tab. XXIV. TUFVIGA TICKAN.

(Polyporus confluens (ALB. SCHW.) FR.)

FRIES Syst. Myc. I, p. 355. Epicr. p. 447. — *P. Artemidorus* LENZ.

Redan i första häftet (s. 10 Tab. VIII) uppgåfvor vi släktets gemensamma kännetecken. Den art, som nu framställes, är närmast beslägtad med *Får-tickan* (*P. ovinus*), ehuru så väl genom färg och yttre kännetecken, som smak och egenskaper från densamma väsentligen skild. Båda äro väl i friska tillståndet köttiga, med fast kött, men *Får-tickan* är mera spröd, den *tufviga Tickan* åter mera seg och äldre tillhårdnad. Smaken, som hos *Får-tickan* är mild, är hos närvarande art något bitter, hvarföre jag icke funnit den smaklig rå, såsom Dr LENZ uppgifver.

Tufviga Tickan växer i tufvor, ofta af en betydlig storlek, bestående af flera, mycket oregelbundna och liksom sammansmytande hattar, med kort eller ingen fot. Öfre ytan är glatt, slät (endast i torr väderlek sönderspricker den i rutor), till färgen föränderlig mellan tegelröd och mörkgul. Porerna på undre sidan små, fastväxta vid hatten, hvitaktiga.

Arten förekommer på jorden i bergiga barrskogar i stor mängd, f. ex. Upland, Södermanland, men i vestra provinserna har jag aldrig sett den. Det var den om svamparnes användande så högt förtjente Dr LENZ, som först införde den bland de ätliga svamparnes antal och högt uppskattar densamma. Mig har den likväl förekommit mindre smaklig, troligen af obekantskap med dess rätta beredning. Jag förmodar, att den bittra smaken bör under rostning försvinna. Den bör derföre närmare prövas, då den genom sitt rikliga förekommande kan blifva af stor vigt. Giftig är den icke.

Mesta likhet med föregående art har den *föränderliga Tickan* (*P. varius*), men den växer endast på träd, blir äldre trådhård, har nedtill svart fot o. s. v.

Tab. XXIV föreställer svampen så väl i yngre som äldre tillstånd.

Tab. XXV. OXTUNG-SVAMPEN.

(Fistulina hepatica Fr. Bolet. SCHÆFF.)

FRIES Syst. Myc. 1, p. 396. Epicr. p. 504. — Buglossus WAHLB.

Släktet *Fistulina* skiljes från alla närförvandta genom fruktlagret, som bildar fria, från hvarandra fullkomligt skilda rör eller pipor, som utskjuta från hattens undre sida, liksom piggarne på Taggsvamparna, fast de i öfrigt likna mera Rör-sopp-arternas pipor, utan att likväl som dessa förenas till ett sammanhängande lager. Från de sistnämnda skiljer det sig afven genom växtstället på trädstubbar, sin oregelbundna eller halfva hatt o. s. v.

Af detta slägte finnes i Europa blott en enda art, växande hösttiden på gamla ekstubbar. I södra Sverige förekommer den i mängd, och afven i medlersta f. ex. i Upsala-trakten är den icke synnerligen sällsynt. Genom sin brunröda färg o. s. v. liknar den en lever, men ännu mera genom sin form och knottiga yta en oxtunga. Denna likhet blir ännu mer i ögonen fallande, då man genomskär densamma; den är inuti

blekt köttfärgad, trädigt utsträlände mot ytan. Öfre sidan blir aldre mycket lös, nästan slennig; undre sidan är, innan piporna utväxt, knottig, vitaktig. Till form och storlek är den högst föränderlig, vanligen saknande fot, men ofta skaftad genom ena kantens förlängning. Den angripes icke af Insektlarver.

Oxtung-svampen lemnar en sund och närande spis; jag har afven förtärt den rå med peppar och attika som sallat. Vanligen förtäres den stufvad eller stekt. Före anrättningen afskiljes så väl det öfre slenniga lagret, som piporna.

I Norra Amerika finnes en annan art af släktet med lång fot och rot; den är seg, hårdnande och icke ätlig.

Tab. XXV föreställer Oxtung-svampen i naturlig storlek — samt särskildt piporna förstörade.

Tab. XXVI. HÖGGULA FINGERSVAMPEN.

(Clavaria flava Fr.)

FRIES Syst. Myc. 1, p. 467. Epicr. p. 571.

Efter Hattsvamparna, hos hvilka fruktlagret endast bekläder hattens undre sida och derföre alltid är vänt emot jorden, följa *Klubb-* och *Fingersvamparne*, hos hvilka all hatt saknas och fruktlagret öfver allt bekläder de upprättstående stänglarne eller grenarne. De egentliga *Fingersvamparne* sakna skild fot, ty bälten förgrenar sig i en mängd trinda grenar, men dessa sammanflyta så utan all gräns med *Klubbsvamparne*, att båda tillhoppa utgöra ett slägte: *Clavaria*.

Den *Höggula Fingersvampen* bildar en tät tufva af upprätta, trinda, tätt närstående, nästan jemmhöga, citron- eller svafvelgula grenar, hvilka nedtill äro förenade i en tjock, vitaktig bäl. Grenarne äro utmärkt spröda och afbrytas lätt, hvarigenom jente det hvita fröstoffet de lättast skiljas från den *Ockragula Fingersvampen*, som har mörkare färg och gult fröstoff. Det är den sistnämnda (*Clavaria aurea* SCHÆFF.), som

af *PERSOON* och de fleste författare förstås under *Clavaria flava*. Den *Höggula Fingersvampen* finnes temligen allmänt öfver hela riket i löfskogar, stundom afven i barrskog.

Ingen af släktets arter är känd som giftig, men flera arter med gulaktigt fröstoff hafva en bitter oangenäm smak och äro sega, hvarföre de som näringsmedel förkastas. Till dessa hör den ofvannämnda *Ockragula*, hvilken för sin seghet och mindre smaklighet icke användes. Deremot räknas den *Höggula* (jente *Druftsvampen*, *Clavaria Botrytes*, hvilken i följande häfte skall afbildas) till de läckraste och sundaste svampar. Smaken är mild, angenäm. Endast bälens nedersta del bortrensas. Den anrättas på lika sätt med *Blomkålssvampen*.

Tab. XXVI föreställer svampen i naturlig storlek.

Tab. XXVII. SKARPA PEPPARLINGEN.

*(Lactarius piperatus (Scop.) Fr.)*FRIES *Syst. Myc.* 1, p. 76. *Epicr.* p. 340.

Pepparlingarne utgöra en egen underafdelning af Mjölkskifflingarnas redan beskrifna slägte. Från de redan afbildade *Riskorna* skiljas de lätt genom sin ursprungligen hvita mjölksaft, som likväl stundom i beröring med luften öfvergår i gult, rött eller violett. Från *Brötlingarna* åter afvika de genom skifvornas rena, oföränderliga färg och saknaden af det fina doft, som öfverdrager *Brötlingarnas*. *Pepparlingarne* är bland de få svamparter, som redan från äldre tider varit upptagna bland ätliga (LINNÉ, RETZIUS och LILJEBLAD), men osäkerheten i arternas bestämning har vållat, att man förväxlat under detta namn trenne, af hvilka en är giftig och en misstänkt, hvarföre vi ansett nödigt framställa alla tre efter naturen tecknade och först den skarpa Pepparlingen, såsom bestämdt giftig (ehuru möjligtvis den genom det skarpa ämnets afsondrande kan göras oskadlig).

Den *skarpa Pepparlingen* utmärker sig genom hvit färg; kort, tjock, tät fot; mycket köttig, i midten nedtryckt och

äldre trattlik hatt, som hvarken i våt väderlek blir kläbbig eller i kanten är långhärig; köttet är synnerligen fast, med rik, ytterst brännande mjölksaft; skifvorna mycket smala, tät sittande, nedlöpande på foten. Mycket närbeslägtad är den *hulna Pepparlingen* (*Lactarius vellereus*), men hatten är hos denna mera kullrig (ej trattlik), öfverallt luden, skifvorna bredare och mera åtskilda.

Det är mig icke bekant, att den hos oss någonsin blifvit använd till födoämne, ehuru det är just denna, som af svampkännare antages för den äkta Pepparlingen, fast detta namn rätteligen tillhör en annan art. Vi kunna icke annat än varna för dess användande till föda. Äldre författare tillskrifva den medicinska egenskaper, såsom ett verksamt medel mot stenplågor, troligen utan all grund.

Tab. XXVII framställer svampen i naturlig storlek.

Tab. XXVIII. SKÄGGIGA PEPPARLINGEN (*Falska Riskan*).*(Lactarius torminosus (SCHÆFF.) Fr.)*FRIES *Syst. Myc.* 1, p. 63. *Epicr.* p. 334.

Denna mycket allmänna art är en af de få arter, som hos oss blifvit insamlade och begagnade som födoämne, i förmodan, att just denna vore den *äktä Ri kan*, ehuru vida och lätt skild genom sin *hvita mjölksaft* och i kanten *inrullade skäggiga hatt*. Arten är för öfrigt till storlek, form och färg ej olik den äkta Riskan. Foten är vanligen slät, blek, äldre ihållig. Hatten i midten nedtryckt, köttfärgad eller blekgul, oftast med mörkare bälten eller ringar. Köttet är lösare än hos de öfrige. Skifvorna tunnare, hvita.

Arten är allmän på öppna, gräsväxta fält, ofta tidigt i Augusti månad efter ihållande regnväder. En närbeslägtad art, den *gropiga Pepparlingen* (*Laetarius serotius*), växer på fuktiga ställen i barrskogar och skiljes lätt af sin gula färg, större, ihålliga, på ytan gropiga fot och hvita, i luften genast svafvelgula mjölksaft. Som födoämne är denna förkastlig.

Den *skäggiga Pepparlingen*, rostad eller stekt öfver sakta eld, är till smaken icke olik Riskan, men synes för vissa personer vara skadlig och förorsaka underlivsplågor (hvilket äfven det latinska namnet antyder). Utomlands räknas den alluänt till de giftiga arterna, och äfven här hafva personer försäkrat mig att de efter dess förtärande befunnit sig illamående. Deremot hafva andra försäkrat mig att de i sällskap med flera personer förtärt hela fat af densamma utan olägenhet. Artens användande kräfver derföre stor försigtighet, men det har ansetts af vigt lemna trogen teckning af densamma för att undanröjda den vanliga förvexlingen med den *äktä Riskan*.

Tab. XXVIII framställer arten i naturlig storlek.

Tab. XXIX. RODNANDE PEPPARLINGEN.

(Lactarius controversus P.—Fr.)

FRIES Syst. Myc. 1. p. 62, Epicr. p. 335.

Denna art är en medelform mellan de båda föregående. Till form, färg samt fotens täthet och fasta kött liknar den *Skarpa Pepparlingen*, men hattens kant är i början inrullad, något luden (dock icke så skäggig, som föregåendes), och på dess yta finnas vanligen rödaktiga fläckar, liksom afbrutna bälten; mjölksaften är sparsammare och mindre skarp, och skifvorne blifva äldre köttfärgade, aldrig gulnande. Till den *Skäggiga Pepparlingen* närmar den sig genom sin inrullade, i början ludna kant, anlag till bälten på hatten, mindre ynnig och brännande mjölksaft, men är tydligen skild genom sin täta fot, sitt fasta kött, hattens hvita färg och rodnande skifvor. Smaken på den friska svampen är äcklig, skarp, men icke brännande.

Arten växer helst på öppna, gräsbevuxna fält, helst i löskogar och parker, och synes kräfvä bördigare jord än de båda föregående. I Skåne, kring Stockholm och Upsala förekommer den ofta i mängd, men i Västra Småland fann jag den aldrig.

Hvilken art äldre författare afsett, då de upptagit *Pepparlingen* bland ätliga svampar, är svårt att afgöra. LINNÉ har under detta namn förväxlat flera arter. Artnmärket (diagnosen) tillhör uppenbart denna; men beskrifningen under α tillhör tydligen föregående (afarten β kan icke hänföras till någon känd art.) Enligt BULLIARD och VITTADINI skall närvarande art vara den ätliga och (enligt den förre) i största mängd förtäras af landtfolket i Frankrike. Sjelf eger jag likväl ingen bestämd erfarenhet; arten har rå förekommit mig osmaklig, hvarföre den förordas till nogare, varsamma försök. Men då *Pepparlingen* allmänt upptagits bland ätliga svampar, har först varit nödvändigt att klart framställa de arter, som under detta namn förväxlats.

Tab. XXIX framställer arten i naturlig storlek.

Tab. XXX. ÄNGS-VAXSKIFLINGEN.

(Hygrophorus pratensis P.—Fr.)

FRIES S. M. 1. p. 99, Epicr. p. 326.

Vaxskifflingarne (*Hygrophori*) skiljas icke utan svårighet från de egentliga Skifflingarne derigenom, att hattens kött nedtränger mellan skifvornas båda binnor och bildar mellan dessa en tydlig skiljevägg, hvarigenom skifvorna blifva tjockare och icke låta klyfva sig i tvenne hinnor. Deras fruktlager är merendels vaxartadt, med vattenaktig (ofärgad) saft. Men ehuru slägtet är svårt genom säkra kännetecken bestämma, bildar det en högst naturlig grupp, som icke utan att rubba naturliga ordningsföljden kan fördelas bland de olika Skifflingarnas afdelningar, hvilka de eljest skulle tillhöra. Tvärtom visa de mera förvandtskap med *Chantarellerna*, från hvilka en del arter endast skiljas genom skifvornas tunna egg eller kant.

Ängs-vaxskifflingen tillhör den afdelning (*Camarophylli*) af släktet, som afviker från *Limacia* genom saknaden af det slemmiga hylle, som hos dessa bekläder hatten och den af fina vårtor vanligen sträffa foten — och från *Hygrocybes*, utmärkta genom höga, lysande färger, vanligen scarlakansröda eller ci-

trougula, genom sin fasta, icke vattenaktiga byggnad. Arten skiljes från de öfriga närbeslägtade genom tät, nedtill afsnallande, glatt fot, äldre päronformig, glatt hatt, hvilken i midten är köttig, men i kanten tunn, och långt åtskilda, bågformigt krökta och på foten nedlöpande skifvor. — Af densamma finnas trenne skarpt åtskilda färgförändringar, som icke genom mellanformer öfvergå i hvarandra, men för öfrigt ej erbjuda några skiljemärken, neml. en brandgul, en grå och en hvit.

Arten är senare på hösten mycket allmän på gräsbevuxna eller mossslupna ängar, t. o. m. torra baeakar, öfver hela landet. Den har mesta likhet med *Chantarellen*, ehuru skifvorna äro mera utbildade och icke trubbiga i kanten. Den är luktlös, har mild smak och är närande och anrättas på lika sätt som vanliga *Chantarellen*. Den angripes icke af insekt-larver.

Tab. XXX framställer olika färgförändringar af Ängs-vaxskifflingen.

Tab. XXXI. MILDA BROKSVAMPEN.

(Marasmius Oreades BOLT.—FR.)

FRIES S. M. I. p. 127, Epicr. p. 379.

De egentliga Broksvamparne äro i allmänhet mycket små och lätt öfversedde, men afvika från de öfriga uti Skifflingarnes stora slägte genom sin seghet och saftlöshet, hvarföre de icke förruttna, utan blott förtorka och vid regnväder åter qvickna till, i likhet med Lafvar och Mossor. Skifvorna, som ofta mera likna ädror, blifva äldre läderartade, men i kanten alltid hela. Foten är brosk- eller horn-artad, af amman byggnad än skifvornas fäste. För sin obetydlighet kunna dessa icke räknas till näringsmedel; men deremot äro några arter berömda som kryddor och förtjena derföre uppmärksamhet.

Den Milda Broksvampen hör till de större arterna i detta slägte; hatten, eluru tunn, är köttig, seg, i början kullrig, blekt köttfärgad, äldre platt, urblekt vitaktig; skifvorna fria från foten, breda, icke tätt sittande, hvitbleka. Företrädesvis utmärker den sig genom sin smala, täta, mycket sega fot, hvilken är beklädd af ett lager af ludd, som lätt afskrapas från fotens inre broskartade del. Denna art, som genom mindre läderartade skifvor vida mer än någon annan art i slägtet närmar sig de egentliga Skifflingarne, är växande mild

och nästan utan lukt, men erhåller torkad mycket angenäm lukt, liknande Neglikors.

På torra backar och gräsväxta fält är denna en af de allmänaste svamparter i hela landet. Den framkommer tidigt efter regnväder sommartiden, någon gång redan om våren. Den växer vanligen i ringar eller radvis.

Eluru ätlig och välsmakande är den som näringsmedel af föga vigt, men mycket eftersökt och värderad som krydda på köttsuppor o. s. v., hvilka den meddelar en ganska angenäm smak. Den insamlas i torr väderlek, foten frånrensas, hvarefter den torkas och kan längre tid förvaras på torrt ställe. Äfven en mindre portion deraf tillsatt soppor och ragouter gifver dessa smak af Champignoner.

Marasmius urens är med den förra närmast beslägtad, men lätt skild genom större, mera läderartad hatt, nedtill ullig fot, skarp, brännande smak. Den är icke användbar, sannolikt giftig.

Tab. XXXI framställer arten i naturlig storlek.

Tab. XXXII. LÖK-BROKSVAMPEN

(Marasmius scorodonius Fr.)

S. M. I. p. 130, Epicr. p. 379.

En mindre art af samma slägte, som föregående, utmärkt genom stark, men icke oangenäm lukt af Lök. Den igenkännes från öfriga lökluktande arter af detta slägte genom sin pipiga, korta (1 tunn), glänsande, rödbruna fot, som nedtill är alldeles glatt, icke rotligt förlängd, utan liksom inympad i mindre qvistar och på ris; vidare genom sin tunna, yngre rödaktiga, äldre hvita, platta, krusiga hatt samt vid foten fastväxta, hvita, äldre krusiga skifvor.

På nedfallna grenar, vissnade risqvistar af Ljung, Lingonris o. s. v. är denna art icke sällsynt och synes förekomma i alla landskaper, på passande växtställen ofta i mängd.

Eluru arten icke är af synnerlig ekonomisk vigt, hafva vi ansett dess upptagande i historiskt afseende ej vara utan intresse, emedan den från äldsta tider varit använd som krydda för att gifva anrättningar en mild löksmak. (Den kallades af äldre författare Agaricus Apicii, efter en bekant Romersk gastronom.) Den insamlas och förvaras på samma sätt som föregående, men kan mindre länge förvaras, emedan löklukten fördunstar.

Broksvamparne äro till en stor del utmärkta genom sin egendomliga starka lukt. *M. foeniculaceus* utmärker sig genom lukt af Fenkol, andra åter af stinkande lukt såsom *M. foetidus*, *impudicus*, *perforans*. Icke mindre än 7 kända arter hafva tydlig löklukt, men af dessa är den ofvananförde den enda som krydda använda. Alla lökluktande Skifsvampar tillhöra detta slägte.

Nagelskifflingen (*Agaricus esculentus*), som vartiden, straxt efter snösmältningen, i mängd framkommer särdeles i barrskogar, är till storlek och form ej olik Lök-Nagelsvampen, men luktlös; foten är gulaktig och förlängd till en lång rot, hatten brungul, och genom skifvornas beskaffenhet tillhör den ett annat slägte. Eluru obetydlig till storlek insamlas den i Kärnten och flera ställen i mängd till näringsmedel. Vi torde i fortsättningen komma att lemna afbildning af densamma.

Tab. XXXII framställer arten i naturlig storlek.

Tab. XXXIII. FJÄLLIGA TAGGSVAMPEN.

*(Hydnum imbricatum L.)*FRIES *Syst. Myc. I. p. 398, Epicr. p. 505.*

Af Taggsvamparnes redan beskrifna slagte är närvarande art den ymnigast förekommande. Hatten är mycket köttig, platt eller i midten nedtryckt, betäckt af ett tjockt, sammanhängande ludd, som sönderspricker i rutor eller grofva fjäll, som betäcka den mörkbruna hattens yta. Foten är mycket kort, nedtill vanligen afsmalnande, grå. Taggarne på hattens undre sida äro enkla, syllika, hvitaktiga, slutligen mörkare, något nedlöpande på foten; vid beröring lossna de lätt från hatten. Till storleken är den mycket föränderlig, uppnår stundom ett kvarters bredd. På den äldre svampen och i regnväder lossna ofta fjällen, så att hatten blir nästan slät.

I barrskogar är denna en af de allmänaste och ymnigast förekommande öfver hela riket. Den framkommer vanligast efter regnväder i September.

Arten är ätlig och närande, men har en skarp smak, som genom kokning måste afsöndras, innan den blir smaklig. Ehuru

den allmänt begagnas i de länder, der svampar ymnigare användas som näringsmedel, har jag funnit den stekta svampens smak sträf. Antingen detta beror af mitt enskilda tycke eller mindre passande beredning, kan jag ej afgöra. Annars lemnar arten genom sin storlek, köttighet och ymniga förekommande ett viktigt näringsmedel.

Flera med denna närbeslägtade arter med likaledes köttig, men slät eller mindre fjällig hatt öfverensstämma äfven till egenskaper och användande. Deremot finnas några andra till formen liknande arter, men med kork- eller träd-artad hatt, som för sin seghet oah hårdhet icke äro användbara. En af dessa, *H. suaveolens*, är mycket märkvärdig för sin angenäma vällukt och blåaktiga färg.

Tab. XXXIII framställer arten i naturlig storlek.

Tab. XXXIV. KORALL-TAGGSVAMPEN.

*(Hydnum Coralloides Scop.)*FRIES *Syst. Myc. I. p. 402, Epicr. p. 511.*

I svamparnas på egendomliga och afvikande former så rika klass utmärka sig Taggsvamparne framför andra genom en mängd egendomliga former. En af dessa är den märkvärdiga Korall-Taggsvampen, hvilken, utan att bilda hatt, upplöser sig i en mängd grenar i likhet med Fingersvamparne, men fröredningen bekläder icke här omedelbart grenarna, utan är inskränkt till taggarna på grenarnes mot jorden vända sida, så att dessa synas lagervis öfver hvarandra nedhängande. Taggarne äro enkla, syllika, utväxta fullt $\frac{1}{2}$ tum, långa. Hela svampen bildar tufvor af ett kvarters höjd och bredd. Färgen är yngre vit, öfvergår äldre något i gult.

På gamla murkade Bokstoecker är denna art i södra Sverige icke sällsynt och derstädes icke funnen på annat trädslag. Men den förekommer, ehuru sparsamt, i mellersta Sverige på Gran och Björk.

Arten är icke blott ätlig och födande, utan tillika välsmaklig, men bör insamlas ung, ty äldre blir den något seg. Dess användande är lika med Fingersvamparnas.

Närmast beslägtad med denna art är *Igelkottsvampen* (*H. Erinaceus*), men den utbildas icke till grenar, utan bildar endast runda eller hjertlika hängande klumpar, utan någon utstående kant. Taggarne äro öfver tumslånga, syllika, men nedtill greniga. Äfven denna upptages bland ätliga arter, men blir ännu mera seg (spongiös) och förekommer blott i enstaka tufvor på Ek- och Bok-stammar mycket sällsynt uti S. Sverige.

Tab. XXXIV framställer Korall-Taggsvampen i naturlig storlek.

Tab. XXXV. DRUF-FINGERSVAMPEN.

(Clavaria Botrytes PERS.)

FRIES Syst. Myc. I, p. 472. Epicr. p. 571.

Af Fingersvamparnes släkte (*Clavaria*) är i förra häftet afbildad en ätlig art; den nu framställda är ännu läkrare och allmänt högt uppskattad som näringsmedel. Den skiljes lätt från den Höggula Fingersvampen genom en tjockare, vanligen oförmlig hæl, hvaremot grenarne äro mera onthildade och oreghlundna. Lättast igenkännes den af sina i spetsen rödaktiga grenar; färgen är för öfrigt blek, stundom blekröd, stundom gulaktig och någon gång aldeles hvit. Lukt ingen, men smaken äfven på den rå svampen angenäm. Hela svampen är mör och grenarne mycket spröda.

I södra Sveriges hokskogar förekommer denna sköna art regnfulla somrar ofta i mängd; mycket torra har jag vanligen sökt den förgäfvets. I mellersta Sverige är den sällsynt, dock funnen vid Upsala och i Södermanland. — Den äkta Druf-fingersvampen har hvitt fröstoff; då detta af en del författare uppgifves gult, förekommer troligen en annan lika färgad art af

detta släkte, förhållande sig till den äkta, som den Mörkgula fingersvampen till den Höggula.

Denna art är, såsom redan blifvit anmärkt, en af de läkraste. Den anrättas helst stufvad. Äfven rå kan den förtäras, och verkliga kännare föredraga t. o. m. detta sätt, ehuru det, i likhet med Ostron, fordras någon vana innan man föredrager dem i deras naturliga friskhet.

I södra Sverige finnes en mycket skön art (*Clavaria amethystina*) af högbå eller mörkt violett färg, men med mycket tunnare hæl, längre och smalare grenar, hvilken äfven är ätlig. Öfriga arter af detta släkte äro dels för ohetydliga att insamla, dels för deras bittra smak förkastliga.

Tab. XXXV framställer Svampen i naturlig storlek efter exempl. samlade i Småland vid Pemsjö.

Tab. XXXVI. HONUNGS-SKIFLINGEN.

(Agaricus Armillaria melleus VAHL.)

FRIES Syst. Myc. I, p. 30. Epicr. p. 22.

Närvarande art tillhör en mindre flock (*Armillaria*) af de genom hvitt fröstoff utmärkta Skifflingarne, hvilken skiljes sig från Fjäll-skifflingarne genom foten, som sammanflyter med hatten eller omedelbart uthreder sig till hatt, då hos Fjäll-skifflingarne hatten är skild från foten och skifvorne aldeles fria från densamma. Från alla öfriga afdelningar med hvitt fröstoff är nämnde flock skild genom tydlig ring på foten.

Honungs-skifflingen skiljes mycket lätt från alla närbeslägtade genom sin mörkt honungsgula färg, genom sin sega, tunna, i kanten strimmiga hatt, hvilken är fjällig af mörkare hårtofsar, sina på foten nedlöpande, mindre tätt sittande skifvor, från hvilka fälles ett ymnigt fröstoff, hvaraf så väl skifvorna som närstående hattar äldre synas heströdde med ett fint, hvitt mjöl. Foten är smutsfärgad, på ytan mycket finträdig och upptill försedd med en foten vidhäftad, utstående ring.

Denna öfverallt allmänna, men mycket föränderliga art växer så väl på trädstammar och vid trädens rötter som på

jorden. I förra fallet växer den i stora tufvor, på jorden mera spridd.

Hos alla Tyska Författare prisas denna, under namn af Hallimaseh, som en förträfflig och till föda allmänt begagnad art. Så väl för dess seghet som bittra oangenäma smak har denna uppgift likväl alltid förekommit mig misstänkt. Jag är nu fullt förvissad, att nämnda uppgift hvilat på en förvexling med *Agaricus mutabilis*, och att närvarande art icke blott är o användbar, utan tillika giftig, enligt noggranna försök af Dr. Paulet. En hund, med hvilken han verkställde sina rön, dog efter dess förtärande. Tvärt emot den vaekra orlofsedel arten erhållit af Tyska författare, måste vi således varna för dess användande.

Figuren föreställer arten i naturlig storlek.

Tab. XXXVII. RUNDA STOCK-SKIPLINGEN.

(Agaricus Pleurotus ulmarius BULL.)

FRIES Syst. Myc. I, p. 186. Epier. p. 130.

I Skiflingarnas stora slägte finnas tvenne naturliga floccar, hos hvilka foten antingen alldeles saknas eller är fastad vid eller närmare den ena kanten, icke midt under hatten. De växa nästan alltid på gamla trädstammar, efter hvilkas olika läge de antaga flera olika former. Den ena af dessa floccar (*Pleurotus*) har hvitt fröstoff, den andra (*Crepidotus*) rostfärgadt.

Närvarande art tillhör den förra gruppen och den afdelning deraf, som har foten ej fastad i kanten, utan på hattens undre sida, dock mer eller mindre närmad ena kanten. Foten är styf, tät, ofta krumböjd, nedtill uppsvåld, finluden, nästan hvit, utan ring. Hatten köttig, i början kullrig, sedan platt, glatt, slät, i våt väderlek fugtig, men ej klabbig; färgen grå-

blek, ofta spräcklig (marmorerad) af runda, vattenaktiga fläckar; köttet fast, hvitt. Skifvorna vid vidhäftningen på foten liksom urnupna, ej fastvuxna vid eller nedlöpande på densamma, breda, tätsittande, hvita. Lukt och smak något syrliga.

Arten är temligen allmän, helst på senhösten, på gamla löfträds-stammar såsom alm, bok, asp, ek o. s. v.

Bland de flera arter af Stock-Skiflingarne, som uppgifvas ätliga, torde denna i främsta rummet förtjena uppmärksamhet. Rå är den ej användbar.

Planchen framställer arten i flera former.

Tab. XXXVIII. PRÄKTIGA CHAMPIGNONEN.

(Agaricus Psalliota augustus Fr.)

Epier. p. 212.

Redan i första häftet fastade vi uppmärksamheten på Champignonernas grupp och angäfvö såväl deras gemensamma kännetecken som flera med den *Allmänna Champignonen* förvandta arter, hvilka till egenskaper och användande med densamma i det närmaste öfverensstämma. Då vi likväl funnit, att tvekan uppstått om deras användbarhet, hafva vi ansett nödigt äfven af dessa lemna trogna afbildningar.

Den *Präktiga Champignonen* är den största af arterna, åtminstone den resligaste. Foten är vanligen ett kvarter lång, 1—2 tum tjock, tät, fast, glatt, med en ofvanifrån nedhängande ring (*annulus superus**), som på undre sidan är rutigt fjällig, en antydning till den dubbla ringen hos *Allmänna*

Champignonen. Hatten, i början klotrund, blir äldre utbredd, $\frac{1}{2}$ fot och deröfver bred, i midten gulbrun, förofrigt vitgul, med små brunaktiga fjäll. Skifvorna äro smala, längre skilda från foten, än hos öfriga arter, så att de lemna en bar ring omkring densamma, och förblifva länge hvita, först gamla sotfärgade eller bruna af fröstoffet, men aldrig rodnande.

Denna art, som först urskildes i skogarne omkring Upsala, är sedan äfven funnen i Östergötland och förekommer sannolikt flerstädes.

Planchen framställer ett mindre exemplar af arten.

*) Ett af de viktigaste skiljemärken mellan närförvandta arter erbjuder ringen, antingen den börjar och nedhänger från fotens spets (*annulus superus*) eller börjar vid fotens bas och fastvuxen bekläder denna såsom en slida, till dess den afbrytes af den utstående kanten (*a. inferus*). Ofta är den likväl fastad midt på foten, utan att man kan följa dess utgång från spetsen eller basen (*a. medius*).

Tab. XXXIX. LÄCKRA CHAMPIGNONEN.

(Agaricus Psalliota cretaceus Fr.)

Syst. Myc. 1, p. 280. Epicr. p. 213.

Skiljes från de öfriga genom ihålig, upptill afsmalnande, slät fot — försedd med enkel ring, som visserligen är nedhängande, men i kanten vanligen uppåt vänd —, i början klocklik, sedermera platt, krithvit hatt, yngre utan fjäll, länge oföränderligt hvita skifvor, som äro något skilda från foten och mot kanten betydligt bredare. — På grund af de länge oförändradt hvita skifvorna förväxlas den lätt med några *Fjäll-Skiflingar*; dock blir färgen hos de äldre först ljusröd, slutligen svartbrun.

Förekommer på gräsbevuxna fält, sednare på hösten än de föregående. I Skåne fann jag den i stor mängd; i mellersta Sverige har den endast mycket sparsamt blifvit sedd. Synes vara allmän i Södra Europa.

Utländska författare anse denna för den läckraste af alla Champignon-arter; — PAULET benämner den "den utsöktaste" (*Hypophyllum exquisitum*).

Agar. (*Lepiota*) *holosericeus*, som hittills endast blifvit funnen i Skåne, har med denna en utomordentlig likhet, så att äfven en svampkännare blott med svårighet förmår skilja dem i yngre tillstånd, hvaremot den förres alltid hvita skifvor och hvita fröstoff häfva hvarje tvifvel vid bestämmande af äldre exemplar. Sannolikt är äfven *A. holosericeus* ätlig, ehuru ännu ej undersökt.

Fig. framställer arten i naturlig storlek.

Tab. XL. STINKANDE KREMLAN.

(Russula foetens Pers. Fr.)

Syst. Myc. 1, p. 59. Epicr. p. 359.

Kremlornas gemensamma kännemärken äro redan ofvan (sid. 17) angifna, men närvarande art, en af de utmärktaste i släktet, afviker i flera afscenden från de öfriga. Skifvorna äro nemligen tunna, tättsittande och olika långa eller gaffelgreniga samt utsippa i våt väderlek vattenaktiga droppar, hvilka afdunstade kvarlemnna mörkare fläckar på de bleka skifvorna.

Arten är för öfrigt bland de största i släktet och ovanligt styf, men tillika spröd, till färgen oföränderlig. Foten är tjock, yngre kort och tät, äldre ihålig och förlängd (2—3 tum). Hatten är endast i midten köttig, i omkretsen himnaktig, så att den genom undre sidans skifvor blir färad mellan upphöjda, knotttriga åsar. Den yngre hatten är nästan klotrund med inböjda kanter, liksom uppblåst; äldre blir den

utbredd eller tillbaka-böjd, ofta i kanten vågig; färgen smutsigt mörkgul eller brungul. I våt väderlek är hatten klibbig, men dess öfre hinna kan ej afdragas. Skifvorna hvita eller något åt gult stötande.

Den Stinkande Kremlan är en af de allmännaste arter, såväl i löf- som barr-skogar. Efter regnväder framkommer den ofta redan under sommaren i stor mängd.

Arten är giftig. Den skarpa smaken och stinkande lukten (som dock i torr väderlek stundom är omärklig) synas tillräckligt varna för dess användande. Likväl har jag i Stockholm sett den till salu utbudas jemte ätliga arter.

Planchen framställer svampen i olika åldrar.

Tab. XLI. PURPURFÄRGADE RÖRSOPPEN.

(Boletus purpureus FRIES.)

Epic. p. 419. — Kromb. t. 37, f. 12—15.

Af Rørsopp-släktet hafva redan flera allmänna arter blifvit framställda; men då detta släkte är såsom näringsmedel kanske det viktigaste, förtjena äfven åtskilliga mera sällsynta uppmärksamhet. Vi upptaga af dessa här nedan trenne arter, af hvilka denna tillhör de giftigaste, de tvänne följande åter de läckraste.

Den Purpurfärgade Rørsoppen står närmast *den Lömska* (*B. luridus*), från hvilken den skiljes genom sin högröda, icke klubbiga hatt, sin gula med purpurfärgade ådror eller prickar beströdda fot och mindre blånande kött. Tvenne förändringar förekomma: en med ljusare, rosenfärgad hatt och en med purpurrod. — Då dessa arters skiljemärken endast heintas från färgen, är väl möjligt, att de bero af någon olika kemisk beskaffenhet hos växtstället. KROMHOLTZ förenar denna med

B. Satanus, en hittills i Sverige osedd art, från hvilken den mer synes afvika.

Förekommer i löfskog, helst under lindar, mycket regnfulla somrar. Den tillhör de s. k. meteoriska svamparne, som endast framträda vissa år, helst efter åskväder.

Hvarken lukt eller smak förråda några menliga egenskaper; likväl är den i hela Svamparnes klass en af de giftigaste. — Anmärkningsvärdt är, att flera de mest giftiga arter företrädesvis utmärka sig just genom sköna, lysande, vanligen högröda färger, t. ex. *Allmänna Flugsvampen*, många bland *Krenlorna*, *Giftiga Brötlingen*, åtskilliga *Rørsopp*-arter o. s. v.

Planchen föreställer arten i naturlig storlek, tecknad i Westergötland af framl. S. J. LINDGREN.

Tab. XLII. LÄCKRA RÖRSOPPEN.

(Boletus inopoliatus FRIES.)

Epic. p. 421. — B. sapidus HARZER.

Närvarande art är närmast beslägtad med *Ätliga Rørsoppen* (t. XIII), men säkert och lätt skild genom sin bleka, smäludna, ej nätådriga fot, sin finluddiga, äldre ojemna och (i torka) liksom gryniga hatt, hvilken är gulbrun. På foten förekommer stundom en röd färgskiftning straxt nedom piporna, som äro rent gula. Köttet är äfven gulnande. Öfverensstämmen för öfrigt till form och storlek med *Ätliga Rørsoppen*; endast foten är mindre uppsvällad.

Denna art upptäcktes först 1836 vid Wårdsätra nära Upsala, hvarest den sedermera, äfvensom på några andra ställen i Upland, flera gånger samlats. Af LINDGREN insamlades den i Degebergs-trakten i Westergötland, äfvensom af min son ROBERT 1861 vid Mariehof i Östergötland. Troligtvis är den mindre sällsynt än man förmodat, dock endast funnen i löf-, helst ek-skog. Äfven i England (BERKELEY) och Tysk-

land (HARZER m. fl.) är den iakttagen. Sannolikt tillhöra äfven *B. reticulatus* SCHAEFF., och *B. edulis* ROSTK., en äldre, rutigt söndersprucken form af denna art. — Närmast beslägtad är *B. Obsonium*, hvilken i Frankrike är högt värderad. Den afviker genom kägellik fot, mörkare hatt med skarp kant, kortare pipor. Då den äfven är funnen i Böhnen (KROMB. t. 76 f. 12—14) och vid Stettin (*B. bureus* ROSTK t. 36), kan man hoppas finna den äfven i Sverige.

Den läckra Rørsoppen är ej blott jemförlig utan i sin smak t. o. m. öfverträffande den *Ätliga*, hvarför den förtjenar synnerlig uppmärksamhet.

Fig. framställer arten tecknad efter exemplar från Östergötland.

Tab. XLIII. TIDIGA RÖRSOPPEN.

(Boletus aestivalis FRIES.)

Epiér. p. 422.

Äfven denna art tillhör samma naturliga grupp som *Ätliga Rørsoppen*, men är i flera afseenden från densamma väl skild. Foten är lökformig, mycket tjock, upptill snalare, glatt, slät, helt gul, inuti äfven gul och nedtill rodnande. Hatten mycket köttig, kullrig, i kanten ofta bugtig, med slät, nästan glatt yta, till färgen blek, nästan hvit. Liksom föregående art träffas den i torr väderlek fint sprickig, liksom grymig. Köttet är mjukt, nära ytan hvitt, nedtill gult, vanligen oföränderligt. Pipornas lager är mindre skildt från foten, än hos föregående arter; piporna små, helt och hållet gula.

Är en af de sällsyntaste i släktet, hittills endast funnen i Jönköpings-trakten och vid Rackeby i Westergötland; i England funnen af Mr BERKELEY. Växer på gräsbevuxna fält och framkommer redan tidigt på sommaren.

Oaktadt jag sjelf ej haft tillfälle att försöka denna art, tvekar jag icke att förorda den såsom ett sundt och födande näringsmedel. Jag har tillagt den det passande namnet *B. aestivalis*; oviss är likväl om PAULET's "*Tubiporus aestivalis*" är samma art.

Den enda art, som med Tidiga Rørsoppen möjligen skulle kunna förväxlas, är *Tjockfotade Rørsoppen* (*B. pachypus*) — som dock ej är giftig och genom sin röda nätdriga fot, förutom andra kännetecken, redan vid första anblicken afviker.

Tab. framställer arten tecknad efter naturen i Westergötland.

Tab. XLIV. YPPIGA TICKAN.

(Polyporus frondosus FRIES.)

Syst. Myc. I, p. 354. Epiér. p. 446.

I Tickornas på ovanliga bildningar rika släkte intager denna art ett utmärkt rum. Den tillhör samma naturliga afdelning som den *Tufriga*, men är mera sammansatt af flera öfver hvarandra liggande hattar eller flikar, bildande mera regelbundna tufvor på en tydligare gemensam fot. Föröfrigt är den genom färg och andra kännemärken väl skild från denna och närmare beslägtad med den *Greniga* (*P. umbellatus*), hvilken är ännu mer förgrenad och har de små, trattlika hattarne försedda med tydlig fot under hattens midt.

Närvarande art bildar tufvor af $\frac{1}{2}$ —1 fots bredd. De enskilda hattarne eller snarare flikarne äro rundade, halfva (d. v. s. endast med ena kanten fästade vid den gemensamma foten), öfver hvarandra liggande och med hvarandra sammanväxande, på ytan skrynkliga, i våt väderlek sotfärgade, i torka mera gråaktiga. Köttet är hvitt, något segt, långsefter trådigt; foten och de små tunna porerna afvenledes hvita.

I Södra Sverige är arten mindre sällsynt i löfskogar, växande dels bland löf på jorden, dels på gamla trädstubbar,

synnerligast af ek. I mellersta Sverige vet jag den endast funnen flera år å rad (1844—49) på Djurgården vid Stockholm (nära Bellmans byst), men sednare åren är den derstädes sökt förgäfvets.

Smaken är icke oangenäm, men lukten något unken. Denna försvinner dock genom rostning eller stekning, då svampen blir ganska smaklig. I Södra Europa är den mycket värderad och eftersökt.

Den enda art, med hvilken denna kan förväxlas, är *Jätte-Tickan* (*P. giganteus*), hvilken är den största hittills kända svamp i världen och några gånger blifvit funnen på bokstubbar i Skåne och Småland. Fullt utväxt bildar den tufvor af ända till 4 fots bredd; de enskilda, halfva hattarne äro fotsbredda, på ytan knottriga, rödbruna. Såsom varande mera seg och äldre trädaktigt är den icke ätlig.

Fig. framställer arten i naturlig storlek, tecknad vid Femsjö i Småland.

Tab. XLV. PUDDRADE PLATTSKIFLINGEN.*

(Agaricus Clitocybe nebularis BATSCH.)

FRIES Syst. Myc. 1, p. 86. Epicr. p. 55.

Plattskiflingarnas atrika grupp (*Clitocybe*) står i naturlig förvandtskap närmast *Stockskiflingarne*, men skiljes från dessa genom tydligare, alltid under hattens midt sittande, rak fot; hel, rund, vanligen platt eller bågformig hatt samt växtställe på jorden. Från *Musseronerna*, med hvilka de lättare förväxlas, skiljas de åter genom skifvorna, hvilka med en jemnt afsmalnande spets nedlöpa på foten. Denna är ock mindre köttig, på ytan seg (fibrös), inuti vanligen mjuk (spongiös); hos närvarande art likväl mera köttig. Fröstoftet hos alla tre är hvitt.

Närvarande art är en af de största och köttigaste i sin afdelning och den enda, som förtjenar upptagas i de åtliga svamparnas antal. Foten är tät, 3 tum och derutöfver hög, nedtill uppsvåld (1 tum i tvärsnitt), upptill afsmalnande ($\frac{1}{2}$ tum tjock), på ytan fintrådig och vid jorden mer eller mindre hvitluden. Mycket gammal finner man den äfven ihålig. Hatten är mycket köttig, yngre kullrig, utväxt aldeles platt, utan upphöjning i midten, 3—5 tum bred, slät och glatt, yngre betäckt af ett fint gråhvitt doft, men äldre bar. Färgen mer eller mindre grå, stundom blek. Skifvorne kort nedlöpande på foten, mycket tätt sittande, tunna, hvita, slutligen bleka.

Den kan endast förväxlas med *A. Cl. clavipes*, men den har långt nedlöpande, mera åtskilda lameller, hvarigenom den får en nästan omvändt kägellik (obconisk) hatt. Foten är nedtill klubblikt uppsvåld. För sitt lösa, svampiga (flocösa) kött är den icke användbar.

Arten förekommer i skogslundar, gamla trädgårdar o. s. v. ofta i stor mängd, sannolikt öfver hela riket. Synnerligen vacker är den i bokskogar. För sitt fasta kött, milda smak kan den räknas bland de bättre åtliga svamparne. Jag har förtärt den stekt tillsammans med fläsk. Den är för öfrigt en af de arter, som skurna i skifvor bäst lampa sig till torkning.

Öfriga arter af denna grupp, med undantag af den mycket sällsynta *A. opiparus*, som har köttfärgad hatt, hafva så tunn, ofta vattenaktig (hygrophan) hatt, att de i ekonomiskt hänseende äro af föga vikt. Endast den *Välluktande Plattskiflingen* (*A. Cl. odoratus* BULL.), lätt känd af sin ärggröna färg och starka vällukt af anis, har blifvit af utländska författare föreslagna, men den är tunn, seg och sparsamt förekommande.

Tab. XLV framställer svampen i yngre ålder.

Tab. XLVI. ALLMÄNNA STOCKSKIFLINGEN.**

(Agaricus (Pleurotus) ostreatus JACQ.)

FRIES Syst. Myc. 1, p. 182. Epicr. p. 134.

Stockskiflingarnas grupp är i föregående häfte beskrifven. Från derstädes upptagna *Runda Stockskiflingen* är denna art lätt skild genom sin egendomliga form, hvilken likväl efter åldern undergår flera förändringar. Den växer vanligen i stora tufvor med en mängd hattar öfver hvarandra. Foten tjock, ganska kort, stundom omärklig, sned och uppstigande, hvit, nedtill hvitluden, upptill utvidgad till hatt, vanligen fästad nära dess ena kant. Hattarne mjuka, köttiga, i början kullriga och rakt utstående, äldre utbredda och uppåt böjda, släta, glatta, i våt väderlek fuktiga. Färgen är i början nästan svart, men urbleknar med åldern, blir först mörkgrå och hos den ruttande svampen slutligen gulaktig. Skifvorne långt nedlöpande på foten, breda, åtskilda, på foten nätformigt förenade (anastomoserande), hvilket väl skiljer denna art från alla närbeslägtade, utom *A. catenatus*, men denna har ring på foten, luden hatt o. s. v.

Arten är allmän på gamla stubbar och trädstammar, äfven lefvande (ehuru den del, hvarifrån de utväxa, är angräpnar af röta), öfver hela riket, och förekommer både vår, ehuru spar-

sammare, och höst, ofta långt frampå vintren, fast urblekt och gulaktig. I bokskogar finner man en närbeslägtad föga skild art (*Ag. glandulosus* BULL.), hvilken är större och skiljes hufvudsakligen af små vårtor (glandler) på skifvorne. Med afseende på deras användande är ingen skillnad.

Arten är mild, åtlig och mycket berömd hos utländska författare. Utom ung har jag likväl funnit den seg, att den måst hackas före anrättningen. Den är vigtig endast derigenom, att den förekommer i mängd och vid årstider, då få åtliga svampar äro att tillgå. Möjligen är jenligaste beredningssättet mig obekant.

Mera sega, äldre läderartade (icke uttunnade) äro tvenne arter af släktet *Panus*, som till form och växtsätt med föregående nära öfverensstämna. Men utom den läderartade beskaffenheten som antyder ett skilt släkte, skiljas de lätt genom sina kött- eller kanelfärgade hatt och skifvor.

Tab. XLVI föreställer svampen i naturlig storlek i dess medelålder.

* En stor del af hit hörande arter hafva trattlik hatt, och benämnas derfor denna flock äfven *Trattskiflingar*.
 ** Den vanliga benämningen *Trädschamp* är alltför obestämd att begnå.

Tab. XLVII. FÖRÄNDERLIGA TOFSSKIFLINGEN.

(Agaricus Pholiota mutabilis SCHÆFF.)

FRIES Syst. 1, p. 245. Epicr. p. 169.

Tofsskiflingarne (*Pholiota*) hafva rostfärgadt fröstoff, ring på foten och vanligen fjäll eller hårtofsar på foten och hatten. Genom fröstoffets färg skilja de sig från alla med ring försedda Skiflingar och derjemte från Fjällskiflingarne och Champignonerna genom foten, som icke kan skiljas från hatten, utan omedelbart öfvergår till densamma, hvarföre ock skifvorne äro mer eller mindre fastade vid densamma. Flertalet af hit hörande arter äro mycket stora, men hafva syrlig, ofta från lukt och äro icke kända såsom ätliga. Men närvarande art räknas med skäl till de läckraste arterna.

Arten växer vanligen i stora tufvor och är mycket föränderlig till storleken. Fötterna äro yngre fyllda med en mjukare märm, utväxta ihåliga, styfva, vanligen 2—3 tum långa, 2 lin. och derutöfver tjocka, nedtill mörkbruna, men ända till ringen betäckta af små utstående fjäll. I följd af växtstället äro fötterna ofta uppat böjda eller vridna. Hatten föga köttig, i början kullrig, ofta småfjällig, men äldre platt, med en upphöjning i midten, alldeles slät, glatt, vanligen 2 tum bred, i våt väderlek kanelfärgad, men i torr mycket blek, hvarigenom en ovan lätt anser den utgöra olika arter. Skif-

vorna fastvexta vid foten, med något nedlöpande spets, tät sittande, blekt kanelfärgade.

På gamla stubbar, nedfallna stockar o. s. v. förekommer denna art redan tidigt på hösten, och någongång redan om våren, öfver hela riket mycket allmänt. Den friska svampen har en något bitter, sträf, sammandragande smak; men denna försvinner hos den stekta, liksom Riskans. Utomlands är den mycket värderad, och flera mina vänner hos oss, som använt den, hafva funnit den välsmaklig.

PERSOON misstänker, att det är genom förväxling med denna art, som Honungsskiflingen (*A. melleus*) blifvit upptagen bland ätliga svampar. Emellertid vidhålla ännu flera Tyska författare, att Honungsskiflingen är ätlig. Efter den grundsats, att det är bättre förkasta tio ätliga arter, än förorda en skadlig, har jag ansett mig böra varna för densamma, helst jag funnit den seg och osmaklig. Önskligt vore om andra i detta afseende behagade anställa försök.

Planchen framställer svampen i naturlig storlek och genomsnitt.

Tab. XLVIII. BLEKA VAXSKIFLINGEN.*

(Hygrophorus penarius Fr.)

FRIES Epicr. p. 45. — Sowerb. t. 71.

Släktets kännemärken äro redan (Tab. XXX) angifna, men närvarande art tillhör en helt annan grupp, hvilken skiljer sig genom ett slemmigt hylle, som yngre bekläder hela svampen, och sträf fot af små vårtor på dess yta, synnerligast dess öfre del. Samtliga arter med ofvan angifna skiljemärken äro efter all sannolikhet ätliga; utomlands berömmes mest den *Elfenbenshvita Vaxskiflingen* (*H. eburneus*); alldeles snövit, mycket klabbig, med smal, äldre ihålig fot, tunn hatt, men främsta rummet tillkommer följande, som af alla före oss med densamma blifvit förblandad.

Den Bleka Vaxskiflingen är icke rent hvit, utan blek, öf-gående i sämskfärg. Foten är tät, mycket fast, 1½ tum eller föga deröfver lång, omkring ½ tum tjock, på ytan sträf och öfverdragen med ett tunnt slem, som hastigt försvinner och i torr väderlek är omärkligt. Mest egendomligt för denna art är, att den vid jorden afsmalar till en tapplik rot, så att den i jordbrynet är uppsvölld och derifrån afsmalar både nedåt och uppåt; stundom är likväl hela foten från toppen nedåt tapplikt afsmalande. Hatten är i början kullrigt halfrund, med en upphöjd puekel i midten, med inrullad kant, äldre

utbredd, flat, utan upphöjd midt, i kanten ofta vågig; endast i våt väderlek är den något klabbig. Köttet, synnerligast på yngre exemplar, är tjockt, mycket fast, hvitt, oföränderligt. Skifvorna tjocka, något nedlöpande, icke tättsittande, förenade genom tvärrador, blekhvita. Färgen är dunkel, icke ren, och torr glänsande som hos öfriga arter.

Arten är hittills endast fännen i södra Sveriges bokskogar, men i stor mängd höstiden. Smaken är mild, angenäm, så att den äfven rå kan förtäras. Genom sitt rikare fasta kött och sin i torr väderlek alls icke klabbiga beklädnad har den ett bestämdt företräde framför Elfenbenshvita Vaxskiflingen och öfriga närbeslägtade arter. Den anrättas som Chantarellen och eger i min smak företräde framför densamma.

Som de närförvandta arterna äfven äro ätliga, är ingen förväxling äfventyrlig utom med *Hygrophorus Cossus*, som likaledes är hvit, men den starka, fräna lukten varnar för dess användande.

Tab. XLVIII föreställer olika former af denna art. Färgen ofta mera hvit än på planchen.

* Benämningen *Sätskifling* anse vi böra inskränkas till släktets sista afdelning: *Hygrocybe*.

Tab. XLIX. MÖRKRÖDA KREMLAN.

*(Russula rubra Fr.)**Epicr. p. 354. — S. M. p. 58.*

Af detta slägte äro redan tvenne arter framställda och slägtets allmänna kännetecken angifna. Från de öfriga röda arterna af detta slägte är denna vida skild, ehuru dess väsendtliga kännetecken, hämtade af köttets beskaffenhet, hattens yta, sinaken o. s. v., svårigen genom teckning kunna framställas.

Röda Kremlan igenkännes af sitt fasta, styfva, likväl i brytning spröda kött; sin hårda, täta, mer eller mindre röda fot; sin mycket köttiga, styfva hatt, som saknar den slemhinna, som hos de flesta arter bekläder hatten, hvarföre den aldrig är kläbbig, men glatt, slät (äldre stundom grynligt söndersprucken); kanten är utstående (icke inböjd), trubbig, utan strimnor; skifvorne endast fastväxta vid foten, temligen tätt sittande, hvita, äldre med någon dragning åt gult, mot kanten bredare och rundade; alla äro icke, som hos den *Skarpa Kremlan*, lika långa, utan en del kortare äro inblandade, andra åter gaffellikt greniga.

Närvarande art är i flera trakter, f. e. Femsjö i Småland, allmän; men i Upsalatrakten har jag aldrig sett den. Den växer på torrare ställen i skogar och framkommer tidigt på hösten.

Af alla Kremlor anses den för den giftigaste, utmärkt af sin skarpa, brännande smak. Hvad som äfven torde bidraga till dess oanvändbarhet, är dess egendomliga liksom grusiga (grunösa) kött, hvilket likväl icke genom beskrifning kan klart uttryckas. — *Blodröda Kremlan (Russula sanguinea)*, som med denna blifvit förväxlad, har deremot ett fast, ostadt, icke sprödt, kött, föröfrigt väl skild genom den med tunn slemhinna betäckta hatten och den hvassa och inböjda kanten; de mycket smala, ytterst tätt sittande, åt båda ändar spetsade och på foten nedlöpande skifvorna.

Sedan vi nu framställt de mest giftiga arter af detta slägte, skola vi i ett följande häfte lemna afbildningar af några ätliga arter. Faran af förväxlingar är likväl i detta slägte större än i de öfriga, hvarigenom de alltid komma att intaga ett underordnad rum. Också äro de med säkerhet ätliga arterna sällsynta; om en stor del af arterna är i afseende på deras användande intet med säkerhet känt.

Tabellen framställer Mörkröda Kremlan i naturlig storlek. Denna art är mindre föränderlig till färg än öfriga arter.

Tab. L. BRUNA RÖRSOPPEN.

*(Boletus badius Fr.)**Elech. 1, p. 126. Epicr. p. 411.*

Af detta slägte äro redan flera arter upptagne och förtjeha det så mycket mera, som detta som näringsämne oenkligen är det viktigaste. De tre arter, som här nedanför anföras, äro till yttre utseendet så lika, att det är nödvändigt framställa dem på en gång, helst den ena räknas till de giftiga arterna.

Bruna Rørsoppen tillhör samma afdelning i släktet, som den *Mörkgula* och *Gryniga*, med hvilka den öfverensstämmer genom ockragult fröstoff och kläbbig hatt, men skiljer sig väsendtligen genom hattens mörkare färg, blekare fot, hvilken är betäckt af ett brunt stof, temligen stora, kantiga, kring foten något kortare pipor, hvarigenom uppstår kring foten en insänkning i fruktagret. Pipornas färg är ursprungligen blekgul, men blir äldre mörkare och stötande i grönt. Köttets färg närmast piporna öfvergår i beröring med luften i blått.

Foten är föröfrigt jemntjock, fullkomligt slät, aldrig lökformigt uppsvållad nedtill, icke heller nätådrig. Hatten dynlik, tjuk, slät, i torr väderlek af den intorkade slembeklädnaden glänsande. Smaken mild.

Arten förekommer spridd i barrskogar öfver södra och medlersta Sverige, i vissa trakter, såsom Småland, temligen allmänt, men kring Upsala mycket sparsamt. Den växer alltid ensamt, icke truppvis eller flera tillsammans såsom den Gryniga Rørsoppen. Som födoämne är den smakligare än båda ofvananförde arter och närmar sig mer till den företrädesvis *Ätliga Rørsoppen (B. edulis)*.

En med föregående närbesläktad art (*B. rubus*) har jag funnit vid Tosterups herregård i Skåne. Den har mera fast, rödaktig, nästan tegelfärgad hatt; alldeles glatt (utan föregående fina stof på ytan), nedtill röd, upptill gul fot, som inuti är gul, men i brottet svartnar; piporna äro mycket små, mörkgula, liksom föregående arts insänkta omkring foten. Ehuru dess användande icke är bepröfvadt, tveka vi dock icke anse den för ätlig, men så länge den icke någonstades blifvit funnen i mängd, förtjenar den som födoämne ingen uppmärksamhet.

Tab. L framställer allmännaste formen af denna art.

Tab. LI. FINLUDNA RÖRSOPPEN.

(Boletus vaccinus Fr.)

FRIES *Epicr.* p. 420. — *Fl. Dan.* t. 1892.

Denna art är så lik föregående, att båda i Syst. Mycol. förenades under en art. Sedan jag likväl erhållit tillfälle jemföra båda lefvande, fann jag dem icke blott skilda, utan tillika tillhöra tvenne olika afdelningar af släktet; den föregående nemligen till den grupp, som har hatten beklädd med en slemhinna; denna åter till samma afdelning som *B. edulis*, *impolitus* och *æstivalis*. Med den förstnämnda öfverensstämmer den den bufvudsakligen till färgen, men afviker väsentligen genom finluden hatt, icke nätådrig fot. Den uppnår icke heller den storlek som nämnde art.

Från föregående skiljes den åter genom kortare, glatt, icke med stoft beströdda fot; mörkbrun, finluden, aldrig klibbig batt; små, runda, från foten nästan fria pipor (d. v. s. emot foten jemnt aftagande i längd), hvilka i början äro slutna, hvita, äldre höggula. Köttet är hvitt, oföränderligt eller rodnande.

Af denna art finnas tvenne mycket afvikande förändringar; den ena med lökformig, nedtill färad gulbrun fot, hvitare

kött; den andra med jemntjock eller nedåt afsmalnande fot, med föga märkbara, långsefter gående streck, hvilka antyda anlag till nätådrighet. Foten är hos båda af samma färg som hatten. Då af den förra en god figur blifvit lemnad i *Fl. Dan.*, hafva vi här lemnat afbildning af den senare formen.

Arten synes väl hufvudsakligen tillhöra bokskogsgregionen, men är likväl funnen flerstädes i medlersta Sverige, såsom vid Tvetaberg i Södermanland af Herr Brukspatron Tamn, som efter egna försök vitsordat dess smaklighet, jemförlig med *B. edulis*. I Upsalatrakten är den endast en gång funnen.

Till ursäkt för upptagande af denna och föregående mera sällsynta arter, då flera allmänt och ymnigare förekommande, hittills blifvit förbigångna, torde förtjena anföras, att dessa icke blott tillhöra de mest läckra arter, utan ock att deras framställning varit nödvändig för åtskiljande af följande för giftig ansedda och till näringsmedel säkerligen ojenliga art.

Tab. LI föreställer den mindre formen af Finludna Rørsoppen.

Tab. LII. BITTRA RÖRSOPPEN.

(Boletus felleus BULL.)

FRIES *Syst. Myc.* I, p. 394. *Epicr.* p. 425.

Den framstående plats Rørsopp-arterna intaga bland de åtliga Svamparne, kräfver att alla mer eller mindre giftiga arter af detta släkte afbildas. Vi hafva derföre ansett så mycket mer nödvändigt framställa denna art, då den näst *Lömska Rørsoppen* är den giftigaste, åtminstone minst användbara till föda. Ehuru till färgen snarlik föregående, är den lyckligtvis lätt skild. Den afviker från alla öfriga genom rosenfärgadt fröstoff, hvaraf de i början snöhvita piporne äldre blifva köttfärgade eller blekröda.

Foten är tät, 3 tum och derutöfver lång, vanligen sotfärgad eller mörkgrön (olivfärgad), upptill afsmalnande och nätådrig gropig. Hatten är i början dynlik, äldre platt, slät, icke klibbig, 3—4 tum bred. Köttet mycket njukt, hvitt, i beröring med luften blekrött. Piporne temligen stora, mycket långa, i öppningen kantiga.

Arten förekommer på något fuktiga ställen i barrskogar, ingenstädes ymnigt, man temligt allmänt spridd. På magta skogsängar har jag funnit en nära besläktad art eller underart med i början finluden, smutsigt sämskfärgad hatt, kortare och i öppningen runda pipor, hvarigenom undra sidan blir platt, icke kullrig. Den rodnar mindre än den vanliga och har mildare smak.

För den synnerligen bittra smaken icke blott förkastas denna art, utan anses äfven giftig. Den har någon likhet med de företrädesvis Åtliga Rørsopp-arterna, men kan endast genom uppenbar värdeslöshet med någondera af dem förväxlas.

Tab. LII framställer vanliga formen af arten i naturlig storlek.

Tab. LIII. RUTIGA TICKAN.

(Polyporus subquamosus. L. sub. Bol.)

FRIES Syst. Myc. I. p. 346. Epicr. p. 428.

Rutiga Tickan är närmast beslägtad med *Färtickan* (Tab. VIII), men väl skild från densamma genom sitt fastare, ej bräckliga kött, sin aldrig i gult stötdande färg samt hattens yta. Foten är kort, sällan öfver tums-hög, men vanligen lika tjock, glatt, slät, men i torr väderlek brister den ofta upp till fjäll på ytan. Hatten synnerligast i midten mycket köttig, i början kulrig, snart mera utbredd och slutligen platt, glatt, slät, men sönderspricker vanligen i bredare rutor, hvarigenom den erhåller ett fjälligt utseende. Så väl hattens som fotens färg vexlar mellan grått och hvitt; mindre och yngre svampar äro mera grå, mera utbildade och äldre nästan hvita. Köttet är mycket fast, något segt, tunnare emot den ojemna, oftast vågiga kanten. Porerna små, mjuka, oliformiga, i början runda, äldre något utdragna, hvita, aldrig öfvergående till gult, som hos *Färtickan*.

Denna synnerligen utmärkta och som det synes för Sverige egendomliga art (ty något säkert växtställe utom Sverige

är icke känt) växer bland nedfallna barr i våra bergsskogar, ehuru sällsynt, i Augusti och September månader. Jag har endast funnit den der alfen är kross-stensgrus växande mera enstaka, icke i tufvor eller truppviss, som *Polyp. ovinus*. Den upptäcktes först af LINNÉ kring Fahlun. Förf. har funnit den i Småland. Den af WULFEN från Österrikiska Alporna angifna liknar visserligen vår art, men är troligen skild och möjligen en form af den vanliga *Färtickan*.

Som näringsmedel öfverensstämmer den med *Färtickan* och beredes på samma sätt. Den är dock betydligt segare och fastare i köttet, hvarför den förtärd rå är mindre smaklig. Vi hafva så mycket mer ansett nödigt fasta uppmärksamheten på densamma, som denna art och *Färtickan* aldrig blifvit funna i samma trakt.

Tab. LIII framställer större och mindre former af denna art. Färgen torde vara den normala, ehuru den ofta äfven förekommer mera hvit.

Tab. LIV. ALLMÄNNA MURKLAN.

(Morchella esculenta. (L.)

FRIES Syst. Myc. II, p. 6. Phallus esculentus. L.

Denna och tvenne följande släkten tillhöra en helt annan klass bland svamparne, *Disksvampar* benämnd, som väsentligen skiljer sig från de förut afbildade Hattsvamparne. Hattsvamparnas frösoft eller sporer sitta *bara*, vanligen 4 tillsammans i spetsen af små fästen, som beklåda hattens *undre sida*, hvarföre sporerne lätt *nedfalla* på jorden. Disksvamparnas sporer åter, vanligen 8 tillsammans, äro *inneslutna* inom långsträckta celler eller säckar (asci), hvilka bilda ett eget fruktlager på svampens *öfre sida*. Som de derifrån icke kunna nedfalla på jorden, utkastas de elastiskt och *uppstiga* som en rök. Vanligast äro Disksvamparna skålförmiga, men hos de högst utbildade blir disken kulrig liknande en mössa. Till denna afdelning hörer Murkel-släktet.

Bland alla svampsläkten är Murklornas det lättast igenkänliga och kan icke med något annat förvexlas. Disken är mosslik med långsefter och tvärsöfver gående, upphöjda åsar eller ribbor, hvarigenom mössan öfverallt blir gropig. Alla dess arter äro värsvampar och ätliga; i hela Disksvamparnas klass finnes ingen enda giftig art, ehuru flertalet af dess släkten äro så små, att aldrig fråga kan uppstå om deras användande som näringsmedel.

Är släktet lätt skildt från alla öfriga, så är arternas urskiljande desto svårare. I den vidsträckt mening vi tagit *M.*

esculenta innefattar den efter fleras åsigt flera arter. Den här afbildade är PERSOONS *M. conica*, den hos oss vanligaste och säkerligen äfven LINNÉ's *Phallus esculentus*. Den skiljes från de öfriga lätt genom sin släta (ej farade) fot, bruna och koniska, vid basen, med foten fastväxta mössa, med utdragna (rhomboidala) gropar. PERSOONS *M. esculenta* har oval mössa och nästan fyrkantiga (rhombiska) gropar och mera sotbrun färg; *M. rotunda* åter rund, ljusgul mössa och rundade gropar. Emellertid har jag icke kunnat finna säkra gränser, och i praktiskt hänseende är alldeles ingen olikhet dem emellan. De båda sistnämnda förekomma hos oss mycket sparsamt.

Allmänna Murklan förekommer såväl på gräsbevuxta fält som i skogar under Maj månad. Den finnes dock icke allestädes, men i bergiga trakter i största mängd. Som begärlig handelsartikel bör dess insamling aldrig försummas; den betalas så väl i våra större städer, att på de trakter, der den växer i större mängd, man icke på annat sätt kan förtjena högre dagspenning än genom Murklors insamlande. De uppträda på trädar och upphängas på torrt, i fuktig väderlek eldad, rum för att torka.

Murklor hafva från längre tid varit en allmänt begagnad och eftersökt läckerhet. Deras användande i saucer, raguöter m. m. är allmänt känt.

Till samma afdelning som den Vanliga Murklan, nemligen med mössans bas fastväxt vid foten, höra äfven tvenne hos oss mycket sällsynta arter, neml.

1. *Läckra Murklan* (*M. deliciosa* FRIES) med nästan cylindrisk mössa, hvars upphöjda åsar icke anastomosera, utan från spetsen till foten löpa nästan parallelt med hvarandra och sins emellan äro förenade med mindre framstående tvärribbor. Färgen är blek, vanligen hvit. Den är utmärkt läcker, men hittills endast funnen på gräsrika åkerrenar vid byn S. Bökeberg i Femsjö sn., Småland.

2. *Uppblåsta Murklan* (*M. elata* Fr.) är mera stötväxt och uppblåst än båda föregående; foten är något gropig, mycket

skör; mössan ägglikt-konisk, gulbrun, med *tuma hinnaktiga* längsefter gående åsar, förenade genom smalare tvärribbor. Smaken är vattenaktig och mindre behaglig. Möjligen bero dessa olikheter till stor del af dess växtort i kärr. Ehuru icke giftig förkastas den i matlagning.

Af släktets andra afdelning med mössan vid basen fri från foten hoppas vi främlades kunna lemna afbildning.

Tab. LIV framställer den hos oss vanligaste formen af Allmänna Murklan. — Derjemte finnas förstorade figurer af fruktlagret framsällande sporerne inom sina hylsor (asci). Alldeles likartad är fröredningen hos de båda följande.

Tab. LV. LILLA STENMURKLAN.

(*Gyromitra curtipes*. n. sp.)

Stenmurkel-släktet är på det närmaste förvandt med Murklorna, så väl till sin konsistens som fröredning, men afviker från desamma genom mössans form och yta. Den uppblåsta disken saknar de upphöjda ribbor, som bilda regelbundna gropar på Murklorna; den är i stället vågig eller skrynkelig af de oregelbundet vridna åsarne; af några tvärribbor finnes icke spår. Af denna anledning fördes Stenmurklorna af PERSSON till *Möss-svamparnas* (Helvellae) släkte, hvilket lätt skiljes genom tunnare, nedböjd, 2-flikig mössa med alldeles slät yta. Genom sitt framträdande endast vartiden, fastare byggnad och hela utvecklingshistoria stå Stenmurklorna Murklorna närmare.

Lilla Stenmurklan, som denna gång framställles, är en från Allmänna Stenmurklan (*Gyromitra esculenta*) väl skild art. Den senare har en mycket tydlig fot, mycket uppblåst, mera utbredd och från foten nästan fri mössa af mörkbrun färg; åsarne äro mera upphöjda och vridna. Vi beklaga att vi för närvarande ej äro i tillfälle lemna god figur af densamma. Lilla Stenmurklan har mycket kort, ofta omärklig fot, som helt och hållet öfvergår till den mera åt höjden än bredden

sig utbildande mössan, i synnerhet då den saknar fot. Åsarne äro ock mindre vridna; färgen mycket blekare.

Denna hittills obeskrifna art upptäcktes af min son Robert i Maj månad 1863 i Alsike-skogen nära Upsala, der den växte i största mängd (jemte *Bulgaria globosa*, *Discina perlata* m. fl.). Äfven denna för alla Murkel-svampar högst ogünstiga vår är den återfunnen men mindre talrik. Det är en egenhet hos Murkel-svamparne, att de blott vissa år framträda högst ymnigt, andra år visa sig mycket sparsamt. ALBERTINI och SCHWEINITZ tro sig hafva funnit, att de hvart tredje år äro synnerligen talrika.

Samma dag denna art upptäcktes, insamlades den i så stor mängd, att den kunde anrättas och försökas som näringsmedel. Den var af samma goda kvalitet som Murklan och kunde till smaken knappt skiljas från densamma.

Tab. LV framställer arten under flera former.

Tab. LVI. BREDA DISKSVAMPEN.

(Discina perlata. FRIES.)

Äfven den här framställda arten hör till Murkel-svamparne, och inre fröredningen öfverensstämmer fullkomligt med den allmänna Murklans. Men den skiljer sig lätt vid första anblicken genom sin platta, utbredda disk, som har knappt märkbar fot. Diskens yta är afven slät, endast något vågig. Härigenom och ännu mera genom sin upphöjda, i början tillslutna kant åtskiljer sig den *Adriga Skålsvampen* (*Peziza venosa*).

Den Breda Disksvampen står dock Skålsvamparne vida närmare än öfriga arter i släktet, som hafva en tydlig tillbakarullad kant. Den ursprungliga, af mig vid Fensjö i Småland upptäckta och i Syst. Myc. II, p. 43 beskrifna *Pez. (Discina) perlata* kan jag för närvarande icke skilja från den här framställda; kanten hos denna var från första början tilltryckt jorden, finluddig och utbredd sig småningom allt mer; då hos Skålsvamparne kanten, som i början är sluten, från första stund

är bestämd. Deremot kan jag icke med full visshet säga, huru förhållandet är hos den här afbildade formen. Den uppnår vanligen en bredd af 4 tum, är mycket bräcklig, på undre sidan blek, finluddig, på öfre brun. Foten är mycket kort, gropig, stundom nästan omärklig.

Denna art insamlades samtidigt med föregående i Alsike-skogen i Maj 1863 i största mängd af ROB. FRIES. Samtidigt insamlades den i Östergötland af H. von POST. Om den vid Fensjö i Småland af mig fordom tagna är ofvan taladt.

Anrättad befinns den till smak och godhet fullt jemförlig med Stenmurklan.

Tab. LVI framställer Breda Disksvampen i nat. st. Originalerna insamlade i Alsike-skogen.

Tab. LVII. HÖSTMUSSERONEN.

(Agaricus (Tricholoma) personatus. FR.)

FRIES Syst. Myc. I, p. 50. Epicr. p. 40.

Närvarande art tillhör samma naturliga grupp, som den läckra Musseronen Tab. IX, der dennas skiljemärken blifvit uppgifna. Nämnda grupp fördelas i Vår- och Höst-musseroner, af hvilka de förra som näringsmedel hafva ett öfvervägande värde.

Allmänna Höstmusseronen har en tjock, tät, ofta lökformig och på ytan finluden fot; hatten är mycket köttig, yngre kullrig, men äldre platt, slät, glatt; i våt väderlek kännes den fuktig; kanten, som utskjuter utom skifvorna, är i början inrullad och finluden eller liksom mjölig. Köttet är i början mycket fast, men sedermera mjukare, svampaktigt (spongiöst), smutsigt hvitt. Skifvorna afrundade emot foten och nära fria från densamma, breda, mycket tätt sittande och låta ofta skilja sig från hatten. Färgen är mycket föränderlig; den förekommer med grå, hvit, men vanligen smutsigt violett hatt; skifvorna äro mera beständigt blå, men blekna med åldern och blifva smutsfärgade. Jag har afven funnit den med hvita skifvor och blå fot.

Arten framkommer i slutet af September och början af Oktober på gräsväxta fält, i löfskogar och gamla trädgårdar, ofta i stora massor. Hufvudformen med grå hatt kan icke förväxlas med någon annan art, men formen med violett hatt lätteligen med *Ag. nudus*, som har mycket tunnare hatt, men till sina egenskaper öfverensstämmer.

Som näringsmedel stå båda dessa arter långt efter den äkta Musseronen: de kunna ätas, men för min del har jag icke funnit dem smakliga och för deras floceösa kött synas de vara mycket hårdsmälta. Jag skulle därför icke här upptagit dem, om man ej allmänt bland ätliga arter upptog »*Agaricus violaceus L.*», hvarunder man förstår denna och ingalunda den äkta Linneanska, som nedanför skall framställas.

Tab. LVII framställer den vanligare formen af Höstmusseronen med violett hatt.

Tab. LVIII. BLÅ SPINDELSVAMPEN.

(Cortinarinus violaceus. L.)

FRIES *Syst. Myc.* 1. p. 217. *Epier.* p. 279.

Spindelssvamparne utgöra den största och mest naturliga grupp bland Hattssvamparne. De igenkännas af de spindelväfslika trädar, hvarmed antingen hela svampen eller åtminstone skifvorna i början betäckas, och det merendels rostfärgade fröstoffet, af hvilket de slutligen kanelfärgade skifvorna blifva liksom mjöliga på ytan. Eget är, att skifvorna, som till en början hos de olika arterna framträda under alla slags färgskiftningar, slutligen hos samtliga blifva nära lika färgade. Motsatsen eger rum bland de öfriga Skifflingarne, hvars skifvor äro ursprungligen merendels hvita, men sluta med alla slags färger.

Ingen art af detta slägte, som utgör flertalet af svamparne i våra skogar hösttiden, är med säkerhet känd som ätlig. Val upptagas som sådane *Cortin. violaceus* och *castaneus*; men under förra namnet förstår man då föregående art, och den senare är allt för obetydlig att komma i fråga. Som typ

för detta slägte har jag likväl ansett mig böra framställa den äkta *Agaricus* eller *Cort. violaceus* L., som för flertalet af svampkännare är en alldeles okänd art.

Den *Blå Spindelssvampen* är öfverallt och äfven inuti mörkblå, men i synnerhet skifvorna. Foten är tjock, nedtill klubblikt uppsvälld, af 2—3 tumns längd, på ytan luden. Hatten köttig, kullrig, äldre mera utbredd, öfverallt öfverdragen med ett fjälligt ludd. Köttet mycket löst, synnerligast i foten. Skifvorna vidhäftade foten, tjocka, breda, icke tätt sittande.

I södra Sverige fann jag denna art endast i löfskogar, företrädesvis bokskogar, men i medlersta Sverige förekommer den äfven i barrskogar, hvar marken är gräsbevuxen. Som näringsmedel är den oanvändbar.

Tab. LVIII framställer typiska formen af *Cort. violaceus* L.

Tab. LIX. MILDA KREMLAN.

(Russula lepida. FR.)

Epier. p. 254.

Detta släktes kännemärken äfvensom flera giftiga arter af detsamma hafva redan (Tab. 24, 40, 49) blifvit framställda; återstå nu några, som anses för ätliga, men i anseende till svårigheten att med säkerhet urskilja fordra största varsamhet vid användandet. Det torde alltid vara säkrast göra försök i smått, innan man i större kvantitet använder dem.

Den Milda Kremlan är bland de lättare igenkända. Den har ingen lukt, mild smak; köttet är fast och icke lättbräckligt. Foten fast, tät, jemntjock, på ytan slät. Hatten köttig, i början kullrig, sedermera i midten vanligen nedtryckt, med trubbig, utstående kant, hvilken aldrig blir strimmig. Hvad som i synnerhet utmärker denna art är att hattens yta är fint silkesluden, äldre småfjällig, utan den tunna, i våt väderlek slemmiga himna, som bekläder hatten hos de flesta arter hos detta slägte. Hattens färg är rosenröd; fotens hvit, ofta med röd anstrykning. Skifvorna emot foten rundade, temli-

gen tjocka och tätt sittande, hvita, äldre något dragande åt gult.

Den Milda Kremlan har jag hittills endast funnit i S. Sveriges bokskogar under September månad; i medlersta Sverige har den insamlats vid Tvetaberg i Södermanland. Teckningen har skett efter exemplar från sistnämnda ställe. De äro något mindre och skifvorna något mera stötande i gult än vanligen.

Vid denna arts användande torde vaskning eller dess afsköljande i kokhett vatten före användandet vara lämpligast. Smaken är icke oangenäm; men som jag icke sjelf haft tillfälle närmare pröfva den, framstalles den här endast till närmare undersökning.

Tab. LIX framställer en mindre form af Milda Kremlan.

Tab. LX. BISTRA PEPPARLINGEN.

(Lactarius turpis FRIES.)

Fr. Epicr. p. 335. Monogr. Hymen. Su. II. p. 154.

Denna art är närmast beslägtad med *Skaggiga Pepparlingen* (t. 28), men från densamma väsentligen skild genom kort, tät, på ytan något kläbbig, blekt olivfärgad fot. Hatten är mycket köttig, i våt väderlek kläbbig, mörkt olivfärgad eller grönbrun, ofta finluden, äldre flat, men yngre i kanten inrullad och gul-luden. Köttet är ovanligt fast, nästan hårdt. Skifvorna något nedlöpanne på foten, mycket tunna och tät sittande, bleka, utsippra liksom köttet en skarp, hvit mjölksaft.

Arten är allmän, symmetriskast i fuktiga löfskogar, och efter olika växtställen till storleken mycket föränderlig. Man finner stundom gamla hattar af en fots diameter.

Utseendet bedrager ofta; många svampar med inbjudande utseende äro ganska giftiga; *Bistra Pepparlingen* ser åter af-

skräckande ut och har derföre (äfvensom genom förväxling med *Giftiga Brötlingen*) länge räknats till giftiga arter (*A. necator* P.); men efter WEINMANN är den i Ryssland allmänt begagnad, och Baron HISINGER i Finland upptager den efter egen erfarenhet bland de som näringsmedel bästa och viktigaste arter. Den kläbbiga öfverhuden måste först afskalas och svampen derefter förvällas i kokande vatten, tills den brännande smaken utdragits. Derefter insaltas den, och före anrättningen låter man den ligga någon tid i vatten för att utdraga saltet, hvarefter den tillagas som Riskan och är ganska smaklig och oskadlig.

Tab. LX framställer svampen i naturlig storlek. Dock förekommer den ofta större.

Tab. LXI. BLEKA BRÖTLINGEN.

(Lactarius pallidus PERS.)

Fr. Epicr. p. 343. Monogr. p. 169.

Af Brötlingarnas atrika afdelning bland Mjölkskifflingarna förtjenar näst *Milda Brötlingen* (t. 8) den *Bleka Brötlingen* förtjädesvis uppmärksamhet. Den utmärker sig genom lösare kött, blek och yngre kläbbig hatt, hvit, mild mjölksaft. Foten är nästan jemtjock, i början tät, äldre ihålig. 2—4 tum hög, 1 tum och deröfver tjock, slät, glatt, blek. Hatten köttig, kullrig, men i midten nedtryckt, med inrullad glatt kant. Hattens färg alltid blek, stundom ljus köttfärgad, stundom lerfärgad. Skifvorna något nedlöpanne, mycket tät sittande, först hvita, sedermera af hattens färg. Mjölken hvit, oföränderlig.

I Södra Sveriges bokskogar är denna art allmän och förekommer ofta i mängd. Den upptages vanligen bland åtliga

arter, och att döma efter den raa svampens smak är den sannolikt att räkna bland de bättre. Men symmetrisk uppmärksamhet fordras att icke förväxla den med den *Äckliga Pepparlingen* (*Lactarius insulsus*), med hvilken den har stor likhet. Den senare skiljes dock ganska lätt genom skarp och äcklig smak, lifigare färg (mörkgul) med mörkare bälten på hatten och skifvornas oföränderligt hvita färg. Den anses, som de skarpa arterna i allmänhet, för giftig, men flera anledningar gifvas till den förmodan att det skarpa ämnet genom förvällning afsöndras, hvarpå föregående art lembar ett exempel.

Tab. LXI framställer arten i naturlig storlek, men färgen är i friska tillståndet vanligen något blekare.

Tab. LXII. ÄKTA FNÖSKTICKAN.

(Polyporus fomentarius FRIES. (L. pr. p.)

Syst. Myc. I. p. 374. Epicr. p. 465.

Bland Tiekorna, lätt kända af sina små rundade porer på hattens undre sida, förekomma en mängd arter utan fot med ena sidan fastväxta på gamla trädstammar, hvarigenom hatten blir half. Dessa äro tillika vanligen af torr, läderartad eller trähärd substans. Dessa senare äro mångåriga, och bildas på dem årligen ett nytt lager af porer, äfvensom i hattens kant, motsvarande årsringarne på träden. Man kan derföre anse dem

motsvara träd bland Svamparna. Af hithörande arter är *Äkta Fnösksvampen* i ekonomiskt hänseende den viktigaste.

Denna svamp igenkännes lätt af sin halfva, dynlika hatt*), hvars yta är mycket hård, glatt, äldre grå, mycket öfvermålad af koncentriska ringar, utmärkande den årliga tillväxten. I kanten och inuti är den mjuk, gulbrun eller rostfärgad; porerna på undre sidan äro mörkt kanelbruna, men yngre öfverdragna af

*) Äldre författare jämförde dessa svampar vanligen med en hästhoft.

ett grått pulver. Porernas olika årslager äro tydligen skilda från hvarandra. Fröstoftets färg lika med porernas.

I Södra Sveriges bokskogar är denna art mycket allmän och bäst utbildad, inuti med ett tjockt lager af en mjuk floccös massa (hvaraf fnösket heredes), hvarigenom den der lemnar en vigtig handelsartikel. I öfra Sverige finnes den äfven, fastän mera spridd, på björk, men den är mindre, inuti ej så mjuk och lemnar därför mycket mindre och säure fnöske.

Der är af denna svamp det före tändstiekornas upptäckt i hvarje hushåll och för hvarje tobaksrökare oundgängligt fnöske beredd. Fastän numera efterfrågan deraf minskats, är det ännu af stor vigt, särdeles i krigstider, emedan det lemnar det bästa medel att stilla blödningsar. På landsbygden, der oftast tillgång till läkare saknas, är det af vigt för stämmande af blodflöde, då något större blodkärl blifvit skadadt och ej kan underbindas. Man tager en tillklippt bit af hattens mjukaste massa, som efter kokning i vatten blifvit torkad och bultad, och trycker den till säröppningen genom passande kompress af linné*. För användning till "tunder" blötes fnösket före torkningen i upplöst salpeter.

Ett par andra, mera sparsamt förekommande arter. (*Pol. applanatus* och *P. vegetus*) lemnar äfven godt fnöske, men de äro mindre och den senare så sällsynt, att fråga om dess användande icke kan uppstå. Deremot lemnar den *Uplattade Fnösktickan* (*P. applanatus*), som finnes på ek-, asp-stockar

m. fl. äfven godt fnöske. Den skiljes genom plattad, knölig hatt, som i början är på ytan liksom mjölig och rostbrun, men äldre grå, beklädd med en mycket styf, men spröd skorpa och i början hvit kant, som i våt väderlek utsipprar vattendroppar. Den lemnar ett bättre fnöske än den Äkta Fnösktickan, då denna växer på björk.

Vid detta tillfälle böra vi tillika fästa uppmärksamheten på ett par allmänna närbeslägtade arter, som med Äkta Fnösktickan lätteligen förväxlas, nämligen *Eldtickan* (*P. ignarius*) och *Talltickan* (*P. pinicola*). Den förra liknar i hög grad *Fnösktickan*, men bildar snarare knölar än dynor (liknar alls icke en hästhoft) med rundad trubbig kant; inuti är den trähard, och porernas olika årslager flyta så tillsammans, att de ej kunna urskiljas. Den lemnar icke fnöske, men för sin hårdhet förbrinner den ytterst långsamt, hvarför man i vissa landsorter brukar kasta den i asknörjan för att längre tid bevåra elden, hvaraf namnet.

Talltickan åter har fullkomligt lika form med Äkta Fnösktickan, men är äfven inuti trähard och lemnar icke fnöske. Den skiljes lätt genom sin bleka substans och hvitgula porer; på äldre svampar är yttre kanten einnörred. Den har en stark syrlig lukt och är allmän på tall- och graustockar.

Tab. LXII framställer Äkta Fnösktickan i naturlig storlek och i genomsnitt.

Tab. LXIII. ÄTLIGA KREMLAN.

(*Russula vesca* FRIES.)

Epicr. p. 352. Monogr. Hymenom. II. p. 193.

Af Kremlornas släkte äro redan flera arter tecknade, de flesta giftiga eller som födoämnen förkastliga, men några anses för ätliga och dessa utmärka sig genom mild smak, fast (ostlikt) kött (men ej styft och bräckligt som den *Högröda* och *Stinkande Kremlan*) samt mer eller mindre greniga eller oliklånga skifvor. Möjligen äro alla arter med fast, ostartadt kött ätliga, om en del arters skarpa genoin förvällning undanröjdes. Men i allmänhet har jag en, måhända förhastad, fördom mot Kremlors användande som näringsmedel, hvarföre jag här nedanför skall sammanföra de viktigaste som ätliga ansedda arter, men lemnar figur blott af den Ätliga Kremlan (jente den Tab. LIX tecknade Milda Kremlan), emedan de öfriga, till sin form lika, från denna lätt urskiljas genom färgen.

Den Ätliga Kremlan har en fast, hvit eller rödfärgad, på ytan fint nätadrig eller skrynklig fot, flat, men i midten af svarta strimmar mörkare och nedtryckt hatt, öfverdragen med en tunn, kötröd slemlinna. Lamellerna fastade vid foten, tunna, tättsittande, hvita, äldre något stötande i gult. Hos den äldre svampen blir hatten i kanten strimmig. Smaken, som hos de tvenne följande, mild.

Den *Brokiga Kremlan* (*R. cyanoxantha*) är med den förra närbeslägtad, men vanligen större, får äldre mera trattlikt nedtryckt och slät hatt samt breda, tjocka och vidt skilda, vid afhäftningen till foten rundade skifvor. Lättast kännes den genom den brokiga hattens färg, som vexlar mellan lilas-, bly-, olivfärg o. s. v., men i kanten vanligen är blåaktig och i midten öfvergår till gult.

Den *Gröna Kremlan* (*Russula virescens*) liknar Ätliga Kremlan till form och storlek, men är en af de lättast urskilda arter i detta släkte genom hatten, som icke beklädes af någon slemlinna, hvarigenom dess yta blir finluddig samt sönderspricker i grynnor eller värtor af grön färg. Dess kant är alldeles slät, ej äldre strimmig. Skifvorna nästan fria från foten, tättsittande, korta.

Santliga dessa arter växa på gräsväxta ställen, helst i S. Sveriges löfskogar, och framkomma tidigt efter första sommarregnet. Endast den Brokiga förekommer i större mängd. De kunna skickligen användas på lika sätt, men då jag ej sjelf pröfvat dessa arter, förordas de till ytterligare undersökningar.

Plauchen framställer Ätliga Kremlan i naturlig storlek.

*) I Småland såg jag fnösksvampen användas till att röka lemmar af husdjur, som blifvit skadade af ormbett; med hvad gagn, kan jag ej bedömma.

Tab. LXIV. ALLMÄNNA FRÄNSKIFLINGEN.

(Agaricus (Hebeloma) crustuliniformis BULL.)

Fr. Syst. Myc. p. 180. Monogr. Hymen. I. p. 328.

Bland Skifflingar med rostfärgadt fröstoft (*Dermium*) afvika Fränskifflingarne från alla öfriga grupper genom blekt, smutstigt gulaktiga (lerfärgade) sporer. Till sin bildning motsvara de för öfrigt Musseronerna (*Tricholoma*); foten är fibröst köttig, utan broskartad beklädnad och ring; hatten afvenledes köttig och skifvorna inskurna vid anhäftningen till foten. Hatten beklädes af en tunn, glatt, fastväxt hinna, som i våt väderlek kännes något klibbig. Mattskifflingarne (*Inocybe*), som i flera afseenden öfverensstämma med Fränskifflingarna, skiljas genom rostbrunt fröstoft och en af fina trådar sammanväfd matta, hvilken bekläder hattens yta och ofta upplöses till fjäll. Båda dessa afdelningars arter växa på jorden och hafva en egen, vanligen från lukt; ingen bland dem är ätlig, men de utgöra en så väsentlig del af svampvegetationen, att deras urskiljande äfven i praktiskt afseende är af vigt.

Deremot äro Fränskifflingarne så lika, att för vårt ändamål här ingen vigt ligger på deras urskiljande, helst de till sina egenskaper öfverensstämma. Den här afbildade Allmänna Fränskifflingen är den vanligast och ynnigast förekommande. Foten är i början tät, men blir sedan ihälig, fast, hvit, utan hylle,

men upptill beklädd af små korta fjäll. Hatten är köttig, i början kullrig, slutligen platt, slät, glatt, i våt väderlek något klibbig, hvitblek; något gulaktig och i midten vanligen mörkare; äldre blir den i kanterna vågig och oregelbunden. Skifvorna vid vidhäftningen till foten rundade, mycket tättsittande, smala, jennbreda (vanl. 1 lin.), i början lerfärgade, men äldre mörka. Hvad som företrädesvis utmärker denna art är, att i våt väderlek utsippra vattendroppar från skifvorna, hvilka i torr väderlek kvarlemnna mörkare fläckar.

På gräsbäckta ställen, så väl på öppna fält, som i skogslundar, förekommer Allmänna Fränskifflingen öfver hela riket och under hela hösten. Den har en vidrig, fastän svag lukt, liknande rättikors. Smaken är äkelig. Den är således icke ätlig; af PAULET m. fl. upptages den bland de giftiga. Likväl finnes den stundom insamlad bland Champignonier och andra ätliga arter, hvilket visar nödvändigheten att före användandet sjelf granska af andra insamlade s. k. ätliga svampar.

Tab. LXIV framställer Allmänna Fränskifflingar af olika storlek.

Tab. LXV. RODNANDE VAXSKIFLINGEN.

(Hygrophorus erubescens FRIES.)

Epicr. p. 322. Monogr. Hymen. II. p. 125.

Vaxskifflingarnas skiljemärken äro redan under Ängs-Vaxskifflingen (t. 10) afgifna, och närvarande art tillhör samma afdelning, som Bleka Vaxskifflingen (t. 48), utmärkt genom sin slemmiga hatt och gryngt-sträfvä fot.

Den Rodnande Vaxskifflingen är en stättlig svamp, hvars grundfärg är hvit, men mer eller mindre öfvergår i rött; hatten är ofta kött- eller rosenröd; inuti är den alltid hvit. Foten är tät, hvit, men öfverdragen med röda fibriller och upptill sträfv af röda punkter; den förekommer så väl kort (2 tum), tjock (1 tum), upptill afsnälmande, som ock förlängd (4 tum) och då mycket smalare, jennstjock eller nedåt afsnälmande. Något tydligt hylle finnes icke. Hatten köttig, i början upphöjd i midten, äldre platt, klibbig (i våt väderlek), ofta med små, punktformiga tilltryckta fjäll, men äfven fullkomligt slät. Skifvorna nedlöpande, långt åtskilda, hvita, men vanligen röd-fläckiga.

I medlersta Sveriges barrskogar förekommer denna art allmänt och ynnigt efter långvarigare höstregn. Den växer ofta i vida ringar, dock mindre täta och regelbundna än hos

en del andra arter, då de fått namn af "Hexringar". Dessa uppkomma derigenom, att svamplagret från en punkt utbreder sig åt alla sidor och företrädesvis fruktificerar i periferien (det äldre svamplagret i centren utdör). Dessa ringar vidga sig derför allt mer, till dess de slutligen upplösas och försvinna.

Den Rodnande Vaxskifflingen intager bland våra ätliga svampar ett af de främsta rummen. Äfvenså är den välsmakande och har ingen oangenäm lukt. Dess användande är lika med Chantarellens, och anses den af flera smakligare än denna. Genom sin köttfullhet och rikliga förekommande på en del orter är den af synnerlig vigt.

Anmärkn. Förhållandet emellan denna art och *Agaricus Russula* SCHAEFF., hvilken i S. Tyskland anses för en af de bäckaste svampar, är ännu icke fullt klart. Hos oss har den icke blifvit funnen, och anmärkningsvärdt är, att i ingen svampförteckning förekomma båda, ehuru endera icke saknas i någon. Men enligt figurerna hafva dess skifvor vid anhäftningen en inskärning, hvarför den föres till *Tricholoma*. Möjligen beror hela derus skillnad på felaktiga teckningar af den förra.

Tab. LXV framställer Rodnande Vaxskifflingen i flera former.

Tab. LXVI. FRÄKNIGA RÖRSOPPEN.

(Boletus variegatus SWARTZ.)

Fries Syst. Myc. I. p. 388. Epicr. p. 413.

Af detta synnerligen viktiga släkte hafva redan tabrika arter blifvit framställda, men ännu återstå några förtjenta af synnerlig uppmärksamhet.

Den Fräkniga Rørsoppen är en af de lättast urskilda i sitt släkte. Foten 2—3 tum tunn lång, $\frac{1}{2}$ tum bred och derut-öfver, jemntjock, slät (utan nätådror), glatt, gul, sällan tillika rodnande. Hatten köttig, i början kullrig, sedan flat, 2—3 tum bred, mörkgul och tätt besatt med små, mörka, af fina hår bildade fjäll, som kunna lätt lossas från hattens öfverhud. Kanten är i början inbörd, skarp och finluden. Köttet gult, blånar ofta vid brytning. Piporna utan nedsänkning fastväxta vid foten, mycket små, vanligen runda i mynningen, mörkt rostfärgade eller kanelbruna.

I våra barrskogar är Fräkniga Rørsoppen en af de allmännaste arter öfver hela riket. Äfven torrare somrar, då de flesta andra saknas, förekommer denna, ehuru mera sparsamt.

Räknas allmänt till ätliga arter, och jag har sjelf jemte flera förtärt den utan all olägenhet. Den är icke osmaklig, men kännes efteråt något skarp (hvilket antyder dess slägt-skap med följande art). Den användes därför helst stekt eller rostad.

Det är en egenhet att några för öfrigt ätliga och ej obehagliga arter efteråt kvarlemna en frän, något obehaglig smak. Särdeles är detta förhållande med Mörkgula Fingersvampen, som finhackad och stekt har en ganska behaglig lukt och i första början afven god smak. Vi tvifla icke, att det framdeles skall lyckas genom beredningssättet afsöndra nämnda skarpa ämne.

Tab. LXVI framställer Fräkniga Rørsoppen i olika åldrar.

Tab. LXVII. SKARPA RÖRSOPPEN.

(Boletus piperatus BULL.)

Fries Syst. Myc. I. p. 388. Epicr. p. 412.

Närvarande art är en af de minsta i hela släktet, men tillika lätt känd genom den nedtill ljusgulare foten, som pressad emellan fingrarna utspirrar en svafvelgul mjölksaft. Smaken är skarp och brännande.

Foten är sällan öfver $\frac{1}{4}$ tum hög, 3—4 linier tjock, slät, bräcklig, mörkgul, men inuti liksom vid basen svafvelgul. Hatten merendels platt, ofta oregelbunden, 1—2 tum bred, glatt, mörkgul, i våt väderlek något klibbig. Kanten icke skarp, som föregående, icke heller finluddig. Piporna utan insänkning fastväxta vid foten, stundom nedlöpaande, rostfärgade, med temligen vid och kantig mynning. Till färgen kommer den närmast föregående, men är för öfrigt vida skild från den. Med någon annan art kan den hvarken jemföras eller förväxlas.

För den skarpa, brännande smaken är den som näringsmedel alldeles obrukbar och räknas af alla författare till gif-

tiga arter. Vid minsta uppmärksamhet kan den väl icke med någon annan förväxlas, men som Rørsopparne i allmänhet äro ätliga, insamlas de ofta utan urskiljande, hvarför nödvändigt är tillse, att denna icke blifvit inblandad.

Utan att i ekonomiskt hänseende ega något värde förtjennar här med några ord omnämnas *Snylt-Rørsoppen* (Bot. parasiticus BULL.). Den är synnerligast märkvärdig derigenom att den aldrig förekommer utan växande på en annan större svamp af Röksvamparnes ordning, nemligen *Scleroderma vulgare*. Denna växtplats är så mycket märkvärdigare, som alla Rørsoppar för öfrigt växa på jorden och ingen enda ens på ruttet trä.

Tab. XLVII afbildar en större form af Skarpa Rørsoppen.

Tab. LXVIII. TJOCKA RÖRSOPPEN.

(Boletus pachypus FRIES.)

Syst. Myc. I. p. 390. Epicr. p. 417.

Arten har sitt namn efter den tjocka foten, men då detta afven gäller om hatten, hafva vi ansett lämpligt förkorta svenska namnet. Ehuru till utseendet lik föregående är den från densamma vida skild och lätt och säkert igenkänd af de rundt kring foten korta piporna, så att dessas lager genom denna insänkning synes nästan fritt från foten.

Tjocka Rørsoppen tillhör de större arterna i släktet. Foten är alltid tjock, vanligen kort ägg- eller lökformig, men förekommer äfven förlängd (från 2 till 5 tum) och då vanligen jemntjock, på ytan, synnerligen upptill, alltid nätadrig, vanligen till hälften gul, till hälften högröd. Hatten tjock, dynlik, 4—8 tum bred, fint luden, i början smutsig, men utväxt blek, sämskfärgad; köttet hvitt, vid brytning lindrigt blånande, snart återtagande den bleka färgen. Piporna små, runda, ljusgula, aldrig med röd mynning. Sistnämnda förhållande skiljer den från den Lömska Rørsoppen (B. luridus) och dess förvandta, med hvilka den till sin yttre form öfverensstämmer.

Arten är i S. Sveriges bokskogar icke sällsynt, vanligen dock ensamt växande. I medlersta Sverige har den hittills icke blifvit funnen.

För likheten med den Lömska Rørsoppen har den blifvit räknad till misstänkta arter, men efter LENZ, hvars uppgifter i detta fall äro palitliga, är den en af de förnämsta ätliga. Den öfverensstämmer också mycket med den Ätliga Rørsoppen i sina väsentligaste kännetecken. Sjelf har jag likväl icke haft tillfälle pröfva densamma.

Man uppgifver vanligen i läroböcker, att arter med blånande kött äro giftiga, hvilket afser Boletus luridus och förvandta. Men som allmän regel är denna uppgift otillförlitlig liksom alla allmänna kännetecken, hvarigenom man trott sig kunna urskilja ätliga och giftiga arter. Endast en säker kändedom af de enskilda arterne kan i detta afseende vägleda.

Tab. LXVIII framställer olika former af denna art.

Tab. LXIX. SKÖNA RÖRSOPPEN.

(Boletus calopus FRIES (non PERS.))

Syst. Myc. I. p. 390. Epicr. p. 416.

Båda först i häftet anförda arter hafva en jemntjock, slät fot, piporna mycket mörkare färgade än hatten; denna och föregående åter en mycket tjock, nätadrig fot och ljusgula pipor. Hatten är tillika mera hvälfd och på ytan finluden.

Den Sköna Rørsoppen har sitt namn egentligen af den karnosinröda foten, som är öfverdragen med ett regelbundet nät af ådror. Den är tillika tjock, upptill afsmalnande, mot basen stundom öfvergående till gul färg. Hatten är mycket köttig, kullrig eller dynlik, mörkt olivfärgad, aldrig kläbbig, utan beklädd af ett fint ludd, 2—3 tum bred, köttet temligen fast, blekt, vid brytning blånande. Piporna utan insänkning fastväxta vid foten, temligen långa, men med smal, något kantig mynning.

Arten förekommer både i löfskog och barrskog, men tillhör de sällsyntaste. I södra Sverige har den flera gånger blifvit funnen, men i medlersta Sverige blott i Södermanland. Den kan anses som den bäst utbildade typen för en hel grupp af närbeslägtade och i det närmaste likfärgade arter, alla med luden hatt, som vi här skola anmärka, då utrymmet ej medgifver upptaga dem särskildt.

a. FLOCKIGA RÖRS. *B. chrysenteron* BULL. et FRIES (B. calopus P.) skild från den förra genom smalare, styf, fibröst strimmig fot (ej nätadrig); mera platt, floeköst-fjällig hatt; större, kantiga, gröngula pipor. Dess mest utmärkande kännetecken är, att köttet nära ytan är rödt, ehvarföre, då den lätt spricker på ytan, dessa sprickor blifva röda. Vanlig på torrare ängsmark.

b. LUDNA RÖRS. (*Bol. subtomentosus* L.). Liknar till sin form och hattens färg mest Sköna Rørsoppen, men foten är gul och utan nätådror, i stället vanligen färad; från den floekiga skiljes den lätt genom hattens kött, som under ytan saknar dess röda färg.

Alla dessa arter äro ätliga, ehuru icke tillhörande de mera läktra arterna. Hattens ludd, liksom piporna, bör före användandet afskalas.

Tab. LXIX föreställer den Sköna Rørsoppen i naturlig storlek.

Tab. LXX. ALLMÄNNA TRÄFRÄTAREN.

(Merulius lacrymans WULF.)

Syst. Myc. I. p. 326. Epicr. p. 502.

Under benämningen *Svamp i hus* är denna art allmänt känd. Ehuru det säkerligen icke faller någon in att använda den som näringsmedel, räkna vi den till giftiga arter, emedan den gör rum, der den angripit träverket, genom sin unkna utdunstning i hög grad osunda. Den förtjenar ock i detta arbete ett rum, då den är en af de mest skadliga svampar.

Träfrätare-släktet, hvars alla arter äro skorplikt utbredda eller blott i öfre kanten något utböjda, igenkännes lätt af grunda, nätformiga porer på ytan, som icke förlängas till pipor som hos Rörsopporna eller Tickorna. Äldre bilda de oregelbundna fällor, stundom tänder. Fröstoftet är hos flertalet af arterna hvitt, men hos närvarande art rostfärgadt. Alla dessa arter växa på trä, hvilket de förstöra och sönderfräta.

Närvarande art är den största och skadligaste i hela släktet. Den börjar som en tunn, fibrillös hinna, men blir utväxt tjock, spongös, gulbrun och slutligen helt brun. I kanten är den hvitluden, och härifrån utsippa vattendroppar (eller, som man säger, gråter svampen), hvarigenom den friska veden genom fuktigheten beredes för dess vidare spridning. Porerne eller fällorna äro mycket oregelbundna, utväxta liksom möjliga af det rostfärgade fröstoftet. Svampen förekommer öfver hela landet, företrädesvis på slöjdadt trä i källare, boningshus

o. s. v. Stundom angriper den nybyggda hus, hvilkas trävirke den inom kort tid förstör. Se Bot. Utl. 3. sid. 347—349.

Man har uppgifvit flera medel att förekomma denna svamps härjningar; säkrast är att undanröjda villkoren för dess utbildning. Dessa äro 1) *fuktig grund*; det är ej tillräckligt att skaffa allt vatten aflopp; man måste äfven undanröjda matjorden, som lätt insuper fuktighet; 2) *qvaf och instängd luft*, hvarföre väderexling är oundgänglig. De svåraste härjningarna inträffa likväl, om man inreder nybyggda stenhus innan murarne fullkomligt torkat, eller begagnar icke fullt torrt virke, synnerligen om detta är hugget senare frampå vintern, sedan safterna i träden börjat uppstiga. — Bland de flera preservativer, man uppgifvit, är trädets flera gånger förnyade bestrykning med kopparvitriol eller något utspädd svafvelsyra det förnämsta. Men då svampen angriper redan byggda hus, måste golvet upptagas, den underliggande jorden undanföras och i stället en lerbädd, helst blandad med sot och mergel, inläggas, och sedan den väl torkat, fylls med grof sand och nytt golf inlägges.

Tab. LXX framställer svampen i flera olika åldrar.

Tab. LXXI. FRANSADE TAGGSVAMPEN.

(Hydnum cirrhatum PERs.)

Syst. Myc. I. p. 411. Epicr. p. 513.

Närvarande art är nära beslägtad med *Gyttrade Taggsvampen* (Tab. XVI) och växer ofta äfven i mindre tuvor, men hattarna äro hos denna mycket tunnare, fullkomligt utbildade, platta, med tydlig, i början inrullad och fransad kant. Hattens öfre sida är beklädd med enkla, nedliggande fibrer, till större delen fastväxta, men närmast kanten fria. Egentligen äro dessa anlag till taggar, hvilket följande art bestyrker.

Taggarne på hattens undre sida mycket långa, smala, alla likformiga. Hela svampen är köttig, hvit, under torkning öfvergående till gult.

Fransade Taggsvampen växer på stammar och grenar af löfträd, i S. Sverige på ek och bok, men i medlersta Sverge äfven på björk, likväl sällsynt och sparsamt. Det är en verklig förlust, emedan den tillhör de läckraste svamparne, liksom följande.

DUBBELTANDADE TAGGSVAMPEN.

(Hydnum diversidens FRIES II. ee.)

Nära förvandt med föregående, men försedd med kort fot, mycket oregelbunden hatt, utan fransad kant och alltid växande ensam. Synnerligast utmärkt är den genom trenne slags taggar; på öfre sidan upprätta, inskurna, ofta handlikt delade, i kanten längre upptill tjockare, klubb- eller trumpetlika, i spetsen tandade; på undre sidan regelbundna, enkla sylhika.

Växer på gamla björkstammar, mycket sällsynt. Hittills funnen i Småland och Östergötland sent på hösten. Dess smak och användande äro lika med föregående.

Tab. LXXI f. 1 föreställer *H. cirrhatum*, f. 2 *H. diversidens*, båda i naturlig storlek.

Tab. LXXII. ALLMÄNNA KÄRINGRÖKEN.

(Lycoperdon Bovista (L.) FRIES.)

Fries, Syst. Myc. III. p. 29.

Buksvamparne (*Gasteromycetes*) utgöra en egen, så från de hittills afbildade hatt- och grensvamparne som Disksvamparne väl och lätt skild klass. Fröredningen hos de förra bekläder svampens yta, hos Buksvamparna deremot utgör den svampens centralmassa, omgifven af ett allmänt hylle. Denna klass innefattar flera utmärkta och skarpt begränsade ordningar (se *Botan. Utfl. 3. p. 350*), men blott en af dessa, nämligen *Röksvamparne* (*Lycoperdine*), erbjuder några ätliga arter.

Röksvamparne äro i yngre ålder köttiga, inre fyllda med en likartad massa, omgifven af ett slutet, sammanhängande hylle, men äldre upplöses den till ett ulligt lager och rikligt fröstoff, som kringsprides likt en rök. Det ibland dessa ätliga slaget benämnas *Käringrök* (*Lycoperdon*, jemte *Bovista*); det omgifves af ett mjukt hylle, som är beklädt med en floeös, värtlik eller grynkig bark. Inre massan mörknar och upplöses slutligen i det merendels sotfärgade fröstoffet. Det till föda oanvändbara, ja skadliga slaget *Scleroderma* skiljes lätt genom sitt hårda hylle och inuti redan i början svarta massa.

Alla arterna af detta slagte, som icke äro tahriska, förenades af LINNÉ till en art, *Lycoperdon Bovista*, och i praktiskt afseende är deras åtskiljande af föga vigt, då samtliga på lika sätt kunna användas. De fördelas i tvenne naturliga afdelningar, af hvilka båda vi å denna och på följande planch framställa hufvudformerna.

Allmänna Käringröken tillhör förra afdelningen, hos hvilken hyllets beklädnad på öfre delen kan fränskiljas och den inre floeösa massan försvinner. Hyllet brister i oregelbundna rutor, utan bestämd öppning, är betäckt af floeösa vårtor och till färgen gråhvitt. — Man eger en större förändring af denna, vanligen ansedd för egen art, Stora Käringröken (*Lycoperdon giganteum*), som uppnår en utomordentlig storlek af en fots diameter, är mera klotrund och vanligen hvitare.

Båda dessa former förekomma öfver hela riket, isynnerhet på gräsbevuxna öppna ställen, men den Stora Käringröken är mera tillfällig och förekommer vanligen ensam. Ett enda exemplar deraf kan vara tillräckligt till en måltid för flera personer. Dessa arters användande och beredning framställas under följande art.

Närvarande art är särskildt vigtig som ett blodhämmande medel vid yttre sår. Man väljer dertill den mogna svampens nedre del eller fastare undre lager, hvilket, sedan fröstoffet blifvit väl fränskakadt och afsköldt, lägges öfver det blödande såret, hvarpå det tillbindes med en kompress.

Tab. LXXII framställer den Allmänna Käringröken i vanlig storlek; nedre sta figuren i moget tillstånd.

Tab. LXXIII. FÖRÄNDERLIGA KÄRINGRÖKEN.

(Lycoperdon gemmatum FRIES.)

Syst. Myc. III. p. 36.

Närvarande art skiljer sig från föregående genom tydligare fot, fastare hylle, hvilket öfver allt är beklädt med en fastväxt beklädnad af gryn eller fina taggar och öppnar sig endast med en rund, värtligt framstående mynning. Hos föregående försvinner på den mogna svampen hyllets öfre del, men hos denna kvar sitter det papperstunt. Vigtigaste skillnaden erbjuder dock hattens inre floeösa del, som då svampen öppnas, afsöndras till en fri upphöjning i midten. Den förekommer för öfrigt i så tahriska förändringar, att man svårigen skulle anse dem tillhöra samma art, om icke tydligen medelformer förenade dem.

Den största och utmärktaste af nämnda förändringar är *Lycoperdon excipuliforme* SCOP., som vanligen anses för egen art. Den har tjock, nedtill fälad fot, rundare hylle, utan uppstående puekel i midten för den blifvarde öppningen, samt fina taggar, då den vanliga har grynkig beklädnad. — Det är denna, som till näringsmedel företrädesvis förtjenar insamlas. Alla artens former äro ytterst allmänna öfver hela riket

och förekomma så väl på öppna fält som i skogsmark. — En tredje art, *L. pyriforme*, förekommer tillika allmänt växande i tät tuft, synnerligast på gamla trädstubbar. Den har långa, hvita rottrådar, som förena de sega päronlika hyllema, hvilka beklädas af fina, lätt försvinnande fjäll. Som näringsmedel är denna sämre än de båda afbildade arterna, och bland dessa eger Allmänna Käringröken företräde.

Endast de yngre svamparne, medan den inre massan är hvit och torr, äro till föda användbara. Så snart de inuti börja gulna eller blifva fuktiga, kunna de ej användas, än mindre då de börja öfvergå till pulver; icke heller duga de att gömma, utan måste genast anrättas. De skäras i förstnämnda tillstånd i skifvor, stekas saut anrättas med olja, salt och peppar. De äro då ganska smakliga och födande.

Å Tab. LXXIII föreställa de tre öfre figurerna (I) den större formen (*Lycoperdon excipuliforme*); de nedre (II) den allmänna förekommande. Artbestämningarnas namn (FR. och SCOP.) äro å Tabellen ombytta.

Tab. LXXIV. RODNANDE FLUGSVAMPEN.

(Agaricus Amanita rubescens (P.) FRIES.)

FRIES Syst. Myc. I. p. 18. Epicr. p. 7.

Af Flugsvamparnas grupp äro redan tvenne ganska giftiga arter framställda, nemligen *Allmänna Flugsvampen* (Tab. I.) och *Ofläckade Flugsvampen* (Tab. II.). Flertalet af våra inhemska arter af detta underslägte synas dela dessa skadliga egenskaper. Men i södra Europa förekomma tvenne utmärkta arter, som allt sedan Romarnes tid räknats till de yppersta, läkraste arter, nemligen *A. caesareus* *) och *ovoides*. Äfven vår inhemska Rodnande Flugsvamp räknas af VITTADINI och italienska författare till ätliga arter. Men då jag icke eger någon inländsk erfarenhet, vågar jag icke förorda densamma. Som likväl arten är utmärkt och allmän, har jag ansett lämpligt att afbilda densamma.

Rodnande Flugsvampen skiljer sig från alla samslägtin-garne genom sitt vid brytning rodnande kött. Den är till-lika utmärkt genom allmänna hyllet, som vid fotens bas helt och hållet försvinner, men bildar mjöliga vårtor på hattens

yta, sin upptill afsmälthande, småfjälliga fot med tydlig ring och de från de hvita skifvorna nedlöpande strimmorna på fotens topp. Hattens kant är i början slät, men blir äldre fint strimmig. Hattens färg föränderlig, vanligen köttfärgad eller sämskfärgad.

Arten växer öfver hela riket, så väl i löf- som barrskog, ofta i stor mängd. Det vore derföre af stor vikt, att man vunne någon visshet om dess egenskaper och att man vid någon veterinär-anstalt deröfver gjorde försök. Man verk-ställer dem vanligen derigenom, att man först gifver svam-pen, dels rå, dels kokad åt hundar. Visa de dervid inga menliga verkningar, gör man sjelf försök i mindre doser.

Tab. LXXIV framställer svampen i olika åldrar.

Tab. LXXV. ALLMÄNNA PLUGGSVAMPEN.

(Pavillus involutus (BATSCH) FRIES.)

FRIES Epicr. p. 317. Monogr. Hym. II. p. 118.

Från alla öfriga Skifvingar skilja sig Pluggsvamparne genom de från hatten lätt skilda skifvorna, hvilka nedlöpa på den tjocka foten och der vanligen nätformigt äro förenade eller ock greniga. I detta afscende, äfvensom det mjuka, saftiga köttet närma de sig till Rörsoopp-släktet. Pluggsvam-parne fördelas i tvenne afdelningar; den ena har smutsigt hvitt fröstoft, den andra rostfärgadt. Till den senare hör närvarande art.

Allmänna Pluggsvampen är en af de lättast urskilda arter. Foten är mycket köttig, af en tums tjocklek och derutöfver, inuti tät, utan ring; färgen smutsigul. Hatten är mycket köttig, fast, i början kullrig, äldre flat, i våt väderlek fuktig och synnerligen utmärkt af sin finludna inrullade kant. Yngre är den ett par tum, äldre ända till kvartersbred. Färgen är mer eller mindre rostfärgad eller gulbrun. Skifvorna tunna,

tättsittande, vid foten nätformigt förgrenade, blekare än hat-ten, men erhålla vid beröring mörkare fläckar.

Arten är synnerligen allmän, företrädesvis i löfskogar öfver hela riket, och framkommer vanligen i stor mängd redan vid slutet af sommaren. Dess fina, saftiga kött, likt Rörsopparnas, antyder dess lämplighet till näringsmedel, hvartill den i Ryssland allmänt begagnas. En olägenhet är, att den vanligen svårt hemsökes af insektlarver. Smaken är ej heller så alldeles läcker. Hos oss är den mig veter-ligen icke försökt. Dess anrättning bör vara lika med Rör-sopparnas.

Tab. LXXV framställer svampen i naturlig storlek.

*) Det är denna art, som hos de gamle romarne kallades *Boletus*. Af de utdrag af deras poeter vi anfört i Inledningen till detta verk (p. 1), kan man se huru högt uppskattad den var.

Tab. LXXVI. BRANDGULA RÖRSOPPEN.

(Boletus elegans FRIES.)

Epicr. p. 409.

Denna med *Mörkgula Rørsoppen* (T. XXII) närbeslägtade art skiljes lätt från denna genom sina renare färger, frånvaron af det bruna slem, hvarmed den senare är öfverdragen, och sina ljusare, på foten nedlöpande pipor. Storleken och formen är hos båda lika, men nu framställda art har hatt och fot brandgula, köttet gult, ringen hvit, och äro dessa färger oföränderliga, då hos den Mörkgula den i början af brunaktigt slem öfverdragna hatten genom slemmens försvinnande blir blekgul, men snutsig och fläckig.

Denna art, som nu finnes i stor mängd hvarhelst Lärkträd blifvit planterade, är synnerligen märkvärdig derigenom, att den först i senare tider här i landet blifvit iakttagen och tvifvelsutan utifrån blifvit införd. Ännu 1838 var den icke sedd af mig; först 1840 fann jag den vid Upsala i Carolina-

parken, der den numera arligen är allmän, och samma förhållande eger rum allstädes, hvar Lärkträd blifvit planterade. I Schweiz, hvarest Lärkträdet är inhemskt, är denna art allmännare än den Mörkgula.

Brandgula Rørsoppen förekommer numera så ymnigt hos oss, att den med allt skäl upptages som en af våra bättre ätliga arter. Ehuru den ej öfverdrages af det mörkbruna slem, som tillhör den allmännare arten, beklädes dess hatt af en tunn slemhinna, som jemte pipornas lager före anrättningen böra afsköljas. Så väl stekt som kokad är den, liksom den mörkgula, födande och välsmaklig.

Tab. LXXVI framställer arten i naturlig storlek i olika utvecklingsåldrar.

Tab. LXXVII. SKARLAKANSRÖDA VAXSKIFLINGEN.

(Hygrophorus puniceus FRIES.)

Syst. Myc. I. p. 104. Epicr. p. 331.

Af Vaxskiflingarnas släkte hafva redan typer af första (tab. 48) och andra (tab. 30) afdelningarne blifvit framställda; nu meddelas den utmärktaste arten af den tredje gruppen, som skiljer sig genom sin vattenaktiga substans, tunna och bräckliga hatt, mjuka, saftiga skifvor och vanligen lysande färger. Störst af hithörande arter är den *Skarlakansröda*. Foten är vanligen tre tum hög, tjock (vanligen $\frac{1}{2}$ tum), ofta uppsvälld, strimmig, gul, med röd anstrykning, vid basen hvit; äldre blir den ihålig. Hatten föga köttig, i början kloeklik, äldre utbredd (änå till 3 tum), med en nppstående puekel i midten, i kanten vanligen vågig och ofta inskuren; för öfrigt slät, glatt, i fuktig väderlek något klibbig, blodröd; men äldre blir den mer eller mindre urblekt. Skifvorna äro vidhäftade foten, tjocka, icke tätt sittande, gula, äldre ofta stötande i rött.

Arten är allmän på mossplupna ängar i September, och i blid väderlek förekommer den långt fränpå hösten. Den

förvexlas lätt med den *Coccionellfärgade Vaxskiflingen* (Hygroph. coccineus), med hvilken den till färgen öfverensstämmer, utom det att foten hos denna är upptill röd, vid basen gul, skifvorna nedlöpande på foten och vid basen röda, midtpå gula, i kanten grå. Som båda hafva lika egenskaper, ligger ingen vikt i ekonomiskt afseende på deras urskiljande.

Det är först under senare åren denna art upptagits bland de ätliga svamparne och som särdeles smaklig blifvit förordad af en tysk författare. Sjelf har jag icke haft tillfälle att pröfva den, men den råa svampens smak är mild och behaglig. Skadlig kan den i intet afseende vara; äfven foten och skifvorna äro användbara.

Tab. LXXVII framställer arten i naturlig storlek och olika åldrar.

Tab. LXXVIII. SKÄRA BRÖTLINGEN.

(Lactarius mitissimus FRIES.)

Epter. p. 345. Monogr. Hym. II. p. 180.

Denna lilla art af Mjölkskifvingarnas släkte har nära förvandtskap med *Milda Brötlingen* (tab. 10) och *Giftiga Brötlingen* (tab. 11), men är alltid mindre än dessa och utmärkt af sin tunna, släta, gullgula, något glänsande hatt, ymniga hvita mjölksaft. Foten är 2, högst 3 tum lång, 3—4 lin. tjock, slät, glatt, äldre ihålig. Hatten är föga köttig, men styf (rigid), nedtryckt med en uppstående vårta i midten. Skifvorna fastväxta vid foten, något nedlöpande, tättsittande, blekare än hatten och äldre ofta rödfläckiga.

Af denna art förekomma tvenne former, som svårigen kunna skiljas genom några karakterer, men hos den ena, mera höggula, är smaken oföränderligen mild och angenäm. Denna, som förekommer i S. Sveriges bokskogar, är tvefvelsutan ätlig och jemförlig med *Milda Brötlingen*.

Den andra, mera mörka, har visserligen en till början mild smak, men efteråt kännes den något brännande liksom

hos den *Bittersöta Brötlingen* (Lactar. subdulcis). Den är nästan en medelform emellan dessa arter och förekommer spridd i medlersta Sveriges barrskogar. Om dess egenskaper är oss intet med visshet bekant, churu flera skäl tala för dess användbarhet.

Bland de öfriga, talrika arterna af denna afdelning är ingen förtjent af särskild uppmärksamhet i ekonomiskt afseende. Som allmän regel kan antagas, att de arter, som hafva ett löst, spongiöst kött, icke äro ätliga, äfven om smaken är mild.

Tab. LXXVIII framställer den mörkare formen i naturlig storlek. Färgen har likväl blifvit mera stötande i rött än svampen vanligen förekommer.

Tab. LXXIX. FALSKA CHANTARELLEN.

(Cantharellus aurantiacus (WULF.) FRIES.)

Syst. Myc. I. p. 318. Monogr. Hym. 2. p. 206.

Släktets skiljemärken äro under n:o 10 angifna, och från den tab. 10 afbildade *Äkta Chantarellen*, med hvilken den vid flyktigt påseende möjligen förvexlas, är den lätt och säkert skild genom sina tät sittande, gaffelgreniga, tunnare skifvor, hvilka ej som hos den *Äkta* likna ådror, sin mjuka, i midten nedtryckta och vanligen fihudna hatt. Färgen är allmänligen brandgul, men öfvergår stundom till blekt gul, ja, någon gång förekommer den alldeles hvit. På fuktiga ställen förekommer derjemte en form med svartnande fot, som blifvit ansedd för egen art (Merulius nigripes P.), men den är otvivelaktigt beroende af ålder och växtställe.

Arten förekommer temligen allmänt så väl i skogar som på odlade ställen, vid vägkanter, bland ruttande trädstickor,

men den växer mera spridd och aldrig truppvis, som den äkta Chantarellen.

Arten anses allmänt för giftig, ehuru man knappt eger några bestämda bevis derför. Men i alla händelser bör den förkastas för sitt mjuka, luddiga (floccosa) kött och osmaklighet. Under vårdslös insamling befinns den stundom inblandad med den äkta Chantarellen, men bör då noga utgallas.

Öfriga arter af släktet äro dels hinnaktiga, dels så små, att ingen fråga kan uppstå om deras användande.

Tab. LXXIX framställer tvenne olika former af denna art.

Tab. LXXX. BLÅNANDE RÖRSOPPEN.

(Boletus cyanescens BULL.)

Syst. Myc. I. p. 395. Epicr. p. 426.

Arten är en af de utmärktaste och mest skilda arter i släktet; från alla förut afbildade afviker den genom hvitt föroft, från foten fullkomligt fria pipor och isynnerhet fotens egendomliga bildning. Denna består nemligen af en yttre fastare stomme, som inuti egentligen är ihålig men till en del fylld med en lös floecös massa, som kvarlemnar flera håligheter eller urgröpnigar, synnerligast om den längs- eller skäres. Den är föröfrigt mycket tjock, yngre äggformig, i början af den omfattande hatten mot spetsen hopknipen, på ytan finluden, af hattens färg. Hatten kullrig, tilltryckt luden eller småfjällig, sämskfärgad eller ljus brunaktig; köttet fast, hvitt, vid brytning i beröring med luften hastigt öfvergående till mörkblå färg. Pipornas lager fullkomligt skildt från foten, hvitt, äldre stötande i gult med små runda pipöppningar.

Denna egendomliga, i de flesta länder mycket sällsynta art, är i vestra Småland och Halland temligen allmän. Den

förekommer så väl i löf- som barrskogar, vanligast i grushälor, till en del nedsänkt i sanden.

Arten hör bestämdt icke till ätliga arter; huruvida den är giftig, känner man likväl icke. Efter en allmän folketro äro alla arter med blånande kött giftiga; men, ehuru den *Lömska Rørsoppen* med dess förvandter synes bestyrka denna åsigt, är detta skiljemärke ingalunda tillförlitligt. Något för denna art fullkomligen egendomligt är, att ur den kramade svampen flyter en ymnig, mörkblå vattenaktig saft, men denna skär sig snart och förlorar färgen.

De med denna närbeslägtade *B. castaneus* med kastanjebrun, luden hatt och *B. fulvidus* med höggul glatt hatt hafva oföränderligt kött, men öfverensstämma fullkomligt med föregående till sina egenskaper. Båda äro mycket sällsynta.

Tab. LXXX framställer Blånande Rørsoppen i naturlig storlek.

Tab. LXXXI. SLÄTA TAGGSVAMPEN.

(Hydnum lœvigatum Sw.)

Fr. Monogr. Hymen. 2. p. 275.

Med *Fjälliga Taggsvampen* (tab. 33) är närvarande art närmast förvandt, men skiljer sig lätt genom sin släta och fullkomligen glatta hatt. Foten är tät, omkring 2 tum lång, nära tums-tjock, emot basen oftast afsmalande, ljusare till färgen än hatten. Denna är mörkbrun, mycket köttig, i början kullrig, sedermera plattad, 3—4 tum bred, på ytan fullkomligt slät och glatt, men i torr väderlek sönderspricker ytan ofta till fina grynnor, så att den synes liksom punkterad. Hattens kött är mycket tjockt, fast och ljusare till färgen. Taggarne fina, syllika, mycket tätt sittande och något nedlöpande på foten, som deraf upptill synes punkterad.

Arten är ännu endast funnen i medlersta Sveriges barrskogar (vid Stockholm, Upsala m. fl. st.), hittills mycket

sparsamt, hvilket är en förlust, då den som näringsmedel genom sitt fasta ostartade kött eger betydligt företräde framför den *Fjälliga* arten.

Med denna har länge förväxlats en snarlik, i Smålands barrskogar allmänare art, nemligen *Bräckliga Taggsvampen* (*Hydnum fragile* Fr.). Den skiljer sig lätt genom tunnare, mjukare, blekare (grågul) hatt, som i början är finluden, aldre något fjällig; taggarne i början hvita. Äfven den är ätlig, men mindre smaklig.

Tab. LXXXI framställer svampen i naturlig storlek. Hattens färg vanligen mörkare än å tabellen.

Tab. LXXXII. ALLMÄNNA STENMURKLAN.

*(Gyromitra esculenta FRIES.)**Syst. Myc. II. p. 10 sub Helvella.*

En art af detta slägte har redan blifvit framställd (tab. 55), och slägtets kännemärken hafva derstädes angifvits. Det har af Botanisterna länge sammanblandats med Möss-svamparne, men allmänhetens öppna natursinne har insett, att det vida mer närmade sig Murklorna genom sina egenskaper och förekomst endast vartiden.

Den här tecknade arten är betydligt större än den förut afbildade *Lilla Stenmurklan* och har tydlig fot, vanligen 1½—2 tum hög. Foten är föröfrigt mycket oregelbunden, ofta kantig eller hoptryckt, beklädd med ett fint hvitt ludd, inuti ihålig eller fylld med ett mjukt ämne. Mössan är uppbläst, rundad, mycket ojämn, på ytan vågig af tjocka, upphöjda, rindad åsar, hvaraf ytan blir gropig; den inböjda kanten är på vissa punkter fastväxt vid foten. På undre (eller inre) sidan är den blek, fint luden.

Denna som näringsmedel synnerligen viktiga art förekommer vartiden i skogstrakter öfver hela riket och vissa är i stor mängd; enligt uppgift af ALBERTINI och SCHWEINITZ är den hvar tredje år tabikast.

Som näringsmedel går den i godhet upp emot vanliga Murklan, och bör dess insamling, hvar den förekommer, aldrig uraktlåtas. Enda olägenheten är dess större bräcklighet, hvarföre den icke med samma lätthet som Murklorna torkas till förvaring. Den användes derföre helst färsk och anrättas på samma sätt som vanliga Murklan.

Af detta slägte finnes högst sällsynt en tredje art: *Gyromitra suspecta* (KROMBH.). Sannolikt är den likväl en sjuklig form af föregående, vuxen på mycket fuktiga ställen. KROMBHOLZ anser den icke ätlig för den unkna lukt och smak, hvilka tillräckligen varna för dess användande. För öfrigt är den så ytterst sällsynt, att man ej behöfver frukta för förväxling.

Tab. LXXXII framställer mindre exemplar af denna art. Den är synnerligen svår att teckna, hvarför de flesta afbildningar af densamma är föga igenkännliga.

Tab. LXXXIII. BISKOPS-MÖSSAN.

*(Helvella Infula SCHÆFF.)**Syst. Myc. II. p. 11.*

Möss-svamparne hafva så mycken likhet med Murklorna, att de vid flyktigt påseende lätteligen förvexlas, synnerligast den här framställda arten för färgens öfverensstämmelse. Men de skilja sig väsentligen redan genom sitt framträdande; Murklorna förekomma uteslutande vartiden, Möss-svamparne hösten, ehuru man likväl kan finna ett och annat stånd af dessa äfven om våren. Föröfrigt är substansen hos Möss-svamparna mycket tunnare, ytan alldeles slät, utan de gropar eller upphöjda åsar, som lätt urskilja Murklorna och isynnerhet derigenom att den mycket uppblåsta mössan blir nedböjd och tufflig, som en biskopsmössa, hvarföre den ock erhållit detta namn i folkspråket.

Närvarande art, hvilken detta namn såsom den allmänaste i slägtet egentligast tillkommer, har till färg och stor-

lek en genast i ögonen fallande likhet med Allmänna Stenmurklan och skiljes hufvudsakligen genom redan angifna slägtkännemärken.

Den växer icke blott på jorden i skogsmark, helst på något fuktiga och afsvedjade ställen, utan äfven temligen allmänt på ruttnade tallstambar.

Alla arter af Möss-svamparna äro ätliga, men till godhet och smak Murklorna vida underlägsna; böra dock som näringsmedel ingalunda föraktas, utan insamlas och anrättas liksom de förra.

Planchen afbildar arten i naturlig storlek.

Tab. LXXXIV. STINKANDE FLUGSVAMPEN.

(Agaricus Amanita virosus Fr.)

Epicr. p. 3.

Alla i Sverige växande Flugsvampar, hvilkas kännetecken förut blifvit uppgifna, äro antingen giftiga eller miss-tänkta, churu den i förra häftet upptagna *Rodnande Flugsvampen* af en del författare upptages bland åtliga arter. Närvarande art är måhända den giftigaste bland alla och utmärker sig genom sin fräna lukt, som varnar för dess användande. Den är närmast besläktad med den *Ofläckade Flugsvampen*, men utom lukten skiljer den sig genom tät, jemntjock, på ytan fjällig fot, nederst omgifven af ett mera fritt hylle. Ringen är lös, af en bomullslik väfnad, trasig. Hatten är tunnare, i början seekertopplik, sedan kloeklik, utan fjäll eller vårtor, i våt väderlek klibbig, i torr glän-sande. Skifvorna smalare, i kanten af ringens lemningar van-ligen luddiga (floccösa). Svampen är oföränderligt hvit; endast hatten stöter stundom i gult.

Hittills är denna art endast funnen i Södra Sveriges löfskogar, men är der icke sällsynt flerstädes, såsom vid Femsjö i Småland; den framkommer tidigt, redan i Juli månad, då väderleken är regnig. Sannolikt är den i Södra Europa förekommande Vår-flugsvampen (*A. vernus*) en art-förändring af denna.

Som så väl denna, som den *Ofläckade* någon gång insam-las för Champignonen, hafva vi ansett nödigt lemna figurer af båda. Sådana misstag hafva äfven haft dödliga följder, men äro oek oförsvarliga, då de vid minsta uppmärksam-het lätt urskiljas af de alltid hvita skifvorna, äfven om det allmänna hyllet vid fotens bas — deras väsentliga känne-tecken — skulle blifvit fränskildt.

Tab. LXXXIV framställer arten i naturlig storlek.

Utom de redan afbildade Flugsvamparne förekomma flera likaledes gif-tiga arter, som vi här nedan skola anmärka, churu utrymmet ej medgifver lemna teckningar deraf.

a. *Fläckiga Flugsvampen* (*A. Amanita Mappa*), om hvilken redan förut vid Tab. II. (*A. phalloides*) blifvit nämndt.

b. *Grå Flugsvampen* (*A. Amanita pantherinus*) liknar fullkomligt All-mäna Flugsvampen, men allmänna, lökformiga hyllet kan skiljas från foten, och hatten är grå.

c. *Stora Flugsvampen* (*A. Amanita excelsus*) har äfven grå hatt, men är mycket större än föregående; allmänna hyllet försvinner alldeles vid fotens bas och kvarlemnar endast möjliga fläckar på hatten.

Alla tre förekomma så väl i löf- som barrskogar.

Tab. LXXXV. VÄLLUKTANDE PLATTSKIFFLINGEN.

(Agaricus Clitocybe odoratus BULL.)

Fr. Syst. Myc. I. p. 90. Epicr. p. 59.

Platt- och Trattskifflingarne utgöra en naturlig grupp, *Clitocybe*, hvars kännetecken under t. 45 blifvit angifna. Enda skillnaden dem emellan är, att hos de förra hatten vanligen är platt och skifvorna endast fastväxta, föga nedlöpande på foten; hos Trattskifflingarne åter är hatten i midten ned-tryckt, trattlik och skifvorna långt nedlöpande på foten.

Välluktande Platts kifflingen är lätt känd genom sin ange-näma anislukt och sin mer eller mindre gröna färg, stundom högrön, oftast erg-grön, tillika stötande uti grått eller hvitt. Skifvorna äro stundom alldeles hvita. Foten är tät, men inuti fylld af en lösare massa, 2 tum och derutöfver läng, 3—4 lin. tjock; stundom kortare och nedtill uppsvåld.

Hatten är köttig, men tunn, i början kullrig, äldre platt, 2—3 tum bred, slät och glatt (icke klibbig). Skifvorna fast-växta vid foten, mindre tätt sittande.

Arten är temligen allmän både i löfskogar och barr-skogar, men förekommer sällan i någon större mängd. Den upptages allmänt bland åtliga arter och har en angenäm smak. Då den likväl är föga köttig, är dess insamling min-dre lönande. Med någon annat art kan den icke förväxlas.

Tab. LXXXV framställer arten i naturlig storlek.

Tab. LXXXVI. JÄTTE-TRATTSKIFLINGEN.

*(Agaricus Clitocybe giganteus Sow.)**Fries Elench. I. p. 10. Epicr. p. 67.*

Tillhör samma grupp, som föregående, men dess senare afdelning med tratlik hatt och långt nedlöpande skifvor. Den är den största bland dessa och i flera afseenden väl skild från samtliga arter i denna artrika grupp. Som skifvorna kunna skiljas från hatten, närmar den sig mycket till Pluggskifflingarnas afdelning med hvitt fröstoft.

Hela svampen är hvit, i smutsgult stötande eller som man säger sämskfärgad (liknande sämskadt skinn). Foten är mycket fast, kort och tjock, glatt. Hatten är redan i sin yngre ålder i midten nedtryckt, äldre bredt bågformig, ända till fots-bred, på ytan i torr väderlek tilltryckt finluden, stundom småfjällig; kanten i början inrullad, äldre färad. Köttet är i förhållande till hattens storlek tunnt och låter lätt klyfva sig från kanten till midten. Skifvorna mindre nedlöpande än på öfriga arter, ovanligt tätt sittande, i början hvita, äldre af hattens färg. Har angenäm lukt.

Arten är mindre allmän, vanligen växande på bördig ängsmark, men hvar den förekommer, växer den vanligen i tufvor och stor mängd (Stoekholn, Upsala o. s. v.). Vid Femsjö i Småland såg jag den endast en gång på en nyodling, men då i otrolig mängd.

Arten är ätlig och välsmakande, med något seg. Den beredes derföre helst haekad eller en längre tid kokad. Icke blott skifvorna måste fränkiljas, utan äfven den hårda foten förkastas.

Med denna art förväxlas lätt *Stora Trattskefplingen* (Ag. Clit. maximus), men den har lång (3—4 tum) fot, som är inuti spongiös och elastisk, hatten har i midten en uppstående puekel och skifvorna äro mycket glesare. Den är icke ätlig, men icke heller giftig.

Tab. LXXXVI framställer Jätte-trattskefplingen i medelstort exemplar.

Tab. LXXXVII. FJÄLLIGA BLÄCKSVAMPEN.

*(Coprinus comatus (BATT.) FR.)**Syst. Myc. I. p. 307. Epicr. p. 242.*

Bläcksvamparne utgöra ett mycket egendomligt släkte bland Skifsvamparne, skildt från alla genom sina i början sammanpackade liksom hoplimmade skifvor, beklädda af ett gryngt hvitt mjöl, hvilka *hastigt upplösas till en svart vätska*.

Större delen af släktets arter äro mycket små och hastigt försvinnande, närvarande art är den största i släktet. Foten är ihålig, nedtill uppsvälld och rotsläende, äldre upptill afsmalnande; ringen är fri, icke fastväxt vid foten. Hatten är något köttig, hvit, i början trind och nästan slät, men äldre utbredd, upplösande sig i fransade fjäll. Skifvorna fria från foten, i början hvita, sedan rödlätta, slutligen svarta, upplösande sig i en smutsande svart vätska.

På feta, gräsbeväxta platser, helst vid byar, förekommer denna svamp i oräknelig mängd, tuffigt växande. Ehuru lös har den oerhörd kraft, om den möter motstånd, såsom hårdnad lera, stenar o. s. v., att undanvräka desamma.

Arten har en förunderlig likhet med *Stolta Fjällskefplingen* och äfven med *Champignoner*, så att jag sett den insamlad för båda. Dermed är likväl ingen fara, ty ung är den mild med angenäm champignon-smak och ätlig, men afviker väsentligt från de ofvannämnda derigenom, att den efter få timmar upplöses i en bläcklik vätska, då den naturligtvis icke är användbar. Jag har i dess första ålder förtärt den rå med god smak.

Den svarta vätskan, hvartill den sammanflyter, kan användas som bläck. Jag har sett dermed författade uppsatser efter flera år fullkomligt läsliga. Detsamma gäller om *Allmänna Bläcksvampen* (*C. atramentarius*); den har smutsig färg, föga märkbara fjäll och otydlig ring.

Tab. LXXXVII framställer arten i naturlig storlek.

Tab. LXXXVIII. SVAFVELGULA TICKAN.

(Polyporus sulfureus (BULL.) FRIES.)

Syst. Myc. p. 357. Epicr. p. 450.

Af Tiekornas slägte äro redan flera arter framställda (tab. 8, 24, 44 m. fl.), hvarvid släktets kännetecken blifvit angifna. Närvarande art framställer en stor tufva, som bildas af flera sammanväxta och öfver hvarandra liggande hattar, antingen växande på upprätta stammar, då tufvan blir half, med alla hattarna åt en sida; eller på nedfälda stockar, då den är hel, med hattar åt alla sidor. Fot saknas nästan alltid.

De enskilda hattarne äro mycket breda, glatta, på ytan vågiga, vanligen rödgula, med åldern bleknande. Undersidan är platt, betäckt med mycket små, alltid svafvelgula porer. Köttet mycket mjukt (närmast liknande mjuk ost), saftigt (så att stundom en svafvelgul mjölk-saft utflyter ur det samma) och icke trådigt, som hos närbeslägtade arter; äldre blir hela svampen vit och söndersmulas.

På gamla löfträds-stammar, synnerligen Ek, förekommer denna art icke sällsynt och faller genom sin storlek och höggula färg lätt i ögonen.

Artens egenskaper äro föga kända. Den har fästast Chemisters uppmärksamhet genom de kristaller af oxalsyra

kali, som afsättas på den torkade svampens hatt och stundom betäcka den som en skorpa. Som ätlig har den hittills icke varit känd; smaken är syrlig. Men Herr C. J. HJERTA har meddelat mig att han använt den som näringsmedel samt funnit den smaklig och oskadlig. Denna iakttagelse är af vikt, ty genom sin storlek bör dess insamling blifva lönande. Beredningssättet är likväl mig obekant.

Utom de redan afbildade tillhöra Tiekornas slägte ett stort antal märkvärdiga arter f. e. *P. umbellatus*, som bildar tufvor af en mängd trattlika hattar. I ekonomiskt hänseende är likväl endast *Björktickan* (*P. betulinus*) anmärkningsvärd; den användes till nåldynor, som kork o. s. v. men framför allt till de yppersta rakstriglar. Den är allmän på björk, lätt skild från alla öfriga genom en sned puekel på hattens öfre sida, med hvilken den är fastväxt. Hattens färg är brun; piporna och genomsnittet hvita.

Tab. LXXXVIII framställer i förminskad skala (3) en tufva af arten.

Tab. LXXXIX. BRÄCKLIGA TAGGSVAMPEN.

(Hydnum fragile FRIES.)

Monogr. Hymenom. II. p. 275.

Denna art har länge blifvit förväxlad med den t. 81 afbildade *Hydnum levigatum*, hvarföre vi ansett nödigt lemna figurer af båda.

Den Bräckliga Taggsvampen är en af de största i släktet och uppnår stundom ända till en fots bredd, med 3—4 tum tjock fot, men finnes oftast mindre och är i allmänhet mera oregelbunden än öfriga förvandta arter. Foten är stundom kort och tjock; stundom förlängs den till 3 tum och är smutsigt hvit. Hatten är mindre köttig än hos beslägtade arter, särdeles bräcklig, vanligen nedtryckt, i början finluden, blekare, äldre glatt, stundom småfjällig, gråbrun,

något stötande i rödbrunt och i kanten vågig eller fligig. Köttet är löst, grått. Taggarne mycket långa, något nedlöpande på foten, i början hvita, äldre grå.

Växer i barrskogar, hittills endast funnen i Småland, Östergötland o. s. v., vissa är mycket sparsamt.

I anseende till sitt lösa kött och milda smak har denna som näringsmedel företrädde framför den fjälliga Taggskiflingen och närmar sig mera den *Bleka*.

Tab. LXXXIX framställer Bräckliga Taggsvampen i yngre ålder.

Tab. XC. BRANDGULA TAGGSVAMPEN.

(Hydnum politum FRIES.)

Epicr. p. 507. Monogr. Hym. II. p. 277.

Den *Brandgula Taggsvampen* är den utmärktaste, väckraste, smakligaste arten i sitt släkte, men tillika den sällsyntaste. Från alla öfriga skiljer den sig derigenom, att taggarne, som hos de öfriga arterna nedlöpa på foten, hos denna lemna en bar ring rundt kring densamma, fri från taggar. Den utmärker sig ytterligare genom sin släta, glatta, glänsande (ehuru aldrig klibbiga) brandgula yta både på hatten och foten.

Foten är vanligen tumshög, $\frac{1}{2}$ –1 tum tjock, men vid basen lökformigt uppsvälld. Hatten är köttig, flat eller något nedtryckt, 2–4 tum bred, vanligen kretsrund, sällan vågig i kanten. Köttet är mörkt, hvitt. Taggarne syllika hvita, utan att äldre skifta färg. I naturlig förvandtskap står den *Bleka Taggsvampen* närmast.

Den är hittills endast funnen vid Femsjö i Småland, der den fanns sparsamt på grusiga vägkanter, betäckta af tallbarr. Taggsvamparne, med få undantag, tillhöra företrädesvis barrskogar.

Sedan ofvanstående redan var satt, har jag erhållit teckning af denna art, funnen i Östergötland af vår utmärkte svampkännare, Herr H. von Post. Den afviker dock från den af mig samlade genom smutsigt gul, i brunt stötande hatt.

Lukt ingen märkbar, men smaken är angenäm. Dess användning lika den *Bleka Taggsvampens*.

Tab. XC framställer svampen, tecknad efter torkadt exemplar.

Tab. XCI. KLUBBLIKA TRUMPETSVAMPEN.

(Craterellus clavatus (PERS.) FR.)^a

Fries Epicr. 533.

Trumpet-svamparnes släkte har en genast i ögonen fallande likhet med Chantarellerna, med hvilka de förr förenades, men dess arter hafva på hattens undre sida inga utbildade skrifvor, utan äro antingen släta eller på sin höjd skrynkliga, helst äldre.

Den Klubblika Trumpetsvampen är mycket köttig, med tät, kort fot, som upptill utvidgar sig till den päronformiga hatten, men i spetsen är den liksom tvärt afhuggen och i midten vanligen nedsänkt, i kanten något vågig. Undre sidan, hvilken beklädes af fröredningen, är skrynklig, purpurfärgad eller violett, men äldre liksom hattens öfre sida smutsigul.

Denna mycket utmärkta och lätt urskilda art finnes på fuktiga ställen i skogarne, helst på lerbotten, i stor mängd.

I mellersta Sverige är den icke sällsynt, men hvarken i Skåne eller Småland har jag funnit densamma.

Arten tillredes och användes på samma sätt som Chantarellen. I vissa trakter af Tyskland f. e. i Mähren torgföres den i stor mängd. Efter min smak är dess kött mera svampartadt (spongiöst), men mindre segt.

Öfriga arter af detta släkte hafva tunn, hinnaktig hatt och äro derföre icke användbara.

Tab. XCI framställer arten i naturlig storlek.

Tab. XCII. 1. FRANSADE FINGER-SVAMPEN.

(Clavaria cristata HOLMSK.)

2. KORALL-FINGER-SVAMPEN.

(Clavaria coralloides L. FR.)

S. Mge. I. p. 467, 473. Epier. p. 572.

Af Finger-svamparnas släkte äro förut afbildade tvenne arter, neml. den *Höggula* och *Draf-Finger-svampen*. Båda dessa hafva hvitt fröstoff, som lätt synes äfvellet, om de läggas på svart botten. Till summa afdelning höra äfven dessa helt och hållet hvita arter, hvilka till sina egenskaper så fullkomligt öfverensstämma, att vi här framställt dem gemensamt.

Oaktadt den stora likheten äro de likväl lätt urskilda. Den *Korallika* växer i tätare tuftar, mera regelbunden och med tjockare stam, som förgrenar sig uti oregelbundna grenar, hvilka äro aftrubbade, icke fransade. Den finnes under rvenne former, en med utdragna mera likformiga grenar, den andra mycket kort, knappt mer än tunnslög.

Den *Fransade* Finger-svampen är oftast spriddt växande, sällan tuftig, till consistensen mera seg, har oftast smal stam, ej tjockare än grenarna, som upptill äro vidgade och

i spetsen delade, liksom fransade. Den är i hög grad föränderlig.

Båda arterna växa på jorden; *Korall-Finger-svampen* helst på gräsväxta ställen, mera sällsynt (dess mindre form var i ar ynnig vid Knifsta station i Upland); den *Fransade* åter mest i skogar på fuktiga ställen.

Båda arterna äro, liksom alla med hvitt fröstoff, milda, ätliga, välsmakande. Utom de här anförda förtjenar den *Högbla* (*Clavaria amethystina*) uppmärksamhet; den är endast funnen i S. Sverige. Deremot äro alla Finger-svampar med gult fröstoff till smaken mer eller mindre bittra och därför förkastliga.

Tab. XCII. f. 1—3 framställer yppigare och tuftigare former af *C. cristata*, f. 4, 5 *C. coralloides*.

Tab. XCIII. HVITA TRYFFELN.

(Terfezia Leonis TULASNE. — Tuber niceum (DESC.))

Tryffelsvamparne utgöra en egendomlig grupp, som till yttre utseendet eger största likhet med Röksvamparne, synnerligast ordningen Hymenogastres, (se Fr. Botan. Utfll. III. p. 351), med hvilka de länge varit förenade, men afvika så väsentligt genom sin helt olika fröredning, att de måste föras till en helt annan familj, *Hylssvamparne* (Ascomycetes). Sporerne äro nemligen inneslutna inom egna hylsor (f. 1, 2), liksom hos Murkelsvamparne (se t. 54), och genom medelformer öfverga Tryffelsvamparne till Vartsvamparne (Sphaeriacei).

Äfven genom sitt växesätt afvika Tryffelsvamparne väsentligt från öfriga Svampar. Flertalet af deras arter växa under jorden. De äro mycket talrika i södra och vestra Europa, hvarest vintrarne äro blida, emedan deras bästa växetid är vintern. Deremot äro de högst sällsynta i norra Europa, der marken vintertiden är tillfrusen; hos oss är blott en art, Hvita Tryffeln, ett par ganger tillfälligtvis träffad på egendomarne Cedersberg och Kuseboholm nära Linköping.

Den *Äkta Tryffeln* (*Tuber cibarium*) är icke funnen i Sverige; dess upptagande som Svensk i Linn. Fl. Su. beror

på ett misstag. Den Hvita Tryffeln skiljes lätt från densamma genom sin släta yta och hvita färg. Båda äro kända och högt värderade som läckerheter. Det vore önskligt, att någon art af Tryffel hos oss någonstädes kunde finnas i mängd; men för att insamla Tryffel-arter måste man ega dertill dreserade hundar, hvilka genom sin fina lukt kunna vadra hvar svampen kan uppgäfväs.

Hvita Tryffeln tillhör egentligen Norra Afrika och är redan i S. Europa sällsynt. Dess förekommande i Sverige är derfore särdeles anmärkningsvärdt. Men just detta betager oss förhoppning om dess förekommande någonstädes i mängd.

Af de falska Tryffel-arterna finnas deremot hos oss flera arter, som man vanligen menar vara verklig Tryffel. Sadane äro *Octariania variegata*, *Hydnangium carneum*, arter af *Rhizopogon*, *Elaphomyces* m. fl., men dessas sporer äro aldrig inneslutna i egna hylsor, och inuti äro de gropiga, ej täta, genomdragna med sporförande adror. De växa tillika i jordbrynet (ej under jorden) utom *Elaphomyces*, hvars arter i folkspråket äro kända under namn af *haräpple*.

Tab. CXIII är kopierad efter Tulasne, emedan jag icke haft tillgång till friska exemplar.

LACTARIUS VOLEMUS. FR.

R. Pries direx E. Fries: approb.

P Åkerlund d.

Lith. och på f. d. Salmsons tryckeri.

AGARICUS (AMANITA) MUSCARIUS. L.

E Fries direx

E Pettersson del.

Lith och tr hos Salmson

ALPHEUS (AMANITA) PHALLOIDES

— var. b. — A. viridis — F.

— A. phalloides — F.

AGARICUS PSALLIOTA LAMPROSUS L.

1. P. durus

with ochraceous gills

LACTARIUS DELICIOSUS. LINN.

E. Petersen. del.

Lith. och tr. hos Salmson

E. Fries. direx.

CANTHARELLUS CIBARIUS FR.

Fr. Fr. direx

Fr. Pettersson del

Lith och tr hos Salmson.

POLYPORUS OVINUS. SCHAEFF.

AGARICUS (TRICHOLOMA) GAMBOSUS FR.

LACTARIUS RUFUS V.R.

BOLETUS EDULIS. BULL.

E. Fries direx

E. Pettersson del.

Lith. och tr. hos Salmson.

1872 10 10 10 10 10

SPARASSIS CRISPA. FR.

Litt. och tr. av Salmson

AMANITA MUSCARIA L. (A. muscaria)

AMANITA PHALLOIDES L. (A. phalloides)

Faint, illegible text, possibly a title or description.

BOLETUS ALBIS.

E. M. C. 200. 100

BULETHS OMAMLAAT WOL

POLYPIRUS CONFLUENS. FR.

PISTILINA HEPATICA SCHAEFF.

11255-25 d. 11

CLAVARIA FLAVA.FR.

E. Fries dux.

L. 211000000

Lith. scilicet per A. J. Salmon

LACTARIA TORRENTIS, SORNETTE.

HYMENOCYSTES SACCHAROPHYLLUS FRANKENB. 17

Agaricus muscarius L.

THE COTTON GIN

— 1850 —

CLAVARIA VARIATA PERG.

AMANTIA MUSCARIA | MELLEUS VAR.

Illustration of Amanita muscaria var. muscaria

AGARICUS (PSALLIOTA) CRETACEUS. FR.

PLATE 100. MUSHROOMS.

紅頭牛肝菌 (Boletus erythrorhizon)

BOLETIN AESTIVAL. F.R.

POLYPORUS FRONDOSUS.FR.

HEATH'S SELECTED BOTANICAL ILLUSTRATIONS

PLATE 100

THE END

AGARICUS (PHOLIOTA) MUTABILIS. SCHAEFF.

HEPATICARIA F.

BOLETUS RADIUS.FR.

BOLETUS VACCINUS. FH

E. Fries direct

1. Åkerlund del

Lith och tr. på f. d. Salmsons tryckeri.

BOLETUS FELLEUS. BALL.

C. Pettersson del.

Fries direx.

Lith. och tr. hos Abrah. Lundquist & Co.

OUR PRUS ... LAMUSC. L'

... ach to pa id ... m. 307 ... rryches.

MORCHELLA ESCULENTA

GYROMITRA CURTIPES.

DISCINA PERLATA FR.

www.mushroomexpert.com

POLYPORUS FUMENTARIUS. L.

Agaricus muscarius L.

AGARICUS (HEBELOMA) CRUSTULINIFORMIS. FR.

L. Fr. direx

P. J. G. uncol.

Lith. o. fr. h. Abrah. Lundquist & C^o.

BOLETUS VARIEGATUS. SW.

E. Friess d. rex.

P. Åkerlund del.

Lith. och tr. hos Abrah. Lundquist & C^{ie}

BOLETUS PIPERATUS. BULL.

BOLETUS CALIPOS.FR.

MERULIUS LACRYMANS. WULF.

E Fries direx

P Åkerlund del

Lith. och tr hos Abrah Lundquist & C^{ie}

I

I

I

II

II

II

I. HYDNUM CIRRHATUM. P.
II. HYDNUM DIVERSIDENS. FR.

P. 24. 1845.

Lith och tr. M. Abrah. Lundström.

Grex

LYCOPERDON BOVISTA. (L.) FR.

I. *LYCOPERDON EXCIPULIFORME* FR.
II. *LYCOPERDON GEMMATUM* SCOP.

AGARICUS JAMANTIA STEPHENS. FR.

E. Feltgen del.

PAXILLUS INVOLUTUS (BATSCH) FR.

BOLETUS ELEGANS. FR.

HYGROPHORUS PUNICEUS FR.

LACTARIUS ROSELLIANUS MITSCHKE & REH.

THE MUSHROOMS OF THE BRITISH ISLES

THE MUSHROOMS OF THE BRITISH ISLES

Lith. by J. G. Smith, 1827

GYROMITRA ESCULENTA. FR.

HELVELLA INFULA. SCHAEFF.

Dir. et approb. E. Fries.

F. Åkerlund del.

Lith. o. fr. hos Abrah. Lundquist & C^{te}

THE MUSHROOMS OF NEW YORK

Vol. 1. No. 1. Attrib. to the B. 11

11/11/11

AGARICUS (CLITOCYBE) ODORUS BULL.

AMANTHA MUSCIPOLICANTENS COW.

STROPHARIA LIGNATA DC.

HYDNUM POLIUM. FR.

CRATERELLUS CLAVATUS.

1

2

4

3

5

1-3. CLAVARIA CRISTATA HELMSK.

4, 5. CLAVARIA CORALLOIDES L.

TEPHROSIA LEUNISI. T. 101

With notes by Abrah. Lundquist & C^o