578. 5-1

PLANTAE PREISSIANAE.

PLANTAE PREISSIANAE

SIVE

ENUMERATIO PLANTARUM

QUAS

IN AUSTRALASIA OCCIDENTALI ET MERIDIONALI-
OCCIDENTALI ANNIS 1838 — 1841

COLLEGIT

LUDOVICUS PREISS,

PHIL. DR. ACAD. CAESAR. LEOPOLD. CAROL. NATUR. CURIOS. ET REG.
SOCIET. BOT. RATISBONENS. SODALIS, CET.

PARTIM AB ALIIS PARTIM A SE IPSO DETERMINATAS
DESCRIPTAS ILLUSTRATAS

EDIDIT

CHRISTIANUS LEHMANN,

M. ET PH. D., HIST. NAT. PROF. P. O., HORTI BOT. DIR., BIBL. P. CIVIT. HAMB.
PRAEF. PRIM., ORD. BORUSS. AQUIL. RUB. CL. III. EQUES, ACAD. CAESAR. LEOP.
CAROL. NAT. CURIOS. ADJUNCTUS, CET.

VOL. I.

HAMBURGI,
SUMPTIBUS MEISSNERI.

1844 — 1845.

E 5052

E 521 704 54

W 521 704 35

V I R O

CELEBERRIMO PRAECLARISSIMO

GUILIELMO JACKSONIO HOOKER

EQUITI,
HORTI BOTANICI REGII KEWENSIS DIRECTORI,
ETC. ETC. ETC.

HUNC LIBRUM AMICAE OBSERVANTIAE PUBLICUM
MONUMENTUM ESSE VOLUIT

J. G. C. Lehmann.

P R A E F A T I O.

Ludovicus Preiss, Philos. Dr. vir clarissimus, summo investigandae perscrutandaeque naturae studio commotus, ante aliquot annos adhibita Hamburgi diligenti praeparatione in occidentalem et meridionali-occidentalem Australasiam proficisci constituit. Quod iter laboribus et difficultatibus impeditissimum quam prospero successu perfecit, rebus naturalibus, e Preissiana collectione in musea translatis satis probatur, quae illorum corporum naturalium, quae antehac rara e Britannia ad nos migrare solebant, nunc opera ejus copiam non exiguam possident. Quanti vero thesauri ad botanicum, quae sine dubio imprimis ab eo adjuncta et aucta est, ex hac expeditione redundaverint, hic ipse liber videtur testari.

In Europam Preissius anno MDCCCXXXII reversus quid in universum itinere suo consecutus sit ipse narraturus, plantarum, quas collegit, in notitiam omnium perferendarum curam mandavit mihi. Ex quarum ingenti multitudine, quae vel se-

cundum familias distribui haud brevi temporis spatio potuerat, facile cognovi, mihi soli opus suscepturo vires facultatesque ad examinandas describendasque omnes non esse suffecturas, maxime quum publici muneris officiis tum perquam occupatus otium, quo tantum opus perficerem, non haberem. Praeterea censui, in illustrandis tot plantis fore, ut conjuncta opera virorum in hoc negotio versatorum, quorum pro suo quisque commodo familias sibi describendas eligeret, non minus ad augendam doctrinam quam ad opus celerius absolvendum conferret. Quod consilium a plerisque viris rei botanicae peritis etiam extra fines Germanicos est comprobatum. Nam praeter eos viros doctos, quos ipse invitaveram, multi rei herbariae cultores, Clarissimi Preissii rogatu arcessituque commoti *), sese in opere edendo mecum laborare velle ultro professi sunt, ita ut, quamquam majorem plantarum partem, quam antea describendam mihi elegeram, aliis tradebam, unicuique satis dare non possem. Quibus omnibus viris spectatissimis pro liberalitate et benevolentia mihi exhibita, pro insumpto studio et diligentia plurimas ago gratias. Nomina hic enumerare non attinet, singulis enim operis partibus, cui summae laudi sunt et decori, praescripta reperiuntur.

Etiam si certa quaedam ratio, qua omnes familiae determinarentur et explicarentur, a me proposita, a reliquis comprobata minus esset, tamen a me non potuit impediri, quin in expositionis genere inter singulos commentarios discrepantiae passim conspicuae essent. Cujus varietatis causa partim quidem in ingenio singulorum scriptorum, quorum alii accuratiore et uberiore, alii concisiore scribendi genere delectantur, partim vero et in exemplarium natura, quae haud semper eadem erat, est sita.

---

*) In ephemeridibus Florae 1842 No. 34.

Diversis temporibus complures investigatores, recentioribus imprimis diligentissimum J. Drummond Scotum, in eisdem fere regionibus Australasiacis, ad quas Clarissimus Preiss appulsus est, haud paucas plantas collegisse viris botanica arte eruditis satis est cognitum. Auctam Australasiae austro-occidentalis floram uno conspectu comprehendendam proposuit Vir Clarissimus J. Lindley in commentatione „a sketch of the vegetation of the Swan-River Colony“, de plantis Drummondianis Vir Celeberrimus et Excellentissimus G. J. Hooker ingeniosissime passim disseruit. Harum plantarum jam antea congestarum numeros ubicumque indicari potuerunt, indicare non praetermisimus; etiamsi neque Drummondianam neque reliquas collectiones omnes inspicere semper licuit.

Accuratissima vero diligentia collocata est in proferendis numeris, quibus eae plantae Preissianae, quarum plura exemplaria exstabant, prius quam distributa est collectio, ideoque longe prius, quam hic liber editus est, insignitae sunt. Quicumque igitur plantas a Clariss. Preissio collectas acceperunt, in libro nostro et nomina et illustrationes earum, quatenus natura plantarum id feret, invenient. Praeterea observationes, quas Clariss. Preiss inter colligendum ipse de stirpium magnitudine, florum colore, aliisque rebus scitu dignis vel adeo futuris investigatoribus utilibus fecit, signis „ „ inclusas addidimus.

Denique monendum est, nonnullas esse plantas, quae, quum exemplaria earum casu in aliarum familiarum loculos inieperint, non ab iis, qui familias, ad quas pertinent, illustraverunt, sed ab iis, ad quos temere venerunt exemplaria, descriptae sint. Sic *Lawrencia squamata* (pag. 242) ab Illustrissimo Nees ab Esenbeck determinata est, non vero a Clarissimo Miquel Dr., qui quum reliquas omnes *Malvaceas* collectionis Preissianae adumbraret, hanc in manibus non habuit.

Ubicumque hoc accidit, adscripto auctoris nomine suum cuique vindicavi, et, si fieri potuit, has plantarum descriptiones e loco alieno in suum locum transtuli. Quae praeterea addenda vel emendanda reperientur, indicesque integri, quorum secundus ordinem numerorum herbarii Preissiani sequetur, alteri hujus operis volumini, in quo de plantis Monocotyledonibus et Acotyledonibus agetur, subjungentur.

Dabam Hamburgi pr. Cal. Sextiles MDCCCXLV.

J. G. C. Lehmann.

In his foliis interjunctis de-
scriptae aut notatae sunt

Plantae

Novae Hollandiae colo-
niae australis,

quas

aut ipse observavit vel
aut ab aliis communica-
tas exploravit

Ferdinandus Müller,

philos. doct. reg.

1847 seq.

Adelaidae.

Abbreviationes: hb. St. = herbarium
A. Caroli Stuart, hortulani —
hb. J. = herbarium A. Jeps,
hortulani —

"Lalupung pouta'ig, Nagafnit
"in fortificationibus"

Chamisso.

Prost. Aphyllae!

Acacia spinosus? Benth. (Pl. H. 172)

Ab. 4. rhytidem differt ramis spinosis, ac-
sonatis, bracteis minimis, ab A. 4.
trigonocarpa capitulis 3-5 floris, co-
rolla alba, seminibus duplo minu-
tioribus. (Si notu adpropt.) etc. Frut. Frut.

Trilix Epid. Octob. 1847. Ad fluvium

Cukaparinga! Jacaranda, Daulbey bay, Duffon

~~*A. rigidissima*. Forster (Pl. 63)~~

~~Diff. (et antea) ramis rhytidibus
capitulis paucifloris, flaminibus exsertis
ab A. 4. trigonocarpa corolla alba
ab A. rhytidem differt capitulis
paucifloris. In hac una A. spinosus
non? eugene distinguere desidero.~~

~~*Acacia (vulgaris)* (Pl. H. 173)~~

~~glabra, ramulis striato-pulveris, spine-
rosiusculis aphyllis, acuminatis, bracteis
paucis, bracteis subrotundis denique 2-3
fidis, trilobatis.~~

~~*A. rigidissima* Forster.~~

~~*A. rigidissima* Forster.~~

A. spinosus? Bentham?

In vicinia fluvii Cukaparinga, frut.
2-3'. Sept. 1848. — In fruticosa
prope pagum Lyndoch-valley. Sept.

* capitulis papilionibus paleis villis
calyce obtuso * quinque-dentato
corolla triplex brevior

Petala nervosa.

Frutex prostratus. In fruticosa
ad Lyndochvalley. Frut. erut. v. ad
solum ramulis paula odore
patentibus. Auth: primo vere

Acacia petrophila, Forster.

In montis in Remerkabili regibus

Ab A. ovata divaricatur: spinis cylindricis
habita ferrea & loco natali rufescenti
humido etc. Auth: primo vere

LEGUMINOSAE.

(Auctore C. F. MEISNER.)

MIMOSEAE.

ACACIA (Linn.) Willden. Endl. gen. n. 6834.
Bentham in Hooker London Journ. of Bot. I.
p. 318. sq.

Series I. PHYLLODINEAE Benth. l. c. p. 322.

I. APHYLLAE, phyllodiis nullis. (Benth. l. c.)

1. **Acacia restiacea** Benth. l. c. p. 323, n. 1.

In locis limoso-arenosis ad radices montis Bakewell (York) d. 3. Sept. 1839.
specim. florifera Herb. Preiss. No. 971.

β **scoparia**, nob., ramis iterato-ramosis, erectis, bracteis ad
gemmularum basin ovato-lanceolatis.

In rupestribus ad latus occidentale montis Currie (York) d. 10. Apr. 1840. fructi-
fera Herb. Preiss. No. 972.

Forte n. sp., sed ex specimine suppetente unico, deflorato, non defi-
nienda. Accedit ad *A. spinescentem* Benth., sed rami haud spinescunt.

„Frutex 6-pedalis, ramis pruinosis.“ *Rami* nunc simpliciores, stricti,
nunc ramosi et saepius flexuosi. *Gemmulae* ad ramulorum ultimorum nodos
minutae, sessiles; *bractee* squamiformes erectae, fuscae, tenuiter striatae,
2-3 lin. longae, apice bifidae (e stipulis 2 inferne connatis conflatae) basi di-
latata 1-1½ lin. latae; *bracteolae* paucae, imbricato-adpressae, ovatae, ob-
tusae, minute puberulae. *Flor.* . . . *Legumen* (fragmenta separatim sub
n. 972 missa) lineari-moniliforme, continuum, 1½? poll. longum, rectiusculum,
glaberrimum, 1-loculare, 2-valve, 5-6-spermum, stipitatum, stipite lineari
compresso, valvis coriaceis, extus secundum longitudinem tenuiter reticulato-
venosis fuscis, intus laevibus pallide rufis, marginibus haud incrassatis, fo-
veis seminiferis ellipticis 2-2½ lin. longis 1½-2 lin. latis, isthmis planis circ.
1 lin. longis latisque. *Semina* nigra, nitida, obovata, 1½ lin. longa, 1
lin. lata, facie una rotundato-convexa, altera medio obtusissime carinata; stro-
phiola albidula, submembranacea, ovata, acuminata, dimidiam fere partem se-
minis a latere amplectens eique adpressa.

2. **Acacia? tetragonocarpa** *n. sp.*, glabra, ramis ramulisque muticis, sulcatis, folii rudimento squamiformi lineari brevi suffultis; pedunculis axillaribus, subsolitariis, submonocephalis, minute bracteolatis; capitulis 3-1-floris; calyce minuto, obtuse 4-lobato; corolla striata, 4-fida; staminibus inclusis; legumine stipitato, acuto, subincurvo, acute tetraquetro, angulis nerviformibus aequalibus, faciebus lineari-lanceolatis planis, superiore et inferiore medio sutura tenui nerviformi vix prominula pereursis caeterum laevibus, lateralibus reticulato-venulosis; seminibus 2-1 longitudinalibus, oblongis, strophiliatis.

In solo subturfoso-arenoso prope villam b. Spencer (Plantagenet) d. 8. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 866.

Species facie simillima *A. restiacea* Benth., sed foliorum vestigiis manifestis, inflorescentia et praecipue legumine distinctissima, forsani novi generis pignus. — *Caulis* e radice simplici verticali parce fibrosa numerosi, $1\frac{1}{2}$ -2-pedales, „decumbentes“, graciles, penna corvina fere tenuiores, teretes, egregie sulcato-striati, virides, a basi inde ramosi, nodis haud incrassatis, internodiis stricte continuis 1-3-pollicaribus. *Foliorum* rudimenta 1-2 lin. longa, fusca, ramo plus minus adpressa, supra canaliculata. *Pedunculi* filiformes, tennes, 5-6 lin. longi (nonnunquam gemini) basi apiceque (rarius etiam secundum longitudinem) bracteolis paucis squamiformibus vix semilineam longis muniti, demum recurvi. *Atabastro* oblonga, acutiuscula. *Corolla* flava? infundibuliformis, $1\frac{1}{2}$ lin. longa, calyce fusco triplo longior, egregie striata, persistens, semi-4-fida, lobis erectis, acutis. *Stamina* numerosa, persistentia, haud exserta. *Legumen* coriaceum, fuscum, glabrum, circ. pollicare, stipite 2-4 lin. longo, angulis plus minus prominulis carinaeformibus, faciebus 2 lin. latis, dorsali et ventrali demum secundum suturam (facile saltem pressione fissilem) dehiscentibus?, valvis crassiusculis. *Semina* subsessilia, pendula, valvarum foveolis immersa, oblonga, fusca (immatura) 2-2½ lin. longa, strophiola adpressa truncata pallida triplo longiora.

II. ALATAE, phyllodiis decurrentibus. (Benth. l. c. p. 323.)

3. **Acacia alata** *R. Brown.* — DC. prodr. 2. p. 448.

a genuina nob., phyllodiorum mucrone recto v. (sursum) incurvo. — *A. alata* Benth. l. c. p. 324, n. 4. Wendl. diss. t. 1. Bot. Reg. t. 396.

In humidis umbrosis ad ripam fluvii Canning, Jul. 1841. cum flor. et fr. Herb. Preiss. No. 997. (Drummond n. 306! et ex parte 307!)

„Frutex 5-pedalis.“

β platyptera nob., phyllodiorum mucrone (deorsum) recurvo, ramorum alis plerumque latioribus. — *A. platyptera* Lindl. in Bot. Reg. 1841. misc. n. 10. Bot. Mag. t. 3933. Benth. l. c. n. 5. —

Swan River. (Drummond. n. 307! ex parte.)

Nisi graviter fallor, a genuina *A. alata* haud specificè distincta.

4. **Acacia diptera** *Lindl.* Swan River (Bot. Reg. 1839, Append.) p. XV. n. 62. Benth. l. c. n. 6.

a latior nob., canthos ramisque latius alatis (5-8 lin. latis) inferne et in costa plus minus pilosis (raro glabris) pilis patulis mollibus. — *A. diptera β erioptera* Benth. l. c. Bot. Mag. t. 3939! (ex ic.)

+ Scavia macrophylla, Linn.

In declivitatibus aruosis
proas fl. Murray locum
Monumide inter & asfuram orien
Solum lignum ad prima utile.

+ Scavia burariacea fud Mill. v. p.
Folia Phyllodii oblongo vilorato
spatulata ad 1" lg 1/2" lt. Ligum. oblongo la
teolatum 4-6" lg 1 1/2-2" lt. utrusq. pilis albis or
cursum. Siliqua oblonga atra fusca subulata 1" cur. 1/2
Prophasi. affinis fuisse per brevitate.

Fili diviso Scavia Macrop. perforata
guamini ex parte porophum folium. Arbor plerumque humilis 12-35' tra
diametro bapli 1/2-2' cortis nigrescens & moxus, 2 annorum p atentia
laevissimus foride fuscus. fol 1/2-2' longa ovata 1/2" lata paulo tri
coracea jumbra magis angusta glauca facibus magis convexis

5. In proleis A. microbotrya? fl. mi
fuit trahenda, quum in nonnullis
exemplaribus phyllodia evidenter de
current. Descriptio autem foliorum
primordialium curissime recedit.
Diagnosis hujus & A. microbotrya
haud in promptu est. Folia prima
sunt biinnata 1/2-1/3, folialis ab
eque oblongis v. ellipticis basi et
apice rotundatis apicalatis sub
avenis 3-8 plegis subsessilibus.
Nihilominus hae differentiae
ex arte de declarari possunt.
~~Substratum ad fundum 6-8 ped. ad urbem~~
~~Silicibus placatis. Jun 1848.~~ Omnia
huc nota ad Scaviam hydrophilam
patent.

Scavia macrophylla fud Mill (non)

Ad portum Sorell, Parmandae
M. 1846. Frutx 4-6.
Inter A. macrophyllam & micro
nataem medium tenus.
Cit. Nov.

In arenosis sylvae prope Perth, d. 8. Maj. Herb. Preiss. No. 995, et in limoso-calculosis inter frutices sylvae prope Halfwayhouse (Darling's-range) d. 12. Sept. 1839. No. 996 cum fl. et fr.

β **angustior nob.**, caulibus vix 1-3 lin. latis, plerumque hispidulis, pedunculis solitariis v. geminis, rarius brevissime racemosis; capituli diametro plerumque vix longioribus. — *A. diptera* Hook. ic. t. 369!

In glareosis ad jugum montium Darling's-range prope cataractam, d. 3. Aug. 1839. — Herb. Preiss. No. 993. in asperis ad latus occidentale montis Wuljenup (Plantagenet) d. 14. Oct. 1840. (No. 394.) et hinc inde in arenosis subumbrosis sylvae ad fluv. Cygnorum, d. 23. Jul. 1839. (sine No.)

Caules annotini, 2-pedales. **Legumen** (unicum, separatim sub n. 995 missum) coriaceum, planum, continuum, glaberrimum, subnitidum, bipollicare, 5-6 lin. latum, falcato-oblongum, ex apice rotundato oblique minuteque mucronatum, basi in stipitem brevissimum attenuatum, suturis nerviformibus incrassatis obtusissimis laevibus, valvulis transverse pulchre venosis leviter torulosis. **Semina** 12, transversa.

5. **Acacia stenoptera** Benth. l. c. p. 325, n. 8.

In arenosis ad fl. Cygnorum ubique, d. 12. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 991. et inter frutices sylvae districtus Sussex, d. 19. Dec. 1839. No. 992.

„Radix lignosa, caules annotini, pedales, v. frutescentes adscendentes.“ **Phyllodia**, maxime infima, interdum (praecipue specim. No. 991.) rectiuscula, margine superiore prope basin obsolete glanduligera. Folia infima nonnunquam perfecta, bipinnata, 1-juga, rhachii 1-1½ poll. longa anguste alata, petiolulis 3-6 lin. longis vix alatis, foliolis 2-jugis oblique obovatis medio 1-nerviis penniveniis mucronulo innocuo acutatis, jugi exterioris majoribus petiolulum aequantibus. **Legumen** desideratur.

6. **Acacia incurva** Benth. l. c. p. 325, n. 10.

In arenosis apertis inter frutices densos haud longe a villa col. Erwin, d. 24. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 990.

„Frutex erectus, 1-2-pedalis.“ **Phyllodia** medio crasse acuteque costata, quasi ancipiti-tetragona, patentissima, a basi leviter recurva, deinde vel recta vel apice paulo incurva v. rarius subrecurva, interdum bipollicaria, vix unquam linea 1 latiora.

7. **Acacia graminea** Lehm. delect. sem. Horti Hamburg. 1842, glabra, stipulis obsoletis; phyllodiis longissimis, subcompresso-filiformibus, trifariam angustissime decurrentibus, brevissime sphacelato-mucronatis muticisve, infra medium glandula poriformi munitis, 1-nerviis, nervo crassiusculo marginibus alisque scabriusculis; pedunculis solitariis, brevibus, 1-cephalis; capitulis multifloris.

In solo humoso vallis prope Mahogany creek (Darling's-range) d. 25. Apr. 1840. Herb. Preiss., No. 984 (Drummond n. 304.)

„Frutex 12-pedalis.“ (An inventor lapsu calami 12-ped. pro 1-2-ped. scripsit, quae statura e plantae aspectu verisimilior videtur?) **Rami** ramulique gracillimi, adscendentes, inferne acute angulati nec vere alati, extremitates versus 3-alati, alis vix ½ lineam latis cum venis 3 tenuioribus alternantibus. **Stipulae** exiguae, lanceolato-subulatae, fuscae, cito deciduae. **Phyllodia** 4-8-pollicaria, ½ lin. lata, semierecta, apice saepius recurva, marginibus nerviformibus cum costa alisque sub lente papilloso-scabriusculis, glandula foveaeformi in margine superiore 10-15 lin. a basi distante. **Pedunculi** 3-6 lin. longi, subtetragoni, glabri, scabriusculi, demum patuli. **Capitula** magnit

seminis *Viciae sativae*, circ. 20-flora. *Flor.* 5-meri. *Calyx* turbinatus, corolla dimidio brevior, lobis brevissimis obtusis. *Legum.* . . . . — Species *Alatas* inter et *Calamiformes* ambigua, illis tamen propius quam hisce affinis; valde accedit ad *A. calamifoliam* Sweet Bot. Reg. t. 839, quae ex ic. differt ramulis subteretibus, phyllodiis brevioribus, capitulis racemosis, caet.

8. ***Acacia extensa* Lindl.** Swan River p. XV. n. 64. Benth. l. c. p. 343, n. 68.

In rupestribus ad portum Princess Royal Harbour, n. Dec. 1840. Herb. Preiss No. 983.

„Frntex 5-pedalis.“ *Rami* inferne acute angulati, superne 3-alati, alis $\frac{1}{2}$ -1 lin. latis margine scabriusculis. *Stipulae* obsoletae. *Phyllodia* fere *A. gramineae*, sed saepius breviora, paulo crassiora et firmiora, stricta, apice brevissime uncinato-mucronulata. *Pedunculi* vix 3 lin. longi, subteretes, laeviusculi. *Capitula* pisi magnitudine. *Legumen* (separatim adjacens) anguste lineare, rectum, 3-pollicare, $1\frac{1}{2}$ lin. latum, multiarticulatum, glaberrimum, laeve, obsolete venulosum, isthmis linea transversa (saepe obsoleta) notatis articulo oblongo (3 lin. longo) utrinque convexo parum angustioribus, suturis nerviformibus paulo incrassatis obtusis pallidis. — Species a. cel. Benthani inter *Calamiformes* suas (§. 5. l. c. p. 341.) recensita, sed secundum nostra saltem specimina (nisi, quod dubitamus, a planta Lindleyana specificè differant) certe ad *Alatas* transferenda.

III. **ARMATAE**, ramis apteris, stipulis spinescentibus, phyllodiis ex ovato ad lineare, pungentibus 1-v. rarius 2-3-nerviis, inflorescentia capitata simplici v. rarius subracemosa. (Benth. l. c. p. 326.)*)

9. ***Acacia teretifolia* Benth.** l. c. n. 13.

In arenosis inter frutices prope praedium rusticum Maddington ad fluv. Canning (Perth) d. 2. Nov. 1839 fructifera Herb. Preiss. No. 998. et prope catartam ad caput fl. Cygnorum, sterile, d. 26. Jul. 1839. No. 975.

„Frntex 1-1 $\frac{1}{2}$ pedalis.“ *Pedunculi* fructiferi semipollicares, crassiusculi. *Legumen* sessile, lineare, subcompresso-cylindricum, leviter arcuatum, utrinque acutum, 2-3-pollicare, 2 lin. latum, sublignoso-coriaceum, glaberrimum, laeve, fuscum, suturis obsoletis v. sulciformibus (interdum guttulas gummi sicci diaphani exsudatas ferentibus) valvula altera v. rarius utraque medio nervo longitudinali plerumque obsoleto percursa.

10. ***Acacia laricina* n. sp.**, ramis teretibus, costato-striatis ramulisque cano-tomentosis; stipulis setaceo-spinescentibus, rectis; phyllodiis tetragono-filiformibus, rectis v. recurvo-arcuatis, mucrone brevi recto pungentibus, 1-nerviis, glabris, marginibus nerviformibus eglandulosis; pedunculis axillariibus, solitariis, brevibus, erectis, monocephalis, tomentosis, fructiferis elongatis phyllodium subaequantibus deflexis; capitulis parvis, multifloris, glabris.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 973.

*) ***A. crassistipula* Benth.** l. c. n. 12. (Drummond n. 295!) inter plantas Preissianae deest. — Idem valet de ***A. congesta* Benth.** l. c. p. 327, n. 19. (Drummond n. 293!) cujus legumen lineare, valde arcuatum, sesquipollicare, 2-3 lin. latum, 2-5-spermum, inter semina paulo contractum, suturis obsoletis submarginatum, valvis convexis enervibus pallidis.

„Frutex pedalis, ramis flaccidis.“ *Phyllodia* 6-10 lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata. *Pedunculi* floriferi 2-3 lin. longi, niveo-tomentosi, fructiferi 6-7 lin. longi, fusci, glabrescentes, arcuato-deflexi. *Capitula* (floribus nondum apertis) vix grani piperis magnitudine; alabastra obtusa, 5-gona. Legumen (nondum perfecte maturum) lineare, attenuato-substipitatum, compressum, continuum, pollicare, lin. 1 latum, leviter arcuatum et tornulosum, cano-tomentosum, demum glabrum, longitudinaliter nervoso-striatum, 3-4-spermm, suturis simplicibus acutiusculis. — Differt ab *A. teretifolia* Benth.: ramis tomentosis, haud angulatis, stipulis tenuioribus erectis ramo fere adpressis rectisque, phyllodiis tenuioribus et brevioribus mucrone fortiore pungentibus, caet.; ab *A. barbinervi* Benth.: stipulis erectis, phyllodiis glabris, tetraquetris nec planis, dimidio angustioribus, brevius mucronatis; ab *A. striatula* Benth.: phyllodiis 1-nerviis, haud divaricatis, et ab *A. sulcata* R.Br., cui etiam accedit, pubescentia, phyllodiis incurvis pungentibus, caet.

11. *Acacia barbinervis* Benth. l. c. n. 14.

In limoso-calculosis prope cataractam ad caput fluvii Cygnorum d. 16. Jun. 1840. Herb. Preiss. No. 988.

„Frutex vix pedalis.“

12. *Acacia nervosa* DC. mém. lég. p. 444; prodr. 2. p. 249, n. 6. Benth. l. c. p. 327, n. 17.

In limoso-calculosis in summitate montis Greenmountain, alt. 800 ped., d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 936. (Drummond n. 298!)

„Frutex 1-pedalis.“ *Phyllodia* constanter videmus glandula poriformi (nunc in medio fere margine superiore, nunc 2-3 lin. a basi sita) munita, modo (praecipue in specim. Drummondianis) 1-1 $\frac{1}{2}$ -pollicaria 6 lin. lata, mollo (ut a Candollio describuntur) dimidio fere minora. *Legumen* (unicum, separatim sub n. 936 missum, immaturum) sesquipollicare, 2-3 lin. latum, coriaceum, laeve, glaberrimum, spiraliter tortum, utrinque attenuato-acutum, valvis planis enervibus, suturis valde incrassatis teretibus medio linea tenui nerviformi percursis. — Cum *A. hastulata* Sm., cui soli comparanda a Candollio dicebatur, nullam plane similitudinem monstrat, dum contra, ut recte jam observavit cl. Bentham, primo intuitu ad *A. myrtifoliam* Willd. valde accedere videatur.

13. *Acacia Bagsteri* (nomine rectius *Baxteri*?) Benth. l. c. n. 16?

In limoso-arenosis porrectis sylvae prope oppidum York, d. 5. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 977. (specim. manca.)

„Frutex humifusus.“ Ramuli subspinescentes. Stipulae dilapsae. *Phyllodia* semipollicaria, 3-4 lin. lata, submutica. *Capitula* pauca, pedunculis 2 lin. longis, flor. nondum expansis.

14. *Acacia Hügelii* Benth. in Hüg. Enum. p. 42, et apud Hook. l. c. n. 22. Hügel Bot. Archiv t. 10!

In sylvaticis arenosis prope Limekiln (Perth) d. 5. Nov. fructifera No. 961. et in colliculis ad portum Leschenault (Wellington) d. 13. Dec. 1839. florens No. 953. Herb. Preiss.

Legumen (fere maturum) sessile, lineare, falcatum, pollicare, 2 lin. latum, planum, obtusum, basi attenuatum, puberulum, 2-3-spermm, inter semina paululum angustatum, venis longitudinalibus tenuibus irregulariter anastomosantibus lineatum, suturis nerviformibus v. subincrassatis obtusis. Pedunculi fructiferi phyllodio paulo longiores; plerumque arcuato deflexi.*)

*) Nova sp. hic inserenda est: *Acacia Shuttleworthii* nob., hispidulo pilosa, ramis teretibus; stipulis minutis, subspiaescenti setaceis; phyllodiis oblique

15. **Acacia obovata** Benth. l. c. p. 329, n. 24.

β **minor nob.**, stipulis spinescentibus, phyllodiis $\frac{1}{2}$ -1-pollicaribus pedunculo longioribus. —

In glareosis inter frutices montis Greenmountain (York) d. 26. Apr. 1840. fl. —
rens, Herb. Preiss. No. 931.

„Frutex 1-1½-pedalis.“

16. **Acacia urophylla** Benth., in Bot. Reg. 1841, misc. p. 24, n. 61., et in Hook. Lond. Journ. l. p. 329, n. 25. —

In lapido-so-sublimosis umbrosis montium continnorum Darling'srange, haud longe a capite fluvii Cygnorum d. 9. Aug. 1839, Herb. Preiss. No. 918. et in humidis umbrosis ad ripam fl. Canning, m. Jul. 1841. No. 913, (steril.)

„Frut. 3-4-6-pedalis.“ Specim. glaberrima, phyllodiis summis vix 1-1½-pollicaribus 8-10 lin. latis, inferioribus duplo majoribus, margine levis-sime crenatis, glandula conspicua ovali concava ad basin marginis superioris, petiolo semipollicari utrinque puberulo. Variat etiam (No. 913.) phyllodiis fere lanceolatis 2 poll. longis 5-7 lin. latis.

IV. **TRIANGULARES**, ramis apteris, stipulis setaceis v. subnullis, phyllodiis parvis plus minus triangularibus 1-v. rarius plurinerviis, angulo inferiore mucronato, superiore mutico plerumque glandulifero, inflorescentia simplici capitata. (Benth. l. c. p. 330.)

17. **Acacia decipiens** R. Br. DC. prodr. II. p. 449, n. 3. Benth. l. c. n. 27. — *Mimosa decipiens* Koen. Bot. Mag. t. 1745. —

In littore arenoso ad Middleton Bay. d. 23. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 964.

„Frutex 5-pedalis.“

$\beta?$ **incrassata** Benth. l. c. — *A. incrassata* Hook. ic. t. 370.

In regionibus interioribus Australiae merid.-occid. m. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 962. et in glareosis sylvae prope fontem Bejoording (Victoria) d. 15. Mart. 1840. fructifera No. 967 (Drummond n. 296!)

„Frut. 3-pedalis.“ Legumen pollicare, 1-1½ lin. latum, suturis incrassatis. Specim. Preissiana alia (No. 967.) ab icone paulo recedunt phyllodiis apice plerumque truncatis, angulo superiore minus elongato marginibusque

obovatis v. suborbicularibus, mucrouulatis, undulatis, 1-2-nerviis, obscure penniveniis, punctato-scabris, marginibus vix incrassatis, superiore prope medium glandulifero; pedunculis axillaribus, solitariis, phyllodio brevioribus, capitulis parvis 10-12-floris villosis; legumine brevi, late oblongo, compresso, 2-3-articulato, utrinque rotundato, puberulo. — Swan River. (Drummond n. 294! in Herb. Shuttleworth.) — Omnes partes pube brevi, molli, in ramis pedunculis floribusque densiore, patula, in leguminibus phyllodisque parciore et brevior, tectae. Phyllodia 5-6 lin. longa, 3-5 lin. lata, nervo conspicuo parum excentrico in mucrouulum excurrente, accedente saepius nervo altero tenuiore illum inter et marginem superiorem (magis arcuatum) medium tenente plerumque obsoleta v. ante marginem evanescente. Pedunculi 5 lin. longi. Legumen circiter semipollicare, 3 lin. latum, articulis linea impressa interstinctis, valvis levissime convexis, suturis simplicibus obtusis. — Species proxime affinis **A. Hügelii**, sed notis indicatis satis superque distincta, nec non accedens ad **A. idiomorpham** et **obovatam** Benth., et **A. sertiformem** et **piligeram** Cunningham, quae abhorrent sive stipulis longioribus recurvisque, sive phyllodiorum forma et magnitudine, caet.

rhomboidalis *ferd mee*
in hb. Stuart.
A. adiantophylla *ferd mee* in hb. *Blancovskyana*
A. rotundifolia *Hook?*
rad. cyclophylla *diffusa*
ramulis angulatis puberulis.
venum glabris, stipulis minutis
pubulosis perispermatis saepe
curvatis, phyllodius obliquis tri-
angulatis vel rotundatis - (rhomboidis)
plurimique apice leviter exsertis, curva-
mentis in mucronulum exsertente
lateraliter absolutis, dimidia superiore
phyllodius inferiore duplo latiore glandulam
obsoletam gerente saepe in angulum
acutum producta, nudum
ribus foliariis phyllodius aequantibus
et duplo superantibus
A. hastulata *W. affinis*
et cyclophyllae
Acaria rhomboidalis ferd mee
H. hb. L. 61. hb. A. 174. var. caule parri-
ata!
var. pubescens. Ad flumina mu-
ray ripas arcuatas. Legumen ab-
fructu suorum spirale. Inae-
pubescens. Hirsutulae et caule phyll.
lobis in forma asplundae legali-
paucum abhorrans. hb. A. 188.
forma legalis legit Stuart in
sola argillacea quid vid. Stueck-
hensis. - Barroja-range
Sept 1848 - Marlesidd Sept
Beyle-range (dylorat.) Nov.
In collibus montibus
hirsu miratis varians, ut videtur
A. fer. hirsuta cum e. s. s. octava
affinis. Folia saepe latiora quam
longiora.
Acaria clavata Schultendat.
An speciem reperiendam frustra
invenimus? = A. hungariara.

X *A. neurophylla* Ferd Mull. § IX

~~(forte in sect vij Wenth pertinet,~~

~~ujus definitionem desiderat)~~

~~rarnis angulatis verrucatis, rugu-~~

~~lis deciduis, phyllodiiis coriaceis rigi-~~

~~lato lineariibus, obtusis, laevis~~

~~v. apiculatis, supra medium apice latioribus, ~~tribus~~~~

~~v. apiculatis, supra medium apice latioribus, ~~tribus~~~~

~~islaque ~~longe a~~ glandula marginali obsoleta~~

~~capitulo previcoribus ebracteatis, glabris,~~

~~Interfructuosa "Murray frons" juxta~~

~~inferiorum partem fluvii Murray! Oct.~~

~~1848. Fructus 1-3' erat. Phyllodia 1-1 1/2~~

~~ly 1 1/2-2" lt. Maxime affinis habita~~

~~tionem Scaciae glanduliferae. Q.~~

~~specim. novum floribus a. v. m. m.~~

~~ex eodem loco communicatum phyllo-~~

~~dis paullo latioribus, inflexis.~~

Ab *A. foliophylla* deriviente modo

aemula ~~typis~~ ^{rigidioribus} ~~curvis~~ ^{curvis} ni-

tidulis, phyllodiiis ~~supra~~ ^{supra} ~~medium~~

ni prope medium latioribus

curvis magis eminentibus, capitula-

lis parvis minoribus brevibus pa-

disovalatis. et; rariorem bractea

absente! In numero Dini. Forst

prope Oppidum Gaolani!

Wangere, ~~pho~~ humido 15-16', Dombey

locus frons 4-5' d. v. globosus.

X *Scacia burfariacea*, Ferd Mull.

A. clara La Schode!

In olivis ~~parvis~~ ^{parvis} prope fortinas Whea
Norton. ~~viduolus & Hill v. v.~~

Fructus 3-5' habitus B. spinosum
aemulans ~~v. v. v.~~, quatuor in pro-
misae arboribus. Legumen hispidum
oblongum oblique laevigatum
phyllodii oblongo v. ovato spatulato
ad pallidum longum & paucum. latius 1/2"

A. solerophylla ! Lel § IX.

ramulis angulatis viscosis puberulis
^{unicis} ~~ramulis~~ ^{unicis} ~~lanceolatis~~ ^{angulatis} ~~apiculatis~~
nigricantibus, phyllodis ^{glabris} ~~lanceolatis~~
ad basin et apicem fere in
acutatis, obtusis vel brevissime
apiculatis leniter curvatis cori-
^{aces} ~~binerviis~~, ^{sub} ~~multis~~ ^{venis}
similibus parallelis conjunctis,
glandula nulla vel raro ^{in marginem} ~~dentifera~~
in ~~productione~~ ^{dentiformi} ~~dentum~~
protrahente longe a basi distante,
pidunculis axillaribus solitaris
vel geminis capitulorum ^{polygamis} ~~longi-~~
tudine glabris basi breviter roscu-
dato-triangulari ^{concolor} ~~fulgida~~ ^{membra-}
nacea subulnis, calyce dentata co-
rolla duplo brevior.

~~et~~ ^{et} Murray - fructu virgato maturo

Barkii.
Frax 2-3'. Capitula crebra mul-
tillora. Phyllodia 1-1 1/2 uncias
longa 1-2 III lata ~~lanceolata~~
~~proteprope apicem~~ ~~hacata~~

Primo induta vix descripta
diagnosi Lel apud Reutham
correspondit, sed differentia
et plantae de aetate orientur;
quoniam aetatem praecissima non
evoluta, definitionem feriorum
elaborari.

Auth: vire.

Acacia creophila fide Mueller.

Cortex ramosus furco niger. Ramuli
patentes ^{eripio} ~~horizontales~~ ^{horizontales} ~~ramuli~~
ramuli ^{ramuli} ~~penduli~~. Flores pallide
flavi sambucum aliquando exalantes.
ramuli ~~amantissimi~~ ^{horizontales} ~~viridis~~,
regulati ramosi ^{horizontales} ~~viridis~~, Phyllod.
subnitentia saturate viridia
in parvis ^{in parvis} ~~subnitentibus~~

4 N. Gunnivint Benth. hb. N. T. n. 380

~~Sub nomine accipiflorum
forte a cl. Hooker definitum,
quod & S. desipiente maxime
videtur affinis. Anth: primo ver.~~

St. X. mupij, Oct. 1848. 1 alt.
Phyllodia ^{St. n. 380 nido} ~~speciminum nostrum~~
potius basi truncata quam
occasata? Epping-forest. 635
variat. S.

S. procumbens Jrdm. Ibidem.

X Acacia acutissima Jrdm. C.

N. S. Jrdm.
1857, 31. Praeridenti proxima videtur, foli-
orum longioribus, ^{glabris} acutius angu-
lo superiore magis acuto
et legumine (immature) pla-
minculo, plegoperno, eton-
fatis longo, quod in illa ~~immatura~~
~~sursum, subglobosum~~, et clau-
disoriminatur. ~~anotopetraen~~
In montium lateribus prope
cataractas, Loffy-ranges & Outk-
Anth. Exeunte hieme et inveni-
vere.

Fructus diffluo-expansus interdum
nostroasis, rari ad a. (nam
longi. Capitula pallide lutea
In montibus scopulosis juxta
St. Outkapinga, utrogen loco
(vid. ant.) rara!

minus incrassatis; alia (No. 962.) phyllodiis saepe fatioribus quam longis, angulo superiore subinde obtusissimo.

γ? elongata Benth. l. c.

In solo sylbinoso juxta oppidum Guildford, d. 29. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 955.

„Frutex spithameus, erectus,“ ubique breviter molliterque puberulus. Phyllodia 4-5 lin. longa, 3-7 lin. lata, margine inferiore subrecto, nervo arcuato in mucronem brevem saepius deorsum spectantem excurrente, venis nonnullis (plerumque 2-4 magis conspicuis) e nervo ortis versus angulum superiorem obtusum glanduliferum convergentibus ibique evanescentibus.

δ? trapezoides DC. l. c. β. — A. decipiens, var. praemorsa Bot. Mag. t. 3244!

In colliculis arenosis ad mare prope Vasse, d. 25. Dec. 1839. fructifera Herb. Preiss. No. 968.

„Frut. 12-15-pedalis.“ Phyllodia pleraque 8-10 lin. longa, 4-5 lin. lata, ramorum sterilibus nonnunquam pollicaria 8-10 lin. lata, a basi ad angulum superiorem 2-pollicaria; omnia tenuiter foliacea (nec coriacea) pallida, margine haud incrassata. Legum. lineare, arcuatum, bipollicare, 1-1½ lin. latum, obtusissime subtetragonum, suturis incrassatis marginatum, valvis planis laevibus vix torulosis.

18. **Acacia cuneata Benth.** in Hügel Enum. p. 42, n. 125; ap. Hook. l. c. p. 332, n. 32.

In elivulis calcareis juxta oppidum Freemantle, d. 19. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 957. (Drummond n. 297!)

„Frut. 4-9-pedalis.“ Pedunculi initio 3 lin. longi, demum phyllodia subaequantes. Adjectae sunt leguminis valvulae separatae, lineares, 2-2½ poll. longae, 2 lin. latae, valde arcuatae, incrassato-marginatae, vix torulosae, extus pube densa patula molli canescentes, — an vere ad hanc plantam pertinentes?

β? glabra nob., glaberrima, stipulis obsoletis fugacissimis, phyllodiorum nervo parum excentrico margini inferiori approximato, angulo superiore glandulam concavam gerente, pedunculis phyllodio brevioribus.

Cum praecedente Herb. Preiss. No. 957. d. 15. Aug. 1839. No. 956.; et in arenosis inter frutices vix penetrabiles insulae Rotenest d. 19. Aug. 1839. florens No. 954.

An n. sp.? Inter *A. decipientem γ.* et *A. cuneatam* ambigua; phyllodia praeter nervum nunquam exacte centralem glandulamque magis conspicuam omnino posterioris. „Frutex 4-7-ped., erectus; flor. fragrantēs.“

19. **Acacia divergens Benth.** ap. Hook. l. c. p. 331, n. 28.

Ad sinum Regis Georgii III., m. Nov. 1840. fructifera Herb. Preiss. No. 960.

20. **Acacia horridula n. sp.**, ramis teretibus, pubescentibus; stipulis setaceis, rigidis, subpersistentibus; phyllodiis patentissimis, ovato-v. lanceolato-triangularibus, 1-nerviis, pungenti-mucronatis, glabris, angulo superiore parum prominente minute glandulifero; pedunculis brevibus, capitulis 2-3-floris; legumine sessili, lineari, tereti, utrinque acuto, obscure venoso-lineato.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, m. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 965, cum fruct. jun. et in arenosis ad fluv. Canning (Perth) d. 4. Dec. 1839. florescens No. 1151.

„Frutex 2½-pedalis.“ *Stipulae* semi-erectae, 2-3 lin. longae. *Phyllodia* patentissima, crassiuscula, rigidissima, avenia, 3-4 lin. longa, 1-2½ lin. lata, nervo recto, angulo superiore basi approximato parum prominulo subinde obsoleto, glandula minuta. *Pedunculi* fructiferi phyllodium aequantes, floriferi dimidio breviores. *Flor.* 4-meri, calyce brevissime obtuseque 4-lobo dimidiam corollam aequante. *Legum.* bipollicare, 1½ lin. latum, junius minute cano-puberulum, demum glabrescens. —

Ab *A. biflora* R.Br., cui simillima quidem, evidenter tamen differt legumine nequaquam marginato; ab *A. triangulari* Benth.: phyllodiis longioribus quam latis, rigidis, spinulentibus, nunquam 2-nerviis; a reliquis affinis denique (*A. divergente*, *decipiente*, *hastulata*) capitulis 2-3-floris etc.

21. *Acacia triangularis* Benth. in Hüg. En. p. 42, in not.; ap. Hook. l. c. n. 30.

In region. interior. Australiae merid.-occid., Herb. Preiss. No. 966. et in sublimoso-glareosis sterilibus sylvae eis fluv. Gordon (Hay) d. 7. Nov. 1840. fructifera No. 963.

„Frutex 3-pedalis.“ Legumen (junius) lineare, suturis crassiusculis marginatum, valvis parce puberulis mox glabris. (Flor. non vidimus.)

22. *Acacia hastulata* Sm. DC. prodr. II. p. 449, n. 5. Bot. Mag. t. 3341! Benth. ap. Hook. l. c. n. 31. —

In solo arenoso-turfacco ad Stirling's terrace (Plantagenet) d. 21. Sept. 1840, florens Herb. Preiss. No. 959.

„Rami 2-3½-pedales.“

23. *Acacia bidentata* Benth. l. c. p. 333, n. 38.

β *pubescens* nob., ramis phyllodiisque minute puberulis.

In arenosis planitie ad fluv. Avon, 9 mill. ab oppido York, d. 10. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 958, florif. et in sterilibus sylvae ad montem prope praedium rusticum Dom. Barker, d. 11. Apr. 1840. sterilis No. 969. —*)

„Frutex decumbens v. 1-1½-pedalis.“ Ramuli divaricati, pallidi, saepe nivi. Phyllodia crassiuscula, dente superiore semper obtusissimo, inferiore acuto v. obtuso nunquam pungente, nervis vix conspicuis.

V. PUNGENTES, ramis apteris, stipulis setaceis v. obsoletis, phyllodiis rigidis acuminato-pungentibus subulato-teretibus v. planis angustis 1-plurinerviis, inflorescentia capitata simplici v. spicata. (Benth. in Hook. Lond. Journ. 1. p. 334.)

24. *Acacia latipes* Benth. l. c. n. 40.

β *pubescens* ramis cano-tomentosis, phyllodiorum nervis minute pilosiusculis.

---

*) Novam hujus sectionis speciem ad calcem addere liceat: ***Acacia Latrobia*** nob., glaberrima, ramis gracilibus acute angulatis; stipulis obsoletis; phyllodiis oblique oblongis v. subtriangulari-obovatis planis, infra apicem obtusum mucronulatis, 1-nerviis, nervo subcentrali aut apicem evanescente, venis obsoletis, margine inferiore parum arcuato, superiore curvato prope medium obscure glandulifero; pedunculis axillaribus aggregatis, 1-cephalis, phyllodium subaequantibus, capitulis parvis multifloris. In colonia ad „Port Philipp“ Australiae meridionali-orientalis legit cl. Latrobe, coloniae praefectus (v. s. in Herb. Musci Neocomensis.) Phyllodia 5-8 lin. longa, 2-3 l.

In planitie arenosa Quangen (Victoria) d. 20. Mart. 1840. sterilis Herb. Preiss. No. 989.

(Nec flores, nec fruct. vidimus, caetera vero cum diagnosi l. c. bene conveniunt.)

25. **Acacia cochlearis** Wendl. — DC. prodr. 2. p. 451, n. 24. Benth. l. c. n. 41. — *Mimosa cochlearis* Labill. Nov. Holl. t. 234!

In arenosis prope oppidum Freemantle (Perth) d. 15. Aug. 1839. florens Herb. Preiss. No. 933. (Drummond n. 288! cum fr.) — *)

„Frutex 8-pedalis.“

26. **Acacia sulcata** R.Br. — DC. l. c. p. 450, n. 15. Bot. Reg. t. 928! Benth. l. c. n. 45.

In rupestribus summitatis montis Clarence (Plantagenet) d. 30. Sept. 1840. florens Herb. Preiss. No. 978.

„Frutex 6-pedalis.“

27. **Acacia Benthamii**, n. sp., glabra, ramulis subteretibus; phyllodiis patulis, rigidis, linearibus, rectis, planis, acuminato-pungentibus, striato-plurinerviis, supra basin attenuatam obscure glanduliferis; pedunculis solitariis geminisve, brevibus, capitulis multifloris; sepalis liberis, angustis, apice sphacelato-spathulatis.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis m. Nov. 1840. Herb. Preiss. florens No. 949. (Drummond n. 284!)

Rami ramulique stricti, interdum obsoletissime angulato-striati, juniores apice minute puberuli. *Phyllodia* coriacea (in specim. Preiss. crassiuscula) 1-rarius $1\frac{1}{2}$ poll. longa, vix ultra lineam lata, recta v. levissime incurva, mucrone recto fere 1 lin. longo, nervis 3 tenuibus bene tamen conspicuis. *Pedunculi* 2 lin. longi, glabri, in specim. Drummondianis semper solitarii semierecti, in Preissianis plerumque gemini divaricato-patuli. *Capitula* pisi magnit., aurea, glabra, calyce dimidium corollam aequante. Legumen ignot. — Affinis sequenti, sed glabritie fere perfecta, phyllodiis duplo majoribus, pedunculis semper conspicuis facile distinguenda; nec non *A. striatulae* Benth. (n. 47.) quae differt (ex diagn.) phyllodiis divaricatis v. recurvis, subcompressis, dimidio minoribus.

28. **Acacia sessilis** Benth. l. c. p. 336, n. 48.

In colliculosis et arenosis sylvaticis ad fluv. Cygnorum, *prope praedium rusticum Dom. S. Moore, d. 29. Jun. Herb. Preiss. No. 979. cis oppidum Guildford, d. 14. Sept. No. 980. florens, et in districtu Wellington d. 23. Nov. 1839. fructifera No. 982.

lata, mucronulo mucoso, saepius obsoleto, nervo interdum margini inferiori paulo approximato. Pedunculi capillares, plerumque phyllodio paulo breviores. Capitula circ. 10-flora, magni sem. Viciae sativae. Flor. 5-meri, sepalis subliberis linearibus ciliatis. Affinis *A. translucens* Cunn. (Benth. l. c. n. 143.) et *vestitae* Ker (ib. n. 87.) sed ab illa phyllodiis 1-nerviis apice haud incrassatis, ab hac inflorescentia non racemosa distincta; nec non *A. amblygonae* Cunn. (ib. n. 35.) quae differt pubescentia, phyllodiis plurinerviis, etc. — Species inter Triangulares et Uninervias latifolias ambigua, illis tamen potius quam hisce adsocianda.

*) Species, ut videtur nova, sed e speciminibus sterilibus mancis haud definienda, hinc *A. cochleari* et *venulosae* Benth. (l. c. n. 152.) inde etiam *A. spirorbi* Labill. (Benth. n. 185.) affinis, in planitie arenosa sylvae inter praedia rustica dom. Barker et Lennard d. 12. Apr. 1810. Herb. Preiss. No. 937. — „Frutex 3-pedalis.“

„Frutex 1-4-pedalis, erectus. Flor. fragrantēs.“ Legumen lineare, rectum, continuum, 1-1½ poll. longum, 1½ lin. latum, attenuato-substipitatum, mucronato-acuminatum, suturis incrassatis obtusissimis marginatum, 2-5-spermum, inter semina quandoque constrictum, valvis leviter torulosis arachnoideo-lanatis demum glabrescentibus. — Phyllodia saepe in eodem specimine ½ et 1 poll. longa, ½ lin. lata, nunc dense approximata, nunc remotiora, semierecta v. patentia.

29. **Acacia sphacelata** Benth. l. c. p. 338, n. 54.

In lapidosis ad tergum montis Currie (York) d. 15. Apr. 1840. Herb. Preiss. No. 985. (Drummond n. 299.)

„Frutex 4-6-pedalis.“ Ramuli divaricato-patentes, pube brevi densa albidā lanato-tomentosi, v. (in n. 299.) subglabri. Phyllodia 4-8 lin. longa, patentia, 4-sulco-tetragona, recta v. vix arcuata, basi v. subtus pubescentia aut (in n. 299.) glaberrima. Legumen (separatim sub. n. 985 missum) lineare, valde arcuatum (semilunare) circ. semipollicare, 1½-2 lin. latum, 2-5?-articulatum, atrofuscescens, glaberrimum, suturis obsoletis, valvis parum convexis obscure venoso-rugulosis.

VI. CALAMIFORMES, ramis apteris, stipulis obsoletis, phyllodiis elongatis subulatis v. subcompresso-linearibus, mucrone brevi vix pungente saepe recurvo, inflorescentia capitata simplici v. breviter racemosa. (Benth. l. c. p. 341.)

30. **Acacia leptoneura** Benth. l. c. n. 64.

Phyllodia pleraque pollicaria v. parum longiora, raro 2-pollicaria. (Drummond n. 303!)

β? **pungens** nob., phyllodiis duplo fere crassioribus, nervis magis conspicuis, mucrone recto pungente. An species distincta? Accedit etiam ad *A. colletioidem* et *striatulam* Benth. l. c. n. 46. 47.

In regionibus interior. Australiae merid.-occid. m. Oct. 1840. sterilis Herb. Preiss. No. 976.

31. **Acacia Hookeri**, n. sp., ramis teretibus, apice minute puberulis; stipulis linearibus, deciduis; phyllodiis anguste linearibus, rectis v. arcuatis, muticis glabris v. parce ciliato-pilosiusculis, supra planis v. canaliculatis, dorso convexo obsoleto nervoso-striatis; pedunculis solitariis geminisve, phyllodio denum aequalibus v. sublongioribus, capitulis parvis, multifloris.

In solo sublimoso prope villam Cl. Mitchell ad fluv. Cygnum, d. 29. Jun. 1839. florens Herb. Preiss. No. 981. (Drummond n. 300!)

„Frutex vix pedalis.“ Rami tenues, rectiusculi, plerumque graciles, fasci, tuberculoso-cicatratis, inferne glabri nunc simpliciter foliosi a medio inde floriferi, nunc conferte ramulosi cinerascens. Stipulae subfoliaceae, rigidae (haud spinescentes) erectae, lanceolato-lineares, acutae, 1½-2 lin. longae, ½ lin. latae, paucae hinc inde superstitēs. Phyllodia erecta, 5-11 lin. longa, ¾ lin. lata, obtusa v. acuta, nunquam manifeste mucronata nec pungentia, recta v. leviter recurvo-arcuata, raro subincurva, nervis striolisque obsoletis v. nullis, marginibus obtusis, facie superiore in specim. Preiss. plus minus concava, in Drummondianis plana v. subplana. Capitula aurea, diametro 2 lin., evolutione ab apice ramorum incipiente, descendente! Pedunculi glabri, 1-cephali, filiformes, superiores phyllodia sensim decrescen-

+ ^{Karelinian.} *Crataegus pynantha* Benth.

*Satum & argillaceum praefert! Radix
perpendicularis lignosa fibras emittens
laevae haud elongatas. (Forma transitiva
pl. Peruvian et Peruvian montanarum).*

X. O. argyrophylla! ^{Teri Millan.}
^{non Mart. & Goldsch.}
Sept. Me-19. Pericoma Ciliaris subc. (To
nanum) non multaxi ab J. similiter
A. H. a. p. sinu. & polypericome. hb. St. 189.

Ranunculus flammula L. *flammula* L.
flammula L. *flammula* L. *flammula* L.
flammula L. *flammula* L. *flammula* L.

[illegible]

Mytilocia 1-1 1/2" long. 3-8 lin
cap. ^{intercalata} capitula ^{intercalata} maj.
min. 2-3" long 1-1 1/2"
lat. - W. C. Murray in locis
arosis non procul a monte Bivort.
Ego ipse legi in aruap's iusu fl.
Murray & montem Parkeri lavis
in d'orsis "Murray" - vrbat. Oct 1848.

Frax. ornatifolius 4-5' vel altior, densius ramis et
oligaculis

tia aequantes v. paulo superantes, 5-6 lin. longi, inferiores dimidio breviores. *Alabastra* obtusissima. *Sepala* libera, spatulato-linearia, obtusa, apice haud sphacelata, corolla semi-5-fida dimidio breviora. *Legum.*..... — Species habitu proxima *A. sulcatae*, sed distinctissima phyllodiis minoribus, inermibus, exsulcis, caet.

32. ***Acacia squamata* Lindl.** Swan River (Bot. Reg. 1839. Append.) p. XV, n. 63. Hook. j. e. t. 367! Benth. l. c. p. 343, n. 69.

In limoso-calcnosis sylvae district. York, d. 12. Sept. 1839. deflorata Herb. Preiss. No. 970. (Drummond n. 305!)

„Frutex 2-pedalis.“ Legumen (junius) lineare, planum, continuum, rectum v. subortum, utrinque attenuatum, glabrum, 1-1½ poll. longum, 2 lin. latum, suturis nerviformibus acutis anguste marginatum.

VIII. *) UNINERVIAE, ramis apteris, stipulis obsoletis, phyllodiis 1-raro 2-nerviis forma variis haud pungentibus, inflorescentia capitata simplici v. racemosa. (Benth. l. c. p. 345.)

33. ***Acacia Meisneri* Lehm.** Delect. Sem. h. Hamburg. 1842, glaberrima, glauco-pruinosa, ramulis aneipitibus triquetrisve; phyllodiis obovato-oblongis, subcuneatis, oblique submucronato-acutis, 1-nerviis, penniveniis, planis, plerumque eglandulosis, capitula solitaria multiflora superantibus.

In limoso-arenosis sylvae prope oppidum York, d. 4. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 930.

β ***angustifolia* nob.** phyllodiis lineari-lanceolatis, subfalcatis, tenuioribus.

In colonia Swan River legit Jac. Drummond, n. 292!

„Frutex 7-9-ped., pruinosis.“ *Rami* stricti, inferne teretes, subangulato-lineati, cicatricibus prominulis quasi dentati, fusci; apice ramulique acute angulati, compressi v. triquetri, plus minus glauci. *Stipulae* caducae v. nullae. *Phyllodia* nunc valde pruinosa-caesia, nunc viridia, pleraque 10-12 lin. longa (raro paulo longiora) 3-4 lin. lata (in var. β 10-15 lin. longa, 2 lin. lata) subpetiolata, plus minus obliqua, mucronulo obtusiusculo brevissimo acuminata, rarius obtusa, nervo centrali v. vix excentrico venisque copiosis parallelis tenuibus rectis parum prominulis (ubique tamen conspicuis) margine superiore circa medium obsolete glandulifero v. saepius nudo. *Pedunculi* filiformes, 3-4 lin. longi. *Capitula* magnit. grani piperis, alabastris obtusissimis, floribus minutis. *Legumen* junius lineare, tortum, laeve, glabrum, ½-1 poll. longum, 2 lin. latum, 1-3-spermum, utrinque et inter semina angustatum, valvis planis, suturis obsoletis: *maturum* (unicum, separatim sub. n. 930 missum, an vere ejusdem speciei?) 3-4-pollicare, egregie moniliforme, fere rectum, 10-12-spermum, isthmis 1-1½ lin. latis, 1-2 lin. longis haud articulatis, loculamentis ovalibus 4 lin. longis 3 lin. latis aequaliter convexis nerviis laevibus, suturis obsoletis. *Semina* lenticulari-oblonga, nigra, laevia, vix nitida, caruncula parva obtusa. — Species valde, ut videtur, affinis *A. anepiti* DC. (nobis haud visae) et forsitan ejusdem var.?: recedit tamen glaucescencia et phyllodiis angustioribus, mucronulatis.

*) E Benthamii §§. VII et XI, et e serie II, inter plantas Preissianas et Drummondianas nullam speciem invenimus.

34. **Acacia celastrifolia** Benth. l. c. p. 349, n. 92.

In regionibus interior. Australiae merid.-occid., m. Febr. Herb. Preiss. No. 915. et in montosis glareosis sterilibus distr. Grantham, d. 21. Mart. 1841. No. 916. (Drummond n. 281!)

„Frutex $2\frac{1}{2}$ -6-pedalis, glaucus.“

35. **Acacia myrtifolia** Willd. — Bot. Mag. t. 302. DC. prodr. 2. p. 452, n. 32. Benth. l. c. n. 93.

In rupestribus promontorii Cape Riche et montis Baldhead, d. 20. Nov. 1840. cum fl. et fr. Herb. Preiss. No. 917.

„Frut. 5-pedalis.“ — Specim. cum Sieberianis (n. 437!) exacte congrua.

36. **Acacia marginata** R. Br. — Wendl. diss. t. 5. DC. l. c. n. 41. Benth. l. c. p. 350, n. 94. — *A. trigona* A. DC.! 8^a not. pl. rar. Jard. Genev. p. 20. (fide specim. ab auctore.)

In turfosis per hiemem inundatis prope villam b. Spencer (Plantagenet) d. 11. Oct. Herb. Preiss. No. 920. et in glareosis sylvae ad latus meridionale montis Clarence, d. 30. Sept. 1840. No. 927, ex parte cum fl. et fr.

„Frut. 4-8-ped.“ Legumen, ut videtur, omnino *A. myrtifoliae*, sed nondum maturum et paulo tortum.

$\beta?$ *angustata nob.*, phyllodiis elongato-linearibus (3-4 poll. longis, 2-raro 3-4 lin. latis) nervo crassiore, racemis abbreviatis in apice rami corymboso.-approximatis. — An species distincta?

Herb. Preiss. No. 927 ex parte. — *)

37. **Acacia Lindleyi** n. sp., glaberrima, glauca, ramulis subflexuosis, acute triquetris, lineatis; phyllodiis coriaceis, elongato-lanceolatis, obtusis (?) basi longe attenuata glanduliferis, 1-nerviis, parallele pinuato-venosis, marginatis, planis; racemis axillaribus, brevibus, oligocephalis, pedunculis longis, capitulis majusculis dense multifloris; sepalis 5 subliberis, spathulato-linearibus, truncatis, glabris, corolla angusta 5-fida plus dimidio brevioribus, ovario glabro.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis m. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 947.

*) Addere hic liceat speciem nondum descriptam: **A. glaucifolia**, Baumann! (cat. hort. Bollwill. et Mulhus. 1843, p. 24.) glaberrima, glauca, inermis; ramis gracilibus, subangulatis; stipulis obsoletis; phyllodiis triangularibus, 1-nerviis, penniveniis, nervo subcentrali arcuato in anguli inferioris mucronulum innocuum excurrente, angulo superiore obtuso glandula minuta (rarius nulla) munito; racemis terminalibus et e summis axillis polycephalis, phyllodio longioribus, pedunculis brevissimis, capitulis multifloris. Colitur in hortis Baumannianis Mulhusiae et Bollwiller, Alsaciae, ubi vivam florentemque vidi. Species forsau Triangularibus adsocianda, quibus phyllodiis convenit, sed capitulis racemosis ab omnibus abhorrens; affinis **A. cultriformi** Cunn., ex Hook. ic. t. 170, quae differt phyllodiis longioribus, angustioribus, marginibus rectilineis, nervo excentrico, racemis longioribus, capitulis minoribus longius pedunculatis. — Rami circ. pedales, simplices, nantes, dense foliosi. Phyllodia 5-8 lin. longa, 3-5 lin. lata, marginibus (praecipue superiore) plus minus arcuatis, interiore et inferiore subinde fere rectis, venis tenuibus, anastomosantibus. Racemi circiter pollicares, 6-10-cephali, paniculam terminalem parvam formantes, pedunculis 1 lin. longis, capitulis globosis pisi magnitudine aureis.

[illegible]

Ramus inferne subteres. *Phyllodia* erecta, rigida, 8-pollicaria, 1 poll. lata (omnia plus minus mutilata, unico minus laeso obtuso nuntico) nervo centrali crassiusculo, utrinque obtuse prominulo; venis creberrimis, tennibus, angulò valde acuto e costa utrinque nascentibus, rectis, parallelis, vix 1 lin. ab invicem distantibus, obscure anastomosantibus; marginibus nerviformibus, vix incrassatis. *Racemi* ante evolutionem squamis tecti, 4-6-cephali, interdum phyllodio parvo interrupti; *squamae* ovatae, acutae, 3 lin. longae, 2 lin. latae, striatae (hinc inde ad basin superstites); rhachis vix 3-5 lin. longa; pedunculi 8-10 lin. longi substriati, patuli v. demum deflexi. *Capitula* aurea, diametro 4 lin., flor. 2 lin. longis, pallidis, tenere membranaceis; corollae tubus anguste cylindricus, demum basi fissa (in petala singula soluta) c. calyce subpersistente secedens, limbi lobis erectis angustis acutiusculis. *Stamina* parum exserta, basi monadelphæ. *Stylus* capillaris, longius exsertus, basi flexuosus. *Legumen* . . . . . — Species ab omnibus distinctissima; phyllodiorum forma, magnitudine et colore quidem ad sequentem accedens, sed ad Benthani subsectionem quartam (Squamatas) referenda.

38. ***Acacia cyanophylla* Lindl.** in Bot. Reg. 1839, misc. not. p. 45, n. 64. Benth. l. c. p. 352, n. 101.

In arenosis subhumidis ad ripam fl. Cygnorum, d. 17. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 925; (Drummond n. 284!)

„Frutex 12-18-pedalis, divaricatus; incolis: Black Wattle,“ *Phyllodia* plerumque multo minora, praecipue angustiora, quam plantae cultae.

39. ***Acacia microbotrya* Benth.** l. c. p. 353, n. 104.

In glareosis sylvae inter praedia rustica Dom. Barker et Lennard, d. 12. Apr. 1840. florens Herb. Preiss. No. 923. (Huc quoque, v. forsan ad *A. subcoeruleam* Lindl., Benth. l. c. n. 97, referenda videntur specim. sterilia, in rupestribus vallis Toodyay, Victoria, m. Mart. 1840 lecta, Herb. Preiss. No. 939.)

„Frut. 7-pedalis. Flor. suaveolentes.“ — A diagnosi l. c. paulo recedit glaucescentia nulla, phyllodiis apice parum angustatis et glandula a basi plerumque magis (6-7 lin.) distante. Ab *A. leiophylla* Benth. differt phyllodiis acutis, vix marginatis et racemis haud ramosis.*)

40. ***Acacia leiophylla* Benth.** l. c. n. 99.

β? ***microcephala* nob.**, racemis subsimplicibus, capitulis parvis.

In regionibus interior. Australiae meridionali-occidentalis m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 921.

*) Hujus loci n. sp. est: ***A. myriobotrya* nob.**, glauca? glabra; ramulis subangulatis, mox teretibus, divaricatis; phyllodiis lineari-lanceolatis, utrinque longe attenuatis, acutis, subfalcatis, planis, haud marginatis, tenuiter 1-nerviis et penniveniis, glandula minuta a basi remota v. saepe nulla; racemis patulis, polycephalis, phyllodio brevioribus subsessilibus, pedunculis patentissimis capitula multiflora aequantibus; sepalis spatulatis (sphacelatis? nigricantibus) glabris, corolla dimidio brevioribus. — Swan River (Drummond n. 286!) — *Phyllodia* vix coriacea, 3-5-pollicaria, 2-6 (plerumque 3) lin. lata, nervo tenui plerumque plus minus excentrico, venis tenuissimis confertis subparallelis, glandula 6-10 lin. a basi distans, minuta, nunc nulla. *Racemi* indivisi, 1-1½-pollicares, 15-20-cephali, demum patentissimi, summi in paniculam subaphyllam congesti, rhachi strictiuscula, pedunc. 2-3 lin. longis vix 1-2 lin. ab invicem distantibus. *Legum.* . . . . . — Species proxima ***A. microbotryae* Benth.** et ***penninerviae* Sieb.**, ab illa distincta phyllodiis haud marginatis, glandula a basi remota, racemis longioribus polycephalis et calyce; ab hac phyllodiis minus coriaceis, angustioribus, glandulis obsoletis, racemis simplicibus brevioribus haud laxis et calyce. Ab ***A. leiophylla*** et ***falciformi* Benth.** l. c. n. 99 et 100 abhorret phyllodiis inmarginatis, racemis nec flexuosis nec ramosis nec tomentosis, calyce, etc.

Forte n. sp., sed specim. nimis imperfecta. *Phyllodia* margine tenuissimo nerviformi sanguineo haud incrassato cincta, mucronulo terminali v. laterali (rariss nullo) munita; glandula nunc unica 1-4 lin. a basi distante saepe obsoleta, nunc duabus, altera prope medium marginis sita. *Racemi* 8-10 lin. longi, plerique haud ramosi, rhachii denum subflexuosa. *Capit.* (flor. nondum expansis) magnit. grani piperis. *Legum.* omnino *A. leiophyllae*. — Ab *A. amoena* *Wendl.* (Benth. l. c. n. 113) cui valde accedere videtur, differt phyllodiis vix marginatis, racemis multo brevioribus, caet.

Alteram varietatem (nisi forte speciem distinctam) e speciminibus suppetentibus sterilibus haud determinandam, phyllodiis longioribus (3-3½ poll. longis, 3-5 lin. latis) utrinque magis angustatis falcatisque, subeglandulosis diversam, sistere videntur specimina „in solo sublimoso-arenoso distr. York d. 8. Mart. 1840“ *Herb. Preiss. No. 922.* (? Drummond n. 291.) — „Arbor circiter 30 pedum. Aboriginibus: *Menna*.“

41. ***Acacia xanthina* Benth.** l. c. p. 355, n. 111.

In calcareis subhumidis ad ripam fl. Cygnorum prope oppidum Freemantle, d. 23. Aug. 1839. florens *Herb. Preiss. No. 928.* (Drummond n. 283!)

„Frutex 16-pedalis. Ramuli pruinosi. Phyllodia verticalia.“ Axillae hinc inde gallas duras rugosas ferunt, Raphani siliquam fere simulant.

42. ***Acacia subbinervia* n. sp.,** glabra. ramulis angulatis, mox teretibus; phyllodiis lanceolato-linearibus, subfalcatis, utrinque attenuatis, immarginatis, apice obtuso recurvo hinc mucronulatis, 2-nerviis, nervo altero subcentrali, altero margini superiori approximato tenuissimo superne evanescente v. interdum deficiente, venis tenuibus obsoletisve, glandula a basi distante obsoleta v. nulla; racemis phyllodio multo brevioribus, simplicibus, oligocephalis, capitulis multifloris, calyce truncato-dentato.

In colliculis arenosis insulae Rotenest, d. 20. Aug. 1839. *Herb. Preiss. No. 924.* (Drummond n. 285!)

„Frutex 6-pedalis.“ — A praecedente proximè affini differt: glaucedine nulla (exceptis forsan ramis phyllodisque junioribus) phyllodiis minus rigidis, plus dimidio angustioribus (2½-raro 3½ lin. latis) haud marginatis, nervis tenuioribus, altero centrali v. vix excentrico, racemis phyllodio dimidio v. plus brevioribus, capitulis paucis (3-6) minoribus. Phyllodia saepe puncticulis elevatis copiosis (ut in *A. xanthina* sed minoribus) granuloso-scabriuscula. — Valde quoque accedit ad *A. rostelliferam* *Benth.* n. 114, sed huic tribuuntur phyllodia crassiuscula, 1-nervia.

43. ***Acacia crassiuscula* Wendl.** diss. p. 31, t. 8. DC. prodr. 2, p. 453, n. 47, Benth. l. c. n. 115?

In arenosis ad portum Princess Royal Harbour, d. 27. Sept. 1840. *Herb. Preiss. No. 929.*

„Frutex 6-7-pedalis.“ Phyllodia e medio apice mucronulo recto brevissimo sphacelato subito acutata v. interdum rotundato-obtusa (nec, ut ap. DC. l. c. dicuntur, apice rotundato inflexo mucronata) et capitula tantum 12-15-flora. Praeterea specimina Preissiana a Sieberianis haud differunt.

44. ***Acacia ramosissima* Benth.** l. c. p. 356, n. 116?

In solo sublimoso et glareoso sylvae cis fluv. Gordon (Hay) d. 7. Nov. *Herb. Preiss. No. 951.* et ad radices montis Bakewell (York) d. 30. Mart. No. 940. in solo coenoso exsiccato ad marginem lacus Mathildae (Hay) d. 7. Nov. No. 941.

ad promont. Cape Riche, d. 10. Nov. 1840. No. 952. et in region. interior. Australiae merid.-occid. m. Febr. 1841. No. 943.*)

„Frutex 3-5-pedalis, pruinosis.“ Specimina (pleraque manca v. sterilia) in descriptionem bene quadrant, excepto tantum calyce truncato (nec sepalis liberis sphacelato-spathulatis.)

45. **Acacia apiculata** n. sp., glabra (junior glauca?) ramis acute triquetris; phyllodiis crasse coriaceis, oblongo-lanceolatis, mucronulo acuto subincurvo apiculatis, vix marginatis, subimmerse 1-nerviis, aveniis, planis, basi obsolete glanduliferis; racemis (?), phyllodio longioribus (?) legumine coriaceo, oblongo, continuo, eomplanato, anguste marginato, juxta suturas transverse venoso, seminibus oblique transversis.

In glareosis sterilibus porrectis promont. Cape Riche, d. 20. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 919.

Species, ut videtur, affinis *A. ancipiti*, *ellipticae* et *oleaeifoliae* (Benth. l. c. n. 82, 83 et 90) tamen certe distincta, sed e specimine suppetente unico floribus carente et legumen unicum gerente non satis cognita nec rite collocanda. — „Frutex 2-pedalis.“ *Phyllodia* pollicaria, 4 lin. lata, utrinque (apice praecipue) parum angustata, apice nunc sensim in mucronulum abeuntia, nunc rotundato-obtusissima et subito mucronulo $\frac{1}{2}$ lin. longo acuto leviter incurvo rubro apiculata, plana, integerrima, margine tenuissimo nerviforui sanguineo saepe obsoleto, textura crassa subcarneo-coriacea (unde facies exsiccatione rugulosa) nervo vix prominulo parum excentrico margini superiori paululum approximato. (Flor. non vidi.) *Pedunculus* gracilis, circ. semipollicaris, teretiusculus, cicatriculis obsitus (hinc verisimiliter racemoso-polycephalus.) *Legumen* sesquipollicare, 5-6 lin. latum, subsessile, utrinque obtusum, breviter acuminatum, glaucum, 6-spermum, suturis nerviformibus tenuibus, valvis coriaceo-membranaceis parum toruloso-convexis nudis aveniis.

46. **Acacia dentifera** Benth. in Botanist, 4, t. 179; ap. Hooker l. c. 363, n. 139. Bot. Mag. t. 4032.

In limoso-arenosis et lapidosis planitie prope Maddington ad fl. Canning, d. 2. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 932. in jugo montium Darling's-range (Perth) m. Sept. 1841. No. 944. et in depressis ad fl. Murray (Wellington) d. 7. Dec. 1839. No. 946. (Drummond coll. I, sine No., et II. n. 298!)

„Frutex 4-8-pedalis.“ *Stipulae* nunc fugacissimae, nunc subpersistentes, in eodem ramo saepe variae, superiores scil. setacco-lineares subfalcatae, 3-4 lin. longae, erectae, diu persistentes; inferiores 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longae dentiformes, manifeste spinescentes, basi crassiusculae. *Phyllodia* recta v. levissime incurva v. falcata, saepe 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. lata, apice interdum uncinato-recurva et utrinque glandulis minutis fuscis punctata, venis nunc obsoletis, nunc conspicuis (quamvis tenerrimis) parallelis. *Pedunculi* 5-8 lin. longi, gemini, rarius solitarii, debiles, in specim. nostris semper 1-cephali sed prope medium constanter sive bractea exigua sive cicatricula denticuliformi muniti. *Legumen* sessile, lineare, 1 $\frac{1}{2}$ -2 poll. longum, 1 $\frac{1}{2}$ -2 lin. latum, membranaceum, glabrum, inter semina (4-6) leviter contractum, suturis obsoletis, valvis turgido-convexis laevibus v. obsolete venoso-rugulosis. Specim. nostra, etsi inflorescentia stipulisque in diagnosi haud exacte quadrent, tamen nonnisi varias hujus speciei formas, nec ab hac ipsa nec inter se certis linitibus distinctas, sistere opinamur. An species potius *Armatis* adsocianda?

*) *A. nerliffolia* Cunn. Benth. l. c. p. 337, n. 117., species in ora orientali detecta, nuper, ni fallor, a Drummondio in colonia ad fl. Cygnorum reperta (ejus No. 291?) inter plantas Preissianas non occurrit.

IX. BRACHYBOTRYAE, ramis apteris, stipulis obsoletis, phyllodiis 3-multinerviis inermibus, inflorescentia capitata subsimplici v. saepius breviter racemosa. (Benth. l.c. p. 363.)

47. **Acacia heteroclita** *n. sp.*, glabra ramulis angulatis, mox teretibus; phyllodiis linearibus, rectiusculis, utrinque attenuatis, mucrone vix puigente subreeurvo acuminatis, acute sulcato-trinerviis, glandula supra basim minuta v. nulla; pedunculis axillaribus solitariis geminisve, monocephallis, capitulo vix longioribus; sepalis liberis, anguste spatulatis, apice sphacelatis.

Ad promont. Cape Riche, d. 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 938.

Facies et phyllodia fere *A. trinervatae et elongatae Sieber* (Herb. Nov. Holl. n. 443, 443!) — a priori diversa phyllodiis longioribus, minus rigidis, vix pungentibus, pedunculis dimidio brevioribus; a posteriore pedunculis nunquam racemosis (plerumque solitariis et brevioribus) ramulisque glabris; ab utraque praeterea phyllodiis apice *sensim* in mucronem angustatis, glandula (etsi obsoleta) saepius obvia, et praecipue sepalis liberis corolla vix dimidio brevioribus apice nigricantibus. Ab *A. multinervia* et *eglandulosa* DC. discrepat phyllodiorum forma, nervatione, glandula etc.

Ejusdem speciei var. (nisi forte *n. sp.*) recedens tantum phyllodiis paulo rigidioribus latioribusque (fere 2 lin. latis) apice simpliciter acutis v. breviter mucronatis vix acuminatis, nervis acutius prominulis, nobis videtur stirps a cl. Preiss in region. interior. Australiae merid.-occ. m. Nov. 1840 lecta (No. 950.) propter capitula nondum evoluta haud certe determinanda.

48. **Acacia cyclopis** *Cunningh.* in G. Don gen. syst. 2. p. 404. Benth. l. c. p. 367, n. 153.

In arenosis ad fl. Cygnorum et ins. Rotenest, d. 26. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 926.

„Arbuscula 16-ped., ramis subfastigiatis.“

49. **Acacia melanoxylon** *R.Br.* Benth. l. c. n. 154. var.?

In arenoso littore maris prope Vasse (Sussex) m. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 948. (Ad Port Philipp in ora australi orientem versus a cl. Latrobe lectam vidi in Herb. Mus. Neocomens.)

Specimina sterilia, quaedam gallis squarrosis fere strobiliformibus ad latera ramulorum et in axillis phyllodiorum subsessilibus (inflorescentiis? insecti cujusdam acn mutatis) insignia. „Frutex 3-pedalis.“

X. JULIFERAE, ramis apteris, stipulis obsoletis, phyllodiis forma variis, haud pungentibus, plerumque plurinerviis, inflorescentia spicata. (Benth. l. c. p. 369.)*

50. **Acacia ephedroides** *Benth.* l. c. p. 370, u. 162.

In rupestribus sylvae cis Halfwayhouse (Darling's-range) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 974.

„Frutex 8-pedalis.“ *Ramuli* subcompressi-obtusanguli, juniores minute cinereo-puberuli. *Spicae* in uno specimine oblongae, fere semipollicares, in altero (caeterum penitus simili) fere globosae.

*) **A. filifolia** Benth. l. c. n. 161. (Drummond n. 392!) in collect. Preissiana non occurrit. — *Spicae* fere globosae.

[illegible]

(1) *Akontophylla* (ferd mee)

+ *A. mucronata*! Stuart ^{non H. J. Britton} (etiam in

Milddenomianae magis quam
aliis propinqua sed ad hoc
phyllodiis lato-linearibus
(haud linearis-spatulatis) plur
nerviis, nervo medio prominenti
(haud 1-3 nerviis) apiculatis
(vix mucronatis) Al. *A. flor*
humida cystintha videtur phyll
haud apice attenuatis sed fore
rotundato-abtusis cum apicula
et vix linearis-lanceolatis
sed elongatis lato-linearibus
(inter ambas quasi media).
Prope urbem Laurelton, Farm.
Hb. N. H. n. 17. Oct 20. 1848. 5-6.

A. disflora Benth.

At H. H. Pauli, Hb. N. 695. Nov
8-10. Annon varietas? praecedentis.

+ *A. exjordus* Tiller! p. 85.

A. brachystachys Ferd. M. in lit

ramis velutinis apice angulatis
phyllodiis ^{irregular} anaequilatis lanceo-
latis vel angusto-lanceolatis mu-
ronato-attenuatis 3-4 nerviis ^{egrandulosis}
glabris nervis pilosis. parvis (ra-
rissimis oppositis) nervis nervis axilla-
ribus solitariis vel pluribus ag-
gregatis cylindricis, pedunculatis
phyllodiis pluries brevioribus, pro-
pulis porpissimibus spinatis.

In camporum fruticetis prope
Hb. N. H. deum prope versus Ri-
voli Bay. part 1-3. Phyllodia
1' vel paullo longiora breviora
2-4" alt. Spicae plerumque 1" brevior
An pro propria sed plerumque a
boni diagnosi dignissimis speciebus
cum cylindricis sed non elongatis
A. piceanipennis Cunningham & N. H. H.
Laddig huc relata ab auctoribus

A. mucronata prope Laurelton

51. **Acacia oncinophylla** Lindl. Swan River p. XV, n. 66. Benth. l. c. n. 165.

In rupestribus aridis montium Darling's-range prope Preiss's well, d. 16. Jan. 1840. Herb. Preiss. No. 914, (Drumm. coll. I.!)

„Frutex 5-pedalis.“ — *Legumen* (separatim adjacens) lineare, subtoruosum, 1-1½ poll. longum, 2 l. latum, continuum, plano-compressum, breviter albido-villosum, 5-8-spermum, suturis nerviformibus inconspicuis glabriusculis. *Semina* ovali-lenticularia, atro-fusca, nitida, caruncula albida bicruri semiamplexa.

52. **Acacia doratoxylon** A. Cunningham. Benth. l. c. p. 373, n. 174?

In rupestribus ad radices montium Currie (York) d. 10. Apr. 1840. Herb. Preiss. (No. 935, „arbor circiter 35-pedalis, junior tota pruinosa“) et in sublimosis distr. Minto, d. 8. Mart. 1841. (No. 945, „frutex 12-pedalis“)

Specimina insufficientia, praeter locum natalem et phyllodia longiora (8-10-pollicaria, 1½-3½ lin. lata) diagnosi bene congrua. *Spicae* pleracque defloratae. *Legumen* (separatim adjacens) omnino *A. acuminatae* Benth., cui planta nostra admodum similis videtur, sed calyce subtruncato certe distincta.

53. **Acacia acuminata** Benth. l. c. p. 373, n. 175. (Drummond n. 287!)

β *ciliata nob.*, phyllodiis anguste linearibus, margine diu brevissime denesque albo-ciliatis. — *A. Lehmanni* Preiss. mss.

In solo sublimoso-arenoso sylvae circa oppidum York. Herb. Preiss. No. 934.

„Arbor circ. 35 pedum, diametro 6-8 unciarum, gracilis, glaberrima; epidermis laevis, subnitida, cinerea. Rami subfastigiati, teretes, albocinerei. *Phyllodia* patentia, 6 unc. et ultra longa, 1½-2 lin. lata, adultiora bivenoso-striata“ (quod specimina suppetentia haud ostendunt.) „*Spicae* erectae, graciles, unciam longae, floribus flavis aggregatis. *Sepala* 4 ovata“ (potius spatululata) „concava, acuta. *Legumen* non vidi. — *Obs.* Radicem adstringentem aborigines comedunt eamque remedium optimum contra odontalgiam, scorbutum dentiumque cariem habent. Arboris lignum siccum, odore baccarum Rubi Idaei insigne, ab iisdem ad varia arma (v. g. „Keili et Mero“) conficienda adhibetur. Arbor, ab indigenis *Manjart* ab incolis Anglis *Raspberry-jam* vocatur.“ Ita Preiss in schedis.

54. **Acacia microneura** n. sp., ramulis subangulatis mox teretibus phyllodiisque junioribus minute cinereo-puberulis; phyllodiis anguste linearibus, subflexuosis faleatisve, utrinque attenuatis, apice subulato-acuminatis recurvis vix pungentibus, eglandulosis, tenerrime nervoso-lineatis, nervo medio saepe crassiore; spicis (?) ovatis v. globosis, sessilibus, solitariis geminisve, multifloris; calyce breviter dentato, corollam dimidiam aequante, vix puberulo.

In region, interior. Australiae merid.-occid. m. Febr. 1841. Herb. Preiss. No. 942.

Affinis praecedenti et *A. leptoneurae* Benth. (an igitur potius ad *Calamiformes* referenda?) sed ab omnibus satis distincta. *Phyllodia* 3-4 lin. longa, vix linea una inquam latiora, rigida, medio crassiora, nervo medio tenui plerumque conspicuo prominulo, lateralibus utrinque 2-3 tenerrimis parallelis. *Capitula* (ut in *A. ephedroides*) perfecte globosa aut vix ovata, nunquam vere spiciformia. *Legumen* desideratur.

Series II. BIPINNATAE, foliis perfectis bipinnatis,
pinnis 1-plurijugis.

XIII. PULCHELLAE, inermes v. spinis axillaribus armatae,
inflorescentia capitata v. spicata simplici, capitulis spi-
cisve axillaribus, singulis e gemmula multibracteata ortis.
(Series III, Benth. l. c. p. 386.)

55. **Acacia nigricans** R.Br. Bot. Mag. t. 2188. DC. prodr.
2. p. 466, n. 179. Benth. l. c. n. 219. — *Mimosa nigricans*
Labill. Nov. Holl. 2, p. 88, t. 238!

„In rupestribus montis William ad portum Princess Royal Harbour, d. 30. Sept.
Herb. Preiss. No. 887. et planitie collium Konkoberuphills (Kent) d. 19. Nov. 1840.
(No. 889. ex parte) nec non in limoso-lapidoso cacuminis montis Bakewell (York)
d. 5. Sept. 1839. No. 891. florens et fructifera (Drummond n. 314!)

„Frutex 2-4-pedalis.“

56. **Acacia obscura** Alph. DC. in 6^e not. pl. rar. Jard.
Genev. p. 23, n. 10, t. 3. Benth. l. c. p. 387, n. 220?

In rupestribus planitiei collium Konkoberuphills (Kent) d. 19. Nov. 1840. Herb.
Preiss. No. 889, ex parte (specim. insufficiens, floribus nondum expansis.)

„Frut. 3-pedalis.“

β ? **canescens** nob., cano-pilosiuscula, pinnis sub-1-jugis,
foliolis 2-3-jugis lineari-spathulatis margine revolutis apice obtuso
subrecurvis, legumine undique pilis albis brevibus villosulo-hispidulo.

Ad sinum Regis Georgii III. absque florib. Herb. Preiss. No. 910.

An n. sp.? Specim. insufficiens. Pinnarum par inferius superiori aequale
aut plerumque deficiens; foliola 3-4 lin. longa, propter margines arcte re-
volutos in media facie inferiore sibi contiguos vix $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ lin. lata.

γ ? **Preissiana** nob., tota hispidula, pinnis 1-3-jugis, folio-
lis 3-5-jugis linearibus margine revolutis hispidulo-scabris.

In region. interior. Australiae merid.-occid. m. Oct. 1840. Herb. Preiss.
No. 885:

„Frutex pedalis.“ — *A. Preissiana* Lehm.! delect. sem. Horti Ham-
burg. 1842.

Forsan cum β propriam speciem sistens, foliola ejusdem magnitudinis
et formae, apice tamen nunquam dilatata nec recurva, paulo magis scabrius-
cula. Caules, petioli pedunculique pilis patentibus v. retrorsis satis dense
hispiduli.

57. **Acacia strigosa** Link. — DC. prodr. 2, p. 466, n. 180.
Benth. l. c. p. 387, n. 222.

β **brevifolia** nob., ramis hispidulis, dense foliosis, pinnis
1-rarius 2-jugis petiolisque 2-3 lin. longis, foliolis 2-3-jugis
ovalibus v. obovatis (1-2 $\frac{1}{2}$ lin. longis) margine subrevoluto serrulato-
ciliatis v. saepius demum nudis.

In solo turfaco-arenoso ad Stirling's-terrace (Plantagenet) d. 22. Nov. 1840.
Herb. Preiss. No. 902.

+ Arctia Benderiana! Th. 88

glabra, ramulis angulatis max
 subtilibus, phyllodiiis elongata
 linearibus obtusis apiculatis
 basi et apicem versus angu-
 stioribus coriaceis tenuiter
 marginatis univariis longi-
 tudinaliter venosis, glandula
 infra medium ^{retia} (a basi) ~~diffusa~~
 remota, ramulis axillaribus
~~6-10 floris~~ capitula 6-10 germi-
 nibus ante anthesin phyllodiiis
 cuplo brevioribus

Fr. 5-6. Sv. fl. Murray. febr 48.
 Spissima folium gemmifera vid.
 inter A. ~~ramulosa~~ ^{officinalis} ~~occidentia~~
 Phyllodia ad 3" lg. 2" lt.
 hb. V. 180!

Series II Botryophalae!
 Benth. C. 1.

+ A. maritima! G. Benth.

Ad maris litora Tarranica.
 hb. I & II, 581. Anth: hieme
 excurrente.

^{in foliis} robustorum ^{juv.} speciminum ~~foliata~~ ^{paucifolia}
 paucifolia ad 7 redunda et ramuli
 passim in paniculam axillarem
 collecti, ^{truncati} petalis vix univariis sub
 lente adpressis laciniis non stri-
 atis ut et. Benth. docet, quo
 signo haec species etiam ab A.
^{minutissima} descolore (Cignaria) ~~quae~~ ^{quae}!

† *Aravia diffusa* Ker, Lde 87

A. erecta Jussmell, ramis erectis
In collibus petracis ad
portum regiorum. Floritis
~~sera~~ ^{sera} ex st. Stuart quam
legitimae hb. St. 613. 4-5'

† *brachypoda* Jussmell
induratis (vixiter) capitulum
aequantibus phyllodio multoties
brevioribus.

Ad ripas fluvii St. Pauli Nov
49. hb. St. 5621. 5-6' alt.

Aravia parvifolia ! W.
Ad litus juxta urbem Gorgon, Tasmanniae hb
St. 934. fr. 4-5'

† *Aravia stricta* ! W.

3. *latifolia* Jussmell
~~aphyllodia~~
Kangaroo Island!
in regibus
2-3' diff. *salicis* (elongato-lance-
olatis 2 plo 3 plove lati-
oribus. ~~non~~ ^{brevius Jussmell} floribus ~~non~~
fructuum (vixi, George-town.

Juxta portum regium.
2-3' hb. St. 5647. Nov 1849

Flora ~~forte~~ ^{forte} *proxima*. *A. saligna*
Muhl. huius proximioribus magis
affinis quam *A. salicatal*.

† *binervis* ! Jussmell, *aphyllodia* *binervis*
Ann var *B. nifida* St.

† *A. dealbata* Lk.

Corky Ad fl. South Esk river prope
Turris Perth 670 et 776 Dec-febr

diffusa praesertim a posteriore
in solo. *fruticosa* arborescente humilioris
ad modum ^{recens} *non* (arborescens) foliis minus pilis

Gambis *bracteae* pube glaucis, foliolis minoribus
et floribus palidioribus. Sed botan.

Tasmaniae explorare relinquit, an
sit species propria an varietas.

„Frut. 4-pedalis.“ Legumen glabrum caeteraque omnia cum descriptione apud Benth. exacte conveniunt.

58. **Acacia Endlicheri** *n. sp.*, ramis strictis, apice subangulatis, glabris v. pilosiusculis; stipulis lineari-setaceis, ciliatis; foliis glabris, petioli glandulis 2-3 concavis, seta terminali subciliata, pinnis 2-3-jugis; foliolis jugi infimi 2-jugis, superiorum 5-7-jugis, oblongis, obtusis, margine revoluti nudis; pedunculis folio subbrevioribus, capitulis globosis, glabris.

In districtu Plantagenet m. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 888 et 905.

„Frutex 1-2-pedalis.“ — Simillima *A. strigosae* et forte potius ejus var. Constantiter tamen differt foliis numerosioribus (plerumque 5-6-jugis) margine nunquam serrulato-ciliatis et pedunculis folio plerumque brevioribus 6-7 lin. longis. *Legumen* non vidimus.

59. **Acacia denudata** *Lehm.!* delect. scm. Horti Hamburg. 1842.; glabra, ramis divaricatis, angulatis, rigidis, subspinescentibus, spinis axillaribus subnullis; foliis subsessilibus, petiolo brevi v. subnullo in spinulam excurrente et ad hujus basin glandula concava longe stipitata munito, pinnis 1-jugis; foliolis 5-jugis, lineari-oblongis, obtusiusculis, planis, nudis; pedunculis solitariis geminisve, folio longioribus, capitulis multifloris glabris, calyce truncato-dentato subciliato.

In depressis umbrosis prope Woodman's-point, d. 15. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 893. (Drummond n. 312!)

β *gracilis nob.*, ramis gracilibus, laxis, vix angulatis, foliis sessilibus plerumque spina axillari praeditis, glandula petiolari tenuissima v. saepe nulla, pedunculis folium vix superantibus. — An sp. distincta?

In umbrosis ad ripam fluvii Preston (Wellington) m. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 904.

γ *spinosissima nob.*, ramis gracilibus, teretibus, lineatis, ramulis divaricato-patentibus subangulatis; spinis axillaribus solitariis geminisve, subulatis, patentissimis gemmuliferis, altera longiore (saepe semipollicari) glandula petiolari minuta (vix 1 lin. longa) v. saepissime nulla, foliolis linearibus, pedunculis solitariis capitulum aequantibus (3-4 lin. longis.)

Colitur in Horto Baumanniano Mulhusiae Alsatorum, ubi florentem vidi vere 1843.

„Frutex (Preiss. No. 893.) 5-pedalis.“ *Rami* rigidi, crassitie fere pennae anserinae, subflexuosi, teretes, lincis nerviformibus a foliorum insertionibus decurrentibus acute prominulis, alas angustissimas referentibus (in β et γ obsoletis) angulati, glaberrimi; ramuli late divergentes, rigidi, apice subspinescentes (in β et γ debiliores et inermes) internodiis $\frac{1}{2}$ -1 poll. longis. *Spinae* axillares, tenues, rectae, 2-6 lin. longae, in β et γ fere semper, in α rarius obviae. *Stipulae* setaceae, 1-2 lin. longae, fugaces. „*Folia* glauca, plus minus sensitiva“; petiolus nunc subnullus, ad punctum fere tuberculumve et setam terminalem reductus, nunc (No. 893.) 2-4 lin. longus subpersistens; seta terminalis crassiuscula, rigida, 2-3 lin. longa, recta v. subreclinata; glandula pinnarum jugo interposita, 1-2½ lin. longa, subrecta, stipite apice in cyathulum dilatato; pinnarum rachis 3-8 lin. longa, tetraquetra, rigida, decidua aut (in specim. Drummond.) post foliorum lapsum persistens et

spinulam simulans; foliola caduca, 3-4 lin. longa, 1-1½ lin. lata (in β et γ fere dimidio minora et diutius persistentia) obscure 1-nervia, avenia, integerrima, glaberrima. *Pedunculi* erecti, filiformes, teretes, glabri, e gemmula minute squamellata nascentes, ½-1 poll. longi. *Capitula* globosa, pisi magnitudine, circ. 30-flora, flava, glaberrima, receptaculo parvulo ovato papilloso. *Calyx* membranaceus, turbinatus, 5-gonus, oris dentibus 5 brevibus latiusculis obtusis sub lente ciliolatis. *Corolla* 5-fida, calyce vix dimidio longior. *Ovarium* glabrum. *Legumen* *A. pulchellae*, cui stirps nostra proxime affinis, sed distincta ramis angulatis, petiolo aristato, axillis saepius inermibus, caet. Varietates indicatae facile pro totidem speciebus haberi possent, nisi formis intermediis, praecipue speciminibus Drummondianis, arctissime invicem connecterentur.

60. ***Acacia pulchella* R.Br.** — Bot. Cab. t. 212. DC. prodr. 2, p. 455, n. 73. Benth. l. c. p. 387, n. 224.

α ***glaberrima* nob.**, omnibus partibus penitus glabris.

In arenosis sylvae ad fl. Cygnorum Herb. Preiss. No. 884 et. 907. (Drummond n. 310.)

β ***hispidula* nob.**, ramis pube brevi patente albida plus minus hispidulis, demum glabratiss.

In limoso-calculosis sylvae inter Mahogany creek et Halfwayhouse (Darling's-range) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 908. (Drummond n. 309, 311!)

γ ***hispidissima* nob.**, ramis pilis albidis patentissimis dense hispidis. — *A. hispidissima* DC. l. c. n. 74. Benth. l. c. n. 226.

Ad fluvium Canning (Perth) d. 4. Dec. Herb. Preiss. No. 899 in lapidosis montis Bakewell (York) d. 5. Sept. No. 895. et ad radices montium continuorum Darling's-range prope cataraetam, d. 26. Jul. 1839. (No. 908.) (Drummond collect. I.)

Valde suspicor, praeter duas sequentes etiam *A. lasiocarpam*, *fagionoidem* et *denudatam* ad hanc speciem mire polymorpham reducendas esse.

61. ***Acacia lasiocarpa* Benth.** in Hügel. enum. p. 43, n. 130; ap. Hook. l. c. p. 388, n. 225.

In region. interior. Australiae merid.-occid. m. Febr. 1841. Herb. Preiss. No. 906. (Drummond n. 313!)

62. ***Acacia Cygnorum* Benth.** l. c. n. 227.

In depressis arenosissimis ad ripam fl. Cygnorum prope Freemantle, d. 14. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 897. in glareosis et sublimosis sylvae prope oppidum Guildford, d. 9. Aug. 1839. No. 886, 898, et inter praedia rustica Dom. Barker et Lennard, d. 12. Apr. 1840. No. 909. in clivulis arenosis prope oram maris, d. 23. Sept. 1839. No. 900. in lapidosis et subumbrosis montis Bakewell (York) d. 5. Sept. 1839. No. 892, 894 et 896. (Drummond n. 308!)

„Frntex 2-5-pedalis. Aboriginibus *Pajang*.“

β ***sedifolia* nob.**, foliolis 2-3-jugis, crassiusculis, abbreviatis (1-1½ lin. longis) margine revolutis, legumine pilosiusculo.

In sublimoso-glareosis sylvae district. Hay, d. 7. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 911.

„Frnt. 2½ pedalis.“ — *A. sedifolia* Lehm.! mss. in Herb. Preiss.

γ? ***minutifolia* nob.**, ramosissima, ramis filiformibus rigidis flexuosis, foliis vix 2 lin. longis, foliolis 1-2-jugis vix 1 lin. longis.

In region. interior. Australiae merid.-occid., d. 7. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 912.

Forsan species distincta. Flor. et fr. ignoti.

Post *A. maritimum* inferenda:

Secs. *Julibrissinae* Don.

A. inallispina W. ^{foliis bipinnatis}

(*Unia* species tenuis que
e *Diemenia* cognita. Di-
agnosis mutanda respectu
dispositionis capitulorum,
quae rarioribus secundum
rhamnum posita, tamen hi
rarioribus campopisi sunt
& plerumque terminalis
qualis ^{etiam} *Amaga* rudis xyl-
ographica in Don. quae *Gy.* et
illustrat. *A. Dehata*.

(quae in minoribus interiorum
regionum versus limites
orientales coloniae Nov. Hae-
draustralis videtur existere cum
alia spec. arborea foliis pin-
natis donata) diagnosis
nulla linea ^{istud} *A. inallispina*
differt, tamen forte spec. propria
cujus diagnosis commendanda).

In locis variis Tasmaniae
Arbor 30-40' pi. N. (10-20'
pi. Don) Sept 15 1848 hb. N. II
n. 28.

Secs. *Elizixia* (Durazz) Fend.
A. Lophantha W.

Frequenter in hortis adu-
lum Adelaide culta & forte
in colonia indigere
Nonam cum *A. Lophanthode*
sectionem sed vix speciem
efformat.

Labichea cardiophora Jord. Mill.
 non sine dubio ad hoc genus tuli-
 nam ^{foliis} ~~foliis~~ ^{petaloides} petaloides (foran-
 cultura in petalum mutata) fla-
 minibus 3 fertilibus sterilibus
 parilibus propriis generis vi-
 deri, nisi haec differentialia
 purpureae 2, cultura ortae sunt
 istius characteribus 3, foliis
 impari pinnatis a castia cer-
 tissime abhorret. A cultis
 Labicheis mihi notis praeter
 notis individuas floribus axilla-
 ribus foliariis est differt
 sattem bonum subgenus Ray-
~~ae~~ ^{ae} nomen duntaxat formae
Labichea bivaricata Pax?
Cassia cordifera ferd. Mill. in litt.
 foliis pinnatis, foliolas 6-8
 pinnis lanceolatis recurvato-
 mucronatis, pedunculis axilla-
 ribus unifloris, petalo super-
 iori macula cordiformi notato
 flaminibus fertilibus tribus
 leguminibus oblongis glabris 3-5
 granis.
 planta erecta 2-3 pedat ramis to-
 tiusque supremis oppositi puberulis
 4-6^m longis 1-2^m latis, flores su-
 perisimi, pedalis 2-3^m longis, pe-
 talis subgyngeollicaribus, maxi-
 mo basi macula citrina cordiformi
 2-3 lin. latis, sim ovatis 1^m long. nigro
 in loris inferioribus coloratae colligib.
 longis. G. Sturt, ex quibus plantae
 eructae 8 mecum communicatae a
 Charles. Stuart. Jun fbs. 1848. vid. v. v.
 + *Pitalophytis Labicheoides* K. Pr
 Fulle bed of a rock with Sturt.

63. **Acacia Drummondii** Lindl. Swan River p. XV, n. 67. Benth. l. c. n. 288.

In limoso - calculosis umbrosis montium continuorum Darling's-range (Perth.) d. 13. Sept. 1839, florens Herb. Preiss, No. 901. (Drummond n. 315.)

„Frut. 4-pedalis.“ Specim. glabrescentia.

ALBIZZIA Durazzini.

Albizzia lophantha Durazz. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. 1. p. 527. — *Acacia lophantha* Willd. DC. prodr. 2 p. 457, n. 93. Bot. Reg. t. 361! Bot. Cab. t. 716. — *Mimosa distachya* Vent. Cels. t. 20. (non Cav.) — *M. elegans* Bot. Repos. t. 563.

In humosis umbrosis ad fl. Cygnorum prope Peninsulam Herb. Preiss, No. 903.

„Arbuscula 12-16-pedalis.“

CAESALPINIEAE.

LABICHEA Gaudich. Endl. gen. n. 6782.

1. **Labichea diversifolia** n. sp., foliis impari? — pinnatis, sessilibus, foliolis 6-3-1 lanceolatis, spinoso - mucronatis, coriaceis, marginatis, supra laevibus, terminali brevissime petiolulato caeteris sessilibus multo longiore, junioribus subtus ramulisque puberulis; racemis axillaribus, simplicibus v. ramosis brevibus, paucifloris, calyce corollaque 4-meris, anthera altera biloculari apice 1-porosa, altera duplo longiore acuminata apice obtusa clausa.

α **brevifolia**, foliis omnibus compositis, foliolis 3-6 brevibus, racemis simplicibus folium subaequantibus.

Inter fragmenta rupium (Quartz) ad latus occidentale montis Bakewell (York) et in rupestribus ad fluv. Canning (Darling's-range) d. 8. Sept. 1839 et m. Jul. 1841. Herb. Preiss. No. 1027.

β **longifolia**, foliis plerisque unifoliolatis, anguste lanceolatis, interdum foliolis 2 lateralibus brevibus auctis, racemosis folio dimidio brevioribus saepe ramosis (v. s. e Drummondii collect. I. in Herb. Shuttleworth.) An *L. lanceolata* Benth. in Hüg. enum. p. 41. hujus forma constanter unifoliolata?

α. „Frutex 7-pedalis.“ Rami ramulique patentes, teretes, glabri, nigricantes, satis dense foliosi. *Stipulae* nullae (in foliola mutatae?) *Folia* sparsa, et rami tuberculo nascentia, petiolo communi nullo; foliola divaricopatula, plerumque 2-5 (raro 6) lateralia 3-6 lin. longa, 2-3 lin. lata, ovato-v. elliptico-lanceolata, extimo (terminali?) 8-16 lin. longo (in β 2-3½ pollicari) 2½-3 lin. lato, petiolulo crassiusculo vix 1 lin. longo suffulto, omnibus margine nerviformi tenui scabriusculo cinctis, rigide coriaceis, pallide viri-

dibus, supra aveniis laevissimis nitentibus glabris, subtus nervo medio valido prominente et in mucronem pungentem rufum fere 1 lin. longum excurrente costatis, obsolete pinnato-venosis (in β reticulatis) demum glaberrimis. *Racemi* axillares, solitarii, indivisi, demum folium subaequantes, laxi, pedicellis 2-3 lin. longis cum rhachi calycibusque minute puberulis. *Alabastra* oblonga, incurvo-acuminata, 3-4 lin. longa. *Sepala* 4 sordide viridia, antico (extimo) complicato-concavo undique coriaceo-herbaceo, reliquis subplanis margine membranaceis. *Petala* 4, sepalis aequilonga, suborbicularia, brevissime unguiculata, tenera, flava, aestivatione convolutivo-imbricata. *Antherae* 2 subsessiles. *Ovarium* breviter stipitatum, rufo-pilosum. *Stylus* filiformis, rectiusculus, glaber, stigmatе minuto. *Legumen* lanceolatum, compressum, laeve, glabrum, suturis obsoletis, valvis demum contortis. *Semina* . . . — Species distinctissima, proxime accedens ad *L. cassioidem* Gaudich., quae (fide ic. Freyc. voy. t. 112.) differt petiolo semipollicari, foliolis omnibus inter se subaequalibus (8-10 lin. longis) spathulato-lanceolatis, oppositis, 1-3-jugis cum impari, et racemis 2-3-pollicaribus. — Var. β nostra nisi foliis saepe 3-foliolatis et anthera longiore certe uni-nec biporosa a *L. lanceolata* Benth. vix distinguenda videtur; cum α vero praeter notas indicatas omni modo congruit.

2. *Labichea punctata* Benth. in Lindl. Swan River p. XV, n. 69.

In solo sublimoso-glareoso ad radices montium Darling's-range (Perth) m. Sept. 1841. Herb. Preiss. No. 1026. (Drummond collect. I et II, n. 279!)

„Suffrutex pedalis.“ *Folia* elliptico-oblonga et lanceolata, minus punctata. *Racemi* simplices aut basi ramosi.

β ***lanceolata* nob.**, foliis omnibus lanceolatis v. lineari-lanceolatis (2-4 poll. longis, 2-7 lin. latis) supra valde reticulatis et punctato-scabris, racemis simplicibus v. basi ramosis.

In limoso-calculosis umbrosis sylvae prope Mahogany creek (Darling's-range, Perth) d. 23. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1025.*)

„Suffrut. pedalis. Flor. flavi.“ — A *L. lanceolata* Benth. abhorret antheris aequalibus conformibus, etc.

PAPILIONACEAE.

Tribus I. PODALYRIEAE. Subtribus I. Eupodalyrieae, Benth. in Hügel Enum. p. 27; Ann. Wien. Mus. II, p. 65.

BRACHYSEMA R.Br. Endl. gen. n. 6425.

Meisn. gen. p. 81. (57.)

- 1. *Brachysema lanceolatum* n. sp.**, foliis oppositis v. sparsis, lanceolatis, mucronatis, reticulato-venosis, subtus

*) *Cassia nemophila* Cunn. Vogel synops. gen. Cass. p. 47. n. 158. Walpers rept. I. p. 827, a Drummondio in colonia fl. Cygnorum lecta (n. 289.) inter plantas Preissianas non occurrit.

+ *Lap. opifera* angustatis *hinc* *ap. recurvis* *ar.*
vel *Lap. rotundatis*, *st. ovata* *rotundata* *verruicosa* *inter*
Cassia *arvensis* *proseria*, *pubulo* *plus* *minus*
compressis

C. Chatlainiana *Gaudich.* *congrua*
differt foliis 2-3 *rarius* 4 *jugis* *pilosi-*
serulis. *An distincta species.* *Ad*
flumen Murray *non rara.* *An speciei-*
mun glabrum *hb. St. n. 220.* *hujus*
loci, in hac flores & fructus desunt.

Cassia compressoides *Gaudichaud.* *hb. 16*
pubescentia *proseria*

C. longicaulis *proseria*. *foliis* *bijugis*.

Fig. ovata *a* *legali* *forma* *dis-*
tinguitur. *In parte* *interiore* *coloni-*

ae *legit* *C. capit. Sturt*

C. hesperoloba *Lil.*

Cassia macra *proseria*.

An C. macrophylla *hunningh?*

capit. diagnosen *desidero.*

foliis 1-2 *jugis* *margine* *involutis*
linearibus *perglabris* *pubescentibus* *floribus*
solitariis *vel* *paucis* *umbellatis* *st. n. 220.* *proseria*
axillares *paucifloras*, *legumi-*
nibus *glabris* *pediculis*

Ab antecede *confine* *diagnoscitur*
glabris *pediculis* *brevioribus*
floribus *minoribus* *et* *foliis*
brevioribus. *Saltum* *variata* *24.*
cellens *nisi* *species* *nova.*

Ad flum. Murray *communis.*
herb. St. 222. *An plantis* *capit. la-*
scum *alexandrinae*, *fine* *Apr. 1848.*

frutex *fruticosa* 3-4' *alt.*

Folia *linear.* *lata* *pubescent* *longa.*
Legumen *serici* *usq* 2 *pullis* *ram-*
nibus *obscure* *fuscam* *compressam*
4-6 *pinnum.* *vel 3!*

Frutex *hominem* *altus.* *Pauciflorus*
extra *Salt-crack.* *Nehr.* - *Author*
obscure *fuscae* *Scrub* *Strait* *halleya,*
inter *mont.* *Wark* *&* *St. Murr.*

C. elongata *proseria*.

pubescentia *foliis* *magis* *attenuatis* *cum*
pubescentia *pubescentia* *pubescentia* *pubescentia*
pubescentia *pubescentia* *pubescentia* *pubescentia*
pubescentia *pubescentia* *pubescentia* *pubescentia*

Lactuca L.
Frut. caesp., 3-6' virgatus, corollae adnatae cordatis; pinnis
Flor. racemosis
Vasc.

antheris capitato recurva ^{supra}
 ovata 2-3" long. per. & arg. nitida. Folia opata.
 Murray. Sonoma Gray.
 In planities fereb. fereb. fereb.
 Murray montium Bellor. v. fereb.

glabra, foliis unijugis, foliulis line-
aribus planis rhombi duplo la-
tioribus, corymbis paucifloris
folia brevioribus

ramosus pube aristis fine appressis
phylloribus aphyllis linearibus planis
paleatis auratis, calycibus glabris,
legumine plano - compresso.
In hb. Martii exstat primum nulla
stationis aut loci indicatio, sed
eandem speciem ad eundem finem
Spencers golf dicti in Perilans
aprilis anno 1802 legi.

Cappia heretinsoula, fuit Moll

pube brevissima appressa proserica co-
 nucos, foliolis 3-6 jugis heretinsoula
 filiformibus obtusis, supra linea longitu-
 dini promissa glandula depresso-coni-
 cata ~~longa~~ ^{proserica} laepe abscisa inter par in-
 firmum, ~~foliis~~ ^{foliis} minutissimis fugacibus
 subulatis, rhachis heretinsoula apiculata
 corymbis axillaribus & brachiatis
 puciofloris folium subaquantilem,
 calycis phyllis membranaceis glabris
 margine ciliatis, interioribus orbicu-
 latis - ovatis, stipulis lineari-subulatis
 & bracteolis ^{ovatis} concavis appressis
 pilosulis, ~~pitissimis~~ ^{pitissimis} deciduis legumini-
 bus ~~longis~~ ^{longis} ~~linguati~~ ^{linguati} ~~caeco~~ ^{caeco} glabris ~~brachiatis~~ ^{brachiatis}
 In oleis fuscis prop. China h. n. n.
 Tam l. multifoliam quam artemisioidi
 nata

Folius plerumque erigitur lat. can-
 tratus. Folia minora, foliola 1/2-1"
 longa, linea tenuiora, Legumen ad 4" lg
 & 1/2" lt. (semina non matura)
 Auth: art. Nov.

Cappia erumophila, Cuvier, v. aut.

In minutis virgultisque lacum Torrens
 vultus. Ratio longitudinis rhachis & foli-
 oborum, quae in hac & ~~seguente~~ ^{seguente} ~~pro~~ ^{pro} ~~aequal~~ ^{aequal}
 sunt, notam bonam recognitionis ^{proserica}
 Rhachis nunc foliis latior planior nunc
 quodam crassitie magis heretinsoula, ~~pro~~
 rang. 1" longa 1-1 1/2" lt. Foliola heretinsoula
 bracteis compressa v. paulo canaliculata
 rassis 1 1/2" lg, corymbis rassis pro
 erumophia breviter pedunculati Ad ha-
 C. canaliculata se habet quam C. ~~pro~~
 ti ad heteralobam & probabilia for-
 intermedium confluit

sericeis glabrisve; floribus axillaribus, solitariis; calyce sericeo, ebracteolato, pedunculo triplo longiore, vexillum acquante, dimidiam carinam paulo superante.

α hypargyreum, foliis oppositis sparsisve, linear-lanceolatis, margine undulatis, subtus ramulisque argenteo-sericeis.

In planitie arenosa prope montem Manypeak l. Tjilberup (Kent) 16. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 823.

β glabrescens, foliis sparsis, lanceolatis v. oblongo-lanceolatis, planis v. vix undulatis, mox glaberrimis.

Ad promontor. Cape Riche, 21. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 822.

γ planifolia, foliis oppositis sparsisve, ovato-oblongis v. lanceolatis, margine planis, subtus ramulisque sericeis.

In glareosis sylvae 15 mill. a Kojonup (Goderich) m. Febr. 1841. Herb. Preiss. No. 815.

Rami graciles, teretes, juniores compressi, sericei, demum glabri, internodiis 1-2-pollicaribus. *Stipulae* setaceae, satis rigidae; 2-2½ lin. longae, sericeae, demum recurvae glabrae. *Petiol*i 1-1½ lin. longi, sericei. *Folia* in var. *α* 1-1½ poll. longa, 2½-3 lin. lata, in *β* 2-4 poll. longa, 6-10 lin. lata, in *γ* bipollicaria 9 lin. lata, mucrone subspinescente lineam longo fusco, recto v. recurvo, reticulatione eadem (tantum paulo grossiore) ac in *B. latifolio*. *Calyx* campanulatus, 6 lin. longus; lobis 5 ovato-triangularibus acutis circ. 2 lin. longis, infimo paulo profundius distincto et angustiore, superioribus duobus paulo latioribus. *Corolla* rubra? glabra; carina falcata, acutiuscula, 8-9 lin. longa; alae et vexillum calycem vix superantes . . . . . — Species ex habitu et flore absque dubio hujus generis, foliis distinctissima. Petalorum forma in speciminibus perfectioribus recognoscenda.

2. ***Brachysema latifolium* R.Br.** Bot. Reg. t. 118. Bot. Mag. t. 2008. DC. prodr. 2. p. 105.

In glareosis sylvae district. Hay, 8. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 807.

„Frutex radicans. Legumen pisiforme.“

3. ***Brachysema undulatum*, R.Br.** Bot. Reg. t. 642. Bot. Cab. t. 778. DC. l. c.

In subarenosis inter frutices densos prope villam Spencer (Plantagenet) 5. Oct. Herb. Preiss. (No. 808, steril) et in glareosis planitiei prope laeum Mathildae (Hay) d. 7. Nov. 1840. No. 809.

„Frutex 2-3-pedalis.“ — Forma foliis sueto minoribus, 10-12 lin. longis, 5-6 lin. latis, demum glaberrimis.

4. ***Brachysema praemorsum* n. sp.**, foliis ternis oppositisque v. subsparsis, obverse triangularibus, peminerviis, angulis obtusis v. rotundatis, apice truncato v. breviter acuminato mucronulato, junioribus subtus cum ramulis pedunculis calycibusque pubescentibus; pedunculis axillaribus, solitariis, apice bracteatis, bifidis, bifloris, folio parum brevioribus; calyce laxo, ebracteolato; vexillo subpanduraciformi, exserto; filamento vexillari basi geniculato.

In solo limoso ad ripam fluvii Preston (Wellington) d. 13. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 824.

„Frutex 2-3-pedalis“, erectus? *Rami* primarii stricti, teretes, glabri, virescentes, crassitie calami scriptorii; secundarii ternatim verticillati, subsimplices, graciles, tenues, adscendentes, molliter pubescentes, superne compressi; internodia $\frac{1}{2}$ -3 poll. longa. *Stipulae* setaceae, 2-3 lin. longae, patulae v. recurvae, fuscae, vix rigidae, tarde deciduae. *Folia* in ramis primariis ternatim verticillata, in secundariis opposita v. rarius alterna (tumque fere semper per paria approximata) petiolo puberulo 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longo; lamina (Passiflorarum quarundam, v. g. *P. Leschenaultii* DC. *P. rotundifoliae* L., Cav. diss. t. 290, etc. forma) 9-18 lin. longa lataque, basi rotundata, lateribus leviter arcuatis, apice truncato rectilineo v. emarginato v. saepius acuminato, acumine brevi lato lobos laterales rotundatos latos vix nunquam superante, mucronulo fusco rigidulo semilineam longo plerumque recurvo armato; margines (exsiccatione?) leviter recurvi et plus minus undulati; nervatio supra impressa, subtus prominula, nervo medio recto valido, venis primariis utrinque 4-5 divaricatis intra marginem anastomosantibus, interstitiis tenuiter reticulatis. *Pedunculi* erecti v. semipatentes, tenues, stricti, glabriusculi, apice compressi et bracteis 2 membranaceis lanceolatis bifidis (stipulis connatis) pubescentibus fuscis marcescentibus muniti; *pedicelli* 2 (altero interdum abortiente) incurvi v. recurvi, 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. longi, sicut calyces tomentoso-puberuli. *Alabastra* oblonga, subfalcata, acuta. *Calyx* late infundibuliformi-campanulatus, 6 lin. longus, coloratus (ruber? purpurascens?) semiquinquefidus, lobis (praecipue lateralibus infimoque, subcarinato-concavis) falcato-incurvis, superioribus latoribus et minus profunde divisis, infimo reliquis paulo longiore. Corollae et genitalium structura omnino *B. undulati*. *Corolla* sanguinea v. punicea? glabra, fere pollicaris; carina alaeque subaequales, longe exsertae, subfalcato-lanceolatae, obtusiusculae, basi supra auriculatae; vexilli lamina ungue longior quasi panduraeformis, sc. basi subrotunda, medio constricta, superne in processum oblongum complicato-fornicatum submarginatum e calyce paulo exsertum producta. *Filamenta* glabra, longissima, capillaria, basi complanata et brevissime monadelphae, decimo basi geniculata vexilli ungui adnato. *Ovarium* ovoideum, albido-villosum, intus glabrum, 1-loculare, pluriovulatum, stipite brevi basi annulo membranaceo fusco cincto. *Legumen* . . . . .

CALLISTACHYS Vent. Endl. gen. n. 6426.

Meisn. gen. p. 81. (57.)

CALLISTACHRYA Sm. Benth. in Ann. Wien. Mus. II, p. 69.

1. **Callistachys ovata** Sims., Bot. Mag. t. 1925. DC. prodr. 2, p. 104. — Forma foliis lanceolato-v. elliptico-oblongis.

In littore arenoso prope oppidum Albany (Plantagenet) 25. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 849. (fl. et fr.)

„Arbuscula 8-14-pedalis.“

2. **Callistachys lanceolata** Vent. Malm. t. 115. Bot. Reg. t. 216. DC. l. c.

In solo humoso umbroso ad fl. King's river (Plantagenet) 25. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 850. (fl. fr.)

„Arbuscula 15-pedalis.“

3. **Callistachys parviflora** Benth. in Hügel enum. p. 27, n. 68. Walpers rept. I, p. 566.: foliis oblongo-linearibus,

+ Cassia repolata, Griseb. & Muell.

pube brevi appressa canaliculata
 stipulis linearibus subulatis pinnatis
 foliis bi-spinosis ^{planis} abbreviatis - in
 ciliato-ovalibus obtusis, saepe ciliatis
 glandula depressa, hemisphaerica
 intra quovis par praeditis, ^{habet multos angulos}
 4-8 floris acilioribus & pinnatis
 (calyci retusis - tomentosa, ^{fulvis} legumine...)
 In terra undulata arundo - angustata humi-
 cat diffinita intra Akaba & Bulgana!
 Fructu pluriglandulis habitu C. p. latypoda
 pinnatis. Foliola 2-1" long 3-5" lat raro
 unijuga vix apiculata. Corymbus per
 pinnatis, ^{fid. C. Cyces rivina}
 F. ^{calycis pinnatis} ^{oblonga interiora ovata}
^{nonnisi in tuba} ^{duplex} ^{nonnisi in tuba}
 nonnisi in tuba & Cyces pinnatis
 neque conopseis intra Bulgana
 nonnisi in tuba & Cyces pinnatis
 ma vassae interioris reperitur!
 Anth. 012. Nov. Valli specierum Australium
 n. p. C. retusae arundinis.

+ Carria pleuroda, K. Br. n. antea

In plicis fissis pusillum salinis montana
Baroni vases
Folia Natura C. humositas
Folia haud rera ligera raris, 1" longa
canaliculata vel arista complicatione li-
nearia, 1" latiora v. angustiora. Rhachis
pallidum & ultra longa 1/2-2" lata. Calypis
phylla glabra sed margine relicta, exte-
riora oblongo-ovata, interiora ovata
ovato-orbiculata.

S. simplicifolia Jacq. & Pl.
angustis vel glabris C. *phylloma* N. Br. *angustis*
stachis aphylla rarius foliolis 2 linearibus
canaliculatis impressis. Longis. & latitud.
In placitibus philibus *phylloides variat.*
alis, monum. Stipens. - angustis in monum.
monum. Stachis in angustis.
Anthum. Stachis. Designo miti v. v. v.
quo ante, in C. plathyoda diffingui possit
igitur varietatem valde gerem excellenter
exhibere videtur! ~~Stachis~~ anthum. Stachis
Anth. d. d. N. Br. aliquando in monum.

mucronatis, reticulatis, basi longe angustatis, planis; racemis terminalibus, laxiusculis.

In paludosis sylvae prope Toby's Julet (Sussex) 27. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 852. (fl. fr.)

„Arbor circ. 25 pedum.“ *Flores* luteae, sequenti minores. *Legumen* coriaceum, durum, oblique nervosum, omnino *C. ovatae*.

4. **Callistachys linearis** Benth. l. c. n. 67. Walpers l. c.: foliis elongatis, linearibus, mucronatis, reticulatis, margine revolutis; racemis terminalibus, laxiusculis. — Bot. Mag. t. 3882!

In limosis umbrosis ad ripam flum. Preston (Wellington) d. 1. Jan. Herb. Preiss. No. 851. in arenosis inter frutices densos ad fl. Cygnorum (Perth) d. 27. Oct. No. 853. et in paludosis district. Sussex, m. Dec. 1839. No. 854. florens et fructifera (Drummond No. 188!)

„Frutex 8-10-pedalis. Flor. purpurei.“ Variat foliis 1-4 lin. latis et flor. flavis (No. 854.) — A praecedente vix distincta nisi floribus paulo majoribus et legumine tenuiore, magis inflato, obsolete venuloso.

5. **Callistachys carinata** n. sp., ramis cano-pubescentibus apice corymbosis; foliis exstipulatis, sparsis, sessilibus, coriaceis, oblongis, utrinque obtusis, obsolete mucronulatis v. muticis, complicato-canaliculatis, subtus pubescentibus, demum glabris; racemis terminalibus, brevibus, laxiusculis.

In glareosis inter frutices ad latus meridionale collium Konkoberuphills (Kent) d. 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1068.

„Suffrutex vix pedalis.“ *Rami* adscendentes, apice tantum in ramulos paucos breves subcorymbosos divisi, teretes. *Stipulae* plane nullae! *Folia* sparsa, subinde subopposite approximata, subadpressa, 4-7 lin. longa, 1½-2 lin. lata, nunc ubique aequilata, nunc apice (rarius basi) paululum dilatata, apice interdum subretusa, rigide coriacea, laete flavo-viridia, plus minus complicato-concava, nervo medio subtus prominulo carinata, caeterum laevia aut transverse venosa et subreticulata, supra glabra, subtus juniora pubescentia, marginibus simplicibus v. obsolete incrassatis nunquam recurvis. *Racemi* ½-1-polliares (fructiferi paulo elongati) rhachi, pedicellis, calycibusque pilis albidis laxiusculis cano-hirsutis; pedicelli 1-2 lin. longi, medio bracteolis 2 oppositis lineari-setaceis 2 lin. longis pilosis muniti. *Calyx* laxus, 4 lin. longus, lobis tubo infundibuliformi longioribus lineari-lauceolatis subaequalibus. *Corolla* vitellina, glabra, calycem parum superans, petalis subaequilongis breviter unguiculatis, vexillo subrotundo, alis obovatis carinaque gibbo-senioribulari acutiuscula basi supra obtuse auriculatis. *Filamenta* glabra. *Ovarium* subsessile, pilosum, 1-loculare, pluriovulatum, intus glabrum. *Legumen* ventricosum-ovatum, turgidum, hirsutiusculum, bivalve, valvis intus transverse striatis nec septuligeris. *Semina* . . . . Affinis *C. sparsae* Cunn., sed jam foliis, floribus majoribus, caet. satis superque distincta.

6. **Callistachys oxylobioides** n. sp., ramulis pubescentibus; stipulis capillaribus, recurvis; foliis ternis, oppositis sparsisque, subsessilibus, oblongo-linearibus, subenneatis, obtusis, mucronatis, utrinque reticulatis glabris, complicato-canaliculatis v. planis, margine haud recurvis; floribus axillaribus 2-3 fasciculatis, calycibus cum pedicellis (ipsis brevioribus) leguminibusque subsericeo-villosiusculis.

In arenosis sylvae prope deversorium publicum Pineapple (Perth) d. 6. Jun. Herb. Preiss. No. 842. et in calcareis inter frutices densos prope oppidum Freemantle, d. 18. Dec. 1839. No. 841.

Species inflorescentia a reliquis *Callistachyis* recedens habituque toto *Oxylobiis* (praecipue *O. capitato*) similior, sed propter legumen intus manifeste, quamvis incomplete, septulatum certe priori generi accensenda. — „Frutex procumbens v. 2-pedalis erectus.“ *Rami* ramulique teretes, strictiusculi, demum glabrati, internodiis $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ pollicaribus. *Stipulae* capillari-setaceae, nigrae, glabrae, 2 lin. longae, valde recurvae. *Folia* ramorum primariorum ternatim verticillata, secundariorum opposita v. rarius sparsa, coriacea, 1-2-pollicaria, $1\frac{1}{2}$ -3 lin. lata, basin versus plus minus cuneato-attenuata, pleraque (exsiccatione?) plus minus complicata, venis anastomosantibus (subtus magis prominulis, fere *Oxylobii reticulati* more) grossiuscule reticulata, nervo medio subtus parum prominulo, mucrone tenui semilineam longo rectiusculo. *Pedicelli* 1-2 lin. longi. *Calyx* ebracteolatus, campanulatus, lobis tubo aequalibus v. demum paulo longioribus. *Alae* et *carina* subaequilongae, obtusae, purpureae, (alae apice luteae) *vexillum* iis longius, amplum, orbiculare, emarginatum, medio purpureum, margine aurantiacum. *Legumen* sessile, subglobosum, cano-subvillosum, 8-spermum, valvis coriaceis intus glabris et septulorum membranaceorum reliquias gerentibus. *Semina* (immatura) obsolete strophilata.

OXYLOBIUM Andr. Endl. gen. n. 6427.

Meisn. gen. p. 80. (57.)

1. ***Oxylobium ovalifolium* n. sp.**, stipulis setaceis, petiolum subsuperantibus; foliis quaternatim et ternatim verticillatis oppositisque, ovalibus, obtusis v. emarginatis, mucronulatis, subtus ramulisque sericeis; capitulis axillaribus terminalibusque, breve pedunculatis, dense multifloris; calycibus leguminibusque villosis.

In glareosis inter frutices densos prope montem Manypeak (Kent) d. 27. Nov. Herb. Preiss. No. 813. et in rupestribus ad radices montis Baldhead (Sinus Regis Georgii III.) d. 16. Oct. 1840. No. 820.

„Frutex 5-pedalis, elegans.“ *Rami* ramulique inferne teretes, glabri, apicem versus 3-4-angulati v. compressi cano-pubescentes. *Folia* $1\frac{1}{2}$ poll. longa, 6-9 lin. lata, alia perfecte ovalia, alia oblonga, alia obsolete ovata v. obovata, basi rotundata, apice truncata v. plus minus emarginata (nonnunquam obcordato-subrotunda) mucronulo brevissimo v. nullo, coriacea, supra laete viridia glabra venis venulisque elevatis dense eleganterque reticulata, subtus pube alba adpressa dense sericeo-villosa, demum glabrata, nervo medio subtus prominulo valido supra impresso. *Stipulae* 2-3 lin. longae, subulatae, rigidae, rectae, puberulae, demum subrecurvae deciduae. *Pedunculi* terminales et c. summis axillis 3-6 lineas longi, angulati, tomentosi, corymbo composito in capitulum subglobosum contracto terminati, pedicellis 1 lin. longis ebracteolatis. *Calyx* 3 lin. longus, corolla dimidio brevior, sordide albidus v. flavido-villosus, infundibuliformis, semi-5-fidus, lobis aequilongis ovato-lanceolatis acutis, superioribus 2 paulo latioribus. *Vexillum* subreniforme, ungue cuneato $1\frac{1}{2}$ lin. longo, lamina $2\frac{1}{2}$ lin. longa 5 lin. lata centro purpurea marginem versus basique aurantiaca; carina purpurea alaeque subaequales luteae obovato-oblongae subincurvae, vexillo parum breviores. *Filamenta* capillaria, glabra. *Ovarium* sessile, villosum, 4-ovulatum. *Stylus* glaber, stigmate acuto. *Legumen* ovatum, turgidum, pilosum. *Semina* . . . — Affinis *O. obovato* Benth.; sed folia nunquam cuneata.

x *C. urbonessimo* ! St. P. Bn

Ad fl. Murfij, Farm, hb. N. H. n.
286. Dec. 1848. Altitudo 15-20
ped. haud 3-6 ped. ut vult Dan.
George - Town Dec 49.

x *O. ellipticum* ! St. P. Bn. F. D. L. !

O. rotundum hb. St. n. 85 non Rbn
quod foliis glabris fatis peruli-
are. - Alexander - river, Western
port, 6-8', hb. N. H. n. 68
et in montibus occidentali-
bus usque ad altitudinem
3000 pedum 8-10' Jan. hb.
N. H. n. 285.

x *β latifolium* ! Juss. & All.

foliis latioribus brevioribus
subrotundis : In monte St. Pauls
Dome Tarnanice, Nov. 1849. hb. N. 727

x *Scavia sessilifolia* Juss. & All.

Ad marginis fruticetorum prope
Gambley bay. Subx pliniped. ^{in crinis} ^{super}
(specim. pui. fl. & fr.) et aliquid
& clathrophyllar proxi.

x Aravia elatophylla, frut. Mill.
Fruix humile diffusus.

In apiculis montium Hiindro
A. portifera frutillima, frut. (folia)
loria frut. aquilata orato- abt.

x Aravia prarifolia, frut. Mill.

In montibus Hiindro & Elders-ran
A. Gunnii propingua, diffat vov
phyllodis praetn nuzum, pro min
tuo nazo vno altrove ^{sonuore} ~~pro~~ vno, frut
vino batoo figurione magis producto.
Lignum spirale fortum pilafum
Luth: primo vov.
2. p. glabellu montium
2. latra propu Crystal brook.
Lutulus humilis diffusus.

2. **Oxylobium obovatum** Benth. in Lindl. Swan River p. XII, n. 42. Walpers rept. 1. p. 567: Lindl. in Bot. Reg. 1843, t. 36! foliis cuneato-obovatis oblongisve, obtusis retusisve, v. 2-3-lobis, mucronulatis, coriaceis; racemis axillaribus capituliformibus, densifloris, calycibus sericeo-villosis, ovario 4-ovulato.

α latifolium nob., foliis obovato-triangularibus, apice valde dilatato truncatis v. subtrilobis, lobis lateralibus rotundatis muticis, intermedio plerumque brevi v. obsoleto acutiusculo v. obtuso cum mucronulo recurvo.

In region. interior. Australiae meridionali-occidentalis Herb. Preiss. No. 828. (Drummond coll. I, sine No.)

β angustatum nob., foliis cuneato-spathulatis, apice modice dilatato emarginatis v. truncatis v. rotundatis mucronatis v. acuminato-subtrilobis, lobis lateralibus obtusis intermedio acuto saepe brevioribus. — *O. cuneatum* Benth. l. c. n. 41. Cfr. Lindl. l. c.

In rupestribus jugi montium Darling's-range, haud longe a cataracta ad caput fluvii Cygnorum (Perth) d. 16. Jan. 1840. specim. fructifera. Herb. Preiss. No. 818. (Drummond n. 207, et coll. I, sine No.)

„Frutex 2-3-pedalis.“

3. **Oxylobium dilatatum** Benth. l. c. n. 43. Walpers l. c.: foliis basi angustatis, apice dilatato-subbilobis mucronulatis, crasse coriaceis; racemis axillaribus, dense capitatis, multifloris, calycibus sericeo-villosis, ovario 4-ovulato.

In glareosis sylvae inter praedia rustica Dom. Barker et Lennard (York) d. 12. Apr. 1840. No. 827 et 834, et in region. interior. Australiae No. 1132. Herb. Preiss. specim. imperfecta.

„Frutex 3-pedalis.“

? *β trilobum* nob., foliis apice dilatato 3-lobis, lobis mucronatis, intermedio minore. — An species distincta?

In region. interior. Australiae merid.-occid. m. Febr. 1841. specimen mancum Herb. Preiss. No. 827.

4. **Oxylobium reticulatum** n. sp., foliis oppositis, obovatis oblongisve, obtusis v. emarginatis, mucronulatis, grosse reticulatis, junioribus subtus ramulisque puberulis, demum glabris; stipulis setaceis, petiolo aequalibus, deciduis; racemis axillaribus, brevibus, paucifloris, calycibus cano-sericeis.

In clivulis arenosis ad littus maris, d. 19. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 840. et in region. interior. Australiae merid.-occid., m. Febr. 1841. No. 831. (Drummond n. 215.)

Species praecedenti (maxime var. *β*) valde affinis, sed distincta: foliis nunquam vere cuneatis, reticulatione insigni multo grossiore, stipulis brevioribus (vix 1-1½ lin. longis) tenuioribus, fere capillaribus, deciduis, racemis plerumque ad umbellam 3-5-floram redactis, calycis pube albida (nec fulvo-villosa) minus nitente. — „Frutex 2-pedalis, erectus.“ *Folia* pleraque pollicaria, 5-7 lin. lata. „Vexillum suborbiculatum, emarginatum, extus basique intus purpureum, margine intusque aurantiacum, carina alaeque purpureae.“ *Ovarium* 4-ovulatum.

5. **Oxylobium capitatum** Benth. in Hügel enum. p. 28, n. 69. Walpers l. c. p. 566. Bot. Reg. 1843, t. 16!, foliis inferioribus, obovatis, superioribus oblongis v. linearibus, mucrone recurvo; racemis axillaribus, densis, capitatis, folio brevioribus, paucifloris *).

In arenosis inter frutices sylvae prope deversorium publicum Pineapple (Perth) m. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 843, 844. (Drummond n. 214.)

„Frutex 2-pedalis, ramis strictis.“

? **β ternifolium nob.**, foliis ternatim verticillatis, crassiuscule coriaceis, ramis validioribus (nec gracilibus.) — An species distincta? Specimina manca, fructifera. Legumen 3-spermum. Semina strophiolata!

In glareoso-lapideis inter frutices densos sylvae ad radices montis Manypeak v. Tjilberup (Plantagenet) d. 23. et 28. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 805 et 814.

6. **Oxylobium tricuspdatum** n. sp., humifusum, glabrum; stipulis rectis, spinuliformibus; foliis oppositis, subsessilibus, cuneato-obovatis, apice truncato 3-mucronulatis, utrinque reticulatis; floribus breve pedunculatis, paucis, axillaribus v. in ramulorum apice aggregatis; calycis dentibus setaceo-acuminatis; ovario 4-6-ovulato.

In sublimoso-glareosis districtus Hay, m. Oct. 1840. specim. florifera. Herb. Preiss. No. 1064. (fructifera. Drummond n. 266.)

„Frutex humifusus“, facie *Cliffortiarum* quarundam, ubique glaberrimus. *Radix* lignosa, tortuosa, digiti crassitie, *caules* emittens plures prostratos, spithamaeos, divergentes, inferne teretes, superne plus minus compresso-angulatos, ubique dense foliosos et ramosos. *Stipulae* erectae v. patulae, 1-2 lin. longae, e basi viridi paulo dilatata in mucrone pungentem rectum fuscum abeunt. *Folia* 4-7 lin. longa, $2\frac{1}{2}$ -4 lin. lata (petiolo $\frac{1}{2}$ lin. longo) coriacea, plana, basi rotundata v. rarius acutiuscula, apice rotundato-truncata v. rarius acutata et mucronibus 3 fuscis pungentibus armata, mucrone intermedio recto 1-2 lin. longo e nervo medio subtus prominulo, lateralibus rectis v. paulo divergentibus 1-2 lin. ab illo remotis et plerumque brevioribus e summis venis primariis ortis, venis pinnatis venulisque rete acute prominulum formantibus. *Pedunculi* axillares 2-4 fasciculati (interdum solitarii) vix calycem aequantes. *Calyx* subcampanulatus, viridis, $2\frac{1}{2}$ lin. longus (cum pedicello sub lente parce puberulus) subbilabiatiim semi-

---

*) **Oxylobium Drummondii** n. sp., ramis apice puberulis, mox glabris; stipulis setaceis, petiolo vix longioribus, deciduis; foliis oppositis, lineari-lanceolatis, emarginato-retusis, obsolete mucronulatis muticisve minute reticulatis, mox glabris, margine nec incrassatis nec revolutis; capitulis ramulos terminantibus, densifloris, inter folia subsessilibus, calyce ovarioque villosis. — Swan River, Drummond n. 210. — **Oxylobio capitato** valde affine, vix tamen mera ejus varietas, recedens, praeter notas indicatas, foliis basin versus vix attenuatis, rarius subcuneatis, apice magis retusis v. emarginato-bilobis, lobis rotundatis, reticulatione paulo minore et (praecipue in pagina superiore) magis obsoleta, petiolo magis conspicuo 1-2 lin. longo, maximeque racemis magis contractis, capituliformibus, nunquam immediate axillaribus, sed ramulos (etsi saepe brevissimos) semper foliosos terminantibus, floribus brevius pedicellatis v. subsessilibus folia haud superantibus, calyce fulvo-villosiusculo minus sericeo, lobis acutis non acuminatis, stylo tenniore et paulo longiore (qui in **O. capitato** nostro est compressus, crassiusculus, inferne paulo attenuatus.) — Ab **O. obtusifolio** Sm. apprimè differt foliis margine haud revolutis, inflorescentia, floribus minoribus caet.

* Acacia tetragonophylla, Juss Mill.

In paravis Jivris subfalsis & ad rivas
superiores prope Curuaku.

Stipitaculatae approximanda & axillari
fol. quadrilatera ovicularia. Arbuscula
6-8' vel frutx divaricatus ramis fissum
raris rotatis raris nigrescentibus
Auth: Sept. 0.12.

* Acacia Salix trifida, Juss Mill.

Arborum 15-20, internum 30-40' ^{rara 2'} alta
Arbor, furcas venustas formans
Rami Salicis Babylonicae cypar
peduli. Truncus 12-18' altus. Cortex
nigrescens qualitas ramis fissum
negus fuc Casuarinae quadrivalis
Ad rivas ut non in humidis locis.
Bark, nervi, Bark. velk, Cypsal
bark, Movunt Remarkable, Broughton
Auth. Lemp. miter. Phyllovia palme
S. foliaria ver. aggre Populth
Ramm paula tenuiora.

* Acacia heliofolia Juss Mill.

Port Livolu, Napan point, Daulley bay
iruprukteta.
Frutx 3-6' diffusus. St. & R. defunct.
Folia insigniter obtusa

* Acacia pyramantha Vth.

f. angustifolia
In apicibus repensibus montium
Marble-ranges & laeis humilibus
ad Daulley bay Frutx 7-8' Rami
flexuosi. Lycopium raris diffusi
Auth: Daulley

* Araria itcaphylla, fnd Mill.

Prope N. retinoderm inferatur!
 Inter fructus 5-8' lacte virens.
 In alveis rivulorum expiratis prope Ar
 kaba, Tudnaka & Wappaena! & prope
 Anth: kerup, iulker. Jonindi! Trilbula
 nec diffini videtur prope aliud ab ea
 Wuth prope Wellington lectum

* Araria cornuta, fnd Mill.

Sulley-reef.
 Inter 6-8', racis cornus.
 A. pyranthae formis angustis
 furilis diffut vno phylloides recte
 minus vucosis immarginatis
 fivibus. fl & fr. sordidatissimus

* Ararice Fergysenii fnd Mill.

Species A. retinoderm cognata, dissona
 tur habitu fruticosa, foliis mino
 ribus lactis viridibus, pedicellis
 pe axillaribus foliis aris coarctatis
 pilosulis (nec glabris)

In alveis glaciis expirantibus am
 cum prope Arkaba.

Anth: vris exado.

* Araria Wattersiana, fnd Mill.

Inter annus Braughton & Kirkby-reef.
 & in graminibus ad Wild Dog reef.
 Inter, sat densus pauci - 5' lacte
 virens phyllis. Folia erecta. Ram
 adulti furci. Ab hac diffini. & glau
 phylla innovationibus puberulis
 glaberrimis, pedicellis abbreviatis nec
 racum ex limbo, pedicellis longioribus
 & limbo florescendi. Anth: alba.

quinquefidus, lobis lanceolatis acuminatis apice fere setaceis aequilongis, superioribus paulo latioribus et altius connatis, inferiorum subus sphacelatis. *Corolla* calyce vix duplo longior, vexillo suborbiculato integro flavo, dorso medioque purpurascente, carina parum incurva purpurea alas oblongas flavas aequante. *Filamenta* libera, glabra. *Ovarium* sessile, basi disco brevissimo cinctum, sericeo-villosum, 4-6-ovulatum, stylum filiformem incurvum acutum glabrum aequans. *Legumen* sessile ovatum, turgidum, puberulum, intus glabrum haud septulatum. *Semina* estrophiolata.

7. **Oxylobium parviflorum** Benth., in Lindl. Swan River p. XII, n. 40. Walpers repert. l. p. 566.: foliis oblongo-linearibus cuneatisve, emarginatis retusisve, muticis; racemis axillaribus et terminalibus, elongatis, laxis; calycibus subsericeis; ovario 4-ovulato.

In sterilibus sylvae prope praedium rusticum Dom. Parker (York) d. 10. Apr. 1840. Herb. Preiss. No. 798. et in lapidosis summitatis montis Bakewell, alt. 1200 ped., d. 5. Sept. 1839. No. 801.

„Frutex 5-7-pedalis. Carina alaeque purpureae, vexillum rotundatum aurantiacum, basi purpureum.“

ISOTROPIS Benth. Endl. gen. n. 6429.

1. **Isotropis striata** Benth. in Hügel Enum. p. 28, n. 73; Ann. Wien. Mus. 2, p. 70. Walpers l. c. p. 567: procumbens, piloso-pubescent; foliis sessilibus, inferioribus obovatis, superioribus cuneato-oblongis v. linearibus, integris; stipulis inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis.

In arenosis umbris et glareosis montium continuorum Darling's-range, haud longe a cataracta, d. 26. Jul. 1839. (No. 1062 ex parte) et in solo turfoso clivuli ad portum Princess Royal Harbour, d. 28. Sept. 1840. (No. 1065 ex parte) Herb. Preiss. (Drummond n. 274.)

„Herba perennis, humifusa“ (fide Preiss. in sched. No. 1062.) „Suffrutex dodrantalis“ (Id. No. 1065.) *Folia* saepe in eodem specimine alia apice rotundata, alia truncata, alia obsolete biloba, in formam sequentis transeuntia, quam igitur mere ejusdem speciei varietatem sistere suspicamur. *Vexillum* aurantiacum, radiatum purpureo-venosum, alae carinaque atropurpureae.

2. **Isotropis biloba** Benth. l. c. p. 29, n. 74; Ann. Wien. Mus. l. c. Walpers l. c.: caule erectiusculo; foliis cuneatis, apice bilobis v. superioribus linearibus integris; stipulis inferioribus lanceolatis, superioribus parvis.

In solo sublimoso-glareoso district. Hay, d. 8. Nov. 1840. fructifera (Herb. Preiss. No. 1066.) et cum praecedente florens (No. 1062, 1065, ex parte) (Drummond n. 275, 276.)

„Suffrutex spithameus.“ — Variat caule folisque pilosis et fere glabris. *Legumen* clavato-lanceolatum, acutum, turgidum, 8-10 lin. longum, in stipitem calyce breviorum attenuatum, subdepressum, adpresse sericeo-pilosiusculum, albidum, suturis vix prominulis. *Semina* 6-8 (immatura) estrophiolata. An praecedentis var.? *Folia* tamen rigidiora, subcoriacea, distinctius venosa.)

*) **I. Drummondii** n. sp., caulibus subsimplicibus, strictis, striatis, adpresse pilosiusculis, superne aphyllis, inferne paucifoliis; foliis coriaceis, spathulatis v. lanceo-

CHOROZEMA Sm., Benth. Endl. gen. n. -6431.

CHORIZEMA Labill. DC. prodr. 2. p. 102. Meisn. gen.
p. 81, (57.)

1. **Chorozema (Euchorozema) cordatum** Lindl. in Bot. Reg. 1838, t. 10! Walpers repert. 1. p. 567: foliis subsessilibus, cordatis, ovato-oblongis, obtusis, aequaliter spinuloso-dentatis, glabris; racemis terminalibus axillaribusque, laxis, nutantibus, paucifloris, calycis pubescentis dentibus tubo aequalibus.

In humidis umbrosisque ad ripas fluvii Canning prope Kelmscott (Perth) n. Jul. 1841. (No. 1042, fl. et fr.) et in arenosis sylvae ad portum Leschenault (Wellington) d. 13. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1056. (Drummond n. 185, et coll. l. sine No.)

„Frutex 1-5-pedalis, ramis flaccidis.“ — Variat foliis saepe in eodem specimine aliis sinuato-dentatis, dentibus subspinulosis, aliisque subintegerrimis sparse minuteque ciliato-denticulatis. *Racemi* saepe fere pedales. *Legumen* clavato-oblongum, turgidum, glabrum.

2. **Chorozema (Euchorozema) varium** Benth. in Bot. Reg. 1839, misc. p. 45, n. 63, t. 49! Walpers l. c.: foliis subsessilibus, subrotundo-cordatis, undulatis, spinoso-dentatis integrisque, pubescentibus; racemis erectis, multifloris, folio paulo longioribus; calycibus pilosis, basi obtusis, dentibus tubo subaequalibus.

In clivulo calcareo Arthur'shead (Perth) d. 15. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1046. (Drummond n. 184.)

„Frutex adscendens. Flores miniati.“ *Legumen* subclavato-oblongum, turgidum, glabrum.

3. **Chorozema (Euchorozema) triangulare** Lindl. in Bot. Reg. t. 1513! Walpers l. c.: foliis subhastatis, pinatifidis, spinosis, acumine integro laciniis longiore; bracteo-
lis ad apicem pedicelli.

In calcareis inter frutices densos ad tergum montis Baldhead, d. 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1041.

„Frutex pedalis. Flores coccinei.“

4. **Chorozema (Euchorozema) rhombeum** R.Br., DC. prodr. 2, p. 103, n. 3. Sweet. Fl. Austral. t. 40.

latis, integris, acutis, subnervosis, demum glabris; stipulis ovato-lanceolatis; racemo terminali, laxo, pedicellis calycem aequantibus v. demum superantibus, bractea stipulaeformi suffultis. In colonia ad fl. Cygnorum legit Jac. Drummond (n. 277.) Herba basi suffrutescens? spithamea. Rhizoma tortuosum, ex apice multicipiti emittens caules subfasciculatos, erectos v. adscendentes, fere junciformes, basi stipulis ovatis imbricatis decoloribus squamatos. Folia vix semipollicaria, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata, venis subflabellato-pinnatis plus minus conspicuis. Flores **J. striatae**, sed alae aurantiacae.

Acacia megaphylla, for. Muell.

Acacia ad A. Pawlikowskiana Ohlson
Species insignis quantum diagnosi
docuit A. cuneipiti & elliptica propinquum
intra cas hujus «alouice» A. notabilis
approximanda. Ab ultimiori facillime
distinguitur: phyllodii primis ovatis
vel lanceolato-ovatis duplo
brevisioribus & capitulis axillaribus
solitariis nec racemosum dispositis
tante ramis petiol. decurre petiolo
ram. alatis

In montem Deffou & Greenly int
coll. "Forsterianum's Look out" Wilhelm
inde 20 mill. ibi. ad litus (aroidum
pretentum & in parte australi li
toris prope Port Lincoln
Arboreola 4-5' truncata ulari
vixto phaeophloio, cornea intrusa
Ruth: exodo unis & multo affatis.

Acacia aneura, for. Muell.

In solo maro prope Ludnaka.
A. neurophyllae phyllodii admodum
finitis, qua etiam angustiorib. & vix nervatis
(Gleditsia striatula), leguminibus vix
& florum dispositione racemosa magnopere
differt. Habitum prae se fort. Cassiae
phyllodineae var. ~~argenteae~~ ~~argenteae~~ ^{argenteae}
& angustipoliae.

* Acacia lissophylla, f. Mee.

Posindy? Wilhelm leg. pro fl & fr.
prope rivulorum marginibus

Frut. altiss.

Spines ab annib. mci h. fasci
~~separanda~~ separanda phyllodis au
gusto lanceolatis nitidulis crasso-
riacis obtusissime nervatis & m.

* Acacia imbricata f. Mee.

ad margines fruticum prope Dam
leg. bag. Wilhelm detexit.

A. asperae L. (ad fl. Murray de-
scriptae mihi adhuc incognita)
habeo affinem. Frut. annis ali-
bis indigenos maxime singulares
facit. Ericae vel Pleurostachyae
foliis imbricatis 4-6" longis leica-
bus obtusis non nisi mucronula
brevis latius apiculatis

Frut. 3-4' altus saepe autem ad 6'
altus

Auth: primo vire

In glareosis sylvae ad tergum montis Clarence, d. 30. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1128. (fl. et fr.)

„Suffrutex decumbens.“

Obs. Ab hac specie vix satis distincta videntur *Ch. diversifolium*. Alph. DC. 7° not. pl. rar. Jard. Genev. p. 44, t. 8. et *Ch. ovatum* Lindl. in Bot. Reg. t. 1528. Cfr. Benth. in Hügel Enum. p. 28, n. 71.

5. **Chorozema (Euchorozema) angustifolium**
Benth. in Hügel Enum. p. 28, n. 72. Walpers l. c. p. 568.
Dillwynia? *glycinaefolia* Sm., DC. prodr. 2 p. 109, n. 9.
Bot. Reg. t. 1514!

In solo turfoso-arenoso ad Stirling's terrace, d. 22. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1127 et 1147. (fl. fr.)

„Suffrutex dodrantalis. *Vexillum* aurantiacum, alae carinaque coccineae.“
Folia 1/2 - 2-pollicaria, 1-2 rarius 2 1/2 - 3 lin. lata, basi constanter rotundata, subtus molliter pubescentia v. demum glabriuscula.

6. **Chorozema (Euchorozema) costatum** n. sp.,
ramulis pubescentibus; foliis subsessilibus, coriaceis, ellipticis v. lanceolatis linearibusve, costato-penninerviis, submarginatis, glaberrimis, margine seabriuseulis, apice acuto subrecurvo pungenti-mucronatis; racemis terminalibus, laxiusculis, paucifloris; calyce piloso, basi vix attenuato, lobis acuminatis.

α lanceolatum, foliis lanceolatis (semipollicaribus, 2 - 2 1/2 lin. latis.)

In solo sublimoso-glareoso ad radices montium continuorum Darling's-range (Perth) m. Sept. 1839 et 1841. Herb. Preiss. No. 1036, fl. fr. (Drummond n. 183.)

β lineare, foliis linearibus (1 lin. latis) longius mucronatis.

In arenosis district. Victoriae, d. 22. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 1039. (sine fl.)

γ brevifolium, foliis ellipticis, parvulis (2-3 lin. longis, 1 1/2 lin. latis) apice valde recurvis, brevissime mucronatis. —

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, m. Febr. 1841. fructif. Herb. Preiss. No. 1040.

„Frutex 1 1/2 pedalis.“

„Frutex 1 1/2 - 3-pedalis“, ramosissimus, ramis ramulisque gracilibus, ascendentibus, plerumque strictiusculis, satis dense foliosis, pube brevi adpressa canescentibus, demum glabris. *Stipulae* nullae. *Folia* sparsa, raro subopposita, rigida, laete viridia, margine tenui nerviformi sub lente parce denticulato-scabriusculo, nervo medio venisque primariis costaeformibus vix anastomosantibus utrinque prominulis, interstitiis haud reticulatis, mucrone terminali 1/2 - 3/4 lin. longo recto pungente. *Racemi* ramulos terminantes, 1 1/2 - 2 1/2 - pollicares, circ. 6-flori, laxiusculi, erecti, inferue nudi; pedicelli 1-2 lin. longi, bractea lineari minuta caducissima suffulti. *Calyx* 4 lin. longus; basi brevissime attenuata bibracteolatus, adpresse cano-v. rufo-pilosus, lobis tubo parum longioribus lanceolatis acuminatis subaequalibus, superioribus 2 paulo latioribus alte connatis. „*Corolla* coccinea“; vexillum calyce duplo longius, ungue brevi, lamina late suborbiculata (latiore quam longa) emarginata, basi macula pallidiore (lutea?) notata; carina valde curvata, obtusa (purpurca?) calyce valisque obovatis (purpurcis?) paulo brevior. *Ovarium* stipitatum, villosum, 8-ovulatum. *Stylus* brevis, incurvus, glaber; stigma subcapitatum, superne penicillo brevi albo barbato.

Legumen (jam apertum, vacuum) oblongum, turgidum, pilosiusculum, bivalve, 4-5 lin. longum. *Semina* . . . — Valde accedit ad *Orthotropidem pungentem* Benth., sed jam carina admodum incurva abhorret.

7. **Chorozema (Euchorozema) reticulatum** *n. sp.*, ramis gracilibus, superne pubescentibus; foliis petiolatis, lanceolatis, submarginatis, apice recto acutis vix mucronatis, glabris, margine scabriusculis, subtus reticulato-venosis; racemis terminalibus, longiuscule pedunculatis, laxis; calyce basi attenuato, adpresse cano-pilosiusculo, lobis lanceolatis vix acuminatis.

In solo subarenoso inter frutices densos prope montem Wuljenup (Plantagenet) d. 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1045.

„Frutex 1-2-pedalis.“ — Species a praecedente, cui habitu et foliorum magnitudine formaque simillima, distinguitur: foliis minus coriaceis, rectis, vix pungentibus, venis intra marginem arcuatim anastomosantibus, interstitiis plus minus reticulatis, petiolo $\frac{1}{2}$ -1 lin. longo, racemis longioribus 8-12-floris, pedunculi parte infera nuda 2-3- pollicari, pedicellis 2-3 lin. longis, calyce vix 3 lin. longo ejusque lobis vix acuminatis. Corollam, stamina et stigma non vidimus. Vexillum (teste Preiss. in sched.) retusum, basi sulphureum. Ovarium subsessile, pilosum, 10-ovulatum.

8. **Chorozema (Aciphyllum) Henchmanni** *R.Br.* in Bot. Reg. t. 986. Bot. Mag. t. 3607.

In confragosis summitatis montis Bakewell (York) m. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1048. (sine fr.)

„Frutex pedalis.“

9. **Chorozema (Aciphyllum) Baueri** *Benth.* in Ann. Wien. Mus. 2, p. 71. Walpers rept. 1, p. 568: ramis puberulis; foliis divaricatis, linearibus, pungentibus, margine revolutis, glabris, supra laevibus; floribus subsessilibus, folio subbrevioribus.

In limoso-lapidoso ad latus occidentale montis Bakewell (York) d. 8. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1037, sine fr. (Drummond n. 192.)

„Frutex 1-2-pedalis.“ *Radix* lignosa, crassa, ramosa, subflexuosa. *Folia* interdum fere pollicaria, rigidiora et paulo latiora quam *Ch. Henchmanni*, nunc patentissima v. deflexa, nunc semierecta. *Pedicelli* 1-2-raro 3 lin. longi. *Calyx* dimidio fere longior quam *Ch. Henchmanni*. *Corolla* (fide Preiss) sulphurea (in illo pallide carnea, caeterum simillima.)

Obs. Podolobium? aciculare DC. prodr. 2, p. 103, n. 6, quod jam cl. Benth. (l. c. p. 72.) „alteram hujus sectionis speciem“ esse suspicabatur, ex diagnosi saltem a speciminibus nostris *Ch. Baueri* distinguere nequimus.

10. **Chorozema (Aphyllon) daviesioides** *n. sp.*, ramosissimum, erectum, aphyllum, glabrum; ramis teretibus, costatis; ramulis folii rudimento squamaeformi adpresso acuminato suffultis, sulcato-4-6-angularis, apice mucronato-pungentibus; racemis terminalibus lateralibusque, subflexuosis, pedicellis brevibus, basi medioque bracteolatis; floribus nutantibus; calycis labio superiore trumeato, emarginato, brevissime 2-dentato, inferiore 3-fido; ovario 4-8-ovulato.

Daviesia ramulosa Benth in Lindl. Swan River p. XIV, n. 56?

• *a* **Preissianum**, calyce ovarioque glabris, pedicellis calyce multo brevioribus (plerumque vix 1 lin. longis).

In lapidosis montium cis oppidum York, d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1183. et in region. interior. Australiae occidentalis, d. 7. Mart. 1840. No. 1138.

β **Drummondianum**, calyce parce minuteque adpresso-puberulo, ovario setuloso-piloso, pedicellis calycem subaequantibus (2 lin. longis). — An species distincta?

In colonia ad fl. Cygnorum legit Jac. Drummond, n. 190.

Species insignis, habitu, praecipue ramificatione et foliorum genuinorum defectu *Jacksoniis Daviesisque* quibusdam similis, sed calycis forma discrepans et propter ovarium pluriovulatum *Eupodalyrieis* accensenda. A *Chorozemate* re vera habitu magis quam characteribus (sc. vix nisi calycis labio superiore subintegro) abhorret, quare generice eam separare non audemus. „Frutex 5-pedalis.“ *Ramuli* rigidi, steriles plerumque trifidi, ultimi $\frac{1}{2}$ -1-polliares, interdum minute gemmiferi, patentes, recti v. subrecurvi, angulis nerviformibus sub lente scabriusculis, apice sphacelato fusco nunc sensim acutato nunc subito in mucronem rectum pungentem semilineam longum excurrente. *Squamae* (foliorum rudimenta) ramis ramulisque arcte adpressae, 1-2 lin. longae, e basi triangulari latiuscula viridi carinato-costata in mucronem sphacelatum fuscum sensim abeuntes. *Racemi* summos ramulos terminantes, erecti, simplices v. ramosi, 6-10-flori, subsecundi, rhachi mutica ramulis simili subflexuosa; pedicelli 1-2 $\frac{1}{2}$ lin. longi, 2-3 lin. ab invicem distantes, singuli squamula sphacelata 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longa suffulti, patuli v. recurvi, glabri v. in *β* puberuli, prope medium bracteolis 1-2 minutis acutis muniti. *Calyx* subcampanulatus, basi angustatus, subnervis, 2 lin. longus, dimidium corollam aequans; labium superius inferiore paululum longius, latum, fornicatum, levissime repando-emarginatum (*Hoveae* morc fere truncatum) dentibus exiguis acutiusculis divergentibus, inferioris dentibus 3 subaequalibus triangularibus acutis $\frac{2}{3}$ lin. longis rectis. „*Corolla* aurantiaca“; vexillum late orbiculare, emarginatum, centro aureola atropurpurea venosa cincto marginibusque aurantiacis; alae vexillo paulo breviores, obovatae, basi brevissime auriculatae, aurantiacae, ungue falcato; carina alis brevior, ovata, ventricosa, obtusa, carnea? v. purpurascens? auriculis basilaribus minutis. *Annulus perigynus* dimidium fere calycis tubum vestiens. Genitalia calycem aequantia. *Filamenta* libera, complanata, glabra. *Ovarium* brevissime stipitatum, oblongum, stylo crassiusculo compresso glabro apice incurvo vix brevius, ovulis 4-6-8 estrophiolatis?, funiculis brevibus. *Stigma* obtusum, subcapitatum. *Legumen* (maceratione semidestructum) sessile, oblongum, turgidulum, 4-5 lin. longum, bivalve . . . . .

GOMPHOLOBIUM Sm. Endl. gen. n. 6432.

Meisn. gen. p. 81. (57.)

• I. Folia simplicia, solitaria, sparsa.

1. **Gompholobium ovatum** n. sp., glaberrimum, ramis angulatis compressisque; stipulis setaceo-linearibus, patentibus; foliis subsessilibus ovatis v. suborbicularibus, subcordatis, acutiusculis v. submucronatis, planis, penninerviis, supra reticulatis; pedunculis terminalibus, geminis, elongatis, me-

dio minute bibracteolatis; calyce dimidiam corollam aequante, carina nuda.

In arenosis sylvae prope oppidum Albany (Plantagenet) m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1105.

Suffrutex? ramis gracilibus subcompresso-triquetris, angulis linea nerviformi a foliorum insertionibus decurrente obsolete marginatis. *Stipulae* angustissime lineares, 1-1½ lin. longae, rectae v. recurvo-arcatae, pallidae, diu persistentes. *Folia* sparsa, coriacea, sessilia v. petiolo fusco vix ½ lin. longo fulta, late ovata v. quandoque subrotunda, integerrima, ½-1½ poll. longa, 6-14 lin. lata, pallide viridia, nunc obsolete attenuato-acuminata, nunc obtusa, mucronulo brevissimo obtuso (rarius nullo) terminata, basi rotundata v. leviter cordata, nervo venisque supra prominulis, subtus tenuibus subimmersis. *Pedunculi* terminales, 1-flori, gemini, aequales, sesqui pollicares, filiformes, erecti, singuli basi bractea solitaria lineari squamiformi 1-1½ lin. longa medioque bracteolis 2 illi similibus approximatis (ne oppositis) muniti. *Flores* speciosi, magnitudine fere *G. barbigeri*, calyce tantum paulo minore (5 lin. longo) vix dimidium vexillum aequante, basi ebracteolata, utrinque glaberrimo, profunde 5-partito, lobis obtusiusculis. *Vexillum* amplum, coccineum? *carina* calycem aequans, alis purpureis obovato-oblongis paulo brevior, obtusa, glaberrima, pallide carnea. *Legumen* . . .

2. **Gompholobium amplexicaule** *n. sp.*, glaberrimum; ramis gracillimis, superne subcompresso-angulatis; stipulis setaceis, minutis, recurvis; foliis subsessilibus, cordatis, semiamplexicaulibus, anguste ovato-oblongis, acutis, submucronatis, utrinque reticulatis; pedunculis axillaribus terminalibusque, solitariis geminisve, folia subaequantibus, basi et prope medium minute bracteolatis; calyce dimidiam corollam aequante, carina imberbi.

In arenosis sylvae prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 14. Oct. 1840.
Herb. Preiss. No. 1106.

„Suffrutex decumbens.“ *Rami* 1-2-pedales, subsimplices, fere filiformes, basi teretes, superne (praecedentis more, sed minus distincte) angulati. *Stipulae* vix 1 lin. longae, demum nigrescentes. *Folia* 1-1½ poll. longa, 2½-3½ lin. lata, e basi rotundata plus minus (nunquam tamen profunde) cordata sursum sensim attenuata (textura, colore et nervatione omnino praecedentis) margine (exsiccatione?) plerumque leviter recurva et subundulata. *Pedunculi* ½-1-pollicares. *Flores* praecedentis, sed ⅓ minores (maguit. *G. virgati* Sieb.) petalorum colore eodem. *Legumen* subglobosum, cerasi minoris magnitudine, laeve, prope suturas obsoletas tenuiter transverse venosum. *Sentina* 12-14, funiculis longiusculis.

II. Folia palmatum 3-v. rarius 5-foliata, petiolo nullo
v. obsoleto.

3. **Gompholobium marginatum** R.Br. DC. prodr. 2, p. 105. n. 5. Bot. Reg. t. 1490! — Variat petiolis, praecipue plantae junioris v. cultae vix 1 lin. et 2-3 lin. longis, pedunculis 1-floris et laxe racemoso-plurifloris.

In solo glareoso-sublimoso inter frutices prope oppidum Guildford, d. 8. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1107. (Drummond n. 219.)

„Suffrutex spithamaens. Flores sulphurei.“

4. **Gompholobium pedunculare** DC. l. c. n. 6. ²

Spina spinosa ex pl. oriental.

Gompholobium Stuartii Johnston

Novae Hollandiae (Terra Australiae felix) hb. St. 828.

G. polymorpho proximum,
sed omnibus partibus magis
validius, pedicellis foliis brevioribus
et vexillo carina parum
brevisiore discriminatur.

x! Gompholobium polymorphum R. Johnston
p. erectum Johnston, prope portum
cygnorum Tasmanniae, hb. St. 639.
G. latifolium Gunn. ex Stuart.

x! forma legalis diagnosi ex cultis quae datus
est. ^{in herb. St. 807} hb. St. 112. Johnston
in Johnston. hb. St. 140.

p. paniculatus Johnston, filialis tenuis
is finis subaequalis. forsan p. nov.
hinc stipulis pediculis obsoletis con-
gioribus foliis angustis distinguendum.
florum color variabilis.

Lottj-range hinc inde vulgare, h. St. 808.

Pl. Tasmannica distincta, an ex ea varietas
melius ad G. grandiflorum vel tetratheri-
um ^{non minus} ~~subaequalis~~ an specificè separanda?

G. uncinatum
ell. Cunningham

In solo turfoso inter frutices densos haud longe a monte Wuljenup (Plantagenet) d. 14. Oct. Herb. Preiss. No. 1112. et in arenosis district. Kent, d. 19. Nov. 1840. No. 1113. (Drummond, n. 221.)

„Suffrutex vix pedalis.“ Foliola etiam foliorum superiorum saepe obovata.

Obs. Specimina Drummondiana recedunt foliorum inferiorum foliolis spatulatis, sc. ratione longitudinis angustioribus (5 lin. longis, vix $1\frac{1}{2}$ lin. latis); accedunt igitur ad *G. latifolium* Sm., quod tamen differt petiolis paulo longioribus, foliolis omnibus conformibus obtusis, carina fimbriata, caet. — *G. venulosum* Lindl. Bot. Reg. t. 1574. a nostra planta vix differt, nisi foliis nunquam (?) obovatis, stipulis petiolo longioribus, pedunculis paulo brevioribus, petalis omnibus concoloribus vitellinis.

5. **Gompholobium tenue** Lindl. in Bot. Reg. t. 1615. Walpers repert. 1, p. 568: glaberrimum, caulibus filiformibus laevibus; foliolis 3 linearibus, angustissimis, mucronulatis, margine revolutis; floribus solitariis, pedunculatis; vexillo emarginato, carina imberbi duplo longiore.

In limoso-calculosis sylvae ad radices jugi montium Darling's-range (Perth) d. 2. Nov. (No. 1109, ex parte) in limosis sylvae prope fl. Vasseriver (Sussex) d. 24. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1111, et in regionibus interior. Australiae meridionali-occident., m. Oct. 1840. No. 1114. (Drummond n. 222: et coll. 1 sine No.)

?*β* **volubile** nob., caulibus volubilibus, stipulis (2-2½ lin. longis) foliolisque longioribus (plerumque sesquipollicaribus). An spec. distincta? (Herb. Preiss. No. 1109 ex parte.)

Species admodum variabilis, a praecedente, cui foliis superioribus floribusque simillima, distinguenda foliis omnibus conformibus et petalis concoloribus vitellinis. Suffrutex (v. „herba perennis.“ fide Preiss in sched. No. 1109.) nunc digitalis, (No. 1114.) nunc pedalis. *Caules* graciles, tenues, striati v. rarius fere laeves, crecti v. (in speciminibus nonnullis sub No. 1109, a reliquis caeterum non distinguendis) volubiles! *Stipulae* 1-rarius 2-2½ lin. longae. *Petioli* nunc (No. 1114.) fere nulli, nunc 1-2-rarius 3 lin. longi. *Foliola* ½-1-rarius (in 1109.) 1½-pollicaria, supra obsolete transverse venulosa v. interdum (No. 1109.) laevia. *Bracteolae* superiores nunc calyci proximae, nunc in medio fere pedicelli sitae. *Carina* alaeque apice et interdum (in specim. Drummondianis nonnullis) etiam vexillum purpurea. *Legumen* brevissime stipitatum, ovato-subglobosum, magnit. cerasi minoris, glabrum, tenuiter denseque transverse venoso-lineatum, sutris nerviformibus. *Semina* 16, ovalia, subcompressa, cinerea, umbilici lateralis oblongi margine tumidulo diaphano rugoso, funiculis rectis 2 lin. longis strophiole obsoleta emarginato-biloba subcapitata. — Var. *β* forsan distinctam speciem sistit, sed specimina nostra ad eam rite definiendam insufficientia sunt et ab ipso lectore a reliquis haud distincta fuerunt. In specim. Drummond. (coll. 1) ramuli interdum etiam subvolubiles videntur.

6. **Gompholobium polymorphum** R.Br. DC. l. c. p. 106, n. 8. Bot. Mag. t. 1533. — *G. grandiflorum* Andr. Bot. Repos. t. 642. (non Sm.)

In subarenosis umbrosis sylvae prope oppidum Albany, d. 22. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1108.

„Herba 4-pedalis.“ Caulis filiformis, volubilis!

7. **Gompholobium burtonioides** n. sp., ramis ramulisque teretibus, laevibus, puberulis, demum glabris; stipulis minutis, deciduis; foliis subsessilibus, inferioribus 3-, summis 5-foliolatis, foliolis anguste linearibus v. sub-

- spathulatis, obtusiusculis, muticis, margine revolutis, supra ciliato-pilosiusculis demum glabris; capitulis terminalibus, sessilibus, paucifloris; calycis pubescentis corolla vix dimidio brevioris lobis breviter aristato-acuminatis.

α subspathulatum, foliolis lineari-subspathulatis.

In arenosis prope oppidum Albany, m. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1100.

- *β subacerosum*, foliolis angustissime linearibus.

In region. interior. Australiae merid.-occid., m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1193.

„Frutex $\frac{1}{2}$ -1-pedalis,“ erectus, a basi ramosus; rami adscendentes, subvirgati, graciles, dense foliosi. *Petiolus* foliorum inferiorum vix ullus, denticuliformis, summorum $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ lin. longus. *Foliola* 3-6 lin. longa, in *α* $\frac{2}{3}$ lin. longa, in *β* dimidio angustiora, 1-nervia, supra obsolete venosa. *Flores* 3-6 in capitula terminalia approximati, raro solitarii, pedunculis 1-2 lin. longis. *Calyx* 3-4 lin. longus, laxiuscule cano-pilosiusculus, lobis apice in aristam mollem 1 lin. longam attenuatis. *Petala* vitellina, concolora?; carina rubescente? imberbi calycem subaequante vexillo duplo brevior. *Legumen* subglobosum, calycem vix superans, pisi magnitudine, glabrum, 8-spermum. — Valde accedere videtur ad *G. aspalathoides* Cunn. (Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 72) quod differt: ramulis angulatis, foliis omnibus 3-foliolatis, floribus subracemosis et vexillo carinam vix superante. — Affine etiam *G. capitatum* Cunn. et *G. aristatum* Benth. l. c., sed ab utroque differt foliolis tantum 1-2-jugis, venosis, muticis, carina laud ciliata, et a posteriore insuper floribus pedunculatis, calycibus corolla multo brevioribus, breviter aristatis, caet.

III. Folia pinnata, rhachi conspicua, foliolis 2-multijugis cum impari.

8. ***Gompholobium aristatum*** Benth. in Hüg. enum. p. 29, n. 77; Ann. Wien. Mus. 2, p. 72. Walpers repert. 1, p. 569, foliis petiolo brevissimo 3-7-foliolatis; foliolis lineari-subulatis, rigidis, mucronatis, margine revolutis; floribus in axillis superioribus subsessilibus, calycibus longe aristatis corolla parum brevioribus legumen subaequantibus, carina ciliata.

α hispidum Benth. l. c.

In arenosis secundum fluv. Cygnorum prope oppidum Freemantle, d. 17. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1199.

Specimina nostra a descriptione l. c. recedunt foliolis 5 v. rarius 3 (nuncquam 7) floribus terminalibus solitariis (nec axillaribus) et carina brevissime ciliata. Caet. exacte congruunt. De identitate igitur vix dubitandum. — „Frutex 2-pedalis.“ Stipulae setaceae. Foliorum insertio transverse semilunaris, pallida. „Flores vitellini.“

9. ***Gompholobium capitatum*** Cunn. mss. Bot. Reg. t. 1563! Walp. l. c. p. 568; pilosum, foliolis 3-4-jugis, subulato-linearibus, mucronatis, supra laevibus, rhachi interdum subnulla; floribus capitatis, calycibus hirsutis, carina ciliata.

In arenosis sylvae district. Sussex, d. 17. Dec. 1839. (No. 1201 et in solo subterroso-arenoso inter frutices ad Stirlingsterrace, m. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 1200.

X
G. uncinatum Lessingham
G. galiophyllum! *frut. Mitt.*

frut. propria non varietas G. poly-
morphi, quod ^{seemiana} ~~fruticulis~~ longi-
coribus, caulibus glabrisculis
pubescentibus stipulis ^{longis} ~~longis~~ aequilungis
differt et vix a Brunonianis ^{di-}
versum etiam ^{habitus} ~~habitus~~ vix dilis
& florum color ^{congruit} ~~congruit~~.

Etiam G. polymorphum et ~~frutic-~~
theoidem inferre nescimus!

maxillum intus ^{calis} ~~calis~~ luteum v.
sub sanguineum aut aurantiacum
lapi luteum! Carina luteo-al-
bida extus apice nigro-virex-
sans lapi luteola.

Fruticul. prostratus. In mon-
tibus Lottz, range virens
pl. Oukajiranga. Dec. 28. 1848.
In umbrosis ^{perilioribus} ~~perilioribus~~
montanis ^{Dr. M.} ~~Dr. M.~~ Barkri-
kand ubique Mart. 1849. ^{frut.} ~~frut.~~
Synala calycis lobi denique reflexi.
Variat corolla atrata vel ra-
ris vexilla intus ^{scarlatina} ~~scarlatina~~

x *Gompholobium capitatum* Linn.
    macropetalum Jussne.
    corollae (discolore?) calycem breviter
    aristatum superante.
    Stipulae spithameae, simplicissimae
    quam e femine ad fl. ⁱⁿ virginum colonia
    Australasica Novae Hollandiae
    austro-occidentali collecta
    eduxit v. L. L. Stuart. Hb. St. 779

„Frutex pedalis et ultra, strictus.“ *Rami* teretes, laeves, minute puberuli. *Stipulae* setaceae, albae, $\frac{1}{2}$ -1 lin. longae, deciduae. *Petioli* cum rhachi 2-rarius 3-4 lin. longi, quandoque brevissimi. *Foliola* 7, rarius 9 v. 5-3, subfiliformia, 2-8 lin. longa, vix rigidula, nunc breviter setaeo-mucronata et interdum subuncinata, nunc (No. 1201.) mutica, pilis albis tenerimis laxis 1 lin. longis ciliata (juniora fere arachnoidea) demum glabra. *Capitula* plerumque, 3-flora, rarius pluri-v. 1-flora. *Calyx* dense cano-villosus, pedicello longior v. subaequalis, 3 lin. longus, lobis arista $1\frac{1}{2}$ lin. longa acuminatis petala paulo superantibus. *Petala* vitellina, concolora, carina vexillo brevior breviter denseque albo-ciliata. *Legumen* subglobosum, laeve, 8-spermum, magnit. seminis *Viciae* sativae. *Semina* pallida, flava. — A *G. aristato* distinguitur praecipue petiolo conspicuo, foliis tenuioribus minus rigidis et corolla calycem haud superante.

10. **Gompholobium Shuttleworthii** *n. sp.*, ramulis teretibus, puberulis; stipulis obsoletis; petiolo brevissimo, foliolis 5 (raro 7 v. 3) filiformibus, obtusiusculis, submuticis, margine revolutis, laevibus, glabris; racemis terminalibus capituliformibus, pedunculatis, 3-6-floris, alabastris carinato-5-gonis; calycis lobis acutis, muticis, extus glabris, intus ad marginem pubescentibus, corolla parum brevioribus, carina minute ciliata.

In calciosis ad radices jugi montium Darling's-range (Perth) d. 17. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1178. (Drummond n. 200 et coll. 1 sine No.)

„Frutex $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ -pedalis,“ a basi ramosus, ramis erectis gracilibus satis dense ericoideo-foliosis. *Stipulae* lineares, semilineam longae, fugaces. *Petiolus* $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ lin. longus. *Foliola* rigidula, $2\frac{1}{2}$ -5 lin. longa. *Pedunculus* communis $\frac{1}{2}$ -1 poll. longus, nudus; pedicelli apici approximati, 2 lin. longi, bractea parum brevior lineari subpersistente fulti. *Calyx* $2\frac{1}{2}$ -3 lin. longus, atropurpureus (in sicco nigricans), ante expansionem ovatus breviter acuminatus, basi vix attenuata bracteolis 2 linearibus sinus attingentibus 1 lin. longis munitis, lobis obsolete 1-nerviis aestivatione valvata marginibus contignis in carinam prominentibus, unde alabastra egregie pentagona videntur. *Petala* „rubro-purpurea,“ breviter unguiculata; vexillum suborbiculare, leviter emarginatum, calyce $\frac{1}{3}$ v. vix dimidio longius, basi purpureum; carina falcato-oblonga, apice rotundato purpurea, margine superiore minute albo-ciliata, alas obtusas dimidio angustiores calyceque subaequans. *Genitalia* glabra. *Ovarium* breviter stipitatum, 4-ovulatum, stylo filiformi falcato acuto. *Legumen* subglobosum, valvis transverse tenuissime venulosis, suturis obsoletis. *Semina* (immutata) ovalia, pallida, fimbriis vix 1 lin. longis. — Acedit ad *G. glabratum* DC. (Sieber n. 362!) sed foliolis fere teretibus, inflorescentia maximeque calyce angulato abunde distinctum.

11. **Gompholobium viscidulum** *n. sp.*, ramis subangulatis, glabris, glutinoso-viscidulis; stipulis obsoletis; foliis pinnatis, petiolatis, jugis distantibus; foliolis 5-9 filiformibus, apice obtusiusculo mutico subuncinatis, margine revolutis, laevibus, glabris v. parce ciliato-pilosiusculis; floribus terminalibus, solitariis, breviter pedunculatis, alabastris sub-5-gonis; calyce mutico, glabro, dimidiam corollam aequante, carina nuda?

In glareoso-lapideosis ad latera collium Konkoberuphills (Kent) d. 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1196.

Praecedenti habitu, foliorum florumque forma et magnitudine et legumine simillimum, sed notis indicatis, praecipue foliorum rhachi 3-4 lin. longa,

foliolorum jugis lineam ab invicem distantibus inflorescentiaque facile distinguendum. A *G. uncinato* Cunn. differt foliis pinnatis petiolatis, foliolis duplo longioribus minus uncinatis, floribusque. — „Frutex sesquipedalis, foliis viscosis.“

12. **Gompholobium venustum**, *R.Br.*, DC. prodr. 2. p. 106, n. 11. (non Reichenb. ic. exot. 1. p. 54, t. 76, quae certe ad *G. pinnatum* Sm. spectat!)

In solo torfoso-arenoso inter frutices densos planitiei prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 5. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1102.

„Flores incarnati.“ *Calyx* dimidiam corollam superans, brevissime acuminatus. *Legumen* subglobosum, pisi magnitudine, brevissime stipitatum, glabrum.

13. **Gompholobium tomentosum** *Labill.* Nov. Holl. 1. p. 106, t. 134! DC. l. c. n. 9. Bot. Reg. t. 1474.

In arenosis circa oppidum Perth, d. 20. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 1198. (Drummond No. 202.)

„Frutex 1-3-pedalis. Flores sulphurei.“

14. **Gompholobium Preissii** *n. sp.*, molliter laxaque pilosiusculum, stipulis minutis; foliis pinnatis, 6-8-jugis, rhachi longiuscula, foliolis anguste linearibus, margine revolutis, acutiusculis v. minute mucronulatis, apice paulo dilatatis saepiusque recurvis, punctato-scabriusculis, terminali caeteris brevior saepius latiore obtusoque; capitulis terminalibus 3-1-floris, sessilibus, foliis superatis, floribus breve pedicellatis; calyce piloso, corollam dimidiam superante, lobis breve setacco-acuminatis, carina imberbi.

In solo subtorfoso-arenoso inter frutices ad Stirling'sterrace, m. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1194. (Drummond n. 201.)

Praeter notas indicatas praecedenti simillimum. — „Frutex 1-2-pedalis, strictus.“ Specimina Drummondiana fruticosa, semipedalia; Preissiana vero herbacea? digitalia, radice simplici, caule a basi diffuse ramoso. *Stipulae* subulatae, $\frac{1}{2}$ -1 lin. longae. *Folia* subsessilia, plerumque 14-foliolata, rhachi 3-7 lin. longa, foliolis jugorum superiorum 3-6 lin. longis $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ lin. latis, infimorum et terminali (apice saepe 1 lin. lato) dimidio brevioribus, plerisque propter mucronulum minutum recurvum obtusa mentientibus. *Flores* paulo minores, sed (in sicco saltem) ejusdem coloris ac *G. tomentos*.

15. **Gompholobium Knightianum** *Lindl.* in Bot. Reg. t. 1468! Walpers repert. 1. p. 568: glabrum, foliis petiolatis; foliolis 3-15, subrotundis obovatis ovatis linearibusque, mucronatis; cymulis terminalibus, pedunculatis, foliorum longitudine.

G. heterophyllum Cunn. in G. Don gen. syst. 2, p. 118.

In limoso-arenosis montis Bakewell (York) d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1104. et in subarenosis sylvae prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 22. Sept. 1840. No. 1103. (Drummond n. 220. et coll. I. sine No.)

„Suffrutex $\frac{1}{2}$ -1-pedalis.“ Flores et legumina *G. venusti*, paulo tantum minora.

Subtribus II. Pultenaeae, Benth. in Hügel Enum. p. 30;
Ann. Wien. Mus. II, p. 73.

BURTONIA R.Br. Endl. gen. n. 6423. Meisn.
gen. p. 81. (58.)

I. Folia trifoliolata; pedicelli axillares, ad apicem ramorum
glomerati, Benth. l. c.

1. **Burtonia scabra** R.Br. DC. prodr. 2, p. 106, n. 1.

In solo turfoso-arenoso circa oppidum Albany (Plantagenet) d. 21. Sept., et floribus albis d. 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1177.

„Frutex 3-pedalis.“ Flores interdum albi. Legumen subglobosum, pubescens, magnit. nuclei cerasini.

2. **Burtonia pulchella** n. sp., ramis laevibus, apice puberulis, mox glabris; foliolis laevibus, glabris, angustissime linearibus, obtusis, muticis, rectis, margine revolutis; pedunculis axillaribus, folio brevioribus, calycem aequantibus, basi medioque 2-bracteolatis, calycis lobis margine intus pilosiusculis.

In arenosis sylvae inter oppida Perth et Guildford, d. 28. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1173. (Drummond n. 199.)

Praecedenti simillima, sed distincta glabritie, foliolis laevibus obtusioribus, vix ac ne vix uncinatis, perfecte sessilibus, basi haud angustatis, et legumine plus dimidio minore, glabro. — „Frutex 2-pedalis, strictus. Flores roseo-violacei.“

3. **Burtonia villosa** n. sp., ramis foliis calycibusque breviter villosis; foliolis breviter petiolulatis, lineari-subulatis, obtusiusculis, muticis, margine revolutis, demum glabrescentibus punctato-scabris; pedunculis axillaribus, folia subaequantibus, calyce brevioribus, basi medioque bracteolatis.

In subarenosis sylvae prope montem Wuljennup (Plantagenet) d. 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1172.

Facies *B. scabrae*, sed facile distinguenda ramorum foliorumque pubescentia fortiore et longiore, foliis paulo crassioribus brevioribusque, 4-5 lin. longis (in illa saepius 6-7 lin. longis) nunquam uncinatis, floribus majoribus (pro genere maximis, speciosis) calyce 4 lin. (in illa vix 3 lin.) longo extus undique sed breviter subsericeo-villoso. — „Frutex 6-pedalis.“ *Calyx* viridis, ultra medium 5-fidus, lobis oblongo-lanceolatis acutis aequilongis, superioribus 2 paululum latioribus et altius connatis. *Vexillum*, amplum 6-7 lin. longum et paululum latius, suborbiculare, emarginatum, persicinum, basi medio luteum; ungue sesquilineam longo; *alae* parum breviores, obovato-oblongae, persicinae, basi luteae et utrinque breviter auriculatae; *carina* alis paulo brevior, obovata, acutiuscula, carnea, apice purpurascens, margine superiore recto, inferiore valde curvato. *Filamenta* filiformia, glabra, rufa, pistillum aequantia, carinam subsuperantia, antheris oblongis. *Stylus* inferne valde dilatatus, compressus, margine superiore ciliatus, apice filiformis glaber, stigmatibus subcapitato minuto glabro. *Legumen* *B. scabrae* (insecti cujusdam e Hymenopterorum ordine exuvias includens: semina destructa).

II. Folia simplicia, sparsa; corymbi terminales. Benth. l. c.

4. **Burtonia conferta** DC. prodr. 2, p. 106, n. 4. Benth. in Hüg. enum. p. 30. Bot. Reg. t. 1600.

In arenosis sylvae cis oppidum Guildford et ad radices jugi montium Darling's-range, d. 17. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1174; in arenosis inter frutices humiles vallis prope Two-peopled Bay No. 1175. et clivuli ad portum Princess Royal Harbour No. 1176. nec non ad promontorium Cape Riche No. 1179. m. Nov. 1840. (Drummond n. 197, 198 et coll. I sine No.)

„Frutex 1-2-pedalis. Folia interdum No. 1176. purpurascentia. Flores No. 1175. coerulei.“ — Variat foliis 3-10 lin. longis, nunc tenuiter filiformibus, nunc crassioribus, corymbis laxiusculis contractisque, pedicellis 3-10 lin. longis. *Legumen* globosum, magnit. pisi, glabrum.

5. **Burtonia diosmaefolia** Benth. in Hüg. enum. p. 30, n. 82; Ann. Wien. Mus. 2, p. 73. Walpers repert. 1, p. 569: foliis confertis, oblongo-linearibus lanceolatisve, obtusis, crassis, carinatis ramisque glabris; floribus capitato-corymbosis, calycibus leguminibusque pilosissimis.

In solo turfoso-arenoso prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 13. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 857. et in limoso-arenosis sylvae ad fluv. Avon, 10 mill. ab oppido York, d. 10. Sept. 1839. No. 858.

„Frutex 1-sesquipedalis. Vexillum flavum, alae carinaque rubro-purpureae.“

β **glabrescens** nob., pedicellis calycibusque glabrescentibus glabrisve.

In arenosis ad Sinum Regis Georgii III., d. 7. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 883.

6. **Burtonia? tenella** n. sp., glaberrima; caulibus prostratis, gracillimis, ramosissimis, ramis filiformibus; foliis angustissime linearibus, acutis, subcarinatis; corymbis 3-1-floris, floribus parvulis; calyce profunde 5-partito, lobis setaceo-linearibus aequalibus; legumine subsessili, lanceolato, compresso, tenuiter marginato, parce adpressequ pilosiusculo.

In arenosis inter frutices prope oppidum Perth, d. 4. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 878.

An novum genus? Praeter habitum tamen et praecipue leguminis formam cum *Burtoniae* characteribus bene convenit. — „Suffrutex prostratus.“ Caulis sesquipedalis et ultra, a basi inde ramosus, penna corvina vix crassior, teres, laevis; rami multo tenuiores, filiformes, internodiis 2-4 lin. longis (in caule saepe duplo longioribus). *Folia* sparsa, simplicia, exstipulata, semipatentia, 2-4 lin. longa, vix $\frac{1}{3}$ lin. lata, complicato-canaliculata, rigidula, acuta, margine sub lente parce punctato-scabriuscula. *Pedicelli* terminales gemini, rarius terni v. solitarii, 2-4 lin. longi, subaequales, erecti, nudi v. infra medium bracteolis 2 oppositis setaceis fugacissimis muniti. *Flores* vix 3 lin. longi. *Calyx* corolla circ. $\frac{1}{3}$ brevior, viridis, fere regularis, lobis lineari-setaceis erectis carinatis basi paululum dilatatis tubo turbinato duplo longioribus, infimo caeteris paulo longiore, sinibus acutiusculis extorsum in denticulum exiguum saepe sphacelatum plicato-prominulis. *Petala* lutea, brevissime unguiculata; vexillum ovatum, obtusum, integrum; alae carinaque aequales; rectiusculae, oblongae, obtusae, supra basin vix auriculatae, vexillo parum breviores. *Filamenta* libera, glabra. *Ovarium* subsessile, sericeo-pubescent, 2-ovulatum. *Stylus* capillaris, incurvus, glaber, ovario

longior, basi vix dilatatus, stigmatе acutiusculo. *Legumen* brevissime stipitatum, 3-4 lin. longum, 1 lin. latum, lanceolatum, rectum, breviter acutеque acuminatum, pilis brevibus adpressis parce conspersum, valvis parum convexis, suturis tenuibus nerviformibus. *Semina* estrophiolata (immatura).

JACKSONIA R.Br. Endl. gen. n. 6434. Meisn. gen. p. 81. (58.)

1. **Jacksonia floribunda** Endl. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 197; nov. stirp. decad. 1. p. 76, n. 87. Walpers rep. 1. p. 569: ramulis sterilibus compressis (phyllodia referentibus) oblongis, basi cuneatis, sinuato-dentatis, utrinque venosis glabris; floribus racemosis, calycibus sericeis corolla longioribus; legumine stipitato.

In arenosis supra oppidum Guildford (Perth) d. 20. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 811 et 812.

„Frutex 2-4-pedalis, erectus.“

J. densiflora Benth. in Lindl. Swan River p. XIII., n. 44, ab hac vix satis distincta videtur.

2. **Jacksonia alata** Benth. in Hügel enum. p. 30, n. 83; Ann. Wien. Mus. 2, p. 74. Walpers l. c., ramis ramulisque subangulatis, bialatis, inermibus, apice sericeis; floribus subsessilibus, racemulosis; calycibus corolla longioribus sericeis; legumine sessili.

In colonia ad fl. Cygnorum legit Jac. Drummond (coll. I, sine No.)

Ramuli stricti v. rarius hinc inde obsolete flexuosi, $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ lin. lati. *Calyx* basi minute bibracteolatus, nec (ut a cl. Benthiam describitur) ebracteolatus.

β **flexuosa nob.**, ramulis egregie flexuosis, compressissimis, foliaceo-bialatis (1-2 lin. latis.) — An distincta species? — sed praeter notam indicatam omnia *J. alatae*.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1119. (Drummond n. 193 et coll. I, sine No.)

3. **Jacksonia Sternbergiana** Hügel Bot. Archiv t. 3! Benth. l. c. n. 84. Walpers l. c., ramis laxе divaricatis; ramulis alternis, angulatis, glabriusculis, apice spinescentibus; floribus lateralibus, laxе racemosis; legumine longiuscule stipitato, ventricosо.

In arenosis ad fluv. Cygnorum, d. 16. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1076. (Drummond coll. I.)

„Aboriginibus *Käbbur*. Frutex 4-12-pedalis, ramis pendulis.“ *Ramuli* steriles ultimi 1-1 $\frac{1}{2}$ -pollicares, stricti, pungentes. „*Flores* aurantiaci.“ *Calyx* autе expansionem 4 lin. longus, obovato-oblongus, brevissime acuminatus, teres, (sepalorum marginibus inconspicuis vel obsoletissime promi-nulis) glaber. *Stamina* aptera! *Ovarii* stipes 1 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$ lin. longus.

β **puberula, nob.**, summitatibus calycibusque (leviter 5-costatis) minute sericeo-puberulis (pedicellis interdum vix 2 lin. longis.) — An species distincta? (Vidimus specimen unicum, insufficiens.)

In porrectis arenosis sylvac prope Bassandeen ad fluv. Cygnorum, d. 23. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 1072.

„Frutex 2-pedalis.“

γ **filicaulis nob.**, glaberrima, ramis ramulisque tenuissimis, angulato-filiformibus (vix $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ lin. crassis) debilibus. — An n. sp.?

In colonia ad fl. Cygnorum legit Drummond, No. 260.

4. **Jacksonia sericea Benth.** l. c. n. 85. Walpers l. c.: ramulis brevissimis spinescentibus ramisque angulatis pubescentibus; floribus solitariis geminis v. subracemosis, bracteolis infra apicem pedicelli, calycibus sericeis; legumine brevissime stipitato, ventricoso.

In arenosis inter frutices ad lacus prope Woodman's point (Perth) d. 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1158.

„Frutex adscendens, divaricatus.“

5. **Jacksonia gracilis n. sp.**, ramis teretibus, striatis ramulisque angulatis gracillimis minute cano-puberulis, sterilibus indivisis inermibus; floribus laxe racemosis, subsecundis, pedicellis calyce dimidio brevioribus infra apicem bibracteolatis; calycis sericei lobis tubo triplo longioribus, linearibus, brevissime acuminatis, erectis; ovarii villosi stipite calycis tubum parum superante.

In arenosis circa oppidum Perth, d. 29. Nov. 1839.

„Aboriginibus *Waljumei*. — Frutex decumbens.“ — An *J. sericeae* var.? Differt tamen ramis gracilioribus, minus acute angulatis, inferne teretibus, ramulis subfiliformibus debilibus fere omnibus floriferis, sterilibus abbreviatis spinescentibus vix ullis, floribus paululum majoribus, 4 lin. longis (in illa 3 lin. longis) magis sericeis, calycis laciniis demum egregie convolutis vix $\frac{1}{4}$ lin. latis. *Filamenta* aptera. *Legumen* non suppetit.

6. **Jacksonia dumosa n. sp.**, tota subsericeo-puberula; ramis teretibus, striatis, junioribus angulatis, sterilibus ditrichotomis indivisisve mucronato-pungentibus; floribus ad ramulorum apicem racemosis, majusculis; pedicellis calyce quadruplo brevioribus, apice v. medio bibracteolatis; calycis lobis semierectis; ovarii villosi stipite calycis tubo brevissimo duplo longiore.

In arenosis ad fluv. Cygnorum, d. 13. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1081. in calcareo-arenosis district. Wellington, m. Dec. 1839. No. 1069, in solo sublimoso distr. Hay, m. Oct. 1840. No. 1070. et in solo humoso ad ostium fl. King'sriver (Plantagenet) d. 25. Nov. 1840. „Frutex 2-3-pedalis. No. 1071.“

β **glabrata**, ramis ramulisque (tenuibus, plerumque divaricato-2-3-fidis rigidis) glabratissimis, floribus sericeis.

„In Australia occidentali“ Herb. Preiss. No. 1075.

„Frutex 12-18-pedalis,“ ramosissimus, ubique (v. in β calyce tantum) eodem modo puberulus ac *J. sericea* et *gracilis*, ramis validis, strictis, ramulis sterilibus erectis v. demum squarroso-divaricatis, compresso-angulatis, $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ lin. latis, in mucronem spinescentem rectum fuscum excurrentibus, nunc valde rigidis spiniformibus, nunc tenuioribus vix rigidis, forma et magnitudine variis, 3-12 lin. longis, aliis indivisis, aliis furcatis v. bis bifi-

Jacksonia Riccartiana Lindmu

Fragmenta vidi plantae
e femine in Australia sebie
colleto cultae a C. Ric-
carti communit. vultu J.
Keruburgiana et nifi spinosa
max. ^{nucosa} cognata. hb St. 750.

dis trifidisve, crure medio indiviso, lateralibus 2-3-fidis. *Flores* „aurantiaci“, magnitudine et forma fere *J. Sternbergianae*, sed pedicelli multo breviores et calyx extus sericeus ante expansionem subpentagonus, lacinii vix acuminatis. *Ovarii* fulvo-villosi stipes $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longus. — Valde accedere videtur ad *J. furcellatam* DC., quae discrepat ramulis inermibus omnibus (?) furcellatis. A *J. gracili* et *sericea* distinguitur floribus circ. $\frac{1}{3}$ majoribus, calycis lobis latioribus planisque et praecipue ramulis sterilibus plerumque 2-3-fido-ramosis; a *J. spinosa* denique, cui ramulorum sterilius forma proxime accedit, differt ramis pubescentibus, floribus plus duplo majoribus et ovario longius stipitato *).

7. **Jacksonia spinosa** R.Br., DC. prodr. 2, p. 107, n. 2. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 74. — *Gompholobium spinosum* Labill. Nov. Holl. 1, p. 107, t. 136! (Lam. ill. t. 949, f. 4.)

In clivulis arenosis ad sinum Two-peopled Bay, d. 23. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1074.

„Frutex 3-4-pedalis.“ *Rami* ramulique glabri, juniores tantum minutissime puberuli. *Flores* paululum minores quam in icone citata et *legumen* subfalcatum. De identitate tamen vix dubitandum.

8. **Jacksonia horrida** DC. l. c. n. 3. Benth. l. c.

In arenosis circa oppidum Albany (Plantagenet) d. 23. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1080.

„Frutex 5-pedalis.“ *Rami* validi, fortiter costato-angulati, apice acute triquetri, pube brevi cano-villosi v. demum glabri; steriles folia simulantes, crasse coriacei, rigidissimi, $\frac{1}{2}$ -fere $1\frac{1}{2}$ lin. lati, in mucronem rectum fuscum abeuntes, trifidi (raro indivisi) cruribus plerumque semipollicaribus lanceolato-linearibus nervo excentrico valido subtus carinatis quasi triquetris, lateralibus divaricatis saepe furcatis. *Flores* fere *J. dumosae*, sericei. *Calyx* 4 lin. longus, pedicello fere duplo longior; lobis planis, brevissime acuminatis, corallam parum superantibus, demum reflexis. *Petala* subaequilonga, vexillo alisque aurantiacis, carina purpurascente. *Filamenta* aptera. *Ovarium* villosum, stipite calycis tubum superante circ. 2 lin. longo. *Legumen* oblongum, turgidum, 4-5 lin. longum, arcuatum, puberulum v. demum glabrescens, intus minutissime puberulum, epicarpio ab endocarpio demum facile secedente.

9. **Jacksonia capitata** Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 74, n. 9. Walp. l. c.: ramis ramulisque inermibus, aphyllis, teretibus, striatis, subglabris; floribus ad apicem ramorum capitato-corymbosis; calycibus pubescentibus, corollam aequantibus, sub-5-partitis.

In solo sublimoso-glareoso district. Peel; m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1078.

*) Eiusdem affinitatis nova sp. est: **J. hakeoides** nob., ramis ramulisque teretibus, leviter striatis, demum glabris, sterilibus rigidis 2-3-fidis, cruribus divaricatis pungenti-acutis mucronatisve plerumque iterum 2-3-fidis; floribus ad apicem ramulorum racemosis; pedicellis calyce triplo brevioribus, prope apicem bibracteolatis; calycis extus fulvo-villosi lobis breviter acuminatis, patulis; ovarii villosi stipite calycis tubum brevissimum vix superante. In colonia ad fl. Cygnorum legit Jac. Drummond, n. 261. Species insignis, a praecedentibus distincta praecipue ramis ramulisque (immo sterilibus) teretibus v. vix ac ne vix compressiusculis $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ lin. crassis (duplo crassioribus quam *J. dumosae*) leviter v. obsolete sulcato-striatis (folia **Hakearum** et **Petrophilarum** quarundam imitantibus.) *Flores J. dumosae*, calyce tantum pubo longiore et laxiore villosinsculo.

„Suffrutex vix pedalis,“ caespitoso-multicaulis, caulibus ramisque erectis v. adscendentibus, debilibus, filiformibus, levissime striatis, subsericeo-incanis, demum glabratis. *Capitula* plerumque 3-flora, pedicellis vix lineam longis bractea minuta ovata acuta fusca suffultis. *Calyx* $2\frac{1}{2}$ lin. longus, basi adpresse bibracteolatus, sericeo-villosus, profunde 5-partitus, lobis linearibus planis breviter acuminatis semipatentibus. *Filamenta* aptera. *Ovarium* subsessile.

10. **Jacksonia restioides** *n. sp.*, aphylla, ramis ramulisque inermibus, teretibus, leviter sulcato-striatis, subsericeo-incanis, demum glabrescentibus; racemis terminalibus, laxe paucifloris; floribus majusculis, subsecundis, brevissime pedicellatis; calyce sericeo-villoso, basi valde attenuata bracteolis 2 lanceolatis cuspidatis adpressis munito, 5-partito, lobis lanceolatis acuminatis erecto-patulis vexillo brevioribus alas carinamque superantibus, filamentis apteris, ovario stipitato.

In arenosis sylvae prope praedium rusticum Dom. S. Moore ad fl. Cygnorum, d. 14. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1079. (Drummond n. 263.)

„Suffrutex $1-1\frac{1}{2}$ -pedalis, praecedenti similis, sed statura altiore, robustiore, ramis distinctius striatis, inflorescentia et praecipue floribus duplo majoribus (5-6 lin. longis) distantibus in pedicellum $1-1\frac{1}{2}$ lin. longum sensim attenuatis bene distinctus. *Calycis* lobi tubo infundibuliformi vix longiores. *Vexillum* suborbiculare, emarginatum, aurantiacum; alae falcatae, flavae, carina purpurea ventricosa obtusa paulo longiores. Cyathulus perigynus plus dimidio calycis tubo adnatus ovarii stipitem aequans, fere 2 lin. longus, margine staminifer. *Ovarium* intus puberulum.

11. **Jacksonia Lehmanni** *Meisn.* aphylla, inermis, ramis ramulisque teretibus, profunde sulcatis, saepe incurvis, junioribus pubescentibus, mox glaberrimis; floribus laterali-bus sparsis v. laxe racemosis, majusculis, pedicellis, calycem subaequantibus medio 2-bracteolatis, alabastris incurvo-rostratis; calyce adpresse puberulo, lobis lanceolatis acuminatis corollam superantibus, petalis subaequilongis, filamentis apteris, ovario stipitato.

In arenosis planitiei prope praedium rusticum Maddington ad fluv. Canning, d. 1. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 1077. (Drummond No. 262.)

„Frutex pedalis,“ habitu florumque magnitudine et forma praecedenti similis, facile tamen distinguendus ramis fortiter sulcatis, fere angulatis, sterilibus nonnunquam subdichotomis aut flexuosis, nonnisi prima juventute pubescentibus; pedicellis circ. 4 lin. longis, medio (nec apice) bibracteolatis, alabastris egregie acuminatis; calycis pube brevissima vix sericea, tubo attenuato lobis triplo brevior ovarii stipite breviter superato. — Specimen Drummondianum nobis obvium (imperfectum) paulo recedit ramis plerisque minus profunde sulcatis, pedicellis dimidio fere brevioribus et alabastris 5-gonis.

DAVIESIA Sm. Endl. gen. n. 6435. Meisn.
gen. p. 81. (58.)

1. **Daviesia juncea** Sm., DC. prodr. 2, p. 114, n. 12.
Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 75, n. 2.

In arenosis sylvae prope oppidum Perth, d. 22. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 1159. in glareosis sylvae inter praedia rustica Dom. Barker et Lennard, d. 12. Apr. No. 1181. et in solo subturioso humido inter frutices prope montem Wuljenup (Plantagenet) d. 14. Oct. 1840 No. 1160. (Drummond No. 237.)

„Frutex 1-3-pedalis.“ *Rami* apice saepius plus minus spinescentes. *Flores* „coccinei“ (fide Preiss in sched. No. 1160.) v. „atropurpurei, vexillo margine supra aurantiaco“ (fide Preiss in sched. No. 1159.)

2. **Daviesia divaricata** Benth. in Hügel Enum. p. 31, n. 87; Ann. Wien. Mus. 2, p. 75, n. 3. Walpers repert. I. p. 570: glabra, ramis floriferis aphyllis, teretibus, sulcatis; racemulis lateralibus, bracteis minutis.

In arenosis sylvae prope lacum Kei-er-mu-lu vel Monger'slake (Perth) d. 16. Jan. Herb. Preiss. No. 1167. et in arenosis prope Perth d. 22. Sept. 1839. No. 1166. (Drummond No. 239, ex parte.)

„Aboriginibus *Manö*.“ — Frutex (fide sched. No. 1167.) 2-4-pedalis, erectus, — v. 10-15-pedalis (fide sched. No. 1166.) „*Vexillum* rotundatum, emarginatum, aurantiacum; *alae carinae* atropurpureae.“ *Pedicelli* apice articulati. — An *D. paniculata* Benth. l. c. satis distincta? Rami huic apud Hügel l. c. dicuntur „apice spinescentes“ (ut in *D. divaricata*) in Ann. Wien. Mus. l. c. vero „apice inermes.“ Racemuli in speciminibus nostris omnibus sunt laterales, — in *D. paniculata* vero dicuntur terminales et rami minus validi.

3. **Daviesia hakeoides** n. sp., glaberrima, ramis ramulisque teretibus, striatis, undique foliosis; foliis adscendentibus, rigidis, teretibus, striatis, mucronato-pungentibus, inferioribus compressis planisve linearibus; racemulis axillaribus, brevissimis, paucifloris, basi bracteis; bracteis squamiformibus, imbricatis, concavis, subpersistentibus, pedicellos subaequantibus; calycis dentibus brevissimis, carina falcata obtusiuscula.

Occurunt formae tres sequentes.

α **robusta**, foliis elongatis (2-4 poll. longis) crassioribus (diametro fere lin. 1) ramisque rigidissimis (Preiss. No. 1156.)

β **intermedia**, foliis elongatis (2-4-poll.) tenuioribus (diam. $\frac{1}{3}$ lin.) ramisque modice rigidis (Preiss. No. 1157.)

γ **gracilentia**, foliis plerisque abbreviatis (1-1 $\frac{1}{2}$ -poll., raro longioribus) tenuibus (diam. $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ lin.) modice rigidis, ramis gracilibus laxis. (Drummond No. 258.)

α Inter fragmenta rupium prope Cataractam ad caput fl. Cygnorum, d. 25. Jul. Herb. Preiss. No. 1156. et β in solo sublimoso „Colonial Church Grant“ (Perth) d. 29. Jun. 1839. No. 1157. γ in colonia ad fl. Cygnor., Jac. Drummond, No. 258.

„Frutex 1-2-pedalis, erectus.“ Inflorescentia omnino *D. juncea*. *Racemi* ante expansionem strobiliformes, 2-3 lin. longi. *Bractae* pallide

rufae, laeves, inferiores minores vix $\frac{1}{2}$ -1 lin. longae, semiorbiculares v. late ovatae, obtusae, arcte adpressae, superiores sensim majores; summae laxae, 1-2 lin. longae, obovato-oblongae, obsolete 1-nerviae, convoluti-concavae, acutiusculae (fere cochleariformes.) *Pedicelli* persistentes, apice articulati. *Calyx* rubescens? vix 1 lin. longus, corolla duplo brevior, turbatus. *Petala* rosea? vexilli centro carinaeque apice atropurpureis. *Genitalia* glaberrima. (Legumen non vidimus.) — Folia inferiora sacpe perfecte plana, 1-1½ lin. lata, superiora teretia v. obsolete triquetra, basi paulo dilatata sensim in ramum deliquescentia, apice in mucronem fuscum $\frac{1}{2}$ -1 lin longum sensim excurrentia. — Proxime accedit ad *D. genistifoliam* et *collettioidem* Cunn. (Benth. in Ann. Wien. Mus. II, p. 75.) sed ab utraque foliis longioribus, racemulis brevioribus (?) et praecipue bracteis distincta. *)

4. ***Daviesia colletioides* A. Cunn., Benth. in Ann. Wien. Mus. p. 75, n. 6. Walpers rept. I. p. 570.** (sphalnate „coluteoides“) glabra, ramis rectiusculis; foliis lineari-teretibus, subcervicibus, crassis, rigidis, apice spinescentibus; racemis folio subduplo brevioribus; carina subrostrata calyce vix duplo longiore.

In solo turfoso planitie prope oppidum Albany, d. 5. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1180. et in region. interior. Australiae meridionali-occid. No. 1163.

„Frutex bipedalis.“ *Folia* 6 lin. (raro 10-18 lin.) longa, $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ lin. lata, recta, patentia, basi haud incrassata, enervia et sicut rami leviter ruguloso-striata. *Pedicelli* 2-4 e rhachi brevissima v. subnulla quasi fasciculatim orti, 2-3 lin. longi, basi bracteolis exiguis patulis cochleariformibus suffulti, apice articulati, calyce subduplo longiores. *Calyx* corolla dimidio brevior, purpureus, turbatus, subpentagonus, dentibus brevibus acutis. „Corolla coccinea“, petalis subaequilongis, carina valde inflexa breviter obtusiuscule subrostrata apice purpurea. *Genitalia* glaberrima. *Ovarium* lanceolatum, falcatum, haud gibbum. — Specim. No. 1163. (mauncum) recedit habitu robustiore, foliis saepe sesquipollicaribus, apice plerumque leviter recurvis; absque dubio tamen ejusdem speciei forma.

*) Hujus loci sunt novae species duae inter Preissianas haud obivae: ***D. Benthamii*** nob., glaberrima, ramis folisque teretibus, leviter rugoso-striatis; foliis patentibus, strictis, rigidis, mucronato-pungentibus; racemulis axillaribus, brevissimis, paucifloris; bracteis minutis, laxis, concavis; pedicellis exsertis, calycem brevissime dentatum subaequantibus, carina acutiuscula. — Swan River Drummond No. 241. Similis ***D. hakeoidi***, sed facile distinguenda foliis patentibus rectis (1-2½ poll. longis, diametro $\frac{1}{2}$ lin.) basi vix ac ne vix dilatatis ramisque potius rugoso-striatis quam nervoso-sulcatis et bracteis omnibus minutis patulis. — An ***D. genistifolia*** Cunn. quoad specimen Baueriana ex ora occidentali-australi? (cfr. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 75.) At ***D. genistifolia*** ex ora orientali (secundum specimen nostra Andersoniana, cum diagnosi bene congrua) certe diversam speciem sistit.

D. chordophylla nob., glaberrima, ramis gracilibus, teretibus, acute costatis; foliis longissimis, laxis, filiformibus, sulcato-striatis, scabrisculis, breviter mucronatis v. demum muticis; racemis axillaribus terminalibusque laxis, pedunculatis, basi nudis, pedicellis basi bractea exigua acuta stipatis; calycis dentibus brevissimis obtusiusculis, superioribus 2 brevioribus obtusioribus, carina obtusa. — Swan River No. 239, ex parte, et 240. — Folia 3-9-pollicaria, diametro semilineae, incurva v. varie flexa, rarius strictiuscula, parum rigida, vix pungentia, mucrone brevissimo nigricante cito deciduo, nervis sub lente dense punctulato-scabrisculis. Racemi circiter pollicares, solitarii v. in summis axillis 2-3 fasciculati, erecti, apice tantum aut a medio inde floriferi, pedunculo prope basium bractea unica vix conspicua munito; pedicelli filiformes 1-2½ lin. longi, vix 1-2 lin. abinvicem distantes, nunc valde approximati et corymbum umbellaeve imitantes. Calyx turbato-campanulatus, sesquilineam longus, corolla vix dimidio brevior, coloratus, laevis. Petala aurantiaca, carina apice purpurascens. Genitalia glabra. Ovarium lanceolatum, inferne gibbum.

Davidia notabilis, Sord. Mueller

In ^{puticulis} interioribus Nov. Hall. austr.
(montem M. Krenarkeable versus)
Primo vire: finem Spenceri vafus

D. collisoidem inter et D. Ben-
thamii videtur media, ab illa
foliis (phyllodii?) vix crassis, ra-
rescens folio triplo brevioribus
pudiculis brevioribus, fere lineam
longis. Longius calycum argenteis
vexillam quam ultra petala,
longiore ergo corolla calyce
plus quam duplo duarum, de-
nique ovario globoso viximi-
us D. Benthamii ^{natur}

Differt: phyllodii fere compressis
et viximilem etiam olis notis.
comparanda extra audis.

Corolla colore Platylobii marcescente,
ad collis mutaturque laciniosas prope-
riam. Crypsal. brook.
Fertur paucipis. rainosipin.
et th: primo vire.

Daviesia ulicina Smith

D. aricularis hb. M. 815 non Sm.

Var. *Hall andiae* (ubi?)

Var: foliis angustioribus, quam
juniperinam dicere queas.

+ Daviesia pinnatifida, Ford Mill.

~~Post. Lignicola~~ *Wilhelminia* Duncanson
D. phyllodei valde affinis, ex frustis legu-
miniferis praecipue differt: pedicellis
calycum vix angulatum longistadial
aequalibus. Frutx 3-4'.

Auth: primo ore.

5. **Daviesia brachyphylla** *n. sp.*, glaberrima, foliis brevibus, crassis, rigidis, teretibus, semipatentibus, rectis, apice obtusiusculo mucrone recto pungente armatis ramisque laevibus v. obsolete rugoso-striatis; racemis axillaribus fasciculiformibus, vix folium aequantibus, paucifloris, basi minute bracteatis, pedicellis calyci subaequalibus, calycis viridis dentibus brevibus acutis, carina obtusiuscule subrostrata.

In planitie arenosa Quangen (Victoria) d. 20. Mart. Herb. Preiss. No. 1162. et in region. inter. Austr. merid.-occ., m. Nov. 1840. No. 1161. (Drummond n. 242.)

Praecedenti adeo similis, ut pro ejus varietate brevifolia et parviflora haberi posset, attamen, ni fallor, notis indicatis specificè distincta. — „Frutex bipedalis.“ *Folia* 2-3-raro 4 lin. longa, $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ lin. lata, saepe coerulescentia, mucrone $\frac{2}{3}$ lin. longo atrofusco recto v. raro subrecurvo. *Calyx* 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longus, sub lente punctatus, caeterum laevis v. obsolete costato-pentagonus. Legumen coriaceum, triangulare, rostratum, 6 lin. longum, 4-5 lin. latum, laeve, glabrum, valvis convexis, stipite calycem haud superante. (Caet. omnia *D. colletioidis*.)

6. **Daviesia physodes** *A. Cunn.* in G. Don gen. syst. 2, p. 125. Benth. in Hügl. Enum. p. 31, n. 89; Ann. Wien. Mus. 2. p. 75. Walpers rept. 1. p. 570., glabra, ramis rectiusculis; foliis linearibus v. subteretibus, striatis, apice spinescentibus, versus apicem saepe dilatatis et utrinque binerviis; carina subrostrata, calycem duplo superante.

In arenosis, prope oppidum Freemantle, d. 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1164. in sylva et collinis prope Preston Creek (Perth) d. 28. Jul. 1839. No. 1184, 1170. locis depressis hyeme inundatis prope oppidum Perth, d. 23. Sept. et 2. Oct. 1839. No. 1165, 1169. et in rupestribus prope Preissvelli (Darling's-range) d. 16. Jul. 1840, No. 1168. (Drummond No. 236.)

„Frutex 1-5-pedalis, erectus, pruinosis.“ *Rami* teretes, rugoso-striati, apice subspinescentes. *Folia* polymorpha, saepe glauca; nunc omnia subulata, 2-8 lin. longa, $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata, teretia, recta v. levissime recurvo-arcuata; nunc nonnulla aut pleraque compressa, linearia, verticalia, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. lata, apice vix dilatata aut supra obtuse gibba; nunc denique (et quidem ramorum tam fertilium quam sterilium) aut omnia aut tantum inferiorum nonnulla plana, verticalia, cuneata, $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ poll. longa, 1-2 lin. lata, apice supra in processum margini superiori continuum erectum 2-8 lin. longum 1-2 lin. latum sursum attenuatum muticum, infra in angulum triangularem pungenti-mucronatum margini inferiori continuum rectum v. refractum 1-2 lin. longum producta, nervis duobus e folii basi in apicis angulum quemque excurrentibus, interstitiis venoso-rugosis, marginibus nerviformibus. *Inflorescentia* et legumen praecedentis, *flores* tantum paululum majores „miniati“, carina apice atropurpurea breviter rostrato-acutiuscula.

7. **Daviesia incrassata** *Sm., DC.* prodr. 2, p. 114.

In limoso-calculosis sylvae prope Halfwayhouse (Darlings-range) 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1150 et in asperis montis Greenmountain (Perth) 26. April 1840. No. 1155.

„Frutex bipedalis.“ *Rami* spinescentes, patentissimi. *Folia* basi lata verticaliter inserta, patentissima, 1-4 lin. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. lata, enervia, leviter rugulosa, margine utroque v. rarius superiore solo arcuato, mucrone brevi recto pungente. *Pedicelli* solitarii, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longi, basi minute bracteati, calyce colorato acute denticulato paulo longiores. *Corollae* magnitudo,

structura, color et *legumen* *D. brachyphyllae*. *Genitalia* glabra. *Ovarium* lanceolatum, margine inferiore gibbo, stipite calycem paulo superante*).

8. ***Daviesia polyphylla* Benth.** in Lindl. Swan River p. XIV, n. 58. Walpers rept. 1. p. 570: glabra, ramis inermibus, angulatis, angulis angustissime subalatis; foliis lanceolatis, leviter recurvo-falcatis v. rarius rectiusculis, marginatis, 1-nerviis v. striato-rugosis, pungenti-mucronatis, crassis, basi plus minus angustata haud decurrentibus; racemis fasciculiformibus, folio brevioribus; calyce pedicello sublongiore obsolete 5-gono; carina semilunari, antice subdilatata vix rostrata, acutiuscula.

In limoso-calciosis ad latus occidentale montis Greenmountain (Perth) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1149. (Drummond No. 232, 233. et coll. 1.)

Species *D. angulatae* Benth. simillima quidem, sed notis indicatis certe distincta et facile dignoscenda. „Frutex bipedalis.“ Ramorum anguli minus prominuli, vix alati; folia dimidio breviora et pro longitudine latiora, 3-6 lin. longa, 1-2 lin. lata (in illa 6-12 lin. longa, $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ lin. lata) plus minus falcata, raro recta (in illa strictissime recta, rarius levissime incurvo-falcata) flores dimidio minores, calyce semilineam longo; petala subconcolora, carnea v. purpurea? (in illa rubra v. aurantiaca? vexilli medio carinaque saturatioribus) carina 2 lin. longa, extra medium latior, apice atropurpureo minus attenuata (in illa 3 lin. longa, extra medium sensim attenuata.) — A *D. incrassata* haec et praecedens species differunt ramis inermibus folisque minus patentibus.

9. ***Daviesia Preissii* n. sp.**, glabra, ramis inermibus, teretibus, strictis v. obsolete flexuosis; foliis verticalibus, linearibus, leviter incurvis rectisve, rigidis, pungenti-mucronatis, nervoso-pluristriatis, basi nec angustatis nec decurrentibus; racemis axillaribus, brevissimis, paucifloris, pedicellis calyce longioribus; carina falcata, erostri, acutiuscula, staminibus monadelphis, legumine stipitato, acute brevirostri.

In sublimoso-glareosis prope praedium rusticum D. Hassel (Hay) m. Febr. 1841. Herb. Preiss. No. 1153.

„Frutex 1 $\frac{1}{2}$ -pedalis,“ glaucus? *Folia* $\frac{1}{2}$ -1 poll. longa, 1 lin. lata, plerumque recta, rarius leviter incurvo-falcata v. apice levissime recurva, haud marginata, sed nervis 3-5 aequalibus parallelis tenuibus sulcato-striata, basi nequaquam angustata nec decurrentia, mucrone 1 lin. longo recto fusco. *Racemi* solitarii, basi minute bracteati, cum pedicellis 3-4 lin. longi. *Flores* pro genere majusculi, 4 lin. longi. *Calyx* coloratus, campanulatus, 1 $\frac{1}{2}$ lin. longus, basi attenuatus, dentibus subaequalibus acutis erectis tubo vix brevioribus. *Vexillum* luteum, late obovatum, alis parum longius; *alae* carinae, lineari-oblongae, obtusae, subrectae; *carina* purpurea, semilunaris,

* *D. angulata* Benth. in Lindl. Swan River p. XIV, n. 57. Walpers rept. 1. p. 570: glabra, ramis 4-5-gonis, angulis hinc inde anguste alatis; foliis linearibus et lineari-lanceolatis, subfalcatis rectisve, spinoscentibus, validis, crassis, marginatis, laevibus v. substriatis, basi vix attenuata non decurrentibus; racemulis fasciculiformibus, folio dimidio brevioribus; calyce pedicello subbreviore, laevi; carina basi subito incurva, antice attenuato-rostrata, recta, acutiuscula. In colonia Swan River legit Jac. Drummond No. 231. (Inter plantas Preissianas non occurrit.)

Sanicoria latipes, Ferd. Mueller ^{san. pat. umbilica}
glabra, foliis lanceolato-pubulatis ^{adnatis} ~~pubulatis~~
mucronatis basi latissima vorticati
decurrentibus, congruis folio duplo
brevioribus vel aequilongis, calyce
pedicellum subaequante, legumine res-
isti vix mucronulato.

in praeiectis juxta Dornbey-bay. Wilhelms
Species in genere quam maxime insignis
cum *S. nitida* proprium *Lycopodium* formam
Folium validus densissimus ambitu globosus
ramuli 1/4 - 1' longi erecti basi foliorum
decurrentibus ~~acuti~~ ^{acutis} Folia divaricata
plumbea 1 - 1 1/2" longa fere pubulata at
guata coriacea interdum paulo fere
mucronis longitudinalibus acutis striata &
prope marginem superiorem nervo praevalens
percurva, ^{apice} ~~acutis~~ ^{acutis} basin circiter 2" longa latam
divaricata, parte adnata foliorum liberam
magnitudine fere aequans. Bracteolae spa-
tulato-cuneatae corollae ^{obtusae} ~~obtusae~~ ^{obtusae} paulisper viliola-
tibus brevissimis. Flores .... Legumen coriaceum
latum compressum 4 - 5" longum 3 - 4" et ^{truncatum}
sinuato (vix ^{stans} ~~stans~~) ovata compressa per
virescentis nigrescentibus ^{adpressis} ~~adpressis~~ varie-
gata; prophylla crassa ~~albida~~ ^{albida} & flavo-albida
breviora integra femine quater brevior.
Rath, primo v. Forthp. Dec. Jan.

acuta, 1 lin. lata, alis angustioribus aequilonga. *Stamina* omnia in tubum connata! *Legumen* coriaceum, glabrum, laeve, triangulare cum rostro (lineam longo acutissimo) 5 lin. longum, 4 lin. latum, turgidulum, stipite calycem paulo superante, suturis obtusiusculis (haud nigro-marginatis) vexillari leviter convexo-arcuata. *Semina* . . . . .

10. **Daviesia spinosissima** *n. sp.*, glabra, ramis terebribus, sulcatis, multifariam densissime foliosis; foliis patentissimis, crassis, rigidissimis, verticalibus, linearibus, rectiusculis, sulcato-striatis, attenuato-spinescentibus, basi lata subdecurrentibus; pedunculis axillaribus 1-floris; subsolitariis, folio dimidio brevioribus, calycem subaequantibus, calycis lobis superioribus brevissimis; carina falcata, obtusiuscula; staminibus monadelphis; ovario subsessili.

In solo glareoso inter frutices prope montem Wuljennup (Plantagenet) d. 8. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1152.

„Frutex 5-pedalis.“ *Rami* validi, penna anserina parum tenuiores, apice subcorymboso-ramosi, de facto teretes, sed costis obtuse prominulis a foliorum basi decurrentibus quasi sulcato-multanguli, undique foliis fere spiniformibus horridi. *Folia* vix lineam ab invicem distantia, ordine spirali $\frac{3}{8}$? disposita, angulo recto patentia, recta v. levissime recurvo-arcuata, 5-6 lin. longa, ex ima basi ($1\frac{5}{4}$ lin. lata) sensim attenuata et in mucronem fuscum acutissimum $\frac{1}{2}$ -1 lin. longum excurrentia. *Pedunculi* solitarii (rarisime gemini) 2-4 lin. longi, basi minutissime bracteati. *Calyx* viridis v. subcoloratus, enervis, $2\frac{1}{2}$ -3 lin. longus, campanulatus, basi attenuatus, dentibus 2 superioribus brevissimis, inferioribus 3 tubo parum brevioribus lanceolatis rigidis subcarinato-complicatis sinubusque acutis. *Vexillum* . . . . . *Alae* . . . . . *Carina* calyce duplo longior, semilunaris, exauriculata, apice atropurpurea, infra carnea? *Stamina* omnia in tubum connata! *Legumen* (separatim sub eodem No. missum) fere praecedentis, sed erostre, rufofuscum, laeve v. obsolete venulosum, stipite calycem subaequante, suturis linea nigra utrinque comitatis, superiore recta, inferiore angulo recto rotundato curvata. *Semina* . . . . .

11. **Daviesia flexuosa** *Benth.* in Hügel Enum. p. 32, n. 90; Ann. Wien. Mus. 2. p. 75. Walp. rept. 1. p. 570: glabra, ramis ancipitibus v. angulatis, flexuosis; foliis divaricatis, crassis, rigidis, linearibus, acutis, spinescentibus, sulcatis; racemis folio vix brevioribus, carina obtusa.

In turfoso-arenosis ad Stirling's terrace (Plantagenet) d. 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1180 ex parte.

„Frutex 5-pedalis.“ *Rami* saepe (praecipue inferne) stricti acuteque quadranguli, superne plus minus compressi, ramuli tantum extremi vario gradu flexuosi. *Folia* verticalia, 2-5 lin. longa, apicem versus attenuata, basi vix 1 lin. lata, in ramuli angulum angustissime decurrentia. *Flores* magnit. et colore *D. polyphyllae*. *Calyx* coloratus, $1\frac{1}{2}$ lin. longus, pedicellum aequans v. paulo superans, dentibus lateralibus brevissimis obtusiusculis, infimo acuto, labio superiore truncato. *Ovarii* glabri stipes calyce brevior. *Legumen* (separatim adjacens) subcoriaceum, nitidum, glabrum, subsessile, falcato-triangulare, 8 lin. longum, 4-5 lin. latum, brevissime acuteque rostratum, sordide flavo-fuscum, nigro-punctatum, margine inferiore acuto angulo recto rotundato curvato, superiore obtuso leviter arcuato, valvis parum convexis. *Semina* oblonga, fere 2 lin. longa, turgida, nitida, sordide flavo-virentia, nigro-punctata, strophiola carnosa crassa integra vix dimidio longiora.

12. **Daviesia decurrens** *n. sp.*, glabra, ramis strictis, acute triquetris; foliis verticalibus, rigidis, linearibus, rectis v. vix falcatis, pungentibus, trifariam anguste decurrentibus, tenuiter nervoso-multistriatis; racemis axillaribus folio dimidio brevioribus, pedicellis calyce subbrevioribus bracteola cochleariformi patula suffultis; calycis dentibus brevibus; carina falcata, obtusiuscula; staminibus liberis; ovario stipitato.

In arenosis sylvae prope oppidum Perth, d. 22. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 1147 a. (Drummond No. 234.)

„Frutex 2-3-pedalis, erectus.“ *Rami* graciles, erecti, angustissime alato-triquetri. *Folia* 5-15 lin. longa, 1-2 lin. lata, a basi (in ramum anguste decurrente) ad apicem pungenti-mucronatum sensim attenuata, nunc strictissime recta, nunc levissime recurvo-falcata, semipatentia (vix unquam angulo recto patentia.) *Racemi* multiflori, rhachi brevissima; pedicelli circ. 1 lin. longi, bracteas calycesque subaequantes. *Bracteae* stramineae, striatae, initio imbricatae, demum patentes, inferiores sensim breviores. *Flores* magnitudine. *Ervi* hirsuti. *Calyx* coloratus, turbinato-campanulatus, labio superiore truncato, inferioris dentibus 3 triangularibus acutiusculis. „*Vexillum* rotundatum, emarginatum, planum v. subrecurvum, basi atropurpureum, apice aurantiacum; *alae carinaeque* (angusta) vexillo breviores, atropurpureae. *Genitalia* glabra, antherae flavae.“ *Ovarii* stipes calycem paulo superans. *Legumen* desideratur,

13. **Daviesia prionodes** *n. sp.*, glabra, ramis striatis, alato-triquetris; foliis verticalibus, rigidissimis, lanceolatis oblongisve, subrecurvo-falcatis, pungenti-acutis, basi lata decurrentibus, tenuissime striato-multinerviis; racemis axillaribus folio brevioribus; pedicellis calyce brevioribus, bractea cochleariformi patula subpersistente suffultis; calycis dentibus brevibus; carina obtusiuscula; staminibus liberis; ovario stipitato.

In limoso-calculosis jugi montium Darling's-range (Perth) d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1148. et in region. interior. Australiae occidentalis, d. 12. Mart. 1840. No. 1141. (Drummond No. 235.)

An prioris var.? Differt tamen ramorum frondisque colore subglaucoviridi, foliis duplo-triplo latioribus (usque ad 4 lin. latis) semper, etsi leviter, arcuatis saepeque angulo recto patentibus, magis decurrentibus ideoque ramis latius alatis, nervis tennioribus v. interdum obsoletis. Caet. omnino praecedentis. *Legumen* (immaturum) 4 lin. longum latumque, fere aequilatero-triangulare, obtuse rostratum, marginibus a basi angulo recto divergentibus, superiore leviter gibbo-convexo, inferiore in angulum obtusissimum deorsum valde producto.

14. **Daviesia quadrilatera** *Benth.* in Lindl. Swan River p. XIV, n. 59. Walpers rept. 1. p. 571: glabra, glauca, ramis teretibus; foliis verticalibus, oblongo-quadrilateris, planis, angulo inferiore affixis, angulo superiore interiore rotundato, exterioribus spinescentibus, superioris spina sursum, inferioris deorsum tendente; racemulis folio sublongioribus.

In regionibus interioribus Australiae occidentalis fragmentum sterile Herb. Preiss. No. 1139. (Drummond No. 228.)

x *D. mimosaoides*. HBK. In collibus Loffy-
range dictis frequenter. hb. H. 219. hb. 724.
In collibus lapideis minus parti-
libusve montium Dryli-range
alibique. Invenitur Var. 1848.
Frutex nudum unum vel plures
albus striatus. Flores aliguan-
to fragrantis. Filidus - range!

Tota glaberrima. *Folia* $\frac{1}{2}$ -1-pollicaria, 2-4 lin. lata, nervosa. *Racemi* 6-8-flori, pedunculati, subumbelliformes, pedicellis valde approximatis 1-2 lin. longis basi minute bracteatis. *Flores* praecedentibus dimidio majores. *Calyx* viridis, turbinatus, basi attenuatus, subcostato-pentagonus, dentibus brevissimis latis acutiusculis. *Petala* carnea? *vexillum* calyce plus duplo longius; *carina* latiuscula, subacuta, apice purpurascens. *Filamenta* libera. *Ovarium* lineare, infra gibbum, stipite calycem superante, stylo capillari longiusculo. Legumen non vidimus.

15. **Daviesia pedunculata** Benth. l. c. n. 60. Walpers l. e. p. 571: humilis, ramis subteretibus, pubescentibus; foliis oblongis, utrinque attenuatis, spinescentibus, glabris; pedunculis folio pluries longioribus, apice umbelliferis.

In limoso-arenosis inter frutices ad radices jugi montium Darling's-range (Perth) d. 15. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1043. (Drummond No. 229.)

β **minor nob.**, foliis linearibus, inermibus, brevissime mucronulatis, subnerviis, aveniis, pedunculum aequantibus v. subsuperantibus, umbellis 2-3-floris.

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberuphills (Kent) d. 21. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1154.

„Frutex procumbens v. ascendens.“ *Rami* ramulique glaberrimi, v. in β minutissime puberuli. *Folia* $\frac{1}{2}$ -1-poll. longa, $1\frac{1}{2}$ -3 lin. (in β 1-1 $\frac{1}{2}$ lin.) lata, brevissime petiolata, 1-nervia, pennivenia *Pedunculi* 1-1 $\frac{1}{2}$ -pollicares, tenues, sparse minuteque bracteati; pedicelli 4-6, umbellati, basi bracteis minutis cincti, 2-3 lin. longi, apice articulati, subpersistentes. *Calyx* coloratus, basi attenuatus, labio superiore subintegro, inferioris dentibus 3 brevibus acutis. *Petala* carnea? *carina* latiuscula, crostris, subacuta. *Filamenta* libera. *Ovarii* glabri stipes calyce brevior. *Legumen* (in α ignotum) in β parvum, subsessile, mucronatum, valvis parum convexis*).

16. **Daviesia nudiflora** n. sp., glabra, ramis inermibus, teretibus, apice subangulatis comosis; foliis horizontalibus, sessilibus, rigidis, lanceolatis, pungenti-acuminatis, basi valde attenuatis, planis, tenuiter marginatis, 1-nerviis, utrinque penniveniis; pedunculis axillaribus v. folii rudimento spinuliformi suffultis, unifloris, folio multo brevioribus,

* **D. Drummondii** n. sp., glabra, ramis inermibus, strictis, acute triquetris; foliis sessilibus, horizontalibus, rigidis, elliptico-lanceolatis, planis v. complicatis, submarginatis, apice subrecurvo mucronato-spinescentibus, 1-nerviis, aveniis, marginibus nervoque in rami angulos decurrentibus; pedunculis axillaribus solitariis, 1-floris, folio dimidio v. plus brevioribus, calycis labio superiore truncato subintegro, inferioris dentibus 3 brevibus acutis; *carina* falcata, angusta, obtusa; filamentis liberis; ovario subsessili glabro. — Swan River, James Drummond n. 227. — *Folia* 3—6 lin. longa, $2\frac{1}{2}$ -3 lin. lata, utrinque aequaliter attenuata, laevia v. subinde obsolete pen-nivenia, marginibus subincrassatis fere nerviformibus apice in mucronem fuscum pungentem fere lineam longum excurrentibus basi in rami costam deorsum deliquescentem productis, nervo medio subtus conspicuo apicem versus saepe evanescente basi magis prominulo et cum rami angulo (acuto quidem, nec tamen unquam alaeformi) continuo. *Pedunculi* constanter solitarii, 2-3 lin. longi, supra medium articulati, apice vix incrassati, basi minute bracteati, bracteis paucis obtusis concavis patulis vix $\frac{1}{2}$ lin. longis. *Calyx* sesquilineam longus, corolla duplo brevior, coloratus, laevis, basi breviter et abrupte attenuatus, dentibus vix $\frac{1}{2}$ lin. longis. *Petala* carnea v. aurantiaca? *vexilli* basi *carinaeque* apice purpureis. Legumen non vidimus.

laxiuseule pluribraeteatis, sursum inerassatis, persistentibus; calyeis dentibus brevibus, acutiseulis; earina valde incurva, acuta, subrostrata; legumine subsessili.

In arenosis sylvae prope Kei-er-mu-lu v. Monger'slake (Perth) d. 16. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1143. (Drummond n. 226.)

„Frutex 2-pedalis, erectus.“ *Rami* inferne tenuiter sulcati, apice corymboso-ramosi, ramulis erectis gracilibus rectis hinc inde (praecipue ad pedunculorum basin) spinula subadpressa 1-2 lin. longa fusca (folio abortivo) praeditis, apice foliosis. *Folia* perfecta 1-2½-pollicaria, 3-6 lin. lata, coriacea, pallide viridia, erecta, utrinque aequaliter angustata, recta; plana v. subcomplicata, apice spinescente recto sulco valde pungentia, venis tenuibus copiosis nervoque medio subtus magis prominulis. *Racemi* totam fere ramulorum partem aphyllam et subinde axillam unam alteramve summitatis foliosae occupantes, solitarii, erecti v. patuli; pedunculus communis vix 1-2 lin. longus, bracteis pluribus spathulatis obtusis laxis fulvis dense obsitus, transiens in pedicellum unicum 2-3 lin. longum basi filiformem pallidum sursum sensim incrassatum et nigricantem (½ lin. crassum) cum calycis basi indistincte articulatam persistentem, apice post floris lapsum truncato. *Flores* magnitudine et forma *D. Drummondii*, *carina* tantum apice magis attenuata et hamato-inflexa. *Filamenta* libera. *Legumen* glabrum 6-7 lin. longum, brevissime acuminatum, suturis tenuibus nerviformibus, superiore recta, inferioris angulo recto rotundato, valvis planis v. subconvexis laevibus v. tenerrime venosis. — Species insignis, a *D. Drummondii* distincta ramis teretibus, foliis angustioribus rectis venosis, ad pedunculorum basin abortientibus, pedicellis incrassatis, carinae forma, caet. — Accedit quoque ad *D. umbellatam* Sm., quae ex ic. Labill. N. Holl. t. 137. differt: ramis apice spinescentibus, foliis angustioribus, pedunculo duplo longiore apice 3-floro, pedicellis haud incrassatis, caet.

17. **Daviesia daphnoides** n. sp., glabra, glaucescens, ramis teretibus apice ramulisque angulatis; foliis horizontalibus, subsessilibus, coriaceis, lanceolatis, utrinque attenuatis, mucrone brevi pungentibus, nervo venisque obsolete; racemis axillaribus brevissimis, laxe paucifloris, minute bracteatis; calyce basi attenuato, pedicello longiore; carina obtusiseula.

In planitie arenosa Quangen (Victoria) d. 20. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 1144. (Drummond n. 225.)

Praecedenti primo vultu, praecipue foliorum forma et magnitudine, similis, sed bene distincta: ramis apice acute triquetris v. subancipitibus, foliis brevius mucronatis, nervo venisque utrinque subimmersis multo minus conspicuis, et inflorescentia. — „Frutex 2-3-pedalis.“ *Racemi* 2-4 lin. longi, 3-5-flori, pedunculo tenui, pedicellis sparsis ½-1 lin. longis basi bractea exigua concava patula fultis. *Flores* praecedente paulo minores, rubri v. aurantiaci? calyce basi magis attenuato. *Legumen* desideratur.

18. **Daviesia horrida** Preiss mss., n. sp., glabra, ramis teretibus, apice ramulisque aphyllis, spinescentibus, rigidissimis, corniformibus, simplicibus v. divaricato-2-3-fidis, squamula minuta suffultis, inferioribus foliosis: foliis horizontalibus, coriaceis, planis, lanceolatis v. linearibus, pungentibus v. demum inermibus obtusis, 1-nerviis, obsolete venosis; racemis e ramulis aphyllis lateraliter ortis, brevibus, laxe sparsifloris bracteatisque, calyce acute dentato, ovario subsessili.

D. umbellulata var. pub. Corolla aurantia
aurantiaca

x *D. umbellulata* ! Smith. *D. angustifolia* St.
D. umbellata Labillardiere !
Port. Philip. ! Loisy. N. 1. *D. ulivina* hb. St.
Loisy-range ! Calycis laciniae glanduloso-
fimbriolatae, folia subtus pubescentia. frequenter
invenitur floribus flavis, ad riv. St. Pauli (12.
D. fruticosa ~~fruticosa~~ ^{fruticosa} ramis hirsutis;
foliis subtus pubescentibus. Vix distincta
species; praeter notas datas etiam tem-
pore florescentiae minus duas serione
uliorum ! Loisy-range ! hb. Stuart 200.
D. angustifolia Candolle. Loisy-range,
Barossa-range, Beryl-range, in val-
libus et montibus - vire 1845. -
Ad urbem Lammiston, Tarn, hb. St. J.
Fr. 12, fr. 1-2' (*D. ulivina* St. nos Sm.)
Frutix erectus - 5' Corolla aurantia
purpurea, fundo obscura. (atro-ignea)
cum *D. umbellulata* Nov. Holl. diste-
tingue *Saxmanniae* et nostra haud. *Stuartiae*
(ambae diagnosi quadrantes) *St. J. Stuart*
D. umbellulata hb. St. J. Fr. 12.
aut speciem propriam (haec ita du-
plo majore floribus siccatibus magis
pubescentibus vix ulla alia nota
distinguendam) praebet aut prius
formam normalis Smithianam
esset
Fr. 3-4' ad fl. South Esk rivu, hb. St. J.
Fr. Oct. 25. 1848.

x *D. divaricata* ~~fruticosa~~ ^{fruticosa}
validior, ramulis horizontalibus
patentibus, foliis laticoribus,
In convallibus super saxosis petraeas
prope portum agnorum hb. St.
J. 606. 4-5' alt. Nov. 49.

In regionibus interior. Australiae meridionali - occidentalis m. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1142. et in limoso-arenosis ad latus montis prope cataractam ad caput fl. Cygnorum, d. 26. Jul. 1839. No. 1171. (Drummond n. 230.)

„Frutex 3-pedalis.“ *Rami* tenuiter striati, aphylli, nunc validi circiter pollicares basi fere lineam crassi, nunc tenues longiores et magis sulcati, recti v. levissime incurvi, squamula triangulari acuta vix lineam longa adpressa fusca suffulti, hinc inde minute gemmuliferi. *Folia* sessilia, 1-5-pollicaria, $2\frac{1}{2}$ -5 lin. lata, obsoletissime marginata, nervo venisque nunc semiimmersis (faciebus potius dense leviterque rugosis quam nervoso reticulatis) nunc acutiuscule prominulis, mucrone brevi recto demum saepius deciduo. *Racemi* $\frac{1}{2}$ -1-pollicares, interdum ramosi, pedicellis 1-2 lin. longis bractea patula concava obtusa vix 1 lin. longa fusca suffultis. *Calyx* corolla dimidio brevior sesquilineam longus, subhemisphaericus, basi attenuatus, laevis, dentibus brevibus acutis. „*Petala* flava“, *carina* falcata obtusa. *Filamenta* libera. *Ovarium* glabrum, lanceolatum, inferne gibbum, stipite calycem haud aequante. — Species inter Benthamii §§. 2, 3 et 5 ambigua, proxima *D. umbellulatae* Sm., praecipue var. *angustifoliae* Labill. N. Holl. t. 137, quae differt foliis multo brevioribus, inflorescentia etc.; nec non ramis sterilibus et inflorescentia simillima *D. divaricatae* Benth., sed distincta ramis sulcato-angulatis foliosis, caet.

19. **Daviesia longifolia** Benth. in Lindl. Swan River p. XIV, n. 61. Walp. rep. 1. p. 571: glabra, foliis longe linearibus, compressis, apice subincurvo muticis, striatis; racemulis axillaribus, laxis, folio brevioribus; ovario sessili.

In arenosis planitiei district. Sussex, d. 23. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1184.

„Frutex decumbens.“ *Rami* graciles, pedales et ultra, compresso-angulati, angustissime subalati. *Folia* 3-6-pollicaria, 1-2 lin. lata. *Racemi* axillares et terminales, erecti, 1-3-pollicares, saepe gemini; pedunculi filiformes, a medio inde laxe-pluriflori; pedicelli patuli, 2-6 lin. ab invicem distantes, tenues, 2-4 lin. longi, persistentes, bractea foliacea setacea 1-5 lin. longa decidua suffulti. *Flores* magnitudine, forma et? colore praecedentis. *Calyx* viridis, labio superiore truncato subintegro, inferioris dentibus brevissimis obtusiusculis. *Petala* parum inaequilonga, purpurea? *carina* obtusiuscula. *Filamenta* libera. *Legumen* non suppetit.

20. **Daviesia alternifolia** Endl. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 149; Nov. Stirp. decad. 1. p. 48, n. 54. Walp. l. c. p. 570: foliis alternis, oblongis, apice subspinescentibus; involucri subtriflori bracteis scarioso-membranaceis, ovalibus, planis.

In solo turfoso-arenoso planitiei prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 855.

„Frutex decumbens. *Bractae* post anthesin clausae. *Vexillum* emarginatum, igneum, basi sulphureum; *alae* purpureae.“ *Legumen* acutum, vix $2\frac{1}{2}$ lin. latum, basi turgidum.

- 21 **Daviesia oppositifolia** Endl. l. c.; decad. p. 49, n. 56. Walpers l. c.: foliis oppositis v. ternis, elliptico-oblongis, marginatis submucronatis; involucri triflori bracteis coriaceis, complicatis.

In glareosis inter frutices densos sylvae prope montem Wuljenup (Plantagenet) d. 20. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 856.

„Frutex 5-pedalis.“ *Legumen* inaequilatero-triangulari, 6 lin. longum, 3 lin. latum, obtusum, vix mucronulatum, sutura superiore levissime arcuata, inferioris angulo fere recto rotundato, valvis levissime convexis tenuiter re-

ticulato-venosis. *Semina* ovalia, turgida, fusca, laevia, subnitida, stropholiola pallida vix $\frac{1}{3}$ longiora.

22. **Daviesia cordata** Sm. DC. prodr. 2, p. 114, n. 10.
Bot. Reg. t. 1005!

In limoso-calculosis sylvae cis Halfwayhouse (Darling's-range) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1137. et in rupestribus sylvae montis Wuljenup (Plantagenet) d. 14. Oct. 1840. No. 1136. (Drummond No. 223.)

„Frutex 2-3-pedalis.“ *Folia* patentia, 2-6-pollicaria, 1-2½ poll. lata. *Pedunculi* axillares 1-3, folium subaequantes v. dimidio breviores, infra apicem corymbisflorum bracteis nonnullis minutis dentiformibus sparsis, apice vero bracteis cordatis 4-6 lin. longis 4-5 lin. latis submembranaceis corymbum involuerantibus deciduis praediti; pedicelli 2-3 lin. longi, singuli bracteolis minutis linearibus suffulti. *Flores* pro genere majusculi. *Calyx* corolla dimidio brevior, coloratus, canipaulatus, basi breviter angustatus, 3 lin. longus, costato-5-nervis v. laevis, labio superiore truncato subintegro, inferioris dentibus 3 late triangularibus acutiusculis $\frac{2}{3}$ lin. longis. *Carina* obtusa. *Filamenta* libera. *Ovarium* subsessile.

23. **Daviesia rhombifolia** n. sp., ramis inermibus, terebibus, apice angulatis, glabris v. pubescentibus; foliis sparsis, subsessilibus, torsione baseos verticalibus, rigide coriaceis, rhombeo-subrotundis ellipticisve, mucronato-pungentibus, planis, 1-nerviis, reticulato-venosis; racemis axillaribus brevissimis fasciculiformibus, basi bracteatis, pedicellis persistentibus apice demum incrassatis; calycis subcostati labio superiore truncato subintegro, inferioris dentibus brevibus acutiusculis, carina obtusa, legumine sessili.

In arenosis sylvae districtus Sussex, d. 17. Dec. 1839, fructifera Herb. Preiss. No. 1145. et in glareosis prope fontem Ronau'swell (Darling's-range) d. 25. Apr. 1840. No. 1146. (Drummond n. 224.)

„Frutex 1½-2-pedalis,“ subcorymboso-ramosus. *Rami* graciles, recti v. adscendentes, semipatentes, apice sulcati acuteque compresso-angulati, nunc (sicut reliquae partes) glaberrimi, nunc No. 1146 superne pube brevi patente hispiduli. *Folia* 6-15 lin. longa, 3-16 lin. lata, basi apiceque acuta, lateribus rotundatis, margine nerviformi paululum incrassato, nervo venisque irregulariter anastomosantibus utrinque prominulis, apice plus minus acuminato in mucronem rectum validum acutissimum $\frac{1}{2}$ -1 lin. longum rufum excurrente. *Racemi* 2-6-flori, sessiles, rhachi subnulla, bracteis squamiformibus $\frac{1}{2}$ -1 lin. longis obtusis concavis imbricatis demum patentibus diu persistentibus, pedicellis filiformibus 2-3 lin. longis apice articulato demum paulo incrassatis. *Calyx* coloratus, sesquilineam longus, corolla dimidio brevior, nervis interdum prominulis, dentibus tubo triplo brevioribus. *Petala* purpurea? *Filamenta* libera. *Legumen* 7 lin. longum, 4-5 lin. latum, subacuminato-acutum, laeve, glabrum, angulo inferiore fere recto, margine superiore levissime incurvo. . . . . — Proxima *D. ruscifoliae* Cunn., quae differre videtur ramulis spinoscentibus et foliis ovatis 4 lin. longis“).

*) *D. virgata* Cunn. Bot. Mag. t. 3196. Walpers l. c. p. 569. ad Port Philipp lecta est a cl. Latrobe, fide specim. in Herb. Mus. Neocom.

P. pubescens *fructu* *mel*
D. mucronifolia! Allan Cunningham
Diagnos. in *anag. 9. Dr. 1854. D. Pitt Rivers.*
Daviesia Fianrohris *fructu* *mel*

ramis ramulisque spicis attenuatis, sulcato-
angulatis hispidulis, foliis ovatis vel
oblongis pubescentibus mucronatis planis
marginatis coriaceis venulosis, floribus axil-
laribus solitariis bracteatis, calycis laciniis
acutis triangularibus superioribus latioribus.

D. latifolia *postponenda*, quae tamen valde differt!
In vicina flum. Torrens (W. m. angl. ab. calce)
et delais. Stuart. N. 202. In parvis collibus
Fragmenta subpudoris inpropterea sunt puci-
is variegatis elationis, rami caespitici pu-
ni asperius, ramuli p. gallicae pubes-
centia alba patula vestiti. Fol. 2-3^m longa
1/2-2^m lata. Flores magnitudinis foliorum
calyx tubo linearis, clavis. Fim. linearibus corolla
duplo brevior. Petal. rotundato-oviformes, lon-
gitudinis corollae, alis parvis longior. Legu-
mina suboblonga cum longioribus 2^m longioribus
sem. lvs. longa, fucileis lvs. lvs. calce
variegata. *D. virgata* *fructu* *mel*

D. virgata *fructu* *mel*
Numerosissime fructu, diuagatio compari
non limit. Port. Philipp. *fructu* *mel*

D. latifolia! *fructu* *mel* *fructu* *mel*
et *D. mimosoidis* in Nov. Holl. a. 1848.
occursit Tasmaniam in collibus
Nov. 5. 1848. pr. 3-4'. *fructu* *mel*
Mm Norfolk.

x Viminaria decedata Smith

1. Ad fluv. Torrens, hb. St. n. 213. hb. 759.
onkaparinga, Tamuda, ad
paludes infra montem Gambir.

VIMINARIA Sm. Endl. gen. n. 6436. Meisn.
gen. p. 81. (58.)

1. **Viminaria denudata** Sm. Exot. Bot. t. 27. Bot. Mag. t. 1190. DC. prodr. 2. p. 107. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 76. — *Daviesia denudata* Vent. choix t. 6. — *Sophora juncea* Schrad. Sert. Hannov. t. 3.

In solo subarenoso ad fluv. Cygnorum, d. 19. Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 1023. (Drummond n. 249.) Vidi etiam specimina ad Port Philipp lecta. (Herb. Mus. Neocomens.)

„Frutex 12-20-pedalis, ramis pendulis.“ — Specimina Drummondiana cum Sieberianis (Herb. Nov. Holl. n. 369; fl. mixt. n. 553.) exactissime congruunt; Preissiana nonnihil recedunt calyce quidquam minore et ramis acutius lineatis.

2. **Viminaria? Preissii** n. sp., floribus racemosis, calyce bilabiato impunctato, labio superiore latiore sublongiore acute bifido, inferioris laciniis erectis angustis acutissimis.

In subarenosis hyeme inundatis ad fluv. Canning m. Aug. 1841. Herb. Preiss. No. 1024.

An potius *Sphaerolobii* sp.? Sed praeter calycem omnia *Viminariae*. „Frutex bipedalis.“ *Racemi* laxiflori, pedicelli remotiores et solitarii, calyce breviores, vix 1 lin. longi, calycis labium superius fere lineam longum.

SPHAEROLOBIUM Sm. Endl. gen. n. 6437.
Meisn. gen. p. 81. (58.)

1. **Sphaerolobium stenopterum** n. sp., ramis angulatis, anguste alatis; calycis impunctati tubo labiis brevior; carina obtusa, alas superante; ovario stipitato; stylo subexserto, apice hinc membranula auriculato.

In subarenosis sylvae prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 22. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1117.

Ramorum alae inferne 1-2 lin. latae, superne multo angustiores et in angulum acutum nerviformem abeuntes. *Racemi* 4-6-flori. *Calyx* pedicello fere duplo longior, circ. 2 lin. longus, corolla dimidio brevior, dentibus plerumque nigro-marginatis. *Legumen* subglobosum, vix grani piperis magnitudine, laeve, glabrum, atrium. — Species proxima *S. alato* Benth., sed notis indicatis, praecipue stylo alato, bene distincta.

2. **Sphaerolobium grandiflorum** Benth. in Hügel Enum. p. 32, n. 93; Ann. Wien. Mus. 2. p. 76. Walpers rept. 1. p. 571.: ramis teretibus; calycis tubo labiis aequilongo; carina arcuata, extus obtusissima, intus obtuse producta; stylo a basi arcuato, apice subexserto recurvo hinc membranaceo.

In solo turfoso-arenoso clivuli prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1116. (sine fr.)

„Frutex 2-3-pedalis. Flores ignei.“ *Calyx* dense nigro-punctatus.

3. **Sphaerolobium fornicatum** Benth. l. c. n. 94. Walp. l. c.: ramis teretibus; calycis tubo labiis subaequilongō; carina apice extus fornicato-producta, intus obtusa; stylo supra basin geniculato, apice incluso hinc membranacco.

In solo humoso inter gramina alta prope villam Dom. Helms (Perth) d. 24. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 1124, et in turfoso-humidis ad radices montis Melville (Plantagenet) d. 21. Oct. 1840. No. 1122.

„Frutex 3-5-pedalis. *Rami* patentes,“ saepius, steriles praecipue, foliis oppositis capillaceis 1-2½ lin. longis patulis remote obsiti. *Flores* nunc subverticillati, nunc sparsi, „igneo-aurantiaci v. purpurei.“ *Legumen* subglobosum, latius quam longum, vix grani piperis mole.

4. **Sphaerolobium medium** R.Br. DC. prodr. 2. p. 107. n. 2.

In solo humoso in umbrosis inter frutices densos prope lacum Kei-er-mu lu vel Monger'slake (Perth) d. 4. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1115 b. (Drummond coll. l. sine No.)

Species inter praecedentem et *S. vimineum* vere intermedia, illi styli carinaeque forma, huic florum magnitudine calyceque similis, ab illa distinguenda floribus minoribus et calycis labio superiore minus cuneato, ab utraque calycis tubo labiis brevior et corollā amoene, rubrae (purpureae?)

5. **Sphaerolobium acuminatum** Benth. l. c. n. 95. Walp. l. c.: ramis teretibus; calycis tubo labiis multo brevior; carina oblonga, recta, acute acuminata, vexillum superante; stylo basi rectiusculo, apice incurvo hinc anguste membranacco.

In limoso-calculosis montium continuorum Darling's-range (Perth) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1123. —? in sublimoso-arenosis sylvae district. Wicklow, m. Oct. 1840. (No. 1126, specim. imperfect.) — in solo subarenoso inter frutices densos prope montem Wuljenup, d. 13. Oct. No. 1120.) alibique in distr. Plantagenet, m. Dec. 1840. No. 1118. (Drummond n. 216, 218.)

ROEA Hügel. Endl. gen. n. 6438. Meisn. gen. comm. p. 350.

1. **Roea linophylla** Hügel mss. Benth. in Hügel en. p. 34, n. 99; Ann. Wien. Mus. 2. p. 77. Walpers rept. 1. p. 571: caulibus procumbentibus v. adscendentibus, filiformibus, tenuissime striatis; foliis anguste linearibus; pedicellis calycis tubum aequantibus, bracteis bractcolisque diu persistentibus.

In solo sublimoso ultimorum arborum Peninsulae (Perth) d. 30. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 880, et in distr. Plantagenet, m. Dec. 1840. No. 1115 a et 1121. (Drummond n. 252.)

„Herba perennis, procumbens v. adscendens, 1-1½ pedalis.“

*) *S. vimineum* Sm. DC. l. c. n. 1. Bot. Mag. t. 969. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2. p. 76. — *S. minus* Labill. N. Holl. t. 138. (Lam. ill. t. 952.) Swan River, Drummond n. 217 et coll. 1. — A cl. Preiss. non lectum.

Affinis hinc virtus *Oxycoccus Pullmanae*
Hb, Pullmanae *Silvestris* Lichen!

Comp. *Microthamnium spinulosum* ^{smithii}

Phyllota ? *eleusifera* fere *müller*

Ab omnibus apud Don *elysifera*
foliis canaliculatis et bracteis flore
brevioribus olivacea. An *Racae* sub-
jugenda augeat definitionem *elysifera*
N. Ph. *laubata* Reuth. dignoscitur
glabritie calicis ramulorumque
erecta. *Gardner*. hb. Stir. 197 1875.
p. pinnatifida. hb. Juss. N. 26.

2. **Roea nudiflora** *n. sp.*, caulibus erectis v. adscendentibus, costato-angulatis; foliis confertis, spathulato-lanceolatis, acutiusculis, planis; pedicellis calycis tubo brevioribus, bracteis bracteolisque nullis v. fugacissimis.

In solo subturioso-arenoso circa oppidum Albany (Plantagenet) Cape Riche et Toby's Julet (Sussex) d. 27. Dec. 1839. et 25. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1018.

„Suffrutex dodrantalis.“ *Caules* praecedente vix crassiores, attamen haud laxi, simplices, conspicue sulcati et superne fere angulati, inferne dense foliosi, apice in racemum aphyllum simplicem $1\frac{1}{2}$ -2-pollicarem erectum 10-16-florum abeuntes. *Folia* 3-6 lin. longa, 1-2 lin. lata, basi attenuata subsessilia, avenia, nervo medio vix conspicuo immerso. *Flores* patuli v. nutantes aut demum deflexi, 4-5 lin. longi, structura et colore praecedentis. *Pedicelli* vix 1 lin. longi, apice basique cicatriculas bractearum et bracteolarum jam ante floris expansionem delapsarum (nusquam superstitum) exhibentes. *Stylus* apice refracto barbatus. *Leguminis* stipes calycem paulo superans.

PHYLLOTA (DC.) Benth. Endl. gen. n. 6439.
Meisn. gen. comm. p. 350. Pulteneae sect. II:
DC. prodr. 2. p. 113.

Phyllota barbata *Benth.* in Hügel. Enum. 2. p. 33, n. 97; Ann. Wien. Mus. 2, p. 77. Walp. rep. 1. p. 572: ramulis subsericeis; foliis glabris, muticis, minute tuberculis, floralibus bracteolisque flore brevioribus; spicis terminalibus, brevibus, paucifloris; corollis calyce sericeo plus duplo longioribus, vexillo integro; stylo line a medio ad apicem dense barbato, caeterum glabro v. basi villosulo.

Inter frutices densos in turfosis promontorii Cape Riche (Kent) d. 17. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 846.

„Frutex 4-pedalis.“

AOTUS Sm. Endl. gen. n. 6440. Meisn. gen.
p. 81. (58.)

1. **Aotus gracillima** *n. sp.*, ramis gracilibus, laevibus, glabris, apice minute puberulis; foliis sparsis v. suboppositis, erectis patulisve, anguste linearibus, obtusis v. mucronulo exiguo innocuo recurvo apiculatis, laevibus, glabris, margine revolutis, supra convexis v. obsolete 1-sulcis, axillis 1-3-floris; pedicellis brevissimis calycibusque adpresso pilosis, calycis labio superiore truncato levissime emarginato.

Inter frutices in depressis arenosis prope oppidum Perth d. 20. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 863. (Drummond n. 246 et coll. I.)

β **uncinata**, foliis patentibus, brevibus (vix $2\frac{1}{2}$ lin. longis) apice magis recurvo-mucronulatis.

In region. interior. Australiae meridionali-occidentalis. Herb. Preiss. No. 869.

Ab *A. villosa* Sm. (fide specim. Sieber.) cui habitu, foliorum, longitudine florumque dispositione structura et magnitudine convenit, differt: glabritie, foliis haud punctato-scabris et floribus copiosissimis, spicas 3-5-pollicares foliosas satis densas formantibus. Specimina Drummondiana No. 246. forsau identica cum planta Hügeliana quam cl. Bentham (Ann. Wien. Mus. 2. p. 78.) aut *A. villosae* var. *microphyllam* aut propriam speciem sistere suspicatur. Var. β nostra fortassis species distincta, sed specimina iusufficiencia. Flores in axillis solitarii, subsessiles, rari, calyx paulo major et villosior. Petala non vidimus. Legumen calyce paulo majus, subrotundum, compressum, pilosum, 2-valve. Caet. omnia ut in α .

2. ***Aotus intermedia* n. sp.**, ramis gracilibus, strictis, laevibus folisque junioribus tomentoso-pubescentibus; foliis sparsis et suboppositis, patulis, anguste linearibus, obtusis, muticis, laevibus, mox glabris, margine revolutis, supra 1-sulcis, axillis 1-3-floris; floribus subsessilibus, calycis laxo cano-villosi labio superiore acute bifido.

In subarenosis planitieci inter frutices densos prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 11. et 14. Oct. Herb. Preiss. No. 864, 1192. et in region. interior. Australiae merid.-occid. m. Oct. 1840. No. 871.

Species pubescentia ad *A. virgatam*, habitu et foliis laevibus vero ad *A. gracillimam* accedens, ab utraque tamen, ni fallor, bene distincta. A posteriore differt ramis strictioribus, foliis plerisque duplo longioribus (semi-pollicaribus) floribusque paulo majoribus. Bractae duae ad pedicellorum basin laterales, oppositae, ovatae, obtusae, concavae, 1 lin. longae, puberulae, saepius diu persistentes, in *A. gracillima* vero fugacissimae, ante florum expansionem jam defluentes.

3. ***Aotus procumbens* n. sp.**, procumbens, ramis pubescentibus, apice adscendentibus et cum foliis junioribus patentim pilosis; foliis sparsis oppositisque v. ternatim approximatis, patulis, linearibus, obtusiusculis, muticis, mox glabris, margine revoluti subscabris laevibusve, supra convexis laevibus nitidis exsulcis, subtus canaliculatis, saepius subtortis; pedicellis geminis v. solitariis, brevissimis, calycis laxo cano-pilosiusculi labio superiore acute bifido.

In arenosis sylvae ad fluv. Cygnorum, d. 9. Sept. 1841. Herb. Preiss. No. 845. et in region. interior. Australiae merid.-occid. No. 882.

A praecedente, cui proximè affinis, dignoscitur statura humili, ramis „procumbentibus“, vix spithamaeis debilibus adscendentibus apice pilis patentibus fere lineam longis mollibus albis (etiam in foliis novellis parce obvis) dense tectis, foliis 5-11 lin. longis more *Dillwyniarum* saepius tortis, supra rotundato-convexis exsulcis (v. basi tantum obsolete 1-sulcis) laevissimis v. rarius secus margines punctis prominulis paucis scabriusculis. Calyx nunc No. 845. ejusdem magnitudinis ac *A. intermediae*, nunc vero (No. 882, cui etiam folia pleraque majora, 8-11 lin. longa, et robustiora) paulo major. Species in speciminibus perfectioribus denuo examinanda.

4. ***Aotus? dillwynioides* n. sp.**, ramis gracilibus, erectis, glabris, apice pubescentibus; foliis sparsis v. suboppositis, anguste linearibus, obtusis, muticis v. submucronulatis, laevissimis, glabris, supra canaliculatis, subtus convexis; floribus axillaribus, subsolitariis, spicam terminalem foliosam saepe interruptam formantibus; pedicellis brevissimis,

Notus villosa! Smith.

In arundinis ad portum regnorum
Tasmaniae, Hb. N. III, 645. Nov. 49.
Frutix Lpidalis. Cum in eodem
loco ubi et Stuart ^{hanc} detexit
quaeque occurrunt aliae plantae
Novae Hollandiae pro australi
proprie, hanc non diversam
considerare ab Australi ~~pro~~
mihi non nisi e brevissima
phrasi auctoris cognitam.

Nota: Noti species a Dillwynis
foliorum marginis revolutis mi
involuto facillime sunt disting
enda,

x *A. ferruginea* Labillardiere
P. laevis Gussone.

Folius lanceolatis fere laevibus. Cum folium modo
progenitum in promptu
visio, an character notatus
stabilis et specificae valoris
annon.

F.D.L. ! hb M. P. Ings.

deussatim 4-braeteatis, braeteis 2 inferioribus ovatis, superioribus 2 longioribus angustioribusque; calyce albo-villoso, labio superiore bifido, inferiore 3 partito, lobis omnibus acuminatis; vexillo dilatato; stylo brevi, crassiusculo, glabro.

In arenosis subhumidis planitie ad fluv. Canning. m. Sept. 1841. Herb. Preiss. No. 872.

Species *Aotum* inter *Dillwyniam* que ambigua, praecedentibus habitu simillima, nec generice ab iis separanda, nisi invita natura, quamvis characteribus pluribus, sc. pedicellis bracteolatis, vexilli lamina latiore quam longa et foliis marginum involutione *supra* (nec *subtus*) canaliculatis potius cum *Dillwynia* quam *Aoto* conveniat immoque stylo brevi crassiusculo ab utroque genere recedat. *Semina* non vidimus, sed ovula ne vestigium quidem strophilorum ostendunt. — „Frutex 4-5-pedalis.“ *Rami* teretes, tenues, striati, purpureo-fusci, laeves v. minute denseque papilloso-punctati. *Folia* 3-4-lin. longa, plerumque subteretia (diametro vix $\frac{1}{4}$ lin.) raro explanata $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ lin. lata, apiculo vel nullo vel brevissimo innocuo subrecurvo. *Flores* in axillis plerumque gemini; pedicelli 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longi, bracteis fuscis puberulis tecti, bracteis 2 inferioribus circ. 1 $\frac{1}{2}$ lin. longis 1 lin. latis ovatis obtusiusculis subconvexis, superioribus 2 paulo longioribus et dimidio angustioribus acutiusculis. *Alabastra* ovato-oblonga, breviter acuminata. *Calyx* dimidiam corollam paulo superans, 3 lin. longus, labiis aequilongis tubo paulo longioribus, lobis lanceolatis acuminatis, superioribus vix latioribus sed altius connatis. *Vexillum* emarginatum, dimidio latius quam longum, aurantiacum v. miniatum? basi purpurascens, *alis* concoloribus anguste oblongis obtusis parum longius; *carina* carnea? calycem haud superans, rectiuscula, oblonga, obtusa, *alis* brevior, pistillum totum includens. *Ovarium* sessile, oblongum, villosum, stylo brevissimo (vix $\frac{2}{3}$ lin. longo) crassiusculo incurvo longius; *stigma* capitatum; *ovula* 2, funiculis brevissimis affixa, subrotundo-reniformia, estrophiolata.

5. ***Aotus cordifolia* Benth.** in Hügel Enum. p. 33, n. 96; Ann. Wien. Mus. 2, p. 78. Walpers rept. 1. p. 572: foliis ternatim verticillatis, ovato-lanceolatis, basi cordatis, margine revoluta undulato-denticulatis, supra reticulato-venosis.

Inter frutices densos in solo humoso ad marginem lacus prope oppidum Perth, d. 14. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1050. (Drummond n. 251.)

„Frutex 4-6-pedalis.“

6. ***Aotus passerinoides* n. sp.**, ramis erectis, gracilibus; foliis ternis v. subinde sparsis, sessilibus, erectis, ovato-oblongis, obtusiusculis, muticis, margine leviter revolutis ramisque adpresse sericeo-villosis, supra demum glabrescentibus; floribus axillaribus, subsolitariis, sessilibus, folio brevioribus; calyce parvo, membranaceo, basi villosa, superne glabro, labii superioris truncate-emarginati inferiorisque 3-fidi lobis ciliatis; stylo inferne barbato.

In turfoso-humidis inter frutices densos planitiei prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 8. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 868.

Species praecedenti affinis, distinctissima, pulchella, habitu *Passerinarum* et *Gnidiarum* quarundam Capensium. *Caules* „sesquipedales, stricti“, vix penna corvina crassiores, nunc simplicissimi, nunc parce ramosi v. apice subcorymbosi, inferne nudi et foliorum cicatris levissime prominulis notati,

superne dense foliosi, pube molli adpressa albida sericea canescenti-villosi, internodiis 3-5 lin. longis. *Folia* plerumque exacte ternato-verticillata, nonnunquam (praecipue inferne) verticillorum solutione sparsa, 3-5 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, basi minus quam apicem versus attenuata. *Flores* *A. cordatae*, petalis, excepta carina atropurpurea, flavis. *Ovarium* sessile, subrotundum, compressum, calycem subaequans, stylo triplo brevius, apice longe comoso-villosum, 2-ovulatum. *Stylus* lateralis, capillaris, subrectus, apice incurvus, ad medium usque laxe pilosiusculus, superne glaber. *Legumen* non visum.

DILLWYNIA Sm. Endl. gen. n. 6441. Meisn. gen. p. 81. (58.)*

1. **Dillwynia (Xeropetalum) acicularis** Sieb. DC. prodr. 2. p. 109, n. 5. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2. p. 79, n. 10.

In solo limoso-lapidoso ad radices montium continuorum prope cataractam, d. 25. Jul. Herb. Preiss. No. 881. et in lapidosis cacuminis montis Bakewell (York) d. 5. Sept. 1839. No. 875, (Drummond n. 243, 244, et coll. 1.)

„Frutex 1-3-pedalis, strictus.“ *Ramuli*, praecipue steriles, apice plerumque spinescentes. — Duplicem distinguere licet formam, α *longifoliam*, foliis rectis et suberectis, 5-9 lin. longis No. 881. et β *brevifoliam*, foliis patentibus saepiusque leviter recurvo-arcuatis, vix 3-4 lin. longis No. 875. Inter utramque specimina Drummondiana medium tenent foliis raro ultra 5-6 lin. longis saepiusque patulis. — Variat praeterea racemis terminalibus dense multifloris ovatis et sphaeroideis calycibusque caescentibus v. parce puberulis (specim. Preiss.) et racemis laxiuscule paucifloris, calycibus parce puberulis (Drumm. n. 244 et coll. 1) et glabris pauloque minoribus (Drumm. n. 243.) — *A.* sequente differt praecipue foliis firmioribus, plerumque strictis, nunquam tortis.

2. **Dillwynia (Xeropetalum) laxiflora** Benth. in Hügel Bot. Archiv t. 9; Ann. Wien. Mus. 2. p. 79, n. 11.: ramis adpresse pubescentibus; foliis subpatentibus, rectis, muticis vel mucrone innocuo incurvo, glabris v. junioribus puberulis; racemis subpaniculatis, terminalibus, laxis.

*) E prima generis sectione (**Dillwyniastrum** DC.) nulla species inter Preissianas occurrit. Habemus vero inter plantas Andersonianas circa Sydney lectas **D. phyllicoidem** Cunn. (Benth. l. c. n. 2.) **D. adenophoram** Eudl. Nov. Stirp. decad. 1. p. 24, n. 30, et novam speciem, quam hic describere liceat. **D. brunioides** nob., ramis ramulisque corymbosis, caescenti-puberulis; foliis sparsis, approximatis, patulis, rectis v. subrecurvis, haud tortis, brevibus, obtusiusculis, muticis, dense punctato-scabriusculis, dorso subangulato-convexis, supra unisuleis; capitulis terminalibus sessilibus, calycis caescenti-villosiusculi tubo bracteis ellipticas vix superante, labio superiore acute bifido. — Species proxima **D. phyllicoidi** Cunn., sed distincta: ramificatione fere umbelliformi (nec racemosa) ramis ramulisque validioribus, magis pubescentibus, foliorum cicatricibus denticuliformi-prominulis, foliis crassioribus magisque (saepe angulo recto) patentibus glabris nunquam tortis (2-3 lin. longis) capitulis (3-12-floris, ramulos circiter bipollicares terminantibus) in ramorum apice corymbum formantibus (in illa vero ramulos laterales tenues vix $1\frac{1}{2}$ pollicares terminantibus et secus ramum primarium in racemum laxum dispositis) floribus brevissime pedicellatis acrius congestis paulo maioribus et calyce densius longiusque pubescente.

Annon L. floribunda Sm, ferrea Cunn
 & elegans Euel ad unam speciem mit
 undunda? Cunnighamiana maxim
 poundum brevissimam phrasin et
 locum natalium in nostram quadrat!
 Dillwynianum peres (ornus?) habet
 folia margine involuta nec revoluta
 Dillwyniae peres diffinietur determinan
 da nisi permina authenticata in promptu.

Perf. synopsis. 2. p. 302. et 638

J. E. Smith remarks on the gen. charact of the
 elegant. papil. pl. of M. Hall in Journal of Bot.

x *D. ferrea* Etn. hb. St. N. 210.

sub nomine Notus ericifolius.

ad fluvium Oukaparinga.

ad Aotofumilis proliis latis
 abhorret! Farmaciae ad nostrum
 cognovimus. 400. 49. hb. St. 700.

D. floribunda Sm. hb. St. n. 211.

In via loci natalis deest. var. praeci.

In fruticetis distorum ad nos
 quito - plain et in lapidosis ad
 rivulis pinn. Guiliu Baynes
 Anth: non, affare

x *D. parvifolia* E. J. R. hb. St. 14986

In monte Lully frequenter. fr. 2nd. 14205

var. *parvifolia*, floribus rariis

superior. hb. St. n. 201. In fruticetis

ad St. Merraj. Linn. Cit. 1848.

x *D. glauca*! Smith.

fruticosa pinn. inermis

capitata. In montium fruticetis

prope Wat. St. Morris - vesp. Guiliu

Bay (Exente Octobr 1848. 8th,

St. n. 201 - n. 201.

In arenosis collibus ad St. St. Pauli

hb. St. 500. 1. Nov. Halland

prope per allelu.

x *D. cinerascens* R. Br.

Port Phillip! ^{Laig's}
ad fl. South Esk rivir Tasmania
Oct 49. hb M. 624. 1' alt.

P. ravenosa, corymbis in ramulis
brevissimis secundum ramos racem.
~~Spidign.~~

~~*D. hispida* L. f.~~

x *Isabera* Schlechtendal. { 1.

^{ignosc.}
Lafly range 4 2' hb M. n.
Vexillum ^{marginatum} ~~marginatum~~ lobi & alis
corinaeque flavum. In vallibus
silvaticis prope stat. cl. Darwinport
versus Riant-Bay. Inct. erect 1-2
ft. - hb M. n. 15. In juga montis
Barthi jct. Michaelis - Barossa
range - Oct. 1848. Trans p. murray.
An ab omnibus hucusque cli-
matibus specibus vera diuina?
D. hispida L. f. habeo var! *D. pedunculata*
varis geo etiam vix differe videtur!

macropoda Griseb.

x *D. peduncularis* ^{nam} ~~forsteri~~ Müller
(*D. parvifolia* propinquissima
distincta: pedunculis corymbu-
rum elongato-hiliformibus, ca-
lycis longioribus dentibus acu-
minatis, floribus majoribus,
vix varicosis. Vexilli lobis luteo-
lapi atro-sanguineis. In fruti-
culis montium prope stat. cl. Mor-
ris versus Giverson Bay. ^{Macropoda} ~~Eximio~~
Oct. 1848. Recurrens ^{prostrata} ~~prostrata~~
~~unif. laticulata haq. super cultota rura~~
~~*D. parvifolia* confluit. et longioribus etiam~~
~~nuda ^{prostrata} ~~prostrata~~~~

x *Isabera* ^{forsteri} Müller

^{bracteis}
Vix ut videtur *D. bracteoides*
affinis forsan aliis generis, cum
nam habita peculiariter ramisissimis
partibus, quam bracteis lobi raris
adidentibus et vexillo trilobo ^{pedunculata}
Vexilli lobis ^{indivisi} ~~indivisi~~ partibus
Frut 2-3' Murray - scrub versus Mellington. Oct. 48
Superiora certa h. c. 22

In limoso-calculosis sylvae inter Mahogany creek et Halfwayhouse (Darling's range) d. 13. Sept. 1839, Herb. Preiss. No. 873.

„Frutex sesquipedalis.“ *Ramuli* vix ac ne vix puberuli, steriles apice saepius breviter spinescentes. *Folia* debilia, evidenter torta, saepe varie curvula. *Calyx* glaberrimus. *Vexilli* lamina medio atropurpurea, macula basilari lutea nulla. Caetera in descriptionem l. c. optime quadrant. A praecedente aegre distinguenda ramis minus strictis foliisque debilioribus, foliis tortis plerumque recurvo-mucronulatis, pedicellis paulo longioribus et calycis labio superiore latiore —“).

EUTAXIA R.Br. Endl. gen. n. 6442. Meisn. gen. p. 81. (58.)

1. **Eutaxia dillwynioides** *n. sp.*, glabra, ramulis filiformibus, laxis; foliis oppositis, subteretibus, muticis, supra 1-sulcis; racemis capituliformibus, terminalibus v. axillaribus 6-1-floris; floribus subsessilibus, 2-bracteatis; calyce bracteas foliaceas aequante, membranaceo, fusco, semiquinquesido, lobis acuminatis, superioribus 2 paulo latioribus altiusque connatis.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1191.

Species *Dillwyniam* inter *Eutaxiam* que subambigua, priori accedens habitu ericoideo foliisque (omnino *D. ericifoliae*) marginum involutione subteretibus; recedens vero calyce profundius diviso, vexillo orbiculari nec dilatato et legumine compresso vix ventricoso; potius igitur *Eutaxiae* adnumeranda, cui characteribus fere omnibus convenit, ab utroque tamen genere discrepans seminibus (si ex ovulis recte judico) haud strophilatis. — Proxime affinis sequenti, sed distincta ramis ramulisque haud strictis, foliis confertioribus internodia constanter (in illa vix unquam) superantibus nunquam planis nec canaliculatis sed sulco tantum angustissimo exaratis dorso convexis v. subcarinatis et calyce subscarioso-membranaceo fusco bracteolas duploto superante laxo subturbinato, lobis tubo paulo longioribus magisque acuminatis. — „Frutex pedalis.“ *Flores* nunc 3-6 in ramorum apice approximati, capitula terminalia simulantes, nunc 3-1 ramulos laterales brevissimos terminantes, primo vultu axillares sparsos mentientes. *Petala* marcescentia, subpersistentia, forma, magnitudine et colore omnino sequentis. *Stylus* uncinatus, brevis, basi paulo dilatato pilosus, apice capillaris glaber; stigma capitatum. *Legumen* (immaturum) sessile, 3 lin. longum, 1½ lin. latum, compressum, parce adpresseque pilosiusculum, sutura superiore subrecta, inferiore arcuata, valvis vix convexis.

2. **Eutaxia ericoides** *n. sp.*, glaberrima, ramis gracilibus, erectis; foliis oppositis, crecto-patulis, anguste linearibus, subacutis, muticis, planis v. subcanaliculatis; pedicellis axillaribus v. subterminalibus, calycis herbacei viridis labio superiore acute bidentato, inferioris lobis lanceolatis acutis.

In colonia ad fluv. Cygnorum legit Jac. Drummond, n. 245 et coll. I.

*) **D. (Xeropetalum) cinerascens** R.Br. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2. p. 79, n. 12. exstat inter plantas a cl. Latrobe ad Port Philipp lectas, fide specim. in Herb. Mus. Neocomens.

? β **filicaulis**, ramis ramulisque tenellis, elongatis, floribus in ramorum v. ramulorum apice paucis (4-1) subsessilibus foliisque minoribus. — An species distincta?

In dumetis arenosis ad fl. Cygnorum, d. 9. Apr. 1839. Herb. Preiss. No. 877.

Plurimis notis convenire videtur cum *E. virgata* Benth., sed differt ramis, etsi strictiusculis, tamen debilibus, penna corvina tenuioribus (nec virgatis) foliis haud cuneatis et axillis bi-nec (nisi abortu) unifloris. „Frutex 2-pedalis, debilis;“ rami dense corymboso-ramosi, internodiis plerumque folia aequantibus. *Folia* 3-6 lin. longa, $\frac{1}{3}$ -raro 1 lin. lata (in ramulis novellis saepe dimidio minora et confertiora) obsolete 1-nervia, avenia, plus minus complicato-canaliculata v. demum plana, rigidula, haud pungentia, laete viridia. *Pedicelli* $1\frac{1}{2}$ lin. longi, recti, medio bracteolis 2 angustis acutis 1 lin. longis ipsos superantibus muniti. *Flores* erecti v. patuli. *Calyx* viridis, $2\frac{1}{2}$ lin. longus, subcampanulatus, parum curvatus, basi brevissime attenuatus, obsolete nervosus, tubo labiis subaequali, laciniis petalis genitalibusque *E. epacridoidis*. Var. β praeter notas indicatas a planta Drummondiana non differt nisi floribus constanter dimidio fere minoribus nec unquam immediate axillaribus, sed ramulos (etsi saepe brevissimos) terminantibus. Utrum propterea specificè separanda sit nec ne, ex paucorum speciminum inspectione dijudicare non audent.

3. **Eutaxia epacridoides** n. sp., glaberrima, caulibus strictis, simplicissimis v. parce ramosis; foliis oppositis, sessilibus, lineari-lanceolatis, subpungenti-acutis, supra concavis, dorso convexo obsolete 1-nerviis, aveniis; pedicellis axillaribus geminis, brevissimis, basi medioque bi-bracteolatis, floribus pendulis; calyce nervoso-striato, basi attenuato, labii superioris paulo longioris lobis divergentibus brevibus acutis, inferioris linearibus acuminatis.

In solo turfoso inter frutices densos prope montes Melville et Elphinstone (Plantagenet) d. 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 412 et 867.

„Frutex pedalis, strictus.“ Habitus quodammodo *Epacridearum* et *Struthiolearum*. *Caules* ramique basi divisi, superne simplicissimi v. parce ramosi, graciles, strictiusculi, foliis quamvis copiosis non (ut in sequentibus) absconditi, cortice laevi sanguineo-fusco epidermide tenera demum longitudinaliter rimosa cinerea decidua tecto. *Folia* 6-8 lin. longa, 1 lin. lata (in ramulis interdum dimidio minora) internodio plerumque $\frac{1}{4}$ longiora, erecta, initio subadpressa, dein laxiuscula, recta v. apice subrecurva, utrinque attenuata, basi obtusa, apice acutata et satis pungentia (etsi mucrone proprio destituta, supra laete viridia et marginum involutione concava, subtus plus minus convexa et livide pallescentia, nervo medio parum conspicuo apicem versus saepius evanescente, venis obsoletissimis faciem dorsalem parallele striantibus v. nullis, facie utraque calycibusque sub lente punctato-scribuculatis. *Flores* saepe ab inferiore caulis parte incipientes, quasi spicas foliosas formantes. *Pedicelli* e singulis axillis gemini, rarius solitarii, 1- $1\frac{1}{2}$ lin. longi, constanter apice patentes v. recurvi, rubri, ima basi bractea ovata v. oblonga obtusa vix $\frac{1}{2}$ lin. longa medioque bracteolis 2 oppositis paulo minoribus acutis dentiformibus pedicello brevioribus praediti. *Calyx* herbaeus, viridis v. erubescens, infundibuliformi-campanulatus, parum curvulus, basi attenuatus, 2 lin. longus, corolla dimidio brevior, tubo labiis subaequali nervis 10 tenerrimis ad sinus et lacinularum apicem tendentibus striato, labii superioris lobis $\frac{1}{2}$ lin. longis. *Vexillum* obovato-subrotundum, leviter emarginatum, atropurpureum margine aurantiacum. *Alae* parum breviores, cuneato-spathulatae, aurantiacae, apice rotundato $\frac{2}{3}$ lin. latae. *Carina* recta, alis brevior, calyce paulo longior, lanceolata, acutiuscula, apice atropurpurea. *Ovarium* sessile, obovatum, apice parce villosum, 2-ovulatum,

mount. Vaguer. Floriceps plani yellow.
D. hispida Lf. (nomen vix aptum!)
variat ut omnes ^{plurimum} turrurum anthra-
lium communes diverso modo:
nempe indumento longiore
breviore, & plus minus deofo
habitu procurrenti ^{se} erecto, gracilente ro-
bustore, ^{magis minusve} pubescentibus abbreviatis
vel elongatis pubescentibus
vel omnino glabris, floribus
majoribus minoribus raro
parvis, in corymbo
rariis ~~etiam~~ in racemum
elongato,
et parvis aestivis montium Floris
raro usque

D. macrophylla Guss. (vide antea)
D. hispida Lf. D. glabra Guss. in litt.
Species antiqua et D. parvifolia
foliis et pubescentibus pubescentibus lon-
gioribus habitu graciliori calycis
dentibus acuminatis, a D. hispida
habitu graciliori, foliis paullo bre-
vioribus et glabrioribus foliis pubescentibus,
a D. glabrissima foliis tripleve bre-
vioribus obtusiusculis, calyce lon-
giori dentato, vexillo magis
usoso, ^{distinta} porro D. filifolia huc
avertere videtur. An sit var. D.
hispida, cui rursus maxime cog-
nata, posterioris investigatione
darebunt.

Dillwynia? abnormis pro Mendo
Australiae felicis.

stylo tenni apice uncinato paulo longius; stigma minutum, subcapitatum. *Legumen* desideratur. — Affinis *E. virgatae* Benth., quae differt foliis cuneatis, muticis, pedicellis solitariis, bracteolis pedicellum superantibus, caet.

4. ***Eutaxia parvifolia* Benth.** in Hüg. Enum. p. 34, n. 102; Ann. Wien. Mus. 2, p. 80. Walp. rep. 1. p. 573: ramosissima, foliis confertis, obovatis, obtusiusculis; floribus subsessilibus; calycis labio superiore apice bifido, laciniis acuminatis, inferioris laciniis subulato-acuminatis.

In rupestribus clivuli arenosi ad portum Princess Royal Harbour m. Dec. 1840 Herb. Preiss. No. 1020.

„Frutex 4-pedalis.“

5. ***Eutaxia reticulata* n. sp.**, ramis strictis, pubescentibus; foliis ternatim verticillatis, imbricato-adpressis, ovatis, obtusis, glabris, leviter carinato-complicatis, 1-nerviis, reticulatis; pedicellis infra ramorum apicem axillaribus, solitariis; calycis villosi labio superiore acute bifido inferiorisque lobis lanceolatis acuminatis.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, m. Oct. 1840 specimina pauca imperfecta Herb. Preiss. No. 870.

„Frutex pedalis, strictus.“ *Rami* tenues, tamen rigidi, foliis undique tecti. *Stipulae* nullae. *Folia* sessilia, 2-3 lin. longa, basi 1-2 lin. lata, obtusa, venis acute prominulis dense anastomosantibus scrobiculato-reticulata, laete viridia. *Flores* magnitudine et structura fere *E. parvifoliae*, sed calyx cano-villosus latior basi vix attenuatus et lacinae latiores minus (nec setaceo-) acuminatae. *Carina* latior ovato-oblonga obtusissima atropurpurea. *Alae* aurantiacae. *Vexillum* orbiculare, leviter emarginatum, dorso atropurpureum, antice aurantiacum. *Ovarium* subsessile, villosum, biovulatum, stylo glabro fere longius. Caet. ignota. — An vere hujus generis?

6. ***Eutaxia cuneata* n. sp.**, ramosissima, glaberrima; foliis oppositis, obovato-oblongis, cuneatis, apice rotundatis v. obtusiusculis, dorso convexis 1-nerviis subaveniis; pedicellis axillaribus, solitariis, floribus nutantibus; calycis labio superiore truncato emarginato, inferioris lobis lanceolatis acutis.

In rupestribus collium Konkoberuphills (Kent) d. 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1022.

„Frutex 3-pedalis.“ *Rami* ramulique semipatentes, foliorum cicatricibus densissime denticulati. *Folia* exstipulata, decussato-opposita, coriacea, supra laete viridia, subtus saepe sanguinea, initio erecta imbricato-adpressa et plus minus complicato-concava, demum laxiuscula saepeque fere plana, nervo parum prominulo, venis supra magis quam subtus conspicuis. *Pedicelli* infra ramulorum apicem axillares, vix lineam longi, bracteolis exiguis acutis. *Calyx* subcurvo-campanulatus, sanguineus, laevis, subnerviis, lobiis subaequilongis, superioris laciniis 1 lin. latis. *Petala* aurantiaca v. rubra? vexillo orbiculari subemarginato medio saturatiore, carina atropurpurea fere recta. *Legumen* sessile, lanceolatum, turgidulum, parce pilosum, 2-sperinum. *Semina* atra, opaca, stropholiola parva subbifida. — Affinis *E. parvifoliae* et *myrtifoliae*; a priore distincta: foliis obtusis apice magis dilatatis floribusque dimidio majoribus et praecipue calycis laciniis haud acuminatis, labio superiore brevissime emarginato; a posteriore: ramis haud virgatis, foliis magis approximatis (vix 1 lin. ab invicem distantibus) obtusissimis v. vix acutiusculis (nec nunquam attenuato-pungentibus) aveniis v. obsolete penni-

venis, minoribus (3-4 lin. longis, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ lin. latis) floribus solitariis, pendulis, dimidio majoribus et calyce ampliore.

7. **Eutaxia myrtifolia** R.Br. DC. prodr. 2, p. 109.
Dillwynia myrtifolia Sm. — *D. obovata* Labill. Nov. Holl.
 t. 140. (Lam. ill. t. 952.) Bot. Mag. t. 1274.

In divulo arenoso ad portum Princess Royal Harbour, d. 27. Sept. 1840.
 Herb. Preiss. No. 1019.

„Frutex 2-5-pedalis.“

GASTROLOBIUM R.Br. Endl. gen. n. 6443. Meisn. gen. p. 81. (58.)

1. **Gastrolobium bilobum** R.Br. Bot. Reg. t. 411! DC.
 prodr. 2, p. 110.

In rupestribus circa oppidum Albany (Plantagenet) d. 25. Sept. 1840. Herb.
 Preiss. No. 799. (fl. et fr.)

„Frutex 6-pedalis.“ *Folia* pleraque non cuneata, sed arcuato-attenuata.
Racemi fructiferi fere umbelliformes, rhachi vix 2-3 lin. longa, pedicellis
 radiantibus 4-5 lin. longis.

2. **Gastrolobium trilobum** Benth. in Lindl. Swan
 River p. XIII, n. 52. Walpers repert. 1. p. 573: glabrum,
 foliis oppositis ternisve, crassis, cuneato-trilobis, lobis late
 lanceolatis, integerrimis, spinoso-mucronatis, intermedio
 majore; racemis axillaribus terminalibusque, laxis, folium
 subaequantibus, calycis leviter sericei labio superiore lon-
 giore breviter bifido, ovario stipitato villosa.

In glareosis sterilibus prope Williams (Wicklow) m. Mart. 1841. sterile. Herb.
 Preiss. No. 825. (Drummond n. 187 et coll. l.)

„Frutex bipedalis.“

3. **Gastrolobium tricuspdatum** n. sp., ramis pu-
 bescentibus, foliis oppositis ternisque, cuneatis, apice trun-
 cato- v. emarginato-bilobis, medio lobisque mucronatis,
 supra laeviusculis, subtus dense minuteque scrobiculato-re-
 ticulatis, junioribus cano villosiusculis; pedicellis axillaribus,
 fasciculatis, brevissimis; calycis sericei lobis subaequilongis,
 lanceolatis, acuminatis, superioribus altius connatis parum
 latoribus, ovario sessili sericeo, stylo compresso glabro.

In region. interior. Australiae merid.-occid., m. Oct. 1840. Herb. Preiss.
 No. 839.

β **latifolium**, foliis majoribus, dilatatis, explanatis.

Swan River. Drummond n. 212.

γ **subinermis**, foliis parvis, apice rotundatis retusisve medio
 tantum mucronatis.

In plantis arenosa Quangen (Victoria) d. 20. Mart. 1840. sterile. Herb. Preiss.
 No. 830.

Frutex facie fere *Lambertiae echinatae*, ramis rigidis, erectis, dense foliosis ramulisque teretibus pube molli densa brevi sordide cinerea v. albida villosa - tomentosis, internodiis semipollicaribus v. brevioribus. *Stipulae* setaceae, vix rigidae, 3-4 lin. longae, erectae, nigrae, pubescentes. *Folia* ternatim verticillata, rarius opposita v. hinc inde sparsa, rigide coriacea, laete viridia, cum petiolo (vix $\frac{1}{2}$ -1 lin. longo) 8-10 lin. longa, apice 3-4 lin. lata, complicata (in var. β 1-1 $\frac{1}{2}$ poll. longa, 5-7 lin. lata plana; in γ 3-6 lin. longa, 2-3 lin. lata, explicata, margine recurvo) euneato-attenuata, basi acuta v. rarius (in γ) obtusa, apice nunc emarginata v. satis profunde biloba, nunc (praecipue in β) rotundata v. subretusa, lobis lateralibus rotundatis (rarius acutiusculis) mucronulo pungente recto semilineam longo fuseo (in var. γ deficiente) sinuque intermedio simili mucrone nervum medium terminante apiculatis, nervatione supra immersa obsoleta, subtus prominula, nervo medio crassiusculo, venis pinnatis obsoletis, interstitiis reticulatione densa minute scrobiculatis v. quasi impresso-punctatis; juniorum pagina utraque cano-villosiuscula, demum (praecipue superiore) glaberrima. *Pedicelli* in singulis axillis 2-3 (raro solitarii) e tuberculo obsoleto (racemi axi contracto) orti, $\frac{1}{2}$ -1 lin. longi, ebracteati. *Calyx* campanulatus, rufus, pube brevi adpressa albedo-subsericeus, 3 lin. longus, semiquinquefido-bilobatus, lobis erectis triangulari-lanceolatis acuminatis, labii superioris altius connatis vix latioribus. (Petala staminaque non vidimus.) *Ovarium* sessile, ovatum, acuminatum, sericeo-pilosiusculum, 2-ovulatum, stylo compresso-filiformi basi puberulo supra glabro apice incurvo fere brevius. *Stigma* acutum. *Legumen* . . . . — Species stylo compresso et ovario sessili ad *Spadostylem* quodammodo accedens, sed calyce discrepans et certe *Gastrolobio* adnumeranda. Formas tres nobis obvias, etsi primo vultu foliis satis diversas, mere tamen unius speciei varietates esse, probatur foliorum consistentia et reticulatione, stipulis et ramorum pubescentia in omnibus specimenibus penitus iisdem. Var. γ sola, ejus flores ignoti, forsan specificae distincta, quod tamen dubitamus.

4. ***Gastrolobium ilicifolium* n. sp.**, ramis, foliis junioribus calycibusque subsericeo-villosiusculis; foliis ternis oppositisque, obovatis oblongisque, basi integra cuneatis, apice v. ultra medium spinoso-dentatis, planis v. undulato-sinuatis, supra laevibus, subtus penniveniis minuteque reticulatis glaucis? demum glabris; racemis axillaribus abbreviatis, calycis lobis subaequalibus, superioribus 2 altius connatis vix latioribus, ovario stipitato villosa.

In limoso-lapidoso umbrosis ad latus septentrionale montis Bakewell (York) d. 8. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 821. et in region. interior. Australiae merid.-occid., n. Febr. 1841. No. 829. (Drummond n. 211.)

„Frutex 4-pedalis,“ ramis validis, strictis, erectis, pubescentia *G. tricuspidati*. *Folia* (fere *Plagiolobiorum*) brevissime petiolata, ternaria v. rarius opposita, 1-2-pollicaria, 5-16 lin. lata, rigide coriacea, laete viridia (juniora subtus glauca?) reticulatione tenui densa (paulo tamen laxiore ac praecedentis); variant (saepae in eodem ramo) circumscriptione obovata, elliptica et oblonga, basin versus brevius longiusve cuneato-angustata, margine ab apice ad medium usque vel ultra sinuato-dentato, sinibus levissimis fere rectilineis aut profundioribus 1 $\frac{1}{2}$ -6 lin. latis, mucronibus $\frac{1}{4}$ -1 lin. longis, apice acuto aut praemorso-truncato (semper tamen mucronato.) *Racemi* circiter semipollicares (juniores contracti, fere capituliformes) satis dense multiflori. *Calyx* paulo minor quam praecedentis, structura fere eadem. *Corolla* calyce vix duplo longior, vexillo suborbiculari leviter emarginato alisque „auriculacis“, carina obtusissima purpurea. *Filamenta* libera. *Ovarium* longiuscule villosum, 2-ovulatum, stylo glabro filiformi compresso brevius, stipite vix calycis tubum aequante. *Stigma* obtusum. *Legumen* . . . .

5. **Gastrolobium spinosum** Benth. in Lindl. Swan River p. XIII, n. 48. Walpers rept. I. p. 573: glaberrimum, foliis oppositis, sessilibus, late ovatis, cordatis, sinuato-dentatis, spinescentibus; racemis terminalibus, calyceis labio superiore lato breviter bifido, ovario longiuscule stipitato villosa, legumine glabro.

In solo sublimoso inter rupium rimas prope Cataractam ad caput fluvii Cygnorum, d. 25. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1130. in planitie arenosa Quangen (Victoria) d. 20. Mart. 1840. No. 1135. et in regionibus interior. Australiae merid.-occid. No. 1129 et 1134. (Drummond n. 186.)

„Frutex 2-4-pedalis, squarrosus.“ *Rami* juniores glauci. *Folia* elegantè denseque reticulata, nervo venis venulisque in utraque pagina acute prominulis. *Racemi* terminales et axillares, 1-1½-pollicares, folia summa duplo et ultra superantibus, peticellis calycem subaequantibus; *calyx* 2½-fere 3 lin. longus vix dimidium corollam aequans. *Legumen* glabrum, oblongum, subventricosum, utrinque acutum, turgidum, 5 lin. longum, valvis 2 lin. latis obsolete venosis laevibus fuscis. *Semina* oblonga, nigra, laevia, strophiolata. — Variat foliis nunc ovatis, fere bipollicaribus sesquipollicem latis, margine subnerviformi utrinque 4-5-spinoso (No. 1134.) nunc late triangulari-ovatis, saepe latoribus quam longis (5-12 lin. longis, 8-18 lin. latis) basi saepius rectilineo-truncatis, margine utrinque 2-4-spinosis (No. 1130.) foliis deltoideo-ovatis, basi semper plus minus cordatis, 8-16 lin. longis, 6-12 lin. latis, margine simplici prope medium 2-1-spinulosis v. hinc inde inermibus, spinulis totiusque laminae consistentia tenuioribus (Preiss. n. 1129 et Drumm. 186.) denique foliis spinoso-5-angulis, 4-8 lin. longis latisque basi subtruncatis.

6. **Gastrolobium Preissii** n. sp., glabrum, foliis oppositis, subsessilibus, crassiuscule coriaceis, cordatis, spinoso-mucronatis, margine sinuatis spinoso-dentatis integerrime, utrinque laevibus; racemis terminalibus axillaribusque, folio vix longioribus; calyceis labio superiore breviter bifido, lobis obtusiuseulis, inferioris lobis acutis vix angustioribus, ovario longiuscule stipitato villosa.

In solo sublimoso district. Hay, d. 8. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1131. et in region. interior. Australiae merid.-occid. No. 1133.

α foliis late ovatis (8-12 lin. longis, 7-10 lin. latis) sinuato-dentatis, dentibus spinescentibus utrinque 2-3. No. 1131.

β foliis cordato-deltoideis (8-11 lin. longis, basi 3-6 lin. latis, apicem versus sensim attenuatis) integerrimis No. 1133.

Species praecedenti simillima, sed praeter notas indicatas floribus minoribus et ovario longius villosa facile dignoscenda. „Frutex 3-pedalis.“ *Foliorum* nervus venaeque primariae visibiles quidem, sed omnino immersae aut vix ac ne vix prominulae et interstitia potius minute punctulata quam vere reticulata. *Racemi* 6-10 lin. longi. *Calyx* pedicello plerumque duplo longior (2 lin. longus) lobis margine pubescentibus. *Ovarii* stipes calycem fere aequans. — A *G. cordato* Benth. differt foliis acutis, pungentibus, angustioribus, non semper integerrimis, floribus multo minoribus.

7. **Gastrolobium villosum** Benth. l. c. n. 46. Walp. l. c. p. 573: foliis oppositis, ovato-lanceolatis, cordatis, obtusis, setaceo-mucronatis, margine undulatis, subtus ramisque molliter villosis; racemis terminalibus axillaribusque

demum clongatis; bracteis lanceolatis, acutis, fuscis, calyce subbilabiato longioribus, deciduis, ovario longiuscule stipitato villosus.

In limoso-calculosis sylvae prope Halfwayhouse (Darling's-range) d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 810. (Drummond n. 194.)

„Frutex decumbens.“ *Rami* adscendentes? satis firmi. *Stipulae* setaceae, 3-6 lin. longae. *Folia* 10-20 lin. longa, 5-14 lin. lata, reticulata, margine constanter integerrima inermia, interdum imo (Drumm. n. 194.) plana v. vix undulata. *Racemi* erecti, cum pedunculo 1-2-pollicari demum 5-7-pollicares, floribus (fere *G. Preissii*) oppositis v. subverticillatis, bracteis 3-5 lin. longis calycibusque pubescentibus, pedicellis calyce dimidio brevioribus. *Vexillum* aurantiacum, *carina* alaeque purpureae. *Legumen* subglobosum, pisi majoris mole, pilosiusculum, stipite calycem subaequante (immaturum.)

8. **Gastrolobium parvifolium** Benth. l. c. II. 47. Walp. l. c.: ramis pubescentibus, foliis ternis, erectis, oblongis, obtusis, mucronatis, integerrimis, crassiusculis, reticulatis, glabris, junioribus glaucis; racemis terminalibus; bracteis oblongis, fuscis, deciduis; calycis glabriusculi labio superiore lato, emarginato, ovarii villosi stipite incrassato.

In limoso-arenosis planitie montis Bakewell (York) d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1017.

„Frutex 4-pedalis.“ *Rami* graciles, erecti. *Stipulae* tenerae, setaceae, 1-1½ lin. longae, deciduae. *Folia* vix semipollicaria, sesquilineam lata. *Racemi* 2-3-pollicares. *Flores* fere *G. villosi* et *Preissii*, calyce fere *G. spinosi*, labio superiore lato truncato brevissime emarginato.

9. **Gastrolobium calycinum** Benth. l. c. n. 51. Walp. l. c.: ramis glabris, foliis ternis oppositisque, lanceolatis oblongisve, aristato-mucronatis, integerrimis, glaucis; racemis axillaribus et terminalibus laxae paucifloris, calycis ampli glabriusculi labio superiore lato bifido, ovario stipitato, legumine villosus.

In limoso-calculosis montis Bakewell (York) d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 836. et in sublimosis district. Goderich, m. Dec. 1840. No. 835. (Drummond n. 203.)

„Frutex 2 3-pedalis.“ *Stipulae* setaceae, subspinescentes, demum patentes 2-3 lin. longae. *Folia* plerumque pollicaria, 5-6 lin. lata, petiolo ½-1½ lin. longo. *Racemi* 2-3 pollicares. *Bractaeae* fuscac, ovatae, acuminatae, florem amplexantes, 3-5 lin. longae. *Calyx* 3-4 lin. longus, latus, basi breviter attenuatus, labio superiore latiusculo bifido. *Petalorum* forma et color praecedentium. *Ovarii* villosiusculi ovato-subglobosi (mole nuclei cerasini) stipes vix calycis tubum aequans *).

---

*) **G. Drummondii** n. sp., ramis gracilibus, puberulis; stipulis setaceis, erectis, petiolos longiusculos vix superantibus; foliis ternis, lanceolatis, pungenti-mucronatis, reticulatis, glaucis; racemis axillaribus terminalibusque, laxiusculis, calyce pubescente. . . . . Swan River. Drummond n. 204 et coll. I. — Habitu foliisque **G. calycino** simillimum, sed notis indicatis, praecipue petiolo duplo-triplo longiore (1½-2½ lin. longo) foliorum reticulatione fortiore, calyce minore (2½-3 lin. longo) adpresse cano-pubescente ejusque labio superiore angustiore facile dignoscendum. Folia nonnunquam elliptica, 14 lin. longa, 8 lin. lata.

10. **Gastrolobium oxylobioides** Benth. l. c. n. 50? Walp. l. c., β *microcarpum* nob., ramis apice puberulis; stipulis setaceis, erectis, petiolo brevissimo multo longioribus non spinescentibus; foliis ternis, elliptico-lanceolatis, spinoso-mucronatis, utrinque attenuatis, tenuiter reticulatis, subtus subsericeis; racemis axillaribus terminalibusque, folia subsuperantibus, calycis labio superiore obtuso bifido; legumine stipitato, ovato, turgido calyceque pilosiusculis parvis.

In region. interior. Australiae meridionali-occidentalis, m. Febr. 1841. Herb. Preiss. No. 816, 817. (Drummond. n. 205.)

An nova sp.? e speciminibus suppetentibus imperfectis a diagnosi l. c. nimis brevi non satis dignoscenda, *G. calycino* foliis simillima, et calyce jam distinctissima. *Stipulae* tenues, erectae, 3 lin. longae, nunquam patentēs nec spinescentes (in specim. Drummond. $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longae; petiolo vix longiores.) *Racemi* laxiusculi, bractae fugaces, ... *Pedicelli* $\frac{1}{2}$ -1 lin. longi. *Flores* nutantes, iis *G. parviflori* paulo minores, aurantiaci, *carina* purpurea. *Calyx* 2 lin. longus, corolla vix dimidio brevior pubescens, labiis subaequalibus tubo basi vix attenuato brevioribus, superioris lobis parum latioribus rotundatis, inferioris ovatis acutis. *Legumen* vix 2 lin. longum (in *G. calycino* circ. duplo majus) stipite calycem (in illa vix ejus tubum) subaequante.

11. **Gastrolobium Lehmanni** n. sp., ramis tomentosis; stipulis setaceis, petiolum subsuperantibus; foliis oppositis, oblongis, obtusis, obsolete mucronulatis muticisve, margine subrevoluto obsolete crenulatis, supra reticulatis glabris, subtus adpresse cano-villosis, racemis axillaribus brevissimis, fasciculiformibus, calycibus sericeis.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occid., m. Febr. 1841. Herb. Preiss. No. 806.

Species foliis, inflorescentia floribusque *Oxylobio capitato* multo similior quam congenerum ulli. *Rami* virgati, teretes, albido-tomentosi. *Folia* $1\frac{1}{2}$ -2-pollicaria; 6-7 lin. lata, utrinque aequaliter attenuata, apice obtuso v. interdum retuso mucronulo vix conspicuo deciduo terminata, margine leviter recurvo nervulis prominulis quasi irregulariter minuteque crenulata, coriacea, supra viridia et minute reticulata (nervo medio impresso venisque inconspicuis) subtus pube albida densa adpressa brevi reticulationem praeter nervum venasque primarias occultante tecta, petiolo sesquilineam longo. *Racemi* axillares, propter pedunculum communem valde contractum obsoletum potius capitula v. fasciculis referentes, 6-10-flori, pedicellis vix lineam longis, calyce dimidio brevioribus. *Calyx* sericeus, campanulatus, semi-5-fidus, lobis 2 superioribus paulo altius connatis latioribusque. *Petala* subaequilonga, longiuscule unguiculata, vexillo ovato-subrotundo integro medio atropurpureo margine alisque obovato-oblongis cuneatis aurantiaco, *carina* rectiuscula obtusa atropurpurea. *Filamenta* filiformia, glabra. *Ovarium* breviter stipitatum, oblongum, villosum, biovulatum! stylo tenui compresso incurvo paulo brevius. *Ovula* estrophilota. *Legumen*. . . . .

12. **Gastrolobium obovatum** Benth. in Lindl. Swan River p. XIV, n. 53. Walp. l. c. p. 573: foliis oppositis sparsisve, cuneato-obovatis, acutis, mucronatis, integerrimis, junioribus ramisque sericeis, adultis glabris; racemis axillaribus, densis, paucifloris; calycis sericei labio superiore bifido; ovario stipitato, villosa.

An hinc *Gastrolobium* species?
S. microphyllum R. Br.
 1. *Sclerothamnus diffusus* Ferdm.
 Legumen desideratum sed ovarium
 pedicellatum. Rara nervimus
 an hic precipue distat ab alia
 a cl. Joiss. communicata, quoniam
 solummodo folia latiora & bre-
 viora et habitus magis ramo-
 sus & diffusus, ponne an ne no-
 strum Brunonianus sit.
 In arenosis inter montem Bar-
 kori & fluvium Murray in fru-
 ticeis Oct. 1848, atque ad ripas
 fluvii ipsius haud longe ab officio.
 Frut. 1-2' sem. In calibus
 calvaris prope Enfield. Oct. 2.
 In fruticibus prope Enfield. Oct. 2.
 In fruticibus prope Enfield. Oct. 2.
 2. *Stricklandia Ferdm.*
 h. l. f. n. 74. vide *S. microphyllum*
 carina magna ex parte rubella.
 Sept. 2.
S. microphyllum R. Br. Port Lewis.
 3. *Spinulopus Ferdm.* N. Frey.
 Confer *Rosa*? *Phyllostachya*? decussata
 Ferdm. alius, quae hujus lori
 et foliis oppositis disjuncta.
 Typi legi plantam in fruticeis
 inter oppidum Strott-halbijn
 & fl. Murray, Oct. 1848. sem. frut. 1-3'.
 Frut. 1-3'. Pappi luteum
 purpurascens striatum. Ca-
 rina (pordide) purpurea. Flor. odor.
 hinc *Eutaxia imbricifolia* Schlechtend.
 4. *Plegitis* Ferdm. (*Gastrolobium*)
 Ramis tenuibus, foliis magis diffu-
 sit. ab antecedente abhorret.
 Frut. humilis in collibus ante montes
 urbi Adalidis proximos. Excurrens Nov.
 1848.

In solo limoso-arenoso et in calciosis ad latus occidentale et septentrionale montis Bakewell (York) d. 8. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 874, et ex parte No. 800. et in region. interior. Australiae merid.-occid. No. 819. (Drummond coll. I, sine no.)

β verticillatum nob., foliis ternatim v. quaternatim verticillatis, rarius oppositis sparsisve, rhomboideo-ellipticis (6-9 lin. longis, medio 4-6 lin. latis, utrinque aequaliter cuneato-attenuatis.)

Swan River. Drummond n. 206.

„Frutex 2-3-pedalis.“ *Folia* 5-10 lin. longa, $2\frac{1}{2}$ -5 lin. lata, plerumque complicata et basin versus cuneato-angustata, apicem versus (nec medio) latiora, utriusque minute reticulata, apice saepius paulo recurva. Inflorescentia, petala et stamina *G. Lehmanni*, scilicet flores fere duplo minores. *Pedicelli* calycem aequantes v. parum breviores, $1\frac{1}{2}$ lin. longi. *Calycis* lobi setaceo-acuminati. *Vexillum* suborbiculare, levissime emarginatum. *Ovarii* breviter albo-villosi biovulati stipes calycem subaequans pilosus. *Legumen* non vidimus.

13. **Gastrolobium spathulatum Benth.** l. c. n. 54. Walp. l. c.: foliis ternis sparsisve, spathulatis, apice dilatato retusis v. emarginato-bilobis, margine integerrimis, deorsum valde angustatis, junioribus ramisque serieis, adultis glabris; racemis axillaribus, abbreviatis, subcapitatis; calyce seriei labio superiore emarginato-bifido; ovario stipitato, villosio.

In *calciosis* ad latus septentrionale montis Bakewell (York) d. 8. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 800, ex parte. (Drummond n. 208 et coll. I.)

„Frutex bipedalis.“ *Folia* apice emarginato-biloba, lobis rotundatis, sinu mucronulo debili recto v. recurvo deciduo munito, reticulatione paulo grossiore et stipulis longioribus quam *G. obovati*, cui inflorescentia florumque magnitudine structura et colore simillimum, *Legumen* ventricosum-ovoideum, magnit. pisi, villosiusculum, intus papillosum!

14. **Gastrolobium Brownii n. sp.**, ramulis puberulis; stipulis minutis, setaceis, deciduis; foliis ternis oppositisque, subsessilibus, cuneato-oblongis obovatisve, obtusis, mucronatis, planis, reticulato-penniveniis, glabris, pedunculis axillaribus folio dimidio brevioribus, corymboso-paucifloris; calyce pedicello vix longiore, puberulo, dentibus 2 superioribus brevibus obtusiusculis, inferioribus 3 acutis; ovarii villosi stipite pubescente, calyce subaequante.

In rupestribus summitatis montis Wuljenup (Plantagenet) d. 13. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 802.

„Frutex 8-pedalis.“ Habitus praecedentium. Differt a *G. spathulato*: foliis basin versus minus angustatis, apice nunquam emarginato-bilobis, mucrone fortiore pungente semilineam longo recto; a *G. obovato*; foliis apicem versus nunquam attenuato-acutatis, mucrone brevioribus; ab utroque: foliis basi obtusis, reticulatione laxiore, venis primariis magis quam venulae interstitiales conspicuis, pedunculo communi magis conspicuo ebracteato apice tantum 2-3-floro et calyce parce puberulo vix sericeo subglabrescente).

*) *G. Hookeri n. sp.*, ramis villosiusculis; stipulis setaceis, parvis, persistentibus; foliis oppositis, ovali-oblongis, utrinque vix angustatis, basi rotundatis, apice obtuso v. subretuso submuticis, tenuiter reticulatis, junioribus pubescentibus; racemis

15. **Gastrolobium epacridoides** *n. sp.*, ramis virgatis, gracilibus, villosis; foliis ternis, exstipulatis, sessilibus, patulis, ovatis, acutis, pungenti-mucronatis, utrinque reticulatis glabris, axillis 1-2-floris, pedicellis calycem subaequantibus, calycis adpresse cano-pilosi lobis tubo brevioribus acutis, superioribus 2 altius connatis, ovario brevissime stipitato.

In rupestribus ad jugum montium Darling's-range prope Cataractam (Perth)

d. 16. Jan. 1840. Herb. Preiss. No. 837. (Drummond n. 196.).

„Frutex 3-pedalis.“ *Folia* sessilia, basi rotundata, haud cordata, nervo subtus acute prominulo, venis primariis in reticulatione vix distinguendis. *Legumen* ovato-globosum, nuclei cerasini mole, mucronatum, pilosiusculum, 2-spermum, intus laeve glabrum. — A *G. acuto*, (saltem quoad specim. nostra et Bot. Mag. t. 4040.) cui pubescentia, inflorescentia, florumque magnitudine convenit, differt: stipularum defectu! foliis late ovatis (3-7 lin. longis, 2-5 lin. latis) reticulatione densiore paulo obtusiore v. minus prominula, calycis lobis acutis, nec acuminatis, et petalis (praecipue alis carinae) paulo majoribus.

EUCHILUS R.Br. Endl. gen. n. 6444. Meisn. gen. p. 81. (58.)

1. **Euchilus obcordatus** R.Br. Bot. Reg. t. 403! Bot. Cab. t. 60. DC. prodr. 2, p. 110. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 80.

In calculosis ad jugum montis Baldhead (Sinus Regis Georgii III.) d. 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 804.

„Frutex decumbens. *Vexillum* alacque crocea, *carina* purpurea.“

2. **Euchilus linearis** Benth. in Hügel Enum. p. 35, n. 104; Ann. Wien. Mus. 2, p. 80. Walpers rept. 1. p. 574: foliis alternis (rarius oppositis) linearibus, margine revolutis; pedicellis axillaribus, 1-floris, folium aequantibus.

In arenosis inter frutices densos prope Pineapple (Perth) m. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 879 et 1110. (Drummond n. 195 et coll. I.)

axillaribus brevissimis, fasciculiformibus, densiusculis; calyce sericeo, pedicello multo longiore, labio superiore bifido, inferiore 3-partito, lobis acuminatis; ovarii villosi stipite calycem subaequante. — Swan River. James Drummond, n. 209. — Simillimum **G. Brownii**, sed ramorum calycisque pubescentia fortiore, foliis haud eucatis basi rotundatis v. subcordatis, mucronulo brevissimo deciduo, venis primariis in reticulatione vix distinguendis, inflorescentia densiore pluriflora et calycis dimidio longioris densiusque pilosi lobis acuminatis bene distinctum. **G. acutum** Benth. l. c. n. 55. Walp. l. c. p. 574. Bot. Mag. t. 4040! ramis villosis; foliis terius, ovatis v. ovato-lanceolatis, acutis, pungenti-mucronatis, integerrimis, adultis glabris; racemis axillaribus abbreviatis, paucifloris; calyce villosa, subbilabiato; ovario sessili, villosissimo. — Swan River. J. Drummond, n. 213. — *Folia* speciminum nostrorum (cum ic. cit. exacte convenientium) 6-9 lin. longa, 2-2½ lin. lata (nunquam ovata) acutata-pungentia, grosse reticulata novella subsericeo-pubescentia. Calyx pedicello dimidio longior, 2½ lin. longus, basi attenuatus, cano-villosus, lobis tubum aequantibus acuminatis.

Remanet explorare, an annes *Pall.*
senaeae species huius memoratae
 ad genus contrarium pertineant
 vel sine partim ad genus *Phyllon*
 (speculis nullis etc.) put refranda
Spadoffyhis (Jalt. aff.) *Cunninghamii*.
 Infr. in. bracteae etc. Murray.
 Leaves heart shaped glaucous like European
Euphorbias. Flowers bright yellow. Mch.

* *Pullinaca hypoleampa* Sieber.
 In glaucis montium humiliorum
 in vicinia fluminis Ochkaparingae
 Fruticulus decumbens, ramis adpre-
 dentibus. Mart. 9. 1849.

* { *P. fasciculata*! Wenth.
P. Pullinaca monticola Fend. Mee.
 et sequenti distat foliis mu-
 coronatis magis curvatis flo-
 ribus majoribus et forsan aliis
 notis adhuc deliquidis. An var.
Dithyria sp. ab H. T. II sine num.
 In montibus 3-4000' altis. proft. Jan. 1849.

* *Pullinaca hemipetala* Bn.
 Hb. J. n. 48 - In ramis florilibus
 fistilibusque prope Rivae Way
 Oct. 1848. et H. Murray in
 aruosis Oct 48. In foresta Murr.
 et glabris Fend. Mee.

* In montium locis aruosis
 lapideis prope stationem H.
 Morris in interioribus Nov. Hall
 austrina Guichen Way & montium
 Burr! Oct. 1848 & M.

* *Pullinaca fasciculata* Fend. Mee.
 (non p. 58.) *prostrata*
 ad fl. Ochkaparingam. Frutex dif-
 fus, prostratus. Dec. 1848.
 Formas duas satis limitatas obser-
 vare nunc: a graviter prostrata
 lutea et robusta diffusa.

In collibus aruosis
 prope Rivae Way.
 Mart. 10. 1849.

Pulsanaca largiflora Fendler

In montib. *P. ferruginea* a var? olim Jm
Calliburg non Rudge, quae ^{jam} *disrupta*
Humboldt ramis junioribus villatis
vixit Krich
non Crisp
brook & haud Gerardi. — fr 1-2'.

In montibus praecipue satis
fertilibus inter praecipua:
Löffly-range, Kugel-range
Frut. infra simplex supra ra-
mosus v. ramosissimus frondum
ramos largam capitulorum
pauciflorum copiam gerens.
Sequentis in pl. viva notari:
Frutex 1-2' ratiom humilitatis
robustus; vexillum vitellinum
flavis & maralis atro-aurantiaca
nina capitulum pallide-vitellinum
corina atro-sanguinea. Sept-Nov.

Monte M. Remarkable luno.

Legumen compressum gibbo-ovatum
obtusum 2-3" 1-2" glisco flavum. Pinnula
ovoidea 1/2-1" nigrescentia 1" l. g. opaca ramulata albula

P. cardiophylla Fendler

P. cardiophylla Fendler. antea
minor, foliis obcordatis gla-
brinsculis.

Pulsanaca magnifica Fendler

Ad St. Tamar prope York-town
Fl. Frut 3-4' hb. M. 951. Habitat epacris
Fendler Tamar

P. densifolia Fendler

Sporium novum florum.

Galwa. hb. M. f. n. 8 nom. 1847.

P. bilobae & *parvifoliae* cognata,
foliis ramis glabris distincta

P. curvifolia Fendler & concolor Fendler
corollis concoloribus haud maculis
vixitque atropurpureis notatis.

In paludibus prope George-town,
Tamaricae, hb. M. 867. 1'

Mr. Fendler range luno

Sclerothamnus microphyllus! Rob Brown.
Haud procul ab ora apud Houtfastbaj.
legit. Sept. N 74. hb. ejusd.
Certe hujus generis et de specie vix dubito
quia species usque cognita, a Brownia
etiam in litore australi nov. Holl. detecta.

(*P. dactyloides*! Sm.)

P. cuneata Forstn. foliis oblongis
cuneatis subretusis. Forma foliorum
paucis *P. obcordatae* inclinans
necnon foliis longioribus non emar-
ginatis. Ad flum. Torrens! hb. J. 4.
Nunc ad *P. obcordatam* Andr. retuli,
i. e. formam magnificam. Folia
saepe ter longiora quam lata, posthac
— frut. usq. ad 3' alt. Styllum subulcalatum
apice sparsis basi striis purpureis donatum;
filamina longitudine carinae, alba vexillo bre-
viora carina longiora. In montibus: Ockoparing
Boyle-range, Lofty-range Sept. Oct. 1848.

xv. *P. obcordata* (Rob Brown) Andr.
Lofty-range. Stuart N. 218.

quae plantam etiam in Tasmania
ad portum Cygnorum hb. J. 754
legit. 8-10'

P. ferruginea R. & G. Lofty-range! Oct 47
Mt. Stuartian N. 193. Coarctata *P.*
longiflora nostra

Pellinaca cardiophylla Forstn. *P. longiflora*!

Sp. ut incerta distinctiora diffusa
P. biloba R. & G. non solum ramina-
libus sed etiam axillaribus, floribus
infra glabrescens, et *P. ferruginea*
R. & G. floribus foliisque minoribus
his cordatis, a *P. sacculata* forma
foliorum non elliptica. hb. J. N 12

Fructus pulcherrimus racis strictis
pyramis pilosiusculis densissime foliis
et floribus parvis oblongis. Folia 1-1 1/2"
l. long. 1 ml. lat., calyx filiformis subulcalis
coarctatus, laciniis subulcalis, vexillum ovato
striatum, alis minime longioribus longioribus
ovulatis.

„Suffrutex pedalis et ultra, strictus v. adscendens. *Flores* aurantiaci.“
Legumen ovale, compressum, tumidum, 4-1½ lin. longum, 3 lin. latum, muticum, adpresse pilosum, demum glabratum, suturis acutis, valvis convexis scrobiculato-punctatis intus laevibus glabris, stipite vix dimidium calycem (reflexum) acquante. *Semina* 2, oblonga, subsessilia, umbilico laterali estrophiolato.

PULTENAEA Sm. Endl. gen. n. 6446. Meisn.
 gen. p. 81. (58.)

PULTENEJA Hoffmannsegg. — **PULTENAEAE** sect. I, DC.
 prodr. 2. p. 110.

1. **Pultenaea Brunonis** Benth. in Ann. Wien. Mus. 2. p. 81, n. 1. Walpers rept. 1. p. 574: glabra, foliis exstipulatis, anguste linearibus, apice latioribus, acutiusculis, subtus convexis enerviis; floribus ramulos terminantibus, solitariis, subsessilibus, bracteis ad basin ramulorum paucis, bracteolis exiguis nullisve; calyce brevissimo, membranaceo, subaequaliter 5-dentato; legumine compressiusculo, ovato, acuminato, calyce multo longiore.

In solo torfoso inter frutices densos planitie prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 8. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 876.

„Frutex 2-3-pedalis.“

2. **Pultenaea genistoides** n. sp., glaberrima, ramis apice subangulatis; foliis sparsis, exstipulatis, oblongo-linearibus, obtusis, muticis, enerviis, laevibus, canaliculatis, dorso convexo apice carinato-incrassatis, junioribus ciliatis; floribus in apice ramulorum brevium basi squamato-bracteatorum solitariis, inter folia sessilibus; calyce brevissimo, subaequaliter 5-dentato; legumine brevissime stipitato, ovato-oblongo, adpresse pilosiusculo.

In solo turfoso prope villam b. Spencer (Plantagenet) d. 23. Sept. Herb. Preiss. No. 1021. et ad portum Princess Royal Harbour m. Nov. 1840. No. 1101.

Cum praecedente, cui inflorescentia et floris structura omnino convenit, propter calycem a *Pultenaeis* genuinis longe discrepantem (membranaceum, cupulaeformem, vix lineam longum) forsitan generice separanda. A *P. Brunonis* differt: ramis validioribus, subvirgatis, obsolete angulatis, nigricantibus, foliis majoribus (4-5 lin. longis, 1½-2 lin. latis) apice dorso in carinulam brevissimam obtusam albidam incrassatis, caeterum laevibus v. obsoletissime l-nerviis, nec rugulosis, squamis ad ramulorum basin duplo majoribus (1½ lin. longis) triangularibus complicatis, flore ⅓ majore. — „Frutex 1-2-pedalis. *Folia* obscure viridia. *Flores* flavi.“

3. **Pultenaea aspalathoides** n. sp., ramis corymbosis, subsericeo-canescens; stipulis minutis, adpressis, deciduis; foliis linearibus, utrinque attenuatis, mucronatopungentibus, reticulatis, in ramorum apice fasciculato-confertis laxe ciliato-pilosis, inferne remotiuscule sparsis

glabris; floribus in ramulorum apice subsolitariis, sessilibus, folia vix superantibus, bracteolis scariosis; calyce corolla duplo brevior, membranaceo, sericeo, subaequaliter 5-fido.

In solo turfoso-subarenoso sylvae et planitiei prope oppidum Albany (Plantagenet) m. Oct. et Nov. 1840, Herb. Preiss. No. 838 et 1195.

Facies fere *Aspalathi araneosae*. Sequenti valde similis, sed inlorescentia et praecipue calycis indole praecedentibus affinium. A sequente differt: ramis apice corymboso-ramosis, ramulorum foliis approximatis fasciculos mentientibus subaeriosis multo angustioribus ($\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ lin. latis) pilis tenerimis fere lineam longis patentissimis diu persistentibus constanter vestitis, floribus subsolitariis folia vix ac ne vix superantibus et praecipue calyce dimidio minore tenuiter scarioso-membranaceo bracteolas (fuscas, diaphanas, truncate-obtusissimas) vix superante. — „Frutex bipedalis.“ *Folia* inferiora remotiora, sparsa, erecta, plana, glabra, saepe 10 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, summa dimidio breviora et triplo angustiora, earinato-v. complicato-subtriquetra, omnium nervo medio venisque primariis sub angulo recto ex eo ortis marginemque petentibus vix anastomosantibus utrinque prominulis. *Bracteolae* apice subtruncatae obsolete emarginatae v. 2-3-denticulatae, evidenter e stipulis connatis conflatae. *Calyx* subturbinatus, 2 lin. longus, lobis tubum subaequantibus triangularibus setaeo-acuminatis. *Vexillum* unicolor alaeque aurantiaeae, *carina* purpurascens. *Legumen* non vidimus.

4. **Pultenaea aciphylla** Benth. in Hügel Enum. p. 35, n. 105; Ann. Wien. Mus. 2. p. 81. Walp. l. c. p. 574: ramis leviter caescentibus, stipulis minutissimis, adpressis; foliis lanceolatis, rigidis, pungentibus, reticulatis, adultis glabris; floribus ad ramulorum apicem subsolitariis v. paucis fasciculatis, bracteis paucis imbricatis, leguminibus ventricosis villosis.

In solo sublimoso district. Sussex, d. 9. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 833. in solo subturfoso-arenoso ad Stirling's-terrace, d. 21. Sept. No. 847. et in planitie prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 11. Oct. 1841. No. 848.

β **latifolia** nob., foliis ovato-oblongis (6-14 lin. longis, 3-6 lin. latis. Nec flor. nec fr. vidi, caet. vero *P. aciphyllae*.

In solo sublimoso distr. Sussex, m. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1044.

„Frutex 6-8-pedalis.“ *Folia* 6-12 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ lin. lata, novella saepe pubescentia, mox glaberrima. *Flores* foliis summis paulo breviores. *Bracteolae* ad basin capituli 4-1-flori paucae, adpresse imbricatae, vix $\frac{1}{2}$ - 1 lin. longae, inferiores triangulares acutae, superiores obtusae, dorso sericeae. *Calyx* herbaceus, sericeus, subcampanulatus, lobis tubo longioribus lanceolatis setaeo-acuminatis rigidulis, superioribus 2 paulo altius connatis latioribusque, sinibus extrorsum denticuliformi-prominulis. *Vexillum* luteum, medio atropurpureum, flabellato-venosum; *carina* atropurpurea. *Legumen* junius oblique obovatum, compressum, 3 lin. longum, $2\frac{1}{2}$ lin. latum, adpresse pilosum; maturum subgloboso-turgidum, 4 lin. longum latumque, laxè molliterque pilosum, valvis intus dense pilosiusculis! *Semina* oblonga, nigra, subnitida, strophiliola pallida biloba parum longiora. — Variat ramis ramulisque glabris v. vix sericeis et dense cano-pubescentibus. — Species meo iudicio ad generis sectionem secundam (Capitatae) nec ad primam (Pauciflorae, quibus a cl. Benthano adscribitur) referenda; flores enim in nostris speciminibus, descriptioni l. c. caeterum optime congruis, plerumque 2-4 subcapitati, rarissime vero solitarii sunt et ab ipso cl. Benthano apud Hügel l. c. subcapitati, in Ann. Wien. Mus. l. c. vero subsolitarii dicuntur.

5. **Pultenaea ochreatea** *n. sp.*, glabra, ramis filiformibus; stipulis membranaceis ochreiformibus, demum laceris deciduis; foliis sparsis, lanceolatis ellipticisve, muticis, planis v. supra concavis, utrinque reticulatis; floribus . . . . .; legumine ventricoso-ovali, turgido, extus intusque pubescente.

In districtu Wellington, d. 5. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1038.

A praecedente, proxime affini, notis indicatis facile distinguenda. *Rami* tenuissimi, laxi, flexiles, laeves, apice compresso-angulati. *Stipulae* intra axillam connatae in vaginam 1-1½ lin. longam, ramum arcte cingentem, tenere membranaceam, albam, basi rufam, nitidam, ochreas *Polygonorum* e sect. *Avicularia* imitantem, mox laceram, demum deciduam. *Folia* 3-4 lin. longa, 1-1½ lin. lata, obtusa v. vix acutiuscula, absque mucrone ullo, reticulatione penitus *P. aciphyllae*. *Flores* ramulos terminantes, solitarii, pedicello brevissimo squamulis scariosis imbricatis bracteolato. *Calyx* circ. 1½ lin. longus, lobis inferioribus triangulari-lanceolatis acutis. *Petala* . . . . . *Legumen* sessile, 4 lin. longum, 2½ lin. latum, obtusum, 2-spermum, suturis acutiusculis, valvis convexis extus nigricantibus minute puberulis, intus pallidis dense pilosiusculis.

6. **Pultenaea ericaefolia** *Benth.* in Lindl. Swan River p. XIII, n. 45: ramis pubescentibus; stipulis erectis; foliis sessilibus, linearibus, muticis, margine involuto subteretibus, supra sulcatis, glabris, exsiccatione corrugatis; capitulis terminalibus, dense multifloris, hinc inde proliferis; bracteis laxiuscule imbricatis, membranaceis, fuscis, 3-fidis, laciniiis ciliatis, lateralibus lanceolatis, intermedia bracteolisque subulatis; calycis bilabiati lobis subulatis ciliato-plumosis.

In glareosis inter frutices montis Greenmountain (Perth) d. 26. Apr. Herb. Preiss. No. 1189. in solo turfoso-arenoso inter frutices sylvae prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 11. Oct. No. 1187. et in confragosis collium Konkoberup-hills (Kent) d. 19. Nov. 1840. No. 1186. (Drummond n. 248 et coll. I.)

„Frutex ½-1½-pedalis.“ *Rami* graciles, plerumque parum ramosi, apice interdum corymbosi. *Stipulae* demum semper, nec adeo tarde, deciduae. *Folia* acuta, mucica, rarius subobtusa, patula, scabriuscula. *Involueri* squamae laxiusculae.

7. **Pultenaea strobilifera** *n. sp.*, ramis divaricatis, pubescentibus; stipulis setaceis, minutis, deciduis; foliis brevibus, subtriquetro-teretibus, obtusis, muticis, laevibus v. minute corrugatis, supra 1-suleis; capitulis terminalibus, strobiliformibus, ovoideis; bracteis imbricatis adpressis, fuscis, pubescentibus, ovatis, apice 3-fidis, lobis lateralibus lanceolatis acuminatis, intermedio subulato; calycis bilabiati lobis acuminatis dense sericeo-plumosis.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, m. Oct. Herb. Preiss. No. 1185. et in districtu Minto, m. Nov. 1840. No. 1190. (Drummond n. 247.)

Praecedenti almodum similis, sed specificè distincta statura humiliori („spithamaea-pedalis“) caulibus a basi jam magis et iterato ramosis, ramis plerumque trichotomis et angulo lato divergentibus, stipulis minoribus fugacibusque, foliis dimidio brevioribus (1-2 lin. longis) semper obtusis, laevissimis et subadpressis (rarius leviter rugulosis et semipatentibus, nunquam punctato-scabris) capitulis dimidio minoribus ovoideis (nec subglobosis) nunquam proliferis, bracteis arcte adpressis floribusque circ. ⅓ minoribus, calyce praecipue ⅓ brevioris et pilis arctioribus erectis mollibus albidis plumoso-ciliato

(nec pilis rigidulis rufis patentibus hispido). *Folia* juniora, aequae ac in illa, patentim hispido-ciliata.

8. **Pultenaea empetrifolia** *n. sp.*, ramulis canescentibus; stipulis membranaceis, lanceolatis, adpressis, persistentibus; foliis confertis, triquetro-linearibus, obtusis, brevibus, glabris; capitulis terminalibus, sessilibus, paucifloris, basi imbricato-squamatis, saepe proliferis; calyce bracteas bracteolasque superante, bilabiato, laciniis acutis rigidulis, inferiorum sinus tuberculiformi-sphacelatis.

In Australia occidentali Herb. Preiss. No. 865.

„Frutex pedalis“, dense ramosus; *rami* inferne defoliati, undique stipulis fuscis acutis vix $\frac{1}{2}$ lin. longis earumve reliquiis tecti, inter stipulas pubem parcam albidam ostendentes. *Folia* vix semilineam ab invicem distantia, semipatentia, 1-2 lin. longa, mutica, laevia, glabra, dorso convexa v. triquetra, supra plana v. canaliculata. *Capitula* nucis avellanae minoris mole, 4-8-flora, plerumque in ramulum foliosum brevissimum excrescentia, basi bracteis stipularibus adpresse imbricata; *bracteae* membranaceae, fuscae, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longae, semibifidae (e stipulis duabus connatis formatae) lobis lanceolatis acutis albo-ciliatis, sinu plerumque folium genuinum viride minutum gerente; *bracteolae* paleaceae, oblongae, integrae, calyce duplo v. triplo breviores. *Calyx* 3-bracteolatus, corolla vix $\frac{1}{3}$ brevior, 2 lin. longus, glaber, subcampanulatus, tubo membranaceo tenui decolore laevi lobis paulo longiore, labiis aequilongis virescentibus, lobis triangularibus apice subcomplicatis rigidulis, superioribus duplo ferè latioribus et paulo altius connatis, inferiorum sinus in denticulum tuberculumve exiguum sphacelato-fuscum obsolete prominulis. *Petala* subaequilonga, *vexillo* subrotundo leviter emarginato medio purpureo-venoso *alisque* vitellinis, *carina* atropurpurea. *Ovarium* sessile, villosum, stylo capillari basi pilosiusculo. *Legumen* . . . . . — Species nobis cognitarum nulli similis, sectioni Proliferarum adnumeranda.

9. **Pultenaea tenuifolia** *R.Br.* Bot. Mag. t. 2086. DC. prodr. 2, p. 113, n. 17. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 82, n. 36.

In summitate montis Baldhead (Sinus Regis Georgii III.) d. 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1203.

„Frutex 6-uncialis.“

Subtribus III. *Mirbelieae*, Benth. in Hügel Enum. p. 35; Ann. Wien. Mus. 2, p. 83.

MIRBELIA Sm. Endl. gen. n. 6448. Meisn. gen. p. 81. (58.)

1. **Mirbelia (Eumirbelia) dilatata** *R.Br.* DC. prodr. 2, p. 115, n. 3. Bot. Reg. t. 1041!

In depressis subarenosis umbrosis Peninsulae (Perth) d. 27. Apr. 1840. Herb. Preiss. No. 1049. (Drummond n. 189 et coll. 1.)

„Frutex 6-8-pedalis, gracilis“, glaberrimus. *Rami* ramulique acute angulati, stricti. *Folia* sparsa v. opposita aut terna v. quaterna v. saltem opposito-v. verticillato-approximata, reticulata, 6-10 lin. longa, apice dilatata (saepe latiora quam longa) triloba, lobis lateralibus 3-5-fidis, intermedio indiviso saepe brevior et plus minus recurvo, laciniis omnibus pun-

x Pultenaea squarrosa Ferdmüll.

Signos ritur a P. stipulari
capitulis parvifloris calycibus
bracteis ^{longioribus} ~~lanceolatis~~ foliis
involutis a P. aristata bra-
cteis latioribus, calycis don-
tibus petalo longe-acuminatis
sed acumine tenui flexili non
firmo pungente etc.

Trans fluvium Murray in
frutices ad rivum Salt-
Creek. Oct. exeunte. 1848. In
stipulae ferrugineae et con-
natae, ut in P. stipulari
^{vittata?}

Pultenaea cynulifolia Ferdmüll.

Agg. St. Pauli, hb. St. J. 656.
4th Nov.

x P. scabra ~~occurraldi~~
P. aspera Ferdmüll. jam antea (Sieb)
erecta floribus ad apicem ra-
morum ^{pubescentium} ~~racemosa~~ - dispersis, fo-
liis ^{reptantibus} linearibus-oblongis acutis mar-
gine involutis supra punctis ele-
vatis pilos fasciculatos gem-
mibus asperis subtus calycibusque
pubescentibus, bracteis calyce
(pallide presso) brevioribus, stipulis
petiolo longioribus.

An satis a P. villosa discrepat.
Sol. patensia serque ad 4th 2g.
Specim. fruticis fragmentum.
Lafly-range. Est var. P. alig anthae.

P. nitida ~~et~~
P. molles Ferdmüll. (jam antea)
Floris & fructus defuit, sed
verisimilitudo hujus generis. ab
omnibus cognitis distincta
P. parviflorae Sieb. forte
proxima foliis omnibus vil-
losis peculiaris. Lafly-range.

gentibus. *Pedicelli* axillares solitarii, raro gemini, 2 lin. longi, calycem aequantes, erecti, infra medium bracteola minuta subulata decidua muniti. *Calyx* viridis, laxe campanulatus, bilabiatus, laciniis subulato-acuminatis. *Corolla* calyce triplo longior, amoene rosea. *Ovarii* glabri, 6-8-ovulati stipes calycis tubum aequans. *Stylus* falcato-filiformis, glaber, inferne paulo incrassatus. *Legumen* exsertum, oblongum, 3-4 lin. longum, turgidum, acutum, transverse venosum, epicarpio fusco endocarpioque pallido ab invicem solutis secundum suturas dehiscētibz, utriusque valvis apice demum breviter fissis, endocarpium complete bilocularis sutura utraque valde inflexa intusque leviter pubescente. *Semina* parva, subreniformi-ovata, compressa, atra, nitida, estrophiolata.

2. **Mirbelia (Eumirbelia) ovata** n. sp., foliis ternis oppositisve, breviter petiolatis, patentibus, ovatis v. ovato-oblongis, obtusis, muticis, margine revolutis, supra reticulatis et punctato-scabriusculis demum glabris, subtus famulisque adpresse sericeo-pilosiusculis; floribus terminalibus 3-1 (raro 5-6) brevissime pedicellatis; calycis pilosi laciniis lanceolatis subaequalibus tubo longioribus, ovario 8-ovulato, legumine subsessili villosa.

In sublimoso-glareosis sylvae cis flum. Gordon (Hay) 7. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 803 et ad portum Princess Royal Harbour Dec. 1840. No. 1202.

Facies fere *Oxylobii cordifolii*, sed stipulae plane nullae et legumen omnino *Mirbeliae*. — „Frutex 2-pedalis.“ *Rami* teretes, graciles, debiles, diffuse ramosi, ramulis semipatentibus. *Folia* 3-4 lin. longa, 1-2 lin. lata, ovata, rarius subrotunda v. oblonga, basi rotundata et plerumque subcordata, nervo subtus prominulo, juniora utrinque, adulta subtus tantum adpresse albido-pilosiuscula, supra mox glabra dense reticulata et sub lente punctigulis elevatis scabriuscula. *Flores* plerumque terni ramulos terminantes (accidentibus interdum 2-3 in sinu axillis, lateralibus); *pedicelli* vix lineam longi, basi bractea subulata ipsis vix longiore apiceque bracteolis duabus similibus calyci adpressis ejusque tubum aequantibus muniti. *Calyx* membranaceus, rufus, adpresse pilosiusculus, laxe campanulatus, 2-2½ lin. longus, ultra medium 5-fidus, lobis lanceolatis acutis fere aequalibus. *Petala* breviter unguiculata, *vexillo* orbiculari subemarginato alisque aurantiacis basi purpureis, *carina* obovata subrecta atropurpurea. *Ovarium* subsessile, villosum, 8-ovulatum, sutura superiore valde inflexa. *Stylus* capillaris, incurvus. *Legumen* (immaturum) oblongum, calycem parum superans, turgidum, fulvo-villosum, valvis coriaceis apice bifidis intus glabris. *Semina* estrophiolata.

DICHOSEMA Benth. Endl. gen. n. 6449.

Meisn. gen. comm. p. 350.

1. **Dichosema spinosum** Benth. in Hügel Enum. p. 35, n. 106; Ann. Wien. Mus. 2, p. 84: ramis subvirgatis, glabriusculis, apice inermibus; foliis ad basin spinarum patentibus ipsis sublongioribus fasciculatis, linearibus, margine revolutis, obtusiusculis, glabris, axillis 3-1-floris, floribus subsessilibus, calyce sericeo-pubescente.

In limoso-calculosis sylvae cis oppidum York, d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 862. et in region. interior. Australiae merid.-occ., m. Oct. 1840. No. 860. (Drummond coll. l.)

„Frutex $2\frac{1}{2}$ -pedalis.“ *Rami* teretes, plerumque parce ramosi. *Petala* carnea v. rosea v. purpurea? (ex Benth. flava.)

2. **Dichosema subinermis** *n. sp.*, ramis fastigiato-ramosis ramulisque tenuibus teretibus puberulis apice inermibus; foliis sparse fasciculatis, patentibus, spina axillari plerumque destitutis, linearibus, obtusis, muticis, glabris, supra convexis, subtus 1-sulcis; floribus axillaribus, solitariis, subsessilibus; calyce subsericeo-pilosiusculo.

In solo glareoso-limoso sylvae prope oppidum Guildford, d. 8. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 859. (Drummond n. 191.)

„Frutex 3-pedalis.“ *Rami* dense ramosi, graciles, ramulis debilibus filiformibus adscendentibus elongatis, pube adpressa subsericeo-canescens, inferne glabrescentibus; lateralibus nonnunquam (rarissime tamen) apice spinoscentibus inferne foliosis. *Folia* omnino praecedentis, saepe paulo tenuiora et in ramorum extremitate solitaria (nec fasciculata) infimis axillis rarissime spinulam gracilem patulam folia aequantem exserentibus. *Ovarium* sessile, 6-ovulatum. — Caet. omn. *D. spinosi*, a quo tamen notis indicatis facile dignoscitur.

3. **Dichosema racemosum** *n. sp.*, corymboso-ramosum, ramulis rigidis sulcato-subangulatis glabris apice spinoscentibus; foliis oppositis verticillatisque v. subsparsis, linearibus, obtusis, muticis; margine revolutis, glabris; racemis terminalibus, brevibus, aphyllis, pedicellis geminis ternisve brevibus calyceisque pubescentibus.

In solo subturfoso-arenoso inter frutices planitiei prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 5. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 861.

„Frutex sesquipedalis.“ *Stipulae* nullae. *Folia* praecedentium, sed nunquam fasciculata, opposita, rarius terna v. quaterna v. sparsa, axillis semper inermibus. *Racemi* circ. pollicares, terminales et nonnunquam e summis axillis, circ. 9-flori, bracteis minutis caducis, pedicellis calyce paulo brevioribus. *Flores* (ut reliqua omnia) praecedentium, sed $\frac{1}{3}$ minores, et calycis ($1\frac{1}{2}$ lin. longi) labium superius rotundato-subtruncatum levissime emarginatum. *Ovarium* sessile, pubescens, 1-loculare? 4-6-ovulatum, stylo brevi crassiusculo pubescente apice uncinato. *Legumen* desideratur.

Tribus II. LOTEAE, DC. Subtribus I. Genisteae, DC.

HOVEA R.Br. Endl. gen. n. 6451. Meisn. gen. p. 82. (58.)

1. **Hovea pungens** Benth. in Hügel Enum. p. 37, n. 110. Hügel Bot. Archiv t. 7! Walpers rept. 1, p. 577: stipulis setaceis, foliis rigidis, linearibus, mucronato-pungentibus, margine revolutis, reticulatis, glabris v. pilosiusculis, pedicellis calyce parum longioribus, ovario stipitato glabro.

In arenosis sylvae prope Pineapple (Perth) d. 20. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 1054. (Drummond n. 177 et coll. 1.)

„Frutex pedalis, erectus. Flores laete coerulei.“

Pultenaea ^{lytophylla, f. Mill. Spruce, alaphragma, Tharant, New}
^{Kobli. Siquem, proxima. S. pluripetala}
Pultenaea pulcherrima f. Mill.

In Tasmania australi hanc
longe ab urbe Hobartown
(Pillaynia juniperina. Stuart)
Ab omnibus numeratis in de
gnatis. & Malp. rep. diffinis
absque difficultate discrimi-
nanda, (quantum e phragibus
diagnositis concludendum
est). *P. lanata* ~~etiam~~
facile imitans, quae attamen
novae Hollandiae rivis etiam
e significatione speciali differt.
Candem sp. habes e regione prope mont.
Gambier in arenosis hinc in aridis. Anth: vix.

Pultenaea Bobrii f. Mill.

Californ. Murr. Nov 48,
Vixillum atropurpureum, calae luteae,
varius atra (?) Murr. (Styllos. ericoides)

A *P. leucifolia* proxima distat
paucis floribus majoribus, in-
cunctis foliorum fericeo-caus-
sente et habitu alieno.

Intra Gaultu loca & Lyubach
valley. Sept. I.

Pultenaea halmaturorum f. Mill.

In arenosis insulae Kangaroo-
idland. frut. paucipet.
Anth: autumnus!

P. purpurea Sweet.

In nova huius proxima ad
juvenda? Adfluminis, South
Bokwin sp. - fr. 5-6, Oct
18. 1848. Hb. N. P. # n. 6.

Excepto tomento ramorum vi-
noso hanc purpurea fol.
Nov. Hall. (Goltunji, Diagnos)
congruit.

x H. Sondraia f. Muel.

foliis anguste ellipticis subtus e ramis
somnolosis, supra nitentibus reticulatis
margine recurvis, rapte inferiori in apicu-
lum excurrente pedicellis calyce ferrugineo
somnoloso brevioribus in axi petiolorum
foliariis

H. ellipticae, purpureae & praesertim
tripartitae cognata. Ramis & folia adal-
teris - juniora ferruginea somnolosa
Petioli 1-1 1/2" longi, fol. 6-8" longa 2-3
lin. lat. Stipul. viles summissae. vix se
linen. Pedicelli 1-2" bracteoli obtusis
oblongis obtusi. Carina alis vixilique
brevioribus, V. D. L. Hb. St. 86.

H. Squartii f. Muel.

prostratae
procumbentis

procumbens, habitu Hoffmannae.
specimen incompletum praedictorum.
H. latifoliae affinis, sed fol.
subtus adpresso-pilosa

ad H. South Park - river, Hb.
St. T. II n. 136. Nov. 10. 1848 fuit

et 585. Anth: primo vere!

H. linearis auctorum sed fo-
lia haud linearia sed ovata-
v. linearilanceolata!

x H. Bakeri, f. Muel.

erecta, foliis oblongis & muticis supra glabris reticu-
lato-nervosis suble margine vix recurvis
super cum ramis calycibus & leguminibus som-
noloso raris velutinis, pedicellis foliariis calyce
brevioribus, bractealis ovali-oblongis, legumini-
bus sessilibus.

ad latro pubesca montis H. Bakeri & adiacentium
Fuit H. Bakeri erectus pluripetalis praesertim apicem unius ramuli
Folia Bakeri ferebunt de raris raris aetate glabrati. Folia 4-8"
longa 4-8" lat. plerumq. sensim supra medium sensim angustata ob-
tusis ~~non nisi~~ ap. raris breviter laciniosis, segm. aut
apiculata supra nitentia suble raris raris raris raris raris raris
lanceolata suble p. equaliter fulvo ve raris raris raris raris raris
somnolosa suble raris raris raris raris raris raris raris raris
Petioli 1 1/2 - 2" longi & stipulae rugosae 1 1/2" longae suble raris raris raris raris raris

2. **Hovea stricta** *n. sp.*, caulibus simplicibus, erectis, strictis, villosiusculis; stipulis linearibus, parvis, mollibus, cadueis; foliis linearibus, breviter mucronatis, margine revolutis laxe ciliatis, supra reticulatis; junioribus laxe pilosiusculis, demum glabris; pedicellis solitariis, calycem villosiusculum subaequantibus; legumine stipitato, glabro, 2-spermo.

In arenosis sylvae districtus Sussex, m. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1057.

A praecedente proxime affini cante distinguenda: caulibus pedatibus simplicissimis, stipulis bracteolisque complanatis nec, nisi apice, vere setaceis, haud rigidis, fugacissimis, foliis plerumque pollicaribus $1\frac{5}{4}$ lin. latis, apice obtuso mucronulo vix $\frac{1}{4}$ lin. longo apiculatis, ciliatis, pubescentia caulis calycisque paulo longiore et laxiore. Caet. omn. *H. pungentis*. (Petala non vidimus.) — A *H. ramulosa* et *pannosa* Cunn. et *H. purpurea* Sweet differt: pubescentia haud ferrugineo-tomentosa, pedicellis solitariis, caet.; a *H. villosa* Lindl.: foliis minoribus, praecipue angustioribus, caet.; a *H. Manglesii* Lindl.: stipulis haud setaceis, floribus pedicellatis, caet.

3. **Hovea trisperma** *Benth.* l. c. n. 111. Walp. l. c.: foliis inferioribus ellipticis oblongisve, superioribus lanceolatis linearibusque, supra reticulatis, subtus pubescentibus; pedicellis calyce brevioribus; legumine stipitato, glabro, trispermo.

In arenosis sylvae circa oppidum Perth, d. 8. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 1051. (Drummond n. 179, 180.)

„Suffrutex pedalis, erectus. Variat floribus albis.“ *Leguminis* stipes calycem aequans.

4. **Hovea Celsi** *Bonpl.* Bot. Reg. t. 280. DC. prodr. 2. p. 115, n. 6.

Locis umbrosis in solo humoso ad margines lacus Kalbenup (Sussex) d. 27. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1053. in rupestribus sylvae ad latus septentrionale montis Melville et in chasmate ad latus occidentale montis Clarence (Plantagenet) d. 5. Sept. 1840. No. 1055.

„Frutex 5-8-pedalis, erectus, strictus.“ *Ramuli* calycesque ferruginei. *Folia* usque ad 3 poll. longa et $1\frac{3}{4}$ poll. lata *).

5. **Hovea crispa** *Lindl.?* in Bot. Reg. 1839. Misc. p. 19, n. 19. Walpers rept. 1. p. 577: ramis gracilibus, pilosis; foliis ovato-oblongis, mucronatis, margine crispis utrinque pilosis; pedunculis subternis petiolorum longitudine, bracteolis sub calyce villosio setaceis; ovario stipitato, glabro, 4-ovulato.

*) **H. elliptica** DC. l. c. n. 4? — Swan River, Drummond n. 118. — Diagn. l. c. insufficiens, a planta Drummondiana paulo recedens „foliis emarginatis, pedicellis folio triplo brevioribus geminis.“ Habitus **H. Celsi**; folia huic similia, sed acuta v. acutiuscula. Stipulae setaceae, rigidulae, petiolo $1-1\frac{1}{2}$ lin. longo vix longiores, fugaces. Pedicelli axillares 2-4, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longi, apice setaceo-bibracteolati. Calyx 4 lin. longus, basi attenuatus, adpresse pilosiusculus, labio superiore maximo tubum subaequante, inferioris duplo brevioris lobis ovato-lanceolatis acutis. Corolla ampla, calyce subduplo longior, coerulea. Ovarii stipes calycis tubum aequans. — Species florum magnitudine reliquas omnes superans.

In glareosis sylvae montis Greenmountain (Darling's-range) d. 15. Apr. 1840. sterilis Herb. Preiss. No. 1063.

„Frutex vix pedalis,“ (bipedalis, floribus purpureis, fide Lindl. l. c.) — *Specimina* nostra tota glabra; ramuli punctis ferrugineis prominulis glandulosis? conspersi.

PLAGIOLOBIUM Sweet. Endl. gen. n. 6452. Meisn. gen. p. 85. (60.)

1. **Plagiolobium chorozeamaefolium** Sweet Fl. Austral. t. 2, foliis ovalibus oblongisve, vix marginatis, concoloribus, plus minus sinuato-dentatis, dentibus spinuloso-mucronatis, stipulis setaceis subspinescentibus; pedicellis axillaribus 2-4 calycem subaequantibus, bracteolis 2 setaceis a calyce remotiusculis ejusque tubum subaequantibus.

Hovea chorozeamaefolia DC. prodr. 2. p. 116, n. 7. Bot. Reg. t. 1524.

a subintegrum nob., ramulis pubescentibus; foliis planis, subtus parce puberulis, subintegris v. levissime sinuato-dentatis, dentibus obsoletis breviter mucronulatis.

In calculosis sylvae inter Greenmountain et Mahogany creek (Darling's-range) d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1052. (Drummond n. 181.)

β dentatum nob., ramulis vix apice puberulis, foliis utrinque glabris, sinuato-dentatis undulatis, dentibus longiuscule spinescentibus.

In rupestribus ad latus montis Melville (Plantagenet) d. 25. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1058.

„Suffrutex sesquipedalis.“ *Radix* lignosa, crassa, divaricato-rainosa, apice multicaulis. *Legumen* *Hoveae* *Celst.*, 2-spermum, stipite vix calycis tubum aequante.

2. **Plagiolobium ilicifolium** Sweet l. c.? (Walp. rept. 1. p. 577.) foliis ovatis v. ellipticis, subtus subglaucescentibus parce pilosiusculis marginatis, sinuato-dentatis, subundulatis, dentibus stipulisque spinescentibus; pedicellis axillaribus 2-4 calyce brevioribus, vix petiolo longioribus; bracteolis 2 subspinescentibus, calyci proximis ejusque tubo (plerumque dimidio) brevioribus.

In region. interior. Australiae occidentalis, d. 7. Mart. 1840. sterile. Herb. Preiss. No. 1060. (Drummond n. 182 et coll. 1.)

An vera stirps Sweetiana? An a praecedente, quacum haec a cl. Lindley conjungitur, satis distincta? Praeter notas indicatas ab ea recedit ramis validioribus, foliis crassiuscule coriaceis subtus pallidis margineque plus minus recurvo nerviformi subcartilagineo cinctis et reticulatione obsoletiore supra plerumque immersa, nec non calycis pube densiore subvillosa. *Stipulae*, bracteolae pedicellique longitudine variant saepiusque a praecedente non differunt. „Frutex pedalis.“*)

*) E genere **Platylobio**, cujus nulla species inter plantas Preissianas occurrit, novam addere liceat speciem: **P. macrocalyx** nob., foliis deltoideis ovatisve, apice

[illegible]

Borocleda ensata Sieber

x 1. In insula Van D. Land lig. Stuart. h. St. 100.
In montib. Catagine hujus locis, tam in a planta
humilis. *Phrygnanthes calyce glabra vix ciliolata*
boreali. *paullum resinosus*. x *occasionalis* *ser. m. 110*
occidua. *suph. Nile-river, h. St. 5. 4 n.*
salva. 70. Oct. Nov. 1848. Frus. 4-5
p. 10. (Caulum brevissimum longitudine varie
2-3' hanc speciem forte B. *pallosum*
erecta. *drum* varietas) Ad fl. North W.
abg. p. river Tasm. h. St. n. 713, 1/2 1' ad
x 1/2.

P. procumbens ferdme, ramis
divaricatis angustioribus.
In collibus saxosis ad rivum
St. Pauli, h. St. 5. 619.

Platylabium triangulare R. Br.

P. platylabium Hook. St. h. 947
non Hook.

Procumbens! Ad portum
Sorell Tasmannie.
Anth. Oct. Nov.

Syn. disticholobium macrocalyx Presl

Platylabium macrocalyx! Vahl

Ramuli esfoliatione pagina infra
inglatis juniori pubescentes.

In vertice montis Tormos! f. Br. f. 1848.
proxima parva. h. St. fin. n., h. p. 72.
Certissime hujus loci verisimiliter
autum novum est antiquiori *P. Stuarti*
rayano postponendum. Etiam si ubi
sine diagnosi. mihi deficit, tamen
procul dubio est ex ulsione flum
minis Murray ortum, ubi verisimiliter
ne planta nascitur.

P. cordatifolium ferdme, foliis ovate
cordiformibus. Specim. fl. in monte
Koorassuk. - fructu. autumnalis. judas.

BOSSIAEA Vent. Endl. gen. n. 6455. Meisn.
gen. p. 82. (58.)

1. **Bossiaea ensata** Sieber Herb. N. Holl. n. 434! DC. prodr. 2, p. 117, n. 2.

In region. interior. Australiae merid.-occid., n. Oct. Herb. Preiss. No. 1033. et in glareosis ad radices montis Barrow (Plantagenet) d. 9. Nov. 1940. No. 1125. *) „Suffrutex pedalis.“ *Rami* ubique aphylli. *Calyx* pubescens. *Carina* imberbis.

2. **Bossiaea sulcata** n. sp., glaberrima, ramosissima, ramis ramulisque aphyllis, compresso-ancipitibus, strictis, rigidis, acute sulcato-lineatis, apice-spinoscentibus, margine alternatim obtuse dentatis; floribus c. ramulorum denticulis nascentibus, subsolitariis, subsessilibus, bracteolis minutis; calycis lobis subaequalibus brevibus, obtusis; carina nuda; ovario subsessili, oblique obovato-oblongo, glabro, 4-ovulato.

In limoso-arenosis planitici ad fluv. Avon, 10 mill. ab oppido York (York) d. 10. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1028.

„Frutex 7-pedalis.“ *Rami* validi, demum subteretes, ramuli compressi, faciebus convexis lineis nerviformibus acute prominulis parallele striatis, marginibus acutiusculis tuberculis obtusis (foliorum abortivorum? v. fugacissimorum? pulvinis) 2-3 lin. ab invicem distantibus denticulatis, omnibus apice in spinam rectam 1-2 lin. longam satis validam pungentem exeuntibus. *Stipularum* foliorumque vestigia, praeter setulas exiguas in ramulorum nascentium denticulis conspicuas, nulla. *Flores* illis *B. ensatae* paulo minores. *Calyx* coloratus? campanulatus, 1-1½ lin. longus, corolla dimidio brevior, lobis tubo brevioribus (⅓ lin. longis) obtusis erectis, superioribus 2 paululum latioribus magisque rotundatis. *Stamina* monadelphia. *Legumen* (seminaturum) 4 lin. longum, 2 lin. latum, stylo multo brevior sublaterali uncinato glabro, marginibus haud incrassatis.

3. **Bossiaea paucifolia** Benth. in Bot. Reg. Jul. 1841. Misc. p. 53, n. 108. (non ib. 1843, t. 63.) Walpers rept. 1. p. 578: glabra, inermis; ramis compressis, alatis; stipu-

mucronatis, lobis basilaribus vix acutis mucronatis nunc rotundatis muticis; bracteis imbricatis, exterioribus ovatis obtusis interioribus scissim majoribus oblongis acutis dimidium calycem aequantibus; calyce amplo, corollam subaequante, adpresse sericeo-piloso, labii superioris lobis maximis subrotundis. — Ad Port Philipp in Novae Hollandiae ora australi legit cl. Latrobe (Herb. Mus. Neocomens.) — A. **P. triangulari** R.Br., cui praeter notas indicatas, simillimum, differt: calyce duplo majore (5 lin. longo) bracteis quadruplo majoribus, foliis basi saepe inermibus rotundatisque subinde cordatis et plerumque majoribus (usque ad 10 lin. longis, 9 lin. latis.) Vexilli apex calycem brevissime superans, carina alaeque eum vix aequantes. — An a **P. obtusangulo** et **Murrayano** Hook. Bot. Mag. t. 3258, 3259. (Walpers rept. 1. p. 577.) nobis ignotis, satis distinctum?

*) **B. rufa** R.Br. DC. l. c. n. 3. The Botanist 2, t. 81. — Swan River. Drummond n. 258 et coll. l. (Inter Preissianas non obvia.) — Facies omnino **B. ensatae**, sed rami hinc inde folia lanceolato-linearia 6-8 lin. longa 1-2 lin. lata obtusa submucronulata plana penninervia glabra, petiolo tenui 1-1½ lin. longo suffulta, gerentia. Calyx glaberrimus. Carina biceps, apice obtuso breviter denseque albo-ciliata.

lis membranaceis, minutis; foliis sparsis, obovatis oblongis linearibusve, obtusis retusisve; pedicellis folio brevioribus basi medioque minute bracteolatis; calycis labiis subaequalibus, tubo brevioribus, superioris breviter bifidi lobis parum latioribus.

B. virgata Hook. in Bot. Mag. (Dec. 1842.) t. 3986. Walp. rept. 2, p. 833.

Locis umbrosis in solo limoso ad ripam fluv. Preston (Wellington) d. 1. Jan. 1840. Herb. Preiss. No. 1029.

„Frutex 5-pedalis.“ *Rami* fere *B. ensatae*, 2-3 lin. lati, sed foliosi. *Stipulae* fuscae, petiolo $1\frac{1}{2}$ lin. longo multo breviores. *Folia* sparsa (nec fasciculata, nec approximato-conferta) herbacea, cum petiolo 6-10 lin. longa, 2-5 lin. lata, apice obtusa v. retusa, nonnunquam obcordato-emarginata, tenuiter penninervia. *Pedicelli* solitarii, filiformes, circ. 3 lin. longi. *Flores* magnit. *B. scolopendriae*. *Calyx* $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longus, corolla duplo triplo brevior. *Vexillum* aurantiacum, atropurpureo-striatum; *carina* alaeque? purpureae. *Legumen* lineare, rectum, circ. pollicare, $2\frac{1}{2}$ lin. latum, apice rotundatum, 4-10-spermum, in stipitem calycem subaequantem attenuatum, valvis planis glabris laevibus, suturis vix incrassatis.

4. ***Bossiaea spinescens* n. sp.**, glabra, ramosissima, ramis adultis teretibus, junioribus ramulisque patentibus compressis subalatisve apice spinescentibus; stipulis setaceis, petiolum aequantibus; foliis confertis, obovato-oblongis, obtusis retusisve, muticis, planis; pedicellis solitariis, folium superantibus, apice bibracteolatis; calycis labio superiore lato subtruncato emarginato, inferiore brevior acute 3-dentato; carina apice minute villosa-ciliata.

B. paucifolia Bot. Reg. 1843. t. 63. (non Benth.)

In limoso-lapidosis sterilibus summitatis montis Bakewell (York) d. 11. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1031. fl. et fr. et in glareosis sylvae inter praedia rustica Dom. Barker et Lennard (York) d. 12. Apr. 1840. No. 1030. fr. (Drummond n. 259 et coll. I.)

A praecedente, proxime affini, praeter notas jam indicatas differt: ramis minus gracilibus, rigidioribus, ramosioribus, ramulis distichis plerumque divaricatis, junioribus angulo fere recto patentibus saepiusque aphyllis spiniformibus, raro complanato-subalatis, subinde parum compressis vix ancipitibus, faciebus valde convexis, margine angustissimo nerviformi; foliis duplo minoribus (cum petiolo $\frac{1}{2}$ -1 lin. longo 3-5 lin. longis, 1-2 lin. latis) apice rotundatis, rarissime emarginatis, saepius ternatim pseudo-fasciculatis (lateralibus scil. revera axillaribus, ex ima basi ramuli, saepe nondum evoluti, nascentibus) stipulis setaceo-subspinescentibus; pedunculis fere semper folium paulo superantibus, apice (nec medio) bibracteolatis, bracteolis magis conspicuis $\frac{2}{3}$ lin. longis erectis oblongis acutis; calyce dimidium corollam aequante, labio superiore quasi abscisso levissime emarginato; legumine plerumque brevior, 4-6-rarius 8-10 lin. longo, 4-6-spermo. *Valvae* intus hand septulatae! — Valde etiam similis *B. microphyllae* Sm. (Sieber Herb. N. Holl. No. 355! Bot. Mag. t. 863.) quae differt: ramulis vix compressis, junioribus puberulis, foliis coriaceis constanter late obovatis et plerumque emarginatis, pedicellis vix 1-2 lin. longis et carina imberbi.

5. ***Bossiaea Preissii* n. sp.**, glabra, ramis ramulisque foliosis, teretibus, apice vix compressis spinescentibus; stipulis spinuliformibus, petiolum brevissimum aequantibus;

Platylobium macrocalyx Meisner.

In fruticulis primum montium
Lassy - ^{one} Parappa - Bayle range
Floruit ⁱⁿ aestate.

Bractea interioribus arbutis et
obtusae. Vexillum lato-uniforme
villosulum rubrum basin versus ab-
scurius ^{purpureo} maculatum, macula
venas emittentibus, ima basi rubrum.
corina ^{purpureo} ~~purpurea~~ ^{fulvo} ~~fulva~~ sub brevior
frutex 1-2' cretus. Stach. vexillum
extus atropurpureo - fuscum. Corina
infra alba. Pedunculatum ra-
morum longius breviusve vil-
loso-pubescentibus.

Similia Tarmanira nulla linea
a nostris divagant. Lammiston
Oct. Nov. 1848. fr. 1-2' hb. N. S. H.
n. 61 & 378. sub nomine P. tri-
angulari, quod pedunculis mani-
festis haec bracteis (praesuma-
ntioribus in P. mac.) ~~intertextis~~.
Sic sine dubio pertinet P. obtu-
sangulum Hook. sed nomen
pessimum plurimoda varietati
conveniens in Meisnerianum
"macrocalyx" ~~confundere~~ ^{confundere} est
aptius est ~~mixtum~~ ^{mixtum} ~~mixtum~~ ^{mixtum}
Inape Ivan port, hb. N. S. H.
Oct. 1^h alt.

Floris tenuis fragrautes.

formosum Smith.

In rupestribus collibus ad por-
tum pygmaum. 1-2' 629 hb. N.

caule gravis ut scrobinum lyeptrochistalutana
x Cyatophyllum procumbens, f. Thunbergii

caule prostrato, foliis plurimisque
7-11 jugis pilis brevibus tosa sparsis
oppositis canaliculatis ovato-ob-
longis, radicibus sat ^{ad apicem} longis
pedunculatis, racina (anfractu
singulo contorta)

In viridia fluvii Wroughton
lois fertilibus humidis vel
passim inundatis. Ruth ¹⁹⁰⁴ 1904.

Rhizoma lignosum. Caulis glaber
striati. Folia impari-^{subopposita} ~~pari-~~
folialis 4-12 jugis ~~cor~~ ^{cor} adultis
ovatis brevissime ~~indivellatis~~ ^{indivellatis} ~~peti-~~
olatis adultis ovatis vel oblongis
obtusis retusive ^{ad} ~~glaberrimis~~ ^{longis}
junioribus angustioribus canalicu-
latis, stipula subcordatae vel
atae nudo-striatae. Peduncu-
li axillares folium duplo super-
rante solitarii rari striati latis-
cati interdum pedales, erecti
aut ascendentes. Calyx breviter
pedicellatus ~~for~~ ^{ultra} medium quin-
9 ^{superius} lobis ~~superioribus~~ ^{inferioribus} parvis
longioribus ~~extus~~ ^{extus} glabris intus vel
lobulis. ~~lobis~~ ^{lobis} indivellus basi bracte-
~~major~~ ^{minor} ovata ~~concorda~~ ^{concorda} ~~membranacea~~
x ~~inter~~ ^{inter} ~~medium~~ ^{medium} bracteolis ~~2~~ ² oppositis
minoribus ovato-lanceolatis pluri-
que ~~angustatis~~ ^{angustatis} ~~obtusis~~ ^{obtusis}. Cor ~~dentata~~
Floris ~~fragrantissimi~~ ^{fragrantissimi} ~~extus~~ ^{extus} ~~purpureo~~ ^{purpureo}
violaceo. Vexillum erectum basi
marulis flavis ~~sinistram~~ ^{sinistram} carinam
aequans alas duplo ~~valvula~~ ^{valvula} ~~triplo~~
superans. Carina apex ~~acutiuscula~~ ^{acutiuscula}
superius angustata apex pallide flava
Stamina ~~multa~~ ^{multa} ~~stylis~~ ^{stylis} (9 x 1)

foliis oblongo-lanceolatis, obtusiusculis, muticis, planis; pedicellis solitariis, folium subaequantibus, medio bibracteolatis, apice incrassatis; calycis labio superiore lato, emarginato-bifido, inferiori acute 3-fido subaequali.

In glareosis sterilibus inter frutices promontorii Cape Riche, d. 20. Nov. 1840. specimina pauca, manca. Herb. Preiss. No. 986.

A praecedente distincta ramis teretibus, ramulis vix compressis et foliis omnibus oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis 3 lin. longis vix 1-1½ lin. latis obtusiusculis subacutisve. *Corollam* non vidi. „Frutex 2-pedalis.“

6. **Bossiaea linophylla** R.Br. Bot. Cab. t. 174. Bot. Mag. t. 2491. DC. prodr. 2, p. 117, n. 4. Benth. in Hügel. En. p. 36, n. 107.

Locus umbrosus in solo humoso ad lacum Kalbenup (Sussex) d. 27. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1013. fructif. in subarenosis sylvae prope oppidum Albany (Plantagenet) d. 23. Sept. No. 1012. fl. et fr. et inter frutices in clivulo arenoso prope Baldhead (Sinus Regis Georgii III) d. 16. Oct. 1840. No. 1011. fl. et fr.

„Frutex bipedalis.“

7. **Bossiaea eriocarpa** Benth. in Hügel. Enum. p. 36, n. 108. Walpers repert. 1. p. 578; inermis, ramis junioribus compressis, pubescentibus; foliis oblongo-linearibus, obtusis, mucronatis; leguminis villosi unilocularis stipite calyce brevior.

In arenosis et collinis sylvaticis ad fluv. Cygnorum, d. 28. Jul. Herb. Preiss. No. 1009. fl. et fr. jun. et ad portum Leschenault (Wellington) n. Dec. 1839. No. 1005, fruct. nec non in planitie arenosa Quangen (Victoria) d. 20. Mart. 1840. No. 1004. steril. (Drummond n. 256 et coll. I.)

„Frutex 1-1½-pedalis, ramis distichis. Flores atropurpurei.“ *Bracteolae* prope medium pedicelli caducissimae. *Legumen* 8-10 lin. longum, 2½ lin. latum, rectum, utrinque obtusum, planum, 1-loculare, 8-12-spermum, suturis paulo incrassatis, valvis pilis longiusculis albidis laxiuscule villosis. *Semina* subsessilia, transversa, oblonga, laevia, rufa, stropholiola pallida lunulata circ. duplo longiora, fere lineam longa.

8. **Bossiaea Endlicheri** nob., inermis, stipulis membranaceis, linearibus, petiolum superantibus; foliis ovalibus oblongis linearibusve, mucronulatis v. muticis, subtus ramulisque teretibus villosis; pedicellis folio brevioribus, supra medium bibracteolatis; calycis adpresse sericei labiis aequalibus, superioris bifidi inferiorisque lobis acuminatis; ovario sessili, villoso.

α **ovalifolia**, foliis coriaceis ovalibus oblongisve (5-6 lin. longis, 2-3 lin. latis) margine obsolete recurvis, mucronulo tenui (rarius nullo) apiculatis, interdum demum glaberrimis.

B. ovalifolia Endl. nov. stirp. decad. I. p. 21, n. 26. Walpers l. c.

An ab hac satis distincta *B. disticha* Lindl. in Bot. Reg. 1841, Misc. p. 38, n. 67, t. 55? quae ex ic. cum nostra bene convenit, ex descr. vero recedit foliis planis, nequaquam coriaceis, omnino laevibus, fere aveniis, sed hae differentiae forsitan ex cultura ortae.

In solo limoso inter frutices sylvae prope villam cl. Harris ad fluv. Cygnorum, d. 1. Jul. 1839. Herb. Preiss. n. 1008.

β angustifolia, foliis linearibus v. lineari-oblongis (6-9 lin. longis, 1-1½ raro 2 lin. latis) obtusis, plerumque muticis.

Swan River. James Drummond n. 255 et coll. I.

γ minor, foliis linearibus (4-6 lin. longis, vix 1 lin. latis, pedicellos plerumque superantibus) obtusis, muticis, margine revolutis.

In region. interior. Australiae occidentalis et meridionali-occidentalis, m. Nov. 1839 et. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1000.

Species satis variabilis, cujus nomen primitivum, quum non omnibus formis (certe tamen haud specificè separandis) conveniat, mutandum videbatur. *Rami* ramulique superne cano-villosiusculi, inferne glabrati. *Stipulae* omnes membranaceae, adpressae, lineares, acuminatae (in var. γ sola apice setaceae.) *Folia* plus minus coriacea, supra transverse venosa (venis in β et γ plerumque obsoletis) et sub lente minute punctato scabriuscula (in α sublaevigata) subtus viridia v. in β sordide albida (glauca?) villosa v. secus nervum solum parce pilosiuscula v. demum glabrata. *Pedicelli* 6-7 lin. longi (in γ paulo breviores) supra medium bracteolis 2 stipulis conformibus diu persistentibus (in γ saepius apici approximatis) instructi. *Calyx* adpresse sericeo-pubescent. „*Inflorescentia* pedalis v. dodrantalis, erectus. *Vexillum* flavum, carina alaeque purpureae.“ — A *B. eriocarpa*, cui praecipue var. β et γ valde accedunt, dignoscitur stipulis omnibus membranaceis (nec superioribus setaceis) foliorum venis transversis minus conspicuis, pagina inferiore plerumque villosa, bracteolis calyci magis approximatis diutius persistentibus et calyce ramisque cano-pubescentibus. *)

9. **Bossiaea pulchella** n. sp., laxè ramosa, ramis gracilibus, teretibus, apice minute puberulis; stipulis minutis, obtusis, deciduis; foliis subsessilibus, cordato-subrotundis, acutiusculis, muticis, planis, coriaceis, lacvibus, glabris; pedicellis solitariis, folio brevioribus, bracteis basilares obtusas vix superantibus; calycis glabri labio superiore emarginato-bilobo, inferiore aequali acute 3-dentato.

In umbris limoso-calciosis sylvae inter Mahogany creek et Halfwayhouse (Darling's-range) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1032. (Drummond n. 250 et coll. I.)

Proxima *B. nummulariae* Endl. nov. stirp. dec. 1. p. 22, n. 27, quae differt stipulis subulatis petiolum aequantibus, foliis mucronulatis, pedicellis folia subsuperantibus (3½ lin. longis) deflexis, caet. — „Frutex 2-3-pedalis, ramulis secundis.“ *Stipulae* obsoletae, vix ¼ lin. longae, membranaceae, ovatae, obtusae, fuscae. *Folia* cum petiolo (vix ⅓ lin. longo) 2½-3½ lin. longa et fere aequè lata, basi rotundata semperque cordata (sinu petiolum aequante) antice sensim angustata, nervo venisque subimmersis vix conspicuis, margine plano sub lente obsolete et irregulariter crenulato. *Bracteis* ad pedicellorum basin quatuor, decussatae, membranaceae, tenniter striatae, ovatae v. oblongae, obtusiusculae; interiores? duae longiores, 2½ lin. longae,

*) Inter plantas a cl. **Latrobe** circa Port Philipp in N. Holl. ora australi lectas exstat **B. tenuicaulis** Grah. in Edinb. New Phil. Journ. Jun. 1840. XXIX, p. 171. Bot. Mag. t. 3895! Walpers rept. t. p. 578, quam a **B. cordifolia** Sweet. Fl. Austral. t. 20. (fide specim. in Anglia cult.) vix distinctam credimus, nisi ramorum pube brevissima adpressa, foliorum basi rotundata nec cordata et calyce paulo majore. An utraque ad **B. cineream** R.Br. reducenda?

x *P. prostrata* Br.
P. humularia (Endlicher)
P. ovata hb. St. J. in numero.
 Lacty-range! (Riidem e notis bre-
 vibus mueri folium etridanda
 sumu & hac non est dubitandum!
 i. infra valde accedit *P. prostratae*
 i. *indiana*? *Tristylis* ^{inter} *luteum* exlus gr?
 flo. rubellum venis rufis et luteis.
 Carina fere rubra alis longior vixillo
 brevior. In frutibus montium Eagle-range
 et 23. Fruticulus diffusus v. diffusus.
 In lucis variis Jarm. hb. St. J. n. 216. Oct. 48.
 i. *officinalis* al. *diffusa* v. *diffusa* - pag. 619
P. horizontalis . . . . . hb. St. J. 28.

(In nomine *Hookerianum*)? Ab omni-
 bus quod Freyf. & Don descriptis dis-
 tinguat. T. G. Land! In p. silvarum
 ad p. l. Murphy-river, hb. St. J. n.
 373. Procreabit Jan. 16. 1849.
 ab eolia appropia *Platycobis*
 accedit!

x *P. cinerea*! R. Br.
 Contra cl. Stuart ab hac distinguere
 nequa sequendum.
 In silvarum prope Lammeyan. 1-2.
 Oct. 1848. hb. St. J. n. 64.
P. tenuicaulis Graham!

Inter bona *P. cordifolia* & *Rivina*
 neco intermedia, ultima ex Tadm-
 sia secundum mentionem cl. Stuart
 est diversa. Post Philippi! Jais 8.

y. *P. corollata* Sweet in
 eliditante *P. tenuicaulis* ad
P. cineream ^{transit} ~~transit~~ Paul. 1-2
 vixtus. *Tristylis* *fulvifolium*
 carina atra-purpurea.
 In fruticulis ad eas. cl. Tadmeyan
 vixtus Rivata - pag. 618.

fuscae, minutissime ciliatae, concavae, florem amplectentes, mox a basi solutae apice invicem cohaerentes et corollae apici calyptrae bilobae instar diu insidentes; interiores? duae duplo breviores, pallidae, persistentes. (Bracteas majores nunquam quidem in situ primario, scil. basi adhaerentes, vidimus, sed ex aliarum specierum analogia interiores fuisse vix dubitamus.) „Flores tristes.“ *Calyx* campanulatus, corolla plus duplo brevior, 2 lin. longus, basi vix attenuatus, lobis subaequalibus tubo brevioribus late triangularibus acutiusculis, superioribus latioribus. *Vexillum* aurantiacum, medio cum *alis* *carinae*que purpureum. *Staminum* vagina supra fissa. *Ovarium* glabrum, 2-ovulatum, stipite calycis tubum aequante. *Legumen* . . . . .

10. **Bossiaea biloba** Benth. in Hügel En. p. 36, n. 109.

Walpers rept. 1. p. 578: ramis subteretibus, villosis; foliis linearibus, apice dilatato bilobis; leguminibus coriaceis glabris, stipite calyce brevior.

In saxosis ad latus collis prope Cataractam ad caput fluvii Cygnorum, d. 25. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1061. (Drummond n. 265.)

β *stenophylla* nob., foliis linearibus (saepe $1\frac{1}{2}$ –2 poll. longis, 1 lin. latis) apice nequaquam v. vix dilatatis retusis v. obsolete bilobis aut acutis mucronulatis muticisve.

Swan River. James Drummond n. 264.

Frutex $1-1\frac{1}{2}$ -pedalis, basi ramosus, ramis erectis strictis subsimplicibus. *Folia* supra punctato-scabra. *Bracteolae* duae calyci approximatae, lineares, breves. *Corolla* calyce duplo longior, flava? v. carnea? carina valde incurva obtusa imberbi. *Legumen* 16 lin. longum, 7 lin. latum, utrinque obtusum, breviter mucronatum, 6-spermm, inter semina membranaceo-septulatum, valvis viridibus parum convexis laevibus aveniis, suturis obsoletis. *Semina* oblonga, $1\frac{1}{2}$ lin. longa, fusca, laevia, opaca, stropholiola pallida crassa truncata triplo longiora.')

LALAGE Lindl. Endl. gen. n. 6453. Meisn.
gen. p. 82. (58.)

1. **Lalage ornata** Lindl. in Bot. Reg. t. 1722! ramis gracilibus pubescentibus glabrisve, apice compressiusculis;

*) E plantis Andersonianis addenda est nova species: **Bossiaea humilis** nob., ramis subdecumbentibus, debilibus, teretibus; stipulis subherbaceis, lanceolatis, acutis, adpressis, petiolo brevissimo longioribus; foliis coriaceis, obovatis ovalibusve, mucronulatis, margine subrecurvis, supra glabris subvenosis, subtus ramulisque adpresse pubescentibus; pedicellis solitariis geminisve, folio dimidio brevioribus, basi apiceque bracteis 2 linearibus deciduis instructis; calycis puberuli labiis tubum subaequantibus, superioris bifidi lobis latis divaricatis acutiusculis, inferioris brevioris trifidi lobis lanceolatis acutis. — Circa Sydney, ora orient., legit Anderson, n. 78. (v. s. in Herb. Shuttleworth.) — Proxima **B. prostratae** R.Br. et **B. ovalifoliae** Endl.; a priori (fide specim. Sieber. hb. N. Holl. n. 351!) differt: pubescentia, ramis paulo firmiteribus et crassioribus, stipulis majoribus (1 lin. longis, fere $\frac{1}{2}$ lin. latis) foliis minoribus (cum petiolo vix $\frac{1}{3}$ lin. longo $2-2\frac{1}{2}$ lin. longis, 1-2 lin. latis) basi obtusis v. angustato-subacutis (nec emarginatis) margine plus minus recurvis (nec unquam perfecte planis) et calyce paulo majore ($2\frac{1}{2}$ lin. longo, dimidiam corollam aequante.) — A **B. ovalifolia** Endl. discrepat: stipulis longo setaceis, petiolo breviori, foliis minoribus basi haud emarginatis, pedicellis brevioribus (vix 2 lin. longis.) — Vexillum alaeque lutae, carina carnea? v. purpurascens? obtusissima imberbis. Legumen desideratur.

stipulis linearibus, acuminatis, petiolo parum longioribus; foliis ovatis v. ovato-oblongis, mucronulatis, basi rotundatis emarginatisve, utrinque reticulatis glabris v. subtus pubescentibus; pedicellis geminis, petiolo duplo-triplo longioribus, bracteis interioribus ovatis, calyce sordide albido-v. fulvo-villosiusculo.

In limoso-calculosis sylvae ad Emuplain et in asperis montium continuorum Darling'srange (Perth) m. Sept. 1839 et 1841 Herb. Preiss. No. 1010 et 1002. florif. in sublimoso-arenosis sylvae district. Sussex, m. Dec. 1839. No. 999, fl. et fr. jun. et in region. inter, Australiae merid.-occid., m. Oct. 1841. No. 1007. (Drummond n. 254.)

„Suffrutex pedalis.“ Legumen fere *Bossiacae eriocarphae*, paulo tantum minus villosum. — *Variat* per gradus insensibiles foliis 1-2-pollicaribus, 6-12 lin. latis, basi rotundatis v. emarginatis v. leviter cordatis, subtus glaucescenti-pallidis v. viridibus vix pallidioribus, venis angulo nunc fere recto nunc plus minus acuto a costa divergentibus, petiolo 1-2 lin. longo, bracteis inferioribus (involucralibus) interioribus 3-5 lin. longis, ovalibus oblongisve, calyceque 4-5 lin. longo.

2. **Lalage? acuminata** n. sp., ramis gracilibus, simplicibus, patenti-pilosis, apice compressis; stipulis membranaceis, fuscis, striatis, linearibus, acutis, patenti-recurvis, petiolo longioribus; foliis cordato-ovatis acuminatis caudatisve, acutis, submuticis, planis, utrinque reticulatis, supra minute punctato-scabriusculis, subtus adpresse pilosiusculis, floribus . . . . .

In districtu Wellington, m. Dec. 1839. sterilis. Herb. Preiss. No. 1003.

Ex habitu absque dubio hujus loci. „Suffrutex pedalis.“ *Rami* pedales, simplicissimi, stricti, pilis tenerrimis albidis patentissimis satis dense tecti, superne ancipites. *Stipulae* fere 3 lin. longae, $\frac{2}{3}$ lin. latae. *Folia* magnitudine formaque fere *L. ornatae*, 15-20 lin. longa, prope basin 8-10 lin. lata, inferiora sensim acutata v. breviter acuminata, superiora a medio inde subito in acumen $\frac{1}{2}$ -1 pollicare (basi 3 lin. latum) angustata, reticulatione utrinque densiore et acutius quam in praecedente prominula.

3. **Lalage hoveaefolia** Benth. in Lindl. Swan River p. XV, n. 68. Walpers rept. 1. p. 577: ramis apice compressis, distiche ramulosis, villosiusculis; stipulis linearibus, acuminatis, petiolo parum longioribus; foliis oblongis lanceolatisve, acutiusculis, mucronulatis muticisve, basi rotundatis v. emarginatis, margine subrecurvis, utrinque reticulatis, subtus pilosiusculis; pedicellis subsolitariis, petiolo vix duplo longioribus, bracteis interioribus oblongis, calyce aureo-villoso.

In subarenosis sylvae district. Wellington, d. 5. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1001. (Drummond coll. I.)

„Suffrutex pedalis.“ A *L. ornata* nonnisi foliis (10-18 lin. longis, 3-6 lin. latis) bracteisque interioribus angustioribus distincta. *Legumen* penitus idem. *)

*) **Lalage angustifolia** n. sp., ramis gracilibus, simplicibus, glabris, apice compressis; stipulis linearibus, acuminatis petioloque ipsis brevioribus pilosiusculis; foliis lanceolato-linearibus, acutis, submucronulatis, basi obtusis, margine subrecurvis, utrin-

non Indigofera pteraloides Wt. in Metb. thm exp
arabidionarpa
Blechnanthus R. Br. in St. exp 17. Lachlan

calyx spinosus. Petala longitudine subaequa-
lia. Stamina diadelphea: antherae uniformes
laculis apice confluentibus, valvula con-
traria ab apice ad basin separanti
dichotomis! Ovarium monopersonum,
stylus filulatus. Stigma obtusum.
Legumen ovatum. Cuticula cari corn-
pactum echinatum.

Herba v. Suffr. glabra glandulosa, ramu-
lis angulatis. Folia cum impari
pinnata, foliol. oppos., subius glan-
dulosis. Spulae parvae basi pe-
toli adnatae. Flores spicati parvi
a llois antea "ut vixit. accitum carinaria, a llois
quarum pallide lilacis, ad basin viridis, carina carina
longioribus lilacis
In ^{Calceolus} ^{Gray} ^{Sturt}, Murray Flats
In ^{Gray} ^{Sturt} ^{Murray Flats}
spicantes in ^{umbrosis} ^{humidis} passim
frequens inter ^{humida} ^{et} ^{viridam}
fluminis orientalem. Sol. saturate viridis vix
nitens. Folia glabra viridis graecolat
Indigofera platyphylla Vahl.

Folia opaca pulchra etiam palli-
diora. Legumina (immatura)
nitentia.

F. brevius Wt. in Metb. trop. Auct. 385.

Indigofera brachybotrya, f. m.

In superioribus Nov. Holl. austr.
montem m. Remarkable super.
Intra Australes (F. australis, fil-
vacea, monophylla, aranthosae-
s-ovoidis) minus graminea sed
jam foliis pubes. trigulosis lat-
diversimoda. At f. filvacea
purpurea diffut habitum multa
minore, ramis brevibus.
Folia humilis vel plures pedes altus
erectus v. diffusus. Corolla rosea
In montibus Flindersi frequens.

Foralea parva! *Ferd Mill* *not*
 in herb. *Behrri*
 (specimeni *terstiae* inferenda)
 caule ^{astrum} basi ^{multis} ~~pubescentibus~~, ramis de-
^{um} ~~erectis~~ ^{erectis} ~~semitibus~~ ^{semitibus} ~~foliis~~
 pedunculis foliisque pilis brevibus
 finis sparsis obfatis, stipulis
 ovato lanceolatis acuminatis
 nervo ^{striatis} ~~striatis~~, reticulatis ~~ter-~~
^{minis} ~~linearibus~~ ^{linearibus} ~~angustis~~
 statis ^{multinerviatis} ~~multinerviatis~~ ^{linearibus} ~~linearibus~~
 ovato-oblongis integris petiolo
 his ^{terve} ~~terve~~ ^{gracili elongato} ~~brevioribus~~
 pedunculo ^{multifloris} ~~multifloris~~ ^{brevioribus}
 bus, floribus ^{sessis} ~~sessis~~ in bracteis
 axillis ^{capitato} ~~capitato~~ ^{spicatis} ~~spicatis~~, bracteis
 pubescentibus minutis, calycibus
 pilis albis subcircis cacinis
 inaequilongis acutis, legumina
 pilisula!

Rare frequens in solo undulato intra par-
 thaurium et montes *Warappa* - *raup*
not! *Sw.* 48. *floris* ^{albidis} ~~albidis~~ ^{lilacis} ~~lilacis~~
 sima. *Floribus* ^{prostratis} ~~prostratis~~ ^{vel humil-}

Desmodium Tasmanicum *Sm.*
^{not. thaurium}
Sw. ^{com.} ~~com.~~ ^{prostr.} ~~prostr.~~ ^{ovale} ~~ovale ^{pubescentibus} ~~pubescentibus~~
^{laeve} ~~laeve~~ ¹ ~~1 ⁷⁹ ~~79 ⁸ ~~8 ⁴⁵⁷ ~~457. An jam *descriptum*
 in *recensitionibus* *operibus*.~~~~~~~~~~

Desmodium Nova Hollandicum *Ferd Mill*
Trifolium repens *L.* *raup.* *pag* 80
Introduitum

Trifolium pratense *L.*
Introduitum *uti* *auterius*
melilotus officinalis *Terrastrica*
In ^{prostratis} ~~prostratis~~ ^{prostratis} ~~prostratis~~ ^{prostratis} ~~prostratis~~ ^{prostratis} ~~prostratis~~
Crym *brook*. *Pro* *act*

4. **Lalage? stipularis** *n. sp.*, molliter patenti-pilosa, ramis teretibus, erectis, strictis; stipulis patentibus, linearilanceolatis, acutis, membranaceis, fuscis, striatis, petiolo triplo longioribus, persistentibus; foliis linearibus, mucronulatis, basi obtusis, margine revolutis, supra reticulatis; floribus . . . . .

„In region. interior. Australiae occidentalis“ sterilis. Herb. Preiss. No. 1006.

Species insignis, ex habitu verisimiliter hujus generis. „Suffrutex pedalis“, pallide virens v. subglaucus? *Rami* graciles, obsolete striati, satis dense foliosi, internodiis 3-6 lin. longis. *Stipulae* 2-2½ lin. longae, inde a basi ⅓ - ½ lin. lata sensim attenuatae, tenerae, cinnamomeae, dense parallelo-lineatae, dorso pilosiusculae. patentes v. recurvae. *Folia* sparsa, petiolo vix lineam longo; lamina lineari, 12-16 lin. longa, 1-raro 2 lin. lata (foliorum infimorum nonnunquam ovali, 4-6 lin. longa, 3 lin. lata) mucronulo brevi rigidulo recto fusco terminata, basi rotundata vix angustata (saepius sub angulo recto petiolo inserta) nervo medio subtus valido, supra cum venis transversis laxè anastomosantibus parum prominulo, pagina superiore parcius breviusque, inferiore secus costam marginesque longiuscule pilosa, pilis tenerrimis, albidis, laxis, sub lente articulatis. Caet. ignota; speciem tamen adeo insignem silentio praeterire noluimus.

SCOTTIA R.Br. Endl. gen. n. 6458. Meisn. gen. p. 83. (59.)

SCOTTEA DC. prodr. 2. p. 118.

1. **Scottia dentata** *R.Br.* DC. l. c. Bot. Reg. t. 1233! Reichenb. Fl. Exot. t. 314!

In districtu Plantagenet, m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1034.

„Suffrutex pedalis.“

2. **Scottia angustifolia** *Lindl.* in Bot. Reg. t. 1266! Walpers rept. 2, p. 833: foliis lanceolatis sublinearibusve, basi truncatis subcordatis hastatisve, margine recurvo serrulatis; bracteolis lanceolatis, complicatis, striatis, calycem aequantibus.

In dumetis confragosis sylvae ad latus meridionale montis Wuljenup (Plantagenet) d. 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1035.

„Frutex 8-10-pedalis, gracilis. Flores sulphureo-rubri.“

que reticulatis glabris; pedicellis solitariis brevibus, calyce fulvo-villoso. — Swan River, James Drummond n. 253. — Species notis indicatis a reliquis facile distinguenda, foliis angustis (12-20 lin. longis, 1½-3 lin. latis) eorumque nervatione ad **L. stipularem** accedens, sed foliis magis lanceolatis ramisque glabris et stipulis subctaeo-acuminatis demum laceris bene distincta. Bractae inferiores (involuerales) interiores bracteolaeque caduicissimae. Flores omnino **L. hoveaeifoliae**, calycis lobis superioribus ad medium usque solutis. Legumen ignotum.

TEMPLETONIA R.Br. Endl. gen. n. 6457.

Meisn. gen. p. 83. (59.)

Templetonia retusa R.Br. DC. prodr. 2. p. 118.

In calcareis ad latus montis Eliza d. 18. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 1083. fl. et fr. et in littore arenoso promontorii Cape Riche, d. 18. Nov. 1840. No. 1082. fr. (Drummond n. 273.)

„Frutex 5-6-pedalis. Flores coccinei.“ *T. glaucam* Sims. Bot. Mag. t. 2688. DC. l. c. ad hanc reducendam esse, cum cl. Lindley (Bot. Reg. adnot. ad t. 859.) valde suspicor. E speciminibus enim nostris n. 1082 foliorum forma exakte convenit cum *T. glauca* Bot. Reg. t. 859!, sed folia non habet glauca; No. 1083 vero et 273. folia exhibent illis *T. retusae* Bot. Reg. t. 883! penitus conformia, sed in No. 1083. subtus glauca, in n. 273 vero utrinque viridia; specimina denique, quae habemus, culta foliorum forma plus minus cuneata apiceque dilatata inter utramque speciem exakte medium tenent. Flores et bracteolarum situs (circ. in medio pedicelli) in omnibus penitus iidem.

GOODIA Salisb. Endl. gen. n. 6456. Meisn. gen. p. 82. (58.)

Goodia lotifolia Salisb. parad. Lond. t. 41. Bot. Mag. t. 958. DC. prodr. 2. p. 117, n. 1.

In arenosis districtus Hay, m. Oct. 1840, desolataa cum legum. jun. Herb. Preiss. No. 1014. *)

„Frutex 4-6-pedalis.“ Obs. An hujus var.? an vero n. sp.? planta ab Andersonio circa Sydney lecta (Herb. Shuttleworth et nostr.) recedens foliolis plerumque angustioribus, pedicellis brevioribus vix 2 lin. (in illa 3-3½ lin.) longis et calyce paulo minore, 1½ lin. longo.

Subtribus III. Galegeae, DC. **)

INDIGOFERA Linn. Endl. gen. n. 6530.

Meisn. gen. p. 86. (62.)

Indigofera ervoides n. sp., fruticosa, ramis gracilibus, sulcato-subangulatis, glabris, foliis pinnatis, elongatis;

*) E subtribu II, *Trifolicearum* DC., nulla species inter Preissianas occurrit; inter plantas vero a cl. *Latrobe* circa Port Philipp lectas (in Herb. Mus. Neocomens.) exstant: *Lotus corniculatus* Linn. a *arvensis* Ser. in DC. prodr. 2. p. 214, n. 42. (quem etiam prope Sydney legit Anderson?) n. 90, fide Hb. Shuttleworth.) et *L. tenuifolius* Poll. (*L. corniculati* var. DC. l. c.) var. *pubescens* nob. — an *L. australis* β *angustifolius* Seringe in DC. prodr. 2. p. 212, n. 27? — Species utraque in Nova Holl. vix indigena.

**) *Ptychosema pusillum* Benth. in Lindl. Swan River p. XVI, n. 71. (Drummond n. 281!) et *Cyclogyne canescens* Benth. l. c. n. 72. (Drummond n. 268!)

*) *Indigofera portii* Bot. Sibuyensis.

Goodbye pubescent! Yours

Adfl. Nil-uvir, Tasmanicae,
inter 4-5 pedalis. Oct 1848.
hb. N. H. n. 60.

Gavia media. Corolla per colore Platy
bii. Ad rivales montium Flindus - rarus
prope Crystal brook alibique lacum Torr
vapor. In run I. intrinseca. pag. 11. 12.
Donia, George & David Don.
non R. Br. ne Pursh

S. pumila! G. & D. Don.

Eleocharis grisea Banks & Solander.

*Stipis Novo-Zeelandica in nostris
hortis saepe culta per totum
huc annum bene floravit.*

Helianthus dampieri B. Br. *Helianthus dampieri* & *Helig. lunifolius*
Gomola G. & J. Don. ^{type j'ovish. of 1890}
Foliola inferiora opposita
hanc superiora. pedicelli
plumbeque subullosim
aggregati, inferiores rimis-
floris racemosi.
Pulcherrima speciosae ^{pauc}
valde procurrens ^{forma} *sola*
adpresso, pedunculi nu-
merosi sed solitarii. Flores
speciosissimi igneo-racemosi
Florantem vidi cultam
a 14. Capt. Stuart ex in-
terioribus coloniis (monumt
Remarkable) in hortos
nostros importatam!
raro lignumina maturat,
florant eusse.

In ascending the Barrier range near the Darling
about 500' above the river, Stuart, ^{no} head of
Spinners gulf, Eyre Gawlin range, Eyre.
U. Brown huii plantae fi. *prostratum* lig.
min. prostrat *diversa*, nom. *generis*
Eumotharis proposit var. *distachya*.

N. Port Lincoln auctos.
 & Latua Australis! Andrews non Forsk.
 Spec. valde polymorpha etiam ab alijs.
 similitudinem flaminis unius valde
 memorabilis. Vivit ~~et~~ at perennans & vivit
 in multis locis. para.
 A. magnus, flos albi maxime hb. St 209.
 B. angustifolius Seringe, Port Philippi.
 hb. Vojts N. 4. In paucifl. Leavoe.
 J. brachyclonum f. A. M. C. 16. 47.
 K. latifolius bay! Jan. 30. 1848. (f. 2. fr.)
 L. discolor f. A. M. C. ad annum
 Gawleri Apr 16. 1848 floribus luteis
 (extra planta variat florum colore variegatis.)

[illegible]

In humidis ^{graminis} apud Gawleri
propagulum Wilhamson
legi Apr. 1848. Nihil r. aug.
Inter hunc et L. australem
fusus hybridus occurrere
videtur. Enim corollas
vidi albas, rubro-rosas-va-
riegatas, majores minores
et longiores breviores
et c. — In Tarnanica variis
locis quoque interioribus hb. 2715
Tetraselolobus numerus Maut.

Prifolium piliferum, L. Feb.

Formanicae. Occurrit inter
plantas Spartianae.

Cruzium nuytbaumii, L.
Sutr. Legum. Graecum. Nov. Libr.

foliolis 10-16-jugis, spathulato-linearibus, obtusiusculis, aveniis, parce puberulis, demum glabris; racemis folio brevioribus, multifloris; calycis pedicello subbrevioris puberuli subbilabiati dentibus brevissimis acutiusculis, labio superiore paulo longiore; legumine lineari, subtetragono-tereti, recto, glabro, laevi, polyspermo.

In umbrosis inter fragmenta rupium montis Mathilda, alt. 975 ped. (York) d.

11. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1067.

„Frutex 4-pedalis.“ *Rami* (facie fere *Ervi Lentis*) erecti, strictiusculi, crassitie pennae corvinae, inferne teretes; superne costis magis prominulis subangulati, saepe purpurascetes. *Stipulae* lineares, acutae, 1-1½ lin. longae, erectae, fuscae, deciduae. *Folia* 2-3-pollicaria, petiolo filiformi, jugis 2-3 lin. ab invicem distantibus, foliolis oppositis, 2-3 lin. longis, ½-⅔ lin. latis, planis, muticis, novellis subargenteo-canis, demum parce adpressequ pilosiusculis glabrisve. *Racemi* laxiusculi, 1-2-pollicares, pedicellis demum 2 lin. longis recurvis, floribus parvulis „roseis.“ *Calyx* corolla subtriplo brevior, coloratus? subcampanulatus, dentibus brevissimis. *Legumen* 12-14 lin. longum, obtusissime tetraquetrum, haud torulosum, suturis pallidis haud prominulis. — Affinis *J. Thibaudianae* DC. prodr. 2. p. 225, quae differt (ex diagn.) foliolis ellipticis retusis, legumine compresso, caet.

Tribus IV. PHASEOLEAE DC. Subtribus Kennedyae
Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 112.

KENNEDYA (Vent.) Benth. Endl. gen. n. 6641.
Meisn. gen. p. 94. (67 et 351.)*

1. **Kennedyia nigricans** Lindl. in Bot. Reg. t. 1715! Bot. Mag. t. 3652. Benth. l. c. p. 123. Walpers rept. 1. p. 757: volubilis, foliolis 1-3, ovatis, obtusis, stipulis bracteolisque lanceolatis parvis, racemis brevibus laxe plurifloris, floribus erectis, calyce rufo-villoso.

et coll. l.) inter Leguminosas Preissianas non exstant. — Inter stirpes Andersonianas circa Sydney lectas occurrunt **Swainsonia coronillaefolia** Salisb. DC. prodr. 2. p. 271, n. 2. (Anderson n. 100 in Hb. Shuttleworth) et **S. lessertiaefolia** DC. l. c. n. 3. (Anders. n. 97, ibid.) **Ervum hirsutum** Linn. circa Port Philipp legit el. Latrobe (Herb. Mus. Neocom.) procul dubio cum cerealibus ex Europa immigratum.

*) Addere hic liceat species duas nondum descriptas, quas nuper in horto Baumanniano Mulhusiae Alsatorum vivas observavimus: 1) **K. Baumannii** nob. (in cat. hort. Bollwill. et Mulhus. suppl. 1841. p. 3, sine diagn.) fruticosa, volubilis; stipulis ovato-lanceolatis brevibus, stipellis obsoletis; foliolis 3 petiolulatis, oblongis, petiolo duplo-triplo longioribus, utrinque rotundatis subemarginatisve, muticis, margine planis, subaequalibus v. medio longiore, subtus cum ramis petiolis pedunculis calycibusque fulvo-villosiusculis, supra parce pubescentibus; racemis laxe plurifloris, petiolum aequantibus. Stirps pulchra, e semiis incertae originis in horto Baumanniano enata, exceptis notis jam indicatis et pubescentia fortiore cum **K. rubicunda** Vent. exacte conveniens, sed foliolorum forma distinctissima. Foliola 3-6 pollicaria, 8-12 lin. v. rarius basi 24 lin. lata (nunquam ovata v. elliptica) in tota planta constanter uniformia, terminali plerumque extra medium paulo latiore, lateralibus prope basin fere semper plus minus dilatatis nonnunquam obsolete auriculatis. 2) **K. splendens** cat. hort. Bollwill. et

*Botan. Magazine of
London 1837 p. 26
C. Bon. icon!*

In solo humoso ad latus montis Tjalup (Kent) et ad promont. Cape Riche, d. 17. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1091.

„Frutex scandens. Flores atropurpurei.“ *Legumen* lineare, $2\frac{1}{4}$ poll. longum, 3 lin. latum, plano-compressum, rectum, acuminatum, tomentosum.

2. **Kennedyia Marryattae** Lindl. in Bot. Reg. t. 1790. Walpers rept. 1. p. 757: prostrata; stipulis bracteisque late ovatis subcordatis acutis; foliolis 3 oblongis obovatis subrotundisve, obtusis, margine undulatis, subtus ramulisque villosis, junioribus sericeis; pedunculis folio brevioribus, bifidis, 2-4-floris; calyce legumineque villosis.

K. Marryattiana Benth. in Ann. Wien. Mus. 2. p. 123. — ?*K. arenaria* Benth. in Hüg. Enum. p. 38, n. 114. (quam saltem ex descriptione a speciminibus Preissianis cultisque *K. Marryattae* ab hac distinguere nequimus.)

In arenosis sylvarum ad fluv. Cygnorum, d. 3. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 1095. (fl. et fr.)

„Frutex humifusus. Flores coccinei, vexillo basi aureo.“ Variat pubescentiore v. rariore (in specim. nostris semper patula) foliolis margine plus minus undulato-crispulis v. omnino planis, pedunculis 2-rariis 1-v. 3-4-floris nonnunquam folium subsuperantibus, bracteis interdum inciso 2-3-fidis.)

3. **Kennedyia bracteata** Gaudich? in Freyc. Voy. p. 286, t. 113. Benth. in Ann. Wien. Mus. 2, p. 123. Walpers l. c.: stipulis foliaceis, late ovatis, acutis; foliolis 3 ellipticis, obtusis, subemarginatis, margine undulato-crispis, subtus ramulisque sericeo-pubescentibus; pedunculis paucifloris, bracteis connatis infundibuliformibus, leguminibus glabris.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1098.

„Suffrutex procumbens.“ *Legumen* lineare, plano-compressum, sesquipollicare, $2\frac{1}{2}$ lin. latum, laeve, 6-8-spermum. *Specimina* manca, paulo recedentia foliolis acutato-mucronulatis, nec subemarginatis.

Mulhus. 1841, p. 13. (absque diagn.) fruticosa, volubilis, parce minuteque adpresso-puberula; stipulis lanceolatis, parvis; stipellis setaceis, petiolulos subacquantibus; foliolis 3 subacqualibus, petiolo subduplo longioribus, subovato-oblongis, obtusis v. emarginatis, muticis, basi rotundatis, margine planis; pedunculis folio longioribus; pedicellis racemosis, calyce brevioribus, apice minute bibracteolatis; calycis laxiusculi campanulati 4-fidi basi attenuati lobis tubo subtriplo brevioribus acutis, superiore lato indiviso. — Planta pulchra, *originis ignotae*. Rami gracillimi, subfiliformes. Stipulae vix 2 lin. longae, subdeciduae. Petiolus totus 12-18 lin., usque ad foliola lateralia 10-12 lin. longus, petiolulis $1\frac{1}{2}$ lin. longis. Foliola herbacea (nec coriacea) 18-25 lin. longa, infra medium latiora 6-9 lin. lata. Pedunculi circ. 3-pollicares, apice racemoso-pauciflori, pedicellis 2-3 lin. longis, bracteis minutis obtusis. Flores magnit. et forma *K. rubicundae* (v. paululum minores) sed calyx multo minus pubescens (pube minuta, parca, adpressa) lobis brevioribus subacuminatis et corolla lacte coccineo-sanguinea, vexillo basi macula sulphurea notato. Alabastra sericea, breviter nostrato-acuminata.

*) **Kennedyia prostrata** H.Br. DC. prodr. 2, p. 383, n. 2, species circa Port Jackson vulgaris, etiam circa Port Philipp in ora australi crescit, fide specim. a cl. Latrobe lect. in Herb. Mus. Neocomens.

J. Hipularis conf. p. 99.
Swainsonia pharaulalia ^{multifloris} ~~Swainson~~
 caule puberulacea erecta, foliolis
 3-4 jugis lineari-lanceolatis apiculatis
 cuneatis, ^{caucis} ~~caucis~~ ^{dentatis} ~~dentatis~~ ^{triangulatis} ~~triangulatis~~ ^{subulatis} ~~subulatis~~
 data lanceolatis-linearibus
 leguminibus suffraginibus.
 In vallibus aruosis prope Geor-
 getown, primo vere 1848. Flores
 pulvis subaurantiaci magnitud.
 fere *J. galigifoliae*, calyx niger.
~~parviflorus, florib. dupla magnitud., caly.~~
~~fl. alba, sig. rubra, l. calycis niger.~~
Swainsonia ~~*pharaulalia*~~ *delata*! ^{Swainson}
 in ~~South Australian~~ ^{South Australian} Register 1850
 n. 1048. Thurst. expd.
 caule puberulacea erecta, foliolis 7-10
 jugis ovatis cuneatis vel emarginatis
 cum apiculo glabris margine po-
 lycusculis, stipulis oblique trian-
 gularibus obtusis, leguminibus breviter
 stipitatis.
 In parte media fructuorum ^{diffusi} ^{Caract.}
 sub inter vases morunda ^{floribus} ^{floribus}
 flavo ochroleucis vexillum rubello ^{fractum}
 alis carinatis dilute rubro tinctis. ^{Rara!}
 Dec 1849 detest. G. Thurst.
J. parviflora ^{Swainson} ^{fl. p. 99.} c. var.
J. arenaria ^{Swainson} ^{fl. p. 99.}
J. major ^{Swainson} ^{fl. p. 99.} ^{per totam coloniam.}
J. arenaria ^{Swainson} ^{fl. p. 99.} ^{per totam coloniam.}
 dum indagations et. Schleich
 Sudali. Diagnosis iterum
 minus audae fuit, nam pl. nostras
 Australis & Dieminae diagnosis
 ambabus non conveniunt. Foliola
 protius orbiculata, quam obovata.
 Occurrit praesertim in umbra ar-
 borum laevis, antea igne ^{vestigatione} ^{vestigatione}
 — hb. M. J. II n. 26. Sept. 10. 1848.
 Insuper Guichenot & Dag.
J. phyllonalyx ^{Swainson}
 calycis laciniis magnopere
 alutis foliaceis
 cum minore forma. Sieme.

Swainsonia halmaturonum Forstn.
in litt. ad Stuartianam pinum. foliisque
caule puberulento erecto glabro
et tenuiter pelosiore, caliculis
6-⁸ multijugis ovato-oblongis
vix emarginatis mucosis, pedunculato
folium 2plo triplove superante,
ligulis calycisque dentibus tri-
angularibus acutis, ^{floribus raris} ~~comune~~
subproli puberulo, seminibus
nigris.

Cl. Stuart detexit in insula halmaturina plantam frutigeram virescentem
1 1/2' altam Mart 1848, e vigis feminibus
duxit specimina necnon binocle communicata. Corollae dilute-
purpurea, vexillum basi maculis duabus albis signatum. hb. 728.
Hinc propinqua maxima affinitate conjunctae sunt S. nivalis, folia
et S. Stuartiana, ultima parte non specifice distincta.

Swainsonia Stuartiana Forstn.
caule erecto glabro puberulento,
foliis pedunculatis foliisque glabro,
caliculis 9-14 jugis oblongis vel lineari-
oblongis truncatis vel emarginatis mucronulatis in basin angustatis,
pedunculo folium 2plo triplove superante, ligulis calycisque
dentibus dilatato triangularibus ^{corollae pappi} ~~ligulis~~
In hb. St. pin. nom. Differt praeter
rationis diagnosis floribus majoribus
pallidis, calyce glabro longius et recte
obtusato

4. **Kennedyia parviflora** *n. sp.*, prostrata, laxe pilosiuscula; stipulis herbaceis, ovatis, acutis, venoso-striatis, floralibus (bracteis) saepius 2-3-fidis; stipellis falcato-lanceolatis, petiolulos superantibus; foliolis 3 subaequalibus, petiolo parum brevioribus, late obovatis obcordatisve, mucicis, margine planis, lateralibus subsessilibus; pedunculis bifloris, pedicellis subaequantibus, folium subsuperantibus; calycis corolla dimidio brevioris lobis tubum subaequantibus, superiore latiore breviter bifido.

In region. interior. Australiae merid.-occid., m. Oct. Herb. Preiss. No. 1099. et in summitate promontorii Cape Riche, d. 20. Nov. 1840. No. 1084.

„Suffrutex procumbens.“ Habitus, pubescentia, stipulae, stipellae et foliolorum magnitudo *K. prostratae*, sed foliola semper plus minus obcordata, antice (nec basi) latiora, basi cuneata, margine plana, petioli et pedicelli longiores (10 lin. longi) flores dimidio minores et petala purpurea? (in sicco violacea) vexillo basi macula sulphurea notato. No. 1084. (specim. defloratum, sine fr.) recedit foliis glaberrimis et ramis glabrescentibus.

5. **Kennedyia microphylla** *n. sp.*, fruticosa, humifusa, ramis glabris v. apice pilosis; stipulis herbaceis, ovatis, acuminatis, venoso-striatis, floralibus (bracteis) conformibus parvis, stipellis nullis; foliolis 3 subaequalibus, petiolo brevioribus, late obcordatis, mucronulatis, margine planis, venosis utrinque parce adpresseque pilosiusculis; pedunculis bifloris, cum pedicellis brevibus folium superantibus; calyce dimidiam corollam aequante, puberulo, lobis tubo sublongioribus acuminatis, superiore latiore brevissime bidentato.

In solo subcoenoso ad margines lacus Mathilda (Hay) d. 7. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1092.

Praecedenti characteribus plurimis florumque forma et colore conveniens, certe tamen praeter notas jam indicatas distincta ramulis c. caulibus procumbentibus quasi fasciculatim nascentibus („caespitosis“ Preiss in sched.) demum elongatis laxioribus; stipulis foliolisque duplo v. triplo minoribus (hisce $1\frac{1}{2}$ -3 lin. longis, $1\frac{1}{2}$ -4 lin. latis) pedicellis 1-2 lin. longis, basi bracteola solitaria stipulis conformi vix 1- $1\frac{1}{2}$ lin. longa fultis, calyce glabrescente corollaque fere $\frac{1}{3}$ minoribus. *Legumen* sessile, linearc, acutum, plano-compressum, 10 lin. longum, $1\frac{1}{2}$ lin. latum, rectum v. leviter arcuatum, leviter torosum et minute puberulum, fuscum, 6-8-spermum, suturis vix incrassatis. *Flores* hujus et praecedentis speciei omnino *Physolobii*, sed legumen compressum, nec inflatum.

PHYSOLOBIUM Benth. Endl. gen. n. 6643. Meisn. gen. comm. p. 352.

1. **Physolobium carinatum** Benth.? in Hügel Enum. p. 39, n. 115; Ann. Wien. Mus. 2. p. 124. Walpers rept. 1. p. 758: prostratum, stipulis bracteisque late ovatis, acuminatis, subconnatis; foliolis obovatis orbiculatisve, retusis, mucronulatis, margine subundulatis, subtus ramulisque pubescentibus; corollae carina apice geniculata obtusissima.

In solo sublimoso ad fluv. Vasse River (Sussex) m. Dec. 1839. fructiferum. Herb. Preiss. No. 1085.*)

„Frutex prostratus.“ *Flores* non vidimus, caet. vero in descript. l. c. bene quadrant.

2. **Physolobium elatum** Hügel Bot. Archiv. t. 2! Benth. l. c. n. 117. Walp. l. c.: erectum, stipulis ovatis v. cordatis, floralibus (bracteis) inciso-dentatis; foliolis ovatis, obtusis, mucronulatis, junioribus ramisque pilosiusculis, adultis glabratiss; pedunculis 3-4-floris, summis folia superantibus paniculatis, carina alas subaequante.

In umbrosis arenosis sylvae prope Bassandeen ad fluv. Cygnorum, d. 31. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1089. fructif. et in solo sublimoso ad fluv. Canning prope Kelmescott, m. Sept. 1841. No. 1087. florif.

Foliola (ex ic. cit.) saepe ovato-oblonga et fere acuminato-acuta (in specim. nostris vero saepius subrotunda semperque obtusa v. retusa) flores $\frac{1}{4}$ majores et calycis lobi margine paucidentati (nobis semper integerrimi.) „Suffrutex 2-3-pedalis, erectus. *Flores* lateritii.“ *Bracteas* 2-3-fidas e stipulis semiconnatis conflatas esse, probatur specimine Preissiano in unius bracteae sinu foliolum genuinum nanum obcordatum gerente. *Legumen* subteres, obtusiusculum, 16-20 lin. longum, leviter arcuatum, reticulato-rugulosum, glabrum, suturis nerviformibus vix prominulis, valvis (ut in *Ph. carinato*) intus inter semina pellicula tenera alba septulatis.

ZICHYA Hügel. Endl. gen. n. 6642. Meisn. gen. comm. p. 352.

1. **Zichya villosa** Lindl.? in Bot. Reg. 1841, Misc. p. 41, n. 81. Walpers rept. l. p. 758. foliolis ovatis, acutis, subtus pallidis ramisque villosis; corymbis densis, capituliformibus, longe pedunculatis; calycis lobis tubo brevioribus; carina alis aequali; stylo apice simplici.

In clivulo calcareo-arenoso ad portum Princess Royal Harbour, d. 1. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 1086.

„Frutex prostratus.“ *Spectamina* floribus carentia, haud certe determinanda; a diagnosi recedunt foliolis ($1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{4}$ poll. longis, 1 - $1\frac{1}{2}$ poll. latis) truncato-obtusissimis cum mucronulo exiguo molli. *Pedunculi* fructiferi 5-6-pollicares, firmi, incurvi v. sigmoideo-flexuosi, persistentes. *Legumen* planocompressum, 2 - $2\frac{1}{2}$ -pollicare, 3-4 lin. latum, tomentosum, intus membranis teneris fuscis septulatum. *Semina* olivaceo-cinerea, nigro-maculata.

2. **Zichya glabrata** Benth. in Hüg. En. p. 40, adnot. Bot. Mag. t. 3956! Walpers l. c. p. 757: stipulis late ovatis,

---

*) **Ph. Stirlingii** Benth. l. c. n. 116. Walp. l. c.: erectum? stipulis bracteisque cordato-ovatis; foliolis late ovatis orbiculatisve, retusis, mucronatis, ramisque pilosis, demum glabrescentibus; pedunculis bifloris, carina alis brevioribus. — **Kennedyia Stirlingii** Lindl. Bot. Reg. t. 1845! Swan River. James Drummond n. 270. — Forma multiflora, pedunculis axillaribus saepius ternis quaternisve inaequalibus, uno alterove plerumque longiore folium superante apice bis v. ter bifido, brevioribus apice 1-4 floris, bracteis superioribus inciso-tridentatis, foliis glabratiss. *Legumen* non vidimus.

and J. Purshii Rayley Catalog. ? 1849.

Swainsonia halmaturorum Pursh

^{herbacea}
caule erecto glabro vel pilosiusculo
Swainsonia ^{gregaria} ^{bot.} ^{et} ^{maritima} ^{frut. full.}
Swainsonia grandiflora R. Br. in Hb. exp.

Suffrutescente pubescens, foliis 8-10 jugis
expansis inaequalibus, foliis
oblongis obtusis retusiusculis: adultis
singlatis: rachis pubescentia,
ramis multifloris foliis superantibus
bracteis lanceolatis linearibus acutis
aequantibus tubum calycis albo la-
riati quinque fide, lacinii acutissi-
mis longitudine fere tubi, vexillo
bicaulo

Common on the rich alluvial flats
on the Murray! & Darling.

Adriana fabulosa Mascher. ^{Herb. purpurei}
^{exhibito albo impunctata.} 2. 66.
Swainsonia *Gregaria* L. bot. reg. 1846

Suffrutescente pubescens, foliis 5-9 jugis
expansis inaequalibus, foliis
oblongis obtusis retusiusculis: adultis
singlatis: rachis pubescentia,
ramis multifloris foliis longioribus
bracteis lateralibus lanceolatis
linearibus brevioribus tubo calycis
albo-lanatis dentatis (dentibus
obtusiusculis tubo dimidia brevioribus,
vexillo bicaulo).

^{α, brachyodonta frut. full.}
^{fr. forte S. albiflorae varietas?}
Swainsonia ? *lana* R. Br. l. n.

glabra, caule ramoso, foliis 6-7
jugis, foliis oblongo-ovalibus ob-
tusis, ramis elongatis laxis, pedun-
culis calyce glabra quinque-dentata
brevioribus, bracteis subulosis,
vexillo exalato.

..... hb. H.
Flowers yellow! fruit unknown.

Crotalaria Shurtii R. Br.

tomentosa, foliis simplicibus ovalibus
utrinque sericeo tomentosis, petiolis
apice geniculatis, racemis terminalibus
multifloris
on the top of the ridges in pure sand
from N. L. 280-260

Swainsonia Behriana, Sw. in the South Austr. reg. Bot.

caule barbae densae adscendente basi pubescente, foliis
pedunculatisque ramulosis petiolatis, foliis 3-5 jugis angustis
oblongis, lanceolatis linearibusque junioribus acutis
adultis retusis, pedunculis foliis glaucis superaulis
lobibus primo capitato ^{prolongatis} denique ad
racemosa desectis, caecis dentibus lanceolatis
acutis folio angustis, stipulis latiore basi
late lanceolatis ^{obtusis}, leguminae prostratis.
In natis planis ^{in natis planis} in subumidis vulgaris.
in natis planis ^{in natis planis} in subumidis vulgaris.
rectissime florum dispositione deservitur.

Pentadynamis R. Br. L. v.

calyx 3fid. subaequalis. Vexillum ex-
planatum callo baseas laminae
in unguem decurrente. Carina obtusa
basin versus gibba longitudine aequa.
Haec. Diadelpa. Antheris 5 line-
aribus majoribus, reliquis atrox.
Ovarium poly spermum. Stylus e
basi arcuata proerectus. pappi
barbatus. Legumen compressum.
Ab. (Vexillum) bipid. pappo - imana,
oculi angulato erecto. Folia bipinnata
foliolis oppositis linearibus obtusis
stipulis raris basi pluri.

Ann Crotalaria Shurtii.

J. imana R. Br.

Indigofera pilulifera Reib. (F. australis p. gracilis Sw.)

Swainsonia microcalyx Sw. in Mill. ?

foliis, caule nudo stato basi superulicose,
pedunculis pilulifera foliis brevioribus, his glabris
4-5 jugis ellipticis breviter pedunculatis oblique
reflexis, caecis minuti pilulifera dentibus
breviter obtusis, stipulis lanceolatis - trian-
gularibus parvis acutis, legum. .... - speciosum tem hab
Charact. pilulifera exaltis.
Pappo. Leguminae praefata pappo adnectenda
3 alta. Floris decalculatis lilaceis. Racemi multiflori

acutis; petiolis ramisque pilosis; foliolis cuneatis, mucronatis, glabris; pedunculis folia aequantibus, subsexfloris, bracteis deciduis.

Kennedyia glabrata Lindl. in Bot. Reg. t. 1838!

In solo sublimoso-glareoso ad latus septentrionale montis Clarence (Plantagenet) d. 22. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1088.

„Frutex prostratus.“

3. *Zichya sericea* Benth. l. c. p. 40, adnot.; Ann. Wien. Mus. 2. p. 123. Walp. l. c.: foliolis ovatis, obtusis, subrepandis, mucronatis, supra tenuiter, subtus dense sericeis; calyceis lobis tubum aequantibus, carina alis brevior, stylo apice valde dilatato.

Kennedyia dilatata Cunn. Bot. Reg. t. 1526, f. 2? ex Benth. l. c.

In arenosis ad latus orientale montis Baldhead, d. 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1096.

Frutex volubilis! („prostratus“ fide Preiss in sched.) Capitula 15-20-flora. Calyx pedicello longior, pube densa fusca sericeo-villosus. Corolla „coccinea“, carina atropurpurea. Caet. diagnosi l. c. bene congrua. An a *Z. inophylla* Benth. satis distincta?

4. *Zichya tricolor* Lindl. in Bot. Reg. 1839, t. 52! Walp. l. c.: foliolis ovato-oblongis obtusis v. acuminato-mucronatis, utrinque (praecipue subtus) sericeis; calyce adpresse fulvo-villoso, vexillo euneato, alis carina obtusissima longioribus, stigmatibus minuto.

In solo sublimoso sylvae ad fluv. Canning prope Kelmscott, m. Aug. 1841. Herb. Preiss. No. 1097. (Drummond n. 272 et coll. I.)

Praecedenti similis, sed pedunculi minus elongati, flores laxius umbellato-corymbosi (nec subcapitati) pedicelli calycem subaequantes, et stigma haud dilatatum. „Frutex scandens.“

5. *Zichya Molly* Hügel Bot. Archiv t. 1! Enum. p. 40, n. 118. Walp. l. c.: foliolis obovatis, obtusis, subrepandis, infimis ovato-lanceolatis acutis, subtus tenuiter pubescentibus; calyceis lobis tubo brevioribus, carina alas subaequante, stylo apice vix dilatato.

In limoso-calculosis sylvae inter Greenmountain et Halfwayhouse (Darling's-range) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1090, ex parte.

„Frutex scandens.“ Rami glabri, inferne nonnunquam flexuosi, juniores pedunculique pube brevi patente aureo-fusca densissime villosi. Folia ovalia, obtusissima, saepe retusa, usque ad 2 poll. longa et 12-14 lin. lata. Pedunculi 3-4-pollicares.

6. *Zichya angustifolia* Lindl. in Bot. Reg. 1839, adnot. ad t. 52. Walp. l. c.: foliolis anguste oblongis, basi latioribus, supra nitidis glabriusculis, subtus adpresse pilosis; calyce adpresse fulvo-villoso, petalorum unguibus longiore; vexillo obovato, alis carina obtusissima longioribus; ovario praeter dorsum puberulum glabro, stigmatibus minuto.

Cum praecedente lecta et in Herb. Preiss. sub No. 1090 commixta.

„Frutex scandens.“ *Rami* inferne glabri, juniores cum petiolis pedunculisque pube brevi *adpressa* fulvo-sericei (nec villosi.) *Foliola* ovato-oblonga v. lanceolata, acutiuscula, 1-1½ poll. longa, 4-7 lin. lata. *Pedunculi* 1½-2½-pollicares. *Caet.* omnia *Z. Molly*, an igitur potius ejus var.?)

HARDENBERGIA Benth. Endl. gen. n. 6644.

Meisn. gen. comm. p. 352.

1. **Hardenbergia Comptoniana** Benth. in Hügel Enum. p. 41, n. 120. Walpers rept. 1. p. 758. *Glycine Comptoniana* Bot. Reg. t. 290! *Kennedya Comptoniana* Link. DC. prodr. 2. p. 383, n. 3.

In arenosis umbrosis secundum fluvium Cygnorum prope oppidum Freemantle, d. 15. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1094.**))

„Frutex scandens.“

2. **Hardenbergia Lindleyi** nob., foliis 3-5-foliolatis, foliolis ovato-oblongis obtusis, terminali longius petiolato; stipulis anguste triangularibus; racemis pedunculatis, folio longioribus, multifloris, vexillo acuto. .

α **trifoliolata**, foliis omnibus 3-foliolatis.

In arenosis sylvae ad fluv. Cygnorum. d. 19. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 1093, ex parte (Drummond n. 271.)

β **digitata**, foliis aliis 3-aliis digitato-5-foliolatis. (Preiss. No. 1093, ex parte.) — *H. digitata* Lindl. in Bot. Reg. 1840, Misc. p. 66, n. 142, t. 60! Walpers l. c. p. 758.

Nomen a cl. Lindley datum, quum nonnisi peculiari plantae statui conveniat, speciei servare non potuimus. *Specimina* Preissiana, in eodem

*) **Zichya? Latrobeana** n. sp., pumila, procumbeus, ramis filiformibus cum petiolis pedunculisque breviter denseque retrorsum pilosis; stipulis parvis, ovatis, obtusis; foliolis 3 petiolo parum brevioribus, subsessilibus, obovato-subrotundis oblongisve, muticis, planis, supra glabris, subtus adpresse subsericeo-pilosis, stipellis nullis; pedunculis folio triplo longioribus, apice racemoso-paucifloris, floribus subsessilibus parvis; calyce subsericeo, breviter 4-fido, labio superiore latiore brevissime bidentato; vexillo orbiculari, emarginato, carina alis brevior. α foliolis suborbicularibus v. obovatis, obtusis v. retusis. β foliolis oblongo-lanceolatis subacutis. Utrunque formam circa Port Philipp legit cl. Latrobe (Herb. Mus. Neocom.) Herbacea? v. suffruticosa, ramis digitalibus v. spithameis debilibus; pube omnium partium adpressa, subsericea, ramorum foliorumque albida, pedunculorum densiore flavescente. Stipulae lineam longae, submembranaceae, venoso-striatae. Petioli 10-12 lin. longi. Foliola in var. α 3-5 lin. longa, 2½-4 lin. lata, in β 6-8 lin. longa, 2-3 lin. lata, venis pinnatis supra conspicuis. Pedunculi axillares, solitarii, 3-4½ poll. longi, apice 5-8-flori, bracteis exiguis pedicello vix ½-2/3 lin. longo subbrevioribus obtusis. Flores 1-2½ lin. ab invicem distantes, illis *Z. glabratae* ⅓ minores. Calyx 2 lin. longus; fuscus, basi rotundatus et minute bibracteolatus, pilosiusculus, campanulatus, lobis tubo brevioribus triangularibus acutiusculis. Vexillum subrotundum, emarginatum, unicolor, alaeque lateritiae carina atropurpurea obtusissima longiores. Stigma minutum, capitatum. Legumen non vidimus.

) **H. ovata Benth. l. c. — **Kennedya ovata** Sims. Bot. Mag. t. 3169. DC. l. c. n. 6. — Port. Philipp, cl. Latrobe. (Herb. Mus. Neocom.)

longica *intertexta*? *Apim* *Las* *manus*
An ab orig. Dec. 1848 *Abc* *L. Tex.* 470. var. α . *Coris* *ramb*

ramo folia 3- et 5-foliolata gerentia, caeterum iconi et descr. l. c. perfecte congrua sunt. „Frutex scandens.“ *Foliola* 2 accessoria, reliquis minora, non, ut in aliis quibusdam Leguminosis, e stipellarum transformatione oriuntur, quum stipellae verae ac immutatae ad eorum basin adsint! *Racemi* saepe 8-10-pollicares, basi interdum ramulum itidem aphyllum racemoso-floriferum emittentes. „*Flores* coerulei, nec violacei.“ *Legumen* glabrum, subtercs, 20 lin. longum, diametro 4 lin., laeve, haud torosum, 1-loculare, 6-spermum, valvis intus laevissimis nec septuligeris. *Semina* concolora, olivacea, subnitida, stropholiola tumida.

ROSACEAE. Iuss. Endl. gen. pag. 1240.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

Subordo II. DRYADEAE Vent. Endl. gen. pag. 1241.

SANGUISORBEAE Endl. l. c. §. 4.

ACAENA Vahl. Endl. gen. no. 6372. Meisn.
gen. pag. 105. (74.) Sect. b. AUCISTRUM
Endl. l. c.

1. *Acaena echinata* n. sp., floribus glomeratis in spica cylindrica basi interrupta dispositis, caule erecto, foliis oblongo-lanceolatis pinnatifidis subtus bracteisque hirsutis, spinis calycis conicis inaequalibus simplicibus (haud uncinatis).

In rupestribus umbrosis ad latus orientale montis Brown (York) d. 4. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 2395.

Acaenae pinnatifidae R. et Pav. subsimilis, differt imprimis calycis crassioribus acutis neque hamatis inaequalibus, et spica glomerata.

CHRYSOBALANEAE R.Br. Endl. gen. pag. 1251.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

STYLOBASIUM Desf. Mém. du Mus. V.

pag. 37 tab. 2. Endl. gen. no. 6417.

Meisn. gen. pag. 101 (72.)

1. *Stylobasium lineare* n. sp., foliis linearibus, floribus in apicibus ramorum racemosis, pedunculis folio bracteali longioribus minute bracteolatis.

In arvis cessatis Peninsulae (Perth) Sept 1839 et in solo limoso prope oppidulum York Martio mense. Herb. Preiss. No. 2383 et 2384.

„Fruticulus tripedalis, erectus, ramosus glaucus“ Olyrae habitu. *Folia* linearia, obtusa, basi attenuata, canaliculata, glaberrima, integerrima, inferiora pollicaria, lineam lata, superiora ramorum decrescentia et angustiora. *Rami* superiores decrescentes apicem fruticuli ramive primarii racemi compositi microphylli specie terminant. *Pedicelli* 2-4 lin. longi uniflori, bracteolis 2-3 alternis exiguis subulatis praediti.

Differt imprimis a *Stylobasio spathulato* foliis angustioribus et pedunculis longioribus.

MYRTACEAE RBr.

(Auctore J. C. SCHAUER.)

Tribus I. CHAMAELAUCIEAE DC.

Germen uniloculare. Capsula mono-vel oligosperma, indehiscens vel apice demum fatiscens. Schauer, Monogr.

Myrt. xeroc. Sect. I. in Act. Acad. Nat. Curios. XIX.

Suppl. II.

ACTINODIUM Schauer l. c. p. 175.

1. **Actinodium Cunninghamsi** Sch. l. c. *Triphelia brunoides* R.Br. Mss. sc. Endl. En. pl. Hügel. pag. 48.

In rupestribus ad King George's Sound. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 432.

GENETYLLIS DC. Schauer l. c. p. 177.

(Polyzone, Genetyllis et Hedaroma Endl. gen. n. 6283—6285.)

1. **Genetyllis diosmoides** DC. floribus sessilibus in capitulum multiflorum subglobosum collectis, foliis subfloralibus reliquis conformibus, calycis inferiore parte polyzonata, limbi dentibus exiguis sinu lato disjunctis, staminodiis filiformi-subulatis staminibus paullo brevioribus, stylo aspergilliformi-barbato, foliis laxè imbricatis confertis lineari-subtetraquetris. DC. Prodr. III. pag. 209. Mém. Myrt. pag. 20 tab. 2! Schauer, l. c. pag. 180. tab. II. fig. A.

In rupestribus graniticis circa portum Princess Royal Harbour ad oppidulum Albany, Septembri exeunte a. 1840 flor. Herb. Preiss. No. 223.

2. **Genetyllis vestita** Endl. floribus pedicellatis in capitulum multiflorum subglobosum congestis, foliis subfloralibus quarum auctis herbaceis coloratis, calyce 5-costato laevi, limbi dentibus minimis sinu lato disjunctis, staminodiis

Laminis ad utrumque latus multum floris
 raris *Heliodendron* Desl. in planities
 angustifolium *Handm.*
~~*Hel. alacolum*~~ *Desl. frum. raris*
 Descriptio brevissima apud Don
 hinc quadrat, etiam ob maximam
 habituum similitudinem cum
Sylvestris *Prattula* ta (vid. icon
 Don) hinc traho, tamen non
 huius generis nam stylus dactyl.
 mucosum tantum proimend-
 bonum (Lod.) vidit El. collector
 Charles Stuart in vicinia flumin.
 Murray, febr. 1848 florifera tamen
 sua fructu ^{definitum} communis nunc
 gerend, an pl. euphorbiacea sit?
 Raro inopabili; ~~est~~ *Aspidobutia*
 species nova, quam folia nun-
 quam obae similia nominari
 possunt. Flores apparetur de-
 Don esse. raris quoque p. 224.
 Explanatio recta futuri *Yucca*
 natoris est
 Patet. aut. p. *Yucca* *racemosa* *Seitz* *7. de*
 & *1848*, *Orkapa* *Seitz*!

- *X* *Alchemilla* *crucifolia* *Sagoli*.
 In foveis ad fl. Nile river, Tasm.
 No. 14 n. 172. 214. Nov. 1848 -
 in vallibus In vasis montis Kaiserstuhl
 montium Sept 1848 - *Nethemica* hanc
 Lofty-rapida Sept 48 - In itinere unus
 finem littoralium *Pivoli* - *Seitz*
 Oct 1848.
 Nova *relegiosa* L var. *p. notu* *indifolia* *Kan*
 sept. *Corpus* *p. p. Cha. n. 14* *novi* *n. n.* *in* *vicinis* *Lofty*
Geum *urbanum* L. *raris* *parum*!
 Pappi in locis vasis remotis *Pni-*
 lionibus raris *fructus* *Tasmaniae*
 ad fl. *Murphy*, Jan. 1848. No. 14 n. 348.
 Intra cl. Stuartem habet intro-
 ductam *Perpam* *non* *indigenam*.

Chamaelaucium rotundifolium

filiformi subulatis staminibus longioribus, stylo aspergilliformi-barbato, foliis dorso vernicoso-nitentibus imbricatis obovato-oblongis. Endl. En. pl. Hügel. pag. 47. Schauer l. l. pag. 182.

In limosis ad radices montium Darling's-range Herb. Preiss. No. 433.

3. **Genetyllis citriodora** Endl. floribus sessilibus paucis confertis foliis subfloralibus reliquis conformibus coloratis absconditis, calycis tubo subpentagono infera parte lineis undulatis exseulpto, limbi dentibus conspicuis subcontiguis, staminodiis liguliformibus truneatis stamina subaequantibus, stylo barbulato, foliis glaucescentibus dorso pallidioribus oppositis oblongis lanceolato-acuminatis revolutis. Schauer l. c. pag. 183. tab. II. fig. C. *Hedaroma latifolium* Lindl. Swan River Bot. pag. VII. n. 15. tab. II. fig. B.

In rupestribus vallis catarractae ad caput fl. Cygnorum, et ad promontorium Cape-Riche, Julio a. 1839. Herb. Preiss. No. 2014.

CHAMAELAUCIUM Desf. Schauer l. c. p. 194. Endl. gen. n. 6280.

1. **Camaelaucium ciliatum** Desf. ramis abbreviatis, foliis oppositis fasciculato-confertis lineari-trigonis, floribus axillaribus, bracteolis basi secedentibus deciduis, stylo imberbi. Schauer l. c. pag. 195. Desf. in Mém. du Mus. d'hist. nat. V. pag. 40. tab. 3. fig. B 1—5.

Lect. ad Sinum Regis Georgii III. in declivitate orientali montis Baldhead, inter frutes. Octobri a. 1840. Herb. Preiss. No. 360.

Calycis phylla tenuiter fimbriata, nec ciliata. *Staminodia* petaloidea, linearia, staminibus longioribus per paria juxtaposita.

2. **Chamaelaucium uncinatum** Schauer. ramis gracilibus; foliis oppositis, distantibus, lineari-trigonis, apice pungente recurvo; floribus corymbosis; bracteolis caducis, pellucidis, cucullatis, citra verticem callosis; calycis phyllis minutis truncatis petalisque integerrimis fugacibus; staminodiis subulatis, laevibus, stylo barbato.

In clivulis arenosis haud procul ab ora maris prope oppidulum Freemantle. Septembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 359. (Planta rara!)

„Frutex 5-pedalis“, ramosus, glaberrimus. *Folia* internodiis duplo fere longiora, subsemitereti-trigona in basin sensim attenuata, stricta, 6-8 lin. longa, tridentem lineae lata, pallide viridia. *Pulvini* foliorum vix manifesti. *Flores* in summis ramulis hornotinis corymbosi. *Bracteolae* argenteae vertice purpuratae. *Hypanthium* obconicum, 10-costatum, ore dein truncato 2 lin. longum. *Petala* minuta, orbicularia, alba. *Stamina* declinata subinaequalia, corolla breviora; connectivum antheram glandula conspicua capitata supereminens. *Stylus* infra stigma corona pilorum barbatus.

**VERTICORDIA DC. Schauer l. c. pag. 197.
tab. IV. B. Endl. gen. n. 6279.**

1. **Verticordia Fontanesii DC.** corymbo composito, tubo calycis obconico-hemisphaerico argenteo-piloso, lobis sessilibus palmatifidis, lobulis fimbriato-incisis, petalis dorso puberulis integris, staminodiis ligulaeformibus, stylo exserto uncinato barbato, bracteolis connatis obtuse apiculatis deinde diruptis deciduis, foliis fasciculatis filiformi-semiteretibus inermibus sessilibus. Schauer l. c. pag. 199. n. 1. DC. Prodr. III. p. 209.

In rupestribus illustribus silvae prope villam Spencer ad Sinum Regis Georgii III. frutex quadripedalis; in arenosis planitie Molloy's plain dictae, districti Sussex: specimina 4-pollicaria, e stirpe anno superiori igne absumta rediviva. Floret Septembri—Decembri. Herb. Preiss. No. 172 et No. 174.

2. **Verticordia densiflora Lindl.** corymbo composito, tubo calycis hemisphaerico-turbinato argenteo-piloso, lobis unguiculatis palmatifidis, lobulis dense pinnatifido-plumosis, petalis dorso pubescentibus integris, staminodiis subulatis, stylo exserto arcuato barbato, bracteolis distinctis muticis caducis, foliis abbreviatis fasciculatis lineari-subtriquetris inermibus sessilibus. Schauer l. c. pag. 202. n. 3. Lindl. Swan River Bot. pag. VI. n. 11.

In depressis arenosis silvae cis oppidulum Guilford, et in solo sublimoso inter gramina planitiei prope Toby's inlet, Januario 1840. Herb. Preiss. No. 180.

„Frutex 2-3-pedalis.“

3. **Verticordia Drummondii Schauer.** racemo subsecundo, tubo calycis obconico glabro, lobis palmatifidis, lobulis longe aristatis pennato-plumosis, petalis subscariosis ovatis multinerviis serratis apice fimbriato-incisis glabris, staminodiis subulatis glabris staminibus duplo brevioribus, stylo exserto uncinato aspergilliformi-barbato, bracteolis caducis dorso corniculatis, corniculis rectis, foliis imbricatis spathulatis infra apicem calloso-mucronatis cartilagineo-serratis. Schauer l. c. p. 208. n. 7. tab. IV. B. fig. 8 et 9.

In depressis arenosis silvae cis oppidulum Guilford, Januario. Herb. Preiss. No. 171.

„Frutex bipedalis.“

4. **Verticordia Lindleyi Schauer.** racemo aequali, tubo calycis obconico glabro, lobis palmatifidis, lobulis lineari-subulatis aristatis pennato-plumosis, petalis ovatis multinerviis apice inciso-3-5-dentatis ceterum integerrimis dorso subvelutinis, staminodiis e basi latiore subulatis glabris stamini aequantibus, stylo incluso arcuato aspergilliformi-barbato, bracteolis caducis dorso corniculatis, corniculis rectis patentibus, foliis laxè imbricatis obovatis oblongisve infra

Pargyphantha campyhorata form.
✓ var. holl.! forte austro-orientalis
no. 810
huic generi faltim videtur
proxima, sed forte novi generis
clanphorothamnus (paraphan-
thoides) dicendi typus.
Baekea campyhorata Swartz
non R. Br. Perkinet enim
non ad Ligtoppermas sed
Chamaelauriceas

4. *Stipularis*, firs Mll
filiis appressis ^{ramosus}
caule herbaceo . . . . ., foliatis 5-6
pilis linearibus - cuneatis, emarginatis,
racemis ~~fess~~ ^{in pappi formis} brevibus ~~stachylois~~
stipulis magnis triangularibus acutis
gracis - pinnatis, flegumine . . .
Siqui ^{lato} ~~staba~~ ^{popule} ~~staba~~ ^{apicem} ~~staba~~ ^{vitus} ~~staba~~
Stipulae notis cum *S. pharaoide* Kth
convenire videtur, *Staph.* *firmulat*
S. pharaoefolia ^{ad} *origis* ~~staba~~ ^{varietas}
vix tam videtur. Ex univ. *speciminis*
sibi *fragmento* non *congruentum*!

4. *Swainsona tephrotrocha* firs Mll!
^{apressis} ~~ramosus~~ ^{perennans}
perennans, caulis herbaceus erectus,
foliatis 5-9 pilis subcuneato - oblongis
obtusis vel recurvatis - apiculatis
racemis multifloris *pyratis*, calypis
multis triangulari - subulatis, *stilo*
popule tota longitudine *carinata*,
germin. *bricea* *humilis* *stipuli*, *leg.*
In collibus aridis *dendatis* *proae* *podmas*
burra *burra* ^{etiam ad rivos} *broughton*, *multis*
staba 4-1'. Caulis pilosus e rhizomate *triste*
erectus aut *adpendens*. Foliola 1" breviora,
2-3" *st.* *stipular* *canaliculato* - *triangularis*
subulatis *aristatis*. Racemus *ill.* *S. vicia*
foliis *annulatus* *quod* *stoma* ^{in a} *na* *stoma*
& *floris* *conjugen* *minutum*, sed *calyp*
gracis *pilos* *nigricantes* *etiam* *albis* *rostris*
maxim *stipuli* ^{statura} *corollae* *roscae*! *actate* *purpure* *stoma*
staba: 012.

apicem mucronatis cartilagineo-denticulatis. Schauer l. c. pag. 210. n. 8.

In turfoso-arenosis exsiccatis planitiis, in silva haud longe a villa eel. Irwin, superioris praefecti excubiarum, Julio dellor. lect. Herb. Preiss. No. 170.

„Frutex pedalis.“

5. **Verticordia pennigera** Endl. racemo subsecundo, tubo calycis turbinato glabro, lobis palmatifidis, lobulis linearibus breviter cuspidatis pennato-plumosis, petalis cuneatis multinerviis apice inciso-acute-dentatis ceterum integerrimis dorso velutinis, staminodiis lineari-subulatis glabris stamina excedentibus, stylo vix exserto arcuato plumoso-barbato, bracteolis caducis dorso corniculatis, corniculis arcuatis convergentibus; foliis imbricatis linearisemiteretibus infra apicem mucronatis cartilagineo-denticulatis. Schauer l. c. pag. 212. n. 9. Endl. Enum. Plant. Hügel. pag. 46.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis; in clivulosis arenosis inter frutices silvae prope Bassandeen ad fl. Cygnorum. Flor. Novembri. Herb. Preiss. No. 182 et No. 183^b.

6. **Verticordia (Catocalypta) Lehmanni** Schauer. corymbo simplici compacto; hypanthio turbinato, basi hispidulo, appendiculis calycis capillari-multifidis reversis involucrato; calycis phyllis palmato-multifidis, lobulis simplicibus aristacformibus: medio subulato, cuspidato, incurvato: reliquis capillaceis, divaricatis; petalis subscariosis, ovatis, apice triaristatis; staminodiis subulatis, integerrimis, glabris; stylo exserto, infra apicem redunco ibidemque externe barbato; stigmatibus minute capitato; bracteolis muticis caducis; foliis laxo-imbricatis, linearis-triquetris, inermibus.

In arenosis planitiis Molloy's plain districti Sussex, et circa Sinum Regis Georgii III. Floret Decembri. Herb. Preiss. No. 166.

Fruticulus elegantissimus, pedalis, gracilis, paucirameus, glaberrimus. Ramuli tenues, laete fusci, laeves, superiorum paria remota. Folia internodiis nunc ipsis duplo brevioribus, nunc aequalibus, nunc longioribus interstincta, 4 lineas Par. circiter metientia; carina subarguta cum latusculis laevis; color laete viridis. Pulvini foliorum vix manifesti. Alabastra oblonga. Bracteolae tenuiter membranaceae, fusco-viridulae. Hypanthii pars fertilis 10-costata; faux subaequalis paullo ampliata. Involucris coma argenteo-nitens. Calycis phylla et corolla dilute lilacina. Petalorum lamina integra, lineam longa, concava, aristis tribus ipsam longitudine aequantibus denticuloque uno alterove accedente terminata. Staminodia punctata, semilinea vix longiora, incurvo-conniventia, stamina fere duplo superantia. Stylus 2 lineas longus; stigma exiguum atropurpureum.

7. **Verticordia Hügelii** Endl. corymbo simplici, tubo calycis subturbinato inferne hispidulo appendiculis loborum capillari-bipinnatifidis reversis coma quasi induto, lobis multifidis, lobulis capillari-pinnatifidis bipinnatifidisque, internodiis apice longe nudis aristaeformibus exsertis, petalis scariosis margine superiori fimbriatis, staminodiis petaloideis apice fimbriato-laceris, stylo subexserto piloso-barbato,

stigmatē amplo disciformi, bracteolis muticis caducis, foliis fasciculatis lineari-semiteretibus inermibus. Schauer l. c. pag. 213. n. 10. Endl. Enum. Plant. Hügel. pag. 16. n. 143.

In depressis arenosis ad radices montium Darling's-range dictorum, Octobri in, florens. Herb. Preiss. No. 177.

„Fruticulus pedalis et ultra.“

8. **Verticordia compta** Endl. corymbo simplici, tubo calycis obconico inferne hispidulo toto recondito sub involucro a limbo reverso pentaphyllo comato, lobis multifidis, lobulis lineari-subulatis apice aristaeformi exsertis plumoso-pinnatifidis, petalis scariosis margine superiori fimbriatis, staminodiis subpetaloideis laceris, stylo inclusio imberbi, stigmatē capitato, bracteolis muticis caducis, foliis subremotis obovato-triquetris compressis carina laevibus recurvato-mucronulatis. Schauer l. c. p. 215. n. 11. Endl. in Annal. d. Wiener Mus. II. p. 194.

In lapidosis ad radices montium jugi Darling's-range dicti, Novembri florens. Herb. Preiss. No. 168.

„Frutex 3-4-pedalis.“

9. **Verticordia insignis** Endl. corymbo simplici, tubo calycis obconico basi hispidulo; toto recondito sub involucro reverso pentaphyllo comato, lobis multifidis, lobulis lineari-subulatis apice aristaeformibus inferius plumoso-pinnatifidis, petalis subscariosis margine superiori fimbriatis, staminodiis ligulaeformibus lacero-fimbriatis, stylo inclusio imberbi, stigmatē capitato, bracteolis muticis caducis, foliis subremotis obovato-triquetris compressis carina denticulatis submucronatis. Schauer l. c. pag. 217. n. 12. tab. IV. B. fig. 10—12. Endl. Enum. Plant. Hügel. pag. 47. n. 145. Lindl. Swan-River tab. II. A.

In limoso-arenosis inter frutices supra oppidulum Guilford. Floret Octobri. Herb. Preiss. No. 167.

10. **Verticordia (Catocalypta) habrantha** Schauer: corymbo simplici; hypanthio turbinato, hispidulo, sub involucro comato reverso abscondito; phyllis calycis palmato-5-partitis, lobulis subulato-aristaeformibus; petalis mollibus, inaequaliter denticulatis; staminodiis petaloideis, basi confluentibus, palmato-7-aristatis; stigmatē subcapitato, laevi, sessili; foliis imbricatis, obovato-triquetris, inermibus.

In solo subarenoso inter frutices planitiei secundae cis fluvium Gordon (Hay). Fl. Novembri. Herb. Preiss. No. 169.

Fruticulus videtur virgatus, ramis strictiusculis. *Ramuli* fusi, glabri, resinoso-punctati. *Folia* laxè quadrifariam imbricata, brevè, argute carinata, glabra, lineà vix majora, sicca aeruginosa. *Corymbuli* pauciflori. *Pedunculi* erecti, semuncia paullo breviores. *Involucrum* ad modum *V. insignis* confectum, argenteo-nitens. *Hypanthium* 10-costatum *Calycis phylla* reflexa. *Corolla* insignis, erecto-patens; petala suborbicularia, luteola, facie velutino-micantia et punctis saturatioribus maculata, sesquilineam longa. *Staminodiorum* lamina lata sed trientem lineae tantum alta; aristae quam

lamina duplo longiores, capillares, inflexae. *Filamenta* laminam staminodiorum paullo excedentia. Connectivum fere *V. insignis*.

11. **Verticordia acerosa** Lindl. corymbo laxo composito, tubo calycis turbinato glabro, lobis 5-partitis, lobulis subulatis pinnatifido-plumosis, petalis coriaceis palmato-7-9-fidis; staminodiis petaloideis oblongo-lanceolatis pectinato-serratis, connectivo apiculo brevissimo antheram superante, stylo recto imberbi andronitide longiori, bractcolis muticis caducis, foliis dense confertis semitereti-acerosis mucronatis. Schauer l. c. pag. 220. n. 14. Lindl. Swan River. Bot. pag. VI. n. 10.

In calciosis limosis ad radices montium Darling's-range, Decembri florens. Herb. Preiss. No. 176.

„Frutex 1-3 pedalis.“

12. **Verticordia (Chrysoma) Preissii** Schauer. corymbo laxo composito; hypanthio obconico; glabro; phyllis calycis 5-partitis, lobulis linearibus pennato-plumosis; petalis mollibus, palmato-7-fidis; staminodiis petaloideis, lanceolatis, superius inaequaliter tridentatis; connectivo oblongo, antheram semiamplectente, callo brevi terminato; stylo recto, imberbi, stamina subaequante; bractcolis muticis, caducis; foliis oblique mucronatis: inferioribus fasciculato-confertis, semitereti-acerosis: superioribus approximatis, sensum latioribus, ovalibus, integerrimis.

In rupestribus terrae superioris cis Halfway-house, alt. 984 pedum. Floret Septembri. Herb. Preiss. No. 175.

„Frutex pedalis,“ squarrosus. *Ramuli* inferiores steriles breves folisque fasciculatis acerosis, 3 lin. longis, consiti; superiores floriferi brachiiati, scabro-hirtelli, foliis duplo brevioribus et latioribus instructi. *Pedunculi* longe exserti, flaccidi et cum flore 3 lin. lato pulcherrime aurei. *Calyx* et *petala* aequalia, reflexa; horum laciniae capillares. *Staminodia* staminibus longioribus triente breviora, brevioribus aequalia et cum his erecta, incurva, sinibus latis filamenta excipientibus distincta, lanceolata, infra apicem utrinque uni-rarius bidentata. *Filamenta* longiuscula, filiformia, alterna breviora. Anthera nutans. *Gemmulae* geminatae, appositae.

13. **Verticordia (Chrysoma) Endlicheriana** Sch. corymbo subsimplici, conferto; hypanthio turbinato, glabro; phyllis calycis 5-partitis, lobulis subulatis aristatis pinnatifido-plumosis; petalis coriaceis, palmato-7-partitis; staminodiis petaloideis, lanceolatis, integerrimis, acuminatis, comiventibus; connectivo oblongo, antheram semiamplectente apiculoque brevi cucullato terminante; stylo recto, imberbi, stamina subaequante; bractcolis muticis, caducis; foliis imbricatis, oblique mucronatis: inferioribus semitereti-acerosis: superioribus ovalibus subcarinatis integerrimis.

In rupestribus collium Konkoberup ad promontorium Cape-Riche, et in solo subarenoso inter frutices plantitae cis fluvium Gordon (Hay). Flor. Novembri. Herb. Preiss. No. 179 et 181.

Fruticulus demissus, ramis sterilibus brevibus fasciculato-foliosis, floriferis confertis subfastigiatis, ramulis fuscis scabro-hirtellis. *Folia* quadrifariam imbricata, acerosa 3-4 lin., ovalia sesquilineam longa, omnia glaber-

rima nitidula. *Corymbuli* pauciflori; pedunculi folium subtendens quadruplo superantes, erecti. *Flores* 3 lin. lati, flavi, siccando nigrescentes. *Petal*a adscendentia, fimbriis subulatis. *Stamtnodia* ab invicem satis distantia, stamina subaequantia et cum his declinatis conniventia. *Gemmulae* binae.

14. **Verticordia nitens** Schauer. corymbo composito multifloro condensato, tubo calycis turbinato glabro, lobis palmato-9-fidis, lobulis pennato-plumosis, petalis subcartilagineis ovatis margine superiori inciso-fimbriatis, staminodiis lineari-subulatis integerrimis, connectivo in galeam cristatam antherae imminuentem extenso, stylo incluso imberbi, bracteolis muticis caducis, foliis filiformi-teretibus oblique mucronatis patulis. Schauer l. c. pag. 223. n. 16. tab. IV. B. fig. 1—5. *Chrysorrhoe nitens* Lindl. Bot. Mag. Comp. II. pag. 357.; Swan River. Bot. tab. I.

In planitie arenosa supra oppidulum Guildford. Flor. Januario. Herb. Preiss. No. 173.

15. **Verticordia chrysantha** Endl. corymbo paucifloro, tubo calycis brevi hemisphaerico glabro, lobis multifidis, lobulis lineari-subulatis pinnatifido-plumosis, petalis subcartilagineis margine superiori longe fimbriato-partitis, staminodiis linearibus petaloideis apice inaequaliter tridentatis, connectivo turgido ultra antheram apiculo tumido breviter producto, stylo incluso imberbi, bracteolis muticis persistentibus, foliis filiformi-teretibus subuncinato-mucronatis patulis. Schauer l. c. pag. 225. n. 17. Endl. Ann. d. Wiener Mus. II. pag. 195.

Var. *a* **Roëi**: staminodiis angustioribus, superne inaequaliter tridentatis ramulisque vernicosis. *V. chrysantha* Endl. et Schauer II. cc.

Var. *β* **Preissii**: staminodiis imbricatis, obovatis, acutiusculis, opacis; ramulis scabro-hirtellis, subvernicosis.

In regionibus interioribus Australiae austro-occidentalis. Floret Octobri. Herb. Preiss. No. 178. *)

*) **Thryptomene** Endl. Gen. n. 6277. Schauer l. c. pag. 232. tab. VI. A. Hujus generis speciem nullam quidem retulit cl. Preissius, nihilo tamen minus quae de eo observanda habeo hinc pagellis inserere juvat. Quum enim *Baeckea saxicolam* nuperime vivam examinare licuerit, cognovi eam *Thryptomenes* esse speciem. *Astreae* genus, quod, nomine insuper a Klotzschio pro genere Euphorbiacearum anticipato, eae superstruxeram (v. Linnaea XVII. pag. 238.), idcirco abolendum, species nova vero sequentibus est describenda. 1) **Thryptomene saxicola** Schauer. foliis laxè quadrifariam imbricatis, deinceps recurvo-patulis, planis, obovato-oblongis muticis; pedunculis folium subaequantibus subexsertisve. **Baeckea saxicola** A. Cgh., Bot. Mag. 3060. Habitat in Nova-Hollandia austro-occidentali (v. v. c.) Floret in tepidario ineunte vere. Frutex in hortis 3-4-pedalis, erectus, virgatus, glaber. Rami tetragoni, phyllopodiis marginantibus linearibus helvolis. Folia coriacea, margine cartilagineo pellucido minute serrulato cincta, scabriuscula, obtusa vel subacutiuscula uninervia, 2 lin. circiter longa, superius unam lineam lata, laete viridia, in petiolum brevem plauum appressum pallidumque abeuntia. Flores infra apicem ramulorum hornotinorum pauci, axillari-racemosi. Bracteolae scariosae, lanceolatae, canaliculatae, punctatae, hypanthium subaequant, fugaces. Hypanthium coarctato-turbinatum, viride, rugulosum. Limbus calycinus petaloideus, co-

+ Campthoromyrtus Dehni Schl.
Backea elaeoides Sm. Flor. fragrant
ad flum. murray haud procul a
monte Beeson! Dec. 1847 hb. H. 157.

+ B. crassifolia Lf.
B. carnasulata! Sieber. affinis
Wf. B. baculata B. T. D. L. hb. H. 66.
Wf. B. ~~crassifolia~~ ~~Stuebel in Lf.~~!
Wf. Divisio locis in precipituum
arboribus aridis "Murray prae!"
Petala alba orbiculata unguiculata
filamina 5 longiora 5 breviora alter-
nantia. Folia lenticulata - trigona
clavata.
Frut. 2-3' Rutilis vere
F. Euryomyrtus

+ B. Stuartiana pr. m. - E. thymifolia
Backea ~~affinis~~ ~~Hook.?~~ ~~Schauer~~
qui non nisi nomine vix diag. ~~non~~ ~~diagn.~~
B. laxifolia Stuart (non cum.
Suffrutesc. ad flumen South Esk
prope riv. Tasmanniae
In Tasm. Nova Hollandia
detecta ex Walp. et ex brev.
diagnosi vix extrinsecum.
Rutilis: primo vere

+ B. Gunniana Schauer.
In montibus altioribus
Tasmanniae 3-4000'
hb. N. I, 66 & # 365.
Procumbens.
B. crassifoliae valde propinqua
Rutilis: vere, appan

* *Euryomyrtus*!
(*Backea*) *leptospermoides* *Forstn.*
Forstn.! In humulis repens, ad
mutus port. cygnum. - hb. M. 1636.
raro
diffusus *Forstn.* *mut. pedalis*. Folia limari
canaliculata! E. diffusa Schauer
(*Forstn.* vitiose c. *Hook.* *indiv.*)
magis affinis nisi eadem.
(*B. affinis* & *B. prostrata* Hook.)

Schidiomyrtus ericacea *Forstn.*
Nov. Holl. (fortasse austro-orient)
hb. M. 816. Murray - *Forstn.*
S. diosmitolia Schauer (*Backea*
diosmitolia *Bridge*) cognata
atque vix eadem.

Similia generis *Euryomyrtus* ut
videtur nondum descripta in E.
leptospermoides sequente molle
obovato: *S. neriiformis* *Forstn.* juli-
ginosa subtilissime punctata $\frac{3}{4}$
lineam sive metentia. Hilum
irregulariter rotundato circa
datum albidum retro parvum
minutum.

* *Euryomyrtus pauciflora* *Forstn.*
In granivosis prope George
Town! hb. M. 977.
Suppliculus procerus secun-
dum diagnosis mihi maxime
E. *procerus* *Forstn.* *prostratae*
accidere videtur, quorum con-
creta in huius patria est
Nova Hollandia, quare non du-
biam relinquo, donec vel iconem
v. proximam authenticam examina-
vero. E. *prostrata* fortasse non
sui generis procerus cum E.
affinis (*B. affinis* Hook non *Forstn.*)

LHOTSKYA Schauer l. c. Endl. gen. n. 6276.

1. **Lhotskya ericoides** Schauer. floribus spicato-racemosis, calyce glabro, foliis exstipulatis confertissimis triquetris inermibus glabris. Schauer l. c. pag. 235. n. 1. tab. VII.

In rupestribus lateris orientalis montis Clarence (alt. 300 ped.) inque montosis ad sinum Two-peopled-Bay. Flor. Novembri. Herb. Preiss. No. 222.

2. **Lhotskya acutifolia** Lindl. floribus spicato-racemosis, calyce glabro, foliis stipulatis confertissimis triquetris subpungenti-acuminatis glabris. Schauer l. c. pag. 236. n. 2. Lindl. Swan River. Bot. pag. VII. n. 13. Walker-Arnott in Hook. Journ. II. tab. XV.

In rupestribus ad radices montis Melville prope oppidulum Albany, Octobri flores. Herb. Preiss. No. 224.

„Frutex 1-1½ pedalis, ramis quandoque decumbentibus.“

3. **Lhotskya brevifolia** Schauer. glaberrima; floribus axillaribus spicatis; bracteolis hypanthium acquantibus, usque ad medium connatis, apice subrecurvis, carinatis, apiculatis, disco lanceolato resinoso-punctato; foliis exstipulatis, imbricatis, brevissimis, subsessilibus, trigonis, acutiusculis, muticis, laevissimis, lucidis.

Hab. in Nova-Hollandia occidentali ad Fluv. Cygnorum Herb. Preiss. No. et J. Drummond.

Frutex pede minor, multicaulis, ramis ramulisque gracillimis, *Folia* sparsa, plurifariam imbricata vel in ramulis vegetis remotiuscula arrecta, lineam-sesquilineam longa, facie oblonga plavinscula argute marginata, dorso argute carinato punctato, superficie tota laete-viridi laevissima nitida. *Flores* parvi, infra apices ramulorum hornotinorum axillari-spicati. *Bracteolae* scariosae, subcoloratae. *Hypanthium* vix lineam longum, oblongum, fere estriatum, limbo calycino coronatum brevissimo patellari truncato phyllis vix distinctis; *corolla* sesquilinea paullo longior lilacina, petalis lanceolatis acutis.

---

rollae concolor, lobis 5 discretis erecto-patulis. *Corolla* dilute rosea; petala imbricata, sub anthesi conniventia calycemque nonnihil excedentia, ante post eam depressa. *Stamina* 10. per paria petalis anteposita, uno alterove abortivo saepe 8-9, super discum epigynum carnosum planum inclinata, circa stylum brevem convergentia. *Antherae* didymae, loculis obovoidcis e connectivo glandula capitata excavata flava quasi pendulis fuscis rima transversa in medio fronte dehiscentibus, (quod corrigas in caractere generis l. c. a nobis edito). *Gemmulae* geminae, adpositae, in antro germinis prorsus immersi depresso arcuissimoque horizontales, spermophoro exili juxta basin unilaterali inserta. 2. **Thryptomene australis** Endl. (Schauer l. c. p. 233. Ann. des Wiener Mus. II. p. 192.) foliis quadrifariis, arrectis, carnosis, subsemitercibus, sursum paullo incrassatis, mucrone reverso terminatis; pedunculis brevissimis. Habitat in interioribus Novae-Hollandiae austro-occidentalis: Roë! (v. s. spont. in Herb. C. Vindb.) Habitu et inflorescentia priori admodum similis.

CALYCOTHRIX Labill. Schauer l. c. Endl. gen. n. 6275.

1. **Calycothrix curtophylla** *A. Cunningham.* glaberrima, foliis imbricatis brevibus oblongis obovatisve carinatis obtusis petiolatis, bracteolis basi connatis herbaceis margine scariosis carinatis cuspidatis cuspe dimidium tubi calycis excedente, floribus octandris corymbosis; aristis corolla ter fere longioribus. Schauer l. c. pag. 242. n. 3. Bot. Mag. 3323. n. 3.

In arenosis sublimosis inter frutices planitieci ad radices montium Darling's-range, inque solo subturfoso silvae illustris prope oppidulum Albany, Octobri deflorata. Herb. Preiss. No. 191.

Stamina 8-9. *Petala* amoene violacea.

2. **Calycothrix Leschenaultii** *Schauer.* glaberrima; foliis quadrifariam imbricatis, brevibus, ovato-triquetris, muticis, marginibus scabrinusculis, subsessilibus; bracteolis usque ad medium connatis, subherbaceis, marginibus scariosis, subventricosis, carinatis, breviter acuminatis, hypanthio quadrante brevioribus; floribus 8-13-andris, corymbosis; aristis corollam duplo excedentibus.

In arenosis planitieci secundae cis fluvium Gordon (Hay.) Flor. Novembri. Herb. Preiss. No. 192.

Ramuli subtortuosi, grisei coloris. *Folia* sessilia vel petiolo lato brevissimo insidentia, lineam longa, pallide viridia atque opaca. *Corymbi* copiosi, pleianthi. *Bracteolae* inferne in stipitem angustum connatae, disco herbaceae punctatae, marginibus superne latiusculis scariosis minute denticulatis complexae, ampliusculae, 3 lin. circiter longae. *Hypanthium* tubulosum gracile, 4 lin. longum; *phylla calycis* obcordata, purpurascentia; aristae capillares, flexuosae. *Petala* elliptico-lanceolata, acuta, pulchre violacea, 2 lin. longa. *Stamina* inter numerum octonarum et denarium ternarium variantia.

3. **Calycothrix glutinosa** *Lindl.* glabra, foliis filiformi-triquetris inermibus petiolatis, bracteolis scariosis glutinosis acuminatis ultra medium connatis tubo calycis paullo brevioribus, floribus decandris corymbosis, aristis corolla duplo longioribus. Schauer l. c. pag. 243. n. 4. Lindl. Swan River. Bot. pag. V. n. 6.

In calculosis montium Darling's-range. Floret Novembri. Herb. Preiss. No. 196.

4. **Calycothrix scabra** *DC.* ramulis villosulis, foliis scabris setuloso-ciliatis imbricatis lineari-tetragonis mucronulatis petiolatis, bracteolis basi connatis scariosis carina pilosis apiculatis tubo calycis dimidio brevioribus, floribus icosandris corymbosis, aristis corolla ter longioribus. Schauer l. c. pag. 248. n. 8. DC. Prodr. III. pag. 208. n. 3. Mem. Myrt. tab. 1.

In interioribus Australiae occidentalis. Herb. Preiss. No. 188.

in unguiculatis eadem ratione cognata sunt ut nostrae novae
Hanc *E. parvifloram* ab *E. Tharckiana*
egregie distinguere queo: ^{folijs} floribusque
multo minoribus, illis ^{paucioribus} brevissimis
petiolatis!
Anthypis vire.

E. frabra γ. *laevigata* Gerd. m.
folius foliis paucioribus
maxi oblongis, foliis longiora.
Adriaticum Tefl Creek.

E. frabra DC. γ. var. *minor* Schell.
4! In montis Kuiperstahl vertice.

caulibusque. Fructus 5-6 pedalis.

fructigera et. 15 Apr. 1848. Löffl. range
(In Tarnaria auct. South
Eth river 2-3' hb. N. # 87. var. *nuda*!)
maxi

Folia adulta (calycem) planiuscula
duplo longiora.
fructus vinctus ramosus plus minusve
rufus humillimus ad 3' Corolla incarnata
exlocatione pallens seu flavescens. Calyx rufus
Anthypis Nov.

C. Behriana Schlechtendal
Calycotrupis ericoides Cunningham.
 Tantum e diagnosi brevi elucet
 hb. J. 5. In fruticosis tractus are-
 nosi litoralis secundum lacum
 Victoriae. Specimen defloratum
 Apr. 28. 1848. frut. 2-3 pedalis?
 T. & L! hb. St. sub. nom. *C. virgata* n.
C. villosa hb. St. 152. 122.

Ad rivum Fife Creek. Octob. 1848.
 A cal. foebra dignoscitur aristis
 calycinis brevissimis, foliis tri-
 quetris sessilibus
C. Stuartiana Gard. Müller.

C. virgata hb. St. hb. St. 150. T. & L.
 In nomen *hookeriana*? Fife
 Creek alibi?

Annus perices hinc notatae ad
 * *C. foebra* reducenda sunt!
 β minor Schlecht

C. laevigata Gard. Müller.
 { *C. nuda* Gard. Müller.
 { *C. Behriana* Schlechtendal.
 In minutis
 laxo lacum
 Obvius rufus.

C. Behriana Schldl.

In sylva Piniforest Nov.
flores perfirma Behr.

In vallis aruosis prope
Gawlu - Luwu, flores albi
4-5' vel humilis, adspandens
ad fl. Outaparinga in aruosis
Variat foliis natis!

Torsapp nil nisi *C. eriothra*
frabrae varietas
nuda fuit Mill.

^{& filamunda}
Calyx ruber, corolla rosea
vel alba ~~filosa~~, antherae
fuscae.

rare laevigata etiam in parte austra-
li insulae Van. Diemen occurrit. bl. 799.

Anthipis Nov. - Jan.

C. ? calmaturosum fuit Mill.

In aruosis insulae Kan-
garoo et Luwu.

Solummodo ex habitus appi-
ritate huius refertur, ab altero
unde prius. frons discrimi-
natur foliis magis explanatis
globosis glauculis olivaceis
reberius punctatis.

Flores & fructus desunt.

Fruticulus natus humilis.

Calgoothrix Fraweri! Will. Lumn.

Isle of Freemantle St Paul Hall
austro-occidentalis.

Strofolia nri bracteolae con-
stantia retusa sed interdum acusi-
moola.

auth. a. f. rate

5. **Calycothrix Fraseri** *A. Cunningh.* glaberrima, foliis quadrifariis confertis recurvis patentibusque lineari-oblongis carinatis retusis petiolatis, bracteolis herbaceis distinctis contiguis lineari-oblongis retusis dorso callosis calycis tubo quater brevioribus, floribus icosandris pedicellatis axillaribus sparsis vel in corymbum pauciflorum collectis, aristis corolla duplo longioribus. Schauer l. c. pag. 250. n. 10. tab. VI. B. fig. 1—5. Bot. Mag. 3323. n. 6.

In silvae caeduae arenosis illustribus supra oppidulum Perth; in regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis. Flor. Januario M. Herb. Preiss. No. 190 et 198.

„Fruticulus erectus spithamalis et ultra.“

6. **Calycothrix variabilis** *Lindl.* glaberrima, foliis imbricatis lineari-tetragonis calloso-apiculatis breviter petiolatis, bracteolis infra medium connatis membranaceis disco herbaceis in tubum amplum medio ventricosum convolutis ecarinatis apiculatis calycis tubum aequantibus, floribus icosandris axillaribus racemosis, aristis corolla paullo longioribus. Schauer l. c. pag. 252. n. 12. Lindl. Swan River, Bot. pag. V. n. 4.

In regionibus interioribus Australiae occidentalis. Herb. Preiss. No. 197.

7. **Calycothrix simplex** *Lindl.* ramulis puberulis, foliis confertis lineari-triquetris obtusis glabris breviter petiolatis, bracteolis inferne connatis lanceolatis cuspidatis hirtellis tubo calycis duplo brevioribus, floribus icosandris axillaribus racemosis, aristis corolla paullo longioribus. Schauer l. c. pag. 253. n. 13. Lindl. l. c. n. 5.

In clivulo arenoso inter frutices densos prope oppidulum Albany. (Plantagenet.) Fl. Septembri. Herb. Preiss. No. 199.

8. **Calycothrix empetroides** *Schauer.* ramulis puberulis, foliis imbricatis oblongis carinatis obtusis scabridis margine carinaque rigidule ciliatis breviter petiolatis, bracteis bracteolisque hirsutis, his ultra medium connatis ecarinatis obtusis superne cucullato-inflatis marginibus contiguis calycis tubo triente brevioribus, floribus icosandris ternis-quinis capitatis, aristis corollam aequantibus. Schauer l. c. pag. 254. n. 14.

In calciosis lateris orientalis montis Bakewell. (York), Septembri florens. Herb. Preiss. No. 195.

„Fruticulus semipedalis“.

9. **Calycothrix sapphirina** *Lindl.* ramulis hirtis, foliis approximatis patentibus lineari-lanceolatis acute carinatis hispido-pilosis petiolatis, subfloralibus tenuioribus longe acutatis, bracteolis membranaceis usque ad medium connatis superne divergentibus lineari-lanceolatis carinatis cuspidula curvata terminatis hirtellis tubum calycis subaequantibus, floribus icosandris in capitula multiflora congestis, aristis corolla duplo longioribus. Schauer l. c. pag. 255. n. 15. Lindl. l. c. n. 2.

In arenosis silvae ad fluvium Canning. Floret Novembri. Herb. Preiss. No. 189.

10. **Calycothrix angulata** Lindl. glaberrima, ramulis angulatis, foliis approximatis subrecurvo-patulis lineari-trigonis obtusis margine carinaque denticulato-scabris sessilibus, bracteolis membranaceis ultra medium connatis carinatis apiculatis tubo calycis triente brevioribus, floribus icosandris axillaribus comoso-racemosis, aristis corolla paullo longioribus. Schauer l. c. pag. 256. n. 16. Lindl. l. c. n. 7.

In arenosis silvae ad fluvii Canning egressum. Novembri. Herb. Preiss. No. 185.

11. **Calycothrix asperula** Schauer. foliis approximatis, subrecurvo-patulis, lineari-subtrigonis, muticis, petiolatis, bracteolisque asperulis; his herbaceis, ima basi connatis, oblongis, concavis, obtusis, hypanthium semiaequantibus, hiantibus; floribus icosandris, axillaribus sparsis; aristis corolla duplo longioribus.

In interioribus Australiae occidentalis. Herb. Preiss. No. 194.

„Fruticulus sesquipedalis erectus,“ inferne simplex, superne ramis paucis tenuibus gracilibus. *Folia* 2-2½ lin. longa, carina obtusa, apice acutiusculo mutico. *Hypanthium* tubulosum 3 lin. longum *phyllae* calycis obcordata purpurascens. *Petala* 3 lin. longa, ovata, acuminata, flavescentia, primum et secundum dorso rubescentia.

Sequenti primo vultu valde similis, sed floribus sparsis bracteolis latioribus obtusis foliisque sub lente asperulis distinctu facilis.

12. **Calycothrix luteola** Schauer. glaberrima; foliis approximatis, patulis, lineari-trigonis, calloso-apiculatis, petiolatis; bracteolis herbaceis, ima basi connatis, lanceolatis, complicatis, ecarinatis, cuspidatis, hypanthium semiaequantibus, hiantibus; floribus icosandris, racemosis; aristis corolla duplo longioribus.

In solo subarenoso planitie haud longe a monte Manypeak (aboriginibus „Tgilberup“) nec non in promontorio Cape-Riche. Novembri exeunte a. 1840. Herb. Preiss. No. 193.

„Fruticulus pedalis-sesquipedalis,“ erectus, gracilis, inferne simplex, superne pauciramens, ramis virgatis grisolis. *Folia* tres lin. longa, laete viridia, nitida. *Hypanthium* folium subtendens quadrante superans, cum calyce corollae luteolus; lobi suborbiculati in aristam acuminati. *Petala* ovato-elliptica, acuminata, 2½ lin. longa, externa dorso rubentia. *Bracteolae* 2 lin. circiter longae, herbaceae, in cuspidem herbaceam sensim acuminatae, patentes.

13. **Calycothrix flavescens** A. Cgh. glaberrima, foliis approximatis patentibus lineari-trigonis mucronato-apiculatis petiolatis, bracteolis herbaceis vix connatis ovato-oblongis concavis aristato-cuspidatis cuspidem laminam tubo calycis terquater brevioris subaequante, floribus icosandris racemosis, aristis corolla duplo longioribus. Schauer l. c. pag. 257. n. 17. Bot. Mag. n. 3323. n. 7. G. Gardner Sertum II. tab. 38!

In arenosis collis Eliza prope oppidulum Perth, gregarie crescens; in arenosis silvae haud longe a fluvio Gordon (Hay.). Floret Januar., Februario. Herb. Preiss. No. 186 et 187.

Calgootheria luteola, Schauer

P. macrochaeta f. Mill.

aristis corollam triplo exsertentibus,
hypanthio folium sustinens bis
terre superante.

Prope oppidum Froonantle Novae
Hollandiae austra-occidentalis.

Forsterian specie distingui possit.
Ipsi omnibus notis supra memo-
ratis exsurgendis coaruit.
Anth: aist.

14. **Calycothrix aurea** Lindl. ramulis junioribus hirtellis, foliis imbricatis oblongis concavis obtusiusculis dorso hirtellis ciliatis petiolatis, bracteolis margine scariosis distinctis patentibus lanceolatis navicularibus ciliatis in cuspidem recurvam acuminatis tubum calycis subaequantibus, floribus icosandris capitatis, aristis corolla plus duplo longioribus. Schauer l. c. pag. 258. n. 18. tab. VI. fig. 6. Lindl. l. c. pag. V. n. 1. tab. III. B.

In arenosis planitie silvae haud procul a praedio rustico Maddington ad fluvium Canning. Floret Decembri. Herb. Preiss. No. 184,

Tribus II. LEPTOSPERMEAE DC.

Germen pluriloculare. Capsula oligo-vel polysperma, loculicida. Schauer, Dissert. gratulat. de Regelia, Beaufortia et Calothamno, Act. Acad. Nat. Cur. XXI. I. pag. 5.

Subtribus I. Baeckeeae. Folia opposita. Flores pedicellati, bracteolis binis stipati. Stamina definita vel indefinita, corolla breviora aut vix longiora, libera vel in phalanges *phyllis calycis oppositas* coalita. Schauer l. c.

TETRAPORA Schauer, Linnaea XVII. 2. pag. 238.

Flores axillares, solitarii, pedicellati, pedicello ad insertionem bracteolis fugacibus stipato. *Hypanthium* patelliforme, tubo germini omnino adnato. *Calycis phylla* 5, brevia, rotundata, marcescentia. *Petala* fauci hypanthii inter lobos calycis inserta, sessilia, subpersistencia. *Stamina* 5, cum petalis inserta, inclinata, caduca; filamenta brevia, subulata, apice attenuato deflexo connectivo continuo; connectivum dilatatum, carnosulum; anthera nutans, e loculis duobus bilocularibus connectivo dorso adnatis poro exiguo dehiscentibus conferruminata. *Germen* plane immersum, vertice convexo, triloculare; gemmulae in loculo paucae. *Stylus* brevis; stigma capitatum. *Capsula* vertice loculicide-trivalvis; loculi oligospermi. *Semina* obovoidea, pendula, hilo citra basin laterali subexcavato.

1. **Tetrapora Preissiana** Schauer l. c.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, Febuario a. 1840. Herb. Preiss. No. 345.

Frutex videtur depressus, ramis tortuosis squarrosis, ramulis lateralibus copiosis abbreviatis. *Folia* opposita, imbricata, subclavato-semiteretia, facie plana acutiuscula, dorso convexo, margine cartilagineo denticulato, glabra, laete viridia; utrinque punctis majusculis subseriatis notata, linea plerumque

breviora. *Pedicellis* folium subtendens duplo triplove excedens. *Calycis phylla* seniorbicularia, margine petaloideo denticulato, dorso calloso. *Petala* alba. *Anthera* filamentis concolor, rosea.

RINZIA Schauer, Linnaea XVII. 2. pag. 239.

Flores axillares, solitarii, pedicellati, pedicello ad basin bracteolis binis oppositis herbaceis stipato. *Hypanthium* breviter patelliforme, basi germinis adnatum, calycis limbo 5-partito continuum. *Calycis phylla* 5, herbacea, obtusa. *Petala* 5, margini hypanthii inserta, phyllis calycinis alterna, orbicularia, marcescentia. *Stamina* 10, cum petalis inserta marcescentia; filamenta lingulata, phyllis calycis opposita minora, apice integro, antheram introrsum adnatum gerentia: petalis opposita majora, emarginato-bidentata, anthera infra emarginaturam interne adnata; anthera dorso adnata, bilocularis, loculis parallelis rima longitudinali dehiscentibus; connectivum glandula terminatum. *Germen* semisuperum, triloculare; gemmulae in loculo binac. *Stylus* brevis; stigma capitatum. *Capsula* basi hypanthio tenui planiusculo adnata, ceterum libera, convexa, loculicide trivalvis, valvis usque ad basin discedentibus patentissimis. *Semina* in quolibet loculo gemina, reniformi-oblonga, hilo medio laterali.

1. *Rinzia Fumana* Schauer l. c.

In interioribus Sinus Regis-Georgii III., distr. Plantagenet, Octobri a. 1840. Herb. Preiss. No. 164.

Frutex dodrantalis, glaberrimus, fere a basi dense ramosus, ramis gracilibus tortuosis, ramulis tenuibus densifoliis. *Folia* 1-2 lineas longa, opposita, imbricata facie lanceolato-lineari, plana cartilagineo-marginata obtusa dorsoque convexo obscure punctato semiteretia, brevipetiolata, laevia, laete viridia, opaca, juniora ad marginem apicis saepius minute denticulata. *Flores* infra apices ramulorum axillares; pedicellus folio bis longior; *bracteolae* foliiformes, concavae, persistentes. *Hypanthium* cum calyce continuo patellam herbaceam, 5-partitam, basi convexam, lineam altam exhibens. *Phylla calycis* subrotundo-ovata, obtusissima, margine membranaceo tenuiter ciliato cincta, saepius purpurea fucata. *Petala* orbicularia, in unguem contracta, denticulata, calyce duplo longiora, alba. *Stamina* majora calycem aequantia minora illis fere duplo breviora et angustiora. *Semina* atrofusca, laevia.

BABINGTONIA Lindl. Schauer, Linnaea XVII. 2. pag. 240.

Pedunculi axillares, solitarii, cymigeri; flores pedicellati deicidui. *Bracteolae* ad basin pedicelli minutae, caducae. *Hypanthium* subtruncato-hemisphaericum, in pedicellum attenuatum, germine omnino adnatum. *Calycis phylla* herbacea, rotundata, marginata, erceta. *Petala* 5, margini hypanthii inter phyllos calycis inserta, orbicularia, subpersistencia. *Stamina* 10, cum petalis inserta, caduca; filamenta breviora; anthera nutans, ob-

* Camphoromyrtus Behrii Schott

Anni Harnagien sp.
 var. ~~H.~~ *densifolia* Schauer.
 (*Baccharis densifolia* Sm.)
 Sylvestris Murray hanc
 longe a monte Peenow
 in ^{la} tura Sandorub ^{unqu. flum. H.} (ad viam)
 oppidulum Lyndach valley
 vus

* *P. submultica* Ford Mcl.

foliis patulis omnino natis
 vel brevi mucron ~~app. breviss.~~
 In montibus humilibus ca.
 pidatis a d portum Linvala

Chalcidya obovata Schauer

Prope Freemanth, N. Holl. austr.
 occidentalis.
 In ramis juvenilibus proeminis
 folia sunt oblongo-linearia; praeterea
 corolla & calycis foliola ptylla alba
 Anth: aepate.

cordiformis, basi in filamentum attenuata, bilocularis, loculis fere usque ad apicem connatis poro apicali deliscentibus. *Germen* immersum, vertice plano, trilobulare gemmulae in loculo circiter 10, circa spermophorum crassum centrali-parietale in anulum verticalem collocatae. *Stylus* filiformis; stigma capitatum. *Capsula* hypanthio calyce emarcido tornoso coronato inclusa, apice loculicide trivalvis. *Semina* . . . .

1. **Babingtonia Camphorosmae** Lindl. Bot. Reg. 1842. tab. 10. *Baeckea Camphorosmae* Endl. En. pl. Hügel. pag. 51.

In fruticetis solo arenoso sublimoso; ad fl. Vasse-River, Decembri a. 1839 flor. Herb. Preiss. No. 348; prope oppid. Guilford, Jan. 1840 flor., No. 347; haud procul a catarracta fl. Cygnorum, Augusto 1839 fructif., No. 349. Hügel! Drummond!

Frutex quoad staturam variabilis, pedalis sesquipedalis nunc erectus, nunc depressus, nunc decumbens, ex omni parte glaberrimus. *Rami* firmi, fusi inferius ramulis oppositis abbreviatis rigidulis foliosisque aucti, apicem versus floriferi. *Folia* 2 lin. circiter longa, opposita, confertissima, filiformi-v. subclavato-semiteretia, facie plana argute marginata, dorso convexo sub lente raripunctato, apice breviter acuminato cartilagineo-apiculata mucronato, laevia, lacte viridia. *Corolla* conspicua; petala valde concava, alba roseo-lucata.

SCHOLTZIA Schauer, Linnaea XVII. pag. 241.

(**Pritzelia** Schauer in Flora 1843 (Julio) pag. 407, non Walpers.)

Inflorescentia axillaris, dichotome cymosa; *flores* subsessiles, decidui, bracteolis binis fugacibus stipati. *Hypanthium* carnosum, subcylindrico-turbinatum, germi fere omnino adnatum, basi attenuatum. *Calycis phylla* 5, membranacea, rotundata, patula, exerescentia. *Petala* 5, in margine hypanthii sessilia, phyllis calycinis alterna, suborbicularia, conniventia, persistentia. *Stamina* 20, cum petalis inserta, decidua; filamenta corolla breviora, subulata, apice attenuato inclinato; anthera intans, obcordiformis, basi in filamentum attenuata, bilocularis, loculis usque ad apicem connatis poro apicali deliscentibus. *Germen* hypanthio innatum, vertice brevissime emersum, bilobulare; gemmulae in loculo geminae, in spermophoro centrali-parietali horizontales, extrorsum anatropae. *Stylus* subulatus; stigma punctiforme. *Capsula* . . . .

1. **Scholtzia obovata** Schauer l. c. *Baeckea obovata* DC. Prodr. III. pag. 230. n. 15. *Baeckea involucrata* Endl. En. pl. Hügel pag. 170!

In arenosis illustribus silvae caeduae prope vicum Perth, Februario a. 1839 flor. Herb. Preiss. No. 343. Hügel!

Frutex glaber, adscendens, pedalis, ramulis floriferis virgatis patentibus, habitu et imprimis florum specie *Tryptomenae saxicolae* haud dissimilis. *Folia* opposita, approximata, patentia, coriacea, obovata l. obovato-oblonga, inflexa, subrecurva, obtusa, margine angusto pellucido scabriusculo praedita,

subsessilia, enervia, impunctata, laevia, nitida. *Flores* versus apices ramulorum inflorescentiam floridam, saepe elongatam, struentes; pedunculi nunc folio breviores biflori, nunc folium subaequant breviter bifurcati l. dichotomi, cruribus 2-4 floris cum flore intermedio; flores articulado-decidiui. *Bractee* et *bracteolae* alabastrum stipantes membranaceae, lanceolatae acuminatissimae, praemature deciduae. *Calycis phylla* subtruncato-rotundata, cum petalis duplo majoribus pallide rosea, firmula. *Petala* exteriora erecto-conniventia, interiora depresso-inclinata.

HYPOCALYMMMA Endl. gen. n. 6306.

Schauer, *Linnaea* XVII. pag. 241.

Flores axillares, vel geminati aut sessiles aut pedunculati, vel in pedunculo brevi bini-terni-quaterni sessiles compacte cymulosi, articulado-inserti, singuli bractea bracteolisque binis oppositis consimilibus persistentibusque subtensi. *Hypanthium* cupulaeformis l. patellaeformis, germine adnatum. *Calycis phylla* 5, cutanea v. membranacea, marcescentia. *Petala* 5, margini hypanthii inserta, phyllis calycis alterna, orbicularia, marcescentia. *Stamina* 20-50, cum petalis inserta, corollam subaequantia v. breviora, marcescentia; filamenta subulato-filiformia, libera vel basi confluentia; anthera dorso inserta, connectivo lineari eglanduloso, bilocularis, loculis parallelis rima longitudinali dehiscen- tibus. *Germen* semisuperum vel vertice tantum emersum, bi-triloculare; gemmulae in loculo 1-2-3, spermophoro ad angulum centalem affixo insertae. *Stylus* filiformis, superne attenuatus v. capillaris; stigma punctiforme. *Capsula* semisupera, hypanthio patellaeformi insidens, staminibus emarcidis cineta, aut bilocularis compressa argute marginata turgidula, aut trilocularis trigona v. tricarinata. *Semina* tot quot gemmulae, pendula, oblonga, reticulato-arcolata, hilo prope basin laterali subexcavato conspicuo.

I. **EUCALYMMMA.** Flores in pedunculo brevi sessiles, geminati, ternati v. quaternati, bractea bracteolisque sub calyce patulis subcaducis. Germen biloculare, loculis trigemmulatis.

1. **Hypocalymma robustum** Endl. ramis virgatis foliisque patentibus; his distantibus, sessilibus, subtriquetro-subulatis, dorso sulcatis, mucronatis, nitidis, punctatis, superius saepe recurvatis; cymulis axillaribus, 2-4-floris, compactis; staminibus numerosis, subliberis. Endl. En. pl. Hügel. pag. 50. n. 153. Lindl. Bot. Reg. 1843. tab. 8!

In arenosis ad vicum Perth, Julio 1839. Herb. Preiss. No. 342. Drummond! Hügel!

Frutex sesquipedalis, erectus, floribus copiosis speciosisque ornatissimus. *Flores* colore et fere magnitudine *Persicae*. *Germen* fere immersum.

Hypocalymma picta Schauer.

Prope Freemantle, N. Holl. austr.
occidentalis.

Auth: aiprose.

Glibisrus notabilis (conf p. 200)

var. albidiflora

In rivis exsicatis infra prop. mont. Flinders
range a Rocky creek usq. ad montem Arden.

Infus 12' altus, plenum. Lignum 5-8', ramis
longis patulis, corolla lilacea (rara
alba) limbo fragrans, petalis lacinis
cuneatis apice subtruncatis nec lacinia
in angulum plus minusve acutum producta
Auth. turae. Stigma dilute flavum. Fil-
amenta & styli alba.

Auth: var.

2. **Hypocalymma Cunninghamsi** Schauer, ramis ramulisque virgatis subfastigiatis; foliis remotiusculis, patentibus, acerosis, triquetro-subulatis, basi attenuata sessilibus, acuminatis, mucronatis, laevibus nitidisque; floribus axillaribus, in pedunculo brevissimo geminatis; staminibus basi coalitis. *Baeckea speciosa* A. Cunningham. Herb. n. 65!

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, Octobri a. 1840. Herb. Preiss. No. 334. Ad Sinum Regis Georgii III. A. Cgh.! a 1818.

Frutex pedalis, glaberrimus, ramulis fuscescentibus leviter marginatis. *Folia* 4-6 lin. longa, facie acutangula sulcata, carina obtusa, subrecurva viridia, punctis propter nitorem vix conspicuis inspersa. *Flores* $1\frac{1}{2}$ lin. longi. *Calycis* *phylla* cutanea, rotundata, contigua. *Filamenta* basi irregulariter connata, saturate tincta, corollam aequantia. *Petala* concava, reflexa, subscariosa, sordide albida. *Germinis* locula 3-gemmulata. *Capsula* forma germini similis, magis tumida, loculis plerumque monospermis.

3. **Hypocalymma strictum** Schauer, ramis ramulisque virgatis strictisque; foliis remotiusculis, arrectis patulisve, accrosis, tetragonis, basi subattenuata sessilibus, acutis, breviter mucronatis, laevibus, opacis, punctatis; floribus axillaribus, in pedunculo brevissimo geminatis; staminibus basi connatis.

In solo turfoso-arenoso in fruticetis planitiei prope vicum Albany (distr. Plantagenet), Septembri et Octobri a. 1840. Herb. Preiss. No. 331 et 335.

Frutex pedalis-bipedalis, glaberrimus, a basi ramosus, ramulis fuscescentibus. *Folia* rigidula, strictiuscula, in sicco facie et saepius etiam dorso sulcata, crassiora quam praecedentis minusque attenuata et acutata, conspicue punctata, tamen laevia, neque vero nitida, lacte viridia, 4-6-8 lin. longa. *Flores* fere illius, fusco-testacei coloris.

4. **Hypocalymma asperum** Schauer: ramulis scabro-pubescentibus; foliis approximatis, arrectis imbricatisve, accrosis, subclavato-trigonis-tetragonisve, basi subattenuata sessilibus, acutis, muticis, tuberculato-punctatis asperisque; staminibus basi connatis.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, Octobri a. 1840. Herb. Preiss. No. 332.

Frutex vix pedalis, habitu floribusque prioribus binis similis, sed ramificatione magis contracta, foliisque imprimis ramulisque asperis distinctus. *Folia* 4-6 lin. longa.

II. **ASTROCALYMMMA.** Flores axillares geminati, sessiles, bractea bracteolisque consimilibus scariosis hypanthii basin stellato-involucrantibus, post floris lapsum residuis. Germen triloculare, loculis unigemmulatis.

5. **Hypocalymma scariosum** Schauer, ramis ramulisque flexibilibus patulis; foliis sessilibus, confertis, decussatis; accrosis, rigidulis, subclavato-trigonis, canaliculatis, cartilagineo-acuminatis, scabro-punctatis; floribus axillaribus, sessilibus; geminatis, dense spicatis, subscariosis.

In turfosis hieme inundatis, inter frutices prope praedium rusticum b. Spencer ad Sinum Regis Georgii III., Octobri a 1840. Herb. Preiss. No. 330.

„Frutex 1-2½ pedalis“, ramosus, ramulis aequaliter foliosis, albidis. *Folia* semipollicaria, punctis prominulis sub lente scabris conspersa, opaca, inferiora patula, subfloralia patentissima. *Flores* ad apices ramulorum in apicem fere pollicarem collecti. *Involucrum* scarioso-membranaceum. *Hypanthium* patellaeforme, punctatum. *Calycis phylla* adscendentia, late rotundata, contigua, cum petalis duplo longioribus rotundatis conniventibus membranacea, subscariosa, testacei coloris, in disco resinoso-punctata. *Stamina* inaequalia, longiora corolla paullo breviora. *Capsula* semisupera, argute tricarinata, loculis monospermis.

6. **Hypocalymma angustifolium** Endl. ramulis virgatis, tetragonis, patulis; foliis remotis, patentibus, decussatis, sessilibus, lineari-subulatis, canaliculatis dorso convexis, vel semitereti-subulatis facie canaliculata, acuminatis, mucronatis, punctatis, opacis; floribus axillaribus, sessilibus, geminatis, interrupte spicatis. Endl. En. pl. Hügel. pag. 50. n. 152.

Adest triplici forma, manifesto ex soli conditione pendente:

α **linophylla**: vegeta, virgata; foliis tenuioribus, lineari-subulatis, canaliculatis, laevibus, punctis immersis;

β **acerosa**: foliis carnosis, semitereti-subulatis, facie et saepe dorso quoque sulcatis, laevibus, punctis immersis;

γ **verrucosa**: macra, rigidula, squarrosa; foliis carnosis, semitereti-subulatis, corrugatis, dorso verrucoso-punctatis.

Forma α lecta est in depressis uliginosis silvae prope vicum Perth, Aug. a. 1839. Herb. Preiss. No. 339. et in reg. interioribus Austr. merid. occid., Octobri a 1840. No. 333; Hügel!; forma β in depressis arenosis silvae ad Hester's-point, Octobri a 1840. No. 338, in calculosis limosis silvae terrae superioris Australiae occidentalis, Septembri a 1839. No. 340. et in sublimosis ad fl. Vasse, Decembri a 1840, sterilis No. 341.; Drummond!; forma γ in solo subarenoso prope vicum Albany, Octobri 1840. No. 336; Drummond!

Ramuli cinerei, laeves. *Folia* 6-8 lineas longa, superiora reliquis paullo majora cuspidato-mucronata subtus teretia vel (sicca saltem) sulcata ideoque tetragona. *Flores* involucro brevi saepe colorato stipati conspicui. *Calycis phylla* petaloidia, semiorbicularia, lilacina vel petalis concoloria. *Petala* erecta, pallide rosea. *Stamina* subaequalia, brevissime exserta. *Germen* semisuperum, trigonum, trigemmulum. *Capsula* trigona, trisperma.

III. **CARDIOMYRTUS.** Flores axillares gemini, pedunculati, pedunculo bractea, hypanthio bracteolis binis oppositis bractaeaeque alternis stipato. Germen triloculare, loculis bigemmulatis.

7. **Hypocalymma cordifolium** Lehm. Ms. ramis gracillimis, virgatis, tetragonis, marginatis; foliis decussatis, membranaceis, planis, cordatis, sessilibus, semiamplexicaulibus, acutiusculis, margine subrevoluto cartilagineo-

x Sida nematopoda, fruct Mll.

oblo.
suffruticosa, diffusa, incano-tomentosa, foliis cor-
grasso subduplicato-pinnatis basi subcordatis petio-
acqui longis, stipulis elongatis filiformi-
pidunculatis axillaribus foliariis filiformibus
laminatis ^{heteromorphis} longioribus ^{longioribus}
pateruliformis demum pendulis, petalis paleis
supracaulibus, laciniis ~~apice~~ calycis deltoideis
carpidiis 6-7 depressis minutim puberulis
rugulosis
Cudnaha.

E diagnosi Lindleyana artificum finitima &
fibulatae suae & portae non nisi pedunc-
ulatis diversa & pro varietate pinnata
kai & ambae sequentes habitu non parum re-
s. corrugata conveniunt.
Auth: vire.

x Sida interdens, fruct Mll.

suffruticosa, arbuscula candelabro-
foliis late ovatis acutis truncatis prope apice
lobatis pinnatis, pinnatis ~~apice~~ acutiusculis
aequalibus, petiolo folium aequante stipulis
gatis pinnatis - filiformibus duplo brevioribus
pinnatis, pedunculatis axillaribus foliariis
rappisculis (etate dilixis) calyci aequi longi
ultimi laciniis (sub truncatis) deltoideis, carpidiis
5-6 rot. glaberrimis corrugatis breviter umbonatis
Ann. procreante.
Auth: vire.

x Sida prodrachma, fruct Mll.

suffruticosa, prostrata, candelabro-
foliis ovatis crenato-pinnatis basi subcordatis pe-
tio longioribus, stipulis filiformi pinnatis, pin-
natis rappisculis medium vix articulationis axi-
ribus foliariis calyci paulo longioribus, brev-
ultimi (sub truncatis) deltoideis, carpidiis 5-6 glab-
rugosis umbonatis ad ramum puras approximatis
Auth: vire. Ad fl. Murray & Padua Wheel W.
San solo argillaceo. s. corrugata mull. non
in vallis. prop.

x Sida trithopoda, fruct Mll.

suffruticosa, prostrata, candelabro-
foliis ovatis crenato-pinnatis basi subcordatis pe-
tio longioribus, stipulis filiformi pinnatis, pin-
natis rappisculis medium vix articulationis axi-
ribus foliariis calyci paulo longioribus, brev-
ultimi (sub truncatis) deltoideis, carpidiis 5-6 glab-
rugosis umbonatis ad ramum puras approximatis
Auth: primo vire.

denticulatis, uninerviis, glaucis; perforato-punctatis; floribus axillaribus geminis, pedunculatis.

In solo turfoso inter fruticeta planitiei prope vicum Albany (Plantagenet), Octobri a. 1840. Herb. Preiss. No. 154. *) Ferd. Bauer!

„Frutex 2-3-pedalis“, ramis subsimplicibus, fuscis, nitidis. *Folia* subdistantia, 4-5 lin. longa itemque ad basin lata. *Pedunculi* variae longitudinis, tamen folio semper plus duplo breviores, tennes. *Bractea* et *bracteolae* tenuiter membranaceae, lineari-lanceolatae, subpersistentes; hae hypanthium aequantes. *Hypanthium* subexplanatum, in *phylla calycis* rotundata herbacea margine membranaceo purpurata et integerrima continuo abiens et cum iis lineam fere radio metiens. *Petala* calyce vix longiora, cum filamentis quam ea ipsa brevioribus liberisque carnea.

ASTARTEA DC. Endl. gen. n. 6289.

Schauer, Linnaea XVII. pag. 241.

Pedunculi axillares, solitarii, uniflori. *Flores* pedicellati; pedicellus in apice pedunculi articulatus eique continuus basi bracteolis binis oppositis, plerumque fugacissimis, stipatus. Bracteolae arcte sub alabastro juvene insertae, pedicello dein excrecente auferuntur. *Hypanthium* turbinatum, in pedicellum attenuatum vel contractum, germiui omnino adnatum. *Calycis phylla* breviter obtusa, inclinata, dorso saepe callosa vel corniculata, persistentia. *Petala* 5, margini interiori hypanthii inserta, lobis calycis alterna, orbicularia, subunguiculata, (alba,) decidua. *Stamina plurima*, cum petalis inserta, in phalanges 5 fasciculatas lobisque calycis oppositas coalita, inclinata, emarcida in fructu remanentia; anthera connectivo filamento continuo erecta, bilocularis, loculis oppositis rima longitudinali subporiformi hiantem dehiscens. *Germen* vertice convexo vix emersum, triloculare; *gemmae* in loculo multae, horizontales, superpositae. *Stylus* filiformis, brevis; stigma capitatum. *Capsula* hypanthio hemisphaerico calyce toruloso coronato inclusa, vertice loculicide trivalvis, loculis polyspermis. *Semina* triquetra, dorso arcuato et convexo, lateralibus planis, hilo ad angulum citra basin laterali.

1. **Astartea leptophylla** Schauer. ramis ramulisque gracilibus teretiusculis; ramulis lateralibus abbreviatis copiosis; foliis tenuissimis, semitereti-filiformibus, inferne attenuatis, muticis, glaucescentibus; pedunculo folio breviori infra medium articulo; calycis phyllis dorso aequalibus; phalangibus 8-andris.

In umbrosis ad ripam fluvii Preston (prov. Wellington), solo limoso, Januario a. 1840. Herb. Preiss. No. 156.

*) Bracteolae arcte sub alabastro juvene insertae, pedicello dein excrecente auferuntur.

„Frutex 12-15 pedalis“, ramificatione gracillima vaga. *Folia* patula, 4-6 lin. longa, facie sulco exarata. *Flores* pro genere majusculi. *Hypanthium* pallidum. *Calycis phylla* ovata, obtusa, margine angustissimo membranaceo. *Petala* lata, orbiculata, breviter unguiculata, punctata.

2. **Astartea fascicularis** DC. ramis quadrangularibus marginatis; ramulis lateralibus abbreviatis copiosis, fasciculato-foliosis; foliis acerosis, subclavato-semiteretibus subtrigonisve, in petiolum brevem attenuatis, acutiusculis, muticis, punctatis, laevibus; pedunculo folio subaequali breviorive, infra medium articulado; calycis phyllis dorso gibbis; phalangibus 5-8-andris. DC. Prodr. III. pag. 210.

Melaleuca fascicularis Labill.! Nov. Holl. II. pag. 29. tab. 170 (v. sp. orig.)

In solo turfoso-arenoso ad ripam flum. Cygnorum pr. vicum Perth, Januario a. 1839. Herb. Preiss. No. 158. In terra Van-Leuwin: Lab.! sic enim certo legendum pro loco, lapsu memoriae allato: „Prom. Van-Diemen“; Ferd. Bauer!)

Frutex 4-8 pedalis, ramis ramulisque terminalibus clongatis laxis cinnamomeis. *Folia* 2-3½ lineas longa, rigidula, recta, incurva vel recurva, subtus convexa, a lateribus leniter compressa, facie plana sulcata v. canaliculata, lacte viridia. *Calycis phylla* herbacea, ovata, obtusa, purpurata, pellucide marginata, dorso subtuberculato-callosa. *Petala* oblonga, in disco punctata. Planta Billardieriana macilentior est quam Preissiana, foliis majoribus et crassioribus; ceterum vero nullo discrimine diversa.

3. **Astartea scoparia** Schauer. ramis virgatis, strictis, subfastigiatis, ramulosis; foliis brevibus, subclavato-semiteretibus, in petiolum brevem attenuatis, acutiusculis, muticis, laevibus, ramulorum fasciculatis; pedunculo folium subaequante, ad medium articulado; calycis phyllis dorso aequalibus; phalangibus subpentandris.

In solo arenoso secundum fl. Cygnorum supra vicum Perth, Febuario, Aprili. Herb. Preiss. No. 150 ex parte.

Frutex 4-8 pedalis, habitu scopario, ramulis lateralibus brevissimis copiosissimis floridisque insignis. *Folia* sesquilineam longa, facie plana, laete viridia, „recentia *Anthoxanthum* redolentia“. *Flores* mediocres.

4. **Astartea aspera** Schauer. ramis rigidis squarrosis; ramulis asperimis; foliis quadrifariam imbricatis, brevibus subclavato-semiteretibus-subtrigonisve, in petiolum brevem contractis, acutiusculis, muticis, aspero-punctatis; floribus

*) **Astartea laricifolia** Schauer. ramis gracilibus, tetragonis, subalato-marginatis, ramulosis; foliis confertissimis, patentibus, filiformi-semiteretibus, in petiolum attenuatis, acutis, muticis, laevibus; pedunculo folium subaequanti, infra medium articulado; calycis phyllis dorso aequalibus; phalangibus 3-4 andris. Walpers Report. II. p. 922. *Leptospermum laricifolium* A. Cgh. Herb. No. 81! In paludosis ad Sinum Regis Georgii III.: A. Cgh. Frutex ramis laxis, ramulis copiosis patenti-foliosis specie quadam laricina indutus. *Phyllopodia* in alam, praesertim sub folio conspicuam, utrinque decurrentia eaque internodum subjectum marginantia. *Folia* angustissima, 2½-4 lin. longa, facie argute marginata sulcata vel leviter canaliculata, dorso convexo, utrinque subtiliter punctata, viridia, nitidula. *Calycis phylla* ovato-subrotunda, margine membranaceo angusto.

Apertea Endlicheriana, Schauer.

S. polyandra f. v. m.

Chalantibus plerumque altitudinis
Prope Freemantle, N. Holl. austr.
occidentalis
Anth: asparte.

vix exsertis; pedunculo supra basin articulato et bracteolato; calycis phyllis dorso gibbis; phalangibus triandris.

In rupestribus collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 361.

„Frutex tripedalis.“ *Ramuli* laterales breves, foliis dense obsiti, inferne pulvinis residuis denticulati; terminales subvirgati, foliis remotis ex axillis fasciculum foliorum pullulantibus instructi, scabritie singulari, scilicet verrucis denticulatis singulis singulorum punctum resinosum obvallantibus asperimi, quae scabrities eadem, sed minus conspicua, in foliis reperitur. *Folia* vix 2 lin. aequantia. *Hypanthium* cyathiforme, herbaceum. *Calycis phylla* lato-ovata, obtusissima, purpurata, membranaceo-marginata, gibbo dorsali crasso. *Petala* limbo calycis triplo longiora, alba, roseo fucata.

5. **Astartea glomerulosa** Schauer. ramis tenuibus angulatis breviramulosis; foliis brevibus crassis, subclavato-semiteretibus-subtrigonisve, in petiolum brevem contractis, muticis, laevibus, ramulorum axillarium compactis; pedunculo exserto, supra medium articulato; calycis phyllis dorso aequalibus; phalangibus 3-4-andris.

In regionibus interioribus Sinus Regis Georgii III, Novembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 162.

Folia $1\frac{1}{2}$ -2 lineas longa, atroviridia, punctis vix conspicuis. *Pedunculi* longe exserti, tenuissimi, articulo semilineam a basi hypanthii distante. *Hypanthium* dimidia linea paullo longius, subito in pedicellum contractum. *Calycis phylla* rotundata, tenuiter membranaceo-marginata. *Petala* candida, calycem triplo excedentia.

6. **Astartea corniculata** Schauer. ramis tenuibus virgatis teretiusculis; foliis brevibus crassis, lineari-semiteretibus, in petiolum brevem contractis, acutiusculis, muticis, laevibus, ramulorum brevium axillarium imbricatis; pedunculo exserto, medio articulato et bracteolato; calycis phyllis dorso corniculatis, corniculis tenuibus margine brevi inflexo pluries longioribus, porrectis; phalangibus 3-4 andris.

In subturfoso-arenosis plantitiei prope vicum Albany, Januario a. 1840. Herb. Preiss. No. 163.

„Frutex pedalis, gracillimus, erectus“. *Ramuli* juniores purpurati. *Folia* sesquilineam longa, supra plana, subtus valde convexa, ideoque fere hemiellipsoidea, laete viridia. *Flores* fere sequentis, sed pedunculi bracteolis herbaceis, foliis similibus tamen minoribus, diu stipati et cornicula calycis longiora, praesertim in alabastro conspicua.

7. **Astartea Endlicheriana** Schauer. ramis ramulisque gracilibus flaccidis; his quadrangulis submarginatis; ramulis lateralibus brevibus, fasciculato-foliosis; foliis patentibus, acerosis, semitereti-subfiliformibus, basi angustatis, muticis, laevibus; pedunculo folium subaequante, medio articulato; calycis phyllis dorso breviter corniculatis callosisve; phalangibus 3-5-andris.

Leptospermum dubium Spr. Syst. II. pag. 492. n. 16. (quo nomine plantam nostram in nonnullis herbariis reperi.) *Baeckea affinis* Endl.! Enum. pl. Hügel. pag. 51. n. 168. *Baeckea frutescens* Hort. et A. Dietr. in Allg. Gartztg. IX. pag. 258!; non L.

In depressis arenosis haud procul a praedio rustico cl. Andrews ad fl. Cygnorum, Decembri a 1839. Herb. Preiss. No. 165; J. Drummond! Ad Sinum Regis Georgii Ferd. Bauer! Hügel! (v. v. c.)

Frutex cultus 3-5 pedes altus, ramis pendulis floridis valde ornatus. *Folia* 3-4 lin. longa, atroviridia. *Bracteolae* fugacissimae. *Hypanthium* viride, saepius purpure tinctum. *Calycis phylla* subrotundo-ovata, margine pellucido subtiliter denticulato, dorso callo herbaceo compresso, saepius obsoleto, aucta. *Petala* subrotundo-oblonga, tenuissime denticulata, alba, venosa, perforato-punctata.

Subtribus II. *Euleptospermeae*. Folia alterna. Flores sessiles. Bracteolae saepe fugaces vel nullae. Stamina indefinita, corolla breviora, libera. Schauer dissert. grat. p. 5.

AGONIS DC. Prodr. III. (1828*) pag. 226.
(Sect. I. *Leptospermi*). *BILLOTTIA* G. Don
et R. Br. (1830.) Endl. gen. n. 6305.

Capitula pleiantha, compacta, vel in ramulis brevibus lateralibus inferne foliatis subapicalia, vel axillaria sessilia, post anthesin saepe ramulo innovante comata. *Flores* bractea et bracteolis binis squamaceis suffulti, sessiles. *Hypanthium* turbinatum, germi adnatum. *Calycis phylla* 5, marcescentia denique obsoleta. *Petala* 5, margini hypanthii inserta, ejusdem lobis alterna, orbiculata, distincte unguiculata, (alba). *Stamina* cum petalis inserta iisque breviora di-pleiocycla; filamenta filiformi-subulata, libera; anthera incumbens, bilocularis, loculis longitudinaliter dehiscens. *Germen* hypanthio immersum, tri-rarius quinque-loculare, loculis paucigemmulatis. *Stylus* filiformis, brevis; stigma capitatum, subtrilobum. *Capsula* immersa, loculicide trivalvis; semina in loculo singula vel bina, basi affixa, adscendentia.

1. **Agonis (*Leptospermum*) flexuosa** DC. l. c. innovationibus vestitis; ramulis compressis, acutangulis subulatisve, pendulis; foliis alternis, lanceolatis vel lineari-lanceolatis, utrinque attenuatis, brevipetiolatis, subtus trinerviis venosisque nervis lateralibus margini proximis excurrentibus, adultis glabris; capitulis axillaribus, pleianthis, villosis.

Leptospermum resiniferum Bertol. amoen. ital. pag. 28.
L. glomeratum Wendl. fil. in Flora 1819. pag. 678, ex ipso Beitr. II. pag. 22. *Metrosideros flexuosa* Willd. Enum. pag. 514!
Leptospermum flexuosum Lk. En. II. pag. 26. Rehb. hort.

*) Nomen Candollei ex jure prioritatis servandum, ut jam optime monuit cl. Lindley (Swau-River Bot. pag. X. n. 33.), quam genus ab auctore praevium tanquam propria Sectio *Leptospermi* satis distinctum sit.

Agonis²¹ hypericifoliae nomen
mutatur in:

A. thaeceformis Schauer.
et deliatus Synonymum L.
hypericifolium Otto & Dietr.,
quod ultimum L rubri-
caulis Lk formam exhibet

bot. II. tab. 115! (icon bona, sed capsulam perperum 5-locularem exhibens.) Colla, Act. Acad. Taur. XXXI. pag. 112. tab. 2.! (valde mediocris). *Billottia flexuosa* G. Don. Gen. Syst. Variat foliorum figura:

α **angustifolia**. foliis anguste lanceolatis, elongatis, utrinque acuminatis.

In arenosis secundum ripam dextram fl. Cygnorum, Decembri. Herb. Preiss. No. 136: frutex 10-20-pedalis; in arenosis silvae haud procul ab ora maris, Septembri flor., No. 137; in litore arenoso prope Busseltown (Sussex), Decembri seminifera, No. 138; in turfosis humidis umbrosisque ad radices montis Elphinstone (Plantagenet), No. 140; in rupestribus insulae Mistaken-Island, No. 139; in solo turfoso arenoso ad Stirling's Terrae (Plantagenet) alabastrigera, No. 147. King George's Sound: A. Cgh.! 1821. (v. v. c.)

β **latifolia**. foliis latioribus simulque brevioribus, basi ovatis.

In solo turfoso arenoso ad Stirling's-Terrae (Plantagenet), Septembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 144.

Frutex 5-8-pedalis. *Corolla* alba. *Lobi* calycini acuti, denique decidui. *Stamina* quina-sena ante singulum lobum calycinum. *Semina* in loculo subgenina.

2. **Agonis (Leptospermum) hypericifolia** Sch. innovationibus hirsutis; ramis confertis, rigidulis, angulatis, cum foliis denique glabratiss; foliis alternis, subdistichis, ovatis ellipticis subrotundisve, uninerviis, venosis, inflexis undulatisque, apice complicato, acumine mucronato deflexo, margine scabro, petiolo brevissimo; capitulis axillaribus, pleianthis, sericeo-villosis.

Leptospermum hypericifolium Otto et Dietr., Allg. Gartztg. IX. pag. 243. (sine flor. descr.) *L. theaeforme* A. Cgh.! herb.

In arenosis subturfosis circa vieum Albany (Plantagenet), Novembri et Decembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 152 et 153. King George's Sound: A. Cgh.! 1822. (v. v. c.)

Frutex 4-8 pedalis“, ramulis hornotinis vegetioribus virgatis. *Folia* perforata variant figura magis elongata et magis rotundata, pubesque diutius residuo. *Phylla calycis* rotundata, a fructu decidua. *Petala* calycem longitudine aequantia, anguste unguiculata, perforata, alba. *Stamina* 20. *Capsula* breviter exserta, loculis dispermis.

3. **Agonis (Leptospermum) marginata** DC. I. c. innovationibus totis sericeis; ramis rigidulis, hirsutis; foliis alternis, obovato-oblongis, margine cartilagineo villosis, denique omnino glabratiss, trinerviis; capitulis subapicalibus axillaribusque, pleianthis; hypanthio sericeo; calyce hirsuto.

Leptospermum marginatum Lab. N. Holl. II. pag. 10. tab. 148!

In rupestribus ad King George's Sound, Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 141: (v. v. c.)

„Frutex 5-pedalis“. *Folia* utrinque multipunctata. *Petala* alba. *Stamina* 10. *Capsula* immersa.

4. **Agonis spathulata** Schauer. ramulis squarrosis, tectibus, villosis; foliis confertissimis, alternis, subrotundo-spathulatis, obtusissimis, concavis, enerviis: junioribus basi

ciliato-hirsutis: adultis glabratiss, nitidulis; capitulis subapicalibus, multifloris; hypanthio glabriusculo; lobis calycis citra apicem dorso barbatis.

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 324.

„Frutex pedalis“, densirameus, squarrosus. *Folia* coriacea, parva, 2 lin. circiter longa, lamina, lineam fere longa, utrinque punctata. *Phylla calycis* ovata, obtusa, inferne confluentia. *Petala* alba, breviter unguiculata. *Capsula* trilocularis, loculis monospermis. *Semina* eburnea, umbilico fusco.

5. **Agonis (Leptospermum) linearifolia** DC. innovationibus sericeo-villosis mox glabratiss; ramulis strictis; foliis alternis, lanceolatis, basi attenuata sessilibus, acumine brevissimo subpungentibus, uninerviis vel subenerviis; capitulis in ramulis brevibus apicalibus, pleianthis; hypanthio sericeo v. subvillosio; calyce villosio-hirsuto. DC. l. c. et Mém. Myrt. tab. 12!

„Spearwood“ Colonorum.

In turfosis umbrosis subhumidisque silvae ad vicum Perth, Junio 1839 florif. et fructif. Herb. Preiss. No. 142; in turfosis depressis ad fl. Cygnorum pr. Perth, Septembri 1840, No. 145; in clivulo arenoso pr. Albany, Septbr 1840, alabastrig., No. 151. King George's Sound, 1822: A. Cgb.!

„Frutex 8-14-pedalis, erectus“. *Folia* juniora in sicco saepe subtrinervia, adulta firma subnervia multipunctata. *Flores* parvi. *Petala* alba, in unguem angustum contracta. *Stamina* 10. *Capsula* immersa, 3-5 locularis, loculis dispermis.

6. **Agonis conspicua** Schauer. innovationibus sericeo-villosis; ramulis submarginatis erectis; foliis alternis, aversis, lanceolatis, basi attenuata sessilibus, acutis acuminatisve, subpungentibus, trinerviis, adultis glabratiss, subnitidis; capitulis in ramulis brevibus subapicalibus axillaribusque, pleianthis; hypanthio calyceque villosis.

In rupestribus summitatis montis Wuljenup (Plantagenet), Octobri 1840. Herb. Preiss. No. 150 ex parte.

„Frutex octopedalis“, ramulis laete fuscis. *Folia* perforato-punctata, flavo-virentia, pollicem circiter longa, superius 2-2½ lin. lata, marginibus imprimis apice inflexis. *Flores* corolla alba explanata 3 lin. diametro mediante conspicui; petalorum ungues calycis phylla ovata obtusa subaequant. *Stamina* 10. *Capsula* immersa, trilocularis, loculis dispermis.

7. **Agonis angustifolia** Schauer. innovationibus sericeis; ramulis marginatis, subvirgatis; foliis alternis, confertis, lanceolato-linearibus, acuminatis, subpungentibus, uninerviis, canaliculatis, adultis glabratiss; capitulis axillaribus, pleianthis; hypanthio sericeo-pubescente; calyce subglabrato.

In rupestribus summitatis montis Wuljenup, Octobri 1840. Herb. Preiss. No. 149.

„Frutex octopedalis“. Variat foliis anguste lanceolatis et lineari-acerosis, 6-8 lin. circiter longis. *Flores* majusculi, albi. *Calycis phylla* ovata. *Stamina* 10. *Fructus* praecedentis.

8. **Agonis juniperina** Schauer. ramulis piloso-hirsutiss, erectis; foliis alternis, fasciculato-confertis, lineari-lanceo-

latis, dorso convexis, sessilibus, mucronato-acuminatis, ciliatis, uninerviis, adultis glabratis; capitulis apicalibus, multifloris, densis; hypanthio sericeo-pubescente; calyce glabro.

In glareosis sterilibus promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840 fructifera. Herb. Preiss. No. 314.

Frutex ramis erectis, ramulis lateralibus fasciculato-foliosis dense consitis. *Folia* 3-4 lin. longa. *Capitula* fructuum magna, oblonga. *Hypanthium* fructiferum turbinatum, helvolum. *Calycis phylla* membranacea, subtriangulari-ovata, acutiuscula, albida. *Capsula* trilocularis.

9. **Agonis parviceps** Schauer. ramulis subvirgatis, patulis, juvenilibus hirsutiusculis; foliis alternis, ramulos axillares brevissimos fasciculato-foliosos subtendentibus, linearilanceolatis subspathulatisque, sessilibus, acuminatis, muticis, cartilagineo-marginatis, canaliculatis, adultis glabratis; capitulis subapicalibus, exiguis, pleianthis; hypanthio subtilissime sericeo; calyce glabro.

In clivulo arenoso inter frutices densos prope vicum Albany, Septembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 160; in solo limoso-glareoso ad vicum Busselton (Sussex), Decembri a. 1839 delorata. No. 161. King George's Sound a. 1822: A. Cgh.!

„Frutex 2-3 pedalis.“ *Folia* 2-3 lineas longa, atroviridia, perforatopunctata, ramulorum florentium capitula obvallantia. *Flores* parvi; calycis phylla triangulari-ovata, obtusa; petala candida, impunctata. *Capsula* trilocularis, loculis dispermiis.

HOMALOSPERMUM Schauer, Linnaea XVII.

2. pag. 242.

Flores axillares, solitarii, basi adnati, bracteolis binis oppositis squamaceis carinatis arctis sub anthesi deciduis stipati. *Hypanthium* cyathiformi-campanulatum, angulatum, germiini totum adnatum. *Calycis phylla* hypanthio continua, cutanea, marcescentia, denique obsoleta. *Petala* 5, margini hypanthii inserta, calycis phyllis alterna, orbicularia. *Stamina* plurima, cum petalis inserta inclinata, corolla breviora; filamenta subulata; anthera dorso inserta connectivo glandula terminato, bilocularis, loculis parallelis rima longitudinali dehiscens. *Germen* (saepe abortivum), hypanthio arete adnatum, vertice depresso, 3-4-5-loculare; gemmulae in spermophoro grosso compresso, angulo centrali basi affixo, biseriales, subdenae. *Stylus* filiformis; stigma peltato-capitatum. *Capsula* innata, vertice ad suturas angulato breviter emersa, loculicide dehiscens; loculi arctissimi, 1-2-3-spermi; semina compressa, irregulariter disciformia, gemmularum tabescentium rudimenta plerumque ad verticem loculi evecta.

1. **Homalospermum firmum** Schauer.

In paludosis silvae haud longe a Bull's-Creek et in turfosis planitiei prope montem Wuljenup (Perth, Plantagenet), Octobri 1840 florif. Herb. Preiss. No. 143; in subarenosis circa Albany, Septembri 1840 alabastrigera. No. 148. Swan-River: J. Drummond! Vasse-River: Mrs. Molloy!

„Frutex 5-8-pedalis“, ramis strictis patulis, innovationibus pubescentibus. *Folia* coriacea, firma, alterna, approximata, lineari-lanceolata, sensim in basin angustata, acuta, mutica, plana; obliqua, adulta glaberrima, nitida, flavescenti-viridia, 6-8 lin. longa, lineam circiter lata. *Alabastra* e bracteolis pergamentaceis geminis oppositis arctissimis obovatis carinatis deciduis erumpentes. *Flores* conspicui. *Hypanthium* 2 lin. longum, germine totum adnatum et secundum ejus locula angulatum, glaberrimum, cum phyllis calycis cutaneis rotundatis corollae resinoso-punctatum. *Petala* flavescenti-albida, patentia, calyci aequalia. *Stamina* subtriginta, corolla duplo breviora; filamenta glanduloso-punctata. *Fructus* pro florum ubertate pauci, arcte adnati, subcubici vel trigoni; loculorum parietes nitidi, resinoso-punctati; semina inter spermophorum et parietem compressa, atra, opaca, margine tenuiter fimbriato-incisa.

PERICALYMMA Endl. gen. n. 6307.

Flores terminales vel axillares, solitarii, sessiles, bractea et bracteolis geminis oppositis consimilibus membranaceis concavis subsupersistentibus obvelati. *Hypanthium* subturbatum, ultra germinem productum cique adnatum. *Phylla calycis* 5, marcescentia. *Petala* 5, margini hypanthii inserta, phyllis alterna, orbiculata, unguiculata. *Stamina* plurima, inclinata, cum petalis inserta iisque breviora; filamenta filiformi-subulata; anthera dorso inserta, bilocularis, loculis parallelis rima longitudinali dehiscentibus. *Germen* hypanthio totum innatum, vertice planum, triloculare; gemmulae in singulo loculo 5. *Stylus* filiformis; stigma peltato-capitatum. *Capsula* hypanthio magis minusve elongato, subcylindrico, tota immersa, trilocularis, vertice loculicide dehiscentis; semen in singulo loculo unicum, rarius et alterum, perfectum, cuneatum, carpidium cocciforme induratum inferne omnino explens; reliquarum gemmularum rudimenta ad apicem loculi repressa.

1. **Pericalymma crassipes** *Lehm. Msc.* caule inferne simplici fusiformi-incrassato, superne dichotomo; ramulis divaricatis, glabris, marginatis; foliis alternis, oblongo-lanceolatis oblongisve, basi euneatis, acuminatis, mucronatis, glabris, canaliculato-inflexis, apice uncinato, margine scabro; hypanthio cyathiformi, subtilissime sericeo; phyllis calycis cutaneis, ovatis, obtusiusculis, bracteolisque scariosis ciliatis glabris. *Leptospermum crassipes* *Lehm.* in *Ind. Sem. hort. Hamb.* a. 1842.

In solo turfoso in fruticetis densis planitieci haud longe a vico Albany (Plantagenet), Octobri a. 1840. *Herb. Preiss. No. 155.* Ferd. Bauer!

Fruticulus palmaris, valde singularis, micromerus. *Folia* sesquilineam longa, arrecta. *Flores* exigui, basi foliis ramulorum, quibus insident, obvallati; *hypanthium* linea vix longior; *phylla* roseo-fucata; *petala* hypanthium longitudine aequantia, orbiculata, in unguem breviter attenuata, pallide rosea, paucipunctata.

2. **Pericalymma ellipticum** *Endl.* ramulis subdichotomis submarginatis foliisque adultis glabris; foliis alternis,

7 Fabridia conica Burm.
~~F. laevigata Gaertn.~~
fruticosa, erecta, foliis cori-
aceis lanceolatis, plus minus
spathuliformibus apiculo vi-
arumine aculeo terminatis
in petiolum brevem latum
angustatis tenuissimis 3 raro
3 nerviis et venosis dense
punctatis glaberrimis, flori-
bus solitariis axillaribus
lateralibusque, calycis
campanulati glabri denti-
bus triangularibus ciliatis
putancis carnis, capsula
4-7 loculata, seminibus
alatis et apteris.

In fruticulis locorum arida-
forum Murray forat rufus
pluvii Optum. Ad ped. montium
marit. radices.
Frutex 4-5' ramifus glaber.
Lilaminata et petala alba
Antherae fulvae. Semina
spadicea alia angustiora
ceptris, alia explanata
alio sumbranaeas paccide
fusetis crispata. Dentata
rimata.

* Leptoppermum grandifolium, Sm

²⁸³
L. fericeum, hb. Stearns (Nec Laps)
Ad flumen South Esk river
commune. L. grandifolium Don!
Det. non Loderger?

! P. complanatum Fendler in hb. St. 322
foliis brevioribus, prostrata, ^{robusta}
desuperatissima, ramis plus patentibus
brevibus, in montib. 3-4000' altis
L. pulcherrimo Lammark. ^{varietas longinatali novissima!}
Jan.

L. grandifolium Sm. { New-
Norfolk!
! P. minores Fendler in
hb. St. II, 304.

In planis paludosis Ter-
manien.

Vix nisi omnibus partibus
duplo minoribus foliis supra
minus nitentibus ab pilos
brevissimis longius remanentibus ab
evidente distare videtur.

* Frustr. 8-10'
Anthesis: Jan.

* Specimina intermedia
in nostra collectione occurrunt.

* Leptoppermum lanigerum, Aiton

In vallibus ad rivulas fratu
riginis, ad rivorum margines
hinc inde, locis semper agrestibus
gregarie!
Varietas Broncolor (Chaen)

Frequenter occurrit.

Fitti calyces longius vel brevius
villosi, folia saepe duplo
angustiora.

Anthesis: aestate.

Sim. pallidum & longius
quam L. pinnatifidum
Popul. interdu in ov-
prop. recumbente.

Cortex sordide griseus pallidius maculatus fibr. albis, fibris
reticularis fore anastomoyantibus, ^{longius} ^{griseis} ^{albis}

L. grandiflorum Lodd? non Don

L. nobile Jussm

L. myrsinifolium Gunn non Sieb.

In clivis scopulosis prope port.
cygnorum. frut 10'. Nov. 49,
hb. St. J. 643.

Leptoppermum flavescens Sm.

In parte australi Tasmantiae
prope Hobart-Town. hb. St. J. 808.

A Smithiano, cuius specimen
^{in Hallandii} Tasmantiae extenuatum com-
paranda, vix discernere quimus
et illud insufficiente descriptione

+ Leptoppermum microcarpum ^{fruitu}

nullo modo a sequente recedat
videtur, quantum ex exemplis

foliis fructiferis extrahendum, quam
fructu toto cum feminibus
duplo minore paululum crassius
et magis compresso; sed hucusque
talis varietates in hoc genere
hanc observatae sunt itaque
inferius meam plantam ut novam
retineo adpone.

Numerosissime in Melaleuca squarrosa in foliis
interlobatis viximus Rivoli Baup. fr. 4 (5)

+ Leptoppermum ^{montanum} fasciculatum Sm.

Ad fontis et rivulas

~~non rarum~~
hanc rarum.

Frut 3-6', folia sicca
apice canaliculata - cuneata
(hanc plana Walpers)

Sutulis Tas-jan.

Australis filix, hb. St. 729.

Sp. cult.

Labriaria laevigata Gärtn.
Hb. St. n. 138. sine notat de loco
natali

x Leptospermum proparium ^{Boott}
 & Adfluvium Mersey-river Ta-
 smaniae. hb. N. n. 826.
 Satis in phrasibus Donii & Schauer
 (apud Walp.) quadrat.

Truck 8-10' Kobark-towa. 10. 11.
Anthr. : Jan. 1890.

Agout. river prop. Cypr. bay.
8-8' Nov 49, at St. S. 789.

L. microphyllum Jord. Mill.

Salicornia a *L. parvifolia*

San ex bovii hujus designati
in don gen. syst. novit foliis
(^{with} ~~evolutis~~) 3-5 nervis. An var?

α viridis, foliis oppositis glabris
lanceolatisque cum macula p. corripa
inflatus interioribus udis versus finem
Rivoli-way. Oct. 1848. 5-61.

myrsinoides Schlechtendal

L. parvifolia Linn. *Sinu Encampsa* Hay.
in *Plantarum* *tenus.*

In destructione montis Sartori

Apr. 1848. Specimina fructifera.

In montibus Lapy - Bayle & Parroja-range, in fruticulis
raltum ad rivulum Valls rursus
ad montem Shunk alibi

L. ericocalyx Viehm. Jan. 1848 f. p. p.

In stratu montium Loftj-range.

D. L. Marsi 1848. *Guerra, pacifica.*

Pl. H. 140. Ab. J. 21. Mount Gairdie!
Rangaroo-island.

Capsula 4-5 loculata

Smith's Oct. Nov.

obovatis obovato-oblongis subellipticisve, basi angustata sessilibus, concavis, obscure trinerviis, acumine brevi complicato mucronato muticove; hypanthio turbinato, tenuiter sericeo; phyllis calycis cutaneis, ovatis, obtusis, ciliatis, bracteolisque scariosis glabris vel glabrescentibus. Endl. Enum. pl. Hügel. pag. 51. n. 167.

In solo limoso ad ripam fl. Vasse-River, Decembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 132; in depressis turfosis hieme inundatis silvae haud procul ab oppido Perth, Septembri 1839 fructiferum No. 157. King George's Sound Hügel!

„Frutex 5-pedalis, erectus“. *Folia* turionum magna, semipollice saepe majora, conspicue trinervia, plerumque vero duplo triplove minora nervis obsoletis, novella pilosa, adulta glaberrima nitidula. *Flores* conspicui, foliis approximatis diminutis cincti, squamis 3-5 scariosis obovatis concavis fuscis pellucidis punctatis hypanthium velantibus involucriati. *Hypanthium* linea paullo brevius, *calyci* longitudine fere aequale. Hujus *phylla* lata, triangulari-ovata, basi trinervia, colorata, dense ciliata, post anthesin adscendentia, dein perfecte emarcida inflexa, denique fatiscentia. *Petala* sesquilinearia, dorso puberula, pallide rosea. *Hypanthium* fructiferum cylindricum, 2 lin. longum.

3. **Pericalymma floridum** Schauer. dichotome ramosum, ramulis tenuibus submarginatis foliisque adultis glabris; foliis alternis, aversis, oblongo-lanceolatis oblongisve, basi angustata sessilibus, inflexis; acumine complicato submucronato reverso; hypanthio obconico-cylindrico, calycisque phyllis bracteolisque sericeo-villosis.

In humidis silvae trans fl. Cygnorum haud procul a vico Guildford, Aug. a. 1839; Herb. Preiss. No. 131. J. Drummond!

„Frutex 7-pedalis“, habitu priori persimilis. *Folia* 2-5 lin. longa, laete virentia, remotiuscula, subfloralia magis congesta. *Flores* petalis dorso glabris, albis v. pallide roseis, ampliusculis speciosi. *Bracteolae*, *hypanthium* et *calyx* praeter indumentum insigne iis praecedentis speciei similes.

LEPTOSPERMUM Forst. Endl. gen. n. 6309.

1. **Leptospermum sericeum** Labill. foliis obovatis mucronatis 3-5 nerviis utrinque sericeis, calycibus totis sericeis, dentibus coriaceis subacutis persistentibus! Schauer, Linnaea XV. 4. pag. 412. Labill. Nov. Holl. II. pag. 9. tab. 147.

In planitie arenosa aboriginibus Quangen dicta (prov. Victoriae), Martio 1840, sine flor. Herb. Preiss. No. 135. (v. v. c.)

„Frutex 5-pedalis“. A Billardiero certo certius in Terra Van-Leuwin, nec in insula Van-Diemen lectum.

2. **Leptospermum erubescens** Schauer. patenti-ramosum; ramulis sericeo-subvillosis; foliis alternis, obovato-oblongis, in petiolum brevem contractis, obtusis retusisve cum acumine brevissimo complicato reverso, inflexis, trinerviis, glaucescentibus, sericeo-pubescentibus, denique glabrescentibus; floribus terminalibus, solitariis, bracteatis; hypanthio campanulato-turbinato, sericeo; calycis phyllis cutaneis, triangularibus, obtusiusculis, marcescentibus.

In glareosis sublimosis sterilibus silvae cis fl. Gordon-River (Hay), Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 133; in glareosis silvae haud longe a fonte St. Rozen's-well (York), Aprili sine flor: Herb. Preiss. No. 134. Vasse-River: Mrs. Molloy!

„Frutex 5-pedalis, procumbens“, ramulis paucifoliis gracilibus flexuosis. *Folia* $2\frac{1}{2}$ -5 lin. longa, subpellucide punctata. *Bractae* pellucido-membranaceae, fuscae, glaberrimae, caducae, alabastrum obvelantes. *Hypanthium* 2 lin. longum. *Calyx* rubescens. *Petala* calycem duplo excedentia, unguiculata, candida v. erubescens. *Fructus* depresso-globosus; *capsula* hypanthio cupulaeformi basi insidens, vertice emersa, 5-locularis, loculis polyspermis.

Subtribus III. Callistemoneae. Folia opposita vel alterna. Stamina indefinita, exserta, libera. Schauer, dissert. .... grat. pag. 5.

CALLISTEMON R.Br. Bot. Reg. n. 393.
DC. Prodr. III. 223. Callistemon a Eucallistemon Endl. gen. n. 6302.

Flores laterales, spicam innovatione axis comosam struentes, bracteis squamaceis singuli singula subtensi, gemmam floriferam imbricatim perulantibus, prae anthesi deciduis; bracteolae nullae. *Hypanthium* herbaceum, basi carnosa axi adnatum, campanulatum, ultra dimidium germi adnatum, fance brevi. *Calycis phylla* 5, hypanthio continua, rotundata, tota vel apice scariosa, basi imbricata. *Petala* 5, margini hypanthii annuliformi inserta, phyllis calycis alterna, subherbacea vel membranacea, suborbicularia, concava, subsessilia. *Stamina* plurima, cum petalis inserta, decidua; filamenta filiformia, longissime exserta, libera, recta; anthera citra basin dorso inserta, incumbens, bilocularis, loculis rima longitudinali dehiscens. *Germen* hypanthio innatum, vertice breviter emerso villosa, triloculare; gemmulae numerosae, in spermophoro oblongo bipartito angulo centrali affixo obliquae. *Stylus* filiformis, rectus, stamina subacquans, marcescens; stigma truncate, subcapitatum. *Fructus* hypanthiis valde incrassatis induratisque aliquandiu calyce aucto coronatis confertissimi, mutua pressione basi angulati, demum ramulo immersi; capsula cartilaginea, arcute adnata, vertice loculicide dehiscens, semina per orificium hypanthii sero emittens; semina numerosa, tenuia, linearia v. clavata, angulata, aptera. *Folia* alterna, verticalia, lata vel elongata.

1. **Callistemon speciosus R.Br.** foliis lanceolatis mucronatis planis, nervo medio prominulo penninervio laterali-bus margini approximatis, calycibus glabris DC. Prodr. III. pag. 224. n. 12.

β **glaucus.** foliis glaucis DC. l. c.

Metrosideros glauca Bonpl. Nov. 1. pag. 86. tab. 34.

In turfoso-arenosis madidis ad Stirling's Terrace prope vicum Albany, Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 351.

„Frutex octopedalis“.

2. **Callistemon phoeniceus** Lindl. foliis lineari-lanceolatis coriaceis mucronatis basi angustatis marginatis aveniis costa obsoleta, calycibus glabris. Lindl. Swan-Riv. Bot. pag. X. n. 32.

In Australiae meridionali-occidentalis regionibus interioribus. Herb. Preiss. No. 352; in locis paludosis silvae ad fl. Canning m. Oct. 1839. No. 353. J. Drummond!

„Aboriginibus Tubādā.“

KUNZEA Rchb. Consp. Regni veget. (1828) pag. 175

Flores racemosi, spicati vel capitati, singuli bractea bracteolisque geminis oppositis stipati, sessiles v. pedicellati. *Hypanthium* campanulatum vel obconico-tubulosum, tubo inferius germi adnato ibidemque angulato, superius libero et in faucem ampliato. *Calycis phylla* 5, hypanthio continua, herbacea, plerumque acuta, sinibus interstincta, persistentia. *Petala* 5, margini hypanthii annuliformi pone sinus calycis inserta, colorata, suborbicularia, vix unguiculata. *Stamina* plurima, cum petalis inserta, decidua filamenta filiformia magis minusve exserta, libera; anthera citra basin dorso inserta, incumbens, bilocularis, loculis rima longitudinali dehiscens. *Germen* fundo hypanthii innatum, vertice planiusculum, 3-5-loculare; gemmulae plurimae, in spermophoro oblongo angulo centrali prope apicem affixo obliquae. *Stylus* filiformis vel teres, rectus; stamina subaequans, marcescens; stigma subpeltato-capitatum. *Fructus*: Hypanthium emarcidum (nec lignescens neque incrassatum) pergamentaceum, calycis phyllis coronatum capsulam fovens; haec adnata, apice loculicide dehiscens; semina plurima, aptera. *Folia* alterna parva.

Genus insigne a *Callistemone* et *Metrosidero* (*Agalmantho* Endl.) cum habitu tum characteribus omnino distinctum *).

*) 1. Floribus spicatis.

K. Baxteri Schauer: foliis confertissimis, patentibus, coriaceis, planis, lineari-cuneatis, acutis, uninerviis, glabris, margine villosulo; floribus sessilibus, infraapicalibus, spicatis; bracteis bracteolisque fugacibus, lineari-navicularibus, scariosis margine lanuginosis; hypanthio campanulato, colorato, pubescente; calycis phyllis foliaceis, lanceolatis, acutis; germine 5-loculari. *Calothamnus Baxteri* et *C. spathulata* Hort. Angl. *Pentagonaster Baxteri* Klotzsch in Otto et Dietr. Allg. Gartenztg. IV. pag. 113! *Callistemon microstachyum* Lindl. Bot. Reg. New-Ser. XI. I. 7. In Nova Hollandia (australi?). Ferd. Bauer! (v. v. c.) *Petala* tenuiter ciliata, calyce duplo breviora, cum filamentis 8-9 lin. longis styloque punicea. *Germen* suturis argenteo-sericeis in vertice stella 5-radiata insignitum.

* *Corolla et filamentis lilacinis (antheris luteis).*

1. **Kunzea pauciflora** Schauer. glabra; foliis confertissimis, imbricatis, semitereti-acerosis, obtusis, laevibus; floribus subapicalibus, singulis paucisve subcapitatis; bractea bracteolisque scariosis, ovatis, acuminatis, carinatis; illa hypanthio obconico breviori; germine 5-loculari.

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 259.

Fruticulus ramis ramulisque confertissimis subfastigiatis tortuosus, his superne foliosis. *Folia* 2-4 lin. longa, angustissima. *Flores* subsessiles, foliis obvallati. *Hypanthium* calyci aequale, 2 lin. longum. *Calycis phylla* a basi ovata acuminata, subherbacea, membranaceo-marginata, involuta: sinus truncati. *Petala* oblonga, calycem aequantia, lilacina.

2. Floribus axillari-v. subapicali-racemosis.

K. corifolia Rchb. l. c. glabriuscula v. puberula; ramulosa; foliis confertissimis, patentibus reflexisve, subobliquis, lineari-lanceolatis, enerviis, apice cartilagineo acuto recurvo; floribus vel axillari-vel subapicali-racemosis; bracteolis patentibus foliaceis persistentibus, vel squamaceis caducis; hypanthio obconico-campanulato; calycis phyllis lanceolatis; germine 3-loculari. *Metrosideros corifolia* Vent. Malm. t. 46! *Leptospermum ambiguum* Sm. exot. Bot. t. 59! *Stenospermum corifolium* Sweet. Hab. in Nova-Hollandia orientali: Sieber N. Holl. exs. n. 321! Ferd. Bauer! Hügel! (v. v. c.) Corolla alba.

3. Floribus capitatis.

K. praestans Schauer. glabra, foliis confertissimis, subrectis, coriaceis, cuneatis, brevissime apiculatis, subnerviis, apice recurvis, margine scabris; capitulis apicalibus, globosis, multifloris; bractea obovata bracteolisque anguste lauceolatis scariosis, acutis, carina margineque sublanuginoso, hypanthio campanulato fere duplo brevioribus; germine 5-loculari. Hab. in Nova-Hollandia occidentali ad fl. Cygnorum: J. Drummond!; ad fl. Vasse-River: Mrs. Molloy! Frutex bipedalis, ramis virgatis subrectis. *Folia* 3 lin. circiter longa, nunc latiora nunc angustiora, viridia, nitidula, nervo medio valde obscuro. *Rhachis* capituli pubescens. *Hypanthium* ampliusculum, glabrum. *Calycis phylla* ovata, acutiuscula; sinus truncati. *Petala* calyce plus duplo longiora, patentia, in disco punctata, cum filamentis breviter exsertis roseo-lilacina. **K. Schaueri** Lehm. Msc. innovationibus villosulis; foliis confertissimis, patulis, coriaceis, obovato-oblongis cuneatisve, breviter apiculatis, 5-nerviis, denique glabratiss, margine scabris; capitulis apicalibus, globosis, multifloris; bractea obovata, acuminata, bracteolisque lanceolatis angustissimis scariosis, cum hypanthio obconico calyceque sericeo-villosis hypanthio triente brevioribus, germine 3-loculari. *Metrosideros capitata* Sm. Act. Soc. Linn. III. pag. 273. n. 13. *Callistemon capitatum* Rchb. hort. bot. I. pag. 59. tab. 81! *Melaleuca eriocephala* Sieb. N. Holl. exs. n. 322! *Stenospermum capitatum* Sweet. Hab. in Nova-Hollandia orientali: Ferd. Bauer! Sieber! Hügel! **K. parvifolia** Schauer. ramulis tenuibus confertis folisque pubescentibus; foliis parvis confertissimis, subimbricatis, recurvopatulis, lineari-oblongis, brevipetiolatis, obtusis, subtus punctatis, denique glabratiss; capitulis apicalibus, plurifloris, densis bractea bracteolisque scariosis, ovatis, acutis, sericeo-pubescentibus, hypanthio campanulato glabriusculo duplo brevioribus; calycis phyllis subrotundo-ovatis, acuminatis, germine 3-loculari. In Novae-Hollandiae orientalis prov. Argyle leg. Hügel! Frutex ramis tortuosis cortice lacinoso indutis, ramulis brevibus confertissimis, saepe fasciculatis, intricatis, tenuibus, rigidulis, terminalibus virgatis floriferis. *Folia* lineae vix longiora, subtus convexa vel subcarinata. *Capitula* 6-8-flora. *Hypanthium* sublanuginosum, mox glabratum. *Calycis phylla* basi contigua. *Petala* orbicularia, subsessilia, calyce paullo excedentia, cum filamentis duplo longioribus persicina.

foliis obsoletis parvis et paucis tenuissimis, etiam in his glabris

Frunzea pomifera Fendler.

in varietates duas segregari:

1 cordifolia Fendler.

Holzapf Bay in sylvis, Simpson &
near Galena - Iowa.

2 ovalifolia Fendler.

Simpson, Angaston in arena,
Sturt-river, Rivoli Bay

Fruticulosae, paucissime fruticulosae
ramis intensius coloratis elongatis
prostratis. Petala et filamenta
alba stylus rubellus. Fructus
fere faccharo conditus saporum
juvendum Native apple ab
incolis appellatur.

Authenticum vix

Frunzea pelagica Fendler.

An fane a *F. cordifolia* R. & B.
discriminanda? quae (ramis)
vix e cognoscitur (haberi amplius)
ad descriptionem *obcordata* addit
Shorea Island, East coast of N. S. Land.

* *F. pomifera* *obcordata* Fendler. lib. St. 787.

prostratis
ramificationibus (villosis) puberulis, foliis
exemplis junioribus ovatis *obcordata*
junioribus ovatis *obcordata* *obcordata* *obcordata*
venosa *obcordata* *obcordata* *obcordata*
dis patulis coriaceis ciliolatis glabris
floribus agglomeratis *obcordata*
intra annuatis bractea cava februnda
globosa *obcordata*, lobulo uno altero
obcordato

Tota *F. Schaueri* L. b. quae *Frunz*
nomen *Schaueri* non affert
in rutilis arboribus e. g. inum ma-
rimum *Holzapf Bay*, specim. florae
for 10. 1848. spec. fructif. lib. Jöiss. 30.
lib. St. 137.

Ramus ramissimus foliosus, pauciflorus
foliis leucop. rotundifol. cum lenticulis.

Petala & stamina longe exserta - pallida.

Eucalyptus Walter.

Sect. 3. Diploclyptra Forster
huc una cum E. maculata
Hooker; E. largiflorus Forster
Cynula duplici, interiori co-
rollam mentiente cutaneo

Sect. 1. Alumnifoliae.

Eucalyptus Quartiana Forster.

Forst. Eadiu est ac E. Campy-
carpa nob. (E. angulosa
Schaer?)

E. Gunnii plus quam E.
viminali cognata,
Frutex 8-10'. In floris repe-
ribus adport. regnum.
Nov. 1849. hb. N. S. 667.

Eucalyptus Silvicultrix Forster.

Euc. acorata eximia acumulat foliis
floribus argy
Arbor (forte memorifica) 60-80'
"White gum" Tasmanicorum. In
Silva prope Perth adfl. South
Est. hb. N. S. 763. Dec. 1849.

2. **Kunzea micrantha** Schauer. glabra; foliis confertissimis, imbricatis, coriaceis, cuneatis, superne cartilagineo-marginatis, acutis, subuninerviis; capitulis apicalibus, globosis, multifloris; bractea obovata, acuta, bracteolisque angustis spathulatis scaphiformibus, dorso infero sublanuginosis, hypanthium basi compressum aequantibus; germine 3-loculari, loculo uno alterove sterili.

In arenosis limosis ad vicum Guildford, Octobri 1839 alabastris adultis. Herb. Preiss. No. 277.

Frutex pedalis, graciliter ramosus. *Folia* 2-2½ lineas longa, plana, viridia, nitida. *Capitula* pisi majoris mole. *Hypanthium* adscendens, basi quatenus germine repletur irregulariter compressum, quo fit ut loculum unum alterumve tabescat. *Calycis phylla* ovata, incurva, acutiuscula; sinus truncati.

3. **Kunzea Preissiana** Schauer. foliis confertissimis, subimbricatis, lineari-lanceolatis, obtusis, uninerviis, villosis, demum glabrescentibus; capitulis apicalibus, paucifloris; bractea subrotunda ovatave, acuminata, bracteolisque linearibus scariosis, hypanthio campanulato-turbinato subaequalibus et cum eo sericeis; calycis phyllis ovatis, obtusissimis; germine 5-loculari.

In plagis interioribus Australiae meridionali-occidentali, Octobri 1840. Herb. Preiss. No. 276.

Frutex ex nostro specimine dodrantalis, pluricaulis, ramis virgatis, ramulis lateralibus brevibus densifoliis. *Folia* 2-2½ lin. longa, subcanaliculata, leviter carinata, brevipetiolata, adulta glabrata nitida. *Petala* calycem duplo excedentia, persicina.

4. **Kunzea villiceptis** Schauer. foliis confertissimis, patulis, subimbricatis, obverse lanceolatis oblongisve, obtusis, mucronatis, cano-villosis; capitulis apicalibus, densis plurifloris, saepe congestis; bractea subrotunda ovatave, acuminata, bracteolisque lanceolatis scariosis, hypanthio obconico tricente brevioribus et cum eo villosissimis; calycis phyllis ovatis acutis; germine 5-loculari.

In planitie arenaosa inter frutices cis fl. Gordon, Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 275.

„Frutex tripedalis“, villo denso undique incanus. *Folia* 2-3 lineas longa, in petiolum brevissimum latiusculum abeuntia. *Capitula* pisi majoris magnitudine, ramulis floriferis brevissimis in apicibus ramorum congestis saepe composita. *Flores* breviter pedicellati. *Petala* calycem duplo superantia, lilacina.

5. **Kunzea recurva** Schauer. innovationibus pubescentibus; foliis confertis, coriaceis, obovato-subrotundis, uninerviis, breviter apiculatis, adultis glabris recurvis; capitulis apicalibus, ovalibus, multifloris; bractea obovato-subrotunda, subacuminata, praeter basin glabra, bracteolisque cuneatis dorso lanatis scariosis, hypanthium campanulato-tubulosum sublanuginosum fere aequantibus; germine 5-loculari.

In calciosis ad radices montium Darling's-range, Octobri 1839. Herb. Preiss. No. 290. J. Drummond!

Frutex 4-5-pedalis, gracilis, ramis virgatis dense foliosis. *Folia* magnitudine varia, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ lin. lata, viridia, nitida, laevia, perforato-punctata. Axis capituli villosus. *Flores* sessiles. *Hypanthium* primum lanuginosum, dein subglabratum. *Calycis* phylla ovata, acuta, marginata; sinus perangusti. *Petala* calycem aequantia, patentia, cum filamentis duplo longioribus lilacina.

** *Corolla et staminibus flavis.*

6. **K. propinqua** Schauer. innovationibus lanuginoso-villosis; foliis confertis, patulis, lineari-lanceolatis, basi attenuata sessilibus, acutiusculis, muticis, denique glabrescentibus; capitulis apicalibus, globosis, multifloris; bractea bracteolisque subrotundis, scariosis, praeter basin glabris, hypanthio fere duplo brevioribus; germine 5-loculari.

Metrosideros propinqua Endl. En. pl. Hügel pag. 50. n. 160!

In arenosis silvae supra vicum Perth, Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 271. Ad Sinum Regis Georgii: Hügel!

„Frutex 8-16-pedalis“, ramis gracilibus patentibus. *Folia* 2-6 lineas longa, angusta, firma, demum glabrata nitida. *Capitula* cerasi minoris mole, 12-20-flora; axis dense villosus. *Bracteolae* concavae, subcarinatae, obtuse acuminatae, sessiles, flavae; bractea bracteolis paullulo major et firmior, ciliolata. *Hypanthium* cum calyce 2 lin. longum, villo raro caduco adpersum; hujus phylla triangularia, sinus acutanguli. *Petala* orbicularia, erecta, cum staminibus sesquilinearibus flava.

7. **Kunzea vestita** Schauer. lanuginoso-villosa; foliis confertissimis, patentibus, lineari-subulatis subtrigonisve, basi attenuata sessilibus, acutiusculis, muticis, denique glabrescentibus; capitulis apicalibus, globosis, multifloris; bractea obovata, acuminata, concava, bracteolisque cuneatis angustissimis scariosis, sericeo villosis, calycem glabrum subaequantibus; germine 5-loculari.

In turfosis hieme inundatis inter frutices densos prope praedium b. Spencer ad Sinum Regis Georgii, Septembri 1840. Herb. Preiss. No. 272.

Frutex 8-pedalis, ramis laxis dense ramulosis. *Folia* crassiuscula, subtus convexa vel subcarinata, 2 lineas circiter longa, plurifariam patentia, saepe recurva. *Capitula* cerasi magnitudine, rhachi villosa. *Flores* circiter 20, sessiles, bracteis magnis villosis fere obtecti. *Hypanthium* cum calyce 2 lin. longum, glabrum, nitidum, glanduloso-punctatum. *Calycis* phylla latiuscula, triangularia, acuta; sinus obtusanguli. *Petala* orbicularia, erecta, cum staminibus iis duplo longioribus pulcherrime flava. — Habitu praecedenti accedens, sed facilis distinctu.

SYMPHYOMYRTUS Schauer.

Flores complures hypanthiis totis arcissime conferruminatis in capitulum globosum, pedunculatum coadunati. *Calyx* operculum clausum, corniforme, sub anthesi circumscisse deciduum exhibens. *Corolla* nulla. *Stamina* plurima, margini interiori

Eucalyptus socialis. Jern. Mcc.
E. variaria Behr (sed verbum
purpureum vix usuale)
fruticosa, ramulis compresso-nervi-
culatis, foliis glaucis coriaceis lan-
ceolatis simplicibus in acumen unci-
natum angustatis subtiliter
venosis punctatisque, pedunculis
lateralibus vel axillaribus 3-
6 floris compressis pedicellis hy-
panthio brevioribus, brevioribus
seco aequilongis, operculato.
Punglobosum sessile in cymis
corymbis conicum attenuato
hypanthio paullo latiore &
duplo seu longiore!
Cappulaeum valvae fimbriatae
ex hypanthio denique truncato-
globoso emergunt.
In flua dimioret prope Gaur
town. Nov. 48. Trans ultra
salt. creek plagas siccissimas
tegit, puberula strab
dura ex parte formet. Ab. 1000.
var. alabastris (maioribus & minoribus)
pedicellis longioribus v. brevioribus
non nam pectis duplo angustioribus
forma latifolia = E. laurifolia Behr
herb. nov. Flors attenuari pot. inodori
Folia nuda coriacea apice imbricata
pinnatim. Hypanthium flavescens.
Fructificationem Jern. Mcc. Auth. Septor.

Eucalyptus Globulus La Brelare
 Tasmanniae!
 Arbor ingens! Hb. St. J. n. 442.

Opprobrium coroniforme cum
 hypanthio mucinoso. Foliorum
 latitudo & petiolorum longitudo
 saepe sequipallicaris! — Blue-gum tree
 an hinc? usque ad 100' alt. 1. Talammodo in parte
 australi insulae T. & E. arbor. Dec. 1848. q. Inat nullo
 prope primum foliorum adulescentium, quae supra 1' longa & 3/4" ad 3/8"
 lata & vix pilis, asperitas multae, pubescentia sunt. ^{hinc, folio}
 modo & in adultibus foliis 5 q. 2 p. ^{negligens} ^{diversum}
 E. amygdalina, La Brelare.

1851 X ^{15-20'} ^{costis laminae} ^{rigida} ^{hinc} ^{St. J.}
 Torsum ^{perfractum} Tasmanniae, 1850
 Fructus
 maturus, glaucis loris arboris Nov. 24. 1848. des. Stuart
 fur hinc
 pharicis, Hb. St. J. n. 77. Pappumint-gum-tree, colo-
 niperis novum Tasm. — Folia usque ad 1/2 "lt. & 4" lg.
 granis ^{Arbor 50-60'} ^{Stiam} ^{judicanti} ^{longiora} ^{quam} ^{St.}
 major ⁱⁿ ^{St. J.} ^{fol.} ⁸⁶ ^{affin.}
 E. ^{Demasa} ^{St. J.} ^{fol.} ⁸⁶ ^{affin.}
 frater hinc, albus. Fructus ^{hinc} ^{St. J.} ^{fol.} ⁸⁶ ^{affin.}

+ E. costata Radmell & Schr. Schr. 1849
 pubescentia ramulis angulatis firmis
 foliis ^{adultis} ^{coriaceis} ^{viscidis} ^{lanceolatis}
 profunde basi inaequaliter in petio-
 lum angustatis apice longe
 a truncatis ^{ramulis} ^{novis}, ram-
 ullis axillaribus 3-6 floris, pedun-
 culo angulato compresso petiolum
 aequante, ^{ramulis} ^{angulatis} ^{hy-}
 panthio ^{costato} ^{cyathiformi} ^{ramulis}
 brevioribus, ^{apice} ^{longe} ^{superioribus} ^{novis} ^{ramulis}
 fructu compresso-hemisphaerico ro-
 stro obtusiusculo apiculato in-
 panthio duplo breviori

fr 15' fol. usq. 4" lg 1" lt; hyp. 6" lg 4" lt
 Sand-orch prop. Ingas town.
 Jan. 1849. leg. v. Dr Schr. Mica
 quinnia amabilis partibus parv majora
 & foliis glauculis oleosi viree praesentat
 punctatis legit in Goleway v. Wilhelmi
 variat fol. punctatis legit in Goleway v. Wilhelmi
 variat fol. punctatis legit in Goleway v. Wilhelmi

Vix allior
 foliola E. angulosa V. charn. ^{quidam} ^{descriptum}
 theor quam
 E. gracilis ^{fructuosa} ^{in modum} ^{E. avorati}
 in murra ^{fructuosa} ^{in modum} ^{E. avorati}
 Schr. ^{fructuosa} ^{in modum} ^{E. avorati}
 Maist. Hb. Schr. ^{fructuosa} ^{in modum} ^{E. avorati}
 ultra ^{fructuosa} ^{in modum} ^{E. avorati}
 foliola ^{fructuosa} ^{in modum} ^{E. avorati}
 Luffe E. lampocarpa! ^{fructuosa} ^{in modum} ^{E. avorati}
 Luffe E. lampocarpa! ^{fructuosa} ^{in modum} ^{E. avorati}

Mammium capisubella.

hypanthii truncati inserta; filamenta filiformia, elongata; anthera infra medium dorsi inserta, incumbens, linearis, bilocularis, loculis rima longitudinali dehiscentibus. *Germen* inferne hypanthio adnatum, vertice subpyramidali angulato in stylum abeunte terminatum triloculare; *gemmulae* plurimae, spermophoro bicostato angulo centrali affixo insertae. *Stylus* angulatus, rectus, stamina subaequans, deciduus; stigma obtusum. *Fructus* syncarpium lignosum, globosum, apicibus capsularum conicis exsertis quasi armatum, struentes. *Capsula* semisupera, apice libero loculicide-trivalvi; valvae lignescentes conniventes vel apice cohaerentes, rimis interjectis hiantibus; locula arcta polysperma; semina ~~cuneata~~.

Planta habitu et ipso flore *Eucalypto* simillima, sed propter inflorescentiam sui generis. Ad *Eucalyptum* eodem, quo *Syncarpia* ad *Metrosiderum*, modo se habet.

1. ***Symphomyrtus Lehmanni*** Schauer, *Eucalyptus* Lehmanni L. Preiss. in Sched. Herb.

In glareosis sterilibus collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840. cum floribus et fructibus maturis lecta. Herb. Preiss. No. 227.

„Frutex 6-8-pedalis“, ramulis teretibus, ex omni parte laevis. *Folia* alterna, elliptica vel oblonga, subinaequilatera, in petiolum contracta, obtusissima, brevissimeque apiculata, pallide viridia; nitida; firma, rigida, imperforata, 2-2½ poll. longa, unum poll. circiter lata. *Pedunculi* ad basin ramulorum annotinorum laterales, sesqui-bipollicares, validi, saepe incrassati, compressi, deflexi, continue in capitulum abeuntes. *Capitulum* globosum, nucis *Juglandis* majoris mole, e floribus 12-14 usque ad limbum hypanthiorum connatis constitutum, prae anthesi operculis coriaceis subuliformibus bipollicaribus porrectis horridum. *Stamina* numerosa, sesquipollicem et quod excedit longa; filamenta quadrangulati-filiformia, sordide alba. *Germen* vertice subpyramidali angulato in stylum tetragonum stamina subaequantem abeuntem emersum, triloculare. *Capsulae* valvae lignosae, triangulares, acuminatae, pluricostatae, nitidae, in conum conniventes vel apice cohaerentes.

EUCALYPTUS Herit. Endl. gen. n. 6300.

* Alternifoliae.

1. ***Eucalyptus cornuta*** Labill. fruticosa; laevis; foliis firmis, alternis, lanceolatis, petiolatis, utrinque acuminatis, nitidis; pedunculis axillaribus lateralibusque, petiolum subaequantibus, teretiuseculis compressisve; capitulis 8-12-floris; hypanthio sessili, cylindrico-cyathiformi; operculo e basi ampliata subuliformi, tereti hypanthio quadruplo-quin-duplo longiori. Labill. Voyage I. pag. 403. tab. 20!

In glareosis sterilibus collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840, florens. Herb. Preiss. No. 238. (v. sp. Billard. in Herb. Willd. n. 9594!)

2. ***Eucalyptus redunca*** Schauer. fruticosa; foliis rigidis, alternis, lanceolatis, inaequilateris, in petiolum atte-

nuatis, acuminatis, utrinque glaucis (costa margineque discoloribus); umbellis lateralibus axillaribusve, 6-12-floris; pedunculo complanato-ancipiti, semipollicari; hypanthio cylindrico; operculo subuliformi-conico, coriaceo, nitido, hypanthio duplo et quod excedit longiori, acumine (saltem in alabastro subadulto) redunco vel cincinato.

In regionibus interioribus inter Sinum Regis Georgii et coloniam York interioribus, Octobri M. cum alabastris subadultis Herb. Preiss. No. 234. Februar. et Martio cum alabastris juvenilibus No. 245 et 247; in glareosis sterilibus collum Konkoberup prom. Cape Riche, Novembri fructifera No. 232.

„Frutex orgyalis“, ramulis angulatis cum petiolo margineque costaque foliorum vitellinis. *Foliorum* lamina 3-4 poll. longa, 6-12 lineas lata. *Hypanthium* (alabastrum cum pedicello ei continuo et aequilongo unciam longi) 3 lin. circiter altitudine metiens. *Operculum* 6-7 lineas longum. *Germen* trilobulare. *Fructus* umbellati, oblongo-clavati, cum pedicello 6-7 lineas longi, superius $2\frac{1}{2}$ lineas crassi, truncati; *capsula* inclusa, valvis erectis os hypanthii attingentibus. ? *apocis mullatis*?

3. **Eucalyptus floribunda** Hügel arbuscula; foliis coriaceis, alternis, lanceolatis, inaequilateris, in petiolum acutatis, longe acuminatis, margine cartilagineo revoluta, facie viridi nitido, dorso glaucescenti v. pallidiori; umbellis axillaribus, 5-12-floris; pedunculo ancipiti, petiolo subaequali; pedicellis angulatis, hypanthio campanulato ore dein dilatato subduplo longioribus; operculo amplo, subcampanulato-conico, hypanthio triente longiori, coriaceo, ruguloso. Endl. Enum. plant. Hügel pag. 49. n. 156!

In arenosis silvae ad fl. Swan-River, Junio exeunte a. 1839, florens Herb. Preiss. No. 251.; in rupestribus subhumidis ad radices montis Baldhead ad Sinum King George's Sound, Octobri a. 1840 florens et fructifera No. 242, in glareosis limosis prope montem Wuljenup, distr. Plantagenet, Septembri M. a. 1840 florens No. 229 et 244. (v. sp. auth. in Herb. Caes. Vindob.)

„Arbor 12-25 pedes alta“, ramulis angulatis gracilibus laxis. *Folia* 3-5 poll. longa. *Operculum* 3 lin. longum, maturum testaceum. „Flores suaveolentes“. *Fructus* nucis moschatae fere mole, subgloboso-oblongus, truncatus; *capsula* hypanthio incrassato lignoso inclusa, trifariam-loculicida, valvis limbum hypanthii tangentibus.

4. **Eucalyptus occidentalis** Endl. fruticosa; laevis; flavo-virens; foliis firmis, alternis, oblongo-lanceolatis lanceolatisve, in petiolum attenuatis, acuminatis, nitidis; umbellis axillaribus, 5-8 floris; pedunculo ancipiti, petiolum aequante vel superante; pedicellis angulatis, hypanthio campanulato late marginato duplo brevioribus; operculo amplo, conico-tereti, medio vix contracto, obtuso, apiculato, coriaceo, hypanthio triente longiori. Endl. Enum. pl. Hügel pag. 49. n. 154!

In glareosis sterilibus collum Wuljenup promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840, deflorata. Herb. Preiss. No. 240; in similibus locis cis fluvium Gordon, distr. Hay, Nov. fructifera No. 228. (v. sp. auth. in Herb. Caes. Vindob.)

Folia 4-6 poll. longa, 6-12 lin. et ultra lata, saepius inaequilatera *Hypanthium* $3\frac{1}{2}$ -4 lin. longum, fauce brevissima, margine post anthesi.

Stamunda luteo-albida, antherae fereae
Agrostidium viridi-luteum. Flos viridi-glaucus
 nitidulus

Eucalyptus haemaphysoma Trin.

hb. St. s. n. & loc. natal.

Eucalyptus intraspicata? LaSillardiere

Quercus maxima, et *Q. diantha*. Fructus vel arborescentes
Lathy. rauge Nov. - *Onkapinga* Set. in
A. Coreo *Hally* mis.

Eucalyptus erythrostemon Fendler

Encounter Bay! 1847. No. 142.

foliis alternis coriaceis inaequali-
teris in petiolum acutatis acuminatis
semicune marginatis, cymula
lobis glaucis, umbellis axillari-
bus 3 floris, pedicellis pedunculatis
que angulatis subcuneatis
hippocanthis obconico-campari-
formi ^{guirga} c. basi ampla in corium
subuliformem attenuata, in flutu
fere rugosa.

E. oneidensis Candolle

~~hb. St. I. n. s. loc. natal. hb. St. 156!~~

E. odorata Vehr & Schlichtkrand.
* (*E. laciniata* Griseb.) var.

Folius ovata lanceolatis pectis.

Frax. E. pilulari quam *E. obtusi-*
folia affinis, ab omnibus reliquis
foliis brevioribus abhorrans.

Ms. A. 149.

{ Port Linslade river, Loris, Dourby bay
E. odorata Behr & Schlechtendal.
var.

x *C. parvifolia* (fruticosa) Box tree moatium
fragmentum, foliis oblique lancea-
tatis perforatis nitidulis ^{arboribus} ^{floribus} ^{perforatis}
glaucis axillaribus ^{et perianthiis} ^{longit.}
et perianthiis hemisphaericis, ^{apertis}
depresso obtuso hemisphaerici obtuso
In monte Kaputzae. Apr. 1848
Folia ^{hujus} vltio acternis sicut *E. odorata*
abundant. Arbor alta cortice
corvide ^{resino} ~~ferro~~ pubescente cinerea

E. odorata Behr & Schlechtendal.
Nyctandra var.

x *C. parvifolia* (fruticosa) ^{a E. parvifolia}
fragmentum foliis oblique lancea-
tatis perforatis venulosis nitidulis
dis ^{hemisphaericis} ^{axillaribus} B.
3 floris, hypanthiis ^{obovatis} ^{apertis}
opaeus huius breviori obtuso de-
presso, conico hemisphaerico
~~et laeviusculis~~ ^{et laeviusculis} ^{et laeviusculis}
fragrantibus x x a *E. parvifolia* ^{et laeviusculis}
diversa. In collibus calcariis prope
Malediam little Swamp portus Linslade. Feb. 5-6

x *E. arbutifolia* Behr & Muellen
fruticosa, foliis alternis
glaucis variis et capi ^{arboribus} ^{et laeviusculis}
mutata sicut in ^{arboribus} ^{et laeviusculis}
in arboribus protractis, pedunculatis
axillaribus & lateralibus petiolatis
duplo brevioribus indivellis 3 pte lon-
gioribus 4-7 floris, hypanthiis
campanulatis perianthiis semi-
globosis breviori acuti longitudine
fruticosa ex magnitudine arboris
mediocri. Rami reconditi afro-
rubri In vine-forest trans
Saults - creek. Jan. 1849
ly. M. Dr. Behr.

incrassato cicatrice lata insignito limbato, basin germinis vertice conico laevique exserti cingente. *Fructus* hypanthium mole paullo auctum et mutatum; *capsula* vertice emerso dentibus 4-5 dehiscens. — Sequenti habitu et flore proxima, operculo et deficiente eo germinis vertice exserto ecostato distincta.

5. **Eucalyptus incrassata** Labill. fruticosa; laevis; viridis; foliis crassiusculis, rigidis, alternis, oblongo-lanceolatis, in petiolum attenuatis, subacuminatis, incrassato-marginatis, nitidis, subtus pallidioribus; umbellis axillaribus, 5-8-floris; pedunculo ancipiti quam petiolo breviori; pedicellis angulatis, crassis, hypanthio campanulato angulato ore producto dilatatoque late marginato duplo brevioribus; operculo e basi depresso-hemisphaerica in apicem obtusum contraeto, crasso, hypanthio subaequilongo. — Labill. Nov. Holl. II. pag. 12. tab. 150!

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840 alabastrigera et fructifera. Herb. Preiss. No. 249. (v. sp. orig. in Herb. Willden. No. 9593!)

„Frutex sesquiorgyalis“, ramulis angulatis rigidulis. *Folia* 3 poll. circiter lata, 9-12 lin. lata. *Hypanthium* 3 lin. altum, tubo subangulato vel plurijugato; fauce producta ampliata post operculi lapsum cicatrice fasciari extrorsa marginata verticem germinis argute 4-costatum ambiente. *Fructus* hypanthium paullo mutatum, 6 lin. longum; *capsula* inclusa, quadrivalvis.

6. **Eucalyptus concolor** Schauer. arbuscula; laevis; tota pallidissime viridis; foliis rigidulis, alternis, oblongo-lanceolatis, in petiolum contractis, acuminatis, nitidulis; capitulis axillaribus, 5-8 floris; pedunculo teretiusculo vel compresso, petiolo breviori; hypanthio sessili, subcampanulato; inferne angulato, fauce brevi ampliata; operculo e basi breviter conica in acumen cornutum contracto, crassiusculum, hypanthio quadrante longius.

In colle calcareo prope coloniam Freemantle, Decembri M. a. 1838 florens. Herb. Preiss. No. 225; in glareosis porrectis regionum interiorum Australiae meridional-occidentalis No. 243, sterilis.

„Arbuscula 8-12 pedalis“. *Folia* 4-5 poll. longa, 1-1½ poll. lata, inaequilatera. *Hypanthium* 3 lin., *operculum* 4 lin. longum. *Germen* vertice conico emersum, 4-loculare. — Proxime affinis *E. capitellatae* Sm., quae, habitu quidem valde similis, differt: operculo conico vix constricto, obtuso, hypanthium longitudine vix aequante.

7. **Eucalyptus decipiens** Endl. fruticosa; laevis; foliis coriaceis, alternis, subrotundis ellipticis oblongis lanceolatisve, in petiolum attenuatis, breviter acuminatis, pallide virentibus, opacis; capitulis axillaribus, 8-12 floris, confertis; pedunculo subtereti; pedicellis hypanthio continuis subnullis vel brevissimis; hypanthio turbinato, fauce brevi; operculo conico, in apicem subcornutum contracto, nitidulo, hypanthio triente circiter longiori. Endl. Enum. pl. Hügel. pag. 49. n. 155!

Variat: *α latifolia*. foliis subrotundis ellipticis oblongisve. *E. decipiens* Endl! l. c. (v. in H. C. Vindb.)

β angustifolia. foliis lanceolatis. Herb. Preiss. sine No.

In glareosis sterilibus collum Wuljenup promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840 florens lecta, Herb. Preiss No. 241.

„Frutex 8-10-pedalis“. *Folia* quoad figuram maximopere variabilia. *Hypanthium* cum pedicello 2-2½ lin. longum, cum operculo fuscum, nitidumque. — Forma latifolia, a nob. L. B. de Hügel lecta, *E. ovatae* Lab. tantopere similis est, ut pro eadem habuerim, nisi operculi forma repugnaret.

8. **Eucalyptus rudis** Endl. arborea; foliis coriaceis, alternis, e basi ovata lanceolatis, longe acuminatis, longe petiolatis, utrinque subglaucescentibus, subopacis; umbellis axillaribus, 4-6 floris; pedunculo semipollicari, teretiusculo vel cum pedicellis hypanthio fere duplo longioribus angulato; hypanthio obconico-cupulacformi; operculo arcto, conico, acutiusculo, hypanthio subaequali v. triciente longiori, firmulo, nitido. — Endl. Enum. pl. Hügel. pag. 49. n. 157!

In arenosis silvae ad fl. Swan-River, Octobri' 1839 florens. Herb. Preiss. No. 252 (v. in H. C. Vindb.)

„Arbor circiter 45 pedes alta“, ramulis gracilibus laxis. *Folia* in nostra 3-5½ poll. longa, petiolo 8-12 lin. aequante. *Hypanthium* 2-2½ lin. altum. *Germen* 4-5-loculare. — Flores in planta Preissiana longius pedicellati paulloque majores quam in Hügeliana, quae foliis majoribus, 6-7 pollices longis, gaudet.

9. **Eucalyptus amygdalina** Lab. arborea; laevis; foliis firmis, alternis, anguste lanceolatis, in petiolum attenuatis, cuspidato-acuminatis, pallidis, nitidis; areolis retis magnis lanceolatis; umbellis axillaribus, 5-8-floris; pedunculo subancipiti, petiolum aequante; pedicellis brevibus; hypanthio obconico-cyathiiformi; operculo subconico-hemisphaerico, obtuso, hypanthio multo breviori. — Lab. Nov. Holl. II. pag. 14. tab. 154?

In solo sublimoso arenoso districti York, Martio M. a. 1840 cum alabastris adultis Herb. Preiss. No. 246, et similibus in locis montis Mathilda distr. York, cum fructibus No. 248. (v. sp. orig. in Herb. Willd. n. 9598!)

„Arbor 45 pedes circiter alta, cortice per strata solubili“ ramulis gracilibus. — Pedicelli in nostra longiores, fructus minores quam in planta Billardierana, quae ceterum omni nota congruere videtur, quantum quidem ex specimenibus satis mancis judicare licet.

10. **Eucalyptus foecunda** Schauer. fruticosa; laevis; foliis coriaceis, alternis, anguste lanceolatis, sensim in petiolum attenuatis; in acumen tenue contractis, viridibus, nitidis; umbellis axillaribus terminalibusque, 5-8-floris, subpaniculatis; pedunculo compresso, petiolum subaequante; pedicellis hypanthio continuis et subaequalibus; hypanthio (fructus) turbinato; operculo . . . . . (fructibus umbellatis 3½ lin. longis truncatis).

In clivulis calcareis haud procul ab colonia Freemantle, Aug. M. 1839 fructifera. Herb. Preiss. No. 231.

„Frutex 5-pedalis“ ramis virgatis. *Folia* cum petiolo 2½ poll. longa, 4-6 lin. lata, sicca tenuiter reticulata, imperforata. *Capsula* 3-rarius 4-lo-

ularis, vertice valvis subulatis paulloque ultra marginem hypanthii exsertis dehiscens. — *E. radiatae* Sieb. affinis.

11. **Eucalyptus hypoleuca** Schauer. arborea; glabra; foliis coriaceis, alternis, ovato-oblongis, basi obliqua breviter in petiolum contractis, acuminatis, subtus glaucis, reticulato-venosis; floribus in pedunculo axillari compresso subancepiti subternis, brevissime pedicellatis; hypanthio...; Opereulo...; (fructu majusculo subgloboso laevissimo, disco elevato capsulam trilocularem inclusam aequante).

In confragosis silvae prope montem Wuljenup distr. Plantagenet, Octobri fructifera. Herb. Preiss. No. 226. Vidi fragmentum.

„Arbor trigintipedalis“, ramis rigidulis. *Folia* 3-4 poll. longa, 16-20 lineas lata. *Fructus* 9 lin. diametro metiens, subglobosus, vertice depresso, e disco elevato formato ore circulari 4 lin. lato pertuso.

12. **Eucalyptus calophylla** Lindl. arborea; laevis; foliis coriaceis, alternis, ovato-lanceolatis oblongisve, inaequilateris, basi in petiolum contractis, acuminatis, vel obtusis cum acumine imposito, tenuiter penninerviis, subtus glaucis; umbellis axillaribus terminalibusque, sub-5-floris, paniculatis; pedunculo ancepiti pedicellisue angulatis elongatis; hypanthio turbinato-hemisphaerico, fauce amplissima; operculo depresso, planiusculo, orbiculari, breviter umbonato, sub anthesi margini hypanthii cardine quasi alligato, reflexo. — Lindl. Bot. Reg. new. Ser. XIV. pl. misc. 157.
- „Ngumbat Autochthonum; Red-Gum colonorum“. *E. calophylla* R.Br. Journ. geogr. Soc. Lond. 1830—31, pag. 19? *E. splachnicarpa* Hook. Bot. Mag. t. 4036! (operculi descriptione vitiosa).

In arenosis silvae circa oppidulum Perth et totius coloniae; floret Januario. Herb. Preiss. No. 250.

„Arbor 35-60 pedes alta“, ramificatione patente. *Folia* subundata, margine incrassato revoluta cincta, supra viridia nitida, subtus glauca deinceps pallidiora, penninervia nervis secundariis parallelis valde approximatis in venam submarginalem anastomosantibus, pellucide punctata, 3-5 pollices longa, citra basin sesquipollicem lata. *Flores* magnitudine speciosi; *alabastra* pyramidalia; *hypanthium* ultra germen vertice planum 3-4-5-loculare in faucem amplissimam coriaceam semigloboso-cupulaeformem productum; *operculum* subtus resinoso-punctatum, vertici alabastris impositum, diametro 3 lineas metiens; *stamina* numerosissima, 5 lin. longa, alba. *Fructus* magnus (2 poll. longus, 15 lin. diametro latus,) liguosus, oblongo-urceolatus, limbo amplo patellaeformi interne laevissimo, ore valde constricto.

*** Oppositifoliae.

13. **Eucalyptus Preissiana** Schauer. fruticosa; ramulis quadrangularibus, rigidis; foliis firmis, oppositis subalternisve, ellipticis oblongis vel subparabolicis, petiolatis, basi rotundatis, obtusissimis, viridibus nitidis; pedunculo axillari

latissimo, alato-ancipiti, petiolum aequante, trifloro; hypanthio brevissime pedicellato, obconico-cyathiformi (9 lin. alto), fauce amplissima diametro oris longitudinem totius hypanthii aequante; operculo . . . .

In lateribus rupestribus collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840 deslorata. Herb. Preiss. No. 239.

„Frutex 8-pedalis“. *Folia* supra lucida, subtus nitida, in sicco utriusque subflavescenti-viridia, pellucide punctata; lamina $3\frac{1}{2}$ poll. longa, $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ poll. lata; petiolus 9 lineas circiter longus, latus, complanatus, tortus. *Hypanthium* magnum, ecostatum, ore extrorsum cicatrice duplici late marginato. „*Stamina* sulphurea“. *Germen* in fundo faucis hypanthii vertice depresso 5-radiato et 5-angulato breviter emersum, 5-loculare. — Species inter omnes tam habitu quam characteribus maxime insignis.

14. **Eucalyptus pleurocarpa** Schauer. fruticosa; undique farinaceo-pulverulenta; ramis alato-tetragonis; foliis firmis, oppositis, petiolatis, obliquis, subrotundis ellipticis ovatisque, basi rotundatis, obtusis retusisve cum acumine brevissimo; petiolo plano, alato-decurrente; floribus ternis in pedunculo axillari semipollicari, cum pedicellis brevissimis alato-ancipiti; hypanthio (fructus) subgloboso, argute 4-costato, capsula paullo longiori; operculo . . . .

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri a. 1840 fructifera. Herb. Preiss. No. 253.

„Frutex 15-pedalis“, ramis rigidis. *Folia* 2-4 poll. longa, inferius $1\frac{1}{2}$ -2 poll. lata, margine valde incrassato limbata, pulvere deterso punctis crebris perforata. *Fructus* nucis *Avellanae* magnitudine, alis pedicelli in hypanthium excurrentibus costis binis argutis satisque prominentibus nec non binis secundariis prioribus contrariisque minus elevatis quadrijugatis. *Capsula* 4-locularis. *Semina* 2" *g. r. v. v. bialata!*

15. **Eucalyptus macrocarpa** Hook. fruticosa; undique farinaceo-pulverulenta; ramis quadrangularibus; foliis rigidis, oppositis, decussatis, cordato-ellipticis, sessilibus, breviter acuminatis; floribus (maximis) axillaribus, singulis, breviter pedunculatis; hypanthio cyathiformi, marginato, cum operculo hemisphaerico-conico acuminato et triente longiori crassissimo. — Hook Icon. plant. tab. 405—407!

In glareosis sterilibus planitiei „Quangen“ ab autochthonis dicta, prov. Victoriae, Martio M. 1840, alabastris et fructibus onusta. Herb. Preiss. No. 235.

„Frutex octopedalis“, rigidus. *Folia* 4-5 poll. longa, $3\frac{1}{2}$ poll. lata, cartilagineo-marginata, sub pulvere crebripunctata. *Alabastra* subadulta sesquipollicaria. *Fructus* maximus, lignosus; *hypanthium* hemisphaericum, diametro ultra 2 pollices metiens, margine extrorsum declivi cicatrice duplici, ex area operculi et area staminum repetenda, 4 lin. lata insignito praeditum, superatum disco lignoso, 4 lin. alto, denique juxta valvas pericarpium dirupto. *Capsula* 4-locularis, accreta, maturitate nihilominus loculicide dehiscens et ab axi centrali conico, spermophora ferente, secedens. *Semina* numerosa, cuneata, angulata.

Subtribus IV. Phalangideae. Folia opposita vel alterna. Stamina indefinita, exserta, in phalanges petalis oppositas coalita. Schauer, Dissert. gratul. pag. 5.

Sect. 1. MELALEUCEAE. Antherae dorso insertae, incumbentes.

GYMNAGATHIS Schauer, Linnaea XVII. 2. pag. 243.

Flores in capitula axillaria, sessilia, axi non amplius innovante terminalia, pleiantha, collecti, sessiles, singuli bractea bracteolisque geminis consimilibus stellatis basi involuerati. *Hypanthium* cyathiforme, inferne germini adnatum, superne margine interiori pentagono-toruloso praeditum. *Calycis phylla* hypanthio continua, brevina, marcescentia. *Stamina* plurima, in phalanges 5 coalita, torulo fauciali hypanthii ad angulos inter calycis phylla insertas, pinnatifidas, post anthesin deciduas; anthera dorso inserta, incumbens, bilocularis, loculis parallelis rima longitudinali dehiscentibus. *Germen* hypanthio innatum, triloculare; gemmulae in loculo complures, in spermothoro subpeltato, angulo centrali affixo obliquae. *Stylus* filiformis, exsertus; stigma peltato-capitatum. *Hypanthium fructiferum vix incrassatum*, siccum; capsula immersa, vertice loculicide-trivalvis; semina numerosa, cuneata, aptera.

Genus a *Melaleuca* inflorescentiae et hypanthii indole distinctum.

1. *Gymnagathis teretifolia* Schauer. *Melaleuca teretifolia* Endl. Enum. pl. Hügel. pag. 49. n. 153!

In arenosis silvae prope Woodman's-point, Decembri 1838. Herb. Preiss. No. 268; in paludosis inter frutices vix penetrabiles ad Hester's-point, Maio 1841, fructifera. Herb. Preiss. No. 269. — Hügel!

„*Frutex* 3-9-pedalis, erectus, subfastigiatus“, ramulis elongatis rigidulis teretibus cum reliquis partibus omnibus glaberrimis. *Folia* alterna, patentia, tereti-filiformia, rigida saepe subincurva sessilia, apice acuto rectiusculo breviter mucronata, punctata, in nostris speciminibus $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ pollices longa. *Capitula* densa, 8-12-flora. *Bractea et bracteolae* squamaceae, scariosae, late ovatae, obtusiusculae, concavae, illa hypanthium subaequans, hae breviores. *Hypanthium* cum calycè subherbaceum, viride, punctatum, lineam longum. *Petala* calyce duplo longiora, orbiculata, unguiculata, cum staminibus alba. *Phalanges* 9-andrae, pinnatifidae, unguibus corollam subaequantibus. *Fructus* glomerati, hypanthii tubo angulato, limbo patellari.

MELALEUCA L. Endl. Gen. n. 6298.

I. COSMOSTEMON. Flores in capitula, sub florescentia apicalia, confertissima, saepe composita, collati (minores). Hypanthium totum vel basi saltem lanatum, indumento denso lanato axis magis minusve immersum. Calyx membranaceus, cutaneus, v. subherbaceus, marcescens. Phalanges staminum rectae, 3-11-andrae, palmatifidae. Stylus filiformis, plerumque exsertus; stigma punctiforme. — Folia alterna Fructus laeves, ore edentato.

1. *Calycis phylla membranacea v. cutanea enervia.*

* *Floribus lilacinis.*

- 1 **Melaleuca spathulata** Schauer. ramulis brevibus, rigidulis; foliis alternis, coriaceis, obovato-spathulatis, brevissime acuminatis, obtusis, subinflexis, recurvo-patentibus, adultis glabratibus utrinque asperulis; capitulis sphaericis, parvis conglobatis, hypanthio campanulato, sericeo, basi immerso; calycis phyllis rotundatis, membranaceo-marginatis; phalangibus subtriandris, unguibus corollam aequantibus.

In glareosis sterilibus ad latera collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 301.

„Fruticulus pedalis, squarrosus“ *Folia* 3½ lin. longa, superius 2 lin. circiter lata, vix conspicue trinervia. *Capitula* diametro 3 lin. *metientia, multiflora. *Bractee* scariosae. *Flores* inter affines minimi. *Petala* calyce ter fere longiora, erecta, oblonga, concava. *Stamina* 2 lineas longa.

2. **Melaleuca Endlicheriana** Schauer. ramulis strictis, puberulis; foliis confertis, alternis, crassiusculis, cuneatis, apice rotundatis, vix apiculatis, subconcavis; arrectis v. subrecurvo-patulis, adultis glabratibus nitidulis; capitulis sphaericis, conglobatis; hypanthio cyathiformi, basi calyceque villosa; hujus phyllis membranaceis, ovatis obtusis (saepe cohaerentibus); phalangibus 7-andris, unguibus corollam aequantibus.

Metrosideros sororia Endl. En. pl. Hügel. pag. 49. n. 158!

In Australia occidentali. Herb. Preiss. No. 302. Swan-River: Hügel!

Folia 4 lin. circiter longa, citra apicem vix lineam lata, sicca supra uninervia, subtus punctata stomatibusque crebris sub lente speciem asperulam exhibentia; novella lanuginosa. *Capitula* cerasi magnitudine. *Bractee* latae, scariosae, obovatae, in disco striatae. *Petala* cum staminibus 3 lineas longis amoene lilacina; antherae luteae.

E. Labrorum Akl. var.
E. murrae Gard. Mill.

*Specimen fruticosum ab desertis
plenis haud pto determinandum
differt ab E. ~~peruviana~~ ^{peruviana} proxima
foliis fructibusque majoribus
illis - nervis et vasis plus pro-
minutibus porosis, his plu-
rimumque lateralibus pedicel-
latis. Folia decidua frani-
cubam quasi relinquunt.*

Laffy - ranges, Mar. 1848.

Procurrit foliis angustioribus & fru-
ctibus brevibus pedicellatis.
~~Est fruticosum~~ *E. labrorum* varietas. pedicellata

E. gracilis Gard. Mill. msc. 1848.

arbusculata ~~gracilis~~ ramulis re-
tibus apice angulatis, foliis co-
riaceis creberrime ~~fruticatis~~ ^{capillatis} line-
ari-lanceolatis uncinato-acu-
minatis vel apiculatis, umbellis
axillaribus aut lateralibus 3-6 fl.
hypanthio furcato, operculo
depresso hemisphaerico hypan-
thio 3 plo circiter brevioris api-
culato mutuoque ^{ex parte!!}

E. perforata Benth hb. 1849 (non Gard. Mill.
msc 1847!) Semina minuta
Partem fruticetorum extensorum
magnam nonnulla millearia
a fl. Murray rescotaneum
fistula Oct. graminis & fructus
brevi. - Arbusculum vel fru-
tex gracile ^{inj. ex Egypto} 5-8. florifera
Dic. ex hb. Benth. Ramis rubri
Murray probr. - Folia oleo volubili
fracta.

E. amygdalina proxime cognata
differt foliis haud venosis (et patria)
ab *E. ambigua* ^(ex decays) apiculato vix apicu-
lato, petiolis longioribus, umb. plurim-
que 5 floris, ab *E. Cneorifolia* ex decays

floribus brevibus
fruticosis etc.

3. **Melaleuca seriata** Lindl. ramulis brevibus foliisque novellis villosis; foliis confertis, alternis, crassiusculis, lineari-lanceolatis, inferne attenuatis, brevissime acuminatis, arrectis, subrecurvis, subtus biseriatim punctatis, glaucescentibus, adultis glabratibus; capitulis globosis; bracteis subherbaceis; hypanthio cyathiformi, basi lanato; calycis phyllis membranaceis, ovatis, obtusis (saepe cohaerentibus); phalangibus 7-andris, unguibus corollam aequantibus. Lindl. Swan-River, pag. VIII. n. 18!

In arenosis prope viam Perth, Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 299. J. Drummond! (v. s. a. cl. Lindl. comm.)

„Frutex tripedalis“. *Folia* 4 lin. longa, in dorso grosse punctata. *Bractae* cutaneae, latae, subrotundae, subito in basin angustam contractae, concavae, ciliatae, disco viridulo striato, marginibus tenuibus sphacelatis coloratis. *Flores* in capitulo circiter 15. *Stamina* 3 lin. longa, cum petalis subrotundis erectis amoene rosea. — Sequenti valde propinqua, sed foliis angustioribus longioribus, floribus majoribus roseis, bracteisque subherbaceis distincta.

4. **Melaleuca ornata** Schauer. ramulis brevibus foliisque junioribus pilosis; foliis confertis, alternis, crassiusculis, lineari-oblongis, in petiololum brevissimum attenuatis, obtusis vel brevissime acuminatis, arrectis, recurvo-patulis, subtus biseriatim punctatis, laete viridibus, adultis demum glabratibus; capitulis globosis; bracteis scariosis; hypanthio cyathiformi, basi lanato; calycis phyllis membranaceis, ovatis, obtusis (saepe cohaerentibus); phalangibus 7-andris, unguibus corollam aequantibus.

In arenosis inter frutices silvae ad fl. Canning, Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 298.

„Frutex bipedalis“, densirameus, floridus. *Folia* subopaca, 3 lineas circ. longa, laevia, sicca uninervia. *Bractae* obovatae, latae, fuscae, striatae, cito deciduae. *Capitula* subvigintiflora, simplicia. *Petala* oblonga, erecta, cum staminibus $2\frac{1}{2}$ lin. longis vivide lilacina; antherae, ut in reliquis, luteae. *Fructus* solitarii vel pauci arcte conglomerati, pisi minoris mole, hypanthio laevi e basi adnata conico-attenuato orificio dentibus obsoletis repando, capsula profunde immersa. — *M. Endlicherianae* valde similis, sed foliis angustioribus pilis subpersistentibus conspersis statim recognoscenda.

5. **Melaleuca Manglesii** Schauer. ramulis subvirgatis foliisque novellis glabriusculis; foliis confertis, alternis, patulis subimbricatisve, clavato-linearibus, basi attenuata sessilibus, breviter acuminatis; muticis, dorso subconvexis, subrecurvis, glaucescentibus, subtus subbiseriatim-punctatis; capitulis globosis; hypanthio cyathiformi calyceque pubescentibus; hujus phyllis membranaceis rotundatis; phalangibus . . . . .

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, Octobri 1840, deflorata. Herb. Preiss. No. 320.

Habitu *M. seriatae* similis, sed magis virgata et hypanthio pubescenti diversa. *Folia* $1\frac{1}{2}$ -5 lin. longa, sicca uninervia. *Fructus* helvoli, sesquilineam lati, globosi, basi mutua pressione angulati, ore amplo aequali.

6. **Melaleuca parviceps** Lindl. ramulis virgatis foliisque novellis piloso-hirsutis, foliis acerosis confertis, alternis, teretibus compressisve, sessilibus, acutis, arrectis, subrecurvis, adultis nitidis scabriusculis; capitulis sphaericis conglobatis; hypanthio ovato, sericeo; calycis phyllis membranaceis, subrotundato-ovatis, obtusis (saepe cohaerentibus), glabris; (petalis hyalinis caducis;) phalangibus 5-7-andris, unguibus corollam subaequantibus. — Lindl. Swan-River Bot. pag. VIII. n. 19!

In arenosis et limoso-arenosis haud longe a praedio rustico Maddington ad fl. Canning, nec non supra vicum Guildford, Octobri et Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 297. — J. Drummond! (v. s. a cl. Lindl. comm.)

„Frutex tripedalis“, ramis fusco-cinereis ramulisque laete fuscis gracilibus patulis. *Folia* saepe magis minusve compressa, subangulata, apice cartilagineo innuita, laete viridia, sub lente in angulis scabriuscula, 6-9 lin. longa. *Capitula* apicalia, Ceraso saepe majora, e capitulis compluribus axillaribus paucifloris, non raro folio subtensis, composita, *Hypanthium* sesquilineam longum, dense sericeum. *Petala* tenuissime membranacea, pellicula, concava, incipiente anthesi decidua. *Stamina* $3\frac{1}{2}$ lin. longa, viride lilacina. *Stylus* longe exsertus. *Hypanthium* fructus subconicum truncatum.

Proxima *M. scabrae* R.Br., quae vero differt: innovationibus glabris, foliis undique asperis, hypanthio subconico basi acuto glabriusculo, petalis mollibus per anthesin persistentibus, stylo stamina aequante.*)

7. **Melaleuca pentagona** Labill. innovationibus pubescentibus; foliis confertis, patulis, alternis, aut subteretibus subulatis subtus ulnisulcis vel carnosulis linearibus, aut planis lanceolatis, basi attenuata sessilibus, pungentibus adultis glaberrimis nitidulis; capitulis globosis; hypanthio cyathiformi glabro; calycis phyllis brevissimis, membranaceis, truncatis; phalangibus 3-5-andris, unguibus corollam subaequantibus. — Labill. Nov. Holl. II. pag. 27. tab. 166!

a planifolia: foliis lanceolatis, in basin angustatis, crassiusculis, planis, enervibus. *M. pentagona* Lah. tab. 166! — Ferd. Bauer!

β subulifolia. foliis subtereti-subulatis dorso sulco exaratis.

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 325; in calcareis inter frutices in monte Baldhead ad Sinum Regis Georgii. Octobri 1840. No. 309. — Ad Sinum Regis Georgii a. 1818: A. Cunningham!

Frutex jam demissior, rigidior, foliis carnosius subulatis 3-6 lineas longis, jam laetius vicens, ramulis vimineis, foliis mirabiliter ludens. Haec enim in uno eodemque ramulo, a b. *Ferd. Bauer* olim lecto, observare licuit in-

---

*) *M. trichophylla* Lindl. ramulis tomentosis foliisque junioribus pilosis, adultis glabratibus; foliis confertis, alternis, filiformi-acicularibus, arcuatis acuminatis, inermibus; capitulis globosis; hypanthio subcylindrico, lanato; calycis phyllis membranaceis, oblongis (saepe cohaerentibus), pubescentibus; phalangibus 3-9-andris, unguibus corolla plus quam duplo longioribus. — Lindl. Swan River Bot. pag. VIII. n. 20! In Australia occidentali: J. Drummond! *Folia* teretia vel subcompressa, 8-14 lin. longa. *Bractae* lineares, fugaces. *Capitula* multiflora, Cerasi majoris mole, pulcherrime roseo-lilacina, antheris flavis ornata. *Hypanthium* calycem aequante lineam longum. *Petala* erecta, oblonga. *Stamina* 4 lin. longa.

E. Laccaxylon ferd mull
 Tanunda. Truncus albus sab-
 lacvis passim striis li corticis
 liberis - luteis. White gum
 colonorum! "Behr. hb. f. n
 Jan - Hanc hanc effuse videtur
 a C. tristi Behr supra mema-
 rata nisi floribus ^{etiam} ~~jam~~ ^{ante}
 anthem majoribus ^{ex ungulam} ~~unquidam~~ ^{per}

P. rostellata ferd mull ^{inapi's}
 operculum in ~~rostellata~~ ^{parum} breve
 prototum. *E. rostellata*
 Vandykei hanc Tanunda
 Jan. Arbor mediocris, corte
 pallida laevi, rami juniori
 rubri Clar-village,

E. curiflora ferd mull
~~umbellis plerumque septis~~
~~pedicellis alabracatis.~~
~~*E. dispersa?* Behr. hb. Nov.~~
~~Arbor 30-40' Gaubler Toron.~~

E. pruinosa, alab. apris ^{inapi's}
~~*E. rugulosa ferd mull*~~
~~*E. Laccaxylon ferd mull* ^{inapi's}~~
~~cliff. ab antecedente floribus~~
~~var 2 majoribus ex hypochaeris~~
 Dombig amplis - abbreviata, foliis
 bay, longioribus. Nov. 1849.
 Dried country
 Sturt river. Arbor elata
 - In planitie prope
 Adelaide, fructit. Dec. 47.

Eucalyptus firma ferd muller.
 In collibus calcariis prope
 Guichen bay.
 Arbor 20'. Species propter fructus
 majusculos hanc multo illis *E. co-*
smophyllae minoribus ~~notabilis~~
 solis *E. odoratae*
 Scholym ^{inapi's} ~~explorata~~

No. 1, tanunda 1849. *E. longirostris* ferd mull.
 In undulatis vixit magis nectare.
 Curax ^{inapi's}

x Eucalyptus parvifolia Forst.

E. melliodora Widd. propinqua
arbutacea, foliis alternis
coriaceis glaucis vix unguis
anguste lanceolatis dense
in acumen recurvatione excurvantibus
pinnatis axillaribus 3-5 floris
syrantho breviter pedicellatis
radice ramis opuntia bre-
vissima depresso hemisphaerico
apiculato.

(Cortex ramorum juniorum viridis
hb. Berol. Trans. rivul. Salicornia
E. Leffinghiana, Berol. id. floris breviter
pedicellatis. Jan. 1849.

Eucalyptus rossophylla Widd. aut.
Fructus hemisphaerici 6-8" longi
pavide puri rugulosi plerumque 5-6 floris
rariis & locis, valde deltoideis acuminatis
parvis emarginatis. Inna furcata.

E. squarrosa Forst. T. & L.

George ham ell. myrtifolia Forst. hb. St. 24.
hb. St. 24. subfluvium Mey. T. & L. Jan. 1849.
8-10' hb. St. 5. Jan. 1849. 8-10'.

macul. gamb. B. glabrata Forst. Widd.
ramulis glabris rigidis
haud proceris pinnatis sed petati
glabrata. Fructus 5-6' densus
fructus platus extensus cum
Leptoporus microcarpo amplius
obtusica vix penetranda si-
vis. In interioribus versus
in mare Revoli Bay Oct 48.
Anth. Nov. - Jan.

Eucalyptus cladocalyx conf. p. 140.

Eucalyptus venosa, Forst. Widd.

From Dorothy Bay (Wilhelm) in are Offi
ab am is. hat in colonia indigenis minis pro-
de equit. foliis minutis prostratis vis-
Anth. 5-8' densus glaucescens. Oct fl. in fruct. vis.

feriora complanata lanceolata enervia, superiora ramulorumque minus vegetorum sensim crassiora, linearia, denique teretia. *Folia* omnia undique stomatiis creberrimis, sub lente micantibus, conspersa, atroviridia. *Capitula* parva, densissima, multiflora. *Bractee* flores aequantes, scariosae, fuscae, fugaces. *Flores* exigui, lilacini. *Petala* fugacia. *Stamina* $2\frac{1}{2}$ lin. longa. *Fructus* in globulum ramulo quasi perfilatum arcte connati, angulati, vertice emerso ore orbiculari subrependo perforato.

8. **Melaleuca Waeberi** *Rchb. Herb.* ramulis virgatis foliisque novellis sericeis, adultis glabratiss; foliis approximatis, coriaceis, alternis, patulis, lanceolatis, sessilibus, utrinque acutis, mucronatis, planis, nitidulis; capitulis subglobosis; hypanthio hemisphaerico, brevi, glabro; calycis phyllis brevissimis, membranaceis, truncatis rotundatisve; phalangibus 3-5-andris, unguibus brevissimis. Schauer in O. et D. Allg. Gartztg. III. pag. 167.

Ad hanc pertinere videtur specimen fructiferum *Herb. Preiss. No. 317*: in glaucosis sterilibus ad radices collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri 1840 lectum. (v. v. c.)

Specimen nostrum, e „frutice pedali squarroso“ decerptum, a cultis recedit ramificatione hac ipsa squarrosa brevi, foliisque crassioribus rigidioribus arcuato-ascendentibus. — *M. pentagona planifolia*, cui proxima, *M. Waeberi* differt: foliis basi minus attenuatis, unguibus phalangium brevissimis, saepius vix distinctis, fructibus minoribus, conglomeratis quidem, sed non concretis et vix angulatis, hypanthio truncato.)

** *Floribus flavis.*

9. **Melaleuca acerosa** *Schauer.* foliis confertis, alternis, linearibus subteretibusve, brevipetiolatis, pungentibus, glabris, nitidis; capitulis paucifloris; hypanthio obconico, pubescente; calycis phyllis membranaceis, truncatis, ciliolatis, corolla quadruplo brevioribus; phalangibus oligandris, unguibus elongatis corolla tridente longioribus.

In clivulis arenosis l. calcareis ad oras maris pr. Freemantle, Junio 1839. *Herb. Preiss. No. 263.* — J. Drummond!

„Frutex 2-4-pedalis, erectus“, inferne simplex, superne ramosus, ramis erectis, ramulis foliisque novellis pilosis. *Folia* crassiuscula, acerosa, subtus biseriatim punctata, subrecurva, 4-6 lin. longa, semilineam lata, laete viridia. *Flores* parvi, flavi. *Fructus* pisiformes, 3-6 coacervati, fusco-cinerei, laeves, hypanthio ad orificium subcontracto.“)

*) *M. striata* Labill. ramulis brevibus foliisque novellis sericeis, adultis glabratiss; foliis approximatis, alternis, patentibus reflexisve rigidulis, lineari-subulatis, basi subattenuata sessilibus, verticalibus, acutis, pungentibus (siccis nervoso-striatis); capitulis oblongis densissimis; hypanthio hemisphaerico brevi, indumento axis omnino immerso calyceque brevissimo cutaneo lanatis; phalangibus 9-11-andris, unguibus corolla plus duplo longioribus. — Labill. N. Holl. II. pag. 26. tab. 165! *M. Fraseri* Hook. Bot. Mag. 3210! *M. hispida* et *M. ulicina* Hort. Hab. in Terra Vanuatu: Labill! (v. sp. orig. in *Herb. Willd. n. 14361* et v. c.)

**) *M. nodosa* Sm. Act. Soc. Linn. III. pag. 276. n. 6! innovationibus sericeis; foliis approximatis, alternis, linearibus, utrinque attenuatis, sessilibus, pungenti-mucro

10. **Melaleuca pungens** Schauer. ramulis subvirgatis, novellis puberulis; foliis approximatis, alternis, patulis, rigidis, tereti-acicularibus, subincurvis, sessilibus, acumina-
tis, pungenti-mucronatis, asperulis, subopacis; capitulis ovalibus densissimis; hypanthio cyathiformi, basi lanato; calycis phyllis membranaceis, brevibus, latis, rotundatis; phalangibus heptandris, unguibus corolla brevioribus.

In solo glareoso sterili inter frutices haud longe a monte Barrow (Plantagenet), Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 316.

„Frutex tripedalis“. *Folia* 8-14 lin. longa, sub lente undique scabritie subtilissima obducta, saepius compressa. *Hypanthium* fere omnino inter lanam axis absconditum, lineam fere altum, praeter basin glabrum. *Stamina* 2 lin. longa. — Huic *M. tenuifolia* DC. (Prodr. III. pag. 213. n. 15.) propinqua videtur. *)

11. **Melaleuca uncinata** R.Br. innovationibus sericeis; ramulis virgatis; foliis alternis, erectis, filiformibus, teretibus subangulatisve, sessilibus, mucrone tenui uncinato termina-
tis, adultis laevibus nitidis; capitulis ovalibus compactis; hypanthio cyathiformi, brevi, lanato; calycis phyllis brevi-
bus, rotundatis, sphacelatis; phalangibus subpentandris, un-
guibus corollam excedentibus. — R.Br. in Hort. Kew. IV. pag. 414. n. 14!

In solo limoso planitie silvae ad fl. Vasse-River, Decembri 1839: Herb. Preiss. No. 270; in glareosis illustribus silvae inter praedia rustica ell. Barker et Lennardt, Aprili 1840 fructif. No. 278. — In Nova-Hollandia interiori ad fl. Lachlan a. 1817: A. Cgh.!

Frutex 6-7-pedalis. *Folia* 1-2 pollices et quod excedit longa, undique punctata. *Filamenta* cum antheris flava.

natis, planis uniuerviis, rigidis, adultis glaberrimis nitidis punctatis; capitulis densissi-
mis, conglobatis; hypanthio cyathiformi, sericeo; calycis phyllis membranaceis, truncatis
rotundatisve; phalangibus subpentandris, unguibus corollam subaequantibus. Hab. in
Nova-Hollandia orientali: Sieber pl. N. H. exs. n. 316! Ferd. Bauer! Hügel! (v. v. c.)
M. juniperina Rehb. innovationibus hirsutis; foliis approximatis, alternis, tereti-
acicularibus, brevi-petiolatis, acuminatis, pungenti-mucronatis, dorso sulcatis, tubercu-
lato-punctatis, adultis laevibus opacis; capitulis globosis, conglobatis; hypanthio cyathi-
formi, lanato; calycis phyllis membranaceis, brevissimis, truncato-subrotundis; phalan-
gibus pentandris, unguibus, corollam subaequantibus. — Reichenb. hort. bot. II. pag. 5.
lab. 112! **M. juniperoides** DC. Prodr. III. pag. 213. n. 20. **Metrosideros ju-
niperoides** Rehb. in Sieb. pl. N. H. exs. n. 317! Hab. in Nova-Hollandia orientali:
Sieber! Hügel!

*) **M. Drummondii** Schauer. ramulis tenuibus foliisque novellis sericeo-pu-
berulis; foliis approximatis, alternis, patulis, rigidis, e tereti compressis, sessilibus,
mucrone recurvo terminatis, adultis glabratissimis laevibus opacis utrinque punctis crebris
seriatis exsculptis; capitulis ovalibus compactis; hypanthio cyathiformi, brevi, lanato;
calycis phyllis subobsoletis truncatis; phalangibus pentandris, unguibus corolla duplo
brevioribus. Hab. in Nova-Hollandia austro-occidentali: J. Drummond! Ramuli cinerei,
punctati. *Folia* 8-12 lin. longa. *Hypanthium* cum calyce semilinea paullo altius,
calyce valde brevissimo glabro. *Petala* hypanthio longitudine aequalia, erecta, oblonga,
concava, cum staminibus linea vix majoribus flava. *Antherae* caesiae.

x Melaleuca oligantha Forst Mull.
In Nova Hollandia (probabiliter
aestivo-orientali)
A M. albaeina Forst differt
spicis lateralibus pedunculatis
nec floribus pinnatis ramulos
spicati dispositis, ramulibus
erectis etc. Etiam M. thymifoliae
accedit. hb. St. 820.

x Melaleuca rubronulifera Forst Muller
B. P. glabra Forst Muller. hb. St. 141.
Hunc ^{muli} (prospice ^{olim} ^{hanc} ~~edita~~, ^{et} ^{speciem}
novam ~~afformam~~ ^{et} ^{rubronuliferam}
nominandam. Differt enim foliis linearibus
pinnatis oblongis etc.

Ruddy-creek. Matthew.
Eortasse M. kalmianum &
varietates hujus sunt varietates.

Melaleuca glaberrima Forst Mull
In nectibus ^{latius} prope Mount Barker
creek. h. am. Forst. prope. h. am.
v. 1881.

Melaleuca acuminata, Forst Mull.
Cum antea dicitur. Forst. h. am. h. am.

Melaleuca squamea Lab.
In parte australi Tasmaniae
juxta urbem Hobart-town.
hb. St. 796. nec non ad oram
austro-occidentalem quodam
insulae prope Port Phillip. 8-10'
Flores purpurei. hb. St. 881
Anth. v. 1.

*** *Species incompletae.*

12. **Melaleuca leptospermoides** Schauer. squarrosa; ramulis foliisque novellis lanuginosis; foliis sparsis, laxe subimbricatis, coriaceis, ellipticis oblongisve, in petiolum brevissimum contractis, acutiusculis, muticis, concaviusculis, subtrinerviis, subtus punctatis, adultis glabris glaucescentibus; capitulis paucifloris; axi lanato; hypanthio subcylindrico adnato, inferne villosa; calycis phyllis membranaceis, rotundatis; phalangibus (brevibus) subdecandris, unguibus corolla brevioribus.

In planitie arenosa Quangen (pr. Victoria), Martio 1840, deflorata. Herb. Preiss. No. 312.

„Fratex pedalis“. *Folia* $2\frac{1}{2}$ lin. circiter longa. *Capitula* 3-6 flora, *Hypanthium* sesquilineam altum. *Phalanges* petalis paullo longiores, (cum petalis lilacinae?). *Fructus* subconicus, truncatus, laevis.

13. **Melaleuca tuberculata** Schauer. glabra; glauca; foliis alternis, approximatis, subimbricatis patulisve, brevibus, clavatis, supra planis, subtus convexis, in petiolum brevissimum attenuatis, breviter acuminatis, tuberculato-punctatis; capitulis plurifloris confertis; axi hypanthiisque subtruncatis adnatis, villosulis; calycis phyllis membranaceis subrotundis; phalangibus . . . . .

In regionibus interioribus sterilibus Australiae meridionali-occidentalis, in itinere a Sinu Regis Georgii ad oppidulum York, Februario 1840, deflorata. Herb. Preiss. No. 261 ex parte.

Ramuli breves, tenues. *Folia* carnosa, facie plana laevi, dorso convexo punctis prominentibus consito, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longa. *Flores* lilacini?

14. **Melaleuca subtrigona** Schauer. ramulis tenuibus confertis foliisque juvenilibus facie subhirsutis; foliis alternis, laxe imbricatis, brevibus, clavatis, plano-convexis subtrigonisve, brevissime petiolatis, obtusis, elevato-punctatis, denique glabratis; capitulis paucifloris confertis; axi lanato; hypanthio cyathiformi, adnato, glabriusculo; calycis phyllis membranaceis, rotundatis; phalangibus . . . . .

In regionibus interioribus sterilibus Australiae meridionali-occidentalis, in itinere a Sinu Regis Georgii ad oppidulum York, Febr. 1840, deflor. fructif. Herb. Preiss. No. 261 ex parte.

Fruticulus videtur exiguus, densus. *Folia* sesquilinearia, viridia, opaca, sub lente stomatiis undique conspersa, dorso punctis exstantibus instructa. *Fructus* conferti, glabri, helvoli. *Bracteae* membranaceae, pellucidae, disco striatae, fugaces. — *Flores* lilacini?

15. **Melaleuca holosericea** Schauer. villosa-tomentosa; foliis alternis, confertis, patulis, semiteretibus, acutis, muticis, punctatis; capitulis paucifloris, confertis; axi hypanthioque adnato subcylindrico villosa; calycis phyllis membranaceis, rotundatis; phalangibus 8-10-andris. (?)

In planitie arenosa Quangen (Prov. Victoriae), Martio 1840, deflorata. Herb. Preiss. No. 315.

„Frutex bipedalis“, ramis tenuibus strictis, indumento molli incano insignis. *Folia* e basi arcuata erecta, 5 lin. circiter longa, facie planiuscula.

2. *Calycis phylla cutanea, cum petalis nervoso-striata.*

16. **Melaleuca spinosa** Lindl. ramulis rigidis spinescentibus foliisque junioribus lanuginosis; foliis alternis, patentibus, coriaceis, ovalibus, brevipetiolatis, acutis, trinerviis, adultioribus glabratissimis nitidis; capitulis oblongis, conglobatis; hypanthio brevi villosissimo; calycis phyllis ovatis acutis petalisque subrotundis erectis disco trinerviis; phalangibus 7-andris, unguibus corollam aequantibus. — Lindl. Swan-River Bot. pag. VIII. n. 23!

In arenosis colliculosis silvae ad fl. Canning, Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 282. J. Drummond!

„Frutex 4-pedalis“, gracilis, patenti-ramosus. *Folia* atroviridia. *Flores* parvi, pulchre flavi. *Petala* membranacea, subrotunda, concava, lata, contigua. *Stamina* 2 lin. longa. — Habitu *Acacias* quasdam aemulatur.

17. **Melaleuca thymoides** Lab. ramulis spinescentibus foliisque junioribus lanuginosis; foliis alternis, patentibus, coriaceis, lanceolatis oblongisve, brevipetiolatis, trinerviis, adultis glabratissimis nitidis; capitulis oblongis; hypanthio brevi, tomentoso; phyllis calycis ovatis subrotundisve petalisque subrotundis erectis disco trinerviis; phalangibus 7-9 andris, unguibus corollam subaequantibus. — Labill. N. Holl. II. pag. 27. tab. 167!

In glareosis sterilibus collum Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri 1840: Herb. Preiss. No. 280; in clivulo arenoso ad portum Princess-Royal-Harbour prope Albany (Plantagenet), Septembri 1840: Herb. Preiss. No. 281; in arenosis prope Point-possession ad Sinum Regis Georgii, Octobri 1840: No. 283. — Ad S. R. Georgii: A. Cunningham! In Terra Van Leuwin: Lab.

„Frutex 5-pedalis“, gracilis, ramulosus, florum conformatione praecedenti proxime accedens, sed foliorum minorum figura facilis distincta. *Folia* laete viridia, 3-4 lin. longa. *Flores* cum staminibus sulfureis (siccando saepius atrovirescentibus) $2\frac{1}{2}$ lineas longi. *Stylus* filiformis, exsertus; stigma obtusum, nec ampliatum concavum, quale describit cl. *Billardierus* l. c.

3. *Calycis phylla herbacea subulata.*

18. **Melaleuca aspalathoides** Schauer. ramulis foliisque tomento sericeo candicantibus; foliis confertissimis, sparsis, subtereti-acicularibus, muticis, saepe curvatis, tuberculato-punctatis; capitulis paucifloris; hypanthio cylindrico, lanato; calycis phyllis herbaceis, subulatis, pubescentibus; phalangibus 7-9 andris, unguibus calycem aequantibus.

In glareosis inter frutices provinciae York, Aprili 1840, deflorata. Herb. Preiss. No. 2426; in planitie arenosa Quangen pr. Victoriae: No. 2425.

„Frutex bipedalis“, rigidus. *Folia* in ramulis brevibus fere fasciculata, 6-9 lineas longa, angusta, subcompressa, tomento denso candido micanti

x, U. gibbosa! Lab. Rh. H. 746. H. n. 51. Florif.
Ad Ft. South Fork river. Dec. 1848.

Ad. Fr. South Esk river. Dec. 1848.

fr. 5-6'. — hb. N. H. n. 439, *Crucifera*

Dec. — *Eginala halmatorum* nom.
municipit. fragmentum Nov 1849

ascellatum St. Hour. *ascellatum*

En. callos ~~maculatus~~ - nix caeruleis
lappula nix conspurcari.

Chamaecrista latifolia (L.) Greene, var. *latifolia*
Chamaecrista latifolia (L.) Greene, var. *latifolia*

thornifolia Smith. hb N. 146.

on Boonigibbafae cui proxime accedit *fructu*

passos innanzi fuit. - Petala non exsertita
 corollae rubra. Fructus erectus diffusum

3' v. albos in humidis montium. Flouren. Onka
in vallis. Dec 1848. Flores liliaceae.

Leucogonum vulgare var. *1840* - *Leucogonum vulgare*, *Leucogonum*
leucogonum *leucogonum* *leucogonum*, *Leucogonum* *leucogonum*

Chenopodium glandulosum Muller

Thymifolia var. *St. 145.*

Andrena M. palmariorum
1903. *Andrena M. palmariorum*

surfaces des puits en naphtalène
corrosifs et volatils ~~ont~~ ^{large} ~~une~~ ^{impureté}

~~his autograph is in the collection~~

les diffiniree aduen. ~~Forst~~ formi

intermediis c. M. halimata or near

In glaucois viridibus sat argenteis maculis

Saxifraga *guianensis* *L.*

South: von H. Hoffman, Berlin. Trich.

Myrsine cladocalyx, first Mueller

liosa, ramulis asculatis, foliis alternis non

longato-lanceolatis pennis acuminatis

Chrysomela picta virentibus scitidulis pubescentibus

marginatis, umbellulis catenatis consp.

loris, ~~satyros~~ ~~lucio~~ alabaffris flaviformibus

*subo rotundum - campanulato in pedicellum
 breviorum pedum deficiente obliquo angulo*

Dioscorea kumipphae (Munier) ^{tenue pubesce} *angulata*

in Res quatuor exordine, principes uicinato-ovatis

montanum Marshall - rarer here. - G. Will. C.

8' densus. Folia 3-4" longa, ^{basis angustior} paulo angustiora vel

Umbellae foliis marginibus & nervum medium
delapsis latere *delapsis latere*

ixi. Flores adpressis pedicellis 8-9" longiusculi patenti

Dianthus barbatus var. *pinnatifidus* 8-9" long; - ubi calyces ^{nervosus corollae}

contratti inaspettati, valori profumati inaspettati

with some old

x M. paludosa! R. Br

Folia juniora ciliolata dycteis
reticulis praebiusculis de minus
laevia. Rachis & calyces orbiculati
pappi glabris. Foliorum nervi
laterales cum venis folium
in foliis exsertatis prominent.
In ripam fissuris ad rivulum Tanunda-
reek, capsula 3 & 4 loculata prim. fractis.
Apr. 1848. — florifera Nov. 1847 ad R. Tan-
undag hb. J. n. 147. — Lb. ab antiquibus ad
riparum propagata utitur. — In ripas
aquarum fluentium hb. J. n. 69. —
Onkaparinga hb. J. n. — in R. Torrens
Nov. 1849. — primina alabastrina
Frutex erectiusculus robustus
saepe ad 10', truncus circiter
1/2' diametro, cortice nigrescente
rimoso. In rivulos montium
costis rari.
Intra popul. rivi Tanundae.
Frutex ad 20' e basi in ramos plures
validos fruticiformes (ad pinnidum
crassos) divisus. Cortex antiquus cor-
poridique nigrescit rugosus et trans-
versim rimosus.

appresso vel subvillosa induta, denique magis minusve calvescentia. *Hypanthium* cum calyce fere 2 lin. longum; hujus dentes valde acuminati. *Stamina* 4 lin. longa, lilacina.

II. CAJUPUTI. Flores (variae magnitudinis) in spicas axi jam sub anthesi innovante comosas, densas, laxas, immo interruptas collecti. *Hypanthium* axi adnatum v. sessile, continue in calycem abiens. Calycis dentes herbacei v. cutanei. Phalanges staminum rectae, 3-polyandrac, palmatifidae v. pinnatifidae. Stylus filiformis; stigma punctiforme v. subcapitatum. Folia alterna, verticillata, opposita. Fructus dentibus calycis induratis, saepe auctis, coronati vel obsoletis ore inaequales.

19. *Melaleuca lateritia* Otto. tota glaberrima; foliis confertis, alternis, patulis, lincari-lanceolatis, utrinque attenuatis, subpetiolatis, acutiusculis, muticis; spicis lateralibus cylindricis, multifloris, laxis; hypanthio adnato; calycis phyllis subrotundis; phalangibus 7-11 andris, unguibus brevissimis. — Otto et Dietr. Allg. Gartztg. II. p. 257!

M. callistemonæa Lindl. Swan-River Bot. pag. VIII. n. 21!

In sublimosis depressis umbrosis hieme inundatis silvae prope oppidum Perth. Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 354. — J. Drummond! (v. v. c.)

Frutex tripedalis, ramis virgatis. Folia 5-7 lineas longa, dimidiam lineam lata, laete viridia, opaca. Rhachis spicae nonnunquam villosula, plerumque tamen glabra. Petala orbiculata, concava, limbo calycis duplo longiora. Stamina distincte fasciculata, sed fere usque ad basin libera, 8 lineas longa, scarlatina.

20. *Melaleuca brachyphylla* Schauer. glabra; laete virens; ramulis tenuibus pendulis; foliis confertissimis, sparsis, patulis, subclavato-teretiusculis semiteretibusve, brevibus, recurvis, in petiolum attenuatis, obtusissimis, enerviis, impunctatis; spicis subapicalibus, ovalibus oblongisve, densis, hypanthio adnato; calycis phyllis rotundatis; phalangibus 5-9-andris, palmatifidis, unguibus corollam aequantibus v. nonnihil excedentibus. Schauer in O. et D. Allg. Gartenztg. III. (1835) pag. 162.

M. tenuissima Tausch, Flora XIX. (1836) II. pag. 411.

In litore rupestri portus Princess-Royal-Harbour, Octobri 1840. Herb. Preiss. No. 255.

„Frutex 4-pedalis“. Flores albi. *Hypanthium* fructus angulatum, limbo e calyce indurato repetendo subpatellari patenti coronatum; capsula vertice e fauce angusta emergente villosa.

21. *Melaleuca incana* R.Br. ramulis flaccidis villosis; foliis confertis, verticillatis ternis, patentibus reflexisve, lineare-lanceolatis, planis, subpetiolatis, acutis, muticis, trinerviis,

cano-tomentosis, aetate glabrescentibus; spicis subapicalibus, ovalibus oblongisve, axi villosis; hypanthio hemisphaerico, sessili, glabro l. puberulo; calycis dentibus herbaceis, lato-ovatis, acutis; phalangibus 3-9-andris palmatifidis, unguibus corolla brevioribus. R.Br. Bot. Reg. 410! *M. canescens* Otto, in Horis phys. Berol. pag. 37! Link et Otto pl. sel. hort. Berol. tab. 37! *M. hypochondriaca* Dehnhardt Revista Napol. I. 3. pag. 177!

In locis hieme inundatis terrae inferioris Australiae occidentalis, Decembri 1839, fructifera. Herb. Preiss. No. 262; in paludosis silvae ad fl. Canning, Junio 1841, florens: No. 266; in glareosis sterilibus ad radices collum Konkoberup prom. Cape Riche, Novembri 1840; No. 329; (v. v. c.)

„Frutex 8-pedalis“. *Folia* annotina in planta sylvestri glabrata, *hypanthium* saepius violaceo tinctum. *Filamenta* subflavescenti-albida; antherae luteae. *Fructus* conferti, calyce indurato patente coronati.

22. **Melaleuca polygaloides** Schauer. glabra; ramulis virgatis; foliis coriaceis, alternis; subimbricatis, oblongo-lanceolatis, basi subattenuata sessilibus, inflexis, acuminatis, pungentibus, glaucescentibus; spicis laxis, axi pubescente; hypanthio adnato; calycis phyllis herbaceis, ovatis, breviter acuminatis, subcarinatis; phalangibus decandris.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, Octobri 1840, alabastrigera. Herb. Preiss. No. 327.

„Frutex pedalis“. *Folia* 3-4 lin. longa. *Spicae* circiter 20-florae. *Bractae* squamaceae, acuminatae, hypanthium aequantes, caducae. *Flores* rosei aut albi? Petala ciliata.

23. **Melaleuca viminea** Lindl. glaberrima; ramulis virgatis; foliis confertis, alternis, patulis, lineari-lanceolatis, in petiolum attenuatis, acutis, muticis; apice recurvis; spicis lateralibus subapicalibusque, cylindricis, laxis, multifloris; hypanthio subcylindrico, adnato; calycis phyllis brevibus, herbaceis, subrotundo-ovatis; phalangibus 7-andris apice radiatis, unguibus petalis convolutis reflexis sublongioribus; stylo filiformi exserto. — Lindl. Swan-River Bot. pag. VIII. n. 22!

In uliginosis ad fl. Cynorum supra oppidum Perth, Septembri 1839. Herb. Preiss. No. 291. — J. Drummond! King-George's Sound: Hügel! (v. s. a. cl. Lindl. comm.)

„Frutex 10-15-pedalis“. *Folia* 4-6 lin. longa, dimidiam lineam lata, viridia, novella puberula. *Spicae* pollicem circiter longae, semipollicem latae. *Stamina* $2\frac{1}{2}$ lineas longa, alba. *Stigma* truncatum. — Habitus omnino *M. armillaris* Sm., a qua fere non differt, nisi omnibus partibus duplo minoribus styloque conspicue exserto.

24. **Melaleuca Lehmanni** Schauer. glaberrima; gracilis; stricta; foliis confertis, alternis, crectis, lineari-lanceolatis semiteretibusve, petiolatis, apice recurvo pungentibus, cnerviis, impunctatis; spicis subapicalibus cylindricis; multifloris, confertiusculis; hypanthio cyathiformi adnato; calycis

x Melaleuca virnifolia Lindl. Muir

In Nova Hall. (austro-orient.?)
No. 2. 834.

A. M. inuana, quorum compari-
are debet, eximie differunt a latioribus
perfecta et foliis angustioribus.

dentibus ovatis; phalangibus polyandris apice radiatis, unguibus corollam aequantibus.

In depressis paludosis silvae prope vicum Perth, Septembri 1839. Herb. Preiss. No. 292.

„Frutex 6-8-pedalis“. *Folia* 4 lin. circiter longa, laete viridia, opaca, facie planiuscula. *Spicae* 6-9 lineas longae, angustae, nudae. *Flores* parvi; hypanthium fere lineam aequans; petala subrotunda, laevia, cum staminibus linea vix longiora, uti videtur alba.

25. **Melaleuca Preissiana** Schauer. arborea; foliis confertis, rigidulis, alternis, obliquis, patentibus, lineari-lanceolatis, planis, brevi-petiolatis, obtusiusculis, trinerviis, glabris; spicis compluribus subapicalibus, fastigiatis, elongatis, laxis, foliatis, axi tomentoso; hypanthio subcylindrico pubescente; calycis phyllis herbaceis, lanceolatis, obtusis; phalangibus polyandris fasciculatis, unguibus manifestis corollam subaequantibus; stylo exserto glaberrimo.

In uliginosis silvae circa vicum Perth, Maio 1840 alabastrigera. Herb. Preiss. No. 265. — J. Drummond!

„Arbor 20-25-pedalis“, trunco valido, cortice libroso solubili induto, ramis tortuosis confertis rigidis, ramulis cinereis. *Folia* 4-6 lin. longa, $\frac{3}{4}$ lin. lata, firma, novella pubescentia, adulta glaberrima, viridia, opaca, impunctata. *Spicae* ad apicem ramuli 3-5, 2-3 uncias longae, apice nudae vel comosae, foliis quam reliquis latioribus brevioribusque interstinctae. *Flores* in axilla singulae bractee singuli-terni. *Hypanthium* cum calyce herbaceum, viride, sesquilineam altum; *phylla calycis* concava, glabra. *Petala* convoluta, reflexa, hypanthium adaequantia, cum staminibus alba. *Phalanges* 3 lineas longae, erectae, ungue angusto. *Antherae* apiculatae. *Stigma* truncatum. *Fructus* diametro sesquilineam metientes, semiglobosi, aliquandiu calyce indurato coronati, deinceps truncati. — *M. genistifoliae* Sm. affinis.

26. **Melaleuca raphiophylla** Schauer. glabra; glaucescens; ramulis tenuibus patentibus; foliis alternis, patulis, acicularibus, teretiusculis vel compressis, in petiolum attenuatis, subincurvis-recurvisve, acumine obliquo v. subrecurvo inermi; spicis oblongis, confertiusculis, axi villosis; hypanthio sessili, subcylindrico; calycis dentibus triangulari-ovatis; phalangibus polyandris pinnatifidis, unguibus corollam subaequantibus.

In arenosis plantitiei ad fl. Cygnorum supra Perth, Septembri 1839: Herb. Preiss. No. 264; in solo humoso ad ripam fl. Avon prope vicum York, Martio 1840: No. 267, fructif.

„Frutex 6-15-pedalis“. *Folia* 5-10 lin. longa, impunctata, saepe secunda. *Spicae* albae. *Hypanthium* cum calyce sesquilinea paullo brevius. *Petala* orbiculata, sessilia, patentia, calyce duplo longiora, glabra, disco punctata. *Stylus* filiformis, stamina aequans; stigma subcapitatum. *Fructus* pisi minoris mole, subconici, truncati, cum ramis ramulisque helvoli. *)

*) *M. semiteres* Schauer. glaberrima; glaucescens; ramulis virgatis; foliis alternis semitereti-filiformibus compressisve, basi attenuata sessilibus, apice acutato inermi; spicis axillaribus, ovalibus, confertis; hypanthio cyathiformi, sessili; calycis dentibus ovatis, acutiusculis, marginatis; phalangibus 7-9-andris pinnatifidis, unguibus co-

27. **Melaleuca Hügelii** Endl. ramulis pubescentibus; foliis alternis, appressis, subimbricatis, apice patulis, ovatis vel ovato-lanceolatis, sessilibus, acuminatis, multinerviis, glabris; spicis elongatis, densis, axi villosis; hypanthio glabro; calycis phyllis rotundatis, marginatis, nervoso-striatis; phalangibus subenmeandris apice pinnatifidis; unguibus corolla plus duplo longioribus. — Endl. Enum. pl. Hügel. pag. 48. n. 152!

In arena maritima hand procul ab urbe Freemantle, Novembri 1838. Herb. Preiss. No. 293. — Swan-River: Car. Fraser! *Melaleuca adpressa* A. Cgh. Herb.!

„Frutex orgyalis“, ramosissimus, spicis 2-4-pollicaribus lilacinis ornatis. *Petala* oblonga, colorata, laevia. *Stylus* stamina aequans, filiformis; stigma punctiforme, obtusum.

28. **Melaleuca densa** R.Br. ramis deflexis, squarrosis; ramulis tomentosis; foliis confertis, verticillatis ternis sparsisque, patentibus recurvisque, ellipticis subrotundo-ovatis obovatisque, subsessilibus, abrupto acuminatis, inflexis, trinerviis, punctatis, glabris; spicis subcylindricis, densis; axi hypanthioque subcylindrico adnato sericeo-tomentosis; calycis dentibus subrotundis, marginatis; phalangibus (brevibus) 5-7-andris; palmatifidis; unguibus corollae aequalibus brevioribusve; stylo stamina aequante. — R.Br. in Hort. Kew. IV. pag. 416. n. 24!

In solo turfoso pr. oppidulum Albany (Plantagenet), Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 288. (v. v. c.)

„Frutex 6-pedalis“, ramis suberosis, rigidis, tortuosis. *Folia* laete viridia, 3-5 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ -3 lin. lata. *Spicae* pollice plerumque breviores, bracteatae. *Hypanthium* cum calyce sesquilineam altum. *Stamina* flavescentia, 2 lin. circiter longa.

29. **Melaleuca propinqua** Schauer. ramis pendulis; ramulis tomentellis; foliis confertissimis, patulis, verticillatis ternis, sexfariam imbricatis, ovatis oblongisve, subsessilibus, breviter acuminatis, inflexis, trinerviis, glabris, nitidis; spicis oblongis densis; axi hypanthioque cyathiformi adnatis sericeis; calycis dentibus subrotundis, breviter acuminatis; phalangibus (brevibus) 3-5-andris, unguibus corollae subaequalibus brevioribusve; stylo exserto. Schauer in O. et D. Allg. Gartenztg. III. pag. 166!

In solo turfoso-arenoso planitie, 13 mill. ab urbe Albany, Novembri 1840: Herb. Preiss. No. 285; et ibidem Octobri 1840 (fragm. fructif.): No. 286. (v. v. c.)

„Frutex bipedalis“. *M. densae* admodum propinqua, ut fere ejus forma omnibus partibus aequaliter diminuta haberetur, sed ramulis subflaccidis

---

rollam subaequantibus. Hab. in Nova-Hollandia austro-occidentali: J. Drummond! *Folia* $\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ uncias longa, nunc semiteretia facie plana, dorso semicylindrico, nunc facie dorsoque fere aequaliter convexis compressa, vix conspiciunt punctata. *Flores* bractea squamea cuspidato-acuminata cum bracteolis minoribus caduca subtensi. *Petala* orbiculata, unguiculata, minute denticulata, calyce duplo longiora. *Stamina* latetitia, fere 4 lin. longa, marcescentia. *Stylus* filiformis, exsertus; stigma petatum.

x E raniis junioribus et latius
Eucalypti, ^{ad forte (pro ag. lat., Feb.)} latharizerae materia
saccharina ⁵⁵⁰ effusit, quae
firmitas ^{magis} decessit et fit pro-
pula ^{magis} refert albida ^{magis} rutilor
humidiorcula ^{magis} faciem ^{magis}
expirantia et penitus indurata
plurimae pisi magnitudinis
nisi ^{magis} minuta nisi plures
maiores porosa, sapore suavi
dulcorato. In alcoholo ta-
citius quam manna omni
dissolvitur.

Ex observatione A. Byrnes, ⁷ medici
nav. Beagle, manna huius memo-
rata, ab cicadis ortum ducit;
^{inferuntur, quia} haec animalia „per annum“ Symplicium
max indurantem succum. Mihi
probabiliter apparet, cicadas
perorum primo et solus Eucal-
ypti patensiflorae trahere et
post ^{plurimum} processum nutritionis
^{quasi per pauca carbonata hanc in opuntiam referri.}
7) Louf. Stokes diacodones in Au-
stralia vol II, pag. 482-483.

Mugilii Evol 6

Melobura Phenotomaea f. Muller

Freemantle! Western Australia
staminum phalangibus flavo-ventibus
Anth. recta
Phenotomus habitus.

pendulis, foliis sexfariam imbricatis dense tectis et habitu tota peculiari insignis. Immutata insuper e seminibus redit. *Folia* $1\frac{1}{2}$ lin. longa. *Hypanthium* cum calyce lineam, *stamina* flavescentia sesquilineam metientia.

30. **Melaleuca cuticularis** Labill. glabra; glaucescens; foliis oppositis, subimbricatis patulisve, crassiusculis, lanceolatis, dorso convexis, obtusis, brevipetiolatis, opacis; floribus citra apicem ramulorum axillaribus solitariis paucisve, bracteis scariosis quadrifariam imbricatis obvallatis; hypanthio campanulato; calycis phyllis herbaceis, aentis, erectis; phalangibus polyandris a basi ramosis, unguibus calycem aequantibus; stylo subexserto. — Labill. N. Holl. II. pag. 30. tab. 171! *M. imbricata* Link, Enum. pl. hort. Berol. II. pag. 272. n. 3240!

In arenosis planitiebus ad fluvium Cygnorum supra oppidulum Perth, Septembri 1839. Herb. Preiss. No. 303; in littore rupestri portus Princess Royal Harbour, Septembri 1840: No. 304, (v. v. c.)

Frutex vel „arbor 10-15-pedalis“, ramis confertis tortuosis foliosis, cortice albedo fissili indutis. *Folia* 4 lin. circiter longa, saepius subrecurva, subtus punctata, siccando non raro aeruginoso-virescentia. *Bractae* scariosae, ovatae, acuminatae, carinatae, fuscae margine albedo, quaternis-senis paribus arcte imbricatis hypanthio subjectae, deciduae. *Calyces phylla* foliacea, marginibus membranaceis involuta, interna pagina cum vertice germinis albo-tomentosa. *Petala* membranacea, pellucida, fimbriolata, involuta, reflexa, calyce paullo longiora, cum staminibus sordide alba. *Stamina* calycem duplo superantia, 4 lineas longa. *Stigma* punctiforme. *Fructus* maturus pisi majoris mole, hypanthio cyathiformi suberoso, calycis phyllis induratis divaricatis, capsula trifloculari hypanthium aequante.

III. **LAMPROMYRTUS.** Flores axillares subsinguli, gemini vel spicati, (majusculi), glabri. Hypanthium adnatum v. sessile, continue in calycem abiens. Calycis dentes herbacei. Phalanges staminum polyandreae, expansae v. incurvo-adscendentes, e staminibus valde inaequalibus conflatae, rhachi petaloidea margine facieque filamentosa. Stylus columnaris, inclusus; stigma truncatum, latiusculum. — Folia plerumque opposita. Fructus dentibus calycis induratis coronati.

31. **Melaleuca Radula** Lindl. glaberrima; glaucescens; foliis oppositis, linearibus, elongatis, tereti-involutis canaliculatisve, sessilibus, pungenti-acuminatis, dorso tuberculato-punctatis, strictis arcuatisve; spicis axillaribus, interruptis, rarifloris; hypanthio subhemisphaerico adnato; calycis phyllis brevissimis, latis, truncatis, membranaceo-marginatis; phalangibus polyandris, margine facieque a basi inde filamentosis, rhachi petaloidea dorso distincta; stylo

staminibus breviori; stigmate peltato. — Lindl. Swan River Bot. pag. VIII. n. 24!

In limoso-calculosis ad amniculum planitiei haud longe a praedio rustico Mad dington (ad fl. Canning), Novembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 306; in glareosis inter frutices terrae superioris Australiae occidentalis, Aprili 1840 fructifera: No. 307. J. Drummond!

„Frutex 4-7-pedalis“, ramis patentibus, angulatis, strictis, virgatis, innovationibus glabris. *Folia* internodiis magis minusve manifestis distincta, 6-10 lin. longa, saepe secunda. *Flores* oppositi, majusculi, lilacini, petalis orbiculatis reflexis hypanthio longioribus et staminibus copiosis speciosi. *Petala* 3 lin. fere longa, in disco resinoso-punctata. *Stamina* permulta in fasciculo, valde inaequalia, longissima circiter semuncialia. *Fructus* magnus, depresso-globosus, laevis, fuscus, ore in vertice orbiculari aequali, capsula immersa apice tomentosa. — *M. fulgenti* R.Br. proxime affinis.

32. **Melaleuca violacea** Schauer. glabra; glaucescens; ramis patentibus suberosis; foliis oppositis, decussatis, patentissimis reflexisve, oblongo-ovatis, basi cordata semi-amplexicaulibus, acutis, 3-5-nerviis, capitulis axillaribus, paucifloris, comosis; hypanthio cyathiformi sessili; calycis phyllis ovatis, obtusis; phalangibus polyandris, incurvis, a basi inde pinnatifidis; rhachi integra facie filamentosa; stylo incluso uncinato.

In solo turfoso-arenoso planitiei 18 mill. ab oppidulo Albany (Plantagenet); Herb. Preiss. No. 273; in confragosis haud longe a monte Manypeak l. Tjilberup, Novembri 1840: No. 274.

„Frutex 1½-4-pedalis“, ramis intricatis, cuticula laciniosa supertextis, vetulis totis, junioribus basi saltem suberoso cortice tectis, ramulis novellis glabris vimineis. *Folia* internodiis ipsis aequalibus brevioribusve interstincta, 4-5 lin. longa, coriacea, planiuscula facie conspicue 3-5 nervi crebripunctata. *Flores* ad basin innovationum tam axillarium quam terminalium pauci, immo singuli geminive, pulcherrime violacei. *Petala* orbiculata, patentia, colorata. *Phalanges* corolla triente longiora, staminibus valde inaequalibus. *Stigma* truncatum. *Fructus* ramis arcte adnati, suberosi, dentibus calycis induratis divaricatisque muniti; capsula trilocularis.

Hujus syntypicae sunt: *M. thymifolia* Sm. (cujus formam majorem exhibet *M. discolor* Rehb.! — *M. elegans* Hornsch.!) et *M. pulchella* R.Br.

IV. MICROMYRTUS. Flores (parvi) ad apice ramulorum in capitula pauciflora congesti (abortu unisexuales.) Hypanthium cum calyce membranaceum. Phalanges breviter exsertae, palmatae, breviunguiculatae. — An genus proprium?

33. **Melaleuca micromera** Schauer. ramosissima; ramulis tenuibus, intricatis, albo-lanatis; foliis (minutissimis) contiguis, arcte appressis, verticillatis ternis, ovoideis apice depresso marginato cum acunine brevissimo dorsali, glaucescentibus, glabris, raripunctatis; floribus citra apicem ramuli ternis-quinis, glabris; calycis dentibus triangularibus; phalangibus pentandris, palmatis, corolla duplo longioribus, unguibus brevissimis; (germine abortivo!)

comp. M. Gammicena Schaeffer.

Uel. capitata frutice.

V. D. L. h. 6 St. 49. floribus ter-
minalibus capitatis, foliis oppo-
sitis parvis basi apiceque et
sinuatis obtusis nervis glabris
palmatis

In glareosis sterilissimis collium Wariuphills (distr. Gooderich) rarissima, Octobri 1840. Herb. Preiss. No. 183^a.

„Frutex 12-16-pedalis, pyramidalis“, ramulis totis foliis minutis tectis, habitum *Haloenemidis* quodammodo referens. *Folia* triente lineae vix majora, punctis nonnullis, in sicco fuscis, conspersa. *Flores* axillares, sessiles, bibracteolati, lineam circiter longi, glaberrimi, flavescentes. *Hypanthium* membranaceum, subpellucide punctatum. *Calycis* phylla uninervia, margine subpellucida. *Petala* suborbicularia, basi attenuata sessilia, concava, minute et inaequaliter denticulata, semilineam longa, patentia, e sinibus calycis semiemergentia, aureo micantia. *Stamina* corolla duplo longiora; antherae subrotundae, incumbentes, biloculares, loculis distinctis parallelis rima longitudinali dehiscitibus; phalangum unguis quartam partem petalorum tantum aequantes, tamen manifesti. *Germinis* in omnibus floribus nostri speciminis ne minimum quidem vestigium!

Planta valde singularis quidem, sed ex quacunque parte ad *Melaleucam* pertinens, nisi fructus differat. *Flores* germine abortivo etiam in aliis speciebus non raro occurrunt.

CONOTHAMNUS Lindl. Swan River Bot. pag. IX. Endl. Gen. n. 6297.

Flores in spicam infraapicalem collecti, sessiles, *bracteis* magnis ovatis scariosis ante anthesin (ut in *Callistemonis*) dense imbricatis eadueis singuli singula subtensi. *Hypanthium* campanulato-eyathiforme, germen ambiens, *calycis* dentibus 5 coronatum. *Corollae* petala 5, margini hypanthii inserta, calycis dentibus alterna, membranacea. *Stamina* plurima, inferne in laminam perigynam conflata, a margine hypanthii inde in phalanges 5, petalis oppositas, polyandras, palmatifidas distincta; filamenta filiformia, apice attenuata; antherae subglobosae, biloculares, juxta basin dorso insertae, incumbentes: connectivum angustum, lineare: loculi distincti, paralleli, rima longitudinali valvisque late hiantibus dehiscences. *Germen* fundo hypanthii immersum, liberum nec nisi basi adnatum, vertice villosum, triloculare; loculi unigemmulati. *Stylus* subulatus; stigma acutum. *Capsula* hypanthio marcescenti pergamentaceo inclusa, libera, chartacea, apice loculicida dehiscens. *Semen* in singulo loculo solitarium, peltatum.

Genus perinsigne. Habitus et inflorescentia exakte *Callistemonis*; stamina *Melaleucae*; fructus et semen *Beaufortiae*. — Quum nuperius tandem mihi contigit, ut plantum examinarem, cognovi genus inter *Melaleucas*, neque inter *Calothamneas* (conf. Dissert. nostr. gratul. pag. 10) esse collocandum.

1. *Conothamnus trinervis* Lindl. l. c. n. 26!

In Nova-Hollandia anstro-occidentali coll. L. Preiss et J. Drummond!

Frutex ramis declinatis, cortice griseo fissili indutis, ramulisque subverticillatis rigidulis. *Folia* coriacea, opposita, aversa, lanceolata, basi in petiolum brevem attenuata, acuminata apice saepius sphacelato, trinervia nervis lateralibus submarginalibus, venosa, margine scabra, novella pilosa, adulta glaberrima utrinque lucida, pollice paullo longiora aut breviora, 2-3 lineas

lata. *Spicae* unciam circiter aequantes, confertissimae, ovatae, rhachi hypanthioque cum calyce villosissimis. *Bractee* scariosae, ovatae, acuminatae, concavae, tergo pubescentes, ambitu margineque villosae, 3-4 lineas longae. *Calycis* dentes triangulares, acuti. *Petala* membranacea, margine scarioso. *Phalanges* staminum flavae, inaequaliter fissae, 9-13-andrae, 4 lin. longae, unguibus petala aequantibus. *Fructus* in spicam cylindraceam congesti.

Sect. 2. **CALOTHAMNEAE.** Antherae basi insertae,
erectae.

REGELIA Schauer. Dissert. gratul. (Acta Acad.
N. C. XXI. Pars I. pag. 7. tab. I. fig. 1—3.)

1. **Regelia ciliata** Schauer l. c. *Melaleuca sprengilioides*
DC. Mém. Myrt. tab. 3.

In arenosis illustribus porrectis silvae ad fl. Vasse River, Decembri 1839:
Herb. Preiss. No. 287. — J. Drummond!

„Frutex 5-pedalis, ramosissimus“, ramulis villosis. *Folia* conferta, opposita, decussata, obovato-oblonga v. subrotunda, sessilia, obtusa, 5-nervia, subinflexa, superne recurva, facie tenuiter puberula, dorso glabra, marginibus costaque piloso-ciliata, laete-viridia. *Capitula* 10-20-flora, lilacina.

BEAUFORTIA R.Br.; Schauer l. c. pag. 8.
tab. I. fig. 4-11.

1. **EUBEAUFORTIA.** Antherae valvulae extensoriiformes,
patentissimae; interiores planae, orbiculares, marginatae,
verticales. Schauer l. c.

1. **Beaufortia decussata** R.Br. ramulis villosis; foliis
confertissimis, decussatis, ovatis ovalibusve, subsessilibus,
acutis, carinatis, recurvis, 7-9-nerviis, marginatis, glabris;
spicis infraapicalibus, multifloris; axi villosis; hypanthio
villosulo; calycis phyllis e basi ovata-subulatis, carinatis,
nervosis, margine villosis; phalangibus aequalibus, subpol-
licaribus, 7-andris, apice subfasciculato-pinnatifidis: filamen-
tis patentibus fastigiatis: unguibus linearibus, rectis, infima
basi interne villosis-barbatis. R. Brown in Hort. Kew. IV.
pag. 418.

In silvaticis arenosis baud procul ab oppidulo Albany (Plantagenet.) rara,
Octobri 1840 alabastrigera. Herb. Preiss. No. 356. — Ferd. Bauer! (v. v. c.)

„Frutex 6-7-pedalis, erectus“.

Beaufortia parva, R. Br.

In vicinia oppidis Freemantli,
Mons. Hollandiae austro-occiden-
talis.

Anth: asphate

II. SCHIZOPLEURA. (Lindl. Swan River Bot. pag. IX.)

Antherae divaricato-bilobae valvulae convexae; exteriores (inferiores) margine involutae; interiores (superiores) minores. Schauer l. c.

2. **Beaufortia sparsa** R.Br. glabra; foliis confertis, patulis, sparsis subverticillatisve, lanceolatis ovalibusve, sessilibus, inflexis, apice complicato acutiusculis, 5-9-nerviis, glabris; spicis infraapicalibus, multifloris; axi lanato; hypanthio basi pubescente; calycis phyllis ovato-subrotundis enervibus glabris; phalangibus aequalibus, pollicaribus, 7-andris; filamentis infimis alternis remotiusculis, reliquis ad apicem subfasciculatis fastigiatis; unguibus rectis, glabris. Schauer l. c.

B. splendens Baxter. Otto et Dietr. Allg. Gartenztg. II. pag. 274!

In turfosis uliginosis ad oppidulum Albany (Plantagenet), Januario 1841. Herb. Preiss. No. 319 et No. 355. (v. v. c.)

3. **Beaufortia squarrosa** Schauer. ramulis pubescentibus; foliis confertis, oppositis, patulis, ovalibus, sessilibus, obtusis, inflexis, recurvis, trinerviis, marginatis, glabris; capitulis subapicalibus, plurifloris; axi hypanthioque pubescentibus; calycis phyllis foliaceis, ovatis, acuminatis apice obtuso, trinerviis, glabris; phalangibus 3-andris: unguibus elongatis, tenuissimis, glabris. Schauer l. c. pag. 11.
„*Buno*“ aboriginum: Preiss. Mss.

In solo sarnenoso plantici inter frutices ad fl. Canning, Junio 1831. Herb. Preiss. No. 358.

„Frutex 4-pedalis, squarrosus“. *Phalanges coccineae*.

4. **Beaufortia macrostemon** Lindl. ramulis pubescentibus; foliis confertis, patulis, oppositis, lineari-lanceolatis, sessilibus, obtusiusculis, trinerviis, marginatis, pubescentibus, margine pilosis, denique glabratibus; capitulis apicalibus, densifloris; axi hypanthioque sericeo-lanatis; calycis phyllis subulatis, pubescentibus, piloso-ciliatis, corollam aequantibus; phalangibus triandris, inaequalibus, leviter declinatis: unguibus longiorum semipollicaribus, inferne barbatis. — Lindl. Swan River Bot. pag. X. n. 31!

In limosis calculeosis silvaticis terrae superioris, haud procul a cataracta ad caput fl. Swan River, Januario 1840. Herb. Preiss. No. 357. — J. Drummond!

„Frutex vix pedalis, ramosissimus, confertus“. *Capitula* 15-20-flora, *phalangibus* bicoloribus, superne scarlatinis, inferne albicantibus.

5. **Beaufortia anisandra** Schauer. ramulis puberulis, denique glabrescentibus; foliis confertis, patulis, oppositis, ovalibus oblongisve, sessilibus, obtusis, inflexis, subrecurvis, 3-5-nerviis, glabris, margine scabris; capitulis apicalibus, densifloris; axi hypanthioque basi lanato; calycis

phyllis ovatis, obtuse acuminatis, glabris, corolla duplo brevioribus; phalangibus apice 5-7 andris, valde inaequalibus; unguibus longis, rectis, inferne barbatis. Schauer l. c. pag. 13 tab. I. A. fig. 6—11.

In solo arenoso inter frutices densos silvae ad planitiem prope oppidulum Albany (Plantagenet), rara, Januario 1841. Herb. Preiss. No. 362. — Ad Sinum Regis Georgii 1818: A. Cgh.!

Frutex gracilis, capitulis globosis atrovioleaceis. „Flores nauseosi.“

6. **Beaufortia purpurea** Lindl. ramulis puberulis, denique glabrescentibus; foliis oppositis, sessilibus, quadrifariam imbricatis, lineari-lanceolatis, carinato-inflexis, obtusis, trinerviis, glabris; capitulis subapicalibus, densifloris, bracteatis; axi hypanthioque sericeo-lanatis; calycis phyllis e basi ovata aristato-subulatis, piloso-ciliatis, corolla duplo longioribus. — Lindl. Swan River Bot. pag. X. n. 30. tab. III. A!

In rupestribus illustribus Australiae occidentalis, Januario 1841. Herb. Preiss. No. 258.

„Frutex pedalis-sesquipedalis, erectus, divaricatus“. *Capitula* Cerasi mole, kermesiana.

7. **Beaufortia Schaueri** L. Preiss. ramulis pubescentibus; foliis oppositis, sessilibus, confertissimis, patulis, quadrifariam imbricatis, lineari-trigonis, canaliculatis, obtusis, glabris; spicis subapicalibus, oblongis, densifloris; axi hypanthioque lanatis; calycis phyllis foliaceis, ovatis, acuminatis, carinatis, glabris, basi ciliatis, corolla duplo brevioribus; phalangibus 3-5-andris, aequalibus, adscendentibus, apice radiantibus; unguibus corolla ter longioribus, interne barbatis. Schauer l. c. pag. 14.

In colliculosis confragosis prope montem Manypeak (l. Tjilberup) et in glareosis ad radices clivium Konkoberup promontorii Cape Riche, Octobri 1840. Herb. Preiss. No. 305.

„Frutex 4-5-pedalis, ramosissimus“, ramulis brevibus rigidis foliosis. *Capitula* roseo-lilacina.

8. **Beaufortia elegans** Schauer. ramulis lanuginosis; foliis oppositis, approximatis, decussatis sessilibus, obovatis, obtusis, subcarinatis, apice recurvis, subtus trinerviis, marginatis, pubescentibus, denique glabrescentibus; spicis infraapicalibus, cylindricis, densifloris, bracteatis; axi hypanthioque sublanatis; calycis phyllis foliaceis, ovatis, obtusiusculis, trinerviis, pubescentibus, corolla duplo brevioribus; phalangibus 3-5 andris, aequalibus, adscendentibus; unguibus corolla fere duplo longioribus, glabris. Schauer l. c. pag. 16.

In planitie arenosa Quangen (Victoria), Martio 1840, deflorata. Herb. Preiss. No. 284.

„Frutex bipedalis“. *Spicae* lilacinae.

9. **Beaufortia inops** Schauer. ramulis tomentosis glabrisve; foliis abbreviatis, carnosulis, oppositis, quadrifariam imbricatis.

Alaloragus muricata Juss. Mill.

P. asperissima Juss. Mill.

robusta, ^{medio, lobatissima} stria creta, foliis etiam floratis
propinque serratis incisive, serraturis un-
inulatis incisionem deinde intrinseca car-
nosa, fructibus saepius laevigatis.

In glacia vivorum exsiccante prope
Gardnaka alibiq. recentes Flinders-
+ ^{locum 5000} ^{valley}
Viti omnis aliar. species valde poly-
morpha.

+ Laudonia citrina, fruct. Mueller

multicaulis, erecta, glabra, caulibus
 succibus elatis remote foliatis apicem
 raris ramosis, ramis apophyllis in
 paniculam corymbosam compactam
 densifloram abeuntibus, foliis sem-
 succibus canaliculatis, bracteis su-
 perioribus membranaceis anguste
 lanceolatis flore minoribus, floribus
 hermaphroditis, calycis tubo tetra-
 ptero, petalis stylisque quatuor,
 brevibus cetero parvis, pili-
 bus nullis.

Ad ripas glareosas fluviorum exsiccatum
 in ^{ad latus, corymbosum} ~~mesotium~~ ^{Flinders range}, nec
 intra rupes apicales - mesotium
 Eoers range & prope Cucunaka

Præter notas, quas diagnosim daret,
 diffingui a L. Behrii totius longi-
 tudinis angustioribus nec planis, cauli-
 bus & ramis ~~longioribus~~ ^{longioribus}
~~herba purpureis~~ ^{floris} ~~longioribus~~ ^{longioribus}
 alba parvis, stam. flava oblonga arach-
 noidea breviter cucullata. Staminibus
 luteis. Stylis & germen pallide flavum.
 Fructus maturas desideravi.

L. aurea proxima pro comparationem
 deest, & L. flavicornis ~~quædam~~ ^{quædam}
~~placida ignota est.~~ ^{placida ignota est.} ~~tantummodo~~ ^{tantummodo} ~~est~~ ^{est}
 Auth. von. his brevibus Drummond-
 diensis ~~non~~ (Hb. L. J. of bot. 1, 396) non

eatis, subrhombeis, utrinque obtusis, basi solutis, facie tomentosa concava adpressis, apice subpatulis, dorso carinato glabris, margine breviter ciliatis; capitulis subapicalibus, exiguis, bracteatis; axi lanato; hypanthio pubescente; calycis phyllis foliaceis, ovatis, obtusis; subcarinatis, glabris, corolla duplo brevioribus; phalangibus 5-andris, aequalibus, adscendentibus; unguibus corollam subaequantibus, glabris. Schauer l. c. pag. 17.

In regionibus interioribus sterilibus Australiae meridionali-occidentalis; in itinere a Sinu Regis Georgii ad oppidulum Perth, Febuario 1840. Herb. Preiss. No. 257.

Frutex ramis ramulisque rigidulis subtortuosis copiosis, his foliis plane obtectis. *Capitula* Piso vix majora, subdecemflora, lilacina.

10. **Beaufortia micrantha** Schauer. ramulis tenellis, tomentosis; foliis abbreviatis, carnosulis, oppositis, sessilibus, quadrifariam imbricatis, arcte adpressis, ovatis, obtusis, facie concava pubescentibus, dorso carinato glabris; capitulis subapicalibus oblongis densifloris, bracteatis; axi hypanthioque lanatis; calycis phyllis ovatis, obtuse acuminatis, carinatis, glabris; phalangibus triandris; unguibus corollam aequantibus, glabris. Schauer l. c. pag. 18.

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberup promontorii Cape Riche, Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 256.

„Frutex pedalis“, conferte ramosus, ramulis foliis penitus obtectis ideoque quadrangularibus, tomento inter folia pullulante albo. *Capitula* diametro 3-4 lin. metientia, lilacina.

CALOTHAMNUS Labill. Schauer l. c. pag. 19. tab. I. B. fig. 12—17.

I. **CALLITHAMNUS**. Gemmae floriferae ramulo adnatae, sub-unilaterales, nudae vel perula cucullata apiculata, dein alabastro adolescente sublata vel bivalvi-dehiscente obtectae. Phalanges polyandrae. Schauer l. c.

1. **Calothamnus sanguinea** Labill. ramulis villosis; foliis sparsis, confertissimis, saepe implexis, accrosis, terebibus l. planiusculis, acutis, inermibus, incurvis apice recurvis vel ascendentibus, pilosis, denique glabrescentibus; floribus tetrameris, axillaribus, paucis subspicatisve; hypanthio cyathiformi, cum calyce albo-lanato; phalangibus duobus polyandris, radiantibus, inferne connatis; (antheris biserialim punctatis); staminodiis duobus sejunctis. — Labill.

N. Holl. II. pag. 25. tab. 164! *C. eriocarpa* Lindl. Swan River Bot. pag. IX. n. 28!

In arenosis silvae eis oppidulum Guildford gregatim crescens Julio 1839. Herb. Preiss. No. 214; in planitie arenosa Quangen, Martio 1840, alabastrigera: No. 216; in regionibus interioribus Sinum Regis Georgii et vicum York interjacentibus, Febuario 1840, alabastr.: No. 219, 220 et 221. — In Terra Van-Leuwin: Labill.; ad Sinum Regis Georgii: Hügel! — J. Drummond!

2. ***Calothamnus torulosa* Schauer.** caule rigido, tornoso; foliis confertissimis, erectis, compactis, tereti-subfiliformibus, pungentibus, incurvis, glaucescentibus: novellis inferius pilosis: adultis glabris, asperis; floribus tetrameris, axillaribus, subsolitariis, torulo fungoso insidentibus; hypanthio hemisphaerico, sericeo; phalangibus polyandris, duabus latissimis erectis, duabus angustioribus flexuosis: unguibus fasciaribus: filamentis fastigiatis: (antheris virgineis longe ciliatis). Schauer l. c. pag. 21.

In calcuosis ad radices montium Darling's-range, haud procul a villa Mad-dington, Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 212. — J. Drummond!

„Frutex dodrantalis-bipedalis“, rigidus. *Flores* speciosi; *phalanges* coccineae pollicares, majores 2-4 lineas latae, minores triplo-quadruplo angustiores.

3. ***Calothamnus rupestris* Schauer.** ramulis villosis; foliis sparsis, confertissimis, compactis, acerosis, e tereti compressis, pungentibus, incurvis, glauco-viridibus: adultis glabris, laevibus; floribus tetrameris, ramealibus, paucis; hypanthio subcylindrico, incano-villoso; phalangibus sub-15-andris, aequalibus, inaequaliter ramosis. Schauer l. c. pag. 22.

Inter rupes quarzinas ad latera montium Darling's-range, Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 211.

„Frutex octopedalis, squarrosus“. *Phalanges* coccineae, pollicem circiter longae, unguibus lineam latis.

4. ***Calothamnus robusta* Schauer.** ramulis tomentosis; foliis sparsis, confertissimis, rigidis, recurvo-patentibus, teretibus, oblique acuminatis, pungenti-mucronatis: junioribus pilosis: adultis glabris, laevibus; floribus tetrameris, ramealibus, paucis; hypanthio cyathiformi, villosa-incano; phalangibus 20-andris, subaequalibus, superne pinnatifidis, apice radiantibus. Schauer l. c. *C. robusta* et *C. Knightii* Hort.

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoherup promontorii Cape Riche, Novembri 1840, desflorata. Herb. Preiss. No. 213.

„Frutex bipedalis“. *Phalanges* coccineae, 14 lineas longa. *Antherae* lorso viscoso-punctatae.

5. ***Calothamnus clavata* Mackay.** ramulis villosis; foliis sparsis, confertissimis, patentibus, subclavatis, e tereti compressis, acutis, incernibus, rectiusculis v. incurvis, piloso-hirsutis, denique glabrescentibus, punctatis; floribus tetrameris, ramealibus, unilateralibus vel aequaliter spica-

Meionoceros Sonderi Jord. & Mueller.

In humulis madidis ad catarractam
latiam montium Lofty-ranges.

Inda M. Brownii & *Pneissii* *suecicus*
Caulis angulatus. Fructus compressus
subcarnosus viridis. Nam B. (an semper?)

Calothamnus quadrifida, Fr. Brown.

Frumentelli.

Auth, restate

x Bootheria (n.g. Sam Myriophyllo quam
meionandride et Haloro. affine) f. n. n.

B. myriophylla Jui Muller.

Occurrit copiose in Thaque aliis
quodam sublapso in N. P. Oceanum
marino & Ruppia noddellata inter
Portum Adelaide & finem Gold-
Harbour!

Fun, on the

Caulis teretiusculus. Flores brevissimi.

Moss: Calycis pphylla 2 orbiculata
sola minima terminata not cito

subulata erecto minimis, ~~petalo~~ pet.
(petalo?) maximo (Galeolaria)

calicium campanulato nunc viridi
nunc nivescente horizontali!

Flos femineus tubigynus conjugiorum

Ipomoea raphanifolia, non magis acuminatula re-
scentur, quam floris & fructus divisis in dode-
nariacationemque quorum *Ipomoea*. *Cynopho-*
rum enim in *Ipomoea* observari integrum, ^{pin-}
^{atun} hoc in lobos partitum, stamina ^{separatis}
^{anthe connatis} *oppositifolia* ex iis quos *proseuntia*, *stamina*
laevia *laevissima* in *laevia* *plura* bene etiam
evoluta. — *Id* *Ipomoea* *laevissima*, quam sub-
genus *Lygophyllo* *connatis*, *libit*.

tis; hypanthio subcylindrico, pubescente; calycis phyllis subaequalibus, ovatis, obtusis; phalangibus subicosandris, aequalibus, superne pinnatifidis; unguibus elongatis. Schauer l. c. Lodd. Bot. Cab. 1447.

„*Queitjät*“ aboriginum.

In solo sublimoso ad ripam fl. Avon, prope praedium rusticum cl. Whitfield, Martio 1840, fructifera. Herb. Preiss. No. 210. — J. Drummond! (v. v. c.)

„Frutex 10-pedalis“, habitu *C. quadrifida* R.Br. valde similis, sed ab omni parte major, foliis latioribus hirsutis, hypanthio pubescente (superius quidem cito calvescente), calyce profundius fissio discriminandus.

6. **Calothamnus quadrifida** R.Br. ramulis glabris villosisve; foliis sparsis, confertissimis, patentibus, acerosis, c. tereti compressis, acutis, inermibus, subnervis: junioribus pilosis: adultis glabris, punctis prominentibus conspersis; floribus tetrameris, ramealibus, unilateralibus vel aequaliter spicatis; hypanthio subcylindrico, glabro, verrucoso-punctato; calycis phyllis rotundatis, externis gibbosis; phalangibus subicosandris, aequalibus, superne pinnatifidis; unguibus elongatis. R.Br. in Hort. Kew. IV. pag. 418! Schauer l. c. pag. 25.

C. purpurea Endl. En. pl. Hügel. pag. 48. n. 151!

In elevatis valde arenosis prope Freemantle ad fl. Swan River, Decembri 1838. Herb. Preiss. No. 207; in calciosis ad radices montium Darling's-range, Octobri 1839, No. 217. — Hügel! J. Drummond!

7. **Calothamnus laevigata** Schauer. ramulis et innovationibus glabris; foliis sparsis, confertissimis, patulis, subclavato-teretibus, obtusis, brevissime apiculatis, laevibus, nitidis, punctatis; floribus tetrameris, ramealibus, unilateralibus; hypanthio cylindrico, glabro, punctato; phalangibus 15-20-andris, aequalibus, superne pinnatifidis. Schauer l. c. pag. 26.

In Australia meridionali-occidentali, inter Sinum Regis Georgii et vicum Perth, Februario 1840. Herb. Preiss. No. 215.

Frutex gracilis, foliis acerosis, 6-12 lin. longis, obtusis, laete virentibus, nitidis, floribusque conspicuis coccineis insignis.

II. **STROMNOTHAMNUS.** Gemmae floriferae in tumescentia ramuli nidulantes, stragulo corticali fungoso oblectae; alabastra adolescentia erumpentia, adulta immersa vel magis minusve emersa. (Hypanthium hemisphaericum cum calyce glabrum.) Phalanges 3-7-andrae. Schauer l. c. pag. 27.

* *Flores submersi, axi paullo tumescenti circumpositi, conferte spicati.*

8. **Calothamnus Lehmanni** Schauer. ramulis hirsutis; foliis sparsis, confertissimis, acicularibus, teretibus, acutis,

inermibus glaucescentibus; junioribus pilosis: adultis glabratis; floribus tetrameris, conferte spicatis; hypanthiis semiimmersis; phalangibus duabus, pentandris; staminibus duobus simplicibus. Schauer l. c. pag. 27.

In Australia meridionali-occidentali interiori, inter Sinum Regis Georgii et oppidulum York, Februario 1840. Herb. Preiss. No. 218.

„Frutex ramosus“. *Folia* pollicaria. *Spicae* multiflorae foliis interstinctae. *Phalanges* 4 lineas longae, *stamina* distincta triente breviora, utraque atropurpurea.

9. **Calothamnus Preissii** Schauer. ramulis villosis; foliis sparsis, confertissimis, patulis, tereti-filiformibus, apice redunco-cuspidatis, glaucescentibus: hornotinis appresse pilosis: annotinis glabratis; floribus tetrameris, glomerato-spicatis; hypanthiis immersis; phalangibus superioribus paullo longioribus, pentandris: inferioribus triandris. Schauer l. c. pag. 27.

In solo glareoso silvae cis fl. Gordon, Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 209.

„Frutex sesquipedalis“, ramis suberosis. *Folia* 2-4 pollices longa, tenuia, saepe flexa. *Phalanges* sanguineae, erectae, majores 9, minores 7 lineas longae.

10. **Calothamnus Schaueri** Lehm. innovationibus villosis; foliis subverticillatis ternis-quaternis, strictis, elongatis, tenuiter filiformibus, teretibus, oblique cuspidatis, pallide virentibus: hornotinis appresse pilosis: annotinis glabratis; floribus tetrameris, dense spicatis; hypanthiis basi immersis; phalangibus brevibus, aequalibus, 2-3-andris. Lehm. Delect. Sem. hort. Hamb. 1842. pag. 7! Schauer l. c. pag. 28.

In regionibus interioribus sterilibus Australiae meridionali-occidentalis, Sinum Regis Georgii et oppidulum York interiacentibus, Februario 1840. Herb. Preiss. No. 202.

Frutex pede vix major, simpliciusculus. *Folia* stricta, 4-6 pollices longa. *Phalanges* adscendentes, 2 lineas longae, atropurpureae.

11. **Calothamnus schoenophylla** Schauer. glabra; foliis oppositis vel subverticillatis ternis-quaternis, subfasciculatis, patentibus, elongatis, semiteretibus, cuspidatis, viridibus; floribus tetrameris, conferte spicatis; hypanthiis semiimmersis; phalangibus . . . . Schauer l. c. pag. 29.

In solo subturfoso-arenoso inter frutices silvae ad planitiem prope oppidulum Albany (Plantagenet), Decembri 1840, fructifera. Herb. Preiss. No. 201.

Frutex pedalis-sesquipedalis, gracilis, ramis paucis tortuosis adscendentibus patentissimis. *Folia* 6-8 pollices longa, rigida, opaca, saepe secunda).

*) **C. Hügelii** Schauer. glabra; foliis in verticillis remotis confertis, patulis, filiformibus, rigidis, teretibus, incurvis, acutis, inermibus, pallide viridibus; floribus tetrameris, unilateralibus; hypanthiis usque ad apices calycis immersis; phalangibus subaequalibus, rectis, 5-7 andris, superne pinnatifidis (antheris seriatim punctatis). Schauer l. c. pag. 30. *C. quadrifida* Endl. En. pl. Hügel. pag. 48. n. 150! Ad Sinum Regis Georgii: Hügel. Frutex validus. *Folia* $2\frac{1}{2}$ -3 poll. longa. *Flores* conferte spicati. *Calycis phylla* subrotunda, acutiuscula, interne glabra, tenuiter ciliata, aestivatione valvata. *Phalanges* 10 lin. longae, purpureae.

Geranium pilosum! Forster non Nabe.
 nostra ^{pl. auct.} *piegnus* *doniana* vni-
 modo *conivens* *diversissima* est
 a *G. Keefiana*, quae cui nomen
 "*G. Keefianum*" ~~adscripti~~ attribuitur.
 "Vulgaris *Tasmanica*" ^{alt. 18} ^{pl. auct.} *1848.* hb. St. II n. 90! ^{pl. auct.} *1848.*
lignis *graminosis* *prope* *St. II.*
Dampier *ad* *finem* *Rivoli-*
Way *vagus.* — *Terribilis*,
radice *crassa* *sub* *capiformi*,
putala *obovato-runcata* *re-*
tusa *v.* *apiculata* *vel* *emur-*
ginata *vel* *imbricata* *vel* *laciniata*
viridis *vel* *viridis*, *caerulea* *vel*
 pallida (non *conivens*!)
Variet *pubescens* *pedicellis* *longis*
pubescentibus *et* *raro*
putalis *inciso-plurifidis!* *St. II.*
Oct. 1848. — *Tasman.* *hb. St. 726.*
Sturt-river. *Nov. 49.*

J. brevicaule *W. Barker.*
G. Diemenicum *Erasm.*
pubescentibus, ^{supra basin} *pubescentibus* *vel* *pubescentibus*
e *coram* *radice* *pubescentibus* *vel* *pubescentibus*
pubescentibus, *foliis* *quinquepartitis*
laciniis *longis* *apice* *inciso*
tridentatis, *supra* *longo-lan-*
ceolatis *mutronatis*, *radice* *perenni!*
Simile *prostratum* *illis* *G. par-*
siflori, *quocirca* *istituta* *est*,
non *est* *alios* *prostratis!* *Exemplum*
unicum *a* *Stuarti* *notum* *non*
vernale *est* *et* *a* *collezione* *sempre*
eadem *habitu* *invenitum* *est*
St. II. *Murzig-river*, *hb. St. II.* *n. 416.*
Jan. 10. 1848. *Juxta* *G. philonotum*
in *systema* *infero.*

G. parviflorum. Willdonow.
G. retrorsum L'Heritier.
 Novae Hollandiae, Australiae.
 Juncus hanc *G. pilosa* maxime
 inopinguam sed floribus mi-
 noribus et pilis brevioribus
 diversa neque *G. parviflori* W.
 nec *G. retrorsi* L'Heritier dia-
 gnosis exacte quadrat, nam
 in hac radice dicitur annua,
 quae revera est *parvifloris*
 (ab aboriginibus ut naves
 pumpha) perennis, ab illius
 diagnosi (fallaciosa Doniana)
 indumento pedunculorum, caly-
 cum et petalorum retrorsis
 abhorret. sicut. Sed opinionio
 cl. Schlechtendali fuit (confer-
 tur Linnaea 1847) et ambae
 et hae *prole* ~~aristata~~ *aristata* ortae
 sunt. Præterea posidea plantae
 ex eodem loco ubi cl. Scher-
 zeram legit, quae ultima ab
 exemplaribus horti botanici Be-
 rolinensis hanc ~~est~~ *sparsa*
 strita porre juncus in colonia
 Novae Holl. austr. crebre arvensis
 et frequentia ~~et perpetua~~ *et perpetua* anthi-
 variations ~~et arvensis~~ *et arvensis* ~~monstrata~~
 debuit. Calyx multicus, mucro-
 na terve corollam superans vel
 petalis brevior. Pedunculi gerunt
 pedicellum 1 vel plerumque 2. *Cl.*
Limina reticulata in *G. retror-*
so indicata etiam in nostro
 reperi. — Ad fl. St. Pauli Tasman.
 Ab. St. 691.

Lythrum Hyoosipifolia L.

** *Flores tumescentiae corticali spongiosae pulvinariformi immersi, unilaterales.*

12. **Calothamnus gracilis** R.Br. glabra; foliis sparsis, confertis, patulis, tereti-filiformibus, rigidis, incurvis, pungenti-mucronatis, pallide viridibus; floribus pentameris, unilateralibus; hypanthiis immersis; phalangibus aequalibus, reetis; 5-7-andris, superne pinnatifidis (antheris impunctatis). — R.Br. in Hort. Kew. IV. pag. 418!

In subarenoso-glareosis clivuli inter montem Manypeak (l. Tjilberup) et promontorium Cape Riche, Novembri 1840. Herb. Preiss. No. 208. — Ferd. Bauer!

Frutex humilis. *Folia* 2-2½ poll. longa. *Flores* speciosi, spicam unilaterallem interruptam struentes. *Calycis phylla* rotundata, interna pagina sericeo-tomentosa, inaequalia, aestivatione imbricata. *Phalanges* coccineae, pollice vix breviores.

13. **Calothamnus longifolia** Lehm. glabra, foliis suboppositis vel subverticillatis ternis-quaternis, strictis, longissimis, tereti-filiformibus, pungenti-mucronatis; floribus tetrameris, unilateralibus; hypanthiis usque ad apices calycis immersis; phalangibus subaequalibus, declinatis, 5-7-andris, fere a basi inde pinnatifidis. Lehm. Delect. Sem. hort. Hamburg, 1842. pag. 7! Schauer l. c. pag. 30.

C. lateralis Lindl. Swan River Bot. pag. IX. n. 27?

In depressis turfosis hieme inundatis: in silva supra Perth, Septembri 1839. Herb. Preiss. No. 200; in planitie prope Albany, Januario 1840. No. 203; ad Sinum Regis Georgii, Novembri 1840, fructif. No. 204. — J. Drummond!

„Frutex sesqui-quadrupedalis“, strictus, gracilis, cortice ad inflorescentiam in pulvinar tumescente. *Folia* 6-15 pollices longa, pallide vel subglaucoviridia. *Flores* nauseosi, atropurpurei. *Phalanges* graciles 6-7 lin. longi.

14. **Calothamnus planifolia** Lehm. ramulis villosis; foliis alternis, confertis, patulis, euneato-linearibus, planis, firmis, obtusis cum apiculo brevissimo inermit, glabris (siccis bisuleis); floribus tetrameris, unilateralibus; hypanthiis usque ad apices calycis immersis; phalangibus subinaequalibus, declinatis, 5-7-andris, a medio inde pinnatifidis. Lehm. Delect. Sem. hort. Hamb. 1842. pag. 7! Schauer l. c. pag. 31.

α angustifolia. gracilior; foliis angustioribus, laevioribus, Schauer l. c. tab. I. B. fig. 12—17.

In solo glareoso planitie prope lacum Mathilda (distr. Hay), Novembri 1840 florens. Herb. Preiss. No. 205.

β latifolia. robustior; foliis latioribus, punctis prominulis asperis costaque crassiori.

In interioribus plagis Sinum Regis Georgii et oppidulum York interjacentibus, Februario 1840. Herb. Preiss. No. 206.

„Frutex bipedalis.“ *Folia* 2-2½ poll. et quod excedit longa, viridia, opaca. *Phalanges* 10 lin. circiter longae, superne purpureae, unguibus perangustis pallidis.

*** Incompleta.

15. **Calothamnus (?) suberosa Schauer.** ramis suberosis, rimosis; foliis subverticillatis ternis, subimbricatis, brevibus, semiteretibus, brevipetiolatis, obtusiusculis, glabris, subglaucescentibus, dorso convexo punctatis; floribus remotiusculis, sparsis, ramo circumpositis, pentameris; hypanthio immerso; phalangibus . . . .

In depressis arenosis inter montem Manypeak (Tjilberup) et promontorium Cape Riche, Novembri 1840, deflorata. Herb. Preiss. No. 206^b.

„Frutex vix pedalis“, ramosus. *Rami* cortice molli, inter flores denique suberéo et rimoso amicti, cum ramulis brevibus patentibus rigiduli. *Folia* $1\frac{1}{2}$ -3 lineas longa, semilineam fere lata, facie lanceolata vel lineari planiuscula argute marginata laevi, dorso convexo punctis biseriatis saepe prominentibus praedito, apice obtuso v. acutiusculo mutico, petiolo brevissimo laminae continuo. *Flores* cortici suberoso immersis, singulati-geminati, spicam interruptam $1-1\frac{1}{2}$ poll. longam struentes. *Hypanthium* ima basi duplici ordine squamularum imbricarum involucreto, campanulatum, breve. *Calycis* dentes 5, ovati, acutiusculi, patentes. (*Petala* et stamina desunt.) *Germen* hypanthio immersum, basi innatum, vertice villosum, triloculare; *gemmulae* in singulo loculo plurimae, in spermophoro ad angulum internum basifixo obliquae. *Capsula* hypanthio cum calyce exarido corticata, subemersa, loculicide trivalvis; semina numerosa, minuta, cuneata, angulata, aptera.

EREMAEA Lindl. Swan River Bot. pag. XI.
Endl. gen. n. 6304.

Flores terminales, singuli vel pauci aggregati, foliis rameis supremis obvallati, bracteis nonnullis squamaceis involuerati, sessiles, bibracteolati. *Hypanthium* campanulatum, germini adnatum, continue in calycem abiens. *Calycis* phylla 5, cutanea, acuminata, persistentia. *Petala* 5, margini interiori hypanthii annuliformi inserta, calycis phyllis alterna, suborbicularia, unguiculata, concava, colorata. *Stamina* plurima, cum petalis inserta, basi connata, irregulariter polyadelphea, exserta, recta; filamenta filiformia; *anthera* connectivo filamento continuo erecta, obovata vel oblonga, bilocularis, loculis connatis prope apicem rima laterali angusta vel poriformi hiantibus dehiscentibus. *Germen* semisuperum, vertice dense villosum, bi-triloculare; gemmulae in singulo loculo plurimae, spermophoro bicostato ad angulum internum basifixo insertae. *Stylus* filiformis, stamina subaequans vel superans; stigma punctiforme. *Capsula* hypanthio valde aucto, basi adnato, acereta, bi-trilocularis, loculicide dehiscens; semina plurima, adscendentia, cuneata, angulata, infima pluralata.

1. **Eremaea fimbriata Lindl.** ramulis pubescentibus pilosisque, foliis approximatis, alternis patulis, coriaceis, oblongo-lanceolatis, obtusis, inflexis, apice recurvis, 3-5-7-nerviis, supra glabris, subtus pilosis, margine villosis;

Ammannia Flourenson.

A. Behriana ^{*Australasica*} ~~*furmell*~~

caule erecto tetragono ramis basi
farpis coccumbentibus, ramis simplicibus,
foliis subsoppositis oppositis caulium
sive amplexantibus lanceolato-line-
aribus, cymis axillaribus paucifloris.
folio baccoribus, floribus tetrandris
apetalis, calyce quadridentato.

In locis inundatis ad fluvium Murray
Aug. 18. Octobr. 1849. *Boissier* & *Endl.*
Prostratum propriam colore & imbric-
distinctam flosse videtur vix novum
genus. Si tamen novum genus sit
nomen ~~*Eadisia*~~ *Behriana* propono!

Behr (Lythraea est Labiatarum genus quoddam
a *Wulframia*!)

9) *Genus* *Lythraea* & viro aestimando *Roberto* *Eades*,
M.D.; *matris* *indicae* in collegio *Lucliniensi* *Profe-*
sori *emissio*.
Eadisia *Australasica* *furmell*

Haloragis *paragustatalia* *furmell*,
Haloragis
Murrayi *var. riviata*
prole *translata*

+ *Muriophyllum varicatum* *Hook.*

Muriophyllum *furmell*

humile foliis minimis pectinatis
circumscriptum lanceolatis, latis
superiorum confluentibus.

In uliginosis ar. fl. Murray Apr.

+ *Lythraea* *humile* *furmell*
& *forman*. *fl. 18. 1849* *nota* *alia* *characteribus*
m. spinato *humile* *habitu* *m. alariflora*

+ *Epilobium canescens* *Endl.*

In graminibus *humilis*

flava *Hook. austr.* & *Tasman.*

pauciflorum *et* *velutinum*

foliis *alternis* *et* *oppositis*

fl. 18. 1849

Epilobium *flava*

fl. 18. 1849

fl. 18. 1849

fl. 18. 1849

In udis ad pl. Murphy Tasm. hb. St. 49.
pluripedalis, aethale
(ex erect. N. & Sp. 49.

Illic species ex diagnosticibus vobis
affine ragnata nisi aequalia sunt
E. cinereum Hook. & indianum
Cum & E. confertum Cunn. ex Nov.
Zealandia.

Anthopsis vire, aethale

x Epilobium Haumi Endl.

In udis Tasmaniae. hb. St. 174.
Sequens forsan varietas
etiam habita praecedenti
accedit.

Anthopsis et priaris

Haloragis (Goniocarpus) rotundifolia Fendl. Mue. Alt.

In paludibus maritimis ad rotundif. Lortian montibus
Lophocarpus. Pa. pulcherrimus virentiorum praecedenti.

x Epilobium Willardii Crichton & Senn

P. lanceolatum Fendl.

foliis lanceolatis basi aequi-
latis. Murry. range Hobart.

Anthopsis vire, aethale nonnulla

Ad hoc rarissime plus solum
Lophocarpus virentiorum Naval. Zeelandia
x. rotundifolia Fendl.

racens, glabra, foliis oppositis ovato vel
cordato - rotundatis apiculis
in undulato furcatis. for a Lortian. Murry. range
aristulatis, floribus purpureis. Lortian. Murry. range
longe callos carnis ligulatus purpureus. Lortian. Murry. range
ovoides, purpureis callos carnis ligulatus purpureus. Lortian. Murry. range
fl. parva (callos carnis ligulatus purpureus). Lortian. Murry. range
ris forsem minimis? G. citrino Cunn. ex Zul. Nov.

Ad H. Murphy, Tasmaniae, hb. St. n. 424.
Jan. 1849.

Haloragis tiliagyna Fendl.

x Goniocarpus tiliaginns! Lortian

Ad rivul. Murphy, Tasmaniae
Jan. 1848 - 2-3' - hb. St. n. 311.

x Haloragis (Goniocarpus) hirsuta Fendl.

H. elata Schlacht, an Cunn. virentiorum
folia angusta - linearia adpressiuscula.
Bethanian, Warappa range, Murray final, Lophocarpus
Fruticulus haud elatus. Odora!
Ruth: vire.

x Haloragis (Goniocarpus) tripartita Fendl. conf.
pag. 184.

ovoides - callos carnis
ligulatus purpureus
Lortian. Murry. range
Ruth: virentiorum

denique glabratiss; floribus subgeminatis; bracteis hypanthio calyceque sericeo-tomentosis; staminibus corolla triplo longioribus, conspicue polyadelphis. — Lindl. Swan River Bot. pag. XI. n. 38!

In arenosis silvae prope lacum Monger's-lake, Octobri 1839. Herb. Preiss. No. 251. — J. Drummond!

Frutex semipedalis, squarrosus, quam sequentes omnibus partibus major. *Folia* 4 lin. longa. *Flores* grandiusculi, filamentis coccineis antheris luteis conspicui. *Bractae* coriaceae, ciliatae, striatae, hypanthium fere omnino velantes. *Calycis* *phylla* subulato-acuminata. *Stamina* irregulariter polyadelphe, unguibus latissimis, petalis haud longioribus; antherae rimae angustae. *Stylus* stamina aequans. *Fructus* magni, singuli, gemini, ramulo arete adnati; hypanthium furfuraceum, albidum, calyce indurato patenti coronatum; capsula vertice densissime villosa. *Semina* numerosa; plurima cuneata, angulata; infima, parieti loculi appressa, pluralata, ala nempe majori dorsum seminis quasi ambiente, duabusque tribusve ad angulos faciales instructa; alis omnibus latis, hyalino-membranaceis, transverse interruptis, ex integumentis gemmulae evolutione progrediente inter vicinas gemmulas partim compressis repetendis.

2. **Eremaea pilosa** Lindl. ramulis lanuginosis; foliis approximatis, alternis, patulis acerosis, lineari-lanceolatis, muticis, apicee subrecurvis, trinerviis, pilosis, adultioribus glabratiss; floribus solitariis; bracteis glabrisenlis vel subpubescentibus, ciliatis; hypanthio intra bracteas puberulo, ceterum cum calyce vernicoso-nitente; staminibus corolla duplo longioribus; unguibus phalangum brevissimis. — Lindl. l. c. n. 37.

In glareosis silvae ad radices montium Darling's-range. Novembri 1839. Herb. Preiss. No. 296; in arenosis illustribus silvae haud longe ab oppidulo Freemantle Decembri 1838. No. 295; in regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis. No. 300.

„*Frutex bipedalis*“ gracilis, inferne simplex, superne laxè ramosus. Innovationes subvillosae. *Folia* 3 lin. circiter longa. *Hypanthium* subcylindricum, viride. *Calycis* dentes cutanei, subrotundo-ovati, acuminati. *Petalata* tenuiter membranacea, subrotunda, reflexa, viridi-purpurea. *Stamina* 3 lin. longa, lateritia, antheris luteis poris ampliusculis dehiscentibus. *Stylus* exsertus. *Germen* vertice emerso albo-sericeum.

3. **Eremaea ericifolia** Lindl. ramulis pubescentibus; foliis approximatis, alternis, patulis, acerosis, lineari-semiteretibus, obtusis, brevipetiolatis, pilosis, adultioribus glabratiss; floribus solitariis; bracteis pubescentibus; hypanthio intra bracteas pubescente, ceterum cum calyce vernicoso-nitente; staminibus corolla vix longioribus; unguibus phalangum brevissimis. — Lindl. l. c. n. 36.

Metrosideros pauciflora Endl. Enum. pl. Hügel. pag. 50. n. 159!

In arenosis colliculosis silvae prope Pine Apple (Perth), Septembri 1839. Herb. Preiss. No. 294. — Hügel!

„*Frutex tripedalis*“, praecedenti valde affinis, sed habitu peculiari, e ramificatione confertiori tortuosa foliisque angustioribus brevioribus crassioribus pendente, floribus paullo minoribus staminibusque brevioribus satis di-

stiuncta. *Petala* patentia viridula. *Filamenta* lateritia, 2 lin. longa; antherae ut in priore. *Fructus* pisi majoris mole, hypanthio fusco laevi ore truncato edentulo, capsula immersa. *Semina* etiam in hac reperi nonnulla simili modo ut supra descripsi pluralata, sed alis perangustis praedita.

HALORAGEAE RBr.

Endl. gen. pag. 1195. Onagrariae
Subordo Halorageae Meisn. gen. pag. 124.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

GONIOCARPUS Koen. Ann. of Bot. I. pag. 546.
DC. Prodr. III. pag. 66. Haloragis specc.
Endl. l. c.

Sect. II. PTEROGYNUS DC. l. c.

1. **Goniocarpus tetragynus** Labill. foliis ovatis acutis sessilibus nitidis marginatis grosse serratis supra hispidis, ramulis junioribus pilosis denum glabrescentibus, spicis axillaribus laxis paucifloris longe pedunculatis gracilibus in apice ramorum subcorymbosis, floribus sessilibus erectis, terminali ad speciem saepe pedicellato, fructu ovali octocostato costis scabris, petalis pilosis. — Labill. Nov. Holl. tab. 53. DC. Prodr. III. pag. 66.

In solo turfoso ad portum Princess Royal Harbour et in turfoso-arenosis scaturiginosis ad Stirling's - Terrace (Plantagenet) m. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 2087 et 2390.

Bractae parvae, lanceolatae, integerrimae. *Caulis* diffusus. ☉

2. **Goniocarpus nodulosus** N. ab E. foliis inferioribus oppositis obovato-cuneiformibus apicem versus serrulatis glabris, superioribus floralibusque hispidis alternis, his lanceolatis integerrimis minoribus, floribus in axillis foliorum sessilibus solitariis spicam dissitifloram foliaceam constituentibus, fructu urceolato quadrangulari octocostato ventre in medio constricto, petalis brevibus apice hispidis.

In Australia occidentali. Herb. Preiss. No. 2378.

Planta parva, annua, erecta, a basi ramosa, ramis oppositis habitu *G. serpyllifolii* Hook, sed foliis floralibus alternis et fructus sculptura singulari distinctissima; ob ventrem fructus medio constrictum cinguli duo nodulorum octonorum alternatim minorum, quorum alter prope basin alter infra collum situs est, oriuntur. *Flos* tetrandrus.

caloneis) *niegacarpa* Fur. Mill. *canx* p. 150.
(*muricata*, *aspartum*)

Microphyllum Vail

~~H. A. ...~~

Folia verticillata 4-6 nervis nervulis parvis
 emarginato ovale-oblongo, subtus pubescente
 serratis ciliolis fere nullis, clavicula vix
 circiter axillaribus. In hirsutissimis Muray 16 miles
 ab oppido Oct. 1892. Alt. lac.
P. puberulum fruticosum folia amplexicaule
 pinnatifida.

Enallagma cyathigerum L.
In l'ogge l'anni Victorica vicinis acqua subpale
stipens, sine stipulis 1888. x s p

2. *U. heteromorphum* Griseb. *U. variegatum* Hook
^{varieg.}

Salix verticillata quadrangulis, cinerea, nonnullis, parvis
 cernis linearibus, bifurcatis, puberulis, rimatis, parvis
 th. laciniis, filicis, floribus verticillatis, axillaribus
 lino. marcescentes, lignum. S. Paul river, N. B.
 18. 1845. 723.

Gonocarpus. Pl. 8, 9. f. 708. v. 68 p. 16. g. 11. m. 1.
f. 708. v. 68 p. 16. g. 11. m. 1.

U. flavo-ovata *U. chamaedryas* *U. fistula*
folia interdum aculeata pubescentia.

In monte lapidoso rarus tractus.
Lapig-range. Dec. 28. 1894. Port Lincoln
flauta subpedation.

*Folia ovato-rotunda, subtus vix glabris, grosse serratis,
ramis herbaceis, hirsutis, densius breviterque glandulis
tomentosis, calycibus, lobis corollae, tubo corollae, et apice*

[illegible]

519 *Polyporus* *serotinus* *hercules* *var. serotinus*

[illegible]

vato. quadrang. Care. jacobaeasata. Kuberulops. nylind. pates.

16. *Leucorhiza* . . . . .
 In planicie arriba de las montes
 Löffi-range. D. B. Mart. 1848. Spruce's "p"

C. muscioides L. S. Musci *platyneura*

Syntherisma *glabrescens* *Dorobay bay.* *northm angulatis*
fructus cauleb. acerris cecidibus *Lagotis*
gibbi *caulecularis* *remo* *icerefo* *-seralis* *capim*
suboppositum *acerristanzuffo* *entran*

marcescentes, *marcescentes* asperso, *marcescentes*

[illegible]

3. **Goniocarpus trifidus** *N. ab E.* foliis omnibus trifidis filiformibus inferioribus verticillato-ternis, floralibus conformibus oppositis, floribus dioicis quadripartitis, axillari-bus solitariis ternisve oppositis maseulis tetrandris.

In turfosis humidis ad lacum haud procul ab oppidulo Albany (Plantagenet) m. Octobri 1840. Herb. Preiss. No. 2401.

„Herba humifusa, radicans“. Antherae lineares.

LAUDONIA Lindl. Swan Riv. XLII, XLIII. Endl. gen. n. 6139. Meisn. gen. pag. 356. Gli-schrocaryon Endl. in Ann. Mus. Wien. 2. pag. 209.

1. **Laudonia aurea** *Lindl.* glaberrima, caule erecto tereti sesquipedali simplici glauco discolore basi foliato apice nunc aphylo, folia linearia alterna coriacea integerrima, panicula terminalis corymbosa, bracteae superiores petaloi-deae obovatae floribus aureis aequales, primariae foliaceae aut deficientes. — Lindl. l. c. pag. XLII. n. 194 cum ic. Walp. Repert. 2. pag. 12. 100.

In calculosis ad latus orientale montis Bakewell (York) m. Septembri Herb. Preiss. No. 2067. et in solo limoso prope urbiculum Guildford et ad fluvium Can-ning (Perth) m. Octobri a. 1839. No. 2068.

β **angustifolia.** foliis linearibus caule infirmo.

In glareosis sterilibus districtus Hay m. Novembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 2079.

Unum tantum vidimus specimen, praeter *folia* multo minora (3-4 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata,) in inferiore caulis parte crebriora, magis patentia, et *cyma* terminalem minorem subsimplicem, haud diversum, de quo, an spe-ciei propriae sit, aliis iudicium relinquimus.

OENOTHEREAE Endl.

Endl. gen. pag. 1188. Onagrarum Sect. II. et III. Juss.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

Tribus II. **EPILOBIAE** Endl. l. c. pag. 1189.

EPILOBIUM Linn. Endl. gen. n. 6121. Meisn. gen. pag. 120. (86.)

1. **Epilobium canescens** *Hügel.* incauo-tomentosum, foliis alternis sessilibus oblongis serratis basi subintegerr-

mis, junioribus subfasciculatis, pedicellis floriferis cernuis fructiferis strictis folio longioribus. Endl. in Enum. plant. Hügel austr. occ. pag. 44. Walp. Repert. 2. pag. 93.

Ad fluvium Cygnorum (Hügel). In arenosis umbrosis et in rupestribus vallis Tood-yay-vally m. Martio a. 1839 et 1840. Herb. Preiss. No. 1946 et 1948.

„Suffrutex bipedalis“ stricte erectus, in umbrosis laxior.

β **glabrescens.** foliis glabris, caule subtilissime pubescenti-exasperato.

In humidis umbrosis ad flumen Cygnorum m. Majo a. 1839. Herb. Preiss. No. 1947.

OXALIDEAE DC.

(Auctore E. T. STEUDEL.)

OXALIS Linn. Endl. gen. n. 6058. Meisn.
gen. 57. (42.)

1. **Oxalis Preissiana** Steud. caule tenero simplici sursum folioso, foliis omnibus petiolatis, petiolis basi cum stipulis adnatis (uti caulis-patenti) hirsutis; foliolis omnibus sessilibus subprofunde bifidis ciliatis glaucescentibus puncticulatis; pedunculis rectis folia superantibus supra medium bibracteolatis, stylis longissimis.

In calcareis umbrosis prope Pointwater ditionis Perth, 18. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1915.

Radix tenuis longe descendens parum fibrosa; *caulis* abbreviatus infra petiolorum ortum vix pollicaris; *petioli* pedunculo solitario duplo breviores ad basin caulis plus minus conferti, apice infra foliola dense pilosi; *foliola* a basi ad excisuram 2-2½ lin. longa 3 lin. circiter lata profunde emarginata fere bifida sordide glaucescentia, juniora etiam in utraque pagina sparsim pilosa, impresso puncticulata; *flores* solitarii; *calycis* laciniae oblongae obtusae corolla alba plus duplo breviores pilosae; *capsulae* conicae dense pilosae. ☉?

2. **Oxalis cognata** Steud. tenera parvula; caule procumbente ramoso petiolisque pilosis, foliolis sessilibus obcordatis sparse pilosis ciliatis; pedunculis axillaribus petiolos superantibus medio bibracteatis refractis; stylis intermediis.

In arenoso-conchyliosis humidis prope lacum insulae Rotenest 22. Ang. 1839. Herb. Preiss. No. 1916.

Radix tenuis fibrosa emittens caulem maxime ramosum; *rami* procumbentes teneres 1-2 pollicares vix et raro longiores; *petioli* subbipollicares erecto-patentes subflexuosi basi stipulis adnatis obtusis muniti; *foliola* parva a basi ad excisuram lineam vix excedentia 2 lineas lata, tenuissime

Billardierianum Seringe Gaule - rivier
~~In vallibus grassantibus~~ ~~Franciae~~ ~~Franciae~~
 Dec. 20. 1848. Flores reflexi - liliatini venis saturati-
 onibus purpureis. Stigma & antherae luteae - luteae
 nudi ad fl. maffi, Satm. n. 435 hb. St. & ~~luteae~~ ~~luteae~~ ~~luteae~~
 pilobium canescens Kiegl ~~mostris~~ ~~alloribus~~ ~~alloribus~~
 hb. St. Tassm. n. 434

fol. plum. suprema. repens altior! caul. asper
 stigma clavatum, petala liliatina vel alba pro-
 funde cordata, rhizoma caespitem repens.
 In fol. patib. ad flumen Torrens rivier. Dec. 26. 1847.
 V. D. L. ! hb. St. Tasmannii n. 99!
 & glabrescens Nees ad eundem montis
 Lottij Dec. 28. 1847. Kingsington Jan. 20.
 1848. Third Creek Jan. 10. 1848. Ad
 Rivium Torrens Dec. 26. 1848.

var. magniflora,
 corollae lobis magis
 profunde - lobatis
 Jan. 10. in maffi
 & maffi maffi

Utriusque citius pro eundem specimenem partem Novo Holl.
 & D. Tassm. partem videntur.
C. microphylla ! Poiret . . V. D. L. !
 Var. pedunculata fl. foliol. intermixta
 hb. St. Tassm. H. Utriusque Tasmanniae,
 per totum annum. hb. St. T. n. 157.

C. cognata Steud.
 Specimina ad riv. Torrens collecta
 recedunt flore flavo, masculinis
 & foemineis separatis characteribus
 uterque bene conveniunt. Petala
 lato cuneata lobis emarginata.
 Jan. 14. 1848. . . . .
 cognatam recedit. plerumque et certe
 pro eadem declaranda, nisi C. Steud.
 recedens bonum desiderat quod in
 Specimenibus intermixtis et fl. a-
 conis subligatis emittent in-
 nitur. In spec. nova, an Descriptio
 juxta specimina manca a Steud.
 facta? In graminis spissis prope
 urbem Adelaide. Jan. 23. 1848. flor.
 hermaphroditi. lutei.

Dec. Stuart eadem apparet in
 caespitibus bonae spici & in terra Van Diemen.
 In regno ulcinio C. microphylla
 appellatur (Error. C. Steud.)

Third Creek Jan. 10. 1848. In valle
juxta montem Laffy, Apr. 28 1848.
Kearington Apr. 28. 1848. Spec. v. a. c.
polyneusiformis, var. flor. foliisque
duplo majoribus, minoribusque, illis
sordidioribus vel extra fulvis.

O. maculatus Desfontainus?
Cenothora sect II Onagra Servign?

C. odoratae Haag. forsan varietas, saltem
huius proxima, et effert tamen sepalis
haud unguiculatis, an igitur spec.
nova Surae australi quondam? *C.*
caulis glanduloso pilosa & pubescens
& petis sparsis hispulis. Petala in
filata illam madefacta ostendunt
ut in *C. odor.* forma cordata. *lapp.*
obtusangula. & *C. striata* L. & *obov.*
repes patria hucusque ignota diff
jam colore florum f. *fluum* cu
thefis f. *rubell.*

Ad vicum inter urbem Ad. castr. &
montes apud Gluc-Osmund. Dec. 28

1847. In hortorum aulica
australe. Sept. 17. 1847.

P. dinum longicaule.
ad fluv. Gaulteri in vicinia pagi
Bethanien. Apr. 14. 1848., ad fl.
Tornens Jun. 16. 1848., ad rivuletum
marginis vespis montes Loftij
range. Her. 28. 1848. — Communis
Tasmaniae Dec. 1848. hb. N. T. Hn.
272—3'. utriusque.
Floris corollae. Al. Don de L.
augustifoliae (Australis) corollam
dilat purpuream, an Australi
itaque differt? quoniam color pu-
salorum in hoc genere basis
conspans est. Erbs indignum.
Ad fivos prope Lyttelton Bay

puncticulata, obscure viridia; *pedunculi* $1\frac{1}{2}$ -2 pollicares, solitarii ex axillis multiflori; calycis laciniae oblongae, striatae, adpresse pilosae; capsula conica, junior stylis persistentibus in adultis evanidis rostrata, dense pilosa.

Proxime accedit ad speciem: *O. procumbentem* Steud. a cl. *Schimpero* (Herb. m. it. No. 1165) in Abyssinia lectam.

LINEAE DC.

(Auctore F. T. BARTLING.)

LINUM L. Endl. gen. 6056. Meisn. gen. 57. (41.)

1. **Linum angustifolium** Huds. sepalis ovatis aenatis eglandulosis capsulam subaequantibus, interioribus obsolete ciliatis; foliis lineari-lanceolatis glabris; caulibus numerosis. — Huds. angl. pag. 134. Engl. bot. tab. 381.

In arenosis inter frutices prope Woodman'spoint d. 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1913. — Ad portum Princess Royal Harbour Nov. 1840. No. 1914.

„Herba 1-2-pedalis, stricta. Flores cyanei“. Stirps Novae Hollandiae, quam etiam prope Port. Jackson lectam coram habemus, ab Europaea caulibus erectis strictis paulisper recedit, vix tamen species diversa videtur.

GERANIACEAE DC.

Fl. Franc. ed. 5. Vol. 4. pag. 1838. Endl. gen. pag. 1166.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

ERODIUM Herit. Endl. gen. n. 6045. Meisn. gen. pag. 57. (41.)

1. **Erodium cicutarium** Leman. caule prostrato aut diffuso hirtio, foliis pinnatisectis segmentis sessilibus pinnatifidis incisus acutis obtusisve, pedunculis multifloris, petalis inaequalibus, staminum basi dilatata integerrima. — DC. Prodr. pag. 646. n. 21. Koch. Synops. Fl. Germ. et Helv. pag. 172. Reichenb. Fl. excurs. pag. 776.

Var. γ **Chaerophyllum** (DC. l. c.), „floribus albis“ (Preiss.), ad formam β caule suberecto accedens.

In solo limoso arenoso ad fluvium Avon River, 19 Mill. ab oppidulo York (York), Septembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 1899; aliis in partibus districtus York No. 1905 (an et haec specimina albidiora?)

Ab Europaeis hujus varietatis et var. *δ pilosae* Thuill. non differt, nisi pubescentia carpellorum alba, quae in nostratibus est ferruginea. *Petala* desunt. ☉

2. **Erodium cygnorum** *N. ab E.* caule „prostrato“ petiolisque retrorsum pilosis, foliis oppositis incumbenti-pilosis triscetis, segmentis lateralibus divaricatis bifido-dentatis, medio majore trifido inciso-dentato, pedunculis submultifloris, calycibus nervosis sericeo-incanis breviaristatis.

In depressis arenosis umbrosis ad flumen Cygnorum supra oppidulum Perth, Augusto a. 1839. Herb. Preiss. No. 1902.

Summopere affine est *Erodio gruino*, a quo differt foliis obtusis neque acutis, lobo medio basi cuneato et integro nec inferne subpinnatifido-inciso, et imprimis sepalis haud caudato-acuminatis, crassinerviis interstitiis nervorum membranaceis fereque glabris, sed ex apice obtuso mucronem aristiformem sepalo quadruplo et amplius brevioribus exsertentibus, tota superficie pilis brevissimis incumbentibus tectis nervisque 5 multo minus conspicuis praeditis. Iisdem characteribus etiam ab *E. scrotino* discernitur, cui quod ad foliorum formam maxime est simile, et insuper differt umbella pauciflora nec multiflora. — *Caulis* articuli novelli dense albo-hirsuti. *Pedunculi* in nostro triflori. *Involuti* foliola ovata, setaceo-acuminata. „*Flores* cyanei“ (Preiss.), petalis ovalibus integris calyce longioribus. *Ovaria* strigosa. *Stamina* glabra. *Fructus* deficit. ☉

An *Erodii gruini* var.? Unum tantum specimen vidi.

GERANIUM Herit. Geran. t. 36—40. Endl. gen. n. 6046. Meisn. gen. pag. 57. (41.)

1. **Geranium pilosum** *Forst.* caule diffuse ramoso, petiolis (foliis) pedunculisque patenti-pilosis, foliis palmatim quinquepartitis laciniis sublinearibus obtusis, trifidis, pedunculis bifloris, pedicellis demum reflexis calycibus ovarisque hirsutissimis, petalis calycem aequantibus subemarginatis „eoeruleis“, filamentis glabris. *Forst. Prodr.* pag. 91. n. 531. (absque diagnosi.) *Willd. sp. pl.* 3. pag. 706. (ad specimen incompletum descriptum.) *Spr. s. v.* 3. pag. 74. *DC. Prodr.* 1. pag. 642. n. 46. *Endlich. in Enumerat. pl.* Hügel. pag. 14. n. 43.

In Nova Zeelandia (Forster).

β *Caule erecto, foliis pilosis.*

In limoso-arenosis porrectis haud longo itinere a praedio rustico cl. Wittenoom (York), Septembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 1900.

Sepala ovata, brevimucronata. 24

2. **Geranium australe** *N. ab E.* pilis brevibus reversis canescens, caule procumbente, foliis palmatim quinquepartitis laciniis sublinearibus obtusis trifidis, pedunculis

Ptilargonium australe Willdenow

F.D.L! hb. Stuart. Tasmaniae 94.
Diagnosi brevissima apud Person
convenit. Sane descriptionis ampli-
oris, vel specimen authenticum sunt
comparanda. — Communis. ad fl.
South Est. riv. Oct. - Nov. 1848.
hb. St. P. II n. 169. — Hinc formis
intermediis plures species plures
autorum confluerent videtur.

P. crinitum V. ab E. Specim. nostra

Directa, an varietas an p. propria?
1. In valle montium Laffy-range nunc
Jorl Longo a domitiliis Glen - Demand
Lifford ad rivales Januar 1848.

Hinc proximum specimen sub
num. 120 e hb. St. P. II in
specibus, piceis aliisque collucta
sed vix specifice diversa a plantis
sub num. 422. *P. erodioides* (?) missis
Ad hanc rem absolutum specimen
authenticum pertinet! An ad *P. australe*
P. litorale! Endlicher. reportandum?

Sine dubio hujus loci, etiam si
solum e nota brevi data ex tri-
cavum. Ambabus ^{plantis} (autenticis) quasi
In aruosis maritimis graciusculis
Leviter. Oct. 16. 1847. by. dr. M.
+ intermedia!

Ptilargonium erodioides M.F. Hook.

var. *pumilum* Jordm. pauciflorum
pinnatis pinnatis gracillimis, totis vix
angustis p. longis, pinnatis ^{latis} totis vix
In specibus ad Lifford - riv. hb. St. P. II n. 169.
? 2. In insula F.D. Laud. hb. St. P. II n. 169.
Ad fl. Murij. Jan. 1849. hb. St.
F. II n. 422.

P. erodioides Hooker?

Specimina pumila hujus diagnosi
aequant mi elatiora. Species videtur
holymorpha. Ad fl. D. D. D. D. D.
mi colligitur piceis vixus sinu rivoli
Mey. Oct. 1848.

bifloris, ovariis hirsutissimis, staminibus glabris; petalis calyce longioribus subemarginatis (coeruleis).

In Australia occidentali. Herb. Preiss. No. 1907.

A *Geranio piloso*, cui quod ad foliorum figuram et flores simillimum, differt statura minore, caule procumbente probabiliter diffuso, et imprimis pubescentia brevior, densiore, reversa, qua efficitur, ut tota planta cauescat. Sepala etiam pilis, sed iis antrorsum incumbentibus canescunt. 2? — An forma sive varietas *Geranii pilosi*?

PELARGONIUM Herit. Endl. gen. n. 6048.

Meisn. gen. pag. 57. (41.)

1. **Pelargonium (Peristera) crinitum** N. ab E. caule angulato diffuso petiolisque pilis mollibus patentissimis villosis, foliis cordato-subrotundis lobatis crenatis glabrusculis basi cuneiformibus subnervellatis, pedunculis multifloris, petalis lineari-cuneiformibus, carpellorum aristis in medio longe barbatis basi apiceque glabris.

α Pedicellis longiusculis.

In arenosis apertis prope oppidulum Fremantle, Decembri a. 1838, et in solo sublimoso districtus Sussex, Decembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 1905 et 1906.

β **Congestum.** floribus propter pedunculos breviores magis congestis pallidioribus, caule firmiore brevior.

In solo arenoso exsiccat ad marginem lacus Mathilde (Hay), Novembri a. 1840. Herb. Preiss. No. 1903.

Species notis indicatis distinctu baud difficilis. *Rhizoma* articulatum, repens, fuscum. *Caules* pedales, angulosi, laxi et debiles, inter villos longos patentes pube brevi subglandulosa densiori vestiti. *Folia* pollicaria, fere quinqueloba, lobis obtusis dense crenatis in nostris saepe crispulis, basi late cordata et e sinu evidenter cuneata ac conniventia, ad costas subtus plus minus scabra hirtave; floralia multo minor, sessilia, trifida. *Pedunculi* firmi, multi, circa apicem caulis subcorymbosi, villosi, 6-7-flori. *Pedicelli* in forma α tubo calycis longiores, in β hunc aequantes eove breviores, cum calycibus pubescentia brevissima viscidula pilisque raris patentibus vestiti. *Calycis* lacinae oblongo-ovales, acutae, margine albo-membranaceo undato cinctae, quatuor reflexae, suprema recta. Tubus nectariferus longitudine tubi calycinii. *Petala* calyce parum longiora, oblongo-linearia, basin versus cuneatim angustata, „laete purpurea“ (Preiss), superiora paulo maiora et basin versus macula saturatiori ramosa notata. *Stamina* 10, basi in urceolum connata, 5 longiora, quorum 4 antherifera, 5 reliqua dentiformia. *Columna centralis* et *carpella* pubescentia. *Rostrum* $\frac{3}{4}$ poll. longum, in medio introrsum (ut in *Pel. humifuso* Willd.) pilis longis erecto-patentibus rigidulis barbatum. 24.

A *Pelargonio littorali* Endlich. (pl. Hugel pag. 14.) differt caulibus procumbentibus diffusis nec erectis, valde angulosis nec teretibus.

2. **Pelargonium (Peristera) erodioides** Hook. (?), subcaule patenti-hirsutum, foliis cordato-rotundatis (sinu lato) subseptemlobatis serratis (crenatis), pedunculis radicalibus (digitalibus) subaphyllis, umbellis tri-7-floris, calycibus villosissimis, tubulo nectarifero subnullo. Journ. of Bot. I. pag. 252. Walp. Rep. II. pag. 459.

Inter rupium rimas summi montis Wuljenup (Plantagenet), Octobri a. 1840.
Herb. Preiss. No. 1901. Specimen sterile.

Species propter flores et fructus deficientes dubia. *Caudex* pollicaris, crassus, residuis petiolorum destructorum exasperatus. *Folia* terminalia, conferta, petiolata. *Petoli* 2-2½ poll. longi, purpurei. *Pubescentia* densa, patens, breviuscula ut in *P. australi*; sed folia breviora sunt et sinus baseos haud angustis lobis conniventibus, sed subulnatis, lenis et parum profundus, quibus commotus ad *P. erodioides* referendum esse censebam nostrum specimen. 24.

ZYGOPHYLLEAE Juss. Endl. gen. pag. 1161.,

(Auctore F. A. GUIL. MIQUEL.)

ROEPERA Adr. Juss. Endl. gen. n. 6035. Meisn. gen. pag. 59. (43.)

1. **Roepera fabagifolia** A. Juss. foliolis oblongis carnosissimis planis, pedicellis brevissimis, caule fruticuloso. A. Juss. Mém. sur les Rutacées pag. 71. tab. 15. n. 157 De Less. Icon. Select. III. tab. 42! pag. 25. *Zygophyllum fruticulosum* DC. Prodr. I. pag. 705. (quare *Roepera fruticulosa* apud quosdam auctores perperam legi videtur.)

Crescit in arenosis clivis Arthur's-head, regionis Perth, 23. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1953.

„Frutex subscandens. *Corolla* aurea“.

Specimina nostra bene cum iconibus citatis quadrant, praesertim quoad florum et fructus analyses. *Foliola* in nostris paullo latiora, acutiuscula, parumper divergentia, an icone cit. operis Lessertiani recte paullo obtusiuscula depicta?

Observ. *Sarcozygium* Bunge (Linnaea XVII. pag. 7) genus mongolicum, nimis fortasse *Roeperae* affine, characteribus bene ponderatis, uice squamulis filamenta intus stipantibus differre videtur.

ZYGOPHYLLUM Linn. Endl. gen. n. 6036. Meisn. gen. pag. 59. (43.)

Sectio Carinaria Miq. Squamula cum filamentis basi in unum conjuncta. *Petala* naviculari-concavata. *Flores* subracemose conferti.

1. **Zygophyllum australasicum** Miq. ramulis, foliis praesertim subtus, sepalisque minute hirtello-pubescentibus, sensim glabratissimis, foliis sessilibus, foliolis binis carnosissimis

Abney St. Garden - near the
wall, near the gate in the
valley in the garden - Sept. 49. 1848.
Hb. Lang. in the garden - Sept. 49. 1848.

Pelargonium Petrianum!

Jud. Müller. ^{notum} notum
Folia ^{erectum} erecta, pilis (majusculum in
pedunculo) brevissimis acutiusculis
longioribus parvis obtusis
foliis ovato-rhombicis lobatis
venosis basi vix truncatis
induratis glaberrimis
pedunculo ^{sub}triaculato subnudo
umbellulis paucifloris, sepalis
lineari-oblongis obtusis
vix mucronatis ciliatis
petalis duplo brevioribus
stipulis plurimae, corollae
coloris saturatis ab aliis Novae Hol.
landiae petalis differt maxime
characteribus. ^{Delavay} Delavay
genum ^{non} non circumscriptum est
ex unico specimenis magno a cl.
colleto ad descriptionem
novum communicato. Sectionem
quidam designare mihi (obsp.
incomplet.) non licuit.

Rar. tota Fol. 2-3" lg 1-2"
lt.
Raro in vallibus prope Lindoth.
valley. Sept. 1848-49. Lyit
H. Dr. Schr.
Pelargonio Rodneyana accedit.

+ Eranium cygnorum Nees.

Corolla cyanea et caerulea
(colore Monarda Chamædrys)
caulis plurimique erectus
magnitudo totius plantae mire
veriat.
Rarum in graminosis coloniae
Nov. Holl. austr. Sept. 49.

Granium Diemeniense F. M.
vix differt a G. brevicaule
+ W. Hooker.

anguste lanceolato-spathulatis, inferioribus plerumque obtusis, superioribus acutis, floribus subracemosis, sepalis ovatis brevi-acuminatis, pistillo albo-piloso.

Crescit in clivulis arenosis insulae Cornac, 8. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 2397.

Zygophyllis plurimis capensibus e *Sect. foliis sessilibus bifoliolatis* affine, petalorum tamen forma et squama fere obsoleta tota coalita (quantum in speciminibus exsiccatis distinguere licet) a congeneribus longius recedens, ob fructum autem adhuc incognitum, tutius huic generi hodie adscribendum. „Frutex tripedalis“. *Rami* vetustiores lignosi, teretes, laeves. *Ramuli* juniores angulati, herbacei, appresse pubescentes. *Foliola* $1\frac{1}{2}$ -3 cent. longa, 3-8 mm. versus apicem lata, subtus praesertim hirtello-puberula sensim glabrata, succulenta. *Stipulae* membranaceae, e lata basi lanceolatae, versus apicem hirtellae. *Flores* in ramulorum apicibus racemoso-conferti, breviter pedicellati, in sicco lutei, plures quidem semiaperti, an tamen jam omnino explicati. *Sepala* 5 succulenta, basi coherentia, magnitudine parumper inaequalia, ovata, breviter acuminata vel acuta, concava, extus pubescentia, $1\frac{1}{2}$ -vix 2 mm. longa. *Petala* duplo vel plus longiora, obovato-elliptica, concavo-navicularia marginibus apiceque inflexis, extus glabra, intus versus basin puberula? *Stamina* 10, petalis inclusa, *antheris* oblongis, bilocularibus, rimis amplis liliatis, *filamentis* basi e squamula concreta incrassatis. *Ovarium* in *stylum* pentagonum continuatum, utrumque albo-pilosum, *stigmatis* 5-lobulati lobulis conniventibus.

DIOSMEAE A. Juss.

(Auctore F. T. BARTLING.)

BORONIA Smith in Transact. Linn. soc. VII. 285.

Adr. Juss. in Mem. Mus. XII. pag. 482. tab. 22.

Endl. gen. n. 6004. Meisn. gen. 60. (44.)

* *foliis simplicibus.*

1. **Boronia laniflora** Bartl. caule dichotome ramoso demum subaphyllo glabro; foliis linearibus canaliculatis, superioribus abbreviatis; cymis terminalibus 3-5-floris pedunculatis; sepalis lanceolatis acuminatis pedicellisque lanatis; filamentis glabriusculis.

α micrantha. caule a basi dichotome ramosissimo adulto aphylo, floribus minoribus.

In turfoso-uliginosis inter frutices plantiei inter montes Melville et Elphinstone (Plantagenet) 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2030.

β macrantha. caule minus ramoso, foliis diutius persistentibus, floribus majoribus.

In sublimosis hieme inundatis districtus Sussex Decbr. 1839. Herb. Preiss. No. 2037.

Suffrutex 1-2-pedalis, erectus, sordide glaucescens, caule tereti, glabro, a basi vel superne dichotome ramoso. *Rami* ultimi subcompressi, glabri vel villo mollissimo fugaci initio obtecti. *Folia* remota, erecta, crassa, obtusa, integerrima, dorso convexa, caulina inferiora sesquipollicaria, superiora, sensim minora, ramulorum perparva, lineari-lanceolata, supra villosa-lanata, dein glabrescentia, in var. α submembranacea, omnia plus minus callicula. *Cymae* erectae, bracteis duabus lanceolatis caducis suffultae. *Flores* pedicellati. *Pedicelli* albo-lanati, centrales longiores florem aequantes. *Sepala* $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longa, lanceolata vel (in var. β) oblongo-lanceolata, longe acuminata, extus albo-lanata, acumine recurvo subtus glabrescente, supra lanato. *Petala* sepalis duplo fere longiora, ovalia, breviter acuminata vel cuspidata, rosea, stria dorsali obscuriore obsolete pubescente, facie villosa fugaci tenni adspersa. *Stamina* 8. calyce parum breviora, omnino Boroniae. *Carpidia* calycem aequantia, valde compressa, acutissime carinata, apice truncata, punctata, obsolete pubescentia.

Species valde paradoxa et habitu et florum indumento. Varietates α et β forsitan species diversae, at specimina, quae perscrutari licuit, notas essentiales haud suppetunt.

2. **Boronia juncea** Bartl. glaberrima, caule erecto dichotome ramoso subaphyllo; foliis linearibus semiteretibus canaliculatis; cymis terminalibus pedunculatis multifloris; sepalis e lanceolata basi acuminato-subulatis, apicem versus sublanatis; filamentis glabriusculis.

In subarenosis exsiccatis districtus Wellington 5. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2036.

Simillima *B. laniflorae* var. β ultra bipedalis, superne dichotome ramosissima, ramis strictis. *Folia* inferiora desunt, superiora remotissima appressa, crassa, obtusa, 3-4 lin. longa, summa adhuc minora, lineari-subulata. *Cymae* parvae, subcompositae, circ. 7-florae. *Pedicelli* glabri, compressi, florem subaequantes. *Flores* parvi. *Sepala* extus glabra, acumine supra sublanata. *Petala* calyce paulo longiora, oblonga acuminata, glabriuscula.

A. B. laniflorae var. α nonnisi floribus minoribus extus pedicellisque glabris recedit, inaeque forsitan pro ejusdem speciei varietate habenda.

3. **Boronia flexuosa** Bartl. suffruticosa, trichotome ramosa, glauca, ramis ancipitibus; foliis remotis oblongo-spathulatis, summis linearibus; cymis dichotomis multifloris terminalibus axillaribusque longe pedunculatis; pedunculis hispidulo-scabris; sepalis lanceolatis acuminatis; filamentis ciliatis.

In arenosis sylvae ad fluvium Canning (Perth) et in districtu Sussex 5. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2024.

Radix crassa, lignosa, multiceps. *Caules* pedales et ultra, erecti, lignescens, teretes, glabri, superne trichotome ramosi. *Rami* erecti, subfastigiati. *Folia* pauca, erecto-patula, crassa, glaberrima, obtusa, integerrima, inferiora basi longe attenuata, $\frac{1}{2}$ -1 poll. longa, superiora lineari-oblonga, 1-1 $\frac{1}{2}$ poll. longa. *Cymae* laxae bis terve dichotomae 5-9-florae, erectae, pedunculo communi teretiusculo vel compresso, erecto, scabriusculo, 2-3 poll. longo, ramis compressis, hispidulo-scabris, flexuosis. *Bractae* ovato-lanceolatae, submembranaceae, breves. *Pedicelli* semipollicares, teretiusculi, scaberrimi, purpurascens. *Sepala* glabra, lineam longa. *Petala* calyce triplo longiora, oblonga apiculata, glabra, rubra. *Stamina* 8. subaequalia. *Antherae* pallide flavae, ellipticae, appendicula minuta obtusa.

4. **Boronia teretifolia** Lindl. suffruticosa glabra, foliis anguste linearibus convoluto-teretibus strictis; cymis termi-

* *Boronia tetratheoides*! (Candolle), prodr.
Tetratheva oppositifolia, Persoon. Syn.
Emmenanthes picea Tasm. ad Fl. Musc.
Jan. 11. 1848. hb. St. H. n. 362.

Maroubius. — Specimen humile sed
erectum legit ad portum regium
et Car. Stuart. Nov. 362 hb. St.
York-towa hb. St. c. n.

x *Correa* (*Sidymeria*) *magnifica* Juss. Mll. ^{sp. n.}
Lapidia 2 pinnata qua feno a *Corrae* differt. ^{sp. n.}
pallida circit 4^m l. 1^m 1^m *crassa* *fruticosa* *virgata* *ulz*
portulacifolia *ad apicem* *longioribus* *obtusis*. *minima* *ad apicem*
lucida *regia* *dors* *convexa* *vastra* *unata* *ad* *1^m* *data* *8* *duplo* *longa*
Boronia pilonema. — Billardiere.

Sepala corollam albam! aequantia.
Fruticulus erectus vel decumbens
spitameus vel paucipollicaris
plus minus ramopus

In humidis ad portum regi-
norum, hb. St. F. 666

George-Laird, hb. St. c. n.

x *Sidymeria magnifica* Juss. Mll.

Floris *bracte* *inbelli* *vel* *univertis*.

In *propulopsis* *vivati* *Tasmaniae*. *Frutx* *lax*
amplus *paucipetalis*.

x *B. rhomboides* Hooker.!

In *montibus* 5-4000' *altis* *Tasmaniae*
rara! Jan. 1849. hb. St. H. n. 365.

x *Correa Stuartiana* Juss. Mll.

In *(rostratus)* *nupetribus* *prope* *Port* *Vorell*.
hb. St. 970. *Differt* a *C. viridi* *foliis* *cupla*
minoribus *pure* *obovatis* *indumento* *nullo*
unione *obductis*
Tasmaniae

x *Boronia Stuartii* Juss. Mll.

Intra *massas* *capiosas* *lapidum*
arinosorum *prope* *montem* *Ta-*
smans *peak* *juxta* *oram* *orientalem*
insulae *Tasmaniae* Nov 49. l. 2-3'
corolla *carnea* *pellestrius* hb. St. 662.

Pomum magis donum B. filifolia Tm.

- x *P. inapifolium* Just. M.

fruticosa glabra, foliis
filiformibus basi apicem angu-
statis, floribus axillaribus
solitariis et terminalibus cy-
nam paucifloram formantibus,
sepalis lanceolatis triangulari-
bus obtusiusculis, filamentis
hispidis

cruticul. erectis pedalis ramulis,
rami angulati, ^{oppositi} pediculi cum flo-
ribus ^{longitudine} foliorum ^{media}
bractealis (!) duabus oppositis su-
bulatis instructis, sepala lineam
longa petalis ^{ovatis} triplo breviora *
P. brevifolia ^{infigit} persistens. + Car-
pidia compresso-ovata ad apicem figuran-
tia-furcata, semina atro-nitentia oblonga
tripliciter ^{infigit} crebris distinctis
alveolis circumdata Ray. Oct-Jan.
h. b. n. 169!

- x * * * *P. turnaxifolia!* Just. Müller *supra*
foliis turnaxifolia, foliis lan-
ceolatis-linearibus acutis integerrimis
planis, floribus axillaribus solitariis pe-
diculatis, sepalis ovato-lanceolatis
acutis, filamentis ciliatis, Fructus duri-
usculis puberulis.

In minoribus. — Corolla rosea.
In glaucis umbrosis montium inter
fl. Onkaparinga et Coors Creek, raro
jam. Just. Martii 1849, Jm.
Habitu B. struthocidis, oppositafolia B. nanas.

- x *P. clausifolia!* Just. Müller.

cruticosa, densa-ranunculifera glabra, foliis par-
vis turnaxifolia, basi petiolatis, foliis ^{angustis} ovatis
obtusis subcavatis, floribus axillaribus et termi-
nalibus solitariis, hinc breviter breviter
sepalis ovato-triangularibus acutis, filamentis
papillois.

*In areolis ^{angustis} inter fruticosa Muraq-
Oct. 1848. Fructus 1-2 ped. flami granulis ^{angustis} rufis. Folio-
sa ^{angustis} 1-2 ped. 1-2 ped. Corolla rosea. Sepala 4 longiora & 4 breviora
alternantia, cardo dilatata. Fructus ^{angustis} papillois ^{angustis} apiculatis
alternantibus. Oct. 1848. J. Müller legit.*

nalibus compositis multifloris longe pedunculatis, sepalis lato-ovatis cuspidatis; filamentis hispidis. — Lindl. Swan River Bot. pag. XVII.

In solo limoso lapidoso vallis Cataractae ad Caput fl. Cygnorum 26. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 2023. — In limoso-calculosis (?) ad radices montis Greenmountain (Perth) 13. Sept. 1839. No. 2029.

„Suffrutex strictas. Flores rosei“.

5. **Boronia macra** Bartl. suffruticosa, glabra, caulibus simpliciusculis erectis; foliis remotis lineari-oblongis linearibusque integerrimis planis; cymis terminalibus pedunculatis; sepalis oblongo-lanceolatis acuminatis; filamentis ciliatis.

In limoso-calculosis (?) sylvae prope Mahoganycreek (Darling's-range) 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 2026.

Planta sublignescens, annua fere. *Caules* e radice solitarii vel pauci, erecti, spithamei-pedales, graciles, filiformes, teretes, apicem versus subcompressi, simplices vel superne ramis aliquot oppositis compressis erectis instructi. *Folia* internodiis breviora, erecto-patula, crassiuscula, uninervia: infima minora lineari-spathulata vel lineari-oblonga, obtusa, basi valde attenuata, superiora sensim majora, remotiora, angustiora et acutiora, summa remotissima, subpollicaria. *Cymae* solitariae, subcompositae 5-7-florae, erectae, pedunculo communi bipollicari, compressiusculo. *Flores* „rosei“ mediae magnitudinis, praeter stamina glabri. *Sepala* sesquialin. fere longa. *Petala* sepalis triplo longiora, oblonga, acutiuscula. *Stamina* 8. calycem paulo superantia. *Antherae* oblongae, pallidae, appendicula minuta.

6. **Boronia spathulata** Lindl. suffruticosa, glauca, glaberrima, ramis strictis ancipitibus; foliis remotis obovato-spathulatis, summis linearibus; cymis terminalibus trifloris pedunculatis; sepalis ovalis obtusis; filamentis basi pilosis. — Lindl. Swan River Bot. pag. XVII.

In arenosis sylvae ad fl. Canning (Perth) Nov. 1841. Herb. Preiss. No. 2025.

7. **Boronia chironiifolia** Bartl. fruticosa, glaberrima, foliis lineari-oblongis vel lineari-lanceolatis acutis basi attenuatis subintegerrimis; cymis terminalibus sessilibus; sepalis triangulari-ovatis; filamentis glabriusculis.

In uliginosis sylvae 17 mill. ab urbicula Albany (Plantagenet) 9. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2027.

„Frutex tripedalis“ erectus, ramosus, sublaevescens. *Rami* erecti vel erecto-patuli, plerumque oppositi vel subcongesti, teretes; ramuli ultimi subangulati, ad nodos compressi. *Folia* crassa, coriacea, erecta vel erecto-patula, internodiis plerumque longiora, plana, integerrima vel majora remotissime et obsolete denticulata, uninervia, avenia, utrinque obsolete glanduloso-punctata, rugulosa, circiter pollic. longa, summa paulo minora. *Cymae* 5-7-florae. *Pedicelli* semipollicares, erecti, angulati, superne crassiores, ebracteolati, purpurascens. *Flores* praeter stamina glaberrimi, mediae magnitudinis, „pallide rosei“. *Sepala* lin. longa, acutiuscula, plana. *Petala* sepalis quadruplo longiora, ovalia. *Stamina* 8. calyce parum longiora. *Filamenta* obsolete pubescenti-ciliolata. *Antherae* pallidae, appendicula minutissima.

8. **Boronia fastigiata** Bartl. glaberrima, glauca, caule stricto superne fastigiato-ramoso; foliis obovatis denticu-

latis; cymis terminalibus compositis multifloris; sepalis ovatis acutis; filamentis ciliatis.

In locis hieme inundatis districtus Plantagenet Novembr. 1840. Herb. Preiss. No. 2028.

Caulis sesquipedalis, lignescens, erectus, teres, inferne simplex, aphyllus, superne in ramos digitales vel sesquidigitales oppositos erectos fastigiatos teretes foliatis deliquescent. *Folia* sessilia, crassiuscula, erecto patula, plana, obovata vel obovato-subrotunda, acutiuscula vel obtusa, basi brevissime attenuata, praecipue apicem versus denticulata, utrinque rugulosa, avenia, nervo glandulisque vix conspicuis, 3-4 lin. longa. *Cymae* fastigiatæ, sessiles vel breviter pedunculatae. *Rhachis* pedunculique partiales compressi. *Cymulae* pedunculatae, oppositae, fastigiatæ triflorae, terminalis nonnunquam 5-flora. *Bractæae* caducæ. *Flores* mediae magnitudinis, pedicellati. *Pedicelli* semipollicares, subangulati, superne incrassati, ebracteolati. *Sepala* plana, purpurea, $1\frac{1}{2}$ lin. longa. *Petala* calyce duplo longiora, glaberrima, ovato-oblonga, obtusiuscula, rosea, stria dorsali purpurea. *Stamina* 8. *Filamenta* calycem aequantia. *Antherae* flavae, ovales, appendicula vix manifesta. *Carpidia* calycem aequantia valde compressa, truncata, elevato-punctata.

9. **Boronia crassipes** Bartl. fruticosa, virgato-ramosa, glabra, foliis linearibus planis serrulatis; pedunculis axillaribus binis infra medium bracteolatis, superne incrassatis angulatis; sepalis lanceolato-subulatis.

In uliginosis planitieci haud longe a monte Wuljenup (Plantagenet) 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2040.

„*Frutex* 10-12-pedalis, gracilis“ ramosissimus, ramis erectis, gracilibus virgatis, teretibus, purpureis, a basi foliatis, ramulis subtetragonis, ad nodos subcompressis. *Folia* internodio longiora, erecta, acuta, basi attenuata, minute sed regulariter serrulata, uninervia, avenia, utrinque glanduloso-punctata, 6-10 lin. longa, $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ lin. lata. *Pedunculi* (raro solitarii) folio duplo vel parum breviores, paulo infra medium bracteolis duabus oppositis subulatis patulo-recurvis $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longis instructi, ultra bracteolas seusim incrassati, angulati, angulis in nervos sepalorum excurrentibus. *Flores* subnutantes, mediae magnitudinis, in racemos foliatis dispositi. *Sepala* bracteolis similina 2 lin. longa, cum pedunculis purpurea. „*Petala* rosea“ calyce vix duplo longiora, elliptico-oblonga, acuta. *Stamina* 8, subaequalia, calyce parum breviora. *Filamenta* tenuia, basi subciliata. *Antherae* pallide flavae, ovales, appendicula minutissima. *Carpidia* calycem aequantia, glabra, obsolete punctata.

10. **Boronia tenuifolia** Bartl. fruticosa, glaberrima, foliis lineari-oblongis obtusis mucronulatis planis pellucido-punctatis, glandulis pellucidis crenulatis; pedunculis terminalibus unifloris solitariis ternisve; sepalis ovatis acuminatis; filamentis villosissimis.

In solo ericetorum inter frutices densos sylvae ad fluvium Canning (Perth) raro Nov. 1841. Herb. Preiss. No. 2022.

„*Suffrutex* $1\frac{1}{2}$ pedalis“, potius frutex parvus. *Rami* inaequales, erectiusculi, teretes, a basi foliati; ramuli oppositi, graciles, subangulati, patuli. *Folia* internodio longiora vel rarius aequalia, patentia, membranacea, basin versus attenuata, uninervia, glandulis sparsis pellucido-punctata, serie densa glandularum pellucidarum secus marginem crenulata, 5-8 lin. longa, 1 - $1\frac{1}{2}$ lin. lata. *Pedunculi* folio paulo breviores, subangulati, erecti, purpurei, circa medium bracteolis duabus oppositis oblongo-lanceolatis patentibus instructi vel nudi. *Flores* erecti. *Sepala* vix lin. longa, purpurea. *Petala* quater longiora, ovalia, acutiuscula, rosea, stria lata dorsali obscuriore. *Stamina* 8.

Conrad Smith

sect. 1. *Breviflorae* DeCandolle

1. C. cryptantha Fiedmüller

callos variis orbiculatis utrin-
que stellata truncatis margine
serriatis obtusis, denticulis na-
cis abscissis

Torjan nilnisi C. rufae varietas,
palia laminae in pagina inferiore
erectis rostris griseo - nig. fangi-
neo laminae, intra hanc pla-
no semipalmaris quadrifidis albon-
datis. Laminae in statu juveni
sunt, et larva Alexandrinae

C. alba. *Androsace flavifolia*

P. rotundifolia - Canby

C. rufa ^{Fairman} ^{auth.} ^{id. off. effig.} ^{Swann}
Adm. li. lora maris m. p. n.
George Town, F.D.L. Apr.
H. J. H. n. 577 Su of h. C.
and l. i. a. t. o. f. o. i. s. c. a. p. h. e. d. u. n. d.

Seck. 2. Longipalae De Candolle

2. *C. ucaator* Ferd Müller ^{in Nova Acta} ^{Sci. Nat.} ^{Vol. 1} ¹⁸¹¹
^{ablongo elliptico}
foliis lato-lanceolatis supra
stellato-pilosis obscure ciliatis

186- uclibus paribus, factus, passus
 hominibus, & conibus brevissimis
 & immutatio erit ^{novi} talis
 innovatio integritate sub integro

brakes variegatae lach. mutar, foliis
1-1 1/2" longis 4-6" latis in petiol
3-4" longior attenuatis; calyx 3-4"
longus, guarda latitudinis flore
magis quam depleto brevior.

In manifestis reportibus agens in
4 Creek. h.b. It. sin. nun

[illegible][illegible]

Didymeria aemula
Hb. nov. Philad.

C. cordifolia Ford Müller in *Bot. nov.*
Correa virens Smith? Lf.
In larvis & embryis distinctus
Purpurea Bay! Oct. 1847. hb. St.
lin. num. ~~etiam hanc aut Didymeria~~
Clusia rutacea d. 14. Apr. 1848. Folia
vix sapientia figuris a revolis in-
madatur ad nuncius haipstul
sedem colluta fruticosa valde pro-
neolens ob folia appropiata aut ad
horonias aut Correas trahenda,
nisi novi generis typus = *D. magnificum*
C. virens Sm. ^{ex Hooker} *Trin. Lamourson. Fuit 24*
Sept 15. 1848. hb. St. J. n. 23 -

B. rutacea Ford Müller. V.D.L! hb. St.
B. variabilis Hooker.
Wasmann. n. 38. (in lim.)
caule striato ^{striato} pub. vixis, sulcata
foliis simpliciter pinnatis ^{foliatis} *hijugis*
spectulata ^{marginibus angustis} *venosis*
apiculatis, ^{marginibus angustis} *pedunculis apiculatis*
coloris folio triplo brevioribus
ad pedicellis basi biconvexis, *se-*
polis triangulatis ovatis *obtusis* *acutis*
Rami fragmentum in promptu est
folia internodiis longiora 8-10 6-8"
longa 2-3" *caule*, *g. lora*, *puberulis*
puberulis *puberulis*. *Articul. raris*
alatae flumens, *pedunculi* 3" *longi*
bracteae minime puberulae, *Chal.*
vix lineares *petales* *triplo brevi-*
ores. - *fl. m. p.*, 2-3'. hb. St. n.
382. Jan. 1849. *Puffin bay* ad *rygnet*.
vix hb. St. 641. - 2' Nov 49.

B. praeox Ford Müller.
i *expt. South* *Ch. rivn*, *Torm.* hb. St.
II n. 1. Oct 20. 1848. fr. 5-6'.
B. Hartii Ford Müller. *B. variabilis* Hooker.
In montibus occidentales *Torm.* hb.
II n. 337. *fr. 1-2'* Jan 21. 1849. *gracilis*

calyce paulo longiora. *Filamenta* villosissima, lanata fere. *Carpidia* calycem vix superantia, glabra.

Maxime affinis *Bor. vimineae* Lindl.

11. ***Boronia crenulata* Smith.** fruticosa, glabra, foliis obovatis mucronulatis crenulatis; pedunculis axillaribus terminalibusque subsolitariis unifloris; sepalis ovatis acuminatis; filamentis villosis-ciliatis apice glandulosis. — Smith. in Transact. Linn. soc. VIII. pag. 284. DC. prodr. I. pag. 721.

Ad Stirling's-Terrace solo turfoso-arenoso (Plantagenet) 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 2010.

** *foliis impari-pinnatis.*

12. ***Boronia crassifolia* Bartl.** foliis sessilibus glaberrimis; foliolis bi- trijugis lineari-spathulatis integerrimis obtusis crassis; pedunculis axillaribus solitariis folio brevioribus medio bracteolatis; sepalis subrotundo-ovatis; filamentis alternis sterilibus.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2033.

Fruticulus spithamaens, gracilis, ramosus, flexuosus, ramis teretiusculis, filiformibus, tenuissime pubescentibus, purpureis. *Folia* internodiis paulo breviora vel eadem aequantia, patentia, brevissime petiolata, foliolis parum distantibus, planis, nervibus, punctato-rugosis, inferioribus paulo longioribus, semipoll. longis, terminali sessili, costae articulis submarginatis, 1-1½ lin. longis. *Pedunculi* 2-4 lin. longi, filiformes, subangulati, purpurei, medio bracteolis duabus oppositis oblongis glabris instructi, ultra bracteolas incrassati. *Sepala* glaberrima, obtusissima, lineam longa. *Petala* calyce triplo longiora, ovalia, obtusa, rubra, ad lentem tenuissime velutina-pubescentia. *Filamenta* calyce breviora, inferne tenuissime ciliata, quatuor fertilia, apice subulata, antheris cordato-ovatis, pallide flavis, minute appendiculatis, quatuor sepalis opposita sterilia, fertilibus paulo breviora, apice glanduloso-capitata. *Germina* glaberrima.

13. ***Boronia alata* Smith.** foliorum rhachi nervisque subtus pilosiusculis; foliolis subquinquejugis crenatis margine revolutis; pedunculis axillaribus dichotomis; bracteolis ciliatis. — Smith. in Transact. Linn. soc. VIII. pag. 283. DC. prodr. I. pag. 721. Sweet. fl. australas. tab. 48.

In rupibus calcareis ad Rocky Bay (Perth) et in insula Rotenest 18. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2012.

„Frutex tripetalis. Flores rosei, nauseosi“.

14. ***Boronia stricta* Bartl.** caule simplici piloso; foliis sessilibus pilosiusculis, foliolis 3-4-jugis angustissime lineari-bus subtus convexis; pedunculis axillaribus solitariis geminisque folio multiplo brevioribus basi bracteolatis; sepalis lanceolato-subulatis.

In solo turfoso inter frutices densos planitie inter montes Melville et Elphinstone (Plantagenet) 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2031.

Radix verticalis, parce ramosa. *Caulis* erectus, strictus, simplicissimus vel ramo uno alterove superne instructus, 1-2-pedalis, lignosus, teres, in-

ferne nudus ac glaber, superne pilis mollibus albidis patentibus dense obsitus denseque foliatus. *Folia* internodiis longiora, erecta vel patulo-incurva, demum glabrescentia, foliolis approximatis, incurvis, acutiusculis vel obtusis, integerrimis, inferne attenuatis, concavo-canaliculatis, inferioribus longioribus 6-8 lin. longis, costae articulis submarginatis, circiter lin. longis. *Pedunculi* pilosissimi, 1-1½ lin. longi, ina basi bracteolis duabus lanceolato-subulatis margine inferne membranaceis muniti. *Calyx* pilosus, sepalis alabastrum ovatum supereminentibus, 2 lin. longis. *Petala* 2½ lin. longa, ovalia, breviter cuspidata, velutino-puberula, „rosea“ stria dorsali lata purpurea pilosiuscula. *Stamina* 8. omnia fertilia, calyce breviora. *Filamenta* glabra, apice glanduloso-incrassata. *Antherae* denticulo sub apice insertae cordato-ovatae, pallide flavae, appendicula satis manifesta albida. *Carpidia* calycem subaequantia, lato-elliptica, rotundato-obtusissima, glabra.

15. **Boronia elatior** Bartl. ramosa, foliis ramisque pilosis; foliolis 2-5-jugis linearibus acutis planis; pedunculis axillaribus solitariis medio bracteolatis; sepalis subrotundo-ovatis acuminato-cuspidatis; filamentis alternis sterilibus.

In humoso-arenosis humidis inter frutices densos vallis jugi montium Darling's range (Perth) Sept. 1841. Herb. Preiss. No. 2013.

„*Frutex* 4-6-pedalis, erectus“ ramosissimus, ramis gracilibus, teretibus, ex adscendente basi erecto-patulis, molliter albedo-pilosis, a basi foliatis. *Folia* brevissime petiolata, internodiis longiora, erecto-patula, ¾-1½ poll. longa, pilis mollibus undique adpersa, pleraque 4-5-juga, summa 2-3-juga, jugis parum distantibus: foliola uninervia, integerrima, glanduloso-rugulosa, terminale reliquis longius, 6-8 lin. longum: costae articuli 1-1½ lin. longi, submarginati. *Pedunculi* uniflori, graciles, laxi, folio vix duplo breviores, piloso-villosi, medio bracteolis duabus oppositis lanceolatis subrecurvis instructi. *Calyx* glaber, glanduloso-punctatus, sepalis tenuissime pubescenti-ciliatis, saepissime purpureis, vix 1½ lin. longis. *Petala* ovata, sub apice cuspidato-mucronata, glabra, purpurea; calyce duplo fere longiora. *Filamenta* brevissima glabra, quatuor fertilia sepalis (nec petalis) opposita, antheris cordato-ovatis, appendicula acutiuscula, quatuor petalis opposita sterilia, antherae rudimento parvo glanduliformi.

Species pulcherrima filamentorum sterilium situ valde singularis.

CYANOTHAMNUS Lindl. Swan-River Bot. pag. XVIII. Endlich. gen. n. 6005.

1. **Cyanothamnus anethifolius** Bartl. caule lignescente a basi ramoso; foliis ternatis bitermatisque; foliolis filiformibus; floribus solitariis axillaribus; filamentis basi ciliatis, superne glandulosis; antherarum appendice erecto plana ipsis pluries breviora.

In solo arenoso prope Spitesbrook ad fluvium Canning 14. Jul. 1841. Herb. Preiss. No. 2035.

„*Fruticulus* pedalis“ glaberrimus. *Radix* lignosa, verticalis, flexuosa, parce ramosa. *Caulis* erectus: rami oppositi, graciles, adscendenti-erecti, subfastigiati, inferne teretes, superne quadranguli vel compressiusculi, a basi foliati, ramulosi. *Folia* opposita, internodiis longiora, patula, ternata vel bitermata, pleraque ternata, foliolis lateralibus simplicibus, intermedio ternato, foliolis 4-8 lin. longis, obtusiusculis, integerrimis, glanduloso-punctatis, supra canaliculatis. *Petioles* 2-3 lin. longi, filiformes, canaliculati. *Pedunculi* sparsi, solitarii, uniflori, petiolo breviores, bracteolis duabus minutis suboppositis

obtusis instructi. *Calyx* semilin. longus, glanduloso-punctatus, 4-partitus, laciniis ovatis, obtusis. *Petala* calyce triplo fere longiora „cyanea“ glabra glanduloso-punctata, ovata, obtusa, apice demum recurva, per aestivationem imbricata. *Stamina* 8. calycem vix superantia, subaequalia, erecta: *antherae* parvae, fuscae, erectae, basifixae, ovales, appendice minuta albida. *Germen* glabrum. *Stylus* cylindraceus, stamina aequans. *Stigma* breviter quadrifidum, lobis subcylindraceis, obtusis. *Carpidia* 4 petalis persistentibus duplo longiora, divergentia, glanduloso-punctata, transversim venulosa, lenticulari-compressa, oblique lata-elliptica, margine exteriori recto, interiori arcuato, apice rotundato-obtusissima.

Adn. Cyanothamni a *Boronis* proximis praeter foliorum indolem et florum colorem diversum praecipue differunt: antheris erectis, basifixis, filamentis in processum (subulatum) antheriferum haud angustatis, stylo tenui cylindraceo et stigmatē quadrifido. Antherarum appendicula notam, qua a *Boronis* distinguantur, certam non praebet.

ERIOSTEMON Smith. in Transact. Linn. soc. IV. pag. 221. Adr. Juss. in Mem. Mus. XII pag. 481. tab. 21. Meisn. gen. 60. (44.) Endl. gen. n. 6006.

1. **Eriostemon spicatum** A. Rich. foliis sparsis linearibus glanduloso-punctatis glabris; racemis terminalibus villosis-subtomentosis; pedicellis bracteatis. — A. Rich. sert. Astrolab. pag. 76. tab. 27. Walpers rept. I. pag. 504.

In arenosis prope oppidulum Perth. d. 22. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 2021. „Frutex pedalis, erectus“. *Bracteae* caducae. *Petala* coerulea (in specimin. exsic. expallentia) basi cuneato-attenuata, subunguiculata.

2. **Eriostemon nodiflorum** Lindl. ramulis pubescentibus; foliis linearibus obtusiusculis glandulosis glabris erectis; floribus lateralibus (terminalibusque) capitatis; bracteis linearibus margine villosis; calycibus pilosis; filamentis villosis; ovarii lobis inaequalibus cornutis. — Lindl. Swan River Bot. pag. XVII. Walpers rept. pag. 504.

In subarenosis haud longe ab Eleven Miles Bridge (Plantagenet) m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2049.

„Frutex $1\frac{1}{2}$ -pedalis“. *Petala* coerulea basi albida, cuneato-attenuata, subunguiculata. Haec species cum antecedente affinisque *E. racemoso* Endl. et *E. ebracteato* Endl. propriam generis sectionem petalis coeruleis subunguiculatis insignem, vel, si mavis, proprium genus *Cyanochlamys* dicendum exhibere videtur.

PHEBALIUM Vent. Malm. 102. Adr. Juss. Mem. Mus. XII. 479. Mem. soc. h. n. II. pag. 130. Endl. gen. n. 6009. Meisn. gen. pag. 60. (44.)

1. **Phebalium anceps** DC. foliis lincari-vel oblongo-lanceolatis obtusis, junioribus utrinque lepidotis, adultis

subundis; corymbis terminalibus; staminibus corolla brevioribus. — DC. prodr. 1. pag. 719. Adr. Juss. Mem. soc. hist. nat. II. pag. 9. tab. 12. f. 2.

In rupestribus scaturiginosis ad Princess Royal Harbour et ad portum Leschenault Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 2011.

„Frutex 12-15-pedalis“.

2. **Phebalium rude** Bartl. foliis obovatis retusis basi in petiolum cuneato-attenuatis subtus pedunculis axillaribus unifloris alabastrisque lepidotis.

In calcareis tergi montis Baldhead 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. Nr. 2038.

„Frutex sesquipedalis“. *Rami* adsunt spithamaei, crassi, rigidi, a basi ramosissimi, cortice inaequali rimuloso. *Ramuli* adscendenti-erecti, sparsi, e petiolorum basi decurrente, tuberculato-angulati; secundarii breves, acute angulati, angulis valde prominulis, albido-lepidoti. *Folia* sparsa, densa, erecta, coriacea, plana vel concaviuscula, integerrima, apice retusa vel late emarginata vel truncata fere, angulis rotundatis, basi in petiolum canaliculatum lepidotum 1-3 lin. longum cuneato-attenuata, supra sparse lepidota, demum calva, glanduloso-punctata, subtus densius albido-lepidota, serius calvescentia, cum petiolo 4-8 lin. longa, $2\frac{1}{2}$ -4 lin. lata. *Pedunculi* axillares, solitarii, uniflori, petiolo paulo longiores, angulati, superne bracteolis 2 vel 3 minutis obtusis deciduis instructi. *Calyx* parvus, acute 5-dentatus, patens. „Flores albi“. *Alabastrum* globosum, suturis subtomentosis. *Petala* sesquilineam longa ovato-oblonga, obtusa, supra glabra. *Filamenta* glaberrima, lanceolato-linearia, apice subulata, petalis duplo fere breviora. *Antherae* ovals. *Germen* argenteo-lepidotum. *Carpidia* juniora e dorso cornuta.

3. **Phebalium bilobum** Bartl. ^{non Lindley} foliis obcordato-bilobis basi cuneatis subtus pedunculis axillaribus unifloris alabastrisque lepidotis.

In rupestribus planitie collium Konkoberuphills (Kent) 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2039.

„Frutex bipedalis“ *Ph. rudi* simillimus sed omnibus partibus minor. *Rami* sesquidigitales, teretes, dense cicatratis indeque exasperati. *Ramuli* breves, patuli, superne conferti, irregulariter angulati, lepidoto-canescens. *Folia* densa, obcordato-biloba, sinu acuto, lobis rotundatis, uninervia, avenia, supra parce subtus densius albido-lepidota, demum calvescentia, 3-6 lin. longa et aequae lata. *Pedunculi* folio duplo triploque breviores, angulati, bracteolis duabus denticuliformibus prope florem. *Calyx* parvus, sinuato-5-dentatus. *Petala* lin. longa, ovato-oblonga, obtusa, supra glabra, per aestivationem valvata. *Carpidia* valde compressa, oblique truncata, angulo dorsali protracto.

CHORILAENA Endl. gen. n. 6010.

1. **Chorilaena quercifolia** Endl. in Hügel. Enumerat. pag. 17.

In colliculo arenoso inter frutices vix penetrabiles prope Baldhead Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2043.

„Frutex 8-pedalis“.

DIPLOLAENA R. Brown in Flinders voy. II. pag. 546. Desf. Mem. Mus. III. pag. 449. Adr. Juss. Mem. Mus. XII. pag. 479. Meisn. gen. pag. 60. (44.) Endl. gen. n. 6011.

1. **Diplolaena Dampieri** Desf. foliis obovato-oblongis ellipticisve apice subemarginatis supra viridibus, subtus incanis; involucri foliolis exterioribus lanceolatis herbaceis. — Desf. Mem. Mus. III. pag. 450. tab. 20. Bot. reg. 1841. n. 64. Rugel ?

In confragosis jugi montium Darling's range 27. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 2042.

Specimen iconi in Bot. reg. editae simillimum. — *Folia* supra hand glabra, sed punctis elevatis pilos minutissimos stellatos gerentibus scabriuscula, apice emarginata vel rotundato-obtusissima.

2. **Diplolaena salicifolia** Bartl. foliis lineari-oblongis vel anguste oblongo-obovatis obtusissimis basi longe attenuatis, supra glabriusculis, subtus albido-tomentosis; involucri foliolis exterioribus subovatis brevioribus.

α revoluta. foliis lineari-oblongis margine revolutis; foliolis involucri exterioribus lato-ovatis subherbaceis.

β cuneata. foliis anguste oblongo-obovatis margine planis; foliolis involucri exterioribus ovato-lanceolatis subcoloratis.

In calcareo-arenosis ad fluvium Cygnorum prope Freemantle, Woodman's point et in insula Rotenest 15. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2020.

„*Frutex* 5-pedalis, pulcherrimus“. *Ramuli* sparsi, patuli, tomento stellato incani, demum glabrescentes. *Folia* erecto-patula, 1-2 poll. longa, lineari-oblonga, lineari-vel oblongo-lanceolata, anguste oblonga vel anguste oblongo-obovata, rotundato-obtusissima vel retusa, basi longe attenuata in petiolum 2-3 lin. longum incano-tomentosum, margine revoluta vel in var. *β* plana, supra glabra et glandulis minutis impresso-punctata, juniora interdum pilis nonnullis stellatis vage adspersa, subtus dense albido- (novella rufa) tomentosa, tomento e fasciulis pilorum stellatis composito. *Capitula* majora quam *D. Dampieri*, *D. grandiflorae* (ex ic. Desf.) fere, multantia, pedunculo semipollicari rufescenti-tomentoso insidentia. *Involucri* foliola exteriora 5 basi in disca diam. 4 lin. connata, explanata, ovata vel ovato-oblonga, obtusiuscula, sordide rubescentia (ex sic.) basin versus obscure virentia vel tota colorata, interiora dupla fere longiora, oblongo-linearia, rubella: omnia tomentosa. *Carpidia* 2 lin. longa, glabra, transverse venoso-rugosa, subtruncata, angulo apicis dorsali rotundato.

3. **Diplolaena microcephala** Bartl. foliis obovatis vel oblongo-obovatis obtusissimis basi cuneatis, supra tenuiter, subtus dense tomentosis; involucri foliolis exterioribus lanceolatis interiora subaequantibus.

In littore rupestri arenoso inter frutices densos promontorii Cape Riche 20. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2019, nec non in montosis glareosis sterilibus districtus Grantham m. Mart. 1841. No. 2018.

„*Frutex* 1½ pedalis, (No. 2018.) vel 3-pedalis (No. 2019.)“ ramosissimus, ramis ramulisque sparsis, patentibus, teretibus, junioribus dense tomentosis. *Folia* circiter semipollicem longa, patentia, saepe complicata, margine plana, in petiolum 1-1½ lin. longum cuneato-attenuata, subtus cum petiolo tomento denso albido-rufa vestita, supra parcius tomentosa, obscure viridia. *Capitula* in ramulis terminalia, solitaria, breviter pedunculata, subnutantia, multo minora quam congenerum, virginea globosa, pisum minus magnitudine vix aequantia. *Foliola* involucri aequilonga, 5 exteriora lanceolata, acuta, subherbacea, subtus fulvescenti-tomentosa, interiora lineari-lanceolata, obtusa, colorata, rosea (ex sicc.).

EUPHORBIACEAE Juss.

(Auctore J. F. KLOTZSCH.)

Tribus EUPHORBIEAE Bartling. Endlicher gen. pl.
pag. 1108.

EUPHORBIA Linn. Endl. gen. pl. n. 5766.

1. **Euphorbia paucifolia** Kl. suffruticosa, erecta, caule tereti, glabro, leviter sulcato; ramis inferioribus verticillatis, quaternis aut senis apice foliiferis, superioribus oppositis, floriferis; foliis oppositis, exstipulatis, linearibus, integerrimis, glabris, basi attenuatis; floribus axillaribus, solitariis, subsessilibus; capsula subglobosa, glabra, calyce sexfido, persistente instructa.

In depressis madidis umbrosisque ad fluvium Canning prope praedium rusticum Maddington (Perth) 2. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 1208.

„*Frutex* 12-16-pedalis, gracilis, lactescens, ramis pendulis“. *Caulis* cylindricus, glaber, inferne lignosus, pallide-fuscus, nitidus, superne ramisque herbaceus, leviter sulcatus. Internodia ad caulem 3-4 unc., ad ramos 2-3 unc. longa. *Folia* opposita, exstipulata, linearia, glabra, obtusa, versus basin attenuata, integerrima, 1-1½ lin. lata, 10-14 lin. longa. *Flores*, axillares solitarii, subsessiles. *Involucrum* semiglobosum, glabrum antherisque purpureum, tridentatum, glandulis tribus sessilibus, patelliformibus instructum, basi bracteis squamiformibus, scariosis, atrofuscis, brevibus, imbricatis vestitum. *Ovarium* subglobosum, trigonum, pedicellatum, nutans, glabrum, calyce persistente, obtuso, sexfido, margine scarioso instructum. *Styli* tres, breves, erecti, bifidi, atro-purpurei.

2. **Euphorbia Peplus** L. Sp. pl. pag. 653. Roeper Enum. Euphorb. pag. 67. u. 25.

In cultis insulae Rotenest. Probabiliter advecta. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1207.

Hydrocarpes

Virgatae

sericeae

micrantha

pp. collegit C. Mitchell

Platyretia Ford. ex Mull. in the J.
Aug. 1859, *Platyretia Ford. ex Mull. in the J.*
Oct. 1271.

natis sanguinis & arte concolor
recedit autem foliis multum
vires foliis tomentosis brevibus
pro foliis, floribus feminis a-
pro salis, ramis pubescentibus etc
et riuum Torrens haud longe ab urbana
et ad-Adelaide in arenosis, umbratis, Jan
23 1848. *Cecypula clastice Disj. Pol. Cicut.*
huius generis proximam videtur *Adriana* M.
(*C. acutifolia* Hook) *Walt. ex B. Hoffm 371*

Poranthera? annua Ford. M.

Solo madida? *Por. B. M. aff. F. M. maritima* hb. St. H.
Callium in fruticetorum *Dorila rambuy.*
Lam. 5. Pignu. 6. Porigoni
Floris monalvi. Vere!
Parvam Stylii pericor. not Thysiam
imitat.

Poranthera ricatrix Ford. M.

In plagis arceps multaria non
nulla anglica a litore remotis.
prope *Enroclata* *Walt. ex B. Hoffm*
Stellata *multaria* *Walt. ex B. Hoffm*
Gnaris *divicula* *pericor. not Thysiam*
imitat.

Calypsofigma lauricola M.

Calypsofigmate oblongifolia
caput foliis majoribus magis
lauricolae, floribus longius
quidicillatis denique habita
elato recto.

Rivnocarpus Tasmanicus Ford. M.

Ad flumen South Esk river, hb. St. Tasm
70, II, 134 & 722. Supra 6-8! Vere.
Monocarpus paspin divinis.

R. pspitifloro maximopere affinis
habita minus valido, et liis a non floris
adunioribus laevibus nec asperis, floribus
subpedunculatis, gatais floris feminis
et liis glabris nec tomentosis
non villosis et forte aliis tharacanth
comparando. ex p. et im. in liis
pucc. provellicoribus extrinsecis.

Tribus CROTONEAE Blume. Endl. gen. pl. pag. 1113.

TRACHYCARYON*) Kl. (Crotonis species Lab. Adrianae species Endl.)

Flores dioici. *Masc. Calyx* quadripartitus: laciniis aequalibus, aestivatione valvatis. *Corolla* et glandula nulla. *Stamina* creberrima, receptaculo conico nudo inserta; *filamentis* brevibus, aestivatione erectis, liberis; *antherarum* loculis longis, linearibus, connectivo apice in ligulam viscoso-subpellucidam producto, utrinque adnatis. *Fem. Calyx* quadripartitus, subregularis. *Corollae* petala 4, lanceolata, calycina, inaequilonga. *Germen* sessile, trioculare. *Ovula* in loculis solitaria, pendula. *Styli* 3, profunde bifidi, verrucosi. *Capsula* verrucosa, tricoeca: coccis bivalvibus, monospermis. *Semina* carunculata.

Frutex Novae Hollandiae, ramis glabris, teretibus, apicem versus digonis, angulis sub nervo medio foliorum enatis, *foliis* oppositis, sessilibus, trinerviis, subtrapeziformibus, coriaceis, grosse dentato-serratis, utrinque glabris, basi biglandulosis; *floribus masculis* interrupte spicatis: spicis axillaribus terminalibusque, bracteatis: *bracteis* magnis, sessilibus, distantibus, multifloris; *floribus feminis* in apice ramulorum axillaribus, subracemosis, bractea oblonga stipatis.

1. **Trachycaryon Labillardierei** Kl. *Croton* quadripartitum Labillard. Nov. Holland. II. pag. 73. t. 233.

In arenosis inter frutices densos secundum fluvium Cynorum haud longe ab urbicula Freemantle Dec. Herb. Preiss. No. 1206.

CALYPTROSTIGMA**) Kl. (Crotonis spec. Labill. Adrianae spec. Endl.)

Flores dioici. *Masc. Calyx* profunde quinquefidus: laciniis inaequalibus, aestivatione imbricatis. *Corolla* et glandula nulla. *Stamina* creberrima, receptaculo convexo nudo inserta; *filamentis* brevibus, aestivatione erectis, liberis, *antheris* brevibus, lateralibus. *Fem. Calyx* profunde quinquefidus: laciniis inaequalibus, aestivatione imbricatis. *Corolla* nulla. *Germen* tri-quadriloculare, sessile. *Ovula* in loculis solitaria, pendula. *Stigma* calyptraeforme, subintegrum, sessile. *Capsula* tricoeca, laevis: coccis monospermis, bivalvibus. *Semina* castanea, carunculata.

Frutices Novae Hollandiae, ramulis triquetris: angulis sub petiolis foliorum enatis; foliis alternis, oblongis aut linearibus, eglandulosis; racemis axillaribus paucifloris; floribus ebracteatis.

*) Nomen e vocibus *τραχὺς* et *κάρων* compositum.

**) Nomen e vocibus *καλύπτρα* et *στίγμα* compositum.

Beyeria viridula Miqul.

1. **Calyptrostigma viscosum** Kl. ramulis triquetris, glabris, viscosis; foliis oblongo-spathulatis, utrinque glabris, supra nitidis, viscosis, subtus ferrugineis, basi attenuatis; capsulis nitidis, viscosis, trigonis; pedicellis longis, sursum incrassatis.

Croton viscosum Labillard. Nov. Holl. II. pag. 72, t. 222.
Hb. Willd. n. 17848 fol. 2.

Crescit in colliculosis arenosis insulae Rotenest 19. August 1839, Herb. Preiss. No. 2387 *).

AMPEREA Adr. Juss. Endl. gen. pl. n. 5813.

1. **Amperea rosmarinifolia** Kl. decumbens, ramosissima, glabra; ramulis longissimis, compresso-triangularibus, striatis, glabris; foliis alternis, linearibus, acuminatis, glabris, margine revolutis; floribus monoicis, axillaribus, fasciculatis: masculis quadrifidis.

In solo turfoso-arenoso inter frutices clivuli prope urbiculam Albany (Plantagenet) 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1225.

Frutex decumbens 3-4-pedalis, ramosissimos. *Rami* teretiusculi, fascicineri. *Ramuli* confertissimi, pedem longi, virgati, subcompresso-trigoni, leviter striati, glabri, lineam fere crassi. *Folia* alterna, linearia, acuminata, distantia, erecta, margine reflexa, subtus longitudinaliter sulcata, basi bistipulata, glauco-viridia, 6-8 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata. *Petoli* glabri, compressi, lineam longi, deorsum attenuati. *Stipulae* lanceolato-lineares, acutae, remote-dentatae, fusco-purpureae, $1\frac{1}{2}$ lin. longae. *Flores* monoici, axillares, fasciculati, brevipedicellati, bracteis ovatis, carinatis suffulti, masculi et feminei intermixti. *Masc. Calyx* quadrifidus, campanulatus, tubo brevi, luteo, laciniis recurvis, ovatis, azureis, aestivatione valvatis. *Corolla* nulla. *Stamina* 8, lutea; filamentis filiformibus, ima basi coalitis, quatuor exterioribus brevioribus; antherarum loculis ovatis, distinctis, ex apice connectivi granuliformis, pendulis. *Fem. Calyx* profunde quinquefidus, laciniis lanceolatis, acutis, carinatis, erectis, aestivatione valvatis. *Ovarium* oblongum, triangulare, glabrum, triloculare: loculis uniovulatis: ovulis pendulis. *Stylus* brevissimus; stigmata 3, erecta, bifida, patentia: laciniis puberulis subulatis.

MONOTAXIS Brong. Endl. gen. pl. n. 5833.

occidentalis Endl.

1. **Monotaxis cuneifolia** Kl. suffruticosa, ramis filiformibus, glabris, leviter sulcatis; foliis oblongis, acutis, versus basin attenuatis, glabris, integerrimis, laete-viridibus, aut

*) Species duas sequentes in Herbariis Lindleyi et Willdenovii observavimus. **Calyptrostigma ledifolium** Kl. ramulis incano-subtomentosis; foliis anguste-linearibus, apice truncatis, margine revolutis, supra pallide-viridibus, subtus incanis; capsulis subglobosis; pedicellis brevibus. Hab. in Nova Hollandia. Drummond. **Calyptrostigma oblongifolium** Kl. ramulis triquetris, flavo-virescentibus, subtomentosis; foliis oblongis, obtusis aut brevissime acutis, supra saturate-viridibus, nitidis, subtus incanis; pedicellis brevibus. *Croton viscosum* Hb. Willd. n. 17848 fol. 1 et 17849 fol. 1 et 2. Hab. in Nova Hollandia Labillardier. R. Cunninghamham.

Canocletum ford Mill.
C. oblongifolium Kilotsch!

In infila Van Diemens Lais! hb. St. 149.
May 1848 Hulse! Cammaratum sub.
nom Croton nigrum. Loris adis umbrosis
commune Nov. 48. hb. St. T. n. 41, 42.
10-12' alt.

C. ledifolium Kilotsch! hb. St. n. 91.

Animum
Anima sub nom Crotonis spec. Ad hum
pla nix Murray ripas! Vooler. 1847 Apr. 48.
In vi Pine-forest ultra altis - nec h
anti voluer Nov. 48. J. M. H. — (Phyllanthus
ut p. mutila M. H.) Haniuli viridis,
cuas opera quae aut. corruis parum
e. uca. otera. quae aut. solis neophylo d. latas
luc. uis litoralibus. St. H. n. 91. H. n. 91.
anti puer aut. oblongifolium Kilotsch!
Calyptrifigmaria pueri videris ford Mill.

In syntibus arenosis finis
Trivoli - Bay. Capsula viridi-
rubella. fruticulus pro-
cumbens ramis ad 1-2' altis
vix adfurentibus.
Sath! astate.

Ampera! runcifolia ford Mill.

Chyrium Liffale & Antho-
liotes triginta hb. St. n. 101.
In Nova Holl. antho-orientali
prope stat. ob. Van Liffale
et Tarmaniae in fivis filva.
Liris iuxta Plumum Murog.
hb. St. T. 68, II, 359, 360.

In Nova Hollandia ad iuvum.
clitum domus diagnoses suspensi
veridici quae, quae fortasse jam
quid non propter hanc hanc hanc
accidentalem pernam, hanc hanc
erato, hanc hanc hanc hanc hanc
runciformis ab id. runciformis hanc
hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc

Tribulus Kythrix R. Br. l. v. 69.
lanatus, foliis 8-10 jugis, frutib. internodis
hitis spinis subulatis longitudine inaeq.
libus: majoribus sparsis parvis longioribus
pupureis

In collinis aruensis latit. 26°

{ non *Scleranthus* Gaub. & Moench = *Scleranthus* R. Br.
Scleranthus! (n. g.) fide Muller

Genus virginale novum *Monotaxis*
proximum *Id. anthraxis* filameosis
in columnam ^{florum} ~~separatis~~ ^{separatis} diostinguenda
attamen ab ^{florum} ~~separatis~~ ^{separatis} deficientem
novum claro exponendum.

Al. microphylla fide Muller.

In liridis orariis inter finem
Guadian - Bay & lacum Elberti.

Lat. v. Facie fere *Erythraea*
Speridophyllae seu *Harbinae* brevifoliae
ad apicem finis Spenceri prope Portum Virie loc.
salis & ad Portum Gault hinc St. Murat. In
his lignis diffusus

Eriophorum salicifolium Smith.

x *Crocea angustifolia* fide Muller

foliis lanceolato-linearibus,
canaliculis calycibusque puberulis

In insulae Ten Dincens Land
parte australi prope Hobart
hb. St. 807.

x *Phabalium capitatum* fide Muller

In St. Hall (portu austra-
orientali) hb. St. 826.

P. phylloidi cognatum
jam caulis raris paleis
serutibus non huiusmodi discre-
nitur a *usur*.

x *Eriophorum microphyllum*, fide Muller

ramulis stellatis puberulis, ramis asperis, foliis inter-
deciduis palatis ovato-vel. pinnatis orbiculatis apice
curvis rotundis glandulosis, punctatis breviter petio-
latis glaberrimis, floribus terminalibus, calycis lacini-
bus minutis glaberrimis, bracteis punctatis, filamen-
tis glabris corollae aequantibus semper obtusatis, style
in finem *St. Vincentis* Killinger. sep. lat. brevis, flg. g.

In reg. a. lat. 6. h. u.
n. l. h. u. r. b.
n. l. h. u. r. b.
n. l. h. u. r. b.

obovatis, acutis; floribus aggregatis, in apice ramulorum axillaribus: mase. pedicellatis, fem. sessilibus; stigmatis lobis subulatis, integerrimis, apice incurvis.

In arenosis umbrosis inter frutices silvae eis urbiculum Guildford (Perth) 14. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1222.

Caulis suffruticosus, basi pennae anatinae crassitie, statim supra radicem subsimplicem fusiformem cinereo-fuscam solutus in ramos plurimos, 5-6 pollices longos, graciles, flaccidiusculos, simplicissimos vel interdum ramulo auctos, e basi procumbente adscendentes, subfastigiatos, leviter sulcatis, glaberrimos, pallide-virescentes. *Folia* alterna, oblonga, acuta, integerrima, glabra, pallide-viridia, brevi-pedicellata, margine subrecurva, 4-5 lin. longa, infra apicem $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata, versus basin attenuata, superiora densa, inferiora remota; nervo medio subtus prominulo; basi utrinque stipula subulata minima aucta. *Flores* in apice ramulorum axillares, dense aggregati, bracteis minimis suffulti. *Mase.* confertissimi, pedicellati; *Calyx* campanulatus, quadrifidus, albidus, laciniis ovato-lanceolatis, acutis, in aestivatione imbricatis. *Petala* 4, ovata, acuta, basi brevi-nnguiculata, albida, laciniis calycis alterna. *Stamina* 8; quatuor petalis opposita, iisdem paullo longiora, praecociora, patentia; antherarum connectivo dilatato, hippocrepiformi-bicuri, deorsum arcuato; utroque crure antherae loculum introrsum longitudinaliter apertum gerente; cruribus connectivi in alabastro filamento adpressis antherisque ejusdem latera spectantibus. *Stamina* 4, petalis alterna, serius evoluta, primum brevissima, tandem reliqua aequantia, erecto-conniventia, antherarum connectivo parum dilatato, loculis discretis, utrinque e connectivi apice pendulis. *Flos femineus* centralis, solitarius, sessilis. *Calyx* quinquefidus: laciniis lanceolatis, erectis. *Ovarium* oblongum, obtuse trigonum, glabrum, calyce duplo fere longius, triloculare: loculis uniovulatis, ovulis angulo interiori loculorum prope apicem appensis. *Stigmata* 3, bifida: lobis subulatis, apice incurvis, purpureis.

- grandiflora* Endl.,
2. **Monotaxis ericoides** Kl. fruticosa, ramis tenuibus, glabris, versus apicem divisis; foliis subulatis, mucronatis, margine revolutis, glaucis; floribus pedicellatis, aggregatis, in apice ramulorum axillaribus, maseulis pentameris, femineis hexameris; stigmatis lobis eleganter fimbriatis, patentibus.

In colliculosis arenosis inter frutices prope urbiculum Perth 19. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1218.

Frutex dodrantalis, facie *Ericae carnea*. *Caulis* cinereo-fuscus, pennae anserinae crassitie, supra basin solutus in ramos plurimos, graciles, apice divisos, glabros, fusco-cinereos. *Folia* sparsa, erecto-incurva, lineari-filiformia, mucronata, margine revoluta, glauca, 5-8 lin. longa, basi utrinque stipula setacea fusca aucta. *Umbella* 8-12 flora, in summitate ramorum ad florem centalem femineum redacta, axillaris, basi stipulis setaceis, purpureis cincta. *Mase.* *Calyx* campanulatus, quinquefidus, amoene purpureus: laciniis lanceolatis, acuminatis. *Petala* quinque, ovato-oblonga, obtusa, albida, calyce dimidio longiora, basi hastata. *Squamae* 5, breves, crassiusculae, truncatae, calycis laciniis oppositae. *Stamina* 10, omnia fertilia; filamenta filiformia, exserta; antherarum connectivo ut in congeneribus hippocrepiformi, loculis globosis crura terminantibus. *Pedicelli* filiformes, glabri, 2 lin. longi. *Fem.* *Calyx* hexaphyllus, brevi-pedicellatus, foliolis albidis, ovatis, acutis, carinatis, glabris, aestivatione imbricatis. *Petala* 6, oblonga, obtusa, basi attenuata, sed non appendiculata, calyce dimidio longiora, albida. *Discus* hypogynus, sexradiatus: radiis crassiusculis, brevibus, spatulatis, apice purpureis, truncatis, sepalis oppositis. *Ovarium* globosum, glabrum, obtuse-trigonum, triloculare: loculis uniovulatis: ovulis pendulis. *Stigmata* 3, profunde bifida, fimbriata, patentia, purpurascencia.

Tribus PSEUDO-ANDROGYNI. Ovarii loculi uniovulati. Stamina sub ovarii rudimento sessili inserta. Flores axillares, solitarii.

.LOPADOCALYX *) Kl. = *Olaux Br.*

Flores monoici. *Masc.* Calyx parvus, patelliformis, integerrimus. *Corolla* profunde quinquepartita, erecta, aestivatione valvata, laciniis intus ad basin appendicee filamentosa instructis. *Stamina* 3; filamentis subulatis, erectis, basi corollae insertis; *antheris* lateralibus, brevibus, ovatis, introrsis. *Ovarii* rudimentum lageniformi-trigonum, apice brevissime trifidum. *Fem.* Calyx parvus, patelliformis, integerrimus. *Corolla* nulla. *Ovarium* disco carnosio orbiculari impositum, triloculare: loculis uniovulatis. *Stylus* brevis, ovarii continuus; *stigmata* 3, brevia, integerrima, obtusa. *Fructus* . . . . .

Frutices Novae Hollandiae ramosi, foliis alternis, sessilibus, subcoriaceis, glabris; floribus axillaribus, solitariis, ebracteatis, masculis cum femineis mixtis. *Olaux Phyllanthi R. Br.*

1. **Lopadocalyx phyllanthoides** Kl. ramis distichis, glaberrimis; foliis late oblongis, subcordatis, sessilibus, integerrimis, apice emarginato-apiculatis; pedicellis sursum iucrassatis, glabris, brevibus calycibusque pallide-luteis; corollae appendiceibus subulatis, staminum longitudine.

In rupestribus circa urbiculum Albany (Plantagenet) 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1211.

Caulis 4-5 pedalis, fruticosus, livido-fuscus, leviter striatus, ramosus. *Rami* teretiusculi, graciles, distichi, versus apicem ramulosi. *Folia* alterna, erecta, sessilia, lato-elliptica, subcoriacea, glabra, opaca, sordide-glaucoviridia, basi subcordata, apice emarginato-apiculata, 4-6 lin. longa, 3-4 lin. lata, stipulis destituta. *Flores* in apice ramulorum axillares, solitarii, ebracteati, masculi aut feminei, brevi-pedicellati. *Masc.* Calyx patelliformis, integerrimus, patens, brevissimus, viridi-luteus, persistens. *Corolla* profunde quinquepartita, erecta, lutea: laciniis oblongis, acutis, 1½ lin. longis, basi appendice filamentosa, erecta instructis, aestivatione valvatis. *Stamina* 3, corolla duplo breviora; filamenta subulata, erecta, basi corollae inserta; *antherae* breves, obtusae, biloculares, laterales, introrsae, longitudinaliter dehiscentes. *Ovarii* rudimentum lageniforme, trigonum, apice brevissime trilobum. *Fem.* Calyx cupularis, integerrimus, luteus, brevissimus, persistens. *Corolla* nulla. *Ovarium* lageniforme, acute-trigonum, disco carnosio orbiculari impositum, loculis uniovulatis: ovulis pendulis oblongis, utrinque attenuatis. *Stylus* brevis, ovario continuus. *Stigma* brevissime trilobum. *Olaux uliginosa Kl.*

2. **Lopadocalyx uliginosus** Kl. suffruticosus, ramis filiformibus, simplicibus, erectis; foliis alternis, sessilibus, oblongis, acutis, basi rotundatis, saturate viridibus, glabris, opacis, subtus nervo magis prominente subcarinatis.

*) Nomen e vocibus *λοπαξ* et *καλῆξ* compositum.

* Phyllanthus vacciniaceus Endl.
 Ad fl. Meander, Tasm, hb. St. 75
 Frutic 3-4' monoecius. Nov. 48.
 P. calycino respectu foliorum
 similis videtur sed flores nappi
 minus.
 # folia brevioribus

* Phyllanthus saxosus fr. Muller.
 Fruticifolius, glaber calvis, ^{angustatis} ramis foliisque glauis, ^{concoloribus} his ^{obtusis} obtusis
 s. obcordatis, basi vixus cuneatis, ^{angustatis} obtusis retusis, ^{angustatis} obtusis ^{angustatis} obtusis
 vix in violaceo, pedicellis axillaribus ^{angustatis} obtusis ^{angustatis} obtusis
 apicalis ^{angustatis} obtusis ^{angustatis} obtusis ^{angustatis} obtusis
 dehiscentibus ^{angustatis} obtusis ^{angustatis} obtusis ^{angustatis} obtusis
 nodulis ^{angustatis} obtusis ^{angustatis} obtusis ^{angustatis} obtusis
 pum. ^{angustatis} obtusis ^{angustatis} obtusis ^{angustatis} obtusis

* Phyllanthus boroniacalis fr. Mull.
 F. V. D. L. herb. Stuart. 74. (fr. Proton)
 Diagnosi. Cand. est comparanda, densa,
 plicata hinc quadrat. Flores majores
 compressi. Habitat boroniac
 variabilis Hooker. Ad fl. South
 Esk river Tasmannian, hb. St. 25.
 Monoecia, pentandrus. Stuart.
 Prismo vire.

* Phyllanthus fr. Mull.
 Cauda a P. fr. Mull.
 immixtus foliis plerisque quibus fr. Mull.
 nunciam fr. Mull.
 variis fr. Mull.
fr. Mull.
fr. Mull.

Ad fl. South Esk river Tasmannian
 hb. St. n. 80. vire.

P. pulchello Endl (pl. Kunze) pro-
 pinquus attamen jam pedicel-
 lis foliis brevioribus distinctissimus.

Phyllanthus margaritaceus fr. Mull.

Abique in virentia potius fr. Mull.

* Phyllanthus fr. Mull.

fr. Mull.
 In glareoso-arenosis flos fl.
 Murray usuratum magnam
 ostentatam vixus.

In Fruticulis virentibus 1' erutus

In theps: vire.

In omnibus descriptis distat
 incommensurabili rariis. Folia glauca
 ovata. Similem quasi aciculata.

In solo turfoso-uliginoso inter frutices densos planitie inter montes Melville et Elphinstone (Plantagenet) 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1210.

Caulis suffruticosus, brevissimus, incrassatus; statim supra radicem solutus in ramos plurimos 8-11 pollices longos, graciles, simplicissimos aut interdum ramulo auctos, laeves, glaberrimos, flavido-virescentes. *Folia* alterna, erecta, oblonga, acuta, basi rotundata, sessilia, saturate-viridia, 3-4 lin. longa, 1-2 lin. lata. *Flores* in apice ramorum axillares solitarii. *Pedicelli* glabri, flavescentes, 1½ lin. longi, deorsum attenuati. *Flores masculi* non observavi. *Flores feminei* ut in specie praecedenti.

Tribus PHYLLANTHEAE Endl. gen. pl. pag. 1119.

PHYLLANTHUS Schwartz Endl. l. c. n. 5847.

1. **Phyllanthus calycinus** Labillard. fruticosus, ramosus, foliis obovatis, apice rotundato-apiculatis, dense imbricatis; floribus in apice ramulorum axillaribus, brevi pedicellatis; calycibus maximis. — Labillard. Nov. Hollandiae plant. spec. II. pag. 75. t. 225. Hb. Willd. n. 17993.

In clivis arenosis insulae Carnac 8. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 1213.

2. **Phyllanthus Preissianus** Kl. fruticosus, ramosus, ramis sanguineis ramulisque teretibus, glabris; foliis subsessilibus oblongo-subspathulatis, brevissime acutis, erectis, membranaceis, subtus glaucescentibus; floribus axillaribus, solitariis, geminis aut rarissime trifloris, 5-6 fidis, pedicellatis: femineis majoribus, folio longioribus: masculis minoribus, in fundo calycis squamis sex, peltatis, castaneis.

Phyllanthus pulchellus Preiss. Mss. nec Endlicher.

In arenosis subumbrosis sylvae ad fluvium Cygnorum. 15. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 1212.

Caulis fruticosus, ramosus, erectus, 1-2 pedalis. *Rami* teretiusculi, glabri, sanguinei, lineam crassi. *Ramuli* tenues, subcompressi-angulati, glauco-fuscescentes, subflexuosi. *Folia* subsessilia, oblongo-spathulata, brevissime-acuta, erecta, membranacea, glaberrima, supra laete-viridia, subtus glaucescentia, 6-9 lin. longa, infra apicem 2-3 lin. lata, basi utrinque stipula parva, lanceolata, acuminata, fusciscente aucta. *Flores* monoici, in apice ramulorum axillares, solitarii, bini aut terni, pedicellati, basi bracteis 2-6 lanceolatis, acuminatis, albidis cincti. *Masc. Pedicelli* filiformes, glabri, albi, 4-5 lineares. *Calyx* profunde-sexfidus, campanulatus, albidus: laciniis concavis, obtusis; stamina 3, inclusa, squamis sex, fuscis, peltatis cincta. *Fem. Pedicelli* albi, sursum incrassati, glabri, 6-8 lin. longi. *Calyx* profunde 5-6 fidus, viridi-sulfureus: laciniis oblongis, obtusis, concavis, margine albedo-diaphanis. *Ovarium* globoso-trigonum, glabrum, triloculare: loculis biovulatis: ovulis pendulis; squamis 5-6 sessilibus, carnosius cinctum. *Stigmata* 3, profunde bifida, glabra: lobis filiformibus, recurvis.

3. **Phyllanthus scaber** Kl. fruticosus, caule ramisque scabris, subangulatis; foliis subspathulatis, brevissime acutis, subcoriaceis, supra scabris, subtus opacis; floribus in apice

ramulorum axillaribus, solitariis, brevissime pedicellatis, basi bracteis 2 sessilibus, lanceolatis, fuscis, margine dentatis cinctis; calyce 6 partito, intus sexsquamoso: laciniis late linearibus, subobtusis; stigmatibus tribus, brevibus, filiformibus, recurvis, integerrimis; capsulis depresso-globosis.

In litore rupestri promontorii Cape Riche 18. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1200.

Frutex ramosus bi-pedalis. *Caule* ramisque subangulati, scabri. *Folia* alterna, spathulata, brevi acuta, dense imbricata, erecta, glaucescentia, supra scabra, subtus pallidiora, opaca, membranaceo-coriacea, 6-8 lin. longa, infra apicem 3-3½ lin. lata, margine recurva, basi utrinque stipula brevis-sima, subfusca aucta. *Flores* feminei in apice ramulorum axillares, solitarii, brevissime pedicellati. *Capsula* depresso-globosa, glabra; trilocularis, trilocca: coccis bivalvibus, dispermis. *Semina* reniformi-trigona, fusca, glabra. *Stigmata* 3, brevissima, filiformia, recurvata, integerrima.

STACKHOUSIACEAE R.Br.

(Auctore A. BUNGE.)

STACKHOUSIA Smith. Endl. gen. n. 5763.

Meisn. gen. pag. 336. (249.)

1. **Stackhousia pubescens** A. Rich. tota pubescens, foliis linearibus angustissimis acutis, floribus in spicam triuncialem dispositis, laciniis calycis margine dissecto-ciliatis. A. Rich. Voy. de l'Astrolabe pag. 89. t. 33.

In calciosis ad latus occidentale montis Bakewell 8. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1972.

Iconem citatam non vidi, neque descriptionem novi; speciem vero nostram huc retuli ob affinitatem cum *St. Hügelii* Endl., tum vero quia nulli specierum, quae, vel e speciminibus exsiccatis, vel e descriptionibus mihi innotuere (*St. monogyna*, *spathulata*, *obtusa*, *muricata*, *nuda*, *Hügelii*, *flava*.) adnumerari potest. Ab omnibus distinguitur pubescentia, a plerisque insuper bracteis elongatis. — *Rami* praesto sunt pedales, teretes, striati, pube densa, brevi, patente, uti folia et racemus, vestiti. *Folia* sparsa, pollicem longa, linearia, acuta, carnosula (?) erecta. *Racemi* abbreviati, pollice parum longiores, ovato-oblongi, dense multiflori. *Flores* sessiles. *Bractae* lineari-subulatae, 4^{lin} longae, ciliatae. *Bracteolae* tenuiores 2^{lin} longae. *Calycis* tubus subglobosus, 0,5^{lin} longus; lacinae limbi lanceolatae, ciliatae, linea paulo longiores. *Corollae* aequalis tubus 2,5^{lin} longus, limbi lacinae oblongo-lanceolatae, 2^{lin} longae, acutiusculae. *Stamina* longiora e fauce vix prominula. *Antherae* fere croceae. *Styli* 3 cohaerentes staminibus brevioribus. *Cocci* . . . . . ?

Sackhausia monogyna Lab.
Ad riv. Masen, Tasm. Jan. 1849. H.
N. n. 546. 1-2! - South Esk
river hb. N. T. H. n. 88. Characters
much as *S. Schlutendal* in Linnaea.
1847. St. Junii from S. V. obtusum.
Lindley. Ciguaron vult circa
flantes fruit! Ad urbem Adelaide
Sept. 1848. - Woodman Baifer.
Habit! cad. limp. Specim. memorat. 3. Hb.
paliis ex parte oratis. - Betha.
nove, Lindar-vallij itq. -

Callitriche vernalis Three flying
at St. South Ekrenia Tasson,
Nov. 22, 1906.
Path: & Far. Dec.

Definitio plantarum hujus familiae ut
videtur ex obliuione a meo qd in G. Don gen.
hist. of dicthamnydeas plants, nam plantae
sunt Arctostaphylos inter dicthamnydeas, com-
munes in campi. appinitate hactenus & Arctostaphylos
(Arctostaphylos plinifolia) monogyna. Lats.

Lab. huius nonini a *Stuartia coccinea*
 sed et *C. Kunge* etiam ignota. *Fl. odorati*!
 F. D. L! Hb. St. 113. Nov. Holl. aust. Third
 Creek! Hb. St. 34, Port Philippi! Hb.
 Zoys. sin. num. et Hb. L. N. 7. fere *calyci-*
ane latimatalis. Third Creek procerum.
 Diffusata Jan. 10. 1848 Dr. W.! *Planta*
dicennia ab nova *Hallaudia* revere
 videtur aegre brevior. Ultima ex parte
 quadrat. *St. monogynata* Lab, sed non
 Smithii ex parte Rch. & Sib. *Whitominus*
foliummado varietatis *Dracae* dae, nam
specimina Tasm. maxime accipha
 a *Novo-Hallaudia*, raris non divergunt
 & cum modo omnium plantarum
inguntium plures formas incunt!

Stachys flava Hook. "parva foliis linearibus v. linearibus - lanceolatis curvatis, apicibus subcurvatis interdum subrecurvis, pinnis parvis terminalibus, nervis foliorum subcapitatis, horripundulis, nervis pinnarum. *Stachys flava*, corollae pinnae, nervis curvatis V.D.L.
- x *Stachys flava* Hook. f. *Stachys flava* Hook. f.

Stachys flava Hook. f. *Stachys flava* Hook. f.
In summis arenosis circa lacum Max-
xandrinae, raro samum! hb. St. 35. Nov.
1847. Cur. Tridivococcus. In Sylvestris
circa finem Rivoli Way, Oct. 1848.
Flores colore v. monogynae. Pa-
lia corollae. Fruticulus erectus
compactus!

x *Trysmalina phlebotyllum*, f. Mill.

In racemosis montium Elders-rang
Hillorum prope Cudnaka!
Fruy parvos pedes altus erectus rufus
ampliusque

x *Pomaderris exigua* f. Mill.

Ad portum S. Mill. Tarmannum
bonoli-occidentalis.

Frut. prostratus, ramis multis
divinibus! hb. St. 932.

x *Pomaderris oraria* f. Mill.

Wagga head ad litus boreali
occidentali Tarm. hb. St. 958.

Stach. P. paniculosa prop.

Frut 2-4'

Pro!

x *Pomaderris* (*Trysmalium*) *Yochmansia* f. Mill.

Bopton point!

Stach. a. *Trysmalium*, quorum natura convenit
foliis subcapitatis duplicatis utrinque pilla
No *Pomaderris*. H & B diffinit.

TRIPTEROCOCCUS Endl. Endl. gen. n. 5764.

Meisn. gen. l. c.

1. **Tripterococcus simplex** Bge. caulibus simplicissimis teretibus striatis basi foliosis, foliis linearibus, bractea media pedicellum superante lateralibus brevioribus, calycis laciniis tubo suo duplo longioribus, petalorum ungue laminam superante, ala coecorum dorsali lateralibus paulo angustiore.

In glareosis apertis montium continuorum Darling's-range (Perth) 8. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1971.

Radix simplex, alte descendens, lignosa, multiceps. *Caules* plurimi ex una radice, erecti, stricti, simplicissimi, pedales et ultra, lineam dimidiam in diametro crassi, vel paulo crassiores. *Folia* anguste linearia, sparsa, inferiora 10-12 approximata, pollicem longa, superiora remota breviora, summa 2^{lin} longa. *Racemi* pauciflori. *Flores* brevissime pedicellati, pedicello 0,5^{lin} longo, tribracteolati. *Bractea* media pedicellum calycisque tubum aequans, bracteolae laterales tubum attingentes. *Calycis* tubus hemisphaericus, 0,7^{lin} longus, striatus, lacinae duplo longiores, lineari-subulatae. *Petalorum unguis* in tubum 5 lineas longum incurvum conniventes. *Laminae* 5^{lin} lineares incurvo-patulae. *Stamina* 3 longiora tubum vix aequantia, duo alterna tubo dimidio paulo longiora. *Filamenta* filiformia. *Antherae* oblongae. Pollinis grana sicca oblonga, triplicata, triporosa, extus celluloso-reticulata, fere *Statices*. *Stylus* simplex calycis laciniis brevior, apice trifidus, ramis intus stigmatosis. *Cocci* indehiscens cum styli parte persistente 3,5^{lin} longi, 2,7^{lin} lati; alae laterales lineam latae, dorsalis angustior brevior, omnes radiatim nervosae, fragillinae. *Semen* trigonum, hinc impresso rugulosum, linea paulo longius, 0,3^{lin} latum, integumento membranaceo pallido. *Embryo* in axi albuminis parci oleosi rectus, radícula infera, cotyledones plano-convexae, carnoso-oleosae.

2. **Tripterococcus juncens** Bge. caulibus ramosis teretibus profunde sulcatis paucifoliis, bracteis pedicellum superantibus, calycis laciniis tubo suo plus duplo longioribus, corollae laminis unguem aequantibus, ala coeci dorsali angustissima.

In arenosis inter frutices prope Woodman'spoint, Perth. 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1973.

Radix multiceps. *Caules* 1½-2 pedales, lineam in diametro crassi, teretes, sulcato-striati, ramosi, ramis elongatis, erectis, simplicibus. *Folia* sparsa remota, facile decidua, inferiora pollicaria et paulo longiora, anguste linearia, acuta. *Racemi* terminales in caule et ramis sub 10-15-flori, laxi, florentes 2-3 pollicares. *Flores* ex sicco livido-flavescentes, minores quam praecedentis. *Bracteolae* subulatae pedicello longiores. *Calycis* tubus hemisphaericus 0,5^{lin} longus, lacinae subulatae fere 1,5^{lin} longae. *Petalorum unguis* in tubum curvatum 3^{lin} longum conniventes, laminae totidem longae, in sicco contortae, subulatae. *Stamina* pistillumque praecedentis. *Cocci* omnino ut in *Tr. Brunonis* describuntur, majores quam in praecedente et ala dorsali angustissima fere nulla.

Tripterococcus Brunonis Endl. in Enum. Hügel. pag. 18. e descriptione talibus definiendus: *Tr.* caulibus ramosis

tetragonis profunde sulcatis paucifoliis, bractea media pedicellum aequante lateralibus brevioribus, calycis laciniis tubo suo triente longioribus, corollae lamina unguem aequantibus, ala coeci dorsali angustissima.

RHAMNEAE Brown.

(Auctore E. T. STEUDEL.)*

POMADERRIS Labill. Endl. gen. n. 5743.
Meisn. gen. pag. 70. (50.)

§. 1. Foliis ovatis.

Tymolium glaberrimum ^{a supra glabris.} ~~Steud.~~ ! ex Reisch.

1. **Pomaderris polyantha** Steud. caule erecto breviteramoso tereti cinerascente cortice subrimuloso; foliis (1-1½ uncialibus) elliptico-ovatis obtusis basi attenuatis margine reflexis supra albo-viridibus glabris subimpresso venulosis, subtus adpresse molliter niveo-tomentosis; stipulis ovatis acutis scariosis subtus medio herbaceis pilosis caducis; cymis axillaribus paniculatis in apice ramulorum aggregato confertis. †

In arenosis ad fluvium cygnorum et ad oras maritimas ditionis Perth, Jun. Dec. Herb. Preiss. No. 1677 et 1679.

Caulis pube brevissima densissima intricata rimulosa vestitus, inferne teres, superne angulatus; *rami* breves, foliati, cinereo-pubescentes, apice cymoso-floriferi; *folia* alterna, magnitudine varia ¾ - 1½ pollicaria; *petioli* folio 3-4-ve breviores, pubescentes; *cymae* ramosae, ramulis subreflexis multifloris; *sepala* extus velutino pilosa; *petala* nulla; capsulae ovato-subrotundae pube secedente vestitae.

2. **Pomaderris aemula** Steud. caule erecto parce ramoso tomentosulo anguloso-striato; foliis (1-2 uncialibus) ovatis integerrimis supra fusco-viridibus glaberrimis reticulato-pellucide-venosis, subtus adpresse albo-cinereo-tomentosis; stipulis lanceolatis acuminatis scariosis subtus medio herbaceis pubescentibus; cymis axillaribus panicula-

*) Synopsis Rhamnearum a clbmo. Reisseck elaboratam (cfr. Endlicher Genera pag. 1094 vel Walper Repertorium I. pag. 542) in componendis speciebus Novae Hollandiae occidentalis aut expectare aut species cum illo monographo communicare in animo erat. Cum vero iste opusculum adhuc desideratur et in eo erat, ut „Plantae Preissianae“ typographo essent tradendae, longioris morae causa esse nolui; itaque hujus familiae species investigationi mihi (saepo, quod maxime doleo, in speciminibus non satis evolutis) traditas, pro virili elaboratas lectoribus trado.

tis multifloris; cymularum capitulis basi bracteais ovatis obtusis semiscariosis involueratis, apice uno alterove folio muunitis; petalis ovatis subplanis luteo-albis. ♀

In arenosis ditionis Plantagenet 23. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1690.

3. *Pomaderris phyllaefolia* ~~Fenzl~~ *Fenzl* foliis imcialibus et brevioribus oblongis ellipticis ovalibusque integerrimis, supra glabris vel pulvere viridi-flavo magis minusve adspersis eventis, supra ramulisque tomento brevi subadpresso holosericeis, floribus in cymis corymbosis parvis confertis; calycibus villo incano patente tomentosis anthesi vix 1-1½ longioribus, petalorum lamina subcordato-ovata vel subrotunda integerrima coneava. Fenzl in Hügel Enumerat. pag. 22. n. 15.

In eluvulis arenosis prope oppidulum Freemantle 15. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1678.

Omnino convenit, nec differt nisi foliis sperne venulosis.

4. *Pomaderris pyrophylla* Steud. caule erecto ramoso fusco-cinereo-pubescente tereti vix striato; foliis suboblique ovatis integerrimis supra glaberrimis pellucide-lineatis rufo-virescentibus, subtus adpresse albo-tomentosis; stipulis ferrugineis lanceolatis caducis foliisque junioribus pilosis; cymis axillaribus terminalibusque; floribus in capitulis bracteatis aggregatis; petalis inter calycis laciniis (saepe) exsertis ovatis concavis. ♀

In arenosis insulae Rotenest 18. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1631.

Caulis plus minus ramosus; rami adulti glabri lignosi, juniores cinereo-pubescentes; folia petiolata, — petiolis folia 3-4-plo brevioribus — ½-2 pollicaria, margine subrevoluta, supra tenne venosa, venis lucem versus pellucidis sparsim reticulatis; sepalis dense villosa.

β ramosior a praecedente non differt, nisi caule magis lignoso, ramosiore; foliis distinctior revolutis. Herb. Preiss. No. 1676.

5. *Pomaderris subretusa* Steud. caule diffuse-ramoso; ramis cinereis, cortice demum secedente, pubescentibus; foliis ovatis vel junioribus suborbiculatis apice retusis basi levissime cordatis supra fusco-viridibus glabris (vel novellis pubescentibus) subtus adpresse albo-tomentosis pilisque patentibus (in summis plus minus rufescentibus) instructis; stipulis ovato-lanceolatis acuminatis membranaceis ferrugineis pilosis; cymis axillaribus in pedunculis folia aequantibus, basi foliatis. ♀

In calcareis summitatis montis Baldhead ditionis Plantagenet 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1687.

Rami teretes: folia brevi petiolulata, parva, juniora minora vix 1-1½ lineas excedentia, subrotunda, adultiora 1 ad summum 6 lineas longa, ovata, apice obtusissimo subretusa, supra glabra, venis tenuibus versus lucem vix pellucidis percursa; cymae axillares in pedunculis 2-4 lineas longis subcapitata confertae; flores 10-12 parvi; calyces extus dense pubescentes, intus glabri, ferruginei, limbi patentes medio nervo conspicuo percursi; petala inter calycis laciniis minima, unguiculata.

β. Foliis ovatis utrinque pubentibus.

- Ternstroemia albicans* Reisch.
6. **Pomaderris albicans** Steud. caule erecto brevi ramoso angulato-striato pubescente; foliis ovatis integerrimis margine subrevolutis supra mollissime cinereo-velutinis subtus dense albo-tomentosis; stipulis ferrugineis scariosis lanceolatis pilosis; cymis axillaribus paucifloris demum elongatis subracemosis. ♀

In calcareis ad latus montis Elizamontagne. 19. Mai 1839. Herb. Preiss. No. 1689.

- Ternstroemia hirsuta* Steud.
7. **Pomaderris hirsuta** Steud. caule diffuse-ramoso cinerascens; ramis patenti-pilosis; foliis oblongo-vel lanceolato-ovatis (parvis semi-uncialibus) supra fusco-viridibus mollissime brevi-velutino-pubescentibus, subtus adpresse albo-tomentosis villisque patentibus hirsutis; stipulis late-ovatis membranaceis acuminatis sparsim hirsutis; cymis axillaribus terminalibusque laxiuscule capitulatis. ♀

In rupestribus ad tergum montis Clarence 30. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1673^a.

Frutex 1-2 pedalis, ramosus; *rami* adulti teretes, cicatricosi, glabri, rufescentes, juniores pubescentes intermixtis pilis longioribus hirsuti; *folia* brevi-petiolata, 2-6 ad summum 8 lineas longa, supra late viridia, venosa, — venae primariae opacae, secundariae versus lucem sub lente pellucidae — margine parum revoluta, supra pube adpressa partim evanescente sub-velutina, subtus inter tomentum album pilis longis vestita; *cymae* ramosae, floribus in ramulis capitato congesti; *calycis* laciniae extus tenue pubescentes, intus glabrae, pallide ferrugineae.

- Ternstroemia commixta* Steud.
8. **Pomaderris commixta** Steud. caule ramoso diffuso, ramis pilosulis; foliis ovatis (parvis 4-6-lineas longis) supra cinereo-velutinis, subtus albo-tomentosis pilis raris patentibus (ad nervos et margines) intermixtis; stipulis minutis ovatis obtusis semiscariosis; cymis axillaribus paucifloris laxè capitatis. ♀

Cum priore lecta. Herb. Preiss. No. 1673^b.

Frutex 1-2-pedalis, ramosus; *rami* adulti teretes pube demum secedente hinc pubescentes hinc glabriusculi; *ramuli* foliorum delapsorum cicatricibus stipulisque persistentibus notati, sursum foliosi, dense pubescentes; *petioli* 1½-2 lin. longi; *folia* magnitudine varia, minora vix lineam excedentia, plus minus rotundata, majora ovata, obtusa nervo medio supra depresso subtus elevato; *cymulae* parvae, axillares, pauciflorae; *calycis* laciniae extus dense pubescentes, glabrae, ferrugineae.

§. 2. Foliis angustis linearibus.

- Ternstroemia rosmarinifolia* Steud.
9. **Pomaderris rosmarinifolia** Steud. caule ramoso laxè puberulo; foliis angustis linearibus (1½ lineas latis, 8-12 longis) obtusis margine revolutis, supra laete viridibus glabris, subtus dense villosis-sericeis; stipulis minutis setaceis acutis; cymis axillaribus diffusis subracemosis. ♀

In calcareis fruticosis ad tergum montis Baldhead 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1674.

P. origanifolia Forstnec. var. *P. parvifolia*!
 caule ramoso pubescente foliis ovatis emar-
 ginatis undulatis ~~obtusatis~~ ^{apiculatis} supra
 sparse hirsutis, petiolis canaliculatis so-
 minatis, stipulis membranaceis angu-
 stissime ciliatis lanceolatis denti-
 catis, cymis axillaribus paucula-
 ris! Fol. prolixa vicia.
In planitie littorali Encounta Bay.
Novbr. 1847. hb. H. J. n. n. n.

Proactitilia Forstnec.
~~*Proactitilia* Forstnec. *Proactitilia* Forstnec. *Proactitilia* Forstnec.~~
 caule ramoso, foliis ovatis emar-
 ginatis undulatis ~~obtusatis~~ ^{apiculatis} supra
 sparse hirsutis, petiolis canaliculatis so-
 minatis, stipulis membranaceis angu-
 stissime ciliatis lanceolatis denti-
 catis, cymis axillaribus paucula-
 ris! Fol. 5-6, longa 3-4" lata
novo intermedio & limbo parvioribus.
Encounta Bay Novbr. 1847. hb. H. J. n. n.

P. multicaulis Forstnec.
~~*P. multicaulis* Forstnec. *P. multicaulis* Forstnec. *P. multicaulis* Forstnec.~~
 caule ramoso pubescente, foliis ovatis
 undulatis compluribus signa pu-
 berantibus foliis tomentosis ^{apiculatis}
 curvato-apiculatis, stipulis ^{apiculatis} ~~pubulatis~~ ^{apiculatis}
 cymis cespitosissimis terminalibus pau-
 cioribus. Cryptantha leuc. Hb. H.
Fol. 2-3" long 1 1/2-2" lata, repanda
utrinque albo-tomentosa.
Dist. erecta, hb. H. J. n. n.

prope Tannunda vire 1848.
 Pine forest inter Goulter Bay et
 Lyndoch valley Trux 2-3' Hb. H. J. n. n.
 In collibus prope Napton point.

Commersonia i. e. involucentium magis rotundum
 quam superficie ret. Stipulis brevissimis
puberulis alaribus spadicis

Pom. (Trymalium?) velutina Forstnec.
 In collibus repens prope
 Tannunda Nov. 1849.
F. 5-6', flor. luteae Mart
hb. H. J. 654.

x *Haloragis Gonioarpus* tri-
fida *fr. m.*
vel apertius signanda.

Hal. (Gon.) Dymorpha *fr. m.*
glaberrima *fr. m.*
cauli et basi foliorum decumbente
confundente erecto simpliciori vel
ramosa striato quadrangulo,
foliis oppositis pinnatis alter-
nantibus immo floralibusque
lanceolata - linearibus integris
cristis aut trifidis segmentis
linearibus acutis lateralibus
patulis aut lanceolato li-
nearibus supra medium incisuris
paucis serratis, floribus in fo-
liculorum superiorum axillis
plurimigenis limbo termino primo
scapulis postea anthemum inter-
rupte spiratis. breviter pedi-
cellatis tetrandris, calycis py-
ramidalis et petalis triplo im-
longioribus pilosula - petalis
bracteis minutis pubulatis.

α. & trifida *fr. m.*

β. trifida *fr. m.* New
Zealand - range.

γ. incis - serrata *fr. m.*

δ. (*Gonioarpus*) repens
fr. m. in hb. St. Mark.

ad ripas floras Tasma-
niae frequens. hb. N. T. H.

Anthemum vix ad asperum.

+ *Pyrrhulium bifidum*, *fr. m.*

In montibus siccis prope ad asperum
bifidato arctis diffusum. Laminis foliis
marginibus revolutis, floribus glomeratis
breviter pedicellatis, calycis pyramidalis
petalis utrinque alba lacunatis involutis
anthemum, asperum

Pomadouris apicalata! Labill.

x *vinosa* Genzel.

Tasmaniae, hb. St. J. I n. 11.

ad fl. South Esk river, 15-20'

Nov. 1849. hb. St. J. n. 82.

et litus Tasmaniae (e.g. George Town)
fructibus 5-6', caespitibus floribus.

Pomadouris elliptica! Labill.

ad fl. South Esk river Ta-

smaniae. Anthesis Nov.

hb. St. J. n. 133 & 584⁵⁹² 5-6' ^{habitu}

Viburni speciem refert.

Pomadouris (*Thymalium*?) *obovata* Ferd. Mee

locis altis arboribus in halm. Fructus 4' alt. Charact.
Procarlipaloca, fol. form. P. trilobatae accedunt.

x *Pomadouris trilobata* Ferd. Mee

foliis cuneatis apice dilatato

trilobis ^{infer} ex cuneam apicu-

latis, lobis antice ^{extus} denti-

culis paucis serratis, stipulis

puberulis ^{puberulis} subulatis ciliatis, bra-

cteis membranaceis ovatis acutis

costa media valida puberula

carinatis pinnatis, fructibus

umbellatis, sa axillaribus

et apicalibus, capsula baccata

apice dehiscente

specimina deflorata legi in

parte orientali coloniae usque

finem ^{Guianae} Kienli-Bay in collibus

prope stat. St. Morris Oct. 1848

In fructibus eos P. ellipticae

acculant.

Pomadouris (*Thymalium*?) *obovata* Hk

ad fl. St. Pauli Tasmaniae, hb.

St. 598. 10' alt. Nov. 1849.

Trymalium (Pom.) *simplicifolium*
D. Holart. - *Barb. hb. 1797* & *W. & M.*

X *Trymalium* *diversifolia* *Good Mill.*
Folius ovato-lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel ovato-lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis

Trymalium *diversifolia* *Good Mill.*
Folius ovato-lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis

Trymalium *diversifolia* *Good Mill.*
Folius ovato-lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis

Trymalium *diversifolia* *Good Mill.*
Folius ovato-lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis

Trymalium *diversifolia* *Good Mill.*
Folius ovato-lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis

Trymalium *diversifolia* *Good Mill.*
Folius ovato-lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis

Trymalium *diversifolia* *Good Mill.*
Folius ovato-lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis

Trymalium *diversifolia* *Good Mill.*
Folius ovato-lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis
vel lanceolatis, apice mucronatis, serratis, nervis

Fruticulus 2-3 pedalis; *rami* debiles, teretes, pilis subdistantibus brevissimis substellatis asperuli; *folia* sparsa, in petiolum brevem attenuata; *stipulae* minutae, vix lineares, acutissimae, deciduae; *flores* parvi; *calyces* basi dense limbi extus vix pilosi, intus glabri; *corolla* nulla.

10. **Pomaderris westringiaefolia** Steud. caule ramoso laxo puberulo vel glabriusculo; foliis angustis subovato-linearibus ($1\frac{1}{2}$ -2 lineas latis, 8-10 longis) obtusis margine revolutis supra fusco-viridibus glabris, subtus dense piloso-sericeis; stipulis minutis setaceis deciduis; eymis axillaribus foliis brevioribus confertis. ♀

In planitie clivuli calcarei Arthur'shead 23. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1686.

Fruticulus parvus, ramosus; *rami* adulti glabri, fusco-rubri, juniores pilis brevissimis fasciculatis vix stellatis asperuli, in summitate piloso-pubescentes; *folia* obovato-linearia, 5-7 lin. longa, raro abbreviata, ovata, in petiolum brevem lineam longum attenuata, sub apices ramulorum subconfecta; *flores* (evoluti desunt) in cymis axillaribus laxiusculis.

TRYMALIUM Fenzl. Endl. gen. n. 5744.

1. **Trymalium expansum** Steud. caule fruticuloso ramoso tereti pubescente; ramis divaricato-patentibus infra nudis superne foliatis et floriferis pilosis; foliis in ramulis alternis supra fusco-viridibus pubescentibus, subtus albotomentosis; floribus subracemosis tandem in ramis elongatis diffuse ramoso-paniculatis; capsula ovata basi calyce persistente circumscissa et superne setoso-villosa. ♀

In rupestribus ad clivulum vallis Todyayvalley ditionis Victoria. 7. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 1683.

Frutex ramis teretibus rufescentibus; *rami* elongati, ultra medium nudi, sarsum ramulosi; ramuli dense albo-pubescentes, abbreviati, foliati; *folia* breviter petiolata, magnitudine varia, 2-8 lin. longa, ovata vel ovato-oblonga; *stipulae* setaceae, marcescentes, pilosae; *flores* ante florescentiam (evoluti desunt) subracemoso-aggregati, tandem in ramis fructiferis elongatis amplo racemoso-paniculati.

2. **Trymalium floribundum** Steud. caule erecto ramoso tereti patenti-piloso; foliis ovatis integris vel obscure repando-dentatis supra sparsim simpliciter pilosis vel glabratis, subtus dense substellato-cinerascenti tomentoso pilosis; stipulis angustissimis lanceolato-acuminatis deciduis; floribus in summis foliis axillaribus terminalibusque paniculatis; calyceis tubo villosio limbo 5-fido glabro; capsula circumscissa setoso-pilosa. ♀

In sublimosis saxosis ad latus praeruptum vallis Cataractae ad caput fluvii Cygnorum 25. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1680.

Caulis teres, rubicundus, pilis patentibus longis aliisque brevissimis adpressis substellatis tectus; *folia* brevi-petiolata, 1-1½ pollices longa, venis versus lucem pellucidis percursa; *stipulae* subscariosae, valde fugaces petiolum subaequant, pilosae; *flores* in racemis axillaribus terminalibusque ramosis paniculam amplam semipedalem formantes; pedicelli pilosi, calycis basi dense villosi, laciniae utrinque glabrae, ferrugineo-rufae, fructus.

CRYPTANDRA Smith. Endl. gen. n. 5742.
Meisn. gen. pag. 70. (50.)

§. 1. Inermes.

a. calycibus villosis.
C. Lomandra Lindl.

1. **Cryptandra nutans** Steud. caule ramoso pumilo (1-1½ pedali) basi glabro, apice ramisque pubescentibus; foliis fasciculatis margine revolutis subacerosis, supra puberulis subtus albo-pilosis floribus terminalibus fasciculato-spicatis subnutantibus; calyceis tubo campanulato limbo connivente albo-sericeo; bracteis ovatis ferrugineis calyceis tubum aequantibus. ♂

In arenosis sylvae prope ora maritima ditionis Perth. Herb. Preiss. No. 2424.

Fruticulus ramosus; *rami* cinereo-fuscescentes, infra glabri sursum pilis albidis vestiti; *stipulae* in ramulis novellis tantum conspicuae fugaces, ovato-lanceolatae, subscariosae, pallide ferrugineae; *folia* fasciculatim aggregata 1-1½ raro 2 lin. longa, marginibus revolutis sese attingentibus, subteretia vel marginibus adhuc distantibus subtus canaliculata; *flores* in apice ramulorum axillares et terminales subracemosi, nutantes; *calycis* limbus intus glaber ferrugineus.

2. **Cryptandra tridentata** Steud. caule ramosissimo glabrescente cicatriceibus foliorum emortuorum noduloso; foliis obovato-cuneatis apice truncatis tridentatis subfasciculatis glabris; stipulis membranaceis ovatis acutis. ♂

In N. Holl. occ. austr. Herb. Preiss. No. 2421.

Fruticulus parvus pedalis, ramosissimus, cortice rimuloso fuscescente; *ramuli* teretes, pubescentes; *folia* alterna, brevi-petiolulata 1-1½ lin. longa, solitaria vel subfasciculata, viridia plana, margine vix revoluta, apice plerumque 3-raro 5-dentata, dentibus plus minus exsertis quandoque vix conspicuis; *flores* et fructus desunt.

β. calycibus glabris.
C. Erythraea Steud.

3. **Cryptandra floribunda** Steud. caule erecto angulato striata rubicundo glabro, ramis brevibus; foliis oblongo-vel lanceolato-linearibus (1-2 pollices longis), supra fusco-glaucis viridibus glabris (junioribus pubescentibus), subtus cinereo-albo-sericeis; stipulis lanceolatis scariosis elongatis; racemis pluribus apices ramorum terminantibus interrupte subverticillatis fasciculatis; pedicellis flore longioribus pilosis; calyce glaberrimo tubo abbreviato limbo patente vel reflexo; staminibus petalis reflexis non inclusis, germine glabro; fructibus . . . . . ♂

In limosis ad fluvium Cygnorum Juli 1839. Herb. Preiss. No. 1675.

Caulis nitide rubens, sub lente punctulis minutis subalbescentibus sparsim notatus; *ramuli* foliati; *folia* plana, margine revoluta, in petiolum brevem attenuata; *stipulae* lanceolatae, acuminatae, semiscariosae; *flores* ex axillis foliorum superiorum, vel immediate ramulos terminantes, in racemis 1-3-polliaribus interrupte verticillatis; *pedicelli* pilosi, flore plerumque longiores; *calycis* lacinae utrinque glaberrimae, rufo-ferrugineae; *petala* parva, unguiculata, cucullata sed stamina demum non tegentia; *stylus* brevissimus; *stigma* 3-fidum, fructus ignotus. Ad Trymalii genus accedens species.

4. *Cryptandra glaucophylla* Steud. caule erecto ramoso rufescente subtereti basi glabro sursum ramisque pubescentibus; foliis alternis approximatis vix fasciculatis marginibus reflexis linearibus angustissimis; supra glabris, (sub lente, valida), tenuissime punctato-impressis, subtus sericeo-pilosis, racemis axillaribus et in ramis terminalibus subdissiti-floris; calycis tubo brevissimo pubescente vel glabro, laciniis glabris patulis vel reflexis, staminibus vix inclusis. ♀

In asperis montis Greenmountain 27. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1684.

Frutex ramosissimus; *caulis* basi rufescente glabrescens sursum uti rami pilis brevissimis adpressis substellatis in summo apice ramulorum solutis longioribus pubescens; *folia* 5-8 lin. longa, ob margines reflexos vix lineam lata, subalterna, summa approximata, non fasciculata, breviter petiolulata, apice fasciculo pilorum (ex inferiore pagina praeminentium) apiculata; racemi in ramulis ex summis foliis axillares et terminales, *floribus* in interstitiis racemosi; *calyx* basi pilosus, parvus, laciniis glabris, flavo-ferrugineis; *petala* minima, cucullata demum calycem versus reflexa *stamina* nondum includentia; fructus

5. *Cryptandra anomala* Steud. fruticulosa ramosa, ramis glabris sursum pubescentibus; foliis petiolo saepe flexuoso lineari-vel ovato-oblongis irregulariter alternis supra viridibus glabris subtus albo-piloso sericeis; stipulis parvis ovato-lanceolatis scariosis; racemis axillaribus, calycis tubo pyramidato-campanulato glabro, laciniis patentibus; capsula ovata apice truncato-plana calycis dejecti marginibus cincta 5-punctata 3-locularis. ♀

In N. Holl. occ.-austr. Herb. Preiss. No. 1685.

Fruticulus pedalis; *rami* teretes, inferne glabri, rufescentes, epidermide demum secedente sursum pilis minutis adpressis substellatis vel simplicibus in summis ramulis confertioribus adpersi; petioli breves, erecti, quandoque curvati; *folia* 3-7 lin. longa, apice vix conspicue mucronulata; *flores* in racemis brevibus, paucifloris, axillaribus, in pedicellis brevibus basi bracteola parva ovato-lanceolata acuta munitis; *calycis* lacinae luteo-ferrugineae glabrae; *petala* minima paulo pallidiora, unguiculata, cucullata; *stamina* demum non tegentia; *fructus* capsularis glaber subconicus. Habitus omnino praecedentium.

§. 2. Spinosae.

a. calycibus villosis.

6. *Cryptandra pungens* Steud. caule ramoso cortice secedente; ramis spinoscentibus puberulis; foliis fascicula-

tis linearibus subteretibus utrinque glabris; stipulis setaceis marcescentibus; floribus in ramis terminalibus racemoso-spicatis vel in ramulis spinescentibus lateralibus erectis vel subnutantibus; calycis tubo campanulato sericeo piloso limbo subpatente minutissime pubescente; bracteis minutis ovatis scariosis acutis: ♀

In arenosis sylvae prope ora maritima ditionis Perth. Herb. Preiss. No. 2422.

Caulis ramique cinerei pubescentes; *rami* plures in spinam terminati vel mutati; *folia* subfasciculata, brevissime petiolulata, 1-3 lineas longa, subteretia, apice minutissime apiculata; *stipulae* mox caducae, in ramis novellis conspicuae, lanceolato-setaceae; *flores* vel in ramulis spinescentibus racemoso-aggregati vel in inermibus longius racemoso-spicati; *petala* stamina tegentia.

7. **Cryptandra holostyla** Steud. caule erecto stricto, ramisque erectis cinereis pubescentibus apice (invalide) spinescentibus; foliis fasciculatis revolutis subteretibus (sub lente) muricato-asperis demum glabris; floribus versus apices ramulorum axillaribus solitariis vel binis pedunculis filiformibus flores longitudine aequantibus; calycibus longe-campanulatis sericeo-pubescentibus limbo abbreviato patente; stylo apice integro. ♀

In clivulis calcareis prope ora maritima ditionis Perth Herb. Preiss. No. 2423.

Rami erecti pilis patentibus sursum vestiti, semiunciales, spinescentes, foliati, ramuli abbreviati; *folia* subfasciculata, 3-4 lineas longa, subteretia, rigidiuscula, sub lente pilis brevibus puncticulis minutis insidentibus rigidiusculis asperula, demum glabrata; *stipulae* scariosae, setaceae, caducae; *flores* parvi; *calyx* conicus, limbi 5-fidi lacinae brevissimae germen dense pilosum non tegentes; *petala* inter calycis lacinas brevissima stamina tegentia; *stylus* apice capitatus, integro, mox deciduus.

C. miticaris Reisch. (calycibus glabris*).
C. pilosphylla Reisch.

8. **Cryptandra glabrata** Steud. caule erecto ramoso glabro, ramis ramulisque pubescentibus floriferis spinescentibus; foliis (parvis 3-5 lineas longis) subfasciculatis in ramis sterilibus sursum alternis, oblongis revolutis acutiusculis glabris; floribus in ramulis spinescentibus racemoso-aggregatis arcte (ante florum evolutione) scarioso-bracteatis, calycibus omnino glabris. ♀

In arenosis sylvae prope Pointwater ditionis Perth. Herb. Preiss. No. 2424.

Rami post delapsam epidermidem secedentem rufescentes, erecti, demum plerumque spinescentes; *ramuli* brevissimi in floriferis 3-4 in sterilibus summis 5-6 lineas non excedentes; *folia* parva, subfasciculata, brevissime petiolulata; *flores* in ramulis pauci, 4-6 subracemosi; *bractae* scariosae ovatae calycem glabrum involucentes.

- C. miticaris* Reisch. et *C. pilosphylla* Reisch.
 9. **Cryptandra lasiophylla** Steud. caule erecto ramoso ramis pubescentibus, ramulis floriferis spinescentibus; foliis

*) Tres sequentes species nullos praebuerunt flores evolutos nec fructus, hinc magis habitus quam florum investigationis fide huc relatae. *Cryptandrae ulicinae* et *vestiferae* Hook diagnoses comparare non licuit.

x Dissararia Tasmanica Johnston.
Speciem propriam a fl. Novio-
Hollandica vil. D. Australi
figenti ptnasi distinctam
constituere videtur.

glaberrima, spinis plerumque
nudis, ramulis ^{terminalibus} ex axillis spinarum
vel terminalibus folia floresque
gerentibus, illis his quadrangulis
quinguefidis in verticillata deca
axillaria ciliatis, illis oppositis anguste spa-
tulato-linearibus cuneatis apo-
suraturis mucosis fimbriatis
latis apice emarginatis vel apu-
culatis.

In Tasmania ad fl. South Esk river
hanc communis. hb. St. J. n. 43.
Nov. 1849. frutex 1-2'.

N. x Bursaria pinnata Cavanilles.
frequentia per latam regionem.
hb. St. n. 10. hb. J. n. 13 & 46. Frutex
pinum Rivali in orientalibus interioribus
colorem magnitudinem arboris mediocrius
R. & J. fig. reg. 5. p. xxxiii occurrit.

Bursaria exarmata. Ford & Mill.
hb. St. n. 11. Ad fl. Murray.
differs a B. pinnata ramis foliis
ramibus floribusque pubescenti-
bus, ovario trifido pubescenti-
bus etc. Apr. 1848. In

Encephalartia amplior
me. Sicut et non nihil nisi

B. pinnatae sit varietatem p
indutam signatam: ramulis

rudiculis ovario pinnatis
foliorum infra terminalibus im-
mis, ibidem. Apr. 1849.
Aut fort. B. dissararia. L. H.

Nutgaria in Tasmania,
ubi plerumque altior quam
prope Delceide pronuntiat 15-20

fasciculatis oblongo-lanceolatis (parvis 2-5 lineas longis) utrinque hirsutis; floribus in ramulis spinescentibus racemoso-aggregatis (ante florum evolutionem) arete bracteolatis calycibus glabris. ♂

Cum praecedente. Herb. Preiss. No. 2420^b.

Caulis teres, post epidermidis secessum rubicundus, glaber; *rami* erecti pube patenti vestiti, steriles longiores 3-4 pollicares, inermes, floriferi breviores $\frac{1}{2}$ - 1 pollicares, spinescentes; *folia* subfasciculata, 2-4-na, plana, brevissime petiolata, supra praesertim hirsuta, subtus demum glabriuscula; *stipulae* e basi latiore lanceolatae, acutae; *flores* nondum evoluti omnino uti in praecedente.

10. **Cryptandra tenuiramea** Steud. caule ramosissimo, ramis tenuissimis ramulisque spinescentibus pubescentibus; foliis subfasciculatis binis ternisque vel solitariis sparsis (parvis 2-4 lineas longis) linearibus utrinque hirsutis; floribus in ramulis solitariis sparsis, bracteolis involucrantibus lanceolatis acutissimis. ♂

In N. Holl. occ.-austr. Herb. Preiss. No. 2419.

Fruticulus tener pedalis; *rami* flores et folia gerentes seminales spinescentes; *folia* solitaria et fasciculata plana, margine revoluto; *stipulae* scariosae, folio triplo breviores, setaceae, acuminatae; *flores* (evoluti desunt) parvi in ramulis sparsi. Iterum ex habitu huc relata.

PITTOSPOREAE.

R. Brown in Flinder's voy. II. 542.

Endl. gen. pag. 1081.

(Auctore ALOYSIO PUTTERLICK.)

PITTOSPORUM Solander Putterlick Synops.

Pittosp. p. 5. Endl. gen. n. 5661. Meisn. gen.

pag. 66. (48.)

Sectio I. EUPITTOSPORUM. Inflorescentia terminalis, simplex vel composita. Fructus plus minusve subglobosi vel ovoidei, angulati vel compressiusculi.

** *Pedunculi* terminales, simplices, solitarii rarius bini ternive, singuli e gemma prodeuntes. *Folia* integerrima.

1. **Pittosporum parviflorum** Putterlick. glabrum, foliis obovatis, 4-5 linealibus, vix ultra 3 lin. latis, apice rotundatis, basi in petiolum vix semilinealem angustatis,

margine integerrimis obtusis, e luteo laete viridescens, sempervirentibus; in utraque pagina concoloribus, opacis, coriaceis; pedunculis solitariis binisve, rarius ternis, tenuibus, linealibus, simplicibus, apicem versus paullo crassioribus; floribus ovatis, vix linealibus, petalis pallide e luteo viridescens, oblongis, obtusis; fructu (immature) ovato-compressiusculo, obscure flavescens, styli basi coronato.

In glareosis sterilibus districtum: York et Wicklow. Australasiae austro-occidentalis, die 20. Martii 1840. Herb. Preiss. No. 1290.

Fruticuli bipedalis *truncus* cylindricus, pennae anserinae crassitie, erectus, cortice cinereo-fusco, longitudinaliter rugoso vestitus, ligno sat duro, denso, flavescens; a basi ramosus. *Rami* teretes, superne sensim attenuati, erecto-patentes, vetustiores trunco conformes, annotini fuscescentes, glaberrimi, nitiduli, punctis minimis resinosis conspersi, ceterum dichotome ramosi. *Folia* obovata, 4-5 linealia, vix ultra 3 lin. lata, apice rotundata, rarissime in junioribus obsolete emarginata, basin versus in petiolum brevissimum vix semilinealem, subtus convexiusculum, supra leviter canaliculatum angustata, plana, e luteo laete viridescens, in utraque pagina concolora, sempervirentia, opaca glaberrima, margine obtusiusculo integerrima, nervo mediano perenni vix infra paululum prominente perducta, lateralibus obsoletis, erecto-patentia. *Pedunculi* in apice ramulorum annotinorum solitarii binive, rarius terni, teretes, vix lineales, filiformes, apicem versus paullo crassiores, et pilis brevibus appressis obsessi, simplices, basi bracteolis, ante evolutionem in gemmam imbricatam conniventibus, minimis, ovatis, acutis, glabris, citissime caducis stipati, sub anthesi mutantes. *Flores* ovati, vix lineam longi, semilineam lati, obtusi. *Calycis foliola* omnia jam delapsa. *Corollae petala* 5, lineari-lanceolata, $\frac{3}{4}$ lin. longa, vix $\frac{1}{3}$ lin. lata, obtusiuscula, glandula punctiformi terminata, extus convexiuscula, intus cava, e luteo laete viridescens, carnosula, succo resinoso ab ovarii glandulis basilariis secreto et inspissato ipso ovario adglutinata. *Stamina* omnia jam delapsa. *Ovarium* ovoideum, lineale, $\frac{2}{3}$ lin. latum, obtuse triquetrum, verruculis minimis scabrum, succo resinoso obductum, basi paulum dilatata glandulis quinque prominentibus, cum staminibus alternantibus et succum resinum secernentibus stipatum; superne stylo tereti, obtuse subtriquetro, ovarium longitudine aequante, filiformi, basi articulatum tumida ovario affixo, in medio paulo ampliore, in apice *stigmatibus* simplici truncato, medio impresso et obsolete trilobis, subtilissime papillato terminato, post anthesin caduco coronatum; intus triloculare, semiseptis tribus medio juxta axium contiguis et utrinque margine ovuliferis septatum. *Ovula* marginibus duorum semiseptorum conniventium alternatim affixa, parallele biseriata, obovata, mutua pressione sub ulteriore evolutione angulata, stipite brevissimo affixa, horizontalia, anartropa 6-10 in quovis loculo. *Fructus* immaturus ovario duplo major, ceterum cum hoc congruus conformatus.

Sectio II. PLAGIANTHERON. Pedunculi ex axillis foliorum laterales vel terminales, simplices vel divisi.

* *Pedunculi simplices, solitarii, rarius bini. Folia integerrima, subevenia.*

2. **Pittosporum ligustrifolium** All. *Cunningh.* ramis virgatis, dichotome divisis, junioribus tomentoso-incanis; foliis anguste lanceolatis, 2-4 uncialibus, sesquilineam la-

P. bicolor. Hooker
P. mutabile Gerdt Müller
P. revolutum HB. N. T. & n B.

A. *P. revoluta* Aiton diffusi
videtur pedunculis axillarib.
& terminalibus perique
foliariis! An var?

Prope Lannoyon ad fl. Saath
Et k rivir. Oct 20. 1848.

Planta minus quam *P. aracioides*
amara gummis exudat conspicienda
fere sebi, coloris ^{fulvato} ~~flavo~~ rubello - flavescens.
Floris parum odori. Fructus *P. araci-*
oide minores.

Bursera spinosa Cavanilles
In plagis ^{20-30'} siccioribus lapidosis
Arbor, cortice gravi fere aro-
matico.

Mount Gambier, ubi, "Box Tree"
vocatur, Port Lincoln, Port Mac-
quary

Divasis Coris diago lampone florat

Didymoria acumata Lth. in Mch.
Proc. exp. II, 198.

undique pilis pellatis. Laciniosis
purpurea. Rami striati.
Folia subrotunda cordata obtusa
opposita brevi petiolata pellu-
cido punctata. Pedunculis
axillares filiformes uniflori
supra medium bracteolis 2
pubescentibus acutis. Calyx cor-
neo-membranaceo 4 partibus
laciniis acuminatis. Petala
4 longissima diffusa lineari
convoluta circa staminum
paria ex his tomentosa intus
glabra. Stamina 8 hypogyna
filamentis ciliis lineari
canaliculatis membranaceis
albis brevioribus, antheris
sagittatis in appendice
stylis filiformis glabris. Stigma
nullum. Capsula 4 correa, villosa
filiformis, racis diffusus?
(in var. 1 pp.) eudoracis foliis
ciliis, pinnatis vico supra al-
bum populi

Flowers green
not far from glutty river

Detached in Cornacis geminis laepe
Diffusus (Flu)

tis, basi sensim in petiolum circiter semipollicarem attenuatis, apice iterum sensim in mucronulum linealem falcato-recurvum attenuatis, planis, utrinque concoloribus, tenue coriaceis, nervo mediano tenui percursis, lateralibus obsoletis, margine integerrimis, junioribus pilis brevibus mollibus pubescenti-imo tomentoso-incanis; pedunculis axillaribus terminalibusque, solitariis, simplicibus, petiolos aequantibus, junioribus tomentoso-incanis; floribus campanulatis, trilinealibus, badiis; capsulis ovoideo-vel obovato-compressiusculis, bivalvibus, pleiospermis, sordide luteis. — All. Cunningham Mss. in sched. 1822, et in Annals of Nat. Hist. IV. 110. Putterlick Synops. Pittosp. 16. Walpers Repert. I. 250.

P. longifolium Putterlick Syn. Pittosp. 15. Walp. Repert. I. 250.

P. Roëanum Putterlick Syn. Pittosp. 16. Walp. Repert. I. 250.

Habitat in littoribus aridis insulae Rotenest, adversus ostium amnis Cygnornum Australiae orae occidentalis, 1822. (All. Cunningham); ibidem in interioribus coloniae Swan River Dec. 1836 (J. S. Roe) et 1837 (J. Drummond); in arenosis sylvae orae occidentalis insulae Rotenest 18. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1297.

Arbuscula 20-30 pedalis, ramis divaricatis, gracilibus, flexuosis; ramulis flexuoso-patentibus, propensis, foliatis; adultis glabris, cortice e rufo-purpurascente vestitis, ligno denso, duro, albido; junioribus purpurascentibus, tomento incano tectis. *Folia* solitaria, alternatim dissita, versus ramulorum apicem confertiora, anguste lanceolata, 2-4 uncialia, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata, basin versus sensim attenuata in petiolum semipollicarem infra convexum, supra canaliculatum, apice iterum in mucronulum linealem falcato-recurvum cuspidato-attenuata, plana, e luteo lacte viridescencia, utrinque concolora, sempervirentia, tenue coriacea, nervo mediano tenui vix infra prominente perducta, lateralibus obsoletis, margine obtusiusculo integerrima; juniora pilis brevibus, mollibus pubescenti-imo tomentoso-incana, adulta glaberrima, supra nitida, subtus apaca, sempervirentia. *Pedunculi* e gemma axillari vel terminali solitarii, simplices, teretiusculi, filiformes, petiolos aequantes vel superantes, una basi bracteolis 2-3, ovatis, acutis minimis, margine ciliolatis, dorso pubescentibus, caducissimis suffulti, tomentoso-incani, adulescentes calvescentes, sub anthesi mutantes. *Flores* campanulati, trilineales. *Calycis foliola* 5, ovata, acuta, linealia, aequalia, aestivatione imbricata, sub anthesi patentia, superne recurvata, extus pubescentia, badia, margine pallidiora et brevissime ciliolata. *Corollae petala* 5, hypogyna, calycis foliolis alterna, aequalia, aestivatione imbricata, subspathulata, ad tres lineas longa, vix lineam lata, unguibus angustioribus in tubulum comiventibus, pallidioribus, laminis sub anthesi patentibus reflexis, in sicco profunde luteis, venis tribus longitudinalibus parallelis et venulis horizontalibus anastomosantibus profundius tinctis perductis, glabris, margine brevissime ciliolatis. *Stamina* 5, hypogyna, petalis alterna et breviora, aequalia; filamentis linearibus, vix sesquilinealibus, superne paululum amplioribus, planiusculis, intus sulco longitudinali exaratis, albidis; antheris terminalibus, ovatis, obtusis, semilineam metientibus, basi emarginata filamento affixis, erectis, post anthesin retrorsis, obscure luteis, biloculatis, loculis oppositis, connectivo adnatis, longitudinaliter introrsum deliscentibus. *Pollinis* granula lutea, globoso-triedra. *Ovarium* ovoideo-vel ellipsoideo-compressiusculum, lineale, semilineam latum, pilis canis villosum, basi glandulis 5 cum staminibus alternantibus stipatum, superne in stylum teretem, filiformem, ovario

ipso dimidio breviorum et *stigmatibus* hemisphaericis, medio impresso, obsolete quadrilobis et subtilissime papilloso terminatum continue transiens; intus semiseptis duobus parietalibus in axi contiguis biloculatum, septis in margine utrinque loculum spectante alternatim ovuliferis, *ovulis* filo brevissimo annexis, subglobosis, horizontalibus, anatropis, parallele biserialibus, circiter 8-12 in quovis loculo, plurimis abortivis. *Capsula* ovoideo-vel obovato-compressiuscula, stylo brevi terminata, sordide flava, glabra, rugosa, opaca, intus biloculata, in valvas duas dehiscens; valvis crassis, coriaceis, reflexo-patentibus, intus citrinis, verniceo-nitidis, medio semisepto incompleto in margine utrinque seminiferis. *Semina* in quovis loculo 4-6, uniseriata, subglobosa, angulato-compressa, diametro lineali, testa purpurascens, nitida, albumine carnosio albo, embryo in fundo albuminis juxta umbilicum posito, ovato, minimo, basi attenuata micropylem vix conspicuam spectante, mere celluloso.

Differt a *Pittosporo acacioides* All. Cunningham Mss. 1817. et in Ann. of Nat. Hist. IV. 109. (*P. angustifolium* Loddig. Bot. Cab. t. 1859 [1832]) quod habitu illo simillimum, ramulis in hoc, foliis et pedunculis jam in statu juniore glaberrimis, foliis magis lanceolatis, utrinque concoloribus, longius petiolatis, pedunculis petiolo duplo brevioribus, floribus paulo majoribus et capsulis aurantiacis, lato-ellipticis; a *Pittosporo phillyraeoides* Dec. vero, cum in hoc folia lanceolata, breviora, duplo latiora, crassioraque, pedunculi petiolo duplo longiores, crassiores, capsulae majores aurantiacae.

3. ***Pittosporum phillyraeoides* DC.** ramis junioribus tomentoso-incanis; foliis ellipticis lanceolatisve, 1-1½ uncialibus, ad 4 lin. latis, basi in petiolum 2-3 linealem angustatis, apice cuspidato breviter mucronatis, mucronulo falcato-reflexo, planis, glaberrimis, pallide luteo-viridescentibus, utrinque concoloribus, coriaceis, nervo mediano tenni perductis, lateralibus obsoletis, margine obtusiusculo integerrimo angustissime subrevoluto, erecto-patentibus; pedunculis axillaribus, solitariis binisve, petiolo duplo longioribus; capsulis elliptico-vel ovoideo-compressiusculis, aurantiacis, opacis, rugulosis, bi-trivalvibus pleiospermis. — DC. Prodr. I. 347. Don Gen. Syst. I. 347. All. Cunningham in Ann. of Nat. Hist. IV. 109. Putterlick Syn. Pittosp. 16. Walp. Repert. I. 254.

P. oleifolium All. Cunningham Mss. in sched. 1822.

Habitat in Australiae ora occidentali in arenosis aridis insulae Dirk Hartog 1802 (Lechenault); Hartoge Bay 1804 (Ferd. Bauer) 1822. (All. Cunningham); in arenosis insulae Horstman's Abrolhos ubi a Cl. G. Moore Jan. 1840 lectum, communicatum accepit cl. Preiss. Herb. Preiss. No. 1294.

„*Frutex* robustus, erectus; ramosus, sexpedalis, habitu fere facie *Oleae*.“ All. Cunningham l. c. *Ramuli* juniores tomentoso-incani. *Folia* alternatim dissita, in ramulorum apicibus confertiora, in petiolum subtus convexiusculum, supra canaliculatum angustata, juxta nervum medianum vix infra parum prominente, superne parum impressa, recentiora utrinque concolora. adulta superne brunnescentia ideoque in pagina inferiore pallidiora apparent. *Flores* hucusque ignoti. *Fructus* capsularis, elliptico-vel ovoideo-vel obovato-compressiusculus, ad 8 lineas longus, 5 lin. latus, ultra 3 lin. diametro transversali, aurantiacus, rugulosus, opacus, in valvas 2-3 dehiscens, valvis fere ultra lineam crassis, coriaceo-lignosis, patentibus-reflexis, intus aurantiacis, verniceo-nitidis, semisepto margine utrinque alternatim seminifero. *Semina* ovata vel subglobosa, angulato-compressa, diametro lineali, testa purpurascens, nitida, glaberrima. *Embryo* in fundo albuminis solidi durioris albidus prope umbilicum situs, minimus, orthotropus, incompletus, mere cellulosis.

Eremothaenus ferdin.

G. n. pinnis solitario in genere
singulare Pittoporo proximo
et in hb. Stuart Pittop.
melanopseum appellari
et in hb. Dehr Myoporo
obtusum vocari; Phytum
seu non videtur!

Inclinis glareosa - arenosa
St. Murray Monocle vides
Stuart, Miller, Mueller!

Frutx ramis elongatis erectis
Folia vix nitentia carnulenta

S.E. myoposoides ferd. Mueller

in the South Australia 1852, n.

In pectinatis depressis videri pinnis
Inuon Gulf apicem & munda Fluit
Arborea humilis vel frutx altior.
Folia nauposo-amara.
Anth: prima vna.

ONCOSPORUM Putterlick. Endl. gen. n. 5663.

Meisn. gen. pag. 348.

Calyx pentaphyllus, imo margini receptaculi floris adnatus hypogynus, foliolis subaequalibus, distinctis. *Corollae petala* 5, distincta, hypogyna, calycis foliolis alterna, spathulata, in corollam campanulatam conniventia, patentia, apice reflexa, subaequalia. *Stamina* quinque, distincta, hypogyna, petalis alterna, subaequalia, in tubum conniventia; *filamentis* e basi latiore planiuscula intus canaliculata subulato-filiformibus, apice antheriferis; *antheris* ovatis, apice obtusis, baseos emarginatae dorso affixis, biloculatis, loculis appositis, superne contiguas, connectivo adnatis, inferne divergentibus, longitudinaliter introrsum dehiscens, pollinis granulis globoso-triedris fere, erectis, tandem reflexis. *Ovarium* stipite brevi basi glandulis 5 cum staminibus alternantibus instructo et receptaculi conici floris apice insidente liberum, elongato-ellipsoideum, cylindraceo-compressiusculum, anceps, glaberrimum, basi in stipitem angustatum, lateribus planiusculis medio juxta axim sulco longitudinali impressum, apice attenuato in *stylum* teretem, filiformem, glabrum, *stigma* simplici, convexiusculo, medio paulo impresso, subtilissime papilloso terminatum continue transiens, intus e semiseptis in axi contiguas biloculatum, septis in marginibus utrinque locum spectantibus, parallele juxta axim decurrentibus et parum prominulis alternatim ovuliferis. *Ovula* brevissimo funiculo introrsum curvato suspensa, juxta axim dissepimenti utrinque biseriata, subglobosa, horizontalia, anatropa, 4-6 in quovis loculo, plurima abortiva. *Fructus* e receptaculo floris superstiti stipite brevi suffultus, capsularis; *capsula* late ovoidea vel subglobosa, utrinque compressiuscula, basi in stipitem attenuata, lateribus planiusculis utrinque medio juxta axim sulco longitudinali impressa, marginibus obtusiusculis subanceps, apice attenuata styli basi persistente coronata, fulva, venulis fuscis reticulatim anastomosantibus elevatis obducta, glabra, opaea, tenuiter membranacea, intus biloculata, pleiosperma, maturitate loculicida ab apice ad medium semibivalvata, loculis adhuc clausis e semiseptis in axi cohaerentibus, mox septifrage, semiseptis nunc medio hiantibus, complete bivalvis, semiseptis nunc margine liberis paulo incrassatis et loculos spectantibus seminiferis. *Semina* funiculo vix $\frac{1}{2}$ lineae longo, tenui, corrugato, fusco suspensa, globosa, diametro lineali, purpurascens, glabra, nitida, libera, 2-6 in quovis loculo; *raphe* brevi ab umbilico ad chalazam horizontaliter per quadrantem circumferentiae seminis producta, toruloso-tumida, discolor, intra testam adnata. *Embryo* in fundo albuminis solidi et duri prope umbilicum propria cavitate inclusus, minimus, ovalis, basi attenuata hilum spectans, mere cellulosus.

Suffrutices Australasiae austro-occidentalis, trunco erecto, a basi ramoso; ramis erecto-patentibus, filiformibus, volubilibus; foliis alternis, indivisis, inferioribus spathulatis, argute serrato-dentatis, imo fere pinnatifide dentatis, dentibus iterum denticulatis, superioribus ellipticis, plerumque integerrimis, membranaceis, pubescentibus; pedunculis terminalibus vel rarius axillaribus, simplicibus vel bifidis; floribus speciosis, laete violaceis vel caerulescentibus.

Oncosporum Putterlick in Nov. stirp. mus. Vind. decad. II. pag. 9. Synops. Pittosp. 21. (exclusis characteribus praeter fructus.)

1. ***Oncosporum Drummondianum*** Putterl. ramis filiformibus, longissimis, volubilibus, patentissimo-pubescentibus, adultioribus calvis; foliis brevipetiolatis, pilis longis canescentibus patentissimis utrinque villosis, inferioribus minoribus, semiuncialibus, ad 2 lin. latis, spathulatis, apicem versus grosse serrato-dentatis, imo fere pinnatifido-dentatis, dentibus iterum denticulatis, superioribus ovalibus vel ellipticis, acutis, fere pollicaribus, ad 3 lin. latis, dente uno alterove arguto instructis, supremis lanceolatis vel oblongo-ellipticis, acutis, 1-1½ uncialibus, plerumque integerrimis, omnibus membranaceis, erecto-patentibus; pedunculis ramulos terminantibus, rarius axillaribus, simplicibus vel bifidis, patentissimo-villosis, erectis, sub anthesi nutantibus; floribus speciosis, campanulatis, subirregularibus, pallide violaceis; calycis foliolis subulatis, patentissimo-villosis, capsulis late-ovoideo-compressiusculis, utrinque sulcatis, membranaceis, pleiospermis.

Habitat in Australiae austro-occidentalis colonia Swan-River (1839 J. Drummond); in solo glareoso sterili coloniae Swan-River, 8. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1288; in interioribus continentis inter promontorium Leschenault et King George's Sound, 1843 (J. S. Roe).

Frutex bipedalis et altior, radice tereti, deorsum sensim attenuata, recta, helvola, ramulis fibrillisque paucis, longis aucta. *Truncus* cylindricus, pennae auserinae tenuioris crassitie, semipedalis, superne sensim attenuatus, cortice ferrugineo, rugoso, glabro, nitido vestitus, ligno solido duro, albedo instructus, erectus, hinc inde flexuosus, a basi ramosus. *Rami* teretes, pennae corvinae crassitie, superne sensim attenuati, filiformes, cortice rufo, nitido, spiraliter rugoso-striato vestiti; juniores pilis tenuissimis, diametro eorum duplo longioribus, incanis, horizontaliter patentibus, praecipue apicem versus sat dense villosi, adultiores calvescentes, erecto-patentes, primum recti, tandem flexuosi et volubiles, longitudinem bipedalem et alteriorem attingentes, alternatim foliati, e foliorum axillis ramulos annosinos foliatis apice floriferos prominentes. *Folia* brevissime petiolata, in serie spirali juxta truncum, ramos ramulosque alternatim dissita; truncus *inferiora* minima, spathulata, uncialia, ad 2 lin. lata, basin versus sensim in petiolum angustata, apicem obtusiusculum vel brevissime acutum versus margine grosse serrato-dentata, imo fere pinnatifido-dentata, dentibus iterum denticulatis, plana, laete viridescens, in pagina superiore intensiora, hinc inde purpura suffusa, seimpervirentia, tenuiter coriacea, annotina pilosa, adultiora calvescentia, erecto patentia; *superiora* ovalia vel elliptica, fere uncialia, ad 3 lin. lata, acuta, margine hinc inde dente uno alterove arguto instructa, plana, laetiviridescens, subtus pallidiora, utrinque pilis tenuissimis, longis, caescentibus, tandem evanescentibus villosa, membranacea, nervo mediano pallidiora tenui vix infra paululum prominente perducta, lateralibus saturatioribus anastomosantibus in pagina inferiore magis conspicuis; fere patentia; *suprema*

Pittospor. a st. (etiam procerius, mol.; aut
exalta.
Characterus generis & specificus nimis
long., enim nullum spatium ad
inferendas species & varietates re-
linquunt. Stirps hinc memoranda
quasi medium inter genera Pit-
tosporum et Bursaria sunt
feminibus et femina nuda
nulla culpa reosina involuta
ad Onocarpum ^{trahenda}
^{X Bursaria} ^(Willd. & Aublet) ^{procumbens} ^{Pattersoni}
Onocarpum prostratum
^{curvatum}
Gerd Muller. Pittosporum
prostratum hb. N. T. II n. 235.

diffusum-procumbens, foliis ^{sub} ob-
longo-lanceolatis acutis ^{margine involutis}
strobiliferis glabris integerrimis
v. apice paucidentatis, pedunculis
axillaribus foliis ^{limbo} nullis
brevioribus, petalis lanceolatis
sepala pubescentia duplo superanti-
bus, capsulis (vix maturis) orbicu-
latis emarginatis revolvendis pleo-
pennis

Rami 1/2 - 1' longi. Foli. riv. 4-8"
lg 1-2" et; adpressa illorum Le-
ptospori proparii.

South Esk river, Tasman. Nov. 20. 1848.
Cultissime frons Bursariae generis
genere confundendum ab ea
lycea praeferuntque abunde
diffinita. Distincta. Distincta.

Species generis alia est species
^{Bursaria (Willd. & Aublet)} ^{angustifolia} ^{facta}
Onocarpum angustifolium ^{Castro}
prociacanti quoad flores omnino
congruum, regis, cultus autem in
viroa proximam impetito a 12
Stuart arripita delictant.
Nov. Wall (austro-orientalis?) lb. 4
N. 824.

S. Murfaria *Diosmide* (Rutul.
(*roil.* *Onocarpum* *diarrhoea* *Diarrhoea*)
quarum ~~arborescentes~~ ^{arborescentes} ~~in~~ ⁱⁿ ~~in~~
diagnosi *explevatis* *convinis*,
differ videtur foliis dupla
brevioribus. Et non hujus
lari etiam *Pronaya* *er-*
coides Ldl? An his libri-
obatas comparare licet?

Onocarpum (*Pronaya*?) *Stuarti-*
arum *fu* *in* *lib.* *St.* *960.*
Hillebrandia (*Muraria*?) *Stuartiana*
fu *in* *lib.* *ad* *il.* *Soud.*
In *collibus* *prope* *Port.* *Sorell*
litoris *Corcati* - *occidentalis*
Sarmatiae.
Ab *aliis* *jau* *proxima* *fronte*
foliis *apice* *tridentatis* *disper-*
nitis. *Pronaya* *erivadi* *for-*
sare *proxima*.
Vere!

tandem oblongo-elliptica vel lanceolata, pollicem et ultra longa, vix 2 lin. lata, acuta, integerrima, plana, membranacea, villosa, ceterum reliquis conformia, sed confertiora et erecto-patentia. *Pedunculi* in apice ramulorum annotinorum axillarium et terminalium terminales, rarius e sinu foliorum axillares, solitarii, simplices vel a medio bifidi, teretes, filiformes, foliis duplo longiores, purpurascens, pilis diametro multo longioribus horizontaliter patentibus juniores cano-villosi, demum calvesscentes, basi bracteolis subulatis, linealibus, 1-2, villosis suffulti, apicem versus in receptaculum floris sensim incrassati, erecto-patentes, sub anthesi mutantes. *Flores* speciosi, campanulati, petalis divergentibus fere bilabiati, semiunciales. *Calycis* *foliola* 5, imo margini receptaculi floris conici adnata, distincta, subulato-acuminata, bilinealia, basi latiore vix $\frac{1}{6}$ lin. lata, extus convexiuscula ibique et margine longe pilosa, intus concaviuscula, glabra, subaequalia, pallide lutea, apicem versus purpurascens, aestivatione imbricata corollae adpressa, sub anthesi patentia, persistentia. *Corollae petala* 5, hypogyna, calycis foliolis alterna, distincta, spathulata, ad 6 lin. longa, subaequalia, marginibus aestivatione imbricata, sub anthesi unguibus fere trientem petali occupantibus, lineam latis, introrsum marginibus involutis canaliculatis pallide luteolis in tubum subobliquum conniventibus, laminis ad sesquilineam latis, cuspidato-apiculatis, laete violaceis, patentibus apice reflexo, tota venis quinque longitudinalibus parallelis, in petalis tribus superioribus sursum reflexis atris, in inferioribus duobus magis divergentibus pallidioribus, et venulis horizontalibus percursa. *Stamina* 5, petalis alterna, hypogyna, distincta, in alabastro duplo, sub anthesi triente breviora, subaequalia, tubum parum excedentia; *filamentis* e basi latiore intus sulco exarata subulato-filiformibus, glabris, albis, in tubum sursum incurvum conniventibus, apice antheriferis; *antheris* ovatis, obtusis, semilinealibus, baseos emarginatae dorso affixis, luteolis, erectis, post anthesin retrorsis, biloculatis, loculis introrsum longitudinaliter debiscentibus; *pollinis* granulis globoso-triedris, luteolis farsctis. *Ovarium* et *fructus* jam in charactere generali exposita. *Semina* nunc in quovis loculo uniseriata, globosa; *raphe* a puncto insertionis funiculi seu umbilico axini capsulae versus horizontaliter per quadrantem circumferentiae seminis producta, toruloso-tumida, integumento communi seminis hic discolore obducta, intus cava, filo tenuissimo e vasorum fasciculis tela cellulosa connexis, albido, corrugato percursa. *Testa* seminis e strato cellularum cubicarum parietibus sat crassis et profundius coloratis superficiali constructa, adnata strato cellularum simplici, teneriori, hyalino albido, cum membrana interna tubuli rhiaphes continuo, in regione chalazae placentulam vasculosam includente et nucleum ipsum undique arcte ambiente. *Nucleus* membrana obsolete cellulosa, tenerrima, transparente, tandem a chalaza soluta et undique libera involutus. *Albumen* subglobosum, ad chalazam complanatum, integrum, solidum, fere corneum, coloris lactei, ad micropylum a testa retractum impressum, ibique intus cavitate ellipsoidea undique clausa, humore repleta, vix $\frac{1}{200}$ partem albuminis consumente embryonem includens. *Embryo* in fundo cavitatis micropylum spectante sacculo proprio, tenerissimo, pellucido inclusus, compresso-ovalis, vix $\frac{1}{400}$ lineae perueniens, basi attenuata umbilicum spectans, apice obtuso paullulum emarginatus, coloris lactei, transparentis, simplex, mere cellulosus, partibus certis nondum discernendis.

MARIANTHUS Hügel msc. Endl. gen. n. 5664.
Meisn. gen. pag. 348.

1. **Marianthus candidus** Hügel. ramis flexuosis, volubilibus, glabris, punctulato-verruculosis; ramulis erecto-patentibus, superne sericeo-incano-tomentosis, apice flori-

feris; foliis alternis, subsessilibus, inferioribus rameis late ellipticis, bipollicaribus et ultra, ad $\frac{2}{3}$ pollicis latis, superioribus oblongo-ellipticis, angustioribus, omnibus margine revoluti integerrimis, pallide viridescentibus, subtns pallidioribus, pilis adpressis pubescentibus, supra glabris, opacis, coriaceis, erecto-patentibus, sempervirentibus; pedunculis terminalibus, folio multo longioribus, teretibus, sat crassis, pilis adpressis sericeo-incanis, erectis, rectis, superne alternatim ramosis, ramulis bracteatis, rectis, trichotomis, in cymam multifloram (50-100-floram), dispositis; floribus speciosis, 7-8-linealibus, campanulatis, erectis; calycis foliosis subulato-acuminatis, purpurascens, pubescentibus; petalis candidis, ungue purpurascens; antheris caeruleis; capsulis . . . . .

Marianthus candidus Hügel msc. Endl. Enum. pl. Hügel pag. 8. Putterlick Synops. Pittosp. 22.

In Australia austro-occidentali ad fluvium Cygnorum (Dec. 1833. L. B. ab Hügel); in Colonia Swan-River (Dec. 1837. J. Drummond, n. 82.) in arenosis sylvae prope oppidum Perth Nov. 1839. L. Preiss. Herb. Preiss. No. 1285.

Frutex robustus, scandens, 6-10 pedalis, floribus innumeris ubicunque onustus, elegantissimus.

2. ***Marianthus coeruleo-punctatus*** Klotz. ramis erecto-patentibus, volubilibus, pubescentibus, apice floriferis; foliis brevipetiolatis, inferioribus spathulatis, bipollicaribus, $\frac{3}{4}$ pollicem latis, brevissime acutis, grosse serratodentatis aut pinnatisectis, superioribus oblongo-ellipticis, utrinque longe attenuatis, $1\frac{3}{4}$ pollicaribus, 7-2 lin. latis, integerrimis, pubescentibus, tandem calvis, erecto-patentibus; pedunculis in apice ramulorum terminalibus, solitariis, teretibus, folio supremo plus duplo longioribus, junioribus pilis adpressis sericeo-pubescentibus, fructiferis calvescentibus, erectis, rectis, superne alternatim ramosis, ramulis basi bracteatis erecto-patentibus, rectis, simplicibus vel superne trichotomis, imo iterum divisis, pedicellis basi bracteatis in cymam multifloram (12-36-floram) dispositis, teretibus, superne in receptaculum floris sensim ampliatis, pilis adpressis sericeo-incanis, sub anthesi nutantibus, fructiferis erectis; floribus speciosis, ad 9 linealibus, divergenti-campanulatis; calycis foliolis subulato-acuminatis, viridibus, interdum apice purpurascens, sericeo-pubescentibus; corollae petalis longe spathulatis, subaequalibus, laete violaceo-caeruleis, superioribus tribus sursum reflexis in ungue candido caeruleo-punctatis, inferioribus duobus divergentibus reclinatis concoloribus; staminibus post anthesin reclinatis, antheris caeruleis; capsulis oblongo-ovalibus, cylindraceo-compressiusculis, toruloso-clevatis, membranaceis, bilocularibus, bivalvibus, polyspermis, seminibus in quovis loculo biseriatis 10-24, purpurascens. — Klotzsch

Hillebrandia, n. g. fuit Muell.

Iniusque cum Thebalia confusum
~~in proximum~~, prole tamen de-
finitis: antheris ^{calyce} ~~versatilibus~~ ^{dentibus} glandu-
la defixis & ~~capitis~~ ^{capitis} diognitis
planis at in Eriopseone liberis;
ab ~~xxx~~ ultimo differt antheris
in appendiculatis, denique a
Chorilaena Pylo simpliciter, &
stigmatibus integro minuto &
calyce haud manifeste abscis-
so. ~~ultima nota Chorilaenae~~
hoc ultimo signo Hillebrandia
capitata (Thebaliu capitatum
fuit Muell. nunc. antea in hb.) Chorilaenae
convenit igitur ^{quam} quodam meritis
potestis ~~consideranda~~, utriusque
fuitis tamen novum reputat
puerit.

Hillebrandia chaptaliae &
H. squarrosa (Eriopseon squarrosu
Theb. Lab., Thebaliu Willardioru
Ad. Juss.) ~~plura~~ obsoletissimae bra-
teatae sunt. Theb. Thebali &
Eriopseonis meritis in Hillebran-
diae genus transfundat. An idem
genus quam Hillebrandia. An tamen
non nisi nomine innotuit?

* Eriopsemon palmaturorum, frut. Pall.

ramis & ramulisque glandulis resinosis
 dense verrucosis ductis, foliis breviter serratis
 subobtusis imbricatis glandulosis. In-
 bracteatis glabris pedicellis axillares soli-
 tarios aequantibus, calycis sepalis mi-
 nutilis ovato-triangularibus, filamentibus
 tubulatis infra medium ciliatis, antheris
 rotatis glandula corollae apicali filamentis
 longioribus, stigma & mucronem quadrifido bi-
 minatum aequantibus, antheris rotatis glauca
 ovali corollae apiculatis, carpodis ovato-
 rhombicis minutim glandulosis, utrumque ad
 rostrum divaricatum, pilosis apice ciliatis.

Stem. humilis internum & albus aromaticus
 uolens, e basi multos ramos purpureos vel
 ramosos erectos vel ascendens agens. Folia
 ovata subcuneolata-lanceolata 3-4" long.
 1" lata, corolla alba pubula. Carpod. & rac. 2" long.
 in rostris, 1" long. dimidia. Sem. nigr. 1/2" long. 1/4" lat. obliqua
 ovato-oblonga oblique reticulata subula pubula
 punctata. Fruct. carumula tenui membranae navi-
 tari ovata acuta ultra 1" long. suffulta.

Colo. bark wallaby shrub vicinis, unde nomen.
 Authy. vris iuris

M. Lizaoniensis

* ell. pubesca Ferd. Müller. ^{in der Ord.}
 Authy. Jussieu 1859, n. 31.

Mar. erubescens Latis

differt ovaris sericeis, foliis
 hirsutiusculis etc. W. Stuart
 N. 28.

Diagn. ramis valvulilibus glabris, foliis
 pubescentibus & basi subcordata ovato-ob-
 longis apiculatis margine revolutis
 undulatis, pyna subnullis subtus
 pallidioribus prope pilositas re-
 ticulatis, coriaceis, praesentibus;
 glandulis & ramulorum latissimum
 vel foliorum axillis solitariis julio
 brevioribus villosis conellonis ^{floribus}
 tantum tubulosis campanulatis

in Icon. plant. rar. h. b. Berol. I. 28. t. 12. Walp. Re-
pert. I. 256.

In Australiae austro-occidentalis colonia Swan-River (Dec. 1839. J. Drum-
mond); 1840. L. Preiss. Herb. Preiss. sine Num.

Frutex 4-6 pedalis, ramis copiosissimis, longissimis, volubilibus, pubescentibus, saepissime in aliis plantis scandens. — *Fructus* in pedicellis erectis rectus, in receptaculo floris superstite stipe brevissimo insidens, capsularis. *Capsula* oblongo-ovalis, cylindraceo-compressiuscula, basi in stipitem attenuata, faciebus planioribus medio juxta axim sulco longitudinali impressa, parietibus juxta sulcum utrinque e seminibus incrassatis torulosa, angulis obtusiusculis medio juxta longitudinem sutura valvarum decurrente subanceps, apice rotundata subemarginata, in emarginatura styli basi persistente coronata, pallide virescenti-flava, glabra, nitida, tenuissime membranacea, intus e semiseptis in axi contiguas biloculata, loculis polyspermis, tandem loculicide et septifrage rupta bivalvis, valvis patentibus apice parum reflexis, in semiseptorum nunc liberorum marginibus prominulis loculorum utrinque spectantibus alternatim seminiferis. *Semina* in quovis loculo biseriata, alternatim mox ex uno, mox ex altero margine septi egredientia, funiculo brevissimo vix $\frac{1}{6}$ lin. longo, corrugato, fusco suspensa, globosa, diametro lineali, purpureo-purpureo, laevia, nitida, 12-16 in quovis loculo. *Raphe* brevi ab umbilico axim capsulae versus horizontaliter per quadrantem circumferentiae seminis producta, toruloso-tumida, integumento communi seminis colore obducta, intus cava, filo tenuissimo e fasciculis vasorum tela cellulosa connexis albedo, corrugato perducta, ad chalazam in placentulam orbicularem vasis pertextam ampliata. *Testa* seminis e strato cellularum crassarum intensius coloratarum simplici superficiali, adnato strato interiore e cellulis tenuioribus albedo, transparente. *Nucleus* membrana tenerrima transparente, tandem a chalaza soluta involutus. *Albumen* subglobosum, ad chalazam complanatum integrum, solidum, sat durum, fere corneum, coloris lactei, ad micropylem parum impressum, intus cavitatem ellipsoideam, vix $\frac{1}{200}$ albuminis consumentem, undique clausam et embryonem includentem continens. *Embryo* in fundo cavitatis situs, sacculo proprio tenerimo pelucido inclusus, ovalis, complanatus vix $\frac{1}{400}$ lineae permetiens, basi attenuata hilum spectans, apice obtuso, coloris candidi, simplex, mere cellulosus.

3. **Marianthus erubescens** *Putterl.* ramis volubilibus glabris; foliis petiolatis, inferioribus lato-ellipticis, bipollicaribus, ultra pollicem latis, superioribus oblongo-ellipticis, aequilongis, angustioribus, apice cuspidato brevissime apiculatis, margine integerrimo subrevolutis, planis, lacte viridescentibus, subtus pallidioribus, glabris, coriaceis, erecto-patentibus; pedunculis e ramulorum lateralium vel foliorum axillis solitariis, imo haud raro binis superpositis, teretibus, folio brevioribus, purpurascens, glabris, erecto-patentibus, superne di-trichotomis, pedicellis basi bracteatis, sub anthesi nutantibus; floribus speciosis, fere pollicaribus, campanulatis, irregularibus, nutantibus; calycis foliolis ovatis, acutis, dorso glabris, purpurascens, margine pallido subtilissime ciliolatis; petalis longe spathulatis, intense purpureis, intus in ungue candidis, subaequalibus, superioribus tribus sursum reflexis, inferioribus duobus magis distantibus reclinatis; antheris flavis; capsulis oblongo-ellipticis, utrinque compressiusculis, longitudinaliter juxta axim sulco impressis, ancipitibus, membranaceis, coloris testa-

cci, venis saturatoribus anastomosantibus pictis, biloculatis, loculis polyspermis (16-24); seminibus utrinque in loculis biseriatis, purpurascentibus. — Putterlick in Nov. Stirp. Mus. Vind. decad. VII. pag. 60 n. 69. Synops. Pittospor. 23. Walpers Repert. I. 256.

Habitat in Australiae austro-occidentalis colonia Swan-River (Dec. 1839. J. S. Roe) ibidem (Dec. 1839. J. Drummond, collect. n. 78); in solo glareoso sterili ad Eucalyptos fruticosos scandens, prope Wicklow. 9. Nov. 1840. L. Preiss. Herb. Preiss. No. 1292.

Frutex scandens, 4-6 pedalis, floribus intense purpureis, in genere luscusque maximis, inter folia laete viridia sparsis, adspectu eximius.

4. **Marianthus pictus** Lindl. ramis ramulisque erecto-patentibus, flexuosis, glabris, nitidis; foliis inferioribus obovatis, 6-8 linealibus, 4 lin. latis, basin versus in petiolum brevissimum angustatis, apice rotundatis, obtusis, e nervo mediano parum excedente brevissime apiculatis, margine integerrimis, superioribus brevi-petiolatis, ellipticis, apice acutis, margine hinc inde argute serrato-dentatis, omnibus marginibus angustissime revolutis, lacte virescentibus, infra pallidioribus, rore glaucescente praecipue infra obductis, planis, glabris, opacis, erecto-patentibus; pedunculis in apice ramulorum amotinorum terminalibus vel e sinu foliorum supremorum axillaribus, teretibus, filiformibus, semipollicaribus, rufis, glabris, erecto-patentibus, apice alternatim ramulosis in cymam pauciflorum, (3-6 florum) dispositis; floribus speciosis, 6 linealibus, irregularibus, fere bilabiatis, nutantibus; capsulis oblongo-ellipsoideis, cylindraceo-compressiusculis, medio utrinque juxta axim sulco longitudinali impressis, membranaceis, biloculatis, loculis polyspermis; seminibus in quovis loculo 12-16, uniseriatis, purpurascentibus. — Lindley in Append. to Bot. Reg. 1839 in notis pag. XXII. n. 93. Walpers Repert. I. 256.

Oncosporum bicolor Putterlick in Nov. stirp. Mus. Vind. decad. II. pag. 9. Synops Pittosp. 21. (exclusa descriptione fructus) Walpers Repert. I. 256.

Habitat in Australiae austro-occidentalis colonia Swan-River (Jan. 1834. L. B. ab Hügel); Dec. 1837. (J. Drummond); in districtibus York, Wicklow, Victoria, etc. 1840. L. Preiss. Herb. Preiss. No. 1286.

Frutex 2-3 pedalis, a basi ramosus, ramis cylindricis, pennae anserinae crassitie, sursum sensim tenuioribus, pedalibus et longioribus, cortice ferrugineo e laminis tenuissimis epidermidis hinc inde soltae cinerascens vestitis, erecto-patentibus, erectis, strictis, undique alternatim ramosis, ramulis teretibus, filiformibus, flexuosis, purpurascentibus, opacis, inferioribus longioribus, erecto-patentibus, fere fastigiatis, alternatim dissite foliatis, apice floriferis. *Folia* solitaria, inferiora obovata, 6-8 linealia, ad 4 lin. lata, basin versus sensim in petiolum brevissimum angustata, apice rotundata, obtusa, e nervo mediano parum excedente brevissime apiculata, fusco-virentia, infra pallidiora, rore glauco obducta; superiora elliptico-obovata vel elliptica, pollicaria, ad semunciam lata, basi in petiolum 1-2 linealem supra caualiculatum subtus convexiusculum angustata, apice acuto imo in supremis cuspidato apiculato line inde argute serrato-dentatis, omnibus

marginibus angustissime revolutis, nervo mediano infra basi versus parum prominulo pallidiore perducta, lateralibus obsoletis, pallide viridescens, infra pallidiora, utrinque sed infra evidentius rore glaucescente obducta, plana, juniora pilis brevibus consita, adulta glabra, opaca, erecto-patentia persistens. *Pedunculi* in apice ramulorum annotinorum terminales vel e simi foliorum supremorum axillares, teretes, filiformes, semipollicares, purpurascens, glabri, erecto-patentes, superne alternatim ramosi, *pedicellis* 3-6, teretibus, filiformibus, circiter 4 linealibus, viridibus, glaberrimis, basi bracteola minima, ovata, acuta, vix $\frac{1}{4}$ lineali, caducissima stipatis, superius cicatrice una alterave instructis in cymam paucifloram dispositis. *Flores* speciosi, sexlineales, campanulati, petalis fere bilabiatis divergentibus, subaequalibus, irregulares sub anthesi mutantes. *Calycis foliola* 5, margini extimo receptaculi coniei floris inserta, distincta, ovata, $\frac{2}{3}$ lin. longa, vix $\frac{1}{2}$ lin. lata, acuta, dorso convexiusculo purpurascens, intus cava, albidia, glabra, aequalia, in alabastro marginibus imbricata, sub anthesi corollae adpressa, demum decidua. *Corollae petala* 5, hypogyna, calycis foliolis alterna, distincta, spatulata, superiora tria 6 linealia, inferiora duplo paulo longiora, fere 7 linealia, ad unguem vix tridentem longitudinis attingentem fere lineam lata, superne in laminam duas lineas latam obovatam, apice rotundatam brevissime apiculatam desinentia, aestivatione marginibus imbricatis sese tegentia, sub anthesi unguibus, marginibus parum involutis canaliculis in tubum sursum incurvum conniventia, lamina patentibus apice relexo, tria superiora sursum recurvata, duo inferiora magis distantia reclinata, in basi unguis glandula luteola instructa, ceterum candida, in pagina exteriori et suprema parte laminae luteola, venis quinque parallelis purpureis, tribus intermediis latiori longitudinallyter percursa, in unguibus trium superiorum inter venas purpureo-punctatis, plana, glaberrima. *Stamina* 5, hypogyna, petalis alterna, distincta, subaequalia, in alabastro petalis duplo, sub anthesi tridentem breviora, in tubum sursum incurvum conniventia, apice divergentia, demum divaricata et deorsum reclinata; *filamentis* subulatis, e basi latiore complanata, dorso convexiuscula intus canaliculis sensim filiformibus, albidis, apice antheriferis; *antheris* ovatis, semilanceolatis, apice obtusis, integris, baseos emarginatae dorso filamento affixis, luteis, erectis, post anthesin retrorsis, biloculatis, loculis appositis, superne contignis connectivo adnatis, inferne subdivergentibus, longitudinallyter introrsum dehiscens, pollinis granulis globoso-triedris, luteolis, glabris fectis. *Ovarium* basi stipite brevissimo glandulis quinque cum staminibus alternantibus instructo subsessile, liberum, longe ellipsoideum, cylindraceo-compressiusculum, bilineale, in faciebus planiusculis medio juxta axim longitudinallyter sulco impressum, angulis convexiusculis, acutiusculis anceps, glabrum, basi rotundatum, apice parum attenuato in *stylum* teretem, filiformem, germinis fere longitudinem attingentem et stamina vix superantem, una cum ovario sursum paulo incurvum, glabrum, apice *stigmatibus* oblique depresso simplicissimo terminatum continue transiens; intus e semiseptis parietalibus in axi contiguis biloculatum, septis in marginibus utraque loculum spectantibus parum prominulis, et juxta axim decurrentibus alternatim oviferis. *Ovula* funiculo brevissimo introrsum curvato suspensa, subglobosa, basi cordato-emarginata, prominentia una umbilicali funiculo affixa, altera ad latus extrorsum prope umbilicum micropylum aperiente, anatropa, utrinque in loco miseriata, horizontalia, 12-16. *Fructus* stipite brevissimo e receptaculo floris superstitibus subulatis, capsularis, mutans. *Capsula* longe ovoidea vel ellipsoidea, cylindraceo-compressiuscula, in faciebus planioribus medio juxta axim sulco longitudinally impressa, angulis obtusiusculis fere anceps, basi rotundato-cordiformi, apice styli basi persistente coronata, glabra, coriaceo-membranacea, olivaceo-spallacea, nitida, intus biloculata, potysperma, maturitate, primo loculicide ab apice ad medium semi-bivalvata tandem septifraga complete bivalvis, valvis in semiseptorum nunc hiantium et marginalium marginibus introrsum prominulis caxum loculorum spectantibus utrinque seminiferis. *Semina* funiculo vix $\frac{1}{4}$ lineali corrugato suspensa, subglobosa, mutua pressione angulata, diametro lineali, purpurascens, laevia,

nitida, raphe brevi ab umbilico axim capsulae versus horizontaliter per quadrantem circumferentiae seminis producta, parum tumida, integumento communi seminis concolori obducta, intus cava, fasciculum vasorum tela cellulosa continentium in filum tenuissimum corrugatum includente, ad chalazam in placentulam orbicularem vasis pertexam ampliata. Integumentum commune seminis sive *testa* e strato cellularum crassarum simplici, coloris profunde umbrini, tenerum, opacum, sat durum, adnatum strato cellularum teneriore, transparente, pallidi coloris. *Nucleus* membrana tenerima, transparente, tandem a chalaza soluta involutus. *Albumen* subglobosum, ad chalazam complanatum, integrum, solidum, durum, corneum, coloris lactei, ad micropylum parum impressum, intus cavitatem ellipsoideam, vix $\frac{1}{200}$ albuminis consumentem, undique clausam et eumbrionem includentem continens. *Embryo* in fundo cavitatis situs, sacculo proprio tenerrimo pelliculo inclusus, ovalis, complanatus, vix $\frac{1}{600}$ lineae permiens, basi attenuata micropylum versus umbilicum spectans, apice obtuso, coloris lactei, simplex, mere cellulosus.

Bronaya angustifolia Lehmann.

5. ~~*Marianthus angustifolius*~~ Putterl. ramis erecto-patentibus, rectis, virgatis, plus minus fastigiatis, glaberrimis, foliosis; foliis subsessilibus, fere linearibus, $1-1\frac{1}{2}$ uncialibus, latioribus ad 2 lin. latis, a medio basin versus sensim angustatis, superne marginibus parallelis apice brevissime acuto, apiculatis, integerrimis, planis, laete viridescentibus, infra pallidioribus, glaucescenti-nitentibus, glabris, erecto-patentibus, pedunculis ramulos annotinos continue terminantibus, solitariis, folia suprema superantibus, filiformibus viridescentibus, glabris erectis, superne cymoso-ramosis, paucifloris; pedicellis simplicibus, bifidisve, erectis, floribus speciosis, 5 linealibus, campanulatis; calycis foliolis subulato-acuminatis, dorso pubescentibus; petalis violaceo-coeruleis, ungue saturatiore; fructibus . . . . .

Habitat in Australiae austro-occidentalis Colonia Swan-River (Nov. 1840. (Drummond) 1839. L. Preiss. Herb. Preiss. No. 1287.

Suppetunt specimina tria, unum tantum suprema radice de fractae parte adhuc instructum, *trunco* cylindrico, bipedali et altiore, inferne vix penna corvina crassiore, superius sensim attenuato, cortice rufescente, longitudinaliter rugoso, nitido, in ramulis pallidioribus vestito, ligno denso, duro, albedo praedito. *Rami* ex axillis foliorum persistentium jam a basi, vix pollicem ultra radice initium, egredientes, inferiores distantia circa pollicari alternatim dissiti, superiores sensim magis approximati, pedales et longiores, plurimi apicem trunci attingentes, filo emporetico vix crassiores, plerumque simplices, rarius inferiores apicem versus ramulosi, erecto-patentes, superiores fere cum trunco erecti, stricti, virgati, a basi foliosi, apice floriferi. *Folia* solitaria, alternatim in ambitu ramorum dissita, subsessilia, fere linearia, $1-1\frac{1}{2}$ uncialia, ad 2 lin. lata, superiora angustiora, a medio versus basin sensim angustata, superne marginibus integerrimis parallelis apice brevissime cuspidato apiculata, apiculo plus minusve oblique recurvo, plana, margine paulo crassiore obtusiusculo tenuissime marginata, nervo mediano pallidioribus infra in basi paulo prominente perducta, venulis lateralibus horizontalibus et anastomosantibus nonnisi in foliis adultioribus conspicuis intra marginem arcuatim connexis, laete viridia, sublus pallidiora, glaucescenti-nitentia, sempervirentia, glaberrima, erecto-patentia. *Pedunculi* ramulos annotinos continue terminantes, solitarii, teretes, folia suprema plerumque superantes, erecti, sparsim pilosi, superne cymoso-ramosi. pe-

dicellis 4-6 linealibus, filiformibus, longitudinaliter sulcatis, adpresse pilosis, erecto-patentibus, basi bracteola subulata vix lineali pubescente suffultis, apice in receptaculum floris paulo ampliatis, simplicibus vel superius bi-trifidis, ramulis bracteola conformi suffultis. *Flores* campanulati, 5 lineales, erecti. *Calycis foliola* 5, hypogyna, distincta, margini extimo receptaculi floris conici adnata, e basi ovata subulato-acuminata, sesquilinealia, basi latiore $\frac{1}{3}$ lin. lata, dorso convexiuscula, ibique et marginibus pilosa, aestivatione marginibus imbricata, sub anthesi patentia, persistentia. *Corollae petala* 5, hypogyna, calycis foliolis alterna, in receptaculo superius adnata, distincta, spatulata, 5 linealia, aestivatione convoluta-imbricata, sub anthesi unguibus $\frac{1}{2}$ lin. latis marginibus involutis canaliculatis, vix trientem petali attingentibus, intense violaceis in tubum conniventibus, laminis $1\frac{1}{2}$ lin. latis, obovatis, planis, apice brevissime cuspidato apiculatis, patentibus apice reflexo, laete violaceis, una cum ungue venis 3 saturatioribus parallele longitudinalibus, et venulis horizontalibus praecipue marginem versus anastomosantibus perductis. *Stamina* 5, hypogyna, petalis alterna, distincta, in alabastra petalis dimidio breviora, sub anthesi $\frac{2}{3}$ petalorum attingentia, tubum floris superantia; *filamentis* subulatis, intus extusque canaliculatis, tetrapteris, albidis, rectis, post anthesin paulo extrorsum curvatis, apice antheriferis; *antheris* ovatis, obtusis, luteolis, baseos emarginatae dorso affixis, intus biloculatis, loculis superne contiguis, connectivo adnatis, inferne parum distantibus, longitudinaliter introrsum dehiscentibus; *pollinis granulis* globoso-triedris, luteolis farctis. *Ovarium* stipite brevissimo glandulis 5 cum staminibus alternantibus instructo apice coni receptaculi floris insidens, longe ellipsoideo-compressiusculum, lateribus convexiusculis medio juxta axim impressum, obtuse anceps, glabrum, superne in *stylum* teretem, filiformem, ovario dimidio breviorum, et stamina aequantem, glabrum, apice *stigmatibus* obtuse bilobo papilloso terminatum continue transiens; intus biloculatum e semiseptis in axi contiguis et marginibus utrinque loculum spectantibus duplicatis alternatim ovuliferis. *Ovula* funiculo brevissimo extrorsum curvato suspensa, subglobosa, horizontalia, anatropa, micropyle ad latus externum prope umbilicum aperta, miserialia, 8-10 in quovis loculo. *Fructus* . . . .

CHEIRANTHERA All. Cunningh. Meisn. gen.
pag. 66. (48.) Endl. gen. n. 5665.

1. **Cheiranthra? Preissiana Putterl.** ramis filiformibus, flexuosis, volabilibus, junioribus pilis canis deorsum directis dense pubescentibus; foliis alternis, brevissime petiolatis, ovatis vel ovalibus vel oblongo-ovalibus, utrinque rotundatis, apice praeterea emarginatis, planis, margine integerrimo revolutis, utrinque pilis canis patentibus dense villosulis, junioribus in axillis adultiorum fasciculatis, erecto-patentibus; pedunculis ex axillis ramulorum et foliorum axillaribus et ex apice ramulorum annotinorum terminalibus, filiformibus, foliis multo longioribus. simplicibus, junioribus patenti-pilosis, adultis calvis; floribus . . . ; ovario longe-ellipsoideo, cylindraceo-compressiusculo, basi in stipitem brevissimum, receptaculo floris superstiti insidentem contracto, faciebus planiusculis medio juxta axim sulco longitudinali impresso, angulis obtusiusculis subancipiti, glabro, apice in stylum teretem, filiformem, sursum incurvum, stigmatibus obtuso, truncato terminatum continue transiente. intus

biloculato, loculis multi-ovulatis (12-16), ovulis in loculo uniseriatis; fructibus . . .

In Australiae austro-orientalis ropestribus montis Currie prope oppidum York, die 15. Aprilii 1840. Herb. Preiss. No. 1291.

Planta deficientibus floribus et fructibus ex ovarii unici foecundati, parum evoluti, solummodo superstitis et ovulorum constructione certe Pittosporarum familiae civis, quoad genus quidem dubia; at habitu universali et reliquorum partium conformatione cum duabus speciebus novis, exacte *Cheirantherae* generis, ab J. Drummondio 1839 floriferis et fructiferis in eadem colonia collectis, etiam inflorescentia et ovarii constructione quam maxime congruens, et cum nullo alio Pittosporarum genera, excepto forsitan genere *Billardiera*, quod vero ovariorum constructione et fructibus pendulis, non erectis, recedit, magis convenit.

Fruticuli 4-6 pedalis, in vicinis plantis lubenter scanilentis, ramulos video teretes, adulescentes vix penna corvina crassiores, plurimos filum emporiticum crassitie vix superantes, longissimos, tripedales et longiores, flexuosos, volubiles, cortice laete ferrugineo, spiraliter rugoso-striato, glabro, laevi, nitido vestiti, superius epidermide tenuissime membranacea, pilis mollibus, canis, deorsum directis obsita et hinc inde a cortice soluta, sed ramulos adhuc interruptim amplectente instructos, superne epidermide adhuc integra et pilis mollibus, canescentibus, deorsum directis densissime cano-villosos, foliis alternatis, basi distantia circiter bipollicari, superius sensim decrescente, dissilis, apicem versus in axillis ramorum fasciculatis. *Folia* brevissimo petiolo infra convexiusculo, supra canaliculato patenti-villoso insidentia, ovata, ovalia, vel oblongo-ovalia, 3-4 linealia usque pollicaria, 2-6 lin. lata, plana, utrinque rotundata, apice praeterea acute emarginata, margine integerrimo revoluta, in sicco convoluta, laete luteo-viridescencia, subtus pallidiora, utrinque pilis mollibus, canis patentissimis, praecipue iuniora dense incano-villosa, patentia vel erecto-patentia, persistentia. *Ramuli* ex axillis foliorum egredientes, e gemma, bracteis minimis ovatis, acutis, dorso convexiusculis margineque breviter pilosis, intus cavis glaberrimis, primo marginibus sese imbricatum tegentibus, conniventibus, serius patentibus, et primo in sinu pedunculum unum alterumve ima basi bracteolis 1-2, minimis suffultum exserens, tandem in ramulum foliferum, ex axillis foliorum hinc inde iterum pedunculum solitarium emittentem, et apice in pedunculum solitarium terminante proveniunt. *Pedunculi* simplices, teretes, filiformes, foliis multo longiores, 1-2 pollicares, apicem versus in receptaculum floris sensim ampliati, pilis mollibus, canis horizontaliter-patentibus dense incano-villosi, adulti calvescentes, erecto-patentes, recti vel apice parum nutantes. *Flores* et *fructus* omnes delapsi. *Ovarium* foecundatum unicum superstes, basi attenuata in receptaculo floris superstite, convexiusculo et medio impresso fere subsessile, longe ellipsoideum, cylindracco-compressiusculum, 4 lineale, diametro latiore transversali $\frac{2}{3}$ lin., angustiore $\frac{1}{3}$ lin. latum, in faciebus planiusculis medio juxta axim sulco longitudinali impressum, parum inclinatum, angulis exterioribus obtusiusculis stria suturali medio longitudinaliter insignitis fere anceps, glabrum, apice attenuato in stylum teretem, filiformem, sursum tenuiorem, ovario fere duplo breviorum, lateribus utrinque sulco ex ovario continue decurrente exaratum, apice stigmatibus obtuse convexiusculo, obsolete bilobo terminatum, glabrum, parum inclinatum, persistentem continue transiens; intus e semiseptis in axi contiguis et cohaerentibus biloculatum, loculis multiovulatis. *Ovula* in marginibus semiseptorum juxta axim capsulae contigue parallela decurrentibus et in loculos utrinque prominentibus funiculo brevissimo, albedo, corrugato alternatum, mox ex uno mox ex altero margine egrediente suspensa, subglobosa, diametro semilineali, mutua pressione angulato, basi emarginato-cordata, torulo uno umbilicali funiculo adhaerentia, altero micropylum prope umbilicum ad latus externum constituite; *raphe* ab umbilico introrsum horizontaliter per quadrantem circumferentiae ovuli producta, parum tumida, testa communi obducta, in

regione chalazae paulo ampliata; intus nuclei loco in cavo sacculum albidum corrugatum, chalazae adhaerentem et contractum includentia.

SOLLYA Lindl. Meisn. gen. pag. 66. (47.)
Endl. gen. n. 5666.

Billardierae spec. Labillardiere.

Labillardierae spec. Roem. et Schult.

1. **Sollya heterophylla** Lindl. Suffrutex 2-4 pedalis, ramulis volubilibus; foliis alternis, oblongo-ellipticis, primariis serrato-dentatis, serioribus integerrimis, supremis linearibus; pedunculis solitariis in ramulis annotinis ex axi foliorum supremorum axillares vel terminales superne in cymam 5-9 florum divisas; floribus nutantibus, coeruleis; fructibus longe cylindraceis baccatis pendulis. — Lindl. Bot. Reg. 1831. t. 1466. Don in Sweet Flow. Gard. t. 232. Loddiges Bot. Cab. t. 1795. Hooker in Bot. Mag. t. 3523. Endl. Ennm. pl. Hügel. pag. 9. Putterlick Synops. Pittosp. 25.

Sollya angustifolia Lindley in Bot. Reg. 1831. sub n. 1446. et 1840. n. 3. n. 1466.

Sollya linearis Lindley in Bot. Reg. 1840. t. 3.

* *Billardiera fusiformis* Labillardiere Nov. Holl. pl. spec. 1. 65. t. 90. Dryander in Ann. of Botany II. 515. Decand. Prodr. I. 345. Spreng. Syst. veg. I. 792. Don. Gen. Syst. 373. Confr. Hook in Comp. to the Bot. Mag. II. 63.

Labillardiera fusiformis Roem. et Schult. Syst. veg. V. 330.

Crescit in Australiae insulae Van Diemen, (Jan. 1793. Labillardiere! ex sched. specim. authent.) Dec. 1804. (Ferd. Bauer) in Australiae ora orientali prope Sydney, Illawara (Dec. Jan. 1803 Ferd. Bauer); (1833. L. B. ab Hügel); in ora austro-occidentali ad sinum regis Georgii (1822 All. Cunningham, Baxter, 1833. L. B. ab Hügel); in colonia Swan-River prope Freemantle (Jan. 1834. L. B. ab Hügel); (1839. J. Drummond); in calcareis declivium montis Baldhead, 16. Oct. 1840. L. Preiss. Herb. Preiss. No. 1289; in interioribus continentis a promontorio Leichenault ad King George's Sound (1842. J. S. Roe).

PRONAYA Hügel. Endl. gen. n. 5667.
Meisn. gen. pag. 348.

Spiranthera Hooker in Bot. Mag. sub n. 2523, non A. St. Hilaire.

Campylanthera Hooker Icon. pl. I. 82, non Schott.

Billardiera spec. Decand. Prodr. I. 345.

1. **Pronaya elegans** Hügel. ramis erecto-patentibus, volubilibus, junioribus pilis erectis adpressis incano-pubescentibus; foliis brevipetiolatis, lanceolatis vel oblongo-lanceo-

latis, sesquipollicaribus, ad 4 lin. latis, breviter euspidatis, superioribus brevioribus et angustioribus, planis, margine integerrimo revolutis, laete virideseentibus, subtus concoloribus, junioribus subtus pilis eanisd adpressis sparse pilosis, supra glabris, adultis calvis, erecto-patentibus; pedunculis terminalibus erectis, brevissimis, vix interdum semipollicaribus, superne alternatim ramosis et una eum ramulis simplicibus vel bi-trifidis basi braeteatis in cymam multifloram vix folia superantem dispositis, pilis adpressis sericeo-incanis; floribus campanulato-patentibus, 5 linealibus, erectis; calycis foliolis subulatis, laete viridibus pilis adpressis sericeo-pubescentibus; petalis spathulatis ungue brevi angustioribus, lamina latiora acuminatis, intense violaceo-caeruleis; antheris sagittiformibus, post anthesin spiraliter revolutis; fructu baecato, oblongo-cylindraceo, fusco-virescente. — Hügel in Bot. Archiv. 6. Endl. Enum. pl. Hügel 9. Putterlick Synops. Pittosp. 26. Walpers Repertorium 257.

Spiranthera Fraseri Hooker in Bot. Mag. sub n. 2523.

Campylanthera Fraseri Hooker leon. pl. 1. tab. 82.

Habitat in Australiae austro-occidentalis colonia Swan-River (Fraser; 1833. L. B. ab Hügel; 1839. Drummond); in arenosis sylvae prope oppidum Perth, 20. Jan. 1840. L. Preiss. Herb. Preiss. No. 1284.

Frutex 2-3 pedalis, ramis volubilibus in vicinis plantis scandens; floribus speciosis, intense violaceo-coeruleis onustus.

2. **Pronaya Hügeli**ana Putterl. ramis erecto-patentibus, longissimis, volubilibus, apicem versus confertim foliatis, junioribus pilis deorsum adpressis pubescentibus; foliis subsessilibus vel brevissime petiolatis, inferioribus spathulatis vel obovatis vel ovalibus, obtusiusculis, semipollicaribus usque pollicaribus, 2-3 lin. latis, margine hinc inde denticulatis, superioribus lanceolatis vel oblongo-lanceolatis, sesquipollicaribus, apicem versus longitudine decreescentibus, 2-3 lin. latis, integerrimis, omnibus margine tenuissime revolutis, secus planiusculis, obscure viridibus, subtus pallidioribus et pilis longis, eanisd villosulis, supra pilis brevibus strictis tuberculo insidentibus pilosis, erecto-patentibus; pedunculis in ramulis terminalibus, et in ramulis lateralibus foliatis ex axillis foliorum superiorum emergentibus terminalibus, subsessilibus, vel brevissimis vix 1-2 linealibus, superne ramosis, ramulis bi-trifidis in cymam densifloram, multifloram, (10-24-floram,) folia vix superantem congestis, dense villosis; floribus campanulato-patentibus, 5 linealibus, erectis; calycis foliolis subulato-aemminatis, dorso purpuraseentibus, dense villosis; corollae petalis spathulatis, lamina latiore acuminato-apiculatis, laete caeruleis; antheris ovatis, post anthesin apice reflexis; fructu baecato, sicco, obovato-cylindraceo, utrinque compressiusculo, rugoso, fusco-viridi.

5
Billardiera frandens Smith. var.
glauca
Hb. St. Tasmanniae n. 45 sub nom
B. frandensis. Hb. hac ultima

differt frondum non pedunculatis
flores longioribus, foliis latioribus
a *B. multabilis* pedunculatis glabris
foliis lanceolatis, a *B. congesta*
in Tasmannia quidem detecta pe-
dunculatis longioribus villatis.

Non aut *B. frandensis* geminiae
varietas, Lamm ex procerum. unico
incompleto non determinanda.

Proxime accedit ad nostram *B.*
discolor atque, si pareretur autem
pedunculatis phyllis ~~pro~~ calycinis
longioribus axillaribus.

Barra alba fidem Stuart.
frater frandens 5-6'. Lamm ex
Tasmanniae, hb. St. n. 58.
Joss. Soell. hb. St. n. 21.

Violarieae Hb. tril. I. *Viola* Hb.

Epitum Hb.

Nonnum genus nunquam cum *Viola*
confundendum & commutandum!

1. *E. gynbalaria* DeCandolle!
E. reniformis Sweet

Viola *E. nudicaerulea* Wehr. in *Linnaea* 1848.
1848 fruticosa lacum desertionis,
non La Billardiere.

Corolla apice pallida medio albo-barbata
violacea saturate virida. In solo fertilione
umbroso fruticem relictam tanquam ad
pides montium Maraffo - range! Sept. 1848.
In humidis montanis districtus Bartai
et ad fl. Onkaparinga Dec. 1848. Ab *E. pu-*
tiolari nunc pubescenti separatum longe
distat, & neque huius rambinardum nec
sectioni *Leptidion* subcongruum! uti
et. Dr. Wehr quaerit. Spuriissimo, in barba
lat. *Leptidion* calyx huius pertinet.

2. *E. nudicaerulea* Don

Viola nudicaerulea DeCand. non Hooker, Wehr.
Lamm ad fl. Soell. l. k. non Tassy, hb. St. n.
n. 150. Oct. Nov. *Viola violacea* margini alba mi-
nis saturatis percurva fundo barbata. In umbrosis
humidis regionum interiorum nuper Rivoli Bay Oct 48

In Australiae orientalis montibus sic dictis caeruleis et in montanis prope Illawara (1833. L. B. ab Hügel); in solo turfoso inter frutices densos ad littora portus Princress Royai Harbour 20. Dec. 1840. L. Preiss. Herb. Preiss. No. 1296.

Frutex 3-4 pedalis, ramis longissimis, volubilibus in vicinis plantis scandens. Rami teretes, robustiores pennae corvinae crassitie, cortice rufopurpurascente longitudinaliter et spiraliter rugoso-striato, glabro, laevi, nitido vestiti, superne pilis deorsum directis pubescentes et confertissime foliati. Folia subsessilia vix brevissime petiolata: inferiora spathulata, obovata vel ovalia, vix semipollicaria, ad 3 lin. lata, obtusiuscula vel apice brevi-cuspidato brevissime apiculata, margine hinc inde denticulo uno alterove instructa: superiora lanceolata, vel oblongo-lanceolata, sesquipollicaria, apicem versus sensim breviora, pollicaria, 2-3 lin. lata, integerrima, omnia marginibus tenuissime revoluta, secus planiuscula, obscure e luteo-viridia, subtus pallidiora et pilis longis canis adpressis villosula, supra pilis brevibus strictis, tuberculo insidentibus, patentibus pilosa, nervo longitudinali subtus prominente percursa, lateralibus saturatioribus tenerrimis horizontalibus inferne vix parum conspicuis, erecto-patentia vel patentia. Pedunculi brevissimi, fere subsessiles, vix interdum in ramis supremis foliis longiores, superne alternatim ramosi, ramulisque brevibus, basi bracteolis subulatis suffultis, b trifidis in cymam densifloram, 12-24 florum, folia suprema raro superantem congestis, dense villosis, erectis. Flores campanulato-patentes, 5 lineales, erecti. Calycis foliola e basi latiore subulato-acuminata 2-3 linealia, dorso convexiuscula et purpurascentia, intus excavata, utrinque villosa, aestivatione marginibus imbricata, sub anthesi patentia, persistentia. Corollae petala spathulata, 5 linealia, basi ungue vix trientem petali consummentis, angustioris, lineam latis, marginibus involutis canaliculato, albedo in tubum conniventibus, laminis ad $1\frac{1}{2}$ lin. latis patentibus cuspidato-apiculatis apice reflexis, laete coerulea, venis tribus parallelis longitudinaliter perducta. Stamina in tubum conniventia, illumque floris parum superantia. subaequalia; filamentis e basi latiore intus canaliculata, dorso convexiuscula subulato-filiformibus, albidis, apice antheriferis; antheris ovatis, obtusis, bascos emarginatae dorso affixis, albidis, biloculatis, loculis superne contiguus, connectivo adnatis, basi divergentibus, longitudinaliter introrsum debiscentibus, dorso convexiuscula et purpurascentia, intus excavata, utrinque villosa, aestivatione marginibus imbricata, sub anthesi patentia, persistentia. Ovarium basi attenuata in receptaculo subsessile, ellipsoideum, cylindraco-compressiusculum, adpresse pilosum, apice in stylum teretem, brevissimum vix $\frac{1}{2}$ linealem, rectum, stigmate convexiusculo medio impresso papilloso terminatum glabrum continue transiens, intus e semiseptis in axi contiguus biloculatum, marginibus septorum juxta axim contiguae decurrentibus et in loculos utrinque paulo prominulis alternatim et biseriatim ovuliferis. Ovula funiculo brevissimo suspensa, subglobosa, mutua pressione tandem complanata, diametro vix semilineali, horizontalia, anatropha, 16-24 in quovis loculo, plurima abortiva, in liquore resinoso, spisso, suave aromatico nidulantia. Fructus in receptaculo floris basi calycis foliolis basibus superstitibus amplexus sessilis, obovato-cylindraco, utrinque compressiusculis, 6 linealis, apice attenuato emarginato stylo brevissimo superstiti coronatus, superficie rugulosus, glaber, fusco-virens, baccam exsuccam, sat duram constituens, intus semiseptis in axi contiguus et connatis utrinque seminiferis biloculatus, pleiospermus. Semina in quovis loculo uniseriata, pauca, vix 3-4 evoluta, reliquis abortivis, in succo inspissato denso duro, albedo interstitia loculorum explente nidulantia, subglobosa, diametro lineali, horizontalia raphe laterali brevi, testa purpurea, glabra, rugulosa, nitida vestita. Embryo in fundo albuminis totam fere seminis molem occupantis, solidi, durioris, coloris lactei prope umbilicum minimus, orthotropus, incomplevus, mere cellulosus.

POLYGALEAE Juss.

(Auctore E. T. STEUDEL.)

COMESPERMA Labill. Endl. gen. n. 5649.
Meisn. gen. pag. 23. (20.)

§. 1. Erectae.

α. *Foliis angustissimis subconvolutis vel linearibus.*

* *Bracteis (in omnibus demum deciduis) ante anthesin flores superantibus.*

1. **Comesperma longifolia** Steud. caule (basi) frutescente ramoso vel subsimplici glabro sursum diviso racemifero; foliis sparsis non approximatis linearibus angustissimis margine revolutis elongatis (pollice longioribus) acutiusculis glabris; racemis elongatis multifloris laxis, bracteis setaceis flores (nondum evolutos) superantibus, labio medio acuto integro lateralibus brevioribus. ‡

In arenosis sylvae prope Limekiln districtus Perth, 29. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 2359.

Radix valida, crassa, perpendiculariter descendens, parce fibrosa; *caulis* basi suffrutescens, divisus vel simplex, inferne cicatricibus foliorum notatus, teres, uti tota planta glaberrimus, mox foliatus, sursum in ramulos racemiferos divisus; *folia* sparsa, angustissima, pollicaria et ultra, patentia, subarcuata, margine revoluta carinata, linearia, apice acutiuscula, basi in petiolum brevissimum attenuata; *ramuli* in apice caulis subumbellato-aggregati, basi foliati, mox racemiferi; *racemi* inaequales, fructiferi demum elongati (3-7 pollicares) simplices; *flores* in pedicellis $1\frac{1}{2}$ lineas longis; *bractee* tenuissime setaceae; *fructus* basi in stipitem attenuati, apice ad latera obtusi, medio breviter mucronulati, *semina* unilateraliter membranula pellucida tenui marginata.

2. **Comesperma corniculata** Steud. caule erecto fruticuloso glaberrimo vix striato tereti inferne cicatricibus foliorum deciduorum notato cacterum nudo, superne ramoso; ramis angulatis foliatis; foliis sparsis in ramulis confertioribus linearibus margine revolutis abbreviatis (4-6 lineas longis) obtusiusculis; racemis terminalibus, bracteis setaceis; alis corollam superantibus lobo corollae medio postice corniculato. ‡

In glariosis sylvaticis circa Wuljenup ditionis Plantagenet, 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. 2360.

Radix subsimplex fibris tenuibus; *caulis* fruticulosus, teres, sursum cum ramulis angulatus; *ramuli* sparsi vel subumbellato-congesti; *folia* linearia, margine subrevoluta, bisulcata, 4-6 lineas longa, unam lata, basi in petiolum

Tribe II (Viol.) Algodineae. Fr. Br.
Alismanthura Wanks

1. *Al. angustifolia*! Brown.

St. Pl. South. Is. river Tasmaniae, p. 45.
hb. Nth. 50. Nov. 15. 1848. Folia divisa,

Comaspermum Ery. syn. 2. p. 275.

Syst. sex ll 17. Ord. Crataegia

2. *Al. dentata*! Fr. Br.

Accipi solum specimen florem
& praeterea caratua & feminibus
in colonia Victoriae collectis
Quartum Tasmaniae hb. Nth 440.

In charactera generis mutas: purpuraceum 2
lobulare, lobulo 1 saepe absente.

3. *Euphorbia corollata* Ferd Müller.

radice depressa vel caespiti foliis cretulis
vel horizontalibus emittente, foliis fasciculatis
angulato - rotundis vel subreniformibus
puberulo in petiolum decurrentibus connatis
v. repandis, stipulis lanceolato linearibus
pubulato - acuminatis, foliis vix oppositis
laeviculis glandulosis, folia parva superantibus
Paeula notas expostat, parit ab E. hederacea
proxima diffinguitur habitu dupione magis
aerato floribus, convolvulis! atque foliis
brevibus v. puberulis.

In aruosis fivis Tasmaniae (incipiente
authepi) Cit. Nov. 1848 hb. Nth n. 154, In
montium fergis graminosis, Liffingange, Nov.
et locus similibus ad pl. Ont. appariga
Du. 48 - In pulc. arcuato rasoportum
intra frutices arcuato rasoportum
versus finem Rivoli - Bay Cit. 1848.

Notas sequentes in planta viva scripti.
Floris corollae corollae; filamenta alba
barbata, antherae fusco - carinae v. auram
liacae triangularis membranae, pili
gna prople!

x Cornusperma reclusa ^{num!} La Bellardiae

In uliginosis ad fl. Murphy-rivum
2-3' hb. St. John. H. n. 345. Jan.
21. 1849. Habitu Veronicae.

Cornusperma linearifolium Cunn.

P. acutifolium Forst. Mill.

(C. acutifolium Steetz)

C. reclusum hb. St. John. num.

Inag. George-town, Jamaica.

Frutex 2-3' floribus purpureis.

(For. L.)

Nonnulla varietatum Cornuspermatis
erivini exhibere videtur! itaque

C. erivinum P. acutifolium
dicendum!

brevem crassiusculum desinentia, apice obtuse attenuato subcartilagineo; *bracteae* flores clausos duplo superantes, lanceolato-setaceae; *alae* violaceae corollam superantes; *corollae* basi violaceae apice lutescentis lobus medius dorso in corniculum brevem productus; *fructus* (immaturus) apice obtusissime truncatus.

3. **Comesperma longebracteata** Steud. fruticosa glabra, basi simplex vel vix ramosa nuda, superne fasciculato-ramosa; ramis foliatis; foliis sparsis non approximatis anguste linearibus subtortuosis apice acutiusculis; racemis ante florescentiam comoso-bracteatis, florentibus subconferto-multifloris elongatis; alis oblongo-ovatis obtusis corollam superantibus, lobo medio subintegro. ♀

In turfosis fruticosis districtus Princess Royal Harbour, 27. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 2361.

Radix simplex, descendens, fibris parvis; caulis basi suffrutescens, teres, simplex vel in *ramos* aliquot divisus, nudus, 4-pedalis, glaber, sursum cicatricibus foliorum notatus, apice in *ramulos* 4-6 divisus, 6-8 pollicares, angulosos, foliatis; *folia* 4-6 lineas longa, semilineam lata, sparsa, linearia, subtortuoso-flexa, obtusiuscula, in pedicellum brevem attenuata; *racemi* simplices, ante florescentiam conspicue comoso-bracteati; *bracteis* in floribus vix evolutis jam deciduae; *flores* albo-violacei; *fructus* . . . . .

4. **Comesperma rosea** Steud. caule erecto stricto glaberrimo striato basi nudo simplici tereti superne ramoso, ramis foliatis; foliis sparsis remotiusculis anguste linearibus margine subrevolutis apice obtusiusculis; racemis terminalibus ante florescentiam longe comoso-bracteatis; florentibus laxiusculis; alis corollam superantibus, lobo medio vix emarginato. ♀

In humoso-arenosis depressis umbrosis prope Monger'slake, 4. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 2363.

Radix fibrosa, fibris albidis tenuibus; *caulis* simplex, erectus, strictus, teres, 4-5-pedalis, per $\frac{3}{4}$ longitudinis efoliatus vix hinc inde cicatrice folii elapsi notatus, sursum in ramulos 5-6 divisus simplices, pedales et ultra, foliis sparsis remotiusculis vestitos; *folia* angustissima, linearia, 4-6 lineas longa, semilineam lata, subarcuata erecto-patentia, basi in pedicellum brevissimum attenuata; *racemi* terminales, simplicissimi; *flores* in pedicellis brevibus (lineam longis); *calyx* roseus, *corolla* lutea; *bracteae* ante florescentiam corollam cum petiolo duplo superantes, lanceolato-subulatae, 3 lineas longae, post evolutionem florum deciduae; *fructus* . . . . .

5. **Comesperma megapteryga** Steud. caule basi ramoso, ramis paucis virgatis strictis glabris sulcatis; foliis raris angustissimis linearibus acutiusculis; racemis terminalibus ante florescentiam confertissimis, bracteis ovatis acutis flores subaequantibus, demum laxis paucis (6-10-) floris; alis (albis) corolla (alba) longioribus ovato dilatatis corollae labio medio integro postice mucronulato. ♀

In arenosis districtus Sussex, Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2370.

Radix exilis emittens *caules* 2-3 subvirgatos, strictos, tenues, remote et rarer foliatis; *folia* angustissima, linearia, subpollicaria, plus quam longitudinem suam distantia, facile decidua; *racemi* in apice caulis abbreviati, con-

ferti, etiam post florescentiam pollice vix longiores; *bracteae* ovatae, acutae subconcauae, flores vix aequantes; *fructus* . . . .

6. **Comesperma aemula** Steud. caule basi simplici tereti superne ramoso anguloso glabro; foliis sparsis linearibus acutiusculis; racemis laxis bracteis setaceis flores superantibus cito deciduis; alis corolla (flavescente) longioribus, lobo medio integro lateralibus subbreuiore.

In arenosis districtus Sussex, 19. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2371.

C. ericinae Dec. proxima sed folia non revoluta plana, ♀

Radix tenuis, simplex; *caulis* vix frutescens, basi simplicissimus, teres, $1\frac{1}{2}$ -2 pedalis, superne ramosus, uti rami angulatus; *rami* subumbellati-congesti, apice raro simplices sed in ramulos racemiferos iterum divisi; *folia* vix in petiolum attenuata, nervo medio prominente plus minus utrinque sulcata, 3-5 lineas longa, vix unam lata; *racemi* laxi, vix pollice longiores, fructiferi elongati laxiores; *bracteae* flores inapertos superantes, evolutos vix aequantes; *flores* parvi, alae calycinae intense purpureo-violaceae; *corolla* apice flavescent; *fructus* apice in marginibus elongatis et commissura media producta 3-dentatus; *semina* non marginata.

7. **Comesperma contracta** Steud. caule fruticoso glaberrimo striato tereti basi nudo superne foliato ramoso; ramis angulatis; foliis sparsis subtortis anguste linearibus margine subrevolutis apice acutiusculis; racemis terminalibus abbreviatis ante florescentiam bracteato-comosis, bracteis filiformibus; alis corollam superantibus, corollae lobo medio postice breviter corniculato antice contracto. ♀

In turfosis inter arundines ad marginem lacus prope villam Dr. Helms, districtus Perth, 24. May 1839. Herb. Preiss. No. 2373.

Caulis teres, basi simplex, cicatricibus foliorum notatus, sursum ramosus, uti rami subangulatus et foliatus; *folia* caulina linearilanceolata, plana, 4-6 lineas longa, ultra lineam lata, obtusiuscula, ramea angustiora, acutiora, subtorta; *racemi* abbreviati (1-2-pollicares) laxiusculi, ante florescentiam bracteis lanceolato-setaceis flores vix duplo superantibus muniti; *calycis* alae subpatentes, pallide roseae, corolla apice lutescente longiores; lobus medius postice in corniculum brevissimum productus, antice contractus, lateribus brevior et angustior; *fructus* . . . .

8. **Comesperma tenuis** Steud. caule simplici vel diviso tenui glabro remote foliato; foliis anguste lanceolatis planis; racemo ante florescentiam bracteolis scariosis flores vix superantibus instructo denum laxo; floribus (albo et coerulesco-variegatis) parvis, lobo medio acuto. 4

In subumbrosis ad Aron Dale, districtus York, 4. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 2367.

Caulis tenuissimus, striatus, teres, simplex vel parum ramosus; parce foliatus; *folia* saepius plus quam duplam longitudinem remota, anguste linearilanceolata, sessilia; *rami* terminales, simplices, laxiusculi; *flores* parvi; alae albo-coerulescentes, patentes, corollam concolorem aequantes; *fructus* immaturi vix in stipitem elongati, utrinque obtusi, medio mucronulati.

Cornesperma ericinum ^{pl. A. nov.} Gle.

In collibus rupestribus ad
portum cognorum Tarmannie
pl. A. n. 757. Nov. 49. 1 1/2' alt.
Habitu *Tetrathoea ericifolia*
pilosa.

Est idem ac *C. linearifolium*
Linnæi. In hoc certe. Deur-
sum?

** *Bracteis ante anthesin flores non superantibus vel nullis.*

9. **Comesperma hirtula** Steud. caule basi subsimplici tereti hirsutulo superne ramoso ramis subconferto-foliatis, foliis linearibus margine subrevolutis pilis brevissimis hirsutis apice acutis, racemis (semper an denu?) ebracteatis submultifloris; floribus (carneis) subconfertis, fructibus abbreviatis. ♀

In turfosis humidis umbrosis, Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 2362 et 2364.

Radix simplex, perpendicularis; *caulis* basi simplex vel ramulo uno alterove sursum inordinate ramosus; *rami* pilis brevissimis pubescentes, angulati; *folia* sparsa, $\frac{1}{2}$ -1 pollicem longa, margine plus minus quandoque ad costam usque revoluta, setis brevibus vix sine lentis ope conspicuis munita, apice vix cartilagineo acuta; *racemi* terminales, simplices, post florum evolutionem (juniores desunt) omnino ebracteati, laxiusculi, 1-3 pollices longi; *capsulae* apice rotundatae, medio tantum obtuse mucronulatae, glabrae; *semina* post pilos longiores delapsos membrana tenui pellucida cincta.

10. **Comesperma ramosissima** Steud. caule basi ramosissimo, ramis erectis teretibus adscendenti-strictis superne simplicibus vel divisis glabris; foliis sparsis remotis linearibus margine reflexis apice acutis; racemis brevibus, confertis pauci (8-12-) floris, bracteolis non prominentibus; floribus (albido-cocroleis) parvis; alis oblongis corolla brevioribus lobo medio integro.

In turfosis arenosis prope oppidulum Albany, 4. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 2369.

Caulis basi ramosissimus; *rami* erecti, subvirgati, simplices vel sursum divisi, striati, subteretes; *folia* sparsa subpollicaria vel breviora longitudine sua, plus minus remota linearia, apice vix cartilagineo-acuta basi sessilia, suberecto-patentia quandoque subtorta; *racemi* in apice ramorum brevissimi, pauci (10-12-) flori, bracteolae nunquam exsertae; *flores* parvi, *ala* et *corolla* coeruleo-albicantes, lobo medio integro; *fructus* . . .

11. **Comesperma xanthocarpa** Steud. caule a basi simplici tereti subpruinoso foliato superne ramoso glabro ramis angulatis; foliis subconfertis supremis sparsis margine revolutato subteretibus apice obtuso cartilagineo; racemis omnino ebracteatis laxiusculis obovatis; alis ovatis corollam subaequantibus lobo medio integro, capsulis elongatis flavescentibus. ♀

In subturfosis arenosis prope oppidulum Perth, 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 2368.

Radix perpendiculariter descendens, parce fibrosa; *caulis* basi simplex, teres, sursum uti rami angulosus, cum his 2-3-pedalis, superne confertum ramosus; *rami* stricti, simplices vel iterum ramulosi; *folia* subconferta uti caulis subpruinoso-glaucia (precina tandem evanescente), linearia, marginibus sese fere attingentibus reflexa, subpollicaria, in pedicellum distinctum brevem (lineam aequantem) desinentia, erecta, stricta; *racemi* terminales, abbreviati, vix (etiam fructiferi) pollicem excedentes; *bractee* omnino nullae vel vix in racemis nondum evolutis conspicuae; *alae* ovatae, corollam superantes, pallide lutescentes; *corollae* flavae lobus medius integer vel vix denticulatus laterales subaequans; *capsulae* elongatae, erecto-patentes, basi valde attenuatae, flavescentes; *semina* non marginata.

12. **Comosperma laxiuscula** Steud. caule tereti basi simplici vel uti superne ramoso virgato glabro, ramis angulatis; foliis sparsis linearibus abbreviatis (3-5 lineas longis) deciduis; racemis terminalibus laxis plurifloris ante anthesin bracteatis bracteolis flore minoribus; alis corollam superantibus lobo medio integro. 3

In lapidoso districtus York, 21. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 2372.

Caulis 2-pedalis et ultra, basi plerumque simplex, teres, apice divisus in ramulos virgatos mox aphyllus; *folia* ramulorum parva, linearia, aucta, saepius minima, subulata, 3-5 lineas non excedentia; *racemi* terminales, laxiusculi, unciales et ultra; *pedicelli* duas lineas longi, suberecto-patentes, laxiusculi 1-1½ lineas remoti; *bracteae* subulatae, pedicellum vix aequantes, mox deciduae; *flores* pallide carneo-rubescens, corolla ferrugineo-rufescens; *fructus* basi stipitatus, striatus, apice rotundatus, marginibus non productis, medio vix apiculatus; *semina* non marginata.

β. *Foliis lanceolatis vel obovatis-planis.*

13. **Comesperma varians** Steud. caule basi vix frutescente ramoso vel simplici hispidulo superne glabro; foliis infimis oblongo-lanceolatis caulinis angustioribus linearibus remotis; racemis simplicibus vel paniculatis laxis multifloris ante florescentiam munitis bracteolis lanceolatis acuminatis florem subaequantibus; poribus (coerulescentibus) parvis, alis corolla longioribus. 4 5

In subturfosis arenosis inter frutices prope Strawberryhill, 24. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2365.

Caulis basi striis flexuosis tenuibus notatus, pilis brevibus rigidiusculis albidis sursum evanescentibus, scabridus; *folia* in ramulis radicalibus sterilibus oblongo-lanceolata, vix petiolulata, acutiuscula, ¾-1 pollicem longa, 2-2½ lineam lata, caudina multo minora, anguste linearia, suprema subsetacea; *racemi* terminales nunc simplices nunc paniculato-compositi; *bracteolae* ante florescentiam lanceolatae, acutae, flore nondum evoluto breviores, post evolutionem deciduae; *alae* albo-coerulescentes *corolla* apice pallide lutescente longiores; *fructus* basi stipitato-attenuatus, superne marginibus parum productis truncatus, subtridentatus; *semina* immatura non marginata.

14. **Comesperma parviflora** Steud. caule basi diviso foliato apice ramuloso striatulo tenuissime (sub lente) pubescente; foliis planiusculis lanceolatis tenuissime ciliolatis, apice cartilagineo-mucronulatis; racemis terminalibus confertiusculis ante anthesin scarioso-bracteolatis, bracteolis flores subaequantibus serius deciduis; calycibus marcescentibus corollam (coeruleam) vix aequantibus. 4 6

In calciosis montium continuorum Darling'srange districtus Perth, 15. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 2374.

Caules e radice exili plures (2-4) 1-1½ pedales, basi pube tenui sursum evanescente muniti, stricti, simplices vel sursum ramosi, striati, teretes, foliati; *folia* sparsa infra dimidiam, superne totam longitudinem remota, plana, lanceolata, acuta, pollicaria, 1-1½ lineas lata, margine (sub lente) ciliolata; *racemi* terminales, simplices, primum conferti, breves, demum laxi, elongati; *fructus* in stipitem attenuati, apice subtruncati, obtuse tridentati.

Cotoneaster oligophylla Ferdm.

15. ? An huj. locis planta communissima a Stuartio sub nomine *C. volubile* (N. 64) communis & hb. Lips. N. 25. Hujus speciei proxima nisi spec. nova. Vix a *C. volubili*, ^{et} comb.anda. Cor. cor. ~~luteis~~, purpureis & caeruleis. Piniforest. prope Garthowen. Nov. 48.

Cotoneaster volubile Labill.

x 16. hb. St. Jansmanni. n. 109. Prope urbem Lammefan, 4-5. St. Jansmanni. 017. 10. 1848. hb. St. J. II n. 38. Ad Swanport hb. St. J. III n. 644. Nov. 1849. 3-41, Guelm. Bay febr. 1850. In parvis elevatis calicibus prope Enfield ad aspidarium fruticosa. 017. Folia aculeolata (comp. *Stictis* in Lchm. pt. Fr. II, 302.) signum charact. rippium non fingunt, quoniam fagium atropa fuit! - New-Worketh, Tasm.

§. 2. Volubiles vel subscandentes.

15. **Comesperma herbacea** Steud. canle subvolubili subsimplici vel basi ramoso tenui glabro vix ima basi fruticuloso; foliis ovato-vel simpliciter lanceolatis margine subrevolutis apice subcartilagineo mucronatis; racemis laxis, (an semper?) ebracteatis; alis corollam aequantibus, corollae labio medio integro acuto, fructibus subflavescentibus. 4

In Australasia occid. Herb. Preiss. No. 2366.

Caulis debilis, glaber vel basi subpubescens, 1-2 pedalis; *folia* sparsa vel alterna (inferiora minora) oblongo-lanceolata vix in petiolum attenuata, $\frac{1}{2}$ -1 pollicem longa, $1\frac{1}{2}$ lineas lata, summa anguste linearia, omnia longitudine sua vel ultra distantia; *racemi* simplicissimi, terminales, laxi, 12-20-flori; *fructus* in brevem stipitem attenuati, vix denticulati.

16. **Comesperma volubilis** Labill.? canle volubili striato ramosissimo glabro basi frutescente; foliis dissitis lanceolatis planis glabris; ramulis apice racemiferis abbreviatis ebracteatis laxiusculis. (Flores evoluti et semina desunt.) 4 ♀

In arenosis insulae Gnadenland, 10. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2375.

17. **Comesperma scandens** Steud. caule scandente profunde striato glabro ramoso, ramis sparsim dissite foliatis; foliis anguste linearibus obtusis planis; racemis terminalibus (ante florescentiam?) ebracteatis abbreviatis laxe-ct pauci (6-10)-floris, corolla antice subemarginata. 4 ♀

In arenosis districtus Sussex, 25. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2376.

TREMANDREAE. R.Br.

(Auctore J. STEETZ.)

TETRATHECA Smith. *) Endl. gen. n. 5644.
Meisn. gen. pag. 22. (20.)

Sectio I. EUTETRATHECA. Filamentis crassiusculis, antheris quadrilocularibus.

a. *Subaphyllae*: ramis subaphyllis, foliis minimis.

1. **Tetrathea affinis** Endl. glaberrima, ramis foliaceo-compressis basi ancipitibus, foliis alternis setaceis minimis

*) Genus hoc haecenus non nisi perpaucis speciebus, floris partium structura inter se maxime affnibus compositum, detectionibus Preissianis non solum specierum numero, sed

sessilibus, pedicellis bibracteolatis axillaribus, floribus pentameris, staminibus puberulis. — Endl. in Hügel. Enumerat. pag. 7. n. 23.

In subarenosis prope oppidulum Albany, (Plantagenet) d. 23. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1334. (Comparavi specimen Hügelianum!)

Proxima *Tetrathecae junceae* Smith. Differt vero primo intuitu: ramis magis foliaceo-compressis, floribus pentameris, sepalis paullo acutioribus, antheris evidenter puberulis, tubuloque antherae longitudinem aequante, qui in *Tetr. juncea* triplo brevior est.

2. ***Tetratheca virgata* Steetz.** caule a basi ramoso, ramis teretibus inferne aphyllis superne foliis alternis minimis linearibus brevissime petiolulatis vestitis, pedicellis basi bracteolatis axillaribus folia corollamque superantibus, floribus tetrameris, staminibus glabris, filamentis tubuloque antherae longitudinem aequante discoloribus, ovario cum stylo rectiusculo glaberrimo.

In limoso-calculosis inter frutices plantiei haud procul a praedio rustico Dom. Brockmann (York) d. 15. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1332, ex parte.

Fruticulus pulcherrimus, superne floribus purpureis creberrime tectus. *Caulis* pedalis et ultra, a basi ramosus. *Rami* glaberrimi, graciles, teretes, erecti, virgati, apice abortientes, inferne aphylli, leviter rugulosi. *Folia* in superiore ramorum parte alterna, arrecta, crassiuscula, brevissime petiolulata, margine revoluta, obtusiuscula, linearia, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, utrinque glaberrima, vel summo apice pilis paucissimis rigidulis brevissimis non nisi lente conspicuis conspersa, decidua. *Pedicelli* axillares, solitarii, uniflori, patenti-curvati, filiformes, apice paullo incrassati, glaberrimi, basi

etiam formis divergentibus adhuc incognitis auctum est: quare in sectiones distribuere coactus sum. Partium floris numerus, iam monente cl. Endlichero in Hügel. Enum. pag. 8 sub n. 24 valde inconstans est, ideoque distributionis malum principium suppeditat. Observavi enim in una eademque planta flores tetmeros et pentmeros promiscue. Sed antherarum fabricam et structuram, contra cl. Endlicherum l. c., semper valde constantem reperi, neque ex his sectiones constituere dubitavi. Filamenta plerumque crassiuscula, brevissima, in unica specie filiformia sunt, in omnibus cum anthera continua. Antherae apice semper in tubulum poro terminali instructum productae sunt, qui in speciebus orae orientali Novae Hollandiae et Terrae Van Diemen indigenis hucusque notis semper brevis est, floribus tetrameris praevaletibus. In speciebus orae occidentali indigenis, quae, paucis exceptis, omnes fere floribus pentameris gaudent, tubulus plerumque longior, antherarum longitudine vel illam superans observatur, si *Tetrathecam nudam*, *Tetrathecam confertifoliam* et *Tetrathecam Preissianam* excipias. Non possum, quin pauca referam de ovulis in ovario biloculari. Cl. Endlicher l. c. signum genericum constans commemorat in *Tetratheca*: Ovula bina in quovis loculo, et in *Tremandra*: Ovula solitaria, quod equidem consentire nequeo. Creberrimis et accuratissimis summa cum patientia institutis sectionibus ovariorum plurimarum specierum, nunquam ovula bina in loculo reperi mihi contigit. Loculus semper ovulo solitario, quod sine ullo opere evolvi, totus repletus erat; abortivne forsitan alterum? An plane abest? Non credo, me feliciorum fore examinando plantam vivam quam siccam, arena madida iterum molliam. Restat denique, ut pauca dicam de indumento, in plerisque speciebus quam maxime variabili. Occurrit enim saepius una eademque species tum tota glabra, tum pubescens, tum setis validis patentibus indique obsita. Nec in ipsis florum organis indumentum semper constans est. Observavi ovarium glabrum, pubescens et imo villosum in *Tetratheca thymifolia* Smith. Quum vero formas varias in ipsa patria colligere et observare mihi non contigerit, aegre equidem ausus sum, specierum et varietatum limites strictissime circumscribere, bene conscius, singula specimina sicca non sufficere ad rem absolvendam.

In character generico loculi germinis
uni-ads bi-ovulati sunt deorsu-
mundi contra H. Endlicher, qui
solummodo ovula in quaque mai-
loculo una observavit et contra
H. Dr. Steety, qui nunquam ger-
mina talia videre testatus est.

x Tetratheca aedonocalyx Gardner

In Nov. Hollandia (Australia
pélée?) hb. St. 830.

T. pilosam imitans, sed pedun-
culis longioribus (jam inter
anthesin folia duplo superan-
tilibus), foliis omnibus vertici-
latis 4-6nis, lobulo anthera-
rum apicali brevioris et
sepalis glandulosis pilosis. U-
triusque quidem faciem occu-
pantibus inspersimata.

ut plurimum bracteola minima suffulti, in apice ramorum aggregati. *Sepala* 4 ovata, acutiuscula, lineam longa, colorata, glabra, margine leviter ciliolata, introrsum puberula. *Petala* 4 obovata, latiuscula, patentia, rosea in planta viva, (teste cl. Preissio) purpurea in sicca, basi macula atropurpurea notata, 4-5 lin. longa. *Stamina* 8, glabra, conniventia. *Filamenta* breviter, semilineam longa, crassiuscula, plano-compressa, pallida; *antherae* cylindricae, quadriloculares, atropurpureae, extrorsum rugulosae, introrsum basi ciliis paucis vix conspicuis vestitae, apice cum tubulo subaequilongo, pallido, oblique truncato, poro terminali instructo, scabriusculae. *Ovarium* sessile, glabrum, ovatum, compressum, roseum, biloculare; *ovulum* in loculis solitarium, apici appensum, caruncula subfungosa, uncinata, obtusiuscula terminatum. *Stylus* stamina vix superans, glaber, rectiusculus, vel paullisper tortus; *stigma* simplex. *Capsula* in speciminibus desideratur.

β *setigera* nob. ramis nudique setis sparsis patentibus rufescentibus basi bulbosis 1-2 lin. longis vestitis.

In Australasia meridionali-occidentali. Herb. Preiss. No. 1333.

Bina modo specimina in promptu habeo, in quibus duo tantum flores evoluti sunt, quorum alter petalis 5 staminibusque 10, sed sepalis 4, tribus regularibus, et quarto e duobus connato, apice bilobo instructus est; alter flos evolutus et omnes ceteri clausi petalis et sepalis 4, staminibusque 8 gaudent. Varietas haec praeter setas non differt a specie primaria, nisi statura paullo humiliori, ovario apice obtusiori, styloque paullo longiore et magis torto. *Folia*, *pedicelli*, *calyces* et *ovaria* aequae glabra sunt, et setae non nisi caule ramisque insident.

3. ***Tetratheca nuda* Lindl.** glaberrima, caule subsimplici parce ramoso, ramis teretibus junceis subaphyllis, foliis rarissimis linearibus minimis in petiolum brevissimum attenuatis deciduis, pedicellis sparsis basi bracteolatis axillariibus corollae longitudine, floribus pentameris, staminibus glabris, filamentis tubuloque antherae triplo brevioris coloribus, ovario hirsuto, stylo recto basi hirsutiusculo apice glaberrimo. — Lindl. Swan River pag. XXXVIII n. 186.

In Australasia leg. cl. Preiss, sed ubinam? et quando? (Herb. Preiss. No. 1332 ex parte. *)

Obiter inspecta *Tetrathecae virgatae* habitum prae se ferens, propter stamina propius ad *Tetrathecam junceam* Smith accedit, a qua vero primo vultu differt: ramis teretibus, floribus pentameris, ovario hirsuto, foliisque in petiolum brevissimum attenuatis. Filamenta et antherae cum tubulo fere eadem ac in *Tetratheca juncea*, sed concoloria nigra, quum in hac tubulus purpurascit. A *Tetratheca virgata*, quacum statura, caulibus teretibus apice abortientibus et foliis petiolulatis convenit, recedit: Caulibus simplicibus, hinc inde non nisi ramum unum alterumve junceum elongatum agentibus, foliis rarioribus margine non revolutis, floribus pentameris, pedicellis duplo brevioribus minus aggregatis hinc inde sparsis, praesertim vero ovario hirsuto staminibusque totis diversis: tubulus enim brevissimus, anthera triplo vel quadruplo brevior, concolor. — Quoad stamina planta haec et sequens ad species orae orientali et australi Novae Hollandiae indigenas approximatur; ceterae species collectionis Preissianae hujus et sequentis sectionis tubulis antheram aequantibus vel superantibus instructae sunt.

*) In collectione Preissiana planta haec cum *Tetratheca virgata* plane confusa est: Exemplaria quae cl. Preiss sub No. 1332 ad examinandum et definiendum designavit sunt *Tetratheca virgata*; ea vero, quae pro herbario meo sub eodem numero mecum communicavit, sunt *Tetratheca nuda* Lindl.

b. Foliatae: ramis densius foliatis.

4. **Tetralthea confertifolia** Steetz. caule simplici vel ramoso tereti hispidulo dense foliato, foliis alternis vel oppositis vel verticillato-aggregatis sessilibus linearibus obtusiusculis margine revolutis hispidis, pedicellis axillaribus folia longe superantibus in apice ramorum aggregatis hispidulis, floribus pentameris, tubulo anthera brevior, ovario ovato hispidissimo, stylo rectiusculo basi hispidulo apice glabro.

In confragosis montium continuorum Darling's-range, (Perth) d. 1. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 1328, et in regionibus interioribus Australasiae meridionali-occidentalis. No. 1329.

Fruticulus. *Caulis* simplex vel supra basin ramosus, cum ramis teretibus, setis minimis subappressis hispidulus, dein glabratus et propter folia delapsa cicatricibus tectus, $\frac{1}{2}$ -1 pedalis. *Folia* conferta, approximata, alterna vel opposita vel subverticillata, arrecta, sessilia, basi attenuata, linearia, integerrima; obtusa, crassa, margine revoluta, utrinque hispidula, et supra, praesertim margine, setis validioribus, rigidulis, patentibus, basi bulbosis onusta, minervia, nervo supra vix impresso, subtus valido, prominulo, hispido, 3-6 lin. longa, $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata. *Pedicelli* in apice ramorum axillares, solitarii, aggregati, uniflori, patentes, hispiduli, pollicares, fructiferi apice mutascentes. *Sepala* 5 lanceolata, acuta, $1\frac{1}{2}$ lin. longa, setoso-hispidula, plerumque reflexa. *Petala* 5 obovata, patentia, sepalis duplo majora, ante anthesin albidula, dein purpurea, basi macula atropurpurea notata. *Stamina* 10 commixta; *filamenta* breviter, $\frac{1}{2}$ lin. longa, crassiuscula, parce puberula, et cum antheris earumque tubulo concoloria, atropurpurea; *antherae* cylindricae, quadriloculares, in tubulum ipsis paullo brevior, oblique truncatum, poro terminali instructum prodest, rugulosae, glabrae, vel introrsum ciliis paucis, lente vix conspicuis, puberulae. *Ovarium* sessile, ovatum, subcompressum, biloculare, hispidissimum. *Stylus* stamina paullo excedens, rectiusculus, vix tortus, basi latiore sensim attenuatus, medio tenus hispidulus, apice glaberrimus, utrinque longitudinaliter sulcatus, simplex, vel, sicuti in floribus binis observavi, secundum sulcum bifidus. *Stigma* simplex. *Capsula* obovata, compressa, basi attenuata, apice emarginata, utrinque longitudinaliter sulcata, hispidula, 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. longa, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata.

Specimina sub No. 1329 ab illis sub No. 1328 dimissa nulla nota differunt, nisi foliis paullo minoribus. Flores nondum evoluti, solito more, petalis albis gaudent.

5. **Tetralthea setigera** Endl. caule parce ramoso tereti, ramis setigeris, foliis alternis oppositis subverticillatis ovato-oblongis grosse paucidentatis subtus glabriusculis supra setoso-strigosis, pedicellis axillaribus gracilibus folia superantibus apice setulis hinc inde conspersis vel glabris, floribus pentameris, petalis obovatis patentibus purpureis basi concoloribus, filamentis brevissimis vix ullis, antheris eum tubulo ipsis paullo longiore apice pallido, ovario ovato styloque recto, glaberrimis. — Endl. in Hügel. Enumerat. pag. 8. n. 24.

In solo turfoso-arenoso inter frutices densos ad Stirling's-Terrace, (Plantagenet) d. 22. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1326. (Comparavi specimen Hügelianum!)

Specimen unicum mihi obvium nulla linea ab Hügeliano differt, sed antheras, quarum permultas secui, semper quadriloculares inveni. (Cf. Endl.

Tetratheca pilosa Labillardiere

Cis flumen Murray fruticibus
montium opulenter intermixta.

T. ericifolia Smith. Perfor.

In flavo montanis fœcis rufus
pagum Watford. Apr. 27. 1848.

Floribus lilavino-purpureis; an-
theris & connatis apice apen-
tis nigra brunneis. hb. Stuart

N. 32. & *p. albiflora* etiam a
Sm. inuenta observata. N. 33.

Fruticulus frictus ulnam raro excedens.

T. calva Fend. Muhl. Radix plurimique
ranch ramulo pecti frabro dense
foliata, foliis alternis vel oppo-
sitis vel verticillata aggregatis
foliis brevissimis petiolatis line-
aribus obtusiusculis margine
revolutis subglabris vel hispi-
dulis, pedicellis axillaribus & lon-
gitudine foliorum in apice ramu-
lorum aggregatis glabrescen-
tis floribus tetra- rariis p. m.
rariis, tubulo anthera brevior
ovario ovali triquo glaucis caps
residuali. Flor. paniculatis.

In planitie aringa vixi. Locum Victoria
Apr. 1848. A pagum Colthal. Jun. 1848.

T. glandulosa Labillardiere. N. 30.

In insula Van Diemens Land.

hb. Stuart Tarmann. 59.

Ad fertionem proximam & fe-
riem b. Steyerii pertinet, pro-
xima inter plantas Australia
occidentalis *T. foetigera*.

Ad fl. Mafy, Tarm. hb. N. 4 n.

325. fr. 1-2' Jan 18. 1849.

New-Norfolk. -

8 *T. pulchella* ferd Muller
In insula Van Diemens Land!
Hb. St. Tasmannii n. 64.
fol. alternis linearibus obtu-
is margine revolutis cum sa-
mulis angulatis & labriuncu-
lis, florib. tetrameris, sepalis
minimis triangulari orbic-
ulatis.

9 *Planta pulchella* nana. Novae
indagationis in proximis ^{locis} perfetus
nigrae me docuit, ~~et~~ solummodo
varietatis valorem habet. In ele-
vatione montium 5000' Tasm.
Hb. St. T. n. 377.

P. pilosa La Billardiere
P. eglanulosa ferd Mull
sepalis glabris, calicorum
^{racemorum}
& caulis pilis eglanulosis.
In insula Van Diemens Land!
leg. Cl. Stuart. Hb. St. Tasm.
num. 107.

10 *P. grandifolia* ferd Muller.
foliis duplo majoribus,
fistulis eorum ^{et} racemorum
longioribus valde magis
apicatis.
In nigr. V. D. L. Hb. St. T. n. 36.
J. Hooker. Macarfield, Sept.
Ad. South Esk river, Tasm. Hb.
St. T. n. 73, ubi valde variat. (17)
Diagnosis *P. eriofoliae* munda,
quum prius etiam *P. pilosa*
repperit.

licher l. c. eas biloculares observavit. Hujus speciei varietas memorabilis occurrit:

β elongata nob. caulibus elongatis virgatis, pedicellis gracilioribus glaberrimis, petalis purpureo-roseis, antherisque cum tubulo apice pallido multo brevioribus.

In subarenosis sylvae ad fluvium Canning, (Perth) mense Sept. 1841. Herb. Preiss. No. 1322.

Fruticulus radice lignosa, multicauli. *Caules* graciles, elongati, virgati, hinc inde ramos subsimplices apice abortivos agentes, 2-3½ pedales, minus strigosi quam in specie primaria. *Pedicelli* basi bracteolis plerumque binis suffulti, gracillimi, glaberrimi, setulis plane destituti, 5-8 lin. longi. *Petala* 5 obovata, patentia, purpureo-rosea, basi concoloria. *Stamina* 10, glaberrima. *Filamenta* brevissima vix ulla; *antherae* cylindricae, quadriloculares, atropurpureae, cum tubulo ipsis paullo longiore, lurido, apice flavescente, oblique truncato et poro terminali instructo, levissime rugulosae, vix 1½ lin. longae. (In specie primaria 2 lineares.) *Ovarium* sessile, ovatum, roseum, cum stylo recto, filiformi, basi roseo, apice flavescente, stamina paullo superante, glaberrimum; *ovulum* in loculis solitarium. *Folia* et *sepala* a specie primaria non differunt. Specimina fructifera non suppetunt. — Forma quidem insignis, quoniam transitus nullos detexi, attamen verisimiliter nil nisi mera varietas, orta in loco natali diverso.

Obs. Ovarium unicum trigonum, loculis tribus instructum observavi; cetera compressa, bilocularia inveni.

6. ***Tetrathea gracilis* Steetz.** caule gracili erecto ramoso hinc inde setis raris consperso ceterum glabro, foliis ternatim verticillatis subsessilibus lineari-lanceolatis margine revolutis utrinque glabris internodiis multoties brevioribus, pedicellis axillaribus folia longe superantibus filiformibus glaberrimis ebracteolatis, floribus pentameris, filamentis brevibus pallidis, antheris cum tubulo atropurpureis scabris, ovario obovato apice subemarginato glaberrimo, stylo.....

In subarenosis sylvae ad fluvium Serpentine-River, (Murray) d. 5. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1335.

Suffruticulosa. *Caules* plures graciles, erecti, ramosi, fere pedales, et cum ramis arrectis teretes, rugulosi, glabri, vel setis patentibus, rufescentibus, basi bulbosis hinc inde, praesertim sub foliorum verticillis, vestiti; *rami* simplices, ut plurimum ternatim verticillati. *Folia* pari modo ternatim verticillata, crassiuscula, in petiolum brevissimum planiusculum attenuata, lineari-lanceolata, integerrima, apice mucronulis 1-3 minutissimis terminata vel nuda, margine revoluta, utrinque glabra, internodiis multoties breviora, 3-4 lin. longa, 1-1½ lin. lata. *Pedicelli* axillares, uniflori, filiformes, apice incrassati, glaberrimi, solitarii, oppositi vel ternatim verticillati, 7-9 lin. longi, basi bracteolis destituti. *Sepala* ovata, acutiuscula, lineam longa, glabra, ciliolata, introrsum puberula, colorata. *Petala* 5 purpureo-rosea, basi concoloria, obovata, sepalis duplo vel triplo longiora. *Stamina* 10; *filamenta* brevissima, semilineam longa, ¼ lin. lata, planiuscula, pallida; *antherae* cylindricae, quadriloculares, introrsum ciliatae, cum tubulo subaequilongo (?) scabrae, atropurpureae. *Ovarium* sessile, compressum, glabrum, obovatum, apice subemarginatum, viride. *Stylus* . . . *Capsula* obovata, subinflata, apice emarginata, utrinque longitudinaliter sulcata, 2½ lin. longa, 2 lin. lata.

Obs. Hujus pulchrae speciei exemplaria pleraque floribus carent; in altero capsula, in altero flos unicus adest, et hic insuper incompletus. Sepalorum enim duo medio tenui connata, antherarum tubuli apice corrosi sunt, et stylus paullo supra basin defractus est. Ex ulterioribus igitur observa-

tionibus patebit demum, an character de speciminibus prorsus defectis simus, constans sit.

Sectio II. DITHECA. Filamentis crassiusculis, antheris bilocularibus *).

7. **Tetrathea viminea** Lindl. caule a basi ramoso, foliis subsessilibus, inferioribus rhombeo-ovatis ternatim verticillatis internodiis multoties brevioribus, superioribus approximatis ovatis verticillatis alternisve, pedicellis axillaribus gracilibus folia longe superantibus glaberrimis, floribus pentameris, antheris cum tubulo ipsis paullo longiore gracili scabris, ovario ovato cum stylo tortuoso glaberrimo. — Lindl. Swan River pag. XXXVIII. n. 184.

In arenosis umbrosis sylvae Bellevue ad fluvium Cygnorum d. 5. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1327.

Fruticulus. *Caulis* 1-2 pedalis et ultra, a basi ramosus, inferne et interdum superne sub foliorum verticillis, setis brevibus rufescentibus patentibus basi bulbosis parce conspersus, ceterum cum ramis glaber, teres, cortice cinerascens ruguloso tectus. *Rami* alterni, oppositi vel verticillati, juniores interdum hirsuti. *Folia* in petiolum brevissimum attenuata, acuta, minervia, coriacea, supra rugulosa et minutissime punctulata, nitidula, subtus opaca, nervo medio valde prominulo, utrinque glabra; *inferiora* ternatim verticillata, rhombeo-ovata vel subrotunda, internodiis multoties breviora, 3-5 lin. longa et 2-4 lin. lata; *superiora* ovata, sensim minora et angustiora, verticillata, vel saepissime alterna, approximata, internodiis vix breviora, juniora ut plurimum supra sparse strigilloso-setosa margineque rigide ciliata. *Pedicelli* pollicares, axillares, uniflori, patentes, filiformes, apice paullisper incrassati, glaberrimi, rubescentes, solitarii, et saepe, quoniam e quavis foliorum axilla orti, ternatim verticillati, basi plerumque sed non semper stipulis 1-2 bractaeformibus suffulti. *Sepala* 5, glabra vel tenuissime ciliolata, ovata, acuta, $1\frac{1}{2}$ lin. longa, membranacea, rosea, sub anthesi reflexa. *Petala* 5, ovata, acuta, $3-3\frac{1}{2}$ lin. longa, patenti-erecta, purpureo-rosea, basi macula atropurpurea notata. *Stamina* 10, conniventia; *filamenta* crassiuscula, complanata, basi plerumque dilatata, concoloria; *antherae* cylindricae, biloculares, basi rugulosae, levissime ciliolatae, superne cum tubulo ipsis paullo longiore, gracillimo, summo apice attenuato, laevi, flavescente, oblique truncato, et poro terminali instructo, purpureae vel atropurpureae, scabrae. *Ovarium* sessile, ovatum vel subrotundum, compressum, roseum, biloculare, et cum stylo albido glaberrimum; *ovulum* in loculis solitarium. *Stylus* filiformis, stamina non superans, tortuosus, i. e. paullisper supra basin geniculatus et iterum sursum plicatus, utrinque longitudinaliter sulcatus. *Stigma* simplex. *Capsula* desideratur.

Observavi varietates duas hujus speciei memorabiles.

β **microphylla** nob. foliis multo minoribus, pedicellis paullo longioribus, petalisque obscure purpureis.

In arenosis sylvae prope oppidulum Albany, (Plantagenet) mense Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1318.

Unicum tantum specimen ad manus habeo. *Folia* minora $1-2\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{1}{2}-1\frac{1}{2}$ lin. lata, *pedicelli* pollice paullo longiores et *petala*, (in planta

*) Antherae biloculares quidem, rudimenta tamen septorum secundariorum, sub lente bene conspicua, semper conservant.

Urtica *Gossypiana* ! *ferd* Müller
 caulibus simplicibus vel parvis
 ramosis teretibus, foliis oppositis
 oppositis summi plerumque
 alternis ceteris sonantem vel
 quaternariam verticillatis, ovato-
 v. orbiculato-rhombicis integris
 subtus glaberrimis supra versus
 marginem ^{caulibusque} ~~marginem~~ ^{axillare} ~~marginem~~ ^{patula} ~~marginem~~ ^{ex hispidis}
 nudius pilosis et glanduloso-fimbri-
 latis axillaribus racemosis dispo-
 sitis, floribus tetrameris
 lobis obovato-fimbriatis, ^{oblongo} ~~oblongo~~ ^{filamentis} ~~filamentis
 brevissimis & antheris subulatis
 brevissimis, ovario subrotundo
 ore velutino stylo recto terminato
 Pappi copiose in capiteum fru-
 tulentis a monte Murrhead usque
 ad regiones Peritoris finem lito-
 ralem "Point Bay" ^{virescit} ~~virescit~~ ^{filas} ~~filas~~
^{ovata pulcherrima} ~~ovata pulcherrima~~ ^{Oct. 1848} ~~Oct. 1848~~ ^{fructu} ~~fructu~~
 fructuosa eruta & radice
 caulem striatum foliariis vel
 plures plus minusve adpressantes
 emissis pedales vel bipedales ^{novum} ~~novum~~ ^{folia} ~~folia
 Hieracis ^{novum} ~~novum~~ ^{folia} ~~folia ^{quae} ~~quae
 pluriformibus et brevioribus hinc
 inde glandulam (terminalium) ger-
 entibus induti sunt. Foliorum for-
 ma in hac sectione ^{novum} ~~novum ^{folia} ~~folia
 quam quo ab aliis distinguenda
 optimum praebens variat ovato-
 et orbiculato-rhomboidem variat
 sed ^{folia} ~~folia ^{plurimumque} ~~plurimumque ^{calque} ~~calque
 apice acuta & ^{plurimumque} ~~plurimumque ^{calque} ~~calque ^{in pectus} ~~in pectus~~
 brevem apicem attenuata sicut
 forma extrema rhomboidalis ^{novum} ~~novum ^{folia} ~~folia
^{reparatur} ~~reparatur ^{novum} ~~novum ^{folia} ~~folia ^{paucis} ~~paucis~~
 ora et latiora v. breviora et angustiora
 sunt margine subundulato parum
 nervosa ciliata, pagina inferiore
 pallidione glabra exaristis nervo re-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

misque pilis etiam brevibus siccis
rigidules compressis, superficie
angulata immo aspera. ^{Infans}
et a cunctis proliaria ^{longius brevius} pilis
perant. Pedunculis aliteri-
cissime gemini patentes 3-4 li-
neas longi filiformes serues
apice paulo ~~longius~~ immixti ubi
que pilis brevibus & prope fi-
lulis longioribus saepe glan-
dulosis & sili obseuro-tubelli-
basi bractealis limis linearibus
suffultis. Sepala calycis 4 trian-
gulari-ovata acuminata. lineam
et quod super est longa indurata
modo pedunculorum subtota, sub
anthusi relaxa max decidua.
Petala 4 internum 5 usque ad
6 lineas longa et 3 lata, pur-
pureo-rosea basi concoloria
filamina alio convergentia. ^{filamentum} ~~Fila~~
mentum squilinae longa. Filamenta
complanata pallida. Natural
cylindrica quadrilobulares atro-
purpureae in tubulum flavescen-
tem truncatum poro terminati
quosum excurrentes. Ovarium
sessile suborbiculatum fo. lict
compressum stylo subulato fili-
formi 1^o loco brevius demum
glaberrimis biloculari, loculis
ovulis in ^{quoribus} utraque loculo limis
stigma simplex. Capsula ma-
tura (cheu?) hucusque difformis
glaberrima, huc omnino
glabra, eisdem locis.

+ Tetrathua caricifolia Ford. Mee

Novae Hollandiae fortasse austro-orientalis. ~~hb. N. 827~~

T. thymifolia Smith ~~juniper~~
acutere videtur, cujus forte
~~sanctum moran~~ varietatem efformat.
It *T. ciliata* longe diffat: ger-
minibus fereis, sepalis acumi-
natis, foliis angustioribus et.

Tetrathua thymifolia Smith.

N. Holl. fortasse austro-orient.
hb. N. 827.

sicca saltem) saturrime, fere atro-purpureae plantae habitum quidem impertiuunt alienum, sed haec signa ad differentiam specificam constituendam non sufficere videntur. Ceterae floris partes nullo modo divergunt, nec constructione, nec indumento, nec forma magnitudineque. Tota planta glaberrima est, sed folia interdum juniora, aequae ac in specie primaria, apice sparse et minutissime strigilloso-setosa margineque ciliata sunt.

Obs. Etiam in hac planta, inter cetera normalia, ovarium unicum anomalum, trigonum, triloculare inventi.

γ setosa nob. caule ramisque pubescentibus setosisque, setis patentibus confertis basi bulbosis, foliis hiuc inde denticulatis, denticulis setigeris, subtus glabris supra strigoso-setosis, pedicellis gracilioribus, floribus minoribus et ovario cum styli ima basi levissime ciliato.

In subarenosis sylvae ad fluvium Vasse-River, (Lussen) d. 24. Decemb. 1839. Herb. Preiss. No. 1317.

Non possum separare hanc plantam, cujus unicum tantum specimen exstat, a *Tetratheca viminea* Lindl. Praeter denticulos enim levissimos et raros, dispositio et forma foliorum plane eadem est, et floris partes omnes nullo modo nisi magnitudine ciliisque paucis in ovario et styli basi differunt. *Folia* inferiora supra plerumque glabrata, et *rami* superne densius setosi sunt. Transitus observabis in *foliis supremis* speciei primariae, quorum superficies strigilloso-setosa, in *ramis junioribus*, qui revera pubescunt, et in *parte inferiore caulis*, ubi non raro setis similibus sparsis vestitus est.

8. ***Tetratheca hispidissima* Steetz.** caule tereti ramoso, ramis setoso-hispidissimis, foliis breviter petiolatis alternis oppositis subverticillatisve ovalibus subintegerrimis utrinque setosis margine setis validioribus vestitis, pedicellis axillaribus gracilibus folia longe superantibus glabris vel apice setis raris conspersis, floribus pentameris, petalis ovatis acutis, antheris cum tubulo ipsis paullo longiore gracili scabris, ovario ovato appresse hirsuto, stylo basi pubescente superne glaberrimo recto, staminibus brevior.

In arenosis sylvae ad sinum regis Georgii III. mense Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1316.

Fruticulus $1\frac{1}{2}$ pedalis. *Caulis* teres, inferne simplex et glabratus, versus medium ramosus et cum *ramis* strigoso-hispidus setisque rigidulis, patentibus, rufescentibus, basi bulbosis densissime onustus, praesertim in ramis junioribus. *Folia* breviter petiolata, alterna, opposita vel ternatim approximata, subverticillata, subcoriacea, ovalia, obtusiuscula, cum petiolo utrinque setoso-strigosa, margine subintegerrima vel levissime undulata, subrevoluta, ciliata, et setis validioribus longioribusque, rufescentibus, patentibus, sparsis, interpositis vestita, supra obscure viridia, subtus cum nervo medio prominulo setis onusto, pallidiora; *inferiora* 3-4 lin. longa, 2-2½ lin. lata; *superiora* sensim breviora et angustiora. *Pedicelli* axillares, solitarii, uniflori, in apice ramorum conferti, 6-9 lin. longi, filiformes, apice incrassati et nutantes, patentes, glabei vel versus apicem setis raris, plerumque glanduliferis, conspersi. *Sepala* 5, ovata, acutiuscula, lineam longa, extrorsum glaberrima, introrsum puberula, obscure triuervia, e viridi purpurascencia. *Petala* 5, ovata, acuta, patenti-erecta, purpurea, basi macula atropurpurea notata, 3-3½ lin. longa. *Stamina* 10, atropurpurea, apice albicantia, paulisper graciliora quam illa speciei praecedentis, a quibus ceterum non differunt. *Ovarium* sessile, ovatum, compressum, biloculare, pilis appressis dense hirsutum. *Stylus* staminibus evidenter brevior, filiformis, rectis vel obsolete tortus, non vero tortuosus, basi latiore hirsutus, sensim attenuatus, supra medium glaberrimus. *Stigma* simplex. *Capsulam* non vidi.

Obs. Hujus quoque speciei distinctissimae nunc tantum specimen existat, quod obiter ad spectum varietatem *γ setosam Tetrathecae vimineae* Lindl. refert, paullo tamen diligentius consideratum: *foliis* non revera verticillatis, et *stylo* recto staminibus brevior ab illa recedit. Proxima dein *Tetrathecae setigerae* Endl. Distinguitur vero facillime: *foliis* petiolatis utrinque setoso-strigosis, *petalis* basi macula atropurpurea notatis, *antheris*que bilocularibus scabris.

9. **Tetratheca epilobioides** Steetz. caule tereti ramoso, ramis hirsutiuseulis, foliis subsessilibus margine undulatis supra strigosis subtus molliter hirsutis, inferioribus oppositis vel ternatim verticillatis oblongo-ovatis, superioribus alternis lineari-oblongis, pedicellis axillaribus filiformibus glaberrimis folia longe superantibus, floribus pentameris, petalis ovato-lanceolatis acutis erectis, antheris cum tubulo aequilongo gracillimo apice glabro scabris, ovario subrotundo subemarginato compressiusculo margine apiceque ciliato, stylo tortuoso basi ciliato, apice glaberrimo.

In limoso-calculosis sylvae inter Mahogany-creek et Halfwayhouse, (Darling's-range) d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1325.

Fruticulus 1-3 pedalis, pulcherrimus. *Caulis* erectus infra medium parce ramosus, apice simplex, cum ramis erectiusculis teres, rugulosus, hirsutiusculus, vel interdum inferne glabratus. *Folia* coriacea, subsessilia, basi attenuata, apice obtusiuscula, margine revoluta, undulata et obsolete denticulata, rigide ciliata, penninervia, supra nervo medio impresso, setoso-strigosa, setis marginalibus validioribus, subtus nervis omnibus prominulis et nervo medio pilis longiusculis mollibus obsito, molliter hirsuta; *inferiora* opposita vel plerumque ternatim, raro quaternatim verticillata, oblongo-ovata, 6-10 lin. longa, 3-4 lin. lata; *superiora* ut plurimum alterna, raro opposita, sensim angustiora et breviora, lineari-oblonga. *Pedicelli* axillares, solitarii, uniflori, patentes, filiformes, glaberrimi, rubescentes, apice paullo incrassati, saepissime stipula minima bracteaeformi suffulti, 9-12 lin. longi. *Sepala* 5, ovato-lanceolata, valde acuta, $1\frac{1}{2}$ lin. fere longa, rosea, extrorsum glaberrima, introrsum albo-pubescentia, demum reflexa. *Petala* 5, ovato-lanceolata, acuta, fere semipollicares, purpureo-rosea, basi macula atropurpurea notata, erecta. *Stamina* 10, conniventia; *filamenta* crassiuscula, semilineam longa, concoloria; *antherae* cylindricae, biloculares, basi et introrsum parce ciliolatae, rugulosae, et cum tubulo aequilongo, gracillimo, sensim attenuato, summo tantum apice glaberrimo et flavescente, oblique truncato et poro terminali instructo, verrucis creberrimis scabrae, atropurpureae vel fere nigrae. *Ovarium* sessile, subrotundum, subemarginatum, compressiusculum, glabrum, marginibus et apice levissime ciliatum, biloculare; *ovulum* in loculis solitarium, apice appensum, caruncula uncinata obtusa anetum. *Stylus* filiformis, fere capillaris, basi latiore ciliatus, medio tortuosus, apice glaberrimus. *Stigma* simplex, acutum. *Capsulam* non observavi.

10. **Tetratheca aculeata** Steetz. ramis pubescentibus hinc inde setosis, foliis alternis subverticillatisve subsessilibus oblongo-ellipticis subintegerrimis margine revolutis supra hispidulis subtus molliter hirsutis, pedicellis axillaribus filiformibus folia superantibus apice striatis et aculeolatis, floribus pentameris, antheris cum tubulo aequilongo gracili apice glabro scabris, ovario ovato compresso margine apiceque ciliato, stylo recto basi hirsuto apice glaberrimo staminibus subbrevisiore.

X Lepidium papillosum var. p. 261.

Sub 1/2-1 1/2' gracile. Ramis patulis
& ramulorum rhachis papillis summis
albis clavatis obtusi. Folia #1-2" by 2-4"
lata glabra in margine papillosa-
scabra. Flores minuti. Siliulae 2-3" by
laevi crassiusculis, fissura angusta
sem. glab. Lupa densiuscula - ovata vix 1"
in ^{caulibus} ~~manibus~~ hirs. prope Cryptal
brook & Rocky-river exuberans!
Cultr: minus vire.

In Australasia occidentali leg. cl. Preiss, sed quando? Herb. Preiss. No. 1319.

Specimen unicum exstat; et hoc insuper non nisi summitas caulis, foliis inferioribus plane destitutum est. Proxime ad speciem praecedentem accedere videtur, a qua dignoscitur: *foliis* supra non strigosis, sed tantum hispidulis, *pedicellis* versus apicem incrassatum striatis et aculeolis patentibus obsitis, *petalis* purpureis nec purpureo-roseis, *ovario* ovato, nec subrotundo nec subemarginato, *styloque* recto, staminibus subbreviore. *Rami* pubescentes hinc inde setosi, setis abbreviatis rufescentibus, basi bulbosis, apice interdum glanduliferis. *Sepala* 5, atropurpurea et pruinosa, acuta, apice setula brevi hinc inde conspersa.

Obs. Suspicio, hanc plantam jam a cl. Lindleyo in App. ad Bot. Reg. pag. XXXVIII. descriptam esse sub nomine *Tetrathecae rubrisetae* l. c. n. 185, sive *Tetrathecae hirsutae* l. c. n. 187. Diagnosis enim utriusque in plantam nostram quadrat. Ceterum, quum ex diagnosi adeo imperfecta, sine autopsia exemplarium authenticorum, plantae definiri non possint, equidem, ne confusio augeretur, *Tetrathecae* nostrae novum nomen imponere coactus sum.

Sectio III. TREMANDROPSIS Filamentis filiformibus.

11. ***Tetratheca Preissiana* Steetz.** caule ramisque pubescentibus setosis, foliis sessilibus basi attenuatis ternatim verticillatis deltoideo-ovatis acutis ciliatis medio dentatis, dentibus setigeris, vel integerrimis supra hirsutiuseulis subtus glabris, pedicellis filiformibus folia paullo superantibus, floribus tetrameris et pentameris, staminibus luteis in tubulum brevissimum productis.

In arenosis montis prope Cataractam versus caput fluvii Cygnorum d. 25. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 1323.

Fruticulus. *Radix* multicaulis, *caules* simplices vel ramosos, $\frac{1}{2}$ -1 pedales agens. *Rami* alterni, oppositi vel ternatim verticillati, cum *caule* teretes, pubescenti-hirsuti, asperi et undique, praesertim infra basin foliorum, setis elongatis, patentibus, rufescentibus, basi bulbosis onusti. *Folia* sessilia, subcoriacea, ut plurimum ternatim verticillata, pauca opposita vel alterna, deltoideo-ovata, acuta, ciliata, basi cuneato-attenuata et apice integerrima, medio dentata, dentibus paucis, utrinque 1-6, acutis, inaequalibus, setigeris, vel tota integerrima et subtriangularia, supra obsenre viridia, hirsutiusecula, nervo medio impresso, subtus pallida, glabra, nervo medio prominulo, valido, lateralibus minus conspicuis, 2-6 lin. longa, 1-4 lin. lata; *superiora* sensim minora, ceterum conformia. *Pedicelli* solitarii, ex foliorum axillis plerumque ternatim verticillati, basi stipulis bracteaeformibus minimis suffulti, uniflori, patentes, filiformes, juniores folia vix superantes, puberuli, adulti 6-8 lin. longi, glabrati. *Sepala* 4 vel 5, ovata, acutiuscula, lineam longa, glabra, ciliolata, viridia vel purpurascantia. *Petala* 4 vel 5 ovata, saturrine purpurea, 2-3 lin. longa, erecto-patentia. *Stamina* 8 vel 10; *filamenta* filiformia, semilineam longa, cum *antheris* quadrilobaribus, cylindricis vel obtuse quadrangulis, lateribus sulcatis, in tubulum brevissimum, $\frac{1}{4}$ lin. longum, poro terminali amplo, truncato, vel hinc paullisper emarginato instructum, productis — continua, concoloria, lutea, glaberrima. *Ovarium* sessile, ovatum, compressum, biloculare, hirsutum; *ovulum* solitarium in loculis. *Stylus* rectus, stamina vix ac ne vix quidem excedens basi latiore sensim attenuatus, infra medium hirsutiuseculus, apice glaberrimus. *Stigma* simplex. *Capsulam* frustra quaesivi.

Obs. 1. In specimenibus meis flores plerumque tetrameri occurrunt, sed in omnibus pentameris quoque observavi, vel in uno eodemque verticillo cum floribus tetrameris alternantes. Exemplaria omnia juniora sunt, et flores perpauci tantum evoluti pedicellis brevibus puberulis insident.

Obs. 2. Planta nostra, obiter adspecta, *Tetrathecam ciliatam* Lindl. refert, cujus specimina Mitchelliana et iconem comparavi in Hook. icon. plant. T. 3 tab. 268; sed in hac folia superiora semper alternant, pedicelli breviores et cum sepalis et ovario glanduloso-setosi sunt. Filamenta inprimis crassiuscula et stamina atropurpurea, qualia in speciebus sectionum praecedentium reperiuntur, differentiam satis superque constituunt.

Obs. 3. Prima fronte suspicatus sum, *Tetrathecam piliferam* Lindl. Swan-River pag. XXXVIII. n. 188, (non nisi e diagnosi brevissima mihi notam) eandem esse plantam, ac nostram. Quum vero cl. auctor de staminibus a ceteris Tetrathecae speciebus adeo diversis nil commemoret, non amplius dubitavi, quin planta illa revera differat a nostra.

Occurrit in collectione Preissiana varietas:

β **integrifolia** nob. statura graciliori, foliisque integerrimis vel 1-2 dentatis.

In limoso calculeosis districtus York, d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1324.

Humilior, gracilior, ramosior, minus setosa, verisimiliter in loco steriliore nata. Folia plerumque integerrima, subtriangularia, basi cuneata, vel dentibus 1-2 utrinque instructa sunt; ovarium paullo magis rotundatum evadit quam in specie primaria, a qua praeterea non differt. Flores aequae variant tetrameri et pentameri, tetrameris praevalentibus. Stirps habitum alienum prae se fert, quoniam specimina floribus bene evolutis, pedicellisque semipollicaribus, glabratis, purpurascens abundant, qualia in specie primaria, cujus specimina priori anni tempore collecta sunt, raro inveni.

Obs. Tetratheca Preissiana quoad filamenta filiformia et antherarum tubulum brevissimum, transitum quasi in genus *Tremandrae* R.Br. explicat. Sed propter filamenta cum antheris continua, et propter totum habitum a *Tetrathecae* genere separari non potest.

PLATYTHECA Steetz.

Calyx 5 partitus. *Corollae* petala 5. *Stamina* biserialim disposita, inaequalia; *filamenta* brevissima, plano-compressa, cum antheris continua; *antherae* compressae, quadriloculares, loculis uniserialibus, tubulo apice delibescens. *Ovarium* biloculare, loculis . . . ovulatis. *Stylus* filiformis, simplex. *Stigma* capitellatum. *Capsula* . . . ? *Semina* . . . . Fruticuli graciles ramosi, foliis linearibus integerrimis margine revolutis verticillatis vestiti, (Galii species quasi simulantes,) pedicellis filiformibus axillaribus unifloris. *)

Genus a *Tetratheca*: filamentis planis antherisque compressis, biserialim dispositis, inaequalibus, 4 locularibus, loculis uniserialibus et stigmatibus capitellato bene distinctum. In *Tetratheca* antherae semper cylindricae, aequales, bi-vel quadriloculares, loculis biserialibus, ovarium uniserialim cingunt. Itaque etiam aestivatio utriusque generis plane diversa. In *Tetratheca* petala stamina geminatim segregantia utrinque involvunt. In *Platytheca* vero petala utrinque involuta, ad apicem usque sepalis valvatis tecta, stamina non includunt. — Specimina fructifera non vidi.

1. **Platytheca galioides** Steetz. glaberrima, foliis sessilibus verticillatis suboctonis linearibus carnosulis margine revolutis acutiusculis, axillis penicillatis, pedicellis axillari-

*) Nomen e *γλῆνις*, planus et *ὀφθαλμός*, locus.

Nostra *T. Osvaldiana* haec differt
a *T. ciliata* Ldl., cuius diagnosi
hunc in promptu habeo.

Port Sorell, ad litus boreali occidentali
Tasmaniae, ab. M. 917.

[illegible]

*En olivis arenosis prope Crystal Brook
near Golden Plumen, Indiana, near and
ripes orange-argillaceas*

Spiraea fœ *Nerosura*. Petala alba ~~fœ~~
horizontal. patuit. Radix lignosa ~~lignosa~~

x *Microlepidium pilosulum*, Fend. Mcl.
canaliculis ^{validioribus} pilis brevibus rigidulis adpressis
indivellitis ^{affinis} foliola cordato-ovata bre-

Sub nom. *Cappella* B. p. pubes Sandro nifi.
In parte superiore virgultosa Murray
frut.

Spt. Oct 2. *Erythronium*

(Strabiochloa) Filiposittum ^{nitra, superstitiosa,} *indum.* plerumque
glabra, foliis linearibus. filiformibus, pa-
sciculatis, pedicellis raphisoculis pa-
rvisculis filigulae acquilanzis, valvis
pubescentibus uniseriatis, pyle brevi,
stigmatibus minutis ^{depresso-} ~~rufidellatis~~ vix cecis
graculo.

Progn. Buffal. brook. Florus Septemb.
~~Pteris~~ ^{Pteris} ~~patens~~ ^{patens} concinnis ram. st. tri-
 loba; in ultima ptylus. ~~Deflexa~~, stigma
 raphis est profundius emarginatum,
 pedicelli ~~longissimi~~ ^{longissimi} ~~seminales~~ ^{seminales} ~~minores~~ ^{minores}
 patens pte erecti, reliqua dupla
 launata & folia varie ~~lata~~

longicauda, *exaltata* var. *lissa* *partita*,
purina *minora* *Arabi* della *cut.* *Allaria*
anth. *in* *una* *var.* *off.* *in* *una* *var.*

Nasturtium officinale, R. Br. ^{may. calyc. protuber.}

Simplifolium furtive *Purpureum*.
pygmaea^m foliis ad sessilem lobum loric.
^{debrothundum} nalem rebus, latib nullis lateralibus,
styl paulo longiore
bryal brook! Praxix forma sanguinalium
alta. Folia curd. debil; analogie simplif.

bus solitariis saepe oppositis filiformibus folia superantibus, antheris ovatis scabriusculis ciliatis, in tubulum gracillimum ipsis sesquolongiorem productis, ovario ovato hirsuto, stylo rectiusculo.

In arenosis umbrosis inter frutices densos ad Preston Creek, (Perth) d. 30. July 1839. Herb. Preiss. No. 1330.

„*Suffrutex*, ramis flaccidis“. *Caulis* erectus, teres, inferne propter folia delapsa articulatus, cortice purpurascente, nitente tectus, a basi ramosus, cum ramis glaberrimus, 2-3 pedalis et ultra. *Rami* subsimplices, axillares, alterni vel saepius praesertim superne oppositi, foliosi. *Folia* in verticillos disposita, suboctona, sessilia, linearia, carnosula, margine revoluta, ita ut teretia videantur, utrinque glaberrima, vel supra hinc inde setula minutissima adspersa, nitida, acutiuscula, divergentia vel demum reflexa, 4-8 lin. longa, $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata, in inferiore caulis parte internodiis multo breviora, in superiore et in ramis internodia aequantia, vel paullo etiam superantia. *Verticilli* articulis apice turbinatim incrassatis et penicillatis insidentes. *Pedicelli* axillares, solitarii, plerumque oppositi, uniflori, filiformes, glabri vel versus apicem incrassatum puberuli, patentes, pollicares. *Sepala* 5, ante anthesin valvatum petala tota tegentia, basi brevissime connata, lanceolata, acumiuata, $2\frac{1}{2}$ -3 lin. longa, sub anthesi colorata, margine ciliolata, infra medium ciliis longiusculis, apice glandulosis intermixtis, ceterum glabra. *Petala* 5, obovata, mucronata, sepalis paullo longiora, patentia, purpurea, basi macula atro-purpurea notata. *Stamina* 10, inaequalia, biseriatim disposita, quorum interiora 5 ovarium cingentia longiora, ab exterioribus 5 brevioribus alternatim teguntur; *filamenta* brevissima, plana, cum antheris continua, basi attenuata; *antherae* compressae, quadriloculares, loculis uniseriatis, ovatae, extrorsum purpureo-luridae, scabriusculae, introrsum laeves, pallidae, longitudinaliter trisulcatae, margine ciliatae, apice in tubulum anthera sesquolongiorem, medio tenuis verrucis acutis deorsum spectantibus onustum, et basi ciliis longiusculis barbatum, ex purpureo sensim roseum, supra medium glaberrimum, flavescentem, attenuatum, oblique truncatum et poro terminali instructum — productae; *tubuli* antherarum interiorum exterioribus paullo longiores, graciliores, basi minus verrucosi, sed magis barbati conspiciuntur. *Ovarium* sessile, ovatum, compressiculum, biloculare, hirsutum; *ovula* in loculis conspiciere mihi non contigit, speciminibus ad examinandum non sufficientibus. *Stylus* filiformis, staminibus paullo brevior, rectiusculus, basi medio tenuis ciliis sursum spectantibus hirsutiusculus, superne glaberrimus. *Stigma* simplex, capitellatum. *Capsulae* non suppetunt.

2. **Platytheca Crucianella** Steetz. ramis pubescentibus, foliis sessilibus verticillatis subdenis linearibus carnosulis margine revolutis acutiusculis supra sparse muricato-setosis, axillis penicillatis, pedicellis axillaribus solitariis filiformibus folia superantibus levissime puberulis, antheris ovatis vix scabriusculis ciliatis, in tubulum gracillimum ipsis duplo longiorem productis, ovario ovato velutino, stylo supra basin paullisper torto.

In regionibus interioribus Australasiae meridionali-occidentalis mense Novembr. 1840. Herb. Preiss. No. 1331.

Proxime ad speciem praecedentem accedens, nil forsitan nisi varietatem ejus exhibet. Differt vero praeter characteres indicatos: Habitu peculiari, multo graciliore, caule humiliore, vix pedali, foliis minus divaricatis non reflexis, sed potius arrectis, articulis densius penicillatis, pedicellisque semper solitariis, (in speciminibus 6 a me examinatis nunquam oppositos vidi). In planta sicca praeterea petala angustiora et breviora videntur, et tubulus antherarum imo exteriorum minus verrucosus, totus fere flavet.

3. **Platytheca crassifolia** Steetz. ramis pubescentibus, junioribus glanduloso-pilosis, foliis sessilibus verticillatis suboetoneis linearibus carnosissimis margine revolutis obtusiusculis supra undique muricato-tuberculatis, axillis pectinatis, pedicellis axillaribus solitariis raro oppositis filiformibus folia superantibus setulis brevissimis patentibus obsitis, antheris late ovatis vix scabriusculis margine laevibus in tubulum gracillimum ipsis triplo fere longiorem productis, ovario subrotundo velutino, stylo supra basin torto.

In Australasia occidentali et meridionali - occidentali leg. cl. Preiss, sed quando! Herb. Preiss. No. 1320 et No. 1321.

Affinis quidem speciebus duabus modo commemoratis, sed sine ullo dubio bona species. *Antherae* enim breviores, margine non ciliatae cum tubulo longiore minus barbato, et *folia* muricato-tuberculata, crassissima, fere obtuse triquetra, abbreviata, lineas 6 raro excedentia, obtusiora, plantam prima fronte distinguunt. No. 1320 et 1321 quorum non nisi specimina singula vidi, nullo caractere essentiali inter se differunt.

TREMANDRA R.Br. Endl. gen. n. 5645. Meisn. gen. pag. 22. (20.)

1. **Tremandra oppositifolia** Steud.*) caule crecto ramoso pilis stellatis dense tomentoso, foliis oppositis petiolatis basi subcordatis ovatis subundulato-crenatis obtusiusculis supra asperulis subtus pilis stellatis dense et albo-velutinis, pedicellis axillaribus unifloris oppositis foliis dimidio brevioribus.

In turfosis umbrosis sylvae ad radices montis Elphinstone, (Plantagenet) d. 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1669. Ferd. Bauer!

„Frutex bipedalis“. *Caulis* erectus ramosus, et cum *ramis* axillaribus, oppositis, decussatis, teres, pilisque stellatis, olivaceis dense tomentosus. *Folia* opposita, decussata, petiolata, petiolo tereti stellato-tomentoso 1-2 lin. longo, basi vix cordata, ovata, obtusiuscula, subundulata, integerrima vel margine leviter inaequaliter et obtuse crenata, penninervia, supra nervis impressis viridia, pilis stellatis sparsis basi tuberculatis asperula, subtus nervis prominulis reticulata, albida, mollissime velutina, pilis stellatis densissime obsita; *inferiora* 1-1½ pollicaria, 10-12 lin. lata, *superiora* et *ramorum* sensim breviora et angustiora. *Pedicelli* axillares, uniflori, oppositi, ebracteati, crassiusculi, penduli, pilis stellatis dense tomentosi, 4-7 lin. longi. *Sepala* 5, lanceolata, acuta, membranacea, pilis stellatis extrorsum conspersa, introrsum glabriuscula, 2 lin. longa. *Petala* 5, obovata, breviter unguiculata, sepalis paullo excedentia, erecto-patentia, venosa, purpurea; *lamina* utriusque glabra, in unguem cuneatum, planum, continuum, ciliatum, extrorsum glabrum, introrsum supra imam basin laevem, pilis simplicibus albidis densissime barbatum — attenuata. *Stamina* 10; *filamenta* filiformia, 1-1½ lin. longa, concoloria, cum *antheris* bilocularibus, obtuse quadrangulis, lateribus longitudinaliter sulcatis, sordide purpureis, undique setis brevibus pa-

*) Planta errore quodam cum Büttneriaceis ad cl. Steudelium missa, nomine hoc characteristico ornata in manus meas venit. Diagnosin et descriptionem accuratorem egomet ipse elaboravi.

Elatineae, Camboosodes.

E. gratiolaris, Pers. Muell.

E. gratioloidea All. Cunningham.
(nomen ob falsam constitutionem
mutatum)

Loris inundatis prope Elshabe
inter primum specum & montes
Flindropii

Descriptio melioris recognitionis ergo
augenda: Folia saepe ~~per~~ oblonga
expirationem pellucida $1\frac{1}{2}$ -3^{la} lata
& duplo longiora. Flores ~~suff~~ in-
terdum manifeste petiolata.
Calycis laciniis suboratae 3.
Sepala 3 rotundata rubra. Stam.
rotundum. Styli IV reflexi. Capsula
diametro lineari, ^{valvis} linearibus. Sem.
vitula pulva nitidula tubum lineam longa
Roth: vire.

Euphimium cardaminoides, Jacq. Muell.

Cardamini pubnula n. 262
Fransitum a horti Varerriae ad
Arabidellam fugit.
Stems albi.

Monoptera phlebotetala, Jacq. Muell.

caulis herbaceis simplicibus v. paucis ramis
angulatis, foliis lato linearibus carnescentibus
petalorum lamina angusta oblonga ruga
filiulis pedicello longioribus subrotundis
ultra medium paulo angustatis vix ad
quintam partem usque diffusis breviter ac-
guato alatis, stylo lobulos filiculae aequante
vel superante!

Cappi prope rivum Rocky-creek.

Stuba praenun ^{v. affinis} nita ^{Phthamace} vel digitalis mul-
ticaulis. Melius cum ^{Phthamace} pteribus ^{St. ardeatata}

tentibus hispidis, poro terminali, marginibus oppositis hinc convexis illinc concavis, dehiscentibus — articulata. *Ovarium* sessile ovatum, compressum, pilis stellatis densissime velutinum, biloculare; *ovulum* in loculis solitarium evolvere mihi non contigit, duobus tantum exemplaribus suppetentibus. *Stylus* filiformis, rectus, $1\frac{1}{2}$ lin. fere longus, ima basi pilis paucis stellatis conspersus, ceterum glaberrimus, crassiusculus, summo apice attenuatus, utrinque longitudinaliter sulcatus. *Stigma* simplex. Specimina fructifera non vidi.

Obs. *Tremandrae* generis character minus, ut mihi videtur, collocandus erit in *loculis uniovulatis* ovarii bilocularis, (quales etiam in plurimis *Tetrathecae* speciebus observavi,) sed potius in *antheris bilocularibus, tubulo plane destitutis, et cum filamentis filiformibus articulatis.*

SAPINDACEAE Juss.

(Auctore F. A. GUIL. MIQUEL.)

DIPLOPELTIS. Endl. gen. n. 5625. Meisn. gen. pag. 346.

1. **Diplopeltis Preissii** Miq. foliis serrato-vel plerumque pinnatifido-incisis, (segmentis latis vel linearibus, integris, vel incisis) marginibus nervis utrinque eaque pilosis, pedunculis pedicellis sepalisque marginibus glandulis pedicellatis instructis, floribus roscis.

Crescit in clivulis calcareis inter frutices densos, haud longe ab ora maris, in regione Perth, 18. Jun. 1839 cum fl. Herb. Preiss. No. 1281.

A D. *Hügelii* Endl. *Pl. Hügel.* pag. 13. foliis profundius incisis, floribus roseis (nec candidis), et squamae e disco productae forma abunde differt. „Suffrutex 2-3-petalis, erectus“, ramosus, foliorum variabilitate (sed in iisdem ramis plus minus conformium) insignis. *Rami* virides vel purpurascens, teretes vel superne obtuse tetragoni, inferne glabrati, superne albido-pubescentes. *Folia* alterna, sessilia, erectiuscula, viridia, nervis in quibusdam purpurascens, coriacea, oblonga, apice obtusa vel acutiuscula, in aliis ramis serrato-incisa, incisuris obtusiusculis, mediis quam superiores latiusculae et infimae angustae stipularum ad instar cauli appressae longioribus, in aliis pinnatifido-incisa, segmentis oppositis remotis, linearibus, integris vel inciso-dentatis, majora 3-4 cent. longa, superiora sensim minora, nec tamen minus incisa, si excipias *floralia* plerumque lanceolata minuta, primas inflorescentiae ramos subtendentia. *Omnia* marginibus incrassatis nervisque majoribus utrinque hirtello-pubescentia. *Panicula* terminalis e *racemis* erecto-patulis alternis scorpioideis apice floriferis composita, 16-20 cent. longa, pubescens, glandulis pedicellatis atro-fuscis pube intermixtis. *Bracteae* pedunculos primarios subtendentes, *infimae* aliquando foliiformes incisaе, *reliquae* lanceolatae, superne sensim minores, marginibus glandulis pedicellatis pilisque ciliatae, saepe rubescentes. *Pedunculi* tenues, sparse bracteolati, apice scorpioideo-floriferi. *Flores masc. Pedicellus* 4-6 mm. longus, crebro-glandulosus, basi *bractea*, decidua lanceolata ciliata aliquando basi fere pedicellatum contracta stipatus. *Sepala* ovato-elliptica, obtusa, concava, intus laevia, pallida, extus viridia pilis albis sparse hirtella, marginibus glandulis pedicellatis nigro-ciliata, $1\frac{1}{2}$ mm. circiter longa, anti-

cum et posticum paullo latiora. *Petala* 4, rosea, in sicco juniora saturata, adulta dilute violacea, obovato-rotundata basi in unguem $\frac{1}{3}$ long. contracta, integerrima, c basi flabellatim venulosa, 6 mm. longa. Discus postice in squamam carnosam in sicco subaurantiaco-fuscam, lata basi sessilem rotundatam latam, sepalo retrojacente breviorē bilamellatam productus: lamellae subaequilongae, exterior paullo brevior, margine undulata, interior cristato-incisa. *Stamina* 8, 3 ante sepala exteriora, 1 sepalo sinistro, 1 dextro opposita filamentis dilute violaceis glabris petala superantibus, antheris violaceis sensim pallescentibus, oblongis, bilocularibus, loculis oppositis antice dehiscentibus, postice medio affixis. *Ovarii* rudimentum minimum.

2. **Diplopeltis Lehmannii** Miq. foliis spathulato-lanceolatis versus apicem sparse serratis utrinque incano-tomentoso-pubescentibus, panicula glanduloso-asperula, petalis retusis, capsulae trilobae coccis rugoso-reticulatis pedicellato-glandulosis.

Crescit in lapidosis subumbrosis montium continuorum Darling's-range in reg. Perth, 9. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1282.

„Frutex bipedalis erectus“. Habitu florum magnitudine ac colore praecedenti haud absimilis, sed foliorum forma ac tomento distinctissimus. Rami inferne glabriusculi vel minime puberuli, teretes vel obsolete tetragoni, ramuli nascentes tomentose hirti. *Folia* (superiora stirpis feminae) spathulato-lanceolata acutiuscula, versus apicem sparse irregulariter serrata, basi integerrima attenuata, coriacea, incana, 3-4½ cent. longa, ½-1 cent. lata. *Paniculae* elongatae axes pube minuta appressa glandulisque pedicellatis atro-fuscis patentibus demum inflexis rigidulisque subasperuli. *Bractae* bracteolaeque ellipticae vel elliptico-lanceolatae. *Sepala* ut in praecedente disposita, sed elliptica, obtusa, pube appressa albidā in dorso, glandulisque pedicellatis imprimis in marginibus instructa. *Petala* subrotunda leviter retusa, integerrima in unguem $\frac{1}{5}$ - $\frac{1}{4}$ long. contracta. *Stamina* 8 ut in praecedenti specie disposita, in floribus masc. qui racemorum apices occupant, petala aequantia, filamentis in sicco purpurascens, in femineis castrata, filamentis abbreviatis. *Antherae* oblongae, obtusae, fusciscentes. *Disci* squama bilamellata fusca, lamella externa brevior truncata, interna dentata. *Capsula* immatura triloba, calyce persistente suffulta, coccis angulo centrali cohaerentibus (stylo centrali filiformi diutius persistente demum deciduo), inferne contractis nudis, vertice rotundato reticulato-rugosis, glandulis pedicellatis venulis fuscis impositis. *Pericarpium* cartilagineum. *Semen* in quovis loco unico unicū adscendens, fuscum, cum rudimento ovuli non circumdanti.

THOUINIA Poit. Endl. gen. n. 5618.

Meisn. gen. pag. 52. (37.)

Sodonaea

1. **Thouinia** (?) **adenophora** Miq. foliis alternis imparipinnatis, glandulosis, foliolis oppositis carnosis anguste cuneato-linearibus, inferioribus bifidis, superioribus emarginatis, summis integerrimis, racemis axillaribus vel in ramulis terminalibus, capsulis tricoccis trialatis.

Crescit in confragosis montium continuorum Darling's-range. Herb. Preiss. No. 2442.

Species quoad genus haud omnino certa, cum ne rudimentum quidem floris in unico ramulo capsulifero reperire licuit, et a reliquis *Thouiniis* foliis impari-pinnatis, coccis basi etiam alatis et cotyledonibus oblongis nec linearibus.

bus recedens, an cum *Th. australi* A. Rich. in proprium genus coniungenda? Frutex. Rami teretes; ramuli subangulosi, glandulosi. Folia alterna, sessilia, valde glandulosa et ut videtur viscida, impari-pinnata, rhachi crassa planiuscula, articulata, foliolis 1-3-5-jugis, erectis angustissimis articulatis, 6-2 mm. longis. Capsulae confertissimae, in racemis paucifloris vel in axillis foliorum trifoliorum solitariae, trialatae, breviter pedicellatae, in samaras tres extus totas alas, axi centrali tenui aduatas solubiles, alis glandulosis, fuscis, venosis. Semen solitarium, compresso-lenticulare, testa coriacea, atro-nitida, embryo curvato, cotyledonibus oblongis plicatis.

DODONAEA Linn. Endl. gen. n. 5626.

Meisn. gen. pag. 53. (38.)

1. **Dodonaea pterocaulis** Miq. ramulis triquetris anguste trialatis, foliis subsessilibus elliptico-vel obovato-lanceolatis, basi attenuatis, apice subpungenti-acutis, marginibus revolutis integerrimis, supra glabris, viscidulis?, subtus minute puberulis sensim glabratis, pedicellis axillaribus solitariis-ternis, capsula tetragona (rarissime pentagona!) subverniosa, carpellis dorso infra apicem in alam acutam erectam productis, quadricorni parumper brevioribus.

Crescit in rupestribus montis prope Tjallop reg. Kent. 17. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2440.

„Frutex bipedalis“. *D. ceratocarpae* Endl. in Enum. pl. Hügel. pag. 13, *D. triquetrae* Andr. et *D. Baueri* Endl. l. c. affinis. — Rami vetustiores trigoni subapteri; ramuli densi, breves, erecti. Folia $1\frac{1}{2}$ -2 cent. longa, 5-7 mm. lata. Capsulae absque alis 7 mm. longae. Semina lenticularia, atra, nitida.

2. **Dodonaea aptera** Miq. ramis teretibus, ramulis compressis, foliis breviter petiolatis obovatis, oblongo-vel spatulato-obovatis, basi attenuatis, apice rotundatis vel emarginatis utrinque glabris, nascentibus viscosis, marginibus leviter revolutis, pedicellis e pedunculo communi ternis vel paucioribus capsulam latam brevem tetragonam infra apicem alae rudimento coriaceo e carpellorum dorso producto subapteram multo superantibus.

Crescit in clivulo calcareo Arthur's-head (Perth) et in insulis Garden-island et Rotenest, 9. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 2439.

„Frutex 2-5-pedalis“, conferte ramosissimus. Ramorum vetustiorum cylindraceorum cortice rimoso-fibroso. Ramuli triquetri-compressi acipites. Folia pallide viridia, coriacea, glabra, nascentia vernicosa, $2\frac{1}{2}$ -4 cent. longa, $\frac{2}{3}$ -2 cent. lata. Capsulae subverniceo-punctatae, 7 mm. longae, 10 latae, tetragonae, carpellis apteris, dorso infra apicem in alae rudimentum rigidum acutato-producto. Dissepimenta seminifera tenuiter membranaea. Semina lenticularia, castaneo-fusca, laevissima, nitidissima.

3. **Dodonaea sororia** Miq. ramis teretibus, ramulis semitereti-ancepitibus, foliis coriaceis utrinque glabris, viscosis longiuscule petiolatis, elliptico-obovatis, basi valde contracta in petiolum decurrentibus, apice lato plerumque retusis, subtus subtilissime venulosis, racemis axillaribus pau-

cifloris, pedicellis subfastigiatis elongatis, capsulisque juvenilibus tetragonis glandulosis.

Crescit in collibus arenosis insulae Rotenest 20. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2388.

D. ceratocarpae Endl. et *D. apterae* cognata, sed pedicellis valde elongatis statim dignoscenda.

„Frutex bipedalis“. *Rami vetusti* teretes, *juniores* tetragono-ancipites, compressi, *ramuli* semitereti-compressissimi, ancipites et ut folia viscida. *Folia* inprimis superiora longius petiolata, adulta rigide, juniora membranaceo-coriacea, utrinque viscida, $2\frac{1}{2}$ -5 cent. longa, $1\frac{1}{3}$ - $2\frac{1}{2}$ lata, iis *D. apterae* simillima sed subtus evidentius venulosa. *Pedicelli* 1-2 cent. longi, sursum incrassati. *Capsulae* tetragonae, apiculatae, adhuc valdopere juveniles apterae.

4. ***Dodonaea humifusa* Miq.** ramulis triquetro-compressis, foliis obovato-cuneatis vel obovato-lanceolatis, basi attenuatis, apice spinoso pungenti tridentatis vel integerrimis supra versus margines subtus in nervo medio minutissime puberulo-hirtellis, cito glabratis, capsulis tetragonis apteris pedicello brevioribus.

Crescit in limoso-glareosis districtus Hay, Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2441.

Capsularum forma *D. apterae*, foliorum autem *D. asplenifoliae* Rudge et *D. cuneatae* Smith (Linn. Transact. Tom. XI Tab. 20 et 19) affinis.

„Frutex humifusus“. *Caule* decumbenti, flexuoso, tereti, radicante, cortice rimoso solubili. *Rami* decumbentes, teretiusculi, densi, *ramuli* triquetro-compressi, herbacei, nascentes minutissime puberuli. *Folia* ob ramorum situm decumbentem ad unum latus directa, patula, coriacea, pallide virida, vix vernicosa, supra versus margines minute puberula marginibus ciliolata, subtus inprimis in nervo medio prominente minutissime puberulo-hirtella, forma varia, majora obovata cuneata, apice tridentato-spinoso-pungentia (rarissime quinque-dentata), alia repanda, alia elliptico-lanceolata, integerrima, omnia marginibus revoluta, 1-2 cent. longa, 4-10 mm. lata. *Pedicelli* axillares solitarii vel terni, sursum incrassati, 1-2 cent. longi. *Capsulae* tetragonae, 6-7 mm. longae, carpellorum dorso versus apicem extenuato-acutato (rudimento alae). *Semina* lenticularia, nigra, nitidula.

5. ***Dodonaea Preissiana* Miq.** partibus omnibus junioribus verniceo-viscosis, foliis erectis rigido-coriaceis glabris junioribus grosse glandulosis, spathulato-linearibus, apice triangulari acutiusculis, versus basin sensim in petiolum contractis, marginibus subrepandis, floribus dioicis racemosis, capsulis lato-tripteris, alis maturis membranaceis.

Crescit inter rupium fissuras montis Hardy, reg. York. 11. Sept. 1839, sp. masc. et fem. Herb. Preiss. No. 2437; et in rupestribus montis Currie.

D. viscosa L., *D. spathulatae* Smith, affinis videtur, foliorum autem forma et capsulae alis facili negotio discernenda.

„Frutex 4-5 pedes altus“, ramosissimus. *Rami vetustiores* teretes, sordide nigricantes, cortice rimose soluto, *juniores* cortice fusco nitido obducti. *Ramuli* angulati subtetragoni, glandulis elevatis subtiliter tuberculati et vernice nitente obducti. *Folia* alterna, erecta, coriacea, *juniora* saturate viridia, grosse glandulosa et tota vernicosa, *adultia* et vetustiora lutescentia et vernice sensim diminuto in sicco minus rigida, spathulato-linearia, fere inde ab apice sensim et demum versus basin in petiolum contracta, apice ipso plerumque triangulariter acuto acutiusculo, marginibus integerrimis vel obiter subdenticulatim repandis et subrevolutis, nervo medio percurrente subtus inprimis prominente venulas vix visibiles patulo-ascendentes emittente, 3-5 mm.

In plantulis hirsutis virgultis montis
olivaceis - range vulgaris

D. angustata Fendler

~~In aruensis ad montem Decon
frequent. eruta, glabra
foliis planis linearibus in basin fustis
agrestibus. In hirsutis montis acutatis (cum apiculis, raris
et serratis hirsutis pinnatis)~~

D. serrata Fendler

~~In aruensis ad montem Decon
frequent. eruta, glabra
foliis planis linearibus in basin fustis
agrestibus. In hirsutis montis acutatis (cum apiculis, raris
et serratis hirsutis pinnatis)~~

D. laevigata Fendler

(ab consuetudine symplocarum)
D. triacetae foliis similis et
ita in littoribus ad Stuart. missis
nominata. In ultima faciem
dispositio florum rarisima est.

hb. L. n. 62. In quibus ad fl.
Merrai. Novbr. 1847. et nova?

D. hirsutissima Fendler

D. angustata Smith. h. hirsutissima forte
in plantis aruensis et simili
ante lacum Victorice. Ex eundem

Aprile 1848. Dr. M. - hb. L. n. 60.
D. longipes George Don general. histor.
of dutcham. pl.

D. preciosa Fendler in littoribus
ad Stuartum. Ex opinione, ut el.
miqu. longipes. foliorum haud recte
descriptis. D. longipes propin-

quissima nisi species nova (hunc D.
hb. Stuart. num. 58. (illata Fm. nominanda)

Folius latior foliis variis -
plumbeis. In. rotunditas
montium Ledy - ranges inter rupes

3 - 5 contin? loco millim?

longa, 3-5 mm. versus apicem lata. *Flores* dioici, in racemis axillaribus et terminalibus dispositi, viscidissimi. *Masc.* brevius pedicellati, virginales tetragoni. *Sepalis* ellipticis acutis marginibus floccoso-laceris (an ex viscidine?) *staminibus* 8, sepala haud superantibus, *filamentis* brevissimis, *antheris* oblongis, bilocularibus, leviter introrsum curvatis. *Racemi feminei* pauciflori, *capsulis* longe pedicellatis, subpendulis, basi annulo e sepalis superstitie suffultis, trialatis. *Alae* subsemiorbiculares vel semilunatae, membranaceae, juniores virides, glandulosae, viscidissimae, adultae tenuiter membranaceae, fusciscentes, 1 cent. circiter longae. Dissepimenta e tenui axi producta, tenuiter membranacea. *Semina* nigricantia.

6. **Dodonaea (?) ericoides** Miq. tota hirtello-pubesces, foliis oppositis summis subalternis alternisque (axillisque fasciculato-foliosis) anguste linearibus subacerosis integerrimis vel apice tridentatis, semitereti-revolutis, supra in medio sulcatis, rigidis, pedicellis terminalibus solitariis brevissimis, capsulis tetragonis incano-pubescentibus, angulis in medio dorso cornuto-alatis.

Crescit in regionibus interioribus Australiae anstro-occidentalis, raro!! Herb. Preiss No. 2435.

Species habitu singulari, foliis oppositis, pedicellis terminalibus, calycibus ad immaturam capsulam persistentibus inter congeneres fere heterogenea, ob capsulam tamen plane congruentem hinc relata.

„Fruticulus humilis ramosissimus“. *Rami* vetustiores teretes, cortice fibrose soluto. *Ramuli* tereti-tetragoni, herbacei, hirtello-pubescentes. *Folia* opposita, summa alternantia sed plerumque binatim approximata, omnia in axillis fasciculos foliorum foventia, in sicco rigida, acerosa, laete viridia, angustissime linearia, usque ad nervum medium prominentem revoluta, supra sulcata, integerrima vel versus apicem tridenticulata, utrinque patentim hirtella, 5-8 mm. longa. *Flores* solitarii, terminales, brevissime pedicellati, deflorati; *calyx* quadripartitus, patens, lobis ovato-ellipticis, acuminatis, viridibus postice pubescentibus. *Filamenta* 8, brevissima, teretia, sepalis opposita et alterna. *Ovarium* minutum subtetragonum . . . . . *Capsulae* immaturae calyce persistenti suffultae, incano-pubescentes, tetragonae, carpellorum in dorso medio in alam brevi-lanceolatam coriaceam quasi cornu referentem producta; e media capsula *stylis* rudimentum glabrum exsurgit.

7. **Dodonaea pinifolia** Miq. glabra viscosa, ramulis tetragono-compressis, foliis sparsis accerosis rigidis angustissime linearibus, valde revolutis glandulis elevatis, remote stigmatosis, nitidis, floribus dioicis axillaribus solitariis, masculis brevissime pedicellatis octandris, femineorum pedicellis clavatis capsula tetragona quadriloculari valvulis dorso infra apicem cornuto-alatis quadricorni brevioribus.

Crescit in glareosis montis prope St. Ronan's-well, reg. York et in planitie arenosa Quangen, reg. Victoria, 12. Apr. 1840. Herb. Preiss. No. 2438.

Species distinctissima, *D. ericoide* proxime accedens, sed omnium partium glabritie et singulari foliorum forma facili negotio inter congeneres discernenda.

„Frutex pedalis“. *Rami* vetustiores subteretes cortice filamentose secedente. *Ramuli* glandulosi vernicosi, tetragono-compressi. *Folia* alterna vel in ramulorum apicibus subfasciculata, lutescente-viridia, vernicosa, angustissima, integerrima vel rarissime uno alterove margine undulata, supra glandulis elevatis stigmatosa, valde (usque ad nervum medium) revoluta et hinc supra convexa, 1-2½ cent. longa. *Flores masc.* brevissime pedicellati,

clausi, tetragono-subtetraquetri, *sepalis* vernicosis ellipticis acutis, capsulam mentientes. *Capsulae tetragonae*, 7 mm. longae, *pedicello* clavato 5 mm. longo sustentae, styli demum in partes 4 soluti vestigio rostellatae; *dissepimentis* molliter membranaceis, valvulis navicularibus, vernicosis, dorso ad apicem alae rudimento cornuiformi instructae.

OLACINEAE Mirb.

(Auctore F. A. GUIL. MIQUEL.)

OLAX Linn. (R.Br.) Endl. gen. n. 5492.
Meisn. gen. pag. 45. (33.)

1. **Olex Benthamiana** Miq. foliis sessilibus linearibus apice uncinato-mucronatis, floralibus densis ovalibus vel obovatis apice postice mucronulatis, carinato-complicatis, flores solitarios amplexantibus, corolla quinquefida, filamentis sterilibus bifidis, inferne pilorum seriem juxta corollam demittentibus.

Crescit inter saxa calcarea clivuli haud longe ab ora maritima, distr. Perlh. 19. Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 2095.

Olaci strictae R.Br. ex phrasi nostram adscripsissem, nisi cel. auctor expressis verbis declaraverit, in *Olacibus* Novae Hollandiae a se examinatis filamenta sterilia *indivisa* esse, in nostra autem bifida reperi.

„Frutex bipedalis, erectus, ramis distichis. Flores albi“. *Ramuli* viridescens, glabri, angulosi aliquando fere tetragoni. *Folia* lata, basi articulatim sessilia, linearia, inferne paullo contracta, apice obtusiuscula, subuncinatum mucronata, uninervia, 1-1½ cent. longa, 2-fere 3 mm. lata, superne concaviuscula. *Folia floralia* (fere bracteae dicenda, et inflorescentia fere spicata) densa, fere imbricata, illis multum breviora, ovalia vel obovata, apice postico mucronata, omnino carinato-complicata et florem axillarem solitarium recipientia. *Flos* breviter pedicellatus, 5-6 mm. longus, virginalis cylindraceo-clavatus. *Calyx* patens truncatus a lateribus utrinque elevatus, hinc quasi bilobus. *Corolla* quinquefida, an petalo quinto toto libero?, *petalis* lineari-lanceolatis. *Stamina fertilia* 3, *filamentis* brevibus, *antheris* ovalibus luteis, polline aureo. *Filamenta sterilia* exserta, alba, bifida, laciniis planis linearibus, apice subcapitellato-involutis. *Stigma* trilobulatum.

Clacocarpicae Jof.

* *Trichia pedunculata* DC!

In insula Van Diemens Land!
 hb. St. Tasmannii. n. 90!
 Ad montium latera. 5-6' hb. St.
 T. II n. 408. Jan. 20. 1849.

Lycopodiaceae DC.

* *Carpidonotus lucida* Labillard.

In insula Van Diemens Land!
 hb. St. Tasmannii. n. 58. Ad fluvium
 usque ripas, arbor 40-50' Jan. 10. 49.
 hb. St. II n. 586.

* *Brathys Billardieri* Spach.

Ad montem Lofly Dec. 28. 1849
 alibiue frequenter Ad fl. v. m. h. b. St. II n. 408. 1849

El. Piceis signavit flores, in
 canas, qui ego nunquam aliis
 colores quam vitellinis vidi. Nam
 sa multifloris, caule distans

Ad caule elato vel humilimo;
 a forma ultima planta sequens
 dignoscenda, caule humiliora,
 foliis ovatis, sepalis nulla brevibus
 oribus & rariis longitudinis latitudinis
 oribus. In ultiora floris fere semper
 in ramulorum apice inter folia foli-
 haria in B. Billardieri rariis
 rariis. Varietas pauciflora
Billardieri in *Billardieri* *Billardieri*
Billardieri *Billardieri* *Billardieri*

* *Asplenium pusillum* Choisy!

Asplenium humilimum Labillard.

In fluvium Pakaparcia & pa-
 gum Macarfield. Apr. 26. 1848
 Flamina numeravi 20. Formis insu-
 aribus cum antheris confluit.
 Ad fl. Formis in umbrosis.

* *Asplenium humilimum*
 * *Asplenium humilimum*
 * *Asplenium humilimum*

HYPERICINEAE DC.

Endl. gen. pag. 1031. Hypericaceae Lindl.
Introd. ed 2. pag. 77. Spach. in Ann.
des sc. nat. 2^e Ser. 5. pag. 349 sq.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

Trib. I. HYPERICEAE. DC. l. c.

BRATHYS Spach. consp. Hyperic. in Ann.
des sc. nat. 2^e Ser. 1836. V. pag. 366. (ex parte).

1. **Brathys Billardieri** Spach. caule adseendente quadri-
quetto, foliis ovato-oblongis ovatove lanecolatis obtusis
pellucido-punctatis, pedunculis ex dichotomia et subalternis
folio longioribus caulem paniculatum exhibentibus, calyce
lanceolato acuto, corolla involuta propterea calyce bre-
viore, stigmatibus capitatis. Spach. l. c. pag. 367.

Hypericum involutum DC. Prodr. 1. pag. 549. *Ascyrum*
involutum Labill. Novae Holl. 2. pag. 32. t. 174.

In solo humoso arenoso ad flumen Cygnorum. Herb. Preiss. No. 1961 et in
turiosis uliginosis ad fl. Cygnorum supra oppidulum Perth, Februario a. 1839. Herb.
Preiss. No. 1960.

„Flores incarnati“ (Preiss).

Variat caule vel erecto fere simplici vel a basi ramosissimo. *Color*
glaucescens. ♀. 24.

Obs. *Hypericum pedicellare* Endl. in Enumerat. pl. Hügel. pag. 12 nisi
staminibus paucioribus (8-10, cum nostrae sint circiter 30) vix differt.

BÜTTNERIACEAE Brown.

(Auctore E. T. STEUDEL.)

MACARTHURIA Hügel msc. Endl. gen.
n. 6889.

1. **Macarthuria australis** Hügel msc. ramis elongatis
simplicibus florentibus aphyllis sterilibus remote alternatim
foliatis, foliis subspathulato-linearibus obtusis, cymis fasci-
cularibus sessilibus bi-decemfloris squamoso-bracteatis

juxta totam ramorum longitudinem dispositis. ♀ — Endl. in Enumerat. plant. Hügel. pag. 11.

In arenosis inter frutices circa oppidulum Perth, 17. Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 1671.

2. **Macarthuria foliosa** Preiss. msc. ramis elongatis simplicibus, foliis infimis lanceolatis superioribus squamiformibus, floribus ad basin ramorum vel in ramis brevissimis radicealibus cymosis confertis. ♀.

In arenosis sylvae dittonis Perth, 18. Nov. 1841. Herb. Preiss. No. 1672.

GUICHENOTIA Gay. Endl. gen. n. 5323. Meisn. gen. 33. (26.)

1. **Guichenotia ledifolia** Gay.

In colliculis arenosis insulae Rotenest, Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1670.

THOMASIA Gay. Endl. gen. n. 5324. Meisn. gen. 33. (26.)

1. **Thomasia macrocalyx** Steud. caule ramoso stellato-hispido; foliis petiolatis ovato-oblongis integris, margine subundulatis subreflexis, pilis simplicibus stellatisque utriusque obsitis; stipulis magnis foliaceis oblique ovatis; racemis oppositifoliis longissimis pedicellis basi (praeter bracteolas hypocalycinas reflexas) bracteola ovata caduca instructis; calycibus (lilacinis) demum tumidis magnis utriusque pilosis; staminibus 5, sterilibus petalisque nullis; capsula profunde trisuleata nitida punctieulato-venosa glabra, oculis dispersis, seminibus punctieulatis. ♀.

In arenosis sylvae ad fluvium Preston dittonis Wellington. Herb. Preiss. No. 1657.

Tota planta pilis stellatis vel simplicibus hispida; *petioli* 3-5 lineas longi, saepe revoluti; *folia* magnitudine varia $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ pollicaria, $1\frac{1}{2}$ -4 lineas lata; *stipulae* magnae, sessiles, folia aemulantes, altero latere latiores, basi subcordatae; *pedunculi* elongati folio multoties longiores, basi nudi, apice subsecundo floriferi; *flores* 5-8 in pedicellis 3-4 lineas longis; ad basin pedicellorum bracteola ovata vel ovato-oblonga saepe caduca; *bractae* calycinae 3, patentes, calycem fere aequantes, lineares; *calyx* petaloideus, amplas, violaceus, sub anthesi patens, demum subclausus, tumidus, membranaceus, fulvus.

2. **Thomasia montana** Steud. caule ramosissimo; ramis stellato-hispidis demum glabrescentibus; foliis petiolatis (petiolo saepe reflexo) utriusque sparsim stellato-hispidis ovatis undulatis margine reflexis; stipulis ovatis oblongis cordatis obliquis foliaceis parvulis; racemis oppositifoliis folia multo superantibus 3-5-floris; calycibus utriusque stellato et simpli-

* *Lodonaea lobulata*, f. Muhl.

fruticosa, recta, ramosissima, glabra
ramis lenticulosis, foliis approximatis
lato linearibus obtusis longius in basi
angustatis margine utraque lobu-
lois purpureis brevibus ovatis in-
guiculis vel integerrimis ^{in piceis, hinc vel hinc}
... capsulis lato tripteris ^{in piceis, hinc vel hinc}
hinc vel politioris.

In collibus repensibus virgultosis mon-
tium Fluviis rariis, prope Curia-
ka & Eiders - rari.

Frut. plurimedialis amplius; ramu-
les opposite spinoso-tuberculati acule-
nigrantes. Folia 1" v. paulo ultra longe
apicem versus 1 1/2 2" et lobulis utrinque
1-4 parvis lobulis 1/2-1" longis in ^{trunc} lobu-
lolarum repensibus instructa, trans-
versim igitur superiorum foliis pinnatis
pinnatis ad simplicifolia parvis
divelli & pedunculo brevi vel ^{trunc}
e axi 3-5" longi. Capsulae a viridi fuscis
plus minusve purpureascentes, a cor-
mibus coarctatis ^{in 3" longis & 3" lat.} ovatis, calis ^{in 3" longis & 3" lat.}
2-4 lobulis 1/2-1" longis & aequae latitudinis
longitudine ringentibus eoque
aequilatis longitudine latitudine aequi-
libus.

Auth:

Frut. p. vere
malvacearum

* *Fitzroya*, n.g. ^{Frut. p. vere}
speciminibus alabastriis, nondum definitis
st. australis f. Muhl. ^{Frut. p. vere}

In montibus humilibus arvis prope
Curia ^{glabra} ^{raspulis}
flora 4-5' fere simplicibus cristis. Folia linearia, ^{in 3" longis & 3" lat.}
nova ^{in 3" longis & 3" lat.} 4-5" longa praesens 3 lobis, lobis
acutis saepe 2" longis, superiora folia simplicia. ^{in 3" longis & 3" lat.}
axillares 1-2 flori 1 1/2" longi, rariis parvis ^{in 3" longis & 3" lat.}
speciebus, laciniis subulatis calyce (ovis
in auro) ad nudum spido for pluriconi brevis
bus. Calycis laciniis subulatis. Petala rari
concolora.

Auth: v. s. fine

Larvosa p. iam differt rariis
proliari.

citer pubescentibus; petalis 5 squamaeformibus; staminibus sterilibus nullis; ovario glabro. ♀.

In lapidosis cacuminis montis Bakewel, ditionis York. 5. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1661.

Caulis ramosissimus pilis facile secedentibus hispidus; *petioli* 3-4 lineas longi, erecti vel arcuati vel deflexi; *folia* (adulta) 4-5 lineas lata, ovata, obtusissima; *stipulae* petiolo breviores, sessiles; *racemi* folio 3-4-plo longiores, 3-5-flori; *pedicelli* 3 lineas longi, basi bracteola valde caduca, ovato-oblonga; *bracteae* calycinae lineares.

3. **Thomasia rupestris** Steud. caule ramoso subherbaceo, ramis stellato-hispidis; foliis brevi-petiolatis (quandoque petioliis reflexis) utrinque stellato-hispidis oblongis obtusis margine subundulatis subreflexis; stipulis oblique ovatis petiolos superantibus foliaceis; racemis oppositifoliis folia superantibus apice 3-5 floris; calycibus utrinque stellato-pubescentibus; petalis staminibusque sterilibus nullis; ovario verrucosulo (purpureo, flores parvi, fructus . . .) 24. ♀.

In rupestribus montis Elphinstone, ditionis Plantagenet, 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1648.

Caulis ramique debiles; *petioli* 1-1½ lineas longi, plerumque erecti, rarius deflexi; *folia* parva, vix semipollicaria, ovato-oblonga, obtusa; *stipulae* oblique ovatae, sessiles vel brevissime petiolulatae folii petiolum superantes, quandoque magnitudine auctae et ob folium delapsum vera folia sessilia mentientes; *pedunculi* filiformes, folio duplo longiores, apice racemosi, pauci (3-5) flori; *flores* parvi.

4. **Thomasia cynopotamica** Steud. fruticulosa; ramis herbaceis pilis stellatis mox evanidis hispidis; foliis (exceptis novellis stellato-hispidis) glabratis lineari-vel obovato-oblongis integris vix una alterave undula notatis; stipulis foliaceis 2-3-fidis 3-nerviis; racemis terminalibus 2-4-floris; bracteis hypocalycinis oblongis coloratis; calycis lobis medio demum subinduratis margine membranaceis; petalis staminibusque sterilibus nullis; stylo filiformi basi piloso: capsula glanduloso-pubescente. 24. ♀.

In limoso-arenosis inter frutices planitie ad fluvium Cygnorum, 15. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1667.

Caulis basi fruticosus, *rami* erecti, subsimplices, pedales et ultra; ob glabritiem partium adultorum planta a reliquis hujus generis speciebus quasi aliena, apice vero et in partibus floralibus stellato-pubescentibus convenit; *folia* internodiis folia superantibus remota, vix pollicaria, oblongo-ovata, obtusa; *stipulae* petiolo longiores, foliaceae, inaequales uno latere auricula vel lobulo simplici auctae.

5. **Thomasia lucida** Steud. fruticulosa; ramis foliisque novellis stellato-pubescentibus, foliis mox glabratis pedicellatis oblongis vel obovatis vix undulatis lucidis; bracteis foliaceis ovatis integris vel subbilobis; racemis terminalibus paucifloris; calycibus membranaceis; capsula puncticulato-pubescente. 24. ♀.

In arenosis ditionis York, 15. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1645.

6. **Thomasia rulingioides** Steud. caule ramosissimo stellato-hispido; foliis subsessilibus lineari-oblongis subsinuato-undulatis utrinque stellato-hispidis; stipulis (relatione foliorum) magnis basi subbilobis auriculatis; racemis oppositifoliis 3-5-floris; calycibus dense stellato-hispidis; petalis squamaeformibus; filamentis sterilibus nullis; capsula sub-5-loculari glabra. ♀.

In solo ferrugineo limoso vallis prope Limekilen, ditionis Perth, 19. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 1663.

Ambigit inter Thomasiam, cui adscribenda ob petala non in ligulam producta, et Rulingiam, cui similis ob capsulam divisione duorum loculorum sub-5-locularem.

Caulis fruticulosus, basi glabrescens, sursum uti tota planta stellato-hispidus; *rami* teretes, petioli brevissimi ad summum lineam longi; *folia* parva, 5-8 lineas longa, vix 2 lata, plus minus conspicue sinuato-undulata, obtusa; *stipulae* foliaceae, longitudine folii dimidium aequantes eoque basi cum auricula fere latiores, sessiles, vix cordatae; *racemi* folio 3plo longiores.

7. **Thomasia cognata** Steud. caule ramosissimo stellato-hispido; foliis brevi-petiolatis oblongis subsinuato-undulatis, margine subreflexis utrinque stellato-hispidis; stipulis foliaceis oblique ovatis basi auriculatis; racemis oppositifoliis 3-5-floris folia multo superantibus; calycibus stellato-hispidis; filamentis sterilibus petalisque nullis; capsula dense villosa. ♀.

In arenoso-conchiliosis humidis vallis prope lacum insulae Rotenest, 19. Aug. 1839; et alibi in N. Holl. Herb. Preiss. No. 1660 et 1666.

Adeo similis praecedenti, ut tantum fructificationis partibus dignoscenda.

Caulis fruticulosus, ramosissimus, basi demum glabrescens, sursum uti tota planta stellato-hispidus; *petioli* breves 1-1½ lineas longi, patentes vel raro reflexi; *folia* 4-6 lineas longa, 1-2 lata, oblonga, obtusa, margine subundulata, subreflexa; *stipulae* foliaceae, sessiles, vix basi cordatae sed lato-auriculatae; *racemi* folio 3-4-plo longiores, apice floriferi. Variat foliis minoribus, calycibus minus hispidis. Herb. Preiss. No. 1666.

8. **Thomasia angustifolia** Steud. fruticulosa ramis stellato-pubescentibus; foliis breviter petiolatis sublineari-lanceolatis subrepando-crispulis; stipulis sessilibus oblongis quandoque auriculatis; racemis oppositifoliis folio multo longioribus 3-5-floris; pedicellis (praeter bracteam hypocalycinam) basi bractcola lineari instructis; filamentis sterilibus petalisque nullis; ovario piloso, stylo glabro. ♀.

In N. Holl. austr. occ. Herb. Preiss. No. 1634.

9. **Thomasia subhastata** Steud. caule diffuso ramoso demum glabrescente; ramis tenuibus piloso stellato asperis; foliis lanceolatis basi subcordato-hastatis utrinque stellato-hispidis; stipulis oblique cordato-oblongis foliaceis petiolo subaequantibus; pedunculis hispidis apice subtrifloris foliorum longitudine; staminibus 5; petalis nullis; stylo basi incrassato germineque tomentoso. (An *T. pauciflora* Lindl. Swan-Riv. Bot. n. 81.?)

In Nov. Holl. aust. occ. Herb. Preiss. No. 1633, 1640 et 1647.

Ramuli breves, tennes; *petioli* 2-3 lineas longi; *folia* lanceolata, remota, solitaria, 6-8 raro 10 lineas longa, apice obtusiuscula, basi plus minus profunde cordata; *stipulae* obliquae petiolo breviores vel cum aequantes; *pedunculi* folii longitudine, apice subtriflori; *calyces* pallide violacei in nervo medio fulvo praesertim stellato-hispidi. Lindl. var. *angustifolia*? Anne *Thomasiae angustifoliae*?

10. **Thomasia pumila** Steud. fruticulosa pumila (vix 4-6 uncialis) superne pubescens (pilis stellatis raris, pluribus simplicibus); foliis confertis suboppositis vel ternis linearibus reflexis supra puncticulato-scabridis subtus tomentosulis; stipulis foliiformibus; racemis paucifloris; filamentis sterilibus petalisque nullis; stylo basi ovarioque piloso. 4. 3.

In N. Holl. austr. occ. Herb. Preiss. No. 1643.

11. **Thomasia aemula** Steud. foliis cordatis oblongis margine reflexis supra glabris glauco-viridibus subtus stellato-tomentosis; stipulis ovatis (saepe mox caducis); racemo oppositifolio folia suprema superante (ut terminalis videatur) apice (3-) florifero; calyceibus basi dense tomentosis laciniis pilosis intus glabris, ovatis acuminatis; staminibus elongatis apice (albo-rostrato-) elongatis basi subhastatis; stylo glabro basi in ovarium pilosum abeunte; floribus magnis (rubellis $\frac{1}{2}$ pollicem in diametro.) 4. 3.

In N. Holl. austr. occ. Herb. Preiss. No. 1641.

12. **Thomasia lasiopetaloides** Steud. caule subherbaceo simplici vix stellato-piloso; foliis cordatis oblongis infra medium vix in lobum obscure contractis, supra scabriusculis, subtus pilis intricatis (vix stellatis) tomentosulis; stipulis (an in omnibus?) plane nullis; racemo oppositifolio folia longissime superante (ut terminalis videatur) apice paucifloro (3-) floribus; staminibus apice (albo-rostrato-) elongatis basi subhastatis; calyce basi hirsuto laciniis pubescentibus ovatis obtusis breviter acutis. 4. 3.

In N. Holl. austr. occ. Herb. Preiss. No. 1636.

13. **Thomasia discolor** Steud. ramis petiolisque dense pubescentibus; foliis grosse sinuato-dentatis vel obtuse 5-7-9-lobis supra ad nervos pubescentibus eaeterum puncticulato-scabriusculis subglabris; subtus albo-tomentosis pilisque stellatis ferrugineis plus minus dense conspersis; stipulis foliaceis pedicellatis ovatis vel subrotundis cordatis obtusissimis; sepalis (magnis rubro-lilacinis) extus ferrugineo-stellatis, intus nervo medio valido rubro striato notatis; staminibus sterilibus petalisque nullis; ovario dense villosa; stylo glabro. 3.

In rupestribus sub umbrosis chasmatis clivuli William's-point, ditionis Plantagenet, 30. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1658.

Pulcherrimus fruticulus; *petioli* (in genere) elongati, in junioribus $\frac{1}{2}$ -in adultis 1-pollicares, validi; *folia* $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ pollices longa, basi pollicem et ultra lata, grosse sinuato-dentata vel lobata, inter lobos subintegra, apice

obtusiuscula; supra ad nervos pilis sine ordine (vix stellato-) intricatis pubescentia, caeterum ruguloso-vel puncticulato-scabra; subtus dense tomentosa, inter tomentum album pilis stellatis ferrugineis conspersa; stipulae breviter pedicellatae subcordatae late ovatae quandoque subrotundae, petiolo multo breviores; *pedunculi* petiolo vix longiores, paniculato-racemosi.

14. **Thomasia viridis** Steud. ramosissima; ramis adultis glabris novellis stellato-pubescentibus; foliis petiolatis ovatis lobato-angulatis viridibus utrinque pilis stellatis sparsim obsitis caeterum glabris subtus pallidioribus reticulato-venosis; stipulis herbaceis minutis lanecolato-ovatis; racemis oppositifoliis subpaniculatis; bracteis hypocalycinis linearibus; calycibus stellato-pilosis; staminibus sterilibus petalisque nullis; ovarii pilosis. 5

In limoso-arenosis subumbrosis ad fluvium Cygnorum 29. Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 1630, 1649 et 1653.

Frutex ramosissimus, *ramis* adultis validis lignosis, junioribus tenuioribus; *petioli* (in genere) longi, folium longitudine saepe aequantes; *folia* forma et magnitudine varia, $\frac{1}{2}$ -1 pollicem longa, plerumque inaequaliter sinuata vel 7-5 vel 3-loba, ambitu ovata, lobis saepe vix distinctis; *stipulae* minutae, vix lineares, saepe caducae; *pedunculi* petiolo superantes, paniculato-racemosi; *flores* parvi.

Quoad descriptionem *Thomasiae foliosae* Gay nimis affinis, sed folia vix sunt cordata nec stellato-pubescentia, pilis vero stellatis sparsim obsita, caeterum glabra. Variat: ramis hirsutioribus, stipulis vix ullis, foliis fusco-viridibus.

15. **Thomasia stipulacea** Lindl. glabra, sed pilis ferrugineis stellatis hispidis; foliis eordatis subhastatis angulatis obtusis sinuatis, margine recurvis; stipulis magnis foliaceis petiolatis eordatis subtrilobis, latioribus quam longis; racemis secundis foliis longioribus; calyce basi hispido; staminibus 5 sterilibus subulatis; petalis nullis. Lindl. Swan-Riv. Bot. n. 79. 5.

In Nov. Holl. occ. Herb. Preiss. No. 1635.

16. **Thomasia glabrata** Steud. caule ramoso glabro; ramis novellis stellato-hispidis; foliis obtuse sinuato 5-7-lobis utrinque glaucescentibus praeter pilos sparsos stellatos glabris; stipulis obovatis obtusis vel subtrilobis foliiformibus; sepalis glabris basi tantum hispidulis; filamentis sterilibus petalisque nullis; capsula dense hispidula. 5.

In arenosis ad fluvium Cygnorum 21. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1639.

17. **Thomasia hypoleuca** Steud. caule ramosissimo, ramis stellato-asperis demum glabrescentibus; foliis sinuato 3°-5-lobis utrinque pilis stellatis sparsim conspersis supra caeterum glabris glaucescentibus, subtus dense albo-tomentosis; stipulis polymorphis ovatis, subrotundis, cordatis integris vel sublobatis subsessilibus; floribus in racemis brevibus paucifloris praesertim versus apices ramorum; staminibus sterilibus petalisque nullis; ovario villosa. 5.

In calcareis ad tergum montis Baldhead, ditionis Plantagenet, 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1646.

is
home.
prop
netio
h.

adul
s ov;
spe
ula
rad
nis
is, p

iter.
ipm
dams
il i
Obs

fer-
ulat
iace
rac

stan
-R
; n
7-l
lat
ors
ste
39.
; B
nu
up
-B
ord
ene
sl
16
y

nervus angustata primum apice alba & hinc in oculos
 culo poro aperta supra basin affixa. Stylus filiformis
 mis glaberrime punctiformi. Capsula bifi-
 mialis magnitudine tridactylis subobovata ex his laxe
 torcentibus plus minusve glaberrimis utris alba. pili
 valis pilis medio septiferis, carulis dextris peris, ses-
 ovali-oblonga lineam nec reula vix angulata
 referentia insignientia pili brevissimi albi
 sparsa piliola, trochista pili ~~trichotoma~~ ^{trichotoma}
 pili angulam brevem praeterea vix latissimata
 Auth: vix, cesp. Lasiopetala raphanifolia & pili
 id nigrescentia & bractealis radiatibus vix latissimata

Lasiopetalum Guzmanii Steud.
 Rhynchospermum ~~feracissimum~~
 Lasiopetalum Stuartianum

L. parviflora proximum
 forte a R. Steud. jam diff.

Ad ripas prope Swan-port
 praefratum, Ad litor. austr-
 orientalia Tasmaniae. hb.
 V. J. 597. Nov. 49. A L. Guzm.
 differe videtur foliis anguste oblongis

R. & L. f. 597. v. 4. p. XXVIII

L. Guzmanii
 * L. griseo-feracum! Guzm.

1. L. Lindenbergii Steud. & Dougl.
 ad fluminis Murrumbidgee ripam
 aringas hinc inde. hb. V. 84.

caule ramoso tomentoso, foliis lani-
 tinariis petiolatis basi et apice
 obtusis supra puberulis glaberrimis
 etibus puberulis tomentosis naris
 vix & vixatis, & vixis oppositi-
 foliis, & vixatis ex his vixis
 in suis terminis tomentosis

Fructus paucipedicellis inter fruticosa
 murrumbidgee ripam vixis monum
 Barkeri Oct. 1848. Steud. & L.
 L. ferruginea Steud. & L. color. tomentis
 inconvulsant albidus griseus
 aut ferrugineus.

Fructus paucipedicellis inter fruticosa
 murrumbidgee ripam vixis monum
 Barkeri Oct. 1848. Steud. & L.
 Silva sine fructu prope Giant's-
 Spring vire. Floris paullo odorati
 ignata minus alba basi in media
 Anthraci rubellata

Caulis valde lignosus *ramique* fusco-purpurascens, glabrati, juniores vix stellato-hispidi; *petioli* 1-2-lineares; *folia* magnitudine varia, 4-8 lineas longa, 3-loba vel ob lobum medium iterum lobatum 5-loba, supra praeter pilos stellatos sparsos glaberrima, glaucescentia, infra albo-tomentosa, praesertim ad nervos pilis stellatis fulvescentibus sparsis obsita. Vix videtur *T. quercifolia* Gay, cui valde affinis, an var.?

18. **Thomasia macrocarpa** Hügel. foliis ovatis cordatis angulato-dentatis supra hirtis subtus hirsuto-tomentosis; petalis nullis; staminibus decem, alternis sterilibus; ovarii loculis biovulatis. Endl. Nov. stirp. Decades n. 40. 5.

In saxosa ad jugum montis Darling's-range prope cataractam ad caput fluvii Cygnorum, 9. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1654.

19. **Thomasia glutinosa** Lindl. foliis cordatis hastato-trilobis, supra pilosis subtus stellato-tomentosis; stipulis nullis; racemis subterminalibus erectis multifloris, pilorum fasciculis sparse stellatis glutinosis; antheris quinque rostratis; petalis nullis; stylo tenui filiformi glabro basi piloso Lindl. Swan-Riv. Bot. n. 82. 5.

In limoso-calculosis inter frutices densos ad radices montium Darling's-range, 2. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 1668.

LASIOPETALUM Smith. Endl. gen. n. 5325 Meisn. gen. 32. (26.)

1. **Lasiopetalum indutum** Steud. caule ramuloso ramisque tomento piloso-intricato demum secedente indutis; foliis linearibus (1-2 pollicaribus) sublanccolatis obtusiusculis supra glabratiss (novellis pilosis), subtus intricato-piloso-tomentosis, margine subreflexis; cymis oppositifoliis calycibusque pilis ramosis (vix stellatis) intricatis tomentosis, intus basi glabris striatis; capsula pilis stellatis asperula. 5.

In confragosis fruticosis collium, ditionis Kent, 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1655.

Rami sub tomento rufescentes; *petioli* 2-3 lineas longi, erecti, patentes vel reflexi; *folia* linearia, 1-2 pollices longa, subcoriacea, 2 lineas lata, apice basique obtusiuscula, margine plus minus perspicue reflexa, supra glabrata, sub lente tenuissime reticulata et punctulis minutissimis scabrinuscula, subtus pilis albidis intricatis tomentosa; *pedunculi* axillares vel oppositifolii, folia aequantes, apice racemoso-paniculati, pauciflori; *calyces* densissime piloso-tomentosi.

2. **Lasiopetalum cordifolium** Endl. foliis cordatis, petalis nullis, stylo barbato. Endl. in Hügel. Enumerat. n. 53. 5.

In rupestribus ad tergum montis Melville, ditionis Plantagenet, 5. Oct. 1810. Herb. Preiss. No. 1659.

CORETHROSTYLIS Endl. Endl. gen. n. 5326.

1. **Corethrostylis membranacea** Steud. foliis cordatis membranaceis subdiaphanis ciliatis utrinque pilis stellatis conspersis, apice obtusis. ♀.

In arenosis collinosis sylvae ad portum Lechenault, ditionis Wellington, 13. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1656.

2. **Corethrostylis coriacea** Steud. foliis cordatis subcoriaceis opacis utrinque pilis stellatis in adultioribus supra evanidis conspersis, apice acutiusculis. ♀.

C. bracteata Endl. (Nov. stirp. decad. n. 1.), in utraque specie sibi simillima bractee ejusdem formae.

In N. Holl. austr. occ. Herb. Preiss. No. 1637.

KERAUDRENIA Gay. Endl. gen. n. 5327. Meisn. gen. pag. 33. (26.)

1. **Keraudrenia (?) integrifolia** Steud. foliis ovatis integerrimis, supra glabriusculis, subtus albo-tomentosis, pilis stellatis minutis; stipulis nullis nisi quandoque foliolo minore axillari; stylis apice liberis filamentis connatis ovarium tegentibus. ♀.

In humoso arenosis sylvae ad fluvium Cygnorum, 14. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 1651.

Fruticulus ramosus; *rami* adulti lignosi denudati, juniores stellato-pubescentes; *petioli* breves lineares, raro erecto-patentes plerumque deflexi; *folia* parva, 2-4 ad summum 6 lineas longa, 2 lata, ovata, obtusa, integerrima, subundulata, supra ad marginem subinflexum pilis adpressis substellatis pubescentia, caeterum glabra, subtus pilis intricatis cinereo-albo-tomentosa; *flores* subcorymbosi; *pedicelli* ad basin bracteola lineari caduca muniti; *calyces* ebracteati, ante florentiam densissime pilosi, petaloidei, coerulei, venosi; *corolla* nulla; *stamina* 5 libera; *filamenta* basi dilatata; *stylus* unicus, filiformis, vix 3 in unum coaliti; hinc et ob fructus defectum genus dubium, forsitan novum.

FLEISCHERIA Steud.

Inflorescentia axillaris: floribus solitariis. *Bractee* hypocalycinae nullae. *Calyx* 5-partitus, laciniis persistentibus tenuissime venosis. *Corolla* 5-petala, petala ovata basi unguiculata. *Stamina* 5 libera sterilia nulla. *Styli* 5, filiformes, apice capitati. *Capsula* depressa 5-locularis: valvis apice in conum conniventibus, dorso ruguloso-tuberculosa, loculis monospermis. *Semina* basi strophiliolo subintegro cincta.

Lapropetalum Behrii Gerdner

foliis coriaceis angusta-
oblongis obtusis, ~~marginibus~~
~~venisque recurvis~~ ^{demum} supra glaberrimis
subtus ~~omnino~~ ^{glandulosis} serrulatis
causculis velutinis
~~mutatis~~, cyma pauciflora
folia appropita subaequilonga
bracteata ~~brevi~~ ^{capitata} lineari, bractea-
la (hypophyllyna) tripartita
calyce duplo ~~longiore~~ ^{breviore} lacini-
is unilobatis ~~longioribus~~ ^{subaequalibus}
calycis lobis ~~gracilibus~~ ^{stellatis}
laciniis ~~bratis~~ ^{auriculatis} apice angustatis
acutis, intus glaberrimis
~~fusca~~ ^{antheris utrinque}
~~longioribus~~ ^{delatis} ~~mutatis~~ ^{mutatis}, fi-
~~nis~~ ^{mutatis} ~~mutatis~~ ^{mutatis}
~~mutatis~~ ^{mutatis} ~~mutatis~~ ^{mutatis}
~~mutatis~~ ^{mutatis} ~~mutatis~~ ^{mutatis}
~~mutatis~~ ^{mutatis} ~~mutatis~~ ^{mutatis}
~~mutatis~~ ^{mutatis} ~~mutatis~~ ^{mutatis}

Coniophytis Behriana
Gerdner in litt. in litt. In silvaticis
Pinus forest trans. Salt-
creek, Nov. 48 ^{Nov. 48} ~~Nov. 48~~ ^{Nov. 48} inventum.
Thamopha elliptica hb Behr.
Sperminna frutilla legit in
Eucalyptorum praticensis
"Murray-forest" vides officina
specimen St. Wirth,

1. *Fleischeria pubens* Steud. ♀.

In umbrosis saxosis ad montem Mathilde, ditionis York, 11. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1662.

Fruticulus 2-3-pedalis; *rami* erecti, subvirgati, uti tota planta pube stellata incani; *petioli* 3-4 lineas longi, erecto-patentes vel deflexi; *folia* pollicem longa, 3 lineas lata, obtusa, oblongo-linearia, omnino integra vel subundulato-crenulata, pube stellata densa supra cinerea subtus pallide flavescens tecta; *flores* in ramulis axillares in pedunculis 4-5 lineas longis, flore majoribus; *calycis* lacinae ovatae, extus dense stellato-pubescentes, intus glabriusculae, venosae; *petala* ovata, glabra, calyce 3-4-plo breviora.

RULINGIA R.Br. Endl. gen. n. 5328.

Meisn. gen. pag. 32. (26.)

1. *Rulingia corylifolia* Grah. foliis ovato-deltoides, subcordatis basi lobatis, supra hispidis subtus hirsuto-tomentosis; stipulis ovato-acuminatis; corymbis oppositifoliis; filamentis antheriferis simplicibus, sterilibus ovato-lanceolatis alternantibus. Grah. in Bot. Mag. tab. 3182. ♀.

In rupestribus summitatis clivuli ad Princess Royal Harbour, 30. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1650.

COMMERSONIA Forst. Endl. gen. n. 5329.

Meisn. gen. pag. 23. (32.)

1. *Commersonia Preissii* Steud. caule fruticuloso; foliis ovatis breviter petiolatis dentatis subsinuatis supra hirsutis subtus pilis simplicibus internixtis stellatis tomentosis; cymis axillaribus terminalibusque; stylis 5 distinctis filiformibus; filamentis sterilibus petala aequantibus. ♀.

In turfoso-arenosis umbrosis ad marginem paludis inter montes Elphinstone et Melville, ditionis Plantagenet, 21. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1652.

Caulis frutescens; *rami* subsimplices, rufescentes pilis stellatis obsiti; *petioli* validi erecti, 2-3 lineas longi, dense stellato-pubescentes; *folia* magnitudine varia, 1-1½ pollicaria, grosse dentata, dentibus obtusis hinc inde sinuata, supra obscure viridia, pilis simplicibus vel substellatis hirsuta, subtus pallida pilis densioribus tecta; *ramuli* axillares, folii circiter longitudine, apice foliati et in axillis vel apice cymas gerentes; *calyce* dense stellato-hirsuti.

2. *Commersonia cygnorum* Steud. foliis inciso-dentatis ovatis supra sparsim hirsutis subtus piloso-tomentosis; capsulis ovato-rotundis rigide setoso-echinatis, setis pubescentibus. ♀? 2?

Ad caput fluvii Cygnorum. Herb. Preiss. No. 1642.

3. **Commersonia cinerea** Steud. fruticosa, ramis glabratiss; foliis ovatis serrulatis supra viridi-subtus cinereo-tomentosulis; capsulis rigide setoso - echinatis, setis apice stellato-pilosis. 3.

In plantis promontorii Cape Riche, 20. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1661.

Frutex humilis, ramosus; *rami* fusco-rufescentes, rariter foliati; *ramuli* abbreviati, stellato-pilosi, foliati; *petioli* vix lineares, erecti vel reflexi; *folia* variae magnitudinis, 2-10 lineas longa, ovata vel oblongo-ovata, supra pallide viridia, subtus cinereo albida velutino-tomentosa; *capsulae* majores — crasum parvam aequantes — densissime setis validis rigidis tectae, apice fasciculo pilorum stellatorum terminatis.

MALVACEAE Juss.

(Auctore Fr. A. Guil. MIQUEL.)

MALVA Linn. (ex emend. Endl.) Endl. gen.
n. 5271.

Sectio. MALVASTRUM DC. §. 3. Prodr. I. pag. 431.

1. **Malva Preissiana** Miq. tota pilis stellatis incano-tomentosa praeter foliorum paginam superiorem stellato-puberulam, his longe petiolatis subsemiorbicularibus obsolete trilobis vel integris irregulariter crenatis, floribus axillaribus glomeratis vel supra ramulos subspicatis, calyce exteriore diphylo, petalis basi intus hirsutis.

Crescit in insula Penguin-Island, 14. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 1893.

„Frutex 6-8-pedalis“. *Ramuli* teretes, subflexuosi, *petioli* subsemiteretes, 3-7 cent. longi, *folia* subtus, *pedunculi* calycesque pilis stellatis incano-tomentosa. *Folia* subcoriacea, marginibus irregulariter crenatis rigida, sparse stellato-puberula, semiorbicularia, basi subcordata vel truncata, integra vel angulato-subtrilobulata, quinquenervia nervis subtus prominentibus, $3\frac{1}{2}$ -6 cent. lata, parumper breviora. *Stipulae* lanceolatae membranaceae. „Flores albi“ axillares, fasciculati vel supra ramos axillares foliis breviores subspicati conferti (foliis scil. diminutis vel abortivis) ipsaque ramum terminantes, *pedunculis* sursum parumper incrassatis 3-8 mm. longis. *Calycis exterioris* phylla 2 obovato-rotundata calycis basi adnata ipsaque inferne cohaerentia, 4-5 mm. longa. *Calyx interior* campanulatus 7-8 mm. longus, phyllis lato-ellipticis, acutis. *Corollae* $1\frac{1}{2}$ cent. circiter longae, semixpansae, petala obovata apice emarginata, basi valde contracta, intus hirta. *Tubus staminis* glaber $\frac{1}{2}$ brevior. *Fructus* depresso-placentiformis, calyce clauso inflato inclusus, *carpellis* 10, dorso multinerviis, marginibus undulato-rugulosis, apice subbicornibus, *semine* reniformi nigricante.

HIBISCUS Linn. Endl. gen. n. 5277.

- Fragaria hakeaeifolia* Hook
1. **Hibiscus (Bombicella) hakeaeifolius** Giordano. caule fruticoso; foliis anguste linearibus teretibus integris trifidisque, pedunculis clavatis angulatis, involucrio gamophyllo sexdentato, calyce quinquepartito, corolla patente, stigmate clavato indiviso, capsula 5-loculari 5-valvi polysperma, seminibus lanatis. *Giordano, Memoria sopra di una nuova specie d'Ibisco. Napoli 1833.*

Crescit in solo humoso ad caput fluvii Cygnorum, 14. Jan. 1840. Herb. Preiss. No. 1342.

„Frutex 4-pedalis“.

Forma dentibus calycis externi aliquando 5, matura deflorata.

Crescit in glareosis sterilibus sylvae prope planitiem Quangen, distr. Victoria. 20. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 1838.

„Frutex 8-10-pedalis. Flores violaceo-coerulei“, mihi incogniti et ulterius cum iis praecedentis comparandi.

2. **Hibiscus (Bombicella) coronopifolius** Miq. caule fruticoso, foliis (planis) linearibus integerrimis vel plerumque sursum dilatatis tridentatis et quinquefido-dentatis, involutis glabris, pedunculis axillaribus solitariis folio brevioribus clavatis angulato-sulcatis, calycis exterioris dentibus 6-7, interiore quinquepartito, capsula elliptica puberula quinqueloculari quinquevalvi.

Crescit in solo sublimoso ad fluvium Avon haud longe a praedio rustico D. Burges, distr. York, 13. Mart. 1840, capsulis maturis Herb. Preiss. No. 1337.

Hib. hakeaeifolio habitu et capsulis simillimus, sed foliis planis nec teretibus, plerisque grosse dentatis, (in sicco) involutis distinctissimis. „Frutex $2\frac{1}{2}$ pedalis“. Rami ramulique teretes, hi virides cicatricibus foliorum fuscis maculati, illi fuscescentes. Folia dilute viridia, glabra, subcoriacea, majora inferne angustissime linearia, sursum dilatata et varie dentato-incisa, minora omnino linearia et involuto-teretia, $2\frac{1}{2}$ - $5\frac{1}{2}$ cent. longa, illa 4-8 mm. versus apicem lata. Pedunculus prope basin articulatus, 3 cent. circiter longus. Calyx exterior in nostris 6-7-irregulariter brevi-dentatus. Capsula matura (delapsis seminibus) fuscula, minute stellato-puberula, subelliptica $1\frac{1}{2}$ cent. longa. Flores haud visi.

- Fragaria*
3. **Hibiscus (Azanza?) Hügelii** Endl. caule fruticoso, ramis floccoso-puberulis, foliis glabriusculis ovatis tri-quinquelobis, lobis cuneatis inciso-pinnatifidis, pedunculis axillaribus unifloris teretibus, calyce exteriori seminato 12-dentato, interiore quinquefido, corolla semicxpansa extus pubescente, stigmate clavato indiviso, capsula lanata 5-loculari polysperma. — Endl. Enum. plant. Hügel. pag. 10.

Crescit in arenosis inter frutices densos ad fluvium Cygnorum haud longe ab ariculo Freemantle, 5. Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 1341.

„Frutex 6-10-pedalis. Flores incarnati“. — Differt parumper a phrasi Endlicheriana: ramis haud tomentosis sed floccoso-puberulis cito glabratibus,

calyce exteriorē 12-dentato. *Petala* lutea purpureo-unguiculata ab *Endlichero* dicta, in sicco ita vides, sed viva ex *Preissio* incarnata sunt.

4. **Hibiscus (Bombicella?) Meisneri**, *Miq.* caule fruticoso, ramis petiolis pedunculis calycibusque hirtomentosis, foliis petalisque extus hirtello-pubescentibus, illis tri-vel subquinquepartitis, lobis oblongis sinuato-pinnatifidis dentatis, floribus axillaribus solitariis longe pedunculatis, calycis externi phyllis 10 angustissime linearibus, interno quinquefido, tubo stamineo corolla ampla quater brevior, capsula quinqueloculari quinquevalvi, loculis polyspermis.

Crescit in solo coenoso exsiccato ad marginem lacus Mathilde, distr. Hay. 8. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1336.

„Frutex 8-peialis, gracilis, floribus lilacinis“. *Foliorum* forma praecedenti similis, sed calycis exterioris indole longe recedens. *Ramuli* angulosi, subtetragoni, pilis stellatis subhutescentibus hirti. *Folia* (superiora) petiolis hirtis 3-4 cent. longis sustentata, submembranacea, utrinque pilis paucis stellatis et subsimplicibus hirtella, circumscriptione cordato-ovata, 4-6 cent. longa, tri-vel quinquepartita (lobis infimis tunc reliquis multo minoribus) segmentis pinnatifido-incisis, oblongis, versus basin contractis, irregulariter crenato-dentatis. *Stipulae* angustissime lineares, hirtae, $1\frac{1}{2}$ cent. longae. *Pedunculi* axillares, solitarii, 10 cent. circiter longi, dense lutescenti-hirti, versus apicem folio minuto petiolato trilobo ac stipulato vel abortivo bracteiformi instructi, multiflori. *Calycis exterioris* phylla 10, angustissima, linearia, hirta, subpatula 1 cent. circiter longa. *Calycis interni* quinquepartiti 2 cent. superantis lobis lanceolato-acuminatis, nervosis, dense hirtis. *Corolla* sem expansa, 5 cent. longa, extus pilis stellatis hirtella, in sicco violacea. *Tubus stamineus* corolla quater circiter brevior, *stigmatibus* quinque. *Capsulae* adsunt effloetae (de quibus autem non constat an huc pertineant) hirtellae, ellipticae, quinqueloculares, quinquevalves.

5. **Hibiscus (Bombicella?) Pinonianus** *Gaudich.* fruticosus foliis subrotundo-ovatis 3-5-lobis crenato-serratis utrinque ramulisque tomentosis flavido-canescens; floribus terminalibus et axillaribus solitariis; foliolis calyculi lineari-subulatis; stylo 1; stigmatē clavato-capitato, seminibus hirsutissimis. — *Gaudichaud* It. Frey. Bot. pag. 476. tab. 100.

Crescit in solo sublimoso-arenoso promontorii Cape-Riche, 22. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1340.

„Frutex tripedalis“ *Fragaria*

6. **Hibiscus (Bombicella?) grossulariaefolius** *Miq.* totus lutescenti-stellato-tomentosus, foliis brevius petiolatis coriaceis subrugosis cordato-rotundatis, tri-vel subquinquelobis lobis obovatis obtusis incisis crenatis marginibus subundulatis, floribus axillaribus solitariis breviter pedunculatis, calycis exterioris octofidi dentibus lineari-subulatis, interni quinquefidi laciniis lanceolatis, styli tubum stamineum longe superantis stigmatē capitato, an semigloboso?

Crescit in solo coenoso ad marginem lacus Mathilde distr. Hay. 9. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 1339.

Frutex 4-6 pedalis, totus pilis stellatis lutescentibus tomentosis. *Ramuli* angulati, subtetragoni. *Petioti* $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ cent. longi, teretiusculi. *Laminae* supra sparse subtus dense luteo-hirtae, tri-vel subquinguenerves, nervis supra canaliculatis, subtus prominentibus, 2- $2\frac{1}{2}$ cent. longae, cordato-rotundatae trilobae vel lobis lateralibus subbifidis quinquelobae, lobis incisim crenatisque. *Stipulae* lingari-filiformes, hirtae, 8 mm. circiter longae. *Pedunculi* axillares solitarii, 2 cent. circiter longi, paullo supra medium bracteis linearibus instructi. *Calyx exterior* 8 mm. circiter longus, ultra medium in dentes lineares sinuato-partitus. *Interioris* $1\frac{1}{2}$ cent. longi lacinae lanceolatae acuminatae. *Corolla* fere expansa, $3\frac{1}{2}$ cent. longa, in sicco violacea, pilis stellatis luteis extus sparse vestita.

Rugosa lilacina

vid. L. D. D.

SIDA Linn. Endl. gen. n. 5289.

MALVINDA §. palmatilobae DC. Prodr. I. pag. 465.

1. **Sida leiophloia** Miq. radice fusiformi, caule herbaceo erecto parce ramoso laevissimo glabro, foliis longius petiolatis, 5-6-lobatis, lobis oblongis incisim vel dentato-crenulatis, utrinque pilis plerumque simplicibus sparse puberulis, floribus axillaribus binis ternis pluribusque ad ramulorum apices paniculatis, longe pedunculatis, calycis quinquefidi semiglobosi glabri lobis ovatis acutatis, carpellis 5-6 acuminato-rostratis.

Crescit in distr. Wellington. 5. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1896.

Species procul dubio nova e speciminē paene aphylo et effoetis tantum fructibus instructo haud perfecte describenda. — E radice fusiformi albicante 12 cent. longa et 8 mm. apice crassa, caules duo metrum circiter alti exsurgunt, teretes, atrovirides, glabri laevissimi, remotis foliorum cicatricibus instructi, simplices, apice in ramos floriferos paniculatos partiti, ramulis pedunculisque angulosis subtetragonis. Folia (e fragmentis foliorum summorum) petiolis 3 cent. longis sustenta, rotundata, 5-6-loba, 1-2 cent. longa. Flores ex axillis foliorum bini, terni, quini, pedunculis variae longitudinis 2-5 cent. longis. Calycis lobi trinerves cum 2 nervulis minoribus. Carpella subtriquetra, glabra, monosperma, rostellata.

2. **Sida (Malvinda) rupestris** Miq. radice tenui-fusiformi, caulibus pluribus prostratis herbaceis, foliis longe petiolatis cordato-rotundatis tri-vel quinquelobo-partitis, lobis obovatis oblongisve, subtridentato-incisis, junioribus utrinque stellato-pubescentibus, adultis subglabris pilis simplicibus, floribus axillaribus solitariis, pedunculis petiolo brevioribus, calycis quinquefidi junioris hirtelli, maturi glabri semiglobosi lobis lato ovatis acutis trinerviis, carpellis 5-8, rostellatis.

Crescit in rupestribus insulae Mistakenisland. 12. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 1897.

Herba, an perennis? Radix perpendicularis, albicans, tenui-fusiformis, 10 cent. longa. Caules plures, an humifusi? glabri, teretes, ramosi, 10-20 cent. longi. Partes juniores stellato-hirtellae, adultae glabrae vel subglabrae, pilis simplicibus. Petioli $1\frac{1}{2}$ -4 cent. longi. Laminae membranaceae, $1\frac{1}{2}$

cent. longae et latae. *Pedunculi* $\frac{1}{2}$ -1 cent. longi, plerumque solitarii. *Calyces juniores* cylindracei, basi subglobosi, *adulti* effoeti semiglobosi.

3. **Sida (Malvinda) Hookeriana** Miq. herbacea erecta. caule glabro subterete, foliis longe petiolatis cordato-rotundatis, 5-7-pedatisectis, lobis oblongis incisitis et serrato-dentatis, junioribus substellato-puberulis, adultis subglabris. floribus brevius pedunculatis axillaribus solitariis vel aggregatis supra ramulos axillares subracemose confertis, pedunculis puberulis, petalis albis, carpellis octo (immaturis subrostellatis).

Crescit in arenoso-conchyliosis humidis prope lacum insulae Rotenest, 20. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1894.

„Herba bipedalis erecta, floribus albis“. *Caules* laeves glabri teretiusculi, ramulos axillares florentes exserentes inque tales terminati. *Partes* juniores puberulae, adultae subglabratae. *Folia* longe petiolata, nascentia pilis stellatis subhiirtella, adulta pilis simplicibus sparsis vel nullis. *Petioluli* 4-5 cent. longi; *laminae* membranaceae, 3-3 $\frac{1}{2}$ cent. longae. *Stipulae* tenero-membranaceae subscariosae, glabrae, lanceolatae, 5 mm. longae. *Pedunculi* $\frac{1}{2}$ -1 cent. longi. *Calycis* lobi ovato-acuminati, glabri; tubus sparse pilosus, cito glabratus. *Calyx* 6 mm. longus; *petala* alba paullo longiora.

LAWRENCIA Hook. Hook. Icon. tab. 261 et 262. Endl. gen. Suppl. III. pag. 79.

1. **Lawrencia squamata** Nees ab Esenb. fruticosa, ramis nudis, ramulis floriferis fasciculum foliorum exhibentibus unifloris, foliis crassis lanceolato-linearibus squamatis.

In planitie arenosa hieme aqua inundata ad fluvium Southern River, Perth Septembri 1841. Herb. Preiss. No. 1231.

„Frutex $1\frac{1}{2}$ pedalis floribus dioicis“. *Caules* ramosi, distorti, rugosi, fusci. Ramulorum loco fasciculi foliorum 2-5. *Folia* 4-5 lin. longa, $\frac{3}{8}$ lin. lata, acuta, supra canaliculata, subtus obtuse carinata, squamis orbiculatis adpersis peltatis puncto medio obscuriori tanquam poro notatis micantibus dense vestita, elaeagnoidea. *Stipulae* parvae triangulares scariosae, fuscae, persistentes. *Flos* in centro fasciculi solitarius, subsessilis, a folio summo cum ejus stipulis suffultus. *Calyx* 2 $\frac{1}{2}$ lin. longus, ovalis, quinquangularis, coriaceus, ore quinquefido clauso, squamatus sicut folia. *Corolla* longitudine calycis, tenera, rosea, infundibuliformis, ad medium usque quinquefida, laciniis obovato-cuneiformibus, obliquis. *Tubus* stamineus tubo corollae cohaerens, limbum aequans, in floribus δ paulo longior. *Filamenta* propria brevia 20 in flore δ in flore γ decem. *Antherae* milocellatae, reniformes, rima verticali dehiscentes. In flore hermaphrodito styli 2-4 (5?), filamentis longiores, crassi, acuti, purpurei, introrsum stigmatosi. *Fructus* immaturus calyce corollaeque marcescente vestitus, oblongus, trilocularis, loculis multiovulatis, nescio an in carpella secedens.

Obs. Differt a *Lawrencia glomerata* Hook. foliis integerrimis et floribus solitariis. (N. ab E.)

Laminaria conf. pag 234
crassum, glomeratum ^{Shuttle}. Frey. prophyll.
Caryophylleae. ^{Shuttle}
crassum, hemisphaeroides L. (Cavillage)
Arenaria.

A. (Alpine) australis! ^{Shuttle} Gent. M. (33)
foliis ^{longioribus} lanceolatis glabris, caulis
adpressis basi decumbentibus
glabris quadrangulis, pedunculis axil-
laribus folio ^{longioribus} brevioribus foliis
segmentis calycis lanceolatis acumi-
natis capsulae ovoideae longiori-
bus, floribus punctatis trigynis
apertis.

Hae species & sequens, plantae ^{aromaticae} parvae,
ut A. Raddianae Seringe sunt af-
fines.

In graminosis montium Bigler-range,
non in rugosius muscosis.
Sept. 1848. In regionibus interioribus vixit
Kivali Bay. Oct. 1848.

A. (Alpine) apicalis! ^{Shuttle} Gent. M. (33)
foliis ^{longioribus} lanceolatis acutis glabris, cau-
libus ^{longioribus} adpressis basi decumben-
tibus glabris quadrangulis, pedun-
culis axillaribus foliis multo brevi-
oribus foliis, segmentis caly-
cis lineari-lanceolatis acutis cap-
sulae lineari-conicae brevioribus, floribus
apertis, stylis 3 saepe 2 brevissimis

In arenosis fruticetorum inter mon-
tem Barkeri & St. Murray. Inven-
te Octob. 1848. — In montibus alti-
oribus tractus Barosfor-range. Sept.
1848.

L. purpurea Sch. N. 190.

Urticaria spigiophylla ^{Shuttle} Gent. M.

caulibus ^{diffusis} brevibus, foliis ^{longioribus} per-
sistens ^{longioribus} lanceolatis acutis fine attenuatis, cori-
aceis nitentibus margine ciliatis, junio-
nis in axillis serrulatis, pedunculis axillari-
bus foliis longioribus, sepalis ^{longioribus} (nuc-
tatis) prominentibus nervosis, filamentis 5.

Petala alba corollae videntur breviora. Antherae albae
fol. 12" ultra longa, 2" et.

In pedem montis Murchhead ^{Shuttle} *crassum* in ^{aromaticis} arenosis
humidis ^{longioribus} fixis. Oct. 1848.

Inae observationes huius retollendae sunt, prima, et typus
et vegetatio nostrae impresse est albae in hac familia rep-
ta, huius, et organorum ^{longioribus} in hac ^{aromaticis} evoluitur, immo
typus ^{longioribus} gratia in ^{aromaticis} definit.

222 alt. Antichambrey bay in arroy. n. h. h. h.
Cyrtolobos gyropneumonea J. & M.
C. Australopium Meq. 2. In inflorescence
Synanthus indagator R. & S. Pet. etc. In inflorescence
Mequiniaria a very rare plant
G. oligogynus J. & M. (rare form)

Genus exiguus a Gyro-
 pneumonea differt!

var. striata, foliis linearibus
 microstibus acuminatis - recurvatis
 ovario sub sex. (puberulis) ^{ad carnositas}
G. ramulosum Schlechtendal
 Schriber. in Linnaea 1847 non
 Desfontaines. C. Schlechtendal
 haud vidit pl. foecundam, ex
 specimenis frustis necesse potuit
 ut planta esset erecta.
 Encount. Bay, Nov. 1847. - In ar-
 nosis prope vicum Lindar-vallij
 1848 - per totum annum pervenit. hb.
 Schriberum. in. Simfons in
 Lyndale-vallij & Gawler - con-
 folia 1-2'.

Silene pungens ... hb. B. 190
Taraxacum
C. Australopium. Petala obtusiuscula. lapi' tenui
 bipartita. Anthura rubellae debite perspicua.
 Cryptoglyphe. Juss. reverse!

Laguna acutata L. ex- raris tenuis
Gracilium novum L. ex- raris tenuis
 in argillaceis circum cultis
 aditidis. Nov. 1848. Haud dispersa habet
 a pl. exiguas
L. barnebyi Murray
Piriparipa compressa J. & M.
 exsertime. diaphragma quadrat
 excepta colora petalorum, quae
 fere purpureas a me absp.
 v. barnebyi)

Fairbairn in foveis arenosis
 argillaceis. flor. 7. 1848. Noddable
 in, flor. 1848. Ad finem bitonalitatis
 Fairbairn in elevatis arenosis. flor. 1848
 In aliquot exemplis folia minus
 nat a & pedicelli longiores repe-
 riuntur. Haec in promptu est
 a pl. minus Murray (flor. 48 hb
 S. n. S. n.) in sp. alio modo
 in campis ad fodinas Capenda
 Apr. 1848

PHYTOLACCACEAE Endl. gen. pag. 975.

GYROSTEMON Desf. Endl. gen. n. 5264.
Meisn. gen. pag. 235.

1. **Gyrostemon ramulosum** Desf. caule diffuso, ramis prostratis ramulosis, foliis lineari-semiteretibus. Desf. in Annal. du Mus. 6. tab. 17. — 8 tab. 10. fig. a. Endl. in Enumerat. plant. Hügel pag. 10.

In arenosis calcareisque inter frutices prope urbiculum Freemantle (Perth), m. Decembri 1838. Herb. Preiss. No. 1234.

„Frutex prostratus, ramis elongatis ramulosis.“

CARYOPHYLLEAE Juss.

(Auctore F. T. BARTLING.)

Subordo I. PARONYCHIEAE.

LEPIGONUM Fries. Wahlbg.

(Spergularia Pers. Endl. gen. n. 5218.)

1. **Lepigonum brevifolium** Bartl. glanduloso-pubescentibus: caulibus simplicibus, internodiis compressis; foliis internodio brevioribus lineari-filiformibus supra planiusculis; cyma pauciflora aequali; pedicellis calyce sesquialongioribus; sepalis corollam aequantibus, capsula trivalvi subduplo brevioribus; seminibus immarginatis granulato-asperis.

In solo sublimoso vallis prope praedium rusticum Dom. Philips (Victoria) d. 19. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 1945.

Caules digitales, simplices, erectiusculi, cum foliis pedicellis calycibusque glanduloso-pubescentes, internodiis compressis, intermediis subpollicaribus. Folia internodio duplo triplo breviora indeque remota, lineari-filiformia, supra planiuscula, subtus convexa, acuta mutica. Cyma terminalis dichotoma, regularis 5-7-flora. Pedicelli calyce circiter sesquialongiores, tenues, florentes et fructus maturos gerentes stricti, erecti, deflorati horizontales. Calyx 2 lin. fere longus, sepalis ovato-oblongis, obtusis, uninerviis, interioribus anguste membranaceo-marginatis. Petala alba, ovata, calycem subaequantia. Stamina 10, sepalis triplo fere breviora. Capsula calyce subduplo longior, trivalvis, valvulis superne recurvis. Semina parva, nigra, cuneato-semirotunda, immarginata, exalata, granulis minutis acutis aspera.

2. **Lepigonum anceps** *Barth.* caulibus adscendentibus glabris, internodiis superioribus compresso-aneipitibus; foliis lineari-filiformibus mueronatis utrinque planiusculis; cyma subracemosa multiflora glanduloso-pubescente; pedicellis calyce pluries longioribus gracilibus; petalis (rubris) calycem aequantibus; capsula trivalvi calyce vix longiore; seminibus immarginatis.

In arenosis prope praedium rusticum Cl. Nash (Perth.) d. 10. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1944.

Caules spithamei, adscendentes vel erectiusculi, glabri, parce ramosi, ramis plerisque abbreviatis. Internodia $\frac{1}{2}$ -2-poll. longa, ima teretiuscula, superiora eximie compresso-plana ancipitia. *Folia* caulina internodio saepissime breviora, ramulorum subfasciculata, carnosa. *Stipulae* ut in congenitibus. *Cyma* subfastigiata multiflora, pedunculis pedicellis calycibusque pilis articulatis glanduliferis patentibus parce glanduloso-pubescentibus. *Pedicelli* tenues capillares fere, demum 9-12 lin. longi, florentes erectiusculi vel subnutantes, deslorati saepe refracti, fructus maturos gerentes iterum erecti stricti. *Sepala* vix sesquilineam longa, anguste ovato-oblonga, uninervia, rotundato-obtusa, interiora margine lato membranaceo. *Petala* calyce vix longiora, ovato-oblonga, rubra, persistentia. *Stamina* 10, sepalis duplo breviora. *Capsula* anguste ovata, calyce vix longior, trivalvis, valvulis apice parum recurvis. *Semina* immatura immarginata: matura desunt.

3. **Lepigonum laxiflorum** *Barth.* caulibus adscendentibus subpubescentibus, internodiis teretiusculis; foliis lineari-filiformibus submueronatis utrinque planiusculis, internodio brevioribus; floribus inferioribus axillaribus remotis, summis subcymosis; pedicellis elongatis gracillimis; petalis (pallide rubellis) calycem aequantibus; capsula trivalvi calycem subsuperante; seminibus immarginatis minutissime granulatis.

In arenoso-conchyliosis humidis prope lacum insulae Rotenest d. 20. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1943.

„Herba prostrata. Flores rosei“. *Semina* perparva cuneato-subtrigona, obscure fusca.

A *L. anetpitti*, cui proxime affine, differre videtur: caulibus a basi parce pubescentibus ramosioribus, ramis magis elongatis, internodiis longioribus omnibus fere teretibus; *pedicellis* gracillimis longioribus, omnibus fere remotis axillaribus solitariis vel alaribus, ultimis solummodo subcymosis, desloratis vix refractis sed potius patentibus vel horizontalibus; *floribus* paulo minoribus; petalis pallidioribus; denique capsulis calyce evidenter longioribus, valvulis magis recurvis.

Subordo III. ALSINEAE.

CERASTIUM Linn. Endl. gen. n. 5241.

1. **Cerastium glomeratum** *Thuill.* caule erecto vel adscendente; foliis subrotundis ovalibusque, inferioribus in petiolum angustatis; paniculae ramis glomeratis; bracteis omnibus herbaecis calyceisque apice barbatis; pedicellis fructiferis calycem aequantibus brevioribusque; petalis ca-

compressa

Singularia (ancipis) Torr. & Muhl.

2. Tanunda! April 1848. Dr. M.

L. brevifolium ad lacum Alex.
andrinae collectum & p. sub
alvum a me nominatum
transitum quadammodo ad
L. ancipitum format. Apr. 29. 1848.
Etiam specimen sub nomine L. bre-
vifolia exposita sic. reiteratam
explorationem huc trahendo: & var.

3. glaudiversa, pilis glandulosis
ubique totam praebuit et in sp.
prima ob maximam affinitatem
juxta Lep. rubrum inferenda
Cura urbum Adl. Nov. 1848 frequenter
ad pagum Blunzig & Kindmarch. Apr.
1849. L. laxiflorum vix ullo characte
mentis ab hoc distat.

repressum, val

4. Singularia (ancipis) Torr. & Muhl. L. ancipis nostrae pertinet ex Torr. & Muhl. repressum, val

L. largiflorum, Torr. & Muhl. repressum, val
& Singularia largiflora Torr. & Muhl.
in floribus collectionem novam lacum
T. D. C. George, 1848. 872.
Waltmanni vases mei, cerium.

L. marginata Torr. & Muhl. repressum, val
solum ex comparata diagnoscentum,
diffuse tamul videtur habitus roba-
thioni & forsan capsulis majoribus.
An var. huius Australasica, an
L. macrothecum, vixit specimen a
multa a me olim ex horto C. Kiliocopi
zisa fuit. An repressum, val
T. D. C. Hall, 1848. Ad lacum 1848. T. D. C. Hall.

An solo humido ad lacum a puer
cateractam! Apr. 5. 1848. Dr. M.

Communis in vicinia lacorum rutorum, longe in
interioribus ubi olim ovis patrua occurrerunt.
Ad lacum Victoria, in paucifolia Lacune,
ad portum Kellacers. (T. D. C. M. Stuart &
St. Philip per Joys.) Ad pagum Kindmarchi
Apr. 1849.
L. primitiva! hunc recenset plus minusve rana lacum

lycem subaequantibus. Koch. syn. ed. 1. pag. 121. — *C. ovale* Pers. syn. 1. pag. 521.

In solo turfoso-arenoso ad Stirling's-terrace, Plantagenet d. 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1949, in arenosis prope lacum insulae Rotenest d. 21. Aug. 1839.

Subordo IV. SILENEAE.

SILENE Linn. Endl. gen. n. 5248. Meisn. gen. pag. 24. (21.)

1. **Silene gallica** Linn. annua: racemis terminalibus plerumque geminatis viscoso-pubescentibus; floribus alternis; calyce tubuloso hirsuto, fructifero ovato, dentibus lanceolato-subulatis; petalis obovatis indivisis integerrimis denticulatis emarginatisvc; foliis anguste oblongis, inferioribus obovatis. — Vaill. bot. par. tab. 16, f. 12.

In solo humoso prope Woodbridge, Perth, d. 31. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1950.

Calyces fructigeri in pedicellis adscendentibus erectiusculi.

PORTULACEAE Juss. Endl. gen. pag. 946.

Tribus II. AIZOIDEAE Endl. l. c.

(Auctore F. A. G. MIQUEL.)

TETRAGONELLA Miquel.

Calyx liber, quadrifidus, limbi laciniis ellipticis cœnosis, praefloratione subimbricatis. *Corolla* nulla. *Stamina* 12, autē et inter sepala disposita, *filamentis* filiformibus, *antheris* erectis oblongis bilocularibus, loculis oppositis, rima laterali antice hiantibus. *Ovarium* liberum, triloculare? loculis uniovulatis? *Stigmata* 3 vel 2, exserta, subclavato-teretia, hispidula.

Herba succulenta, glabra, crystallino-papillosa, *foliis* alternis vel in ramulis abbreviatis subfasciculatis, lanceolato-ellipticis cœnosis, *floribus* axillaribus solitariis longe pedunculatis.

Genus e siccis speciminibus fructibusque carentibus aegre extricandum, *Tetragoniae* et *Galeniae* affine, ab illa *stigmatibus*, ovarioque libero, et ab hac *staminum* situ satis diversum.

1. *Tetragonella amplexicoma* Miq.

Crescit in clivulis arenosis insulae Rotenest, 19. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2393.

„Herba ramis intricatis, floribus flavis.“ *Rami* filiformi-teretes, glabri, epidermide fibrosa. *Ramuli* alterni, vagi, foliorum fasciculorum vestigiis tuberculati, juniores papilloso. *Folia* alterna, plerumque supra ramulos contractos fasciculata, comosa, in sicco submembranacea, glabra vel glabriuscula, flaccida, obsolete uninervia, non nisi ad lentem fortiolem parce venulata, elliptico-lanceolata, obtusa vel obtusiuscula, basi in petiolum longiusculum attenuata, cum petiolo 3-4½ cent. longa, ½-fere 1½ cent. lata. Bases petiolorum post folia lapsa persistentes incrassatae. *Flores* axillares, solitarii, *pedunculis* filiformibus sursum parumper incrassatis 1-2 cent. longis sustentis, virginales obovati, florentes obovato-seniiglobosi, 2-3 mm. longi. *Calycis* succulenti quadrifidi laciniae ellipticae. *Stamina* 10, vix exserta (duo ante singulas calycis lacinias, alia inter sinas disposita?) *filamentis* subulato-filiformibus; *antheris* laete luteis. *Stigmata* staminibus paullo longiora, in sicco nigricantia.

Tribus V. CALANDRINIEAE. Endl. l. c. pag. 950.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

TALINUM Adans. Endl. gen. n. 5178.

Meisn. gen. pag. 130. (94.)

Sectio inter b et c media. *Stylus* usque ad basin fere tripartitus, *stigmatibus* filiformibus divergentibus attenuatis. *Placenta* brevis. *Plantae* humiles, annuae, Novam Hollandiam incoleutes. — *Petala* deflorata inferne in tubum cohaerentia, fructum calyptrae ad instar tegentia.

1. *Talinum nanum* N. ab E. caule basi ramoso ramis lateralibus procumbentibus adscendentibus apice caulis brevissimi longioribus, foliis carnosissimis alternis sessilibus oblongis obtusis subtus convexis supra depressis, floribus in racemum terminalem simplicem subsecundum tam caulis quam ramorum dispositis brevipedicellatis.

In depressis arenosis umbrosis ad ripam fluvii Cygnorum supra oppidulum Perth. Septembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 1930.

Planta vix pollice altior, *radice* tenui recta subsimplici. *Rami* simplices, inferiores caule sub duplo longiores, terrae incumbentes, adscendentes, apice racemiflori sicuti et caulis apex. *Folia* vix unguicularia, glabra, demum defluentia; superiora vix lin. longa, obovata. *Racemus* scorpioides videtur. flexuosus, e cyma proficiscens, ebracteatus, vel ubi bractea accedit, huc laterali, nec pedicello subjecta. *Pedicelli* ½-1 lin. longi. *Flos* 2 lin. latus („sordide albus.“ Preiss.). *Calycis* foliola ovato-subrotunda, herbacea, decidua relicto disco orbiculari capsulam suffulciente. *Petala* quinque, oblonga, calyce duplo longiora, patentia, libera. *Stamina* 10; *filamenta* basi dilatata:

Paronychiae St. Hil

Polytrichon. Löffl. & v. Linn.

10. *alsinifolium* Debandolle. ranges
 In valle ^{bus} ~~montina~~ ^{calcario} Löffl. & v.
 28. 1848. Ad latus rivuli apud
 Karakam. Jbr. 6. 1848. In totum an m. ^{corina}
 vide Caryophylloae subtile. Paro-
 nychieae. Warte. p. 243.
 Sim. ~~powpart~~ ^{ag. tenuis}. Engelm!
 Mugo Novo Hollandia ^{quid} Mueller.
 ved. pag. 248

Scleranthaceae Lk

1. *puengeri* St. Hil. ^{flor. - ranges}
 Ad litor. maris ^{longa} apud
 Portum Adelaide. Jbr. 1847
 (vero litor.) In arenosis ripariis
 ad p. ~~Murray~~ ^{Winnap. a. p.} p. 48.
 2. *S. diander* St. Hil.

3. *S. diander* ~~St. Hil.~~ ^{flor. Tasmanniae} ~~St. Hil.~~ ^{St. Hil.}
 In p. ~~St. Hil.~~ ^{St. Hil.} ~~St. Hil.~~ ^{St. Hil.}
 In p. ~~St. Hil.~~ ^{St. Hil.} ~~St. Hil.~~ ^{St. Hil.}

Utricularia St.

U. biflorum Forster

Ad N. South Esk river, Tasm.
 hb. St. Hil. n. 117. Nov 48

Calandrinia calypstrata! J. D. Hook

^{montos} ^{nitros}
 In ^{montos} ^{nitros} ^{montos} ^{nitros} ^{montos} ^{nitros}
 et rivulos, Waroffae et Löffl. - range
 et prope Perth Tasmanniae. hb. St. Hil. 146.
 Annua, polycarpa, foliis, alta. Folia brevi-
 compressa supra ^{nitros} ^{montos} ^{montos} ^{nitros} ^{montos} ^{nitros}
 facit. - b. Petala bilabata.
 Annua juniora rotundato ^{nitros} ^{montos} ^{montos} ^{nitros} ^{montos} ^{nitros}
 elongata ^{nitros} ^{montos} ^{montos} ^{nitros} ^{montos} ^{nitros}
 pedalis, foliis ad 2" - l. 1/2" latis, racemis longa
 hi pro bellis saepe ^{nitros} ^{montos} ^{montos} ^{nitros} ^{montos} ^{nitros}
 ad fluvi. Murray arenosam ripam. p. 48.
 vire, vere. ^{nitros} ^{montos} ^{montos} ^{nitros} ^{montos} ^{nitros}

antherae ovaes, locellis discretis parallelis. *Stigmata* longa. *Capsula* rigida, chartacea, nitida, petalorum marcescentium calyptra involuta, ovato-subglobosa, obsolete trigona, trivalvis, in nostris autem clausa valvulis arcute cohaerentibus. *Semina* funiculis longis erectis placentae basilari brevi adfixa, multa, parva, ovali-lenticularia, striata, fusca.

Propter stylum ad basin ferme divisum, et vitam annuam cum sectione secunda (Talinastro) conjungi nequit, a genere autem tam diu haud removendam esse hanc speciem censeo, dum in eo restant sectiones *Talinellum* et *Eutmon*.

CALADRINIA H. B. K. Endl. gen. n. 5179.

Meisn. gen. pag. 130. (94, 357.)

C. leprosa Endl. in Endl. Enumer. pl. Hügel. pag. 51. n. 171.

1. ***Calandrinia liniflora* Fenzl.** glaberrima, caulis (ex una radice pluribus) simplicibus adscendentibus, foliis lineari-filiformibus teretiuseulis carnosus basi attenuatis, racemo laxo terminali, petalis 5 late obovatis sepalis ellipticis imbricatis subtriplo longioribus, staminibus 10 basi in anulum membranaeum connatis. Fenzl in Endl. Enumerat. pl. Hügel pag. 52. n. 172. Walp. Rep. 2. pag. 236. n. 22. (*C. linifolia* errore calami.)

In arenosis ad fluvium Cygnorum, Augusto a. 1839. Herb. Preiss. No. 1952.

⊙

2. ***Calandrinia polypetala* Fenzl.** glaberrima, caulis adscendentibus, foliis teretiuseulis filiformibus, racemo laxo terminali, petalis 8-10 oblongis ellipticisve integerrimis roseis sepalis ovato-subrotunda duplo superantibus, staminibus 8-10 in anulum membranaeum basi connatis.

α. caulis simplicibus, racemo terminali *simplici* vel inferiori minori aucto.

Calandrinia polypetala Fenzl in Endl. Enumerat. pl. Hügel. pag. 51. n. 171. Walp. Rep. 2. pag. 236. n. 21. (Swan River, Hügel.)

β. **composita.** caule supra basin in ramos multos fastigiatos basi simplices a medio inde compositos racemosos diviso.

In arenosis prope oppidulum York, Octobri a. 1839. Herb. Preiss. No. 1951. „Herba annua, humifusa. *Flores* rosei.“ (Preiss.)

3. ***Calandrinia calyptrata* J. Hook.** caule ramosissimo ramis valde diffusis, foliis lineari-spathulatis, superioribus (supremis) minutis bracteiformibus, pedunculis circa ramos apicem axillaribus elongatis post anthesin deflexis, petalis in corollam calyptriformem connatis. — Hook. Leones plant. t. 296. Walp. Rep. 2. pag. 236.

In arenosis insulae Rotenest, Augusto a. 1839. Herb. Preiss. No. 2400.

Petala 5, distincta ut in reliquis, sed tenerima et apicibus denique marcescendo conglutinata, quo facto corolla calyptrae ad instar capsulae

vertici inhaeret. *Stamina* 5. *Stigmata* 3, subsessilia, clavata. *Calyx* ad $\frac{3}{4}$ bifidus. — Est planta digitalis et humilior, *Montiae* habitus, laxa, irregularis, floribus parvis. *Radix* simplex, annua.
„Flores pallide rosei.“ (Preiss.)

MESEMBRYANTHEMEAE Fenzl.
in Ann. Wien. Mus. 1. pag. 347, 349.
Endl. gen. pag. 945.

MESEMBRYANTHEMUM Linn. Endl. gen.
n. 5163. Meisn. gen. pag. 129. (93.)

§. 18. HUMILLINA DeC.

1. **Mesembryanthemum australe Ait.** (?) caule semitereti reptante, foliis triquetris glaucescentibus punctulatis laevibus incurvantibus, pedunculis obtuse ancipitibus basi bibracteatis. H. Kew. 2. pag. 187. Haw. synops. pag. 241. ed. Schrank. pag. 261. DeC. Prodr. 3. pag. 428. n. 103. Salm-Dyk. 3. n. 12.

? Var. pedunculo (solo obvio, fructifero) subtripollicari.

In districtu Victoria, Martio, J. Drummond legit. Herb. Preiss. No. 1909.
Specimen nimis incompletum.

§. 20. ACINACIFORMIA Salm-Dyk.

2. **Mesembryanthemum virescens Haw.** caulibus (crassis) decumbenti-prostratis, foliis subinaequilateri-tri-quetris subvirentibus, pedunculis terminalibus solitariis alato-ancipitibus, calyce quadrifido, stigmatibus octo filiformibus. Haw. Syn. pag. 236. ed. Schrank. pag. 260. DeC. Prodr. 3. pag. 429. n. 117. Salm-Dyk Monograph. 3. t. 93. (secundum Walp. Repert. 2. pag. 268.), quae tabula in nostro hujus operis exemplo deest.

In arenosis prope oppidulum Freemantle, Decembri a. 1838. Herb. Preiss. No. 1908.

„Prostratum, ramis valde elongatis. *Folia* triangularia, subacinaciformia. *Flores* laete purpurei. Ab incolis Colonial-Figs et ab aboriginibus. 9. fructum comedunt, Kolboje appellatur.“ (Preiss.)

Apud Candollium l. c. pro „petiolis basi albis“ legendum „petalis basi albis.“

Cappula bafi oblonga apice attenuato-
trigona calycis paullo superius
valvis denique patentibus coram
simulans! ^{acuta}

[illegible]

cum ad litora, tunc in p. lagis
longe a mari remotis aruosis
nec non in montibus stricibus
passim occurrunt. Flosia permi-
bus quibusdam delecta ^{et per mition}
^{antecessor nungan} ^{Nungan} ^{minor} ^{major}
edunt. Fructus germinatos

[illegible]

post Calandriniam adv.

Claytonia Australasica
glabra. D. Don. icon. pl.

[illegible]

Tilamusa petalis *baluiana* 5 an-
theris carnis

Quarta aut huiusmodi caespitosa
aut in aqua profundiore se habet
longior et elongata habet Lepidodermis

Here! *xi nizam pleovii muerrijencunda.*

Sam. fides pontium Wellingtonianum

x *Mollugo* & *Vero* *Hollandica* pro Mill.

Scous ripam fluvii Minnray
arvensiam juxta Morruade.
ine, cedatam (nisi perfloratum)
in. hirta, cedatam proxima et
saltem eundem est portionis alyne
differt de aliis illi collectatis
pubescentia, a m. hirta floribus
pudicis calyce circa aequi longe
practitis pedicamento communis
definitis.

Herba prostrata. Calyx extus
 ferrug. intus albus. corollae
 Stam 6 3 raro 2. Filamentum
 stylis 3

pag. 246.

Tetragonella implegiroma Mij.

Lociis umbrosis litoralibus vel
subsalinis inferiorum hinc inde.

~~Planta procumbens suffrutescens~~
~~caulis effusa~~ ^{glabra vel pilosa} ~~nervulosa~~
~~calice supra pedicula papilloso~~
pulsus crystallino-papilloso
linearis - lanceolata basi longe
angustata facie formis inter
medio in formam rhombicam
convergentia ad 1" lata, et 2 1/2" cum
petalo longa. Filis 85 intus
lucis odoratissimi.

Anth: vere, aest.

Thellaria Australasica J. M. M.
In vallibus maritimis mont. Lofy-v.
ad fl. Onkapar.

Anth. rubr. sing. nigrescent. hb. intrinseca
in humidis effusa glauca.

Thellaria Gallia.

Transfuga ex Europa, quum me
antea californiam visitarem nondum
reperita. Mhr in litt.

Thellaria pulvinaris J. M. M.

Novi riparia fl. Murray arripam
~~pinum~~ ^{montium} ~~valley~~ ^{unus!}

caespitis vel pulvinos ficiquis, quum
intrinseca procumbit. Anthrac ru-
bellas max nigrescentis. Petala
basi minus fissis.

Anth: vni, aest.

Frankenia pauciflora Desv.

S. pubigera Griseb. Müller

calycibus pilis brevissimis
paucifloris puberulis.

Erinellina ~~axata~~ victor

1. *H. atrapetalae* Labillardiere

H. F. haia & *H. F. pauciflorae*
rota

quasi eadem media, quales autem
a sapientia distributa

Juniperus 5 (*Juniperus* 5), *Juniperus* 5
Juniperus 5 (*Juniperus* 5), *Juniperus* 5
Juniperus 5 (*Juniperus* 5), *Juniperus* 5

Return! "Four 1/2 - 3 per. Diffusion!"

In oris marinis inter fructus.

Spine portum Hollandi & Kennebec
Lep. L. 16 16 16 16 16 16

Lophoceros latipes

2. *Gracilaria* *parvula*,
Gracilaria *parvula* *Gracilaria*

y. glandulifera Forst. Mill.

ramis calycibusque 9 tantum.

to go just as common as
any other thing in the world

Shrews murrayi 1888!

H. H. M. are very numerous In box

was de l'off. publique valoir et

W. H. D. M. Nov. 1848. Dr. S. H. H.

var. α . habeo a ^{com. of} Stone and

Albert & James Gierken - Bay, Ar 24

ad ripam altam latioram
et magis in speciem

the following are important
and in fact out of

South Island

Urosalpinx *incrimis* *Ant. Muller*

Anth: vnc.

Petrargonia inermis, Fr. Maccl. 12. February

Herbacea procumbens v. diffusa, foliis ovato-

*repheto. rhomboides in caudibus infim in pericolum aq.
basis, cloribus axillaribus - olivarius 9 cinninove burs.*

pedicellatis, ... 8 foliariis, ... 4-7, ...
 " ... subprostratis ... 1 ... 3 ... 4 ...

in apiculis dilatatis & in apiculis fore pro productis

Enjourné l'après-midi à l'école. L'après-midi
à l'école. L'après-midi à l'école. L'après-midi à l'école.

В cornuta, ludnak. 2012 год

FRANKENIACEAE St. Hilaire.

Endl. gen. pag. 913.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

FRANKENIA Linn. Endl. gen. 5053.

Meisn. gen. pag. 22. (20.)

1. **Frankenia fruticulosa** DeC. foliis linearibus acutiusculis margine revolutis glabris basi non ciliatis, caulibus erectis glabris; calycibus acutis glabris. DeC. Prodr. I. pag. 350. n. 13.

In arenosis exsiccatis inter Restiones ad ripam fluvii Cygnorum prope Peninsulam, Januario a. 1839. Herb. Preiss. No. 1283.

„Suffrutex 2-3-pedalis, ramis intricatis. Flores incarnati.“ (Preiss.)

DROSERACEAE DeC. Endl. gen. pag. 906.

DROSERA Linn. Endl. gen. n. 5033.

Meisn. gen. pag. 22. (19.)

Sect. I. ROSELLA DC. Prodr. I. pag. 317.

§. 1. ACAULES.

1. **Drosera platystigma** Lehm. foliis minimis orbiculatis petiolatis supra margineque glanduloso-ciliatis, stipulis scariosis, scapo simplici erecto uni-paucifloro calyceque pauciglanduloso, stylis tribus indivisis, stigmatibus peltatis. Lehm. Pugill. VIII. pag. 37.

In solo glareoso inter frutices densos Plantagenet prope „Seven miles bridge“, d. 20 m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1994.

Planta pulchella, humilis. *Folia* numerosa, conferta, rosulata, terrae adpressa, cum petiolo 2 lineas longa. *Lamina* exacte orbicularis, pagina inferiore glabra, superiore glandulis sparsis versus marginem crebrioribus obtecta, margine longe glanduloso-ciliata: ciliis laminam aequantibus. *Petiolus* lamina duplo fere longior. *Stipulae* ad basin petiolorum scariosae, albae, margine serratae, a basi ad medium usque indivisae, dein trifidae, laciniis lateralibus plerumque bifidis, intermedia trifida, interdum vario modo laciniatae: laciniis lanceolatis. *Scapus* erectus, pollicaris, tenuis, apice

1-3 florus, glandulis nonnullis minutis instructus. *Sepala* ovata, acuta, basi angustata, extus glandulosa. *Petala* obovata, calyce triplo longiora, 2-2½ lineas longa, 1½ lin. lata, pulchre punicea, venis saturatioribus striata. *Filamenta* glabra, calycem aequantia; antherae oblongae, longitudinaliter dehiscentes. *Ovarium* sphaericum, glabrum, subcoloratum. *Styli* tres, simplices, stamina subaequantes, diaphani, stigmatibus peltatis nigris.

2. ***Drosera pulchella* Lehm.** foliis parvis orbiculatis petiolatis supra margineque glanduloso-ciliatis, stipulis scariosis, scapo adscendente simplici paucifloro calyceque pauciglanduloso, stylis 5, stigmatibus linearibus papillosis. Lehm. l. c. pag. 38.

In districtu Plantagenet ad Stirling's-terrace locis turfosis arenosis d. 8 m. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 1992.

Herba hypollicaris. *Folia* rosulata terrae adpressa, in statu sicco laete viridia. *Lamina* orbicularis petiolo plano, bilineari, glabro duplo brevior. *Cilia* marginem cingentia basi sunt latiora longitudine fere folii. *Stipulae* scariosae prope basin foliorum omnino ut in *Drosera Platystigma*. *Scapi* adscendentes plerumque hypollicares, glandulis minutis instructi. *Pedunculi* 2-4, breves, in modum racemi dispositi, inferiores lineam longi. *Petala* obovata, basi cuneata, calyce plus quam duplo longiora, rosea, striis saturatioribus longitudinalibus. *Stamina* quinque: antheris longitudinaliter dehiscentibus. *Styli* 5, indivisi: stigmatibus lateralibus elongatis papillosis. *Semina* oblonga, nigra, subpunctata.

Obs. *D. Platystigma* valde affinis; sed diversa foliis majoribus, scapo adscendente praesertim floribus minoribus, stylorum numero, stigmatibusque elongatis non peltatis.

3. ***Drosera pygmaea* DC.** foliis minimis orbiculatis subpeltato-petiolaris supra margineque glanduloso-ciliatis, stipulis scariosis, scapo simplici erecto paucifloro calyceque subglanduloso, stylis tribus indivisis, stigmatibus elongatis lineari-subclavatis. — DC. Prodr. 1. pag. 317.

Drosera micrantha Lehm. l. c. pag. 39.

Rarissime occurrit in locis arenosis prope oppidulum Perth, -d. 26 m. Sept. 1839 lect. Herb. Preiss. No. 1995.

Radix e fibrillis paucis, filiformibus, simplicibus, brunneis constat. *Folia* numerosa, dense rosulata, inferiora terrae adpressa, plerumque rufescentia, superiora in statu sicco obscure viridia, omnia 2 lin. longa. *Lamina* orbiculata, semilinearis, non sensim in petiolum attenuata sed subpeltato-petiolata. *Pili* glandulosi marginem foliorum cingunt et laminam longitudine superant. *Stipulae* scariosae ad basin petiolorum, margine serratae, acute trifidae, lobis iterum divisis in lacinias plures setaceas. Haec stipulae in apice rosularum saepe dense aggregatae, imbricatae, bulbillum referunt alium ut in *Drosera Platystigma* et *pulchella*, sed in his bulbillus ob folia majora minus conspicuus est. *Scapus* pollicaris, rarius bipollicaris, filiformis line inde glandulis minutis instructus, rarius glaber et subnitidus, apice 2-6 florus. *Pedunculi* breves vix semilineam longi, ut et calyces subglandulosi vel glabriusculi. *Sepala* lanceolata, obtusiuscula, ½ lin. longa. *Petala* obovata, alba, calyce paullo longiora. *Stamina* brevissima, glabra: antheris subrotundis. *Ovarium* sphaericum, glabrum. *Styli* 3, simplices, breves: stigmatibus linearibus subclavatis indivisis, papillosis, stylo longioribus.

Obs. Characteribus accedit ad *Droseram Platystigma* et *pulchellam*, sed habitu valde est diversa. A priori differt praeter alias notas: floribus multo minoribus albis, a posteriore foliis minimis, scapo erecto. floribus minoribus stylorumque numero.

Cucurbitaceae, Juss.

Cucumis Linne

C. pubescens Willdenow

In interioribus legumētis omnibus
armigari perignatoris Mart.

C. ....

Introductus occurrit ad Terras
plumum & in hortis

Species ut videtur apud Hb
nondum descripta. Tunc accedit
C. prophetarum, sed fructus valde
amari sunt. Foris idem ac C. Spu-
do-colocynthis Koyli monium
Minalagysium, tamen haec
valde ingratum ap. Walpers descripta

Drosera pygmaea DC.

B. Ant. Stuart. sine numero, Forster
e loco delatiano. ^{Wag. Cap. Juss.} Descripta
Lichmanniana. fraxum 2-6 florum
signat, quae ipse semper uniflo-
rum inveni, uti etiam diagnosi
Groniana docet. — Sir. Stuartii
Littor. in herpatis Eucumens
Wag. In utiginosis ad St. South
Cock river Dec. 1848. hb. N. Tarn II
n. 280. In: D. pygmaea R. Person
K. (L. D. Humboldt).

Habitu & fol. forma Tetragonellae.

Tetragonia inermis: Calyx 4fidus: lavi-
nis 2 latioribus obtusis 2 acutioribus &
angustioribus, rarior aristatus. Stamina
a cortu pauciora pro ca. Goe breviora
Anther flavae. Siliqua 4-7 linearia
brevipinna flavo virentia
Anth: vire.

J. Whittakeri Planchon

x G. Lingens? Geri Müller

^{in foliis} ^{in foliis} ^{in foliis}
ciliatis simplicibus, longioribus, unguibus,
ciliis regulatis, fere obovatis cu-
neatis supra margineque glan-
duloso ciliatis, pubescentibus ag-
gregatis unilobis folia foliorum
lanceolata, valde etiam globosa, lamini-
bus longiore, radice subrotunda.

A. et Dr. Kehr vitiose ad G. rosula
nam a me ipso ut varietatem G.
macrophyllae excoctam plantam
nunc sine ullo dubio percipere ut
utroque segregari. Ad ampliorum
descriptionem Descriptio perita est
cundum scriptum vivam facta.

Gulbas, thauricus lamellis hirsutis mun-
danas, latus, intus latitudo - coarctatus
avellanae vixit magnitudine. Caulis
pauciguttulatus linearis diametro simpliciter
ciliatus v. pubescentibus, hirsutis, crassius
folia, latus in vixit, pluresque 6-12 in v.
folium expansa 1-2^o lq et 1/2-1^o lq. apice
rotundata. Capi utrinque globosa plures
via, una medio maxime prominula. Clau-
dula, calicorum, ligulatae delictus ut fatus
purpureas, cum hirsutis vixit 1^o lq. Capi
sub foliis, pauci vel nulli ciliis, tota
ocallum fructiferi, globosum, globi
ferebatur. Sepala lanceolata demum
ovata 3-4^o lq 1-2^o lq. in hirsutis v. nigrescenti-
viridia sub anthip, reflexa prius, hirsutis
pervasis latis, dupli vixit. Ciliata. Staminum
numerus varius 3-6. Filamenta alba livida
curvata, agglutina, utitur, subrotunda, hirsutis
Ciliata, subrotunda, viride glabrum. Stylis
ciliatis multiplex.

G. v. ciliata, fragis unilobis
habet. hb. L. v. l. nat. num 226.
ex catalogo in solo argillaceo.
fr. suavis, pr. vixit. in liliis, Lot.
hy-ridge "

Sect. II. ERGALEIUM DC. l. c.

§. 1. CAULESCENTES.

* *Foliis rosulatis.*

4. ***Drosera rosulata* Lehm.** caule brevi simplici squamoso, foliis rosulatis late obovatis basi cuneatis supra margineque glanduloso-ciliatis, pedunculis aggregatis unifloris folia aequantibus, calycibus glabris. Lehm. l. c. pag. 36.

Crescit locis arenoso-turfosis ad fluvium Cygnorum prope oppidulum Perth, d. 29 m. April. 1839. Herb. Preiss. No. 1983.

Radix in speciminibus Preissianis deest, sed verisimiliter bulbosa. *Caulis* erectus, pollicaris, et paullo longior, fibris cinerascentibus dense tectus. *Folia* 6-8 in rosulam expansa ut videtur terrae adpressa, 6 lineas circiter longa, 3-3½ lin. lata, obovata, apice rotundata basi cuneato-attenuata, non petiolata, nervo medio basi valde incrassato apice tenuiore ramulosoque percursa, subtus glaberrima, supra et margine glandulis stipitatis purpureis, cum stipite fere lineam longis ciliata. *Pedunculi* congesti, (4-10) longitudine foliorum, juniores breviores, glaberrimi, teretes, semper uniflori. *Sepala* ovata, acuta, glabra, 2 lin. longa. *Petala* calyce triplo longiora, obovata, basi cuneata, alba striolis (in floribus siccis non discoloribus) longitudinalibus. *Stamina* 5, calyce vix breviora. *Filamenta* aequalia: antheris subrotundis. *Ovarium* subsphaericum, glabrum. *Styli* capillaceo-multifidi. Secundum adnotationes Preissianas antherae in viva planta sunt badiæ, filamenta alba et germen cum stylis viridi-flavum.

Obs. Valde similis *Droserae bulbosae* Hook. Icon. plant. tab. 375; sed nostra est humilior, foliis sessilibus triplo latioribus. *Pedunculi*, qui in icone Hookeriana foliis duplo longiores reperiuntur in *Drosera rosulata* folia non superant. An forsan varietas?

A *Drosera erythrorhiza* Lindl. differt statura humiliore et praesertim pedunculis brevibus unifloris.

5. ***Drosera erythrorhiza* Lindl.** radice bulbosa coccinea. caule brevi simplici, foliis rosulatis obovato-rotundatis supra marginibusque villosis glandulosis pedunculo solitario ey-migero, cyma puberula. — Lindl. Swan-River Bot. pag. XX. n. 90.

In arenosis umbrosis sylvae prope oppidulum Perth, d. 13 m. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 1987.

Caulis pollicaris squamis nonnullis lanceolatis glabris. *Folia* 6-7 lin. longa, 5-6 lin. lata, basi subangustata subtus glaberrima, supra margineque pilis albis (½ lin. longis) glandula purpurea terminatis dense vestita. *Pedunculus* glaberrimus circiter bipollicaris. *Cyma* 6-20-flora. *Pedicelli* plerumque glanduloso-puberuli. *Sepala* ovata, acuta, 2½ lin. longa. *Petala* alba calyce duplo longiora. *Stamina* calycem subaequantia: antheris subrotundis. *Styli* capillaceo-multifidi.

6. ***Drosera macrophylla* Lindl.** radice tuberosa solida, caule simplici, foliis (magnis) rosulatis cuneatis apice truncatis in petiolum brevem attenuatis supra marginibusque glanduloso-pilosis, pedunculis aggregatis folio longioribus 2-3 floris. — Lindl. l. c. n. 91. Hook. Icones plant. Vol. IV. tab. 376.

In solo turfoso humido ad portum Princess Royal Harbour, d. 17 m. Junii 1839. Herb. Preiss. No. 1986.

Affinis *Droserae erythrorhizae*, a qua differt: foliis duplo majoribus basi magis attenuatis, tenuioribus reticulato-venosis, pedunculisque gracilioribus 1-3 floris.

7. ***Drosera glanduligera* Lehm.** foliis parvis obovato-rotundatis in petiolum attenuatis supra margineque glandulosis; seapo suberecto pedunculisque racemosis glandulosis. Lehm. l. c. pag. 37.

In solo sublimoso inter frutices Perth, d. 30 m. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1976.

Planta pusilla. *Folia* omnia radicalia. *Lamina* obovata, rotundata, subtruncata, longitudine fere petioli, $2\frac{1}{2}$ lin. longa, subtus glabra, supra margineque pilis longioribus basi latioribus apice glandulosis instructa. *Scapus* erectus fere pollicaris, a basi ad apicem usque pilis glanduligeris tectus, in singulo specimine subsimplex apice biflorus in reliquis omnibus floribus (4-8) racemosis instructus. *Pedunculi* glanduloso-pilosi, 2 lin. circiter longi. *Flores* punicei, primum erecti, dein horizontaliter patentes vel subflexi. *Calyx* extus glandulosus, sepalis lanceolatis, basi subattenuatis, lineam longis, margine fimbriatis: fimbriis glanduligeris. *Petala* obovata, basi cuneata, calyce duplo longiora.

8. ***Drosera ramellosa* Lehm.** caule brevissimo apice squamoso plerumque stolonifero, foliis parvis rosulatis suborbiculatis in petiolum attenuatis utrinque glabris margine glanduloso-ciliatis, pedunculis 1-3 floris foliis subduplo longioribus. Lehm. l. c. pag. 40.

In locis arenosis humidis prope lacum insulae Rotenest, d. 17 m. Junii 1839. Herb. Preiss. No. 1990.

Planta pusilla, vix pollicaris, glabra. *Radix* ut videtur bulbosa. *Caulis* semipollicaris, prope basin nudus, apicem versus squamis nonnullis glabris tectus et verticillo foliorum unico terminatus. Ex axillis foliorum oriuntur rami laterales seu stolones ascendentes, seminunciam fere longi. *Folia* ramorum lateralium alterna, ceterum reliquis conformia, omnia orbiculata, subcuneata et in petiolum aequilongum decurrentia, cum petiolo 3 lineas longa, glabra, margine pilis apice glandulosis ciliata. *Flores* solitarii insident pedunculo glabro, simplici vel subramoso et tunc 2-3 floro stolonibus vix longius quidem longiore. Quandoque pedunculi uniflori oriuntur in axillis foliorum ramorum lateralium, sed hi pedunculi semper sunt brevissimi et folia non superant. *Sepala* ovata, obtusa, glabra, apice denticulata, $1\frac{1}{2}$ lin. longa. *Petala* obovata, alba, calyce longiora. *Styli* tres, in lacinias 6 vel plures irregulares vel potius inaequales divisi.

9. ***Drosera porrecta* Lehm.** bulbo sphaerico coccineo, caule erecto anguloso glabro saepe stolonibus adscendentibus instructo, foliis verticillatis orbiculatis in petiolum angustatis, pedunculo e verticillo supremo orto apice paniculato subglanduloso. Lehm. l. c. pag. 41.

In locis arenosis montis „Eiza mountain“ Perth, d. 20 m. August 1839. Herb. Preiss. No. 1985.

Radix gracilis, perpendicularis, basi bulbo parvo, sphaerico, intus pulchre coccineo terminata, tota longitudine fibris tenuissimis subflexuosis et apice squamis herbaceis instructa. *Squamae* inferiores minimae, lanceolatae, sequentes majores, supremae infra verticillum foliorum primum positae li-

Eragra anagallidiflora Nutt. Mill.

E. glandulifera Lohm! Nov. Holl. austr.

hb. M. sine descriptione loc. natalis. & num. Sp. Stuart. (e littoris)

Ad flum. Torrens passim in humidiusculis. Scapus saepe 2".

In pratis collinis ad Lindoch-valley

perundum plurimum Gauderi Sept.

48. Ad radices montium Bo-

raffoi-range. Sept. 48. Flores

minuti. eos Anagallidis phal-

nirae acuminantur. ^{adoneo} Tamen spec.

prosumum forte in *E. anagalli-*

difloram mutandum & rejici-

endum est. An forte species forti-

onis? In istius vespasium

Prinoli-Way ad montem Beer.

Oct 48. Hinc inde in montibus

Bugle-range. Nov. 1848.

Mulge nativorum

Ursanthemum praeox, Nutt. Mill.

sulphureo-purpureo, ramis erectis,

plis triquetris glaucis viridibus ^{puberulis} basi

connatis margine ^{puberulis} crenulatis, floribus

solitariis binisve immediate sub ca-

lyce bracteis ²foliiformibus suffultis,

in pedunculata arripibile

habitu non prostrato jam ab omnibus

supralasiris & omnibus queat. Jam

octobre fructus maturant, dum alia ²florant.

Solia ac Nys. inaequaliter

triginta attamen suplo minor. Intra

valley vultus. In planis vicibus subsp. ad

latu occidentale montium Flinders range

neari-subspathulatae, foliis simillimae et ab iis vix distinguendae. Verticilli semper duo, ex foliis decem compositi. *Folia* 5 lin. longa, *lamina* orbiculari, margine pilis purpureis glandulosis; petioli modo angustiores modo latiores, sensim in folium dilatati. *Caulis* circiter pollicaris, angulatus, glaber, verticillo foliorum altero terminatus. Ex hoc verticillo oritur *pedicellus* solitarius, vel 2-4, quorum unus et intermedius reliquis longior est. *Pedicellus* intermedius 3-4 poll. longus, glaber, aphyllus, laterales — si adsunt — circa bipollicares, verticillum unicum foliorum orbiculatum, petiolo 2-5 linearis insidentium ferentes. *Paniculae* corymbosae vel subracemosae; rami glandulis minutis sparsis instructi, plerumque basi bracteis setaceis fulti, inferiores 4-6 lin. longi, superiores breviores. *Sepala* in speciminibus siccis nigricantia, ovata, acuta, apicibus patentibus vel subreflexis. *Petalum* alba sepalis duplo longiora. *Antherae*, teste cl. Preissio, sulphureae. *Styli* capillaceo-multifidi.

Obs. Simillima *Drosera stolonifera* Endl. in Hüg. Enumerat., a qua differt: stolonibus lateralibus brevibus vel nullis, praesertim vero eo, quod flores semper e verticillo foliorum superiore proferuntur, nunquam vero e verticello inferiore.

10. ***Drosera stolonifera* Endl.** foliis radicalibus spathulatis rosulatis, stolonibus e basi procumbente adscendenti-bus, foliis suborbiculatis petiolatis quaternatim verticillatis scapum racemoso-paniculatum aequantibus, calycibus glabris. Endl.! in Enumerat. plant. Hüg. pag. 5. n. 13.

In locis arenosis umbrosis inter frutices silvae prope Peninsulam, Perth, d. 31 Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1984 et in solo turfoso-arenoso prope montem Wuljenup, Plantagenet, No. 1977.

Stolones nunc scapo florifero breviores nunc eo longiores, non semper steriles sed interdum ex axilla inferiore vel ex suprema pedunculos solitarios emittentes. *Folia* internodiis breviora nunquam longiora, petiolo latiori vel angustiori insidentia. *Flores* albi.

** *Foliis sparsis solitariis ternisve.*

11. ***Drosera Hügelii* Endl.** caule erecto flexuoso glabro, foliis sparsis longe petiolatis peltatis orbiculatis, racemis paniculatis, pedicellis bracteisque glaberrimis, petalis sepala acutiuscula glaberrima ciliata duplo superantibus. Endl.! in Enumerat. plant. Hüg. pag. 6. n. 15.

In solo turfoso humido inter frutices densos plantitiei prope oppidulum Albany (Perth,) d. 8 m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1980.

Flores secundum adnotationes Preissianas purpurei. *Petalum* calyce plus minusve longiora. *Filamenta* calyce duplo breviora, antheris oblongis. *Styli* capillaceo-multifidi.

12. ***Drosera pallida* Lindl.** caule erecto flexuoso glaberrimo, foliis caulinis alternis longissime petiolatis peltatis orbiculatis glanduloso-fimbriatis, axillaribus brevibus geminis, racemis terminalibus paniculatis, petalis sepala acuta integerrima duplo superantibus. Lindl. Swan-River Bot. pag. XX. n. 87.

In arenosis subumbrosis haud longe ab oppidulo Perth, d. 29 m. April. 1839. Herb. Preiss. No. 1996.

Bipedalis et ultra. *Caulis* ad medium usque aphyllus, sed squamis nonnullis lanceolatis lineam longis instructus. *Folii* longioris petioli ultra pollicaris folia brevia triplo superans. Internodia nunc semipollicaria nunc pollicaria.

13. ***Drosera macrantha* Endl.** caule erecto flexuoso puberulo, foliis caulinis alternis longissime petiolatis, axillaribus geminis, peltatis orbiculatis, racemis terminalibus paniculatis, pedicellis bracteisque pubescentibus, petalis sepala obtusiuscula pubescentia ciliata duplo superantibus. Endl. in Enumerat. plant. Hügel. pag. 6. n. 14.

In locis arenosis silvae prope oppidulum Guildford, d. 31 m. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1982.

Caulis bipedalis et ultra, basi bulbo minimo subtunicato instructus. *Flori* secundum cl. Preiss albi vel rosei. *Petala* subconcaua. *Antherae* sulphureae.

14. ***Drosera sulphurea* Lehm.** caule erecto flexuoso glaberrimo, foliis caulinis alternis longe-petioliatis, axillaribus geminis ternisve peltatis triangulari-lunatis, racemis terminalibus paucifloris, pedicellis glabris, petalis sulphureis sepala acutiuscula pubescentia ciliata duplo superantibus. Lehm. l. c. pag. 43.

Crescit in districtu Plantagenet in solo turfoso et inter frutices densos plantis prope oppidulum Albany. Herb. Preiss. No. 1981.

Caulis erectus, 1-1½ pedalis, subangulatus, angulis inter folia evidentioribus, in parte inferiore squamis nonnullis exiguis lanceolatis instructus, a medio foliosus. *Folia* alterna, longe petiolata, petiolo subpollicari basi latiore canaliculato, apice tereti. Internodia nunc pollicaria nunc semipollicaria. Folia axillaria plerumque bina, interdum etiam terna, petiolo brevissimo bilineari, teretiusculo. Foliorum *lamina* peltata, lunato-triangularis, basi truncata auriculata, auriculis duabus e ciliis longis deorsum spectantibus laminam aequantibus formata, subtus glabra, in disco et margine ciliis glandulosis basi latioribus obsita. *Inflorescentia* subracemosa, e floribus 3-6 composita. *Pedicelli* erecti, glabri vel apicem versus glandulis paucis instructi, inferiores circa 4 lin. superiores 2-3 lin. longi. *Bractee* minutae, lineares, margine glandulosae. *Sepala* ovata, acuta, 2 lin. longa, in statu sicco nigrescentia, intus glabra, extus glandulis brevibus densis pubescentia, margine pilis longis, minutissime glandulosis ciliata. *Petala* sulphurea, obovato-cuneata, 4 lin. longa, apice subtruncata, 2 lin. lata. *Filamenta* calycis longitudine, glabra; antheris oblongis. *Ovarium* glabrum. *Styli* capillares multifidi, staminibus subbreuiores.

15. ***Drosera Neesii* Lehm.** caule erecto glabro, foliis caulinis alternis longe petiolatis, axillaribus geminis, peltatis triangulari-lunatis, racemis terminalibus subpaniculatis, pedicellis glandulosis, petalis purpureis sepala acutiuscula puberula glanduloso-ciliata triplo superantibus. Lehm. l. c. pag. 42.

In solo turfoso ad portum Princess Royal Harbour, m. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 1978.

Radix ut videtur bulbosa. *Caulis* bipedalis, basi teres, apicem versus subangulatus, subflexuosus, glaber. *Folia radicalia* nulla, caulina inferiora squamiformia, linearia seu lineari-lanceolata, 1-2 lin. longa, *superiora* internodiis pollicaribus sejuncta, alterna, petiolo pollicari, prope basin canaliculata.

D. pellata. Smith. St. Luech

D. fulfurea! Vehr non Lehmann.
Irresistibilis in pl. sua a D. hirsuta
numerosa prius D. pilicaulis
advenit. Ad D. pellatam plan
tam trahere licet Lanthum &
D. grandis hirsuta D. hirsuta caule
oblongum. Caulis juvenilis saepe
glandulas spargas, sicut et passim
in ramis divinus est, palis virid.
Laribus diffusus v. instructus.
Folia radicalia intusum, cito
emarescentia. Flores viridi D. pilicaulis
minores. Caulis pl. diaminat
pore pedalis. Flores albi v. rosei.
In graminis praecipue collum &
montium Sept. - Nov. 1848. Nov.
Holl. austr. passim. — In humides
prope Lannostan, V. d. L., Oct. 48 etc.
cum sequente confusa sub. num. 176.
Hb. M. H. Traa rure D. hirsuta, sed
gradat. Surcus viridus odore aporeque
nausoso. M. Fl. hirsuta - rure hirsuta

D. leiocalyx! Herd Muller

caule ~~oblongo~~ ^{principali v. caulescente} fluxuoso glaberrima, palis ra
divalibus repulosis, caulis aeternis sub
tus glabris, supra marginique glandulis
pungentibus acutis longe petiolatis, ped
iculis triangulatis linearibus, juvenis tri
minatilibus paucifloris subpaniculatis
induratis glabris, petalis roseis sepala ovata
oblonga linearibus glabra duple superioribus
Hb. M. H. St. fr. num. & linearibus adnotata

Sione

Alia proxima, qua ipse colligi
fuit Aug. 1848 ad viam versu
Glen - Ormond a Stuartianis
vix separabilia rectius ab flor
folia axillaria obolata & cau
lim humiliorum ad D. pellata!
Im sunt frangenda.

[illegible]

L. binata Leck. Billardiere! Mar. 1847.
 hb. Mus. n. 227. Quoniam tu hujus
 in f. varietate *S. pygmaea* est.
 In religinosa - paludosis arce
 Murry, Tasm. hb. V. T. n. 46.
 Jan. 25. 1848. In humo, is maris
 umbratis ad cataractam huius
 montium *L. pygmaea* - raris rursus laetum.
 Petioli & foliola compressa. Caulis de
 reticulatus. Et foliola, prae- alba. Vitis
 est aurantiaca. Signata dichotoma
 cum germine filamentisque flore
 viridia. Foliola haud raro divisa, quae
S. pecta hujus vel rectius haud ipse
S. pectata varietas esse videtur.
 Leck. exodo raris et initio agglatis.

culato, apice tereti, glabro, patenti vel subincurvo insidentia. Foliorum *lamina* lunato-subtriangularis, auriculis 2 longe ciliatis, diametro bilineari, subtus et in disco glabris, margine pilis basi latioribus apice glandulosis, diametrum laminae aequantibus ciliata. *Folia axillaria* gemina, brevi petiolata, petiolo glabro trilineari, lamina conformi. *Flores* in racemum subpaniculatum dispositi. *Pedicelli* glandulis brevibus obtecti, primarii circiter pollicares, secundarii 2-3 lin. longi, erecti vel subpenduli, deflorati semper erecti. *Bracteae* ad basin pedicellorum, minimae, ciliatae. *Sepala* ovata, acuta vel sublanceolata, 2 lin. longa, extus glanduloso-pubescentia, margine fimbriato-ciliata, ciliis apice glanduligeris. *Petala* late obovata, sepalis triplo longiora et multo latiora, apice denticulata, purpurea. *Stamina* calyce breviora; filamentis glabris; antheris subrotundis. *Ovarium* subsphaericum. *Styli* capillaceo-multifidi, longitudine staminum. *Semina* immatura arcuatim caudata, membranaceo-arillata, parte crassiore dilatato calyculata, oblique truncata.

Obs. Proxime accedit ad sequentem, differt vero caule multo robustiore folisque non orbiculatis. A *Drosera peltata* Sm. (Labill. Nov. Holl. Vol. I. tab. 106 fig. 2) facile distinguitur caule robustiore, foliis radicalibus nullis, caulinis fasciculatis et floribus multo majoribus.

16. ***Drosera filicaulis* Endl.** caule erecto flexuoso glaberrimo, foliis caulinis alternis longe petiolatis, axillaribus geminis peltatis orbiculatis, racemo terminali paucifloro glabro, bracteis eiliatis, petalis sepala obtusiuscula puberula eiliata plus duplo superantibus. Endl. in Enumerat. plant. Hügel. pag. 6. n. 16.

In locis uliginosis inter frutices prope oppidulum Perth, d. 1 m. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1988.

Caulis pedalis et ultra, purpureo-nitidus, basi bulbosus et tunicatus. *Racemus* pauciflorus. *Filamenta* calyce breviora; antheris oblongis. *Styli* capillaceo-multifidi.

17. ***Drosera gigantea* Lindl.** caule erecto paniculato glaberrimo, foliis brevi petiolatis peltatis triangularibus, longissime fimbriatis, axillaribus geminis fere aequilongis, panicula laxa multiflora, alabastris subrotundis, petalis sepala acuta glaberrima superantibus. Lindl. Swan-River Bot. pag. XX. n. 88.

In locis turfoso-arenosis aquaticis inter frutices prope oppidulum Perth, d. 1 m. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1991.

Radix perpendicularis tunicata. *Caulis* basi simplex apice paniculatus, erectus $1\frac{1}{2}$ -2 pedalis, subangulatus, glaberrimus, squamosus: squamis lanceolatis vel lineari-lanceolatis in parte caulis inferiore aggregatis, apicem versus sparsis. *Folia* peltata, non cauli sed ramis tantum insidentia, internodiis circiter pollicaribus sejuncta. *Petioli* folii longioris 4-5 lin. longus, illi foliorum axillarum paulo breviores. *Lamina* triangularis, duas fere lineas lata, fimbriato-ciliata: ciliis ex angulis 2 inferioribus egredientibus longissimis, lamina duplo longioribus. *Rami* inferiores apice subramoso 10-20-flori, paniculam laxam formantes superiores sensim breviores pauciflori. *Flores* parvi, albi, pedunculo brevi lineari glabro insidentes. *Calycis* glabri sepala ovata, acuta, lineam longa, petalis ovato-oblongis subtriplo breviora. *Filamenta* brevia longitudine fere calycis.

SONDERA Lehm. Pugill. VIII. pag. 44.

Calyx profunde 8-fidus, aequalis. *Petala* 8, hypogyna oblonga vel oblongo-linearia. *Stamina* 8, petalis alterna, filamenta lineari-subulata, antherae extrorsae, biloculares: loculi longitudinaliter dehiscens. *Ovarium* uniloculare pluriovulatum placentis parietalibus. *Stylus* terminalis partitus, cruribus pedicellato-multipartitis, stigmata obtusa. *Capsula* membranacea, multilocularis, bivalvis. *Semina* linearia, teretia in processum filiformem elongatum attenuata, testa crustacea, basi obliqua superliciei capsulae affixa.

Herbae Australasiacae elegantissimae, *Drosera*-~~taxum~~ habitu, caule erecto, foliis alternis infimis squamiformibus reliquis orbiculatis, petalis glanduloso-pilosis, junioribus circinatis, floribus terminalibus, subsolitariis albis vel roseis.

1. *Sondera macrantha* Lehm. sepalis ovatis obtusis corolla triplo brevioribus, petalis oblongo-linearibus. Lehm. l. c.

Habitat in solo turfoso-arenoso planitie prope oppidulum Albany. Herb. Preiss No. 1979.

Radix bulbosa cum inferiore caulis parte tunicata. *Caulis* 1-1½ pedalis, subflexuosus, subangulatus, glaberrimus. *Folia infima* sessilia, sub aggregata, squamiformia, plana, lineari-lanceolata, 2-3 lin. longa, glabra *superiora* petiolata, alterna, interstitio 3-6-lineari sejuncta, axillaria interdum hinc sed plerumque deficientia. *Petiolus* 3-4 lin. longus, basi subsulcatus, glaber. *Lamina* semilunaris, excentrice peltata, supra margineque glanduloso-ciliata, subtus glabra. *Flores* terminales gemini, longe pedicellati: pedicellis glabris, ultra pollicem longis. *Calyx* laciniis ovatis obtusae, 3 lin. longae, glabrae, margine glandulosae, siccitate nigrescentes. *Petala* oblongo-linearia, prope basin attenuata, 7-8 lin. longa, in plantae exsiccata rosea, striis longitudinalibus saturatioribus. *Stamina* calycem subaequantia. Filamenta glabra: antheris subrotundis, longitudinaliter dehiscens. *Styli* capillaceo-multifidi. *Capsula* subsphaerica, membranacea, glabra, 3 lin. longa, bivalvis. *Semina* nigricantia, glaberrima, basi obliqua latius superficiei internae capsulae affixa, lineari-subulata, 2 lin. longa, in processum (caudam) filiformem curvatum eadem longitudine attenuata.

2. *Sondera Preissii* Lehm. sepalis ovatis acutiusculis corolla quadruplo brevioribus, petalis oblongis. Lehm. l. c. pag. 45.

Crescit prope oppidulum Perth in locis depressis exsiccatis ad fluvium Cygnorum Herb. Preiss. No. 1989.

Radix ut videtur bulbosa. *Caulis* erectus, pedalis, subangulatus, subflexuosus, glaberrimus, prope basin foliis sessilibus, squamiformibus, lanceolatis vel lineari-lanceolatis, 1-3 lin. longis tectus. *Folia* reliqua omnia petiolata, alterna, internodiis semipollicaribus sejuncta, erecto-patentia, nallaria nulla. *Petioles* glabri, 3-4 lin. longi, teretiusculi, basi latiore subenaliculati. *Lamina* foliorum excentrice peltata, semilunata, lineam longa et vix 1½ lin. lata, subtus glabra, supra margineque glanduloso-ciliata: ciliis marginalibus lamina ipsa longioribus, glandula nigra, subcapitata terminatis. *Flores* terminales, plerumque solitarii, rarius bini. *Calyx* glabri laciniis ovatae, acutae, 1½ lin. longae, siccae nigrescentes, margine glandulis breviter stipitatis ciliatae. *Petala* oblonga, obtusa, versus basin subattenuata, 5 lin.

longa, alba vel subrosea: striis longitudinalibus tenuissimis saturatoribus. *Stamina* calyce subbreviora, lineari-subulata: filamentis glabris, antheris subrotundis, longitudinaliter dehiscentibus. *Ovarium* sphaericum, glabrum. *Styli* capillaceo-multifidi, glabri: stigmatibus obtusis.

BYBLIS Salisb. Endl. gen. no. 5035. Ejusd.
Iconogr. gen. plant. tab. 113. Meisn. gen.
pag. 22. (19.)

1. **Byblis gigantea** Lindl. glanduloso-pubescens, caule erecto flexuoso (sesquipedali), foliis longissimis filiformibus, pedunculis solitariis unifloris axillaribus foliis brevioribus, sepalis lineari-lanceolatis 3-5-nerviis quam petala serrulata duplo brevioribus, stigmati simplici. Lindl. Swan-River Bot. pag. XXI. n. 92.

In locis arenosis inter frutices planitiei haud longe a praedio rustico „Maddington“ ad fluvium Canning, d. 1 m. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 1993.

CRUCIFERAE Juss.

(Auctore A. BUNGE.)

STENOPETALUM R.Br. Endl. gen. n. 4920.
Meisn. gen. pag. 13. (13.)

1. **Stenopetalum gracile** Bge. foliis radicalibus inferioribusque caulinis pinnatipartitis; laciniis utrinque 2-3 distantibus linearibus obtusiusculis integerrimis vel dente majusculo auctis, superioribus tripartitis linearibusve integerrimis, racemis florentibus laxis, pedicellis calyce brevioribus demum cernuis, petalis sepala 3plo superantibus (albis), ovario 12-ovulato, silicula . . . . ?

In arenosis umbrosis vallis haud longe ab ora maritima Perth, 24. Juni 1839. Herb. Preiss. No. 1938.

A *St. lineari* R.Br. distinctum, uti sequentes, pedicellis demum cernuis, nec erectis. *St. robusto* Endl. affine videtur, at diversum: foliis neutiquam interrupte lyratis, pedicellis brevioribus, floribus majoribus, petalis longioribus. — *Caules* erecti, stricti, solitarii e radice tenui (bienni? vel annua), florentes pedales, diametro ad summum 0,8^m metientes, teretes, striati, glabri. *Folia radicalia* 1½-2 pollicaria, pinnatipartita, rhachi lobisque utrinque 2-3, linea angustioribus, linearibus, inferioribus brevioribus, 2^m longis, caeteris 4-5^m longis, terminali longiore, apice obtusis vel rotundatis, integerrimis vel basi dente majusculo auctis, terminali saepius medio utrinque denticulis 2 brevibus instructo; *caulina* inferiora similia, superiora plerumque tripartita, lobis ut in radicalibus, vel etiam magis elongatis; *summa* et *ramea* linearia.

Racemi gracillimi, multiflori, jam florentes valde elongati, floribus ab invicem 7-10^m distantibus. *Pedicelli* lineam longi, erecti, subinde cernui. *Sepala* albida, nervis 3 viridibus tenuissimis picta, infra apicem gibbosa, valvaria 1,7^m longa 0,7^m lata, placentaria breviora angustiora. *Petala* alba ex toto 6^m longa, latiora, strictiora quam in sequentibus, lamina obliqua. *Stamina* ealyceum subaequantia. *Glandulae* hypogynae valvariae fere subulatae. *Ovarium* 12-ovulatum. Fructus, vel juniores, desunt.

2. ***Stenopetalum croceum* Bge.** foliis radicalibus inferioribusque pinnatifido 3-5-lobis; lobis lineari-spathulatis, summis linearibus integerrimis, racemis florentibus laxis, pedicellis calyce dimidio brevioribus demum cernuis, petalis sepala quadruplo superantibus (croceis) ovario 12-ovulato, silicula orbiculato-obovata pedicellum superante.

In arenosis sylvae haud longe ab oppidulo Perth, 13. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1939.

A praecedente facile distinctum florum colore, petalis angustioribus longioribus contortes. — *Caules* basi violacei, fructiferi altitudinem pedalem haud excedentes, plerumque humiliores. *Folia radicalia* fere omnia deperdita, e rudimentis videntur similia sed minus dissecta ac in antecedente: *caulina* omnia linearia. *Racemi* elongati. *Pedicelli* florum linea vix longiores. *Sepala* valvaria obovato-oblonga, albida, infra apicem extus gibba viridula, late membranaceo-marginata, 1,9^m longa, basi in sacculum producta, placentaria 1,7^m longa, superne 0,8^m lata, basi cuneata, apice obtusata. *Petala* crocea, unguiculata, lamina in appendiculum lineari-lanceolatum apice circumnatum longe producta, basi crispato-marginata, exteriora videntur paulo longiora, omnino explanata, 8^m longa, (unguiculo 1^m, lamina 1^m, appendice 6^m longis.) *Filamenta* longiora sepala aequantia. *Glandulae* hypogynae valvariae utrinque binae, obovatae, placentariae nullae. *Ovarium* oblongum stamina subaequans, 12-ovulatum. *Stigma* sessile, capitatum, obsolete bilobum. *Silicula* (nondum omnino matura) 1,9^m longa, 1,5^m lata, obovato-suborbicularis, valvis convexiusculis, reticulato-venosis. *Semina* in loculis 2-3 (immatura) obovata, laevia, fusca. *Dissepimentum* tenuissime dense reticulato-areolatum, pliea opaea, apicem versus evanida medio pereursum.

3. ***Stenopetalum minus* Bge.** foliis radicalibus inferioribusque basi cuneatis obovato-oblongis inciso-dentatis: lobis utrinque 2-3 obtusis distantibus, summis lineari-oblongis integerrimis, racemis florentibus abbreviatis, pedicellis calyce brevioribus demum cernuis, petalis sepala duplo superantibus (croceis), ovario 8-ovulato, silicula . . . ?

Ad Princess Royal Harbour Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 1936.

Cum *St. croceo* convenit floris colore; ab hoc vero et *St. gracili* differt statura humili, petalorum longitudine et ovario. — *Radix* simplex, annua: (vel biennis?). *Caules* solitarii, (vel in unico specimine, ex una radice plures, laterales duo videntur steriles subaphylli?) basi puberuli, vel glabri, florentes 3-4 pollicares. *Folia radicalia* et *caulina infima* fere rosulata, pollicaria, cum dentibus 3-4^m lata, dentibus lobisve linea paulo longioribus, lanceolato-triangularibus, subcurvatis, obtusiusculis; *superiora* angustiora dentibus minoribus, caulina caetera pauca, 5^m longa, lineam lata, integerrima. *Racemi* terminales et axillares, florentes 1-1½ pollices longi, ebracteati, vix ultra 10 flores gerentes. *Pedicelli* lineam vix aequantes, ante petalorum expansionem erecti mox nutantes. *Flores* omnino praecedentis, at minores. *Sepala* breviora latiora, valvaria 1,5^m longa, 0,9^m lata, placentaria paulo breviora et angustiora. *Petala* 4,2^m longa, appendice 2,2^m. *Ovarium* videtur 8-ovulatum. *Fructus* desunt. *Glandulae* valvariae tenuiores magis elongatae.

Cardamine. Linn. gen.

Cardamine Banksii in St. J. 1848

Cardamine hirsutissima heterophylla
var. hirsutissima heterophylla Forst.
in vallibus montium Löffl. - rano
praeputium ibidem veris. Ca
laractam. flor. 3. 1848. In sola
fualo ad montem Thaurstahl.
Apr. 15. 1848. pl. annua. Sim re
nuie & designatione loci natalis
inter plantas Tasmannicas a
Quartio misas occurrit. 1848

Cardamine intermedia Hook.

fl. pl. 1848. St. J. 1848. Tasmannica
Nepenthes filifera Stuart & C. 1848. 1848.
1-31 alt. Forst. C. Devils, var. luxurians.

Cardamine hirsutissima Forst. Muller

fl. 1848. 3. 1848. 1848. 1848. 1848.
foliis omnibus radicalibus, parvis
simis lanceolatis, serratis insigne
sequantibus, pinnatifidis, carminis
lanceolatis linearibus clute uno
celtrove instructis ad 6-jugis
glaucis, caulibus nudis adpen
dentibus floridus. 1848. 1848.
sim in intervallis flonensis,
pedicellis 3-fidibus, patentes
fruits adev reflexis arcuatis
que, radice ramosa folonifera.
In granivasis sedis montium
pupit - rano ad 1848. 1848.
norum. Exante Apr. 1848. 1848.

Cardamine hirsutissima & Cardamine

1848. 1848. 1848. 1848. 1848.
ad 1848. 1848. 1848. 1848. 1848.
characteribus. 1848. 1848. 1848. 1848. 1848.
1848. 1848. 1848. 1848. 1848.
1848. 1848. 1848. 1848. 1848.

MENKEA Lehm. Ind. sem. in h. Hambg. 1843
collect. pag. 8.

(Nov. genus e Camelinearum tribu.)

Sepala quatuor, obovata, patula, basi aequalia. *Petala* 4 calycem aequantia, unguiculata, obovato-oblonga, integra. *Stamina* 6 tetradynama inclusa. *Glandulae* hypogynae. *Ovarium* suborbiculatum, stigmate sessili. *Silicula* sessilis obovato-oblonga, utrinque subacutata, plano-compressa, bivalvis, septo ad marginem angustissimum reducto, unilocularis. *Valvae* uninerviae, reticulato-venosae. *Placentae* inclusae filiformes. *Semina* minutissima, in funiculis setaceis elongatis, in toto placentarum ambitu horizontalibus, numerosa, quadriseriata, suborbiculata immarginata, striatim verruculosa. *Cotyledones* incumbentes.

Genus distinctissimum, affine ex characteribus *Orobio* et *Eudemate*, ex habitu *Stenopetalo*; ab *Orobio* differt seminibus numerosis quadriseriatis, funiculis horizontalibus ex toto placentarum ambitu ortis, nec paucis ex apice pendulis; ab *Eudemate* seminibus quadriseriatis et stigmate sessili, ab utroque habitu; a *Stenopetalo* petalis, et *Silicula* uniloculari.

1. Menkea australis Lehm. l. c.

In Australi meridionali. Herb. Preiss. No. 1937.

Herba annua, debilis, glabra, habitu *Drabae vernae*. *Caules* 1-3 pollicares plures, simpliciter simplici, exili, simplices vel ramo aucti, oligophylli. *Folia* radicalia obovato-spathulata integerrima caulinum unum alterumve, rarius plura, spathulato-oblonga, in petiolum brevem angustata. *Racemi* pauci (6-7) flori, ebracteati, laxi. *Flores* fugaces suaveolentes, minutissimi, 0,5" longi latique, pedunculati. *Sepala* obovata. *Petala* alba acutiuscula, calycem vix excedentia. *Antherae* pallide violaceae. *Stigma* sessile, bilobum. *Pedunculi* fructiferi laxi, elongati, 4-5" longi, filiformes. *Silicula* 2,5" longa, supra medium 1,3" lata, basin versus angustata, apice stigmate sessili, subacutata, facillime dehiscens; valvis delapsis persistunt placentae, latere interiore tenuissimum marginem hyalinum, dissepimenti rudimentum, gerentes, et funiculis horizontalibus inaequilongis numerosis (ultra 50) quasi fimbriatae. *Semina* 0,1" lata, paulo longiora, rufula, verruculoso-striata, 4 vel pluriseriata. *Cotyledones* strictae incumbentes.

MONOPLOCA Bge. (Lepiae sp. Desv. Journ.
bot. 166 et 181? Lepidii et Iberidis sp.
DC. Prodr. II. 537.

Sepala 4, oblonga, erecta, basi aequalia. *Petala* 4, obovata, aequalia, integra, obtusa. *Stamina* tetradynama, edentula libera. *Glandulae* hypogynae 4 valvares. *Ovarium* obcordatum, biovulatum, stylo elongato; stigma capitatum. *Silicula* a latere compressa suborbiculata, profunde bifida, bivalvis, valvis navicularibus dorso alatis, stylo inter alas libero, bilocularis, loculis

monospermis. *Dissepimentum* crassiuscule spongiosum, medio pellucidum, transverse rugosum. *Semina* pendula. *Cotyledones* dissepimento applicitae et parallelae, transversim ad basin semel plicatae, rostello longiores illique parte superiore incumbentes, apice subinflexae.

Obs. Embryonis structura distinguenda ab *Iberide* et *Lepidio* quibus cum convenit siliculis angustiseptis dispermis dehiscentibus. A *Lepia* (*Lepidi* sectione) differt insuper stylo omnino libero, elongato et dissepimenti structura. *Cotyledones* omnino ut in *Senecbiera*, *Subularia*, *Stroganovia* et *Lachnolomate*, a quibus differt valvis navicularibus alato-carinatis. Structura embryonis in veris *Diplecolobis*: *Brachycarpaea*, *Chamiræ* *Heliophila* et *Cycloptychi* longe aliena, in his enim cotyledonis sunt vere bis plicatae in illis semel tantum, ad basin.

1. ***Monoploca rotunda*** Dew. caulibus angulatis asperulis, foliis oblongo-linearibus. Dew. l. c. (sub *Lepia*.) *Lepidium* rotundum. DC. l. c. Endl. in Hügel Enum. plant. pag. 5.

In arenosis prope oppidulum Freemantle, 7. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1941.

2. ***Monoploca linifolia*** Dew. caulibus teretiusculis striatis, foliis anguste linearibus. Dew. l. c. (sub *Lepia*.) *Iberis* linearifolia. DC. syst. 2. pag. 405.

In limoso-arenosis porrectis circa urbiculum York, 4. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 2070.

Hanc alteram, priori valde affinem, nec forsan specie distinctam, quamvis fructu maturo caret, sine ullo dubio huc traho. Utriusque habitus omnino idem, *Iberidem* potius, quam *Lepidium* aemulans. *Hedysarum* *serrennes* 3-4' altae, *caulibus* strictis rigidulis; prior robustior, (quia *serrennes*?) caulibus exquisitis angulatis, asperulis, sub lente valida ad angulos tuberculis cartilagineis minutis quasi muriculata; alterius caules multo tenuiores (quia planta junior, florens?) teretiusculi striati, vix ac ne vix quidem exasperati. *Folia* prioris pollice longiora 1-1½" lata, basi angustata, apice fere cuspidata, alterius fere filiformi-linearia, inferiora pollice longiora 0,5" vix lata. *Racemi* terminales 10-20 flori, laxiusculi, ebracteati. *Flores* (in *M. linifolia* tantum visi) albi, sesquilineares. *Petala* calycem parum excedentia. *Siliculae* maturae (in *M. rotunda* solummodo visae) pedicello depresso-plano horizontali 1,8" longo suffultae, adscendentes, extus convexae intus concavae, 3" longae, 2,3" latae, basi rotundatae, apice profunde bifidae, lobis (valvarum alis parum divergentibus. *Valvae* reticulato-venosae, alatae; ala superne loculum latitudine aequans; lineam ultra loculum producta. *Placentae* lineares crassiusculae, 2" longae. *Stylus* persistens 0,5" longus. *Semina* lapsis valvulis diutius persistunt, pendula, 1" longa, 0,7" lata, humefacta mucilagine multa obducuntur, uti semina *Lepidii sativi*.

LEPIDIUM (L.) R.Br. Endl. gen. n. 4932. Meisn. gen. pag. 14. (13.)

1. ***Lepidium (Dileptium) impressum*** Bge. glaberrimum; siliculis pedicello brevioribus ovato-oblongis emarginatis stigmate vix prominulo quasi truncatis, floribus corollatis tetradynamis, foliis carnosulis: inferioribus lineari-oblongis basi integerrimis a medio ad apicem remote inciso-

* *Arabis trifolia* Nutt.

Flor. adpressis, petala alba ovata cuneolata
fol. cuneolata glauca adpressis fl. brevibus
altum c. 1.5 pediculis subul. *Fructus* *Rutid.* (p. 219)
in argilla sabulosa. *Fruct.* p. 219

* *L. cuneifolia* ab *sig. v. acerab.*

Paululum quidem videtur
a descriptione *Candolleana*; talis
longioribus & pilulis paulo mi-
noribus. Talis autem differentia
haud ad fixandam speciem suf-
ficiunt.

In fructibus ad ripas *lanceolatis*
stac. Apr. 28. 1848. Dr. M. - *lanceol.*
(*Del.* de, Jul. 18. Apr. Mai 49.
Licogonum *Lepidiorum* *Novo* *Hol-*
landii *omni* *mutandem* *fruct.* *et*
certe *difficiliter* *determinandae*, *quam*
characteris *valde* *inconspicuis.*

* *Lepidium* (*Drilaprium*) *papillosum* Nutt.
radice annua, caulibus *vitis* *ramulis* *densis*
pilosis, foliis *angustis* *oblongis* *capis* *paginatis* *angustis*
trianulatis *acutis* *crasso* & *reticulatis* *dentatis* *apiculatis*
acutis, *vis* *marginis* *papillosum*, *floribus* *apiculatis* *(an* *fructu)*
2-4 *audis*, *filiculis* *crato* *corollatis* *ad* *quartam* *partem* *ovatis*
vis, *foliis* *in* *lobis* *obtusis* *pilulis*, *pediculis* *apiculatis* *(an* *fructu)*
apiculatis *filiculis* *partis* *ovatis*, *part.* p. 219.

* *L. ambiguum* *fructu* *ovatis*
siliiculis *pediculis* *acutis* *ovatis*
oblongis *agris* *obtusis* *marginatis*
marginis *crasso* *marginatis*,
marginis *papillosum* *papillosum*
vis *marginis*, *floribus* *corollatis*
foliis *papillosum* *papillosum* *marginis*, *caulibus*
fructu *ovatis*.

Nutt. *fructu* *ovatis* *marginis*, *caulibus*
L. puberula & *hystero* *papillosum* *apiculatis*
marginis.

Nov. Holl. austr. . . . . Apr. 1849. *Dr. M.*
Fructus *longioris* *quam* *in* *nostris*
L. cuneifolia & *hystero* *papillosum*.

Lardamine *caespitosa* Nutt.

Fructus *ovatis* *marginis* *marginis* *marginis*
marginis, *Legumin* *foliolosum*
Legumin *foliolosum* *foliolosum*
lobata *lobata* *lobata* *lobata*
Fructus, *ovatis*. *Fructus* *lobata* *lobata* *lobata* *lobata*

dentatis; dentibus acutis, superioribus angustioribus utrinque acutis 1-2 dentatibus integerrimisve, novellis subtus glaucis tenuissime impresso-punctulatis, caule erecto anguloso folioso ramoso, ramis patulis.

In arenosis prope oppidulum Freemantle, Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 1942.

Ex specimine unico incompleto, et Diagnosi brevi cl. Desvaux diducari nequit, an nostra planta sit eadem cum *L. hyssopifolio* Desv.; cui sane propius accedit quam ad alias generis, e Nova Hollandia ortas, species. Neque enim diagnosis *L. foliosi* Desv. quadrat nostram plantam, licet siliculis majusculis cum illo convenit. — Specimen nostrum praebet *caulis* robusti partem superiorem, basi fere crassitie pennae anserinae, 8 pollicarem in ramos divisum, cum rhachi racemi primarii oppositifolia, quadripollicari superstiti, racemis ramos ramulosque paucos terminantibus fructus maturos gerentibus brevioribus. *Caules* ramique glaberrimi, angulosi foliis numerosis obtecti. *Folia inferiora* bipollicaria, crassiuscula, 4" lata, supra medium dentibus magnis remotis 5-6 incisa, penninervia, nervis subtus valde prominulis; *superiora* breviora, angustiora, parcius dentata vel integerrima, in ramulo novello juniora glauca, subtus sub lente punctis minutis impressa. *Flores* linea dimidia minores; sepalia glabra, obtusa, albo-marginata. *Petala* minuta, in unico alabastro, quod examinare licuit, duo tantum extrorsum sita, interiorum vix vestigium ullum. *Stamina* 6, tetradynamia. *Stigma* sessile. *Silicula* pedicello subpatulo bilineari et quod excurrit insidens, 1,8" longa, infra medium 1,2" lata, ovato-oblonga, apice emarginata, stigmate subsessili emarginaturam explete quasi truncata. *Valvulae* apice obtusae. *Placentae* basi dilatato-saccatae. *Semina* rufa, linea paulo breviora, dimidiam lata, obovato-oblonga. *Cotyledon* altera radicleae incumbens ad basin plicata, altera recta.

2. ***Lepidium (Dileptium) puberulum* Bge.** siliculis pedicellum aequantibus oblongo-obovatis brevissime emarginatis, stigmate exserto, floribus apetalis 2-4-andris, foliis subtus margineque tenuissime setulosis; inferioribus in petiolulum longe attenuatis oblongis utrinque grosse inciso 4-5-dentatis; dentibus subaequalibus acutissimis, summis linearibus integerrimis, caule tereti simplici erecto vel ramoso decumbente pedicellisque dense puberulis, radice annua.

In rupibus calcareis insulae Rotenest, 20. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 1940.

A *L. piseidio* Forst. quocum e Diagnosi Candolleana (Prodr. I. pag. 206) silicularum forma convenit, foliis omnibus, praeter summa, grosse incisis differt; a caeteris affinis siliculis evidenter obovatis distinctum, praesertim a *L. owayhiensi* Cham. et Schl., cujus stigma insuper inclusum. *Specimina* plurima omnino deflorata, *foliis* orbata, *caulibus* erectis, strictis, 3 pollices et quod excurrit altis, superne in racemos fructiferos plures divisos; *pedicelli* erecti, puberuli, 1" longi. *Siliculae* glabrae pedicellum longitudine tantisper superantes, supra medium 0,8" latae, basi acutae, apice latiuscule emarginatae, *stylo* vix ullo, *stigmate* ex emarginatura prominente bilobo. *Valvulae* naviculares, carinatae, apice obtusae. *Placentae* filiformes, basi aequales. *Semina* rufa 0,5" longa, 0,3" lata. *Specimen* unicum simul folia, flores et fructus gereus pubescentia et silicularum forma exakte cum illis convenit, sed robustius, multicaule, caulibus decumbenti-divaricatis. *Folia radicalia et caulina inferiora* in petiolulum semipollicarem attenuata, lamina 8-9" longa, 4" lata, oblonga, utrinque dentibus 4-5 magnis, acutis, interdum ad basin denticulo auctis, incisa; *superiora* lineari-oblonga, brevius petiolata, lamina longiore, 1,5" lata, dentibus minoribus distantibus incisa, summa linearia, integerrima. *Flores* minutissimi, 0,3" longi, sepalia oblonga, extus hirsutiuscula. *Petala* nulla video. *Antheras* plerumque duas tantum in alabastris inveni,

rarissime quatuor. *Siliculae* omnino ut in caeteris speciminibus, at pedicello paulo longiori (1,5^m) insidentes.

RANUNCULACEAE Juss.

(Auctore E. T. STEUDEL.)

CLEMATIS Linn. Endl. gen. n. 4768.

Meisn. gen. 1. (1.)

Sect. **FLAMMULA** §. 2. DC. Prodr. Vol. 1. pag. 4.

1. **Clematis linearifolia** Steud. caule scandente striato angulato ad nodos praesertim piloso; foliis longe petiolatis biternatis; foliolis linearibus sublanceolatis basi pilosulis uninerviis; floribus dioicis umbellatis axillaribus; pedicellis folio brevioribus trifloris cum flore intermedio, bracteatis ad basin umbellulae lanceolatis sepalisque piloso-sericeis.

In arenosis sylvae Pointwater et insulae Rotenest, 18. Jul. 1839. 24. 5. Herb. Preiss. No. 1343.

Caulis ramosissimus, flexuosus, scandens, profunde striatus hinc angulatus, obsitus pilis sparsis patentibus ad internodia plus minus incrassata copiosis; petioli communes 2-3 pollicares, patentes, apice divisi, in partiales 2-3 pollicares et longiores, trifoliatos; *foliola* 1-1½ pollices longa, vix 2 lineas lata, pallida, basi et apice attenuata, uni-vel obscure trinervia; *flores* in axillis foliorum pseudo-umbellato-paniculati; *pedicelli* inaequales cum floribus dense piloso-sericei; bractae ad basin pedicellorum, 2 lineas longae; flores fructiferi desunt.

2. **Clematis indivisa** Willd. floribus paniculatis, foliis ternatim sectis, segmentis ovatis integerrimis mucronatis coriaceis glabris. DC. Prodr. Vol. 1. pag. 5. n. 38. Willd. spec. plant. 2. pag. 1291.

In solo limoso sylvae ad fluvium Vasse-River, provinciae Sussex; 17. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 1345.

3. **Clematis discolor** Steud. caule scandente striato angulato ad internodia pubescente; foliis longe petiolatis ternatis, foliolis petiolulatis ovatis nervosis glabris integerrimis subtus glaucis; floribus axillaribus paniculatis dioicis, petiolo communi pedunculo brevioris pedicellisque sericeo-pilosis.

In limoso, calculosis sylvae Halfwayhouse, 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 1344.

Caulis ramosus, flexuoso-scandens, angulato-striatus, pilis sparsis patentibus ad internodia parum incrassata copiosis; *petioli* basi plus minus pubescentes sursum glabri; *foliola* 1½ pollices longa, dimidium lata, subcoriacea, margine subundulata, subtus glauco-albida, utrinque glaberrima, laxa

x *Ranunculus Stuartianus* Juss. ex
R. glabrifolius Hooker
Folia haud unquam
glabra.

Duxto *R. collinum* infirmus Juss.
multo major.

In humidis ad fl. South Esk river
Nov. 1848. hb. St. H. n. 185. *Abom-*
nilus Brunoniensis ^{rigidus} ~~exspat!~~
Etiam *R. leopigero* *Finland.*

+ *Ranunculus pisum-pinellifolius* Hook.
In uliginosis palis frequentis
inundatis Tarn. hb. St. 462 & 679
Nov - Jan.

+ *Sec. I. Warrington* *H. fist.*
R. aquatilis L. var. *fragilis*
H. fist. aquatilis *H. fist.*
H. fist. aquatilis *H. fist.*

Mosent Water, Plana oleolis hinc pra-
crebris et in
glacibus Murray
a Jussieu
Willingford
Nov. 1848 -
South Esk river
Tarn. hb. St. H.
n. 271 *fragilis*!

Sec. II. *Spinae glaucas* *adpellaria*
Spinae glaucas *adpellaria*
& 6. *H. fist. var. I. p. 166.* Jan. 1848

R. Gunnianus Hooker!

In insula "Terra Diemantem"
nisi 10 Stuart. hb. St. 105.
In montibus *R. collini* po-
nendus. In penitentiis rari-
tatem altorum Jan 21. 49. hb. St. H.
n. 414

x *R. Lappaceus* V. Smith
R. Lappaceus (Lindstr.) Fr.
In graminosis elationibus
apud Third Creek! Jan. 10.
1848. Carpella matura, 14 qui-
tus nomen est, desunt.

reticulato-venosa; *flores* axillares paniculati; *petala* lineari-oblonga, sub-pollicaria, extus praesertim sericea; *antherae* connectivo 1-1½ lineas producto superatae; *flores* foemineae desunt. 5.

Praecedenti, uti sequens, proxima.

4. **Clematis cognata** Steud. caule scandente glaberrimo angulato-striato; foliis ternatis petiolatis, foliolis petiolulatis ovatis vel ovato-oblongis coriaceis glabris obscure nervosis; floribus paniculatis axillaribus folio brevioribus; carpellis ovato-lanceolatis pubescentibus, caudis elongatis longe pilosis.

In littore arenoso sinus Middleletowsbay, ditionis Plantagenet, 30. Sept. 1830. Herb. Preiss. No. 1346.

RANUNCULUS Hall. Endl. gen. n. 4783.

Meisn. gen. 1. (1.)

Sect. IV. HECATONIA. §. 4. DC. Prodr. Vol. 1. pag. 33.

1. **Ranunculus plebejus** Brown. caule rectiusculo dichotomo basi petiolisque patentim pilosissimo apice subglabro, foliis 3-sectis villosis, segmentis petiolulatis ovatis inciso-dentatis, summis linearibus integris, calyce subreflexo. DC. Prodr. Vol. 1. pag. 39. n. 118.

In regionibus interioribus Australasiae meridionali-occidentalis, 18. Nov. 24. Herb. Preiss. No. 1348.

2. **Ranunculus discolor** Steud. caule erecto dichotomo basi petiolisque patentim pilosissimis apice subglabro; foliis patenti-villosis trisectis subtus albescentibus, segmentis lateralibus brevius (medio longius) petiolulatis tri- (rarius bi-) partitis, laciniis inciso-dentatis, summis linearibus; calycibus reflexis carpellis glabris obliquis marginatis stylo acuminato terminatis.

In arenosis umbrosis sylvaticis hand procul ab ore maritima, in districtu Perth, 23. Sept. 1839. 24. Herb. Preiss. No. 1347.

Caulis 3-pedalis et ultra, fistulosus, striatus, internodiis 6-10 pollices distantibus, pilis basi tuberculis minutis insidentibus, 1-1½ lineas longis obsitus; *folia inferiora* longissime petiolata, petiolus basi dilatata impresso-striatus, semiamplexicaulis, uti caulis pilosus, 4-5 pollicaris; *folia superiora* breviter petiolata, summa sessilia; folia ternato-secta, foliola trisecta, segmenta 2-4 ter inciso-dentata, superiora simpliciora, trisecta trifido-dentata; *sepala* reflexa, longe pilosa, *petala* lutea, ovato-oblonga, striata; *carpella* in disco glabra, ad marginem incrassatum pilosa, in stylum uncinatum carpellis paucobreviorem terminata.

DILLENiaceae DeCand.

(Auctore E. T. STEUDEL.)

PLEURANDRA Labill. Endl. gen. n. 4754. Meisn. gen. 2. (5.)

1. **Pleurandra enervia** DC. caule a basi ramoso, ramis strictis glabris; foliis anguste linearibus planis acutiusculis glabris; floribus in ramulis brevissimis sessilibus; sepalis ovatis ovariisque glabris. DC. Prodr. Vol. 1. pag. 72. n. 16. ♀.

In arenosis fruticosis sylvae ad radices montis Parker, districtus Plantagenet, 9. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2155 et in turfoso arenosis clivuli prope villam Albany, districtus Plantagenet, 21. Dec. 1840. No. 2163.

Frutex $1\frac{1}{2}$ -2-pedalis, a basi ramosus; *rami* erecti, subangulosi, fusco-cinerei, cortice facile secedente; *folia* interstitiis breviora, subfasciculata non immediate e ramo, sed plerumque mediante ramulo brevissimo ($\frac{1}{2}$ -1 lineam longo) erumpentia, $1\frac{1}{2}$ -4 lineas raro excedentia, glabra, subtrigona, enervia, saepissime florem sessilem foliis brevioris foventia; *sepala* ovata, obtusa, mucronulata; *flores* pallide lutei. No. 2155.

Non differt nisi foliis paulo majoribus 5 lineas longis, floribus rarioribus, sepalis magis acuminatis. Etiam *P. riparia* Sieb. No. 150 vix differre videtur.

2. **Pleurandra recurvifolia** Steud. caule ramosissimo humili (vix pedali) ramis erectiusculis; foliis sparsis subapproximatis glaucescentibus brevibus (4 lineas longis) glabris rigidiusculis crassiusculis margine puncticulato-scarbris apice recurvo fasciculo pilorum brevissimorum deciduo terminato; floribus axillaribus sessilibus; sepalis ovatis puncticulatis; ovariis villosis. ♀.

In glareosis sterilibus ad radices collium Konkoberup, districtus Kent, 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2170.

Fruticulus ex trunco crasso lignoso radicali mox ramosus, ramis erectis sursum ramulosis; *folia* in ramis primariis delapsa in ramulis laxè imbricata, apice distincte recurva, submucronulata, praeterea sub lente valida, pilis aliquod confertis brevibus mox deciduis, hinc in pluribus deficientibus terminata; *pedicelli* folio longiores; *sepala* obtuse mucronulata, puncticulata, caeterum glabra.

3. **Pleurandra glaucophylla** Steud. caule ramoso glabrò, ramulis teretibus tenuè pubescentibus; foliis subfasciculatis glaucis brevibus (3-4 lineas longis) rigidiusculis crassiusculis glaberrimis apice obtuso vel vix conspicue recurvato-mucronulato; floribus axillaribus sessilibus; calycibus bractcolis 1-2 accessoriis munitis, sepalis ovatis ovariisque glabris. ♀.

In arenosis prope Avon-Dale, districtus York, 10. Apr. 1810. Herb. Preiss. No. 2159.

R. colonorum *Wright* forte:
R. laevigata *Wright* var.
 forma humilior *acutalini*
 in *Hamaculi* *bulbasi*. *Ham-*
phist-vale, *Feb. 23. 1843.*
Inpratis *opiquis*
Spicem *novam* *in* *claus* *effluat* *is*
mandistingui *ab* *antecedente* *ha-*
lic *magiore* *ferice*, *hand* *ma-*
gna *recumbentia* *in* *ramenda*.
ex *specimen* *in* *col. reddi* *ali-*
lus *difficile* *non* *determinandum*
In *graminis* *quod* *urbem*
Edelweide *(Saxonia)* *Kohlau*
Petala *extra* *retulla*. *In*
forma *memorabilis* *R. lae-*
perei, *qui* *affinis* *quacu-*
alis *hujus* *generis* *specimen*
in *hujus* *nativis* *colleis*.
Frequentissime *in* *graminis*.
Etiam *R. plebeia* *nagatus*
omnibus *in* *formis*, *hb. N. 697*

Pleurandra ovata *Labillard!*
In *insula* *Vandensis* *Laud!*
hb. N. sin. nov. num. 57
5-8. pl. fragilis, arct. muris, hb. N. 11
oolong, pro me, diffusa, p. solis, raris, 128.
anti, glori, floribus raris, 128. 128. 128. 128.
V. repens, hb. N. 626.

In *insula* *Vandensis* *Laud!*
hb. N. s. nov. num. 151. (C. Stuart
hac *legit* *in* *Mayo* *1848.*
Nile-river, omni *actate* *2' hb. N.*
II n. 46. Murray-river. 1' Jan 10. 48.
II n. 329. Filamentorum *longitudo* *actate*
acta, 1' pro, 1' St. Pauls river 1' 40. 48.
762

Elgasius minimus, *L. 762*
In *locis* *humidis* *arosis* *ad*
fl. Murray *16* *milleas* *ab* *oppo.*
Oct. 1848. Mix *a* *proie* *Europaea*
rivera *et* *portage* *ingressa* *floris.*
in *australia* *Th.*

In arnoso-lapidosis ad portum Lincoln.

virgata! f. *virgata* Mill

caule ~~virgata~~ ^{ramosa}, ramis
confundentibus striatis ramu-
lis, ramulis crebris brevis-
sime, foliis in his imbricatis
in cellis parvis patentibus
omnibus exacte linearibus ob-
tusis stellata tenuissime per
venulis margine revolutis, fla-
ribus in ramulis terminalibus
pedunculatis, pedunculis folia
suprautibus, ^{in brevibus} ~~sepalis~~ ^{et} ~~trigonibus~~
lato lacunculatis intervenibus
liberes attenuato apiculatis!

frut. 2-3 pedalis!

In montanis prope South Creek.
Jul. 1848. floribus non evolutis.

Pachyrrhiza *californica*.

~~*P. strita* Schott. eadem eff. f. *strita* Schott.~~

~~*P. strita* Schott. a. et *strita* Schott.~~

~~*strita*! Schott. a. et *strita* Schott.~~

~~*strita*! Schott. a. et *strita* Schott.~~

~~*strita*! Schott. a. et *strita* Schott.~~

~~*strita*! Schott. a. et *strita* Schott.~~

~~*strita*! Schott. a. et *strita* Schott.~~

~~*strita*! Schott. a. et *strita* Schott.~~

~~*strita*! Schott. a. et *strita* Schott.~~

~~*strita*! Schott. a. et *strita* Schott.~~

~~*strita*! Schott. a. et *strita* Schott.~~

~~*strita*! Schott. a. et *strita* Schott.~~

~~*strita*! Schott. a. et *strita* Schott.~~

~~*strita*! Schott. a. et *strita* Schott.~~

~~*strita*! Schott. a. et *strita* Schott.~~

~~*strita*! Schott. a. et *strita* Schott.~~

Fruticulus parvus 6-9-pollicaris, cortice pallide rufescente facile secedente; *rami* subalterni subpatenti-erecti tenui, pubescentes; *folia* interstitiis breviora, solitaria, bina-quaterna in apice ramulorum quandoque (juventute?) viridia caeterum glauca; *flores* pallide lutei.

4. **Pleurandra hemignosta** Steud. caule ramis cortice cinereo secedente glabris; foliis subsetaceo linearibus glabris acutis; floribus ad foliorum fasciculos sessilibus; calycibus glabris; sepalis ovato-lanceolatis margine scariosis apice acutis; ovariis glabris. ♀.

In Australasia meridionali-occidentali. Herb. Preiss. No. 2172.

5. **Pleurandra hibbertioides** Steud. caule fruticoso basi ramoso, ramis simplicibus vel sursum divisis; foliis fasciculato-confertis lineari-subulatis glabris; floribus axillaribus vel in ramulis brevissimis sessilibus; calycibus glabris; sepalis ovatis mucronatis; antheris subunilateralibus; ovariis glabris. ♀.

Ob stamina fere aequaliter ovaria cingentia ad *Hibbertiam* accedens, toto habitu *Pleurandris* affinior.

In lapidosis ad latus septentrionale montis Bakewell, dittonis York, 8. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 2164.

Fruticulus $1\frac{1}{2}$ -2 pedalis, truncus basi lignosus in radicem validam attenuatus, a basi ramosus; *rami* erecti, simplices vel sursum ramosi, pedales et ultra, glabri, a basi dense foliati; *folia* setacea, subteretia, 4-9 lineas longa, in ramulis brevissimis pseudofasciculato-conferta; *flores* praesertim inferne in ramulis terminales solitarii vel raro bini inter folia nidulantes vel versus apices ramorum simpliciter racemosi; *sepala* margine pellucido-membranacea petala pallide lutea fere aequantia. *Pleurandrae camphoromae* Sieber. (Herb. mixt. No. 506.) proxima ejusque forsitan varietas robustior magis glabra.

6. **Pleurandra diamesogenos** Steud. caule basi ramosissimo, ramis superne divisis angulatis glabris; foliis sparsis anguste linearibus margine reflexis glaucescentibus sparsim longe villosis demum glabrescentibus; pedunculis subaxillaribus elongatis folia duplo superantibus; calycibus bractea accessoria (plerumque) munitis; sepalis ovato lanceolatis longe pilosis margine membranaceis; staminibus unilateralibus; ovariis 2 villosis. ♀.

Generice ad *Pleurandras* pertinet habitu vero uti sequens species inter utrumque genus intermedia.

In turfosis sylvaticis districtus Sussex, 17. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2141.

Fruticulus vix pedalis, e trunculo lignoso divisus in ramos plures basi simplices, sub medio iterum ramulosos; *folia* 6-8 lineas longa, vix semilineam lata, subtus marginibus sese non attingentibus reflexa, glaucescentia, nitida primo intuitu glabra sub lente sparsim ex punctulis asperis pilosa; *pedunculi* versus apicem ex axillis foliorum, erecti, glabri; *sepala* oblongo-lanceolata acuta pilosa; *petala* pallida, flava.

7. **Pleurandra cognata** Steud. caule humili (vix pedali, basi parvi) superne ramoso; ramis angulatis glabris; foliis sparsis anguste linearibus margine revolutis apice acutis undique punctis elevatis setulisque minutissimis asperulis; ovariis villosis. ♀.

In fissuris rupium ad latns orientale montis Melville, ditionis Plantagenet, 5. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2156.

Simillima praecedenti, a qua differt: *ramis* superne magis confertis; *foliis* marginibus arcte incumbentibus reflexis, subtus non adeo carinatis quam bilineatis, evidentius punctulato-scabris, brevius (calycibus vero densius) pilosis, floribus aureo-luteis.

HIBBERTIA Andr. Endl. gen. n. 4753. Meisn. gen. 2. (5.)

DC. Prodr. Vol. 1. pag. 74. §. 2.

1. **Hibbertia perfoliata** Hügel. caule volubili, foliis ovatis perfoliatis aristulato-serrulatis; pedunculis oppositifoliis unifloris folio longioribus. Endl. in Hügel Enumerat. plant. pag. 3.

In subumbris scaturiginosis prope villam clb. Andrews supra urbiculum Perth, 4. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 2127.

- 2 **Hibbertia amplexicaulis** Steud. caule erecto flexuoso glabro; foliis amplexicaulibus ovato-oblongis basi subhastatis levissime repando-denticulatis integrisve; pedunculis oppositifoliis unifloris folio longioribus; calycis sepalis ovato-lanceolatis (magnis) glabris bracteola aecessoria multo minore munitis; staminibus basi subcoadunatis; ovarii glabris. ♀.

Staminibus basi submonadelphis et floribus in genere maximis generi *Candolleae* affinis.

In limoso calculosis umbris sylvaticis prope Mahagony-creek, 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 2129.

Caulis fruticosus; *rami* subflexuosi, glabri, fusco-rufescentes, cortice tenui facile secedente; *folia* $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ pollices longa, glaberrima, oblongo-ovata, arcte amplexicaulia basi profunde cordato-emarginata, hinc subhastata, lobis obtusis, apice in mucronem plicato-contorta, margine subreflexo integerrima, vel hinc inde denticulo uno alterove ex undulatione notata; *pedunculi* subpollicares flore longiores; *sepala* oblongo-lanceolata, acuminata, 5-6 lineas longa, ad basin calycis bracteola aecessoria; *petala* ovata obtusa, margine (in siccis) subundulato-crenata.

A praecedente specie facile diagnoscitur: floribus duplo majoribus, foliis non perfoliatis, sed amplexicaulibus oblongis, pedunculis folia non superantibus.

3. **Hibbertia hastata** Steud. caule subvolubili glabro cortice secedente; foliis basi hastata amplexicaulibus linearibus vel sublanecolatis integerrimis apice mucronulatis; pedunculis axillaribus folia subaequantibus unifloris; calyce unibraeteato; ovarii 2 glabris; staminibus liberis. ♀.

In Australasia occidentali-meridionali. Herb. Preiss. No. 2128.

Caulis debilis vix fruticosus, ramosus, cortice in ramis adultioribus facile secedente; *folia* bipollicaria et ultra, 2-3 lineas lata, uninervia, nervo subtus prominente, margine subrevoluta, supra fusco-viridia, subtus pallidiora, utrinque glabra; *pedunculi* in axillis foliorum solitarii, elongati, arcuati, folium

Libertia virgata! R. Brown
B. glandulosa ^{ferdine} ^{naucissimus}
Gruta humilis ^{diffusus} ^{inter}
fruticosa murrayi - scrub. 18748.
Folia propositum in varietate
cauculorum innovationum aggre-
gata - fasciculata, aculeis diffusa.
U. & R. dubitas, H. B. glandulosa
(forte a forma nostra diversa) diff.
H. virgata v. umbin a d. a.

Libertia prostrata! Nutt
In collibus arenosis ad fl. St. Pauli hb. N. 5763.
excrescens glandulosa ^{ferdine} ^{1' alt. Sp. th. h. n. hb. N. 5764}
H. fasciculata ^{R. Br.} ^{ad fl. murrayi}
procreantibus ^{ferdine} ^{Tasm. 1. Jan. 49. hb. N. H. n. 303 et in arundinis}
hb. St. Pauli. 40 sub. nom. Pleu-
radicae spec. Flores odoriferi
procreantibus foliis influxu ^{Th. Stuart}
a specie separare nullam causam habeo
hb. hanc varietatem forte pertinet Pleurandra, nam
H. angustifolia ^{Salisbury} ^{Th. Stuart}

Dillenia procreantibus ^{Lab.}
Th. Stuart ^{hb. N. 55.}
procreantibus, florum odor inamans! ^{hb. fl.}
Th. Stuart ^{hb. N. H. n. 309. Folia saepe}
abundant et petala calycis saepe profunde cordata!
Jan. 1849.

H. virgata! ^{R. Br.}
Th. Stuart ^{hb. N. 55.}
procreantibus, florum odor inamans! ^{hb. fl.}
Th. Stuart ^{hb. N. H. n. 309. Folia saepe}
abundant et petala calycis saepe profunde cordata!
Jan. 1849.
H. virgata! ^{R. Br.}
Th. Stuart ^{hb. N. 55.}
procreantibus, florum odor inamans! ^{hb. fl.}
Th. Stuart ^{hb. N. H. n. 309. Folia saepe}
abundant et petala calycis saepe profunde cordata!
Jan. 1849.

aequantes vel superantes; *sepala* ovata basi bracteola multo minore aucta, 6 lineas longa, petala subaequantia.

4. **Hibbertia lactucaefolia** Steud. caule erecto vel subflexuoso glabro subancipiti-anguloso; foliis linearibus elongatis (2-3-pollicaribus) basi hastata amplexicaulibus integerrimis glabris apice mucronulatis; pedunculis axillaribus unifloris folio (sub-) brevioribus; calyce ebracteolato ovariisque glabris. ♀.

In sublimosis sylvaticis districtus Sussex, 23. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2161 et in umbrosis sylvaticis prope Albany, districtus Plantagenet, 22. Sept. 1840. No. 2173.

Difficile a praecedente praeter notas allatas distinguitur: caule erecto basi distincte fruticuloso, strieto, minus ramoso; foliis multo angustioribus, latitudine lineam saepe non attingentibus, raro vix excedentibus; pedunculis brevioribus erectis in apice caulis copiosioribus et tunc quam folia vix evoluta parva vix longioribus.

5. **Hibbertia confertifolia** Steud. caule fruticuloso erecto ramoso piloso-scabro demum cortice secedente glabro; foliis subfasciculato-confertis sessilibus oblongo-cuneatis obtusis utrinque pilosis; floribus sessilibus axillaribus; calycibus bracteolis ferrugineis (gemmarum phyllis persistentibus?) involucriatis; sepalis ovato-lanceolatis longe pilosis acutiusculis; petalis obovatis emarginatis; germinibus (3?) glabris. ♀.

In subarenosis districtus Plantagenet, Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2143.

Fruticulus sursum ramosus, ramuli teretes cano-pubescens; *folia* in intervallis parvis $\frac{1}{2}$ -1 pollicaribus, superne magis approximata, in fasciculos unilaterales conferta, 2-3 lineas longa, — juniora praesertim — pilis sericeis elongatis obsita; *flores* in axillis foliorum sessiles, involucriati, bracteis ovatis ferrugineis deciduis; *sepala* (plerumque) ad marginem membranaceo-scariosa petala subaequantia.

6. **Hibbertia commutata** Steud. caule fruticuloso erecto basi ramoso pubescente demum cortice secedente glabro; foliis confertis oblongo-lanceolatis utrinque (praesertim infra) villosis; floribus axillaribus (saepe ad axillas foliorum dejectorum) sessilibus bracteis ferrugineis involucriatis; sepalis lanceolatis dense villosis; ovariis 3-4 glabris; stylis stamina superantibus. ♀.

In saxosis vallis cataractae ad caput fluvii Cygnorum, 26. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 2136.

Fruticulus ramis brevibus (2-pollicaribus) praesertim ad basin vel in medio caulis superne simplicis; *folia* subconferta 3-5 inaequalia, ovato-oblonga vel lanceolata, apice breviter acutata, minora 2-3 reliqua ad summum 7 lineas longa, supra obscure viridia pilosa, subtus dense pilis longioribus albidis subintricatis canescentia; *flores* axillares in fascientis foliorum sessiles, bracteis ferrugineo-rubris apice pubescentibus caeterum glabris involucriati; *calyx* villis longis albidis dense obsitus, *sepala* ante florescentiam in conum aeternum conniventia, aperta oblongo-lanceolata acuminata.

7. **Hibbertia discolor** Steud. caule fruticuloso ramoso cinereo-villoso vel cortice secedente demum glabro; foliis

oblongis vel oblongo-linearibus supra tenuissime adpresse pilosis vel nudiusculis opacis subtus pube alba intricata brevi velutinis; calycibus bracteis ferrugineis involucreatis; sepalis ovato-lanceolatis, extus dense villosis, intus basi subglabris; ovariis (2-3) glabris. ♀.

In limosis ad fluvium Canning, 22. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 2137.

Variet: caule stricto minus ramoso et hirsuto.

A praecedente simillima differt praecipue: *ramis* strictis elongatis firmioribus; *foliis* majoribus 5-12 lineas longis utrinque pube breviori indutis; *reliqua* praecedentis, cujus forsitan var.

8. **Hibbertia argentea** Steud. caule humili erecto sericeo-villoso cortice secedente demum glabro; foliis confertis oblongis obtusis utrinque (praesertim junioribus) calycibusque sericeo villosis; ovariis glabris. ♀.

Ad promontorium Cape-Riche, 20. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2144.

9. **Hibbertia depressa** Steud. caule fruticuloso prostrato ramoso cortice secedente; ramis villosulis; foliis subfasciculato-confertis linearibus margine revoluta longe sericeo-villosis subrecurvis; floribus axillaribus terminalibusque sessilibus; sepalis lanceolatis pilosis; ovariis (5) glabris. ♀.

In clivulo arenoso prope oppidulum Albany, ditionis Plantagenet, 25. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 2153.

Caulis diffusus ramosus; *rami* subhorizontales pilis plus minus longis cum epidermide deciduis obsitus; *folia* plerumque in interstitiis folio longioribus fasciculata, raro in ramulis secundariis solitaria, alterna, anguste linearia, margine revoluta subteretia, 4-8 lineas longa, curvata, pilis longis sericeis, in adultis rarioribus obsita; *flores* in axillis foliorum sessiles; *bractae* involucrentes, pallide-ferrugineae, multo minus quam in praecedentibus conspicuae; *sepala* extus dense, intus in medio tantum, pilosa, aequantia petala, pallide flava.

Proxima videtur *Hibbertiae prostratae* Hook. Journ. I. 246, sed in dubie diversa.

10. **Hibbertia tenuiramea** Steud. fruticulosa ramosa glabra, ramis attenuatis divaricatis; foliis linearibus apice subdilatis glaberrimis obtusiusculis; pedunculis axillaribus folia subaequantibus; sepalis ovatis obtusis glaberrimis petalis emarginato-bilobis (duplo) brevioribus; ovariis glabris. ♀.

In arenosis subumbrosis fruticosis prope Perth, 19. Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 2145.

Fruticulus 1-2 pedalis, a basi ramosus, omnino etiam in partibus junioribus glaber; *folia* vix fasciculata, sed saepe basi subimbricata, 2-4 approximata, quandoque solitaria, $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ pollices longa, angusta, linearia, infra medium attenuata; *pedunculi* solitarii, axillares, teneres, subflexuosi folia subaequantes; *sepala* glaberrima, patentia, margine pellucido-scariosa, *petala* aureo-flava.

11. **Hibbertia basitricha** Steud. caule fruticuloso ramoso glabro, cortice secedente; foliis linearibus margine revolutis basi pilosis sursum glabris apice acutiusculo; floribus axillaribus sessilibus; sepalis ovato-lanceolatis piloso-sericeis margine membranaceis; ovariis glabris. ♀.

microphylla DC.

Clematis plumifera Ledeb.

nitida var!

sepala ochroleuca, semina
arida.

A. C. microphylla Differt
a *audis* ^{carpidiorum} ~~asturum~~ longiori-
bus, foliis *minoribus* a *C.*
microsepala foliis *integerrimis*
est.

In fruticulis *pythium* circa *Kuisto*
Bay. Oct. 1848. fruticosa. & *Fumosa*
Viburnum *Lofty-ranges* a *rata*.
rattas. Oct. 4. In *pythium*
simus *bold* *off. bag.*
Clematis aristata *R. Br.* *Vi. & od!* (austro
orient?) *hb. St. 818.*

C. microsepala Ledeb.

x-*C. blanda* Hooker.

In *Nova Hollandia* forte austro-
orientali ubi antea nusquam lita
exinde *R. Stuart* *argut.* *hb. St. 819.*

A. C. appendiculata nostra
habitu minore, *sepalis* ratione
longitudinis latioribus et foliis
integerrimis ^{oblongis} *fruticulis*
minidis *typis.* Habitu *C. micro*
phylla, sed *anthurae* *appendice*
microsepala gaudent. *A. C.*
plumifera foliis *arutis* et *flori-*
bus *plumigen* *pannulat* *disen-*
pat. *Diagnosis* *trium* *specimen*
novarum *formarum* *specimen* *a.*
composita *utriusque* *specimen* *specimen*
elaborabo.

Locutus *15-20'* In *umbrosis*
formarum *hb. N. H. n. 5.* Oct.
1848. & *Cum* *binaside* *clitoroide* *DC.*
foliis *arutis* *arutis* *conferre* *ne-*
ob *pannulos* *folia* *typis.* *plumigen* *ge-*
supinatus *atque* *sepala* *margin* *puberula*
puberula

Gernatis gentianoides! Ob.

In convallibus repens
in portum cygnorum Tarn
nov. 1849. hb. V. II, 664
Planta pinante & maris
nisi cito evanescens. Per
santum specimina maris.
pdis altitudinem attingent
Hm. Morpakk!

Ranunculus platycarpus
fordii.

R. fissiliflorus var platy.
carpus fordii pag. 262
R. leptocauli Hook appinis

Ranunculus Rumicula R. Br.

Costisime ad portionem septi
mam pertinet et valde ac
cert R. fissiliflora, sed
specifice recidere videtur
foliis raris digestis, ^{napis} ~~fractis~~
minoribus, stylo brevior
Ad descriptione Ranunculi
fontis ex specimine nant
data differt vix essentialiter
sed habet majore facies
subpedali, praeterea carpi
numerosi et partibus omni
bus magis scabulis. Circa
glabro fordii.

R. fissiliflorus pelatus fordii

villosus fordii

Locis natis ad St. Pauls river
Tasmaniae Nov. 49. hb. V. II

R. Rumicula, platycarpus et
Annon osiores contrahenda?
fissiliflorus

Fortasse aptus & cum R.
fissiliflorus var. R. platycarpus
et R. Rumicula in cl. V. II.

In confragrosis ad radices jugi montium Darling's-range, ditionis Perth, 4. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2165.

Fruticulus tennis pedalis et ultra, ramosus; *folia* in interstitiis variis fasciculato-aggregata, anguste linearia, vix semilineam lata, $\frac{3}{4}$ -1 pollicem raro ultra longa, margine revoluta, erecta, plerumque curvata, glaucescentia, basi pilis longiusculis notata sed vix ampliata, *sepala* acuminata, margine membranaceo glabra, medio pilosa, *petala* pallide flava subaequantia.

12. **Hibbertia pachyrrhiza** Steud. radice lignosa incrassata ramosa; ramis erectis strictis ramulosis pubescentibus ad foliorum ortum conferto-albo-pilosis; foliis subfasciculatis elongatis anguste linearibus revolutis striatis basi pilosis, sursum glabris; floribus axillaribus solitariis sessilibus; sepalis vix puberulis; ovariiis glabris. 5.

In arenosis montium Darling's-range, ditionis Perth, 20. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 2149.

Caules e trunco radicali crasso lignoso plurimi, erecti, 1-1½ pedales, glabrescentes vel pilosuli ad foliorum ortum dense villosi; *folia* raro solitaria sed 2-4 approximata, anguste linearia, 1½-2 pollices longa, margine revoluta subcanaliculata, basi parum dilatata subamplexicaulia; *flores* arcte sessiles; bractae involuerantes nullae; *sepala* ovata, medio praesertim puberula, aequantia petala pallide flava.

13. **Hibbertia subexcisa** Steud. fruticulosa a basi ramosa; ramis subsimplicibus vel brevi-ramulosis pubescentibus; foliis longiusculis (pollicaribus) sublinearibus margine revolutis glabris, basi dilatata subamplexicaulibus ciliatis, apice emarginatis; pedunculis pilosis axillaribus solitariis folia subaequantibus; sepalis lanceolato-ovatis ovarisque (2?) glabris. 5.

In arenosis sylvae prope oppidulum Perth, 13. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2146.

Fruticulus 1-2-pedalis, e trunco lignoso incrassato ramosus; *rami* erecti, basi cortice secedente glabri sursum pubescentes; *ramuli* breves, foliati; *folia* approximata, linearia, inferne angustiora, basi pilosa et dilatata, in parte dilatata lineola transversa notata quasi articulata, in margine ampliata baseos pilis longiusculis albidis ciliata, apice plus minus conspicue emarginata quandoque mucronulata; *pedunculi* folio plerumque parum breviores, patentim pilosi; *sepala* ovata, apice mucronulata aequantia petala pallide flava.

DC. Prodr. Vol. I. pag. 74. §. 3.

14. **Hibbertia latifolia** Steud. caule prostrato serpente adscendente tereti asperulo; foliis petiolatis ovatis subincisodentatis pilosis ruguloso-scabris; pedunculis axillaribus folio longioribus unifloris; carpellis pilosis. 5.

In clivulo arenoso inter frutices prope Pointpossession, 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2126.

Caulis longissime prostratus, nudus, tandem in ramos adscendens erectos, foliatis, piloso-asperulos, pedales et ultra; *petioli* 3-4 lineas longi, erecti vel recurvi; *folia* 2-4 subconferta, magnitudine varia, majora pollicem longa et $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ lata, ovata vel oblongo-ovata, minora subrotundata, supra pilis brevibus scabra, subtus pilis adpressis longioribus pubescentia, margine subinciso-crenata crenis obtusis; *pedunculi* axillares arcuati, patentim-pilosi

basi; *sepala* pilosa, duplo breviora quam petala pallide flava, ovata, emarginata.

15. **Hibbertia ovata** Steud. caule fruticuloso a basi ad apicem ramoso villosulo vel cortice secedente glabro; foliis ovatis (raro oblongis) utrinque praesertim subtus villosis, hinc inde dente uno alterove notatis vel integerrimis; floribus axillaribus terminalibusque sessilibus; calycibus bracteis ferrugineis involueratis; sepalis ovato lanceolatis, extus albido-villosis, intus (basi) glabriusculis; ovariis velutinis. ♀.

In limoso-calculosis fruticosis prope Mahagony-creek, ditionis Darling's-range.

12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 2134.

16. **Hibbertia montana** Steud. caule fruticuloso ramoso villosulo vel demum cortice secedente glabro; foliis subconfertis oblongis obtusis integerrimis utrinque dense molliterque villosis; floribus axillaribus terminalibusque sessilibus; calycibus bracteis ferrugineis involueratis; sepalis ovato-lanceolatis, extus albido-villosis, intus (basi) glabriusculis; ovariis velutinis. ♀.

In limosis lapidosis cacuminis montis Bakewell, ditionis York, 5. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 2135.

Fruticulus pedalis diffuse ramosus; *rami* lignosi, validiusculi, villis longis albidis plus minus dense vestiti; *folia* fusco-viridia, sessilia, 6-8 lineas longa, $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ lata, margine reflexo, uti ramuli villis albidis dense utrinque obsita; *flores* in apice ramulorum inter folia vel in axillis sessiles, bracteis lutescenti-ferrugineis, ovatis, obtusis vel mucronatis, glabris vel carina et apice pilosis involuerati; *sepala* acuta petala intense lutea aequantia.

17. **Hibbertia astrophylla** Steud. foliis oblongo-linearibus integris obtusis margine revolutis supra pulvinato-stellato-asperis pilosis, subtus stellato-intricato-cinereo-pilosis; floribus in pedicellis brevibus demum parum elongatis; sepalis ovatis obtusis asperis; ovariis dense velutinis. ♀.

In rupestribus ad latus occidentale montis Clarence, districtus Plantagenet. 28. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 2167.

Frutex 1-2 pedalis, ramosissimus; *rami* subvalidi lignosi, post epidermidis recessum glabri; *ramuli* pilis stellatis simplicibusque asperi; *folia* alterna in apice ramulorum magis conferta, basi in petiolum brevissimum attenuata, 6-8 lineas longa, $1-1\frac{1}{2}$ lata, margine revoluta, obscure viridia subtus pallidiora; *flores* sparsi, axillares et terminales, brevissime pedicellati; *sepala* breviora quam petala ovata, profunde emarginata, obscure flava; *stamina* ovarium quidem cingunt, sed uno latere confertiora, hinc ad *Pleurandram*, coalitione eorum ad basin ad *Candolleam* accedens species.

18. **Hibbertia aspera** DC. foliis oblongis obtusis margine subrevolutis superne subseabris subtus cinereo-velutinis; floribus pedicellatis digynis; ovariis hirsutis. ♀. DC. Prodr. Vol. I. pag. 74. n. 14.

Ad fluvium Cygnorum locis arenosis 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 2136.

Bot.
Blennodia. K. W. (app. to

2, 67. *Sturtia* exp. into Central Austr.
Cruciferarum genus prope *Matthiobom*
calyx clausus, foliis lateralibus
basi farnatis. Petalae aequalia
laciniis oblongatis. Filamentum
occulum. Germen lineare. Sty-
lus brevissimus. Stigma bilobum
dilatatum. Siliqua linearis
valvis convexiusculis, stigmate
coronata polyperra. Summa
aptera pube fibrosa-nucosa
luta! Cotyledones incumbentes!

Cuba v. *suffruticosa* erecta ramosa caespitosa
puberula, foliis lato-linearibus
risuolentibus, racemis terminalibus
libris. *P. W. L.* in *arborescens* *Hort. (W.)*

Y. racemosa. — In *arborescens* *Hort. (W.)*

In *arborescens* *Hort. (W.)*

Suffruticosa 1 1/2' caule ramisque
terribilibus. Foli. vix 1" paucidentato.

Racemi multiflori erecti abra-

ctati. Flores albidis. Calyx

incurvus pubescens. Petalorum

unus calyce paullo longior

Stam. 6. Siliqua, filamentis line-

aribus membranis a pice

suspensum angustato.

Folia nocti *speciosissimi* laucula-

la immo *interdum* ex parte sub-

ovata! Ad ripam fl. Murray in

urna mobili *in arborescens* *Hort. (W.)*

Solano ..... Callispermum .....
..... *multicaule*
Herba viscosa.

Juncea R. Br. ! var.
Pleurandra unita Jord. Mill. (P. III)

Pericallor *P. erioxiphae* proxima sed sigalis exterioribus haud
ocumminatis sed obtusis parum
attenuatis et praefertim ovario
subovoidis velutinis in fructum
unicum ^{subcordatum} longitudinaliter con-
cretis et ab hac et ab aliis
hujus sectionis discriminalur.
Duae occurrunt varietates:

A. *glaberrima*, foliis signa
glabris nitentibus

Needy-creek trans fl. Murray
Aug. 30. frut 1-2'. cl. Situbzum

B. *pubescentula* Jord. Mill.

foliis signa piloso-pubes. frut. 4'
Needy-creek frut. Aug. 30.
cl. Situbzum legit.

Inthesis: vix similis per totum am-
plius gracilioribus.

+ (Thalys in nuptoria suo omisit species
quatuor Sicilianas huj. gen. jam in Germ.
gen. syst. neglectas.)

Pleurandra monadelphica Jord. Mill.

(*P. aristata* Thunberg! ab. pl. Farm. 952)
Stirps perigla, ^{et} omnibus ejusdem
sectionis ^{et} foeminae foliis pollinaribus
graculatis et floribus longe pedunculatis
discreta.

In altitudine 5-6 pedum caudis
habitu polyandrae.

Ad oppidulum York-town, Tasmania
Nov. 1850.

19. **Hibbertia proxima** Steud. caule erecto strieto brevi ramuloso asperulo sparsim rigide villosa; foliis planiusculis oblongo-linearibus margine revolutis rugulosis junioribus (praesertim margine) villosis, villis demum deciduis, supra nitentibus asperis, subtus pube densa brevissima eaneseuntibus; floribus in apice ramulorum axillaribus terminalibusque pedunculatis; pedunculis folia subaequantibus; sepalis ovatis tenuissime asperulis pilosulis apice acuminatis vel obtusis; ovarii velutinis. ♀.

In sublimoso-glareosis umbrosis jugi montium Darling's-range, ditionis Perth, 9. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2147.

Caulis erectus strictus pallide-rufescens, pilis brevissimis adpressis asperulis, intermixtis sparsim longioribus patentibus rigidiusculis pilosus; *rami* erecti, breves, 1-2-nunciales; *folia* sparsa, linearia, 6-10 lineas longa, 1-2 lata, supra rugulosa, punctis lepidotis sparsim notata, ad marginem pilis rigidiusculis demum deciduis ciliata; *sepala* breviora quam petala, aureo-lutea, margine crenulata, apice emarginata. *H. asperae* DC. proxima.

20. **Hibbertia trachyphylla** Steud. caule fruticuloso (bipedali) ramosissimo glabro; ramulis puncticulato-asperulis subpilosis; foliis anguste linearibus margine revolutis (hinc subteretibus) supra punctato-vel sublepidoto-asperis demum denudatis subtus glabriusculis; floribus in apice ramulorum terminalibus vel axillaribus; pedunculis folia superantibus; sepalis ovatis puncticulato-scabris; petalis ovatis emarginatis; ovarii 2 velutinis. ♀.

In arenosis prope oppidulum Perth, 31. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 2132.

Caulis bipedalis et ultra, diffuse ramosissimus, glaber; *rami* pallide rufescentes, erecto-patentes, sub lente punctis minutis plerumque ex pilis brevissimis compositis asperuli; *folia* alterna, in apicibus ramulorum magis congesta, angusta, vix $\frac{1}{2}$ lineam lata, 6-10 longa, obtusiuscula, margine revoluta subtus canaliculata, glaucescentia, punctis vel squamulis ex epidermide elevatis albidis asperula; *pedunculi* folia aequantia vel superantia similiter asperuli, erecti; *sepala* ovato-oblonga, extus punctato-scabra, margine evanescenti-ciliolata et apice mucronulato intus brevissime pilosula, basi glabrescentia, quam petala lacte lutea breviora.

21. **Hibbertia cinerascens** Steud. caule fruticuloso erecto asperulo sparsim piloso brevi ramuloso; foliis planis oblongo-linearibus margine subreflexis supra lepidoto-asperis subtus pube brevissima cinerea velutinis; pedunculis axillaribus terminalibusque folia superantibus; sepalis ovatis oblongis asperulis; ovarii velutinis. ♀.

In limosis ad praerupta vallis Cataractae, ditionis Perth, 25. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 2140.

Frutex 2-3 pedalis, ramosus; *caules* rufescentes pilis brevissimis rigidis adpressis asperulis, intermixtis sparsim longis albidis; *folia* sparsa, subalterna, magnitudine varia $\frac{1}{2}$ -1 pollicaria, 1-2 lineas lata, supra fusco viridia squamulis sub epidermide nidulantibus albidis aspera, subtus cinereo-albicantia, utrinque praesertim ad margines pilis sparsis rigidiusculis munita; *pedunculi* erecti, asperuli et pilosi; *sepala* intus glabrescentia petalis aureo-luteis emarginatis breviora.

22. **Hibbertia pilosa** Steud. caule subscandente patentiramoso piloso; foliis oblongo-ovatis acutis supra sparsim lepidoto-punctatis pilosis; floribus axillaribus sessilibus solitariis vel 2-3 aggregatis; sepalis oblongis pilosis obtusiusculis mucronulatis; carpellis 1-2 dense longeque undique pilosis. ♀.

In densis umbrosis montis Darling's-range, ditionis Perth, Sept. 1841. Herb. Preiss. No. 2130.

23. **Hibbertia pallida** Steud. caule basi ramoso; ramis strictis simplicibus angulosis glabris; foliis sparsis anguste linearibus margine revolutis (hinc subteretibus) glabris apice subrecurvo mucronulatis; floribus versus apicem ramorum axillaribus vel in ramulis brevissimis terminalibus (subracemosis); calycibus bracteola lanceolata auctis; sepalis ovatis acutiusculis glabris; ovarii (2?) velutinis. ♀.

In sublimoso glareosis ad radices jugi montium Darling's-range, ditionis Perth, 9. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2152a.

Caules e trunco radicali lignoso plures, erecti, simplices, pedales et ultra, luteo-albidi; *folia* glaucescentia, sparsa, solitaria, pollicaria et ultra, basi in foveola conspicua elevata nidulantia, post delapsum foliorum persistente; *flores* vel immediate e caule vel in ramulis brevissimis, 2-5 lineas longis, sessiles; *petala* pallide lutea emarginata quam sepala parum longiora.

24. **Hibbertia aurea** Steud. caule erecto sursum ramoso ramisque glaberrimis cortice demum secedente angulosis; foliis sparsis anguste linearibus margine revolutis (marginibus sese non attingentibus) puncticulis elevatis sparsis exasperatis, apice apiculatis; floribus versus apicem ramulorum (subracemosis) axillaribus sessilibus; calycibus glaberrimis bracteis pluribus ovato-lanceolatis involueratis; ovarii (2?) velutinis. ♀.

Cum antecedente lecta. Herb. Preiss. No. 2152b.

A praecedente simillima, quacum in *Preissii* herbario erat commixta, differt: *caule* sursum ramosiore, bracteis 6-8 imbricatis calycem involuerantibus, sepalis similibus sed minoribus tenuissime ciliatis, primo intuitu vero petalis aureo-luteis.

25. **Hibbertia lineata** Steud. caule fruticulosos a basi ramoso; ramis erectis strictis cortice cinereo secedente glabris; foliis sparsis superne subconfertis anguste linearibus longitudinaliter sulcato-striatis strictis rigidis margine punctato-asperis; floribus axillaribus solitariis pedunculis folia subaequantibus; sepalis asperulis ovatis bracteola lanceolata (decidua) munitis; ovarii (2) velutinis. ♀.

In confragosis umbrosis sylvaticis ad latus septentrionale montis Wuljenup, ditionis Plantagenet, 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2151.

Caules e trunco radicali incrassato lignoso plures, erecti, stricti, $1\frac{1}{2}$ -2 pedales, basi nudi supra medium foliati; *folia* magnitudine varia, 4-8 lineas longa, una vix latiora, supra vix convexiuscula, glabra, ad margines praesertim punctis elevatis exasperata, infra sulcis 3 longitudinaliter percursa, apice breviter

recurva, mucronulata; *pedunculi* erecti vel subarenati glabri; *calyx* praeter punctula minuta asperula glaber; *petala* sepalis majora pallide lutea, emarginata.

26. **Hibbertia microphylla** Steud. caule erecto parvulo (4-8-unciali) ramoso fruticuloso; foliis confertis brevissime petiolatis crassiusculis oblongo linearibus obtusiusculis (raro mucronulatis) glabris; floribus axillaribus pedicellis folia superantibus; sepalis obtusis ante anthesin pilosis demum glabris; ovariiis (2?) pilosis. ♀.

In glareosis prope montem Wuljenup districtus Plantagenet, Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2154 et 2180.

Fruticulus parvus 6-8 uncialis vel pedalis, e trunco radicali lignoso ramosus, ramis plerumque simplicibus strictis vel plus minus ramulosis (No 2180) folia approximata, sparsa (non fasciculata) 1-1½ lineas longa, dimidium lata, subearnosa, viridi-glaucescentia, glabra vel punctis minutissimis sparsis asperula; flores ad apices ramorum axillares, *pedunculi* folia superantes; *sepala* oblonga petalis luteis vix emarginatis breviora.

CANDOLLEA Labill. Endl. gen. n. 4755.

Meisn. gen. pag. 2. (5.)

1. **Candollea assimilis** Steud. caule ramoso epidermide secedente glabro; ramulis subunifariam pilosis; foliis linearibus subconfertis margine revolutis sparsim — basi ampliata — dense pilosis apice mucronulatis; floribus axillaribus pedunculatis pedunculis pilosis folio brevioribus; sepalis ovatis obtusiusculis ovarisque glabris. ♀.

In arenosis ad fluvium Cygnorum, 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 2133b.

Fruticulus praecedenti simillimus, pedalis et ultra, caule glabro cortice facile secedente; rami rufescentes praesertim ramuli unifariam pube alba sericea quandoque in totum ramulum diffusa pubescentia, in apice ramulorum subcongesta; folia ½-1 pollicaria, ad margines inflexos vix semilineam lata, sursum parum dilatata, mucronulata, basi ampliata ciliolata, caeterum glabra glaucescentia; pedicelli folio breviores, 4-5 lineas longi, pubescentes; sepala ovata, tenuissime pubescentia. Iterum *Pleurandrae* facie sed stamina partim anthera intermixtis monantheris.

2. **Candollea latifolia** Steud. caule diffuse ramoso ramis angulatis pubescentibus; foliis glabris subcoriaceis obovatis apice dentatis basi angustata, junioribus minoribus saepe omnino integerrimis; floribus solitariis in apice ramulorum inter folia sessilibus; sepalis ovatis glabris mucronatis (basi) ciliolatis petala obovata superantibus; phalangibus 2-3-andris. (*C. tetrandrae* Lindl. proxima, an var?)

In depressis umbrosis ad portum Leschenault, Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2162.

Caulis lignosus, diffuse ramosus, inferne glaber uti ramuli dense pubescentes, cicatricibus et basi foliorum delapsorum persistente notati; folia sparsa, versus apicem ramorum approximata, magnitudine varia ½-1 pollicaria et ultra, ovata vel ovato-oblonga, coriacea, versus apicem dentibus remotis 3-5 notata, supra fusco- (subtus pallidius) rufescentia; sepala quam in praecedente

parum minora sed petala eis multo longiora, ovato-oblonga, margine subrevolutato-undulata; *ovaria* 5, glabra.

3. **Candollea Preissiana** Steud. caule fruticoso erecto (2-3 pedali) ramuloso pubescente; foliis lineari-cuneatis apice obtusis submarginatis medio mucronulatis subcoriaceis superne demum glabris, basi dense pilosis et dilatato-semiamplexicaulibus; floribus ad apices ramulorum inter folia subracemosis pedunculatis; calycibus pilosis sepalis ovato-lanceolatis acutis; staminibus sublateralibus 2-4 andris; carpellis glabris. (Si mavis ad *Pleurandras* sect. IV. *Candolleanas* DC. referre possit.) 7.

Inter saxa calcarea colliculi maritimi ditionis Perth, 9. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 2159b.

Caulis subflexuosus, inferne cortice facile secedente glaber sursum pubescens; *rami* patentes, plerumque abbreviati, densius pube albida vestiti; *folia* in ramulis conferta, pollicem et ultra longa, 2-4 lin. lata, basin versus attenuata, ima basi dilatata subamplexicaulia, apice subtruncata; *pedunculi* dense pilosi, ex axillis foliorum his breviores; *sepala* margine membranacea, glabra, medio pilosa, petalis pallide-luteis breviora.

4. **Candollea calycina** Steud. caule fruticoso (6-8 pedali) ramoso rigido piloso demum glabrescente; foliis subcoriaceis glabris margine subrevolutis oblongo-lanceolatis raro integris sed apice 3-5 dentatis mucronulatis basi in petiolum brevem subdilatato-amplexicaulem abscuntibus; calycibus magnis, sepalis ovatis apice acutis petala superantibus glabris; staminibus antheras 2-4 gerentibus; ovaris 2-5 glabris stylis capitatis antheras aequantibus. 7.

In colliculis arenosis ad portum Leschenault et ad littora maritima districtus Sussex, 11. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2131.

Caulis valde lignosus, diffuse ramosus; *rami* cicatricibus foliorum noduloso-notati, sursum foliati puberuli albidi; *folia* in petiolum angustum brevem attenuata, ima basi sursum semi-amplexicauli-dilatata, subcoriacea, magnitudine varia 4 lineas-pollicem et ultra longa, oblonga, quandoque linearia, plus minus lanceolata; nunc (praesertim juniora) omnino integra nunc apice dentibus 3 rarissime 5, plus minus distinctis notata; *flores* in apice ramulorum brevissimorum sessiles; *calyces* in genere maximi, *sepala* foliacea margine et basi membranacea, semipollicaria; *petala* pallide lutea.

5. **Candollea glaberrima** Steud. caule fruticuloso erecto ramosissimo (ut tota planta) glaberrimo; foliis linearibus margine revolutis apice leviter emarginatis vel obtusis mucronulatis basi valde ampliatis subamplexicanlibus; floribus axillaribus sparsis sessilibus, sepalis ovato-lanceolatis acutis, staminibus diantheris et simplicibus. 7.

In arenosis fruticosis sylvaticis cis oppidulum Guildford ditionis Perth, 2. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 2157.

Fruticulus 1-2 pedalis, radice lignosa, parum fibrosa; *caulis* a basi ramosus, clierascens, uti rami hinc inde cicatricibus foliorum notati; *folia* erecto-patentia, subpollicaria, $1\frac{1}{2}$ -2 lineas lata, basin versus parum angustata, ima basi late ovato-ampliata et hac basi subimbricata, glaucescentia; *flores* basin

24. virgata R. Br. & Pilgera
Elbertia *memorabilis*
Candollea casualis *Gu. Me.*
^{diffusa, prostrata}
 caule ~~erecto~~ ^{diffusa} *ramosa*,
 ramis aculeis glabris, lignosis
 fuit foliisque ^{per. brevibus, latis} *ovatis*,
sarmentalis *linearibus* *can-*
aliculatis *apice pub-*
erulis *memorabilis*, *base paulo*
dilatata *virginatis*, *floribus*
in apice ramulorum *multis* *foliis*
sarmentalis *per. brevibus*, *apicalis*
ovatis *acuminatis* *velutis* *reticulatis*
C. sarmentalis *arceutis*, *charac-*
teribus *in descriptione* *expressis*, *facile*
distincta.
Ad flumina Murray, sylvas
arborescens *frequens*, *hb. St. n. 22*.
Forbes Hibbertia species *non parva* *et*
virgatam *ajungenda*.
C. cognoscenda *hb.*

Tarmanica *R. Br.*

- 25. aromatica R. Br. in R. Br. & Pilger*
T. fragrans *hb. St. 997. M. p. m.*
at St. South Isk river, Ta-
manica, primum *marcal*
8-10' Oct. 15. 1848. hb. St.
T. n. 15. A Tarmanica
aromatica *descriptione* *a*
Candolle *condita* *nullo*
modo *nisi* *foliis* *passim* *et*
laticibus *discrepat*.

ampliatam excedentes; *sepala* 3-4 lineas longa, margine subscariosa *petala* flava subaequantia.

6. **Candollea subvaginata** Steud. caule erecto fruticoso ramoso glabro, ramis junioribus pubescentibus; foliis apice cuneato dilatatis mucronulatis vel subemarginatis (raro omnino obtusis) integerrimis glabris basi dilatato-vaginantibus; floribus axillaribus subsessilibus staminibus 2-4 antheras gerentibus; sepalis lanceolatis acuminatis petala superantibus; ovariis 3-4 stylis longis filiformibus. ♀.

In sublimosis districtus Hay, Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2160.

A praecedenti simillima, cujus forsitan varietas, differt: habitu tenuiore, foliis apice vel omnino obtusis vel simpliciter mucronulatis nec subtruncatis nec 3-dentatis, basi magis solutis, caulem quasi subvaginantibus; ramis junioribus praesertim ad divisiones et foliorum ortum omnino nec in linea laterali pubescentibus.

7. **Candollea rupestris** Steud. caule fruticoso (4-5 pedali) ramoso, ramis junioribus pubescentibus; glaberrimis sublineari-cuneatis apice obtusiusculo subtridentato vel mucronulato, basi subdilatata subamplexicaulibus; floribus axillaribus sparsis subsessilibus; sepalis lanceolatis acuminatis glabris; staminibus 2 antheriferis vel simplicibus; germimbus glabris. ♀.

Inter rupium rimas montium Darling's-range ditionis Perth, 15. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 2158.

Caulis fruticosus, 4-5-pedalis; *rami* rufescentes, glaberrimi, *ramuli* juniores apicem versus unifariam pubescentes; *folia* subalterna sparsa, linearia, pollicem et ultra longa, 1-1½ lineas lata, apicem versus plerumque latiora, truncata et utrinque in dentem plus minus conspicue excedentia vel obtusa dente medio solum restante, ima basi subamplexicauli-dilatata, glaucescine fugaci adpersa; *flores* axillares, brevissime pedunculati, *pedunculis* bractea una alterave munitis; *sepala* lanceolata, margine subscariosa, longe subpungenti-acuminata *petala* flava subaequantia.

8. **Candollea striata** Steud. caule fruticoso (1-2 pedali) ramoso, ramis subteretibus (junioribus) pubescentibus; foliis angustissime linearibus (3) striatis, superne glabris basi pilosis vix ampliatis; floribus axillaribus sessilibus; sepalis ovatis acuminatis pilosis ciliatis; staminibus 2-3 antheriferis et simplicibus; ovariis pubescentibus. ♀.

In arenosis prope oppidulum Perth, 6. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 2148.

Caulis et *rami* erecti vel divaricato-patentes, glaberrimi; *folia* in ramulis brevibus subfasciculato-conferta, 1-1½ pollices longa, marginibus reflexis subteretia, striata, sursum glabra, nitida, basi pilosa, apice subpungentimarginata; *flores* in apice ramulorum inter folia sessiles, solitarii; *sepala* semipollicaria, extus pilis sericeis munita, intus glabra, acute acuminata *petala* pallide lutea superantia.

9. **Candollea cygnorum** Steud. caule erecto debili parum ramoso pubescente; foliis anguste linearibus integris pilosis basi non dilatata semiamplexicaulibus; floribus oppositifoliis pedicellatis pedicello infra calycem bracteolato; se-

palis ovatis acuminatis extus pubescentibus intus ovarisque glabris. 2. 5.

In arenosis prope cataractam ad caput fluvii Cygnorum, 26. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 2174.

Caulis vix pedalis, ramosus, debilis, inferne glabrescens superne dense pubescens, pallide rufescens; *folia* erecta, pollicaria et ultra, vix lineam lata, plana, margine vix revoluta, basi praesertim pilosa; *pedunculi* oppositifolii 5-6 lineas longi, medio bractea filiformi 3-4 lineas longa muniti; *sepala* petalis obscure flavis sublongiora, acute acuminata.

10. **Candollea parviflora** Steud. caule fruticuloso (1-1½ pedali) erecto ramoso piloso; foliis linearibus margine revolutis supra basin glabris apice leviter emarginatis, basi pilosis dilatatis subamplexicaulibus; floribus axillaribus pedunculatis folia subaequantibus pilosis; sepalis glabris ovato lanceolatis acutis; staminibus 2-3 antheris; germinibus glabris. (Habitus *Pleurandrae*, stamina *Candolleae*.) 5.

In arenosis montium Eliza mountain ditionis Perth, 17. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 2150 et ad Princess Royal Harbour, 11. Oct. 1840. No. 2168.

Frutex 1-1½ pedalis, diffuse ramosus, omnino *Pleurandrae* facie ad filamentis diandris et foliis basi dilatatis *Candolleae* congener; *caulis* ante corticis seressum ramique plus minus dense molliter pilosi; *folia* subfasciculato-conferta, pollicem et ultra longa, 1-1½ lineas lata, margine plus minus revoluta, praesertim basi pilosa, ad 2-2½ lineam dilatata et quoad basin subimbricata, apice obtuso subtruncato submarginata, quandoque mucrone brevissimo munita, subtus pallidiora; *pedunculi* axillares, pilosi, folio nunc breviores nunc sublongiores, ebracteati, subfiliformes; *calyx* parvus, glaber, *sepala* vix 3 lineas longa, oblongo ovato *petalis* pallide flavis vix breviora.

11. **Candollea? exasperata** Steud. *) canle ramoso cinerascente cortice seccedente; foliis sparsis ad apices ramulorum confertis glaucescentibus linearibus apice mucronatis punctato exasperatis dorso tenuissime sulcato lineatis; floribus inter folia sessilibus terminalibus. 5.

In glareosis planitiei Quangen ditionis Victoria, 12. April 1840. Herb. Preiss. No. 2175.

---

*) Genus dubium, flores nulli adsunt evoluti; ex unico staminum rudimento divisio genus divinari potest.

Cunoniaceae Br.

Samara Salisb.

B. Billardieri ! David Don.

B. rubioides La Billardiere

not Andr. Sims Tasmant

B. rubiacifolia hb. St L. 54. Tasm.

B. salisburiensis ! T. G. L.

C. procera ^{in refectum vergentes vel albae} ^{montibus 3-4000 ft. frut 2-3' hb St L. 296}

Meinmannia L.

M. biglandulosa ! M. Cunningham

M. Murphy Tasm. 20

hb. St. J. II n. 338. Jan. 49,

Ericaceae Br.

Anopterus glandulosa Lab.

Tasmaniae, hb. St. 793.

Turnariaceae

Turnaria Ekloniana Sonder?

Introduita, nunc oratica prope
North Adelaide.

Auth: vire.

Papaveraceae Lb

Papaver. Scammonium.

N. 1. P. Scammonium! Candolle.

Don gen. syst. I p. 131. cum
icone nudis sed bona

In arenosis inter frutices sic distos
Murray. var. maximum Warbur-
ton. Ind. 1818. In alio p. 1818
Capsulae raro apice fere pedales
mannu. Color pedicellorum haec
reflexus per latitudinem. Caulis inter-
dum humillimus! Capsula usque
ad 14 longa! Signata in nostris
speciminibus tantum 5-6 ra-
diata. itaque varietas ad in-
dus spurius. Augus lat. eff. vidi.

* In planta a nob. Mich. in interiori
nupta & in libro suo pag 357 cum P. Dubio
comparata.

Capsularae. Lb.

N. 2. Stellata verticillaris. Lb.

Signatissime in Nova Holl.
australi et Tasmannia
tam montibus quam
planities. Lb. St. n. 147.

Occurrit caede varia: digitatis ad
pollicem alta longa, triplex, tri-
plex vel praecipua & n. verticilla-
eorge congestis vel saevius diffusi
floribus annuibus saepe fessilibus
anthypis: vni.

* Chamae maculata ovato-oviformis
* N. 1. 1818. In alio p. 1818

CRASSULACEAE DC. Endl. gen. pag. 808.

(Auctore NEES ab ESENBECK.)

TILLAEA Mich. Endl. gen. n. 4607. Meisn. gen. pag. 134. (89.)

Characteri generico addas: *Calyx* 3-5-partitus. *Stamina* 3-5. *Ovaria* 3-5.

* *Tillaea* DC. Endl. l. c. *Flores* 3-5-meri. *Carpella* disperma.

1. ***Tillaea adscendens*** N. ab E. caule basi brevi spatio decumbente hinc stricte erecto inferne ramoso, foliis connatis ovato-cymbiformibus subcarnosis, floribus pentameris in axillis congesto-verticillatis omnibus sessilibus, sepalis petalisque membranaceis acuminatis, his duplo angustioribus.

In arenosis laud procul ab oppidulo Freemantle, Decembri a. 1838. Herb. Preiss. No. 1931.

Caulis vix digitalis, strictus, tetragonus, purpureus, brevi spatio e basi procumbens, dein erectus, basi ramosus. *Folia* in sicco statu pallida exsucca et valde collapsa, in vivo ergo succulenta, 1-2½ lin. longa. *Flores* ex omnium fere foliorum axillis, sessiles, inferiores gemini ternive, superiores oppositi, hinc habitus verticillatus, verticillis folia articulosque aequantibus densis. *Bracteolae* ad basin calycis duae, ovatae, apice subulatae, calyce plus duplo breviores ejusque laciniis similes. *Calyx* sessilis, basi truncatus, albo-membranaceus, quinquepartitus, laciniis basi hyalinis, superiora versus in disco purpureis, ambitu hyalinis, ovato-lanceolatis, subulato-acuminatis. *Petala* 5, lanceolata, setaceo-acuminata, saturatius purpurascentia. *Stamina* 5. *Squamulae* obsoletae. *Carpella* 5, nonnullis saepe abortivis, oblique lanceolata, apice subulata retrorsum uncinata, compressa, disperma. *Semina* ovalia, fusca, ad hilum caruncolata. *Discus* hypogynus delapsis carpellis quinqueareatus. ☉.

2. ***Tillaea colorata*** N. ab E. caule erecto stricto inferne ramoso, foliis connatis ovato-cymbiformibus subcarnosis, floribus pentameris in axillis congesto-verticillatis, verticillis sex-plurifloris confertis, flore intermedio cujusque axillae pedicellato, sepalis petalisque membranaceis acuminatis, his duplo angustioribus.

In arenosis silvae prope oppidulum Perth, Septembri a. 1839. Herb. Preiss. No. 1932.

Simillima *Tillaeae adscendenti*, cujus nescio an sit varietas, differt *caule* statim a basi erecto (ejusdem altitudinis), *verticillis*, praesertim versus apicem caulis et in ramis, confignis, faciem alopecuroidem provocantibus, plurifloris, flore fasciculi cujusque lateris intermedio pedicello longitudine calycis praedito, lateralibus fasciculum triflorum flore *intermedio* et in hisce, ut brevi-

ter, pedicellato exhibentibus, ideoque verticillo quaque 1-1-flore, tametsi raro omnes flores perficiantur, — porro *florum* colore rubro seu rubro saturatiore calycem et petala undique imbuenti, saepe tamen etiam expallescente, *laciniis calycis* angustioribus oblongo-lanceolatis, petalis non modo sepalis angustioribus sed iis etiam $\frac{1}{3}$ brevioribus, *disco hypogyno* minori non plano et evidenter quinquenealveolato, sed elevato subconico.

** Bulliarda DC. Endl. l. c. *Flores* tetra-pentameri. *Petala* ovalia vel oblonga, acuta vel acuminata. *Squamulae* hypogynae lineares, vel filiformes subcapitatae (staminum interiorum rudimenta). *Capsulae* ovales, in stylum attenuatae, polyspermae (in medio haud contractae styloque deciduo denique obtusatae ut in *Tillaea muscosa* ejusque affinibus).

3. **Tillaea (Bulliarda) intricata** N. ab E. caule diffuso intricato repente, ramis adscendentibus, floribus axillaribus sessilibus oppositis pentameris distantibus, sepalis petalisque ovato-lanceolatis acuminatis, foliis oblongo-linearibus obtusis cariosis supra depressis subtus convexis.

In arenosis conchyliosis humidis prope lacum insulae Rotenest, Augusto 1839. Herb. Preiss. No. 1929.

Caulis 1-2 poll. longus, repens, ramosus; rami etiam decumbentes, apice adscendentes, purpurei, acute tetragoni, ut reliquae partes glabri; internodia foliis longiora aut ea aequantia. *Folia* patentissima, incurva, $1\frac{1}{3}$ - $1\frac{3}{4}$ lin. longa, oblongo-linearia, obtusa. *Flores* in angulis foliorum inferiorum aggregati vel eorum loco gemmula microphylla, in superiorum foliorum angulis subsessiles, oppositi, folium aequantes ($\frac{3}{4}$ lin.). *Bractae* duae ad basin calycis, ovato-oblongae, obtusae, adpressae, succulentae, calyce dimidio breviores. *Aestivatio* calycis valvata. *Sepala* et *petala* longitudine aequalia, alba (?); illa latiora, utraque acuminata. *Stamina* longitudine pistilli, filamentis subulatis, antheris transversim ovalibus. *Stamina* sterilia capitulo parvo praedita, filamentis triplo breviora. *Ovarium* acute 4-5-angulum; *styli* subulati, papulosi, recurvi. *Ovula* plura. *Fructum* non vidi.

CEPHALOTEAE Endl. gen. pag. 812.

ROSACEAE, Tribus 5 **SANGUISORBEAE**, Subtribus 2, **CEPHALOTEAE** Meisn. gen. pag. 105. (74.) **CEPHALOTACEAE** Lindl.

Syst. ed. 2. pag. 14. "23"

CEPHALOTES Labill. Endl. gen. n. 4628.

Meisn. gen. pag. 105. (74.)

1. **Cephalotes follicularis** Labill. Fl. Nov. Holl. Vol. 2. pag. 7. tab. 145. R. Brown in Flind. Vol. 2. pag. 601. tab. 4. opp. ed. Nees ab Esenb. 1. pag. 144. Hook. in Bot. Mag. Vol. 58. tab. 3118 et 3119.

In locis subturfosis arenosis, prope oppidulum Albany (Plantagenet) m. Januar. 1841. Herb. Preiss. No. 1204.

Tillaea capillaris Forstn.

caule simpliciter vel ramoso erecto, foliis line-
aribus acutis, pedunculis axillaribus solitariis
longatis capillareis, floribus tetrameris, ^{linariis ovatis} sepalis petalis
duplo brevioribus.
In montibus humilibus & pagum Clare-village.
Loci humidus ad fl. South Esk river Tasmania
nival. hb. N. II n. 465 & 238. Vu!
alt. 1/2 - 3' alta.

Tillaea grandiflora Forstn.

caule erecto vel diffuso frabto ^{invol} orthotome-ramoso
foliis ^{pub} linearibus acutiusculis, ^{floribus tetrameris} pedunculis ^{invol} inter ex
axillis subternis lanceolatis breviter insumendis
longe pedunculatis subcymosis, sepalis linearilanceolatis
petala lanceolata acuta parum superantibus inaequaliter glanduloso-ciliatis.
In T. maritima Hookeri var?
Stips humillima H. 2"

Satis frequenter in Nov. Holl. auct. Vu!

Tillaea (Bullicarda) Stuartii Forstn.

caule basin usque reptante ^{diffuso} ^{capill}
arborescente, ramis erectis?, floribus
tetrameris, axillaribus solitariis
breviter ^{longis} pedunculatis remotis, sepalis
petalisque ^{longis} lanceolatis ovatis, foliis angu-
sto-lanceolatis acutis.

In aquis fluvii South Esk river Tasmaniae,
hb. N. 1002. Tillaeae aquaticae
propinquissima. Futurum pedum alta.
Annon Dasyphylla in Tillaeae genus
innocenda? Ad ripas fl. Ockapamie
& Torrens superioris innotatas

Cephalotheca ^{us} gallicularis Less.

Vidi primum cultum nondum
florens in Nova Hollandia ad
indicali miffum.

^{trigyna}
Cephalotheca Less., quae genus
nomen mutandum cum genus inest an
liquius oleospororum

LORANTHACEAE Don.

(Auctore F. A. GUIL. MIQUEL.)

NUYTSIA R. Brown. Endl. gen. n. 4587.

Meisn. gen. pag. 154. (110. 359.)

1. **Nuytsia floribunda** R.Br. glabra, foliis late linearibus obtusis crassis, staminibus petalis nudis aequilongis, stylo exserto. Lindl. Swan-River Bot. tab. 4. (mala.) Fenzl. in Endl. Enum. pl. Hügel pag. 57. Brown in Journ. of the royal geogr. Societ. I. pag. 17.

♂ Crescit in arenosis sylvae ad fluvium Cygnorum incolis Cabbagetree nuncupata, 18. Dec. 1838 florens. Herb. Preiss. No. 1608.

„Arbor 25-35 pedalis.“

LORANTHUS Linn. Endl. gen. n. 4586.

Meisn. gen. pag. 154. (110. 359.)

1. **Loranthus (Dendrophthoë) linophyllus** Fenzl. foliis ramulis floribusque albo-tomentosis fasciculatis oppositis alternisque tereti-filiformibus obtusis, cymis squamoso-dichotomis 3-5-floris simplicibus vel subcorymbosis axillaribus, floribus sessilibus, calycis limbo obsolete denticulato truncato, petalis 4-5 lineari-subspathulatis a basi liberis in alabastro clavato angulato coalitis, staminibus petalorum trienti superiori insertis, antheris aequilongis, stigmatibus filiformi. Fenzl. in Endl. Enum. pl. Hügel pag. 56.

Parasiticus in Casuarinis planitieci supra urbiculam Perth, 10. Oct. 1839. Flores coccinei (intus). Herb. Preiss. No. 1614.

2. **Loranthus (Dendrophthoë) Casuarinae** Miq. glaber, ramulis teretibus foliisque suboppositis vel oppositis tereti-filiformibus succulento-coriaceis brevi-mucronatis glabris, floribus axillaribus solitariis vel in pedunculo communi binis pedicellatis, calycis limbo obsolete denticulato, petalis 6 anguste subspathulato-linearibus in alabastrum tereti-subclavatum cohaerentibus, demum solutis, staminibus petalorum trienti superiore insertis, antheris anguste linearibus aequilongis, stylo filiformi.

Parasiticus in Casuarinis planitieci supra urbiculam Perth, 13. Maji 1839. Herb. Preiss. No. 1615.

Rami teretes, trichotomi vel alternatim ramulosi, laeves, fusco-cinerascentes, haud fragiles. Folia subopposita, raro perfecte opposita, viridia, teretia, in sicca rugulosa, glabra, rigidiuscula, in brevem mucronem terminata, recta vel subflexuosa, 5-10 cent. longa, 1-2 mm. crassa. Flores axillares, solitarii vel in pedunculo communi 2-4 mm. longo bini, pedicellis

1 cent. circiter longis suffulti, basi *bractea* ovata brevi-acutata, concava, carnosa sustenti, 4 cent. paullo superantes, sulphurei, in sicco fuscii, virginales cylindraceo-subclavati versus apicem parumper curvati. *Calyx* 4 mm. longus, obconicus, margine pallido, obsolete denticulato. *Petala* linearia versus apicem aliquid dilatata, acuta. *Antherae* 7 mm. longae.

3. **Loranthus (Dendrophthoë) Preissii** *Miq.* glaber. ramulis teretibus, foliis suboppositis tereti-filiformibus strictiusculis subacutis muticis succulento-carnosis, floribus axillaribus in cymis di-vel trichotomis folio brevioribus, pedicellatis (vel intermedio sessili), calycis brevi-obconici limbo repando, petalis 5 lineari-spathulatis apice concavis, staminibus eorum quadriente superiori insertis aequifloris stylo filiformi sursum leviter incrassato paullo brevioribus.

Parasiticus in Acaciae specie, ad Perth, 8. Mart. 1841 florens. Herb. Preiss. No. 1611.

Praecedenti similis, sed inflorescentia et florum forma diversissimus. *Rami ramulique* teretes stricti, dichotomi, alterni, glabri, laeves, fusciscenti virides. *Folia* erecta, recta vel leviter curvata, 4-5 cent. longa, teretiuscula, in sicco rugulosa rigidiuscula, acutiuscula, mutica, 1-2 mm. crassa. *Flores* in cymis iteratim di-vel trichotomis *pedunculis* $\frac{1}{2}$ cent. circiter longis sustenti, *mediis* sessiles, *bractea* carnosa, colorata, ovata, acuta naviculari glabra apice subciliolato-lacera sustenti, in sicco fusciscentes, $2\frac{1}{2}$ cent. longi, virginales clavato-cylindrici, basi parumper tumiduli, apice incrassato obtusi, rectiusculi, *calyce* brevi-obconica subcylathiformi 2 mm. longo, margine truncato repando, *petalis* 5 linearibus, apice elliptice dilatato acutiusculo concavis, *staminibus* paullo infra partem dilatatam insertis, *antheris* spathulato-linearibus, acutis, 3 mm. longis. *Stylus* filiformis petala parumper superans, versus apicem incrassatus, stigmatibus vix capitellato subtruncato.

~ **Loranthus Preissii, varietas?** Rami et folia ut in specie, sed haec interdum omnino alterna. Flores desunt.

Parasiticus in Acacia Lehmanniana, reg. York. Flores coccinei. 8. Mart. 1840. Herb. Preiss. 1618.

4. **Loranthus (Dendrophthoë?) scoparius** *Miq.* glaber, ramis teretibus, foliis suboppositis erectis, axillaribus accessoriis plerumque subfasciculatis, filiformi teretibus acutiusculis glabris, floribus . . . . .

Parasiticus in Acaciae specie, reg. York, 20. April. 1840. Herb. Preiss. No. 1613.

Praecedenti foliorum forma similis, sed eorum situ plerumque fasciculato et minore magnitudine distinctus, ob flores incognitos haud tuto determinandus. Fruticulus dichotome et alternatim ramosissimus; *rami ramulique* teretes, in sicco fusco-grisei, densi, erecti. *Folia* versus ramulorum apices confertissima, viridia, erecta, subopposita vel plane opposita, accedentibus in eorum axillis plerumque uno limbo paullo brevioribus purpure fasciculata, filiformia, teretia, plerumque leviter curvata, glabra, 1-2 $\frac{1}{2}$ cent. longa, $\frac{1}{2}$ mm. in sicco crassa vel paulum crassiora, acutiuscula, mutica.

5. **Loranthus (Dendrophthoë) Miquelii** *Lehm.* *Mss.* glaber, ramis teretibus, foliis suboppositis vel oppositis longe petiolatis, infimis quibusdam obovatis vel obovatis, reliquis lanceolatis vel linearibus plerumque leviter falcatis, obtusissimis muticis, basi attenuatis, uninerviis vel subtriplinerviis venulosis purpureo-marginatis, corymbis axillaribus

Mique Cui Lehmann

Loranthus pendulus Lieber
Porre est raro occurrit in Capuarina quadrivalvi
e. i. in *Ar. algyptorum* reusis

ad medietatem Biggell-range criss.

fin. Apr. 1848. fructiger. 80 m.

fructus viri. ferebatur parva viri.

Dis.

In iucalypto odorata, son-
giroffii aliisque speciesibus

Anth: ~~uricatis~~ ^{uricatis}, verem. c. septum!
Fructus ovalis!

Cum in Barkoria australi tum in Malakura
curai *Loranthos* reperti nequaquam tunc
florentes vel fructificantes. (L. Malakura
?)

Folia carnosa saepe utraque latere
conaristata in toris exserta

ut stylus

Corolla (patina) apicem vixit viridius
denique flavescens. Stylus viridis. Filamenta
saturate viridia autem nigrescentia

In Capuarinis ferendum et Lora

Eucalypto Maj 8, flumen 20 m.

80 m. 323 Inermia corollis luteis.

8 n. r. incis donata ita eadem arbore
(Myoporo regulan) asperavi; corolla ^{ut stylus} lutea
flava apicem vixit viridius, ^{ut stylus} filaments
viridis. Lutea viridis, filaments saturate
viridis. Lutea ^{ut stylus} flavescens

[illegible]

solitariis longe pedunculatis folia aequantibus vel superantibus 4-5-fidis, ramis trifloris, floribus omnibus longiuscule pedicellatis, singulis ad basin bractea rotundata naviculari sustentis, calycis limbo truncato obsoletissime denticulato.

Parasiticus in Eucalyptis, distr. York, 13. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 1617.

Lorantho pendulo Sieb. fl. Nov. Holl. n. 241. DC. Mémoir. Loranth. Tab. I. maxime affinis, sed species nihilominus distinctissima ob folia multo breviora obtusa uninervia, flores pedicellatos omnesque bracteatos.

„*Rami* valde elongati, penduli, brunneo-cinerascentes, *ramuli* purpurascens“, teretes, nodosi. *Folia* subopposita, summa plerumque plane opposita, coriacea, glabra, „purpureo-marginata“, longe petiolata, *petioli* semiteretibus $1\frac{1}{2}$ -3 cent. longis, *inferiora* quaedam obovata vel obcordata, 2-4 cent. longa, *reliqua* subobliqua, falcata, lanceolata vel summa linearia, obtusa, basi in petiolum contracta, 5-9 cent. longa, $1\frac{1}{2}$ -4 mm. lata, perspicue uninervia vel subtriplinervulosa, reticulata. *Corymbi* axillares solitarii, *pedunculi* purpureis $2\frac{1}{2}$ -4 cent. longis sustenti, umbellatim in ramos 4-5 teretes 1- $1\frac{1}{2}$ cent. longos partitis, *ramis* trifloris, *pedicellis* 5-8 mm. longis. *Bractea* sub quovis flore subrotundata, concava, carnosae, apice subtilissime ciliata. *Alabastra* tereti-clavata, recta, 3 cent. circiter longa. *Calyx* obconico-cylindraccus, 3-4 mm. longus, limbo subdilatato truncato repando-denticulato. *Petala* 5 „coccinea“ linearia, apice subspathulato-dilatato elliptico concavo. *Stamina* trienti propemodum superiori inserta, petala circiter aequantia, *antheris* linearibus, versus basin attenuatis, fere 4 mm. longis. *Stylus* stamina parumper superans filiformis, sulcato-angulatus, stigmate „flavo“ subcapitellato, verruculoso.

Loranthus Miquelii Lehm. *varietas?* foliis lanceolatis perspicue triplinerviis, floribus brevioribus (an nascentibus?) a specie differens. Baccae immaturae ovatae.

Parasiticus in Eucalyptis districtus Grantham, 7. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 1612.

Uterius inquirendum num revera a specie differat, nam flores in praesente specimine $\frac{1}{2}$ breviores juveniles videntur et pressione tantum aperti.

6. **Loranthus (Dendrophthoe) Melaleucae** Lehm.

Mss. glaber, ramis ramulisque teretibus, foliis oppositis vel suboppositis decussatis longiuscule petiolatis coriaceis anguste spathulatis obtusis basi sensim in petiolum contractis obsolete uninerviis aveniis vel praesertim supra subvenuloso-reticulatis, floribus corymbosis pedicellatis pentameris, basi bractea oblonga concava glabra suffultis, calycis cylindraceo-conici longiusculi limbo subdilatato truncato.

In ramis Melaleucarum insulae Rotenest, 18. Ang. 1839. Herb. Preiss. No. 1616.

Fruticulus dichotome ramosus. *Rami* vetustiores cylindracei cortice griseo-fusco laevi obducti, foliorum cicatricibus tuberculati, *ramuli* subteretes. *Folia* 2-4 cent. longa, 6-8 mm. versus apicem lata, sicca facile decidua. *Petioli* cum lamina confluentes semiteretes, $\frac{1}{2}$ -fere 1 cent. longi. *Pedicellus* 6 mm. longus teres sursum incrassatus. *Bractea* patula 1 mm. longa. *Calycis* tubus 1 mm. longus, carnosus, limbo angustissimo dilatato subundulato truncato vix aliquid repando.

7. **Loranthus (Dendrophthoe) miraculosus** Miq.

glaber, ramis teretibus, ramulis praesertim infra foliorum

insertionem compressis, foliis oppositis breviter petiolatis carnosio - coriaceis elliptico - vel subspathulato - lanceolatis basi contractis apice obtusis obsolete uninerviis aveniis, cymis breviter pedunculatis di-trichotomis, ramis trifloris, floribus pedicellatis vel medio sessili, bractea ovato-rotundata naviculari apice ciliolata, calyce truncato.

Parasiticus in Santali specie ad Wicklow, 8. Mart. 1841, florens. Herb. Preiss. No. 1609, ad York, 12. Apr. 1840 sterilis, No. 1610.

Species ob magnam cum planta materna similitudinem admodum insignis et in parasitismi physiologia memorabilis. Non solum enim foliorum forma, compage et nervatione, sed ramulorum juniorum compressorum, aetati tere-tium indole *Santalis* simillima.

„Frutex *Santalo* cui increscit simillimus sed paullo flavior“, dichotome ramosus, glaber, ramis teretibus laevibus, ramulis praesertim versus superiorem internodiorum extremitatem compressis, dilatatis. Folia opposita vix subopposita, decidua; cicatrices elevatas relinquentia, petiolis antice canaliculatis, 3-4 mm. longis sustentata, crasse carnosio-coriacea, elliptico-vel spathulato-lanceolata, versus basin cuneato-contracta, apice obtusa vel rotundata, $2\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ cent. longa, $1-1\frac{1}{2}$ supra medium lata, obsolete uninervia avenia. Cymae corymbosae, axillares, an et terminales, folio breviores, di-et-trichotomae, fragiles. Pedunculi triflori. Flores pedicellati vel inter-medio aliquando sessili. Bractae carnosae rotundato-ovata naviculari-concava, apice subtilissime ciliata. Calyx obconicus, repando-truncatus, 2 mm. paullo brevior. Petala 5, in sicco fusca, lineari-spathulata, apice elliptico concava, 8-9 mm. longa. Stamina paullo supra mediani altitudinem inserta, antheris lineari-ellipticis. Stylus stamina parum superans, filiformis, anguloso-sulcatus, sursum plerumque flexuosus, stigmate verruculoso, subcapitellato.

UMBELLIFERAE Juss.

(Auctore A. BUNGE.)

HYDROCOTYLE Tourn. Endl. gen. n. 4355.
Meisn. gen. pag. 140. (102.)

1. **Hydrocotyle Cymbalaria** Benth. glaberrima, caulis diffusis subulatis, foliis inferioribus subpeltatis cordato-reniformibus angulato-quinquelobis, lobis integerrimis acutiusculis, pedunculis petiolum subaequantibus, umbellis plurifloris capitatis, fructibus compressis orbicularibus utriusque quadricostatis. — Benth. in Endl. Enumerat. plant. Hugel. pag. 53. n. 175.?

In depressis arenosis umbrosis sylvae ad fluvium Cygnorum supra urbiculum Perth. 27. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 2084.

Dubitanter huc refero plantulam, cujus pauca specimina praesto sunt; folia enim subpeltata, petiolo paulo supra basin laminae, nec margini inserto.

L. Auandang videtur affinis & L. congrua
Loranthus miraculofus Mig.

! *planta ramifica, ramis arborum non pendulis ut in L. Myrsinifolii sed erectis, fructibus in ramis subulati ^{lanceolati} aggregatis (Nodisae post hb. 49!) ad flumen Murray in provincia montis Secor, raro suum! 1847. hb. Stuart n. 224! Folia intusdem ac ramis venulosa, flores purpurei! Myoporo & Myrsinifolii. Flor. purpurei. coloris inter alio rubri. Nodisae laevibus adhaerent & Myoporo glaberrima.*

Hydrocotyle nana Griseb.

juxta Hb. exiliter inferenda. Minutula, radice annua, cauli erecto singulidati foliis reniformibus trifidis, lobis obovato-lanceolatis ^{apice 3-dentatis} vel integris, subtulis brevibus cuspidatis, nervulis membranaceis laevissimis, umbellatis

Invasive montis Kaiserstuhl. Sept. 1848.

L. loranthifolia Mill. fruct. glabris. Ad ripam fl. Torrens & in montibus ad Kowland. Hb. Stuart. petiol. 1" long. fol. 3" lato

Hydrocotyle cordifolia. L. D. Hook.

in horto ad ripam fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata)

ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata)

ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata)

ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata)

ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata)

ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata)

ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata)

ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata)

ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata)

ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata)

ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata)

ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata)

ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata) ad fl. Torrens. (in parte signata)

Stipulae majusculae, scariosae, integrae, margine tenuissime denticulatae. *Cactera* cum Diagnosi citata congruunt.

2. **Hydrocotyle hispidula** Bge. caulibus erectis basi nudis glabris, foliis utrinque sparse hispidulis cordato-reniformibus palmato 5-fidis partitisve quinquenerviis, lobis obovatis acute tri-pluridentatis, stipulis scariosis laceris, pedunculis oppositifoliis petiolo brevioribus, involucrio brevissimo scarioso-lacero, umbella subcapitata 7-10-flora, pedicellis aequantibus fructum didymum compressum minute punctulato hispidulum utrinque bicostatum.

In arenosis insulae Rotenest, 21. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2086.

H. tripartitae Rich. affinis videtur, sed folia, saltem radicalia et caulina inferiora semper quinquepartita, nec trisecta. — *Caules* erecti, 6" alti, a basi ad duas tertias partes nudi. *Folia radicalia* longe petiolata, petiolis 1-1½" longis; *lamina* ad summum 7" lata, 5" longa, ad medium usque vel profundius quinquepartita, sinibus acutis, rarius subrotundatis; *caulina* minora, petiolo inferiorum ad summum 8" longa, superiorum vix trilineari, *lamina* profundius partita, summorum interdum fere trisecta, lobis obovato-oblongis, inciso-pluridentatis; dentibus mucronato-acuminatis. *Umbellae* gracillimae, florentes subsessiles, globosae, vix linea dimidia in diametro latiores; fructiferae pedunculo 2-4" longo suffultae, pilis scariosis pedicellos subaequantibus involucriatae. *Fructus* minuti 0,6" lati, 0,4" alti rufescentes. *Carpophorum* persistens, indivisum, rigidulum.

3. **Hydrocotyle callicarpa** Bge. annua, hirtula, crecta, foliis palmato-5-3-fidis, lobis ovatis acutis acute inciso-dentatis, supra sparse hirtis, stipulis scariosis fimbriato-laceris, umbellis oppositifoliis brevius longiusve pedunculatis exinvolueratis globosis 9-15-floris, fructibus pedicello brevioribus didymis dorso acutis lateribus turgidis ad commissuram utrinque profunde impressis laevibus subecostatis.

Ad portum Princeps Royal Harbour, Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2074.

Plantula 1-2 pollices alta. *Radix* exilis. *Caules* solitarii, erecti, basi rubentes glabri, superne hirtuli. *Folia* infima brevius petiolata, superiorum petiolis 2-3" longis, *lamina* inferiorum basi cuneata, acute 3-5-loba, lobis integerrimis, superiorum basi fere rectilinea, palmato 5-partita, lobis obovato-oblongis, inaequaliter acute 2-3-pluridentatis. *Umbellae* pedunculatae, pedunculo 1½-3 lineas longo, florentes in diametro lineam parum superantes, fructiferae fere bilineares, globosae. *Pedicelli* fructiferi 0,5" longi. *Petala* acutiuscula recta videntur rubicunda. *Styli* divergentes. *Fructus* singularis, a generis structura normali recedens; 0,6" latus, 0,4" altus, utrinque emarginatus, didymus; medio utrinque profunde impressus, cavitate subcordato-orbiculari producta sub juga lateralia arcuata tumida; *mericarpi* dorso acute marginata. *Semen* dorso arcuato acutum, medio turgidum, versus commissuram abrupte compressissimum. Nec haec ad stabiliendum novum genus sufficere videntur, quum caeterum habitu plantula nostra cum nonnullis veris *Hydrocotylis* Novae Hollandiae convenit.

4. **Hydrocotyle asiatica** L. DC. villosula vel glabrata, caulibus repentibus, foliis orbiculato-reniformibus aequaliter crenatis 7-nerviis, petiolis pedunculisque fasciculatis, umbellis capitatis brevi pedunculatis 3-4-floris, fructu orbiculari utrinque 4-costato. — DC. prodr. IV. pag. 62. n. 26.

In turfosis exsiccatis ad fl. Cygnorum prope urbiculam Freemantle, 17. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 2065.

5. **Hydrocotyle tetragonocarpa** Bge. glabra, prostrata annua, foliis reniformi-orbiculatis 5-lobis, lobis late 3-pluricrenatis, stipulis ovatis scariosis margine laceris, umbellis oppositifoliis capitatis parce scarioso-involueratis 5-7 (?) -floris, fructibus pedicello longioribus aente tetragonis apice subtruncatis, mericarpiis trigonis utrinque obsolete costatis.

In arenosis conchyliosis humidis prope lacum insulae Rotenest, 21. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2085.

Radix filiformis. *Caules* plures laxi prostrati. *Folia radicalia* longe ($1\frac{1}{2}$ -2 poll.) petiolata, ad summum 6" lata, a basi ad apicem $3\frac{1}{2}$ " alta, plerumque minora, sinu plerumque clauso orbiculata, rarius reniformia; lobi 5 subaequales late obovati, saepissime crenis tribus majoribus, interdum nonnullis insuper minoribus instructi. *Stipulae* scariosae late ovatae margine lacerae. *Folia caulina* radicalibus similia, at brevius petiolata. *Pedunculi* oppositifolii demum petiolum aequantes vel superantes. *Flores* sub anthesi capitati, capitulis vix lineae $\frac{2}{3}$ diametro metientibus. *Fructus* minuti 0.6" longi, 0.1" lati, tetragoni, basi subrotundati, in pedicellum acutati, apice subtruncati, stylis subsistentibus coronati, obsolete inter commissuram carinatum et juga dorsalia acuta pluricostati. *Semen* tripartitum. Observavi etiam fructum et mericarpiis tribus conflatum, subhexagonum, angulis commissuralibus magis prominulis. Fructu ad commissuram haud compresso ab omnibus facile distinguenda, nec tamen, nisi invita natura, a genere removenda.

DIMETOPIA DC. *) Endl. gen. n. 4358.

Meisn. gen. pag. 140. (102.)

1. **Dimetopia hirta** Benth.? piloso-hirta, caule elongato, foliis longe petiolatis trisectis, segmentis trifidis, lobis tridentatis, involucri umbella brevioris foliolis oblongis integris setoso-ciliato-dentatisve, mericarpio altero discolore laevi margine crenato. — Benth. l. c.? (*Pritzelia discoides* Walp. l. c.?)

In arenosis circa urbiculam Perth, 2. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 2072.

Diagnosis et Descriptio nimis breves Benthamianae l. c. non male quadrant in nostram plantam, ad solvenda dubia tamen haud sufficiunt. Mericarpium interius maturum pallidius griseum, exterius pallide fuscum.

2. **Dimetopia Preissii** Bge. piloso-hirta, pumila, foliis longe petiolatis tripartitis, laciniis bi-trifidisque inciso-dentatis, involucri umbellam duplo superantis foliolis foliiformi-

*) Observ. Huc sine dubio: *Pritzelia* Walpers Repertorium II. pag. 429. Petala inaequalia; mericarpia in speciebus a me observatis compressa, nec turgida, ex cl. Benth. (Endl. Enum. pag. 54) etiam in *D. pusilla* compressiuscula. Mericarpium utrumque fertile, neque alterum, interius, constanter sterile, quale e manca observatione fructus immaturi *Pritzeliae* suae adscribit Walpers l. c. — *Hydrocotyle heteromeria* Rich. e descriptione fructus huc spectare videtur. Genus *Didisco* propius affine quam *Hydrocotylis*.

* Dimetopia perovilla ! DC.

In planitie prope Adelaide, Inp.
in nemore sine-forest inter Can-
lirstown & Lyndochua Cay ad Karas
declinansculas Vchr. (S. vana 1840)

Viridis saepe rubella. ^{prospiciat} Typic.
nirta solum varietatem ^{repraesentat}, nam, perimina sup-
parentia jam transitum perfectum
ad pl. Benthamianam ali' e
phrasi cognitam faciunt.

Anth: prima vere.

Didymus rotundus, Blackw.

Sagu Summae li, N. Anth. orrid. Anth: usque

* Didymus humilis ! J. L. Hook

Ad pl. Mirey, Tasmaniae.
Jan. 1849. hb. N. #, 405.

Occurrit varietas glabra

et variis insignifolia Jm.

~~Didymus a. biflorus DC. in quest. Bentham.~~

~~Specimen a Linnibus in Australia felice col-
lectis Tasmaniae inatum, inquit, sicut specimen in~~

Hydrocotyle glehnamoides Jm.

* caulis gracilentis representibus

miculis pedunculis quo villosa-

pubescentibus, foliis suborbicula-

to-nemiformibus 5-7 lobatis tri-

gulofo latis, lobis latitudine

propriae duplo brevioribus re-

nato-dentatis, stipulis numbra-

tiaceis denticulatis vel integris,

pedunculo oppositifolium

plurimae superante, umbellis

capitatis, sessibus brevisime

pedicellatis & compressis didymis

longo acutis latibus utrinque

sinuato-latis (trijugis)

Thid creek, Jan 1848 Jm - Tasmaniae

Murey - river Jan 49, hb. N. #, 420

D. glabrae v. Jm.

In calceolaria ad pl. South etc

river, hb. N. #, n. 454. DC.

metastem. vel. nem. g. can.

bus, mericarpio altero concolori obsolete tuberculato margine acuto integerrimo.

In arenosis clivuli prope lacum insulae Rotenest, 21. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2089.

Specimina juniora tantum praesto sunt; praecedenti simillima, at involucro uti fructu evidenter distincta. *Radix* annua, (?) *folia* radicalia numerosa. *Petioti* 1-1½ pollicares, pilis complanatis patentibus apice crispatis hirsuti; *lamina* utrinque pilis similibus sparsis vestita. *Caulis* cum *umbella* primaria folia adaequans vel vix superans. *Involuceri* foliola inaequalia, nonnulla omnino foliiformia petiolata, omnia umbellam etiam fructiferam superantia. *Flores* in umbellis post anthesin contractis sub-20; radii exteriores longiores plano-compressi, rigidi, cum carpophoro post fructus delapsum fere tres lineas longi, fructus intimi subsessiles. *Mericarpium* utrumque brunneum, exterius muricibus nadique glochidatis dense obsessum, interius glabrum utrinque costa arcuata fere obsoleta notatum, versus marginem rugis vel tuberculis 2-3 parum elevatis instructum, margine ipso acuto continuo, nec ut in praecedente crenis aliquot interrupto.

DIDISCUS DC. Endl. gen. n. 4361.

Meisn. gen. pag. 149. (102.)

1. **Didiscus coeruleus** Hook. annuus hirsuto-villosiusculus, caule erecto simplici folioso, foliis petiolatis tripartitis, partitionibus 2-3-fidis, lobis grosse 2-3-dentatis, pedunculis involucrisque hirsuto-villosis. — DC. prodr. IV. pag. 72.

In virgultis inter saxa calcarea prope urbiculum Freemantle et in insula Garden Island, 18. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2055.

PLATYSACE Bge.

(Nov. gen. Hydrocotylearum.)

Calycis margo obsolete 5 dentatus. *Petala* oblonga retrorsubmarginata concava intus carinata. *Styli* erecti juniores apice involuti e stylopodio erasso orti denum cum illo indurati subpungentes. *Fructus* a latere compressissimus didymus. *Mericarpia* aequalia dorso acuta utrinque unijuga, obsolete univittata, glabra. *Carpophorum* bifurcum. *Semen* compressissimum antice rectum semiorbiculare. — Umbellae compositae, involucratae; flores flavo-virentes.

Genus distinctissimum *Hydrocotylearum* tribui ob fructum adnumerandum, et quidem *Trachymeni* proximum, quamvis vitta obsoleta in altero vel in utroque mericarpiorum latere adest.

1. **Platysace cirrosa** Bge.

In lapidosis prope praedium rusticum Dom. Drummond, Victoria, 13. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 2064.

Specimina fructifera foliis fere omnino orbata cum florum rudimentis. Ex schedula adjecta radix tuberosa, Aboriginibus „Kanna“ dicta, edulis.

Caules tenues, flexuosi, ramosi, ramis superioribus vel praesertim umbellarum pedunculis interdum cirrosis, sublignescentes, epidermide in inferiore parte soluta, angulato-sulcati; rami juniores subpentagoni. *Folia* (e rudimentis in ramulo juniori) sparsa, approximata, lineari-subulata, lineam circiter longa, in altero ramulo anguste linearia fere pollicaria. *Umbellae* terminales et axillares, compositae, involucriatae, *involucri* foliolis linearibus brevibus; quinqueradiatae, accedentibus floribus nonnullis solitariis in pedunculis filiformibus inter radios 6-7" longos. *Umbellulae* 5-7-florae, involuclatae, radiolis in flore filiformibus 2" longis, interdum iterum divisis, 2 floris. *Calyx* cum ovario minutus, minutissime 5-dentatus. *Petala* 0,6" longa, aestivatione valvata (?). *Cremocarpium* nigricans, 2,5" latum, cum stylopodiis 2" altum, utrinque emarginatum: emarginaturam superiorem explent et superant stylopodia compressa fere triangularia, cum stylo recto continua. *Carpophorum* persistens, 1½" longum, apice in fuream semicircularem divisum.

TRACHYMENE Rudge. Endl. gen. n. 4362. Meisn. gen. pag. 140. (102.)

1. **Trachymene teres** Bge. herbacea, glabra; caule tereti stricto apice ramoso, foliis inferioribus petiolatis multifidis, umbellis terminalibus multiradiatis compositis. mericarpiis compressis dorso acute carinatis rugulosis tuberculatis.

In arenosis inter frutices montium continuorum Darling's-range Perth, 21. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 2083.

Radix lignosa, repens, (?) multicaulis; e basi suffruticosa surgunt caules sesquipediales erecti, stricti, ad summum crassitie pumae corvinae, teretes, striati, ad duas tertias partes usque indivisi, abhinc ramo unico vel 3-4 aucti; ramis erectis strictis. *Folia* (in speciminibus omnia jam deperdita; ex rudimentis) in parte inferiore caulis conferta, petiolata, petiolo 5-5" longo, trisecta, segmentis bi-trisectis lineari filiformibus (?) divaricatis; folia superiora, quorum ne rudimenta quidem supersunt, et cicatricibus ab invicem interstitiis 5-10 linearum remota. *Pedunculus* terminalis semipedalis. *Involucrium* polyphyllum. *Umbellae* radii subduodecim, (accedentibus radiolis nonnullis uniloricis) 4-6" longi; *umbellulae* 3-9-florae; radiolis fructu duplo triplove longioribus. *Petala* obovata, subretusa, alba. *Styli* basi divergentes, arcuato-inflexi. *Fructus* 0,8" longi, subaequilati.

2. **Trachymene juncea** Bge. suffruticosa, glabra; caule angulato stricto ramoso, ramis erectis substerilibus, foliis canaliculis linearibus, umbella terminali erecta subsolitaria composita multiradiata, mericarpiis compressis dorso acute carinatis tuberculatis.

In glareoso-sublimosis porrectis sylvae, haud longe a cataraeta ad caput fluvii Cygnorum, 9. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2069.

Ex schedula suffrutex tripedalis; praesto sunt *rami* herbacei, 1-1½ pedem longi, erecti, stricti, angulati, a basi ramosi. *Folia* fere omnia deperdita, e rudimentis lineari-filiformia, 5-6" longa, interstitiis fere pollicaribus ab invicem distantia. *Ramuli* juncei, rigidi, apice subpungentes semipedales vel breviores 3" longi, erecti, plerumque steriles. *Umbella* terminalis, longe pedunculata, composita, involucri polyphylli foliola linearia, radiis multoties breviora. *Radii* numerosi, ad summum 4" longi. *Umbellulae* sub 10-florae; radioli 1½" longi; flores flavicantes. *Styli* erectiusculi, apice

Cratylia Australasica Ford-McC.

In udis limosis, subalgis in societate Triglo-
chinis & cypripidis finum Holzapf bag vafus.

^{genus}
Plantula notabilis ^{atque} nusquam
nisi in America reperti! Herba flavida
repens. Folia succulenta compressa pelli-
cula septato-articulata. Flores virides in
rubros argenti. Anthracae luteolae. Fructus
novus parum compressus.

R. & S. f. ysk. neg (p. XXXII)

Ecdiurus glaucifolius, Ford-McC.

Herbaceus, glaber, glaucus, foliis
palmatifidis, superioribus brevibus
inferioribus longis petiolatis, illo-
rum pinnatis multipartitis, lobu-
lis angustis integris, fucilibus sub-
caevibus.

Unico tantum loco repertus, nempe: ad
quondam rivulem intra Monalala
& Elders-rang in solo repertori Simpson
pluviale humido, umbrato.

Herba perennans paucipedalis vel humi-
lior. Radix perpendiculis densa
internum digitum crassa flexuosa simplex
Caulis erecti parum ramosi, rarius
simplices ^{et} foliis pinnatis lineiglaucis
absorrenda superius. Folia ad 2" longa
etiam petiolo in inferioribus 3". Pe-
dunculi internum ultra binipeda-
les ^{saepem} breviores. Umbellae ^{albiflorae} paulo
minores quam D. pilosi ^{et} minus diviso
pinnis fragrantis. Fructus minoris ut
in D. piloso tanta styli longioris. For-
tan D. albifloro maxime.
Anth: vni

[illegible]

convergentes. *Fructus* 1,2" lati parum longiores, compressi, ad commissuram contracti, dorso acuti, minutissime tuberculati.

3. **Trachymene Candelabrum** Bge. herbacea, glabra, multicaulis; caulibus acutangulis superne dichotome ramossissimis, foliis caulinis inferioribus petiolatis trisectis; segmentis filiformibus, superioribus linearibus, pedunculis oppositifoliis arcuato-reflexis, umbellis surrectis compositis multiradiatis, mericarpis dorso acute carinatis ruguloso-tuberculatis.

In calcareis hand longe ab urbicula Freemantle, 18. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 2057.

Proxima videtur *Tr. pendulae* Benth., at umbellae multi-(10) radiatae et fructus evidentes tuberculati.

Radix simplex, crassitie pennae corvinae. *Caules* numerosi, erecti, stricti, graciles, pedales, a basi ad altitudinem pollicum 3-4 indivisi, abbinde dichotomi, superne ramosissimi, acutanguli, neque alato-compressi. *Folia inferiora*, usque ad umbellas primarias, mox emarcida petiolata, petiolo basi parum dilatato, subgibbo, 3" longo, trisecta, segmentis lineari-filiformibus 2-3 lineas longis; *superiora* linearia, *summa* linea breviora. *Umbellae* primariae in medio caule oppositifolae; pedunculus pollices tres longus, angulatus, arcuato-deflexus, apice inflexus. *Umbellae* surrectae, *involucrum* polyphyllum, foliolis lineari subulatis, acutis, reflexis. *Radix* sub 10. *Umbellulae* subdecemflorae, involuella patula. *Flores* ex schedula albi, in sicco flavicantes, plerique abortivi masculi. *Fructus* pedicello paulo brevior, 0,9" in diametro metiens, orbicularis, ad commissuram utrinque sulco profundo latiusculo exaratus; *mericarpia* dorso acute carinata, utrinque ruguloso-tuberculata; caetera generis.

4. **Trachymene scabriuscula** Bge. herbacea, multicaulis; caulibus angulatis scabris ramosis, foliis paucis linearibus abbreviatis, umbellis pendulis? mericarpis.....?

In arenosis humidis umbrosisque ad fluvium King's River, Plantagenet, 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2075.

Specimen unicum incompletum, nondum florens, at praecedentibus evidenter congener et ab omnibus facile distinguendum scabritie caulium. Tota planta 2½ pollicaria; *caules* numerosi, ad angulos cartilagineo-denticulati, dichotomo ramosi, ramis flexuosis. *Folia* perpauca minuta, linearia, inferiora adpressa, suprema saepe reflexa. *Umbellae* virgineae cernuae, radiis tribus umbelluliferis nonnullisque unifloris. *Flores* nondum expansi. An *Tr. ramosissima* Benth. l. c.? sed caules scabri, et folia omnia integra.

5. **Trachymene platyptera** Bge. herbacea, multicaulis, ramosa, glabra; caulibus utrinque late alatis subdecemnerviis, foliis omnibus sessilibus tenuissime multisectis, umbellis terminalibus, involucri foliolis multifidis integrisque, fructibus truncatis, mericarpis hinc turgidis dorso convexis tristriatis rugulosis etuberculatis.

α. turfosa; strictior, laevis, nervis alarum minus prominulis, venis transversalibus vix distinctis, involucri foliolis trisectis.

In solo turfoso-arenoso inter frutices densos ad portum Princess Royal Harbour, 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2062.

β. rupestris; flexuosa, asperula, nervis alarum venisque transversalibus valde prominentibus, involucri foliolis linearibus integris.

In fissuris rupium cacuminis montis Baldhead, 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2063.

Affinis *Tr. compressae* Spreng.; at distincta alis latioribus, foliis omnibus multisectis, mericarpiis tuberculatis. Varietates, quas proponimus, (ex soli indole varia enatae?) forsan specie distinguendae, fructus forma, quantum ex immaturis varietatis α judicari potest, congruunt. *Radix* in utraque lignescens, tortuosa, crassa, multiceps. *Caulis* a basi ramosi, in α strictiores teneriores, ramis magis elongatis, in utraque ad summum 2,5" lati, in α , quamvis juniore, 10 pollices alti, in β semipedales. *Folia* sessilia, omnia in lacinulas tenuissimas multisecta, in β pleraque emarcida, lacinulis, uti videtur, paucioribus brevioribusque. *Umbellae* in apicibus ramorum constrictis, sessiles, 4-5 radiatae, radiis subaequalibus, divaricatis, fructiferis 3-4 lineas longis. *Umbellulae* involuclatae, pauciflorae. *Fructus* submaturum lineam lati, 0,7" alti, basi apiceque subtruncati stylis breviter reflexis coronati, lateribus hinc subconcavi, illinc turgidi, ad commissuram profunde contracti, dorso convexi, parce reticulato-rugulosi, tuberculis omnino nullis.

6. **Trachymene anceps** DC. herbacea, multicaulis, ramosa, glabra, caulibus ancipitibus quadrinerviis, foliis paucis summis brevissimis filiformibus, umbellis terminalibus sub-lateralibusque, involucri foliolis integris, fructibus . . . . ?
DC. Prodr. IV. pag. 73?

Ad promontorium: Cape-Riche, 21. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2061.

Specimen micum vix florens. *Folia* omnia fere deperdita, summa videntur integra; attamen *Tr. compressa* Spreng. esse nequit; caules enim angustiores quam in icone Billardieriana (Nov. Holl. I. tab. 101.) haud vere alati, sed ancipites 0,6"-0,8" lati (in *Tr. compressa* ex icone citata 1,6"-2" lati); umbellae multo minores graciliores, rami floriferi minus elongati. Melius igitur diagnosin *Tr. ancipitis* DC. quadrat.

7. **Trachymene stricta** Bge. herbacea, ramosa; caulibus strictis elongatis ramisque patulis anguste alatis; alis uninerviis, foliis inferioribus petiolatis minutis paucis, omnibus in lobos paucos tenuissimos fissis, umbellis axillaribus terminalibusque gracilibus, pauciradiatis patulis, involucri foliolis linearibus brevibus, fructibus turgidis cordato-reniformibus; mericarpiis dorso acute unicostatis dense acute tuberculatis.

In arenosis prope orbiculam Perth, 15. April 1839. Herb. Preiss. No. 2059.
Huc sine dubio etiam specimen incompletum nondum florens lectum; in limoso-calculosis jugi montium Darling's range, Perth, 16. Jan. 1840. Herb. Preiss. No. 2060.

Radix perennis, superne simplex, crassitie pennae corvinae vel columbinae; *caules* plures et rami inferiores elongati, stricti, bipedales et ultra, ad summum 1,5" lati, plerumque linea angustiores, longe indivisi; caule ipso tereti, at utroque latere abrupte in alam angustam expanso; alae plerumque uninerves; in caulis parte superiore rami floriferi patentissimi, abbreviati. *Folia* pleraque jam ante anthesin deperdita, inferiora (e rudimentis) petiolata, trisecta, segmentis tripartitis, linearibus divaricatis, superiora sessilia dissecta, segmentis abbreviatis, summa nonnulla integra filiformia. *Rami* umbelliferi in superiore parte caulis horizontaliter patentes, $\frac{1}{2}$ -1-pollicares. *Umbellae* 3-5-radiatae, radiis inaequalibus patentissimis, 2 lineas circiter longis; *umbellulae* 3-5-florae, floribus albis, unico plerumque fertili. *Fructus* linea vix angustiores, reniformi cordati, commissura 0,6" longa. *Styli* patentissimi. *Stigmata* capitata.

8. **Trachymene filiformis** Bge. herbacea, glabra, ramosa; caulibus ramisque flaccidis elongatis filiformibus angustissime alatis, foliis minutissimis omnibus in lobos paucos subclavatos fissis, umbellis axillaribus terminalibusque gracillimis, fructibus turgidis didymis; mericarpiis dorso convexis unicastatis dense acute muriculatis.

In arenosis umbrosis inter frutices densos ad rivulum prope villam cl. Andrews supra urbiculam Perth, 4. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 2058.

Specimina valde incompleta. *Caules* basi flaccidi, tenuissime alati, 0,4" lati ramis sparsis laxis, pendulis. *Foliorum* vestigia pauca. *Umbellae* gracillinae inaequales, terminales vix $\frac{1}{2}$ pollicem in diametro latae, subquinque-radiatae, radiis nonnullis accessoriis, 1-3 floris; *umbellulae* pauciflorae interdum radiolo uno alterove umbellulifero. *Flores* plurimi masculi, pauci fertiles. *Fructus* multo minores quam in *Tr. striata*, 0,6" - 0,7" lati, commissura 0,4" longa, caeterum similes, at apice non rotundati, sed tantisper emarginati, *mericarpiis* turgidis, dorso obsoletius unicastatis. *Styli* brevissimi patuli.

SCHOENOLAENA Bge.

Calycis tubus ovatus compressus; limbi laciniae cordatae vel peltatae deciduae cartilagineae albae. *Petala* quinque obovato-oblonga, lacinula acuminata infracta. *Stylopodia* planiuscula glabra. *Styli* subulati, demum corneo indurati, basi articulata decidui. *Fructus* evittatus compressus, mericarpiis quinquejugis, jugis nerviformibus, lateralibus a commissura remotiusculis. *Semen* compressum antice rectum. *Carpophorum* integrum liberum.

Plantae herbaceae junciformes; folia teretia. Umbellae compositae capitatae, glumaceo-involucratae.

Genus *Xanthostae* proximum, ab hac differt stylopodiis, stylis et lacinis calycinis, a *Pentapeltide* petalorum forma et jugorum numero, ab utroque habitu.

1. **Schoenolaena juncea** Bge. umbellis capitatis; umbellulis quinque 4-5-floris, antheris lineari-oblongis.

In solo arenoso-anfractuoso ad fluvium Cygnorum supra urbiculam Perth, 26 Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 2082.

Radix crassa, perennis, multiceps. *Folia radicalia* numerosa, florendi tempore emarida, ex rudimentis, apicibus orbatis, fere sesquipedalia, teretia, sulcata, fistulosa, crassitie pennae corvinae. *Caules* aequae crassi, 2-3-pedales, erecti, stricti, basi compressi, superne teretes sulcato-striati, superne ramosi, ramis erectis strictis. *Folium caulinum* primum circiter $\frac{1}{2}$ pedem supra basin caulis ortum basi dilatata semiamplexicaule, mox angustatum teres, striatum, superne canaliculatum, acutiusculum, 5-6 pollices longum; caetera ab invicem pollices 4-5 distantia, pauca, similia at breviora, summa 4 lineas longa. *Pedunculi* terminales et axillares 2-4 pollices longi. *Capitula* 4-5 lineas in diametro lata. *Involucri* foliola quinque, glumacea, 3 lineas longa, $1\frac{1}{2}$ lineas lata vel angustiora, basi attenuata, acuta, sordide albida, pallide fusco-lineata, adpressa. *Involucella* similia angustiora tetraphylla, flores superantia. *Flores* in quavis umbellula raro tres plerumque quatuor vel quinque. *Calycis* laciniae interdum orbiculatae, vere peltatae, vel saepius cordatae, sinu clauso, acutae, margine saepe denticulatae,

albo subdiaphanae, cartilagineae. *Petala* alba nervo lutescente, acumine longe inflexo. *Antherae* lineari-oblongae. *Stylopodia* glaberrima, plana, persistentia, in sicco nigricantia. *Styli* cornei, rectiusculi, demum decidui. *Fructus* (maturus desideratur), 1,5" longus, 0,9" latus, compressus, basi cordatus, apice truncatus, margine rectilineus, albus, jugis tenuissimis filiformibus fusciscentibus.

2. **Schoenolaena tenuior** Bge. umbellis capitatis; umbellulis quatuor trifloris, antheris subglohis.

In solo subturfoso planitie prope oppidulum Albany, Plantagenet, 29. Jun. 1841. Herb. Preiss. No. 2080.

Præcedente multoties minor, glaberrima. *Radix* . . . ? *Folia radicalia* . . . ? *Caules* cum inflorescentia 6-9" alti, basi adscendentes, caeterum stricti, tenues, filiformes, simplicissimi, vel ramo uno alterove aucti, 1-4-phylli. *Folia caulina* florendi tempore fere omnino deperdita, linearia, basi parum dilatata, teretiuscula (?) superne canaliculata, acuta, rigidula, inferiora videntur pollicem longa, vel forsitan longiora, medium (ex unico integro superstitè) 3" longum, summa breviora squamiformia. *Umbellae* capitatae longe pedunculatae, pedunculo caulem aequante vel superante. *Involucri* foliola 4, glumaceo-cartilaginea, convexa, umbellam aequantia, adpressa, oblonga acuta, basi extus sordide albidæ, apice violaceæ, demum fusca, intus alba, 2" longa 0,7" lata, obsolete nervosa. *Umbellulae* 4, subsessiles; involucelli foliola 4; tria exteriora flores fructusque superantia, involucri foliolis similia, quarto interiori membranaceo scarioso albo, flores aequante. *Flores* in quavis umbellula 3, omnes hermaphroditi, paulo minores quam in *Sch. juncea*, caeterum similes. *Calycis* laciniae reniformes, sessiles vel subpeltatae, 0,2" latae albido-subdiaphanae, deciduae. *Antherae* subglohis fusciscentes. *Stylopodia stylisque* præcedentis. *Fructus* (quos observavi, omnes erant vacui) forma præcedentis, et minor, 0,7" latus, lineam fere longus.

XANTHOSIA Rudge. *) Meisn. gen. 140. (102.)

LEUCOLAENA R.Br. Endl. gen. n. 4364. sect. a.

Sect. **CHLOROSIA**. Involucri foliola parva herbacea vel membranacea; fructus paucijugi.

1. **Xanthosia glabrata** Bge. herbacea, glabra; caulis diffusis laxis, foliis petiolatis; petiolo ciliato, trisectis; segmentis oblongo-linearibus acutis margine integerrimis revolutis, umbellis axillaribus pedunculatis tantibus untriflorisve, involucri foliolis linearibus longe ciliatis, calycis lacinis ovatis acutis, mericarpis 5-jugis.

In umbrosis sylvae ad fluvium Canning, Perth, Nov. 1841. Herb. Preiss. No. 2076.

Planta videtur annua. *Radix* exilis. *Caules* tenues, laxi, 8-pollicares, vel longiores, ramosi. *Folia* petiolata, petiolo inferiorum pollicari summorum

*) *Observ.* Nomen antiquius servandum putavi. Genus forsitan in plura dividendum. Fructus enim in nonnullis speciebus paucijugati, in aliis multijugati; *X. rotundifolia* involucellis petaloideis, et habitu distat. Attamen in hisce omnibus calycis, petalorum stylodii, stylorumque structura eadem. Longius distat *Leucolaena peltigera* Hook. sine dubio generice distinguenda.

Xanthopia (Erioxanthopia) pinnatifida
frut Muller.

Ab omnibus generis speciebus revers-
miciatur foliis modo hexagonatis
prostratis pinnatifidis, rigidis, ultimis
provincina minora hanc nova
species simulat.

Prope Tapers-river, Tasmanniae,
h.b. St. 976. Nov. 51.

Xanthopia? leiophylla, frut Mull.

In parvis salpugniosis insul. habi-
taturorum! part. austral. Pinnula
et folia annua nuda a X. glabrata et foliis
König. & Loh. sicut vix. l. p. xxviii et glabritie pene
purpurea et foliis pinnatifidis
differt. flor & frut. incompleti
sue emaridi. Torsos carum ac Albi-
notus? geranthium.
(Sic Chloropia.)

Xanthopia glabrata! Searce.

In montibus alcionitis
circa Delaines proximis
non non esse firmum sa-
raventa Bay nescis.

(Luth: more.

minor. frut Mull.

ad rivum Tamar

harissime prope York-tocum.

Tasmanniae, h.b. St. 1034

Ex indagationibus Muthami in
Aug. pt. electis, ut varietas,
X. pilosae Kdg (X. hirsutae Dc) esse
pupit.

2^m longo; omnia trisecta, segmenta lineari-oblonga, utrinque acuta, 8^m longa, ad summum 1,2^m lata, membranacea, subtus pallida, margine revoluta. *Umbellae* axillares, inferiores brevius pedunculatae, pedunculo lineam longo, superiores in pedunculo 4-lineari nutantes, in uno eodemque specimine 1-et 3-florae. *Involucri* involucellique foliola in unifloris 3-, in trifloris 6-linearia, flores superantia, pilis longis nitidis subplumosis ciliata. *Fructus* apicem versus hispiduli. *Stylopodia* majuscula villosa. Juga in quovis mericarpi 5, nerviformia, haud prominula.

2. **Xanthosia pusilla** Bge. herbaecea; caulibus adscendentibus dense hirsutis demum glabratis, foliis petiolatis trisectis; segmentis oblongis basi attenuatis acutis obsolete dentatis ciliatis; ciliis demum evanidis, umbellis axillaribus sessilibus 1-2-floris erectis, calycis laciniis lanceolatis acuminatis, mericarpiis quinquejugis.

In arenosis humidis umbrosisque ad fluvium King's-River, Plantagenet, 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 2078.

Planta pusilla, vix bipollicaris; radix simplex, perennis (?) alte descendens; caules primarii erectiusculi, glabrati, rigidi steriles, laterales breviores adscendentes, hirsuti. *Folia* ima ad petiolum dilatatum, ovatum, amplexicaulem redacta, interdum apice tridentata; superiora petiolata, petiolo 2^m parum excedente, trisecta, segmenta coriacea, lineari-oblonga, acuta, basi cuneata, juniora margine ciliata, demum glabrata, ciliorum basibus persistentibus denticulata, ad summum 4^m longa, lineam lata. *Flores* solitarii vel gemini in axillis subsessiles, erecti; *involucri* foliola 3, flores superantia. *Calycis* lacinae angustiores longiores quam in praecedente. *Fructus* omnino praecedentis, sed parum angustior.

Sect. 2. EUXANTHOSIA. Involucri foliola parva herbacea vel membranacea; fructus multijugi.

3. **Xanthosia Hügelii** Steud. canescenti-hirta, caulibus erectis, foliis trisectis, segmentis linearibus subintegerrimis margine revolutis subtus tomentosis, umbellis nutantibus subquinquefidis, umbellulis bifloris, involucri involucellisque 2-3-phyllis, foliolis lanceolato-linearibus fructum multijugatum apice hispidum superantibus. — Benth. in Endl. Enum. plant. Hügel. pag. 55. sub *Leucolaena*.

In arenosis umbrosis sylvae prope lacum Mongerslake, Perth, 4. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 2090.

4. **Xanthosia candida** Steud. caulibus demum glabratis procumbentibus erectisve, foliis ovatis oblongisve grosse et acute dentatis junioribus subtus niveo-tomentosis, umbellis breviter pedunculatis nutantibus subquinqueradiatis, involucri 2-3-phylo, umbellulis unifloris, media sessili exinvolucellata caeterorum involucello diphylo, foliolis oblongis fructum multijugatum puberulum superantibus. — Benth. in Endl. Enumerat. plant. Hügel. pag. 55. sub *Leucolaena*.

a. prostrata.

In limosis scaturiginosis clivuli inter frutices prope praedium rusticum cl. P. Brown, ad fl. Cygnorum, 22. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 2088.

β. erecta.

In sublimosis umbrosis districtus Sussex. 23. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 2077.

Nisi caulibus erectis umbellis brevis pedunculatis, foliis paulo majoribus, dentibus minus profundis, a var. *α* vix distinguenda.

Sect. 3. LEUCOLAENA DC. Involucri foliola magna, involucella petaloidea; fructus multijugi.

5. **Xanthosia rotundifolia DC.** ramulis dense hirsutis aut pube decidua submuriculatis, foliis reniformi-orbiculatis grosse et acute dentatis, umbella 3-4-radiata, umbellis multifloris, involuero et involucello 3-phyllis. *β.* DC. Prodr. IV. pag. 75.

In solo subarenoso sylvae ad latum septentrionale montis Clarence, Plantagenet. 23. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 2066.

Involucrum in speciminibus observatis tetraphyllum, involucella triphylla, foliolo medio cuneato-obovato, lateralibus obliquis latioribus fere semicordatis acutissimis.

PENTAPELTIS Endl. Endl. gen. n. 4364. c.
Leucolaenae sectio.

Calycis tubus ovatus compressus, limbi laciniae 5 peltatae imbricatae cartilagineae. *Petala* 5 stipitata obovata acutiuseula, lacinula inflexa nulla. *Stylopodia* exigua plana glabra. *Styli* rigidi corni, basi articulati. *Fructus* compressus turgidulus evittatus, commissura contractus; mericarpi novemjuga, jugis prominentibus.

Herba perennis multicaulis, folia semiorbiculata, basi truncata. *Umbella* composita 3-4-radiata, *umbellulae* subquadriflorae. *Involucra* involucellae rigida linearia.

Genus a *Xanthosia* abunde diversum: calycis laciniis, petalis, stylopodiis, stylis et habitu; a *Schoenolaena* habitu, petalis, fructibusque multijugatis.

1. **Pentapeltis peltigera Hook.** foliis reniformi-lunatis grosse dentatis, involucri involucellique segmentis lineari-subulatis striatis, lobis calycis peltatis, petalis spatulatis intus carinatis. Hook. Icon. pl. t. 45. (sub *Leucolaena*.)

Iconem citatam non vidi.

In sublimosis glareosis jugi montium Darling's-range, 9. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 2081.

ACTINOTUS Labill. Endl. gen. n. 4387.
Meisn. gen. 141. (103.)

1. **Actinotus leucocephalus Benth.** piloso-pubescent, foliis patenatim 3-4-sectis, segmentis integerrimis 3-5-fidis

N^o Lium latifolium L.
Lium angustifolium Schlecht. p. 13.

Ad rivulos, in pratibus
hæc rarum.

Flori. ^{in cal.} ~~gergen~~ in nardum vidi
in pratibus in plantam nostram
quadrat florum & in nardum
frutificans.

+ Paenitulum vulgare, Ray.

Ad fl. Torrens sponte.

Anth: vere.

+ Anethum graveolens L.

Hic illi sponte Torrens.

+ Paspinaca sativa L.

Ad fl. Torrens prope Kluizing
nunc subsponte.

+ Coccandrium fativum L. sed ca (Coccus
cordatus)
Prope Bethaniam subsponte.
Hb. M. H.

Xanthoxia leiophylla?

A. ? geraniaceus Ser. M.
^{foliis quin, junioribus}
caulib. tenui - puberulis dense tomentoso-
puberulis mox glabrescentibus,
foliis bisinato-multifidis, segum-
tis incisuris acutis incis, involucri
phyllis lanceolatis pubulato - cune-
atis ~~prode~~ ~~saxatilis~~ umbellulis
brevioribus. —

In collibus ad. fl. 14. Darnyport prope
Kivoli - Ray. Flores evoluti & fractus
reput. 0.12 48.

disve laciniis linearibus, calycis limbo cupuliformi, corollis pentapetalis. Benth. in Endl. Enum. plant. Hüg. pag. 56.

In limoso-arenosis apertis ad fluvium Canning, 2. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 2056.

Habitus omnino idem ac in caeteris *Actinoti* speciebus, signaque ad distinguendum genus: *Holotome*, levis momenti.

ERYNGIUM Tournef. Endl. gen. n. 4386.

Meisn. gen. 141. (103.)

- Eryngium pinnatifidum* Bge.** caule superne breviter trichotomo infra ramificationem unifolio, foliis radicalibus in petiolum longe attenuatis oblongis pinnatifidis; laciniis distantibus; infimis minoribus lanceolato-linearibus mucronatis, superioribus ovato-oblongis inciso-grosse dentatis; dentibus mucronatis, caulino solitario radicalibus simili, foliis subfloralibus ternatim verticillatis late petiolatis apice trifidis, capitulis pedunculatis, involucri foliolis suboctonis lanceolatis integerrimis rigidis spinescentibus capitulum superantibus, paleis similibus minoribus, petalorum lacinulae inflexae tripartitae lobis filiformibus.

In solo fertili montium continuorum Darling's-range, Aug. 1841. Herb. Preiss. No. 2054.

E. ovino Cunn. affine videtur, attamen caulis (e specimine unico) vix erectus neque dichotomus, folia minime bipinnatifida, lacinae nec lineares, nec spinosae. — Glaberrimum. *Folia* radicalia cum petiolo 9-11 poll. longa, pinnatifida, partitionibus sub 10, infimis integerrimis, minutis, alternis, superioribus oppositis pollice dimidio longioribus 3-4^m latis, summis confluentibus in lobum 7-8" latum, trifidum, grosse inciso-dentatis, dentibus longe mucronatis. *Caulis* pedalis laxis, decumbens (?), striatus, a basi ad duas tertias partes nudas, hic unifolius; folium radicalibus simile 3½ pollices longum, rhachi dilatata, in sicco transverse nodulosa; in apice caulis folia tria verticillata, ad petiolos foliaceos semiamplexicaules apice trifidos, lobis integerrimis redacta; superata pedunculo capituli primarii pollicari, ramisque tribus paulo longioribus bibracteatis, semel dichotomis. *Involucri* foliola rigida, carinato-trinervia, pungentia, 8-9 lineas longa, caerulescentia. *Paleae* similes, at angustiores et breviores, flores parum superantes. *Calycis* tubus obsessus vesiculis ovato-lanceolatis, obtusiusculis; lacinae tubo longiores longe cuspidatae. Petalorum lacinula infracta, apice carinata tripartita, lobis filiformibus involutis.

- Eryngium tetracephalum* Bge.** caule erecto stricto sulcato infra ramificationem nudo semel trichotomo, foliis radicalibus longe petiolatis pinnatisectis; segmentis remotis linearibus integerrimis vel hinc inciso-uni-bidentatis acuminatis pungentibus, caulinis tribus verticillatis similibus subsessilibus, capituli terminalis pedunculati involucri 8-phyllo, ramis tribus diphyllis monocephalis, capitulis pedunculatis, involucri 6-phyllo; foliolis lanceolatis spinosis capitulum excedentibus, paleis similibus minoribus, petalorum lacinula apice longe fimbriata.

In arenosis sylvae prope lacum Keiermulu, Perth, 27. Oct. 1839. Herb. Preiss. No. 2053.

Praecedenti proximum, at notis in diagnosi indicatis abunde diversa videtur. Ad *E. ovinum* Cunn., quoad diagnosin hujus incompletam, referri nequit, ob folia simpliciter pinnatisecta, et caulem semel trichotomum quasi umbella 4-radiata terminatum. Longius distat ab *E. vestuloso* Labill., et *E. angustifolio* DC. — *Folia radicalia* pedem longa vel breviora, petiolo interdum plus quam semipedali, angusto, lineari, rhaclis angusta nodulosa, segmenta sub 10, inferiora minora integerrima, media ad summum pollicem longa, lineam lata, acuminato-pungentia, integerrima, vel hinc dente solitario vel binis distantibus subulato-pungentibus munita, extimum elongatum lineare, integerrimum. *Caulis* penna anserina tenuior, cum inflorescentia 1-1½ pedalis, a basi usque ad altitudinem 9-12 pollicum nudus, profunde sulcatus; superne foliis tribus verticillatis munitus, petiolis basi dilatatis; caeterum folia radicalibus similia, inaequalia, uno longiore, ramos aequante. *Rami* 3, circa pedunculum terminalem inaequales, pedunculo breviores vel longiores, supra medium bifoliati, foliis oppositis pinnatipartitis, vel rarius integerrimis, in axillis interdum ramulos abortivos gerentibus. *Capituli terminalis* subgloboi, 4-6" in diametro, pedunculus 2-3 pollicaris, striato-sulcatus; *involucrum* sub 8-phyllo capitulum superans, erectum; foliola 6-8 lineas longa, basi linea latiora, carina nervisque marginalibus subtus prominentibus, rigida, spinoscentia; paleae pleraeq. minores, flores subaequantes, una alterave longior spinosa, longe e capitulo prominens. *Capitula ramealia* minora involucri sub 6-phyllo. *Calycis* tubus dense obsessus vesiculis oblongo-linearibus elongatis obtusis, intermixtis brevioribus, limbi laciniae lanceolatae acuminato-pungentes. *Petalorum* lacinula inflexa apice fimbriis piliformibus subquatuor involutis appendiculata. *Stamina* longe exserta.

Observ. Petalorum forma hae species ab omnibus, quae examinare licuit differunt. In plerisque speciebus (*E. campestri*, *Burgati*, *Billardieri*, *Spina alba*, *dilatato*, *amethystino*, *maritimo*, *plano*, *dichotomo*, *pustillo*, *tripartito*, *tricuspidato*, *ilicifolio*.) petalorum lacinula apice obtusa; rarissime fimbria una alterave brevi aucta v. gr. in *E. triquetro*; in paucis (*E. glaciali*, *giganteo* et *alpino*) petala acuminata, acumine inflexo, denique in *E. corniculato* lacinula dilatata lacera.

HELOSCIADIUM Koch. Endl. gen. n. 4397. Meisn. gen. 142. (104.)

1. **Helosciadium (Cyclospermum) australe** Bge. glabrum; caule erecto parce dichotomo-ramoso angulato, foliis sparsis inferioribus pinnatisectis; segmentis paucis basi cuneatis 2-3-partitis; laciniis lanceolatis acuminatis integerrimis incisive, superioribus trisectis; segmentis basi attenuatis elongatis lanceolatis integerrimis, umbellis oppositifoliis subsessilibus pedunculatisve 4-6-radiatis, involucri utroque nullo, petalis apice inflexis, jugis crassiusculis subsuberosis.

In solo turfoso ad fluvium Cygnorum, 4. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 2052.

Specimina duo pedalia, superne bis vel ter dichotoma, internodia inferiora 3-2½ poll. longa. *Folia inferiora* emarida, petiolis elongatis fere bipollicaribus suffulta, pinnatisecta bijuga; segmenta pollicem longa, lateralia bipartita, lobo altero integerrimo, altero inciso trifido, terminale cuneatum tripartitum, lobis basi lineam, et quod excurrit, latis, lanceolatis acutis integerrimis; *folia superiora* petiolo pollice dimidio breviori, dilatato insi-

Proconyrtis crepida! End.

Calceola eriopoda Ib.
In arroyos ad ft. V. Elk riv. Co. S.E.,
n. 184.

*Sectae ultra primum alta pinnaculis
semit glabratis, folia bipinnata saepe
glaberrima, lobis connatis vel line-
aribus integris marginem.*

Leucis angustifolia! L.

28. 2. 1. / 1904. neg. 6. p. 130.

Paffin al remotas interiores.

M. acer (P. triflorus) Crathichia

Yucca glauca, Torr. Yucca
Yucca glauca, Torr. Yucca

2-18 Halls
 1848 Third Creek, Jan 16. 1848. *Sp.*
inflata *inflata* *inflata*, *inflata*
inflata *inflata* *inflata*, *inflata*
inflata *inflata* *inflata*, *inflata*

Trochilanthus *auratus* *mexicanus* *L.*
Ternatensis, det. St. Tern. 110. Specimina com-
mune hispida vel fuliginea. Ex Casatiobus
ad rivos hominis adfuerit. In tula
ad Casatiobus.

Succisa Carota L.

Succaria - Carota
 7668 Var: foliis glaberrimis hispatis
 involucri foliulis pinnatis,
 multifidis umbellam fructif.
 saepe superantibus, involucri
 foliis simplicibus vel pinnatis
~~multifidis~~ longioribus vel bre-
 vioribus. Specimina mea
 praesens solum radice
 progerunt, quae altitudi-
 nem secundum 3 attingit, et
 radice umbellae (fructiferae)
 non divergunt sed contractae
 adfructuant.

adjuvants.
I received Third Crook Jan 10, 1848
I received Tamunda frequently
Mar. 4 1848. Do same.

dentia, trisecta, segmentis basi angustatis, acuminatis 15^m longis, ad summum 1½^m latis. *Umbellae* in superiore caulis parte oppositifoliae, inferiores subsessiles, superiores pedunculatae; pedunculus 3-4 lineas longus, acute angulatus; radii plerumque 6, in umbella deflorata 5-7 lineas longa. *Calycis* margo obsoletus. *Petala* ovata acuta, lacinula inflexa. *Fructus* maturi 0,7^m longi, turgiduli, a latere compressiusculi; juga crassiuscula aequalia, vittae in quavis vallecula solitariae, latiusculae. *Styli* patentes reflexi. *Carpophorum* integrum liberum. — Sine dubio igitur ad *Helosciadii* genus referenda species.

2. ? ***Helosciadium prostratum* Bge.** caule procumbente flexuoso, foliis pinnatisectis segmentis petiolulatis pinnatifidis-laciniiis 5 lanceolatis ultimis apice trifidis, umbellis subsessilibus oppositifoliis, involucri submonophyllo. Hook. Icon. plant. tab. 305. sub. *Petroselino* (tabula non inspecta). DC. Prodr. IV. pag. 102.?

Apium prostratum Labill. ex schedula Preissii adjecta.

Ad fluvium Cygnorum, 19. Jan. 1839. Herb. Preiss. No. 2051.

Specimina communicata duo vix florentia, igitur genus laud extricandum. *Petala* acuminata! ad *Petroselinum* vel ad *Apium* referre dissuadent. Praecedenti videtur congener, et evidenter affine, at caules multo crassiores profunde sulcati, folia magis decomposita.

DAUCUS Tournef. Endl. gen. n. 4497.

Meisn. gen. 141. (107.)

1. ***Daucus brachiatus* Sieb.** caule erecto foliis bipinnatisectis segmentis multipartitis, lobis linearibus, involucri foliolis multifidis, radiis inaequalibus divergentibus, aculeis fructus apice glochidatis, carpophoro indiviso. — DC. Prodr. IV. pag. 214.

In arenosis sylvae ad fl Canning, Perth, 31. Oct. 1839 et in Australia occidentali. Herb. Preiss. No. 2071 et 2073.

Hispiditate tantum a planta Sieberiana differe videtur. Comparatis speciminibus *D. montani* Willd. (*toriloidis* DC.), mexicanis, *D. montevidensis*, Il. Berol. cultis et specimine Poeppigiano e Valparaiso *D. australis* Poepp., quorum differentiae vix ad distinguendas varietates suppetunt, sententiae cl. Benthani (Endl. Enumerat. plant. Hügel. pag. 56.) assentio qui has species haud diversas esse affirmat.

EPACRIDEAE R. Brown.

(Auctore O. GUIL. SONDER.)

Tribus I. STYPHELIEAE Bartl.

STYPHELIA Smith. Endl. gen. n. 4267.

Meisn. gen. 248. (156. 157.) **STYPHELIA** et **Soleniscia** DC. Prodr. 7. pag. 735 et 737. *)

1. **Styphelia elegans** Sond. erecta, ramulis tenuissime puberulis, foliis ovatis acuminatis rigide mucronatis coriaceis supra nitidis subtus glaucis striatis, corollae tubo elongato intus fasciulis barbatis destituto.

Styphelia tenuifolia Lindl. Swan-River bot. pag. 25.? *Soleniscia elegans* DC. l. c. pag. 738.

In arenosis silvae prope Bellevue, ad fluvium Cygnorum, d. 14. Maji 1839. Herb. Preiss. No. 468. (Drummond n. 481!)

„Frutex bipedalis erectus.“ *Folia* coriacea 6-9 lin. longa, 3 lin. lata, supra laevia nitida, subtus glauca striata, margine denticulata scabra. *Pedunculi* axillares brevissimi, 1-2-flori. *Bractae* 4, obtusae apiculatae. *Calyx* 5-partitus, pergameus, foliola lanceolata $2\frac{1}{2}$ lin. longa. *Corollae* albae tubus calyce 6-tuplo longior, gracilis, extus glaberrimus, intus apice velutinus, basi glaber, lobi lineares, revoluti, barbati. *Filamenta* exserta. *Discus* hypogynus 5-dentatus, dentibus acutis ovario brevioribus. *Ovarium* 5-loculare, loculis 1-ovulatis. *Stylus* stamina superans. *Stigma* capitella-

*) Characteres quibus cl. DC. genera *Solenisciae* et *Stypheliae* distinguit vult, ad corollam gracilem et praesentiam fasciculorum barbatorum in basi corollae redeunt, discum enim hypogynum quem in *Soleniscia* deesse dicit, in exemplaribus ad unum omnibus invenio. Verum neque majorem corollae longitudinem neque absentiam praesentiaeve fascicul. barbat. tanti esse ex quibus genus singulare distinguatur, cum *Astroloma humifusum* et *longiflorum*, nec non *Conostephii* species sola praesentia et absentia fasciculorum barbatorum distinguiderimus, nemo est qui concedat. Cum denique fructus *Solenisciae* et *Stypheliae* non differant utrumque genus in unum comprehendere non dubitavi. Etiam *Stenantherae* aliquam speciem nondum descriptam a *St. pinifolia* praesentia fascie. barbat. distinguere, hac occasione significare licebit.

Stenanthera conostephioides Sond. ramulis hirtellis, foliis erectis adpressis v. subpatulis linearibus mucronatis margine ciliatis revolutis utrinque pilosis supra scabrisculis, pedunculis axillaribus brevissimis recurvis, cor. tubo intus juxta basin fasciulis barbatis instructo. Ad Port Adelaide leg. Th. Siemssen 1839. (com. amic. Steetz.) *Frutex* erectus ramosus, ramis glabris, ramulis pubescenti hirtellis. *Folia* 8-11 lin. longa, lineam lata, supra viridia subtus pallida striata, mucrone pungente terminata. *Flores* in axillis foliorum solitarii subpenduli. *Bractae* circ. 8, margine ciliolatae, inferiores brevissimae rotundatae, superiores acutiusculae glabrae. *Calycis* foliola subacuminata glabra, bracteis longiora. *Corollae* tubus concolor, coccineus, calycem aequans, 5 lin. longus, extus apice pubescens, intus glaber, prope basin vero fasciculatim barbatus, limbi lobis semibarbatis apice glabris. *Filamenta* brevissima alte adnata, antheris linearibus sublongiora. *Gyathus* hypogynus integer. *Ovarium* glabrum 5-loculare. *Stylus* corollam aequans, glaber, stigmate capillato. *β. glabrata*, foliis ciliatis supra laevibus. In regionibus interior. Nov. Holl. legit cl. Mitchell.

Erucineae R. Br.

Goatthiria Vahl.

G. hispida R. Br. *Fl. L.*

montana, 6-8. *frutris cino-pubis* Jan 49. *hb. St. II*
hb. St. I. n. 341.

Pernettya, Gaudichaud.

P. Tarnanrica, *hb. St. (forte Hooker)*

Prostratus, in fumis montibus V. D. L.
hb. St. II n. 344. Jan 1849.

R. Br. prod. l. p. 537. Horn & Schult. Syst. veg. 4 p. 225.

S. adnascens R. Br. *per. ed. Syd. p. 163.*

In insula Vandimius Land. hb.

St. n. 34. Gaudichaud flores fructusque

desunt, Lamin. de hujus lori fil.

meam exco, praesertim quia uni

va hujus generis speciosior in Tas-

manica defossa L. novis pau-

minibus a cl. Lottore viderunt

sis prodeit, hanc non esse Dico,

*fam. ab *S. condiculata* (Vahl)*

castro)

Geranthere.

R. Br. prod. l. p. 538. Fl. L. Syst. veg. 4 p. 225

Cruciferae Sander.

Pentastaphurus Behr. St. L. Schult.

cum amicissimo Sander hanc plantam

milius Gerantheream subjecit, quam

novum genus habeo. Sed locum

divisionem novum St. L. Schult.

ornandam format. — Alia cl. Sch.

ne quidem nomen Sanderianum ut

synonymum citat.

Cryptal, brook!

Lefty range, hb. N. H. fr. 3-4'

In mont. Tarrus. L. Mart. 1848

In montibus graminosis pagum

Hahndorf n. s. v. Apr. 27. 1848-

calyx cum bracteis igneis ruber

corolla pulchra rubra

(P) glabrata. Sonder.

frut. erectus strigosus 2-3'.

In montibus Warroba-range

In fruticulis prope Tarrundam

in aruosis Jul. 1848. Vesp.

Holofasthag hb. J. n. 34 n. 47.

In lapidosis nemorosis Canill

Angl a Guiltin - Bay? Intra

Macleysfeld et M. Plongam

et Rangero island!

* Senanthera penifolia! R. Br.

In Macleysiana frut. null

ramulis pubescentibus.

frut. pedalis ad fl. str.

Pauli Tasmaniam raro

occurrens. Nov. 40. hb. N. H.

J. beg.

Strobeloma? halimaturorum fr. Mill
et latra montium. ^{inf. halimaturorum} ~~fr. Mill~~
Frut. erectus ad 3' foliis omnino
et humifusi nisi magis in basin
attenuatis.

St. Br. prodr. 1 p. 338. St. Br. f. 4. p. 225

A. humifusum? R. Br.

Lofty-range. W. — In praticis
fimum Rivoli-Bay versus Oct 48
In collibus secundum el South-
Eck river Apr. 4. 1849. hb. St. Br.
An. 573.
Ina Macleayfield et Killungam
Cris montis cur. 50.
Kangaroo-island.

A. denticulatum? R. Br.

Symphylae sp. herb. St. — Lofty-range.
Dec. 1848. In convallibus ad riv.
Thud Creek Jan 48 alibi que Lofty-
range febr — Apr. 48 — In montibus
occidentibus calorniae versus parum
Victoriae Apr. 48 — In roramento
montis Porturi, festa Michaelis
1848. Supra viridi-negrescentes. —
In collibus fivis ad fl. Gaudui
Apr. 49. (et. humifusum? ^{inf. halimaturorum} ~~fr. Mill~~)
In jugo montis Kaiaputahl, Wang-
Ja-range. Apr. 14. 1848.

et portum regnum Tasmaniae
Oct. rev. 1849. hb. v. 620. et I, 37.
B. adpressus, fr. mu.
Plindus-range.

tum. *Drupa* oblonga, styli basi mucronata, calyce duplo longior, coerule-scens, subexsucca, putamine osseo solido.

β. *lanceolata*, foliis lanceolatis acuminatis.

In glareosis inter frutices districtus York, d. 25. Apr. 1840. Herb. Preiss. No. 469.

ASTROLOMA R.Br. STOMARRHENA et ASTROLOMA DC. Prodr. *) Endl. gen. n. 4268. Meisn. gen. pag. 248. (156.)

1. ***Astroloma longiflorum* Sond.** caule prostrato ramosissimo, ramulis pubescenti-hirtellis, foliis patentibus lanceolato-linearibus mucronatis supra convexiusculis margine ciliatis, bracteis calycibusque pubescentibus, corollae tubo intus prope basin fasciculis barbatis destituto.

Stenanthera ciliata Lindl. Swan-River bot. pag. XXV.

In arenosis silvae prope oppidum Perth, d. 13. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 419. (Drummond n. 474!)

Suffrutex pedalis et ultra, ramis elongatis. *Folia* numerosa, horizontaliter patentia, linearia mucrone subulato terminata, subtus striata, 4 lin. longa, vix $\frac{1}{2}$ lin. lata. *Flores* axillares, solitarii, brevissime pedicellati. *Bractee* 4, obtusae, apiculatae, inferiores minimae, superiores calyce triplo breviores. *Sepala* ovata, subacuminata, ut bractee extus pubescentia. *Corolla* purpurea, elongata, calyce 3-4-plo longior (circ. pollicaris) tubo intus prope basin glabro, limbo erecto vel subpatente, acuminato, barbato, apice glabro. *Filamenta* brevissima, ad faucem sessilia. *Antherae* oblongo-lineares. *Discus* hypogynus cyathiformis, subdentatus. *Ovarium* glabrum, 5-loculare. *Stylus* glaber corolla brevior. *Stigma* capitatum. *Drupa* subexsucca, subglobosa, styli basi superata, 5-sperma, calyci aequilonga.

Simillimum *A. humifuso* Br. differt tantum: tubo corollae longiore graciliore fasciculis villorum carente et limbo apice glabrinsculo, fructus et reliquae utriusque plantae partes non differunt.

2. ***Astroloma foliosum* Sond.** caule prostrato, ramis adscendentibus pubescenti-hirtellis, foliis confertis linearibus mucronatis supra convexis margine ciliatis, bracteis calycibusque glabris.

In limoso-calculosis ad rivulum planitiei haud longe a praedio rustico Mad-dington, d. 1. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 420. (Drummond n. 472!)

„Frutex bipedalis.“ *Rami* hirtelli ramulis brevibus foliosisissimis dense obsiti. *Ciliae* foliorum longae, tenues. *Bractee* obtusae, apiculatae. *Calyces* acuminati. *Corolla* deest. *Drupa* globosa Pisi minoris magnitudine, calyce brevior.

Valde affinis *A. humifuso* et *longifloro*, differt: caule elatiore foliosis-simo, foliis adpressis subbrevioribus, margine magis revolutis, sepalisque angustioribus.

*) *Stomarrhenae* genus, quod cl. DC. *Stypheliae* proximum judicat, secundum observationes meas ab *Astrolomate* non diversum est, characteres enim *Stomarrhenae* in plurimis *Astrolomatis* speciebus inveniuntur.

3. **Astroloma discolor** Sond. caule prostrato ramoso, ramulis hirtellis, foliis linearibus mucronatis supra convexiusculis viridibus, subtus pallidis striatis, margine rigide ciliatis, bracteis calycibusque pubescentibus, corollae tubo intus fascioulis barbatis destituto.

In arenosis silvae prope oppidum Perth, d. 13. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 419 ex parte.

Rami nunc erecti simplices, nunc humifusi, ramulis adscendentibus brevissimis. *Folia* 3 lin. longa, semilineam lata, ramulorum subbrevia. *Calyces* pallidi. *Corollae* (purpureae) tubus longissimus, intus a basi ad apicem omnino glaber, limbi lobis acuminatis, barbatis. *Filamenta* brevissima. *Antherae* oblongae. *Discus* hypogynus cyathiformis, subdentatus. *Ovarium* glabrum. *Stylus* filiformis, glaber, non exsertus. *Stigma* subcapitatum. Summopere affine *A. longifloro*, sed diversum: foliis brevioribus discoloribus erectis subadpressis, quorum ciliae sunt rigidiores.

4. **Astroloma dilatatum** Sond. caule diffluso, ramulis adscendentibus glaberrimis, foliis lineari-spathulatis mucronatis, margine revoluta rigide ciliatis, glaucescentibus. bracteis calycibusque pubescentibus.

In arenosis silvae prope oppidum Perth, d. 13. Maj. 1839. Herb. Preiss. No. 419 (ex parte) (Drummond!)

Habitu proxime accedit ad *A. prostratum* et *longiflorum* sed ramulis glaberrimis, foliis linearibus apice latioribus satis distinctum. *Folia* 4½ lin. longa, apice semilineam lata, subglauca, concoloria. *Calyces* 2½ lin. longi, bracteis 4 obtusis mucronulatis. *Corollae* desunt.

5. **Astroloma glaucescens** Sond. caule erecto ramoso, ramulis glabrinusculis, foliis erectis subadpressis anguste linearibus planis, mucrone subulato terminatis, margine serrulato scabris, bracteis calycibusque glabris.

In Australasia occidentali. Herb. Preiss. No. 409. (Drummond n. 478!)

Frutex, ut videtur, ultra pedalis. *Folia* 5 lin. longa, ¼ lin. lata, conferta, canli ramisque subadpressa, glaucescentia, subtus obsolete striata. *Bractae* 4, obtusae. *Sepala* lanceolata. *Corollam* non vidi. *Drupa* subglobosa, Pisi minoris magnitudine, styli basi mucronata, 5-locularis.

Propter folia tenuia conferta *Stenantherae pinifoliae* Br. haud absimile.

6. **Astroloma microcalyx** Sond. caule erecto ramoso, ramulis pubescentibus, foliis patentibus linearibus mucronatis margine revoluta rigide ciliatis, bracteis calycibusque puberulis glabrisve.

Inter saxa calcarea clivuli prope Lime-Kiln, Perth, d. 19. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 470. (Drummond n. 470!)

„Frutex 1-1½ pedalis.“ *Radix* ramosa, fibrillosa. *Caulis* sublignosus, epidermide fusco-nigricante rimosa, penna gallinacea subcrassior, nunc a basi nunc apice tantum ramosus, rami erecti, subnudi, ramuli foliosi. *Folia* inferiora sparsa patentia, 4 lin. longa, ½ lin. lata, superiora magis adpressa confertiora. *Flores* miniati folium superantes. *Bractae* 4, obtusae, mucronatae. *Calyces* parvuli cum bracteis vix 2 lin. longi, sepalis sublanceolatis, apiculatis. *Corollae* tubus calyce duplo longior, intus juxta basin fascioulis 5 barbatis instructus; limbi lobis acuminatis, barbatis. *Filamenta* brevissima. *Antherae* lineari-oblongae. *Discus* hypogynus cyathiformis, sub-

(*Bractyloma ericoides* Lour. Syn)

(*S. ericoides* Jacq Muller)

(*S. Sarcothamnus* Jacq Mull.)

erectum, ramosissimum, ra-
mosis pectusculis - herbulis, fo-
liis ^{oppositis} clivideis approximato im-
bricatis linearibus planis mu-
cratis margini ^{subul} ciliato sili-
alo, calycibus, bracteis axillaribus
laciniis extenuatis.

Guadaloupe - town. Juli 1848.

erectum, ramosissimum, infra denu-
datus, floribus axillaribus
oppositis subsessilibus *Bractyloma*
linearibus. Folia vix recurva 2-3
lin long. pumiliuscam lata subul-
striata. Affr. *Bayani* videtur
agnata.

Hujus synonymum est: *S. a-*
bricogon ericoides Schlechtendal
pl. Bohem. in Linnaea 1847,
qui vix specie ab *Abrotanum*
differt. Vnum speciale nunc
pl. nostrae adposui.

Fruct. 1/2 - 1' diffusus.

Ab originis umbratis inter
fruticosa Murray shrub 1848.
Fusus opprima Tamuda Fire
1848.

integr. *Ovarium* discum superans, glabrum. *Stylus* filiformis, glaber, non exsertus.

7. **Astroloma Baxteri** A. Cunn. erectum, ramosissimum, ramulis pubescenti-hirtellis, foliis linearibus mucrone apiculatis serrato-ciliatis erectis, corollae lobis linearibus glabriusculis. — A. Cunningham. ap. DC. Prodr. l. e. pag. 739.

In arenosis ad Stirling's-terrace, Plantagenet, d. 25. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 425. New-South-Wales leg. Fraser! (herb. Shuttleworth.)

„Frutex tripedalis“. *Folia* 5 lin. longa, margine subrecurva. *Bracteae* 4 vel 6, inferiores minores, superiores 2 calycem dimidiam aequantes, omnes obtusiusculae, apiculatae. *Sepala* acuminata, corolla duplo triplove breviora, glaberrima. *Corollae* lobi erecti, glabriusculi, apice vix barbupati. *Drupa* globosa Pisi minoris magnitudine stylo longo glabro persistente terminata *).

8. **Astroloma divaricatum** Sond. caule erecto ramoso, ramis divaricatis, ramulis tenuissime puberulis, foliis coriaceis patulis reflexisve lanceolatis basi subcordatis apice mucronatis, margine recurvato integerrimis vel denticulato scabris subtus glaucescentibus, bracteis calyceibusque subcoloratis glaberrimis.

Leucopogon epacridis DC. l. e. pag. 754!

In glareosis silvae inter praedia rustica Dom. Barker et Lennard, York, d. 12. April 1840. Herb. Preiss. No. 467. (Drummond n. 468!)

„Frutex bipedalis“ ramis valde rigidis, habitu *Acrotriches divaricatae*. *Folia* 4-6 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata, basi subcordata, sessilia, subtus pallidiora, striolata. *Pedunculi* subreflexi, squamosi. *Bracteae* 4, obtusae vel brevissime apiculatae, calyce subtriplo breviores. *Sepala* obtusa mucronulata colorata. *Corollae* tubus intus prope basin fasciculis 5 barbatis instructus, ad faucem tomentosus, limbi lobis patentibus apice glabris. *Filamenta* fauci inserta antheris lineari-oblongis breviora. *Discus* hypogynus cyathiformis, subinteger. *Ovarium* glabrum, 5-loculare. *Stylus* non exsertus glaber, lente auctus tuberculis obsitus. *Stigma* subcapitatum.

9. **Astroloma marginatum** Sond. caule erecto ramoso, ramis divaricatis, ramulisque glabris, foliis rigidis squarrosopatulis e basi cordata lanceolatis in mucronem subpuigentem attenuatis, striatis, glauces subcoloratisve, margine scabridis.

In solo glareoso sterili silvae prope fontem Pitscharding, Victoria, d. 20. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 471.

*) **Astroloma Drummondii** Sond. erectum, ramosum ramulis tenuissime puberulis, foliis subsessilibus erectis linearibus mucronatis margine revolutis integerrimis, bracteis calyceibusque pubescentibus. Swan River. leg. Drummond n. 467. Frutex rigidus, ramis erectis. *Folia* 6-7 lin. longa, explanata $1\frac{1}{2}$ lin. lata, utrinque glabra, subtus pallidiora, petiolo brevissimo insidentia, mucrone subpuigenti terminata, ramis subadpressa. *Flores* axillares, solitarii. *Bracteae* 4 vel 6, inferiores minutae. *Sepala* ovata apiculata, 4 lin. longa, margine ciliata. *Corollae* rubrae tubus calyce vix longior intus prope basin fasciculis villarum instructus, medio glaber, apice inter antheras tomentosus. *Limbi* lacinae erectae acutissimae barbatae. *Antherae* lineari-oblongae, glabrae. *Discus* hypogynus subinteger, ovario glabro duplo brevior.

Specimina perpauca deflorata tantum adsunt. *Caulis* ut videtur, ultra pedalis fruticosus, teres, pennae gallin. crassitie, cortice griseo-albo. *Rami* erecto-patentes, rigidi. *Folia* 4-5 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. lata, basi cordata, sessilia, plana, utrinque nervoso-striata, subglauca vel roseo subcolorata, margine denticulis brevissimis scabriuscula. *Flores* fructusque ignoti. *Habitus* paene praecedentis speciei. An hujus generis?

10. ***Astroloma pallidum* R.Br.** diffusum, ramis adscendentibus, foliis lanceolatis sessilibus ciliatis imbricatis supra concaviusculis. R.Br. prod. 538. DC. l. c. pag. 739.

Leucopogon blepharodes DC. l. c. pag. 753!

In arenosis apertis silvae caeduae haud longe ab oppido Freemantle, d. 13. Jan. 1839 et in solo sublimoso inter frutices densos planitie ad fluvium Canning, d. 23. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 424. (Drummond!)

„Frutex spithameus, caespitosus“, ramulis pubescentibus. *Folia* 5-7 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, mucrone setaceo pungenti terminata, subtus pallida, striata. *Flores* axillares, solitarii, interdum in apicibus ramulorum aggregati, subspicati. *Corolla* incarnata. *Filamenta* brevia. *Discus* hypogynus subinteger ovarium dimidium aequans. *Stylus* glaber. *Drupa* oblonga vel subglobosa longitudine calycem aequans, stylo persistente coronata, abortu saepe monosperma.

β . **suberectum.** caule erectiusculo, ramis gracilioribus.

Inter formam primariam. An species distincta?

11. ***Astroloma compactum* R.Br.** diffusum, ramulis adscendentibus brevissimis, foliis obovato-lanceolatis ciliatis petiolato-attenuatis supra concaviusculis. R.Br. l. c. DC. l. c.

In arenosis terrae superioris undulatae, York, d. 21. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 423. In colliculo arenoso et in rupestribus prope oppidulum Albany, Plantagenet, d. 28. Sept. 1840. No. 421. (Drummond n. 473!)

„Frutex humilis, diffusus, 3-4-pollicaris, rarius spithameus.“ *Rami* abbreviati, ramuli puberuli. *Folia* 4 lin. longa, lineam lata, basi valde angustata, mucrone pungenti terminata supra laevia, subtus pallidiora, margine ciliata, ciliis saepe geminis. *Calyces* pallidi, bracteis obtusissimis apiculatis. *Corolla* sanguinea, gracilis, calyce duplo triplove longior, intus supra basin fascienlis 5 villorum instructa. *Filamenta* abbreviata. *Discus* hypogynus integer. *Stylus* glaber. *Drupa* subglobosa, calyce paullo longior, styli basi mucronata.

Variat: foliis remotioribus vel confertis imbricatis, concavis vel subplanis, glabris vel subhis minute puberulis.

12. ***Astroloma cuneifolium* Sond.** erectiusculum ramossimum ramulis abbreviatis pubescentibus, foliis obovatis in petiolum attenuatis margine serrato-ciliatis, apice subrecurvo truncatis spinuloso-mucronatis, supra concaviusculis.

In glareosis silvae inter praedia rustica Dom. Barker et Lennard, York, d. 12. April 1840. Herb. Preiss. No. 422.

„Frutex digitalis“ apice ramossissimus, ramis adscendentibus. *Folia* cuneata, apice truncato vel obtuso integerrima, mucrone pungenti refracto terminata, 3-4 lin. longa, apice $1\frac{1}{2}$ lin. lata, margine serrato-ciliata, ciliis rigidis, basi dilatatis, subtus pallida multinervia, nervis lateralibus ramosis. *Bractae* et calyces pallidae, ab illis *A. compacti* non diversae. *Corolla* deest.

Affine *A. compacto*, sed foliorum forma satis diversum.

13. **Astroloma Stomarrhena** Sond. caule erecto, ramulis hirtellis, foliis rigidis imbricatis lineari-lanceolatis in mucronem pungentem attenuatis concavis margine serrulato-scabris extus pilosis glabrisve, bracteis calycibusque pubescentibus.

In regionibus interioribus Australasiae occidentalis. Herb. Preiss. No. 410. (Swan-River Drummond n. 467!)

Frutex ut videtur pedalis. Rami erecti, rigidi, basi glabriusculi, apice hirtelli. Folia subadpressa, imbricata, concaviuscula, supra nitida laevissima, subtus pallida, striata, rigide mucronata, pollicem longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, nunc dorso et margine pilis longis albis obsita nunc omnino glabra. Flores axillares folio breviores. Bractae 4, oblongae, inferiores glabriusculae, superiores pubescentes. Sepala lanceolata, 4 lin. longa, a medio ad apicem usque hirsuta. Corolla calyce duplo longior, tubo intus dense tomentoso, limbi laciniis supra glabriusculis et apice tantum barbulatis, subtus vel in superficie exteriore pilosis. Filamenta brevissima. Discus hypogynus subinteger, ovario glabro duplo brevior. Stylus corollam aequans. Drupa depresso-globosa Pisi minoris magnitudine, styli basi coronata, 5-locularis.

14. **Astroloma xerophyllum** Sond. caule erecto, ramulis pubescentibus, foliis rigidis imbricatis lineari-lanceolatis acuminatis subpungentibus concavis margine integerrimis glabris pilosisve, bracteis calycibusque glaberrimis.

Stomarrhena xerophylla DC. l. c. pag. 738!

In colliculis arenosis prope Pine-Aple, d. 14. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 407. (Drummond n. 476!)

„Frutex 2-3 pedalis“ ramis erectis vel subpatentibus. Folia petiolulata, concava, supra laevia nitida, subtus nervoso-striata, pallida, inferiora sparsa cauli adpressa 7-9 lin. longa, lineam lata, superiora confertiora imbricata. Flores in axillis foliorum superiorum sessiles, solitarii, folio breviores. Bractae 4 obtusae, subapiculatae. Sepala pallida, ovata, sublanceolata, glaberrima, margine brevissime ciliata bracteis subtriplo longiora. „Corolla alba“ in sicco subarmeniaca. Tubus calyce inclusus, intus dense barbatus, prope basin glaber, rarius annulo piloso praeditus, limbi lacinae erectae vel subconniventes, barbatae. Filamenta brevissima, corollae adnata, apice inter corollae lacinias libera, ob barbam densam non conspicua, antheris lineari-oblongis. Discus hypogynus cyathiformis, 5-partitus, ovarium pentagonum aequans vel brevior. Stylus glaber corollae longitudine aequalis basi sensim incrassatus, per lentem visus tuberculis minutis dense obsitus. Stigma capitatum. Drupa immatura subglobosa, subcrustacea, glaucescens, styli basi apiculata, 5-locularis, 5-sperma.

Variet: foliis glaberrimis, pilosiusculis et pilosissimis.

A praecedente cui simillimum differt: foliis integerrimis, calycibus albidis glaberrimis, corollae tubo calycem non superante, stylo tuberculato et fructu.

15. **Astroloma macrocalyx** Sond. diffusum, ramis erectis vel adscendentibus, ramulis nitidis glabris, foliis imbricatis lineari-lanceolatis elongatis concaviusculis mucronatis margine scabriusculis, calycibus maximis bracteisque glaberrimis.

In arenosis inter frutices silvae prope Pine-Aple, d. 4. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 413. (Drummond n. 477!)

„Frutex spithamaeus“ radice crassa, perpendiculari, saepe pedali. *Rami* intermedii erecti, laterales adscendentes, epidermide griseo-alba, ramuli nitidi, glabri, dense foliosi. *Folia* 16-24 lin. longa, 1-1½ lin. lata, in acumen pinguis producta, supra nitida, subtus pallidiora, striata, margine denticulis brevissimis scabrida. *Flores* axillares pedunculo perbrevis insidentes. *Bractae* 4, obtusae mucronatae. *Calyces* maximi *Stypheliae*. *Sepala* lanceolata acuminata, 10 lin. longa. *Corolla* purpurea, calyce inclusa. *Tabus* intus juxta basin fasciculis 5 barbatus, medio glaber, apice tomentosus, limbi laciniis acuminatis barbatis, apice flavescentibus, glabris. *Filamenta* brevissima, fangi affixa. *Atherae* lineari-oblongae, inclusae. *Discus* hypogynus cyathiformis subinteger, brevis. *Ovarium* obsolete pentagonum. *Stylus* glaber, corollae limbo brevior. *Stigma* subcapitatum. *Drupa* coarlescens, oblonga, pentagona, acuta, styli basi superata, 5-sperma calyce duplo brevior.

Species quam maxime, singularis quae primo aspectu facile pro *Styphelia longifolia* R.Br. haberi potest.

16. **Astroloma Candolleanum** Sond. caule erecto ramoso, ramulis puberulis, foliis imbricatis ovatis basi attenuatis apice acuminatis mucronatis margine rigide ciliato-serratis concaviusculis, bracteis calycibusque glabris.

Stomarrhena serratifolia DC. l. c.!

In calcuosis cacuminis montis Bakewell (alt. 1300 ped) d. 5. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 466. (Drummond n. 471!)

„Frutex bipedalis“ ramis rigidis inferioribus elongatis, superioribus brevioribus. *Ramuli* foliis imbricatis tecti, inferne plerumque nudi. *Folia* intus laevia, extus glauca, striata, 5-6 lin. longa, 2-2½ lin. lata. *Bractae* obtusae mucronulatae. *Sepala* pallida vel subrosea obtusiuscula, mucronata. *Corolla* purpurea. *Tabus* calycem aequans vel parum superans, intus prope basin fasciculis 5 villorum barbatus, limbi lobis erectis, subconventibus, angustis acutissimis dense barbatis. *Filamenta* brevissima, longitudine et latitudine atheras oblongas aequantia, fangi inserta et inter tomentum densum occultata. *Discus* hypogynus cyathiformis, subdentatus, ovario glabro brevior. *Stylus* glaber non exsertus. *Stigma* capitatum. *Drupa* coarlescens, oblonga, styli rudimento superata, calycis longitudine, 2-5 sperma.

17. **Astroloma latifolium** Sond. erectiusculum simplex, caulibus apice puberulis, foliis imbricatis ovato-lanceolatis rigide mucronatis basi in petiolum brevem angustatis striatis margine cartilagineo-denticulatis, bracteis calycibusque glabris.

In solo basaltico-glareoso inter frutices densos prope montem Wuljenap. Plantagenet, d. 20. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 411.

„Frutex spithamaeus“. E radice crassa cylindrica perpendiculari sublignosa caules assurgunt plures simplices, quorum laterales adscendentes, intermediis erecti. *Folia* coriacea, concaviuscula, supra nitidula, subtus pallidiora, multistriata, striis lateralibus divergentibus apice ramulosis, 9-11 lin. longa, 3-4 lin. lata. *Bractae* 4, obtusae, vix apiculatae, margine brevissime ciliatae. *Sepala* lanceolata, 4 lin. longa. *Corolla* deest. *Discus* hypogynus cyathiformis, integer. *Drupa* oblonga, calycem subaequans, styli basi apiculata, abortu plerumque 1-2-locularis.

16. *P. brethoflylis* ~~fu~~ Müller.
In vertice montis Formus
flor. 1848.

Nunc est speciem difforme

x 17. *claystyli* ~~fu~~ Müller
fratex cretus in montibus

~~Protonotaria~~ alvioribus lapideis tra-
itus Loxij nange D. 2 Mart.
1849. hanc Kensington.

Non distat a *Leucopogone* afro-
concaide.

Dura cylindrico-ellipsoidea striatula in
capis sursum quam in apicem acutata, ~~scabra~~
actale pura paulisper nitens r. d. 3" long 1"
rassa plerumque elvialis. Turcificat
vire.

CONOSTEPHIUM Benth. Endl. gen. n. 4266.

Meisn. gen. pag. 248. (157.)

Calyx 5-phyllus pergamiacens ovoides vel ovoideo-oblongus, bracteis pluribus conformibus imbricatus. *Corolla* tubulosa extra calycem plerumque ventricosa conoidea, limbo minimo erecto vel subpatente imberbi, tubo intus juxta basin fascienlis 5 villorum instructo vel basi glabro et apice villosa. *Filamenta* corollae adnata linearia brevissima. *Antherae* inclusae bifidae. *Discus* hypogynus 5-partitus vel brevissimus subinteger. *Ovarium* 5-loculare, loculis 1-ovulatis. *Drupa* exsucca abortu 1-sperma, putamine osseo solido.

§. 1. tubo intus juxta basin fasciculis 5 barbatis.

1. **Conostephium pendulum** Benth. calycibus ovoideo-oblongis, filamentis alte adnatis, ovarii stylisque glabris.

Conostephium pendulum Benth. in Hügel. Enum. pag. 76.

In colliculis arenosis silvae ad Preston-creek, d. 28. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 414. (Drummond n. 466!)

„Frutex 1-2 pedalis“ ramis lutescentibus, ramulis tenuissime puberulis. *Folia* erecta, pollicaria, 2 lin. lata, lineari-oblonga, mucrone brevi rigido nigro terminata, utrinque glabra vel supra glabra subtus villis brevissimis canescentia, margine subrevoluta, denticulis minimis scabrida. *Pedunculi* recurvi squamosi, 2 lin. longi. *Calyx* 4-5 lin. longus plerumque velutinus, rarius subglaber. *Bractee* 8-10 ovato-rotundatae, apiculatae. *Sepala* ovata apiculata margine tenuissime ciliata. *Corolla* 6 lin. longa, aetate juniore calyce inclusa, evoluta infra stamina constricta, pars supra constricturam exserta, conica, subcoriacea, intense purpurea, 2 lin. longa, pars inferior inclusa, tenuis, non colorata, tubus extus glaber, intus villosus et basi fasciculis barbatis instructus, limbus brevissimus, lacinii vix $\frac{1}{2}$ lin. longis, linearibus, erectis, imberbibus. *Filamenta* parti corollae superiori adnata. *Antherae* magnae, lanceolatae, demum profunde bifidae, glabrae, filamentis subduplo longiores. *Discus* hypogynus 5-partitus, ovario glabro duplo brevior. *Stylus* demum longe exsertus, glaber. *Stigma* obtusum.

§. 2. tubo intus absque fasciculis barbatis.

2. **Conostephium minus** Lindl. calyceibus ovoideis, filamentis tubo medio adnatis, ovario sericeo, stylo piloso.

In arenosis juxta oppidum Perth, d. 24. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 408. (Drummond n. 467!)

„Frutex pedalis strictus“ ramis virgatis, ramulis glabris vel tenuissime puberulis. *Folia* 6-8 lin. longa, lineam lata, mucrone brevissimo obtuso sphacelato terminata, margine integerrima, supra glabra, subtus striata et villis minimis subcanescentia. *Pedunculi* recurvi velutini. *Flores* purpurei, 3-4 lin. longi. *Bractee* circ. 6, obtusae, apiculatae. *Sepala* obtusiuscula, ut bractee extus velutino-pubescentia. *Corollae* tubus paullo infra medium constrictus, pars inclusa extus puberula, pars exserta conica, glabra, purpurea, lineam longa, intus inferne glaber, a medio ad apicem usque pilosus. Limbi brevissimi laciniae subpatentes, imberbes, rarius basi subpilosae. *Filamenta* corollae tubo paullo infra medium adnata, antheris subbifidis bre-

viora. *Discus* hypogynus brevissimus, 5-dentatus. *Ovarium* sericeum. *Stylus* pilosus, apice exserto glaber. *Stigma* obtusum.

Primo adspectu ab antecedente et sequente distingui potest: caule humiliore debiliore et foliis brevioribus duplo angustioribus revolutis.

3. **Conostephium Preissii** Sond. calycibus ovoideis, filamentis basi corollae adnatis, ovario glabro, stylo piloso.

In arenoso-umbrosis silvae haud longe ab urbe Freemantle, d. 13. Mart. 1839. Ad ripam fl. Canning-River, d. 4. Dec. 1839. In solo arenoso inter frutices ad duvium Cygnorum, d. 4. Febr. 1839. Herb. Preiss. No. 416.

„Frutex 2 pedalis“ glaber seu velutino-pubescent. *Folia* lineari-oblonga, subpollicaria, 2 lin. lata, apice callosa plana vel margine denticulato scabro recurva, utrinque glabra vel velutino-pubescentia, vel supra glabra subtus canescenti-velutina. *Pedunculi* recurvi, 2-3 lin. longi. *Calyx* 3 lin. longus, glaberrimus, rarius velutinus. *Bracteae* 6, obtusae. *Sepala* obtusa. *Corolla* pallide purpurea. Tubus conicus, prope basin constrictus, pars inclusa extus velutina, pars exserta (vix 1 lin. long.) glabra, intus basi glaber, a constrictura usque ad limbum pilosa. Limbus brevissimus, subpatens, linearis, imberbis. *Filamenta* imae corollae adnata, antheris lanceolatis bifidis subduplo breviora. *Discus* hypogynus brevissimus. *Ovarium* glabrum. *Stylus* pilosus, apice exserto glaber. *Stigma* obtusum.

Floribus subduplo minoribus et foliis callosis facile distinguitur a *Conostephio pendulo*.

MELICHRUS R.Br. Endl. gen. n. 4270. Meisn.
gen. pag. 348. (156.) DC. l. c. pag. 740.

Sect. I.

1. **Melichrus squarrosus** Sond. foliis squarroso-patentibus lanceolato-linearibus basi concaviusculis utrinque marginibusque pilosis.

In glareosis inter frutices circa oppidum Albany, Plantagenet, d. 8. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 418.

Fruticulus prostratus ut videtur spithamaeus, dense foliatus. *Caulis* peninae corvinae crassitie glaber purpurascens, superne foliorum rudimentis subsquamosus. *Rami* circ. digitales adscendentes a medio ramulosi, ramulis inferioribus brevioribus, superioribus vix ultra pollicem longis, omnibus foliis squarroso-patentibus basi imbricatis obtectis. *Folia* 5-6 lin. longa, basi lineam lata, subtus striis circ. 5 parallelis discoloribus notata, elongato-lanceolata apice valde attenuata rigidiuscula, squarrosa, aetate juniori utrinque pilosa, superiora stellatim patentia, inferiora remotiora apice subrecurva denum subglabrata. *Flores* non vidi.

A *Melichro rotato* differt: foliis brevioribus basi concaviusculis squarrosis recurvisve, junioribus non imbricatis.

BRACHYLOMA Sonder.

Calyx coloratus ovoideus, 4-bracteatus, 5-partitus, sepalis subinaequalibus. *Corolla* tubulosa calyce inclusa, tubo medio fasciculis 5 serieis, limbo erecto imberbi lobis linearibus concaviusculis. *Filamenta* brevissima, corollae alte adnata. *Antherae* inclusae. *Discus* hypogynus cyathiformis dentatus. *Ora-*

Gyathodes R. Br.
(*L. Billardierei*)

Stems nigrit in herb. fr. Jac
manus duas plantas sub
numeris 71 & 72, quae ambae
haud ex uide. & cognationibus
indis. congruunt.

In montibus 3000' altitud.
G. Gayanae R. Br.

In montibus 3000' altitud. V. D. L. hb. St. I, 87, 25.
G. parvifolia R.

In montib. a citius 3000 ped.

V. D. L. hb. St. I. n. 25. Diagn. fructu
non optimi quodrat, haud datae a V. D. L.
adnotat, qui propter dimidiam p. magnit.
revert, quales naturalis rubrid vix minores
iuvend. In montib. occidentalis Jacm. 3-4000' alt.
Jan. 4. 1849 fl. & fr. hb. St. I. n. 318. fruct. 2-3'

R. Br. pr. 1. p. 539. Röm. & Schult. 4. p. 221

G. Looanthi montana R. Br. }

G. obtusifolia Fend. Müller

G. acrocarpa maxime similis, sed videntu
foliis haud mucronatis vix apicu-
latis videtur distincta.

In montib. occidentalis Jacm.

3-4000' altis. fruct. 1'. Jan. 21. 1849.

hb. St. I. n. 287. Ex humilione loco
698 ad fl. St. Pauli. Cor. 49. hb. St. I. 693.

G. straminea! Brown.

ibidem; fr. 2-3' Jan. 21. 1849. hb. St. I. n.
319.

G. dilatata! Brown Fend. Müller

ibidem. fr. 1' hb. St. I. n. 292.

hb. proinde affini differt. foliis
basin versus dilatatis (haud attenuatis)
pictus apicis ciliis (haud striis nitidulis)
continuique sui in brevatis (haud abruptis)
& fort. alius characteribus ex specimine
fl. & fr. distincto haud exponendis

Ligianthe
Gyathodes (Succaria) pinnatifida

L. glauca La Will. *oxymis*.
 Fructus (parte erectis) 5-6' Nov. 49
 in collibus spargulosis ad portum
 regnorum, hb. 1. 5. 625.

Lissanthe fuchsii *relicta* Br

Ad portum regnorum & Rinn
 Pexu Tarnanicae, hb. 12. 625,
 sub nom *Gyathodes*.

(Lanth: *Gyathodes*?)

Lissanthe (Succaria) fuchsii *relicta*

in coll. St. Pauli Tarn, hb. 12. 693.
 St omniculus limbo sinuato
 barbato ciliato retro *Lissanthe*
montana (*Gyathodes* a *Chrysophylis*
peruvialis)
 2 Nov. 4. 1849. reg. 4 p. 221

Lycopogon Richei ! K. Brown

Dryas
 albidus
 asperis
 laud
 inerte
 lar.
 adrag.
 fort
 Lin
 in la

1! *many* *rufus* *purpurea*
firma in *aromatis* *nata* *mon*
luc *fridula* *com*. *Succaria*
herb. n. 122. In *humilis* *aromat*
fruticem *dumum* *formos* *criticis* *callos*
 2-3' *aspinum* *Rivoli* *Bay* *Oct* 49
diffusum *opulens* *florifera* *aromat*
luc *aromat* *Richei*

In *dum* *aromat* *juxta*
luc *Walter* *Bay* *frutic*
fr *for* *10/48*. *Don*. - *hb* *7* *ili*.
Don. n. 27 In *rupibus* *jugis*
montis *Burr* *fruticulus* *digitalis*
mithamans *ve*. *Exant* *Octobri* *48*
Tarnanica *hb*. *St* *5* *mun*

luc *aromat* *callos* *fruticulus* *frutic*
nigricans
luc *aromat* *fruticulus* *frutic*
luc *aromat* *fruticulus* *frutic*

rium 5 loculare: loculis 1 ovulatis. *Stylus* brevis, crassus, cylindricus. *Drupa* sub exsucca, 5 sperma, putamine osseo solido.

Genus habitu *Conostephi*.

1. *Brachyloma Preissii* Sond.

In arenosis prope Bull's-creek, Nov. 1841 leg. cl. Preiss. (Swan-River, Drummond n. 480!)

Frutex erectus, ut videtur, ultra pedalis, ramis tectibus, cinerascen-
bus, glabris, ramulis hirtellis. *Folia* erecta adpressa superiora subimbricata,
petiolulata, linearia vel oblongo-linearia, mucronata, glabra, supra laevia,
viridia, subtus pallidiora, nervoso-striata, striis lateralibus divergentibus,
plana, margine serrulato-scabra, 6-7 lin. longa, 1-1½ lin. lata. *Flores*
axillares, solitarii, pedunculati. *Pedunculus* bracteatus, recurvus, 2 lin.
longus. *Bractae* 4, obtusae, inferiores minores, subcoloratae. *Sepala* ro-
seo-colorata ut bractae glaberrima, ovata, apiculata, vix ultra 2 lin. longa,
imbricata subinaequalia, inferiora 2-3, subbreviora. *Corolla* parva, roseo-
rubra, calyce inclusa, 2 lin. longa, tubulosa, tubus brevis limbum aequans,
extus glaber intus medio fasciculis 5 villorum sericeorum barbatus, basi et
apice glaber, limbi lobis crectis, linearibus, glaberrimis, concaviusculis. *Fi-
lamenta* brevissima, tubo alte adnata. *Antherae* lineari-oblongae, inclusae,
dorso infra apicem insertae. *Discus* hypogynus 5 dentatus, ovarium dimi-
dium glabrum aequans. *Stylus* crassus, vix ultra ½ lin. longus, cylindricus,
glaber. *Stigma* breve capitellatum. *Drupa* parvula, suborbicularis, calyce
subbrevior, styli basi terminata.

β. *brevifolium*. foliis duplo brevioribus et angustioribus.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, Oct. 1840. Herb.
Preiss. No. 426.

LEUCOPOGON R. Brown. Endl. gen. n. 4273.

Meisn. gen. pag. 248. (156.)

§. 1. PSILOSTACHYI.

1. *Leucopogon Richei* R.Br. ramulis tenuissime velu-
tinis, foliis oblongo-lanceolatis extra medium latioribus
3-5 nerviis basi striatulis marginibus subrecurvis, spicis
erectis folia subaequantibus.

Leucopogon Richei R. Brown l. c. pag. 541.

Leucopogon lanceolatus Sieb.! fl. exs. Nov. Holl. n. 102.

Leucopogon Richei et *parviflorus* DC. l. c.

Styphelia Richei Labill.! Nov. Holl. 1. pag. 44. t. 60.

In solo sublimoso inter frutices planitiei ad fluvium Vasse-River, Sussex, Dec.
1839. Herb. Preiss. No. 372 ex parte (King George's Sound, Hügel! New-South-
Wales, Fraser!)

Specimina Preissiana cum Billardierianis et Sieberianis exacte conveniunt
Spicae axillares et terminales. *Drupa* parva ovata, baccata, pulpa coern-
lea, 4-5 sperma.

2. *Leucopogon parviflorus* Lindl. ramulis glaberrimis,
foliis lanceolatis vel lineari-oblongis planis supra 3-5 nerviis

subtus striatis, spicis sub terminalibus erectis folio brevioribus longioribusve. — Lindl. bot. Reg. t. 1560.

Styphelia parviflora Andr. bot. repos. tab. 287.

In collibus calcareis silvae haud longe ab ora maris Perth, d. 25. Jun. 1839. Herb. Preiss. No. 370. in arenosis umbrosis silvae insulae Rotenest, d. 18. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 365. (Drummond n. 459!)

„Frutex strictus, 2-3 pedalis“, ramis teretibus ramulisque glaberrimis. *Folia* coriacea, glabra, plana, apiculo brevi, obtuso, lanceolata basi subattenuata, linearilanceolata vel lineariloblonga, inferiora 12-16 lin. longa, 3-3½ lin. lata, superiora angustiora et breviora margine praesertim versus apicem denticulata, scabra, supra laevia nitidula, 3 vel 5 nervia, subtus multinervia nervis 5-7 evidentioribus latere apiceque ramosis. *Spicae* ad apices ramulorum aggregatae erectae, inferiores folio breviores vel aequilongae, superiores saepe longiores. *Rachis* cano-puberula, 10-20 flora, ad basin infra flores bracteolas plures gerens. *Bracteae* carinatae. *Corollae* tubus calycem brevem aequans, lobis superne dense barbatis. *Filamenta* brevissima. *Antherae* lineares. *Cyathus* hypogynus, 5 dentatus. *Stylus* brevis stigmatum capitato. *Drupa* parva subglobosa, coerulescens, pulpa vix ulla, 4,5 rarissime 6-sperma.

Antecedenti quamquam similis, tamen dispar: foliis multo crassioribus magis oblongis basi vix cuneatis planis.

3. **Leucopogon Drummondii** DC. ramulis glabris, foliis lanceolatis basi subobtusis apice attenuatis acutis callosis planis, supra glabris 5-7 nerviis, subtus tenuiter velutinis 7-9 nerviis, spicis axillaribus ad apices ramorum subpaniculatis folio aequalibus vel longioribus, rachis angulata puberula, bracteis parvis dorso carinulatis, calycis lobis ciliatis albidis, corollae tubo limbum hirsutissimum aequante. DC. l. c. pag. 745.

In turfoso-arenosis umbrosis inter gramina alta silvae prope oppidum Perth. d. 1. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 368. (Drummond n. 459!)

„Frutex 4 pedalis“ palleus, caule tereti, pennae corvinae crassitie, ramulis angulatis, glaberrimis, subvitellinis. *Folia* subtus pallidiora et tenuissime puberula, 2-2½ poll. longa, plana, lanceolato-attenuata vel linearilanceolata, acuta, rarius mucrone brevi terminata. *Spicae* subterminalis, foliis plerumque longiores, rarius aequilongae vel subbreviores 20-30 florum. *Rachis* puberula, basi multibracteata. *Bracteae* carinatae ut calyces pallidi margine ciliolatae. *Corollae* albae tubus calycem aequans, tubus cum limbo 1½ lin. longus, limbi laciniae angustae, dense barbatae, tubo aequales. *Filamenta* brevia antheris linearibus. *Discus* hypogynus dentatus. *Stylus* brevis, ut ovarium glaber. *Stigma* capitatum.

4. **Leucopogon paniculatus** Sond. ramulis glabris, foliis lanceolatis acutis mucronatis margine revolutis subtus tenuissime pubescentibus, spicis terminalibus erectis paniculatis folio multo longioribus, rachis angulata puberula, calycis lobis ciliatis albidis, corollae tubo limbi lobis hirsutissimis brevioris.

In locis subturfosis ad marginem lacus prope Middleton's Bay, Plantagenet, Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 367. et in turfoso-humidis inter frutices densos ad marginem lacus plantitiae haud longe ab oppidulo Albany, Plantagenet, d. 11. Oct. 1840. No. 374.

„Frutex 6-8 pedalis“ caule tereti, ramis ramulisque subangulatis, vitellinis, glaberrimis. *Folia* brevissime pedicellata, erecta, adpressa, subopaca

2. *L. parviflorus* L. affinis Bn.

Monatura elliptica hb. St. 134!

Passim ad rivum Fourth Creek.
Quantum e diagn. brevissima
extricari quæ. Hinc dubia
relinquo, enim *L. parviflorus*
db. noster plane æqualis
a cl. Sandro ad *L. Ritchei*
forte ex errore relatus est!

L. parviflorus Sanderson
Lindleyi, satis superque distat.
In paludosis inter *Leptospermorum*
& *melaleucaeum* proficere vapus
sinum litoratum Rivoli-Way!
Oct. 1848. Frut. vitis plurimodis.
Ad litus marium Tasmaniae
4-6'. Oct. 48. hb. St. II n. 35 (sub.
nom. *L. Ritchei*). In madidis rionti
Brown hills creek. Frut 3-5'.
Vne.

L. Australis! K. Brown.

Folia adulta majora praevalent
latiora ut cl. db. indicat. *L. affi-*
nis certe cognatus sed foliis sub-
recurvis videtur distinctus. *L. Drum-*
moulti db. ¹⁸⁴⁸diagnosis satis quadrat
huc forte referenda.
In solvatis, magis a litore distans
ut *L. affinis*. Fr. 2-3'. Oct. 48. hb.
St. II n. 56. George Town. hb. St. n.

C. *Setis vulgaris* in *Arcta*
montana *Lappj-range* etc
fere per totum annum. *Floruit.*

tactu mollia, supra 5 nervia, subtus vix pallidiora, multinervia, apice sphacelata, mucronata, margine revoluta, $1\frac{1}{2}$ -2 poll. longa, explanata, 3 lin. lata. *Spicae* ad apices ramorum paniculatae folia plerumque multo longiores, 20-30 florum, rachi puberula, angulata. *Bractee* carinatae ut calyces pallidi margine ciliolatae. *Corolla* alba, lineam longa, tubo brevi, limbi laciniis linearibus, tubo longioribus, dense barbatis. *Filamenta* brevissima antheris sublinearibus subexsertis, supra medium peltatis. *Cyathus* hypogynus, 5 dentatus. *Stylus* calycem aequans, stigmatibus subcapitato. *Drupa* parvula, subglobosa, pentagona, apiculata.

A *Leucop. Drummondii* habitu strictiore, foliis magis adpressis opacis margine recurvis, spicis sublongioribus et tubo corollae abbreviato diversus.

5. **Leucopogon verticillatus** R.Br. foliis interrupto-verticillatis oblongo-lanceolatis apice attenuatis, spicis subterminalibus aggregatis, fructiferis nutantibus, drupis 5-locularibus putamine 5 gono. R. Brown l. c.

L. glaucescens DC.! l. c.

Lissanthe verticillata Lindl. Swan-River bot. pag. XXV.

In limoso-calcareis silvae inter Mahagoni-creek et Halfwayhouse nec non in subarenosis silvae prope oppidulum Albany, Plantagenet, d. 13. Sept. 1839 et d. 23. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 431. (Swan-River, Drummond!)

„Frutex 2-5 pedalis erectus“ apice plerumque ramosus, glaberrimus. *Folia* sessilia, basi subangustiora, subtus glaucescentia, multinervia, supra 5-nervia, utrinque laevia, inferiora saepe 4 poll. longa, pollicem lata, superiora breviora et angustiora. *Verticilli* in parte caulis inferiore intervallo 3-4 pollicari disjuncti, apicem versus magis approximati et foliis 6-8 constant. *Internodia* plerumque nuda sunt, interdum vero foliola nonnulla brevina, reliquis conformia et semper cicatrices foliorum delapsorum in illis inveniuntur. *Spicae* in foliorum superiorum verticillis, elongatae, laxae, sero nutantes, multiflorae, rachi angulata glaberrima. *Bractee* 2 ut calyces virides, margine tenuissime ciliatae. *Corolla* in siccis purpurascens apice pallidiora. *Tubus* calyce duplo longior, extus glaber, intus subpilosus, limbi lobis revolutis basi parce barbatis. *Filamenta* brevissima antheris linearibus subexsertis duplo superata. *Discus* hypogynus 5 dentatus. *Stylus* brevis glaber stigmatibus obtuso. *Drupa* parvula subexsucca (?) oblonga, pentagona, 5 locularis, rarius 4 gona, 4 locularis *).

§. 2. BRACHYSTACHYL.

6. **Leucopogon polystachyus** R.Br. ramulis glabris virgatis, foliis lineari-lanceolatis muticis convexo-con-

*) **Leucopogon Shuttleworthii** Sond. ramulis glabris, foliis erectis adpressis, concaviusculis petiolatis ovato-oblongis acutis callosis-mucronatis glabris subtus striatis margine denticulatis scabris, spicis axillaribus folio subtriplo longioribus, axi flexuosa angulata puberula, bracteis persistentibus ciliatis, corollae lobis supra dense barbatis. New-South-Wales leg. Fraser! (herb. Shuttleworth). Frutex pluripedalis ramis ramulisque teretibus, subvirgatis, glabris. *Folia* adpressa supra concaviuscula, impressae 3-5 nervia, subtus nervoso-striata, 7-9 lin. longa, $2\frac{1}{2}$ -3 lin. lata petiolo brevissimo (1 lin. long.) insidentia, apice acuta et callo brevi obtuso terminata. *Spicae* erectae in axillis foliorum supremorum. *Axis* subflexuosa, tenuissime puberula. *Bractee* persistentes lanceolatae dorso striatae margine ciliatae. *Bracteolae* acutae carinatae puberulae. *Calycis* lacinae acutae, ut bractee pubescentes. *Corollae* tubus calyce brevior, limbi lobis lanceolatis albo hirsutissimis. *Filamenta* brevissima. *Cynthus* hypogynus, subdentatus, ovario glabro duplo brevior. *Stylus* brevissimus.

cavinsculis adpresse erectis, spicis axillaribus terminalibusve aggregatis 7-10 floris, rachii hirsuta, drupis exsuccis ovalibus apice depresso. R. Brown l. c. DC. l. c.

In arenosis prope oppidulum Albany, Plantagenet, Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 363.

Frutex bipedalis et ultra, erectus ramis virgatis. *Folia* sparsa, sessilia, glaberrima, plerumque 5-6 lin. longa, lineam lata, erecta vel cauli subadpressa, supra concaviuscula, apice callo brevissimo terminata, margine integerrima, in varietate serrata. *Spicae* folio aequales, 5-7 florae vel parum longiores 8-10 florae rachii pubescente. *Bractae* carinatae ut calyx membranaceae, pallidae et rufae coloratae, subtendentes, ovatae, acutae margine ciliato-lanatae. *Calycis* foliola lanceolata, obtusiuscula, margine ciliata, 2 lin. longa. *Corollae* tubus calycem aequans, limbi lobi tubo longiores, revoluti, albo hirsutissimi. *Filamenta* brevissima, antheris linearibus. *Discus* hypogynus 5 dentatus. *Stylus* brevissimus stigmatate subcapitato. *Drupa* exsucca, pentagona, oblonga basi angustiore, apice truncata, stylo coronata, calyci aequilonga, 5 locularis, abortu 1-4 locularis.

β. serratifolius. foliis lanceolatis acuminatis muticis margine serrulatis scabris.

In arenoso-turfosis humidis inter frutices densos prope villam beat Rich. Spencer, Plantagenet, d. 23. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 364.

„Frutex 4-6 pedalis“. *Folia* 6-9 lin. longa, 1-1½ lin. lata, utriusque glaberrima, viridia margine serraturis minimis scabra, inferiora saepius margine ciliata et subpatentia, superiora erecta, concaviuscula. *Flores* et fructus ut in α.

γ. monostachys. spica solitaria terminali multiflora, bracteis subtendentibus subfoliaceis.

Habitat cum priore.

7. **Leucopogon brachycephalus** DC. ramulis glabriusculis, foliis obovatis oblongisve erectis vix acutiusculis margine scabriusculis junioribus et summis subtus distincte striatis, inferioribus subtus et omnibus superne laevibus: spicis paucifloris pluribus in capitulum terminalem aggregatis, bracteis subacutis, corollae lobis angustis superne barba candida copiosa hirsutissimis. — DC. l. c.

In arenosis silvae ad fluvium Canning, d. 23. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 381. (Drummond n. 461 et 463!) (Vasse River, Mrs. Molloy 1839!)

Frutex pedalis subramosus, ramulis glabriusculis erectis. *Folia* sessilia inferiora sparsa, obovata, acutiuscula vel oblonga, rarius oblongo-lanceolata, ramulorum subimbricata, adpressa, omnia supra laevia, subtus striata, margine plerumque denticulato-scabra, rarius integerrima, coriacea, 1½-2½ lin. longa, 1-1½ lin. lata. *Spicae* terminales, saepius numerosae. *Rachis* pubescens. *Bractae* dorso carinatae, acutae, glabrae, apice ciliatae, subtendente parum minore. *Sepala* lanceolata lineam longa, extus a medio ad apicem puberula et margine ciliolata. *Corollae* tubus calyce subbrevis, limbi lacinae lanceolatae, dense barbatae. *Filamenta* brevissima. *Antherae* linear-oblongae. *Cyathus* hypogynus obtuse 5 lobatus. *Ovarium* glabrum. *Stylus* brevis. *Stigma* obtusum.

β. heterophyllus. foliis inferioribus imbricatis lanceolatis acutis, ramulorum superiorum remotioribus ovatis suborbiculatisve acutiusculis, bracteis calycibusque glabris.

§! Optimum diagnosendi gradus
exceptor foliorum ramis junioribus
vittellinis

Satis frequenter in superatilo
L. spiculae sur-
h. St. n. 123. qui etiam in finitellum).
in hac sp. ad L. post-
p. h. n. 123. ad hanc
eodem genere habere possunt.

L. aspinilis K. Br

De flum. Torrens. Oct. 1847
h. St. n. 123. fruct. 2 ped. al.
fruct. cupres. glabros in
fere reticulatos, corulis
5. uno altiore in angulo.
Innotata exploratio me docuit, pl. a
L. virgato non nisi magnitudine om-
nium partium diffinita.

In limoso-calculosis ad radices jugi montium Darling's-range, d. 15. Oct. 1839-
Herb. Preiss. No. 383.

Folia inferiora $1\frac{1}{2}$ lin. longa et semilineam lata, superiora lineam longa
et lata. *Spicae* pauciflorae.

8. **Leucopogon vitellinus** Sond. ramulis puberulis, foliis adpressis lineari-lanceolatis callosis supra laevibus subtus subcarinatis nervosis, nervo medio crassiore, margine denticulatis, spicis terminalibus aggregatis, bracteis calycibusque glabriusculis.

In arenosis prope oppidulum Albany, Plantagenet, Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 363 ex parte.

Frutex rigidus, ramis strictiusculis, glabris, vitellinis, ramulis velutino-pubescentibus. *Folia* inferiora sparsa, suprema subimbricata, lineari-lanceolata vel linearia, supra plana, viridia, subtus convexiuscula, nervo medio prominente subcarinata, nervis 5-7 parallelis striata, margine denticulato-scabra, 5-6 lin. longa, lineam lata. *Spicae* 4-6 florum. *Calyx* membranaceus, subcoloratus. *Bractae* carinatae, acutae, apice et margine puberulae, subtendente ovata obtusiuscula striata subbreviore. *Calycis* foliola $1\frac{1}{2}$ lin. longa, tenuissime puberula. *Corollae* tubus calycem aequans, intus prope basin glaber, limbi laciniae tubo longiores, dense et albo barbatae. *Filamenta* brevissima, inter barbam fere occultata, antheris lineari-oblongis breviora. *Discus* hypogynus obtuse 5 dentatus, ovario glabro duplo brevior. *Drupa* exsucca, oblonga, (lineam longa) obsolete 5 gona, apice truncata, stylo superata, abortu saepe disperma.

Num forte idem cum *L. assimili* Brown? Verum enim vero calyces in nostro non foliacei. *L. assimilis* β , *callosus* DC. certo ad *L. vitellinum* pertinet.

9. **Leucopogon polymorphus** Sond. ramulis villosis, foliis adpressis lanceolato-linearibus linearibusve muticis utrinque villosis vel glabriusculis, subtus striatis margine ciliatis denticulatisve, spicis terminalibus subsolitariis aggregatisve, bracteis calycibusque pubescentibus.

Leucopogon assimilis Benth.! in Endl. Enumerat. plant. Hügel. vix Brown.

In arenosis inter frutices prope Pine-Aple, Perth, d. 20. Jun. 1839. No. 392 et in porrectis arenosis inter frutices haud longe a cataracta ad caput fluvii Cygnorum, d. 26. Jun. 1839, Herb. Preiss. No. 402. (King George's Sound, Hügel!)

Fruticulus 1-2 pedalis, nunc villosissimus nunc fere glaber, subsimplex, apice tantum ramosus ramis abbreviatis, vel ramosissimus ramis longis virgatis. *Folia* inferiora seu caulina sparsa superiora subimbricata, inferiora lineari-lanceolata seu linearia, 6 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, superiora breviora, 3-4 lin. longa, lineam lata, omnia sessilia, villosa, glabriuscula vel omnino glabra, supra concaviuscula laevia, subtus nervoso-striata, nervo medio vix aut ne vix elevato, margine pilis longis ciliata, vel glabrata tantum denticulato-scabra. *Spicae* in apicibus ramulorum simplices vel subaggregatae 4-8 florum. *Rachis* puberula. *Bractae* subtendentes plerumque foliaceae striatae, flores aequantes, vel breviores. *Bracteolae* calycesque puberuli subcolorati, interdum subglabri, pallidi, membranacei, margine ciliolati. *Bracteolae* ovatae acutae. *Sepala* ovato-lanceolata. *Corollae* tubus calycem aequans, limbi lobis albo-hirsutissimis. *Antherae* lineari-oblongae. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobus. *Stylus* brevis glaber ovario aequilongus, stigmate subcapitato. *Drupa* calycem non superans, crustacea, ovato-oblonga, apice depressa, 5 locularis.

10. **Leucopogon pulchellus** Sond. ramulis pubescentibus, foliis erectis vel distiche subpatentibus crassiusculis linearibus obtusiusculis supra planis subtus carinatis uninervis, pilosis vel glabris, margine ciliatis denticulatisve, spicis terminalibus subsolitariis, bracteis calycibusque coloratis puberulis.

In arenosis inter frutices haud longe a valle cataractae, d. 26. Jul. 1839 et in lapidosis ad jugum montium Darling's-range, d. 9. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 401 et 396. (Drummond n. 460!) (Vasse River. Mrs. Molloy 1839!)

„Frntex gracilis 2-4 pedalis“ ramis ramulisque teretibus. *Folia* caulina sparsa, ramulorum subimbricata, 3-3½ lin. longa, semilineam lata, anguste linearia, supra plana vel vix carinata, subtus carinata, nervis 2 lateralibus obsoletis, intermedia valde prominente ut folium apice fere triquetrum appareat. In nonnullis speciminibus folia omnia pilis brevibus vestita sunt, in aliis omnia glabra, in prioribus margo ciliatus in posterioribus denticulatus. *Folia* ramulorum suprema imbricata a ceteris recedunt quod breviora sint et minus carinata. *Spicae* ramulos terminantes plerumque solitariae, 3-8 florum, rarius aggregatae. *Rachis* pubescens. *Bracteae* ovatae obtusiusculae carinatae. *Sepala* puberula rarissime glabra, membranacea, apice colorata, margine longe ciliata, lineam longa. *Corollae* tubus calycem aequans, lobis lineari-lanceolatis, albo hirsutissimis. *Filamenta* brevissima, antheris lineari-oblongis. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobus. *Stylus* brevis, stigmate obtuso. *Ovarium* glabrum. *Drupa* exsucca, oblongo-linearis, calyce longior, monosperma.

11. **Leucopogon hirsutus** Sond. ramis ramulis foliisque pilis longis patentibus hirsutis, foliis petiolatis oblongis muticis planis vel margine subrecurvis spicis axillaribus terminalibusque solitariis 3-5 floris bracteis calycibusque glabris, corollae lobis parce barbatis.

In solo limoso inter frutices densos ad latus austro occidentale montis Clarence, Plautagenet, d. 7. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 464. (Drummond n. 465!)

Caulis ut videtur procumbens, ramis saepe longissimis (ultra 2 ped.) flaccidis, tenuibus nudique pilis patentibus hirsutis. *Ramuli breviores*. *Folia* oblonga, 3 lin. long., 1½ lin. lata, pilis subsericeis utrinque pilosa, supra impressa subtus elevato 3 nervia, breviter petiolata, apice acutiusculo mutica, plana vel marginibus integerrimis ciliatis subrecurva. *Flores* parvi spicati, spicae solitariae 3-6 florum, semper solitariae et in apice ramulorum et in axillis foliorum supremorum. *Axillae* nonnunquam florum abortu pedunculum 1 vel 2 tantum gerunt. *Pedunculi* hirsuti. *Bracteae* et *calyces* obtusiusculi, glabri, apice longe-margine breve ciliati, bracteae subtendentes minores striatae. *Corolla* ¾ lin. longa. Tubus calyce brevior, intus glaber, limbi laciniis revolutis supra pilis nodulosis parce barbatis. *Filamenta* glabra. *Antherae* oblongae, apice submarginatae, sub apice affixae. *Cyathus* hypogynus obtuse 5-lobatus. *Stylus* brevis, crassus, stigmate obtuso. *Drupa* subexsucca, subrugulosa, globosa, subcompressa, dorso elevato obliqua, stylo laterali persistente, semper monosperma.

Planta insignis, ab reliquis hujus generis habitu peculiari et fructibus obliquis diversa.

12. **Leucopogon revolutus** R.Br. ramulis minute hirtello-pubescentibus, foliis modice patentibus lineari-oblongis obtusis muticis apiculo obtuso callosa, supra convexis scabris, subtus lineatis glabris, marginibus recurvis nudis, spicis subterminalibus aggregatis 4-5 floris, calycibus

L. collinus R. Br. ex H. Sander, quod iratum!

L. ciliatus? All. Cunningham.

Exactissime diagnosi convenit!

Oct. 25. 1848. hb. St. II n. 8. prot. 1'

South-Esk-river, Tasm. Thidm.

hb. St II n. 31. Sept. 10. 48. 1' et 584.

Benedus Ferd Müller *galii ciliis* De
Hittibus. Nilo-River 1-2'. Oct. 48.

L. apidissimus Ferd Müller hinc
proximus.

L. nervatus, *galii recurvatis* Fr.
hb. St I n. 30. Espers river Tasm, 942.

L. europaeus *collinis* ad por-
tum cyrenum Nov. 1849. hb. St.
T. 642 - 2'.

L. brachocarpus? A. C. For

Stiphelia brachocarpa Lab.

hb. St. Tasmanniae. n. 21.

Alia *provinia* *perifera* s. muni

et haec non per. ~~videtur~~ *Stiphi-*

gunda. A. C. For, Tasm. 5-6!

Jan. 10. 1849. hb. St II n. 375.

In collibus arenosis ad portum
cyrenum, hb. St. T. Nov 49. hb. 637.

Hobart-town, hb. St T. 795.

L. villifera Ferd Müller

petalis patentibus longe villatis,
calicis ovato-lanceolatis acutis
multis concavis serratis, spicis
axillaribus & terminalibus ^{abbreviatis}
~~luteis paucifloris~~ ^{concoloratis} ~~superioribus~~ ^{superioribus} spi-
ratim aggregatis, calycibus, loba-
tisque petalibus ~~calycibus~~ ^{calycibus} ~~bracteis~~ ^{bracteis} duplo superantibus.

L. pilibundu & *hirsuto* approxima-
tus. Suprastris erectus adscendens
pedalis ^{& monanthus} ~~terminalis~~ ^{terminalis} ~~bracteis~~ ^{bracteis} ~~duplo~~ ^{duplo} superantibus
In nemoribus ~~terminalibus~~ ^{terminalibus} ad fl. On-
koparinga. Sept. 21. 1848. J. M.

F. fol. distantia naturalia 6-9" lg 2-3"

cruth: v. v.

glab.

L. novus v. v.

bracteisque tenuissime pubescentibus, subtendenti dimidio minore, drupis exsuccis obovatis 4-5 locularibus. R.Br. l. c. DC. l. c.

L. villosus Benth.! in Endl. Enum. plant. Hügel. nou R.Br.

In arenosis haud procul ab oppidulo Albany, Plantagenet, Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 393. (King George's Sound, Hügel!)

„Frutex 2 pedalis“ ramis erectis, substrictis. *Folia* oblongo-linear, ramorum floriferorum saepe linearia, apiculo obtuso terminata, supra scabra margine revoluta, inferiora cauli adpressa, 6 lin. longa, lineam lata, superiora erecto-patentia, 4-5 lin. longa. *Spicae* 4-6 florum, subterminales. *Bractae* et calycis foliola obtusiuscula, pubescentia, margine ciliolata. *Corollae* tubus calycem aequans, limbi lobi tubo aequilongi, revoluti, barbati. *Filamenta* brevissima, antheris lineari-oblongis. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobatus. *Stylus* brevissimus, stigmate subcapitato. *Drupa* parva, obovata, 4-5 locularis.

Leucopogon villosus R.Br. cujus specimen a cl. Mittchel in interiore Nov. Holl. lectum possideo, cum *L. revoluta* confundi non potest.

13. ***Leucopogon angustatus* Benth.** ramulis glabriusculis, foliis ovali-ellipticis sublanceolatisve obtusis muticis supra convexis margine subrevoluto, supra glabriusculis subtus pilosis, spicis paucifloris terminalibus congesto-capitatis, bracteis calycibusque subcoloratis glabris. Benth.! in Endl. Enumerat. plant. Hügel. pag. 77. DC. l. c.

In arenosis haud procul ob oppidulo Albany, Plantagenet, Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 393b.

Frutex pedalis et ultra, ramis erectis, ramulis brevissime pubescentibus. *Folia* sessilia, oblongo-lanceolata, lanceolata vel oblongo-linear, acutiuscula, mutica, inferiora sparsa, subplana, superiora subimbricata, margine subrevoluto ciliolata vel denticulato-scabra, supra pilosiuscula, demum glabrata, subtus pilosa rarius glabra, 4-5 lin. longa, lineam lata. *Flores* in apicibus ramulorum aggregati, spicati. *Bractae* carinatae ut calycis foliola obtusiuscula, margine ciliolatae. *Corollae* tubus calycem aequans, limbi lobis dense barbati. *Filamenta* brevissima. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobatus. *Stylus* brevis ovarium subaequans. *Stigma* obtusum.

β. hirsutus. ramulis hirsutis, foliis utrinque pilosis margine subrecurvo ciliatis, calycibus bracteisque puberulis.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 394.

Folia obscure viridia, supra brevius, subtus longe pilosa, 4-5 lin. long. 1 lin. lata. Indumento densiore excepto nullas differentias inter specimina Preissiana et Hügelianum invenio. Nescio an melius haec varietas pro typo et *Leucop. angustatus* pro forma glabrata habeatur? Ceterum *Leucop. angustatus* a *L. collino* R.Br. cujus specimen anth. in herb. Lehmanniano vidi, vix diversus videtur.

14. ***Leucopogon capitellatus* DC.** ramulis minute puberulis hirtellis, foliis linearibus acuminatis erecto patulis superne et margine minutissime scabridis subtus glabris, capitulis 3-5 floris folio brevioribus ad axillas sessilibus, bracteis obtusis, calycis lobis ciliolatis, corollae lobis barba alba conferta superne hirsutis. — DC.! l. c.

In limoso calcuosis silvae prope Mahagony-creek, d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 371. (Drummond n. 462!)

„Frutex 1-2 pedalis“ strictus. *Rami* breves, erecti, hirsuto-pilosi. *Folia* linearia, acuminata, planiuscula vel margine revoluta, supra marginibusque scabra, 6-10 lin. longa, $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata. *Flores* 3-5 in axillis sessiles, rarius capitula multiflora in apice ramulorum. *Bractae* carinatae, obtusae, subtendente dimidio minore. *Calycis* foliola vix lineam longa, ovata, acuta, margine ciliolata, corollae tubum aequantia. *Lobi* corollae demum reflexi angusti. *Antherae* lineari oblongae, ad sinus corollae subexsertae, lobis breviores. *Discus* hypogynus obtuse lobatus. *Stylus* brevis. *Stigma* obtusum. *Drupa* parvula, suborbicularis, apice depressa, stylo superata, 4 et 5 locularis.

β . sparsiflorus. floribus omnibus axillaribus, axillis 1-3 floris.

In glareosis inter frutices montis prope fontem St. Ronan'swell, d. 25. April. 1840. Herb. Preiss. No. 427.

Folia in hac varietate magis sunt adpressa et 6-7 lin. longa, $\frac{3}{4}$ lin. lata, flores non spicati nec capitati, corollae paullo minores.

15. *Leucopogon racemulosus* DC. ramulis glabris rigidulis, foliis linearibus margine recurvatis mucrone subpungenti apiculatis utrinque glabris supra convexis subtus concavis substriatis subglaucescentibus, racemulis axillaribus 3-5 floris folio brevioribus, bracteis minimis pedicello brevioribus, bracteolis brevibus subrotundis, calyce tubo corollae dimidio brevior, lobis corollae dense barbatis. — DC.! l. c.

In arenosis silvae circa oppidum Perth., d. 10. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 369. (Drummond n. 482! Capt. Mangles!)

„Frutex rigidus, 7 pedalis“, foliis sessilibus, patulis, pungentibus, 8-9 lin. longis. *Flores* omnes axillares, albi. *Corolla* infundibuliformis 3 lin. longa, tubo intus glabro, limbi lobis brevissime sed dense barbatis demum subrevolutis, tubo subtriplo brevioribus. *Filamenta* longiuscula tubo corollae adnata, apice libera. *Antherae* lineares, dimidia parte exsertae. *Discus* hypogynus 5 lobatus, lobis acuminatis ovarium aequans. *Stylus* glaber, apice muriculatus, corollam fere aequans, stigmatem capitato. *Ovarium* glabrum.

β . pauciflorus. pedunculis axillaribus 1-3 floris.

Huc pertinet specimen Drummondianum sub No. 482 in herb. Shuttleworth asservatum, alterum Drummondianum a Cl. Alph. DC. mecum communicatum racemulis axillaribus instructum est. In collectione Prussiana formas intermedias vidi. Intelligitur hanc speciem eodem jure ad sectionem quintam „Axilliflori“ accenseri posse.

16. *Leucopogon gracillimus* DC. fruticulosus erectus ramosissimus, ramis tenuissimis glabris, foliis teretiusculis vix acutis stricte adpressis glabris, spicis abbreviatis terminalibus solitariis aut subcongestis, bracteis obtusiusculis substriatis, corollae tubo calyci aequali, lobis superne villosis albis confertissimis hispidis. — DC.! l. c.

In limoso-calcareosis lateris orientalis montis Bakewell, York, d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 395. (Drummond!)

„Suffrutex 1-3 pedalis“ ramosissimus. *Rami* virgati tenuissimi, ramulis glabris foliis dense obsitis. *Folia* subtus plerumque trinervia, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longa. *Bractae* subfoliaceae, striatae. *Sepala* membranacea vel subfoliacea, margine membranaceo, obtusiuscula, apice ciliata. *Antherae* lineares.

L. collinum ! R. Br.

Lythylia collina La Bill
ab H. Tassin. n. 30, fol. contra
ll. Breton parvula & contra
ll. La Billardiere. haud plana
nō ut Br. recte monuit, margi-
ne recurvata observari. Dr. M.

* *L. virgatus* ! R. Br.

Lythylia virgata La Bill.

L. apiculatus hb. St. Tassin
non R. Br. perbrevis.

Sine dubio huc pertinens, et tamē
Dr. citis folios recurva non pa-
vis. Longo recurva non. A Leuc.
apiculata divergit dupis sub
globosis calycem figurantibus
& foliis villosis !

Hinc restuli etiam proximina omnia
alia *L. polystachya* adordinata,
ex diagnosi brevi haud longe (vi.
serpentina.

In locis diversissimis. Perilobis
praesertim montanis, per per totum
annum floris.

Radix lignosa apice nigra !

& folios sericeolentes.

(L. riv. Tassin. hb. St. 947.

Discus hypogynus lobis 5 obtusis. *Stylus* brevis, stigmate obtuso. *Drupa* crustacea, subcompressa, calycem aequans, stylo coronata, 2 locularis.

Hic et sequens ob calyces subfoliaceos forsitan rectius sect. 4 „*Perojoani*“ conseciantur.

17. **Leucopogon obtusatus** Sond. ramulis puberulis, foliis semiteretibus obtusis glabris margine ciliato-denticulatis, spicis terminalibus paucifloris solitariis aggregatisve, bracteis calyceibusque obtusis subfoliaceis glabris.

In limoso-calculosis lateris orientalis montis Bakewell, York, d. 13. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 395 ex parte.

Fruticulus gracilis, ramosissimus, praecedenti proxime affinis sed ramulis pubescentibus et foliis crassioribus facile diversus. *Folia* lineam longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata, supra plana, vix concaviuscula, subtus convexa, carinata, subuninervia, apice obtusa, stricte adpressa, ramulorum subimbricata. *Spicae* in apicibus ramulorum solitariae vel aggregatae, pauciflorae. *Bractae* obtusissimae apice lanato-ciliatae, subtendenti parum minore. *Sepala* obtusa lanato-ciliata tubum corollae aequantia. *Corollae* lobi albo-hirsutissimi. *Antherae*, *discus*, *stylus* et *stigma* ut in antecedente. *Drupa* crustacea, oblonga, cylindrica (non compressa) calyce parum longior, stylo superata, 2-arius 1-locularis.

§. 3. CARDIOPHYLLI.

18. **Leucopogon cordatus** Sond. ramulis glabris, foliis alternis exacte cordatis acutis vel acuminatis planis glaberrimis patentibus reflexisve, spicis ramulos terminantibus solitariis vel axillaribus aggregatis, bracteis inferioribus foliaceis calycem coloratum subaequantibus, superioribus brevioribus.

In Australia meridionali-occidentali. Herb. Preiss. No. 388.

Frutex erectus, ramis filiformibus glabris. *Folia* caulina 3-3½ lin. longa, 2-2½ lin. lata, ramulorum minora, aequae longa ac lata, basi profunde cordata, subtus pallidiora, striata. *Spicae* in apice ramulorum 5-8 florum, solitariae vel ad basim earum spicis 2-3 brevioribus patentibus sub 4-floris munitae. *Bractearum* inferiores 3-4 foliaceae, calycem subaequantes, sequentes coloratae breviores. *Bracteolae* obtusiusculae ut sepala coloratae, margine ciliolatae. *Corollae* tubus brevis, lobi dense barbati. *Filamenta* brevissima, antheris linearibus. *Discus* hypogynus brevis, lobis obtusis. *Stylus* brevis, stigmate subcapitato. *Drupa* exsucca oblonga cylindrica, striata, apice truncata, stylo persistente apiculata, plerumque 5 locularis.

Plurimis notis convenire videtur cum *L. glabello* R.Br. sed folia in nostro non late cordata. An potius varietas est? *L. cordifolius* Lindl. in Annal. sc. nat. XV. 62. est species valde diversa.

19. **Leucopogon distans** R.Br. ramulis glabris, foliis ovatis subcordatis divaricatis muticis supra convexis subtus pubescentibus, spicis terminalibus aggregatis flexuosis, floribus distantibus, drupis crustaceis 5 locularibus depresso-obovatis. — R.Br. l. c. DC. l. c.

In solo subturfoso arenoso inter frutices densos planitie prope Albany, Plantagenet, d. 5. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 390.

„Frutex 1-1½ pedalis“ erectus, ramis gracilibus ramulisque glabris. *Folia* sparsa, alterna, patentia, inferiora saepius reflexa, omnia lineam circ.

longa, supra convexa profunde striata glabra, subtus dense pubescentia, margine revoluta. *Spicae* terminales subpaniculatae. *Rachis* flexuosa, puberula, floribus sessilibus distantibus. *Bracteae calycisque* fusco coloratae. *Bracteae* obtusiusculae, subtendenti parum minores. *Sepala* ovata, acuta, ciliolata. *Corollae* tubus brevissimus, limbi laciniis supra hirsutissimis subtus tenuissime puberulis. *Filamenta* brevissima, inter barbam occultata. *Antherae* lineares. *Stylus* brevis, stigmate subcapitato. *Drupa* calyce brevior, crustacea, depresso-ovata vel potius suborbicularis, stylo apiculata, 5 locularis.

Variat: calycibus minute puberulis et glabriusculis intensius coloratis.

20. **Leucopogon reflexus** R.Br. ramulis pubescentibus, foliis ovatis subcordatis muticis reflexis divaricatisve, supra convexis, subtus concavis pilosis lineatis, spicis terminalibus confertis paucifloris, floribus imbricatis, drupis crustaceis 5 locularibus. — R.Br. l. c. DC. l. c.

In turfosis inter frutices densos prope oppidulum Albany, Plantagenet, Decbr. 1840. Herb. Preiss. No. 398. (New-South-Wales: Fraser! herb. Shuttleworth.)

„Frutex 1-3 pedalis“. *Rami* elongati, graciles, simplices vel apice divisi, ramuli pubescentes. *Folia* inferiora angustiora, sublanceolata, mutica, patent-reflexa, superiora breviora, ovata, subcordata, omnino reflexa, adpressa supra convexa glabra, subtus pallidiora, lineata, pilosa, marginibus recurvis. *Bracteae* acutae, subtendenti minore obtusiuscula, ut calycis foliola ovato-lanceolata, subvillosae. *Corollae* tubus brevis, limbi lobis dense barbatis. *Filamenta* brevissima, antheris lineari-oblongis. *Stylus* brevis, stigmate obtuso. *Drupa* parvula, crustacea, stylo coronata, 5-rarius 4-locularis.

21. **Leucopogon variifolius** Sond. ramulis glabris, foliis glabris sessilibus patentibus reflexisve inferioribus lanceolatis muticis margine recurvo ciliatis, superioribus ovato-cordatis cordatisve subacuminatis margine subrecurvo denticulatis scabris, spicis subterminalibus multifloris, calycibus bracteisque foliaceis glabris.

In subarenosis prope oppidulum Albany, Plantagenet, Jan. 1840. Herb. Preiss. No. 404.

„Frutex bipedalis“ ramis erectis, glabris. *Folia* inferiora lanceolata, basi non cordata, 3 lin. longa, vix ultra $\frac{1}{2}$ lin. lata, superiora ovato-acuminata, ovato-cordata vel cordata acuta et subacuminata, subtus striata, 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. longa, 2 lin. lata. *Spicae* elongatae, solitariae vel aggregatae in axillis foliorum supremorum, 8-20 florum. *Flores* bracteati, bracteis foliaceis, margine ciliolatis, calyce plerumque brevioribus. *Bracteolae* acutae ut calycis foliola lanceolata foliacea, margine ciliolatae. *Corollae* lobi breves, albo-hirsuti. *Antherae* oblongo-lineares. *Ovarium* glabrum. *Stylus* brevis. Stigma obtusum.

A *L. glabellum* R.Br. cui affinis videtur, foliis non coriaceis nec late cordatis et inferioribus lanceolatis, omnino differt.

§. 4. PERGOANI.

22. **Leucopogon elatior** Sond. ramulis glabris, foliis inferioribus linearibus vel lineari-lanceolatis patentibus deflexisve, superioribus ovatis acutis vel subacuminatis erecto-patentibus, omnibus glabris margine denticulatis, spicis ter-

L. villifera f. *glabra*, ramulis foliisque

glabris, *L. concurrens*? Ferd Müller

ramulis glabris, foliis glabris breviter
pubescentibus ovato cordatis obtusiuscu-
lis cuneatis (saepe ramum inter
vaginantes) margine ciliatis
multinerviis, peticis axillaribus
terminalibusque paucifloris ca-
pitatis, calyce apice ciliato, bracteis
glabris

Fructus erectus vix pedalis, olivaceo
similis ad *L. cuneatam* quando
relatus — In arceusis diffusus
juxta finem Encourter Bay
fili Nov. 1847 hb. St. n.

minialibus elongatis solitariis aggregatisve, calycibus bracteisque subfoliaceis glabris.

In solo sublimoso planitieci haud longe ab oppidulo Busselton, Sussex, Decbr. 1839. Herb. Preiss. No. 391. (Vasse-River, Mrs. Molloyl)

Caulis fruticosus, 3-pedalis, gracilis. *Radix* teres subfusca, ramulis fibrillisque paucis longis. *Truncus* cylindricus, pennae corvinae crassitie, ramis elongatis, teretibus, vitellinis, glabris, sparse foliatis terminatus. *Folia* ramulorum steriliom tenuia, patentia, exacte linearia, 3-4 lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata, trunci seu inferiora lineari-lanceolata, mutica, subcoriacea, 5 lin. longa, basi lineam lata, margine subrecurva, intermedia latiora, subbreviora, suprema late ovata, acuta, apice patenti, omnia utrinque glabra, subtus striata. *Spicae* in apice ramulorum gracilium nunc solitariae nunc aggregatae, foliaceae, saepe 30 florum. *Rachis* glabra cum bracteis tendentibus persistens. *Bractea* ovata, acuta, plerumque apiculata, concava, dorso striata, viridis, floribus brevior. *Bracteolae* carinatae, ovatae, acutae, margine serrulatae. *Sepala* lanceolata bracteolis triplo-, corollae tubum vix superantia. *Corollae* lobi albo-hirsutissimi, pilis subplanis margine denticulatis. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobatus. *Ovarium* suborbiculare basi parum angustatum, glabrum. *Stylus* brevis. *Stigma* obtusum.

Ut videtur haec species transitum e sectione praesente ad antecedentem facit, in omnibus quidem speciminibus Preissianis bases foliorum cordatae desiderantur, in uno a dom. Molloy collecto folia nonnulla subcordata video. Habitu et characteribus proxime accedit ad *L. vartifolium*.

23. **Leucopogon vaginans** Sond. ramulis glabris, foliis adpressis basi subvaginantibus lanceolatis subacuminatis muticis utrinque glabris striatulis margine vix denticulatis, spicis terminalibus elongatis multifloris, calycibus bracteisque subfoliaceis glabris.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis leg. cl. Roe, Jan. 1840. Herb. Preiss. No. 382.

Fruticis pars inferior desideratur. *Caulis* tenuis ramos habet graciles, glabros. *Folia* in parte speciminum inferiore $1\frac{1}{2}$ lin. longa, sessilia, subcoriacea, basi latiore semivaginantia, ramulorum floriferorum sparsa, steriliom subimbricata, lanceolata supra concaviuscula obsolete, subtus evidenter striata. *Spicae* in apice ramulorum fere semipedalium 4-6 elongatae, saepe 20 florum, basi subramulosae. *Flores* in axillis bractearum foliacearum solitarii, haec bractea ovata acuta nervosa viridis floribus brevior. *Bracteolae* acutae. *Sepala* lanceolata, lineam fere longa, margine ciliolata. *Corollae* tubus brevis calyci subbrevior, limbi lobi hirsutissimi, pilis scabridis incrassatis. *Antherae* lineari-oblongae. *Cyathus* hypogynus obtuse 5 lobus. *Ovarium* glabrum, disco duplo longius. *Stylus* brevis, stigmatibus obtusis.

24. **Leucopogon rupestris** Sond. ramulis glabris, foliis sessilibus planis late ovatis vix acutiusculis supra laevibus subtus nervosis glabris margine cartilagineo-denticulatis, inferioribus sparsis superioribus imbricatis, spicis terminalibus solitariis aggregatisve multifloris elongatis, bracteis calycibusque foliaceis glabris.

In rupestribus collium Konkoberup, promontorii Cape Riche, d. 21. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 406.

„Frutex rigidus“ ramis ramulisque abbreviatis, subvitellinis, glabris. *Folia* inferiora 2 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, coriacea, glaberrima, subtus nervosa, nervis lateralibus divergentibus, superiora parum minora, dense imbricata. *Spicae* ramulos terminantes, 10-20 florum, solitariae, rarius aggregatae.

tae, lateralibus vel inferioribus abbreviatis, paucifloris. *Rachis* glabra, persistens. *Bractae* ovatae, acutae, inferiores foliis conformes flores superantes, sequentes sensim minores. *Bracteolae* ovatae acutae, margine ciliatae. *Sepala* bracteolas triplo superantia, lanceolata, foliacea, margine ciliolato-serrata. *Corollae* tubus brevis, limbi lobis albo-hirsutis. *Drupa* immatura obovata, 1 locularis.

25. **Leucopogon gracilis** R.Br. ramulis glabris filiformibus, foliis lanceolato-linearibus erectis concavo-convexis muticis, subtus nervosis trilincatis margine laevibus, spicis congestis 4-6-floris, calycibus bracteisque subfoliaceis glabris, subtendente parum breviori. — R.Br. l. c. DC. l. c.

In solo turfoso humido inter frutices densos planitie prope oppidulum Albany, Plantagenet, d. 8. et 14. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 381 et 389.

Frutex pedalis et ultra, ramis virgatis. *Folia* sparsa, alterna, adpressa vel erecta, glabra, 3-3½ lin. longa, ½ lin. lata, subtus convexa, striis 3, in foliis latioribus saepius 5. *Calycis* foliola viridia, bracteis subtriplo longiora, tubum corollae aequantia. *Corollae* lobi albo hirsutissimi. *Antherae* lineares. *Discus* hypogynus acute 5 lobatus. *Stylus* brevis, stigmate subcapitato.

Simillimus *L. virgato* Br., differt: foliis minus acuminatis margine nudis, spicis terminalibus et calycibus foliaceis.

26. **Leucopogon oppositifolius** Sond. ramulis puberulis, foliis oppositis adpressis lanceolato-linearibus muticis supra concavis albo-velutinis subtus trinerviis glabris margine laevibus, spicis terminalibus aggregatis paucifloris, calycibus bracteisque foliaceis glabris.

Ad sinum regis Georgii, Dec. 1840 et in Australia occidentali. Herb. Preiss. No. 380 et 400.

„Frutex dodrantalis“ (No. 380) nunc ultra pedalis (400) radice crassa, nigricante, nulliflori, caulibus erectis, a basi ramosis, teretibus, striatis, ramis virgatis lutescentibus, tenuissime puberulis. *Folia* sessilia, decussata, lanceolato-linearia vel sublinearia, convexo-concava, plerumque 2 lin. longa et ¼ lin. lata, in spec. majoribus sublongiora et latiora, inferiora remotiora, superiora et praesertim ramulorum sterilium distiche imbricata, omnia cauli arcute adpressa et supra villis brevibus albis velutina. *Spicae* 3-4, terminales. *Bractae* obtusiusculae, margine ciliatae, tendente subaequali. *Sepala* lanceolata, obtusiuscula, margine ciliolata, bracteis duplo superantia. *Corollae* tubus calycis longitudine, limbi lobi dense barbati. *Filamenta* antheris linearibus breviora. *Cyathus* hypogynus obtuse 5 lobatus. *Stylus* brevissimus, stigmate obtuso.

β. **pubescens**. minor, ramis foliisque inferioribus pubescentibus.

In regionibus interioribus Australiae merid.-occid. m. Nov. 1840 leg. cl. Preiss.

27. **Leucopogon crassifolius** Sond. ramulis pubescentibus, foliis crassiusculis linearibus apice subtriquetro mucronatis glabris, spicis subaggregatis paucifloris, calycibus bracteisque foliaceis ciliatis.

In rupestribus collium Konkoberup, promontorii Cape Riche, d. 19. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 386.

„Frutex 2 pedalis“ ramis rigidis, sublignosis, elongatis, erectis, ramulis abbreviatis, foliosis. *Folia* inferiora adpressa, sparsa, 3 lin. longa, ½ lin. lata, glaberrima, supra plana sed apice cucullato-contracta, mucrone brevi rigido

L. unguati var. ?

✓ *L. fascicularis* (H. & A.) Pers. Mill.

30. *L. sp. nov.* hinc maxima cum
a *L. unguati* (H. & A.) a partibus
Philippini differt foliis majori-
ribus, pinnatis integris. Petalum
nominavi *L. floridissimum* H. & A.

^{grata cum} ~~Specimen~~ ^{tribui} ~~tribui~~ agnitionis gratia (et. detestata)
^{grata cum} qui hanc aliis plantis Australiac
delicis mecum communicabat.

terminata, subtus carinata, 3 nervia, nervo medio valde prominente et hinc apice subtriquetra, margine ciliolata demum nuda; folia superiora seu ramulorum imbricata, reliquis subbreviora. *Spicae* terminales in nonnullis speciminibus forsan ramuli abortu axillares, subaggregatae, 3-6 florum. *Bractee* carinatae, glabrae, margine ciliatae, subtendente minore. *Calycis* foliola ovata acuminata, apice sphacelato patula. *Corollae* tubus calyce longior, limbi lobis albo hirsutissimis. *Antherae* apice affixae. *Discus* hypogynus obtuse lobatus, ovario 4 plo brevior. *Stylus* subnullus. *Stigma* obtusum. *Drupe* (immatura) lineari-oblonga, turbinata, pentagona.

28. **Leucopogon tetragonus** *Sond.* ramulis, foliis, bracteis, calycibusque hispidulis, foliis quadrifariam imbricatis oblongo-linearibus oblongisve margine recurvo longe ciliatis, spicis terminalibus paucifloris, calycibus bracteisque foliaceis.

In rupestribus collium Konkobernp, promontorii Cape Riche, d. 19. Nov. 1840, Herb. Preiss. No. 387.

„Caulis fruticosus, 2 pedalis“. *Rami* rigidi, sublignosi, ramulis foliosis. *Folia* erecta, imbricata, lineari-oblonga, oblonga vel ovato-oblonga, obtusiuscula, 1-1½ lin. longa, supra scabriuscula, subtus nervosa, nervo medio validiore, margine ciliata, ciliis longis. *Flores* 4-12 in apice ramulorum spicati. *Bractee* ovatae, acutae, margine ciliatae, subtendente parum majori. *Calycis* foliola lanceolata, margine ciliata, apice sphacelato plerumque patula. *Corollae* tubus calyce brevior, lobis albo-barbatis, pilis barbae nodulosis. *Antherae* oblongo-lineares. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobus. *Stylus* brevis ovario obovato turbinato acquilongus. *Stigma* obtusum.

29. **Leucopogon corifolius** *Endl.* foliis lanceolatis acutis margine revolutis patentibus vel reflexis ramulisque hispidis, spicis terminalibus paucifloris congesto-capitatis, calycibus bracteisque herbaceis villosis. — *Endl.* nov. stirp. dec. 2. n. 19.

In solo turfoso inter frutices densos prope oppidulum Albany, Plantagenet, Febr. 1840. Herb. Preiss. No. 399.

Folia inferiora glabrata. *Antherae* oblongo-lineares. *Discus* hypogynus obtuse lobatus ovario glabro duplo brevior. *Stylus* brevis, stigmatibus obtusis.

30. **Leucopogon squarrosus** *Benth.* ramulis pubescentibus, foliis ovatis lanceolatisve acutis ciliatis subglabris basi subadpressis apice recurvis, spicis paucifloris terminalibus aggregatis, bracteis calycibusque subfoliaceis glabris. — *Benth.* in *Endl.* Enumerat. plant. Hügel. pag. 77.

Inter saxa calcarea divulorum haud longe ab oppidulo Freemantle, d. 15. Aug. 1839. Herb. Preiss. No. 403. (v. sp. anth. in Herb. caes. Vindob.)

„Frutex 3 pedalis“ apice ramosissimus, ramulis hirtello pubescentibus. *Folia* lanceolata, ovato-lanceolata vel ovata, acuta, 1-2 lin. longa, ½-1 lin. lata, sessilia, squarrosa-patentia basi plerumque adpressa, utrinque glabra, subtus striata, margine ciliata vel denticulata. *Spicae* ramulos terminantes, 2-4-florae. *Bractee* lanceolatae, carinatae, glabrae, margine ciliolatae. *Sepala* lanceolata, lineam longa, pallida, apice serrato-ciliata. *Corollae* tubus calyce brevior, lobis albo-hirsutissimis. *Filamenta* brevissima, antheris oblongo-linearibus. *Discus* hypogynus obtusus. *Ovarium* suborbiculare glabrum. *Stylus* brevis, stigmatibus obtusis.

β. paradoxus. caule humiliore, foliis inferioribus lineari-lanceolatis planis, superioribus ovatis acuminatis subsquarroso-patentibus. Herb. Preiss. No. 403 ex parte.

31. **Leucopogon cymbiformis** *Cumm.* ramulis glabrinseculis, foliis imbricatis lanceolatis mucronatis superne plano-concavis laevibus subtus subcarinatis striatis margine subdenticulatis, spiculis aggregatis paucifloris, calycibus bracteisque foliaceis ciliolato-serratis, ovario setis circumdato. — A. *Cumm.* ap. DC. l. c.

In arenosis inter frutices planitiei cis flumen Gordon, Hay, d. 7. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 385. (Swan-River, Drummond!)

Fruticulus $\frac{1}{2}$ pedalis, a basi ramosus, rami erecti, glabri, ramuli vix pubescentes, foliis sparsis, imbricatis obsiti. *Folia* arcute adpressa acuminata, mucronata, supra concaviuscula subtus-striata, et nervo medio valido subcarinata, pleraque 2-2½ lin. longa, semilineam lata, alia 1-1½ lin. longa, semilinea angustiora. *Spicae* 3-4 florum, in apice ramulorum aggregatae, in nonnullis speciminibus ramuli forsitan abortu axillares solitariae. *Bractae* lanceolatae, apice serrulatae, subtendente breviori. *Sepala* lanceolata, acutissima, bracteis duplo superantia, apice ciliolato-serrata. *Corollae* tubus calyce parum longior, intus glaber, limbi lacinae lanceolatae, tubo subbreviores, supra dense barbatae. *Antherae* lineari-oblongae. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobatus. *Ovarium* sublineare, angulatum, setis numerosis albis disco hypogyno longioribus circumdatum. *Drupa* (immatura) suberustacea, obsolete pentagona.

32. **Leucopogon elegans** *Sond.* ramulis villosis, foliis ovatis sublanceolatisve acutiusculis convexo-concavis supra pilosiusculis subtus glabris, striis 5 semipellucidis notatis, margine longe ciliatis, spicis terminalibus solitariis, calycibus bracteisque foliaceis glabris.

In glareosis sterilibus collium Konkoberup, promontorii Cape Riche, d. 20. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 378.

Fruticulus humilis, vix spithameus, ramis purpurascentibus glabris, ramulis brevibus, erectis, villosis. *Folia* sparsa, versus apicem copiosiora, subimbricata, petiolulata, petiolo purpureo, erecto adpressa, valde concava, 2½ lin. longa, explanata 1-1½ lin. lata, intense viridia, utrinque concolora, margine ciliis longis obsita. *Spicae* in omnibus exemplar. a me examinatis solitariae, flores inferiores in axillis foliorum supremorum. *Bractae* obtusiusculae, apice ciliatae, sepalis lanceolatis, margine ciliatis triplo breviores. *Corollae* 2 lin. longa, tubus longitudine calycis intus apice pilosus, limbi lacinae albo-hirsutissimae (pilis longiusculis non crispatis, exasperatis). *Antherae* lineares. *Discus* hypogynus 5 dentatus, ovarium dimidium aequans. *Stylus* brevissimus. *Stigma* capitellatum.

β. glaucifolius. ramulis glabris, foliis glabris glaucescentibus. Ad portum regis Georgii leg. cl. Preiss.

33. **Leucopogon tectus** *Sond.* ramulis tenuissime puberulis, foliis imbricatis oblongis sublanceolatisve muticis glabris supra planiusculis subtus convexiusculis nervis elevatis, margine ciliato-denticulato, spicis terminalibus solitariis, calycibus puberulis margine ciliatis.

In rupestribus collium Konkoberup, promontorii Cape Riche d. 21. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 406 ex parte.

Frutex ultra pedalis, ramis glabris, ramulis abbreviatis foliis imbricatis dense obsitis. *Folia* 3 lin. longa, lineam lata, glaberrima, petiolulata, supra laevia, subplana vel apice cucullato-contracta, concaviuscula, subtus elevato-nervosa, nervo medio valde prominulo. *Spicae* simplices, 6-8-florae, rachis puberula, persistente. *Bracteae* tendentes foliaceae, obtusiusculae, striatae deciduae. *Bracteolae* margine ciliolatae calycem dimidium paullo superantes. *Sepala* subfoliaceae, extus puberula, lanceolata, obtusiuscula, margine ciliata. *Corollae* lobi albo-hirsutissimi.

L. nervosus R.Br. similissimus videtur, differt tamen ut ex descriptione elucet: foliis ellipticis, spicis congestis et calycibus foliaceis glaberrimis.

34. **Leucopogon ovatus** *Sond.* ramulis tenuissime puberulis, foliis sessilibus adpressis ovatis oblongisve muticis glabris supra concaviusculis subtus convexiusculis nervoso-striatis, margine denticulatis scabris, superioribus subimbricatis, spicis terminalibus paucifloris, calycibus apice ciliatis bracteas duplo superantibus.

In regionibus interioribus Australiae meridionali-occidentalis, d. 8. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 375.

Fruticis ramos video semipedales, ramulis nonnullis erectis, tenuibus, abbreviatis, instructos. *Folia* sunt ovata, ovato-oblonga vel oblonga, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longa, coriacea, supra laevia, subtus striata, inferiora remotiuscula, superiora breviora, subimbricata. *Flores* ramulos terminantes spicam subfoliosam efformantes, spicae rarius solitariae, plerumque subaggregatae, pauciflorae. *Bracteae* subtendentes inferiores foliaceae, calycem aequantes, superiores sensim minores. *Bracteolae* calycesque membranacei, obtusi, glabri apice ciliati. *Corollae* tubus calycem aequans, limbi laciniis revolutis dense barbatis. *Antherae* lineari-oblongae. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobatus. *Stylus* brevis, glaber. *Stigma* subcapitatum. *Drupa* calycem subaequans, crustacea, truncata, striata, plerumque bilocularis.

Num forte idem est ac *L. striatus* R.Br.? Ab antecedente differt: foliis duplo brevioribus tenuioribus, nervis subtus vix prominulis et spicis subaggregatis.

35. **Leucopogon parvifolius** *DC.* ramulis glabris, foliis ovatis concavo-cymbaeformibus obtusis muticis margine integerrimis subtus striatis utrinque glabris, floribus in axillis foliorum superiorum sensim decrescentium solitariis sessilibus in spicam ideo elongatam foliaceam dispositis, drupis obovato-globosis sub 1-spermis. — *DC. l. c. pag. 752!*

Ad sinum regis Georgii leg. cl. Preiss.

Fruticulus semipedalis. *Folia* ramorum inferiorum $1\frac{1}{2}$ lin. longa, saepe longiora, nunc planiuscula nunc caulem subamplectentia, supra laevia, subtus striata, margine integerrima vel subdenticulata. *Rachis* spicae puberula. *Bracteae* subtendentes persistentes. *Bracteae* calycesque subfoliacei glabri. *Sepala* acutiuscula margine ciliata, bracteolas triplo superantia. *Corollae* lobi revoluti, albo hirsutissimi. *Drupa* subglobosa, calycem subaequans, bilocularis 1-2-sperma.

Specimen Preissianum bene congruit cum frustulo speciminis Candolleani. Differt a praecedente cui proximus, foliis integerrimis vel subintegerrimis saepe subamplexicaulibus, spicis solitariis et praesertim calycibus acutiusculis bracteisque brevioribus.

36. **Leucopogon sprengelioides** *Sond.* ramulis glabrisculis, foliis parvulis late obovatis vix acutiusculis, basi

cucullatis semivaginantibus supra laevibus subtus lineatis margine nudis glabris, spicis terminalibus solitariis aggregatisve, calycibus puberulis subtendentibus foliaceis.

In Australia meridionali-occidentali. Herb. Preiss. No. 376 et in arenosis planitiebus haud longe a Halfwayhouse, York, d. 13. Sept. 1839. No. 397. (Drummond!)

„Suffrutex 1-3 pedalis“ ramis nunc elongatis nunc abbreviatis. *Radix* gracilis nigrescens. *Caulis* prope basin crassitie pennae corvinae. *Rami* ut caulis basi plerumque nudi, glabri, *Ramuli* semper breves vix puberuli foliis tecti. *Folia* imbricata, coriacea, lineam circ. longa totidemque lata apice subattenuata sed non acuta, hasibus cucullatis semi-vaginantia, apice patulo vel subadpresso, subtus lineis notata, margine integerrima rarissime subdenticulata. *Spicae* solitariae, rarius aggregatae, 4-8-florae. *Rachis* pubescens bracteolis persistentibus foliaceis margine tenuissime ciliatis, bracteis carinatas obtusas margine ciliolatas aequantes vel parum longiores. *Calyces* foliola subfoliacea, obtusiuscula, extus puberula margine ciliolata, bracteis duplo superantia. *Corollae* lobi elongati, revoluti, dense hirsuti. *Antherae* lineari-oblongae. *Discus* hypogynus obtuse 5 lobatus, ovario duplo brevius. *Stylus* brevis. *Stigma* obtusum. *Drupa* crustacea, striata, calycem subaequans, stylo coronata, 4-5 locularis.

37. **Leucopogon cucullatus** R.Br. ramulis vix puberulis, foliis ovatis obtusis muticis cucullatis imbricatis sessilibus subtus lineatis margine nudis, spicis solitariis aggregatisve, bracteis subtendentibus foliaceis, ovariiis 5 locularibus. — R.Br. l. c.

In littore arenoso inter frutices Point Possession (sinus regis Georgii III.) d. 16. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 377.

„Frutex pedalis“ ut videtur prostratus, basi lignosus, ramis adscendentibus gracilibus plerumque nudis, ramulis glabriusculis foliis imbricatis dense tectis. *Folia* 3 lin. longa, explanata 2 lin. lata, basi vaginantia, ovata apice obtuso subincurvo, utrinque glaberrima, subtus striatula, margine integerrima. *Spicae* in speciminib. Preissianis semper solitariae 4-12-florae, foliaceae. *Bractaeae* subtendentes (i. e. folia suprema) basi non vaginantes, calyces aequantes. *Bracteolae* calycesque membranacei, saepius subcolorati. *Bracteolae* calyci dimidio aequales, carinatae, obtusiusculae. *Sepala* ovato-lanceolata, obtusiuscula ut bracteolae ciliolata. *Corollae* tubus calyce subbrevior, limbi lobis elongatis, revolutis, supra dense barbatis. *Filamenta* brevissima. *Antherae* supra medium affixae, lineares. *Cyathus* hypogynus obtuse 5-lobus. *Ovarium* conicum subangulatum, 5 loculare. *Stylus* brevis, glaber, stigmatibus sublobato.

§. 5. AXILLIFLORI.

38. **Leucopogon secundiflorus** Sond. ramulis tenuissimè puberulis, foliis erectis subadpressis linearibus cuspidato-mucronatis glabris margine revolutò denticulato-scabripedunculis 1-2 floris recurvis, corollae tubo calycem duplo superante, stylo subexserto.

L. pendulus Benth.! in Endl. Enumerat. plant. Hügel. pag. 77. non R.Br.

Ad sinum regis Georgii leg. cl. Preiss. (Klug George's Sound, Hügel! New-South-Wales, Fraser!)

37. In circulo per Evonymum Bag.
Ab. M. 120.

x L. hirsutissimus Juss. Mill.

foliis brevissimis hirtis; foliis
 ovalis, apice attenuatis cuspi-
 datis, margine recurvis supra
 nitebilibus, subtus limatis opa-
 cis; pedunculis axillaribus bre-
 vissimis paucifloris;

Similitudo florum calyc. haud
 excludit. & figende genus facit
 non dubium. Utrumque fragmentum

foliis brev. ^{hirsutis} pedunculis ^{axillaribus} globosis, racemulis
 subterminalibus foliis, fol. plus minusve
 palatilibus apice recurvis paull. recurva.
 pedic. 3" long 2" lata.

L. astrolomoides Juss. Mill. ^{var. hirsuta}

Sp. 10. Hinc proxima vel varietas vel
 novus species distincta: calycis foliis
 hirsutis, racemulis glabris, peduncu-
 lis ad 4 floris, brevibus corollae
 (tamen foliis in planta juniori)
 nitis & fragrantia pliglo piloso.

In tractu littorali Inconitum
 Juss. hinc ind. frequent. fructus 2-3'.

Hinc propositi valoris hirtus &
 nomen adpono propter ex affinitate

x Astrolomatidis: L. astrolomoides Juss.
 Flores egrigie odorati. Drupa sicca
 angusta elliptica utroque ac sine
 attenuata nitens fere striata
 3-4" longa croceas lineas decas orassa.
 2-3 lobulata. Sem pulva.

In arenosis in pl. halimaturorum
 nec non collibus siccis inter affinis
 fl. Murray & opp. Villanva
 aestate!

Frutex spithamaeus, erectus. *Rami* a basi orti, erecti, ramuli digitum circiter longi, lente visi tenuissime puberuli. *Folia* in parte caulis inferiore sparsa, alterna, adpressa, in ramis densiora, subimbricata et subadpressa, linearia, 4 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, margine revoluta, mucrone subpungenti cuspidata, subtus striata. *Pedunculi* 1-2-flori, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longi, recurvi, squamulis nonnullis obsiti. *Bractee* 2 obtusae apiculatae. *Calycis* foliola acutiuscula, 1 lin. longa, glabra margine ciliolata. *Corolla* 2 lin. longa, tubus calyce duplo longior, limbi lobis brevibus demum revolutis, dense barbatis. *Stamina* inclusa. *Stylus* corolla longior, glaber, stigmatibus obtusis.

39. **Leucopogon oxycedrus** Sond. ramulis tenuissime puberulis, foliis patentibus vel reflexis lineari-lanceolatis mucrone pungenti terminatis glabris supra convexis subtus concaviusculis lineatis margine denticulato-scabris, pedunculis 1-2-floris recurvis, corollae tubo calycem duplo superante.

In Novae Holl. ora meridionali-occidentali leg. cl. Preiss. (Herb. Preiss. sine No.)

Frutex valde rigidus, ramis patentibus et divaricatis. *Folia* sessilia, utrinque glabra, 6-8 lin. longa, lineam lata, nunc erecto-patentia, nunc reflexa, marginibus subrecurvis denticulatis, subtus subpallidiora, striatula. *Pedunculi* semper reflexi, brevissimi, pubescentes, 1 vel biflori. *Bractee* obtusae, apiculatae, glabrae, margine ciliolatae, calyce triplo breviores. *Sepala* lanceolata, glaberrima, margine ciliolata. *Corolla* 3 lin. longa, limbi lobis albo hirsutis, pilis nodulosis. *Filamenta* glabra, antheris inclusis, oblongo-linearibus, minimis, infra apicem affixa. *Discus* hypogynus acute 5-lobus. *Stylus* glaber, longitudine corollae, stigmatibus obtusis. *Ovarium* ovoideum, glabrum, disci lobis subtriplo longius.

40. **Leucopogon conostephioides** DC. ramulis puberulis, foliis lineari-sublanceolatis acuminato-pungentibus convolutis glabris subtus striatulis supra laevibus, margine scabris, floribus axillaribus geminis subsessilibus patulis, corolla tubo calycem aequante. — DC. l. c. pag. 753!

In arenosis inter frutices supra urbiculam Perth, d. 26. April 1839. Herb. Preiss. No. 405. (Drummond n. 479!)

Fruticulus pedalis, rigidus, ramosissimus. *Folia* brevissime petiolata, 5-6 lin. longa, lineam lata, lanceolata sensim in mucronem pungentem attenuata, supra concaviuscula, nitidula, subtus convexiuscula, pallidiora, striata, striis lateralibus divergentibus. *Pedunculi* brevissimi patuli vel reflexi, 2 rarius 1-flori. „*Flores albi*“ in sicco subrosei. *Bractee* obtusae apiculatae, glabrae, ciliolatae. *Calycis* foliola glaberrima, acuminata, bracteis 3-plo longiora. *Corollae* tubus intus hirsutus, lobi acuminati, revoluti, barbati, barbae pilis nodulosi. *Filamenta* antheris linearibus semiexsertis medio affixa. *Discus* hypogynus acute 5-lobatus. *Stylus* longitudine corollae, glaber, stigmatibus subcapitato. *Drupa* crustacea, parvula, ovalis, striata, 3-locularis, abortu saepe 1 vel 2-locularis.

A praecedente facile distinguitur foliis supra concaviusculis acuminatissimis et corollae tubo brevioribus).

*) **Leucopogon similis** Sond. ramulis glabris, foliis sessilibus patulis lineari-lanceolatis supra concaviusculis laevibus, subtus planis striatis cuspidato-mucronatis margine subdenticulatis, pedunculis 1-2-floris recurvis, corollae tubo calycem subsuperante, stylo exserto. Habitat in Australasia. (H. mus. Paris. No. 83.) Vidi in herb. Caes. Vindob. *L. conostephioidi* affinis, differt: foliis sessilibus patulis cuspidatis non sensim attenuatis, margine vix denticulatis, planiusculis et subbrevioribus (4 lin. long.) florum pe-

41. **Leucopogon flavescens** Sond. ramulis puberulis, foliis glabris erectis lineari-oblongis basi attenuatis apice obtusiusculo callosis planis margine scabris, pedunculis erectis 1-2-floris, calycibus margine ciliatis tubum corollae aequantibus, disco hypogyno acuto, ovario lineari-clavato.

In confragosis prope Two-peopled Bay, Plantagenet, d. 24. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 379.

„Frntex 4-pedalis“ ramis erectis gracilibus, foliis imbricatis dense obslis. *Folia* pallide flavescentia, 4-5 lin. longa, apice latiore lineam lata, in petiolum brevem attenuata, supra laevia, subtus nervosa, nervis lateralibus divergentibus, mucrone brevissimo calloso terminata. *Pedunculus* pubescens, erectus, 1, 2, rarius 3-florus, basi 2-bracteolatus. *Bractee* calyci subadpressae, acutae, glabrae, margine ciliatae. *Calycis* foliola lanceolata, lineam fere longa, bracteas duplo superantia, basi saepe pilosiuscula, apicem versus glabra et margine lanato-ciliata. *Corollae* tubus calyce parum longior, intus prope basin glaber, limbi laciniis lanceolato-linearibus tubum duplo superantibus, supra albo-barbatis, barbae pilis nodulosis vel tuberculatis. *Filamenta* brevissima alte adnata, antheris oblongis supra medium affixa. *Discus* hypogynus 5-partitus, foliolis lanceolatis ovarium dimidium aequantibus. *Ovarium* lineari-clavatum, striatum, glabrum. *Stylus* longitudine tubi corollae, stigmate capitato.

42. **Leucopogon corynocarpus** Sond. ramulis fere glabris, foliis glabris oblongo-lanceolatis acutiusculis muticis supra concaviusculis laevibus, subtus convexis striatis margine subintegerrimis, pedunculis erectis subbifloris, calycibus margine nudis corollae tubum subsuperantibus, disco hypogyno obtuso, ovario obovato.

In Novae Hollandiae ora merid. occid. prope promontorium Cape Riche, Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 379 (ex parte.)

Frntex ut videtur pluripedalis. *Folia* petiolulata, 4 lin. longa, lineam lata, subtus convexiuscula, nervis tribus validioribus parallelis et pluribus lateralibus divergentibus instructa, crassiuscula, supra laevissima, subtus pallidiora. *Pedunculi* erecti, 1-3-flori, lineam circ. longi, basi bracteolati. *Bractee* obtusae, extus glabrae calyce 3-plo breviores. *Calycis* foliola lanceolata, glabra, $1\frac{1}{4}$ lin. circ. longa, margine nuda, rarissime apice vix ciliolata. *Corollae* tubus calyce subbrevior, limbi laciniis lanceolato-linearibus tubo longioribus, supra albo-barbatis, pilis brevibus nodulosis. *Filamenta* alte adnata antheris oblongo-linearibus sub apice adfixa. *Discus* hypogynus 5-partitus, foliolis truncato-obtusis. *Ovarium* obovatum, glabrum. *Stylus* glaber antheris aequilongus, stigmate capitellato. *Drupa* pedicellata, erecta, crustacea, clavata, ventricosa apice mammillata, brunnea, nitida, 2 lin. longa, 1-locularis, semine nigro.

A priore cui simillimus est differt: foliis crassioribus magis oblongis et subtus concavis, margine plerumque integerrimis et praesertim disci foliolis obtusis ovarioque obovato.

43. **Leucopogon planifolius** Sond. ramulis tenuissime puberulis, foliis petiolatis erecto-patulis lanceolatis vel lineari-lanceolatis acutis calloso-mucronatis planis margine

dunculo longiore recurvo et antheris duplo brevioribus (lineari-oblongis). *Flores* sunt parum majores, corollae intus hirsutae. *Stylus* glaber stigmate obtuso. *Ovarium* glabrum disco hypogyno acuto lobato longius.

Leucopogon Stuartii Gardn.

Similitudine insignis et
L. appresso R. Br. forte pro-
ximus, sed hoc nobis non
nisi e' brevisissimis diagnosibus
notus!

et v. South Esk river Tarma-
niae invenit H. C. Stuart
Sept 20. 1849 floriferum. "Rad.
decurrens" hb. N. 586.

natos, demum 5-lobum, lobis apice latioribus, patentibus. *Drupa* exsueca, obovata, 5-sulcata, 1-locularis.

β. oblongatus foliis obovato-oblongis subacuminatis; caetera ut in α.

Crescit ad fluvium Canning. Herb. Preiss. No. 434 (ad sinum regis Georgii herb. Kunth!)

46. **Leucopogon ovalifolius** Sond. ramulis glabris, foliis petiolulatis reflexis glabris ovalibus obovatisve mucrone brevi cuspidatis, supra convexiusculis laevibus, subtus concaviusculis striatis, margine serrulatis scabris, pedunculis 2-floris recurvis, disco hypogyno obtuso, stylo longe exserto.

In planitie arenosa Quangen, Victoria, d. 20. Mart. 1840. Herb. Preiss. No. 417.

„Frutex rigidus 1-2-pedalis“ radice perpendiculari, longa, subramosa, nigricante. *Caulis* pennae corvinae crassitie, basi subsimplex, apice ramosissimus, ramulis tenuibus, gracilibus, glabris. *Folia* omnia reflexa, coriacea, 2 lin. longa, $1\frac{1}{2}$ lin. lata, supra nitidula subtus pallidiora striata, striis lateralibus divergentibus, petiolo brevi insidentia, apice mucrone brevi subpungenti terminata, margine serrulata. *Pedunculi* plerumque 2-flori $1-1\frac{1}{2}$ lin. longi, glabri, basi bracteolis minutis obsessi, demum recurvati. *Bracteae* obtusae, calyce plus duplo breviores. *Calycis* foliola lineam longa, obtusiuscula, apiculata, margine ciliolata. *Corollae* tubus calyce longior, limbi lobis revolutis, pilis subnodulosis barbatis. *Filamentae* alte adnatae. *Antherae* lineares faucem superantes, subexsertae. *Disci* hypogyni foliola obtusiuscula. *Ovarium* glabrum. *Stylus* glaber, exsertus, $2\frac{1}{2}$ lin. longus, stigmatibus obtusis.

Habitu prope accedit ad *L. rotundifolium*, sed foliis concavo-convexis, pedunculis recurvis et stylo longe exserto satis differt.

47. **Leucopogon pungens** Sond. ramulis pubescentibus, foliis linearibus sublanceolatisve, mucrone longo pungenti terminatis glabris, margine recurvo serrulatis scabris, pedunculis erectis axillaribus 2-4-floris, bracteis aristatis, drupa subbaccata maxima.

In locis arenosis Australiae occidentalis, d. 21. Mart. 1839. Herb. Preiss. No. 366. In solo calcareo colliculi prope oppidulum Freemantle, d. 17. Dec. 1839. No. 373 et ad sinum regis Georgii. (Swan-River: Drummond!)

„Frutex 2-4-pedalis“ ramosissimus, dense foliosus. *Folia* sessilia, erecta plerumque 9-11 lin. longa, lineam lata, (in spec. ad sinum reg. Georgii lectis longissima, $1\frac{1}{2}$ pollicaria, 2 lin. lata.) linearia vel sublanceolata, mucrone rigido pungenti terminata, utrinque glabra, supra impressae 3-nervia, subtus vix pallidiora nervosa, nervis tribus magis prominulis. *Pedunculi* breves, pubescentes, bracteolati, bracteolis acuminatis, plerumque 2-rarius 3-5-flori. *Bracteae* plerumque 2, rarius 4, exteriores 2 minores, interiores calycem dimidium aequantes, dorso carinatae longe cuspidatae vel aristatae, margine ciliolatae. *Calycis* foliola lanceolata, acuminata, margine brevissime ciliata, corollae tubum aequantia. *Laciniae corollae* revolutae, barbatae. *Antherae* oblongo-lineares. *Discus* hypogynus lobis acutiusculis, ovario brevioribus. *Stylus* filiformis, glaber, antheris circ. aequalis, stigmatibus capitato. *Drupa* baccata, (3 lin. longa) coerulescens, ovalis, styli basi mucronata, 5-locularis.

Obs. Flores quidem numerosiores qui in singulis exemplaribus invenimur nec non fructus baccati, hanc speciem potius ad sect.: *brachystachyum* quam ad praesentem relegare videntur, sed in centenis fere exemplaribus, quae in herb. Preissiano examinare mihi contigit, pedunculos semper

Monotoca R. Br.

M. limata R. Br.

Alph. Murray, Tarn. hb. St. II n.
294. Tarn. hb. 1849. fr. 6-8'.

M. campetrisfolia R. Br.

Specimen manum. In montibus
Tarnanniae (non regionibus tro-
picis St. I ut in editione prostrata
ex ipse dictum) 4000' altis. hb.
St. I n. 31.

Viximiliter ab hac non differt:

Monotoca nyathodes Ferd. Mee.

~~St. I prostratum prostratum, 6" alt.~~
~~fruticulosus, Tarn. 1849. Corall.~~
hb. St. I. 625. fin. num. 8 ad loc.
West head litoris boreali occidentalis
Tarnanniae, hb. M. 868. (frutic.)
1' alt. (an prostratum)

2-floros (rarius 1-3-floros) vidi. Etiam habitus, hujus magis quam illius sectionis specierum est. Fructus baccati et bractee 4 hanc plantam *Astroloma* aequant, sed flores omnino *Leucopogonis* sunt *).

ACROTRICHE R.Br. DC. prodr. 7. pag. 756.

Endl. gen. n. 4275. Meisn. gen. pag. 248.

(156. 364.)

1. **Acrotriche subcordata DC.** ramulis minutissime subvelutinis, foliis petiolulatis ovatis basi subcordatis apice callosis muticis planis subtus striatulis, floribus ad axillas paucis subspicatis subsessilibus. — DC. l. c.

Acrotriche cordata et *A. ovalifolia* Br. prodr. *Acrotriche ovalifolia* Hook. bot. mag. t. 3171. *Styphelia cordata* Labill.! Nov. Holl. 1. pag. 46. tab. 63.

In arenosis prope oppidulum Freemantle et in insula Rotenest, d. 26. Dec. 1838. Herb. Preiss. No. 435.

*) **L. dasystylis** Soud. ramulis puberulis, foliis erectis subadpressis lanceolatis, mucrone pungenti cuspidatis planis, supra laevibus nitidulis, subtus pallidis striatis, pedunculis brevissimis 1-2-floris, corollae tubo calyce subduplo longiore, stylo piloso, stigmate lobato. In Nova Hollandia (Mus. paris. No. 81.) Spéc. vidi in herb. Caes. Vindob. Frutex rigidus, ramis erecto-patentibus. *Folia* petiolulata, erecta, superiora imbricata, lanceolata, sublinearia, mucronata, subtus striata striis lateralibus divergentibus. *Pedunculi* bracteolati. *Bractee* carinatae, obtusae. *Calycis* foliola glabra, acuta, 1 lin. longa, margine tenuissime ciliata, bracteis triplo longiora. *Corolla* 2½ lin. longa, limbi lobis erectis, parce barbatis. *Stamina* inclusa. *Discus* hypogynus obtuse lobatus. *Stylus* 2 lin. longus, pilosus. *Stigma* lobatum.

L. abnormis Soud. ramulis pubescenti-hirtellis, foliis erectis adpressis lanceolatis basi attenuatis apice mucrone subpungenti terminatis planiusculis supra laevibus subtus pallidioribus striatis margine scabris, pedunculis brevissimis subbifloris, drupa truncata 5-locularis. *Leucopogon acuminatus* Voyage de la Coquille tab. 53, vix R. Brown. Ille de Waighion, terre des Paponx (d'Urville et Lesson 1825) v. in herb. Kunth. Frutex gracilis, erectus. *Folia* 7-8 lin. longa, 1½ lin. lata, vix ab iis *L. appressi* distinguenda sed basi parum magis angustata. *Pedunculi* bracteolati, bracteolis bracteisque obtusissimis, mucronulatis, glabris. *Calycis* foliola ovata cuspidata, corollae tubum aequantia. *Discus* hypogynus 5-dentatus, obtusus. *Drupa* subbaccata, ovata, truncata, stylo rigido terminata calyce vix brevior, 5-locularis, sed abortu interdum 1-locularis. Differt a simillimis *L. appresso* et *esquamato* praepter drupam, ramulis hirtellis et forma calycis. Drupa in *L. esquamato* est lineari-oblonga, siccata laevis, crustacea plerumque bilocularis rarissime 1-3-locularis.

L. vaccinioides Soud. ramulis glabriusculis, foliis petiolatis imbricatis oblongis concavo-cymbaeformibus muticis margine pellucidis subtus lineatis, junioribus tenuissime ciliatis, pedunculis axillaribus 1-floris. *Epacris vaccinioides* Lhotzky pl. exs. In turfosis humidis inter sphagna vallis Napoleon leg. Dr. Lhotzky. (Vidi in herb. Lucaeano.) Prostratus ramosissimus semipedalis, radice repente. *Folia* dense imbricata, supra concava, laevia, subtus convexa et lineis albidis notata, apice mutica vel subcallosa, 2½-3 lin. longa, lineam lata. *Flores* solitarii, pedunculo brevi multiflorato. *Bractee* obtusae, ciliatae, superiores calyci adpressae. *Calycis* foliola obtusiuscula, striata, pallida, margine ciliolata apice barbata. *Corolla* infundibuliformis, tubus calyce triplo longior, limbi lobis dense barbatis, barbae pilis nodulosis. *Filamenta* brevia, antheris lineari-oblongis sub apice affixa. *Discus* hypogynus 5-lobatus, lobis emarginatis ovario glabro subpentagona brevioribus. *Stylus* stamina aequans, teres, glaber. *Stigma* capitatum.

Folia forma variant, utpote nunc ovalia nunc subcordata, in nonnullis ramis adultis folia superiora basi profunde cordata iconi Billardierii prorsus convenientia video. *Spicae* in plerisque speciminibus axillares, in nonnullis etiam terminales. „Bacca immatura sordide alba, matura violacea“).

NEEDHAMIA R.Br. Endl. gen. n. 4279.

Meisn. gen. pag. 248. (157.)

1. *Needhamia Pumilio* R.Br. l. c.

α. Brownii DC. caule basi simplici apice ramoso, foliis omnibus oppositis dorso obtusiuscule convexis.

In subarenosis rupestribusque inter frutices densos montis Clarence, Plantagenet, d. 31. Sept. 1840 et in arenosis aridis clivuli ad Princess Royal Harbour prope oppidulum Albany, d. 28. Sept. Herb. Preiss. No. 436 et 437. (Swan-River: Drummond 1839! et Capt. Mangles!)

Fruticulus 2-4-pollicaris. *Rami* inferiores subadscendentes, reliqui erecti, glabri; ramuli tenuissime puberuli. *Folia* omnia opposita, minuta, lineam longa, arcte adpressa, carinata, utrinque laevia, margine ciliolata. *Spica* terminalis 6-10-flora. *Folia* suprema flores fulcrantes reliquis parum majora concava margine evidentius ciliata. *Calycis* lobi angustissimi hyalini, nervo apice sanguineo percursi, margine longe ciliati. *Corollae* tubus cylindricus calyce longior, intus subpilosus, limbi lobis rotundatis, imberbibus. *Filamenta* brevissima tubo prope basin adnata, antheris oblongis. *Stylus* brevis. *Stigma* subcapitatum. *Drupa* minima, subglobosa, apice subvelutina, 2-sperma, rarius 1-sperma.

β. Cunninghamsi DC. caule a basi ramosissimo, ramis exterioribus adscendentibus, foliis inferioribus oppositis, superioribus alternis dorso acutius carinatis.

(New-South-Wales: Fraser!) (herb. Sbuttonworth.)

OLIGARRHENA R.Br. DC. prodr. 7. pag. 759.

Endl. gen. n. 4280. Meisn. gen. pag. 248. (157.)

1. *Oligarrhena micrantha* R.Br. l. c.

In arenosis districtus Ilay et ad promontorium Cape Riche, Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 2099.

γ. Acrotriche Manglesii Sond. ramulis pubescentibus, foliis petiolatis lanceolatis cuspidatis planis supra nitidulis subtus discoloribus nervosis, margine ciliato serratis, patulis, spiculis rameis. Swan-River Capt. James Mangles. Fruticulus verisimiliter diffusus. *Rami* glabri. *Ramuli* breves puberuli. *Folia* 3-4 lin. longa, e basi lineata sensim in mucronem rigidum attenuata, erecto-patula vel horizontaliter patentia, utrinque glabra, subtus nervis 4 debilibus et intermedio valido in mucronem excurrente, praedita, margine breve et rigide ciliata. *Spiculae* 6-10-florae, in axillis foliorum et semper in ramis adultis non in junioribus. *Calyx* glaber bibracteatus, bractaeae obtusae sepalis obtusiusculis apice vix ciliolatis lineam longis subtriplo breviores. *Corollae* tubus calyce longior, gracilis, extus glaber intus fauce barbata, limbi lobis stellato patentibus apice barba rara deflexa penicillatis. *Antherae* subexsertae. *Gynthus* hypogynus integer ovario alba-sericeo triplo brevior. *Stylus* brevis glaber. *Stigma* obtusum.

Ab. A. serrulata separare nolui *A.*
mangrovei Sonder. Spiculae initio axil-
lari prius p. foliis dimidatæ ramicae sunt.
Spiculae semper foliis eximie longiores
non breviores, aequales et. *A.* forte juxta
specimina presens a *D. fragilis*. *Fr.* de po-
tino parit. *Pl. Australis* Hollaudia a
Scheumera solum modo inducunt diffusi videtur.
R. Br. pr. 1 p. 349. Fl. m. 3. L. h. syst. veg. 4 p. 221

Acrotiche ramiflora R. Br.
comparsa p. marginata anteriorem!
Radix ramosa, apice lignosa, intras-
secta ramis eadem validis alique
respondentibus extus furcis intus
lignosis albidis fibrillisque
fibrillaribus albidis. — Mollis, tempi-
ris corollarum subo semi exp. *Fr.*
Floris periculis. *Fr.* calli montium Loffy-
ranges.

Decapora R. Br.

Thymalia R. Brown.

In montibus occidentaliibus 3-
Tarmannice *fr.* 1-2 / 4000' alt.
Jan. 20. 1849. *hb. R. # 289.*

St. B. pr. 1. p. 352. Rom. v. L. h. 4. p. XXX.

„Fruticulus vix pedalis“ radice bipollicari subfusca simplici vel subramosa. *Caulis* brevis glaber, circ. pollicaris, apice ramosus, ramis strictiuscule erectis saepe fastigiatis, tenuissime puberulis, nudis vel sparse foliatis, ramulis pubescentibus abbreviatis, rarius elongatis, foliis subimbricatis tectis. *Folia* minima (1 lin. longa) sparsa, arcte adpressa, lanceolata, supra canaliculata, subtus carinata 3-nervia, nervo medio valde prominente, lateralibus obsoletis, apice subincurva, utrinque glabra, margine tenuissime ciliata. *Spica* ramulos terminans nunc $\frac{1}{2}$ nunc 2-pollicaris. *Flores* iterum racemosim dispositi, in rachi 2-3-lineari pubescenti sessiles. *Bracteae* subtendentes persistentes, ovatae, sublanceolatae, margine ciliatae calyce subtriplo breviores horizontaliter patentes. *Bracteolae* 2 sublanceolatae, calyci adpressae et duplo breviores. *Calycis* foliola 4, lanceolata, subacuminata ut bracteae margine longe ciliata. *Corolla* minima, alba, subclavata, tubo calyce longior intus glaber, limbi lobis brevibus erectis vel subconniventibus imberbibus. *Filamenta* 2 glabra, inclusa, medio tubo adnata, corollae lobis alterna, antheris minimis oblongis. *Discus* hypogynus 4-partitus. *Ovarium* 2-loculare 2-ovulatum suborbiculare compressum, glabrum, sessile. *Stylus* brevissimus, apice bifidus, stigmatibus aequalibus. *Drupa* ovata, (semilinea subbrevior) crustacea, brunnea, nitidula, tenuissime striata monosperma.

Trib. II. EPACREAE Reichenb.

LYSINEMA R.Br. DC. prodr. 7. pag. 764.

Endl. gen. n. 4282. Meisn. gen. pag. 249.

(157. 364.)

1. **Lysinema pentapetalum R.Br.** corollis pentapetalis, unguibus longitudinaliter distinctis calyce longioribus extus glabris, filamentis antheras triplo superantibus. — R.Br. l. c. DC. l. c.

In depressis arenosis prope oppidulum Perth, d. 21. Maji 1839. Herb. Preiss. No. 441 (ex parte) et in planitie arenosa Quangen, Victoria, d. 20. Mart. 1840 (fruct.) Herb. Preiss. No. 442 (v. v. c.)

„Frutex 1-2½-pedalis.“ *Ramuli* tenuissime puberuli. *Folia* glabra, trigona, obtusiuscula, ramulorum minora, imbricata. *Bracteae* circ. 10, obtusiusculae. *Calycis* foliola lineari-obtusiuscula ut bracteae margine ciliatolanceolata. *Corollae* tubus 5-6 lin. longus, extus glaber, intus pubescens, limbi lobis ovatis, reflexis. *Filamenta* pilosa tubum aequantia, antheris triplo longiora. *Squamulae* hypogynae obtusae, subdentatae. *Stylus* pilosus, stigmatibus 5-lobulato. *Capsula* glabra, cylindracea calyce brevior.

2. **Lysinema elegans Sond.** corollis pentapetalis, unguibus longitudinaliter distinctis calyce longioribus extus glabris, antheris elongatis subexsertis longitudine filamentorum.

In colliculis arenosis silvae ad flumen Canning, d. 2. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 439. (Swan-River: Drummond! et Capt. Mangles!)

Frutex pedalis et ultra, radice subsimplici, perpendiculari, fusca, pennae gallinaeae crassitie. *Rami* erecti, teretes, striati, glabri, ramulis tenuissime pubescentibus. *Folia* inferiora imbricata, superiora remotiuscula, opposita vel subalterna, omnia arcte adpressa, lanceolata vel linearia, acuta vel obtusiuscula, glabra, supra canaliculata, subtus acute carinata, margine brevissime ciliata, 1-1½ lin. longa. *Flores* terminales spicatae, spica mox 8-12-

flora mox elongata multiflora. *Calyces* fusco-scariosi, in axillis foliorum sessiles, bracteis circ. 15 lanceolatis et linearibus fuscis concoloribus margine ciliato-pilosis cincti. *Calyx* foliola linearia, acuta, margine ciliato-pilosa, 5 lin. longa, tubo tereti demum breviora. *Corolla* alba. Lobi demum reflexi lineari-oblongi acutiusculi ungue 3-plo breviores. *Filamenta* pilosa. *Antherae* glabrae, supra medium peltatae, elongato lineares, unguibus longiores et subexsertae. *Squamulae* hypogynae, lineares, apice bifidae, scarbiusculae ovarium angulatum apice albo-velutinum superantes. *Stylus* pilosus, exsertus, in stigma quinquelobum sensim incrassatus.

3. ***Lysinema curvatum* Lindl.** corollis pentapetalis, unguibus apice cohaerentibus subcurvatis calyce longioribus extus glabris pubescentibusve, filamentis antheras longitudine 3-plo superantibus. — Lindl. Swan-River bot. pag. XXV!

In depressis arenosis prope oppidulum Perth, d. 21. Maji 1839. Herb. Preiss. No. 441 (ex parte) et in planitie arenosa Quangen, Victoria, d. 20. Mart. 1840. No. 442 ex parte. (Drummond n. 494!)

Frutex 2-pedalis, erectus. *Rami* steriles plerumque breves, floriferi longi virgati. *Folia* nunc longiora nunc breviora, ovata, acuta vel lanceolata, apice leviter incurvo, subtus carinata, margine brevissime ciliata, rarius glabra, ramulorum sterilium saepius trigona. *Spica* 1-4-pollicaris. *Flores* in axillis foliorum solitarii, rarius 3-4 iterum spicati. *Bractee* 20-25, lineari-lanceolatae margine lanatae, acutae vel obtusiusculae. *Corollae* albae tubus calycem superans, 8 lin. longus subcurvatus, rarissime inter flores serotinos 1 vel pauci recti inveniuntur — intus tomentosus, extus glaber vel basi pubescens, unguibus summo apice cohaerentibus, limbi lobis lineari-oblongis, acutiusculis, reflexis. *Filamenta* pilis brevibus adpressis velutina. *Antherae* supra medium peltatae, glabrae. *Squamulae* hypogynae ovario albo-velutino duplo breviores, apice emarginatae vel eroso denticulatae. *Stylus* pilosus sensim in stigma clavatum attenuatus. *Capsula* angulata, pubescens, calyce brevior. *Semina* ovata, punctata, glabra.

4. ***Lysinema ciliatum* R.Br.** corollis pentapetalis, unguibus apice cohaerentibus longitudine calycis extus glabris, limbi lobis reflexis tubo 4-plo brevioribus, filamentis anthera duplo longioribus, foliis lanceolatis. — R.Br. l. c.

In depressis arenosis prope oppidulum Perth, d. 21. Maji 1839. Herb. Preiss. No. 441 (ex parte) et in virgultis inter saxa calcarea prope oppidulum Freemantle, d. 18. Dec. 1838. (Swan-River; Drummond!)

Radix horizontalis, crassa, multicaulis. *Caules* 1-1½-pedales, graciles, stricti, ramulis puberulis. *Folia* ovata, acuminata, erecta, basi adpressa, inferiora sen caulina 3-4 lin. longa, lineam lata, sparsa, suprema et ramulorum sterilium breviora imbricata, omnia glabra, supra laevia, subtus carinata, striata, petiolulata, margine prope basin breve ciliata. *Flores* albi, spicati, spica nunc densa ovata, nunc laxa elongata: floribus in axillis foliorum sessilibus. *Bractee* 8-10, fusco-scariosae margine ciliato-pilosae, inferiores minores ovatae acutae, sequentes acuminatae, superiores lanceolatae. *Corollae* tubus subpentagonus, circ. 5 lin. longus, intus tomentosus, unguibus apice cohaerentes calycem aequantes, limbi lobis ovatis acutis vel obtusiusculis, reflexis, saepius superne transverse rugulosis. *Filamenta* pilosa. *Squamulae* hypogynae breves, obtusae, emarginatae vel denticulatae. *Stylus* pilosus, apice verruculosus, stigmate subclavato. *Capsula* calycem dimidium subaequans, adpresse pilosa.

Variat: unguibus extus glabris et subtomentosis; ad Varietatem posteriorem pertinet: *Lysinema virgatum* DC. l. c. et *Lysinema spicatum* Lindl. Swan-Riv. bot. pag. XXV.!

Epacris Lavanilles

E. pulchella (Fr. Br.) Lavanilles

B. Tasmanica J. D. Muller
floribus fasciatis (loco foliorum)
ramulos terminantibus, cor-
ollae lobis acutis. Si ram-
paras cum pl. Nov. Hall.,
forte alias diffinitiones repe-
ris.

In montibus altissimis Tasman-
iae, Jan. 20. 1849. pl. pauci-
palliaris interdum 1'.
hb. St. I. n. 13 & II n. 288.

E. cardiophylla J. D. Muller
In humidis v. fl. South-Est river
3-4' Nov. 10. 1848. hb. St. I. n. 48.

E. imbricata Labillardiere
Lofty-range, hb. St. I. n. 1000.
In locis florilibus montanis ^{ferum Encoumen Hay} vides
praecipue veta frutices distinctus
Barkni. Mart. incant 1848 — Ibid.
Apr. 1848. frut 1-3' floribus
corollaeis, incarnatis, lacteis va-
rius. — Lobethal Jan 30. 1848.
Kake's place. Sept. 8. 1848.
Eadem frutem redisse credo in
itinere ^{trans} fl. Murrumbidgee
montem Burr, in florilibus col-
libus passim. Specimen unicum a
St. ex inf. V. D. L. missum foliis longi-
oribus angustioribus, calycis laciniis
longius cruminatis paululum abhorret.
Alia specim ex Tasmania — hb. St. I. n. 66 et 699.
illa communia exate natis congruent
Inter Macleayfield et Villanyam

x *E. intermedia* Erdmüller

ramis uterinis, calicis ^{ut} peristibus
lanceolatis, attenuatis acutis mu-
cronulatis, floribus ^{mutis} subsessilibus
axillaribus spicatum dispositis
patulis corollis calycibus duplo
longioribus, lobis calycis acumi-
natis acutis, sessilibus

Antirrhinum E. imperforatum & *sericeoflorum*
indivium ^{supra} *flor.* Caulis ^{supra} *erecti*
pedalis *ultraque*. *Flor.* 3-4 ^{supra} *longa* 1^{ma}
latiora v. *angustiora*. Calyx pallidus
uniqui *fulgidus* vix 2 lineas longus
ovoides *altis*. *antherae* *linea* *exsertae*
 (2^{da} 4. *Mursey*, *Tus. maritima*. Jan. 10. 1879.
 Hb. B. n. 383., *Port. Coroll.* Hb. B. 938 *Port. Ep.*
impressar var. *E. Ant. hirsuta* *saep.* *Florum*
color *antherae* *E. impressar* *indivium*

C. ceratophora. Graham

Ed. H. Mearns. fruit 2¹. hb. N. II
n. 381. Novemb. Ramuli foliis
neculosis.

Euplyantha Gerd Müller

ramentis velutinis, foliis breviter
pedicellatis ovato longiusculis attri-
mentis mucronulatis, ^{fructibus} floribus
subtus pilis axillaribus spicam
infram formantibus denique fra-
gilitibus, corollis calycibus dupla
fere longioribus, calycis lobis
acuminatis.

*Diffusa rigida forte plurifida
pilis crispis et lanugine imbricata
pinnatis*

In Australia Felix (new colonia
Victoriae) Aug. 18. 1847. Feb. 7. 18

Epacris parviflora Forst. Mu.

In parte australi Patagoniae, pr.
Robert. Town. 26. Sept. 809

Præcedenti vaginata, ab hac aliq^{uo}
 diffinitibus, aut taliter obliquis, ^{interdum}
 aut basi latiorum brachiis atq^{ue}
 discriminaanda

E. mucronulata ! R. Br.
x *Guercis exserta* R. Br.

J. nupivula Junc. Mill. ^{caulis infus}
foliis squarrosa patensibus latioribus
crassius et brevius petiolatis acutis
breviter mucronatis calycis lobis brevioribusque
seioribus.

Rarissime inter rupes collinum
prope Oyster Bay, 1-2' frut. cratus
Nov. 1849, hb. L. T. 699.
Totus nil nisi *E. exsertae* videtur
varietas sed valde excellens!

In nonnullis exemplis tubus juxta basin tantum tomentosus est, in aliis paene ad apicem. Sed hujusmodi character ad speciem singularem statuendam certo non sufficit. Ungues in flore spec. anth. *L. spicati* quas Vir. ill. liberas esse dicit apice cohaerentes esse et in flore pl. Candolleanae quem Vir. ill. calycem superare dicit, revera non eminere edoctus sum.

5. **Lysinema ovatum** *Sond.* corollis pentapetalis, unguibus apice cohaerentibus longitudine calycis extus basi subpuberulis, limbi lobis ovato-oblongis tubo triplo longioribus, filamentis anthera 3-plo longioribus, foliis ovatis.

In glareosis promontorii Cape Riche, d. 20. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 443.

„Frutex bipedalis“ erectus, ramulis puberulis. *Folia* adpressa, ovata acutiuscula, supra laevia, subtus vix striata, subuninervia, carinata, utrinque glabra, basi margine brevissime ciliata, $1\frac{1}{2}$ -2 lin. longa, $\frac{3}{4}$ lin. lata, plerumque sparsa, ramulorum sterilium subimbricata. *Flores* in axillis foliorum superiorum sessiles, spicam subcapitatum vel ovatum efformantes. *Bractae* circ. 10, scariosae, pallide fuscae, lanceolatae, superiores magis acuminatae. *Calycis* foliola lineari-lanceolata ut bracteae margine ciliata. *Corollae* albae tubus subpentagonus, 4 lin. longus, extus infra medium subpuberulus, intus tomentosus, limbi lobis reflexis. *Filamenta* pilosa. *Squamulae* hypogynae breves, obtusae, subemarginatae. *Ovarium* albo-elutinum. *Stylus* pilosus, corolla subbrevior, in stigma subclavatum incrassatus.

6. **Lysinema lasianthum** *R.Br.* petalis inter se liberis, unguibus calycem superantibus extus lanatis limbo quadruplo quintuplove longioribus. — *R.Br.* l. c.

In solo turfoso plantitiei prope oppidulum Albany, Plantagenet, d. 5. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 440. (King George's Sound. Hügel!)

„Frutex $1\frac{1}{2}$ -pedalis“ gracilis. *Caulis* teres, erectus, plerumque a basi ramosus, ramis tenuibus virgatis glabris. *Folia* sparsa, petiolata, subadpressa vel subpatula, linearia vel lanceolato-linearia obtusa supra concava, subtus nervo prominente carinata et apice plerumque trigona, utrinque glabra, 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. longa. *Flores* pauci (3-5) spicati, in axillis foliorum superiorum sessiles, remoti, plerumque distichi, rarius unilaterales. *Bractae* circ. 15, scariosae, pallidae, obtusae, margine ciliato-pilosae, calyce angusto obtuso breviores. *Corollae* tubus subinflatus calycem superans extus dense et albotomentosus, basi glaber, 4-5 lin. longus, ungues liberi sed inargines ob tomentum densum non conspicui; concreti non sunt, nam pressione in petala 5 finduntur, limbi lobi glaberrimi, tubo 5-plo breviores. *Filamenta* pilosa, tubo adglutinata sed non adnata. *Antherae* lineares supra medium peltatae, filamentis triplo breviores. *Squamulae* hypogynae obtusae, subemarginatae, ovarium albo-velutinum aequantes. *Stylus* pilosus stigmatibus capitato. *Capsula* brevis, ovata, glabra.

Obs. Haud scio an hoc idem sit ac *Brownianum*. Quod in descriptione *Candolleana* *L. lasiantho* folia elliptico-oblonga et flores pollicares adtribuntur — qua de causa nostrum olim *L. gracile* nominaveram — hoc in pl. Preissian. non quadrat. Cum vero cl. Benthiam judicaverit, plantam Hügelianam, quae omnino cum nostra convenit, eandem cum pl. *Browniana* esse, melius mihi visum est, huic sententiae adstipulari, quam novam speciem temere proponere.

7. **Lysinema conspicuum** *R.Br.* corollis monopetalis, tubo 5-fido calycem superante, foliis lanceolato-subulatis adpressis. — *R.Br.* l. c! *DC.* l. c!

In arenosis juxta oppidulum Albany, Plantagenet, d. 7. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 444.

Frutex pedalis et ultra, ramulis glabriusculis. *Folia* 3 lin. longa, adpressa, apice subpatula, carinata, margine ciliata. *Flores* spicati in axillis sessiles, spica plerumque densa, 1-2-pollicaris, rarius elongata subpedalis et apice subramosa. *Bractae* apice patulae. *Calyces* acuminati basi ciliolati. *Corollae* tubus extus glaber, intus tomentosus, in sicco subroseus, 4 lin. longus, apice 5-fidus, limbi lobis albissimis, ovatis, subrugulosis, reflexis. *Filamenta* antheras lineares supra medium peltatas longitudine 3-plo superantia. *Stylus* subpilosus, apicem versus verruculosus, in stigma subclavatum incrassatus. *Capsula* cylindrica, calyce duplo brevior.

COSMELIA R.Br. DC. Prodr. 7. pag. 766.
Endl. gen. n. 4285. Meisn. gen. pag. 249. (157.)

1. *Cosmelia rubra* R.Br. DC. l. c.

In solo turfoso arenoso oppiduli Albany, Plantagenet, d. 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 429.

„Frutex 8-10-pedalis“. *Folia* nitida, margine basin versus brevissime ciliata, pollicem longa, 3-4 lin. lata, dorso laevia vel substriata. *Flores* 9-10 lin. longa. *Calyx* foliola lanceolato-linearis, margine vix ciliolata, circ. 8 lin. longa. *Stylus* filiformis, glaber, corollae limbum aequans. *Stigma* capitatum. *Capsula* matura Pisi majoris magnitudine. *Semina* parva oblonga.

ANDERSONIA R.Br. DC. Prodr. 7. pag. 766.
Endl. gen. n. 4286. Meisn. gen. pag. 249. (157.)

Sect. 1. **EUANDERSONIA.** Sepala lanceolata, filamenta inclusa,

a. *bibracteatae.*

1. *Andersonia sprengelioides* R.Br. caule erecto, ramis dense foliosis, foliis patulis subspiraliter tortis, acumine plano, filamentis medio piliferis basi dilatatis. R.Br. l. c. Bot. magaz. t. 1645. DC. l. c.

In rupestribus montium prope portum Princess Royal Harbour, d. 28. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 459. (v. v. c.)

Folia 3-4 lin. longa, 1½ lin. lata. *Stylus* glaber. *Stigma* subcapitatum.

2. *Andersonia Lehmanniana* Sond. caule erecto ramoso, foliis basi adpressis, lanceolato-acuminatis subspiraliter tortis apice subtriquetropatulo, filamentis apice dilatata hirsutis.

In solo limoso-arenoso inter frutices prope oppidulum Guildford, Perth, d. 2. Jul. 1839. Herb. Preiss. No. 457. (Drummond n. 496!)

„Frutex bipedalis“ habitu *A. gracilis*, caracteribus fere *A. sprengelioidis*. Differt a priore: ramis densius foliosis et foliis tortis: ab *A. sprengelioides* cui similior: foliis brevioribus et angustioribus magis adpressis, corollae lobis

H. Br. pr. 1. p. 553. Röm. & Lohs jst. 4. p. XLII

H. Br. pr. 1. p. 553. Röm. & Lohs jst. 4. p. XXX.

hirsutioribus, filamentis non basi sed apice dilatatis et stigmate exlimie capitato.

Folia 2 lin. longa, lineam lata. *Calyces* pulchre coerulescentes, corolla alba *).

3. **Andersonia gracilis** DC. caule erecto, foliis basi cucullatis apice subulatis vix adpressis, summis amplius vaginantibus. DC. l. c.

In locis calcareis ad radices jugi montium Darling's-range, d. 23. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 456. (Drummond!)

Pedalis et ultra. *Spicae* capitatae 3-10-florae. *Flores* majusculi. *Calyces* coerulescentes glabri. *Corollae* in sicco plerumque roseae, intus hirsutae. *Filamenta* glabra aequalia, non dilatata. *Stylus* glaber. *Stigma* subcapitatum.

4. **Andersonia patens** Sond. caule erecto a basi ramosissimo, foliis rectis horizontaliter patentibus cuspidatis margine sublaevibus apice triquetris, sepalis lineari-lanceolatis bracteis cuspidatas duplo superantibus.

In solo turfoso inter frutices densos planitie prope oppidulum Albany, Plantagenet, d. 8. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 451.

Fruticulus pedalis, ramis glaberrimis basi plerumque nudis, apice dense foliosis. *Folia* saepe disticha nitidula, patentia, recta, non spiralter torta, 2 lin. longa, 1-1½ lin. lata, acumine triquetro vix mucronulata, margine integerrima vel denticulis brevissimis scabriuscula. *Spicae* terminales capitatae. *Bractee* ovatae breve cuspidatae, ciliatae, subtendente latiore subbreviore glabro. *Calycis* foliola glabra, margine nuda, lineari-lanceolata corollam aequantia. *Corolla* in sicco rosea, extus glabra intus hirsuta, limbi lobis acuminatis barbatis, tubum subaequantibus. *Filamenta* hypogyna aequalia, glabra, antheris linearibus. *Ovarium* apice puberulum. *Stylus* corollam aequans puberulus, prope basin plerumque tortus. *Stigma* obtusum **).

5. **Andersonia involucrata** Sond. caule erecto ramoso, foliis sublanccolatis acuminatis squarroso-patulis vel subspiralter tortis, margine laevibus, acumine plano recurvo,

*) **Andersonia pubescens** Sond. caule erecto, ramis deuse foliatis, foliis pubescentibus erectis subadpressis, subspiralter tortis, acumine elongato triquetro, filamentis apice latiore pilosis. Swan-River: Drummond n. 495! (Vidi in herb. Shuttleworth.) Fruticulus circ. pedalis, subramosus, supra basin partitus, ramis erectis, ramulisque saepe aggregatis. *Folia* pube densa vestita, apice acuminatissima, 2 lin. longa, basi lineam lata. *Calycis* laciniae lineari-lanceolatae, margine ciliatae. *Corolla* alba, in sicco subrosea, intus pilosa. *Filamenta* calycem dimidium aequantia, apice sublatisiora, pilosa. *Antherae* lineari-oblongae breves. *Stylus* glaber, teres, stigmate capitellato. *Ovarium* glabrum apice puberulum.

) **Andersonia Fraseri Sond. caule erecto ramoso, foliis ovato-lanceolatis cuspidatis subsquarroso-patulis margine serratis scabris, acumine recto subulato, spica oblonga foliosa, sepalis ovato-acuminatis bracteis cuspidatas duplo superantibus. In New-South-Wales leg. Fraser! (herb. Shuttleworth.) *Folia* 2½-3 lin. longa, lineam lata, margine evidenter serrato-scabra. *Bractee* ovatae, cuspidatae, carinatae, ciliatae, calyce duplo breviores. *Calycis* foliola glabra imbricata, ovata, acuminata, margine pallidiora, apice vix ciliolata, 2 lin. longa, corollam aequantia. *Corollae* tubus extus glaber, intus pilosus, limbi lobis tubum aequantibus erectis, acuminatis, basi barbatis. *Filamenta* glabra. *Antherae* minimae oblongae. *Ovarium* apice puberulum. *Stylus* rectus glaber, longitudine tubi.

capitulis involueratis, sepalis lineari-lanceolatis bracteis acuminatas parum superantibus.

In arenosis planitie districtus Sussex, d. 22. Dec. 1839. Herb. Preiss. No. 463. (Vasse River: Mrs. Molloy!)

„Frutex pedalis“ gracilis, ramis erecto-patulis, foliosis. *Folia* nitida, squarrosa, apice recurvato, margine integerrima vel apice summo brevissime denticulata, 3 lin. longa, 1-1½ lin. lata. *Spica* terminalis ovoidea, subcapitata, basi foliis pluribus apice subreflexis involucreta. *Bractee* carinatae, acuminatae, dorso ciliatae, subtendenti aequali. *Sepala* lineari-lanceolata, pallida, glabra, margine nuda. *Corolla* in sicco rosea, calycem aequans, extus glabra, intus vix puberula, limbi lobis subbarbatis tubo subtriplo brevioribus. *Filamenta* hirsuta. *Antherae* lineares. *Stylus* glaber stigmatibus obtusis.

6. **Andersonia parvifolia** R.Br. caule erecto, foliis adpressis rectis acumine triquetro. R.Br. l. e. DC. l. e.

In regionibus interioribus Australiae austro-occidentalis, Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 453.

Fruticulus spithamaeus. *Folia* 1-1½ lin. longa. *Spica* pauciflora. *Bractee* mucronulatae calycibus pallide coerulescentibus 4-plo breviores. *Calyces* 2 lin. longi, laciniis margine nudis corollam aequantibus. *Filamenta* ut styli glabra. *Stigma* obtusum. *Ovarium* apice puberulum.

7. **Andersonia pauciflora** Sond. caule erecto ramosissimo, foliis adpressis, acumine triquetro arcuato.

In solo glareoso sterili districtus Grantbam, m. Febr. 1841. Herb. Preiss. No. 455.

Vix spithamaea. *Folia* minima basi vaginantia subauriculata, acumine triquetro erecto incurvo, lineam longa, basi senili lineam lata. *Spicae* pauciflorae, rarius flores in apice ramulorum solitarii. *Calycis* lacinae 2½ lin. longae, lineari-lanceolatae obtusiusculae, margine nuda bracteis carinatis 3-4-plo longiores. *Corolla* calycem aequans, intus subhirsuta, limbi lobis apice glabris. *Filamenta* glaberrima. *Stylus* glaber. *Stigma* obtusum.

A. parvifoliae similis, sed foliis triquetris patenti-incurvis distinctissima.

b. *multibracteatae*.

8. **Andersonia micrantha** R.Br. caule erecto ramosissimo; foliis basi lata subvaginantibus acuminatis acumine triquetro, floribus solitariis aut subaggregatis, stylis infra medium pubescentibus. — R.Br. l. e. DC. l. e.!

In solo arenoso inter frutices ad latus meridionali-occidentale montis Clarence, Plantagenet, d. 7. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 461.

„Frutex vix pedalis“ erectus a basi ramosissimus, glaber. *Folia* 1-1½ lin. longa, adpressa, in ramis inferioribus saepe erecto-patula, e basi lata in acumine triquetrum attenuata, acumine basin aequante vel superante, nitidula, margine denticulata. *Flores* ramulos terminantes solitarii, bracteis mucronulatis longiores. *Calyces* in sicco pallide rosei, 2 lin. longi, sepalis lineari-lanceolatis margine ciliatis, extus glabris. *Corollae* calycem aequantes intus subhirsutae, limbi lobis apice glabris. *Filamenta* glabra antheras lineares longitudine subtriplo superantes. *Styli* infra medium incrassati, puberuli. *Capsula* minima apice puberula.

9. **Andersonia brevifolia** Sond. caule erecto ramosissimo, foliis arete adpressis ovatis mucronato-cuspidatis

margine membranaceis, floribus solitariis aut subaggregatis, filamentis stylisque glabris.

In planitie arenosa haud longe a Halfwayhouse, York, d. 12. Sept. 1839. Herb. Preiss. No. 462.

„Frutex 1-3-pedalis,“ a basi ramosissimus, ramulis abbreviatis subaggregatis. *Folia* vix lineam longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, ramulorum juniorum per lentem visa subpubescentia, margine membranaceo brevissime ciliata. *Bracteae* arcte adpressae, ut *calyces* margine breve ciliatae. *Flores* albi, in sicco rosei. *Corolla* intus hirsuta $2\frac{1}{2}$ lin. longa, tubulosa, calycem aequans, limbi lobis basi hirsutissimis. *Filamenta* glabra antheris linearibus triplo longiora. *Stylus* corollam aequans, *stigmatibus* obtuso.

Habitu *A. micranthae*, differt tamen: foliis latioribus imbricatis margine membranaceis brevissime ciliatis et stylis glabris non incrassatis.

10. *Andersonia coerulea* R.Br. caule erecto, foliis modice patentibus, novellis calycibusque extus pubescentibus, filamentis stylisque hirsutis. — R.Br. l. c. DC. l. c.

In solo turfoso-arenoso circa oppidulum Albany, Plantagenet, d. 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 450. (New-South-Wales leg. Fraser! herb. Shuttleworth.)

Frutex pedalis et ultra, ramis erectiusculis. *Folia* canlina lanceolata, acuminata, 6-7 lin. longa, basi 2 lin. lata, subadpressa apice subspiraliter torta, glabra, subtus striata, margine scabriuscula. *Flores* in apice ramulorum solitarii, sed ramuli aggregati et hinc flores spicam ovatam referentes. *Calyces* lacinae coerulescentes, puberulae, lineari-lanceolatae, 4 lin. longae, margine ciliatae. *Corollae* tubus intus basi glaber, apice hirsutus, limbi lobi apice glabri, basi albo-hirsutissimi. *Filamenta* hirsuta. *Stylus* corollae longitudine pilis erectis hirsutus. *Stigma* subcapitatum. *Capsula* puberula.

11. *Andersonia prostrata* Sond. caule prostrato ramosissimo, foliis anguste lanceolatis squarroso-patulis vel subspiraliter tortis glabris, filamentis apice piliferis, stylis pubescentibus basi tortis.

In solo turfoso-arenoso ad Stirling's-terrace, Plantagenet, d. 21. Sept. 1840. Herb. Preiss. No. 458.

Fruticulus spithameus, ramis glabris adscendentibus dense foliosis. *Folia* concaviuscula, lanceolata, acuminata, glaberrima, nitidula, striata, patula, apice recurvata vel subtortilia, 3-4 lin. longa, $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata. *Flores* ramulos terminantes solitarii vel racemosi et laxo spicati. *Bracteae* exteriores squarroso-patentes, margine glabrae, interiores adpressae, ciliatae, calycem dimidium aequantes. *Calyces* in sicco pallidi, basi virescentes, glabri, margine ciliati, corollam superantes, 4-5 lin. longi. *Corollae* pallide roseae intus pubescentes, lobis hirsutissimis. *Stylus* prope basin semper subspiraliter tortus, pilosus. *Stigma* capitatum.

12. *Andersonia heterophylla* Sond. caule erecto ramoso, foliis ramorum steriliu erecto-patulis subulatis, florigerorum amplius vaginantibus ovatis acuminatis, filamentis glabris, stylis medio incrassatis scabriusculis.

In locis calcareis silvae ad radices jugi montium Darling's-range, d. 29. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 460.

„Frutex pedalis“ ramis erectis inferne nudis. *Folia* glaberrima, subnitida, basi margine submembranacea, ramorum steriliu 2-2 $\frac{1}{2}$ lin. longa, basi $\frac{1}{2}$ lin. lata, ramulorum florigerorum 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata. *Flores* terminales solitarii, vel subaggregati. *Bracteae* inferiores subpatentes, superiores plerumque adpressae. *Calyces* bracteis duplo superantes, glabri, in

sicco pallidi, margine nudl, 3 lin. longl. *Corolla* calycem aequans, lobis basi hirsutissimis. *Filamenta* glabra antheras lineares longitudine non superantia. *Stylus* medio vel paulum infra medium subincrassatus. *Stigma* subcapitatum.

13. *Andersonia variegata* Sond. caule erecto rigido subramoso, foliis adpressis acumine triquetro mucronulato, bracteis coloratis, filamentis apice stylisque pilosis.

In regionibus interioribus Australiae austro-occidentalis, Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 454.

Fruticulus 4-pollicaris nunc spithamaeus, ramis erectis, rigidulis, glabris. *Folia* imbricata, glaberrima, nitidula, basi cucullata, acumine triquetro incurvinsculo, adpressa et mucrone brevissimo terminata, 1-1½ lin. longa. *Flores* solitarii, rarius subspicati, ramulis nunc brevioribus nunc longioribus insidentes. *Bractee* arcte adpressae, lanceolatae, inferiores virides apice tantum coloratae, superiores intense violaceae, calyce subdimidio breviores. *Calycis* foliola lanceolata, margine non ciliata, pallide coerulescentia, 2½ lin. longa. *Corolla* in sicco rosea calyce superata, limbi lobis basi hirsutissimis. *Filamenta* basi subdilata, apice subhirsuta, antheris oblongis. *Stylus* corollam aequans. *Stigma* capitellatum.

β. subconcolor caule humiliore, foliis mucronulatis muticisve, floribus saepius spicatis, bracteis superioribus apice tantum coloratis.

In regionibus interioribus Australiae austro-occidentalis, Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 452.

Habitu valde differt ab *Andersonia micrantha*.

Sect. 2. ATHEROCEPHALA. — *Atherocephala* DC. Prodr. 7. pag. 755. Endl. gen. pag. 1411. Meisn. gen. (364.)

ANDERSONIA spec. Lindl. Swan-River bot. pag. XXV.

Sepala cuspidiformia, filamenta exserta.

14. *Andersonia aristata* Lindl. foliis adpressis acumine triquetro mucronulato, spica capitata, corollae laciniis revolutis apice imberbibus, genitalibus exsertis. Lindl. l. c

Atherocephala Drummondii DC. l. c.!

In arenosis planitiebus haud longe a praedio rustico Maddington ad fluvium Cygnorum, d. 1. Nov. 1839. Herb. Preiss. No. 449. (Drummond!)

„Frutex 1-2-pedalis“ erectus, ramosissimus. *Radix* perpendicularis, subsimplex, nigrofusca. *Caulis* brevis pennae gallinaeae crassitie vel crassior, cortice fusco-cinereo, subrimoso. *Rami* alterni, erecti, glabri, ramulis gracilibus teretibus longioribus vel brevioribus pubescentibus. *Folia* imbricata, glabra, basi subvaginantia lata, cuspidato-acuminata, acumine triquetro mucronulato, 1-1½ lin. longo, adpresso. *Flores* spicati, spica densa capitata vel ovata in apice ramulorum nunc terminalium nunc lateralium, plerumque solitaria, rarius 2-3 subaggregatae. *Folia* floralia reliquis conformia sed basi latiora et evidentius cuspidata. *Bracteolae* 2 foliaceae carinatae, cuspidatae, glabrae, bracteis sen foliis floralibus breviores. *Calycis* 5-phylli foliola albida, glabra, lanceolato-linearia, marginibus demum convolutis aristaeformia, rigida, 4½ lin. longa, basi parum latiora, bracteolis triplo longiora. *Corolla* albida vel (in sicco) subrosea, infundibuliformis, tubo extus glabro intus hirsuto calyce subbrevisiore, limbi laciniis linearibus revolutis, albo-hirsutissimis apice summo glabris. *Filamenta* libera, corolla longiora, glabra. *Antherae* lineares dorso infra medium filamentis affixae.

Sprengelia Sm.

x *S. incurvata* Smith

In caedibus obscuris in
crebris. communis Waj. frequent.

hb. St. n. 135. Inuliginosis

Tasm. frut. 3-4' Jan. 1849. hb. St.

n. 316. Phil. Nov. 78. hb. St. II n. 59. et

607

x *S. stolonifera* Br

In montibus altis (4000')

Tasmaniae. hb. St. Tasm.

n. 61. Jan. 20. 1849. hb. St. II n.

302. Aem. var. St. propinqua

Cunningham habeo, vix peritum

revera diaphana, nam anthraci

initio barbatae mox glabrescent

Cystanthus R. Br.
* *C. springelioides* R. Br. l. c.
In montibus occidentaliibus
3-4000' altis hb. St. # n. 291. Jan.
21. 1849. frut. 2'.

Richaea R. Br.
non *La Billaudiere*
* *R. dracophylla* R. Br.
In insula *Neermannia*
hb. St. Germ. n. 79. Admon-
tes 3,500' altis. (sub spha.
dracophyll. spec.) In montib.
occidentaliibus 34000' altis. 3-4'
floris pallide flavi (pinnatis auram-
buri) Jan. 21. 1849. hb. St. # n. 317.
(*dracophyllum* *Richii* hb. St.)

Squamulae 5 hypogynae, obtusae, ovario dimidio breviores, cum staminibus hypogynis alternantes. *Ovarium* subglobosum, apice puberulum, 5-loculare. *Stylus* filiformis, glaber, exsertus, $5\frac{1}{2}$ lin. longus. *Stigma* obtusum, vix capitellatum. *Capsula* minima subglobosa, 5-locularis, 5-valvis, placentis columnae centrali adnatis.

SPHENOTOMA Sweet. Endl. gen. n. 4293.
 Meisn. gen. pag. 249. (157.) *Dracophylli* sect.
Sphenotoma R.Br. *Sphenotoma* DC. Prodr. 7.
 pag. 770.

§. 1. *Stamina hypogyna.*

1. ***Sphenotoma dracophylloides*** Sond. caule erecto ramoso, ramis strictis, foliis omnibus rigidis adpressis imbricatis lanceolatis acuminatis glabris margine scabriusculis, supremis basi subciliatis, ramis floriferis spica ovata duplo longioribus, staminibus hypogynis.

In lapidoso inter frutices lateris meridionalis collis Konkoberup promontorii Cape Riche, d. 20. Nov. 1840. Herb. Preiss. No. 446.

„Frutex bipedalis“ strictus. *Rami* glabri, basi nudi annulati. *Folia* pollicaria rigida, arcte adpressa, elongato-lanceolata, parallele nervosa, basi latiore submembranacea, cucullata, semiamplexicaulia, glabra, margine denticulis brevissimis scabriuscula, superiora prope basin piloso-ciliata. *Rami* floriferi $1\frac{1}{2}$ -2-pollicares, foliis conformibus imbricatis dense obsiti. *Spica* pauciflora terminalis, e floribus 4-8 constans. *Bracteae* 2 carinatae, cuspidato-mucronatae circ. 2 lin. longae, glabrae, subtendente longiore et latiore calycem aequante. *Calycis* foliola lanceolata mucronata, 4 lin. longa, glabra, ut bracteae fusca, margine pallidiore. *Corolla* alba hypocrateriformis, tubus fauce subcoarctatus, calyce subbrevis, extus et intus glaber, limbi lobis patentibus rotundatis obtusissimis. *Filamenta* glabra, hypogyna, corollae adglutinata sed non adnata. *Squamulae* hypogynae acutiusculae, ovario breviores. *Stylus* brevis, stigmate obtuso. *Capsula* globosa, glabra, Pisi dimidii magnitudine, calyce duplo minor, stylo persistente coronata. *Semina* oblonga, flavescentia.

Planta memorabilis habitu *Dracophylli*, et quodammodo medium tenens inter hoc et *Sphenotoma*, sed propter corollam hypocrateriformem adnumeranda posteriori, ad quod sese habet ut *Dacryanthus* ad *Dracophyllum*.

§. 2. *Stamina corollae inserta.*

2. ***Sphenotoma capitatum*** Lindl. ramis floriferis spica subcapitata multoties longioribus, foliis caulinis ensiformi-lanceolatis erectiusculis, rameis adpressis. Lindl. in Bot. reg. t. 1515.

Dracophyllum capitatum Brown prodr. 556. Hook. Bot. mag. t. 3624 opt.!

In solo turfoso inter frutices prope oppidulum Albany, Plantagenet, d. 4. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 447. (King George's Sound, Hügel!)

Frutex nunc spithamaeus nunc $1\frac{1}{2}$ -pedalis. *Folia* margine ciliata vel glabra, scabriuscula, erecto-subpatentia, rarius adpressa, e basi latiore vaginante lanceolata acuminata subpungentia, pollicaria, basi $1-1\frac{1}{2}$ lin. lata, ramea adpressa amplius vaginantis cuspidato-acuminata. *Spica* subcapitata. *Bracteae* carinatae ut *calycis* foliola pubescentia margine subciliatae. *Corollae* tubus extus glaber, limbi lobis obtusissimis. *Filamenta* brevia, tubo adnata. *Stylus* brevis, glaber. *Stigma* obtusum.

3. **Sphenotoma gracile** Sweet. ramis floriferis spica ovata multoties longioribus, foliis caulinis subulato-lanceolatis patulis recurvisve, ramis adpressis. — Sweet. fl. Austr. t. 44.

Dracophyllum gracile Brown prodr. 556. Bot. mag. t. 2678.

In turfoso-arenosis elevatis circa oppidulum Albany, Plantagenet, d. 21. Dec. 1840. Herb. Preiss. No. 448. (King George's Sound. Hügel! A. Cunningham! Lewin's Land: Ferd. Bauer!)

Bipedalis et ultra. *Folia* in nonnullis specim. ciliata, in aliis glabra; inferiora erectiuscula superioribus saepe duplo triplove latiora, intermedia et superiora anguste lanceolata, acuminata, patula, magis minusve recurva. *Folia* ramea adpressa magis vaginantis, breviora, rarissime patula subrecurva. *Spica* ovata. *Bracteae* carinatae, ciliatae, calycis foliolis subinaequalibus glabris duplo breviores. *Corollae* tubus extus apice subpilosus, limbi lobis obtusissimis. *Filamenta* brevia infra medium tubum adnata. *Stylus* brevis, glaber, stigmatibus obtusis. *Capsula* calyce triplo superata, apice puberula.

4. **Sphenotoma squarrosus** Don. ramis floriferis vix longitudine spicae, foliis squarrosis ensiformi-lanceolatis. Don. gen. syst. 3. pag. 785.

Dracophyllum squarrosus Brown l. c.

In solo turfoso humido ad marginem lacus planitie prope oppidulum Albany, Plantagenet, d. 11. Oct. 1840. Herb. Preiss. No. 445.

„Frutex 8-10 pedalis.“ *Rami* subverticillati. *Folia* caulina speciminum sesquipedalium $1-1\frac{1}{2}$ poll. longa, basi 2-3 lin. lata, lanceolata acuminata, glabra, striata, squarroso-patula, suprema villis brevissimis subcanescentia, omnia basi vaginante ciliata. *Spicae* aggregatae, laterales ovatae, ramum floriferum aequantes vel sublongiores, rarius breviores, terminali elongata saepe bipollicari ramo florifero 2-3-plo longior. *Rachis* puberula. *Bracteae* carinatae, ciliatae, calycem dimidium aequantes, subtendentibus in spicis lateralibus parum longioribus, in spica terminali elongatis acuminatissimis. *Calycis* foliola pubescentia. *Corollae* albae tubus longitudine calycis, superna adpresse pilosus, intus vix hirsutus, limbi lobis obovatis obtusis. *Filamenta* brevissima, corollae tubo adnata. *Squamulae* hypogynae breves, obtusae. *Stylus* glaber, stigmatibus obtusis. *Capsula* subglobosa, apice puberula, calycem dimidium subaequans. *Semina* oblonga, flavescens.

KL
5819921
LEH
Copy 1