Digitized by the Internet Archive
in 2016

ARBORETUM SEGREZIANUM

ÉNUMÉRATION

DES

ARBRES ET ARBRISSEAUX

CULTIVÉS A SEGREZ

(SEINE-ET-OISE)

COMPRENANT

LEUR SYNONYMIE ET LEUR ORIGINE

AVEC L'INDICATION D'OUVRAGES DANS LESQUELS ILS SE TROUVENT FIGURÉS

PAR

ALPH. LAVALLÉE

DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE D'AGRICULTURE DE FRANCE,

SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE D'HORTICULTURE DE FRANCE,

MEMBRE DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES, ETC., ETC.

PARIS

LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

19, RUE HAUTFEUILLE, 19, PRÈS LE BOULEVARD SAINT-GERMAIN

LONDRES

BAILLIÈRE, TINDALL AND COX

MADRID

C. BAILLY-BAILLIÈRE

M D CCC LXXVII

ARBORETUM SEGREZIANUM

PARIS. — IMPRIMERIE DE E. DONNAUD, RUE CASSETTE, 9.

ARBORETUM SEGREZIANUM

ÉNUMÉRATION

DES

ARBRES ET ARBRISSEAUX

CULTIVÉS A SEGREZ

(SEINE-ET-OISE)

COMPRENANT

LEUR SYNONYMIE ET LEUR ORIGINE

AVEC L'INDICATION D'OUVRAGES DANS LESQUELS ILS SE TROUVENT FIGURÉS

PAR

ALPH. LAVALLÉE

DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE D'AGRICULTURE DE FRANCE,
SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE D'HORTICULTURE DE FRANCE,
MÈMBRE DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES, ETC., ETC.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

PARIS

LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

49, RUE HAUTEFEUILLE, 49, PRÈS LE BOULEVARD SAINT-GERMAIN

LONDRES

BAILLIÈRE, TINDALL AND COX

MADRID

C. BAILLY-BAILLIÈRE

M D CCC LXXVII

Q 480

F7

A 726

1877

PRÉFACE

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

Les collections dendrologiques dont je publie l'énumération sont établies à Segrez, dans le département de Seine-et-Oise, sur les territoires des communes de Saint-Sulpice-de-Favières et de Saint-Yon (1), qui faisaient partie de l'ancien Hurepoix; ces communes sont placées à une distance à peu près égale des villes de Dourdan, Etampes et Arpajon, entre la grande ligne du chemin de fer d'Orléans et celle de Tours, par Vendôme (2).

Le parc de Segrez est situé, ainsi que ses dépendances, sur la pente orientale de la vallée du Renard, petit affluent de l'Orge. Resserrée entre deux lignes de collines, cette vallée reçoit à son origine, du côté du sud-ouest, les sources de Villeconin et de Souzy, enfin celles de Segrez (3). Les eaux sont déjà assez abondantes, après quelques kilomètres de parcours, pour alimenter plusieurs moulins.

En face de Segrez, la vallée s'élargit; la colline de la rive gauche s'éloigne vers le couchant; de ce côté la vue s'étend sur des prairies et, au delà, sur des pentes cultivées,

(1) A 36 kilomètres de Paris. — Arrondissement de Rambouillet, canton de Dourdan nord.

(2) Longitude de Paris, 38°.
Latitude — — 48°.
Altitude 76 mètres.

(3) Elles produisent, à peu près, 800 litres d'eau à la minute.

tandis que les collines de la rive droite, après avoir formé le vallon pittoresque occupé par le village de Saint-Sulpice-de-Favières, dont l'église remonte au ^{xiii}^e siècle, offrent à la vue des pentes rapides et boisées.

En descendant la vallée vers le nord-est, les eaux du Renard vont grossir, vers Breuillet, la petite rivière de l'Orge, qui se jette dans la Seine à Athis, près de Paris.

La formation géologique des terrains explique l'abondance des sources de Segrez et des environs : le thalweg de la vallée, depuis Villeconin jusqu'à sa jonction dans la vallée de la Seine, appartient au terrain tertiaire du bassin de Paris ; mais les étages du *gypse* et du *calcaire grossier* n'y sont pas représentés ; on trouve celui de l'*argile plastique* en couche inclinée dans le sens de la vallée, et, au-dessus de cette couche, les dépôts des terrains tertiaires moyens de formation plus récente ; les grès de Fontainebleau et les meulières forment ces collines et ces encaissements de vallées si remarquables aux environs de Fontainebleau, d'Étampes, de Dourdan, et en se rapprochant de Paris, à Orsay et près de Versailles.

Les grès et les sables composent la colline boisée de Segrez ; au-dessus, les meulières forment le plateau qui précède la Beauce et qui s'étend, au sud, vers Étampes. Or, ces terrains sont perméables ; les eaux de pluie s'y infiltrent, et, retenues par la couche d'argile inférieure, elles se dégagent en sources abondantes dans les bas-fonds de la vallée où affleure cette couche, ainsi que sur des points même élevés, lorsque l'argile a pu être atteinte au moyen de tranchées et de galeries.

Par sa situation, Segrez est exposé à des vents violents et à des froids parfois intenses ; les gelées printanières,

très-fortes, comme dans toutes les vallées abritées et parcourues par des cours d'eau, y sont signalées presque chaque année. Par opposition les chaleurs estivales se font remarquer par leur ardeur.

Ces conditions climatiques, que des observations météorologiques (1) relevées avec soin permettent de préciser, offrent encore cette particularité que les pluies y sont relativement rares.

La flore ligneuse spontanée autour de Segrez est assez variée. J'ai constaté la présence du *Mespilus germanica*, de deux variétés du *Sorbus aucuparia*, du *Torminaria*, du *Quercus pubescens* Willd. et de deux formes de chênes bien caractérisées se rapprochant l'une du *Q. Tozza* Bosc. (chêne Brosse), l'autre du *Q. apennina* Lamk. Les *Genista pilosa* et *prostrata*, le *Rosa arvensis*, le *Ruscus aculeatus* se rencontrent dans les parties calcaires, tandis que le *Malus acida*, le *Viburnum Opulus*, les *Salix lanceolata* et *rubra*, le lauréole, etc., recherchent les terrains humides ou argileux. Le myrtille, le genêt à balais, la viorne, le bouleau, le châtaigner caractérisent les parties siliceuses. On y rencontre aussi les *Cornus mas* L. et *sanguinea* L., le *Rosa villosa* Wolf., l'*Erica vagans* L., l'*Ulmus tortuosa* Host., le buis, quelques rares pieds de *Pirus cordata* Desv. et d'alisier de Fontainebleau. Enfin l'arbre de Judée, le faux ébénier, l'érable plane, le Robinia, le pin du Lord y sont naturalisés sur certains points (2).

(1) L'Observatoire de Segrez fonctionne régulièrement depuis le 4^{er} juillet 1875. Les observations sont faites trois fois par jour, à 7 heures du matin, 2 heures et 7 heures du soir.

(2) J'ai constaté, dans nos environs, quelques plantes intéressantes pour la flore parisienne : *Scilla bifolia* L., *Paris quadrifolia* L., *Allium flavum* L., *Ophrys arachnites* Willd., et *monorchis* L., *Spiranthes au-*

Le parc mesure environ 31 hectares. Les collections d'arbres y sont disséminées suivant un ordre que j'indiquerai plus loin, et placées dans les conditions les mieux appropriées à chaque genre.

Les arbustes sont réunis dans deux Écolés : l'une, commencée en 1858 est d'environ 1 hectare ; l'autre, créée en 1874, occupe près de 3 hectares.

Les premiers arbres qui font aujourd'hui partie des collections de Segrez furent plantés en 1857, mais sans ordre ; car aucun but scientifique ne présida à ces premiers essais. De beaux individus, dont quelques-uns rares, existaient déjà dans le parc (1) et m'avaient permis de pressentir les excellentes conditions qui m'étaient offertes pour en augmenter le nombre. Dès 1858, encouragé par mon père, qui mit à ma disposition les terrains nécessaires pour ces collections, je résolus de réunir tous les végétaux ligneux cultivables à l'air libre aux environs de Paris, pour en former un *Arboretum*. Le nombre des individus s'éleva très-promptement à environ 3 000 ; mais les déterminations me firent plus tard comprendre combien ce chiffre était exagéré.

Je fus naturellement amené à reconnaître qu'il n'était pas possible de conserver un aussi grand nombre de végétaux

tumnalis Rich., *Alisma Damasonium* L., *Circæa lutetiana* L., *Anemone pulsatilla* L., *Crassula rubens* L., *Sedum hirsutum* All., *Epilobium palustre* L., *Primula grandiflora* Lamk., *Gentiana germanica* Willd., *Atropa belladonna* L., *Veronica peregrina* L., et *montana* L., *Linaria Pelis-eriana* Mill., *Orobanche concolor* Duby, *Lamium maculatum* L., *Galeobdolon luteum* Smith, *Sylibum marianum* Gœrtn., *Antennaria dioica* Gœrtn., *Trifolium rubens* L., et *subterraneum* L., *Tillæa muscosa* L. etc. Guettard, dans ses *Observations sur les plantes*, publiées à Paris en 1774, cite souvent Segrez, Saint-Sulpice et d'autres localités environnantes.

(1) Les tulipiers, cyprès chauve (*Taxodium distichum* Rich., et *ascendens* Brongt.), des noyers américains, les *Pinus pungens*, *Fraxinus pubescens*, etc.

vivants sans les classer : c'est ce qui me détermina, en 1860, à établir des Ecoles d'arbres en lignes, et non plus en massifs. Mais que d'essais et de tâtonnements furent nécessaires ! Les chênes et plusieurs genres de Conifères purent seuls être conservés à la place qui leur avait été assignée. Si j'entre ici dans ces détails, c'est afin d'épargner aux autres l'embarras dans lequel je me suis trouvé.

La collection des érables, plantée le long d'une allée trop couverte, dut être changée en 1864 et placée dans les conditions plus favorables qu'elle occupe aujourd'hui. Celle qui comprend les espèces arborescentes du groupe des Pomacées, faute d'un emplacement suffisant, fut également transportée ailleurs cette même année. En effet, au lieu de 22 espèces ou variétés, réunies en 1858, il fallait pouvoir en cultiver une centaine et y faire de nouvelles introductions. Les marronniers et les peupliers furent aussi remaniés en 1865. Enfin, en 1872, je me résignai à refaire la collection de frênes. Croyant agir sagement, je l'avais placée sur le bord de prairies irriguées, mais je ne tardai pas à voir que mes arbres souffraient d'un excès d'humidité.

Aujourd'hui toutes les collections d'arbres ont un emplacement bien approprié à leurs besoins, comme en témoignent la vigueur et la bonne santé des individus. Elles sont au nombre de 21, et renferment toutes les espèces et variétés d'une même famille, ou, tout au moins, d'un même grand genre, représentées chacune, en général, par plusieurs individus. Elles occupent les deux côtés d'une allée, et s'étendent sur une longueur d'environ 2 000 mètres.

L'école des arbustes établie primitivement fut bientôt beaucoup trop petite : les intercalations avaient rompu l'ordre méthodique, et le peu de place accordé à chaque

individu obligeait à lui faire subir une taille regrettable à tous égards et impuissant à maintenir certaines espèces trop vigoureuses.

Diverses autres considérations me déterminèrent enfin à créer une nouvelle Ecole, et à lui donner définitivement une contenance en rapport avec les besoins du présent et les nécessités possibles de l'avenir ; suffisante, en outre, pour renfermer les arbres de petite taille.

Ma nouvelle Ecole a été plantée dès le printemps de 1874. Placée à l'extrémité du parc, vers le village, elle forme un vaste triangle dont la base mesure 140 mètres. Elle est divisée en 12 grands carrés que séparent des allées de 3 mètres, et subdivisée en 660 plates-bandes, de 1^m 60, coupées par des sentiers ; leur longueur totale est d'environ cinq kilomètres. Cette vaste Ecole est encadrée par de larges bandes de 210 mètres de longueur, consacrées, au nord et à l'ouest, aux *Ericacées*, *Vacciniées*, *Hydrangéacées*, *Magnoliacées* et autres genres de plantes, dites de *terre de bruyère*, au midi elles renferment les variétés jardinières de Lilas, *Diervilla* (Weigela) ; tandis que les nombreux althéa et pivoines en arbres occupent le côté oriental, associés à des mûriers ainsi qu'à des bouleaux.

Les collections d'arbres et d'arbustes, réunies à Segrez, peuvent être considérées aujourd'hui comme complètes, c'est-à-dire que mes dernières recherches dans les établissements scientifiques et horticoles de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, et même des Etats-Unis, me conduisent à penser que je possède, à peu près, toutes les espèces, indigènes ou exotiques, qui peuvent vivre en plein air sous notre climat. Mais que de richesses encore à conquérir parmi les arbres de la Chine, du Thibet, de l'Himalaya, de la région

du fleuve Amour, du Japon, pour ne parler que des végétaux de l'ancien continent !

Les espèces et variétés que je suis parvenu à réunir sont au nombre de 4 267 (1) ; ce chiffre ne comprend pas les variétés jardinières, purement ornementales (2), et dont la nomenclature, pour certaines espèces, est devenue impossible, telles sont celles des roses, des pivoines, des clématites, etc., et surtout les variétés fruitières.

Mais pour cultiver un aussi grand nombre d'espèces, les conserver, les faire fleurir et fructifier, enfin, les déterminer avec exactitude, que de peines, que de temps !

Il me fallut d'abord rassembler tout arbre ou arbuste qui portait un nom quelconque, et tout ce qui m'était inconnu ; recevoir maintes fois la même plante sous des noms différents !... Je dus entretenir une correspondance avec les pépiniéristes de toute l'Europe, me créer des relations avec les voyageurs, visiter les parcs et les jardins botaniques, être enfin à l'affût de toutes les introductions.

Mais les témoignages bienveillants et les excellentes relations que me procuraient ces études spéciales m'encourageaient à persévérer dans la lourde tâche que je m'étais bénévolement imposée.

Je suis heureux de pouvoir témoigner ici ma reconnaissance à M. Decaisne, professeur de culture au Muséum d'His-

(1) Les Monocotylédonées ne sont représentées que par 84 espèces ou variétés ; les Dicotylédonées en comprennent donc 4 081, dont 1 029 espèces et 994 variétés sont des polypétales, 418 espèces et 429 variétés des monopétales, enfin 609 espèces et 702 variétés des apétales.

Cent soixante arbres et arbustes, environ, restent indéterminés et n'ont été encore l'objet d'aucune étude.

(2) Le nombre de ces variétés, purement ornementales, s'élève à Segrez à plus d'un mille.

toire naturelle, qui a bien voulu se souvenir de l'*Arboretum* de Segrez en me procurant les espèces ligneuses introduites directement par le Muséum et qui ne se trouvaient pas dans le commerce, ou des graines d'espèces intéressantes d'une provenance authentique. Je dois aussi à M. Decaisne de nombreux renseignements et la détermination de certaines espèces litigieuses.

Ma tâche la plus ingrate fut la détermination de ce nombre considérable de végétaux, dont je devais tout d'abord obtenir la floraison et la fructification.

Après avoir récolté et séché de beaux échantillons, j'ai toujours dû chercher à oublier momentanément les noms sous lesquels les plantes avaient été reçues, seule manière de débrouiller leur nomenclature et de parvenir à connaître nettement nos richesses dendrologiques. Tout en rectifiant, au fur et à mesure des déterminations, la nomenclature de mes Ecoles, je reconnus combien il était nécessaire de conserver la provenance de chaque espèce et la date précise de son introduction à Segrez. Je fus dès lors conduit à dresser des catalogues méthodiques permettant de retrouver de suite ces indications relatives à chaque individu, qui a ainsi une sorte d'état civil. J'ai en outre indiqué sur un plan (1) par un numéro correspondant à la fois au catalogue général, ainsi qu'à une fiche sur laquelle sont inscrits sa provenance, le nom sous lequel l'individu a été reçu, la date de sa réception, celle de sa première floraison ou de sa première fructification, etc., etc., enfin tous les renseignements qui peuvent contribuer à constituer son histoire.

(1) Chaque plan, établi à l'échelle d'un demi-centimètre par mètre, comprend toutes les espèces et variétés appartenant à une même famille, ou à un même grand genre.

Pour compléter cette organisation, il était nécessaire d'adopter un double mode d'étiquetage : chaque individu, à son arrivée, reçoit, en effet, une première étiquette matricule sur laquelle est inscrit le nom, fût-il absurde, sous lequel il a été envoyé, l'indication de sa provenance, la date de sa plantation, etc. ; puis, lorsque la détermination rigoureuse en est faite, on remplace l'étiquette primitive par une autre plus grande, de forme différente, qui, outre ces premiers renseignements, indique le nom spécifique et le pays d'où la plante est originaire.

Les difficultés contre lesquelles j'ai dû lutter pour entretenir ces collections vivantes, et y conserver l'ordre nécessaire, sont peut-être plus grandes que celles que j'avais à vaincre pour les créer. Sans une exactitude rigoureuse dans toutes les opérations, sans de continuels recensements, sans des précautions infinies pour que chaque espèce soit représentée par plusieurs individus, il eût été impossible de conserver l'ordre au milieu d'un aussi grand nombre de plantes. Aussi, que d'espèces, jadis introduites, sont aujourd'hui disparues ! Que sont devenues toutes les *Ericacées*, *Vacciniées* que cultivaient nos pères ? Où trouverait-on les *Gordonia*, les *Hopea*, les *Talauma* (*Magnolia*) *pumila* et *fuscata*, etc., etc. ? Telle espèce cultivée en abondance, il y a peu d'années, vendue même chez les fleuristes et jusque sur les marchés, n'existe même plus dans les écoles de botanique.

Pour former et entretenir cette organisation, j'ai été secondé par M. Herincq, aide de botanique au Muséum d'Histoire naturelle, qui a bien voulu consacrer à mes collections tous les moments que lui laissaient ses fonctions dans le grand établissement scientifique auquel il est attaché. Son

dévouement affectueux m'a puissamment aidé à vaincre les difficultés que j'ai rencontrées pour former mon *Arboretum*. M. Herineq s'est chargé des recensements annuels de mes diverses Écoles et de la comparaison d'un grand nombre d'échantillons avec ceux de l'herbier du Muséum.

Si les arbres ont été l'objet d'études sérieuses et suivies jusque dans les premières années de ce siècle, il faut reconnaître que, malgré les introductions très-nombreuses que nous devons aux Siebold, Douglas, Fortune, Maximowitz, Roelz, Boissier, David, etc., etc. et malgré les variétés remarquables obtenues ou découvertes dans ces dernières années, personne n'a entrepris, en France, de les grouper et d'en faire une étude spéciale.

Les espèces décrites dans les flores et dans les journaux de botanique ne sont pas associées aux espèces voisines, originaires de contrées différentes, auxquelles elles pourraient être comparées, ou parfois réunies. Dans les écoles de botanique, tout au contraire, elles sont rapprochées, mais ordinairement dans de mauvaises conditions; d'ailleurs, un assez grand nombre, comme je le disais plus haut, se rencontrent dans les jardins, sans avoir jamais été décrites; leur origine nous échappe souvent. C'est ainsi que nous ignorons encore la patrie du lilas, dit de Perse, publié par Cornuti; celle du marronnier à fleurs rouges; celle du marronnier d'Inde, quoique soupçonnée par M. Decaisne, ne nous est connue que depuis peu.

Placé loin d'un centre scientifique je fus forcément entraîné à former une bibliothèque dendrologique, d'y joindre des flores locales des pays septentrionaux, ainsi que les ouvrages descriptifs généraux et les recueils de botanique et d'horticulture où se trouvent de nombreuses descriptions des plantes ligneuses cultivées.

Je dus aussi former un herbier spécial, contenant un rameau, soit en feuilles, soit en fleurs ou en fruits, cônes, etc., de chaque espèce (1), ainsi qu'une collection de bois, et conserver dans l'alcool les fruits mous. Je fus enfin amené à avoir un album de dessins des espèces nouvelles ou critiques accompagnées de leurs principaux organes. Ces dessins, faits sur nature, sont destinés à la publication d'un *Icones* des espèces rares, nouvelles ou litigieuses, cultivées à Segrez.

Ce ne fut qu'après tous ces travaux préalables que je pus reconnaître, avec quelque certitude, mes richesses dendrologiques et entreprendre leur détermination rigoureuse. Quoique très-imparfaite encore, elle permettra cependant de connaître avec quelque certitude leur nomenclature et leur effrayante synonymie. C'est-là le but de cette publication et la première raison d'être des collections que j'ai formées; c'est là que réside pour moi leur véritable intérêt.

Comme je viens de le dire, les jardins et les pépinières fourmillent d'espèces imparfaitement connues; j'ai pu constater, trop souvent, que beaucoup d'autres, regardées comme vulgaires, n'existent pas dans les cultures, tandis que quelques-unes, considérées comme rares, s'y rencontrent au contraire à profusion. J'ai reconnu, en outre, qu'un certain nombre d'espèces douteuses, dont l'introduction n'a pas été signalée, sont confondues avec celles inédites.

Quelques exemples feront mieux comprendre combien

(1) L'ancien herbier de Desvaux que j'ai pu conserver à la France en en faisant l'acquisition à la mort du savant botaniste angevin, m'a été d'un grand secours pour la comparaison de certaines espèces litigieuses. J'ai pu souvent mettre à la disposition de botanistes monographes les types, parfois uniques, renfermés dans ces collections qui contiennent environ 40 000 espèces.

est confuse la nomenclature des plantes introduites dans nos jardins. En effet, ni les catalogues des jardins botaniques, ni des horticulteurs, n'ont jamais signalé la présence du *Ribes gayanum* Walp., du *Pourthiæa arguta* Dene, des *Rhamnus libanoticus* Boiss. et *bapticus* Dene., du *Juglans rupestris* Engelm, etc., etc.; tandis qu'au contraire, les *Amorpha*, à l'exception de l'*A. fruticosa*, considérés comme des arbrisseaux vulgaires et mentionnés dans la plupart des catalogues, n'existent en réalité dans aucun jardin. Il en est de même des *Platanus*, dont le *P. orientalis* seul est cultivé, quoique les *P. occidentalis*, *californica* et *cuneata* soient partout mentionnés.

Quelques genres ou espèces anciennement introduits, et que l'on croit très-répandus, sont néanmoins fort rares. Je puis citer les *Nyssa*, *Gordonia*, *Pinckneya*, le *Cratægus Azarolus*, etc., qui n'existent que dans un très-petit nombre d'anciens parcs, quoique portés sur les catalogues de plusieurs pépiniéristes.

Des espèces entièrement nouvelles] se rencontrent dans nos jardins, sans y avoir jamais été signalées et ont reçu, au hasard, leurs noms des horticulteurs ou des voyageurs; d'autres s'y trouvent inscrites comme espèces vulgaires, ou simplement désignées comme variétés jardinières, souvent même placées dans des genres auxquels elles n'appartiennent pas. C'est ainsi que, sous le nom d'*Ampelopsis japonica*, j'ai reconnu un *Rhus*; que sous celui fort singulier de *Malus edulis*, j'ai trouvé un pommier très-curieux à petits fruits dressés; que, sous les qualificatifs de *fraxinifolia* et de *caucasica*, j'ai distingué deux espèces de *Pterocarya* et que le même genre *Pterocarya* m'a encore offert une espèce très-caractérisée par son port buissonnant. Sous le nom d'*Hydrangea*

volubilis, on nous vend le *Colquhounia coccinea* ; sous celui d'*H. alternifolia.*, le *Mæsa hirsuta* ; comme *Leycesteria japonica*, le *Deeringia celosioides* ; pour le *Galphimia hirsuta*, un *Lippia* ou un *Callicarpa*, et sous le nom de *Ligustrum multiflorum* le *Citiharexylon laurinum*, etc., etc.

Je n'ai pas à multiplier ces exemples. Ceux que je viens de citer font assez pressentir l'étrange confusion qui règne dans la nomenclature horticole des arbres et arbustes. Les plus fausses déterminations y ont été introduites et s'y perpétuent ; leur synonymie grossit et se complique sans cesse. Ce ne sont là que des erreurs fâcheuses pour la science, mais, jusqu'à un certain point, excusables.

Malheureusement quelques horticulteurs, j'en ai acquis la conviction, ne craignent pas, dans un intérêt trop facile à comprendre, de changer le nom des espèces ou des variétés depuis longtemps cultivées, pour les rajeunir au moyen de noms de fantaisie. Cette pratique est d'autant plus regrettable, que ces fausses dénominations se transmettent rapidement, persistent, et s'imposent d'autant plus facilement, que personne ne se charge de les rectifier. Il serait aisé de citer de nombreux exemples de végétaux ligneux, anciennement cultivés, transformés aujourd'hui en espèces nouvelles.

Je ne saurais également m'empêcher de signaler un autre genre d'erreurs dans la nomenclature horticole. Il arrive trop souvent que si l'horticulteur, auquel une commande est adressée, n'a plus telle ou telle espèce, il ne craint pas de la remplacer par une autre, en l'étiquetant du nom de l'objet demandé ; il est inutile de dire que c'est presque toujours par une plante sans valeur.

C'est ainsi qu'après avoir planté jadis une collection des

principales variétés de notre noyer, j'ai reconnu, quinze ans plus tard, lorsqu'ils se sont mis à fructifier, que, sur vingt-six d'entre elles, deux seulement se trouvaient exactement nourmées ; deux constituaient des variétés jardinières ; les vingt-deux autres n'étaient que des individus sans intérêt.

Je me suis étendu sur ce sujet, afin de faire saisir les difficultés que j'ai eu à vaincre pour constituer l'*Arboretum* de Segrez, et pour publier l'énumération des espèces qu'il renferme, suivie de leurs synonymes horticoles (1).

Outre les espèces que j'ai pu me procurer dans les pépinières et les jardins botaniques, je suis parvenu à en introduire quelques nouvelles, en nouant des relations avec des collecteurs tels que MM. Bourgeau, Deyrolle, Roelz, Warren, Wallis, etc.

Mon *Arboretum*, quoiqu'il ne soit définitivement constitué que depuis peu d'années, a déjà eu l'honneur de recevoir plusieurs visiteurs célèbres, au nombre desquelles figurent : MM. Asa Gray, Mettenius, Von Siebold, Sargent, colonel Korolkow, l'abbé Brunet, etc., qui m'ont fait à différentes reprises, de précieux envois. Enfin, une commission de la Société centrale d'horticulture de France s'est transportée à Segrez en 1874. Elle était composée de MM. Briot, Burelle, Carrière, Duchartre, Hardy, Keteleër, Malet, Rivière et Verlot. Ce dernier a fait, au nom de cette commission, un rapport qui indique le genre d'intérêt qu'offre actuellement à la science l'*Arboretum* que j'ai créé (2).

(1) Cette énumération renferme un assez grand nombre d'espèces qui ne sauraient résister aux hivers des environs de Paris, mais que j'ai cru devoir conserver puisqu'elles font partie des collections de Segrez. Toutes pourraient, du moins, résister sur quelques points de la France.

(2) Voir à la fin de cette préface, page xxx, un extrait de ce rapport.

Il n'existe plus en effet, en France, de grandes collections dendrologiques. Celles dont il reste quelques vestiges se composaient principalement d'espèces des Etats-Unis. Aucune, au siècle dernier, ne possédait de plantes du Japon, du fleuve Amour, ou de la partie de l'Amérique du Nord que baigne le Pacifique, enfin de tant de contrées tempérées que des explorations récentes nous ont fait connaître depuis un demi-siècle. Cependant, nos jardins botaniques renferment quelques arbres ou arbustes précieux; mais ces établissements sont situés dans des villes, dont ni le sol, ni l'atmosphère ne se prêtent à une bonne culture; il est pour ainsi dire impossible qu'ils puissent y prendre tout leur développement. On ne saurait d'ailleurs y placer ce grand nombre d'espèces douteuses et de variétés jardinières que j'ai entrepris de réunir à Segrez.

Les *Arboretum* les plus riches aujourd'hui sont donc; en réalité, les grandes pépinières, où des horticulteurs intelligents conservent quelques exemplaires à cause de leur belle venue ou de leur rareté.

Certains genres trouvaient encore, il y peu d'années, des collectionneurs ardents, animés du désir de rassembler les espèces ou variétés ornementales d'un même groupe, mais sans être guidés par un but scientifique. C'est ainsi que les Conifères ont eu une certaine vogue pendant ces quinze dernières années. Aussi, les belles espèces de cette famille sont-elles presque communes, tandis qu'une infinité d'autres, moins recommandées, mais tout aussi intéressantes, sont fort rares. Il en est de même de la famille des Éricacées, qui passionnaient les amateurs du commencement de ce siècle, à la suite des voyages des deux Michaux. Un peu auparavant, le célèbre Duhamel de Monceau avait exercé une influence

plus décisive encore et, le premier, avait su exciter en France le goût des arbres exotiques.

Mais, avant Duhamel, et dès le milieu du ^{xvi}e siècle, une collection d'arbres avait été formée et réunissait déjà, outre les espèces indigènes, un certain nombre de types étrangers. C'est dans la Sarthe, à Touvoye, alors résidence des évêques du Mans, que René du Bellay avait rassemblé toutes les espèces ligneuses qu'il avait pu se procurer, et dont les plus précieuses lui avaient été adressées par Pierre Belon (1), savant médecin et célèbre voyageur de l'époque, qui avait su diriger, au profit de la science, les goûts de l'évêque du Mans vers ce but spécial. « René du Bellay, au dire » de Bonaventure des Perriers (2), se tenait sur son évêché » studieux des choses de la nature, et singulièrement de » l'agriculture, des herbes et du jardinage. »

Au dire de Gesner, « le jardin de Touvoye était alors le » plus beau, le plus riche, non-seulement de la France, » mais encore de l'Allemagne et de l'Italie. » La liste de quelques-uns des arbres, qui y étaient cultivés, se trouve citée dans un chapitre du plus célèbre des ouvrages de Belon, publié en 1558 : « *Les remontrances sur le défaut du labour et culture des plantes, et de la connaissance d'icelles, contenant la manière d'affranchir et apprivoiser les arbres sauvages.* »

Enfin, Le Corvoisier (3) nous dit, en parlant de René du Bellay : « Il gouverna paisiblement son diocèse, y faisant

(1) Problème 6. « J'ai fait parvenir des graines d'espèces variées, provenant de l'Italie, l'Allemagne et la Flandre, qui ont poussé et dont la plupart existent encore et ornent le jardin de Touvoye.

(2) Contes.

(3) *Histoire des évêques du Mans.*

» sa résidence ordinaire dans son château de Touvoye, où il
» menait une vie douce et tranquille, prenant ses divertis-
» sements innocents aux plaisirs de l'agriculture, du jardi-
» nage et de la curiosité des plantes rares, qu'il faisait venir
» de toutes parts pour en peupler son jardin, qui fût le pre-
» mier qui fit voir que les *Ebéniers*, les *Pistachiers* et la *Ni-*
» *cotiane* pouvaient se nourrir à l'air de cette province. »
Parini les espèces citées par Belon se trouvent les *Quercus*
Ilex, suber, coccifera, un *Erable à feuilles crispées*, l'*Arbre de*
Judée, l'*Agnus castus*, un *Sumac* (*Rhus veterum* ?), le *Juni-*
perus Oxycedrus, les *Mûriers blanc et noir*, le *Viburnum*
Tinus, le *Zisypus*, le *Styrax*, le *Diospyros*, le *Rosa mos-*
chata, le *Myrthe*, plusieurs espèces de genêts.

C'est aux bienfaits de Belon et de l'évêque du Bellay que les provinces du Maine, de l'Anjou et de la Touraine, nous dit Renouard dans son *Annuaire littéraire de la Sarthe*, ont dû le bonheur d'être les premières en France qui aient cultivé avec succès les arbres à fruits de toutes espèces.

On peut donc considérer les collections formées par du Bellay, sous les inspirations de Belon, comme les premières établies en France. J'ai vainement cherché à retrouver quelques traces des anciennes plantations faites à Touvoye, qui appartenait pendant près d'un siècle à ma famille ; je n'ai pu en découvrir aucune et je me suis assuré que les archives du département de la Sarthe ne renfermaient plus le moindre document propre à nous éclairer sur les collections de l'évêque du Mans. Tout ce qui concernait l'ancienne propriété des évêques a, en effet, été brûlé pendant la Révolution.

Jean du Bellay, archevêque de Paris et frère de Mgr du Mans, avait aussi, au dire de Belon, réuni, à la même époque, des arbres étrangers dans les jardins de l'abbaye de

Saint-Maur. Il y introduisit l'*Alaterne*. M. Moréau, dans son *Histoire littéraire du Maine*, nous dit : « Il employait volontiers son temps à greffer ses rosiers, à tailler ses arbres fruitiers, à semer des graines nouvelles qu'il avait acquises à grands frais de divers voyageurs. »

Le premier jardin botanique de Paris fut créé à la fin du xvi^e siècle par Jean Robin, qui publia, dès 1601 (1), le catalogue des espèces cultivées, parmi lesquelles quinze espèces ou variétés de Roses, entre autres : la *Rose jaune*, la *Rose mousseuse à fleurs simples* et la *Rose blanche à fleurs pleines*, les *Mûriers blanc et noir*, le *Styrax*, etc.

Vespasien Robin, fils du précédent, fut chargé d'établir, en 1635, un jardin botanique qui devint notre Jardin des Plantes et, plus tard, le Muséum d'Histoire naturelle.

Dès 1640, Guy de la Brosse, conseiller et médecin ordinaire de Louis XIII, publia la liste de toutes les plantes qui s'y trouvaient (2), parmi lesquelles figuraient aussi un certain nombre d'espèces déjà mentionnées par Belon ou par Robin. Après Guy de la Brosse et Robin, Fagon, Tournefort, Vaillant, Antoine puis enfin son frère Bernard de Jussieu, mirent tous leurs soins à constituer et à enrichir les collections vivantes du Jardin Royal. Le nombre des arbres et arbustes avait considérablement augmenté, et la plupart s'étaient déjà répandus dans les parcs et les jardins.

Les arbres dont l'introduction est due au Muséum d'His-

(1) *Catalogus stirpium tam indigenarum quam exoticarum quæ Lutetiæ colluntur*, à Robino botanico regio et latrici horti celeberrimæ scholæ Parisiensis curatore. Parisiis ex typographia Phillipi a Prato, via amygdalina, ad veritatis insigne.

(2) *L'ouverture du Jardin Royal de Paris pour la démonstration des plantes médicinales*, par Guy de la Brosse, conseiller et médecin ordinaire du roi. Paris. Par Jacques Dugast, rue de la Boucherie. 1640.

toire naturelle sont nombreux : le *Robinia*, l'*Ailanthé* et le *Sophora* dont les graines furent envoyées par le Père d'Incarville ; le *Juniperus excelsa*, l'*Acer creticum*, rapportés par Tournefort ; les *Pirus salicifolia* et *sinaica*, ainsi que le *Pêcher d'Ispahan*, par Michaux et Olivier ; le *Noyer noir*, le *Paulownia*, l'*Abies cilicica*, le *Pinus Bungeana*, tout récemment encore le *Xanthoceras sorbifolia*, le *Cedrela sinensis*, le *Poirier de la Chine*, les *Pêchers à fruits plats*, etc., introduits à la demande de M. Decaisne par MM. l'abbé David. de Geoffroy, ministre de France à Pékin et le R. P. Heude.

La collection d'arbres créée au Tremblay, près Paris, nous est révélée par la publication, en 1735, d'un catalogue anonyme attribué à Bernard de Jussieu (1). Cet *Arboretum* était déjà remarquable par de nombreuses espèces étrangères telles que : l'*Erable à sucre*, le *Negundo*, le *Sassafras*, les *Noyers blancs* et *pacaniers*, le *Marronnier rouge*, des *Chênes américains*, etc.

Peu avant, en 1705, le parc de Rambouillet avait reçu quelques espèces des États-Unis, dont de beaux sujets existent encore. L'abbé Nollin en était alors le directeur, et fut chargé de cultiver les nombreuses espèces envoyées plus tard par André Michaux.

Buffon, vers 1739, introduisit dans une terre qu'il possédait en Bourgogne, à Montbard, plusieurs espèces d'arbres exotiques dont il donna quelques exemplaires à Duhamel de Monceau ; ce fut l'origine des riches collections réunies par cet homme illustre qui chercha promptement à les augmenter, et auquel Bernard de Jussieu et Richard, directeur des pépinières de Trianon, procurèrent tour à

(1) Catalogue des arbres et arbrisseaux qui se peuvent élever aux environs de Paris. 1735.

tour les espèces qu'ils possédaient. C'est à Duhamel de Monceau que revient l'honneur d'avoir réuni, dans un but scientifique déterminé, les premières collections dendrologiques. Le célèbre inspecteur de la marine avait rassemblé toutes les espèces ligneuses qu'il avait pu se procurer dans ses vastes propriétés de Vignay, de Monceau et même à Denainvilliers, domaine d'un frère cadet qui le secondait dans tous ses travaux, et qui surveilla toutes ses plantations et les soumit à une étude rigoureuse. Duhamel put ainsi les décrire avec soin et publier en 1755 son *Traité des arbres et arbustes qui se cultivent en France*. C'est cet important ouvrage que Loiseleur-Deslongchamps compléta cinquante ans plus tard et qu'illustrèrent des artistes célèbres, tels que Bessa et Redouté (1). Cet ouvrage est encore actuellement le meilleur traité descriptif que nous ayons des espèces ligneuses.

Placé à la tête de la marine, et membre de l'Académie des sciences, Duhamel occupait à la cour un des premiers rangs et sut se servir de sa haute position pour obtenir, à diverses sources, un grand nombre d'arbres et d'arbustes, non encore introduits, et qu'il sut désigner à ses correspondants, MM. de Fontenette, en Louisiane; Gautier, à Québec; Peyronnel, consul à Smyrne; Prevost, commissaire à l'Île royale; Caussineri, chancelier à Chio. Grâce au concours de son ami Bernard de Jussieu, de Buffon et de la Galissonnière, l'ancien gouverneur du Canada; grâce en outre, à une correspondance suivie avec trois membres de la Société royale de Londres: Mitchell, Miller et Collinson, il parvint à acquérir des graines de la Virginie et du Canada. Duhamel s'était aussi créé des relations dans diverses

(1) Nouvelle édition, Paris 1800-1812 (Nouveau Duhamel).

parties de la France : MM. de Bombarde, Charentoneau, le chevalier Turgot, et enfin l'abbé Nollin, directeur des cultures de Rambouillet, puis de celles du Roi, au Roule, lui procurèrent des espèces intéressantes et précieuses. Il était ainsi parvenu à réunir un millier d'arbres et arbrisseaux, appartenant à 191 genres. Dans ce nombre figuraient, il est vrai, des variétés jardinières, beaucoup plus nombreuses déjà qu'on ne peut le supposer.

C'est à Duhamel que l'on doit en grande partie la plantation dans les parcs et les jardins des premiers arbres étrangers. Non-seulement il cultivait et multipliait toutes les espèces qu'il avait pu rassembler, mais il se plaisait à les distribuer et à les répandre. Il essayait, en outre dans ses domaines, la culture forestière de plusieurs d'entre elles, et l'on peut encore voir aujourd'hui quelques restes de ses grandes plantations : le cèdre, le cyprès chauve, et quelques autres espèces y sont représentés par de magnifiques individus.

A l'époque où Duhamel réunissait ses richesses dendrologiques, le duc d'Ayen, maréchal de Noailles, plantait dans son parc, près de Saint-Germain-en-Laye, avec le concours de Lemonnier, un grand nombre d'arbustes d'ornement, dont quelques-uns, fort rares, et qui firent l'admiration de tous ceux qui visitèrent ces beaux jardins ouverts à tous les amateurs. Ce fut lui l'instigateur, auprès de Louis XV, de la création du Jardin botanique de Trianon, où Bernard de Jussieu établit la classification naturelle.

Les jardins du petit Trianon furent confiés, en 1753, par Louis XV, d'après les conseils de Lemonnier, à Claude Richard, qui créa rapidement, outre des orangeries et des serres une Ecole de plantes de pleine terre, qui fit faire de

grands progrès à la botanique. Le parc avait été peuplé de nombreuses essences forestières provenant de pays étrangers, dont le climat n'est pas moins rigoureux que le nôtre, et qui se répandirent ensuite sur tous les points de la France.

L'Ecole de botanique disparut lors de la transformation du petit Trianon; mais quelques arbres épars représentent encore ces anciennes collections, tels sont : les *Quercus pyramidalis*, *Ilex*, et *occidentalis*, *Chamæcyparis sphæroidea*, *Pinus strobus*, *Gincko*, le *Planera*, des *Celtis*, le *Maclura*. Les vastes pépinières actuellement existantes furent organisées sous Charles X; elles servirent aux collections réunies par M. Massé, le collaborateur de de Mirbel, et renferment encore beaucoup d'espèces précieuses ou critiques.

Les pépinières du Roi, au Roule, contribuèrent, comme celles de Trianon, à répandre les premières introductions d'arbres de l'Amérique septentrionale. Etablies probablement sous Henri IV, elles restèrent consacrées, jusqu'en 1772, à la multiplication d'espèces destinées aux parcs et jardins de la couronne. A cette époque, placées sous la direction de l'abbé Nollin, des espèces rares y furent plantées et multipliées pour servir à leur propagation.

M. de Lézernes, neveu de l'abbé Nollin, succéda à son oncle et fut bientôt remplacé par Aubert du Petit-Thouars, membre de l'Académie des sciences, auquel on doit à peu près les seuls renseignements relatifs à ces pépinières (1).

La pensée chimérique d'accoutumer les plantes de pays chauds à vivre sous des latitudes septentrionales, en les y

(1) Notice historique sur la pépinière du Roi, au Roule, Paris, 1825.

amenant par des degrés insensibles, prit naissance dans les pépinières du Roule. L'espalier de pistachiers qui ornait les murs de l'Orangerie semblait, en effet, encourager ces tentatives; mais Aubert du Petit-Thouars ne partageait pas ces illusions.

Les pépinières du Roule servirent surtout à propager et à répandre les végétaux dont les Michaux faisaient incessamment des envois. L'exactitude rigoureuse des renseignements fournis dans leurs ouvrages, et surtout le soin apporté à indiquer les conditions précises d'habitat de chaque espèce dans *l'Histoire des arbres de l'Amérique du Nord*, exercèrent une influence considérable et contribuèrent puissamment à faire rechercher les arbres nouveaux dont l'introduction est due à ces deux savants et courageux voyageurs.

Michaux fils était membre de la Société centrale d'agriculture de France et fut chargé, à ce titre, pendant longtemps, de la direction du domaine forestier d'Harcourt (1). Il y planta des massifs entiers d'espèces des États-Unis et réunit dans une sorte d'Ecole plusieurs autres, qui ne lui semblaient pas offrir un aussi grand intérêt. Les *Pinus strobus*, *Cupressus thuyoides*, *Thuya occidentalis*, *Quercus rubra*, etc., etc. constituèrent bientôt, à Harcourt, des groupes exploitables, dont l'étude est pleine d'intérêt.

Le duc d'Ayen, fils du créateur des collections de Saint-Germain, en transporta une grande partie dans sa propriété de Champlâtreux, près de l'Isle-Adam, et fit de grands ef-

(1) Des rapports de MM. Huzard fils en 1836, Adolphe Brongniart en 1845 et 1852, Pépin la même année et en 1857, permettent d'apprécier l'intérêt que peut offrir, aux forestiers, le domaine légué à la Société centrale d'agriculture de France par l'un de ses membres, M. Delamarre. La petite Ecole formée par Michaux renferme quelques espèces devenues très-rares en France.

forts pour les augmenter. C'est, actuellement, l'un des seuls parcs de France où subsistent encore quelques-uns des premiers arbres introduits, à la fin du siècle dernier, de l'Amérique du Nord.

Lemonnier avait prêté au duc d'Ayen son précieux concours, et il est probable que l'intérêt scientifique qui s'attacha aux collections de Saint-Germain et de Champlâtreux, est entièrement dû à son initiative, que secondaient merveilleusement ses relations amicales avec Michaux. Il habitait Montreuil, près de Versailles, et avait réuni, dans son propre jardin, les arbrisseaux de petite taille, et surtout ceux appartenant à la famille des Éricacées, alors en vogue. La propriété de Lemonnier fut saccagée pendant la Révolution : un *Zelkova*, un *Quercus coccifera*, et deux variétés de Cèdre du Liban existaient pourtant encore en 1835 (1). A la même époque, un amateur distingué, le chevalier Janssin, rassemblait à grands frais, dans sa propriété, à Chaillot, les espèces et variétés d'arbres précieux. Ne reculant devant aucune dépense, il achetait, dans toutes les parties de l'Europe, les arbres et arbustes qui lui paraissaient nouveaux. Quoiqu'en grande partie détruites par la Révolution, on pouvait encore retrouver, vers 1830, quelques beaux sujets de cette collection : un *Acer opalus* et un *Ilex balearica*, qui permettaient d'apprécier l'œuvre du chevalier Janssin. Vers 1810, de Vilmorin entreprit, dans son domaine des Barres, d'importantes plantations des arbres exotiques qu'il croyait les plus propres à l'exploitation, et dont la plupart existent encore aujourd'hui. Cette Ecole forestière, acquise par l'Etat, renferme environ 260 espèces ou variétés, parmi lesquelles un grand nombre de Conifères.

(1) *Journal de la Société d'horticulture de Paris*, 1835, p. 342.

Les arbres et les arbustes d'ornement étaient plus spécialement cultivés à Brunoy, chez Noisette (1), fils du jardinier de Monsieur (Louis XVIII), et à Ville-d'Avray, chez Godefroy, l'un des premiers qui multiplia les plantes de terre de bruyère.

C'est aussi au commencement du siècle que furent créées les pépinières, très-connues, des frères Audibert, à Tarascon; celles de Baumann, à Bollwyller; de Jacquemet-Bonnefont, à Annonay; d'André Leroy, à Angers; d'E. Simon, à Metz, etc. Elles permirent à plusieurs amateurs de se procurer d'intéressantes collections; la réputation des jardins du baron de Pappenheim, à Combes-la-Ville (2), de l'amiral Tchitchagoff, à Sceaux; du comte de Montberon, à Clervaux, près de Châtellerault, et du comte de Dijon, à Nérac, s'est transmise jusqu'à nous.

Des arbres exotiques furent encore plantés en grand nombre dans les parcs de Méréville, près d'Etampes et de Saint-Leu, aux environs de Paris, ainsi qu'à La Maillardière, près Nantes, où le comte de la Bretèche introduisit, probablement le premier en Europe, le *Magnolia grandiflora*, dont de magnifiques individus existent encore.

Je dois en outre citer le général Lemarrois et M. de Mayneville qui, tous deux, avaient fait d'importantes plantations de Conifères en Normandie; M. d'Ivoy, dans le département de la Gironde. Le baron de Tschudy, de son côté, réunissait dans sa propriété de Columbière, près Metz, les espèces

(1) Une note insérée dans le *Journal de la Société d'horticulture de Paris* signale quelques arbres remarquables introduits ou propagés par Noisette: *Acacia var. spectabilis*, *Juglans nigra macrocarpa*, *Quercus macrocarpa*, *Ulmus nigra*, *Populus grandidentata*, *Betula bella*, *Cupressus Tournefortii*, *Hovenia dulcis*.

(2) *Journal de la Société d'horticulture de Paris*, 1829, p. 195.

précieuses de Conifères, qui lui paraissaient pouvoir offrir quelque intérêt. Son fils, l'inventeur de la greffe herbacée qui porte son nom, s'appliqua à les enrichir encore.

Malheureusement rien n'a été publié sur ces diverses collections, qui ne sont que très-vaguement connues; elles n'ont laissé aucune trace, et sont disparues avec leurs propriétaires. Quant à celle formée par le vicomte Héricart de Thury, dans sa propriété de Thury, elle est connue par un rapport inséré dans les annales de la Société d'horticulture (1) ainsi qu'une autre à Baleine, près Moulins, appartenant à M^{lle} Aglaé Adanson, fille du célèbre botaniste. Mais cette propriété ne renferme pour ainsi dire, aujourd'hui, aucune des espèces qui y avaient été réunies. De gros buissons de camélias, en pleine terre, indiquent la localité, probablement la plus septentrionale, où puisse vivre ce bel arbuste dans le centre de la France.

Nous rencontrons encore, près de Pithiviers, dans le très-beau parc de M^{me} Eulalie Lebrun, quelques arbres fort rares, tels que : *Nyssa uniflora* et *capitata*, *Ilex opaca*, *Prinos glaber*, *Abies canadensis*, etc., qui, pour la plupart, proviennent de Monceau ou de Vignay; car Duhamel paraît avoir été l'inspirateur de cette collection.

Quoique je ne puisse avoir l'intention, dans cet examen rapide, de passer en revue les collections d'arbres réunies sous un climat très-différent de celui du bassin de Paris, il me paraît difficile de négliger celles créées au commencement de ce siècle par Dumont-Courset, l'auteur d'un ouvrage estimé de botanique horticole (2), qui était correspondant de l'Institut

(1) Tom. IX, p. 293.

(2) *Le botaniste cultivateur*, 3 vol. 1802.

et membre de la Société centrale d'agriculture. Ce savant amateur, esprit spéculatif autant qu'observateur, avait entrepris de réunir dans sa propriété, près Boulogne-sur-Mer, des plantes de toute nature, mais principalement de pleine terre, et surtout des arbustes d'ornement, placés, grâce au climat maritime, dans d'excellentes conditions. Ces écoles, commencées dès 1784, n'ont été classées systématiquement qu'en 1792. Les *Vacciniées*, les *Ericacées*, étaient, paraît-il, l'objet des soins tout particuliers de Dumont-Courset. Ces collections, dont une courte notice (1) peut encore nous donner l'idée, n'ont pas été, comme tant d'autres, dispersées à la mort de leur créateur et subsistent encore en partie.

Le beau parc de Fromont, à Ris, près de Paris, appartenant au chevalier Soulange-Bodin, renfermait une multitude d'arbres précieux, plantés de 1810 à 1829 ; à cette époque, son propriétaire y établit un Institut horticole enseignant, ainsi qu'un établissement pour la propagation et la vente des espèces précieuses. C'était le temps de splendeur de ces belles collections, qui devaient cesser de s'augmenter quelques années plus tard, à la mort de leur créateur.

Le parc de Fromont passa, depuis lors, en plusieurs mains ; mais les nouveaux propriétaires respectèrent du moins les plus beaux arbres ; aujourd'hui l'établissement horticole, qui contribuait surtout à assurer la conservation de la plupart des sujets, vient d'être vendu, et il est à craindre qu'il ne soit rien conservé des anciennes collections et qu'elles ne soient détruites, puisqu'en France tout ce qui n'a pas un caractère public, mais est dû à la seule initiative privée, est bientôt condamné à disparaître.

Ces riches collections exercèrent aussi une influence

(1) *Description des jardins de Courset*, par M. Lair. Paris, 1814.

réelle et ramenèrent, un moment, la vogue aux plantations d'espèces exotiques. Des hommes de mérite : Guillemain, Poiteau, et d'autres, y professaient. Les plus grands noms scientifiques concouraient à la rédaction des *Annales de Fromont* : du Petit-Thouars, de Mirbel, Brongniart, Adrien de Jussieu, Loiseleur-Deslongchamps, André Michaux, Richard, Turpin, etc., enrichirent de leurs articles cet important recueil. Les visiteurs étrangers y affluaient ; le roi Charles X et d'autres souverains vinrent également admirer ce bel établissement.

Il convient enfin de mentionner des collections, qui, bien que n'étant pas consacrées entièrement aux espèces ligneuses, n'en étaient pas moins très-intéressantes. Je veux parler de celles créées, vers 1825, par le duc d'Orléans, dans ses propriétés de Neuilly, du Raincy et de Mousseaux, qui comprenaient, outre les plantes de serre, un grand nombre d'arbres et surtout d'arbustes, dont quelques-uns fort rares. Ces cultures étaient confiées à Jacques, jardinier fort habile, qui en publia le catalogue (1). On y remarquait des espèces fort précieuses, dont quelques-unes ont disparu des cultures françaises ; telles sont le *Ceanothus procumbens*, le *Daphne altaica*, l'*Hypericum veronense*, deux *Ledum*, aujourd'hui inconnus (les *L. odoratissimum* et *procumbens*), le *Lycium americanum*, les *Cratægus ovalis*, *radiata*, *grandiflora* et *græca*, diverses espèces ou variétés typiques de *Roses*, etc., etc.

Ces collections, qui avaient exigé tant de soins et de dé-

(1) Catalogue alphabétique des plantes, arbres et arbustes, croissant naturellement ou cultivés en plein air, orangeries ou serres chaudes dans les jardins de Neuilly, du Raincy et de Mousseaux. Paris, 1824.

penses, furent saccagées lors de la révolution de 1848, et le parc morcelé. Toutefois, on retrouve encore un certain nombre de beaux arbres de l'ancien domaine, sur les bords de la Seine, près de l'île de la Grande-Jadhe (1).

A part les collections spéciales que je viens de citer et qui ne comprennent généralement que des végétaux ligneux de grande taille, il n'en existe plus, à ma connaissance, à l'état d'entretien, c'est-à-dire qui comprennent les nouvelles introductions.

Je regrette que cet aperçu rapide ne m'ait pas permis de mentionner les parcs et les jardins situés trop en dehors du bassin de Paris, et dans lesquels on rencontre encore de beaux exemplaires d'espèces exotiques. J'aurais voulu citer les essais de MM. Robert, Bredin, Daudin, Herpin de Frémont, C^{te} de Courval, M^{is} de Vibray, etc., etc., qui, dans d'autres parties de la France, se sont occupés, les uns et les autres, de la culture des arbres à divers points de vue ; mais cet examen m'eût fait sortir du cadre que je me suis tracé.

A. LAVALLÉE.

(1) J'ai pu le constater dans une visite récente ; la collection de Saules est encore à peu près complète.

(Extrait du Rapport de la commission de la Société centrale d'Horticulture, chargée de visiter les collections dendrologiques de Segrez). (1)

.

Les écoles d'arbres et d'arbustes, fruit d'un actif et patient labeur, qui ont été formées à Segrez, ne souffrent aucune concurrence. Nous n'avons rien à leur opposer en France et nous ne leur connaissons aucune rivale à l'étranger. Segrez possède une réunion de végétaux ligneux des plus importantes par le nombre et la variété des formes qui la composent. On y trouve, groupées ou isolées, la grande majorité des espèces des régions froides et tempérées froides de l'Europe moyenne et orientale, de l'Asie Mineure, du Caucase. L'Asie centrale, notamment les hautes régions de l'Himalaya, le Bootan, le Thibet et le Népal, dont la végétation arbustive est si variée et si différente de la précédente, s'y trouvent représentés par un certain nombre de formes les moins frileuses. Les végétaux de la région Amour, du Japon, de la Chine et des autres contrées de l'Asie orientale ont été recherchés avec cette passion ardente qui caractérise le botaniste. Enfin, est-il besoin de dire que l'Amérique du

(1) Cette commission était composée de MM. Briot, Carrière, Duchartre, Hardy, Ketelcër, Malet, Rivière et B. Verlot, rapporteur. — Extrait du *Journal de la Société centrale d'horticulture de France*, 2^{me} série, t. IX, 1875, pp. 281 à 297.

Nord et du Nord-Ouest, ainsi que les régions les plus froides du Mexique ont aussi leurs représentants à Segrez ?

Il est inutile de faire ressortir l'immense labeur que représente un établissement comme celui de Segrez, arrivé à son point actuel.

Là, ainsi que nous avons cherché à l'indiquer, nous n'avons pas seulement sous les yeux une masse de végétaux rassemblés à grands frais de tous les points du globe, mais chacun d'eux a donné lieu à un travail qui a créé sa véritable valeur. M. A. Lavallée peut dire, à juste titre, que son *Arboretum* est son herbier, herbier vivant, constamment révisé et étudié, où chaque individu est un type bien déterminé, auquel vient se comparer chacune des acquisitions nouvelles. Mais on sent qu'un herbier de cette nature présente des difficultés de conservation et de classement plus grandes que les herbiers desséchés de nos collections scientifiques. A une plante sèche quelques grammes de sublimé corrosif dissous dans l'alcool et un local à l'abri de l'humidité assurent une conservation pour ainsi dire indéfinie, en même temps que les introductions nouvelles viennent, avec une extrême facilité se classer entre les anciennes. La plante vivante a bien d'autres exigences. L'individu nouveau, souvent unique, est exposé à tant de périls, avant sa complète et définitive installation, que tout le soin et le tact du jardinier ne sont pas de trop. Quels seront ses besoins, ses aptitudes ? Sera-ce un nain ou un géant ? C'est ce que le plus souvent on est réduit à deviner, faute de renseignements. Puis, si la détermination manque ou si elle est inexacte, pour remettre un arbre ou même un arbuste à sa véritable place dans la série, il faut des transplantations souvent fort délicates et non sans périls. Les déterminations botaniques,

en laissant de côté le travail de cabinet souvent aride qu'elles nécessitent, ne peuvent se faire d'une façon précise qu'à la floraison ou même à la fructification, et celles-ci ne se produisent souvent que sur des individus déjà âgés. Quelles difficultés ne résultent pas de cet état de choses ? Disons que nous les avons trouvées, à Segrez, aussi parfaitement vaincues qu'il est possible de le faire. Chaque espèce nous a paru avoir été placée dans les conditions qui lui sont les plus favorables, et nous ne pouvions en avoir de meilleure preuve que la bonne santé et la vigueur générale des individus qui font des écoles de Segrez des plantations modèles.

Votre Commission a été unanime pour féliciter notre savant collègue de sa création qui est appelée à rendre de signalés services à la science. L'encombrement des dénominations erronées est l'une des plaies de l'horticulture, et on ne peut mieux s'en débarrasser qu'en lui fournissant une réunion de types bien déterminés. Aussi aurions-nous désiré vous proposer, en outre des vives félicitations que nous vous demandons, Messieurs de lui adresser, de renvoyer ce Rapport à la Commission des Récompenses, avec une recommandation toute spéciale, si nous n'étions assurés que la modestie de M. A. Lavallée lui ferait refuser une distinction à laquelle il a cependant tous les droits.

.

VERLOT, *Rapporteur.*

AUTEURS ET OUVRAGES CITÉS

A

- A. Braun.* — Alexandre Braun.
Act. Acad. Paris. — Mémoires de l'Académie de Paris.
A. Gr. et As. Gr. — Asa Gray.
A. Gr. Gen. — Asa Gray, Genera floræ Americæ boreali-orientalis.
Ait. — Aiton, Hortus Kewensis.
All. fl. pedem. — Allioni, Flora pedemontana.
All. Cunn. — Allan Cunningham.
Alph. DC. — Alphonse de Candolle.
Anders. Monogr. Salic. — Anderson, Monographia Salicum.
Arch. Mus. — Archives du Muséum.
Andr. The heath. — Andrews, The heathery, or monograph of the genus Erica.
— Bot. rep. — Andrews, The Botanist's repository.
Ann. de Gand. — Annales de Gand.
Ann. From. — Annales du Jardin de Fromont.
Ann. Mus. — Annales du Muséum d'histoire naturelle.
Ann. Soc. Hort. Par. — Annales de la Société royale d'horticulture de Paris.
Ann. sc. nat. — Annales des sciences naturelles.
Ant. Conif. — Antoine, Die coniferen nach Lambert.
A. Rich. Elæg. — Achille Richard, Monographie des Eléagnés.
Arn. — Walker Arnott.
Audib. — Audibert.
Audub. Birds of amer. — Audubon, Birds of america.

B

- Baill.* — Baillon, Adansonia.
Balb. — Balbis, Miscellanea botanica.
Balf. — Balfour, A catalogue of british plants.

- Banks.* Ic. Kämpf. — Banks, Icones selectæ plantarum quas in Japonia collegit et delineavit Kaempfer.
- Barkh.* — Berekhausen, Specimen botanieum, etc.
- Barr.* Plant. Icon. — Barrelier, Plantæ per Galliam, Hispaniam et Italiam observatæ iconibus æneis exhibitæ.
- Bart.* Fl. bor. amer. — Barton, Flora of north America.
- Bartr.* It. ed. germ. — Bartram, Travels trough north and south Carolina. Edition allemande.
- Bast.* — Bastard, Essai sur la Flore du dépt. de Maine-et-Loire.
- Bauh.* — Bauhin (Gaspard).
- Beauv.* — Palisot de Beauvois.
- Beauv.* Agrost. — Palisot de Beauvois, Essai d'une nouvelle agrostographie.
- Beckl.* — Beekley.
- Belg. Hort.* — Belgique horticole.
- Benth.* — Bentham.
- Bert.* Mém. genev. — Bertoloni, Mémoire de l'Académie de Genève.
- Bess.* — Besser.
- Bieb.* — Bieberstein (Marschall von).
- Bigel.* med. bot. — Bigelow, American medical Botany.
- Blom.* (Carl Magnus). — Register öfver Bengt Bergii.
- Blackw.* Blackwel, A curious herbal.
- Blum.* Fl. Jav. — Blume, Flora Javæ.
— Mes. Lugd. bat. — Blume, Museum Lugduni batavorum.
- Bung.* Enum. — Bunge, Enumeratio plantarum quas in China boreali collegit.
- Boiss.* — Boissier (Edmond).
— Voy. Esp. — Boissier, Voyage botanique dans le midi de l'Espagne.
— Fl. or. — Boissier, Flora orientalis.
- Bonaf.* — Bonafous.
- Bong.* — Bongard, Descriptiones plantarum novarum.
- Bork. ou Borkh.* — Borkhausen.
- Bosc.* — Bose (Louis-Augustin-Guillaume).
- Bot. cab.* — Botanical cabinet.
- Bot. mag.* — Botanical magazine.
- Bot. reg.* — Botanical register.
- Brand.* Illustr. for Ind. — Brandis, Illustration of the forest of India.
- Brit. flow. gard.* — The british flower garden.
- Brongt.* — Adolphe Brongniart.

- Brot.* — Brotero.
Buckl. — Buckland.
Bull. soc. bot. fr. — Bulletin de la Société botanique de France.
Bull. Ac. Brux. — Bulletin de l'Académie de Bruxelles.
Bur. — Edouard Bureau.
Burgsd. — Burgsdorff.

C

- Cambess.* — Cambessèdes.
C. A. Mey. — Carl Anton Meyer.
Carr. Conif. — Carrière, Traité général des Conifères.
Cas. DC. — Casimir De Candolle.
Catesb. Carol. — Catesby, The natural history of Carolina.
Cathe. Illustr. of himal. pl. — Hooker in « Catheart » Illustrations of Himalayan plants.
Cav. Diss. — Cavanilles, Monadelphicæ classis Dissertationes.
 — Icon. — Cavanilles, Icones et descriptiones plantarum quæ in Hispania creseunt.
Cham. — Chamisso.
Cham. et Schl. ou Schlecht. — Chamisso et Schlechtendal.
Chapm. — Chapman.
Chois. — Choisy.
Christ. — Christ (Johann-Ludwig).
C. Koch — Carl Koch.
Cl. Gay. Fl. chil. — Claude Gay, Flora Chilena.
Clus. hist. — Clusius (Charles de l'Eeluse), Rariorum plantarum historia.
Coll. — Colla, Hortus Ripulensis.
Comm. — Commerson.
Commel. Hort. amst. — Commelyn (Johan), Catalogus plantarum horti medici amstelodamensis, etc.
Compt. rend. Ac. se. — Comptes rendus de l'Académie des sciences.
Cook. — Cook (S. E.).
Coss. — Cosson.
Crantz. — Crantz.
 — Stirp. austr. — Crantz, Stirpes austriacæ.
Cunn. — Allan Cunningham.
Curt. Fl. lond. — Curtis, Flora londinensis.

Curt. Bot. mag. — Curtis, The Botanical magazine.

Cyr. Pl. rar. — Cyrillo, Plantarum rariorum.

D

DC. — De Candolle (Augustin-Pyramus).

— Fl. fr. — Flore française.

— Hort. genev. — Hortus genevensis.

— Ic. rar. — Icones plantarum Galliae rariorum, etc.

— Pl. rar. genev. — Plantes rares du jardin de Genève.

— Prodr. — Prodromus systematis naturalis Regni vegetabilis.

Dene. — Decaisne.

— Jard. fr. Mus. — Decaisne, Jardin fruitier du Muséum.

Dene et Pl. — Decaisne et Planchon.

De Chambr. — De Chambray.

Dehndt. — Dehnhardt.

Del. — Delile.

Delaun. — Delaunay.

Deless. Icon. select. — Delessert, Icones selectae plantarum.

Déségl. — Déséglise.

Desf. — Desfontaines.

— Fl. atl. — Desfontaines, Flora atlantica.

Despr. — Despréaux.

Desv. — Desveaux, Dictionnaire des sciences naturelles.

D. Hook. Rhod. of Sik. Him. — Dalton Hooker, Rhododendrons of Sikkim-Himalaya.

Dietr. Dietrich.

Dict. sc. nat. — Dictionnaire des sciences naturelles de Desveaux

Domb. — Dombey.

Don. — Don (David).

Dougl. — Douglas.

Drum. — Drummond.

Duh. ou *Duham.* — Duhamel du Monceau.

— Arb. — Duhamel, Traité des arbres et arbustes cultivés en France.

Dum. Cours. — Dumont-Courset.

Dur ou *DR.* — Dunal.

Dur. — Durieu de Maisonneuve.

Duroi. — Duroi, Dissertatio inauguralis, Observationes botanicas (de arboribus americae septentrionalis) sistens.

Durraz. — Durrazini.

E

- Eat.* — Eaton.
Ehret. — Ehret, *Plantæ depictæ*.
Ehrh. — Ehrhart.
Ehrnb. — Ehrenberg.
Eichw. Cauc. — Eichwald, *Plantarum novarum, quas in itinere Caspio-Caucasico observavit, fasciculi*.
Ell. — Elliot.
Ellis. — Ellis.
Emers. Rep. Massach. — Emerson, *Report on the trees of Massachusetts*.
Endl. — Endlicher.
— Conif. — Endlicher, *Sinopsis Coniferarum*.
Engelm. — Engelmann.
Engl. bot. — English botany.
Engl. fl. — English flora.
Exot. bot. — Exotic botany.

F

- Fisch.* — Fischer.
Fisch. et Mey. — Fischer et Meyer.
Fl. austr. — Host, *Flora austriaca*.
Fl. atl. — Desfontaines, *Flora atlantica*.
Fl. dan. — *Flora danica*.
Fl. des serr. — *Flore des serres*.
Fl. et Pom. fr. — *Flore et Pomone françaises*.
Fl. franç. — De Lamarck et De Candolle, *Flore française*.
Fl. gard. — Loudon, *Flower-gardens*.
Fl. lapp. — Linné, *Flora lapponica*.
Fl. ross. — Ledebour, *Flora rossica*.
Fl. sard. — *Flora sardoa*.
Flor. and Pomol. — *Florist and Pomologist*.
Flor. mag. — *Floral magazine*.
Flugg. Ann. Mus. — Flugge, *Annales du Muséum*.
Forb. Pinet. Wob. — Forbes, *Pinetum Woburnense*.
— *Salic. Woburn.* — Forbes, *Salicetum Woburnense*.
Forsk. — Forskal.

Forst. Gen. pl. austr. — J. Forster et G. Forster, Characteres generum plantarum quas in itinere ad insulas maris australis collegerunt.

Fort. — Fortune.

Foug. Mém. Ac. sc. Par. — Fougereux, Mémoires de l'Académie des sciences de Paris.

Frém. — Frémont.

Frey. — Freyer.

Fries. — Fries.

G

Gærtn. fruct. — Gärtner, De fructibus et seminibus plantarum.

Gard. chron. — Gardener's chronicle.

Gartenfl. — Gartenflora.

Gaud. — Gaudin.

Gaudich. — Gaudiehaud.

Gill. et Hook. — Gillies et Hooker.

Gmel. — Gmelin.

Godr. — Godron.

Gord. — Gordon.

Gouan. Deser. Gink. — Gouan, Description du Ginkgo biloba, dit Noyer du Japon.

Gr. — Grenier.

Gr. et Godr. — Grenier et Godron.

Griff. — Griffith.

Griseb. — Grisebach.

G. Thur. — Gustave Thuret.

Guill. Arch. bot. — Guillemin, Archives de botanique.

Guimp. Abbild. deut. Holz. — Guimpel, Abbildung der Fremden in Deutschland ausdauernden Holzarten.

— Holzgew — Guimpel, Abbildung der Fremden in Deutschland ausdauernden Holzarten.

— fr. holzg. — Guimpel, Abbildung der Fremden in Deutschland ausdauernden Holzarten.

— et Hayne, Deutsch. holtz. — Abbildung der Fremden in Deutschland ausdauernden Holzarten.

Guss. Pl. rar. — Gussone, Plantæ rariores, etc.

H

Hamilt. — Hamilton.

Hartw. — Hartweg.

Hartig. — Hartig.

Harting. Parad. — Hartinger, Paradisus Vindobonensis.

Hassk. — Hasskarl.

Haw. — Haworth.

Hayn. Arzn. — Hayne, Arzneigewächse, etc.

— Darstell. — Hayne Darstellung und Beschreibung der Arzneigewächse, etc.

H. B. K. Nov. gen. — Humboldt, Bonpland et Kunth, Nova genera et species plantarum, etc.

Heldr. — Heldreich.

Hend. ou *Henders.* — Henderson.

Herb. amat. — Herbar de l'amateur.

Heuff. — Heusser.

Hochst. — Hochstetter.

Hoffm. Salic. — Hoffmann, Historia salicum iconibus illustrata.

Hombr. Voy. Pôl. sud. — Hombron, Voyage au Pôle sud.

Hook. Bot. mag. — Hooker, Botanical magazine.

— Bot. misc. — — Botanical miscellany.

— Icon. — — Icones plantarum.

— Fl. bor. am. — — Flora boreali-americana.

Hook. fil. Fl. nov. zel. — — Flora novæ-zelandiæ.

— Illustr. him. — — Illustrations of himalayan plants.

— In catch. Ill. him. — Hooker, In Catchcart Illustrations of himalayan plants.

— Fl. antarct. — Hooker fils, Flora antarctica.

Hook. et Arn. Bot. Beech. — Hooker and Walker Arnott. The botany of capitain Beechey's voyage, etc.

Hook. et Thom. — Hooker et Thompson.

Hopp. — Hoppe.

Horn. — Hornemann.

Huds. — Hudson.

Hort. berol. — Hortus berolinensis.

— *bogor.* — — bogorensis.

— *Booth.* — — Booth.

— *paris.* — — parisiensis.

- Hort. lon l.* — Hortus londinensis.
 — *kew.* — — regius kewensis.
 — *lugd.bat.* — — lugduno-batavus.
 — *petrop.* — — petropolitanus.
 — *segr.* — — segreziensis.
Host, Gram. — Host, Icones et descriptiones Graminum austriacorum
Host, Salix. — Host, Salix.
Houtt. — Houttuyn.

I

- Illustr. hort.* — Illustration horticole.

J

- Jacq. Fl. austr.* — Jacquin (Nicolaus Joseph von), Flora austriaca.
 — *Hort. schænbr.* — — Hortus schoenbrunnensis.
 — *Hort. vind.* — — Hortus botanicus vindobonensis.
 — *Icon.* — — Icones plantarum rariorum.
 — *Misc. austr.* — — Miscellanea austriaca ad botanicam.
 — *Ecl.* — — (Joseph Franz von) Eclogæ plantarum rariorum.
Jeaume St.-Hil. Fl. fr. — Jeaume de St.-Hilaire, Flore française.
 — *Pom. fr.* — — Pomone française.
Jaub. — Jaubert.
 — et *Spach. Illustr.* — Jaubert et Spach, Illustrationes plantarum orientalium.
 — et *Spach. Pl. or. ill.* — Jaubert et Spach, Illustrationes plantarum orientalium.
Jeffr. — Jeffrey.
J. F. Gmel. — Johann Friedrich Gmelin.
J. Gay, Jacques Gay.
Journ. hort. Soc. L. — Journal of horticultural Society of London.
 — *Soc. hort. Fr.* — Journal de la Société centrale d'horticulture de France.
Juss. — De Jussieu.

K

Kæmpf., Amœn. — Kæmpfer, Amœnitatum, etc.

— *Icon.* — Kæmpfer, Icones selectae plantarum quas in Japonia, etc.

Kalm. — Kalm (Pehr.)

Ker. — Ker (John Bellenden).

Kern. — Kerner.

— *Gen.* — Kerner, Genera plantarum selectarum specierum iconibus illustrata.

Kirchn. — Kirchner.

Knight. — Knight.

Kotsch. Die Eich. — Kotschy, Die Eichen europas un der orient.

Kth. Gram. — Kunth, Agrostographia synoptica.

Kth. et *Bouch.* — Kunth et Bouché.

L

L. ou *Lin.* — Linné.

L. fl. — Linné fils.

Lab. ou *Labill.* Syr. ou Pl. syr. rar. — Labillardière, Icones plantarum Syriæ rariorum.

Lamb. Pin. — Lambert, A description of the genus Pinus.

Lamk. Encycl. — De Lamarck, Encyclopédie méthodique.

— *Dict.* — De Lamarck, Dictionnaire ou Encyclopédie méthodique.

— *Illustr.* ou *Ill.* — De Lamarck, Illustrationes.

Lang. — Lang.

Lange. — Lange.

Lapeyr. — Picot de Lapeyrouse.

Lavall. Arbor. segrez. Ic. — Lavallée, Icones de l'Arboretum de Segrez.

Lawr. — Miss Mary Lawrance.

Laws. Pinet. brit. — Lawson, Pinetum britannicum.

Laxm. — Laxmann.

L. C. Rich. — Louis-Claude Richard.

Ledeb. Fl. alt. — Ledebour, Flora altaïca.

— *Icones.* — Ledebour, Icones floræ altaïcæ.

Lej. — Lejeune.

Lem. — Lemaire.

L'hérit. Corn. — L'héritier de Brutelle, Cornus.

— *Stirp. nov.* — L'héritier, *Stirpes novæ aut minus cognitæ.*

L'hort. fr. — Herineq, L'Horticulteur français de 1854.

Liebm. Chênes. — Liebman, Chênes de l'Amérique tropicale.

Lin. — Linné.

Lin. Transact. — Linnean society's Transactions.

Link. — Link.

Link et Otto, *Icon. hort. berol.* — Link et Otto, *Icones plantarum horti berolinensis.*

Lindl. — Lindley.

— *Bot. reg.* — Lindley, *Botanical register.*

— *Monogr. Ros.* — Lindley, *Rosarum monographia.*

Lob. *Icon.* — De Lobel (Lobelius), *Plantarum seu stirpium icones.*

Lodd. bot. cab. — Loddiges, *Botanical Cabinet.*

Lois. — Loiseleur-Deslongchamps.

— *Herb. am.* — Loiseleur-Deslongchamps, *Herbier de l'amateur.*

— *Nouv. Dub.* — Loiseleur, *Nouveau Duhamel.*

Loud. *Arb. brit.* — Loudon, *Arboretum et fruticetum britannicum.*

— *Encycl. of tres.* — Loudon, *Encyclopedia of trees and shrubs.*

Lour. — Loureiro.

M

Maak. *Tent. Fl. ussur* — Maak, *Tentamen floræ ussuriensis.*

Magn. — Magnol.

Manett. — Manetti.

Marsh. — Marshall.

Marsigl. — Marsigli (Marsilius).

Mart. et Galeot. — Martens et Galeotti.

Martyn. — Martyn.

Mast. Gard. chron. — Masters, *Gardener's chronicle.*

Maund, Bot. — Maund, *The botanic garden.*

Maxim. *Lesped.* — Maximowicz, *Lespedesa.*

— *Prim. Fl. amur.* — Maximowicz, *Primitiæ floræ amurensis.*

May. — Mayer.

M. Bibb. Cent. pl. rar. — Marshall von Bieberstein, *Centuria plantarum rariorum Rossicæ meridionalis.*

Medic. — Medicus.

Meisn. — Meisner.

- Mém. Mus.* — Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.
Mér. — Mérat.
Mhlbr. — Muhlenberg.
Michel. — Micheli.
Michx. Arb. Am. — Michaux fils, Histoire des arbres forestiers de l'Amérique septentrionale.
— Arb. for. — Michaux fils, Histoire des arbres forestiers de l'Amérique septentrionale.
— Chênes. — Michaux, Histoire des Chênes de l'Amérique.
Mill. Icon. — Miller, Icones plantarum.
Miq. — Miquel.
Mirb. — Brisseau-Mirbel.
Mos. — Mosino.
Moc. et Sess. — Mocino et Sessé.
Moench. Verzeich. Ausl. — Moench, Verzeichniss ausländischer Baume und Stauden.
Mol. — Molina.
Moor et Jackm. Clem. — Moor et Jackmann, The Clematis.
Moric. — Moricand.
Moris. Fl. sard. — Moris, Flora sardoa.
Morr. — Morren.
Muhl. — Muhlenberg.
Mull. — Muller.
Murr. Comment. Gætt. — Murray (Johan Anders), Commentarii societatis scientiarum gottingensis.
Murr. Bot. exped. to Oreg. — Murray, The botany of the expedition to Oregon.
Murr. fil. Pin. and Fire of Jap. — Murray fil, Pinetum and Fûres of Japon.
Munro. Bamb. — Munro, A. Monograph of the Bambusæ.
Mut. — Mutis.
Mutel. Fl. fr. — Mutel, Flore de France

N

- Ndn.* — Naudin.
Nees. — Nees von Esenbeck.
Nels. — Nelson.
Nestl. — Nestler.

Newb. in Will. report. — Newberry in Williams reports of botany of northern California and Oregon.

Nouv. Arch. mus. — Nouvelles archives du Muséum.

Nouv. Duh. — Nouveau Duhamel (Traité des arbres et arbustes).

Nutt. North-Am. Sylv. — Nuttall, the North-American sylva.

O

Ortg. — Ortgies.

P

Pall. Fl. ross. — Pallas, Flora rossica.

Parlat. in DC. Prodr. — Parlatore in Aug. Pyr. De Candolle, Prodromus systematis naturalis Regni vegetabilis.

Park. Parkinson.

Parr. — Parry.

Pav. — Pavon.

Paxt. — Paxton.

— Fl. gard. — Paxton's Flower garden.

— Mag. of bot. — Paxton, Magazin of botany.

Perrot. — Perrottet.

Pers. — Persoon.

Planch. — Planchon.

Pluk. — Plukenett.

Plum — Plumier.

Poepp. — Poeppig.

— Nov. gen. et spec. — Poeppig, Nova genera et species plantarum.

Poir. — Poiret.

— Eneyel. — Poiret, Eneyelopédie botanique.

Poit. Poiteau.

— et Turp. Arbr. fruit. — Poiteau et Turpin, Pomologie française, ou recueil des plus beaux fruits cultivés en France.

Poit. et Riss. — Poiteau et Risso, Histoire naturelle des Orangers.

Pourr. — Pourret.

Presl. — Presl.

Prsh. Fl. bor. amer. — Pursh, Flora Americæ septentrionalis.

R

- Ræusch.* — Ræuschel.
Rafin. — Rafinesque.
Rau. — Rau, *Enumeratio Rosarum*.
Rauch. — Rauch.
R. Br. — Robert Brown.
Rechb. Fl. germ. — Reichenbach, *Flora germanica*.
Redout. Ros. — Redouté, *Les Roses*.
— Lil. — Redouté, *Les Liliacées*.
— et Th. — Redouté et Thori, *Les Roses*.
Reg. — Regel.
— Bem. Bet. — Regel, *Monographisch Bearbeitung der Betulaceen*.
— Gartenfl. — Regel, *Gartenflora*.
— Tent. fl. ussur. — Regel, (in Maak) *Tentamen floræ ussuriensis*.
Reichb. Icon. fl. germ. — *Icones floræ germanicæ*.
Retz. — Retzius, *Observationes botanicæ*.
Rev. hort. — *Revue horticole*.
Rhecd. Hort. mal. — Rheedee, *Hortus indicus malabaricus*.
Rich. Conif. — Richard, *Mémoire sur les Conifères*.
Riss. Orang. — Risso, *Essai sur l'histoire naturelle des Orangers*.
Ræm — Rømer.
— Fl. Europ. — Roemer, *Flora europea inchoata*.
Ræm et Sch. — Rømer et Schultes.
Rælz. — Rælz.
Roxb. — Roxburgh.
— Corom. Pl. — Roxburgh, *Plants of the coast of Coromandel*.
Roxb. Fl. ind. — Roxburgh, *Flora indica*.
Royle, Illustr. — Royle, *Illustrations of the botany of the himalayan mountains*.
Ruel. — Rucling.
Ruiz et Pav. Fl. peruv. — Ruiz et Pavon, *Flora peruviana*.
Rumph. — Rumphius.
Rupr. — Ruprecht.
— Bamb. — Ruprecht, *Bambusæ*.
Rupr et Maxim. — Ruprecht et Maximowicz.

S

- Salisb.* Parad. lond. — Salisbury, The Paradisus londinensis.
Saltzm. Ros. — Saltzmann, De Rosa.
Santi. Viag. tose. — Santi, Viaggio al Montamiata.
Saund. et Bak., Refug. bot. — Saunder et Bak. Refugium botanicum.
Sav. Fl. ital. — Savi, Flora italiana.
Schied. — Schiede.
Schlech. ou *Schlecht.* — Schlechtendal.
Schk. Handb. — Schkuhr, Botanisches Handbuch.
Schr. — Schrader.
Schreb. — Schreber.
Schmidt, Arb. — Schmidt (Franz), Oesterreichs allgemeine Baumzucht.
Sims, — Sims, Botanical magazine.
Schtz. — Schultz.
Scop. Fl. carn. — Scopoli, Flora carniolica.
Ser. — Seringe.
Sibth. Fl. græc. — Sibthorp, Flora græca.
Sieb. — Sieber.
Sieb. et Zucc. — von Siebold et Zuccarini.
— Fl. jap. — von Siebold et Zuccarini, Flora japonica.
— Fam. nat. — von Siebold et Zuccarini, Floræ japonicæ familiæ naturales.
Sitgrves, Rep. — Sitgreaves, Report of an expedition dawn Colorado.
Sine. Jam. — Sloane, A voyage to the Islands Madera and Jamaica.
Smith, Exot. bot. — Smith, Exotic Botany.
— Leon. piet. — Smith, Icones pictæ plantarum rariorum.
— Spieil. — Smith, Spieilegium botanicum.
Sol. ou *Soland.* — Solander.
Soul. Bol. — Soulange Bodin.
Soy.-Wilm. — Soyer-Willemet.
Spach, Suit. Buff. — Spach, Suites à Buffon.
Spreng. — Sprengel.
Staunt. — Staunton.
Steud. — Steudel.
Stev. — Steven.
Swtz. — Swartz.

Swtz. Trans. lin. soc. — Swartz, Transactions of the Linnean society of London.

— bot. — Swartz, Observationes botanicæ.

Sweet, Cist. — Sweet, Cistineæ.

T

Tausch. — Tausch.

Tchihat. — Tchihatchef.

Ten. Fl. nap. Icon. — Tenore, Icones floræ napolitanæ.

— Fl. napolit. — Tenore, Flora napolitana.

Thom. et Hook. — Thomson et Hooker.

Thor. — Thory.

Thouin. — Thouin (André).

Thuill. — Thuiller.

Thunb. Fl. jap. — Thunberg, Flora japonica.

Thur. — Thuret (Gustave).

Torr. — Torrey.

— Fl. New-York. — Torrey, Flore of the state of New-York.

Torr. et Gr. — Torrey et Asa Gray.

Torr. et Frem. To Rock. mount. — Torrey et Fremont, Report of the exploring expedition to the Rocky mountains.

Tourn. — Tournefort.

Tradesc. — Tradescant.

Trans. Edimb. soc. — Transactions of the Edinburgh society.

Tratt. Arch. — Trattinick, Archiv der Gewachskunde.

Trautv. Imag. fl. russ. — Trautvetter, Plantarum imagines et descriptiones Floram rossicam illustrantes.

Tréc. — Trécul.

Turez. — Turczaninow.

Turp. Turpin.

V

Vahl. — Vahl.

— Symb. bot. — Vahl, Symbolæ botanicæ.

V. Htte. — Van-Houtte

Vent. — Ventenat.

— Ch. de pl. — Ventenat, Choix de plantes.

Vent. Jard. Cels. — Ventenat, Plantes nouvelles du Jardin de Cels.

— Malm. — Ventenat, Jardin de la Malmaison.

Versch. Illustr. Cam. — Verschaffelt, Illustration des Camellia.

W

Vill. — Villars.

Visian. — Visiani.

Wahlenb. — Wahlenberg.

Wald. et Kit. Hung. rar. — Waldstein et Kitaibel, *Descriptiones et Icones plantarum rariorum Hungariæ.*

— — *Fl. hung.* — Waldstein et Kitaibel, *Flora hungaria.*

Wall Tent. fl. nepal. — Wallich, *Tentamen floræ nepalensis illustratæ.*

Walp. — Walpers.

Walt. Fl. Carol. — Walter, *Flora caroliniana.*

Wangenh. Beitr. — Wangenheim, *Beitrag zur teutschen holzgerechten Forstwissenschaft.*

Wats. Dendr. brit. — Watson, *Dendrologia britannica.*

Webb. — Webb.

— et *Bert.* — Webb et Berthelot.

Wendl. Collect. pl. — Wendland, *Collectio plantarum, etc.*

Weihe. Rub. — Weihe et Nees von Esenbeck, *Rubi germanici descripti et figuris illustrati.*

Wesm. Mon. Popul. — Wesmael, *Monographie du genre Populus.*

Wght. Icon. pl. ind. or. — Wight, *Icones plantarum Indiæ orientalis.*

Willd. — Willdenow.

— *Baumz.* — Willdenow, *Berlinische Baumzucht.*

— *Hort. berol.* — Willdenow, *Hortus berolensis.*

Wimm. — Wimmer.

Winsl. — Winslow.

Witcher. ou Wither. — Withering.

Woods. — Woods.

Wulf. — Wulfen.

Z

Zeyh — Zeyher.

Zucc. — Zuccarini.

ARBORETUM SEGREZIANUM

ÉNUMÉRATION DES ESPÈCES ET VARIÉTÉS

DICOTYLEDONEÆ

POLYPETALÆ

RANUNCULACEÆ

CLEMATIS Lin.

§. FLAMMULA :

C. mandshurica *Rupr.* — Mandshuria.

C. Flammula *L.* — *Rehb.* Fl. germ. IV, tab. 62 et 64. —
Europa.

C. fragrans *Ten.*

var. maritima.

C. maritima *L.* — *Rehb.* Ic. tab. 4665.

— *rubella.*

— *linearis.*

C. orientalis *L.* — *Dill.* Elth., tab. 419; *Lavall.* Arbor.
segrez. Icones, tab. ined. — Caucasus.

C. flava *Mœnch.*

C. graveolens *Lindl.* Journ. Hort. soc., p. 307. —
Bot. mag., tab. 4495.

Meclatis orientalis *Spach.*

- C. glauca** Willd. — Wats. Dendr. brit. I, tab. 73. — Sibiria.
C. orientalis var. glauca Hort.
Meclatis sibirica Spach.
- C. apilifolia** DC. — Japonia.
- C. Vitalba** L. — Engl. bot. IX, tab. 612; *Jacq. Fl. austr.*, tab. 303. — Gallia.
- C. paniculata** Thunb. — Japonia.
C. Vitalba japonica Houttuyn Pflanz., tab. 2.
- C. Grahami** Benth. — Journ. Hort. soc. I, tab. 315. — Mexico.
- C. virginiana** L. — Wats. Dendr. brit., tab. 74. — Amer. sept.
var. bracteata.
C. bracteata Mœnch.
- C. bitermata** Sieb. et Zucc. — Japonia.
Clematis virginica Thunb. (non Lin.).
- C. montana** Hamilt. — Bot. reg. XXVI, tab. 53; *Moor et Jackm. Clematis*, tab. 8. — Nepalia.
C. anemoneflora Don.
var. grandiflora. — Bot. mag., tab. 4061.
- C. mendocina** Hort. — Chili?

§. VIORNÆ :

- C. villosa** DC. — India.
- C. soongarica** Bge. — Songaria.
C. Gebleriana Bnge. Acad. Petersb. VI, tab. 4.
- C. Pitcheri** Torr. et Gray. — Arkansas.
- C. grata** Wall. Pl. asiat. rar. I, tab. 98. — India orientalis.
- C. Viorna** L. — *Jacq. Ecl.*, tab. 32; *Andr. repos.* I, tab. 71.
 — America septentrionalis.
Viorna urnigera Spach.
- C. cylindrica** Sims, Bot. mag., tab. 4160. — Amer. sept.
C. divaricata *Jacq. Ecl.*, tab. 33.
Viorna cylindrica Spach.

C. cordata Walt. (non Pursh). — Bot. mag., tab. 4816. —
America septentrionalis.

C. Simsii Sweet.

C. rosea Smith.

C. crispa L. — Bot. mag., tab. 4892; Bot. reg. XXXII, tab. 60.
— Virginia.

C. reticulata Walt. (non Wats.).

C. crispa rosea Hort.

C. reticulata Wats. Dendr. I, tab. 72. (non Walt.). — Georgia.

C. Schillingii C. Koch.

C. Hendersoni Hort.

C. Chandleri Hort. brit.

var. pallida (intermedia).

C. japonica Thunb. — Japonia.

§. VITICELLA.

C. campaniflora Brot. — Lodd. Bot. cab., tab. 987. — Iberia.

C. parviflora DC. Hort. Genev., tab. 12.

C. revoluta Desf. (non Walt. nec Wats.).

C. viornoides Hort.

C. Viticella L. — Bot. mag., tab. 563. — Europa merid.

var. Guascoi. — Belg. hort. VII, tab. 37; Ill. hort. 1857, tab. 117.

Alt. variet. hortenses multe.

C. patens Dcne. Bull. acad. Brux. III, 173. — Rev. hort.
1856, tab. 44. — Japonia.

C. cærulea Lindl. Bot. reg., tab. 1955.

C. — grandiflora. — Bot. mag., tab. 3983.

C. — azurea. — Harting. Parad. I, tab. 3.

var. Helena. — Rev. hort. 1855, tab. 48.

— *Louisa*. — Fl. des serres X, tab. 1052.

— *rubra grandiflora* Moor et Jackm., Clematis, tab. 2, fig. 2.

— *venosa* Hort. (non Royle). — Fl. des serres XIII, tab. 1964.

— *Sophia* Sieb. — L'Hort. franç. 1854, tab. 1; Fl. des serres
VIII, tab. 852.

— *speciosa plena*. — Illust. hort. V, tab. 184.

STIRPES VEL VARIETATES INCERTÆ.

- var. Jackmanni* — *Moor et Jackm.* Clematis, tab. 14; l'Hort. franç. 1872, tab. 2; Fl. des serres XVI, tab. 1628.
- *John Gould Weitch.* — *Moor et Jackm.* Clematis, tab. 7; Fl. des serres XVIII, tab. 1875.
- *Mad. J. Bateman.* — *Moor et Jackm.* Clematis, tab. 2, fig. 1.
- *magnifica.* — *Floral mag.* tab. 153.
- *marmorata.* — *Moor et Jackm.* Clematis, tab. 4, fig. 2.
- *rubella.* — *Moor et Jackm.* Clematis, tab. 4, fig. 4.
- *rubro-violacea.* — Fl. des serres XVI, tab. 1629.
- *splendida (splendens).* — *Rev. hort.* 1865, p. 70.
- C. florida** *Thunb.* — *Bot. mag.*, tab. 884; *Rev. hort.* 1856, tab. 3. — Japonia.
- var. Tessen (millefolia).*
- flore albo.
- — pleno. — *Jacq. Hort. Schœnbr.* tab. 357.
- C. Sieboldi** *Don.* — Fl. des serres V, tab. 487; *Rev. hort.* 1856, p. 24; *Moor et Jackm.* Clem. tab. 16. — Japonia.
- C. florida var. bicolor Lindl.* *Bot. reg.* XXIV, tab. 25.
- C. Standishii** *Moor.* — *Belg. hort.* XIV, tab. 3. — Japonia.
- C. Fortunei** *Moor.* — *Florist and Pomol.* 1863, p. 169 cum Icon.; Fl. des serres XV, tab. 1553; *Moor et Jackm.* Clematis, tab. 43. — Japonia.
- C. lanuginosa** *Lindl.* — *L'Hort. franç.* 1855, tab. 4; Fl. des serres VIII, tab. 814; *Moor et Jackm.* Clematis, tab. 4. — China et Japonia.
- var. candida.* — *Floral mag.* tab. 210.
- *lady Bowill.* — *Moor et Jackm.* Clematis, tab. 15.
- *pallida.* — Fl. des serres XI, tab. 1176.
- *Reginæ.* — *Floral mag.* tab. 175.

§. CHEIROPSIS :

C. elrrhosa *L.* — Bot. mag., tab. 1070; Bot. reg. XXXIII, tab. 21; *Sibth.* Fl. gr. tab. 317. — Sicilia.

var. pedicellata.

C. pedicellata *Lindl.* Bot. reg. XXXIII, tab. 21.

C. balearica *Pers.* (non *Rich.*).

C. calycina *Ait.* — *Lodd.* Bot. cab. tab. 720; Bot. mag., tab. 939. — Insula Minorca.

C. balearica *Rich.* (non *Pers.*).

C. barbellata *Edgew.* — Bot. mag. tab. 4794; Fl. des serres IX, tab. 956. — Himalaya.

C. nepalensis *Royle.*

§. ATRAGENE :

C. alpina *Mill.* — Bot. repert., tab. 480. — Europa media.

Atragene alpina *L.* — *Pall.* Fl. ross. II, tab. 76.

C. sibirica *Mill.* — Sibiria.

Atragene sibirica *L.* — Bot. mag., tab. 4931.

C. verticillaris *DC.* — America borealis.

Atragene americana *Sims*, Bot. mag., tab. 887.

PEONIA *Lin.*

P. Moutan *L.* — *Bonpl.* Malm. tab. 1 et 23; *Nouv. Duham.*

VII, tab. 3; Bot. mag., tab. 1155 et 2175. — China.

P. arborea *Hort.*

var. papaveracea *Lodd.* Bot. cab. tab. 347.

P. papaveracea *Andr.* Bot. repos. VII, tab. 463.

— *Banksii.*

— *grandis.*

P. germania *Hort. Sieb.*

Varietates hortenses multæ.

XANTHORHIZA *L'Hérit.*

X. apiifolia *L'Hérit.* Stirp. tab. 38. — Bot. mag., tab. 4736;

Nouv. Duham. III, tab. 37. — Virginia.

MAGNOLIACEÆ

ILLICIUM Lin.

- I. religiosum** *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 4; Bot. mag., tab. 3963. — Japonia.
- I. floridanum** *Ell.* Lett. to Lin. — *Lamk*, Encycl. tab. 493; Bot. mag., tab. 439. — America septentrionalis.
- I. anisatum** *L.* — *Lamk*, Encycl., tab. 493. — China.
Vulg. *Anis étoilé.*
- I. parviflorum** *Michx.* — *Vent.* Jard. Cels, tab. 22. — Florida.

DRYMIS Forst.

- D. Winteri** *Forst.* — *Lamk*, Illustr., tab. 494; *Hayne* IX, tab. 6. — Fret. Magellan.

MAGNOLIA Lin.

SPECIES AMERICANÆ :

- M. grandiflora** *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 4. — *Nouv.* Duham. II, tab. 63. — Carolina.
- var. angustifolia.*
- *crispa*
 - *Gallissonieri.*
 - *macrantha.*
 - *majardieriensis.*
 - *nannetensis.*
 - *oxoniensis.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 814.
 - *rotundifolia.*
 - *salicifolia.*
 - *stricta.*

M. glauca L. — *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 2; Bot. mag., tab. 2164. — America septentrionalis.

var. longifolia.

— *pumila.* — Bot. mag., tab. 977; *Vent. Malm.*, tab. 37.

— *Thompsoniana.*

M. Thompsoniana Hort.

— *sempervirens.*

— *arborea.*

M. umbrella Lamk. — *Herb. amat.* III, tab. 198. — Amer. sept.

M. tripetala Michx fil. Arb. amer. III, tab. 5.

M. acuminata *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 3. — Bot. mag. tab. 2427. — America septentrionalis.

M. maxima Lodd.

var. rustica.

M. rustica Hort.

M. auriculata Lamk. — *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 6; Bot. mag., tab. 1206. — Carolina.

M. pyramidata Bartr. — Bot. reg., tab. 107. — Carolina.

M. auriculata var. Michx.

M. Fraseri Walt.

M. macrophylla *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 7; Bot. mag., tab. 2189. — America septentrionalis.

M. cordata *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 6. — Bot. reg., tab. 325. — America septentrionalis.

var. biflora.

SPECIES ASIATICÆ:

M. Campbelii Hook. et Th. — Hook. in *Cathart* II. Him., tab. 4 et 5. — Sikkim et Bhotan.

M. conspicua Salisb. — Bot. mag., tab. 4621; Bot. reg., tab. 1164. — China.

M. Yulan Desf. — *Bonpl.* Malm. tab. 29; *Herb. amat.* V, tab. 297; *Lodd. Bot. cab.*, tab. 1187.

Yulania conspicua Spath.

M. conspicua.*var. stricta.*— *Soulangeana*. — Ann. soc. hort. Par. I, p. 90, cum
Icon.; Bot. reg., tab. 4464.— *Fischeri*.*M. odoratissima Remw.*— *Alexandrina (superba)*.*M. Northbertii Hort.*— *Bylsiana*.— *spectabilis (alba)*.*M. spectabilis Hort.*— *triumphans*.— *speciosa*.**M. Kobus DC. — Japonia.***M. gracilis Salisb. Parad., tab. 87.**Yulania Kobus Spach.**var. unicolor.***M. obovata Thunb. Kermer hort., tab. 653. — Japonia.***Yulania japonica Spach.**var. discolor.**M. discolor Vent. Malm., tab. 24. — Nouv. Duham. II,*
*tab. 66 bis.**M. purpurea Curtis, Bot. mag., tab. 390.*— *liliflora.**M. liliflora Lamk. — Banks., Ic. Kæmpf., tab. 44.*— *floribus roseis (subroseis)*.— — *atropurpureis.*— *Lenneï.* — Fl. des serres, XVI; tab. 4693; Rev. hort.
1866, p. 370, cum Icon.**LIRIOPSIS Spach****M. fuscata Spach. — China.***Magnolia fuscata Andr. Bot. reposit. tab. 2100. — Bot*
mag. tab. 1008.

TALAUMA Juss.

T. pumila *Blum.* Fl. jav. fasc. 19, tab. 42. — China.

Magnolia pumila *Andr.* Bot. Rep. IV, tab. 226. — *Vent.*

Malm., tab. 37; *Bot. mag.*, tab. 977.

Liriodendron liliifera *L.*

LIRIODENDRON Lin.

L. Tulipifera *L.* — *Michx. pl.* Arb. amer. III, tab. 5; *Nouv.*

Duham. III, tab. 5. — America septentrionalis.

var. acutifolia aurea. — *Fl. des serres*, XIX, tab. 1025.

— *contorta.*

— *crispa.*

— *foliis medio-pietis.*

— *heterophylla.*

— *integrifolia.* — *Illustr. hort.* XV, tab. 574.

— *pyramidalis.*

— *variegata.*

SCHIZANDRACEÆ

SCHIZANDRA Michx.

S. chinensis *Hook. et Benth.* — Ussuri.

Maximowiczia chinensis *Turcz.* — *Maxim.* Prim. fl.

amur., tab. 4; *Fl. des serres* XV, tab. 1273.

M. amurensis *Rupr.*

Kadsura chinensis *Turcz.*

KADSUREA Juss.

K. japonica *Kämpf.* Amœn., tab. 474. — *Sieb. et Zucc.* Fl

jap., tab. 17. — Japonia.

var. variegata.

DILLENIACEÆ

ACTINIDIA Lindl.

A. volubilis *Hort. segrez.* — Japonia.

Trocho stigma volubile Sieb. et Zucc.

A. polygama *Planch.* — *Lavall. Arbor. segrez. Icones, tab. ined.* — Regio amur.

Trocho stigma polygama Sieb. et Zucc.

A. Kolomikta *Rupr.* — Ussuria.

Trocho stigma Kolomikta Maxim.

Prunus Kolomikta Maxim.

Kolomikta mandshurica Regel.

ANONACEÆ

ASIMINA Adans.

A. triloba *Dunal.* — Pensylvania et Florida.

Anona triloba Michx fl. Arb. amer., III, tab. 9.

A. glabra Hort. (non Lin.).

LARDIZABALEÆ

AKEBIA Dene.

A. quinata *Dene.* — *Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 77; L'Hort.*

franc. 1869, tab. 4; Lava'l. Arbor. segrez. Icones, tab. ined. — Japonia.

Rajania quinata Thunb.

HOLLEBELLIA Wall.

H. latifolia *Wall. Tentam. fl. nepal, tab. 16.* — Nepalia.

Stauntonia latifolia Hort. (non Wall.). — *Gard. chron. 1876, fig. 46.*

STAUNTONIA DC.

S. chinensis DC. — China.

S. hexaphylla Dene. Arch. Mus. I, tab. 2. — Sieb. et Zucc.
Fl. jap., tab. 176 ; Garden. Chron. 1876, fig. 107. —
Japonia.

LARDIZABALA Ruiz. et Pav.

L. bitermata Ruiz. et Pav. — Dene, Arch. Mus. 4, tab. 44,
fig. A; Bot. mag., tab. 4301 ; Belg. hort. III, tab. 51.
— Chili.

L. tritermata Ruiz et Pav. — Deless. Icon. I, tab. 94. — Chili.

MENISPERMEÆ**COCCULUS** C. Baulh.

C. Thunbergii DC. — Japonia.

Menispermum orbiculatum Thunb.

C. japonicus DC. — Japonia.

Menispermum japonicum Thunb.

C. carolinus DC. — Gray Genera., tab. 28. — Florida.

Menispermum carolinum L.

MENISPERMUM Tourn.

M. canadense L. — Bot. mag., tab. 1910; Spach, Suites
Buff., tab. 62. — America borealis.

var. virginica.

M. dauricum DC. — Deless. Icon. I, tab. 100. — Dahuria.

BERBERIDEÆ

BERBERIDOPSIS Hook. fil.

B. corallina *Hook fil.* Bot. mag., tab. 5443; — L'Hort. franç. 1863, tab. 13. — Chili.

BERBERIS Lin.

B. vulgaris *L.* — Nouv. Duham. IV, tab. 4; Engl. bot. I, tab. 49. — Europa, Asia et America.

var. foliis purpureis.

— — *variegatis.*

— — *macrocarpa.*

B. monspeliensis Hort.

— *fructu albo.*

— — *violaceo.*

— *cuneata Hort. (non Banks.).*

— *declinata Hort. (non Schrad.).*

— *gracilis.*

— *ovalifolia aurea.*

— *sanguinolenta Schrad.*

B. sinensis Aliq. Hort. (non Desf.).

— *chinensis Hort. (non Desf.).*

B. sinensis hybrida Hort.

B. sinensis *Desf.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 26. — China.

B. monosperma Hort.

B. spathulata Hort. (non Schrad.).

B. serratifolia *Poir.*

B. microphylla Hort.

B. cretica *L.* — *Sibth.* Fl. gr., tab. 342. — Creta.

B. iberica *Steven.* — Caucasus.

B. sibirica *Pall.* — Bot. reg., tab. 487. — Sibiria.

B. altaica Pall. Fl. ross. II, tab. 67,

- B. nitens** *Schrad.* — America borealis.
- B. spathulata** *Schrad.* — America septentrionalis.
- B. canadensis** *Mill.* (non *Pursh*). — *Gray*, Gen., tab. 31. —
America septentrionalis.
- B. caroliniana** *Loud.* — America sept.
- B. Fischeri** *Hort. segreg.* — America sept.?
- B. lucida** *Schrad?* — Iberia.
- B. laxa** *Hort. Boott.* — Patria ignota.
 B. canadensis Hort. (non *Miller*).
- B. amurensis** *Rupr.* — Mandshuria.
- B. emarginata** *Hort.* (non *Willd.*).
- B. cratægina** *DC.* — Asia minor.
 B. ilicifolia Hort. (non *Forst.*).
- B. ætnensis** *Presl.* — *Moris*. Fl. sard., tab. 5. — Sardinia.
 B. macracantha Guss. Fl. sic.
 B. cretica Lois. (non *Lin.*).
- B. provincialis** *Hort. Audub.* — Gallia merid.
 B. ilicifolia Aliq. Hort. (non *Forst.*).
- B. petiolaris** *Hort.* (non *Wall.*).
- B. globularis** *Hort.*
- B. elegans** *Desf.* — Asia septentrionalis.
- B. nepalensis** *Hort.* (non *Spreng.*).
- B. aristata** *DC.* — Bot. mag., tab. 2349. — Nepalia.
 B. Chitria Hamilt. — Bot. reg., tab. 729.
 var. floribunda.
 B. floribunda Wall.
- B. asiatica** *Roxb.* — *Deless.* Icon. II, tab. 4. — Himalaya.
- B. tinctoria** *Lesch.* — *Deless.* Icon. II, tab. 2 ; *Wight.* Ill.,
 tab. 8. — India orientalis.
 B. nepalensis Lodd. (non *Spreng.*).
- B. Kämpferi** *Hort. segreg.*
- B. Neuberti** *Hort. Baum.* (Stirps hybrida ?). — Illustr.
 hort. I, p. 444 cum icon.

- B. actinacantha** Mart. — Bot. reg. XXXI, tab. 55. — Magell.
var. Knightii.
B. Knightii Hort.
- B. ruscifolia** Lamk, Illustr., tab. 253. — America austr.
B. sulcata Koch et Bouché.
B. angustifolia Hort. (non Roxb.).
B. heterophylla Hort. (non Juss.).
B. Lycium Hort. (non Royle).
B. umbilicata Hort.
- B. Thunbergii** DC. — Japonia.
B. cretica Thunb. (non Lin., nec Lois.).
- B. Wallichiana** DC. — Wall. Pl. asiat., tab. 243; Bot.
mag., tab. 4656. — Nepalia.
- B. Hookeri** Hort. brit. — Illustr. hort. VI, tab. 207.
B. Jamesii Hort.
- B. macrophylla** Hort.
B. Wallichiana Herincq, L'Hort. fr. 4868, tab. 9 (non DC.)
- B. Darwinii** Hook. Icon. plant., tab. 672. — Bot. mag., tab.
4590; Fl. des serres VII, tab. 763. — Chili.
- B. dulcis** Sweet, Flow. gard. II, tab. 400. — L'Hort. franç.
1857, tab. 44; Pact. Mag. X, tab. 474. — Magell.
- B. buxifolia** Lamk, Encycl., tab. 253. — Lodd. Bot. cab.
tab. 1944. — Magellania.
B. rotundifolia Hort.
B. dulcis Hort. (non Sweet).
var. nana.
- B. cristata** Hort. segreg. — Fret. Magellan.
B. buxifolia var. cristata Lamk.
- B. empetrifolia** Lamk, Encycl., tab. 253. — Bot. reg.,
XXV, tab. 27. — Magellania.
- B. stenophylla** Hort. brit. (Stirps hybrida?).

MAHONIA DC.

M. fascicularis DC.— Bot. mag., tab. 2996. — Nov. Gran.

Berberis fascicularis Sims, Bot. reg., tab. 762.

var. serrata.

M. Aquifolium Nutt. — Paxt. Mag. IX, tab. 5. — Amer. sept.

Berberis Aquifolium Pursh. — Bot. reg., tab. 1425.

var. erecta.

— stricta (macrocarpa Hort.).

— gracilis.

— anemonefolia.

— crassifolia.

— diversifolia.

M. diversifolia Sweet, Fl. gard. II, tab. 94.

— intermedia.

— rotundifolia.

— Wagneri.

M. repens G. Don.

Berberis repens Lindl. Bot. reg., tab. 1176.

M. glumacea DC. — Paxt. Mag. VII, tab. 55. — Amer. sept.

Berberis glumacea Spreng. — Bot. reg., tab. 1426.

var. nervosa.

Berberis nervosa Pursh. — Bot. mag., tab. 3949.

M. nepalensis DC. — Deless. Icon. II, tab. 4. — Nepal.

Berberis nepalensis Spreng. — Jard. Fleur. III, tab. 278.

B. Miccia Hamilt.

M. japonica DC. — Japonia.

M. Bealii Herincq, L'Hort. franç. 1855, tab. 43.

M. Fortunei Lindl. Journ. Hort. soc. I, p. 251.

M. intermedia Hort.

Berberis Bealii Curt. Bot. mag., tab. 4852.

var. planifolia.

Berberis Bealii var. planifolia Hook. Bot. mag., tab. 1846.

M. Sieboldi Hort. segreg. — Japonia.

M. japonica Hort. (non DC.).

M. Bealii Hort. (non Herincq.).

Berberis Sieboldi Miq. in Ann. mus. bot. bat. II, p. 69.

M. trifurca Fort. — Paxt. Fl. gard. III, fig. 253. — China sept.

M. trifoliata Hartw. — Mexico.

Berberis trifoliata Lindl. Bot. reg., XXXI, tab. 40. —

Fl. des serrés I, 56.

M. longifolia Hort. segreg. — Patria ignota.

M. Leschenaulti Wall. — India orientalis.

M. pallida Benth. — Bot. reg. XVII, tab. 44. — Mexico.

M. Ehrenbergii Kunze. — Mexico.

Escallonia illinita Presl. — Bot. reg., tab. 1900.

NANDINA Thunb.

N. denudata Lavall. Arb. segreg. Icon., tab. ined. — Japon.

N. domestica var. *tenuifolia* Hort.

var. *foliis variegatis*.

— *minor*.

— *fructibus albis*.

— — *flavis*.

N. domestica Thunb. — Kämpf. Ic. sel. tab. 44; Bot. mag.,

tab. 4109; Herb. amat., tab. 284. — China et Japon.

var. *purpurea*.

N. domestica var. *heterophylla* Hort.

CAPPARIDEÆ

ISOMERIS Nutt.

I. arborea Nutt. — Bot. mag., tab. 3842. — California.

BIXACEÆ

AZARA Ruiz et Pav.**A. dentata** Ruiz et Pav. — Bot. reg., tab. 1788. — Chili.*A. ovata* Hort.**A. integrifolia** Ruiz et Pav. — Chili.**IDESIA** Maxim.**I. polycarpa** Maxim. — Japonia.*Polycarpa Maximowiczii* Hort.*Flacourtia japonica* Hort.

POLYGALEÆ

POLYGALA Tourn.**P. Chamæbuxus** L. — Bot. mag., tab. 916. — Europa.

CISTINEÆ

HELIANTHEMUM Tourn.**H. variabile** Spach. — Europa, etc.*H. vulgare* Gærtn. — Sweet, Cistineæ, tab. 34.*var. multiplex*. — Sweet, Cist., tab. 64.**H. diversifolium** Sweet, Cist., tab. 93. — Regio medit.*var. multiplex* — Sweet, Cistineæ, tab. 98.**H. grandiflorum** DC. — Sweet, Cist., tab. 69. — Regio medit.*var. flore pleno***H. roseum** DC. — Sweet, Cist., tab. 53. — Europa merid.*var. multiplex*. — Sweet, Cist., tab. 86.**H. virgatum** Pers. — Sweet, Cist., tab. 79. — Regio medit.

Arbor. segreg. Enumeratio.

2

CISTUS Tourn.

C. iadaniferus L. — Bot. mag., tab. 112; Herb. amat. IV, tab. 265; *Sweet*, Cist., tab. 4 et 84. — Hispania.

var. angustifolia.

Cistus angustifolius Juss. — *Jacq.* Hort. Vind. IV, tab. 53.

C. laurifolius L. — *Sweet*, Cistineæ, tab. 52. — Hispania.

MALVACEÆ

HIBISCUS Lin.

H. syriacus L. — Bot. mag., tab. 83; Nouv. Duham., tab. 27.
— Syria.

Varietates hortenses multæ.

H. Hamabo Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 93. — Japonia.

PLAGIANTHUS Forst.

P. divaricatus Forst. — Bot. mag., tab. 3274. — Nova-Zeland.

STERCULIACEÆ

STERCULIA Lin.

S. platanifolia L. — *Spach*, Suites Buff., tab. 69. — China
Firmiana platanifolia Marsigl.

var. japonica Sieb.

TILIACEÆ

TILIA Lin.

SPECIES EUROPEÆ.

T. sylvestris Desf. — Europa.

T. parvifolia Ehrh. — Engl. bot., tab. 1705.

T. microphylla Vent. Mém. Instit. IV, tab. 4.

T. ulmifolia Scop.

T. europæa var. γ L.

var. pubescens.

— rosea.

— marginata alba.

— Parmentieri.

— Blechiana.

T. dasystyla Stev. — Tauria.

T. euchlora C. Koch.

T. mollis Spach. — Europa centralis.

T. platyphylla Scop. — Neuv. Duham. I, tab. 50.

T. grandifolia Ehrh. — Smith, Engl. bot., tab. 2720.

T. communis var. Spenn.

T. europæa Desf. — Fl. danica IV, tab. 533.

T. rubra DC.

T. hollandica Hort. (non Duroi).

var. pyramidalis.

T. pyramidalis Host. — Richb. Fl. germ, VI, tab. 323.

— pendula.

— vitifolia.

T. vitifolia Host. — Richb. Fl. germ. VI, tab. 319.

— corallina.

T. rubra DC.

T. triflora Horn.

— spectabilis.

T. argentea Desf. — *Rehb.* Fl. germ. VI, tab. 324. — Hungaria.

T. rotundifolia Vent. Mém. Instit. IV, tab. 4. —

Nouv. Duham. I, tab. 52.

T. tomentosa Mænk.

var. pendula.

— *fructu oblongo.*

— *pannonica (depressa rosea Hort.).*

— *mandshurica.*

T. mandshurica Rupr. et Maxim.

SPECIES AMERICANÆ.

T. truncata Spach. — Carolina.

T. pubescens var. Vent.

T. glabra Vent. Mém. Inst. IV, tab. 2. — America sept.

T. americana L. — *Wats.* Dendr. brit., I, tab. 45; *Michx*
fil., Arb. amer. III, tab. 4.

T. canadensis Michx.

T. hollandica Duroi (non Hort.).

T. nigra Barchk.

var. mississippiensis.

T. mississippiensis Bosc.

— *pendula.*

— *macrophylla.*

— *hybrida superba.*

— *longidentata (longiflora dentata Hort.).*

T. neglecta Spach. — America septentrionalis.

T. laxiflora Michx (non Willd.). — Florida.

T. pubescens Ait. — Nouv. Duham. I, tab. 51; *Michx*
fil., Arb. amer. III, tab. 3.

T. leptophylla Hort.

T. heterophylla Vent. Mém. Inst. IV, tab. 5. — Amer. sept.

T. alba Michx fil., Arb. amer. III, tab. 2.

T. macrophylla Hort.

T. gigantea Hort.

ARISTOTELIA L'HÉRIT.

A. Macqui L'Hérit. Stirp., tab. 46. — Chil.

TERNSTROEMICEÆ**STACHYURUS** Sieb. et Zucc.

S. præcox Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 48. — Japonia.

S. japonicus Sieb.

var. gracilis.

TERNSTROEMIA Lin.

T. japonica Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 80. — Japonia.

Cleyera japonica Thunb. (non Sieb. et Zucc.).

var. variegata.

CLEYERA Thunb.

C. japonica Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 81 (non Thunb.).

— Japonia.

C. ochracea DC.

var. longifolia.

— *variegata.*

EURYA Thunb.

E. japonica Thunb. Fl. jap., tab. 25. — Japonia.

var. latifolia variegata.

E. latifolia Sieb. et Zucc.

— *angustifolia marginata.*

E. chinensis R. Br. — Lodd. Bot. cab., tab. 1213. — China.

E. littoralis Sieb. et Zucc.

STUARTIA Lin.

- S. pentagyna** *L'Hérit.* Stirp. nov., tab. 74. — Bot. reg., tab. 4104. — America septentrionalis.
Malachodendron ovatum Cav. Diss., tab. 158.
S. virginica *Michx.* — *Cav.* Diss., tab. 159. — America sept.
S. Malachodendron L.
S. marylandica Andr. Bot. repos., tab. 73.
S. grandiflora *Sieb.* — Japonia.

GORDONIA Ell.

- G. lasianthus** *L.* — Bot. mag., tab., 668; *Michx fil.*, Arb. amer. III, tab. 4. — America septentrionalis.
G. pubescens *Pursh.* — Herb. amat., tab. 236; *Michx fil.*, Arb. amer. III, tab. 2. — Carolina.

CAMELLIA Lin.

- C. japonica** *L.* — *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 82; Herb. amat., tab. 43-46; *Versh.* Illust. Camellia. — Japonia.
var. apucæformis Hort. Sieb.
 — *quercifolia.*
Varietates hortenses multæ.
C. Sasanqua *Thunb.* Fl. jap., tab. 39. — Bot. mag., tab. 2080. — Japonia.
var. Batavia.
 — *oleifera.*

THEA Lin.

- T. chinensis** *Sims.* Bot. mag., tab. 998. — China.
var. Bohea.
T. Bohea L. — Bot. mag., tab. 998; *N. Duh.* II, tab. 6.
 — *viridis.*
T. viridis L. — Bot. mag., tab. 3148.
T. macrophylla *Sieb.* — Japonia.
T. assamica Hort.

AURANTIACEÆ

CITRUS Lin.

C. japonica *Thunb.* Ic. fl. jap., tab. 15. — China.

C. Bigaradia var. *chinensis* *Poit. et Riss.* — Nouv. Duham. VII, tab. 5.

C. sinensis *Riss.*

Vulg. *Kum-Kouat*.

var. *spinosa* *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 15.

— *inermis* *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 15.

C. californica *Hort.*

— *margarita* (fructu elliptico) *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 15.

C. aurantium japonica. — Bot. mag., tab. 6128.

C. leucocarpa *Sieb.* — Japonia.

C. Daidai *Sieb.* — Japonia.

C. myrtifolia *Ferr.* Hesp. tab. 433, fig. 2. — China.

C. Bigaradia var. *myrtifolia* *Poit. et Riss.*, tab. 50.

C. sinensis *Hort.* (non *Riss.*).

Vulg. *Oranger à feuilles de Myrte*.

C. nobilis *Lour.* — *Andr.* Bot. repos. IX, tab. 608. — China.

C. deliciosa *Ten.* Mem. Oranc. Mandarin, et Ind. sem. hort.

Nap. 1840. — China.

Vulg. *Mandarine*.

C. Aurantium *Risso*, Orang., tab. 3-29. — Nouv. Duham.

VII, tab. 35, fig. 3. — China meridionalis.

Vulg. *Oranger*.

Varietates numerosæ.

C. Limonium *Risso*, Orang., tab. 70-95. — Nouv. Duham.

VII, tab. 28. — China meridionalis.

Vulg. *Citronnier*.

Varietates numerosæ.

C. medica *Risso*, *Orang.*, tab. 96-107. — *Nouv. Duham.*, tab. 22-24. — *China meridionalis*.

Vulg. *Cédratier*.

Varietates numerosæ.

C. bigaradia *Risso*, *Orang.*, tab. 30-52. — *Nouv. Duham.* VII, tab. 30-39. — *China meridionalis*.

Vulg. *Bigaradier*.

Varietates numerosæ.

PSEUDÆGLE *Miq.*

P. seplaria *Miq.* — *Japonia*.

Ægle? *sepiaria DC.*

Citrus trifoliata L. — *Ssi Kæmpf. Amœnit.* p. 801.

C. triptera Desf. — *Rev. hort.* 1869, cum *Icon.*

HYPERICINEÆ

ANDROSÆMUM *All.*

A. officinale *All.* — *Bot. mag.*, tab. 127; *Engl. bot.*, tab. 1225. — *Europa borealis*.

Hypericum Androsæmum L. — *Curt. Lond. bot.* II, tab. 127.

H. elatum Hort. (non *Ait.*).

H. Caprifolium Hort. (non *Boiss.*).

H. Webbii Hort. (non *Spach.*).

H. orientale Hort. (non *Lin.*).

HYPERICUM *Lin.*

H. calycinum *L.* — *Bot. mag.*, tab. 146. — *Oriens*.

H. balearicum Hort. (non *Lin.*).

H. elatum *Ait.* — *Juss. Ann. Mus.* III, tab. 11; *Wats. Dendr. brit.* II, tab. 85. — *America borealis*.

- H. hircinum** *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 64; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 86; *Nouv. Duham.* VI, tab. 28. — Europa meridionalis.
 H. elatum *Hort.* (non *Ait.*).
 var. minor.
 — *stricta.*
 H. strictum *Hort.* (non *Humb. et Bonpl.*).
 — *fol. variegatis.*
- H. prolificum** *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 643; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 88. — America sept.
 H. Kalmianum *Hort.* (non *Lin.*).
 H. rosmarinifolium *Hort.* (non *Lamk.*).
- H. Kalmianum** *L.* — *Torrey*, Fl. New-York, tab. 43. — America septentrionalis.
- H. Gumbletoni** *Hort. segreg.* — Japonia?
 H. patulum *Hort.* (non *Thunb.*). — *Rev. hort.* 1875, p. 470, cum Icon.
 H. nepalense *Hort.* (non *Choisy*).
- H. uralum** *Don.* — *Bot. mag.*, tab. 2375. — Nepalia.
 H. uralense *Hort.*
- H. oblongifolium** *Chois.* *Hyper.*, tab. 4. — *Wall.* Pl. asiat., tab. 244. — Nepalia.
- H. multiflorum** *Sieb.* — Japonia.
- H. japonicum** *Thunb.* Fl. jap., tab. 34. — *Royle*, *Illust.*, tab. 24. — Japonia.
- H. monogynum** *L.* — *Bot. mag.*, tab. 334. — China.
 H. aureum *Lour.*
 H. chinense *Lamk.*
 var. salicifolia.
 H. salicifolium *Sieb. et Zucc.*

ACERINEÆ

ACER Tourn.

§. 1. FLORIBUS RACEMOSIS.

A. tataricum *L.* — *Pallas* Fl. ross., tab. 3; *Nouv. Duham.* IV, tab. 9; *Wats. Dendr. brit.* II, tab. 160; *Reich.* Fl. germ. V, tab. 162. — *Tataria*.

var. *Ginnala* (laciniata). — *Regio amur.*

A. Ginnala Maxim.

A. glabrum *Torr.* — *America occidentalis.*

A. pensylvanicum *L.* — *Tratt. Arch.* I, tab. 41, (non *Duroi*). — *America sept.*

A. canadense Duham. Arb. I, tab. 42.

A. striatum Lamk. — *Michx. fil.* Arb. amer. II, tab. 47.

A. hybridum Bosc. — *Lodd. Bot. cab.*, tab., 1221.

A. tegmentosum *Maxim.* — *Regio amur.*

A. spicatum *Lamk.* — *America septentrionalis.*

A. montanum Ait. — *Tratt. Arch.* I, tab. 43.

A. pensylvanicum Duroi Arb. tab. 2 (non *Lin.*).

A. Pseudo-Platanus *L.* — *Duham.* Arb. I, tab. 36; *Fl. danica* IX, tab. 1575. — *Europa.*

A. montanum Lamk. (non *Ait.*).

Vulg. *Erable Sycomore.*

var. *trilobata.*

— *opulifolia* (non *A. opulifolium Vill.*).

— *purpurea* (rubra). — *Belg. hort.* XVIII, cum Ic.

— *Leopoldi.* — *Illustr. hort.* XI, tab. 411.

— *erythrocarpa.* — *Rev. hort.* 1864, cum Ic.

— *tricolor.*

— *aureo-variegata.*

— *jaspidea.*

A. macrophyllum Pursh. — Hook. Fl. bor. amer., tab. 38.

Nutt. North-Am. sylv., tab. 67. — America borealis,

A. campestre L. — Guimp. Holz.; tab. 213; Fl. danica VIII,
tab. 1288. — Europa,

var. austriaca.

A. austriacum Tratt. Arch., tab. 36; Guimp. Holz., tab. 212,

— taurica,

— hebecarpa,

— heterocarpa.

— leiocarpa (collina).

— pulverulenta.

— suberosa.

— variegata.

A. hyrcanum Fisch. et Mey. — Caucasus.

§. II. FLORIBUS CORYMBOSIS FASCICULATISVE.

A. Opalus Ait. — Wats. Dendr. brit. II, tab. 474; L'Hérit.

Stirp. II, tab. 98; Reich. Fl. germ. V, tab. 163. —

Gallia meridionalis,

A. rotundifolium Lamk.

var. villosa.

A. villosum Presl. (non Wall.).

A. coriaceum Bosc. — Patria ignota.

A. opulifolium Vill. — Gaud. Fl. helv. VII, tab. 3; Tratt.

Arch. tab. 43. — Gallia merid.

A. hispanicum Pourr.

A. obtusatum Kit. — Tratt. Arch., tab. 44. — Hungaria.

A. neapolitanum Ten. Fl. nap., tab. 400. — Italia.

A. lætum C. A. Mey. — Caucasus.

A. colchicum Hartw.

A. ænense Hort.

var. rubra.

A. Mono Maxim. — Regio amur.

A. lætum parviflorum Reg. (non C. A. Mey.).

- A. circinnatum** Pursh. — *Hook.* Fl. bor. amer., tab. 59;
Nutt. North-Amer. sylv., tab. 68. — America sept.
- A. creticum** Tourn. — *Tratt.* Arch., tab. 45. — Creta.
A. trilobatum Lamk.
A. obtusilobum Sibth. Fl. græc., tab. 391.
- A. monspessulanum** L. — *Tratt.* Arch., tab. 46. — Europa
 merid. et Austria.
- A. ibericum** M. Bieb. — Iberia.
- A. barbatum** Michx. — Carolina.
A. carolinianum Walt.
- A. platanoides** L. — *Duham.* Arb. I, tab. 40. fig. 1; *Tratt.*
 Arch., tab. 34. (non *Tausch.*). — Europa.
Vulg. Erable plane.
var. lactescens.
 — *palmatifida* (dissecta).
A. palmatifidum Tausch.
 — *laciniata* DC.
A. crispum Lauth. — *Tratt.* Arch., tab. 5.
 — *Schwerdlerii*.
- A. Lobelii** Ten. Fl. napol., tab. 499. — Italia meridionalis.
A. platanoides var. Tausch. (non *Tratt.*).
- A. saccharinum** Michx fil. Arb. amer. II, tab. 45; — *Nouv.*
Duham. III, tab. 8. — America sept.
- A. nigrum** Michx fil. Arb. amer. II, tab. 46. — Carolina.
- A. eriocarpum** Michx fil. Arb. amer. II, tab. 42. — Amer. sept.
A. dasycarpum Willd. — *Tratt.* Arch., tab. 38.
A. rubrum var. pallida Ait.
A. glaucum M. Bieb.
A. rubrum Lamk. (non *Lin.*).
A. tomentosum Hort.
var. Wagneri (laciniata). — *Rev. hort.* 1868, cum Ic.

A. rubrum *L.* (non *Lamk.*). — *Michx fl.*, Arb. amer. II, tab. 14. — America septentrionalis.

A. coccineum Hort.

var. sanguinea.

A. sanguineum Spach. — *Rev. hort.* 1867, cum *lc.*

A. rubrum Wats. *Dendr. brit.* II, tab. 169, (non *Lin.*)

— *pendula.*

— *tomentosa.*

A. fulgens Hort.

§. III. SPECIES JAPONICÆ.

A. japonicum *Thunb.* *Icon. jap.*, tab. 20. — *Sieb. et Zucc.* *Fl. jap.*, tab. 144.

A. cratægifolium *Sieb. et Zucc.* *Fl. jap.*, tab. 157.

A. trifidum *Thunb.* — *Sieb. et Zucc.* *Fl. jap.*, tab. 153.

A. micranthum *Sieb. et Zucc.* *Fl. jap.*, tab. 151.

A. pictum *Thunb.* *lc. Fl. jap.*, tab. 43.

A. pulchrum *Maxim.*

A. rufoerve *Sieb. et Zucc.* *Fl. jap.*, tab. 148.

A. polymorphum *Sieb. et Zucc.* *Fl. jap.*, tab. 155-156.

var. dissecta.

A. dissectum Thunb. *lc. Fl. jap.*, tab. 45. — *Illustr. hort.* XIV, tab. 523.

— *palmata.*

A. palmatum Thunb. *lc. Fl. jap.*, tab. 43. — *Fl. des serres* XII, tab. 1273.

— *palmata foliis rubris.* — *Fl. des serres* XII, tab. 173.

A. polymorphum atropurpureum Hort.

— *palmata foliis sanguineis.* — *Illustr. hort.* XIV, tab. 156.

— — *foliis crispis.* — *Illustr. hort.* XVII, tab. 43.

— *septemloba (versicolor Van Htte)* *Fl. des ser.* XIV, tab. 1498.

A. septemlobum Thunb.

— *ornata.* — *Illustr. hort.* XVII, tab. 46.

A. ornatum Carr. *Rev. hort.* 1867, cum *lc.*

A. hederæfolium *Sib.*

NEGUNDO Mœnch.**N. fraxinifolium** Nutt. — America septentrionalis.

N. aceroides Mœnch.

Acer Negundo Michx fl., Arbr. amer. II, tab. 18; —

Nouv. Duham. III, tab. 7; Wats. Dendr. brit. II,
tab. 172.

var. crispa.

— laciniata.

— variegata. — Fl. des serres XVII, tab. 1781.

— violacea.

N. californicum Torr. — Hook. Beech., tab. 77; Nutt.

North-Am. sylv., tab. 72. — California.

Acer californicum Hort.

N. cissifolium Sieb. et Zucc. — Japonia.

Acer cissifolium C. Koch.

HIPPOCASTANEÆ**ÆSCULUS** Lin.**Æ. Hippocastanum** L. — Clus. Hist., p. 8, cum Icon.; Reich.

Fl. germ. V, tab. 161. — Græcia.

Vulg. Marronnier d'Inde.

var. pyramidata.

— nana.

Æ. pumila Aliq. Hort.

— pendula.

Æ. pumila pendula Hort.

— crispa.

— digitata.

— laciniata (heterophylla).

Æ. incisa Hort.

— dissecta (aspleniifolia.)

— Memmingeri.

var. præcox.

— serotina.

— marginata.

— variegata.

— flore pleno. — Illustr. hort.
II, tab. 59.

— pavoides.

— fructu eduli.

— spectabilis.

— nigra.

— procera.

Æ. rubicunda *Lois.* — *DC.* Pl. rar. Genev., tab. 24 ; *Herb. amat.*, tab. 367 (non *Lodd.*). — Patria ignota.

Æ. carnea *Willd.* (non *Wats.*). — *Bot. Reg.*, tab. 993.

var. nana.

— *tortuosa.*

— *pubescens.*

— *marginata.*

— *heterophylla foliis aureis.*

— *variegata.*

— *flore albo.*

— — *purpureo.*

Æ. carnea *Wats.* *Dendr. brit.* II, tab. 121 (non *Willd.*). — *Sweet Fl. gard. série 4, I*, tab. 301. — *Amer. sept.*

Æ. rubicunda *Lodd.* *Bot. cab.*, tab. 1242 (non *Loisel.*).

Æ. glabra *Willd.* — *Gray Gen.* tab. 176. — *America sept.*
Pavia glabra *Spach.*

var. pallida.

Æ. pallida *Willd.* — *Guimp. Holzg.*, tab. 25.

Pavia pallida *Spach.*

— *ohiotensis.*

Æ. ohiotensis *Michx.* — *Bot. reg.* XIV, tab. 51.

Pavia ohiotensis *Michx fil.*, *Arb. amer.* II, tab. 29.

— *ohiotensis aspera.*

Æ. chinensis *Bunge.* — *China borealis.*

Æ. indica *Wall.* — *Brand. Il. for. Ind.*, tab. 19. — *Ind. orient.*

Pavia indica *Camb. in Jacquem. voy.*, tab. 35.

Æ. flava *Ait.* — *Lodd. Bot. cab.*, tab. 1280 ; *Wats. Dendr. brit.*, tab. 1634. — *America sept.*

SPECIES VEL VARIETATES DUBIÆ.

Æ. (Pavia) marylandica *Hort.*

Æ. (Pavia) dubia *Hort.*

Æ. (Pavia) canadensis *Hort.*

PAVIA Boerh.

P. neglecta *Spach.* — Patria ignota.

Æsculus neglecta *Lindl.* Bot. reg., tab. 4009.

P. flava *DC.* — America septentrionalis.

P. lutea *Poir.* — Nouv. Duham. III, tab. 38.

Æsculus flava *Ait.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1280; *Wats.*

Dendr. brit., tab. 163.

Æ. lutea *Wangenh.* Act. nat. scienc. Berol. VIII, tab. 6.

P. livida *Spach.* — Patria ignota.

P. hybrida *DC.* — Patria ignota.

P. versicolor *Spach.* — Patria ignota.

Æsculus Pavia *Wats.* *Dendr. brit.* II, tab. 163, (non *Duham*, nec *Michx*).

P. discolor *Pursh.* — America septentrionalis.

Æsculus discolor *Lindl.* Bot. reg., tab. 310.

P. atropurpurea *Spach.* — America septentrionalis.

Æsculus Pavia *var. sublaciniata* *Wats.* *Dendr. brit.*, tab. 126 (non *Æ. Pavia Willd.*).

P. Lindleyana *Spach.* — America sept.

Æsculus Pavia *var. arguta* *Lindl.* Bot. reg., tab. 993.

P. Willdenowiana *Spach.* — Patria ignota.

Æ. Pavia *Duham.* Arb. II, tab. 19 (non *Wats.*, nec *Michx*).

var. Lyonii.

Æ. Lyonii *Loud.*

— *sanguinea.*

Æ. Whitleyi *Hort.*

P. humilis *Spach.* — America sept.?

Æ. humilis *Lodd.* — Bot. reg., tab. 4018.

P. lucida *Spach.* — Patria ignota.

P. Michauxii *Spach.* Suites Buff., tab. 18. — America sept.

P. rubra *Lamk.* Enc., tab. 273. — *N. Duh.* III, tab. 19.

Æ. Pavia *Michx* (non *Duham.*, nec *Wats.*).

MACROTHYRSUS Spach.**M. discolor** *Spach*, Suites Buff. — Georgia.*Æsculus parviflora* *Walt.**Æ. macrostachya* *Michx fil.* Arb. amer. I, tab. 9. —
Bot. mag., tab. 2118.*Pavia macrostachya* *DC.* — Herb. amat. III, tab. 212.*P. edulis* *Poit.* Arb. fruit., tab. 88.**CALOTHYRSUS** Spach.**C. californica** *Spach*, Suites Buff. — California.*Æsculus californica* *Nutt.* North-Amer. sylv., tab. 64;

Rev. hort. 1855, Icon.; Belg. hort. IX, tab. 121.

UNGNADIA Endl.**U. speciosa** *Endl.* Atakta, tab. 36. — Fl. des serres X, t. 1076;

L'hort. franç. 1865, tab. 45. — America sept.

SAPINDACEÆ

KÆLREUTERIA Laxm.**K. paniculata** *Laxm.* Nov. Comm. Petr. 16, tab. 18; —

Nouv. Duham., tab. 36; Bot. reg., tab. 320. — China.

K. japonica *Sieb.* — Japonia.*K. paniculata* var. *japonica* *Hort.***XANTHOCERAS** Bnge.**X. sorbifolia** *Bnge.* — Fl. des serres XVIII, tab. 1889. —

China septentrionalis.

SAPINDUS Lin.**S. Mukorossi** *Gærtn.* Fr. I, tab. 70. — Japonia.

Arbor. segreg. Enumeratio.

MELIACEÆ

MELIA Lin.

M. Azedarach *Cav.* Diss. VII, tab. 207. — Bot. mag., tab. 1666. — Asia.

M. japonica *G. Don.* — Japonia.

CEDRELA Lin.

C. sinensis *A. Juss.* — China.

Ailanthus flavescens *Carr.* Rev. hort. 1865 p. 361,
cum Icon.

AMPELIDEÆ

AMPELOPSIS Michx.

A. cordata *Michx.* — America borealis.

Vitis indivisa *Willd.*

A. hederacea *DC.* — America borealis.

Vitis hederacea *Willd.*

var. himalayca.

— *major.*

A. quinquefolia *Michx.* — *Gray*, Gen., tab. 162, — America borealis.

var. hirsuta.

A. hirsuta *Don.*

— *macrophylla.*

— *pubescens.*

Vitis pubescens *Hort.* (non *H. B. K.*).

— *rotundifolia.*

A. bipinnata Michx. — Carolina.

Vitis arborea Willd.

var. minima.

A. serjaniæfolia Bnge. — Asia septentrionalis.

Cissus viticifolia Sieb. et Zucc.

Ampelopsis napæformis Carr. Rev. hort. 1870, fig. 3.

A. tuberosa Carr. Rev. hort. 1870, p. 17, fig. 2.

A. aconitifolia Bnge. — China borealis.

A. tripartita Carr.

A. triloba Carr.

A. lucida Carr.

A. palmiloba Carr.

var. dissecta.

A. dissecta Carr.

Vitis dissecta Hort. — The Gard., 1874, p. 523, cum Ic.

— affinis (dissectæ affinis).

VITIS Lin.

SPECIES AUSTRALASICÆ.

V. antarctica Benth. — Australia.

Cissus antarctica Vent. Choix, tab. 21.

SPECIES ASIATICÆ.

V. japonica Sieb. et Zucc. — Japonia.

Cissus japonica Willd.

V. biterminalis Hort. segreg. — Asia minor.Cissus orientalis Lamk. Ill., tab. 84; — Wats. Dendr.
brit. II, tab. 143.**V. vinifera** L. — Duham. Arbr. fruit. II, tab. 61. — Asia min.

var. laciniosa Schmidel. Icon., tab. 8.

V. laciniosa L.

V. apiifolia Hort.

Vulgo Cioutat.

V. vinifera.*var. italica.*— *variegata.**Varietates hortenses multæ.***V. amurensis Maxim.** — China borealis.**V. flexuosa Thunb.** — Japonia.*V. indica Thunb.**V. nepalensis Hort.***V. parvifolia Roxb.** — Japonia.**V. heterophylla Thunb.** (non *Poir.*, nec *Wall.*). — Japonia.*Ampelopsis heterophylla Sieb. et Zucc.**Cissus Davidiana Carr.* Rev. hort. 1868-69.*C. acutiloba Carr.**C. pinnata Carr.**C. major Carr.**var. integra.**V. humulifolia Bnge.**V. rubra Carr.* (non *Desf.*).*V. intermedia Carr.**V. platanifolia Carr.?**Cissus humulifolia Maack.* Tent. fl. ussur., tab. 3.**V. ficifolia Bnge.** — Japonia.*V. Labrusca Thunb.* (non *Lin*).*V. mollis Carr.**var. Sieboldi.**V. Sieboldi Van-Htte.*— *Thunbergi.**V. Thunbergii Sieb. et Zucc.* — *Reg. Gartenfl.*, tab. 424.**V. inconstans Miq.** — *Lavall.* Arbor. segreg. Icon., tab.

ined. — Japonia.

*V. Roylei Hort.**Ampelopsis tricuspidata Sieb. et Zucc.***V. Weitchi Hort.** *segreg.* — Asia septentrionalis.*V. Roylei Aliq. Hort.**Ampelopsis tricuspidata var. Weitchi Aliq. Hort.*

SPECIES AMERICANÆ.

V. caribæa DC. — *Sloane*. Jam. II, tab. 210. — Florida.

var. coriacea.

V. candicans Engelm. — Texas.

V. Labrusca L. — *Jacq.* Schœnb., tab. 426 ; *Gray*. Gen., tab. 461. — America septentrionalis.

var. integrifolia.

V. cordifolia *Hort* (non *Michx*).

— palmata.

V. palmata *Lecomte* (non *Vahl*).

— tiliæfolia.

V. tiliæfolia *Willd.* (non *H. B. K.*).

V. æstivalis *Michx.* — America septentrionalis.

V. virginiana *Hort. Paris*.

V. cordifolia *Michx.* (non *Hort.*). — America sept.

V. vulpina L. — *Jacq.* Schœnb., tab. 423.

var. Solonis.

V. Solonis *Hort*.

— riparia.

V. riparia *Michx.* — *Bot. mag.*, tab. 2429.

V. odoratissima *Don*.

V. monticola *Beekley*. — Texas.

var. rupestris.

V. rupestris *Scheete* Linnæa, XXI, p. 391.

V. rubra *Desf.* — America septentrionalis.

V. rotundifolia *Michx.* — America septentrionalis.

V. vulpina *Torr. et Gr.* (non *Lin.*).

VARIETATES AMERICANÆ (†).

§. I. Var. **Vitis Labruscæ** :

Black macer	fruct. nigris.	Cambys August, fruct. nigris.
Bracut Amber	— rubris.	
		Catawba — rubris.

(†) Des boutures de ces vignes ont été envoyées en 1868, de Washington ; elles proviennent de la collection réunie par les soins du département de l'Agriculture du gouvernement des États-Unis.

Var. Vitis labruscæ :

Cheowa	fruct.	rubris.	Logan.	fruct.	nigris.
Christine	—	nigris.	London's Early	—	»
Cloanthe	—	»	Loomis	—	»
Columbia	—	»	Louisa	—	»
Concord	—	»	Mary Ann	—	rubris.
Creveling	—	»	Miller's Isabella	—	nigris.
Cuyahogo	—	albis.	Nothern muscadine	—	»
Diana	—	rubris.	Ottinger	—	»
Hammille	—	nigris.	Perkins	—	rubris.
Hartford prolific	—	»	Saluda	—	nigris.
Hydes Elisa	—	»	Telegraph	—	»
Iona	—	rubris.	To Kalon	—	rubris.
Isabella	—	nigris.	Union village	—	nigris.
Ives seedling	—	»	Wilders no 6	—	»
Little geant	—	»	Woodbury	—	»

§. II. Var. Vitis viniferae :

Clara	fruct.	albis.	Kilminster	fruct.	albis.
-------	--------	--------	------------	--------	--------

§. III. Var. Vitis æstivalis :

Baldwin's Lenoir	fruct.	nigris.	Herbemont	fruct.	nigris.
Purple favorite	—	»			

§. IV. Var. Vitis cordifoliae :

Alwez	fruct.	nigris.	Oporton	fruct.	nigris.
Clinton	—	»	Taylor's Bullett	—	albis.
Gusmann	—	»			

Alt. variet. americana.

Alexandrina		Hetgella
Franklin		Reginia.

Var. Vitis incertæ :

Delaware	fruct.	rubris.
----------	--------	---------

RUTACEÆ

RUTA Tourn.

- R. graveolens** L. — *Duham. Arb.* II, tab. 64. — Europa austr.
var. *variegata*.

ZANTHOXYLEÆ

ZANTHOXYLUM L'Hérit.

- Z. fraxinifolium** Willd. — *Nouv. Duham.* VII, tab. 2;
Spack, Suites Buff., tab. 13. — America sept.
Z. fraxineum Hort.
Z. schinifolium Sieb. et Zucc. — Japonia.
Z. planispinum Sieb. et Zucc. — Japonia.
Z. piperitum DC. — *Maxim. Decas* IX, p. 3. — Japonia.
Fagara piperita Thunb.

PHELLODENDRON Rupr.

- P. amurense** Rupr. — *Maxim. Pr. fl. Amur.*, tab. 4. — Amur.
P. japonicum Maxim. Dec. IX. — Japonia.
Phellodendron species Hort. *Van-Htte.*

PTELEA Lin.

- P. trifoliata** L. — *Lamk. Encycl.*, tab. 84; *Nouv. Duham.* I,
tab. 57. — America septentrionalis.
var. *heterophylla*.
— *persicifolia*.
— *glauca*.
— *pubescens*.
— *foliis variegatis*.

CNEORUM Lin.

C. tricoccum *L.* — *Jaume St-Hil.* Fl. fr., tab. 5. — Eur. mer.

AILANTHUS Desf.

A. glandulosa *Desf.* Act. Ac. par. 1786, tab. 8. — *L'Hérit.*

Stirp., tab. 84; *Nouv. Duham.* I, tab. 35. — China.

var. macrophylla.

— *purpurascens.*

SKIMMIEÆ**SKIMMIA** Thunb.

S. japonica *Thunb.* — *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 63;

Lem. Illustr. hort., tab. 48; Fl. des serres VII,

p. 39. Icon. xylogr. — Japonia.

— *foemina.*

— *mascula.*

S. Laureola *Sieb. et Zucc.* — Nepalia.

S. Limonia *DC.* — *Wall.* Pl. asiat. rar., tab. 245. — India.

S. oblata *Lindl.* — Japonia.

— *foemina.*

— *mascula (fragrans).*

var. floribus albis.

— — *roseis.*

— *variegata.*

S. ovata *Hort.*

CORIARIEÆ**CORIARIA** Lin.

C. myrtifolia *L.* — *Duham.* Arb. I, tab. 73. — Europ. merid.

var. rubricaulis.

STAPHYLEACEÆ

STAPHYLEA Lin.

S. trifolia L. — *A. Gray* Genera, tab. 172. — Amer. boreal.

S. pinnata L. — *Lamk.* Encycl., tab. 210; Engl., bot. 1560.

— Europa australis.

S. colchica Steud. — *Lavall.* Arbor. segrez. Icon., tab. ined.

— Asia occidentalis.

var. parviflora.

S. Bumalda Thunb. — *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 95; *Deless.*

lc. III, tab. 51. — Japonia.

EUSCAPHIS Sieb. et Zucc.

E. staphyleoides Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 67. — Japon.

Sambucus japonica Thunb.

CELASTRINEÆ

EVONYMUS Lin.

E. europæus L. — *Lamk.* Encycl., tab. 131. — Europa.

var. atropurpurea.

E. atropurpureus Hort. (non Jacq.).

— *latifolia* (virens).

E. purpureus Hort.

— *ovata.*

— *variegata.*

— *pallida.*

— *ardens.*

— *aucubæfolia.*

— *leucocarpa* (fructu pallido).

— *nana pumila.*

— *monstrosa.*

- E. Maakii** Rupr. — Regio amur.
E. Hamiltonianus? Wall. — Nepalia.
E. atropurpureus Jacq. Hort. vind. II, tab. 120. — Amer. bor.
 E. macrocarpus Hort.
 E. americanus Hort. (non Lin.).
E. americanus L. — Lodd. Bot. cab., tab. 1322. — Amer. sept.
 var. pendula.
 E. obovatus Nutt.
 E. sarmentosus Loud.
 E. europæus pendulus Hort.
E. verrucosus Scop. — Jacq. Fl. austr., tab. 49. — Austria.
E. alatus Thunb. — Reg. Tent. fl. ussur. tab. 7. — Japonia.
 E. Thunbergianus Blume.
 E. amurensis Hort.
 Celastrus alatus Thunb. Ic. jap., tab. 33.
E. angustifolius Pursh. — Georgia.
 E. rosmarinifolius Hort.
 var. repens.
E. nanus M. Bieb. (non Hort.). — Caucasus.
 var. pulchella.
 E. linifolius Hort.
E. japonicus Thunb. — Kæmpf. Icon. jap., tab. 8.; Bot.
 reg., tab. 6. — Japonia.
 var. macrophylla.
 — *latifolia.*
 — *punctata.*
 — *flavescens.*
 — *variegata.*
 — *tricolor.*
 — *foliis albo-marginatis.*
 — *calamistrata.*
 — *microphylla.*
 Eurya microphylla Hort.

E. ovatus? *Wall.* — India orientalis.

var. foliis medio-pictis.

— — marginatis.

E. radicans *Sieb. et Zucc.* — Japonia.

E. japonica crispa Hort.

var. viridis.

— foliis pictis.

E. gracilis *Sieb.* — Japonia.

E. radicans Hort. (non Sieb. et Zucc.).

var. foliis argenteis.

— — roseo-marginatis.

E. fimbriatus *Wall.* — India orientalis.

CELASTRUS *Lin.*

C. scandens *L.* — *Duham.* Arb. I, tab. 95. — Amer. sept.

C. punctatus *Thunb.* — Japonia.

C. Orixa *Sieb. et Zucc.* — Japonia.

Evonymus japonicus Hort. (non Thunb.).

C. paniculatus *Willd.* — *Wight*, Illustr., tab. 72. — Japon,

ILICINEÆ

ILEX *Lin.*

I. latifolia *Thunb.* — Bot. mag., tab. 5597. — Japonia.

I. macrophylla Blume.

var. Tarajo.

I. Tarajo Sieb.

I. chinensis *Sims*, Bot. mag., tab. 2043. — China.

I. cornuta *Lindl. et Paxt.* Flow. gard. I, p. 43, fig. 27. —

Bot. mag., tab. 5059; Fl. des serres IX, tab. 895. —

China septentrionalis.

var. furcata.

I. furcata Fortune.

— obtusata.

— minor.

- I. Fortunei** Hort. — Japonia.
- I. dipyrena** Wall. Pl. asiat., tab. 292. — Brand. Illustr. for. India, tab. 13. — China sept.
var. Cunninghami.
 I. Cunninghami Hort.
- I. crenata** Thunb. — Japonia.
 Ilex Fortunei crenata Hort.
var. latifolia.
 — longifolia.
 — rotundifolia aureo-variegata.
 — foliis variegatis.
- I. microcarpa** Lindl. et Paxt. Flow. gard. I, p. 43, fig. 28.
 — China septentrionalis.
- I. rotunda** Thunb. — Japonia.
 I. japonica Hort. (non Thunb.).
- I. Bessoni** ? Hort.
- I. purpurea** Hassk. — Asia.
 Symplocos japonica Hort. (non DC.).
- I. vomitoria** Ait. — America borealis.
 I. floridana Lamk. Illustr., tab. 4731.
 I. religiosa Bart.
- I. Dahoon** Walt. — America septentrionalis.
 I. Cassine Willd. Hort. ber. I, tab. 34 (non Ait.).
 I. phyllireifolia Hort.
var. laurifolia.
 I. laurifolia Nutt. (non Hort.).
- I. Cassine** Ait. — Nouv. Duham. I, tab. 3. — Carolina.
 I. caroliniana Mill.
 I. laurifolia Hort. (non Nutt.).
 I. cassinoides Lindl.
 I. castaneæfolia Hort.
- I. serrata** Thunb. — Japonia.
- I. microphylla** Sieb. — Japonia.

I. Doniana DC. — Nepalia.I. elliptica *Don.*I. nepalensis *Dietr.*

var. purpurea.

I. elliptica purpurea *Hort.***I. leptocantha Hort.****I. magellanica Loud.** — Magellania.**I. opaca Ait.** — *Michx fl.* Arb. amer. II, tab. 11. — Pensylv.

var. prinifolia.

I. prinifolia *Hort.***I. Perado Ait.** — *Lodd. Bot. cab.*, tab. 349. — Madera.I. maderensis *Lamk.* (non *Willd.*).I. platyphylla *Webb et Bert.*

var. nana (maderensis nana).

I. balearica Desf. — Insula minorca.I. maderensis *Willd.* (non *Lamk.*).I. aquifolium var. β *Lamk.*

var. elegans.

I. Aquifolium L. — *Nouv. Duham.* I, tab. I. — Europa.*Varietates hortenses.*

var. Altaclarensis.

— angustifolia inermis.

— atrovirens.

— — marginata alba.

— — marginata aurea.

— aurea.

— — medio-picta. — *Gard. chron.* 1876, p. 78, cum Ic.— — Auran — *Gard. chron.* 1876, p. 616, cum Ic.— — picta latifolia. — *Gard. chron.* 1876, p. 365, cum Ic.— — regina. — *Gard. chron.* 1876, p. 44, cum Ic.

— bicolor.

— calamistrata.

— — variegata.

1. Aquifolium.

- var. camelliæfolia*, — Gard. chron. 1874, p. 813, cum Ic.
- *ciliata minor*.
- — *aurea*. — Fl. des serres, XVII, tab. 4811.
- *compacta marginata aurea*.
- *Cookii*. — Gard. chron. 1876, p. 437, cum Icon.
- *crassifolia*. — Gard. chron. 1874, p. 751, cum Ic.
- *Doningtonensis* — Gard. chron. 1874, p. 687, cum Ic.
- *excortica*.
- *ferox*.
- — *argentea*. — Gard. chron. 1876, p. 44, cum Ic.
- — *aurea*. — Gard. chron. 1876, p. 616, cum Icon.
- — — *albo-marginata*.
- — — *aureo-variegata*.
- *flammea argentea*.
- — *aurea*.
- — *aureo longifolia*.
- *foliis aureo-marginatis*.
- *fructu luteo*.
- *fulhamensis*.
- *grandifolia*. — Gard. chron. 1874, p. 432, cum Ic.
- *harringtoniensis fol. aureo marginatis*.
- *heterophylla*. — Gard. chron. 1874, p. 519, cum Ic.
- *Hodkensoni*.
- *hybrida*.
- *integrifolia*. — Gard. chron. 1874, p. 813, cum Ic.
- *intermedia fol. aureis*.
- — *latifolia*. — Gard. chron. 1874, p. 435, cum Ic.
- *latispina*. — Gard. chron. 1874, p. 813, cum Ic.
- *laurifolia*.
- — *aurea nana*.
- — *foliis argenteis*.
- — *foliis aureis*. — Gard. chron. 1876, fig. 51.
- — *sulphurea*. — Gard. chron. 1876, fig. 51.

I. Aquifolium.

var. Lechtentali.

— *lutescens.*

— *maculata.*

— *Madame Briot.*

— *marginata alba.* — Gard. chron. 1874, p. 813, cum lc.

— — *aurea.*

— *myrtifolia.*

— — *aurea.* — Gard. chron. 1876, p. 365, cum lc.

— *monstrosa.* — Gard. chron. 1874, p. 751, cum leon.

— *nigricans.*

— — *marginata aurea.*

— *nobilis.* — Gard. chron. 1874, p. 433.

— — *foliis aureis.*

— *pendula.*

— — *argentea.*

— *provincialis.*

— *pumila marginata aurea.*

— *punctata.*

— *pyramidalis.*

— *recurva.* — Gard. chron. 1874, p. 813, cum leon.

— *regina Victoria.*

— *rigida.*

— *rubricaulis aurea.*

— *scotica.* — Gard. chron. 1874, p. 873, cum lc.

— *senescens.*

— *serratifolia.* — Gard. chron. 1874, p. 687, cum leon.

— — *albo-marginata.* — Gard. chron. 1876, p. 305.

— — *argentea.*

— — *aurea.*

— — *latifolia aurea.*

— — — *variegata.*

— *Watereriana.* — Gard. chron. 1876, fig. 49.

— *Whittingtonensis.* — Gard. chron. 1874, p. 687, cum lc.

NEMOPANTHES Rafin.

- N. canadensis** DC. Pl. rar., tab. 3. — Amer. borealis.
Ilex canadensis Michx Fl. bor. amer., tab. 49.

PRINOS Lin.

- P. verticillata** L. — *Duham.* Arb., tab. 23. — Amer. sept.
P. lævigata Pursh. — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 28. —
 America septentrionalis.
P. lanceolata Pursh. — America septentrionalis.
P. glaber L. — *Nouv. Duham.* III, tab. 54; *Wats.* Dendr.
 brit. I, tab. 27. — America septentrionalis.
P. prunifolia Desf. — Patria ignota.
P. glauca Hort. segrez. — Patria ignota.

RHAMNEÆ**ZIZYPHUS** Tourn.

- Z. vulgaris** Lamk. Encycl., tab. 485. — Europa australis.
Z. sativa Desf. — *Nouv. Duham.*, tab. 46.
Z. sinensis Lamk. — China.
Z. Jujuba L. — *Brand.* Illustr. for. India, tab. 17. — Asia.

PALIURUS Tourn.

- P. aculeatus** Lamk. — *Nouv. Duh.* III, tab. 240. — Eur. austr.
P. australis Gærtn. Carpol., tab. 43.
P. virgatus Don. — Bot. mag., tab. 2585. — Japonia.
P. lucidus Hort.

BERCHEMIA Neck.

- B. volubilis** DC. — *Gray* Gen., tab. 650. — Amer. sept.
Rhamnus volubilis L. — *Jacq.* Ic., tab. 339.
Zizyphus volubilis Willd.

RHAMNUS Lamk.

R. oleifolius *Hook.* Fl. bor. amer. tab. 44. — America sept.

R. Alaternus *L.* — *Nouv. Duham.* III, tab. 44. — Eur. austr.
var. balearica.

R. rotundifolius *Dum. Cours.*

— *hispanica.*

R. monspeliensis *Hort.*

— *latifolia.*

— *angustifolia.*

R. Clusii *Willd.*

— *robusta.*

— *foliis aureis.*

R. hybridus *L'Hérit.*

R. sempervirens *Hort.*

R. subsempervirens *Hort.*

R. americanus *Hort.*

var. Billardi.

R. Billardi *Hort.*

R. ovalifolius *Hort.*

R. californicus *Eschsch.* — California.

R. oleifolius *Hook.* Fl. bor. amer., tab. 44.

R. pedunculatus *Hort.*

R. intermedius *Carr.* Rev. hort. 1868 (non *Maxim.*).

R. latifolius *L'Hérit.* Sert. angl., tab. 8. — Bot. mag., tab
2663. — Insulæ azoricæ.

var. cucullatus.

R. Frangula *L.* — *Nouv. Duham.*, tab. 43. — Europa.

Vulg. *Bourgène.*

R. alpinus *L.* — *Nouv. Duham.*, tab. 43; *Lodd. Bot. cab.*,
tab. 1077. — Europa.

var. major.

R. alnifolius *L'Hérit.* — *Hook.* Fl. bor. amer., tab. 42. —
America septentrionalis.

R. americanus *Aliq. Hort.*

R. libanoticus *Boiss.* — Asia occidentalis.

R. imeretiae *Hort.*

R. castaneifolius *Hort.*

R. utilis *Dene.* Compt. rend. acad. 1857, cum Icon. — China.

R. viridis *Hort.*

R. dahuricus *Hort.* (non *Pall.*).

R. japonicus *Hort.*

R. chlorophorus *Dene.* Compt. rend. 1857, cum Ic. — China.

R. bapticus *Dene.* Compt. rend. 1857. — Asia sept.

R. salicifolius *Hort. segrez.* — Patria ignota.

R. catharticus *L.* — *Nouv. Duham.* III, tab. 10. — Europa.

R. intermedius *Maxim.* (non *Carr.*). — Canada.

R. rupestris *Hort.* (non *Scop.*, nec *Vill.*).

R. Wichelli *Hort.*

R. pumilus *L.* — *Jacq.* Coll. II, tab. 44; *Cav.* Ic., tab. 481.

— Europa.

R. rupestris *Vill.* (non *Scop.*).

R. saxatilis *L.* — *Jacq.* Fl. austr. I, tab. 33. — Europa.

R. prunifolius *Hort.* (non *Sieb.*).

R. Erythroxylon *Pall.* Fl. ross., tab. 62. — Sibiria.

R. Pallasii *Fisch. et Mey.*

COLLETIA Commers.

C. cruciata *Gill. et Hook.* — Bot. mag., tab. 5033. — Chili.

C. bictoniensis *Lindl.* — Fl. des serres XIV, tab. 1457.

C. ulicina *Gill. et Hook.* — *Hook.* Bot. misc., tab. 44. — Chili.

C. ferox *Gill. et Hook.* — Chili.

C. horrida *Brong.* Ann. sc. nat. sér. 4, X, tab. 14.

CEANOETHUS Lin.

C. americanus L. — *Lamk*, Encycl., tab. 429; *Bot. mag.* tab. 4479. — America sept.

var. glabra.

C. glaber *Spach.*

C. tardiflorus *Horn.* — America septentrionalis.

C. tardivus *Hort.*

C. Delilianus *Spach.* — Patria ignota.

C. intermedius *Pursh.* — America septentrionalis.

C. azureus *Desf.* — *Bot. reg.*, tab. 291. — Mexico.

C. cæruleus *Lodd.* *Bot. cab.*, tab. 410.

VARIETATES HORTENSES.

var. Arnoldi.

— *azurea latifolia.*

— *Bertini.*

— *carnea.* (*Présid. Réveil.*)

— *corymbosa (albida).*

— *grandiflora.*

var. gloire de Versailles.

— *Lemoineana.*

— *Lucie Simon.*

— *Lucie Moser.*

— *rosea* *Hort. Baum.*

— *Théodore Frœbel.*

C. Fontanesianus *Spach.* — America sept.?

C. ovatus *Desf.*

C. pallidus *Lindl.* *Bot. reg.* XXVI, tab. 20.

var. spicata.

C. ovatus hybridus *Hort.*

— *thyrsiflora.*

C. thyrsiflorus *Eschsch.* — *Bot. reg.* XXX, tab. 38.

C. divaricatus *Hort.* (non *Nutt.*).

C. velutinus *Dougl.* — *Hook.* *Fl. bor. amer.*, tab. 45. — America septentrionalis.

C. Veitchianus *Hook.* — *Bot. mag.*, tab. 5127; *Fl. des serres* XIII, tab. 4383. — California.

C. rigidus *Nutt.* — *Belg. hort.* III, tab. 46; *Bot. mag.* tab. 4664. — California.

C. divaricatus *Nutt.* — America septentrionalis.

POMADERRIS Labill.

P. apetala *Labill.* Nov. Holl., tab. 87. — Van Diemen.

HOVENIA Thunb.

H. dulcis *Thunb.* — Sicku. *Kämpf.* Amœnit., p. 808, cum Icon; *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 73-74. — Japonia.
H. inæqualis *Hort.* (non *DC.*).

TEREBINTHACEÆ

PISTACIA Lin.

- P. Terebinthus** *L.* — *Lamk*, Encycl., tab. 811: *Nouv. Duham.* IV, tab. 87. — Oriens.
P. vera *L.* — *Lamk*, Encycl., tab. 844. — *Nouv. Duham.* IV, tab. 47. — Syria.
P. Lentiscus *L.* — *Nouv. Duham.* IV, tab. 48; *Bot. mag.*, tab. 1967. — Regio medit.
P. chia *Desf.* — Insula Chio.

RHUS Lin.

- R. Cotinus** *L.* — *Jacq.* Austr., tab. 284; *Nouv. Duham.* II, tab. 49. — Europa australis.
Vulg. Fustet.
R. Coriaria *L.* — *Nouv. Duham.* II, tab. 46; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 436. — Europa australis.
R. semialata *Murr.* Comm. Goett. IV, tab. 3. — India orient.
R. Osbeckii *DC.* — Japonia.
R. semialata *Murr.* Comm. Goett. 1744, tab. 3. (pro parte).
R. — *var. Miq.*
R. alata *Sav. et Franch.* Enum. I, p. 92.
R. japonica *Hort.*

R. typhina *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 47; *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 47 et 48. — America borealis.

var. arborescens.

— *laciniata* (non *R. glabra laciniata*).

R. viridifolia *Poir.* — America borealis.

R. canadensis *Mill.*

R. glabra *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 207; *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 45. — America borealis.

R. caroliniana *Mill.*

R. elegans *Ait.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 46.

R. sanguinea *Hort.*

R. coccinea *Hort.*

var. laciniata. — Rev. hort. 1863, cum Icon.

R. copallina *L.* — *Jacq.* Hort. Schœnb., tab. 344; *Lamk.* Encycl., tab. 207. — America borealis.

R. leucantha *Jacq.* Hort. Schœnb., tab. 342. — Amer. sept.

R. sylvestris *Sieb. et Zucc.* Fam. nat., sect. I, p. 32. — Japon.

R. succedanea *L.* — *Kæmpf.* Amœn., p. 795; *Wight.* Ic., pl. Ind. or. II, tab. 560. — Japonia.

var. radicans.

R. vernicifera *DC.* — *Kæmpf.* Amœn., p. 792. — Japonia.

R. vernix *L.* (pro parte). — *Lamk.* Encycl., tab. 207; *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 49.

R. juglandifolia *Wall. et Don.* (non *Willd.*).

R. venenata *DC.* — *Dill.* Eith., tab. 292. — America sept.

R. ternata *Hort. Petropol.* — Japonia.

R. radicans *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 48; *Bot. mag.*, tab. 1809. — America septentrionalis.

R. Toxicodendron *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 48; *Bot. mag.*, tab. 1806. — America septentrionalis.

R. variclobata *Steud.* — Carolina.

R. lobata *Hook.* (non *Poir.*) *Fl. bor. amer.*, tab. 46.

R. Simoni *Hort.* — China.

R. suaveolens Ait. — America septentrionalis.

Myrica trifoliata Hort. an *L*?

R. ambigua Hort. segreg. — Japonia.

Ampelopsis japonica Hort.

R. aromatica Ait. — Turp. Ann. Mus. V, tab. 39. — Am. sept.

Rhus canadensis Marsh.

Myrica trifoliata Aliq. Hort.

Turpinia aromatica Rafin.

STYPHONIA Nutt.

S. integrifolia Nutt. — California.

Rhus integrifolia Benth. et Hook.

LITRÆA Miers.

L. laurina Walp. — California.

Rhus laurina Nutt.

DUVAUA Kunth.

D. dentata DC. — Andr. Bot. repos., tab. 620. — Chili.

LEGUMINOSÆ

STYPHNOLOBIUM Scht.

S. japonicum Scht. — Japonia et China.

Sophora japonica L. — Nouv. Duham. III, tab. 21.

var. pendula.

— pubescens.

Sophora pubescens Tausch.

— violacea.

— variegata.

SOPHORA Lin.

S. angustifolia Sieb. et Zucc. Fam. nat., p. 10. — Japonia.

EDWARDSIA Salisb.

E. microphylla *Salisb.* — *Lamk*, Illustr., tab. 325. — *Rehb.*
Icon., pl. cult. I, tab. 49. — Nova Zelandia.

CLADRASTIS Rafin.

C. tinctoria *Rafin.* — America borealis.

Virgilia lutea Michx fil. Arb. amer. III, tab. 3. — Herb.
amat. III, tab. 497.

var. gracilis.

C. amurensis *Benth. et Hook.* — Regio Amur.

Maackia amurensis Rupr. et Max. Pr. fl. Amur., tab. 5.

ANAGYRIS Tourn.

A. foetida *L.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 740. — Europa austr.

THERMOPSIS R. Br.

T. nepalensis *DC.* — *Lavall.* Arbor. segreg., Icon., tab.
ined. — Nepalia.

Piptanthus nepalensis D. Don.

ULEX Lin.

U. europæus *L.* — *Nouv. Duham.* I, tab. 59; *Smith* Engl.
bot., tab. 743. — Europa occidentalis.

Vulg. *Ajone*; *jone marin.*

var. inermis.

— flore pleno.

U. nanus *Smith*, Engl. bot., tab. 743. — Europa occidentalis.

U. europæus nanus L.

U. strictus *Mackoy.* — Hibernia.

U. hibernicus G. Don.

SPARTIUM Lin.

S. junceum *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 22; Fot. mag., tab. 85. — Hispania.

Genista juncea *Lamk*, Encycl., tab. 619 — Nouv. Duham. II, tab. 22.

Vulg. *Genêt d'Espagne*.

var. flore pleno.

SAROTHAMNUS Wimm.

S. scoparius *Wimm.* — Gallia.

Genista scoparia *Lamk*, Encycl., tab. 619.

Cytisus scoparius *L.*

Spartium scoparium *Desf.* — Fl. danica II, tab. 313.

Vulg. *Genêt à lalais*.

var. fl. albo (albido).

— ramulis variegatis.

S. purgans *Gren. et Godr.* — Gallia.

Genista purgans *L.* — Bull. Herb., tab. 115.

G. radiata Hort. (non *Scop.*, nec *Vil.*).

G. daurica Hort.

RETAMA Boiss.

R. sphærocarpa *Boiss.* Voy. Esp. — Hispania.

Genista sphærocarpa *Lamk.*

Spartium Clusii *Spach*, Suites Buff., tab. 16.

R. Duriei *Spach.* — Numidia.

Spartium monospermum *Desf.*

GENISTA Lin.

G. radiata *Scopol.* — Europa australis.

G. horrida *DC.* — Hispania.

G. germanica *L.* — Fl. danica XI, tab. 1826. — Europa.

G. hispanica *L.* — *Cor.* Icon., tab. 214; *Lodd. bot. cab.*, tab. 1738. — Hispania.

- G. anglica** L. — Fl. danica IV, tab. 619. — Europa septentrionalis.
- G. ferox** Poir. — Algeria.
Spartium heterophyllum *L'Herit.* Stirp., tab. 87.
- G. Scorpius** DC. — Wats. Dendr. brit. I, tab. 78.
- G. sagittalis** L. — Jacq. Fl. austr. III, tab. 209. — Gallia.
G. herbacea *Lamk.*
- G. lasiocarpa** Spach. — Italia.
- G. æthnensis** DC. — Moris, Fl. sard., tab. 28. — Sicilia.
Spartium trispermum *Smith.*
S. æthnense *Biv.* — Bot. mag., tab. 2674.
- G. tinctoria** L. — Sow. Engl. bot., tab. 44. — Europa.
G. germanica *Hort.* (non *Lin.*).
G. ternifolia *Hort.* (non *Loisel.*).
Carniola tinctoria *Presl.*
- G. sibirica** L. — Jacq. Hort. Vindob., tab. 160. — Sibiria.
Carniola sibirica *Presl.*
- G. pilosa** L. — Fl. dan. VII, tab. 1223. — Europa austr.
G. repens *Lamk.*
- G. procumbens** Waldst. et Kit., tab. 180. — Bot. reg., tab. 1150. — Hungaria.
Sarcothamnus procumbens *Presl.*
- G. candicans** L. — Wats. Dendr. brit. I, tab. 80. — Europa meridionalis.
G. canariensis *Lindl.* Bot. reg., tab. 217 (non *L.*, nec *DC.*).
Cytisus candicans *Lamk.* Encycl., tab. 618.
- G. canariensis** L. — Europa meridionalis.
Cytisus candicans var. *Lamk.*
- G. ramosissima** Spach. — Atlas.
G. canariensis *DC.* (non *Lin.*, nec *Lindl.*).
Cytisus ramosissimus *Poir.*
- G. linifolia** L. — Bot. mag., tab. 442. — Gallia.
Spartium linifolium *Desf.* Fl. atl., tab. 181.
- G. Spachiana** Webb. — Bot. mag., tab. 4193. — Regio mediet

CYTISUS Lin.

C. albus Link. — Lusitania.

C. multiflorus albus Hort.

Genista multiflora Lois. Nouv. Duham. II, tab. 23.

Sarothamnus albus Presl.

Spartium album Desf.

S. multiflorum L'Hérit. — Lodd. Bot. cab., tab. 1032.

C. Everestianus Hort. — Rev. hort. 1873, p. 391, cum lc.

— Patria ignota.

C. argenteus L. — Brot. Phytogr., tab. 69. — Gallia merid.

C. nubigenus Link. — Webb. Canar., tab. 46. — Ins. Canaria.

C. fragrans Lamk.

C. triflorus L'Hérit. — Rehb. lc., tab. 2077. — Regio medit.

C. villosus Pour.

C. æolicus Guss. — Bot. reg., tab. 1902. — Regio medit.

C. spinosus Lamk. — Lob. lc. II, tab. 93. — Reg. medit.

C. purpureus Scop. — Bot. mag., tab. 1176; Nouv. Duham.

V, tab. 42. — Austria.

var. incarnata (atropurpurea.).

— — major.

— *superba*.

— *ratisbonensis*.

— *versicolor*.

C. biflorus L'Hérit. — Waldst. et Kit., tab. 166. — Austria.

C. elongatus Waldst. et Kit. tab. 183. — Hungaria.

var. longispicata.

C. speciosus Presl. — Patria ignota.

C. supinus Jacq. Fl. austr. I, tab. 20 (non Pall.). — Eur. mer.

C. hirsutus L. — Jacq. Obs., tab. 96. — Europa austr.

C. Tournefortianus Loisel.

C. capitatus Jacq. Fl. austr., tab. 33. — Lodd. Bot. cab.,

tab. 497. — Europa australis.

C. polytrichus Bieb. — Europa australis.

- C. uralensis** *Bieb.* — Russia orient.
C. caucasicus *Hort.* — Caucasus.
C. velutinus *Hort.*
C. caramanicus *Hort. segreg.* — Oriens.
Podocytisus caramanicus *Boiss.*
P. americanus *Hort.*

LEMBOTROPIS Griseb.

- L. sessilifolius** *Griseb.* — Europa australis.
Cytisus sessilifolius *L.* — *Nouv. Duham.* V, tab. 45;
Bot. mag., tab. 255.
C. quinquefolius *Hort.*
Sparothamnus sessilifolius *Presl.*
L. nigricans *Griseb.* — Europa.
Cytisus nigricans *L.* — *Nouv. Duham.* V, tab. 45; *Bot.*
reg., tab. 802.
var. leucantha.
Cytisus leucanthus *Hort. (non Waldest.).*
 — *reflexa.*

LABURNUM Griseb.

- L. vulgare** *Griseb.* — Europa centralis.
Cytisus Laburnum *L.* — *Bot. mag.*, tab. 176; *Nouv.*
Duham. V, tab. 44.
<i>var. bifera</i> (autumnale).	<i>var. pendula.</i>
— <i>bullata</i> (involuta).	— <i>quercifolia.</i>
— <i>Carlieri.</i>	— <i>ramentacea.</i>
— <i>Fauquermonti.</i>	— <i>rugosa.</i>
— <i>foliis connatis.</i>	— <i>serotina.</i>
— <i>floribunda.</i>	— <i>sessilifolia</i> (non <i>Lem-</i>
— <i>grandiflora.</i>	<i>botropis sessilifolius).</i>
— <i>leucantha</i>	— <i>variegata.</i>
— <i>macrophylla.</i>	— <i>verrucosa.</i>
— <i>monstrosa.</i>	— <i>Watereri.</i>
— <i>Parksii.</i>	

L. Adami *Hort. segreg.* (stirps hybrida).

Cytisus Laburnum *var. purpurea Hort. brit.* — Bot. reg.,
tab. 1965.

C. Adami *Poit.*

L. alpinum *Griseb.* — Alpes.

Cytisus alpinus *Mill.* — *Guimp. Holzgew.*, tab. 128.

var. pendula.

— *annularis.*

— *latifolia.*

— *fragrans.*

L. Weldeni *Griseb.* — Dalmatia.

Cytisus Weldeni *Vis. Dalmat.*, tab. 39. — Bot. reg.
XXIX, tab. 40.

C. ramentaceus *Sieb.*

L. Alschingeri *Hort. segreg.* — Dalmatia.

Laburnum vulgare *var. Alschingeri Griseb.*

Cytisus Alschingeri *Vis. Fl. Dalmat.*, tab. 54.

INDIGOFERA *Lin.***I. Dosua** *Hamilt.* — Bot. reg. XXVIII, tab. 57. — Nepalia.

var. minor.

— *najor.*

I. decora *Lindl.* — Bot. mag., tab. 5063. — China.

var. alba.

— *rosea elegans.*

I. Iwafusi *Sieb.* — *Lavall. Arbor. segreg. Icones*, tab. ined.

— Japonia.

I. Roylei *Hort.* — Asia.**I. macroptera** *Hort.***AMORPHA** *Lin.***A. fruticosa** *L.* — *Nouv. Duham. III*, tab. 36; *Hort. Clif.*,
tab. 19. — *America septentrionalis.*

var. (1) crispa.

(1) Les *Amorpha* que nous avons reçus des pépiniéristes sous les noms de *A. canescens*, *caroliniana*, *crocea*, *dealbata*, *elatior*, *emarginata*, *fragrans*, *Gardneri*, *glabra*, *Ludoviciana*, *marginata*, *nana*, *pubescens*, *tenessensis* et *tomentosa* diffèrent si peu de l'*A. fruticosa* qu'ils ne peuvent même pas être considérés comme des variétés.

A. fruticosa.*var. Lewesii.*— *pendula Carr.* Rev. hort. 1870, p. 378.**ROBINIA** Lin.**R. Pseudo-Acacia** L. — Nouv. Duham. II, tab. 16; *Michx*
fil. Arb. Amer. II, tab. 4. — America sept.

VARIETATES HORTENSES.

amœna.	Gondouini.
amorphæfolia.	inermis nana.
angustifolia.	— pabularia.
bella rosea.	jaspidea.
bullata.	latisiliqua.
coluteoides.	macrophylla.
cornigera.	melanoxylon.
crispa (undulata).	monophylla.
Decaisneana. — Rev. hort. 1863,	monstrosa.
p. 151, cum Ic.; Fl. des	patula.
serres XIX, tab. 2027.	pendula.
dissecta.	procera.
Edwardsiæfolia.	Rehderii.
fastigiata (pyramidalis, stricta).	rubra.
fastigiata nana.	sapindifolia.
formosa (formosissima).	sophoræfolia.
glaucescens.	spectabilis (Utherarii).
Robinia revoluta Hort.	tortuosa.
- R. dubia** Foug. — Lamk, Encycl., tab. 606. — Patria ignota.
R. hybrida Audib.
R. intermedia Soul. Bod.
R. ambigua Poir.
- R. viscosa** Vent. Hort. Cels., tab. 4. — Nouv. Duham. II, tab.
 17; *Michx fil.* Arb. am. III, tab. 2. — Amer. sept.
R. glutinosa Curt. Bot. mag., tab. 560.
var. alba.

R. hispida L. — Bot. mag., tab. 311. — America sept.

R. rosea *Loisel.* Nouv. Duham. III, tab. 48.

var. *Camuseti.*

R. macrophylla *Schrad.* ex DC. Prodr. — Amer. sept.

R. hispida *inermis Carr.* Rev. hort. 1865, p. 149.

R. glabra *Hort.*

R. complexa *Hort.*

R. spectabilis *Hort.*

CARAGANA Lamk.

C. Altagana *Poir.* — Dahuria.

Robinia Altagana *Pall.* Fl. ross., tab. 42. — *L'Hérit.*

Stirp., tab. 76.

var. *microphylla Poir.*

C. microphylla DC. (non Lamk).

Robinia microphylla *Pall.* Fl. ross., tab. 42, fig. 4 et 2.

— *glomerata.*

C. arborescens Lamk, Encycl., tab. 607. — Sibiria.

Robinia Caragana L. — Nouv. Duham. II, tab. 19; Bot. mag., tab. 1886.

var. *pendula.*

— *nana.*

C. Chamlagu Lamk. — China.

Robinia Chamlagu *L'Hérit.* Stirp., tab. 17. — Nouv. Duham. II, tab. 21.

C. frutescens DC. — *Regel*, Icon., tab. 348. — Sibiria.

Robinia frutescens L. — *Pall.* Fl. ross., tab. 43.

R. sinensis *Hort.*

var. *pendula.*

— *angustifolia.*

— *latifolia.*

C. triflora *Lindl.* — *Paxt.* Flow. gard. II, fig. 212. — Nepal.

C. brevispina *Royle.*

C. spinosa DC. — Sibiria.

Robinia ferox Pall. Fl. ross., tab. 44. — Nouv. Duham.
II, tab. 20.

C. pygmæa DC. — Bot. reg., tab. 1021. — Sibiria.

var. grandiflora.

C. grandiflora Bieb.

— *gracilis.*

— *pendula.*

C. jubata Poir. — Fl. des serres XIX, tab. 2013. — Sibiria.

Robinia jubata Pall. Act. Petr. X, tab. 6. — Lodd.
Bot. cab., tab. 522.

HALIMODENDRON Fisch.**H. argenteum** DC. — Sibiria.

Robinia Halodendron Lin. fil. — Pall. Fl. ross., tab.
36; Bot. mag., tab. 1016.

Caragana argentea Lamk, Encycl., tab. 607.

H. grandiflorum Hort. — Patria ignota.

H. speciosum Carr. Rev. hort. 1876.

CALOPHACA Fisch.**C. wolgarica** Fisch. — Rossia meridionalis.

Cytisus pinnatus Pall. Fl. ross. I, tab. 47.

C. wolgaricus Lin. fil. — Nouv. Duham. V, tab. 48;
Wats. Dendr. brit. II, tab. 83.

COLUTEA Lin.**C. arborescens** L. — Bot. mag., tab. 81; Nouv. Duham.

III, tab. 22. — Europa.

var. pygmæa (crispa).

— *monstrosa.*

C. cruenta Ait. — *L'Hérit.* Stirp. II, tab. 41. — Oriens.

C. orientalis Lamk, Encycl., tab. 624. — Nouv. Duham.
I, tab. 23.

C. sanguinea Pall.

C. purpurea Hort.

C. halepica *Lamk.*, Illustr. tab. 624, fig. 2. — Asia minor.

C. Pocockii *Ait.* — *Schmidt.* Arb., tab. 129.

C. procumbens *L'Hérit.* Stirp. II, tab. 42.

C. media *Willd.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 440. — Patr. ign.

C. frutescens *Hort.* (non *Lin.*).

ASTRAGALUS *Lin.*

A. Tragacantha *L.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 84. —

Asia minor.

CORONILLA *Tourn.*

C. Emerus *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 630 ; Bot. mag., tab.

445. — Gallia meridionalis.

Emerus major *Mill.* Ic., tab. 132, fig. 1.

var. lanceolata.

C. glauca *L.* — Bot. mag., tab. 43. — Gallia meridionalis.

C. sibirica *Hort.*

DESMODIUM *DC.*

D. racemosum *DC.* — Japonia.

D. argyraceum *Hort.* (non *Sieb.*).

D. penduliflorum *Oudem.* — Fl. des serres XVIII, tab. 4888.

— Japonia.

D. racemosum *Hort.* (non *DC.*).

D. incanum *Hort.*

D. japonicum *Miq.* Prol. Fl. jap. — Japonia.

D. Dillenii *Darlingt.* — America borealis.

Hedysarum trifoliatum *Dill.* Elth., tab. 444.

D. villosum *Hort. segreg.* — Patria ignota.

Lespedeza villosa *Hort.* (non *Pers.*).

LESPEDeza *Michx.*

L. bicolor *Turez.* — L'Hort. franç. 1869, tab. 11. — Regio amur.

var. alba.

— *purpurea.*

— *rosea.*

L. cyrtobotrya *Miq.* — *Maxim.* Lesped., p. 31. — Japonia.

L. virgata *DC.* — Japonia.

Hedysarum virgatum *Thunb.*

L. argyrea *Sieb. et Zucc.* — Japonia.

CAMPYLOTROPIS *Bnge.*

C. chinensis *Bage.* — *Lavall.* Arbor. segreg. Icones, tab. ined. — China borealis.

Lespedeza macrocarpa *Bnge.*

WISTERIA *Nutt.*

W. frutescens *DC.* — America septentrionalis.

Glycine frutescens *L.* — Bot. mag., tab. 2103; *Nouv.*

Duham. III, tab. 55.

var. magnifica. — *L'Hort.* fr. 1855, tab. 49; *Fl. desser.*, tab. 1151.

— *purpurea.*

— *Backousiana.* — *Rev. hort.* 1862, p. 42, cum Icon.

— *alba* (*nivea*).

W. chinensis *DC.* — *Sieb. et Zucc.* *Fl. jap.*, tab. 44. — China.

W. floribunda *DC.*

Glycine sinensis *Curt.* Bot. mag., tab. 2083.

var. alba.

— *macrobotrys.*

W. brachybotrys *Sieb. et Zucc.* *Fl. jap.*, tab. 45. — *Fl. des serres* IX, tab. 880. — Japonia.

W. japonica *Sieb. et Zucc.* *Fl. jap.*, tab. 43. — Japonia.

W. multijuga *Sieb.* — *Fl. des ser.* XIX, tab. 2002. — Japon.

Wisteria grandiflora *Hort.*

CERCIS *Lin.*

C. Siliquastrum *L.* — *Nouv. Duham.* I, tab. 7; Bot. mag., tab. 1138. — Europa australis.

var. alba.

— *carnea.*

— *variegata.*

— *fructu rubro.*

— *sterilis.*

C. canadensis L. — *Guimp.* Holzgew, tab. 92.-- Amer. sept.

C. chinensis Bnge. — China.

C. japonica Sieb. — Fl. des serres VIII, tab. 849.

C. californica Hort. segreg. — America sept.?

GLEDITSCHIA Lin.

G. triacanthos L. — *Nouv. Duham.* I, tab. 105; *Wats.*

Dendr. brit. II, tab. 138; *Michx fl.* Arb. amer. III, tab. 10. — America septentrionalis.

Acacia triacanthos Hort.

var. inermis (lævis).

G. latifolia Hort.

— *Bujoti* (pendula).

G. sinensis Lamk. — China.

G. horrida Willd. — *Wats.* *Dendr. brit.* I, tab. 75.

G. indica Hort.

var. nana (purpurea).

G. japonica Hort.

G. ferox Desf. — China.

G. orientalis Bose.

var. subinermis.

G. macracantha Desf. — China.

G. Fontanesii Spach.

G. caspica Desf. — Asia occidentalis.

G. monosperma Walt. — *Michx fl.* Arb. amer. III, tab. 10.

— America septentrionalis.

G. aquatica Bieb.

G. caroliniensis Lamk, *Encycl.*, tab. 857.

GYMNOCLADUS Lamk.

G. canadensis Lamk, *Encycl.*, tab. 823. — *Michx fl.* Arb.

amer. II, tab. 51; *Nouv. Duham.* VI, tab. 19. —

America septentrionalis.

Guilandina dioica L.

G. chinensis Baill. *Journ. soc. hort. France* 1875, p. 465.

cum Icon. — China.

ALBIZZIA Durraz.

A. Julibrissin Durraz. Memor., cum Ic. — Oriens.

Acacia Julibrissin Willd.

Mimosa Julibrissin Forsk. — Scop. Insubr., tab. 19.

A. Nemu Hort. segregz. — China et Japonia.

A. rosea Carr. Rev. hort. 1870-71.

Acacia Julibrissin var. Benth.

A. mollis Wall. Pl. asiat. rar. II, tab. 477.

A. Nemu Van-Htte. Fl. des serres XXI, tab. 2199.

Mimosa speciosa Thunb. Linn. Trans. II.

M. arborea Thunb. — Banks, Kämpf. Ic. jap., tab. 19.

ROSINEÆ**AMYGDALUS** Tourn.

A. nana L. — Bot. mag., tab. 161; Nouv. Duham. IV, tab. 30.

— Rossia meridionalis.

var. virgata (non Armeniaca Mume v. v.).

— tortuosa.

— divaricata.

— dumosa.

— crassa.

— fl. pleno albo.

— — — rubro.

— — — carneo.

A. georgica Desf. — Flor. et Pom. franç., tab. 364. — Georgia.

A. pedunculata Pall. Nov. act. Petr. VII, tab. 89. — Sibiria.

A. Pallasii Ledeb.

A. incana Pall. Fl. ross., tab. 7. — Bot. reg. XXV, tab. 33.

— Caucasus.

A. campestris Besser. — Hungaria.

A. Besseriana Schott.

A. Gessleriana Hort.

A. sibirica Lodd. Bot. cab., tab. 1399. — Sibiria.

A. orientalis Ait. — *Lodd.* Bot. cab., tab. 4137. — Oriens.

A. argentea Lamk.

A. glandulosa Hook. Icon., tab. 288. — Texas.

A. communis Lamk. — *Nouv. Duham.* IV, tab. 29. — Asia min.
var. dulcis.

— flore pleno.

— macrocarpa. — *Bot. reg.*, tab. 4460.

— persicoides. — *Dene*, Jard. fruit. Mus.

A. amara Hayn. Arzn. IV, tab. 39, fig. 1. — Oriens.

var. pendula.

— pyramidata.

PERSICA Tourn.

P. vulgaris Mill. — *Nouv. Duham.* VI, tab. 2-3; *Spach*,
Suites Buff., tab. 5. — Persia.

Amygdalus Persica L.

Vulg. *Pêcher*.

var. nana. — *Duham.* Arb. fruit. II, tab. 32; *Dene* Jard. fruit.

— pendula.

— pyramidata.

— rubrifolia (atropurpurea). — *Fl. des serres* XIX, tab. 1983.

— flore pleno roseo.

— — — albo.

— ramulis albis. — *Lindl.* Bot. reg., tab. 4586.

— — flavis.

— — rubris.

— caucasica.

Varietates hortenses multæ.

P. lævis DC. — Patria ignota.

Amygdalus Persica var. nectarina Ait.

Vulg. *Brugnonier*.

Varietates hortenses diversæ.

P. ispahanensis Thouin Ann. Mus. VIII, p. 423. — Persia.

P. vulgaris var. ispahanensis Loisel.

var. flore pleno.

P. chinensis *Hort. segreg.* — Asia septentrionalis.

Amygdalus cochinchinensis *Lour.*

A. sinensis *Hort.*

var. flore pleno roseo (rosæflora).

P. pumila flore pleno *Hort.*

-- — *semi pleno albo.* — Fl. des serres X, tab. 969.

Amygdalus Fortunei *Hort.*

— *flore pleno rubro.* — Fl. des serres X, tab. 969.

— *camelliæflora.* — Fl. des serres X, tab. 1299.

— *dianthiflora.* — Fl. des serres X, tab. 1300.

— *radiata.*

— *versicolor.* — Fl. des serres X, tab. 1319.

P. Simoni *Dene.* — China septentrionalis.

Prunus Simoni *Carr. Rev. hort. 1872, p. 111, cum Ic.*

P. platycarpa *Dene.* -- China.

Vulg. *Flat peach* *Hort. transact. IV, tab. 49.*

— *Pêche plate* *Rev. hort. 1870-1871, p. 111, cum Ic.*

P. Davidiana *Carr. Rev. hort. 1871, p. 73.* — China.

var. nana.

— *alba.*

P. lancæfolia *Hort. segreg.* — Patria ignota.

Amygdalus lancæfolia *Hort.*

ARMENIACA *Tourn.*

A. vulgaris *Lamk, Encycl., tab. 431; — Nouv. Duham. V,*
tab. 49 et 50. — Asia minor.

Vulg. *Abricotier.*

var. amygdalifolia.

— *caucasica* (an species propria?).

— *pendula.*

— *salicifolia.*

-- *variegata.*

Varietates hortenses diversæ.

PRUNUS Tourn.

P. Mume Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 41. — *Lavall.* Arbor.
segrez. Icones. tab. ined. — Japonia.

var. præcocissima.

— virgata flore pleno.

— — — roseo pleno.

Prunus virgata Aliq. Hort.

Amygdalopsis virgata Hort. (non *Amygdalus nana* var.).

P. dasycarpa Ehrh. — Bot. reg., tab. 1243. — China.

Armeniaca dasycarpa Pers.

Prunus armeniaca nigra Desf.

var. persicæfolia. — Nouv. Duham. V, tab. 52.

P. spinosa L. — Fl. danica VI. tab. 926 ; Nouv. Duham. V,
tab. 54. — Europa.

Vulg. *Prunelier*; *Épine noire*.

var. flore pleno.

— — rubro.

— sterilis.

— fructu ovato.

P. neglecta Hort. segrez. — Patria ignota.

P. insititia L. — Engl. bot. XII, tab. 844. — Gallia.

P. exigua Bechst.

P. præcox Tourn^{off}.

P. domestica L. — Nouv. Duham. V, tab. 50-62 ; Engl. bot.

XXV, tab. 1783. — Europa australis.

P. communis Huds.

Vulg. *Prunier*.

var. flore pleno.

— armenioides. — Duham. Arb. fr. II, tab. 43.

Vulg. *P. abricotée*.

— claudiana. — Duham. l. c. II, tab. 44.

Vulg. *P. Reine Claude*.

P. domestica.

var. damascena. — *Duham.* l. c. II, tab. 20, fig. 3.

Vulg. *P. de Damas.*

— *turonensis.* — *Duham.* l. c. II, tab. 20, fig. 4.

Vulg. *P. de Tours.*

— *pruneautiana.* — *Duham.* l. c. II, tab. 7.

P. pyramidalis DC.

P. æconomica Borkh.

Vulg. *P. à pruneaux.*

— *apyrena.*

— *pendula.*

— *persicæfolia.*

P. Mirololana *Lois.* *Nouv. Duham.* V, tab. 57. — Amer. sept.

Prunus cerasifera *Ehrh.* — *Bot. mag.*, tab. 5934.

P. domestica var. Myrobolana L.

var. arbutifolia.

— *gigantea.*

— *ligustrifolia.*

— *serotina.*

P. ursina *Kotschy*, *Verhandl. Bot. Vind.* 1864, — Oriens.

P. divaricata *Ledeb.* *lc. Fl. ross.*, tab. 43. — *Lavall. Arbor.*

segrez. *Icones*, tab. ined. — Caucasus.

P. Cocomilio *Ten.* — *Dene.* *Jard. fruit. Mus.* — Italia.

P. brigantiaea *Vill.* — Gallia.

Vulg. *P. de Briançon.*

var. pendula.

P. maritima *Wangh.* — America septentrionalis.

P. nigra *Ait.* — *Bot. mag.*, tab. 1117. — Amer. sept.

P. americana *Hort.* (non *Marsh.*).

Cerasus nigra *Lois.*

P. borealis *Poir.* — *Lodd. Bot. cab.*, tab. 1598. — Amer. sept.

Cerasus borealis *Michx. fl. Arb. amer.* III, tab. 8.

P. pygmæa Willd. — America septentrionalis.

Cerasus pygmæa Loisel.

P. americana Marsh. — Texas.

P. hyemalis Michx. — America septentrionalis.

P. acinaria Desf.

Cerasus hyemalis Seringe.

P. acuminata Michx. (non Wall.). — America sept.

P. reclinata Bosc.

P. depressa Pursh. — Lodd. Bot. cab., tab. 1607. — Amer. sept.

P. susquehænæ Willd.

P. pumila Hort. (non Lin. ; nec Michx.).

P. hybrida pumila Hort.

P. canadensis Hort. (non Willd. ; nec Mill.).

Cerasus depressa Seringe.

P. pumila L. — Guimp. Holzgew. tab. 119. — America sept.

Cerasus pumila Michx.

C. glauca Mœnch.

C. canadensis Mill. Ic., tab. 89, fig. 2. (non Lin.).

Vulg. *Ragouminier*.

P. prostrata Labill. Syr. I, tab. 6. — Nouv. Duham. V, tab. 83, fig. 2 ; Bot. reg., tab. 6 ; Rev. hort. 1870-71, p. 370, cum Icon. — Liban.

Cerasus prostrata Seringe.

C. incana Stev. — Rev. hort. 1853, tab. 13.

Amygdalus incana Pall. Fl. ross., tab. 7.

P. Chicasa Michx. — Carolina.

P. candicans Willd. — Bot. reg., tab. 1135.

Cerasus Chicasa DC.

P. tomentosa Thunb. — Sieb. et Zucc. Fl. jap. I, tab. 22 ;

Lavall. Arbor. segreg. Icones, tab. ined. — Japoria.

P. trichocarpa Bnge.

P. triloba Lindl. — L'Hort. franç. 1865, tab. 10. — China.

Amygdalopsis Lindleyi Carr. Rev. hort. 1862, p. 91,

cum Icon. — Fl. des serres XV, tab. 1532.

P. japonica *Thunb.* — *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 10 ; Bot. reg., tab. 27 et 1801. — Japonia.

P. sinensis *Pers.*

P. persica alba *Hort.*

Cerasus japonica *Loisel.*

C. chinensis *G. Don.*

var. multiplex (fl. pleno). — *Rev. hort.* 1870-71, p. 290, cum Ic.

P. japonica *Lindl.* Bot. reg., tab. 27.

Amygdalus pumila *L.* — Bot. mag., tab. 2176.

P. sinensis *Althæa Hort.*

P. flore albo pleno *Hort.*

— *pendula.*

P. insignis *Hort.*

P. canadensis hybrida *Hort.*

CERASUS Tourn.

§. CERASOPHORA.

C. serrulata *Loud.* — China.

C. serratifolia fl. pleno *Hort.*

C. serrulata fl. pleno *Hort.*

C. serotina fl. pleno *Hort.*

C. depressa *Hort.* (non *Ser.*)

Prunus serrulata *Lindl.*

C. Pseudo-cerasus *Lindl.* — China.

C. Sieboldi *Carr.* *Rev. hort.* 1866, p. 371, cum Icon.

C. pseudo-cerasus flore roseo *Hort.*

C. hortensis flore roseo pleno *Hort.*

C. carneo pleno *Hort.*

Prunus pseudo-cerasus *Steud.*

P. serratifolia fl. roseo pleno *Hort.*

P. paniculata *Ker.* (non *Thunb.*).

var. pendula.

C. Sieboldi *pendula* flore roseo *Hort.*

— flore pleno.

C. Avium *Mæneh.* — Nouv. Duham. V, tab. 3; Fl. danica X, tab. 1647. — Gallia.

Prunus Cerasus avium *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 432.

P. nigra *Mill.* (non *Ait.*).

P. sylvestris *Pers.*

P. effusa *Hort.* (non *Host.*).

Vulg. *Merisier.*

var. multiplex.

— *præmorsa.*

— *salviæfolia.*

— *laciniata.*

C. vulgaris laciniata *Hort.*

— *aspleniifolia.*

— *longifolia.*

— *rubrifolia.*

— *pendula.*

C. Juliana *DC.*

Vulg. *Guignier.*

C. duracina *DC.* — Patria ignota.

Prunus Cerasus Bigarella et duracina *L.*

Vulg. *Bigarreantier.*

var. macrophylla.

C. nicotianæfolia *Hort.*

C. decumana *Delaun.*

— *salicifolia.*

C. vulgaris salicifolia *Hort.*

C. caproniana *DC.* — Europa.

C. acida *Mill.*

Prunus acida *Ehrh.*

P. austera *Ehrh.*

Vulg. *Cerisier* ; *Griottier.*

C. caproniana.*var. multiplex.**C. Rhexii Hort. Booth.**C. caproniana ranunculiflora Hort. — Fl. des serres XVII, tab. 1805.**C. serotina flore pleno Hort.*— *polygyna. — DC. Pl. rar. Genev., tab. 48.**Vulg. Griottier à bouquets. — Duham. Arb. tab. 3.*— *umbraculifera.*— *salicifolia.*— *pumila.**C. acida pumila Hort.*— *humilis.**C. acida humilis Hort.***C. Chamæcerasus** *Lois. Nouv. Duham. V, tab. 5. — Europa.**Prunus Chamæcerasus L. — Jacq. Ic., tab. 90.**P. fruticosa Pall. Fl. ross. I, tab. 8.**var. umbraculifera. (non C. caproniana var.).**C. amygdalifolia Hort. (non Webb.).*— *floribunda.**Prunus pumila Aliq. Hort. (non Michx.).***C. semperflorens** *DC. — Nouv. Duham. V, tab. 9; Rev hort.**1877, p. 50, cum. Icon. — Europa.**Prunus semperflorens Ehrh — Wats. Dendr. II, tab. 131.**P. serotina Roth, (non Ehrh., nec Willd.).***C. persicifolia** *Lois. — America septentrionalis.**Prunus persicifolia Desf.***C. Mahaleb** *Mill. — Nouv. Duham. V, tab. 2. — Europa.**Prunus Mahaleb L. — Jacq. Fl. austr. III, tab. 287.**var. fructu albo.*— — *luteo.*— *monstrosa.*— *cerasifera.***C. Fontanesiana** *Spach. — Græcia.**Prunus græca Desf.*

§. PADUS.

C. glaucifolia Wall. — India Orient.

C. cornuta Wall. — *Royle* Illustr. Him., tab. 38. — Himalaya.

Prunus cornuta Steud.

Padus cornuta Carr. Rev. hort. 1869, fig. 64.

C. mollis Dougl. — *Nutt.* North-Am. sylv. II, tab. 46. — Oreg.

C. Padus DC. — *Nouv. Duham.* V, tab. 4. — Europa.

Prunus Padus L. — *Fl. danica* II, tab. 205.

Vulg. *Merisier à grappes*; *Bois de Ste Lucie*.

var. *racemosa rotundifolia*.

-- -- *fimbriata*.

-- *aucubæfolia*.

-- *latifolia*.

Cerasus cornuta Aliq.

Hort. (non Wall.).

-- *bracteosa*.

var. *encullata monstrosa*.

-- *rubra*. Willd. Arb., tab. 4.

-- *heterophylla*.

-- *longifolia*.

-- *aspleniifolia*.

-- *flore pleno*.

C. virginiana Michx fl. Arb. amer. III, tab. 6; Willd.

Arb. tab. 5. — America sept.

Prunus virginiana L. — *Guimp.* Holzgew. tab. 36.

P. rubra Ait. — *Guimp.* Holzgew. tab. 78.

var. *micropyrena*.

C. serotina Loisel. — America septentrionalis.

Prunus serotina Willd. Arb., tab. 5. (non Roth.). —

Wats. Dendr. brit. I, tab. 48.

P. virginiana Mill. (non Lin.; nec Ehrh.).

P. cartilaginea Lehm.

C. Capuli DC. — *Lavall.* Arb. segrez. Icon, tab. ined. — Mexico.

Prunus Capuli Ser.

§. LAURO-CERASUS.

C. lusitanica Loisel. — *Mill.* Icon., tab. 193; *Dill.* Hort.

Eltham., tab. 459. — Iberia.

C. lusitanica.

Prunus lusitanica L.

Vulg. *Laurier de Portugal* ; *Azaréro*.

var. angustifolia.

— *crassifolia.*

— *ormistoniensis.*

— *foliis variegatis.*

C. Lauro-Cerasus *Loisel.* — *Guimp.* tab. 64. — Europa austr.

Prunus Lauro-Cerasus L. — *Bull. Herb.*, tab. 153.

Vulg. *Laurier-Cerise.*

var. erecta.

— *latifolia.*

— *longifolia.*

— *microphylla.*

— *myrtifolia.*

— *rotundifolia.*

var. Otini.

— *azorica.*

— *caucasica.*

— *kamtschatica.*

— *intermedia.*

— *foliis variegatis.*

C. caroliniana *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 7. — Amer. sept.**C. ilicifolia** *Nutt.* North-Amer. sylv. I, tab. 47. — *Hook.*

Beechey voy. tab. 83. — California.

KERRIA DC.**K. japonica** DC. — *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 98; Bot.

reg., tab. 1873. — Japonia.

Corchorus japonica *Thunb.*

Spiræa japonica *Camb.*

var. flore pleno. — Bot. mag., tab. 4296.

— *foliis variegatis.*

— *ramulis aureo-vittatis.*

RHODOTYPOS *Sieb. et Zucc.***R. kerrioides** *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 99. — Bot. mag.,

tab. 505; *Lavall.* Arbor. segr. Icon, tab. ined. — Japon.

SPIRÆA Lin.

§. FLORES PANICULATI.

S. sorbifolia L. — *Pall.* Fl. ross., tab. 24 et 29. — Sibiria.

S. pinnata *Mench.* — *Gmel.* Fl. sib., tab. 401.

S. alpina *Pall.* Fl. ross., tab. 20. — Sibiria.

S. sorbifolia var. alpina *DC.*

S. Pallasii *Hort. petrop.*

S. Tobolskia *Lodd.* — Sibiria.

S. Lindleyana *Wall.* — Bot. reg., tab. 33. — Nepalia.

S. Humboldtii *Hort.*

S. ariæfolia *Smith.* — Bot. reg., tab. 1365. — America bor.

S. lævigata L. — *Lamk.* Illustr., tab. 436, fig. 3. — Sibiria.

S. altaica *Pall.* Fl. ross. I, tab. 23.

S. salicifolia L. — *Lamk.* Encycl., tab. 439; *Gmel.* Fl. sibir. III, tab. 49. — Sibiria et America sept.

var. carpiniifolia. — *Pall.* Fl. ross., tab. 22.

S. carpiniifolia *Ehrh.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 66.

S. amœna *Rafin.*

S. alba *Pers.* (non *Ehrh.*).

— major (latifolia). — *Pall.* Fl. ross., tab. 21.

S. obovata *Rafin.* (non *Waldst.* et *Küt.*).

— paniculata alba.

S. paniculata *Willd.*

S. alba *Ehrh.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 183.

S. Rigoldi *Hort.*

S. salicifolia fl. albo *Hort.*

— undulata.

S. caneifolia *Rafin.* (non *Wall.*).

— rubro-viridis.

— Bethlehemensis.

— Regeliana (Sanssouciana).

— grandiflora rosea.

S. salicifolia.

var. pensylvanica.

— *carnea* (S. *nepalensis carnea Hort.*).

-- *roseola* (S. *sinensis Hort.*).

— *alba-lilacina.*

— *rosea* (S. *pruinosa Hort.*).

— *Fontenaysi rosea.*

— *incarnata.*

— *polystachys.*

— *floribunda.*

— *Billardi.* — L'Hort. franç. 4853, tab. 6.

— — *longepedunculata Hort. Billard.*

— *rubra.*

S. *nepalensis Hort.*

S. Douglasii Hook. — Fl. des serres II, tab. 2; Bot. mag., tab. 5151; Rev. hort. 1846, tab. 6. — Oregon.

S. *argentea Hort.* (non *Lin.*, nec *Loud.*).

var. pachystachys.

S. tomentosa L. — *Pluck. Phyt.*, tab. 321. — America sept.

S. Menziesii Hook. — America septentrionalis.

S. *eximia Hort.*

S. Nobleana Hook. Bot. mag., tab. 5169. — California.

var. pachysandra.

S. *californica Hort.*

— *intermedia.*

S. *Nobleana Hort.*

§. FLORES CYMOSO-CORYMBOSI.

S. Fortunei Planch. Fl. des serres IX, tab. 571; Bot. mag. tab. 5164. — China.

S. *callosa Lindl.* Fl. gard. II, tab. 413, (non *Thunb.*).

var. Foxii.

— *Fortunei paniculata.*

— *macrophylla.*

-- *corymbiflora (bella coccinea).*

— *semperflorens.*

S. *Regeliana Aliq. Hort.*

S. Fortunei.

- hybrida rosea.
- — Van-Houttei.
- syringæflora.
- atrosanguinea.

S. callosa Thunb. (non Lindl.). — Belg. hort. III, tab. 37.
— Japonia.

var. alba.

— superba.

S. bella Sims, Bot. mag., tab. 2426. — Nepalia.
S. ovata Hort.

S. expansa? Wall. — India orientalis.
S. species du Kamaon Hort.
S. montana Hort.

var. nivea.

S. opulifolia L. — Nouv. Duham. VI, tab. 44. — Amer, sept.
var. lutea.

§. FLORES CORYMBOSI.

S. decumbens C. Koch in Sturm. Fl. XIV, tab. 62; — Lindl.
Fl. gard. I, tab. 45. — Austria.

S. pubescens Bnge. — Bot. reg. XXXIII, tab. 38. — China.

S. arctica Hort.

S. rupestris Sieb. — Japonia.

S. ulmifolia Scop. Fl. carn., tab. 22 bis. — Nouv. Duham. VI,
tab. 43. — Sibiria.

S. chamædrifolia Jacq. Hort. vind., tab. 440. (non Lin.).

S. foliosa Poir.

S. betulæfolia Pall. Fl. ross. III, tab. 16.

var. parvifolia.

S. thalictroides Hort. (non Pall.).

S. chamædrifolia L. (non Jacq.). — Pall. Fl. ross., tab. 45;
Bot. reg., tab. 4222. — Sibiria.

S. flexuosa Hort. (non Fischer).

S. cana Waldst et Kit. Fl. hung. III, tab. 227. — Croatia.

S. flexuosa *Fisch.* (non *Reichb.*) — *Cambes*. Ann. sc. nat. 1^{re} sér.

I, 365. — *Siberia*.

S. alpina *Hort. Paris.* (non *Pall.*).

S. inflexa *Hort.*

S. tenuissima *Hort.*

S. trilobata *L.* — *Wats.* Dendr. brit. I, 68. — *Altaï*.

S. thalictroides *Hort.* (non *Pall.*).

S. lobata *Hort.* (non *Murr.*).

S. intermedia *Hort.*

S. media *Hort.* (non *Pursh.*).

S. grossulariæfolia *Hort.*

S. adiantifolia *Aliq. Hort.*

var. fl. rubro.

S. cratægifolia *Link.* — *Guimp.* Fr. Holzg., tab. 82. — *Siberia*.

S. betulæfolia *Wats.* Dendr. brit. tab. 67.

S. japonica vel *californica* *Hort.*

S. pruinosa *Hort.*

S. corymbosa *Rosin.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 674.

S. ceanothifolia *Horn.*

S. Reevesiana *Lindl.* Bot. reg. tab. 40. — *China*.

S. cantoniensis *Lour.*

S. chamædrifolia oblongifolia *Hort.*

S. flexuosa *Hort.* (non *Fisch.*).

var. fl. pleno. — *L'hort. franç.*, 1855, tab. 44.

S. robusta *Hort.*

S. hypericifolia *L.* — *Ledeb.* Icon., tab. 428-430. — *Europa*.

S. foliosa *Poir.*

S. Pikoviensis *Aliq. Hort.* (non *Bess.*).

var. obovata.

S. crenata *Hort.* (non *Pall. nec Thunb.*).

— *brevifolia.*

S. acuta *Hort.*

S. acutifolia *Hort.* (non *Willd.*).

— *oblongifolia major.*

S. hypericifolia.*var. nutans Hort.**S. nutans Hort.**S. rhombifolia Hort.*— *nana,**S. nana Hort.**S. decumbens Hort.* (non *C. Koch.*).*S. cuneifolia Hort.* (non *Wall.*).*S. californica Hort.**S. flagellata Hort.*— *adiantifolia ?**S. adiantifolia Hort.*— *vacciniifolia ?**S. vacciniifolia Hort.* (non *Don.*).**S. flagelliformis Hort.****S. confusa Hort.****S. canescens Don.** — *Nepalia.**S. Pikoviensis Hort.* (non *Bess.*).**S. Thunbergii Sieb. et Zucc.** *Fl. jap., tab. 69.* — *Japon.**S. Thompsoni Hort.***S. prunifolia Sieb. et Zucc.** *Fl. jap., tab. 70.* — *Japonia***S. Blumei G. Don.** — *Japonia.*

SPECIES VEL VARIETATES DUBIÆ.

S. oblongata Hort.**S. fissa Hort.****S. formosa Hort.****S. Hookeri Hort.****S. mexicana Hort.****S. himalayea Hort.****EXOCHORDA Lindl.****E. grandiflora Lindl.** — *Lavall. Arbor. segreg. Icones,*
tab. ined. — *China borealis.**Spiræa grandiflora Hook. Bot. mag., tab. 4793.**Amelanchier racemosa Fortune.*

NUTTALLIA Torr. et Gr.

- N. cerasiformis** Torr. et Gr. — *Hook. et Arn. Bot. Beech.*
tab. 82. — *Lavall. Arbor. segregz. Icones*, tab. ined.
— America septentrionalis.
Exochorda Davidiana Baill. Adans. IX, p. 149.

LINDLEYA H. B. K.

- L. mespiloides** H. B. K. — *Paxt. Fl. gard. II*, tab. 212.
Rev. Hort. 1854, tab. 5. — Mexico.

DRYADEÆ

MARGYRICARPUS Ruiz et Pav.

- M. setosus** Ruiz et Pav. *Fl. Per. I*, tab. 8. — Chili.
Ancistrum barbatum Lamk., Ill. I, p. 77.

CHAMÆBATIA Benth.

- C. foliolosa** Benth. — *Bot. mag.*, tab. 5174. — California.

RUBUS Lin.

SPECIES EUROPEÆ.

- R. Idæus** L. — *Nouv. Duham. VI*, tab. 23. — Gallia.
R. cæsius L. — *Nouv. Duham. VI*, tab. 22. — Gallia.
R. fruticosus L. — *Nouv. Duham. VI*, tab. 22. — Gallia.
var. inermis (*R. inermis Willd.*).
— *cruciata*.
— *laciniata*. (*R. laciniatus Willd. non Wats.*).
— *rotundifolia*.
— *variegata*.
— *pomponia flore pleno*. — *Savi, Fl. ital. tab. 28*.
— *flore semi-pleno*. (*R. discolor Weihe, Rubus tab. 28.*).
— *fructu viridi*.
R. tomentosus Willd. — *Weihe, Rubus tab. 8*. — Gallia.
var. flore pleno.

SPECIES ASIATICÆ.

- R. rosæfolius** *Smith.* — Fl. des Ser. tab. 1714. — Ind. orient.
var. coronaria. — Bot. mag., tab. 1783.
R. sinensis Hort.
- R. triphyllus** *Thunb.* — Japonia.
- R. crategifolius** *Bnge.* — *Reg. Tent. fl. ussur.* tab. 5. —
 China bor.
- R. parvifolius** *L.* — Bot. reg. tab. 496. — Chin. et Japon.
var. floribus roseis.
- R. trifidus** *Thunb.* — Japonia.
R. japonicus Hort.
- R. phanicolasius** *Maxim.* — Japonia.

SPECIES AMERICANÆ.

- R. nutkanus** *Moc.* — Bot. reg., tab. 1368. — California.
- R. deliciosus** *Torr.* — Bot. mag., tab. 6062. — Canada.
- R. occidentalis** *L.* — Canada.
- R. leucodermis** *Dougl.* — Orégon.
R. biflorus Dene. (non Don.).
- R. spectabilis** *Pursh*, Fl. bor. amer. I, tab. 46. — Amer. sept.
 — flore subflavo.
 — fructu flavo.
- R. nobilis** *Hort. angl.*
- R. odoratus** *L.* — *Mill. Icon.*, tab. 223. — Amer. sept.
R. edulis Hort.
 — flore albo.
 — — roseo pleno.
- R. canadensis** *L.*
- R. parviflorus** *Nutt.*
- R. Ristonii** *Hort.*
- R. Lawtonii** *Hort.*
- R. rosæflorus** *Hook.* *Icon.*, tab. 46. — Peruvia.

SPECIES AUSTRALASICA.

R. australis *Forst.* — *Hook.* Fl. Nov. Zel., I, tab. 44 —
Nova Zelandia.

STIRPS INCERTA.

R. Hoffmeisterianus *Kth.* et *Bouché.* — Himalaya.

ROSACEÆ

POTENTILLA *Lin.*

- P. fruticosa** *L.* — Alpes et Europa septentrionalis.
var. dahurica. — Sibiria, Asia borealis et Amer. sept.
P. davurica *Nestl.*
P. floribunda *Pursh.*
P. tenuifolia *Schlecht.*

ROSA *Lin.*

- R. microphylla** *Roxb.* — (§. *Platyrhodon* *Decne.* Bon jard.
 1850). *Lindl.* Bot. reg. II tab. 419. — China.
R. bracteata *Wendl.* — *Redout.* Les Roses tab. 6. — China.
R. indica *L.* — *Redout.* Les Roses tab. 50. Vulg. *Rosier Thé.*
 — China.
R. fragrans *Redout.* et *Th.*
R. indica odoratissima *Lindl.*
Varietates hortenses multæ.
R. borboniana *Redout* — Vulg. *Rosier de l'île Bourbon.*
Varietates hortenses multæ.
R. hybrida *Hort.* (non *Schleich.*). — Vulg. *Rosier hybride*
remontant.
Varietates hortenses multæ.
R. Noisettiana *Redout.* et *Th.* — Vulg. *Rosier de Noisette.*
R. indica var. Noisettiana *Ser.*
Varietates hortenses multæ.
R. multiflora *Thumb.* — *Redout.* Les Roses, tab. 70. — Japon
R. sinica *Ait.* — Bot. mag., tab. 2847. — Japonia.

- R. diversifolia** Vent. Jard. Cels tab. 35. — Vulg. *Rosier du Bengale*.
R. semperflorens Curt. Bot. mag., tab. 284.
R. bengalensis Pers.
R. indica var. *sempervirens* Ser.
var. *viridiflora*. — L'Hort. franç., 1836 tab. 49.
- R. Russeliana** Hort. Loud. — Sibiria.
- R. rubifolia** R. Br. — Amer. sept.
- R. hystrix** Lindl. Monogr. tab. 47. — China et Japonia.
- R. kamtschatica** Vent. Jard. Cels. tab. 67. — Kamts. et Tauria.
R. horrida Bess.
- R. rugosa** Thunb. — Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 28. — Japonia.
R. ferox Lawr. (non *M. Bieb.*).
R. Regeliana Ed. Andr. Illustr. hort. 1871.
var. fl. albo. — Lavall. Arbor. segreg. Icones, tab. ined.
- R. Zuccariniana** Lavall. Arbor. segr. Ic. tab. ined. — Japon.
- R. rugosa* var. *flore pleno* Sieb.
- R. acicularis** Lindl. Monogr. tab. 8. — Japonia.
- R. spinosissima** L. — Fl. dan. III, tab. 398. — Europa.
- R. coruscans** Link. — Asia.
- R. Fischeriana** Link. — Rossia.
- R. Fortuneana** Paxt. Flow. gard., tab. 471. — China.
Varietates hortenses diversæ.
- R. Eglanteria** L. — Sw. Bot. tab. 463. — Asia occidentalis.
R. lutea Willd. — Bot. mag. tab. 363.
var. *punicea*. — Vulg. *Rosier capucine*.
— Persian yellow.
- R. sulphurea** Ait. — Redout. Les Roses, tab. 3. — Oriens.
- R. rubrifolia** Vill. — Redout. Les Roses, tab. 4. — Europa.
- R. lutescens** Pursh. — Lindl. Monogr. tab. 9. — Sibiria.
- R. pimpinellifolia** L. — Pall. Fl. ross. tab. 75. — Europa.
- R. alba** L. — Fl. dan. VII, tab. 4215; Nouv. Duham. VII tab. 46
— Europa centralis.
- R. alpina** L. — Redout. Les Roses, tab. 413. — Alpes.

- R. Banksiæ** *R. Br.* — L'hort. franç. 1851, tab. 7. — China.
var. Fortunei.
- R. anemoneflora** *Lindl.* — China?
- R. Lawrenceana** *Sweet.* Bot. reg. tab. 588. — Vulg.
Rosier pompon. — China.
- R. sempervirens** *L.* — Bot. reg. tab. 465. — Eur. austr.
- R. moschata** *Mill.* — *Redout.* Les Roses V, tab. 37. — Mauritania.
- R. Ayreshirea** *Lindl.* — Europa?
R. Manetti Hort.
- R. portlandica** *Hort.* — Vulg. *Rosier perpétuel; R. du roi*
Varietates hortenses multæ.
- R. damascena** *Mill.* — Syria.
- R. centifolia** *L.* — *Redout.* Les Roses tab. 1. — Vulg. *Rosier*
à cent-feuilles. — Oriens?
Varietates hortenses multæ.
- R. muscosa** *Ait.* — *Guimp.* Fr. Holzgew. tab. 39. — Vulg.
Rosier moussu. (flor. simpl.).
Variet. hort. flor. pleno multæ.
- R. gallica** *L.* — *Jacq.* Fl. austr. tab. 498. — Vulg. *Rosier de*
Provins. — Gallia.
- R. lucida** *Ehrh.* — *Redout.* Les Roses, tab. 11. — Amer. sept.
- R. carolina** *L.* — *Lindl.* Monogr. tab. 4. — Amer. sept.
- R. cinnamomea** *L.* — *Lindl.* Monogr. tab. 4. — Europa.
- R. sericea** *Lindl.* Monogr. tab. 12. — *Royale Ill.* Him. tab. 2.
 — Himalaya.
- R. polyantha** *Sieb. et Zucc.* — Japonia.
- R. Iwara** *Sieb. et Zucc.* — Japonia.
- R. Woodsii** *Lindl.* Bot. reg. tab. 976. — Missouri.
- R. californica** *Lindl.* — California.
- R. platyphylla** *Rau* — Europa.
- R. gracilis** *Woods.* — Europa.
- R. arvensis** *Huds.* — Gallia.
- R. Chaboissæi** *Gren.* — Gallia.
- R. arvina** *Krock.* — Europa.
- R. pendula** *Redout*
- R. hybrida** *Schleich* — Europa.

- R. Jundzilliana** Bess. — Gallia.
R. macrantha Desp. — Gallia.
R. tenuicarpa Deségl. — Gallia.
R. arvensis Pug. — Gallia.
R. saxatilis Stev. — Tauria.
R. obtusifolia Desv. — Gallia.
R. hibractenta Bast. — Gallia.
R. uncinella Bess. — Gallia.
R. pendulina Ait. — Europa.
R. Deseglisei God. — Gallia.
R. Guepini Desv. — Gallia.
R. Neuteri God. — Gallia.
R. ramealis Pug. — Gallia.
R. Habermani Pug. — Gallia.
R. obscura Pug. — Gallia.
R. Blondeana Rip. — Gallia.
R. malmundariensis Lejeune — Redout. Les Roses, tab. 74.
 — Europa.
R. dumetorum Thuill. — Redout. Les Roses, tab. 100. — Gallia.
R. caroliniana Michx. — America septentrionalis.
R. glandulosa Bess. — Gallia.
R. montivaga Deségl. — Gallia.
R. lugdunensis Deségl. — Gallia.
R. leucochroa Desv. Journ. II, tab. 15. — Gallia.
R. setigera Michx. — Amer. sept.
R. Brunonii Lindl. Monogr. tab. 44 — Nepalia.
 R. Brownii Spreng — Fl. des serres IX, tab. 366 et 367.
R. sphaerica Gren. — Gallia.
R. sepium Thuill. — Engl. bot. tab. 2653. — Gallia.
R. sylvatica Rau. — Gallia.
R. Boreana Rip.
R. similata Pug. — Gallia.
R. Camellia Sieb. — Japonia.
 var. floribus albis.

POMACEÆ

MESPIUS Lin.

M. germanica L. Vulg. *Néflier*. — Nouv. Duham. IV, tab. 38.

— Europa.

var. macrocarpa.

— apyrena.

M. Smithii DC. Prodr. II, p. 633. — *Lavall.* Arbor. segregz.,

Icones, tab. ined.

M. grandiflora Smith. Exot. Bot. I, tab. 18.

Cratægus lobata Desf. — *Jaume St-Hil.*, Pom. franç.,
tab. 360.

C. acanea Hort.

C. intermedia Hort.

C. capitata Smithii Hort.

PYRACANTHA Spach.

P. coccinea Rœm. Vulg. *Buisson ardent* — Europa australis

Cratægus Pyracantha Pers.

Mespilus Pyracantha L. — *Pall.* Fl. ross., tab. 13, fig. 4.

var. fructibus luteis.

— Lalandii.

— implexa.

P. crenulata Rœm. — Nepalia.

Cratægus crenulata Roxb. — Bot. reg. 1844 tab. 52.

C. Pyracantha var. *crenulata* Hort.

Mespilus crenulata Don.

CRATÆGUS Lindl.

C. linearis Pers. — America septentrionalis.

C. Crus-galli var. *linearis* L.

C. stipulacea microphylla Hort.

Mespilus linearis Desf.

C. salicifolia *Medic.* — Amer. sept.*C. Crus-galli* var. *salicifolia* *Hort.**C. Boscii* *Hort.**Mespilus salicifolia* *C. Koch.***C. pyracanthifolia** *Ait.* — America septentrionalis.*Mespilus Watsoniana* *Spach.**M. Crus-galli* *Wats.* *Dendr. brit.*, tab. 56. (non *Poir.*).**C. lucida** *Mill.* — *Wangenh.* *Beitr.* 53, tab. 17. — Amer. sept.*C. Crus-galli* *L.**C. Crus-galli* var. *lucida* *Regel.**C. Crus-galli* var. *splendens* *Ait.**C. laurifolia* *Medic.**Mespilus Crus-galli* *Poir.* (non *Wats.*).*M. lucida* *Ehrh.**Azarolus lucida* *Hort.*var. *macracantha.**Azarolus macracantha* *Hort.***C. ovalifolia** *Hornem.* — America septentrionalis.*C. Crus-galli* *ovalifolia* *Lindl.* *Bot. reg.*, tab. 1860.*C. prunellifolia* *Bosc.**Mespilus prunellifolia* *Poir.***C. prunifolia** *Bosc.* — *Bot. reg.*, tab. 1868. — Amer. sept.*C. Crus-galli* var. *prunifolia* *Aza Gray.**C. ingestria* *Lodd.***C. Bosciana** *Stend.* — America septentrionalis.*C. Bosceana* *Hort.**C. splendens* *Hort.**Mespilus Bosciana* *Spach*, *Suit. Buff.*, tab. 10, F.*M. badiata* *Bosc.***C. Fontanesiana** *Lavall.* — Amer. sept.*Mespilus Fontanesiana* *Spach* *Suit. Buff.*, tab. 10, fig. K*M. Crus-galli* *Desf.* (non *Lin.*).*M. glandulosa* *Bosc* (non *Willd.*).*M. elliptica* *Ait.*

- C. leucophlæos** *Mærch.* Wereich, tab. 2. — *Lavall.* Arbor. segregz. Icones, tab. ined. — America sept.
C. pirifolia *Ait.* (non *Hort. Paris.*), Bot. reg. tab. 4860.
- C. punctata** *Jacq.* Hort. vind. I, tab. 281. — *Wats.* Dendr. brit., I, tab. 57. — America septentrionalis.
var. fructibus rubris.
C. punctata rubra *Hort.*
C. pirifolia *Hort. Paris.* (non *Ait.*).
Mespilus cuneifolia *Ehrh.*
- fructibus aureis.
C. punctata aurea *Hort.*
C. flava *Hort.* (non *Ait.*).
C. turbinata *Hort.* (non *Pursh.*).
C. triloba *Hort.* (non *Lindl.* Bot. reg.).
C. neapolitana *Hort.*
Mespilus pirifolia *Wats.* Dendr. brit., tab. 64.
M. cornifolia *Poir.*
Azarolus pirifolia *Hort.*
- C. latifolia** *Pers.* (non *Hort. Paris.*). — America sept.
Mespilus latifolia *Poir.*
- C. stipulacea** *Lodd.* — *Lavall.* Arbor. segregz. Ic. tab. ined.
Mespilus stipulacea *Desf.*
M. Loddigesiana *Spach.*
- C. mexicana** *Moç. et Sess.* — Bot. reg., tab. 4910; *Lavall.* Arbor. segregz. Icones tab. ined. — Mexico.
- C. flava** *Ait.* — Bot. reg., tab. 4939. — America sept.
C. glandulosa *Michx.* (non *Willd.*).
C. caroliniana *Poir.*
Mespilus flava *Willd.* — *Wats.* Dendr. brit., tab. 59.
M. Michauxii *Pers.*
- var. lobata *Lindl.* Bot. reg., tab. 4932.
C. lobata *Bosc* (ex *Lindl.*).
Mespilus lobata *Poir.* — Bot. mag. tab. 3442.
- Mac-Nabiana.
C. Mac-Nabiana *Hort.*

- C. tomentosa** *L.* — *Kerner* Ockan. Gew., tab. 699; *Lavall* Arbor. segreg. Icones, tab. ined. — Amer. sept.
- C. uniflora** *Duroi* — *Lavall*. Arbor. segreg. Icones tab. ined. — Amer. sept.
Mespilus tomentosa *Poir.*
M. uniflora *Mœnch.*
- C. parvifolia** *Ait.* — *Wats.* Dendr. brit. tab. 65. — Am. sept.
Mespilus virginiana *Mill.*
M. parvifolia *Willd.*
- C. betulæfolia** *Lodd.* — *Lavall*. Arbor. segreg., Icones, tab. ined. — America septentrionalis.
C. Pinschaw *Hort.*
- C. cuneata** *Sieb. et Zucc* — Japonia.
C. spathulata *Hort.* (non *Michx.*, nec *Pursh.*).
- C. atropurpurea** *Lavall*. Arbor. segreg. Icones, tab. ined. — Japonia.
C. alnifolia *Hort.* (non *Sieb.*).
- C. glandulosa** *Mœnch.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1012 — America septentrionalis.
Mespilus glandulosa *Willd.*
var. rotundifolia.
C. glandulosa *Lodd.* Bot. cab., tab. 1002.
C. glandulosa purpurea *Hort.*
C. viridis *Willd.*
C. virginiana *Oxyacantha* *Hort.*
Mespilus rotundifolia *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 54.
M. viridis *C. Koch.*
- flabellata.
Mespilus flabellata *Bosc.* — *Spach*, Suit. Buff. tab. 10.
- succulenta.
- macracantha *Lindl.* Bot. reg., tab. 1912.
C. macracantha *Lodd.*
C. coccinea *Lindl.* Bot. reg., tab. 1957 (non *Lin.*).
C. pruinosa *Wendl.*

- C. sanguinea** *Pall.* Flor. ross ; tab. 44. — Sibiria.
 C. purpurea Loud.
 Mespilus sanguinea Spach, Suit. Buff., tab. 40.
 M. purpurea Poir. — *Wats.* Dendr. brit., tab. 60.
- C. Douglasii** *Lindl.* Bot. reg., tab. 1810. — America sept.
 C. sanguinea var. Douglasii Torr. et Gray.
- C. coccinea** *Wangh.* — Bot. mag., tab. 3432. — America borealis.
 C. coccinea L. (ex parte.).
 C. corallina Loud. (non Desf.).
 Mespilus coccinea Poir. — *Wats.* Dendr. brit. I, 62.
var. cordata. — *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined.
— *macrocarpa.*
 C. macrocarpa Hort.
- C. Wendlandi** *Hort.* — America septentrionalis.
 C. coccinea var. mollis Torr. et Gray.
 C. coccinea var. pruinosa Hort.
 C. subvillosa Hort.
 C. sanguinea var. villosa Rupr. et Maxim.
 C. pruinosa Hort. (non Wendl.).
 Mespilus pubescens Wendl.
 M. tiliæfolia C. Koch.
- C. cordata** *Mill.* — Bot. reg., tab. 4454. — America sept.
 C. populifolia Walt.
 Mespilus cordata Willd. — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 63.
 M. corallina Desf.
 M. caroliniana Poir.
 M. acerifolia Poir.
- C. Celsiana** *Bosc.* — America septentrionalis.
 Mespilus Celsiana Dum.-Cours.
- C. nigra** *Wald. et Kit.* Hung. rar. tab. 64. — Hungaria.
 Mespilus nigra Willd. — *Wats.* Dendr. brit., tab. 64.
 M. tomentosa Hort. (non Lin.).

C. tanacetifolia Pers. — Bot. reg., tab. 1884. — Oriens.

Mespilus tanacetifolia Poir. — Smith, Exot. bot., tab. 58;

Lavall. Arbor. segreg. Icones, tab. ined.

Cratægus apiifolia Hort. (non Michx.).

var. monstrosa.

Cratægus monstrosa Hort.

— glabra.

Cratægus glabra Hort. (non Thunb.).

C. odoratissima Lindl. Bot. reg. tab. 1885. — *Lavall.*

Arbor. segreg. Icones, tab. ined. — Oriens.

C. odorata Bosc.

C. orientalis Pall. — Bot. reg., tab. 1852.

Mespilus odoratissima Andr. Bot. rep., tab. 590.

M. orientalis Poir.

C. Azarolus L. — Rev. Hort. 1856, tab. 23; *Spach*, Suit.

Buff., tab. 10, fig. M; *Lavall. Arbor. segreg. Icones*,
tab. ined. — Oriens.

Mespilus Azarolus Poir. — Nouv. Duham. II, tab. 42.

Cratægus pectinata Bosc.

C. Aronia Bosc. — Bot. reg., tab. 1897; *Lavall. Arbor. segreg.*

Icones, tab. ined. — Oriens.

Mespilus Aronia Willd. — *Spach*, Suit. Buff., tab. 10,
fig. B.

M. Azarolus DC. Flore franç. (non Poir.).

C. heterophylla Flugg. Ann. Mus. XIV, tab. 38. — Bot. reg.

tab. 1847. — Amer. sept.

Mespilus heterophylla Poir.

Cratægus Azarolus var. *heterophylla* Regel.

C. maroccana Lindl. Bot. reg., tab. 1855. — Mauritania.

C. pentagyna Wald. et Kit. — Oriens.

Mespilus pentagyna C. Koch.

C. fissa Bosc. — America septentrionalis.

C. incisa Hort.

Mespilus fissa Poir.

C. Oliveriana Bosc. — Asia minor.

C. Oxyacantha var. *Oliveriana* Lindl. Bot. reg.,
tab. 1933.

C. melanocarpa Bieb.

C. platyphylla Lindl. Bot. reg., tab. 1874.

C. fissa L. (non Poir. nec Lodd.).

Mespilus Oliveriana Dum.-Cours.

M. melanocarpa Poir. (non Fisch.).

C. Oxyacantha L. — Jacq. Fl. austr. III, tab. 292. Vulg.
Aubépine. — Gallia.

C. oxyacanthoides Thuill. — Bot. reg., tab. 1128.

Mespilus Oxyacantha Willd.

var. *monogyna*. — Pallas Fl. ross. tab. 12.

C. monogyna Jacq.

C. triloba Pers.

— flore albo.

— flore roseo. — Fl. des serres. XV, tab. 1509.

— flore puniceo.

— flore pleno albo.

— flore pleno roseo.

— flore pleno rubro. — Fl. des serres XV, tab. 1509.

— flore pleno puniceo. — Ann. de Gand, 1847

— flore pleno coccineo William Paul. — Illustr. Hort. XIV,
tab. 536.

— *eriocarpa*.

— *flexuosa*.

— *foliis tricoloribus*.

— *Gumperi bicolor*. — Fl. des serres XVI, tab. 79.

— *laciniata pendula*.

— *pectinata*.

— *præcox*.

— *quercifolia*.

— *spinosisissima (horrida)*. — Fl. des serres XIV, tab. 1468.

C. ferox Host.

C. Oxyacantha.

var. stricta.

C. punctata stricta Hort.

Azarolus stricta Hort.

A. rubra stricta Hort.

— *Sutheriana.*

— *tortuosa.*

C. pinnatifida *Bge.* — *Regel.* Gartenfl., tab. 366; *Lavall.*

Arbor. segreg. Icones, tab. ined. — *China borealis.*

Mespilus pinnatifida C. Koch.

C. pteridifolia *Hort.* (non *C. Oxyacantha var.*). — *Patr. ign.*

C. chinensis Hort.

C. californica Hort.

C. Layii Hort.

C. piriformis *Jacques.* — *Lavall.* *Arbor. segreg.* Icones.,

tab. ined. — *Patria ignota.*

COTONEASTER *Medic.*

C. vulgaris *Lindl.* — *Curt.* Lond. V, tab. 209. — *Europa.*

Cratægus Cotoneaster Borkh.

Mespilus Cotoneaster L.

Pirus Cotoneaster Mæneh.

C. melanocarpa *Loddi.* Bot. cab., tab. 4534. — *Europa.*

C. vulgaris var. melanocarpa.

Mespilus melanocarpa Fisch.

C. tomentosa *Lindl.* — *Guimp.* Holtz. tab. 405. — *Europa.*

Mespilus tomentosa Willd. (non *Lamk.*).

M. eriocarpa DC.

C. Fontanesii *Spach.* — *Rev. hort.* 1867. — *Patria ignota.*

Mespilus racemiflora Desf.

C. laxiflora *Jacq.* — *Bot. mag.*, tab. 3519; *Bot. reg.* tab. 1305.

— *Siberia.*

C. vulgaris var. laxiflora Lindl.

C. uniflora *Bunge.* — *Ledeb.* Icon., tab. 269. — *Siberia.*

C. bacillaris *Wall.* — *Nepalia.*

C. frigida *Wall.* — *Bot. reg.*, tab. 1229. — *Nepalia.*

C. himalayensis *Hort.***C. acuminata** *Lindl.* *Lin. Transact.* XIII, tab. 9. — Nepalia.*Mespilus acuminata* *Lodd. Bot. cab.*, tab. 949.*C. sinensis* *Hort.**var. Simonsii.**C. Simonsii* *Hort.***C. affinis** *Lindl.* — *Lodd. Bot. cab.*, tab. 1522. — Nepalia.*Mespilus affinis* *Don, Fl. nepal.*, p. 238.**C. nummularia** *Fisch.* — Asia min., Mauritan.**C. buxifolia** *Wall.* — *Wight, Icon. plant. ind. rar.* III, tab. 992.

— Nepalia.

C. repens *Hort.**C. Welheri* *Hort.**C. Royleana* *Hort.***C. rotundifolia** *Wall.* — *Bot. reg.*, tab. 4487. — Nepalia.*C. microphylla* *var. Uva-Ursi* *Lindl.**C. nepalensis* *Hook.**C. Hookeriana* *Hort.***C. microphylla** *Wall.* — *Bot. reg.*, tab. 4414. — Nepalia.**C. thymifolia** *Booth.* — *Schlecht. Linn.*, 1854, p. 546. —

Nepalia.

STRANVÆSIA *Lindl.***S. glaucescens** *Lindl.* *Bot. reg.*, tab. 4956. — Asia.*Cratægus glauca* *Wall.***ARIA** *Host.***A. nivea** *Host.* — *Engl. bot.* XXVI, tab. 1858. — Europa.*Mespilus Aria* *Scop.**Pirus Aria* *Ehrh.**P. edulis* *Willd. (non Wats.).**Cratægus Aria* *L.* — *Fl. danica.* III, tab. 304 et 302.*Sorbus Aria* *Crantz.*

A. nivea

var. elliptica.

Aria latifolia var. elliptica Hort.

— *latifolia.* (non *Spach.*).

— *longifolia.*

Cratægus Hostii Hort. (non *Jacq.*).

C. Aria edulis Hort.

Sorbus macrophylla Hort.

S. Aria edulis Hort.

— *glabrata.*

Sorbus glabrata Hort.

— *lanata.*

Sorbus monstrosa macrophylla Hort.

— *quercoides.*

Sorbus quercoides Hort.

— *undulata.*

A. græca Spach. — Asia, Græcia.

Sorbus græca Lodd.

Pirus Aria Sibth. Flor. græc., tab. 474.

Sorbus nivea Hort. (non *Host.*).

S. argentea Hort.

S. Aria rotundifolia Hort.

A. obtusifolia DC. — Fl. danica, tab. 302. — Europa.

Pirus obtusata Steud.

Cratægus Aria obtusata Spach.

Aria rotundifolia græca Hort. (non *A. græca Spach.*).

Cratægus Aria latifolia rotundifolia Hort.

A. majestica Lavall. Arbor. segrez. Icones, tab. ined.

Sorbier du Népaul Aliq. Hort.

A. flabellifolia Spach. — Asia minor.

Cratægus Aria flabelliformis Spach.

C. corymbosa Desf.

Pirus edulis Wats. Dendr. brit. I, tab. 32, (non *Willd.*).

A. flabellifolia.

Sorbus corymbosa Lodd.

S. Aria rotundifolia Aliq. Hort. (non *A. græca* Spach.).

S. flabellata Hort.

A. lanata Dcne. — Nepalia.

Pirus lanata Don.

P. nepalensis Lodd.

Sorbus vestita Lodd.

S. nepalensis Hort.

Cratægus Aria cuspidata Spach.

Aria pseudo-vestita Hort.

A. latifolia Spach. — (Vulg. *Alisier de Fontainebleau*). —

Europa.

Cratægus latifolia Lamk.

C. dentata Thuill.

Sorbus latifolia Pers.

var. rotundifolia.

A. Hostii Host. — Suecia, Delphinatus.

Sorbus Hostii Jacq.

Pirus sudetica Tausch.

Aronia Aria Chamæmespilus Reichb.

Sorbus arioides Michx.

S. Aria var. suecica L.

S. Mougeoti Hort. (non *Godr. et Soy. Wilm.* .

Cratægus Pseudaria Spach.

A. scandica Dcne. — Europa boreal.

Sorbus scandica Fries.

Cratægus Aria ♂ et scandica L.

Pirus intermedia Ehrh.

Sorbus Meugeoti Godr. et Soy. Wilm. Acad. Stanisł.

1838. (non Hort.).

S. dentata Hort.

A. Chamæespilus *Host.* Fl. aust. II, p. 8. — Europa.

Cratægus Chamæespilus *Jacq.* Fl. austr., tab. 234.

Sorbus Chamæespilus *Crantz*, Stirp. austr. II, tab. I.

Pirus Chamæespilus *L.* — *Hartig.*, tab. 75.

Aronia Chamæespilus *Pers.*

var. bicolor.

Sorbus Hostii *Hort.* (non *Host.*).

TORMINARIA DC.

T. Clusii *Ræm.* — Europa.

T. vulgaris *Schr.*

Pirus Tormalis *DC.* — Engl. bot. V, tab. 298.

Cratægus Tormalis *L.* — *Jacq.* Fl. austr., tab. 4'3

Nouv. Duham. IV, tab. 83.

Sorbus Tormalis *Crantz.*

var. pubescens.

SORBUS Tourn.

S. Aucuparia *L.* — *Crantz*, Austr., bot. tab. 4. — (Vulg.

Sorbier des oiseleurs.) — Europa borealis.

Pirus Aucuparia *Gartn.*

Mespilus Aucuparia *Scop.*

var. fastigiata.

— nana.

— pendula.

— saturejifolia.

— pubescens.

— variegata.

— Lord Fifes.

— fructu luteo.

S. lanuginosa *Kit.* — Hungaria.

Pirus lanuginosa *DC.*

S. americana *Pursh.* — America septentrionalis.

S. Aucuparia Michx. (non *L.*).

S. micrantha Hort.

Pirus americana DC. — *Wats. Dendr. brit.* I, tab. 51.

S. hybrida *L.* — (Vulg. *Sorbier de Laponie.*) — Europ. sept.

Cratægus fennica Kalm.

S. Aria et fennica L.

Pirus hybrida Ehrh. — *Engl. bot.*, tab. 2331.

S. fennica C. Koch.

var. laciniata.

S. longifolia laciniata Hort.

— *quercifolia Hort.*

— *monstrosa macrocarpa Hort.*

— *pinnatifida.*

Aria pinnatifida Hort.

Pirus pinnatifida Ehrh.

S. sambucifolia Hort. (non *Cham.*).

CORNUS Spach.

C. domestica *Spach.* — *Engl. bot.* V, tab. 350. — Vulg.

Cormier.) — Europa.

Pirus domestica Smith.

P. Sorbus Gærtn.

Sorbus domestica L. — *Nouv. Duham.*, I, tab. 47.

S. sativa Bauh.

var. maliformis (macrocarpa.).

— *microcarpa.*

— *piriformis.*

— *fructu cinereo.*

— — *fulvo.*

— — *rubro.*

C. florentina *Dcne.* — Italia septentrionalis

Cratægus florentina Savi.

Pirus cratægifolia Savi.

C. trilobata *Dene.* — Libanus.

Cratægus trilobata *Labill.* Icon. Pl. syr. rar., tab. 40.

Pirus (*Eriobolus*) *trilobata* *DC.*

MALUS *Tourn.***M. communis** *Lamk.* — Europa.

M. sylvestris *Mill.*

Pirus Malus *L.* — *Flor. danica.* XII, tab. 2118.

Poma paradisiaca *Ruel.*

M. baccata fructu maximo *Hort.*

var. paradisiaca. (Vulg. *Pommier Paradis.*)

M. paradisiaca *Borkh.*

M. præcox *Pall.*

M. pumila *Mill.*

— *pusilla.* (Vulg. *Pommier Doucin.*)

— *monstrosa.*

— *upsaliensis.*

— *foliis contortis purpureis.*

— — *tricoloribus.*

— *aucubæfolia.*

M. acerba *Mérat* — *Nouv. Duham.* VI, tab. 44. — Eur. bor.

Pirus acerba *DC.*

M. Ringo *Sieb.* — Japonia.

Pirus Ringo *Maxim.*

M. Sieversii *Ledeb.* — Sibiria.

Pirus Sieversii *Ledeb.*

M. spectabilis *Desf.* — *Bot. mag.*, tab. 267. — China.

M. sinensis *Dum-Cours.*

M. chinensis *Hort.*

Pirus spectabilis *Ait.* — *Wats.*, *Dendr. brit.* I, tab. 50.

var. Toringo.

Pirus Toringo *Sieb.*

P. Sieboldi *Regel.*

M. spectabilis.

var. Toringo major.

— Kaido.

— flore roseo pleno.

— Riversii.

M. baccata *Desf.* — *Pall.* Fl. ross., tab. 40. — Sibiria.

Pirus baccata *L.* — *Wats.* Dendr. brit. I, tab. 54.

P. microcarpa *Wendl.*

M. orthocarpa *Lavall.* Arbor. segrez. Icones, tab. ined. —
Japonia?

M. edulis *Hort.*

M. diversifolia *Bongard.* — America et Asia borealis.

M. coronaria *Mill.* — Bot. mag., tab. 2609; *Michx.*

Arb. am. III, tab. 40. — America sept.

Pirus coronaria *L.* — Bot. reg. tab. 634.

Malus odorata *Hort.*

M. prunifolia *Spach*, Suites Buff., tab. 9. — Sibiria?

Pirus prunifolia *Willd.* (non *Desf.*) — Bot. mag. tab. 6138.

Malus hybrida *Loisel.* Nouv. Duham. VI, tab. 42. (non
Desf.).

var. fructu dulci.

— pulverulenta.

M. heterophylla *Spach*, Suites Buff., tab. 8, fig. V. — Patria
ignota.

Pirus heterophylla *Steud.*

M. Fontanesiana *Spach*, Suites Buff. tab. 8. — Sibiria?

M. hybrida *Desf.* (non *Loisel.*).

M. astracantha *Dum.-Cours.*

M. expansa *Hort.*

Pirus Fontanesiana *Steud.*

M. cerasifera *Spach*, Suites Buff., tab. 10. — Patria ignota.

M. baccata *Lois.* (non *Desf.*) — Bot. mag. tab. 6112.

M. prunifolia *Desf.* *Hort.* Paris. (non *Willd.*).

Pirus cerasifera *Tausch.*

M. cerasifera.*var. jenensis.*

- fructu albo.
- — atropurpureo.
- — cœruleo.
- — nigro.
- — oblongo.
- — purpureo.
- — rubro.
- — striato.

M. denticulata *Lavall.* — China borealis?*M. baccata tatarica Hort.***M. dioica** *Mœnch* Werzeich. Ausland., tab. 5.*Pirus dioica Willd.**P. divisa Link.**P. apetala Mœnch.* Werzeich. Ausl. V. p. 247.**M. armeniacaefolia** *Hort.*Subgenus: CHLOROMELES *Dene.***M. angustifolia** *Michx.* — Carolina.*M. sempervirens Mill* — *Nouv. Duham.* VI, tab. 43.*Pirus angustifolia Ait.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 132*M. coronaria var. angustifolia Hort.***PIRUS** *Tourn.***P. cordata** *Desv.* — *Dene* Jard. fruit. Mus, tab. 3; *Lavall.*Arbor. segreg. Icones, tab. ined — *Gallia.**P. azarolifera Dur.***P. longipes** *Coss. et Dur.* — *Dene* Jard. fruit. Mus.
tab. 4. — *Algeria.*

P. communis L. — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 1. — Europa.

var. fascicularis.

— pendula.

— præcox.

— monstrosa.

— linearis.

— quercifolia.

— variegata.

— Achras.

P. Achras *Gærtn.* Fruct., tab. 87.

P. parviflora Desf. Ann. Mus. XII, tab. 4. — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 13. — Europa oriental.

P. eriopleura *Reichb.*

P. amygdaliformis *Vill.*

P. cuneifolia *Guss.* Pl. rar., tab. 39.

P. nivalis *Lindl.* (non *Jacq.*).

P. salicifolia *Lois.* (non *Pall.* nec *DC.*).

P. sylvestris *Magn.*

P. oblongifolia *Spach.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 44.
— Gallia merid.

P. glabra *Boiss.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 41. — Syria.

P. sinaica *Thouin.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 15. — Asia?

P. Michauxii *Bosc.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 16. — Asia?

P. præcox *Hort.*

• **P. eleagrifolia** *Pall.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 17. —
Taurica.

P. orientalis *Horn.*

P. persica *Pers.*

P. salicifolia *Kotschy* (non *Pall.* nec *DC.*).

P. nivalis *Jacq.* Fl. austr. II, tab. 107. — *Vulg.* *Poirier* *Sauger.*
— *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 21. — Asia min.

P. salvifolia *DC.* — Bot. reg., tab. 1482.

P. salicifolia *Pall.* Flor. ross., tab. 9. — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 12. — Caucasus.

P. canescens *Spach.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 49.

P. Pashia *D. Don.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 12. —
Nepalia.

P. variolosa *Wall.*

P. heterophylla *Hort.*

P. nepalensis *Hort.* (non *Lodd.*).

P. Balansæ *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 6. — Lasistan.

P. sinensis *Lindl.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 8; *Lavall.*
Arbor. segreg. Icon, tab. ined. — China.

P. chinensis *Roxb.* — *Gard.* chron. 1875, p. 457,
cum Icon. xyl.

P. communis *Sieboldi Hort.*

P. ussuriensis *Maxim.*

P. Simoni *Carr.* Rev. hort. 1872. p. 28. fig. 3.

Varietates hortenses japonicæ multæ.

STIRPES HYBRIDÆ.

P. malifolia *Spach.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus., tab. 32.

P. Polwilleriana *J. Bauh.* — *Dcne* Jard. fruit. Mus.,
tab. 31.

P. Pollveria *L.* — *Spach*, Suites Buff., tab. 8.

P. Bollwilleriana *DC.* — *Bot. reg.*, tab. 1437.

STIRPES INCERTÆ.

P. sphaerocarpa *Wender.*

P. candidissima *Hort.*

P. lutea *Hort.*

P. pellucida *Hort.*

P. pubescens *Hort.*

P. scandinavica *Hort.*

POURTHILÆA *Dcne.*

P. arguta *Dcne* *Nouv. Arch. Mus.* X, tab. 40. — Himalaya.
Photinia arguta *Wall.*

ERIOBOTRYA Lindl.

- E. japonica** *Lindl.* Bot. reg., tab. 363. — China et Japonia
Cratægus Bibas *Lour.*
Mespilus japonica *Thunb.* — *Vent.* Malm., tab. 49.
var. latifolia.

HETEROMELES J. Rœm.

- H. arbutifolia** *Rœm.* — California.
Cratægus arbutifolia *Ait.*
Photinia arbutifolia *Lindl.* Bot. reg., tab. 491.

PHOTINIA Lindl.

- P. serrulata** *Lindl.* — China.
Cratægus glabra *Thunb.* — Bot. mag., tab. 2103.
var. rotundifolia *Hort.*
P. dentata *Hort.*
P. glabra rotundifolia *Hort.*
 -- *rubra.*

PERAPHYLLUM Nutt.

- P. ramosissimum** *Nutt.* — Orégon.

ARONIA Pers.

- A. melanocarpa** *Nutt.* — America septentrionalis.
Pirus arbutifolia *Nutt.*
P. melanocarpa *Willd.*
Mespilus arbutifolia var. melanocarpa *Michx.*
A. arbutifolia *Pers.*
A. pubens *Spach.* — Patria ignota.
Pirus pubens *Lindl.*
P. capitata *Hort.*
A. grandifolia *Ell.* — America septentrionalis?
Pirus grandifolia *Lindl.* Bot. reg., tab. 4454.

A. arbutifolia *Ell.* (non *Pers.*). — America septentrionalis.
var. rubra.

Pirus arbutifolia *L. fil.* — *Bot. mag.*, tab. 3668.

A. pirifolia *Pers.*

A. floribunda *Spach.* — China.

Pirus floribunda *Lindl.* *Bot. reg.*, tab. 1006.

A. sorbifolia *Spach.* (*Stirps hybrida*).

Pirus hybrida *Mænoch* *Weirs.*, tab. 6.

P. spuria *DC.* — *Bot. reg.*, tab. 1496.

Sorbus spuria *Pers.*

Cratægus sorbifolia *Hort.*

Mespilus sorbifolia *Poir.* *Encycl.*, tab. 4.

AMELANCHIER *Medic.*

A. vulgaris *Mænoch.* — Europa.

Mespilus Amelanchier *L.* — *Jacq.* *Fl. austr.* III,
tab. 300.

Pirus Amelanchier *Willd.* — *Bot. mag.*, tab. 2430.

Aronia rotundifolia *Pers.*

A. Amelanchier *Rchb.*

Cratægus rotundifolia *Lamk.* — *Mænoch* *Weissenst.*, tab. I.

Sorbus Amelanchier *Crantz.*

Cratægus Amelanchier *Desf.*

A. spicata *Hort.*

A. integrifolia *Boiss.* — Asia occident.

A. japonica *Hort.* (non *Miq.*).

A. asiatica *Endl.* — Japonia.

A. canadensis *var. japonica* *Miquel.*

Aronia asiatica *Sieb. et Zucc.* *Fl. jap.*, tab. 42.

A. alnifolia *Nutt.* — America septentrionalis.

Aronia alnifolia *Nutt.*

Amelanchier canadensis *var. alnifolia* *Walp.*

A. montana *Hort.*

A. japonica *Hort.* (non *Miq.*).

A. sinensis Hort.?**A. ovalis** Lindl. — America septentrionalis.

Pirus ovalis Willd.

Aronia ovalis Pers.

Mespilus canadensis var. *rotundifolia* Michx.

A. sanguinea Lindl. Bot. reg. 1174.

Cratægus spicata Lamk.

A. Botryapium DC. — America septentrionalis.

Mespilus canadensis L.

M. canadensis var. *cordata* Michx.

Cratægus racemosa Lamk.

Pirus Botryapium Lin. fil. — Guimpel Holzger., tab. 79.

Aronia Botryapium Pers.

A. arborea Michx. Arb. for. III, tab. 11.

A. canadensis var. *Botryapium* Walp.

A. lancifolia Hort.

A. canadensis Hort.

A. oblongifolia Nutt. — America septentrionalis.

Mespilus canadensis var. *obovalis* Michx.

A. canadensis var. *oblongifolia* Walp.

A. intermedia Spach.

A. oligocarpa Nutt. — America septentrionalis.

Mespilus canadensis var. *oligocarpa* Michx.

A. canadensis var. *oligocarpa* Walp.

A. florida Lindl. Bot. reg. tab. 1589. — America bor.

A. uniflora Hort.

RAPHIOLEPIS Lindl.**R. indica** Lindl. Bot. reg., tab. 652. — China.

R. pheostemon Lindl.

Cratægus indica L. — Bot. mag., tab. 1726.

R. rubra Lindl. Bot. reg., tab. 400. — China.

Cratægus rubra Lour.

R. salicifolia *Lindl.* Bot. reg. tab. 652. — Rev. hort. 1874.
— China.

R. japonica *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 83 — Bot. mag.
tab. 550. — Japonia.

R. integerrima *Hook. et Arn.*

R. ovata *Hort.*

CHÆNOMELES *Lindl.*

C. japonica *Lindl.* — Japonia.

Cydonia japonica *Pers.* — *Savi* Fl. ital. I, tab. 13.

C. lagenaria *Duham.*

Pirus japonica *Thunb.* — Bot. mag., tab. 692.

Malus japonica *Hort.*

var. *Bugeauti.*

— *fastigiata.*

— *flore roseo.*

— *gigantea.*

— *Maillardi.*

— *macrocarpa.*

— *Maulei.*

Pirus Maulei *Mast. Gard. Chron.* 1874, pag. 459 cum. icon.

— *umbilicata.* — Fl. des serres V, tab. 510-512.

Pirus umbilicata *Hort.*

DOCYNIA *Dcne.*

D. indica *Dcne.* Nouv. archiv. Mus. X, tab. 8. — Sikkim.

Cydonia indica *Spach.*

Pirus indica *Wall.* Pl. asiat. rar. II, tab. 473.

CYDONIA *Tourn.*

C. sinensis *Thouin*, Ann. Mus. XIX, tab. 8. et 9. — Bot. reg.
tab. 905. — China.

Pirus sinensis *Poir.* (non *Lindl.*).

C. chinensis *Hort.*

C. vulgaris *Tourn.* — *Kerner* Gener., tab. 214 et 215. —

Europa australis.

C. europæa *Savi.*

Pirus *Cydonia* *L.*

var. macrocarpa (Vulg. *Cognassier d'Angers*).

— *maliformis.* — *Duham.* Arb. I, tab. 83.

— *oblonga* (*piriformis*). — *Duham.* Arb. I, tab. 83.

— *Bourgeana.*

— *algeriensis.*

— *constantinopolitana.*

C. lusitanica *Mill.* (Vulg. *Cognassier de Portugal*) —

Armenia et Boukharia.

C. latifolia *Lusitanica* *Tourn.*

CALYCANTHÆ

CALYCANTHUS *Lin.*

C. floridus *L.* — *Bot. mag.*, tab. 503; *Nouv. Duham.* I, tab. 47. — Florida,

C. sterilis *Walt.*

var. ovata. — *Lavall.* Arbor. Segrez. Icones, tab. ined.

— *inodora.*

— *asplenifolia.*

C. lævigatus *Willd.* — *Bot. reg.*, tab. 481. — Amer. sept.

C. ferax *Michx.* — *Herb. amat.* III, tab. 472 bis.

C. fertilis *Andr.* *Bot. reposit.*, tab. 539 (non *Walt.*).

C. nanus. *Lois.* *Nouv. Duham.* I, tab. 48.

var. angustifolia.

— *elongata.*

C. glaucus *Willd.* — *Guimp.* Fr. holzg., tab. 5. — Amer. sept.

C. fertilis *Walt.* (non *Andr.*). *Bot. reg.*, tab. 404.

C. nana *Hort.* (non *Lois.*).

C. occidentalis *Hook. et Arn.* — *Bot. mag.*, tab. 4808. —

Amer. sept.

C. macrophyllus *Hort.*

CHIMONANTHUS Lindl.

- C. fragrans** *Lindl.* — Hort. Kew. II, tab. 40. — Japonia.
Calycanthus præcox *L.* — Bot. mag., tab. 466; Nouv.
 Duham. I, tab. 49.
var. grandiflora *Lindl.* Bot. reg., tab. 451.
 — *lutea.*
 — *japonica.*
 — *parviflora.*

GRANATEÆ

PUNICA Tourn.

- P. Granatum** *L.* — *Poit. et Turp.* Arb. fruit., tab. 22
 — Regio mediterr.
var. albescens. — *Andr.* Bot. repos., tab. 96.
 — — flore pleno.
 — flava.
 — — flore pleno.
 — *Legrellei.* (flore variegato.).
 — *prolifera.*
 — *rubra.* — Bot. mag., tab. 1832.
 — — flore pleno. — *Elhret.*, tab. 71.
 — *nana.* — Bot. mag., tab. 934.
 P. nana *L.*
 P. sinensis *Hort.*

TAMARISCINEÆ

TAMARIX Lin.

- T. africana** *Poir.* — Europ. merid.
T. anglica *Webb.* — *Hook* Journ. 1844, tab. 15. — Europa
 occidentalis.

T. gallica *L.* — *Sibth.* Fl. græc., tab. 291. — Europa orientalis.

T. canariensis Willd.

T. chinensis *Lour.* — *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab., 74. — China et Japonia.

T. gallica var. chinensis Ehrh.

T. japonica Thunb.

T. plumosa Hort.

T. tetrandra *Pall.* — Tauria.

var. purpurea.

T. indica *Willd.* — India orientalis.

T. parviflora *DC.* — Fl. des serres XIX, tab. 898.

T. tetrandra Griseb. (non Pall.).

MYRICARIA Desv.

M. germanica *Desv.* — Europa.

Tamarix germanica L. — Fl. danica. II, tab. 234.

Tamariscus germanicus Scop. — *All.* Fl. pedem. II, p. 87; *Icon. taurin.* II, tab. 142.

ALANGIEÆ

MARLEA Roxb.

M. begoniæfolia *Roxb.* — Bot. reg., tab. 91. — China et Himalaya.

M. bryoniæfolia Hort.

M. platanifolia *Sieb. et Zucc.* — Japonia

LYTHRARIEÆ

NESEÆ Comm.

N. salicifolia *H. B. K.* — *Rechb.* Hort. tab. 166. — Mexico.

LAGERSTROMIA Lin.

L. indica L. — Bot. mag., tab. 405; Herb. amat. II, tab. 122.
— India.

var. japonica.

— *rosea.*

— *rubra.*

PHILADELPHEÆ**PHILADELPHUS** Lin.

P. coronarius L. — Bot. mag., tab. 391; Nouv. Duham. I, tab. 20. — Eur. austr.

var. nana.

P. parviflorus Hort.

— *pyramidata.*

— *cochleata.*

— *cucullata.*

— *pendulifolia.*

— *dianthiflora.*

— *flore semipl. candidissimo.*

— *nivea.*

P. inodorus L. — Bot. mag., tab. 1478. — Carolina.

P. colombarius myrtiflorus Hort.

P. cordatus Hort.

P. cordifolius Hort.

P. coronarius nivalis Hort.

P. multiflorus Hort.

P. floribundus Hort. (non Schrad.)

P. Grahmi Hort.

P. Zeyheri multiflorus Hort.

Deutzia corymbosa Hort.

var. foliis variegatis.

P. globularis *Hort.*

P. lucidus *Hort.*

P. Satzumi *Sieb.* — *Paxt. Fl. gard. Icon. xyl.* 188. — Japonia

P. coronarius, *var. Satzumi Maxim.*

P. Satzumanus Hort.

P. Ledebourii Hort.

var. Schrenkii.

P. Schrenkii Rupr.

P. Godohokerii *C. Koch.* *Dendr. I*, p. 346. — Amer. sept?

Deutzia Godohokerii Hort. Booth.

P. hirsutus *Nutt.* — *Bot. reg. XXIV*, tab. 14. — America
septentrionalis.

P. Zeyheri *Schrad.* — America borealis.

P. trinervius Hort. (non Schrad.).

P. gracilis Hort.

P. verrucosus *Schrad.* — America bor.

P. grandiflorus Lindl. Bot. reg., tab. 570. (*non Willd.*).

P. mexicanus *Schlecht.* — *Bot. reg. XXVIII*, tab. 38. —
Mexico.

P. latifolius *Schrad.* — America septentrionalis,

P. pubescens Lois. Herb. amat., tab. 208.

P. grandiflorus *Willd.* (*non Lindl.*). — America septen-
trionalis.

Deutzia sinensis Hort.

var. speciosissima.

— *foliis variegatis.*

P. nepalensis variegatus Hort.

P. laxus *Schrad.* (*non Hort.*). — *Bot. reg. XXV*, tab. 39.

— America septentrionalis.

P. humilis Hort.

P. speciosus *Schrad.* — *Bot. reg.*, tab. 2002. — America
septentrionalis.

P. grandiflorus laxus Hort.

P. Yokohama *Sieb.* — Japonia.

P. sinensis thyrsiflorus Hort

- P. triflorus** Wall. — *Lavall.* Arbor. Segrez. Icones, tab. ined.
— Nepalia.
- P. Keteleëri** Hort.
- P. Gordonianus** Lindl. Bot. reg. XXV, tab. 32 — California.
P. columbeanus Hort.
- P. Deyrolleanus** Lavall. — Europa orientalis.
- P. californicus** Benth. — California.
P. lucidus Hort.
Deutzia californica Hort.
- P. Lewisii** Pursh. — America septentrionalis.
- P. pubescens** Rafin. — America septentrionalis.
P. globulus Hort.
- P. myrtifolius** Hort.

DEUTZIA Thunb.

- D. scabra** Thunb. Fl. jap., tab. 24. — Sieb. et Zucc. fl. jap.,
tab. 7; Bot. reg., tab. 1718. — Japonia.
var. foliis variegatis.
- D. crenata** Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 6. — Japonia.
var. fl. puniceo.
— fl. purpureo pleno. — Morren, Belg. hort. 1864, tab.
49.
— fl. albo pleno. — Fl. des serres XVIII, tab. 1850.
D. candidissima Hort.
— foliis variegatis.
— Fortunei.
D. Fortunei Hort.
— Sieboldi.
D. Sieboldi Hort.
- D. gracilis** Sieb. et Zucc. Fl. jap. I, tab. 8. — L'Hort. franç.,
1851., tab. 5, Morren, Belg. hort. I, tab. 53. — Japon.
var. foliis variegatis.
- D. dentata** Hort.
- D. staminea** R. Br. — Wall. plant. asiat. II, tab. 191. —
India orientalis.

DECUMARIA Lin.

- D. barbara** *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 403. — Carolina.
D. Forsythia Michx.
D. radicans Mæneh.
D. sarmentosa Bosc.

MYRTACEÆ

EUGENIA Lin.

- E. apiculata** *DC.* — Chili.
Myrtus apiculata Bert.
E. Ugni *Hook. et Arn.* — Bot. mag., tab. 4626; Fl. des serres VII,
 tab. 734. — Chili.
Myrtus Ugni Mol.

MYRTUS Lin.

- M. communis** *L.* — Nouv. Duham. I, tab. 43. — Europe
 australis.
var. flore pleno.
 — *italica.*
 — *mucronata.*
 — *romana.*

NITRARIACÆ

NITRARIA Lin.

- N. Schoberi** *L.* — *Pall.* Fl. ross., tab. 50. — Russia

PASSIFLOREÆ

PASSIFLORA Juss.

- P. cærulea** *L.* — Bot. mag. tab. 28; L'Hort. franç. 1864, tab. 4. — America sept.
P. Laurantseana *Lavall.* — Louisiana.

GROSSULARIÆ

ROBSONIA Berl.

- R. speciosa** *Spach.* — California.
Ribes speciosum Pursh. — Bot. mag., tab. 3530; Bot. reg., tab. 4557.
R. stamineum Smith.
R. fuchsioides Berl. Mem. Genev. III, tab. 3.
R. Hookeri Hort.

RIBES Lin.§. GROSSULARIA *Mill.*

- R. lacustre** *Poir.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 884. — Amer. sept
R. oxyacanthoides Michx. (non *L.*).
R. grossularioides Michx.
R. echinatum Dougl.
R. Menziesii Hort. (non *Pursh.*).
R. Menziesii *Pursh.* — Bot. reg. XXXIII, tab. 50. — America septentrionalis.
R. ferox Smith.
R. hystrix Nutt.
R. Grossularia *L.* — Engl. bot. XVIII, tab. 1293. — Europa.
Grossularia vulgaris Spach.
var. inermis.

R. Uva-crispa *L.* — Nouv. Duham. III, tab. 58. — Europ. et Asia sept.

R. Uva-crispa *L.*

R. spinosum *Lamk.*

var. spinosissima.

— *macrocarpa.*

— *foliis variegatis.*

R. aciculare *Smith.* — *Ledeb.* Fl. alt. Icon., tab. 230. — Sibiria.

R. divaricatum *Dougl.* — Bot. reg., tab. 1359 — America septentrionalis.

R. gracile *Hort.* (non *Michx.*).

R. subvestitum *Hook. et Arn.* — Bot. mag., tab. 4931. — California.

R. rotundifolium *Michx.* — Carolina.

R. gracile *Pursh.* (non *Michx.*).

R. gracile *Michx.* (non *Pursh.* nec *Hort.*). — America sept.

R. Cynosbati *L.* — *Jacq.* Hort. vind., tab. 123. — Amer. sep'.

R. triflorum *Willd.* Hort. berol., tab. 61. — Amer. sept.

R. Cynosbati *Hort.* (non *L.*).

R. Hogtoni *Hort.*

R. niveum *Lindl.* Bot. reg., tab. 1692. — Amer. sept.

R. cereum *Dougl.* — Bot. mag., tab. 3008; Bot. reg., tab. 1263.

— Pennsylvania.

R. inebrians *Lindl.* Bot. reg., tab. 1474.

R. pumilum *Nutt.*

§. BERISIA.

R. orientale *Desf.* — Syria.

Berisia orientalis *Spach.*

R. punctatum *Lindl.* Bot. reg., tab. 1298.

R. resinsum *Sims*, Bot. mag., tab. 1583.

R. saxatile *Pall.* — *Ledeb.* Icones, tab. 239. — Sibiria.

R. Diacantha *var. Spach.*

R. Diacantha *Pall.* Fl. ross. tab. 66. — Sibiria.

R. opulifolium *Hort. Lond.* — Russia.

R. alpinum *L.* — Fl. danica, VI, tab. 968. — Europa.

R. dioicum *Mæsch.*

var. sterilis.

R. sterile *Hort.* (Specim. masc.).

R. opulifolium *Hort.*

R. recurvum *Hort.*

— *laciniata.*

§. RIBESIA.

R. triste. *Pall.* — Sibiria.

R. altaicum *Lodd.*

R. atropurpureum *C. A. Mey.*

R. petraeum *Wulf.* in *Jacq.* Misc. austr. II, tab. 3. — Europa.

R. rigens *Hort.* (non *Michx.*).

R. glaciale *Wall.* — Nepalia.

R. procumbens *Pall.* Flor. ross., tab. 63. — Dauria.

R. multiflorum *Kit.* — Bot. mag., tab. 2368. — Europ. orient.

R. spicatum *Schultz.* (non *Rob.*).

R. vitifolium *Host.*

R. prostratum *L'Hérit.* Stirp., tab. 2. — America sept.

R. glandulosum *Ait.*

R. rigens *Michx.* (non *Hort.*).

R. laxiflorum *Rich.*

R. trifidum *Michx.*

R. rubrum *L.* — Nouv. Duham. III, tab. 37; *Decae.* Jard. fruit.

Mus. — Gallia.

var. laciniata.

— *variegata.*

— *hortensis* (dulcis).

— *sylvestris.*

— *alba.*

— *carnea.*

— *macrocarpa.*

— *striata.* (*Gloire des Sablons.*) — L'hort. franç. 1856, tab. 15

R. Gayanum *Walpers.* — Chili.

Rebis Gayana *Spach.*

Ribes Chilense *Hort.*

R. Hodgesii *Hort.*

§. BOTRYOCARPUM.

R. nigrum *L.* — *Fl. danica*. IV, tab. 556. — Asia et Eur. bor.

var. nana.

— *aconitifolia* (*acerifolia*).

— *heterophylla.*

— *reginæ.*

— *variegata.*

— *Bactoni.*

R. Bactoni Hort.

— *fructu albo.*

— — *flavescente.*

— — *viridi.*

— — *magno.*

R. floridum *L'Hérit.* — America septentrionalis.

R. pensylvanicum Lamk.

R. americanum Mill.

§. CALOBOTRYA.

R. malvaceum *Smith.* — *Sweet. Fl. gard.* II, tab. 340. — Calif.

R. sanguineum var. malvaceum Hort.

R. sanguineum *Pursh.* — *Bot. mag.*, tab. 3335 — Amer. sept.

Calobotrya sanguinea Spach.

var. fol. laciniatis.

— *fl. pleno.* — *Fl. des serres I*, tab. 44.

— *albida.* — *Paxt. Mag. of bot.* X, p. 217.

— *splendens.*

— *atrovirens.*

-- *Fontaneti.*

R. Gordonianum *Lem.* *Fl. des serres II*, tab. 163.

R. Loudoni Hort.

R. Bactoni Aliq. Hort.

R. Billardi *Hort.*

§. CHRYSOBOTRYA.

R. fragrans *Lodd.* *Bot. cab.*, tab. 1533 — America sept.

R. palmatum Desf.

R. odoratum Hort.

R. revolutum *Lindl.* — America septentrionalis.

R. palmatum aureum Hort.

R. aureum Pursh. — *Bot. reg.*, tab. 125.

Chrysobotrya revoluta Spach. *Ann. sc. nat.* IV, tab. 1.
var. intermedia.

Chrysobotrya intermedia Spach. *Ann. sc. nat.* IV, tab. 1.

R. oregoni *Hérincq*, *L'Hort. franç.* 1872, tab. 8. — Orégon.

R. revolutum var. oregoni Hort.

R. tenuiflorum *Lindl.* *Bot. reg.*, tab. 1574. — Amer. sept.

R. palmatum fœmineum Hort.

R. longiflorum Hort.

Chrysobotrya Lindleyana Spach. *Ann. sc. nat.* IV, tab. 1.

R. Benthani *Hort.*

SAXIFRAGÆ

ESCALLONIA Mutis.

E. macrantha *Hook.* *Bot. mag.*, tab. 4473. — Chili.

E. organensis *Hook.* *Bot. mag.*, tab. 4272. — Brasilia austr.

E. pterocladon *Hook.* *Bot. mag.*, tab. 4827. — Patagonia.

ITEA Lin.

I. virginica *L.* — *Nouv. Duham.* VI, tab. 9. — Carolina.

I. caroliniana Hort.

JAMESIA Torr. et Gr.

J. americana *Torr. et Gr.* — *Lavall. Arbor. Segrez. Icones.*,
tab. ined. — Nov. Mexico.

PLATYCRATER Sieb. et Zucc.

P. arguta *Sieb et Zucc.* Fl. jap., tab. 27. — L'hort. franç. 1870, tab. 7. — Japonia.

HYDRANGÆA Lin.

§. SPECIES AMERICANÆ.

H. arborescens *L.* — Bot. mag., tab. 437. — Pennsylvania.
H. arborea Hort.

H. cordata *Pursh* — Wats. Dendr. brit. I, tab. 42. — Carolina.

H. nivea *Michx.* — Wats. Dendr. brit. I, tab. 43.

H. radiata Walt.

H. glauca Hort.

var. canescens.

H. canescens Hort.

H. quercifolia *Bartram.* It. ed. germ., tab. 7. — Florida.

H. radiata Smith. Icon. pict., tab. 42.

H. urticæfolia *Hort.*

§. SPECIES ASIATICÆ.

H. japonica *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 53. — Jap. et China.

H. sinensis Hort.

var. macrophylla.

H. fimbriata Sieb.

— *elegans maculata.*

— *latifolia albo-variegata.*

— *cærulescens.*

— *floribus albis.*

— — *roseis.*

— *floribunda* (Impératrice Eugénie). — An species propria?

— *Rev. hort.* 1868, p. 469.

— *rosalba.* — Fl. des serres XVI, tab. 4649 et 4650.

— *versicolor.*

H. japonica.

var. Asizai.

II. Asizai *Sieb. et Zucc.* Fl. jap. I, tab. 51.

— Asizai foliis variegatis.

— Hortensia.

H. Hortensia *DC.*

II. hortensis *Smith*, Icon. pict., tab. 12.

— Hortensia foliis variegatis.

— — variabilis.

H. Otaksa *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 52. — Fl. des serres XVII, tab. 1732-33. — Japonia.

H. Lindleyana *Aliq. Hort.*

H. paniculata *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 64. — Japonia.

var. grandiflora. — Fl. des serres XVI, tab. 1665.

H. Thunbergii *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 58. — Japonia.

H. acuminata *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 56 et 57. —

Rev. hort. 1874, p. 91. — Japonia.

H. involuerata *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 63 et 64. — Japonia.

H. pubescens *Sieb. et Zucc.* Fl. jap. tab. 61. — Japonia.

H. stellata *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 59 — Japonia.

var. prolifera (flore pleno). — Fl. des serres XVIII, tab. 1890.

H. Cyanema *Nutt.* — Bot. mag., tab. 5058. — Himalaya.

II. cyanea *Hort.*

H. altissima *Wall.* Tent. Fl. nepal. II, tab. 50. — Himalaya.

CARDIANDRA *Sieb. et Zucc.*

C. alternifolia *Sieb. et Zucc.* Fl. jap. I, tab. 65 et 66. — Japonia.

Hydrangea alternifolia *Sieb.*

NEILLIA *Don.*

N. thyrsiflora *Don.* — *Lavall.* Arbor. Segrez. Icones, tab. ined. — Nepalia,

UMBELLIFERÆ

BUPLEURUM Lin.

- B. fruticosum** *L.* — *Wats. Dendr. brit.* I, tab. 44; *Nouv. Duham.* VI, tab. 34 — *Europa meridionalis.*

ARALIACEÆ

ARALIA Tourn.

- A. spinosa** *L.* — *Commel. Hort. amst.* tab. 47. — *Carolina.*

- A. chinensis** *L.* — *China.*

A. japonica *Hort.* (non *Thunb.*).

var. canescens.

A. canescens *Hort.* (non *Sieb. et Zucc.*).

— *intermedia.*

A. intermedia *Hort.*

— *elata.*

Dimorphanthus elatus *Miquel.*

D. mandshuricus *Maxim.*

- A. canescens** *Sieb. et Zucc.* — *Japonia.*

- A. hybrida** *Hort.*

- A. Mitsde** *Sieb.* — *Japonia.*

- A. pentaphylla** *Thunb.* — *Lavall. Arbor. Segréz. Icones,* tab. ined. — *Japonia.*

Panax spinosum *L.*

var. foliis variegatis. — *Fl. des serres* XX, tab. 2079.

OREOPANAX Dcne et Planch.

- O. xalapense** *Dcne et Planch.* — *Mexico.*

Aralia xalapensis *H. B. K.*

A. mexicana *Hort.*

ACANTHOPANAX Dene et Planch.**A. ricinifolium** *Dene et Pl.* Rev. hort. 1854. — Japon. sept?*Panax spinosissimum* *L. fl.**Aralia ricinifolia* *Sieb. et Zucc.**A. Maximowiczii* *Van-Htte.* Fl. des serres, XX, tab. 2067.**FATSIA** Dene et Planch.**F. japonica** *Dene et Pl.* — Japonia.*Aralia Sieboldi* *Henders.**A. japonica* *Thunb.* (non *Hort.*).*var. undulata.*— *albo-marginata.*— *aureo-variegata.*— *aureo-reticulata.* — *Illustr. hort.* 1870, tab. 22.**HEDERA** *Lin.***H. Helix** *L.* — *Bull. Herb.*, tab. 133. — Gallia.*var. algeriensis.*— — *foliis variegatis.*— *canariensis.*— — *foliis variegatis.*— *chrysocarpa.**H. Helix* *Wall.**H. poetica* *C. Bauh.*— *hibernica.*— — *elegans.*— — *foliis variegatis.*— *japonica.**H. japonica* *Sieb.*— *japonica foliis variegatis.*— *Rœgneriana.**H. caucasica* *Hort.**H. colchica* *C. Koch.*

H. Helix.

var. cochleata.

— *conglomerata.*

— *dentata.*

— *donerailensis.*

— *lanceolata.*

— *palmata.*

— *sagittæfolia.*

— *foliis argenteis.*

— — *aureis.*

— — *maculatis.*

— — *tricoloribus.*

— *pulchella.*

H. rhombea *Sieb. et Zucc.* — Japonia.

var. variegata.

HAMAMELIDEÆ

HAMAMELIS Lin.

H. virginica *L.* — Nouv. Duham. VII, tab. 111. — Canada.

H. androgyna Walt.

H. caroliniana Walt.

H. dioica Walt.

H. monoica Walt.

H. arborea *Sieb.* — Gard. chron. 1874, p. 187. — Japon.

H. japonica *Sieb. et Zucc.* — Japonia.

PARROTIA C. A. Mey.

P. persica *C. A. Mey.* — Bot. mag., tab. 574. — Persia.

Hamamelis persica DC.

FOTHERGILLA Lin.

F. alnifolia *L.* — Nouv. Duham. IV, tab. 26. — Virginia.

F. Gardeni Michx.

F. tomentosa Hort.

DISTYLIUM Sieb. et Zucc.

D. racemosum Sieb. et Zucc. Fl. jap. I, tab. 10. — Japonia.
var. foliis variegatis.

CORYLOPSIS Sieb. et Zucc.

C. spicata Sieb. et Zucc. Fl. jap. tab. 49; — Bot. mag.
tab. 5438; Fl. des serres XX, tab. 2135. — Japonia.
C. arborea Sieb. — Japonia.

RHODOLEIA Hook.

R. Championi Hook. Bot. mag. 4509. — Fl. des serres,
VI, tab. 361. — China.

EUPTELEA Sieb. et Zucc.

E. polyandra Sieb. et Zucc. Fl. jap. tab. 72. — Japonia.

GARRYACEÆ

GARRYA Dougl.

G. elliptica Dougl. Bot. Reg., tab. 1686; L'hort. franç. 1863.
tab. 13. — California.
G. macrophylla Benth. — Mexico.
Fadyenia macrophylla Endl.
G. Fadyeni Hook. Icones, tab. 333. — Amer. merid.
Fadyenia Hookeri Griseb.

STIRPS HYBRIDA.

G. elliptico-Fadyeni Thur.
G. Thureti Carr.

CORNEÆ

BENTHAMIA Lindl.

B. japonica Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 16. — Japonia.
Cornus japonica Thunb.?

B. chinensis Hort.

B. fragifera Lindl. Bot. reg., tab. 1579. — Belg. hortic., II,
tab. 62. — Nepalia.

Cornus capitata Wall. Pl. asiat. rar., tab. 214.

CORNUS Tourn.

C. alternifolia L. fl. — *L'Hér.* Corn., tab. 6. — America
septentrionalis.

C. alaternifolia Hort.

C. paniculata *L'Hér.* Corn., tab. 5. — America sept.

C. racemosa Lamk.

C. foemina Mill.

C. citrifolia Hort. Paris.

C. citrina Hort.

C. stricta Lamk. — *L'Hérit.* Corn., tab. 4. — Amer. sept.

C. fastigiata Michx.

C. canadensis Hort. Paris.

C. sanguinea L. — Fl. danica, III, tab. 484. — Europa.

C. foemina Lob. Icon. II, tab. 460.

var. variegata.

C. alba L. — *Pall.* Fl. ross. tab. 34. — Sibiria, America
septentrionalis.

C. stolonifera Michx.

C. tatarica Mill.

C. australis C. A. Meyer. — Dahuria et Tauria.

C. sibirica Lodd. — Sibiria.

var. variegata.

C. sericea *L'Hér.* Corn., tab. 2. — Sibiria et America sept.

C. cærulea *Lamk.*

C. lanuginosa *Michx.*

C. Amomum *Mill.*

C. ferruginea *Hort. Paris.*

var. variegata.

— *asperifolia.*

C. circinnata *L'Hér.* Corn., tab. 3. — America sept.

C. rugosa *Lamk.*

C. virginiana *Hort. Paris.*

C. Theléyriana *Hort.*

C. acuminata *Hort.*

C. japonica *Hort.* — Japonia?

C. Mas *L.* — Europa.

C. mascula *L'Hér.* — *Sibth.* Fl. græc., tab. 151.

var. angustifolia.

— *crispa.*

— *fructu luteo.*

— *heterophylla.*

— *lanceolata.*

— *macrocarpa.*

— *nana.*

— *variegata.*

C. officinalis *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 50. — Asia.

C. florida *L.* — *Michx.* Arb. am. III, tab. 3; *L'Hort. franç.*

1843, tab. 44. — Carolina.

C. Nuttalli *Audubon*, Birds of Amer., tab. 367. — Nutt.

North-Am. sylv. II, tab. 97. — Amer. sept.

AUCUBA Thunb.

A. japonica *Thunb.* Icones Fl. jap., tab. 42 et 43. — Japonia.

var. arborea mascula.

— — *foemina.*

— *bicolor mascula.*

A. japonica.

- var. elegans* fœmina.
- *grandidentata maculata* fœmina.
- — — *viridis*.
- *hermaphrodita*.
- *latimaculata*.
- — — *fœmina*.
- *longifolia*.
- — — *mascula*.
- — — *fœmina*.
- — — *maculata mascula*.
- — — *striata*.
- *fructu luteo* fœmina.
- *grandidentata* mascula.
- *macrophylla*.
- — — *dentata* fœmina.
- *maculata* fœmina.
- — — *mascula*.
- *marginata aurea*.
- *ovata* fœmina.
- — — *mascula*.
- — — *aureo-punctata* mascula.
- *picta* fœmina.
- *pygmea* mascula.
- *salicifolia Sieboldi* fœmina.
- — — *Standishi* fœmina.
- *sulphurea* mascula.
- — — *fœmina*.
- *viridis* mascula.
- — — *longifolia* mascula.
- — — *fœmina*.

A. himalayea Hook. Illustr. Himalaya, tab. 42. — *Lavall.*

- Arbor. segreg. Icones, tab. ined. — Asia.
- *mascula et fœmina*.

MONOPETALÆ

LONICERÆ

SAMBUCEÆ.

SAMBUCUS Tourn.

S. canadensis *L.* — America septentrionalis.

S. virginica *Hort.*

S. racemosa *L.* — *Duham.* Arb. II, tab. 66. — Europa.

var. spectabilis.

— *laciniata.*

— *variegata.*

S. pubens *Michx.* — America septentrionalis.

S. pubescens *Pers.*

S. glauca *Hort.* (non *Nutt.*).

S. californica *Carr.*

var. Fontaneti.

S. nigra *L.* — *Duham.* Arb. II, tab. 65. — Europa?

S. vulgaris *Lamk.*

var. monstrosa (fasciata.). — Vulg. *Sureau à tiges plates.*

— *stricta.* (*S. pyramidata* *Hort.*).

— *plantierensis.*

— *heterophylla.*

— *laciniata.*

— — *foliis variegatis.*

— *rotundifolia.*

— *foliis luteis.*

— — *marginatis.*

— — *pulverulentis.*

— — *tricoloribus.*

S. nigra.

var. foliis variegatis.

— flore pleno.

— roseflora.

— semperflorens.

— — flore pleno.

— fructu albo.

— virescens.

VIBURNEÆ.

VIBURNUM Lin.

V. Tinus *L.* — Bot. mag. tab. 38. — Europa meridionalis.

V. lauriforme Lamk.

var. rotundifolia.

— — foliis variegatis.

— lucida.

V. lucida Mill.

— — Towardi.

— — variegata.

— variabilis.

— foliis variegatis.

V. rugosum *Pers.* — Bot. mag., tab. 2082. — Canaria.

V. Tinus var. stricta Ait.

V. rigidum Vent. Malm., tab. 98.

V. strictum Link.

V. Sieboldi *Hort.*

V. Awafuski *Lindl.* — China.

V. odoratissimum Ker. — Bot reg., tab. 456.

var. foliis variegatis.

V. suspensum *Hort.*

V. caucasicum *Hort.*

V. pirifolium *Poir.* — *Wats. Dendr. brit. I, tab. 22.* — Pensylv.

V. prunifolium *L.* — *Nouv. Duham. II, tab. 38.* — Carol.

- V. Lentago** *L.* — *Wats. Dendr. brit.* I, tab. 24. — Carolina.
V. acuminatum Hort. (non Wall.).
- V. nudum** *L.* — *Bot. mag.*, tab. 2281; *Mill. Icon.*, tab. 274.
 — Carolina.
V. amethystinum Hort.
V. anglicum Hort.
- V. obovatum** *Walt.* — *Lodd. Bot.*, tab. 1476. — Carolina.
V. cassinoides Michx. (non Lin.).
- V. puniceifolium** *Desf.* — Carolina.
V. obovatum var. puniceifolia Desf.
- V. lævigatum** *Willd.* — Carolina.
V. asiaticum Hort. (non Wall.).
- V. mexicanum** *Hort.* — Mexico?
- V. odoratissimum** *Ker.* — *Bot. reg.*, tab. 436. — China.
V. chinense Zeyh. in coll. Hort. rip. (non Hook.).
- V. nepalense** *Hort.* — Asia?
- V. Keteleëri** *Hort.*
- V. himalayense** *Hort.* — Asia?
V. Fortunei Hort.
- V. Lantana** *L.* — *Duham. Arb.* II, tab. 403. — Europa.
V. tomentosum Lamk. (non Thunb. nec Oudem.).
var. Burejætica.
V. Burejæticum Regel et Herd.
 — lanceolata.
 — foliis punctatis.
 — minor foliis variegatis.
- V. lantanoides** *Michx.* — *Lodd. Bot. cab.*, tab. 1370. —
 America septentrionalis.
V. grandifolium Smith.
V. Lantana var. grandifolia Ait.
V. L. indica Hort.
V. indicum Hort.
V. Lantana var. canadensis Pers.

- V. cotinifolium** *Don.* — Bot. reg., tab. 4630. — Nepalia.
 V. multratum Hort.
- V. stellulatum** *Wall.* Pl. asiat. rar., tab. 469. — Nepalia.
- V. tomentosum** *Thunb.* — *Sieb. et Zucc.* Fl. jap. tab. 38.
 — Japonia.
- V. macrocephalum** *Fortune.* — Flore des serres III,
 tab. 263-264. — China.
- V. dilatatum** *Thunb.* — Bot. mag., tab. 6213. — Japonia.
- V. plicatum** *Thunb.* — *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 37; Bot.
 reg. 4847, tab. 51. — Japonia.
 V. dentatum Thunb. (non *Lin.*).
 var. tomentosa.
 V. tomentosum Oudem. (non *Thunb. nec Lamk.*).
- V. macrophyllum** *Thunb.* — Japonia.
- V. dahuricum** *Pall.* Fl. ross. II, tab. 58. — Dahuria.
 Lonicera mongolica Pall. It. III, p. 424.
- V. grandiflorum** *Wall.* ? — Nepalia.
- V. erosum** *Thunb.* — Japonia.
- V. reticulatum** *Sieb.* — Japonia.
- V. acerifolium** *L.* — *Vent. Hort. Cels*, tab. 72. — Carolina.
- V. orientale** *Pall.* Fl. ross. tab. 58, fig. H. — Iberia.
- V. Oxycoccos** *Pursh.* — *Lodd. Bot. cab.*, tab. 4123. — Am. sept.
 V. Opulus var. americana Ait.
 V. trilobum M. Bieb.
 V. opuloides Muhl.
- V. edule** *Pursh.* — America septentrionalis.
 V. Opulus var. edulis Michx.
- V. Opulus** *L.* — Fl. Danica. IV, tab. 661. — Europa.
 V. lobatum Lamk.
 var. Hartwegi Hort. (non *V. Hartwegi Bth.*).
 — *nana.*
 — *pygmæa.*
 — *pygmæa crispa Hort.*
 — *foliis variegatis.*

V. Opulus.

var. sterilis (Vulg. *Boule de neige*).

— *floribus roseis*.

CAPRIFOLIACEÆ.

DIERVILLA Tourn.

D. acadiensis *Tourn.* — America septentrionalis.

D. canadensis *L.*

D. lutea *Pursh.*

D. Tournefortii *Michx.*

D. humilis *Pers.* — Bot. mag., tab. 1796.

Lonicera Diervilla *L.* — Nouv. Duham. II, tab. 48.

D. sessilifolia *Buckl.* — *Lavall. Arb. segr. Ic. t. ined.* — Carol.

D. splendens *Hort.*

D. floribunda *Sieb. et Zucc.* Fl. Jap., tab. 32. — Japonia.

Weigela floribunda *Hort.* — Rev. hort. 1874.

D. multiflora *Lem.* Illustr. Hort., tab. 383.

var. flavo-fusca *Sieb.*

§. *WEIGELA* (*Weigela Thunb.*).

D. japonica *Thunb.* Fl. jap., tab. 16. — Japonia.

D. versicolor *Sieb et Zucc.* Fl. Jap., tab. 33.

var. longifolia.

— *aurea.*

D. rosea *Herincq*, L'Hort. franç. 1854, tab. 21. — China.

Weigela rosea *Lindl.* Journ. of. Hort. Soc. I, tab. 6.

var. nana.

— — *aurea.*

— *striata.*

— *Desboisi.*

— *Kosteriana*

— *Sieboldi.*

— *Stelzneri.*

— *aureo variegata.*

— *intermedia.*

D. hortensis *Sieb et Zucc.* Fl. jap., tab. 29. — Japonia.

var. floribunda.

— *rubra.*

— — *foliis marginatis.*

— *nivea.*

— *alba.* — *Rev. hortic.* 1861.

D. grandiflora *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 31. — Japonia.

D. amabilis Hort. — Fl. des serres, VIII, tab. 855.

var. Grœnewegeni.

— *Isolinæ.* — Fl. des serres XIV, tab. 1445.

— *striata.* — Fl. des serres XIV, tab. 1446.

— *versicolor.*

— *Van-Houttei.* — Fl. des serres XIV, tab. 1447.

— *foliis variegatis* — Fl. des serres XII, tab. 1189.

D. purpurata *Hort.*

STIRPES HYBRIDÆ?

D. extus coccinea *Hort.*

D. Lavalleyi *Lemoine.* — L'Hort. franç. 1870.

D. Lemoinei *Hort.*

D. Lowii *Hort.*

LONICERA Lin.

§. *Caprifolium.*

L. Caprifolium *L.* — Engl. bot., tab. 799. — Europ. australis.

Caprifolium hortense Lamk. Encycl., tab. 150.

C. italicum Rœm et Sch.

L. hortensis Hort.

var. rubella.

L. Caprifolium italicum Schmidt.

L. italica flore rubro Hort.

— *rubella flore piloso.*

L. Caprifolium.

var. pallida.

L. hortensis pallida Hort.

L. Caprifolium var. præcox. — Duham. Arb. I, tab. 48.

L. italica flore albo Hort.

L. Caprifolium flore albo Hort.

L. Magnevillei Hort. Gall.

— *verna.*

L. verna Hort.

— *villosa.*

— *erosa.*

— *variegata.*

L. hortensis erosa variegata.

— *atrosanguinea.*

L. Etrusca Santi, Viagg. tab. 4. — Gartenflora., tab. 38. —

Europa meridionalis.

Caprifolium etruscum Ræm. et Sch.

L. atrosanguinea Hort.

L. Periclymenum L. — Fl. danica., VI, tab. 908. — Europa.

Caprifolium sylvaticum Lamk.

var. germanica Ait.

L. serotina Ait.

Periclymenum germanicum Mill.

— *belgica.*

— *quercifolia.*

L. pubescens Sweet Exot. Fl., tab. 27. — Amer. sept.

L. Goldii Spreng.

L. villosa Hort.

L. hirsuta Eaton. — Bot. mag., tab. 3103. — Amer. sept.

L. orientalis Hort. (non Lamk.).

L. Douglasi Hort. (non DC.).

L. Frazeri Hort.

var. flore pallido.

L. flava, L'Hort. franç. 1863, tab. 20, (non Bot. mag.).

L. occidentalis Hort. (non Steud.).

L. hirsuta.

var. involucrata.

L. involucrata Hort. (non Banks.).

L. parviflora Lamk. — America septentrionalis.

L. gibbosa Michx.

L. dioica L. — Bot. reg. II, tab. 138.

L. glauca Hort.

L. prolifera Hort.

Caprifolium parviflorum Pursh.

C. bracteosum Michx.

C. glaucum Mœnch.

L. hispida Pall. — Ledeb. Icon., tab. 212. — Sibiria.**L. grata Ait. — America septentrionalis.**

L. virginiana Marsh.

L. macrophylla Hook. — America septentrionalis.**L. occidentalis Steud. — America septentrionalis.**

Caprifolium occidentale Lindl. Bot. reg., tab. 1457.

C. ciliosum Dougl.

var. Plantierensis. — Illustr. hortic. 1871, tab. 86.

L. sempervirens Ait. — Bot. mag., tab. 781 et 1753. — America septentrionalis.

L. coccinea Pers.

Caprifolium sempervirens Mill.

var. major. — Bot. mag., tab. 781; Fl. des serres, XI, tab. 1120.

— *minor. — Bot. mag., tab. 1753.*

— *fuchsoides.*

— *Browni. — Fl. des serres, XI, tab. 1133.*

— *Shepherdii.*

— *Youngii.*

— *superba (speciosa). — Fl. des serres, XI, tab. 1128.*

L. coccinea superba Hort.

— *sanguinea.*

L. coccinea sanguinea Hort.

L. punicea Sims Bot. mag., tab. 2469. — Patria ignota.

L. confusa DC. — China et Japonia.

L. japonica *Thunb.* — *Andr. Bot. repos.*, tab. 583.

L. macrantha DC.

L. chinensis *Wats.* *Dendr. brit.* II, tab. 417. — China.

L. japonica *Thunb.* (non *Andrew.*) — *Bot. reg.*, tab. 70.

L. flexuosa *Lodd. Bot. cab.*, tab. 4037.

L. sinensis flexuosa *Hort.*

L. diversifolia *Wall.* — *Bot. reg.* XXXIII, tab. 33. —
Nepalia.

L. brachypoda DC. — Japonia.

var. repens.

— reticulata. — *Belg. hort.* 4871, tab. 5.

L. discolor *Hort.* (non *Lindl.*).

L. affinis *Hort.*?

§§. *Chamæcerasus et Xylosteum.*

L. tatarica L. — *Pall. Fl. ross.*, tab. 36; *Bot. reg.*, tab. 31. —
Tataria.

Xylosteum tataricum *Dum.-Cours.*

var. nana.

— angustifolia.

— microphylla.

— præcox.

— albiflora.

— — foliis acutis.

— — foliis obtusis.

— virginalis grandiflora.

— bicolor.

— discolor.

— elegans.

— gracilis.

— rubra.

L. sibirica *Hort.*

— rubra grandiflora.

L. tatarica.

var. speciosa.

— *splendida.*

— *baccis luteis.*

L. ciliata? Mühl. — Torr. New-York, tab. 42. — Amer. sept.

L. tatarica Michx. (non L.).

L. canadensis Ræm. et Sch.

Xylosteum ciliatum Pursh.

L. orientalis Lamk. — Iberia.

L. caucasica Pall. — Jaub. et Spach Illustr., tab. 74.

L. Xylosteum L. — Fl. danica V, tab. 808; Engl. bot. XIII

tab. 916. — Europa.

Caprifolium dumetorum Lamk.

var. baccis nigris.

L. melanocarpa Hort.

L. caprifolioides C. Koch. — Patria ignota.

Xylosteum Philomelæ Hort.

var. Magnevillei.

L. uniflora Blm. — Japonia.

L. acuminata Hort. (non Wall.).

L. philomenæ Aliq. Hort.

L. chrysantha Turcz. Bull. Soc. nat. Mosc. XI, 93. — Ussuri

Xylosteum gibbiflorum Rupr. et Max.

L. Ruprechtiana Reg. Gartenfl. XIX, tab. 645. — Regio

Amur.

L. gibbosa Hort. (non Willd. nec Michx.).]

L. Regeliana Kirschn. — Rossia.**L. iberica** M. Bieb. Cent. pl. rar., tab. 13. — Iberia.**L. Mouraviæ** Hort.**L. pyrenaica** L. (non Pall.). — Nouv. Duham. I, tab. 115.

— Gallia.

Caprifolium pyrenaicum Lamk.

L. pubens Hort.

L. Aucheri Hort.

L. cærulea L.—Nouv. Duham. I, tab. 47; Bot. mag., tab. 1965.

— Europa et Amer. sept.

Caprifolium cæruleum Lamk.

Xylosteum Solonis Eat.

var. præcox.

L. Maximowiczii Rupr. Bull. Acad. Petersb. XV, 370. —
Siberia.

L. Standishii Lesc. L'Hortic. franç. 1862, tab. 10. — China.

L. fragrantissima Carr. (non Paxt.). — Fl. des serres
XIII, tab. 63.

L. fragrantissima Paxt. (non Carr.). Fl. gard. III, tab. 75.
China.

L. Niagarelli Hort.

L. segreziensis Lavall. — Patria ignota.

L. diversifolia Hort. (non Wall.).

L. Webbia Wall. — Himalaya.

L. alpigena L. — Nouv. Duham. I, tab. 46. — Europa.

Caprifolium alpinum L.

L. microphylla Willd. — Ledeb. Icon. tab., 213. — Siberia
orientalis.

L. altaica Pall. Fl. ross., tab. 37. — Siberia.

L. Ledebourii Eschsch. — Gartenflora, tab. 64. — California.

L. spectabilis Hort. — China?

SYMPHORICARPOS Dill.

S. racemosus Michx. — Dict. sc. nat., tab. 466. — Am. sept.

Symphoria racemosa Pursh. — Wats. Dendr. brit. I,
tab. 7; Bot. mag., tab. 2211.

S. leucocarpa Hort.

var. macrophylla.

— macrocarpa.

S. macrocarpa Hort.

— glauca.

S. glauca Hort.

-- foliis variegatis.

S. montanus *H. B. K.* Nov. gen., tab. 296. — The botanist., tab. 20. — Mexico.

S. mexicanus *Hort.*

S. microphyllus *H. B. K.* — Bot. mag., tab. 4975.

Symphoria mexicana *Lodd.*

S. vulgaris *Michx.* — *Guimpel* Fr. Holzgew., tab. 133. — America septentrionalis.

S. parviflora *Desf.*

S. à petites fleurs rouges.

var. foliis aureis.

— *glomerata.*

S. glomerata *Pursh.*

LEYCESTERIA Wall.

L. formosa *Wall.* — Bot. reg. 1839, tab. 2. — Nepalia.

ABELIA R. Brown.

A. rupestris *Lindl.* Bot. reg. 1846, tab. 8. — Japonia.

var. grandiflora alba *Veitch.*

A. triflora *R. Br.* — Rev. hortic. 1870-74. — Himalaya.

A. uniflora *R. Br.* — Belg. hortic. I, p. 338. — China.

A. floribunda *Dcne* — Fl. des serres II, tab. 1846. — Mexico.

Vesalia floribunda *Mart, et Galeot.*

A. chinensis *R. Br.* — China.

RUBIACEÆ

CEPHALANTHUS Lin.

C. occidentalis *L.* — *Duham.* Arb. I, tab. 54; Herb. amat.

IV, tab. 272. — America septentrionalis.

var. angustifolia.

PINCKNEYA Michx.

P. pubens *Michx.* Arb. am. II, tab. 24. — Fl. des serres XIX, tab. 13. — Georgia.

P. officinalis *Hort.*

PÆDERIA Lin.

P. foetida *L.* — *Lamk.* Dict., tab. 166. — China et Japonia.

SERISSA Comm.

S. foetida *Comm.* — China et Japonia.

Lycium foetidum *L.*

L. japonicum *Thunb.* Fl. jap., tab. 17. — Bot. mag., tab. 361.

COMPOSITEÆ

IVA Lin.

I. frutescens *L.* — *Lamark.* Illustr., tab. 166. — Florida.

SWAMMERDAMIA DC.

S. Antennaria *DC.* — Van-Diemen.

OZOTHAMNUS R. Br.

O. rosmarinifolius *DC.* — Van-Diemen.

ARTEMISIA Lin.

A. Abrotanum *L.* — *Hayne* II, tab. 22. — Europa australis.
var. tobolskiana.

A. arborescens L. — Oriens.

Absinthium arborescens *Gærtn.* — *Sibth.* Fl., gr., tab. 856.

A. italica *Ræusch.* — Italia.

A. procera *Willd.* — Europa orientalis.

A. Roelzii *Oertgies.* — Nov.-Mexico.

SANTOLINA Lin.

S. Chamæcyparissus L. — Europa australis.

S. viridis *Willd.* — Europa australis.

EURYBIA Cass.

E. erubescens DC. — Nov.-Hollandia.

Aster ilicifolius *Cunng.*

E. ilicifolia *Hort.*

OLEARIA Moench.

O. Haastii *Hook.* — Nov.-Zeland.

Eurybia parvifolia *Hort. angl.*

BACCHARIS Lin.

B. halimifolia L. — America septentrionalis.

— *lutescens* *Hort.* (est individ. mascul.).

GESNERIACEÆ

MITRARIA Cav.

M. coccinea Cav. — Bot. mag., tab. 4466; Fl. des serres IV,
tab. 385. — Chili.

VACCINIEÆ

VACCINIUM Lin.

V. Vitis-idea L. — Fl. danica. I, tab. 40. — Europa.

V. punctatum *Lamk.*

V. Myrtillus L. — Nouv. Duham. II, tab. 99. — Europa.

Arbor. Segrez. Enumeratio. 40

V. pensylvanicum *Lamk.* — Bot. mag., tab. 3434. — Pennsylvania.

V. tenellum *Ait.*

V. obovatum *Hort.*

V. stamineum *L.* — *Pluk. Alm.*, tab. 339, fig. 3. — America septentrionalis.

OXYCOCCLUS Pers.

O. macrocarpus *Pers.* — Bot. mag., tab 25. — America septentrionalis.

Vaccinium macrocarpum *Ait.*

V. Oxycoccus, *var. oblongifolia* *Michx.*

O. palustris *Pers.* — Europa.

Vaccinium Oxycoccus *L.* — *Fl. danica*, I, tab. 80.

O. erectus *Pursh.* — *Wats. Dendr. brit.*, I, tab. 31. — Carolina.

ERICACEÆ

ARBUTUS Lin.

A. Unedo *L.* — *Nouv. Duham.* I, tab. 21. — Eur. occ'd.

var. crispa.

— *myrtifolia.*

— *quercifolia.*

— *salicifolia.*

— *flore rubro.*

— *pleno.*

— *Croomii.*

A. Andrachne *L.* — Bot. mag., tab. 2024; *Nouv. Duham.* tab. 22. — Asia min.

var. floribunda.

— *longifolia.*

— *magnifica.*

A. Andrachne.

var. Rollissoni.

— rotundifolia.

A. procera Dougl. — Bot. reg., tab. 1753. — Amer. sept.

A. andrachnoides Link.

var. turbinata.

A. oleifolia Hort.**A. formosa** Hort.**ARCTOSTAPHYLOS** Gal.**A. Uva-ursi** Spreng. — Europa.

Arbutus Uva-ursi L. — Fl. danica, I, tab. 33.

PERNETTYA Gaud.**P. microphylla** Gaudich. — America australis.

Andromeda prostrata Cav. Icon, VI, tab. 562.

A. Myrsinites Lamk.

P. mucronata Gaudich. — Magell.

Arbutus mucronata L. fil. — Bot. mag., tab. 3093.

P. speciosa Hort.**CLETHRA** Gärtn.**C. alnifolia** L. — Nouv. Duham. V, tab. 429. — Virginia.

C. dentata Ait.

C. tomentosa Lamk. — Wats. Dendr. brit. I, tab. 39. — Virginia.

C. alnifolia var. tomentosa Michx.

C. incana Pers.

C. pubescens Willd.

C. glauca Hort.

C. paniculata Ait. — Carolina.

C. acuminata *Michx.* — *Bart.* Fl. Bor. am. III, tab. 71. — Carolina.

C. barbinervis *Sieb. et Zucc.* — Japonia.

EPIGÆA Swartz.

E. repens *L.* — *Loisel.* Herb. amat., tab. 239; Belg. hort. IX, p. 321. — Canada.

GAULTHERIA Kalm.

G. procumbens *L.* — *Nouv. Duham.* I, tab. 113. — America septentrionalis.

G. Shallon *Pursh.* — *Bot. mag.*, tab. 2843. — Amer. sept

ZENOBLIA D. Don.

Z. speciosa *D. Don.* Brit. fl. gard., tab. 330. — Virginia.

Andromeda pulverulenta *Loisel.* *Nouv. Duham.* I, tab. 193.

A. cassinefolia *Vent.* *Jard. Cels.* tab. 60.

A. speciosa *Michx.* — *Wats.* *Dendr. brit.* II, tab. 126.

var. pulverulenta.

A. pulverulenta *Bartr.* — *Bot. mag.*, tab. 667.

A. dealbata *Lindl.* *Bot. reg.*, tab. 1010.

A. cassinefolia var. pulverulenta *Vent.* *Malm.*, tab. 79.

A. speciosa glauca *Wats.* *Dendr. brit.* II, tab. 126.

Z. floribunda *DC.* — Carolina.

Andromeda floribunda *Pursh.* — *Bot. mag.*, tab. 1566.

Leucothoe floribunda *D. Don.*

PIERIS D. Don.

P. formosa *D. Don.* — Nepalia.

Andromeda formosa *Wall.* — *Wigth.* Ic. Ind. or. IV, tab. 1200.

P. japonica *Don.* — *Loud. Arb.* p. 445, fig. 913. — *Japonia.*

Andromeda japonica Thunb. Fl. jap., tab. 22.

P. Rolissoni *Hort.*

Andromeda Rolissoni Hort.

LYONIA *Nutt.*

L. ligustrina *DC.* — *America septentrionalis.*

Andromeda ligustrina Mühl. — Lodd. Bot. cab., tab. 442.

A. globulifera Hort.

A. pilulifera Hort.

A. paniculata Willd.

L. frondosa *Nutt.* — *Virginia.*

Andromeda frondosa Pursh.

L. frondosa Don.

L. rubiginosa *G. Don. ?* — *Insula Sancti Thomas.*

Andromeda pubescens Poir.

A. rubiginosa Pers.

OXYDENDRON *DC.*

O. arboreum *DC.* — *Florida.*

Andromeda arborea L. — Michx. Arb. am. III. tab. 7 ;

Bot. mag., tab. 903.

Lyonia arborea G. Don.

LEUCOTHOE *G. Don.*

L. axillaris *G. Don.* — *Loud. Arb.* p. 443, fig. 908. — *Carol.*

Andromeda axillaris Ait. — Lamk. Encycl., tab. 365 ;

Nouv. Duham. I, tab. 39.

L. coriacea DC. — Carolina.Andromeda lucida *Lamk.**A. coriacea* *Ait.* — Bot. mag., tab. 1045.*A. nitida* *Michx.**A. marginata* *Loisel.* Nouv. Duham. I, tab. 40.*Lyonia marginata* *Don.***L. Mariana** DC. — Florida.Andromeda Mariana *L.* — Bot. mag., tab. 1579 ; Nouv.

Duham. I, tab. 37.

Lyonia Mariana *Don.***ANDROMEDA** Lin. (partim).**A. polifolia** *L.* — Fl. danica I, tab. 54; Nouv. Duham. I, tab. 38

— Europa.

var. latifolia *Ait.**A. canadensis* *Hort.**A. americana* *Hort.*— *glaucophylla*.*A. glaucophylla* *Link.***A. glauca** *Hort.**A. pensylvanica* *Hort.**A. augusta* *Hort.***CASSANDRA** D. Don.**C. calyculata** *Don.* — Europ. boreal.Andromeda calyculata *L.* — Bot. mag., tab. 1286;

Nouv. Duham. I, tab. 41.

C. angustifolia *Don.* — Loud Arb. p. 4108, fig. 897. — Carol*A. angustifolia* *Pursh.**A. calyculata* *var. angustifolia* *Ait.**A. crispa* *Desf.**C. calyculata* ? *Hort.*

CASSIOPE D. Don.**C. tetragona** Don. — Europa borealis.Andromeda tetragona L. — Fl. danica, VI, tab. 1030 ;
Bot. mag., tab. 3481.**CALLUNA** Salisb.**C. vulgaris** Salisb. — Curt. Fl. lond. III, tab. 84. — Europa.

C. Erica DC.

Erica vulgaris L.

var. dumosa.

— nana.

— Foxii.

— Alportii.

— Serli.

— variegata.

- **ERICA** Lin.**E. cinerea** L. — Fl. danica, I, tab. 38. — Gallia.*var.* alba major.

— rubra.

E. codonodes Lindl. Bot. reg., tab. 1698. — Eur. merid.**E. herbacea** L. — Bot. mag., tab. 11. — Europa borealis.

E. carnea L. — Lodd. Bot. cab., tab. 4452.

var. alba.**E. Mackayi** Hook. — Iberia et Hibernia.**E. mediterranea** L. — Bot. mag., tab. 471. — Eur. austr.*var.* alba.

--- hibernica.

E. multiflora L. — Lodd. Bot. cab., tab. 4572 — Europa*var.* alba.

— rubra

- E. stricta** Andr. The Heath., tab. 92. — Europa meridionalis.
E. corsica DC. Ic. rar., tab. 47.
E. Tetralix L. — Curt. Fl. lond., tab. 21. — Europa.
var. alba.
E. vagans L. — Engl. bot., tab. 3; Spach, Suit. Buff., tab. 88.
 — Eur.
var. rubra.
E. Watsoni Benth. — (*stirps hybrida.*)

BRYANTHUS S. G. Gmel.

- B. Gmelini** D. et G. Don. — Kamtschatka.
B. repens Gmel.
Menziesia bryantha Swartz, Trans. Lin. soc. X, tab. 30.
Andromeda Byantha L. — Pall. Fl. Ross., tab. 74.
B. erectus Lindl. — Fl. des serres VII, tab. 659. — Patria
 ignota.

PHYLLODOCE Salisb.

- P. empetriformis** D. et G. Don. — America borealis.
Menziesia empetriformis Smith, Bot. mag., tab. 3476.
P. taxifolia Salisb. Parad. lond., tab. 56. — Eur. bor,
Andromeda taxifolia Pall. Fl. ross., tab. 72.
A. cærulea L. Fl. lapp., tab. 4.

DABŒCIA D. Don.

- P. polifolia** D. et G. Don. Brit. fl. v. gard., tab. 276. —
 Pyrenées occid.
Menziesia polifolia Juss. Ann. Mus. I, tab. 4, fig. 4.
M. Dabœci DC. — Engl. bot. I, tab. 35.
Erica Dabœcia L. — Smith, Engl. Bot., tab. 35.
Andromeda Dabœcia L.
var. alba. — Sweet, Fl. gard. II, tab. 276.

MENZIESIA Smith.

M. globularis *Salisb.* Parad. lond., tab. 44. — Virginia.

· *M. ferruginea* *var.* β . Bot. mag., tab. 1571.

M. Smithii *Michx.*

LOISELEURIA Desv.

L. procumbens *Desv.* Dict. sc. nat., tab. 74. — Alpes.

Azalea procumbens *L.* — Fl. danica, I, tab. 9.

AZALEA Desv. (1).

§. SPECIES AMERICANÆ.

A. viscosa *L.* — America septentrionalis.

Rhododendron venustum *Salisb.*

R. viscosum *Torr.* Cat. New-York, tab. 66.

Azalea fragrans *Raff.* (non *Adans.*). — *Catesb.* Carol. I, tab. 57.

var. ornata (*stirps hybrida*).

Rhododendron ornatum *Sweet*, Brit. flow. gard., tab. 137

Azalea pontica rubescens *Gowen.*

— floribus rubris. — *Lodd.* Bot. cab., tab. 441.

A. glauca *Lamk.* Encycl., tab. 110. — America borealis.

Rhododendron glaucum *G. Don.* (non *Hook.*).

R. viscosum glaucum *Torr.*

Azalea viscosa glauca *Michx.*

var. flore pleno.

A. nudiflora *L.* — Bot. mag., tab. 189; Herb. amat. IV, tab. 213. — America septentrionalis.

Varietates hortenses diversæ.

A. calendulacea *Michx.* — Bot. mag., tab. 1721. — Virginia.

(1) Le groupe entier des Azalées a été réuni aux Rhododendron; mais afin de ne pas rompre avec d'anciennes habitudes horticoles, j'ai considéré comme distinctes des Rosages, les espèces américaines et celles que l'on désigne improprement par le nom d'Azalées de l'Inde.

A. calendulacea.

- var. crocea.* — Bot. mag., tab. 1721.
 — *flammea.* — Bot. reg., tab. 145.
 — *cuprea* — Lodd. Bot. cab., tab. 1391.
 — *cuprea maxima.*
 — *fulgida* — Bot. mag., tab. 3439; Nouv. Dubam. V, tab. 63.
 — *bicolor* (*hybrida bicolor*).

§. SPECIES ASIATICÆ.

- A. pontica** L. — Bot. mag., tab. 433. — Asia minor.
Rhododendron flavum G. Don.

Varietates hortenses diversæ.

- A. sinensis** Lodd. Bot. cab., tab. 885. — China.
A. mollis Blum. — Illustr. hort., tab. 68.
A. japonica Asa Gray.
Rhododendron sinense Sweet, Fl. gard. I, tab. 290 —
R. molle Sieb. et Zucc.
var. glabrior, Fl. des serres XIX, p. 177-183.
 — *coccinea.*

- A. obtusa** Lindl. Bot. reg., tab. 37. — China.

Varietates hortenses diversæ.

- A. amæna** Hook. Bot. mag., tab. 4728. — Paxt. Fl. gard. III,
 tab. 89. — China.
var. alba.
 — *rosea.*

- A. indica** L. — Lamk. Dict. sc. nat., tab. 70. — Asia bor.
Rhododendron indicum Sweet. — Maund, Bot. IV,
 tab. 160.

Varietates hortenses diversæ.

- A. lateritia** Hort. — China.

- A. indica var. lateritia* Lindl. Bot. reg., tab. 1700.
var. phœnicea.
Rhododendron indicum speciosum Sweet, Brit. Fl.
 gard. II, tab. 284.
A. ledifolia phœnicea Hook. Bot. mag., tab. 3239.

A. ledifolia *Hook.* Bot. mag., tab. 2904. — China.

Rhododendron ledifolium *DC.*

A. liliiflora *Poit.*

A. liliiflora indica *Hort.*

RHODODENDRON *Lin.*

§. SPECIES EUROPEÆ, AMERICÆ VEL SIBIRIÆ.

R. ponticum *L.* — Bot. mag., tab. 650; *Nouv. Duham.* I, tab. 41. — Asia min.

var. rubra.

R. myrtifolium *Lodd.* Bot. cab. tab., 908. (non *Schott* et *Kotschy*). — Iberia.

R. ponticum myrtifolium *Don.*

R. maximum *L.* — Bot. mag., tab. 931; *Michx.* Arb. Am. III tab. 4. — America septentrionalis.

R. procerum *Salisb.*

var. elegans.

R. catawbiense *Michx.* — Bot. mag., tab. 1671. — Carolina.

var. Altaclarensis. — Bot. reg., tab. 1444.

Varietates hortenses diversæ.

R. chrysanthum *Pall.* Fl. ross., tab. 30. — Dahuria.

R. officinale *Salisb.* Parad. lond., tab. 80.

R. brachycarpum *G. Don.* — Japonia.

R. caucasicum *Pall.* Fl. ross. I, tab. 31. — Caucasus

var. grandiflora.

— *hybrida.*

R. hirsutum *L.* — Bot. mag., tab. 1853; *Nouv. Duham.* II, tab. 40. — Europa.

- R. ferrugineum** *L.* -- *Lodd.* Bot. cab., tab. 65. — Europa.
var. floribus albis. — *Sweet*, Brit. flow. gard. ser. 2, tab. 253.
 — *foliis variegatis.*
- R. dahuricum** *L.* — *Pall.* Fl. ross, tab. 42. — Sibiria.
var. sempervirens. — *Bot. mag.*, tab. 1888.

SPECIES HIMALAYENSES, JAPONICÆ VEL CHINENSES.

- R. Metternichii** *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 9. — Japonia.
R. maximum Thunb. (non *Lin.*).
- R. rhombicum** *Miq.* — Japonia.
- R. ovatum** *Planch.* — Asia.
Azalea ovata Lindl. Journ. hort. soc. II, tab. 2.
- R. Falconeri** *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 40; Fl. des serres V, 477.
R. superbum Hort.
- R. argenteum** *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 9; Fl. des serres V, 473.
- R. Hodgsoni** *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 13.
- R. Aucklandii** *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 11.
- R. Thomsoni** *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 12. — Fl. des serres VII, tab. 688.
- R. Dalhousiæ** *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 1 et 2. — Fl. des serres V, tab. 460.
var. Lindleyana.
R. Lindleyanum Hort.
- R. Nuttallii** *Booth.* — Fl. des serres XIII, tab. 326.
- R. Boothii** *Nutt.*
- R. barbatum** *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 3. — Fl. des serres V, tab. 469.
var. lancifolia.
R. lancifolium D. Hook. Rhod. of Sik. Him., tab. 4.

- R. Edgeworthii** *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 21.
R. ciliatum *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 24. — Fl. des serres VIII, tab. 766.
var. rubra.
R. arboreum *Smith.* — Bot. mag., tab. 3290. — Ind. or.
R. puniceum Roxb.
var. alba. — Bot. reg., tab. 4681.
— *cinnamomea.* — Bot. reg. tab. 4982.
Varietates hortenses multæ.
R. Campbellii *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 6.
R. nilagiricum Hook. — Bot. mag., tab. 4381 (non *Zenh.*).
R. niveum *D. Hook.*
R. formosum *Wall.* — Bot. mag., tab. 4457. — Nepalia.
R. Gibsoni Hort. — Fl. des serres I, tab. 18.
R. splendens Hort.
R. campanulatum *Don.* — Bot. mag., tab. 1944.
var. robusta.
R. Wallichii *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 5.
R. Wightii *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 27. — Fl. des serres VIII, tab. 792.
R. fulgens *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 25. — Fl. des serres VIII, tab. 789.
R. campylocarpum *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 30.
R. Maddeni *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 18. — Fl. des serres IX, tab. 912; L'hort. franç. 4863. tab. 20.
R. Roylii *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 7.
R. camelliæflorum *D. Hook.* Rhod. of Sik. Him., tab. 28.
R. eximium *Nutt.*
R. anthopogon *Don.* — Bot. mag., tab. 3947.
R. aromaticum Wall.

SPECIES DUBIÆ.

R. Russelianum Sweet, Brit. fl. gard. ser. 2, I, tab. 91.

R. arboreum Russelianum Hort.

R. aureum splendens Hort.

R. azaleoides Desf. — Ann. de Gand 1843, tab. 4.

R. ponticum deciduum Andr. Bot. repos., tab. 329.

R. kalmiæfolium Hort.

R. pelargoniflorum. — Fl. des serres X, tab. 4063.

R. rosalba — Fl. des serres X, tab. 4038.

R. dona Maria. — Fl. des serres X, tab. 4040.

R. campanulatum hybridum Hort.

R. spectabile grandiflorum Hort.

R. Bilsianum Hort.

R. daphnoides Hort.

R. Thompsonianum hybridum Hort.

R. Wilsonianum Hort.

R. Cartonianum Lindl. Bot. reg., tab. 4449.

R. Govenianum Sweet, Fl. gard., tab. 253.

R. Torlonianum Hort.

R. cheiranthifolium Hort.

R. Hamondi Hort.

R. tenellum Hort.

RHODORA Duham.

R. canadensis L. — *L'Hér. Stirps.*, tab. 68; *Nouv. Duham.*

III, tab. 53; *Bot. mag.*, tab. 474. — America sept.

RHODOTAMNUS Reichb.

R. Chamæcistus Reichb. — Europa et Asia.

Rhododendron Chamæcistus L. — *Bot. mag.*, tab. 488.

KALMIA Lin.

K. latifolia L. — Bot. mag., tab. 331; *Michx.* Arb. III, tab. 5;

Nouv. Duham. I, tab. 44. — Amer. sept.

var. nana (minor.).

— *alba*.

K. angustifolia L. — Bot. mag., tab. 331. — Amer. sept.

var. pumila.

— *lucida*.

— *variegata*.

K. glauca Ait. — Bot. mag., tab. 177; Nouv. Duham. I,

tab. 45. — America septentrionalis.

K. polifolia Wangeh. Schrift. naturf. Fr. VIII, tab. 5.

var. stricta.

— *rosmarinifolia*.

K. rosmarinifolia Dum.-Cours.

— *præcox*.

LEIOPHYLLUM Pers.

L. buxifolium Ell. — America septentrionalis.

Ledum buxifolium Berg. Act. Petrop. 1777, tab. 3.

L. thymifolium Lamk. Illustr., tab. 363.

Ammysine buxifolia Pursh. — Bot. reg., tab. 531.

var. variegata.

LEDUM Lin.

L. palustre L. — Duham. Arb. I, tab. 67. — Europa borealis.

L. latifolium Ait. — Delaun. Herb. amat., tab. 241. —

America septentrionalis.

L. palustre var. latifolia Michx.

L. canadense Lodd. Bot. cab., tab. 1049. — Amer. sept.

L. latifolium var. canadensis DC.

L. angustifolium Hort.

MYRSINEÆ

ARDISIA Swartz.

A. crenulata *Vent.* Choix de pl., tab. 5. — Hispaniola.

A. crispa *A. DC.* — China.

Bladhia crispa Thunb. — *Banks*, Ic. Kæmpf., tab. 7.

A. crenulata Lodd. Bot., cab. tab. 2. (non *Vent.*).

A. crenata. — Bot. mag., tab. 1950.

A. lentiginosa. — Bot. reg., tab. 553.

A. japonica *Bl.* — Japonia.

Bladhia japonica Thunb. Fl. jap., tab. 18.

var. *Belgorum.*

A. odontophylla Lindl. Bot. reg., tab. 1892. (non *Wall.*).

— *latimaculata.*

— *picta.*

SAPOTEÆ

BUMELIA Swartz.

B. lycioides *Gærtn.* — *Nutt.* North-Amer. sylv. II, tab. 90.

— Georgia.

Sideroxylon spinosum Duham. Arb. II, tab. 68.

B. syderoxyloides Hort.

B. tenax *Willd.* — *Nutt.* North-Amer. sylv. II, tab. 91. — Carolina.

Sideroxylon tenax L.

S. chrysophylloides Michx.

EBENACEÆ

DIOSPYROS Dalech.

D. Kaki *L. fil.* — *Kampf.* Amœn., Icon. p. 806. — China.

D. Schi-Tse *Bnge* Enum. p. 237. — China borealis.

D. Kaki Carr. (non *L.*). *Rev. hort.* 1869.

var. costata.

D. costata Carr. *Rev. hort.* 1870-74, p. 440. — *Hiern.*

Cambr. Phil. Trans. XII, p. 227 cum Icon.

— *Mazeli.*

D. Mazeli Carr. *Rev. hort.* 1874, p. 70.

D. Lotus *L.* — *Pall.* *Fl. ross.* tab. 58; *Nouv. Duham.* VI, tab. 27. — Europa australis.

D. virginiana *L.* — *Wats.* *Dendr. brit.* II, tab. 446; *Michx.*

Arb. am. II, tab. 42. — America septentrionalis.

var. angustifolia Hort. Audibert.

— *glabra.*

— *calycina Hort. Audibert.*

— *intermedia.*

— *lucida.*

— *microcarpa.*

D. pubescens Pursh.

STYRACEÆ

STYRAX Tourn.

S. officinale *L.* — *Duham.* *Arb.* II, tab. 79. — Europa australis.

S. Obasia *Sieb. et Zucc.* *Fl. jap.*, tab. 46. — Japonia.

Ilalesia Obasia Hort.

S. japonicum *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 23.— Japonia.

S. californicum *Torr.* — California.

PTEROSTYRAX *Sieb. et Zucc.*

P. hispidum *Sieb. et Zucc.* — Rev. hort. 1875, p. 307, cum Icon. — Japonia.

HALESIA *Ellis.*

H. tetraptera *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 404; Bot. mag., tab. 910. — Carolina.

var. grandiflora ?

H. diptera *L.* — *Lodd.* Bot. cab., tab. 1172. — Carolina.

H. parviflora *Michx.* — Bot. reg., tab. 952. — Florida.

OLEACEÆ

FRAXINUS *Tourn.*

§. SPECIES EUROPEÆ VEL ASIATICÆ

F. Ornus *L.* — *Nouv. Duham.* IV, tab. 15; *Sibth.* Fl. græc. I, tab. 4. — Europa australis.

F. florifera *Scop.*

Ornus europæa *Pers.* — *Hayne*, Darstell. XIII, tab. 11.

var. nana.

Ornus nana *Hort.*

— *latifolia.*

Ornus europæa latifolia *Hort.*

F. pseudornus *Steud.*

— *corymbosa.*

Ornus corymbosa *Hort.*

var. globifera.

F. Ornus.

Ornus globifera Hort.

O. glomerata Hort.

— *superba.*

F. rotundifolia Lamk. — Willd. Baumz., tab. 2. — Oriens.

O. rotundifolia Pers. — Hayne, Darstell. XIII, tab. 42.

F. mannifera Hort.

F. floribunda Hort. (non Wall.).

F. zanthoxyloides Wall. — India orientalis,

Ornus zanthoxyloides G. Don.

F. longicuspis Sieb. et Zucc. — Japonia.

F. Sieboldiana Blum.

F. dimorpha Coss. — Mauritania.

F. incana Carr.

var. dumosa.

F. excelsior L. — Fl. Danica, VI, tab. 969 ; Lamk. III, tab.

858. — *Europa.*

F. apetala Lamk.

var. atrovirens.

F. crispa Bosc.

F. — foemina Hort.

F. — mascula Hort.

— *horizontalis.*

F. horizontalis Desf.

— *monstrosa.*

— *nana polemonifolia (non F. nana Pers.).*

F. humilis Hort.

— *pyramidalis.*

— *pendula.*

F. pendula Vahl.

— *foliis variegatis.*

— *Wentworthi.*

— *spectabilis.*

F. excelsior.

var. verticillata.

— verrucosa.

F. verrucosa *Hort.*

F. fungosa *Hort.*

— jaspidea.

F. jaspidea *Desf.*

— aurea.

F. aurea *Willd.*

F. cinerea *Hort.* (non *Bosc.*).

— pendula.

— cucullata.

— erosa (edentata).

— glabra (glauca).

— glomerata.

— heterophylla.

F. heterophylla *Wohl.* — *Engl. bot.*, tab. 2476.

F. monophylla *Willd.*

F. simplicifolia *Wall.*

F. imbricaria monophylla *Hort.*

F. rotundifolia *Hort.* (non *Lamk.*).

F. integrifolia *Hort.*

Frêne de Crimée *Hort.*

— longifolia.

F. longifolia *Bosc.*

— lyrata.

— linearis (laciniata).

— — variegata.

— scolopendrifolia.

F. myrtifolia *Hort.*

— variegata.

— viridis (nobilis).

F. sinensis *Hort.* (non *Roxb.*).

— intermedia.

F. excelsior.

var. elegans (superba).

— *officinalis*.

F. officinalis Hort.

— *elegantissima*.

— *argenteo-variegata*.

F. reticulata Hort.**F. oxyphylla Bieb.** — Asia minor.

F. oxycarpa Willd.

F. elonzæ Hort. (sic!)

F. rostrata Guss. Pl. rar., tab. 63. — Italia meridionalis.**F. angustifolia Vahl.** — Hispania.

F. salicifolia Hort.

var. brachystachya DC.

F. calabrica Hort.

F. Theophrasti Hort. (non *Ornus var. Lois.*).

F. parvifolia Willd. Baumz. p. 155, tab. 2. (non *Lamk.*).

F. parvifolia Lamk. (non *Willd.*). — Gallia meridionalis.

F. lentiscifolia Desf.

F. tamariscifolia Vahl.

F. angustifolia Hort. (non *Vahl.*).

F. corymbosa Hort.

F. pannosa Hort. (non *Bosc.*).

F. pallida Hort. (non *Bosc.*).

F. oxyphylla Hort. (non *Bieb.*).

var. nana.

— *pendula*.

F. chinensis Roxb. — China.**F. mandshurica Regel.** — Mandshuria.**F. jasminifolia Hort.**

SPECIES AMERICANÆ.

F. americana L. — *Michx*, Arb. am. III, tab. 8. — Amer. bor.

F. discolor Muhl.

F. americana.

var. acuminata.

F. acuminata Lamk. — Torr., Fl. New-York, tab. 89.

— *coriacea.*

F. coriacea Hort.

— *lucida.*

F. lucida Bosc.

— *novæ-angliæ.*

F. Novæ-angliæ Wangenh. Beiträg.

— *nigra.*

F. nigra Bosc.

— *rubicunda.*

F. rubicunda Bosc.

F. arbutifolia Hort.

F. platycarpa Michx. fil., Arb. am. III, tab. 43. — Carolina.

F. caroliniana Lamk.

F. caroliniensis Hort.

F. platyphylla Hort.

F. epiptera Michx. — Carolina.

F. canadensis Gærtn. Frut. I, tab. 49.

F. lancea Bosc.

F. americana longifolia Hort.

F. juglandifolia Lamk. — Nouv. Duham. IV, tab. 46. —

America septentrionalis.

F. viridis Michx., Arb. amer. III, tab. 40.

F. concolor Muhl.

var. subserrata Willd.

F. subintegerrima Vahl.

— *serratifolia.*

F. serratifolia Hort.

F. expansa Willd. — America septentrionalis.

F. caroliniana Hort. (non Lamk.).

F. Richardi Bosc. — America borealis.

F. juglandifolia subserrata Hort. (non Willd.).

- F. alba** *Bosc.* — America borealis.
- F. pubescens** *Walt.* — *Torr.*, Fl. New-York, tab. 90. —
America septentrionalis.
- F. tomentosa Michx.*, Arb. amer. III, tab. 9.
- var. longifolia Vahl.*
- F. longifolia Bosc.*
- *latifolia Willd.*
- *subpubescens Pers.*
- F. subvillosa Bosc.*
- F. cerasifolia Hoffm.*
- F. sambucifolia** *Lamk.* — *Michx.*, Arb. amer. III, tab. 42.
— America septentrionalis.
- F. quadrangularis** *Michx. fil.*, Arb. amer. III, tab. 44. —
America septentrionalis.
- F. tetragona Cels.*
- F. cinerea** *Bosc.* — America septentrionalis.
- F. elliptica** *Bosc.* — America borealis.
- F. mixta** *Bosc.* — America borealis.
- F. hispida** *Hort.*
- F. aucubæfolia Hort.*
- F. nana** *Pers.* — America borealis.
- F. polemonifolia Poir.*
- F. nana Bosc.* (non *Hortul.*).
- F. Bosci Don.*
- F. rufa** *Bosc.* — America borealis.

FONTANESIA (1) Labill.

- F. phylliræoides** *Labill.* — *Turpin*, Dict. sc. nat. IV, tab. 37;
Wats. Dendr. brit. I, tab. 2. — Syria.
- F. Fortunei** *Carr.* *Rev. Hort.* 1859, fig. 9. — China.

(1) L'arbuste cultivé sous les noms de *Fontanesia californica* ou *F. grandiflora* ne paraît pas appartenir à ce genre; il n'a pas encore fleuri à Segrez.

FORSYTHIA Vahl.

F. suspensa Vahl. — Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 3; Belg. hort. VIII, tab. 4. — Japonia et China.

Syringa suspensa Thunb. Fl. jap., tab. 3.

Lilac perpensa Lamk.

F. Fortunei Lindl. — China borealis.

F. Sieboldi Hort.

F. viridissima Lindl. — L'Hort. franç. 4852, tab. 42; Bot. mag., tab. 4587. — China.

var. foliis variegatis.

SYRINGA Lin.

S. persica L. — Bot. mag., tab. 486. (Vulg. *Lilas à feuilles de Persil.*) — Persia?

* *Lilac persica* Lamk. — Nouv. Duham. II, tab. 62.

S. laciniata Hort.

S. capitata Gmel. Itin. III, tab. 32.

var. pteridifolia (laciniata). — Lodd. Bot. cab., tab. 4407; Schmidt, Arb. tab. 79.

— alba.

S. dubia Pers. — (Vulg. *Lilas Varin* et fals. *L. de Perse.*)

S. chinensis Willd.

S. correlata A. Braun.

S. Saugeana Hort.

S. speciosa Hort.

Lilac Varina Dum--Cours.

S. persica rothomagensis Loisel. Nouv. Duham. II, t. 63.

var. sanguinea.

— alba.

— Gloire de Moulins.

S. vulgaris L. — Europa.

Lilac vulgaris Lamk. — Nouv. Duham. II, tab. 61.

var. violacea. — Bot. mag., tab. 183.

— — flore pleno.

S. vulgaris.*var. alba.*— — *pyramidalis.*— *cærulea.*— *purpurea.* (Vulg. *Lilas de Marly.*)*S. rubra Hort.**Lilac media Dum--Cours.*— — *major.* (Vulg. *Lilas Charles X.*)— *variegata.**Varietates hortenses diversæ.***S. oblata** Fortune. — China.*S. chinensis Bunge?***S. Emodi** Wall. — Royle. III, tab. 65. — Himalaya*var. aureo-variegata.***S. Josikaea** Jacq. *fil.* — Bot. mag., tab. 3278. — Hungaria.**OLEA** Tourn.**O. europæa** L. — Nouv. Duham., tab. 25-32. — Asia.*var. myrtifolia (robusta).***O. americana** L. — Michx *fil.* Arb. amer. III, tab. 6. —*America septentrionalis.***OSMANTHUS** Lour.**O. fragrans** Lour. — Japonia.*Olea fragrans Thunb.* Fl. jap., tab. 2. — Bot. mag.,
tab. 4552.*Olea sinensis Hort.**var. reticulata.*— *floribus rubris.***O. Aquifolium** Sieb. et Zucc. — Japonia.*O. diversifolius. Sieb.**Ilex Aquifolium Thunb.**var. foliis pictis.*— — *aureo-variegatis.*— — *argenteo-variegatis.*

O. ilicifolius *Hort.* — Japonia.

var. foliis variegatis.

O. latifolius *Hort. Sieb.* — Japonia.

var. foliis marginatis.

PHILLYREA Tourn.

P. latifolia *L.* — *Lamk. Encycl.*, tab. 8; *Sibth. Fl. græc.*,
tab. 2. — Regio mediterr.

var. stricta.

— *buxifolia.*

— *crispa.*

— *ilicifolia,*

Phillyrea spinosa Mill.

— *macrophylla.*

— *obliqua.*

— *rotundifolia.*

P. media *L.* — *Nouv. Duham. II*, tab. 27. — Europa austr.

var. lævigata.

— *oleifolia.*

— *virgata.*

P. ligustrifolia Mill.

P. angustifolia *L.* — *Lamk. Encycl.*, tab. 8. — Reg. mediterr.

P. lanceolata Hort.

var. rosmarinifolia Ait.

P. rosmarinifolia Mill.

P. neapolitana Hort.

P. Vilmoriniana *Boiss.* — Oriens.

P. laurifolia Hort.

LIGUSTRINA Rupr.

L. amurensis *Reg.* *Gartenfl.* XII, tab. 396; *Beitr. Fl. russl.*

— China borealis et regio amur.

Syringa amurensis Rupr. — *Maxim. Prim. fl. amur.*
et *Mél. biol. decas XIX*, p. 393.

LIGUSTRUM Tourn. (1).

L. vulgare L. — Fl. danica VII, tab. 4441; *Guimp.* Abbild. deut. Holz, tab. 4; Nouv. Duham. III, tab. 49. — Europa, var. italica.

L. italicum *Mill.*

- erecta.
- excelsa foliis variegatis.
- longifolia.
- lutea (aurea, odorata).
- pendula.
- chlorocarpa.
- leucocarpa.

L. Ibota *Sieb.* Bot. Verts. XII, p. 36. — Japonia.

L. obtusifolium *Sieb.* et *Zucc.*

L. vulgare *Thunb.* (non *Lin.*).

L. Roxburghii *Hort.* (non *Bl.*).

L. nepalense *Hort.* (non *Wall.*).

L. amurense *Hort.* (non *Maxim.*).

Ibutta *Kæmpf.* Amcœnit.

L. Stauntoni *DC.* — China.

L. Ibota *Hort.* (non *Sieb.*).

L. sinense *Hort.* (non *Lour.*).

L. sinense nanum *Hort.*

L. chinense *Carr.* Rev. hort. 1863.

L. villosum *May*, Rev. hort. 1875.

L. Massalongianum *Visian.* — Patria ignota.

L. spicatum *Hort.* (non *Ham.*).

L. — japonicum *Hort.*

L. rosmarinifolium *Hort.*

L. myrtifolium *Hort.*

L. angustifolium *Hort.* *Booth.*

(1) Je dois l'indication des nombreux synonymes de ces *Ligustrum* à l'obligeance de M. Decaisne, qui s'occupe d'une monographie de ce genre.

L. lucidum *Ait.* Kew. — Bot. mag., 2565. — China.

L. japonicum Hort. (non *Thunb.*).

L. robustum Hort. (non *Hook.* et *Thom.*).

L. nepalense glabrum Hort.

L. strictum Hort.

L. magnoliæfolium Hort.

Ligustridium japonicum Spach.

L. nepalense *Wall.* Pl. asiat., tab. 270. — Bot. mag., tab. 2924. — Nepalia.

L. vestitum Wall.

L. japonicum *Thunb.* Fl. jap., tab. 4. — Japonia.

L. glabrum Hort.

L. Kellerianum Visian.

L. Kellermanni Hort. Van-Houtte.

L. lucidum Hort. (non *Ait.*).

L. ovatum Hort.

L. Sieboldi Hort.

L. syringæflorum Hort.

L. spicatum Hort.

var. coriacea Bl. Mus. Lugd. bat. I, p. 313.

L. coriaceum Carr. Rev. hort. 1874.

— *macrophylla.*

L. macrophyllum Hort.

— *foliis variegatis.*

L. ovalifolium *Hassk.* — Japonia.

L. californicum Hort.

L. ovatum Aliq. Hort.

L. amurense Carr. Rev. hort. 1864 cum Icon. (non *Maxin.*)

var. foliis variegatis.

— *foliis tricoloribus.*

L. compactum *Hook.* et *Thom.* — Nepalia et Himalaya

L. japonicum robustum Hort. (non *Hook.* et *Thom.*).

L. lucidum Hort. (non *Ait.*).

L. angustifolium Hort. (non *Booth.*).

L. compactum.

L. japonicum lineare Hort.

L. lineare Hort.

L. longifolium Hort.

L. lancæfolium Hort.

L. japonicum Simoni Hort.

L. Simoni Carr.

L. laurifolium Hort.

CHIONANTHUS Lin.

C. virginica *L.* — *Nutt.* North-Amer. sylv. II, tab. 98. —
America septentrionalis.

var. maritima.

C. maritima Lodd.

C. pubescens Hort. (non *H. B. K.*).

— *angustifolia.*

— *latifolia.*

C. montana Hort.

C. virginica var. montana Pursch. — *Wats.* Dendr.
brit. I, tab. 4.

— *lutea Hort.*

C. lutea Hort.

FORESTIEREÆ**FORESTIERA** Poir.

F. acuminata *Poir.* — Carolina.

Borya acuminata Willd.

Adelia acuminata Michx. Fl. bor. Amer. II, tab. 48.

F. ligustrina *Poir.* — Amer. sept.

Borya ligustrina Willd.

Adelia ligustrina Michx.

JASMINEÆ

JASMINUM Tourn.

- J. fruticans** *L.* — Bot. mag., tab. 464; Nouv. Duham. I, tab. 28. — Europa meridionalis.
 J. collinum *Salisb.*
 J. luteum *Lob.* Icon. I, tab. 106.
 J. heterophyllum *Mærch.*
 J. fruticosum *major Hort.*
- J. humile** *L.* — Bot. reg., tab. 350. — Gallia meridionalis.
 J. fruticans *var. β. Lapeyr.*
 J. italicum *Hort.*
- J. officinale** *L.* — Bot. mag., tab. 34; Nouv. Duham. I, tab. 27. — Asia.
 J. vulgare *Lamk.*
 J. Wallichianum *Hort.* (non *Lindl.*).
 var. flore pleno.
 — *foliis variegatis.*
- J. floridum** *Bge.* — China.
- J. revolutum** *Sims.* — Bot. mag., tab. 4734; Bot. reg., tab. 478. — Nepalia.
 J. chrysanthemum *Roxb.*
 J. flavum *Sieb.*
 J. triumphans *Hort.*
- J. affine** *Reyle* in *Lindl.* Bot. reg. XVIII, tab. 26. — *Wight*, Icon., tab. 4255. — India orientalis.
- J. nudiflorum** *Lindl.* Bot. reg. XXXII, tab. 48; — Fl. des serres, VIII, tab. 762. — China.
 var. foliis variegatis.

APOCYNÆ

RYNCHOSPERMUM Alph. DC.

R. japonicum *Sieb.* — Japonia.

R. jasminoides *Alph. DC.* — Bot. mag., tab. 4737. — China.
Trachelospermum jasminoides. Lem. Fl. des serres,
 VI, tab. 615.

R. pulchrum *Hort.*

R. scandens *Hort.*

ASCLEPIADEÆ

PERIPLOCA Lin.

P. græca *L.* — *Lamk. Encycl.*, tab. 177; *Bot. mag.*, tab. 2289.
 — Europa meridionalis.

P. lævigata *Hort. Kew.* — Syria.

P. punicaefolia Cav. Icon. 2., tab. 217.

P. angustifolia Labill. Syr. decas II, tab. 7.

MARSDENIA R. Br.

M. erecta *R. Br.* — Asia minor.

Cynanchum erectum L. — Lamk. Encycl., tab. 177.

BIGNONIACEÆ

CATALPA Scop.

C. bignonioides *Walt.* — America septentrionalis.

C. syringæfolia Sims. Bot. mag., tab. 1094.

Bignonia Catalpa L. — Duham. Arb., tab. 41; *Michx*
fl. Arb. amer. III, tab. 6;

var. aurea.

C. Kæmpferi DC. — *Lavall.* Arb. segrez. Icon., tab. ined.
— Japonia.

Catalpa ovata *G. Don.*

var. crassifolia *Lavall.* — (an species propria?).

C. Bungei *C. A. Mey.* — China.

var. nana (pumila).

C. Kæmpferi *Aliq. Hort.*

TECOMA Juss.

T. radicans *Juss.* — *Nutt.* North-Amer. sylv. II, tab. 404;
Nouv. Duham. II, tab. 3. — Virginia.

Bignonia radicans *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 526;
Bot. mag., tab. 483.

var. minor.

Bignonia radicans coccinea *Pers.* — *Catesb.* Carol. I,
tab. 65.

— flava.

— *Manglesii.*

— *præcox.*

— *punicea.*

— — *coccinea grandiflora.*

— *speciosa.*

— *Thunbergii.*

T. Thunbergii *Sieb.*

T. grandiflora *Delaun.* Herb. amat., tab. 286. — Japonia.

Bignonia grandiflora *Thunb.* — *Bot. mag.*, tab. 1398.

B. chinensis *Lamk.*

Campsis adrepens *Lour.*

var. amabilis.

— *multiflora.*

— *rubra.*

BIGNONIA Tourn.

B. capreolata *L.* — *Bot. mag.*, tab. 864; *Paxt. mag.*,
VIII, tab. 243. — Carolina.

B. lucida *Lodd.* — America septentrionalis.

var. sempervirens.

B. sempervirens *Hort.* (non *Lin.*).

BORRAGINEÆ

LITHOSPERMUM *Tourn.*

L. fruticosum *L.* — *Sibth.* Fl. gr., tab. 161. — Europa australis.

CORDIACEÆ

CORDIA *Plum.*

C. thyrsoflora *Hort. Petrop.* — Japonia.

var. longifolia.

SCROPHULARINEÆ

BUDDLEIA *Lin.*

B. globosa *Lamk.* — Bot. mag., tab. 74. — Chili.

B. capitata *Jacq.* Icon. rar. II, tab. 307.

B. curviflora *Hook. et Arn.* — Illustr. hort. XVII, tab. 25.

— Japonia.

B. Lindleyana *Fortune.* — Bot. reg. XXXII, tab. 4; Fl. des

serres, II, tab. 48. — China.

var. intermedia.

B. intermedia *Carr.* Rev. hort. 1873, p. 151, cum Icon
(non *H. B. K.*).

— *salicifolia.*

B. salicifolia *Hort.* (non *Wall.* nec *Jacq.*).

B. floribunda? *H. B. K.* — Mexico.

Arbor. Segrez. Enumeratio. 12

FREYLLINIA Benth.**F. cestroides** Colla. — Asia.

Capraria lanceolata *L. fil.* — *Link et Otto*, Icon. hort. berol., tab. 4.

Capraria salicifolia *Hort.*

Buddleia glaberrima *Hort.* — *Herb. amat.* IV, tab. 266.

PAULOWNIA Sieb. et Zucc.

P. imperialis Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 40. — *Rev. hort.* 1847; *Bot. mag.*, tab. 4636. — Japonia.

Kirri *Kæmpf.* amœn, p. 839. cum Icon.

Bignonia tomentosa *Thunb.*

VERONICA Lin.

V. speciosa *R. Cunn.* — *Bot. mag.*, tab. 4075. — Nov. Zeeland.
var. hybrida.

— rubra.

V. Andersonii *Hort.* (Stirps hybrida?)

V. Lindleyana *Paxt.* Mag. XII, tab. 247 (non *Wall.*). —
Nova Zeelandia.

V. salicifolia *Forst.* — *Bot. reg.* 1846, tab. 5. — Nov. Zeeland.

V. decussata *Ait.* — *Bot. mag.*, tab. 207. — Falkland.

V. Devoniana *Hort.*

V. formosa *R. Br.* — *Bot. mag.* 4512. — Tasmania.

V. Hulkeana *Hook.* — Nova Zeelandia.

VERBENACEÆ.

CITHAREXYLUM Lin.

C. cyanocarpum *Hook. et Arn.* in *Beech.* Voy. tab. 44. —
Chili.

C. ligustrinum *G. Thur.* — Patria ignota.

Ligustrinum multiflorum *Jacq.* Man.

L. amurense *Hort.* (non *maxim.*).

CALLICARPA Lin.

- C. arborea** *Roxb.* — Nepalia.
C. americana *L.* — *Lamk. Encycl.*, tab. 69. — Louisiana.
Burcardia Heisteri Duham. Arb. Edit. I; tab. 44.
C. japonica *Thunb.* — Japonia.
C. longifolia Lamk. — *Bot. reg.*, tab. 864.
var. rosea.
C. purpurea *Juss.* — *L'hort. franç. 1861*, tab. 4. — China
 et Japonia.
C. Murasaki *Sieb.* — Asia?
Galphimia hirsuta Hort. (non Cav.).
C. gracilis *Sieb. et Zucc.* — Japonia.
C. Sieboldi *Lavall.* — Japonia?
C. Murasaki Hort. (non Sieb.).
C. sinensis *Hort.*
C. latifolia *Hort.*

CLERODENDRON Lin.

- C. fragrans** *Vent.* *Malm.*, tab. 70. — China.
Volkameria japonica Thunb. — *Jacq. Hort. schönbr.*
 tab. 338.
C. trichotomum *Thunb.* — *Kæmpf. Amœn.*, tab. 22. —
 Japonia.
var. glauca.
C. glauca Wall.
C. foetidum *Bnge.* — China.
C. Bungei Steud.
Volkameria Bungei Hort.
C. squamatum *Vahl.* — *Bot. reg.*, tab. 649. — Asia.
C. Kæmpferi Fisch. — *Ann. Gand. 1845*, tab. 3.
Volkameria Kæmpferi Jacq. Icones, tab. 500.

VITEX Lin.

V. Agnus-castus *L.* — Nouv. Duham. VI, tab. 33. —
Regio mediterr.

V. verticillata *Lamk.*

V. incisa *Lamk.* Encycl., tab. 341. — Mongolia.

V. laciniata *Hort.*

V. Negundo *L.* — Bot. mag., tab. 361. — Nepalia

V. arborea *Desf.*

V. paniculata *Lamk.*

var. alba.

— *rosea.*

V. angustifolia *Hort.*

V. Hort. *Van-Htte.* — China?

LABIATÆ

PHLOMIS Lin.

P. fruticosa *L.* — Nouv. Duham. VI, tab. 40. — Europa
australis.

P. ferruginea *Hort.* (non *Ten.*).

P. italica *Smith.* — Italia.

P. purpurea *L.* — *Ræmer.* Fl. europ. XII, tab. 5.

P. rotundifolia *Müll.*

P. viscosa *Poir.* — Asia minor.

P. virens *DC.*

TEUCRIUM Lin.

T. fruticans *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 304. — Regio mediterr.

T. latifolium *L.* — Bot. mag., tab. 245.

T. Marum *L.* — *Hayne* Darstell. VIII, tab. 2. — Regio medit.

T. maritimum *Lamk.*

SOLANEÆ

LYCIUM Lin.

L. chinense Mill. — Nouv. Duham. I, tab. 30. — China.

L. Trewianum Rœm. et Schult.

L. Barbarum var. chinense Ait.

L. chiliense *aliquot* Hort. (non Miers.).

L. europæum L. — Jaub. et Spach, Illustr., tab. 403. —

Europa australis.

L. megistocarpum Dunal. in DC. Prodr.

L. chilense Hort. (non Bert.).

L. carolinianum Hort. (non Michx.).

var. ovata.

L. ovatum Poir.

L. carnosum Hort. (non Poir.).

— macrocarpa.

L. macrocarpa Hort.

L. Barbarum L. — Wats. Dendr. brit. I, tab. 9. — Oriens.

L. carolinianum Hort. (non Michx.).

L. ruthenicum Murr. Comment. Gott. II, tab. 2. — Sibiria.

L. tataricum Pall. Fl. ross. I, tab. 49.

L. afrum L. — Nouv. Duham., I, tab. 29. — Mauritania.

L. inerme Hort. (non Lin.).

GRABOWSKIA Schlecht.

G. bœrhaaviæfolia W. Arn. — Amer. merid.

Lycium bœrhaaviæfolium L.

L. heterophyllum Murr. Comment. Goett. VI, tab. 2.

CESTRUM Lin.

C. Parqui *L'Hér.* Stirp. I, tab. 36. — Bot. mag., tab. 4770.
— Chili.

C. jasminiflorum *Moric.* — Patria ignota.

FABIANA Ruiz et Pav.

F. imbricata *Ruiz et Pav.* Fl. peruv. II, tab. 422, fig. 2.
— Chili.

SOLANUM Lin.

S. dulcamara *L.* — Fl. danica IV, tab. 607. — Europa.
var. variegata.

S. jasminoides *Paxt.* Mag. VIII, tab. 5. — Bot. reg. XXXIII,
tab. 33. — Patria ignota.

S. cynanchoides *Dun.*

S. glaucophyllum *Desf.* — Amer. australis.

S. fastigiatum *Willd.* — *Dunal*, Solan., tab. 16. — Mexico.

DESFONTAINEA Ruiz et Pav.

D. spinosa *Ruiz et Pav.* Fl. peruv., tab. 486; — Fl. des
Serres IX, tab. 938; Bot. mag., tab. 4781. — Peru.

A P E T A L Æ

A M A R A N T A C E Æ

DEERINGIA R. Br.

D. celosioides R. Br. — Bot. mag., tab. 2717. — Nova
Hollandia.

Leycesteria japonica Hort.

var. variegata.

P O L Y G O N A C E Æ

POLYGONUM Lin.

P. chinense L. — *Wight. Icones pl. ind. or.* V, tab. 4806.
— China.

Ampelgynum chinense Lindl.

CALLIGONUM Lin.

C. comosum L'Hérit. — Asia minor.

C. polygonoides L. (non *Pall.*).

BRUNNICHIA Banks.

- B. cirrhosa** Banks. — *Gærtn. Fruct.*, tab. 45. — Carolina.
Polygonum claviculatum Hort. Paris.

MUHLENBECKIA Meisn.

- M. complexa** Meisn. — Nova Zeelandia.
 , *M. nummularia Brongt.*
Polygonum complexum A. Cunn. — *Bot. mag.*, tab. 4846.
M. sagittifolia Meisn. — Brasilia meridionalis.
Polygonum acetosæfolium Vent. Hort. Cels, tab. 88.
M. pandurata Dcne. — Nova Hollandia.
M. varians Meisn. — Patria ignota.
Polygonum cordatum Hort. Berl.
M. Cunninghami Hort.

ATRAPHAXIS Lin.

- A. spinosa** L. — *L'Hér. Stirp.*, tab. 44; *Wats. Dendr. brit.* II tab. 449. — Asia occident.

HELWINGIACEÆ

HELWINGIA Willd.

- H. japonica** Dietr. — Japonica.
Osyris japonica Thunb. Icones. dec. III, tab. 1.
H. rusciflora Willd. — *Dcne, Ann. sc. nat.* 2^e sér., vol. VI, tab. 7; *Zucc. in Sieb. Fl. jap.*, tab. 86.

NYSSACEÆ

NYSSA Lin.

- N. aquatica** L. — *Michx*, Arb. am. II, tab. 22. — Amer. sept.
 N. integrifolia Ait.
 N. villosa *Michx*.
N. multiflora *Wangenh.* Beiträg. — *Emory*, Rep. Mass.,
 tab. 47. — America septentrionalis.
 N. sylvatica *Michx*, Arb. amer. II, tab. 24.
N. uniflora *Wangenh.* Beiträg., tab. 27. — America sept.
 N. grandidentata *Michx*, Arb. amer. II, tab. 49.
N. capitata Walt. — *Michx*, Arb. am. II, tab. 29. — Amer. sept.
 N. candicans A. *Michx*.

PROTEACEÆ

EMBOTRIUM Forst.

- E. coccineum** Forst. — *Cav.* Icones, tab. 65. — Magellania.

GREVILLEA R. Br.

- G. sulphurea** Cunn. — *Lodd.* Bot. cab., tab. 4723. — Nova
 Zeelandia.
 G. aciphylla *Sieber*.
G. rosmarinifolia Cunn. — Nova Zeelandia.
 G. riparia *Sieber*.

THYMELEÆ

DIRCA Lin.

- D. palustris** *L.* — *Lamk. Encycl.*, tab. 293; *Bot. reg.*, tab. 292. — America septentrionalis.

DAPHNE Lin.

§. MEZEREUM.

- D. Mezereum** *L.* — *Fl. danica*, II, tab. 268. — Europa.
var. albida.

— *autumnalis.*

— *grandiflora.*

— *Houtteana* (*atropurpurea*).

D. Houtteana *Planch.*

D. species *Van-Htte.* *Fl. des serres* VI, tab. 592.

- D. Genkwa** *Sieb. et Zucc.* *Fl. jap.*, tab. 75. — China.
var. Fortunei.

D. Fortunei *Lindl.* *Journ. hort. soc.* II, tab. 1. — *Fl. des serres* III, tab. 208.

- D. altaica** *Pall.* *Fl. ross.* I, tab. 35. — Sibiria.

- D. caucasica** *Pall.* — Asia minor.

D. salicifolia *Lamk.*

- D. alpina** *L.* — *Lodd. Bot. cab.*, tab. 66. — Europa.
Thymelea alpina *All.*

§. CNEORUM.

- D. Cneorum** *L.* — *Bot. mag.*, tab. 318. — Europa.
var. Delahayana (*versailensis*).

— *major* (*maxima*).

— *Verloti.*

D. Verloti *Gren. et Godr.*

— *foliis variegatis.*

- D. striata** *Tratt.* Arch. de Gewächsk. I, tab. 133. — *Rchb.*
Icones, fl. germ. XI, tab. 554. — Europa.
D. Cneorum *Wahlenh.* (non *Lin.*).
D. oleoides *Schreb.* Decad. I, tab. 7. — *Lodd.* Bot. cab.,
tab. 299. — Europa et Asia.
D. caucasica *Bieb.*
var. foliis variegatis.
D. Blagayana *Freyer.* — *Reich.* Icones fl. germ. XI, tab.
550. — Carniolia.
D. collina *Smith.* Spicil. II, tab. 18. — Italia.
D. australis *Cyr.* Pl. rar. III, tab. 16.
var. neapolitana *Lindl.* Bot. reg., tab. 822.
D. neapolitana *Lodd.* Bot. cab., tab. 719.
— *foliis marginatis.*
D. odora *Thunb.* (non *Lour.*). — *Banks,* Icones Kämpf.,
tab. 16. — Japonia.
var. foliis aureo-marginatis.
D. sinensis *Lamk.* — China.
D. odora *Lour.* — Bot. mag., tab. 1587.
D. indica *Hort.* (non *L.*). — Herb. amat. II, tab. 105.
var. hybrida (stirps hybrida?).
D. hybrida *Lindl.* Bot. reg., tab. 1177.
D. Delphini vel *Dauphini* *Hort.*
D. japonica *Hort. Ludg. Batav. ex Sieb. et Zucc.* — *Paxt.*
Mag. VIII, tab. 175; Rev. hort. 1866. — Japonia.
D. Gnidium *L.* — *Duham.* Arb. II, tab. 23; *Lodd.* Bot. cab.,
tab. 150. — Regio mediterr.

§. LAUREOLA.

- D. Laureola** *L.* — Bot. mag., tab. 206. — Europa.
D. major *Lamk.*
Thymelea Laureola *Scop.*
D. pontica *L.* — Bot. mag., tab. 1282. — Oriens.
var. rubra.

EDGEWORTHIA Meisn.

E. chrysantha *Lindl.* Bot. reg. 1847, tab. 48. — Fl. des serres, tab. 289. — China.

E. papyrifera *Zucc.*

Daphne papyrifera *Sieb.*

WIKSTRÆMIA Endl.

W. indica *C. A. Mey.* — China.

Daphne indica *L.* — *Hook et Arn.* Bot. Beech., tab. 15.

THYMELEÆ Tourn.

T. Tartonraira *All.* — *Reichenb.* Icones Fl. germ. XI, tab. 552. — Regio mediterr.

Daphne Tartonraira *L.* — *Lamk.* Illustr., tab. 290.

ATRIPLICEÆ

ATRIPLEX Lin.

A. Halimus *L.* — *Sibth.* Fl. gr., tab. 962. — Europa, Asia et America.

Chenopodium Halimus *Thunb.*

SALSOLA Lin.

S. fruticosa *L.* — *Nouv. Duham.* VII, tab. 79. — Europa, Asia et America.

Schoberia fruticosa *Meyer.*

Suæda fruticosa *Forsk.*

ELÆAGNEÆ

ELÆAGNUS Lin.

E. argentea *Pursh* (non *Colla*). — *Wats. Dendr. brit.* II, tab. 464. — *Amer. septentrionalis*.

E. hortensis *Bieb.* — *Regio mediterr.*

var. angustifolia.

E. angustifolia *L.* — *A. Rich. Monogr.*, tab. 24; *Bot. reg.*, tab. 1156.

E. parvifolia *Hort.* (non *Royl.*).

E. parviflora *Hort.*

E. orientalis *L.* — *Pall. Fl. ross.* I, tab. 5.

E. hortensis var. Orientalis schlecht in *DC Prodr.* XIV, p. 609.

E. hortensis lutea *Hort.*

E. crispa *Thunb.* — *Japonia.*

E. macrophylla *Thunb.* — *Japonia.*

var. argenteo-variegata.

— *aureo-variegata.*

E. arborea *Roxb.* — *India orientalis.*

E. argentea Colla (non *Pursh*). *Hort. ripul.*, tab. 28.

E. ferruginea *A. Rich.* — *Asia.*

var. Gussoni.

E. chrysophylla *Hort.*

E. nivea *Hort.*

E. flava *Hort.* — *Pépin* in *Lem. hort. univ.* III, p. 304.

E. fusca *Hort.*

E. longipes *Asa Gray.* — *Lavall. Arb. segreg. Icones*, tab. ined. — *Japonia.*

E. edulis *Hort.*

E. rotundifolia *Hort.*

E. odorata edulis *Hort.*

var. crispa.

E. reflexa *Dcne.*, Bull. Acad. Brux. — Japonia.

E. pungens *Hort.* (non *Thunb.*).

var. foliis marginatis.

— *pictis.*

— *variegatis.*

E. tenuiflora *Benth.* — China.

E. Simoni *Carr.* — China ?

E. stricta *Hort.*

E. persica *Hort.*

SHEPHERDIA Nutt.

S. canadensis *Nutt.* — *A. Rich.* monogr., tab. 24. — America septentrionalis.

Hippophaë canadensis *L.*

S. argentea *Nutt.* North-Amer. sylv. I, tab. 35. — *Hook.*

Fl. bor. Am., tab. 448. — America septentrionalis.

Hippopahë argentea *Pursh.*

HIPPOPHAE Lin.

H. rhamnoides *L.* — *Lamk.* Encycl., tab. 5; *Fl. danica*, II, tab. 265; *Engl. bot.* VI, tab. 425. — Europa.

H. salicifolia *Don.* — Nepalia.

LAURINEÆ

LAURUS Tourn.

L. nobilis *L.* — *Nouv. Duham.* II, tab. 32. — Europa merid.

var. angustifolia.

— *crispa.*

L. nobilis,

var. regalis.

L. regalis Hort.

L. californica (Hort, non Nutt.).

— *salicifolia.*

— *variegata.*

SASSAFRAS Nees.

S. officinale Nees. — America septentrionalis.

Laurus Sassafras L. — Michx, Arb. am. III, tab. 2.

CINNAMOMUM Burmam.

C. Camphora Nees. — Japonia et China.

Camphora officinarum G. Bauh. — Blachw., tab. 347.

Laurus Camphora L. — Jacq. Coll. IV, tab. 3.

var. longifolia.

Camphora japonica var. Sieb.

— *latifolia.*

Camphora japonica Sieb.

C. Sieboldi Meisn. — Japonia.

C. dulce Nees.

C. chinense Blume.

C. ? tomentosum D. Don. — Nepalia.

Laurus tomentosa Hamilt.

MACHILUS Rumph.

M. Thunbergii Sieb. et Zucc. — Japonia.

Laurus indica Thunb.

PERSEA Gærtn.

P. caroliniensis Nees. — America borealis.

Laurus caroliniensis Michx, Arb. am. III, tab. 2.

BOLDU Feuill.**B. chilanum** *Nees*. — Chili.Peumus Boldus *Mol.**P. fragrans Bert.**Laurus chilensis Poepp.*Bellota Miersii *Cl. Gay*. Fl. chil. V, tab. 59.**LINDERA** Thunb.**L. Benzoin** *Meisn.* — America septentrionalis.*var. verna.**Laurus Benzoin L.**Benzoin odoriferum Nees.*— *æstivalis.**Laurus æstivalis Wangenh. Beiträg.**Benzoin æstivale Nees.***L. præcox** *Blum.* — Japonia.*Benzoin præcox Sieb. et Zucc.***L. sericea** *Blum.* — Japonia.*Benzoin sericeum Sieb. et Zucc.***L. hypoglossa** *Hort.* — Asia?**TETRANTHERA** Jacq.**T. japonica** *Spreng.* — *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 37 et 100.

— Japonia.

*Tomex japonica Thunb.**var. foliis variegatis.***LITSÆA** Juss.**L. glauca** *Sieb.* — Japonia.*Laurus glauca Thunb.**var. baccis rubris.*

ARISTOLOCHIÆ

ARISTOLOCHIA Lin.

- A. Sipho** *L'Hér.* Stirp. nov., tab. 7. — Bot. mag., tab. 534.
— America septentrionalis.
- A. tomentosa** *Sims*, Bot. mag., tab. 1369. — Carolina.
- A. Kämpferi** *Willd.* — *Banks*, Icones sel. Kæmpf., tab. 49.
— Japonia.
- A. sempervirens** *L.* — Bot. mag., tab. 1116; *Lodd.* Bot. cab., tab. 231. — Creta.
- A. debilis** *Sieb. et Zucc.* — Japonia.
A. longa *Thunb.* (non *Lin.*).

EUPHORBIACEÆ

MALLOTUS Mull.

- M. japonicus** *Mull.* — Japonia et China septentrionalis.
Croton japonicum *Thunb.* Fl. jap., tab. 28-29.
Rottlera japonica *Spreng.* — *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 79.

SEBASTIANA Spreng.

- S. ligustrina** *Mull.* — America septentrionalis.
Stillingia ligustrina *Michx.*

STILLINGIA Garden.

- S. sebifera** *Michx.* — China et Japonia.
Croton sebiferum *L.*
Triadica sinensis *Lour.*
Excæcaria sebifera *Mull.*

SECURINEGA Mull.**S. ramiflora** Mull. — Dahuria et Rossia.Geblera suffruticosa *Fisch.*Fluggea suffruticosa *Baill.***BUXACEÆ****BUXUS** Lin.**B. balearica** Willd. — Insul. Balear.B. sempervirens *var. gigantea* Loisel. Nouv. Duham.

I, tab. 23.

*var. marginata.***B. longifolia** Boiss. — Asia.**B. sempervirens** L. — *Lamk. Encycl.*, tab. 761. — Europa.*var. arborescens.* — *Duham. Arb.* tab. 24.

— subglobosa.

— suffruticosa *Lois.* Nouv. Duham. I, tab. 24.

— — foliis variegatis.

— angustifolia.

— bullata.

— crispa (navicularis).

— glauca.

— ledifolia.

— marginata.

— myrtifolia — *Duham. Arb.* tab. 23.

— minima.

— obcordata.

— ovalifolia.

— rotundifolia.

— rosmarinifolia.

B. sempervirens.*var. tenuifolia* (thymifolia).— *variegato argentea*.— — *aurea*.— *caucasica*.— *Handsworthii*.— *Hardwickensis*.**B. chinensis** *Link.* — China et Japonia.*var. rotundifolia*.*B. rotundifolia* *Sieb.***B. japonica** *Mull.* — Japonia.*B. sempervirens* *Thunb.* (non *Lin.*).*var. latifolia* (Fortunei).— *microphylla**B. microphylla. Sieb. et Zucc.*— — *elegans*.— — *rotundifolia*.— *argentea*.— *ovalifolia**B. ovalifolia* *Sieb.***SARCOCOCCA** *Lindl.***S. pruniformis** *Lindl.* Bot. reg. tab. 1012. — India orient.*Buxus coriacea* *Spreng.*

EMPETRACEÆ

EMPETRUM *Lin.***E. nigrum** *L.* — Fl. danica, VI, tab. 975; Engl. Bot. VIII, tab. 526. — Europa septentrionalis.**E. rubrum** *Willd.* — Bot. reg. tab. 1783. — Magellania.

URTICEÆ

VILLBRUNEA Gaudich.

V. frutescens *Blum.* — Japonia.

Bœhmeria frutescens *Thunb.*

Urtica frutescens *Thunb.*

PIPERACEÆ

PIPER *Lin.*

P. Futokadsura *Sieb.* — Japonia.

CHLORANTHEÆ

CHLORANTHUS *Sw.*

C. inconspicuus *Swartz*, *Phil. Transact.* LXXVIII, tab. 45.

— *Le Maout et Dene* *Traité gén. bot.* p. 504 cum *Icon.*

— China et Japonia.

Nigrina spicifera *Lamk.* *Illustr.*, tab. 74.

CUPULIFERÆ

QUERCUS *Lin.*

SPECIES GERONTOGEÆ.

Q. coccifera *L.* — *Nouv. Duham.* VII, tab. 46. — *Kotsch.*

Die Eich, tab. 29. — *Regio mediterr.*

Q. Kormesina *Hort.*

Q. calliprinos *Webb.* — *Jaub. et Spach*, *Pl. or. ill.*, tab. 57. —

Regio. mediterr.

Q. pseudo coccifera *Hook.*

Q. suber *L.* — Nouv. Duham. VII, tab. 45; *Kotsch.* Die Eich., tab. 33. (Vulg. *Chêne-Liège.*). — Europa australis.

Q. pseudo-suber *Desf.* — *Santi Viag. tosc.* I, tab. 4. — *Kotsch.* Die Eich., tab. 35. — Sicilia.

Q. Turneri Hort. Paris. — *Willd.* Baumz., tab. 3.

Q. Fontanesii Guss.

Q. castaneæfolia Coss. (non *C. A. Mey.*).

Q. esculenta Hort.

var. Gussonei.

Q. haliphlaeos Guss. (non *Lamk.*).

— *gibraltariensis.*

Q. hispanica var. gibraltariensis Lamk.

Q. gibraltariensis fastigiata Hort.

— *ægilopifolia.*

Q. ægilopifolia Pers.

Q. hispanica Lamk.

Q. occidentalis *J. Gay.* in Bull. soc. bot. Fr. 1857—Gallia occid.

Q. Suber Duham. Arb. II, tab. 20. (non *Lin.*).

Q. Ilex *L.* — Nouv. Duham. VII, tab. 46; *Kotsch.* Die Eich., tab. 38. — Europa australis.

Q. calycina Poir.

var. agrifolia.

— *fagifolia.*

— *Fordii (fastigiata).*

— *gramuntia.*

Q. gramuntia L.

— *lanuginosa.*

— *longifolia (salicifolia).*

— *macrophylla.*

— *Shepherdii.*

— *serratifolia (serrata).*

— *Smilax.*

Q. Ballota Desf. Act. acad. Paris ann. 1790 (cum Icon.).
— Hispania.

Q. Ilex *var.* Ballota Alph. DC.

Q. castellana Poir.

Q. rotundifolia Lamk.

Vulg. *Chêne castillan*.

Q. lusitanica Lamk. — Hook. icones VI, tab. 562. —
Iberia.

Q. faginea Lamk.

Q. canariensis Willd.

Q. australis Link.

var. Boissieri.

Q. lusitanica *var.* Boissieri Alph. DC.

Q. humilis Lamk. — Lusitania.

Q. fruticosa Brot.

var. prasina.

Q. prasina Bosc. — Nouv. Duham. VII, tab. 44.

Q. Mirbeckii Durieu. — Mauritania.

Q. lusitanica *var.* bætica Webb.

Q. Cerris L. — Nouv. Duham. VII, tab. 57; Wats. Dendr. brit.
II, tab. 92 et 93. — Europa merid.

Q. lanuginosa Lamk.

Q. crinita Desf.

var. sempervirens.

Q. austriaca Willd. — Kotsch. Die Eichen, tab. 20.

— Fulhamensis — Loud. Arb. III, fig. 1870-1874.

Q. Lucombeana Swt.

Q. Cerris dentata Wats. Dendr. brit., tab. 93. (non
Thunb.)

Q. exoniensis Lodd.

— latifolia.

Q. Cerris.*var. crispa.*— *laciniosa.**Q. Tournefortii Willd.**Q. Haliphlæos Lamk. (non Guss.).***Q. serratifolia Hort. Booth.** — *Hispania.***Q. Toza Bosc.** Journ. hist. nat. II, tab. 32, fig. 3. — *Kotsch.**Die Eich., tab. 22. — Europa australis.**Q. humilis Bosc (non Lamk.).**Q. nigra Thore (non Lin. nec Willd.).**Q. stolonifera Lapeyr.**Q. pyrenaica Willd. — Nouv. Duham. VII, tab. 56.**Q. Tausin Pers.**Vulg. Chêne noir. — Secondat, Chênes, tab. 5.**var. splendens.**Q. pyrenaica var. splendens Hort.***Q. pedunculata Willd.** — *Nouv. Duham., tab. 54; Kotsch.**Die Eich., tab. 27. — Europa.**Q. Robur L. — Trans. Edimb. soc. I, tab. 4-5.**Q. racemosa Lamk. Encycl., tab. 779.**Q. Robur var. vulgaris Alph. DC.**var. concordia. — Illustr. hort. XVI, p. 578.*— *diversifolia.*— *fastigiata.**Q. fastigiata Lamk. — Nouv. Duham., tab. 55.**Q. pyramidalis Hort.**Q. Robur var. fastigiata Alph. DC.*— *fastigiata aureo-bicolor.*— — *cucullata.*— — *cupressoides.*— — *elata.*— — *foliis atropurpureis.*— — *heterophylla.*

Q. pedunculata.

var. fastigiata macrophylla.

— — *viridis.*

— *Fennessi (laciniata).*

Q. Fennessi Hort.

Q. heterophylla Fennessi Hort.

Q. heterophylla Hentzii Hort.

— *Fennessi dissecta (comptonæfolia).*

— — *cupreis.*

Q. Robur nigra Hort. — Fl. des serres, XVII, tab. 1783.

— *foliis involutis.*

— — *variegatis.*

— *heterophylla Loud.*

Q. laciniata Lodd.

Q. ficifolia Hort.

Q. Robur dissecta Hort.

— *Hodginsii Loud.*

Q. Hodginsii Lodd.

Q. Robur var. Hodginsii Alph. DC.

Q. subfastigiata Hort.

— *microcarpa DC.*

Q. pedunculata microbalanos Heuff.

— *pectinata.*

— *petiolaris.*

— *pendula.*

Q. pendula Lodd.

Q. Robur pendula Alph. DC.

— *pendula heterophylla (laciniata).*

— *purpurea.*

Q. purpurea Lodd.

Q. Robur purpurascens Alph. DC.

Q. pedunculata.

var. rubrinerva.

— *salicifolia pendula.*

— *striata.* — *Illustr. hort.* XVII, p. 44.

Q. Brutia *Ten.* *Fl. neapolitana* V, tab. 197. — Italia.

Q. Robur var. Brutia Alph. DC.

Q. Thomasii *Ten.* *Fl. neapolitana.* V, tab. 198. — Calabr.

Q. pedunculata macrocarpa Bess.

Q. Robur Thomasii Alph. DC.

Q. apennina *Lamk.* — *Nouv. Duham.* VII, tab. 53. —

Gallia et Italia.

Q. tomentosa Ehrh.

Q. pedunculata apennina Godr.

Q. sessiliflora *Sol.* — *Smith. Engl. bot.*, tab. 1845; *Kotsch.*

Die Eich., tab. 32. — Europa.

Q. sessilis Ehrh.

Q. Robur var. sessilis Martyn.

Q. microcarpa Lapeyr.

Q. sessilifolia Hort.

— *alnoides.*

— *afghanistanensis.*

Q. afghanistanensis Hort. Booth.

— *ambigua.*

Q. ambigua Hort.

— *cucullata.*

Q. Robur foliis elegantibus Hort.

— *Dauvessi pendula.*

Q. Robur Dauvessi pendula Hort.

— *falkenbergensis.*

Q. falkenbergensis Hort.

— *foliis agenteo-variegatis.*

— *foliis aureis.*

Q. Robur foliis aureis Hort.

Q. sessiliflora.

var. foliis palide-variegatis.

— *Geltoviana.*

— *iberica.*

Q. iberica Bieb.

Q. Robur iberica Alph. DC.

— *Louetti.*

Q. Robur Louetti Hort.

— *macrophylla.*

Q. Robur macrophylla Hort.

— *nigra.*

Q. Robur nigra Hort.

— *pendula.*

— *purpurea.*

— *rubens.*

— *sessilifolia.*

Q. pubescens Willd. — *Reich. Cent.*, tab. 44; *Kotsch. Die Eich.*, tab. 34. — *Europa.*

Q. lanuginosa Thuill.

Q. Robur var. lanuginosa Lamk.

Q. Collina Schleich.

Q. sessiliflora var. pubescens Loud., *Encycl. fig. 1573.*

Q. altissima Hort.

Q. ajudaghiensis Stev. — *Rossia.*

var. dissecta.

Q. Hartwisiana Stev. — *Rossia.*

Q. ajudaghiensis var. ventricosa Hort. Booth.

Q. Dalechampii Ten. — *Italia.*

Q. Robur var. Tenorei Alph. DC.

Q. Ægilops *L.* — *Hayne*, Darstell. XII, tab. 47. — Europa orientalis.

Q. Ægilops Oliveriana Tchihat. Asia min. II, tab. 42.

Q. Ungerii Kotsch. Die Eich., tab. 13.

Q. Vallonea Kotsch. Die Eich., tab. 7.

var. latifolia.

Q. Velani Oliv.

Q. vesca *Kotsch.* Die Eich., tab. 36. — Asia minor.

Q. Haas *Kotsch.* Die Eich., tab. 2. — Asia minor.

Q. Robur var. Haas DC.

Q. pedunculata var. Haas Hort.

Q. Ehrenbergii *Kotsch.* Die Eich., tab. 15. — Libania.

Q. Pyrami *Kotsch.* Die Eich., tab. 3. — Cilicia.

Q. hypoleuca Kotsch.

Q. Pyramus Hort.

Q. macrolepis *Kotsch.* Die Eich., tab. 16. — Græcia et Creta.

Q. Ægylops (pro parte) L. — *Nouv. Duham.* VII, tab. 51.

Q. castaneæfolia *C. A. Mey. (non Coss.).* — *Kotsch.* Die Eich. tab. 40. — Caucasus.

Q. macranthera *Fisch. et Mey.* — Caucasus.

Q. Dshorochensis *C. Koch.* — Asia minor.

Q. Robur var. Dshorochensis Alph. DC.

Q. Dschogoriensis Hort.

SPECIES ASIE ORIENTALIS.

Q. dentata *Thunb.* — Japonia.

Q. Daimyo *Sieb.* — Japonia

Q. mongolica *Fisch.* — Dahuria et Mandshuria.

Q. Robur Pall. (non Lin.).

Q. chinensis *Bnge.* — China septentrionalis.

- Q. tomentosa** Hort. — China borealis.
Q. bombyx tomentosa Hort.
- Q. serrata** Thunb. — Japonia et China sept.
Q. acutissima Carruthers in. Journ. Linn. soc. VI.
Q. serratifolia Hort.
Q. bombyx glabra Hort.
- Q. glabra** Thunb. — Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 89. —
Japonia.
var. longifolia.
- Q. acuta** Thunb. — Japonia.
var. nervis roseis.
- Q. glauca** Thunb. — Japonia.
var. cæsia (Awokasi).
— lapidea (Isikasi).
— nigra (Kurokasi).
- Q. salicina** Blume. — Japonia.
Q. bambusæfolia Hance. — Bot. Herald, tab. 94.
- Q. nepalensis** Desf. — Nepalia.
Q. lanata Loud. Encycl. Trees, fig. 1633.
Q. incana Roxb. var. nepalensis Alph. DC.
- Q. lamellosa** Sm. (non Hook.). — Wall. Pl. as. rar. II, tab. 149,
Hook. fil. Cathcart. III, him., tab. 28. — Nepalia.
Q. imbricata Don.
Q. lamellata Roxb.
Q. Wallichiana Lindl.
- Q. cuspidata** Thunb. — Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 2. —
Japonia.
Q. angustifolia Hort.
- Q. gilva** Blum. — Japonia.
Q. incana Roxb.?
- Q. angustifolia** Sieb. — Japonia.
- Q. salicifolia** Sieb. — Japonia.
- Q. striata** Hort. Sieb. — Japonia.

Q. biglandulosa *Hort.*

Q. sclerophylla *Lindl.* in *Paxt.* Flow. gard. I, tab. 37. —
China borealis.

§. SPECIES AMERICÆ SEPTENTRIONALIS.

Q. virens *Ait.* — *Michx.* Chênes, tab. 10-11; *Liebm.* Chênes
tab. 33. — America septentrionalis.

Q. Phellos var. β *L.*

Q. virginiana *Mill.*

Q. sempervirens *Walt.*

Q. oleoides *Chom. et Schl.*

var. *caroliniana.*

— *heterophylla.*

— *tomentosa.*

Q. Phellos *L.* — *Michx. fil.* Arb. amer. II, tab. 12. —
America septentrionalis.

Q. Phellos sylvatica *Michx.* Chênes, tab. 12.

var. *dentata.*

Q. imbricaria *Michx.* Chênes, tab. 15. — Georgia.

Q. Phellos var. β *Spach.*

Q. sericea *Willd.* — Carolina.

Q. pumila *Walt.* — *Michx. fil.* Arb. amer. II, tab. 15.

Q. Phellos var. *pumila* *Michx.* Chênes, tab. 15.

Q. cinerea *Michx.* Chênes, tab. 14. — Florida.

Q. Phellos cinerea *Spach.*

Q. Prinos var. β *L.*

Q. sempervirens *Catesb.* Carol., tab. 37.

Q. Phellos cinerea *Spach.*

Q. nigra *L.* — *Michx.* Chênes, tab. 22-23. — Amer. sept.

Q. ferruginea *Michx. fil.* Arb. amer. II, tab. 18.

Q. marylandica *Catesb.* Carol. I, tab. 19.

Q. Genabii *Hort.*

Q. agnostifolia *Hort.*

Q. Nova-Genobi *Hort. (sic!).*

Q. aquatica Walt. — *Michx*, Chênes, tab. 19-21. — Florida.

Q. maritima Willd.

Q. Phellos maritima Michx, Chênes, tab. 13.

var. laurifolia.

Q. laurifolia Michx, Chênes, tab. 17 et 18.

— *heterophylla.*

Q. heterophylla Michx fil. Arb. amer. II, tab. 16.

— *dentata Michx*, Chênes, tab. 20, fig. 2.

Q. tinctoria *Michx fil. Arb. amer. II, tab. 22.* — Georgia.

var. hippophlæos.

Q. bicolor Willd. — *Emers. Rep. Massach., tab. 14.* —

America septentrionalis.

Q. Prinus tomentosa Michx, Chênes, tab. 9, fig. 2.

Q. Prinus discolor Michx fil. Arb. amer. II, tab. 6.

Q. Michauxii Nutt.

var. platanoides.

Q. Prinus platanoides Lamk.

Q. velutina L'Her.

Q. pannosa Bosc.

Q. pannosa Michauxii Hort.

Q. mollis Nutt.

Q. Prinus L. — *America septentrionalis.*

Q. Prinus palustris Michx, Chênes, tab. 6.

Q. montana Emers. Rep. Mass., tab. 6.

var. acuminata.

Q. Prinus acuminata Michx, Chênes, tab. 8.

Q. montanea Emers. Rep. Mass. (non Icon.) (non Willd.).

Q. castanea Muhl. — Emers. Rep. Mass. tab. 5.

— *monticola.*

Q. monticola Michx, Chênes, tab. 7.

Q. montana Willd. (non Emers.).

Q. chincapin *Pursh.* — Carolina.

Q. *Prinus pumila Michx*, Chênes, tab. 9, fig. 4.

Q. — *Chincapin Michx fil.* Arb. amer II, tab. 40.

Q. *pedunculata monticola Hort.*

var. *subvelutina.*

— *tomentosa.*

Q. stellata *Wangenh.* Amer., t. 6. — *Emers.* Rep. Mass. tab. 3.

Q. *obtusiloba Michx*, Chênes, tab. 4.

Q. *villosa Walt.*

Q. alba *L.* — *Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 4. — *Emers.* Rep.

Mass. tab. 4. — America septentrionalis.

Q. *alba virginiana Cat. Car.* I, tab. 24.

Q. *americana alba Hort.*

var. *elongata.*

— *microcarpa.*

Q. *microcarpa Hort.*

Q. nobilis *Hort.*

Q. falcata *Michx*, Chênes, tab. 28. — America septent.

var. *Ludoviciana.*

Q. *Novi-Aureliani Hort.*

Q. Banisteri *Michx*, Chênes, tab. 27. — Virginia.

Q. *ilicifolia Wangenh.* — *Emers.* Rep. Mass., tab. 44.

Q. rubra *L.* — *Michx*, Chênes, tab. 35-36. — Georgia.

Q. *coccinea var. rubra Spach.*

Q. palustris *Duroi.* — *Michx*, Chênes, tab. 33-34. — Virginia.

Q. *rubra dissecta Lamk.*

Q. coccinea *Wangenh.* Amer. — *Michx*, Chênes, tab. 31-32.

— America septentrionalis.

Q. *ambigua Michx fil.* Arb. amer. II, tab. 24.

Q. *borealis Michx.*

Q. lyrata *Walt.* — *Michx*, Chênes, tab. 4. — America sept.

- Q. lobata** *Nee.* — *Liebm.* Chênes tab. 42. — California.
Q. Hindsii Benth.
- Q. macrocarpa** *Michx.* Chênes, tab. 2 et 3. — America
 septentrionalis.
var. macrophylla.
 — *pandurata.*
- Q. olivæformis** *Michx. fil.* Arb. amér. II, tab. 2. — America
 septentrionalis.
Q. macrocarpa var. olivæformis A. Gray.
var. Hampteri.
- Q. densiflora** *Hook. et Arn.* — *Hook.* Icones, tab. 380. —
 California.

§. SPECIES MEXICANÆ.

- Q. chrysophylla** *H. B. K.* Pl. æquin. II, tab. 87.
- Q. confertifolia** *H. B. K.* Pl. æquin. II, tab. 96.
- Q. reticulata** *H. B. K.* Pl. æquin. II, tab. 86.
Q. rugosa Nee.
- Q. Hartwegi** *Benth.*
Q. ambigua H. B. K. Pl. æquin. II, tab. 93 (non
Michx.)
Q. obtusata var. Hartwegi Alph. DC.
Q. Hartwisiana Hort. (non Stev.).
- Q. magnoliæfolia** *Nee.*
var. lutea.
Q. lutea macrocarpa Hort.
- Q. Ghiesbreghtii** *Martens.* — *Liebm.* Chênes tab. 21.
- Q. pandurata** *H. B. K.* Pl. æquin., tab. 77.
Q. obtusata var. pandurata Alph. DC.
- Q. polymorpha** *Cham. et Schl.* — *Liebm.* Chênes tab. 38.
Q. petiolaris Benth.
- Q. Sideroxyla** *H. B. K.* Pl. æquin. II, tab. 83.
Q. Sideroxylon Hort.

Q. skinneri *Benth.* — *Hook.* Icones, tab. 402; *Liebm.* Chênes
tab. 4.¹

Q. xalapensis *H. B. K.* Pl. æquin. II, tab. 75; *Liebm.* Chênes
tab. 4.

Q. tomentosa *Willd.* — Mexico.

Q. callosa *Benth.*

var. diversifolia.

Q. diversifolia *Nee.*

§. STIRPES DUBIE IN SEMINARIIS CULTÆ.

Q. Agbayi *Hort.*

Q. comata *Hort. Booth.*

var. pendula.

Q. alnoides *Hort. Booth.*

Q. dilacerata *Hort.*

Q. Fapannsii *Hort.*

Q. roseo-striata *Hort.*

Q. sonchifolia *Hort. Booth.*

Q. stenocarpa *Hort.*

Q. syriaca *Hort.*

Q. Quexigo *Hort.*

Q. Neumannii *Hort.*

Q. lanata *Hort.*

Q. lancifolia *Hort.*

CASTANOPSIS *Spach.*

C. chrysophylla *Alph. DC.* — Orégon.

Castanea chrysophylla *Hook.* Bot. mag. 4953. — Belg.
hort. VII, p. 248.

CASTANEA *Tourn.*

C. vulgaris *Lamk.* — *Nouv. Duham.* III, tab. 49. — Europa

Fagus Castanea *L.* — *Engl. bot.*, tab. 886.

Castanea vesca *Gartn.* Fruct., tab. 3.

C. Bungeana *Blume.*

C. vulgaris.

var. americana Michx, Arb. amer. II, tab. 6.

C. americana Rafn.

--- *pendulifolia Lavall.* Arb. segreg. Icones, tab. ined.

— *aspleniifolia* (dissecta).

— *cochleata* (crispa).

— *heterophylla*.

— *quercifolia*.

— *Downtoniana*.

— *prolifera*.

C. pumila *Mill.* — *Michx*, Arb. amer. II, tab. 7. — Amer. sept.

C. Clincapin Hort.

Fagus pumila L.

F. nana Duroi.

FAGUS Tourn.

F. ferruginea *Ait.* — *Michx*, Arb. amer. II, tab. 9. —
America septentrionalis.

F. americana latifolia Wangenh.

F. sylvestris Michx, Arb. amer. II, tab. 8.

F. sylvatica americana Loud.

F. alba Rafn.

F. sylvatica *L.* — *Fl. danica* Vill, tab. 1283; *Nouv. Duham.*
II, tab. 24. — Europa.

F. sylvestris Gærtn. Fruct, I, tab. 37.

Castanea Fagus Scop.

var. monstrosa.

— *Pagnyensis.*

— *pendula.*

— *pyramidata.*

--- *Remillensis.*

— *retroflexa.*

--- *tortuosa.*

— *aspleniifolia* (laciniata).

F. sylvatica.*var. castaneæfolia.*— *cristata.*— *grandidentata*— *latifolia.*— *quercifolia.*— *purpurea.*— — *major (atropurpurea).*— — *pendula.*— *cuprea.*— *foliis variegatis.*— — *tricoloribus.***F. obliqua** *Mirb.* Mém. Mus. XIV, tab. 23. — Fretum Magell.*F. valdiviana Philip.**F. obliqua* β *valdiviana Alph. DC.***F. Cunninghami** *Hook.* Journ. bot. 1840, tab. 7; Fl. Tasm.

I, p. 346. — Tasmania.

F. betuloides *Mirb.* — *Hook. fil.* Fl. antarct. II, tab. 124. —

Fretum magell.

*Betula antarctica Forst.**Calusparassus betuloides Homb.* Voy. Pôle sud, tab. 7.

CORYLACEÆ

CORYLUS Tourn.**C. Avellana** *L.* — *Lamk.* Illustr., tab. 780. — Europa.*var. pendula.*— *crispa.*— *latifolia (filicifolia).*— *quercifolia.*— *urticæfolia (laciniata).*— *foliis variegatis.*— *grandis (pedemontana).*— *glomerata.*

C. avellana.*Varietates hortenses diversæ.*

var. africana.

- algérienne rouge.
- anglica.
- à gros fruits.
- aveline dorée.
- — à feuilles panachées.
- — de Barcelone.
- — de Péronne.
- — ronde.
- — rouge.
- — à fruit strié (*striata*).
- Bucharest (?)
- Bænd-Nusa.
- californica.
- commun à grappes.
- Cosford.
- Dowton.
- Einzeln Tragende (?)
- fertile d'Angers.
- franche.
- Gekrausette Filber Nuss.
- glomerata.
- grandis.
- heterophylla.
- Louis-Berger.
- macrocarpa.
- mandell Nuss.
- merveille de Bollwiller.
- Micheli.
- Nottingham's prolific.

C. avellana.

var. précocè d'Angers.

— *præcox oblonga*.

— *prolific*.

— *spicata præcox*.

C. heterophylla *Fish.* — *Trautv.* *Imagines ross.* I, tab. 4.

— *Dahuria*.

C. avellana *Pall.* (non *Lin.*).

C. avellana var. dahurica *Ledeb.*

C. Colurna *L.* — *Fl. des serres* XXI, tab. 2223 et 2224. —

Thracia.

C. arborescens *Hort.*

C. bizantina *Clus.*

C. pontica *C. Koch.*

C. tubulosa *Willd.* — *Reichb.* *Icones*, tab. 637. — *Istria*.

var. atropurpurea (*purpurea*).

Varietates hortenses.

var. à coque tendre.

— d'Espagne.

— — grosse ronde.

— à pellicule rouge.

— ronde d'Espagne.

— rubra.

— de Trébizonde (*impériale*).

C. americana *Walt.* — *America septentrionalis*.

var. humilis *Wangenh.* *Arb.*, tab. 29.

C. mexicana *Hort.*

C. rostrata *Ait.* — *America septentrionalis*.

OSTRYOPSIS *Dcne.*

O. Davidiana *Dcne.* *Bull. soc. bot.* 1873, p. 155. — *Mon-golia*.

CARPINUS Tourn.

C. Betulus L. — Nouv. Duham. II, tab. 58. — Eur. et Asia.

C. carpinizza Kit.

var. incisa.

— *pendula.*

— *quercifolia* Desf.

Ostrya quercifolia Hort.

— *purpurea.*

C. Betulus foliis purpureis Hort.

aureo-variegata.

C. caroliniana Walt. — amer. septentrionalis.

C. americana Michx. fil. Arb. amer. III, tab. 8. — America borealis.

C. Duinensis Scop. Carn. ed. 1772, tab. 60. — Asia occid.

C. orientalis Lamk. — Wats. Dendr. brit. II, tab. 98.

OSTRYA Micheli.

O. carpinifolia Scop. — Europa merid. et Asia.

O. vulgaris Willd. — Reichb. Icones, tab. 635.

O. italica Spach.

O. quercifolia Hort.

Carpinus Ostrya L. — Nouv. Duham. II, tab. 59.

O. virginica Willd. — America septentrionalis.

O. vulgaris Wats. Dendr. brit., tab. 143.

O. americana Michx.

Carpinus virginiana Clit.

DISTEGOCARPUS Sieb. et Zucc.

D. Carpinus Sieb. et Zucc. — Japonia.

Carpinus japonica Blum.

JUGLANDEÆ

JUGLANS Lin.

J. regia L. — Nouv. Duham. IV, tab. 47. — Europa et Asia.

var. pendula.

— heterophylla.

— laciniata.

— monophylla.

— bifera.

— serotina (*Noyer de la St-Jean*). — Rev. hort. 1863, p. 450.

— præparturiens (fertilis).

— racemosa (spicata).

J. californica Hort.

— dura.

— macrocarpa (maxima). — Vulg. *Noir à bijoux*.

— oblonga.

— ovata Hort. (non Mill.)

— tenera (fragilis).

— rugosa.

J. intermedia Hort. — The Garden, 1876, p. 365 et 367 cum Icon.

J. piriformis Carr. Rev. hort. 1863, p. 29 et 30. (non Liebm.).

J. hybrida Hort.

J. Vilmoriniana Carr. (Stirps hybrida?).

J. segreziensis Lavall. Arbor. segrez. Icones, tab. ined.

J. nigra L. — Michx, Arb. amer. I, tab. 4; Wats. Dendr. brit.

II, tab. 158. — Amer. septentrionalis.

var. racemosa (an species propria? sub nomine *J. neglectæ*. in Arb. segrez. indicata).

— crassa.

— lævis.

J. nigra.

var. acuta.

J. nigra *Lois.* — *Nouv. Duham.* IV, tab. 48.

— *oblonga.* *Hort.* (non *Mill.*).

J. stylosa *Lavall.* — *Amer. septentrionalis.*

J. nigra *Hort.* (non *Lin.*).

J. cinerea *L.* — *Jacq.* *Icones*, tab. 492. — *amer. sept.*

J. oblonga *Mill.*

J. cathartica *Michx.* *Arb. amer.* I, tab. 2.

var. glomerata.

J. mandshurica *Maxim.* — *Regio Amur.*

var. dumosa (*nana*).

— *ailanthifolia.* — *Lavall.* *Arb. segreg.* *Icones*, tab. ined.

J. ailanthifolia *Sieb.*

J. macrophylla *Hort.*

J. rupestris *Engelm.* — *Sitgreaves*, *Rep.*, tab. 45 et 46. —

America borealis.

J. fruticosa *Hort. Bot. Berol.* (Ex hort. *Sim.-Louis.*). — *Patria ignota.***CARYA** *Nutt.***C. alba** *Nutt.* — *Emers. Rep. Massach.*, tab. 42; *Belg. hort.*

VI, p. 219. — *Amer. septentrionalis.*

Juglans ovata *Mill.*

J. squamosa *Lamk.* — *Michx.* *Arb. amer.* I, tab. 7.

J. alba *Michx.* (non *Lin.*)

C. sulcata *Nutt.* — *America septentrionalis.*

Juglans laciniosa *Michx.* *Arb. amer.* I, tab. 8.

J. hybrida *Hort.*

C. tomentosa *Nutt.* — *Emers. Rep. massach.*, tab. 43. —

America septentrionalis.

Juglans alba *L.* (non *Michx.*). — *Wats. Dendr. brit.* II, tab. 448.

C. tomentosa.

Juglans tomentosa Lamk. — *Michx*, Arb. amer. I, tab. 6; Kern. hort., tab. 518.

C. amara Nutt. — *Emers.* Rep. Massach., tab. 15. — Georgia et Texas.

Juglans angustifolia Lamk.

J. amara *Michx*, Arb. amer. I, tab. 4.

C. aquatica Nutt. — Carolina et Georgia.

Juglans aquatica *Michx*, Arb. amer. I, tab. 5.

C. olivæformis Nutt. — Belg. hort. XI, p. 219. — Louisiana.

Juglans cylindrica Lamk.

J. olivæformis *Michx*, Arb. amer. I, tab. 3.

PTEROCARYA Kunth. (1).

P. fraxinifolia Spach. — *Lavall.* Arb. segreg. Icones, tab. ined. — Russia.

Juglans fraxinifolia Lamk.

J. pterocarpa Willd.

P. caucasica C. A. Mey. — *Lavall.* Arb. segreg. Icones, tab. ined. — Caucasus.

P. dumosa *Lavall.* — Patria ignota.

P. fraxinifolia Hort. (non *Spach.*).

P. caucasica Hort. (non *C. A. Mey.*).

P. stenoptera Cas. DC. — *Lavall.* Arb. segreg. Icones, tab. ined. — Asia septentrionalis.

P. japonica Hort. (non *P. sorbifolia*, nec *rhoifolia* Sieb. et Zucc.).

P. lævigata Hort.

P. sinensis Hort.

(1) Les 4 espèces de *Pterocarya* énumérées ici sont très-distinctes et ne sauraient être réunies; elles ont fleuri et fructifié à Segrez. Les 3 premières sont confondues dans les pépinières et les jardins publics sous les noms de *P. fraxinifolia* ou *P. caucasica*.

PLATYCARYA Sieb. et Zucc.

- P. strobilacea** Sieb. et Zucc. Abhandl. der. Münch. acad. III, tab. 5. — *Lavall.* Arb. segrez. Icones, tab. ined. — Japonia et China.
Fortunea chinensis Lindl. Journ. Hort. soc. I, tab. 154. — Fl. des serres IV, tab. 331.

MYRICACEÆ

MYRICA Lin.

- M. cerifera** L. — *Bigelow*, Med. bot., tab. 48. — Louisiana.
M. pensylvanica Hort. Paris. — Nouv. Duham. II, tab. 55.
 — America septentrionalis.
M. caroliniensis Mill.
M. cerifera var. *media* Michx.
M. Gale L. — Fl. danica II, tab. 827; Nouv. Duham II, tab. 57. — Europa et America sept.
M. californica Cham. et Schlecht. Linnæa VI, p. 335. — Journ. Hort. soc. VII, tab. 283. — California.

COMPTONIA Banks et Soland.

- C. aspleniifolia** Banks et Soland. — Nouv. Duham. II, tab. 44; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 456. — America borealis.
Liquidambar aspleniifolium L.
Myrica Comptonia Cas. DC.

BALSAMIFLUÆ

LIQUIDAMBAR Lin.

L. styraciflua *L.* — *Michx.* Arb. amer. III, tab. 5; *Nouv. Duham.* II, tab. 40. — America septentrionalis.

L. orientalis *Mill.* — *Hook.* Icones, tab. 4019. — Asia minor.

Platanus orientalis *Pococke*, Trav. II, tab. 89. (non *Lin.*).

L. imberbe *Ait.*

PLATANEÆ

PLATANUS Tourn.

P. orientalis *L.* — *Sibth.* Fl. græc., tab. 945; *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 401; *Nouv. Duham.* II, tab. 4. — Oriens.

P. palmata *Mæneh.*

P. hispanica *Ten.*

P. occidentalis *Hort.* (non *Lin.*).

P. vulgaris var. *orientalis* *Spach.*

var. *umbraculifera* (nana, tortuosa).

P. cuneata *Hort.* (non *Willd.*).

— *acerifolia* *Loudon*, Encycl. of Trees, p. 928, fig. 1733.

P. algeriensis *Hort.*

— *nepalensis* (pyramidata, laciniata).

P. cuneata *Willd.* — Asia minor.

P. orientalis cuneata *Loud.*

P. — *undulata* *Ait.*

P. — *flabelliformis* *Spach.*

- P. occidentalis** L. — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 100;
Michx. Arb. amer. III, tab. 3. — Amer. borealis.
P. vulgaris var. *occidentalis* *Spach.*
P. lobata *Mæneh.*
P. hybrida *Brot.*
P. integrifolia *Hort.*
P. macrophylla *Hort.*
P. racemosa *Nutt.* North.-Amer. sylv. I, tab. 43. —
 California.
P. californica *Benth.*

BETULACEÆ

BETULA Tourn.

- B. alba** L. — *Nouv. Duham.* III, tab. 50. — Europa.
B. verrucosa *Ehrh.*
 var. *fastigiata* (*Baumannii*).
 — *pendula* *Youngii* *Hort.*
 — *tristis*.
B. tristis *Link.*
 — *populifolia* *Spach.*
B. populifolia *Willd.* — *Michx. fil.* Arb. Amer. II, tab. 2.
B. acuminata *Ehrh.*
B. laciniata *Hort.* (non *Wahlenb.*).
 — *dalecarlica* L.
B. hybrida *Blom.*
B. laciniata *Wahlenb.*
 — *sibirica* *Hort.*
 — *foliis purpureis.*

B. papyrifera Michx. — *Michx. fl. Arb. amer. II, tab. 1.* —

America septentrionalis.

B. papyracea Willd.

B. alba var. *papyrifera* Spach.

B. amygdalifolia Hort. (non Willd.).

var. *cordifolia*.

C. pubescens undulata Hort.

B. pubescens Ehrh. — *Guimp. et Hayn. Deutsch. holtz.*

tab. 446. — Europa.

B. alba var. *pubescens* L.

B. carpathica Wald. et Kit.

B. pontica Desf.

B. ætnensis Rafin.

B. hircynica Wend.

B. papyracea Hort. (non Willd.).

B. nigra Willd. — *Wats. Dendr. brit. II, tab. 153.* — America

borealis.

var. *pendula* Hort.

B. urticifolia Reg. — Suecia.

B. alba var. *urticifolia* Spach.

B. pubescens var. *urticifolia* Hort.

B. crispa Hort. (non Ait.).

B. rubra Michx. *fl. Arb. amer. II, tab. 3.* — America bor.

B. ulmifolia Sieb. et Zucc. — Mandshuria borealis.

B. costata Trautv.

B. Ermani Cham. in *Linnæa* VI, tab. 6, fig. D. — Sibiria
orientalis.

B. Bhojpaltra Wall. — *Regel. Monogr. Betul., tab. 6.* —

Japonia.

B. utilis Don.

B. Jacquemontii Spach. — *Dene. in Jacq. voy. tab. 158.*

B. corylifolia Reg. et Maxim. — *Regel. Bem. ii Bet. VIII,*

tab. 8. — Japonia.

- B. lenta** Willd. — *Michx*, Arb. amer. II, tab. 4. — Amer. bor.
B. lutea *Michx*, Arb. amer. II, tab. 5. — America borealis.
 B. persicæfolia Hort.
B. acuminata Wall. — Nepalia.
 B. acuminata var. δ et ζ *Reg.* Monogr. Betul., tab. 6 et 13.
 B. cylindrostachys Lindl. (non *Wall.*).
 Betulaster cylindrostachys Spach.
B. pumila L. — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 97. — Amer. bor.
 B. rotundifolia Hort.
 B. daurica Hort. (non *Pall.*).
 B. frutescens Hort.
 B. fruticosa Hort. (non *Pall.*).
B. Quebecensis *Burgsd.* in Berl. schrift. nat. V, p. 196. —
 Canada.
B. humilis *Schrank.* — *Reichb.* Icones. Fl. germ. XII, tab. 624.
 — Europa meridionalis.
 B. pycowiensis Reichb. Icones, Fl. germ. III, tab. 622.
 B. Socolowii Jacq. fil.
 B. fruticosa Fall. Fl. ross. tab. 40.
 B. sibirica Lodd. — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 154, fig. B.
B. nana L. — *Flor. lapp.*, tab. 6. — Helvetia.

ALNUS Tourn.

- A. viridis** DC. — *Reichb.* Icon. Fl. germ. XII, tab. 628. — Europa
 A. undulata Willd.
 A. crispa Pursh.
 A. Mitcheliana Curtis.
 Alnaster viridis Spach.
 A. fruticosa Ledeb.
 Betula crispa Michx.
var. sibirica.
 A. suaveolens Reg.
 A. viridis var. suaveolens Heg.

A. cordifolia *Ten.* Flor. nap. Icones II, tab. 99. — Europa meridionalis.

var. nervosa.

A. maritima *Nutt.* North.-Amer. Sylv. suppl. I, tab. 10. — America septentrionalis.

var. arguta. — Mandshuria.

A. japonica *Sieb. et Zucc.* — *Reg.* Monogr., tab. 45, f. 22-27. — Japonia.

A. glutinosa *Willd.* — Fl. danica XIII, tab. 2302. — Europa.

A. elliptica *Reg.*

A. denticulata *C. A. Mey.* — *Eichw.* Cauc., tab. 2.

A. barbata *C. A. Mey.*

A. sibirica *Hort.* (non *Fisch.*).

var. laciniata *Willd.*

A. glutinosa var. pinnatifida laciniata *Reg.* Monogr., tab. 45, fig. 36-37.

— *imperialis* *Hort.* *Desfossé-Thuil.*

— *incisa* *Willd.*

A. glutinosa var. pinnatifida incisa *Reg.* Monogr., tab. 47, fig. 9-10.

A. Oxyacantha *Hort.*

— *quercifolia* *Willd.*

A. pubescens *Tausch.* — Bohemia.

A. badensis *Lang.*

A. glutinosa pubescens *Reg.*

A. serrulata *Willd.* — *Michx.* Arb. amer. III, tab. 4, fig. 4. — America borealis.

A. glutinosa var. serrulata *Reg.* Monogr., tab. 44, f. 6-10.

A. glutinosa var. acutifolia *Spach.*

A. hybrida *Reich.*

var. rugosa.

A. rugosa *Hort.*

A. americana *Hort.*

A. incana Willd. — *Reg. Monogr.*, tab. 46, fig. 14-18, et
tab. 47, fig. 1-8. — Europa, Asia et Amer. sept.

A. hirsuta Turcz.

A. alpina Bork.

var. sibirica Spach. — Siberia.

A. sibirica Fisch.

— *glauca* Ait.

A. glauca Michx, Arb. amer. III, tab. 4, fig. 2.

A. intermedia Schrad.

— *laciniata*.

A. incana var. pinnatifida laciniata Reg. Monogr.,
tab. 47, fig. 5.

A. serrata Hort.

— *laciniata acuminata*.

A. incana acuminata Hort.

A. incana var. pinnatifida acuminata Reg. Monogr.,
tab. 47, fig. 2.

— *nana plicata*.

A. nana plicata Hort.

SALICINEÆ

POPULUS Tourn.

P. alba L. — *Nouv. Duham.* II, tab. 53. — Europa.

var. acerifolia.

P. Arenbergica Lodd.

— *grisea*.

P. major Mill.

— *nivea*.

P. nivea Willd. — *Schk. Handb.* tab. 330.

P. alba.

var. Bachofeni.

P. Bachofenii Wierzb. — *Reichb.* Icones, Fl. germ. V, tab. 616.

P. belgica Lodd.

P. canescens Smith. Engl. bot., tab. 1619. — Europa.

P. alba Tremula Krause.

P. hybrida Bieb. — *Rehb.* Fl. germ. XI, tab. 615.

P. alba Erhenbergii Hort.

Vulg. *Grisard.*

P. Tremula L. — Lamk. Encycl., tab. 819. — Europa
Africa et Asia.

P. cilicica Kotsch.

P. australis Ten.

Vulg. *Tremble.*

var. pendula.

P. supina Lodd.

— *parvifolia.*

— *villosa.*

P. villosa Lang. — *Rehb.* Fl. germ. XI, tab. 617.

P. Simoni Carr.

P. tremuloides Michx, Arb. amer. III, tab. 8, fig. 1. —
America sept.

P. græca Willd. — Nouv. Duham. II, tab. 54.

P. benzoifera Tausch.

P. atheniensis Hort.

P. cordata Hort.

P. grandidentata Hort. (non Michx).

P. grandidentata Michx Arb. amer. III, tab. 8, fig. 2. —
America septentrionalis.**P. Sieboldi** Miq. — Japonia.

P. rotundifolia Sieb.

P. heterophylla L. — Nouv. Duham. I, t. 54. — Louisiana.

P. cordifolia Burgsd.

P. heterophylla.

var. argentea.

P. argentea Michx., Arb. amer. III, tab. 9.

P. nigra *L.* — Engl. bot., tab. 4910. — Europa et Asia.

P. pannonica Kit. in *Reich.* Icones Fl. germ., tab. 649.

var. betulæfolia Wesm. — America septentrionalis.

P. betulæfolia Pursh.

P. Hudsoniana Michx. fil. Arb. amer. III, tab. 40 fig. 1.

P. canadensis vera Hort.

— *pyramidalis Spach.* — Vulg. *Peuplier d'Italie.*

P. dilatata Ait. — *Hayne*, Darstell. XIII, tab. 46.

P. fastigiata Desf.

P. nigra italica Duroi.

P. pannonica italica Mæench.

P. italica dilatata Willd.

P. pyramidata Hort.

— *plantierensis mascula Hort. Sim.-Louis.*

— — *fœmina Hort. Sim.-Louis.*

— *crispa Hort.*

P. berolinensis *C. Koch.* (Stirps hybrida).

P. canadensis *Desf.* — *Michx. fil.* Arb. amer. III, tab. 41. —

America septentrionalis.

P. marylandica Bosc.

P. lævigata Hort.

P. angulata Hort. (non *Michx.*).

P. monilifera Ait. — *Wats.* Dendr. brit, tab. 102; *Michx.*,

Arb. amer. III, tab. 10, fig. 2.

P. virginica Desf.

P. carolinensis Borkh.

P. angulosa medusæ Hort.

Vulg. *Peuplier suisse.*

var. pendula.

— *Eugenei.*

— *grandis (régénéré).*

P. canadensis.

var. foliis variegatis.

P. angulata Michx *fil.* Arb. amer. III, tab. 42. — Amer. sept.

P. cordata Aliq. Hort.

P. cordifolia Hort. (non *Burgsd.*).

P. macrophylla Lodd. (non *Lindl.*).

Vulg. *Peuplier de la Caroline.*

P. candicans Ait. — Michx *fil.* Arb. amer. III, t. 2. — Canada.

P. ontariensis Desf.

P. macrophylla Lindl. (non *Lodd.*).

P. latifolia Mærch.

P. Acladesca Hort. (sic!).

P. heterophylla Hort. (non *Lin.*).

P. americana latifolia Hort.

P. balsamifera L. — Michx *fil.* Arb. amer. III, tab. 43;

Nouv. Duham. II, tab. 50. — America et Asia sept.

P. Tacamahaca Mill.

P. viminea Hort.

P. candicans Hort. (non *Ait.*).

var. suaveolens.

P. suaveolens Fischer.

— *viminalis.*

P. viminalis Lodd.

P. longifolia Pall. Fl. ross., tab. 41.

P. Lindleyana Hort. Booth.

P. salicifolia Hort.

SALIX Tourn. (1).**S. alba** L. — Fl. danica, XV, tab. 2552; Nouv. Duham. III.
tab. 26; Hoffm. Salic., tab. 7 et 8. — Sibiria.

S. nana argentea Hort.

S. Bradfordii Hort.

(1) J'ai suivi dans l'énumération des saules cultivés à Segrez la classification et la synonymie adoptées par M. Andersson dans sa *Monographia Salicum*.

- S. triandra** L. — *Anders.* Monogr. salic., p. 23, fig. 17;
Hoffm. Salic. tab. 9 et 10. — Europa.
S. amygdalina L. — *Host.* Salic., tab. 13-14.
S. Villarsiana *Flugge.*
S. Hoffmanniana *Smith.* Engl. bot., tab. 2620.
S. Hoppeana *Willd.* — *Rechb.* Fl. germ. XI, tab. 605.
S. androgyna *Hoppe.*
S. hastata *Thuil.* (non *Lin.*).
S. italica nigra *Hort.*
S. pomeranica *Hort.*
S. triandra nigra *Hort.*
- S. pentandra** L. — *Forbes*, Salic. woburn., tab. 34; *Anders.*
 Monogr., Salic. p. 39, fig. 24. — Europa.
- S. fragilis** L. — Fl. danica, XIV, tab. 2484. — Europa.
S. lanceolata *Hort.*
S. petiolaris *Hort.*
S. conformis *Hort.*
S. uliginosa *Hort.* (non *Willd.*).
var. latifolia.
S. monspeliensis *Forbes*, Salic. woburn., tab. 30.
S. excelsa *Tausch.*
- S. vitellina** L. — *Nouv. Duham.* III, tab. 27 bis.; *Host.* Sal.,
 tab. 30-31; *Hoffm.* Salic., tab. 11 et 12. — Sibiria.
 Vulg. *Osier jaune.*
- S. balylonica** L. — *Nouv. Duham.* III, tab. 27. *Anders.*
 Monogr. Sal., fig. 32. — Persia.
S. propendens *Ser.*
 Vulg. *Saule pleureur.*
var. annularis.
S. annularis *Forbes*, Salic. woburn., tab. 44.
- S. japonica** *Thunb.* Fl. jap., cum icon. — Japonia.
S. balylonica var. japonica *Anders.*
S. fragilis *Hort.* (non *Lin.*).
S. petiolaris *Hort.* (non *Smith.*).
S. decipiens *Hort.* (non *Hoffm.*).

S. aurita L. — *Forbes*, Salic. woburn., tab. 424; *Anders.* Monogr., Sal. fig. 43; *Hoffm.* Salic., tab. 4. — Europa, S. uliginosa Willd. — *Guimp.* Holzgew., tab. 190.

S. rugosa Ser.

S. ulmifolia Vill. (non *Hort. Par.*).

S. cinerea L. — *Nouv. Duham.* III, tab. 28 bis; Fl. danica, XV, tab. 2601. — Europa.

S. acuminata Ehrh. (non *Pall.*) — *Hoffm.* Salic., tab. 6.

S. incana Hort.

S. firma Hort.

var. rufinervis DC.

S. capræa L. — *Anders.* Monogr., Sal. fig. 45. — Europa.

S. tomentosa Ser. (non *Host.*, nec *Schrad.*).

S. hybrida Vill.

S. pallescens Hort.

Vulg. Saule marceau.

var. ulmifolia. *Hort. Paris.* — *Nouv. Duham.* III, tab. 25.

— nervosa.

— Kilmarnoki Hort.

— pendula.

S. repens L. — *Anders.* Monogr., Salic., fig. 64. — Europa.

S. arenaria L. — *Nouv. Duham.* III, tab. 30.

S. depressa *Hoffm.* Salic., tab. 15 et 16.

S. argentea *Smith.* Engl. bot., tab. 1364.

S. prostrata *Thuil.*

S. sericea Hort.

S. nigricans *Smith.* Engl. bot., tab. 1213. — Europa.

S. phylicifolia var. β *Lin.* — Fl. danica VI, tab. 1053.

S. stylosa DC.

S. stylaris Ser. — *Rehb.* Fl. germ., tab. 573.

S. — lancifolia Hort.

S. hastata *Hopp.* (non *Lin.*).

S. stipularis Hort.

S. tetrapla Hort.

S. phylicifolia *L.* — *Anders.* Monogr., Salic. fig. 70. — Suecia.

S. arbuscula *L.* — *Fl. danica* VI, tab. 4035.

S. bicolor *Ehrh.* — *Guimpel*, Holzgew, tab. 480.

S. formosa *Willd.* — *Rehb.* Fl. germ. XI, tab. 566.

S. nitens *Anders.* — *Forbes*, Salic. woburn., tab. 44.
var. Croveana *Ser.*

S. nigricans *Ser.* (non *Smith.*).

S. nigra elliptica *Ser.*

S. arbuscula *L.* — *Anders.* Monogr., Sal. fig. 80. — Europa.

S. laurina *Smith.* Engl. bot., tab. 1806. — Europa borealis.

S. bicolor *Smith.* — *Forbes*, Salic. woburn., tab. 38.
var. microcarpa *Anders.*

S. venusta *Hort.*

S. daphnoides *Vill.* — *Rehb.* Icones, Fl. germ., tab. 1253.
— Europa borealis.

S. bigemmis *Hoffm.* Salic., tab. 32.

S. præcox *Hopp.* — *Forbes*, Salic. woburn., tab. 26.

S. pomeranica *Willd.* — *Rehb.* Fl. germ. XI, tab. 602.

S. cinerea *Smith.* Engl. bot., tab. 1897.

S. capræa *Hort.* (non *Lin.*).

S. glauca *Hort.*

S. bicolor *Hort.* (non *Smith.*).

Vulg. *Saule bleu*, *Saule en candélabre*.

S. viminalis *L.* — *Nouv. Duham.* III, tab. 28; *Fl. danica* XIV, tab. 2485; *Hoffm.* Salic. tab. 2. — Europa.

S. longifolia *Lamk.* (non *Mhlbr.* nec *Host.*).

S. rosea *Hort.*

var. angustissima.

S. dasyclados *Wimm.* — Europa.

S. calodendron *Wimm.*

S. acuminata *Smith.* — *Forbes*, Salic. woburn., tab. 131.

S. Smithiana *var. acuminata* *Anders.*

S. stipularis *Smith.* Engl. bot., tab. 4244. — Fl. danica, XV. tab. 2668. — Europa.

S. viminalis var. *dasyclados* *Wimm.*

S. Hostii *Kern.*

var. *vestita.*

S. dasyclados *Hort.* (non *Wimm.*)

S. incana *Schrank.* — *Host.* Sal., tab. 58 et 59; *Forbes*, Sal. woburn., tab. 90. — Europa australis.

S. rosmarinifolia *Gouan.* (non *Lin.*).

S. angustifolia *Lapeyr.* — *Nouv. Duham.* III, tab. 29.

S. linearis *Forbes.* Salic. woburn. tab. 89.

S. riparia *Willd.* — *Host.*, Salic., tab. 58 et 59.

S. Seringeana *Gaud.* — *Rechb.* Icones Fl. germ. tab. 4229; *Coss.* Atlas tab. 31. — Helvetia.

S. lanceolata *Ser.* Saules, tab. I.

S. longifolia *Schleich.* (non *Mhlbr.* nec *Host.*).

S. holosericea *Ser.*

S. canescens *Willd.*

S. incano-capræa *Wimm.*

S. capræo-incana *Wimm.*

S. cinereo-incana *Wimm.*

S. microdentata *Hort.*

S. purpurea *L.* — Fl. danica, XV, tab. 2554. — Europa.

S. monandra *Hoffm.* Salic., tab. 4, 5 et 23.

S. carniolica *Hort.*

Vulg. *Osier rouge.*

var. *Lambertiana* *Anders.*

S. Lambertiana *Sm.* Brit. 1044. — *Forbes*, Sal. wob., t. 3-4.

S. pratensis *Scop.* — *Host.* Salic., tab. 50 et 41.

S. oppositifolia *Hort.*

S. mutabilis *Hort.*

— *helix* *Anders.*

S. helix *L.* — *Forbes*, Salic. woburn., tab. 2.

S. microphylla *Hort.*

S. americana pendula *Hort.*

Vulg. *Saule pleureur d'Amérique*

S. purpurea.

var. pallescens Anders.

S. pallescens Hort.

S. rubra *Huds.* — *Host. Sal.*, tab. 34 et 35. — Europa.

S. fissa Hoffm. Salic., tab. 43 et 44.

S. olivacea Thuil.

S. virescens Vill.

S. concolor Host. Salic., tab. 31 et 35.

S. mollissima Wahlenb.

S. Hoffmannia Tausch.

S. acuminata lanceolata Hort.

S. Basfordiana Hort.

S. betulæfolia Hort.

S. heterophylla Hort.

var. purpureoides latifolia Gren. et Godr.

S. Forbyana Smith. — *Forbes, Salic. woburn.*, tab. 5.

STIRPES MIHI IMPERFECTE NOTÆ

S. alaternoides *Forbes.*

S. ambigua *Ehrh. vel Pursh.*

S. Ammaniana *Willd.*

S. Amsoniana *Forbes.*

S. atrovirens *Forbes.*

S. attenuatifolia *Hort.*

S. aurea *Hort.*

S. aurantiaca *Hort.*

S. australis *Hils. et Boj.*

S. candida *Flugge.*

S. carpinifolia *Forbes.*

S. coccinea *Hort.*

S. cœrulea *Sm.*

S. conformis *Forbes.*

S. cordata *Muhl.*

- S. cotinifolia** Sm.
S. crassifolia Forbes.
S. damascena Forbes.
S. Dicksoniana Sm.
S. fagifolia Willd.
S. finmarkica Hartig. vel Wild.
S. Forsteria Sm.
S. germanica nigra Hort.
S. grisoniensis Forbes.
S. hastata ovalifolia Hort.
S. helvetica Vill.
S. hippophæfolia Auct. mult.
S. huntingdonia? Hort.
S. lacustris Forbes.
S. latifolia Forbes.
S. malifolia Sm. vel Bess.
S. nitens Anders.
S. obtuserrata Hort.
S. oleifolia Sm.
S. petræa Forbes.
S. prunifolia Host. vel Sm.
S. pirifolia Anders.
S. regalis Hort.
S. recurvata Pursh.
S. rivularis Forbes.
S. rotundata Hort.
S. Russeliana Forbes.
S. sanguinea Hort.
S. Seleichneriana Forbes.
S. septentrionalis Hort.
S. Sieboldiana Blume. — Anders. Monogr. Salic., tab. 47.
S. sordida Kern.

- S. spathulata** Willd.
S. tenuifolia Sm.
S. trepida Forbès.
S. triandra alba Hort.
S. — nigra Hort.
S. undulata Ehr. vel Forbes.
S. vallesia Hort.
S. varia, Host.
S. vaudensis Forbes vel Kern.
S. violacea Host. vel Andrews.

U L M A C E Æ

ULMUS Tourn.

- U. pedunculata** Foug. Mém. Ac. sc. par. 1787, tab. 12.
 — Europa orient.
 U. effusa Willd. — Hayne Darstell. III, tab. 17.
 U. major Smith. — Belg. hort. II, tab. 19.
 U. ciliata Ehrh. — Rehb. Fl. germ. XII, tab. 666.
U. americana Willd. — Michx fil. Arb. amer. III, tab. 4.
 — America septentrionalis.
 U. florida Chapman.
 var. pendula.
U. alata Michx fil. Arb. amer. III, tab. 5. — Carolina.
 U. americana var. alata Spach.
U. campestris L. — Smith. Engl. bot., tab. 1886; Nouv
 Duham. II, tab. 12. — Europa.
 var. angustifolia.
 U. minor Mill. — Rehb. Fl. germ. XII, tab. 660.

U. campestris.

var. antarctica.

— *aurea.* — Belg. hort. 1866, tab. 49 ; Illustr. hort. XIV, tab. 513.

— *belgica.*

— *Berardi.*

— *betulæfolia.*

— *carpinifolia.*

U. *carpinifolia* *Lindl.*

— *Clemmeri.*

— *concavæfolia.*

— *crispa* (*Webbiana*).

— *Dauvessi.*

— *Escaillardi.*

— *fastigiata.*

U. *suberosa fastigiata* *Hort. Audib.* (non *Desf.*).

— *foliis variegatis.*

— — *purpureis.*

— *lævis (glabra).*

U. *lævis* *Pall.*

U. *glabra* *Mill.* Engl. bot., tab. 2248.

U. *inæqualis* *Bosc.*

— *gracilis (virginalis).*

— — *monstrosa (microphylla pendula).*

— *horizontalis.*

— *incisa.*

— *microphylla.*

U. *pumila* *Pall.* Fl. ross. , tab. 48 (non *Lin.*)

— *modiolana.*

U. *tortuosa* *Hort.*

— *monstrosa.*

— *monumentalis.*

U. *pyramidalis* *Aliq. Hort.*

U. campestris.*var. pendula.*— *pubescens.*— *purpurascens* (purpurea).— *pyramidalis* Bertini.— *plumosa.*— *rubra.*— *sericea.*— *stricta* (cornubiensis) Vulg. *Orme d'Oxford.*— *virens.*— *virgata.* *U. virgata* Pépin. (non Wall. nec Roxb.).— *Weathley.*— *Werschaffelti.***U. suberosa** Ehrh. Engl. bot. XXXI, tab. 2461.*var. betulæfolia.*— *lanuginosa.*— *pendula.*— *pyramidalis.* *U. pyramidalis* Desf. (non Hort.).— *viscosa.***U. pumila** L. — Sibiria *U. microphylla* Pers. *U. parvifolia* Hort. (non Jacq.).**U. montana** Wither. — Smith Engl. bot., tab. 1887. — Eur *U. nuda* Ehrh. *U. cebennensis* Hort. Audub. *U. major* Rehb. Icon. Fl. germ., tab. 4563.*var. hollandica.* *U. hollandica* Mill. *U. campestris macrophylla* Spach. *U. campestris latifolia* Desf. *U. excelsa* Borkh — Rehb. Fl. germ. XII, tab. 665.

U. montana.*var. gigantea.*— *aureo-variegata.**U. latifolia aureo-variegata Hort.*— *horizontalis (pendula).**U. latifolia pendula Hort.*— *laciniata (Pitteursii).*— *oxoniensis.*— *pyramidalis (Dampieri).*— *triserrata.*— *tridens (superba).*— *macrophylla (fastigiata).*— *cinerea.**U. cinerea Hort. Andr. Leroy.*— *crispa.**U. crispa Willd.**U. urticæfolia Hort. Audib.**U. campestris crispa Desf.**U. campestris urticæfolia Hort.***U. fulva Michx.** — *America septentrionalis.**U. rubra Michx fil. Arb. amer. III, tab. 6.***U. parvifolia Jacq. (non Hort.). Hort. Schœnb. III, tab. 262.**— *China.**U. chinensis Desf. Dict. sc. nat., tab. 282.**Planera parvifolia Sweet.**Microptelea parvifolia Spach.**var. decidua (an species propria?).**U. sibirica Hort.***PLANERA J. F. Gmel.****P. aquatica J. F. Gmel.** — *America septentrionalis.**P. ulmifolia Michx. Arb. amer. III, tab. 7.**P. Gmelini L. C. Rich.*

ZELKOWA Spach.**Z. crenata** Spach. — Caucasus.

Planera crenata Desf. — Michx, Mém. Zelkow, (cum icon.).

Planera Richardii Michx. — Dunal, Descript. (cum Icon.).

Planera carpinifolia Wats. Dendr., brit. II, tab. 106.

Rhamnus carpinifolia Pall. Fl. ross. II, tab. 40.

var. repens.

Planera repens Hort.

Z. cretica Spach. — Créta.

Planera Abelicea Rœm. et Schultz.

Ulmus Abelicea Sibth. et Smith.

Z. acuminata Planc. in DC. Prodr. — Japonia.

Planera acuminata L.

P. japonica Miq.

P. dentata japonica Hort.

P. Kaki Reg.

P. Kiaki Hort.

Ulmus Keia-Ki Sieb.

CELTIDEÆ**CELTIS** Tourn.**C. australis** L. — Nouv. Duham, II, tab. 8. — Regio medit.

C. lutea Hort.

var. segreziensis.

C. occidentalis Hort. (non Lin.).

C. glabrata Stev. (non Spreng.). — Tauria merid.

C. Tournefortii Lamk. Encycl., tab. 844. — *Jaub. et Spach*
Illustr., tab. 400. — Regio. mediterr.

C. orientalis Mill. (non Lin.).

var. arbuscula.

C. pumila Hort.

-- *aspera.*

C. glabrata Hort. (non Stev.).

C. occidentalis L. — *Michx.* Arb. amer. III, tab. 8. — America
borealis.

C. cordata Hort. (non Desf.).

C. Audibertiana Hort. (non Spach).

var. pumila.

C. pumila Hort. Booth.

C. Audibertiana Spach. (Ex horto Fr. Audib.).

C. occidentalis cordata Hort. Audib.

C. cordata Hort.

C. crassifolia Lamk. — *Michx. fil.* Arb. amer. III, tab. 9. —
America borealis.

C. cordata Desf.

C. rugosa Hort. Paris.

C. mississipiensis Bosc. — America septentrionalis.

C. americana Hort. Paris.

C. lævigata Willd.

C. pumila Aliq. Hort. (non Booth).

C. Willdenowiana Schult. — China et Japonia.

C. sinensis Willd.

MOREÆ

MORUS Tourn.

M. nigra L. — Nouv. Duham. IV, tab. 22 ; Belg. hort. VI,
cum icon. — Italia.

var. laciniata,

- M. alba** *L.* — *Lamk.* Illustr., tab. 762, fig. 2. — Asia.
var. romana *Lodd.* — Gallia meridionalis.
 M. rosea italica *Hort.*
 M. alba rosea *Ser.*
 M. ovalifolia *Hort. Audib.*
— *macrophylla* *Lodd.* — Gallia meridionalis.
 M. Moretti *Hort. Audib.*
 M. alba Moretti *Ser.*
 M. alba Morettiana *Lodd.*
 M. Morettiana *Jacques.*
 M. alba Lhou *Ser.*
 M. patavina *Hort. Audib.*
 M. alba latifolia *Hort.* (non *Poir.*).
 M. hispanica *Hort.*
— *Tókwa* *Ed. Bureau* in *DC Prodr. XVII.* — *Lavall. Arb.*
 segrez, *Icones* tab. ined. — Japonia.
 M. Tokwa *Sieb.*
 M. japonica *Hort.*
— *Kaki.*
 M. Kaki *Hort.*
— *pyramidalis* *Ser.*
— *constantinopolitana latifolia.*
 M. constantinopolitana var. latifolia *Poir.*
 M. pumila latifolia *Hort.*
— *venosa* *Delile.*
 M. alba nervosa *Lodd.*
 M. fibrosa *Ser.*
 M. nervosa *Hort.*
— *indica nova* *Hort.*
— *laciniata*
 M. urticæfolia *Hort.*
— *Levasseurei.*
 M. Levasseurei *Hort.*

M. alba.

- var. *latifolia* Bureau in DC. Prodr. XVII. — China.
M. multicaulis Perrot. — Ann. de From. 1829, tab. 3.
M. alba multicaulis Loud.
M. intermedia Perrot. — Guilem. Arch. de bot. I, tab. 7.
M. tatarica Desf. — Pall. Fl. ross. tab. 52.
M. cucullata Bonaf.
M. bullata Balb.
M. alba sinensis Bosc.
M. sinensis Hort.
M. chinensis Lodd.
Vulg. *Mûrier des Philippines; Mûrier Lou.*

M. rubra L. — Michx fil. Arb. amer. III, tab. 10. — Amer. sept.

- M. canadensis* Lamk.
M. virginica Pluck.
M. pensylvanica Noir.
M. missouriensis Hort. Audib.
M. caroliniana Hort.
var. *incisa*.
M. scabra Willd.
M. rubra scabra Loud.
— *macrophylla* (an species propria?).
— *membranacea*.
M. membranacea Hort.
— *cedrona*.

BROUSSONETIA Vent.**B. papyrifera** Vent. Ann. Mus. VIII, tab. 34. — Nouv.

Duham. II, tab. 7. — China et Japonia.

Papyrius japonica Poir.

Morus papyrifera L. — Kämpf. Amœnit. p. 472, cum Icon.

var. *nana* Bureau in DC. Prodr. XVII.

Broussonetia nana Hort.

B. papyrifera.

var. cucullata.

B. cucullata Hort.

B. spathulata Hort.

B. navicularis Lodd.

B. navifolia Hort. (sic !).

— *ficifolia.*

— *laciniata.*

B. dissecta Hort.

— *macrophylla (integrifolia).*

B. nova species Hort.

— *variegata.*

B. Kämpferi Sieb. — Japonia.

Papyrus spuria Kämpf. Amœn. p. 472, cum Icon.

B. Kasinoki Sieb. — Japonia.

B. papyrifera var. Kämpferi Aliq. Hort.

MACLURA Nutt.

M. aurantiaca Nutt. North-Amer. sylv. I. tab. 37 et 38. —

Lamb. Pinus, tab. 3. — Louisiana.

Vulg. Bois d'Arc; Oranger des Osages.

var. calcar-galli.

M. calcar-galli Hort.

— *marmorata.*

— *variegata.*

ARTOCARPEÆ**FICUS** Tourn.

F. Carica L. — *Lamk. Encycl., tab. 861; Nouv. Duham. IV,*

tab. 53-59. — Europa australis et Africa borealis.

Varietates hortenses diversæ.

- F. hirta** *Roxb.* — *Wight*, Icones pl. Ind. or. II, tab. 672. — China et Japonia.
F. stipulata *Thunb.* — *Wendl.* Coll., tab. 72. — China et Japonia.
var. minima.
F. minima Hort.
F. erecta *Thunb.* — *Kæmpf.* Icon. Plant. Jap. tab. 4. — Japon.
F. japonica Blum.
var. foliis laciniatis.
 — — *lanceolatis.*
 — — *ovatis.*

CUDRANIA Trécul.

- C. tricuspidata** *Bureau*, Mss. in Herb. Paris. — China.
Maclura tricuspidata Carr. Rev. hort. 1864, fig. 37.

CASUARINEÆ

CASUARINA Rumph.

- C. equisetifolia** *Forst.* Gen. pl. austr., p. 103, fig. 52. —
Lamk. Illustr., tab. 746. — Africa et Asia.

GNETACEÆ

EPHEDRA Tourn.

- E. altissima** *Desf.* Fl. atl. II, tab. 253. — Africa borealis.
E. vulgaris *Rich.* Conif., tab. 4. — Eur. austr. et orient.
E. distachya L. — *Lamk.* Encycl., tab. 830, fig. 2.
E. monostachya L. — *Lamk.* Encycl., tab. 830, fig. 4 ;
Wats. Dendr. brit. II, tab. 442.

CONIFERÆ

ARAUCARIA Juss.

A. imbricata Pav. — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 45. —
Chili.

Pinus Araucana *Molin.*

Dombeya chilensis *Lamk.*

Columbea quadrifaria *Salisb.*

Quadrifaria imbricata *Manett.*

Abies chilensis *Mirb.*

A. Dombeyi *Rich.*

A. araucana *Poir.*

Colymbea imbricata *Carr.*

var. *columnaris.*

— *distans.*

— *dumosa.*

DAMMARA Rumph.

D. australis *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 44. — *Ndn.* Fl. des
serres XI, p. 75, cum Icon. — Nova Hollan-
dia.

PINUS Linn.

SECT. PINASTER.

P. sylvestris L. — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 4; — *Rich.*
Conif., tab. 44; *Nouv. Duham.* V, tab. 66. — Eu-
ropa.

P *vulgaris genevensis* *Bauhin.*

P. sylvestris.

var. hagenensis (argentea). — Vulg. *Pin de Hagueneau*.

P. rubra Mill. — Nouv. Duham. V, tab. 67, fig. 4.

P. scotica Willd.

P. horizontalis Hort.

P. hagenensis Hort. — Loud. Encycl. of tr. fig. 953.

P. scariosa Lodd.

P. tortuosa Hort.

— *rigensis*.

P. sylvestris Lo's. Nouv. Duham. V, tab. 66.

P. genevensis Hort.

P. rigensis Hort.

— *fastigiata* (pyramidalis).

— *nana* (pygmæa).

— *pendula*.

— *tortuosa*.

— *spiralis*.

— *monophylla* (non *P. monophylla* Torr.).

— *conglomerata*.

P. montana Du Roy. — Styria.

P. tatarica Mil'.

P. sylvestris montana Ait.

P. sanguinea La Peyr.

P. humilis Link.

P. rotundata Link. — Hayne XIV, tab. 40.

P. Fischeri Hort. Booth.

P. pumilio Hænk. — Waldst. et Kit. Plant. hung. II, tab. 149.

— *Europa australis*.

P. carpathica Hort.

P. Mugho Scopol. (non Poir.).

P. Mugho Poir. (non Scopol.). — Nouv. Duham. V, tab. 68.

— *Europa australis*.

P. sylvestris Mugho Gord

P. uncinata Ram. — Ant. Conif., tab. 3, fig. 3

P. Pinaster *Soland.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 9 et 40;
Ant. Conif., tab. 6; *Lawson*, Pinet., brit., tab. 28 et
 29. — Europa australis.

P. maritima *Poir.* (non *Lamb.*). — *Nouv. Duham.* V,
 tab. 72.

P. nepalensis *Royle et Hort.*

P. japonica *Hort.*

P. chinensis *Knight.* (non *Lamb.*).

var. contorta.

— *Hamiltoni* *Lindl.*

P. Hamiltoni *Ten.*

— *Lemoniana* *Endl.*

P. Lemoniana *Benth.*

— *catenaria.*

— *longifolia.*

— *major.* — *Vulg. Pin de Corte.*

— *minor.* — *Vulg. Pin à trochet.*

P. resinosa *Soland.* (non *Loisel.*). — *Lamb.* Pinus, ed. 1,
 tab. 44. — America borealis.

P. rubra *Michx fl. Arb. amer.* 1, tab. 4.

P. Laricio *Poir.* — *Nouv. Duham.* V, tab. 67 et 74. —
 Europa australis.

P. Poiretiana *Hort.*

P. corsica *Hort.*

P. altissima *Hort.*

var. caramanica *Spach.* — Europa orientalis.

P. caramanica *Hort.*

P. taurica *Hort.*

P. romana *Hort.*

P. Pallasiana *Lamb.*

P. Laricio var. Pallasiana *Endl.*

— *monspeliensis* *Hort.*

P. monspeliensis *Saltzm.*

P. pyrenaica *Aliq. Hort.* (non *Lapeyr.*).

P. Saltzmani *Dunal.*

P. Laricio.

- var. calabrica* (stricta).
- *pyramidata Carr.*
- *Bujoti Carr.*
- P. sylvestris Hort.*
- *pygmæa Rauch.*

P. austriaca Hoss. — Europa.

- P. Laricio var. austriaca Endl.*
- P. nigricans Host.*
- P. nigra Link.*
- P. dalmatica Vis.*
- P. magellensis Guss.*
- P. Fenzlii Kotsch. et Ant.*
- P. Heldreichii Christ.*

P. pyrenaica Lapeyr. — Europa australis.

- P. pseudo-halepensis Dehenht.*
- P. Paroliniana Webb.*

P. halepensis Ait. — Mill. Icones, tab. 216; Lamb.

- Pinus*, ed. 2, tab. 7; *Nouv. Duham.* V, tab. 70.
- *Regio mediterr.*

- P. hierosolimitana Duham.*
- P. genuensis Cook.*

var. abasica.

- P. abchasica Fisch.*
- P. abasica Carr.*

— *Pithyusa.*

- P. Pithyusa Strangw.*
- P. maritima Lamb.* *Pinus*, ed. 2, tab. 6. (non *Poir.*).
- P. Brutia Ten.* *Fl. napol.* V, tab. 200.

— *rotunda.***P. Loiseleuriana Carr. — Patria ignota.**

- P. resinosa Loisel.* *Nouv. Duham.* V, tab. 77. (non *Sotland.*).
- P. resinosa d'Alfort Hort.*

- P. densiflora** Sieb. et Zucc. Fl. jap. II, tab. 112. — Japonia.
P. rubra Sieb. (non Michx).
- P. Thunbergi** Parlat. in DC. Prodr. XVI. — Japonia.
P. Massoniana Sieb. et Zucc. Fl. jap. II, tab. 113 et 114. (non Lamb.).
- P. Massoniana** Lamb. Pinus, ed. 2, tab. 8. (non Sieb. et Zucc.). — China.
- P. persica** Strangw. — Persia australis.
- P. Pinea** L. — Nouv. Duham. V, tab. 72 et 73; Lamb. Pinus, ed. 2, tab. 6-8. — Regio mediterr.
P. maderensis Ten.
P. aracanensis Hort. brit.
P. Pinea chinensis Hort.
P. — americana Hort.
Vulg. *Pin à Parasol*.
- P. contorta** Dougl. — Loud. Encycl. of. trees, f. 1815-1816.
— America occidentalis.
P. Boursieri Carr. Rev. hort. 1854, cum Icon.
P. Mac-Intoshiana Laws.
- P. hudsonica** Poir. — America borealis.
P. rupestris Michx fl. Arb. amer. I, tab. 2.
P. Banksiana Lamb. Pinus, ed. 2, tab. 3. — Nouv. Duham. V, tab. 67.
- P. inops** Soland. — Lamb. Pinus, ed. 2, tab. 44; Michx fl. Arb. amer. I, tab. 4; Nouv. Duham. V, tab. 69, fig. 2. — America borealis.
P. virginiana Mill.
P. variabilis Lamb. Pinus, ed. 2, tab. 46. (non Pursh).
P. ruthenica Hort.
Vulg. *Pin chétif* ; *Pin pauvre*.
- P. pungens** Michx fl., Arb. amer. I, tab. 5. — Lamb. Pinus, ed. 2, tab. 47; Nouv. Duham. V, tab. 67, fig. 4. — America borealis.

- P. mitis** *Michx fil.*, Arb. amer. I, tab. 3. — *Ant. Conif.*, tab. 5. — America septentrionalis.
P. variabilis Pursh. (non *Lamb.*). — *Nouv. Duham. V*, tab. 69, fig. 2.
P. echinata Mill.
- P. monophylla** *Torr. et Frem.* Rep. Exped. to Rocky Mount., tab. 4. — *Laws. Pinet. brit. fasc. 3*, cum Icon. — California.
P. Fremontiana Endl. — *Journ. hort. soc. IV*, tab. 294.
P. Llaveana Hartw. (non *Schied.*)
- P. muricata** *Don.* — *Lamb. Pinus*, ed. 2, tab. 84. — California.
P. Murrayana Balf.
P. Edgariana Hartw.

SECT. TÆDA.

- P. Gerardiana** *Wall.* — *Lamb. Pinus*, ed. 2, tab. 65; *Royle, Illustr.*, tab. 85. — Himalaya.
P. Aucklandii Ludd.
- P. Sabiniana** *Dougl.* — *Lamb. Pinus*, ed. 2, tab. 7; *Fl. des serres IX*, cum Icon.; *Nutt. North-amer. sylv. II*, tab. 413; *Laws. Pinet. brit.*, fasc. 2, cum Icon. — California.
var. reptans.
- P. Coulteri** *Don.* — *Lamb. Pinus*, ed. 2, tab. 8; *Ant. Conif.*, tab. 12 et 13. — California.
P. macrocarpa Lindl.
P. Sabina Coulteri Loud. *Encycl. fig. 4839-41.*
- P. australis** *Michx fil.* Arb. amer. I, tab. 4. — *Nouv. Duham. V*, tab. 75, fig. 3. — Florida et Louisiana.
P. palustris Mill. — *Lamb. Pinus*, ed. 2, tab. 24;
var. excelsa Loud.
P. lutea Hort. Makoy.

- P. Jeffreyi** *Murr.* Not. Califor. trees II, tab. 6 et 7. —
Laws. Pinet. brit. fasc. 5, cum Icon. — California.
P. Jeffreyana *Hort.*
- P. Tæda** *L.* — *Michx* *fil.* Arb. amer. I, tab. 9; *Laws.* Pinet.
 brit., fasc. 18. — *Nouv. Duham.* V, tab. 73, fig. 2.
 — Virginia.
- P. serotina** *Michx* *fil.*, Arb. amer. I, tab. 7. — *Lamb.*
Pinus, ed. 2, tab. 18; *Nouv. Duham.* V, tab. 73,
 fig. 4. — Pensylviana.
- P. rigida** *Mill.* — *Michx* *fil.* Arb. Amer. I, tab. 8; *Lamb.*
Pinus, ed. 2, tab. 19 et 20; *Nouv. Duham.* V, tab. 74.
 — America borealis.
P. Fraseri *Lodd.* (non *Pursh*).
P. Loddigesii *Loud.*
P. Tæda rigida *Ait.*
- P. tuberculata** *Don.* — *Lamb.* *Pinus*, ed. 2, tab. 83;
Laws. Pinet. brit., fasc. 9, cum Icon. — California.
P. californica *Hartw.* (non *Lois.*).
- P. insignis** *Dougl.* — *Ant.* Conif., tab. 8, fig. 1. — *Laws.*
 Pinet. brit., fasc. 19, cum Icon. — California.
P. montereyensis *Rauch.*
P. californica *Hort.* (non *Hartw.*, nec *Loisel.*).
var. macrocarpa.
P. radiata *Don.* — *Fl. des serres* VI, p. 44, cum Icon.
- P. ponderosa** *Dougl.* in *Loud.* Arbor., fig. 2132-2137. —
Forbes, Pinet. Wob., tab. 15. — America borealis.
P. Sinclairiana *Hook.* et *Arn.* in *Beechey*, tab. 93.
P. nootkænsis *Manetti.*
P. Craigiana *Hort.*
P. Beardsleyi *Murr.*
P. Parryana *Gord.*
- P. Benthamiana** *Hartw.* *Journ. Hort. soc.* I, tab. 236. —
Fl. des serres VI, cum Icon. — America boreali-
 occidentalis.

- P. Teocote** *Cham. et Schecht.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 62. — Mexico.
P. *Vilmoriniana* *Ræzl.*
P. *Besseriana* *Ræzl.*
P. *Mulleriana* *Ræzl.*
P. *microcarpa* *Ræzl.* (non *Don.*).
P. *Hugeli* *Ræzl.*
P. *Galocote* *Ræzl.*
P. *interposita* *Ræzl.*
- P. patula** *Schied. et Depp.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 61. — Mexico.
P. *subpatula* *Ræzl.*
- P. sinensis** *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 53. (non *Knight.*).
— *Ant.* Conif., tab. 4; *Forb.*, Pinet. Woburn., tab. 12. — China.
P. *nepalensis* *Forb.*
P. *Cavendishiana* *Hort.*
- P. cembroides** *Zucc.* — *Journ. hort. soc.* I. tab. 236; Fl. des serres IV, tab. 33. — Mexico.
P. *edulis* *Carr.* (non *Engelm.*).
P. *Llaveana* *Schiede et Depp.* (non *Torr.*). — *Forbes* Pinet. Woburn., tab. 17; *Loud.* Encycl., fig. 1858.
P. *fertilis* *Ræzl.*
P. *osteosperma* *Engelm.*
- P. edulis** *Engelm.* (non *Carr.*). — *Torr.* in *Sitgreaves*. Report, tab. 20. — Nev. Mexico.
- P. Bungeana** *Zucc.* in *Endl.* Conf. p. 166. — China borealis.

SECT. PSEUDO-STROBUS.

- P. Montezumæ** *Lamb.* Pinus, ed. 3, tab. 22. — *Ant.* Conif., tab. 17. — Mexico.

P. Hartwegii *Lindl.* — Mexico.

- P. amecaensis* *Rætz.*
- P. atrovirens* *Rætz.*
- P. corrugata* *Rætz.*
- P. Ehrenbergii* *Endl.*
- P. Endlicheriana* *Rætz.*
- P. frondosa* *Rætz.*
- P. Geitheri* *Rætz.*
- P. Iztachihuatti* *Rætz.*
- P. Krelagi* *Rætz.*
- P. Montezumæ* *Gord.* (non *Lamb.*).
- P. longifolia* *Rætz.* (non *Roxb.*).
- P. Lowii* *Rætz.*
- P. Papelei* *Rætz.*
- P. resinosa* *Rætz.* (non *Lois.*, nec *Solard.*).
- P. robusta* *Rætz.*
- P. scoparia* *Rætz.*
- P. Standishii* *Rætz.*
- P. suffruticosa* *Rætz.*
- P. tlamacensis* *Rætz.*

P. aristata *Engelm.* *Trans. Ac. Sc. Saint-Louis* II, tab. 5-6.
— *America borealis.***P. rudis** *Endl.* — Mexico.**P. Parryana** *Engelm.* — California.

- P. Llavecara* *Torr. Bot. Bound.*, tab. 53 (non *Schied. et Depp*).
- P. quadrifolia* *Parry.*

SECT. CEMBRA.

P. Cembra *L.* — *Lamb. Pinus*, ed. 2, tab. 23; *Nouv. Duham.* V, tab. 17, fig. 4; *Laws. Pinet. brit.* fasc. 16, cum Icon. — Europa.

- P. montana* *Lamk.* (non *Duroi*, nec *Baum.*).
- P. Cembra communis* *Endl.*
- Vulg. *Cembro*, *Alviez.*

P. Cembra.

var. pumila *Pall.* Fl. ross. I, tab. 2.

P. pygmæa *Fisch.*

P. Cembra nana *Hort.*

P. Cembra pygmæa *Hort.*

— *mandshurica.*

P. mandshurica *Reg.* — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 47,
cum Icon.

P. flexilis *James.* — *Nutt.* North-Amer. sylv. II, tab. 412. —
Nov. Mexico.

P. Lambertiana *var. β.* *Hook.*

P. albicaulis *Engelm.*

P. Shasta *Curr.* Conif., ed. 2.

P. parviflora *Sieb. et Zucc.* Fl. jap. II, tab. 443. —
Japonia.

P. Cembra *Thunb.* (non *Lin.*).

P. Koraiensis *Sieb. et Zucc.* Fl. jap. II, tab. 446. —
Koraia et Kamtschatka.

P. Strobis *Thunb.* (non *Lin.*).

SECT. STROBUS.

P. excelsa *Wall* — *Lamb* Pinus, ed. 2, tab. 26; *Laws.* Pinet.
brit. fasc. 24, cum Icon. — Nepalia.

P. Strobis excelsa *Loud.* Encycl. of trees, f. 1915.

P. Strobis argentea *Hort.*

P. Strobis pendula *Hort.*

P. pendula *Griff.*

P. nepalensis *De Ciambr.*

P. Chylla *Lodd.*

P. Dicksoni *Hort.*

Vulg. *Pin pleureur.*

var. Peuce.

P. Peuce *Griseb* — Grecia.

P. Cembra fruticosa *Griseb.*

P. monticola *Dougl.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 67, cum Icon. — California.

P. Strobis *var. monticola* *Nutt.*

P. nivea *Hort.*

P. Strobis *L.* — *Michx. fil.*, Arb. amer. I, tab. 40; *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 35; *Nouv. Duham.* V, tab. 76. — America septentrionalis.

Vulg. *Pin du Lord*; *Pin du Lord Weymouth.*

var. nana (*brevifolia*).

P. Strobis *compressa* *Hort. Booth.*

— *pyramidata.*

— *tabulæformis* (*umbraculifera*).

— *alba* (*nivea, argentea*).

— *variegata.*

— *viridis.*

— *Veitchei.* *Hort.* (non *Rœtz*).

P. Ayacahuite *Ehrenb.* — *Loud.* Encycl. of trees, fig. 4919. — Mexico.

P. strobiformis *Engelm.*

P. Veitchei *Roetz.*

P. Loudoniana *Gord.*

P. Verschaffeltii *Roetz* — Mexico.

P. Lambertiana *Dougl.* — *Nutt.* North-Amer. sylv. II, tab. 444; *Laws.* Pinet. brit. fasc. 2, cum Icon. — America boreali-occidentalis.

ABIES Link.

A. bracteata *Hook et Arn.* — *Hook.* Icones, tab. 379; Bot. mag., tab. 4740; *Nutt.* North.-Amer. sylv. II, tab. 448; Fl. des serres IX, tab. 899. — California.

Picea bracteata *Loud.* Arbor. brit. IV, fig. 2256.

Pinus bracteata *Don.* — *Laws.* Pinet. brit. tab. 43 et 47, cum Icon; *Lamb.* Pinus, ed. 3, tab. 9.

A. nobilis *Lindl.* — *Nutt.* North-Amer. sylv. II, tab. 447.

— California et Oregonia.

Picea nobilis *Loud.* Arbor. brit. IV, fig. 2249-2250.

Pinus nobilis *Dougl.* — *Lamb.* *Pinus*, ed. 3, tab. 74;

Laws. Pinet. brit., fasc. 4, cum Icon.

var. glauca.

— *robusta.*

A. amabilis *var. Nutt.*

A. amabilis *Hort. brit.* (non *Forbes*).

Picea magnifica *Hort. brit.* (non *Murray*).

A. Fraseri *Lindl.* — *Nutt.* North.-Amer. sylv. II, tab. 99.—

America borealis.

Picea Fraseri *Loud.* Arbor. brit., fig. 2243-2244.

Pinus Fraseri *Pursh.* — *Lamb.* *Pinus*, ed. 3, tab. 42.

var. glauca (cærulea).

A. balsamea *var. nana* *Hort.* (non (*Mill.*)).

— *hudsonica* (prostrata).

A. hudsonia *Bosc.*

A. Hudsoni *Hort.*

Picea balsamea prostrata *Knight.*

A. religiosa *Schlecht.* — Mexico.

A. hirtella *Lindl.*

Picea religiosa *Loud.* Arbor. brit. IV, fig. 2257.

P. hirtella *Loud.*

Pinus religiosa *H. B. K.* — *Ant. Conif.*, tab. 28, fig. 2.

P. hirtella *H. B. K.*

var. glaucescens.

A. glaucescens *Roelz.*

A. pectinata *DC.* — *Nouv. Duham.* V. tab. 81; *Rich. Conif.* tab, 46. — *Europa media.*

A. alba *Mill.*

A. taxifolia *Desf.*

A. vulgaris *Poir.*

A. candicans *Fisch.*

A. argentea *De Chambr.*

Picea pectinata *Loud.* *Arbor. brit.* IV, fig. 2237-2239.

Pinus Picea *L.* — *Lamb. Pinus*, ed. 2, tab. 32.

P. pectinata *Lamk.*

P. Abies *Du Roi.*

Vulg. Sapin de Normandie, Sapin argenté.

var. columnaris *Carr.*

A. taxifolia pyramidalis *Hort.*

— *brevifolia.*

A. taxifolia brevifolia *Hort.*

— *laxa.*

— *nana* (*prostrata*).

— *pendula.*

— *pyramidalis* *Carr.*

— *stricta.*

A. metensis *Hort.*

A. Nordmanniana *Spach.* — *Caucasus.*

A. candicans *Fisch.*

A. pectinata leioclada *Link.*

A. Picea leptoclada *Lindl.*

Picea Nordmanniana *Loud.* *Encycl. of trees*, fig. 1950.

P. pectinata leioclada *Gord.*

Pinus Nordmanniana *Stev.* *Bull. soc. nat. Mosc.* 1838, tab. 2. — *Ant. Conif.*, tab. 28, fig. 2.

P. leioclada *Stev.*

P. Abies *Parlat.* in *DC. Prodr.* XVI, p. 424.

var. compacta (*nana*).

A. cephalonica *Link.* — *Forbes* Pinet. Woburn., tab. 42. —

Oriens.

A. Apollinis *Link.*

A. Reginae Amaliæ *Heldr.* in *Regel*, Gartenfl.

A. Monte-Draco *Hort.*

A. Panachaica *Heldr.*

A. peloponesiaca *Haage.*

A. Luscombeana *Hort.* in *Loud.* Arbor. brit.

Picea cephalonica *Loud.* *Encycl. of trees*, fig. 1940-1946; *Laws.* Pinet. brit., fasc. 3, cum Icon.

P. Apollinis *Ant.* — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 3, cum Icon.

Pinus cephalonica *Endl.* — *Ant.* Conif., tab. 27 fig. 1.
var. acicularis.

A. acicularis *Maxim.*

A. cilicica *Heuzé*, *Rev. hort.* 1836 p. 81. — *Fl. des serres* XI, p. 67, cum Icon. — *Taurus.*

A. Tchugatskoi *Laws.*

A. Rinzi *Hort.*

Picea cilicica *Rauch.*

Pinus cilicica *Ant.* et *Kotsch.*

P. Tchugatskoi *Fisch.*

A. firma *Sieb.* et *Zucc.* *Fl. jap.*, tab. 407. — *Japenia.*

A. bifida *Sieb.* et *Zucc.* *Fl. jap.*, II, tab. 409.

Picea firma *Gord.*

P. bifida *Hort. brit.*

Pinus firma *Ant.* Conif., tab. 27 bis.

P. bifida *Ant.* Conif., tab. 31, fig. 2.

A. brachyphylla *Maxim.* — *Japonia.*

Picea brachyphylla *Gord.*

Pinus brachyphylla *Parlat.* in *DC.* *Prodr.* XVI, p. 424.

A. balsamea Mill. — *Rich.* Conif., tab. 16; *Nouv. Duham.* V, tab. 83, fig. 2. — America boreali-orientalis.

A. balsamifera Michx fil. Arb. amer. I, tab. 44.

Pinus balsamea Loud. Arb. brit., fig. 2240-2241.

P. balsamea L. — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 33.

Vulg. *Sapin Baumier; Baumier de Gilead.*

var. nana (tenuifolia).

— *longifolia.*

A. Pinsapo Boiss. Voy. Esp., tab. 167-169. — Fl. des serres, XIV, tab. 1437-1438. — Hispania.

Picea Pinsapo Loud. Encycl. of trees, fig. 1947-1948.

— *Laws.* Pinet. brit. fasc. 3, cum icon.

Pinus Pinsapo Boiss. — *Ant.* Conif., tab. 26.

var. fastigiata (pyramidata).

— *concolor.*

— *glauca.*

— *aurea.*

A. numidica De Lannoy. Rev. Hort. 1866, p. 106. — Mauritan.

A. baborensis Coss.

A. Pinsapo var. baborensis Coss. Bull. soc. bot. 1866, p. 607.

Picea numidica R. Smith.

A. Tschonoskiana Reg. Ind. sem. Hort. Petrop. 1865, p. 32.

A. amabilis Forbes, Pinet. Wob., tab. 44 (non *Hort.*). —

America boreali-occidentalis.

Picea amabilis Loud. Arbor. brit. IV, fig. 2247-2248.

Pinus amabilis Dougl. — *Ant.* Conif., tab. 24, fig. 2.

var. magnifica.

A. magnifica Murr. (non *Hort.*).

Picea magnifica Gord.

— *macrocarpa Rætz.*

A. bifolia Murr. — Colorado.

Pinus amabilis Parlat. (pro parte). in *DC*, Prodr. XVI, p. 425, (non *Dougl.*).

A. Gordoniana Carr. — California.

A. grandis *Hort.* (non *Lindl.*).

Picea grandis *Lobb.* (non *Loud.*).

P. Lowiana *Gord.*

P. Parsonsii *Hort.*

P. Lowii *Hort. brit.*

Pinus grandis *Parlat.* Prodr. XVI, p. 427 (non *Dougl.*).

Abies grandis de Vancouver *Hort.*

A. species de Vancouver *Hort.*

A. Veitchii *Henk. et Hochst.* — Japonia.

Picea Veitchii *Lindl.*

Pinus selenolepis *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 427.

A. Pindrow *Spach.* — Himalaya.

A. chiloensis *Hort.*

A. himalayensis *Hort.*

Picea Pindrow *Loud.* Arbor. brit. IV, fig. 2214.

P. Naphta *Knight.*

Pinus Pindrow *Royle* Himalaya, tab. 36. — *Lamb.*

Pinus, ed. 3, tab. 92.

A. grandis *Lindl.* — *Forbes*, Pinet. Wob., tab. 43. — California.

Picea grandis *Loud.* Arbor. brit., fig. 2245.

Pinus grandis *Dougl.* — *Lamb.* *Pinus*, ed. 2, tab. 77.

var. lasiocarpa.

A. lasiocarpa *Lindl.*

Picea lasiocarpa *Hort.*

Pinus lasiocarpa *Hook.*

P. amabilis *Parlat.* (pro parte). in *DC.* Prodr., p. 426 (non *Dougl.*).

A. concolor *Lindl.* — Novo Mexico.

Picea concolor *Gord.*

Pinus concolor *Engelm.*

var. violacea *Röhlz.*

A. Webbiana *Lindl.* — *Forbes*, Pinet. Wob., tab. 41. — Himalaya.

A. densa *Griffith*.

A. spectabilis *Spach*.

A. chilrowensis *Hort*.

Picea Webbiana *Wall.* — *Loud.* Arb. brit. IV. fig. 2254-2253; *Lamb.* Pinus, ed. 3, tab. 44.

P. striata *Hamilt.*

P. tinctoria *Webb*.

P. spectabilis *Hort*.

A. sibirica *Ledeb.* — Illustr. hort., tab. 500. — *Rossia borealis et Sibiria*.

A. Pichta *Forbes*, Pinet. Wob., tab. 37.

Picea Pichta *Loud.*, Encycl. of trees, fig. 1951.

Pinus sibirica *Turcz.* — *Ant.* Conif., tab. 24, fig. 4.

P. Pichta *Fisch*.

§ PICEA.

P. alba *Michx fil.*, Arb. amer. I, tab. 12. — *Nouv. Duham.* V, tab. 81, fig. 2; *Forbes*, Pinet. Woburn., tab. 33. — *America borealis*.

A. canadensis *Mill.* (non *Michx*).

A. Tschugatskoye *Hort*.

Picea alba *Link*.

Pinus alba *Ait.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 26.

P. laxa *Ehrh*.

P. glauca *Mærch*.

Vulg. *Sapinette blanche*.

var. cærulea (glauca).

A. cærulea *Forbes*.

Picea cærulea *Link*.

Vulg. *Sapinette bleue*.

— *echinoformis* (minima).

A. alba.

var. fastigiata.

— *nana* (prostrata).

A. rubra *Poir.* — *Loud. Arbor. brit.*, fig. 2248; *Forbes*,
Pinet. Wob., tab. 35. — *America borealis.*

A. nigra var. rubra Michx fil.

A. arctica Cunningham.

A. rubra californica Hort.

Picea rubra Link.

Pinus rubra Lamb. Pinus, ed. 2, tab. 28.

Vulg. *Sapinette rouge.*

A. nigra *Michx fil. Arb. amer. I*, tab. 44. — *Nouv. Duham. V.*
tab. 81, fig. 4. — *America borealis.*

A. mariana Mill.

A. denticulata Poir.

Picea nigra Link.

Pinus nigra Ait. — *Lamb. Pinus*, ed. 2, tab. 29.

P. marylandica Hort.

Vulg. *Sapinette noire.*

var. Doumeti Carr.

— *pendula.*

— *pumila* (fastigiata).

— *pyramidata.*

A. Menziesii *Loud. Arbor. brit. IV*, fig. 2232. — *Forbes*,
Pinet. Wob., tab. 32. — *California septentrionalis*
et *Japonia.*

A. ajanensis Lindl. et Gord.

A. Merkiana Fisch.

A. jezoensis Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 410., (non
Lindl.).

Picea Menziesii Nutt. North-amer. sylv. II, tab. 416.

P. ajanensis Fisch.

P. jezoensis Carr.

P. sitkensis Carr.

Pinus Menziesii Lamb. Pinus, ed. 2, tab. 74.

P. jezoensis Ant. Conif., tab. 37.

A. microsperma *Lindl.* — *Murr. fil.* Pin. and Fires of Jap. fig. 429-436. — Japonia.

Picea microsperma Carr.

A. Morinda *Nelson.* — Himalaya.

A. Smithiana Forbes. Pinet. Wob., tab. 30.

A. Khutrow Loud. Encycl. of trees fig. 4731.

A. Thunbergii Gord.

A. spinulosa Griffith.

Picea Morinda Link.

P. Khutrow Carr.

Pinus Smithiana Lamb. Pinus, ed. 2, tab. 70.

P. Khutrow Royle, Himal. tab. 84, fig. 1.

P. Morinda Hort.

A. polita *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 444. — Japonia.

A. Torano Sieb.

Picea polita Carr.

Pinus polita Ant. Conif. tab. 36, fig. 1.

A. Engelmanni *Parry.* — Nov. Mexico.

A. nigra Engelm.

Picea Engelmanni Engelm.

P. commutata Ræzl.

Pinus commutata Parlat. in *DC.* Prodr. XVI, p. 417.

A. Alcoquiana *Veitch.* — Journ. of hort. 1862, cum Icon.
— Japonia.

A. Maximowiczii Rob. Neum.

A. bicolor Hort.

Picea Alcoquiana Carr.

Pinus Alcoquiana Parlat. in *DC.* Prodr. XVI, p. 417.

P. bicolor Maxim.

P. Maximowiczii Reg. Id. sem. Hort. Petrop. 1863,
p. 33.

A. calicularis *Hort. Sieb.* — Japonia.

Picea calicularis Hort.

Pinus calicularis Maxim.

A. excelsa DC. — Nouv. Duham. V, tab. 80; *Laws.* Pinet. brit. fasc. 26, cum Icon. — Europa.

A. *Picea* Mill.

A. *gigantea* Hort.

A. *carpathica* Hort. — *Laws.* Pinet, brit. fasc. 27, cum Icon.

A. *rugosa* Hort.

Picea excelsa Link.

P. *vulgaris* Link. — Nees Gen. IV, tab. 7.

Pinus *Picea Duroi*.

P. *Abies* L. — Lamb. Pinus, ed. 2, tab. 25 et 35.

P. *excelsa* Lamk.

Vulg. *Epicea*.

var. *pyramidata* (*pyramidalis*).

— *columnaris*.

A. *columnaris* Jacques.

— *sibirica*.

— *candelabrum*.

— *inflexa*.

— *segrezensis*.

— *Lemoniana* (*nigra gigantea*).

A. *Lemoniana* Hort. Booth.

— *inverta*.

A. *inverta* Hort.

— *pendula*.

A. *communis* var. *pendula* Hort. Booth.

— *pendula major*.

— *Clambrasiliana*.

A. *Clambrasiliana* Hort.

— *conica* (*stricta*).

A. *conica* Hort. Thib. et Keteleer.

— *dumosa* (*elegans*).

A. *elegans* Hort. (non Smith).

— *expansa* (*procumbens*).

— *nana*.

A. excelsa.

var. mucronata.

A. mucronata Rauch. (non Raff.).

— *pumila (pygmea).*

A. parvula Knight.

A. Clambrasiliana stricta Loud. et Gord.

A. elegans Smith.

A. minuta Hort.

A. minima Hort.

— *densa.*

— *denudata (virgata).*

A. Cranstonii Hort.

— *intermedia.*

— *monstrosa.*

— *attenuata.*

A. attenuata Knight.

— *concinna.*

— *crassifolia (eremita).*

— *Finedœnensis.*

A. Finedœnensis Hort.

— *phylicoides.*

— *mutabilis.*

— *aurea (medio-aurea).*

— *tenuifolia Loud.*

A. gracilis Hort.

A. gracilis microphylla Hort.

A. viminalis Wahl.

— *variegata.*

— *rubellensis.*

— *violacea (fructu rubro).*

A. obovata *Loud.* — Asia borealis.*A. ovata* *Hort**A. orientalis* *Aliq. Hort.* (non *Poir.*).*Picea obovata* *Ledeb.* Fl. alt. III., tab. 499.*Pinus obovata* *Ant. Conif.*, tab. 37, fig. 2.*P. Abies* *Pall.* (non *Lin.*).**A. orientalis** *Poir.* — *Jaub.* et *Spach.* Plant. orient. I, tab. 44; *Laws.* Pinet. brit. fasc. 44, cum Icon. — Taurus et Caucasus.*A. Withmaniana* *Hartwess.**Picea orientalis* *Carr.**P. Withmaniana* *Carr.**Pinus orientalis* *L.* — *Lamb.* Pinus, Ed. 2, tab. 291, fig. a.

§ TSUGA.

A. canadensis *Michx. fil.*, Arb. amer. I, tab. 43. — *Rich.* Conif., tab. 47, fig. 2; *Nouv. Duham.* V, tab. 83, fig. 4. — America borealis.*Picea canadensis* *Link.**Tsuga canadensis* *Carr.**Pinus canadensis* *L.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 35.*P. americana* *Duroi.*Vulg. *Hemlock-Spruce.**var. nana* (*dumosa*).**A. Mertensiana** *Lindl.* et *Gord.* — California.*A. taxifolia* *Jeffr.* ex *Murr.* (non *Desf.*).*A. Albertiana* *A. Murr.* — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 42, cum Icon.*A. canadensis taxifolia* *Gord.**A. Bridgesii* *Kellog.**Tsuga Mertensiana* *Carr.**Pinus Mertensiana* *Bongard.**P. canadensis* *Hook.* (non *Lin.*).

- A. Hookeriana** *Murr.* — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 4, cum Icon. — America boreali-occidentalis.
A. Pattoniana *Balf.* — *Laws.* Pinet. brit. fasc. 4, cum Icon.
A. Pattoni *Jeffrey.*
A. Williamsoni *Newberry*, in Williams report VI, tab. 7.
A. Hookeri *Hort.*
Tsuga Hookeriana *Carr.*
Pinus Pattoniana *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 429.
A. Tsuga *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 406. — Japonia.
A. Araragi *Loud.*
Tsuga Sieboldi *Carr.*
T. Tsuga *A. Murr.*
Pinus Araragi *Sieb.*
P. Tsuga *Ant.* Conif., tab. 32, fig. 2.
var. nana *Sieb. et Zucc.*
A. Brunoniana *Lindl.* — Himalaya.
A. dumosa *Loud.* Arbor. brit. IV, fig. 2233-2234.
A. cedroides *Griffith.*
Picea Brunnoniana *Wall.* Pl. asiat. rar., tab. 247.
Tsuga Brunoniana *Carr.*
Pinus dumosa *Dor.* — *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 35 bis.
P. decidua *Wall.*
P. Brunoniana *Wall.*
Micropeuce Brunoniana *Spach.*

§ PSEUDOTSUGA.

- A. Douglasii** *Lindl.* — *Forbes*, Pinet. Wob., tab. 45; *Nutt.* North-amer. sylv. II, tab. 445; *Laws.* Pinet. brit. fasc. 3?, cum Icon. — California.
A. californica *Aliq. Hort.* (non *Carr.*).

A. Douglasii.

Pseudotsuga Douglasii Carr.

Tsuga Douglasii Carr.

Pinus Douglasii Lamb. *Pinus*, ed. 2, tab. 90.

P. taxifolia Lamb. *Pinus*, ed. 2, tab. 33.

Picea Douglasii Link.

var. fastigiata (Standishiana).

— *stricta.*

— *taxifolia (pectinata).*

A. taxifolia Drum. (non Desf.).

A. Drummondii Hort.

— *pallida.*

§ KETELEERIA.

A. Fortunei Lindl. — China.

A. jezoensis Lindl. — *Fl. des serres VII*, tab. 858. (non *Carr.*).

Picea Fortunei Murr.

Pinus Fortunei Parlat. in *DC. Prodr. XVI*, p. 430.

Keteleeria Fortunei Carr. *Rev. hort.* 1866, cum *Icon.*

ABIES INCERTÆ MONDUM RECOGNITÆ.

Abies Pichtiana Maxim.**Abies magnifica affinis Hort.****A. (Picea) californica Carr.****CEDRUS Link.****C. Deodora Loud.** *Arbor. brit. IV*, f. 2283 2283. — *Laws.*

Pinet. brit. fasc. 6, 7, 8 et 10, cum *Icon.* — Himalaya.

Abies Deodora Lindl.

Pinus Deodora Roxb. — *Lamb. Pinus*, ed. 2, tab. 42.

C. indica De Chambr.

Vulg. Cèdre pleureur.

C. Deodora.

var. erecta (fastigiata).

— *robusta*.

C. Deodora gigantea Hort.

— *glauca*.

— *viridis*.

— *variegata*.

C. Libani *Barrelier*, Plant. Icon. 499. — *Laws. Pinet. brit.*

fasc. 40, cum Icon. — Asia minor et Africa boreal.

Larix cedrus Mill.

L. patula Salisb.

Abies Cedrus Poir. — *Rich. Conif.*, tab. 44 et 47.

Pinus Cedrus L. — *Lamb. Pinus*, ed. 2, tab. 37.

Vulg. *Cèdre du Liban*.

var. fastigiata (*viridis*).

— *nana* (Vulg. *Cèdre du comte de Dijon*).

— *pendula*.

— *atlantica*.

C. atlantica Manetti. — *Laws. Pinet. brit.* fasc. 20,
cum Icon.

C. argentea Loud.

C. elegans Knight.

C. libani africana Hort.

Abies atlantica Lindl.

— *glauca* (*argentea*).

LARIX Link.

L. Griffithii *Hook.* in *Cathcart*, Illustr. of himal. plants,
tab. 31. — Fl. des serres XII, tab. 4267-68. —
Himalaya.

L. Griffithiana Gord.

D. sikkimensis Hort.

Abies Griffithiana Lindl. et Gord.

Pinus Griffithiana Parlat. in *DC. Prodr.* XVI, p. 414.

L. europæa DC. — *Loud. Arbor. brit.*, fig. 2258-2262.

L. pyramidalis *Salisb.*

L. decidua *Mill.*

Abies Larix Lamk. III, tab. 785. — *Rich. Conif.*,
tab. 43; *Nouv. Duham.* V, tab. 79.

Pinus Larix L. — *Lamb. Pinus*, ed. 2, tab. 38.

var. compacta (pyramidata).

— *pendula.*

— *glauca.*

— *prolifera.*

— *rubra.*

L. occidentalis *Nutt.* *North-amer. sylv.* II, tab. 120. —

— *America boreali-occidentalis.*

L. americana var. brevifolia *Carr.* (non *Michx*).

Pinus Nuttallii Parlat. in *DC. Prodr.* XVI, p. 442.

L. microcarpa *Forbes*, *Pinet. Wob.*, tab. 47. — *America borealis.*

L. americana Michx fil. *Arb. amer.* III, tab. 4.

L. tenuifolia *Salisb.*

Abies microcarpa Lindl. et Gord.

Pinus pendula Soland.

P. Larix rubra Marsh.

P. intermedia Du Roi.

P. microcarpa Lamb. *Pinus*, ed. 2, tab. 40.

var. pendula.

L. pendula Salisb. — *Forbes. Pinet. Wob.*, tab. 46.

Pinus pendula Lamb. *Pinus*, ed. 2, tab. 39.

— *prolifera.*

L. leptolepis *Gord.* — *Japonia septentrionalis.*

L. japonica Carr.

Abies leptolepis Sieb. et Zucc. *Fl. jap.*, tab. 403.

Pinus japonica Thunb.

L. dahurica Turcz. — *Trautv.* Imag. plant., tab. 32. —

Siberia arctica.

L. Gmelini *Ledeb.*

L. sibirica *Ledeb.*

L. kamtschatica *Hort.*

Abies Gmelini *Rupr.*

Pinus dahurica *Fisch.*

PSEUDOLARIX Gord.

P. Kämpferi Gord. — China et Japonia sept.

Larix Kämpferi *Fortune.*

Abies Kämpferi *Lindl.* Gard. chronicl. 1854, p. 255,
cum Icon.

CUNNINGHAMIA R. Br.

C. sinensis R. Br. in *Rich.* Conif., tab. 18, fig. 3. — Bot.
mag., tab. 2743; *Sieb.* et *Zucc.* Fl. jap., tab. 403
et 404. — China.

C. lanceolata *Lamb.* Pinus, ed. 2, tab. 37.

Abies lanceolata *Desf.*

Belis lanceolata *Sweet.*

Araucaria sinensis *Hort.*

var. glauca.

ARTHROTAXIS Don.

A. taxifolia *Hock.* Icon., tab. 573. — Tasmania.

A. Doniana *Park.*

A. selaginoides *Don.* in *Linn.* Trans., tab. 14. — *Hook.*
Icon., tab. 574. — Tasmania.

A. alpina *Van Houtte.*

A. imbricata *Hort.*

Cunninghamia selaginoides *Zucc.*

SCIADOPITYS Sieb. et Zucc.

- S. verticillata** Sieb. et Zucc. Fl. jap. II, tab. 1 et 2. —
 Fl. des serres XIV, tab. 1483-86. — Japonia.
Taxus verticillata Thunb.
Pinus verticillata Sieb.
var. variegata.

SEQUOIA Endl.

- S. sempervirens** Endl. — Dene, Rev. hort. 1855, p. 11,
 cum Icon. — America boreali-occidentalis.
Taxodium sempervirens Lamb. Pinus, ed. 2, tab. 48.
var. pyramidata (adpressa).
 — *taxifolia.*
 — *glauca.*
 — *variegata.*
- S. gigantea** Torrey. — Dene, Rev. hort. 1855, p. 10, cum
 Icon. — California.
S. Wellingtonia Laws. Pinet. brit. fasc. 21, 22 et 23,
 cum Icon.
Wellingtonia gigantea Lindl. — Bot. mag., tab. 4777-
 4778; Fl. des serres IX, tab. 892-93.
Washingtonia californica Winslow.
Taxodium Washingtonianum Hort. amer.
var. pendula.
 — *pyramidalis.*
 — *crassifolia.*
 — *glauca.*
 — *variegata.*

CRYPTOMERIA Don.

C. japonica Don. — *Sieb. et Zucc.* Fl. jap., tab. 124 ;

Hook. Icon., tab. 668. — Japonia.

Cupressus japonica L. *fil.*

Taxodium japonicum Brong.

var. *Lobbii* (viridis).

C. Lobbii Hort.

C. viridis Hort.

— *monstrosa*.

— — *nana* (compacta).

— *nana*.

C. pygmæa Knight.

— *araucarioides*.

— *pungens*.

C. japonica vera Hort.

— *spiralis* (falcata).

— *glabra*.

— *variegata*.

C. elegans J. G. Veitch. — Japonia.

C. gracilis Hort.

C. japonica elegans Nelson.

C. japonica vera Aliq. Hort.

TAXODIUM Rich.

T. distichum Rich. Conif., tab. 40. — *Lamb.* Pinus,

ed. 2, tab. 63. — America septentrionalis.

Shubertia disticha Murb.

Cupressus virginiana Tradescant.

C. americana Catesby, Carol. I, tab. 11.

C. disticha L. — *Michx fil.* Arb. amer. III, tab. 1.

Vulg. *Cyprès Chauve*; *Cyprès de la Louisiane*.

var. *nana*.

nigra (tristis).

T. adscendens Brongt. Ann. sc. nat., sér. 1^{re}, XXX, p. 182. —
Carolina.

T. distichum fastigiatum Knight.

T. — var. microphylla Parlat. in DC. Prodr.
XVI, p. 441, (pro parte).

T. imbricatum Hort.

Schubertia disticha var. β Spach.

Cupressus disticha var. imbricaria Nutt.

T. microphyllum Brongt. Ann. sc. nat., sér. 1^{re}, XXX, p. 182.
— America borealis.

T. distichum var. microphylla Parlat. in DC. Prodr.
XVI, p. 441, (pro parte).

Schubertia disticha var. microphylla Nutt.

T. pendulum Noisette. — China?

T. distichum var. microphylla Parlat. in DC. Prodr.
XVI, p. 441, (pro parte).

T. sinense Gord.

T. — pendulum Hort.

Glyptostrobus pendulus Endl. Conif., p. 71.

Cupressus sinensis Aliq. Hort.

var. intermedia.

T. distichum var. intermedia Carr. Conif., ed. 2, p. 184.

T. mucronatum Ten. Osserv. sudi pianta Conif. del gen.
Taxod. 1853, cum Icon. — Mexico.

T. Montezumæ Dcne.

T. mexicanum Carr.

T. distichum mexicanum Gord.

T. — excelsum Hort. Booth.

T. — pinnatum Hort.

T. pinnatum Hort.

T. virens Hort.

GLYPTOSTROBUS Endl.

G. heterophyllus Endl. — China.

Thuya lineata Poir.

T. pensilis Staunton.

G. heterophyllus.

Taxodium japonicum var. *heterophylla* Brong.

T. Horsfieldii Hort.

Schubertia japonica Spach.

Cupressus nucifera Hort. (non *Torreya nucifera*).

FRENELA Mirb.**F. Gunnii** Endl. — Tasmania.

F. australis Mirb.

F. variabilis Carr.

Callitris oblonga Rich. Conif., tab. 18, fig. 2.

C. australis R. Br.

C. macrostachya Hort.

F. Hugelii Hort. — Nova Hollandia.**CALLITRIS** Vent.**C. quadrivalvis** Vent. — Rich. Conif., t. 8, fig. 4. — Algeria.

Thuya articulata Vahl, Symb. bot. II, tab. 48. — Desf.

Fl. atlant., tab. 252; Nouv. Duham III, tab. 5.

Frenela Fontanesii Mirb.

Vulg. *Thuya d'Algérie*.

LIBOCEDRUS Endl.**L. Doniana** Endl. — Rev. hort. 1866, cum Ic — Nova Zelandia.

Dacrydium plumosum Don.

Thuya Doniana Hook. Lond. Journ. bot., tab. 48.

L. tetragona Endl. — Paxt. Flow. Gard. I, fig. 32. —

Fretum Magell.

L. chilensis Endl. — Chili australis.

Cupressus thuyoides Pav. (non Lin.).

Thuya chilensis Don, in Lamb. Pinus.

T. andina Pöppig, Nov. Gen. et spec. III, tab. 220.

var. *argentea*.

L. argentea Hort.

— *viridis*.

L. excelsa Gord.

L. decurrens Torr. Pl. Frémont, tab. 3, — Orégon.

Thuya Craigana Murr. Bot. exped. Orégon, cum Icon.

T. gigantea Carr. in Fl. des serres IX, cum Icon. (non Nutt.).

var. laxa.

Thuya magnifica Hort. Booth.

FITZ-ROYA Hook. fil.

F. patagonica Hook. fil. — Fl. des serres VII, cum Icon. —
America austro-occidentalis.

THUYA Tourn.

T. gigantea Nutt. North-Amer. sylv. II, tab. 411. (non Carr.).
— America boreali-occidentalis.

T. plicata Lamb. (ex parte).

T. Douglasii Nutt.

T. Menziesii Dougl.

T. Lobbii Hort.

T. japonica Maxim.

T. Standishii Carr.

Thuyopsis Standishii Gord.

var. erecta (fastigiata):

— variegata.

T. plicata Don. — America septentrionalis.

T. Warreana Hort. Booth.

T. odorata Marsch.

T. aspleniifolia Hort.

T. occidentalis L. — Michx fil. Arb. amer. III, tab. 3 ;
Rich. Conif., tab. 7, fig. 4 ; Nouv. Duham. III,
tab. 4. — America septentrionalis.

T. tatarica Gord.

T. occidentalis.

var. cristata. (non *Biota orientalis var.*).

T. cristata Hort.

— *fastigiata.*

— *Hoveyi.*

T. Hoveyi Hort.

— *nana* (*compacta*). (non *Biota orientalis var.*).

— *pendula.* (non *Biota orientalis var.*).

— *recurva nana.*

T. incurva Hort.

— *Vervæneana.*

T. Vervæneana Hort.

— *variegata.* (non *Biota orientalis var.*).

BIOTA Endl.

B. orientalis Endl. — China et Japonia borealis.

Thuya orientalis L. — *Rich. Conif.*, tab. 7, fig. 2;

Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 448.

Platycladus stricta Spach.

var. aurea.

B. Zuccarinii Sieb.

Thuya aurea Hort.

— *comata.*

— *cristata* (*aristata*).

Thuya cristata Hort.

— *cupressoides.*

Thuya cupressoides Hort.

— *dumosa* (*pygmæa*).

Thuya antarctica Hort.

— *elegantissima Hort.*

T. elegantissima Hort.

— *falcata Hort.*

Thuya falcata Hort.

B. orientalis.

var. Fernandiana.

B. Fernandiana *Hort. Booth.*

B. falcata *Hort.*

Thuya falcata *Hort.*

— glauca.

— globosa.

— gracilis (freneloides).

Thuya japonica *Hort.* (non *Sieb.*).

T. nepalensis *Hort.*

— monstrosa (Defresneana).

Thuya sibirica monstrosa *Hort.*

Thuyopsis dolabrata *Aliq. Hort.* (non *Sieb.*).

— pendula.

B. pendula *Endl.*

Thuya filiformis *Hort.*

T. pendula *Lamb. Pinus*, ed. 2, tab. 50 *bis* ;

Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 417.

T. flagelliformis *Hort.*

Cupressus pendula *Thunb.* (non *l'Hérit.*, nec *Griff.*,
nec *Staunt.*).

C. filiformis *Hort.*

— Sieboldi (nana).

B. japonica *Sieb.*

B. coreana *Sieb.*

B. Fortunei *Hort.*

Thuya nana *Hort.*

T. orientalis nana *Hort.*

— tatarica (cupressoides).

B. tatarica *L.*

B. pyramidalis *Carr.*

Thuya tatarica *Hort.* (non *Gord.*).

T. nepalensis *Hort.*

T. pyramidalis *Tenor. Mem. acad. neap.* III, tab. 2.

T. orientalis stricta *Hort.*

B. orientalis.*var. triangularis.*— *argenteo-variegata.**T. argentea Hort.*— *aureo-variegata.**T. variegata Hort.*— *semper aurea.***THUYOPSIS** Sieb. et Zucc.**T. dolabrata** Sieb. et Zucc. Fl. jap., tab. 119 et 120. —
Japonia.*Thuya dolabrata L. — Lamb. Pinus II, tab. 4.**Platycladus dolabrata Spach.**Libocedrus dolabrata Nelson.**var. latifolia.**T. latifolia Hort.*— *nana.**T. lætevirens Lindl.*— *variegata.***CUPRESSUS** Tourn.§. **CHAMÆCYPARIS** Spach.**C. thuyoides** L. — *Michx fl. Arb. amer. III, tab. 2; Nouv.*
Duham. III, tab. 2; Wats. Dendr. brit. II, tab. 156.— *America borealis.**Chamæcyparis sphæroidea Spach.**Thuya sphæroidalis Rich.**Vulg. Faux-Thuya.**var. andelyensis.**Retinospora squarrosa leptoclada Gord. (non Zucc.).*

C. thuyoides.

var. *pumila* (pygmæa).

Thuya pygmæa Hort.

— *atrovirens*.

Thuyopsis atrovirens Hort.

— *glauca* (pendula).

C. Kewensis Hort.

C. thuyoides Kewensis Hort.

Thuyopsis borealis glauca Hort.

Thuya glauca Hort.

C. Lawsoniana Murr. Descr. new conif. Calif., tab. 9. —

Bot. mag., tab. 5584; *Laws. Pinet.*

brit. fasc. 45, cum Icon. — California.

Chamæcyparis Boursieri Dene.

C. Lawsoniana Parlat. Stud. conif., tab. 3

var. compacta (pygmæa, minima).

— *erecta* (stricta, pyramidalis).

Chamæcyparis Lawsoniana stricta Hort.

C. Lawsoniana erecta viridis Hort. brit.

— *nana* (pumila, glauca).

— *variegata*.

— *pendula albo-variegata*.

— *flavescens* (lutescens).

— *elegans*.

— *gracilis*.

Chamæcyparis Lawsoniana gracilis Hort.

— *albo-spica*.

— *argenteo-variegata* (argentea).

— *aureo-variegata* (aurea). — Illustr. Hort. X, tab. 367.

— *luteo-variegata* (lutea).

C. Nutkænsis Hook. — America boreali-occidentalis.

C. Nootkatensis Lamb.

C. americana Trautv. Imag. Plant. Fl. ross., tab. 7.

C. Nutkænsis.

Thuja excelsa *Bongard.*

Thuyopsis borealis *Fisch.*

T. Tchugatskoy *Hort.*

T. cupressoides *Carr.*

Chamæcyparis nutkænsis *Spach.*

var. compacta.

— *glauca.*

— *variegata.*

§. *RETINOSPORA*, *Sieb. et Zucc.*

C. pisifera *Hort. segreg.* — Japonia.

Retinospora pisifera *Sieb. et Zucc. Fl. jap. III, tab.*

422. — *Gard. chron. 1876, p. 237, cum Icon.*

Chamæcyparis pisifera *Sieb. et Zucc. in Endl. Conif.*

var. filifera.

Retinospora filifera *Hort. Standish. — Gard. chron.*

1876, p. 237, cum Icon.

— *stricta.*

— *aurea (nana aurea).*

— *flavescens.*

— *variegata.*

C. obtusa *Hort. segreg.* — Japonia.

Retinospora obtusa *Sieb. et Zucc. Fl. jap. II, tab. 424.*

— *Gard. chron. 1876, p. 236, cum Icon.*

Chamæcyparis obtusa *Sieb. et Zucc. in Endl. Conif.*

C. Keteleeri *Standish.*

var. compacta.

Thuyopsis borealis compacta *Hort.*

— *nana.*

— *argentea.*

— *aurea.*

— *plumosa. (non Dacrydium plumosum Don).*

Retinospora plumosa *Hort. — Gard. chron. 1876,*

p. 236, cum Icon.

C. obtusa.

var. plumosa aurea.

— — *argentea.*

— *pygmæa.*

Thuya pygmæa Hort.

— *robusta.*

— *filicoides.*

R. filicoides Hort. Weicth. — Gard. chron. 1876,
p. 235, cum Icon.

— *gracilis.*

— *lycopodioides (monstrosa).*

Retinospora lycopodioides Gord.

— *albo-spica.*

— *argenteo-variegata.*

— *aureo-variegata (Keteleeri variegata).*

C. squarrosa Hort. segreg. — Japonia.

Retinospora squarrosa Sieb. et Zucc. Fl. jap. II,
tab. 123.

R. ericoides Gord. Pinet. ed. 1, p. 294.

Chamæcyparis squarrosa Sieb. et Zucc. in Endl.
Conif.

C. ericoides Carr. Conif., ed. 1, p. 140.

Biota meldensis Carr., Conif., ed. 2, p. 141.

Thuya meldensis Hort. Quétier.

T. hybrida Aliq. Hort.

var. dubia (compacta).

Retinospora dubia Carr.

Thuya ericoides Hort.

T. japonica Aliq. Hort.

T. Devriesiana Hort.

Biota ericoides Hort.

— *glauca.*

Retinospora glauca Hort.

C. squarrosa.

var. juniperoides.

C. ericoides *Aliq. Hort.*

Retinospora juniperoides. *Carr. Rev. hort.* 1869, fig. 69.

R. decussata *Hort.*

R. recurvata *Hort.*

Chamæcyparis decussata *Hort.*

— *Elwangeriana.*

Retinospora Elwangeriana *Barry. Rev. hort.* 1869, fig. 74.

Thuja occidentalis ericoides *Hort.*

T. Elwangeriana *Hort.*

— *variegata.*

SPECIES VEL VARIETATES NON SATIS NOTÆ.

C. leptoclada *Hort. segreg.* — Japonia.

Retinospora squarrosa leptoclada *Sieb. ex Gord.*

R. leptoclada *Zucc. ex Gord. Rev. hort.* 1869, fig. 24.

Chamæcyparis squarrosa var. leptoclada *Endl. Conif.,*
p. 65.

C. andelyensis *Aliq. Hort.*

C. pseudo-squarrosa *Hort. segreg.*

Retinospora pseudo-squarrosa *Carr. Conif. ed. 2, p. 140.*

Chamæcyparis pseudo-squarrosa *Parlat. in DC. Prod.*
XVI, p. 467.

C. acuta *Hort. segreg.*

Retinospora acuta *Hort. Sieb.*

C. Nobleana *Hort. segreg.*

Retinospora Nobleana *Hort. brit.*

§. CUPRESSUS.

C. sempervirens *L.* — *Nouv. Duh. Ill, tab. 4 ; Rich. Conif.,*
tab. 9; *Wats. Dendr. brit., tab. 155.* — Asia occident.

C. fastigiata *DC.*

C. refracta *Hort.*

var. Bregeoni.

C. sempervirens.

var. cereiformis (pyramidata).

C. Fernandini Hort.

— *contorta.*

C. Bregeoni Aliq. Hort.

— *horizontalis.*

C. horizontalis Mill. — Forbes, Pinet. Wob., tab. 61.

C. patula Hort.

C. Tournefortii Hort. (non Ten.).

— *indica Parlat. in DC. Prodr. XVI, p. 469. (Whitleyana).*

C. Roylei Carr.

C. Whitleyana Hort.

C. Doniana Hort.

C. torulosa Don. — Loud. Arb. IV, fig. 2329-2336. — Himalaya.

C. pendula Griff. (non l'Hérit., nec Thunb., nec Staunt.).

C. himalayensis Hort.

C. nepalensis Loud.

C. Smithiana Hort.

Juniperus nepalensis Loud.

var. majestica.

C. majestica Knight.

C. flagelliformis Knight.

C. Corneyana Knight. — China.

C. gracilis Gord.

C. torulosa var. Corneyana Carr.

C. chinensis Corneyana Hort.

C. torulosa chinensis Hort.

Juniperus gracilis Hort.

J. pendula Hort.

C. glauca Lamk. — Peninsula Indica circa Goam.

C. lusitanica Mill.

C. pendula l'Hérit. Stirp., tab. 48 (non Thunb., nec Staunt., nec Griff.). — Nouv. Duham. III, tab. 3.

C. Udheana Gord.

C. glauca *Lamk.**C. sinensis Hort.**Juniperus glauca Hort.**var. pendula (tristis).**C. religiosa Hort. (non Knight).***C. Lindleyi** *Klotsh. in Endl. Conif. (non Parlat.).— Mexico.**C. thurifera Lindl. (non Schlecht.).**C. Karwinskyana Reg.**C. flagelliformis Hort.**C. lusitanica var. Lindleyi Carr.***C. Benthami** *Endl. — Mexico.**C. thurifera Schlecht. (non Lindl.).**C. glauca Forbes. (non Brotero).**C. aromatica Gord.**C. lusitanica var. Benthami Carr.**C. — var. Udheana Carr.**C. Skinneri Hort.**C. elegans Aliq. Hort.**C. kewensis Hort.**C. Ugellii Hort.**C. Udheana Aliq. Hort. (non Gord.).**C. Cunninghamii Aliq. Hort.***C. Knightiana** *Carr. — Mexico.**C. Lindleyi Parlat. (non Klotzsch.).**C. elegans Hort.**C. thurifera elegans Hort.**C. — var. Knightiana Gord.***C. funebris** *Endl. — Fl. des serres VI, p. 89, cum. Icon ; Belg. Hort. III, tab. 20. — China.**C. pendula Staunt. (non l'Hérit., nec Thunb., nec Griff.). — Lamb. Pinus, ed. 2, tab. 50.*

C. Goveniana *Gord.* Journ. Hort. soc. IV, p. 295,
cum Icon. — California.

C. glandulosa *Hort.* (non *Hook.*).

var. attenuata (*Kæmpferi*).

C. attenuata *Gord.*

C. nivea *Hort.*

— *glauca*.

C. californica *Carr.* — California.

C. aromatica *Hort.* (non *Gord.*).

C. kewensis *Aliq. Hort.*

C. cornuta *Hort.* (non *Carr.*).

C. macrocarpa *Hartw.* — *Gord.* Journ. Hort. soc. IV,
p. 296, cum Icon. — California.

C. Hartwegii *Carr.* (pro parte).

C. Lambertiana *Gord.*

C. Reinwardtii *Hort. brit.*

var. fastigiata *Knight.*

— *Lambertiana*.

C. Lambertiana *Carr.*

C. Mac-Nabiana *Murr.* Descript. conif. Calif., tab. 40. —

Rev. hort. 1870, p. 185, fig. 26. — California.

C. glandulosa *Hook.* (non *Hort.*).

JUNIPERUS Lin.

§. OXYCEDRUS.

J. drupacea *Labill.* Pl. syr. dec. II, tab. 8. — Syria, Asia min.

J. Sabina baccifera *Clus.* Hist., p. 37, cum Icon.

J. macrocarpa *Sibth.* — *Reichb.* Ic. Fl. germ. XI, tab. 446;

Ten. Fl. neap., tab. 247. — Europa meridionalis.

J. Oxycedrus *Rich.* Conif., tab. 6, fig. 4. (non *Lin.*).

J. umbilicata *Gren. et Godr.*

J. sphærocarpa *Ant.* Conif., tab. 40.

J. elliptica *Hort. Van-Htte.*

J. Fortunei *Aliq. Hort.*

- J. Oxycedrus** *L.* — *Nouv. Duham.* VII, tab. 45, fig. 2 ;
Rich. Conif., tab. 6, fig. 4. — *Europa meridionalis.*
J. Marschalliana *Stev.*
Vulg. Genévrier Cade.
var. reflexa (*pendula*).
 — *Withmaniana* (*rufescens*).
J. Withmaniana *Fisch.* (*non Stev.*).
J. rufescens *Link.*
J. Oxycedrus taurica *Aliq. Hort.*
Oxycedrus Withmaniana *Hort.*
- J. communis** *L.* — *Fl. danica* VII, tab. 4449 ; *Lamk. Encycl.*
 tab. 829 ; *Nouv. Duham.* VI, tab. 45, fig. 4 ; *Rich.*
Conif., tab. 5. — *Europa.*
Vulg. Genévrier.
var. compressa (*hispanica*).
J. compressa *Rinz.*
J. hispanica *Presl.*
 — *fastigiata* *Loud.* (*suecica*).
J. hispanica *Hort. Booth* (*non Presl.*).
J. cracovia *Hort.*
J. Withmaniana *Aliq. Hort.* (*non Fisch. nec Stev.*).
 — *oblonga* *Loud. Arb.* IV, fig. 2315 et 2316.
J. oblonga *Bieb.* (*non Gord.*).
 — *reflexa.*
J. oblonga *Gord.* (*non Bieb.*).
J. Withmaniana *Stev.* (*non Fisch.*).
 — *hybernica* (*stricta*).
J. hybernica *Lodd.*
J. pyramidalis *Hort.*
J. stricta *Hort.*
 — *variegata.*
- J. nana** *Willd.* — *Smith, Engl. bot.*, tab. 2743. — *Europa*
borealis; *America et Asia septentrionalis.*
J. communis var. L.

J. nana.

J. communis var. *alpina* Gaud.— *Parlat.* in *DC.* Prodr. XVI, p. 480.

J. communis var. *nana* Hook.

J. alpina Gaud.

J. sibirica Burgsd.

J. davurica Hort. (non *Pall.*).

J. saxatilis Hort.

var. *canadensis* (montana).

J. canadensis Lodd.

J. alpina minor Hort.

J. rigida Sieb. et Zucc. Fl. jap. II, tab. 423. (non *Desf.*). — Japonia.

J. communis Thunb. (non *Lin.*).

§. SABINA.

J. recurva Don. Prodr. fl. nepal. — Nepalia.

J. repanda Hort.

var. *squamata* Hook. (densa).

J. squamata Don. — *Loud.* Encycl. fig. 2107.

J. dumosa Wall.

J. Lambertiana Wall.

J. rigida Wall.

J. procumbens Hort. (non *Sieb.*).

J. davurica Pall. Fl. ross. II, tab. 55. — *Andrews*, Bot. repos., tab. 534. — Sibiria altaica.

J. Sabina L. — *Duham.* Arb. II, tab. 62; *Pall.* Fl. ross., tab. 36, fig. 2. — Europa centralis et australis; America septentrionalis.

J. excelsa Willd.

J. repens Nutt.

J. foetida var. *Sabina* Spach.

J. prostrata Pers. (non *Torrey.*).

J. Hudsonica Lodd.

J. Sabina.

J. Sabina var. *prostrata* *Loud.*

var. *nana* (*prostrata*).

J. prostrata *Torrey* (non *Pers.*).

J. Sabina var. *humilis* *Hook.*

J. cupressifolia *Hort.*

J. cupressoides *Hort.*

— *tamariscifolia* (*sabinoides*). — *Loud.* *Encycl. of trees*,
fig. 2022.

J. sabinoides *Griseb.* (non *Endl.*).

J. turbinata *Guss.*

J. Sabina var. *mascula* *Hort.*

J. alpina *Hort.* (non *Gaud.*).

— *variegata*.

J. excelsa *Bieb.* — *Forbes*, *Pinet. Woburn.*, tab. 64. — *Asia*
minor.

J. Sabina var. *taurica* *Pall.*

J. foetida var. *excelsa* *Spach.*

J. Olivieri *Carr.*

J. isophyllos *C. Koch.*

J. polycarpus *C. Koch.*

J. himalayensis *Hort.*

J. procera *Hort.* (non *Hochst.*).

var. *stricta*.

J. foetidissima *Willd.* — *Græcia* et *Asia minor*.

J. Sabina *Sibth.* (non *Lin.*).

J. foetida var. *squarrosa* *Spach.*

J. excelsa *Carr.* (pro parte).

Cedrus orientalis foetidissima *Tourn.*

J. phœnicea *L.* — *Guss.* *Pl. rar.*, tab. 62. — *Regio mediter.*

J. tetragona *Mœnch.*

J. bacciformis *Aliq. Hort.*

J. thurifera *Aliq. Hort.* (non *Lin.*).

J. phœnicea.

var. lycia Loud. — Nouv. Duham. VI, tab. 47; *Pall.* Fl. ross., tab. 56.

J. lycia L. — *Loud.* Arbor. IV, fig. 2367.

J. Langoldiana Hort. *brit.*

Cupressus Devoniana Hort.

— *pyramidalis.*

J. pyramidalis Hort.

J. thurifera L. — *Loud.* Arbor. IV, fig. 2369. — Europa australis et Algeria.

J. hispanica Lamk.

J. foetida *var. thurifera* Spach.

J. sabinoides Endl. (non *Griseb.*).

J. Bonatio Vis. Illustr. Pl. nuov. ort. bot. di Padova, tab. 4.

var. cinerea.

J. cinerea Carr.

J. thurifera Hort. (non *Lin.*).

J. sabinoides Hort. (nec *Endl.*, nec *Griseb.*).

J. chinensis L. — *Sieb. et Zucc.* Fl. jap. II, tab. 126-127.

— Japonia, China et Himalaya.

J. virginica Thunb. (non *Lin.*).

J. cernua Roxb.

J. religiosa Royle.

J. dioica Hort.

— *mascula.*

J. dimorpha Roxb?

J. Thunbergii Hook.

J. dioica Hort.

J. mascula Hort.

— *foemina.*

J. Rewesiana Hort.

J. flagelliformis Hort. — *Loud.* Encycl., fig. 4090.

J. foemina Hort.

J. struthiacea Hort.

J. chinensis.

var. *Jacobiana*.

— *japonica*.

J. japonica Carr. Conif. Ed. 2, p. 34.

J. procumbens Sieb. et Zucc. Fl. jap. II, tab. 427,
fig. 3.

J. mongolica Hort.

— *japonica pyramidalis*.

J. pyramidalis glauca Hort.

J. sinensis glauca Hort.

— *Leeana*.

J. Leeana Hort. brit.

— *nana*.

J. japonica nana Hort.

— *aurea*.

— *variegata*.

J. sphaerica Lindl. in Paxt. Fl. gard. I, tab. 35.

— *China borealis*.

J. chinensis var. *Smithii* Loud.

J. Fortunei Hort.

J. sinensis Aliq. Hort.

var. *pendula* (Smithiana).

J. Smithiana pendula Hort.

J. virginiana L. — Michx fl. Arb. amer. III, tab. 5; Nouv.

Duham. VI, tab. 46. — *America septentrionalis*.

J. caroliniana Duroi.

J. arborescens Mœnch.

J. foetida var. *virginiana* Spach.

Vulg. *Cèdre rouge* ; *Cèdre de Virginie*.

var. *Bedfordiana* Knight (Gossainthaneae).

J. Bedfordiana Hort.

J. gracilis Endl.

J. Gossainthaneae Lodd.

J. virginiana barbadensis Gord.

J. virginiana.

var. Chamberlaynii (pendula).

J. virginiana pendula *Hort.*

— *Canaertii* (robusta).

— *dumosa*.

J. dumosa *Hort.*

— *freneloides*.

J. freneloides *Hort.*

— *glauca* *Carr.* (*cinerascens*, *argentea*).

J. glauca *Willd.*

J. cinerascens *Hort.*

J. argentea *Hort.*

— *humilis* (pumila).

— *pyramidalis* (stricta).

— *Schottii* (viridis).

J. Schottii *Hort. brit.*

J. Schollii *Hort.*

— *tripartita*.

J. tripartita *Hort.*

— *variegata*.

— — *alba*.

J. occidentalis *Hook.* — *Newberry*, Rep., tab. 40. — Amer.
boreali-occidentalis.

J. excelsa *Lewis.* in *Pursch.* (non *Bieb.*).

J. andina *Nutt.* North-Amer. sylv., tab. 410.

J. dealbata *Hort.* (non *Loud.*).

J. californica *Carr.* Conif. Ed. 2, p. 41.

J. piriformis *Lindl.*

J. dealbata *Loud.* — America borealis.

J. bacciformis *Hort.*

J. foetidissima *Hort.* (non *Willd.*).

J. occidentalis *Hort.* (non *Hook.*).

J. fragans *Knight.*

J. pyramidalis *Hort.* (non *J. phæniceæ* var.).

J. tetragona *Schlecht.* — Mexico.

J. mexicana *Spreng.*

Cupressus sabinoides *H. B. K.*

Sabina tetragona *Ant. Conif.*, tab. 53.

SPECIES VEL STIRPES CULTÆ, SED NONDUM RECOGNITÆ.

J. alba *Knight.* — Himalaya.

J. cyprina *Hort. Sim.-Louis.*

J. decumbens *Hort.*

J. Smithiana *Hort.*

J. Shepherdii *Hort. Sieb.*

J. Veitchei *Hort. brit.*

DACRYDIUM Soland.

D. Franklinii *Hook. fil. Lond. journ. bot. IV, tab. 6, et*
Fl. tasman., tab. 400. — Tasmania.

D. Huonense *All. Cunn.*

SAXE-GOTHÆA Lindl.

J. conspicua *Lindl.* — *Fl. des serres VII, cum Icon.; Illustr.*
hort. 1854, cum Icon. — Chili.

TAXUS Tourn.

T. baccata *L.* — *Rich. Conif., tab. 2; Nouv. Duham. I, tab.*
49. — Europa et Asia.

T. nucifera *Wall. Tent. fl. nepal., tab. 57.*

T. virgata *Wall?*

T. nepalensis *Jacquem. mss.*

T. Wallichiana *Zucc?*

Vulg. If.

T. baccata.

var. fastigiata Loud.

T. fastigiata Hort.

T. hibernica Hook.

T. pyramidalis Hort.

— *fastigiata aurea mascula.*

T. hibernica aurea mascula Hort.

— *erecta (stricta).*

T. stricta Hort.

T. Crowderi Hort. brit.

T. pyramidalis Knight.

— *nidpathensis (erecta robusta).*

— *cheshuntensis Gord. (suberecta).*

— *pyramidalis (subpyramidalis).*

T. pyramidalis Hort. (non Knight.).

— *horizontalis.*

T. horizontalis Hort.

— *Jacksonii Gord.*

— *nana (Foxii).*

T. Foxii Hort. brit.

— *monstrosa.*

T. monstrosa Hort.

T. sparsifolia Hort.

T. Mitchelli Hort.

— *ericoides (empetrifolia).*

T. ericoides Hort.

T. microphylla Hort.

— *Dovastoni. — China.*

T. Dovastoni Hort.

T. — pendula Hort.

T. pendula Hort.

T. umbraculifera Hort.

Cephalotaxus umbraculifera Sieb.

— *Dovastoni variegata.*

T. baccata.

- var. glauca* (glaucescens).
— *aurea* (aureo-variegata).
— *argentea* (elegantissima).
 T. baccata variegata Hort.
 T. marginata Aliq. Hort.
— *fructu luteo.*
— *macrocarpa.*
 T. macrocarpa Hort.

T. adpressa *Gord.* Pinet., Ed. 2, p. 387. — *Japoma.*

- T. baccata var. adpressa Carr. Conif., Ed. 2, p. 731.*
T. brevifolia Hort.
T. sinensis tardiva Knight.
Cephalotaxus adpressa Hort.
C. brevifolia Hort.

var. stricta.

- T. adpressa stricta Hort.*
T. — fastigiata Hort.

T. canadensis *Willd.* — *Loud. Encycl., fig. 2105-2106.* —

America borealis.

- T. baccata minor Michx.*
T. baccata Hook. (pro parte).
T. procumbens Lodd.

var. aurea (variegata).

- T. Washingtoni Hort. brit.*

T. brevifolia *Nutt.* North-Amer. sylv., tab. 408. — *California.*

- T. baccata Hook. (pro parte).*
T. Lindleyana Murr.
T. Boursieri Carr. Conif. Ed. 2, p. 739.
T. occidentalis Hort.

- T. cuspidata** Sieb. et Zucc. Fl. jap. II, tab. 138. — Japonia.
T. baccata var. cuspidata Carr.
var. brevifolia Sieb. (non T. brevifolia Nutt.).

CEPHALOTAXUS Sieb. et Zucc.

- C. pedunculata** Sieb. et Zucc. Fl. jap. II, tab. 132. —
Japonia.
Taxus Harringtoniana Forbes, Pinet. Woburn., tab. 68.
T. sinensis Hort. brit.
T. Inukaja Knight.
var. fastigiata.
C. Koraiana Hort.
Podocarpus Koraiana Sieb. Ann. hort. Pays-Bas, 1844.
Taxus japonica Lodd.
C. Fortunei Hook. Bot. mag., tab. 4449. — Fl. des serres VI,
tab. 555. — China.
C. Fortunei mascula Hort.
C. — fœmina Hort.
C. — pendula Hort.
C. — pedunculata Hort.
C. filiformis Knight.
var. robusta.
C. fructibus globosis rubris Hort.
C. drupacea Sieb. et Zucc. Fl. jap. II, tab. 130-131. —
Japonia.
C. fœmina Hort.
C. coriacea Hort.
Podocarpus coriacea Hort.
Taxus coriacea Hort.

TORREYA Arnott.

T. grandis *Fortune* in *Gord. Pinet.* — China borealis.

Caryotaxus grandis *Henk. et Hochst.*

T. nucifera *Sieb. et Zucc.* *Fl. jap.* II, tab. 429. — Japonia.

Taxus nucifera *Kæmpf.* *Amœn.*, p. 814-815, cum Icon.

— *Rich. Conif.*, tab. 2, fig. 3.

Podocarpus coreana *Hort. Van-Htte.*

T. taxifolia *Arnott.* — *Hook.* *Icon.* III, tab. 232-233 ; *Nutt.*

North-Amer. sylv., tab. 469. — Florida.

T. montana *Hort.*

T. californica *Torr.* — *Newberry* in *Williams Report.* VI, fig. 27. — California.

T. Myristica *Hook. fil.* *Bot. mag.*, tab. 4780. — *Fl. des serres* IX, tab. 923 ; *Murr. Notes calif. trees*, I, tab. 3.

GINKGO Kæmpf.

G. biloba *L.* — *Gouan.*, *Descr. Gink.* cum Icon. — China et Japonia.

Salisburia adianthifolia *Salisb.* — *Sieb. et Zucc.* *Fl. jap.*, tab. 436.

var. pendula.

— *macrophylla* (*laciniata*).

— *variegata.*

PODOCARPUS L'Hérit.

P. Nageia *R. Br.* — *Mirb.* in *Mém. Mus.* cum Icon.; *Sieb. et Zucc.* *Fl. jap.* II, tab. 435. — Japonia.

Nagi *Kæmpf.* *Amœn.*, Icon. p. 875.

Myrica Nagi *Thunb.*

Nageia japonica *Gærtn.*

var. albo-variegata.

P. Totara Don. in *Lamb. Pin.* — Nova Zelandia.

P. Bidwilli Hort.

P. neriifolia Don. in *Lamb. Pin.* — Fl. des serres, VIII, tab. 768. — Nepalia.

P. chinensis Wall. — China.

P. macrophylla var. *Maki* Endl.

P. Maki Sieb. et Zucc. Fl. jap. II, tab. 134.

P. Makoyi Hort.

P. Vriesiana Hort.

P. Koreana Aliq. Hort.

P. Miquelia Aliq. Hort.

Maki Spuria Kæmpf.

Taxus chinensis Roxb.

var. *variegata* (argenteo-variegata).

— *fructibus cœruleis.*

— — *rubris.*

P. macrophylla Don. in *Lamb. Pinet.* ed. 2, (non Wall.). —

Sieb. et Zucc. Fl. jap. II, tab. 133. — Japonia.

Maki foetens Kæmpf.

Taxus macrophylla Thunb. — *Banks. Ic. Kæmpf.*, tab. 24.

P. japonica Hort. Bogor. ex *Sieb. Ann. soc. hort. Pays-Bas.*

— Japonia.

var. *longifolia.*

P. flagelliformis Hort.

— *aureo-variegata.*

P. andina Pæpp. — Chili.

P. spicata Pæppig. (non *R. Br.*).

Taxus spicata Dombey.

Prumnopitis elegans Philippi, in *Linnæa* XXX, p. 371.

P. læta Hoibr. in *Endl. Conif.* — Nova Hollandia.

P. japonica Hort. Bogor ex *Sieb.* — Japonia.

P. lanceolata Gord.

P. latifolia *Wall.* *Plant. asiat. rar.*, tab. 30. — *Hook.*

Lond. journ. bot. I, tab. 23. — *Bengalia Orient.*

P. zamiaefolia *Hort.*

P. pinnata *Aliq. Hort.*

Nageia latifolia *Gord.*

P. chilina *Rich.* *Conif.*, tab. 4, fig. 4. — *Amer. merid.*

P. saligna *Don.* in *Lamb. Pinus.*

P. elongata *L'Hérit.* — *Rich. Conif.*, tab. 4, fig. 2. — *Prom.*

Bon. spei.

Taxus Capensis *Lamk.*

P. nubigena *Lindl.* in *Paxt. Flow. gard.* 1854. fig. 218. —

Chili.

P. nubicola *Hort. Makoy.*

MONOCOTYLEDONEÆ

SMILACINEÆ

SMILAX Tourn.

S. Salsaparilla *L.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 3; *Lamk.* Encycl., tab. 817. — America sept.

S. glauca *Walt.* — *Bot. mag.*, tab. 846.

S. aspera *L.* — *Nouv. Duham.* I, tab. 53. — Europa meridionalis.

S. mauritanica *Poir.* — Regio mediterr.

S. nigra *Willd.*

S. aspera var. β *L.*

S. China *L.* — *Kæmpf.* Amœn., tab. 782. — China et Japon.

S. pseudo-China *L.* — *Descourt.* Fl. med. VII, tab. 462. — America septentrionalis.

S. rotundifolia *L.* — America septentrionalis.

S. Sebeana *Hort. Sieb.* — Japonia.

S. excelsa *L.* — *Nouv. Duham.* I, tab. 57. — Caucasus et Oriens.

S. China *Gmel.* (non *Lin.*).

S. lanceolata *L.* — America septentrionalis.
var. *alba.*

S. alba *Pursh.*

S. laurifolia *L.* — America septentrionalis
S. cuspidata *Poir.*?

RUSCUS Lin.

R. aculeatus *L.* — *Bull.* Herb., tab. 243; *Smith*, Engl. bot. tab. 560; *Lamk.* Encycl., tab. 835. — Gallia.

Vulg. *Fragon*; *Petit Houx*.

var. rotundifolia.

R. hypophyllum *L.* — *Bot. mag.*, tab. 2049. — Italia.

Vulg. *Laurier Alexandrin*.

R. hypoglossum *L.* — *Black.* Herb., tab. 128. — Europa meridionalis.

DANAE Medicus.

D. racemosa *Mench.* — Regio mediterr.

Ruscus racemosus *L.* — *Wats.* Dendr. brit. II, tab. 145.

LAPAGERIA Ruiz. et Pav.

L. rosea *Ruiz. et Pav.* Fl. peruv., tab. 297. — *Bot. mag.* tab. 4447; Fl. des serres V, tab. 491. — Chili.

var. alba.

PHILESIA Juss.

P. buxifolia *Willd.* — *Lamk.* Encycl., tab. 248; *Bot. mag.*, tab. 4738; Fl. des serres IX, tab. 873; *Illust. hort.* 1854, tab. 3. — Fret. Magell.

P. magellanica *Raeusch.*

LILIACEÆ

YUCCA Lin.

Y. aloifolia L. — DC. Pl. grasses, tab. 20 ; *Redout.* Lil., tab. 401 et 402 ; *Bot. mag.*, tab. 1700. — Mexico et Florida.

Y. serrulata Haw.

var. angustifolia.

, — *variegata.*

Y. Draconis L. — *Lamk.* Encycl., tab. 243 ; *Bot. reg.*, tab. 1894. — Carolina.

Y. Harruckeriana Crantz.

Y. tenuifolia Haw. — Patria ignota.

Y. concava Haw. — Patria ignota.

Y. filamentosa var. latifolia Hort.

Y. filamentosa L. — *Bot. mag.*, tab. 900 ; *Redout.* Lil., tab. 277-278 ; *Saund. et Bak.* Refug. bot., tab. 324. — Carolina et Virginia.

Y. puberula Haw.

Y. flaccida Haw. — *Bot. reg.*, tab. 1895 ; *Saund. et Bak.* Refug. bot., tab. 323. — Patria ignota.

Y. recurvifolia Salisb. Parad., tab. 31 ; *Saund. et Bak.* Refug. bot., tab. 321. — Georgia.

Y. recurva Haw.

Y. pendula Sieb. — *Carr.* Rev. hort. 1859, p. 488 cum lc.

Y. japonica Hort.

Y. recurvata Hort.

Y. glaucescens Haw. — *Sweet.* Brit. fl. gard., tab. 55. — America septentrionalis.

Y. angustifolia Hort. brit. (non Pursh).

Y. gloriosa var. glaucescens Hort.

- Y. angustifolia** *Pursh.* — Bot. mag. tab. 2236. — Amer. Sept.
- Y. stricta** *Sims.* Bot. mag., tab. 2222. — *Carr.* Rev. hort. 1859, p. 468, cum Icon. — Carolina.
- Y. gloriosa** *L.* — Bot. mag., tab. 1260; *Redout.* Lil., tab. 326-327; *Nouv. Duham.* III, tab. 35; *Saund.* et *Bak.* Refug. bot., tab. 329. — America sept.
- var. reflexa.*
- *longifolia.*
- *plicata* (*plicatilis*). — Bot. mag. tab. 2662.
- *minor.*
- Y. superba* *Haw.* Bot. rep. tab. 473.
- Y. rubra* *Hort.*
- *quadricolor.*
- *variegata.*
- Y. glauca** *Sims,* Bot. mag., tab. 2662. — *Saund.* et *Bak.* Refug. bot., tab. 325. — Carolina.
- Y. glaucescens* *Aliq. Hort.*
- Y. baccata** *Torr.* — Illustr. Hort. XXI, tab. 115; — Nov. Mexico.
- Y. obliqua** *Haw.* — Patria ignota.
- Y. canaliculata** *A. Gray.* — Texas.
- Y. Treculeana* *Carr.* — L'hort. franç. 1864, tab. 46.
- Y. filifera** *Hort. Makoy.* — Mexico.
- Y. lutescens** *Carr.* — Texas.
- Y. flexilis** *Carr.* Rev. hort. 1859, p. 398, cum Ic. — Amer. sept.
- Y. stenophylla* *Hort.*
- Y. angustifolia* *Aliq. Hort.* (non *Pursh.*).
- Y. undulata* *Hort.*
- Y. Wipplei** *Torrey* Bot. Mex. Bound, p. 222. — Gard. chron. 1876, fig. 42. — Nov. Mexico.
- Y. graminifolia** *Hort. A. Leroy.*

PALMÆ

TRACHYCARPUS Wendl.

T. Fortunei Wendl. — *J. Gay*. Bull. Soc. bot. VIII, p. 429.

— China et Himalaya.

Chamærops Fortunei Hook.

C. sinensis Hort.

var. grandis.

Chamærops excelsa Mart. (non *Thunb.*).

— *tomentosa*.

Chamærops Barilleti Aliq. Hort.

T. Martiana Wendl. — *Wall.* Pl. asiat. tab. 214 — Nepalia.

Chamærops Martiana Hort.

T. Ritchieana Wendl. — Himalaya.

Chamærops Ritchieana Hort.

CHAMÆROPS Lin.

C. humilis L. — *Lamk.* Encycl. tab. 900; *Nouv. Duham*, VII, tab. 58. — Sicilia, Mauritan. et Hispania.

C. conduplicata J. Kickæ.

var. hermaphrodita.

— *tomentosa*.

C. macrocarpa Hort. berol. (1) — Africa borealis.

Chamæripes minor Gærtn. Fruct. I, tab. 9.

C. humilis var. β. Loisel.

C. — macrophylla Hort. Hamma.

var. elegans.

(1) Il y a deux espèces de vrais *Chamærops* en Algérie : l'un à fruits ronds, sucrés, mangeables; l'autre à fruits oblongs et qui exhalent à la maturité une odeur repoussante d'acide butyrique.

SABAL Adans.**S. Palmetto** Lodd. — Louisiana.

Chamærops Palmetto Michx, Arb. amer. II, tab. 40.

BRAHEA Mart.**B. filamentosa** Wendl. — Gard. chron. 1876, p. 80. — Orégon.

Pritchardia filifera Hort.

GRAMINEÆ

ARUNDO Lin.**A. Donax** L. — Host. Gram. IV, tab. 38; Mutel. Fl. fr., fig. 78. — Europa australis.

A. sativa Lamk.

Donax arundinaceus Beauv. Agrost., tab. 16, fig. 4 et tab. 49, fig. 4.

var. variegata.

A. mauritanica Desf. — Nees. Gen. I, tab. 36. — Europa australis et Africa borealis.**ARUNDINARIA** Michx. (1).**A. japonica** Sieb. et Zucc. — Japonia.

Bambusa Metake Sieb.

B. mete Hort.

A. Maximowiczii Hort.

(1) La monographie des *Bambusaceæ* de M. le général William Munro m'a servi, presque exclusivement, pour établir l'énumération et la synonymie des espèces de graminées ligneuses réunies à Segrez.

A. falcata Nees. — *Rupr.* Bult. Petersb., p. 115, tab. 3, fig. 8.

— Himalaya et Nepalia.

A. interrupta Trin.

Bambusa gracilis Hort. (non Wall.).

THAMNOCALAMUS FALCON.

T. Falconeri Hook. — Himalaya.

PHYLLOSTACHYS Sieb. et Zucc.

P. bambusoides Sieb. et Zucc. — Japonia, China et Himalaya.

Bambusa reticulata Rupr.

B. bifolia Sieb.

B. Metake Aliq. Hort.

P. nigra Munro. — China et Japonia.

Arundarbor nigra Rumph.

Bambusa nigra Lodd.

B. puberula Miquel.

B. Duquilloi ? Carr.

BAMBUSA Schreber.

B. angulata Munro. — China.

Vulg. *Bambou à tiges carrées* Hort. — Rev. Hort. 1876, fig. 3.

B. flexuosa Munro. — China.

B. Fortunei, Van-Htte Fl. des serres XV, tab. 1535. — Japonia.

B. Fortunei foliis niveo-vittatis Hort. Van-Htte.

B. picta Sieb. et Zucc. (non Lind.).

B. variegata Sieb.

B. nana, *Roxb.* — China et Japonia.

B. glauca *Lodd.*

B. glaucescens *Sieb.*

B. viridi-glaucescens *Carr.*

Arundinaria glaucescens *Pal. de Beauv.* — *Rupr.*,

Bambus. tab. 1, fig. 3.

SPECIES IN HORTIS EUROPEIS NUPERRIME INTRODUCTÆ,
SED ADHUC IMPERFECTE NOTÆ.

B. aurea *Sieb.* apud *Miquel.* — Japonia.

B. aureo-striata *Reg.* *Gartenfl.* 1865, tab. 490, fig. 3 et 4.

Phyllostachys ? *Munro.*

B. argenteo-striata *Reg.* *Gartenfl.* 1865, tab. 491, fig. 5.

Affin. *B. Fortunei* *Van-Htte*, ex *Munro.*

B. striata *Lodd.* — China.

B. viridi-striata *Hort.*

B. Quihoui *Hort.* — Japonia septentrionalis.

B. violescens *Hort.* — China.

B. Ragamowski *Hort.*

B. Simoni *Carr.*

B. albo-striata *Hort.*

DENDROCALAMUS *Nees.*

D. latifolius *Munro* *Bambus.*, tab. 6. — China.

Bambusa verticillata *Benth.* *Fl. Hongk.* (non *Willd.*,
nec *Hook.* et *Arn.*).

D. strictus *Nees.* — India orientalis.

Bambusa stricta *Roxb.* — *Rupr.* *Bambus.*, tab. 12.

Bambusa verticillata *Rotler* (non *Willd.*, nec *Benth.*,
nec *Hook.* et *Arn.*).

TABLES

PREFACE	Pages. 1
Extrait du Rapport de la Commission de la Société centrale d'horti- culture, chargée de visiter les collections dendrologiques de Segrez.	XX
Auteurs et ouvrages cités.	XXXIII
Enumération des espèces.	1
Tables.	307

TABLE ALPHABÉTIQUE

NOTA : Les noms génériques adoptés sont en caractères romains ordinaires , les noms synonymes ou d'espèces reportées dans un autre genre, en caractères *italiques* ; les noras vulgaires ou français en PETITES CAPITALES ; et les noms de familles en GRANDES CAPITALES.

A		pages.		pages
Abelia	143	Akebia	40	
Abies.. . . .	234	ALANGIÉE.	413	
<i>Abies</i>	244, 267, 268, 269, 270	ALATERNE, voir Rhamnus Alaternus.		
<i>Abies</i> , voir Cedrus.		Albizzia.	67	
— — Larix.		ALISIER.	99	
— — Pseudolarix.		<i>Alnaster</i>	222	
— — Cunninghamia.		Alnus.. . . .	222	
ABRICOTIER	69	ALVIEZ.. . . .	232	
Absinthium.	143	AMANDIER, voir Amygdalus.		
<i>Acacia</i>	66, 67	AMARANTACÉE.	183	
Acanthopanax.	126	Amelanchier.	102	
Acer.	26	<i>Amelanchier</i>	82	
<i>Acer</i>	30	<i>Ammyrsine</i>	139	
ACERINÉE.	26	Amorpha.	60	
Actinidia.	10	ANPELIDÉE.	34	
Adelia.	173	Ampelopsis.	34	
Ægle.	24	<i>Ampelopsis</i>	36, 54	
Æsculus.	30	<i>Ampelygonum</i>	183	
<i>Æsculus</i>	32, 33	<i>Amygdalopsis</i>	70, 72, 73	
Ailanthus.	40	Amygdalus.	67	
<i>Ailanthus</i>	34	<i>Amygdalus</i>	68, 69, 72	
ALONC.	55	<i>Anagyris</i>	55	
		<i>Ancistrum</i>	83	

	pages.		pages.
<i>Boehmeria</i>	496	<i>Campsis</i>	176
Bois d'Arc.	242	<i>Campylotropis</i>	65
— DE SAINTE-LUCE	76	CANNE DE PROVENCE, voir <i>Arundo</i> .	
Boldu.	192	CAPPARIDÆ.	16
BORRAGINÆ.	177	<i>Capraria</i>	178
<i>Borya</i>	173	<i>Caprifolium</i>	137 à 142
BOULE DE NEIGE.	136	<i>Caragana</i>	62
BOULEAU, voir <i>Betula</i> .		<i>Caragana</i>	63
BOURGÈNE.	49	<i>Cardiandra</i>	124
Brahea.	304	<i>Carniola</i>	57
Broussonetia.	241	<i>Carpinus</i>	214
BRUGNONIER.	68	<i>Carpinus</i>	214
Brunniehia.	184	<i>Carya</i>	216
Bryanthus.	152	<i>Caryotaxus</i>	296
Buddleia.	177	<i>Cassandra</i>	150
<i>Buddleia</i>	178	<i>Cassiope</i>	151
Buis, voir <i>Buxus</i> .		CASSIS, voir <i>Ribes nigrum</i> .	
Buisson ARDENT, voir <i>Cratægus pyra-</i>		<i>Castanea</i>	209
cantha.		<i>Castanea</i>	209, 210
Bumelia.	460	<i>Castanopsis</i>	209
<i>Burcardia</i>	179	<i>Casuarina</i>	243
Bupleurum.	125	CASUARINÆ.	243
BUXAGÆ.	194	Catalpa.	175
<i>Buxus</i>	194	<i>Ceanothus</i>	50
<i>Buxus</i>	195	CÉDRATIER.	24
		CÈDRE DU COMTE DE DIJON.	268
		— DU LIBAN.	268
		— DE VIRGINIE.	290
		— PLEUREUR.	267
		— ROUGE.	290
		<i>Cedrela</i>	34
		<i>Cedrus</i>	267
		CELASTRINÆ.	41
		<i>Celastrus</i>	43
		<i>Celastrus</i>	42
		CELTIDÆ.	238
		<i>Celtis</i>	238
		CEMBRO.	252
		<i>Cephalanthus</i>	143
		<i>Cephalotaxus</i>	295
		<i>Cephalotaxus</i>	293, 294
		<i>Cerasus</i>	72
		<i>Cerasus</i>	71, 72, 73
		<i>Cereis</i>	65

C

<i>Callicarpa</i>	479
<i>Calligonum</i>	183
<i>Callitris</i>	274
<i>Callitris</i>	274
<i>Calluna</i>	151
<i>Calobotrya</i>	121
<i>Calophaca</i>	63
<i>Calothyrsus</i>	33
<i>Calusparassus</i>	241
CALYCANTHÆ.	111
<i>Calycanthus</i>	111
<i>Calycanthus</i>	112
<i>Camellia</i>	22
<i>Camphora</i>	191

	pages.		pages
CERISIER.	72	CONIFERÆ.	244
Cestrum.	482	COPALME, voir Liquidambar.	
Chænomeles.	110	<i>Corechorus</i>	77
CHALEF, voir <i>Etæagnus angustifolia</i> .		<i>Cordia</i>	177
Chamæbatia.	83	CORDIACEÆ.	177
<i>Chamæcerasus</i>	140	<i>Coriaria</i>	40
<i>Chamæcyparis</i>	278, 282	CORIARIÆÆ.	40
<i>Chamaripes</i>	303	CORMIER, voir Cormus.	
Chamærops.	303	Cormus.	101
<i>Chamarops</i>	303	CORNEÆ.	129
CHARME, voir <i>Carpinus</i> .		CORNOUILLER, voir <i>Cornus</i> .	
CHATAIGNIER, voir <i>Castanea</i> .		<i>Cornus</i>	129
CHÈNE, voir <i>Quercus</i> .		<i>Cornus</i>	129
CHÈNE CASTILLAN.	498	<i>Coronilla</i>	64
— LIÈGE.	197	CORYLÆÆ.	211
<i>Chenopodium</i>	188	<i>Corylopsis</i>	128
Chimonanthus.	112	<i>Corylus</i>	211
<i>Chionanthus</i>	173	Coloneaster.	96
CHLORANTHÆÆ.	496	COUDRIER, voir <i>Corylus</i> .	
Chloranthus.	496	<i>Cratægus</i>	89
<i>Chrysobotrya</i>	121, 122	<i>Cratægus</i> . 89, 97-102, 107, 108, 109	109
Cinnamomum.	491	<i>Croton</i>	193
CIRIER, voir <i>Myrica</i> .		Cryptomeria.	272
<i>Cissus</i>	35, 36	Cudrania.	243
CISTINÆÆ.	17	Cunninghamia.	270
Cistus.	18	<i>Cunninghamia</i>	270
Citharexylum.	178	Cupressus.	278
CITRONNIER.	23	<i>Cupressus</i> . 272, 273, 274, 277, 281,	289, 292
<i>Citrus</i>	23	CUPULIFERÆ.	496
<i>Citrus</i>	24	Cydonia.. . . .	110
Cladrastis.	55	<i>Cydonia</i>	110
Clematis.	1	<i>Cynanchum</i>	175
Clerodendron.	179	CYPRÈS, voir <i>Cupressus</i> .	
Clethra.	147	CYPRÈS CHAUVÉ.	272
Cleyera.	21	— DE LA LOUISIANE.	272
<i>Cleyera</i>	22	Cytisus.	58
Cneorum.	40	<i>Cytisus</i> 56, 57, 59, 60, 63	
Coeculus.	11		
COIGNASSIER	111		
Colletia.	50		
Colutea.. . . .	63		
<i>Columba</i>	244		
COMPOSITÆ.	144		
Comptonia.	218		

D

Dabœcia.	152
Dacrydium	292

	pages.		pages.
<i>Dacrydium</i>	274	ERABLE, voir Acer.	
Dammara	244	ERABLE PLANE	28
Danae	300	Erica	131
Daphne	186	<i>Erica</i>	151, 152
<i>Daphne</i>	188	ERICACEÆ	146
Decumaria	117	Eriobotrya	107
Deeringia	183	Escallonia	122
Dendrocalamus	306	<i>Escallonia</i>	16
Desfontainea	182	Eugenia	117
Desmodium	64	EUPHORBACEÆ	193
Deutzia	116	Euptelea	128
<i>Deutzia</i>	114, 115	Eurya	21
DICOTYLEDONEÆ	4	<i>Eurya</i>	42
Diervilla	136	Eurybia	145
DILLENIACEÆ	10	<i>Eurybia</i>	145
<i>Dimorphanthus</i>	125	Euscaphis	41
Diospyros	161	Evonymus	41
Dirca	186	<i>Evonymus</i>	43
Distegocarpus	214	Excæcaria	193
Distylium	128	Exochorda	82
Docynia	110	<i>Exochorda</i>	83
<i>Dombeya</i>	241		
<i>Donax</i>	304		
Drymis	6		
Duvaua	54		
		F	
		Fabiana	182
		<i>Fadyenia</i>	128
		<i>Fagara</i>	39
		Fagus	210
		<i>Fagus</i>	209, 211
		Fatsia	129
		FÉVIER, voir Gleditschia.	
		Ficus	211
		FIGUIER, voir Ficus.	
		Fitz-Roya	275
		<i>Flacourtia</i>	17
		<i>Fluggea</i>	191
		Fontanesia	167
		Forestiera	173
		FORESTIERE F	173
		Forsythia	168
		<i>Fortunea</i>	218
		Fothergilla	127
		FRAGON	300
E			
EBENACEÆ	161		
EBÈNIER (faux), voir Laburnum.			
Edgeworthia	158		
Edwardsia	55		
ELÆAGNEÆ	189		
Elæagnus	189		
Embothrium	185		
<i>Emerus</i>	64		
EMPETRACEÆ	195		
Empetrum	195		
Ephedra	243		
EPICEA	263		
Epigæa	148		
EPINE NOIRE	70		
EPINE-VINETTE, voir Berberis.			

	pages.		pages.
Fraxinus.	162	Hamamelis.	427
FRÊNE, voir Fraxinus.		<i>Hamamelis</i>	427
FRÊNE DE CRIMÉE	164	Halesia.	162
Frenela	274	<i>Halesia</i>	161
Freylinia.	178	Hedera	126
		Hedysarum.	64, 65
G		Helianthemum.	17
<i>Galphimia</i>	179	Helwingia	184
Garrya.	128	HELWINGIACEÆ	184
GARRYACEÆ	128	HEMLOCK-SPRUCE	265
Gaultheria.	148	Heteromcles	107
Geblera	194	HÊTFE, voir Fagus.	
GENÊT, voir Genista.		Hibiscus	18
GENÊT A BALAI.	56	HIPPOCASTANEÆ	30
GENÉVRIER, voir Juniperus.		Hippophaë	190
Genista.	59	<i>Hippophaë</i>	190
<i>Genista</i>	56, 57, 58	Holboellia.	10
GESNERIACEÆ	145	Houx, voir Hlex.	
Gingko.	290	Houx (PETIT).	300
Gleditschia	66	Hovenia	52
GLYCINE	65	Hydrangea	123
Glyptostrobis.	273	<i>Hydrangea</i>	124
<i>Glyptostrobis</i>	273	HYPERICINEÆ	24
GNETACEÆ	243	<i>Hypericum</i>	24
Gordonia.	22		
Grabowskia	181	I	
GRAMINEÆ	304	<i>Ibulla</i>	171
GRANATEÆ.	112	Idesia.	17
GRENADIER, voir Punica.		If	292
Grevillea	185	Hlex.	43
GRIOTTIER	74	<i>Hlex</i>	48, 169
GRISARD.	225	ILICINEÆ	43
GROSEILLIER, voir Ribes.		Illicium	6
<i>Grossularia</i>	118	Indigofera	60
GLOSSULARIÆ.	118	Isomeris.	16
GUIGNIER	74	Itea.	122
<i>Guilandina</i>	66	Iva	114
Gymnocladus	66		
		J	
H		Jamesia	122
Halimodendron	63	JASMINEÆ.	174
HAMAMELIDEÆ.	127		

	pages.
Jasminum	174
JASMIN, voir Jasminum.	
JONC-MARIN.	55
JUGLANDE.E	215
Juglans.	215
<i>Juglans</i>	716, 217
JUTTEIER, voir Zizyphus.	
JULIBRISSIN, voir Albizzia.	
Juniperus.	283
<i>Juniperus</i>	283

K

Kadsura	9
<i>Kadsura</i>	9
Kalmia.	159
Kerria	77
<i>Keteleeria</i>	267
<i>Kirri</i>	178
Kœlreuteria	33
<i>Kolomikta</i>	40

L

LABIATÆ.	180
Laburnum.	59
Lagerstrœmia.	114
Lapageria	300
Lardizabala.	41
LARDIZABALE.E	40
Larix	268
LAURIER, voir Laurus.	
— D'APOLLON, voir Laurus nobilis.	
— A SAUCES, — — —	
— TIN, voir Viburnum Tinus.	
— ALEXANDRIN.	200
— DE PORTUGAL	77
— CERISE.	77
LAURINE.E.	190
Laurus.	190
<i>Laurus</i>	191, 192

	pages.
Ledum.	159
<i>Ledum</i>	159
<i>L. iophyllum</i>	159
LEGUMINOS.E	54
Lembotropis.	59
Lespedeza.	64
<i>Lespedeza</i>	64, 65
Leucothœ	149
<i>Leucothœ</i>	148
Leycesteria	143
<i>Leycesteria</i>	183
Libocedrus.	274
<i>Ligustridum</i>	172
Ligustrina	170
<i>Ligustrinum</i>	178
Ligustrum	171
<i>Litac</i>	168, 169
LILAS, voir Syringa.	
LILIACE.E.	304
Lindera.	192
Lindleya	83
Liquidambar	219
<i>Liquidambar</i>	218
Liriodendron.	9
Liriopsis	8
Lithospermum	177
Litræa.	54
Litsæa	192
Loiseleuria.	153
Lonicera	137
<i>Lonicera</i>	135, 136
LONICERE.E.	132
Lycium	181
<i>Lycium</i>	144, 181
Lyonia	149
<i>Lyonia</i>	149, 150
LYTHRARIÆ.E.	113

M

<i>Maakia</i>	55
Machilus	191

	pages.		pages.
OLIVIER, voir Olea.		Persca	191
ORANGER.	23	Persica	68
— A FEUILLES DE MYRTIE.	23	Pcumus	192
— DES OSAGES.	242	PEUPLIER, voir Populus.	
Oreopanax	125	— D'ITALIE.	226
ORME, voir Ulmus.		— SCISSE.	226
ORME D'OXFORD.	276	— DE LA CAROLINE	227
Ornus.	162, 163	Phellodendron.	39
OSIER JAUNE.	228	PHILADELPHÉE.	114
— ROUGE.	231	Philadelphus.	114
Osmanthus.	169	Philesia	300
Ostrya	214	Phillyrea.	170
Ostrya.	214	Phlomis	180
Ostryopsis.	213	Photinia	107
Ostryis.	184	Photinia	106
Oxycedrus.	285, 286	Phyllococe.	152
Oxycocens	146	Phyllostachys	305
Oxydendron.	149	Picea, voir Abies.	
Ozothamnus.	144	Pieris.	148
P		PIN, voir Pinus.	
PACANIER? voir Carya olivæformis.		Pin à parasol.	248
Padus.	76	— à trochets.	246
Pæonia.	5	— chétif	248
Paliurus	48	— de Corté.	246
PALME	303	— du Lord.	254
Panax.	125, 126	— du Lord Weymouth.	254
Panicum.	306	— pauvre.	248
Papyrus.	242	— pleureur.	253
Papyrus	241	Pinckneya.	144
Parrotia	127	Pinus.	244
Passiflora	118	Pinus, voir Abies.	
PASSIFLOREE.	118	— — Cedrus.	
Paulownia	178	— — Larix.	
Pavia	32	— — Sciadopitys.	
Pavia.	31, 33	Piper.	496
PÊCHE-PLATE.	69	PIPERACEE.	196
PÊCHER	68	Pipthanthus	55
Peraphyllum	107	Pirus.	104
Perilymenum	138	Pirus	96 à 111
Periploca	175	PISTACHIER, voir Pistacia.	
Pernettya	147	Pistacia.	52
		Pivoine, voir Pæonia.	
		Plagianthus.	18
		Planera.	237

	pages.
<i>Planera</i>	237, 238
PLAQUEMINIER voir Diospyros.	
PLATANE E	219
<i>Platanus</i>	219
<i>Platanus</i>	219
<i>Platycarya</i>	218
<i>Platyclusus</i>	276, 278
<i>Platycrater</i>	123
<i>Podocarpus</i>	296
<i>Podocarpus</i>	295, 296
<i>Podocytisus</i>	59
<i>Pœderia</i>	144
POIRIER, voir <i>Pyrus</i> .	
POIRIER SAUCER	103
<i>Polycarpa</i>	17
<i>Polygala</i>	17
POLYGALE.E	17
POLYGONACE.E	183
<i>Polygonum</i>	183
<i>Polygonum</i>	184
<i>Poma</i>	102
POMACE.E	89
<i>Pomaderis</i>	52
POMMIER, voir <i>Malus</i> .	
<i>Populus</i>	224
<i>Potentilla</i>	83
<i>Pourthiæa</i>	106
<i>Prinos</i>	48
<i>Pritchard a</i>	304
PROTEACE.E	185
PRUNELIER	0
PRUNIER	70
<i>Prumnopitis</i>	297
<i>Prunus</i>	70
<i>Prunus</i>	10, 69-77
<i>Pseudægle</i>	24
<i>Pseudolarix</i>	270
<i>Pseudotsuga</i>	267
<i>Ptelea</i>	59
<i>Pterocarya</i>	217
<i>Pterostyrax</i>	162
<i>Punica</i>	112
<i>Pyracantha</i>	89

Q

	pages
<i>Quadrifaria</i>	244
<i>Quercus</i>	196

R

RAGOUNMIER	72
<i>Rajania</i>	10
RANUNCULACE.E	1
<i>Raphiolepis</i>	109
<i>Rabis</i>	120
<i>Retama</i>	56
<i>Pectinospora</i>	279, 280, 281, 282
RUAMNE.E	48
<i>Rhamnus</i>	49
<i>Rhamnus</i>	48, 238
<i>Rhododendron</i>	155
<i>Rhododendron</i>	153, 154, 155, 158
<i>Rhodolia</i>	128
<i>Rhodora</i>	158
<i>Rhodotamnus</i>	158
<i>Rhodotypos</i>	77
<i>Rhus</i>	52
<i>Rhynchospermum</i>	175
<i>Ribes</i>	118
<i>Ribes</i>	118
<i>Robinia</i>	61
<i>Robinia</i>	62, 63
<i>Robsonia</i>	118
RONCE, voir <i>Rubus</i> .	
<i>Rosa</i>	85
ROSINE.E	67
ROSIER THÉ	85
— ÎLE BOURBON	85
— HYBRIDE REMONTANT	85
— DE NOISETTE	85
— DU BENGAL	86
— CAPUCINE	86
— POMPON	87
— PERPÉTUEL OU DU ROI	87

	pages.		pages.
ROSIER A CENT FEUILLES	87	Sciadopitys	271
— MOUSSU	87	SCROPHULARINÆ	177
— DE PROVINS	87	Sebastiania	193
<i>Rottlera</i>	193	Securinea	194
RUBIACEÆ	143	Sequoia	271
Rubus	83	SERINGAT, voir Philadelphus.	
Ruscus	300	Serissa	144
<i>Ruscus</i>	300	Shepherdia	190
Ruta	39	<i>Sideroxylon</i>	160
RUTACEÆ	39	Skimmia	40
S		SKIMMIEÆ	40
		SMILACINÆ	299
Sabina	292	Smilax	299
SALICINÆ	244	SOLANACEÆ	181
<i>Salisburia</i>	296	Solanum	182
Salix	227	Sophora	54
SALSEPAREILLE, voir Smilax.		<i>Sophora</i>	54
Salsola	188	SORBIER, voir Sorbus.	
Sambucus	132	Sorbus	100
<i>Sambucus</i>	41	<i>Sorbus</i>	97 à 101, 108
Santolina	145	SAPIN BEAUMIER	258
SAPIN, voir Abies.		SAPINETTE BLANCHE	260
SAPIN ARGENTÉ	256	— BLEUE	260
— DE NORMANDIE	256	— NOIRE	261
SAPINDACEÆ	33	— ROUGE	261
Sapindus	33	Spartium	56
SAPOTIÆ	160	<i>Spartium</i>	56, 57, 58
Sarcococca	193	Spiræa	78
Sarothamnus	56, 57, 58	<i>Spiræa</i>	77, 82
Sassafras	191	Stachyurus	21
SAULE, voir Salix.		Staphylea	41
SAULE BLEU	230	STAPHYLEACEÆ	41
— D'AMÉRIQUE	231	Stauntonia	11
— EN CANDELABRE	230	<i>Stauntonia</i>	10
— PLEUREUR	228	Sterculia	18
Saxe-Gotha	292	STERCULIACEÆ	18
SAXIFRAGEÆ	122	Stillingia	193
Schizandra	9	<i>Stillingia</i>	193
SCHIZANDRÆÆ	9	Stranvæsia	97
<i>Schobertia</i>	188	Stuartia	22
<i>Schubertia</i>	272, 273	Styphnolobium	54
		Styphonia	54
		STYRACEÆ	161
		Styrax	161

	pages.		pages.
<i>Suæda</i>	188	TILLEUL, voir <i>Tilia</i> .	
SUMAC, voir <i>Rhus</i> .		<i>Tomex</i>	492
SUREAU, voir <i>Sambucus</i> .		Torminaria.	100
Swammerdamia.	144	Torreya.	296
SICOMORE.	26	<i>Trachelospermum</i>	173
<i>Symphoria</i>	442	Trachycarpus.	303
Symphoricarpos.	442	TREMELE.	223
<i>Symplocos</i>	44	<i>Triadica</i>	193
<i>Syringa</i>	168	Trochostigma.	10
<i>Syringa</i>	168, 170	TROENE, voir <i>Ligustrum</i> .	
		<i>Tsuga</i>	263, 266, 267
		TULAPIER, voir <i>Liriodendron</i> .	
		<i>Turpinia</i>	54
T			
Talauma.	9		
TAMARISCINEE.	112	U	
<i>Tamariscus</i>	113	<i>Ulex</i>	55
Tamarix.	112	ULMACEE.	234
<i>Tamarix</i>	113	<i>Ulmus</i>	234
Taxodium.	272	<i>Ulmus</i>	238
<i>Taxodium</i>	271, 272, 273	UMBELLIFERE.	123
Taxus.	292	Ungnadia.	33
<i>Taxus</i>	271, 293, 296, 297	<i>Urtica</i>	196
Tecoma.	476	URTICEE.	196
TEREBINTHACEE.	52		
Ternstroemia.	21		
TERNSTROEMICEE.	21	V	
Tetranthera.	192	VACCINIEE.	145
Teucrium.	180	<i>Vaccinium</i>	145
Thamnocalamus	305	<i>Vaccinium</i>	146
Thé, voir <i>Thea</i> .		VERBENACEE.	178
<i>Thea</i>	22	Veronica.	178
Thermopsis.	55	Viburnum.	134
Thuyopsis.	278	VIGNE, voir <i>Vitis</i> .	
<i>Thuyopsis</i>	275, 277, 279, 280	Villbrunea.	196
Thuya.	275	VINETIER, voir <i>Berberis</i> .	
<i>Thuya</i>	271, 281	<i>Viorna</i>	2
THUYA DE L'ALGÉRIE.	274	Viorne, voir <i>Viburnum</i> .	
Thymelca.	188	<i>Virgilia</i>	55
<i>Thymelca</i>	186, 187	Vitex.	180
THYMELEE.	186	Vitis.	35
<i>Tilia</i>	18		
TILIACEE.	18		

	pages.
<i>Vitis</i>	35
<i>Volkameria</i>	179

Y

W	
<i>Washingtonia</i>	271
<i>Weigelia</i>	136
<i>Wellingtonia</i>	271
<i>Wickstrœmia</i>	188
<i>Wistaria</i>	65

X

<i>Xanthoceras</i>	33
<i>Xanthorrhiza</i>	5
<i>Xylosteum</i>	140, 142

pages

YEUSE, voir <i>Quercus Ilex</i> ,	
YPRÉAU, voir <i>Populus alba</i> .	
<i>Yucca</i>	301
<i>Yulania</i>	7, 8

Z

ZANTHOXYLEE	39
<i>Zanthoxylum</i>	39
<i>Zelkova</i>	238
<i>Zenobia</i>	148
<i>Zizyphus</i>	48
<i>Zizyphus</i>	48

LIBRAIRIE DE J.-B. BAILLIÈRE & FILS

- BEILYNCK (A.).** — Cours élémentaire de botanique. Deuxième édition. 1876, gr. in-8, 680 pag., avec 900 fig. 10 fr.
- BLANCHARD (E.).** — Les Poissons des eaux douces de la France. Anatomie, physiologie. Description des espèces, mœurs, instincts, industrie, commerce, ressources alimentaires, pisciculture; législation concernant la pêche. Gr. in-8, 656 pag., avec 151 fig. dessinées d'après nature. 12 fr.
- BREHM.** — La vie des animaux illustrée, ou Description populaire du règne animal. Caractères, mœurs, instincts, habitudes et régime, classes, combats, captivité, domesticité, acclimatation, usages et produits.
— Les mammifères. Ouvrage complet, 2 v. gr. in-8, avec 800 fig. et 40 pl. 21 fr.
— Les oiseaux. Ouvrage complet, 2 vol. gr. in-8, avec 500 fig. et 40 pl. 21 fr.
- BRONGNIART (Ad.).** — Énumération des genres de plantes cultivées au Muséum d'histoire naturelle de Paris, suivant l'ordre établi dans l'Ecole de botanique. Deuxième édition, avec une table générale alphabétique. 1850, in-12, 3 fr.
- CHATIN (J.).** — Du siège des substances actives dans les plantes médicinales. 1876, in-8 de 173 pag., avec 2 pl. 3 fr. 50.
- DUCHARTRE (P.).** — Éléments de botanique comprenant l'anatomie, l'organographie, la physiologie des plantes, les familles naturelles et la géographie botanique. Deuxième édition. 1877, 4 vol. in-8 de 1280 pag., avec 510 fig. dessinées d'après nature, par A. Riocreux, cart. 20 fr.
- DUVAL-JOUVE.** — Histoire naturelle des Equisetum de la France. 1864, in-4, viii-296 pag., 10 pl. gravées, en partie colorées, avec 33 fig. 20 fr.
- GAUDICHAUD.** — Botanique du voyage autour du monde exécuté sur la corvette la Bonite (Amérique méridionale, Océanie, Chine): 1^o Cryptogames cellulaires et vasculaires (Lycopodiacees), par MONTAGNE, LÉVELLE et SPRING. 1844-46, 4 vol. in-8, 356 pag.; 2^o Botanique, par GAUDICHAUD. 1851, 2 vol. in-8; 3^o Atlas de 150 planches in-folio; 4^o Explication et Description des planches de l'Atlas, par M. Ch. d'ALLEZETTE. 1866, in-8, 186 pag. Prix réduit. 80 fr.
Séparément: l'Explication et description des planches. Paris, 1866, in-8, 6 fr.
- GERMAIN (de Saint-Pierre).** — Nouveau Dictionnaire de botanique, comprenant la description des familles naturelles, les propriétés médicales et les usages économiques des plantes, la morphologie et la biologie des végétaux (étude des organes et étude de la vie). 1870, 1 vol. in-8 de xvi-1388 pag. avec 1460 fig. 25 fr.
- GODRON (D.-A.).** — De l'espèce et des races dans les êtres organisés, et spécialement de l'unité de l'espèce humaine. 2^e édition. Paris, 1872, 2 v. in-8. 12 fr.
- GRENIER (Ch.).** — Tableau analytique des familles de la Flore de France. Paris, 1874, in-8, 27 pag. 1 fr.
- GRISEBACH (A.).** — La végétation du globe d'après sa disposition suivant les climats; esquisse d'une géographie des plantes, traduit par P. de TCHATCHEFF, et accompagné d'une carte générale des domaines de végétation.
TOME 1^{er}, in-8 de 765 pag. 16 fr.
TOME II, 4^{re} partie, in 8 de 448 pag. 7 fr. 50
- JAUME SAINT-HILAIRE (J.-H.).** — Exposition des familles naturelles et de la germination des plantes. 1805, 2 vol. in-4, avec 117 pl. coloriées. 20 fr.
- JUSSIEU (A.-L.).** — Principes de la méthode naturelle des végétaux. 1824, in-8, 51 pages. 1 fr.
- LAMOTTE (Martial).** — Catalogue des plantes vasculaires de l'Europe centrale, comprenant France, Suisse, Allemagne. 1847, in-8 de 104 pag. 2 fr. 50.
- LOISELEUR-DESLOUCHAMPS (J.-L.-A.).** — Flora gallica. Editio secunda, 1828, 2 vol. in-8, avec 31 planches. 4 fr. 50.
— Nouvel herbier de l'amateur, contenant la description, la culture, l'histoire et les propriétés des plantes rares et nouvelles cultivées dans les jardins de Paris. Paris, 1830-1838, 1 vol. in-8, avec 52 planches coloriées. 40 fr.
Le même, in-4. 50 fr.
- PLÉE (F.).** — Glossologie botanique, ou Vocabulaire donnant la définition des mots techniques usités dans l'enseignement. 1854, in-12, 72 pag. 1 fr. 25
- VERLOT (B.).** — Le Guide du botaniste herborisant, conseils sur la récolte des plantes, la préparation des herbiers, l'exploration des stations de plantes phanérogames et cryptogames et les herborisations. 1865, 1 v. in-18 de 600 pag., avec fig. cart. 5 fr. 50

New York Botanical Garden Library

QK480.F7 A726 1877

gen

Lavallee, Alphonse/Arboretum Segrezianum

3 5185 00023 5935