26.

STRANI FENOMENI

OSSERVATI

SULL'UOVO DI GALLINA

MEMORIA

DEL CAV. PROF. VINCENZO DIORIO

ESTRATTO DAGLI *ATTI DELL'ACCADEMIA PONTIFICIA DE' NUOVI LINCEI*,
ANNO XXIV, SESSIONE III. DEL 7 MAGGIO 1871.

R O M A

TIPOGRAFIA DELLE SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE
Via Lata, N° 211 A.

1871

Digitized by the Internet Archive
in 2016

<https://archive.org/details/stranifenomenios00dior>

STRANI FENOMENI
OSSERVATI NELL'UOVO DELLA GALLINA DOMESTICA

Ho l'onore di richiamare l'attenzione dell'Accademia su due strani fenomeni accaduti, per quanto se ne disse a me, spontaneamente nelle uova della Gallina domestica (*Phasianus gallus*, Foem. Lin.). Questi per verità costituirebbero, l'uno un fatto, e l'altro un problema che, a mio credere, attenderà ancor lungamente prima di essere risoluto dalla scienza. Consiste il primo in un uovo che presenta dipinta sulla superficie del guscio l'*area vascolare sanguigna*, la quale cinge l'*area germinativa* dentro delle uova ingallate, alla fine del secondo giorno d'incubazione (1). Si riduce il secondo ad un uovicino tutto completo, cioè a dire munito financo del guscio suo calcareo, che mi si volle persuadere da persona autorevole, rinvenuto così dentro di un uovo ordinario, rotto a caso per gli usi della economia domestica, sullo scorcio dell'Aprile passato. Intorno all'uno ed all'altro preteso fenomeno, dirò succintamente il mio opinamento.

Per quanto io mi sappia, nessun fisiologo ha fissato la sua attenzione intorno al primo fatto annunziato. Ne è già ch'io lo creda difficile ad accadere ne' nostri climi, e con le costumanze de' nostri proventieri, soprattutto in certe stagioni dell'anno; ma sì lo ritengo fra quei molti che passano inavvertiti e forse ignoti ai cultori delle scienze naturali, che avvezzi a ricercare fra più sublimi sfere i temi de' loro studj, si dispensano talora dallo esaminare la natura negli argomenti, i quali non perciò che sieno più umili riescono sempre meno interessanti. Ed a non dipartirmi dall'esempio avanzato, chi mai potrà non meravigliarsi scorgendo diseguate dalla natura sù di un guscio calcareo le traccie sensibili di quelle operazioni organico-vitali, che compendosi ove lo sguardo umano non può giungere, ci rivelano agli occhi la vita operante con misterioso artificio nell'uovo incubato, dentro del quale sì v'è nascostamente organizzando un essere novello? I fisiologi costretti a strappare dalle vittime sacrificate alla scienza, il verdetto di una vita che

(1) Debbo alla gentilezza del collega Prof. Socrate Cadet il possesso di questa anomalia.

fugge loro sott'occhio, non isgradiranno adunque di vedere per tal modo, confermato dalla natura stessa, uno dei fatti più interessanti della embriologia, lo sviluppo cioè del sangue e dei vasi che lo canalizzano, e quindi lo stabilimento di una circolazione primordiale nel pulcino; laddove nè vasi, nè sangue si rinvenivano fra le membrane o negli umori entro de' quali il corpicciuolo suo si manifesta: ne è a dire che in tal caso dal di fuori quel umore gli possa essere trasfuso. Lo che se non rivela la esistenza di una forza propria, passata ereditariamente al novello essere dalla materia organizzata che per mandato del Fattore supremo ne è la posseditrice esclusiva, forza sola capace di avvivare i corpi nei quali alberga; non saprei io da che mai trarre argomenti più efficaci a costatarne la indubitabile esistenza. Ma non volendo adesso occuparmi fuori di luogo di argomenti di filosofia zoologica, vado senza altro alla considerazione del fenomeno indicato.

Il genio immortale del bolognese *Marcello Malpighi* nella lettera che dirresse nell'ottobre dell'anno 1672 alla Reale Società di Londra dando notizia delle interessantissime sue osservazioni sulla formazione del pulcino nell'uovo, descrivendo la *cicatricetta* di un uovo dopo il secondo giorno d'incubazione, si esprimeva così: « In medio umbilicalis area C. locabatur (fig. 24), quae limbi » D, loco zonam albam habebat, et convexa ibidem reddebatur. Haec reticu- » lari vasorum opere E. contegebatur, in quibus rubiginosus humor turge- » bat. Carina, solitis praedita vesiculis et corde, innatabat in colliquamento. » Spatium quod inter circulos A. et umbilicalem aream C. extendebatur, in- » signibus rivulis F. alluebatur; in dextro enim latere veluti a tot distin- » ctis fontibus deducebantur alveoli G. qui ampliores redditus sub area um- » bilicali ultimum sortiebantur terminum: contentus ichor rubiginosus erat » et ejusdem pene naturae ac in corde et vasis observabatur; unde pulcher- » rimum occurrebat spectaculum » (1). Nel caso nostro si stavano evidentemente sviluppando nell'uovo da oltre a due dì, gli effetti di una di quelle incubazioni spontanee delle quali paga lo sconto l'economia domestica sempre e talora eziandio l'umana salute, per l'industre opera dei procaccini che recano sul mercato nei mesi estivi, per la pubblica consumazione, taluni generi di cui non si conosce nè la data, nè il luogo di provenienza, nè le condizioni in cui spesso da una stagione all'altra si tengono conservati con lo scopo di mantenerne più elevato il prezzo.

Il guscio dell'uovo del quale mi vado occupando rivela, s'io mal non mi

(1) Marcelli Malpighi, Op. omn. Lugduni Batav. 1637. Tom. II, pag. 79.

appongo, l'opera inoltrata della putrefazione dopo che le circostanze ebbero interrotto dentro del medesimo il già incominciato sviluppo del germe. Questo per la sospesa spontanea incubazione essendo morto sul nascere, subì le conseguenze necessarie dell'intercettamento della vita, prima di giungere a fruirne alcuno dei compensi. I gas sviluppati nell'uovo così alterato avendo accresciuta l'esosmosi, che a traverso delle membrane dell'uovo naturalmente avea luogo, spinse forse le correnti del fluido sanguigno novello a traverso delle trame vascolari delicatissime. Laonde trasmesso quel fluido, colorato per la prima volta, ed imbrunito probabilmente di più dalla reazione spiegata sul medesimo dal gas idrogeno-solfurato, alle membrane del guscio dalle correnti esosmotiche; si fece strada fra le porosità esistenti nello strato calcareo che costituisce il guscio dell'uovo, e diè luogo così a quella figura anatomica che si vede dipinta sopra il medesimo. Attribuisco alla stessa cagione, ossia ai gas della putrefazione, l'impronta dell'area circolare che si vede tracciata sul polo maggiore dell'uovo (1). Corrisponde la medesima alla camera d'aria, nella quale la raccolta gassosa essendo ristretta entro limiti più angusti, fece maggior violenza contro la parte corrispondente del guscio; e risultato di quella pressione si fù che la crosta calcarea incominciasse già a cedere, distaccandosi parzialmente dal rimanente, siccome si vede sull'esemplare che abbiain sott'occhio e nella annessa tavola viene rappresentato.

Ritornando ora alla faccia principale del nostro uovo dipinto dalla natura (2), se ne scorge il centro occupato da un area ellittica scura, in mezzo a cui ed alquanto lateggiata, apparisce una listerella biancastra, la quale fa sì che la prima prenda l'aspetto di un corpicciuolo piegato ad arco, con una estremità rigonfia, con l'altra acuminata, e con il seno aperto. Tre cerchi eccentrici la circondano. Si staccano dal più interno di questi, a modo di raggi asimmetrici 13 tronchi vascolari, dei quali alcuni camminano come appaiati, ed altri solitarii. Fra gli uni e gli altri decorrono vasi anastomotici che li fanno comunicare scambievolmente fra loro non solo, ma eziandio con i cerchi vascolari esterni, coi quali si vanno quei canali serpeggianti intersecando. Vi si scorge un picciol tronco che mette in comunicazione il secondo dei tre cerchi vascolari suddetti con il terzo od esterno; come pure un altro ve ne ha, che da quest'ultimo si spicca a dirittura per perdersi nell'ombra insieme con gli altri. I vasi usciti dalla cinta vascolare

(1) Vedi la tavola annessa, fig. C.

(2) Vedi la tavola stessa fig. A.

esterna , vanno irraggiando ed irretiscono così tutta la superficie che chiameremo anteriore dell' uovo , mentre due dei medesimi veggonsi in penombra, superato il polo più ristretto, disperdersi nella superficie opposta. Questa (1) apparisce come marmorizzata per chiazze oscure non ben definite , che quà traspariscono discrete, e là confluenti. Se noi non andiamo errati, lo sviluppo della rete vascolare richiama la *figura venosa*, e la prima cinta *annulare* che circonda l'area ellittica suddetta, ricorda la *vena terminalis* dell' Ocken.

Gli artifizi adoperati dagli istologi onde giungere a scuoprire i passi che d'ora in ora l'incubazione va tracciando con gli organici sviluppi dentro l' uovo fecondato della gallina , ed i frutti ubertosi che si raccolsero dalle loro ricerche, appartengono già alla scienza. Il fenomeno che noi presentiamo non serve dunque che a confermare quello ch'era già conosciuto. Ma una prova di tal genere, mentre giova ad aggiunger fede a quanto venne già discoperto da abilissimi naturalisti, rivela forse una nuova sorgente di osservazioni ; che quanto più facili ad eseguirsi , altrettanto più utili forse addiverrebbero per la scienza , e probabilmente non infruttuose per le applicazioni che ne potrebbero fare le scienze economiche e salutari.

Il celebre delle Chiaje scrivea nel 1836, che *lo studio dello sviluppo del pulcino è nato e cresciuto in Italia* (2). Non fù però tra noi che giunse questo alla sua maturità. L'istologia che s'innalzò in quest' ultimi tempi moderatrice prepotente di presso che tutte le scienze naturali e biotiche, non ha percorso ancora tutto il campo che gli è destinato ; e forse taluni di quei fatti che riteniamo come stranissimi e fenomenali, potrà succedere che sieno meglio compresi, e forse anco scientificamente interpretati, in un prossimo avvenire. Ciò non pertanto alcuni se ne annoverano cui si vorrebbe pure trovar posto nella scienza ma sembrano destinati a rimanerne perpetuamente esclusi, almeno infino che le nozioni che abbiamo sulla vita operante negli organismi ed intorno alle funzioni degli organi che la servano, non subiscano un totale sconvolgimento ed un rinnovamento quale non può prevedersi ancora.

Un esempio di questa ultima verità crediamo noi lo si trovi nell'uovicino che presento, il quale costituisce il secondo dei fenomeni de'quali ho inteso parlare.

Un domestico del chño sig. Avvocato G. B. S. rompendo degli uovi di

(1) Vedi la tavola, fig. B.

(2) Istituzioni di anatomia comparata. Napoli 1836. Tomo II, pag. 184.

gallina per uso culinario, dicesi che rinvenisse racchiuso in uno di essi un corpicciuolo, che disceso con la massa liquida che l'involgeva in un sottoposto recipiente, venne riconosciuto per un uovicino tutto formato, il quale presentato al padrone di casa, fù dal medesimo rimesso gentilmente al mio studio siccome fenomeno curioso e strano. L'uovicino speditomi è quello stesso che presento. Misura 15 mill. nel maggior diametro ossia nel bipolare, 12 ne ha nel trasverso maggiore e 10 in quello che tagliando quest'ultimo ad angolo retto, ne lo spartisse in porzioni eguali. L'uovicino è fesso verso il maggior polo irregolarmente; sicchè questa estremità dell'uovo apparisce con una boccuccia sbadigliante circonscritta da labruccie irregolarmente frastagliate. Da questa fenditura è facile il riconoscere che vi fù racchiuso un torlo ed uno albume, e che la membranca testacea non vi facea difetto. Il guscio calcareo è candido ed immacolato, e lo insieme dell'uovicino ricorda le uova dei Canarii (*Fringilla canaria* L.) chiare o non ingallate, facili ad osservarsi nelle cove di questi uccellini addomesticati. Una femmina di questi fino dal 12 di aprile p.^o p.^o emise le prime uova in mia casa. Ora senza le assertive contrarie del domestico del sig. Avvocato suddetto, si direbbe che uno di questi uovicini passato per *scamottaggio* dentro quello di una gallina, mentre si rompeva per farne frittata, fosse addivenuto il soggetto di un preteso fenomeno naturale inesplicabile. Non volendo però noi fondarci sopra supposti di tal genere, toglieremo invece a considerare la questione dal lato scientifico; e memori della storia del *dente d'oro* che in altra epoca non lontana tenne lungamente sospesi gli animi degli scienziati, vedremo se sia possibile il dare del supposto fatto una scientifica spiegazione: e così il ricordare le scoperte della scienza intorno ad argomenti interessantissimi, ci compenserà del tempo che vi spendiam sopra, che altrimenti avrebbe da ritenersi per inutilmente sprecato.

Delle uova chiuse in altre uova, vi sono moltissimi esempi registrati nella scienza, e non ne mancano dei più strani e più curiosi di feti rinvenuti dentro di altri feti, come si hanno pure storie di feti o germi sviluppati entro corpi adulti, in individui nei quali la ragion del sesso si opponeva a qualsiasi altra naturale interpretazione (1). Nelle uova di gallina che adoperiamo nella economia domestica non è raro di rinvenire due torli chiusi in un guscio stesso, e qualche scrittore ricorda, di averne rinvenuti fino tre insieme. In

(1) Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation. Paris 1836. Tome Troisième pag. 582.

quanto a ciò adunque nulla vi avrebbe di strano nel caso nostro astrattamente considerato. Rinvenire peraltro chiuso e sepolto nello albume di un novo di gallina normale e perfetto un altr'uovo, fornito egli pure del suo albume, e quello che è più, del suo *guscio calcareo indurito*, è tale un fenomeno che ripugna decisamente colle leggi anatomiche e fisiologiche finora conosciute, e somiglierebbe quindi ad un prodigio.

Ed invero ammettendo pure che nel caso nostro fosse avvenuto come negli altri casi accennati, il distacco simultaneo di due torli dall'ovajo della gallina; sempre rimarrebbe a spiegare il come ciò avesse potuto fisiologicamente avvenire, in torli fra loro distantissimi per la differenza dello sviluppo. Da poichè la notevolissima disproporzione che vi ha fra i diametri del uovo continente e quelli del contenuto, mette in evidenza che già la caduta simultanea di entrambi nell'ovidotto costituirebbe un primo paradosso. Infatti oggi è positivamente conosciuto che il distacco delle uova dall'ovajo, avviene nella gallina secondo una legge prestabilita, per la quale nessun uovo può lacerare i vincoli che lo rattengono sullo *stroma* ovarico, se prima non è giunto a quel grado di pienezza che non consentendo più agli invogli esterni di contenerlo, se ne sprigiona ed è raccolto così dal piccolo padiglione dell'ovidotto, che automaticamente si gitta sù lui per riceverlo ed assorbirlo nella sua via. Riesce quindi troppo astruso il comprendere, come un uovicino ad un grado relativamente minimo di sviluppo, abbia mai potuto concepire tale energia di movimento iniziale, da precipitare la sua parabola vincendone tutte le contrarie naturali resistenze. Ricorderemo a tale proposito una sentenza dal *Leydig* espressa così: « *Comme dans les autres classes des vertébrés, les oiseaux, les amphibiés et les poissons, les oeufs à maturité surpassent en grosseur ceux des mammifères; l'ovaire, abstraction faite des ses autres dimensions, présente toujours un aspect aciculaire, et les follicules se détachent de la masse du stroma en restant suspendus par un simple pédicule* » (1).

Ma seguiamo il nostro esame. Gli autori hanno scritto che l'uovo della gallina scendendo nell'ovidotto vi camina a rilento, ed ivi riceve lo albume che lo completa, e le membrane che lo ricuoprano; sulla più esterna delle quali si aggiunge poi verso l'estremità inferiore dell'ovidotto, per sovrapposizione sotto forma di laminette cristalline esagonali, il carbonato calcareo che in-

(1) Franz Leydig. *Traité d'histologie* traduit de l'allemande par R. Lahillonne. Paris 1866, pag. 570.

durito ne costituisce il guscio esterno. Ora il nostro uovicino come mai avrebbe potuto pervenire a cingersi dentro lo albume dell'uovo continente, di proprie membrane? come sulla esterna di queste, si sarebbe mai raccolto il carbonato calcareo più o men puro, senza del quale il guscio delle ova non si costituisce? Se il contatto immediato delle pareti secernenti di questi sali solidificabili con l'uovicino che deve rimanerne incrostato, è condizione indispensabile perchè l'uovo si completi secondo l'ordine di natura; chi potrà mai immaginare il modo, nel quale questo incrostamento si sarebbe verificato, ove realmente il picciuol uovo fosse rimasto chiuso in mezzo al liquido albuminoso di quello maggiore, e quindi per mezzo di tutte le membrane proprie di questo, separato e disgiunto dalle pareti dell'ovidotto alle quali l'escrescenza di quei sali calcarei, è dimostrato che esclusivamente si appartiene? Dunque o il fatto a noi riferito è falso; o tutte le teorie e dimostrazioni della scienza, fino quì ritenute per vere sono manchevoli ed erronee. Impertanto se non vogliamo ammettere la prima parte del dilemma, conviene che necessariamente ne accettiamo la seconda. Prima però di così fare, ci sia lecito di riassumere quello che la scienza positiva ce ne ha tramandato.

L'unico ovajo di cui va munita la femmina degli uccelli, ritrovasi sotto i reni aderente alla colonna vertebrale e ricoperto dal peritoneo, il quale serve insieme al medesimo di copertura, di legamento e di conduttore pei vasi arteriosi e per i nervi che vanno ad investirlo, e per le vene e per i linfatici che ne risortono. Sotto alla tunica peritoneale, ridotta al solo epitelio, se ne rinviene sull'ovajo una seconda costituita da una membrana propria, la quale vien chiamata dagli anatomici l'*albuginea dell'ovajo*. L'aspetto generale dell'organo in attività funzionale, rassomiglia ad un grappolo di uva ad acini disegualmente sviluppati, sicchè sempre se ne scorga fra tutti uno o più maggiori, mentre si stà verificando la ovulazione. Ciò che in talune specie non addomesticate succede ad epoche fisse dell'anno, in altre si rinnova a periodi ricorrenti e più o meno ravvicinati; ed in altre finalmente, quali sono le galline, accade quasi senz'ordine apparente; dipendendo il fenomeno più dalle influenze del clima, della stagione, e dalle condizioni nelle quali sono esse chiamate a vivere, di quello che da una legge governata semplicemente dalla natura. Accade così che nel pollame la fecondità può dentro certi limiti essere messa a profitto e sviluppata, più o meno per il concorso della industria umana.

Ciascheduno di quelli acini, che dicemmo costituire con il loro insieme il

racemo ovarico, si trova adunque ricoperto dalle due membrane che rivestono esternamente lo *stroma* sopra del quale si sollevarono, e giunti questi a maturanza vi sono rattenuti e legati, come indicammo con il Leydig, da un semplice peduncolo sottilissimo, quantunque ancora tenace. A quest'epoca i vassellini sanguigni che prima vedeansi percorrere ed irretire delicatissimamente gl'invogli apparenti delle sfere ovariche sono già scomparsi e, secondo alcuni autori, una striscia biancastra *equatoriale* spartisce quelle in due emisferi. Noi di questa striscia biancastra nelle uova che ancora non avevano abbandonato l'ovajo non abbiamo potuto riconoscere l'evidenza; siccome pure dei pretesi calicetti ciascheduno dei quali servirebbe, come da taluni si è detto, di base e di difesa all'ovo, troviamo che il nostro delle Chiaje trovò soltanto nelle femmine degli struzzi l'esempio (1).

Queste sfere, che si chiamano nel linguaggio volgare *uova non nate*, si svolgono e crescono sotto degli involucri membranosi suddetti, in mezzo a quella massa di tessuto connettivo e di cellule fusiformi che costituisce la porzione corticale dello stroma ovarico, distinta dalla midollare per gli anzidetti corpicciuoli vescicolari che vi si annidano, per il difetto di fibre muscolari lisce e per il meno di vascolarizzazione. Le vescichette ovariche sono conosciute dagli anatomici con il nome del *Graaf* che ne illustrò la storia negli animali mammiferi e nella specie umana fino dall'anno 1672 (2). Esse peraltro non costituiscono l'uovo propriamente detto, ma solamente il nicchio od incunabolo naturale dentro del quale quello si sviluppa, e dal quale sempre spontaneamente e talora periodicamente (siccome avviene nella specie umana) si sprigiona per la lacerazione della capsula membranosa che lo contiene: lacerazione che tiene il luogo della deiscenza dei frutti capsulari di certi vegetabili, la quale concorre in essi alla dispersione dei semi entro i confini prescritti dalla natura. L'ovicino chiuso nella vescichetta di *Graaf* degli animali mammiferi fù scoperto dal *De Baër* nell'anno 1827. Esso è involuto da un piccolo ammasso di cellule, distinto dagli anatomici con il nome di cumulo proligero (*cumulus proligerus*) ed immerso in un liquido proprio, il quale distende tutta la vescichetta, limitato dal di dentro al di fuori prima da un invoglio epiteliale che è chiamato della *membrana granulosa*, poi in alcuni casi da una seconda capsula che viene chiamata *membrana amorfa* o *mem-*

(1) Stefano Delle Chiaje. Istituzioni di Anatomia comparata. Seconda edizione. Napoli 1836, Tomo II, pag. 185.

(2) Vedi Regneri de Graaf. Opera omnia. Lugduni 1678.

brana propria del follicolo dagli anatomici, e finalmente dall'invoglio di tutti il più esterno che costituisce la *membrana esterna del follicolo di Graaf*. Questa ultima membrana è fibrosa, vascolarizzata e messa a contatto immediato con la sostanza dello stroma ovarico dentro del quale si sviluppa.

Ove però si raffrontino insieme lo sviluppo delle cellule ovariche dei mammiferi e quello che si verifica negli uccelli, ne appariscono a prima giunta notevolissime le differenze. Queste studiate comparativamente rilevano forse la sorgente di qualche equivoco sfuggito a quei scrittori di altra epoca, che ritennero per uova vere o propriamente dette gli acini, i quali cambiati in vesciche ripiene di un umore giallo caratteristico fanno di sè bella mostra sulle ovaja delle galline vendute su i mercati per uso della domestica economia, e che con proprietà di linguaggio anatomico, rappresentano le uova insieme con le capsule che le contengono.

E per verità la vescichetta di *Graaf* sviluppandosi nelle ovaja doppie degli animali mammiferi, incomincia dallo approfondirsi nello stroma in che nasce e si addentra sempre più nel medesimo, infino che la elasticità e la contrattilità dell'organo produttore e lo iniziato sviluppo delle altre cripte omonime vicine non lo risospingano in alto, sicchè debba finalmente trasparire sotto gl'invogli comuni delle ovaja, in un punto qualsiasi della loro superficie. Negli uccelli invece la vescichetta stessa cresce e si svolge tutta *exogena*, lo che facendo concorre a dare all'ovajo unico di questi animali quell'aspetto racemoso che di sopra abbiamo indicato; e quindi ognuno di quegli acini, ognuna di quelle vesciche che sù di tali organi fanno sporgenza, non rappresenta altrimenti un uovo, ma il *ricettacolo* dentro del quale uno di quelli si annida. L'umore proprio della cripta Graaffiana, cambiando di natura, diviene l'umore *vitellino* e dà con il suo colore caratteristico l'aspetto giallongolo speciale a quelle cisti, destinate a portare al di fuori insieme con le uova racchiuse, un sacco di nutrimento copioso abbastanza per sopperire allo sviluppo del germe, il quale nascosto in queste ultime senza ricorsi esterni potrà divenir pulcino, ove le circostanze ne favoriscano sviluppo dopo pregressa la fecondazione.

L'umor giallo che riempie la vescicola di *Graaf* nelle galline non è un umore omogeneo, ma fino dai primordii del suo apparire lascia intravedere, studiato al microscopio, alcune granulazioni gialle che diremo vitelline. Queste crescendo danno a tutta la massa il loro colorito. Insieme coi granuli vitellini vi si riscontrano delle bollicine di diverso diametro, che non sono poi altro

che particelle oleose (olio di rosso d'uovo), e finalmente vi si trovano pure delle cellule sieno semplici, siano nucleate. Di queste cellule però, a sviluppo completo dell'uovo, dobbiam dichiarare di non averne fino ad ora vedute.

La deiscenza irregolare o la lacerazione delle cisti Graaffiane che segue l'epoca del caldo nelle femmine degli animali mammiferi e marca le ricorrenze lunari nella femmina umana, accadono pure, come indicammo, negli uccelli. In questi però tutta la vescichetta Graaffiana lasciando l'organo nel quale si produsse, scende insieme con il suo contenuto nell'ovidotto, che per organico eretismo si gitta ad abbracciarla. Invece negli animali mammiferi, la cripta aperta per scissione spontanea all'epoca della ovulazione, resta sull'organo ovarico nel quale nacque; e la successiva trasformazione di quello che fù già cumulo proligero in una sostanza gialla, ed il ritirarsi ed il raggrinzarsi dei bordi della vescicola lacerata, lasciano sulla superficie dell'organo produttore quella impronta caratteristica, a cui dalla sporgenza e dal colorito venne accordato il nome di corpo giallo *corpus luteum* dagli embriologisti. Nel caso degli uccelli accade secondo noi, quello che si verifica nelle piante fanerogame a frutti indeiscenti, nelle quali ritenuti quelli fino alla maturità aderenti per i pedicciuoli alla pianta produttrice; inariditi questi per il cessato passaggio degli umori, i frutti se ne distaccano al più piccolo urto, per portare i semi che già maturi chiudono nel seno a fertilizzare il seno della gran madre comune, onde riprodurre, se le circostanze non lo impediscono, le piante che prima diedero loro la vita. Nel fatto degli animali mammiferi invece l'analogo del seme delle piante, ossia l'uovo propriamente detto, innalzato già a maggiore potenza di sviluppo e preparato quindi a stringere rapporti diretti con il seno materno, al quale più tardi si abbarbicherà se la fecondazione non faccia difetto, abbandona spontaneamente la cisti nella quale si produsse, che per deiscenza ne lo lascia uscire; e quindi lascia sull'ovajo la cripta che gli diè cuna, appunto così come vediamo accadere in taluni vegetabili, a frutti deiscenti; che slanciano lungi da se, e talora con molta vigoria, i semi prodotti, rimanendo essi stessi aperti ed inariditi sulle piante delle quali ebbero già rappresentata la fruttificazione. Per conseguenza negli animali mammiferi incominciano fin dai primordii vitali a stabilirsi fra il generante ed il generato quei vincoli di famiglia, che rimanendo sempre di breve durata nei bruti, si prolungano nell'uomo siffattamente da costituire per naturale necessitu-

dine la base della dipendenza e della soggezione, e quindi il fondamento primitivo della società umana.

Se non chè il confronto fatto or ora da noi del frutto dei vegetabili con le così dette uova degli uccelli, patisce una assai valida eccezione per ciò che la maggior parte dei naturalisti sembra insegnare, non essere già il laceramento del peduncolo, il quale collega la vescicola Graaffiana all'ovajo degli uccelli, quello che ne opera il distacco e la caduta nell'ovidotto; ma sì bene una lacerazione a modo di deiscenza irregolare della capsula esterna; la quale lascerebbe aderenti sull'organo produttore l'invogli peritoneale e fibroso; mentre la vescichetta di Graaf propriamente detta libera da questi accessori velamenti, verrebbe presa dall'apertura slabrata (ma non sfrangiata in questi animali) dell'ovidotto. Intorno a chè domando io venia di proporre liberamente un qualche dubbio. Questo saprà forse a taluno di stravaganza ma nelle scienze naturali non essendo vietato di dubitare, soprattutto quando non si ha in vista altro che il verace avanzamento della scienza, non me ne terrei per menomamente offeso. Or bene volli già accennato fino dal principio, che quella cinta così detta *equatoriale*, la quale, per sentenza di parecchi autori, si scorge attorno alle uova della gallina preste ad abbandonare l'ovajo, non è sempre facile di osservarla fino che le medesime stanno allo stato di uova non nate, appese cioè allo stroma produttore. Ora ciò non potrebbe nulamente avvenire, se quella cinta indicasse con precisione il posto ove la natura ha destinato che inevitabilmente accada l'apertura degli involucri più superficiali dell'uovo. Avvertirò in secondo luogo, che più volte mi è avvenuto di trovare sulle ovaja della gallina dei torli, che non tenevano a quelle altro che per un sottile peduncolo, senza dimostrare intanto nessuna traccia d'imminente lacerazione sulla loro periferia. Ricorderò in terzo luogo, che sulle ovaja stesse ho ricercato indarno i brani di quelle membrane esterne, ossia le abbandonate spoglie della capsula Graffiana caduta prossimamente nell'ovidotto; mentre non mi fù difficile di rinvenire i pedicciuoli i quali, cred'io, recentemente avevano perduto il frutto corrispondente. In quarto luogo accennerò che il preteso limite di vascolarizzazione su quella zona equatoriale già detta, non è a carico delle membrane esterne ovariche che ricuoprono le vescichette sporgenti, ma solo a spese della membrana esterna della vescichetta di Graaf, la quale è realmente percorsa da vasi abbondevolissimi, insino che il contenuto suo non è cangiato totalmente in massa vitellina; ma operato questo cangiamento, tutti quei vasi spariscono. Quindi siccome, per

le cose dette, tutt'essa (la vescichetta Graaffiana) negli uccelli si distacca dall'ovajo per cadere nell'ovidotto, tutto porta ad argomentare, che i tralci vascolari che la ritenevano unita allo stroma ovarico, si debbono senza grandi sforzi lacerare, e si lacerino di fatto ad ogni ovicino che se ne disprenda: altrimenti nessuno di essi si troverebbe mai impegnato nell'ovidotto. Ora se i tramiti vascolari non valgono ad impedire il distacco di quelle vescichette dall'ovajo, vorremo noi ritenere che di tanto sieno capaci quelle brigliuzze membranose delicatissime che ricuoprono gli acini del grappolo ovarico, se ad esse nè vasi, nè fibre dimostrate aggiungono tenacità e resistenza? I commentatori dell'anatomia comparata del Barone Giorgio Cuvier, nelle giunte agli scritti di quel sommo, mentre fanno cenno della lacerazione degli involucri ovarici degli uccelli in corrispondenza della cinta *equatoriale* anzidetta, aggiungono in quanto alle membrane delle quali dovrebbero rimanere pendenti i brani dall'ovajo, che può essere *peut-être* che queste sieno riassorbite (1). Ora fondare sopra di *un può essere* una teoria, ritenere per riassorbibili degli *elementi anatomici* senza indicare le vie per le quali questo riassorbimento di solidi per quantunque minutissimi si possa operare, mentre se ne dovrebbe ripetere ogni giorno per intiere stagioni nelle galline domestiche l'occasione; e ciò senza che nessun fisiologo sia mai riuscito a verificarlo: vale per noi quanto il dritto d'immaginare e di esporre sotto la garanzia del *può essere* ogni altra teoria, ancorchè discordante da quella infino a quì abbracciata nello scolastico insegnamento. Che se questa regga meglio dell'altra al controllo dei fatti dei quali la prima non dà spiegazione soddisfacente, potremo domandare che venga l'una all'altra sostituita nelle scientifiche disquisizioni.

Notomizzando io le uova appese ancora all'ovajo delle galline, le rinvenni costantemente ricoperte dagli invogli ovarici sopraindicati, e staccandone talora con lieve sforzo quelle più mature dai pedicciuoli che le rattenevano, le rinvenni mai sempre con l'involucro stessi. Or se ritrovo l'uovo maturo dentro dell'ovidotto, non lo posso più riconoscere per quel di prima, nè per la sua forma, nè per la sua apparenza, nè finalmente per la sua anatomica composizione. Come mai in poche ore (6 all'incirca) tanti e così sorprendenti cangiamenti potè in quello operare la natura? quali congegni artificiosi vi

(1) V. Cuvier. *Leçons d'anatomie comparée*. Troisième édition revue, corrigée et considérablement augmentée. Bruxelles 1840. Tome Troisième. Pag. 384. Il passo al quale noi ci riferiamo, crediamo che appartenga al *Laurillard*.

concorsero? quale potente chimismo vi cooperò? quale forza diresse in così breve tempo ed in spazio così angusto, tanto svariate ed ammirabili operazioni?

Se bastassero solo circa 6 ore di permanenza dell'uovo nell'ovidotto (1) per riformirlo di una doppia membrana nuova, ossia di quella *dello albume* e dell'altra *testacea*, per munirlo ed incingerlo di tutta la massa albuminosa che per tanta parte lo riempie, per svolgere verso i poli del medesimo le briglie o *calaze*, per rivestirlo finalmente di un guscio calcareo il quale consolida la forma che nel canale stesso gli è data, senza che intanto si rinvenga lo stampo nel quale quest'ultima si formò; non saprei io da vero quale altro organo rinvenire in tutta quanta la struttura animale, che per l'attività o per le meravigliose sue produzioni potesse reggere al confronto dell'ovidotto. Ma se questo canale tanto potea negli uccelli, perchè mai la natura nella organizzazione degli animali mammiferi provide che gl'invogli o membrane dell'uovo scendessero con il medesimo dalle vescichette Graffiane, mentre di poteri produttivi così singolari ebbe arricchito negli uccelli l'organo analogo per struttura a quello per il quale dovea pure l'ovicino dei mammiferi compiere naturalmente il suo tragitto? Forse che non vi era in questi ancora un utero, ove quel complemento avrebbe potuto verificarsi?

Ma andiamo ai fatti. È assioma provato nella scienza, che la Natura ha semplicizzato, sempre che è stato possibile, i mezzi che si proponeva per il conseguimento di un determinato fine. Or bene solo ammettendo che il distacco delle uova dall'ovajo che le produce, si faccia negli uccelli per la semplice lacerazione del peduncolo che le ritiene, più tosto che per la scissione e per lo spogliamento degli involucri ovarici che le ricuoprono; troveremmo noi una maniera facilissima di spiegare il completamento delle uova nell'ovidotto per endosmosi, senza bisogno di ricorrere ad una portentosa produzione di membrane accessorie dentro di questo canale: membrane che se appariscono semplici nella loro struttura, non per questo sono men complicate per i loro rapporti, o meno necessarie per il fine al quale furono coordinate.

Incinceremo pertanto dal rammentare, che i pochi autori che si sono occupati di discuoprire il luogo e la maniera con la quale si aggiungono al torlo dell'uovo della gallina le membrane accessorie anzidette e lo albume, non sembra sieno stati sempre d'accordo fra loro. Il *Dugès* (2) parla della

(1) Beclard. *Traité élémentaire de Physiologie humaine*. Cinquième edition. Paris 1866. Pag. 1204.

(2) Antonio Dugès. *Trattato di fisiologia comparata* tradotto dal Dottor F. Gastinelli. Napoli 1841. Vol. III. Pag. 227—228.

pellicola sottoposta al guscio come di una membrana *formata nella parte superiore dell'ovidotto*, ed aggiunge che *in seguito viene il bianco o albume*. A seconda delle osservazioni di *Purkinje* e *Valentin* riportate dal *Burdach* (1), sarebbe solo nella parte mezzana e più stretta, ossia nell'istmo dell'ovidotto, che si formerebbe la membrana testacea alla superficie dell'*embriotrofo secondario*: ivi cioè il liquido albuminoso segregato produrrebbe prima dei filamenti isolati, e poi uno strato di granulazioni che si riuniscono in una membrana. Ci facciamo intanto lecito di osservare, che siccome i liquidi assumono per legge fisica costantemente la forma del recipiente nel quale si raccolgono (giacchè è vieto assioma che *quidquid recipitur per formam continentis recipitur*), se il liquido albuminoso precedesse la formazione della membrana che sopra del medesimo rinveniamo nelle ova compiute, converrebbe trovare riprodotta sù di queste la forma dell'ovidotto, e non già una forma propria e costante, e per quella dovrebbero le uova apparire sotto l'aspetto di altrettanti fusi, a pancia rotundata e ad estremità assottigliate e forse anco canalicolate longitudinalmente. Lo che non avvenendo, siamo obbligati a supporre che le membrane dello albume preesistano o precedano la raccolta di questo liquido attorno alla sfera del giallo, più tosto che seguirla; mentre ciò sarebbe di impossibile spiegazione, per la difficoltà accennata da noi e tratta dalle leggi invariabili della idrostatica. Quanto perciò non rimarrebbe più facile il concepire che il liquido albuminoso segregato abbondevolmente nell'ovidotto, passando per forza di corrente endosmotica a traverso delle delicatissime membranucce che sono destinate a contenerlo, si accumulasse in questa maniera dentro del sacco a lui preparato dalla natura; ed appunto perciò che tale, di pareti definite e di forma e proporzioni invariabili?

Io pertanto restringerei il mio ragionare così. O il liquido albuminoso che costituisce il così detto bianco dell'uovo della gallina si raccoglie attorno al giallo che ne stabilisce il centro, prima che le membrane le quali lo ricuoprano sieno formate; o sono queste ultime membrane quelle che precedono la raccolta di quel liquido. Se si ammette il primo, non si spiegherà mai, per le cose dette, la causa determinante della forma propria delle uova: se si ricorre al secondo, converrà supporre che il giallo d'uovo fino dalla prima sua discesa nell'ovidotto abbia addossate quelle membrane, che appariscono più tardi su del medesimo, perchè solo allora rimangono se-

(1) C. F. Burdach. *Traité de Physiologie*. Traduit par A. J. L. Jourdan. Paris 1838. Tome deuxième pag. 405. § 341. I, 1°

parate e distese dallo albume del quale ultimamente s'imbeverarono. E se la cosa non andasse così, come mai le fibrille ed i fiocchetti destinati a formare quest'ultime, potrebbero riuscire a riunirsi con tanto di tenacità e di consistenza da reggere alle spinte centrifughe del liquido che le distende? Oltre a ciò rimarrebbe quasi impossibile il concepire come giungerebbero le membrane dello albume a rassodarsi in mezzo ad un liquido, che tenderebbe sempre a disgregarne per la stessa fluidità sua gli elementi.

Nè si supponga ch'io mi abbandoni quì alle larve di una immaginazione riscaldata, supponendo negli ovidotti una forza contrattile capace di reagire validamente contro dei liquidi che insieme con l'uovo vi si trovino di passaggio. Mentre tanto la struttura anatomica, quanto l'azione fisiologica di questi organi cospirano a sostegno della presente tesi. L'ovidotto unico negli uccelli, siccome unico in questi è l'ovajo, si estende da esso infino alla cloaca. *È costituito in principio da un canale assai stretto che si allarga a proporzione che si accosta alla cloaca. In principio l'ovidotto è di pareti assai sottili ma divengono in seguito assai resistenti. In esso ci si possono notare quattro tuniche, una esterna peritoneale, che tien fisso questo condotto alla colonna vertebrale, una seconda muscolare, una terza cellulosa sottile, ed una quarta mucosa che ne tappezza l'interna superficie, ed in questa ci si osservano molti ripieghi, la più parte dei quali sono longitudinali, onde questo canale si può prestare alla necessaria dilatazione* (1). La membrana muscolare è costituita da fibre lisce, e quindi sottratta all'impero della volontà dell'animale e governata invece dalla innervazione ganglionare, che la rende ligia ed obbediente alle operazioni automatiche dell'organismo. *L'ovidotto è organo di movimento e di formazione* (2). Incomincia esso a dimostrarsi tale, portandosi con la sua estremità aperta o libera o superiore, alla ricerca dell'ovajo ed applicandovisi sopra per assorbire l'uovo al momento del suo distacco. *Chez... les oiseaux... c'est... l'extrémité ouvert, ou le pavillon de l'oviducte qui va chercher l'ovaire, et qui s'y applique pour absorber l'oeuf au moment où il en sort* (3). Siegue l'ovidotto a spiegare la sua azione muscolare colla spinta graduata con la quale va guidando l'uovo verso l'uscita della cloaca. Finisce finalmente di dimostrarla con l'esito che determina dell'uovo già compiuto a traverso della

(1) Uccelli. Compendio di anatomia—fisiologico comparata. Vol. VI., pag. 327.

(2) Burdach. Op. cit. Tome I. Pag. 170. §. 102.

(3) Burdach. Op. cit. Tom. II. Pag. 353. § 323. 2.

apertura inferiore dell'ovidotto stesso, la quale offre una specie di picciolo sfintere per le briglie muscolari che lo circondano. Che l'organo poi testè menzionato sia pure laboratorio di formazione, è messo fuori di dubbio dallo sviluppo e dalla forma propria che in esso prendono le uova, dalla massa albuminosa che vi si separa, dalle calazze che dentro di esso si dispiegano nell'uovo, e per ultimo dal guscio calcareo che dentro del suo perimetro lo incrosta; e ciò per nulla ripetere di quelle membrane, le quali diedero sufficiente argomento al ragionar nostro.

Che se mi fosse lecito di azzardare una ipotesi, vorrei io proporre modestamente il supposto seguente. L'uovo della gallina, o più propriamente la cisti vitellina che lo racchiude, giunta a maturità, per il concorso delle trazioni che sopra della medesima dispiega l'estremità aperta e su di lei addossata dall'ovidotto, si distacca dal pedicciuolo che la manteneva aderente allo *stroma* ovarico che la produsse. Distaccata così penetra nell'ovidotto e vi rinviene il fluido albuminoso, del quale accresce con lo stimolo della sua presenza la secrezione. Questo fluido separato dalle ghiandole mucipore dell'ovidotto stesso, prima è denso vischioso, diviene poscia più fluido e meno tenace. La cisti vitellina essendo ripiena anch'essa di un umore di densità e di natura diversa da quello che si raccoglie nell'ovidotto, ne avviene che si produce per la legge discoperta dal Dutrochet, fra i due liquidi separati da membrane organiche, una potente corrente endosmotica, per la quale il fluido albuminoso penetrando sotto alle prime membrane che ricuoprano la cisti vitellina, ne le discosta dalle pareti sottostanti; e per conseguenza lo albume si raccoglie dentro di esse. Si stabilisce così una sfera esterna albuminosa attorno alla sfera interna vitellina, la quale occupa il centro. Crescendo però sempre più, dentro certi limiti, l'albume fluido al disotto delle suddette membrane esterne, e dovendo questo liquido vincere la resistenza, che in corrispondenza dell'asse trasversale della sfera vitellina presenta al suo sempre crescente aumento lo strato delle fibre circolari dell'ovidotto; ne consegue necessariamente che lo stesso liquido albuminoso, in ragione della resistenza incontrata, si porta in direzioni opposte, ossia verso l'asse che diverrà verticale o bipolare nell'uovo perfetto; ossia quando questo avrà raggiunto il suo completo sviluppo. In altri termini il liquido che costituisce il bianco dell'uovo, va ad accumularsi nella direzione del canale lineare dell'ovidotto: e poichè questo canale è ristretto verso il suo principio, e dilatato verso la sua fine; ne verrà per conseguenza che la sfera

involgente dello albume distesa davantaggio in queste direzioni , costituirà due poli l'uno dei quali più angusto, corrisponderà alla parte più ristretta dell'ovidotto; e l'altro più grosso, richiamerà alla mente la parte più ampia dello stesso canale. Ora ove questi dati teoretici si applichino allo studio pratico dell'uovo della gallina, ognuno si accorgerà che la proposta ipotesi non sembra andare troppo lungi dal vero. Per noi cioè potrebbe supporre che le due esterne tuniche dell'ovajo, le quali negli uccelli si distendono per abbracciare da ogni parte l'uovicino prodotto, semplicizzate nella loro tessitura sotto l'azione della distensione continua e crescente, non lo abbandonino allorchando esso lasciando la sua cuna discende nell'ovidotto; ma ivi stesso accompagnandolo, addivengano , distese dallo albume, le tuniche esterne dell'uovo. L'interna limiterebbe al di dentro quel fluido; l'esterna, ricevendo sopra di se il deposito dei cristallini calcarei, rappresenterebbe la membrana testacea ossia del guscio. La distinzione delle due tuniche si vede tracciata in natura verso l'estremità grossa dell'uovo, per lo sviluppo della così detta camera d'aria; la quale però nelle uova recenti appena è percettibile. Il primo albume penetrato attorno alla sfera vitellina essendo, come si è detto di sopra, assai più denso di quello che sarà fornito dall'ovidotto in appresso, si addensa attorno a quella e la circonda co'suoi strati. Ma per lo scostamento delle tuniche esterne nella direzione dei poli dell'uovo, quell'albume denso si spiega in due briglie, le quali prendono l'aspetto di *calazze* o spire albuminose, per lo avvolgersi che fa su stessa la sfera vitellina nella direzione dell'asse bipolare suddetto. Basta rompere un uovo recente, versandone il contenuto dentro di un bicchiere di acqua fredda , per vedere la tessitura e la direzione delle *calazze*. Nè voglio qui omettere che il così detto calice vascolare esistente, secondo alcuni autori, al disotto di ciascun uovo e visibile sull'ovajo dopo la caduta dell'ovicino, e che al dire dei medesimi ivi lo riteneva accoglieva, fu solo per equivoco che potè ritenersi fatto dalle membrane che rivestono l'ovajo stesso; mentre nè la sierosa, ridotta al semplice strato epiteliale, nè la fibrosa sottostante cangiata in sottilissimo velamento diafano, divengono mai membrane vascolari. Questo attributo compete invece alla membrana esterna della vescichetta di Graaf, la quale facendo parte sostanziale del follicolo dello stesso nome, ne seguita lo sviluppo e ne accompagna con le altre vicende eziandio la caduta nell'ovidotto. Ora stando così le cose, come potrebbe conciliarsi la teoria antica, la quale volea che proprio la deiscenza della membrana vascolare determinasse la caduta delle uova ,

con quella proposta or ora da noi, e con il fatto che prova mancare assolutamente negli uccelli quel flusso che caratterizza il caldo nelle femmine degli animali mammiferi, e con esso la deiscenza per lacerazione dei follicoli Graaffiani? Se non vi avea differenza per i fatti anatomici fra ciò che accade nei mammiferi e quello che si osserva negli uccelli, come è che tale differenza negli atti fisiologici appare manifestissima? Arroge che nella ipotesi da noi proposta, si darebbe pure facile spiegazione della cicatricetta, la quale corrisponderebbe al punto d'inserzione del tralcio vascolare, che insieme con il peduncolo rimane divolto dallo stroma ovarico al momento della caduta dell'uovo nell'ovidotto.

Ma è tempo oramai che ritorniamo all'assunto primitivo di questa memoria, raffrontando con l'uovo che si pretese rinvenuto dentro dell'altro, le teorie finora esposte. La spiegazione da noi immaginata per rinvenire sull'ovajo l'origine delle membrane esterne della cisti vitellina, sarebbe senza dubbio la meno favorevole ad ammettere le probabilità di quel fenomeno. Ed in fatti se ogni e singolo uovo di gallina, fino dal distaccarsi che fa dall'organo produttore, porta seco tutti gli involucri che mostrerà spiegati giunto al completo suo sviluppo; come mai potrebbe immaginarsi che l'uno di essi riuscisse a penetrare a traverso di tutte le membrane di un suo vicino, per finirvi annidato nella massa liquida che in tanta parte lo costituisce? Ma se invece queste membrane si plasmano sullo albume addensato attorno alle sfere vitelline, riescirebbe meno difficile il supporre che involute due di queste cisti nello stesso umore, potessero comparire più tardi, la maggiore come involgente della minore, sotto di velamenti comuni. Ma anche in tale ipotesi, rimarrebbe ancora inesplicabile il modo col quale la sfera vitellina più piccola, appropriandosi una porzione dello albume separato nell'ovidotto, perverrebbe a circondarsi di membrane sue proprie, in mezzo al liquido spettante all'uovo maggiore. Ma supponiamo pure che un azione coagulativa speciale, irraggiando forse dalla piccola cisti vitellina, avesse potenza di ciò fare, cosa che io non credo. Resterebbe tuttavia a risolversi l'ultima parte del problema proposto, la quale non ne è certamente la più facile, mentre è da ritenersi come la più decisiva per la prima questione proposta. Il carbonato calcareo cioè, come mai avrebbe potuto foggarsi a guscio solido e resistente dentro dell'ovicino inchiuso, se fra questo e l'organo escretore di quel principio terroso non vi ebbe alcun possibile contatto? Stimeremo noi forse che pure per endosmosi i sali calcarei siensi precipitati sulla membrana esterna dell'ovicino, attraversando impunemente il liquido circumambiente dell'uovo maggiore e senza depositarsi al

tempo stesso sulla sfera vitellina di questo, con la quale quel corpicciuolo inchiuso sarebbe stato in necessario contatto. Certamente nessun fisiologo vorrà ammetterlo facilmente. Ed anzi affine di addimostrarlo più chiaramente, mi sia lecito il trarne da un autore non sospetto un qualche altro positivo argomento che faccia acconciamente al nostro proposito.

Fù opinione del *Jacopi* (1), accettata poi e ripetuta da altri autori, che *l'uovo percorrendo l'ovidotto si veste dell'albumine, ed in cloaca riceve quella vernice calcarea, che poi indurita ne forma il guscio*. Questa opinione però non fù ammessa da fisiologi posteriori; e già il *Ranzani* Professore a Bologna scriveva fino dal 1821. *Discendendo poi l'ovo per l'ovidotto, gli si aggiunge il bianco, o sia l'albumine, in un colle membrane, ond'è questo avvolto indi il guscio* (2). Il *Burdach* più tardi illustrò questa tesi descrivendo più accuratamente l'anatomica struttura della membrana mucosa che riveste il lume interno dell'ovidotto degli uccelli, ed analizzandone le diverse funzioni. Scrisse egli della inferiore porzione di questo canale « *plus loin, on trouve une cavité ovale, plus courte, bornée à ses deux extrémités par un renflement, ayant des parois épaisses, pourvue des muscles longitudinaux et annulaires (uterus), dans la quelle l'oeuf séjourne et acquiert sa coquille* » (3). Il *Le Maout* ricordò ancora una membrana epidermoidea che si aggiungerebbe esternamente al guscio calcareo, della quale a dir vero non ritroviamo fatta da altri menzione speciale. Sono queste le sue parole « *L'oeuf, parvenu vers l'extrémité de l'oviducte, y reçoit un dépôt calcaire qui se solidifie promptement, et de plus une couche épidermoide qui contient la substance colorante homogène ou mouchetée, qu'on observe sur les oeufs de certains oiseaux* » (4). Aggiunse finalmente precisione di dettagli il *Béclard* nei suoi elementi di fisiologia ripetendo: « *. . . lorsque l'oeuf est arrivé au tiers inférieur de l'oviducte (c'est-à-dire environ six heures après sa sortie de l'ovaire chez la poule), la couche albumineuse s'enveloppe d'une membrane, d'abord transparente, qui se dédouble bientôt en deux feuillets. Le feuillet adhérent à l'albumine restera à l'état de membrane; le feuillet le plus externe s'incrusterà de*

(1) Giuseppe Iacopi. Elementi di Fisiologia e Notomia comparativa. Napoli 1810. Parte terza pag. 138 in fine.

(2) Camillo Ranzani. Elementi di zoologia. Tomo Terzo. Parte Prima pag. 38.

(3) Burdach. Op. e Trad. citata (1837). Vol. I, pag. 178, e 404 in fine.

(4) Emm. Le Maout. Histoire naturelle des oiseaux. Paris 1853, pag. XVI.

cristaux calcaires et formera la coque » (1). L'Hollard, confermando pure ciò stesso, dichiarò di non riconoscere nell'ovidotto degli uccelli « *nessuna dilatazione che potesse essere paragonata ad una saccoccia di deposito, quindi le uova non vi si trattengono che per rivestirsi delle loro membrane accessorie* (adventives), *delle quali la più esterna è costantemente un guscio duro calcareo* (2). Dallo insieme delle autorità quì riportate, deve dunque ragionevolmente conchiudersene, che sulla membrana esterna dell'uovo si precipitano nell'ultima porzione dell'ovidotto, quei sali calcarei che servono ad incrostarla; quantunque forse il definitivo indurimento del guscio, in alcuni casi almeno, non si operi solo che nella cloaca. Da questa infatti, eccezionalmente, sortono talora delle uova molli e sprovvedute di quella pretesa costante guarentigia del guscio indurito e resistente: al quale fenomeno concorre forse qualche argomento ancora non ben compreso di chimismo vitale. E per verità sapendosi che il carbonato calcareo non è per se stesso solubile nei liquidi, ognuno è portato a facilmente sospettare, che quello escreto sotto forma liquida dai vasellini che arricchiscono la porzione ultima della membrana mucosa dell'ovidotto, non possa uscirne a quello stato insolubile che assume poscia precipitando sulla membrana esterna dell'uovo. È senza dubbio la perdita di un atomo di acido carbonico, quella che lo ritorna allo stato solidificabile; ed ove questa perdita sia ritardata per la insufficienza delle reazioni vitali, può sospettarsi ne avvenga allora, per il più lento rapprendersi dell'inorganico concreimento, che si stampino, per così dire, le impronte delle sinuosità e delle pieghe che fanno sporgenza nel lume interno della cloaca sull'uovo della gallina, fenomeno che già più volte fù dato a noi di osservare.

Ora dopo tanti fatti e ragioni chi vorrà sostenere che possa accettarsi per vero senza esitanze, il preteso fenomeno di un uovo rinvenuto con il suo guscio calcareo ben rassodato e perfetto, chiuso dentro di un'altr'uovo, che avea come il primo i suoi involucri e la sua coccia regolarmente costituita? È vero che il Leydig ha scritto che « *il peut arriver aussi que déjà, dans le follicule ovarique il se forme autour d'elles* (ossia dell'involuppo primitivo) *d'autres enveloppes ou coques souvent très complexes, dont la genèse est encore peu connue* » (3) Ma ciò non ostante, non esitiamo a con-

(1) Béclard. *Traité élémentaire de Physiologie humaine*. Cinquième édition. Paris 1866, pag. 1204.

(2) Hollard. *Précis d'anatomie comparée*. Bruxelles 1836, pag. 161.

(3) Leydig. *Op. e luogo cit.*

fessare, che noi ci sentiamo poco disposti ad annoverare l'esempio che ce ne venne porto, fra le ammissibili eccezioni.

Ho esaurito un debito di convenienza e di rispetto, facendo intorno al preteso fenomeno la parte dello storico: soddisfeci a quello della scienza, esponendo le riflessioni critiche che la stranezza del fatto mi ebbe suggerite, lasciandone se non altro al tempo la decisione. « *Couciossiacosachè (couchiuderò con il Vallisnieri), siccome è temerità iusoffribile, negar subito le cose nuove, così non è maschia prudenza abbracciarle, prima di non averle più e più volte disaminate, ed osservato, se in tutto, o in parte corrispondono al vero, se vi sono stati equivoci, se hanno i primi scoperto abbastanza, se finalmente sono uniformi a tutte le leggi della natura, che suole sovente mostrare aperta una cosa, e un'altra tener celata, per lasciare a più d'uno il merito di faticare, a molti la gloria di scoprire, e a tutti il contento di godere una volta svelati gli arcani suoi* (1).

(1) Vallisnieri. Opere fisico-mediche. In Venezia 1733. Tomo secondo, pag. 147.