QL
35
A1
C49

Clarke

"
"

Cyperaceae
[of West Indies]

EX
URBAN: SYMBOLAE ANTILLANAE
VOL. II FASC. I

SEORSUM IMPRESS.

BEROLINI
FRATRES BORNTRAEGER
SCHÖNEBERGERSTR. 17 a

141
049

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

II. Cyperaceae.

Exposuit

CAROLUS BARON CLARKE.

Flores 1—2-sexuales. Perianthium 0, aut ad setas vel squamulas hypogynas reductum. Stamina 3—1, hypogyna. Ovarium superum, 1-loculare; stylus 3—1-fidus; ovulum 1, basilare, erectum, anatropum. Nux trigona vel compressa. Semen erectum, liberum; embryo minutus, in basi albuminis situs. — Herbae. Flores parvi vel minuti, in fasciculis spiculisve saepius adgregati, a bracteis paleaceis (glumis) fulti. — Species 3300, per orbem terrarum (praesertim in humidis) sparsae.

Obs. Ordinis character hoc loco (ut generum) ad species Antillanas quodammodo coarctatus.

Clavis generum Antillanorum.

Subordo I. SCIRPO-SCHOENEAE. Flos nuciger bisexualis, staminibus perfectis.

Tribus 1. **Cypereae**. Spiculae glumae inferiores vacuae 2—0; glumae distichae.

* Styli rami 2; nux lateraliter compressa.

Rhachilla supra 2 glumas imas vacuas decidua

I. *Kyllinga* Rottb.

Rhachilla supra 2 glumas imas vacuas persistens

II. *Pycneus* Beauv.

** Styli rami 2; nux a dorso (facie antica) compressa

III. *Juncellus* C. B. Clarke.

*** Styli rami 3.

Spiculae rhachilla persistens . . IV. *Cyperus* Linn.

Spiculae rhachilla supra 2 glumas imas vacuas decidua

V. *Mariscus* Gaertn.

Spiculae rhachilla in nodos 1-nucigeros soluta

VI. *Torulinium* Desv.

Tribus 2. **Scirpeae.** Spiculae glumae inferiores vacuae 2—0; glumae 3—pleio-stichae.

* Styli basis bulbosa, a nucis apice separabilis.

§ Setae saepissime obviae; culmus aphyllus, spicula 1 terminali

VII. *Eleocharis* R. Br.

§§ Setae 0; plantae saepissime foliigeræ.

Stylus deciduus; styli basis decolorata in nuce relicta

IX. *Bulbostylis* Kunth.

Stylus persistens, vel cum styli basi decidua

VIII. *Fimbristylis* Vahl.

** Styli basis non bulbosa, in nucis apicem sensim transiens.

§ Plantae cum spiculis glabrae vel fere glabrae.

† Squamae hypogynae hyalinae 2, altera antica altera postica

XIII. *Lipocarpa* R. Br.

†† Setae hypogynae 0—plures, vel in *Scirpo micrantho* Vahl squama hypogyna minuta lateralis.

Setae speciei 0—8, simplices X. *Scirpus* Linn.

Setae speciei numerosae (6, ad basin divisae)

XI. *Eriophorum* Linn.

§§ Plantae plus minus (spiculae conspicue) pilosae

XII. *Fuirena* Rottb.

Tribus 3. **Rynchosporae.** Spiculae glumae inferiores vacuae 3—plures; stylus 2-fidus.

Setae 0; styli rami 2 longi; spicularum caput 1

XIV. *Dichromena* Vahl.

Setae 0 vel apice filiformes; styli rami 2, vel brevissimi inflorescentia monocephala, vel longi inflorescentia non monocephala

XV. *Rynchospora* Vahl.

Setae apice ob setulas longas incrassatae, alopecuroideae

XVI. *Pleurostachys* Brongn.

Tribus 4. **Schoeneae.** Spiculae glumae inferiores vacuae 3—plures; stylus 3-fidus.

Plantae magnae. Flos nucifer axillaris

XVII. *Cladium* (P. Br.)

Planta humilis. Flos nucifer pseudo-terminalis

XVIII. *Remirea* Aubl.

Subordo II. SCLERI-CARICEAE. Flores omnes unisexuales.

Tribus 5. **Sclerieae.** Flos foemineus a glumis fultus.

* Panicula longa, in parte superiore foeminea, inferiore mascula

XXI. *Lagenocarpus* Nees.

** Spiculae foemineae masculae (aut androgynae) intermixtae vel fasciculatae.

§ Spicula nucigera flore 1 foemineo basali, a floribus masculis aut gluma vacua (floris masculi rudimento) terminata

XIX. *Scleria* Berg.

§§ Spiculae nucigeræ flos 1 foemineus specie terminalis

Spicula nucigera a masculis distincta

XX. *Diplacrum* R. Br.

Spicula nucigera basi a masculis paucis cincta

XXII. *Calyptracarya* Nees.

Tribus 6. **Cariceae.** Flos foemineus nudus, in utriculo inclusus.

Utriculus includens setam longam uncinatam

XXIII. *Uncinia* Pers.

Utriculus praeter pistillum nihil includens

XXIV. *Carex* Linn.

Subordo III. **MAPANIEAE.** Flores omnes unisexuales; foemineus terminalis nudus cum 2—10 inferioribus masculis spiculam parvulam (specie 1-floram perfectam) efformans.

Spicae 5 mm. longae; spiculae 2-andrae

XXV. *Hypolytrum* L. C. Rich.

Spicae 3 cm. longae; spiculae 5—8-andrae

XXVI. *Diplasia* L. C. Rich.

I. *Kyllinga* Rottb. partim

(i. e. sp. stylo 2-fido).

Spicula 4—5-gluma; rhachilla supra 2 glumas imas articulata proventu caduca. Glumae distichae; tertia florem bisexualem nuciferum fovens, quarta et quinta vacuae (quarta raro mascula, rarissime in sp. Americanis nucigera). Setae hypogynae 0. Stamina 3—1, antica. Stylus 2-fidus. Nux lateraliter compressa. — Glabrae vel fere glabrae. Culmus nudus, i. e. folia omnia prope ad basim sita. Inflorescentia in apice dense capitata sessilis, e 3—1 capitibus in unum plus minus confluentibus composita; spiculae in unoquoque capite globoso vel breviter cylindrico numerosae sessiles.

Species 45, in calidioribus orbis totius sparsae — in regione Mediterranea nondum lectae.

Obs. Generis character ad species Indiae occident. coarctatus.

Clavis specierum.

Sect. 1. **Thryocephalum** (genus) J. R. et G. Forst. Gen. Pl. p. 129 t. 65. Gluma
nucigera in carina cristato-alata . . 1. *K. squamulata* Vahl.

Sect. 2. **Eu-Kyllinga**. Gluma nucigera in carina levis aut setulosa neque alata. Spiculae 1-nucigerae.

* Rhizoma elongatum, horizontale, crassiusculum; culmi in rhizomate distantes aut approximati.

Folia graminea, apice longe attenuata 2. *K. brevifolia* Rottb.

Folia breviuscula viridia, apice subito angustata

3. *K. pungens* Link.

Folia 0 vel vix ulla, scarioso-colorata 4. *K. peruviana* Lam.

** Annuae aut biennes, rhizomate 0 vel perbrevis. Culmi caespitosi. Folia graminea.

Annua. Gluma nucigera eglandulosa, in carina setuloso-scabra

5. *K. pumila* Mich.

Annua aut biennis. Gluma nucigera glandulis rotundis rubris
inspersa, in carina levis 5^b. *K. odorata* Vahl.

1. **Kyllinga squamulata** Vahl, radice fibrosa; foliis culmo saepe longioribus, 3 mm. latis; capite 1, ovoideo, 8 mm. longo, viridi aut fusco; bracteis 3—4, ima usque ad 10—15 cm. longa, cum foliis consimilibus; gluma nucigera naviculari, ovata, carina in mucronem brevem recurvatum excurrente, per totam longitudinem ab ala scariosa grosse dentata percursa.

Kyllinga squamulata Vahl Enum. II (1806) p. 381; Duss! Fl. (1897) p. 543.

Kyllinga squamulosa Kunth Enum. II (1837) p. 135.

Hab. in Martinique, satis frequens locis umbrosis prope mare ad Carbet et Prêcheur: Duss n. 209, 461, 703.

Distrib. in Africa tropica, et in India frequens.

2. **Kyllinga brevifolia** Rottb. rhizomate longius repente; foliis culmo longioribus aut multo brevioribus, 2—4 mm. latis, viridibus; bracteis 3—4, usque ad 5—12 cm. longis, cum foliis consimilibus; capitibus 1—3-nis, lateralibus ovoideis, centrali ovoideo aut breviter cylindrico 7—12 mm. longo; gluma nucigera naviculari, ovato-lanceolata submucronata, fere eglandulosa, in carina superiore exalata viridi setuloso-scabra rarius omnino levi.

Kyllinga brevifolia Rottb. Descr. et Ic. (1773) p. 13 t. 4 fig. 3; Griseb.! in Mem. Acad. Amer. n. ser. VIII (1862) p. 535 et Flor. p. 568 et Cat. Pl. Cub. p. 238; Sauv. Fl. Cub. n. 2605 p. 173.

Kyllinga pumila A. Rich. in Sagra Fl. Cub. III p. 288; Griseb. Pl. Cub. p. 238.

Kyllinga cruciformis Schultes in Roem. et Sch. Syst. II Mant. (1824) p. 137 (*Kyllinga*); A. Rich. in Sagra Fl. Cub. III p. 289; Griseb. Kar. p. 120 (syn. excl.); Schrader ms. fide Schultes.

Kyllinga monocephala Thunb. *Fl. Japon.* (1784) p. 35; Swartz *Obs. Bot.* (1791) p. 32; Griseb. *Flor.* p. 568 et *Cat. Pl. Cub.* 238.

Kyllinga sororia Kunth *Enum. II* (1837) p. 131; non Rottb.

Schoenus coloratus Linn. *Sp. Pl. ed. I* (1753) p. 43, *ed. II* p. 64 *partim*.

Hab. in Bermudas: Moseley; Cuba: Guthnick n. 12, Rugel n. 902, C. Wright n. 699; Jamaica: J. H. Hart n. 762, March n. 10, Swartz, Wilson n. 310, 311; Hispaniola: Eggers n. 1969, 2190, Picarda n. 426, 1454; Portorico: Blauner n. 110, 245, Grosourdy n. 19, Sintenis n. 13, 1449^b, 2198^b, 2526, 5089^b, Stahl n. 298; St. Thomas: Eggers n. 129, 164, Ehrenberg n. 691 (alt. 460 metr.); Antigua: Nicholson n. 26; Isle Therèse: Gibollet n. 12; Guadeloupe: Duchassaing n. 206, Duss n. 3129, 3820, l'Herminier n. 18, 20; Dominica: Eggers n. 942, Imray n. 54, Ramage; Martinique: Hahn n. 831^b, Husnot n. 13, 15, Sieber n. 16, 357; St. Lucia: Ramage; St. Vincent: Smith n. 212; Grenada: Broadway n. 178, 180, Lambert, Sherring; Tobago: Eggers n. 5525; Trinidad: Fendler n. 902, 903, Hart n. 3218.

Distrib. per orbem terrarum in calidioribus fere omnibus.

3. ***Kyllinga pungens*** Link, rhizomate 1 — 8 cm. longo, 3 mm. crasso, a squamis ovatis acutis conspicue intecto; foliis brevibus, raro cum $\frac{1}{3}$ parte culmi aequilongis, 4 mm. latis, apice subito acutatis; bracteis 3—4, 1—6 cm. longis, cum foliis consimilibus; capite 1, ovoideo aut breviter cylindrico, 6—9 mm. longo, fusco; spiculis numerosis, 2—3 mm. longis, lanceolatis, imis subhorizontalibus; gluma nucigera acuta aut mucronata, naviculari, in latere utroque 3-striata.

Kyllinga pungens Link *Hort. Berol. I* (1827) p. 326.

Kyllinga obtusata Presl *Rel. Haenk. I* (1828) p. 183.

Hab. in Portorico prope Mayagüez in pascuis circa Castellum: Krug n. 1248, Sintenis n. 13^b.

Distrib. in America australi frequens; in Africa, Asia rara.

4. ***Kyllinga peruviana*** Lam. rhizomate 1 — 4 cm. longo, 3 — 5 mm. crasso, a squamis ovatis acutis conspicue intecto; foliis vix ullis, i. e. praeter vaginas 1—4 cm. longas subscariosas coloratas (rarissime virides); bracteis saepius capite brevioribus, rarius usque ad 2—4 cm. longis viridibus; capite 1, globoso, 1 cm. in diam., fusco; spiculis numerosis, 3—4 mm. longis, ovato-lanceolatis, imis deflexis; gluma nucigera vix acuta minute mucronata, naviculari, in latere utroque 3—4-striata.

Kyllinga peruviana Lam. *Encyc. III* (1789) p. 366.

Kyllinga vaginata Lam. *Ill. I* (1791) p. 148; Kunth *Enum. II* p. 129; Ham. *Prod. Ind. occid.* p. 13; Bock. in *Linnaea XXXV* (1867—68) p. 416.

Kyllinga tibialis Ledeb. in Schrad. *Neues Journ. II pars 2* (1805) p. 291; Poiteau ms. e Ledebour.

Mariscus aphyllus Vahl *Enum. II* (1806) p. 373.

Kyllinga aphylla Kunth *Enum. II* (1837) p. 127; Griseb. *Flor.* p. 568.

Lyprolepis denudatus Steud. *Cyp.* (1855) p. 130.

Sloane Jamaica I. 121. t. 81 fig. 2.

Hab. in Jamaica: Cuming n. 72, 89, Purdie, W. Wright; Hispaniola: Bertrand, Eggers n. 1699, Poiteau; Portorico: Eggers n. 445, 595, Krug n. 1239, Sintenis n. 130, 4942^b, 4972, Stahl n. 1140; Antigua: Forsyth, Masson, Wulschlaegel n. 711; Antilles: Grosourdy n. 13; Trinidad: Crueger.

Distrib. America et Africa tropicae.

5. **Kyllinga pumila** Mich. annua; culmis caespitosis, 5—25 cm. longis, gracilibus; foliis cum $\frac{2}{3}$ parte culmi subaequilongis, 2—3 mm. latis, viridibus; capitibus 3—1, ovoideis aut intermedio cylindrico, 5—9 mm. longis; bracteis 3—4, usque ad 5—8 cm. longis, cum foliis consimilibus; gluma nucigera naviculari, ovato-lanceolata, eglandulosa, in carina viridi setuloso-scabra.

Kyllinga pumila Mich. *Fl. Bor. Amer. I* (1803) p. 28; *Kunth Enum. II* p. 132 partim; *Sauv.! Fl. Cub. n.* 2606 p. 173.

Kyllinga odorata Duss! *Fl.* p. 543 partim.

Kyllinga caespitosa Nees in Mart. *Fl. Bras. II pars 1* (1842) p. 12, syn. *Kunth et var. β exclusis*; *Hemsl. Biol. Centr. Am. III* p. 453.

Kyllinga flexuosa Boeck.! *Cyp. Nov. Heft II* (1890) p. 1.

Hab. in ins. caribaeis: Sieber n. 102; Cuba: C. Wright n. 3760; Jamaica: Eggers n. 3753 (Bellevue); Hispaniola: Mayerhoff; Portorico: Sintenis n. 1402, 2767, 4612; St. Thomas: Riedlé; Antigua: Liebmann; Guadeloupe: l'Herminier n. 16, 17; Martinique: Belanger n. 394, Duss n. 444^a, 474^a, Hahn n. 368, 369; St. Vincent: Eggers n. 6708, Smith n. 408; Barbados: Eggers n. 7106; Grenada: Eggers n. 6081; Tobago: Eggers n. 5950; Trinidad: Hart n. 1430, O. Kuntze n. 632, Sieber n. 2.

Distrib. per Americam calidiorem et temperatam communis; in Africa frequens.

5^b. **Kyllinga odorata** Vahl, annua vel biennis, rhizomate 0 vel vix ullo, fragrante; culmis caespitosis, 1—4 dm. longis, tenuioribus; foliis culmo brevioribus, 2—4 mm. latis, viridibus; capitibus 1—3, intermedio 6—15 mm. longo ovoideo aut cylindrico, lateralibus minoribus, cinnamomeis; bracteis 3—4, usque ad 5—8 cm. longis, cum foliis

consimilibus; gluma nucigera naviculari, ovato-oblonga, a glandulis rotundis impressa, in carina levi.

Kyllinga odorata Vahl Enum. II (1806) p. 382; Kunth Enum. II p. 132 partim; Boeck. in Linnaea XXXV (1867—68) p. 410; Duss! Fl. p. 543 partim.

Kyllinga triceps Willd. Sp. Pl. I (1794) 256 partim i. e. exempla americana; Griseb. Flor. p. 568 pro maiore parte; Steud.! Nomencl. I p. 851; — non Rottb.

Kyllinga monocephala Muehl. Descr. (1817) p. 1; Sauv.! Fl. Cub. (1871) n. 2607 p. 173 partim, — non Rottb.

Sloane Jamaica I p. 119 t. 78 fig. 2.

Hab. in India occident.: Sieber n. 3; Cuba: C. Wright n. 3759; Jamaica: W. Wright; Antilles: Shuttleworth n. 792; Antigua: Wulschlaegel n. 708, 709; Guadeloupe: Duss n. 3130; Dominica: Nicholls n. 159; Martinique: Duss n. 217, Sieber n. 18; St. Vincent: Guilding n. 29, Smith n. 1083 (alt. 450 metr.); Grenada: Broadway n. 675; Trinidad: Fendler n. 902, Hart n. 3220, Sieber n. 356.

Distrib. in America, a New Orleans usque ad Uruguay, vulgaris.

Obs. In orbe vetere *Kyllinga cylindrica*, a *K. odorata* vix nisi glumis nucigeris eglandulosis diversa, in Africa, India, Australia trop. late sparsa est.

Rhizoma in *K. pumila* (et in *Kyllingae* speciebus paucis aliis) collectoribus „*fragrans*“ interdum inscribitur.

Species residuae.

Kyllinga capillaris Boeck. radice tenui repente cum vaginis bruneis; culmo capillari, 6—7" longo basi foliato; foliis 3—4-pollicaribus, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ " latis; foliis 4 involucralibus valde inaequalibus; capite globoso-ovato 3" longo, 2" lato; spicis 3-floris, obovatis vel oblongis, obliquis; squamis ovatis hyalinis obtusis; caryopsi (non perfecte matura) plano-convexa quam squama longiore.

Kyllinga capillaris Boeck. in Flora XLI (1858) p. 409.

Hab. in India occid.: Bertero sub Cypero n. 221 missa, fide Boeckeler.

Kyllinga intermedia R. Br. culmo elongato, graciliore; capite 1, laterali, parvo, globoso aut depresso ovoideo (nec cylindrico); glumae nucigerae carina levi, pallida; ceteroquin ut *K. brevifolia*.

Kyllinga intermedia R. Br.! Prod. (1810) p. 219; Spreng. Syst. I p. 235; Kunth Enum. II. 138.

Kyllinga brevifolia Boeck.! ms. in Amalia Dietrich n. 717.

Hab. in India occid.: fide Sprengel l. c.

Distrib. Australia orient. i. e. Queensland, New South Wales.

Obs. Nullum exemplum, in India occidentali lectum, mihi obvium. — Species autem a *K. brevifolia* Rottb. vix distinguenda videtur.

Kyllinga monocephala Rottb. glumae nucigerae carina in $\frac{1}{2}$ parte superiore ab ala scariosa glandulis inspersa cristata; ceteroquin ut *K. brevifolia*.

Kyllinga monocephala Rottb. *Descr. et Ic.* (1773) p. 13 t. 4 fig. 4; *Kunth Enum.* II. 129; *Boeck. in Linnæa* XXXV (1867—68) 427; *Mayc. Barbado.* p. 44; *Sauv. Fl. Cub. n.* 2607 p. 173 (var. *triceps*); *Egg. Fl. St. Croix* p. 108; *Bello y Esp. Ap. Portor.* p. 124; *Chapm. Fl. South. U. S. p.* 513; *Hitch. Fl. Bahamas* p. 140.

Hab. in Ind. occid.: fide Sprengel; Great Cayman: fide Maycock; Cuba: C. Wright n. 3758 (fide Sauvalle); Portorico: fide Bello y Esp.; St. Croix: fide Eggers; Barbados: fide Maycock.

Distrib. per orbem veterem calidiorem communis.

Obs. Ex orbe novo exemplum mihi obvium adhuc nullum.

II. *Pyereus* Beauv.

Spiculae 5—6—multiflorae; rhachilla persistens. Glumae 2 imae vacuae, persistentes; 4—plurimae sequentes distichae, florem nucigerum bisexualem foventes, a basi spiculae sensim caducae; glumae paucae summae steriles aut vacuae, subtrispirae. Setae hypogynae 0. Stamina 3—1, antica. Styli rami 2, ab axi rhachillae avorsi. Nux lateraliter compressa, plus minus secunda. — Glabrae. Culmi nudi, prope ad basin foliigeri. Spiculae in spicis saepe densis spicatae, vix digitatae. Spicae in quasi-umbella (pannicula depresso-corymbosa) dispositae vel in 1 caput fere congestae, aut in umbella composita in apicibus radiorum fere digitatae.

Species 63, per regiones calidiores totius orbis terrarum sparsae, paucae in zonam temperatam frigidiorum extensae.

Obs. In sp. antillanis spicae stramineae, luteae, pallide rubro-tinctae aut fusciscentes videntur; nunquam castaneae aut atrae.

Clavis specierum antillanarum.

Series A. **Zonatae.** Nucis superficiei cellulae extimae, praesertim in humeris, longitudinaliter oblongae. Nux tenuiter transversim undulato-lineata.

Annua, caespitosa. Spicae saepe simpliciter umbellatae

6. *P. flavescens* Reich.

Series B. **Reticulatae.** Nucis superficiei cellulae extimae subquadratae. Nux minute reticulata, punctulata, aut granularis.

* Graciles. Spiculae 2—3 mm. latae.

† Spiculae pallidae plus minus rubro-tinctae.

Spiculae 2 mm. latae 8. *P. polystachyus* Beauv.

Spiculae 3 mm. latae 9. *P. ferrugineus* C.B. Clarke.

†† Spiculae omnino stramineae, luteae vel fusciscentes.

Umbella in 1 caput congestum . 10. *P. propinquus* Nees.

Spicae in umbella simplice dispositae.

Glumae mucronulatae 7. *P. nitens* Nees.

Glumae apice triangulares, vix acutae

11. *P. helvus* C. B. Clarke.

** Robustior. Spiculae 5 mm. latae. Umbella 1—2 dm. lata

12. *P. angulatus* Nees.

6. ***Pycreus flavescens*** Reich. annua, caespitosa, culmis 2—30 cm. longis; foliis cum $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, 1—3 mm. latis; umbellae radiis 1—6, usque ad 0—7 cm. longis; bracteis umbellam superantibus, foliiformibus; spiculis compressis, luteis aut fuscis, 5—20 mm. longis, 2—3 mm. latis, 6—50-floris, lateribus subparallelis; glumis ovatis, obtusis, paullo inflatis; styli ramis 2, e gluma parum exsertis; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, lucide nigra, tenuiter transversim undulato-lineolata; nucis cellulis extimis, praesertim in humeris, longitudinaliter oblongis.

Pycreus flavescens Reich. *Fl. excurs.* (1830—32) p. 72; C. B. Clarke in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* VI (1893) p. 589.

Cyperus flavescens Linn. *Sp. Pl. ed. I* p. 46, *ed. II* p. 68, nec Linn. *herb. propr.*; Kunth *Enum.* II p. 5; Boeck. in *Linnaea* XXXV (1867—68) p. 438, nec Schkuhr.

Hab. in ins. caribaeis: Sieber *Agrost.* n. 105; Haiti prope Mariani in uliginosis: Picarda n. 1108.

Distrib. in Europa, Asia occidentali, Africa; in America rara.

7. ***Pycreus nitens*** Nees, annua, caespitosa, culmis 2—30 cm. longis; foliis cum $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, 1—3 mm. latis; umbellae radiis 1—6, usque ad 0—10 cm. longis; bracteis 3—6 cum umbella subaequilongis, foliiformibus; spiculis breviter spicatis, stramineis aut brunescens, 5—18 mm. longis, 2 mm. latis, 8—44-floris; glumis ovatis, apice oblique patulis, saepissime mucronulatis; styli ramis 2, paullum exsertis; nuce parvula, cum $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, compressa, apice truncata, levi; nucis cellulis extimis subquadrangulis.

Pycreus nitens Nees in *Linnaea* IX (1834) p. 283; C. B. Clarke in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* VI p. 591.

Pycreus pulvinatus Nees in *Linnaea* IX (1834) p. 283.

Cyperus pumilus Linn.! *Amoen. Acad.* IV (1758) p. 302 et *Sp. Pl. ed. II* p. 69; Kunth *Enum.* II p. 4 pro minore parte; nec Rottb. nec Nees.

Cyperus nitens Retz. *Obs. fasc. V* (1789) p. 13?; Kunth *Enum.* II p. 3; Boeck.! in *Linnaea* XXXV (1867—68) p. 483.

Hab. in Martinique: Duss n. 477.

Distrib. in Florida; in orbe vetere calidiore communis.

8. **Pyereus polystachyus** Beauv. caespitosa, rhizomate nullo vel raro 5 cm. longo; culmis 3—8 dm. longis (vel casu 0); foliis cum $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{4}$ parte culmi aequilongis, 2—5 mm. latis; umbella aut monocephala composite 10—50-stachya, aut saepe radiata radiis 1—7 usque ad 0—5 cm. longis, spica in unoquoque radio subcomposita 10—40-stachya; bracteis 3—6, patulis, usque ad 1—4 dm. longis; spiculis longis 2 cm., latis 2 mm., usque ad 20—50-floris, linearibus, imo in fructu suberectis, stramineis saepe plus minus rubro-pictis; glumis ovatis, apice triangularibus vix acutis; nuce oblonga, compressa, paullo biconvexa, nigricante, cellulis extimis quadratis interdum porosis; stylo cum nuce subaequilongo, ramis 2.

Pyereus polystachyus Beauv. *Fl. d'Owar. II* (1807) p. 48 t. 86 fig. 2; C. B. Clarke in Hook. f. *Fl. Brit. Ind. VI* p. 592.

Cyperus polystachyus R. Br. *Prod.* (1810) p. 214; Kunth *Enum. II* p. 13; Griseb. *Kar. p.* 118, et *Flor. p.* 562 et *Pl. Cub. p.* 236; Boeck. in *Linnaea XXXV* (1867—68) p. 477; Sauv. *Cub. n.* 2565 p. 171 (*polistachyus*); Duss *Fl.* (1897) p. 535; non Rottb.

Cyperus odoratus Linn.! *Sp. Pl. ed. I* p. 46, *ed. II* p. 68 et *herb. propr. pro majore parte.*

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3354; Hispaniola: Mayerhoff, Picarda 1110, Poiteau; Portorico: Blauner n. 246, Eggers n. 432, 591, 834, Sintenis n. 1314, 6789; Antigua: Wulschlaegel n. 678; Guadeloupe: Duchassaing n. 4, Duss n. 3104, 3669, l'Herminier n. 45; Dominica: Eggers n. 833, Imray n. 276, 343; Martinique: Belanger n. 1258, Duss n. 691, Hahn n. 697^b, Husnot n. 1, Sieber n. 13, 360; St. Lucia: Murray; St. Vincent: Guilding n. 36, H. H. Smith n. 879; Barbados: Eggers n. 7164, (alt. 330 metr.); Grenada: Broadway n. 589, 589^b, Murray et Elliot n. 33; Trinidad: Broadway n. 5744, Bromfield, Crueger, Hart n. 2079, 2088, 3262.

Distrib. in toto orbe terrarum calidiore.

Var. β . **laxiflora** Ridley, spicis explanatis, subcorymbosis aut umbellulatis; spiculis rectangulatis patulis, subsolitariis, saepe magis coloratis luteo- vel rubro-bruneo-tinctis.

Pyereus polystachyus var. β . *laxiflora* Ridley in *Journ. Singapore Asiat. Soc. n.* 23 (1891) p. 5; C. B. Clarke in Hook. f. *Fl. Brit. Ind. VI* p. 592.

Cyperus paniculatus Rottb. *Descr. et Ic.* (1773) p. 40.

Cyperus scopellatus L. C. Rich. in *Acta Soc. Hist. Nat. Paris I* (1792) p. 106; Vahl *Eclog. Amer. II* (1798) p. 7 et *Ic. Pl. Amer. t.* 12.

Pyereus paniculatus Nees in *Linnaea IX* (1834) p. 283.

Cyperus microdontus Torrey in *Ann. Lyceum New York III* (1836) p. 255, 430; *Sauv. Fl. Cub. n.* 2566 p. 171; *Boeck.! in Flora LXIV* (1881) p. 77.

Pycerus Olfersianus Nees! in *Mart. Fl. Bras. II pars 1* (1843) p. 8; non *Cyperus Olfersianus* Kunth.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3571; Jamaica: Purdie; Trinidad: Hart n. 2099.

Distrib. var. in Africa, Asia, Oceania, America obvia.

Obs. *Cyperus scopellati* L. C. Rich. exemplum, in herb. J. Gay conservatum, est *C. sphacelatus* Roth.

Var. γ . **Hahniana** C. B. Clarke, spiculis glumis nucibus perparvis. *Cyperus subulatus* Nees! in *Flora XI* (1828) p. 335; *Boeck.! ms.*; non *R. Br.*

Cyperus Hahnianus Boeck.! in *Flora LVI* (1878) p. 138.

Hab. in India occident.: Sieber *Agrost. n.* 145; Martinique: Hahn n. 700; Ins. Grenadine Bequia: H. H. Smith n. B. 347.

9. ***Pycerus ferrugineus*** C. B. Clarke, spiculis paullo majoribus, usque ad 2 cm. longis 3 mm. latis, saepe magis coloratis, ferrugineis aut bruneis, interdum basi obscure lineari-lanceolatis; glumis paullo magis remotis; ceteroquin ut *P. polystachyus* var. β *laxiflora*.

Pycerus ferrugineus C. B. Clarke in *Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI* (1893) 593.

Cyperus ferrugineus Poir. in *Lam. Encyc. VII* (1806) p. 261; *Kunth Enum. II* p. 11.

Cyperus Nuttallii C. Spreng. *Neu. Entdeck. II* (1821) p. 240.

Cyperus polystachyus var. *ferruginea et macrostachya* Boeck. in *Linnaea XXXV* (1867—68) p. 479.

Hab. in Bahamas: Brace n. 493; St. Thomas: in herb. Mus. Brit.

Distrib. in Africa, Asia, America boreali; sed a *P. polystachyo* var. β *laxiflora* vix certe distinguenda.

10. ***Pycerus propinquus*** Nees, rhizomate tenui, breviter descendente; culmis caespitosis, 2—5 dm. longis; foliis cum $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, 2—3 mm. latis; umbella in 1 caput 8—16-stachyum congesta; bracteis 3, usque ad 15 cm. longis; spiculis usque ad 2 cm. longis $3\frac{1}{2}$ mm. latis, 20—36-floris, luteo-stramineis, sat compressis, linearibus, lateribus parallelis; glumis ovatis, vix acutis, paullo inflatis; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae vix aequilonga, obovoidea, levi, castanea, cellulis extimis parvis, quadratis; stylo quam nux brevior, ramis 2.

Pycerus propinquus Nees! in *Mart. Fl. Bras. II pars 1* (1842) p. 7.

Cyperus Olfersianus Kunth! *Enum. II* (1837) p. 10; Boeck. in *Linnaea* XXXV (1867—68) p. 439; *Sauv. Cub. n.* 2564 p. 171; — non *Pycreus Olfersianus* Nees.

Hab. in Hispaniola: Herb. Hennecart (Jacquemont?).

Distrib. in Africa, Mexico; frequens in America australi.

11. *Pycreus helvus* C. B. Clarke, umbellae radiis 3—5 usque ad 2—5 cm. longis; spicis 6—20-stachyis; spiculis $2\frac{1}{2}$ mm. latis, lanceolatis 4—8-floris, aut linearibus usque ad 20-floris, multum compressis; glumis rigide imbricatis neque inflatis; ceteroquin ut *P. propinquus* Nees.

Cyperus densus Link *Jahrb. III* (1820) p. 83; *Humboldt ms. fide Link.*

Cyperus helvus Liebm.! *Mexic. Halvgr.* (1850) p. 9.

Cyperus ambiguus Liebm.! *Mexic. Halvgr.* (1850) p. 11; non Steud.

Cyperus correctus Steud.! *Cyp.* (1855) p. 7.

Cyperus variegatus Griseb. *Flor.* (1864) 562; *Sauv.!* *Cub. n.* 2567 p. 171; non H. B. K.

Cyperus Jacquemontii Boeck.! in *Linnaea* XXXV (1867—68) p. 442.

Cyperus Olfersianus γ . *clatior* Boeck.! in *Linn. XXXV* (1867—68) p. 440.

Cyperus Humboldtianus Schultes in *Roem. et Sch. Syst. II Mant.* (1824) p. 100; *Kunth Enum. II* p. 11; *Boeck. in Linnaea* XXXV (1867—68) p. 441.

Cyperus Olfersianus Boeck. in *Engl. Jahrb. I* (1881) p. 362; C. B. Clarke in *Journ. Linn. Soc. XXI* (1884) p. 62 partim; non Kunth.

Cyperus Jacgei Boeck. *Cyp. Novae. Heft 1* (1888) p. 2.

Cyperus melanostachyus Kunth *Enum. II* (1837) p. 10 partim; var. *pallida* Schlecht. ms. fide Boeck.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 706, Sagra, Combs n. 428; Jamaica: Purdie; Hispaniola: Jacquemont.

Distrib. in Mexico et Guatemala frequens; in Brasilia australi et Montevideo rara.

12. *Pycreus angulatus* Nees, rhizomate elongato, tenui; culmo 6—10 dm. longo; foliis cum $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, usque ad 4—5 mm. latis; umbellae simplicis radiis 3—8, usque ad 5—10 cm. longis; bracteis 4—5, usque ad 2—3 dm. longis; spicis 3—20-stachyis, basi interdum subcompositis; spiculis spicatis, usque ad 16 mm. longis, 5 mm. latis, 22-floris, compressis, luteo-stramineis aut fusciscentibus; glumis ovatis, inflatis, in dorso viridi 3-nerviis, in lateribus lucidis,

in margine crispato-undulatis; nuce cum $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, compressa, levi, nigra; cellulis extimis subquadratis, emarcidis albescensibus saepe porosis; stylo brevi, ramis 2.

Pycnus angulatus Nees in *Linnæa* IX (1834) p. 283; C. B. Clarke in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* VI p. 593.

Cyperus unioides R. Br.! *Prod.* (1810) p. 216; Kunth *Enum.* II p. 112; Hemsl.! *Centr. Amer. Bot.* III p. 452.

Cyperus bromoides Link *Jahrb.* III (1820) p. 85; Kunth *Enum.* II p. 8; Griseb. *Pl. Cub.* p. 236; *Sauv. Cub. n.* 2568 p. 171; Boeck. in *Linnæa* XXXV (1867—68) p. 463; Willd. *ms. fide* Link.

Cyperus angulatus Nees in *Wight Contrib.* (1834) p. 73; Boeck.! in *Linnæa* XXXV (1867—68) p. 465.

Cyperus pseudo-bromoides Boeck.! in *Linn.* XXXV (1867—68) p. 464.

Cyperus Selloanus Boeck.! in *Linnæa* XXXV (1867—68) p. 466; Hemsl. *Centr. Amer. Bot.* III p. 451.

Cyperus Tauberti Boeck. in *Kneuck. Allg. Bot. Zeit.* I (1895) p. 158.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 214, 3752; Hispaniola prope Port-au-Prince: Herb. Hennecart, Jacquemont.

Distrib. in Africa australi, Asia austro-orient., Australia septentr., Mexico, America australi.

III. *Juncellus* C. B. Clarke.

Spiculæ 5—6—multifloræ; rhachilla persistens. Glumæ 2 imæ vacuæ, persistentes; 4—plurimæ sequentes distichæ, florem nucigerum bisexualem foventes, a basi spiculæ sensim caduæ. Setae hypogynæ 0. Stamina 3—1, antica. Styli rami 2. Nux convexo-plana aut subtrigona angulo antico plus minus depresso. — Culmi nudi. Spicularum spicæ in quasi-umbella dispositæ vel at 1 caput congestæ.

Species 13, in orbe vetere late sparsæ, in orbe novo rariores.

Obs. Genus a *Cypero* non-nisi stylo 2-fido diversum.

Clavis specierum Antillanarum.

Umbella composita, spiculis numerosis . . . 13. *J. alopecuroides* C. B. Clarke.
Culmus monocephalus 14. *J. laevigatus* C. B. Clarke.

13. *Juncellus alopecuroides* C. B. Clarke, glaber, culmo robusto, usque ad 1 metr. longo, erecto, saepissime annuo; foliis cum culmo aequilongis, 1 cm. latis; umbellæ radiis 10—15 cm. longis, apice saepe iterum umbellatis; bracteis usque ad 3—5 dm. longis; spicis usque ad 3—5 cm. longis 17 mm. latis, cylindricis, polystachyis; spiculis 8 mm. longis, 2—3 mm. latis, 8—30-nucigeris; glumis ovatis, fusce strami-

neis; stylo 2-fido; nuce cum $\frac{1}{3}$ parte glumae aequilonga, subtrigona plano-convexa, levi, cinereo-nigra.

Juncellus alopecuroides C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1893) p. 595.

Cyperus alopecuroides Rottb. Deser. et Ic. (1773) p. 38 t. 8 fig. 2; Kunth Enum. II 19; Boeck. in Linnaea XXXVI (1869—70) p. 322 var. α exclusa; Duss Flor. p. 535.

Hab. in Guadeloupe in fossis prope urbem Pointe-à-Pitre: Duss n. 3105, Husnot n. 2.

Distrib. in Africa et India frequens; in Malaya et Queensland rarior.

14. ***Juncellus laevigatus*** C. B. Clarke, glaber, rhizomate horizontali, 2—5 mm. in diam., modo 4—10 cm. longo, modo in aquis natante usque ad 1—2 metr. longo culmis distantibus; culmis 1—6 dm. longis, tenuibus aut crassiusculis, apice trigonis levibus; foliis interdum cum culmo aequilongis 3 mm. latis, saepius abbreviatis, haud raro (praeter vaginas) 0; capite 1—30-stachyo, laterali, bractea ima erecta quasi culmum continuante; spiculis longis 1 cm., latis 2 mm., compressis turgidis, 16—40-floris, linearibus aut lineari-oblongis, rigidis, rectis aut saepe curvatis; glumis spisse imbricatis, ovatis, obtusis, albis aut plus minus castaneo-pictis; stylo 2-fido; nuce cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, plano-convexa, brunea.

Juncellus laevigatus C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1893) p. 596.

Cyperus laevigatus Linn.! Mant. (1771) p. 179; Rottb. Deser. et Ic. p. 19 t. 16 fig. 1; Boeck. in Linnaea XXXV (1867—68) p. 486.

Cyperus mucronatus Rottb. Deser. et Ic. (1773) p. 19 t. 8 fig. 4; Kunth Enum. II p. 17; Griseb. Kar. p. 118 et Flor. p. 562.

Hab. in Jamaica: Hart n. 801, Latrobe, Macnab; Hispaniola: Mayerhoff, Picarda n. 1428, 1562, 1563; Portorico: Sintenis n. 2984, 3317, 3847, 3875; St. Thomas: Eggers n. 337, Ehrenberg n. 68; Antigua: Wullschlaegel n. 675.

Distrib. per omnes fere terras calidiores et tropicas.

IV. *Cyperus* Linn.

Spiculae 5—6—multiflorae; rhachilla persistens. Glumae 2 imae vacuae, persistentes; 4—plurimae sequentes distichae, florem nucigerum bisexualem foventes, a basi spiculae sensim caducae; glumae paucae summae steriles aut vacuae, subtrispirae. Setae hypogynae 0. Stamina 3—1, antica; antherae lineares aut breviter oblongae. Styli rami 3. Nux trigona, angulo antico non raro plus minus depresso. — Glabrae praeter 1—2 species. Culmi nudi, prope ad basin foliigeri

aut nodosi, foliis omnibus rarius ad vaginas reductis. Spiculae in spicis spicatae aut digitatae. Spicae in quasi-umbella (panicula depresso-corymbosa) dispositae vel in 1 caput congestae.

Species 280 per totum orbem terrarum sparsae, in tropicis et calidioribus vulgares, in temperatis frigidioribus rarae.

Obs. Character supra ad species Antillanas quodammodo coarctatus est.

Clavis specierum Antillanarum.

Sect. 1. *Anosporum* (genus) Nees in Linnaea IX (1834) p. 287. Stylus longus; rami 3, cum $\frac{1}{3}$ parte styli vix aequilongi. — Aphylla
15. *C. nudicaulis* Poir.

Sect. 2. *Pycnostachyae*. Styli rami longi. Spiculae digitatae aut congestae.

* Annuae.

Culmus monocephalus; spiculae virides 16. *C. humilis* Kunth.

Spicae umbellatae, aureae aut luteae 17. *C. amabilis* Vahl.

Spicae umbellatae, ferrugineae aut subcastaneae

18. *C. uncinatus* Poir.

** Perennes.

† Stamen 1; plantae majusculae aut mediocres.

Folia transversim lineolata . . . 21. *C. virens* Mich.

Folia non transversim lineolata

Spicae flavae aut fusciscentes

Spiculae admodum compressae 22. *C. surinamensis* Rottb.

Spiculae paullo inflatae . . 23. *C. ochraceus* Vahl.

Spicae rubro-brunneae, congestae 24. *C. Luxulæ* Retz.

Umbellae radii longissimi, culmo longiores

28. *C. simplex* H. B. K.

†† Stamina 3—2.

Culmus monocephalus, 1—2-stachyus

27. *C. trichodes* Griseb.

Culmus polystachyus

Spiculae 1—2 mm. latae . . 19. *C. Haspan* Linn.

Spiculae 3 mm. latae

Nux in parte superiore crasse corticata

20. *C. Gardneri* Nees.

Nux non crasse corticata

Folia viscosa in sicco convoluta

25. *C. elegans* Linn.

Folia latiuscula plana viridia 29. *C. diffusus* Linn.

Spiculae 4—5 mm. latae . . 26. *C. oxylepis* Nees.

Sect. 3. *Choristachyae*. Styli rami longi. Spiculae spicatae.

* Spiculae rhachilla non aut peranguste alata.

† Annuae.

Glumae obtusiusculae . . . 30. *C. sphacelatus* Rottb.

Glumae acutae, mucronulatae . . 31. *C. compressus* Linn.

†† Perennes.

Folia non spongiosa; spiculae 1 mm. latae

32. *C. distans* Linn. f.

Folia spongiosa; spiculae 3—4 mm. latae

33. *C. lacunosus* Griseb.

** Spiculae rhachilla conspicue alata; perennes.

Aphyllae, culmis pseudoseptatis.

Culmus apice 3—4 mm. in diam., subteres

35. *C. articulatus* Linn.

Culmus apice $1\frac{1}{2}$ mm. in diam., trigonus

36. *C. nodosus* Willd.

Foliigerae.

Stolones tenuissimi, mox emarctidi 34. *C. esculentus* Linn.

Stolones in rhizomata lignea indurati 37. *C. rotundus* Linn.

*** Spiculae rhachilla conspicue alata; plantae elatae, in primo anno florescentes.

Foliigerae.

Rhachillae alae persistentes . . 38. *C. radiatus* Vahl.

Rhachillae alae mox solutae . . 39. *C. digitatus* Roxb.

Aphyllae.

Bracteae umbellularum perlongae. 40. *C. giganteus* Vahl.

Bracteae umbellulis breviores . . 41. *C. comosus* Poir.

15. **Cyperus nudicaulis** Poir. glaber, natans, aphyllus, rhizomate horizontali 3 mm. crasso; culmis approximatis, 3—8 dm. longis, monocephalis; vagina summa truncata aut a cauda 1—4 mm. longa coronata; bracteis 2—1, inferiore quasi culmum continuante, 5—15 mm. longa; spiculis 1—12, digitatis, usque 24 mm. longis 5 mm. latis, 20—70-floris, multum compressis, rhachilla persistente; glumis densissime imbricatis, acute carinatis, pallidis aut pallide bruneis, elliptico-lanceolatis apiculatis; staminibus 3, magnis; nuce cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, ovoideo-lanceolata, basi subereo-incrassata; stylo longo lineari, ramis 3 brevissimis.

Cyperus nudicaulis Poir. in *Lam. Encyc. VII* (1806) p. 240; *Kunth Enum. II* p. 48.

Cyperus pectinatus Vahl *Enum. II* (1806) p. 298; *Kunth Enum. II* p. 107.

Atomostylis cyperiformis Steud.! *Cyp.* (1855) p. 315.

Anosporum nudicaule Bocck.! in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 411.

Hab. in Martinique: Duss n. 479.

Distrib. in Africa trop. cum Madagascar.

16. **Cyperus humilis** Kunth, glaber, annuus, culmis caespitosis, 5—12 cm. longis, monocephalis; foliis culmos saepissime superantibus, 2—3 mm. latis; capite saepius polystachyo, bracteis 3 usque ad 5—8 cm. longis; spiculis usque ad 1 cm. longis $1\frac{1}{2}$ mm. latis, 40-floris, linearibus aut lineari-oblongis, viridibus aut pallidis, compressis; glumis naviicularibus, ovatis, acutis, 3-nerviis; stamine 1 (viso); nuce cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{5}$

glumae aequilonga, anguste obovoidea, trigona, nigra; stylo brevi, ramis 3 linearibus.

Cyperus humilis Kunth! *Enum. II* (1837) p. 23; Boeck. in *Linnaea* XXXV (1867—68) p. 499; *Saur. Cub. n.* 2572 p. 171.

Cyperus acuminatus Griseb.! in *Mem. Acad. Amer. VIII* (1862) p. 534, *Pl. Cub.* (1866) p. 237 et *Flor.* p. 563.

Hab. in Cuba: Combs n. 495, Eggers n. 5394, Poeppig, Liebmann n. 752, Rugel n. 890, C. Wright n. 700.

Var. β . **elatior** Britton, robustior, culmis usque ad 14 cm. longis, apice subtrialatis; capite usque ad 70-stachyo; nuce ovoidea, apice acute pyramidata, luteo-brunea.

Cyperus humilis var. β *elatior* Britton! in *Bull. Torrey Club XV* (1888) p. 99 et in *Donnell Smith Pl. Guatemala.* p. 48.

Cyperus pygmaeus Liebm.! *Mexic. Halcgr.* (1851) p. 15.

Hab. in Cuba: Liebmann; Martinique: Duss n. 476.

Distrib. in Mexico et Guatemala.

17. **Cyperus amabilis** Vahl, glaber, annuus, culmis caespitosis, 5—20 cm. longis; foliis cum $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ parte culmi aequilongis 2 mm. latis; umbellae composita aut simplicia, bracteis usque ad 5 cm. longis, cum foliis consimilibus; spiculis in spicas 5—10 mm. fasciculatis, linearibus, aureo-bruneis, usque ad 18 mm. longis 2 mm. latis, compressis; glumis navicularibus, ovatis, truncatis, mucrone saepius minute excurrente, in lateribus aurantiacis enerviis, in dorso viridi 3—5-nerviis; stamine 1; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, trigona; stylo cum nuce subaequilongo, ramis 3 linearibus.

Cyperus amabilis Vahl *Enum. II* (1806) p. 318; *Kunth Enum. II* p. 108; *Hemsl. Centr. Amer. Bot. III* p. 441.

Cyperus aureus H. B. K.! *Nov. Gen. et Sp. I* (1815) p. 205; *Kunth Enum. II* p. 21; Boeck. in *Linnaea* XXXV (1867—68) p. 494; *Saur.!* *Cub. n.* 2569 p. 171.

Cyperus aurantiacus H. B. K. *Nov. Gen. et Sp. I* (1815) p. 205; *Kunth Enum. II* p. 20; *Griseb. Pl. Cub.* p. 237.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3356; Hispaniola: Mayerhoff.

Distrib. per fere omnes terras calidiores sparsa.

18. **Cyperus uncinatus** Poir. glaber, annuus, culmis caespitosis 3—15 cm. longis; foliis cum culmo subaequilongis, 2—2 $\frac{1}{2}$ mm. latis; umbellae saepius simplicis radiis 0—5 cm. longis; bracteis cum umbella aequilongis, foliiformibus; spiculis 3—20-nim digitatis, 1 cm. longis 1 $\frac{1}{2}$ mm. latis, ferrugineis aut subcastaneis, compressis, 15—50-floris; glumis ovatis, navicularibus, valide 3—5-nerviis, carina in mucronem recurvatum conspicuum excurrente; staminibus 3—1; nuce

cum $\frac{1}{2}$ parte glumae (mucrone excluso) aequilonga, oblongo-obovoidea, trigona; stylo quam nux multo brevior, ramis 3 parum exsertis.

Cyperus uncinatus Poir.! in Lam. *Encyc. VII* (1806) p. 247; W. Ham. *Prod. Fl. Ind. Occid.* p. 12; Kunth *Enum. II* p. 21; Boeck. in *Linnaea XXXV* (1867—68) p. 502.

Cyperus cuspidatus H. B. K. *Nov. Gen. et Sp. I* (1815) p. 204; Kunth *Enum. II* p. 22; Boeck. in *Linnaea XXXV* (1867—68) p. 496.

Cyperus hamulatus Kunth *Enum. II* (1837) p. 22.

Cyperus aristatus Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 237; *Sauv. Cub. n.* 2571 p. 171; non Rottb.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3355.

Distrib. in omnibus fere terris tropicis et calidis.

19. **Cyperus Haspan** Linn. glaber, rhizomate repente (sed non raro caespitosa culmis primo anno florentibus); culmis 1—6 dm. longis, mediocribus aut gracilibus; foliis saepius brevibus aut 0, interdum cum culmo aequilongis, 2—4 mm. latis; umbella composita, polystachya (exemplis oligostachyis etiam obviis); bracteis saepius brevibus, umbellam interdum superantibus; spiculis 2—6-nim digitatis, longis 5—15 mm., latis 1—2 mm., multum compressis, 10—40-floris, viridibus aut rubescentibus nec luteis; glumis navicularibus, ovatis, obtusis; staminibus 3—2; nuce cum $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, ovoidea aut obovoidea, trigona; stylo cum nuce subaequilongo, ramis 3 parum extrusis.

Cyperus Haspan Linn. *Sp. Pl. ed. II* p. 66 partim, nec Linn. *herb. propr.*; Kunth! *Enum. II* p. 34; Boeck.! in *Linnaea XXXV* (1867—68) p. 574, var. *inclusa*; Griseb.! *Pl. Cub.* p. 237 et *Flor. p.* 564; *Sauv. Cub. n.* 2579 p. 172.

Cyperus aphyllus Vahl *Eclog. Amer. II* (1798) p. 6; L. C. Rich. *ms.*

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3358, 3359; Jamaica: Alexander; Hispaniola prope Jarabacoa: Eggers n. 2118; Portorico: Eggers; Trinidad prope Icacos: Finlay in herb. Trin. n. 2084.

Distrib. per omnes fere terras calidiores.

20. **Cyperus Gardneri** Nees, glaber, rhizomate tenui repente; culmis caespitosis, 1—3 dm. longis; foliis cum $\frac{1}{2}$ parte culmi subaequilongis 3—4 mm. latis; umbella simplice aut paullo composita; bracteis 4—5, usque ad 15 cm. longis; spicis globosis 10—20-stachyis, densis; spiculis oblongis, 8 mm. longis, 3 mm. latis, 6—9-floris, viridibus purpureo-maculatis; glumis ovatis, navicularibus, apice triangularibus minute apiculatis; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, trigona, in $\frac{1}{2}$ parte superiore in humeris crasse suberi-corticata lutea; stylo quam nux multo brevior, ramis 3 brevibus.

Cyperus Gardneri Nees in Mart. Fl. Bras. II pars 1 (1842) p. 34;
cf. Boeck. in Linnaea XXXVI (1869—70) p. 410 in nota.

Cyperus corticatus C. Wright in Saur. Cub. (1871) n. 2570 p. 171.
Hab. in Cuba: C. Wright.

Distrib. Pernambuco.

21. *Cyperus virens* Mich. glaber, robustior, rhizomate brevi, obliquo; culmis 3—8 dm. longis; foliis cum $\frac{3}{4}$ parte culmi aequilongis, 6—9 mm. latis, plus minus spongiosis, saepe conspicue transversim lineolatis; umbella polystachya, saepius composita umbellulis bracteatis; bracteis umbellam superantibus cum foliis aequilongis; spiculis 8—20-nim fasciculatis, usque ad 12 mm. longis, 3—4 mm. latis, viridibus; glumis navicularibus, ovali-oblongis, obtusis, 3-nerviis, obcellulas laxas lucidis; stamine 1, laterali; nuce ellipsoidea, trigona, apice lanceolata, cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{5}$ parte glumae aequilonga; stylo cum $\frac{1}{2}$ parte nucis vix aequilongo, ramis 3 breviter extrusis.

Cyperus virens Mich. Fl. Bor. Amer. I (1803) p. 28; Kunth Enum. II p. 40; Boeck. in Linnaea XXXV (1867—68) p. 553.

Cyperus vegetus A. Rich. in Sagra Fl. Cub. III p. 285?

Cyperus surinamensis Griseb. Pl. Cub. p. 237; Saur. Cub. n. 2578 p. 172.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3357.

Distrib. in America a Virginia usque ad Argentinam.

Var. β . **Brittoni** C. B. Clarke, evolutus, foliis vix spongiosis; umbellae radiis 12 usque ad 8 cm. longis; spiculis usque ad 14 mm. longis.

Cyperus virens Britton! in Bull. Torrey Club XIII (1886) p. 208.

Cyperus vegetus Pursh Fl. Amer. Sept. I (1814) p. 51; non Willd.

Hab. in Guadeloupe: l'Herminier n. 44.

Distrib. Florida.

22. *Cyperus surinamensis* Rottb. glaber, culmis 2—6 dm. longis, gracilioribus; foliis 2—3 mm. latis, non transversim lineolatis; spiculis 10—50-nim capitatis, admodum compressis, delicatulis, usque ad 11 mm. longis 2—3 mm. latis 30—40-floris, flavescentibus nitidis vel fusciscentibus; glumis minute apiculatis; stamine 1; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, ellipsoidea, trigona, apice pyramidalis, ceteroquin fere ut *C. virens*.

Cyperus surinamensis Rottb. Descr. et Ic. (1773) p. 35 t. 6 fig. 5; Kunth Enum. II p. 43, syn. *C. polycephalo* Schrank excl.; Griseb. Kar. p. 118, et Flor. p. 564; Boeck. in Linnaea XXXV (1867—68) p. 158; Duss Fl. (1897) p. 537.

Cyperus formosus Vahl Enum. II (1806) p. 327; Kunth Enum. II p. 41.

Hab. in India occident.: Sieber Agrost. n. 103; Jamaica: Hart n. 857 partim; Hispaniola: Eggers n. 2186, Preneloup n. 652; Portorico: Eggers n. 434, 594, Krug n. 1236, 1246, Sintenis n. 85, 1256, 1314^b; St. Thomas: Ehrenberg n. 70, Ventenat; Guadeloupe: Duss n. 3524; Dominica: Imray n. 398; Martinique: Duss n. 690^a, Hahn n. 185, 484, Husnot n. 6, Sieber n. 8; Grenada: Eggers n. 6254, 6489; Tobago: Eggers n. 5530, 5585, 5827, 5968; Trinidad: Fendler 899, Hart n. 2100, 3608, O. Kuntze n. 1071, Sieber n. 8.

Distrib. in America, a Florida usque ad Argentinam.

23. **Cyperus ochraceus** Vahl, spiculis modice (multo minus quam in *C. surinamensi*) compressis; glumis arctius approximatis, paullo inflatis, vix apiculatis; ceteroquin ut *C. surinamensis* Rottb.

Cyperus ochraceus Vahl Enum. II (1806) p. 325; Kunth Enum. II p. 27; Griseb.! in Mem. Acad. Amer. N. Ser. VIII (1862) p. 534, Kar. p. 118 (ie. Sloane citat. excl.), Pl. Cub. p. 237 et Flor. p. 563; Boeck.! in Linnæa XXXV (1867—68) p. 553; Sauv. Cub. n. 2577 p. 172; Duss Fl. (1897) p. 537.

Hab. in Cuba: Eggers n. 4544^b, 5416, Guthnick n. 35, Liebmann, Rugel 601^c, 892, 900, 975, Sagra n. 381, C. Wright n. 707; Jamaica: Hansen n. 1, Hart n. 857 partim, Purdie, Wilson, Wright; Hispaniola: Eggers n. 1700, 2475, 2827, Ehrenberg, Jacquemont, Picarda n. 1424, Preneloup n. 651; Portorico: Sintenis n. 1274, 3605, 3817, 3839; Antigua: Wullschlaegel; Guadeloupe: Bertero, Duchassaing, Duss n. 3654.

Distrib. in America centrali et in Novo-Granata.

24. **Cyperus Luzulae** Retz. glaber, rhizomate brevi ligneo, culmis 2—8 dm. longis, subcaespitosis, robustioribus; foliis culmum saepe superantibus, usque ad 5—7 mm. latis, vix transversim lineolatis; umbella pseudo-simplice, umbellulis in spicas compositas densas irregulares congestim glomeratis; bracteis saepe 6—10, usque ad 2—5 dm. longis, cum foliis consimilibus; spiculis 3—4 mm. longis 2—3 mm. latis, 6—10-floris, compressis, rubro-bruneis; glumis ovali-oblongis, subobtusis, in carina 3—5-nerviis; stamine 1; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, oblonga, anguste obovoidea, trigona; stylo cum $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongo; ramis 3 breviter exsertis.

Cyperus Luzulae Retz. Obs. IV (1786) p. 11; Kunth Enum. II p. 43; Griseb.! Flor. p. 564; Boeck. in Linnæa XXXV (1867—68) p. 561; Gard. in Proc. Acad. Philad. 1890 p. 360; Duss Fl. (1897) p. 537.

Cyperus polycephalus Lam. Ill. I (1791) p. 147.

Cyperus conoideus L. C. Rich. in *Acta Soc. Hist. Nat. Paris* 1 (1792) p. 106.

Cyperus Trinitatis Steud.! *Cyp.* (1855) p. 26.

Cyperus sp. n. 27 Rottb. *Deser. et Ic.* (1773) p. 23 t. 13 fig. 2.

Scirpus Luxulae Linn. *Sp. Pl. ed. II* p. 75; *Kunth Enum. II* p. 175.

Mariscus polycephalus Link *Hort. Berol.* (1827) p. 324; *Kunth Enum. II* p. 126.

Hab. in ins. Bahami: Brace n. 408; India occident.: Sieber *Agrost.* n. 101; Hispaniola: Eggers n. 1510; Portorico: Bertero; Guadeloupe: Duss n. 3107, l'Herminier n. 28; Dominica: Eggers n. 535, 859, Imray n. 395; Martinique: Belanger n. 392, 1259, Duss n. 705^a, Hahn n. 704, Husnot n. 5; St. Lucia: Anderson, Murray; Grenada: Masson; Tobago: Clemens n. 27, Eggers n. 5531, 5535, 5968; Trinidad: Broadway n. 5746, Fendler n. 901, Hart n. 2093, 4210, Sieber n. 1.

Distrib. per Americam tropicam divulgata.

25. ***Cyperus elegans*** Linn. rhizomate subnullo; culmis 2—7 dm. longis, saepe viscosis aut tenuiter pilosulis; foliis cum culmo aequilongis, 5—8 mm. latis, saepius viscoso-pilosulis interdum glabratiss, plus minus transversim lineolatis, in sicco convolutis; umbella irregulari, laxa, saepe composita; bracteis 3, umbellam longe superantibus, cum foliis consimilibus; spiculis 3—12-nim fasciculatis, 9 mm. longis, 3 mm. latis, 10-floris, modice compressis fusce viridibus; glumis ovatis, carina subexcurrente; staminibus 3: nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae subaequilonga, late obovoidea, nigra; stylo quam nux brevior, ramis 3 modice exsertis.

Cyperus elegans Linn.! *Sp. Pl. ed. II* p. 68; Rottb. *Deser. et Ic.* p. 34 t. 6 fig. 4; Vahl *Eclog. Amer. II* p. 7, et *Enum. II* p. 323 partim.

Cyperus viscosus Swartz *Prod.* (1788) p. 20 et *Fl. Ind. Occident. I* p. 113; Jacq. *Ic. Pl. Rar. II* p. 8 t. 295; *Kunth Enum. II* p. 28; Griseb.! *Kar.* p. 118 et *Pl. Cub.* p. 237 et *Flor.* p. 563; Boeck. in *Linnaea XXXV* (1867—68) p. 547; Saww. *Cub. n.* 2575 p. 171; Duss *Fl.* (1897) p. 537.

Cyperus laxus Lam. *Ill. I* (1791) p. 146.

Cyperus confertus Griseb.! *Flor.* (1864) p. 563 pro magna parte, non Swartz.

Scirpus viscosus Lam. *Ill. I* (1791) p. 142.

Sloane Jamaica I p. 117 t. 75 fig. 1.

Hab. in Cuba: Eggers n. 4584, Rugel n. 878, Sagra, C. Wright n. 310, 3753; Jamaica: Fadyen n. 30, March n. 3; Hispaniola:

Eggers n. 2473, Ehrenberg n. 220, hb. Hennecart, Picarda n. 1427, 1466; Portorico: Ledru; St. Thomas: Eggers n. 38, Ehrenberg n. 71, Wydler n. 58, 59; St. Jan: Ryan; Antigua: Nicholson n. 25; Guadeloupe: Duchassaing, Duss n. 3440, Husnot n. 4, l'Herminier n. 48, 49; Martinique: Duss n. 692^a, Hahn n. 699, Sieber n. 12; St. Lucia: Anderson; St. Vincent: Eggers n. 7015, Smith n. 1088, 1091, 1970; Bequia: Smith n. B 341; Trinidad: Fendler n. 900.

Distrib. Florida, America centr., Argentina.

26. **Cyperus oxylepis** Nees, spiculis majusculis, usque ad 22 mm. longis 4—5 mm. latis, 20—26-floris, sublucidis, flavescentibus aut brunescens; glumis acutis, mucronatis, 3-nerviis; staminibus 3—2; nuce cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, oblonga aut oblongo-ellipsoidea, trigona, nigra; ceteroquin fere ut *C. elegans* Linn.

Cyperus oxylepis Nees! in *Linnæa* IX (1834) p. 285; Boeck. in *Linnæa* XXXV (1867—68) p. 549.

Cyperus Jenmani C. B. Clarke ms.; Britton in *Ann. New York Acad.* VII (1892) p. 252.

Hab. in Jamaica: Alexander.

Distrib. in Ecuador, Guiana.

27. **Cyperus trichodes** Griseb. glaber, rhizomate tenui, repente, a squamis rubro-ferrugineis intecto, interdum diviso intricato; culmo 1—2 dm. longo, capillaceo, 1—2-stachyo; foliis capillaceis; bractea 1, 0—3 cm. longa, culmum quasi continuante; spiculis 5—12 mm. longis, 1 mm. latis, compressis, 8—16-floris; glumis ovatis, obtusis, rubromaculatis, rigidis; staminibus 3; nuce cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, ovoidea, castanea, curvata; stylo brevi, ramis 3 modice exsertis.

Cyperus trichodes Griseb.! *Flor.* (1864) p. 564.

Hab. in Jamaica: Bassett, Hart n. 1500, Wulschlaegel n. 1136.

28. **Cyperus simplex** H. B. K. glaber, rhizomate repente, 2 mm. in diam.; culmis 2—15 cm. longis; foliis culmo longioribus, 4—7 mm. latis, apice lanceolatim acutatis; umbellae simplicis radiis 1—2 dm. longis, culmo longioribus; bracteis 4—10, radios superantibus, cum foliis consimilibus; spiculis 1—3-nis, usque ad 24 mm. longis $2\frac{1}{2}$ mm. latis, 16—42-floris, compressis, pallidis aut cinnamomeis; glumis navicularibus, ovato-lanceolatis, undique scabro-glandulosis; stamine 1; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, truncata, trigona, pallida; stylo quam nux brevior, ramis 3 longiusculis.

Cyperus simplex H. B. K. *Nov. Gen. et Sp.* I (1815) p. 207; Presl *Rel. Haenk.* I p. 176 t. 31 fig. 1; Kunth *Enum.* II p. 26; Griseb.! *Flor.* p. 563; Boeck. in *Linnæa* XXXV (1867—68) p. 531.

Cyperus radiosus Reich.! ms.; "radicosus" Kunth in *citat.*

Hab. in Tobago: Eggers n. 5809, 5952, 5956; Trinidad: Fendler n. 898, Hart n. 1665, 2083, Lockhart n. 290, Purdie n. 27.

Distrib. in America tropica.

29. **Cyperus diffusus** Vahl, glaber radicibus lentis, stolonibus nullis; culmis 3—6 dm. longis; foliis pluribus, cum culmo saepe aequilongis, usque ad 8—16 mm. latis, viridibus; umbella 1—3 dm. in diam., composita; bracteis 4—10, usque ad 3—6 dm. longis, cum foliis consimilibus; spiculis 3—9-nim digitatis, usque ad 12—20 mm. longis 3—4 mm. latis, 10—24-floris, parum compressis; glumis navicularibus, ovatis, subito acutatis mucronatis, in fructu subdistantibus, in dorso laete viridibus 5-nerviis, in lateribus pallide lucidis aut subcastaneis; staminibus 3—2; nuce cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, late ellipsoidea, triquetra, fusco-nigra; stylo quam nux multo breviora aut vix ullo, ramis 3 breviter exsertis.

Cyperus diffusus Vahl *Enum. II* (1806) p. 321; *Kunth Enum. II* p. 30.

Cyperus elegans Swartz *Obs. Bot.* (1791) p. 30; *Kunth Enum. II* p. 28; *Bocck. in Linnaea XXXV* (1867—68) p. 532; *Duss Fl.* (1897) p. 536.

Cyperus laxus Griseb. *Flor.* (1864) p. 563.

Hab. in Jamaica: Alexander, Eggers n. 3440 (alt. 350 metr.) Hart n. 808, March, Swartz; Martinique: Duss n. 221, 447; St. Vincent: Smith n. 1090, 1675, 1970; Tobago: Eggers n. 5703, 5827^b, 5956^b; Trinidad: Fendler n. 893, Hart n. 2081, 3404, O. Kuntze n. 612, Sieber n. 9.

Distrib. per regiones calidas utriusque orbis.

30. **Cyperus sphacelatus** Rottb. annuus, glaber; culmis caespitosis 1—6 dm. longis; foliis cum $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, 3—5 mm. latis; umbellae compositae aut simplicis radiis 1—8, usque ad 3—12 cm. longis; bracteis 3—6, saepe umbellam superantibus, cum foliis consimilibus; spiculis 5—12-nim laxiuscule spicatis, 1—2 cm. longis $1\frac{1}{2}$ —2 mm. latis, compressis, sphacelatis aut viridibus; glumis obtusiusculis; rhachillae alis anguste oblongis, superne lanceolato-productis solubilibus; staminibus 3; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, ellipsoidea aut obovoidea, trigona, cinereo-nigra; stylo quam nux breviora, ramis 3 linearibus parum elongatis.

Cyperus sphacelatus Rottb. *Descr. et Ic.* (1773) p. 26; *Kunth Enum. II* p. 63; *Griseb. Kar. p.* 119, *et Flor. p.* 565; *Bocck. in Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 292; *Duss Fl.* (1897) p. 538.

Cyperus nemorosus G. F. W. Meyer *Esseq.* (1818) p. 31; *Kunth Enum. II* p. 60.

Cyperus Balbisii Kunth Enum. II (1837) p. 63; cf. Boeck. in Flora XLII (1859) p. 446, 447.

Cyperus Duchassaingii Steud.! Cyp. (1855) p. 45.

Cyperus chromatolepis Steud.! Cyp. (1855) p. 32; Boeck. in Linnaea XXXVI (1869—70) p. 293.

Cyperus hexastachyus Swartz Fl. Ind. Occid. I (1797) p. 117, non Rottb.

Hab. in Jamaica: Hart n. 760, Purdie; Hispaniola: Eggers n. 2116, 2235, 2235^b; Portorico: Blauner n. 105, 245, Eggers n. 90, 433, 592, O. Kuntze, Read n. 374, Sintenis n. 2506, 4542; S. Kitts: Eggers n. 430^b; Guadeloupe: Duchassaing, Duss n. 3102, 3655, l'Herminier n. 41, Read n. 375; Dominica: Eggers, Imray n. 19; Martinique: Belanger n. 790, Duss n. 185, 452, 460, Hahn n. 467, 697^b, Husnot n. 8, Sieber n. 14; St. Lucia: Ramage; St. Vincent: Eggers n. 6658, Guilding n. 30, Smith n. 520, 842; Grenada: Broadway n. 518, Eggers n. 6080; Tobago: Eggers n. 5483, 5559, 5941; Trinidad: Fendler n. 897, Hart n. 2097, Sieber n. 6.

Distrib. in Africa et America, in calidioribus.

31. *Cyperus compressus* Linn. glaber, annuus, viridis, culmis caespitosis, 1—4 dm. longis; foliis cum $\frac{3}{4}$ parte culmi aequilongis, 3—4 mm. latis; umbellae simplicis radiis 1—15 cm. longis; bracteis umbella longioribus, cum foliis consimilibus, spiculis 3—10-nim spicatis, 10—25 mm. longis, 3—7 mm. latis, 4—40-floris, multum compressis, viridibus lutescentibus; glumis acute navicularibus, carina in mucronem excurrente; rhachilla exalata; staminibus 3; nuce cum $\frac{1}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea obtusa, acute triquetra, nigra; stylo quam nux brevior, ramis 3 linearibus.

Cyperus compressus Linn.! Sp. Pl. ed. II p. 68; Rottb. Deser. et Ic. p. 27 t. 9 fig. 3; Kunth Enum. II p. 23; Griseb. in Mem. Acad. Amer. N. Ser. VIII (1862) p. 535, Kar. p. 118 et Flor. p. 562 et Pl. Cub. p. 236; Saur. Cub. p. 171; Saund. et Bak. Ref. Bot. t. 240; Boeck. in Linnaea XXXV (1867—68) p. 517; Duss Fl. (1897) p. 535; non Jacquin.

Cyperus brachiatus Poir. in Lam. Encyc. VII (1806) p. 259.

Sloane Jamaica I p. 117 t. 76 fig. 1.

Hab. in ins. Baham.: Brace n. 365; Cuba: C. Wright n. 1528; Jamaica: Purdie; Hispaniola: Prenleloup n. 644; Portorico: Krug n. 1235, Sintenis n. 1939, Wydler n. 348; Guadeloupe: Bertero, Duss n. 3818; Dominica: Eggers n. 833, 843; Martinique: Duss n. 700^a; St. Vincent: Smith n. 22; Trinidad: Fendler n. 896, Hart n. 2101, Lockhart n. 40.

Distrib. in utroque orbe terrarum, in terris fere omnibus calidioribus late divulgata.

Var. **capillacea** C. B. Clarke, culmis 3—7 cm. longis, tenuissimis, 1—2-stachyis; foliis capillaceis; bracteis 2, inferiore erecta, culmum quasi continuante; spicula (saepius unica) cum ea *C. compressi* typici consimili et aequimagna.

Cyperus compressus (forma foliis setaccis) Griseb.! *Flor.* (1864) p. 562.

Hab. in Dominica: Imray n. 430.

32. **Cyperus distans** Linn. f. glaber, stolonibus usque ad 4 cm. longis $1\frac{1}{2}$ mm. in diam.; culmo 4—10 dm. longo; foliis cum culmo saepe aequilongis, 6—10 mm. latis; umbella saepe 2—3 dm. lata, composita; bracteis umbellam superantibus, cum foliis consimilibus; spiculis spicatis, 2—3 cm. longis, 1 mm. latis, 10—20-floris, maturis divaricatis, rubentibus; rhachillae alis angustissimis, proventu secedentibus; glumis remotis, oblongo-ellipticis, obtusis; staminibus 3; nuce cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{5}$ parte glumae aequilonga, oblonga aut angustius ellipsoidea, trigona, fusco-nigra; stylo quam nux multo brevior, ramis 3 medio-cribus.

Cyperus distans Linn. f. *Suppl.* (1781) p. 103; *Jacquin Ic. Pl. Rar.* II t. 299; *Kunth Enum.* II p. 93; *Boeck.*! in *Linnaea* XXXV (1867—68) p. 612; *Griseb. Flor.* p. 565; *Duss Fl.* (1897) p. 540.

Cyperus elatus Presl! in *Oken Isis* XXI (1828) p. 271; *Boeck.*! in *Flora* LXII (1879) p. 551; non Linn.

Cyperus latus Vahl *Enum.* II (1806) p. 362.

Cyperus leptostachyus Vahl ms. ex *Kunth Enum.* II p. 93.

Cyperus n. 48 *Rottb. Descr. et Ic.* p. 37 t. 10 syn. excl.

Hab. Jamaica: Swartz; Hispaniola: Mayerhoff n. 219; Portorico prope Juncos, Yabucoa, Cayey, Adjuntas: Sintenis n. 2376, 2376^b, 2502^b, 4093^b, 5102; St. Thomas: Eggers n. 145, Ehrenberg n. 75; St. Kitts: Eggers n. 145^c (ed. Rensch); Antigua: Wulschlaegel; Guadeloupe: Duss n. 3365, 3576, 3577, 3668; Martinique: Belanger n. 1262, Duss n. 220, 472; St. Vincent: Smith n. 1677; Tobago: Eggers n. 5668; Ins. Antillan.: Eggers n. 232; Trinidad: Hart n. 2080, O. Kuntze n. 747.

Distrib. per omnes fere terras calidiores divulgata.

33. **Cyperus lacunosus** Griseb. glaber, elatior, rhizomate horizontali; culmo fere metrali; foliis cum $\frac{3}{4}$ parte culmi aequilongis, angustis, in sicco tereti-convolutis, spongiosis transversim lineatis, basi percrasse lacunosus; umbellae compositae radiis usque ad 12 cm. longis; bracteis usque ad 4 dm. longis, cum foliis consimilibus; spiculis laxe

spicatis, 2 cm. longis, 4 mm. latis, 15-floris, compressis, bruneis; rhachilla exalata; glumis 3—4 mm. longis, proventu oblique patulis navicularibus oblongo-ellipticis obtusis, mucrone subexcurrente; staminibus 3; nuce cum $\frac{3}{4}$ parte glumae aequilonga, linear-oblonga, trigona, brunea; stylo cum $\frac{1}{2}$ parte nucis vix aequilongo, ramis 3 longiuseulis.

Cyperus lacunosus Griseb. *Pl. Cub.* (1866) p. 237; *Sauv. Cub.* n. 2580 p. 172.

Hab. in Cuba occ.: C. Wright n. 3360.

34. *Cyperus esculentus* Linn. glaber, culmo saepe solitario, 2—6 dm. longo, basi erecto; stolonibus pertenuibus, apice bulbillos efformantibus, postea tabescentibus neque in rhizomata lignescentibus; foliis cum culmo subaequilongis, 2—7 mm. latis; umbella 4—15 cm. in diam.; bracteis umbellam superantibus, cum foliis consimilibus; spiculis spicatis, 2 cm. longis 1—3 mm. latis, e viridi luteis aut aureis; glumis ovatis vix acutis, per totam fere latitudinem longitudinaliter striatis; staminibus 3; nuce cum $\frac{1}{3}$ parte glumae aequilonga, trigona, obovoidea; stylo quam nux brevior, ramis 3 linearibus longis aut breviusculis.

Cyperus esculentus Linn. *Sp. Pl. ed. II* p. 67; *Kunth Enum. II* p. 61; *Boeck. in Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 287; *Griseb. Flor.* p. 565; *Duss Fl.* (1897) p. 540.

Cyperus phymatodes Mühlenb. *Deser. uber.* (1817) p. 23; *Kunth Enum. II* p. 62.

Cyperus cubensis Steud. *Cyp.* (1855) p. 42.

Hab. in Cuba ad Santa Clara: Combs n. 434; Martinique satis frequens in regione inferiore: Duss n. 470.

Distrib. in Europa meridionali, in Africa, Asia, Oceania, America, in calidioribus.

Var. *macrostachya* Boeck. spiculis elongatis, 2—4 cm. longis, usque ad 40-floris, bruneis; glumis navicularibus, acute carinatis, rigide imbricatis, per totam fere latitudinem longitudinaliter valide 9—11-striatis.

Cyperus esculentus Linn. var. δ *macrostachya* Boeck. in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 291.

Cyperus lutescens Torrey in *Ann. Lyceum New York III* (1836) p. 433; nec Torrey in *Bot. U. S. et Mexic. Bound.* p. 227.

Hab. in St. Thomas: Eggers.

Distrib. Florida, Texas, Mexico, Ins. Galapagos.

35. *Cyperus articulatus* Linn. glaber, stolonibus longis, 3—4 mm. in diam., a squamis 15 mm. longis ovato-lanceolatis striatis atro-rubris intectis; culmis usque ad 1—2 metr. longis, apice teretibus vel vix

trigonis, a nodis inter sese 10—15 mm. distantibus in sicco pseudo-articulatis; foliis 0, vagina summa in altero latere producta scarioso-colorata rarissime viridi; umbellae radiis 10, usque ad 5—15 cm. longis; bracteis 1—2 cm. longis, ovatis aut triangularibus, suberectis, squamiformibus, concavis, marginibus non reflexis, pallidis; spiculis 5—15-nim spicatis, 1—4 cm. longis, 2 mm. latis, 12—50-floris, parum compressis, stramineis fusciscentibus; glumis ovatis, obtusis, vix carinatis; rhachillae alis oblongis, proventu solutis; staminibus 3; nuce cum $\frac{3}{5}$ parte glumae aequilonga, oblonga aut ellipsoidea, trigona, nigra; stylo quam nux brevior, ramis 3 paullo exsertis.

Cyperus articulatus Linn.! *Sp. Pl. ed. I* (1753) p. 44, *ed. II* p. 66; *Kunth Enum. II* p. 53; *Boeck. in Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 274; *Griseb.! Pl. Cub.* p. 237; *Saur.! Cub. n.* 2582 p. 172.

Sloane Jamaica I p. 121 t. 81 fig. 1.

Hab. in ins. caribaeis: Sieber n. 107; in Cuba: C. Wright n. 3754; Jamaica: Elliott n. 3001, Purdie, W. Wright; Hispaniola: Mayerhoff; Portorico: Eggers n. 429, Sintenis n. 2503, 2548, 2549, 5119, Stahl n. 1141; St. Thomas: Ehrenberg; Antigua: Wulfschlaegel n. 682; Guadeloupe: Duchassaing; Martinique: Belanger n. 1257, Duss n. 700 partim, Hahn n. 1258; Trinidad: Cruieger, Hart n. 2082, 3298, 5025, O. Kuntze n. 1142.

Distrib. in tropicis et calidis totius fere orbis terrarum.

36. **Cyperus nodosus** Willd. culmo 3—8 dm. longo, apice 1—1½ mm. in diam., trigono; vagina summa in altero latere 1—5 cm. producta, rarius viridi; umbella 3—8 cm. in diam., 6—20-stachya; bracteis 5—10 mm. longis, ima erecta viridi marginibus in sicco recurvatis scabris; ceteroquin fere ut *C. articulati* forma tenuior.

Cyperus nodosus Willd. *Enum. Hort. Berol.* (1809) p. 72; *Boeck. in Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 275.

Cyperus articulatus (partim) *Kunth Enum. II* (1837) p. 54; *Griseb.! Flor.* p. 564.

Hab. in Jamaica: March; Martinique: Duss n. 700 partim.

Distrib. in America centrali, Novo-Granata, Ecuador.

37. **Cyperus rotundus** Linn. glaber rhizomate tenuiore ligneo a tuberibus incrassato; culmis 1—8 dm. longis, basi bulboso-incrassatis, in rhizoma oblique descendentibus; foliis culmum saepe superantibus, 4—6 mm. latis; umbella evoluta composita aut simplice vel depauperata; bracteis umbellam superantibus, cum foliis consimilibus; spiculis 3—8-nim laxiuscule spicatis, 2 cm. longis, 1½—2 mm. latis, 20—30-floris, modice compressis, rubescentibus aut castaneis vel viridibus; rhachillae alis hyalinis, vix solubilibus; glumis ovatis, obtusis, in lateribus sub-

enerviis, in margine scariosis, staminibus 3; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, late ellipsoidea, trigona, fusce nigra; stylo cum nuce subaequilongo, ramis 3 longiusculis.

Cyperus rotundus Linn. *Sp. Pl. ed. II* (1762) p. 67 *neque herb. propr.*; *Kunth Enum. II* p. 58 (*C. bulboso* Vahl *speciminibusque variis exclusis*); *Boeck.! in Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 283; *Griseb. Flor. p.* 564; *Gardn. in Proc. Acad. Philad.* (1890) p. 360.

Cyperus hexastachyus Rottb. *Descr. et Ic.* (1773) p. 28 t. 14 fig. 2; *Swartz Fl. Ind. Occid. I* p. 117.

Cyperus Hydra Mich. *Fl. Bor.-Amer. I* (1803) p. 27; *Ham. Prodr. Fl. Ind. Occid. p.* 13.

Cyperus purpureo-variegatus Boeck.! *Cyp. Novae. Heft 2* (1890) p. 37; *Duss Flor. p.* 539.

Hab. in ins. Bahama: Brace n. 397; ins. caribaeis: Sieber *Agrost. n.* 109, 112; Cuba: Combs n. 433 (Santa Clara), Sagra n. 321; Jamaica: hb. Hooker; Hispaniola: Llenas n. 121, Picarda n. 424, 425; Portorico: Blauner n. 111, Krug n. 1234, Sintenis n. 12, 4833, 5089, Stahl n. 296; St. Thomas: Eggers n. 37, Ehrenberg n. 73, 74; Guadeloupe: Duchassaing; Dominica: Ramage; Martinique: Duss n. 449, 746, Hahn n. 888, Husnot n. 7, Sieber n. 14; St. Vincent: Smith n. 53; Barbados: Lehmann n. 712; Grenada: Eggers n. 6492; Tobago: Eggers n. 5645; Trinidad: Bromfield, Hart n. 2158.

Distrib. per omnes terras calidiores, — in oryzetis pestis.

38. *Cyperus radiatus* Vahl, glaber, primo anno florens, culmo 5—10 dm. longo; foliis cum $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, 6—9 mm. latis; umbella polystachya, composita aut simplice aut in 1 caput congesta; bracteis inflorescentiam longe superantibus, cum foliis consimilibus; spicis digitatis, vix pedicellatis, 3 cm. longis 8 mm. latis, cylindricis; spiculis 5—8 mm. longis, 1 mm. latis, 12—30-floris, griseis neque rubris neque aureis; rhachillae alis oblongis, persistentibus; glumis ovatis, obtusis, non aut minute mucronatis; staminibus 3, antheris non cristatis; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, ovoidea aut ellipsoidea, acutius trigona, cinereo-nigra; stylo cum $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongo; ramis 3 paullo exsertis.

Cyperus radiatus Vahl *Enum. II* (1806) p. 369; *Kunth Enum. II* p. 71; *Boeck.! in Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 317.

Hab. in Jamaica: hb. Kew.; Hispaniola: Eggers n. 2844; Portorico: Eggers n. 418^b, 682, Sintenis n. 126, 1213, 5587, Stahl; Trinidad: Fendler n. 895, Hart n. 2090.

Distrib. in calidis orbis veteris vulgaris, orbis novi rarior.

39. *Cyperus digitatus* Roxb. glaber, primo anno florens, culmo 5—15 dm. longo, apice triquetro; foliis cum culmo fere aequilongis, 8—15 mm. latis; umbella 2—6 dm. in diam., radiis divaricatis; bracteis usque ad 3—8 dm. longis, cum foliis consimilibus; spicis 5 cm. longis, 2 cm. latis, cylindricis; spiculis pernumeris, 5—12 mm. longis, 1—2 mm. latis, 20—40-floris; rhachillae alis lanceolatis, flavis, mox solutis; glumis ovatis, navicularibus, vix mucronatis; staminibus 3, antheris non cristatis; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae subaequilonga, oblongo-obovoidea, obtuse trigona, nigra; stylo quam nux paullo brevior, ramis 3 cum nuce aequilongis.

Cyperus digitatus Roxb. Hort. Beng. 1814 (1813) p. 81 et Fl. Ind. (ed. Wall. et Carey) I (1820) p. 209; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI p. 618.

Cyperus giganteus Griseb.! in Mem. Acad. Amer. N. Ser. VIII (1862) p. 535, et Pl. Cub. p. 238; Sauv. Cub. 2587 p. 172; non Vahl.

Cyperus trinidadensis Boeck.! Cyp. Norae. Heft 2 (1890) p. 7.

? *Cyperus auricomus* O. Kuntze Rev. II p. 748; non Sieber.

Hab. in Ind. occident.: Sieber n. 111; Cuba: C. Wright n. 1529; Trinidad: Hart n. 2096.

Distrib. in tropicis Africae et Americae rarior, Asiae orient. communis.

40. *Cyperus giganteus* Vahl, culmo 1—2-metrali, aphyllor; umbella 3—8 dm. in diam.; bracteis numerosis, usque ad 8 dm. longis 22 mm. latis; umbellulis a bracteis secundariis numerosis usque ad 20—25 cm. longis circumdatis; spicis usque ad 6 cm. longis 2 cm. latis, cylindricis; spiculis numerosis, 1 cm. longis 1 mm. latis, 8—14-floris; rhachillae alis elliptico-lanceolatis, mox solutis; glumis ovatis, obtusis; staminibus 3, antheris mucronatis; nuce cum $\frac{1}{4}$ parte glumae subaequilonga, oblongo-ellipsoidea, cinereo-nigra; stylo cum nuce fere aequilongo, ramis 3 subconspicue extrusis.

Cyperus giganteus Vahl Enum. II (1806) p. 364; Kunth Enum. II p. 65; Boeck.! in Linnaea XXXVI (1869—70) p. 305.

Cyperus princeps Kunth! Enum. II (1837) p. 66; Boeck.! in Linnaea XXXVI (1869—70) p. 307.

Cyperus Berteri Kunth! Enum. II (1837) p. 67; Boeck.! in Linnaea XXXVI (1869—70) p. 307.

Cyperus elatus Griseb.! Flor. (1864) p. 566 partim; non Linn.

Papyrus giganteus Nees in Mart. Fl. Bras. v. 2 pars 1 (1842) p. 58.

Hab. in Jamaica: Purdie, Wilson n. 294; Hispaniola: Bertero, Poiteau; Portorico: Sintenis n. 1217, 4941^b, 5621; Trinidad: Crueger, O. Kuntze n. 1141.

Distrib. a Mexico usque ad Buenos Ayres sparsa.

41. **Cyperus comosus** Poir. bracteis quam umbellae radii brevioribus; umbellulis a bracteis secundariis non (aut vix) superatis; spiculis breviter linearibus, 8—12-floris; ceteroquin ut *C. giganteus*.

Cyperus comosus Poir. *Encyc. Suppl. V* (1817) p. 185; *Kunth Enum. II* p. 66; *Benth.! Pl. Hartweg. p. 157*.

Cyperus affinis Roem. et Sch. *Syst. II* (1817) p. 213, 875, et *Mant. p. 122*.

Cyperus giganteus G. F. W. Meyer Esseq. (1818) p. 35; Boeck. in *Linnaea XXVI* (1869—70) p. 306 partim; Hemsl. *Centr. Amer. Bot. III* p. 447 partim.

Cyperus pseudo-giganteus Steud.! *Cyp.* (1855) p. 39.

Cyperus elatus Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 238; *Sauv.! Cub. n. 2586* 172; non Linn.

Papyrus comosus Willd. in *Abhandl. Akad. Berol.* (1812) p. 74.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3363.

Distrib. in America tropica.

Species residuae.

Cyperus alternifolius Linn.

Cyperus alternifolius Duss *Fl.* (1897) p. 537.

Colitur in fossis et locis aquaticis ad Basse Terre in Guadeloupe: Duss n. 3284; Martinique: Duss n. A.

Cyperus familiaris Steud. rhizomate parvo, subbulboso, lignescente; culmo 2—3-pedali, triquetro; foliis culmum subaequantibus, 1—1½''' latis; bracteis pluribus, umbellam multoties superantibus; radiis pluribus, 2—4-pollicaribus, apice dense paniculato-spicigeris; involucellis 2—3, paniculam aequantibus vel brevioribus; spiculis gracilibus, horizontalibus, 12—20-floris; glumis laxiuscule imbricatis, ovatis, acutis, indistincte multinerviis, lateribus sordide stramineis; rhacheola squamoso-alata; nuce ovata, triquetra, squama multo brevior.

Cyperus familiaris Steud. *Cyp.* (1855) p. 46.

Hab. in Cuba: ex Steudel.

Cyperus filiculmis A. Rich. culmo sesquipedali, gracili, triquetro; foliis linearibus, angustissimis; umbella simplice, contracta aut subcapitata; bracteis 2—3, longissimis; spiculis subcapitatis, oblongo-lanceolatis, compressis, 18—20-floris; glumis obtusiusculis, in carina et 3—5 nervis castaneis, inferioribus deciduis et axin quadratum alternatim foveolatum denudantibus.

Cyperus filiculmis A. Rich. in *Sagra Fl. Cuba XI* (1850) p. 285.

Hab. in Cuba: fide A. Richard.

Ex affin. *Cyp. vegeti* vel *Cyp. surinamensis* fide cl. auctoris.

Cyperus guatemalensis Steud. radice fibrosa, culmo 3-pedali, acute triquetro; foliis culmum aequantibus, 2—3^{'''} latis, lineari-lanceolatis; bracteis pluribus umbella ampla decomposita multoties longioribus; umbellulis pluriradiatis; involucellis 3—5 eas subaequantibus; spiculis patentissimis, teretiusculis, 5-floris; glumis acutis, pallidis.

Cyperus guatemalensis Steud. *Cyp.* (1855) p. 47.

Hab. in Guadeloupe: Kegel n. 1270 ex Steudel.

Cyperus miliifolius Kunth, culmis mediocribus, 1—4 dm. longis; umbella contracta aut in caput 1 compositum condensata; ceteroquin ut *C. simplex*.

Cyperus miliifolius Kunth *Enum. II* (1837) p. 29; Boeck. in *Linnaea XXXV* (1867—68) p. 532; Poeppig et Kunth *ms. ex Kunth*.

Cyperus tenuispicatus Boeck.! in *Linnaea XXXV* (1867—68) p. 525.

Hab. in Hispaniola: Mayerhoff fide Boeckeler (verisim. planta guianensis).

Distrib. Guiana, Amazonas convallis, Brasilia.

Cyperus navicularis Steud. culmo apice triquetro; bracteis pluribus, angustis, umbellam compositam multoties superantibus; radiis numerosis, 1—1½^{''} longis, apice paniculato-polystachyis; spiculis 12—24-floris; glumis distinctis, obsolete 3—5-nerviis, lateribus sordide ferrugineis; nuce fusca, tenui, rugulosa, quam squama plus 2-plo brevior.

Cyperus navicularis Steud. *Cyp.* (1855) p. 32.

Hab. in Cuba: fide Steudel.

Cyperus praemorsus Boeck. culmo 4—7^{''} longo, tenui; foliis culmo duplo brevioribus, angustis, rigidis, marginibus revolutis; radiis 5—6, usque ad ½^{''}—1^{''} longis; bracteis 4, umbellam parum superantibus; spiculis 3—5, spicato-fasciculatis, 6^{'''} longis ¾^{'''} latis, lanceolato-linearibus, 16—10-floris; glumis convexis, 7-nerviis, pallide ferrugineis, vix mucronatis; rhacheola alata; stylo 3-fido; nuce obovata, triquetra, quam gluma plus duplo brevior, fusca.

Cyperus praemorsus Boeck. in *Flora XLII* (1859) p. 436^{bis}.

Hab. in Jamaica: Macnab e Boeckeler.

Obs. Species silentio serius a cl. auctore damnata; e Griseb. *Flor.* p. 565 = *C. rotundus* Linn.

Cyperus subanceps Boeck. culmo pluripedali; umbella composita; bracteis 4, usque ad 10 poll. longis 3 lin. latis; spiculis numerosis, spicatis, bifariis, patentibus, leviter incurvis, linearibus, paullo compressis, 6 lin. longis, ¾^{''} lin. latis, 30—24-floris, glumis dense imbricatis, brevissime mucronatis, flavido-rufis; rhachillae alis oblongis, acuminatis,

stylo 3-fido; nuce parva, cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, triangulari, anguste oblonga, utrinque attenuata, subtilissime reticulata, straminea.

Cyperus subanceps Boeck. in *Linnaea* XXXVIII (1874) p. 368.

Hab. in India occident.: e Boeckeler.

V. *Mariscus* Gaertn.

Spiculae 1—pauci- vel pluri-florae; rhachilla continua, supra 2 glumas imas vacuas e pulvino decidua. Glumae nucigerae persistentes; ceteroquin ut *Cyperus*. — Folia elongata, angusta, viridia, in speciebus Indiae occidentalis.

Species 180, in calidioribus totius orbis terrarum sparsae.

Clavis specierum antillanarum.

Series 1. *Pauciflorae*. Spiculae 1—4- (raro 5-) nucigerae.

* Gluma ima vacua glumis nucigeris brevior.

Spicae 2—3 cm. longae; spiculae lanceolatae, 1—4-nucigerae
42. *M. Sieberianus* Nees.

Spicae 12 mm. longae; spiculae oblongae, 1-nucigerae
43. *M. umbellatus* Vahl.

** Gluma ima vacua saepius caudata, glumis nucigeris longior.

† Umbellae simplices, quasi-simplices aut vix conspicue compositae.

§ Glumae nuciferae arctius imbricatae

Spiculae 1- vel 1—2-florae.

Spiculae 2—4 mm. longae 44. *M. flavus* Vahl.

Spiculae $1\frac{1}{2}$ mm. longae

Spicae pluristachyae, saepe umbellatae

45. *M. Swartzii* Dietr.

Spica 1, altera pedunculata rarius addita

46. *M. gracilis* Vahl.

Spiculae 2—4- (rarius 5-) florae.

Spicae ovoideae aut subquadratae; spiculae dense congestae.

Spicae subquadratae, e viridi lutescentes

44. *M. flavus* Vahl β .

Spicae ovoideae, fuscae 47. *M. echinatus* Elliott.

Spicae cylindricae; spiculae rectangulatim patulae.

Spiculae distantes

Spiculae $1\frac{1}{2}$ mm. latae, tetragonae

48. *M. tetragonus* C. B. Clarke.

Spiculae 1 mm. latae, vix tetragonae

49. *M. dissitiflorus* C. B. Clarke.

Spiculae 2 mm. latae, subellipsoideae

52. *M. Mutisii* H. B. K.

Spiculae densiuscule sitae

Folia 8—14 mm. lata 51. *M. elatus* Vahl.

Folia 5—8 mm. lata

Spicae digitatae 50. *M. Jacquinii* H. B. K.

Spicae subumbellatae

53. *M. Meyenianus* Nees.

§§ Glumae nuciferae distantes. (Plantae graciles. Inflorescentia monocephala aut umbella depauperata. Spiculae parvulae.)

Folia 4 mm. lata; glumae nucigeræ parum striatæ

54. *M. Urbani* C. B. Clarke.

Folia vix 2 mm. lata; glumae nucigeræ valide striatæ

Umbella depauperata; spiculae 4—5 mm. longæ

55. *M. tenuis* C. B. Clarke.

Caput unicum; spiculae 2 mm. longæ

56. *M. capillaris* Vahl.

†† Umbella composita; spiculae rubro-brunee turgidæ

57. *M. rufus* H. B. K.

Series 2. *Multifloræ*. Spiculae 3—12-(saepius 5—10-) nucigeræ.

Spiculae lineares, fere subulatae . . . 58. *M. flabelliformis* H. B. K.

Spiculae viridi-lutescentes, oblongæ, compressæ

59. *M. confertus* C. B. Clarke.

Spiculae brunee aut rubro-brunee, oblongæ.

Umbellæ radii 0—2 cm. longi . . . 60. *M. bruneus* C. B. Clarke.

Umbellæ radii 2—6 cm. longi

Spiculae spicatae, patulae . . . 61. *M. purpurascens* C. B. Clarke.

Spiculae fasciculatae 62. *M. brizaeus* C. B. Clarke.

42. **Mariscus Sieberianus** Nees, glaber, perennis, rhizomate nullo aut brevissimo noduloso; culmis 3—8 dm. longis, basi incrassatis; foliis cum culmo fere aequilongis, 3—6 mm. latis, viridibus; umbella simplice, radiis 5—12, usque ad 3—10 cm. longis, proventu rectis; bracteis 5—10, usque ad 1—2 dm. longis, cum foliis consimilibus: spicis solitariis, 2—3 cm. longis, 7—9 mm. latis, exacte cylindricis, nudis aut obscure bracteatis; spiculis numerosis, fructiferis lanceolatis, densis, undique rectangulatim patulis, 1—4- (saepius 3—1-) nucigeris, lutescentibus ant pallidis; gluma ima setacea glumis nucigeris brevior, secunda oblongo-truncata quam ima brevior, tertia ovato-oblonga, carinata, vix acuta, 2—3 mm. longa, proventu circa rhachillam convoluta nucem retinente; staminibus 3—2, antheris ecristatis; nuce cum $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ parte glumae aequilonga, trigona, oblonga, cinereo-nigra; stylo cum $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongo, ramis 3 linearibus breviter exsertis.

Mariscus Sieberianus Nees! in *Linnæa* IX (1834) p. 286; C. B. Clarke in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* VI p. 622.

Mariscus umbellatus Vahl Enum. II (1806) p. 376 pro parte; Kunth Enum. II p. 118 pro majore parte.

Cyperus ovularis Boeck.! in *Linnæa* XXXVI (1869—70) p. 376 var. *α* partim; nec Torrey.

Cyperus cylindrostachys Boeck.! in *Linnæa* XXXVI (1869—70) p. 383 pro magna parte.

Cyperus umbellatus var. *ε* *cylindrostachys* C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 201 pro magna parte.

Scirpus cyperoides Linn. *Mant.* (1771) p. 181; *Swartz Obs. Bot.* p. 31.

Hab. in India occident.: Bertero; Jamaica: Hart n. 759, Wulschlaegel n. 1127; Trinidad: Herb. Hort. Bot. n. 3405.

Distrib. in calidioribus orbis veteris ubique vulgaris; in orbe novo per rara, forsitan allata.

43. **Mariscus umbellatus** Vahl, umbellae simplicis radiis 7—12, usque ad 3—8 cm. longis; spicis fructiferis 12 mm. longis 5 mm. latis, perdensis, spiculis ellipsoideis aut oblongis, vix 2 mm. longis, obtusis, 1-nucigeris, fusce viridibus aut fuscis, inferioribus proventu deflexis; ceteroquin ut *M. Sieberianus*.

Mariscus umbellatus Vahl *Enum. II* (1806) p. 376 pro parte; *Benth.!* in *Hook. Niger Fl.* p. 552.

Kyllinga umbellata Rottb. *Deser. et Ic.* (1773) p. 15 t. 4 fig. 2.

Cyperus orularis Boeck. *!* in *Linnaea XXVI* (1869—70) p. 376 a partim; non *Torrey*.

Cyperus umbellatus C. B. Clarke in *Journ. Linn. Soc. XX* (1883) p. 296 varr. excl.; *Boeck. in Engl. Jahrb. V* (1884) p. 91; *Duss Flor.* p. 536.

Hab. in Martinique prope St. Pierre vulgatissima: Duss n. 695^a.

Distrib. per Africam tropicam cum Mascarenia sat vulgaris.

44. **Mariscus flavus** Vahl, glaber, mediocris, rhizomate descendente, in sicco usque ad 6 cm. longo 1—3 mm. in diam. viso; culmis 1—6 dm. longis; foliis cum culmo aequilongis, usque ad 6—7 mm. latis, saepius multo angustioribus; umbellae simplicis radiis brevibus aut vix ullis; bracteis usque ad 1—3 dm. longis, cum foliis consimilibus; spicis ovoideis aut breviter cylindricis, 13 mm. longis 6 mm. latis, proventu lutescentibus; spiculis turgidis, ellipsoideis, 1—2-nucigeris (cf. var. β); gluma nucigera ovata, vix acuta, striata, ima (in exemplis typicis) minuta triangulari a seta longiusecula terminata; stylo 3-fido; nuce oblongo-obovoidea, cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga.

Mariscus flavus Vahl *Enum. II* (1806) p. 374; *Kunth Enum. II* p. 118.

Mariscus aggregatus Willd. *Enum. Hort. Berol.* (1809) p. 70; *Kunth Enum. II* p. 119.

Mariscus laevis H. B. K. *Nov. Gen. et Sp. I* (1815) p. 214; non *R. Br.*

Mariscus sylvestris H. B. K. *Nov. Gen. et Sp. I* (1815) p. 377.

Mariscus confertus H. B. K. *Nov. Gen. et Sp. I* (1815) p. 213.

Mariscus huarmensis H. B. K. *Nov. Gen. et Sp. I* (1815) p. 214; *Kunth Enum. II* p. 125.

Mariscus littoralis G. F. W. Meyer Esseq. (1817) p. 37; Kunth Enum. II p. 120.

Mariscus clatus Kunth Enum. II (1837) p. 116 syn. excl.

Mariscus conferto-spicatus Steud. Cyp. (1855) p. 64.

Kyllinga cayennensis Lam.! Ill. I (1791) p. 149.

Cyperus flavomarisceus Griseb.! Flor. (1864) p. 567 partim, Pl. Cub. p. 238 et in Mem. Acad. Amer. Scient. N. S. (1862) p. 535; Sauv. Cub. n. 2600 p. 172; Duss Flor. p. 542.

Cyperus flarus Nees! in Linnaea XIX (1847) p. 698; Boeck. in Linnaea XXXVI (1869—70) p. 384 pro magna parte; non Presl.

Cyperus productus Wr. in Sauv. Cub. (1871) n. 2601 p. 172.

Didymia cyperomorpha Philippi in Engl. Jahrb. VIII (1887) p. 57 t. 1.

Hab. in India occident.: Sieber Agrostotheca n. 104; Cuba: C. Wright n. 730; Jamaica: Campbell n. 3022, Hansen n. 3, 4; Hispaniola: Eggers n. 2038, 2064, 2140, 2186^b; Portorico: Eggers n. 430, 589, Sintenis n. 1904, 4479^b, 6555, Stahl n. 297; St. Croix: Horne-mann n. 97; Guadeloupe: Duss n. 3653; Martinique: Belanger n. 396, Duss n. 45, 184, 454, 473, 707; St. Vincent: Smith n. 1084; Trinidad: Hart n. 2098.

Distrib. a Mexico et Texas usque ad Patagoniam communis.

Var. β . **humilis** C. B. Clarke, evolutior, umbella usque ad 7 cm. lata; spicis usque ad 17 mm. longis 13 mm. latis, subquadratis; spiculis usque ad 6—7 mm. longis 1½ mm. latis, 4—5-nuciferis; gluma ima usque ad 5 mm. longa, longe setifera.

Mariscus flarus Vahl var. *humilis* C. B. Clarke in Dur. et Schinz Fl. Afr. V (1895) p. 588; Benth.! ms.

Cyperus flarus C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) p. 196.

Cyperus redolens P. Maury! in Mém. Soc. Genre XXXI (1890) p. 126 t. 36 A.

Hab. in Martinique: Hahn n. 465.

Distrib. a Guatemala ad Argentinam sparsa; etiam ad flum. Congo.

45. **Mariscus Swartzii** Dietr. glaber, rhizomate breviter repente; culmis 3—5 dm. longis, mediocribus vel gracilioribus; foliis cum ½ parte culmi aequilongis vel interdum (e. g. C. Wright n. 314) vix ullis, 2—3 mm. latis; umbella simplice vel ad caput 1 fere congesta, radiis 3—1 usque ad 3—5 cm. longis; bracteis 3, modo 12 cm. longis modo 3 cm. longis, cum foliis consimilibus; spicis 5—7 mm. longis 4—5 mm. latis, fuscis aut bruneis; spiculis 1½ mm. longis, obtusis, 1-nucigeris, proventu divaricatis parum deflexis; glumis 2 imis parvis, vacuis, tertia

naviculari, nucigera, lata, obtusa, 15-striata; stylo 3-fido; nuce cum $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, trigona, laete brunea.

Mariscus Swartzii Dietr. *Sp. Pl. II* (1833) p. 343.

Mariscus filiformis Spreng. *Syst. I* (1825) p. 234; *Kunth Enum. II* p. 116; *Sagra Fl. Cub. XI* p. 288; non *H. B. K.*

Kyllinga filiformis Swartz *Prod.* (1788) p. 20 et *Fl. Ind. Occid. I* p. 121; *Boeck. in Linnaea XXXV* (1867—68) p. 433; *Griseb. Kar. p. 120 et Flor.* p. 568 var. β ; *Sauv. Cub. n. 2603* p. 173.

Kyllinga rigidifolia Boeck.! in *Linnaea XXXV* (1867—68) p. 432; *Sauv. Cub. n. 2604* p. 173.

Kyllinga brevifolia (var. *foliis convoluto-filiformibus*) *Griseb. Pl. Cub. p. 238*; *Sauv. Cub. n. 2605* p. 173; non *Rottb.*

Cyperus Swartzii Boeck.! *ms.*

Hab. in Cuba: Otto n. 264, Sagra, C. Wright n. 314, 699 partim, 699^a; Jamaica: Hart n. 1501, Swartz, Wright, Wulschlaegel n. 1141, 1142; Hispaniola: Poiteau; Guadeloupe: Bertero, Duss n. 3579, l'Herminier n. 37.

Obs. Species quasi *M. flavi* Vahl exemplum in omnibus partibus diminutum, cum hoc specificè arete junctum. Mirum est quod planta stylo 3-fido, umbella explicata, gluma nucigera 15-striata, ad *Kyllingam* saepe relata fuerit.

46. **Mariscus gracilis** Vahl, gracillimus, culmis 3—12 cm. longis; foliis fere filiformibus, culmum saepe superantibus; spicis 1 vel 2 sessilibus vel altera raro pedunculata; bracteis usque ad 13 cm. longis, erectis, filiformibus, spiculis minimis; stylo 3-fido; ceteroquin ut *M. Swartzii* Dietr.

Mariscus gracilis Vahl *Enum. II* (1806) p. 273; *Kunth Enum. II* p. 115.

Kyllinga microcephala Liebm. *Mexic. Halvgr.* (1850) p. 46; non *Steud.*

Kyllinga Liebmanni Steud. *Cyp.* (1855) p. 67; *Hemsl. Centr. Amer. Bot. III* p. 454 (*Liebmanniana*).

Kyllinga filiformis *Griseb.! Flor.* (1864) p. 568 var. α .

Kyllinga granularis Boeck.! in *Linnaea XXXV* (1867—68) p. 432; *Desfont. ms.*

Cyperus nanus Boeck. in *Engl. Jahrb. I* (1881) p. 363.

Hab. in Jamaica: March n. 13; Hispaniola: Poiteau; Portorico: Sintenis n. 3808, 4742; St. Croix: Benzon.

Obs. *Marisci Swartzii* forsau var. *filiformis* cum *M. Swartzii* specificè conjungenda.

47. **Mariscus echinatus** Elliott, glaber, rhizomate brevi; culmis 2—5 dm. longis, mediocribus aut gracilioribus; foliis 2 dm. longis, 4 mm.

latis; umbella simplice, raro ad caput 1 reducta, radiis 0—8, usque ad 2—7 cm. longis; bracteis 3—6, usque ad 10—15 cm. longis, cum foliis consimilibus; spicis ovoideis, 7—15 mm. longis, fuscis; spiculis maturis 6 mm. longis, usque ad 3—5-nucigeris; stylo 3-fido; nuce cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, anguste obovoidea.

Mariscus echinatus Elliott Bot. S. Carol. I (1816) p. 75 t. 3 fig. 1.

Mariscus orularis Kunth Enum. II p. 121 partim; Vahl Enum. II p. 357 partim i. e. exemplum Portoricense.

Cyperus globulosus Aubl. Guiana I (1775) p. 47.

Cyperus croceus Vahl Enum. II (1806) p. 357.

Cyperus Baldwinii Torrey in Ann. Lyceum New York III (1836) p. 270.

Cyperus cyclostachyus Griseb.! Flor. (1864) p. 567.

Cyperus echinatus Britton in Bull. Torrey Club XV (1888) p. 99.

Cyperus paniceus Boeck.! ms. in Eggers n. 431, minime *Mariscus paniceus* Vahl.

Sloane Jamaica I p. 119 t. 79 fig. 1.

Hab. in Jamaica: March n. 15; Portorico ad Playa de Humacao locis uliginosis: Eggers n. 431, 588.

Distrib. in America septentr. orientali frequens; etiam in equinoctiali.

48. ***Mariscus tetragonus*** C. B. Clarke, glaber, rhizomate brevi, horizontali; culmis 4—10 dm. longis, mediocribus aut robustioribus, apice triquetris scabris; foliis culmo parum brevioribus, 4—6 mm. latis; umbellae simplicis radiis 5—10 cm. longis; bracteis 5—8 usque ad 15—25 cm. longis, cum foliis consimilibus; spicis in apice uniuscujusque radii paucis digitatis vel solitariis, 3 cm. longis 1 cm. latis, exacte cylindricis, subcastaneo-bruneis; spiculis distantibus, rectangulatim patulis, 6 mm. longis $1\frac{1}{2}$ mm. latis, 3—5-nucigeris, tetragonis; glumis nucigeris navicularibus, ovatis, obtusis vix mucronulatis, 7-nerviis; stylo 3-fido; nuce cum $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ parte glumae aequilonga, late oblonga aut subellipsoidea, trigona.

Cyperus tetragonus Elliot Bot. S. Carol. I (1816) p. 71; Kunth Enum. II p. 113.

Cyperus anceps Liebm. Mexic. Halagr. (1850) p. 25; Griseb. Pl. Cub. p. 238 et Flor. p. 567; Sauv. Cub. n. 2591 p. 172.

Cyperus amphelkes Steud. Cyp. (1855) p. 56.

Cyperus martinicensis Boeck.! Cyp. Norae. Heft 2 (1890) p. 38; Duss Flor. p. 542.

Hab. in Cuba: fide Liebmänn; Jamaica: Wulfschlaegel n. 1126; Martinique: Duss n. 471.

Distrib. in America septentr. orientali et Mexico sat frequens.

49. **Mariscus dissitiflorus** C. B. Clarke, foliis bracteis spicis spiculis quam in *M. tetragono* gracilioribus; spiculis longe distantibus, linearibus (vix 1 mm. latis) obscure (aut vix) tetragonis; nuce longiore angustiore; ceteroquin ut *M. tetragonus*.

Cyperus dissitiflorus Nees in *Linnaea* IX (1834) p. 285 (nomen); Boeck.! in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 364.

Hab. in Tobago in fruticetis ad King's Bay: Seitz n. 34.

Distrib. in America septentr. austro-orient. et in Venezuela.

Obs. *Marisci tetragoni* pro var. strictiore forsàn habenda.

Var. β . **lucidior** C. B. Clarke, spiculis lucidioribus, lutescentibus aut rubro-bruneis, saepius 3—2-nucigeris; bracteis basi 3—4 mm. latis.

Cyperus thyrsiflorus Liebm.! *Mexic. Halvgr.* (1850) p. 26; Boeck. in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 311 pro magna parte.

Cyperus pseudosphacelatus Boeck.! *Cyp. Novae. Heft* 2 (1890) p. 7.

Hab. in Trinidad: Fendler n. 892, Hart n. 2091.

Distrib. in Texas, Mexico, Guatemala.

Obs. Planta critica, a cl. N. L. BRITTON sub *C. dissitifloro* ordinata, a *Cyp. thyrsifloro* differt spiculis inter se longius distantibus.

50. **Mariscus Jacquinii** H. B. K. glaber, rhizomate brevi, horizontali; culmis 3—8 dm. longis, mediocribus aut robustioribus; foliis cum $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, usque ad 7—8 mm. latis; umbellae simplicis radiis 4—20 usque ad 6—20 cm. longis; bracteis 4—12, usque ad 15—25 cm. longis, basi usque ad 7—8 mm. latis, cum foliis consimilibus; spicis in apice uniuscujusque radii saepe solitariis rarius 2—4 digitatis, 4 cm. longis 15 mm. latis, densiusculis, e viridi lutescentibus; spiculis rectangulatim patulis vel paullo deflexis, 5—9 mm. longis 1 mm. latis, 2—4-nucigeris; glumis nucigeris ovatis, obtusis, carina viridi subexcurrente, ima vacua lanceolata mucronata aut caudata; stylo quam nux multo brevior, 3-fido; nuce cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, anguste ellipsoidea, trigona.

Mariscus Jacquinii H. B. K. *Nov. Gen. et Sp.* I (1815) p. 216 in nota; Kunth *Enum.* II p. 124.

Carex hermaphrodita Jacq. *Collect.* IV (1790) p. 174 et *Ic. Pl. Rar.* III t. 615.

Cyperus thyrsiflorus Jungh.! in *Linnaea* VI (1831) p. 24; Kunth *Enum.* II p. 86; Boeck. in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 365 pro parte.

Cyperus incompletus Boeck.! in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 361 (syn. excl.) pro majore parte.

Cyperus Picardae Boeck.! in *Kneuck. Allg. Bot. Zeitschr.* II (1896) p. 18.

Hab. in Hispaniola prope Port-au-Prince in litoralibus: Picarda n. 353, 428, 1473; Grenada: Sherring.

Distrib. a California usque ad Argentina, frequens.

Obs. Species 2 praecedentibus *M. tetragono*, *M. dissitifloro* major, ob folia latiora spicas densiores paullo diversa.

Var. β . **angustior** C. B. Cl., minor, bracteis spicisque angustioribus. *Cyperus dissitiflorus* (partim) Hemsl.! *Centr. Amer. Bot. III* p. 446. *Cyperus flavus* var. *peduncularis* Britton! in *Proc. Amer. Acad. XXI* (1886) p. 442.

Hab. in Martinique: Belanger n. 792; St. Vincent: Smith n. 243.

Distrib. a California usque ad Venezuela, frequens.

51. **Mariscus elatus** Vahl, glaber, rhizomate brevi, horizontali; culmis 6 dm. longis, robustis, basi ob vaginas magnas usque ad 3 cm. incrassatis, apice 2—3 mm. in diam. levibus; foliis cum culmo fere aequilongis, 8—14 mm. latis; umbellae simplicis radiis 4—8, usque ad 3—7 cm. longis; bracteis 4—6, usque ad 3—5 dm. longis, basi 7—12 mm. latis, cum foliis consimilibus; spicis in unoquoque radio 4—5, digitatis, 4 cm. longis, 11 mm. latis, exacte cylindricis, densiusculis, aureo-brunceis; spiculis 5—6 mm. longis $\frac{3}{4}$ mm. latis, 2—3-nucigeris, rectangulatim patulis; stylo 3-fido; nuce anguste oblonga.

Mariscus elatus Vahl! *Enum. II* (1806) p. 377; non Kunth.

Kyllinga incompleta Jacq. *Collect. IV* (1790) p. 101 et *Ic. Pl. Rar. II* t. 300; Griseb. *Kar. p.* 120.

Hab. in Portorico prope Fajardo in graminosis: Sintenis n. 1256^b; Martinique: Belanger n. 1260.

Distrib. in Venezuela et Brasilia.

52. **Mariscus Mutisii** H. B. K. glaber, robustior, rhizomate horizontali; culmis 3—9 dm. longis; foliis cum culmo fere aequilongis, usque ad 6—8 mm. latis; umbellae simplicis radiis 4—11, a 1 cm. usque ad 21 cm. longis; bracteis umbellam longe superantibus, usque ad 8 mm. latis, cum foliis consimilibus; spicis in unoquoque radio 5—1 digitatis, usque ad 3 cm. longis 8 mm. latis, cylindricis, fusce stramineis aut lacte brunceis; spiculis 3—4 mm. longis, 3—1-nucigeris, maturis rectangulatim patulis, oblongis aut ellipsoideis, numerosis sed distantibus i. e. non congestis; glumis nucigeris ovatis, obtusis, in dorso 7—9-nerviis, marginibus hyalinis; staminibus 3, rarius 2, antheris muticis; stylo cum $\frac{1}{3}$ parte nucis subaequilongo, ramis 3 linearibus; nuce cum $\frac{3}{4}$ parte glumae subaequilonga, ellipsoidea, trigona.

Mariscus Mutisii H. B. K. *Nor. Gen. et Sp. I* (1815) p. 216 t. 66; *Kunth Enum. II* p. 124.

Mariscus Poeppigianus Kunth! *Enum. II* (1837) p. 123.

Mariscus Karwinskianus Kunth Enum. II (1837) p. 123.

Cyperus Mutisii Griseb.! Flor. (1864) p. 567; Boeck. in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 387.

Cyperus semitribrachiatus Boeck.! in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 386.

Cyperus ochreatus Boeck. in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 386.

Cyperus compresso-triqueter Boeck.! Cyp. Novae. Heft 1 (1888) p. 10.

Hab. in Jamaica: Eggers n. 3432, 3746, 3746^a, Hart n. 765, Purdie, Swartz; Hispaniola: Mayerhoff n. 217, 220; Portorico prope Coamo in fruticetis: Sintenis 3068; Grenada: Broadway n. 589 partim, 1006.

Distrib. in America centrali, Venezuela, Peru, Bolivia.

53. **Mariscus Meyenianus** Nees, glaber, rhizomate brevi; culmis 2—4 dm. longis, robustioribus, levibus; foliis cum culmo subaequilongis, 6—7 mm. latis; umbellae radiis 10—12, usque ad 3—7 cm. longis; bracteis saepe 6—9, umbellam superantibus, 5—7 mm. latis; spicis in unoquoque radio solitariis aut 2—3 umbellulatis, 20—25 mm. longis 10—15 mm. latis, cylindricis, densis, fuscis; spiculis 6—8 mm. longis, 1 mm. latis, 3—4-nucigeris, undulatis, rectangulatim patulis; glumis nucigeris oblongo-ellipticis, obtusis, sub-9-nerviis; nuce cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, lineari-oblonga; stylo cum $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongo, ramis 3, linearibus.

Mariscus Meyenianus Nees in Mart. Fl. Bras. II pars (1842) p. 49.

Mariscus subulatus Nees in *Linnaea* IX (1834) p. 286; Kunth Enum. II p. 123.

Cyperus subulatus Meyen! Reise I (1834) p. 108.

Cyperus Meyenianus Kunth Enum. II (1837) p. 88; Boeck. in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 362; Griseb. Flor. p. 567?

Cyperus trispicatus Boeck.! in Flora LXV (1882) p. 14; Duss Flor. p. 541.

Hab. in Martinique satis rara in savanis humidis Parnasse, Morne-Vert, Gros-Morne, alt. 250—500 m.: Duss n. 219, 455.

Distrib. a Mexico usque ad Montevideo, frequens.

54. **Mariscus Urbani** C. B. Clarke, glaber, gracilis, viridis, radice fibrosa; culmis caespitosis, 2—5 dm. longis, monocephalis; foliis cum culmo fere aequilongis, usque ad 4 mm. latis; spica 5 mm. longa, 5 mm. lata; bracteis 3, usque ad 6 cm. longis, cum foliis consimilibus; spiculis 2—3 mm. longis 1 mm. latis, obtusis, 2—3-nucigeris, proventu patulis aut deflexis; rhachilla supra 2 imas glumas vacuas a pulvino secedente; glumis ovatis, recurvo-mucronatis, parum imbricatis, in dorso viridi-3-

nerviis, in lateribus stramineis, proventu rhachillam non celantibus; stylo perbrevis, ramis 3 linearibus; nuce cum $\frac{3}{4}$ parte glumae aequilonga, obovoideo-ellipsoidea, trigona brunea.

Cyperus Urbani Boeck.! *Cyp. Novac. Heft 1* (1888) p. 10.

Hab. in Portorico prope Cayey ad rivulum Murillo et in sylvis primaevae ad ripas, prope Aybonito in declivibus graminosis ad Cariblanco: Sintenis n. 2198^b, 2241, 2319, 2929.

55. **Mariseus tenuis** C. B. Clarke, glaber, tenuis, rhizomate subnullo; culmis caespitosis, 1—3 dm. longis, filiformibus; foliis cum $\frac{3}{4}$ parte culmi aequilongis, usque ad 1½ mm. latis; umbella simplice depauperata vel ad spicam unicam reducta; bracteis 3, usque ad 6 cm. longis, cum foliis consimilibus; spicis usque ad 8 mm. in diam.; spiculis 4—5 mm. longis, linearibus, 2—5-nucigeris, fuscis, proventu deflexis; glumis nuciferis ovatis, obtusis, submucronatis, valide striatis, remotis; stylo 3-fido; nuce cum $\frac{3}{4}$ parte nucis aequilonga, ellipsoidea.

Cyperus tenuis Swartz *Prod.* (1788) p. 20 et *Fl. Ind. Occid. I* p. 119; *Kunth Enum. II* p. 85; *Griseb.! Flor.* p. 563.

Hab. in Jamaica: March, Purdie; Hispaniola ad Corail: Picarda n. 1368; St. Croix: Eggers; Ins. Antillae: herb. J. Gay.

56. **Mariseus capillaris** Vahl, gracillimus, culmis 5—15 cm. longis, capillaribus; spica 3—5 mm. in diam., densa, albida; spiculis vix 2 mm. longis, lineari-oblongis, 2—3-nucigeris, proventu deflexis; glumis ovatis, obtusis, vix mucronatis, subconspicue striatis; stylo brevissimo, ramis 3 linearibus brevibus rubris.

Mariseus capillaris Vahl *Enum. II* (1806) p. 372; *Kunth Enum. II* p. 116.

Schoenus capillaris Swartz *Prod.* (1788) p. 20 et *Fl. Ind. Occid. I* p. 106.

Cyperus nanus Willd. *Sp. Pl. I* (1797) p. 272 tab. *Pluk. excl.*; Boeck. in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 373; *Sauv. Cub.* p. 173.

Kyllinga capillaris Griseb.! *Kar.* (1857) p. 120 et *Pl. Cub.* p. 238.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 701, 3364; Jamaica: March n. 13, Swartz; Hispaniola: Eggers n. 2828, Picarda n. 193, Prenleloup n. 642; St. Croix: West.

Obs. *M. tenui* forsan potius specificè conjungenda.

57. **Mariseus rufus** H. B. K. glaber, robustior, rhizomate vix ullo; culmis 3—10 dm. longis; foliis cum $\frac{3}{4}$ parte culmi aequilongis, usque ad 5—10 mm. latis, robustis, in margine scabris, saepissime transversim lineolatis; umbella composita, subcorymbosa; bracteis 4—7 usque ad 3—6 dm. longis, cum foliis consimilibus; radiis 5—12, robustis, usque ad 1 dm. longis; spicis in unoquoque radio paniculatis aut fere sessilibus,

terminali 2—3 cm. longa, cylindrica, caeteris brevioribus saepe deflexis; spiculis 5 mm. longis, $1\frac{1}{2}$ mm. latis, pallide rubro-bruneis, 2—4-nucigeris, oblongis, turgidis parum compressis, dense congestis, proventu undique divaricatis; glumis nuciferis ovatis, rubro-bruneis carina interdum viridi, 11—15-striatis; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, triquetra, anguste obovoidea, castanea; stylo quam nux brevior, ramis 3 linearibus.

Mariscus rufus H. B. K. *Nov. Gen. et Sp. I* (1815) p. 216 t. 67; *Kunth Enum. II* p. 123.

Mariscus coriaceus G. F. W. Meyer *Esseq. (1818)* p. 38; *Kunth Enum. II* p. 125.

Cyperus ligularis Linn.! *Amoen. Acad. V* (1759) p. 391, et *Sp. Pl. ed. II* p. 70; *Rotth. Descr. et Ic. p. 35 t. 11 fig. 2*; *Swartz Obs. Bot. p. 31*; *Kunth Enum. II* p. 79; *Griseb.! Kar. p. 119 et Fl. p. 566*; *Boeck. in Linnaea XXXVI (1869—70)* p. 332, *exemplis australicis excl.*; *Saur. Cub. n. 2590* p. 172 *partim*.

Cyperus bidentatus Vahl *Enum. II (1806)* p. 330; *Kunth Enum. II* p. 62.

Cyperus callophorus G. F. W. Meyer *Esseq. (1818)* p. 32; *Kunth Enum. II* p. 104.

Cyperus ventricosus Nees in *Flora XI (1828)* p. 332.

Cyperus coriifolius Boeck.! in *Linnaea XXXVI (1869—70)* p. 391 *partim*.

Cyperus Sintenisii Boeck.! *Cyp. Novae. Heft 1 (1888)* p. 12.

Cyperus trigonus Boeck.! *Cyp. Novae. Heft 1 (1888)* p. 11.

Cyperus Rionensis Boeck.! *Cyp. Novae. Heft 1 (1888)* p. 12.

Cyperus glauco-viridis Boeck.! in *Kneuck. Allg. Bot. Zeitschr. II (1896)* p. 19.

Sloane Jamaica I p. 36 t. 9.

Hab. in ins. Bahama: Dale, Eggers n. 4099; Cuba: Sagra, C. Wright n. 3756; Jamaica: Alexander, Hart n. 799, Wilson n. 296; Hispaniola: Favrat n. 76, hb. Hennecart, Jaeger n. 278, Mayerhoff, Picarda n. 1113, 1371; Portorico: Krug n. 1237, O. Kuntze, Sintenis n. 82, 1218, 3302, 4861, 4952; St. Thomas: Eggers n. 228; Antigua: Wullschlaegel; Guadeloupe: Duss n. 3683; Dominica: Inray n. 345; Martinique: Belanger n. 1261, Duss n. 456, Hahn n. 698, 871, Husnot n. 9; St. Lucia: Inray; St. Vincent: Eggers n. 6957, Smith n. 337, 346; Mustique: Smith n. 54; Barbados: Eggers n. 7165; ins. caribaeis: Sieber *Agrost. n. 106*; Grenada: Broadway n. 39, Eggers n. 6350; Trinidad: Fendler n. 883, Hart n. 2102, 3349, 5038, 5745, O. Kuntze n. 1138.

Distrib. in Africa tropica cum Mascarenia; in America a Virginia usque ad Brasiliam australem, in America aequinoctiali vulgaris.

58. **Mariseus flabelliformis** H. B. K. glaber, rhizomate perbrevis, obliquo; culmis 3—5 dm. longis, gracilioribus; foliis culmo saepe longioribus, 3 mm. latis; umbella simplice, radiis 2—8 brevibus, saepius 2 cm. longis; bracteis 4—6, usque ad 1—2 dm. longis, cum foliis consimilibus; spicis 15 mm. longis, 15—10 mm. latis, ovoideis aut cylindricis, densis, viridibus fuscescentibus; spiculis vulgo 7 mm. longis 1 mm. latis, linearibus, 3—8-nuciferis, proventu rectangulatim divaricatis, numerosis distantibus; glumis nucigeris ellipticis, obtusis, nervis 5—7 viridibus; nuce cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, lineari oblonga; styli ramis 3.

Mariseus flabelliformis H. B. K. *Nov. Gen. et Sp. I* (1815) p. 215.

Cyperus flabelliformis Spreng. *Syst. I* (1825) p. 228; non Rottb.

Cyperus caracasanus Kunth (?) *Enum. II* p. 86; Boeck. in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 358.

Cyperus platystachyus Griseb.! *Flor.* (1864) p. 567.

Cyperus subulatus Nees! in *Flora XI* (1828) p. 335; nec Nees in *Linnaea IX* (1834) p. 285.

Cyperus Hartii Boeck.! *Cyp. Novac. Heft 1* (1888) p. 9; Duss *Flor.* p. 539.

Hab. in Jamaica: Eggers n. 3453, 3710, Hart n. 759, March, Swartz; Martinique: Duss n. 450^b; Trinidad: Hart n. 3405.

Distrib. in Africa tropica, Java, Polynesia, America centrali, late sparsa.

59. **Mariseus confertus** C. B. Clarke, glaber, rhizomate 3 cm. longo, repente (vel planta interdum primo anno florens); culmis 1—4 dm. longis, mediocribus; foliis cum culmis saepe aequilongis, 3—4 mm. latis; umbella simplice radiis paucis 1—6 cm. longis vel saepe in caput 1 contracta; bracteis 1—2 dm. longis, cum foliis consimilibus; spicis 1 cm. longis et latis, densis, viridibus proventu lutescentibus; spiculis 6 mm. longis 2 mm. latis, multum compressis, 3—12-nim breviter spicatis, 4—9-nucigeris; glumis nucigeris navicularibus, ovatis, acutis, mucrone parvo paullo recurvato; staminibus 3—2; nuce cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{5}$ parte glumae aequilonga, obtuse obovoidea, trigona, lutea proventu brunescens; styli ramis 3.

Cyperus confertus Swartz *Prod.* (1788) p. 20 et *Fl. Ind. Occid. I* p. 115; Kunth *Enum. II* p. 23; Griseb.! *Flor.* p. 563 pro parva parte; Boeck.! in *Linnaea XXXV* (1867—68) p. 514.

Cyperus dissitiflorus et *C. binucialis* N. J. Anderss. in *Handl. Kong. Akad. Stockh.* (1853—55) p. 153, 156.

Hab. in Jamaica: Harris n. 6641, March, Wright (alt. 700 ped.); Haiti: Poiteau; Portorico: Sintenis n. 3714, 5465^b; St. Thomas: Eggers n. 833^b, Hornemann n. 104; Martinique: Duss n. 46, 453.

Distrib. in Colombia, Venezuela, ins. Galapagos.

60. **Mariseus bruncus** C. B. Clarke, glaber, rhizomate horizontali, 3 mm. in diam.; culmis 1—6 dm. longis; foliis culmum saepe superantibus, usque ad 5—6 mm. latis, lentis nec transversim lineolatis; umbellae radiis paucis, 0—2 cm. longis; bracteis 4, usque ad 1—3 dm. longis, cum foliis consimilibus; spicis 10—18 mm. in diam., ovoideis, usque ad 24-stachyis, densis, bruneis aut sanguineo-tinctis; spiculis usque ad 1 cm. longis 2—3 mm. latis, 5—8-nucigeris vix carinatis, ovatis obtusis, nervo medio viridi brevissime excurrente, per totam fere latitudinem conspicue 17—21-striatis; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, acutius trigona; stylo quam nux multo brevior, ramis 3 longis multum exsertis.

Cyperus brunneus Swartz *Fl. Ind. Occid. I* (1797) p. 116 partim; Kunth *Enum. II* p. 104; Sagra *Fl. Cub. XI* p. 287; Griseb. *Kar. p. 119, Flor. p. 565 partim et Pl. Cub. p. 237; Sauv. Cub. n. 2584 p. 172.*

Cyperus rubicundus Vahl *Enum. II* (1806) p. 308; non Kunth.

Cyperus Ottonis Boeck.! in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 350 partim; Duss *Flor. p. 539.*

Cyperus discolor Boeck.! *Cyp. Novae. Heft 1* (1888) p. 7.

Cyperus Krugii Boeck.! *Cyp. Novae. Heft 1* (1888) p. 8.

Cyperus glaucus Boeck.! *ms. pro magna parte.*

Cyperus Sloane Jamaica *I* p. 116 t. 74 figg. 2, 3.

Hab. in Cuba: Rugel n. 899, Sagra n. 10, C. Wright n. 3361; Jamaica: Purdie, Swartz, W. Wright; Cayman: Fawcett; Portorico: Forster, Sintenis n. 842, 842^b, 1308^b, 3302^b, 3419, 5694, 6690, hb. Vahl; St. Thomas: Eggers n. 534; Guadeloupe: Bertero, Duchassaing n. 13; Martinique: Duss n. 695, 709, 765; St. Vincent: Anderson; Barbados: Anderson.

Distrib. in Florida, America centrali, Fernando Noronha.

61. **Mariseus purpurascens** C. B. Clarke, glaber, rhizomate brevi, obliquo; culmis 4—8 dm. longis; foliis usque ad 1 metr. longis, 1 cm. latis; umbella 15 cm. in diam., locupleti, composita ac saepius decomposita, spicis numerosis densa; bracteis usque ad 6 dm. longis, cum foliis consimilibus; spicis 7—30-stachyis, laxiusculis; spiculis linearilanceolatis, 10—12 mm. longis, 1 $\frac{1}{2}$ mm. latis, 10—12-nucigeris, rubro-bruncis; glumis nucigeris navicularibus, proventu laxiuscule imbricatis, ovatis, obtusis, subunicoloribus; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae fere aequilonga, obovoidea, trigona, cinereo-brunea; stylo cum nuce aequilongo, ramis 3 linearibus perlongis.

Cyperus purpurascens Vahl *Enum. II* (1806) p. 359; Kunth *Enum. II* p. 92; Boeck.! in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 348.

Cyperus planifolius L. C. Rich.! in *Acta Soc. Hist. Nat. Paris I* (1792) p. 106; Presl! in *Oken Isis XXI* (1828) p. 271; Kunth *Enum. II* p. 81 partim.

Cyperus bruneus Griseb.! *Flor.* (1864) p. 565 partim.

Cyperus glaucus var. β Boeck.! in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 339.

Cyperus sanguineus Balbis ms. fide Boeckeler.

Hab. in Portorico prope Maunabo ad Punta de la Tuna: Sintenis n. 5080; Antigua: Wulfschlaegel n. 687; Guadeloupe: Bertero; Dominica: Imray n. 29, Ramage; Martinique: Belanger n. 397, Duss n. 709, Husnot n. 11, Sieber n. 260; St. Vincent: Smith n. 381; Grenada: Broadway n. 188, 248; Trinidad: Sieber n. 7.

62. **Mariseus brizaeus** C. B. Clarke, glaber, robustior, culmis 6 dm. longis; foliis cum culmo subaequilongis, usque ad 8 mm. latis, non transversim lineolatis; umbellae compositae radiis usque ad 2—7 cm. longis; bracteis usque ad 3 dm. longis, cum foliis consimilibus; umbellulis e 3—5 spicis densiuscule spicatis; spicis ovoideis, densis, lucide rubro-bruneis; spiculis compressis, 6—9-nucigeris; glumis nucigeris usque ad 3 mm. longis, elliptico-lanceolatis; nuce ellipsoidea; ceteroquin ut *M. purpurascens*.

Cyperus brizaeus Vahl *Enum. II* (1806) p. 316; Kunth *Enum. II* p. 81, nec L. C. Rich.

Cyperus glaucus Steud. *Cyp.* (1855) p. 42 fide Boeck.; Boeck.! in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 338 partim, et var. β excl.

Cyperus bruneus Swartz *Fl. Ind. Occid. I* (1797) p. 116 partim; Kunth *Enum. II* p. 104; Duss *Flor.* p. 539.

Cyperus planifolius Vahl *Enum. II* (1806) p. 354 partim; Kunth *Enum. II* p. 81 partim; Boeck. in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 349 omnino nec L. C. Rich.

Cyperus Ottonis Boeck.! in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 350 partim.

Cyperus evaginatus Boeck.! in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 351.

Hab. in ins. Bahama New Providence: Eggers n. 4332; Cuba: Otto n. 47, C. Wright n. 3755; St. Thomas: Ehrenberg; Guadeloupe: Duss n. 3103; Grenada: Sherring.

Distrib. in Florida.

Species residua.

Mariseus spec.

Cyperus Dussii Boeck.! *Cyp. Novac. Heft 2* (1890) p. 37.

Cyperus Dussianus Duss! *Fl.* (1897) p. 541.

Hab. in Martinique locis siccis v. humidis Trois Ilets, 200—300 m. alt.: Duss n. 454^b.

Obs. Cl. BOECKELER speciem suam condidit in exemplari nimis juvenili inextricabili et numerum 478 (qui *Bulbostylis fimbriata* est) errore huc laudavit.

VI. *Torulinium* Desv.

Spiculæ 4—16-nucigeræ, teretes vel fere teretes. Rhacheola spiculæ in nodos singulos soluta. Nux inter rhacheolæ alas subinclusa, cum nodo decidua; cætera *Marisci*.

Species 8, quarum 7 in America præcipue tropica endemicæ, 1 per omnes terras calidiores sparsa.

Clavis specierum antillanarum.

* Robusta; umbella sæpius evoluta; spiculæ $1\frac{1}{2}$ mm. in diam.

† Glumæ remotiusculæ, subrigide adpressæ.

Spicæ laxiusculæ; spiculæ patulæ luteo-brunæ

63. *T. confertum* Ham.

Spicæ densæ; spiculæ fasciculatæ, suberectæ

64. *T. Eggersii* C. B. Clarke.

Spicæ densæ; spiculæ rigidæ, ferrugineo-rubrae

65. *T. VahlII* C. B. Clarke.

†† Glumæ parum remotæ, proventu oblique patulæ

66. *T. Michauxianum* C. B. Clarke.

** Gracile; culmus sæpius monocephalus; spiculæ 1 mm. in diam.

67. *T. filiforme* C. B. Clarke.

63. ***Torulinium confertum*** Ham. glabrum, mediocre aut magnum, culmo solitario, a basi erecto, a 15 mm. usque ad 12 dm. (sæpius 3—5 dm.) longo, rarius culmis cespitosis a propaginibus brevibus lateralibus exortis; foliis cum $\frac{3}{4}$ parte culmi aequilongis 5—7 mm. longis; umbella composita, spicis spiculisque numerosis, majuscula aut magna, modo 6 dm. in diam., modo in caput 2—3 cm. in diam. contracta; bracteis longis, cum foliis consimilibus; umbellularum bracteis sæpius longis, conspicuis, sed interdum parvis; spicis sæpe laxiusculis, 20-stachyis, interdum densis; spiculis 10—15 mm. longis $1-1\frac{1}{2}$ mm. latis, 5—12-nucigeris, luteis aut brunescens, subteretibus aut parum compressis; glumis 2 mm. longis, quadrato-ellipticis, in dorso convexis, 7-striatis; rhachilla recta aut flexuosa, alis ellipticis proventu sæpe in-crassatis circa nucem incurvatis interdum in cylindrum brevem connatis; nuce alas superante, oblonga aut anguste obovoidea, nigra; stylo cum $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongo, ramis 3 linearibus exsertis.

Torulinium confertum Ham. *Prod. Ind. Occid.* (1825) p. 15.

Torulinium ferox Kunth *Enum. II* (1837) p. 90 in citat.

Cyperus odoratus Linn. *Sp. Pl. ed. I* p. 46 quoad tub. *Sloanei* citatam, nec *Sp. Pl. ed. II* p. 68, neque herb. propr.; Kunth *Enum. II* p. 67; Griseb.! *Kar. p. 120, Pl. Cub. p. 237 et Flor. 565; Boeck.! in Linnæa XXXVI (1869—70) p. 407; Sauv. Cub. n. 2599 p. 172; Duss Flor. p. 540.*

Cyperus ferax L. C. Rieh.! in *Acta Soc. Hist. Nat. Paris I (1792) p. 106; Kunth Enum. II p. 89; Boeck.! in Linnæa XXXVI (1869—70) p. 399; Sagra Fl. Cub. XI p. 287; Duss Flor. p. 541.*

Cyperus ferox Vahl *Enum. II (1806) p. 357 saltem pro parte.*

Cyperus flexuosus Vahl *Enum. II (1806) p. 359; Kunth Enum. II p. 91; Sauv. Cub. n. 2597 p. 172; Griseb.! Pl. Cub. p. 238 partim et Flor. p. 566 et in Mem. Acad. Amer. Scient. N. S. VIII (1862) p. 535.*

Cyperus conglobatus Link *Jahrb. III (1820) p. 87; Kunth Enum. II p. 90; Boeck.! in Linnæa XXXVI (1869—70) p. 394.*

Cyperus stellatus Rudge *Guiana (1805) p. 17 t. 20.*

Cyperus jubaeiflorus Rudge *Guiana (1805) p. 17 t. 21; Kunth Enum. II p. 104.*

Cyperus densiflorus G. F. W. Meyer *Esseq. (1818) p. 34; Kunth Enum. II p. 104; Griseb.! Pl. Cub. p. 237 et Flor. p. 566; Sauv. Cub. n. 2588 p. 172.*

Cyperus distans G. F. W. Meyer *Esseq. (1818) p. 35.*

Cyperus fastuosus Ham. *Prod. Fl. Ind. Occid. (1825) p. 12; Kunth Enum. II p. 105.*

Cyperus poaeoides Ham. *Prod. Fl. Ind. Occid. (1825) p. 12; Kunth Enum. II p. 105.*

Cyperus rapiostachys Link *Jahrb. III (1820) p. 87 (?) ; Kunth Enum. II p. 68 (raphiostachys).*

Cyperus auriculatus Nees in *Linnæa IX (1834) p. 285; Kunth Enum. II p. 83; Boeck. in Linnæa XXXVI (1869—70) p. 354.*

Cyperus Hamiltonii Kunth *Enum. II (1837) p. 90.*

Cyperus insignis Kunth! *Enum. II (1837) p. 92; Griseb. Kar. p. 120; Boeck. in Linnæa XXXVI (1869—70) p. 401.*

Cyperus Ehrenbergii Kunth *Enum. II (1837) p. 89; Sagra Fl. Cub. XI p. 287; Griseb.! Pl. Cub. p. 238 et Flor. p. 566; Sauv. Cub. n. 2589 p. 172.*

Cyperus longeradiatus Steud. *Cyp. (1855) p. 37.*

Cyperus lenticularis Steud. *Cyp. (1855) p. 48; Boeck.! in Linnæa XXXVI (1869—70) p. 406.*

Cyperus acicularis Steud. *Cyp. (1855) p. 45; Boeck.! in Linnæa XXXVI (1869—70) p. 409; Duss Flor. (1897) p. 539.*

Cyperus pseudostrigosus Steud. *Cyp. (1855) p. 46.*

Cyperus cubanus Liebm.! *Mexic. Halvgr.* (1850) p. 34; *Sauv. Cub.* n. 2598 p. 172; Boeck.! in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 403; cf. Boeck. in *Flora* LXIV (1881) p. 76.

Cyperus St. Crucis Liebm. *Mexic. Halvgr.* (1850) p. 35.

Cyperus pennatus Boeck. in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 404, non Lam.

Cyperus ignoratus Boeck.! in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 395.

Cyperus nitidulus Boeck.! in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 363.

Cyperus multibracteatus Boeck.! in *Flora* LVIII (1875) p. 107 partim.

Cyperus VahlII Boeck.! in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 398.

Cyperus parvispiculatus Boeck.! *Cyp. Norae. Heft 1* (1888) p. 6.

Cyperus purpureo-ragrinatus Boeck.! *Cyp. Norae. Heft 2* (1890) p. 8.

Cyperus flavicomus Balbis! ms.

Cyperus elegans Duchassaing ms. fide Boeckeler.

Papyrus odoratus Willd. in *Abhandl. Akad. Berlin* (1812) p. 73 partim.

Marisens Pohlianus Nees! in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1842) p. 50; Schrader ms. fide Nees.

Marisens ferax C. B. Clarke in *Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI* (1893) p. 624, et in *Dur. et Schinz Fl. Afr. V* p. 587.

Diclidium aciculare Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1842) p. 55; Schrader ms.

Diclidium ferox Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1842) p. 54.

Diclidium lenticulare Nees! in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1842) p. 53 t. 2; Schrader ms.

Diclidium odoratum Nees! in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1842) p. 54; Schrader ms.

Hab. in Bermuda: Moseley; ins. Bahama New Providence: Eggers n. 4340; India occident.: Sieber *Agrost.* n. 110; Cuba: Eggers n. 4832, 5415, Liebm., Melville, Sagra, C. Wright n. 704; Jamaica: Hart n. 803, March, Shakespeare, Wilson n. 295, Wulfschlaegel; Hispaniola: Eggers n. 3358, Jacquemont, Mayerhoff n. 221, Prenleloup n. 649; Portorico: Blauner n. 112, 248, Eggers n. 145^b, O. Kuntze n. 208, Sintenis n. 166, 166^b, 2502, 4477; St. Thomas: Eggers, Ehrenberg n. 77; Guadeloupe: Duchassaing n. 3, Duss n. 3106, 3578, 3913, l'Herminier; Dominica: Eggers, Imray n. 335; Martinique: Belanger n. 395, Duss n. 223, 448, 450, 451, 458, 688, 708, Hahn n. 366 partim, 697, Husnot n. 10; St. Lucia; Anderson, Murray; St. Vincent: Guilding, Smith n. 381; Barbados: Lane n. 489; Grenada: Broadway

n. 1253, Eggers n. 6010, Elliott n. 54; Tobago: Eggers n. 5600, 5763, 6588, Hamilton (alt. 175 metr.); Trinidad: Crueger, Eggers n. 1090, Fendler n. 891, Hart n. 2085, 3248.

Distrib. per orbem terrarum calidiorem sparsum; in orbe vetere rarius, in Oceania et in orbe novo vulgare.

Obs. *Cyperi odorati* Linn. 2 exempla (bona) a manu Linnaci inscripta in herb. Linn. proprio conservata sunt; ex his alterum est *Pycereus polystachyus* Beauv., alterum est *Cyperus malaccensis* Lam.

64. **Torulinium Eggersii** C. B. Clarke, spicis ovoideis, densis; spiculis imo proventu suberectis, fasciculatis; ceteroquin ut *T. confertum*.

Cyperus Eggersii Boeck.! *Cyp. Novae. Heft 1* (1888) p. 53.

Cyperus multibracteatus Boeck.! in *Flora LVIII* (1875) p. 107 partim.

Cyperus odoratus Griseb. *Pl. Cub.* (1866) p. 237, non Linn.

Cyperus ligularis Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 238, non Linn.

Hab. in Cuba ad Arroyo de Pedro 500 m. alt. et ad El Potrero Yarey, locis humidis: Eggers n. 4831, 5078, Rugel n. 601, 906; Hispaniola prope Batey ad ripam fluminis Yasia: Eggers n. 2627.

Distrib. in America centrali, Peru, Bolivia.

Obs. Species cum *T. conferto* forsán melius rejungetur.

65. **Torulinium VahlII** C. B. Clarke, spiculis 8 mm. longis, rigidis, linearibus 4—6-nucigeris, ferrugineo- rubro-tinctis, dense sitis; ceteroquin ut *T. confertum*.

Diclidium VahlII Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 53; Schrader ms. e Nees.

Cyperus VahlII Steud. *Cyp.* (1855) p. 48; Griseb.! *Pl. Cub.* 238 et *Flor.* p. 566, et in *Mem. Acad. Amer. Scient. N. S. VIII* (1862) p. 535; Sauv.! *Cub. n.* 2596 p. 172.

Cyperus OerstedII Liebm. *Mexic. Halvgr.* (1850) p. 36.

Cyperus ferax var. β Boeck. in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 400?

Cyperus flexuosus Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 238.

Cyperus ferax forma *flexuosa* Boeck.! in *Flora LXIV* (1881) p. 77.

Cyperus Michauxianus Boeck.! in *Flora LXIV* (1881) p. 77.

Cyperus insignis Boeck.! ms.

Hab. in Cuba: Eggers n. 4544, 4673, 4866, C. Wright n. 705; Jamaica: Wilson n. 496; Hispaniola: Eggers n. 2471; Antigua: Wulfschlaegel n. 684; Guadeloupe: Duchassaing.

Distrib. in Mexico, Brasilia.

66. **Torulinium Michauxianum** C. B. Clarke, glumis parum remotis, proventu sublaxe oblique patentibus; nuce ellipsoidea, apice acutata aut subovoidea apice breviter acuta; ceteroquin ut *T. confertum*.

Cyperus Michauxianus Schultes in Roem. et Sch. Syst. II Mant. (1824) p. 123; Boeck. in Linnæa XXVI (1869—70) p. 400.

Cyperus Michauxii Boeck. in Engl. Jahrb. I (1881) p. 363 partim.

Cyperus speciosus Vahl Enum. II (1806) p. 364?; Kunth Enum. II p. 88.

Cyperus erythrorrhizos Torrey Compend. (1826) p. 43.

Cyperus virginicus Steud. Cyp. (1855) p. 47.

Cyperus strigosus Mich. Fl. Bor. Amer. I (1803) p. 28; Kunth Enum. II p. 87 partim.

Cyperus flavicomus Pursh! Fl. Amer. Sept. I (1814) p. 53 partim; Jungh. in Linnæa VI (1831) p. 24.

Cyperus Engelmannii Steud.! Cyp. (1855) p. 47; Boeck.! in Linnæa XXVI (1869—70) p. 393.

Cyperus rufinus Liebm. Mexic. Halagr. (1850) p. 34; cf. Boeck. in Engl. Jahrb. I (1881) p. 363.

Cyperus californicus S. Wats. Bot. Californ. II (1880) p. 216.

Cyperus tenuior Engelmann ms. fide A. Gray.

Hab. in ins. Bermuda: Lefroy, Moseley; Cuba: herb. Shuttleworth; Jamaica: W. Wright.

Distrib. a New York et Ohio usque ad Texas; in California fide S. Watson; in America centrali.

Obs. Species a *Marisco strigoso* longe diversa, cum hoc magnopere confusa, a *Torulinio conferto* aegre aut vix distinguenda.

Cyperus Michauxianus Schultes est *Cyperii strigosi* Mich. nomen alterum; nihilominus Britton (in Bull. Torrey Club XIII (1886) p. 214) scripserat "*Cyp. Michauxianus* Torrey non Schultes". Planta est certissime *Torulinii* nec *Marisci* sp.

67. ***Torulinium filiforme*** C.B. Clarke, gracile vel gracilius, glabrum, rhizomate tenui; culmis 1—5 dm. longis, approximatis, monocephalis (spica altera pedunculata rarius addita); foliis 2—5 cm. longis aut cum culmo aequilongis, 2—3 mm. latis; capite e 3—8 spiculis subdigitatis exstructo; bracteis suberectis, in exemplis brevifoliatis cum spica aequilongis, in exemplis longifoliatis usque ad 10—15 cm. longis, cum foliis consimilibus; spiculis usque ad 18 mm. longis 1 mm. latis, 7—8-nucigeris (vel 2—4-nucigeris), linearibus, teretibus erectis; glumis nucigeris ovatis vix acutis, lutescentibus carina viridi, vix striatis; nuce cum $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ parte glumae aequilonga, trigona, ellipsoidea utrinque acuta, paullo curvata, fere nigra; stylo brevi, ramis 3 linearibus.

Cyperus filiformis Swartz Prod. (1788) p. 20 et Fl. Ind. Occid. I p. 121; Kunth Enum. II p. 84; Sagra Fl. Cub. XI p. 287; Griseb.! Pl. Cub. p. 237 et in Mem. Acad. Amer. Scient. N. S. VIII (1862) p. 534, et Flor. p. 565; Boeck. in Linnæa XXVI (1869—70) p. 369; Sauv. Cub. n. 2594 p. 172.

Cyperus ornithopus Pers. *Syn. I* (1805) p. 61.

Cyperus Havanensis Kunth *Enum. II* (1837) p. 84; *Grisch.!*
Pl. Cub. p. 237; *Boeck. in Linnæa XXXVI* (1869—70) p. 370;
Sauv. Cub. n. 2595 p. 172; *Willd. ms. ex Kunth.*

Cyperus unifolius Boeck. *!* in *Linnæa XXXVI* (1869—70)
p. 374.

Epiphyllis ophiuroides Trin. *Fund.* (1820) p. 98 t. 1.

Mariscus filiformis Roem. et Sch. *Syst. II* (1817) p. 242 *partim*
et Mant. p. 140.

Mariscus Havanensis H. B. K. *Nov. Gen. et Sp. I* (1815) p. 212.

Hab. in ins. Bahama, New Providence: Eggers n. 4412; Cuba:
Liebmann, Linden (Santiago) n. 2068, (Cobre) n. 2069, Rugel n. 879,
C. Wright n. 3362, n. 702 (foliis longis, umbella 2—3-radiata); Jamaica:
Hart n. 1502, March, Purdie; Hispaniola: Picarda n. 359, 585, Poiteau
n. 45; Portorico: Sintenis n. 841, 3353, 3471, 3817^b; St. Thomas:
Eggers n. 36; St. Croix: Raven.

VII. Eleocharis R. Br.

Glumæ plurimæ aut numerosæ, 3- aut multi-spiræ, obtusæ
aut vix acutæ; ima obtusa sæpissime vacua cæteris non aut vix longior.
Flos imus 2-sexualis, nucem maturans. Setae hypogynæ 3—8, cum
nucæ sæpe æquilongæ retrorsim scabridæ, vel raro nullæ. Stamina
3—1, antica. Stylus glaber; rami 3 aut 2, lineares; styli basis dila-
tata, pyramidalis, bulbosa aut conica, a nucis apice facile (praeter *E.*
rostellatam) distinguenda. Nux trigona aut plano-convexa, sessilis, an-
guste vel late obovoidea; stylus in nucæ persistens. — Culmus glaber,
aphyllus, monostachyus.

Species 120, per orbem terrarum sparsæ, in America copiosæ.

Clavis specierum antillanarum.

Subgenus I. *Limnochloa* (genus) Nees in *Wight Contrib.* (1834) p. 114, non
Lestib. Stoloniferae. Culmi robustiores. Spicula longius cylindrica.
Glumæ rigidiores, plano-concavae, vix carinatae, stramineae, virides
aut fuscae, fere unicolores.

Culmi (in sicco) conspicue transversim (pseudo-)septati

68. *E. interstincta* R. Br.

Culmi non (aut admodum obscure) septati

Culmi apice triquetri aut acutius trigoni

69. *E. mutata* R. Br.

Culmi apice teretes aut obscure subtrigoni

Setae leves vel vix denticulatae

Nux apice truncata; setae breves 70. *E. mitrata* C. B. Clarke.

Nux apice angustata; setae longae 71. *E. cellulosa* Torrey.

Setae valide retrorsim scabrae . 72. *E. variegata* Presl var.

Subgenus II. *Eleogenus* (genus) Nees in *Wight Contrib.* (1834) p. 112. Culmi minores aut mediocres. Glumae membranaceae, in carina 1—3-nerviae saepe virides. Stylus 2-fidus.

* Vagina summa apice scariosa, rugosa, detergilis, saepe mox evanida.

Spicula viridis aut ferruginea . 73. *E. ochreate* Nees.

Spicula castanea aut cinerascens 74. *E. maculosa* R. Br.

** Vagina summa apice firma, integra aut unidentata.

Rhizoma filiforme aut nullum.

Culmi capillacei; spicula 1—4-nucigera

75. *E. capillacea* Kunth.

Culmi graciles; spicula pluri- aut multi-nucigera

Setae albiae aut perpallidae 76. *E. atropurpurea* Kunth.

Setae ferrugineae aut bruneae 77. *E. capitata* R. Br.

Rhizoma horizontale, robustum, castaneum

78. *E. nodulosa* Schultes.

Subgenus III. *Eu-Eleocharis*. Spicula culmo multo latior. Glumae membranaceae, in carina saepe virides. Stylus 3-fidus.

* *Aciculares*. Nux longitudinaliter costata, inter costas transversim trabeculata 79. *E. acicularis* R. Br.

** *Chaetariaeae*. Nux cancellata, vix longitudinaliter costata

80. *E. Chaetaria* Roem. et Sch.

*** *Leiocarpicae*. Nux levis vel plus minus reticulata vix cancellata.

† Culmi capillares; nux pallida, vel proventu fuscescens.

Spiculae 2—6-florae.

Spicula atrosanguinea; setae 3—5, perbreves

81. *E. oligantha* C. B. Clarke.

Spicula pallida; setae nucem superantes

82. *E. camptotricha* C. B. Clarke.

Spiculae pluri- (saepius 6—20-)florae.

Setae ferrugineae aut pallide bruneae

Culmi 3—5 cm. longi; spicula 3—5 mm. longa

83. *E. punctata* C. B. Clarke.

Culmi 5—10 cm. longi; spicula 5—9 mm. longa

84. *E. Wrightiana* C. B. Clarke.

Setae albae.

Spicula 2—4 mm. longa; glumae imae subdistichae

85. *E. minima* Kunth.

Spicula 5—8 mm. longa; glumae imae polyspirae

86. *E. subtilis* C. B. Clarke.

†† Culmi 1—3 dm. longi, tenues; glumae albo-marginatae

87. *E. microcarpa* Torrey.

††† Culmi graciles.

Stylo-basis a nuce facile distinguenda.

Nux alba aut straminea 88. *E. sulcata* Nees.

Nux fusca aut castanea

Setae cum $\frac{1}{3}$ parte nucis vix aequilongae

90. *E. melanocarpa* Torrey.

Setae cum nuce subaequilongae

Spicula obovoidea 89. *E. pachystyla* C. B. Clarke.

Spicula cylindrica 91. *E. albida* Torrey.

- Nux aurea 92. *E. montana* Roem. et Sch.
 Stylo-basis cum nucis apice fusa concreta
 93. *E. rostellata* Torrey.
 †††† Culmi robustiores 3—8 mm. in diam., pseudoseptati
 94. *E. geniculata* R. Br.

68. ***Eleocharis interstincta*** R. Br. stolonibus crassiusculis; culmis 4—7 dm. longis, robustioribus, teretibus, exsiccatiss transversim septatis; spicula unica 2—4 cm. longa, 3—5 mm. lata, cylindrica, densiuscula, fusce straminea; glumis 5—6 mm. longis, obovatis subtruncatis in dorso ecarinatis, multistriatulis, saepe nigro-punctatis, emareidibus subpersistentibus, ima latiuscula viridi culmum quasi continuante; setis nucem paullo superantibus, saepissime 7, retrorsim scabris, pallidis aut rubro-bruneis; stylo 3- (vel 2-)fido; nuce cum $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, plano-convexa, pallida, a 30—36 striis tenuiter longitudinaliter lineata, inter strias transversim arcte trabeculata.

Eleocharis interstincta R. Br. *Prod.* (1810) p. 224 in nota; *Kunth Enum.* II 154; *Sagra Fl. Cub.* XI p. 290.

Eleocharis articulata Kunth *Enum.* II (1837) p. 157.

Eleocharis equisetoides Torrey in *Ann. Lyceum New York* III (1836) p. 296.

Eleocharis septata Miq. in *Linnaea* XVII (1843) p. 58.

Eleocharis obsoletu Steud. *Cyp.* (1855) p. 81.

Eleocharis cognata Steud. *Cyp.* (1855) p. 81.

Scirpus interstinctus Vahl *Enum.* II (1806) p. 251.

Scirpus plantagineus Swartz *Fl. Ind. Occid.* I (1797) p. 123 syn. excl.; *Griseb.!* *Kar.* p. 122, *Flor.* p. 571, et *Pl. Cub.* p. 240; *Sauv.!* *Cub.* n. 2626 p. 175.

Scirpus polygamus Wright! *ms. ex Boeck. in Flora LXIV* (1881) p. 78.

Limnochloa articulata Nees in *Linnaea* LX (1834) p. 294.

Heleocharis plantaginica Boeck. in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 474 quoad pl. et syn. *Americanas*, et *Cyp. Norae.* Heft 2 (1890) p. 14; *Hemslay!* *Bot. Challenger pars I* p. 75.

Hab. in Bermuda: Moseley; ins. Bahama: Eggers n. 4510; Cuba: Combs n. 431 (St. Clara), Eggers n. 4727, Liebmann n. 956, hb. Roemer, C. Wright n. 710; Jamaica: Alexander, Hart n. 804, Purdie; Hispaniola: Eggers n. 2829, Ehrenberg, hb. Hennecart, Picarda n. 430, 1465, Poiteau; St. Thomas: Riedlé; Thérèse: Gibollet n. 127; Guadeloupe: Beaupertuis, Bertero, Duss n. 3123, l'Herminier, Read n. 362; Dominica: Ramage (alt. 900 metr.); Martinique: Belanger n. 1256, Duss n. 696, Hahn n. 546, Husnot n. 23; St. Lucia: Plée; St. Vincent: Eggers n. 6719, Smith n. 11; Barbados: Eggers n. 7108; Grenada:

Broadway n. 430, 1163, Murray n. 34; Trinidad: Fendler n. 906, Lunt n. 6037, O. Kuntze n. 772.

Distrib. in America septentrionali orient. et centrali; per Americam australem tropicam et temperatam calidiorem vulgaris.

Obs. *Eleochar. plantaginica* R. Br., species per regiones calidiores orbis veteris late vulgata, in orbe novo nondum lecta, ob nucem levem (nec cancellatam) multum differt.

69. *Eleocharis mutata* R. Br. stolonibus longis; culmis 3—7 dm. longis, 3—6 mm. crassis, apice triquetris aut trigonis, non septatis; spicula unica, 2—4 cm. longa, 5—6 mm. lata, quam culmus paullo latiore, luteo-brunea; glumis 5—6 mm. longis, obovatis, obtusis, emarcidis subpersistentibus, ima lata, viridi, culmum quasi continuante; setis nucem superantibus, 8—5, retrorsim scabris, rubro-bruneis; stylo 3-fido; nuce parva, oblongo-obovoidea, inaequaliter biconvexa, fusce brunea, tenuius cancellata; stylobasi conica quam nucis apex latiore.

Eleocharis mutata R. Br. *Prod.* (1810) p. 224 in notu; *Kunth Enum.* II p. 154.

Eleocharis scariosa Steud.! *Cyp.* (1855) p. 80.

Scirpus mutatus Linn.! *Amoen. Acad.* V (1788) p. 391 et *Sp. Pl.* ed II p. 71; *Swartz Obs. Bot.* p. 31; *Griseb.! Flor.* p. 571 et *Pl. Cub.* p. 240; *Sauv. Cub. n.* 2622 p. 175.

Limnochloa mutata Nees! in *Linnaea* IX (1834) p. 294.

Limnochloa mutata Kunth *Enum.* II p. 154 in citat.

Heleocharis spiralis Boeck.! in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 473, syn. R. Br. et Rottb. exclusis.

Heleocharis fistulosa Boeck. in *Linnaea* XXXVI (1869—70) partim i. e. pl. et syn. Americana.

Heleocharis nodulosa Hemsl. *Centr. Amer. Bot.* III (1885) p. 456 pro majore parte.

Heleocharis mutata Schlecht. in *Bot. Zeit.* (1849) p. 134.

Heleocharis plantaginica "forma culmis haud septatis" Boeck.! ms. in *Glaxiou n.* 6422.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3375, 3376; Jamaica: Purdie, Wilson; Hispaniola: Mayerhoff; Portorico: Eggers n. 440, 680, 977^b, Read n. 366, Sintenis n. 4942; Antigua: Wulfschlaegel n. 706; Guadeloupe: Beaupertuis, Duss n. 3441, 3637, l'Herminier; Martinique: Duss n. 754, Husnot n. 22, Sieber n. 10, 355; St. Lucia: Anderson; Grenada: Eggers n. 6508; Trinidad: Crueger n. 2074, Lockhart.

Distrib. in America centrali, per Americam meridionalem, tropicam et temperatam calidiorem vulgata.

Obs. Species ab *Eleochar. spirali* R. Br. specie in Asia austro-orientali vigente, multum diversa; cum *Eleochar. fistulosa* Schultes, specie in orbe vetere vigente, forsan melius specificè jungenda.

70. **Eleocharis mitrata** C. B. Clarke, stolonibus longis; culmis 4—6 dm. longis, 2—3 mm. latis, subteretibus, non septatis; spicula unica 2—3 cm. longa, 3—4 mm. lata, cylindrica; glumis 4—5 mm. longis, ovatis, obtusis, fusce viridibus rubro-sphacelatis, ima viridiore, culmum quasi continuante; setis 7 cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilongis, albis, fere levibus; stylo (saltem saepissime) 2-fido; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, biconvexa, urceolata, apice vix angustata, fusce straminea, cancellata inter strias 24—30 longitudinales transversim trabeculata; stylobasi mitraeformi, cum nucis apice vix aequilata.

Scirpus mitratus Griseb.! *Flor.* (1864) p. 570.

Helcocharis Jelkskiana Bocck. in *Limnæa* XXXVIII (1874) p. 376
e. descript.

Hab. in Trinidad: Crueger n. 24.

Distrib. in Brasilia prope Manáos. Var.? β *africana* ad Niger lecta est.

71. **Eleocharis cellulosa** Torrey, stolonibus longis; culmis 4—7 dm. longis, apice subteretibus, non septatis; spicula unica 3 cm. longa, 5 mm. lata, cylindrica, pallida, e viridi luteo-fuscescente; glumis 4—5 mm. longis, obovatis obtusis, fusce viridibus aut brunescens, ima viridescens, culmum quasi continuante; setis 7, tenuibus, nuce longioribus, rubro-bruneis, levibus aut vix denticulatis; stylo 3-fido; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, compresso-trigona, obovoidea apice angustata, stramineo-brunea, longitrorsum 30—36-striata, transversim trabeculata.

Eleocharis cellulosa Torrey in *Ann. Lyceum New York* III (1836) p. 298 et *Mexic. Bonuul.* p. 228; *Hitch. Pl. Bah.* (1893) p. 175.

Scirpus dictyospermus C. Wright! in *Saur. Cub.* (1871) n. 2623 p. 175.

Helcocharis spiralis, forma *tenuis* Bocck.! *ms.*

Hab. in ins. Bahama: Dale; Cuba: C. Wright.

Distrib. Florida, Texas.

72. **Eleocharis variegata** Presl var. **laxiflora** Ridley, stolonibus longis; culmis 2—4 dm. longis, 2—3 mm. latis, apice subtrigonis, non septatis; spicula unica 25 mm. longa, 3 mm. lata, cylindrica; glumis fusce viridescens, unicoloribus, vel anguste bruneo-marginatis; setis 7, nucem saepe fere duplo superantibus, valide retrorsim scabris; stylo 3—2-fido; nuce minute reticulata, late ellipsoidea, compresso-trigona, a 30—40 striis tenuibus longitudinaliter percursa, apice paullo angustata; stylobasi ovoideo-triangulari.

Eleocharis variegata Presl var. *laxiflora* Ridley! in *Journ. Singapore Asiat. Soc.* n. 23 (1891) p. 14; C. B. Clarke in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* V p. 626.

Scirpus laxiflorus Thwaites! *Enum. Pl. Zeyl.* (1864) p. 435.

Scirpus plicarrhachis Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 239; *Saur. Cub.* n. 2619 p. 174; cf. Boeck. in *Flora LXIV* (1881) p. 78.

Heleocharis variegata Boeck.! in *Flora XXXIX* (1881) p. 78.

Limnochloa Zeylanica Nees! *ms.*

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3372.

Distrib. in Asia austro-orient. late sparsa; Polynesia; Mexico.

73. ***Eleocharis ochreata*** Nees, rhizomate tenuissimo pallido; culmis 5—30 cm. longis, tenuibus, subquadrangularibus; vagina summa apice scariosa, rugosa, detergibili, saepe evanida praetermissa; spicula 3—6 mm. longa, pauci- aut multiflora; glumis 2—3- (aut multi-)spiris, ellipticis, obtusis, parum carinatis, albo-viridibus vel ferrugineis, ima majore fere semper vacua; setis 7, cum nuce subaequilongis, retrorsim scabris; stylo 2-fido; nuce cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, plano-convexa, levi, castanea aut fusce olivacea; stylo-basi parva, bulboso-conica, straminea viridi aut alba.

Eleocharis ochreata Nees! in *Linnaea IX* (1834) p. 294; *Kunth Enum. II* p. 157.

Eleocharis capitata Kunth! *Enum. II* (1837) p. 150 *partim*.

Scirpus ocreatus Griseb.! *Flor.* (1864) p. 570, et *Pl. Cub.* p. 239; *Saur. Cub.* p. 174 (*ochreatus*).

Scirpus anisochaetus C. Wright! in *Saur. Cub.* (1871) n. 2611 p. 174.

Heleocharis alboraginata Boeck.! in *Vidensk. Meddel. Kjob.* (1869—70) p. 133, et in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 436.

Heleocharis bahamensis Boeck. *Cyp. Norae. Heft 2* (1890) p. 11.

Heleocharis crispo-raginata Boeck. in *Engl. Jahrb. VIII* (1887) p. 206 *e descript.*

Heleocharis capitata Boeck.! *ms. partim*.

Hab. in ins. Bahama: Eggers n. 4101; in Cuba: C. Wright n. 711, 3761; Jamaica: Wulfschlaegel n. 1138; Hispaniola: Eggers n. 2678, Picarda n. 427; Portorico: Blauner n. 115, Eggers n. 978, 1330, 1332, Schwanecke n. 412, Sintenis n. 1222, 2656, 6594, 6685; St. Thomas: Ledru; Guadeloupe: Duss n. 3124, 3124^b, 3735, l'Herminier n. 31, 32, Husnot n. 19, 20; Martinique: Duss n. 457, Hahn n. 375, 703, 1446, Plée n. 504; Trinidad: Sieber n. 4.

Distrib. in ins. Philippinis; in America septentr. calidiore et centrali, per Americam australem, sat vulgaris.

Var. β . ***flaccida*** Boeck. culmis usque ad 3—5 dm. longis, flaccidis.

Scirpus flaccidus Spreng. *Tent. Suppl.* (1828) p. 3.

Eleocharis capitata Miq. in *Linnaea XIX* (1847) p. 225.

Heleocharis alboraginata var. β . ***flaccida*** Boeck.! in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 437.

Helcocharis Dussiana Bocck.! in Kneuck. *Allg. Bot. Zeitschr.* II (1896) p. 54.

Hab. in Portorico: Sintenis n. 176, 1404, 2201, 4180; Guadeloupe: l'Herminier n. 7; Martinique: Duss n. 466^a, Hahn n. 703; St. Lucia: Murray.

Distrib. America australis tropica.

Var. γ . **humilis** C. B. Clarke, humilis, debilis aut rigidior; spica pauciflora aut cylindrica densa; glumis fructiferis interdum subpatulis; nuce olivacea, interdum laete viridi, setis parvis albis.

Eleocharis ochreatea var. γ *humilis* C. B. Clarke in Dur. et Schinz *Fl. Afr. V* (1895) p. 599.

Helcocharis albiraginata var. γ *humilis* Bocck.! in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 384.

Helcocharis minuta Bocck.! in *Engl. Jahrb. V* (1881) p. 503.

Helcocharis cancellata Hemsl.! *Biol. Centr. Amer. Bot.* III (1885) p. 455, non *Eleocharis cancellata* S. Watson.

Helcocharis Tuerckheimii Bocck.! *Cyp. Novae. Heft 1* (1888) p. 16.

Hab. in Cuba ad La Prenda 800 m. alt., in paludosis gregaria: Eggers n. 5205.

Distrib. Socotra, Mascarenia, Australia tropica, America centralis.

74. **Eleocharis maculosa** R. Br. stolonibus tenuioribus castaneis; culmis 10—35 cm. longis; vagina summa apice scariosa, rugosa, detergibili; spicula 5—12 mm. longa, 3—4 mm. lata, ovoidea, densiflora, castaneo-purpurea; glumis in margine scariosis, tardius deciduis, ima vacua paullo majore magis viridi subbracteiformi; setis 7 vel 8, cum nuce subaequilongis, retrorsim scabris, bruneis aut ferrugineis; stylo 2-fido; nuce cum $\frac{1}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, planoconvexa, levi, lucide castanea, apice angustata; stylo-basi angusta, pallida.

Eleocharis maculosa R. Br. *Prod.* (1810) p. 224 in obs.; *Kunth Enum.* II p. 146.

Scirpus maculosus Vahl *Enum.* II (1806) p. 247; *Griseb.! Flor.* p. 570.

Isolepis fusco-purpurea Steud.! *Cyp.* (1855) p. 99.

Helcocharis maculosa Cl. Gay *Chile VI* (1853) p. 172; *Bocck.! in Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 460.

Helcocharis gracillima Bocck.! in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 459, non *Eleocharis gracillima* Hook. f.

Helcocharis univaginata Bocck.! *Cyp. Novae. Heft 1* (1888) p. 14.

Hab. in Guadeloupe: Duss n. 3125, 3595, 3911 (alt. 800 metr.), l'Herminier n. 39, 40, Husnot n. 18, Perrottet; Dominica: Eggers n. 40

(ad Lake Roseau, alt. 1000 metr.), 547 (locis humidis prope Laudat), 852; Martinique: Guyon.

Distrib. Texas, America centralis, America australis quam tropica tam temperata.

75. *Eleocharis capillacea* Kunth, rhizomate pertenui; culmis fasciculatis, 2—5 cm. longis, capillaceis, subquadrangularibus; vagina summa apice stricta, nec scariosa detergibili; spicula 2—3 mm. longa, juniore lineari-cylindrica, 1—4-nucigera, ferruginea; glumis 2 imis spiculam saepe subincludentibus, oblongis vix acutis, scariosis, ima saepius vacua in carina viridiore; setis 4—6, cum nuce subaequilongis, retrorsim scabris, ferrugineis; staminibus 2—1; stylo 2-fido; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae subaequilonga, obovoidea, plano-convexa, levi, castanea; stylobasi parva, conica.

Eleocharis capillacea Kunth *Enum. II* (1837) p. 139; *Sagra Fl. Cub. XI* p. 288.

Scirpus capillaceus Griseb. *Pl. Cub.* (1866) p. 239.

Chaetocyperus capillaceus Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars 1* (1842) p. 93.

Heleocharis capillacea Boeck. in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 434.

Hab. in Cuba: C. Wright.

Distrib. in America, a Carolina usque ad Paraguay.

76. *Eleocharis atropurpurea* Kunth, annua, culmis 5—15 cm. longis, tenuibus, striatis; vagina apice herbacea, nec scariosa detergibili; spicula 3—8 mm. longa, ovoidea, aut cylindrica, atropurpurea; glumis polyspiris, late ellipticis, obtusis, caducis, ima paullo majore, magis viridi, vacua; setis 7—5 (vel paucioribus vel nullis), retrorsim scabris, albis (raro pallide cinnamomeis); stylo 2-fido; nuce cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, plano-convexa, atro-castanea; stylobasi minima, bulboso-conica.

Eleocharis atropurpurea Kunth! *Enum. II* (1837) p. 151; *J. Gay! in Flora XXV* (1842) p. 641; *C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI* p. 627.

Eleocharis Lereschii Shuttlew. in *Flora XX* (1837) p. 241.

Eleocharis capitata var. β . Torrey in *Ann. Lyceum New York III* (1836) p. 305.

Scirpus atropurpureus Retz. *Obs. V* (1789) p. 14.

Scirpus ocreatus Griseb. *Pl. Cub.* (1866) p. 239.

Isolepis atropurpurea Roem. et Sch. *Syst. II* (1817) p. 106; *Kunth Enum. II* p. 190.

Isolepis allochroa et *I. dichroa* Steud. *Cyp.* (1855) p. 91.

Eleocharis atropurpurea Nces in *Wight Contrib.* (1834) p. 113.
Heleocharis atropurpurea Koch *Syn. Fl. Germ. ed. II* (1844) p. 853;
 Boeck.! in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 458 (var. γ . *exclusa*).

Heleocharis Sintenisii Boeck.! *Cyp. Novae. Heft I* (1888) p. 16.

Heleocharis bahamensis Boeck.! *Cyp. Novae. Heft II* (1890) p. 11.

Hab. in Baham. ins. Hog Island: Eggers n. 4101, 4101^a, Andros: Northrop n. 745; Cuba: C. Wright n. 3371; Portorico in fossis ad Palo seco prope Bayamon: Sintenis n. 1220.

Distrib. per orbem veterem calidiorum frequens; in orbe novo rarior.

77. ***Eleocharis capitata*** R. Br. annua, culmis 5—30 cm. longis, tenuioribus, striatis; vagina summa apice integra, nec scariosa detegibili; spicula 3—12 mm. longa, ellipsoidea, obtusa, densa, pallida; glumis ellipticis, obtusis, fusce stramineis in carina viridescens, ima (vel 2—3 imis) vacua, majore, bracteiformi; setis 7, vel paucioribus, cum nuce subaequilongis, retrorsim scabris, bruneis aut ferrugineis; stylo 2-fido; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, planoconvexa, atra, apice subito angustata; stylobasi parva, depresso-conica, pallida.

Eleocharis capitata R. Br.! *Prod.* (1810) p. 225; *Kunth Enum. II* p. 150, syn. quibusdam excl.; *Sagra Fl. Cub. XI* p. 289; C. B. Clarke in *Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI* p. 627.

Eleocharis setacea R. Br.! *Prod.* (1810) p. 225, neque homonyma p. 224; *Kunth Enum. II* p. 156.

Scirpus capitatus Linn.! *hb. propr. partim*; Swartz *Obs. Bot.* p. 31; G. F. W. Meyer *Esscq.* p. 43; Griseb.! *Flor.* p. 570 partim, et *Pl. Cub.* p. 229; *Saur. Cub. n.* 2613 p. 174.

Scirpus caribaeus Rottb. *Deser. et Ic.* p. 46 (1773) t. 15 fig. 3.

Eleocharis capitatus Nces! in *Wight Contrib.* (1834) p. 112; Liebm.! *Mexic. Halagr.* p. 57.

Heleocharis capitata Boeck.! in *Vidensk. Meddel. Kjob.* (1868—69) p. 159.

Sloane Jamaica I p. 122 t. 75 fig. 2.

Hab. in ins. Bermuda: fide Hemsley; in ins. Bahama: Dale, Eggers n. 3862, 4093, 4148, Northrop n. 247, 327; Cuba: Rugel n. 904, Sagra n. 503, 911, C. Wright n. 712; Jamaica: Hart n. 805, Swartz, Wilson n. 495; Hispaniola: Eggers n. 2470, Picarda n. 1086; Portorico: Blauner n. 66, Krug n. 1240, Sintenis n. 1219, 1221, 1968, 2344, 2530, 3041, 3145, 5617, Stahl n. 299; St. Thomas: Eggers n. 93; Antigua: Wulfschlaegel n. 704; Guadeloupe: Duss n. 3126, 3910, l'Herminier; Martinique: Duss n. 752, Husnot n. 21, Plée n. 18, 411; ins. Caribaeis: Coll. ign. n. 128; Barbados: Eggers n. 7107; Tobago:

Eggers n. 5891; Trinidad: Crueger n. 45, Fendler n. 904, Lockhart n. 307.

Distrib. in tropicis et subtropicis fere totius orbis terrarum.

78. Eleocharis nodulosa Schultes, rhizomate horizontali, robusto; culmis approximatis, 2—5 dm. longis, 1—2 mm. latis, spongiosis, subteretibus, in sicco saepe transversim pseudoseptatis; vagina summa apice firma, truncata, in altero latere dente minuto ornata; spicula 10—25 mm. longa, cylindrica, densissima, purpurascente vel fusca; glumis ovato-oblongis, ima (vel 2 imis) brevi, magis viridi, vacua, latiore saepe culmum omnino amplexante; setis 6—4, cum nuce subaequilongis, rigidis, retrorsim scabris, ferrugineis; staminibus 3; stylo 2-fido; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, plano-convexa, ovoidea, apice paullo angustata, olivaceo-brunea; stylobasi parva, compresso-pyramidali, fusco-nigra.

Eleocharis nodulosa Schultes in Roem. et Sch. Syst. II Mant. (1824) p. 87; Kunth Enum. II p. 156.

Eleocharis consanguinea Kunth! Enum. II (1837) p. 148.

Eleocharis subnodulosa Steud.! Cyp. (1855) p. 81.

Eleocharis geniculata Roem. et Sch. Syst. II Mant. (1824) p. 538; non R. Br.

Scirpus nodulosus Roth Nov. Pl. Sp. (1821) p. 29; Griseb.! Pl. Cub. p. 239 et Flor. p. 570; Saur. Cub. n. 2624 p. 175.

Eleocharis nodulosus Nees! in Mart. Fl. Bras. II pars I (1842) p. 104; Liebm.! Mexic. Itagr. p. 57.

Heleocharis nodulosa Boeck.! in Flora XLIII (1860) p. 4 et in Linnaea XXVI (1869—70) p. 468.

Isolepis heteromorpha Steud.! Cyp. (1855) p. 100.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 1957, 3374; Hispaniola in pinetis prope Jarabacoa 600 m. alt. et in paludosis Savannah de Cupey 360 m.: Eggers n. 2117, 2710; Portorico prope Guanica ad lagunam circa La Plata frequentissima: Sintenis n. 3833; Antigua: Wulfschlaegel n. 703.

Distrib. in America tropica et temperata calidiore sat vulgaris.

79. Eleocharis acicularis R. Br. rhizomate filiformi; culmis 5—15 cm. longis, capillaribus; spicula 3—6 mm. longa, 4—6-flora aut multiflora, castaneo-rubra vel pallidiore fusca; glumis ovato-oblongis, obtusis, ima vacua aut non raro nucigera; setis 3—4 vel 0; stylo 3-fido; nuce cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, oblongo-lanceolata, longitudinaliter 12—15-striata, et inter strias horizontaliter trabeculata; stylobasi parva bulbosa.

Eleocharis acicularis R. Br. *Prod.* (1810) p. 224 in nota; Kunth *Enum.* II p. 141; C. B. Clarke in *Journ. Bot. Lond.* XXV (1887) p. 270 et in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VI p. 628.

Eleocharis trichoides Kunth! *Enum.* II (1837) p. 141.

Scirpus acicularis Linn. *Sp. Pl. ed.* II p. 71 partim, nec Linn. *herb. propr.*

Heleocharis acicularis Koch *Syn. Fl. Germ. ed.* II (1844) p. 853; Boeck. in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 431; Hemsl.! *Biol. Centr. Amer. Bot.* III p. 454.

Scirpidium aciculare Nees in *Linnaea* IX (1834) p. 293.

Hab. in Hispaniola in paludosis ad flumen Bahuati 600 m. alt. et in Valle nuevo ad ripas 2270 m. alt.: Eggers n. 2051, 2245.

Distrib. in orbe utroque terrarum, in tropicis et temperatis calidioribus vulgaris.

80. **Eleocharis Chaetaria** Roem. et Sch. rhizomate filiformi albo aut nullo; culmis 2—20 cm. longis, modo setaceis modo rigidioribus; spicula 3—4 mm. longa, ovoidea, 1—4-nucigera, basi 2—3-spira, pallida, interdum purpureo-variegata; glumis navicularibus, vix acutis, ima vacua proventu decidua; setis 6, cum nuce aequilongis, retrorsim scabris, pallidis, vel minoribus vel obsoletis; stylo 3-fido; nuce ob-ovoidea, triquetra, apice truncata, alba, grosse cancellata vix costata; stylobasi pyramidalis, nigro-fusca.

Eleocharis Chaetaria Roem. et Sch. *Syst.* II (1817) p. 154; Kunth *Enum.* II p. 140; C. B. Clarke in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VI p. 629.

Eleocharis depauperata Kunth! *Enum.* II (1837) p. 140.

Eleocharis polymorpha Nees in *Linnaea* IX (1834) p. 294; Kunth *Enum.* II p. 157.

Cyperus depauperatus Vahl *Eclog. fasc.* III (1807) p. 2.

Scirpus retroflexus Poir.! in *Lam. Encycl.* VI (1804) p. 753; Griseb.! *Flor.* p. 569.

Scirpus exiguus var. *prolifera* Griseb. ms. fide C. Wright in *Suav. Cub.* (1871) p. 174.

Chaetocyperus polymorphus a *depauperatus* Nees in *Mart. Fl. Bras.* II pars I (1843) p. 94.

Chaetocyperus depauperatus Steud. *Cyp.* (1855) p. 73.

Heleocharis Chaetaria Boeck.! in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 428.

Heleocharis triflora Boeck.! in *Flora* LXIII (1880) p. 437; Hemsl. *Biol. Centr. Amer. Bot.* III p. 457.

Hab. in Antillis: Sieber *Agrost.* n. 24; Cuba: C. Wright n. 3764; Jamaica: Wilson n. 304; Hispaniola: Eggers n. 1509, Swartz n. 804;

Portorico: Blauner n. 249, 250, hb. Desfontaines, Eggers n. 979, 1331, Sintenis n. 115, 1209, 1403; St. Thomas: Riedlé; Guadeloupe: Duss n. 3739, l'Herminier n. 2, 33, Husnot n. 17; Dominica: Eggers n. 42; Martinique: Belanger n. 400, Duss n. 224, 467, 468, 470^a, Hahn n. 1261; Grenada: Broadway n. 1128, Eggers n. 6105 (alt. 500 metr.), 6025^b, 6395, 6395^b; Trinidad: Alexander n. 5689, Crueger n. 48, Fendler n. 905.

Distrib. in tropicis et temperatis calidioribus utriusque orbis frequens.

81. **Eleocharis oligantha** C. B. Clarke, parvula, annua, culmis 1—5 cm. longis, capillaribus, intricatis; vagina summa apice paullo inflata, scariosa; spicula 1—2 mm. longa, 2—4-flora, atosanguinea; glumis oligospiris, ovatis, obtusis, ima multo minore vacua pallida; setis 3—5, cum $\frac{1}{3}$ parte nucis vix aequilongis, albidis, tenerrimis, levibus; stylo 3-fido; nuce obovoidea, apice paullo angustata, trigona, pallide olivacea, levi; stylobasi depresso-conica, nigrescente.

Eleocharis Wrightii C. B. Clarke ms. olim (*non Heleocharis Wrightiana* Boeck.).

Scirpus retroflexus Griseb.! Pl. Cub. (1866) p. 239; Sauv. Cub. n. 2617 p. 174; non Poir.

Heleocharis nana (forma capillaris) Boeck.! ms.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3367, 3368.

82. **Eleocharis camptotricha** C. B. Clarke, rhizomate (viso) nullo; culmis caespitosis, 8—12 cm. longis, capillaribus, a punctis nigris maculatis; vagina summa apice in altero latere lanceolato-producta, non detergibili; spicula longa 3 mm., ellipsoidea, 2—6-flora, pallida; glumis ovatis, obtusis; setis 6—5, nucem superantibus; stylo 3-fido; nuce obovoidea, apice angustata, trigona, levi, pallida; stylobasi pyramidalis, nucem superante.

Scirpus camptotrichus C. Wright! in Sauv. Cub. (1871) n. 2610 p. 173.

Heleocharis camptotricha Boeck.! ms.

Hab. in Cuba: C. Wright (Pinar del Rio).

Var. β . **Schweinitzii** C. B. Clarke, stylobasi bulbiformi; spiculis basi interdum proliferis; nuce proventu luteo-brunea.

Eleocharis prolifera Torrey! in Ann. Lyceum New York III (1836) p. 316, nec p. 442.

Heleocharis tenuissima Boeck.! in Linnaea XXXVI (1869—70) p. 420 partim.

Hab. in ins. Bahama: Northrop n. 524^b; Guadeloupe: Bertero.

Distrib. Carolina, Georgia, Florida, Louisiana.

83. **Eleocharis punctata** C. B. Clarke (non Steud.), rhizomate nullo; culmis caespitosis, 3—5 cm. longis, capillaribus, a punctis minutis saepe

inspersis; vagina summa apice in altero latere lanceolato-producta, non detergibili; spicula 3—5 mm. longa, 3—10-flora, fusce straminea; glumis 3—pleio-spiris, ovatis vix acutis; setis 5—6, nucem superantibus, retrorsim scabris, ferrugineo-bruneis; stylo 3-fido; nuce obovoidea, apice angustata, trigona, levi, albida; stylobasi pyramidalis, brunescente.

Chaetocyperus polymorpha var. *sphagnicola* et *praticola* Nees! in Mart. Fl. Bras. II pars 1 (1843) p. 94 (syn. plurimis excl.).

Heleocharis punctata Boeck.! in Vidensk. Meddel. Kjob. (1869—70) p. 420 (non *Chaetocyperus punctatus* Nees).

Scirpus retroflexus Griseb.! Kar. (1857) p. 120; non Poir.

Hab. in Guadeloupe: Duchassaing.

Distrib. in America australi aequinoctiali.

84. **Eleocharis Wrightiana** C. B. Clarke, rhizomate nullo; culmis 5—10 cm. longis, fere capillaribus; vagina summa apice subinflata, scariosa, in 2 labia oblonga fissa; spicula 5—9 mm. longa, anguste ellipsoidea, 12—18-flora, brunea; glumis inferioribus 3—4-spiris, ovatis, obtusis, ima vacua decidua; setis 5, inaequalibus, cum nuce vix aequilongis, retrorsim scabris, pallide ferrugineis, interdum multum depauperatis; stylo 3-fido; nuce obovoidea, apice multum angustata, levi tenuiter reticulata, straminea proventu brunescente; stylobasi anguste conica, nigrescente.

Scirpus exiguus Griseb.! Flor. (1864) p. 569, Pl. Cub. p. 239.

Scirpus setaceus C. Wright! in Sauv. Cub. (1871) n. 2614 p. 174.

Heleocharis Wrightiana Boeck.! Cyp. Norae. Heft I (1888) p. 12.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3369; Trinidad: Crueger.

Distrib. Guiana, ad Amazonas inferiorem.

85. **Eleocharis minima** Kunth, rhizomate tenuissimo, repente; culmis caespitosis 1—15 cm. longis, capillaribus; vagina summa stricta, castanea; spicula 2—4 mm. longa, 8—10-flora; glumis imis subdistichis, vix acutis, atosanguineis vel bruneis: setis imperfectis, $\frac{1}{2}$ parte nucis brevioribus, levibus vel vix scabris albis, interdum in annulum basalem reductis; stylo 3-fido; nuce obovoidea apice truncata, levi, alba in angulis 3 costata; stylobasi depresso-globosa, nigrescente.

Eleocharis minima Kunth! Enum. II (1837) p. 139.

Chaetocyperus polymorphus α depauperata minima et γ capillacea Nees! in Mart. Bras. II pars 1 (1843) p. 94 partim (syn. multis excl.).

Chaetocyperus urceolatus Liebm.! Mexic. Halvgr. (1851) p. 55.

Heleocharis nana Boeck.! in Linnæu XXXVI (1869—70) p. 421 pro magna parte et in Engl. Jahrb. I (1881) p. 363; non Kunth.

Heleocharis minutiflora Boeck.! in Engl. Jahrb. VIII (1886) p. 274.

Heleocharis cubensis Boeck.! Cyp. Norue. Heft II (1890) p. 10.

Scirpus microlepis Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 239; *Sauv. Cub.* n. 2615 p. 174.

Scirpus acicularis C. Wright! in *Sauv. Cub.* (1871) n. 2618 p. 174.

Hab. in Cuba: Morales (Habana), C. Wright n. 3370, 3765; Jamaica: Purdie; St. Thomas ad Crumbay: Eggers n. 546, 767.

Distrib. a Florida et Mexico usque ad Rio de Janeiro sparsa.

86. **Eleocharis subtilis** C. B. Clarke, rhizomate (viso) nullo; culmis caespitosis, 5—20 cm. longis, capillaribus, 6—8-angulatis, a maculis minutis nigris saepe inspersis; vagina summa stricta; spicula 5—8 mm. longa, ellipsoideo-oblonga, 6—15-flora, fusce purpurascente; glumis (imo inferioribus) polyspiris, obtusis, ima vacua decidua; setis 5, cum $\frac{2}{3}$ parte nucis aequilongis, retrorsim scabris, albis; stylo 3-fido; nuce ellipsoidea, apice latiuscula truncata, levi, fusce straminea, triquetra; stylobasi cum nucis apice aequilata, bulbosa.

Chaetocyperus polymorphus var. γ *nutans* Nees! in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 95.

Isolepis ambigua Steud.! *Cyp.* (1855) p. 91.

Scirpus exiguus Griseb.! *Flor.* (1864) p. 569 *partim*.

Heleocharis subtilis Boeck.! in *Linn. XXXVI* (1869—70) p. 126.

Heleocharis leuocarpa Boeck.! in *Vidensk. Meddel. Kjob.* (1869) p. 132 et in *Linnæa XXXVIII* (1874) p. 372.

Heleocharis acicularis Boeck.! in *Vidensk. Meddel. Kjob.* (1869—70) p. 133, *syn. exclusis*.

Hab. in Trinidad: Crueger.

Distrib. in Brasilia, Bolivia.

87. **Eleocharis microcarpa** Torrey, rhizomate nullo; culmis 1—3 dm. longis, tenuibus, quadrangularibus; vagina summa apice herbacea in altero latere lanceolato-producta; spicula 4—8 mm. longa, oblonga, 10—20-flora, non raro prolifera; glumis pleiospiris, obtusis, in dorso viridibus, in margine late albo-scariosis; setis 3—5, cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ parte nucis aequilongis, retrorsim scabris, albis, interdum nullis; stylo 3-fido; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae vix aequilonga, obovoidea, trigona, apice paullo angustata, levi obscure reticulata, straminea aut brunescens; stylobasi pyramidalis, quam nucis apex latiore.

Eleocharis microcarpa Torrey in *Ann. Lyceum New York III* (1836) p. 312.

Heleocharis microcarpa Boeck. in *Linnæa XXXVI* (1869—70) p. 439.

Heleocharis paracicularis Boeck.! in *Engl. Jahrb. VII* (1888) p. 275 in nota.

Scirpus paracicularis C. Wright! *ms.*

Chaetocyperus Jamesoni Steud.! *Cyp.* (1855) p. 174.

Hab. in Cuba: C. Wright.

Distrib. in Africa (Djur); in America a New Jersey et Mexico usque ad Guayaquil et Pernambuco.

88. ***Eleocharis sulcata*** Nees, rhizomate brevi, interdum 4 cm. longo, lignescente; culmis fasciculatis, 1—3 dm. longis, gracilibus; vagina summa stricta, apice in altero latere ovato-producta; spicula 4—7 cm. longa, ellipsoidea, multiflora, fusca aut purpurascens; glumis ovatis, obtusis, ima (vel 2 imis) latiore, vacua, persistente; setis (6, 5, 3) cum $\frac{2}{3}$ parte nucis aequilongis (vel 0), retrorsim scabris, pallidis; stylo 3-fido; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, apice paullo angustata, levi, alba aut straminea; stylobasi bulbiformi, quam nucis apex latiore.

Eleocharis sulcata Nees! in *Linnaea* IX (1834) p. 294; Kunth! *Enum.* II p. 157.

Scirpus sulcatus Roth Nov. Pl. Sp. (1821) p. 30.

Fimbristylis sulcata Roem. et Sch. Syst. II Mant. (1824) p. 52; Kunth *Enum.* II p. 214.

Limnochloa calyptrata Liebm.! Mexic. Halvgr. (1851) p. 56.

Heliocharis sulcata Boeck.! in *Vidensk. Meddel. Kjob.* (1868—69) p. 133, et in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 415 partim.

Heliocharis Rothiana Boeck.! in *Flora* XLIII (1860) p. 3 et in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 444.

Hab. in Trinidad: Crueger n. 2076.

Distrib. America, a Mexico usque ad Buenos Aires, vulgaris.

89. ***Eleocharis pachystyla*** C. B. Clarke, rhizomate usque ad 8 cm. longo, a squamis ovatis castaneo-rubris dense inteecto; culmis approximatis, 4—6 dm. longis, tenuioribus; vagina summa stricta, apice herbacea, in altero latere ovato-oblonga; spicula 6 mm. longa, obovoidea, densa, fusca; glumis elongato-ellipticis, obtusis, ima majore culmum fere amplectente viridi persistente; setis 6, nucem superantibus, retrorsim scabris, ferrugineis; stylo 3-fido; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae vix aequilonga obovoidea, apice parum angustata, acutius trigona, fusca; stylobasi conica longiuscula.

Eleocharis capitata Miq.! in *Linnaea* XVIII (1844) p. 736 (neque XIX (1847) p. 225).

Scirpus pachystylus C. Wright! in *Sauv. Cub.* (1871) n. 2620 p. 174.

Scirpus melinocarpus Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 239.

Scirpus capitatus Griseb.! *Flor.* (1864) p. 570 partim.

Heliocharis sulcata Boeck.! in *Linnaea* XXXVI (1869—70) p. 445 partim.

Heleocharis Schenckii Boeck.! *Cyp. Norw. Heft II* (1890) p. 13.

Heleocharis grandis Boeck.! *ms. in C. Wright n. 3373.*

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3373; Trinidad: Crueger n. 1806.

Distrib. Venezuela, Guiana, Pernambuco.

90. **Eleocharis melanocarpa** Torrey, rhizomate brevissimo; culmis caespitosis, 2—4 dm. longis, gracilibus; vagina summa truncata, in altero latere a dente parvo ornata; spicula 6—12 mm. longa, ellipsoidea, densa; glumis obtusis, bruneis in dorso luteis, ima vacua bractei-formi; setis 5—4, cum $\frac{1}{3}$ parte nucis vix aequilongis; stylo 3-fido; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, obpyramidali, apice truncata non angustata, levi, castanea; stylobasi cum nuce aequilata, depressa, alba.

Eleocharis melanocarpa Torrey in *Ann. Lyceum New York III* (1836) p. 311 (nec p. 441), et *Fl. New York II* p. 520.

Heleocharis melanocarpa Boeck.! in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 445.

Scirpus melanocarpus Baldwin *ms. fide Torrey, non Griseb.*

Hab. in ins. Bermuda: fide Hemsley.

Distrib. a Massachusetts usque ad Florida, Georgia.

91. **Eleocharis albida** Torrey, rhizomate tenuissimo, pallido; culmis 5—25 cm. longis, gracilibus; vagina summa stricta, apice in altero latere lanceolato-producta; spicula 5—12 mm. longa, cylindrica, multiflora, straminea; glumis ovatis, obtusis, ima multo latiore culmum amplexante persistente; setis 6, nucem superantibus, retrorsim scabris, rubro-bruneis; stylo 3-fido; nuce trigona, obovoidea apice multum angustata, levi, brunea (luteo-castaneo-vel olivaceo-tincta); stylobasi parva, bulbiformi, pallida.

Eleocharis albida Torrey in *Ann. Lyceum New York III* (1836) p. 304.

Eleocharis simplex Kunth *Enum. II* (1837) p. 143, non Dietr.

Isolepis aphylla Boeck.! in *Flora XLI* (1858) p. 417.

Heleocharis albida Boeck.! in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 442, *syn. E. Engelmanni* excl.

Hab. in ins. Bermuda: Moseley; Jamaica: Mac Nab.

Distrib. in America septentrionali et Mexico.

92. **Eleocharis montana** Roem. et Sch. rhizomate robustiore; culmis 1—3 dm. longis, gracilibus; vagina summa apice truncata marginata, dente lineari in altero latere sub margine saepissime exstante; spicula 5—11 mm. longa, 12—40-flora; glumis ovatis, vix acutis; setis 6—5, nucem saepe superantibus, retrorsim scabris, cinnamomeis; stylo 3-fido; nuce obovoidea, apice multum angustata, levi minute granulata, aurea; stylobasi parva conica.

Eleocharis montana Roem. et Sch. Syst. II (1817) p. 153; Kunth Enum. II p. 149.

Eleocharis ochreata Boeck. in Flora XLII (1859) p. 68.

Scirpus montanus H. B. K. Nov. Gen. et Sp. I (1815) p. 226.

Helcocharis montana Boeck. in Linnaea XXXVI (1869—70) p. 450.

Helcocharis arenicola Hemsl.! Biol. Centr. Amer. Bot. III (1885) p. 454.

Helcocharis Vulcani Boeck.! in Engl. Jahrb. VIII (1887) p. 206.

Limnochloa truncata Liebm. Mexic. Halvgr. (1851) p. 56.

Hab. in Guadeloupe: Bertero.

Distrib. in fere omni America calidiore vulgaris, sed in Guiana et Brasilia nondum lecta.

93. **Eleocharis rostellata** Torrey, rhizomate brevi, lignescente; culmis 3—7 dm. longis, tenuioribus, rigidis; vagina summa stricta, in altero latere triangulari-producta; spicula 1—2 cm. longa, ellipsoideo-lanceolata, multiflora, fusce brunea; glumis ovatis, obtusis, fuscis in dorso luteis, ima latiore culmum amplectente persistente; setis 7 aut 5, cum nuce subaequilongis, retrorsim scabris, ferrugineis; stylo 3-fido; nuce cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, apice angustata, inaequaliter trigona, levi, lutescente aut olivacea; stylobasi longe conica, cum apice nucis concreta.

Eleocharis rostellata Torrey! Fl. New York II (1843) p. 347 et Phanerog. Wilkes Exped. (1874) p. 474.

Scirpus rostellatus Torrey in Ann. Lyceum New York III (1836) p. 318; Griseb.! Pl. Cub. p. 239; Saur.! Cub. n. 2621 p. 175.

Helcocharis rostellata Boeck.! in Linnaea XXXVI (1869—70) p. 442.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3769.

Distrib. in America septentrionali temperata sat frequens; in Mexico.

94. **Eleocharis geniculata** R. Br. rhizomate robustiore; culmis 3—8 dm. longis, 3—8 mm. in diam., sub spicula constrictis, in sicco transversim pseudo-septatis; vagina summa stricta, truncata; spicula 1—3 cm. longa, densissima, pallide brunea, culmo multo crassiore (usque ad 5—9 mm. lata); glumis ovatis, vix acutis, 3 imis rotundatis, multo brevioribus, viridibus, bracteiformibus; setis 7—8, nucem saepe superantibus, retrorsim scabris, ferrugineo-rubris; stylo (in spiculae floribus inferioribus) 3-fido; nuce parvula, cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, anguste ellipsoidea apice angustata, inaequaliter trigona, leviuscula aut granulata, luteo-brunea; stylobasi conica, elongata, fusco-nigra.

Eleocharis geniculata R. Br. Prod. (1810) p. 224 in nota; Kunth Enum. II p. 152.

Eleocharis constricta Schultes in Roem. et Sch. Syst. II Mant. (1824) p. 87; Kunth Enum. II p. 153; Hitchc. Pl. Bahamas (1893) p. 140.

Eleocharis crassicaulis et *E. singularis* Steud.! Cyp. (1855) p. 81.

Scirpus geniculatus Linn. Sp. Pl. ed. II p. 71 partim; Swartz Obs. Bot. p. 31; G. F. W. Meyer Esseq. p. 42; Griseb. Kar. p. 121?.

Scirpus constrictus Griseb.! Kar. (1857) p. 122, Flor. p. 570 et Pl. Cub. p. 240; Saur. Cub. n. 2625 p. 175.

Limnochloa geniculata, *L. crassicaulis*, *L. constricta* Nees in Mart. Fl. Bras. II pars I (1843) p. 99 cum nota.

Heleocharis geniculata Boeck.! in Vidensk. Meddel. Kjob. (1868—69) p. 135 et in Linnaea XXXVI (1869—70) p. 496.

Heleocharis valida Boeck.! in Vidensk. Meddel. Kjob. (1881) p. 159.

Heleocharis viridis Boeck.! Cyp. Norac. Heft I (1888) p. 17.

Sloane Jamaica I p. 121 t. 81 fig. 3.

Hab. in Cuba: Rugel n. 901, C. Wright n. 709; Jamaica: Hansen n. 7, 8, Harris n. 5657, 6723, Hart n. 675, Jenman n. 61, Wilson n. 229; Hispaniola: Coll. ign.; Portorico: Blauner n. 117, Sintenis n. 2915, 5355; Dominica: Imray n. 394; Martinique: Hahn n. 576.

Distrib. a Mexico usque ad Uruguay, vulgaris.

Obs. Species in pluribus herbariis ob magnitudinem inter *Limnochloas* confusa, ut a NEES ipso; sed spiculae (culmo latoris) structura a *Limnochloa* longe distat.

VIII. Fimbristylis Vahl.

Glumae plurimae aut numerosae, undique imbricatae aut (in sect. *Abildgaardia*) inferiores subdistichae; 1—3 imae vacuae. Flores inferiores plures 2-sexuales, nuges maturantes. Setae hypogynae 0. Stamina 3—1, antica. Styli rami 3 aut 2, lineares; stylobasis a nuce vel constrictione vel linea separata, cum nuce decidua. Nux trigona aut plano-convexa, fere sessilis, basi interdum multum angustata. — Stolones 0; rhizoma 0 vel brevissimum. Culmus nudus i. e. nodi folia prope ad culmi basin sita. Inflorescentia umbellata, explanata vel contracta vel ad 1 caput, imo ad 1 spiculam, reducta. Spiculae solitariae aut fasciculatae.

Species 130, in tropicis et calidioribus totius orbis (praesertim veteris) late diffusae; quam in frigidioribus tam in montibus non visae.

Obs. *Iria* (gen. nov.) L. C. Rich. in Pers. Syn. v. 1 (1805) p. 65 "Spica simplex; squamis subdistichis imbricatis, summis congestis, infimis

aristatis. Stamen 1. Stigmata 2. Semen muticum." in una specie *Fimbr. monostachya* conditum huc pertinet. In hac specie autem stigmata tria. In diagnosi *Iria* (generis L. C. Rich.) species *Fimbristylidis* ne quidem unica includitur.

Clavis specierum Antillanarum.

Sect. 1. **Dichelostylis** Benth. Glumae non distichae. Culmi pluristachyi. Stylus 2-fidus.

* Spiculae solitariae (sed in *F. spathacca* Roth interdum subcapitatae).

† Stylobasis a longis trichomatibus pendulis ornata
95. *F. squarrosa* Vahl.

†† Stylobasis trichomatibus pendulis carens.

§ Nux conspicue longitudinaliter striata
96. *F. diphylla* Vahl.

§§ Nux levis, plus minus reticulata

Folia longa; spiculae durae, castaneae
98. *F. spadicca* Vahl.

Folia breviora; spiculae minus durae.

Glumae apice minute pilosae
97. *F. ferruginea* Vahl.

Glumae apice glabrae 99. *F. spathacca* Roth.

** Spiculae subcapitatae 100. *F. Vahliae* Link.

Sect. 2. **Trichelostylis** Benth. Glumae non distichae. Culmi pluristachyi. Stylus 3-fidus.

Spiculae solitariae (in *F. autumnali* rarius geminatae).

Culmus (ut tota planta) patule pilosus 101. *F. exilis* Roem. et Sch.

Culmus glaber.

Culmus apice 4—5-angularis; spiculae 2—4 mm. longae
102. *F. miliacca* Vahl.

Culmus apice complanatus; spiculae 1 cm. longae
103. *F. complanata* Link.

Culmus apice 4—5-angularis; spiculae 6 mm. longae
104. *F. autumnalis* Roem. et Sch.

Spiculae in spicas 3—5-nim fasciculatae
105. *F. obtusifolia* Kunth.

Sect. 3. **Abildgaardia**. Glumae inferiores mucigerae distichae aut subdistichae.

Culmi graciles; spiculae 12—15 mm. longae
106. *F. monostachya* Hassk.

Culmi setacei; spiculae 6 mm. longae 107. *F. Grisebachii* Greum.

95. **Fimbristylis squarrosa** Vahl, annua, culmis 5—20 cm. longis, tenuibus; foliis cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ parte culmi aequilongis, angustis; umbella composita; bracteis 3—4, cum umbella interdum aequilongis; spiculis solitariis, 6 mm. longis, 2 mm. latis, densifloris; glumis multispiris. ellipticis, nervis 3—5 in mucronem recurvatum confluentibus; stylo 2-fido, infra bifurcationem piloso; nucē cum $\frac{1}{3}$ parte glumae aequilonga, ob-ovoidea, biconvexa, fere levi, straminea; stylobasi a trichomatibus longis circum nucem pendentibus ornata.

Fimbristylis squarrosa Vahl Enum. II (1806) p. 289; Kunth! Enum. II p. 224; Boeck. in Linnæa XXXVII (1871) p. 10; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI p. 635.

Scirpus squarrosus Poir. Encyc. Suppl. V (1817) p. 100; non Linn.

Scirpus cornatus C. Wright! in Saur. Cub. (1871) n. 2637 p. 177.

Pogonostylis squarrosa Bertol. Fl. Ital. I (1833) p. 313.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3771.

Distrib. in calidioribus orbis veteris late sparsa; in Brasilia et Argentina.

96. ***Fimbristylis diphylla*** Vahl, culmis 2—60 cm. longis; foliis cum $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, angustis; umbella composita vel simplice; bracteis 3—4, brevibus aut umbellam superantibus; spiculis solitariis, 5—10 mm. longis, 3—4 mm. latis, ovoideo-oblongis, multifloris; glumis multispiris, ovatis breviter acutis, glabris; stylo 2-fido, infra bifurcationem pilosulo; nuce cum $\frac{1}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, biconvexa, in utraque facie longitudinaliter 5—11-costata, clathrata, alba aut straminea, in exemplis americanis levi.

Fimbristylis diphylla Vahl! Enum. II (1806) p. 289; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI p. 636.

Fimbristylis laxa Vahl Enum. II (1806) p. 292; Kunth Enum. II p. 232; Sagra Fl. Cuba XI p. 291.

Fimbristylis villosa Roem. et Sch. Syst. II (1817) p. 98.

Fimbristylis brizoides Nees! in Linnæa IX (1834) p. 290; Griseb. Flor. p. 572; Liebm.! Mexic. Halagr. p. 50.

Fimbristylis obtusifolia Nees in Linnæa IX (1834) p. 290; Sieber! ms., non Kunth.

Fimbristylis communis Kunth Enum. II (1837) p. 234, syn. quibusdam excl.

Fimbristylis pentastachya Boeck.! in Flora XL (1857) p. 36 et in Linnæa XXXVII (1871) p. 17.

Fimbristylis polymorpha Boeck.! in Vidensk. Meddel. Kjob. (1869) p. 141, 158 et in Linnæa XXXVII (1871) p. 14, syn. paucis excl.

Fimbristylis Eggersii Boeck.! Cyp. Novae. Heft II (1890) p. 17.

Scirpus diphyllus Retz. Obs. V (1789) p. 15.

Scirpus dichotomus Linn. Sp. Pl. ed. I p. 50 quoad exemplum Zeylunicum citatum, fide Trimen.

Scirpus annuus All. Fl. Pedemont. II (1785) p. 271 et III p. 12 t. 88 fig. 5; Griseb. Kar. p. 122.

Scirpus serrulatus et *S. hirtellus* Vahl! Eclog. III (1807) p. 1.

Scirpus brizoides Muehl. Descr. uber. (1817) p. 36 in citat.; Griseb.! Flor. p. 572 et Pl. Cub. p. 240; Smith ms.

Scirpus Candelabrum Link *Jahrb. III* (1820) p. 80; *Saur. Cub. n. 2640* p. 177; *Willd.! ms.*

Hab. in ins. Bahama Fortune Island: Eggers n. 3997; in Cuba: Combs n. 417, 430 (S. Clara), Eggers n. 5144, Poeppig, C. Wright n. 714; Jamaica: Hart n. 859, Purdie, Swartz, Woollett n. 3005; Hispaniola: Eggers n. 2236, Nectoux, Picarda n. 1369, 1440, 1522; Portorico: Blauner n. 107, 251, 252, Krug n. 1319, Sintenis n. 96, 1410, 1940, 2200, 2446, 2505, 2610, 5237, 5301^b, Stahl n. 301, Wydler n. 370; St. Thomas: Eggers n. 189, Ehrenberg n. 72; St. Jan: Eggers n. 3245; Antigua: Wullschlaegel; ins. Thérèse: Gibollet n. 11; Guadeloupe: Duchassaing n. 8, Duss n. 3283, 3594, l'Herminier n. 50; Dominica: Nicholls n. 148, 158, 174; Martinique: Belanger n. 402, Duss n. 698, 759, Hahn n. 364, 792, Husnot n. 25; St. Lucia: Plée; St. Vincent: Eggers n. 6581, Guilding n. 29; Becquia: Smith n. B 339; Barbados: Eggers n. 7099, 7189, 7198; Grenada: Broadway n. 968, Eggers n. 6023, 6025, 6311; Tobago: Eggers n. 5469, 5616, 5649, 5867; Trinidad: Fendler n. 858, Hart n. 2071, 2073, 2160, 2179, 3273, O. Kuntze n. 954, Sieber n. 5; ins. Caribaeis: Sieber n. 113, 117.

Distrib. in calidis et temperatis, per orbem terrarum, communis et ubique.

97. **Fimbristylis ferruginea** Vahl, culmis 2—7 dm. longis, basi paullo incrassatis, in rhizomate brevissimo stipatis; foliis breviusculis aut vix ullis, fere glabris aut pilosis; umbella saepius 5—10- (raro 20-) stachya; bracteis umbella (saepius multo) brevioribus; spiculis ovoideo-oblongis, multifloris, longis 1 cm., latis 4 mm.; glumis multispiris, ovatis vix acutis, ferrugineis aut fuscis, in parte superiore minute pilosis; stylo 2-fido, infra bifurcationem villosa; nuce cum $\frac{2}{5}$ — $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, biconvexa, levi, brunescente.

Fimbristylis ferruginea Vahl *Enum. II* (1806) p. 291; *Kunth! Enum. II* p. 236; *Bocck.! in Peters Mossamb. p. 544 et in Linnaea XXXVII* p. 16; C. B. Clarke in *Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI* p. 638.

Fimbristylis stans Spreng. *Pugill. I* (1813) p. 6; *Kunth Enum. II* p. 245; *Sagra Fl. Cuba XI* p. 292.

Fimbristylis sublateralis Steud.! *Cyp. (1855)* p. 114; *Hemsl. Biol. Centr. Amer. Bot. III* p. 460.

Scirpus ferrugineus Linn. *Sp. Pl. ed. II* p. 74; *Griseb.! Kar. p. 123, Flor. p. 572 et Pl. Cub. p. 240; Saur. Cub. n. 2642* p. 177.

Scirpus stans Ham. *Prod. Fl. Ind. Occid. (1825)* p. 14; *Kunth Enum. II* p. 175; *Desvieux ms. ex Ham.*

Sloane Jamaica I p. 118 t. 77 fig. 2.

Hab. in ins. Bahama: Eggers n. 4357 (New Providence); Cuba: C. Wright n. 715, 3379; Jamaica: Hart n. 802, Mc Nab, Purdie; Hispaniola: Bertero, Jacquemont, Picarda n. 1109, 1459, Poiteau n. 40;

Portorico: Krug n. 1244, O. Kuntze n. 558, Sintenis n. 905, 1234, 3318, 3347, Stahl n. 302, 303; St. Thomas: Eggers n. 94, Hornbeck n. 328; Antillae: Eggers n. 176; Antigua: Wullschlaegel n. 693; Guadeloupe: Duchassaing n. 14, Duss n. 3133, Read; Martinique: Duss n. 232, 704, 756, Hahn n. 699, Husnot n. 27; St. Vincent: Smith n. 41; Mustique: Smith n. M 52; Barbados: Eggers n. 7163^b, 7188^b.

Distrib. in omni orbe vetere in tropicis et temperatis calidioribus; in America centrali et australi.

98. **Fimbristylis spadicea** Vahl, rigida, dura, culmis 2—7 dm. longis; foliis longis; umbella simplici vel composita, 4—16-stachya; bracteis 3—4, usque ad 3—5 cm. longis; spiculis 11 mm. longis, 4 mm. latis, densifloris, oblongis acutiusculis; glumis multispiris, ovatis vix acutis, duris, lucide castaneis in dorso luteis; stylo 2-fido, infra bifurcationem pilosulo; nuce cum $\frac{1}{3}$ parte glumae aequilonga, biconvexa, orbiculari, levi tenuiter reticulata, fuscescens.

Fimbristylis spadicea Vahl! Enum. II (1806) p. 294; Kunth Enum. II p. 237; Sagra Fl. Cuba XI p. 292; Boeck! in Linnaea XXXVII (1871) p. 19.

Fimbristylis cylindrica Vahl! Enum. II (1806) p. 293; Kunth Enum. II p. 238.

Fimbristylis speciosus Spreng. Pugill. I (1813) p. 5; Rhode ms.

Scirpus spadiceus Linn.! Sp. Pl. ed. II p. 74; Griseb.! Flor. p. 572, Pl. Cub. p. 240; Saur. Cub. n. 2641 p. 177.

Scirpus domingensis Pers. Syn. I (1805) p. 67; Kunth Enum. II p. 175.

Sloane Jamaica I p. 118 t. 76 fig. 2.

Hab. in ins. Bermuda: Warwick n. 14; Bahama: Northrop n. 596; Cuba: Torralbas n. 339^b, C. Wright n. 320, 3773; Jamaica: Hart n. 761, 2018, March n. 32, Purdie; Hispaniola: Picarda n. 1370, Poiteau; Portorico: Sintenis n. 2893, 3339, 3871, 4875, 4876; Martinique: Duss n. 697, 756, 757, Husnot n. 26; Barbuda: Nicholls; Grenada: Broadway n. 42, Eggers n. 6500; Trinidad: Fendler n. 856, 882, Hart n. 5740, O. Kuntze n. 766.

Distrib. America trop. et temp. calidiore.

99. **Fimbristylis spathacea** Roth, culmis 1—4 dm. longis, rigidis; foliis cum $\frac{1}{3}$ parte culmi aequilongis, glabris; umbella composita, saepius contracta, interdum fere congesta; bracteis brevibus; spiculis solitariis, 3—6 mm. longis, 2 mm. latis, cylindricis aut anguste ellipsoideis; glumis polyspiris ovatis, glabris, apice emarginatis, scarioso-marginatis; stylo 2-fido; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, biconvexa, obovoidea, levi granulata aut subtuberculosa, fusca.

Fimbristylis spathacea Roth Nor. Pl. Sp. (1821) p. 24; Kunth Enum. II p. 246; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI p. 640. *Fimbristylis Sintenisii* Bocck.! in Engl. Jahrb. VII (1886) p. 276. *Scirpus glomeratus* Retz Obs. IV (1786) p. 11. *Scirpus obtusifolius* Griseb.! Flor. (1864) p. 571.

Hab. in Portorico prope Mayagüez in litoralibus: Sintenis n. 96^b, 6866; Antigua: Wulschlaegel n. 707; Guadeloupe in Petit Canal in uliginosis: Duss n. 3912.

Distrib. in tropicis orbis fere totius terrarum sparsa.

100. **Fimbristylis VahlII** Link, annua, culmis 1—10 cm. longis, tenuibus, monocephalis; foliis setaceis, culmo saepe longioribus; spiculis 3—12, fere capitatis, 6—10 mm. longis 2 mm. latis, densifloris, viridibus proventu brunescentibus; bracteis pluribus, 1—4 cm. longis, setaceis; glumis multispiris, ovatis, mucronatis; stylo 2-fido; nuce cum $\frac{1}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, biconvexa, levi in utraque facie tenuiter 5—9-costata, stramineo-lutea.

Fimbristylis VahlII Link Hort. Berol. I (1827) p. 287; Kunth! Enum. II p. 224; Bocck.! in Linnæa XXXVII (1871) p. 8; Liebm.! Mexic. Halagr. p. 51.

Scirpus VahlII Lam. Ill. I (1791) p. 139.

Isolepis Vincentii Bocck. in Flora XLIII (1860) p. 34.

Hab. in Antigua: Liebmänn.

Distrib. a New Jersey usque ad Pará rarior; in Peru septentrionali.

101. **Fimbristylis exilis** Roem. et Sch. annua, culmo 1—4 dm. longo, patule piloso; foliis cum $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ parte culmi aequilongis, angustis, hispidis; umbella 3—14-stachya; bracteis 3—5, umbella longioribus aut brevioribus; spiculis 6—12 mm. longis, 10—20-floris, castaneo-pictis; glumis paucispiris, ovatis, mucronatis, pilosis; stylo longo, tenui, glabro, cum stylobasi parva pyramidalis deciduo, ramis 3 linearibus; nuce majuscula, pyriformi, acute triquetra, transversim rugosula, levi rarius paullo tuberculata, fuscescente.

Fimbristylis exilis Roem. et Sch. Syst. II (1817) p. 98; C. B. Clarke in Dyer Fl. Cap. VII p. 201.

Fimbristylis hispidula Kunth! Enum. II (1837) p. 227; Bocck. in Linnæa XXXVII (1871) p. 27.

Scirpus exilis Poir. Encyc. Suppl. V (1817) p. 105, Willd. ms. fide Kunth.

Scirpus chirigota C. Wright! in Saur. Cub. (1871) n. 2636 p. 176.

Cyperus hirtus Thunb. Phytogr. Blætt. 1 (1803) p. 6.

Isolepis exilis H. B. K. Nor. Gen. et Sp. I (1815) p. 224.

Hab. in ins. Bahama: Dale; Cuba: C. Wright n. 3770.

Distrib. per Africam (cum Madagascar) vulgatissima; in Venezuela, Guiana et Mexico(?) perrara.

Obs. Species inter omnes *Fimbristylidis* culmo foliis glumis hispidulis facile recognoscenda, quam ob rem cum speciebus (variis) *Bulbostylidis* saepissime confusa. Stylobasis pyramidalis concolor (pallida) cum stylo caduca cum *Fimbristylide* congruit; stylobasi parva disciformi discolorata in nuce relicta *Bulbostylis* distat. In *Fimbr. exili* nihilominus diversitas inter *Fimbristylidem* et *Bulbostylidem* sedem habet.

102. **Fimbristylis miliacea** Vahl, annua, glabra, culmo 2—6 dm. longo, apice 4—5-angulari; foliis saepe cum $\frac{1}{2}$ parte culmi aequilongis, vagina summa interdum aphylla, rarius culmo omnino aphylo; umbella 10—100-stachya, saepius composita; bracteis 1—4 cm. longis; spiculis solitariis, subglobosis, 2—4 mm. longis, obtusis, castaneis aut bruneis; glumis polyspiris, dense sitis, ovatis, subacutis; stylo 3-fido, sub trifurcatione villosa; nuce cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, trigona, transversim lineata, straminea aut pallide brunea, levi aut plus minus tuberculata.

Fimbristylis miliacea Vahl! *Enum. II* (1806) p. 287; *Kunth Enum. II* p. 230; *Boeck.! in Linnæa XXXVII* (1871) p. 43; *Liebman! Mexic. Halvgr.* p. 51; *C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI* p. 644.

Scirpus miliaceus Thumb. *Fl. Jap.* (1784) p. 37; *Griseb.! Pl. Cub.* p. 240; *Saur. Cub. n.* 2639 p. 177; *nee Linn. herb. propr.*

Scirpus n. 77, *Rottb. Descr. et Ic.* (1773) p. 57 t. 5 fig. 2.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3772; Portorico prope Yabucoa in arenosis litoralibus: Sintenis n. 4947.

Distrib. in tropicis orbis terrarum; in Asia et Oceania copiosa, in Africa et America rara.

103. **Fimbristylis complanata** Link, glabra, rhizomate brevissimo aut nullo; culmo 2—6 dm. longo, apice 4-angulari compresso; foliis saepius 1—2 dm. longis, 4—6 mm. latis, apice subito angustatis; umbella 20—150-stachya; bracteis 2, umbella multo brevioribus, suberectis, cum foliis consimilibus; spiculis solitariis, 6 mm. longis 2 mm. latis; glumis ovatis, pleiospiris, obtusis aut acutis; stylo 3-fido, glabro; nuce parvula, angustius obovoidea, trigona, transversim lineata, luteo-brunea, minute tuberculata rarius levi.

Fimbristylis complanata Link *Hort. Berol. I* (1827) p. 292; *Kunth Enum. II* p. 228; *C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI* p. 646.

Fimbristylis autumnalis var. α *Boeck.! in Linnæa XXXVII* (1871) p. 38.

Fimbristylis Rudgeana Steud. *Cyp.* (1855) p. 115.

Fimbristylis conferta A. Rich. in *Sagra Fl. Cub. XI* (1850) p. 291.

Scirpus complanatus Retz. Obs. V (1789) p. 14.

Scirpus amentaceus Griseb.! Kar. (1857) p. 123, Flor. p. 571 et Pl. Cub. p. 240.

Scirpus autumnalis Roth Nov. Pl. Sp. (1821) p. 26 partim; Griseb. Flor. p. 571?; Sauv.! Cub. n. 2638 p. 177.

Cyperus complanatus Willd. Sp. Pl. I (1797) p. 270.

Cyperus amentaceus Rudge Pl. Guiana (1805) p. 16 t. 19; Kunth Enum. II p. 104.

Trichelostylis Rudgeana Nees! in Mart. Fl. Bras. II pars I (1843) p. 79.

Hab. in Cuba: Combs n. 474 (S. Clara), Sagra n. 85, 121, C. Wright n. 715, 716, 3378; Jamaica: Hart n. 827; Hispaniola: Eggers n. 2452, 2687, Jacquemont, Picarda n. 1111; Portorico: Krug n. 1243, Sintenis n. 1006, 1411, 2595, 5238, Stahl n. 300; Guadeloupe: Duss n. 3134, l'Herminier n. 29, 46, 47; Dominica: Eggers n. 543, 832, Imray n. 23, Nicholls n. 163; Martinique: Belanger n. 98, 1255, Duss n. 692, 755, Hahn n. 630, 700, Husnot n. 24; St. Lucia: Anderson; St. Vincent: Eggers n. 6606, 6917, Smith n. 1678; Grenada: Eggers n. 6113, Sherring; Trinidad: Crueger, Hart n. 2072, 4202.

Distrib. in tropicis et subtropicis utriusque orbis, vulgaris.

104. **Fimbristylis autumnalis** Roem. et Sch. culmis 1—3 dm. longis, gracilibus, apice vix compressis; spiculis omnibus solitariis (aut quibusdam interdum geminatis), 6 mm. longis vix 2 mm. latis; nuce minuta; ceteroquin ut *F. complanata*.

Fimbristylis autumnalis Roem. et Sch. Syst. II (1817) p. 97 et Mant. p. 56; Kunth Enum. II p. 227; Boeck.! in Linnæa XXXVII (1871) p. 39, var. *α* excl.

Scirpus autumnalis Linn. Mant. (1771) p. 180; Griseb.! Pl. Cub. p. 240.

Hab. in Cuba: C. Wright.

Distrib. a Canada usque ad Amazonas inferiorem.

105. **Fimbristylis obtusifolia** Kunth, culmis 1—3 dm. longis; foliis pluribus, rigidis; spicis in umbella (saepius composita) laxiuscula aut densa dispositis; spiculis in spicis 3—5-nim fasciculatis, nullis solitariis; stylo (saltem in floribus inferioribus spiculae) 3-fido; nuce ovoidea, castanea aut nigra, transversim notata, saepe porosa.

Fimbristylis obtusifolia Kunth Enum. II (1837) p. 240; C. B. Clarke in Dyer Fl. Cap. VII p. 203.

Scirpus obtusifolius Lam. Ill. I (1791) p. 141; Griseb. Flor. p. 571.

Isolepis obtusifolia Beauv.! Fl. d'Owar. II (1807) p. 38 t. 81 fig. 1. .

Hab. in Antigua: Wullschlaegel; Guadeloupe in collibus madreporicis litoralibus prope Bourg du Moule: Duss n. 3520; Martinique: Husnot n. 28, Sieber n. 12.

Distrib. per Africam tropicam cum Madagascar tenuius sparsa; Novo-Granata et Guiana.

106. *Fimbristylis monostachya* Hassk. glabra, rhizomate nullo, raro brevissimo; culmis caespitosis, basi interdum subbulbosim in-crassatis, 5—40 cm. longis, gracilibus 1- (rarius 2—3-)stachyis; foliis cum $\frac{1}{2}$ parte culmi subaequilongis, angustis; bractea brevissima, spiculam raro superante; spicula 12—15 mm. longa, 5 mm. lata, compressa marginibus acutis, rhachilla saepe torta; glumis navicularibus, ovatis mucronatis, lucidis; stylo longo, fere usque ad basin villosa, cum basi pyramidalis deciduo, ramis 3 breviusculis; nuce cum $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, majuscula, obovoidea, basi multum angustata, rotundo-trigona, straminea aut vix brunescente, plus minus tuberculata.

Fimbristylis monostachya Hassk. *Pl. Jav. Rar.* (1848) p. 61; C. B. Clarke in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* VI p. 649.

Cyperus monostachyus Linn.! *Mant.* (1771) p. 180; *Rottb. Descr. et Ic.* p. 18 t. 13 fig. 3; H. B. K. *Nor. Gen. et Sp.* I p. 203.

Cyperus caribaeus Pers. *Syn.* I (1805) p. 65.

Abildgaardia monostachya Vahl *Enum.* II (1806) p. 296; *Kunth Enum.* II p. 247; *Griseb.! Kar.* p. 123, *Flor.* p. 569 et *Pl. Cub.* p. 238; *Bocck.! in Linnaea* XXXVII (1871) p. 53.

Abildgaardia monocephala Sauv.! *Cub.* (1871) n. 2609 p. 173.

Iria Caribaeus L. C. Rich. in Pers. *Syn.* I (1805) p. 65 char. em.

Sloane Jamaica I p. 120 t. 79 fig. 2.

Hab. in ins. Bahama Andros: Northrop n. 634; Cuba: Combs n. 397 (S. Clara), C. Wright n. 708; Jamaica: Hart n. 1503, Purdie, Wilson n. 302; Hispaniola: Eggers n. 2441, 2441^{b c}, Picarda n. 569, 1124; Portorico: Sintenis n. 1210, 6615; Antigua: Wullschlaegel n. 691; Guadeloupe: Duss n. 3127, l'Herminier n. 34, 87, Perrottet; Martinique: Duss n. 466, Hahn n. 892, Husnot n. 16, Sieber n. 11, 361; St. Lucia: Duss; St. Vincent: Smith n. 51, 342; Grenada: Broadway n. 82, 652, Eggers n. 6418; Tobago: Eggers n. 5468.

Distrib. in tropicis et calidioribus orbis fere totius.

107. *Fimbristylis Grisebachii* Greenm. annua, culmis 10—15 cm. longis, setaceis, glabris apice minute scabro-pilosis, 1-(rarius 2—3-)stachyis; foliis cum $\frac{1}{2}$ parte culmi aequilongis, setaceis; bractea 6 mm. longa, viridi; spicula 6 mm. longa, 3 mm. lata, compressa, 7-flora; glumis navicularibus, ovatis, acuminatis vix mucronatis, subdistichis, glabris, stramineo-ferrugineis in carina viridibus; stylo longo fere glabro, cum

stylobasi pyramidali tardius deciduo, ramis 3 longiuseulis; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, levi, transversim undulata, straminea.

Fimbristylis Grisebachii Greenm.! in *Trans. Acad. Sci. St. Louis VII* (1897) p. 474.

Abildgaardia setacea Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 238; *Sauv.*! *Cub.* n. 2608 p. 173.

Hab. in Cuba: Combs n. 400 (Cieneguita), C. Wright n. 1531, 3366.

Species residuae.

Fimbristylis divaricata Ham. culmis caespitosis, hirtis-pilosis, basi subramosis, ramis divaricatis; umbellis irregularibus; pedunculis solitariis, subglobosis; pedicello elongato.

Fimbristylis divaricata Ham. *Prod. Fl. Ind. Occid.* (1825) p. 14; *Kunth Enum. II* p. 245; *Desv. ms. ex Ham.*

Hab. in Portorico: fide Hamilton.

Fimbristylis hirtella Ham. culmis caespitosis, subtetragonis, piloso-hirtis; involucri subtriphylo; ramis subtrifloris; spicis ovatis; pedunculis hirtis.

Fimbristylis hirtella Ham. *Prod. Fl. Ind. Occid.* (1825) p. 12; *Kunth Enum. II* p. 245; *Desv. ms. ex Ham.*

Fimbristylis Hamiltonii Steud. *Cyp.* (1855) p. 119.

Hab. in Portorico: fide Hamilton.

Fimbristylis Spartium Ham. culmo subcaespitoso; scapo subcomplanato, basi distiche folioso; foliis subteretibus, filiformibus, subtus canaliculatis, culmum aequantibus; umbella irregulari; spicis (nigerrimis) ovato-acutis; involucri diphylo, uno multo longiore.

Fimbristylis Spartium Ham. *Prod. Fl. Ind. Occid.* (1825) p. 12; *Kunth Enum. II* p. 245; *Desv. ms. ex Ham.*

Hab. in Antillis: fide Hamilton.

IX. Bulbostylis Kunth.

Glumae nucigeræ saepissime minute pilosae. Stylus longus, gracilis, glaber; rami 3, lineares; stylobasis perparva, a nuce distincta, proventu (post stylum casum) in nuce relictâ, decolorata; ceteroquin ut *Fimbristylis*. — Stolones 0. Culmi caespitosi, graciles, nudi. Folia setacea vel perangusta; vaginae in ore saepissime ciliatae aut barbatae. Inflorescentia umbellata, aut monocephala, vel monostachya. Spiculae solitariae aut fasciculatae.

Species 80, in calidis orbis terrarum sparsae, in Africa et America praesertim numerosae.

Obs. Genus ab *Eleocharidis* speciebus setis hypogynis carentibus vix differt. Species *Bulbostylidis* antillanae (omnes foliigeræ) ope foliorum ab *Eleocharide* facile diagnoscentur.

Clavis specierum antillanarum.

Sect. 1. *Monostachyae*. Culmus spiculam unicam gerens.

Spicula terminalis; gluma ima vix bracteiformis.

Folia longiuscula; spicula straminea . 108. *B. leucostachya* Kunth.

Folia brevia; spicula fusce brunea . 109. *B. conifera* Kunth.

Spicula lateralis; bractea spiculam saepe superans

110. *B. floccosa* C. B. Clarke.

Sect. 2. *Monoecephalae*. Culmus caput unicum gerens.

Subaphylla; caput 3—9-stachyum . 111. *B. subaphylla* C. B. Clarke.

Foliigera; caput 1—2- (rarius 3-)stachyum

112. *B. fimbriata* C. B. Clarke.

Sect. 3. *Umbellatae*. Spiculæ in umbella simplice aut composita dispositae.

* Spiculæ in spicis fasciculatae; spicae umbellatae.

Culmus apice ipso minute pilosulus 113. *B. vestita* Kunth.

Culmus apice ipso glabro . . . 114. *B. junciformis* Kunth.

** Spiculæ solitariae.

Culmus apice ipso glabro; spiculæ modice pedicellatae

115. *B. capillaris* Kunth.

Culmus apice ipso piloso; spiculæ breviter pedicellatae

116. *B. Langsdorffiana* Kunth.

108. *Bulbostylis leucostachya* Kunth, rhizomate brevi, descendente, a squamis intecto, apice diviso; culmis 2 dm. longis, glabris, tenuibus, monostachyis; foliis pluribus, cum $\frac{1}{2}$ parte culmi subaequilongis, setaceis; vaginis in ore dense lanato-barbatis vel fere glabratiss; spicula terminali, erecta, usque ad 14 mm. longa, 3—4 mm. lata, cylindracea, proventu straminea; gluma ima vacua, breviter viridi-mucronata, caduca; glumis fertilibus plurimis, densissime stipatis, rotundis, concavis, stramineo-scariosis, in margine minute ciliatis; stylo quam nux brevior, glabro, ramis 3 linearibus; nuce cum $\frac{1}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, levi, fusco-brunea; stylobasi minuta, nigra, in nucis umbone relictæ.

Bulbostylis leucostachya Kunth! Enum. II (1837) p. 205.

Isolepis leucostachya H. B. K. Nov. Gen. et Sp. I (1815) p. 220.

Scirpus leucostachys Poir. Encyc. Suppl. V (1817) p. 104; Boeck. in Linnæa XXXVI (1869—70) p. 737.

Scirpus Gaillardii Maury in Journ. Bot. Paris III (1889) p. 197 fig. 7.

Fimbristylis leucostachya Roem. et Sch. Syst. II (1817) p. 92.

Hab. in India occident.: Swartz.

Distrib. Columbia, Orinoco, Rio Negro.

109. **Bulbostylis conifera** Kunth, dense caespitosa, culmis 3 dm. longis, tenuibus, glabris, monostachyis; foliis cum $\frac{1}{4}$ parte culmi aequilongis, setaceis, denticulato-scabris; vaginis in ore (interdum parum) lanato-barbatis; spicula terminali, 10—12 mm. longa, 3 mm. lata, cylindrica, cinereo-brunea; gluma ima vacua, vix aristata, decidua; glumis fertilibus densissime imbricatis, concavis, ovatis, glabris in margine pilosulis, fusce purpureis; stylo cum nuce aequilongo, glabro, ramis 3 linearibus; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, late obovoidea, truncata, lutescente lucide castaneo-maculata, transversim conspicue undulato-zonata; stylobasi minuta nigra, in nucis umbone relictâ.

Bulbostylis conifera Kunth! *Enum. II* (1837) p. 206 cf. p. 205.

Oncostylis conifera Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 81.

Isolepis conifera, *I. ciliifolia*, *I. Gardneriana* Steud. *Cyp.* (1855) p. 99.

Scirpus Reichenbachii Boeck. in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 737.

Hab. in Hispaniola: Mayerhoff (anne e Guiana?).

Distrib. Venezuela, Guiana, Brasilia.

110. **Bulbostylis floccosa** C. B. Clarke, radicibus fibrosis; culmis dense caespitosis, 1 dm. longis, rigidiusculis, minute adpresso-papillosis, monostachyis; foliis cum $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, setaceis, fere glabris; vaginis in ore barbato-pilosis; spicula laterali, 2—3 cm. longa, 3—4 mm. lata, lanceolata, fusca; bractea spiculam saepe superante; glumis ovatis, vix acutis, puberulis aut fere glabratis; styli ramis 3, longis; nuce cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, levi, nigro-castanea; stylobasi late conica, nigra, in nuce relictâ.

Scirpus floccosus Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 241; *Sauv. Cub. n.* 2635 p. 176.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3381.

Obs. C. Wright n. 3381 var. est *Dichromena* sp.

111. **Bulbostylis subaphylla** C. B. Clarke, culmis dense caespitosis, 3 dm. longis, gracilibus, glabris, monocephalis, subaphyllis; vagina summa apice modo in altero latere lanceolato-producta modo a folio 2—6 mm. longo lineari terminata; bractea spiculis brevior; spiculis 1—2 (rarius 3), 5—6 mm. longis, oblongis; glumis navicularibus, ovatis vix acutis, fere glabris, fusce bruneis; styli ramis 3; nuce cum $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, levi tenuiter transversim undulata, pallide fuscescente; stylobasi parva, fusco-nigra, in nuce relictâ.

Scirpus juncoides Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 241 partim.

Hab. in Cuba orient.: C. Wright n. 1533.

Obs. Species *B. Lichtensteinianae* affinis.

112. **Bulbostylis fimbriata** C. B. Clarke, annua, culmis caespitosis 2 dm. longis, gracilibus, glabris, monocephalis; foliis cum $\frac{1}{2}$ parte culmi aequilongis, setaceis, vaginis in ore densius piloso-barbatis; capite 3—9-stachyo, 1 cm. in diam.; bracteis 3, usque ad 2—3 cm. longis, basi a pilis ferrugineis ornatis; spiculis 5—8 mm. longis, oblongis, ferrugineis; glumis navicularibus, ovatis, carina viridi vix excurrente, minute hirtellis; stylo cum nuce aequilongo, glabro, ramis 3 linearibus; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, levi, fusce brunea; stylobasi parva, fuscescente, in nuce relicta.

Oncostylis fimbriata Nees! in Mart. Fl. Bras. II pars I (1843) p. 88.

Isolepis fimbriata Steud. Cyp. (1855) p. 101; Schrader ms.

Scirpus fimbriatus Boeck. in Linnæa XXXVI (1869—70) p. 749.

Scirpus Dussii Boeck.! Cyp. Novae. Heft II (1890) p. 38.

Scirpus Dussianus Duss! Fl. (1897) p. 548.

Hab. in Martinique passim et rara in Champ de Pétrification, Sainte Anne: Duss n. 478.

Distrib. Peru, Amazonas inferior, Minas Geraës (Brasilia).

113. **Bulbostylis vestita** Kunth, annua, culmis caespitosis, 3 dm. longis, gracilioribus, apice pilosulis; foliis cum $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, setaceis, densius pilosulis; vaginis in ore tenuiter barbatis; spicis 3—12-stachyis, simpliciter umbellatis, raro in 1 caput fere congestis, bracteis 10—15 mm. longis; spiculis 5—8 mm. longis, oblongis, fusce castaneis; glumis navicularibus, ovatis, carina in mucronem subcurvatum excurrente; stylo cum nuce aequilongo, ramis 3; nuce cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, levi tenuiter reticulata, pallide brunea; stylobasi parva, conica, fuscescente, in nuce relicta.

Bulbostylis vestita Kunth! Enum. II (1837) p. 211 cf. p. 205.

Oncostylis vestita Nees in Mart. Fl. Bras. II pars I (1843) p. 88 in nota.

Oncostylis hispida Liebm.! Mexic. Halvgr. (1851) p. 52.

Isolepis vestita Steud. Cyp. (1855) p. 102.

Isolepis hispida Steud.! Cyp. (1855) p. 104.

Scirpus vestitus Boeck. in Linnæa XXXVI (1869—70) p. 753; Reich.! ms.

Scirpus hirtus Griseb.! Pl. Cub. (1866) p. 241; Sauv. Cub. n. 2633 p. 176.

Fimbristylis vestita Hemsl. Biol. Centr. Amer. III (1885) p. 460.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3383.

Distrib. a Mexico usque ad Bahia, late sparsa.

114. **Bulbostylis junciformis** Kunth, radicibus fibrosis; culmis caespitosis, 1—6 dm. longis, gracilibus aut setaceis, apice glabris; foliis cum $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, setaceis; vaginis in ore ciliatis; umbella composita 1 dm. in diam., aut simplice aut in caput unicum fere contracta; bracteis usque ad 4 cm. longis; spiculis fasciculatis, 4—8 mm. longis, oblongis, lanceolatis, castaneis bruneis aut rufescentibus; glumis navicularibus, ovatis, minute scabro-hirtellis, carina sub-excurrente; stylo cum nuce aequilongo, ramis 3 linearibus; nuce cum $\frac{1}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, levi aut reticulata, lucide brunea; stylobasi parva, in nuce relicta.

Bulbostylis junciformis Kunth Enum. II (1837) p. 211 cf. p. 205.

Isolepis junciformis H. B. K. Nov. Gen. et Sp. I (1815) p. 222.

Scirpus junciformis Poir. Encycl. Suppl. V (1817) p. 105; Saur.! Cub. n. 2632 p. 176, non Retz.

Scirpus Humboldtii Spreng. Syst. I (1825) p. 213; Boeck.! in Linnæa XXXVI (1869—70) p. 756.

Scirpus hirtus Griseb. Pl. Cub. (1866) p. 241 partim.

Scirpus juncoides Griseb.! Flor. (1864) p. 572 et Pl. Cub. p. 241; Willd. ms. ex Griseb.

Scirpus rufescens Boeck. in Linnæa XXXVI (1869—70) p. 747 partim.

Oncostylis junciformis Nees in Mart. Fl. Bras. II pars I (1843) p. 85; Liebm.! Mexic. Halvgr. p. 52.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 1533, 3383 partim; Hispaniola: Mayerhoff n. 726; Trinidad: Crueger.

Distrib. a Mexico usque ad Montevideo, frequens.

115. **Bulbostylis capillaris** Kunth, annua, culmis 1—4 dm. longis, gracilibus, apice glabris; foliis cum $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, setaceis, fere glabris; vaginis in ore ciliato-barbatis; umbella simplice vel composita, laxa (raro ad spiculam 1 depauperata); bracteis 1—3, umbella longioribus aut brevioribus; spiculis solitariis, 5 mm. longis, ellipsoideis aut oblongis, 6—15-floris, ferrugineis bruneis aut atrocastaneis; glumis navicularibus, ovatis, minute pilosulis, carina vix excurrente; stylo cum nuce aequilongo, 3-fido; nuce parvula, cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, pallida aut brunescens, transversim undulata; stylobasi parva, depresso-globosa, proventu in nuce relicta.

Bulbostylis capillaris Kunth Enum. II (1837) p. 212 cf. p. 205; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI p. 652.

Scirpus capillaris Linn.! Sp. Pl. ed. II p. 73 (tab. Pluk. excl.) et Mant. p. 321; Griseb.! Flor. p. 572 et Pl. Cub. p. 241; Saur. Cub. n. 2634 p. 176; Boeck. in Linnæa XXXVI (1869—70) p. 759.

Isolepis capillaris Roem. et Sch. Syst. II (1817) p. 118.

Fimbristylis capillaris A. Gray Bot. North. U. S. ed. V (1867) p. 567.

Sloane Jamaica I p. 120 t. 79 fig. 3.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 715; Jamaica: Wulfschlaegel n. 1135; Dominica: Imray n. 20; Martinique: Duss n. 758, Hahn n. 1135.

Distrib. a Canada usque ad Buenos Aires, vulgaris.

Var. **tenuifolia** C. B. Clarke, culmis admodum gracilibus; foliis tenuissimis; spiculis anguste lanceolatis; nuce obscurius (aut non) undulata.

Scirpus tenuifolius Rudge Guiana (1805) p. 18 t. 22.

Scirpus bufonius Poir. Encyc. Suppl. V (1817) p. 105; Willd. *ms.* fide Poiret.

Isolepis bufonia H. B. K. Nov. Gen. et Sp. I (1815) p. 222.

Oncostylis tenuifolia Nees in Mart. Fl. Bras. II pars I (1843) p. 83, *vix* Liebm.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3382.

Distrib. in America australi tropica frequens.

116. **Bulbostylis Langsdorffiana** Kunth, annua, culmis caespitosis, 1—3 dm. longis, gracilibus, apice pilosis; foliis cum $\frac{1}{2}$ parte culmi aequilongis, setaceis, pilosulis; vaginis in ore tenuiter ciliatis; umbella contracta, radiis 5—15 mm. longis, simplice aut composita; bracteis 1—3 cm. longis; spiculis solitariis 5—7 mm. longis, oblongis; glumis navicularibus, ovatis, minute hirtellis, castaneo-bruneis, carina vix excurrente; stylo cum nuce aequilongo, 3-fido; nuce parva, cum $\frac{1}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, levi aut tenuiter reticulata luteo-brunea; stylobasi parva, conica, fusciscente in nuce reticulata.

Bulbostylis Langsdorffiana Kunth Enum. II (1837) p. 214, *cf.* p. 205.

Isolepis hirtella Roem. et Sch. Syst. II Mant. (1824) p. 70; Kunth Enum. II p. 218; Schrader *ms.*

Isolepis ciliata Presl! Rel. Haenk. I (1830) p. 188.

Isolepis Langsdorffiana Steud. Cyp. (1855) p. 104.

Oncostylis hirtella Nees in Mart. Fl. Bras. II pars I (1843) p. 85 var. α 3 et β exclusis.

Cyperus pubifolius Steud.! Cyp. (1855) p. 16.

Scirpus hirtellus Boeck.! in Linnaea XXXVI (1869—70) p. 765.

Scirpus Uleanus Boeck. *ms.* in Ule n. 1936.

Fimbristylis ciliatifolia var. *pilosa* Britton! in Bull. Torrey Club XV (1888) p. 102.

Hab. in Portorico prope Mayagüez in sylvâ montana ad Hacienda Buenavista: Sintenis n. 1208.

Distrib. a Mexico usque ad Brasiliam australem, frequens.

X. *Scirpus* Linn.

Spiculæ pluri- aut multi-nucigeræ. Glumæ 2—0 imæ vacuæ, sequentes bisexuales nucigeræ, summæ tabescentes; glumæ pleio-spiræ, glabræ præter margines. Stylus 3—2-fidus, basi in pistilli apicem continuo sensim transeunte. — Culmi (in speciebus antillanis) nudi. Foliorum vaginæ in ore non ciliato-barbatæ.

Species 136, per orbem terrarum sparsæ.

Obs. Habitus varius; e 10 sectionibus diversis 2—3 forsan potius pro generibus habendæ.

Clavis specierum antillanarum.

Sect. 1. **Nemum** (genus) Ham. Glumæ persistentes atrosanguineæ.

Culmus monostachyus; spicula cylindrica 117. *S. spadiceus* Boeck.

Sect. 2. **Monostachyæ**. Glumæ deciduæ. Culmi monostachyi.

* Stylus 2-fidus.

Culmus submersus; spiculæ 1-nucigeræ

118. *S. submersus* C. Wright.

Culmi aphylli; spiculæ pluri-nucigeræ

119. *S. nanus* Spreng.

* Stylus 3-fidus. (Culmi natantes, aphylli) 120. *S. natans* Griseb.

Sect. 3. **Isolepis** (genus) R. Br. Spiculæ fasciculatæ. Setae penitus 0. Culmi (nisi basi) nudi. (Planta majuscula) . 121. *S. cubensis* Kunth.

Sect. 4. **Euscirpus**. Glumæ deciduæ. Setae obviæ. Plantæ majusculæ.

Culmi trigoni, apice triquetri, monocephali 122. *S. Olneyi* A. Gray.

Culmi teretes, apice plus minus trigoni, umbelligeri

123. *S. lacustris* Linn.

Sect. 5. **Microstylæ**. Teneriores, foliati. Culmi nudi, monocephali. Spiculæ densifloræ. Setae 0. Stylus brevissimus deciduus; rami breviusculi.

Stylus 2-fidus; spiculæ in capite 3—1 124. *S. micranthus* Vahl.

117. ***Scirpus spadiceus*** Boeck. glaber, rhizomate 0 vel brevissimo; culmis 2—3 dm. longis, tenuibus, basi tantum foliigeris, monostachyis; foliis paucis, 1 dm. longis, setaceis; bractea 0 vel quam spicula brevior; spicula 12 mm. longa, late cylindrica, densa, apice basique obtusa, atro-rubra; glumis 3 mm. longis, ovatis, obtusis, concavis, vix nervosis, persistentibus; nuce cum $\frac{1}{3}$ parte glumæ vix æquilonga, obovoidea, plano-convexa, levi tenuiter longitudinaliter striata, nigro-castanea; stylo 2-fido, deciduo, juniore cum nuce continuo.

Scirpus spadiceus Boeck.! in *Linnæa* XXXVI (1869—70) p. 493; non Linn.

Eriocaulon spadiceum Lam. *Ill. I* (1791) p. 214.

Schoenus spadiceus Vahl *Enum. II* (1806) p. 210.

Nemum spadiceum Ham. *Prod. Fl. Ind. Occid.* (1825) p. 13; *Kunth Enum. II* p. 220.

Hab. in Hispaniola: herbb. Delessert, Berol. lectore ignoto.

Distrib. Sierra Leone.

118. **Scirpus submersus** C. Wright, glaber, debilis, atroviridis, caulibus 3—5 dm. longis, submersis, nodosis, divisis; foliis fasciculatis, 5—8 cm. longis, capillaceis; pedunculis 3—10 cm. longis, axillaribus, monostachyis; spicula 8 mm. longa, oblongo-lanceolata, 1-nucigera; glumis 2 imis 8 mm. longis, membranaceis, fere convolutis, luteo-viridibus; glumis caeteris brevioribus, paucis, masculis aut rudimentariis vel 0; setis 10—6, nucem superantibus, retrorsim hispidis, stramineis; stylo longo, ramis 2 longis, linearibus; staminibus 3; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, levi, pallida.

Scirpus submersus C. Wright! in *Saur. Fl. Cub.* (1871) n. 2627 p. 175; C. B. Clarke in *Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI* p. 653.

Scirpus conferroides Poir. in *Lam. Encyc. VI* (1804) p. 755 partim; *Kunth Enum. II* p. 173 partim i. e. Willd. n. 1123 planta in descriptione neque in diagnosi Kunthii exscripta.

Eleocharis submersa Miq. in *Linnaea XIX* (1847) p. 225.

Rhynchospora ruppioides Benth.! in *Hook. Ic. Pl. XIV* (1881) p. 31 t. 1344; *Trimen! Syst. Cat. Ceylon Pl.* p. 103.

Websteria linnophila S. H. Wright in *Bull. Torrey Club XIV* (1887) p. 135.

Schoenus conferroides Willd. *ms. fide Link.*

Hab. in Cuba prope Pinar del Rio: C. Wright n. 3775.

Distrib. Madagascar, Ceylon, Java, Carolina, Rio Negro, Surinam, Paraguay.

Obs. Planta (e mea sententia) *Scirpo fluitanti* Linn. affinis, a genere *Rhynchospora* longe distans ob stylobasin cum nucis apice continuam, folia, glumas imas longas, habitum. III. BENTHAM propter spiculam 1-nucigeram (characterem in Cyperaceis levis momenti) hanc plantam in *Rhynchospora* verosimiliter locaverat.

119. **Scirpus nanus** Spreng. glaber rhizomate tenuissimo, tubera parva interdum gerente; culmis 3—10 cm. longis, aphyllis, setaceis, monostachyis; spicula 3—5 mm. longa, specie terminali, 3—10-flora, ellipsoidea, pallida vel castaneo-rubra; glumis paucispiris, ovatis, obtusis, ima cum caeteris fere consimili, sterili, caduca; setis 4 aut 6, tenuibus, retrorsim scabris, fusce stramineis; staminibus 3; stylo longiusculo 3-fido, basi pyramidalis in nucem sensim transeunte; nuce cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, levi, luteo-brunea.

Scirpus nanus Spreng. *Pugill. I* (1815) p. 4.

Scirpus parrulus Roem. et Sch. *Syst. II* (1817) p. 124; Kunth! *Enum. II* p. 157; Boeck.! in *Linnæa* XXVI (1869—70) p. 477.

Scirpus Floridanus Mich.! *ms.*

Chaetocyperus polymorphus Nees in *Linnæa* IX (1834) p. 289 *partim.*

Hab. in Cuba: Rugel n. 877, 905.

Distrib. Europa, America borealis usque ad Florida et Mexico.

120. **Scirpus natans** Griseb. glaber, culmis usque ad 25 cm. longis, natantibus, tenuibus, intertextis, aphyllis, monostachyis; spicula longa 3 mm., 3—6-flora; glumis paucispiris, ovatis, obtusis, viridibus purpureo-maculatis, ima cum caeteris subsimili, interdum fertili; setis 5—6, tenuibus, albis, nuce multo brevioribus, interdum 0; staminibus 3; stylo 3-fido, basi lineari; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga obovoidea, apice obtusa, fusce lutea.

Scirpus natans Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 238; Saur.! *Cub. n.* 2628 p. 176.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3377.

Distrib. Pernambuco.

121. **Scirpus cubensis** Kunth, glaber praeter glumas, stolonibus longis, debilibus, rubris, a squamis 2—3 cm. longis, lanceolatis bruneis intactis; culmis basi decumbentibus, 3—7 dm. longis, nudis i. e. prope ad basin tantum foliigeris; foliis cum culmo saepe aequilongis, 5 mm. latis; umbella specie simplicee; bracteis pluribus, usque ad 2—3 dm. longis, foliiformibus; radiis 2—6—12, usque ad 5 cm. longis, aut capite 1; spicis subglobois, 5—12 mm. in diam., e spiculis numerosis dense capitatis, non comosis; spiculis 4—8 mm. longis, multifloris; glumis multi-spiris, ovatis, acutis, fusce bruneis in carina viridibus, in margine superiore a ciliis ornatis; setis 0; stylo cum nuce continuo, ramis 2 linearibus; staminibus 3, antheris apice cristatis; nuce cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, anguste obovoidea, in rostrum acuminata, basi a cellulis suberosis incrassata, levi, pallida.

Scirpus cubensis Kunth *Enum. II* (1837) p. 172; Griseb.! *Pl. Cub.* p. 240; Saur. *Cub. n.* 2643 p. 177; Benth. in *Benth. et Hook. f. Gen. Pl. III* p. 1051.

Scirpus ablepharus Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 240.

Oryzaryum Schomburgkianum Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 90.

Kyllingia scirpina Reich.! *ms.*

Cyperus? *sp.* Kunth *Enum. II* p. 40, 43.

Cyperus blepharoleptos Steud.! *Cyp.* (1855) p. 28.

Cyperus lasiocephalus C. Wright ms. fide Griseb.

Courtoisia olivacea Bocck. in *Flora XLIII* (1860) p. 331.

Anosporum cubense Bocck.! in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 413.

Anosporum piliferum et *A. paraguayense* Manry! in *Mem. Soc. Génér. XXXI* (1890) pp. 123, 124 tt. 34, 35.

Isolepis cchinocephala Oliver! in *Trans. Linn. Soc. XXIX* (1875) p. 167 t. 107.

Crepidocarpus cubensis Klotzsch ms. fide Bocck.

Hab. in Cuba: Poeppig, C. Wright n. 221, 3380, 3384; Hispaniola: Jacquemont, Mayerhoff; Trinidad: Bromfield, Finlay n. 1887.

Distrib. Africa trop., Alabama, America centralis et australis tropica.

122. **Scirpus Olneyi** A. Gray, glaber praeter glumarum margines, culmis 1-metralibus, apice triquetris, submonocephalis; foliis brevibus; bractea ima 1—4 cm. longa; spiculis 3—12, subcapitatis, 5—9 mm. longis, obtusis, fusce ferrugineis; glumis apice leviter emarginatis, minute mucronatis; setis 3—6, cum $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{3}$ parte nucis subaequilongis, bruneo-rubris, retrorsim albo-scabris; stylo 2-fido; nuce oblongo-obovoidea, levi, griseo-brunea.

Scirpus Olneyi A. Gray! in *Boston Journ. Nat. Hist. V* (1845) p. 238 in nota; Bocck. in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 710.

Scirpus pungens Benth.! *Pl. Hartw.* (1839) p. 27; Liebm.! *Mexic. Halvgr.* p. 58 partim; Bocck. in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 708 partim.

Hab. in ins. Bermuda: Moseley; Jamaica: Bromfield; Hispaniola: Ehrenberg n. 78, Jacquemont, Picarda n. 1460 (prope Port-au-Prince in litoralibus), 1570.

Distrib. a Rhode Island usque ad Florida, New Orleans, California, Guatemala.

Obs. Differt a *S. triquetro* capite simplice, a *S. americano* Pers. (*S. pungente* Vahl) spiculis obtusis.

123. **Scirpus lacustris** Linn. glaber praeter glumarum margines, rhizomate horizontali crassiusculo; culmis (saepius in aqua suberectis) 5—20 dm. longis, teretibus vel apice plus minus trigonis, enodosis, saepius aphyllis; umbellâ composita aut simplice, aut in 1 caput fere contracta; bractea ima suberecta, brevi aut umbellam superante; spiculis fasciculatis aut solitariis, usque ad 15 mm. longis 6 mm. latis, cylindricis aut ovoideis, bruneis; glumis ovatis, apice emarginatis mucronulatis, in margine minute ciliatis, saepe glandulosis; setis 6—5, cum nuce subaequilongis (interdum brevioribus), retrorsim scabris; staminibus 3, antheris cristatis; stylo 3-fido aut 2-fido; nuce cum $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ parte

glumae aequilonga, compresso-trigona aut plano-convexa, obovoidea aut oblongo-obovoidea, levi aut microscopice reticulata, proventu nigrescente.

Scirpus lacustris Linn.! *Sp. Pl. ed. II* p. 72; *Kunth Enum. II* p. 164; *Sagra Fl. Cub. XI* p. 290; *Bocck. in Linnæa XXXVI* (1869—70) p. 712; *Sauv. Cub. n. 2631* p. 176; *C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI* p. 658 et in *Dyer Fl. Cap. VII* p. 231.

Scirpus validus Vahl *Enum. II* (1806) p. 268; *Kunth Enum. II* p. 165; *Griseb.! Pl. Cub. p. 240 et Flor. p. 571.*

Scirpus Ehrenbergii Bocck.! in *Linnæa XXXVI* (1869—70) p. 712.

Hab. in ins. Bermuda: Moseley; in Cuba: Eggers n. 4545, Linden n. 1812, Poeppig, C. Wright n. 713; Jamaica: Bromfield, Hart n. 824, Purdie, Shakespear; Hispaniola: Poiteau; Portorico prope Guanica in uliginosis ad Mte. Puerco: Sintenis n. 3846.

Distrib. in Europa, Asia, Oceania, copiosa late sparsa; in Africa, rara; in America boreali et centrali, vulgaris.

124. ***Scirpus micranthus*** Vahl, glaber, culmis 3—15 cm. longis, setaceis, monocephalis; foliis 5—30 mm. longis, anguste linearibus; bracteis 1—2, ima 1—5 cm. longa, quasi culmum continuante; spiculis 3—1, fasciculatis, lateralibus, 2—4 mm. longis, ovatis, obtusis, 30—50-floris; glumis multispiris, ovatis, breviter acuminatis, in dorso viridibus in latere sanguineis; squamula intra glumam oblique laterali lanceolata aut saepius 0; stamine 1, anthera parvula quadrato-oblonga; stylo cum $\frac{1}{5}$ parte nucis vix aequilongo, basi non incrassato, deciduo, ramis 2 parvis recurvatis; nuce cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, oblongo-obovoidea, biconvexa, levi reticulata, nigrescente.

Scirpus micranthus Vahl *Enum. II* (1806) p. 254; *Bocck.! in Linnæa XXXVI* (1869—70) p. 499.

Hemicarpha subsquarrosa Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 61 t. 4 fig. 1; *Griseb.! Flor. p. 372.*

Hab. in Martinique: Belanger n. 401, Duss n. 460^a; Trinidad: Crueger, Fendler n. 894, Bot. Gard. herb. n. 1431.

Distrib. in fere omni America, in Angola.

Species residuae.

Scirpus articulatus Griseb. *Kar. (1857) p. 122.*

Isolepis articulata Kunth *Enum. II* (1837) p. 198 *partim.*

Hab. in St. Croix: hb. Vahl ex Kunth l. c.

Obs. Species est gerontogea. Cl. GRISEBACH exemplum americanum non viderat. E nota KUNTHII, quoad plantam VAHLII Americanam, error verosimiliter latet.

Scirpus caespitosus Linn. foliis admodum brevibus; spica ovoidea, 3—7-flora, breviter bracteata; setis 6—4, fere levibus; stylo 3-fido; nuce obovoidea, apice acuta, levi, straminea aut brunescente.

Scirpus caespitosus Linn.! *Sp. Pl. ed. II* p. 71; *Kunth Enum. II* p. 159; *Boeck. in Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 488; *Chapm. Fl. South. U. S.* p. 519.

Hab. in Jamaica: fide Boeckeler.

Distrib. Europa, Asia bor. orient.; America septentr., Chile.

Scirpus stramineus Presl.

Scirpus stramineus Presl in *Oken Isis XXI* (1828) p. 269.

Scirpus_eriophorus Poeppig ms., non Linn.

Hab. in Cuba: Poeppig fide Presl.

Scirpus subdistichus Boeck. caespitosa, culmis $2\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ poll., setaceis; foliis 2 cum $\frac{1}{2}$ parte culmi aequilongis, setaceis; spicula laterali, late ovata, obtusa, 8—4-flora, $1\frac{1}{2}$ —1 lin. longa; bractea altera stricta, 6—9 lin. longa; glumis subdistichis, navicularibus, obtusis, hyalino-albis; nuce quam squama $\frac{1}{3}$ brevior, ellipsoidea, trigona, densissime seriatim puncticulata.

Scirpus subdistichus Boeck.! in *Linnaea XXXVI* (1869—70) p. 490.

Isolepis disticha Boeck.! in *Flora XLI* (1858) p. 415.

Cyperus Berterianus Spreng.! ms.

Hab. in St. Thomas: Bertero in hb. Boeckeler.

Obs. E materie parca ad *Se. cernuum* Vahl reducendus videtur.

XI. Eriophorum Linn.

Setae hypogynae elongatae, numerosae (vel usque ad basin divisaе), ligulatae planae nec teretes; ceteroquin fere ut *Scirpus*. — Culmi per totam longitudinem nodosi, foliigeri. Inflorescentia paniculata.

Species 10, in regione arctica et boreali (specie unica in Natal etiam lecta).

125. **Eriophorum angustifolium** Roth, stoloniferum, umbellae radiis 1-stachyis, levibus, glabris; glumis scarioso-nigricantibus.

Eriophorum angustifolium Roth *Neue Beitr.* (1802) p. 94; *Kunth Enum. II* p. 178; *Boeck. in Linnaea XXXVII* (1871) p. 95.

Eriophorum polystachyon Linn.! *Sp. Pl. ed. II* p. 76 partim.

Hab. in Jamaica: W. Wright.

Distrib. in regione tota arctica et boreali.

Species residua (*Eriophori?*).

Tricophorum Lockhartii G. Don in *Loudon Hort. Brit.* (1832) p. 468.

Hab. in Trinidad: e G. Don.

XII. *Fuirena* Rottb.

Setae hypogynae 3 interiores petaliformes, ovatae aut obovatae; ceteroquin ut *Scirpus*. — Culmi supra basin nodosi, foliigeri. Inflorescentia non umbellata. Glumae saepissime mucronatae hispidae. Rhizoma in speciebus antillanis repens.

Species 35, in calidioribus orbis totius sparsae.

Clavis specierum antillanarum.

Spicularum capita 1—5, apicem versus culmi sita.

Setae interiores ovato-lanceolatae acutae. 126. *F. squarrosa* Rottb.

Setae interiores ellipticae obtusae, caudiculatae

127. *F. simplex* Vahl.

Spicularum capita numerosa, in panicula oblonga composita disposita.

Setae interiores obovatae, vix unguiculatae 128. *F. umbellata* Rottb.

Setae interiores ovato-lanceolatae, longius stipitatae

129. *F. robusta* Kunth.

126. ***Fuirena squarrosa*** Mich. culmis 1—5 dm. longis, trigonis, apice pilosis; foliis usque ad 15 cm. longis, anguste linearibus, plus minus hispidulis; capitibus 1—5, 1—6-stachyis; spiculis 7—12 mm. longis, 3—5 mm. latis, ovoideis aut oblongis, viridibus aut brunescen-
tibus; glumis ellipticis, obtusis, mucronatis aut aristatis, 3-nerviis, minute dense pilosis, sparsim hispidis; setis 3 exterioribus (sepalis) cum nuce saepe aequilongis, linearibus retrorsim hispidis; setis 3 interioribus (petalis) cum nuce (rostro incluso) saepe aequilongis, longe stipitatis, ovato-lanceolatis, in aristam acuminatis, integris, glabris raro minute pilosulis; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, longius stipitata, ovoidea, trigona, levi, pallida, rostro lineari longo apice scabro.

Fuirena squarrosa Mich. *Fl. Bor. Amer. I* (1803) p. 37; Kunth *Enum. II* p. 184; Bocck. in *Linnaea* XXXVII (1871) p. 106; Hemsl. *Biol. Centr. Amer. Bot. III* p. 463; Holm in *Amer. Journ. Sci. IV* (1897) pp. 13—26 cum tab.

Fuirena Schiedeana Kunth! *Enum. II* (1837) p. 183.

Hab. in Cuba: Torralbas n. 26; Jamaica: fide Vahl.

Distrib. in America septentrionali frequens.

127. ***Fuirena simplex*** Vahl, setis interioribus (petalis) rotundato-obtusis, muticis aut aristella parva curvata infra glumae apicem excurrente; ceteroquin ut *F. squarrosa* Mich.

Fuirena simplex Vahl *Eclog. Amer. II* (1798) p. 8; Kunth *Enum. II* p. 183; A. Rich. in *Sagra Fl. Cub. XI* p. 291; Coville in *Bull. Torrey Club XVII* (1890) p. 4 t. 98 fig. 2.

Fuirena obtusiflora Vahl *Eclog. Amer. II* (1798) p. 8; Kunth *Enum. II* p. 183.

Fuirena Schiedeana C. Wright! in *Saur. Cub.* (1871) n. 2645 p. 177; non Kunth.

Hab. in Cuba: Liebmann, Sagra, C. Wright n. 3777.

Distrib. in Texas, Mexico.

Obs. A *F. squarrosa* Mich. parum diversa.

128. ***Fuirena umbellata*** Rottb. rhizomate repente, a squamis ovato-lanceolatis intecto; culmis 5—15 dm. longis, triquetris, apice pilosis; foliis usque ad 15 cm. longis 8—12 mm. latis, hispidopilosis rarius glabratiss; panicula oblonga, composita, pedunculis axillaribus remotis; capitibus corymboso-paniculatis; spiculis 1 cm. longis, 3—4 mm. latis, 3—10-nim fasciculatis, pilosis, viridibus aut fusco-castaneis, ob aristas glumarum undique patulas subsquarrosis; glumis ellipticis, aristatis saepius hispidis; setis interioribus (petalis) cum nuce subaequilongis, latius obovatis, vix unguiculatis; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, ovoidea, levi, pallida aut brunescens, rostro cylindrico minute scabro.

Fuirena umbellata Rottb. *Deser. et Ic.* (1773) p. 70 t. 19 i. c. t. 18 altera fig. 3; *Kunth Enum. II* p. 185; *Griseb. Flor.* p. 573 et *Pl. Cub.* p. 242; *Bocck. in Linnæa XXXVII* (1871) p. 110; *Saur. Cub.* n. 2647 p. 178; C. B. Clarke in *Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI* p. 66.

Fuirena paniculata Linn. f. *Suppl.* (1781) p. 105.

Fuirena campotricha C. Wright! in *Saur. Cub.* (1871) n. 2646 p. 177.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3387, 3778; Jamaica: Aublet n. 36, March n. 84; Hispaniola: Mayerhoff, Picarda n. 1426; Portorico: Blauner n. 116, 250, Eggers n. 439, 697, Hornemann n. 250, Sintenis n. 123, 1253, 1471, 1962, 6805, Stahl n. 304; Guadeloupe: Duchassaing n. 11, Duss n. 3128, l'Herminier n. 14; Dominica: Eggers, Imray n. 353, Nicholls n. 155, 166; Martinique: Belanger n. 1253, Duss n. 694, 694^a, Hahn n. 694, Husnot n. 29, Sieber n. 15; St. Lucia: Anderson; St. Vincent: Smith n. 929; Grenada: Eggers n. 6114, Sherring n. 271, Smith n. 66; Trinidad: Appun n. 206, 223, Fendler n. 878, Hart n. 2223, 3216, 3344, 3609, Sieber n. 358.

Distrib. in tropicis et calidioribus orbis fere totius.

129. ***Fuirena robusta*** Kunth, culmo robusto, fere glabro; spicularum fasciculis 2—5-stachyis; setis interioribus (petalis) stipitatis, ovato-lanceolatis, mucronatis, nucem multo superantibus; ceteroquin ut *F. umbellata* Rottb.

Fuirena robusta Kunth! *Enum. II* (1837) p. 185; *Bocck. in Linnæa XXXVII* (1871) p. 111.

Fiirena schizophylla C. Wright! in *Saur. Cub.* (1871) n. 2650 p. 178.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3779.

Distrib. in America tropica.

XIII. *Lipocarpa* R. Br.

Glumae bisexuales, fertiles numerosae, dense undique imbricatae. Squamellae 2, nucem superantes, hyalinae, cum gluma parallelae, postica inferior. Setae hypogynae 0. Stylus parvulus, breviter 3—2-fidus. — Glabrae. Culmi praeter basin enodes, nudi. Spiculae in 1 caput congestae (vel spicula 1). Rhachilla spiculae persistens; glumae a basi sensim caducae. Stylus basi non dilatatus, deciduus.

Species 13, in tropicis et calidioribus utriusque orbis sparsae.

Obs. Spiculae structura mihi non certa. Ex sententia KUNTHII et HOLMII "spicula" est spica; "glumae" sunt bracteae; squamella inferior est prophyllum; spicula vera e 2 floribus nudis altero masculo altero foemineo constat.

130. *Lipocarpa Humboldtiana* Nees, culmo 10—25 cm. longo; capite 3—1-stachyo; spiculis stramineis aut plus minus purpurascentibus; glumarum apicibus acuminatis, obtusis, subincurvatis; nuce in gynophoro parvulo depresso-globoso sustentata; stylo lineari.

Lipocarpa Humboldtiana Nees in *Linnaea* IX (1834) p. 287.

Lipocarpa maculata Torrey! in *Ann. Lyceum New York* III (1836) p. 288; Kunth *Enum.* II p. 267; Boeck. in *Linnaea* XXXVII (1871) p. 117; *Saur. Cub.* n. 2644 p. 177.

Lipocarpa cochleata Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 241.

Lipocarpa argentea Boeck.! in *Linnaea* XXXVII (1871) p. 114 partim i. e. quoad exempla americana.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3386.

Distrib. in America, a Virginia usque ad Brasiliam australem.

Obs. Anthera 4-locellata fide THEO. HOLM in *Amer. Journ. Sci.* VII (1899) p. 173.

XIV. *Dichromena* Vahl.

Glumae numerosae, dense polyspirae; imae plures vacuae, sequentes paucae (1—3) bisexuales nucigerae; superiores plures infertiles vel masculae. Setae hypogynae 0. Stamina 3—2, antica. Stylus linearis; rami 2, lineares, stylo longiores. Nux sessilis, obovoidea aut orbicularis, compressa, a stylobasi pyramidali (depressa aut conica) compressa persistente coronata. — Plantae graciliores, foliis angustis. Culmi nudi, monocephali. Spiculae dense (in *D. ciliata* laxius) capitatae,

saepe albae aut cinnamomeae. Bracteae caput superantes, angustae, basi dilatatae saepe plus minus albicantes.

Species 13, in America calidiore sparsae.

Obs. Genus a *Rhynchospora* Sect. *Psilocarya* non nisi differt spiculis capitatis, saepe stramineis vel cinnamomeis, nuces paucas (1—3) maturantibus; forsan cum cl. BOECKELER in *Rhynchospora* potius mergendum.

Clavis specierum antillanarum.

* Bracteae basi glabrae.

Bracteae 3.—5 basi albescentes, patulo-deflexae

131. *D. leucocephala* Mich.

Bracteae 2, oblique erectae . . . 132. *D. seslerioides* C. B. Clarke.

** Bracteae basi (saepe minute) ciliato-pilosae.

† Nux transversim conspicue undulato-lineata

Nucis lineae transversales paucae

133. *D. pubera* Vahl.

Nucis lineae transversales numerosae tennes

Spiculae albae subspicatum capitatae

134. *D. ciliata* Vahl.

Spiculae 1—5, sessiles

Culmi filiformes; spiculae albae

135. *D. filiformis* C. B. Clarke.

Culmi graciles; spiculae cinnamomeae

136. *D. radicans* Schlecht. et Cham.

†† Nux levis, vix obscure transversim lineata

137. *D. Grisebachii* C. B. Clarke.

131. **Dichromena leucocephala** Mich. glabra, stolonibus tenuibus, elongatis, a squamis striatis fusce stramineis intectis; culmis 3—5 dm. longis; foliis cum $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, angustis; bracteis 3—5, usque ad 8 cm. longis, basi glabris dilatatis quam intus tam extra albescentibus; spiculis 8—16, dense capitatis, 6—8 mm. longis, 8—15-glumis, 3—1-nucigeris; glumis 5 mm. longis, ovato-triangularibus, obtusis, albis; stylo longo, ramis 2 longis; nuce cum $\frac{1}{4}$ parte glumae aequilonga, late obovoidea, compressa, a lineis crebris horizontalibus undulata; rostro cum $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongo.

Dichromena leucocephala Mich. *Fl. Bor. Amer. I* (1803) p. 37; *Kunth Enum. II* p. 275.

Dichromena colorata Hitchc. *Pl. Bahamas* (1893) p. 141 quoad tab. *Sloanei* 78 fig. 1.

Schoenus stellatus Lam. *Encey. I* (1784) p. 741; *Swartz Prodr. p. 19 et Fl. Ind. Occid. I* p. 102.

Schoenus coloratus Linn. *Sp. Pl. ed. II* p. 64 partim; cf. Boeck. in *Linnaea XXXV* (1867—68) p. 428 in nota.

Rhynchospora stellata Griseb.! *Kar. (1857)* p. 123 et *Flor. p. 576 et Pl. Cub. p. 247; Saur.!* *Cub. n. 2696* p. 185.

Rhynchospora leucocephala Bocck.! in *Kjob. Vidensk. Meddel.* (1869—70) p. 144, et in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 532.

Sloane Jamaica I p. 119 t. 78 fig. 1.

Hab. in Bermuda: Moseley; Bahama: Brace n. 212, Eggers n. 3833 (Fortune Island), 4129 (Hog Island), Northrop n. 100; Cuba: Sagra n. 511, C. Wright n. 716, 718, 1530; Jamaica: Aublet n. 41, 66; Hispaniola: Favrat n. 53, Jacquemont, Picarda n. 1104, Preneloup n. 632 partim; Portorico prope Yabucoa: Eggers n. 483, 590; Guadeloupe inter Pointe à Pitre et Gozier: Duss n. 3131, l'Herminier n. 26, 27; Martinique: Husnot n. 30.

Distrib. a Carolina usque ad Texas, Mexico, Yucatan, frequens.

132. **Dichromena seslerioides** C. B. Clarke, fere glabra, rhizomate repente; culmis 2—4 dm. longis, tenuibus, rigidiusculis; foliis 10—15 cm. longis, 1—2 mm. latis, marginibus involutis, minute puberulis; bracteis 2, usque ad 12 mm. longis, caput superantibus, rigidis, basi paullo dilatatis, albicantibus; spiculis 5—8, usque ad 5 mm. longis, albide stramineis, 3—1-nucigeris; glumis muticis; stylo lineari, ramis 2 linearibus longis; nuce parva, obovoidea, castanea (fide Grisebachii transversim undulato-lineata); rostro pyramidali, compresso, magno.

Dichromena seslerioides Benth.! ms.

Rhynchospora seslerioides Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 247; *Saur.*! *Cub.* n. 2697 p. 185.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3415.

133. **Dichromena pubera** Vahl, radice fibrosa; culmis 1—3 dm. longis, gracilibus; foliis 10—15 cm. longis, usque ad 3—4 mm. latis, planis, obtusiusculis, pilosulis aut glabratis; bracteis c. 4, usque ad 2—5 cm. longis, cum foliis consimilibus, basi paullo ciliato-pilosis parum albicantibus; spiculis 8—1, usque ad 6—8 mm. longis, 8—15-glumis, c. 3-nucigeris, stramineis apice fusce cinnamomeis; glumis ovato-oblongis, obtusis; stylo tenui, ramis 2 longis, linearibus; nuce 1 mm. longa, orbiculari, compressa, brunea nigrescente, a paucis lineis horizontalibus insigniter undulato-zonata; rostro cum nuce aequilato, in nuce depresso.

Dichromena pubera Vahl! *Enum. II* (1806) p. 241 pro majore parte; *Kunth Enum. II* p. 275.

Schoenus pubescens H. B. K. *Nov. Gen. et Sp. I* (1815) p. 228.

Rhynchospora pubera Bocck.! in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 528.

Hab. in Hispaniola (an re vera ex hac insula, anne e Guiana?): Mayerhoff n. 847; Trinidad: Aublet n. 84.

Distrib. in America australi tropica.

134. **Dichromena ciliata** Vahl, rhizomate brevi, oblique descendente; culmis 1—7 dm. longis, gracilibus, trigonis, glabris vel raro hirto-pilosis; foliis 2—3 dm. longis, 2—4 mm. latis, planis, pilosis aut glabratiss, vaginis fere semper pilosis; capite 10—15 mm. in diam., 3—15-stachyo; bracteis 4—6, usque ad 5—10 cm. longis, 2—3 mm. latis, basi paullo dilatatis, extra parum intus plus minus albicantibus, ciliato-pilosis vel in forma *nervosa* (sp. Vahl) fere glabris, ima saepe 1—2 mm. distante; spiculis 7 mm. longis, 8—15-glumis, c. 3-nucigeris, subspicatis, albo-stramineis; glumis in carina saepe scabro-pilosis; stylo lineari, ramis 2 linearibus longis; nuce 1 mm. longa, late obovoidea, brunea proventu nigra, a crebris lineis horizontalibus undulato-zonata; rostro cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ parte nucis aequilongo, ovoideo-lanceolato.

Dichromena ciliata Vahl Enum. II (1806) p. 240; Kunth Enum. II p. 276.

Dichromena nervosa Vahl Enum. II (1806) p. 241?

Dichromena pura Nees! in Linnæa IX (1834) p. 291 et in Scem. Voy. Herald p. 222.

Dichromena puberula A. Rich. in Sagra Fl. Cub. XI (1850) p. 292.

Schoenus globosus H. B. K.! Nov. Gen. et Sp. I (1815) p. 229.

Rhynchospora hirsuta Griseb.! Flor. (1864) p. 576, non Vahl.

Rhynchospora pura Griseb.! Flor. (1864) p. 577.

Rhynchospora nervosa Boeck.! in Kjob. Vidensk. Meddel. (1869—70) p. 113 et in Linnæa XXXVII (1873) p. 529, syn. *D. pulchella* Kunth excl.

Rhynchospora Jelskiana Boeck.! in Linnæa XXXVIII (1874) p. 401.

Hab. in Cuba: Combs n. 126 (S. Clara), Sagra, C. Wright n. 2797; Jamaica: Alexander, Cuming n. 54, Hansen n. 2, Hart n. 847, Wilson n. 309; Hispaniola: Eggers n. 1681^b, 2009, 2688, Favrat n. 53, Picarda n. 423, Prenleloup n. 632 partim, Schomburgk n. 74, 89; Portorico: Blauner n. 114, Krug n. 1245, O. Kuntze n. 268, Sintenis n. 89, 5109, 5148, Wydler n. 363; St. Thomas: Eggers n. 188; Antigua: Wullschlaegel n. 701, 702; Guadeloupe: Duss n. 3611, 3822, l'Herminier n. 23, 25; Martinique: Belanger n. 403, Duss n. 465, Hahn n. 370, 831; St. Vincent: Guilding, Smith n. 539; Barbados: Eggers n. 7199; Grenada: Broadway n. 129, Sherring; Tobago: Eggers n. 5506; Trinidad: Crueger n. 481, Fendler n. 880.

Distrib. America centralis et australis calidior.

Var. **Vahlia**n C. B. Clarke, stolonibus longis, a squamis fusce stramineis intectis.

Dichromena tenuifolia Spreng. Syst. I (1825) p. 203; Kunth Enum. II p. 275.

Schoenus tenuifolius H. B. K. *Nov. Gen. et Sp. I* (1815) p. 228.
Rhynchospora Vahlia Griseb.! *Flor.* (1864) p. 577, *Pl. Cub.*
p. 248; Sauv.! *Cub. n. 2695 p. 185.*

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3797; Guadeloupe: Bertero.

Distrib. America centralis et australis calidior.

135. **Dichromena filiformis** C. B. Clarke, rhizomate filiformi, vix $\frac{1}{2}$ mm. crasso; culmis 3—6 cm. longis filiformibus; foliis 8—15 cm. longis, filiformibus; spiculis 3—5, capitatis, 3 mm. longis, albis; bracteis filiformibus, basi ciliatis parum dilatatis; glumis stylo staminibus fere ut *D. ciliatae*.

Hab. in India occident., verisim. Hispaniola: Poiteau.

Obs. Exemplum in herb. Delessert conservatum; *D. ciliatae* vix forma gracillima.

136. **Dichromena radicans** Schlecht. et Cham. radice fibrosa vel rhizomate oblique descendente; bracteis basi tenuissime ciliato-pilosis, parum albicantibus; spiculis 3—1, fusce cinnamomeis; capite ob culmum tenuem nutantem in humo saepe prostrato, radicante, prolifero; nuce a crebris lineis transversim tenuiter undulato-lineata; ceteroquin fere ut *D. ciliata*.

Dichromena radicans Schlecht. et Cham. in *Linnaea* VI (1831) p. 38; Liebm.! *Mexic. Halvgr. p. 59.*

Dichromena pubera Vahl! *Enum. II* (1806) p. 241 partim.

Dichromena nervosa Vahl! *Enum. II* (1806) p. 241 partim.

Rhynchospora Persooniana Griseb.! *Flor.* (1864) p. 577; *Sauv. Cub. n. 2698 p. 185.*

Rhynchospora Humboldtiana Griseb.! *Flor.* (1864) p. 577 syn. excl.

Rhynchospora Dussiana Boeck.! *Cyp. Norac. Heft II* (1890) p. 40.

Rhynchospora pubera var. β *microcarpa* Boeck.! in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 529.

Hab. in Cuba: Eggers n. 5067, C. Wright n. 717; Jamaica: Aublet n. 25, Bertero, Masson, Wilson n. 308; Hispaniola: Eggers n. 1864, 2148, Poiteau; Portorico: Blauner n. 246, Sintenis n. 2447 (prope Cayey in sylvis); St. Thomas: Eggers n. 188 partim; Guadeloupe: Duss n. 3132, l'Hermier n. 8, 22, 24; Dominica: Imray; Martinique: Duss n. 462, 464, 702, 706, Husnot n. 31, 369; St. Vincent: Eggers n. 6644, Smith n. 237; Grenada: Broadway n. 86, Eggers n. 6027, Sherring; Trinidad: Fendler n. 879, Finlay n. 1884, Hart n. 3239, Sieber n. 3.

Distrib. America centralis et tropica.

137. **Dichromena Grisebachii** C. B. Clarke, radicibus fibrosis; culmis caespitosis, 1—2 dm. longis, gracillimis; foliis $\frac{1}{2}$ mm. latis;

bracteis 1—2 cm. longis, basi tenuissime ciliato-pilosis parum albican-
tibus; capite 1—3-stachyo; spiculis 3—4 mm. longis, 8—12-glumis,
cinnamomeis; stylo lineari, ramis 2 longis; nuce vix 1 mm. longa, late
obovoidea, compressa, levi, vix obscure undulata, rostro depresso cum
 $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ parte nucis aequilongo.

Rhynchospora setigera Griseb.! Pl. Cub. (1866) p. 248; Sauv.!
Cub. n. 2693 p. 185, nec Griseb. Flor. p. 577, nec *Dichromena seti-*
gera Kunth.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3385.

XV. *Rynchospora* Vahl.

Glumae polyspirae aut obscure subdistichae; imae 3—plures va-
cuae, sequentes 1 aut plures bisexuales nucigeræ, superiores infertiles,
masculæ aut vacuæ. Setae hypogynæ 7—6 aut irregulares aut 0
(in *R. alba* usque ad 8—10). Stamina 3—2, antica. Stylus 2-fidus,
in serie *Haplostyleis* perlongus apice breviter 2-dentatus, in serie *Diplo-*
styleis alte 2-fidus ramis linearibus. Nux obovoidea, compressa, a stylo-
basi conica (brevis aut longa) persistente coronata. — Inflorescentia
capitata aut paniculata, (nec umbellata). Folia linearia semper obvia.

Species 185, in tropicis et calidioribus orbis fere totius sparsæ,
2 per zonam septentrionali-temperatam extensæ.

Obs. Series *Haplostyleae* a genere *Dichromena* stylo subindiviso, series
Diplostyleae a genere *Dichromena* spiculis laxius sitis (non dense capitatis)
diagnoscitur.

Clavis specierum antillanarum.

Series A. **Haplostyleae.** Stylus longus, rami 2 (vel vix ulli) breves, parte
styli indivisa saltem breviores.

Sect. 1. *Monocephalae.* Culmus 1-cephalus.

* Nux a basi in utroque margine scarioso-alata

Folia 2—3 mm. lata, plana 138. *R. pterocarpa* C. B. Clarke.

Folia subsetacea, marginibus incurvatis

139. *R. subimberbis* C. B. Clarke.

** Nux exalata.

Bracteae suberectae.

Fere glabra. Setae ciliatae subplumosae

140. *R. curcula* C. B. Clarke.

Bracteae basi pilosae. Setae scabrae

141. *R. hispidula* C. B. Clarke.

Capita globosa, stellata, bracteis proventu divaricatis

Bracteae caput vix superantes

142. *R. globosa* Britton.

Bracteae 3—4 dm. longae

143. *R. longibracteata* C. B. Clarke.

Sect. 2. *Polycephalae*. Capita globosa plura, raro 1.

Capita laxe corymboso-paniculata 144. *R. cyperoides* Britton.

Capita anguste elongato-paniculata 145. *R. exaltata* C. B. Clarke.

Sect. 3. *Calyptrostyleae*. Spiculae solitariae aut fasciculatae, non dense capitatae.

* Corymbi axillares, compositi; spiculae numerosae, multae fasciculatae, aureae vel ferrugineo-brunee.

† Nux oblonga.

Rhizoma vix ullum

Spicularum fasciculi oligostachyi

Stolones 0; rostrum cum nuce aequilongum

146. *R. aurea* Vahl.

Stolonifera; rostrum nuce multo longius

147. *R. triflora* Vahl.

Spicularum fasciculi 12—30-stachyi

148. *R. gigantea* C. B. Clarke.

Rhizoma horizontale, lignescens

149. *R. scutellata* Britton.

†† Nux late obovoidea . . 150. *R. corymbifera* Britton.

** Spiculae in paniculae ramis subracemosae

151. *R. racemosa* C. B. Clarke.

*** Corymbi axillares, polystachyi, in panicula oblonga, elongata dispositi; spiculae pallidae aut castaneo-viridi-maculatae

Setae 0 vel fere obsoletae.

Rostrum cum nuce subaequilongum, lineare

152. *R. elongata* C. B. Clarke.

Rostrum submitriforme, viride

153. *R. polyphylla* Vahl.

Setae 3—5, cum nuce subaequilongae.

Paniculae partiales laxe corymbosae

154. *R. aristata* C. B. Clarke.

Paniculae partiales contractae, ramulis erectis

155. *R. Ruiziana*

var. *triceps* K. Schum.

Series B. *Diplostyleae*. Stylus linearis; rami 2, lineares, cum parte styli indivisa aequilongi.

Sect. 1. *Psilostachys*. Setae 0.

* Nux transversim undulata aut rugosa.

† Spiculae 3—pluri-nucigerae.

Nucis rostrum ovoideum acuminatum.

Robusta; corymbi 30—40-stachyi

156. *R. corymbiformis* Britton.

Gracilior; corymbi 5—20-stachyi

159. *R. Juncellus* C. B. Clarke.

Nucis rostrum latum admodum depressum.

Culmus cum foliis hispidulo-pilosus

157. *R. trichodes* C. B. Clarke.

Glabra 158. *R. eximia* Britton.

†† Spiculae 1—2-nucigerae.

§ Spiculae bruneae.

Robustior; culmus 5—8 dm. longus

160. *R. rufa* var. *Liebmanniana*
C. B. Clarke.

Gracillima; culmi 1—3 dm. longi

166. *R. pusilla* Britton.

§§ Spiculae pallidae aut albae

Spiculae minutae, 1—2 mm. longae

161. *R. micrantha* Vahl.

Spiculae parvae 3—6 mm. longae.

Nux apice tridentata

165. *R. tenerrima* C. B. Clarke.

Nux apice non tridentata; rhizoma tenue.

Spiculae numerosae

Culmi glabri 162. *R. tenuis* Britton.

Culmi puberulo-sabri

163. *R. pseudo-lunata* C. B. Clarke.Spiculae 2—5 164. *R. Berterii* C. B. Clarke.

** Nux levis aut reticulata, non transversim undulato-rugosa.

Gabrae.

Spiculae bruneae, 3 mm. longae

167. *R. divergens* Britton.

Spiculae luteo-bruneae, 9 mm. longae

168. *R. longispicata* C. B. Clarke.

Spiculae stramineo-luteae 4—5 mm. longae

169. *R. brevisrostris* C. B. Clarke.

Glumae inferiores pilosae; spiculae castaneae aut bruneae

170. *R. hirsuta* Vahl.Sect. 2. *Plumosae*. Setae (saltem basi) longe dense pilosae, plumosae.Nucis rostrum bulbiforme . . . 171. *R. plumosa* Britton.Nucis rostrum basi bilobum . . . 172. *R. lunata* C. B. Clarke.Sect. 3. *Albae*. Setae retrorsim scabrae 173. *R. alba* Vahl.Sect. 4. *Fuscae*. Setae antice scabrae; nux levis nec transversim undulata.

* Plantae graciliores aut mediocres, interdum tenues.

† Nucis rostrum scabro-pilosum.

Folia plana . . . 174. *R. fuscoides* C. B. Clarke.Folia canaliculata . . . 175. *R. leptorrhyncha* C. B. Clarke.

†† Nucis rostrum glabrum

Setae longae.

Plantae mediocres

Rostrum cum $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongum176. *R. distans* C. B. Clarke.

Rostrum cum nuce subaequilongum

180. *R. gracilentia* Britton.

Planta filiformis; spiculae minutae

179. *R. Lindeniana* C. B. Clarke.

Setae breves

Spiculae bruneae . . . 177. *R. fascicularis* Vahl.Spiculae pallidae . . . 178. *R. pallida* Britton.

** Plantae robustiores, rudes.

Panicula terminalis, in caput fere congesta

181. *R. cephalotes* Vahl.

Corymbi 3—4 axillares, remoti

182. *R. comata* C. B. Clarke.

Sect. 5. *Glaucæ*. Setae antice scabrae; nux transversim undulata.

* Spiculæ 5—7 mm. longae; plantae robustiores.

Folia 4 mm. lata; corymbi densi

184. *R. stipitata* C. B. Clarke.

Folia 5—7 mm. lata; corymbi 4—8 cm. in diam.

191. *R. Marisculus* C. B. Clarke.

** Spiculæ 1—3 (rarius 4) mm. longae.

† Folia 2—4 mm. lata; culmi saepius 3—10 dm. longi

§ Rostrum $\frac{1}{2}$ parte nucis brevius.

Spiculæ ovoideae acutae, 1—2-nucigeræ

Setae nuce longiores 183. *R. glauca* Vahl.

Setae nuce breviores

185. *R. cymosa* Britton.

Spiculæ subglobosae

Spiculæ 1—2-nucigeræ

187. *R. microcarpa* Britton.

Spiculæ 5—2-nucigeræ

189. *R. sparsa* Vahl.

§§ Rostrum $\frac{1}{2}$ parte nucis longius.

Corymbi laxè divaricati 190. *R. cubensis* C. B. Clarke.

Corymbi parvi densi 192. *R. pruinosa* C. B. Clarke.

†† Folia 1—2 mm. lata, setacea aut filiformia.

Culmi 1—3 dm. longi, graciliores

Rostrum $\frac{1}{2}$ parte nucis brevius

186. *R. variflora* Britton.

Rostrum $\frac{1}{2}$ parte nucis longius

188. *R. stenophylla* Britton.

Culmi 5—15 cm. longi, setacei

193. *R. cernua* C. B. Clarke.

138. **Rynchospora pterocarpa** C. B. Clarke, stolonibus 0; culmis 1—4 dm. longis, caespitosis, gracilioribus, trigonis, glabris; foliis pluribus cum $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{4}$ parte culmi aequilongis, 2—3 mm. latis, planis, saltem in margine saepissime ciliato-pilosis; capite 1 polystachyo, 8—12 mm. in diam., denso; bracteis 3 vel pluribus, ima caput saepius superante; spiculis 5—8 mm. longis, lanceolatis, 7-glumis 1-nucigeris, glabris, stramineo-bruneis; glumis obscurius distichis, obtusis, subcorneis, 4 imis parvis vacuis, quinta multo majore bisexuali nucigera, sexta paullulum distante; setis 5—3, saepe 4, nucem cum rostro superantibus, antice scabris ima basi ciliatis; stylo longissimo, rubro, apice breviter 2-dentato; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae vix aequilonga, sessili, oblongo-obovoidea, a tergo compressa, concavo-convexa, levi, nigra, a stylobasi fere usque ad basin conspicue alata, alis scariosis tenuibus multum

incurvatis; stylobasi persistente cum $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilonga conica compressa, straminea, basi in alas decurrente.

Rhynchospora pterocarpa Roem. et Sch. Syst. II (1817) p. 891.

Rhynchospora barbata Kunth Enum. II (1837) p. 290; Griseb.! Flor. p. 574; Boeck.! in Linnaea XXXVII (1873) p. 545.

Rhynchospora macrostylis A. Dietr. Sp. Pl. II (1833) p. 74.

Chaetospora pterocarpa H. B. K. Nov. Gen. et Sp. I (1815) p. 230.

Schoenus barbatus Vahl Eclog. Amer. II (1798) p. 4.

Schoenus globosus Rudge Guiana (1805) p. 14 t. 15.

Pterotheca Vahlîi Presl Symb. Bot. I (1832) p. 56 t. 35.

Haplostylis barbata Nees! in Linnaea IX (1834) p. 295.

Diplochaete guianensis Nees in Linnaea IX (1834) p. 296.

Hab. in Hispaniola: Bertero; Trinidad: Alexander n. 5161, (Piarco Savanna), Fendler n. 895, Finlay n. 1890, Hart n. 4661, Lockhart n. 298, Lunt n. 6023.

Distrib. America tropica, a Panama usque ad Rio de Janeiro.

139. **Rynchospora subimberbis** C. B. Clarke, fere glabra, culmis 7—20 cm. longis tenuibus; foliis pluribus, cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, subsetaceis marginibus involutis; capite 7 mm. in diam., 10—3-stachyo; setis saepissime 6 cum nuce subaequilongis, scabris, ima basi ciliatis; spicularum structura nucibusque fere ut *R. pterocarpae*.

Rhynchospora subimberbis Griseb.! Pl. Cub. (1866) p. 245; Sauv.! Cub. n. 2679 p. 182.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3402.

140. **Rynchospora curvula** C. B. Clarke, fere glabra, culmis caespitosis 10—14 cm. longis, tenuibus; foliis cum $\frac{1}{3}$ parte culmi vix aequilongis, rigidis, curvatis, angustis, concavo-convexis apice trigonis; capite 5—8-stachyo, fusce stramineo; bracteis capite brevioribus, ima ovata acuta; spiculis 6 mm. longis, lanceolatis, 6—7-glumis, 1-nucigeris; glumis 4 imis parvis subcorneis, vacuis, quinta multo majore ovali-oblonga florem bisexualem in rhachillae sulco fovente, sexta paullulo distante mascula; setis 6—5, nucem paullo superantibus, plumoso-ciliatis apice scabris; stylo perlongo, apice breviter 2-dentato, stylobasi parvula bulbillo-conica; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, oblongo-ellipsoidea, sessili, apice subito angustata, levi, fusca.

Rhynchospora curvula Griseb.! Flor. (1864) p. 574.

Hab. in Trinidad: Lockhart n. 299.

Distrib. Guiana gallica.

141. **Rynchospora hispidula** C. B. Clarke, rhizomate brevi, horizontali; culmis 3 dm. longis, gracilioribus, glabris; foliis prope ad culmi

basin sitis, cum $\frac{1}{3}$ parte culmi aequilongis, 1—2 mm. latis, planis, in margine saepe minute pilosis, vaginis pilosis; capite sub-8-stachyo; bracteis 3—6, viridibus, basi dilatatis, ima caput superante, in margine ciliato-pilosa; spiculis 7 mm. longis, oblongis, glabris, luteo-bruneis, 7-glumis, 1-nucigeris; glumis subcorneis, quinta nucigera a sexta paullum distante; setis 6, nucem paullo superantibus, simpliciter scabris; stylo longissimo, apice breviter 2-fido; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, oblongo-obovoidea, sessili, apice subito angustata, in facie postica leviter excavata, microscopice muriculata; rostro cum $\frac{1}{3}$ parte nucis aequilongo, basi cum nuce fere aequilato, conico, pallido, marginibus incurvis.

Rhynchospora hispidula Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 245; *Saur. Cub.* n. 2672 p. 181, non Boeck.

Rhynchospora Grisebachii Boeck.! ms.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3401.

Obs. *Rhynchospora cephalantha* A. Rich. in *Sagra Cub.* XI p. 293 ob setas hypogynas piloso-setosas recedit.

142. ***Rynchospora globosa*** Britton, fere glabra, stolonibus nullis; culmis 3—7 dm. longis, mediocribus, basi foliigeris, monocephalis; foliis 2—5 dm. longis, usque ad 5 mm. latis; capite 1—2 cm. in diam., juniore anguste obovoideo, proventu globoso spiculis undique stellatis; bracteis caput vix superantibus, ovatis, obtusis, bruneis perrigidis mucrone brevi; spiculis 6—10 mm. longis, rigidis, 7-glumis, 1-nucigeris; glumis subdistichis obtusis, 4 imis parvis, quinta multum longiore bisexuali, sexta oblonga mascula aut sterili paullum distante; setis 5—6, nuce parum brevioribus ciliato-plumosis apice scabris; stylo longo, rubro, apice breviter 2-dentato; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, levi aut in humeris scabro-hispida, fusca; rostro parvulo, cum $\frac{1}{3}$ parte nucis vix aequilongo, bulboso-conico.

Rhynchospora globosa Britton! in *Trans. New York Acad.* XI (1892) p. 83.

Rhynchospora globosa Roem. et Sch. *Syst.* II (1817) p. 89; Kunth! *Enum.* II p. 288; Boeck.! in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 538; Griseb.! *Flor.* p. 574 et *Pl. Cub.* p. 246; *Saur. Cub.* n. 2674 p. 181.

Rhynchospora alta Boeck.! *Cyp. Norae.* Heft II (1890) p. 20.

Chactospora globosa H. B. K. *Nor. Gen. et Sp.* I (1815) p. 230.

Schoenus globosus Poir. *Encyc. Suppl.* V (1817) p. 617; Willd. ms. ex Kunth.

Cephaloschoenus globosus Nees in *Linnaea* IX (1834) p. 296.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3403; Trinidad in Piarcó Savanna: Broadway n. 5296, Fendler n. 881, Hart n. 1888, 4656, Lockhart.

Distrib. a Mexico usque ad Paraguay, frequens.

143. **Rynchospora longibracteata** C. B. Clarke, fere glabra, culmis 6—8 dm. longis, mediocribus, teretibus, monocephalis, basi foliigeris; foliis cum culmo aequilongis, 3—4 mm. latis, marginibus in sicco involutis; capite 10—14 mm. in diam., polystachyo, denso, albo; bracteis 3—4 dm. longis, cum foliis consimilibus; spiculis 7-nucigeris; glumis obtusis, corneis, 4 imis parvis, quinta multo longiore bisexuali; setis 0; nuce cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, levi, pallida; rostro cum $\frac{1}{3}$ parte nucis vix aequilongo, conico, nigrescente.

Rynchospora longibracteata Boeck.! in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 534.

Rynchospora setigera Griseb.! *Flor.* (1864) p. 577 partim, non Kunth.

Hab. in Hispaniola (an re vera ex hac insula, anne e Guiana?): Mayerhoff; Trinidad: Lockhart.

Distrib. Guiana anglica.

Obs. Nux levissima, symmetrica, biconvexa est; nux a cl. BOECKELERO descripta (e Schomburgk n. 233) deformata est.

144. **Rynchospora cyperoides** Britton, fere glabra, rhizomate horizontali, lignescente; culmo 1—8 dm. longo, mediocri, in parte superiore saepius nodoso, foliigero; foliis culmum saepe superantibus, 3—5 mm. latis; capitibus 1—25, laxe paniculatis, 8—10 mm. in diam., globosis, 8—24-stachyis, ferrugineo-brunceis; bracteis quam capita longioribus, cum foliis consimilibus; spiculis 7-glumis, 1-nucigeris; glumis 4 imis parvis vacuis, quinta nucigera paullo infra sextam sita; setis 6, nuce parum brevioribus, rigidis, antice scabris, ferrugineis; stylo longo rubro, apice breviter 2-fido; nuce vix 1 mm. longa, $\frac{3}{4}$ mm. lata, sessili, apice multum angustata, levi aut tenuissime transversim undulata, cinnamomea proventu brunescens; rostro cum nuce aequilongo, basi cum $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilato, e conico lineari.

Rynchospora cyperoides Britton! in *Trans. New York Acad.* XI (1892) p. 84; C. B. Clarke in *Dur. et Schinz Fl. Afr.* V (1895) p. 653.

Rynchospora cyperoides Mart. in *Denkschr. Acad. Wiss. Muench.* VI (1816—17) p. 149; Griseb.! *Flor.* p. 574 et *Pl. Cub.* p. 246; Saur. *Cub.* n. 2675 p. 181.

Rynchospora polycephala Kunth *Enum.* II (1837) p. 291; Griseb. *Kar.* p. 123; Boeck.! in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 552.

Rynchospora tenuirostris Kunth *Enum.* II (1837) p. 303.

Rynchospora sphaerocephala Boeck.! *Cyp. Novae. Hest* I (1888) p. 24.

Schoenus cyperoides Swartz *Prod.* (1788) p. 19 et *Fl. Ind. Occid.* I p. 110.

Schoenus triceps Vahl *Eclog. Amer. II* (1798) p. 4.

Schoenus? holoschenoides L. C. Rich. in *Acta Soc. Hist. Nat. Paris I* (1792) p. 106.

Schoenus fragiferus Rudge *Guiana* (1805) p. 15 t. 17.

Chaetospora triceps Schlecht. et Cham. in *Linnaea VI* (1831) p. 29.

Dichromena fragifera Dietr. *Sp. Pl. II* (1833) p. 169.

Cephaloschoenus polycephalus Nees! in *Linnaea IX* (1834) p. 296.

Ephippiorrhynchium polycephalum Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 134 t. 12.

Mariscus pillulifer G. Bertol. in *Mem. Acad. Scienz. Ital. Bologna V* (1854) p. 466 t. 24.

Hab. in ins. Bahama: Dale, Northrop n. 288; Cuba: C. Wright n. 3404; Hispaniola: Eggers n. 1696, 2453, 2453^b, Prenleloup n. 633; Portorico: Blauner n. 253, Eggers n. 676, 714, Sintenis n. 850, 1235, 1236, 1241^b, 1409^b, 1485, 5244, 6794, 6851, Stahl n. 307, Wydler n. 364; Guadeloupe: l'Herminier n. 36; Martinique: Duss n. 699, 761, Hahn n. 33, 792, Sieber n. 8; Trinidad: Broadway n. 5300, 5329, Crueger, Fendler n. 855, O. Kuntze n. 1041, Lockhart.

Distrib. in Africa tropica cum Mascarenia sparsa; in Mexico, in America australi a Venezuela usque ad Montevideo, frequens.

145. **Rynchospora exaltata** C. B. Clarke, rhizomate horizontali, lignescens; culmo 3—8 dm. longo, robusto, per totam longitudinem nodoso foliigero aut bracteigero; foliis cum culmo saepe aequilongis 5 mm. latis; capitibus in panicula linearis 3—5 dm. longa dispositis, 8—14 mm. in diam., globosis, densis, stramineis aut fusciscentibus; pedunculis distantibus, piloso-scabris; spiculis oblongo-lanceolatis, 7-glumis, 1-nucigeris; glumis mucronatis, 4 imis vacuis; setis obsoletis; stylo longo, apice subindiviso; nuce 1½ mm. longa, 1½ mm. lata, obovoidea, tenuiter transversim lineolata, castaneo-rubra; rostro cum nuce aequilongo, basi cum ½—⅔ parte nucis aequilato, pallido.

Rhynchospora exaltata Kunth! *Enum. II* (1837) p. 291 partim; Boeck! in *Linnaea XXXVII* (1873) p. 551; Griseb.! *Pl. Cub.* p. 246; Saur.! *Cub. n.* 2671 p. 181.

Echinoschoenus triceps Nees in *Linnaea IX* (1834) p. 297, *syn. excl.*

Echinoschoenus sparganioides Nees in *Nova Acta Nat. Cur. XIX Suppl. I* (1843) p. 103; Lindl. et Nees *ms. ex Nees*.

Hab. in Cuba: Eggers n. 5007 (Pinal de Sta. Ana 800 m. alt.), C. Wright n. 719.

Distrib. America australis tropica.

146. **Rynchospora aurea** Vahl, fere glabra, robusta, estoloniifera, culmo 6—10 dm. longo, per totam longitudinem nodoso; foliis

3—6 dm. longis, 10—15 mm. latis; panicula 3—4 dm. longa, corymbo terminali composito, corymbis 3—4 axillaribus distantibus majore; bractea ima folio summo simili, vagina saepe 2—4 cm. longa; spiculis numerosis, solitariis et subfasciculatis, 6—10 mm. longis, ovato-lanceolatis, 1-nucigeris, ferrugineo-bruneis; glumis ovatis, obtusis vel mucronatis; setis 6, nucem superantibus, simpliciter antice scabris, rigidis, bruneis; stylo longo, subindiviso; nuce 2—3 mm. longa, sessili, oblongo-obovoides, levi vel rugosa, fusce nigra; rostro cum nuce aequilongo, basi cum nuce subaequilato, longe conico, pallido, in utraque facie levi-sulcato plus minus scabrello.

Rhynchospora aurea Vahl *Enum. II* (1806) p. 229; Beauv. *Fl. d'Owar. II* p. 39 t. 81 fig. 2; C. B. Clarke in Hook. f. *Fl. Brit. Ind. VI* p. 670.

Rhynchospora aurea R. Br. *Prodr.* (1810) p. 230; Kunth *Enum. II* p. 293; Griseb. *Kar.* p. 124; Boeck. in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 266; Duss. *Flor.* p. 550.

Rhynchospora articulata Spreng. *Syst. I* (1825) p. 197; Kunth *Enum. II* p. 293.

Rhynchospora florida Roem. et Sch. *Syst. II Mant.* (1824) p. 45; Griseb. *Pl. Cub.* p. 246; Sauv. *Cub. n.* 2678 p. 182.

Rhynchospora surinamensis Nees in *Linnaea* IX (1834) p. 297; Griseb. *Flor.* p. 575.

Rhynchospora corymbosa Hitchc. *Pl. Baham.* (1893) p. 141.

Scirpus corymbosus Linn. *Amoen. Acad. IV* (1788) p. 303.

Schoenus surinamensis Rottb. *Deser. et Ic.* (1773) p. 68 t. 21 fig. 1.

Schoenus floridus Rudge *Guiana* (1805) p. 15 t. 18.

Calyplostylis fuscicularis Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 139.

Cephaloschoenus articulatus Nees in *Edinb. New Phil. Journ.* (1834) p. 266.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3405; Hispaniola: Bertero; Portorico: Krug n. 1247, Sintenis n. 150, 1241, 5137, Stahl n. 306; Guadeloupe: Duchassaing, Duss n. 3118, 3523, 3612, Husnot n. 38; Martinique: Duss n. 761^a, Hahn n. 696; Trinidad: Hart n. 1883, Purdie.

Distrib. in terris fere omnibus tropicis et subtropicis.

147. ***Rhynchospora triflora*** Vahl, robustior, fere glabra, stolonifera; corymbis laxis, radiis radiolisque longis, tenuibus; spiculis 3—1-nim fasciculatis; setis 6, nucem superantibus; rostro quam nux longiore, lineari-conico; ceteroquin ut *R. aurea* Vahl.

Rhynchospora triflora Vahl *Enum. II* (1806) p. 232; C. B. Clarke in Hook. f. *Fl. Brit. Ind. VI* p. 670.

Rhynchospora triflora Roem. et Sch. Syst. II (1817) p. 84; Kunth! Enum. II p. 292; Bocck.! in Linnæa XXXVII (1873) p. 625.

Rhynchospora stenorrhyncha Griseb.! Flor. (1864) p. 575, et Pl. Cub. p. 246; Saur.! Cub. n. 2677 p. 182.

Ephippiorrhynchium triflorum Nees in Mart. Fl. Bras. II pars I (1843) p. 136 in nota.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3384, 3389; Trinidad: Lockhart, Purdie n. 26.

Distrib. Zeylanica, Brasilia (Rio Negro).

148. **Rhynchospora gigantea** C. B. Clarke, spiculis 12—30-nim fasciculatis; nuce in utroque humero a 1—2 sulcis impresso; ceteroquin fere ut *R. aurea* Vahl.

Rhynchospora gigantea Link Jahrb. III (1820) p. 76; Kunth Enum. II p. 294; Bocck.! in Linnæa XXXVII (1873) p. 628.

Rhynchospora surinamensis C. Wright! in Sauv. Cub. (1871) n. 2676 p. 181; non Nees.

Cephaloschoenus pseudo-mariscus Nees in Linnæa IX (1834) p. 296.

Calyptrostylis Rudgei Nees in Linnæa IX (1834) p. 295.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3790; Portorico prope Manatí in paludosis ad margines lagunae Tortuguero: Sintenis n. 6672.

Distrib. a Guiana usque ad Paraguay.

149. **Rhynchospora scutellata** Britton, rhizomate brevi, horizontali, lignescente; culmo 9 dm. longo; corymbis laxis; spiculis 2—6-nim fasciculatis vix ullis solitariis; nuce in utraque facie a magna depressione excavata, scutellata; ceteroquin ut *R. aurea*.

Rhynchospora scutellata Britton! in Bull. Torrey Club XVIII (1891) p. 369 et in Trans. New York Acad. XI (1892) p. 85.

Rhynchospora scutellata Griseb.! Pl. Cub. (1866) p. 246; Saur. Cub. n. 2673 p. 181.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3406.

Distrib. Texas.

150. **Rhynchospora corymbifera** Britton, fere glabra, robusta, estolonifera; culmo metrali et ultra; foliis 4—8 dm. longis, 1 cm. latis; panicula 3—4 dm. longa, oblonga, corymbis axillaribus distantibus, compositis, 5—10 cm. in diam.; spiculis vix capitellatis, 1 cm. longis, 1½ mm. latis, 7-glumis, 1-nucigeris, bruneis; glumis 4 imis vacuis parvis, quinta nucigera vix mucronata; setis 6, nucem superantibus, rigidis, antice scabris, bruneis; stylo longo, apice vix 2-dentato; nuce 1 mm. longa, cum ¼—⅓ parte glumae aequilonga, obovoidea, levi, brunea; rostro cum nuce aequilongo, e basi bulboso-conica lineari, pallido.

Rhynchospora corymbifera Britton! in *Trans. New York Acad.* XI (1892) p. 85.

Rhynchospora longiflora Presl! in *Isis* XXI (1828) p. 269 et *Symb. Bot.* p. 41 t. 28.

Rhynchospora corymbifera Nees! in *Linnaea* IX (1834) p. 297; Boeck. in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 619; Duss! *Flor.* p. 550.

Rhynchospora aurea Nees! in *Flora* XI (1828) p. 303; Kunth *Enum.* II p. 293 partim.

Rhynchospora florida Griseb.! *Flor.* (1864) p. 575, non Dietr.

Rhynchospora laxa Roem. et Sch. *Syst. II Mant.* (1824) p. 46 partim, non Vahl.

Schoenus Surinamensis Rottb. *Descr. et Ic.* (1773) p. 68 t. 21 fig. 1; Swartz *Fl. Ind. Occid.* I p. 99.

Hab. in India occident.: Sieber *Agrost.* n. 96; Guadeloupe: Duss n. 3117, l'Herminier n. 12; Martinique: Belanger n. 794, Duss n. 701, 762, 763, Hahn n. 705, Husnot n. 34, Sieber n. 261; Dominica: Eggers n. 675, 978, Imray (alt. 900 metr.), Ramage (alt. 1000 metr.); St. Vincent: Smith n. 1089, 1676.

Var. **subcostata** C. B. Clarke, nuce longitudinaliter subcostata (ob nucis cellulas extimas per series longitudinales magis regulariter ordinatas).

Hab. in Jamaica: Domina March, Purdie.

151. **Rhynchospora racemosa** C. B. Clarke, fere glabra, rhizomate brevi; culmis 5—6 dm. longis, per totam longitudinem nodosis; foliis 1—2 dm. longis, 1—3 mm. latis; panicula 2—4 dm. longa, angusta, pedunculis imis 8—20-stachyis anguste paniculigeris, superioribus racemosis; spiculis 5—7 mm. longis, albicantibus, 8-glumis, 2-nucigeris; glumis muticis, 4 imis parvis vacuis; stylo longo, subindiviso; setis 0; nuce 1 mm. longa, obovoidea, tenuiter reticulata, pallide brunea; rostro cum $\frac{2}{3}$ parte nucis aequilongo, viridescente.

Rhynchospora racemosa C. Wright! in *Sauv. Cub.* (1871) n. 2680 p. 182.

Rhynchospora polyphylla Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 246 partim.

Rhynchospora polyphylla var. *umbrosa* Boeck. in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 636.

Schoenus gracilis Swartz *Fl. Ind. Occid.* I (1797) p. 109 partim.

Hab. in Cuba: Eggers n. 5114 (prope villam Monte Verde, alt. 800 m.), C. Wright n. 727.

152. **Rhynchospora elongata** C. B. Clarke, glabra, rhizomate brevi; culmis 2—6 dm. longis, per totam longitudinem nodosis; foliis longis, 2—3 mm. latis; corymbis axillaribus, remotis, 1—2 cm. in diam., 4—15-

stachyis; spiculis subfasciculatis, 3—4 mm. longis, lanceolatis, 1-nucigeris; glumis ovatis, subacutis, inferioribus saepe mucronatis; setis 0; stylo longo, rubro, apice breviter 2-fido, nuce (rostro incluso) cum gluma fere aequilonga, ellipsoidea, fere levi, luteo-brunea; rostro angustissime conico, cum nuce subaequilongo.

Rhynchospora gracilis Vahl Enum. II (1806) p. 234?

Rhynchospora elongata Boeck.! Cyp. Novae I (1888) p. 261.

Schoenus debilis et *Sch. gracilis* Swartz! ms.

Hab. in Jamaica: Jenman n. 763^b (alt. 1750 m.), Stokes, Swartz; Portorico in Sierra de Luquillo in cacumine montis Yunque: Sintenis n. 1356; Guadeloupe locis siccis scopulosis Mornes de Houelmont: Duss n. 3115.

153. ***Rhynchospora polyphylla*** Vahl, rhizomate tenui; culmis 6 dm. longis, tenuioribus, per totam longitudinem multi-nodosis; foliis cum culmo saepe aequilongis, 4 mm. latis, glabris aut sparsim pilosis; panícula 3—4 dm. longa, ramis gracilibus, corymbis axillaribus compositis; spiculis parvis, pallidis; glumis ovato-lanceolatis; setis fere obsoletis; stylo longo, subindiviso; nuce 1 mm. longa, obovoideo-globosa, grosse reticulata, castanea; rostro cum $\frac{1}{2}$ parte nucis subaequilongo, submitrato, viridi.

Rhynchospora polyphylla Vahl Enum. II (1806) p. 230.

Rhynchospora polyphylla Roem. et Sch. Syst. II (1817) p. 83; Kunth Enum. II p. 299; Griseb.! Kar. p. 123, et Flor. p. 575; Boeck.! in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 636; Duss! Flor. p. 551.

Rhynchospora rigida Spreng. Syst. I (1825) p. 196.

Rhynchospora paniculata Presl in Oken Isis XXI (1828) p. 269 et Symb. Bot. p. 42 t. 29 (setis deletis).

Schoenus polyphyllus Vahl! Eclog. Amer. II (1798) p. 5.

Mitrospora polyphylla Nees! in *Linnaea* IX (1834) p. 295.

Hab. in Jamaica: Eggers n. 3426, Hansen n. 6, Hart n. 758, March n. 83, Purdie, Sullivan n. 3004; St. Kitts: Masson; Montserrat: Ryan; Guadeloupe: Duchassaing, Duss n. 3116, l'Herminier n. 13; Dominica: Eggers n. 39, 520, Imray n. 22, 461, Nicholls n. 149, 172, Ramage; Martinique: Aublet n. 27, Belanger n. 408, 796^b, Duss n. 689, 764, Hahn n. 517, 1418, Husnot n. 37, Sieber n. 9; St. Vincent: Caley, Eggers n. 6723, 7015^b, Smith n. 133; Grenada: Broadway n. 550, Eggers n. 6065, 6209 (alt. 600 metr.), Sherring n. 316; Tobago: Eggers n. 5695, 5869, 5950^b.

Distrib. America centralis, Novo-Granata, Venezuela.

154. ***Rhynchospora aristata*** C. B. Clarke, elata, fere glabra, panícula 5 dm. longa 1 dm. lata, corymbis axillaribus laxis, compositis;

spiculis numerosis, subsolitariis, 7—8 mm. longis, ovato-lanceolatis, 1-nucigeris, bruneis; glumis vix mucronatis; setis 3—5, nucem vix superantibus; stylo longo, brevissime 2-fido; nuce late ellipsoidea, levi, tenuiter cancellata, castaneo-rubra; rostro elongato-conico, nigrescente.

Rhynchospora aristata Boeck.! in *Flora* XL (1857) p. 36 et in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 639.

Rhynchospora florida Griseb.! *Flor.* (1864) p. 575.

Rhynchospora Schiedeana var. *elongata* Boeck.! in *Engler Jahrb.* I (1881) p. 364.

Rhynchospora Cruegeriana et *R. Eggersiana* Boeck.! *Cyp. Novae.* Heft II (1890) p. 26.

Hab. in Jamaica, Catherines Peak 1500 m. alt.: Eggers n. 3596; Trinidad: Crueger.

Distrib. Mexico, Venezuela.

155. ***Rhynchospora Ruiziana*** var. ***triceps*** K. Schum. ms. fere glabra, elata, panicula 4 dm. longa, pedunculis 3—4 cm. exsertis, rigidis, scabris; paniculis partialibus in spicas oblongo-cylindricas compositas plus minus contractis, ramulis (imo proventu) stricte erectis; spiculis 6—7 mm. longis, ellipsoideo-lanceolatis, 1-nucigeris, bruneis aut castaneis; 3—5 setis nuce parum brevioribus, antice scabris, ferrugineis; stylo longo, breviter 2-dentato; nuce $1\frac{1}{2}$ mm. longa, obscurius longitudinaliter costata, subtrabeculata, pallide brunea; rostro cum $\frac{2}{3}$ parte nucis aequilongo, a basi angusta conica lineari, cinerascete.

Rhynchospora triceps Boeck.! in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 642.

Rhynchospora quadrispicata Boeck.! *Cyp. Novae.* Heft I (1888) p. 28.

Rhynchospora quinquespicata Boeck.! l. c. Heft I (1888) p. 29.

Hab. in Jamaica: Swartz.

Distrib. *R. Ruiziana* Boeck. in Novo-Granata, Ecuador, Bolivia.

156. ***Rhynchospora corymbiformis*** Britton, glabra, radicibus fibrosis; culmo 3—6 dm. longo; corymbis axillaribus terminalique 30—40-stachyo laxis; spiculis 5—6 mm. longis, $1—1\frac{1}{2}$ mm. latis, multi-nucigeris; glumis ovatis, triangulari-acutis; setis 0; stylo lineari, ramis 2 longis; nuce parvula, globosa, compressa, transversim rugosa; rostro cum nuce fere aequilongo, ovoideo acuminato, juniore viridi.

Rhynchospora corymbiformis Britton! in *Trans. New York Acad.* XI (1892) p. 86.

Rhynchospora ignorata Boeck.! in *Engl. Jahrb.* V (1884) p. 508.

Scirpus corymbiferus C. Wright! in *Sauv. Cub.* (1871) n. 2630 p. 176.

Psilocarya corymbiformis Benth.! in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. III (1883) p. 1048.

Psilocarya corymbifera Benth.! in Hook. Ic. Pl. XV (1883) p. 25 t. 143.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3774.

Distrib. Florida, Georgia.

157. **Rhynchospora trichodes** C. B. Clarke, hispidulo-pilosa, radicibus fibrosis; culmo 2—4 dm. longo, graciliori, hispidulo; foliis cum culmo saepe aequilongis, 2—4 mm. latis; corymbis terminali axillari-busque, 3—8 cm. in diam., 5—25-stachyis; spiculis fere omnibus solitariis, late ovoideis, 3-nucigeris, 3—4 mm. longis; glumis ovatis, obtusis, glabris, bruneis; setis 0; stylo longo, alte 2-fido; nuce cum $\frac{1}{3}$ parte glumae aequilonga, late obovoidea, sessili, biconvexa, luteo-brunea, tenuiter transversim undulato-rugosa; rostro lato depresso, nigrescente, cum nuce aequilato, quam nux multo brevior.

Rhynchospora hispidula Boeck.! in Linnæa XXXVII (1873) p. 604; non Griseb.

Schoenus hispidulus Vahl! Enum. II (1806) p. 219.

Dichromena hispidula Kunth Enum. II (1837) p. 279.

Fimbristylis hirsuta Steud.! Cyp. (1855) p. 116.

Hab. in Portorico: herb. Delessert.

Distrib. Guiana.

158. **Rhynchospora eximia** Britton, glabra, radicibus fibrosis; culmo 1—4 dm. longo, gracilior; foliis culmum saepe superantibus, 3 mm. latis; corymbis axillaribus terminalique, usque ad 6 cm. in diam., 20-stachyis; spiculis longius pedicellatis, 7 mm. longis, ovoideo-lanceolatis, 3—8-nucigeris, obscure bruneis; glumis ovatis, vix mucronatis; setis 0; stylo lineari, ramis 2 longis linearibus; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, biconvexa, sessili, transversim undulata, luteo-brunea; rostro multum depresso, cum nuce aequilato, cum $\frac{1}{4}$ parte nucis vix aequilongo, nigrescente.

Rhynchospora eximia Britton! in Trans. New York Acad. XI (1892) p. 86.

Rhynchospora eximia Boeck.! in Linnæa XXXVII (1873) p. 601 et in Flora LXIV (1881) p. 78.

Rhynchospora oxycephala C. Wright! in Saur. Cub. (1871) n. 2692 p. 184.

Dichromena Schiedeana Kunth Enum. II (1837) p. 282.

Spermodon eximius Nees! in Seem. Voy. Herald (1857) p. 222.

Rhynchospora psilocaryoides Griseb.! Pl. Cub. (1866) p. 247.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3381.

Distrib. Mexico, Panama.

159. **Rynchospora Juncellus** C. B. Clarke (n. sp.) glabra, radicibus fibrosis; culmo 2—3 dm. longo; foliis cum culmo aequilongis, 1—2 mm. latis; corymbis pluribus distantibus, 2—3 cm. in diam., 5—20-stachyis; spiculis subsolitariis approximatis, 7 mm. longis 1 mm. latis, 3—6-nucigeris, imo proventu lanceolatis, fusce stramineis; glumis laxe imbricatis, caducis, rhachillam longam anfractuosa exhibentibus; setis 0; stylo lineari, ramis 2 longis linearibus; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, oblongo-obovoidea, parum stipitata, transversim undulata, fusce straminea; rostro cum $\frac{1}{3}$ parte nucis aequilongo cum nuce aequilato, in humeris nucis in utroque margine breviter decurrente.

Hab. in St. Kitts: Masson; Guadeloupe: l'Herminier n. 6, 51; Martinique: Hahn n. 375.

160. **Rynchospora rufa** var. **Liebmanniana** C. B. Clarke, tenuiter pilosa vel glabrata, rhizomate oblique descendente; culmis 5—8 dm. longis; panicula elongata, corymbo terminali usque ad 60-stachya; spiculis subfasciculatis, 5 mm. longis, ellipsoideis acutis, 2—1-nucigeris, intense bruneis; glumis exterioribus nucigerisque tenuibus, lucidis, admodum caducis, exterioribus mucronatis; setis 0; stylo lineari, ramis 2 longis linearibus; nuce parva, obovoidea, subsessili, marginata, transversim undulata; rostro cum nuce aequilato, in apicem elongato-conicum mox angustato, opace albido.

Rynchospora mexicana C. Wright! in *Saur. Cub.* (1871) n. 2683 p. 182; non Steud.

Rynchospora rufa Boeck.! in *Flora LXIV* (1881) p. 78.

Rynchospora velutina var. *glabrescens* Boeck.! in *Engl. Jahrb. I* (1881) p. 364.

Psilocarya mexicana Liebm.! *Mexic. Halvgr.* (1850) p. 60.

Hab. in Cuba: C. Wright.

Distrib. Mexico.

161. **Rynchospora micrantha** Vahl, glabra, gracilis, radicibus fibrosis; culmis 1—4 dm. longis; foliis 1—2 dm. longis, 2—3 mm. latis; panicula longa gracili, corymbis laxis 2—4 cm. in diam., 10—30-stachyis, ramis ramulisque capillaceis; spiculis 1—3-nis, 1—2 mm. longis, maturis ovoideis, 1-nucigeris aut masculis; setis 0; stylo lineari, ramis 2 longis linearibus; nuce $\frac{2}{3}$ mm. longa, obovoidea, sessili, turpide biconvexa, luteo-brunea, transversim rugosa; rostro depresso, cum nuce aequilato, cum $\frac{1}{3}$ parte nucis vix aequilongo nigrescente.

Rynchospora micrantha Vahl *Enum. II* (1806) p. 231 partim; C. B. Clarke in *Dur. et Schinz Fl. Afr. V* p. 654.

Rynchospora micrantha Roem. et Sch. *Syst. II* (1817) p. 84 partim nec Mant. p. 45; Griseb.! *Kar.* (1857) p. 123 et *Flor.* p. 576

et Pl. Cub. p. 247; Bocck. in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 608; Sauv. Cub. n. 2686 p. 183; Duss! Flor. p. 552.

Haloschoenus sparsus Nees! in *Linnaea* IX (1834) p. 296.

Zosterospermum gracile Desv.! in Ham. Prod. Ind. Occid. (1825) p. 14; Kunth Enum. II p. 536.

Psilocarya Teneriffae Torrey in Ann. Lyceum New York III (1836) p. 362 in nota.

Dichromena micrantha Kunth! Enum. II (1837) p. 278.

Dichromena contracta Steud. Cyp. (1855) p. 136.

Scleria minutiflora Spreng. Syst. III (1826) p. 831 in citat.; Kunth Enum. II p. 359.

Scleria pygmaea Nees! in Flora XI (1828) p. 332; non Spreng.

Juncus parviflorus Poir. in Lam. Enc. Suppl. III (1813) p. 160 (teste Urban, qui specimen originarium in herb. Cosson asservatum comparavit).

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3411; Jamaica: Purdie; India occid.: Sieber Agrostotheca n. 108; Portorico: Eggers n. 812^b, Ledru (herb. Cosson ex Urb. in lit.), Sintenis n. 107, 1211, 5301, 6616; Antigua: Wulschlaegel n. 692; Guadeloupe: Duss n. 3119, l'Herminier n. 5, 74; Dominica: Eggers n. 48, 588, Krause n. 105; Martinique: Duss n. 463, 690, Hahn n. 369, 484, Husnot n. 32, Sieber n. 259, 362; St. Vincent: Eggers n. 6586, Smith n. 779, 1085; Grenada: Broadway n. 128, Eggers n. 6038, 6311^b.

Distrib. Teneriffa, Guinea; America trop.

162. **Rynchospora tenuis** Britton, glabra, gracilis, rhizomate brevi; culmis 1—3 dm. longis; foliis 1—2 dm. longis, 1—3 mm. latis; corymbis axillaribus terminalique 1—8 cm. latis, polystachyis, a bracteis fere semper superatis; spiculis 1—3-nim approximatis, 3—4 mm. longis, lanceolatis, pallidis, 1-nucigeris; glumis ovatis, acutis, inferioribus mucronatis; setis 0; stylo lineari, ramis 2 longis, linearibus; nuce 1 mm. longa, sessili, obovoidea, brunea aut cinerascens, transversim rugosa; rostro cum $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongo, cum nuce aequilato, in lateribus nucis decurrente.

Rynchospora tenuis Britton! in Trans. New York Acad. XI (1892) p. 86 et in Ann. New York VII (1892) p. 256.

Rhynchospora tenuis Link Jahrb. III (1820) p. 76; Bocck.! in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 610.

Rhynchospora cubensis Griseb.! Fl. (1864) p. 576 (non Griseb. Pl. Cub. p. 246).

Rhynchospora curvula Bocck.! in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 596; nec Griseb.

Fnirena gracilis Spreng. Nov. Prov. (1819) p. 46.

Dichromena gracilis Kunth! Enum. II (1837) p. 280.

Dichromena cubensis Kunth! Enum. II (1837) p. 281; *Sagra Fl. Cub. XI* p. 293.

Haloschoenus capillaris Nees in *Linnæa* LX (1834) p. 296.

Haloschoenus caracasanus Liebm.! *Mexic. Halagr.* (1850) p. 61 (non *Dichromena caracasana* Kunth).

Spermodon curvulus Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 119.

Scleria cincta Steud.! *Cyp.* (1855) p. 177.

Hab. in ins. Bahama Hog Island: Eggers n. 4142; Cuba ad Cieneguita: Combs n. 402, prope Monteverde 250 m. alt.: Eggers n. 5132^a, in collibus Cobre 200 m. alt.: Linden n. 2068; Dominica: Imray; Martinique: Duss n. 693; St. Vincent: Smith n. 843.

Distrib. a Mexico usque ad Montevideo, frequens.

163. *Rynchospora pseudo-lunata* C. B. Clarke, fere glabra, capillacea, rhizomate elongato vix 1 mm. crasso, brunescente aut castaneo; culmis 2 dm. longis, puberulo-scabris; foliis cum culmo aequilongis filiformibus; corymbis 3—2, imo interdum distante, vix 1 cm. latis; spiculis subfasciculatis, 5 mm. longis, lanceolatis, pallidis, 1-nucigeris; setis 0; stylo lineari, ramis 2 linearibus; nuce cum $\frac{1}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, breviter stipitata, biconvexa, transversim rugosa; rostro cum $\frac{3}{4}$ parte nucis aequilongo, ovoideo-oblongo, basi sub-2-lobo.

Rynchospora filiformis Vahl Enum. II (1806) p. 232?, non Griseb. sub *Rhynchospora*.

Rhynchospora cubensis Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 246; *Sauv. Cub. n.* 2690 p. 184; nec Griseb. *Flora* p. 576 nec *Dichromena cubensis* Kunth.

Rhynchospora pseudo-lunata Bocck.! *Cyp. Novae. Heft I* (1888) p. 25.

Schoenus distans Poir. *Encycl. Suppl. II* (1811) p. 249.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 1531 (prope Monte Verde), n. 3408 partim (in herb. Krug et Urb.).

164. *Rynchospora Berterii* C. B. Clarke, pusilla, stolonibus 5 cm. longis vix 1 mm. crassis, in rhizoma tenuissimum proventu induratis; culmis 2—8 cm. longis, subsetaceis; foliis 2—15 cm. longis 1 mm. latis, glabris vel basi (cum vaginis) pilosis; spiculis 2—5 in apice culmi fasciculato-spicatis, 2—4 mm. longis, 1—2 mm. inter se distantibus, lanceolatis, 6—7-glumis 1- (rarius 2-)nucigeris, albidis; bracteis 2—1, usque ad 1—3 cm. longis, setaceis; glumis ovato-oblongis, obtusis, albis; setis 0; stylo lineari, ramis 2 longis linearibus; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte

glumae aequilonga, globosa, sessili, transversim undulata, brunca interdum viridi-tincta; rostro cum $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongo, conico, nigrescente.

Rhynchospora pusilla Griseb.! Kar. (1857) p. 123, et Flor. p. 576, et Pl. Cub. p. 247; Boeck.! in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 527; Sauv. Cub. n. 2694 p. 185; non Curtis.

Schoenus pusillus Swartz Prod. (1788) p. 20 et Fl. Ind. Occid. p. 7 t. 6 (char. emend.); Vahl Enum. II p. 109.

Hypolytrum Berterii Spreng.! Neu. Entdeck. I (1820) p. 241.

Hypoclytrum Berterianum Roem. et Sch. Syst. II Mant. (1824) pp. 133, 528.

Dichromenium pusilla Kunth Enum. II (1837) p. 275.

Seleria microdiscus Steud.! Cyp. (1855) p. 175.

Kyllinga brevifolia Schultes in Roem. et Sch. Syst. II Mant. (1824) p. 137, non Rottb.

Hab. in Cuba: Otto n. 321, Rugel n. 762, C. Wright n. 3414; Jamaica: Swartz, Wilson n. 303, Wulschlagel n. 1139; Hispaniola: Eggers n. 2601, 2690, 2812, Poiteau; Portorico orient.: Wydler n. 401; Guadeloupe: Bertero, Duchassaing.

165. **Rhynchospora tenerrima** C. B. Clarke. glabra, radicibus fibrosis; culmo 1—3 dm. longo, gracili; foliis 10—15 cm. longis, 1—2 mm. latis; corymbis 2—4, parvulis, distantibus, 3—10-stachyis; bracteis corymbos longe superantibus subsetaceis; spiculis 4 mm. longis, lanceolatis, c. 10-glumis, 2—1-nucigeris, pallidis; glumis ovato-lanceolatis, nucigeris saepe mucronatis; setis 0; stylo lineari, atro-rubro, ramis 2 linearibus; nuce 1 mm. longa, sessili, obovoidea, turgide biconvexa, transversim undulato-rugosa, brunea, apice 3-dentata (i. e. humerorum 2 angulis in cornua productis); rostro minuto conico nucis cornubus parum longiore.

Rhynchospora tenerrima Spreng. Syst. Curae Post. (1827) p. 26; Nees! in Flora XI (1828) p. 333.

Rhynchospora Spermodon Griseb.! Flor. (1864) p. 576, et Pl. Cub. p. 246; Sauv.! Cub. n. 2691 p. 184.

Rhynchospora setacea Boeck.! in Vidensk. Meddel. Kjob. (1869—70) p. 159 et in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 559 et in Flora LXIV (1881) p. 78; Duss! Flor. p. 551.

Rhynchospora emuciata Duss! Flor. p. 551.

Schoenus setaceus Berg. in Act. Helv. VII (1772) p. 130 t. 9; Rottb. Descr. et Ic. p. 62 t. 21 fig. 2; Swartz Prod. p. 20 et Fl. Ind. Occid. I p. 107.

Spermodon setaceus Nces in *Linnæa* IX (1834) p. 296, et in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 118 t. 8 fig. 1.

Dichromena setacea Kunth *Enum. II* (1837) p. 279; *Sagra Fl. Cub. XI* p. 293.

Triodon L. C. Rich. in *Pers. Syn. I* (1805) p. 60.

Triodon setaceus Kunth *Enum. II* (1837) p. 280 in *citat.*

Hab. in India occid.: Sieber *Agrostotheca* n. 116; Cuba: C. Wright n. 3407; Jamaica: Purdie, Swartz; Portorico: Sintenis n. 846, 1231, 5168, 5292, Stahl n. 305; Guadeloupe: Duchassaing, Duss n. 3121; Iles des Saintes: Duss n. 3122; Martinique: Belanger n. 1254, Duss n. 760, Hahn n. 790, Husnot n. 35; St. Vincent: Eggers n. 6602; Grenada: Broadway n. 74, Eggers n. 6133 (alt. 600 metr.), Sherring.

Distrib. America australis tropica.

166. **Rynchospora pusilla** Britton, glabra, gracillima, culmis 1—3 dm. longis; foliis 1—2 dm. longis, 1 mm. latis; corymbis 1—3 cm. in diam., inferioribus remotis; bracteis brevibus; spiculis numerosis, 2 mm. longis, ovoideis, 1-nucigeris, bruneis; glumis ovatis, obtusis; setis 0; stylo alte 2-fido; nuce $\frac{1}{2}$ mm. longa, sessili, obovoidea, biconvexa, transversim undulata; rostro cum $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilato, cum $\frac{1}{5}$ parte nucis vix aequilongo, bulbiformi, brunescente.

Rynchospora pusilla Britton! in *Trans. New York Acad. XI* (1892) p. 87.

Rhynchospora pusilla Curtis! in *Sillim. Amer. Journ. ser. 2 VII* (1849) p. 409 in *Obs.*

Rhynchospora intermixta C. Wright! in *Sauv. Cub. (1871) n. 2689* p. 184.

Rhynchospora lunata C. Wright! in *Sauv. Cub. (1871) n. 2670* p. 181 *partim.*

Rhynchospora perpusilla C. Wright! *Msc.*

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3794.

Distrib. Florida, Louisiana.

167. **Rynchospora divergens** Britton, glabra, rhizomate brevi; culmis 2—4 dm. longis, gracilibus; foliis 2 dm. longis, vix 2 mm. latis; corymbis axillaribus, remotis, 1—4 cm. in diam.; spiculis fasciculatis, 3 mm. longis, ovoideis, 1-nucigeris, bruneis; glumis ovatis, obtusis; setis 0, stylo lineari, ramis 2 longis linearibus; nuce $\frac{1}{2}$ mm. longa, sessili, obovoidea, levi, pallida; rostro cum $\frac{1}{4}$ parte nucis aequilongo, bulbiformi.

Rynchospora divergens Britton! in *Trans. New York Acad. XI* (1892) p. 87.

Rhynchospora divergens Curtis! in Sillim. Amer. Journ. ser. 2 VII (1849) p. 409; Sauv. Cub. n. 3796 p. 182.

Rhynchospora lamprosperma C. Wright! in Sauv. Cub. (1871) n. 2684 p. 183.

Hab. in Cuba: C. Wright; Portorico: Blauner n. 247.

Distrib. Florida.

168. **Rhynchospora longispicata** C. B. Clarke, glabra, rhizomate brevi; culmo 3 dm. longo, gracili; foliis cum culmo fere aequilongis, 2 mm. latis; corymbis 5—12-stachyis, laxis, distantibus; spiculis 9 mm. longis, lanceolatis, 1—2-nucigeris, luteo-bruneis; glumis ovato-oblongis, nucigera vix mucronata; setis 0; stylo lineari, ramis 2 linearibus; nuce cum $\frac{1}{3}$ parte glumae aequilonga, stipitata, obovoidea, apice truncata, levi, brunea; rostro cum $\frac{1}{3}$ parte nucis aequilongo, conico, nigrescente.

Rhynchospora longispicata Boeck.! in Linnaea XXXVII (1873) p. 600.

Rhynchospora filiformis Griseb.! Flor. (1864) p. 576 et Pl. Cub. p. 246; non Vahl.

Rhynchospora podosperma C. Wright! in Saur. Cub. (1871) n. 2687 p. 183.

Dichromena filiformis Kunth! Enum. II (1837) p. 281 syn. excl.

Spermodon filiformis Nees in Mart. Fl. Bras. II pars I (1843) p. 118.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3409, 3791; Portorico: Ledru; St. Thomas: herb. Arnott; Trinidad in Piarco Savanna: Alexander n. 5174, Lockhart.

Distrib. America australis tropica.

169. **Rhynchospora brevirostris** C. B. Clarke, glabra, culmo 1 dm. longo, gracili; foliis setaceis; corymbis sparsis, 2—5-stachyis, 10—15 mm. longis, a bracteis superatis; spiculis 4—5 mm. longis, lanceolatis, 1-nucigeris, stramineo-luteis; setis 0; stylo lineari, ramis 2 longis linearibus; nuce 1 mm. longa, orbiculari, compressa, levi, purpureo-maculata; rostro cum $\frac{1}{3}$ parte nucis vix aequilongo, depresso ovoideo.

Rhynchospora brevirostris Griseb.! Pl. Cub. (1866) p. 246; Sauv. Cub. n. 2688 p. 184.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3410, 3413; Trinidad: herb. Trinid. n. 1882.

170. **Rhynchospora hirsuta** Vahl, undique tenuius hirsuta aut fere glabra, culmo 1—3 dm. longo, graciliore; foliis cum $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, 2—3 mm. latis; corymbis distantibus, 2—4 cm. in diam., polystachyis; bracteis corymbos saepe superantibus; spiculis 4 mm. longis, ovoideo-oblongis, 1—4-nucigeris, castaneis aut bruneis; glumis ovatis,

muticis, extimis pilosis; setis 0; stylo lineari, ramis 2 linearibus; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae vix aequilonga, ovoidea, grosse reticulata, luteo-brunea; rostro quam nux brevior, conico.

Rynchospora hirsuta Vahl! Enum. II (1806) p. 231 char. emend.

Rhynchospora hirsuta Boeck.! in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 612; Griseb.! Pl. Cub. p. 247; Sauv. Cub. n. 2685 p. 183 (non Griseb. Flor. p. 576).

Schoenus hirsutus Vahl Eclog. I (1796) p. 6.

Dichromena hirsuta Kunth Enum. II (1837) p. 281.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3412; Trinidad in Piarco et Aripo Savanna: Alexander n. 5160, 5699, Crueger, Fendler n. 857.

Distrib. Venezuela, Guiana, Pernambuco.

Obs. Beatus VAHL (Enum. II p. 231) errore quodam scripserat. "Setae plumosae".

171. **Rynchospora plumosa** Britton, glabra, rhizomate obliquo; culmo 2—6 dm. longo, graciliore; foliis cum $\frac{2}{3}$ parte culmi aequilongis, 1—2 mm. latis; corymbis in spicam approximatis, spica remota axillari interdum addita; spiculis 2—3 mm. longis, ovoideis, 1- (raro 2-) nucigeris, ferrugineo-bruneis; setis 6, cum nuce (rostro excluso) aequilongis, basi (saltem). ciliato-plumosis; stylo lineari, ramis 2 longis linearibus; nuce cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ glumae aequilonga, biconvexa subglobosa, transversim undulata; rostro cum circa $\frac{1}{3}$ parte nucis aequilongo, bulbiformi.

Rynchospora plumosa Britton! in Trans. New York Acad. XI (1892) p. 87.

Rhynchospora plumosa Elliott Bot. S. Carol. I (1816) p. 58; Kunth Enum. II p. 297; Boeck. in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 577; Sauv.! Cub. n. 2666 p. 180.

Rhynchospora pennisetia Griseb.! Pl. Cub. (1866) p. 244.

Rhynchospora semiplumosa Chapm.! Fl. South. U. S. (1860) p. 524; nec Britton.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3398.

Distrib. a Carolina usque ad New Orleans et Florida.

172. **Rynchospora lunata** C. B. Clarke, glabra, radicibus fibrosis; culmis 1—3 dm. longis, gracilibus; foliis cum $\frac{1}{2}$ parte culmi aequilongis, 1 mm. latis; corymbis subterminalibus, 8—15-stachyis; spiculis 5 mm. longis, ellipsoideo-lanceolatis, 1-nucigeris, ferrugineis; setis 6, nucem superantibus, in dimidio inferiore ciliato-pilosis; stylo lineari, ramis 2 longis linearibus; nuce cum $\frac{2}{3}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, transversim rugosa, marmorata; rostro cum $\frac{1}{3}$ parte nucis aequilongo, basi bilobo.

Rhynchospora lunata Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 244.

Rhynchospora diodon Boeck.! in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 558.

Ptilochaeta diodon Nees! in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 148 t. 8 fig. 2.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3408 partim.

Distrib. Piahy.

173. ***Rhynchospora alba*** Vahl, glabra, radicibus fibrosis; culmis 1—6 dm. longis, gracilioribus; foliis 1—2 dm. longis, 2—3 mm. latis; corymbis distantibus, pallidis aut cinnamomeo-bruneis; spiculis fasciculatis, 4 mm. longis, lanceolatis, 1—2-nucigeris; setis 8—10, nucem saepe superantibus, in parte superiore (saltem) retrorsim scabris; stylo lineari, ramis 2 longis linearibus; nuce vix 1 mm. longa, anguste obovoidea; pallide brunea levi; rostro cum $\frac{2}{3}$ parte nucis fere aequilongo.

Rhynchospora alba Vahl *Enum. II* (1806) p. 236 var. α .

Rhynchospora alba Willd. *Enum. Hort. Berol.* (1809) p. 71; *Kunth Enum. II* p. 295; *Boeck. in Linnaea* XXXVII (1873) p. 570.

Schoenus albus Linn.! *Sp. Pl. ed. I* (1753) p. 44.

Hab. in Portorico: Blauner n. 247 (in herb. DC.).

Distrib. Europa, Asia septentr. cum Japonia, America septentr., sat communis.

174. ***Rhynchospora fuscoides*** C. B. Clarke, glabra, culmis 6—7 dm. longis, medioeribus; foliis longis, 1—3 mm. latis, planis; corymbis 3—1, remotis, subcapitatis, bruneis; spiculis 5 mm. longis; setis 6, rostri apicem saepe superantibus, antice scabris; stylo lineari, ramis 2 longis; nuce ellipsoidea, levi, brunea; rostro cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{5}$ parte nucis aequilongo, setoso.

Rhynchospora filifolia C. Wright! in *Sauv. Cub.* (1871) n. 2662 p. 180, vix Torrey.

Rhynchospora fascicularis var. *distans* Chapm.! *Fl. South. U. S.* (1860) p. 527.

Rhynchospora distans var. *microcarpa* Boeck.! in *Flora* LXIV (1881) p. 78.

Rhynchospora fusca hb. Chapman.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3783 (in herb. Kew pro magna parte).

Distrib. Delaware, Florida, Texas.

175. ***Rhynchospora leptorrhyncha*** C. B. Clarke, glabra, culmis 6 dm. longis medioeribus; foliis 1—3 dm. longis, 1—3 mm. latis, canaliculatis; corymbis 3—1, remotis, subcapitatis, 5—15 mm. in diam., 8—20-stachyis, castaneis; spiculis 6—8 mm. longis, ellipsoideo-oblongis, 1—2-nucigeris; setis 6, nucem multo superantibus, antice scabris; stylo lineari, ramis 2 longis; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequi-

longa, late obovoidea, levi, castanea; rostro cum $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongo, triangulari, viridescente, ciliato-scabro.

Rhynchospora leptorrhyncha C. Wright! in *Sauv. Cub.* (1871) n. 2661 p. 180.

Hab. in Cuba: C. Wright sine numero et cum n. 3783 in herb. Kew intermixta.

176. ***Rhynchospora distans*** Vahl, glabra, culmis 3—7 dm. longis, mediocribus vel gracilioribus; foliis 10—15 cm. longis, 1—3 mm. latis; corymbis 3—1, remotis, subcapitatis, 5—15 mm. in diam., polystachyis, bruneis; spiculis 3—4 mm. longis, ovoideo-lanceolatis, sub-1-nucigeris; setis 6, cum nuce subaequilongis, antice scabris; stylo lineari, ramis 2 longis; nuce cum $\frac{1}{2}$ parte glumae aequilonga, obovoidea, levi, brunea aut castanea; rostro cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{5}$ nucis aequilongo, levi, longe conico.

Rhynchospora distans Vahl *Enum. II* (1806) p. 235.

Rhynchospora distans Roem. et Sch. *Syst. II* (1817) p. 86; Kunth *Enum. II* p. 296 syn. plur. excl.; Boeck.! in *Linnaea XXXVII* (1873) p. 569.

Schoenus distans Mich. *Fl. Bor. Amer. I* (1803) p. 36.

Hab. in Portorico prope Bayamon ad Pueblo viejo: Sintenis n. 1232.

Distrib. Carolina, Florida, Guatemala, Surinam.

177. ***Rhynchospora fascicularis*** Vahl, setis 6—5, cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ parte nucis aequilongis, vel saepius brevioribus, irregularibus; ceteroquin ut *R. distans*.

Rhynchospora fascicularis Vahl *Enum. II* (1806) p. 234.

Rhynchospora fascicularis Nutt. *Gen. N. Amer. Pl. I* (1818) p. 33; A. Gray in *Ann. Lyceum New York III* (1836) p. 210 t. 6 fig. 20 et p. 368, non Boeck.

Rhynchospora filiformis Roem. et Sch. *Syst. II Mant.* (1824) p. 46 quoad exempl. domingense; Balbis! ms.

Rhynchospora distans (forma) Kunth *Enum. II* p. 296; Griseb. *Pl. Cub.* p. 243 partim.

Rhynchospora Berteroana Boeck.! in *Flora XLI* (1858) p. 645.

Schoenus fascicularis Mich. *Flor. Bor. Amer. I* (1803) p. 37.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3397 partim, 3349 in hb. Kew, 3399 in hb. Krug et Urban; Jamaica: Purdie; Hispaniola in Savana Mata Redondo juxta flumen Muñoz 200 m. alt.: Bertero n. 201, Eggers n. 2452^b, 2453^c; Portorico prope Manatí in arenosis ad Campo alegre: Sintenis n. 6840.

Distrib. America septentr. austro-orient., Venezuela.

178. **Rynchospora pallida** Britton, glabra, tenuis, culmis 1—3 dm. longis; foliis filiformibus; corymbo unico, subcapitato, 1 cm. in diam., 5—10-stachyo; spiculis pallidis aut brunescens; setis cum $\frac{1}{3}$ parte nucis vix aequilongis, saepe obsoletis; rostro cum $\frac{1}{4}$ parte nucis aequilongo; ceteroquin ut *R. fascicularis*.

Rynchospora pallida Britton! in *Trans. New York Acad. XI* (1892) p. 87.

Rynchospora brachychaeta Britton in *Trans. New York Acad. XI* (1892) p. 90.

Rhynchospora pallida Curtis! in *Sillim. Amer. Journ. Ser. 2. VII* (1849) p. 409.

Rhynchospora Curtisii Steud. *Cyp.* (1855) p. 141; Bocck. in *Linnaea XXXVII* (1873) p. 564.

Rhynchospora brachychaeta C. Wright! in *Sauv. Cub.* (1871) n. 2667 p. 180.

Rhynchospora gracillima C. Wright! in *Sauv. Cub.* (1871) n. 2668 p. 181.

Rhynchospora tenerrima Bocck.! in *Linnaea XXXVII* (1873) p. 554; non Spreng.

Rhynchospora Wrightiana Bocck.! in *Flora LXIV* (1881) p. 78.

Dichromena rufidula Steud. *Cyp.* (1855) p. 137 fide Bocck.

Hab. in Cuba: C. Wright; Portorico in Sierra de Luquillo in planitie montis Jimenes: Sintenis n. 1381.

Distrib. New Jersey, Carolina, Florida, Venezuela.

179. **Rynchospora Lindeniana** C. B. Clarke, culmo 3 dm. longo, filiformi; foliis longis, filiformibus; corymbo subsolitario, terminali, 3—6-stachyo, subcapitato; spiculis minutis; setis 6, nucem superantibus, bruneis, antice scabris; stylo lineari, ramis 2, longis; nuce oblongo-ellipsoidea, levi, castaneo-brunea; rostro longo, conico, albo, vix scabro.

Rhynchospora Lindeniana Griseb. *Pl. Cub.* (1866) p. 244; *Sauv. Cub.* n. 2664 p. 180.

Hab. in Cuba in scopulosis montis Liban: Linden n. 1945.

180. **Rynchospora gracilentia** Britton, setis 6, nuce longioribus, saepe usque ad rostri apicem attingentibus; rostro cum nuce fere aequilongo, levi, ceteroquin ut *R. distans*.

Rynchospora gracilentia Britton! in *Trans. New York Acad. XI* (1892) p. 90.

Rhynchospora gracilentia A. Gray! in *Ann. Lyceum New York III* (1836) p. 216 t. 6 fig. 27; Bocck.! in *Linnaea XXXVII* (1873) p. 565.

Rhynchospora Drummondiana Boeck. in *Flora XLI* (1858) p. 644.

Rhynchospora distans Kunth Enum. II (1837) p. 296 partim;
Boeck. in *Flora LXIV* (1881) p. 78.

Rhynchospora tetrandra C. Wright! Msc.

Hab. in Cuba: C. Wright.

Distrib. a New Jersey usque ad Texas et Florida, frequens; in Brasilia et Montevideo.

181. **Rhynchospora cephalotes** Vahl, robustior, rhizomate repente; culmis 1—8 dm. longis, per totam longitudinem nodosis; foliis usque ad 2—4 dm. longis, 3—7 mm. latis, in marginibus inferioribus plus minus pubescentibus; panícula terminali, composita, ovoidea, in caput unicum 4 cm. longum 3 cm. latum congesta, saepe 50—100-stachya; bracteis 3—1 usque ad 2 dm. longis; spiculis 7 mm. longis 4 mm. latis, 10—20-glumis, duris; glumis ovato-lanceolatis, subcorneis, stramineis aut ferrugineis; setis 6, nuce multo longioribus, antice scabris, rubro-bruneis; stylo lineari, ramis 2 longis; nuce $1\frac{1}{2}$ mm. longa, obovoidea, plano-convexa, levi grossius reticulata, castanea; rostro quam nux longiore basi cum nuce aequilato, levi, pallido proventu fusco-nigro.

Rhynchospora cephalotes Vahl Enum. II (1806) p. 237.

Rhynchospora cephalotes Roem. et Sch. Syst. II (1817) p. 88 et Mant. p. 48, 530; Kunth Enum. II p. 301; Griseb.! Flor. p. 573; Boeck.! in *Linnaea XXXVII* (1873) p. 630.

Scirpus cephalotes Linn.! Sp. Pl. ed. II (1762) p. 76.

Schoenus cephalotes Rottb. Descr. et Ic. (1783) p. 61 t. 20.

Hab. in Jamaica: Masson; Tobago: Barclay n. 976; Trinidad: Bromfield, Broadway n. 5309 (Aripo Savanna), Crüger, Eggers n. 1123, 1455, Fendler n. 884, Hart n. 1879, 1880, 3613, O. Kuntze n. 705.

Distrib. in Honduras; in America australi tropica vulgaris.

182. **Rhynchospora comata** C. B. Clarke, robustior, rhizomate lignescens; culmis 4—8 dm. longis; foliis usque ad 3—5 dm. longis, 4—10 mm. latis, undique pilosis vel praeter basin glabratissimis; corymbis 2—4 pyramidalibus, pedunculatis, remotis, 3—6 cm. in diam. pilosulis; spiculis usque ad 7 mm. longis 4 mm. latis, stramineo-fuscis, iis *R. cephalotis* Vahl simillimis; setis 6, nuce multo longioribus, antice scabris, bruneis; stylo lineari, ramis 2 linearibus; nuce $1\frac{1}{2}$ mm. longa, obovoidea, turgide biconvexa, levi, castanea; rostro quam nux longiore.

Rhynchospora comata Schultes in Roem. et Schultes II Mant. (1824) p. 50; Griseb.! Flor. p. 574.

Rhynchospora sylvatica Nees! in *Linnaea IX* (1834) p. 297; Kunth Enum. II p. 303; Boeck.! in *Linnaea XXXVII* p. 634.

Rhynchospora bromoides Kunth! Enum. II (1837) p. 300.

Rhynchospora cephalotoides Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 242; *Sauv.!* *Cub.* n. 2654 p. 179.

Rhynchospora cephalotes Boeck. in *Flora LXIV* (1881) p. 78 *fide num. citati.*

Rhynchospora Dietrichsenii Boeck.! *Cyp. Novae. Heft II* (1890) p. 25.

Schoenus comatus Link *Enum. I* (1821) p. 41; *Kunth Enum. II* p. 337.

Schoenus sylvaticus Salzmann! *ms.; cf. Schlecht. in Bot. Zeit. VII* (1849) p. 167 *in nota.*

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3390; Trinidad: Crueger, Fendler n. 875, Hart n. 1893, Lockhart n. 289.

Distrib. in Guiana et Brasilia, sat vulgaris.

183. ***Rhynchospora glauca*** Vahl, glabra, rhizomate brevi, horizontali; culmis 3—8 dm. longis, gracilioribus aut vix mediocribus; foliis usque ad 2—5 dm. longis, 2—4 mm. latis; panicula anguste oblonga, 2—3 dm. longa, corymbis axillaribus saepe 3—2, distantibus, 2 cm. in diam.; spiculis 3 mm. longis, ovoideis, acutis, 2—1-nucigeris, 6—7-glumis, bruneis; glumis nucigeris ovatis breviter acuminate; setis 6, nucem paullo superantibus, antice scabris, ferrugineo-bruneis; stylo lineari, ramis 2 linearibus; nuce cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ parte glumae aequilonga, latius obovoidea, turgida, castanea, a 12—18 lineis undulatis horizontalibus notata; rostro cum $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongo, minute hispido vel glabro, cum apice nucis aequilato, conico, compresso, pallido aut viridi-fuscescente.

Rhynchospora glauca Vahl *Enum. II* (1806) p. 233; C. B. Clarke in Hook. f. *Fl. Brit. Ind. VI* p. 671.

Rhynchospora glauca Roem. et Sch. *Syst. II* (1817) p. 85; *Kunth Enum. II* p. 297 *syn. quibusdam excl.; Boeck.!* in *Linnaea XXXVII* (1873) p. 585 *forma majore excl.*

Rhynchospora gracilis Roem. et Sch. *Syst. II* (1817) p. 86; Griseb.! *Kar.* p. 124, et *Flor.* p. 574 *syn. excl. et Pl. Cub.* p. 243; *Sauv. Cub.* n. 2660 p. 179 *syn. R. Torreyana excl.*

Rhynchospora laxa R. Br.! *Prod.* (1810) p. 230; *Kunth Enum. II* p. 298; Coss. et Dur. *Expl. Alger. Glum.* p. 239.

Rhynchospora pungens Liebm.! *Mexie. Halvgr.* (1850) p. 65; Boeck. in *Linnaea XXXVII* (1873) p. 574.

Rhynchospora ferruginea Roem. et Sch. *Syst. II* (1817) p. 85.

Schoenus gracilis Swartz *Prod.* (1788) p. 19 et *Fl. Ind. Occid.* p. 109 *pro minore parte.*

Chaetospira ferruginea H. B. K.! *Nov. Gen. et Sp. I* (1815) p. 230.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3395, 3393 in herb. DC.; Jamaica: Hart n. 852, Purdie; Portorico prope Lares et Aguada: Blanner n. 248, Sintenis n. 5742, 5901; Trinidad: Broadway n. 5337 (Aripo Savanna), Fendler n. 859, O. Kuntze.

Distrib. in calidioribus orbis fere totius, vulgaris.

184. **Rynchospora stipitata** C. B. Clarke, robustior, rhizomate repente, 2 mm. in diam., a squamis intecto; culmo fere metrali; foliis longis, 4 mm. latis; corymbis axillaribus, distantibus, densis, ramulis erectis apice subnutantibus; spiculis 6 mm. longis, ovoideo-lanceolatis, 3—1-nucigeris, bruneis; setis 7, nuce multo longioribus, antice scabris, bruneis; stylo lineari, ramis 2 linearibus; nuce obovoidea, biconvexa, transversim a multis lineis undulata; rostro cum $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongo, conico.

Rynchospora stipitata Chapm. *Fl. South. U. S.* (1860) p. 660; Hemsl. *Bot. Challenger Voy. sect. 1* p. 76 t. 10.

Hab. in ins. Bermuda: Lefroy, Moseley.

Distrib. Florida.

185. **Rynchospora cymosa** Britton, glabra, foliis 2—4 mm. latis, plano-canaliculatis; panícula angusta, corymbis remotis saepius contractis 1—3 cm. in diam., rarius compositis 8 cm. in diam. 50-cymulosis; spiculis 2—3 mm. longis, cymosim fasciculatis, ovoideis, acutis, ferrugineo-bruneis, sub-1-nucigeris; setis cum $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongis aut brevioribus; rostro cum $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongo; ceteroquin fere ut *R. glauca*.

Rynchospora cymosa Britton in *Trans. New York Acad.* XI (1892) p. 91.

Rynchospora cymosa Elliott *Bot. S. Carol.* I (1816) p. 58; Boeck.! in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 587.

Rynchospora pauciflora Presl in *Oken Isis* XXI (1828) p. 269 et *Symb. Bot.* p. 57 t. 36.

Rynchospora gracilis Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 243; Saur. *Cub.* n. 2660 p. 179 p. p.; non Vahl.

Rynchospora Torreyana Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 243, non A. Gray.

Schoenus cymosus Willd. *Sp. Pl.* I (1797) p. 265.

Hab. in ins. caribaeis: Sieber *Agrost.* n. 146 in hb. DC.; Cuba: C. Wright n. 3395, 3396; Hispaniola in monte Barrero 1200 m. alt.: Eggers n. 2022, 2043; Portorico prope Lares in pratis montanis montis Isabellae: Sintenis n. 6141; Martinique: Sieber n. 383.

Distrib. in America, a Pennsylvania usque ad Brasiliam austral. sparsa.

186. **Rynchospora rariflora** Britton, glabra, culmis 1—4 dm. longis, filiformibus; foliis 1—3 dm. longis, 1—2 mm. latis, setaceo-linearibus; corymbis 4—1, laxis; pedicellis pro magna parte usque ad 4—10 mm. longis; spiculis iis *R. cymosae* simillimis.

Rynchospora rariflora Britton in *Trans. New York Acad.* XI (1892) p. 92.

Rhynchospora rariflora Elliott *Bot. S. Carol.* I (1816) p. 58 syn. excl.; Boeck. in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 599.

Rhynchospora setacea Kunth *Enum.* II (1837) pp. 299, 538; Griseb. *Pl. Cub.* p. 243; *Sauv. Cub. n.* 2665 p. 180.

Schoenus rariflorus Mich. *Fl. Bor. Amer.* I (1803) p. 35.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3400.

Distrib. a Carolina usque ad Florida et Texas.

187. **Rynchospora microcarpa** Britton, glabra, culmis 1—10 dm. longis, gracilioribus; foliis 1—3 dm. longis, 2—3 mm. latis vel fere setaceis; panicula 2—3 dm. longa, corymbis distantibus 1—6 cm. in diam., 10—40-stachyis; spiculis subfasciculatis, 2 mm. longis, ovoideis, 1—2-nucigeris, ferrugineo-bruneis; setis 6, modo nucem superantibus, modo brevibus, interdum fere obsoletis; stylo lineari, ramis 2 linearibus; nuce vix 1 mm. longa, orbiculata, compressa, grossius transversim undulato-rugosa; rostro cum $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongo.

Rynchospora microcarpa Britton! in *Trans. New York Acad.* XI (1892) p. 92.

Rhynchospora microcarpa A. Gray in *Ann. Lyceum New York* III (1836) p. 202 t. 6 fig. 9; Kunth *Enum.* II p. 539; Boeck. in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 583.

Rhynchospora Torreyana var. *microrhyncha* Griseb. *Pl. Cub.* (1866) p. 243.

Rhynchospora involuta C. Wright! *Msc.*

Hab. in ins. Baham.: Dale, Eggers n. 4308 (New Providence in paludosis); Cuba: C. Wright n. 3785.

Distrib. a Carolina usque ad Florida et Texas; in Brasilia australi.

188. **Rynchospora stenophylla** Britton, glabra, gracilis, culmis 3 dm. longis; foliis 10—15 cm. longis, vix 1 mm. latis, setaceis; corymbis inter se 1—2 dm. distantibus, laxis, 4—12-stachyis; spiculis solitariis, anguste ellipsoideo-lanceolatis; setis saepe 6, nempe 3 cum nuce subaequilongis 3 brevioribus, antice scabris, bruneis, vel interdum omnibus aequilongis vel reductis; stylo lineari, ramis 2 linearibus; nuce obovoidea-ellipsoidea, transversim undulata, luteo-brunea; rostro cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ parte nucis aequilongo, conico.

Rynchospora stenophylla Britton! in *Trans. New York Acad.* XI (1892) p. 92.

Rhynchospora stenophylla Chapm.! *Fl. South. U. S.* (1860) p. 525.

Rhynchospora tenuifolia Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 244; *Sauv. Cub.* n. 2669 p. 181.

Rhynchospora Preneloupiana Boeck.! *Cyp. Novae. Heft I* (1888) p. 26.

Rhynchospora capillacea Boeck.! in *Flora LXIV* (1881) p. 78.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3392, 3393; in Hispaniola: Preneloup n. 634.

Distrib. Alabama; Florida.

189. ***Rynchospora sparsa*** Vahl, glabra, mediocris, stolonibus longis a squamis striatis intectis; culmo saepe metrali; foliis usque ad 3—4 dm. longis, 3—6 mm. latis, planis; panicula 3—5 dm. longa, 4—6 cm. lata; corymbis 4—8, distantibus, subglobosis, 40-stachyis, ramulis divaricatis; spiculis solitariis, 3 mm. longis ovoideis, maturis subglobosis 5—2-nucigeris; glumis ovatis, obtusis, caducis; setis 6, antice scabris, bruneis, cum nuce subaequilongis aut brevioribus; stylo lineari, ramis 2 linearibus; nuce 1 mm. longa, obovoidea, transversim rugosa, pallide brunea; rostro cum $\frac{1}{3}$ parte nucis vix aequilongo, conico.

Rynchospora sparsa Vahl *Enum. II* (1806) p. 230.

Rhynchospora sparsa Pursh *Fl. Amer. Sept. I* (1814) p. 48; *Kunth Enum. II* p. 299; *Boeck. in Linnæa XXXVII* (1873) p. 609.

Rhynchospora miliacea A. Gray in *Ann. Lyceum New York III* (1834) p. 198 t. 6 fig. 4 et p. 365; *Griseb.! Pl. Cub.* p. 243; *Sauv. Cub.* n. 2657 p. 179.

Schoenus miliaceus Lam. *Ill. I* (1791) p. 137.

Schoenus sparsus Mich. *Fl. Bor. Amer. I* (1803) p. 35.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3788.

Distrib. Georgia, Alabama, Louisiana, Florida.

190. ***Rynchospora cubensis*** C. B. Clarke, glabra, gracilis, rhizomate tenui, repente; culmis 3—5 dm. longis, 2—4 mm. latis; corymbis 2—4, distantibus, laxis, globosis, 3—5 cm. in diam., ramulis capillaribus divaricatis proventu saepe deflexis; spiculis solitariis, 4 mm. longis, lanceolatis, pallide bruneis, 1-nucigeris; glumis longius lanceolato-acuminatis; setis 6, cum nuce (rostro incluso) aequilongis, antice scabris vel fere levibus; stylo lineari, ramis 2 linearibus; nuce cum $\frac{2}{5}$ parte glumae aequilonga, sessili, subglobosa, transversim obscurius undulata, nigrescente; rostro cum nuce aequilongo, e basi conica lineari.

Rhynchospora cubensis A. Rich.! in *Sagra Cub. XI* (1850) p. 294.

Rhynchospora deflexa Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 243; *Sauv. Cub.* n. 2658 p. 179.

Hab. in Cuba: Combs n. 1419 (St. Clara), Sagra, C. Wright n. 3399; Hispaniola prope Puerto-Plata solo calcareo 50 m. alt., in monte Isabel de la torre 400 m. alt., inter Batey et Jameo 150 m. alt.: Eggers n. 1658, 2600, 2600^b.

191. ***Rhynchospora Marisculus*** C. B. Clarke, glabra, mediocris vel robustior, stolonibus in rhizoma repens 2—3 mm. in diam. induratis; culmo 5—10 dm. longo; foliis 2—4 dm. longis, 5—7 mm. latis, rigidis, marginibus in sicco subrecurvis; corymbis distantibus, 4—8 cm. in diam., densis, ramulis erectis apice subnatis; spiculis 5—7 mm. longis, approximatis fere fasciculatis, ellipsoideo-lanceolatis, 3—1-nucigeris, bruneis aut ferrugineo-bruneis; glumis ovato-lanceolatis, acutis; setis 7, nuce multo longioribus, antice scabris basi saepe albo-pilosulis, bruneis; stylo lineari, ramis 2 linearibus; nuce breviter stipitata, obovoidea, a 16 lineis undulatis transversim notata; rostro cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{5}$ parte nucis aequilongo, pallido, saepe scabrido.

Rhynchospora Marisculus Nees! in *Linnaea* IX (1834) p. 297 et in *Mart. Fl. Bras. II pars I* p. 142; Boeck. in *Linnaea* XXXVII (1873) p. 590.

Rhynchospora tenuiseta C. Wright! in *Sauv. Cub.* (1871) n. 2656 p. 179.

Rhynchospora odorata C. Wright! in *Sauv. Cub.* (1871) n. 2655 p. 179; an Griseb. *Pl. Cub.* p. 242?

Rhynchospora jubata Liebm.! *Mexic. Halagr.* (1850) p. 66.

Rhynchospora Ulcama Boeck.! ms. in *Ule* n. 1394.

Rhynchospora rigidula Schrader ms. ex Kunth *Enum. II* p. 297 in citat.

Rhynchospora glauca (*longirostris*?) Kunth ms. fide Boeckeler.

Schoenus Marisculus Salzmunn! ms.

Hab. in ins. Bahama: Eggers n. 4451 (New Providence); Cuba: Eggers n. 5018 (La Clarita), C. Wright n. 3787, 3780 in hb. Kew et Kr. et Urb.; Jamaica: Wilson n. 493; St. Lucia: Tweedie.

Distrib. a Mexico usque ad Paraguay, sat frequens.

Obs. Species critica, a *R. glauca* Vahl (nisi magnitudine) parum diversa.

192. ***Rhynchospora pruinosa*** C. B. Clarke, glabra, gracilis, culmis caespitosis 2—4 dm. longis; foliis 1—3 dm. longis, 2—3 mm. latis, in utraque pagina pruinoso-scabratibus; corymbis 1—3, parvis, remotis, densis, 10—30-stachyis; spiculis 2—3 mm. longis, ovoideis, acutis, fusce stramineis, 1-nucigeris; setis 6, cum nuce aequilongis, antice scabris; stylo lineari, ramis 2 linearibus; nuce cum $\frac{3}{5}$ parte glumae

aequilonga, sessili, obovoideo-ellipsoidea, brunea, obscurius transversim undulata; rostro cum $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ parte nucis aequilongo, pallido, e basi bulbosa conico.

Rhynchospora pruinosa Griseb.! in *Mem. Acad. Amer. Sc. New Ser. VIII* (1862) p. 535, et *Pl. Cub.* p. 243; *Saur. Cub.* n. 2659 p. 179.

Rhynchospora scabrata Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 243.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 1532, 3391, 729 in hb. DC.

193. ***Rynchospora cernua*** C. B. Clarke, glabra, pusilla, culmis 5—15 cm. longis, setaceis; foliis basalibus pluribus 6 cm. longis, setaceis, pruinosis; corymbis 2 (vel 1) remotis, subcapitatis, 5—10-stachyis; spiculis 1—2 mm. longis, fusce stramineis, 1-nucigeris, proventu ovoideis; setis 6, nuce parum brevioribus, antice scabridis, rubro-bruneis; stylo lineari, ramis 2 linearibus; nuce vix 1 mm. longa, sessili, obovoidea, plano-convexa, transversim undulata, luteo-brunea; rostro cum $\frac{1}{2}$ parte nucis aequilongo, conico, bruneo.

Rhynchospora cernua Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 248; *Saur. Cub.* n. 2681 p. 182.

Rhynchospora brevirostris Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 246; *Saur. Cub.* n. 2688 p. 184.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3365, 3413.

Species residua.

Rynchospora pyramidata culmo argute triquetro, folioso; foliis glaberrimis; panicula elongata, interrupta; fasciculis pyramidato-thyrsoideis; rhachilla subpilosa; spiculis albescens.

Rhynchospora pyramidata Ham. *Prod. Fl. Ind. Occid.* (1825) p. 15; *Kunth Enum. II* p. 302; *Desr. ms. ex Ham.*

Hab. in Jamaica: ex Hamilton.

XVI. *Pleurostachys* Brongn.

Glumae undique imbricatae, 3—4 imae minores vacuae, 1—plures sequentes bisexuales nucigeræ, summae tabescentes masculae aut steriles. Setae 6—3, alopecuroideae i. e. apice densius basi sparsim scabro-hispidae. Stylus linearis; rami 2, lineares; stylobasis conica, sessilis, persistens; ceteroquin ut *Rhynchospora*. — Corymbi axillares, numerosi.

Species 20, in America tropica a Trinidad usque ad Paraguay sparsae.

Obs. Genus (vel subgenus) admodum naturale, a *Rhynchospora* habitu ac praesertim setis alopecuroideis (in nulla specie *Rhynchosporae* visis) diversum.

194. **Pleurostachys puberula** Boeck. robustior, undique minute pilosa, rhizomate horizontali; culmo metrali et ultra, per totam longitudinem nodoso, foliigero aut bracteigero; foliis saepe 5—8 dm. longis, linearibus interdum usque ad 3 cm. latis, superioribus distantibus; corymbis 6—15 cm. in diam., compositis, ramis primariis brevibus, rigidis, rectangulatim divaricatis; spiculis 1 mm. longis, bruneis, 1-nucigeris; nuce 1 mm. longa, obovoidea, turgida, fere levi, luteo-brunea; rostro cum $\frac{1}{3}$ parte nucis aequilongo, levi, pallido.

Pleurostachys puberula Boeck.! in *Flora LXIII* (1880) p. 453.

Rhynchospora Millegrana Griseb.! *Flor.* (1864) p. 575.

Hab. in Trinidad: Crueger.

Distrib. Guiana, Rio de Janeiro.

XVII. *Cladium* (P. Browne).

Glumae undique imbricatae. Floris imi nuciferi gluma cum 4—2 inferioribus aequilonga. Stamina 3. Styli rami 3 longi, basis incrassata cum nuce arcte fusa. — Perennes, robustiores, praeter inflorescentiam glabrae. Folia angusta. Inflorescentia elongato-paniculata. Spiculae in 3 speciebus caribaeis 1—4-nucigerae.

Species 44, quarum 1 (*Cl. jamaicense*) per totum orbem terrarum fere sparsa, caeterae fere omnes insulares aut prope mare vigentes.

Clavis specierum antillanarum.

Subgenus I. **Eu-*Cladium*** Benth. *Fl. Austral. VII* p. 402. Setae hypogynae 0.

Folia 5—10 mm. lata. Corymbi polystachyi

195. *C. jamaicense* Crantz.

Subgenus II. **Machaerina** Vahl *Enum. II* p. 238 (genus). Setae obviae.

Folia xiphoidea, 5—10 mm. lata . . . 196. *C. restioides* Benth.

Folia subteretia, anguste linearia . . . 197. *C. filifolium* Benth.

195. ***Cladium jamaicense*** Crantz, glabrum, stoloniferum, culmo 1—3-metrali; foliis longis, 5—10 mm. latis; panicula 3—8 dm. longa, corymbis distantibus ∞ -stachyis; spiculis fasciculatis, 2—4 mm. longis, 2-floris, bruneis; glumis ovatis; setis 0; stylo 3-fido; nuce $1\frac{1}{2}$ mm. longa, ovoidea, acuta, castanea, lucida.

Cladium jamaicense Crantz *Inst. I* (1766) p. 362; C. B. Clarke in *Dur. et Schinz Fl. Afr. V* p. 665.

Cladium germanicum Schrad. *Fl. Germ. I* (1806) p. 75 t. 5 fig. 7.

Cladium Mariscus R. Br. *Prod.* (1810) p. 236; Kunth *Enum. II* p. 236; Boeck.! in *Linnaea XXXVIII* (1874) p. 232; Hemsl.! *Bot. Challenger sect. 1* p. 76 et *Biol. Centr. Amer. Bot. III* p. 468.

Cladium occidentale Roem. et Sch. *Syst. I* (1817) p. 284; Griseb.! *Kar. p. 124 et Flor. p. 573 et Pl. Cub. p. 242; nec Schrad. Fl. Germ. I p. 76 in Obs.*

Cladium effusum Torrey in *Ann. Lyceum New York* III (1836) p. 374; *Sauv. Cub.* n. 2651 p. 179.

Schoenus Mariscus Linn.! *Sp. Pl. ed. I* (1753) p. 42.

Schoenus Cladium Swartz *Prod.* (1788) p. 19 et *Fl. Ind. Occid. I* p. 97.

Schoenus effusus Swartz *Prod.* (1788) 19 et *Fl. Ind. Occid. I* p. 98 in nota.

Hypolytrum Kuntzeanum Boeck.! *Cyp. Novae. Heft I* (1888) p. 23.

Hab. in Bermuda: Moseley; ins. Bahama: Brace n. 199; Cuba: C. Wright n. 1534; Jamaica: Bromfield, Hart n. 822, Purdie; Hispaniola: Picarda n. 1112 (prope Mariani in uliginosis), Prenleloup n. 636, Prescott; Portorico in paludosis Playa de Humacao: Eggers n. 423, 681, prope Bayamon ad Cataño: Sintenis n. 1214, prope Manatí circa Lagunam Tortuguero: Sintenis n. 6814; Guadeloupe, Etang des Trois Rivières: Duss n. 3108, Husnot n. 38, l'Herminier n. 15; Martinique: Duss n. 230; St. Lucia circa La Soufrière: Duss n. 469; Grenada in monte Morne au Camp 670 m. alt. et ad Grand Etang: Broadway n. 780, Eggers n. 6208^b.

Distrib. in temperatis et calidis orbis fere totius.

196. ***Cladium restioides*** Benth. fere glabrum, culmo usque ad 6—10 dm. longo compresso; foliis xiphoideis, equitantibus, 5—10 mm. latis; panicula 3—6 dm. longa, oblonga, composita, ramis obscurius flexuosis; spicularum fasciculis numerosis, atro-rubris; spiculis 3—4 mm. longis, ovoideis, 2—4-nuciferis; glumis ovatis, concavis; setis nuce longioribus, tenuissimis, saepius 6; stylo longo, bruneo-rubro, ramis 3 linearibus; nuce 1 mm. longa, stipitata, triquetra, lanceolato-obovoidea, luteo-brunea, rostro (stylobasi) pyramidali piloso.

Cladium restioides Benth.! in *Benth. et Hook. f. Gen. Pl. III* (1883) p. 1066.

Schoenus restioides Swartz *Prod.* (1788) p. 19 et *Fl. Ind. Occid. I* p. 104.

Machaerina restioides Vahl! *Enum. II* (1806) p. 238; *Kunth Enum. II* p. 313; *Griseb. Kar. p.* 124 et *Flor. p.* 573; *Boeck.! in Linnaea XXXVIII* (1874) p. 252.

Cortadera Port. ex Sint.

Hab. in Portorico orient. in planitie montis Jimenes et in cacumine montis Yunque: Sintenis n. 1382, 1449; St. Kitts: Masson; Montserrat: Ryan; Guadeloupe in savane à mulet frequens: Duss n. 3120, l'Herminier n. 35; Dominica: Duss, Eggers n. 744 (alt. 330 metr.), 1102, Nicholls n. 153, 168, Ramage; Martinique: Belanger n. 795, Duss n. 760^a, Hahn n. 696, 871, Husnot n. 30, Sieber n. 262;

St. Vincent in monte Soufrière et in summo monte St. Andrews: Anderson n. 1793, Eggers n. 6918, 6918^b (alt. 750 metr.), Smith n. 134.

Var β . **effusa** C. B. Clarke, panicula copiosa; spiculis ferrugineis, turgidis; setis nuce brevioribus, parum scabris; nuce majore, minus stipitata.

Machaerina restioides var. *effusa* Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 242.

Machaerina restioides C. Wright! in *Saur. Cub.* (1871) n. 2652 p. 179.

Hab. in Cuba orientali prope Monteverde: C. Wright n. 1535.

197. **Cladium filifolium** Benth. fere glabrum, culmis caespitosis, 6 dm. longis, 1—1½ mm. in diam., subteretibus; foliis culmo multo brevioribus, cum culmo consimilibus; panicula 2 dm. longa, angusta, parum ramosa, ramulis interdum anfractuoso-flexuosis; spiculis 4 mm. longis, c. 3-floris; setis cum ½ parte nucis aequilongis, filiformibus, levibus, bruncis; stylo 3-fido; nuce c. 1 mm. longa, ovoidea, subsessili, trigona, brunea, rostro longe pyramidali, pallido, piloso.

Cladium filifolium Benth.! in *Benth. et Hook. f. Gen. Pl. III* (1883) p. 1066.

Machaerina filifolia Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 242; *Saur. Cub.* n. 2653 p. 179.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3388.

XVIII. **Remirea** Aubl.

Spiculæ 1-floræ. Glumæ 4 undique imbricatæ; flos in gluma summa dissimili 2-sexualis pseudo-terminalis. Setae 0. Stamina 3, unilateralia. Stylus cum ovario continuus, basi non bulbosus, linearis; rami (saepissime 3) lineares. Nux sessilis, levis. — Spiculæ in spicis digitatis dense spicatæ.

Species 1.

198. **Remirea maritima** Aubl. glabra, rhizomate usque ad 1—5 dm. longo; culmis 1—12 cm. longis, fere usque ad apices a vaginis foliorum intactis; foliis superioribus 3—8 cm. longis, rigidiusculis, marginibus saepe recurvis; bracteis 2—6, usque ad 3—6 cm. longis, patulis, cum foliis consimilibus; spicis 10—18 mm. longis, 30-stachyis, stramineis aut fuscis; spiculis 3—5 mm. longis, ellipsoideis; nuce cum ⅔ parte glumæ summae aequilonga.

Remirea maritima Aubl. *Pl. Guian.* I (1775) p. 45 t. 16; *Beaur. Fl. d'Ocar.* II p. 23 t. 73; *Kunth Enum.* II p. 139; *Boeck.*! in *Linnaea XXV* (1867—68) p. 435; *Griseb.*! *Flor.* p. 569; C. B. Clarke in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VI p. 677.

Remirea pedunculata R. Br.! *Prod.* (1810) p. 236; *Kunth Enum.* II p. 139.

Remirea Wightiana Nees! in *Wight Contrib.* (1834) p. 92.

Remirea distichophylla Boeck. in *Flora XLI* (1858) p. 410.

Miegia maritima Willd.! *Sp. Pl. I* (1797) p. 311.

Mariscus capitatus et *M. pungens* Steud.! *Cyp.* (1855) p. 60.

Cyperus Kegelianus Steud.! *Cyp.* (1855) p. 60.

Lipocarpus foliosa Miq.! *Fl. Ind. Bat. III* (1859) p. 332.

Hab. in Trinidad: Crueger, Hart n. 2224, Lockhart n. 297.

Distrib. in maritimis tropicis totius fere orbis terrarum sparsa.

XIX. *Scleria* Berg.

Flores unisexuales, axillares. Gluma foeminea aperta, nec marginibus connatis florem includens utriculiformis. Setae hypogynae 0. Nux ossea, globosa plus minus trigona, aut obovoidea, alba aut rarius decolorata plumbea aut purpurascens, in gynophoro (apice in discum trilobum aut cupuliformem saepe explanato) sustentata. — Spiculae pauciflorae, modo androgynae flore nucifero unico basali superioribus masculis, modo unisexuales alterae masculae pluriflorae alterae flore unico nucifero basali superioribus (masculis) sterilibus rudimentariis aut fere obsoletis. Folia semper obvia. Inflorescentia paniculata nec quasi-umbellata; sed corymbus interdum congestus subterminalis et culmus nisi basi fere nudus paucinodosus.

Species 180, per orbem terrarum in regionibus humidis calidioribus sparsae, praesertim tropicae.

Clavis specierum antillanarum.

A. Spiculae non omnes unisexuales i. e. e spiculis nucigeris quaedam androgynae.

Sect. *Hypoporum*. Discus cum nucis stipite fusus, obscurus vel obsoletus.

Radices fibrosae.

Inflorescentia (specie) spica simplex.

Nux verrucosa 199. *S. verticillata* Willd.

Nux levis 200. *S. distans* Poir.

Paniculae laxae rami longi . . . 201. *S. Liebmanni* Steud.

Rhizoma horizontale, ligneum, 3—5 mm. in diam.

Inflorescentia (specie) spica simplex

202. *S. hirtella* Swartz.

Panicula laxa, tenuis . . . 203. *S. lithosperma* Swartz.

Sect. *Brownieae*. Discus angustus; margo e 3 squamis parvis aut 3—6 glandulis exstructus.

Nux levis 204. *S. gracilis* Elliott.

Nux tuberculosa, subglochidiata

Nucis disci margo e glandulis 6 exstructus

205. *S. pauciflora* Willd.

Nucis disci margo e glandulis 3 exstructus

206. *S. ciliata* Mich.

B. Spiculae omnes unisexuales.

Sect. *Tessellatae*. Radices fibrosae.

Nux reticulata. Plantae mediocres.

Paniculae in pedunculis longis nutantes

207. *S. Torreyana* Walp.

Paniculae rigidae, pyramidatae 208. *S. hemitaphra* Steud.

Nux levis marmorata. Planta robustior

209. *S. lacustris* C. Wright.

Sect. *Eu-Scleria*. Perennes. Disci margo nec ciliatus nec fimbriatus.

* Ligula magna, margine scarioso.

† Culmi erecti . . . 210. *S. cyperina* Kunth.

†† Culmi vagantes ramosi . 212. *S. reflexa* H. B. K.

** Ligula breviter ovata

† Culmi vagantes ramosi . 211. *S. Flagellum* Swartz.

†† Culmi erecti

Spiculae masculae et foemineae in paniculis mixtae.

Nux verrucosa subtuberculosa

215. *S. stereorrhiza* C. Wright.

Nux levis aut fere levis

Plantae mediocres, mediocriter scabrae.

Paniculae rubrae; nux decolorata

213. *S. melaleuca* Schlecht. et Cham.

Paniculae fusco-virides

Nux depressa globosa. Discus margine patulus

214. *S. pterota* Presl.

Nux longior quam lata. Discus margine non

patulus 214^b. *S. Wrightiana* Boeck.

Plantae rudes, serrato-scabrae, manus secantes

Panicula 1 subterminalis

216. *S. scindens* Nees.

Panicula composita 24 cm. longa

217. *S. canescens* Boeck.

Paniculae superiores masculae, inferiores foemineae

218. *S. bracteata* Cav.

Sect. *Ophryoscleria*. Disci margo ciliatus. In folii parte superiore margines praemorsim angustati.

Nux 5—6 mm. longa. Folia saepe 3 cm. lata

223. *S. paludosa* Kunth.

Nux 1—3 mm. longa. Folia 5—20 mm. lata

Nux parva 1—2 mm. longa, subacuta

219. *S. microcarpa* Nees.

Nux alba, a stylobasi nigra coronata

221. *S. mitis* Berg.

Nux ovoideo-globosa, 2—3 mm. longa

Disci margo microscopice papillosus

220. *S. phylloptera* Griseb.

Disci margo dense ciliatus 222. *S. Grisebachii* C. B. Clarke.

Sect. *Schixolepis*. Disci margo fimbriatus aut alte serratus. In folii parte superiore margines praemorsim angustati.

Folia 5 mm. lata; planta mediocris

224. *S. porphyrorrhiza* C. Wright.

Folia 3—5 cm. lata; plantae robustae

Panicula fusca aut viridis . 225. *S. latifolia* Swartz.

Panicula purpurascens . . 226. *S. arundinacea* Kunth.

Sect. *Becquerelia*. Spicula mascula foeminea multo minor, eique arcte adpressa; ceteroquin ut sect. *Eu-Scleria*.

Nux 3 mm. lata, verrucosa . 227. *S. cymosa* Boeck.

Nux 1½ mm. lata, tuberculata 228. *S. tuberculata* Boeck.

199. ***Scleria verticillata*** Willd. praeter vaginas inferiores glabra, radicibus fibrosis; culmis 1—5 dm. longis, gracilibus; foliis 1—3 dm. longis, 1—2 mm. latis; spica specie simplice, spicularum fasciculis distantibus ovoideis; bracteis 6—7 mm. longis, saepe caudatis; spiculis 2—4 mm. longis castaneo-rubris, masculis et 2-sexualibus; stylo 3-fido; nuce 1 mm. in diam., trigono-globosa, obtusa, albida, undique a laminis levibus horizontalibus verrucosa; disco annulari, angusto, fusce flavido cum nucis stipite contracto fusco vel proventu vix ullo; nuce non (aut obscure) hypopora.

Scleria verticillata Willd. *Sp. Pl. IV* (1805) p. 317; *Kunth Enum. II* p. 353 (*syn. Mich. excl.*); *Boeck. in Linnaea XXXVIII* (1874) p. 445 *partim*.

Scleria hirtella var. *glabrescens* Boeck.! *ms. in C. Wright n. 3417*.

Hypoporum verticillatum Nees in *Linnaea IX* (1834) p. 303 (*nec Nees in Bonplandia III* (1855) p. 87).

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3417 in hb. Krug et Urban (in hb. Kew., DC. *partim*).

Distrib. a Canada usque ad Florida et Texas.

200. ***Scleria distans*** Poir. praeter spiculas glabra, debilis, radicibus fibrosis; culmo 20—25 cm. longo, gracili; foliis linearibus; spica specie simplice, 5 cm. longa, fasciculis 6 distantibus, parcius hispidociliatis, proventu erectis; bracteis cum spiculis subaequilongis; spiculis 4 mm. longis, masculis et 2-sexualibus; stylo 3-fido; nuce 1 mm. in diam., globoso-trigona, perlevi, alba, longius stipitata, in stipitis apice alte porosa; disco annulari, ferrugineo micante.

Scleria distans Poir. in *Lam. Encyc. VII* (1806) p. 4; *Kunth Enum. II* p. 353; *nec R. Br.*

Scleria hirtella Boeck. in *Linnaea XXXVIII* (1874) p. 439 *partim*; *non Swartz.*

Scleria tenella Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 249 *partim*; *non Kunth.*

Hypoporum distans Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 171 *in nota?*

Hab. in Cuba: C. Wright 3418 B, D in hb. Kew; Hispaniola: Jacquemont; Portorico: hb. Desfontaines (verisim. Riedlé v. Ledru leg.); St. Thomas: Riedlé; Guadeloupe in savannis Camp Jacob 540 m. alt.: Duss n. 3109, 3736, Husnot n. 45.

Obs. *Scleria distans* Nees (e NEESII descriptione) discrepat ob nucem tuberculatam, et ad *S. interruptam* Rich. forsán refert.

201. **Scleria Liebmanni** Steud. praeter vaginas inferiores glabra, gracilis, radicibus fibrosis; panicula laxa, ramis gracilibus, inferioribus usque ad 3—6 cm. longis, spicularum fasciculis parvis ovoideis sessilibus distantibus, bracteis quam spiculae brevioribus; stylo 3-fido; nuce 1 mm. in diam., obovoidea, trigono-globosa, alba, transversim grossius verrucosa, in 3 faciebus a spatio levi longitudinaliter costata.

Scleria Liebmanni Steud.! Cyp. (1855) p. 179.

Scleria luxulaciformis C. Wright! in Saur. Cub. (1871) n. 2715 p. 188.

Scleria tenella Griseb.! Pl. Cub. (1866) p. 249 pro parte, non Kunth.

Scleria verticillata Boeck.! in Engl. Jahrb. I (1881) p. 364; non Willd.

Hypoporum purpurascens Liebm.! Mex. Halvgr. (1850) p. 68, non Nees.

Hypoporum verticillatum Nees! in Bonplandia III (1885) p. 87; nec Nees in Linnæa IX (1834) p. 303.

Hab. in Cuba; C. Wright n. 3418 A, C herb. Kew.

Distrib. a Mexico usque ad Brasiliam australem.

202. **Scleria hirtella** Swartz, pilosa, rhizomate 3—5 mm. in diam. usque ad 1 dm. longo; culmis subdistantibus, 2—6 dm. longis, gracilioribus, ima basi angustis; foliis imis abbreviatis, superioribus 1—2 dm. longis 2—4 mm. latis; spica (specie) simplicia, 8—20 cm. longa; spicularum fasciculis hispidis pleiostachyis, proventu nutantibus; spiculis 4 mm. longis, 3—12-nim fasciculatis, saepe castaneis aut ferrugineis, plurimis androgynis; glumis inferioribus vacuis et gluma nucigera aristatis; stylo 3-fido; nuce 1 mm. longa, obovoidea subtrigona, levi, alba, sub bascos contractione a poris 9—12 excavata.

Scleria hirtella Swartz! Prod. (1788) p. 19 et Fl. Ind. Occid. I p. 93; Kunth Enum. II p. 353; Boeck.! in Linnæa XXXVIII (1874) p. 439 a partim nec β nec γ; Griseb.! Flor. p. 579 (syn. excl.) et Pl. Cub. p. 249; Saur. Cub. n. 2717 p. 189; C. B. Clarke in Dyer Fl. Cap. VII p. 294.

Scleria nutans Kunth! Enum. II (1837) p. 352; Liebm.! Mex. Halvgr. p. 67; Saur.! Cub. n. 2716 p. 189.

Scleria cenchroides Kunth! Enum. II (1837) p. 352.

Scleria mollis Kunth! Enum. II (1837) p. 352.

Scleria hirta Kunth Enum. II (1837) p. 352 in citat., Willd. ms. ex Kunth.

Scleria interrupta Kunth Enum. II (1837) partim (pl. antillana), nec L. C. Rich.

Hypoporum hirtellum Nees! in Linnaea IX (1834) p. 303.

Hypoporum nutans Nees in Mart. Fl. Bras. II pars I (1843) p. 170.

Cenchrus hirsutus Spreng.! Neu. Entdeck. III (1822) p. 15 (cf. Kunth Enum. I p. 166 in Obs.).

Hab. in Cuba: Combs n. 441 (S. Clara), C. Wright n. 3417 partim, 3806; Hispaniola: Bertero, Eggers n. 2127, 2491, 2491^b, Rob. Schomburgk; Trinidad in Arimo Savanna: Crueger n. 1734, Lockhart n. 281.

Distrib. Africa cum Madagascaria, in America fere omni vulgaris.

203. ***Scleria lithosperma*** Swartz, praeter foliorum vaginas fere glabra, medioeris aut gracilis, rhizomate 5 mm. crasso longiusculo; culmis saepius 3—5 dm. longis, interdum metralibus; foliis 1—3 dm. longis, 3—5 cm. latis; panícula tenui, saepe 2—3 dm. longa, modo depauperata modo composita, spicularum fasciculis distantibus; spiculis 4 mm. longis, fere levibus ac glabris, pluribus masculis paucis androgynis, ferrugineo-brunneis vel viridescenscentibus vel castaneis; stylo 3-fido; nuce 2 mm. longa, obovoidea, marmorea, levi alba, basi excavata vix hypopora; disco pertenui rubescente cum nucis basi fusa i. e. fere obsoleta.

Scleria lithosperma Swartz Prod. (1788) p. 18 et Fl. Ind. Occid. p. 92 in nota; Kunth Enum. II p. 349; Boeck.! in Linnaea XXXVIII (1874) p. 451; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI p. 685.

Scleria filiformis Swartz Prod. (1788) p. 19 et Fl. Ind. Occid. I p. 91; Kunth Enum. II p. 348; Liebm.! Mex. Halvgr. p. 69; Griseb.! Kar. p. 124, et Flora p. 579 et Pl. Cub. p. 249; Sanr.! Cub. n. 2713 p. 188.

Scleria gracilis L. C. Rich. in Acta Soc. d'Hist. Nat. Paris I (1792) p. 113.

Scleria purpurea Poir. in Lam. Encyc. VII (1806) p. 4.

Scleria Krugiana Boeck.! Cyp. Novae. Heft I (1888) p. 35.

Scirpus lithospermus Linn. Sp. Pl. ed. I (1753) p. 51.

Schoenus lithospermus Linn. Sp. Pl. ed. II p. 65 pro parva parte.

Hypoporum lithospermum Nees! in Mart. Fl. Bras. II pars I (1843) p. 172.

Cortadera Cub. ex Eggers.

Hab. in Bahamas: Brace n. 426, Dale, Eggers n. 4457 (New Providence), Northrop n. 603 (Andros); Cuba: Eggers n. 4714, Rugel n. 198, C. Wright n. 721, 722, 3419; Jamaica: Purdie, Swartz, Wulschlaegel n. 1143; Hispaniola: hb. Hennecart (Jacquemont?), Picarda n. 429, Poiteau, Preneloup n. 639; Portorico: Sintenis n. 4753, 4945, 5499; St. Thomas: Eggers n. 95; Guadeloupe: Duss n. 3114, l'Herminier n. 9; Dominica: Duss, Imray n. 350; Antillae: Eggers n. 178; ins. Carib.: Sieb. Agrostotheca n. 97; Martinique: Belanger n. 789, Duss n. 446^a, Hahn n. 890, Husnot n. 44; Becquia: Smith n. B. 340; St. Vincent: Smith 1087; Grenada: Broadway n. 254, Elliott; Trinidad: Fendler n. 890, Finlay n. 1874, Sieber n. 14.

Distrib. in calidioribus orbis fere totius, in Africa rara, in Asia, Oceania, America communis.

204. **Scleria gracilis** Elliott, fere glabra, rhizomate 4 mm. crasso; culmis 3—6 dm. longis, gracilibus; foliis 2 dm. longis 2 mm. latis; inflorescentia composite subcapitata, capite axillari remoto interdum addito, capite terminali 3—8-stachyo, bractea 5—10 cm. longa, suberecta; spiculis 7—10 mm. longis, fere omnibus androgynis, bruneis aut pallidis; stylo 3-fido; nuce 2 mm. longa, obovoidea, levi, obscure longitudinaliter costata, stipite eglanduloso sub basi 6-ocellato; disco obpyramidali rufescente, limbo parvo subintegro.

Scleria gracilis Elliott *Bot. S. Carol. II* (1824) p. 571; *Kunth Enum. II* p. 359; *Griseb.! Pl. Cub.* p. 249; *Boeck. in Linnaea XXXVIII* (1874) p. 450; *Saur.! Cub. n.* 2714 p. 188.

Hypoporum gracile Torrey! in *Ann. Lyceum New York III* (1836) p. 381.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3420.

Distrib. Carolina septentr., Florida, Texas.

205. **Scleria pauciflora** Willd. gracilior aut mediocris, rhizomate 3 mm. in diam.; culmis 3—5 dm. longis, glabris aut laxe pilosis; foliis 2 dm. longis 3 mm. latis, glabris aut pilosis; paniculis 3—1, inferioribus distantibus, bractea summa suberecta, glabra aut pilosula; spiculis 5 mm. longis, fere omnibus androgynis; stylo 3-fido; nuce 1½ mm. longa, globosa, tuberculosa; disco angusto, margine e glandulis 6 (rarius e 3 bilobis) exstructo.

Scleria pauciflora Willd. *Sp. Pl. IV* (1805) p. 318; *Kunth Enum. II* p. 349; *Boeck. in Linnaea XXXVIII* (1874) p. 461; *Saur.! Cub. n.* 2711 p. 188.

Scleria caroliniana Willd. *Sp. Pl. IV* (1805) p. 318; *Kunth Enum. II* p. 359.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3799.

Distrib. a Pennsylvania usque ad Florida, Texas.

Var. **effusa** C. B. Clarke, panicula terminali composita, ramis primariis usque ad 6 mm. longis, secundariis usque ad 5 mm. longis; panicula altera, depauperata, 10—15 cm. distante saepissime addita; nuce (cum disco) omnino ut in *S. pauciflora* Willd.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 720 in herb. Kew.

206. **Scleria ciliata** Mich. mediocris, parum pilosa, inflorescentia subterminali, panicula partiali remota rarius addita; bractea summa suberecta, basi in margine fere semper ciliata; nuce tuberculosa; disco angusto margine e glandulis 3 (integris aut emarginatis) exstructo; ceteroquin ut *S. pauciflora* Willd.

Scleria ciliata Mich. Fl. Bor. Amer. II (1803) p. 167; Kunth Enum. II p. 350; Boeck.! in Linnaea XXXVIII (1874) p. 463.

Scleria Elliottii Chapm.! Fl. South. U. S. (1860) p. 531; Sauv.! Cub. n. 2712 p. 188.

Scleria macrantha Boeck.! in Flora XLI (1858) p. 647; nec Boeck. in Flora LXII (1879) p. 572.

Scleria pauciflora var. *Elliottii* Britton! in Ann. New York Acad. III (1884) p. 233.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3798; Hispaniola in graminosis montis Barrero 1200 m. alt.: Eggers n. 2043^b, 2126.

Distrib. a Virginia usque ad Florida, Texas.

207. **Scleria Torreyana** Walp. fere glabra, rhizomate nullo; culmis 2—6 dm. longis, gracilibus; paniculis axillaribus saepe 1—2 dm. distantibus, 2—6 cm. longis, in pedunculis longiusculis saepe nutantibus; spiculis unisexualibus; stylo 3-fido; nuce 1½ mm. longa, globosa, fenestrata, alba aut fuscescens, reticulaturibus glandulosis plus minus pilosis; disci lobis parvis, ovatis saepe triangulari-acutis.

Scleria Torreyana Walp. Ann. III (1853) p. 696; Boeck.! in Linnaea XXXVIII (1874) p. 468.

Scleria reticularis Mühl. Descr. uber. (1817) p. 266; Kunth Enum. II p. 348 partim; Sauv. Cub. n. 2708 p. 188.

Scleria laxa Torrey! in Ann. Lyceum New York III (1836) p. 376; Sauv.! Cub. n. 2709 p. 188; non R. Br.

Scleria oligantha A. Rich.! in Sagra Pl. Cub. XI (1850) p. 295; nec Mich.

Scleria dictyocarpa Griseb.! Pl. Cub. (1866) p. 249.

Scleria Jelskiana Boeck. in Linnaea XXXVIII (1874) p. 469.

Scleria trichopoda C. Wright! Msc.

Hab. in Cuba: Sagra, C. Wright n. 3416^a, 3800.

Distrib. a New Jersey usque ad Florida, Mexico; in Guiana, Brasilia usque ad Pernambuco.

208. **Scleria hemitaphra** Steud. fere glabra, rhizomate 0; culmis 3—8 dm. longis, pro longitudine gracilioribus; paniculis axillaribus pyramidalibus, rigidis, saepe 2—4 cm. latis, bracteis secundariis conspicue exstantibus; spiculis unisexualibus; stylo 3-fido; nuce 1½—2 mm. longa, ellipsoidea, fenestrata; reticulationibus levibus, sparse tenuissime pilosis; disci lobis parvis, ovatis, saepe triangularibus.

Scleria hemitaphra Steud.! *Cyp.* (1855) p. 169.

Scleria reticularis Spreng. *Syst. III* (1826) p. 831 partim; Boeck.! in *Linnaea XXXVIII* (1874) p. 469.

Scleria bracteata var. *angusta* Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 249.

Scleria debilis C. Wright! in *Saur. Cub.* (1871) n. 2704 p. 186.

Scleria Torreyana var. Boeck.! in *Linnaea XXXVIII* (1874) p. 469.

Scleria setacea Poir. in *Lam. Encycl. VII* (1806) p. 4 e *descript.*

Scleria micrantha Poir. *Encyc. Suppl. V* (1817) p. 108; *Kunth Enum. II* p. 359; e *descript.*

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3416^b in herb. Kew. (Savanna Retiro), n. 3416 herb. Mus. Brit.; Portorico prope Hato grande in graminosis ad montem Gregorio: Sintenis n. 2718.

Distrib. in America septentr., austro-orient., Mexico, Guatemala.

209. **Scleria lacustris** C. Wright, robustior, parum pilosa, radicibus fibrosis in aqua natantibus; culmo 8 dm. longo, triquetro, in angulis perscabro; foliis usque ad 6 dm. longis, 11 mm. latis; paniculis 1—2, inferiore longe distante, terminali 1 dm. longa 6 cm. lata, ramis rigidis, spicularum fasciculis sessilibus paullo distantibus; spiculis omnibus 1-sexualibus, fere glabris, fusco-brunceis, foemineis 4 mm. longis; gluma nucigera acuta, vix mucronata; stylo 3-fido; nuce 3 mm. longa, ovoidea, levi, marmorea, alba; disco depresso obpyramidalis, pallido, margine angustissimo purpureo subintegro.

Scleria lacustris C. Wright! in *Saur. Cub.* (1871) n. 2700 p. 185.

Scleria Junghuhniana Boeck. in *Linnaea XXXVIII* (1874) p. 499.

Hab. in Cuba: C. Wright.

Distrib. Guiana gallica; Java.

210. **Scleria cyperina** Kunth, glabra, robusta, perennis, culmo 6 dm. longo, triquetro, levi; foliis 3 dm. longis, 9—12 mm. latis, 3-nerviis, vaginis (anguste aut mediocriter) alatis, ligula 9 mm. longa ovata venosa in margine integro scariosa; panicula terminali 6 cm. longa 35 mm. lata, densiuscula; bracteis 3 foliiformibus 5—8 cm. longis 9 mm. latis;

spiculis unisexualibus, masculis numerosis, foemineis paucis 6 mm. longis; stylo 3-fido; nuce vix 2 mm. longa, ellipsoidea, obtusa, proventu fere levi glabra; disci lobis ovatis brevibus, tenuibus.

Scleria cyperina Kunth Enum. II (1837) p. 345; Boeck.! in *Linnaea* XXXVIII (1874) p. 494.

Hymenolytrum cyperinum Nees in Mart. Fl. Bras. II pars I (1843) p. 175 in adnot.

Hab. in Trinidad: Aublet.

Distrib. Guiana.

211. **Scleria Flagellum** Swartz, vagans, pilosula, perennis, culmo elongato, ramoso, in angulis scabro; foliis 2—3 dm. longis, 8 mm. latis, caudatis, vaginis exalatis pilosis, ligula ovata brevi pilosa; paniculis axillaribus 5 aut pluribus distantibus, 6 cm. longis 5 cm. latis; spiculis subremote sparsis, unisexualibus, 5 mm. longis, vix pilosis; glumis nuci-geris ovatis, apice triangularibus; stylo 3-fido; nuce 3 mm. in diam., globosa, lucida, levi, glabra, alba aut decolorata interdum atro-purpurea, stipitata; disco brevi, atro-purpureo, lobis 3 magnis, orbiculatis, sub-erectis.

Scleria Flagellum Swartz Prod. (1788) p. 18 et Fl. Ind. Occid. I p. 88 t. 3; Kunth Enum. II p. 339 partim; Boeck. in *Linnaea* XXXVIII (1874) p. 501.

Schoenus lithospermus Linn. Sp. Pl. ed. II (1762) p. 65 partim.

Schoenus secans Linn. Amoen. Acad. V (1760) p. 391.

Carex lithosperma Linn. Syst. ed. XII (1767) p. 618.

Arundo fureta Aubl. Guiana I (1775) p. 52 fide Poiret.

Omoscleria Flagellum Nees in Mart. Fl. Bras. II pars I (1843) p. 180.

Sloane Jamaica I p. 118 t. 77 fig. 1.

Hab. in Jamaica: W. Wright in hb. Mus. Brit.

Distrib. Venezuela, Guiana, Brasilia.

212. **Scleria reflexa** H. B. K. vagans, pilosula, perennis, ligula scarioso-appendiculata; paniculis 3—2 in rami apice approximatis, rhachidibus villosis; stylo 3-fido; nuce ellipsoidea, levi, alba, marmorea; disci margine tenui, pallido, laxè patulo vel reflexo, subintegro; ceteroquin ut *S. Flagellum* Swartz.

Scleria reflexa H. B. K. Nov. Gen. et Sp. I (1815) p. 232; Kunth Enum. II p. 340; Boeck.! in *Linnaea* XXXVIII (1874) p. 503.

Scleria Flagellum Nees! in Flora XI (1828) p. 303; Griseb.! Flor. p. 578, vix Swartz.

Mastigoscleria reflexa Nees in Mart. Fl. Bras. II pars I (1843) p. 177; Liebm.! Mex. Halagr. p. 69.

Razor Grass *Gren. et Trin.*

Hab. in India occident.: Sieber Agrost. n. 98; Jamaica: Purdie; Hispaniola: Bertero, prope Puerto-Plata ad Cupey 500 m. alt., 20 ped. scandens et fruticeta densa formans: Eggers n. 1681; Portorico prope Cayey: O. Kuntze n. 316; Martinique: Duss n. 444, 474, Hahn n. 691, Husnot n. 40; St. Vincent: Smith n. 262; Grenada: Broadway n. 984, Eggers n. 6087 (in monte Felix); Trinidad: Broadway n. 3843, Fendler n. 877, Hart n. 1877, Purdie.

Distrib. a Mexico usque ad Brasiliam australem, frequens.

213. **Scleria melaleuca** Schlecht. et Cham. mediocris, praeter vaginas inferiores fere glabra, rhizomate horizontali, nodoso, 4—8 mm. in diam.; culmis 3—8 dm. longis, triquetris; foliis usque ad 2—3 dm. longis, 1 cm. latis, vaginis anguste 3-alatis, ligula 2—5 mm. longa pilosa; inflorescentia 1—3 dm. longa 4—6 cm. lata, paniculis axillari-bus 1—4, rigidis, rhachidibus saepe purpurascens; spiculis breviter pedicellatis, 5 mm. longis, fere glabris; stylo 3-fido; nuce $1\frac{1}{2}$ —2 mm. longa, ovoidea levi, nitida, proventu atro-purpurascens; disci lobis 3, orbiculatis, in margine rubro-bruneis.

Scleria melaleuca Schlecht. et Cham.! in *Linnaea* VI (1831) p. 29; *Kunth Enum. II* p. 340; *Griseb.! Flor.* p. 578; *Boeck.! in Linnaea XXXVIII* (1874) p. 480.

Scleria pratensis var. *melanocarpa* Boeck.! in *Vidensk. Meddel. Kjob.* (1869) p. 153.

Scleria pratensis var. *mucronata* Boeck.! ms.

Scleria communis Liebm.! *Mex. Halvgr.* (1850) p. 71 partim.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 723 partim; Jamaica: Mac Fadyen; St. Vincent in montibus St. Andrews: Eggers n. 6724; Grenada in monte Felix 450 m. alt.: Eggers n. 6029; Tobago inter castellum et portum Gomez: Eggers n. 5498, 5526; Trinidad: Crueger, Fendler n. 889, Hart n. 1740, Lockhart.

Distrib. per Americam tropicam vulgaris.

214. **Scleria pterota** Presl, panicula viridi aut luteo-fuscescente; nuce globosa, plus minus depressa, levi, alba aut proventu subfusco-straminea; ceteroquin ut *S. melaleuca* Schlecht. et Cham.

Scleria pterota Presl! in *Oken Isis* XXI (1828) p. 268.

Scleria pratensis Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 179 t. 23; *Griseb.! Kar. p. 124, et Flor. p. 577, et Pl. Cub. p. 248; Boeck.! in Linnaea XXXVIII* (1874) p. 481; *Sauv.! Cub. n. 2701 p. 185.*

Scleria communis Kunth *Enum. II* (1837) p. 340 pro parva parte.

Scleria Ottonis Boeck.! in *Linnaea XXXVIII* (1874) p. 490.

Schoenus latifolius Vahl Enum. II (1806) p. 226, fide Kunth Enum. II p. 338.

Dichromena Vahlîi Dietr. Sp. Pl. II (1833) p. 169.

Hab. in India occident.: Eggers n. 179, Sieber Agrost. n. 100; Cuba: Guthnick, Linden n. 1957, Otto n. 299, C. Wright n. 723 partim, 3805; Jamaica: Bertero, Hansen n. 9, Hart n. 810; Hispaniola: Eggers n. 1758, Poiteau; Portorico: Blauner n. 106, 251, Sintenis n. 78, 4954, Stahl n. 308; St. Thomas: Eggers n. 190; Antigua: Wullschlaegel n. 714; Guadeloupe: Duchassaing, Duss n. 3112 partim, 3824; Martinique: Belanger n. 405, 796, Duss n. 443, 705, Hahn n. 1539, Husnot n. 41; St. Vincent: Eggers n. 6956^b, Smith n. 707; Barbados: Eggers n. 7191.

Distrib. in America tropica sat communis.

214^b. **Scleria Wrightiana** Boeck. nuce 2 mm. longa, 1½ mm. lata; disco apice truncato, sub-3-lobo, margine non patulo; ceteroquin ut *S. pterota*.

Scleria Wrightiana Boeck.! in Flora LXIV (1881) p. 79.

Scleria elata C. Wright! in Sauv. Cub. (1871) n. 2703 p. 186; non Thwaites.

Hab. in Cuba: C. Wright.

215. **Scleria stereorrhiza** C. Wright, mediocris, fere glabra, rhizomate ligneo, 4—7 mm. crasso. nodoso; culmis 15—35 cm. longis, triquetris; foliis 10—18 cm. longis, 3—4 mm. latis, vaginis strictis vix alatis, ligula truncata; paniculis partialibus distantibus, oblongis, contractis, usque ad 4 cm. longis 15 mm. latis; spiculis sessilibus fasciculatis, unisexualibus, 4 mm. longis; stylo 3-fido; nuce 2 mm. longa, ellipsoidea, minute tuberculata, transversim verrucosa, alba; disci lobis 3, quadratis, pallidis, suberectis.

Scleria stereorrhiza C. Wright! ms.

Scleria bracteata var. *angusta* Griseb.! Pl. Cub. (1866) p. 249.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 316.

Var. **major** foliis usque ad 4 dm. longis 6 mm. latis; paniculis evolutis pyramidatis, 7 cm. longis 5 cm. latis; spiculis sparsis.

Scleria bracteata Griseb.! Pl. Cub. (1866) p. 249; Sauv.! Cub. n. 2702 p. 186.

Hab. in Cuba: C. Wright "n. 725 aut 3416^a" (in hb. Kew.), 3416^b (in hb. Krug et Urb.).

216. **Scleria scindens** Nees, robusta, praeter paniculam fere glabra, rhizomate nodoso; culmis 5—10 dm. longis, triquetris, in angulis serrato-scabris, manus scindentibus; foliis 4—8 dm. longis, 8—11 mm.

latis, vaginarum alis 1 mm. latis aut 0, ligula depressa ovata; paniculis in 1 terminalem approximatis, pyramidatis, rigidis, densis, minute pilosis, canescenti-viridibus; spiculis brevissime pedicellatis, unisexualibus, foemineis 4—5 mm. longis, glumis in margine pilosis; stylo 3-fido; nuce 2—2½ mm. in diam., globosa, levi, alba; disci lobis 3, perbrevis, latis, pallidis, laxa patulo-reflexis.

Scleria scindens Nees! in *Linnaea* IX (1834) p. 303; *Kunth Enum.* II p. 343; *Griseb.* Pl. Cub. p. 249 et *Flor.* p. 578; *Boeck. in Linnaea* XXXVIII (1874) p. 505.

Scleria scaberrima Boeck.! *Cyp. Novae. Heft II* (1890) p. 11.

Cutgrass Vine. ex Egg.

Hab. in Antillis: Eggers n. 287, hb. Mus. Paris n. 303; Cuba: C. Wright n. 726 partim; Tortola: Eggers n. 3218; Guadeloupe, hauteurs des Trois Rivières: Duss n. 3110; Dominica: Imray; Martinique: Duss n. 446; St. Lucia: Anderson, Ramage (alt. 300 metr.); St. Vincent in sylvis mont. Montrose Hills: Eggers n. 6596.

217. ***Scleria canescens*** Boeck. robusta, culmo 6—10 dm. longo; foliis 6—8 dm. longis 1 cm. latis, in margine retrorsum scabris manus secantibus, vaginis exalatis apice pilosis, ligula depressa-triangulari; panicula 24 cm. longa 8 cm. lata, cylindrica densa; spiculis unisexualibus, subsolitariis, fusce castaneo-purpureis, foemineis 4—5 mm. longis, glumis nucigeris fere glabris; stylo 3-fido; nuce 3—4 mm. longa, ellipsoidea, levi, alba; disci lobis 3, latis brevibus, pallidis, reflexis.

Scleria canescens Boeck.! *Cyp. Novae. Heft I* (1888) p. 37.

Cortadera Port. ex Sint.

Hab. in Portorico: Blauner n. 252, inter Cayey et Guayama 700 m. alt.: O. Kuntze n. 504, in Sierra de Luquillo in regione superiore montis Jimenes: Sintenis n. 1383.

218. ***Scleria bracteata*** Cav. robusta, saepe pilosa, rhizomate horizontali crasso; culmo 6—10 dm. longo, triquetro, fere levi; foliis 3 dm. longis 12 mm. latis, caudatis, vaginis vix alatis, ligula breviter ovata; paniculis partialibus pluribus, superioribus densis masculis polystachyis, inferioribus foemineis multo minus densis conspicue bracteatis; stylo 3-fido; nuce 2 mm. in diam., globosa, transversim verrucosa vel subtuberculosa, pilosula, proventu fuscescente interdum decolorata fere baccante; disco obpyramidali rubro, marginis nec ciliati nec fimbriati lobis 3 in lineam undulatam brevem fere concretis.

Scleria bracteata Cav. *Ic. V* (1799) p. 34 t. 457; *Kunth Enum.* II p. 345; *Boeck. in Linnaea* XXXVIII (1874) p. 515; *Griseb.* *Flor.* p. 579; C. B. Clarke in *Hook. f. Fl. Brit. Ind. V* p. 694.

Scleria floribunda H. B. K. *Nov. Gen. et Sp. I* (1815) p. 233.

Macrolomia bracteata Nees! in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 182 t. 24.

Hab. in ins. Trinidad: Fendler n. 887, Hart n. 1741, 1872, 3668, 4671 (Piarco Savanna), O. Kuntze n. 784, Purdie n. 70.

Distrib. in America tropica copiosa.

219. **Scleria microcarpa** Nees, rhizomate horizontali; culmo 6—10 dm. longo; foliis 2—3 dm. longis, 8—11 mm. latis, sursum praemorsim angustatis, vaginis 3-alatis, ligula usque ad 6—8 mm. longa; panicula 2—5 dm. longa, angusta; spiculis 2—3-nim subfasciculatis, sessilibus, 2 mm. longis; gluma foeminea obtusiuscula; stylo 3-fido; nuce 1—2 mm. longa, ellipsoidea, levi, alba; disci poculiformis margine subintegro, densius albo-ciliato.

Scleria microcarpa Nees in *Linnaea IX* (1834) p. 302; *Kunth! Enum. II* p. 341; *Boeck.! in Linnaea XXXVIII* (1874) p. 516.

Ophryoscleria microcarpa Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 184; *Wauca in Maximil. Brasil.* p. 173 t. 91.

Hab. in Cuba: C. Wright n. 723 partim, 724 partim; Trinidad: Hart n. 1076, 1739, 1876.

Distrib. a Guatemala usque ad Brasiliam australem.

Var. β . **foliosa** C. B. Clarke, foliis vaginisque glabris; disci margine a ciliis perminutis interruptim parcius piloso.

Scleria foliosa (sp.) C. Wright! in *Sauv. Cub.* (1871) n. 2706 p. 187, non A. Rich.

Hab. in Cuba: C. Wright; Portorico: Blauner n. 109, prope Cabo-rojo in paludosis: Sintenis n. 78^b; Guadeloupe: Krauss.

Distrib. Guiana.

Var. γ . **subceciliata** C. B. Clarke, fere glabra, elatior, foliis 1—2 cm. latis, vaginis alatis; nuce 3 mm. longa, ovoidea, apice conica, viridescenti-straminea; disci margine integro a papillis vix puberulo.

Scleria microcarpa Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 248; *Sauv. Cub.* n. 2705 p. 187 partim.

Scleria cubensis Boeck.! *Cyp. Novae. Heft II* (1890) p. 42.

Cortadera Cub. ex Egg., Portor. ex Sint.

Hab. in Cuba: Eggers n. 5113 (prope Monteverde 800 m. alt.), C. Wright n. 723 partim, 724 partim; Jamaica: Hart n. 674, Purdie; Hispaniola in sylvis montis Isabel de la torre in Savanne de Cupey 360 m. alt.: Eggers n. 2694; Portorico: Blauner n. 253, Sierra de Luquillo in monte Jimenes: Sintenis n. 1443 partim, Wydler n. 365.

220. **Scleria phylloptera** Griseb. fere glabra, culmo fere metrali; foliis 3—4 dm. longis, 6 mm. latis, vaginis vix aut non alatis, ligula

usque ad 1 cm. longa; panicula longa, spiculis 3—1-fasciculatis, pro magna parte sessilibus; stylo 3-fido; nuce 3 mm. in diam., ovoideo-globosa, levi, alba, apice obtusa; disci margine integro a papillis paucis microscopicis vix ciliato.

Scleria phylloptera Griseb.! *Pl. Cub.* (1866) p. 248; *Sauv.*! *Cub.* n. 2707 p. 188; *C. Wright Msc.*

Scleria microcarpa var. *angustifolia* Boeck.! in *Flora LXIV* (1881) p. 79.

Hab. in Cuba: Combs n. 489 (S. Clara), C. Wright n. 724^b, 924.

Obs. Species a *S. microcarpa* ob folia angustiora et nucem majorem vix sat diversa.

221. **Scleria mitis** Berg. robusta, parum pilosa, culmo 1—2-metrali; foliis 3—5 dm. longis, 15—25 mm. latis, vaginis 3-alatis, ligula saepe 1 cm. longa; panicula 3—5 dm. longa, 1 dm. lata, composita, copiosa; spiculis 2½ mm. longis, foemineis sessilibus, masculis breviter pedicellatis; stylo 3-fido; nuce 3 mm. longa, 2 mm. lata, ellipsoidea, levi, alba, apice a stylobasi persistente nigra conspicue coronata; disci margine truncato, a ciliis longis atosanguineis vel bruneis densissime piloso.

Scleria mitis Berg. in *Acta Holm.* (1765) p. 145 t. 5 fide Swartz; Swartz *Prod.* p. 18 et *Fl. Ind. Occid.* I p. 90 (syn. *P. Browne excl.*); *Kunth Enum.* II p. 343; *Boeck. in Linnæa XXXVIII* (1874) p. 520, non Griseb.

Scleria trinitatis Boeck.! *Cyp. Novae. Heft II* (1890) p. 31.

Scleria Eggersiana Boeck.! *Cyp. Novae. Heft II* (1890) p. 41.

Schoenus lithospermus Linn.! *Sp. Pl. ed. II* p. 65 pro parte.

Carex lithosperma Linn. *Syst. Veg. ed. 13* (1774) p. 706.

Ophryoscleria mitis Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 185.

Ophryoscleria lucida Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 183 t. 25.

Cortadera Cub. ex Egg., Portor. ex Sint.

Hab. in Cuba in Pinal de Sta. Ana 800 m. alt.: Eggers 5181; Portorico: Eggers n. 1180^b, prope Bayamon in paludosis et in Sierra de Luquillo monte Jimenes: Sintenis n. 1215, 1714; Guadeloupe in Gombeyre et in Ravine chaude: Duchassaing, Duss n. 3112, 3442, l'Herminier n. 11; St. Vincent: Smith n. 1674; Trinidad: Fendler n. 876, Hart n. 1739^b, 3263, O. Kuntze.

Distrib. a Panama usque ad Brasiliam australem frequens.

222. **Scleria Grisebachii** C. B. Clarke, robusta, fere glabra, culmo metrali; foliis 1—2 cm. latis, vaginis anguste alatis, ligula 1 cm. longa;

panicula 3—5 dm. longa, angusta, densa; stylo 3-fido; nuce $2\frac{1}{2}$ —3 mm. in diam., fere globosa, levi, alba; disci margine dense ferrugineo-ciliato.

Scleria microcarpa var. *latifolia* Boeck.! in *Linnaea* XXXVIII (1874) p. 517.

Scleria microcarpa Griseb.! *Flor.* (1864) p. 578 partim.

Scleria mitis Griseb.! *Flor.* (1864) p. 578 omnino.

Cortadera Port. ex Sint.

Hab. in Jamaica: W. Wright; Portorico: Eggers n. 432^b, 671, prope Adjuntas ad margines sylvae montis Cedro: Sintenis n. 1443 partim, 4279; Antigua: Nicholson; Guadeloupe: Husnot n. 43; Dominica: Imray n. 352; Martinique: Duss n. 445.

223. ***Scleria paludosa*** Kunth, robusta, praeter paniculam fere glabra, rhizomate 1 cm. crasso; culmo metrali et ultra; foliis 2—4 dm. longis, saepe 3 cm. latis, vaginis 3-alatis, ligula rigida breviuscula; inflorescentia 3—4 dm. longa, paniculis partialibus erectis rigidis densis; spiculis 4 mm. longis; stylo 3-fido; nuce 5—6 mm. longa, ovoidea, subacuta, levi, nitida, alba aut decolorata; cupulae margine leviter 3-lobo breviter ferrugineo-ciliato.

Scleria paludosa Kunth *Enum. II* (1837) p. 344.

Scleria palmifolia Schlecht. in *Bot. Zeit.* III (1845) p. 492.

Scleria macrocarpa Boeck.! in *Linnaea* XXXVIII (1874) p. 521.

Ophryoscleria paludosa Nees in *Mart. Fl. Bras. I pars II* (1843) p. 185.

Hab. in Trinidad: Finlay n. 1871.

Distrib. a Panama usque ad Brasiliam australem, frequens.

224. ***Scleria porphyrorrhiza*** C. Wright, fere glabra, rhizomate crasso nodoso; culmo 6 dm. longo; foliis 2—3 dm. longis, 5 mm. latis, apice triangulatis (nec caudatis), vaginis late 3-alatis, ligula fere 1 cm. longa; paniculis partialibus c. 3, in pedunculis 1 dm. longis quasi dense spicatis; spiculis omnibus 1-sexualibus, foemineis sessilibus, masculis pedicellatis; stylo 3-fido; nuce 3 mm. longa, ovoidea, levi alba; disci lobis 3, in lacinias lanceolatas rigidas alte divisus.

Scleria porphyrorrhiza C. Wright! in *Sauv. Cub.* (1871) n. 2710 p. 188.

Hab. in Cuba: C. Wright.

Distrib. in Brasilia.

225. ***Scleria latifolia*** Swartz, parum pilosa, culmo metrali et ultra, usque ad 1 cm. in diam.; foliis 4—6 dm. longis, 3—5 cm. latis, vaginis late 3-alatis, ligula 5—8 mm. longa; inflorescentia saepe 4 dm. longa, paniculis partialibus densis pyramidatis fuscis; spiculis foemineis 4—5 mm. longis, masculis 3—4 mm. longis brevissime pedicellatis;

stylo 3-fido; nuce 3 mm. in diam., globosa, levi, alba saepe purpurascente; disci lobis 3, basi in cupulam brevem coalitis, apice fimbriatis.

Scleria latifolia Swartz *Prod.* (1788) p. 18 et *Fl. Ind. Occid.* I p. 95; *Kunth Enum.* II p. 359; *Griseb.! Fl.* p. 578 (var. *a*); *Boeck. in Linnaea XXXVIII* (1874) p. 530.

Scleria nervosa Wikstr.! *Öfr. Guadel. Flora* (1828) p. 75 et in *Linnaea V* (1830) *Litteraturber.* p. 91; *Kunth Enum.* II p. 359.

Scleria chlorantha Boeck. in *Linnaea XXXVIII* (1874) p. 506?
Herbe couteau *Domin. ex Egg.*

Hab. in St. Kitts: Masson; Montserrat: Ryan; Guadeloupe in savanis humidis Trois Rivières: Duss n. 3113, Forstroem, l'Herminier n. 10; Dominica: Eggers n. 591, 850, Imray n. 18, 55, 211, Nicholls n. 154, 167, Ramage; Martinique: Aublet n. 129, Hahn n. 468; St. Vincent in montibus St. Andrews: Eggers n. 6759, Smith n. 741 partim; Grenada: Eggers n. 6233, Sherring n. 370, Smith n. 112.

Distrib. Guatemala, Venezuela.

226. ***Scleria arundinacea*** Kunth, panicula cum spiculis nucibusque plus minus purpurascente, interdum atropurpurea; disci lobis rigidioribus, dentibus sublinearibus rigidis rubris; ceteroquin ut *Scl. latifolia* Swartz.

Scleria arundinacea Kunth! *Enum.* II (1837) p. 347; *Boeck.! in Linnaea XXXVIII* (1874) p. 531.

Scleria cyanocarpa Kunth! *Enum.* II (1837) p. 347.

Scleria grandifolia Miq. in *Linnaea XIX* (1847) p. 230.

Scleria latifolia Nees! in *Flora XI* (1828) p. 303; *Griseb.! Flor.* p. 578 (var. β et γ pro magna parte); *Boeck.! in Vidensk. Meddel. Kjob.* (1882) p. 159.

Schizolepis latifolia Nees in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 186.

Schizolepis trigonocarpa Nees in *Mart. Fl. Bras. I pars II* (1843) p. 186 t. 26.

Hab. in Dominica: Imray; Martinique: Belanger n. 406, 407, Duss n. 443^a, Hahn n. 1281, Husnot n. 43, Sieber Agrost. n. 99; St. Lucia: Anderson; St. Vincent in montibus St. Andrews: Eggers n. 6759^b, Smith n. 1971; Grenada: Broadway n. 740; Tobago ad Frenchman river: Seitz n. 8; Trinidad: Fendler n. 870, Hart n. 1738, 1875, 3340, Lockhart n. 268, Purdie.

Distrib. Venezuela, Brasilia.

227. ***Scleria cymosa*** Boeck. culmis metralibus; foliis saepe metralibus, 1—2 cm. latis; panicula 2—3 dm. longa, 5—8 cm. lata, paniculis partialibus numerosis, parum interrupta; glumis nucigeris 6 mm.

longis, conspicue striatis, subcuspidatis; stylo 3-fido; nuce 3 mm. lata, verrucosa vel vix tuberculata.

Scleria cymosa Boeck.! in *Vidensk. Meddel. Kjob.* (1869) p. 155 et in *Linnaea XXXVIII* (1874) p. 538.

Becquerelia cymosa Brongn. in *Duperrey Voy. Coquille pars II* (1829) p. 161 t. 27; *Kiauth Enum. II* p. 361; *Griseb. Flor.* p. 579.

Becquerelia verruculosa Nees! in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 191.

Hab. in Tobago in sylvis montis Morne d'or: Eggers n. 5837; Trinidad: Fendler n. 871, Hart n. 2218, 3200, 5363.

Distrib. Nova Granata, Guiana, Brasilia.

228. ***Scleria tuberculata*** Boeck. glumis nucigeris 4 mm. longis, striatis, cuspidatis; nuce $1\frac{1}{2}$ mm. lata, albescente, obtuse tuberculata; ceteroquin ut *S. cymosa*.

Scleria tuberculata Boeck.! in *Linnaea XXXVIII* (1874) p. 540.

Becquerelia cymosa Griseb.! *Flora* (1864) p. 579, vix Brongu.

Hab. in Hispaniola?: Mayerhoff; Trinidad: Broadway n. 5332 (Aripo Savanna), Crueger, Fendler n. 874, O. Kuntze.

Distrib. Guiana anglica, Surinam.

XX. *Diplacrum* R. Br.

Spicula foeminea 3—4-gluma. Gluma pistillifera pseudo-terminalis, rudimento floris masculi superioris nullo. Nux saepe longitudinaliter striata; ceteroquin ut *Scleria*.

* Species 6, in tropicis totius orbis terrarum sparsa.

Obs. Fide auctorum, *Diplacri* species Americanae (*Pteroscleria*, genus) a *Diplacro* R. Br. ob glumas foemineas alas generice sunt diversae; in specie autem typica *Pteroscleriae* viz. *Pteroscleria longifolia* (ut in *Pt. notoptera*) glumae foemineae minime alatae videntur.

229. ***Diplacrum longifolium*** C. B. Clarke, stolonibus vix $\frac{1}{2}$ mm. in diam.; culmo 2—4 dm. longo, robustiore; foliis usque ad 3 dm. longis, 4—6 mm. latis; capitibus 1—4, remotis, axillaribus, densis, 1 cm. et ultra in diam., in pedunculis vix 1 cm. longis erectis; spiculis masculis 1—3, foeminea quasi-terminali, 5 mm. longa, sub-3-gluma; glumis foemineis, ellipticis, mucronatis, in carina non alatis; stylo lineari, ramis 3 linearibus; nuce vix 1 mm. longa, subglobosa, levi, alba, striis longitudinalibus obscuris inter se parce anastomosantibus.

Pteroscleria longifolia Griseb.! *Flor.* (1864) p. 579; *Benth. in Hook. f. Ic. Pl. t.* 1347.

Hab. in Trinidad: Fendler n. 873.

Distrib. Guiana, Brasilia. Var. (?) in Sierra Leone.

XXI. *Lagenocarpus* Nees.

Flores 1-sexuales. Flos foemineus specie terminalis, nudus. Setae hypogynae 0. Styli rami 3, lineares. Nux apice truncata, cum rostro conico extra fusa, a septo intus disjuncta. — Paniculae longae, terminales, in parte superiore foemineae, inferiore masculae. Spiculae masculae pluriflorae in spicas 1—5-nim fasciculatae; spiculae foemineae 1-florae. Pistillum a 3 glumis summis quasi suffultum.

Species 17, Americam aequatorialem incolentes.

Clavis specierum antillanarum.

Pedunculi masculi suberecti, paniculis pyramidatis 1. *L. guianensis* Nees.
Pedunculi masculi 10—15 cm. longi, nutantes . 2. *L. tremulus* Nees.

230. *Lagenocarpus guianensis* Nees, culmo 1—2-metrali, robusto, trigono, levi; foliis usque ad 1 metr. longis, 10—25 mm. latis, glabris; panicula 4—7 dm. longa, pedunculis inferioribus 2—5-nis, pyramidatis, spicis masculis 3 mm. longis, ferrugineo-bruneis, e 2—5 spiculis fasciculatis; paniculae parte foeminea terminali 3—4 dm. longa, elongato-pyramidali, basi 8—12 cm. lata; spiculis foemineis pedicellatis, 2 mm. longis, 6—7-glumis; stylo 3- (vel 4-)fido; nuce (rostro incluso) 4 mm. longa, ovoideo-conica, terete, levi, a glandulis discoideis inspersa, saturate brunea; rostro cum nuce aequilongo, exacte conico, ab externo cum nuce omnino fuso.

Lagenocarpus guianensis Nees! in *Linnaea* IX (1834) p. 304 et in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 166; Boeck.! in *Linnaea* XXXVIII (1874) p. 423.

Scleria guianensis Steud. *Cyp.* (1855) p. 177.

Hab. in ins. Bahama Hog Island et New Providence: Eggers n. 4136, 4309; Trinidad in Aripo Savanna: Broadway n. 5331.

Distrib. Guiana, Brasilia.

231. *Lagenocarpus tremulus* Nees, paniculae ramis masculis inferioribus 3—4-nis, 10—15 cm. longis, patulis plus minus nutantibus; nuce 2 mm. longa, 1 mm. lata, anguste ellipsoidea, levi, brunca, a 3 lincis longitudinaliter costata, lucida aut subrugosa rostro levissimo; ceteroquin ut *L. guianensis*.

Lagenocarpus tremulus Nees! in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 168; Griseb.! *Flor.* p. 580; Boeck.! in *Linnaea* XXXVIII (1874) p. 429.

Anogyne tremula Nees! in *Hook. Journ. Bot.* II (1840) p. 395.

Scleria tremula Steud. *Cyp.* (1855) p. 177.

Cryptangium Kuntzeanum Boeck.! *Cyp. Novae. Heft I* (1888) p. 32.

Hab. in Portorico prope Dorado in paludosis: Sintenis n. 6845; Trinidad: Crueger, Fendler n. 888, Hart n. 4669 (Piarco Savanna), O. Kuntze (in sylvis ad Arima).

Distrib. Guiana, Pernambuco.

XXII. *Calyptrocarya* Nees.

Flores 1-sexuales. Flos foemineus specie terminalis, nudus. Setae hypogynae 0. Styli rami 2, lineares. Nux ovoideo-conica, minute pilosa. — Plantae puberulae fere leves. Spicae minimae, androgynae, spicula 1 terminali foeminea 1-flora, lateralibus 2—4 masculis 1—4-floris; spicae densae, pisiformes, corymboso-paniculatae. Glumae foemineae propriae 2, distichae, naviculares, ovatae. Flores masculi 1-andri.

Species 7, in America tropica vigentes.

Folia 4—6 mm. lata, 3-nervia 232. *C. fragifera* Kunth.

Folia 2—4 mm. lata, 1-nervia 233. *C. angustifolia* Kunth.

232. *Calyptrocarya fragifera* Kunth, culmo 3 dm. longo; foliis subbasalibus, culmum saepe superantibus, 4—6 mm. latis, 3-nerviis, fere glabris; corymbis distantibus, 3—5 cm. in diam., ramis glabris; capitibus fructiferis vix 5 mm. in diam.; stylo 2-fido; nuce vix 1 mm. longa.

Calyptrocarya fragifera Kunth! *Enum. II* (1837) p. 364 (syn. *Rudge excl.*); Boeck.! in *Linnaea XXXVIII* (1874) p. 430 partim; non Nees.

Calyptrocarya Palmetto Nees! in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 195 (syn. *Schoeno longifolio* *Rudge excl.*).

Calyptrocarya longifolia Boeck.! in *Linnaea XXXVIII* (1874) p. 431, non Kunth.

Becquerelia glomerulata Brongn.! in *Duperrey Voy. Coquille pars II* (1829) p. 163.

Hypolytrum multinerve Steud.! *Cyp.* (1855) p. 133.

Hab. in Hispaniola (an re vera ex hac insula, anne e Guiana?): Mayerhoff; Trinidad: Hart n. 3198.

Distrib. Nova Granata, Venezuela, Guiana, Brasilia.

233. *Calyptrocarya angustifolia* Nees, foliis culmum saepe superantibus, 2—4 mm. latis, sub-1-nerviis; ceteroquin ut *C. fragifera*.

Calyptrocarya angustifolia Nees in *Linnaea IX* (1834) p. 304 et in *Mart. Fl. Bras. II pars I* (1843) p. 193; Kunth *Enum. II* p. 364; Griseb.! *Flor.* p. 580.

Calyptrocarya fragifera var. Boeck. in *Linnaea XXXVIII* (1874) p. 431.

Scleria lasiocarpa Steud.! *Cyp.* (1855) p. 319

Hab. in Trinidad: Broadway n. 3723 (ad Chaguanas), Crueger, Fendler n. 886, Hart n. 2219, Lockhart n. 293.

Distrib. Guiana.

Obs. Species a *C. fragifera* vix sat diversa.

XXIII. *Uncinia* Pers.

Flores 1-sexuales. Prophylli bicarinati margines connati, pistillum nudum in utriculo amplexantes. Spiculae axeos rudimentum in utriculo setiforme, ex utriculi ore exsertum, apice uncinatum.

Species 26, praesertim in zona australi obviae; in Australia cum Nova Zeelandia, in insulis Oceanicis australibus, in America australi temperata ad Mexico et Jamaica extensae.

234. *Uncinia jamaicensis* Pers. stolonifera, culmis 3—6 dm. longis, monostachyis; foliis culmum saepe superantibus, 3 mm. latis; spica 1 dm. longa, 3—4 mm. lata, continua, subtereti; bracteis foemineis oblongis, remotiuscule imbricatis; utriculis lanceolatis, hispidulis, bracteas parum superantibus; stylo 3-fido; nuce oblonga; seta (spiculae axeos rudimento) quam utriculus duplo longiore, curvata, proventu divaricata.

Uncinia jamaicensis Pers. *Syn. II* (1807) p. 534; *Kunth Enum. II* p. 525; *Griseb. Flor.* p. 581; *Bocck. in Linnaea v. 41* (1877) p. 347 (*syn. U. mexicana excl.*).

Carex uncinata Schkuhr *Riedgr. I* (1804) p. 13 t. 6, fig. 30, non Linn.

Carex hamata Swartz *Prod.* (1788) p. 18; *Schkuhr Riedgr. II* p. 31.

Carex jamaicensis Poir. *Encyc. Suppl. III* (1813) p. 282 in nota.

Hab. in Jamaica: Hart n. 2010, Shakespear, Stokes.

Distrib. America centralis, Nova Granata, Venezuela, Brasilia, Argentina.

XXIV. *Carex* Linn.

Flores 1-sexuales. Prophylli bicarinati margines connati, pistillum nudum in utriculo amplexantes. Spiculae axeos rudimentum in utriculo nullum.

Species 1300, per orbem terrarum in humidioribus vulgatae.

Clavis specierum antillanarum.

Subgenus I. **Vignea**. Stylus 2-fidus.

Spicae androgynae, terminalis basi mascula

235. *C. echinata* Murray.

Subgenus II. **Eu-Carex**. Stylus 3-fidus.

Spicae ovoidae aut oblongae, terminalis apice mascula basi foeminea

- Utriculus glaber 236. *C. cladostachya* Wahl.
 Utriculus scabro-pilosus 237. *C. scabrella* Wahl.
 Spicae lineari-cylindricae, terminalis basi mascula
 238. *C. virescens* Schkuhr.
 Spicae lineari-cylindricae, terminalis omnino mascula
 Utriculus erostratus, cinnamomeo-bruneus
 239. *C. hinnulea* C. B. Clarke.
 Utriculus longe rostratus, viridis albescens
 240. *C. hystericina* Schkuhr.

235. **Carex echinata** Murray, glabra, culmis 3—5 dm. longis, gracilibus; foliis 1—2 dm. longis, 2—3 mm latis; spicis 3—8 in spica simplice distantibus, 5—10 mm. longis, globosis aut oblongis, viridibus lutescentibus, bracteis vix ullis aut ima 1 cm. longa setacea, terminali apice foeminea basi mascula; utriculis 2—3 mm. longis, ellipsoideis, attenuato-rostratis, striatis levibus, glabris, proventu divaricatis aut recurvis; stylo 2-fido.

Carex echinata Murr. *Prod. Stirp. Goett.* (1770) p. 76; Boeck. in *Linnaea* XXXIX (1875) p. 668; L. H. Bailey in *Proc. Amer. Acad. XX* (1886) p. 142.

Carex stellulata Gooden. in *Trans. Linn. Soc. II* (1792) p. 144; Schkuhr *Riedgr. I* p. 45, *II* p. 19 t. C. fig. 14; Kunth *Enum. II* p. 399; Boott *Carex I* p. 56 t. 146 * * (var. *scirpoides*).

Carex scirpoides Schkuhr *Riedgr. II* (1806) p. 19 t. Zzz fig. 180; Kunth *Enum. II* p. 400.

Carex grypos Schkuhr *Riedgr. II* (1806) p. 18 t. Hhhh p. 193.

Hab. in Hispaniola in Valle Nuevo ad ripas rivuli, alt. 2270 metr.: Eggers n. 2230.

Distrib. per regiones temperatas septentrionales utriusque orbis vulgaris.

236. **Carex cladostachya** Wahl. fere glabra, culmo 3—8 dm. longo, graciliore; foliis culmo saepe parum brevioribus, 3—4 mm. latis; panícula longa, composita, 20—60-stachya, bracteis filiformibus paniculam superantibus; spicis 1 cm. longis, viridibus, luteo-brunescens, terminali (e summis pluribus) apice mascula, basi foeminea; utriculis 2—4 mm. longis, ellipsoideis, attenuato-rostratis, striatis, levibus, glabris; stylo 3-fido.

Carex cladostachya Wahl. in *Kong. Vet. Acad. Handl. Stockh. XXIV* (1803) p. 149; Schkuhr *Riedgr. II* p. 41; Kunth *Enum. II* p. 510; Griseb. *Flor. p.* 580, *Pl. Cub. p.* 250; Boeck. in *Linnaea XL* (1876) p. 361; Sauv. *Cub. n.* 2720 p. 189; L. H. Bailey in *Proc. Amer. Acad. XXII* (1886) p. 98.

Carex polystachya Wahl. in *Kong. Vet. Acad. Handl. Stockh. XXIV* (1803) p. 149; Schkuhr *Riedgr. II* p. 41; Kunth *Enum. II* p. 507;

Boott Carex IV p. 152 t. 490—492; *L. H. Bailey in Proc. Amer. Acad. XXII* (1886) p. 99.

Carex mexicana Presl *Rel. Haenk. I* (1829) p. 204; *Kunth Enum. II* p. 510; *Boott Carex* IV p. 157 t. 512.

Carex Hartwegii Boott in *Benth. Pl. Hartw.* 1848 p. 96 et *Carex* IV p. 157 tt. 509, 510.

Carex Humboldtiana Steud. *Cyp. (1855)* p. 208; *Boeck. in Linnæa XL* (1876) p. 169.

Carex Dussiana Boeck.! *Cyp. Novae. Heft II* (1890) p. 42.

Carex flaccida Swartz *Fl. Ind. Occid. Append. fide Wahl.*

Hab. in Cuba: C. Wright n. 3421; Jamaica: Hart n. 768, M^cFadyen, M^cNab, Stokes; Portorico in Sierra de Luquillo monte Jimenes ad saxa et in cacumine montis Yunque, Sierra de Naguabo in sylvis apricis ad Los Ranchones: Sintenis n. 1360, 1361, 1409, 5398; Martinique: Duss n. 763^b.

Distrib. a Mexico usque ad Bolivia, vulgaris.

Obs. Ex sententia cl. L. C. BAILEY (ut cl. BOECKELERI) *C. polystachya* Wahl. est a *C. cladostachya* Wahl. specifice diversa ob culmum strictum, folia rigidiora fere levia, spicas magis numerosas, et utricululum longius rostratum. *C. polystachya* est (L. C. BAILEY) C. Wright n. 3421 quae planta mihi omnino *C. cladostachya* Wahl. videtur, a BOECKELERI manu est "*C. cladostachya* Wahl. forma tenuis" inscripta. — Magis diversa mihi est Sintenis n. 1409, in qua utriculi multo minores, spiculac (imo fere maturae) suberectae nec patulae videntur.

237. ***Carex scabrella*** Wahl. praeter utriculos fere glabra, culmo 2—5 dm. longo gracili vel interdum (fructum maturante) 8 cm. longo; foliis cum culmo saepe aequilongis 3—4 mm. latis; panicula admodum tenui, laxa 3—20-stachya, pedunculis axillaribus remotis capillaribus imo saepe subradicali; bracteis foliiformibus inflorescentiam saepe superantibus; spicis 5—10 mm. longis, ovoideis aut oblongis, fusce bruneis, summis apice masculis basi foemineis; utriculis 3 mm. longis, ellipsoideis, valide nervosis, undique scabro-pilosis; rostro cum $\frac{1}{2}$ parte utriculi aequilongo; stylo 3-fido.

Carex scabrella Wahl. in *Kong. Vet. Acad. Handl. Stockh. XXIV* (1803) p. 149; *Schkuhr Riedgr. II* p. 41; *Kunth Enum. II* p. 513; *Boott Carex I* p. 29 t. 75; *Griseb.! Flor.* p. 580, et *Pl. Cub.* p. 249; *Boeck. in Linnæa XL* (1876) p. 375; *Sauv. Cub. n.* 2719 p. 189; *L. H. Bailey in Proc. Amer. Acad. XXII* (1886) p. 100.

Carex laxa Swartz *Prod. Fl. Occid. Append. fide Wahl.*

Caguazo *Cub. ex Wright.*

Hab. in Cuba orient.: C. Wright n. 728; Jamaica: Bromfield (St. Ann's), Eggers n. 3706 (Guava Ridge 700 m. alt.), Macnab (Port Royal Mts.), Purdie (St. Ann's), Stokes; Hispaniola in sylva montis Isabel de la torre, 400 m. alt.: Eggers n. 2650.

238. **Carex virescens** Schkuhr, culmo 4—7 dm. longo, mediocri; foliis cum culmo saepe aequilongis, 4—6 mm. latis, subtus sparsim pilosis; spicis 3—6, cylindricis, 25 mm. longis, 3—4 mm. latis, lucide virescentibus, terminali apice foeminea basi mascula, 1—2 inferioribus non raro 1—2 dm. distantibus, pedunculis pergracilibus, bracteis foliiformibus inflorescentiam superantibus; utriculis 2 mm. longis, ovoideis, trigonis, striatis, undique pilosis, nigro-fuscis, rostro nullo; stylo 3-fido.

Carex virescens Schkuhr Riedgr. II (1806) p. 45 t. Mmm fig. 147; Willd. Sp. Pl. IV (1805) p. 251; Muehl. Descr. uber. (1817) p. 233; Kunth Enum. II p. 429; Boott Carex I p. 28 t. 73; Boeck. in Linnaea XL (1876) p. 405; L. H. Bailey in Proc. Amer. Acad. XXII (1886) p. 100.

Hab. in Jamaica: herb. Goodenough.

Distrib. Civitates Americae sept. unitae, Venezuela.

239. **Carex himmulea** C. B. Clarke, glabra, culmi parte visa 32 cm. longa, gracili; foliis obviis 2, superiore 21 cm. longo 3 mm. lato, arcte multistriato, subtus glaucescente; spicis 4 densiusculis, nempe: terminali 14 mm. longa 1½ mm. lata, alba, mascula; secunda 1 cm. distante, 9 mm. longa 1½ mm. lata, alba, mascula; tertia 28 mm. distante, 12 mm. longa 5 mm. lata, foeminea, cylindrica, subsessili, cinnamomeo-ferruginea; quarta 38 mm. distante, 2 cm. longa 5 mm. lata, foeminea cinnamomeo-ferruginea; spicae imae pedunculo 8 mm. longo, erecto, bractea non vaginante, filiformi, 13 mm. longa fere 3 mm. lata; glumis masculis 4 mm. longis, oblongis, obtusis; glumis foemineis 2—3 mm. longis, ovatis, obtusis, scariosis (praesertim in dorso) cinnamomeo- vel ferrugineo-tinctis; utriculo fere 3 mm. longo, anguste obovoideo, vix striato, cinnamomeo rubro-glanduloso-maculato, levi, glabro, rostro perbrevis vix bifido; styli ramis 3, longe exsertis, atro-rubris; nuce anguste obovoidea subacuta trigona.

Carex sp. nova? Goodenough ms.!

Hab. in Jamaica: herb. Goodenough.

240. **Carex hystericina** Schkuhr, robusta, glabra, spica terminali mascula, 35 mm. longa 4 mm. lata, straminea paullo cinnamomea, a spicula foeminea superata; spiculis foemineis 3, 6 cm. longis 9 mm. latis, densis, stramineis virescentibus, ob rostra numerosa undique erectopatula hystericinis; glumis aristatis, foemineis quam utriculi brevioribus; utriculis (rostro incl.) 5—6 mm. longis, ellipsoideis, lucide stramineo-viridibus, valide nervatis, perlevibus, glabris; rostro cum ½ parte utriculi aequilongo in 2 dentes lineares rigidos alte fisso.

Carex hystericina Schkuhr Ricdgr. II (1806) p. 69 t. Fff fig. 127; Willd. Sp. Pl. IV (1805) p. 282; Kunth Enum. II p. 497; Boott Carex I p. 62 t. 165; Boeck. in Linnaea XLI (1877) p. 323.

Carex hystericina L. H. Bailey in Proc. Amer. Acad. XXII (1886) p. 69.

Hab. in Jamaica ad Salt Hill: Herb. Jam. Bot. Departm. n. 2081.

Distrib. Civitates Americae sept. unitae.

XXV. *Hypolytrum* L. C. Rich.

Flores unisexuales, 3 in unaquaque spicula, 2 inferiores masculi monandri oppositi, summus foemineus (pistillum nudum) terminalis. Stylus basi tumidus aut bulbosus, rami 2 lineares. Nux parva, turgide biconvexa, stylobasis cum nucis apice fusa. — Spiculae perparvae, in spicas (*Scirpi* spiculis similes) capitatae, spicularum bracteis spiraliter imbricatis. Glumae masculae naviculares, in carina pilosulae, liberae vel interdum (imo altius) connatae. Inter flores 2 masculos et pistillum 1—4 glumae vacuae (flores masculi steriles) spiraliter rarius interponuntur. Spicae (e spiculis pluribus exstructae) paniculato-corymbosae, aut in caput compositum plus minus contractae.

Species 42, tropicae raro paullo extratropicae, in utroque orbe sparsae.

241. *Hypolytrum longifolium* Nees, praeter glumarum carinas glabrum, rhizomate tenui; culmo 3—7 dm. longo, graciliore, apice trigono parum scabro; foliis omnibus culmi basin versus sitis, culmum saepe superantibus, 3—11 mm. latis; panicula 4 cm. longa 3 cm. lata, 5—35-spicigera, ramis divaricatis; bractea ima paniculam multo superante, cum foliis consimili; spicis 5 mm. longis, oblongis aut proventu ellipsoideis, bruneis; glumis 2 masculis elliptico-oblongis, bractea brevioribus, glumis vacuis (inter glumas masculas et pistillum) nullis; nuce cum glumis aequilonga, obscure rugosa viridescente, apice (stylobasi cum nuce fusa) pallido; stylo ipso perbrevis, ramis 2 linearibus.

Hypolytrum longifolium Nees! in Linnaeu IX (1834) p. 288; Kunth Enum. II p. 271; Boeck. in Linnaea XXXVIII (1871) p. 123.

Hypolytrum fuscum Nees! in Mart. Fl. Bras. II pars I (1843) p. 67; Boeck. in Linnaea XXXVII (1871) p. 123.

Scirpus longifolius L. C. Rich. in Act. Soc. d'Hist. Nat. Paris I (1792) p. 106.

Hab. in Trinidad: Hart n. 3210.

Distrib. in Guiana frequens, usque ad Brasiliam australem sparsum.

XXVI. Diplasia L. C. Rich.

Flores unisexuales, 6—9 in unaquaque spicula, inferiores 5—8 masculi monandri, summus foemineus (pistillum nudum) terminalis. Stylus basi tumidus; rami 2 lineares. Nux ellipsoidea, levis, fusce brunea, spicularum bracteas superans. — Spiculae perparvae, in spicas elongatas lineari-cylindricas fusae, spicularum bracteis spiraliter imbricatis. Spiculae glumae 2 imae oppositae, naviculares, 4 superiores pertenues ecarinatae, maturatae plus minus coalitae 7—8 stamina includentes. Inflorescentia (si spicae pro spiculis habitae fuerant) ei *Cyperis* magni simillima, composite subumbellata.

Species 1, in America tropica late sparsa, sat frequens.

242. **Diplasia karataefolia** L. C. Rich. culmo 5—8 dm. alto, robusto, trigono, parum scabro; foliis usque ad 10 dm. longis, 5 cm. latis, vix trinerviis, apice basique attenuatis, in margine scabris; umbella 1—3 dm. in diam., 20—150-spicigera; bracteis inferioribus 2—4 dm. longis, cum foliis consimilibus; spicis 3—10-nim spicatis, usque ad 3 cm. longis, 3 mm. in diam., cylindricis, duris; spicularum bracteis 4 mm. longis, ovatis, obtusis; nuce 5 mm. longa, fere erostri.

Diplasia karataefolia L. C. Rich. in *Pers. Syn.* I (1805) p. 70; *Kunth Enum.* II p. 273; *Griseb.! Flor.* p. 573; *Boeck.! in Linnaea* XXXVII (1871) p. 135.

Scirpus bromeliaefolius Rudge *Guiana* (1805) p. 19 t. 24.

Fimbristylis bromeliaefolia A. Spreng. *Tent. Suppl.* (1828) p. 3.

Hypaelyptum iridifolium Link *Jahrb.* III (1820) p. 91.

Hab. in Trinidad: Eggers n. 1175, 1447, Fendler n. 872, Hart n. 3201, 3343, O. Kuntze n. 1054, Purdie n. 25.

Distrib. Guiana; fluminis Amazonum vallis.

Addenda.

p. 11. *Kyllinga brevifolia* Rottb. Adde synonym. *K. intermedia* Spreng.! (non R. Br.) et syn. *K. monocephala* Bello! (Portorico: Krug n. 1251).

p. 13. *K. odorata* Vahl. Adde synonym. *K. monocephala* Rottb. var. *triceps* C. Wright! in *Saur. Cub.* n. 2607 p. 173 (Cuba: Wright n. 3758).

p. 14. *K. capillaris* Boeck. deest in herb. Boeck., nunc berlinensi.

p. 14. *K. intermedia* R. Br. delenda est (cf. supra ad p. 11).

p. 19. *Pycereus helvus* C. B. Clarke. Adde synonym. *Cyperus filiculmis* A. Rich.! in *Sagra Cub.* XI (1850) p. 285 (Cuba: Sagra).

p. 34. *Cyperus rotundus* Linn. Adde synonym. *C. praemorsus* Boeck.! in *Flora XLII* (1859) p. 436^{bis} (Jamaica: Macnab).

p. 36. *C. giganteus* Vahl. Adde synonym. *C. auricomus* O. Ktze. *Rev. II* p. 748 (Trinidad ad flumen Caroni: O. Kuntze).

p. 37. *C. familiaris* Steud. deest in herb. Steudel., nunc Cosson.

p. 37. *C. filiculmis* A. Rich. delenda est (cf. supra ad p. 19).

p. 38. *C. guatemalensis* Steud. quoad plant. guadel. et *C. navicularis* Steud. desunt in herb. Steudel., nunc Cosson.

p. 38. *C. praemorsus* Boeck. delenda est (cf. supra ad p. 34).

p. 38. *C. subanceps* Boeck. deest in herb. Vatk., nunc Haussknecht.

p. 73. Ante *Eleocharis albida* inserenda est:

Eleocharis Berlandieri C. B. Clarke *Msc. in herb. Kew. (m. Jun. 1889).*

Eleocharis albida Torr. var. *Berlandieri* Britton in *Journ. New York Microsc. Soc. vol. V* (1889) p. 108.

Eleocharis ovata A. Gray! *Msc., Nces! Msc. — non R. Br.*

Hab. in ins. Bermudas: J. Rein.

Distrib. Texas (frequens).

p. 94. *Scirpus articulatus* Griseb. (*Isolepis articulata* Kunth) deest in herb. Vahl., nunc Haun.

p. 95. *Sc. caespitosus* Linn. a cl. BOECKELER! recte determinatus: Jamaica: Maefadyen.

p. 95. *Sc. stramineus* Presl deest in herb. Presl., nunc Prag.

p. 95. *Sc. subdistichus* Boeck. deest in herb. Boeck., nunc Berolin.

p. 119. *Rynchospora filiformis* deest in herb. Vahl., nunc Haun.

p. 133. *R. pyramidata* Ham. deest in herb. Desv., nunc Paris.

M. de Candolle
4 Cour St. Pierre
Genève
Svitzerland

3 5185 00070 5150