All'Esco. Sig. Prof. Aless.
Encl. S. Scaroni

Sebastiani et Mauri. Florae romānae prodromus 8^a Romae
1878 fig.

May 10 1870

Trubel 8565

2nd enlarged ed.

ROMANARUM
PLANTARUM

CENTURIA
DECIMATERTIA

AUCTORE
ERNESTO MAURI

ROMÆ MDCCCXX.
TYPIS DE ROMANIS

Superiorum Permissu.

ROMANARUM PLANTARUM

CENTURIA XIII.

DIANDRIA MONOGYNIA .

PHILLYREA .

LATIFOLIA . *L.* Foliis ovato-oblongis subcordatis . *Ait.*
Kew. - *Savi Tr. d. alb.* 1. 149 , et *Bot. Etr.* 2. p. 1.
Ph. latifolia . *All. Fl. Ped. n.* 452. - *W. Sp.* 1. p. 43. -
Pers. Enchir. 1. p. 8. - *Loisel. Deslong. Fl. Gall.*
 p. 5. *Ph. arbor gallo* - provinciæ verior . *Lob. ic.* 2.
 p. 132 .

In sylvaticis , ad sepes . *Sul Monte Mario , a Monte Gennaro . . .* Frut. Floret Aprili . Flores albo-virescentes .

VERONICA .

PROSTRATA . *L.* Pubescens ; caule prostrato , florifero ascendente ; foliis sessilibus ovato - ellipticis obtusis serratis planis ; calycinis foliolis inæqualibus , quinto subnullo .

V. prostrata . *W. Sp.* 1. p. 67. - *Pers. Ench.* 1. p. 12. -
Roem. et Sch. Syst. Veg. 1. p. 111. * *V. Teucrium* *Æ. Savi Bot. Etr.* 1. p. 12.

In jugis apenninis . *Fra Norcia e Castelluccio* legit clariss. Schow Danus , qui mihi benevole communicavit . Perenn. Floret Junio . Fl. amethystei grandiusculi .

Characteribus a cl. Roem. et Sch. in *Syst. Veg.* 1. c. et p. 113. sub *V. latifolia* positis , planta nostra cum auctorum *V. prostrata* convenit . At in exemplaribus mihi allatis vel e dicto loco vel e vicinioribus Aprutii montibus , calyces evidenter ciliati , nec glabri . Nonne potius cum cl. Savio habenda ut varietas *grandiflora V. Teucrii* ?

TRIANDRIA MONOGYNIA.

VALERIANA.

Ser. Floribus 3-andris ; corolla ecalcarata .

TUBEROSA . *L.* Floribus corymbosis triandris : caule glabro ; foliis radicalibus lanceolato - oblongis , integris ; caulinis pinnatifidis .

V. tuberosa . *All. Fl. Ped. n. 10. - W. Sp. 1. p. 178. - Pers. Ench. 1. p. 38. - Loisel. Fl. Gall. 1. p. 22. - DC. Syn. p. 296. - Roem. et Sch. Syst. Veg. 1. p. 356.* Nardum montanum. *Matth. Valgr. 35.*

In montibus . Prope *Norcia* legit *cl. Schow* superius citatus . Perenn. Floret Junio . Fl. rubelli .

Variat foliis superioribus indivisis , et foliis omnibus pinnatifidis .

POLYCNUM . Char. Gen. *Calix 2-3-phyllus . Petala 5. Stylus bifidus . Capsula monosperma non dehiscent . - Stamina 1 , 2 , 3 , et 5.*

ARVENSE . *L.* Foliis subulato triquetris , apice spinulosis ; calycibus diphyllis aristatis .

P. arvense . *All. Fl. Ped. n. 1994. - W. Sp. 1. p. 192. Hoffm. Fl. Germ. ed 2 , T. 1 , P. 1 , p. 40. - Loisel. Fl. Gall. 1. p. 25. - Pers. Ench. 1. p. 40. - DC. Syn. p. 198. - Roem. et Sch. Syst. Veg. 1. p. 523.* Anthilis altera italorum . *Lob. ic. 404.*

In arenosis . Ad ripas *Anienis* , ad rivos a *Tor di Quinto* . . . Ann. Floret Julio . Fl. albo-membranacei , antheris rubris .

Caulis diffusus , ramosus . Folia sparsa , approximata , rigida , subulata , carinata , spinula alba terminata , ad basim marginibus dilatatis scariosis . Flores sub-solitarii , sessiles , in axillis foliorum superiorum reconditi , triandri , foliolo membranaceo ntrinque suffulti .

SCIRPUS .

Ser. B. Semine nudo .

ANNUUS . *All. Fl. Ped. 2. p. 277. t. 88. f. 5.* Culmo triquetro , striato , basi vaginato ; foliis pubescentibus ; involucri polyphylo ; umbellae radiis simplicibus vel bifidis vel umbelluliferis ; spiculis intermediis sessilibus ; glumis mucronatis ; fructu costato .

Sc. annuus. *Pers. Ench.* 1. p. 63. - *DC. Syn.* p. 147.
Sc. dichotomus. *L.* (?). *Sc. dichotomus*. *Savi Bot. Etr.* 2. p. 24. * *Fimbristylis annua*. *Roem. et Sch. Syst. Veg.* 2. p. 95. *Cyperus minimus panicula maxima*, radice odora repente. *Scheuchz. Agr.* 397. t. 9. f. 6.

In aquosis, ad ripas Tyberis. Ann. Floret Julio, Augusto.
 Radix fibrosa. Culmi compressiusculi, striati, 2-6-pollicares, basi tantum vaginis foliorum vestiti, cæterum nudi. Umbella terminalis: involucri foliola sub-terna, inaequalia, umbellam superantia. Pedunculi inaequales, simplices, vel bifidi, vel umbellam partialem involucello proprio cinctam gerentes. Spiculæ ovato-oblongæ, teretiusculæ, solitariæ; e dichotomia vel ex umbellarum centro prodeuntes sessiles. Squamæ primum albo-lutescentes, dein ferrugineæ, nervo dorsali viridi producto mucronatæ. Semen absque setis, turbinato-compressum, longitudinaliter striatum, lutescens.

An *Sc. annuus* All. a vero *Sc. dichotomo* L. specie diversus sit, lis adhuc pendet, quod sciam. Hinc auctorum synonymiæ, quorum quidam separari, alii vero conjugii jubent, nonnisi caute interea admittendæ.

TRIANDRIA DIGYNIA.

CRYPISIS.

SCHOENOIDES. *Lam. ill. n.* 805. t. 43. f. 1. Culmis compressis, sub-ramosis, procumbentibus: paniculis sub-spicatis, ovatis, vagina foliacea involucrentibus; floribus triandris.

C. schoenoides. *Pers. Ench.* 1. p. 79. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 18. - *Savi Bot. Etr.* 1. p. 41. - *Roem. et Sch. Syst. Veg.* 2. p. 375. * - *DC. Syn.* p. 120. *Phleum schoenoides*. *L. Phalaris vaginiflora*. *Forsk.* - *Smith Prodr. Fl. Græc.* 1. p. 38. *Gramen typhinum* brevi et crassiori spica ad singula genicula prodeunte. *Scheuchz. Agr.* p. 86.

In locis humentibus, ad ripas Tyberis. Bienn. Floret Julio, Augusto.

Culmi sub-pedales, basi procumbentes, interdum ramosi. Folia rigida, acuta, nec pungentia, superne aspera. Pylorum series loco ligulæ. Vaginæ supremæ latiores laxiores. Spica terminalis semi-pollicaris, elliptico-ovata, basi vaginis foliorum unica binisve involucrata. Flores parvi, dense imbricati, compressi. Valvæ calycinæ inæquales, carina ciliis aspera. Corolla calycem excedens. Tota planta viridi glaucescens.

ALOPECURUS.

BULBOSUS. *L.* Culmo erecto, basi bulboso: panicula spicata cylindrica: calyceibus villosis, valvis acutis distinctis.

A. bulbosus. *Smith Fl. Br.* 1. p. 73. * - *W. Sp.* 1. p. 356. - *Pers. Ench.* 1. p. 79. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 41. - *DC. Syn.* p. 120. - *Roem. et Sch. Syst. Veg.* 2. p. 268. Gramen typhinum phalaroides pilosa spica aquaticum bulbosum. *Barr. ic.* 699. f. 1.

In pratis depressis. *Fra Tor di Quinto e il Tevere*. . . . Perenn. Floret Aprili, Majo.

Radix bulbosa, cæspitosa, fibras e parte inferiore emittens. Culmus simplex 8-14-pollicaris, erectus, basi nonnihil geniculatus, foliosus, binodis, striatus, glaber. Folia glabra, linearia, breviter. Ligula brevis striata. Spica sesqui-pollicaris, simplicissima, gracilis, acuta. Valvæ calycinæ parum inæquales, acutæ, muticæ, villosæ, basi distinctæ. Corolla emarginata, arista basilari flosculo duplo longiore.

Valvis calycinis apice acutis distincta præsertim videtur ab *A. geniculato*.

AIRA.

CAPILLARIS. *Host Gram. Aust.* 4. p. 20. t. 35. Panicula divaricata ramosissima, ramis trichotomis: calycinis valvis apice obtusiusculis érosis; flosculis inclusis mutico aristatoque, arista calycem excedente.

A. capillaris. *Bert. Amoen. Ital.* p. 328. * *A. caryophyllea* γ *capillaris.* *Roem. et Sch. Syst. Veg.* 2. p. 681. Gramen tenue avenaceum versicolori panicula. *Bonann. Panph.* t. 145. *G. paniculatum* purpureo-argenteis locustis delicatissimis. *Scheuchz. Agr.* 223. t. 4. fig. 23.

In glareosis, muris vulgatissima. Ann. Floret Majo. Speciem hanc ob flosculos nonnunquam utrosque aristatos cum affini *Aira caryophyllea* confusa fuit in Prod. Rom. Floræ p. 37. n. 20. Characteres, quibus statim separandæ, huc subijcio.

Airæ capillari Hostii sunt. Culmus tenuissimus, altitudine varius. Folia capillacea, ligula latiore elongata, lanceolata. Panicula terminalis ramosissima, ramulis capillaribus trichotomis flexuosis. Spiculæ minutæ pallidæ vel rubescentes. Calix valvis duabus æqualibus, concavis, ovatis, apice obtusiusculis eroso-denticulatis. Flosculi bini, calyce inclusi, inæquales, glumis exterioribus scabris, acuminatis, leviter bifidis; alter instructus arista dorsali geniculata calycem excedente.

Airæ caryophylleæ L., quæ apud nos minus frequens, sunt. Culmus altitudine varius, tenuis, firmior tamen quam in præcedente. Folia angustissima, nec capillaria, ligula latiore lanceolata. Panicula terminalis ramosa, ramis tenuibus trichotomis. Spiculæ quam in præcedente duplo etiam majores, sæpius basi coloratæ. Calix valvis æqualibus, concavis, ovato-acuminatis. Flosculi bini, calyce parum breviores, inæquales, acuminati: gluma exterior acuminata, profunde bifida: flosculus uterque aristatus (rarius alter muticus) arista dorsali geniculata exerta.

MELICA.

MINUTA. L. Panicula simplici, vel basi ramosa; spiculis nutantibus trifloris; calycinis valvis obtusiusculis; petalis imberbibus: culmo filiformi subramoso; foliis lineari-angustissimis, ligula elongata.

M. minuta. All. Fl. Ped. n. 2252. - Smith Prod. Fl. Graec. 1. p. 50. - Roem. et Sch. Syst. Veg. 2. p. 524.* - Bert. Amoen. Ital. p. 111.* M. nutans. Cavanill. ic. et descr. 11. p. 58. t. 175. f. 2. M. aspera. Vivian. Ann. bot. 1. P. 2. p. 138. M. ramosa. Loisel. Fl. Gall. 1. p. 47. Gr. avenaceum tenui spicataque panicula, albis utriculis. Barr. ic. 96. f. 2. (sat bene).

In collibus, muris siccis non infrequens. Perenn. Floret Majo, Junio,

Culmi semipedales, sesquipedales, tenuēs, rigidiusculi, glaucescentes, sæpe basi ramosi. Folia linearia, angustissima, arefactione involuta, sursum strictu scabra. Ligula etiam bi-linearis, apice lacera. Panicula racemiformis, circa basim ut plurimum ramulis simplicibus extantibus, unico, binis, interdum et 4, erecto-patulis, quandoque patentissimis. Spiculæ raræ, unilaterales, sub-nutantes, breviter pedunculatæ. Calix valvis pallidis, nonnunquam dorso rubro-violaceis, glabris, margine scariosis, lanceolato-obtusiusculis, inaequalibus.

Notæ quæ *Melicam minutam* L. a *M. pyramidalis* Roem. et Schult. præsertim distinguunt jam relatæ sunt in Fl. Rom. Prodomo p. 39. n. 99, eoque loco ratio data cur Barrelerii *Gramen avenaceum angustifolium panicula pyramidalis* ic. 95. cum *pyramidalis* potius quam cum *minuta* convenire visum fuerit. Silentio tamen nunc non præteream me in loco a Barrelerio citato (idest inter Portam D. Laurentii et Portam Piam) *M. minutam* abunde, nunquam vero *pyramidalem* invenisse.

DACTYLIS. Char. Gen. *Calix bivalvis, inaequaliter compressus, altera valva majore carinata. Corollæ valvula exterior sub apice emarginato setigera, interior bifido-dentata. - Spiculæ aggregatæ.*

GLOMERATA. L. Panicula secunda decomposita glomerata; foliis carinatis.

D. glomerata. *Smith Fl. Br.* 1. p. 111. - *W. Sp.* 1. p. 408. - *Pers. Ench.* 1. p. 88. - *DC. Syn.* p. 134. - *Hoffm. Intr. ad Fl. Germ.* t. 6. - *Roem. et Sch. Syst. Veg.* 1. p. 625. * - *Bertol. Amoen. Ital.* p. 116. *Bromus glomeratus.* *Scop. Carn.* 111. *Festuca glomerata.* *Vill.* - *Savi Bot. Etr.* 2. p. 54.* *Gramen spicatum folio aspero.* *C. B. Prod.* p. 9. cum ic. - *Scheuchz. Agr.* p. 209.

In pratis, viis campestribus undique. Perenn. Floret Majo, Junio.

Culmi 1-3 pedales. Folia margine præsertim scabra, ligula elongata. Panicula ante et post anthesim contracta; ramis alternis, inaequalibus flexuosis, scaberrimis, decompositis. Spiculæ secundæ conglome-

ratae . Calix sub-3-florus valvis valde inaequalibus acuminatis , exterior carina sub-ciliata , interior angustior glabriuscula , membranacea . Flosculi calyce majores , gluma exteriore mucronata , carina pectinato-ciliata , interiore apice bifida .

POA.

Ster. E. Glumis obtusis ; calycinis inaequalibus ; corollina exteriore apice membranaceo emarginata , interiore erosa . - Spiculae compressae , secundae . (*Eleusine* pl. auct.)

DURA . Scop. Carn. Panicula secunda , coarctata , rigida ; rachi pedicellisque laevibus : spiculis adpressis linearibus , obtusis , sub-4-floris ; gluma corollina exteriore 9-nervia .

P. dura. *All. Fl. Ped. n. 2211. - Schrad. Fl. Germ. 284. - DC. Syn. 132. Cynosurus durus . L. - W. Sp. 1. p. 413. - Hoffm. Fl. Germ. ed. 2, T. 1, P. 1, p. 48. - Loisel. Fl. Gall. 1. p. 53. Festuca dura . Vill. Delph. 2. p. 94. Eleusine dura . Lam. ill. n. 1127. - Gaud. Agr. Helv. 1. p. 156. Schlerochloa dura . P. de Beauv. - Roem. et Sch. Syst. Veg. 2. p. 698. Gramen arvense polypodii panicula crassiore . Barr. ic. 50.*

Im arenosis , et ad vias inter saxa . *Sulla sponda del Tevere a Ponte Molle , a Ripetta , a Porta Portese . . . intorno alla Tolfa , etc. Ann. Floret Majo .*

Planta 2-4-pollicaris , admodum rigida , pallide viridis . Radix fibrosa . Culmi plures , procumbentes , vaginis foliorum tecti . Panicula pollicaris , contracta , obverse lanceolata , ultra medium dilatata , pedicellis distichis 1-2-3-floris . Spiculae unilaterales compressae , rachi adpressae , sub-lineares , obtusae , flosculis 3-5 . Valvae omnes margine scariosae ; calycinae breves , inaequales , obtusae ; corollina exterior carinata , 9-nervis ; interior apice obtuso suberoso .

BROMIUS.

SCOOPARIUS . L. *Amoen. Ac. 4. p. 266. * Panicula fasciculata , spiculis subsessilibus ; aristis patulis .*

B. scoparius. *W. Sp.* 1. p. 436. - *Pers. Ench.* 1. p. 96. - *Smith Prod. Fl. Graec.* 1. p. 63. - *Roem. et Sch. Syst. Veg.* 2. p. 653. *B. rubens*. *Savi Bot. Etr.* 1. p. 76.* (ex spec. auct. in Herb. Sebastianii). Gramen bromoides murorum lanuginosum erectum locustis amplioribus aristatis in panicula compacta propemodum spicata et veluti alopecuroide dispositis. *Mich. Cat. H. Pis.* p. 76.

In sterilibus, muris. *Intorno a Sutri* (signate in veteri amphitheatro). *Ann. Floret Majo*.

Culmus 5-8 pollicaris, basi sub-ramosus. Folia breviter, striata, superne villosa, praesertim ad oram vaginæ: ligula brevis lacera. Panicula sesqui-pollicaris densa; pedunculis in quovis semi-verticillo sub-ternis, semi-lineam, sesqui-lineam longis, simplicibus, vel rarius bifidis. Spiculae erectae fasciculatae semi-pollicares, lanceolatae, compressae, 6-8-florae, in exemplaribus nostris, aequae ac cl. Savii breviter hirsutae (Linnaeo l. c. glabrae). Calycis valvae inaequales, lanceolato-acuminatae, margine scariosae, major 7-nervia, minor 3-nervia, nervis omnibus ciliatis. Corollae gluma exterior lanceolata, obtusa, margine scariosa, dorso 5-nervia, nervis lateralibus approximatis, omnibus ciliatis, apice leviter emarginata: arista lineam fere infra apicem inserta, glumae longitudinem vix aequans, tenuissima, scabra, primo erectiuscula, maturitate extus flexa. Gluma interior a basi ad apicem pectinato-ciliata.

Linnaei *Bromus rubens*, quocum a pluribus auctoribus species haec confusa vel juncta fuit, habet glumas subulatas aristis rectis longis terminalibus, ideoque nuperis pluribus sub *Festuca* militat. Gaudet insuper statura duplo majore, docente Smithio.

SECALE.

CEREALE. *L* Calycinis valvis lanceolatis: corollae gluma exteriore dorso ciliato-scabra.

S. cereale. *W. Sp.* 1. p. 471. - *Pers. Ench.* 1. p. 108. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 68. - *DC. Syn.* p. 136. - *Roem. et Sch. Syst. Veg.* 2. p. 773.

In agris passim provenit, e cultis aufugum. Vulgo :
Segala. Ann. Floret Junio.

Culmus 4 - pedalis. Spica oblonga 2 - 3 - pollicaris, demum nutans. Spiculae biflorae. Calycis valvae minores lineari-lanceolatae, albae. Corollae gluma exterior lanceolata, glabra, nervosa, nervo dorsali ciliis asperis instructo, in aristam producta; interior mutica.

AN DROPOGON.

ANGUSTIFOLIUS. *Smith Prod. Fl. Graec.* 1. p. 47. - *Roem. Syst. Veg.* 2. p. 822.

A. ischaemum. *Flor. Rom. Prodr.* p. 69. n. 167. (cujus nomini specifico hoc surrogandum, detenta adumbratione et synonymis, praeter illud Roemerii et Schulthesii).

Species haec differt a vero *A. ischaemo* L. teste Smithio: statura minore, foliis angustioribus brevioribusque, spicarum numero (saepius) majori; valvis calycinis duplo minoribus, magis concinne striatis. Insuper cl. Decandollius in specie hac spiculas videt purpurascens, quae in suo *A. provinciali*, idest in *A. ischaemo* L. virescentes sunt.

TETRANDRIA TETRAGYNIA.

POTAMOGETON.

PERFOLIATUS. L. Foliis cordatis, amplexicaulibus, nitidis, nervosis; omnibus immersis: caule tereti.

P. perfoliatum. *All. Fl. Ped. n.* 875. - *W. Sp.* 1. p. 713. - *Smith Fl. Brit.* 1. p. 194. * - *Pers. Ench.* 1. p. 152. - *Hoffm. Fl. Germ. ed.* 2, *T.* 1, *P.* 1, p. 81. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 95. - *DC. Syn.* p. 156. *P. perfoliatum*. *Roemer et Sch. Syst. Veg.* 3. p. 507. * *P. tertia*. *Dod. Pempt.* 582.

In lacubus, stagnis, fluviis. *Nel lago di Bracciano*, etc. Perenn. Floret Junio, Augusto. Fl. subvirides.

PENTANDRIA MONOGYNIA .

LYSIMACHIA .

NUMMULARIA . *L.* Foliis oppositis cordato-subrotundis : pedunculis axillaribus unifloris ; laciniis calycinis ovatis acutis : caule repente , glabro .

L. nummularia . *Smith Fl. Br.* 1. p. 229. - *W. Sp.* 1. p. 821. - *Pers. Ench.* 1. p. 172. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 117. - *Hoffm. Fl. Germ. ed. 2, T. 1, P. 1, p. 97.* - *DC. Syn. p. 305.* - *Roem. et Sch. Syst. Veg.* 4. p. 128. *L. humifusa* , etc. *Hort. Rom.* 2. f. 44.

In pratis humidis , juxta fossas . *Al Piano di due Torri , presso Ponte Molle* Perenn. Floret Junio . Fl. flavi .

LINUM-STELLATUM . *L.* Foliis oppositis , sessilibus , lanceolatis , angustis : pedunculis axillaribus unifloris ; calycibus corolla majoribus : caule erecto , ramoso , glabro .

L. linum-stellatum . *All. Fl. Ped. n. 343.* - *W. Sp.* 1. p. 820. - *Pers. Ench.* 1. p. 172. - *Loisel. Fl. Gall.* p. 117. - *DC. Syn. p. 205.* - *Roem. et Sch. Syst. Veg.* 4. p. 126. *Linum minimum stellatum.* *Magn. Monsp.* 163. cum ic .

In siccis . *Nella Villa Mellini* Ann. Floret Majo . Fl. ochro-leuci , minuti .

Plantula sub-3-pollicaris . Folia passim nigro-punctata . Capsula quinquevalvis .

PRIMULA .

VERIS . *Smith Fl. Br.* 1. p. 223. Foliis cordato-ovatis , obtusis , dentatis , petiolo alato : scapo multifloro ; corollae fauce elongata infundibuliformi , limbo concavo .

P. veris. *W. Sp.* 800. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 113.

P. veris (officinalis) . *Pers. Ench.* 1. p. 160. *P. veris* α . *L. P. officinalis.* *All. Fl. Ped. n. 332.* - *DC. p. 207.* - *Hoffm. Fl. Germ. ed. 2, T. 1, P. 1. p. 93.*

In sylva Tusculana vulgo *la Rusinella* invenit , et communicavit amicissimus meus R. D. Leander Ciuffa . Perenn. Floret Aprili . Fl. citrini .

Flores umbellati sub-nutantes : calycis laciniae obtusiusculae : corollae tubus calycem superans , fauce infundibuliformis , limbus parvus non nihil concavus . Hinc satis distincta a *P. suaveolente* Bertolonii (*P. Columnae* Tenor.) cui caeterum calyx valde major , dentibus acutis corollae tubum et faucem hemisphaericam aequantibus .

PENTANDRIA DIGYNIA .

CHENOPODIUM .

URBICUM . *L.* Foliis triangularibus dentatis : racemis confertis , strictissimis , cauli approximatis , longissimis , sub-aphyllis .

Ch. urbicum . *Smith Fl. Brit.* 1. p. 273* . - *W. Sp.* 1. p. 1299 . - *Pers. Ench.* 1. p. 234 . - *Hoffm. Fl. Germ.* ed. 2, T. 1, P. 1, p. 118 . - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 144 . - *DC. Syn.* 196 . - *Bertol. Amoen. Ital.* p. 134 .

In ruderalis , ad pagos montium Latii An.
Floret Augusto . Fl. herbacei .

- » Folia basi integra et cuneata , sed non adeo longe ut
- » in *Ch. rubro* , reliquo margine eroso-denticulata .
- » Semina quinquies majora quam in *Ch. rubro* ,
- » in quo sunt minutissima , sabuli tenuioris ad
- » instar . » *Bert. l. c.*

ZIZYPHUS . Char. Gen. *Calix patens 5-fidus . Petala 5 squamiformia , disco glanduloso calycino inserta . Drupa ovata , foeta nucleo biloculari , dispermo .*

VULGARIS . *Lam. Enc.* p. 316 . Aculeis geminis , altero recurvo ; foliis ovato-oblongis , retusis , dentatis , glabris . *DC. Syn.* p. 566 .

Z. vulgaris . *W. Sp.* 1. p. 1105 . - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 148 . *Rhamnus zizyphus* . *L. All. Fl. Ped. n.* 1766 . - *Pers. Ench.* 1: p. 240 . - *Savi Tr. d. Alb.* 1. p. 182 .
Z. Dod. Pempt. 807 .

In dumetis , ad margines viarum frequens . Frut. vel Arb. Floret Junio , Julio . Fl. flavescentes . - Fructus edules vulgo *gensole* , *giuggiole* .

VELEZIA . Char. Gen. *Calix tubulosus , 5-dentatus . Petala 5 , unguibus filiformibus , limbo parvo emar-*

ginato: *Capsula 1-locularis. Semina plurima, simplici serie.*

RIGIDA. *L.-W. Sp. 1329.-Pers. Ench. 1. p. 290.-Loisel. Fl. Gall. 1. p. 149.-DC. Syn. p. 392.*

Lychnis corniculata major et minor. Barrel. Obs. 664. tab. 1017, 1018.-Bocc. Mus. 2. p. 50. t. 43.

In sterilibus. Nella Valle dell' Inferno. . . Ann. Floret Julio. Fl. purpurei.

Planta pubescenti-glandulosa. Caulis ramosissimus dichotomus, flexuosus, rigidus. Folia opposita, linearisubulata, cauli adpressa. Flores axillares, alares, sub-solitarii, sessiles: calix tubulosus gracilis, semi-pollicaris dentibus 5 acutis erectis. Petala 5, ungue tenuissimo, limbo purpureo. Capsula filiformis, unilocularis, sub-5-valvis. Semina oblonga, nigra, serie simplici. Numerus partium a quinario ad senarium; hinc Linnaeo ad Hexandriam digyniam relata.

ULMUS.

EFFUSA. *W. Sp. 1. p. 1325. Foliis duplicato-serratis, acuminatis, basi inaequalibus: floribus pedunculatis, effusis; fructibus margine ciliatis.*

U. effusa. Pers. Ench. 1. p. 291.-Hoffm. Fl. Germ. ed. 2, T. 1, P. 1, p. 121.-Loisel. Fl. Gall. 1. p. 148.-DC. Syn. p. 183. U. montana. Smith Fl. Br. 1. p. 282. U. octandra. Schkuhr. 57.

In montium sylvaticis. Copiose intorno a Castel Gandolfo. Arb. Floret Martio. Fl. spurco-albi, sub-purpurei.

Ramuli juniores glabri, laeves. Folia ampla, basi valde inaequalia, apice acuminata.

CAUCALIS.

Ser. Fructuum aculeis numerosis sparsis.

SCANDIX. *Scop. Fl. Carn. ed. 2. n. 312. Seminibus ovatis hispidis, rostro brevi nudo: caule ramoso, laevi, glabro; foliis tripinnatis, villosis.*

C. aequicolorum. All. Ped. n. 1390. C. scandicina. Oed. Dan. t. 863.-DC. Syn. p. 312. Scandix anthriscus. L.-Smith Fl. Br. 1. t. p. 325.-W. Sp. 2. p. 1450.-Loisel. Fl. Gall. 1. p. 173. Anthriscus*

vulgaris. *Pers. Ench.* 1. p. 320. Myrrhis aequicolorum nova. *Column. ecphr.* 1. p. 110. f. 112.

Ad sepes, oras sylvarum in montosis. *All' ingresso dei castagneti di Soriano* Ann. Floret Majo. Fl. albi.

Caulis gibbosus, striatus. Folia subtus parum villosa, ad marginem petioli densius. Umbellae oppositifoliae, breviter pedunculatae, sub-5-fidae, involucri nullo: umbellulae 5 florum, involucellis lanceolatis. Corollae uniformes. Semina ovata, pilis hispida, rostro brevissimo glabro terminata, inter *Caucalidem* et *Scandicem* genere ambigunt.

FERULA.

NODIFLORA. *L.* Foliis decompositis; foliolis linearibus, angustissimis: umbella terminali sessili; lateralibus altioribus, superiorum pedunculis verticillatis.

F. nodiflora. *All. Ped. n.* 1294. - *Enc.* 3. p. 456. - *Pers. Ench.* 1. p. 312. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 154. - *DC. Syn. p.* 314. - *Savi Due Cent. p.* 64*. - *Bertol. Amoen. Ital. p.* 138. Libanotis tenuifolia altera ferulae folio et semine. *Barr. ic.* 835. - *Bocc. Mus.* 171. tab. 125. Panaces asclepium. *Dod. Pempt.* 308.

In montibus Latii ad margines agrorum. *Sulla Serra S. Antonio al di là di Feletino* Perenn. Floret Julio. Fl. luteoli. Amicissimus meus Sebastianus Rolli entomologus romanus solertissimus loco supradicto legit, mihiq. exemplaria attulit.

Caulis 3-4-pedalis. Folia 4-pinnata, pinnis triphylis, foliolis lineari-sub-cuneatis angustissimis brevibus, apice acutis. Umbella terminalis sessilis. Lateralium umbellarum pedunculi inferiores sparsi, superiores oppositi vel ad nodos verticillati. Singuli bractea ad basim suffulti, simplices, vel ultra medium pedicello uno alterove umbellam sterilem gerente. Odor aromaticus.

SIUM.

ANGUSTIFOLIUM. *L.* Caule erecto: foliis pinnatis; foliolis inaequaliter incisissimis serratisve: umbellis oppositifoliis, pedunculatis; involucri universali polyphyllo.

S. angustifolium. *All. Fl. Ped. n.* 1368. - *W. Sp.* 1. p. 1431. - *Smith Fl. Br.* 1. p. 313*. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 169. - *Hoffm. Fl. Germ. ed. 2, T. 1, P. 1, p.* 137. - *DC. Syn. p.* 307. - *Savi Bot. Etr.* 1. p. 130. *S. angustifolium (incisum)*. *Pers. Ench.* 1. p. 316. *S. nodiflorum*. *Fl. Dan. t.* 247. *S. umbelliferum*. *J. B. H.* 3. p. 173.

In fossis. *Ai due ponti di Tor di Quinto . . . Perenn.* Floret Junio, Julio. Fl. albi.

Folia inferiora foliolis 13-17 ovatis, inaequaliter serratis, impari 3-lobo; superiora foliolis 7-9, incisis. Pinnarum par inferius a caeteris remotus. Involucri foliola integra, vel incisa.

OENANTHE.

PEUCEDANIFOLIA. *Pollich. Pal. I. pag.* 289. t. 4. Foliis radicalibus bipinnatis, caulinis pinnatis: omnibus foliolis linearibus acutis; involucro sub-nullo.

Oe. peucedanifolia. *W. Sp.* 1. p. 1442. - *Smith Br.* 1. p. 319. - *Pers. Ench.* 1. p. 318. - *Hoffm. Fl. Germ. ed. 2, T. 1, P. 1, p.* 139. - *DC. Syn. p.* 307. - *Bertol. Amoen. Ital. p.* 240. *Oe. gymnorhiza*. *Brign. Fasc. rar. pl. Foroj. p.* 21. (fide Bertol.). *Bulbocastanum foemina*. *Dalech. Hist. p.* 773.

In pratis, praesertim humidis maritimis. Frequens a *Civitavecchia . . . Perenn.* Floret Majo. Fl. albi.

CHÆROPHYLLUM.

SYLVESTRE. *L.* Fructibus laevibus, stylo persistente coronatis: caule ramoso, laevi, striato, geniculis tumidiusculis.

Ch. sylvestre. *All. Fl. Ped. n.* 1392. - *W. Sp.* 1. p. 1752. - *Pers. Ench.* 1. p. 320. - *Smith Fl. Br.* 1. p. 326. - *Hoffm. Fl. Germ. ed. 2, T. 1, P. 1, p.* 142. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 173. - *DC. Syn. p.* 306. *Myrrhis*. *Dalech. H.* 761. *Cicutaria vulgaris*. *Dod. Pempt.* 701.

Ad sepes, locis humidiusculis circa urbem et in montibus frequens. Perenn. Floret Aprili, Majo. Fl. albi.

HEXANDRIA MONOGYNIA .

ALLIUM .

PENDULINUM . *Tenor. Fl. Nap.* 1. p. 168. t. 31. Scapo nudo triquetro : foliis linearibus , inferne carinato-triquetris ; spatha caduca ; petalis persistentibus obtusis : floribus sub anthesi rotatis , demum globosis , undique pendulis : capsulis turbinato-sexlobatis .

A. triquetrum . *Fl. Rom. Prod.* p. 126. n. 396. (imperfecte) .

In montosis sylvaticis nil communius . *Sui monti Albani , Tuscolani , Cimini , Sabatini , alla Tolfa , etc.* Perenn. Floret Aprili , Majo . Fl. albi .

Scapus nudus 6-8-pollicaris , acute triqueter . Folia basi insigniter carinata , triquetra , prope apicem planiuscula . Spatha diphylla , linearis , caduca . Umbella 3-20-flora , pedunculis longiusculis inaequalibus , demum undique pendulis . Corolla persistens sub anthesi rotata , mox petalis inflexis apice conniventibus globosa . Petala candida , dorso viridi , ovato-oblonga , apice obtusa . Capsula turbinata , valvulis margine introflexis sublobata .

TRIQUETRUM . *Mill.* Scapo nudo , foliisque argute triquetris : spatha caduca : petalis persistentibus acuminatis ; floribus sub anthesi campanulatis , demum pyriformibus , hinc cernuis : capsulis rotundatis .

A. triquetrum . *W. Sp.* 2. p. 80, et *auct.* (non autem *Prod. Fl. Rom.*) . Moly caule et foliis triangularibus . *Park. Par.* 145. t. 143. f. 4.

In sylvaticis , ad sepes . *A Civitavecchia* copiose in dumetis juxta oram maritimam , Romae a *Villa Borghese* in nemore prope lacum Perenn. Floret Majo . Fl. albi .

Scapus nudus , 10-pollicaris , sesquipedalis et ultra , argute triqueter , hinc canaliculatus , superne admodum attenuatus . Folia acute carinata , sub-triquetra . Spatha diphylla , caduca . Umbella 3-10-flora , nutans , demum hinc cernua , pedunculis , quam in praecedenti paullo brevioribus sub flore incrassatis . Corolla persistens primum tubulosa , sub anthesi campanulata (more *Hyacinthi orientalis*) ; mox py-

riformis acuminata. Petala candida linea dorsali viridi, lanceolata, acuminata. Capsula turbinato-rotundata, nec ad valvarum suturas sulcata.

LILIUM.

MARTAGON. *L.* Foliis verticillatis ovato-lanceolatis: floribus reflexis; corollis revolutis. *W. Sp.* 2. p. 88. - *Pers. Ench.* 1. p. 359. - *Savi Bot. Etr.* 1. p. 133. *

L. martagon. *All. Ped. n.* 1886. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 198. - *Hoffm. Fl. Germ. ed.* 2, T. 1, P. 1. p. 157. - *DC. Syn.* p. 160. *L. montanum*. *Lob. ic.* 168. *L. sylvestre*. *Dod. Pempt.* 201.

In montibus elatis Latii. *Sulla Serra S. Antonio vicino al Romitorio* legit, mihiq; attulit amic. Seb. Rolli superius laudatus. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. albidus, aut rubellus, punctis atris adpersus.

AGAVE. Char. Gen. Corolla supera erecta tubulosa, aut infundibuliformis, 6-partita. Filamenta erecta, Capsula triangularis, trilocularis, polysperma.

AMERICANA. *L.* Acaulis, scapo ramoso; staminibus corolla longioribus, stylo brevioribus; foliis dentato-spinosis.

A. americana. *All. Fl. Ped. n.* 435. - *W. Sp.* 2. p. 192. - *Pers. Ench.* 1. p. 379. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 206. - *DC. Syn.* p. 166. Aloe ex America. *Dod. Penpt.* 359.

Hinc inde ad muros, in sterilibus sponte nunc luxuriat. *Sul Monte Palatino, a Tivoli presso S. Antonio* . . . Vulgo Aloe. Perenn. Floret aestate. Fl. spurco-virescentes.

Ex America orta; florens procerum scapum quam citissime attollit. - Variat foliorum margine luteo.

LUZULA.

FORSTERI. *DC. Syn.* p. 150. Foliis pilosis; corynbo subsimplici; pedunculis unifloris erectis; calycinis laciniis ovato-acuminatis; capsula mucronato-acuta. *DC. l. c.*

Juncus Forsteri. *Smith Fl. Br.* 3. p. 1395. - *Loisel. Fl. Gall.* 2. p. 724. - *Savi Bot. Etr.* 2. p. 70. Juncoides nemorosum villosum angustifolium minus, flore majore. *Mich. N. P. G.* p. 41. O. 1. N. 2. Gramen hirsutum angustifolium perenne, lini utriculis. *Barr. ic.* 748.

In nemorosis frequens . Perenn. Floret Aprili , Majo .
Fl. fusci .

» Similis *Junco piloso* (*Luzulae pilosae*) sed in il-
» lo capsulae obtusiores , quamvis mucronulatae . »
Savi l. c.

CAMPESTRIS . DC. Syn. p. 151 Foliis pilosis : spicis pe-
dunculatis , umbellatis , intermedia sessili ; calycinis
foliolis mucronatis , capsula obtusa longioribus .

L. campestris . W. En. H. Ber. 1. p. 394. *Juncus*
campestris . L. - *Smith Fl. Br.* 1. p. 385. * . - W.
Sp. 2. p. 221. - *Pers. Ench.* 1. p. 386. - *Loisel.*
Fl. Gall. 1. p. 212. - *Savi Bot. Etr.* 1. p. 114. *Gramen*
hirsutum capitulis Psyllii . *Scheuchz. Agr.* 310.

In sylvaticis , ericetis communis circa urbem et in mon-
tibus . Perenn. Floret Aprili , Majo . Fl. fusci bra-
cteis albis .

HEXANDRIA TRIGYNIA .

RUMEX .

ALPINUS . L. Floribus hermaphroditis , sterilibus , femi-
neisque ; valvulis integerrimis nudis : foliis corda-
tis , obtusis , maximis . *Pers. Enchir.* 1. p. 293.

R. alpinus . *All. Ped. n.* 2039. - W. *Sp.* 2. p. 259. -
Loisel. Fl. Gall. 1. p. 216. - *Hoffm. Fl. Germ.*
ed. 2. T. 1. P. 1. p. 173. - DC. Syn. p. 193. -
Targ. Ist. T. 2. p. 313. *Lapathum rotundifolium* .
Clus. H. 2. p. 69. L. folio rotuado alpinum . *J.*
B. H. 2. p. 987. - *Moris. H.* 2. s. 5. t. 27. f. 2.

In sylvis montium presso *Anagni* Communic.
amicissimus Rolli. Perenn. Floret Aprili , Majo .
Fl. herbacei , polygamo-monoici .

Radix in officinis nota nomine *Rhabarbari monachorum* ,
interdum pro *Rheo rapontico* venundatur .

OCTANDRIA TETRAGYNIA .

ARIS . Char. Gen. *Calix 4-phyllus* . *Petala 4 angustio-*
ra . *Antherae mediis filamentis adnatae* . *Bacca 4-*
locularis , loculis 6-8-spermis .

QUADRIFOLIA . L. Caule unifloro : verticillo unico , sub-
4-folio .

P. quadrifolia. *All. Fl. Ped.* n. 1225. - *W. Sp.* 2. p. 471. - *Smith Fl. Br.* 1. p. 431*. - *Pers. Ench.* 1. p. 446. - *Hoffm. Fl. Germ.* ed. 1, T. 1, P. 1, p. 185. - *Loisel Fl. Gall.* 1. p. 231. *Herba paris Matth.* 1193. - *J. B. H.* 3. p. 613. - *Lob. ic.* 267. *Aconitum pardalianches*. *Fuchs. H.* 87. *ic.* 48.

In nemorosis montanis. Sulla sommità della Serra *S. Antonio al di là di Feletino* . . . legit amicissimus Rolli. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. virides.

Folia numero variant 3-5, etiam 8.

DECANDRIA DIGYNIA.

SAXIFRAGA.

VERONICÆFOLIA. *Bertol. Amoen. Ital.* p. 361. Foliis radicalibus reniformibus, crenatis, petiolatis; caulinis sessilibus, ovatis, cuspidatis, inferioribus incisis: bulbillis caulinis: caule simplicissimo, *Bert. l. c.*

S. bulbifera * *veronicaefolia*. *Pers. Ench.* 1. p. 489.

S. bulbifera pl. auct. *S. bulbosa* altera *bulbifera montana*. *Colum. Ecphr.* 1. p. 317. *S. ad folia bulbos gerens*. *Segui. Veron. Supp.* p. 205.

In sylvaticis montium. Frequentem inveni in Ciminis: alla *Forcella presso Monte Compatri* legit *R. D. Leand. Ciuffa*.

Radix granulata. Caulis simplicissimus pedalis et ultra. Folia caulina alterna, ad axillas bulbifera. Flores pauciores, sub capitati. Pubescentia omnis apice glandulifera.

SCLERANTHUS. *Char. Gen.* Calyx monophyllus, inferus, tubulosus, collo coarctatus, supra quinquefidus. Corolla nulla. Stamina 1-2, calyce inclusa.

ANNUUS. *L.* Calycibus segmentis viridulis, acutis, dorso carinatis, sub-patulis. *Enc.* 3. p. 754.

Sc. annuus. *Smith Fl. Br.* 2. p. 458*. - *W. Sp.* 2. p. 661. - *Pers. Ench.* 1. p. 491. - *Hoffm. Fl. Germ.* ed. 2, T. 1, P. 1, p. 196. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 246. - *DC. Syn.* p. 324. Polygonum minus al-

terum . *Tabern. Ic.* 835. *Sc. n.* 1551. *Hall. Helv.-Gmel. Sib.* 3. t. 6. f. 2.

In aridis , ad vias . In Ciminis non rarus . *Ann. Floret Majo , Junio . Fl. viridi-glaucescences , colore plantae .*

DIANTHUS .

CARYOPHYLLUS . *L.* Caule simplici ramosove , erecto ; floribus solitariis ; squamis calycinis sub-rhombeis , obtusissimis , medio mucronulatis ; petalis crenatis , imberbibus . *Bert. Amoen. Ital. p.* 363 * .

D. caryophyllus . Smith Fl Br. 2. p. 471. *et Engl. bot. t.* 213.

ε *Inodorus . L. - Bert. l. c.* Herba viridi , floribus inodoris .

D. sylvestris . Jacqu. rar. 1. t. 82. - *W. Sp.* 2. p. 675. - *Pers. Ench.* 1. p. 493. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 249. - *DC. Syn. p.* 587. *D. virgineus . Savi Pis.* 1. p. 414. *Caryophyllus sylvestris flore rubro inodoro , etc. Segui. Veron.* 1. p. 435. t. 6. f. 3.

In marino litore . Frequens fra Torre S. Lorenzo e Torre del Vajanico Perenn. Floret Junio . Fl. rubelli , vel albi .

Varietatem hanc nondum in montibus nostris legi ; pluries vero a vicinioribus Aprutii Apenninis allatam observavi . A specie non disjungendam esse recte monet cl. Bertolonius l. c. , cum reapse praeter herbam macriorem non glaucam et florem inodorum ab hortorum Caryophyllo (vulgo *garofolo*) nullimode differat . Verum speciei typum hunc judicat Linnaeus .

DECANDRIA TRIGYNIA .

ARENARIA .

TRINERVIA . *L.* Caule debili , dichotomo : foliis ovatis , acutis , ciliatis , nervosis , petiolatis : pedunculis elongatis unifloris , demum reflexis .

A. trinervia . All. Fl. Ped. n. 1700. - *W. Sp.* 2. p. 718. - *Pers. Ench.* 1. p. 502. - *Hoffm. Fl. Germ. ed. 2 , T. 1 , P. 1 , p.* 205. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 259. - *Savi 2 Cent. - DC. Syn. p.* 366. *A.*

trinervis. *Smith Fl. Br.* 2. p. 478. Alsine plantaginis folio. *J. B. H.* 3. p. 363.

In umbrosis, sylvis. *All' Aricia*, sul monte Soriano, etc. Ann. Floret Aprili, Majo. Fl. albi.

Folia breviter petiolata, 3-5 nervosa. Calycis foliola carina scabra, margine membranacea, corolla longiora.

VERNA. *L.* Caespitosa, multicaulis; foliis subulatis, obtusiusculis, nervosis: caulibus sub-paniculatis elongatis, calycibus acuminatis, striatis. *DC. Syn.* p. 397.

A. verna. Smith Fl. Br. 2. p. 481. - *W. Sp.* 2. p. 722. - *Pers. Ench.* 1. p. 505. - *Hoffm. Fl. Germ. ed.* 2. T. 1. P. 1. p. 205. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 261. *A. saxatilis* et multiflora, capillaceo folio. *Vaill. Paris. t.* 2. f. 3.

In elatioribus montibus. *Sulla Serra S. Antonio* legit et communic. pluries commendatus Rolli. *Perronn.* Floret Majo-Augusto. Flores albi, antheris carneis.

RUBRA. *Smith Fl. Br.* 2. p. 479*. Caulibus prostratis; foliis filiformibus, mucronulatis; calycibus capsulam sub-aequantibus: seminibus compressis, angulatis, scabriusculis.

A. rubra. Pers. Ench. 1. p. 504. - *Savi B. Etr.* 2. p. 140. * - *DC. Syn.* p. 397. *A. rubra* α campestris. *All. Ped.* v. 2. p. 113. *Spergula purpurea. J. B. H.* 2. P. 2. p. 722.

In maritimis frequens, et in viis urbis inter saxa. *Sulla Piazza di S. Pietro*, etc. Ann. Floret Majo-Junio. Fl. dilute purpureo-caerulescentes.

Folia ut plurimum internodiis breviora. Capsula calicem non excedens, seminibus scabris, non alatis. Caules diffusi, tenuiores quam in *A. marina* Smithii.

DECANDRIA PENTAGYNIA.

SPERGULA. Char. Gen. *Calix* 5-phyllus. *Petala* 5, integra. *Capsula* ovata, 2-locularis. *Stamina* interdum 5.

ARVENSIS . *L.* Foliis linearibus verticillatis ; floribus paniculatis , pendulis ; seminibus nudis . *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 273.

Sp. arvensis . *All. Fl. Ped. n.* 1734. - *W. Sp.* 2. p. 818. - *Smith Fl. Br.* 2. p. 292. - *Pers. Ench.* 1. p. 522. - *DC. Syn. p.* 394. *Sp. Dod. Pempt.* 527. - *J. B. H.* 3. p. 719.

In agris arenosis . Prope Ardeam ... Ann. Floret aestate . Fl. albi staminibus saepius 10 , nonnunquam 5.

DODECANDRIA TRIGYNIA .

EUPHORBIA .

FALCATA . *L.* - *Prod. Fl. Rom. p.* 153. *n.* 542.

α. **Mucronata** . *Lam. Enc.* 2. p. 427. Umbella trifida , dichotoma ; foliis sparsis lineari-cuneatis , (inferioribus) obtusiusculis , floralibus ovato-sub-rotundis mucronatis . *Lam. l. c.* - *Pers. Ench.* 2. p. 15.

In montibus Latii . - Praeter folia inferiora cuneata apice obtusa mucronata , cum variet. *acuminata* *Prod. Rom. Fl. l. c.* convenit , eodemque tempore floret .

ICOSANDRIA MONOGYNIA .

CACTUS . Char. Gen. *Calix monophyllus , superus , imbricatus . Corolla multiplex . Bacca 1-locularis , polysperma .*

OPUNTIA . *L.* Caule articulato , aphylo , articulis ovatis , compressis , proliferis ; aculeis setaceis , fasciculatis : floribus sessilibus . *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 287.

C. opuntia . *All. Fl. Ped. n.* 1932. - *W. Sp.* 2. p. 943. - *Pers. Ench.* 2. p. 23. - *DC. Syn. p.* 324. *Opuntia vulgaris herbariorum . Hort. Rom.* 4 t. 68.

Ex America orta , sponte nunc in ruderatis , et praesertim in Palatino monte . Perenn. Floret Julio . Fl. flavi . Fructus edules vulgo *Fichi d' India* .

PUNICA . Char. Gen. *Calix 5-fidus superus . Petala 5 . Bacca coronata , extus coriacea , multilocularis , polysperma . Semina pulpa cincta .*

GRANATUM . *L.* Foliis lanceolatis , caule arboreo . *L. -W.*
Sp. -Pers. Ench. 2. p. 33. -DC. Syn. p. 439. -Savi Tr.
d. Alb. 2. p. 155 .

Punica quae malum granatum fert. *Duham. T. 1. t. 44.*
Malus punica . Dod. Pempt. 784.

-In sepibus et in arvis nunc sponte frequens , ex Afri-
 ca olim advecta . *Arb. Floret Julio . Fl. rubri . -Fru-*
ctus edulis vulgo : granato , melogranato , balau-
sto .

ICOSANDRIA DIGYNIA .

SORBUS .

Ser. A. Floribus digynis ; fructu duriore ;
 foliis simplicibus . (*Aria*) .

TORMINALIS . *Crantz Aust.* Foliis simplicibus . sub-corda-
 tis , serratis , septem-lobatis ; lobis acuminatis , in-
 fimis divaricatis : floribus corymbosis .

S. torminalis . Pers. Ench. 2. p. 38. -Savi Tr. d. Alb. 1.
p. 204. Crataegus torminalis . L. -Loisel. Fl. Gall. 1.

p. 290. -DC. Syn. p. 330. Pyrus torminalis . Smith
Fl. Br. 2 p. 532. -W. Sp. 2. p. 1021. -Hoffm. Fl. Germ.
ed. 2 , T. 1 , P. 1 , p. 227. Sorbus torminalis Pli-
nii . Lob. ic. 2. p. 200.

In montium sylvis . *Sul Monte di Soriano . . . Arb.*
Vulgo Pollandrello . Floret Majo . Fl. albi .

ICOSANDRIA POLYGYNIA .

POTENTILLA .

HIRTA . *L.* Foliis septenatis , quinatisque ; foliolis oblon-
 gis , cuneiformibus , incisis , pilosis ; stipulis inte-
 gris ; caule adscendente paucifloro ; petalis calyce
 majoribus .

P. hirta . W. Sp. 2. p. 1102. -Pers. Ench. 2. p. 54. -Loisel.
*Fl. Gall. 1. p. 301. -Bertol. Amoen. Ital. p. 372. * P.*
rubens . All. Ped. 2. p. 58. (fide Bert.)

In maritimis ad vias . Frequens a *Civitavecchia . . .*
Perenn. Floret Majo , Junio . Fl. aurei .

Caulis 6-10-pollicaris , adscendens , rubens . Folia in-
 feriora petiolata , superiora sessilia , profunde inci-

sa. Stipulae constanter integrae mihi visae (at Allionius l. c. de stipulis unidentatis loquitur). Corymbus terminalis sub-4-florus. Tota planta pilis longis albis obtecta.

P. recta Prod. Rom. Fl. p. 172. n. 577. differt: caule altiore, foliis non adeo incis: stipulis passim latere exteriore incisura una alterave, corymbo multifloro, floribus fere duplo majoribus; denique tota herba magis virenti, pilis rarioribus brevioribusque induta. - An hujus tantum varietas?

GEUM.

MONTANUM. *L.* Caule unifloro; foliis pinnatis, foliolo extimo maximo subrotundo, inferioribus sensim minoribus, stipulis ovato-acutis sub-integris, seminum aristis rectis villosis. *Savi Bot. Etr.* 2. p. 115.*

G. montanum. *W. Sp.* - *Pers. Ench.* 2. p. 57. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 306. - *Hoffm. Fl. Germ. ed.* 2. *T.* 1. *P.* 1. p. 238. - *DC. Syn.* p. 337. Caryophyllata montana. *Dod. Pempt.* 137. *C. major* rotundifolia. *Lob. ic.* 695.

In jugis subapenninis. *Sul Monte Calvo* (ex herb. Sebast.) Perenn. Floret Julio. Fl. aurei.

POLYANDRIA MONOGYNIA.

PAPAVER.

HYBRIDUM. *L.* Capsulis sulcato-torosis, hispidis, sub-globosis; caule hirsuto, pilis pedunculorum adpressis; foliis pinnatifidis, pinnis incis.

P. hybridum. *All. Fl. Ped.* n. 1064. - *W. Sp.* 2. p. 1144. - *Pers. Ench.* 2. p. 62. - *Smith Fl. Br.* 2. p. 555. * - *Hoffm. Fl. Germ. ed.* 2, *T.* 1, *P.* 1. p. 240. - *Savi Bot. Etr.* p. 151. * - *DC. Syn.* p. 368. Argemone capitulo brevior, hispido. *J. B. II.* 3. p. 396. *A.* capitulo hirsuto rotundo torulis canaliculato. *Moris. H.* 2. s. 3. t. 14. f. 9.

In incultis. *Sul Monte Mario nella Villa Mellini* ... Ann. Floret Aprili. Fl. punicea, antheris cyaneis.

SOMNIFERUM. *L.* Calycibus capsulisque glabris: foliis amplexicaulibus incis: glaucis. *Smith Fl. Br.* 2. p. 568. - *Pers. Ench.* 2. p. 62.

P. somniferum . *W. Sp. - Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 310. - *DC. Syn. p.* 368. *P. album sativum* . *Lobel. ic.* 172. - *Hort. Rom.* 4. t. 62.

Æ. Capsulis globosis , semine nigro .

P. nigrum sativum . *Dod. Penp.* 445. - *Hort. Rom.* 4. t. 63.

In incultis nunc sponte erraticum , ex hortis aufugum . *Offic. Papavero* . *Ann. Floret Junio* . Fl. albi vel triste rosei .

NYMPHAEA . *Char. Gen. Calix* 4 5 *phyllus* . *Petala pluri-*
ma multiplici serie . *Stigma radiatum sessile* . *Bac-*
ca multilocularis , *loculis polyspermis* .

LUTEA . *L. Foliis cordatis integerrimis* , lobis approxima-
tis ; calyce 5-phyлло petalis longiore ; stigmate in-
tegerrimo .

N. lutea . *All. Fl. Ped. n.* 1933. - *W. Sp.* 2. p. 1151. - *Smith Fl. Brit.* 2. p. 569. - *Pers. Ench.* 2. p. 63. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 311. - *DC. Syn. p.* 367. - *Hort. Rom.* 4. t. 99.

In stagnis . *Nelle Paludi pontine* . Perennis . *Floret*
Majo , Junio . Fl. lutei , super aquam exerti .

ALBA . *L. Foliis cordatis* , integerrimis , lobis imbricatis
rotundis ; calyce 4-phyлло petalis minore ; stigmate
lobato .

N. alba . *All. Fl. Ped. n.* 1934. - *W. Sp.* 2. p. 1152. - *Smith Fl. Br.* 2. p. 570. - *Pers. Ench.* 2. p. 63. - *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 311. - *DC. Syn. p.* 367. - *Hort. Rom.* 4. t. 100.

In stagnis . *Nelle Paludi pontine* superiore minus co-
piosam invenit praestantissimus geologus J. B. Broc-
chi , qui utramque mihi benevole communicavit . Pe-
renn. *Floret Majo , Junio* . Fl. candidi , super aquam
natantes .

POLYANDRIA TRIGYNIA .

ACONITUM . *Char. Gen. Calix nullus. Corolla irregula-*
ris 5-petala , *petalo superiore fornicato* . *Necta-*
ria plura , minima , squamulosa , bina superiora
elongata unguiculata sub galea recondita . *Capsu-*
lae 3 , seu 5 .

LYCOCTONUM. *L. Cuculli calcare spirali, galea conica elongata; foliis pubescentibus palmatis, lobis trifidis dentatis.*

*A. lycoctonum. All. Fl. Ped. n. 1498. W. Sp. 2. p. 1232. - Pers. Ench. 2. p. 83. - Loisel. Fl. Gall. 1. p. 319. Hoffm. Fl. Germ. ed. 2. T. 1. P. 1. p. 245. - DC. Syn. p. 420. - Savi Bot. Etr. 1. p. 155. **
A. l. vulgare luteo flore. Clus. H. 2. p. 94. A. luteum ponticum. Lob. ic. 677.

In nemoribus montanis Latii. Sulla Serra S. Antonio legit amiciss. Seb. Rolli. Perenn. Floret Julio. Fl. pallide flavi.

POLYANDRIA PENTAGYNIA.

HYPERICUM.

Ser. Floribus trigynis.

QUADRANGULUM. *L. Floribus trigynis; caule quadrangulo herbaceo; foliis pellucido-punctatis, nervosis; foliolis calycinis lanceolatis.*

H. quadrangulum. Smith Fl. Br. 2. p. 801. - Loisel. Fl. Gall. 2. p. 497. - DC. Syn. p. 411. H. quadrangulare. Syst. Veg. ed. 14. - W. Sp. 3. p. 1459. - Pers. Ench. 2. p. 89. - Hoffm. Fl. Germ. ed. 2. T. 1, P. 2, p. 102. - Savi Bot. Etr. 1. p. 177. **
Ascyron. Dod. Pempt. p. 78. - Matth. Valgr. 187.

In humentibus, secus fossas circa urbem, et in montibus. A Porta Angelica, Prata-lata, Fontana bella, etc. Perenn. Floret Julio. Fl. flavi.

DUBIUM. *Leers 195. Floribus trigynis: caule obsolete quadrangulo; foliis obtusis, impunctatis; foliolis calycinis ellipticis. Smith Fl. Br. 2. p. 802. - W. Sp. 3. p. 460. - Hoffm. Fl. Germ. ed. 2, T. 1, P. 2, p. 102. - Pers. Ench. 2. p. 89. - Loisel. Fl. Gall. 2. p. 498.*

H. dubium. DC. Syn. H. maculatum. All. Fl. Ped. n. 1488. t. 81. f. 1. H. delphinense. Vill. delph. 3. p. 497. t. 44.

In nemorosis, dumetis circa urbem praesertim frequens. Perenn. Floret Aprili-Junio. Fl. lutei, punctis nigris adpersi.

Foliola calycina obtusa, quae in *H. perforato* lanceolata, acuta, angustiora.

PERFOLIATUM. *L.* Floribus trigynis paniculato-cymosis; calycibus ciliato glandulosis: caule herbaceo, erecto, ancipiti; foliis pellucido-punctatis, nitidis, ovatis, basi amplexicaulibus, margine cartilagineo denticulatis.

H. perfoliatum. *W. Sp.* 3. p. 1462. - *Pers. Ench.* 2. p. 90. - *Smith Prod. Fl. Graec.* 2. p. 117. *H. ciliatum.* *Lam. Enc.* 4. p. 162*. - *W. Sp.* 3. p. 1463. - *Pers. Ench.* 2. p. 90.

β. Smith l. c. Foliis minoribus: cyma ampliori, floribus pedicellatis.

H. ciliatum β. *Lam. l. c.* *H. creticum* amplissimo folio nitido. *Tourn. cor.* 18.

H. dentatum. *Loisel. Fl. Gall.* 2. p. 499. t. 17. (macrior).

Var. *β* in agris maritimis. Copiose intorno a Civita-vecchia; presso Campo-Juni ... Perenn. Floret Majo, Junio. Petala flava punctis nigris.

Caulis basi adscendens, superne erectus, pedalis et ultra, glaberrimus, internodiis brevibus, alternatim leviter ancipitibus. Folia magnitudine varia; in exemplaribus nostris 1-sequi-pollicaria, 4-8 lineas lata (in specie bipollicaria) internodio longiora, opposita, basi sub-cordata, semi-amplexicaulia, nec connata; inferiora sub elliptica, integerrima, superiora sensim minus obtusa, ovata, ovato-acuta, quandoque ovato-lanceolata, margine cartilagineo scabro, vel plus minus denticulato, aetate sub-revoluto; omnia superne lutescenti viridia pulchre nitida, inferne pallidiora, opaca, punctis pellucidis perforata, juxta marginem saepius nigro-punctata. Panicula terminalis, cymosa, floribus, in varietate hac, pedicello etiam sesqui-lineari suffultis (in specie sessilibus). Calyces parvi, foliolis lanceolatis, ciliato-serratis, disco ciliisque nigro-glandulosis. Petala 5 lineas longa, patentissima, oblonga, flava, nigro-punctata.

H. dentatum cl. *Loiseleurii* Desl. tuto huc reducendum putavi: ex diagnosi enim et icone, est lu-

sus gracillimus speciei nostrae, cui folia internodio breviora, magis angusta, margine evidentius dentata, et cyma floribus paucioribus: caeterum res eadem.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

TEUCRIUM.

MONTANUM. *L.* Corymbis terminalibus glabris: foliis lanceolatis integerrimis, margine revolutis, subtus tomentosus: caule diffuso, lignoso.

T. montanum. *Schreb. Unilab.-DC. Syn. p. 220.-Savi B. Etr. 1. p. 162* . Bert. Amoen. Ital. p. 376. * Aju-ga folio integro. Rivin. Monop. irreg. 15.*

In montanis aridis. *Al Piglio...* legit amiciss. Rolli. Pereun. Floret Junio. Fl. albo-luteoli, antheris rubris.

SATURÆJA.

MONTANA. *L.* Calyce 10-striato, dentibus mucronatis, fauce pilosa pervia: foliis lineari-lanceolatis mucronatis: pedunculis axillaribus, solitariis, 4-6-floris, sub-secundis; bracteolis pedicello longioribus.

S. montana. W. Sp. 3. p. 44. - Pers. Ench. 2. p. 113. Loisel. Fl. Gall. 2. p. 344. - DC. Syn. p. 220.-Savi Bot. Etr. 2. p. 139. Tymbra flosculis candidis. Dod. Pempt. 288. Saxifraga secunda. Camer. Epit. 717.

In aridis, saxosis montium. *A Terni, a Feletino, etc.* Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. albo-purpureascentes.

Folia, bracteae, et calycis laciniae apice acutissimo.

NEPETA. Char. Gen. *Calix 5-fidus, fauce nuda. Corollae tubus longus, faux patens, labium superius emarginatum, inferius trilobum, lobis lateralibus brevissimis reflexis, medio majore crenato concavo.*

CATARIA. *L.* Pubescenti-mollis: florum cymis pedunculatis spicatim dispositis; foliis petiolatis, cordatis, dentato-serratis.

N. cataria. W. Sp. 3. p. 49.-All. Fl. Ped. n. 131.-Smith Fl. Br. 2. p. 608.-Pers. Ench. 2. p. 114.-

*Hoffm. Fl. Germ. ed. 2, T. 1, P. 2, p. 3. - Loisel. Fl. Gall. 2. p. 345. - DC. Syn. p. 221. - Savi Bot. Etr. 2. p. 155. * Cattaria herba. Dod. Pempt. 99. Mentha cattaria. J. B. H. 3. p. 225.*

In ruderatis, circa pagos montium frequens, et circa urbem *alla Fonte Egeria* . . . Perenn. Floret Julio. Flores albi, antheris violaceis. • Corollae calice-sque pubescentes.

THYMUS.

GRANDIFLORUS. Scop. Fl. Carn. Pedunculis axillari-bus 3-4 floris, bracteis lanceolatis sessilibus: foliis ovatis acutis, argute serratis. DC. Syn. p. 227.

Melissa grandiflora. L. - All. Ped. n. 137. - W. Sp. 3. p. 146. - Loisel. Fl. Gall. 2. p. 361. - Pers. Ench. 2. p. 132. Calamintha magno flore. Riv. Mon. 43.

In sylvis montium. *Sulla Serra S. Antonio* reperit pluries laudatus Seb. Rolli. Perenn. Floret aestate. Fl. purpurei.

Corollae calice duplo longiores. Pedunculi axillares sub-dichotomi, floribus grandiusculis, 2-6.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

OROBANCHE.

ELATIOR. W. Sp. 3. p. 349. Gaule simplicissimo; corollis quadrifidis; staminibus inferne pilosis; stylo superne glabriusculo; stigmate declinato, obcordato.

O. elatior. Sutton Act. Soc. Linn. Lond. 4. p. 178. t. 17. - Pers. Ench. 2. p. 181.

In agris *a Civitavecchia presso la porta Romana*. Perenn. Floret Majo. Fl. flavi, venulis rufescentibus.

Parasitica, ni fallor, radicum *Hedysari coronarii*. In exemplaribus a me collectis; tota planta flava, pedalis: spica densa; floribus leviter inflatis, limbo quadrifido, vix ampliato, nec reflexo, labii inferioris laciniis obtusis, intermedia majore; superioris apice retuso-emarginato: stamina pubescentia, inferne hirsuta. Germen glanduloso-puberulum, superne minus. Stigma grandiusculum, obcordato-bilobum, deflexum. Odor ingratus, fugax.

TETRADYNAMIA SILICULOSA .

IBERIS .

UMBELLATA . *L.* Herbacea : foliis lanceolatis acuminatis , inferioribus serratis , superioribus integerrimis , siliculis bicuspidatis , umbellatis .

I. umbellata . *W. Sp.* - *Pers. Ench.* 2. p. 187. - *Loisel. Fl. Gall.* 2. p. 399. - *DC. Syn.* p. 382. - *Savi Bot. Etr.* 2. p. 185. * *Draba* sive *arabi* aut *Thlaspi Candiae* . *Dod. Pemp.* 701.

In montosis subapenninis . *Sul Monte Calvo* (ex herb. Sebast.) Ann. Floret Junio . Fl. purpurei , vel rosei .

LEPIDIUM .

PETRAEUM . *L.* Canle folioso ; foliis pinnatis , foliolis integerrimis ; siliculis ovato-oblongis retusis . *Bert. Amoen. Ital.* p. 162. *

L. petraeum . *All. Fl. Ped.* n. 928. - *Smith Fl. Br.* 2. p. 681. - *W. Sp.* 3. p. 434. - *Pers. Ench.* 2. p. 187. - *Hoffm. Fl. Germ. ed.* 2 , T. 1 , P. 2 , p. 36. - *Loisel. Fl. Gall.* 2. p. 393. - *DC. Syn.* p. 380. - *Savi Bot. Etr.* 2. p. 177. *Cardamine pusilla saxatilis montana discoides* . *Column. Ecphr.* 1. p. 274. t. 273.

In petrosis . *Sul monte Catillo presso Tivoli* . Ann. Floret Martio . Fl. albi .

Planta pusilla , glabella . » . . . Petala alba , alter-
» nantia cum foliolis calycinis , iisdem angustiora ,
» sed longitudine aequalia , vix sensibilibiter emargi-
» nata . Antherae luteae . » *Bert. l. c.*

THLASPI .

NUDICAULE . *Desf. Atl.* 2. p. 67. Scapo nudo , simplicissimo ; foliis pinnatifidis : siliculis dissepimento semi-lanceolato .

Th. nudicaule . *DC. Syn.* p. 381. *Lepidium nudicaule* . *L.* - *W. Sp.* 3. p. 432. - *Pers. Ench.* 2. p. 187. - *Loisel. Fl. Gall.* 2. p. 392 . *Nasturtium minimum ver- num* , foliis tantum circa radicem . *Magn. Monsp.* 187. t. 186.

In montanis petrosis . *Sulla costa del Monte Soriano presso Bagnaja* . Ann. Floret Aprili . Fl. albi .

Siliculae apice emarginatae , altero latere planiusculae , ideoque dissepimentum semi-lanceolatum . Semina

subrotunda, non marginata, in quovis loculo bina. - Non confundenda cum *Iberide nudicauli* auctorum.

CAMPESTRE. *L. Incano* - pubescens: caule ramoso, foliis caulinis sagittatis, sub-dentatis: siliculis sub-rotundis, glanduloso-punctatis, superne marginatis.

Th. campestre. *All. Fl. Ped. n. 912.* - *Smith Fl. Br. 2. p. 684.* * - *W. Sp. 3. p. 444.* - *Pers. Ench. 2. p. 189.* - *Loisel. Fl. Gall. 2. p. 395.* - *Savi Bot. Etr. 2. p. 181.* - *Bertol. Amoen. Ital. p. 385.* Th. alterum. *Dod. Pempt. 700.* Th. vulgatus. *J. B. H. 2. p. 921.*

In aggeribus viarum: frequens a *Viterbo* . . . Bienn. Floret Majo. Fl. albi.

TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

SISYMBRIUM.

MURALE. *L. Sub-acaule*: foliis lanceolatis, sinuato-serratis, laeviusculis: scapis sub-scabris adscendentibus. *L. - W. Sp. 3. p. 496.* * - *All. Fl. Ped. n. 7002.* - *Pers. Ench. 2. p. 197.* - *Hoffm. Fl. Germ. ed. 2, T. 1, P. 2. p. 49.*

S. murale. *Smith Fl. Br. 3. p. 1401.* - *Loisel. Fl. Gall. 2. p. 408.* - *DC. Syn. p. 373.* - *Savi Bot. Etr. 2. p. 190.* - *Bertol. Amoen. Ital. p. 243.* *Eruca viminea iberidis folio, flore luteo. Barr. ic. 131.* *Eruca sylvestris major caule aspero. Zannich. Ven. p. 95. tab. 178.*

In muris, maceris: frequens ad ripas Tyberis . . . Ann. Floret Julio. Fl. lutei.

Caules basi sub-ramosi, superne nudi: siliquae sub-compressae, crassiusculae.

HESPERIS.

MARITIMA. *Lam.* Caule diffuso scabro; foliis ellipticis, sub-integris, obtusis, scabriusculis; petalis emarginatis. *DC. Syn. p. 372.*

H. maritima. *Pers. Ench. 2. p. 203.* *Cheiranthus maritimus. L. - W. Sp. - Loisel. Fl. Gall. 2. p. 413.* - *Sebast. Rom. Pl. Fasc. 2. p. 36.* *Leucoium minus flore violaceo. Barr. ic. 1127.*

In Amphitheatro Flavio semel. Ann. Floret Majo . Fl. purpureo-violacei .

BRASSICA . Char. Gen. *Calix connivens . Discus ovarii 4-glandularis . Siliqua teres , compressa , dissepimento parum producto subulato .*

ERUCA . *L. Siliquis stylo ensiformi rostratis , glabris : caule hirsuto ; foliis lyratis .*

B. eruca . All. Fl. Ped. - W. Sp. - Pers. Ench. 2. p. 207. - Loisel. Fl. Gall. 2. p. 420. - DC. Syn. p. 371. Eruca sativa . Dod. Pempt. 708. Sinapi alterum genus. Fuchs. H. 539 .

In rudertis , incultis . Vulgo *rughetta* . Ann. Floret Junio . Fl. albo-flavidi venis fuscis .

SINAPIS .

ARVENSIS . *L. Siliquis multangulis toroso-turgidis , rostro ancipiti longioribus : foliis ovatis , dentatis , inferioribus sub-lyratis .*

*S. arvensis . All. Fl. Ped. n. 957. - W. Sp. 3. p. 554. - Smith Fl. Br. 2. p. 721. * - Pers. Ench. 2. p. 207. - Hoffm. Fl. Germ. ed. 2 , T. 1 , P. 2 , p. 59. - Loisel. Fl. Gall. 2. p. 420. - Bert. Amoen. Ital. p. 166. - DC. Syn. p. 370. Irion. Fuchs. 257.*

In arvis . In villa Mellini , ai piedi del Monte Mario . . . Ann. Floret Majo . Fl. lutei .

Caulis sub-hispidus , rectus . Silique glabrae aut hispidae .

NIGRA . *L. Siliquis glabris , tetragonis , racemo adpressis : foliis radicalibus lobato-pinnatifidis , dentatis , scabris : summis lineari-lanceolatis , integerrimis , glabris .*

S. nigra . All. Fl. Ped. n. 959. - W. Sp. 3. p. 555. - Smith Fl. Br. 2. p. 722. - Pers. Ench. 2. p. 207. - Hoffm. Fl. Germ. ed. 2 , T. 1 , P. 2 , p. 59. - Loisel. Fl. Gall. 2. p. 421. - DC. Syn. p. 370. Sinapi siliqua latiuscula glabra , semine ruffo s. vulgaris . J. B. H. 2. p. 855.

In agris , praesertim ab occidente urbis frequens . *Alla Magliana , a Mezzo-cammino , Ostia , etc.* Vulgo et off. *Senapa* . Ann. Floret Junio , Julio . Fl. lutei , parvi .

MONADELPHIA POLYANDRIA .

LAVATERA .

ARBOREA . *L.* Caule altissimo , bienni : foliis alternis cordato-sub-rotundis , 7 angularibus , plicatis , pubescentibus : pedunculis confertis , unifloris .

L. arborea . *W. Sp.* 3. p. 793. - *Pers. Ench.* 2. p. 252. - *Loisel. Fl. Gall.* 2. p. 433. - *DC. Syn.* p. 405. - *Savi Bot. Etr.* 2. p. 74. * *Malva arborescens. Dod. Pempt.* 658. *Malva arborea. Camer. Epit.* 239. - *J. B. H.* 2. p. 952.

In semita quae ducit alla Grotta di Nettuno a Tivoli : an eo loco spontanea ? Bienn. Floret Majo. Fl. purpurei , striis saturatoribus .

DIADELPHIA DECANDRIA .

ONOBRYCHIS . Char. Gen. *Calix 5-fidus ; carina transverse obtusa ; alae brevissimae . Legumen compressum , breve , uniloculare , monospermum , saepius aculeis hirtum , sutura superiore complanatum et truncatum .*

CAPUT-GALLI . *All. Fl. Ped.* n. 1192. Foliis pinnatis , foliolis oblongo-obovatis ; capitulis paucifloris ; calycibus ciliatis corollam subaequantibus : leguminibus pubescentibus , cristatis , echinatis , spinis subulatis .

O. Caput-galli . *DC. Syn.* p. 365. *Hedysarum Caput-galli. L. - W. Sp. - Pers. Ench.* 2. p. 324. - *Loisel. Fl. Gall.* 2. p. 470. O. sive Caput galli minus , fructu maximo insigniter echinato . *Triumf. Obs.* 65.

In arvis , ad vias circa Civitavecchia , Corneto frequens. Ann. Floret Majo . Fl. rosei .

Caulis diffusus , procumbens , rarius erectus .

VICIA .

Ser . A . Floribus racemosis .

GERARDI . *Jacqu. Aust.* 3. t. 229. Pedunculis multifloris folio brevioribus ; foliis multijugis , foliolis ovato-oblongis obtusis inermi-mucronulatis , stipulis semisagittatis integerrimis . *Savi Bot. Etr.* 2. p. 253. * (sub *V. cassubica*) .

V. Gerardi. *All. Fl. Ped. n.* 1137. - *DC. Syn. p.* 359.
 V. cassubica. *W. Sp. 3. p.* 1096. - *Pers. Ench. 2.*
p. 306. - *Loisel. Fl. Gall. 2. p.* 459. V. cassubica .
 L? V. multiflora. *Pollich. Pal.*

In sylvaticis. *Sul Tuscolo* invenit et comm. benevo-
 le Excellentiss. Dominus Carolus Luciano-Bonaparte
 e Principibus Canini. Perenn. Floret Junio. Fl. ve-
 xillo purpureo-violaceo, carina et alis apice rubris.
 Folia multijuga pubescentia.

Ser. B. Floribus axillaribus sessilibus,
 vel pedunculo simplicibus.

LUTEA. L. Leguminibus sessilibus, solitariis, reflexis, pi-
 loso-hispidis; foliolis oblongis, retusis acutisve,
 mucronatis, pilosis; stipulis coloratis; vexillo glabro.

V. lutea. *All. Fl. Ped. n.* 1203. - *W. Sp. 3. p.* 1107. -
Smith Fl. Br. 2. p. 77. *-*Hoffm. Fl. Germ. ed. 2,*
T. 1, P. 2, p. 81. - *Pers. Ench. 2. p.* 308. - *Loisel.*
Fl. Gall. 2. p. 462. - *DC. Syn. p.* 360. - *Savi B.*
Etr. 2. p. 255. V. flore ochroleuco, siliquis hir-
 sutis propendentibus. *Moris. H. 2, p.* 62, s. 2,
t. 21, f. 5.

Ad sepes, margines frequens in montosis, et circa
 urbem. Ann. Floret Junio. Fl. sulphurei.

PIMPINELLOIDES. Nob. (*Rom. Pl. Cent. XIII. tab. 1.*)

Leguminibus sessilibus sub-solitariis: foliolis inci-
 so-crenatis, superioribus integerrimis.

Ad Albano nella Galleria di sotto di Castel Gan-
 dolfo, e nella Macchia di Marino. Ann. Floret
 Aprili, Majo. Fl. rubro-violacei.

Caules simplices, scandentes, 2-6-pedales, tetragoni,
 sulcati, glabriusculi, inanes. Folia 4-5-juga, pe-
 tiolo communi supra canaliculato, laete viridia,
 sub-hirsuta: foliola elliptica, apice retuso mucro-
 nata, inferiora grosse profunde inaequaliter crenata,
 superiora sensim minus incisa, summa angustiora
 integerrima. Stipulae semi-hastatae, notatae, laci-
 nia inferiore bifida aut dentata, ad axillas flori-
 feras sub-nulla. Flores solitarii, interdum gemini,
 erectiusculi, pedunculo brevissimo. Calix camp-
 anulatus, nervosus, quinque-costatus, dentibus elon-
 gatis lanceolato-acuminatis sub-conformibus, ciliatis

corolla paullo brevioribus. Corolla rubro-violacea, demum caerulea. Legumina erecta, oblonga, glabra, polysperma. Semina laevia, compresso-rotundata.

TRIFOLIUM.

§. Tr. ebracteata. Ser. C. Calyce piloso, margine integro, dentibus inaequalibus.

MEDIUM. *L.* Caule erectiusculo, flexuoso, ramoso; stipulis glabris, cauda longa triangulo-acuminata ciliata: capitulis sub-globosis laxiusculis; dentibus calycinis sub-pilosis, flexilibus, inaequalibus, carina brevioribus.

*T. medium. Smith Fl. Br. 2. p. 786. - W. Sp. 3. p. 1367. - Hoffm. Fl. Germ. ed. 2, T. 1, P. 2, p. 95. - Loisel. Fl. Gall. 2. p. 482. - DC. Syn. p. 347. - Savi Obs. in Trif. n. 51. - Bert. Amoen. Ital. p. 177. * T. flexuosum. Jacqu. Aust. t. 386. - All. Fl. Ped. 1105. - Pers. Ench. 2. p. 350.*

In calcareis montibus Latii. Presso Feletino legit amicissimus meus Sebastianus Rolli pluries commendatus. Perenn. Floret Junio. Fl. purpurei.

Folia lanceolato-obtusa, glabra, stricto-venosa, superius maculis binis lunulatis saepe notata, inferne glancescentia, margine ciliata sub-denticulata. Corollae calyce longiores, alis vexillum sub-aequantibus, carinam paullo excedentibus.

§. Tr. bracteata. Ser. c. Calyce immutato, nervoso: corolla immutata, vexillo non sulcato.

SUFFOCATUM. *L.* Caule procumbente: capitulis axillari-bus sessilibus, sub-rotundis; dentibus calycinis subaequalibus, acutis, recurvis, corolla longioribus: leguminibus dispermis.

*T. suffocatum. Smith Fl. Br. 2. p. 790. - W. Sp. 3. p. 1378. - Pers. Ench. 2. p. 351. - Loisel. Fl. Gall. 2. p. 485. - DC. Syn. p. 347. - Bivon. Sic. Cent. 2. p. 69. - Savi Obs. in Trif. p. 96. * T. minimum flosculorum et seminum globulis plurimis confertim ad radicem nascentibus. Raii. H. 1. p. 942. T. arvense supinum verticillatum. Barrel. Obs. 828. ic. 882.*

In siccis circa urbem non infrequens. *Alla Caffarella, a Tor di Quinto, all' Arsenale di Porta Portese, etc.* Ann. Floret Aprili-Junio. Fl. albi. Cito distinguendum foliorum petiolis longissimis; caulibus prostratis, brevibus, caespitosis, glabris; corollis in tubo calycis latentibus.

MEDICAGO.

Ser. B. Leguminibus cochleatis; spiris pluribus, glabris, inermibus.

ORBICULARIS. *L. Fl. Rom. Prod. p. 260. n. 936.*

β. Leguminibus amplis pubescentibus.

A Corese in margine agrorum. Floret Junio.

A specie differt leguminibus 8 g lineas latis, pubescentibus; caeterum plane similis.

Ser. D. Leguminibus cochleatis; spiris pluribus, glabris, spinosis.

LITTORALIS. *DC. Fl. Fr. 5. p. 568.* Pedunculis 2-4-floris: leguminibus glabris cochleatis, sub-cylindricis, utrinque planis; anfractibus approximatis, aculeis raris distichis; stipulis sub dentatis; foliolis pubescentibus, cuneato-obcordatis, apice serrulatis.

α. Longiseta. *DC. l. c.* Aculeis longis sub-arcuatis. uncinatis: pedunculis subbifloris.

M. arenaria. Tenor. Syn. Novar. Pl. n. 142.

In littoribus arenosis maris nostri vulgaris varietas haec *longiseta*. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. lutei.

Herba incano-pubescent caulibus prostratis, diffusis.

Stipulae dentato-laciniatae. Pedunculi folio sub-breviores. Legumina glabra, anfractibus quaternis; aculeis subulatis, raris, in varietate hac sesquilineam etiam longis, primo rectiusculis, dein arcuato divergentibus, apice uncinatis. In *M. littorali* Loisel. Desl. Notic. p. 118. (quae speciei typus) aculei breves, ideoque sub varietate β *breviseta*. DC.

APICULATA. *W. Sp. 3. p. 2414.* * Pedunculis multifloris: leguminibus cochleatis, utrinque planis; anfractibus tribus reticulatis, marginè duplici papillarum ordine muricatis; stipulis ciliato-dentatis; foliolis obcordatis, apice denticulatis.

M. apiculata. Pers. Ench. 2. p. 357.-Loisel. Fl. Gall. 2. p. 494.-DC. Syn. p. 351.

In herbidis , ad margines viarum prope Amph. Flavium . Ann. Floret Majo . Fl. lutei .

Pedunculi 3-6-flori . Legumen grosse reticulatum glabrum , marginis sutura prominula , papillis acutiusculis hinc inde insidentibus . Foliola obovato-cuneata , minus retusa , denticulata , ad basim integerrima .

SYNGENESIA POLYG.-ÆQUALIS .

PRÆNANTHES .

PURPUREA . *L.* Caule erecto ; foliis lanceolato-oblongis , sub-denticulatis , subtus glaucis , basi dilatatis , cordatis , amplexicaulibus : paniculis nutantibus ; pappo sessili .

P. purpurea. *All. Fl. Ped. n. 827.-W. Sp. 3. p. 1534.-Pers. Ench. 2. p. 365.-Hoffm. Fl. Germ. ed. 2, T. 1, P. 2, p. 111.-Loisel. Fl. Gall. 2. p. 511. -DC. Syn. p. 356.-Savi Bot. Etr. 3. p. 110. ** *Sonchus montanus purpureus tetrapetalos. Column. Ecphr. 1. p. 244. t. 246. Sonchus laevior Pannonicus quartus purpureo flore. Clus. H. 2. p. 147.*

In editiorum montium umbrosis . *Alla Serra S. Antonio* legit amic. Rolli . Perenn. Floret Junio , Julio . Fl. purpurei .

CREPIS .

NEGLECTA . *L. Mant. 107.-Smith Prod. Fl. Graec. 2. p. 137.-Bertol. Amoen. It. p. 39. **

C. stricta . Prod. Fl. Rom. p. 271. n. 965. C. stricta . Scop. Carn. t. 47.-Loisel. Notic. p. 122.-Bertol. R. It. Pl. Dec. 3. ed. 1. p. 34.-Savi Bot. Etr. 3. p. 130.

HYPOCHÆRIS .

BALBISII . *Loisel. Desl. Notic. 124. ** Foliis obovato-oblongis dentatis , hispidis : scapis unifloris , squamosis : calicibus glabris ; pappis omnibus stipitatis aequalibus .

H. minima. Balb. Misc. alt. 29.

In collibus sterilibus circa urbem non rara . *Al Pigneto di Bichi , alla Valle dell' Inferno . . . Ann. floret Aprili . Fl. lutei.*

Plantula 1-4-pollicaris ; calice glabro , seminibus superne hispidis , singulis pappo stipitato plumoso .

CNICUS .

SYRIACUS . *W.-Prod. Fl. Rom. p. 282. n. 1017. t. 8.*

β. Floribus albis .

Promiscue cum specie undique luxuriat varietas haec in arvis et viis circa Centumcellas (*Civitavecchia*) florens Majo , Junio .

SYNGENESIA POLYG. - SUPERFLUA .

GNAPHALIUM .

RECTUM . *Smith Fl. Br. 2. p. 370. * Caule erecto , simplici , racemoso , multifloro : foliis lanceolato-linearibus , subtus tomentosis , supra denudatis .*

Gn. rectum . *W. Sp. 3. p. 1885. -Loisel. Fl. Gall. 2. p. 558. - Hoffm. Fl. Germ. ed. 2, T. 1, P. 2, p. 138 - Savi Bot. Etr. 3. p. 151. -Bertol. Amoen. Ital. p. 406* . Gn. sylvaticum . Scop. Carn.-All. Fl. Ped. n. 629. -Pers. Ench. 2. p. 421. Gn. sylvaticum β. DC. Syn. 278. Gn. rectum . J. B. H. 3. p. 160. Pseudo-leontopodium Matthioli . Dalech. H. p. 1344.*

In montanis Latii . Perenn. Floret Augusto . Fl. pallide flavicantes , squamis calicinis apice incarnato-fuscis .

» Racemus nunc brevissimus , nunc praelongus , compositus ex aliis racemulis brevissimis , axillaribus , inferioribus folio florali longe brevioribus . . . » *Bert. c. l.* Speciem hanc pro varietate *Gn. sylvatici* L. habent plurimi : folia in hac superius plus minus denudata diversitatem praecipuam constituunt .

FILAGO .

ARVENSIS . L. Albo-lanuginosa , mollissima : caule herbaceo paniculato ; foliis oblongo-lanceolatis : floribus congestis lateralibus terminalibusque .

F. arvensis . *Pers. Ench. 2. p. 422. Gnaphalium arvense . All. Fl. Ped. n. 631. -W. Sp. 3. p. 1897. -Hoffm. Fl. Germ. ed. 2. T. 1. P. 2. p. 139. -Loisel. Fl. Gall. 2. p. 559. -DC. Syn. p. 278.*

In arenosis montium, et ad Tyberis ripas circa urbem.
Floret Junio, Augusto. Fl. sordide straminei.

BELLIS.

ANNUA. *L.* Caule sub-simplici, sub folioso; foliis ovalibus obtusis, apice crenulatis. *DC. Syn. p.* 287. *-Sebast. Rom. Pl. Fasc. 2. p.* 29.

B. annua. All. Fl. Ped. W. Sp. 3. p. 2122. *-Pers. Ench. 2. p.* 460. *-Loisel. Fl. Gall. 2. p.* 578. *B. minima pratensis, caule folioso. Bocc. Mus. 2. p.* 96. *t. 35. B. leucanthemum annuum italicum. Mich. N. Pl. G. 34. B. annua minima. Triumf. obs. 82. cum ic.*

In pratis, agris requietis copiose. Ann. Floret Februario-Majo. Fl. radio albo disco luteo.

Pappus nullus. Semina compressa, margine apicem nudum versus scabra. Triumphetti synonymon huc certe referendum, nec ad *Bellium bellidioides*.

CENTAUREA.

Ser. *G.* Calicinis squamis margine laceris, vel ciliatis, vel serratis.

SCABIOSA. *L.* Calycinis squamis ciliatis pubescentibus: panicula sub-corymbosa: foliis scabriusculis pinnatifidis; laciniis lanceolatis, patentibus, mucronulo terminatis, inferiorum summis basi sub-lobatis.

C. scabiosa. All. Fl. Ped. n. 583. -W. Sp. 3. p. 2296. *-Pers. Ench. 2. p.* 484. *-Loisel. Fl. Gall. 2. p.* 595. *DC. Syn. p.* 271. *Scabiosa major. Matth. Valgr. 969.*

In montanis petrosis. Inter saxa in montibus circa *Feletino* reperit amiciss. Rolli, qui mihi communicavit. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. purpurascens.

In speciminibus meis spontaneis et hortensibus, calyces constanter basi pubescentes, squamis margine nigris pectinato-ciliatis; folia scabra laciniis lanceolatis obtusiusculis mucronulo terminatis; radicalia laciniis nonnullis superioribus basi lobo uno alterove adjecto.

CINERARIA. *W. Sp. 3. p.* 2293. Calicinis squamis ciliatis: foliis bipinnatifidis, utrinque niveo-tomentosis; laciniis lineari-lanceolatis obtusis.

C. cineraria . *All. Fl. Ped. n.* 582.-*Pers. Ench.* 2. p. 483. *C. candidissima* . *Lam. Enc.* 1. p. 662. *Jacea montana candidissima* *Stoebe foliis* . *C. B. P.* 272.-*Moris. H.* 3, p. 141, s. 7, t. 26, f. 2.-*Raii H.* 329. *Stoebe tenuifolia incana* maguo capite *italica* . *Barr. Obs.* 953. *ic.* 348.

In rupium fissuris , ad viarum margines frequens circa Terracinam . Perenn. Floret Aprili, Junio . Fl. rosei . Folia in speciminibus meis constanter bipinnatifida , utrinque tomento candido obdusa , subtus densiore . Barrelierius cujus icon citata recte refert, alii-que antiqui auctores cum *Jacea* spe consociant *Jaceam cinerariam laciniato flore purpureo* *Triumfetti nostri* (*Obs.* p. 72) . Et revera Auctor hic plantam suam non procul a nostrae loco natali invenisse fatetur cum de radicibus *Circelli montis* loquatur . Huc autem tuto referre visum non est ; nam ejus icones et descriptio cum exemplaribus dicto loco lectis , mihi-que a pluribus amicorum allatis non quadrant . *Triumfettus* certe proponit plantam foliis inferioribus tantum pinnatifidis , superioribus indivisis , quibus characteribus cl. *Lamarckius* in *Enc. T.* 1. p. 662. speciem distinctam sistit nomine *C. cinereae* . Nonne ex his eruendum potius *C. cineream* *Lam.* nil aliud forsitan esse , quam lusum *C. cinerariae* , easque sub una eadem-que specie cum *Linnaeo* recensendas ?

Ser. E. Calycinis squamis spina simplici terminatis .

SALMANTICA . *L.* Calycibus sub-globosis , squamis glabris setula brevi recurva terminatis ; foliis serratis ; radicalibus lyratis , caulinis lanceolatis , summis linearibus .

C. salmantica . *W. Sp.* 3. p. 2325.-*Pers. Ench.* 2. p. 488. - *Loisel. Fl. Gall.* 2. p. 499.-*DC. Syn.* p. 273.-*Bivon. Sic. Cent.* 2. p. 21. *Stoebe salmantica prima* . *Clus. H.* 2. p. 9.

Romae in muris quibusdam in *Via di Porta S. Pancrazio* . An e veteri Horto Archigymnasii proxime sito aufuga , nec indigena ? Perenn. Floret Julio . Fl. albi .

GYNANDRIA DIANDRIA .

OPHRYS .

SPECULUM . *Bertol. Pl. Gen.* 124. Labio indiviso , subelliptico elongato , villosus , sursum incurvus , apice emarginato , appendicula minima interjecta , antice macula ampla glabra nitida .

- O. speculum . *Bert. Amoen. Ital. p.* 201. *-*Bivon. Sic. Pl. Cent.* 1. p. 61. t. 3. *-*Loisel. Notic. p.* 133. O. ornuciflora , fuliginea , clunicula depilata fusca . *Cup. Hort. Cath. p.* 158, *Suppl. alt. p.* 68, et *Panph. Sic.* 1. tab. 175. - *Benann. t.* 28.

A Tivoli sul Monte Catillo. Perenn. Floret Majo . Bulbi sub-rotundi . Caulis 6-12-pollicaris , foliosus . Folia ovato-lanceolata , striata , viridia . Bractee foliaceae flore longiores . Flores 4-7 in spica laxiuscula . Petala rosea , patentia , lanceolata ; duo interiora duplo fere breviora , basi sub-cordata , margine revoluta , intensius colorata . Labium atro-sanguineum , villosum , integrum , convexum , subellipticum ; ultra medium attenuatum , dorso depressum , et macula glabra nitida , grandiuscula , pallidiore , albidomarginata notatum ; antice sursum inflexum , apice leviter emarginatum appendicula minuta sursum versa interjecta . Columna porrecta , labio duplo brevior , rostrata , viridis , dorso lurido .

- CRABRONIFERA . *Nob. (Rom. Pl. Cent. XXIII. tab.* 2. f. 1.) . Labio indiviso , rotundato , convexo , villosus , apice retuso , appendicula lanceolata sursum versa interjecta ; dorso macula glabra , reniformi , transversa .

Nella Macchia di Marino presso la Cappelletta. Perenn. Floret Aprili ad finem .

Bulbi sub-rotundi . Caulis pedalis , foliosus . Folia ovato-lanceolata , striata , viridicinerascentia . Bractee foliaceae germinis longitudine . Flores 2-3 in spica laxiuscula . Petala rosea , patentia , lanceolata ; duo interiora duplo breviora , margine undulata . Labium pullum , villosum , convexum , late obovatum , rotundatum : labii dorsum circa ortum magis villosum , in centro macula glabra , pallidiore , re-

niformi medio attenuata, transversali notatum: labii latera deflexa, margine obscure angulata, utrumque notatum macula minuta, pallidiore, glabra, triangulari, aetate evanida: labii apex levissime retusus, cuspidate flavescenti sursum versa terminatus. Columna rostrata, labio duplo brevior flavescenti, dorso sordide virenti.

HIULCA. *Nob. (Rom. Pl. Cent. XIII. tab. 2. f. 2).*

Labio trilobo; lobis lateralibus villosis, triangularibus, deflexis; medio puberulo, obovato, convexo, margine utrinque unidentato, apice truncato transversim fissus.

Nei colli al Settentrione del Monte Mario, e nella Villa Pamfili . . . Perenn. Floret Aprili.

Bulbi sub-rotundi, alter remotus. Caulis 3-6-pollicaris, foliosus. Folia lanceolata, striata, pallide viridia. Bracteae foliaceae germine breviores. Flores 1-4 in spica laxiuscula, subpedunculati, supini. Petala 3 exteriora patenti-divaricata, ovata, ochroleuca, linea dorsali viridi; bina interiora triplo breviora, cordato-lanceolata, margine revoluta, luteo-virentia. Labium fusco-violaceum; ad basim fovea grandi, fauce cordata marginata, margine surrecto utrinque tridentato; ultra basim trilobum; lobis lateralibus deflexo-pendulis, villosis, sub-triangularibus, acutis; medio puberulo, obovato, convexo, dorso obsolete tricarinato, circa basim nitidulo, margine anterieus hinc et inde uni-dentato, inter dentes truncato, et transversim horizontaliter fissus; fissurae labris hiantibus, inferiore concavo apice nonnihil porrecto sursum inflexo. Columna minuta, obtusa, rufula, linea media viridi.

MONOECIA MONANDRIA.

NAJAS.

MINOR. *All. Fl. Ped. n. 216.* Caule dichotomo, inermi: foliis oppositis ternisve, amplexicaulibus, lineari-subulatis, recurvis, aculeato-dentatis; summis fasciculatis: calice nullo.

N. minor. *Roth Germ.* 2. p. 500. - *Loisel. Fl. Gall.* 2. p. 651. - *DC. Syn.* p. 119. *Caulinia fragilis.* *W. Sp.* 4. p. 182. *Fluvialis minor.* *Hoffm. Fl. Germ. ed.* 2. T. 1, P. 2, p. 251. - *Pers. Ench.* 2. p. 530. *F. minor foliis angustioribus denticulatis, deorsum reflexis, fructu acuto, tenuiori, monospermo.* *Mich. N. Pl. G.* 11. t. 8. f. 3.

In lacubus et fluminibus. *Nel lago di Villa Pamfili, etc.* Ann. Floret Julio, Augusto.

MONOECIA DIANDRIA.

LEMNA.

GIBBA. L. Foliis ellipticis, subtus bullato-convexis, basi cohaerentibus, radicibus solitariis. *W. Sp.* 4. p. 194. *Pers. Ench.* 2. p. 532. - *Loisel. Fl. Gall.* 2. p. 624. - *DC. Syn.* 119.

Lenticularia palustris major, inferne magis convexa, fructu polyspermo. *Mich. N. Pl. G.* 15. t. 11. f. 3.

In aquis segnis ad superficiem frequens. Perenn. Floret Majo-Julio.

MONOECIA TRIANDRIA.

TYPHA.

ANGUSTIFOLIA. L. Foliis linearibus, semicylindricis: spica mascula femineaeque remotis, utraque cylindrica.

T. angustifolia. All. Fl. Ped. n. 2349. - *W. Sp.* 4. p. 198. - *Smith Fl. Br.* 3. p. 959. - *Pers. Ench.* 2. p. 533. *Hoffm. Fl. Germ. ed.* 2, T. 1, P. 2, p. 250. - *Loisel. Fl. Gall.* 2. p. 625. - *DC. Syn.* p. 148. *T. palustris media. Moris. H.* 3, p. 246, s. 8, t. 13, f. 2.

In stagnis, rivulis. *Nella Valle dell' Inferno; presso Civitavecchia, etc.* Perenn. Floret Julio.

Folia hinc convexiora, illinc sub-canaliculata, quam in *T. latifolia* paullo angustiora. Spicae intervallo sub-pollicari discretae.

AREX.

§. 1. Spicis androgynis.

Ser. A. Spicis pluribus androgynis superne masculis, stigmatibus 2.

DIVISA. *Gooden. Trans. of the Linn. Soc. 2. p. 157. n. 12. t. 19. f. 2.*

C. cuspidata. *Bertol. Rar. Lig. Pl. Dec. 1. p. 25. - Fl. Rom. Prod. p. 322. n. 1135. (cujus synonymis sequentia addenda).*

C. divisa. *Smith Fl. Br. 3. p. 973. - Schkuhr Car. n. 61. - W. Sp. 4. p. 33. - Pers. Ench. 2. p. 538. - Loisel. Fl. Gall. 2. p. 630. - DC. Syn. p. 139. - Bivon. Sic. Pl. Cent. 1. p. 24. - Bert. Amoen. It. p. 72.**

C. splendens. *Pers. Ench. 2. p. 536. (fide Bert.)* C. schoenoides. *Host. Aust. 1. p. 35. t. 45. (fide specim. a Bertol. observ.) - Hoffm. Fl. Germ. ed. 2. T. 1. P. 2. p. 193. - W. Sp. 4. p. 226. - Pers. Ench. 2. p. 537.*

Statura plurimum variat: sed radix constanter lignosa, tortuosa, repens, et fructus hinc valde convexus, illinc planus adpressus.

Ser. C. Spicis pluribus androgynis superne masculis: stigmatibus 3.

GYNOMANE. *Bert. Rar. It. Pl. Dec. 2. Spiculis lineari-subulatis, alternis, floribus foemineis laxis: capsulis binervibus, utrinque attenuatis sub bifidis, latere interiore canaliculatis.*

C. gynomane. *Bert. Amoen. It. p. 83. * - Savi Bot. Etr. 2. p. 32. * - DC. Fl. Fr. 6. p. 289. C. tuberosa. Loisel. Fl. Gall. 2. p. 629. - Pers. Ench. 2. p. 536. C. Linckii? Bivon. Sic. Cent. 2. p. 17. C. nemorosa angustifolia, etc. Mich. N. Pl. Gp. 66, O. 2, t. 33. f. 2. (mala).*

In umbrosis sylvaticis etiam circa urbem. Copiose ad Albano nella Galleria di sotto di Castel Gandolfo, etc. Perenn. Floret Martio-Majo.

Radix fibrosa. Culmi 4-12-pollicares tenues, triquetri, debiles, inferne foliosi; foliis linearibus, angustis, vaginantibus. Bractee foliaceae, inferior longissima. Spiculae 2-5, alternae, strictae, lineari-subulatae, androgynae, sessiles, infima saepe brevi-pedunculata, floribus foemineis laxioribus. Capsulae in quavis spi-

cula paucae, laxae, maturae gluma breviores, glabrae, triquetrae, utrinque attenuatae, latere inferiore canaliculato-cavae, dorso obtuse carinatae, hinc inde nervo saturatius virente prope marginem Stigmata 3.

» Ulterius inquirendum quantum *C. gynomane* differat a *C. Linckii* W. Sp. 4. p. 223. » *Bert. l. c.*

§. 2. Spicis sexu distinctis.

Ser. Spicis plurib. sexu distinctis. Stigm. 3.

Fructu pubescente aut villosa.

ALPESTRIS. *All. Fl. Ped. n.* 2329. Spica mascula solitaria; foemineis tribus sub 5 floris; binis approximatis sessilibus; infima radicali, longissime pedunculata: fructibus pyriformibus sub-glabris, brevissime rostratis, ore obliquo.

*C. alpestris. W. Sp. 4. p. 284. - Savi Bot. Etr. 1. p. 106. * - Bertol. Amoen. Ital p. 207. - C. gynobasis. Vill. Delph. 2. p. 206. (excl. syn.) - Schkuhr Caric. p. 71. - Hoffm. Fl. Germ. ed. 2, T. 1, P. 2, p. 213. * - Pers. Ench. 2. p. 543. - Loisel. Fl. Gall. 2. p. 647. - DC. Syn. p. 142. - Bivon. Sic. Pl. Cent. 1. p. 26. C. diversiflora. Host Gr. Aust. 1. p. 53. t. 70. C. rhizantha. Gmel. Syst. Veg. 144. C. n. 1385. Hall. App. 2. ad Scheuchz. Agr. p. 43. n. 14.*

In sylvaticis, umbrosis. *Sul Monte Mario, etc.* Perenn. Floret Martio, Aprili.

Culmi plures ex eadem radice, basi tantum foliis induti, superne aphylli, palmares, tenues, debiles. Folia linearia, culmum et pedunculos radicales basi vaginantia. Spica mascula lineari-lanceolata terminalis, quandoque basi flore uno alterove capsulifero adjecto. Spicae foemineae caulinae duae (interdum unica, vel nulla), altera spicae masculae proxima, altera parum remota, sub-sessiles, pauciflorae, bractea foliacea brevi auriculis spadiceis ad basim suffultae. Spiculae radicales foemineae, unica vel plures, pauciflorae, pedunculo longo nudo et folii vagina exerto. Squamae ovato-oblongae, acutae, badiae dorso virides, margine scariosae. Fructus obscure triquetri, obovati, sub lente nonni-

hil villosi , rostro brevi obtuso integro terminati .
Stigmata 3.

Ser.B. Spicis pluribus sexu distinctis . Stigmatibus 3.

Fructibus glabris , vel ad angulos tantum
ciliato-scabris .

STRIGOSA . *Good. Caric. Angl.* Spica mascula solitaria ;
foemineis quaternis , filiformibus , pendulis , distan-
tibus , inferioribus exerte pedunculatis ; fructibus
laxiusculis oblongis , utrinque attenuatis nervosis ;
ore oblique truncato , squama ovato-lanceolata lon-
gioribus .

C. strigosa . Smith Fl. Br. 3. p. 982. - Schkuhr Caric.
p. 94. - W. Sp. 4. p. 289. - Hoffm. Fl. Germ. ed. 2 ,
T. 1 , P. 2 , p. 227. - Loisel. Fl. Gall. 2. p. 643. -
*Savi B. Etr. 2. p. 36. * - DC. Syn. p. 144. C. leptos-*
tachys . L. fil. Suppl. - Pers. Ench. 2. p. 544.

In sylvaticis , humidis . *Sul Monte Mario , nella Vil-*
la Borghese Perenn. Floret Martio , Aprili .

Radix fibrosa . Culmus foliosus , gracilis , acutangulus ,
sub-2-pedalis . Folia latiuscula , margine et carina
scabra . Spiculae 6 8. Masculae terminalis , linearis ;
rarius plures : foemineae filiformes , muticae , remo-
tae , pedunculatae , primo erectae , mox pendulae ,
floribus laxiusculis ; superiores pedunculis maxima
parte vaginis bractearum vestitis ; inferiores pedun-
culo exerto . Squamae pallide virescentes , in flo-
ribus masculis lanceolatae , in foemineis ovato-acu-
tae . Capsula oblongo-triquetra , pallide virescens ,
utrinque attenuata , apice oblique truncato termi-
nata , squamam excedens . Stigmata 3.

MONOECIA TETRANDRIA .

PARIETARIA .

LUSITANICA . *L. Procumbens* , ramis confertis ; foliis utrin-
que opacis , hirsutis , ovatis , apice obtusis : glome-
rulis trifloris ; calycibus sub-conformibus .

P. lusitanica . W. Sp. 4. p. 955. - Pers. Ench. 2. p. 555. -
Loisel. Notic. p. 144. - Roem. et Sch. Syst. Veg. 3.
*p. 467. * P. alsines folio sicula . Bocc. rar. 47. t. 24.*
f. B. P. lusitanica annua minima . Tourn. Inst. 509.

Ad muros, urbis mœnia frequens. Abunde *sulla scala della Trinità de' monti*, etc. Lapidis Tiburtini (vulgo *travertino*) fessuras diligit. Ann. Floret a Februario ad Junium. Fl. herbacei.

MONOECIA POLYANDRIA.

CERATOPHYLLUM. Char. Gen. *Calix multipartitus. Corolla nulla. Fl. masc. Stamina 14-20 brevissima, antheris tricuspidatis. Fem. Pistillum 1, stylo filiformi. Nux monosperma.*

DEMERSUM. *L.* Caule ramoso: foliis verticillatis, linearibus, duplicato-bifidis, dentatis: fructibus axillari-bus sessilibus trispinosis. *Loisel. Fl. Gall. 2. p. 657.*

C. demersum. W. Sp. 4. p. 948. - Pers. Ench. 2. p. 568. - Hoffm. Fl. Germ. ed. 2. T. 1. p. 252. - DC. Syn. p. 526. Hydroceratophyllon folio aspero quatuor cornibus armato, *Vaill. Act. Ac. 1719. p. 21. t. 2. f. 1.*

In fossis, fluviis submersum. Frequens in Tybere. Perenn. Floret aestate. Fl. herbacei, antheris albidis sanguineo vittatis.

CARPINUS. Char. Gen. Masc. *Amentum elongatum. Calix squama basi ciliata. Corolla nulla. Stamina 8-14. Fem. Strobilus ovatus, laxeus. Calix squama foliacea 2-flora. Corolla sex-dentata. Nux unilocularis, monosperma.*

BETULUS. *L.* Strobili squamis tripartitis; laciniis integris lanceolatis, intermedia elongata. *DC. Syn. p. 181.*

*C. betulus. Smith Fl. Br. 3. * - W. Sp. 4. p. 467. - Pers. Ench. 2. p. 572. Hoffm. Fl. Germ. ed. 2, T. 1, P. 2, p. 255. - Loisel. Fl. Gall. 2. p. 661. - Savi Tr. d. Alb. 1. p. 74. C. Duham. Arb. 1. t. 49. - Dod. Pempt. 481.*

In nemoribus, sylvaticis montium communis. Vulgo *carpino, carpino bianco*. Arb. Floret Aprili.

OSTRYA. Char. Gen. Masc. *Amentum elongatum. Calix squama. Corolla nulla. Filamenta ramosa. Fem. Amentum nudum. Calix nullus. Corolla nulla. Capsulae inflatae, imbricatae, basi monospermae.*

VULGARIS . *W. Sp.* 4. p. 469. Strobilis ovatis pendulis foliis ovatis acutis ; gemmis obtusis . *W. l. c.* - *Pers. Ench.* 2. p. 573. - *Savi Tr. d. Alb.* 1. p. 145.

Carpinus ostrya . *L.* *O. italica* *carpino* similis , etc. *Mich. N. Pl. G.* 223. t. 104. f. 1, 2.

Frequens in sylvaticis montium , et circa urbem *sul Monte Mario* , etc. Vulgo *carpino rosso* , *carpino nero* . Arb. Floret Aprili.

A *Carpino betulo* cui foliis simillima statim distinguenda fructificatione , qua secedente , ramis magis simplicibus , ramulis virgatis , cortice fusco punctis albis adperso nec cinereo , statura minore .

ARUM .

TENUIFOLIUM . *L.* Acaule : foliis lanceolatis , angustis : spadice subulato ; spatha lanceolata longiore .

A. *tenuifolium* . *W. Sp.* 4. p. 477. - *Pers. Ench.* 2. p. 574. - *Loisel. Fl. Gall.* 2. p. 617. - *DC. Syn.* p. 148. *Arisarum angustifolium* . *Moris. H.* 3. p. 545. s. 13, t. 6, f. 21.

In umbrosis sylvaticis . *Sul Tuscolo presso il praticello della malinconia* legit Excellentiss. Dom. Carolus Luciano-Bonaparte e Principibus Canini , qui mihi benevole communicavit . Perenn. Floret Majo .

DIOECIA PENTANDRIA .

CERATONIA . Char. Gen. *Polygamo-dioica* . Fl. herm. *Calix 5-fidus inaequalis* . *Corolla nulla* . *Stamina 5-7, elongata* . *Legumen compressum coriaceum sponte non dehiscens* . Fl. masc. et fem. distincti , conformes , *sexus alterius genitalibus abortivis* .

SILIQUA . *L.* Foliis abrupte pinnatis , 5-6-jugis , coriaceis , sempervirentibus .

C. *siliqua* . *All. Fl. Ped. n.* 2096. - *W. Sp.* 4. p. 1130. - *Pers. Ench.* 2. p. 618. - *Loisel. Fl. Gall.* 2. p. 698. - *DC. Syn.* 341. - *Savi Tr. d. Alb.* 2. p. 49. *Siliqua edulis* . *Duham. Arb.* t. 262.

Prope Centumcellas (*Civitavecchia*) in agro quodam vulgo *Zampa d' agnello* . Arb. Floret Novembri . Fl. sub-virides .

Fructus vulgo *guainelle* ex australiori Italia edules ; nostrates equis pabulum tantummodo praebent . Lignum valde durum , utilissimum , vulgo *carubbo* , *guainella* .

DIOECIA OCTANDRIA .

POPULUS .

ALBA . L. Foliis cordato-subrotundis lobatis , dentatis , subtus tomentoso-niveis , supra glabris : amentis ovato-oblongis . DC. Syn. p. 179.

P. alba . All. Fl. Ped. n. 1975. - Smith Fl. Br. 3. p. 1079. - W. Sp. 4. p. 802. - Pers. Ench. 2. p. 623. - Loisel. Fl. Gall. 2. p. 680. - Savi Tr. d. Alb. 1. p. 161. - Matth. Valgr. 136. - Dod. Pempt. 835.

Secus Tyberim , rivos abunde . Arb. procera vulgo *Gatto* . Floret Martio ineunte .

Lignum quam P. nigrae durius , vulgo *albuccio-gatto* .

F I N I S .

LECTORI MONITUM

Genera et species in hac Centuria recensitas ad generale operis systema in Floræ Romanæ Prodromo expositum sic refer

- Pag. 3 PHILLIRÆA . *Vide Characteres Genericos in Rom. Fl. Prodromo pag. 3.*
 — Latifolia . *Inserenda in dicto Prodromo pag. 4. ante PH. mediam .*
 — VERONICA . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 3.*
 — Prostrata . *Inser. in Prodr. pag. 6. post V. chamaedrym .*
 4 VALERIANA . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 11.*
 — Tuberosa . *Inser. in Prodr. pag. 15. post V. tripterim .*
 — POLYCNEMUM . *Inser. in Prodr. pag. 11. post FEDIAM .*
 — Arvense . *Inser. in Prodr. pag. 15. post species FEDIÆ .*
 — SCIRPUS . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 11.*
 — Annuus . *Inser. in Prodr. pag. 22. post Sc. Savii .*
 5 CRYPsis . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 12.*
 — Schoenoides . *Inser. in Prodr. pag. 29. post CR. aculeatam .*
 6 ALOPECURUS . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 12.*
 — Bulbosus . *Inser. in Prodr. pag. 29. post A. agrestem .*
 — AIRA . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 13.*
 — Capillaris . *Inser. in Prodr. pag. 37. ante A. caryophylleam .*
 7 MELICA . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 13.*
 — Minuta . *Inser. in Prodr. pag. 40. post M. pyramidalem .*
 8 DACTYLIS . *Inser. in Prodr. pag. 13. ante FESTUCAM .*
 — Glomerata . *Inser. in Prodr. p. 45. ante FESTUCÆ species .*

- Pag. 9 POA . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 13.*
 — Dura . *Inser. in Prodr. pag. 53. post P. fluitantem .*
 — BROMUS . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 13.*
 — Scoparius . *Inser. in Prodr. pag. 58. post Br. ligusticum .*
 10 SECALE . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 14.*
 — Cereale . *Inser. in Prodr. pag. 67. ante S. villosum .*
 11 † ANDROPOGON angustifolius . *Surrogandus A. ischaemo Prodr. pag. 69.*
 — POTAMOGETON . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 73.*
 — Perfoliatus . *Inser. in Prodr. pag. 82. post P. natantem .*
 12 LYSIMACHIA . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 85.*
 — Nummularia . *Inser. in Prodr. pag. 95. post L. punctatam .*
 — Linum-stellatum . *Inser. ibid. post superiorem speciem .*
 — PRIMULA . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 85.*
 — Veris . *Inser. in Prodr. pag. 95. post P. caulem .*
 13 CHENOPODIUM . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 86.*
 — Urbicum . *Inser. in Prodr. pag. 106. ante Ch. murale .*
 — ZIZYPHUS . *Inser. in Prodr. pag. 87. ante ULMUM .*
 — Vulgaris . *Inser. in Prodr. pag. 108. ante species ULMI .*
 — VELEZIA . *Inser. in Prodr. pag. 87. ante Sectionem Umbelliferarum sub peculiari Sect. « Floribus pentapetalis inferis . »*
 14 Rigida . *Inser. in Prodr. pag. 109. ante species Umbelliferarum .*
 — ULMUS . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 87.*
 — Effusa . *Inser. in Prodr. pag. 109. ante U. campestem .*
 — CAUCALIS . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 87.*
 — Scandix . *Inser. in Prodr. pag. 112. post C. nodifloram .*

† Plantas in superioribus Centuriis expensas , quas illustrationis , aut emendationis gratia huc vel eadem vel nova appellatione designatas interserui , hac nota instruxi .

- Pag. 15 FERULA . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 88.*
 — Nodiflora . *Inser. in Prodr. pag. 114. post F. communem .*
 — SIUM . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 88.*
 — Angustifolium . *Inser. in Prodr. pag. 114. ante S. nodiflorum .*
 16 OENANTHE . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 88.*
 — Peucedanifolia . *Inser. in Prodr. pag. 115. post Oe. pimpinelloidem .*
 — CHÆROPHYLLUM . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 89.*
 — Sylvestre . *Inser. in Prodr. pag. 115. ante Ch. temulum .*
 17 ALLIUM . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 122.*
 — Pendulinum . *Inser. in Prodr. pag. 126. post A. album .*
 — † Triquetrum . *Surrog. speciei sub ipso nomine adumbratae in Prodr. pag. 396.*
 18 LILIUM . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 122.*
 — Martagon . *Inser. in Prodr. pag. 127. post L. bulbiferum .*
 — AGAVE . *Inser. in Prodr. pag. 123. post HYACINTHUM .*
 — Americana . *Inser. in Prodr. pag. 131. post HYACINTHI species .*
 — LUZULA . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 123.*
 — Forsteri . *Inser. in Prodr. pag. 133. post L. vernalem .*
 19 Campestris . *Inser. ibidem post superiorem speciem .*
 — RUMEX . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 123.*
 — Alpinus . *Inser. in Prodr. pag. 134. ante R. bucephalophorum .*
 — PARIS . *Inser. in Prodr. pag. 137. ante ADOXAM .*
 — Quadrifolia . *Inser. in Prodr. pag. 143. ante ADOXÆ species .*
 20 SAXIFRAGA . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 145.*
 — Veronicæfolia . *Inser. in Prodr. pag. 148. post S. granulata .*
 — SCLERANTHUS . *Inser. in Prodr. pag. 145. post SAXIFRAGAM .*
 — Annuus . *Inser. in Prodr. pag. 148. post SAXIFRAGÆ species .*

- Pag. 21 DIANTHUS. *V. Char. Gen. in Prodr. p. 145.*
 — Caryophyllus. *Inser. in Prodr. p. 149. post D. proliferum.*
 21 ARENARIA. *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 146.*
 — Trinervia. *Inser. in Prodr. pag. 153. ante A. serpillifoliam.*
 22 Verna. *Inser. ibid. post A. serpillifoliam.*
 — Rubra. *Inser. ibid. ante A. marinam.*
 — SPERGULA. *Inser. in Prodr. pag. 146. post CERASTIUM.*
 23 Arvensis. *Inser. in Prodr. pag. 159. post CERASTII species.*
 — † EUPHORBIA falcata & acuminata. *Adnect. E. falcatae Prodr. pag. 163.*
 — CACTUS. *Inser. in Prodr. pag. 167. ante cætera Classis genera.*
 — Opuntia. *Inser. in Prodr. pag. 168. ante cæteras Classis species.*
 — PUNICA. *Inser. in Prodr. pag. 167. post MYRTUM.*
 24 Granatum. *Inser. in Prodr. pag. 168. post MYRTI species.*
 — SORBUS. *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 167.*
 — Torminalis. *Inser. in Prodr. pag. 169. post S. ariam.*
 — POTENTILLA. *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 168.*
 — Hirta. *Inser. in Prodr. pag. 172. post P. rectam.*
 25 GEUM. *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 168.*
 — Montanum. *Inser. in Prodr. pag. 173. post G. urbanum.*
 — PAPAVER. *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 174.*
 — Hybridum. *Inser. in Prodr. pag. 176. ante P. rhaeas.*
 — Somniferum. *Inser. ibid. post P. dubium.*
 26 NYMPHAEA. *Inser. in Prodr. pag. 174. post PAPAVER.*
 — Lutea. *Inser. in Prodr. pag. 176. post PAPAVERIS species.*
 — Alba. *Inser. ibid. post superiorem speciem.*

- Pag. 26 ACONITUM . *Inser. in Prodr. pag. 174. post DEL-*
 PHINIUM .
- 27 Licocotonum . *Inser. in Prodr. pag. 179. post*
 DELPHINII species .
- HYPERICUM . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 175 .*
- Quadrangulum . *Inser. in Prodr. pag. 180. post*
 H. androsæumum .
- Dubium . *Inser. ibid. post H. perforatum .*
- 28 Perfoliatum . *Inser. ibid. post superiorem spe-*
 ciem .
- 29 TEUCRIUM . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 186 .*
- Montanum . *Inser. in Prodr. pag. 190. post*
 T. flavum .
- SATUREJA . *V. Char. Gen. in Prodr. p. 186 .*
- Montana . *Inser. in Prodr. p. 190. post S.*
 graecam .
- NEPETA . *Inser. in Prodr. pag. 186. post SATURE-*
 JAM .
- Cataria . *Inser. in Prodr. pag. 190. post SA-*
 TUREJÆ species .
- 30 THYMUS . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 187 .*
- Grandiflorus . *Inser. in Prodr. pag. 197. ante*
 TH. calamintham .
- OROBANCHE . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 188 .*
- Elatior . *Inser. in Prodr. pag. 207. post O.*
 cruentam .
- 31 IBERIS . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 209 .*
- Umbellata . *Inser. in Prodr. pag. 213. post*
 I. pinnatam .
- LEPIDIUM . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 209 .*
- Petraeum . *Inser. in Prodr. pag. 213. ante*
 L. graminifolium .
- THLASPI . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 209 .*
- Nudicaule . *Inser. in Prodr. pag. 213. ante*
 TH. perfoliatum .
- 32 Campestre . *Inser. ibid. post TH. saxatile .*
- SISYMBRIUM . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 210 .*
- Murale . *Inser. in Prodr. pag. 217. post*
 S. tenuifolium .
- HESPERIS . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 210 .*
- Maritima . *Inser. in Prodr. pag. 219. ante*
 H. parvifloram .

- Pag. 33 BRASSICA . *Inser. in Prodr. pag. 210. ante SINAPIM .*
- Eruca . *Inser. in Prodr. pag. 220. ante SINAPEOS species .*
- SINAPIS . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 210.*
- Arvensis . *Inser. in Prodr. pag. 220. ante S. albam .*
- Nigra . *Inser. ibid. post S. albam .*
- 34 LAVATERA . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 222.*
- Arborea . *Inser. in Prodr. pag. 227. ante L. hispidam .*
- ONOBRYCHIS . *Inser. in Prodr. pag. 230. post HEDYSARUM .*
- Caput-Galli . *Inser. in Prodr. pag. 239. post HEDYSARI species .*
- VICIA . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 231.*
- Gerardi . *Inser. in Prodr. pag. 244. post V. sylvaticam .*
- 35 Lutea . *Inser. in Prodr. pag. 247. post V. hybridam .*
- Pimpinelloides . *Inser. ibid. post V. grandifloram .*
- 36 TRIFOLIUM . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 231.*
- Medium . *Inser. in Prodr. pag. 253. post T. pratense .*
- Suffocatum . *Inser. in Prodr. pag. 255. post T. hybridum .*
- 37 MEDICAGO . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 231.*
- † Orbicularis *β. Adnect. M. orbiculari Prodr. pag. 260.*
- Littoralis . *Inser. in Prodr. pag. 261. post M. maculatam .*
- Apiculata . *Inser. ibid. post superiorem speciem .*
- 38 PRAENANTHES . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 263.*
- Purpurea . *Inser. in Prodr. pag. 268. ante P. muralem .*
- † GREPIS neglecta . *Surrog. C. strictae. Prodr. pag. 271.*
- HYPOCHAERIS . *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 264.*
- Balbisii . *Inser. in Prodr. pag. 276. post H. radiatam .*

- Pag. 39 † *CNICUS syriacus* *β. adnect.* *CN. syriaco* . *Prodr.*
pag. 282.
- *GNAPHALIUM* . *V. Char. Gen. in Prodr. pag.* 265.
- *Rectum* . *Inser. in Prodr. pag.* 286. *post*
GN. angustifolium .
- *FILAGO* . *V. Char. Gen. in Prodr. pag.* 265.
- *Arvensis* . *Inser. in Prodr. pag.* 286. *post*
F. germanicam .
- 40 *BELLIS* . *V. Char. Gen. in Prodr. pag.* 266.
- *Annua* . *Inser. in Prodr. pag.* 292. *ante*
B. perennem .
- *CENTAUREA* . *V. Char. Gen. in Prodr. pag.* 267.
- *Scabiosa* . *Inser. in Prodr. pag.* 297. *post*
C. montanum .
- *Cineraria* . *Inser. ibid. post superiorem speciem.*
- 41 *Salmantica* . *Inser. in Prodr. pag.* 299. *post*
C. solstitialis .
- 42 *OPHRYS* . *V. Char. Gen. in Prodr. pag.* 300.
- *Speculum* . *Inser. in Prodr. pag.* 310. *post*
O. arachnitem .
- *Crabronifera* . *Inser. ibid. post superiorem*
speciem .
- 43 *Hiulca* . *Inser. in Prodr. pag.* 312. *post O.*
apiferam .
- *NAJAS* . *V. Char. Gen. in Prodr. pag.* 318.
- *Minor* . *Inser. in Prodr. pag.* 321. *post N.*
majorem .
- 44 *LEMNA* . *V. Char. Gen. in Prodr. pag.* 318.
- *Gibba* . *Inser. in Prodr. pag.* 321. *post L.*
trisulcam .
- *TYPHA* . *V. Char. Gen. in Prodr. pag.* 318.
- *Angustifolia* . *Inser. in Prodr. pag.* 322.
post T. latifoliam .
- 45 *CAREX* . *V. Char. Gen. in Prodr. pag.* 318.
- † *Divisa* . *Surrog. C. cuspidatae* . *Prodr.*
pag. 322.
- *Gynomane* . *Inser. in Prodr. pag.* 323. *post*
seriem B.
- 46 *Alpestris* . *Inser. in Prodr. pag.* 324. *post*
C. praecocem .
- 47 *Strigosa* . *Inser. in Prodr. pag.* 325. *ante*
C. maximam .

- Pag. 47 *PARIETARIA*. *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 319.*
 — *Lusitanica*. *Inser. in Prodr. pag. 327. post*
P. officinalem.
 48 *CERATOPHYLLUM*. *Inser. in Prodr. pag. 319. an-*
te MYRIOPHYLLUM.
 — *Demersum*. *Inser. in Prodr. pag. 329. an-*
te MYRIOPHYLLI species.
 — *CARPINUS*. *Inser. in Prodr. pag. 320. post CA-*
STANEAM.
 — *Betulus*. *Inser. in Prodr. pag. 331. post*
CASTANEAM vescam.
 — *OSTRYA*. *Inser. in Prodr. pag. 320. post supe-*
rius genus.
 49 *Vulgaris*. *Inser. in Prodr. pag. 331. post*
superiorem speciem.
 — *ARUM*. *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 320.*
 — *Tenuifolium*. *Inser. in Prodr. pag. 331.*
post A. arisarum.
 — *CERATONIA*. *Inser. in Prodr. pag. 334. post HU-*
MULUM.
 — *Siliqua*. *Inser. in Prodr. pag. 337. post*
HUMULUM lupulum.
 50 *POPULUS*. *V. Char. Gen. in Prodr. pag. 334.*
 — *Alba*. *Inser. in Prodr. pag. 338. post P.*
nigram.

IMPRIMATUR.

Si videbitur Reverendissimo Patri Sac. Palatii Apostolici Magistro .

C. M. Frattini Archiep. Philippensis Vicesg.

IMPRIMATUR.

Fr. Philippus Anfossi Sac. Pal. Ap. Mag.

Vicia Simpinelloides

Back of
Foldout
Not Imaged

Ophrys Grabronifera

Ophrys Thulcea

Back of
Foldout
Not Imaged