John Carter Brown
Library
Brown University

DESCRIPTION
DES
PLANTES
DE
L'AMERIQUE.

96. 51
11:0

DESCRIPTION

DE

PLANTES

DE

LAMERQUE

1744

DESCRIPTION
DES *John Carter Brown*
PLANTES
DE
L'AMERIQUE.

AVEC LEURS FIGURES.

Par le R. P. CHARLES PLUMIER, Religieux Minime.

A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DC. XCIII.

P R E F A C E.

LA Botanique est sans contredit une des parties de l'Histoire naturelle, des plus utiles, & des plus agreables. Cela est si connu aujourd'huy, que je ne m'arrestera pas à le prouver, ces deux avantages estant expliquez avec beaucoup d'étenduë dans un tres-grand nombre de livres qui traitent de l'Histoire des plantes. Je rapporteray seulement icy ce qui a donné lieu à la composition de cet ouvrage, & de quelle maniere, j'ay travaillé à l'execution du dessein qu'a toujors eu le Roy d'augmenter les sciences pendant son Regne.

Je dois la premiere inclination que j'ay eüe pour l'étude des plantes, aux curieuses demonstrations que le R. P. Philippe Sergeant, tres-habile Pharmacien, Religieux de nostre Ordre, de la Province de France, & M. François de Onuphriis Medecin Romain, firent dans nostre Couvent Royal de la Trinité du Mont à Rome. Je quittay deslors insensiblement l'étude des Mathematiques, qui avoit jusques à ce temps-là fait ma principale occupation, pour m'appliquer à la Botanique. L'obeïssance m'ayant rappelé dans ma Province, j'obtins de mes Superieurs la permission de parcourir les costes de Provence, & les Montagnes des Alpes, pour y decouvrir ce qu'il y a de plus curieux en matiere de plantes : j'avois mesme resolu de faire un nouveau *pinax*, ou recueil general des plantes, avec les figures, & j'en avois déjà un nombre considerable de dessinées, lorsqu'herborisant le long des costes de Marseille, l'occasion se presenta de faire le voyage de l'Amerique. M. Begon, si connu des savans, qui trouve au milieu de ses grands emplois des moments à donner à l'Etude des sciences, estoit pour lors

Intendant des Galeres à Marseille. Il souhaitoit pour satisfaire aux ordres du Roy, de trouver quelqu'un qui peût faire le voyage de nos Isles Antilles (où il avoit esté Intendant) pour y faire la recherche de tout ce que la Nature y produit de plus rare & de plus curieux. Il en fit la proposition à M. Surian, fort capable, non seulement dans la connoissance des plantes, mais aussi dans les secrets de la chymie ; & il luy donna en mesme temps commission de chercher quelqu'un qui fust en état de l'ayder dans l'exécution de ce dessein. M. Surian m'en fit la proposition : j'y donnay les mains avec plaisir, & nous entreprismes quelque temps après le voyage par les ordres de Sa Majesté.

Nous avons tant de belles & fideles relations des Isles Antilles, qu'il est facile de juger que j'y trouvay abondamment de quoy satisfaire ma curiosité. J'y ay esté environ deux ans, en deux voyages que j'y ay faits, & pendant ce temps-là, j'y ay dessiné, & décrit près de six cens plantes differentes, dont je donne une partie dans ce volume ; & comme je sçavois par ma propre experience, qu'il est tres-difficile de bien connoître une plante par des figures en petit, j'ay voulu les dessiner dans leur grandeur naturelle ; si non en tout, au moins en partie. On sera peut-estre surpris que je n'en donne que le simple trait presque sans ombre, mais j'ay esté bien aise de les graver de maniere, qu'on y püst ajoûter le coloris plus facilement, comme nous voyons dans tous les ouvrages de Fuchsius, qui sont gravez de mesme à simple trait, & dont la plupart sont enluminez. J'ay tâché de les décrire le plus succinctement qu'il m'a esté possible, sans pourtant rien omettre de ce qui est nécessaire pour en expliquer toutes les particularitez. J'ay voulu aussi, pour la plus grande satisfaction des curieux, les ranger sous des genres connus, & je leur ay donné des noms Latins convenans à leurs genres. J'ay pourtant esté obligé d'établir un nouveau genre pour quel-

P R E F A C E.

ques plantes particulieres, n'en trouvant point de ceux qui sont connus, sous lequel je pusse les ranger & je leur ay donné le nom de *Saururus*, à cause de leur ressemblance avec la queue d'un lézard, car *σαῦρος* signifie *lézard*, & *οὐρα* signifie *queue*: j'ay rangé ces dernieres plantes après les *Arum* & *Dracontium*, à cause de la conformité de leurs fruits. Enfin j'ay divisé ce volume en trois genres de plantes; le premier en *Fougères*, *Hemionites*, *Polypodes*, *Langues-de-cerf* & *Capillaires*; le second en *Arum* & *Dracontium*, & en ce nouveau genre de *Saururus*, & le troisième en *Periploques*, c'est-à-dire, en plantes, qui montent en grimpant sur les arbres. Je ne pretends point ôter aux Auteurs qui ont écrit avant moy des plantes de l'Amerique, la gloire qui leur est due. J'avoue que j'ay profité de leurs lumieres; mais comme la plupart n'ont donné les noms de ces plantes, que dans le langage vulgaire de ce pais-là, ce qui fait que ceux qui ne les ont jamais vues en nature ont beaucoup de peine à distinguer de quel genre elles sont, je crois que le Lecteur me sçaura quelque gré de les avoir reduites sous des genres, & sous des especes connues dans la Botanique.

Il me reste à avertir le public, que s'il tire quelque plaisir de ce travail, il en a l'obligation à feu Monseigneur de Seignelay, Ministre & Secretaire d'Estat, & à Monseigneur de Pontchartrain, qui luy a succédé. Le premier m'obtint de la liberalité du Roy, de fournir aux frais de mes voyages, & le second a eû la bonté de m'honorer aussi de sa protection auprès de Sa Majesté, pour la graveûre, & pour l'impression de ce premier volume.

P R E F A C E.

A U T E U R S

C I T E Z D A N S C E V O L U M E.

GONZALES OVIEDO, della naturale & generale Historia d'elle Indie. Lib. VIII.

NARDUS ANTONIUS RECHUS, ex Francisco Hernandez, rerum medicarum novæ Hispaniæ.

CAROLUS CLUSIUS. Historia plantarum Exoticarum.

GUILLELMUS PISO. Historia naturalis Brasiliæ. Lib. IV.

GEORGIUS MARCGRAVIUS. Historia rerum naturalium Brasiliæ. Lib. I. II. III.

Le Reverend Pere JEAN BAPTISTE DU TERTRE de l'Ordre des FF. Prescheurs. Histoire generale des Antilles Tome II.

CHRISTOPHORUS ACOSTA. ex Hist. Lugd. Lib. XVIII.

G. BAUHINUS. pinax Theatri Botanici.

BREYNIUS. Centuria prima plantarum exoticarum.

PAULUS HERMANUS. paradisi Batavi prodromus.

MENTZELIUS. Pugillus rariorum plantarum.

DESCRIPTION

DESCRIPTION DES PLANTES DE L'AMERIQUE.

I. II.

Filix arborescens, pinnulis dentatis.

Fougere-arbre, à pinules dentelées.

ETTE plante ressemble par son port à un petit palmier : sa tige est droite & n'est garnie de branches qu'au sommet, où elles sont disposées en rond de la même façon que celles des palmiers. Cette tige a environ huit à dix pieds de hauteur & près de demi-pied de diamètre, d'égale grosseur depuis le bas jusques au bout, & couverte d'écailles membraneuses & grises, au dessous desquelles on trouve un fonds tané, parsemé de plusieurs petits trous assez profonds disposez en raieau, & entremêlé des vestiges des anciennes branches, qui sont moins enfoncez.

Cette tige étant coupée en travers, on decouvre à la place de la moëlle une chair très-blanche assez ferme, d'un goût douçastre, pleine d'un suc blanc & gluant, & entourée d'un lassis de veines noires, ondées, & dures comme du bois.

Au haut de cette tige, il y a environ douze branches étendues en rond, qui dans leur commencement ont environ deux à trois pouces de grosseur, & vont s'amointrissant jusques au bout :

A

elles sont longues d'environ dix pieds, lisses, plates par dessus avec le dos arrondi, & teintes d'un vert qui tire sur le roux. Elles soustiennent de part & d'autre une trentaine de rameaux opposez alternativement, & rangez assez près les uns des autres, de la grosseur d'une plume d'oye, & dont les plus longs sont environ de deux pieds.

Ces derniers rameaux sont encore garnis de part & d'autre de plusieurs costes opposees entr'elles alternativement, fort près les unes des autres. Ces costes sont lisses, d'un vert assez gay, & leur longueur est à peu près de sept à huit pouces : elles soustiennent de chaque costé des feüilles assez semblables à celles de la fougere masle de Mathiole, longues de sept à huit lignes, larges de deux dans leur naissance, & qui finissent par une pointe émoussée : leur bord est découpé par une crenelure en dent de scie : leur couleur est d'un vert agréable, & leur dos est chargé d'un double rang de bossettes qui se reduisent en poussiere de couleur châtain foncé. J'ay observé autant que la veüe m'a peu permettre, qu'avant que ces bossettes soient réduites en poussiere, elles sont précédées par de très-petites fleurs grises composées d'une seule feüille creuse comme une petite coupe hemispherique & pleine de quantité de très-petits filaments gris.

Avant que les jeunes branches de cet arbre s'étendent en long, elles représentent assez la volute d'un chapiteau Ionique, ou la crosse d'un Evêque : elles sont toutes couvertes de petites écailles pointuës, rousses & argentées dans leurs bords.

Il y a quantité de ces plantes dans la Martinique le long du ruisseau qui passe par le Fort S. Pierre, & dans les forests humides le long du chemin de la Cabsterre. J'en ay veu aussi en plusieurs endroits de l'Isle S. Domingue vers un quartier qu'on appelle le massacre proche le Port-de-paix.

C'est la plante que Gonzale Oviedo appelle *Alberi del Felce* (Arbre de la Fougere) dans l'Histoire des Indes, livre neuvième, chapitre quatorzième. Le R. P. du Tertre de l'ordre de S. Dominique en parle aussi dans son traité troisième des Antilles, chapitre premier, parag. troisième.

Je fis un jour abbattre quantité de ces plantes que je laissay secher, & les ayant fait brusler j'en tiray des cendres d'un goust fort acre & piquant, qui sans doute pourroient servir à faire du verre.

III.

Filix arborescens, latifolia, aculeata.

Fougere arbre, épineuse, & à larges feuilles.

Ses racines sont cheveluës, noires, dispersées en gazon, & poussent quelquefois un tronc, & quelquefois des tiges qui forment une espece de buisson noir, fort épineux & épais comme le corps d'un homme.

Ces tiges ont dans leur naissance presque trois pouces de gros-
seur, & sont noires & fort épineuses: elles vont diminuant jus-
ques à la hauteur d'un homme; & c'est à cette hauteur qu'elles
se separent en trois branches: celle du milieu ne se divise plus,
mais celles des costez se divisent un peu plus haut en deux autres
qui avec celle du milieu forment une espece de fourche à cinq
branches.

Ces branches poussent dans toute leur longueur des rameaux
opposez alternativement, chargez de feuilles disposées de mesme
maniere, dont les decoupûres ressemblent fort aux feuilles de la
plante que Gaspard Bauhin apelle *Lonchitis aspera*. Ces feuilles
sont membraneuses, lisses, vertes-brun, longues d'environ dix pou-
ces sur trois de large, leur nerveûre parcourt toute la longueur de
la feuille, distribuant des rameaux à chaque decoupûre.

Je n'ay peû observer si elle a sur le dos la poussiere qu'on re-
marque ordinairement sur les plantes de la mesme espece. Il s'en
trouve quantité dans les forests de la Martinique en allant à la
Cabsterre, après avoir descendu le Morne de la Calebasse.

IV.

Filix latifolia, ramosa, cauliculis nigris & spinosis.

Grande fougere branchuë, noire & épineuse.

Les racines de celle-cy sont fort toufuës, menuës & noirastres,
d'où il sort quelques simples tiges fort droites, hautes d'en-
viron quatre pieds & épaisses d'un pouce; rondes, mais tant soit
peu canelées en devant, noires, luisantes & couvertes d'aiguillons
roides, mais un peu plus longs que ceux de la précédente, fort
pointus & noirs. Elles jettent deçà & delà, des branches opposées

alternativement, & celles-cy d'autres de mesme maniere, mais plus menuës & plus courtes & qui portent des feüilles de la mesme façon que la précédente, plus larges pourtant, & dentelées seulement aux extrémitéz de leurs découpûres. Elles sont aussi un peu plus fermes, & d'un vert un peu chargé: elles ont par dessous une petite nervûre d'où sortent de petites costes qui se divisent en trois autres, entre lesquelles il y a deux rangs de petites bossettes poudreuses & tanées.

J'en ay trouvé en plusieurs endroits dans les forests de l'Isle S. Domingue.

V.

Filix latifolia, laciniata, & ad lacinias molliter aculeata.

Fougere à larges feüilles decoupées, garnie d'une pointe tendre aux découpûres.

Cette plante naist de la mesme façon & grandeur que la précédente, mais elle n'est point épineuse: ses feüilles sont plus déliées & d'un vert plus agréable. Les dentelûres de ses découpûres sont crenelées tout à l'entour mais fort legerement: il y a aussi dans le fonds de chaque découpûre une pointe fort tendre de mesme consistance que la feüille.

Je n'ay sceu non plus observer sa poussiere, elle croît dans les forests humides de l'Isle S. Domingue.

V I.

Filix latifolia, nodosa.

Grande Fougere, noïeuse.

LA principale racine de cette fougere est assez épaisse & ramassée: elle rampe comme celle de nostre polypode commun, mais elle est composée d'un double rang de nœuds les uns sur les autres, dont les superieurs sont creux comme de petites boëtes, à cause que les tiges qui en estoient sorties sont pourries. Ces racines sont accompagnées de quantité de fibres éparpillées, minces & cheveluës.

Il sort au bout de la principale racine quatre ou cinq tiges, qui ont environ quatre pieds de haut, épaisses de quatre lignes, un

DES PLANTES DE L'AMERIQUE. S

peu enflées par en bas. Elles s'arrondissent ensuite & leur devant est canelé d'un seul sillon : leur couleur est vert-brun, mais elles sont parsemées de quelques écailles noirâtres. Ces tiges sont fortifiées depuis le milieu jusques au bout d'environ neuf à dix nœuds assez tumesciez, éloignez de deux à trois pouces les uns des autres. Deux feuilles opposées vis-à-vis sortent des costez de chaque nœud. Elles sont membraneuses, semblables aux feuilles de nos langues de cerf : mais un peu plus pointuës, d'environ dix pouces de long & d'un pouce & demi de large, ondées tout à l'entour, avec une nervûre qui s'étend depuis le commencement jusques au bout, & qui donne en travers de petites costes qui sont parallèles, & fort proches les unes des autres.

Je n'ay peu observer la poussiere qu'ont par derriere les autres plantes de mesme nature. J'en ay trouvé plusieurs dans un vallon proche un quartier qu'on appelle le Massacre vers le Port-de-paix dans l'Isle S. Domingue.

V I I.

Filix palustris aurea, foliis linguæ cervinæ.

Fougere de marests, dorée, à feuilles de langue de cerf.

ELle a quantité de racines fibreuses & roussâtres, qui jettent une touffe de tiges de neuf à dix pieds de long, presque aussi grosses que le petit doigt, d'un roux noirâtre, polies & luisantes, rondes par derriere & creuses par devant. Elles ont de chaque costé une vintaine de feuilles opposées alternativement d'espace en espace, longues d'environ un pied & demy, & larges de près de deux pouces : elles ont la figure d'une longue langue émouffée, mais tant soit peu pointuë au bout de la nervûre : leur pedicule est fort court, mais il s'étend tout le long de la feuille, & forme une nervûre assez élevée : elles sont membraneuses & solides comme du parchemin, unies & venées fort menu en façon d'un rets confondu. Elles sont d'un vert agréable, & quelques-unes de celles qui sont vers le bout de la tige sont couvertes par derriere d'une poussiere dorée.

Ces feuilles ont un goust fort aspre qui exprime assez de salive dans la bouche. On en voit beaucoup dans les lieux marefcageux de la Martinique, sur tout au bord de la riviere du Fort Royal, ou celle que je fis brusler donna des cendres fort salées.

J'en ay remarqué aussi quantité dans l'Isle S. Domingue au

quartier de Leogane, le long de quelques ruisseaux : elle est tout-à-fait semblable à celle-cy, si ce n'est que les feuilles sont un peu plus longues, moins larges & la poussière qui est sur le derrière est d'une couleur plus foncée. Les Caraïbes la nomment *Hamamalligra*.

Je crois que c'est la scolopendre dont parle le R. P. du Tertre dans son traité troisième des Antilles chap. 1. parag. 3.

VIII.

Filix latifolia, ad margines pulverulenta.

Grande Fougere, à bord poudreux.

Celle-cy naît de la même façon & dans les mêmes lieux marécageux que la Fougere décrite cy-dessus : les tiges ont presque la même grandeur, mais les feuilles sont un peu plus étroites, plus pointuës, & posées plus près vis-à-vis l'une de l'autre.

Les tiges sont rondes & un peu plus menuës qu'une plume à écrire, d'un vert-pâle tirant sur le brun : les plus longues feuilles ont presque deux pieds de long & près d'un pouce & demy de large, fort pointuës dans leur bout, arrondies vers la tige, fermes comme du parchemin, unies par dessus & vert-pâles : elles sont accompagnées par dessous & en long d'une nervûre qui distribue en travers quantité de petites costes parallèles & fort proche les unes des autres : elles sont garnies tout au tour d'une bordure poudreuse de couleur tané, & épaisse d'environ une ligne.

J'en ay trouvé souvent le long de quelques ruisseaux de Leogane, & du petit Goive dans l'Isle S. Domingue.

IX.

Filix latifolia, non ramosa nigris tuberculis pulverulenta.

Grande fougere non branchuë, parsemée de verruës noires.

Cette plante a quantité de racines menuës comme des cheveux, longues, branchuës, noires & dispersées çà & là : il en sort plusieurs tiges hautes d'environ quatre pieds, & de deux à trois lignes de grosseur, rondes par derrière, creuses par devant, polies, luisantes & noires.

DES PLANTES DE L'AMERIQUE. 7

Il y a deçà & delà de ces tiges neuf ou dix feüilles disposées alternativement, d'environ huit pouces de long, & d'un & demy de large, faites presque comme celles de nos langues de cerf, mais plus courtes & plus pointuës : elles sont de la consistance du vélin, découpées fort legerement tout au-tour par de petites dentelûres rondes : elles ont au-dessous une nervûre noire, avec de petites costes en travers de mesme couleur, qui sont paralleles & assez proche l'une de l'autre, dans l'intervalle desquelles il y en a quantité d'autres petites qui sont courbées, dont l'entre-deux est rempli d'une bosslette poudreuse & noirastre.

On trouve cette espece de fougere dans les bois de la Martinique en descendant du Morne de la Calebasse vers la Cabsterre.

X.

Filix latifolia, non ramosa, rotundiûs crenata.

Grande Fougere à simples jets, & à crenelûres arrondies.

ELLE jette dès sa racine, qui est fort roufue, quelques tiges d'environ trois pieds de haut, assez menuës, rondes, lisses & de couleur brune. Elles finissent par une feüille longue d'environ sept à huit pouces, & large presque de deux. Outre cette feüille il y en a encore trois ou quatre à chaque costé de la tige attachées alternativement & de la mesme grandeur à peu près que la premiere : elles sont arrondies vers la tige, pointuës en leur extrémité, & découpées en leur bord par des dentelûres rondes & assez larges, lisses & d'un vert-brun par dessus; mais elles ont de petites nervûres presque paralleles éloignées l'une de l'autre de près de trois lignes, entre lesquelles il y a deux rangs de petites bosslettes poudreuses gris-de-fer.

J'en ay trouvé quelques plantes le long des ruisseaux de Leogane & du petit Goive dans l'Isle S. Domingue.

XI.

Filix non ramosa, scolopendrioides.

Fougere sans branches, à feüilles comme la scolopendre.

ELLE a des racines fort longues, menuës, noires, enfoncées bien avant dans la terre, & qui en étant arrachées ressem-

blent à un escheveau de fil noir. Il sort de ces racines sept ou huit feuilles d'un pied, & même de deux pieds de long; une partie de ces feuilles se courbe vers la terre, & l'autre se relève: elles ont environ un pouce & demy de large: elles sont étroites en leurs extrémités, & vont s'agrandissant vers le milieu: elles sont découpées presque de la façon de nostre *asplenium* ou *ceterach*, mais les découpures en sont plus pointuës, excepté celles qui sont les plus proches du pedicule. Ces feuilles sont lisses par dessus & d'un vert un peu enfoncé, mais pasles par dessous & chargées à chaque d'entelêure d'un double rang de petites bossettes, grisâtres & poudreuses.

La grandeur de cette plante n'est pas déterminée, elle change suivant le terrain: j'en ay veu plusieurs dont les feuilles n'avoient pas plus de deux pieds de long, & d'autres qui en avoient plus de quatre & qui rampoient à terre. J'ay encore observé une particularité, qui est que des feuilles qui rampent à terre il sort du fond des découpures de petites racines qui produisent une autre plante de mesme espece, & quelquefois une seule feuille.

Elle naît particulièrement dans les forests humides, & le long des ruisseaux dans l'Isle S. Domingue, où je l'ay trouvée en divers quartiers.

XII.

Filix scandens, latifolia, ferrata.

Grande Fougere montante, dentelée.

ELle pousse plusieurs tiges qui s'attachent sur les troncs des arbres par quantité de petites racines courtes, menuës & noirâtres de mesme que celles du lierre. Les tiges sont plus menuës que le petit doigt, assez solides, souples, d'un roux foncé ou tané, & couvertes de petites écailles pointuës, membraneuses & roussâtres: elles chargent quelquefois les arbres ou elles grimpent, & en cachent entierement le tronc. Ces mesmes tiges poussent des branches alternativement d'espace en espace, éloignées de trois à quatre pouces les unes des autres: ces branches ont quelquefois deux pieds de long; elles sont rondes, pliables, unies & d'un vert-gris: elles portent des feuilles par paires jusques au bout: j'en ay compté quatorze ou quinze, mais celle qui termine la tige est impaire: elles ont depuis deux jusques à quatre pouces de long & plus d'un demi pouce de large; leur figure aproche de celle d'un

d'un parallelogramme, bien qu'elles soient pointuës par les deux bouts : leur bord est agréablement dentelé ; elles sont membra-neuses & fermes comme du vélin, d'un vert foncé par les deux costez, unies par dessus & un peu ridées au dessous par quantité de petites costes qui les traversent depuis la nervûre jusques au bord.

J'en ay trouvé souvent le long des ruisseaux dans les Isles de la Martinique & de S. Domingue, sans avoir peû observer leur semence.

X I I I.

Filix latifolia, caudata, pinnulis lonchitidis dentatis.

Grande Fougere à longue queue, à pinnules de lonchitis.

SA racine est composée de quantité de fibres noires, longues & fort menuës qui la rendent fort touffuë. Elle pousse en dehors quelques tiges menuës, longues d'environ deux pieds, unies & de couleur tané, creuses par devant & rondes par derriere ; chacune de ces tiges soutient trois ou quatre paires de feüilles longues de sept à huit pouces, larges de deux, terminées par une queue étroite d'environ trois pouces de long. Ses découpûres ressemblent aussi à celles du *lonchitis aspera*, dont chacune a environ trois lignes de large. Leur vert est un peu passe & leur nervûre est une coste qui va d'un bout de la feüille à l'autre & distribuë en passant des rameaux à chaque découpûre, qui finissent par quantité de moindres qui s'étendent jusques sur les bords.

Chaque tige est terminée par une feüille semblable. Je n'ay peû observer leur poussiere : j'en ay trouvé quelques plantes le long d'un ruisseau au quartier du Fort Royal de la Martinique.

M. de Tournefort qui fait la démonstration des plantes dans le Jardin Royal à Paris, a apporté de Portugal une Fougere semblable à celle-cy, & dont la poussiere est attachée au bord des pinnules.

XIV.

Filix pinnulis lonchitidis obtusis, non dentatis,
ad oras pulverulentis.

*Fougere à pinnules de lonchitis, émoussées, poudreuses
par le bord & sans dentelûres.*

Ses racines sont fort menuës & toutes remplies d'autres plus petites d'un gris obscur, longues & éparpillées. Elles jettent cinq ou six pedicules de près de deux pieds de haut, d'environ deux lignes d'épaisseur, rondes par derriere & canelées par devant, d'un brun fort pâle & blanchâtre. Elles portent huit à neuf paires de feüilles à deux pouces de distance les unes des autres. Il n'y a que les deux plus basses qui soient branchuës, les autres sont simples; & les plus longues ont environ neuf pouces de long & deux pouces de large. Elles finissent en pointe & sont découpées presque jusques à la coste par des pinnules larges de trois lignes; leur pointe est émoussée & leur bord est poudreux tout au tour & grisâtre. Leur couleur est d'un vert-pâle; elles sont unies & comme membraneuses.

J'en ay trouvé en plusieurs endroits des Isles de la Martinique & de S. Domingue.

XV.

Filix latifolia, non ramosa, foliis gladiformibus
ferratis.

*Grande Fougere sans branches, à feüilles dentelées,
& en façon de coûteau.*

Elle pousse dès sa racine dix ou douze tiges d'une ligne d'épaisseur, presque quarrées, unies & d'un vert-brun, longues d'environ quatre pieds, qui depuis leur milieu ont deçà & delà dix-huit ou vingt feüilles rangées alternativement à la distance d'un bon pouce. Ces feüilles ont environ demy pied de long & un pouce de large avec une nervûre qui va depuis la tige jusques au bout: elles sont fort pointuës & faites presque comme un coûteau, leur consistance est membraneuse: elles sont d'un vert-brun par devant, ayant par derriere quantité de petites costes depuis la

nervûre jusques près du bord qui est tant soit peu dentelé, avec un double rang de bossètes poudreuses & tanées, de chaque costé de la nervûre.

Elle naît le long des ruisseaux dans les forests de l'Isle S. Domingue.

XVI.

Filix non ramosa, latiùs dentata major.

Grande fougere sans branches, à larges dentelûres.

Cette plante a neuf ou dix tiges de quatre ou cinq pieds de hauteur qui sortent d'une racine fibreuse & noirâtre : elles sont plus menuës qu'une plume à écrire, brunes, lisses, & presque quarrées : les feüilles qui viennent par paires au nombre de dix ou douze sont attachées deçà & delà de ces tiges d'espace en espace d'environ deux pouces de distance. Elles ont près de dix pouces de long & un pouce de large : elles sont de consistance de parchemin, mais pourtant assez fragiles & d'un vert fort passe : elles sont pointuës & leur bord est tout entaillé par des découpûres aiguës, larges & enfoncées presque jusques au milieu de la feüille. Il y a une nervûre depuis la tige qui court tout le long de la fueille jusques au bout, & depuis cette nervûre il y en a d'autres qui vont chacune jusques à la pointe des dentelûres, & d'autres aussi qui vont de cette mesme nervûre jusques à l'enfoncement des dentelûres. Depuis la deuxième nervûre, il y a quantité de petites costes qui traversent jusques à la troisième, & parmi ces costes il y a un double rang de verruës poudreuses & grisâtres, qui vont depuis la principale nervûre jusques au bout de chaque découpûre.

XVII.

Il s'en trouve en divers endroits de l'Isle S. Domingue, où l'on en voit de deux sortes de cette mesme espece, à sçavoir la premiere cy-devant décrite, & un autre seconde fort semblable en tout à cette premiere, mais beaucoup plus petite.

Elles naissent toutes deux le long des ruisseaux & dans les forests humides de la mesme Isle S. Domingue.

X V I I I.

Filix non ramosa, longissimis, angustis & ad basim
auriculatis foliis.

*Fougere sans branches, à feüilles très-longues, étroites, &
oreillées à la base.*

SA racine est toute cheveluë & noirâtre, de laquelle il sort neuf ou dix tiges grosses d'environ deux lignes, brunes, unies, rondes par derriere, sillonnées par devant & hautes d'environ quatre à cinq pieds.

Ces tiges ont plusieurs feüilles vert-pâles assez près les unes des autres, & opposées en façon des dents d'un peigne : elles ont demi-pied de long, & sont tout au plus larges de trois lignes : elles finissent en pointe fort aiguë, mais leur commencement s'élargit & représente en quelque façon le lobe extérieur de l'oreille. Elles ont une coste relevée par dessous qui en distribue plusieurs autres plus petites, qui vont de travers jusques au bord, qui est tout couvert d'une bordure poudreuse, grisâtre & un peu relevée.

Il s'en trouve quantité le long des ruisseaux de l'Isle S. Dominique vers le Port-de-paix.

X I X.

Filix altera longissimis, angustis, & ad basim
foliosis foliis.

*Autre Fougere à feüilles très-longues, étroites
& reseüilluës.*

CElle-cy est très-semblable à la précédente : elle n'en diffère qu'en ce que ses feüilles sont un peu plus étroites ; & au lieu que les autres ont les apendices de la base faites comme le lobe de l'oreille, celle-cy les a beaucoup plus longues & plus étroites, en sorte qu'elles ressemblent à deux petites feüilles dont l'une regarde en haut & l'autre en bas. Elle a aussi les bords couverts d'un cordon poudreux comme la précédente & naît dans les mêmes endroits.

X X.

Filix furcata, pinnulis longiusculis, non dentatis.

Fougère fourchuë, à longues pinnules non dentelées.

Cette espece de fougere est fort rare : je n'en ay jamais trouvé que dans un seul endroit, sçavoir dans la Martinique vers le Morne de la Calebasse en descendant au quartier de la Cabsterre.

Sa racine est toute fibreuse & noirâtre qui ne jette tout au plus que deux ou trois tiges rouffastres tirant sur le noir, rondes, de deux lignes de grosseur, longues d'environ deux pieds & couvertes de quelques écailles fort petites & fort minces, d'un roux un peu moins chargé que celui de la tige.

Ces tiges se fourchent en deux branches longues d'environ un pouce & assés éloignées l'une de l'autre. Chacune de ces branches se separe aussi en deux autres branches environ deux fois plus longues que les premières : enfin ces dernières se fourchent encore en deux autres longues d'environ cinq à six pouces, mais qui ne sont pas si écartées que les premières. Outre ces deux branches situées au bout de chaque tige, il y en a encore deux autres quasi vers le milieu de la tige opposées l'une à l'autre qui se divisent aussi en d'autres branches de la même façon que les supérieures.

Toutes ces branches sont garnies de feuilles découpées jusques à la coste principale : les plus longues découpûres qui se trouvent vers le milieu, ont environ un pouce de long, & près de deux lignes de large : leur longueur diminuë à mesure qu'elles approchent de l'extrémité des branches : leur arrangement peut estre fort bien comparé à celui des dents d'un peigne ou des feuilles de l'if, en Latin *Taxus*.

Je n'ay peu remarquer leur semence, ni de quelle façon elles la portent.

XXI.

Filix ramosa, pinnulis rostratis.

Fougere branchuë, à pinnules en bec.

SA racine est toute cheveluë & noirâtre, qui produit dès le commencement un amas de plusieurs tiges seches parmy lesquelles il en sort sept ou huit autres grosses d'environ une ligne, rondes, unies & roussâtres, hautes de trois à quatre pieds, branchuës deçà & delà alternativement, & presque de deux en deux pouces.

Les plus longues de ces branches ont quasi un pied de long & portent des feüilles d'un pouce & demy de long, disposées de mesme maniere que les branches, & éloignées de l'une à l'autre de près de neuf lignes; elles ont bien six lignes de large, & sont découpées tout à l'entour par des aislerons presque jusques à la nervûre. Ces aislerons ont deux lignes de large, ils sont pointus comme le bec d'un oiseau & tant soit peu crochus; elles sont unies par dessus & d'un vert clair, mais par dessous elles sont d'un vert un peu enfoncé, & raïées par de petites costes traversieres.

J'en ay trouvé souvent en divers endroits de l'Isle S. Domingue.

XXII.

Filix ramosa, pinnulis longiusculis partim auriculatis.

Fougere branchuë à longues pinnules, quelques-unes à oreillon.

ON prendroit d'abord cette fougere pour la fougere femelle de Mathiole assez connuë en France; mais elle est beaucoup plus branchuë & plus étenduë: sa racine est toute cheveluë & brune, elle pousse sept ou huit tiges de près de deux lignes d'épaisseur, fort lisses & roux-châtain, qui jettent çà & là de longues branches presque vis-à-vis les unes des autres, qui en poussent d'autres, & celles-cy encore d'autres de même couleur, tirant pourtant tant soit peu sur le verd. Les plus longues de ces secondes branches ont environ un pied de long, & les dernieres sont beaucoup plus courtes, s'amointrissant à mesure qu'elles approchent de l'extrémité des secondes. Ces mêmes dernieres sont ter-

minées par une pinnule, longue & étroite, & ont de part & d'autre alternativement & assez près, des pinnules aussi fort étroites, dont les plus longues ont un peu plus d'un pouce : leur largeur est presque d'une ligne & demie, & leur pointe est tant soit peu émoussée. Il y a aussi d'autres pinnules aux commencemens des plus longues, mais beaucoup plus courtes & en façon de petits ailerons : elles ont toutes le bord replié en dedans, comme les feuilles du rosmarin vulgaire, en Latin *rosmarinus hortensis* ; le dessus lisse & vert blanchâtre, & le dessous tout raïé de quantité de petites côtes traversières.

Je n'ay peu observer leur semence, & je n'en ay trouvé que dans deux endroits, sçavoir le long du Tapion proche le petit Goive de l'Isle S. Domingue, & sur le coupeau de l'Isle de la Tourtuë dans la parroisse de Mirebalai.

X X I I I.

Filix ramosa villosa, major, crenis rotundis dentata,

Fougere branchuë & veluë, à dentelûres arrondies.

Cette espece de fougere devient fort grande, quand elle naît dans des lieux humides le long des ruisseaux. Ses racines sont toutes cheveluës comme la plupart de celles des autres fougères : elles sont grisâtres & poussent cinq ou six tiges tanées d'environ quatre pieds de haut, grosses de deux lignes, rondes mais sillonnées par devant : elles poussent aussi de chaque côté alternativement & par des espaces inégaux des branches d'environ un pied & demy de long, qui portent dans leur longueur deçà & delà & alternativement des feuilles d'environ deux pouces & demy de long, qui diminuent insensiblement jusques au bout, & elles finissent en pointe & sont decoupées jusques à la nervûre principale par des pinnules de trois lignes de large, arrondies par le bout & incisées tout à l'entour par des crenelûres assez rondes : elles sont lisses & d'un beau vert par dessus, mais pâles par dessous & chargées d'un double rang de petites verruës poudreuses & noirâtres.

Toute la plante est parsemée de quelques poils fort menus, tortus & roussâtres. Je n'en ay veû que dans deux endroits de l'Isle S. Domingue, sçavoir le long d'un ruisseau proche le Massacre vers le Port-de-paix, & vers le Tapion du petit Goive.

X X I V.

Filix villosa minor, pinnulis profundè dentatis.

Petite Fougere veluë, à longues dentelûres.

C Elle-cy est beaucoup plus petite que la precedente : sa racine est faite de mesme & naist aussi dans les lieux humides : elle n'a pas plus de deux pieds de haut, ses tiges sont fort menuës, rondes & noires, couvertes de quantité de petits poils noirs & tortus.

Environ à la troisiéme partie des pedicules elles ont deçà & delà des feüilles étenduës en façon d'aîsles & opposées les unes aux autres, distantes d'environ un pouce & demy. La plus grande a près de quatre pouces de long, & un pouce & demy de large : la nervûre est aussi toute veluë comme la tige : elles finissent toutes en pointe, & sont découpées jusques à la nervûre, chaque decoupûre ayant environ trois lignes de large : leur nervûre est petite & leurs bords sont découpez par des crenelûres assez profondes & pointuës. Il y a par derriere de chacune de ces crenelûres une petite bosslette poudreuse & rouffastre : elles sont unies & d'un vert gay par devant, membraneuses mais fort minces.

C'est une plante assez rare : je l'ay trouvée le long du mesme ruisseau comme la precedente.

X X V. A.

Filix pinnulis cristatis.

Fougere à pinnules crestées.

C Ette plante a plusieurs petites racines fibreuses, grisastres de deux ou trois pouces de long, & écartées deçà & delà dans la terre. Il en sort quatre ou cinq tiges fort menuës, rondes, d'un vert sale, & d'environ un pied de haut : elles ont depuis le milieu jusques au bout de part & d'autre des feüilles étenduës alternativement, en sorte que le bord de la supérieure touche celui de l'inférieure. La plus longue de ces feüilles a près de deux pouces de long, & neuf à dix lignes de large : elles sont émoussées & dentelées au bout : elles sont aussi découpées par des aîlerons jusques à la nervûre : ces aîlerons ont près de quatre lignes de large, &

& sont dentelées tout à l'entour, excepté vers l'endroit qui regarde la principale tige, en sorte qu'ils ressemblent fort à de petites crestes.

Les feüilles deviennent toujours plus courtes à mesure qu'elles aprochent de l'extremité de la tige : elles sont d'un vert foncé, lisses par devant & chargées par derriere de quelques petites éminences poudreuses non pas rondes comme aux autres, mais ovales & pointuës par les deux bouts & d'un roux fort tané.

Je n'en ay trouvé que dans un endroit de l'Isle S. Domingue, le long d'un ruisseau, vers un quartier qu'on appelle le Moustique, environ à dix lieües du Port-de-paix.

X X V. B.

Filix pulverulenta, pinnulis obtusè dentatis.

Fougere poudreuse, à dentelûres émoussées.

LE corps de sa racine n'est composé que de quelques restes des tiges pourries accompagnées de plusieurs racines fibreuses, longues & éparfées çà & là, de couleur brune comme tout le corps de la racine, d'où il sort quatre ou cinq tiges fort menües, rondes, vert-brun, & d'environ un peu plus d'un pied de haut : elles ont de chaque costé seize ou dix-huit feüilles assez proche & vis-à-vis les unes des autres : celles du milieu ont environ deux pouces de long sur six ou sept lignes de large, mais celles qui regardent l'extrémité & la racine deviennent plus courtes à mesure qu'elles s'en aprochent : les unes & les autres sont découpées presque jusques à la nervûre & ces découpûres sont fort étroites, émoussées par le bout, & dentelées tout au tour : chaque feüille a deux découpûres plus longues en son commencement, qui sont comme deux petites feüilles dont l'une regarde en bas & l'autre en haut : elles sont lisses d'un vert-gris. Leur dessous est tout couvert d'une poussiere fort menuë & tanée.

C'est une fougere fort rare que je n'ay trouvée que dans quelques forests écartées de l'Isle S. Domingue.

XXVI.

Lonchitis hirsuta, florida.

Lonchitis veluë, & fleurissante.

SA racine est touffuë & cheveluë, elle pousse sept ou huit pedicules deliez d'environ un pied de hauteur, fort cassants, creusez par devant, arrondis sur le dos, verdastres & couverts de poils courts & bruns : ils soutiennent depuis leur milieu dix ou douze feüilles quelquefois oposées vis-à-vis, & d'autrefois alternativement, elles vont toûjours diminuant jusques au bout : les plus basses ont environ un pouce & demy de long, sur environ demi-pouce de large : elles sont crenelées tout à l'entour avec de petites costes par dessus : leur couleur est d'un vert-gay, mais elles sont garnies de part & d'autre de poils blanchastres : pour ce qui est de leur figure, elles sont semblables à celles du *lonchitis* ordinaire, c'est à dire qu'elles aprochent d'un demy cœur.

Le pedicule fournit à la base des premieres feüilles deux autres pedicules plus deliez & comme jumeaux, qui s'élevent à la hauteur de demi-pied : ils sont velus, fillonez, & portent chacun une grape pyramidale d'environ deux pouces de long, chargée de plusieurs autres petites grapes, comme celles à peu près de *l'osmunda regalis* : elles sont vertes dans le commencement, mais elles deviennent brunes dans la suite.

Je n'ay jamais trouvé cette plante qu'une fois & dans un seul endroit de la Martinique, sçavoir en montant le Morne, quand on va de la grande Anse d'Arlet à celle du Diamant, un peu après l'habitation de M. l'Orange.

XXVII.

Lonchitis glabra, major.

Grande lonchitis, lisse.

SA racine ressemble à du gazon fort touffu, qui pousse plusieurs fibres grisastres, & plusieurs tiges d'environ deux pieds de long, épaisses de deux lignes, de couleur vert-brun, lisses, rondes par le dos, & un peu canelées par le devant, garnies de plusieurs feüilles depuis le tiers en haut, qui est terminé par une

feuille étroite, pointuë de près de trois pouces de long : elles sont posées deçà & delà alternativement & fort près les unes des autres : leur figure ressemble à une petite faux : les plus longues ont environ quatre pouces de long, & un pouce de large vers la base : elles sont fort pointuës & découpées tout à l'entour par des dentelures rondes : leur base a le costé superieur arrondi, & qui avance comme une oreillette, mais l'interieur est taillé obliquement : il y a une nervûre principale qui s'étend depuis le commencement jusques au bout de la feuille, & qui fournit des filets de part & d'autre : leur dessus est uni & d'un beau vert, mais le dessous est passe & tant soit peu ridé par plusieurs petites nervûres avec une rangée deçà & delà de quelques vermissaux poudreux, fort étroits, attachez à la feuille, longs d'environ six à sept lignes, de couleur tané obscur.

J'en ay trouvé souvent dans nos Antilles dans les forests & le long des ruisseaux.

XXVIII.

Lonchitis glabra, minor.

Petite lonchitis, lisse.

SA principale racine est presque aussi longue & aussi grosse que le doigt, tirant sur le tané par dehors, charnuë comme le polypode & verdastre en dedans : elle produit quantité de fibres cheveluës assez longues & de mesme couleur.

Il en sort quelques tiges unies & rondes de couleur tané obscur, d'environ deux pieds de long, de la grosseur d'une ligne, garnies de part & d'autre au dessus d'un demi-pied de la racine, de feuilles fort proches les unes des autres, posées alternativement & étenduës en forme d'aislerons : elles ont la figure d'une petite faux émouffée par le bout, longues d'environ un pouce & demy, & larges de quatre lignes, tant soit peu dentelées à l'entour, & particulièrement vers le bout. Le dessus est lisse & d'un vert un peu chargé, mais au dessous il y a une nervûre courbe qui va tout le long, & se divise en de petits filets jusques au bord : outre cela il y a un rang deçà & delà de la nervûre, de petites bossettes rondes, poudreuses & tanées.

Il s'en trouve dans les mesmes lieux, & elle est mesme plus frequente que la precedente.

XXIX. a.

Lonchitis auriculata & ferrata.

Lonchitis dentelée, & oreillée.

SA racine est de mesme que celles des precedentes & pousse ses tiges de mesme façon, longues d'environ un pied & demy : elles ne sont pas trop grosses, mais elles sont rondes & passes, & soutiennent environ demi-pied par dessus la racine une vintaine de feüilles deçà & delà fort près les unes des autres & rangées alternativement : elles ont environ deux pouces & demy de long, & ont presque la mesme forme que celles de la premiere, mais elles sont un peu plus courtes : elles sont fort pointuës & sont decoupées dans le bord par des crenelûres émouffées fenduës au bout par deux petites dentelûres : leur base a une oreillette dans sa partie superieure, qui est coupée en creste de coq, & leur dos est garni d'un double rang de petites verruës poudreuses & tanées.

J'en ay trouvé en quelques forests de l'Isle S. Domingue.

XXIX. b.

Lonchitis juxta nervum pulverulenta.

Lonchitis poudreuse le long de la nervûre.

SA racine est fort touffuë & fibreuse : les tiges n'ont pas plus d'un pied & demy de long, ses feüilles commencent presque au tiers des tiges, assez proche & vis-à-vis l'une de l'autre : les deux plus basses sont plus courtes que la troisiême, qui est ordinairement la plus longue de toutes, ayant environ près de trois pouces de long, & demy pouce de large : les autres vont diminuant jusques au bout de la tige, qui finit par une feüille un peu plus étroite & plus pointuë : la principale nervûre ou coste de ces feüilles est accompagnée deçà & delà d'une bordure fort étroite poudreuse & tanée : elles ont la mesme figure que celles de la precedente, excepté que la base est arrondie, plus large, & comme en forme de cœur : elles sont un peu rudes par dessous à cause de plusieurs petites costes qui vont obliquement depuis la principale nervûre jusques au bord qui est ondé par une fort petite dentelure.

J'en ay trouvé souvent dans les mesmes endroits.

X X X.

Lonchitis ramosa, limbo pulverulento.

Lonchitis branchuë, à bord poudreux.

SA racine ressemble à une touffe de cheveux noirs, d'où il sort quelques pedicules fort minces d'un vert-passe, d'environ demi-pied de long : chaque pedicule se termine en trois rameaux, ceux des costez sont plus courts que ceux du milieu : ils sont opposés vis-à-vis l'un de l'autre, découpez jusques à la coste en feüillages taillez en faux & disposez alternativement, dont les deux premiers qui sont à la naissance de chaque rameau pendent en bas, & n'en ont aucun opposé de l'autre costé. La feüille qui finit ces rameaux a près de trois pouces de long & quatre lignes de large : & la principale de celles qui regardent en bas, qui est la plus proche du principal pedicule, est presque aussi longue & aussi large, les autres diminuent à mesure qu'elles approchent du bout.

Le rameau du milieu soutient cinq ou six feüilles dont les plus basses qui sont tres-longues, sont découpées à leur base en trois feüillages, deux en bas & un seul relevé en haut, celles qui suivent n'ont qu'une oreille pointuë de part & d'autre : les autres n'en ont qu'une seule dans la partie superieure qui est arrondie. Enfin la dernière feüille qui termine le rameau, est pointuë dans son extrémité, & garnie environ un pouce par dessus sa base de deux oreilles assez longues & émoussées : les plus longues de ces feüilles ont près de quatre pouces de long, & quatre à cinq lignes de large, & celle qui finit le rameau a environ trois à quatre pouces, & aussi quatre à cinq lignes de large ; celle-cy est pointuë, mais les autres sont un peu émoussées : leur consistance est membraneuse, fort lisse & d'un beau vert par devant, mais un peu ridées en derriere par quantité de petites costes qui les traversent : elles ont tout à l'entour une petite bordure poudreuse de couleur tané, tirant pourtant sur le gris.

Il s'en trouve dans les forests, & le long de quelques ruisseaux de l'Isle S. Domingue, mais rarement.

XXXI.

Hemionitis maxima, quinque-folia.

Grande hemionite à cinq feuilles.

ELle pousse dès sa racine qui est toute cheveluë & noire, cinq à six tiges d'environ trois pieds de haut, & grosses d'environ deux lignes, rondes, mais un peu canelées au devant & d'un vert sale : chaque tige finit par une feuille d'environ un pied de long, étroite en son commencement, pointuë par le bout, & large d'un demi-pied dans son milieu. Par dessous celle-cy, il y en a quatre autres attachées deux à deux, & vis-à-vis, un peu plus étroites & un peu plus pointuës que la supérieure : les deux plus basses ont du costé interieur de la base une petite oreille ronde ; elles sont ondées à l'entour, mais assez legerement : leur consistance est comme du velin fort delié vert-passe ; elles ont au dessous une nervûre qui va tout le long d'un bout à l'autre, & qui distribuë quantité de costes fort delicates obliques & paralleles, qui s'étendent jusques sur le bord où elles se recourbent un peu : ces costes sont traversées par d'autres plus fines, ondées & courbées.

Quand les feuilles de cette plante commencent à pousser, elles ressemblent fort bien à la crosse d'un Evesque, & sont couvertes d'une poussiere tres-menuë & fort noire, qui tombe quand elles prennent leur grandeur ordinaire.

Il s'en trouve souvent dans les forests sombres & humides. J'en ay trouvé quantité, particulièrement le long d'un ruisseau proche le Massacre vers le Port-de-paix, dans l'Isle S. Domingue.

XXXII.

Hemionitis maxima, trifolia.

Grande hemionite à trois feuilles.

SEs racines sont aussi toutes cheveluës & noires : il en sort six ou sept pedicules fort menus, lisses, noirs & luisants, comme ceux de nos capillaires, de la hauteur d'environ demi-pied. Ils portent ordinairement trois feuilles : celle du milieu où la supe-

rieure est toujours la plus grande, elle a près d'un pied de long & demi-pied de large, ayant vers le milieu deux avancemens comme deux oreilles: elle commence par un angle arrondi, & finit en pointe. Les deux autres ne sont que comme la moitié de celle-cy: la nervûre qui les traverse, les partage en deux parties inégales, dont la supérieure est beaucoup moindre, elles n'ont aussi qu'une oreille dans la partie inférieure.

Ces trois feuilles sont membraneuses & fort minces d'un vert un peu chargé, lisses par dessus, mais soustenuës en dessous par des costes obliques, & assez distantes de l'une à l'autre, qui sont aussi traversées par d'autres costes courbées en dehors: ces feuilles sont aussi remplies par derrière de quantité de verruës qui du commencement sont vertes, unies & creuses comme un nombril, de la grandeur d'une petite lentille, mais qui deviennent en suite toutes poudreuses de couleur chastein obscur.

J'ay trouvé cette espece dans la Martinique le long du chemin de la Cabsterre proche la riviere Falaise; j'en ay aussi remarqué souvent de la mesme espece dans l'Isle S. Domingue, le long des ruisseaux, mais qui a cinq feuilles, & ses avancemens fort pointûs, & comme en demy croissant, au lieu que celle-cy les a presque ronds.

XXXIII.

Hemionitis aurea, hirsuta.

Hemionite dorée & veluë.

ELle a plusieurs petites racines noires & menuës comme des cheveux qui poussent neuf ou dix feuilles: les plus vieilles sont immédiatement couchées par terre, mais les plus jeunes sont droites; elles sont presque toutes de mesme grandeur, mais les pedicules des vieilles sont beaucoup plus courts, que ceux des récentes, n'ayant pas plus de deux pouces de long, & ceux-cy environ demi-pied: ces pedicules sont menus, ronds & rouges: les feuilles ont bien deux pouces & demy d'étenduë, elles sont découpées en cinq parties aiguës, presque comme le *ricinus* commun: leur dessus est d'un vert chargé & luisant, mais le dessous des plus jeunes est tout couvert d'une nervûre en façon d'un petit raieau dont les trous sont remplis d'une poussiere dorée, ce qu'on ne trouve pas dans les vieilles: toute la plante est couverte d'un petit poil ras & blanchastre: on remarque encore que les

plus jeunes poussent quelquefois au commencement de laquelle une de leur découpûre, une fort petite feüille de mesme consistance, & de mesme façon que les autres, mais découpée en trefle : les unes & les autres sont aussi crenelées à l'entour.

J'ay trouvé cette plante sur les rochers des forests humides de la Martinique, particulièrement dans le chemin qui est entre l'Anse à l'Asne, & la grande Anse d'Arlet plus près de celle-cy.

X X X I V.

Hemionitis profundè laciniata, ad oras pulverulenta.

Hemionite fort découpée, bordée de poussiere.

SA racine n'est formée que de quantité de fibres noires & menuës comme des cheveux de trois à quatre pouces de long, il en sort sept ou huit pédicules de diverse grandeur, fort deliez, droits, ronds & noirs, lissés & luisans : les vieux sont toujours les plus courts, & ont tout au-plus quatre pouces de long, mais les jeunes qui naissent au milieu des autres, ont environ huit à neuf pouces.

Chaque pédicule soutient une feüille divisée en trois : les plus grandes sont découpées jusques au bout du pédicule, & ont environ quatre à cinq pouces d'étenduë : ces découpûres des costez sont encore découpées en deux fort profondement, & sont divisées en quelque maniere comme celles du polypode ; celle du milieu est découpée de mesme, mais regulierement, & les unes & les autres finissent toujours en pointe : elles sont toutes lissés par dessus & teintes d'un fort beau vert, mais elles ont au dessous une bordure tout à l'entour d'une poussiere fort menuë tané-obscur, leur nervûre est fort noire & luisante, & le vert un peu passe.

Les moindres feüilles n'ont point de bordure, leur découpûre sont aussi plus grandes & moins profondes : elles sont toutes de consistance de vélin.

Je n'ay trouvé cette plante que dans un seul endroit de l'Isle la Tortuë, vers la vallée en descendant de l'habitation du sieur la Franchise à la Mer. Quand je la trouvay, ses feüilles étoient toutes recourbées en dedans comme les serres d'un oiseau de proie, à cause de la secheresse, mais elles reprirent bien-tost leur verdure & leur étenduë naturelle, dès que je les eû mises tremper dans de l'eau.

Polypodium

X X X V.

Polypodium majus aureum.

Grand Polypode doré.

SA racine a près d'un pouce d'épaisseur, & quelquefois un pied de long, elle est ronde, fort noueüse, branchuë, charnuë, & verdastre en dedans, mais elle est toute couverte de tres-petites écailles dorées avec des trous au milieu des nœuds, qui ne sont autres que les lieux des tiges passées.

Elle pousse quelques feuilles d'environ un pied de long, dont le pedicule qui s'allonge en coste est presque aussi long : elles sont fenduës deçà & delà par sept ou huit découpûres fort profondes, ayant un pouce de large & trois ou quatre de long, un peu écartées les unes des autres, & pointuës au bout : on remarque par dessous un double rang de verruës poudreuses, & dorées, tout le long de la nervûre des découpûres.

On en trouve quantité dans la Martinique sur les troncs des grands arbres : c'est peut-estre le *filix Indica polypodii facie*, la fougere des Indes ressemblant au polypode de Mentzelius.

X X X V I.

Polypodium radice tenui, & repente.

Polypode à racine menuë, traçante.

LA racine de ce polypode n'a pas plus d'une ligne d'épaisseur : elle est ronde & noueüse, & s'étend bien au long à la façon du chien-dent : elle se plaît beaucoup ou sur les roches couvertes de mousse, ou sur les troncs des arbres pourris, elle est toute couverte d'une poussiere noirastre, & jette quantité de petites racines fort menuës à l'endroit de ses nœuds.

Elle pousse tout le long, des feuilles faites presque comme celles de nostre polypode commun, & de mesme grandeur : elles sont lisses & d'un beau vert par dessus un peu chargé pourtant, mais toutes couvertes par dessous d'une poussiere comme dorée, semblable à celle de nostre *asplenium* ou *ceterach*, avec un double rang de petites verruës poudreuses & noirastres.

J'en ay trouvé souvent dans l'Isle S. Domingue, particulièrement vers le Port-de-paix.

XXXVII.

Polypodium nigrum, tenuius sectum.

Polypode noir, fort-découpé.

LA racine est longue, & grosse comme le doigt, noire par dehors, & fort cheveluë, avec un double rang de nœuds, qui sont fort près les uns des autres, & creux comme de petites écuelles d'ou sortoient les vieilles feuilles.

Elle pousse trois ou quatre feuilles d'environ deux pieds de long & deux pouces de large, découpées jusques à la coste qui est ronde, lisse, & noire : ces découpûres sont opposées alternativement : elles se touchent, & sont larges ordinairement de trois lignes, finissant par une pointe émoussée : celles qui sont aux extrémités sont plus courtes que les autres : elles sont d'un beau vert, & lisses par dessus, & un peu plus foncées par dessous avec un double rang de petites bossètes poudreuses, rondes & noires.

Cette plante aime les lieux frais : on en trouve souvent dans nos Antilles : quelque temps après qu'on l'a cuillie, ses feuilles se replient toutes en dedans, & se desarticulent fort-facilement, en sorte qu'elles tombent toutes laissant la tige nuë.

XXXVIII.

Polypodium foliis linguæ cervinæ majus.

Grand Polypode à feuilles de langue de cerf.

CETTE plante s'attache particulièrement contre les troncs des vieux arbres de la même façon que nostre polypode d'Europe, & sa racine luy ressemble aussi : c'est à dire qu'elle est grosse comme le doigt, & longue de cinq à six pouces, solide & verte en dedans, mais nouveüse par dehors, noirestre & accompagnée de quantité de fibres : ces nœuds sont un peu élevez & creux, & ne sont que le reste des vieilles tiges pourries.

Elle pousse six à sept feuilles longues de deux à trois pieds, pointuës dans leurs extrémités, étroites dans leur naissance, & larges dans leur cours, d'environ un pouce & demy, lisses & d'un beau vert par devant : leur pedicule qui est fort court, s'allonge en nervûre lisse & luisante, qui distribué de tous

costez des costes obliques & paralleles éloignées les unes des autres d'environ trois lignes, & traversées par plusieurs moindres, dans l'entre-deux desquelles il y a une verruë poudreuse & noirâtre, qui fait avec ses voisines un double rang tout le long des costes obliques, dont le vestige paroist de l'autre costé : ces feuilles sont ondées dans leur bord qui paroist assez bien distingué par une double nervûre.

On trouve frequemment cette plante dans les forests de nos Antilles, où on la prenoit ordinairement pour la scolopendre, ou langue de cerf, à cause que ses feuilles en ont la ressemblance. La plante que Breynius dans sa premiere centurie, appelle premier polypode des Indes, ressemblant à la Scolopendre, *polypodium Indicum primum scolopendriae facie*, a beaucoup de raport à celle-cy, & j'estime que c'est la mesme.

XXXIX.

Lingua cervina longo, lato, ferratoque folio.

Langue de cerf à feuilles longues, larges, & dentelées.

SA racine n'est proprement qu'une masse composée de tiges pourries, & de quantité d'autres petites racines courtes, cheveluës & noires. Il en sort sept ou huit feuilles de la mesme façon que celles de nostre langue de cerf vulgaire, mais beaucoup plus grandes : elles ont quelquefois deux pieds & demy de hauteur, & trois à quatre pouces de largeur : leur bout est pointu, & leur commencement étroit : elles sont de mesme consistance, & couleur que les nostres : le devant est uni, mais le dos est chargé d'une coste fort élevée, qui en fournit quantité de fort menuës, obliques, paralleles, & fort proches les unes des autres. Leurs bords sont découpez par de petites dentelûres un peu arrondies : au milieu des costes il y a comme de petits vermissaux poudreux fort adherans, & qui sont d'un tané-obscur.

J'en ay trouvé en plusieurs endroits de la Martinique & de S. Domingue, le long des ruisseaux & des ravines.

X L.

Lingua cervina foliis acutis, & ad oras summitatum pulverulentis.

Langue de cerf aiguë , à pointe poudreuse sur les bords.

Ses racines sont presque comme celles du polypode, mais beaucoup plus menuës, jettant quelques branches & quantité de petites fibres noires si fort condensées, qu'elles composent un espece de petit gazon : elles poussent sept à huit feüilles d'environ un pied de long, & d'un peu plus d'un pouce de large vers le milieu : leur pedicule est court : elles sont étroites par les deux bouts, particulièrement par celuy d'en haut qui est fort pointu & entouré tout le long du bord de derriere d'une poussiere fort menuë & tanée.

Elles sont épaisses & lisses, n'ayant aucune coste, mais seulement une nervûre noire qui les traverse tout le long : leur consistance est presque comme du gros vélin, & ont deux ou trois petites avances, tantost pointuës, tantost émoussées, vers le bord du milieu.

J'en ay trouvé quelques plantes dans l'Isle S. Domingue, le long d'un ruisseau proche le petit Goive, & dans l'Isle de la Tortuë.

X L I.

Lingua cervina longissimis & angustissimis foliis.

Langue de cerf tres-longue , & tres-étroite.

SA racine n'est qu'un amas de plusieurs pedicules pourris & de plusieurs petites racines roussastres & couvertes de mousse : elle jette quantité de feüilles tres-longues & tres-étroites : elles n'ont pas plus d'une ligne & demi de large sur environ trois pieds de long : elles sont solides & épaisses comme du parchemin, unies & d'un vert-gay par devant, mais toutes traversées de biais en derriere par quantité de petites costes fort proches les unes des autres ; elles ont aussi le bord replié en dedans & le bout fort pointu.

J'ay trouvé cette plante à la source de la riviere froide vers le quartier du Port-de-paix, dans l'Isle S. Domingue.

X L I I.

Phyllitis scandens, cauliculis squammosis.

Phyllitis montante, à tiges écaillées.

ELle pousse quantité de tiges fort longues & fort menuës qui s'attachent en serpentant sur les troncs des arbres, de la même façon que les tiges du lierre : ces tiges poussent quantité de branches deçà & delà, dont il y en a de tres-longues & de fort-courtes : elles sont toutes couvertes de petites écailles étroites, pointuës, tanées & parsemées de quantité de petits filaments, & elles ont de part & d'autre de temps en temps des feüilles alternatives d'environ quatre pouces de long, & sept à huit lignes de large du costé d'en-bas : elles ont le bord ondé & vont se retreffissant vers la pointe qui est un peu émouffée : leur consistance est membraneuse. Le devant est lisse d'un beau vert : le dos a une coste tout au long qui fournit d'autres costes fort menuës & ondées : entre l'espace de ces costes, il y a une verruë ronde poudreuse, & griffastre.

J'en ay trouvé en plusieurs endroits des Isles de la Martinique, & de S. Domingue.

X L I I I.

Adiantum saxosum, floridum.

Capillaire de roche, fleurissant.

CE capillaire ressemble fort à la deuxième espee de capillaire de G. Bauhin : il est pourtant un peu plus grand : ses feüilles sont plus rudes & plus ridées : ses racines sont fort minces, fibreuses & de gris-obscure : elles jettent deux pedicules tout au-plus, mais ordinairement elles n'en portent qu'un seul qui est menu, poli, rond & quasi de même couleur que la racine : ce pedicule a environ un pied & demy de haut, & il jette à peu près du milieu quelques branches deçà & delà rangées alternativement. La plus longue de ces branches a environ cinq pouces de long, les autres sont toujours plus courtes à mesure qu'elles approchent du bout de la tige, & se terminent par de petits aislerons pointus & dentelez.

Il y a deçà & delà de ces branches des feuilles assez proches, disposées aussi alternativement, & qui sont plus longues vers la tige & vont en diminuant vers le bout de la branche, qui finit de même que la principale tige. La plus longue de ces feuilles a environ un pouce & demy de long : elle est pointuë & découpée tout à l'entour par des aislerons dentelez : ces feuilles sont d'un vert-passe, & tant soit peu ridées par plusieurs petites costes relevées.

Environ un pouce au dessous des principales branches, tirant vers la racine, il sort du pedicule deux autres pedicules dressés en haut, fort minces & longs d'environ huit à neuf pouces, branchus alternativement au de la du milieu : la plus longue de ces branches a environ un pouce de long ; les autres diminuent aussi en montant & chacune de ces branches est chargée de petites grappes composées d'une infinité de fort-petits grains ronds de couleur chastein, de la même façon que nous voyons dans nostre *osmunda* ordinaire.

J'ay trouvé cette plante en fort peu d'endroits, & celui où j'en ay le plus rencontré est le long du Tapion entre le grand & le petit Goive de l'Isle S. Domingue.

X L I V.

Adiantum nigro simile, albissimo pulvere conspersum.

Capillaire semblable au noir, couvert d'une poussiere tres-blanche.

SA racine est toute cheveluë & noire : elle pousse plusieurs tiges aussi fort noires, lisses, luisantes, rondes, & menuës, longues d'environ deux pieds, & qui ont une vintaine de branches deçà & delà, situées quelquefois vis-à-vis l'une de l'autre, & d'autrefois alternativement : ces branches vont toujours diminuant à mesure qu'elles approchent de l'extrémité de la tige : la plus longue a près de sept à huit pouces : elles ont toutes deçà & delà des aislerons fort proches les uns des autres jusques au bout qui finit en pointe : ces aislerons sont aussi plus grands vers la tige que vers le bout : ils sont situés alternativement ; le plus grand a environ six à sept lignes de long, & quatre de large : ils sont pointus & découpez tout à l'entour par des dentelûres pointuës & un peu enfoncées : ils sont unis par dessus & d'un vert luisant & chargé ; mais par dessous ils sont tout couverts d'une poussiere fort menuë & fort blanche.

On en trouve quantité de cette espece dans la Martinique, tant

DES PLANTES DE L'AMERIQUE. 31

dans les bois humides que le long des hayes. Je crois que c'est le capillaire noir de l'Amerique couvert d'une poussiere tres-blanche de Breynius, dans la premiere centurie des plantes estrangeres. *Adiantum nigrum Americanum pulvere candidissimo aspersum, Breynii, plantarum Exoticarum centuria prima capite XC VII.*

An avença minor Georgii Marcgravii lib. 1. c. 12.

XLV.

Adiantum nigrum ramosum & bacciferum.

Capillaire noir branchu, portant des bayes.

SA racine est rouffastre, grande, fort touffuë & fort cheveluë, elle pousse sept à huit tiges de quatre à cinq pieds de haut, qui se divisent vers le milieu alternativement de part & d'autre en de longues branches, qui se soudivisent encore en des rameaux comme la fougere femelle, & ces rameaux soutiennent aussi de part & d'autre, à la distance de près d'un pouce, des costes d'environ un pouce de long, qui diminuent à mesure qu'elles aprochent des extrémitez: elles sont chargées deçà & delà de feüilles posées alternativement assez semblables à celles du *lonchitis*, d'environ demi-pouce de long sur trois lignes de large, & vont aussi en diminuant jusques au bout de la coste, où elles finissent par une pointe fort aiguë: leur contour est decoupé assez avant dans le tranchant, & crenelé vers le bout: on remarque au commencement de chaque crenelure une petite baye brune de la grosseur d'une graine de chou attachée sur la feüille. Toute la plante est d'un vert fort agreable, & se plaist le long des ruisseaux.

J'en ay trouvé particulierement en deux endroits de l'Isle S. Domingue vers le Port-de-paix, à la source de la riviere froide, & le long d'un ruisseau proche le Massacre.

XLVI.

Adiantum ramosum, foliis trapeziis, dentatis.

Capillaire branchu à feüilles trapezes, dentelées.

SA racine est fibreuse, noire & entortillée: elle pousse quatre à cinq pedicules noirs, fort menus, rudes & ronds, longs

d'environ deux pieds, quelquefois de trois, qui poussent des branches alternativement de part & d'autre, à la distance d'environ un pouce, depuis le milieu jusques au bout, qui est feüillû de mesme que les branches : les plus longues ont près d'un pied, & les plus basses sont fourchuës : elles sont garnies de feüilles fort près les unes des autres d'une figure aprochante de celle d'un trapeze, c'est-à-dire à quatre costez irreguliers, dont ceux qui forment l'angle exterieur sont crenelez, avec leur bords repliez en dedans : elles ont comme le capillaire commun, quatre à cinq lignes d'étenduë, vert-brun par dessus, mais un peu plus fillonnées en dessous par de petites costes qui s'étendent par toute la feüille.

X L V I I.

Adiantum nigrum, ramosum, pulverulentum, & falcatum.

Capillaire noir, branchu, & poudreux, à feüilles en faucille.

Cette plante naist de la mesme façon & grandeur que la precedente ; c'est à dire que sa racine, ses tiges, ses branches & ses feüilles sont situées de mesme, avec cette difference que ses tiges sont couvertes d'une poussiere rouffastre, qui durcit peu à peu & s'éleve en petites pointes, & qu'il n'y a aucune de ses branches fourchuës : ses feüilles sont coupées en faucille, courtes & arrondies par le bout, dont le tranchant regarde en haut : elles ont environ six lignes de long, & trois de large : le tranchant se replie en dedans comme dans les autres especes : le repli est couvert d'une petite poussiere grisastre.

X L V I I I.

Adiantum nigrum, pinnulis lonchitidis ferratis, minus.

Petit Capillaire noir, à pinnules dentelées de lonchitis.

Ce capillaire a le mesme port, la mesme grandeur, & pousse ses branches & ses feüilles comme les deux precedentes : ses pedicules sont lisses, fort noirs & luisants : les deux rameaux inferieurs en ont encore un petit de chaque costé : ses feüilles sont disposées de mesme façon, & sont de mesme figure que celles de
la

la precedente: elles ont presque neuf lignes de long & quatre de large. Leur pointe est plus aiguë, & leur contour n'est découpé de crenelûres que du costé qui regarde en haut & vers la pointe avec cette difference que les premieres crenelûres sont plus enfoncées & plus larges, arrondies & repliées en dedans. Leur dessus est d'un beau vert, mais tant soit peu chargé, & leur dessous est d'un vert-passe.

On trouve quantité de ces trois especes dans les forests de S. Domingue. J'en ay pourtant remarqué une especie dans la Martinique semblable en tout à la derniere, excepté qu'elle n'est pas si branchuë, & que ses feüilles sont beaucoup plus grandes, & un peu plus rudes au toucher. *An Avença major G. Marcgravii l. 1. c. 12.*

X L I X.

Adiantum ramosum, radiatum.

Capillaire branchu, radié.

Cette plante pousse plusieurs racines deçà & delà dans la terre, fort menuës, longues, branchuës & noires, qui aboutissent toutes à une petite tette garnie des fibres des pedicules pourris: les nouveaux pedicules sont noirs, deliez & luisants, d'environ un demi-pied de long: ils soutiennent chacun une feüille ronde semblable à une rosette d'environ trois à quatre lignes de diamètre, découpée en cinq ou six pieces arrondies, & tant soit peu dentelées. Du centre de cette feüille sortent six ou sept costes noires & deliées qui representent une especie d'étoile à rayons inégaux: dont les plus longs ont environ cinq à six pouces, & les plus courts deux & demy: ces costes sont garnies alternativement de part & d'autre de feüilles disposées à peu près comme celles du Polytrich; mais si près que leurs bases sont couchées les unes sur les autres: leur figure approche d'un demi-cœur d'environ cinq lignes de long & trois de large: leur couleur est d'un vert-gay & luisant, elles ont les bords crespez & crenelez, mais les crenelûres sont brunes & renversées sur le dos.

Je n'en ay trouvé que dans deux endroits de la Martinique, du costé des Anses d'Arlet, particulièrement dans le chemin qui va de la grande Anse d'Arlet à l'Anse-à-l'Asne. Le R. Pere du Tertre en parle sous le nom de Pôlytrich dans son traité 3. des Antilles ch. 1. tome 2.

L. figure a.

Adiantum muscosum, lichenis petræi facie.

Capillaire en mousse, semblable à l'hepatique de roche.

Cette plante a des racines fort menuës & tres-longues, qui tracent comme celles du chien-dent, & jettent plusieurs fibres noires qui s'attachent contre les rochers humides : elle ressemble assez par la disposition de ses feüilles au *lichen* ou *hepatique* de Mathiole : elles sont couchées comme par écailles, & couvrent presque tout un rocher sur lequel elles paroissent comme colées : elles ont la figure d'un éventail étendu, & sont fort deliées, d'un vert assez beau, & rayées fort legerement par de petits fillons disposez comme des rayons qui sont entrecoupez par d'autres fillons quasi circulaires : elles ont presque un pouce & demy de grandeur : leurs bords sont tous dentelez plus ou moins profondément : les dentelûres les moins profondes se replient en dedans comme les bordures du capillaire commun.

J'en ay trouvé en plusieurs endroits de l'Isle S. Domingue sur les roches humides le long des ruisseaux.

L. figure b.

Adiantum minus, foliis in summitate retufis.

Petit capillaire, à bouts refoulez.

SA racine est comme celle du polypode, mais beaucoup plus menuë : elle est cheveluë noire & tortuë, couverte d'une poussiere rousse, & elle trace de part & d'autre : elle pousse plusieurs pedicules deliez d'un vert fort-passe d'environ demi-pied de hauteur, divisez & sousdivisez en plusieurs rameaux plus deliez, chargez alternativement de feüilles qui approchent assez de la figure d'un triangle isoscele renversé, dont la base est un peu courbe & repliée sur elle-mesme : ce repli est grisastre & rend la feüille en cet endroit plus espaisse qu'ailleurs : quelques-unes de ces feüilles sont recoupées, mais la plupart sont entieres, de couleur vert-passe, & ont environ quatre lignes de long & une de large.

J'en ay trouvé en fort peu d'endroits : le lieu où j'en ay veü le plus, c'est le long d'un ruisseau appelé le *Trou du precipice*, proche le Moustique, dans l'Isle S. Domingue, aux endroits du Port-de-paix.

L. *figure c.*

Polytrichum faxatile, dentatum.

Polytrich de roche, dentelé.

Cette plante a plusieurs petites racines tortuës, griffastres, & accompagnées de plusieurs fibres fort-menuës; elles poussent quelques pedicules de differente grandeur: ceux qui sortent ou qui sont situés au milieu ont environ demi-pied de long, & ceux qui sont à costé n'ont pas trois pouces: les uns & les autres sont fort menus & noirâtres, & ont deçà & delà neuf ou dix paires de feuilles opposées les unes vis-à-vis des autres: ces feuilles sont grandes à proportion de leurs pedicules, car celles des plus longs ont près de neuf à dix lignes de longueur & cinq à six de largeur, mais celles des petits n'en ont pas plus de trois à quatre: les unes & les autres sont comme ovales, si on en excepte la base qui est pointuë & étroite: elles sont membraneuses, dentelées vers le bout, fort unies par devant & d'un beau vert, mais un peu plus chargé par derriere: chaque pedicule finit par une feuille découpée en façon de trefle, & les trois ou quatre feuilles qui sont situées presque au milieu des grands pedicules, ont par derriere quelques bossettes poudreuses, longues & tanées.

Cette plante devient plus grande ou plus petite suivant que le lieu où elle naît est sec ou humide. J'en ay trouvé en plusieurs endroits sur les rochers de l'Isle de la Tortuë située vis-à-vis du Port-de-paix de l'Isle S. Domingue.

Muscus squamosus, erectus.

Mousse droite, écaillée.

Voyez la planche xxiv. *figure a.*

SA racine est fort petite & fort fibreuse, de couleur-brun; elle ne pousse qu'une seule tige, ronde, de la grosseur d'une ligne & haute d'environ un pied, dure comme du bois, & d'un vert fort chargé: elle se tient droite, & est toute couverte en façon d'écaillés par de tres-petites feuilles presque de la forme d'un petit cœur, c'est à dire pointuës au bout & arrondies à la base: elle n'est branchuë qu'environ trois pouces par dessus la racine, mais

E ij

depuis cet endroit jusques au bout, elle est comme panachée par plusieurs petites branches mises alternativement : qui sont branchuës de mesme que la tige, & s'amoindrissent toujors à mesure qu'elles avancent vers le bout de la tige : elles sont aussi couvertes de feüilles de mesme façon, mais plus petites & plus proches les unes des autres, se surmontant en façon d'écaïlles & alternativement. Le vert des branches est un peu plus clair que celui de la tige, & rend la plante d'un aspect fort agreable.

Muscus repens, squammosus.

Mousse rampante, écaïllée.

Voyez la planche xxiv. figure b.

Cette plante s'étend fort au large à la façon de nos chiens-dents, & pousse quantité de petites tiges tres-menuës & grifës, qui jettent deçà & delà plusieurs branches attachées à la terre par de tres-petites racines cheveluës, qui prennent naissance au commencement des branches principales : ces branches sont attachées alternativement à la tige, & sont éloignées les unes des autres d'environ deux pouces : chacune est longue de près de trois pouces, & jette deux ou trois autres branches aussi alternativement : ces dernieres se fourchent & se sousdivisent encore en deux, & celles-cy en deux autres beaucoup plus courtes que la principale, la plus longue n'ayant pas plus de cinq à six lignes de long : les tiges & les branches principales ont deçà & delà de tres-petites feüilles attachées alternativement, mais un peu plus écartées les unes des autres, au contraire de celles des rameaux qui sont beaucoup plus petites, & qui se touchent presque toutes : elles ont environ une ligne de long : leur bout est pointu & leur base presque ronde : elles sont aussi attachées immédiatement aux branches qui sont encore toutes couvertes d'autres écaïlles tres-petites.

J'ay trouvé la premiere de ces plantes le long du ruisseau du Fort S. Pierre à la Martinique, & la seconde dans les forests de l'Isle S. Domingue.

L I. *figure a* & L II.*Colocasia hederacea, sterilis, latifolia.**Colocasia montante, sterile, à larges feüilles.*

J'Appelle les quatre plantes suivantes steriles, à cause qu'après avoir pris beaucoup de peine pour les observer en diverses saisons de l'année, & en avoir vu assez bon nombre, je n'y ay jamais peü remarquer ni fleurs ni fruits. Ce n'est pas que je puisse assurer qu'elles n'en portent point du tout, puisque Dieu a donné à chaque plante une semence pour pouvoir se perpetuër; mais si elles en portent c'est bien rarement, tout de mesme que la *Colocasia* d'Egypte, qui a causé de si grandes disputes parmi quelques celebres Botanistes, touchant sa fertilité. Je leur ay donné aussi le nom de *Colocasia*, à cause que leurs feüilles ont presque la mesme consistance que la *Colocasia* d'Egypte, qui est l'*Arum Maximum Aegyptiacum* de Gaspar Bauhin.

Elles sont tout-à-fait semblables entr'elles dans leur maniere de croistre; & elles s'attachent contre les rochers, ou contre les arbres, de la mesme façon que nos lierres: leurs feüilles sont pourtant differentes; leurs racines principales c'est-à-dire celles qui sont dans la terre, sont à peu près de mesme figure & de mesme grosseur que leurs tiges; car elles sont longues, noüeuses, blanchâtres, & poussent de chaque noëud trois ou quatre autres racines, longues, rondes, blanches, & tendres, qui ressemblent à des vermisseaux assez longs.

Chaque plante ne pousse ordinairement qu'une tige, qui grimpe tout le long des troncs des arbres: la tige de la premiere espece est tout-à-fait ronde, & de la grosseur d'un pouce; sa substance interieure est charnuë, blanche, succulente, & meslée de quelques fibres: elle est lisse, verte, & noüeuse en dehors, à peu près comme nos roseaux: les noëuds sont éloignés d'environ un pied l'un de l'autre: ils sont creusés par un petit canal tout au tour, qui represente assez bien la scotie d'une base de colomne ou le canal d'une poulie; outre cela, ils sont aplatis en écussion ovale dans les endroits où ils s'attachent aux arbres ou aux rochers voisins, & cet écussion est couvert de deux membranes, dont la premiere est fort mince, de couleur-chastain, & frisée sur les bords, l'autre qui est par dessus est plus épaisse & de couleur grisâtre: à costé de cet écussion sortent plusieurs petites racines longues d'environ un

pouce & demi, grosses comme de la ficelle ordinaire, & tournées toutes d'un mesme costé.

Il sort aussi de chaque nœud & alternativement un fort long pedicule rond, gros comme le petit doigt, & de mesme consistance que la tige, qui porte une feuille semblable en figure & en grandeur à celle de la *Colocasia* d'Egypte, ces feuilles ont plus d'un pied d'étendue: elles sont presque ovales, mais un peu pointuës par le bout, & taillées profondement en cœur vers le pedicule: leur consistance est la mesme que celle de la *Colocasia* ou de nos especes de pied-de-veau, si ce n'est qu'elle est un peu plus solide: elles sont fort lisses & d'un beau vert, ayant par dessous une nervûre assez large & élevée, qui fournit deçà & delà quelques costes traversieres aussi élevées, dont l'entre-deux est tout fillonné par quantité de veines.

Cette plante est un violent caustique; je voulus la goûter en la décrivant, mais à peine eûs-je mordu un bout de la tige, que ma bouche s'enflamma si fort, qu'il me fut impossible de pouvoir parler pendant près de deux heures, de sorte que je fus obligé de tenir la bouche ouverte, & mesme de tirer la langue en dehors autant que je pûs. L'oxicrat dont je me servis abbatit bien cette inflammation, mais je fus pendant plus de dix jours sans pouvoir connoître le goût de ce que je mangeois, à cause que l'acrimonie de ce suc m'avoit brûlé la langue & le palais: c'est pour cette raison qu'on la nomme vulgairement *Liane brûlante*. On en trouve en plusieurs endroits dans les forests de l'Isle S. Domingue.

L I. figure b. & L I I I.

Colocasia hederacea, sterilis, & laciniata.

Colocasia montante, sterile, & découpée.

CElle-cy pousse à chaque nœud de sa tige deux ou trois racines longues & presque de la grosseur d'une ligne: les pedicules des feuilles sont plus longs & plus gros que ceux de la precedente: les feuilles ont presque la mesme grandeur, & sont de mesme consistance, mais elles sont découpées fort profondément tout au tour, à peu près comme celles du *Palma christi*. Leur dessus est fort lisse & d'un beau vert, & le dessous est soutenu par une grosse nervûre qui envoie des costes asses élevées à chaque bout des découpûres, & qui fournissent par toute l'étendue de la

feuille quantité de petites veines fort proches les unes des autres.

J'en ay trouvé quantité dans l'Isle de la Tortuë, le long d'un vallon qu'on nomme La ravine de la rouffiere.

LI. *figure c.* & LIV.

Colocasia hederacea, sterilis, angustifolia.

Colocasia montante, sterile, & à feuilles étroites.

Elle-cy a sa tige beaucoup plus menuë & plus noüeuse que les precedentes : ses feuilles ont environ un pied de longueur & un demi-pied de largeur vers la base : elles ont presque la figure du fer d'une flèche, excepté que les deux pointes d'enbas sont arrondies avec deux petits replis en dedans : leur nervûre & leurs costes sont de mesme que celles des autres, & les petites veines qui rendent les entre-deux de ces costes comme fillonez, vont se terminer a une ligne ondée qui court tout à l'entour de la feuille comme une double bordure.

J'ay trouvé celle-cy dans le mesme endroit que la precedente.

LI. *figure d.* & LV.

Colocasia hederacea, sterilis, minor, folio cordato.

Petite Colocasia, montante, sterile, & à feuilles en cœur.

Elle a sa tige un peu plus menuë que celle de la premiere espece, & ses nœuds sont aussi plus près les uns des autres, mais elle est beaucoup plus branchuë, & rampe sur les arbres de la mesme façon que nostre vigne sauvage : elle a à chaque nœud un écusson entouré de racines vermiculaires longues d'un pouce, par lesquelles elle s'attache contre les troncs des arbres : il y a aussi à chaque nœud une feuille attachée à un pedicule d'un demi-pied de long, & gros de deux lignes, canelé dans son commencement, mais rond dans la suite : ces feuilles ont environ quatre pouces d'étendue, & sont taillées en façon d'un cœur, leur consistance est un peu plus épaisse que celle des autres : leur nervûre & leurs costes sont grandes & relevées à proportion : elles ne sont point fillonnées, mais fort lisses & d'un beau vert, & l'on voit une petite tache ronde & rougeastre qui répond à l'endroit où elles reçoivent le pedicule.

Les extremittez de chaque branche sont comme envelopées d'une longue feuille étroite & pointuë, blanchastre & membraneuse, qui venant à s'ouvrir, se détache de son insertion, tombe & laisse espanoüir une feuille nouvelle ; cette mesme extremité venant à s'alonger en produit une autre de mesme.

J'en ay trouvé en plusieurs endroits de la Martinique , particulièrement le long du ruisseau qui traverse le Fort S. Pierre proche le Mont-Noël.

LVI. & LVII.

Arum hederaceum, amplis foliis perforatis.

Arum montant, à grandes feuilles percées.

Quelques Auteurs ont remarqué que cette plante est un remede souverain contre la morsure des bestes venimeuses, aussi on en trouve en plusieurs endroits de la Martinique, qui est particulièrement infectée de viperes fort dangereuses.

Elle s'attache contre les troncs des arbres de la mesme façon que nos lierres : sa tige qui monte en serpentant a un peu plus d'un pouce de grosseur, & paroist comme écaillée, à cause des marques des feuilles qui en sont tombées ; elle est un peu ridée : son fond est de couleur de cendre, & les marques des feuilles sont vertes & picotées de quantité de petits points plus foncez : elle jette de part & d'autre quantité de racines qui s'attachent contre les troncs des arbres, dont la plupart sont fort menuës & courtes, & quelques autres sont fort longues & un peu plus épaisses qu'une plume à écrire : elles sont rousses, fort souples, & fort adherantes aux troncs des arbres. La substance interieure de cette tige est fort blanche, charnuë & meslée de fibres.

Elle pousse des feuilles alternativement fort proches les unes des autres sur-tout vers le haut, d'environ un pied & demi de longueur, & de neuf à dix pouces de largeur ; elles sont presque pointuës au bout, & arrondies vers le pedicule, qui a environ un pied de long, & qui est gros comme le petit doigt, canelé depuis le milieu jusques au bas, mais arrondi dans le reste & un peu tumefié dans l'endroit où il s'insere dans la feuille.

Ces feuilles sont lisses & membraneuses, tendres, d'un vert fort agreable, plus clair par dessus que par dessous, qui est chargé d'une nervûre & de plusieurs costes obliques & élevées. La maniere dont elles sont percées parmi leurs costes est fort remarquable. On

trouve

trouve une grande fente dans l'espace compris entre deux de ces costes, qui ressemble en quelque façon à une playe ouverte & rebordée en dedans, & toute la feuille a quelque apparence d'un masque assez grotesque.

Il sort du sein des feuilles superieures une espece d'envelope qui est une feuille un peu plus épaisse que les autres, & semblable à celle qui renferme le fruit du pied-de-veau commun en Latin *Arum vulgare*: elle a plus de demi-pied de long: sa substance est membraneuse, verte par dehors, jaune, luisante, & fort unie en dedans: quand elle s'ouvre, on decouvre un fruit d'une structure admirable, fait a peu près comme un épi de bled de Turquie, de forme cylindrique, mais arrondi par le bout: il a environ cinq pouces de long sur un pouce de diametre: il est fort tendre, fort poli, de couleur d'or, & comme buriné par quarrceaux à six pans de la grandeur d'une lentille, disposez comme les cellules d'une ruche de mouches à miel: au milieu de chaque quarrceau, il y a une petite bossette un peu plus longue que large de couleur d'azur, de façon qu'il semble que ce soit un saphir enchassé dans un chaton doré. Je n'ay pas pu voir ce fruit en sa maturité, ayant esté obligé de partir avant le temps.

J'en ay trouvé en plusieurs endroits de la Martinique, mais plus particulièrement le long du ruisseau du Fort S. Pierre, ou je la vis au mois de May, dans l'état que je viens de la décrire.

C'est le bois des couleuvres du R. P. du Tertre dans son histoire Naturelle des Antilles, traité 3. chap. 3. parag. 13. c'est le *Clematis Malabarensis, foliis vitis, colore dracunculi* de G. B. c'est enfin le *lignum colubrinum primum* Acoſta, *Lugd. lib. 18. cap. 140.* où il dit qu'on estime ce bois un remede souverain contre la morsure des couleuvres & des viperes; & que les habitans du païs allant à la campagne ont coustume la plupart de le porter avec eux; persuadez à ce qu'ils disent, qu'il chasse les serpens par sa seule odeur, & que les couleuvres crevent s'ils les peuvent atteindre avec ce bois.

LVIII. & LI. figure e.

Arum hederaceum, triphyllum & auritum.

Arum montant, en trefle & à oreillons.

C Elle - cy naist de la mesme façon que la precedente; c'est à dire qu'elle s'attache & rampe contre le tronc des ar-

bres : sa tige a plus d'un pouce d'épaisseur : elle est ronde , d'un vert cendré , lisse , & de mesme substance que les autres : elle a plusieurs nœuds annulaires fort près les uns des autres , & chaque nœud pousse une racine fort longue d'environ une ligne d'épaisseur : elle jette plusieurs branches qui s'étendent de tous costez.

Les feuilles naissent au bout des branches alternativement , & fort près les unes des autres : leur pedicule a presque deux pieds de long : son commencement est fort large & embrasse la tige : il est creux à la façon d'un canal jusques environ le tiers , en suite il est tout rond , & il a environ deux lignes d'épaisseur ; la feuille qu'il soutient est de la mesme substance que celle de nos especes de pied-de-veau en Latin *Arum* : elle est fort lisse , & presque de la figure d'un fer de pique : elle a environ neuf a dix pouces de long , & près de demi-pied de large : elle est accompagnée de chaque costé d'une feuille encore plus petite , & chacune de ces feuilles a une oreillette placée du costé du pedicule : leur nervûre qui parcourt toute leur longueur fournit deçà & delà quelques veines menuës & obliques qui se terminent sur une petite coste qui court tout à l'entour de la feuille. Leur dessous est teint d'un fort beau vert , & le dessus est un peu plus chargé.

Les fruits naissent parmi les pedicules de ces feuilles semblables à ceux de nos pieds-de-veau : leur envelope a neuf ou dix pouces de long : elle est comme étranglée vers le tiers de sa hauteur , lisse tant en dedans que dehors , d'un vert tout a fait beau , mais la moitié d'en-bas du dedans est d'une couleur de feu tres-agreable , & le reste est vert-passe.

Elle enferme comme deux pilons joints ensemble par un col fort étroit de couleur vermeille , cylindriques , & longs de sept à huit pouces sur plus d'un demi pouce d'épaisseur ; celui d'en-haut est au double plus long que celui d'en-bas : il est tant soit peu enflé par le milieu & émoussé dans son bout ; il est comme doré & tout buriné par deux lignes spirales , qui montant l'une à droit & l'autre à gauche , composent un raisseau dont les quareaux sont comme joints par une espece de future : ils ont chacun en leur milieu un petit trou fort enfoncé. La partie d'en-bas est divisée en quareaux hexagones berlongs de couleur vert-gay , dont les extremités s'emboëntent l'une dans l'autre , & il y a dans le fond de chacun une petite demi-boule fort blanche , de sorte qu'il semble qu'on ait enfoncé une perle dans une émeraude.

Je n'ay pas pu voir ce fruit en sa maturité : toute la plante jette un suc blanc comme du laiët & qui est fort acre. J'en ay trou-

vé en plusieurs forests de l'Isle S. Domingue, sur-tout le long des ruisseaux & dans les lieux humides.

LIX. & LI. *figure f.*

Arum hederaceum, foliis bissectis, rigidis, & sulcatis.

Arum montant, à feuilles fermes, froncies, & fenduës.

SA tige a environ un pouce & demi d'épaisseur : elle s'attache fortement contre les troncs des arbres par plusieurs petites racines fort longues ; son écorce est de couleur cendré, toute couverte de poussière, & est aussi fort inégale & raboteuse par la chute de ses feuilles. Sa consistance intérieure est blanche, & beaucoup plus fibreuse que celle des précédentes.

Elle porte vers le bout sept à huit feuilles appuyées chacune sur un pédicule d'environ un pied & demi de longueur, & épais de quatre lignes, enflé par le bas, rond par le dos & sillonné par devant ; elles ont bien deux pieds & demi de longueur & leur plus grande largeur est de huit pouces : elles sont fenduës jusques vers le milieu, & ressemblent à deux feuilles du *lilium convallium*, jointes ensemble par la partie inférieure. Le pédicule s'allonge en nervûre jusques à la division, & depuis cette nervûre elles sont plissées jusques à leur extrémité de la même façon que le *palma minor* de G. Bauhin, ou comme un éventail : elles sont fort roides, fort luisantes, d'un vert clair par dessous & d'un vert chargé par dessus.

Il sort parmi les pédicules de ces feuilles quelques fruits qui panchent en-bas, & qui sont attachez chacun à des pédicules de plus d'un demi-pied de longueur, sur trois à quatre lignes d'épaisseur, articulés en deux ou trois endroits, & garnis en chaque articulation d'une feuille creuse, longue, étroite & grisâtre : toutes ces feuilles enveloppent le fruit dans sa naissance, de même que celles du bled de Turquie. Ce fruit est cylindrique, long d'environ quatre pouces sur un de diamètre, émoussé par le bout, & tout couvert, lorsqu'il sort de ces enveloppes, de quantité de filaments assez longs & menus comme des cheveux d'un tané fort obscur & entortillez presque comme ceux d'une perruque : ces cheveux étant tombez, on voit tout ce cylindre à découvert : il est entaillé d'une gravûre admirable, c'est à dire par des quarrceaux disposés en raieau de trois à quatre lignes de large. Leur fond est vert, les angles intérieurs ont chacun une entailure, dentelée, relevée, & qui en occupe tout le fonds. Il y a dans le milieu, comme dans

le champ d'un écuillon, quatre bossettes de couleur brun plus longues que larges, disposées en croix de Saint André, avec une petite éminence dans chaque coin semblable à une caruncule.

Je n'ay pas pû voir ce fruit en sa maturité, non plus que celui de la précédente. J'ay trouvé celle-cy dans les forests de la Cabsterre vers la paroisse de sainte Marie.

LX. & LI. *figure g.*

Arum arborescens, sagittariæ foliis.

Arum arbre, à feuilles de sagittaire.

Cette plante naît dans les lieux marecageux & humides. Sa racine est presque aussi grosse que le bras, & longue de deux pieds: elle est blanchâtre & noïeuse en dehors; blanche, tendre & douceâtre en dedans: elle ne pousse ordinairement qu'une tige épaisse d'environ deux pouces, & haute de cinq à six pieds, assez ferme, ronde, & noïeuse presque comme nos roseaux: son écorce est unie & vert-cendré, & son intérieur est charnu & mêlé de filaments: les feuilles sont situées au bout, ou de la tige ou des branches: il y en a ordinairement cinq ou six d'environ un pied d'étendue: elles ont presque la forme d'un fer de flèche ou des feuilles de notre *Sagittaire*: elles sont lisses & membraneuses, ayant le dessous d'un vert fort-agreable avec quelques nervûres, & costes assez élevées, & le dessus teint d'un vert un peu plus chargé: leur pedicule a environ un pied de long: il est fait en gaine depuis le bas jusques vers le milieu, rond dans le reste, & de trois ou quatre lignes d'épaisseur.

Les fruits naissent parmy ces pédicules, fort peu différents de ceux de nos especes d'*Arum*: ils sont enfermez de même dans l'enveloppe d'une feuille étranglée vers le milieu, comme le col d'unealebasse: elle est pointuë & épaisse comme du cuir, unie & lisse, verte en dehors, blanchâtre en dedans, & teinte par tout le fonds d'un rouge obscur.

Le fruit qui y est enfermé ressemble à un pilon d'environ deux pouces de long, épais d'un & demi, jaunâtre & comparté par des figures hexagones, rangées comme les quarréaux des vitres à losange, d'environ quatre lignes d'étendue, avec une petite fosse au milieu de leur aire. Ce pilon en supporte un autre un peu plus long, & un peu plus mince, émoussé par le bout, un peu enflé vers le milieu, ferme, passe, & rayé en dehors en façon d'un rai-

seau confus : celui-cy se seche entierement & le premier devient une espece de grape composée de plusieurs bayes de la grosseur de nos pois chiches toutes taillées à pan, de couleur de pourpre, fort tendres & succulentes,

Le fruit & les feüilles échauffent & piquent la langue, quoyque sa racine soit douçastre & d'un assez bon goust : elle est ordinairement rongée par les souris, & par les crabres.

Arum Brasilianum arborescens ; folio sagittaria, paradisi Batavi, in prodromo.

LXI. & LI. figure h.

Arum caulescens, cannæ Indicæ foliis.

Arum à tige, & à feüilles de la canne d'Inde.

LA racine de cette plante est grosse presque comme la moitié du bras, & d'une longueur indéterminée : le dedans est fort tendre, blanc & tant soit peu piquant : elle est grisâtre en dehors, & a plusieurs autres petites racines blanchâtres de plus d'un pied de longueur, de deux ou trois lignes de grosseur, & accompagnées de quantité de petites fibres.

Elle s'éleve en une tige fort droite, de trois à quatre pieds de haut, d'environ deux pouces d'épais, ronde, verte, unie, un peu variée par les marques des vieilles feüilles, de la mesme consistance que la racine, & pleine d'une humeur blanche comme du lait.

Il y a au bout de cette tige sept à huit feüilles fort tendres d'environ un pied de long sur demi-pied de large, pointuës au bout, & quasi arrondies vers le pedicule : elles sont d'un vert fort gay, lisses tant dessus que dessous, ayant plusieurs costes fort courbes, mais qui paroissent peu, & qui les traversent obliquement depuis la nervûre principale qui est fort élevée, jusques au bord : leurs pedicules ont environ un pied & demi de long : ils sont creux & larges du commencement, & arrondis depuis le milieu en haut.

Il sort parmi le creux de ces pedicules quelques fruits formez du commencement comme un double pilon jaunâtre, d'environ huit à neuf pouces de long, & près de demi-pouce d'épais, envelopé dans une feüille comme dans un étui membraneux, fort uni, teint par dehors d'un vert-passe, mais teint en dedans de couleur de pourpre, qui ouvrant son extremité fait paroistre en

dehors la partie supérieure de ce pilon, laquelle est toute gravée en raiseau par des figures quadrilateres dont les costez sont fort arrondis, ayant au milieu une petite fosse. La partie inférieure qui est enfermée dans l'étui, est toute chargée en devant par un double rang alternatif de petits boutons joints ensemble, & presque de même grosseur, que la semence de la *mercuriale masle*. Ils sont d'un fort beau rouge, & accompagnez à leur base de quelques petits vermiculeux blancs & fort tendres.

Je n'ay pas pû voir ce fruit en sa maturité: cette plante aime les lieux couverts & les forests humides. Je l'ay trouvée en plusieurs endroits de la Martinique, & de S. Domingue: celle qui vient dans la Martinique est extrêmement caustique, & celle de S. Domingue n'a presque point ou fort peu d'acrimonie.

Pison dans son livre quatrième des facultez des simples ch. 70. nous donne deux plantes sous le nom d'*Aninga*, où il dit qu'il y en a une qu'on nomme *Aninga-iba*, laquelle comme je crois est l'*Arum, arbre, à feuilles de sagittaire*, décrit au chapitre precedent, quoy qu'elle ait les feuilles arrondies & semblables à celles de la *Nymphaea*, car j'ay pris garde en divers endroits que ces feuilles sont tantost plus & tantost moins pointuës, ce qui ne peut causer une difference fort essentielle, si ce n'est qu'on veuille dire que celle dont Pison parle est un *Arum arbre, à feuilles de Nymphaea*. L'autre *Aninga* est sans doute la plante que je décris en ce chapitre, comme il est aisé de voir par la structure de leurs feuillages dans la figure que j'en ay donné, & dans celle que Pison en donne. Le même Pison parlant des qualitez de l'*Aninga-iba*, dit qu'elle a une grosse racine bulbeuse, qu'on doit preferer aux feuilles, & au fruit dans l'usage de la medecine, puisque outre les premières qualitez froides qu'elle a, elle est encore composée de parties tenuës, propres à emporter les obstructions, & est employée en divers usages par les Portugais, & par les Sauvages.

On fait en suite des fomentations contre l'inflammation & les obstructions des reins, & des hypocondres: enfin l'huile qu'on tire de l'*Aninga*, est tres-souveraine contre les maux susdits, & peut suppléer à l'huile de Capres.

Si on fait des bains de ses racines cuites dans de l'urine humaine, & qu'on les reitere quelquefois, ils soulagent extrêmement les douleurs, & les maladies articulaires, tant inveterées que recentes.

L X I I.

Arum foliis rigidis, angustis, & acuminatis.

Arum à feuilles fermes, étroites & pointuës.

Cette plante a plusieurs racines de differente grosseur, entremeslées les unes dans les autres, roussastres en dehors, & blanches en dedans : elle pousse plusieurs feuilles dès la racine d'environ un pied & demi de long, & de trois pouces à l'endroit le plus large : elles sont pointuës, dressées en haut, solides, épaisses, unies, teintes d'un beau vert, & comme pliées en dedans ; leur pedicule a environ un pouce de long, sur quatre lignes d'épaisseur, & plié à la façon d'un coude vers le commencement de la feuille, qui a une nervûre en dos d'asne tout au long, avec quelques petites costes traversieres, mais qui ne paroissent quasi pas.

Il y a parmi ces feuilles quelques pedicules assez longs, ronds, épais d'une ligne, portant chacun un fruit, qui étant meur, a prés de neuf à dix pouces de long, sur un pouce d'épais, rond & finissant peu à peu en pointe émoussée. Il sort d'une feuille membraneuse qui luy servoit d'envelope, & il est tout entaillé par deux lignes spirales, qui se croisant, forment des quareaux en raisseau de trois à quatre lignes d'étendue, teints d'un violet passe, ayant chacun une baye enchassée dans son champ, de la grosseur d'un pois, formée comme un petit cœur de couleur d'Amethyste où violet clair meslé de rouge, molle, unie & luisante, pleine d'un suc blanc & mucilagineux, qui enferme deux semences noires, & tant soit peu longues.

Le fruit & les feuilles piquent la langue quelque temps après qu'on les a maschées. On en voit ordinairement dans les forests humides, sur les troncs des vieux arbres : le fruit est exprimé dans la planche, quand il est en sa maturité & lorsqu'il ne fait que de naître.

Quelques-uns appellent cette plante *Perroquet*, sur quoy il faut sçavoir, qu'on voit dans nos Isles plusieurs differentes especes de plantes qui naissent de la mesme façon que celle-cy, ayant leurs feuilles disposées comme celles des aloës vulgaires ; elles naissent aussi immediatement sur les troncs des arbres, & on les nomme generalement *perroquets*.

LXIII. & LI. *figure i.*

Dracontium amplis foliis, cordatis, radice nodosa rubra.

Grande Serpentaire, à grandes feuilles en cœur, à racine rouge, & nouëuse.

Cette plante naît particulièrement sur les troncs des gros arbres, d'où elle semble prendre naissance à la façon de nos guys, quoy qu'elle ait une racine grosse presque comme le bras, & de près d'un pied de long; mais comme elle est ordinairement toute couverte de mousse, il semble qu'elle sorte immédiatement du tronc des arbres: elle est tortuë & fort nouëuse, couverte d'une poussière rouffastre: sa substance est presque comme celle des racines de nos roseaux, mais pourtant un peu plus tendre, & comme spongieuse, de couleur de sang un peu pâle, & d'un goût fort astringent; elle s'attache contre les arbres par plusieurs petites racines: & pousse sept ou huit grandes feuilles de près de deux pieds d'étenduë, faites en façon d'un cœur, lisses, membraneuses, & luisantes, d'un vert-chargé par dessus, mais teintes par dessous d'un vert-clair, & soustenuës par une nervûre, & par quelques costes assez élevées: leur pointe panche en bas, & leurs pedicules sont fort longs, & ont bien près de trois lignes de grosseur: ils sont roides, unis, ronds, & tant soit peu creusés en devant.

Outre les pedicules des feuilles, il en sort deux ou trois autres d'environ deux pieds de long tout à fait ronds, & lisses, qui portent chacun un fruit qui panche en-bas, d'un pied de long, & d'un pouce d'épaisseur dans le commencement, & qui se retrescit peu à peu jusques au bout, qui est un peu émouffé. Il est rond, & fort comme de l'enveloppe d'une feuille membraneuse, étroite & pointuë: sa substance est tendre, & teinte en dehors d'un violet fort chargé: sa superficie est toute entaillée par une ligne spirale, dont les intervalles sont entrecoupez par d'autres lignes qui composent de petits quarréaux, ou parallelogrammes situés obliquement, ayant chacun au milieu de leur champ, une petite bosse ronde, & bleüe, qui ressemble fort bien à un saphir enchassé dans un Améthiste. Je n'ay pourtant pu voir ce fruit en sa maturité entière.

Plusieurs habitans appellent cette plante de la *Schine*, à cause que sa racine est grosse, nouëuse, & rouge, presque comme celle de

de la véritable Schine ; mais ils se trompent , puisque la véritable Schine est une plante épineuse , qui rampe sur les arbres à la façon de nos houblons & couleuvrées , comme je montreray par la description , & par la figure que j'en donneray dans le volume suivant. J'ay dessiné pourtant la racine de ce *dracontium* , après l'avoir bien nettoyée de sa mousse , & de sa poussière , pour la mieux donner à connoître.

LXIV. & LXV.

Dracontium hederaceum , polyphyllum.

Grande serpentaire , montante , à plusieurs feuilles.

SA tige est presque de même grosseur , couleur & consistance que celles des précédentes , LVIII. & LIX. Elle pousse aussi des racines de même façon , & s'attache contre le tronc des arbres : elle produit vers le bout quelques feuilles qui ont souvent plus de trois pieds d'étendue : leur pedicule a près de quatre pieds de long , & environ quatre lignes d'épaisseur ; il est plus gros par le bas , & tumefié dans l'endroit où il s'attache à la feuille ; il est roide , fort uni , d'un beau vert , & arrondi , excepté par le devant où il est sillonné.

Les feuilles sont fendues par neuf ou dix découpûres , à peu près comme celles de notre *Agnus Castus* , ou comme celles du *Magnoc* ; les découpûres n'arrivent pas pourtant jusques au pedicule : elles sont épaisses comme du gros parchemin , toutes lisses , d'un vert fort chargé par dessus , & un peu plus clair par dessous : il y a aussi une nervûre tout le long de chaque découpûre , fort relevée , & un peu enflée vers le pedicule , qui fournit quelques costes deçà & delà plus menuës & fort courbées.

Il sort parmi ces feuilles quelques fruits attachez chacun sur un pedicule un peu plus delié & plus court : ces fruits ont plus d'un pied de long , & ils sont épais d'un pouce vers le pedicule : ils panchent en-bas , & ils sont enveloppez , avant qu'ils paroissent , dans une feuille membraneuse , pointuë & toute sillonnée par quelques veines d'un vert blanchâtre : ils sont verts au commencement & tout tracez de gauche à droit , par des lignes spirales , qui étant entrecoupées par d'autres lignes , forment des quarrs où losanges d'environ deux lignes d'étendue , & qui ont chacun au milieu une bossette quarrée , un peu relevée , & en-

chassée dans le losange, comme la pierre d'un anneau dans son chaton.

Je ne les ay jamais pu voir en leur maturité, quoyque j'en aye veû assez bon nombre le long du chemin qui va du Fort S. Pierre à la Cabsterre, mesme vers la paroisse Sainte Marie de la Martinique, sur tout dans l'habitation de M. de la Calle.

L X V I.

Saururus hederaceus, cauliculis maculosus major.

Grande queue de lézard, rampante, & tachetée.

Cette plante & les suivantes ayant beaucoup de raport par leurs fruits aux precedentes, j'ay cru qu'il estoit bon d'en parler après, & comme on ne sçauoit les rapporter à un genre connu, je me fers du nom de *Saururus*, qui exprime la ressemblance que leurs fruits ont avec la queue d'un lézard; car *σαῦρος* veut dire *lézard*, & *οὐρα* signifie *queue*.

Cette espece rampe & s'attache contre les rochers & les arbres voisins: sa racine principale & sa tige sont fort semblables: leur épaisseur est d'un demi-pouce: elles sont lisses, plus tendres que celles des plantes precedentes, & garnies de nœuds disposez inégalement; mais la couleur de la racine est blanchastre, & celle de la tige est d'un vert un peu passe, marqueté de taches de couleur de pourpre: les nœuds inferieurs ont cinq ou six racines fort longues & minces, qui s'attachent contre les rochers ou contre les arbres, mais ceux d'en-haut poussent chacun une feuille, dont la pointe est tournée en-bas: leur pedicule s'insinue dans le champ de la feuille; il a près d'un pied de long, & environ deux lignes & demi d'épais, il est aussi fort uni & tout tacheté de quantité de petites marques rouges, comme celles de la tige.

Les feuilles ont plus de demi-pied de long, & quatre pouces de large: elles ont presque la figure d'un fer de lance, quoy que pourtant arrondies, & un peu échancrées en façon d'un cœur vers le pedicule: leur consistance est fort épaisse, tendre & succulente de mesme que les feuilles de nostre grande joubarbe, que G. Bauhin appelle *sedum majus vulgare*: leur goust est fade, elles sont lisses, d'un vert-blanchastre par dessous, avec une nervûre assez élevée, qui distribuë deçà & delà quatre ou cinq costes fort minces, & courbes; mais leur dessus est d'un vert fort chargé, ayant quelques traces blanches qui répondent à la nervûre, & aux costes de dessous.

DES PLANTES DE L'AMERIQUE.

51

Elle pousse un ou deux fruits semblables à la queue d'un lézard, d'environ un pied de long, & près de demi-pouce d'épais par en-bas; ces fruits sont droits, mais j'ay esté obligé de les peindre crochus, à cause du peu d'espace du papier: ils sont solides en dedans, tendres, succulents & insipides, mais en dehors ils sont vert-pâles, & tous raiez par deux spirales qui s'entrecroisant forment de petits losanges, ayant chacun une petite éminence ronde, située à l'angle d'en-bas.

Je n'ay pas pû voir ces fruits en maturité, ni observer s'ils ont du commencement une enveloppe, comme celle des especes d'*Arum*, ou *Pieds-de-veau*.

J'en ay trouvé quelques plantes dans les forests de S. Dominique, vers un endroit que les habitans du Port-de-paix appellent le *Precipice du trou*, proche le Moustique.

L X V I I.

Saururus hederaceus, cauliculis maculosis, minor.

Petite queue de lézard, rampante, & tachetée.

J'ay trouvé cette plante dans le mesme endroit que la precedente; elle est de mesme consistance & de mesme goût, mais ses tiges ne sont pas plus grosses qu'une plume à écrire, & poussent plusieurs branches par les nœuds, d'où il sort aussi une feuille, & plusieurs petites racines fibreuses, d'environ deux pouces de long: ces tiges & ces branches rampent à terre, ou s'attachent contre les arbres: elles sont tout à fait rondes, lisses, d'un beau vert & toutes marquetées de plusieurs petites taches rondes, & rouges comme du carmin.

Les feuilles sont fort unies, vert-pâles & approchent aussi de la forme d'un fer de pique arrondi vers le pedicule: elles sont beaucoup plus petites que celles de la precedente, mais un peu plus pointuës, ayant environ quatre pouces de long, & deux de large: elles sont attachées immédiatement par le bord au pedicule qui est mince, de près de trois pouces de long, & aussi tout marbré comme la tige.

Dans l'entre-deux des branches il en sort un pedicule d'environ deux pouces de long, & tacheté de mesme, qui supporte deux fruits longs d'environ trois pouces, & épais d'une ligne: ils sont ronds, & ressemblent à la queue d'un rat ou d'un petit lézard, de mesme couleur, goût & consistance que ceux de la plante pre-

cedente, & gravez de mesme par deux lignes spirales à gauche & à droit.

L X V I I I.

Saururus hederaceus, triphyllus.

Queuë de lezard, rampante, à trois feüilles.

Cette plante s'attache particulièrement contre le tronc des arbres, de la mesme façon que nos lierres : elle pousse quantité de tiges branchuës, fort menuës, & couvertes d'un petit poil ras, & entrecoupées de plusieurs nœuds éloignez d'environ un pouce les uns des autres.

A chaque nœud il y a trois feüilles rondes, un peu moindres que l'ongle du pouce, convexes des deux costez, plus charnuës que les feüilles du pourpier, mais moins tendres, succulentes presque comme celles de la grande joubarbe, & bordées d'un poil fort court : leur dessous est vert-clair, & soutenu par trois petites nervûres, mais le dessus est plus chargé, & la surface en est tant soit peu rude, presque comme la peau du chien de mer.

Il y a aussi a chaque nœud plusieurs racines menuës comme des cheveux, & qui s'attachent contre le tronc des arbres : les bouts des tiges & des branches sont terminez par un fruit rond, comme la queuë d'un rat, long d'environ trois pouces, & épais d'une ligne, de couleur jaunastre, & tout couvert de quantité d'écaillés fort menuës, & rangées par cercles.

Cette plante est presque sans goust, mais elle échauffe modiquement le palais & la langue quand on la mâche. J'en ay trouvé sur quelques arbres vers le Mont-Noël, proche le Fort S. Pierre de la Martinique.

L X I X.

Saururus repens, folio orbiculari, nummulariæ facie.

Queuë de lezard rampante, à feüilles rondes, & semblable à la nummulaire.

AU premier abord vous prendriez cette plante pour la nummulaire ordinaire, car elle rampe de mesme façon, & a ses feüilles rondes & presque de mesme grandeur : c'est particuliere-

DES PLANTES DE L'AMERIQUE. 53

ment sur les roches, & sur les troncs des arbres abbatus qu'elle étend ses tiges fort menuës & fort longues, avec quantité de branches disposées alternativement, & qui s'étendent de tous costez : elles ont plusieurs feüilles rangées aussi alternativement, de la grandeur à peu près de l'ongle du pouce, & attachées à des pedicules fort courts & fort menus : leur figure est fort ronde, & on ne scauroit les mieux comparer qu'à la moitié d'une lentille, car elles sont fort plates par dessus, & convexes par-dessous.

Les bouts des branches & des tiges se terminent aussi comme ceux de la precedente, par un petit fruit arrondi comme un petit pilon, ou comme une petite queue émoussée, d'environ un pouce de long & d'une ligne d'épaisseur, picotée par de petites taches en raïseau.

Toute la plante est d'un vert blanchâtre, & pousse de chaque nœud quelques racines fort menuës : elle cause un peu de chaleur au goust, mais cette chaleur n'est pas desagréable : j'en ay trouvé en plusieurs endroits vers le Fort-Royal de la Martinique.

L X X.

Saururus humilis, folio carnosio, subrotundo.

*Petite queue de lezard, à feüilles arrondies,
& charnuës.*

Elle a plusieurs racines menuës & fibreuses, qui poussent quelques tiges & qui rampent ordinairement : elles sont rondes, & ont environ deux à trois lignes d'épaisseur ; elles sont fort lisses, teintes d'un vert foncé & noueuses, poussant quelques branches & une feüille à chaque nœud : ces feüilles ont le pedicule fort court, & quelques-unes n'en ont presque point : elles sont étroites en leur commencement & arrondies vers le bout, longues d'environ trois pouces, sur un & demi de largeur : leur consistance est comme celle de nos pourpiers, mais un peu plus solide ; elles sont lisses & n'ont qu'une nervûre qui les traverse tout au long.

Au bout de chaque branche & bien souvent dans les aisselles des feüilles, il en sort un fruit appuyé sur un pedicule d'environ un pouce ou deux de long : il a aussi la figure de la queue d'un petit lezard, longue de trois à quatre pouces, & épaisse de près de deux lignes, de couleur jaunâtre, & gravée par de petits trous disposez en raïseau.

Son goust est un peu amer & accompagné d'un peu de chaleur : elle naist ordinairement dans les forests humides sur les troncs pourris , & on l'appelle vulgairement *pourpier de bois*.

L X X I.

Saururus alius humilis, folio carnofo, acuminato.

Autre petite queue de lezard, à feüilles pointuës, & charnuës.

C Elle-cy est tout à fait semblable à la precedente en sa grandeur & en sa disposition : son fruit est le mesme , mais les feüilles , qui sont presque de mesme grandeur & consistance, ont la figure d'un fer de pique pointu par les deux bouts , avec cinq petites nervûres par dessous en long , comme celles de nos plantains.

Ces feüilles sont d'un goust aigre , & le fruit est un peu piquant : on la trouve dans les mesmes endroits que la precedente : & elle peut servir contre la morsure des serpents , en appliquant son suc sur la blessure, après toutefois y avoir fait une scarification.

L X X I I.

Saururus minor procumbens, botryitis, folio crasso, cordato.

Petite queue de lezard, à feüilles grasses , & en cœur.

C Ette plante a sa racine menuë & fibreuse, fort peu enfoncée en terre, qui pousse une tige fort courte, épaisse d'environ deux à trois lignes , ronde , unie , tendre, blanchastre & un peu purpurine , entrecoupée de quelques nœuds , & qui pousse aussi quelques branches nouveüses de mesme grosseur & consistance.

Il y a ordinairement à chaque nœud, une ou deux feüilles d'un peu plus d'un pouce d'étenduë, faites quasi en cœur, de consistance fort tendre , & épaisses comme les feüilles de nos pourpiers , lisses, d'un vert un peu foncé par dessus, & blanchastre par dessous, avec une nervûre tout au long, accompagnée de quelques autres à costé, un peu courbées.

On voit presque à chaque nœud un ou deux fruits d'environ deux à trois pouces de long , & d'une ligne d'épaisseur , sem-

blables aussi à la queue d'une souris, ou d'un petit lézard, presque tous couverts de quantité de petits grains ronds, en façon d'une petite grappe, qui du commencement sont verts, & en suite deviennent noirs.

Cette plante rampe, & n'a presque qu'un ou deux pieds d'étendue : on en trouve quantité au quartier du Fort S. Pierre de la Martinique, où on l'appelle vulgairement *l'herbe à la couresse*, à cause, à ce que j'ay entendu dire à quelques habitants, d'une espèce de couleuvre appelée *couresse*, menuë & longue, chamarrée tantost de noir & de jaune, tantost de gris & de noir : cette couleuvre est assez fréquente dans la Martinique, elle est sans venin, puisqu'on la peut manier sans danger, & elle est, à ce qu'on dit, fort ennemie des autres serpens venimeux qui sont dans la même Isle ; de sorte que bien souvent elle les attaque, & les presse si fort en les entortillant, qu'elle les étouffe : & si elle se sent mordue par ces serpens : elle a recours à cette plante comme à un contrepoison, & c'est pour ce sujet qu'on la nomme *l'herbe à la couresse*.

L X X I I I.

Saururus arborescens, foliis amplis, cordatis, non umbilicatis.

Queue de lézard arbre, à grandes feuilles en cœur.

SA racine a un peu plus d'un pouce d'épaisseur : elle est d'une matière ligneuse, blanchâtre, divisée en plusieurs autres racines plus menuës, fort peu enfoncées en terre : elle est chaude au goût, & aromatique.

Elle pousse une tige fort droite, & d'environ un pouce de gros-
seur, & de quatre à cinq de longueur, noueuse à la façon de nos roseaux, & pleine d'une chair moëlleuse : elle est d'un vert foncé, ronde depuis le bas jusques au delà de sa moitié, raboteuse, par plusieurs petites verrues & dechiquetée par des enfoncures comme de petites playes, mais ses nœuds & leurs interstices supérieurs, sont goderonnez par plusieurs angles ronds, & couverts en long d'un petit poil blanchâtre & cotonné.

Il y a à chaque nœud supérieur, une feuille fort grande d'environ deux pieds d'étendue : elle est taillée en forme de cœur, & est attachée immédiatement au pedicule, par son enfoncure ; elle est d'un vert-passe par dessous avec plusieurs nervû-

res & costes élevées , & par dessus d'un vert un peu chargé.

Ses pedicules sont un peu enflés par en-bas, canelez en devant, & goderonnez & velus par derriere , mais en suite ils sont ronds, unis, & épais d'environ deux lignes, & longs de près d'un pied & demi : il sort de leur angle un ou deux autres pedicules fort courts , qui soutiennent chacun quatre à cinq fruits , comme de petites queueës de lezard, avec la pointe émouffée, d'environ trois à quatre pouces de longueur, & d'une ligne & demi d'épaisseur : d'un vert blanchâtre , & couverts de petites écailles rangées comme les entaillûres d'une lime : ces fruits sont douçastres du commencement qu'on les mange, en suite ils laissent une petite amertume accompagnée de chaleur.

J'en ay trouvé souvent le long des ruisseaux , ou dans les forests humides de l'Isle S. Domingue , où on la nomme *Collet - de - Nostre - Dame*.

C'est l'*Aguaxima* des Brasiliens , & le *Malva d'Isco* des Portugais de G. Pison liv. 4. ch. 72. où il dit que sa racine est tres-bonne & tres-utile ; qu'elle est chaude au troisieme degré, & estimée un contre-poison , puis qu'étant composée de parties tennûes, elle ouvre & desobstruë fortement ; qu'il n'y a personne qui ne la connoisse à cause de ses grandes vertus : étant pilée & apliquée en façon d'emplastre sur la partie malade, elle meurit & nettoye tres-bien : le suc des feüilles est aussi fort bon pour les blessures , à cause de sa froideur : on se sert de ces mesmes feüilles dans les lavemens, parce qu'elles ont la mesme vertu que celles des mauves.

L X X I V.

Saururus arborescens , foliis amplis , rotundis & umbilicatis.

Queue de lezard arbre , à grandes feüilles rondes.

Elle-cy a le mesme aspect que la precedente ; elle n'en differe qu'en ce que ses feüilles sont tout à fait rondes , si ce n'est vers le pedicule où elles sont un peu échancrées : leur nervûre est composée de plusieurs costes un peu courbes , qui sont comme tirées du centre à la circonference , & dont les entre-deux sont venez par de petites costes ondées & comme circulaires.

Sa racine a bien demi - pied de long, & un pouce d'épaisseur : elle est noirâtre par dehors, blanche & succulente en dedans, & accompagnée de quelques autres racines plus menuës & plus longues.

Sa

DES PLANTES DE L'AMERIQUE. 57

Sa tige est fort droite, épaisse d'un pouce, & haute d'environ trois à quatre pieds: elle est toute ronde & nouëuse comme nos roseaux, lisse, & verte en dehors, & pleine en dedans d'une chair blanche & ferme: ses feuilles sont situées vers le bout, d'environ deux pieds d'étendue, suivant la bonté du terrain où elle naît: leurs pedicules sont fort longs; ils embrassent la tige par une gaine qui s'étend environ jusqu'à leur moitié, au delà de laquelle ils sont ronds, & s'insèrent bien avant dans les feuilles: il sort du fond de cette gaine une petite branche, longue d'environ un pouce & demi, & épaisse de deux ou trois lignes: elle supporte quatre ou cinq fruits faits comme la queue d'un lézard, longs de trois à quatre pouces, épais de trois lignes, émoussés par le bout, & couverts de quantité de petits grains disposés en écailles: ils sont d'un goût un peu piquant, & font venir l'eau à la bouche, quand on les mâche aussi bien que toute la plante.

On l'appelle aussi communément *Collet de nostre-Dame*, & elle croît dans les mêmes endroits que la précédente.

L X X V.

Saururus botrytis major, arborescens, foliis plantagineis.

Grande queue de lézard, arbre à grappes, & à feuilles de plantain.

ON trouve plusieurs espèces de cette plante dans nos Isles, qui ne diffèrent que par la grandeur des feuillages, & que l'on peut compter parmi les arbrisseaux; celle-ci devient arbre & pousse un tronc gros comme la cuisse: son écorce est de couleur cendré, & marbrée par de grandes taches vertes & blanches: ce tronc pousse quantité de branches de la grosseur du bras, fort longues, droites, vertes, lisses, moëlleuses, fragiles, & nouëuses, & qui jettent d'autres branches plus menuës & nouëuses de même: il y a à chaque nœud une feuille attachée à un pedicule d'environ un pouce de long, longue de près de huit pouces, & large de quatre à cinq: son extrémité est fort pointue, & sa base est comme arrondie: elle est vert-gay par dessus, mais un peu plus clair par dessous, & chargée de sept costes étendues en long, de même que celles de nos plantains, dont l'entre-deux est traversé par plusieurs moindres costes.

Il y a aux mêmes nœuds & vis-à-vis de chaque feuille un fruit

ou plutôt une grappe d'environ demi-pied de long, & de quatre à cinq lignes d'épaisseur dans le bas : elle se retreffit jusques au bout, & elle est chargée de quantité de grains de la grosseur presque de ceux de la moutarde, qui sont verts dans le commencement, & noirs & mols dans leur maturité, d'un goût chaud & piquant : c'est pourquoy quelques-uns l'appellent *poivre long*.

J'ay trouvé cette espèce vers le cul-de-sac de la Trinité de la Martinique, où il y en a une autre espèce qu'on trouve quasi partout, & qu'on appelle aussi *poivre long*, pour le même sujet, mais ce n'est qu'un arbrisseau : ses feuilles & ses branches sont plus petites, noueuses, rondes, lisses, vert-clair, & fort fraîles : son fruit est de même façon, mais plus petit.

J'en ay remarqué une autre espèce dans l'Isle S. Domingue, vers Leogane & le grand Goive, un peu plus grande que celle-cy, dont pourtant le fruit est plus court, plus épais & émoussé, comme on le peut voir dans la planche LXXVI.

Les habitans de nos Isles se servent du fruit de cette plante, & particulièrement de la décoction de sa racine dans une maladie qu'ils appellent le *mal d'estomac*, qui n'est proprement qu'une intempérie froide & humide causée par le trop grand usage des fruits, & des boissons du pays, ou faute de se couvrir la nuit, surtout le matin, où le froid se fait fort bien sentir, particulièrement aux mois de Decembre, Janvier, & Fevrier, dans les quartiers qu'on appelle la Cabsterre, où le vent de Nord-Est souffle ordinairement. Ils font bouillir cette racine avec du *maschefer*, & ils en donnent à boire au malade à jeun deux grands verres de la décoction ; après quoy il est obligé de se promener & d'agir, afin d'exciter la sueur, & dissiper par ce moyen, les humeurs crasses, causées par cette intempérie froide & humide.

LXXVI.

Saururus arborescens, fructu adunco.

Queue de lézard, arbre à fruit crochu.

Cette plante a grand rapport par son aspect & sa structure à nos noisetiers : elle pousse ordinairement dès sa racine dix ou douze tiges fort droites, fort longues, & grosses presque comme le bras : elles sont fort noueuses : leur bois est blanchâtre & fragile, & leur écorce cendrée & toute raboteuse, par quantité de petites verrues : ces tiges poussent alternativement au de là de

leur moitié, des branches qui tirent droit en haut, & celles-cy en poussent encore d'autres plus menuës entre-coupées de nœuds éloignez d'environ un pouce l'un de l'autre, avec une feüille à chaque nœud assez semblable à celles du laurier commun, d'environ huit à neuf pouces de long sur trois de large : ces feüilles sont un peu rudes : leur dessous est d'un vert-passe, & soutenu par une nervûre assez élevée, & par quelques costes fort courbes & blanchâtres, traversées par plusieurs petites veines : le dessus est d'un vert un peu foncé.

Il y a vis-à-vis de chaque feüille un fruit crochu de couleur passe, relevé, & fort semblable à la *queue de lezard*, d'environ six à sept pouces de long, & de trois lignes d'épaisseur par le bas : ils sont tout courbez vers le mesme costé, & couverts de petits grains disposez comme par anneaux fort ferrez.

Les fruits, les feüilles, & l'écorce de cette plante, ont un gouft acre & chaud, qui pourtant n'est pas desagréable : j'en ay trouvé abondamment le long de quelques ruisseaux au quartier du petit Goive, & vers le port-de-paix de l'Isle S. Domingue.

Les trois especes dont j'ay parlé avant celle-cy dans le chapitre precedent, ressemblent assez à celles que Pison li. 4. ch. 57. & 59. nomme *Nhandi* & *jaborandi*, premier & second : on peut mesme assurer que ce sont les mesmes : il dit parlant du *Nhandi* (qui est proprement cette espece dont nos habitans se servent contre le mal d'estomac, comme j'ay dit cy-dessus) que ses racines & ses feüilles étant fort acres, on peut les garder seches, & les employer au-lieu d'herbes chaudes & corroboratives pour les bains qu'on prépare pour guerir les maladies froides.

Lorsqu'il parle du premier *jaborandi*, il dit que toute sa vertu consiste dans sa racine, qui est chaude & sèche au troisième degré, étant composée de parties subtiles & caustiques, & pouvant suplée a bon droit au defect du piretre : il dit aussi que le second *jaborandi*, a les mesmes qualitez, mais non pas si fortes que celles du premier, & que sa vertu est aussi dans sa racine. Enfin il rapporte que les Brasiliens, qui en ont decouvert la vertu aux Portugais, font si grand cas de leurs racines, qu'ils s'en servent pour toute sorte de maux, & mesme bien souvent pour contre-poison : car un pugil de sa racine fraische (qui est proprement, ce qu'on peut prendre avec les trois doigts) étant pilé & pris dans de bon vin, chasse la force du venin par les sueurs & par les urines : qu'enfin étant prise en sternutatoire, elle produit des effets fort salutaires par son aigreur mordicante ; & étant aussi pri-

se en masticatorie , elle attire la pituite dans la bouche , & chasse le catharre des yeux.

Marcgrave parle aussi du *jaborandi* dans son liv. 2. ch. 8. où il dit que sa racine n'a presque point d'odeur & de saveur , mais qu'étant tant soit peu mâchée , elle pique extrêmement la langue , & même plus que le piretre ; qu'elle tire quantité de pituite de la langue , & qu'ainsi elle delivre la teste des catharres , & apaise la douleur des dents : il dit aussi que cette même racine pilée & infusée dans de l'eau , étant ensuite cuite , & prise en breuvage le matin , est un tres-souverain remede contre les gonorrhées , & qu'enfin elle est bonne contre les venins , contre les supressions d'urine , & contre le calcul ou gravier.

Nard Antoine Reche , parle de trois plantes dans son livre IV. ch. 37. qu'il nomme *Buyo* : ce sont sans doute les mêmes que celles de dessus : il leur donne aussi presque les mêmes qualitez & effets.

L X X V I I I.

Saururus repens lanceolatus , ad nodos villosus.

Queue de lezard rampante , à feuilles en fer de lance , à nœuds velus.

Cette espece a plusieurs tiges d'une longueur indéterminée , grosses comme la moitié du petit doigt , grisâtres en dehors , & pleines en dedans d'une substance fort fibreuse : elles sont entrecoupées par quantité de nœuds fort proche les uns des autres , & garnis tout à l'entour de poils dressés & rangez comme ceux du cil de l'œil : elles rampent à terre , & y sont attachées par plusieurs racines blanchâtres , vermiculaires , fort longues , & grosses presque comme de la ficelle.

Il y a environ quatre à cinq feuilles vers le bout de chaque tige , de la figure d'un fer de lance , longues d'environ demi-pied , & larges de deux pouces , d'une substance assez ferme , & épaisse comme du gros velin : elles sont polies , luisantes , & d'un vert foncé par dessus , mais d'un vert fort clair par dessous , & piquetées par quantité de points rouges comme du sang : elles ont une nervûre principale tout le long , qui distribuë deçà & delà quelques costes assez minces , paralleles , obliques , & qui se terminent à une autre coste onnée , qui court tout le long , & proche le bord de la feuille : leur pedicule a quatre ou cinq pouces de long , & il

DES PLANTES DE L'AMERIQUE. 61

est tumefié par les deux bouts : il sort du pied de chacun un fruit long d'environ demi-pied , & gros par en-bas de trois lignes , arrondi comme la queue d'un lézard , & tout entaillé comme une de ces limes qu'on nomme queue de rat : il est vert du commencement , & il sort d'une petite envelope à la façon des fruits de nos *Arums* , en suite il devient jaunâtre , d'un goût fade , qui pourtant échauffe tant soit peu la langue quelque temps après qu'on l'a mâché : il est aussi appuyé sur un pedicule de trois à quatre pouces de long.

J'ay trouvé cette espece le long d'un ruisseau , proche un endroit que les habitans du Port-de-paix de l'Isle S. Domingue , appellent le Moustique.

DES LIANES.

LEs François des Isles de l'Amerique appellent indifferemment *Lianes*, toute sorte de plantes qui rampent sur les hayes ou sur les arbres, en les distinguant pourtant, ou par leur figure, ou par leur vertu, comme la *Liane à serpent*, à cause qu'elle est fort efficace contre leur morsure ; la *Liane à dent de scie*, parce que ses feuilles sont découpées comme les dents d'une scie, la *Liane brulante*, à cause qu'elle est fort caustique, & ainsi de plusieurs autres. Ils donnent ce nom de *Liane* à ces sortes de plantes du verbe *lier*, parce qu'ils se servent de quelques-unes comme de cordages, tant pour la construction de leurs maisons, qu'ils nomment vulgairement *Cases*, que pour fortifier les barrières, & pour plusieurs autres usages. Il y en a pourtant à qui ils donnent plus particulièrement le nom de *Liane*, qui sont celles que les Caraïbes appellent *Meregoïia*, les Brasiiliens *Murucua*, les Espagnols *Granadilla*, & nos François *Fleur de la passion*, à cause qu'on croit y trouver quelques marques de la passion du Sauveur, comme les trois clous, les cinq playes, les fouets, & les cordes. On en voit plusieurs especes de celle-cy, qui tant par la fraîcheur de leurs feuillages, que par l'agréable odeur de leurs fleurs, & la bonté de leurs fruits, meritent bien qu'on en fasse cas & qu'on les cultive avec soin, pour l'ornement des berceaux & cabinets des jardins.

LXXIX.

Clematitis Indica, polyphylla major, flore clavato,
fructu colocynthidis.

*Grande fleur de la passion, à feuilles refendues, & à fruit
de coloquinte.*

Cette plante pousse plusieurs sarments aussi gros, durs & noueux que ceux de la vigne, qui s'étendant bien au long sur les arbres & sur les buissons, leur servent d'ornement par l'agréable verdure de leurs feuilles. Il n'y a qu'une feuille en chaque nœud, & ces nœuds sont distans d'environ demi-pied les uns des autres : ces feuilles sont grandes presque comme une main étendue : elles sont lisses & fendues en sept découpures bien avant, & fort près de leur pedicule, qui a environ quatre à cinq pouces de long, avec quelques petits tourrillons de la longueur presque d'une ligne : ces découpures sont dentelées en façon d'une scie ; elles sont un peu étroites d'en-bas, & un peu élargies vers le bout qui est pointu ; elles ont par dessous une nervûre tout le long, & quelques petites costes courbes qui les traversent : la couleur de toute la feuille est d'un vert fort agréable, un peu plus chargé par dessus que par dessous.

Il sort à la naissance de chaque pedicule un tenon comme ceux des vignes, & une fleur attachée à un pedicule de près de deux pouces de long, & enfermée dans une vessie membraneuse, qui est un peu plus grande qu'un œuf de poule, & qui s'ouvre en trois feuilles unies & blanchâtres, marquetées en dedans de plusieurs petits points, & foïettées de quelques veines purpurines : lorsque cette vessie est ouverte, le bouton de la fleur paroît presque aussi gros qu'étoit la vessie ; c'est un ovale dont la partie moyenne & inferieure est d'une seule piece, mais la superieure est divisée en cinq feuilles jusques au bout : il est vert-passe par dehors & marbré de plusieurs taches rouges comme du sang.

Quand cette fleur est épanouie, la moitié d'en-bas représente une coupe pentagone dans son bord, blanchâtre en dedans, chargée & toute velue dans le fonds : chaque poil est fort court, & soutient une petite teste rouge : cette coupe est bordée d'une double frange, dont les filets sont épais d'une ligne, tendres & pointus, presque quarez & contigus les uns aux autres : ceux du rang interieur ont environ un pouce & demi de long, & ceux

du rang extérieurs n'ont pas tout-à-fait un pouce : ils sont blanchâtres vers le bout, & tout-à-fait violets jusques vers le milieu, mais depuis le milieu en-bas il sont de couleur-passe, ornez de cinq bandes annulaires de couleur-violet : ceux-ci sont eslevez droit en haut, mais ceux du rang extérieur sont un peu couchés, étant de la même consistance & couleur que les premiers ; outre ces filets qui sont rangez en rayon, il y a encore tout à l'entour un double rang de feuilles violettes, scavoir cinq en chaque rang : les intérieures sont beaucoup plus étroites que les extérieures, & la longueur des unes & des autres est d'environ un pouce & demi, avec une petite pointe par le bout en dehors.

Il y a outre cela dans le fond & au centre de la coupe dont nous avons parlé, comme une espece de base de figure cylindrique, épaisse de trois à quatre lignes, entourée d'un petit fossé & de quantité de petits poils fort courts, de couleur rouge-brun : sur cette base il y a une petite colonne blanche & ronde, comme si elle avoit esté travaillée au tour, ayant près de huit à neuf lignes de hauteur, & une ligne & demie de grosseur : elle se divise en son extrémité en cinq petits bras, ayant chacun un sommet fait en façon d'une playe, long de quatre lignes, & large de près de deux, tout couvert par dehors d'une poussiere dorée fort menuë : au milieu de ces cinq petits bras, il y a un petit bouton ovale, vert & fort poli, long d'environ cinq lignes, & épais de trois, surmonté de trois filaments faits en façon d'un clou, ayant deux ou trois lignes de long, & une grosse teste ovale jaune, & fenduë d'un costé par une petite fosse.

Ce bouton n'est autre chose que le commencement du fruit qui devient en suite de la grosseur d'une orange, presque rond & lisse, comme une pomme de Coloquinte, excepté vers son pied où il approche un peu de la figure d'une poire : son écorce a bien deux lignes d'épaisseur, elle est de consistance assez solide, & blanche en dedans, mais verdâtre par dehors : le dedans de ce fruit est plein d'une chair blanche & mucilagineuse, qui enferme quantité de semences un peu plus grosses qu'un grain de bled, de figure presque ovale, un peu applaties & pointuës par un bout, noirâtres, un peu dures, luisantes & chagrinées.

La fleur de cette plante est fort agreable par sa structure, & son odeur. Je n'ay pu gouter son fruit n'en ayant pu trouver de meur : je n'en ay veü qu'à la Martinique, au quartier de la Cabsterre, vers la paroisse, & le long de la riviere de Sainte Marie, & au quartier de la riviere du Lamentin, vers le Fort Royal.

L X X X.

Clematitis Indica, fructu citriformi, foliis oblongis.

Fleur de passion à citrons.

C Elle-ci croist de la mesme façon que la precedente : c'est à dire que ses sarments s'étendent fort au long deçà & delà par dessus les arbres & sur les hayes : ils sont un peu plus nerveux, plus souples, & plus difficiles à rompre ; ils ne portent aussi qu'une feuille, une fleur, & un tenon à chaque nœud, qui sont éloignez inégalement les uns des autres.

Les feuilles sont presque de figure ovale allongée, mais pourtant un peu pointuës au bout, & un peu échancrées à leur base : leur pedicule est tortu & long d'environ demi-pouce, ayant deux petits boutons proche de la feuille : elles ont presque quatre pouces de long, & près de deux de large, leur consistance est membraneuse, solide & lisse ; le dessous est d'un vert-clair soutenu par quelques costes traversieres & courbées, & le dessus est d'un vert un peu chargé ; elles sont comme pliées en dedans, & comme onduées tout à l'entour.

Les fleurs sont attachées à des pedicules d'environ un pouce & demi de long, elles sont presque de la grosseur d'un œuf de pigeon avant que d'estre épanouïes : elles sont enveloppées dans trois feuilles vertes membraneuses, creuses en façon d'une cuilliere, & tant soit peu dentelées. La fleur qui est enfermée dans ces trois feuilles est composée de dix autres feuilles inégales : elles ont toutes environ un pouce & demi de long, les plus grandes ont bien demi-pouce de large, & les plus étroites trois lignes ; elles sont disposées en maniere que la plus étroite est située entre deux larges, qui ont chacune une petite pointe au bout par dehors, en façon d'un petit bec : elles sont toutes d'un vert-blanchastre par dehors, ayant cinq petites nervûres tout au long, d'un vert un peu plus chargé, mais en dedans elles sont blanches, & toutes marquerées par quantité de petits points rouges-brun : ces feuilles ont à peu près la figure d'une langue assez pointuë, & entourent une frange composée d'un double rang de filets rangez comme ceux de la premiere espece, mais beaucoup plus menus : ceux du rang interieur ont près d'un pouce & demi de long, & ceux de l'exterieur un peu plus de demi. Les uns & les autres sont frisez vers leurs pointes, & sont violets sans meslange jusques au milieu

milieu ; mais depuis le milieu en-bas , ils sont ornez de deux ou trois bandes annulaires & rouges , qui forment comme trois rangs de cercles variez de rouge & de violet : outre les deux rangs de ces filets , il y en a encore deux autres de petits poils , à l'endroit où ceux-cy s'unissent , & qui sont fort courts , fort minces , & blanchâtres.

Dans le fond & au centre de toute la fleur , il y a une petite colonne ronde de la grosseur d'une ligne , & de la hauteur d'environ trois : elle est jaunâtre & marbrée de rouge : elle s'élève par dessus une petite base ronde , & supporte un petit chapiteau ovale , & jaunâtre de la grosseur presque d'un grain de poivre : ce chapiteau est surmonté par trois filets également distans l'un de l'autre , faits en façon de clous attachez au même centre , de couleur rouge , & dont la teste est ronde & jaunâtre : ce même chapiteau est entouré par en-bas de cinq petits bras , longs de deux lignes , & larges de demi , un peu fendus par le bout , chacun soutenant un petit sommet presque ovale de près de quatre lignes de long , & de deux de large , blanchâtre par dessus , & couvert par dessous d'une poussière jaune.

Cette fleur est d'une odeur fort agreable ; & lors qu'elle est passée , ce petit chapiteau ovale devient un fruit fait comme un citron de la grosseur d'un œuf de poule , relevé de trois angles depuis la pointe jusques à la base , fort peu eslevez , & presque également esloignez les uns des autres. Il est vert dans le commencement , mais en suite il devient jaunâtre , marqueté de quantité de petits points blanchâtres presque imperceptibles : son écorce est de l'épaisseur , & consistance d'un gros cuir molasse , blanche en dedans , & comme cotonnée par dehors , à la façon de nos pavies ; mais quelquefois elle est unie & luisante : elle couvre une membrane fort deliée qui enferme quantité de semences semblables à un cœur un peu applati , longues de deux lignes , & larges d'une ; elles sont noires & envelopées chacune dans une pellicule particuliere fort subtile , attachée à la principale membrane par de petits filets courts & blancs ; elles sont aussi couvertes d'une chair blanchâtre & mucilagineuse , qu'on avale avec les semences , & qui est d'un goût fort agreable.

On cultive cette plante dans les jardins pour couvrir les cabinets , & à cause de la bonté de ses fruits qui sont meurs vers les mois d'Avril & de May : & qu'on appelle vulgairement *pommes de liane* : elle ressemble beaucoup au *Murucua guacu* , de G. Marcgrave liv. 2. ch. 9. si elle n'est pas la même , elle est peut-être aussi le *Murucua guacu* de G. Pison , suivant la description qu'il a fait de son fruit , liv. 4. ch. 73. où il loue extrêmement les qualitez

d'un autre *Murucua* à fruits tout-à-faits ronds, & dont les vertus, à ce que je croy, ne different gueres de celles du fruit que j'ay décrit cy-dessus; ayant experimenté en moy-mesme, qu'il est fort rafraichissant; c'est pourquoy j'ay voulu rapporter icy ce qu'il en dit. Je me suis servi ordinairement de la chair de ce fruit pour soulager les febricitans; elle peut tenir lieu de syrop cordial, à la place du rob des groseilles, ou de l'espine-vinette: on peut en manger sans apprehender de s'en charger, c'est la plus rafraichissante de toutes les especes de fleurs de la passion, qui ne fait d'autre mal que d'agacer quelquefois les dents; elle defaltere ceux qui sont fatiguez par les grandes chaleurs, elle donne de l'appetit, abbat le grand feu de l'estomac, & rétablit les esprits, soit qu'on en mange le fruit tout frais, ou qu'on prenne son suc en syrop ou en breuvage: les fleurs & l'écorce du fruit confits ont la mesme vertu, & ne cedent en bonté à pas un autre fruit. La feüille de la plante peut estre appliquée sur les cauterres à la place du lierre; on l'y employe tous les jours.

L X X X I.

Clematitis Indica alia polyphylla, flore crispato.

Autre fleur de la passion, à feüilles refendues, & à fleur frisée.

LA maniere de croistre de cette plante ne differe point de celle des precedentes: ses sarments pourtant ne sont pas tout à fait ronds, mais anguleux: ses feüilles sont decoupées de mesme façon que celles de l'hellebore noir à fleur couleur de rose de G. B. *Helleborus niger flore roseo.* G. B. c'est-à-dire que leur pedicule, qui est long d'environ deux a trois pouces se divise en trois autres beaucoup plus courts & plus minces: celui du milieu ne soustient qu'une seule feüille plus grande que les autres, & ceux des costez se fourchent encore. La partie qui regarde la feüille du milieu, soustient une feüille de mesme figure, mais plus petite: l'autre division soustient une feüille moindre que la precedente, qui est decoupée jusques à la base, mais la portion qui regarde le pedicule ressemble plutôt à une oreillette: chaque feüille considerée en particulier ressemble en quelque façon à celle du laurier, elles sont toutes dentelées à l'entour, unies, luisantes, & d'un beau vert un peu chargé par dessus, mais plus clair par dessous, avec plusieurs costes courbes. La plus grande qui est

celle du milieu a environ quatre pouces de long, & près de deux de large, mais la plus petite a un peu plus d'un pouce de long, sur demi-pouce de large.

Les fleurs sont de même construction que celles des précédentes, mais un peu plus amples. La colonne, les clous, & les bras où sont attachées les playes, sont blanchâtres, & tous tachetés de points rouges : la teste des clous est fendue en deux, & les playes sont couvertes d'une poussière jaune fort menuë : les filers de la frange sont serrez les uns contre les autres, teints d'un rouge fort chargé, & variez de deux ou trois rangs de bandes annulaires & blanches : leur bouts sont fort deliez teints d'un beau violet, & tous tortus à la façon des serpents, qu'on peint à l'entour de la teste de Méduse. Des feuilles qui sont immédiatement sous ces rayons, les cinq intérieures sont tout à fait bleuës, & les cinq extérieures ont le dedans d'un vert fort pâle, tacheté de quantité de petits points rouges, & le dehors d'un vert fort clair : les trois feuilles qui envelopent la fleur avant que d'être épanouie sont creuses en façon d'une cuillère, frangées tout au tour, & teintées d'un vert un peu chargé, avec plusieurs costes par dessus.

De toutes les fleurs de la passion que j'aye vues dans nos Isles, celle-ci est la plus remarquable, tant par son odeur que par sa structure & sa grandeur, qui est de l'étendue de la paume de la main, comme aussi par la vivacité de ses couleurs. Son fruit est de la grosseur & figure d'une de nos pommes médiocres ; son écorce a la même consistance que nos petites courges, dont on fait les tabatières ; elle est unie de la même façon, d'un beau vert-clair, & marbrée de petits points encore plus clairs : sa chair & ses semences sont de même nature que celles des précédentes. Je n'ay pourtant sçu la voir en sa maturité : je n'ay trouvé cette espèce que dans un seul endroit, le long du chemin qui va du petit Goive au lac de Miragoan, dans l'Isle S. Domingue, fort proche de Miragoan.

LXXXII.

Clematitis Indica, latifolia, flore clavato, fructu maliformi.

Fleur de la passion à larges feuilles, & à fruit à pomme.

Celle-ci n'a rien de particulier sur les précédentes, qu'en la forme & grandeur de ses feuilles, qui ont plus de demi-pied de longueur & trois pouces de largeur : elles finissent en pointe,

& ont leurs bases arrondies, & tant soit peu taillées en cœur : elles sont membraneuses, lisses, & teintes d'un fort beau vert.

Les fleurs sont enfermées du commencement, dans une bourse composée de trois feuilles deliées comme du velin le plus fin, de couleur rouge-passe, & venées d'un rouge fort vif : ces fleurs ont la même couleur, odeur, grandeur, & construction que les précédentes : les fruits sont tout à fait ronds, & gros comme une pomme moyenne ; leur écorce est beaucoup plus solide que celles des autres ayant la même consistance, que celle de ces petites courges d'ont on fait les tabatieres, & elles peuvent servir à en faire.

Je trouvay cette plante au quartier de Leogane vers Marsennou dans l'Isle S. Domingue, au mois de Janvier, où pour lors je n'y peûs remarquer que des fruits secs ; mais ayant passé le mois d'Avril suivant du Port-de-paix dans l'Isle la Tortuë, je la trouvay en fleur.

L X X X I I I.

Clematitis Indica, flore clavato, suaverubente, fructu hexagono, coccineo, folio bicorni.

Fleur de la passion, à feuilles cornuës.

ON trouve deux especes de cette plante, l'une qui a festiges triangulaires, comme celle du fouchet, en latin *cyperus*, verdastres & cotonnées ; l'autre, qui est celle que je vais décrire, les a fort menuës, rondes & noirastres. L'une & l'autre portent une feuille, une fleur, & un tenon à chaque nœud de même grandeur, & de même figure. La couleur des fleurs de celle-cy tire sur le rouge clair, & celle de l'autre est presque toute blanche : le fruit de la première est un peu plus long que celui de la seconde, & il est allongé en pointe par les deux bouts.

La fleur est attachée à un pedicule fort menu, rougeastre & long de près d'un pouce & demy. Le bouton ressemble à un petit cône d'environ neuf à dix lignes de long, enflé par en-bas, blanchastre & velu, mais tant soit-peu rouge dans son extrémité. Lors que cette fleur est épanouïe, elle est composée de dix feuilles étenduës en rond, dont les cinq extérieures sont plus grandes que les intérieures, & chacune de celles-cy sont situées entre deux grandes, qui ont environ un pouce de long, & près de quatre lignes de large ; mais les intérieures son beaucoup plus étroites,

bien qu'elles soient de mesme longueur : les unes & les autres sont faites quasi en façon d'une langue : les plus grandes sont d'un vert blanchâtre par derriere avec trois petites nervûres vertes, & sont presque blanches en dedans : les plus petites sont d'un blanc tirant sur le rouge ; on en trouve pourtant plusieurs qui sont tout à fait blanches : au dessus de ces feüilles, il y a une frange à double rang de filets fort delicats, dont les plus longs sont partie purpurins, & partie blancs, les autres sont fort courts, courbez en dedans, & disposez sur le bord d'un petit bassin, du centre duquel s'élève un pistille chargé d'un bouton ovale surmonté par trois petits clous rougeâtres, & qui panchent en-bas : ce petit bouton est posé sur cinq languettes éloignées également les unes des autres, ayant chacune un sommet presque ovale couvert par dessous d'une poussiere jaune : la fleur étant bien épanoüie, n'a pas tout à fait deux pouces de diametre, & n'a presque point d'odeur.

Après que la fleur est passée, ce petit bouton devient comme un petit citron de figure hexagone & gros comme une de nos noix moyennes : son écorce est épaisse & mole comme du cuir, il est quelquefois tout à fait rouge par dehors, & de couleur de pourpre, & quelquefois il est d'un vert blanchâtre, tirant sur le purpurin, & marbré de petits points plus chargez du costé qui regarde le soleil : ce fruit est rempli de quantité de semences ovales, noires & attachées à l'écorce interieure par de petits filets, & envelopées dans de petites pellicules blanches.

Les feüilles sont attachées à des pedicules un peu plus gros que ceux des fleurs, & tout marbrez de points rouges ; elles sont ordinairement grandes comme la paume de la main ; leur consistance est membraneuse d'un beau vert par dessus & par dessous : il y en a qui sont tout à fait unies & polies, mais il y en a aussi qui sont tant soit peu cotonnées : elles sont taillées en cœur à l'endroit où elles tiennent au pedicule, & leur bout est fendu en deux pointes cornuës fort écartées les unes des autres, entre lesquelles il y a un petit angle en pointe, mais fort court : elles ont au dessous trois nervûres qui s'étendent chacune depuis le pied jusques aux pointes avec quelques petites costes traversieres.

Il y en a beaucoup de cette espece dans la Martinique, mais je n'en ay trouvé de celle qui a la tige tringulaire, que dans l'Isle S. Domingue, au quartier de Leogane vers une terre nommée Marsenou, appartenante à feu M. de Cussi-Tarin, pour lors Gouverneur de ladite Isle : son fruit n'est pas plus gros que celle de la premiere espece, comme j'ay déjà dit, mais il est plus long, étant épais dans le milieu, & fort pointu par les deux bouts.

LXXXIV.

Clematitis Indica, folio hederaceo, major, fructu
olivæ formi.

Grande fleur de la passion, à feuilles de lierre.

J'Ay remarqué trois especes de celle-cy, sçavoir la grande, la moyenne, & la moindre : elles sont toutes trois de mesme consistence, tant en leurs sarments qu'en leurs feuilles, fleurs, & fruits.

La premiere espece a les feuilles de la mesme grandeur, épaisseur, & figure que celles de nostre lierre : leur base est presque demicirculaire, mais la partie du devant est divisée en trois autres parties qui finissent en pointe, dont celle du milieu est un peu plus longue & plus large que celle des costez. *Planche LXXXIV. A.*

Les feuilles de la moyenne sont découpées plus profondement & celles de la moindre le sont encore davantage : ses parties sont beaucoup plus étroites, & forment entre-elles comme la figure d'un marteau de sellier, renversé : les unes & les autres sont attachées à un pedicule, non pas tout à fait sur le bord, mais un peu par dessous le dos.

Les fleurs sont composées d'une seule feuille attachée par son centre à un pedicule fort mince, un peu plus long d'un pouce, & intercepté d'un petit nœud au milieu : cette feuille est divisée en cinq lambeaux étroits & pointus, disposez en étoille, mais non fendus jusques au centre : elle contient dans son sein une frange à double rang, de filets menus ; les extérieurs sont droits, & les intérieurs sont recourbez en dedans : il y a au fond, qui est tant soit peu enfoncé, une petite colonne comme à la precedente, avec un petit bouton fait en ovale pointuë, ayant ses trois petits clous au bout : ce petit bouton devient en suite un fruit semblable à une olive, mais tant soit peu plus gros. Il est de couleur-violet, son écorce est fort unie & mince, pleine d'un suc violet fort agreable : il enferme dans sa capacité plusieurs semences ovales noires & rudes, attachées dans l'interieur de l'écorce par de petits filets, & envelopées chacun dans une petite pellicule particuliere.

Ce fruit est aigrelet : les oiseaux & les fourmis en sont fort friands : les fleurs n'ont presque point d'odeur, & sont de couleur passe, mais les extremités de la frange sont rougeastres. On en trouve quantité le long des Hayes dans nos Isles. *Planche LXXXV.*

L X X X V I.

Clematitis Indica, hirsuta, foetida.

Fleur de la passion, veluë, & puante.

LEs principaux farments de celle - cy ont environ un pouce de grosseur, & en produisent quantité d'autres beaucoup moindres, verts, fillonez en long, & couverts d'un poil court & blanchastre : ils sont entrecoupez par quantité de nœuds, à chacun desquels il y a deux petites feüilles en façon d'aîlerons frangez, qui poussent de leur sein une feüille, une fleur, & un tenon.

Les feüilles sont presque de la grandeur de la paume de la main : elles ont trois pointes, dont celle du milieu est la plus avancée & la plus aiguë : elles sont taillées en façon d'un cœur, à l'endroit du pedicule, qui a environ un ou deux pouces de longueur : leur consistance est fort tendre : elles sont minces & veluës, d'un vert un peu passé, ayant par dessous trois nervûres qui vont du pedicule à chaque pointe, & qui en distribüent quelques autres plus menuës vers le bord.

Les fleurs sont aussi attachées à des pedicules d'environ deux pouces de long, velus & blanchastres : elles sont enfermées du commencement dans trois feüilles vertes, découpées d'une admirable façon, composant comme une boule veluë un peu plus grosse qu'une noix : elles ont dix feüilles, à sçavoir cinq exterieures, & cinq interieures. Les exterieures sont plus grandes, & ont un peu plus d'un pouce de long, & près de demi-pouce vert-clair, de large : elles sont arrondies aux deux bouts, & leur dessous est avec trois nervûres un peu plus chargées, dont celle du milieu finit par une petite pointe tendre, & un peu avancée hors le bout de la feüille. Leur dessus est fort blanc, & elles sont distantes presque également les unes des autres, en façon d'un étoile pentagone : chaque feüille du rang interieur est située entre deux inferieures ; elles sont un peu plus étroites, mais elles sont aussi plus blanches de part & d'autre, ayant par dessous une petite nervûre un peu élevée : elles sont rangées au tour d'une frange composée de petits filets d'environ un pouce de long, & teints d'un rouge tirant sur le violet dans leur commencement, & presque blancs dans leurs extremités : chargez quelquefois sur le rouge d'un cercle violet un peu plus enfoncé ; ils partent tous d'un autre petite frange, dont les filets sont beaucoup plus menus, plus courts, &

dressez en façon d'une palissade, au centre de laquelle il y a une petite colonne qui supporte un bouton, dont les bras & les clous sont de même façon que ceux des autres, mais d'un vert clair. Ce bouton devient en suite gros comme une noix mediocre, & presque fait de même façon : il est comme divisé par six lignes depuis le pedicule jusques à la pointe, il est verd dans le commencement, mais étant meur, il devient de couleur de safran tirant sur le rouge. Son écorce est unie, fort mince, & fort fragile ; elle enferme au dedans quantité de semences faites presque comme un grain de bled, mais plus petites, noires, & couvertes d'une pellicule blanche. Les oiseaux, les petits lézards & les fourmis aiment fort ce fruit, c'est pourquoy il est fort difficile d'en trouver de meurs, & qui soient entiers.

Cette plante est d'une odeur forte : elle est comme gluante, & fleurit presque toute l'année : ses fleurs s'épanouissent avant le lever du soleil, & ne durent presque qu'un jour : il s'en trouve quantité parmi les hayes dans les Isles de la Martinique & de S. Domingue ; mais j'ay remarqué que les fleurs, les fruits, & les feuilles de celle de S. Domingue, sont un peu plus grandes que celles de la Martinique.

Les Caraïbes l'appellent *Meregovia*, & c'est la plante que Marcgrave appelle *Hedera Murucua species*, liv. 2. sur la fin du chapitre onzième.

L X X V I I.

Clematitis Indica flore puniceo, folio lunato.

Fleur de la Passion, couleur d'écarlate, à feuilles en croissant.

Ses sarments sont fort menus & ronds ; mais elle ne laisse pas de monter fort haut, & de couvrir les hayes, s'y attachant par ses tenons qui sont fort deliez. A chaque nœud de ces sarments, il y a une feuille faite en façon d'un croissant, dont les cornes sont émoussées, ou comme les aîles étenduës d'un papillon : elles sont unies, & d'un vert un peu chargé, ayant par dessous trois petites costes qui en distribuent de moindres sur les costez : elles ont près d'un pouce de large, & deux pouces d'étenduë d'un bout à l'autre, leur pedicule est fort court, n'ayant tout au plus que trois lignes de long, & étant tant soit peu tortu.

Il sort des mêmes nœuds d'où sortent les feuilles une fleur rouge écarlate, qui n'étant pas encore ouverte, ressemble à un petit cône

cône long de près d'un pouce, enflé & goderonné par en bas, & quand elle est ouverte, ses feuilles sont disposées de la même façon que celles des autres décrites cy-dessus : celles du rang inférieur sont tant soit peu plus grandes que celles du supérieur : elles ont un pouce de long, & trois ou quatre lignes de large : elles sont faites comme une langue émoussée, & sont tant soit peu recourbées en dehors, avec trois petites costes en dessous : les feuilles intérieures sont toutes unies, plus courtes & plus étroites : elles sont rangées à l'entour d'un tuyau canelé, fait en façon d'un cône creux & coupé par le haut, d'environ demi-pouce de long. Il sort du fond de ce tuyau une petite colonne fort mince, & un peu plus longue que celle des autres espèces ; cette colonne est de couleur rougeâtre, divisée par le haut en cinq petits filets recourbez en dehors, ayant chacun une petite teste pendante & mobile, faite en façon d'une playe, & couverte d'une poussière fort menuë & jaunâtre. Dans le sein de ces cinq petits filets, il y a un bouton vert ovale, & surmonté de trois petits clous fort minces, & rouges, avec la teste verte ; cette fleur n'a point d'odeur, & son pedicule a environ un pouce de long.

Ce bouton devient ensuite de la même grosseur & figure que nos jujubes (il s'en trouve pourtant qui sont tout-à-fait ronds :) son écorce est fort unie, mince, & d'un beau violet obscur ; le dedans est rempli d'une chair fort tendre, qui rend un suc violet, & contient quantité de semences noires comme chagrinées : quand ce fruit est meur, le pedicule s'allonge deux fois autant que lors qu'il ne soutient que la fleur ; son goût est insipide, c'est pourquoi je n'en ay jamais veu de gastez par les petits animaux comme les fruits des autres espèces.

Cette plante fleurit presque toute l'année, mais particulièrement dans les mois de Mars & d'Avril : il y en a quantité au quartier du Port-de-peace, dans l'Isle S. Domingue.

LXXXVIII.

Clematitis Indica, flore minimo pallido.

Fleur de la passion, à petite fleur pasle.

LEs sarments de celle-cy sont fort deliez & fort souples : ils portent à chaque nœud une feuille, un tenon, & deux fleurs ordinairement, & quelque fois trois.

Ses feuilles sont membraneuses, lisses, vert-chargé par dessus,

& garnies par dessous de quelques costes & nervures : elles sont de differents contours ; les unes ont une maniere d'avancement émoussé deçà & delà ; quelques unes n'en ont que d'un costé , & les autres n'en ont point du tout : les plus grandes ont environ deux pouces de long , & un pouce & demi de large : elles sont presque de figure ovale , excepté les avancemens qui sont en façon d'oreillettes : leur pedicule est fort court , & chacun est garni de deux petits tourrillons.

Le pedicule des fleurs est menu , & long d'environ un pouce ; les fleurs ont la mesme structure que les precedentes , & ne sont pas plus grandes que l'ongle du pouce : leur couleur est vert-passe , & elles n'ont aucune odeur.

Les fruits sont tout à fait ronds , & de la grosseur d'une bale de pistolet : du commencement ils sont vert-luisants , mais en suite ils deviennent violet-foncé , comme la couleur de l'*Indigo* , leur écorce est fort tendre , & ils sont remplis d'un suc de mesme couleur , & de plusieurs petites semences , noires & chagrinées & faites en façon d'un cœur applati.

J'en ay trouvé en plusieurs endroits de l'Isle S. Domingue , où j'en ay remarqué deux autres especes assez semblables. La premiere differe de celle que nous venons de décrire par ses feüilles qui sont fort veluës , LXXXVIII. A. & l'autre à les feüilles coupées , pour ainsi dire en fer de lance , longues d'environ deux pouces & demi , sur un & demi de large ; ses fleurs sont un peu plus grandes , mais de mesme couleur , & de mesme odeur ; ses fruits sont semblables à nos jujubes , & ils sont de la couleur des fruits de la premiere de ces trois especes , & ils renferment des semences à peu près semblables. LXXXIX.

Cette derniere espece est le *Murucua miri* de Pison , liv. 4. chap. 74. où traitant de ses qualitez , il dit qu'elles sont si grandes qu'elles surpassent mesme celles de la *Sarse-pareille* , en emportant les obstructions & provoquant les urines & les sueurs ; car toute l'herbe entiere , qui a peu de saveur , estant legerement pilée , & prise avec du vin où avec de l'eau , fait sortir promptement & sans danger l'arriere-faix , & toutes les suites des accouchemens : elle fortifie aussi les visceres ; & Pison l'ayant appris des Brasiliens de la Riviere de S. François , conseilla aux Hollandois , & aux Portugais de la mettre en usage ; ce qu'ils firent avec succez.

Enfin les feüilles pilées , macerées dans de l'eau bouillante , & appliquées au fondement , sont d'un tres-grand secours pour les hémorrhoides.

X C.

Clematitis Indica, polyanthos odoratissima.

Fleur de la Passion, à plusieurs fleurs parfumées.

ELle pousse quantité de sarments fort menus & branchus, sur les hayes & sur les buissons, comme toutes celles de son espèce : ces sarments sont verts & entrecoupez par des nœuds, presque de deux en deux pouces. Il y a à chacun un tenon fort delié : & une feuille : les feuilles sont attachées alternativement à un pedicule fort court & tortu, avec deux petits boutons vis-à-vis l'un de l'autre : elles ont près de trois pouces de long, & un peu plus d'un pouce de large vers le pedicule où elles sont arrondies ; en-suite elles diminuent peu à peu jusques au bout, qui est aussi un peu arrondi, & qui finit pourtant par un petit bec pointu : elles ont le dessous d'un vert clair un peu cotonné, & soutenu par quelques costes un peu relevées, mais leur dessus est d'un vert fort chargé, & comme gravé par quelques lignes qui répondent aux costes de dessous.

Ces mêmes sarments sont fort branchus vers les extremités, & ils ont à chaque nœud, outre le tenon & la feuille, cinq à six petites fleurs de la largeur de longle & d'une odeur fort agreable : leur pedicule est fort court, & elles sont composées de même façon que les precedentes, excepté qu'elles n'ont point de colonne ; mais le bouton qui porte les clous, est assis immédiatement sur une petite base ronde, rouge & toute couverte de petits poils blancs & fort menus : ce petit bouton est vert ; & les rayons qui sont à l'entour de la base qui le supporte sont jaunâtres, fort menus & frisez au commencement, mais le bout en est un peu plus épais : les trois clous qui sont attachez sur le sommet du bouton, sont aussi verts & fort menus ; & les petits bras qui sont au dessous, sont un peu larges & blancs, ayant leurs testés fort petites & blanchâtres. Le tout est assis dans le fonds d'une seule feuille un peu creuse au milieu, & divisée tout à l'entour, en cinq petites découpures pointuës, en façon d'une étoille.

Les fleurs étant passées, ce petit bouton devient un fruit rond, & de la grosseur presque d'une bale de pistolet : il est vert du commencement, & devient en suite violet foncé : son écorce est fort unie, mince, & enferme plusieurs petites semences comme celles des autres, mais tant soit peu rudes.

Elle fleurit en Decembre, & les fruits sont meurs en Fevrier & Mars. Il s'en trouve le long du chemin qui va du Port-de-paix à la grande Orterie, dans l'Isle S. Domingue.

X C I.

Clematis pentaphylla, pediculis alatis, fructu racemoso, tricocco & coccineo.

Clematis en quinte-feuille, à queues aislées.

Ses tiges rampent sur les arbres de la mesme façon que les sarments de nos vignes de treille : leur bois est souple & facile à plier : elles ont des sarments gros comme le bras, qui sont triangulaires avec les angles arrondis : leur écorce est d'un gris fort chargé, & ils jettent quantité d'autres sarments plus deliez, noïeux & triangulaires aussi, mais couverts d'une écorce lisse, verte & meslée de tant soit peu de rouge ; ces sarments ont à chaque nœud, cinq feüilles & un tenon comme celuy des vignes : ces feüilles sont attachées au mesme pedicule, qui est long d'environ quatre pouces, & qui est articulé presque au milieu de sa longueur : chacune de ces parties est aislée de part & d'autre, a peu près comme le bois des flèches, dont se servent les Turcs : la partie superieure contient trois de ces feüilles à son extrémité disposées en façon de trefle, les deux autres sont attachées à l'articulation ou à l'extrémité de la partie inferieure, & sont opposées l'une à l'autre. La longueur de ces feüilles est d'environ quatre pouces, sur un pouce & demy de large : elles ont presque la figure de celles de nos lauriers, avec quelques dentelures sur les bords, assez grandes, & plus ou moins pointuës : elles sont lisses, & de consistance presque de velin : leur couleur est d'un vert fort chargé, & le dessous est soutenu par une nervûre, & par quelques costes rouges.

Du mesme nœud d'où sortent les feüilles & le tenon, il en sort quelquefois une branche fort menuë, longue, d'environ demi-pied, & couverte de petites fleurs blanches, semblables en grosseur & en figure à celles de nos vignes, qui produisent en suite une grape de fruits fort agreables : ces fruits ont presque la figure d'une poire relevée de trois éminences arrondies, qui aboutissant à la base du fruit, forment une espece de nombril enfoncé, du milieu duquel s'esleve une petite pointe. Ils ont environ un pouce & demy de long, & près d'un pouce d'épaisseur vers leur

base; ils sont fort unis & verts du commencement, mais étant meurs, ils sont de couleur d'écarlate: ils s'ouvrent en trois cellules, dont chacune contient une espece de fève de la figure d'un petit rein, longue de demi-pouce, & large de trois ou quatre lignes, dont la consistance est à peu près comme celle de nos fèves, quand elles sont encore vertes: leur goust est un peu astringent, & leur couleur est d'un noir de jayet poli, mais elles sont moitié couvertes d'une chair douçastre fort tendre, & fort blanche, divisée comme en deux lobes.

Cette plante est assez frequente dans nos Isles, particulièrement à la Martinique, ou quelques-uns la nomment *Liane à dent de scie*, c'est le *Cururu-ape* de Marcgrave liv. 1. chap. 11. & de Pison liv. 4. chap. 88. où il dit que l'eau dans laquelle on a jetté son fruit pilé, enivre & tuë les poissons: il rapporte aussi que les feuilles vertes pilées & appliquées mondifient & guerissent les playes.

X C I I.

Clematis folio anguloso, aceris fructu.

Clematis à feuilles anguleuses, & à fruit d'érable.

Cette plante jette des sarments fort longs, un peu plus gros qu'une plume à écrire, souples & difficiles à rompre, qui en poussent encore d'autres plus deliez, fort longs aussi; raboteux, & de couleur tané-clair, & entrecoupez par des nœuds enflez, & assez éloignez les uns des autres: il y a à chacun de ces nœuds deux feuilles opposées l'une à l'autre, & soutenues par des pedicules assez longs: leur contenu est presque quarré, & elles sont grandes environ comme la paume de la main, & quelquefois davantage, tendres & lisses, avec quelques avances qui rendent leur contour anguleux: leur dessus est vert-chargé, mais le dessous est vert-clair, & soutenu par une nervûre, & par quelque costes assez élevées.

Il sort tout joignant les pedicules des feuilles, un autre pedicule tant soit peu plus gros, & d'environ un demi-pied de long, soutenant dans son extrémité deux autres pedicules plus courts, dont chacun porte un espece de bouquet de six ou sept fleurs jaunes & sans odeur, soutenues sur des pedicules articulez d'environ un pouce de long: elles sont composées de cinq feuilles presque rondes, grandes environ comme l'ongle du petit doigt, un peu creuses comme les feuilles du *Cochlearia*, & dentelées

tout au tour : elles sont attachées par un pedicule fort court & fort menu , à une teste de la grosseur d'un pois, verte & goderonnée, qui pousse de son fonds trois à quatre filets fort courts , un peu épais, chargez chacun d'une petite teste jaune, ronde, & de la grosseur de la teste d'une épingle.

Ses fruits sont de mesme grandeur & figure que ceux de l'*érable*, ordinaire ; c'est à dire que leur teste est un peu plus grosse qu'un pois chiche, dont l'écorce est assez dure & enferme dans deux cellules, deux semences presque de la grosseur de la semence d'*orobe*, d'un goust fade : ces testes ont quelques éminences en façon de creste, & sont ornées de deux ou trois ailles faites de mesme façon que celles des fruits de l'*érable*, la couleur de ces ailles est d'un tané clair, entremeslé de tant soit peu de rouge.

Les feüilles des plus jeunes plantes, & mesme les plus jeunes feüilles ont les bords couverts de poils blancs & fort deliez, qu'elles quittent en suite quand elles ont acquis leur grandeur naturelle. Je l'ay veüe en fleur presque pendant tout le temps que j'ay resté dans l'Isle S. Domingue, où on la trouve en plusieurs endroits.

X C I I I.

Clematis baccifera, glabra & villosa, rotundo & umbilicato folio.

Clematis à bayes, lisse & veluë.

Cette plante couvre toutes les hayes par ses sarments qui sont menus, souples, ronds, unis, & qui poussent alternativement à chaque nœud (qui sont assez proche les uns des autres) une feüille & rarement deux : ces feüilles sont presque rondes, & quelquefois de la figure d'un cœur émoussé : elles ne sont pas attachées à leurs pedicules immédiatement par le bord, mais un peu plus par dessous le dos ; leur grandeur est indeterminée, il y en a qui sont grandes comme la paume de la main, & d'autres beaucoup moindres : elles ont quelques nervûres tant soit peu eslevées qui sortant de l'insertion du pedicule s'étendent deçà & delà par la feüille, enfin elles ont beaucoup de rapport aux feüilles de l'*Aristolochie ronde*, tant par leur figure que par leur consistance.

On en trouve de deux especes ; l'une est tout à fait lisse, & c'est la plus frequente ; l'autre a ses feüilles cotoneuses & blanchâtres,

mais elle est plus rare : on peut y ajouter une troisième espece que j'ay souvent remarquée dans l'Isle S. Domingue, dont les feuilles sont attachées immédiatement à leurs pedicules par le bord.

Les unes & les autres poussent de branches fort menuës du mesme endroit d'où sortent les feuilles : elles ont environ demi-pied de long, & sont couvertes de feuilles beaucoup plus petites que les premieres qui s'entrecouvrent souvent les unes les autres, & composent comme la cheûte d'un feston. Du fond de chacune de ces feuilles, il en sort une petite grappe de fleurs blanches fort menuës, & composées de quatre petites feuilles pointuës : après qu'elles sont passées, il y vient des bayes rouges comme du corail, & grosses comme la semence de l'*orobe* ; on les prendroit pour des bayes de nos *chevre-feuilles*, car elles en ont la grosseur, la couleur & la consistance, & elles pendent en-bas en façon de petites grappes.

On appelle cette plante dans nos Antilles, & particulièrement dans la Martinique (*Liane à serpent*,) à cause de la grande vertu qu'elle a pour guerir les morsures des serpents, & par ce que le contour de sa feuille represente le plan de la teste de ces animaux. C'est le *Caapeba des Brasiliens*, *l'erva di nostra Senora*, *Herbe de Nostre-Dame*, *Cipo de Cobras*, *des Portugais*, de Marcgrave liv. 1. chap. 13. où il dit que les feuilles de cette plante sont un singulier remede, contre la morsure des bestes venimeuses, tant pour les hommes que pour toute sorte d'animaux ; si on en pile les feuilles & si on les applique sur la morsure, sans qu'on soit obligé de recourir à d'autres remedes. Sa racine est excellente suivant cet auteur, contre le calcul ou la gravelle, & c'est cette racine qu'un Portugais donnoit avec grand succez.

Pison la nomme de mesme dans son liv. 4. chap. 44. où il rapporte & enseigne les usages qu'il en a fait, & qu'on en peut faire. Il apprend que cette racine coupée par petits morceaux, & mise à infuser dans une liqueur convenable, luy communique sa vertu, qu'elle ne donne point de méchant goust au vin, ni à la biere dans laquelle on la met infuser, & que les malades s'en servent avec succez, au lieu de leur boisson ordinaire, à cause qu'elle emporte les obstructions des reins, des ureteres & de la vessie, chassant fort les matieres graveleuses ; & enfin que les Portugais la preferent à tout autre remede. Il dit encore que cette plante leur est en grande recommandation, non seulement pour les vertus dont nous venons de parler, mais encore à cause de ses facultez, qui sont si opposées aux venins ; & il assure aussi que le suc qu'on

exprime des feüilles fraifches guerit la morfure des ferpens , & que la racine pilée avec les feüilles & prise dans du vin , détruit la force du poifon qu'on auroit avalé.

X C I V.

*Clematis quadrifolia , flore digitalis luteo ,
claviculis aduncis.*

Clematis à quatre feüilles , à fleur jaune de digitale.

Cette plante s'attache fur les rochers , ou fur les troncs des arbres de la mefme maniere que nos lierres : elle pousse des farments fort menus , & de couleur cendré , entrecoupez par des nœuds affez prés les uns des autres , à chacun defquels il y a deux pedicules fort menus , & longs d'environ un pouce , oppofez les uns aux autres : chaque pedicule porte deux feüilles d'environ un pouce & demy de long , & d'un pouce de large , appuyées chacune fur un autre pedicule beaucoup plus court , & qui n'a qu'environ deux ou trois lignes de long : elles font arrondies par le bas , & pointuës par le haut , membraneufes , unies , d'un vert-gay par deffus , mais un peu plus clair par deffous avec une nervûre , & quelques petites coftes traversieres , courbées vers le bord.

Il fort un tenon fort court d'entre les pedicules de ces feüilles , qui fe fend en deux ou trois autres , crochus & pointus : & c'est par ceux-cy , que la plante s'attache contre les troncs des arbres. Je n'ay pu trouver aucune de ces plantes en fleur , ni en fruit dans la Martinique , quelque diligence que j'aye faite : mais étant arrivé à S. Domingue vers le mois de Novembre , j'en vis quelques arbriffeaux chargez , d'où pendoient quantité de longues gouffes : & au mois de May fuivant , je vis quelques arbres tous couverts de leurs fleurs.

Elles font faites prefque comme les fleurs de nos digitales , mais tant soit peu plus grandes & plus ouvertes par le bord , qui eft taillé en cinq découpûres rondes : elles font jaunes , fans odeur , & forment du fonds d'une petite coupe , dont le bord eft auffi taillé en cinq pointes , & qui eft foustenuë par un pedicule fort menu d'un peu plus d'un pouce de long , articulé par un petit nœud vers le bas , & attaché joignant le pedicule des feüilles.

Les gouffes qui viennent en-suite , ont environ deux pieds de long fur environ demi-pouce de large ; elles font fort applaties , & finiffent par un bout fort pointu : elles font de couleur tané étant meures

DES PLANTES DE L'AMERIQUE. 81

meures, & s'ouvrent dans ce temps-là en trois longues lames, & font voir deux rangs de semences rondes, presque comme des lentilles, ayant à chaque bout une membrane blanche fort deliée en façon de deux aislerons: ces semences sont attachées tout le long & des deux costez de la lame du milieu, & sont mises les unes sur les autres en façon d'écailles.

On appelle cette plante *Liane au chat*, dans la Martinique, à cause de ses petits tenons crochus & pointus, comme les griffes d'un chat, & on l'appelle *Fleur de May*, à S. Domingue, à cause de ce qu'elle fleurit dans le mois de May, où pour-lors elle sert d'ornement aux arbres qu'elle couvre.

X C V.

Apocynum majus scandens, filiqua oblonga, tumida, & glabra.

Grand Apocynum montant, à gouffes lisses, longues & enflées.

Cette plante pousse des ceps comme ceux de nostre vigne, ils produisent des sarments assez gros & noüeux, dont l'écorce est fort épaisse, entrefenduë de quantité de rides, & de couleur vert-cendré: ils produisent des branches de la grosseur d'une plume a écrire, & qui rampent sur les hayes & sur les arbres: Leurs noeuds sont assez esloignez les uns des autres, & poussent chacun deux feüilles opposées d'environ demi-pied de long, & de trois pouces de large vers le milieu, pointuës au bout, & découpées en façon de cœur vers le pédicule qui est tortu, & qui a environ un pouce de long: elles sont tendres, unies, & leur couleur est vert-gay, ayant par dessous une nervûre, & des costes courbées vers le bord.

Au mesme endroit d'où sortent les feüilles, il y a comme une ombelle de plusieurs fleurs, d'une seule feüille découpée en cinq pointes en façon d'une étoile: elles ont environ demi-pouce de diametre, & sont un peu concaves au milieu; leur couleur est rouge-brun: elles n'ont aucune odeur, & sortent comme d'une petite coupe composée de cinq feüilles vertes, appuyées sur des pedicules fort courts, qui sont tous attachez sur un appuy commun, un peu plus gros, mais fort court.

Ces fleurs avortent presque toutes: celles qui restent produisent chacune une gouffe attachée à cet appuy commun: ces gous-

ses ressemblent fort bien à certaines petites calebasses, dont les chasseurs se servent pour tenir de la poudre; elles ont environ demi-pied de long, & deux pouces de grosseur vers le milieu, qui est l'endroit le plus gros: elles sont toutes unies & rondes, ayant pourtant une petite areste dans leur longueur, par laquelle: elles s'ouvrent étant meûres: leur écorce est solide comme un cuir endurci; du commencement elle est verte, en suite elle devient grisâtre: sa substance interieure est une chair fort blanche, & pleine de laiçt, elle enferme un petit corps de plusieurs semences, placées les unes sur les autres comme des écailles; ce corps est envelopé d'une membrane blanche & fort deliée: ces semences sont applaties comme de petites lames, leur figure est ovale: elles sont longues d'environ cinq à six lignes sur trois de large, & finissent comme par un petit manche orné d'un panache, qui est composé de quantité de petits filets argentez & deliez comme de la soye tresfine, & qui s'épanouit & se dilate de la mesme façon que ces panaches que nous appellons *aigretes*: ces semences sont de couleur rouffastre, lors qu'elles sont meures; & pour lors la gouffe s'ouvrant, elles se détachent l'une de l'autre, & sortent hors de la gouffe.

Cette plante est pleine d'un suc blanc comme du laiçt, & d'un goust douçastre & adstringent, d'où vient que quelques-uns la nomment *Liane laiçteuse*: il s'en trouve en plusieurs endroits dans nos Isles, où je les ay veuës en fleur aux mois de Juin & de Juillet, & j'en ay cueilly des gouffes meûres en Mars & en Avril.

Marcgrave parle d'une plante liv.1. ch.10. qu'il nomme *Ibati des Brasiliens*, qui quoy qu'elle ait son fruit plein de verruës, ne laisse pas d'estre de la mesme espee.

X C V I.

Apocynum scandens, flore nerii albo.

Apocynum montant, à fleur de laurier-rose, blanche.

Cette plante pousse quantité de sarments sur les arbres, & sur les hayes, de la grosseur d'une plume à écrire, unis, souples, & vert-cendrez: les noeuds sont fort esloignez les uns des autres, il y a à chacun deux feüilles opposées d'environ trois pouces de long, & d'un pouce & demy de large; elles sont presque ovales, plus étroites pourtant vers le pedicule, & arrondies vers le bout avec une petite pointe: elles sont lisses, solides, & épaisses comme du velin: leur dessous est vert-clair, avec une nervûre

DES PLANTES DE L'AMERIQUE. 83

tout au long, qui distribué de part & d'autre quelques costes transversieres paralleles, mais courbées vers le bord : le dessus est vert- chargé, & leur pedicule a environ demi-pouce de long : quand on les arrache, elles jettent un suc fort blanc d'un goust adstringent.

Les fleurs sortent de l'endroit mesme d'où naissent les feuilles : il y en a quelquefois trois ou quatre ensemble, mais le plus souvent il n'y en a qu'une : leur pedicule a trois ou quatre lignes de long, & soutient une petite coupe verte, longue de trois ou quatre lignes, fort étroite en-bas, & divisée par le haut en cinq pointes : la fleur qui sort du dedans de cette coupe est fort blanche, & sans odeur ; elle est faite de la mesme façon que les fleurs de nos lauriers-roses, qu'on appelle en latin *nerion* ou *rhododendron* ; elle est pourtant un peu plus grande, & le fond interieur de son tuyau est jaune-passe, mais la partie exterieure du mesme tuyau est tant soit peu rouge : outre cela ses découpûres ont un costé arrondi, & l'autre taillé en façon d'un bec pointu.

Les fruits de cette plante sont deux gouffes qui font la figure de deux petites cornes rondes, & aiguës, droites, longues d'environ demi-pied, & épaisses d'une ligne & demy, attachées toutes deux ensemble au mesme pedicule, & presque paralleles entre elles : elles sont fort unies, de couleur verdastre, pleines de quantité de petites semences, & d'un petit poil fin, & delié comme de la soye, de couleur chastein.

Cette plante fleurit & porte ses gouffes meures en divers mois de l'année ; elle aime particulièrement les marais qui sont proche de la mer. J'en ay rencontré souvent au quartier de Leogane dans l'Isle S. Domingue, & à la Martinique, le long de la Riviere du Lamentin.

XC VII.

Bryonia racemosa, foliis ficulneis.

Coluvrée à grapes, à feuilles de figuier.

LA racine de cette plante est semblable par sa figure à celle de nos grosses raves ; elle est de mesme consistance, & blanche en dedans, grisastre en dehors, mais elle a dans le centre une nervûre comme ligneuse.

Elle pousse quantité de sarments de quatre à cinq lignes de grosseur, anguleux, verts, noûeux & aisez a rompre. Il y a à chaque nœud une feuille, & un tenon, comme celui de nos vignes ;

les feuilles sont presque de la même grandeur, forme & aspreté que celles de nos figuiers, quoy qu'elles ne soient pas si épaisses ni si fragiles; bien souvent la même plante en porte, qui sont encore plus découpées que celles des figuiers, & d'autres qui ne le sont pas tant: les unes & les autres ont quelques petites dentelures tout au tour.

Il sort des nœuds qui sont aux extremités des sarments, des branches assez longues & menuës, qui ont des rameaux alternatifs beaucoup plus courts, plus menus & assez esloignez les uns des autres: chacun de ces rameaux porte deux sortes de fleurs alternatives, dont les unes sont steriles, & les autres fertiles. Les steriles sont de petites coupes posées sur un pedicule de deux ou trois lignes de long, & grosses aussi d'environ trois lignes de diamètre, avec un petit pilon en dedans; leur bord est entouré de cinq petites feuilles d'un jaune-passe un peu pointuës, fenduës au bout, & recourbées en dehors. Les fertiles sont beaucoup plus petites; elles sont situées sur le commencement du fruit, qui devient ensuite de la même figure & grosseur que nos olives: ces fruits sont attachez à des pedicules minces, qui se recourbant en haut, font que les fruits regardent aussi le même costé. Leur peau est fort deliée & unie, verte du commencement, mais en suite elle devient rouge comme du corail: il y a dans ces fruits un peu de chair mucilagineuse, d'un suc blanchâtre & amer, qui enferme deux ou trois semences presque de la grosseur, & figure de celles de nos melons; tous ces fruits ensemble composent une espece de grape, fort agreable à voir, particulièrement lors qu'ils sont meûrs.

J'en ay veu en fleurs & en fruits dans les mois de May, & de Juin, en divers endroits de l'Isle S. Domingue.

XCVIII.

Bryonia fructu alato, foliis auriculatis.

Coluvrée à fruit aisé, à feuilles oreillonées.

SA racine est quelque fois grosse & faite comme l'œuf d'un oye; d'autrefois elle est longue de quatre à cinq pouces, épaisse environ de deux, & arrondie par les deux bouts, en façon d'un petit boudin: elle est de consistance de rave, sans aucune nervûre; son écorce est fort mince de couleur-cendré, un peu ridée & raboteuse par plusieurs petites bossettes: sa chair est fort blanche, tendre & d'un goust de fève: elle ne pousse qu'un sarment fort me-

nu, vert, lisse, noüeux, qui rampe fort au long sur les hayes, & qui est plus épais dans son commencement, où il est aussi accompagné de plusieurs petites racines fibreuses & grisâtres.

Il y a à chaque nœud deux petits aiguillons fort tendres, du milieu desquels sort une feuille aussi assez tendre, appuyée sur un pedicule de trois lignes de long : ces feuilles sont longues d'environ trois pouces ; leur base est élargie par deux avances en façon d'oreillettes, & elle a près d'un pouce de large, mais le corps de la feuille est fort étroit & finit en pointe : le dessous est blanchâtre, tant soit peu velu, & soutenu par trois petites nervûres qui en parcourent la longueur, & le dessus est tout à fait lisse, & d'un vert fort gay.

Dans les endroits d'où sortent les feuilles, il en sort aussi un petit rameau de trois à quatre pouces de long, chargé de fort petites fleurs composées d'une coupe grosse comme la teste d'une épingle, & surmontée par cinq petites feuilles blanches : ces fleurs sont suivies par une grappe de fruits, dont la figure approche de celle de la moitié du fruit de l'Erable, de six à sept lignes de long sur trois de large : leur aïsse est fort mince ; & ils sont comme argentez du commencement, en suite ils deviennent fauves, & ils renferment une semence semblable à une petite lentille, & d'un goût de legume.

J'ay trouvé cette plante à l'entour du Port-de-Paix dans l'Isle S. Domingue.

X C I X.

Cucumis triphyllus, fructu variegato.

Coucombre à feuilles en trident, à fruit bigarré.

SA racine est assez semblable à celle d'une rave, épaisse d'un pouce, longue de près d'un pied, fourchuë & terminée par d'autres petites racines qu'elle pousse : son écorce est grisâtre & raboteuse, à cause de plusieurs petites verrûes dont elle est couverte.

Ses sarments grimpent sur les faïstes des arbres les plus élevez, quoy qu'ils n'ayent que deux ou trois lignes de grosseur : ils sont ronds, fort souples, vers-cendré, & aussi raboteux que la racine : ils ont à chaque nœud, qui sont éloignez d'environ demi-pied les uns des autres, un tenon long & menu comme celui des vignes, & trois feuilles attachées à un mesme pedicule : ces feuil-

les sont fort tendres, unies, & d'un vert-chargé : celle du milieu est assez semblable à la feuille du laurier, mais celles des costez sont presque taillées en demy-cœur : les unes & les autres ont environ trois pouces de long, & un pouce de large.

Les fleurs naissent trois à quatre ensemble vers les extrémités des sarments, tantost sur de petites branches, tantost dans l'endroit mesme d'où sortent les feuilles : elles sont faites de mesme que celles de nos coucombres, mais d'un beau vermillon : les unes sont steriles, & les autres fertiles : les fertiles produisent un fruit semblable à un petit coucombres, un peu plus gros que le fruit du coucombres sauvage : il est tout uni & vert par dehors, mais rayé en long par quelques bandelettes blanchâtres : sa chair est rouge & fort douce, de mesme consistance que celle de nos coucombres, & les semences sont faites & disposées de mesme.

J'ay trouvé cette plante au quartier de Leogane dans l'Isle S. Domingue, où je la vis en fleur & en fruit, dans le mois de Janvier.

C.

Colocynthis flore albo, fimbriato, fructu oblongo.

Coloquinthe à fleur blanche, frangée.

Ses sarments sont fort menus, lisses, verts, anguleux & souples : les nœuds sont environ à deux pouces de distance l'un de l'autre, & chacun d'eux a un tenon fort mince & fort long, une feuille, & bien souvent une fleur.

Les feuilles n'ont pas plus d'un pouce d'étendue ; elles sont taillées à peu près comme les feuilles de la pomme-de-Merveille, que G. Bauhin appelle *Balsamina rotundifolia repens vel mas* : elles sont un peu rudes, & attachées à des pedicules d'un pouce de long ; elles ont par dessus quelques petites taches grisâtres, & quantité de petits points quasi imperceptibles.

Ses fleurs sont fort blanches, de mesme grandeur & forme que celles de nos Calebasses, en Latin *Cucurbita Lagenaria, flore albo, folio molli*, de G. Bauhin, avec cette difference pourtant qu'elles sont toutes frangées par le bord : il y en a de steriles aussi bien que de fertiles, comme dans toutes les plantes de ce genre.

Le fruit est de la figure d'une poire allongée, long de quatre à cinq pouces, & gros d'environ un pouce & demy : son écorce est assez mince, tendre, & unie par dehors, verdâtre & marquée

en long par quelques lignes d'un verd un peu plus clair, mais sa chair est fort blanche & fort amere, enfermant quantité de semences un peu longues, étroites & de couleur minime.

J'ay trouvé cette plante dans les bois de l'Isle S. Domingue en allant du Port-de-paix au Moustique : je la vis en fleur dans le mois de Decembre, & j'en cueillis les fruits dans le mois d'Avril suivant : elle a grand rapport par sa fleur à la plante que Bremius appelle *planta scandens, hederaceis foliis, zeilanica*, dans les observations des sçavants d'Allemagne, aux années 4. & 5. observation 137. quoy que ses feüilles soient un peu plus petites, & n'ayent pas tout à fait la mesme entaillûre.

C I.

Lupulus folio trifido, fructu tricocco, & hispido.

Houblon à feüilles en trident, & à fruit piquant.

Cette espee de houblon rampe & monte sur les hayes & sur les arbres de la mesme façon que le houblon commun, mais ses sarments sont plus petits ; ils sont verts & velus : ses noeuds sont aussi assez éloignez les uns des autres, & à chacun d'eux il y a une feüille attachée sur un long pedicule : ces feüilles sont presque de la grandeur de la main ouverte, fenduës en trois découpûres assez profondes, & taillées vers le pedicule en forme de cœur : ces découpûres sont pointuës, & ont environ deux pouces de large, elles sont dentelées fort legerement, & leur couleur est vert-obscur, mais leur dessous est velu, & comme ridé par quantité de petites costes.

Du mesme endroit d'où sortent les pedicules des feüilles, il en sort un autre pedicule (& quelquefois mesme deux à trois) fort long & fort menu, qui porte en son extremité une espee de bourse composée de deux feüilles faites presque en cœur d'environ un pouce & demy d'étenduë, & decoupées en trois pointes par le bout : elles sont veluës & chargées de quelque costes d'un bout à l'autre, accompagnées aussi a leur base de deux autres feüilles petites & étroites : il sort du fond de cette bourse trois petits pedicules, dont celuy du milieu est toûjours le plus long : chacun d'eux porte un fruit de la grosseur d'un pois chiche, fait de la mesme façon que le fruit de l'*Heliotropium tricoccum*, de G. Bauhin, en François *Tournefol* ; & ce fruit est entouré de neuf petites feüilles étroites & pointuës, qui y sont comme collées par dessus : elles sont

aussi dentelées tout au tour, & couvertes de quelques petits poils blanchâtres & piquants comme ceux de nos *orties* ordinaires, qui font souffrir une demangeaison fort importune quand on les touche, entrant dans les doigts, d'où on ne les peut tirer que fort difficilement : ces fruits ont aussi à leur bout un petit stile surmonté d'une petite teste en façon d'un nombril : ils sont verts du commencement, en suite ils deviennent fauves : on trouve dans chaque cellule une semence ronde, & blanche, couverte d'une petite membrane noire & fort déliée.

Je n'ay pas peu observer les fleurs de cette plante, quoy que je l'aye trouvée en plusieurs endroits de la Martinique, au quartier du Fort S. Pierre, particulièrement dans le jardin des R.P. Jesuites.

C I I.

Convolvulus luteus, polyanthos.

Liseron, à plusieurs fleurs Jaunes.

Ses sarments sont fort menus, & ils ont à chaque nœud une feuille faite en façon d'un cœur, pointuë par le bout, de quatre à cinq pouces de long, & de trois à quatre pouces de large; ces feuilles ont le pedicule fort long & greffe, elles sont aussi, fort tendres, lisses, d'un vert-foncé, & comme ondées à l'entour, avec une nervûre, & quelques costes par dessous.

Il sort des mêmes nœuds un autre pedicule fort long, & un peu plus gros que celui des feuilles, particulièrement vers le bout, qui soutient un bouquet de fleurs semblables à celles de nos lisérons ou clochettes, de couleur jaune éclatant, ayant dans leur fond cinq petits filets avec leur testes un peu longues & blanches, & ces filets entortillent un stile un peu plus long, dont la teste est verte & fenduë.

Les capsules sont rondes & grosses presque comme le bout du petit doigt, composées d'une membrane solide rouge-brun, qui enferme deux ou trois semences de la grosseur d'un pois ordinaire, couvertes d'un velouté roux & luisant.

J'en ay trouvé quantité dans la Martinique, & dans l'Isle S. Domingue, où j'ay remarqué qu'elle y venoit plus grande, mais celle qui croist à la Martinique, a les pedicules qui supportent le bouquet des fleurs, accompagnez dans leur longueur de deux manieres d'aîles frisées : elle fleurit en Janvier & en Fevrier.

C I I I.

C I I I.

Convolvulus coccineus, folio anguloso.

Liseron à fleurs d'écarlate, & à feuilles anguleuses.

L Es sarments de cette espece sont fort menus, ronds & gristres; ses feuilles sont fort tendres, de la figure d'un cœur, avec quelques avances tout au tour, qui les rendent anguleuses; elles sont lisses, d'un fort beau vert, d'environ quatre à cinq pouces d'étendue, & attachées à des pedicules assez longs.

Dans le mesme endroit d'où sortent ces pedicules, il en sort un autre aussi-long & menu, qui se divise en plusieurs autres beaucoup plus courts, plus menus, & qui portent des fleurs de couleur de pourpre fort éclatant: chaque fleur est comme un tuyau de prés d'un pouce & demy de long, & gros environ comme une plume à écrire, mais un peu plus menu en son commencement: ce tuyau se dilate ensuite, en façon d'un petit entonnoir de neuf à dix lignes de diamètre, decoupé à l'entour fort legerement par cinq entailles rondes, à chacune desquelles aboutit un rayon pointu: du fond de ce tuyau sortent quelques filets fort minces, & blancs colorez legerement de rouge.

Les capsules des semences sont rondes & grosses comme des pois chiches: elles s'ouvrent en quatre, & contiennent en chaque quartier une semence noirâtre presque aussi grosse qu'un orobe.

J'en ay trouvé en plusieurs endroits de l'Isle S. Domingue, particulièrement vers le Port-de-paix: elle fleurit en Decembre & en Janvier.

C I V.

Convolvulus marinus catharticus, folio rotundo, flore purpureo.

Liseron marin purgatif, à feuilles rondes & à fleurs pourprées.

L Es racines de cette plante sont des sarments fort longs qui tracent & occupent une grande étendue dans les lieux sablonneux le long des costes ou anes de mer: ces sarments sont de la grosseur d'un pouce, de consistance quasi de bois, blancs en de-

dans & pleins de lait, couverts en dehors d'une écorce noire, & toute gerfée : ceux-cy en poussent d'autres plus menus que le petit doigt, & qui rampent fort loin sur le sable, jettant à leurs nœuds, quelques petites racines fibreuses & blanches : ils portent aussi dans toute leur longueur, quantité de feuilles attachées à des pedicules assez longs & épais, marquez de deux petites taches rouges vers la feuille.

Ces feuilles sont presque rondes, & comme pliées en dedans, lisses & fort épaisses, d'environ quatre pouces de grandeur, ayant par dessous une nervûre en long, & plusieurs costes paralleles qui les traversent obliquement, & qui se courbent vers le bord : elles sont d'un fort beau vert, tant dessus que dessous, & jettent du lait quand on les coupe aussi-bien que toute la plante.

Les mesmes tiges poussent aussi des pedicules fort longs, qui portent trois ou quatre fleurs, & quelquefois une seule, de mesme façon que celles de nos lisérons, mais un peu plus grandes, pourprées tant dedans que dehors, ayant près de trois pouces de diamètre & cinq ou six filets blancs en dedans, dont le plus long soutient une petite boule blanche divisée en quatre quartiers ; & les autres ont une pointe blanche un peu longue.

Ses semences sont veloutées de noir, assez semblables à de petites noisettes : il y en a toujours trois ou quatre dans des bourses composées de trois à quatre feuilles membraneuses de couleur-tané.

Je n'ay jamais veu cette plante que le long des sables de la mer, c'est pourquoy on l'appelle vulgairement *patate de mer*, à cause qu'elle ressemble fort, tant par son étendue que par ses fleurs, à la plante qu'on nomme *patate*, qui n'est autre qu'une espece de liseron, dont la racine est bonne à manger, & fort commune dans toutes nos Isles.

Les Caraïbes l'appellent *Camoulroulé* : c'est le *Convolvulus marinus*, seu *soldanella* : *liseron de mer*, ou *soldanelle*, de G. Marcgrave liv. 1. chap. 24. c'est aussi le *salsa do praya*, des Portugais, de G. Pison liv. 4. chap. 69. où traitant de ses vertus, il dit que les sarments & les feuilles fraîches sont d'une chaleur tempérée, & ont la vertu de ramollir, & que pour cela elles sont fort utiles pour faire des bains, & qu'elles servent aussi à fortifier le corps dans les maladies froides : enfin la décoction des sarments & des racines seches, prise par la bouche, peut servir au mesme usage : les feuilles fraîches appliquées sur les cautères y apportent du soulagement.

J'ay pourtant appris par des personnes expérimentées, que son suc épais étoit fort purgatif : aussi c'est une véritable espece de

scamonée, & l'on peut donner ce suc en mesme dose que celui de la scamonée ordinaire ; c'est-à-dire depuis dix jusques à douze & quatorze grains : on peut la corriger à la vapeur du soufre, avec le crème de tartre, où avec les coïns ordinaires ; & au défaut de ce fruit, on peut se servir de la chair du fruit de la goyave, ou le mesler avec quelques amandes, ou quelques semences froides.

C V.

*Convolvulus marinus, catharticus, foliis acetosæ,
flore niveo.*

*Liseron marin purgatif, à feüilles d'ozeille, &
à fleurs blanches.*

Cette plante est de mesme nature, & rampe de la mesme façon & dans les mesmes lieux que la precedente : ses feüilles sont de mesme grandeur & figure que celles de l'ozeille commune : elles sont pourtant un peu plus épaisses, plus tendres, & d'un vert plus gay, pliées en dedans, avec une nervûre, & quelques costes traversieres.

Ses fleurs sont de mesme que celles de la precedente : mais elles sont un peu plus petites, & de blanc de laiët, avec le fond rouge-foncé : ses semences ont aussi la mesme figure, & sont veloutées de noir : quoyque un peu plus petites, enfin toute la plante jette un laiët fort blanc comme la premiere, & son suc épaissi est aussi purgatif.

Je n'ay jamais veu cette plante que dans un seul endroit, le long de l'Anse du diamant à la Martinique, du costé de l'Est. Je la trouvay en fleur au mois de Janvier, & j'eûs beaucoup de peine à y appercevoir quelques semences, après avoir cherché longtemps.

C V I.

Aristolochia longa, scandens, foliis, ferri equini effigie.

Aristolochie longue, montante, à feüilles en fer-de-cheval.

La premiere fois que je découvris cette plante, je crus avoir rencontré la *Contrahierva*, dont Nard Anthoine Reche

parle dans son 8. liv. ch. 58. à cause de la ressemblance de ses feuilles ; mais quelque temps après ayant trouvé la plante en fleur , je connus que c'estoit une espece d'Aristolochie longue, sur-tout en ayant gousté la racine qui est fort amere, celle de la *Contrahierua*, estant douce, suivant le rapport du mesme auteur.

Cette racine a plus d'un pied de long, & près d'un pouce d'épaisseur : elle est enfoncée droit dans la terre, & finit par quelques sousdivisions : son écorce est grosse & noire en dehors, & toute découpée en long par de longues fentes ; le dedans est jaunâtre, & d'un goust fort amer : les tiges qu'elle pousse sont fort menuës, lisses, rondes, & rampent fort avant sur les hayes : elles sont entrecoupées de plusieurs nœuds, à chacun desquels il y a une feuille taillée presque comme un fer de cheval, dont les deux bouts sont émouffez : ces feuilles ont un peu plus d'un pouce d'étendue, & leur pedicule a environ un demy pouce de long : elles sont lisses, membraneuses, d'un beau vert par dessus, un peu pâles par dessous, & chargées en long de deux ou trois nervûres qui partent d'une petite coste qui est un allongement du pedicule.

Les fleurs sont presque de la mesme figure que celles de nos aristoloches, mais beaucoup plus élargies dans leurs ouvertures, ayant aussi la langue pointuë, & plus étenduë : elles sont jaunes-pâles & venées de rouge-brun.

Le fruit est gros comme un œuf de pigeon ; ayant une pointe émouffée vers le bout d'en-bas : il est divisé en six angles arrondis, dont le dos est surchargé d'une areste ronde & eslevée ; il est aussi divisé en dedans en six cellules pleines de semences noires, plates, fort minces, arrondies par un bout & pointuës par l'autre, rangées de plat les unes sur les autres.

J'en ay trouvé en plusieurs endroits de l'Isle S. Domingue, sur-tout au Port-de-paix, où je l'ay veuë en fleur en Novembre & en Decembre, & en fruit en Février & en Mars.

C V I I.

Phaseolus filiquis latis, hispidis, & rugosis, fructu nigro.

Phaseole à gousses larges, veluës, & froncées.

Cette plante rampe sur les arbres de la mesme façon que nos phaseoles : ses feuilles sont faites de mesme maniere & de mesme grandeur : elles sont pourtant un peu plus solides : quand elle a attrapé le haut des arbres, elle pousse certains filaments très-

longs, de la grosseur d'une des plus grosses cordes de viole, qui pendent en bas, & ont à leur bout un groupe de fleurs, tantost jaunes, tantost pâles : ces fleurs sont composées d'une coupe verte, un peu plus grosse qu'une noisette, ayant le bord taillé par quelques découpûres; elles sont attachées à un pedicule fort court : il sort cinq feuilles du fond de cette coupe, dont la plus courte est creuse & s'élève un peu en haut, poussant comme de son sein les autres quatre qui sont pointuës, d'environ deux pouces de long, & de huit à neuf lignes de large : de ces quatre feuilles il y en a deux par les costez qui couvrent presque les deux autres, de façon qu'elles ne montrent que leur extrémité : du milieu de ces feuilles il en sort aussi plusieurs filets un peu plus longs que les feuilles, fort menus & fort blancs, ayant chacun une pointe jaune, excepté le plus long dont la pointe est blanche.

La plupart de ces fleurs avortent, de sorte qu'il n'y en aura qu'environ deux ou trois qui portent des fruits ou des gousses d'environ un demi-pied de long, de deux pouces de largeur, & de près d'un pouce d'épaisseur, un peu enflées aux endroits où sont les graines, arrondies vers le pedicule, & pointuës au bout : elles sont toutes ridées par certains plis assez eslevez qui les traversent, & sont couvertes (excepté le dos qui est nud & lisse) de petits poils fort menus & fort penetrans, qui donnent bien de l'embarras quand on les manie, car ils s'attachent si fort aux doigts qu'on a peine à s'en débarrasser : elles sont vertes du commencement, & ensuite elles deviennent noires ou fauves.

Il y a au dedans deux ou trois haricots attachez chacun dans sa cellule par une petite membrane noire & frangée, & qui est fort adherante au fruit même : ce haricot, ou ce fruit est tout à fait rond, mais comme applati, de près d'un pouce de diametre, & de quatre à cinq lignes d'épaisseur ; son écorce est dure, quoyqu'assez mince ; elle est noire, luisante, & grenée à la façon du chagrin, entourée comme par un anneau tout lisse ; sa chair est blanche & solide, mais d'un goût fade.

Les Caraïbes mangent ces haricots, & se servent du suc des feuilles pour teindre en noir les filets de leurs hamacs (qui sont des lits d'une piece de toile de coton qu'on suspend en l'air par les deux bouts) nos François les appellent *grands pois à grater*, à cause de la grande demengeaison que causent leurs petits poils : c'est le *Mucuna des Brasiliens* de G. Marcgrave liv. i. ch. 10. c'est enfin le *phaseolus Nigritarum*, *phaseole des Nègres*, de Clusius dans son liv. 3. des plantes exotiques chap. 11.

C V I I I.

Phaseolus amplo flore peltato , filiquis nigris,
& angulosis.

Phaseole à grandes fleurs rondes.

Ses feüilles sont aussi disposées de trois à trois sur chaque pedicule , de mesme que celles des phaseoles ordinaires ; elles sont fort tendres ; celle du milieu est plus grande , & un peu plus arrondie que celles des costez , qui sont quasi ovales ; mais les unes & les autres sont un peu pointuës. La plus grande a environ quatre pouces de longueur sur trois de large : leur pedicule est fort long & enflé par les deux bouts : du mesme endroit d'où sort ce pedicule, il en sort aussi une petite branche fort courte, qui porte en son extremité quelques fleurs dont la feüille principale est ronde, à la façon d'un petit bouclier, mais un peu échancrée par le haut , d'environ deux pouces & demy de diametre ; elle est fort blanche , mais chargée d'un petit écusson couleur d'azur , avec quelques lignes, qui partant du milieu, vont se terminer obliquement vers le bord : les deux autres feüilles qui sont situées dans le sein de celle-cy, composent une espece de bourse ou ventre rouge au commencement, blanc vers le milieu, bleu par le bord, & rayé en long par quelques lignes.

Ses gouffes sont fort droites, de demi-pied de long sur cinq lignes de large , & un peu plus de trois lignes d'épaisseur : elles finissent par une pointe un peu longue & fort aiguë : elles ont quatre arestes dans leur longueur un peu élevées & ondées : deux de ses costez sont tout à fait plats , & les deux autres arrondis par le dos : les cellules du dedans sont toutes séparées par une membrane fort blanche , & ont chacune une semence un peu plus grosse qu'un pois , de figure presque cylindrique , un peu enflée vers le milieu , ayant la face de devant aplatie , & celle de derriere, arrondie : ces semences sont de couleur tané-obscur, & les gouffes deviennent presque noires.

J'ay trouvé cette plante en fleur au mois de Decembre , proche le passage des trois rivières, au Port-de-Paix de l'Isle S. Dominique, & j'en ay cueilly les fruits meûrs aux mois de Février & de Mars.

F I N.

INDEX PLANTARUM.

A

A DIANTUM saxosum floridum.	29. XLIII.
Adiantum nigro simile, albiſſimo pulvere conſperſum.	30. XLIV.
<i>Adiantum nigrum Americanum, pulvere candidiſſimo aſperſum, Breynii.</i>	31.
Adiantum nigrum, ramoſum & bacciferum.	31. XLV.
Adiantum ramoſum, foliis trapezis dentatis.	31. XLVI.
Adiantum nigrum ramoſum, pulverulentum & falcatum.	32. XLVII.
Adiantum nigrum, pinnulis lonchitidis ferratis minus.	32. XLVIII.
Adiantum ramoſum radiatum.	33. XLIX.
Adiantum muſcoſum, lichenis petræi facie.	34. L. a.
Adiantum minus, foliis in ſummitate retuſis.	34. L. b.
<i>Aguaxima Braſilienſium, Piſonis.</i>	56.
<i>Aninga-iba.</i>	46.
Apocynum majus ſcandens, ſiliqua oblonga, tumida & glabra.	81. XCV.
Apocynum ſcandens, flore nerii albo.	82. XCVI.
Aristolochia longa, ſcandens, foliis ferri equini effigie.	91. CVI.
Arum hederaceum, amplis foliis perforatis.	40. LVI. LVII.
Arum hederaceum, triphyllum & auritum.	41. LI. c. LVIII.
Arum hederaceum, foliis biſſectis, rigidis & ſulcatis.	43. LI. f. LIX.
Arum arboreſcens, ſagittariæ foliis.	44. LI. g. LX.
<i>Arum Braſilianum arboreſcens, folio ſagittaria, para-diſi Batavi, in proadromo.</i>	45.
Arum cauleſcens, cannæ Indicæ foliis.	45. LI. h. LXI.
Arum, foliis rigidis, anguſtis & acuminatis.	47. LXII.
<i>Avença major Marcgravii.</i>	33.

B

B RYONIA racemosa, foliis ficulneis.	83. XCVII.
Bryonia fructu alato, foliis auriculatis.	84. XCVIII.
<i>Buyo, Nardi Antonii Rechi.</i>	60.

C

C APEBA Braſilienſium, Marcgravii.	79.
Clematitis Indica poliphylla major, flore clavato, fructu colocynthidis.	62.
LXXXIX.	
Clematitis Indica alia, poliphylla, flore criſpato.	66. LXXXI.
Clematitis Indica, fructu citriformi, foliis oblongis.	64. LXXX.
Clematitis Indica, flore clavato, ſuaverubente, folio bicorni.	68. LXXXIII.
Clematitis Indica, folio hederaceo, major, fructu olivæ formi.	70. LXXXIV.
Clematitis Indica latifolia, flore clavato, fructu maliformi.	67. LXXXII.
Clematitis Indica, hiriſuta, fœtida.	71. LXXXVI.
Clematitis Indica, flore puniceo, folio lunato.	72. LXXXVII.
Clematitis Indica, flore minimo pallido.	73. LXXXVIII.
Clematitis Indica, folio anguſto, trifido, fructu olivæ formi.	70. LXXXV.
Clematitis Indica alia, flore minore pallido.	74. LXXXIX.
Clematitis Indica, polyanthos, odoratiſſima.	75. XC.
Clematis pentaphylla, pediculis alatis, fructu racemoſo, &c.	76. XCI.

INDEX PLANTARUM.

Clematis folio anguloso , aceris fructu.	77. XCII.
Clematis baccifera, glabra & villosa, rotundo & umbilicato folio.	78. XCIII.
Clematis quadrifolia , flore digitatis luteo , claviculis aduncis.	80. XCIV.
<i>Clematis Malabarensis , foliis vitis , colore dracunculi Casparis Bauhini.</i>	41.
Colocasia hederacea , sterilis & laciniata.	38. LI. b. LIII.
Colocasia hederacea, sterilis, latifolia.	37. LI. a. LII.
Colocasia hederacea , sterilis , angustifolia.	39. LI. c. LIV.
Colocasia hederacea , sterilis , minor, folio cordato.	39. LI. d. LV.
Colocynthis flore albo, fimbriato, fructu oblongo.	86. c.
Convolvulus aureus polyanthos.	88. CII.
Convolvulus coccineus, folio anguloso.	89. CIII.
Convolvulus marinus, catharticus , folio rotundo, flore purpureo.	89. CIV.
Convolvulus marinus, catharticus, foliis acetosæ, flore niveo.	91. CV.
<i>Convolvulus marinus, seu soldanella Marcgravii.</i>	90.
Cucumis triphyllus, fructu variegato.	85. XCI.
<i>Curru-a-pe Marcgravii.</i>	77.

D

D Racontium amplis foliis cordatis, radice nodosa rubra.	48. LI. i. LXIII.
Dracontium hederaceum polyphyllum.	49. LXIV. LXV.

F

F Ilia arborefcens, pinnulis dentatis.	I. 2. i. II.
Filix arborefcens latifolia, aculeata.	3. III.
Filix latifolia ramofa, cauliculis nigris & fpinofis.	3. IV.
Filix latifolia laciniata, & ad lacinias molliter aculeata.	4. V.
Filix latifolia, nodofa.	4. VI.
Filix paluftris aurea, foliis linguæ cervinæ.	5. VII.
Filix latifolia, ad margines purverulenta.	6. VIII.
Filix latifolia non ramofa, nigris tuberculis pulverulenta.	6. IX.
Filix latifolia non ramofa, rotundius crenata.	7. X.
Filix non ramofa, scolopendrioides.	7. XI.
Filix latifolia caudata, pinnulis lonchitidis dentatis.	9. XIII.
Filix fcandens, latifolia, ferrata.	8. XII.
Filix pinnulis lonchitidis, obtufis non dentatis, ad oras pulverulentis.	10. XIV.
Filix latifolia non ramofa, foliis gladiformibus ferratis.	10. XV.
Filix non ramofa, latius dentata , major & minor.	II. XVI. XVII.
Filix non ramofa, longiffimis, anguftis, & ad bafim auriculatis foliis	12. XVIII.
Filix altera , longiffimis, anguftis & ad bafim foliofis foliis.	12. XIX.
Filix furcata, pinnulis longiufculis, non dentatis.	13. XX.
Filix ramofa , pinnulis roftratis.	14. XXI.
Filix ramofa , pinnulis longiufculis, partim auriculatis.	14. XXII.
Filix ramofa villofa major, crenis rotundis dentata.	15. XXIII.
Filix villofa minor, pinnulis profunde dentatis.	16. XXIV.
Filix pinnulis cristatis.	16. XXV. A.
Filix pulverulenta, pinnulis obtufe dentatis.	17. XXV. B.
<i>Filix Indica , polypodii facie , Menzelii.</i>	25.

H

H Edera murucua fpecies , Marcgravii.	72.
Hemionitis maxima, quinquefolia.	22. XXXI.
Hemionitis maxima , trifolia.	22. XXXII.
Hemionitis aurea , hirsuta.	23. XXXIII.
Hemionitis profunde laciniata, ad oras pulverulenta.	24. XXXIV.

Faborandi

INDEX PLANTARUM.

I

Aborandi Pisonis & Marcgravii.

59.

L

Lignum colubrinum Acoſta.
Lingua cervina, longo, lato, ferratoque folio.
Lingua cervina, foliis acutis & ad oras summitatum pulverulentis.
Lingua cervina, longissimis & angustissimis foliis.
Lonchitis hirsuta florida.
Lonchitis glabra major.
Lonchitis glabra minor.
Lonchitis auriculata & ferrata.
Lonchitis juxta nervum pulverulenta.
Lonchitis ramosa, limbo pulverulento.
Lupulus folio trifido, fructu tricocco & hispido.

41.
27. XXXIX.
28. XL.
28. XLI.
18. XXVI.
18. XXVII.
19. XXVIII.
20. XXIX. a.
20. XXIX. b.
21. XXX.
87. CI.

M

Melva d'Isco, Pisonis.
Murucua guacu, Marcgravii, & Pisonis.
Murucua miri Pisonis.
Muscus squamosus erectus.
Muscus squamosus repens.

56.
65. 66.
74.
35.
36.

N

Nandi Pisonis.

59.

P

Phaseolus Nigritarum, Clusii.
Phaseolus, filiquis latis, hispidis, & rugosis, fructu nigro.
Phaseolus, amplo flore peltato, filiquis nigris & angulosis.
Phyllitis scandens, cauliculis squammosis.
Planta scandens, hederaceis foliis, zeilanica, Breynii.
Polypodium majus, aureum.
Polypodium, radice tenui & repente.
Polypodium nigrum, tenuius sectum.
Polypodium, foliis linguæ cervinæ majus.
Polypodium Indicum primum, scolopendriæ facie, Breynii.
Polytrichum saxatile, dentatum.
Polytrichum Terterii.

93.
92. CVII.
94. CVIII.
29. XLII.
87.
25. XXXV.
25. XXXVI.
26. XXXVII.
26. XXXVIII.
27.
35. I. C.
33.

S

Saururus hederaceus, cauliculis maculosis major.
Saururus hederaceus, cauliculis maculosis minor.
Saururus hederaceus, triphyllus.
Saururus repens, folio orbiculari, nummulariæ facie.
Saururus repens lanceolatus, ad nodos villosus.
Saururus humilis, folio carnosio subrotundo.
Saururus alius, humilis, folio carnosio acuminato.
Saururus minor, procumbens, botryitis folio crasso cordato.
Saururus arborescens, foliis amplis cordatis, non umbilicatis.
Saururus arborescens, foliis amplis, rotundis & umbilicatis.
Saururus botryitis major arborescens, foliis plantagineis.
Saururus frutescens, foliis plantagineis, fructu brevior.
Saururus arborescens, fructu adunco.
Soldanella Marcgravii.

50. LXVI.
51. LXVII.
52. LXVIII.
52. LXIX.
60. LXXVIII.
53. LXX.
54. LXXI.
54. LXXII.
55. LXXIII.
56. LXXIV.
57. LXXV.
58. LXXVI.
58. LXXVII.
90.

N

TABLE DES PLANTES.

A

<i>A</i> <i>Guaxima du Bresil, de Pison.</i>	56.
<i>Alberi del Felce, de Gonzale Oviedo.</i>	2.
<i>Aninga-iba de Pison.</i>	46.
Apocynum montant, à fleur de laurier rose, blanche.	82. XCVI.
Grand apocynum montant à gouffes lisses, longues & enflées.	81. XCV.
Aristolochie longue, montante, à feuilles en fer de cheval.	91. CVI.
Arum arbre, à feuilles de sagittaire.	44. LI. g. LX.
<i>Arum arbre du Bresil, à feuilles de sagittaire. Paradis d'Hollande, prodr.</i>	45.
Arum montant, à grandes feuilles percées.	40. LVI. LVII.
Arum à tige, & à feuilles de la canne d'Inde.	45. LI. h. LXI.
Arum montant, à feuilles, fermes, fronces & fenduës.	43. LI. f. LIX.
Arum montant, en trefle & à oreillons.	41. LI. c. LVIII.
Arum à feuilles fermes, étroites, & pointuës.	47. LXII.

B

<i>B</i> <i>Bois des couleurs, du R. P. du Tertre.</i>	41.
<i>Bois des couleurs, d'Acosta.</i>	41.
<i>Buyo, de Nard Antoine Reche.</i>	60.

C

<i>C</i> <i>Aapeba du Bresil de Marcgrave.</i>	79.
<i>Camoulroulé des Caraïbes.</i>	90.
Capillaire de roche, fleurissant.	29. XLIII.
Capillaire semblable au noir, couvert d'une poussiere tres-blanche.	30. XLIV.
Capillaire noir, branchu, portant des bayes.	31. XLV.
Capillaire branchu, à feuilles trapezes, dentelées.	31. XLVI.
Capillaire noir branchu, poudreux & à feuilles en faucille.	32. XLVII.
Petit Capillaire noir, à pinnules dentelées de lonchitis.	32. XLVIII.
Capillaire branchu, radié.	33. XLIX.
Capillaire en mousse, semblable à l'hepatique de roche.	34. L. a.
Petit Capillaire, à bouts refoulez.	34. L. b.
<i>Cipo di Cobras.</i>	79.
Clematis en quintefeuille, à queues aislées	76. XCI.
Clematis à quatre feuilles, à fleur jaune de digitale.	80. XCIV.
Clematis à bayes, lisse & veluë.	78. XCIII.
Clematis à feuilles anguleuses, & a fruit d'érable.	77. XCII.
Coucombres à feuilles en trident à fruit bigarré.	85. XCIX.
<i>Collet de Nostre-Dame.</i>	57.
Colocasia montante, sterile, & decoupée.	38. LI. b. LII.
Colocasia montante, sterile, à larges feuilles.	37. LI. a. LII.
Colocasia montante, sterile, & à feuilles étroites.	39. LI. c. LIV.
Petite Colocasia montante, & à feuilles en cœur.	39. LI. d. LV.
Coloquinte à fleur blanche frangée.	86. c.
Couluvrée à grapes, à feuilles de figuier.	83. XCVII.
Couluvrée à fruit aislé, à feuilles oreillonées.	84. XCVIII.
<i>Herbe à la couresse.</i>	55.
<i>Cururu-apè de Marcgrave.</i>	77.

TABLE DES PLANTES.

E

E *Rva di nostra senora.*

79.

F

G *Rande Fleur de la passion , à feüilles refenduës , à fruit de coloquinte.* 62.

LXXIX.

Autre fleur de la passion , à feüilles refenduës , à fleur frisée.

66. LXXXI.

Fleur de la passion , à larges feüilles , à fruit à pomme.

67. LXXXII.

Fleur de la passion , à citrons.

64. LXXX.

Fleur de la passion, veluë & puante.

71. LXXXVI.

Fleur de la passion , à feüilles cornuës.

68. LXXXIII.

Grande Fleur de la passion , à feüilles de lierre.

70. LXXXIV.

Fleur de la passion à feüilles en trident.

70. LXXXV.

Fleur de la passion , couleur d'écarlate , à feüilles en croissant.

72. LXXXVII.

Fleur de la passion à petite fleur passe.

73. LXXXVIII.

Autre fleur de la passion à petite fleur passe.

74. LXXXIX.

Fleur de la passion à plusieurs fleurs parfumées.

75. XC.

Fleur de May.

81.

Fougere Arbre , à pinnules dentelées.

I. 2. I. II.

Fougere arbre, épineuse , à larges feüilles.

3. III.

Grande Fougere branchuë, noire & épineuse.

3. IV.

Fougere à larges feüilles decoupées, garnie d'une pointe tendre aux decoupûres. 4. V.

Grande Fougere, noieuse.

4. VI.

Fougere des marests , dorée , à feüilles de langue de cerf.

5. VII.

Grande Fougere , à bord poudreux.

6. VIII.

Grande Fougere non branchuë, parsemée de verruës noires.

6. IX.

Grande Fougere à simples jets , à crenelûres arrondies.

7. X.

Fougere sans branches , à feüilles comme la scolopendre.

7. XI.

Grande Fougere montante, dentelée.

8. XII.

Grande Fougere à longue queue , à pinnules de lonchitis.

9. XIII.

Fougere à pinnules de lonchitis , emouffées , poudreuses par le bord , & sans dentelûres.

10. XIV.

Grande Fougere sans branches , à feüilles dentelées & en façon de couteau. 10. XV.

Grande Fougere sans branches, à larges dentelûres.

11. XVI.

Petite Fougere sans branches , à larges dentelûres.

11. XVII.

Fougere sans branches , à feüilles tres-longues , étroites & oreillées à la base. 12.

XVIII.

Autre Fougere à feüilles tres-longues, étroites, & refeuilluës.

12. XIX.

Fougere fourchuë , à longues pinnules, non dentelées.

13. XX.

Fougere branchuë , à pinnules en bec.

14. XXI.

Fougere branchuë , à longues pinnules, quelques-unes à oreillon.

14. XXII.

Fougere branchuë & veluë , à dentelûres arrondies.

15. XXIII.

Petite Fougere veluë , à longues dentelûres.

16. XXIV.

Fougere à pinnules crestées.

16. XXV. a.

Fougere poudreuse , à dentelûres émouffées.

17. XXV. b.

Fougere des Indes semblable au polypode , de Mentzelius.

25.

H

H *Amama-ligra des Caraïbes.*

6.

Grande Hemionite à cinq feüilles.

22. XXXI.

Grande Hemionite à trois feüilles.

22. XXXII.

Hemionite dorée & veluë.

23. XXIII.

Hemionite fort decoupée, bordée de poussiere.

24. XXIV.

Herbe de Nostre-Dame.

79.

N ij

TABLE DES PLANTES.

Herbe à la couresse.

Houblon à feuilles en trident, & à fruit velu.

55.
87. ci.

I

I *Aborandi de Pison. 59. de Marcgrave.*
Ibati de Marcgrave.

60.
82.

L

L Angue de cerf à feuilles longues, larges & dentelées.
Langue de cerf aiguë, à pointes poudreuses sur le bord.
Langue de cerf, tres-longue, & tres-étroite.

27. XXXIX.
28. XL.
28. LXI.

Lianes.

61.

Liane bruslante.

38.

Liane à dent de scie.

77.

Liane à serpent.

79.

Liane lacteuse.

82.

Liane au Chat.

81.

Liseron à fleur d'écarlate, à feuilles anguleuses.

89. CIII.

Liseron à plusieurs fleurs jaunes.

88. CII.

Liseron marin purgatif, à feuilles rondes, & à fleurs pourprées.

89. CIV.

Liseron marin purgatif, à feuilles d'ozeille, à fleur blanche.

91. CV.

Lonchitis veluë, & fleurissante.

18. XXVI.

Lonchitis dentelée, & oreillée.

20. XXIX. a.

Lonchitis branchuë, à bord poudreux.

21. XXX.

Grande Lonchitis, lisse.

18. XXVII.

Petite Lonchitis, lisse.

19. XXVIII.

Lonchitis poudreuse, le long de la nervûre.

20. XXIX. b.

M

M *Alva d'Isco, de Pison.*

56.

Meregovia des Caraïbes.

72.

Mousse droite, écaillée.

35.

Mousse rampante, écaillée.

36.

Mucuna du Bresil, de Marcgrave.

93.

Murucua guacu de Pison.

66.

Murucua guacu de Marcgrave.

65.

Murucua miri de Pison.

74.

N

N *Handi de Pison.*

59.

P

P *Atates de mer.*

90.

Perroquet

47.

Phaseol à gousses larges, veluës & froncies.

92. CVII.

Phaseol des Negres, de Clusius.

93.

Phaseol à grandes fleurs rondes.

94. CVIII.

Phyllitis montante, à tiges écaillées.

29. XLII.

Grands pois à grater.

93.

Poivre long.

58.

Polypode à racine menuë, & traçante.

25. XXXVI.

Grand polypode doré.

25. XXXV.

TABLE DES PLANTES.

Polypode noir, fort decoupé.	26. XXXVII.
Grand polypode à feuilles de langue-de-cerf.	26. XXXVIII.
Polytrich de roche, dentelée.	35. L. C.
<i>Polytrich du Tertre.</i>	33.
<i>Pommes de Liane.</i>	65.
<i>Pourpier de bois.</i>	54.

Q

Queüe de lezard, arbre, à grandes feuilles en cœur.	55. LXXIII.
Queüe de lezard, arbre, à grandes feuilles rondes.	56. LXXIV.
Queüe de lezard, arbre, à fruit crochu.	58. LXXVII.
Queüe de lezard, arbre, à grappes, & à feuilles de plantain.	57. LXXV.
Queüe de lezard, arbrisseau, à feuilles de plantain.	58.
Grande Queüe de lezard, rampante & tachetée.	50. LXVI.
Petite Queüe de lezard, rampante & tachetée.	51. LXVII.
Queüe de lezard, rampante, à trois feuilles.	52. LXVIII.
Queüe de lezard rampante, à feuilles rondes, semblable à la numulaire.	52.
L X I X.	
Petite Queüe de lezard, à feuilles arrondies, & charnuës.	53. LXX.
Autre petite Queüe de lezard, à feuilles pointuës, & charnuës.	54. LXXI.
Petite queüe de lezard, à feuilles grasses, & en cœur.	54. LXXII.
Queüe de lezard rampante, à feuilles en fer de lance, & à nœuds velus.	60. LXXVIII.

S

<i>Salso do praya des Portugais.</i>	90.
<i>Scolopendre du Tertre.</i>	6.
Grande serpentaïre à grandes feuilles en cœur, à racine rouge & nouëuse.	48. LI. i.
L X I I I.	
Grande Serpentaïre, montante, à plusieurs feuilles.	49. LXIV. LXV.
<i>Schine fausse.</i>	48.

TABLE DES MATIERES.

A ppetit : fruit bon à donner de l'appetit. 66.	ceres. 77.
Ardeur : pour abbatre les ardeurs de l'Estomac. 66.	Morsure : contre la morsure des viperes, & bestes venimeuses, tant pour les hommes, que pour les bestes. 41. 79.
Arriere faix : pour faire sortir l'arriere faix. 74.	Obstruction : contre les obstructions des reins, des hypochondres, des ureteres, & de la vefcie. 46. 79.
Bains propres à fortifier le corps contre les maladies froides. 90.	Panacée : racine panacée, c'est à dire bonne contre toute sorte de maux. 59.
Bestes : contre la morsure des bestes venimeuses, tant pour les hommes que pour les bestes. 41. 79.	Pituite : pour attirer la pituite à la bouche. 60.
Blessures : pour les blessures. 56.	Plante extrêmement caustique. 38.
Calcul : contre le calcul ou gravier. 60.	Playe : pour mondifier, & guerir les playes, & les ulceres. 77.
Catharre : contre le catharre de la teste. 60.	Poison : contre les poisons, & venins. 56. 79. 80.
Caustique : plante extremement caustique. 38.	Purger : plante bonne à purger. 90.
Cendres propres à faire du sel, pour du verre. 2.	Racine panacée, c'est à dire bonne, contre toute sorte de maux. 59.
Cordial : syrop cordial, pour soulager les febricitants. 66.	Ramollir : feuilles propres pour ramollir. 90.
Dents : contre les douleurs des dents. 60.	Reins : contre les obstructions des reins. 79.
Defalterer, pour defalterer, & pour donner de l'appetit. 66.	Sel de Fougere, propre à faire du verre. 2.
Douleur : contre les douleurs des dents. 60. contre les douleurs, & maladies articulaires, inveterées, & recentes. 46.	Suppression : contre les suppressions d'urine. 60.
Enivrer : pour enivrer les poissons. 77.	Sueur : pour provoquer les sueurs. 74.
Esprits, pour rétablir les esprits. 66.	Syrop : syrop cordial, pour soulager les febricitants. 66.
Estomac : contre le mal d'estomac. 58.	Venin : contre les poisons, & venins. 56. 79. 80.
Febricitans : syrop cordial, pour soulager les febricitants. 66.	Venimeux : contre la morsure des bestes venimeuses. 41. 79.
Froid : bains propres à fortifier le corps, contre les maladies froides. 59. 90.	Verre : cendres propres à faire du sel, pour le verre. 2.
Gonorrhées : contre les Gonorrhées. 60.	Vefcie : contre les obstructions de la vefcie. 79.
Gravier : contre le gravier, où calcul. 60.	Vipere : contre la morsure des viperes. 41. 79.
Hemorrhoides : contre les Hemorrhoides. 74.	Viscere : pour fortifier les visceres. 74.
Inflammation : contre l'inflammation des reins, & des hypochondres. 46.	Ulcere : pour mondifier, & guerir les ulceres, & les playes. 77.
Lavements : plante bonne pour les lavements. 56.	Uretere : contre les obstructions des ureteres. 79.
Maladie : contre les maladies articulaires. 46. contre les maladies froides. 90.	Urine : contre les suppressions d'urine, 60. Pour provoquer les vrines. 74.
Mondifier : & guerir les playes, & les ul-	

A P A R I S,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

Par les soins de JEAN ANISSON, Directeur de ladite
Imprimerie.

M. DC. XCIII.

[illegible]

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

Filix arborescens
pinnulis dentatis.

Fr. C.P. m. b. r. d.

NPJCB

Filix arborescens pinnulis dentatis.

RPJCB

Filix arborescens latifolia aculeata.

RPJCB

Filix latifolia ramosa
cauliculis nigris et spinosis.

RPJCB

*Filix latifolia, laciniata,
et ad lacinias molliter aculeata*

RPJCM

Filix Latifolia, nodosa

RPJCS

*Filix palustris aurea, folijs
linguæ Cervinæ.*

176

RPJCE

Filix latifolia, ad margines pulverulenta

Fr. C. P. m. b. r. d.

RPJCS

*Filix latifolia, non ramosa nigris
tuberculis pulverulenta.*

RPJCE

*Filix latifolia, non ramosa,
rotundius crenata.*

RPJCB

Filix non ramosa, Scolopendrioides.

Filix Scandens, Latifolia, Serrata.

Fr. C. Plumier mini. B.R.D.

Filix latifolia, Caudata, pinnulis
lonchitidis dentatis.

RFJC

lix pinnulis Lonchitidis, obtusis,
entatis, ad oras pulverulentis.

RPJCB

ix latifolia, non ramosa, folijs gladi formibus serratis

Fr. C. P. m. b. v. d.

Filix non ramosa, latius dentata major.

Filix non ramosa, latius dentata minor.

Fr. C. P. m. b. r. d.

SPJCS

*Filix non ramosa longissimis, angustis,
et ad basim auriculatis folijs.*

Fr. C.P. m. b. r. d.

1710

Filix altera, longissimis, angustis, et ad basin foliosis folijs.

SPACE

Filix furcata, pinnulis longiusculis, non dentatis.

RFCE

Filix ramosa, pinnae rostratis.

F. C.P.m.b.r.d.

RFJCS

Filix ramosa pinnulis longiusculis, partim auriculatis.

5

HPICB

*Filix ramosa, villosa major,
crenis rotundis dentata*

NPJCB

*Filix villosa minor, pinnulis
profunde dentatis.*

Muscus squamosus erectus.

Muscus squamosus repens.

Fr. C.P.m.b.r.d.

RPJCS

A
Filix pinnulis cristatis

B
Filix pulverulenta
pinnulis obtuse dentatis.

Er. C. P. m. b. r. d.

RPJCB

Lonchitis hirsuta florida.

RFJC

Cheilanthes glabra, major.

Pr. C. P. m. h. r. d.

1872

RPJCS

602

Onychitis glabra, minor.

Fr. C. P. m. b. r. d.

RP-ICB

A .

Lonchitis auriculata, et serrata.

B

*Lonchitis juxta nervum
pulverulenta .**Fr. C. P. m. b. r. d.*

RPJCS

Lonchitis ramosa, Limbo pulverulento.

Fr. Carolus Plumier Minimus Botanicus Regius delin.

SPICE

Hemionitis maxima, quinquefolia.

Fr. C.P.m.b.r.d.

PPJCB

Hemionitis maxima trifolia

APUCE

Hemionitis aurea, hirsuta.

Hemionitis profunde Laciniata,
ad oras pulverulenta.

Polypodium majus aureum.

1000

1721

RPJCS

*Polypodium nigrum, tenuius
sectum.*

1875

RPJCS

Polypodium folijs Linguae Cervinae majus.

RPJCE

Lingua Cervina
longo, lato, serratoque folio.

RPJCB

*Lingua cervina folijs acutis, et ad
apices summitatum pulverulentis.*

RUICE

*Lingua Cervina longissimis et angustissimis
folijs.*

Fr. C. P. m. b. r. d.

Phyllitis scandens, Cauliculis squamosis.

RPJCS

Adiantum Saxosum, Floridum.

Carolus Plumier Minimus Botanicus Regius delin.

RPJCB

Adiantum nigro simile, albissimo pulvere conspersum.

Fr.C.P.m.b.v.d.

RPJCB

Adiantum nigrum
ramosum et bacciferum.

RPJCB

ntum ramosum, folijs Trapezijs, dentatis.

RPJCS

ntum nigrum, ramosum, pulverulentum et falcatum.

RPJCB

*Adiantum nigrum, pinnulis
lonchitidis serratis minus.*

PRICE

Adiantum ramosum, radiatum.

RPJCB

Adiantum muscosum, Lichenis petræi facie.

Adiantum minus, folijs in summitate retusis.

Polytrichum saxatile, Dentatum.

[Faint, illegible text, possibly a title or description]

RPJCS

[Faint, illegible text, possibly a title or description]

[Faint, illegible text, possibly a title or description]

RFJCB

Colocasia hederacea, sterilis, latifolia.

Fr. C.P. m. b. r. d.

RFJCB

Colocasia hederacea, sterilis et laciniata.

RPJCS

Colocasia hederacea, sterilis, angustifolia

RPJCB

*Colocasia hederacea, sterilis,
minor, folio cordato.*

RPJCS

m hederaceum, amplis
lyis perforatis.

RPJCB

LVII

Arum hederaceum amplis folijs perforatis.

Fr. C.P. m.b.r. d.

RPJCB

RPJCB

Arum hederaceum folijs Bissectis ridigis et sulcatis.

1930

Arum arborescens, Sagittariae folijs.

1871

*caulescens, Cannæ
licæ folijs.*

Fr. C. P. m. b. r. d.

RPIC

*Aram folijs rigidis,
angustis et acuminatis.*

RPJCS

*Dracontium amplexifolium, cordatis,
radice nodosa rubra.*

RPJCB

Dracontium hederaceum, poliphyllum

Fr. Carolus Plumier Minimus Botanicus Regius delineavit.

RPJCB

Dracontium soderacum,
polyphyllum.

Saururus hederaceus,
cauliculis maculosis major.

1913

aururus hederaceus, Cauliculis maculosis minor

Fr. C. P. m. b. r. del.

NPICB

Saururus hederaceus, triphyllus folio rotundo.

RPJC

Saururus repens, folio
orbiculari, nummulariæ facie.

[Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

RPJC

[Faint, illegible text at the bottom right corner]

Saururus humilis folio carnosio subrotundo.

Fr. C.P.m. b.r.d.

NPICB

Saururus alius, humilis, folio carnososo, et acuminato.

RPJCB

Saururus minor procumbens
Botryitis folio crasso cordato.

RPJCS

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom right corner of the page.

*Saururus arborescens, folijs
 amplis, cordatis non umbilicatis.*

RPJCB

Saururus arborescens folijs
amplis rotundis et umbilicatis.

RPJC

Saururus Botryitis major,
arborescens, folijs plantagineis.

Fr. C. P. m. b. r. d.

RPJCB

Saururus frutescens, folijs plantagineis, fructu breviori.

RPJCS

Saururus arborescens, fructu adunco.

Fr. C.P.m.b.r.d.

RPJCS

*Saururus repens Lanceolatus,
ad nodos villosus*

Fr. C. P. M. b. r. del.

RPJCB

Clematis indica poliphylla maior,
flore clauato, fructu colocinthidis

Fr. Carolus Plumier Minimus Botanicus Regius delineav.

RPJCB

*Clematis Indica fructu
citriformi, folijs, oblongis.*

Fr. Carolus Plumier Minimus Botanicus Regius delineat.

SPICB

*Clematis Indica alia poliphylla,
flore crispato.*

Fr. Carolus Plumier Minimus Botanicus Regius delineavit

NPJCB

*Clematis indica, latifolia, flore
clauato, fructu maliformi.*

Clematis indica flore
clavato suaverubente, fructu
hexagono, coccineo, folio
bicorni.

RPJCB

Clematis Indica, Folio hederaceo major, fructu olivæ formi.

RPJCB

Clematis indica, folio angusto, trifido fructu olivæ formi.

RPJCB

RPJCB

Clematis Indica, Flore puniceo, folio lanato.

RPJCB

Clematis Indica, Flore minimo pallido.

A

RPJCE

Clematis indica alia, flore minore pallido.

RPJCE

Clematis indica, polianthos odoratissima.

E. C. P. M. b. r. del.

RPJCZ

lematis pentaphylla, pediculis alatis,
uctu racemoso, tricocco et coccineo.

RPJCB

RPJCB

*Clematis baccifera, glabra et villosa,
rotundo et umbilicato folio*

RPJC

*Clematis quadri folia, flore digitalis luteo, claviculis
aduncis, siliquis longissimis, semine alato.*

RPJCE

XCV

*Apocynum majus, scandens, siliqua
oblonga, tumida et glabra.*

SPICE

Apocynum scandens, flore neri, albo.

Fr. Carolus Plumier Minimus Botanicus Regius delineavit.

SPJCB

Bryonia racemosa, folijs ficulneis

RPJCS

*Bryonia fructu alato,
folijs auriculatis.*

RPJCB

Cucumis triphyllus, fructu variegato.

(RPL)

*Colocynthis flore albo, fimbriato,
fructu oblongo.*

APJCS

ulus folio trifido, fructu tricocco et hispido.

RPJCB

Convolvulus luteus, polyanthos

Convolvulus coccineus, folio anguloso

RPJCB

Convolvulus maritimus
catharticus folio rotundo, flore
purpureo.

RPJCB

Convolvulus maritimus catharticus folijs actosis

JCB

*Aristolochia longa, scandens,
folijs, ferri equini effigie.*

NPJCB

Phascolus siliquis latis,
vidis et rugosis, fructu nigro.

AP/CE

*Phaseolus am- plo flore
 elypeato, siliquis nigris et
 angulosis.*

Fr. Carolus Plumier Minimus Botanicus Regius delineavit

SPCB