7.3

ZHL^A 00540

Lepidopterorum Catalogus

editus a

F. Bryk

Pars 89:

A. Klima

Pyralididae:

Subfam.: Pyraustinae I.

Titel-Blatt zu Band XXVIII.

Dr. W. Junk

Verlag für Naturwissenschaften

's-Gravenhage

28. II. 1939.

Lepidopterorum Catalogus

- Pars 1: Ch. Aurivillius, Chrysopolomidae. 1911. 4 p.
2: A. Pagenstecher, Callidulidae. 1911. 14 p.
3: A. Pagenstecher, Libytheidae. 1911. 12 p.
4: H. Wagner et R. Pfiltner, Hepialidae. 1911. 26 p.
5: E. Strand, Noctuidae: Agaristinae. 1912. 82 p.
6: E. Meyrick, Adelidae, Micropterygidae, Gracilariadae. 1912. 68 p.
7: H. Zerny, Syntomidae. 1912. 179 p.
8: L. B. Prout, Geometridae: Brephinae, Oenochrominae. 1912. 94 p.
9: P. Mabille, Hesperidae: Pyrrhopyginae. — McDunnough, Megathymidae. 1912. 22 p.
10: E. Meyrick, Tortricidae. 1912. 86 p.
11: H. Eltringham et K. Jordan, Nymphalidae: Acraeinae. 1913. 65 p.
12, 18, 21, 23: H. Wagner, Sphingidae. 1913—1919. 420 p.
13: E. Meyrick, Carposinidae, Heliodinidae, Glyphipterygidae. 1913. 53 p.
14: L. B. Prout, Geometridae: Hemitheinae. 1913. 192 p.
15: K. W. von Dalla Torre, Castniidae: Castniinae, Neocastniinae, Pemphigostolinae. 1913. 28 p.
16: E. Strand, Brahmaeidae. — H. G. Dyar et E. Strand: Megalopygidae, Dalceridae, Epipyropidae. 1913. 35 p.
17: E. Meyrick, Pterophoridae, Orneodidae. 1913. 44 p.
19: E. Meyrick, Hyponomeutidae, Plutellidae, Amphitheridae. 1914. 64 p.
20: K. W. von Dalla Torre, Thyrididae. 1914. 55 p.
22, 24, 26: E. Strand, Arctiidae: Arctiinae, Nolinae, Lithosiinae. 1919—1922. 900 p.
25: K. W. von Dalla Torre, Cymatophoridae. 1921. 38 p.
27: F. Bryk, Baroniidae, Teinopalpidae, Parnassiidae. 1923. 247 p.
28: K. W. von Dalla Torre et E. Strand, Lepidarbelidae. — E. Strand, Heterogyniidae. 1923. 14 p.
29: K. W. von Dalla Torre, Cossidae. 1923. 63 p.
30: K. W. von Dalla Torre, Epiplemidae, Uraniidae. 1924. 57 p.
31: K. W. von Dalla Torre et E. Strand, Aegeriidae. 1925. 282 p.
32: R. van Eecke, Cochlidionidae (Limacodidae). 1925. 81 p.
33, 71: H. Burgeff et F. Bryk, Zygaenidae. 1926—1936. 332 p.
34: K. W. von Dalla Torre et E. Strand, Psychidae. 1929. 215 p.
35, 37, 39: F. Bryk, Papilionidae. 1929—1930. 675 p.

Fortsetzung siehe 3. Umschlagseite.

LEPIDOPTERORUM CATALOGUS:

Arrangement

The volumes marked by an asterik *) are now complete.

Title-pages have been published: to vols. IV, V, X, XX, XXIII, XXIV, XXVI and XXIX in part 88 on July 31, 1938 and to vol. XXVIII in part 89 on Febr. 25, 1939.

- Volumen I: Micropterygidae, Eriocraniidae, Neopseustidae, Prototheoridae, Palaeosetidae, Hepialidae, Adelidae, Incurvariidae, Prodoxiidae, Nepticulidae, Tineidae, Ochsenheimeriidae, Parathyridae, Tischeriidae, Arrhenophanidae, Psychidae, Teichobiidae, Lypusidae (Partes 4, 6, 34 and others). about 900 p.
- Volumen II: Lyonetiidae, Oenophilidae, Bucculatricidae, Plutellidae, Orthotaeliidae, Cemiostomidae (Leucopteridae), Amphitheridae, Epermeniidae, Gracilariidae (Lithocolletidae), Phyllocnistidae, Opostegidae, Coleophoridae, Hyponomeutidae, Rösslerstammiidae, Cyclotornidae, Blastobasidae, Scythrididae, Douglasiidae, Elachistidae, Glyphipterygidae, Atychiidae, Heliodinidae (Schreckensteiniidae), Augasmiidae, Heliozelidae, Aegeriidae (Sesiidae) (Partes 6, 13, 19, 31 and others). about 700 p.
- Volumen III: Copromorphidae, Orneodidae, Carposinidae, Anomologidae, Cryptophasidae [Xyloryctidae], Stenomidae, Physoptilidae, Strepsimanidae, Oecophoridae, Momphidae, Cosmopterigiidae, Agonoxenidae, Hyposmocomidae [Diplosaridae], Metachandidae, Chlidanotidae, Eucosmiidae, Phaloniidae (Partes 13, 17, 67, 88 and others). about 600 p.
- *) Volumen IV: Gelechiidae, Tortricidae, Cossidae [incl. Lepidarbelidae] (Partes 10, 28, 29, 79, 81) 1912—1937. 793 p. fl. 75, bound fl. 79.—
- *) Volumen V: Cochlidionidae [Limacodidae], Dalceridae, Epipyropidae, Chrysopolomidae, Megalopygidae, Zygaenidae, Heterogynidae, Castniidae (Partes 1, 15, 16, 28, 32, 33, 71) 1911—1936. 477 p. fl. 44, bound fl. 47.—
- Volumen VI: Pyralidae (Partes 84, 89 and others). about 900 p.
- Volumen VII: Tineodidae, Oxychirotidae, Pterophoridae, Thyrididae, Hyblaeidae, Endromidae, Lasiocampidae (Partes 17, 20, 73 and others). about 900 p.
- Volumen VIII: Sphingidae, Brahmaeidae, Lemoniidae, Eupterotidae, Mimallonidae (Perophoridae) (Partes 12, 16, 18, 21, 23, 50, 85 and others) about 700 p.
- Volumen IX: Bombycidae. about 800 p.
- *) Volumen X: Cercophanidae, Oxytenidae, Saturniidae, Syssphingidae (Partes 55, 56, 58, 65, 70, 75, 76) 1933—1936. 1031 p. fl. 101, bound fl. 105.—
- Volumen XI: Taumetopoeidae, Notodontidae, Dioptidae, Cymatophoridae, Drepanidae, Axiidae (Partes 25, 42, 49, 59 and others). about 700 p.
- Volumen XII—XIV: Geometridae (Partes 8, 14, 61, 63, 68 and others). about 2000 p.
- Volumen XV et XVI: Uraniidae, Epiplemidae, Epicopeidae, Sematuridae, Arctiidae, Aganidae, Syntomidae (Partes 7, 22, 24, 26, 30, 45, 52, 87, 85 and others). about 1500 p.
- Volumen XVII—XIX: Noctuidae (Partes 5 and others). about 2500 p.
- *) Volumen XX: Lymantriidae, Ratardidae, Callidulidae (Partes 2, 62, 81) 1911—1937. 458 p. fl. 44, bound fl. 47.—

- Volumen XXI et XXII: Hesperidae (incl. Megathymidae) (Partes 9, 47, 57, 64, 69, 74, 77, 83, 87, 90 and others). about 1800 p.
- *) Volumen XXIII: Pieridae, Libytheidae (Partes 3, 53, 60, 66) 1911—1935. 708 p. fl 70, bound 74.—
- *) Volumen XXIV: Baroniidae, Teinopalpidae, Parnassidae, Papilionidae (Partes 27, 35, 37, 39) 1923—1930. 923 p. fl 73, bound fl 77.—
- Volumen XXV: Lycaenidae (Partes 72 and others). about 500 p.
- *) Volumen XXVI: Riodinidae (Partes 38, 40, 41, 44) 1930—1931. 795 p. fl 69, bound fl 73.—
- Volumen XXVII: Brassolidae, Amathusiidae, Morphidae (Partes 51, 54 and others). about 500 p.
- *) Volumen XXVIII: Danaidae (Partes 78 et 80) 1937. 702 p. fl 71, bound fl 75.—
- *) Volumen XXIX: Satyridae (Partes 43, 46, 48) 1931. 759 p. fl 76, bound fl. 80.—
- Volumen XXX—XXXII: Nymphalidae (incl. Heliconiidae) (Partes 11, 36, 86 and others). about 2500 p.
- Volumen XXXIII: Index.

Coleopterorum Catalogus. Auxilio et auspiciis W. Junk editus a S. Schenkling. Parts 1—164. 1910—1939. fl 860.—

Hymenopterorum Catalogus. Editus a H. Hedicke. Parts 1—7. 1936—1938. fl 15.50.

Lepidopterorum Catalogus. Editus a F. Bryk. Parts 1—84. 1911—1938. fl 625.—

Orthopterorum Catalogus. Editus a M. Beier. Parts 1 and 2. 1938. fl 6.—

Psyllidarum Catalogus. Auctore: G. Aulmann. 1923. 92 p. fl 3.—

M. Gemminger et E. de Harold, Catalogus Coleopterorum. Volumina I—XI. 1868—74. fl 40.—

BIBLIOGRAPHIA LEPIDOPTEROLOGICA

1913. 168 p. with 1 photograph. plate. Cloth. Price fl 3.—

With nearly 4000 titles of books etc. and notices of their rarity, prices etc.

P. Thierry-Mieg-Saint Claude: Je profite de l'occasion pour vous féliciter de la manière dont vous avez composé votre catalogue. — Entomologische Blätter: Die Vollständigkeit des Cataloges wird sich kaum übertreffen lassen.

0610-108-
ZMLA 570

Lepidopterorum Catalogus

editus a

F. Bryk

Volumen XXVIII.

F. Bryk, Danaidae.

W. Junk
's-Gravenhage
1937.

Volumen: XXVIII.

pars 78: **F. Bryk**, Danaidae: Danainae pag. 1—432. 5. VII. 1937.

pars 80: **F. Bryk**, Danaidae: Ituninae,
Tellervinae, Ithomiinae pag. 433—702. 18. XII. 1937.

Lepidopterorum Catalogus

editus a

F. Bryk

Pars 89:

A. Klima

Pyralididae:

Subfam.: Pyraustinae I.

Dr. W. Junk

Verlag für Naturwissenschaften

's-Gravenhage

1939.

Familia: **Pyralididae**

Subfam. **Pyraustinae** Hampson

Auct. **A. Kllma**

Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 1, 245 (tab. gener. p. 245—251) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 591, 592 (tab. gener. p. 594—604) (1898). — Staudinger & Rebel, Cat. Lep. Pal. Faun., 2, p. 53 (1901). — Fernald in Dyar, List North Amer. Lepid. (Bull. U. S. Nat. Mus., nr. 52) p. 371 (1902). — Rebel in Spuler, Schm. Eur., 2, p. 189, 225 (1906). — Turner, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral., 32, p. 79 (1908). — Wahlgren, Svensk Insektfauna, 10 (2), p. 11, 53 (1915). — Mosher, Bull. Illinois State Lab. Nat. Hist., 12, art. 2, p. 73, 76 (1916). — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128 (1917). — Janse, Check List South Afric. Lep. Heter., p. 128, 157 (1917). — Tullgren & Wahlgren, Svenska Insekter, p. 395 (1922). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 169 (tab. gener. faun. formos. p. 169—174) (1928); *ibid.*, 25, p. 156 (tab. gener. faun. japon. p. 156—159) (1929). — De Joannis, L'Amat. Pap., 4, p. 282, 285 (1929); *ibid.*, 6, p. 8, 20 (1932). — Börner in Brohmer, Fauna v. Deutschland, 2. Aufl., p. 348 (1920); 3. Aufl., p. 376 (pars) (1926); 4. Aufl., p. 389 (1932). — M. Hering, Tierwelt Mitteleur. (Ergbd. 1), p. 288 (1932). — Eckstein, Schm. Deutschl., 5, p. 45, 64 (1933). — Lhomme, Cat. Lep. France Belge, 2 (1), p. 114 (1935). — Zerny & Beier in Küenthal & Krumbach, Handb. Zool., 4 (2), Ins. 2, Lief. 8, p. 1678, 1700 (1936).

Pyraustinae (p. 445, 447) + *Homophysinae* (p. 445, 446, 457) Ragonot, Ann. Soc. Ent. Fr. (s. 6) 10, (1890) (1891).

Pyraustinae (p. 525, 541) + *Glaphyrinae* (part.) (p. 524, 536) Forbes, Lep. N. York (1923).

Pyraustini Handlirsch, Handb. Entom., 3, p. 901 (1925).

Pyraustini (part.) Börner in Brohmer, Fauna v. Deutschland, 4. Aufl., p. 389 (1932).

Pyraustidae (part.) Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 436 (tab. gener. p. 437—439) (1890). — Rebel, Ent. Zeit. Stettin, 52, p. 104 (1891). — Smith, List Lep. Bor. Amer., p. 74 (1891). — Meyrick, Handb. Brit. Lep., p. 392 (1895). — Barrett, Lep. Brit. Isl., 9, p. 161 (1904). — Tillyard, Ins. Austral. New Zealand, p. 431 (1926). — Meyrick, Revis. Handb. Brit. Lep., p. 375, 414 (1928).

Pyraustidae (p. 452) *Hymeniinae* (p. 452) + *Pinacinae* (p. 472) + *Dichocrociinae* (p. 478) + *Syleptinae* (p. 488) + *Margaroniinae* (p. 498) + *Pyraustinae* (p. 518) Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2 (1900).

- Hercynites* (p. 195) + *Ennychites* (p. 196) + *Pyrallites* (part.) (p. 199) + *Scopulites* (p. 203) + *Botytcs* (p. 205) Duponchel, Cat. Méth. Lep. Eur. (1844).
- Aglossidi* (part.) (p. 234) + *Nymphulidi* (part.) (p. 236) + *Botydi* (part.) (p. 238) + *Scopulidi* (p. 243) + *Ennychidi* (p. 246) Stephens, List Spec. Brit. Anim., 5, Lep. (1850).
- Odontidae* (p. 112) + *Hercynidae* (p. 146) + *Ennychidae* (p. 146, 162) + *Asopidae* (p. 146, 186) + *Steniidae* (part.) (p. 146, 232) + *Hydrocampidae* (part.) (p. 146, 254) + *Spilomelidae* (p. 146, 277) + *Margarodidae* (p. 146, 286) + *Botydae* (part.) (p. 146, 315) + *Scoparidae* (part.) (p. 412) Guenée, Delt. & Pyral., (1854).
- Odontidae* (17, p. 256; 34, p. 1224) + *Hercynidae* (17, p. 295; 34, p. 1279) + *Ennychidae* (17, p. 306; 34, p. 1280) + *Asopidae* (17, p. 331; 34, p. 1281) + *Steniidae* (part.) (17, p. 406; 34, p. 1325) + *Spilomelidae* (part.) (17, p. 463; 34, p. 1343) + *Margarodidae* (part.) (p. 17, p. 489; 34, p. 1353) + *Botydae* (part.) (18, p. 545; 34, p. 1380) Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, 18, 19 (1859).
- Odontidae* (p. 133) + *Ennychidae* (p. 137) + *Asopidae* (part.) (p. 141) + *Steniidae* (part.) (p. 142) + *Botydae* p. 146) Stainton, Man. Brit. Butt. Moths, 2 (1859).
- Pyrallididae* (part.) (p. 334) + *Homophysidae* (p. 454) Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7 (1863).
- Botididae* (part.) Heinemann, Kleinschm., 1, H. 2, p. 8, 18 (1865).
- Pyrallides* (part.) Woeke, Cat. Lep. Eur. Faun., p. 201 (1871).
- Botydes* Wallengren, Oefvers. Kgl. Vet. Akad. Förh., 28 (8), p. 971 (1871).
- Odontidae* (p. 40) + *Hercynidae* (p. 63) + *Ennychidae* (p. 76) + *Asopidae* (part.) (p. 96) + *Steniidae* (p. 99) + *Margarodidae* (p. 112) + *Botydae* (part.) (p. 124) + *Scoparidae* (part.) (p. 193) Berce, Faune Ent. France, Lep. 6 (1878).
- Asopiidae* (p. 57) + *Margarodidae* (p. 57) + *Botididae* (p. 58) Butler, Ill. Typ. Spec. Lep. Het. Brit. Mus., 2 (1878).
- Spilomelidae* (p. 76) + *Botididae* (p. 76) Butler, Ill. Typ. Spec. Lep. Het. Brit. Mus., 3 (1879).
- Botydae* (part.) Snellen, Vlinders Nederl., 2 (1), p. 10, 19 (1882).
- Botydididae* Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 292 (tab. gener. faun. austral., p. 292—294) (1884).
- Botydes* (part.) (p. 591) + *Margaronidae* (p. 613) + *Asopidae* (part.) (p. 624) + *Spilomelidae* (part.) (p. 633) + *Ennychidae* (p. 638) + *Hercynidae* (p. 643) + *Steniidae* (p. 644) + *Hydrocampidae* (part.) (p. 647) + *Pyrallidae* (part.) (p. 654) + *Scoparidae* (part.) (p. 666) Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5 (1889).
- Hapaliidae* (p. 268) + *Asopiidae* (p. 277) + *Margaronidae* (p. 278) + *Spilomelidae* (p. 280) + *Ennychidae* (p. 282) + *Steniidae* (part.) (p. 283) Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (1890).
- Pyrallidinae* (part.) Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 200 (1895—96).
- Odontidi* (p. 343) + *Hercynidi* (p. 344) + *Ennychidi* (p. 344) + *Agroteridi* (p. 345) + *Steniidi* (part.) (p. 345) +

- Margarodesidi* (p. 345) + *Botysidi* (part.) (p. 346) Acloque, Faune de France, 3 (1897).
Margarodidae (p. 505) + *Botydae* (p. 506) Saalmüller, Lep. Madag., 2 (1901).
Hymeniinae (p. 660) + *Pinaciinae* (p. 667) + *Dichocrociinae* (p. 670) + *Syleptinae* (p. 674) + *Margaroniinae* (p. 677) + *Pyraustinae* (p. 686) Semper, Schm. Philipp. Ins., 2 (1902).
Agroterinae Hampson, Nov. Zool., 25, p. 386 (1918).

1. Genus **Neurophyseta** Hampson

Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 16, p. 333 (1895); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 594, 605 (1898).

(Typus generis: *clymenalis* Walk.)

- clymenalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, Mexiko, p. 459 (♀), (1859) (*Hydrocampa*) (Venezuela, Guatemala, — Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 16, p. 333 (1895) (*Neurophyseta*); Costarica, Panama, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 605, f. 2 (♂) Venezuela (1898).
laothoealis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 460 (1858) (*Hydrocampa*) (Venezuela).
laudamialis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 959 (♂) (1859) (*Hydrocampa*?) (Venezuela).
subpuralis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1353 (1865) (*Leucochroma*) (Venezuela).
praestriatalis Ledorer, Wien. Ent. Monatsschr., 7, p. 502, t. 18, f. 12 (1863) (*Stenia*) (Cayenne, Venezuela). — Snellen, Tijds. v. Ent., 43, p. 293, t. 17, f. 13, 1900 (*Cataclysta*).
camptogrammalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Guatemala (s. 8) 9, p. 149 (1912).
clymenalis Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 275 (1895), part. (*Hydrocampa*), nec Walk. (1859).
cyclicalls Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 11, Costarica p. 261 (♀) (1913). (Júan Vinas)
fulvistrigalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Peru 8), 20, p. 369 (♂) (1917).
disclatralls Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8), Peru 20, p. 639 (♀) (1917).
normalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8), 9, p. St. Vincent 150 (1912).
arcigrammalls Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. S. Paulo 8) 9, p. 151 (♂) (1912).

- diplogrammalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 151 (♀) (1912). Brasilien (Rio de Janeiro)
- albinalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 152 (1912). Costarica, Guatemala, Panama, Kolumbien, Brasilien
- clymenalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 275 (1895) part. (*Hydrocampa*), nec Walk. (1859). (Rio de Janeiro)
- debilis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 276 (1895) part. (*Hydrocampa*).
- argyroleuca** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 152 (♂) (1912). Peru
- albirufa** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 9, p. 153 (♂) (1912). Peru
- mesophaealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, p. 370 (♂) (1917). Peru
- perrivalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 153 (♂) (1912). Kolumbien
- fulvilinealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, p. 370 (♀) (1917). Kolumbien
- auralis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 154 (♀) (1912). Brasilien (S. Paulo)
- flavirufalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, p. 371 (♀) (1917). Peru
- areuatalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 9, p. 154 (♀) (1912). Guatemala, Panama
- clymenalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 275 (1895), part. (*Hydrocampa*), nec Walk. (1859).
- rufalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 155 (♂) (1912). Jamaika
- fulvalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 155 (1912). Brasilien (S. Paulo)

Specios incertae sedis.

- albimarginalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 173 (♀) (1920). Guatemala (Volcan de S. Maria)
- durgalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 172 (♀) (1920). Guatemala (Volcan de S. Maria)
- mellograpta** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 257 (♀) (1914). Panama
- narcissusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 956 (♂) (1859) (*Cymoriza*). — Hampson, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 155 (1897) (*Musotima*). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 257 (1914) (*Neurophyseta*). Brasilien
- tanamoalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 173 (♂) (1920). Cuba (Tanamo)
- turrialbalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 289 (♀) (1912). Costarica (Turrialba)

- ursmaralis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 29, p. 185 (♀) (1927). Alto Parana River (zw. Argentinien u. Paraguay)
- volcanalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 173 (♂) (1920). Mexiko (Popocatepetl)
- 27

2. Genus **Psephis** Guenée

Guenée, Delt. & Pyral., p. 257 (1854). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 594, 605 (1898).

(Typus generis: *myrmidonalis* Guen.)

- myrmidonalis** Guenée, Delt. & Pyr., p. 257, t. 7, f. 8 (♀) (1854) (*Psephis*) (Patria?). — Brasilien, Venezuela
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 605, f. 3 (♂) (1898).
- trifunalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 455, t. 18, f. 16, (1863) (*Scybalista*) (Venezuela).
- ministralis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 257 (♂) (1914). Panama
- gomalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 174 (♂) (1920). Guatemala (Volcan de S. Maria)
- 3

3. Genus **Gonodiscus** Warren

Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 7, p. 430 (1891). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 594, 606 (1898).

(Typus generis: *amplalis* Warr.)

- amplalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 7, p. 430 (♂) (1891). — Chile
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 606, f. 4 (♂) (1898).
- australensis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 606, t. 49, f. 1 (♂), p. 76 (1898). W. Australien Queensland
- 2

4. Genus **Glaphyria** Hübner

Hübner, Zutr. Exot. Schm., 2, p. 29 (1823) (*Glaphyria sequistrialis*); id., Verz. bekannt. Schmett., [23], p. 357 n. 3423 [1825]. — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 267 (1895). — Forbes, Lep. N. York, p. 524, 536 (1923). — Hemming, Hübner, 2, p. 201 (1937).

Homophysa Guenée, Delt. & Pyr., p. 364 (1854). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 454 (1863). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 607 (1898).

(Typus generis: *sequistrialis* Hübn.)

- glaphyralis** Guenée, Delt. & Pyr., p. 366 (♀) (1854) U. S. A. (*Homophysa*). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 455, t. 18, f. 14 (1863) (N. Atlant. Staaten, Florida)

- Lond., p. 607, f. 5 (1898) (*Homophysa*). — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4899 (1917). — Forbes, Lep. N. York, p. 537, f. 317 (1923).
- stipitalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1460 (♀) (1865) (*Scopula?*) (N.-Amerika).
- albolineata* Grote & Robinson, Trans. Amer. Ent. Soc., 1, p. 28 (1867) (*Homophysa*). — Grote, Canad. Ent., 10, p. 28 (1878) (*Homophysa*).
- sequistrialis** Hübner, Zutr. Exot. Schm., 2, p. 29, nr. 185, f. 369, 370 (1823) (*Glaphyria*) (Montana, Pennsylvania). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 607 (1898). — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4900 (1917). — Forbes, Lep. N. York, p. 537 (1923). U. S. A.
- dimotalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1346 (1865) (*Zebronia?*) (Honduras).
- oriola** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 256 (♀) (1914). Panama
- reniculis** Zeller, Verh. z. b. Ges. Wien, 22, p. 526 (1872) (*Homophysa*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 607 (1898). — Fernald, Bull. U. S. Nat. Mus., nr. 52, p. 372 (1902) (*Symphysa*). — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4910 (1917) (*Egesta*). — Dyar, Insec. Insc. Menstr., 5, p. 69 (1917) (*Glaphyria*). — Forbes, Lep. N. York, p. 538 (1923) (*Lipocosma*). U. S. A.
- renalis* Ragonot, Ann. Soc. Ent. Fr., (s. 6) 10, p. 458 (1890) (*Egesta renalis* err. typ.). (Illinois, N. Carolina bis Texas, Arizona)
- periculosalis** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash., 10, p. 58 (1908). — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4908 (1917). Kalifornien
- invisalis** Guenée, Delt. & Pyr., p. 361, (♀) (1854) (*Eubulea*) (Cayenne). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 607 (1898). — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4901 (1917). U. S. A. (Süd-staaten), Panama Franz. Guayana
- lentiflualis* Zeller, Verh. z. b. Ges. Wien, 22, p. 525 (1872) (*Homophysa*). — Forbes, Lep. N. York, p. 537 (1923).
- psychicalis** Hulst, Trans. Amer. Ent. Soc., 13, p. 149 (♀) (1886) (*Botys*) (Georgia, Texas). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 608 (1898) (*Homophysa*). — Fernald, Bull. U. S. Nat. Mus., nr. 52, p. 372 (1902). U. S. A.
- psychialis* Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4902 (1917). — Forbes, Lep. N. York, p. 537 (1923). (Atl. Staaten)

- reluctalis** Hulst, Trans. Amer. Ent. Soc., 13, p. 156 (♂) (1886) (*Orohena*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 608 (1898) (*Homophysa*). — Barnes & Mc. Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4903 (1917) (*Glaphyria*). — Lichti, Schallenger & Johnson, Journ. Ent. Zool. Pomona Coll., 9, p. 130, f. 98 (1917) (*Homophysa*). — Dyar, Insec. Insc. Menstr., 5, p. 69 (1917) (*Egesta*).
forma *remellalis* Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 556, t. 100, f. 24 (1899) (*Homophysa remellalis*). — Barnes & Mc. Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4903 (1917) (*reluctalis* fa.). U.S.A. (Typus: Arizona, Californien)
- decisa** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 35, p. 1963 (1866) (*Acontia?*) (Jamaika). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 607 (1898). Jamaika, Brasilien, Argentinien
- flavidalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 156 (♂) (1912) (*Homophysa*). Paraguay, Argentinien
- pentascia** Meyrick, Veröff. Deutsch. Kolonial- u. Übersee-Mus. Bremen, 1 (3), p. 323, t. 13, f. 10 (♂, ♀) (1936) (*Homophysa*). Venezuela (Timotes, Merida)
- fulminalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 455, 487, t. 18, f. 13 (1863) (*Homophysa*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 607 (1898). — Barnes & Mc. Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4904 (1917). — Forbes, Lep. N. York, p. 538 (1923). U.S.A. (Atlant. Staaten, Texas, Florida)
- pomonalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 174 (♀) (1920) (*Homophysa*). Guatemala (Cayuga), Franz. Guayana, Cuba
- polycyma** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 607, t. 49, f. 4 (♂), p. 761 (1898) (*Homophysa*). Brasilien (Castro Paraña)
- cymalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 256 (♀) (1914) (*Homophysa*). Panama
- moribundalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 257 (♀) (1914) (*Homophysa*). Panama
- bilinealis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1346 (♀) (1865) (*Zebronia?*) (Venezuela). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 608 (1898) (*Homophysa*). U.S.A., Venezuela
- peremptalis** Grote, Canad. Ent., 10, p. 28 (♂) (1878) (*Homophysa*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 608 (1898) (= *H. bilinealis* Walk.). — Barnes & Mc. Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4905 (1917). — Forbes, Lep. N. York, p. 538 (1923). U.S.A. (Pennsylvania bis N. Carolina, N. York, Texas)
- basiflavalis** Barnes & Mc. Dunnough, Contr. Lep. N. Amer., 2 (4), p. 172, t. 4, f. 12 (1913); Florida, Texas

- id., Check List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4906 (1917).
- furvalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Mexiko
p. 156 (♀) (1912) (*Homophysa*).
- leucostictalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) Grenada,
16, p. 334 (♀) (1895) (*Homophysa*); id., St. Vincent
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 608 (1898) (*Homophysa*).
- falcatalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 16, Grenada,
p. 333 (1895) (*Homophysa*); Proc. Zool. Soc. St. Vincent,
Lond., p. 608 (1898). — Druce, Biol. Centr.- Mexiko
Amer. Het., 2, p. 555, t. 100, f. 22 (1899) (*Homophysa*).
- distictalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Franz.
9, p. 157 (♀) (1912) (*Homophysa*). Guayana
- dichordalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) Mexiko,
9, p. 157 (1912) (*Homophysa*). Kolumbien,
Surinam,
Brasilien
(Bahia)
- dualis** Barnes & Mc. Dunnough, Contr. Nat. Hist. U.S.A.
Lep. N. Amer., 2 (6), p. 225, t. 1, f. 1 (Texas)
(1914); id., Check List Lep. Bor. Amer.,
p. 128, nr. 4907 (1917). — Dyar, Insec. Menstr., 5, p. 69 (1917) (*Egesta*).
- albifascialis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Peru,
9, p. 158 (1912) (*Homophysa*). Chile,
Argentinien

Species incertae sedis.

- atmocharis** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 545 Argentinien
(♂) (1935) (*Homophysa*). (Álta Gracia)
- ausonialis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 561, Guatemala,
t. 101, f. 20 (1899) (*Glaphyria?*). Panama
- calla** Kaye, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 153, t. 6, Trinidad,
f. 14 (1901) (*Neurophyseta*). — Dyar, Proc. Panama
U. S. Nat. Mus., 47, p. 256 (1914) (*Homophysa*).
- citronalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 556, Mexiko
t. 100, f. 27 (1899) (*Homophysa*).
- condensata** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 394 Argentinien
(♂, ♀) (1933) (*Homophysa*). (Álta Gracia)
- crambidalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 30, p. 62, t. 5, Curacao,
f. 5 (1887) (*Homophysa*). — Hampson, Proc. Venezuela
Zool. Soc. Lond., p. 608 (1898) (*Homophysa*).
- dolatalis** Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. Portorico
321 (1890) (*Homophysa*). — Hampson, Proc.
Zool. Soc. Lond., p. 608 (1898) (*Homophysa*).
- micralis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 366 (♀) (1854) Brasilien
(*Homophysa*). — Hampson, Proc. Zool. Soc.
Lond., p. 608 (1898) (*Homophysa*).

5. Genus **Homophysodes** Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 296 (1914).

(Typus generis: *morbidalis* Dyar)

morbidalis Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 296 Panama
(1914).

1

6. Genus **Scybalista** Lederer

Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 455 (1863). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 608 (1898).

Eupoca Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 8, p. 63 (1891)
(typus: *cinerea* Warr.).

(Typus generis: *restionalis* Led.)

- leueolepta** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 608 Brasilien
(♀) (1898). (Castro Paraña)
- bifascialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 27, Brasilien
p. 59 (♀) (1863) (*Nephopteryx*). — Hamp- (Castro
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 609; p. 608, Paraña,
f. 6 (♂) (1898). S. Paulo),
cinerea Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Peru,
6) 8, p. 64 (1891) (*Eupoca*). Venezuela
- acutalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 8, p. Peru
63 (1891) (*Eupoca*). — Hampson, Proc. Zool.
Soc. Lond., p. 609 (1898).
- subductalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, Venezuela
p. 1229 (♀) (1865) (*Pyrallis?*). — Hampson,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 609 (1898).
- prusalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 205, Mexiko
t. 60, f. 18 (1895) (*Phlyctenia?*). — Hamp-
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 609 (1898).
- rufescens** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 9, Panama
p. 158 (♀) (1912).
- restionalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 455, U.S.A.,
487, t. 18, f. 15 (1863). — Hampson, Proc. Venezuela,
Zool. Soc. Lond., p. 609 (1898). — Barnes Brasilien
& Mc Dunnough, Check List Lep. Bor.
Amer., p. 128, nr. 4909 (1917).
- canalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 35, p. St. Domingo
1717 (♀) (1866) (*Nephopteryx*). — Hampson,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 609 (1898).
- semiferrealis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Brit.
609 (1898). Guayana,
Panama,
Brasilien
- leucostactalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Brasilien
9, p. 158 (1912). (Unt.
Amazonas),
Peru,
Chile

Species incertae sedis.

- chicalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 178 Guatemala
(♂) (1920). (Cayuga)
- polyorma** Meyrick, Veröff. Deutsch. Kolonial- u. Venezuela
Übersee-Mus. Bremen, 1 (3), p. 322, t. 13, (Timotes)
f. 1, 2 (♂, ♀) (1936).
- potentalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 260 Panama
(♀) (1914).
- sanctalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. Costarica
289 (♀) (1912). (Juan
14 Vinas)

7. Genus **Symphysa** Hampson

Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 594, 609 (1898).

Egesta Ragonot, Ann. Soc. Ent. Fr., (s. 6) 10, p. 458 (1891),
nec Conrad (1845). — Barnes & McDunnough, Check
List Lep. Bor. Amer., p. 128 (1917).

(Typus generis: *sulphuralis* Cram.)

- sulphuralis** Cramer, Pap. Exot., 4, p. 113, t. 348, Mexiko,
f. E (1782) (*Phalaena Pyralis*) (Surinam). Panama,
— Warren, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 267 Franz.
1889) (*Homophysa*). — Hampson, Proc. Zool. u. Holl.
Soc. Lond., p. 609, f. 7 (♂), p. 610 (1898) Guayana,
(*Symphysa*). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Brasilien
Het., 2, p. 267 (1895) (*Glaphyria*). (Amazonas)
- lepidaria** Cramer, Pap. Exot., 4, p. 161,
t. 371, f. K (1782) (*Phalaena Pyralis*).
- sulphuratalis** Guenée, Delt. & Pyr., p.
365 (1854) (*Homophysa*). — Walker, Cat.
Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 751 (1859)
(*Homophysa*). — Lederer, Wien. Ent. Mo-
natschr., 7, p. 455 (1863) (*Homophysa*).
- lepidalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 610 (1898) (ex synonym.).
- discais** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Jamaika
p. 159 (1912).
- rufifusca** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Panama
9, p. 160 (♀) (1912).
- amoenalis** Walker, Trans. Ent. Soc. Lond., (s. 3), Panama,
1 (2), p. 123 (♂) (1862) (*Oligostigma*) Brasilien
(Brasilien). — Hampson, Proc. Zool. Soc.
Lond., p. 610 (1898).
- eripalis** Grote, Canad. Ent., 10, p. 29 (♀) (1878) U.S.A.
(*Homophysa*) (Texas). — Ragonot, Ann. Soc. (Iowa,
Ent. Fr., (s. 6) 10, p. 458 (1890) (*Egesta*). Texas,
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 610 Oregon,
(1898). — Barnes & McDunnough, Check Californien)
List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4912 (1917)
(*Egesta*). — Forbes, Lep. N. York, p. 538
(1923) (*Lipocosma*) (Virginia bis Illinois,
Missouri).
- var. **salutalis** Hulst, Trans. Amer. Ent.
Soc., 13, p. 150 (1886) (*Botys salutalis*). —
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 610

- (1898) (= *S. eripalis*). — Barnes & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4912 (1917) (*Egesta eripalis* var.).
ochrealis Haimbach, Ent. News, 19, p. 263 (1908) (Colorado). — Barnes & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128 (1917) (= var. *salutalis*).

Species incertae sedis.

- glorialis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 176 Franz.
 (♀) (1920). Guayana
 (Cayenne)
- hermalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 176 Guatemala
 (♀) (1920). (Cayuga)
- maralis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 177 Cuba
 (♀) (1920). (Matanzas)
- matanzalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 177 Cuba
 (♀) (1920). (Matanzas)
- simplicialis** Kearfott, Canad. Ent., 39, p. 4 (1907). — U.S.A.
 Barnes & McDunnough, Check List Lep. (Texas,
 Bor. Amer., p. 128, nr. 4911 (1917) (*Egesta*). Arizona)

10

8. Genus **Monocoptopera** Hampson

- Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 596, 610 (1898).
 (Typus generis: *M. ecmetallescens*).

- ecmetallescens** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., Amboina
 p. 610, f. 8 (♂) (1898).

1

9. Genus **Voliba** Walker

- Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 35, p. 1983 (1866). — Hampson,
 Proc. Zool. Soc. Lond., p. 594, 611 (1898).

Gabrisa Walker (nec Walker, ibid., p. 1174 (1865)), Cat.
 Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1266 (1865) (typus: *scoparialis*
 Walk.).

Stereocopa Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 448
 (1885) (typus: *scoparialis* Walk.).

(Typus generis: *scoparialis* Walk.)

- asphyctopa** Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral., 32, N. Queensland
 p. 87 (♂) (1908). (Townsville)

- gigantea** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Brit. Neu-
 p. 100 (♀) (1912). Guinea

- leptomorpha** Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral., N. Queensland
 32, p. 86 (♀) (1908). (Townsville)

- psammoessa** Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral., 32, p. 88 (♂) (1908). Queensland (Adavale)
- pynosticta** Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral., 32, p. 87 (♂) (1908). Queensland (Burpengary)
- scoparialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1266 (♂) (1865) (*Gabrisa*) (Sydney). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 611, f. 9 (♂) (1898). Australien (W. Australien, Victoria)

6

10. Genus **Lipocosma** Lederer

Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 448 (1863). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 594, 611 (1898). — Forbes, Lep. N. York, p. 537, 538 (1923).

(Typus generis: *sicalis* Walk.)

- sicalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 942 (1859) (*Leucinodes?*) (Patria?). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 611, f. 10 (♂) (1898). — Barnes & Mc. Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4913 (1917). — Forbes, Lep. N. York, p. 539 (1923). U.S.A. (Atlant. Staaten, Texas)
- perfusalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1226 (1865) (*Pyrallis*) (N. Amerika).
- diabata** Dyar, Insec. Insc. Menstr., 5, p. 70 (♀) (1917). U.S.A. (Florida)
- fuliginosalis** Fernald, Ent. Amer., 4, p. 37 (1888) (Maine, Ontario, Illinois). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 612 (1898). — Barnes & Mc. Dunnough, Check List Bor. Amer., p. 128, nr. 4914 (1917). — Forbes, Lep. N. York, p. 539, f. 316 (1923). U.S.A. (Atlant. Staaten)
- intermedialis** Barnes & Mc. Dunnough, Contr. Nat. Hist. Lep. N. Amer., 1 (5), p. 32, t. 3, f. 3 (♀) (1922); Check List Bor. Amer., p. 128, nr. 4915 (1917). Texas
- nigripictalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 612 (♀) (1898). Brasilien (Espiritu Santo)
- chiralis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 175 (♂) (1920). Cuba (Santiago)
- nigrisquamalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 160 (♂) (1912). Panama
- adelalis** Kearfott, Journ. N. York Ent. Soc., 11, p. 145, t. 9, f. 11, 20 (1903) (*Symphysa*). — Barnes & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4916 (1917). — Forbes, Lep. N. York, p. 539 (1933). N. Jersey
- albibasalis** Barnes & McDunnough, Journ. N. York Ent. Soc., 19, p. 161 (1911). — Kalifornien

Lichti, Schallenger & Johnson, Journ. Ent. Zool. Pomona Coll., 9, p. 139, f. 102 (1917). — Barnes & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4917 (1917).

Species incertae sedis.

- alegralis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 175 (♂) (1920). Guatemala, Panama, Franz. Guayana (Cayenne)
- argyrectalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 676 (♀) (1912) (*Ambia*). — Dyar, Proc. Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 258 (1914) (*Lipocosma*). Costarica (Juan Vinas)
- consortalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 259 (♀) (1914). Panama
- hebescalis** Möscher, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. 316 (1890). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 612 (1898). Portorico
- illosalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 392 (1914). Mexico
- metalophota** Hampson, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 166 (♀) (1897) (*Ambia*). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 259 (1914) (*Lipocosma*). Jamaika, Bahama Ins.
- parcipunctalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 258 (♀) (1914). Panama
- plagalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 290 (♀) (1912). Costarica (Juan Vinas)
- punctissimalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 258 (1914). Panama
- savoralis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 176 (♀) (1920). Cuba (Baracoa)
- telliferalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 258 (1914). Panama

20

11. Genus **Catapsephis** Hampson

Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 594, 612 (1898).

(Typus generis: *apicipuncta* Hampson.)

- apicipuncta** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 612, f. 11 (♂) (1898). Fergusson Ins., Neu-Guinea
- melanostigma** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 161 (♂) (1912). Holl. Neu-Guinea, Neu-Georgia
- acutlanguialis** W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exped., 2, nr. 15, p. 127 (♀) (1915). Holl. Neu-Guinea

subterminalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Neu-Georgia,
8) 20, p. 371 (♂) (1917). Salomon Ins.

flavizonalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Holl.
20, p. 372 (♀) (1917). Neu-Guinea

leucomelaena Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Salomon Ins.
8) 20, p. 372 (♂) (1917).

6

12. Genus **Sufetula** Walker

Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 946 (1859). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 252 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 594, 613 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 186 (1900).

Mirobriga Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 27, p. 131 (1863) (typus: *albicans* Walk. = *sunidesalis* Walk.).

Loetrina Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 27, p. 132 (1863) (typus: *flexalis* Walk.).

Pseudochoreutes Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 20 (1880) (typus: *choreutalis* Snell.).

Pseudochoreutis Hampson, Proc. Zool. Soc. London, p. 613 (1898) (ex synonym.).

(Typus generis: *sunidesalis* Walk.)

a) Orientalische Region.

macropalpia Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Amboina,
613 (♂) (1898). Banda Ins.,
Fergusson
Ins.

cyanolepis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) S. Celebes
9, p. 164 (♂) (1912).

sunidesalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, Sikkim,
p. 947 (♂) (1859) (*Sufetula*) (Sarawak). Assam,
— Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. Siam,
251 (♂) (1896). — Meyrick, Trans. Ent. Borneo,
Soc. Lond., p. 91 (1897). — Hampson, Proc. Bismarek-
Zool. Soc. Lond., p. 613, f. 12 (♂), p. 614 Archipel,
(1898). — Tams, Journ. Nat. Hist. Soc. Siam, N. Amerika
6, p. 284 (1924).

albicans Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus.,
27, p. 132 (♀) (1863) (*Mirobriga*) (Sarawak).

flexalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus.,
27, p. 132 (♀) (1863) (*Loetrina*) (Sarawak).

choreutalis Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 202 (1880) Celebes,
(*Pseudochoreutes*); 26, p. 124, t. 6, f. 8, 8a Samoa,
(1883) (*Pseudochoreutes*). — Hampson, Fau- Neu-Guinea
na Brit. India Moths, 4, p. 252 (1896) (= *P. sunidesalis* Walk.); Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 614 (1898) (= *Pseudochoreutis sunidesalis* Walk.). — Snellen, Tijds. v. Ent., 41, p.
175 (1898) (*Pseudochoreutes*). — Pagen-
stecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 186
(1900) (*Sufetula*). — E. Hering, Ent. Zeit.
Stettin, 62, p. 343 (1901).

- melanophthaima** E. Hering, Ent. Zeit. Stettin, 62, p. 343 (1901); 64, t. 1, f. 27 (♂) (1903). Sumatra,
? Java
- brunnealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, p. 373 (♀) (1917). Philippinen
(Manila)
- rectifascialis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 253, n. 4765 (♂, ♀) (1896); Proc. Zool.
Soc. Lond., p. 614 (1898). Ceylon
- nitidalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 576, t. E, f. 16 (♀) (1908). Ceylon

Species incertae sedis.

- minimalis** B. Fletcher, Trans. Linn. Soc. Lond., 13, p. 301, t. 17, f. 4 (♂) (1910). Seychellen,
Coetivy Ins.
- sythoffi** Snellen, Tijds. v. Ent., 41, p. 175, t. 8, f. 4, 5 (♂, ♀) (1898). Java

b) Aethiopische Region.

- nigrescens** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 162 (1912). Sierra Leone,
S. Nigeria
- trichophysetis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 165 (♀) (1912). Goldküste

c) Australische Region.

- macropalpia** Hampson, vide sub a) Orientalische Region.
- sunidesalis** Walker, vide sub a) Orientalische Region.
- choreutalis** Snellen, vide sub a) Orientalische Region.
- obilquistialis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 161 (♂) (1912). Louisiaden
(Rossel Ins.)
- billinealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 163 (♀) (1912). Holl.
Neu-Guinea
- polystrials** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 163 (1912). Brit.
Neu-Guinea,
Louisiaden
(St. Aignan)
- hemioththaima** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 286 (♂) (1884) (*Diplopseustis*). — Hampson,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 614 (1898). — N. S. Wales,
Samoa,
Pacific Ins.,
Tams, Ins. Samoa, 3, fasc. 4, p. 273 (♂, ♀) (1935). Malaischer
Archipel

d) Nearktische Region.

- sunidesalis** Walker, vide sub a) Orientalische Region.

e) Neotropische Region.

- diminutalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1315 (1865) (*Isopteryx?*) (Honduras). — St. Vincent,
Honduras,
Panama,
Bermuda Ins.
- Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 614 (1898). — Barnes & Mc Dunnough, Check

- List Lep. Bor. Amer., p. 128, nr. 4918 (1917).
dematralis Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 276, t. 63, f. 25 (1896) (*Hydrocampa*).
pygmaea Hampson, Anu. Mag., (s. 8) 9, p. 163 (♀) Mexiko, (1912).
philogelos Dyar, Insec. Insc. Menstr., 10, p. 15 Mexiko, (1922). Florida
hypochiralis Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 259 Panama (♀) (1914).
hypocharopa Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 259 (♂) (1914). Panama

Species incertae sedis.

- dulcinalis* Snellen, Tijds. v. Ent., 41, p. 176, t. 8, Kolumbien f. 6 (♀) (1898).
grumalis Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 178 Cuba (Typus (♀) (1920). Santiago),
 Biologie: Lopez Dominquez, Informe annel del director de la estacion exper. insular. Rio Piedras 1925—26, 62 pp. (San Juan) (1927).
 — Sein, Journ. Dept. Agric. Porto Rico, 14 (3), p. 167—191 (1930).
 23

13. Genus **Trigamozeucia** Meyrick

Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 135 (1937).

(Typus generis: *radiciformis* Meyr.)

- radiciformis* Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 136 Fidji Ins. (♂) (1937). (Vunidawa)

1

14. Genus **Erpis** Walker

Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 27, p. 133 (1863). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 594, 614 (1898).

(Typus generis: *macularis* Walk.)

- macularis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 27, Borneo p. 133 (♀) (1863) (*Erpis*) (Sarawak). —
 Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 614, f. 13 (♂), p. 615 (1898).
pacificalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Bonin Ins. 9, p. 165 (♂) (1912).

2

15. Genus **Aulacoptera** Hampson

Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 254 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 595, 617 (1898).

(Typus generis: *fuscintervalis* Swinh.)

- fuscinervais** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) Assam,
16, p. 300 (♂) (1895) (*Aulacophora*). — Pulo Laut,
Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. Samoa,
254, f. 152 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Fidji Ins.,
Lond., p. 617, f. 15 (♂) (1898). Salomon Ins.,
Neu-Guinea
- philippinensis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Philippinen
8) 9, p. 167 (1912). (Negros Ins.)
- eucentra** Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 102 (♂, ♀) Belg. Congo
(1937). (Eala)
- 3

16. Genus **Xanthomelaena** Hampson

Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 255 (1896); Proc. Zool.
Soc. Lond., p. 595, 617 (1898).

(Typus generis: *schematias* Meyr.)

- schematias** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 458 Birma,
(1894). — Hampson, Fauna Brit. India Pulo Laut,
Moths, 4, p. 255, f. 153 (♂) (1896); Proc. Tambora,
Zool. Soc. Lond., p. 617, f. 16 (♂), p. 618 Borneo,
(1898). Sumbawa,
Celebes,
Holl.
Neu-Guinea
- quinquepuncta** Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., Borneo
p. 156 (♂) (1904).
- 2

17. Genus **Rhimphaleodes** Hampson

Hampson, Ill. Typ. Spec. Lep. Het. Brit. Mus., 9, p. 174 (1893);
Fauna Brit. India Moths, 4, p. 255 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 595, 618 (1898).

(Typus generis: *macrostigma* Hampson.)

- macrostigma** Hampson, Ill. Typ. Spec. Lep. Het. Ceylon,
Brit. Mus., 9, p. 174, f. 9 (1893); Fauna Pulo Laut,
Brit. India Moths, 4, p. 256, f. 154 (♂) Malakka,
(1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 618, f. Tonkin
17 (♂) (1898).
- ochrocephala** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 397 Belg. Congo
(♂) (1933). (Yambata)
- 2

18. Genus **Trichoceraea** Sauber

Sauber in Semper, Schm. Philipp., 2, p. 661 (1902).

- semperi** Sauber in Semper, Schm. Philipp., 2, p. 661, Philippinen
t. 66, f. 8, 9 (♂, ♀) (1902). (Luzon)

19. Genus **Pycnarmon** Lederer

Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 441 (1863). — Hampson, Fanna Brit. India Moths, 4, p. 256 (1896). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 187 (1900). — Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, p. 374 (1917). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Univ. Sapporo, 22, p. 170, 174 (tab. anal. spec. formos. p. 175) (1928); id., 25, p. 156, 159 (1929).

Entephria Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 428 (1863) (praeocc.), nec Hübner, Verz. bek. Schm., p. 331 (1826) (typus: *praeruptalis* Led.). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., 618 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 180 (1900). — Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8), 20, p. 374 (1917).

Aripana Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 312 (1886) (typus: *cribrata* Fabr.).

Satanastrea Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 442, (1890) (typus: *argyria* Buil. = *lactiferalis* Walk.).

Eutrichotis Swinhoe, Cat. Het. Mus. Oxford, 2, p. 453 (1900) (typus: *abrazalis* Walk.).

Pyralocymatophora Strand, Deutsche Ent. Zeit. Iris, 32, p. 34, 35 (1918) (*Aripana* subgen. *P.*; typus generis: *frenulalis* Strd.).

(Typus generis: *jaguaralis* Guen.).

a) Paläarktische Region.

- cribrata* Fabricius, Ent. Syst., 3 (2), p. 215, n. 322 (1794) (*Phalaena*) (India or.). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 619 (1898) (*Entephria*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stettin, 62, p. 334 (1901) (*Aripana*). — Strand, Deutsche Ent. Zeit. Iris, 32, p. 37 (1918). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 175, t. 7, f. 1 (1928); 25, p. 159 (1929). West-, Mittel- u. Südchina, Korea, Japan, Formosa, Indien, Ceylon, Birma, Tonkin, Malakka, Sumatra, Java, Borneo, Celebes, Lombok, Sumbawa, Flores, Sula, Ceram, Aru, Key Ins., Holl. Neu-Guinea, Bisuarek-Archipel, Fidji; Sierra Leone, Kamerun,
- caberalis* Guenée, Delt. & Pyral., p. 284 (1854) (*Spilomela*) (Java). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 443 (1863) (*Conchylodes*). — Snellen, Tijds. v. Ent., 27, p. 44 (1884) (*Conchylodes*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 312 (1886) (*Aripana*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 280 (1890) (*Aripana*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Lep. Het. Brit. Mus., 8, p. 38 (1891) (*Aripana*); 9, p. 48 (1893) (*Aripana*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 258 (1896) (*Pycnarmon*). — Aurivillius, Ent. Tidskr., p. 168 (1897) (*Aripana*). — Swinhoe, Cat. Het. Mus. Oxford, 2, p. 453 (1900) (*Aripana*). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 188 (1900). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 447 (1901) (*Entephria*). — Gaede, Ent. Zeit. Stettin, 77, p. 132 (1916) (*diaphana* var.). — Janse, Check-List S. Afr. Lep. Het., p. 157 (1917) (*Entephria*).

- cabiralis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 482 (♂) (1859) (*Zebronia*) (Java).
- abdicalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 480 (♀) (1859) (*Zebronia*) (Ceylon). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 443, t. 17, f. 12 (1863) (*Conchylodes*). — Wallace & Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 364 (1866) (*Zebronia*). — Butler, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 684 (1880) (*Zebronia*). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 870 (1885) (*Zebronia*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Lep. Het. Brit. Mus., 8, p. 38 (1891) (*Aripana*); 9, p. 48 (1893) (*Aripana*). Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 459 (1894) (*Aripana*). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 336 (1925) (*caberalis* fa.). — Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 401 (1933).
- corycialis* Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 237 (1880) (*Conchylodes*); 27, p. 44, t. 4, f. 6 (1884) (*Conchylodes*).
- privialis* Snellen, Tijds. v. Ent., 43, p. 282, t. 16, f. 1 (1901) (*Conchylodes*).
- frenulalis* Strand, Deutsche Ent. Zeits. Iris, 32, p. 34 (1918) (*Aripana* subg. *Pyraclocymatophora*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 26 (1928).
- Parasiten: Wilkinson, Bull. Ent. Res., 17 (4), p. 417—420 (1927).
- tylostegalis** Hampson, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 395, t. 3, f. 6 (♂) (1900) (*Entephria*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 448 (1901) (*Entephria*). Amur, Ussuri, West-, Mittel- u. Südschina
- lactiferalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 480 (♀) (1859) (*Zebronia*?) (Hindostan). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 313 (1886) (*Aripana*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 280 (1890) (*Aripana*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Lep. Het. Brit. Mus., 8, p. 38 (1891) (*Aripana*); 9, p. 48, t. 173, f. 28 (1893) (*Aripana*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 459 (1894) (*Aripana*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 259 (1896) (*Pycnarmon*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 620 (1898) (*Entephria*). — Swinhoe, Cat. Het. Mus. Oxford, 2, p. 454 (1900) (*Aripana*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 447 (1901) (*Entephria*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stettin, 62, p. 331 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 160 (1929). Ussuri, West- u. Südschina, Korea, Japan, Formosa, N.W. u. O. Himalaya, Indien, Ceylon, Birma, Sumatra, Pulo Laut, Borneo, Celebes, Holl. Neu-Guinea
- argyria* Butler, Ill. Typ. Spec. Lep. Het. Brit. Mus., 3, p. 76, t. 59, f. 9 (1879) (*Zebronia*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 443 (1890) (*Satanastra*).

- paucipunctalis* Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 633, t. 19, f. 2 (♂) (1890) (*Conchylodes*) (Sikkim). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 336 (1925) (*lactiferalis* fa.).
- aeriferalis* Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 447 (1901) (*Entephria*), nec Moore (1877). forma *latepunctalis* Caradja, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 40, p. 163 (1925). Ussuri
- aeriferalis* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 618 (1877) (*Conchylodes*). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 634 (1889) (*Aripama*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 635 (1890) (*Conchylodes*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 259 (1896) (*Pycnarmon*). — Hering, Ent. Zeit. Stettin, 62, p. 333 (1901) (*Aripama*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 177, t. 7, f. 3 (1928). Südchina, Japan, Korea, Formosa, Indien (Assam, Sikkim), Tonkin, Andamanen, Sumatra
- aeriferalis* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 620 (1898) (*Entephria*).
- apicipicta* Strand, Deutsche Ent. Zeits. Iris, 32, p. 37 (1918) (*Aripama lactiferalis* ab.). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 27 (1928).
- pantherata* Butler, Ill. Typ. Spec. Lep. Het. Brit. Mus., 2, p. 59, t. 39, f. 4 (1878) (*Crociodophora*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 620 (1898) (*Entephria*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 448 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 177, t. 7, f. 11 (1928); 25, p. 160 (1929). Mittel- u. Westchina, Korea, Japan, Formosa

b) Orientalische Region.

- jaguaralis* Guenée, Delt. & Pyr. p. 283 (♀) (1854) (*Spilomela*) (Patria?). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 486 (1859) (*Zebronia*). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 441, t. 17, f. 11 (♂) (1863) (*Pycnarmon*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1368 (1865) (*Pycnarmon*). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 91 (1867). — Hopffer, Ent. Zeit. Stett., 35, p. 47 (1874). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 38, p. 60 (1885). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 257 (1886). — Pagestecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 43, p. 105 (1890). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 630 (1890). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 256, f. 155 (♂) (1896). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 87 (1897). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 619, f. 18 (♂) (1898) (*Entephria*). — Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. 187 (1900). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 446 (1901). — E. Hering, Ent. Zeit. Stettin, 62, p. 331 (1901). — Semper, Schm. Westchina, Indien (Dharmasala, Sikkim, Assam), Ceylon, Malakka, Tonkin, Sumatra, Lombok, Philippinen, Nias, Java, Celebes, Sangir, Talaut, Sula, Amboina, Key Ins., Mysol, Waigau, Buru, Ceram,

- Philipp. Ins., 2, p. 662 (1902). — Rothschild, Rep. B. O. U. Exped., 2, ur. 15, p. 127 (1915).
- Salomon Ins.,
Neu-Guinea,
Fergusson
Ins.,
Lousiaden
(St. Aignan),
Cap York,
Queensland
- var. *chinensis* Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 446, t. 14, f. 2 (♀) (1901). Westchina
- tylostegalis** Hampson, vide sub a) Paläarktische Region.
- virgatalis** Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 92, t. 7, f. 9 (non 10) (1867) (*Pycnarmon*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 633 (1890) (*Ravana*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 257 (1896) (*Pycnarmon*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 619 (1898) (*Entephria*). — Swinhoe, Cat. Het. Mus. Oxford, 2, p. 453 (1900) (*Eutrichotis*). Indien
(Himalaya,
Bengalen,
Assam,
Sikkim),
Ceylon
- pulchralis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 7), 8, p. 135 (♂) (1901). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 576 (1908). Birma
- abraxalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1349 (♂) (1865) (*Zebronia*) (Darjiling). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 91 (1867) (*Pycnarmon*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 631 (1890). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 251 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 619 (1898) (*Entephria*). — Swinhoe, Cat. Het. Mus. Oxford, 2, p. 453 (1900) (*Eutrichotis*). N. O.
Indien,
Sikkim,
Assam
- alboflavalis** Moore, Descr. N. Ind. Lep. Ins. Atkinson, p. 220 (♂) (1887) (*Conogethes*) (Darjiling). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 258 (1896) (*Pycnarmon*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 619 (1898) (*Entephria*). Sikkim,
Andamanen
- cribrata** Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.
- dryocentra** Meyrick, Exot. Macrolep., 4, p. 401 (1933) (♂, ♀) (*Entephria*). Assam
(Khasis),
Sikkim
- meritalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 479 (♀) (1859) (*Zebronia?*) (Ceylon). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 310 (1884) (*Conchylodes*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 313 (1886) (*Aripama*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 634 (1890) (*Conchylodes*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Lep. Het. Brit. Mus., 9, p. 48 (1893) (*Aripama*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 459 (1894) (*Aripama*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 259 (1896) (*Pycnarmon*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 620 (1898) (*Entephria*). — Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. 187 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 335 (1901). — Shibuya, Journ. China,
Formosa,
Indien
(Assam,
Sikkim,
Kalkutta),
Ceylon,
Sumatra,
Borneo,
Java,
Celebes,
Sumbawa,
Buru,
Ceram,
Aru Ins.,

- Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 176, t. 7, f. 2 (1929).
- plexiippusalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 487 (1859) (*Zebronia*?) (Moreton Bai).
- baptalis* Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 238 (1880) (*Conchylodes*) (Celebes, Java); 27, p. 44, t. 4, f. 7 (1884) (*Conchylodes*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 37, p. 283 (1884); 39, p. 175 (1886); 41, p. 116 (1888).
- annulata* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 168 (1896) (*Aripana*).
- glaucias** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 459 (1894) (*Aripana*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 620 (1898) (*Entephria*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stettin, 62, p. 332 (1901) (*Aripana*). Pulo Laut, Sumatra, Holl. Neu-Guinea
- lactiferalis** Walker vide sub a) Paläarktische Region.
- macrotis** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 87 (♂) (1897) (*Aripana*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 620 (1898) (*Entephria*). Talaut
- aeriferalis** Moore, vide sub a) Paläarktische Region.
- albalis** Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint. (s. 3) 3, mem. 7, p. 337 (1925). Key Ins.
- radiata** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 169 (1896) (*Aripana*). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 12, p. 706 (1899) (*Entephria*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 620 (1898) (*Entephria*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 448 (1901) (*Entephria*). West-, Mittel- u. Südchina, Indien (Assam)
- subsp. *benesignata* Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint. (s. 3) 3, mem. 7, p. 337 (1925). Südchina
- marginalis** Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 635 (1890) (*Conchylodes*?) (Sikkim). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 259 (♀) (1896) (*Pycnarmon*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 620 (1898) (*Entephria*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 333 (1901). — Gaede, Ent. Zeit. Stettin, 77, p. 132 (1916). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 177, t. 7, f. 10 (1928). Indien (Assam, Sikkim), Malakka, Formosa; Sierra Leone, Kamerun
- dichocrocialis* Strand, Deutsche Ent. Zeits. Iris, 32, p. 35 (1918) (*Aripana*?) (Formosa). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 27 (1928).
- idalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 485 (♀) (1859) (*Zebronia*) (Sarawak). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 620 (1898) (*Entephria*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Mus. Oxford, 2, p. 454, t. 7, f. 16 (1900) (*Aripana*). Borneo, Amboina, Neu-Guinea
- nebulosalis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 260 (♀) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 620 (1898) (*Entephria*). Ceylon

- argenticincta** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 620 (♀) 1898 (*Entephria*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 334 (1901). S. Celebes, Neu-Guinea, Fergusson Ins., St. Aignan
- pantherata** Butler, vide sub a) Paläarktische Region.
- geminipuncta** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 169 (♂) (1912). Westchina
- praeruptalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 428, t. 16, f. 8 (1863). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 621 (1898) (*Entephria*). Amboina, Mysol, Fergusson Ins.

Specios incertae sedis.

- sarumaiis** Holland, Novit. Zool., 7, p. 585 (♂) (1900) (*Entephria*). Buru
- tabidialis** Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 86, t. 4, f. 12, 13 (♂) (1899) (*Entephria*). Java, Borneo

e) Aethiopische und Madagassische Region.

- subpictalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 167 (1912) (*Entephria*). Sierra Leone
- dialithalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8), 20, p. 374 (♀) (1917). Goldküste
- diaphana** Cramer, Pap. Exot., 2, p. 26, t. 113, f. G (1782) (*Pyrallis*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 619 (1898) (*Entephria*). — Janse, Check-List S. Afr. Lep. Het., p. 157 (1917) (*Entephria*). Sierra Leone, Kamerun, Span. Guinea Congo, Zambesi, Rhodesia, S. Afrika
- cribrata** Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.
- marginalis** Snellen, vido sub b) Orientalische Region.
- sempunctalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 168 (1912) (*Entephria*). Sierra Leone, S. Nigeria
- Biologie: Lamborn, Bull. Ent. Res., 5 (3), p. 197—214 (1914).
- diffusalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 20, p. 376 (♂) (1911). Brit. Zentr.-Afrika

Spoeies incertae sedis.

- empaiaeta** Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 104 (♂) (*Conogethes*). Belg. Congo (Lulua)
- ledereralis** Strand, Arch. f. Naturg., 85 A, H. 12, p. 136 (1920). Sierra Leone
- besusalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 100, t. 12, f. 15 (♀) (1863) (*Filodes?*), nec Walk. (1859).
- leucodoce** Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 9 (♂) (1936). Belg. Congo (Eala Manghay)
- nigrianalis** Gaede, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 8, p. 391 (♂) (1917) (*Entephria*). Kamerun (Kokumi)

- phalaromima** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 401 Belg. Congo
(♂) (1933) (*Entephria*). (Luelio)
- pseudohesusalis** Strand, Arch. f. Naturg., 85 A, Nyassaland
II. 12, p. 135 (♀) (1920).
- septemnotata** Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr., 68 (1899), Madagascar
p. 743 (1900) (*Entephria*).
- stramlnealis** Gaede, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 8, p. D. Ostafrika
392 (1917) (*Entephria*). (Daressa-
laam),
Br. Ostafrika
(Kibwezi)

d) Australische Region

- jaguaralis** Guenée, vide sub b) Orientalische Region.
cribrata Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.
meritalis Walker, vide sub b) Orientalische Region.
glaucias Meyrick, vide sub b) Orientalische Region.
lactiferalis Walker, vide sub a) Paläarktische Region.
idalis Walker, vide sub b) Orientalische Region.
argenticincta Hampson, vide sub b) Orientalische
Region.
crocallis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 621 Fergusson
(1898) (*Entephria*). Ins.,
Neu-Guinea
- praeruptalis** Lederer, vide sub b) Orientalische
Region.

Species incertae sedis.

- fulvomarginalis** Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. Bismarck-
29, p. 181 (1900) (*Entephria*). Archipel
- grisealis** Kenrick, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 550, Holl.
t. 68, f. 12 (1912) (*Entephria*). Neu-Guinea
- mioswari** Kenrick, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 550, Holl.
t. 68, f. 20 (1912) (*Entephria*). Neu-Guinea

e) Neotropische Region.

- receptalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. Brasilien
473 (♀) (1859) (*Zebronia*) (Pará, Villa
Nova). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 619 (1898) (*Entephria*).
- deicoonalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., Brasilien
19, p. 966 (♀) (1859) (*Zebronia*).
deicoonalis Hampson, Proc. Zool. Soc., p.
619 (1898) (*Entephria*).
- peruvialis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Peru
20, p. 375 (1917).
- meritalis** Walker, vide sub b) Orientalische Region.
- levinia** Cramer, Pap. Exot., 4, p. 131, t. 357, f. K. Mexiko,
(1782) (*Phalaena Pyralis*). — Druce, Biol. Panama,
Centr.-Amer. Het., 2, p. 252 (1895). — Ecuador,
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 620, n. Fr. u. Holl.
17 (1898) (*Entephria*). Guayana,
bunusalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Brasilien
Mus., 19, p. 967 (1859) (Rio Janeiro). (Amazonas,
Rio de
Janeiro)

- divaricata** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 621 Brasilien
(1898) (*Entephria*). (S. Paulo)
- syleptalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 621 Ecuador
(1898) (*Entephria*). (Loja)
- staminalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8), Guatemala
9, p. 169 (♂) (1912) (*Entephria*).
cylonalis Druce, Biol. Centr.-Amer., Het.,
2, p. 258 (1895), part. (*Epichronistis*).

Species incertae sedis.

- breiralis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 178 Mexiko
(♂) (1920). (Venadio,
Sinaloa)
- callidalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7), 7, Bahama Ins.
p. 259 (♀) (1901) (*Entephria*).
- juanalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 10), 12, Brasilien
p. 492 (♀) (1933). (S. Paulo)
- leucinodialis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Costarica
9, p. 290 (♂) (1912). (Poas)
52

20. Genus **Pimelephila** Tams.

Tams, Bull. Ent. Res., 21, p. 75 (1930).

(Typus generis: *ghesquierei* Tams).

- ghesquierei** Tams, Bull. Ent. Res., 21, p. 75, t. 4 Belg. Congo
(1930). (Sankuru,
Komi)
Biologie: Ghesquière, Bull. Ann. Soc. Ent.
Belg., 71, p. 131—138 (1931). — Mayné,
Arch. Zool., 16 (3/4), p. 1097—1101 (Torino)
(1932).
- albivittalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 9, Natal
p. 140 (1912) (*Entephria*). — Tams, Bull. (Durban)
Ent. Res., 21, p. 76 (1930) (*Pimelephila*).

2

21. Genus **Asphadasfis** Meyrick

Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 499 (1934).

- cryphomycha** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 500 Java
(♂) (1934). (Telawa)

1

22. Genus **Platygraphis** Dyar

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 54, p. 367 (1918).

- isabella** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 54, p. 367 Mexiko
(1918).

1

23. Genus **Ravanoa** Moore

Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 284, 1885). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 260 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 594, 621 (1898).

(Typus generis: *xiphialis* Walk.).

- xiphialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 483 (♀) (1859) (*Zebronia*) (Sarawak). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 260, f. 156 (♂) (1896) (*Ravanoa*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 622, f. 19 (♂) (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 328 (1901). Ceylon, Birma, Tonkin, Malakka, Sumatra, Java, Borneo, Mysol
- bilineolalis** Walker, 34, p. 1350 (♀) (1865) (*Zebronia*) (Mysol). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 284, t. 180, f. 9 (1885) (*Ravanoa*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 274 (1890) (*bilinealis* err. typ.). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Lep. Het. Brit. Mus., 9, p. 51 (1893) (*Dolichosticha*).
- calligraphalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 35, p. 175, t. 10, f. 13 (1892) (*Pterygisus*) (Java). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 704 (1898) (*Nacoleia*).

1

24. Genus **Rehimena** Walker

Walker, Cat. Het. Brit. Mus., 34, p. 1492 (1865). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 289 (1885). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 261 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 594, 622 (1898). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 170, 178 (1928).

Cyclarcha Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6), 14, p. 203 (1894) (Typus: *driolalis* Snell.).

(Typus generis: *phrynealis* Walk.).

- phrynealis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 630 (♂) (1859) (*Botys*) (Patria?). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 290, t. 181, f. 5 (1885) (*Rehimena*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 276 (1890). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 36 (1891); 9, p. 49 (1893). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 459 (1894). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 261 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 622 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 231 (1901). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 21, p. 1263 (1912) (larva). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 178 (1928). West-n. Mittelchina, Indien (Bombay), Ceylon, Birma, Tonkin, Formosa, Philippinen, Sumatra, Java, Borneo, Bismarck-Archipel, Brit. Neu-Guinea, Tasmanien
- haliusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 695 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak).

- dichromalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1492 (♀) (1865) (*Rehimena*) (S. Hindustan). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 872 (1885).
- infundibulalis* Snellen in Veth, Midden-Sumatra, 4, Lep., p. 64, t. 5, f. 5 (non 5a, b) (1880) (Botys).
- striolalis** Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 604 (♀) (1890) (Filodes?) (Sikkim). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 261, f. 157 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 623, f. 20 (♂) (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 230 (1901). Sikkim, Assam (Khasis), Tonkin, Sumatra
- atristrigalis* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 204 (1894) (*Cyclarcha*) (Khasia Hills).
- stictalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 576, t. E, f. 25, (1908). Ceylon
- unimaculalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 170 (♂) (1912). Singapore
- pallidicostalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 6) 17, p. 138 (1896) (*Cyclarcha*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 261 (1896) (= *striolalis* Snell.); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 623 (1898) (= *striolalis* Snell.). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 231 (1901). Sikkim, Sumatra
- flavinervis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 204 (♂) (1894) (*Cyclarcha*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 261 (1896) (= *striolalis* Snell.); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 623 (1898) (= *striolalis* Snell.). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 231 (1901). Sikkim (Typus: Cherra Punji), Sumatra

Species incertae sedis.

- cissophora** Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral., 32, p. 88 (♂) (1908) (*Entephria*) (Queensland). Queensland, Holl. Neu-Guinea, Neu-Hebriden, Salomon Ins., Samoa Ins.
- divisa** Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (s. 2) 8, p. 160 (♂, ♀) (1893). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 623 (1898). Queensland (Geraldton)
- hypostictalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 577, t. E, f. 14 (1908). Ceylon
- monomma** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 173 (1896) (*Cyclarcha*). — Hampson, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 187 (1907) (*Luma*); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 12, p. 704 (♂) (1899) (*Luma*). — De Joannis, Ann. Soc. Ent. Fr., 98 (1928), p. 638 (1930) (*Rehimena*). Assam, Tonkin
- reductalis** Caradja, Bull. Acad. Roum., 15, p. 149 (♀) (1932). Südechina (Shanghai)

straminealis South, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 449, Mittelchina t. 14, f. 21 (♂) (1901).

villalis Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, Andamanen p. 287 (1906). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 577 (1908).

13

25. Genus **Haplochyfis** Meyrick

Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 395 (1933).

crocochaica Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 395 Belg. Congo
(♀) (1933). (Katanga,
1 Lakando)

26. Genus **Glyphidomarpfis** Meyrick

Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 9 (1936).

(Typus generis: *cyphoplaca* Meyr.).

cyphoplaca Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 397 Belg. Congo
(♂) (1933) (*Rhymphaleodes*); 5, p. 10 (1936) (Coquil-
(*Glyphidomarpfis*). hatville à
Lisala,
Yamburga)

pyrochlaena Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 10 (♀) Belg. Congo
(1936). (Lulua)

pelonephes Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 102 (♀) Belg. Congo
(1937). (Bokoro)

3

27. Genus **Hymenia** Hübner

Hübner, Verz. bek. Schmett., p. 360 [1825] (sine fixatione typi generis). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 395 (1859). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 293 (1885). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 441 (1890). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 262 (1896) (part); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 594, 623 (1898) (ex synonym.). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Mus. Oxford, 2, p. 455 (1900). — Meyrick, Trans. Proc. N. Zeal. Inst., 45, p. 39 (1913). — Forbes, Lep. N. York, p. 544, f. 326 (1923). — Hudson, Butt. Moths N. Zeal., p. 179 (1928). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 170, 178 (1928); ibid., 25, p. 156, 161 (1929). — Hemming, Hübner, 2, p. 209 (1937).

Zinckenia Zeller, Kgl. Vet. Handl., Lep. Micropt. Caffr., p. 55 (1852) (Typus: *perspectalis* Hübn.). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 436 (1863). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 308 (1884). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 262 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 623 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. 188 (1900).

Spoladea Guenée, Delt & Pyral., p. 224 (1854) (Typus: *recurvalis* Fabr.).

(Typus generis: *perspectalis* Hübn.).

a) Paläarktische Region.

- recurvalis** Fabricius, Syst. Ent., p. 407 (1775) (*Phalaena*); Spec. Ins., 2, p. 274 (1781) (*Phalaena*); Ent. Syst., 3 (2), p. 237 (1794) (*Phalaena*); Mant. Ins., 2, p. 22 (1787) (*Phalaena*). — Zeller, Kgl. Vet. Handl., Lep. Micropt. Caffr., p. 55 (1852) (*Zinckenia*). — Guenée, Delt. & Pyral., p. 225, t. 8, f. 5 (1854) (*Spoladea*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 396 (1859) (*Hymenia*). — Lederer, Wien. Ent. Monatsschr., 7, p. 437 (1863) (*Zinckenia*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1321 (1865) (*Zinckenia*). — Wallace & Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 364 (1866). — Snellen, Tijds. v. Ent., 15, p. 95 (1872) (*Zinckenia*); in Veth, Midden-Sumatra, 4, Lep., p. 75 (1880). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 37, p. 133 (1884). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 308 (1884) (*Zinckenia*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 293 (1885) (*Hymenia*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 217 (1886) (*Zinckenia*). — Moore, Journ. Linn. Soc. Zool., 21, p. 59 (1886). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 217 (1888) (*Zinckenia*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. 279 (1888). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 629 (1890) (*Zinckenia*). — Aurivillius, Ent. Tidskr., p. 169 (1897). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 455 (1900). — Snellen, Tijds. v. Ent., 43, p. 259 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 324 (1901). — Holland, Moth Book, p. 392, t. 47, f. 28 (1903). — Marumo, Journ. Col. Agr. Tokyo Imp. Univ., 8, p. 189 (1923). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 179, t. 7, f. 12 (1928).
- fascialis** Cramer, Uitl. Kapellen, 4, p. 236, t. 398, f. O. (1782) (*Phalaena Pyralis*); 5, p. 163, t. 36, f. 13 (textfig. 12 err.) (1790) (*Pyralis*). — Butler, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 683 (1880). — Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 5) 11, p. 117 (1883). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 524 (1884); p. 457 (1886). — Butler, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 384 (1886). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 262, f. 158 (♂) (1896) (*Zinckenia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 623, f. 21 (♂) (1898) (*Zinckenia*). — Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. 188 (1900) (*Zinckenia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 449 (1901) (*Zinckenia*). — Shiraki, Bull. Agr. Exp. Stat. Gov. Gen. Formosa, 8, p. 365 (1913). — Barnes & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4920 (1917). — Matsumura, Inj. Ins. Jap., p. 496, t. 16, f. 2 (1920); Journ. Col.
- In allen trop. u. subtrop. Regionen verbreitet: Andalusien, Canaren, Aegypten, Syrien, Mesopotamien, pal. Asien bis Ussuri, Japan; West-, Mittel- u. Südchina, Korea, Formosa, Indien, Ceylon, Tonkin, Sumatra, Java, Bornco, Philippinen, Chagos Ins., Coetivy Ins., Seychellen, Amiranten, Burn, Cocos Keeling, Christmas Ins., Mirikoi, Malediven; S. Sahara, Sierra Leone, Congo, Kamerun, Port. u. D. Ostafrika, Südafrika, Südarabien, Sokotra, Madagaskar, Komoren; Hawaii Neu-Guinea, Bismarck-Archipel, Salomon Ins., Neu-Hebriden, Kermadec, Mysol, Fidji, Samoa, Laysan Ins.,

- Agr. Hokkaido Imp. Univ., 15, p. 188 (1923).
 — Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 37 (1918). — Forbes, Lep. N. York, p. 545 (1923). — Hudson, Bull. Moths N. Zeal., p. 179, t. 20, f. 41 (1928).
angustalis Fabricius, Mant. Ins., p. 222 (1787) (*Phalaena*).
recurvella Zincken, Germ. Mag., 3, p. 143 (1818) (*Phycis*).
diffascialis Hübner, Verz. bek. Schm., p. 361 [1825] (*Hymenia*).
albifascialis Boisduval, Faun. Ent. Madagascar, Lep., p. 119, t. 16, f. 1 (1833) (*Hydrocampa*).
formosana Shiraki, Bull. Agr. Exp. Stat. Formosa, 1, p. 146, t. 35, f. 5 (1910) (*Odegia hecate* Butl. var.).
 Biologie: Marsh, Bull. U. S. Dept. Agric. Bur. Ent., nr. 109, pt. 1, p. 1—15, f. 1, 2 (1911) (*fascialis*). — Meyrick, Trans. Proc. N. Zeal. Inst., 45, p. 39 (1912) (Chun) (larva) (*fascialis*). — Chittenden, Bull. U. S. Dept. Agric. Bur. Ent., nr. 127, pt. 1, p. 9, t. 4, f. 2 (1913) (*fascialis*). — Poos, Bull. Virginia Truck Expt. Stat., nr. 56, p. 491—497 (1926) (*fascialis*). — Eguchi, Agric. Exp. Stat. Korea (Suigen), Spec. Rept. nr. 2, p. 1—23 (1926) (*fascialis*).
 Parasiten: Swezey, Hawaiian Ent. Soc. (Honolulu), 3 (2), p. 99—109 (1915); 6 (2), p. 296 (1926); Journ. Econ. Ent., 19 (5), p. 714—720 (1926) (*fascialis*). — Poos, Bull. Virginia Truck Exp. Stat. nr. 56, p. 491—497 (1926) (*fascialis*). — Eguchi, Agric. Exp. Stat. Korea (Suigen), Spec. Rep. nr. 2, p. 1—23 (1926) (*fascialis*).
noxia: Duport, Bull. Econ. Indochine (Hanoi-Haiphong) n. ser., nr. 99 (1912), nr. 102, 105 (1913) (*fascialis*). — Zacher, Arbeit. K. Biol. Anst. Land- u. Forstwirtschaft. (Berlin), 9, p. 121—230 (1913) (*fascialis*). — Fullaway, Rept. Hawaii. Agric. Exp. Stat., f. 1914 (Washington), p. 43—50 (1915) (*fascialis*). — Cockerell, Canad. Entomologist, 48 (3), p. 76—79 (1916) (*fascialis*). — Watson, Univ. Florida Agric. Exp. Stat. (Gainesville) Bull. nr. 134, p. 35—127 (1917) (*fascialis*). — Aoyama, Tokubetsu Hokoku, Korea, Heian-Nando Seedling Plantation Stat. nr. 1, 31pp. (1920) (*fascialis*). — Ogilvie, Agric. Bull. Bermuda Dept. Agric., 2, nr. 12 (1923); 3, nr. 1—3 (1924) (*fascialis*). — Perry, Rep. Virginia Isl. Agric. Exp. Stat. f. 1923, p. 13 (1924) (*fascialis*). — Ogilvie, Bermuda Reps. Board & Dep. Agric. f. 1923, p. 28—34 (1924); f. 1924, p. 26—43 (1925) (*fascialis*); f. 1925, p. 36—63 (1926) (*fascialis*). — Simmonds, Fiji Dep. Agric. Ann. Rep. (Suva) f. 1923, p. 8 (1924) (*fascialis*). — Kuwayama, Kuribayashi & Oshima, Hokkaido Agric. Exp. Norfolk Ins., N.S. Wales, Neu-Seeland U.S.A. (N. York, Pennsylvanien), Bermuda Ins.: Honduras, Jamaika, Haiti, St. Domingo, Virginische Ins., Bahama Ins., Venezuela, Chile

Stat. Bull. nr. 36, p. 1—138 (1925) (*fascialis*). — Hutson, Ceylon Adm. Reps. f. 1925, p. D15—D17 (1926) (*fascialis*). — Eguchi, Agric. Exp.-Stat. Korea (Suigen), Spec. Rep. nr. 2, p. 1—23 (1926) (*fascialis*). — Nakayama, Ann. Agric. Exp. Stat. Chosen (Suigen), 4 (3), p. 261—300 (1929) (*fascialis*). — Illingworth, Proc. Hawaii. Ent. Soc., 12 (2), p. 248—254 (1929). — Simmonds, Ann. Bull. Div. Reps. Dep. Agric. Fiji (Suva) f. 1931, p. 9—12 (1932) (*fascialis*). — Russell, Rep. Dep. Agric. Bermuda f. 1933, p. 28—36 (1934) (*fascialis*).

b) Orientalische Region.

- perspectalis** Hübner, Samml. Eur. Schm. Pyral., p. 18, t. 16, f. 101 (1796) (*Pyralis*); Verz. bek. Schm., p. 361, n. 3452 [1826] (*Hymenia*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 395 (1859). — Guenée, Delt. & Pyral., p. 226 (1854) (*Spoladea*). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 437 (1863) (*Zinckenia*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 309 (1884) (*Zinckenia*). — Snellen, Tijds. v. Ent., 27, p. 43 (1884) (*Zinckenia*). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 256 (1895). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 262 (1896) (*Zinckenia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 623 (1898) (*Zinckenia*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 435 (1900) (*Hymenia*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 324 (1901) (*Zinckenia*). — Barnes & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4919 (1917). — Forbes, Lep. N. York, p. 544 (1923). — Shihuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 179 (1928).
- primordialis** Zeller, Kgl. Vet. Handl., Lep. Micropt. Caffr., p. 56 (1852) (*Zinckenia*) (Caffraria). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1321 (1865) (*Zinckenia*).
- animalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 226 (♀) (1854) (*Spoladea*) (Pernamhuco).
- exportalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 227 (♀) (1854) (*Spoladea*) (Neu Holland). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 317 (♀) (1859) (*Hymenia*) (Australien).
- rinthonalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 932 (♀) (1859) (*Desmia*) (Sarawak).
- phrasiusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 944 (♀) (1859) (*Hymenia*) (Rio Janeiro).
- Biologie:** Chittenden, U. S. Dep. Agr. Bur. Ent. Bull., nr. 127, pt. 1, p. 1—3, f. 1—3, t. 4 (1913).
- noxa:** Davis, Illinois Ent. Rep., 27, p. 103 (1912). — Chittenden, U. S. Dep. Agr. Bur. Ent. Bull., nr. 127, pt. 1, p. 1—11 (1913). —

N. Indien,
Ceylon,
Birma,
Tonkin,
Malakka,
Formosa,
Sumatra,
Java,
Borneo,
Celebes,
Buru, Philippinen,
Südafrika,
Queensland,
Tahiti,
U.S.A.
(N. York bis Illinois, Texas),
Mexiko,
Guatemala,
Honduras,
Costarica,
Panama,
Kolumbien,
Venezuela,
Ecuador,
Brasilien
(Amazonas, Rio de Janeiro),
Bahama Ins.,
Haiti,
Dominica,
Jamaika,
Trinidad

Watson, Univ. Florida Agric. Exp.-Stat.
(Gainesville) Bull., nr. 134, p. 35—127 (1917).
— Holland, Journ. Econ. Ent., 10 (4), p.
446 (1917).

recurvalis Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.

nigerrimalis Hampson in Andrews, Monogr. Christmas
Is., p. 73, t. 9, f. 10 (1900). Christmas
Is.

c) Aethiopische und Madagassische Region.

perspectalis Hübner, vide sub b) Orientalische Region.

recurvalis Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.

alimucalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, Westafrika
p. 397 (♀) (1858) (*Hymenia*) (Sierra Leone). (Sierra
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 623 Lone)
(1898) (*Zinckenia*).

avuncularis Saalmüller, Ber. Senckenb. Ges., p. 300 Madagaskar
(♂) (1879—80) (*Spoladea*). — Hampson,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 624 (1898).

spilotalis Saalmüller, Ber. Senckenb. Ges., p. 299 Madagaskar
(1879—80) (*Spoladea*). — Hampson, Proc.
Zool. Soc. Lond., p. 624 (1898).

d) Australische Region.

perspectalis Hübner, vide sub b) Orientalische Region.

recurvalis Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.

e) Hawaiische Region.

recurvalis Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.

exodias Meyrick, Ent. Mon. Mag., 40, p. 130 (1904). Hawai

f) Nearktische Region.

perspectalis Hübner, vide sub b) Orientalische Region.

recurvalis Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.

g) Neotropische Region.

perspectalis Hübner, vide sub b) Orientalische Region.

recurvalis Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.

6

28. Genus **Lumenia** De Joannis

De Joannis, Ann. Soc. Ent. Fr., 98 (1929), p. 659 (1930).

colocasiac De Joannis, Ann. Soc. Ent. Fr., 98 Tonkin
(1929), p. 660, t. 4, f. 1 (♂) (1930).

1

29. Genus **Tabidia** Snellen

Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 219 (1880). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 263 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 594, 624 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. 190 (1900).

(Typus generis: *insanalis* Snell.).

- insanalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 220 (1880). *(Tabidia)* (Celebes); 26, p. 136, t. 8, f. 6, 6a (1883). — Meyrick, Trans. Ent. Soc., p. 467 (1894). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 263, nota (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 624 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. 190 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 322 (1901).
Sumatra, Nias, Java, Borneo, Pulo Laut, Celebes, Herzog v. York, Shortland Ins., Buru, Holl. Neu-Guinea
- stenioides* Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 5) 10, p. 235, 1882 (*Hydrocampa*) (Herzog v. York-Ins.).
- felix* Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 5) 20, p. 18 (1887) (*Hydrocampa*) (Shortland Ins.).
- craterodes** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 467 (1894). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 624 (1898). — Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 61 (1899). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 323 (1901).
Pulo Laut, Celebes, Sumatra
- flexulalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 62 (1899). — Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. 190 (1900).
Neu-Guinea, Bismarck-Archipel (Neu-Pommern)
- aculealis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1427 (♀) (1865) (*Botys*) (Sula). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 263, f. 159 (♂) (1896) (*Tabidia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 624, f. 22 (♂) (1898). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Mus. Oxford Mus., 2, p. 456, t. 7, f. 26 (1900).
Ceylon, Pulo Laut, Sula, Celebes, Java
- trisinata* Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 306 (1885) (*Isopteryx*).
Biologie: Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 500 (1934).
- noxa**: Hutson, Ceylon Dep. Agric. Admin. Reps. (Peradeniya) f. 1920, p. C5—C10 (1920). — Hutson, Techn. Rept. f. 1928, Dept. Agric. Ceylon (Colombo) (1929). — Franssen, Korte Meded. Inst. Planten-Ziekten, nr. 20, 21pp. (Buitenzorg) (1934).
- Parasiten**: Wilkinson, Bull. Ent. Res., 21 (2), p. 147—158 (1930).
- fuscifusalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, p. 376 (♂) (1917).
Ceylon
- candidalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 6) 18, p. 169 (♀) (1896) (*Aripana*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 624 (1898); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 12, p. 706 (1899).
Assam (Khasis), Südchina

- truncatalls** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 624; p. 761, t. 49, f. 5 (♂) (1898). Amboina, Fergusson Ins., Neu-Guinea, Queensland
- naecolelalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 171 (♂) (1912). Penang
- strigiferalls** Hampson, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 586, t. 3, f. 30 (1900). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 337 (1925). Amur, Ussuri, Tjutjuje, West-u. Südchina

30. Genus **Eurrhyarodes** Snellen

Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 215 (1880). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 294 (1885). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 263 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 595, 625 (1898). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 170, 181 (1928); ibid., 25, p. 156, 162 (1929).

Molybdantha Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 309 (1884) (Typus: *bracteolalis* Zell.).

(Typus generis: *bracteolalis* Zell.)

a) Paläarktische, Orientalische, Aethiopische und Australische Region.

- plumbelmarginalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 625 (♂) (1898). — Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 12, p. 706 (1899). Assam (Khasis)
- bracteolalis** Zeller, Kgl. Vet. Akad. Handl., Lep. Micropt. Caffr., p. 30 (1852) (*Botys*). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 419 (1863) (*Diasemia*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1325 (1865) (*Diasemia*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 309 (1884) (*Molybdantha*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 295 (1885) (part.) (*Eurrhyarodes*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Lep. Het. Brit. Mus., 8, p. 39 (1891); 9, p. 50 (1893); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 264, f. 160 (♀) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 626, f. 23 (1898). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 456 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 321 (1901). — Leech, Trans. Ent. Soc., p. 449 (1901). — Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 37 (1918). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint. (s. 3) 3, mem. 7, p. 337 (1925). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 180 (1928). West-, Mittel- u. Südchina, Japan, Formosa, Indieu, Ceylon, Birma, Malakka, Tonkin, Sumatra, Sangir, Java, Borneo, Celebes, Sula, Philippinen, Buru; Kamerun, Port. u. D. Ostafrika, Kaffernland, Madagaskar; Australien, Neu-Hebriden, Louisiaden (St. Aignan)
- plumbalis** Guenée, Delt. & Pyral. p. 231 (1854) (*Isopteryx*) (Patria?). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 406 (1859) (*Isopteryx*).
- accessalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 405 (1859) (*Isopteryx*) (China).

- Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 294, t. 179, f. 6 (1885) (*Eurrhyparodes*). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 633 (1889).
- stibialis* Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 134, t. 8, f. 3, 3a, b (1883) (*Eurrhyparodes*).
- tricoloris* Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 37 (1918), nœ Zeller (1852).
- var. *mambarelis* Strand, Arch. f. Naturg., 85, A 12, p. 136 (1920). Brit. Neu-Guinea
- tricoloralis** Zeller, Kgl. Vet. Akad. Handl. Lep. Micropt. Caffr. p. 31 (1852) (*Botys*) (Natal). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 419 (1863) (*Diasemia*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1325 (1865) (*Diasemia*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc., p. 283 (1890). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 39 (1891); 9, p. 50 (1893); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 264 (1896) (*Molybdantha*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 86 (1897) (*Molybdantha*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 626 (1898). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 456 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stettin, 62, p. 321 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 181 (1928).
- abnegatalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 404 (1859) (*Isopteryx?*) (Ceylon, Moreton Bai). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 376, t. 11, f. 17 (1863) (*Botys*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 295, t. 179, f. 7 (1885) (*Eurrhyparodes*).
- confusalis* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 218 (♂) (1896) (*Eurrhyparodes*).
- nymphulalis** Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 39 (1918). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 180 (1928). Formosa
- contortalis** Hampson, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 387, t. 3, f. 11 (1900) (*Pilocrocis*). — Staudinger & Rebel, Cat. Lep. Pal. Faun., 2, p. 54, nr. 988 (1901) (*Pilocrocis*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 27, 182, t. 8, f. 22 (1928) (*Eurrhyparodes*). Amur, Ussuri, Südchina, Formosa
- leechi** South, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 450, t. 15, f. 15 (1901). West-, Mittel- u. Südchina

b) Neotropische Region.

- calis** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 9, p. 329 (♂) (1902). Kolumbien
- diffRACTA** Meyrick, Arb. morph. taxon. Ent. Berlin-Dahlem, 3 (2), p. 98 (♀) (1936). Peru (Cuzco)

- lygdamis** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 9, p. 329 (♂) (1902). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 261 (1914) (*lygdemus* err. typ.). — Barnes & McDunnough, Contr. Nat. Hist. Lep. N. Amer., 2 (6), p. 222 (1914); id., Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4930 (1917). Texas, Mexiko, Panama, Brasilien (Amazonas)
- sculdus** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 261 (1914). Panama
- splendens** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 271, t. 63, f. 10 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 626 (1898). Mexiko, Guatemala, Panama
- syllrepidia** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 626, t. 49, f. 6 (♀) (1898). Mexiko (Gudalajara)
- voralis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 179 (♂) (1920). Brasilien (S. Paulo)

13

31. Genus **Heterocnephes** Lederer

Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 402 (1863). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 265 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 596, 627 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. 191 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 279 (1901).

Charitoprepes Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 136 (1896) (Typus: *lubricosa* Warr.).

(Typus generis: *scapularis* Led.).

- scapularis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 402, t. 14, f. 5 (1863) (*Heterocnephes*); (Amboina). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1371 (1865). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. 109 (1888). — Moyrick, Trans. Ent. Soc., p. 511 (1889) (*Glyphodes*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 456 (1894) (*Margaronia*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 627 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. 192, t. 1, f. 10 (1900). Sumatra, Ceram, Amboina, Key Ins., Salomon, Goodenough Ins., Bismarck-Archipel, Br. u. Holl. Neu-Guinea
- aegialis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, p. 165 (♂) (1917). Trobriand Ins. (Typus: Kiriwiri), Holl. Neu-Guinea
- lymphatalis** Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 420, t. 44, f. 7 (1889) (*Nosophora*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 265, f. 161 (♂) (1895); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 627, f. 24 (♂) (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 280 (1901) (= *scapularis* Led.). N.O. Indien, Birma, Malakka, Tonkin, Borneo, Java, Pulo Laut

- lubricosa** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, Indien
p. 136 (1896) (*Charitoprepes*). — Hamp- Assam,
son, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 265 Sikkim,
(♀) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 627 Bengalen),
(1898). — Leech, Trans. Soc. Lond., p. Süd- u.
451 (1901). Mittelchina
- reniferalis** Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 616 Sikkim,
(1890); Tijds. v. Ent., 42, p. 74 (1899). Sumatra
- rotundalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 43, p. 274, t. 15, Borneo
f. 8 (1901).

Species incertae sedis.

- atropygialis** Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Aru Ins.
Naturk., 39, p. 172 (1886). — Hampson, Proc.
Zool. Soc. Lond., p. 627 (1898).
- lunulalis** Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Na- Aru Ins.
turk., 39, p. 172 (1886).
- lunulatis* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 627 (1898).

8

32. Genus **Agrotera** Schrank

Schrank, Fauna Boica, 2 (2), p. 163 (1802). — Guenée, Delt. & Pyral., p. 217 (1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 386 (1859). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 439 (1863). — Heinemann, Kleinschm., 1, H. 2, p. 101 (1865). — Berce, Faune Ent. Fr. Léop., 6, p. 96 (1878). — Snellen, Vlinders Nederl., 2 (1), p. 22, 72 (1882). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 288 (1885). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 224 (1887); ibid., p. 442 (1890). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 266 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 596, 627 (1898). — Rebel in Spuler, Schm. Eur., p. 225 (1906). — Meyrick, Revis. Handb. Brit. Lep., p. 422 (1928). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 170, 182 (1928); ibid., 25, p. 157, 162 (1929). — M. Hering, Tierwelt Mitteleur. (Ergbd. 1), p. 288, f. 507 (1932). — Eckstein, Kleinschm. Deutschl., 5, p. 64 (1933). — Pierce & Metcalfe, Genit. Brit. Pyral., p. 24 (1933). — Hübner, Verz. bek. Schmett., p. 348 [1825] (part.).

- Nistra* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 488 (1859)
(Typus: *coelatalis* Walk.). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 295
(1885). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 320 (1901).
- Tetracona* Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 307 (1884)
(Typus: *amathealis* Walk.).
- Sagariphora* Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 460
(1894) (Typus: *magnificalis* Hampson).
- Leucinodella* Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32,
p. 62 (1918) (Typus: *agroterodes* Strd.).

(Typus generis: *nemoralis* Scop.)

a) Paläarktische Region.

- effertalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. Japan,
348 (♀) (1859) (*Aediodes*) (Ceylon). — Lep. Assam,
derer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 439 Ceylon,
(1863) (*Agrotera*). — Moore, Lep. Ceylon, Birma,

3, p. 288 (1885). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 224 (♀) (1887). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. 280 (1888). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 173, t. 174, f. 19 (1893). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 6, 461 (1894). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 266 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 628 (1898). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 457 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 319 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 163 (1929).

nemoralis Scopoli, Ent. Carn., p. 242 (1763) (*Phalaena*). — [Schiffermüller & Denis], Syst. Verz. Schm. Wien., p. 123 (1775) (*Pyralis*). — Hübner, Beitr. Gesch. Schm., 4, p. 18, t. 3, f. O (1786); Samml. Eur. Schm., 6, Horde, p. 17, t. 15, f. 100 (1796) (*Pyralis*). — Schrank, Fauna Boica, 2 (2), p. 64, 163 (1802) (*Agrotera*). — Treitschke, Schm. Eur., 7, p. 156 (1829) (*Asopia*). — Duponchel, Hist. Nat. Lep., 8 (2), p. 203, t. 223, f. 9 (1831) (*Asopia*). — Eversmann, Fauna Lep. Volgo-Ural, p. 467 (1844) (*Asopia*). — Herrich-Schaeffer, Syst. Bearb. Schm. Eur., 4, p. 12 (1848). — Guenée, Delt. & Pyral., p. 217 (1854). — Stainton, Mem. Brit. Butt. Moths, 2, p. 141 (1859). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 387 (1859). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 439 (1863). — Heinemann, Kleinschm., 1, H. 2, p. 101 (1865). — Berce, Faune Ent. Fr. Léop., 6, p. 97, t. 3, f. 4 (1878). — Snellen, Vlinders Nederl., 2 (1), p. 72 (1882). — Meyrick, Trans. Ent. Soc., p. 442 (1890). — Handb. Brit. Lep., p. 406 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 630 (1898). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 451 (1901). — Rebel in Spuler, Schm. Eur., p. 225, t. 81, f. 16 (1906). — Meyrick, Revis. Handb. Brit. Lep., p. 422 (1928). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 183, t. 7, f. 19 (1928); 25, p. 163 (1929). — Müller-Rutz, Mitt. Schweiz. Ent. Ges., 14 (5), t. 4 (genit.) (1929). — M. Hering, Tierwelt Mitteleur. (Ergbd. 1), p. 288 (1932). — Eckstein, Schm. Deutschl., 5, p. 64, t. 1, f. 26 (1933). — Pierce & Metcalfe, Genit. Brit. Pyral., p. 24, t. 14 (genit.) (1938).

erosalis Fabricius, Ent. Syst., 3 (2), p. 236, n. 405 (1794) (*Phalaena*) (Gallia).

posticalis Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 374 (1911). — Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 40 (1918). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 27 (1928).

Biologie: Hellins, Ent. Mon. Mag., 12, p. 232 (1876). — Tungwell, Entom., 9, p. 179

Malakka,
Sumatra,
Borneo,
Celebes,
Philippinen,
Amboina,
Queensland

England,
Mitteleuropa
N. Spanien,
Italien,
Sardinien,
Kroat.
Küste,
Balkan
(excl. Griechen-
land),
Südrussland,
Kleinasien,
Amur,
Ussuri,
West-,
Nord- u.
Mittelchina,
Japan,
Korea,
Formosa

- (1876). — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths, 9, p. 54, t. 150, f. 5 (1901). — Sorhagen, Allg. Zeitschr. Ent., 6, p. 276 (1901). — Meyrick, Revis. Handb. Brit. Lep., p. 422 (1928). — Schulze, Biol. Kleinschm., p. 57, 60, 75 (1931). — Lhomme, Cat. Lép. France Belge, 2 (1), p. 114 (1935).
- olivacealis** Bremer Lep. Ost-Sib. (Mém. Acad. St. Petersburg), p. 16, t. 6, f. 2 (1864) (*Rhodaria*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 630 (1898) (*Agrotera*). Amur
- b) Orientalische Region.**
- magnificalis** Hampson, Ill. Typ. Spec. Lep. Het. Brit. Mus., 9, p. 173, t. 174, f. 17 (1893); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 267, f. 162 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 628, f. 25 (♂) (1898). Ceylon, Sumbawa
- helioclaena* Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 461 (1894) (*Sagariphora*).
- setipes** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 628 (♂) (1898). Natuna Ins. (Bungurau)
- scissalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1526 (♂) (1865) (*Aediodes*) (Java). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc., p. 278 (1890) (*Aetholix*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 630 (1890) (*Agrotera*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Lep. Het. Brit. Mus., 8, p. 39 (1891); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 267 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 628 (1898). N.O. Indien (Assam, Sikkim, Ceylon, Birma, Java, Formosa)
- ornata** Wileman & South, Entom., 50, p. 176 (♂) (1917). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 184, t. 7, f. 21 (1928). Formosa
- effertalis** Walker, vide sub a) Paläarktische Region.
- lienpingialis** Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint. (s. 3) 3, mem. 7, p. 338, t. 1, f. 36 (1925). Südchina
- basinotata** Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 137, t. 155, f. 13 (1891); 9, p. 50 (1893); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 266 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 629 (1898). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 183 (1928). Indien (Nilgiris, Kalkutta), Ceylon, Birma, Tonkin, Formosa
- effertalis* Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 868 (1885) (*Aediodes*), nec Walker (1852).
- discinotata** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 6) 14, p. 207 (♂) (1894) (Cherra Punji). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 266 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 629 (1898). — E. Heuing, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 319, 1901 (? = *effertalis* Walk.). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 183, t. 7, f. 20 (1928). Indien (Bhotan, Khasis), Südchina, Formosa
- griseola* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 139 (1896) (Khasis).

- coelatalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 488 (1859) (*Nistra*) (Ceylon). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 295, t. 182, f. 10, 1885 (*Nistra*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 50 (1893) (*Nistra*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 267 (1896) (*Agrotera*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 630 (1898). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 458 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 320 (1901).
- proximalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1434 (♂) (1865) (*Botys* ?) (Sula).
- chalybealis** Snellen, Tijds. v. Ent., 35, p. 160, t. 10, f. 5, 6, 1892 (*Botys*) (Java); 43, p. 269 (1901) (*Botys*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 706 (1898) (*Goniorhynchus*).
- leucostola** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 268 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 630 (1898). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 451 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 184, t. 7, f. 28 (1928).
- agrotodes** Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 62 (1918) (*Leucidonella*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 27 (1928).
- noxa**: Hutson, Ceylon Adm. Reps., Dep. Agric. (Colombo) f. 1924, p. D15—16 (1925).
- barcealis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 942 (♀) (1859) (*Leucinodes*) (Sarawak). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 268 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 630 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 320 (1901).
- retractalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1350 (1865) (*Zebronia* ?) (Mysol).
- indecisalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1352 (♂) (1865) (*Zebronia*) (Sula).
- opalina** Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 289, t. 179, f. 10 (1885) (*Leucinodes*) (Ceylon). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 1326 (1893) (*Leucochroma*).
- nitida** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 35, p. 1636 (1866) (*Zanclopteryx* ?) (Sula). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 593 (1900).
- Ceylon,
Malakka,
Sumatra,
Java,
Borneo,
Celebes,
Lombok,
Philippinen,
Sula,
Sumbawa,
Ceram,
Holl.
Neu-Guinea
- Sikkim,
Assam,
Tonkin,
Süd-u.
Mittelchina,
Formosa
- Ceylon,
Sumatra,
Nias, Java,
Borneo,
Lombok,
Sula,
Mysol

c) Aethiopische Region.

- fumosa** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 629 (1898).
- Westafrika
(Accra,
Aburi),
Brit.
Neu-Guinea

- rufitinctalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, p. 376 (♀) (1917). Brit. Zentr.-Afrika
- citrina** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 629 (1898). Westafrika (Acera)

d) Australische Region.

- effertalis** Walker, vide sub a) Paläarktische Region.
- mysolalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1299 (♂) (1865) (*Aediodes*) (Mysol). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 458 (1900) (*Agrotera*). Mysol, Brit. Neu-Guinea
- endoxantha** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 628, p. 761, t. 49, f. 26 (♀) (1898) (*Agrotera*) (Neu-Guinea).
- fumosa** Hampson, vide sub c) Aethiopische Region.
- ignepicta** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 629 (♀) (1898). Queensland (Cedar Bai, Cooktown)
- ignepictoides** Rothschild, Rep. B. O. U. Exped., 2, nr. 15, p. 128, t. 2, f. 41 (♂) (1915). Holl. Neu-Guinea
- amathealis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 348 (♂) (1859) (*Aediodes*) (Moreton Bai). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 307 (♂, ♀) (1884) (*Tetracona*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 630 (1898) (*Agrotera*). Queensland
- ornatalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1246 (♀) (1865) (*Pyrallis*) (Moreton Bai, Swan River).
- pietalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 139 (♀) (1896) (*Tetracona*?). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 630 (1898). — Tillyard, Ins. Austral. N. Zeal., p. 432, t. 27, f. 18 (1926). Australien (Typus: Queensland), Brit. Neu-Guinea
- pyrostrota** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 172 (♀) (1912). Holl. u. Br. Neu-Guinea

Species incertae sedis.

- glyciphanes** Turner, Proc. Roy. Soc. Queensland, 24, p. 143 (♀) (1913). N. Australien (Port Darwin)
- semipictalis** Kenrick, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 78, t. 4, f. 80 (1907). Brit. Neu-Guinea

26

33. Genus **Trigonobela** Turner

Turner, Proc. Roy. Soc. Queensland, 27, p. 38 (1915).

- nebridopepla** Turner, Proc. Roy. Soc. Queensland, 27, p. 38 (♀) (1915). N. Australien (Port Darwin)

1

34. Genus **Desmia** Westwood

Westwood in Guérin, Mag. Zool., 2, cl. 9, t. 2 1831. — Guenée, Delt. & Pyral., p. 188 (1854). — Clemens, Proc. Acad. Nat. Sci. Phil., p. 215 (1860). — Leleer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 433 (1863). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 259 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 596, 630 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stettin, 67, p. 52—108 (1906) (Revision). — Forbes, Lep. N. York, p. 545, f. 327 (1923).

Aediodes Guenée, Delt. & Pyral., p. 191 (1854).

Arna Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 8, p. 75 (1856).

(Typus generis: *funeralis* Hübn.)

a) Nearktische Region.

- funeralis** Hübn., Samml. Eur. Schm. Pyral. f. 103 (1796); id., Verz. bekannt. Schmett., p. 360 n. 3449 [1825] (*Anania*). — Comstock, Man. Ins., p. 230, f. 273 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 631, f. 26 (♂) (1898). — Holland, Moths Book, p. 392, textfig. 216, t. 47, f. 37 (♂) (1903). — Barnes & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4921 (1917). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 54 (1906). — Forbes, Lep. N. York, p. 545 (1923).
 ♀ *subdivisalis* Grote, Canad. Ent., 3, p. 126 (1871).
 Biologie: Strauss, U. S. Dept. Agric. (Washington) Farmers Bull. nr. 419, 16pp. (1916).
 noxa: Slingerland, Rural New Yorker, p. 84 (1894). — Symons, Maryland Bull. nr. 101, p. 153 (1905). — Bethune, Ontario Agr. Coll. Bull., nr. 158, p. 30 (1907). — Quaintance & Shear, U. S. Dep. Agric. Farmers Bull. nr. 284, p. 22 (1907). — Douglas, Indiana Ent. Rep., 3, p. 195 (1910). — Gossard, Ohio Bull. nr. 233, p. 140 (1911). — Baldwin, Indiana Ent. Rep., 5, p. 112 (1912). — Sanderson, Ins. Pests, p. 523 (1912). — Dean & Peairs, Kansas Agr. Educ., 6 (2), p. 94 (1913). — O'Kane, Inj. Ins., p. 303 (1914). — Slingerland & Crosby, Man. Fruit Ins., p. 418 (1914). — Somes, Bienn. Rep. Missouri State Fruit Exp. Stat. Bull., nr. 24, p. 4—19 (1914). — Monthl. Bull. Cal. State Commiss. Hortic. (Sacramento), 3, nr. 10, p. 445 (1914); 4, nr. 3, p. 170 (1915); 4, nr. 11, p. 528 (1915). — Strauss, U. S. Dep. Agric. (Washington) Farmers Bull. nr. 419, 16pp. (1916). — Britton, Connecticut Agric. Exp. Stat. (New Haven) Bull. nr. 203, p. 231—370 (1918). — Raymundo, Characas e Quintaes (S. Paulo) 21, nr. 5, p. 371—372 (1920). — Haseman, Sullivan & McLane, Missouri Agric. Exp. Stat. Columbia, Bull. nr. 179, p. 26—30 (1921).
 U.S.A.
 (Atlant. Staaten, Texas), Mexiko, Bahama Ins.

— Quaintance & Shear, U. S. Dep. Agr. (Washington) Farmers Bull. nr. 1220, 75pp. (1921). — Forbes, Canad. Ent., 54, (7/8), p. 151—158, 176—184 (1923). — Dean, Bienn. Rep. Kansas Hort. Soc. (Topeka), f. 1928—29, 40, p. 137—155 (1930). — Davis, Proc. Indiana Acad. Sci., 44 (1934), p. 198—206 (1935).

Parasiten: Strauss, U. S. Dep. Agric. (Washington) Farmers Bull., nr. 419, 16pp., 1916. — Donohoe & Barnes, Journ. Econ. Ent., 27 (4), p. 859 (1934).

maculalis Westwood, Mag. Zool., 9, t. 2 (1831). — Clemens, Proc. Acad. Nat. Sci. Phil., p. 215 (1860).

funeralis (part.) Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 631 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 54 (1906). — Barnes & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129 (1917) (= *funeralis* Hübn.).

noxia: Walsh & Riley, Amer. Ent., 1, p. 60 (1868). — Riley, Prairie Farmer Annual, p. 53—59 (1867). — Riley, Trans. Illinois Hort. Soc., f. 1867 (n. ser.), 1, p. 105—107 (1868). — Riley, Amer. Ent. and Bot., 2, p. 208—209 (1870); 3. Annual Rep. State Ent. Missouri, p. 61—63 (1871); 6. Ann. Rep. State Board Agric., f. 1870, p. 61 (1871); Gardeners Mo. and Hort., 19, p. 90 (1877); Journ. and Farmer, nr. 14, p. 133 (1877). — Atkinson, First Ann. Rep. S. Carolina Agr. Exp. Stat., f. 1888, p. 19—56 (1889). — Woodworth, First Ann. Rep. Arkansas Agric. Exp. Stat., p. 121—127 (1889). — McCarthy, N. Carolina Agric. Exp. Stat. Bull., nr. 78, p. 31, 38 (1891). — Weed, Ann. Rep. Columbus Hort. Soc. f. 1890, p. 166 (1891). — Woodworth, 3. Ann. Rep. Ark. Agric. Exp. Stat., p. 70—97 (1891). — Riley & Howard, Insect Life, 5, p. 137 (1892). — Troop, Trans. Ind. Hort. Soc., f. 1891, p. 72—76 (1892). — Miller, Fruits Growers Journ. 15. Apr. (1892). — Marlatt, Yearbook U. S. Dep. Agric., p. 385—404 (1895). — Bogue, Oklahoma Agric. Exp. Stat. Bull., nr. 26, 22pp. (1897). — Luger, Minnesota Agric. Exp. Stat. Bull., nr. 61, p. 55—333 (1899). — Stinson, Arkansas Agric. Exp. Stat. Bull., nr. 43, p. 105—117 (1899).

nominabilis E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 55 (♀) (1906). — Dyar, Insec. Insc. Menstr., 5, p. 70, 1917 (= *funeralis* var.).

tages Cramer, Pap. Exot., 2, p. 2, t. 97, f. D (1777) (*Phalaena Noctua*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 631 (1898). — Dyar, Journ. N. York Ent. Soc., 9, p. 22 (1901). — Barnes & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4922 (1917).

U.S.A.
(Texas,
Ohio)

Texas

Florida,
Mexiko,
Guatemala,
Costarica,
Panama,
Franz. u.

- tagesalis* Guenée, Delt. & Pyral., p. 291 (1854) (*Hyalitis*) (Surinam).
propinqualis Möschler, Verh. z. b. Ges. Wien, 31, p. 430, t. 18, f. 37 (1881) (*Desmia*).
 Holl.
 Guayana,
 Bahama Ins.,
 Cuba,
 Haiti,
 Jamaika,
 Brasilien
 (Amazonas),
 Venezuela

f) Neotropische Region.

- mapirica* Strand, Arch. f. Naturg., 85, A 12, p. 137 (1920). Bolivien
trimaculalis E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 56 (♀) (1906). Ecuador,
 Kolumbien
tages Cramer, vide sub a) Nearktische Region.
mesosticta Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 172 (♂) (1912). Kolumbien,
 Brit.
 Guayana
geminalis Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 249, t. 14, f. 5 (1875). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 631 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 70 (1906). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 260 (1914). Mexiko,
 Guatemalaia,
 Costarica,
 Kolumbien,
 Peru,
 Panama
bifidalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 173 (♂) (1912). Mexiko,
 Peru
geminalis Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. 2, p. 260, part. (1895), nec Snellen (1875).
tetratocera Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 260 (♂) (1914). Panama
ceresalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 339 (♂) (1859) (*Desmia*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 631 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 60 (1906). Jamaika
pentodontalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 631 (1898). Ecuador
dentipuncta Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 173 (♂) (1912). Kolumbien
ufodealis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 9, p. 174 (♂) (1912). Mexiko,
 Guatemala,
 Paraguay
ufcus Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 261 (1895), nec Cramer (1777).
ufcus Cramer, Pap. Exot., 2, p. 2, t. 97, f. E (1777). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 631 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stettin, 67, p. 57 (1906). Mexiko,
 Guatemala,
 Brit. u. Holl.
 Guayana,
 Brasilien
 (Rio de Janeiro,
 Rio Grande do Sul),
 Bahama Ins.,
 St. Domingo
orbalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 192 (♂) (1854) (*Aediodes*) (Cayenne). — Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 251, 1875. — Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. 310 (1890). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 57 (1906) (spec. dist.).
prognealis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 346 (♂) (1859) (*Desmia*) (Patria?).

- bulisalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 928 (♂) (1859) (*Desmia*) (Rio Janeiro).
- divisalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1292 (1865) (*Desmia?*) (St. Domingo).
- internicalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 192 (♀) (1854) (*Aediodes*) (Brasilien). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 631 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 57 (1906) (= *orbalis* ♀ Guen.). Mexiko, Guatemala, Costa Rica, Brit. u. Franz. Guayana, Brasilien (Rio Grande do Sul)
- herichialis** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 59 (♂, ♀) (1906). Kolumbien, Ecuador, St. Thomas
- sertorialis** Herrich-Schaeffer, Corresp.-Blatt zool.-min. Ver. Regensburg, 25, p. 24 (Sep. p. 63) (1871). — Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. 310 (1890). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 62 (1906). Cuba, Portorico, Haiti
- bajulalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 291 (1854) (*Hyalitis*) (Cayenne). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 632 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 101 (1906). Guatemala, Costa Rica, Panama, Venezuela, Fr. Guayana, Brasilien (Paraná), Ecuador, Peru, Bolivien
- dermatialis* Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 10, t. 136, f. 23 (♂) (1874) (*Glyphodes?*) (Fr. Guayana).
- stenoleuca** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 9, p. 242 (♂) (1912). W. Kolumbien
- pisusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 927 (♂) (1859) (*Desmia*) (Rio Janeiro). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 632 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 78 (1906). Brasilien (Rio de Janeiro, Espiritu Santo)
- melanopalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 242 (♂) (1912). Costa Rica
- ploralis* Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 262 (1895) (*Aediodes*), part., nec Guen. (1854).
- lacrimalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 243 (♂) (1912). Brasilien
- funeralis** Guenée, Delt. & Pyral., 189 (♀) (1854) (Brasilien). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 261 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 632 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 85 (1906). Mexiko, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, Brasilien (Amazonas, Espiritu Santo)
- notalis* Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 8, t. 136, f. 4 (1874) (*Desmia*) (Amazonas).

- vicina** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 50, p. 121 (1906). Franz. Guayana
- phaiorhoea** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 261 (♂) (1914). Panama
- geninipuncta** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 9, p. 243 (♂) (1912). Kolumbien
- mortalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 9, p. 243 (♂) (1912). Guatemala
- intermicalis* Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 261 (1895), part. (*Aediodes*), nec Guen. (1854).
- stenizonalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 9, p. 244 (1912). Costarica, Panama
- intermicalis* Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 261 (1895), part., nec Guen. (1854).
- albitarsalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, p. 376 (♂) (1917). Venezuela
- deploralis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 244 (1912). Jamaika, Paraguay
- ruptilinealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 245 (♀) (1912). Costarica
- intermicalis* Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 261 (1895) (*Aediodes*), part., nec Guenée (1854).
- paucimaculalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 632 (♂) (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 79 (1906). Brasilien (Amazonas, Espiritu Santo, S. Paulo)
- sepulchralis* Warren, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 632 (1899), nec Guen. (1854).
- tristigmalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 9, p. 245 (♂) (1912). Ecuador
- extrema** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 8, p. 75 (♂, ♀) (1856) (*Arna*) (Pará). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 632 (1898) (*Aediodes*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 86 (1906). Brasilien (Rio Grande do Sul)
- tenulzona** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 9, p. 245 (♀) (1912). S.O. Peru
- ploralis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 192 (♂) (1854) (*Aediodes*) (Cayenne, Brasilien). — Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 249 (1875). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 632 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 69 (1906). Westindien, Bahama Ins., Mexiko, Guatemala, Costarica, Brasilien (Espiritu Santo)
- sepulchralis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 190 (♀) (1854) (Cayenne). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 632 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 82 (1906). Fr. Guayana, Trinidad, Brasilien
- strigilvitrilis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 193 (♂) (1854) (*Aediodes*) (Brasilien). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 632 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 60 (1906). Brasilien, Venezuela

- semivacualis** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 47, p. 279 Ecuador (Loja) (1903).
- validalis** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 47, p. 280 Ecuador (Loja) (1903).
- melaleucalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 632, t. 49, f. 27 (♀); p. 761 (♂!) (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 93 (♂) (1906). Ecuador, Bolivien
- odontoplaga** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 633 (♂) (1898). Brasilien (Paraná, Unt. Amazonas)
- chryseis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 633, t. 49, f. 28 (♂) (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 106 (1906) (*Desmia*). Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Brasilien (Rio Grande do Sul)
- var. *briseis* E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 106 (♂) (1906). Peru
- flavalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. s. (8) 9, p. 292 (♂) (1912). Costarica

Species incertae sedis.

- aclistalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 261 Panama (♂) (1914).
- angustalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 181 (♂) (1920). Guatemala (Volcan de S. Maria)
- anitalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 182 (♂) (1920). Guatemala (Cayuga)
- benealis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 180 (♂) (1920). Guatemala (Volcan de S. Maria)
- bigeminalis** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 49, p. 68 Bolivien (1905) (*Aediodes*).
- cristinae** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 9, p. 291 (♂) (1912). Costarica (Juan Vinas)
- falcatalis** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 94 Bolivien (♂) (1906).
- flebilialis** Guen. Delt. & Pyral., p. 191 (♂) (1854) (*Aediodes*) (Cayenne). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 633 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 74 (1906). Franz. Guayana, Ecuador, Peru
- girtealis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 183 Peru (♂) (1920).
- grandisalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 9, p. 291 (♀) (1912). Costarica (Cachi)
- hadriana** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 227, t. 61, f. 25 (1895). — Hampson, Proc. Mexiko, Panama

- Zool. Soc. Lond., p. 670 (1898) (*Acridura*).
 — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 68 (1906).
- hoffmannsi** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 88 Peru
 (♂) (1906).
- ilsalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 182 Peru
 (♂) (1920).
- isaralis** Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep., Westindien,
 p. 4, t. 135, f. 25 (♂) (1874) (*Botys*) (Bogotá). Brit.
 — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 647 Guayana,
 (1898) (*Samea*). — E. Hering, Ent. Zeit. Kolumbien,
 Stett., 67, p. 96 (1906) (= *jovealis* Snell.). Bolivien,
jovealis Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 252, Uruguay
 t. 14, f. 8, 9 (1875). — Hampson, Proc.
 Zool. Soc. Lond., p. 633 (1898). — E.
 Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 96 (1906).
- jonesalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 181 Brasilien
 (♀) (1920). (S. Paulo)
- julialis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 179 Costarica
 (♂) (1920). (Avangarez)
- melanalis** Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep., Peru,
 p. 12, t. 135, f. 16 (♂) (*Hyalea*). — Hamp- Brasilien
 son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 632 (1898) (Amazonas)
 (= *funeralis* Guen.). — E. Hering, Ent.
 Zeit. Stett., 67, p. 84 (1906).
- microsticticalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. Bahama Ins.
 7) 14, p. 184 (♀) (1904).
- minualis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 180 Venezuela
 (♂) (1920). (Aroa)
- minutalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, Suppl., Brasilien,
 p. 560, t. 101, f. 18 (1899) (*Diasemia*?). — Bolivien
 E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 90
 (1906) (*Desmia*).
- nachialis** Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 250, t. 14, f. Westindien,
 6, 7 (1875) (Patria?). — ? Möschler, Abh. Portorico,
 Senckenb. Ges., 16, p. 311 (1891). — Hamp- Br. Guayana,
 son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 633 (1898). — Brasilien
 E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 81 (Espiritu
 (1906). Santo,
 S. Paulo)
- natalialis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 180 Guatemala
 (♂) (1920). (Volcan de
 S. Maria)
- niveiciliata** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 76 Haiti
 (♂) (1906).
- pantalis** Dyar, Pan-Pacific Ent., 4, p. 9 (1927). Mexiko
- parastigma** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 261 Costarica,
 (♂) (1914). Panama
- pehlkei** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 103 Kolumbien,
 (♂) (1906) (*Aediodes*). Ecuador
- peruviana** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 92 (♂) Peru
 (1906) (*Aediodes*).

- quadrinaculata** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 83 (♂) (1906) (*Aediodes*). Ecuador, Peru
- repandalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 183 (♂) (1920). Guatemala (Chejel), Cuba
- revindicata** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 66 (♂) (1906). Peru, Bolivien
- sextalis** Herrich-Schaeffer, Korr.-Bl. Regensburg., 25, p. 24 (Sep. p. 64), 1871 (*Aediodes*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 73 (1906). Mexiko, Ecuador
- tenuinaculata** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 89 (1906). Bolivien
- unipunctalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 261, t. 62, f. 26 (1895) (*Aediodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 633 (1898). Panama
- viduatalis** Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. 311 (1890). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 633 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 65 (1906). Portorico (Typus), Holl. Guayana, Brasilien
- vulcanalis** Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. Het., p. 2, t. 135, f. 40 (♂) (1874) (*Aediodes*) (Chiriqui). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 260 (1895). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 70 (1906) (= *geminalis* Snell.).

c) Aethiopische Region.

- horaria** Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 103 (♂, ♀) (1937). Belg. Congo (Eala)

d) Australische Region.

- discrepans** Butler, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 5) 20, p. 117 (1887) (*Aediodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 632, 1898. Salomon Ins.
- subsp. *dissimulalis* W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, nr. 15, p. 128 (♂) (1915). (Utakwa River). Holl. Neu-Guinea
- meyricki** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 67, p. 98 (♂, ♀) (1906) (*Aediodes*). 84 Fergusson Ins., St. Aignan

35. Genus **Aetholix** Lederer

Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 437 (1863). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 286 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 596, 633 (1898).

(Typus generis: *flavibasalis* Guen.)

- flavibasalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 193 (♂) Südcina,
(1854) (*Aediodes*) (Bombay). — Walker, Indien,
Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 347 (♀) Ceylon,
(1859) (*Aediodes*). — Lederer, Wien. Ent. Andamanen,
Monatschr., 7, p. 438, t. 17, f. 6 (1863) Sumatra,
(*Aetholix*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Borneo,
Mus., 34, p. 1321 (1865). — Meyrick, Trans. Amboina,
Ent. Soc. Lond., p. 461 (1894). — Hamp- Neu-Guinea
son, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 269
(1869); Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9,
p. 269 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p.
634, f. 27 (♂) (1898). — E. Hering, Ent.
Zeit. Stett., 62, p. 319 (1901).
cingalesa Hampson, Ill. Typ. Spec. Het.
Brit. Mus., 9, p. 173, t. 174, f. 18 (1893)
(Ceylon). — Id., Proc. Zool. Soc. Lond., p.
634, 1898 (= *flavibasalis* Guen.). — Swin-
hoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 459
(1900) (spec. dist.).
indecisalis Warren, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 6) Assam
17, p. 148 (♀) (1896) (*Metasiodes*). — (Khasis)
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 634
(1898).
borneensis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 9, Borneo
p. 246 (♂) (1912).

3

36. Genus **Pagyda** Walker

Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 487 (1859). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 313 (1886). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 516 (1889). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 270 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 634 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. 192 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stettin, 62, p. 219 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 170, 184 (1928) (tab. anal. spec. formos., p. 184, 185); ibid., 25, p. 157, 163 (tab. anal. spec. japon., p. 163, 164) (1929).

Synalera Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 444 (1863). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 315 (1866). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 272 (1896) (= *Pagyda*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 636 (1898) (= *Pagyda*).

(Typus generis: *salvalis* Walk.).

a) Paläarktische Region.

- arbiter** Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 3, Japan,
p. 77, t. 59, f. 13 (1879) (*Botys*) (Yoko- Formosa,
hama). — Hampson, Fauna Brit. India Queensland
Moths, 4, p. 270 (1896), part. (= *sal-
valis* Walk.); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 635
(1898) (= *salvalis* Walk.). — Leech, Trans.
Ent. Soc. Lond., p. 451 (1901). — E. Hering,
Ent. Zeit. Stett., 62, p. 220 (1901). — Shi-
buya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ.
Sapporo, 22, p. 186 (1928); 25, p. 164 (1929).
schaliphora Hampson, Proc. Zool. Soc.
Lond., p. 635 (♀) (1898) (Queensland).

- salvalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 487 (1859) (*Pagyda*) (Ceylon). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 314, t. 182, f. 6 (1886). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 516 (1889). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 615 (1890). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 37 (1891); 9, p. 48 (1893). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 10, 467 (1894). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 270, f. 164 (♂) (1896), (part.). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 86 (1897). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 634, f. 28 (1898). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 459 (1900). — Pagenstecher, Zoologica (Chnn) H. 29, p. 193 (1900). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 451 (1901). — Janse, Check List S. Afr. Lep. Het., p. 158 (1917).
- West-, Mittel- u. Südchina, Indien (Sikkim), Ceylon, Birma, Tonkin, Sumatra, Pulo Lant, Borneo, Celebes, Sangir, Philippinen, Südafrika, Bismarck-Archipel, Neu-Guinea, Australien
- subsp. *ochrealis* Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 375, t. 30, f. 17 (1911) (*Pagyda ochrealis*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 164 (1929) (*salvalis* subsp.).
- quinquelineata** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 64, p. 101 (1903) (Yokohama). — Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 398 (1911). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 187, t. 7, f. 22 (1928); 25, p. 165 (1926).
- Mittel- u. Westchina, Japan, Formosa
- amphisalis* Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 542 (1901), nec Walk. (1859).
- amphisalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 661 (♂) (1859) (*Botys*) (China). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 635 (1898) (*Pagyda*); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 12, p. 707 (1899). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 220 (1901). — Strand, Deutsche Ent. Zeit. Iris, 32, p. 42 (1918). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 187 (1928); 25, p. 165 (1929).
- West-, Mittel- u. Südchina, Indien (Assam), Japan, Korea, Formosa, Pulo Lant
- quadrilineata* Butler, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 586 (1881) (*Pagyda*) (Japan). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 636 (1898). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 636 (1901). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 221 (1901). — Marumo, Journ. Col. Agr. Tokyo Imp. Univ., 8, p. 189 (1923).
- amphisaloides* Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 42 (1918) (*amphisalis* fa).
- tradiculis** Zeller, Kgl. Vet. Akad. Handl. Lep. Micropt. Caffr., p. 54 (1852) (*Eudiotis*) (Limpopo, Gariep). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 444 (1863) (*Synclera*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1367 (1865) (*Synclera*). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 93 (1867) (*Synclera*). —
- Syrien, Palästina, Cyrenaica; Indien (Bombay, Kalkutta, Assam,

- Snellen, Tijds. v. Ent., 17, p. 3 (1874); 18, p. 259 (1875); 22, p. 62 (1879); 27, p. 45 (1884) (*Synclera*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 316, t. 182, f. 9 (♀) (1886) (*Eudiotis*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. 281 (1888) (*Synclera*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 464 (1890) (*Nausinoë*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 636 (1890) (*Synclera*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 47 (1893) (*Synclera*). — Baker, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 47 (1894) (*Synclera*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 272 (1896) (*Pagyda*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 636 (1898). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 460 (1900) (*Synclera*). — Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. 193 (1900) (*Synclera*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 318 (1901) (*Synclera*). — Barnes & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4923 (1917) (*Synclera*).
- retinalis* Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 1, p. 100 (1857) (*Spilomela* ?) (Beirut).
- jarbusalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 352 (♀) (1859) (*Samea*) (St. Domingo).
- univocalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 499 (♀) (1859) (*Glyphodes*) (Ceylon). — Butler, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 622 (1881) (*Glyphodes*). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 522 (1884); p. 872 (1885) (*Glyphodes*).
- cottalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 964 (♂) (1859) (*Zebronia* ?) (St. Domingo).
- chlorophasma* Butler, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 493 (1878) (*Samea*) (Jamaika).
- bleusei** Oberthür, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 82 (1887) (*Synclera*); Etud. Ent., 12, p. 37, t. 6, f. 12 (1888) (*Synclera*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 464 (1890) (*Nausinoë*). — Staudinger & Rebel, Cat. Lep. Pal. Faun., 2, p. 49, nr. 914 (1901) (*Nymphula*). — Caradja, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 30, p. 20 (1917) (*Synclera*).
- tenuivittalis* Turati, Atti Soc. Ital. Sci. Nat., 73, p. 191, fig. (1934).
- Sikkim),
Ceylon,
Birma,
Sumatra,
Java,
Celebes,
Amboina,
Philippinen;
Congo,
Port.
O. Afrika,
Kiliman-
dscharo,
Kaffernland;
Holl.
Neu-Guinea,
Bismarek-
Archipel,
Nordamerika
(Florida);
Mexiko,
Guatemala,
Costarica,
Panama,
Bahama Ins.,
Haiti,
Ecuador
- Algier
(Biskra),
Palästina,
Canaren
- Cyrenaica

b) Orientalische Region.

- auroralis** Moore, Descr. N. Ind. Lep. Ins. Atkinson, p. 215, t. 7, f. 17 (1887) (*Haritala*) (Cherra Punji). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 632 (1890) (*Zebronia*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 270 (1896) (*Pagyda*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 635 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 223 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 185, t. 7, f. 29 (1928).
- Südchina,
N.O. Indien
(Sikkim),
Birma,
Formosa,
Sumatra

- rubricatalis* Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 282 (1890) (Rangoon).
- lustralis** Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 615 (♂) (1890) (Sikkim). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 636 (1898). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 186, t. 8, f. 30 (1928). Südchina, Indien (Sikkim), Birma, Formosa
- arbiter** Butler, vide sub a) Paläarktische Region.
- salvalis** Walker, vide sub a) Paläarktische Region.
- nebulosa** Wileman & South, Entom., 50, p. 177 (♂, ♀) (1917). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 186, t. 7, f. 4 (1928). Formosa
- holonalis** Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 460, t. 7, f. 22 (♂) (1900). Borneo
- pullalis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 7) 11, p. 511 (♂) (1903). Siam
- callida** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 635 (1898). Malakka, Borneo
- discolor** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 6) 14, p. 197 (♂) (1894). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 271 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 635 (1898). Assam (Typus: Cherra Punji), Birma
- var. *pulverulenta* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 7) 8, p. 136 (♂) (1901). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 577 (1908). Assam (Khasis)
- botydalis** Snellen in Veth, Midden-Sumatra, 4, Lep., p. 69, t. 5, f. 9, 9a (1880) (*Glyphodes*) (Sumatra). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 271 (1896) (*Pagyda*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 635 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 223 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 186, t. 7, f. 13 (1928). Indien, Ceylon, Tonkin, Sumatra, Borneo, Formosa, Neu-Guinea
- aurantialis* Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 169, t. 173, f. 17 (1893) (*Pagyda*).
- argyrtis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 635 (1898); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 12, p. 707, t. A, f. 26 (♂) (1899). Indien (Bhotan, Sikkim), Tonkin
- quinquelineata** Hering, vide sub a) Paläarktische Region.
- amphisalis** Walker, vide sub a) Paläarktische Region.
- poeasalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 717 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 636 (1898) (*Pagyda*). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 460, t. 7, f. 24 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 221 (1901). Borneo, Sumatra
- exalbalis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 271 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 636 (1898). Birma
- fulvistriga** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 6) 14, p. 206 (♂) (1894) (*Orphanostigma*) (Shillong). — Hampson, Fauna Brit. India

Moths, 4, p. 272 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 636 (1898).

- traducalis** Zeller, vide sub a) Paläarktische Region.
- subtessellalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1406 (♀) (1865) (*Botys*) (Darjiling). — N.O. Indien,
Birma
— Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 97 (1867) (*Botys*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 636 (1890) (*Synclera*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 273 (1896) (*Pagyda*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 636 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 318 (1901).
- straminealis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 273 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 636 (1898). Sikkim
- erythrias** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 457 (1894) (*Omiodes*) (Celebes). — Celebes,
Flores
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 636 (1898) (*Pagyda*).

c) Aethiopische Region.

- retractilinea** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 20, p. 377 (♀) (1917). Brit.
Ostafrika
- caritalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 789 (♀) (1859) (*Scopula*?) (Sierra Leone). — Congo,
Togo,
Kamerun
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 636 (1898).
- auralis** Snellen, Tijds. v. Ent., 15, p. 90, t. 7, f. 9, 10 (1872) (*Botys*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 335 (1896) (= *Hyalobathra filalis* Guen.); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 189 (1899) (= *Hyalobathra filalis* Guen.). — Karsch, Ent. Nachr., 26, p. 250 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 111 (1901). — Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 14 (1936).
- salvalis** Walker, vide sub a) Paläarktische Region.
- traducalis** Zeller, vide sub a) Paläarktische Region.
- trivirgalis** De Joannis, Livre Centenn. Soc. Ent. Fr., p. 453, t. 23, f. 22 (1932). Mauritius

d) Australische Region.

- arbiter** Butler, vide sub a) Paläarktische Region.
- salvalis** Walker, vide sub a) Paläarktische Region.
- furcatalis** Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 460, t. 7, f. 12 (♂) (1900). Neu-Guinea
- perlustralis** Rebel, 2. Beiheft Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt., 32, p. 137, t. 1, f. 9 (1915). Samoa Ins.
- paraphragma** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 517 (1889). — Neu-Guinea
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 636 (1898).
- traducalis** Zeller, vide sub a) Paläarktische Region.
- atriplagiata** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 8) 20, p. 377 (1917). Brit.
Neu-Guinea

Species incertae sedis.

- callipona** Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral., 32, N. Queensland
p. 93 (♂, ♀) (1908). (Küranda)
- fumosa** Kenrick, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 551, t. Holl.
68, f. 13 (1912). Neu-Guinea
- nitidalis** Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. Bismarck-
194 (1900). Archipel
- tremula** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 243 (♂, ♀) Fidji Ins.
(1932). (Lautoka)

c) Nearktische Region.

traducalis Zeller, vide sub a) Paläarktische Region.

f) Neotropische Region.

- traducalis** Zeller, vide sub a) Paläarktische Region.
- aponianalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. Mexiko,
557, t. 101, f. 7 (1889) (*Pionea*). — Dyar, Panama
Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 231 (1914)
(*Pagyda*).
- praelatalis** Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 14 (3), p. Jamaika
81 (1886) (*Synclera* nec *Synctera*). — Hamp-
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 636 (1898).
37

37. Genus **Hypereclis** Meyrick

Meyrick, Fauna Hawaii, 1, p. 356 (1899).

(Typus generis: *diectias* Meyr.)

- diectias** Meyrick, Fauna Hawaii, 1, p. 356 (♂) Hawai
(1899). (Maui)
- aplealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Ecuador
p. 296 (♂) (1912).
2

38. Genus **Ercia** Walker

Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 425 (1859). — Hampson,
Fauna Brit. India Moths, 4, p. 273 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 596, 636 (1898). — Rebel in Spuler, Schm. Eur., 2, p. 225
(1906).

Spanista Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 445 (1863),
nec Förster, 1862 [Hymen.] (typus: *ornatalis* Dup.). —
Snollen, Tijds. v. Ent., 23, p. 239 (1880). — Moore, Lep.
Ceylon, 3, p. 297 (1885).

Hydriris Meyrick, Trans. Ent. Soc., p. 443, 1885 (typus:
chalybitis Meyr.). — Hampson, Fauna Brit. India Moths,

4, p. 273 (1896), part.; Proc. Zool. Soc. Lond., p. 636 (1898), part. — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 171, 187 (1928).

(Typus generis: *tipulalis* Walk. = *vittata* Fabr.)

a) Paläarktische Region.

- ornatalis** Duponchel, Hist. Nat. Léop. Fr., 8 (2), p. 207, t. 223, f. 8 (1831) (*Asopia*). — Herrich-Schaeffer, Syst. Bearb. Schm. Eur., 4, p. 10, t. 8, f. 52, 53 (1848) (*Nymphula*). — Guenée, Delt. & Pyral., p. 247 (1854) (*Stenia*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 416 (1859) (*Stenia*). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 446 (1863) (*Spanista*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1328 (1865) (*Ommatospila*). — Snellen, Tijds. v. Ent., 15, p. 96 (1872) (*Spanista*); 27, p. 46 (1884) (*Spanista*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 297, t. 181, f. 10 (1885) (*Spanista*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 226 (1886); p. 214 (1887) (*Spanista*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. 116 (1888) (*Spanista*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 284 (1890) (*Spanista*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 463 (1890) (*Hydriris*); p. 68 (1894) (*Hydriris*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 274 (1896) (*Erecta*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 86 (1897) (*Hydriris*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 637 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. 195 (1900) (*Hydriris*). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 462 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 325 (1901). — Rebel in Spuler, Schm. Eur., 2, p. 225 (1906); 2. Beiheft Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt, 32, p. 137 (1915). — Barnes & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4924 (1917). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Sciint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 339 (1925) (var.) (Südchina). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 188, t. 7, f. 31 (1928) (*Hydriris*). — Müller-Rutz, Mitt. Schweiz. Ent. Ges., 14 (5), p. 186, t. 4 (genit.) (1929).
- saturnalis** Treitschke, Schm. Eur., 10 (3), p. 29 (1835) (*Nymphula*). — Heeger, Beitr. Schmetterlingsk., p. 7, t. 1, f. 13 (♂) (1838).
- saturalis** Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 284 (1890) (ex synonym.). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 637 (1898) (ex synonym.).
- deciusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 905 (♂) (1859) (*Pyralis* ?) (Ceylon).
- invenustalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1431 (1865) (*Botys* ?) (Ceram).

In allen tropischen u. subtrop. Gegenden der Erde verbreitet: Südeuropa (excl. Südrußland), Canaren, Syrien, Aegypten, W. Mauretanien, Cyrenaica, Palästina; Südchina, Indien, Tonkin, Ceylon, Sumatra, Java, Celebes, Sumbawa, Ceram, Philippinen, Seychellen, Mirikoi Ins.; Kamerun, Port. Ostafrika, Transvaal; U.S.A. (Florida) Bahama Ins., Panama; Bismarck-Archipel, Tonga, Fidji, Samoa, Neu-Hebriden

- fraterna* Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 4) 16, p. 415 (1875) (*Cataglysta*) (Natal).
elutalis Strand, nec Walker, 1859, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 42 (1918) (*Ercta*).
bifascialis Heeger, Beitr. Schmetterlingsk., p. 7, t. 1, f. 14 (♀) (1838).
 Biologie: Semper, Schm. Philipp. Ins., 2, p. 665, t. 5, f. 11 (1902) (Raupe). — Mariani, Boll. Soc. Sci. Nat. Econ. Palermo, 11, p. 3—8, fig. (1929). — Lhomme, Cat. Lep. France Belge, 2 (1), p. 114 (1935).

b) Orientalische Region.

- elutalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 448 (1859) (*Cataglysta*?) (Ceylon). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 468 (1894) (*Hydriris*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 274, f. 165 (♂) (1896) (*Ercta*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 637 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 194 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 325 (1901).
conisalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 911 (♂) 1859 (*Pyralis*) (Borneo).
bornealis Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. Het., p. 4, t. 135, f. 27 (1874) (*Botys*) (Borneo).
pretiosalis Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 239 (1880) (*Spanista*) (Celebes); 27, p. 47, t. 4, f. 9, 9a (1884) (*Spanista*).
ornatalis Duponchel, vide sub a) Paläarktische Region.
chalybitis Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 444 (1885) (*Hydriris*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 637 (1898) (*Ercta*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 189 (1928) (*Hydriris*).
angustalis Snellen, Tijds. v. Ent., 38, p. 154 (1895) (*Hydriris*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 637 (1898).
- Indien
 (Nilgiris,
 Kalkutta),
 Tonkin,
 Ceylon,
 Sumatra,
 Borneo,
 Celebes,
 Bismarck-
 Archipel
- Formosa,
 Neu-
 Hebriden,
 Tonga Ins.
- Java

c) Aethiopische Region.

- ornatalis* Duponchel, vide sub a) Paläarktische Region.
scotialis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 247 (♂) (1912).
- Mashona-
 land

d) Australische Region.

- elutalis* Walker, vide sub b) Orientalische Region.
ornatalis Duponchel, vide sub a) Paläarktische Region.
chalybitis Meyrick, vide sub b) Orientalische Region.
gaudealis W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, no. 15, p. 129 (♂) (1915).
- Holl.
 Neu-Guinea

e) Hawaiiische Region.

excausta Meyrick, Proc. Hawaii. Ent. Soc., 7, p. Hawaii
95 (1928).

f) Nearktische Region.

ornatalis Duponchel, vide sub a) Paläarktische
Region.

desmialis Barnes & McDunnough, Contr. Nat. Hist. Arizona
Lep. N. Amer., 2 (6), p. 225, t. 1, f. 2
(1914).

kaeberalis Haimbach, Ent. News, 26, p.
322, t. 12, f. 4 (1915) (*Hymenia*). — Mc
Dunnough, Ent. News, 26, p. 471 (1915).

g) Neotropische Region.

ornatalis Duponchel, vide sub a) Paläarktische
Region.

trichoneura Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Panama
9, p. 246 (♂) (1912).

novalis Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2,
p. 242 (1895), nec Walker (1865).

vittata Fabricius, Ent. Syst., 3 (2), p. 217, n. 328 (1794) Westindien,
(*Phalaena*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Panama,
London, p. 637 (1898) (*Ercta*). Brasilien

hemialis Guenée, Delt. & Pyral., p. 248
(♂) (1854) (*Stenix*) (Brasilien).

tipulalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit.
Mus., 17, p. 426 (♂) (1859) (*Ercta*) (St.
Domingo).

10

39. Genus **Cnaphalocrocis** Lederer

Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 384 (1863). — Meyrick, Trans.
Ent. Soc. Lond., p. 303 (1884). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 281
(1885). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 275 (1896);
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 596, 637 (1898). — Pagenstecher, Zoo-
logica (Chun), H. 29, p. 195 (1900). — Shibuya, Journ. Pac. Agr.
Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 170, 189 (1928); *ibid.*, 25,
p. 157, 165 (1929).

(Typus generis: *jolinalis* (Walk.) Led. = *medinalis* Guen.)

medinalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 201 (♀) (1854) Amur,
(*Salbia*) (Ostindien). — Walker, Cat. Lep. Ussuri,
Het. Brit. Mus., 17, p. 361 (1859) (*Salbia*). Tjutjuje,
— Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 381 Nord-,
(1863) (*Salbia*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, Mittel-u.
p. 281 (1885) (*Cnaphalocrocis*). — Meyrick, Südchina,
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 216 (1887); p. 514 Japan;
(1889). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., Indien,
p. 272 (1890). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Ceylon,
Het. Brit. Mus., 9, p. 51 (1893). — Mey- Birma,
rick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 467 (1894). Malakka,
— Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, Tonkin,
p. 275, f. 166 (♂) (1896); Proc. Zool. Korea,
Soc. Lond., p. 638, f. 30 (1898). — Swin- Formosa,

- hoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 462 (1900). — Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. 195 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 339 (1901). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 452 (1901). — Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 42 (1918). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 189, t. 7, f. 5 (1928); 25, p. 165 (1929).
- rutilalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 665 (1859) (*Botys*) (Ceylon, N. Hindustan, China). — Moore, Journ. Linn. Soc. Zool., 21, p. 59 (1886) (*Botys*).
- iolealis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 663 (♂) (1859) (*Botys*) (Hongkong, Sarawak). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 385 (1863) (*Botys*). — Butler, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 683 (1880) (*Asopia*). — Snellen in Veth, Midden-Sumatra, 4, Lep., p. 65 (1880). — Swinhoe, Proc. Soc. Zool. Lond., p. 876 (1885) (*Botys*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1480 (1865) (*Cnaphalocrocis*).
- jolinialis* Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 385, t. 12, f. 7 (1863) (*Cnaphalocrocis*). — Snellen in Veth, Midden-Sumatra, 4, Lep., p. 65 (1880); Tijds. v. Ent., 26, p. 135 (1883). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 104 (1884); p. 216 (1887). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 37, p. 104 (1888). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 594 (1890). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 467 (1894).
- fasciculatalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1431 (♂) (1865) (*Botys*) (Neu-Guinea).
- acerrimalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1449 (♀) (1865) (*Botys*) (Java).
- Biologie: Shiraki, Injur. Ins. Formosa, 1, p. 126, t. 8 (1910). — De Joannis, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 137—139 (1913) (Mimicry).
- noxia*: Fletcher, Madras Dep. Agric. Bull., 3 (67), 10 pp. (1913). — Duport, Bull. Econ. Indochine (Hanai-Haiphong) (n. ser.), p. 99, 102, 105 (1913). — Hall, Meded. Laborat. v. Plantenziekten (Buitenzorg), nr. 29, 37 pp. (1917). — Mackenna, Rep. Progr. Agric. in India, f. 1916/17 (Calcutta), p. 72—84 (1918). — Dupert, Bull. Econ. Indochine, no. 134 (1919). — Hutson, Ceylon Dep. Agric. Admin. Rep., f. 1919 (Paradeniya), p. C8—C10 (1920). — Vincens, Bull. Agric. Ind. Sci. (Saigon), 2, p. 97—105 (1920) [Referat in L'Agric. Colon., Firenze, 14 (7), p. 314 (1920)]. — Misra, Mem. Dep. Agric. India (Calcutta) Ent. ser. 5, nr. 5, p. 207—237 (1920). — Duport, Suppl. to Bull., no. 130

Sumatra,
Java,
Borneo,
Celebes,
Amboina,
Philippinen;
Madagaskar;
Mysol,
Neu-Guinea,
Neu-
Hebriden,
Neu-
Kaledonien,
Bismarck-
Archipel,
Samoa,
Australien;
Texas

—131, Chambre d'Agric. Tonkin et Nord-Annam (Hanoi), nr. 11, 12 (1920/21). — Camus, Philippine Bur. Agric. (Manila) Bull., nr. 37, 90 pp. (1921). — Pillai, Travancore Dep. Agric. (Trivandrum), 53 pp (1921). Goco, Philippine Agric. Rev. (Manila), 14 (1), p. 57—62 (1921). — Gater, Malayan Agric. Journ. (Kuala Lumpur), 12 (11), p. 374—376 (1924); 13 (6), p. 160—167 (1925); 13 (7), p. 220—226 (1925); 13 (10), p. 317—329 (1925). — Jebaratnam, Ceyl. Adm. Rep., f. 1925, Dep. Agric., p. D19—D20 (Colombo) (1926). — Pillai, Rep. Dep. Agric. & Fisheries, Travancore, f. 1924/25, p. 3 (1926). — V. d. Goot, Meded. Inst. Plantenziekten (Buitenzorg), nr. 74, 85 pp. (1928). — Wormser, La Cochinchine Agric., 2 (12) (1928) [Referat in Riz et Riziculture, Extr. & Anal., 3 (4), p. 129—130 (Paris) (1929)]. — Kuwayama, Bull. Hokkaido Agric. Exp. Stat., nr. 47, 107 pp. (Sapparo) (1928). — Treppa, Riz et Riziculture (Paris), 3 (4), p. 167—184 (1929). — Uichango, Rep. Comm. Cane Varieties, Diseases & Fertilizers, 6. Ann. Conv. Philipp. Sugar Ass. (Manila), 16 pp. (1928). — Commun, Bull. Econ. Indochine, 33 (3B), G. R. Trav. 1928/29, 2-Ent. Cryptog., p. 1—28 (Hanoi) (1930). — Hsu, [Yearb. Bur. Ent. Hangchow] (Chines.), nr. 2 (1932), p. 332—363 (Hangchow) (1933). — Anantamayanan, Bull. Ent. Res., 25 (1), p. 55—61 (1934). — Corbet, Gen. Ser. Dep. Agric. S. S. & F. M. S., nr. 19, p. 38—54 (Kuala Lumpur) (1934).

Parasiten: Vincens, Bull. Agric. Ind. Scientif. (Saigon), 3 (10), p. 307—323 (1921). — Gahan, Philipp. Journ. Sci., 27 (1), p. 83—100 (Manila) (1925). — Wilkinson, Bull. Ent. Res., 19 (1/2), p. 79—105, 109—146 (1928). — Ferrière, Bull. Ent. Res., 21 (3), p. 353—360 (1930). — Wilkinson, Stylops, 3 (7), p. 145—156 (1934). — Baranoff, Ent. Nachr.-Bl., 8 (2), p. 41—49 (Troppau) (1934).

nurscialis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 724 (♂) (1859) (*Botys*) (Moreton Bai, Sydney). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 638 (1898) (*C. medinalis* subsp.).
medinalis Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 216 (1886); p. 514 (1889), nec Guenée (1854). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 275 (1896), part.; Proc. Zool. Soc. Lond., p. 638 (1898) part.
rutilalis Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 304 (1884); p. 235 (1886), nec Walker (1859).

marginalis Pagenstecher, Abh. Senckenb. Ges., 23, p. 462, t. 19, f. 8 (1897). Sumatra, Borneo, Celebes

40. Genus **Marasmia** Lederer

Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 385 (1863). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 283 (1885). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 235 (1886). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 275 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 596, 638 (1898). — E. Hering, Ent. Zeitg. Stett., 62, p. 339 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 170, 190 (1928); *ibid.*, 25, p. 157, 166 (1929).

Dolichosticha Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 304 (1884) (typus: *veniliatis* Walk.). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 282 (1885). — Snellen, Tijds. v. Ent., 38, p. 124 (1895).

Epimima Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 235 (1886) (typus: *stereogona* Meyr.).

Lasiacme Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 176 (1896) (typus: *L. pilosa* Warr. = *latimarginalis* Hamp.).

(Typus generis: *cicatricosa* Led. = *veniliatis* Walk.)

a) Paläarktische Region.

veniliatis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 373 (1859) (*Asopia*) (Moreton Bai). — West-u. Südchina, Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 305 (1884); Japan; p. 217 (1887); p. 9 (1894) (*Dolichosticha*). Indien, — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 282 (1885). Ceylon, (*Dolichosticha*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Birma, Lond., p. 273 (1890) (*Dolichosticha*). — Tonkin, Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 595 (1890). Sumatra, (*Dolichosticha*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Borneo, Het. Brit. Mus., 9, p. 51, t. 174, f. 11, 1893. Chagos, (*Marasmia*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 276, f. 167 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Cocos, Lond., p. 638, f. 31 (♂) (1898). — Keeling, Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 463 (1900). Coetivy Ins., — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 329 Seychellen, (1901). — Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond., Amiranten; p. 376 (1911). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Südarabien; Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 191 D. u. Port. (1928); 25, p. 167 (1929). Ostafrika, Kamerun, *marisalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Süd-Afrika, Mus., 18, p. 717 (1859) (*Botys*) (Sarawak, Mauritius; Sydney). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., Australien, p. 10 (1894) (*Dolichosticha*). Holl.

cicatricosa Lederer, Wien. Ent. Monatsschr., 7, p. 386, t. 12, f. 8 (1863) (*Marasmia*) (Java). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1491 (1865). — Snellen, Tijds. v. Ent., 26, p. 135 (1883) (*Cnaphalocrocis*). Neu-Guinea, Salomon

ruralis Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 235 (1886) (*Marasmia*), nec Walker (1859). Ins.,

mimica Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 177 (♂) (1896) (*Lasiacme*) (Khasis). Sanna, Fidji Ins.

limbalis Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 376 Japan (1911). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 166 (1929).

b) Orientalische Region.

- venialis** Walker, vide sub a) Paläarktische Region.
- pauperalis** Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 41 (1918). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 191, 1928. Formosa
- ruralis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 666 (♂) (1859) (*Botys*) (Ceylon). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 273 (1890). — De Joannis, Ann. Soc. Ent. Fr., 98 (1929), p. 664 (1930). Ceylon, Tonkin
- latimarginalis** Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 138 (1891); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 276 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 639 (1898). Südchina, Indien (Assam, Sikkim, Nilgiris)
- pilosa** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 176 (♂) (1896) (*Lasiacme*) (Khasis).
- euryterminalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, p. 378 (♂) (1917). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 191, t. 7, f. 14 (1928). Assam, Formosa
- trebiusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 718 (♂, nec ♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 276 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 639 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 341 (1901). Südchina, Indien (Dharmasala, Kalkutta), Ceylon, Tonkin, Sumatra, Borneo, Flores;
- socialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1306 (1865) (*Asopia*) (Flores). Westafrika;
- stereogona** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 236 (1886) (*Epimima*). — Hampson Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 40 (1891) (*Epimima*); 9, p. 51 (1893) (*Epimima*) (Fidji). Fidji Ins., Salomon Ins., Samoa
- bilinealis** Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 139, t. 155, f. 25 (1891); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 277 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 639 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 342 (1901). Westchina, Indien (Assam, Nilgiris), Ceylon, Malakka, Sumatra, Java, Borneo, Celebes
- subauralis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 175 (1896) (*Dolichosticha*) (Khasis).
- subsp. **intristalis** Caradja, Ac. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 4, mem. 8, p. 408 (1927). Westchina (Kwanhsien)
- noxia**: Speyer, Ceylon Admin. Reps. f. 1917, Dep. Agric. p. C10—C13 (1918). — Hutson, Ceylon Dep. Agric. Admin. Reps. f. 1919 (Paradeniya), p. C8—C10 (1920). — Jepson, Ceylon Admin. Rep. Dep. Agric. f. 1923, p. D19—D21 (Colombo) (1924). — Hutson, Trop. Agriculturist, 65 (5), p. 303 (Peradeniya) (1925). — Jepson, Admin. Rep.

- Dir. Agric. Ceylon, 1934, p. D132—D147 (Colombo) (1935).
- aracalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 247 (1912). Seychellen, Queensland
- trapezalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 200 (♂) (1854) (*Salbia*) (Sierra Leone). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 360 (1859) (*Salbia*) (Sierra Leone). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 381 (1863) (*Salbia*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 217 (1887) (*Dolichosticha*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 40 (1891) (*Dolichosticha*); 9, p. 51 (1893) (*Dolichosticha*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 277 (1896) (*Marasmia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 639 (1898). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 464 (1900) (*Epimima*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 342 (1901). — Barnes & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4926 (1917). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 192 (1928).
- creonalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 579 (1859) (*Botys*) (St. Domingo). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 284, t. 180, f. 10 (1885) (*Ravanoa*). — Warren, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 334 (1888) (*Ravanoa*).
- neoclesalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 635 (♂) (1859) (*Botys*) (Kap). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 460 (1886) (*Botys*).
- suspicalis** Walk. Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 667 (♀) (1859) (*Botys*) (Ceylon).
- convectalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1411 (♂) (1865) (*Botys*) (S. Indien).
- bifurcalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 219 (1880) (*Cnaphalocrocis*) (Celebes); 26, p. 136, t. 8, f. 5, 5a (1883). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 237 (1886) (*Dolichosticha*).
- subsp. **perinephes** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 236 (♂) (1886) (*Dolichosticha*) (Fiji); ibid., p. 217 (1887) (Queensland). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 639 (1898).
- Biologie: Indian Mus. Notes, 5, p. 141, t. 14, f. 3 (1903). — De Joannis, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 137—139 (1913).
- noxia**: Duport, Bull. Econ. Indochine (Hanoi-Haiphong) (n. ser.), nr. 99 (1912), nr. 102, 105 (1913). — Van Heurn, Meded. Algem. Proefst. A.V.R.O.S. (Medan), Alg. ser., nr. 7, 66 pp. (1919). — Briggs, Rep. Guam Agric. Expt. Stat. f. 1920 (Wash.), p. 15—64 (1921); Guam, Agric. Exp. Stat. Bull., 3, 28 pp. (1922). — Gosh, Rep. Entom. Mande-
- Südechina, Indien (Sikkim, Nilgiris, Kalkutta), Tonkin, Celebes; Sierra Leone, D. u. Port. Ostafrika, Kamerun, Sudan, Kapland; Tonga, Ellice Ins., Samoa, Fidji Ins.; Guam; U.S.A. (Florida, Texas); Guatemala, Peru, Venezuela, Haiti, St. Domingo

lay, Sericult. Work f. 1925 (Rangoon) 10+8 pp. (1926). — Wolcott, Journ. Econ. Ent., 22 (1), p. 268—269 (1929); Bull. Ent. Res., 20 (2), p. 225—231 (1929). — Ritchie, Ann. Rep. Dep. Agric. Tanganyika Terr. f. 1931, p. 83—86 (Dar-es-Salaam) (1932). — Hargreaves, Ann. Rep. Dep. Agric. Uganda f. 1931, pt. 2, p. 43—47 (Entebbe) (1932).

Parasiten: Wolcott, Journ. Econ. Ent., 18 (2), p. 422 (1925). — Cherian, Yearb. Dep. Agric. Madras f. 1928, p. 12—22 (Madras) (1929).

fuscifascialis Hampson, Fauna Brit. India Moths, Ceylon,
4, p. 277 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Brit.
Lond., p. 639 (1898). Neu-Guinea

laticostalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Java
9, p. 248 (♂) (1912).

Species incertae sedis.

rectistrigosa Snellen, Tijds. v. Ent., 15, p. 92, t. 7, Indien
f. 11, 12, 1872 (*Marasmia*); in Veth, Mid- (Sikkim),
den-Sumatra, 4, Lep., p. 65 (1880). — Sumatra,
Karsch, Ent. Nachr., 26, p. 250 (1900). Java,
Celebes;
Span. Guinea,
Togo,
Kamerun,
Congo,
D. Ostafrika,
Fernando Po;
St. Aignan;
N. Amerika

sanitalis Snellen in Veth, Midden-Sumatra, 4, Lep., Sumatra,
p. 65 (1880) (*Cnaphalocrocis*). — Hamp- Borneo,
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 639 (1898). — Celebes
E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 342
(1901).

sordidalis W. Rothschild, Novit. Zool., 22, p. 225 Ceram
(1915).

subvenilialis Snellen, Tijds. v. Ent., 38, p. 124 (♂, Java
♀) (1895) (*Dolichosticha*). — Hampson, Proc.
Zool. Soc. Lond., p. 640 (1898).

c) Aethiopische Region.

venilialis Walker, vide sub a) Paläarktische Region.

hampsoni W. Rothschild, Novit. Zool., 28, p. 227 N. Nigeria
(1921).

trebinsalis Walker, vide sub b) Orientalische Region.

trapezalis Walker, vide sub b) Orientalische Region.

brunneofusalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Brit. Zentr.-
8) 20, p. 378 (♀) (1917). Afrika

rectistrigosa Snellen, vide sub b) Orientalische
Region.

d) Australische Region.

- venialis* Walker, vide sub a) Paläarktische Region.
hemicrosa Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 217 (♂, ♀) (1887) (Tahiti). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 639 (1898). Fidji Ins.
treblusalis Walker, vide sub b) Orientalische Region.
araealis Hampson, vide sub b) Orientalische Region.
trapezalis Guenée, vide sub b) Orientalische Region.
fuscifascialis Hampson, vide sub b) Orientalische Region.

Species incertae sedis.

- aurea* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 230 (1888). Fidji Ins.
 — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 639 (1898).
carstensziana W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, no. 15, p. 129 (♂, ♀) (1915). Holl. Neu-Guinea (Snow-Mts.)
hexagona Lower, Trans. Roy. Soc. S. Austral., 27, p. 63 (♂) (1903). Queensland (Cooktown)
ioxodesma Turner, Proc. Roy. Soc. Queensland, 27, p. 44 (♂) (1915). N. Australien (Port Darwin)
rectistrigosa Snellen, vide sub b) Orientalische Region.

e) Nearktische Region.

- cochrusalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 959 (♀) (1859) (*Hydrocampa*?) (St. Domingo). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 639 (1898). — Barnes & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4926 (1917). U.S.A., Panama, Westindien, (St. Domingo)
azionalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 985 (♂) (1859) (*Botys*) (Rio Janeiro). Südamerika (Brasilien)
ruptalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1391 (♂) (1865) (*Botys*) (U.S.A.).
trapezalis Guenée, vide sub b) Orientalische Region.
floridalis Fernald, Journ. N. York Ent. Soc., 9, p. 49 (1901). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 265 (1914). — Barnes & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4928 (1917). Florida, Panama
rectistrigosa Snellen, vide sub b) Orientalische Region.

f) Neotropische Region.

- cochrusalis* Walker, vide sub d) Nearktische Region.
trapezalis Guenée, vide sub b) Orientalische Region.
floridalis Fernald, vide sub d) Nearktische Region.
perpersalis Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. 293 (1890) (*Cnaphalocrocis*). — Hampson, Portorico

- Proc. Zool. Soc. Lond., p. 640 (1898)
(Marasmia).
similis v. Hedemann, Ent. Zeit. Stett., 55, p. 287 St. Croix
 (♀) (1894) (*Cnaphalocrocis*). — Hampson,
 Proc. Zool. Soc. Lond., p. 641 (1898).
 30

41. Genus **Prodotaula** Meyrick

Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 541 (1934).

- conformis** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 541 Congo
 (♂, ♀) (1934). (Elisabeth-
 1 ville)

42. Genus **Rhimphalea** Lederer

Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 410 (1863). — Meyrick, Trans.
 Ent. Soc. Lond., p. 299 (1884). — Hampson, Fauna Brit. India
 Moths, 4, p. 278 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 596, 640 (1898).
 — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 335 (1901).

Spilomela Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 235 (1880)
 (Typus: *ommatalis* Snell.); Trans. Ent. Soc. Lond., p. 631
 (1890).

(Typus generis: *scelatalis* Led.)

a) Orientalische Region.

- trogusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 711 (♂) (1859) (Botys) (Sarawak). — Mey-
 rick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 513 (1889)
 (*Lepyrodes*). — Hampson, Fauna Brit. India
 Moths, 4, p. 278, f. 168 (♂) (1896); Proc.
 Zool. Soc. Lond., p. 640, f. 32 (♂) (1898).
 — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 464
 (1900). — Semper, Schm. Philipp. Ins., 2,
 p. 666 (1902).
ocularis Felder & Rogenhofer, Reise Novara,
 Lep. Het., p. 16, t. 136, f. 20 (1874) (*Pina-*
cia?) (Manila). — E. Hering, Ent. Zeit.
 Stett., 62, p. 336 (1901) (? = *ommatalis*
 Snell.).
ommatalis Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 235
 (1880); 27, p. 44, t. 4, f. 5, 5a (1884);
 (*Spilomela*) (Celebes, Sumatra); id., Trans.
 Ent. Soc. Lond., p. 631 (1890) (*Spilomela*).
 — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 336
 (1901) (spec. dist.).
megalopsalis Swinhoe & Cotes, Cat. Moths
 India, 5, p. 596 (1888), nec Walker (1865).
trogusalis Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond.,
 p. 469 (1894) (*Nausinoe*); p. 86 (1897)
 (*Nausinoe*).
megalopsalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, Malakka
 p. 1428 (♂) (1865) (Botys?).
trogusalis Hampson, Fauna Brit. India
 Moths, 4, p. 278 (1896) (part.); id., Proc.
 Zool. Soc. Lond., p. 640 (1898).

- ochalls** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 711 (♂) (1859) (*Botys*) (Java). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 278 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 640 (1898).
strabonalis Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 236 (1880) (*Spilomela*).
astrigalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 640, 761, t. 49, f. 25 (♂) (1898). Borneo
heranialis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 714 (♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 641 (1898). — Swinhoe, Cat. Het., 2, p. 465, t. 7, f. 17 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 337 (1901). Malakka, Sumatra, Borneo, Tevor Ins., Holl. u. Br. Neu-Guinea
lindusalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 712 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 641 (1898) (*Rhimphalea*). Borneo, Salomon Ins., Australien
lindalis Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 214 (1887) (*Rhimphalea*); Trans. Ent. Soc. Lond., p. 469 (1898) (*Nausinoe*).
fastidialis Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 228 (1880); 27, t. 3, f. 7, 7a (1884). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 641 (1898). Celebes

b) Australische Region.

- scelatalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 411, t. 15, f. 3 (1863). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 641, 1898. Australien, Neu-Guinea, Buru,
papualis Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 17, t. 136, f. 22 (1874) (*Rhimphalea*) (Neu-Guinea). Tevor Ins., Amboina (Typus)
aenone Butler, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 428 (1886) (*Rhimphalea*) (Rockhampton).
heranialis Walker, vide sub a) Orientalische Region.
splendidalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1490 (♂) (1865) (*Polythlipta*) (Neu-Guinea). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 641 (1898) (= *heranialis* Walk.). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 465, t. 7, f. 27 (1900). Neu-Guinea
anoxantha Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 248 (♂) (1912). Holl. Neu-Guinea
lindusalis Walker, vide sub a) Orientalische Region.
cleotoma Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 513 (1889). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 641 (1898). Neu-Guinea
linealis Kenrick, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 79, t. 4, f. 86 (1907). Brit. Neu-Guinea

12

43. Genus **Hyalea** Guenée

Guenée, Delt. & Pyral., p. 206 (1854). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 596, 641 (1898).

(Typus generis: *dividalis* Hübn.)

- dividalis** Hübn., Zuträge Samml. Exot. Schm., 4, p. 89, nr. 390, f. 779, 780 (1825). Nordamerika, Brasilien

- (*Anania*) (N. Amerika). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 642, f. 33 (♂) (1898) (Brasilien).
- pallidialis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 642, 761, t. 49, f. 23 (♂) (1898). Brasilien (S. Paulo), Peru
- succinalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 206 (♂) (1854). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 642 (1898). Brasilien
- africalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 249 (1912). S. Nigeria
- impeditalis** Maassen in Maassen & Weymer, Lep. Reise Stübel, p. 169, t. 9, f. 22 (1890) (*Botys*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 642 (1898). Ecuador

5

44. Genus **Leucochroma** Guenée

Guenée, Delt. & Pyral., p. 286 (1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 491 (1859). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 596, 642 (1898).

(Typus generis: *corope* Cram.)

- corope** Cramer, Pap. Exot., 4, p. 130, t. 357, f. J (1782) (*Phalaena Pyralis*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 642, f. 34 (♂) (1898). Mexiko, Honduras, Panama, Haiti, Franz. u. Holl.
- corrivalis** Hübner, Verz. bek. Schm., p. 358 (1826) (*Epipagis*). Guayana,
- splendidalis** Cramer, Pap. Exot., 4, p. 161, t. 371, f. L (1782) (*Phalaena Pyralis*). — Hübner, Verz. bek. Schm., p. 358 (1826) (*Epipagis*). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 266 (1895). Guayana, Brasilien (Amazonas), Kolumbien, Ecuador
- selectalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1396 (♀) (1865) (*Botys*) (Bogotá).
- minoralis** Warren, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 267 (1889) (*Leucochroma*).
- mineralis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 642 (1898) (ex synon).
- jamaicensis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 249 (♀) (1912). Jamaika
- colombensis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 250 (♂) (1912). Kolumbien, Panama
- colombiensis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 262 (1914).
- melusinalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 492 (1859) (*Leucochroma*) (Venezuela). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 642 (1898). — Dyar, Proc. Zool. Soc. Lond., 47, p. 263, nota 1 (1914). Venezuela, Trinidad
- peruvensis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 250 (♂) (1912). Peru
- trinitensis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 251 (♀) (1912). Trinidad

Species incertae sedis.

- analytica** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 263, Trinidad
nota 1 (1914).
- bicoloralls** Dyar, Zoologica, 1, p. 134, f. 42 (1910) Brit.
(Ischnurges). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., Guayana
47, p. 262 (1914) (*Leucochroma*).
- cecinalis** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 41, p. 248 Ecuador
(♀) (1897) (*Leucochroma?*). (Loja)
- cupharamacis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, Panama
p. 263 (♀) (1914).
- euphthinylla** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 262 Panama
(♂) (1914).
- neutralis** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 48, p. 127 Ecuador
(1904).
- prosalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 266, Panama
t. 62, f. 30 (1895). — Hampson, Proc. Zool. (Chiriqui)
Soc. Lond., p. 643 (1898).
- ruscialis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. Panama
266, t. 63, f. 1 (1895) (*Leucochroma?*). — (Chiriqui)
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 643
(1898).
- saltigalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 266, Panama
t. 62, f. 31 (1895). — Hampson, Proc. Zool. (Chiriqui),
Soc. Lond., p. 643 (1898). Peru

15

45. Genus **Syngamia** Guenée

Guenée, Delt. & Pyral., p. 187 (1854). — Walker, Cat. Lep. Het.
Brit. Mus., 17, p. 333 (1859). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7,
p. 434 (1863). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 279
(1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 596, 663 (1898) (typus: *flori-*
dalis Zell.). — Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. 196 (1900).
— Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p.
171, 192 (1928).

Platamonía Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 427
(1863) (typus: *ampliatalis* Led.). — Pagenstecher, Zoo-
logica (Chun) H. 29, p. 175 (1900). — Swinhoe, Cat. Het.
Oxford Mus., 2, p. 405 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit.
Stett., 64, p. 41 (1903).

Aethaloessa Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 435
(1863) (typus: *floridalis* Zell.).

Chnaura Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 435 (1863)
(typus: *floridalis* Zell.).

Bacotoma Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 282 (1883) (typus:
violata Fabr.).

Orphanostigma Warren, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 6)
6, p. 478 (1890) (typus: *abruptalis* Walk.).

(Typus generis: *florellalis* Guen. = *florella* Cram.)

a) Orientalische Region.

- floridalis** Zeller, Kgl. Vet. Akad. Handl. Lep. Südchina,
Micropt. Caffr., p. 60 (1852) (*Stenia*) (Na-
tal). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, Indien,
p. 435, t. 17, f. 2 (1863) (*Aethaloessa*). — Birma,
Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 239 Malakka,

- (1886). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 644 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun) H. 29, p. 196 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 327 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 193, t. 7, f. 23 (1928).
merionealis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, 334 (♂) (1859) (*Syngamia*) (Port. Natal).
vitialis Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 5, t. 135, f. 8 (1874) (*Botys*) (Viti).
fulvidalis Wallengren, Wien. Ent. Monatschr., 4, p. 174 (1860) (*Ilyalca*) (Tahiti). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 218 (1887).
 Biologie B. Fletcher, Trans. Linn. Soc. Lond., 13, p. 304 (1910) (Mimicry).
noxia: Zacher, Arbeit. K. Biol. Anst. Land-u. Forstw. (Berlin) 10 (1), p. 121—130 (1913).
- Tonkin,
 Formosa,
 Sumatra,
 Java,
 Celebes,
 Ceram,
 Chagos Ins.;
 Kamerun,
 D. Ostafrika,
 Kaffernland,
 Fernando Po;
 Brit.
 Neu-Guinea,
 Bismarck-
 Archipel,
 Shortland
 Ins., Neu-
 Hebriden,
 St. Aignan,
 Tahiti,
 Samoa,
 Herz. v.
 York Ins.

- aurantiaca* Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 254 (♀) (1912). Singapore
calidalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 294 (1854) Indien,
 (*Glyphodes*) (Coromandel). — Walkor, Cat. Ceylon,
 Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 497 (1859) Siam,
 (*Glyphodes*). — Lederer, Wien. Ent. Mo- Borneo,
 natschr., 7, p. 402 (1863) (*Glyphodes*). — Celebes,
 Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, Amboina,
 p. 50 (1891) (*Aethaloessa*); Proc. Zool. Soc. Philippinen,
 Lond., p. 644 (1898) (= *floridalis* Zell.). Aru,
 — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. Neu-Guinea,
 466 (1900) (*Syngamia*). — Semper, Schm. Neue
 Philipp. Ins., 2, p. 666 (1902). Hebriden
octavialis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 334 (♂) (1859) (*Syngamia*)
 (N. Indien, Sumatra). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 435, t. 17, f. 4
 (1863) (*Chnaura*). — Walkor, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1323 (1863) (*Chnaura*).
 — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 90 (1867) (*Chnaura*); Lep. Ceylon, 3, p. 271 (1885)
 (*Chnaura*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 277 (1890) (*Chnaura*). — Hampson,
 Proc. Zool. Soc. Lond., p. 644 (1898) (= *floridalis* Zell.).
tiphalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 335 (♂) (1859) (*Syngamia*)
 (Celebes). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 664 (1898) (= *floridalis* Zell.).
secutalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1291 (♂) (1863) (*Syngamia*)
 (Siam, Aru, Neu-Guinea, Ceram, Mysol). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 664
 (1898) (= *floridalis* Zell.). — Semper, Schm. Philipp. Ins., 2, p. 666 (1902) (*Syngamia*).

- floridalis* Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 628 (1890) (*Syngamia*), nec Zeller (1852). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 250, f. 164 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 644, f. 35 (♂) (1898) (*Syngamia*) (part.).
- xanthalis* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 644 (♀) (1898) (Humboldt Bai). Malakka, Neu-Guinea
- abruptalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 371 (1859) (*Asopia?*) (Ceylon). — Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 4 t. 135, f. 10 (1874) (*Botys*) (Bengalen). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 277, t. 178, f. 14 (1885) (*Hedylepta*). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 867 (1885) (*Pyrausta*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 279 (1896) (*Syngamia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 645 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 49 (1901) (*Pyrausta*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 194, t. 7, f. 32 (1928) (*Syngamia*).
- dotatalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1305 (1865) (*Asopia*) (S. Hindustan).
- suffectalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1307 (♀) (1865) (*Asopia*) (Moreton Bai).
- n o x a*: Zacher, K. Biol. Anst. Land- u. Forstw. (Berlin), 10 (1), p. 121—230 (1913).
- viblusalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 634 (♀) (1859) (*Botys*) (Congo). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 273 (1890) (*Marasmia*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 39 (1891) (*Orphanostigma*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 280 (♀) (1896) (*Syngamia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 645 (1898). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 194 (1928).
- canarialis* Snellen, Tijds. v. Ent., 41, p. 191, t. 9, f. 10 (♂) (1898) (*Botys*) (Java).
- terminalis* Wileman & South, Entom., 50, p. 178 (1917) (*Pyrausta*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 33 (1928) (*Syngamia*).
- n o x a*: Corbet, Malayan Agric. Journ. (Kuala Lumpur), 17 (8), p. 261—276 (1929).
- latimarginalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 370 (♂) (1859) (*Asopia*) (Ceylon). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 868 (1885) (*Asopia*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 277, t. 178, f. 16 (1885) (*Hedylepta*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 39 (1891) (*Orphanostigma*); 9, p. 49
- Indien,
Birma,
Ceylon,
Java,
Formosa,
Andamanen;
Span.
Guinea,
Goldküste,
Sierra
Leone,
N.W. Nigeria
Congo,
Brit. u. D.
Ostafrika,
Mashona-
land,
Rhodesia,
Mauritius,
Seychellen,
Sokotra;
Australien
(Moreton
Bai),
Fidji Ins.
- S. Indien,
Birma,
Java,
Formosa;
Westafrika,
Congo
- Indien
(Khasis),
Ceylon,
Birma,
Java,
Tonkin,
Formosa;

- (1893) (*Orphanostigma*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 279 (1896) (*Syngamia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 645 (1898) (*Syngamia*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 195 (1928) (*Syngamia*).
jucundalis Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 463, t. 8, f. 17 (1863) (*Botys*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 240 (1901).
versicolor Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6), 18, p. 175 (1896) (*Orphanostigma*) (Khasis, Nilgiris).
falsidicalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 370 (♀) (1859) (*Asopia*) (Ceylon). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 277 (1885) (*Hedy-lepta*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 39 (1891) (*Orphanostigma*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 280 (1896) (*Syngamia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 645 (1898). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 453 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 195 (1928).
suisharyonalis Strand, Deutsche Entom. Zeitschr. Iris, 32, p. 82 (♀) (1918) (*Pyrausta*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 33 (1928) (*Syngamia*).
dentilinealis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 645, t. 49, f. 24 (♀) (1898).
violata Fabricius, Mat. Ins., 2, p. 213, n. 238 (1787) (*Phalaena*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 645 (1898).
abjungalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 670 (♂) (1859) (*Botys*) (Ceylon). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 282, t. 180, f. 8 (1885) (*Baeotoma*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 51 (1893) (*Platamonia*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 281 (1896) (*Syngamia*). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 465 (1900) (*Platamonia*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 84 (1901) (*Sylepta*).
abjunctalis Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 376, t. 11, f. 11 (1863) (*Botys*).
latifusalis Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 281 (♂) (1912); id., Proc. Zool. Soc. Lond., p. 646 (1898).
albiceps Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8), 9, p. 254 (♂) (1912).
oggalis Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 288 (1906) (*Platamonia*). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 577 (1908) (*Syngamia*).
camillusalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 713 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 646 (1894) (*Platamonia*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 646 (1898) (*Syngamia*). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 465 (1900) (*Platamonia*).

West- u.
Ost-Afrika
(Kamerun,
Span.
Guinea)

West-,
Mittel- u.
Südchina,
Indien
(N. W.
Himalaya,
Assam,
Nilgiris),
Ceylon,
Formosa

Formosa
(Kosempo,
Suisharyo)

Java

Ceylon,
Sumatra

Birma,
Celebes

Singapore

Assam

Malakka,
Borneo

- medinalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 85, t. 4, f. 9—11 (1899) (*Platamonia*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 64, p. 42 (1903) (*Platamonia*).
Sumatra,
Java,
Celebes,
Woodlarck,
Teoor Ins.
- poecilura** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 64, p. 42 (♂, ♀) t. 1, f. 29 (1903) (*Platamonia*).
Sumatra,
Java,
Borneo

Species incertae sedis.

- moluccalis** Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 4, t. 135, f. 13 (1874) (*Botys*).
— Hampson, Proc. Zool. Soc., p. 646 (1898).
Molukken

b) Aethiopische Region.

- floridalis** Zeller, vide sub a) Orientalische Region.
- fervidalis** Zeller, Kgl. Vet. Akad. Handl. Lep. Micropt. Caffr., p. 59 (1852) (*Stenia*) (Limpopo, Gariep). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 645 (1898).
Span. Guinea,
D. Ostafrika,
Südafrika
- biblisalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 368 (♂) (1859) (*Asopia*) (Port Natal).
- abruptalis** Walker, vide sub a) Orientalische Region.
- liquidalis** Zeller, Kgl. Vet. Akad. Handl. Lep. Micropt. Caffr., p. 61 (1852) (*Stenia*) (Limpopo, Gariep). — Gaede, Stett. Ent. Zeit., 77, p. 133 (1916).
D. Ostafrika,
Kamerun,
Südafrika
- vibiusalis** Walker, vide sub a) Orientalische Region.
- latimarginalis** Walker, vide sub a) Orientalische Region.

Species incertae sedis.

- convulsa** Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 14 (♀) (1936).
Belg. Congo
(Itoko à
Gombe)
- longicornalis** Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr., 68 (1899), p. 744 (♂) (1900).
Madagaskar
- luteofusalis** Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr., 68 (1899), p. 744 (♂) (1900).
Madagaskar

c) Australische Region.

- floridalis** Zeller, vide sub a) Orientalische Region.
- calidalis** Guenée, vide sub a) Orientalische Region.
- xanthalis** Hampson, vide sub a) Orientalische Region.
- abruptalis** Walker, vide sub a) Orientalische Region.
- ampliatialis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 428, t. 16, f. 6 (1863) (*Platamonia*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1487 (1865) (*Platamonia*) (Amboina, Morty, Neu-Guinea). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. 113 (1888). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 468 (1894) (*Platamonia*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 646 (1898) (*Syngamia*).
Amboina,
Sula,
Aru Ins.,
Buru,
Key Ins.,
Bismarck-
Archipel,
Salomon
Ins.,
Holl.
Neu-Guinea,
Morty
- illatialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1436 (♂) (1865) (*Botys*) (Sula).

medinalis Snellen, vide sub a) Orientalische Region.
fuscicostalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8)
 20, p. 380 (1917).

Holl. u. Brit.
 Neu-Guinea

marmorata Lucas, Proc. Roy. Soc. Queensland, 8,
 p. 92 (1891) (Nausinoe) (Brisbane). —
 Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 646
 (1898).

Queensland,
 Brit.
 Neu-Guinea

subtessellalis Warren, Ann. Mag. Nat.
 Hist., (s. 6) 17, p. 137 (♀) (1896) (*Mero-*
dictya) (Queensland).

d) Nearktische Region.

micromphalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8)
 9, p. 253 (1912).

Florida,
 Mexiko

masculinalis Barnes & Mc Dunnough,
 Contr. Nat. Hist. Lep. N. Amer., 2 (4),
 p. 172, t. 2, f. 10 (1913) (*Sylepta*); id.,
 Check List Lep. Bor. Amer., p. 310, nr.
 4964 (1917) (*Sylepta*). — Dyar, Insec. Insc.
 Menstr., 5, p. 70 (1917).

florella Cramer, Pap. Exot., 4, p. 114, t. 348, f. L
 (1782) (*Phalaena Pyralis*). — Hampson, Proc.
 Zool. Soc. Lond., p. 644 (1898). — Barnes
 & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor.
 Amer., p. 129, nr. 4929 (1917) (*Anania*).

Florida,
 Bahama,
 Bermuda Ins.
 Mexiko,

quinqualis Hübner, Zuträge Samml. Exot.
 Schm., 2, p. 27, t. 176, f. 351, 352 (1823)
 (*Anania*); id., Verz. bek. Schmett., p. 360
 n. 3450 [1825] (*Anania*). — Druce, Biol.
 Centr.-Amer. Het., 2, p. 259 (1895).

Guatemala,
 Honduras,
 Costarica,
 Panama,

quisqualis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lon-
 don, p. 644 (1898) (ex synon.).

Kolumbien,
 Venezuela,
 Surinam,
 Brasilien

florcellalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 187
 (1854) (*Syngamia*) (Südamerika).

(Amazonas),
 Ecuador,
 Venezuela,
 Jamaika,
 Haiti,
 Dominica

haemorrhodialis Guenée, Delt. & Pyral., p. 201
 (1854) (*Salbia*) (Brasilien). — Hampson,
 Proc. Zool. Soc. Lond., p. 645 (1898) (*Syn-*
gamia). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett.,
 62, p. 50 (1901) (*Pyrausta*).

Texas,
 Panama,
 Mexiko,
 Haiti,
 Dominica

dircealis Walker, Cat. Lep. Het. Brit.
 Mus., 17, p. 365 (♀) (1859) (*Asopia*) (St.
 Domingo). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het.,
 2, p. 258 (1895).

futilalis Barnes & Mc Dunnough, Contr.
 Nat. Hist. Lep. N. Amer., 2 (6), p. 226 (♂, ♀),
 t. 1, f. 3 (1914) (*Hedylepta*) (Texas). —
 Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep.
 Bor. Amer., p. 130, nr. 4950 (1917) (*Hedy-*
lepta). — Dyar, Insec. Insc. Menstr., 5,
 p. 70 (1917).

floropieta Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 392
 (1914).

U.S.A.
 (N. Carolina,
 Missouri),
 Mexiko

c) Neotropische Region.

- abnormalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 215, t. 12, f. 7, 8 (1875) (*Salbia*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 643 (1898) (= *flabellalis* Guen.). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 263 (1914). Westindien, Panama, Costarica
- flabellalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 199 (1854) (*Salbia*) (Brasilien). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 643 (1898). Westindien, Panama, Kolumbien, Brasilien
- tytiusalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 984 (♂) (1859) (*Botys*) (Rio de Janeiro).
- endolasea** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 251 (♂) (1912). St. Vincent
- flabellalis* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 643 (1898) (part., nec Guenée) (1854).
- sciagraphalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 263 (♂) (1914). Panama
- plieata** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 251 (♂) (1912). Brasilien (Amazonas, S. Paulo), Paraguay
- ancidalis* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 644 (1898) (nec Snellen) (1875).
- deformalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 214, t. 12, f. 4—6 (1875). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 644 (1898). Kolumbien
- cognatalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 215, t. 12, f. 9, 10 (1875). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 644 (1898). Mexiko, Panama, Kolumbien
- melanobathrum** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 264 (♂) (1914). Panama
- eephaea** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 252 (♂) (1912). Kolumbien
- extensalis** Dognin, Hét. Nouv. Amer. Sud, 4, p. 30 (1911) (*Salbia*). Kolumbien
- ancidalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 216, t. 12, f. 11, 12 (1875). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 644 (1898) (part.). Brasilien
- lophoceralls** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, p. 379 (♂) (1917). Peru
- melanolopha** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, p. 379 (♂) (1917). Ecuador
- cassidalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 199 (♂) (1854) (*Salbia*) (Brasilien). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 644 (1898). Costarica, Panama, Trinidad, Brasilien, Ecuador
- squamosalis* Wallengren, Eugen. Resa, p. 381 (1861) (*Salbia*) (Puna).
- pellucidalis* Warren, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 268 (1889) (*Salbia*).
- mleromphalis** Hampson, vide sub d) Nearktische Region.
- pachyeeralis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, p. 380 (1917). Panama

- rubrocinctalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 204 (♂) (1854) (*Asopia*) (Cayenne). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 644 (1898). Mexiko, Honduras, Panama, Kolumbien, Trinidad, Fr. Guayana
- dilutalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1301 (1865) (*Salbia*) (Honduras).
- eoidalis** Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 4, t. 135, f. 14 (1874) (*Botys*) (Bogotá). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 274 (1899) (*Pyrausta*).
- coidalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 644 (1898) (ex synonym.).
- inflammatalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 253 (♀) (1912). Panama, Brasilien (S. Paulo), Paraguay
- pepitalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 187 (♂) (1854) (Cayenne). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 644 (1898). Panama, Kolumbien, Fr. Guayana, Brasilien
- collaris** Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 4, t. 135, f. 19 (1874) (*Botys*) (Bogotá).
- florella** Cramer, vide sub d) Nearktische Region.
- haemorrhoidalis** Guenée, vide sub d) Nearktische Region.
- anaemicalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 254 (♂) (1912). Paraguay
- tytlusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 605 (♀) (1859) (*Botys*) (Honduras). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 646 (1898). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 264 (1914). Honduras, Panama, Dominica, Trinidad, Brasilien (S. Paulo)
- violescentalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 16, p. 337 (♀) (1895); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 646 (1898). Grenada
- aquatlicalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 284, t. 8, f. 4 (♂) (1854) (*Spilomela*) (Brasilien). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 646 (1898). Panama, Brasilien
- lacrinesalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 965 (♂) (1859) (*Zebronia*) (Brasilien).

Species incertae sedis.

- florepecta** Dyar, vide sub d) Nearktische Region.
- fulviferalis** Dognin, Mém. Soc. Ent. Belg., 19, p. 174 (1912). Kolumbien
- fulviplaga** Dognin, Hét. Nouv. Amér. Sud, 4, p. 30 (1911). Kolumbien
- lotanalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 553, t. 100, f. 17, (1899) (*Salbia*). Costarica
- monostigmatalis** Dognin, Mém. Soc. Ent. Belg., 19, p. 174 (1912). Kolumbien
- nebulosalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 292 (♀) (1912). Costarica (Juan Vinas)

- praeformatalis** Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, Portorico,
p. 291 (♀) (1890) (*Salbia*). — Hampson, Kolumbien
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 646 (1898).
simulata Druce, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 9, p. Ecuador
330 (♂) (1902).
subnebulosalis Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 54, p. Mexiko
368 (1918).
tremulalis Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 539, Mexiko
t. 101, f. 15 (1899).
zena Druce, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 9, p. 330 Kolumbien
(1902).
61

46. Genus **Hileithia** Snellen

Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 217 (1875). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 596, 646 (1898).

(Typus generis: *H. appialis* Snell. = *decostalis* Guen.)

- decostalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 229 (♂) (1854) Panama,
(*Isopteryx*) (Brasilien). — Hampson, Proc. Brasilien,
Zool. Soc. Lond., p. 646, f. 36 (♂) (1898). Venezuela,
melicertalis Walker, Cat. Lep. Het., 17, Westindien
p. 356 (♀) (*Samea*) (Venezuela).
perseusalis Walker, Cat. Lep. Het., 17,
p. 475 (♀) (1859) (*Zebronia*) (Venezuela).
appialis Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 219,
(♂, ♀), t. 12, f. 13, 14 (1875) (Westindien).
ductalis Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. 292 Portorico
(♂) (1890). (Typus),
2 Cuba

47. Genus **Samea** Guenée

Guenée, Delt. & Pyral., p. 193 (1854). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 379 (1863). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 597, 647 (1898). — Forbes, Lep. N. York, p. 552, f. 328 (1923).

(Typus generis: *ecclesiialis* Guen.)

a) Orientalische Region.

- castoralis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, Indien
p. 693 (♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — (Nilgiris),
Hampson, Brit. India Moths, 4, p. 426 (♀) Tonkin,
(1896) (*Pionea*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. Sumatra,
247 (1898) (*Pionea*). — E. Hering, Ent. Borneo,
Zeit. Stett., 62, p. 282 (1901). — De Joannis, Andamanen,
Ann. Soc. Ent. Fr., 98 (1929), p. 666 (1930) Morty,
(*Samea*). Neu-Guinea
(Dinan Ins.)
purpurascens Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 615 (♂) (1877) (*Samea*) (Anda-
manen).
incisalis Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 74,
t. 4, f. 2, 3 (♂, ♀) (1899) (*Heterocnephes*)
(Sumatra).

trimaculalis Kenrick (ubi?).

subsp. *extensalis* W. Rothschild, Novit. Zool., 22, p. 225 (♂) (1915). Ceram (Manusela)

b) Aethiopische Region.

figuralis Walker, Proc. Nat. Hist. Glasgow, 1 (2), p. 368 (♀) (1869) (*Samea*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 647 (1898) (*Samea*). Congo

c) Australische Region.

castoralis Walker, vide sub a) Orientalische Region.

d) Nearktische Region.

ecclesiialis Guenée, Delt. & Pyral., p. 194, t. 6, f. 7 (♀) (1854) (Brasilien) (Kolumbien). — U. S. A. (N. Carolina, Florida), Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 647, f. 37 (♂) (1898). — Berg, An. Mus. Buen. Aires, 6, p. 385 (1899). — Holland, Moth Book, p. 393, t. 48, f. 2 (♀) (1903). — Bahama Ins., Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Gnatemala, Bor. Amer., p. 129, nr. 4931 (1917). — Honduras, Forbes, Lep. N. York, p. 552 (1923). Costarica, Panama, **castellalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 195 (♀) (1854) (*Samea*) (Brasilien, Kolumbien, N. Amerika). Dominica, Grenada, **lucusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 937 (♀) (1859) (*Samea*) (Brasilien). Trinidad, Kolumbien, Ecuador, **disertalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1302 (♂) (1865) (*Samea*) (Honduras). Venezuela, Franz, Guayana, Brasilien (Amazonas), Uruguay, Argentinien

multiplicalls Guenée, Delt. & Pyral., p. 277, (♂) (1854) (*Isopteryx*) (Brasilien). — U. S. A. (Florida), Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 647 (1898). Honduras, — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Panama, Bor. Amer., p. 129, nr. 4932 (1917). Brasilien, **discessalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1302 (♂), (1865) (*Samea*) (Honduras). **nicaeusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 464 (1859) (*Lepyrodes?*) (Honduras).

e) Neotropische Region.

ecclesiialis Guenée, vide sub d) Nearktische Region.
multiplicalls Guenée, vide sub d) Nearktische Region.

similalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 255 (1912). Brasilien (S. Paulo)

- choristalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 255 (1912). Trinidad,
Br. Guayana,
chloristalis Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., Panama
47, p. 264 (1914).
mictalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Mexiko,
p. 256 (1912). Guatemala,
ecclesiastis Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., Panama
2, p. 244 (1898) (part., nec Guenée) (1854).
alophalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Mexiko,
p. 257 (1912). Surinam

Species incertae sedis.

- asadias** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 555, Guatemala,
t. 100, f. 19 (♀) (1899) (*Samea?*). Costarica
conjunctalis Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, Portorico
p. 290 (♀) (1890). — Hampson, Proc. Zool.
Soc. Lond., p. 647 (1898).
delicata Kaye, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 996, t. 1, Trinidad
f. 22 (1922).
druchalalis Dyar, Insec. Insc. Menstr., 12, p. 20 Mexiko
(1924).

13

48. Genus **Trithyris** Lederer

Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 410 (1863). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 596, 648 (1898).

Praenesta Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 219 (1875)
(Typus: *fabialis* Snell.).

(Typus generis: *janualis* Led.)

- scyllalis** Walker, Cat. Het. Lep. Brit. Mus., 18, p. Mexiko,
566 (♂) (1859) (*Botys*) (Mexiko). — Hamp- Guatemala,
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 648, (♂) Honduras,
(1898). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., Costarica,
2, p. 247 (1895). Panama,
turnusalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Kolumbien,
Mus., 18, p. 628 (♀) (1859) (*Botys*) (Rio Ecuador,
de Janeiro). Brasilien
delicatalis Lederer, Wien. Ent. Monat- (Amazonas).
schr., 7, p. 376, 473, t. 11, f. 10 (1863)
(*Botys*) (Brasilien).
fabialis Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 220,
t. 12, f. 15 (♂), 16 (1875) (*Praenesta*).
sunialis Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 220, t. 12, Panama,
f. 17, 18 (♂) (1875) (*Praenesta*). — Hamp- Kolumbien
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 648 (1898).
rubralls Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 648 Peru
(♂) (1898).
aurantiacalis Warren, Trans. Ent. Soc. Lond., p. Brasilien
289 (1889). — Hampson, Proc. Zool. Soc.
Lond., p. 649 (1898).
perticalis Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. Panama,
(Het., p. 4, t. 135, f. 9 (♀) (1874) (*Botys*) Kolumbien,
(Bogotá). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het. Ecuador

- 2, p. 259 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 649 (1898).
- galbula* Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 4, t. 135, f. 20 (♂) (1874) (*Botys*). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 259 (1895). Bogotà
- iphielalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 376 (♂) (1859) (*Hyalca*) (Villa Nova). (Amazonas)
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 649 (1898).
- fulvirufalis* Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Peru
20, p. 381 (1917).
- protenoralis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 628 (♂) (1859) (*Botys*). (Ega, Santarem). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 649 (1898). Brasilien (Amazonas)
- nysalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 606 (♂) (1859) (*Botys*) (Santarem, Villa Nova). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 649 (1898). Brasilien (Unt. Amazonas)
- fenestralis* Guenée, Delt. & Pyral., p. 341, t. 5, f. 8 (♀) (1854) (*Botys*) (Brasilien). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 649 (1898). Mexiko, Ecuador, Brasilien (Rio de Janeiro)
- prosopealis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 358 (♂) (1859) (*Salbia*) (Jamaika). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 649 (1898). Jamaika
- janualis* Lederer, Wien. Ent. onatschr., 7, p. 410, 479, t. 15, f. 2 (1863). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 649 (1898). Brasilien
- latifasciatis* Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 238, t. 22, f. 12 (1875) (*Syllepis*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 649 (1898). Costarica, Kolumbien, Ecuador, Peru

Species incertae sedis.

- apicolor* Druce, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 9, p. 330 (1902) (*Syngamia*). Costarica, Panama, Kolumbien
- auropurpuralis* Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 54, p. 69 (1910). Peru, Franz. Guayana
- flavifimbria* Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 49, p. 69 (♀) (1905). Ecuador
- igneifacialis* Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 14 (3), p. 81 (♂) (1886). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 649 (1898). Jamaika
- pretiosalis* Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 292 (♀) (1912). Costarica (Sixola), Panama

49. Genus **Agrioglypta** Meyrick

Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 244 (1932).

enneactis Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 244 (♂, Fidji Ins.
♀) (1932). (Lautoka)

1

50. Genus **Diasictis** Hübner

Diastictis Hübner, Zutr. z. Sammlg. exot. Schmett., 1, p. 21 (1818) (*D. argyralis*); Verz. bek. Schm., p. 355 n. 3392 [1825]. — Hemming, Hübner, 2, p. 180 (1937). (Typus: *argyralis* Hübn.). — Bryk, Parnassiana, 5, p. 54 (1938).

Bocchoris Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 271 (1885). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 281 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 597, 649 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 197 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 327 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 171, 195 (1928); ibid., 25, p. 157, 167 (1929) (Typus: *inspersalis* Zell.).
Diastichtis Forbes, Lep. N. York, p. 545, f. 334 (1923).
Chabula Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 317 (1886) (Typus: *acamasalis* Walk.).

Didymostoma Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 9, p. 392 (1892) (Typus: *euphranoralis* Walk.).
Anomostictis Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 9, p. 434 (1892) (Typus: *argyralis* Hübn.).

(Typus generis: *D. argyralis* Hübn.)

a) Paläarktische Region.

onychinalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 205, t. 6, f. 9 (1854) (*Asopia*) (Coromandel). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 369 (1859) (*Asopia*). — Snellen, Tijds. v. Ent., 27, p. 45 (1884) (*Synclera*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 214 (1887) (*Synclera*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 636 (1890) (*Synclera*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 37 (1891) (*Synclera*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 10 (1894) (*Nausinoe*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 283, f. 170 (♂) (1896) (*Bocchoris*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 651, f. 39 (♂) (1898). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 467 (1901). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 197 (1900). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 454 (1901). — Rebel, Verh. z. b. Ges., 62, p. 148 (1911). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 197 (1928); 25, p. 168 (1929).
braurealis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 971 (♀) (1859) (*Zebronia*?) (Ceylon). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 316 (1886) (*Synclera*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 213 (1897) (*Synclera*). —

Syrien, Südchina, Korea, Japan, Formosa, Indien (Sikkim), Ceylon, Birma, Malakka, Borneo, Ceram, Bismarck-Archipel, Holl. Neuguinea, Australien; Südarabien, Westafrika, Kapland

- Swinhoe & Cotes, Cat. India Moths, 5, p. 633 (1889) (*Synclera*).
- astomalis* Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep., (Het.), p. 13, t. 135, f. 22 (♂) (1874) (*Lepyrodes*) (Südafrika). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 224 (1886) (*Glyphodes*).
- telphusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 974 (♂) (1859) (*Glyphodes?*) (Sarawak). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 284 (1896) (*Bocchoris*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 651 (1898). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 468 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 281 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 198, t. 7, f. 6 (1928); 25, p. 168 (1929).
- vicinialis* Snellen in Veth, Midden-Sumatra, 4, p. 77 (1880) (*Heterocnephes*) (Sumatra). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 627 (1898) (*Heterocnephes*). — Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 74 (1899) (*Heterocnephes*).
- uncinialis* Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 37, p. 273, t. 7, f. 6 (1884) (*Glyphodes*).
- reniferalis* Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 616 (1890) (*Heterocnephes*); id., Tijds. v. Ent., 42, p. 74 (1899) (*Heterocnephes*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 281 (1901).
- fazanalis* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 288 (1906) (*Bocchoris*). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 577 (1908).
- albitalunalis* Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 381, t. 31, f. 12 (1911) (*Glyphodes*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 31 (1928).
- adipalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 376 (*abipalis*), 475, t. 11, f. 16 (1863) (*Botys*) (Amboina). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1390 (1865) (*Botys*) (Amboina, Mysol). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 286 (1896) (*Bocchoris*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 652 (1898). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 468 (1900). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 454 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 198, t. 7, f. 15 (1928); 25, p. 169 (1929).
- notatalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1437 (♀) (1865) (*Botys*) (Mysol).
- cuprinalis* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 615 (1877) (*Samea*) (Port Blair). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 623 (1889).
- marginalis* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 114 (1896) (*Mimorista*) (Khasia Hills).
- Amur, Japan, Formosa, Indien (Assam, Sikkim), Birma, Sumatra, Nias, Borneo, Amboina, Brit. Neu-Guinea
- Japan, Formosa, Indien (Assam, Sikkim), Ceylon, Celebes, Birma, Malakka, Tonkin, Andamen, Buru, Amboina, Holl. Neu-Guinea, Mysol

- chosokeialis* Strand, Ent. Zeitschr. Frankfurt, 36 (4), p. 15 (1922) (*Bocchoris adipalis* fa.). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ., 22, p. 31 (1928).
 subsp. *nigromarginalis* Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 339 (1925).
aptalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1425 (♀) (1865) (*Botys*) (Mysol). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 286 (1896) (*Bocchoris*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 653 (1898). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 468 (1900). — Leech, Trans. Ent. Soc., p. 434 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 198, t. 7, f. 24 (1928); 25, p. 169 (1929).
usitata Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 3, p. 74, t. 59, f. 3 (1879) (*Samea*) (Yokohama).
euryclealis Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 471 (1901) (*Lygropia*), nec Walker (1859). — Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 380 (1911), part.
 subsp. *kwantungialis* Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 339, t. 1, f. 37 (1925).
inspersalis Zeller, Kgl. Vet. Akad. Handl. Lep. Micropt. Caffr., p. 33 (1852) (*Botys*). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 434 (1863) (*Aediodes*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 272 (1885) (*Bocchoris*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 39 (1891); 9, p. 49 (1893). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 9 (1894). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 284 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 654 (1898). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 487 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Steft., 62, p. 327 (1901). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 455 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 199, t. 5, f. 20 (1928); 25, p. 169 (1929).
afflictalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 190, t. 5, f. 4 (♀) (1854) (*Desmia*) (Abessinien). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 344 (1859) (*Desmia*).
bootanalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1298 (♂) (1865) (*Aediodes*) (Bhotan).
stellalis Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 3, p. 73, t. 58, f. 15 (1879) (*Desmia*).
albipunctalis Shibuya, Ins. Matsum., 3, p. 112 (♂) (1929).

Chosokei
(Formosa)

Südchina

Japan,
Formosa,
Indien
(Sikkim,
Assam),
Tonkin,
Sangir,
Buru, Mysol

Südchina

Nord-, Mittel-
u. Westchina,
Japan,
Formosa,
Indien
(Bhotan,
Nilgiris),
Ceylon,
Birma,
Tonkin,
Sumatra,
Java;
Südarabien,
Abessinien,
Kamerun,
D. Ostafrika,
Rhodesia,
Kaffernland,
Madagaskar,
Mauritius,
Seychellen,
Fernando Po

Bonin Ins.

b) Orientalische Region.

- rotundalis** Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 169, t. 172, f. 23 (1893) (*Synclera*) (Ceylon). — Hampson, Fauna Brit.

Indien,
Ceylon

- India, 4, p. 282 (1896) (*Bocchoris*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 650 (1898).
- invertalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 20, p. 78, t. 6, f. 4 (1877). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 287 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 650 (1898). Birma, Sumatra, Borneo, Brit. Neu-Guinea, Queensland
- junctifascialis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 650, t. 49, f. 29 (♀) (1898) (*Bocchoris*). Banda Ins.
- inductalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1450 (♀) (1865) (*Botys*) (Java). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 650 (1898). Pulo Laut, Java
- danalis** Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 169, t. 172, f. 25 (1893). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 282 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 651 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 327 (1901). Ceylon (Typus), Sumatra, Java
- incisalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 215 (1880); 26, p. 132, t. 8, f. 1, 1a (1883) (*Botys*) (Celebes). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 283 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 651 (1898). Indien, Ceylon, Celebes (Typus); Westafrika; Brasilien
- in scisalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 651 (1898) (*Bocchoris*).
- tenera** Butler, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 167 (1883) (*Hydrocampa*) (Celebes). Celebes
- onychinalis** Guenée, vide sub a) Paläarktische Region.
- albinalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 21, p. 1263 (1912) (*Bocchoris*). Bombay, Arabien (Muscat)
- insulalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 257 (♀) (1912) (*Bocchoris*). Ceram, Fergusson Ins.
- acamasalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 970 (♂) (1859) (*Zebronia*?) (Hindustan). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 317 (1886) (*Chabula*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 281 (1890) (*Chabula*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 616 (1890). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 284 (1896) (*Bocchoris*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 651 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 271 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 197 (1928). Mittel- u. Südchina, Indien, Ceylon, Birma, Tonkin, Formosa, Sumatra, Java, Celebes, Flores
- perspicualis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1347 (♂) (1865) (*Zebronia*) (S. Indien, Dekkan). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 91 (1867) (*Lepyrodes*). — Butler, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 167 (1883) (*Salbia*?). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 870 (1885) (*Salbia*?).
- flexissimalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1426 (♀) (1865) (*Botys*?) (Flores, Java).
- strangulatis** Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 224 (1880); 27, p. 35, t. 3, f. 1, 1a (1884) (*Heterocnephes*).

- telphusalis** Walker, vide sub a) Paläarktische Region.
- terrealis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 503 (♂) (1859) (*Glyphodes*) (Sarawak). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 651 (1898) (*Bocchoris*). — Swinhoe, Cat. Het. Oxford Mus., 2, p. 468, fig. (1900). Borneo
- vedonalis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 197 (♂, ♀) (1894) (*Chabula*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 282 (1901) (*Chabula*). — Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 288 (1906). Assam, Sumatra, Nias, Borneo, Pulo Laut
- vedrualis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 284 (1896) (*Bocchoris*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 652 (1898).
- sphenocosma** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 456 (♂) (1894). (*Margaronia*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 652 (1898). Pulo Laut
- pulvrealis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 652 (♂) (1898) (*Bocchoris*). Java
- adipalis** Lederer, vide sub a) Paläarktische Region.
- euphranoralis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 1004 (♂) (1859) (*Botys*) (Celebes). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 652 (1898) (*Bocchoris*). Celebes, Br. Neu-Guinea
- aptalis** Walker, vide sub a) Paläarktische Region.
- artificialis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 370, 463, t. 8, f. 16 (1863) (*Botys*) (Brasilien). — Snellen, Tijds. v. Ent., 26, p. 126 (1883) (*Botys*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 38 (1891) (*Mimorista*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 285 (1896) (*Bocchoris*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 653 (1898). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 199 (1928). Indien (N. W. Himalaya, Kalkutta), Formosa, Java, Celebes, Philippinen; Brasilien
- inscitalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1297 (♀) (1865) (*Aediodes*) (Hindustan). — Butler, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 167 (1883) (*Samea*).
- abstrusalis** Moore, Descr. N. Ind. Lep. Ins. Atkinson, p. 207 (1888) (*Aediodes*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 624 (1900).
- xanthialis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 653 (1898) (*Bocchoris*). Amboina, Queensland
- ciliata** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 206 (♂) (1894) (*Aediodes*) (Cherra Punji). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 285 (♀) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 654 (1898) (*Bocchoris*). Assam
- trimaculalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 232 (♀) (1880) (*Aediodes*); 27, p. 42, t. 4, f. 2, 2a (1884). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 284 (1890). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 285 (1896) (*Bocchoris*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 654 (1898). Assam, Birma, Celebes (Typus)

- quaternalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 434, 483, t. 17, f. 1 (1863) (*Aediodes*). — Ceylon.
Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 224 (1887) (*Bocchoris*). — Amboina,
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 654 (1898); Journ. Bombay Key Ins.,
Nat. Hist. Soc., 15, p. 214 (1903). Neu-Guinea, Queensland

Species incertae sedis.

- amandalis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) Siam
11, p. 511 (♂) (1903) (*Bocchoris*).
lumaralis Holland, Novit. Zool., 7, p. 586 (♂) Buru
(1900) (*Bocchoris*).
manuscalis W. Rothschild, Novit. Zool., 22, p. 225 Ceram
(♂) (1915) (*Bocchoris*). (Manusela)

e) Aethiopische und Madagassische Region.

- incisalis** Snellen, vide sub b) Orientalische Region.
onychnalls Guenée, vide sub a) Paläarktische Region.
flavibrunnea Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Natal
651, t. 49, f. 30 (♂) (1912) (*Bocchoris*).
labyrinthalls Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. S. Nigeria
8) 9, p. 258 (♂) (1912). (*Bocchoris*).
rufflavallis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Madagaskar
9, p. 259 (1912) (*Bocchoris*).
inspersalis Zeller, vide sub a) Paläarktische Region.

Species incertae sedis.

- nuclealis** De Joannis, Bull. Soc. Léop. Genève, 5, Port.
p. 247, t. 7, f. 13 (1927) (*Bocchoris*). Ostafrika
rectilinealis Kenrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. Madagaskar
99, t. 5, f. 191 (1917) (*Bocchoris*).
tenuilinealis Kenrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 99 Madagaskar
(1917) (*Bocchoris*).

d) Australische Region.

- invertalis** Snellen, vide sub b) Orientalische Region.
onychinalis Guenée, vide sub a) Paläarktische Region.
insulalls Hampson, vide sub b) Orientalische Region.
telphusalis Walker, vide sub a) Paläarktische Region.
adipalis Lederer, vide sub a) Paläarktische Region.
cuphranoralls Walker, vide sub b) Orientalische Region.
aurotinetalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Brit. Neu-
653 (1898) (*Bocchoris*). Guinea, Fer-
gusson Ins.,
Queensland
aptalis Walker, vide sub a) Paläarktische Region.

xanthialis Hampson, vide sub b) Orientalische Region.
quaternalis Lederer, vide sub b) Orientalische Region.

e) Nearktische Region.

argyralis Hübner, Zuträge Samml. Exot. Schm., 1, U.S.A. (Atlant.
 p. 21, nr. 57, f. 113, 114 (1818) (*Diastictis*) Staaten, N.
 (Georgien); Verz. bek. Schm., p. 355 (1826) York, N.
 (*Diastictis*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Hampshire,
 Lond., p. 653 (1898) (*Bocchoris*). — Barnes Wyoming)
 & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor.
 Amer., p. 129, nr. 4933 (1917) (*Diastictis*). —
 Forbes, Lep. N. York, p. 545 (1923) (*Diastictis*).

forma *ventralis* Grote & Robinson, Trans.
 Amer. Ent. Soc., 1, p. 21, t. 2, f. 23 (♂,
 ♀) (1867) (*Botys ventralis*) (N. York bis
 Pennsylvanien). — Hampson, Proc. Zool.
 Soc. Lond., p. 653 (1898) (*argyralis* var.).
 — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep.
 Bor. Amer., p. 129, nr. 4933 (1917) (*Diastictis*).
 — Strand, Arch. f. Naturg., 85,
 A 12, p. 138 (1920). — Forbes, Lep. N.
 York, p. 545 (1923) (*argyralis* var.).

fracturalis Zeller, Verh. z. b. Ges. Wien, 22, p. 509, U.S.A. (Texas,
 t. 3, f. 16 (1872) (*Botys*) (Texas). — Hamp- Arizona),
 son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 653 (1898) Mexiko
 (*Bocchoris*). — Holland, Moth Book, p. 393,
 t. 48, f. 1 (♂) (1903). — Barnes & Mc
 Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer.,
 p. 129, nr. 4934 (1917) (*Diastictis*).

caecalis Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 9, U.S.A.
 p. 434 (1892) (*Anomostictis*). — Hampson, (Kalifornien)
 Proc. Zool. Soc. Lond., p. 653 (1898) (*Bocchoris*). — Barnes & Mc Dunnough, Check
 List Lep. Bor. Amer., p. 129, no. 4935
 (1917) (*Diastictis*).

talis Grote, Canad. Ent., 10, p. 26 (♂) (1878) (*Botys*) U.S.A.
 (Alabama). — Hampson, Proc. Zool. Soc. (Alabama,
 Lond., p. 654 (1898) (*Bocchoris*). — Barnes Virginia)
 & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor.
 Amer., p. 129, nr. 4936 (1917) (*Diastictis*).
 — Forbes, Lep. N. York, p. 546 (1923).

rehamalis Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 393 Texas, Mexiko
 (1914) (*Bocchoris*).

f) Neotropische Region.

adalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 989 Brasilien
 (♂) (1859) (*Botys?*) (Ega). — Hampson,
 Proc. Zool. Soc. Lond., p. 650 (1898) (*Bocchoris*).

obliqualis Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Costarica
 p. 293 (♀) (1912) (*Bocchoris*). (Juan Vinas,
 Guapiles)

incisalis Snellen, vide sub b) Orientalische Region.

- consortilinealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Grenada
6) 16, p. 336 (♀) (1895) (*Bocchoris*); Proc. (Typus),
Zool. Soc. Lond., p. 651 (1898). — Dyar, Dominica,
Proc. U. S. Nat. Mus., 54, p. 368 (1918). Jamaika,
veroniae Dyar, Insec. Insc. Menstr., 5, p. Cuba, Br.
89 (1917) (*Lamprosoma*). Guayana
- darsanalis** Druce, Biol. Centr.-Amer., 2, p. 238, Panama,
t. 62, f. 6 (1895) (*Bocchoris*). — Hampson, Mexiko,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 651 (1898). Brasilien
- incoalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 201 Peru
(♂) (1920) (*Bocchoris*).
- marucalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 237, Mexiko
t. 62, f. 3 (1895) (*Bocchoris*). — Hampson,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 651 (1898).
- cubanalisis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 200 Cuba
(♀) (1920) (*Bocchoris*). (Santiago)
- chalcidiscalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Guatemala,
652 (♂) (1898) (*Bocchoris*) (Espiritu Santo). Brasilien
— Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 558, (Espiritu
t. 100, f. 23 (1899). Santo)
- stigmatalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 652 Brasilien
(1898) (*Bocchoris*). (S. Paulo)
- plenilinealis** Dyar, Insec. Insc. Menstr., 5, p. 58 Br. Holl. u.
(1917) (*Bocchoris*). Fr. Guayana,
Cuba
- artificialis** Lederer, vide sub b) Orientalische Region.
- fracturalis** Zeller, vide sub e) Nearktische Region.
- clytialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, Brasilien
p. 342 (♂) (1859) (*Desmia*). — Hampson,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 654 (1898) (*Boc-
choris*).

Species incertae sedis.

- approprialis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 266 Costarica,
(♀) (1914) (*Bocchoris*). Panama
- apygalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 229 (♀) (1854) Mexiko,
(*Isopteryx*) (Kolumbien). — Hampson, Proc. Panama,
Zool. Soc. Lond., p. 701 (1898) (*Nacoleia*). Kolumbien
— Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 265
(1914) (*Bocchoris*).
- appialis* Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2,
p. 238, t. 62, f. 1 (1895) (*Pterygisus*).
- densalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 266 Panama
(♀) (1914) (*Bocchoris*).
- differentialis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 266 Panama
(♀) (1914) (*Bocchoris*).
- edaphodrepta** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 267 Panama
(♂) (1914) (*Bocchoris*).
- hohaelis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 263 Panama
(♂) (1914) (*Bocchoris*).
- invidiosa** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 267 Panama
(♂) (1914) (*Bocchoris*).

- nacobora** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 267 Panama
(♀) (1914) (*Bocchoris*).
placitalis Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Costarica
p. 294 (♀) (1912) (*Bocchoris*). (Juan Vinas)
rehamalis Dyar, vide sub e) Nearktische Region.
rhealis Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 239, t. Mexiko
62, f. 9 (1895) (*Nacoleia*). — Hampson,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 703 (1898) (*Nacoleia*). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus.,
47, p. 268 (1914) (*Bocchoris*).
rhehabalis Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 268 Panama
(♀) (1914) (*Bocchoris*).
sparsalis Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 266 Panama
(♀) (1914) (*Bocchoris*).

63

51. Genus **Carthade** Snellen

Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 91 (1899).

(Typus generis: *cacalis* Snell.)

caecalis Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 92 (1899); Kolumbien
id., 43, p. 278, t. 15, f. 14 (♂) (1901).

1

52. Genus **Salbiomorpha** Snellen

Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 216 (1875). — Hampson, Proc.
Zool. Soc. Lond., p. 595, 654 (1898).

(Typus generis: *torsalis* Guen.)

torsalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 200 (♂) (1854) Fr. Guayana,
(*Salbia*) (Cayenne). — Hampson, Proc. Zool. Kolumbien
Soc. Lond., p. 654, f. 40. (♂) (1898).

1

53. Genus **Pilocrocis** Lederer

Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 430 (1863). — Hampson,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 597, 655 (1898). — Forbes, Lep. N.
York, p. 549, f. 333 (1923).

Ceratoclasia Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 430
(1863) (Typus: *delimitalis* Guen.). — Meyrick, Trans. Ent.
Soc. Lond., p. 221 (1887).

Lotanga Moore, Lep. Ceyl., 3, p. 344 (1886) (Typus:
milvinalis Swinh.). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford
Mus., 2, p. 469 (1900).

Anisoctena Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 455
(1894) (Typus: *synomotis* Meyr.).

(Typus generis: *ramentalis* Led.)

a) Orientalische Region.

coptobasis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 656 Celebes,
(♂) (1898). Amboina,
Batjan,
Fergusson
Ins., Neu-
Guinea

- synomotis** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 456 (1894) (*Anisoctena*) (Celebes). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 656 (1898) (*Pilocrocis*). Celebes, Sula Ins.
- fumidalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 261 (1912). Borneo, Sangir
- barcalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 1001 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 313 (1896) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 657 (1898) (*Pilocrocis*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 469 (1900) (*Lotanga*). Indien, Ceylon, Birma, Borneo, Flores
- milvinalis** Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 875, t. 57, f. 2 (1885) (*Deba*) (Bombay). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 344, t. 183, f. 11 (1885) (*Lotanga*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 273 (1890) (*Lotanga*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 38 (1891).
- anigrusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 682 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 657 (1898) (*Pilocrocis*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 469, t. 26 (1900) (*Lotanga*). Borneo, Br. Neu-Guinea
- confixalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1430 (♂, non ♀) (1865) (*Botys*) (Neu-Guinea). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 659 (1898). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 469, t. 8, f. 18 (1900) (*Lotanga*). Borneo, Sumbawa, Sula, Neu-Guinea
- conjunctalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1437 (♂) (1865) (*Botys*) (Sula, Neu-Guinea).
- iatifuscalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 659 (1898). Amboina
- acutangula** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 659 (1898). Borneo (Sandakan)
- dohrnialis** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 289 (♂) (1901); 64, t. 1, f. 26 (1903). Sumatra

Species incertae sedis.

- polialis** Schaus, Philippin. Journ. Sci., 34, p. 313, t. 1, f. 12 (♀) (1927). Philippinen (Luzon)
- sulpitalis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 18, p. 414 (♂) (1906) (*Ceratoclasia*). Sumatra

b) Aethiopische und Madagassische Region.

- cuprealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 259 (♂) (1912). S. Nigeria
- pterygodia** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 263 (1912). Goldküste, Uganda, Mashonaland, Transvaal

- melastictalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Mashonaland,
9, p. 264 (1912). Natal
- glaucitalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Natal
9, p. 265 (1912).
- dichocrosalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Zambesia,
9, p. 266 (♂) (1912). — Janse, Check List Port. Ost-
S. Afr. Lep. Het., p. 159 (1917). afrika, Süd-
afrika,
- nigridentalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Br.
9) 1, p. 127 (1918). Zentr.-Afrika

Species incertae sedis.

- aegrotalis** Zeller, Kgl. Vet. Akad. Handl. Lep. Südafrika
Micropt. Caffr., p. 39 (1852) (*Botys*) (Lim-
popo, Gariep). — De Joannis, Bull. Soc.
Ent. Fr., p. 286 (1925) (*Pilocrocis*).
- ingemlnata** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 401 Belg. Congo
(♀) (1933); 5, p. 13 (♂) (1936). (Katanga)
- laralis** Hampson, Trans. Zool. Soc. Lond., 19, p. 135, Uganda
t. 4, f. 67 (1909). (Ruwenzori)
- nubillnea** Bethune-Baker, Ann. Mag. Nat. Hist., Congo (Ituri)
(s. 8) 3, p. 436 (1909).
- patagialis** Hampson, Trans. Zool. Soc. Lond., 19, Uganda
p. 135, t. 4, f. 66 (1909). (Ruwenzori),
Kamerun
- percnospila** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 400 Belg. Congo
(♂ ♀) (1933). (Equateur,
Busanga,
Ifuta)
- xanthostictalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Madagaskar
(s. 8) 1, p. 490 (♂) (1908).

c) Australische Region.

- coptobasis** Hampson, vide sub a) Orientalische Re-
gion.
- pachyceralls** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Br.
8) 20, p. 383 (♂) (1917). Neu-Guinea
- nielangnatha** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Holl.
8) 9, p. 262 (♂) (1912). Neu-Guinea
- anlgrusalis** Walker, vide sub a) Orientalische Re-
gion.
- confixalis** Walker, vide sub a) Orientalische Region.

Species incertae sedis.

- angulifera** Kenrick, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 553, Neu-Guinea
t. 68, f. 15 (1912).
- erlomorpha** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 400 Fidji Ins.
(♂) (1933). (Vunidawa)

- insignificalis** W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., Holl.
2, nr. 15, p. 130 (♀) (1915). Neu-Guinea
- stephanorma** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 608 Fidji Ins.
(♀) (1935). (Vunidawa)

d) Nearktische Region.

- tripunctata** Fabricius, Ent. Syst., 3 (2), p. 217 n. 327 U.S.A. (Texas,
(1794) (*Phal.*; Amer. mer. Insul.). — Hamp- Florida),
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 655 (1898). Bahama Ins.,
— Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Cuba, Porto-
Bor. Amer., p. 129, nr. 4938 (1917). — rico, Jamaika,
Jones, U. S. Dept. Agric. (Wash.) Bull., nr. Dominica,
609, 12 pp. (1917). Haiti,
campalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 344 Mexiko,
(1854) (*Botys*) (Haiti). — Druce, Biol. Guatemala,
Centr.-Amer. Het., 2, p. 213 (1895). Salvador,
cubana Guenée, Delt. & Pyral., p. 345 Panama,
(♀) (1854) (*Botys*) (Cuba). Kolumbien,
memmialis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Brasilien
Mus., 18, p. 731 (♂) (1859) (*Botys*) (Pa-
tria?).
Biologie: Jones, U. S. Dept. Agric. (Wash.)
Bull., nr. 609, 12 pp. (1917).
noxa: Ritchie, Jamaica Dept. Agric. Rep. f.
1917/18 (Kington), p. 34—40 (1918). —
Cotton, Journ. Dep. Agric. Porto Rico (Rio
Piedras), 2 (4), p. 265—313 (1918). —
Smyth, Rev. Agric. Puerto Rico (San Juan),
4 (5), p. 11—21 (1920). — Bondar, Correio-
agric., 3 (4), p. 102—103 (Bahia) (1925).
— Edwards, Ent. Bull. Dep. Agric. Jamaica
(Kingston), nr. 5, 12 pp. (1930).
Parasiten: Jones, U. S. Dept. Agric.
(Wash.) Bull., nr. 609, 12 pp. (1917).
- plumbicostalis** Grote, Canad. Ent., 3, p. 103 (♂) Alabama,
(1871) (*Botys*) (Alabama). — Hampson, Proc. Florida
Zool. Soc. Lond., p. 655 (1898). — Barnes
& Mc Dunnough, Check List Lep. Bor.
Amer., p. 129, nr. 4939 (1917).
- ramentalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 430, U.S.A. (N.
t. 16, f. 13 (1863) (Patria?). — Hampson, York bis Zen-
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 656, f. 41 (♂) tralstaaten,
(1898). — Barnes & Mc Dunnough, Check Florida),
List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4937 Panama,
(1917). — Forbes, Lep. N. York, p. 549 Venezuela,
(1923). Brasilien
- perfuscalis* Hulst, Trans. Amer. Ent. Soc.,
13, p. 159 (♂) (1886) (*Zinckenia*) (Florida).
- inguinalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 346 (♂) U.S.A.
(1854) (*Botys*) (Cayenne). — Hampson, Proc. (Alabama,
Zool. Soc. Lond., p. 657 (1898). — Barnes Florida),
& Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Bahama Ins.,
Amer., p. 129, nr. 4940 (1917). Brasilien
- thalloalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit.
Mus., 18, p. 610 (1859) (*Botys*) (Brasilien).
- anticostalis** Grote, Canad. Ent., 3, p. 104
(1871) (*Botys*) (Alabama).

levalis Hulst, Trans. Amer. Ent. Soc., 13, p. 152 (1896) (*Botys*) (Florida, Kalifornien).

— Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4940 (1917).

thoasalis Hampson, Zool. Proc. Soc. Lond., p. 657 (1898) (ex synonym.). — Barnes &

Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129 (1917) (ex synonym.).

tristigmalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 659 Florida
(♀) (1898) (Miami). — Barnes & Mc Dun- (Miami),
nough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, Bahama Ins.
nr. 4941 (1917).

e) Neotropische Region.

lauralis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, Costarica,
p. 358 (♂) (1859) (*Salbia*) (St. Domingo, Panama,
Venezuela, Ega). — Druce, Biol. Centr. Kolumbien,
Amer. Het., 2, p. 224, t. 11, f. 17 (1895). — Venezuela,
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 655 Ecuador,
(1898). Brasilien
?verecundalis Berg, Bol. Ac. Nac. Cord., (Amazonas),
1, p. 177, 15 (1874) (*Ceratoclasia*). Haiti,
Dominica

delimitalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 351 (1854) Mexiko,
(*Botys*) (Haiti). — Lederer, Wien. Ent. Guatemala,
Monatschr., 7, p. 431, t. 16, f. 14 (1863) Costarica,
(*Ceratoclasia*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Panama,
Lond., p. 655 (1898). Brasilien,
Haiti

imbrexalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, Brasilien
p. 937 (♂) (1859) (*Botys*) (Rio de Janeiro).
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 655
(1898). — Therese v. Bayern, Berlin. Ent.
Zeitschr., 46, p. 287 (1901).

flagellalis Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 53, p. 92 Franz.
(1909). Guayana

gnamptoceralis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Panama
(s. 8) 20, p. 381 (♂) (1917).

infuscalis Druce, Biol. Centr.-Amer. Het.,
2, p. 244 (1895) (part. (*Ceratoclasia*), nec
Guenée) (1854).

tripunctata Fabricius, vide sub d) Nearktische Re-
gion.

eurypalpalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Costarica,
9, p. 259 (♂) (1912). Kolumbien

goniopalia Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Kolumbien
9, p. 260 (♂) (1912).

fulvicolor Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, Br. Guayana,
p. 382 (1917). Brasilien
(Pernambuco
Bolivien

fulviflavalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Peru
20, p. 382 (♀) (1917).

- purpurascens** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Ecuador,
656 (1898) (Loja; Trinidad). Trinidad
- pallidipuncta** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 49, Ecuador
p. 70 (♂) (1905).
- dithyralis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Br. Guayana,
p. 261 (1912). Brasilien
(Amazonas)
- monothyralis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Panama,
9, p. 261 (1912). Br. u. Fr.
Guayana
- ramentalis** Lederer, vide sub d) Nearktische Region.
- femoralis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Br. Guayana
p. 262 (♂) (1912).
- cora** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 393 (♂) Mexiko,
(1914). Trinidad
- dryalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 573 Mexiko,
(1859) (*Botys*) (St. Domingo). — Hampson, Bahama Ins.,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 657 (1898). Jamaika,
glaucausalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Haiti,
Mus., 18, p. 576 (♂) (1859) (*Botys*) (Ja- Grenada,
maika). Trinidad
- xiphialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. Costarica,
594 (♂) (1859) (*Botys*) (Rio de Janeiro). Panama,
— Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 223, Venezuela,
t. 61, f. 16 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Ecuador,
Soc. Lond., p. 657 (1898). Brasilien
serratilinealis Lederer, Wien. Ent. Mo- (Rio de
natschr., 7, p. 375, 472, t. 11, f. 2 (1863) Janeiro)
(*Botys*) (Venezuela). — Druce, Biol. Centr.-
Amer. Het., 2, p. 223 (1895).
- calamistis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 657 Mexiko
(♂) (1898). (Jalapa)
- hypoleucalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Mexiko,
9, p. 262 (1912). Panama,
agavealis Druce (nec Walker), Biol. Centr.- Jamaika
Amer. Het., 2, p. 242 (1895) (*Stenomelas*),
nec Walker (1859).
- roseinalis* Druce, Biol. Centr.-Amer. Het.,
2, p. 253 (1895), part. (*Omiodes*).
- inguinalis** Guenée, vide sub d) Nearktische Region.
- xanthyalinalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Venezuela
657 (♂) (1898).
- plicatalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Br. Guayana
p. 263 (♂) (1912).
- roxonalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 253, Panama
t. 62, f. 20 (1895). — Hampson, Proc. Zool.
Soc. Lond., p. 658 (1898).
- poliochroa** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Peru
20, p. 383 (♂) (1917).
- reniferalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Jamaika
9, p. 264 (♀) (1912).
- liberalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 380 (♀) (1854) Panama,
(*Botys*) (Brasilien?). — Hampson, Proc. Zool. Fr. Guayana,
Soc. Lond., p. 658 (1898). Brasilien,
Trinidad

- sixolalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 296 (♂) (1912). Costarica
(Juan Vinas,
Sixola)
- leucoplagalalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 658, p. 761, t. 49, f. 18 (♀) (1898). Mexiko,
Brasilien
(Castro
Paraña)
- var. *cachiana* Strand, Arch. f. Naturg., 85, A. 12, p. 138 (1920). Costarica
- xanthozonalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 264 (1912). Br. u. Fr.
Guayana
- damonalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 617 (1859) (*Botys*) (Villa Nova). — (Amazonas)
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 658 (1898).
- gilippusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 536 (1859) (*Heterodes*) (Villa Nova, Ta-
payos). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 658 (1898). Brasilien
(Amazonas)
- flavicorpus** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, p. 384 (♂) (1917). Peru
- infuscalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 350 (♂) (1854) Guatemala,
(*Botys*) (Brasilien). — Hampson, Proc. Zool. Panama,
Soc. Lond., p. 658 (1898). St. Domingo,
- agavealis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 574 (♀) (1859) (*Botys*) (St. Trinidad,
Domingo). Kolumbien,
Brasilien
- pruinialis* Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 373, 469, t. p. f. 6 (1863) (*Botys*) (Rio de
(Brasilien). Janeiro)
- fuliginialis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1400 (♀) (1865) (*Botys*) (Bra-
silien).
- decora** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 269 (1914). Panama,
Costarica,
Peru
- cuprescens** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 20, p. 384 (♂) (1917). Peru
- anormalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 352 (♂) (1854) Honduras,
(*Botys*) (Cayenne). — Hampson, Proc. Zool. Jamaika,
Soc., p. 658 (1898). Haiti, Fr.
- alvinialis* Guenée, Delt. & Pyral., p. 352 (♂) (1854) (*Botys*) (Brasilien). Guayana,
Brasilien
(Rio de
Janeiro)
- guianalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 202 (♂) (1920). Fr. Guayana
(Cayenne)
- discodontalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 658 (♂) (1898). Venezuela
(Aroa)
- cyrissalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 255, t. 62, f. 23 (1895). — Hampson, Proc. Zool.
Soc. Lond., p. 658 (1898). Panama

- cyranonalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 204 (♂) (1920). Guatemala (Cayuga)
- cryptalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 255, t. 62, f. 22 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 658 (1898). Panama
- maceralis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 940 (♂) (1859) (*Botys?*) (Villa Nova). Brasilien (Amazonas). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 659 (1898).
- metachrysius** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 125 (♂) (1918). Peru (Jahuar-mayo)
- leucochasma** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 265 (♂) (1912). N.O. Peru (Huanca-bamba)
- ab. *huanca bamba* Strand, Arch. f. Naturg., 82, A 3, p. 11 (1916) (*Pil. leuc. ab.*). N.O. Peru (Huanca-bamba)
- tristigmalis** Hampson, vide sub d) Nearktische Region.
- eupreinitens** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 125 (♀) (1918). Jamaika
- chlorisalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 601 (♂) (1859) (*Botys*) (Rio de Janeiro). Mexiko, Panama, Brasilien
- Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 659 (1898).
- rufescens** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 266 (1912). Bahama Ins. (Nassau)
- holoxantha** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 266 (♀) (1912). Jamaika
- caustichroalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 126 (♀) (1918). Peru (Yahuar-mayo)
- melanoproctis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 659 (♂) (1898). Brasilien (S. Paulo)
- collustralis** Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 14 (3), p. 76 (♂) (1886). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 660 (1898). Bahama Ins., Jamaika (Typus), Panama
- lactealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 267 (♀) (1912). Brasilien (Rio de Janeiro)

Species incertae sedis.

- apellalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 295 (♂) (1912). Costarica (Avangarez)
- bastalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 204 (♂) (1920). Peru
- caudatella** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 42, p. 103 (♂) (1912). Mexiko (Misantla)
- chathamalis** Schaus, Zoologica, 5, p. 45 (1923). Galapagos Ins.

- citrina** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 9, p. 330 (♂) (1902). Ecuador
- cyclostigma** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 268 (♀) (1914). Panama
- dentilinealis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 202 (♂) (1920). Brasilien (Rio de Janeiro)
- estebanalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 203 (♀) (1920). Venezuela (S. Esteban Valley)
- evanidalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 204 (♂) (1920). Guatemala (Cayuga)
- gastralis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 346 (♀) (1854) Haiti, Guadeloupe, Bahama Ins.
- granjae** Hoffmann, An. Inst. Biol. Mexico, 5, p. 205 (♂) (1934). Mexiko
- mapetalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 295 (♂) (1912). Costarica (Tuis, Sixola)
- metatalis** Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. 307 (1890) (*Ceratoclasia*).
metatalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 660 (1898). Portorico
- microbathra** Meyrick, Veröff. Deutsch. Kolonial-u. Übersee-Mus. Bremen, 1 (3), p. 324, t. 13, f. 3 (♂) (1936). Venezuela (La Trinidad, Maracay)
- modestalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 295 (♂) (1912). Costarica (Sixola), Panama
- musalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 295 (♂) (1912). Costarica (Sixola, Banana River)
- nalotalis** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus., 65, art. 7, p. 62 (♂) (1924). Ecuador (Loja)
- omophanes** Meyrick, Arb. morph. taxon. Ent. Berlin-Dahlem, 3 (2), p. 99 (♀) (1936). Surinam
- pargialis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 201 (♂) (1920). Castro Paraña
- plumbilinea** Kaye, Trans. Ent. Soc., p. 154, t. 6, f. 4 (1901). Trinidad
- plumipes** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 49, p. 70 (1905). Ecuador
- rooalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 247, t. 14, f. 4 (1875) (*Ceratoclasia*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 660 (1898). Kolumbien
- runatalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 268 (♀) (1914). Panama
- sororalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 203 (♂) (1920). Guatemala (Typus: Cayuga)

- subcandidalis** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 49, Ecuador
p. 70 (1905).
- tenebralis** Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 246, t. 14, Kolumbien
f. 2, 3 (1875) (*Ceratoclasia*). — Hampson,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 660 (1898).
- terminalis** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 54, p. Peru,
120 (1910). Panama
- tortuosalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Costarica
p. 296 (♂) (1912). (Juan
115 Vinas,
Esperanza)

54. Genus **Ulopeza** Zeller

Zeller, Kgl. Vet. Akad. Handl. Lep. Micropt. Caffr., p. 57 (1852).
— Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 287 (1896); Proc. Zool.
Soc. Lond., p. 597, 660 (1898).

- Xacca* Walker, Proc. Nat. Hist. Glasgow Soc., 1 (2), p. 370
(1869) (Typus: *trigonalis* Walk.).
- Pseudanalthes* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 6,
p. 477 (1890) (Typus: *idyalis* Walk.).
- Pseudanalthes* Hampson, Proc. Zool. Soc. London, p. 597
(1898) (ex synonym.).

(Typus generis: *idyalis* Walker).

a) Orientalische Region.

- idyalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. Südchina,
996 (♂) (1859) (*Botys*) (Ceylon). — Swin- Indien
hoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 874 (1885) (Assam, Sik-
(*Botys*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 319, kim), Ceylon,
t. 183, f. 5 (1886) (*Analthes*). — Snellen, Tonkin,
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 618 (1890) (*Anal- Sumatra,
tes*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., Borneo,
p. 460 (1894) (*Analthes*). — Warren, Ann. Celebes,
Mag. Nat. Hist., (s. 6) 6, p. 477 (1890) Pulo Laut
(*Pseudanalthes*). — Hampson, Ill. Typ.
Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 49 (1893)
(*Pseudanalthes*); Fauna Brit. India Moths, 4,
p. 287, f. 171 (♂) (1896) (*Ulopeza*); Proc.
Zool. Soc. Lond., p. 661, f. 42 (1898) (*Ulo-
peza*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62,
p. 284 (1901).
- disjunctalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit.
Mus., 34, p. 1408 (♀) (1865) (*Botys*) (Süd-
Hindostan). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 319
(1886) (*Analthes*). — Hampson, Ill. Typ.
Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 38 (1891)
(*Pseudanalthes*).
- junctilinealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Bali
8) 9, p. 267 (♀) (1912).
- semivialis** Moore, Descr. N. Ind. Lep. Ins. Atkinson, Sikkim
p. 209, t. 7, f. 6 (1887) (*Patania*) (Dar-
jiling). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond.,
p. 618 (1890) (*Nosophora?*). — Hampson,
Fauna Brit. India Moths, 4, p. 288 (1896)

- (*Ulopeza*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 661 (1898).
 subsp. *nigricostalis* Caradja, Acad. Rom. Südchina
 Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 340 (1925).

Species incertae sedis.

- cruciferalis* Kenrick, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 79, Ceram, Br.
 t. 4, f. 97 (1907) (Br. Neu-Guinea). Neu-Guinea

b) Athiopische u. Madagassische Region.

- conigeralis* Zeller, Kgl. Vet. Akad. Handl. Lep. Span. Guinea,
 Micropt. Caffr., p. 58 (1852). — Hampson, Congo,
 Proc. Zool. Soc. Lond., p. 661 (1898). Südafrika
trigonalis Walker, Proc. Nat. Hist. Soc. (Limpopo,
 Glasgow, 1 (2), p. 370 (♀) (1869) (*Xacca*). Gariep)
 (Congo).
innotalis Karsch, Ent. Nachr., 26, p. 374 (♂) N. Kamerun
 (1900).
phacothoracica Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Goldküste,
 (s. 8) 9, p. 267 (1912). S. Nigeria
flavicepsalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Kamerun
 9, p. 267 (♂) (1912).
disjunctalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) Kamerun
 1, p. 126 (♂) (1912).
nigricostata Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) S. Nigeria
 9, p. 268 (♀) (1912).
denticulalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Transvaal,
 9, p. 269 (1912). Natal

Species incertae sedis.

- alcenialis* Strand, Arch. f. Naturg., 78, A 12, p. 74 Span.
 (♂) (1913). Guinea
 (Alen)
 ab. *fulvimaculalis* Strand, Arch. f. Na- Kamerun
 turg., 85, A 12, p. 141 (♂) (1920). (Bitje)
crocifrontalis Mabilie, Ann. Soc. Ent. Fr., 68 (1899), Madagaskar
 p. 744 (1900).

c) Australische Region.

- tenebrosalis* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) Queensland
 17, p. 101 (♀) (1896) (*Notarcha?*). — Hamp-
 son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 661 (1898).
sterictodes Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Br.
 9, p. 268 (♂) (1912). Neu-Guinea

Species incertae sedis.

- cruciferalis* Kenrick, vide sub a) Orientalische Re-
 gion.

d) Neotropische Region.

syleptalis Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Costarica
p. 296 (♀) (1912). (Juan Vinas,
17 Tuis)

55. Genus **Nosophora** Lederer

Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 407 (1863). — Moore, Lep. Ceyl., 3, p. 319 (1886). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 288 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 597, 661 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 197 (1900). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 171, 200 (1928); ibid., 25, p. 157, 170 (1929).

Analt(h)es Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 407 (*Analt(h)es* err. typ.), 502 (1863) (Typus: *semitritalis* Led.).
— Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 471 (1900).
— Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 285 (1901).

Analt(h)es Hampson, Proc. Zool. Soc. London, p. 661 (1898) (ex synonym.).

Eidama Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1374 (1865) (Typus: *hypsalis* Walk.).

(Typus generis: *chironalis* Led. nec Walk. = *conjunctalis* Walk.)

a) Paläarktische Region.

semitritalis Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 407, t. 14, f. 14 (1863) (*Analt(h)es*) (Amboina). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1487 (1865) (*Analt(h)es*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau, Ver. Naturk., 41, p. 275 (1888). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 618 (1890) (*Analt(h)es*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 291 (1896) (*Nosophora*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 663 (1898). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 471 (1900) (*Analt(h)es*): — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 200, t. 7, f. 7 (1928).
palpalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1430 (♂) (1865) (*Botys*) (Mysol).
var. *orbicularis* Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 201, t. 7, f. 16 (♂) (1928); 25, p. 170 (1929).
semivitalis Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 455 (1901), nec Lederer (1863). — Matsu-mura, Cat. Ins. Jap. p. 209 (1905).
subsp. *hilaralis* Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 340 (1925).

Süd- u. Mittelchina, Indien (Sikkim), Birma, Formosa, Borneo, Amboina, Philippinen, Pulo Laut, Br. Neu-Guinea, Mysol Japan, Formosa Mittelchina

b) Orientalische Region.

scotaula Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 459 (1894). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 291 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 662 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 285 (1901).

Birma, Singapur, Pulo Laut, Sumatra

- albiguttalis** Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 273, t. 8, f. 16 (nec 14) (1890). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 291 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 662 (1898). Südchina, Birma, Tonkin
- chironalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 683 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 289 (1896) (part.) (*Nosophora*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 662 (1898) (part.). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 470, t. 8, f. 26 (1900). Mittelchina, Assam, Tonkin, Singapur, Sumatra, Java, Borneo, Bismarck-Archipel (Neu-Pommern),
- conjunctalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1483 (♂) (1865) (*Nosophora*) (Flores). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 289 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 662 (1898). Assam, Sikkim, Birma, Borneo, Flores, Amboina, Neu-Guinea, Australien
- chironalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 407, t. 14, f. 12 (1863) (*Nosophora*) (nec Walker) (1859). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1483 (1865) (*Nosophora*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 225 (1887).
- ochnodes** Meyrick, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (s. 2) 1, p. 255 (♂) (1886) (*Nosophora*) (N. Guinea); Trans. Ent. Soc. Lond., p. 460 (1894).
- incomitata** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 205 (1894) (*Nagia*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 662 (1898) (= *N. chironalis* Walk.). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 479 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 283 (1901). Assam (Khasis), Birma, Tonkin, Sumatra, Java
- chironalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 15, p. 214 (1903) (part.); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 666 (1898) (part.).
- triguttalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 173 (1896). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 289 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 662 (1898).
- mesosticta** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 21, p. 1263 (1912). Assam
- taihokualis** Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 43 (1918). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 200, t. 7, f. 33 (1928). Formosa
- parvipunctalis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 290 (♂) (1896) (Tenasserim). Birma
- parvipunctalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 662 (1898).
- dispilalis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 288 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 662 (1898) (part.); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 12, p. 707 (1899). Assam, Tonkin, Borneo, Pulo Laut, Amboina, Br. Neu-Guinea

- subsp. *artusalis* Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 340, t. 2, f. 39 (♀) (1925). Südchina
- obliqualis* Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 170, t. 173, f. 5 (♂) (1893); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 662 (1898). Ceylon
- althealis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 697 (♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak); 34, p. 1487 (1865) (*Analthes*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 290, f. 172 (♂) (1896) (*Nosophora*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 663; p. 661, f. 43 (♂) (1898). Sikkim, Ceylon, Singapore, Borneo, Pulo Laut, Sula, Andamanen, Amboina, Bismarck-Archipel, Holl. u. Brit. Neu-Guinea, Buru, Mysol
- congenitalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1488 (♀) (1865) (*Analthes*) (Mysol, Sula, Neu-Guinea).
- quadrisingnata* Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 320, t. 183, f. 6 (♂, ♀) (1886). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 290 (1896) (= *althealis* Walk.); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 663 (1898) (= *althealis* Walk.). — W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, nr. 15, p. 130 (1915) (spec. dist.). Ceylon, Holl. Neu-Guinea
- semitritalis* Lederer, vide sub a) Paläarktische Region.
- fulvalis* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 663 (1898). Pulo Laut, Fergusson Ins., Holl. u. Br. Neu-Guinea
- flavibasalis* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 663, t. 50, f. 3 (♂) (1898). Buru, Neu-Guinea

Species incertae sedis.

- tripunctalis* Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 37, p. 275, t. 6, f. 5 (1884) (*Analthes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 664 (1898). Amboina
- unipunctalis* Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 37, p. 276 (1884) (*Analthes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 664 (1898). Amboina

c) Aethiopische Region.

- panaresalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 992 (♀) (1859) (*Botys*) (Congo). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 664 (1898). Span. Guinea, Kamerun, Congo
- latiferalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit., 34, p. 1401 (♂) (1865) (*Botys?*) (Sierra Leone). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 664 (1898). Sierra Leone, Rhodesia

d) Australische Region.

chironalis Walker, vide sub b) Orientalische Region.

conjunctalis Walker, vide sub b) Orientalische Region.

dispilalis Hampson, vide sub b) Orientalische Region.

euspalalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, Neu-Guinea
p. 1489 (♀) (1865) (*Analthes*). — Hampson,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 662 (1898) (*Nosophora*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford
Mus., 2, p. 471, t. 8, f. 4 (1900) (*Analthes*).

barbata Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 663, Fergusson
t. 50, f. 2 (♂) (1898). Ins., Br. u.
Holl.
Neu-Guinea

althealis Walker, vide sub b) Orientalische Region.

quadrisignata Moore, vide sub b) Orientalische Region.

bisexualis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Salomon Ins.
9, p. 321 (1912). (Bongainville)

semitritalis Lederer, vide sub a) Paläarktische Region.

fulvalis Hampson, vide sub b) Orientalische Region.

hypsalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, Aru, Holl.
p. 1374 (♂) (1865) (*Eiduma*) (Aru). — Neu-Guinea
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 663
(1898) (*Nosophora*). — Swinhoe, Cat. Lep.
Het. Oxford Mus., 2, p. 471, t. 7, f. 19
(1900) (*Analthes*).

flavibasalis Hampson, vide sub b) Orientalische Region.

23

56. Genus **Nothosalbia** Swinhoe

Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 471 (1900).

Chalcidoptera (part.) Hampson, Proc. Zool. Soc. London, p. 664 (1898).

(Typus generis: *straminalis* Guen.)

straminalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 200 (1854) Nordindien
(*Salbia*) (Coromandel). — Walker, Cat. Lep.
Het. Brit. Mus., 17, p. 360 (1859) (*Salbia*).
— Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4,
p. 291 (♂) (1896) (*Chalcidoptera*); Proc.
Zool. Soc. Lond., p. 664 (1898) (*Chalcidoptera*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford
Mus., 2, p. 471 (1900) (*Nothosalbia*).

nemoralis Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 421, t. 44, f. 6 (1889) (*Synclera*) (Simla).

1

57. Genus **Chalcidoptera** Butler

Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 5) 20, p. 119 (1887). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 291 (1896); Proc. Zool. Soc., p. 597, 664 (1898) (part.). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 198 (1900).

Euthalanthia Snellen, Tijds. v. Ent., 37, p. 42 (1894); 38, p. 144 (1895) (Typus: *crinipes* Feld. & Rog.).

Gnamptorhiza Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 135 (1896) (Typus: *multiplicalis* Warr.).

(Typus generis: *rubra* Butl. = *emissalis* Walk.).

a) Orientalische und Australische Region.

- atrilobalis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, Birma p. 292 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 664 (1898).
- rufilinealis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) Südchina, 16, p. 303 (♂) (1895). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 292 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 665 (1898). (Typus: Cherra Punji)
- pryeri** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 665, Borneo t. 50, f. 1 (♂) (1898).
- emissalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, Indien p. 1421 (♀) (1865) (*Botys*) (Aru). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 293, f. Ceylon, 173 (1896) (*Chalcidoptera*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 665, f. 44 (♂) (1898). — Swinhoe, Tonkin, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 472 (1900). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, Singapores, p. 198 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Sumatra, Stett., 62, p. 287 (1901). Java, Borneo, Philippinen, Aru, Salomon Ins., Bismarck-
crinipes Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. Het., p. 2, t. 134, f. 43 (♂) (1874) (*Analthes?*) (Amboina); Tijds. v. Ent., 38, p. 143 (1895) (*Euthalanthia*).
- rubra* Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 5) Archipel, 20, p. 120 (1887) (*Chalcidoptera*) (Salomon Br. Neu-Guinea, Ins., Alu).
pyrrhocoma Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 460 (♀) (1894) (*Analthes*) (Borneo).
- appensalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 27, p. 41, t. 3, N.O. Indien f. 12, 12a (1884) (*Entephria*) (Celebes, Java). (Khasis), — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 283 Ceylon, (1890) (*Entephria*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 294 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 665 (1898) (*Chalcidoptera*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, Birma, Tonkin, Sumatra, Rhodisia, p. 282 (1901) (*Chabula*).
- var. *fimbrialis* Gaede, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 8, p. 393 (1917). D. Neu-Guinea
- var. *aethiops* Gaede, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 8, p. 393 (1917). Togo, Kamerun

- aedilis** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 227 Australien
(♂) (1887) (*Conogethes*) (Townsville). — (Queensland)
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 665
(1898).
excavalis Warren, Ann. Mag. Nat. Hist.,
(s. 6) 18, p. 175 (♂) (1896) (*Patania*?)
(Queensland).
multiplicalis Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) Assam
17, p. 135 (♂) (1896) (*Gnamptorhiza*) (Kha-
sis).

b) Aethiopische u. Madagassische Region.

- trogobasalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Nigeria,
9, p. 321 (1912). — Janse, Check List S. S. Afrika
Afr. Lep. Het., p. 158 (1917).
thermographa Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Goldküste,
8) 9, p. 322 (♂) (1912). Togo,
rufilinealis Hampson, Proc. Zool. Soc. Rhodesia,
Lond., p. 497, t. 40, f. 23 (1910), nec Natal
Swinh. (1895).
contraria Gaede, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 8, p. 392 Togo,
(1917). Kamerun
var. *curtipalpis* Strand, Arch. f. Naturg., Kamerun
85, A 12, p. 140 (1920).
thermographalis Strand, Arch. f. Naturg., 85, A 12, Togo,
p. 140 (1920). Kamerun
orbidiscalls Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) Kamerun
1, p. 127 (♂) (1918).
appensalls Snellen, vide sub a) Orient. u. Austr.
Region.
bilunalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 665 Sierra Leone
(♂) (1898).
argyrophoralls Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Goldküste,
8) 9, p. 322 (♂) (1912). — Janse, Check- Südafrika
List S. Afr. Lep. Het., p. 158 (1917).

Species incertae sedis.

- albotessulalis** Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr., 68 (1899), Madagaskar
p. 744 (1900).
nigricans Gaede, Mitt. Zool. Mus., Berlin, 8, p. 393 Kamerun,
(1917). Span. Guinea
16

58. Genus **Eulepte** Hübner

Hübner, Zuträge Samml. Exot. Schm., 6, 3, 1, B. 1 [1825] (*Eu. concordalis* Hübn.). — Hemming, Hübner, 2, p. 194 (1937).

Mesocondyla Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 392
(1863). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 597, 666
(1898) (Typus: *dardusalis* Walk.).

(Typus generis: *Eu. concordalis* Hübn.)

- dardusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, Costarica,
p. 513 (♂) (1859) (*Phakellura*) (Rio de Brasilien
Janeiro). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het.,
2, p. 262 (1895) (*Mesocondyla*). — Hampson,

- Proc. Zool. Soc. Lond., p. 666, f. 45 (♂) (1898).
stigmatalis Lederer, Wien. Ent. Monatsschr., 7, p. 392, t. 13, f. 3 (♂) (1863) (*Mesocondyla*) (Brasilien).
concordalis Hübner, Zuträge Samml. Exot. Schm., 6, 3, 13, 1, B. 1, t. 435, f. 1—4 (1827) Mexiko, Guatemala,
 (Eulepte). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., Panama,
 2, p. 245 (1895) (*Mesocondyla*). — Hampson, Haiti,
 Proc. Zool. Soc. Lond., p. 666 (1898). Dominica,
gastralis Guenée, Delt. & Pyral., p. 346 Guadeloupe,
 (♀) (1854) (*Botys*) (Haiti, Guadeloupe). Trinidad,
socialis Sepp, Surinaamsche Vlind., 3, t. Venezuela,
 114 (1852—55) (*Phalaena*) (Surinam). Ecuador,
peranthusalis Walker, Cat. Lep. Het. Brasilien
 Brit. Mus., 18, p. 610 (♀) (1859) (*Botys*) (Amazonas)
 (Rio de Janeiro).
ogniusalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 730 (♂) (1859) (*Botys*) (Patritia?).
tarsibarbalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Panama,
 667 (♂) (1898) (*Mesocondyla*). Brasilien

3

59. Genus **Leucophofis** Butler

Butler, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 426 (1886). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 597, 667 (1898).

(Typus generis: *pulchra* Butl.)

- pulchra* Butler, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 426 Fidji Ins.,
 (1886). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., Samoa
 p. 667, f. 46 (♂) (1898). — Tams, Ins.
 Samoa, 3 (4), p. 276, t. 16, f. 5 (1935).

1

60. Genus **Coptobasoides** Janse

Janse in Van Straelen, Result. Sci. Voy. Ind. Orient. Néerland., 4 (12), p. 7, t. 5, f. 69—73, t. 6, f. 76, 77 (1935).

(Typus generis: *leopoldi* Janse)

- leopoldi* Janse in Van Straelen, Res. Sci. Voy. Ind. Celebes
 Orient. Néerland., 4, (12), p. 8 (♂) (1935).
sulcialis Janse in Van Straelen, Res. Sci. Voy. Ind. Celebes
 Orient. Néerland., 4 (12), p. 8, t. 5, f. 74,
 75, t. 6, f. 78—80 (1935).

2

61. Genus **Caprinia** Walker

Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 543 (1859). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 294 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 597, 667 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 199 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 239 (1901).

Caprina Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1366 (1865) (err. typ.).

Cydalima Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 397 (1863) (typus: *conchylalis* Guen.).

Sylora Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 472 (1900) (typus: *cirralis* Swinh.).

Uliocome Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 472 (1900) (typus: *diaphanalis* Walk.).

(Typus generis: *periusalis* Walk.)

a) Orientalische Region.

- cirralis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 19, Borneo, p. 170 (1897) (*Sisyrophora*) (Borneo). — Sumatra, Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, Singapore p. 472 (1900) (*Sylora*).
- cirrhialis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 668 (1898) (*Caprinia*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 242 (1901) (*Cydalima*).
- diaphanalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, Birma, p. 1365 (♀) (1865) (*Margaronia*) (Aru). — Sumatra, Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 209 Java, (♀) (1887); p. 456 (1894) (*Margarodes*). — Celebes, Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 294 Lombok, (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 668 (1898) Ceram, (*Caprinia*). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), Philippinen, H. 29, p. 199 (1900). — Swinhoe, Cat. Bismarck-Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 472 (1900) Archipel, (*Uliocome*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., Salomon Ins., 62, p. 242 (1901) (*Cydalima*). — Janse in Van Straelen, Res. Sci. Voy. Ind. Orient. Néerland., 4, (12), p. 8, t. 6, f. 83 (1935). Holl. Neu-Guinea, Queensland
- plumifera** Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 5) 10, p. 236 (1882) (*Margaronia*) (Neu-Pommern).
- margaronialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1442 (♀) (1865) (*Botys*) (Java). — Java, Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 668 Celebes (1898) (= *diaphanalis* Walk.). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 472 (1900) (= *Uliocome diaphanalis*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 242 (1901) (*Cydalima diaphanalis*). — Janse in Van Straelen, Res. Sci. Voy. Ind. Orient. Néerland., 4 (12), p. 8, t. 6, f. 84 (1935).
- fuscinerualis** Snellen, Tijds. v. Ent., 38, p. 123 Sumatra (1895) (*Botys*). — Snellen, Tijds. v. Ent., (Typus), 41, p. 192 (1899) (*Cydalima*). — E. Hering, Java, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 242 (1901) (= Philippinen *Cydalima diaphanalis* Walk.).
- conchylalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 303, t. 8, Indien (Bombay, Sikkim, f. 9 (♀) (1854) (*Margarodes*) (Bengalen). — Assam, Nilgiris), Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 529 (1859) (*Margaronia*). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 397 (1863) (*Cydalima*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, Birma, Tonkin, Borneo, p. 1369 (1865) (*Cydalima*). — Moore, Proc. Celebes, Zool. Soc. Lond., p. 94 (1867); p. 850 Andamanen, (1878) (*Cydalima*). — Snellen in Veth, Mid-Bismarck-den Sumatra, Lep., 4, p. 66 (1880); Tijds. Archipel, v. Ent., 26, p. 140 (1883) (*Cydalima*). — Samoa

- Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 871 (1885) (*Cydalima*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 326 (1885) (*Cydalima*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. 190 (1888) (*Cydalima*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 279 (1890) (*Cydalima*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 606 (1890) (*Cydalima*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 37 (1891); 9, p. 47 (1893) (*Cydalima*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 295, t. 174 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 668, f. 47 (1898) (*Caprinia*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 473 (1896) (*Cydalima*). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 199 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stettin, 62, p. 241 (1901) (= *Cydalima laticostalis* Guen.). Biologie: Ind. Mus. Notes, 6, p. 87, t. 4, f. 11 (1908).
- noxia**: Rutherford, Trop. Agric. (Peradeniya), 42 (1), p. 41—44 (1914); Rep. Ceylon Dep. Agric. f. 1912/13, p. 9—21 (Colombo) (1914). — Hutson, Ceylon Dep. Agric. Admin. Rep. f. 1919 (Peradeniya), p. C8—C10 (1920). Parasiten: Hutson, Ceylon Dep. Agric. Rep. f. 1921, p. C23—C26 (1922).
- mysteris** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 223 (♂) (1886) (*Cydalima*) (Neu-Hebriden). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 245 (1901) (*Cydalima*) (West-Java). — Rebel, 2. Beiheft Hamb. Wiss. Anstalt, 32, p. 137, 138 (1915) (= *conchylalis* Guen.). — Tams, Ins. Samoa, 3 (4), p. 281 (1935) (*Margaronia*). Java, Neu-Hebriden, Samoa
- felderi** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 401, 478, t. 13, f. 18 (1863) (*Caprinia*) (Amboina). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1366 (1865) (*Caprina* err.) — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 468 (1894) (*Caprinia*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 294 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 668 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 240 (1901). Assam, Sumatra, Java, Amboina, Ceram, St. Aignan, Fergusson Ins., Br. u. Holl. Neu-Guinea
- intermedia** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., 6, 17, p. 100 (1896) (*Caprinia*) (Khasis).
- marginata** Janse, Bull. Hill Mus., 1, p. 490 (♀) (1924). Ceram
- conglobatalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1421 (♂) (1865) (*Botys*) (Flores). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 668 (1898). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 473, t. 6, f. 17 (1900). Flores, Br. u. Holl. Neu-Guinea

b) Australische Region.

- diaphanalisis** Walker, vide sub a) Orientalische Region.
- mysteris** Meyrick, vide sub a) Orientalische Region.
- trichotarsia** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 324 (♂) (1912). Holl. Neu-Guinea

- cuprescens** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 324 (♂) (1912). Holl.
Neu-Guinea
felderi Lederer, vide sub a) Orientalische Region.
conglobatalis Walker, vide sub a) Orientalische Region.

Species incertae sedis.

- castanealis** Kenrick, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 80, t. 4, f. 105 (1907). Br.
Neu-Guinea
ocellalis Kenrick, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 80, t. 4, f. 106 (1907). Br.
Neu-Guinea

c) Neotropische Region.

- periusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 543 (♂) (1859). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 668 (1898). Venezuela
hyphusalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 523 (♀) (1859) (*Margaronia*). — Brasilien
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 668 (1898) (*Caprinia*). (Amazonas)

15

62. Genus **Spilomela** Guenée

Guenée, Delt. & Pyral., p. 280 (1854). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 597, 669 (1898) (typus: *perspicata* Fabr.).

(Typus generis: *fimbriauralis* Guen.)

- perspicata** Fabricius, Mant. Ins., 2, p. 213 (1787) Guatemala,
(*Phalaena*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Costarica,
Lond., p. 669, f. 48 (♂) (1898) (*Spilo- Panama,*
mela). Kolumbien,
strigialis Stoll in Cramer, Pap. Exot., Ecuador,
Suppl., p. 56, t. 12, f. 7 (1791) (*Phalaena Venezuela,*
Pyralis). Surinam,
stygialis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lon- Brasilien
don, p. 669 (1898) (ex synonym.). (Amazonas)
- fimbriauralis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 319 (♀) Mexiko,
(1854) (*Astura*) (Brasilien?). — Walker, Guatemala,
Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 548 (1859) Costarica,
(*Astura*). — Lederer, Wien. Ent. Monat- Panama,
schr., 7, p. 502, t. 12, f. 16 (1863) (*Astura*) Jamaica,
(Brasilien). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Haiti,
Het., 2, p. 247 (1895) (*Astura*). — Hamp- Trinidad,
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 669 (1898). Brasilien
fimbriauratalis Lederer, Wien. Ent. Mo-
natschr., 7, p. 390 (1863) (*Astura*) (err.
typ.).
- minoralis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Br. Guayana
p. 322 (♂) (1912).

Species incertae sedis.

- discordens** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 269 Panama,
(1914). Guayana

- paeonialis** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 9, p. 331 (♂) (1902).
5 Kolumbien,
Panama

63. Genus **Macarefaera** Meyrick

Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 255 (1886). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 295 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 598, 669 (1898).

Trichoptychodes Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 207 (1894) (Typus: *delicata* Swinh.).

(Typus generis: *hesperis* Meyr.)

hesperis Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 255 Assam,
(1886). — Hampson, Fauna Brit. India Tonkin,
Moths, 4, p. 296, f. 175 (♂) (1896); Proc. Sumatra,
Zool. Soc. Lond., p. 669, f. 49 (♂), p. 670 Fidji Ins.
(1898).

delicata Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, Assam
p. 207 (1894) (*Trichoptychodes*). — Hamp-
son, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 296
(1896) (= *hesperis* Meyr.); Proc. Zool. Soc.
Lond., p. 670 (1898) (= *hesperis* Meyr.).
— Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7)
17, p. 289 (1906); (s. 8) 20, p. 165 (1917)
(*Trichoptychodes*).

2

64. Genus **Acridura** Butler

Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 4) 15, p. 398 (1875). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 598, 670 (1898).

(Typus generis: *gryllina* Butl.)

daedala Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 227, Panama
t. 61, f. 24 (1895). — Hampson, Proc.
Zool. Soc. Lond., p. 670 (1898).

metallica Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 4) 15, Mexiko,
p. 399, t. 5, f. 5 (1875). — Druce, Biol. Guatemala,
Centr.-Amer. Het., 2, p. 227, t. 61, f. 22 Brasilien
(1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., (Espiritu
p. 670 (1898). Santo)

prochyta Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 227, Mexiko,
t. 61, f. 23 (1895). — Hampson, Proc.
Zool. Soc. Lond., p. 670 (1898).

gryllina Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 4) 15, p. Mexiko
398 (1875); id., Trans. Ent. Soc. Lond., Guatemala,
p. 125, t. 5, f. 6 (1878). — Hampson, Panama,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 670, f. 50 (♂); Kolumbien,
671 (1898). Ecuador,
glaucopidalis Oberthür, Etud. Ent., 6, Brasilien
p. 114, t. 20, f. 4 (1881) (*Phryctena*). (Espiritu
Santo),
Paraguay

Species incertae sedis.

- binigrata** Dognin, Mém. Soc. Ent. Belg., 19, p. 174 Kolumbien (1912).
caerulealis Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Costarica p. 297 (♂) (1912). (Juan Vinas)
eusebia Druce, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 9, p. Ecuador 331 (♂) (1905).
fortunata Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 49, p. 71 Bolivien (1905).
nigrans Druce, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 9, p. Peru, 331 (♂) (1902). Bolivien
pudens Druce, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 9, p. 331 Ecuador (♂) (1902).
pulchralis Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Costarica p. 297 (♂) (1912). (Juan Vinas)

11

65. Genus **Filodes** Guenée

Guenée, Delt. & Pyral., p. 317 (1854). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 390 (1863). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 214 (1887). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 602 (1890). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 296 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 593, 671 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 232 (1901).

Pinacia Geyer in Hübner, Zuträge Samml. Exot. Schm., 4, p. 15 (1832) (nec Hübner, ibid., 3, p. 13 [1831]). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 473 (1900).
Auxomitia Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 391 (1863) (typus: *mirificalis* Led.). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 191 (1900).

(Typus generis: *fulvidorsalis* Hb.)

a) Orientalische Region.

- fulvidorsalis** Geyer in Hübner, Zuträge Samml. Indien Exot. Schm., 4, p. 15, nr. 322, f. 643, 644 (Sikkim, 1832) (*Pinacia*) (Java). — Guenée, Delt. & Assam), Pyral., p. 317 (1854) (*Filodes*). — Walker, Ceylon, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 539 (1859) Birna, (*Euglyphis*) (Java). — Lederer, Wien. Ent. Malakka, Monatschr., 7, p. 390, t. 12, f. 17 (1863) Tonkin, (*Filodes*) (Manila, Java). — Moore, Proc. Sumatra, Zool. Soc. Lond., p. 95 (1867). — Snellen, Java, Tijds. v. Ent., 26, p. 137 (1883). — Swinhoe, Borneo, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 872 (1885) Celebes, An- (*Euglyphis*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. damanen, 33, t. 182, f. 2, 2a (larva) (1886) (*Filodes*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., Nicobaren, p. 215 (1887). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau, Philippinen, Ver. Naturk., 41, p. 270 (1888). — Pagenstecher, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 3, Amboina, p. 32 (1890). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Reunion; Lond., p. 280 (1890). — Snellen, Trans. Queensland, Ent. Soc. Lond., p. 601 (1890). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8,

- p. 37 (1891) (*Pinacia*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 47, p. 42 (1894) (*Filodes*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 468 (1894) (*Pinacia*); p. 10 (1894) (*Filodes*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 297, f. 176 (♂) (1896) (*Filodes*). — Pagenstecher in Kückenthal, Reise, Lep., p. 462 (1897). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 672, f. 51 (♂) (1898). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 473 (1900) (*Pinacia*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 233 (1901) (*Filodes*). — Fryer, Spol. Ceyl., 7, p. 220, f. 3, 4 (larva) (1911).
- patrueilis* Moore, Descr. N. Ind. Lep. Ins. Atkinson, p. 218 (1887) (*Filodes*) (Calcutta, Cherra Punji).
- mirificalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 391, t. 13, f. 3 (1863) (*Auxomitia*) (Nicobaren). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 602 (1890) (*fulvidorsalis* var.) (*Filodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 672 (1898) (*fulvidorsalis* var.). — Fryer, Spol. Ceyl., 7, p. 220, f. 1, 2 (larva) (1911) (spec. dist.). Südchina, Indien (Sikkim, Assam), Nicobaren, Borneo
- decoloralis** Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 66, t. 3, f. 7 (♂) (1899) (*Filodes*). — Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 234 (1901). Sumatra
- sexpunctalis** Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 603, t. 20, f. 6, 6a (1890) (*Filodes*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 297 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 672 (1898). Sikkim (Darjiling) Ceram
- fulvidorsalis* var. β, Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 539 (1859) (*Euglyphis*) (Himalaya).
- bilinealis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 577, t. E, f. 44 (1908) (*Filodes*). Ceylon
- fulvibasalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 672, p. 761, t. 50, f. 10 (♂) (1898) (*Filodes*). Tenimber Ins., Queensland
- tenuimarginalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 127 (♀) (1908) (*Filodes*). Sangir Ins.

Species incertae sedis.

- minoralis** Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 222 (1880); 26, p. 137, t. 8, f. 8, 8a (1884) (*Auxomitia*). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 191 (1900) (*Auxomitia*). Celebes, Bismarck-Archipel (Neu-Pommern)

b) Aethiopische u. Madagassische Region.

- cocytusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 540 (♀) (1859) (*Euglyphis*) (Sierra Leone). — Strand, Arch. f. Naturg., 85, A 12, p. 142 (1920) (*Filodes*). Sierra Leone, Kamerun, D. Ostafrika, Reunion
- cocytusalis* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 671 (1898) (err. typ.) (*Filodes*).

- abnormalis* Plötz, Ent. Zeit. Stett., 41, p. 305 (♂) (1880) (*Phryganodes?*) (Bonjongo, Aburi).
productalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 671; p. 761, t. 50, f. 14 (♂) (1898) (*Filodes*). Congo, Zentralafrika (Ikomba), Br. u. D.
costivitrallis Guenée in Maillard, Réunion, Lep., p. 65 (1852). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 671 (1898) (= *cocytusalis* Walk.). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 233 (1901). Ostafrika, Mashonaland, Rhodesia, Portug., Ost-Afrika, Mauritius

1111

fulvidorsalis Hübner, vide sub a) Orientalische Region.

normalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 323 (1912) (*Filodes*). Goldküste, S. Nigeria, Kamerun

Species incertae sedis.

- alboterminalis** Kenrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 98, t. 5, fig. (1917) (*Filodes*). Madagaskar
grisealis Kenrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 98, t. 6, fig. (♀) (1917) (*Filodes*). Madagaskar
hesusalis Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 391, t. 12, f. 15 (♀) (1863) (*Filodes*). Sierra Leone
obscuralis Strand, Arch. f. Naturg., 85, A 12, p. 142 (♂, ♀) (*Filodes*). Kamerun

c) Australische Region.

- fulvidorsalis** Hübner, vide sub a) Orientalische Region.
fulvibasalis Hampson, vide sub a) Orientalische Region.
xanthalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 672, p. 761, t. 50, f. 11 (♂) (1898) (Tenimber). Br. u. Holl. Neu-Guinea, Fergusson Ins., Trobriand Ins.
 — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 232 (1901).

Species incertae sedis.

minoralis Snellen, vide sub a) Orientalische Region.
 16

66. Genus **Tyspanodes** Warren

Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 7, p. 425 (1891). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 298 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 598, 682 (1898). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 171, 201 (1928); ibid., 25, p. 157, 170 (1929).

Peribona Snellen, Tijds. v. Ent., 38, p. 145 (1895) (typus: *venosa* Butl.).

Radiorista Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 138 (1896) (typus: *venosa* Butl.).

(Typus generis: *nigrolinca* Moore)

a) Paläarktische Region.

- striata** Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 3, p. 76, t. 59, f. 10 (1879) (*Astura*) (Yokohama). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 673 (1898) (*Tyspanodes*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 474 (1900). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 456 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 202, t. 7, f. 34 (1928); 25, p. 170 (1929). — Caradja, Mat. Microlep. Chin. Prov., p. 36 (1935).
 var. *saturata* Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 341, t. 1, f. 38 (1925).
 West- u. Südchina, Japan, Korea, Formosa
 Mittel- u. Südchina

b) Orientalische Region.

- venosa** Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 7, p. 98, t. 135, f. 10 (1889) (*Heterocnephes*) (Dharmasala). — Snellen, Tijds. v. Ent., 38, p. 145 (1895) (*Peribona*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 299 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 673 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 230 (1901).
creaghi Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 672 (♂, ♀); p. 761, t. 50, f. 7 (♂) (1898).
linealis Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 665, t. 33, f. 14 (1867). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 298 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 673 (1898).
 Indien (Himalaya, Sikkim), Java
 Borneo
 Südchina, Indien (Himalaya, Sikkim), Ceylon, Andamanen
hypsalis Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 7, p. 426 (1891) (Sikkim). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 673 (1898); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 12, p. 708, t. A, f. 9 (1899). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 455 (1901). — Caradja, Acad. Rom. Mem., (s. 3) 3, mem. 7, p. 341, t. 2, f. 41 (1925). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 201, t. 7, f. 25 (1928).
 Nord- u. Westchina, Sikkim, Korea, Formosa
obscuralis Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 341, t. 2, f. 40 (1925).
striata Butler, vide sub a) Paläarktische Region.
exathesalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 978 (♂) (1859) (*Euglyphis*) (Sarawak). — Hampson, Zool. Proc. Soc. Lond., p. 673 (1898) (*Tyspanodes*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 474, t. 6, f. 16 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 228 (1901).
flavolimbatis Snellen, Tijds. v. Ent., 38, p. 127 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. London, p. 674 (1898).
flaviventer Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 7, p. 426 (1891) (Sikkim). — Hamp-
 Indien (Sikkim, Assam), Malakka, Sumatra, Nias, Java, Borneo

- son, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 298 (♂) (1896) (spec. dist.); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 673 (1898) (spec. dist.). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 229 (1901) (= *exathesalis*).
- nigrolinealis** Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 95 Sikkim (1867) (*Filodes*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 603 (1890) (*Filodes?*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 298, f. 177 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 673 (1898).
- fascialis** Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 665 Indien (1867) (*Propachys*). — Snellen, Trans. Ent. (Sikkim, Loc. Lond., p. 604 (1890) (*Filodes?*). — Assam), Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 298 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 674; p. 673, f. 52 (♂) (1898). Tonkin
- cardinalis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, Assam p. 299 (♀) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 674 (1898).

c) Australische Region.

- albidalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Salomon Ins. p. 323 (♂) (1912).

Species incertae sedis.

- metachrysalis** Lower, Trans. Roy. Soc. S. Austral., Queensland 27, p. 63 (1903).
- phaeosticha** Turner, Proc. Roy. Soc. Queensland, Queensland 24, p. 146 (♂, ♀) (1913).
- radiota** Kenrick, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 80, t. 3, Br. Neu- f. 108 (1907). Guinea

d) Neotropische Region.

- albomarginalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, Guatemala p. 205 (♀) (1920). (Typus: Cayuga)
- piuralis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 205 Peru (Typus: (♂) (1920). Piura)
- santiagalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 205 Cuba (Typus: (♀) (1920). Santiago)
- suasalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 553, Mexiko t. 100, f. 21 (1899).

18

67. Genus **Tasenia** Snellen

Snellen, Tijds. v. Ent., 44, p. 63 (1901).

(Typus generis: *nigromaculalis* Snell.)

- nigromaculalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 44, p. 63 Java, (1901). Philippinen

68. Genus **Conchylodes** Guenée

Guenée, Delt. & Pyral., p. 28 (1854). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 442 (1863). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 598, 679 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 328 (1901). — Forbes, Lep. N. York, p. 547 (1923).

Lypotigris Geyer in Hübner, Zutr. Exot. Schmett., 4 (24), t. 346, f. 691, 692 (1832) (*diphtheralis*).

Ledereria Snellen, Tijds. Ent., 18, p. 256 (1875) (nec Grote, 1874); *ibid.*, 23, p. 236 (1880).

Zebronia Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 631 (1890).

(Typus generis: *diphtheralis* Geyer)

a) Nearktische Region.

diphtheralis Geyer in Hübner, Zuträge Exot. Schm., U.S.A.
4, 24, t. 346, f. 691, 692 (1832) (*Lypot.*). — (Florida,
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 674, f. 53 Texas),
(♂) (1898). — Barnes & Mc Dunnough, Bahama Ins.
Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr.
4942 (1917). — Forbes, Lep. N. York,
p. 547 (1923).

platinalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 282 (1854) U.S.A.
(*Spilomela*) (Missouri). — Druce, Biol. (Südatlant.
Centr.-Amer. Het., 2, p. 250 (1895). — Staaten,
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 675 Missouri),
(1898). — Dyar, Insec. Insc. Menstr., 5, Mexiko,
p. 70 (1917). — Forbes, Lep. N. York, p. Guatemala,
548 (1923). Nicaragua,
Costarica,
Panama,
Venezuela,
Trinidad

ovualis Guenée, Delt. & Pyral., p. 283 (♂) (1854) U.S.A. (N.
(*Spilomela*) (Kolumbien). — Hampson, Proc. Carolina bis
Zool. Soc. Lond., p. 675 (1898). — Barnes Illinois,
& Mc Dunnough, Contr. Nat. Hist. Lep. Missouri),
Bor. Amer., 2 (4), p. 213 (1914). — Barnes Panama,
& Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Brasilien,
Amer., p. 129, nr. 4944 (1917). — Forbes, Kolumbien
Lep. N. York, p. 537 (1923).

erminea Felder & Rogenhofer, Reise Novara
Lep. (Het.), p. 20 (♂, ♀) t. 135, f. 7 (1874)
(*Zebronia*) (Venezuela, Chiriqui). — Hamp-
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 675 (1898)
(= *C. argentalis* Cramer).

concinna Hampson, Proc. Zool. Soc.
Lond., p. 675 (♂) (1898) (U. S. A.). —
Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep.
Bor. Amer., p. 129, nr. 4944 (1917).

platinalis Holland, Moth Book, p. 393,
t. 47, f. 60 (♂) (1903).

b) Neotropische Region.

diphtheralis Geyer, vide sub a) Nearktische Region.

hebraealis Guenée, Delt. & Pyral., p. 288 (♀) (1854) St. Domingo
(Haiti). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 674 (1898).

- salamisalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 251, t. 62, f. 19 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 674 (1898). — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4943 (1917). Mexiko, Panama, Ecuador
- bryophilalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 674, t. 50, f. 6 (♂) (1898). Ecuador
- intricata** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 324 (1912). Panama, Peru
- nolkenialis** Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 257, t. 14, f. 11 (1875). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 248 (1895) (*Ledereria*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 675 (1898). Mexiko, Honduras, Costarica, Kolumbien, Brasilien
- zebra** Sepp, Surinaamsche Vlinders, 2, p. 221, t. 99 (1848—50) (*Phalaena*) (Surinam). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 675 (1898). Mexiko, Panama, Kolumbien, Ecuador, Surinam, Fr. Guayana, Brasilien
- striginalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 281, t. 7, f. 9 (1854) (*Spilomela*) (Cayenne). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 251 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 675 (1898).
- gammaphora** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 325 (♀) (1912). Mexiko
- striginalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 251 (1895), part., nec Guenée (1854).
- argentalis** Cramer, Pap. Exot., 4, p. 161, t. 371, f. M (1782) (*Phalaena Pyralis*) (nec Fabr.). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 251 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 675 (1898). — Barnes & Mc Dunnough, Contr. Nat. Hist. Lep. N. Amer., 2 (5), p. 213 (1914). Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama, Costarica, Kolumbien, Trinidad, Surinam, Brasilien (Pará)
- erinalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 474 (1859) (*Zebronia*) (Venezuela). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 675 (1898) (= *C. platinalis* Guen.). — Fernald, Bull. U. S. Nat. Mus., nr. 52, p. 375, nr. 4297 (1902) (= *platinalis* Guen.).
- magicalis** Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 20, t. 135, f. 6 (♂) (1874) (*Zebronia*) (Veragua, Chiriqui). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 675 (1898) (= *C. platinalis* Guen.). — Fernald, Bull. U. S. Nat. Mus., nr. 52, p. 375, nr. 4297 (1902) (= *platinalis* Guen.).
- platnalls** Guenée, vide sub a) Nearktische Region.
- vincentalis** Schaus, Proc. U. S. Mus., 65, art. 7, p. 62 (♀) (1924). Bolivien (Buena Vista)
- ovulalis** Guenée, vide sub a) Nearktische Region.
- arcifera** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 325 (1912). Guatemala, Nicaragua, Mexiko
- platinalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 250 (1895), part., nec Guenée (1854).

- terminipuncta** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Guatemala, (s. 8) 9, p. 326 (1912).
Costarica,
platinialis Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., Mexiko
2, p. 250 (1895), part., nec Guenée (1854).
stictiperalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Brasilien
9, p. 327 (♀) (1912). (Pará)
- hedonialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, St. Domingo
p. 470 (1859) (*Zebronia*) (St. Domingo). —
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 675
(1898).

17

69. Genus *Nevrina* Guenée

Guenée, Delt. & Pyral., p. 313 (1854). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 395 (1863). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 299 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 597, 675 (1898). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 28, 171, 202 (1928).

Neurina Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 330 (1886). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 538 (1859) (part.). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 475 (1900).
Euglyphis Hübner, Verz. bek. Schm., p. 341 n. 3275 [1825] (*Eu. procopialis*) (non descr., nomen praeoccup. nec Hübner 1820). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 475 (1900). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 28 (1928) [kein Pyraliden-Genus].

(Typus generis: *procopia* Stoll.)

- procopia** Stoll in Cramer, Pap. Exot., 4, p. 152, Japan,
t. 368, f. E (1781) (*Phalaena Pyralis*). — Indien
Guenée, Delt. & Pyral., p. 317 (1854) (*Neu-* (Sikkim,
rina). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, Assam),
p. 396 (1863) (*Nevrina*). — Pagenstecher, Ceylon,
Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 38, p. 58 (1885) Birma,
(*Neurina*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 330, Tonkin,
t. 182, f. 1 (1886) (*Neurina*). — Pagen- Singapore,
stecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. Formosa,
270 (1888) (*Neurina*). — Snellen, Trans. Nias,
Ent. Soc. Lond., p. 606 (1890). — Hampson, Sumatra,
Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 46 (1893) Java,
(*Euglyphis*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. Lombok,
300, f. 178 (♂) (1896) (*Nevrina*). — Mey- Philippinen,
rick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 86 (1897). Ceram,
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 676, Sangir,
f. 54 (♂) (1898). — Swinhoe, Cat. Lep. Amboina,
Het. Oxford Mus., 2, p. 475 (1900) (*Eu-* Fergusson
glyphis). — Semper, Schm. Philipp. Ins., 2, Ins., Br.
p. 668 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Neu-Guinea;
Stett., 62, p. 234 (1901). — Shibuya, Journ. Afrika
Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo,
22, p. 202, t. 7, f. 8 (1928).
procopialis Hübner, Verz. bek. Schmett.,
p. 341 n. 3275 [1825] (*Euglyphis*). — Guenée,
Delt. & Pyral., p. 314 (♂) (1854) (*Nevrina*)
(Bengalen, Coromandel). — Walker, Cat.

- Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 538 (1859) (*Euglyphis*). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 95 (1867); p. 850 (1878) (*Euglyphis*).
- falsalis* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 290 (1906) (*Euglyphis*). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 578 (1908).
- var. *graphica* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 18, p. 489 (1916). Br. Neu-Guinea, Fergusson Ins.
- africalis* Gaede, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 8, p. 394 (1917). Sierra Leone, Kamerun, Span. Guinea
- singularis* Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 376, 475, t. 12, f. 1 (1863) (*Botys*) (N. Amerika). — Fernald, Bull. U. S. Nat. Mus., nr. 52, p. 390, nr. 4435 (1902) (*Pyrausta*). — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 134, nr. 5136 (1917) (*Pyrausta*). — Strand, Arch. f. Naturg., 85, A 12, p. 143 (1920) (*Nevrina*) (Kamerun).

3

70. Genus **Dichogama** Lederer

Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 396 (1863). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 597, 676 (1898).

- Carbaca* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1379 (1865) (typus: *decoralis* Walk.).
- Carbacha* Hampson, Proc. Zool. Soc. London, p. 676 (1898) (ex synonym.).
- Pleurasympieza* Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. 146 (1890) (typus: *smithii* Möschl.).
- (Typus generis: *redtenbacheri* Led.)
- decoralis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1380 (♂) (1865) (*Carbaca*) (St. Domingo). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 676 (1898).
- innocua* Fabricius, Ent. Syst., 3 (1), p. 461, n. 170 (1793) (*Bombyx*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 676 (1898). Westindien
- krugii* Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. 296, f. 2 (♂, ♀) (1890) (Portorico).
- obsolescens* Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 327 (♂) (1912). Grenada
- redtenbacheri* Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 396, t. 13, f. 10, 11 (1863) (*Dichogama*) (St. Thomas). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 234 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 676, f. 55 (♂) (1898). Mexiko, Guatemala, Peru
- Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4945 (1917).

- Biologie: Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 23, p. 271, 272 (1900).
diffusalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, Venezuela p. 127 (♂) (1918).
smithii Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. 147 Westindien, f. 18 (1890) (*Pleurasympiezia*). — Hampson, Panama Proc. Zool. Soc. Lond., p. 677 (1898).

Species incertae sedis.

- amabilis** Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. 296 (♂, ♀) (1890) (Portorico, Cuba). — Westindien Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4946 (1917).
bergii Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. 297 Panama, (♀) (1890). — Dyar, Journ. N. York Ent. Soc., 9, p. 21 (1901). Portorico (Typus)
bergi Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4947 (1917).
colotha Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 42, p. 103 (♀) Mexiko (1912). (Tehuacan)
fernaldi Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. 297 Portorico (♀) (1889).
gudmanni v. Hedemann, Ent. Zeit. Stett., 55, p. 290 St. Jan (♂) (1894).

11

71. Genus **Phostria** Hübner

Hübner, Verz. bek. Schm., p. 130 [1819] (sine fixatione typi generis; 2 spec.). — Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 128 (1918). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 171, 203 (1928); *ibid.*, 25, p. 157, 171 (1929).

- P hry g a n o d e s* Guenée, Delt. & Pyral., p. 353 (1854) (typus: *plicatalis* Guen.). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 300 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 597, 677 (1898). — Karsch, Ent. Nachr., 26, p. 375 (1900) (tab. anal. spec. aethiop., p. 375—377). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 200 (1900).
O m i o d e s Guenée, Delt. & Pyral., p. 355 (1854) (typus: *humeralis* Guen.). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 740 (1859). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 409 (1863). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 441 (1890); Fauna Hawaii, 1, p. 201, 202 (tab. spec. haw.) (1899). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 476 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 290 (1901).
E p o r i d i a Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 541 (1859) (typus: *dariusalis* Walk.). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 684 (1898). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 477 (1900).
C i r r o c e p h a l a Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 395 (1863) (typus: *venosa* Led.).
S p a r g e t a Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 406 (1863) (typus: *basalticalis* Led.). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 475 (1900). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 199 (1900).

- Coenostola* Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 408 (1863) (typus: *originalis* Led.). — Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 225 (1880). — Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 292 (1901).
- Microthyris* Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 432 (1863) (typus: *prolongalis* Guen.).
- Vatica* Walker, Proc. Nat. Hist. Glasgow, 1, p. 369 (1869) (typus: *rutilalis* Walk.).
- Condega* Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 344 (1886) (typus: *obscurata* Moore). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 475 (1900).
- Charema* Moore, Deser. N. Ind. Lep. Atkinson, p. 218 (1888) (typus: *noctescens* Moore).
- Saroscelis* Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 461 (1894) (typus: *nicoalis* Walk.). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 475 (1900).
- Plectrona* Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 68 (1899) (typus: *dohrni* Snell.).
- Hoplisa* Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 68 (1899) (typus: *xipharesalis* Walk.).
- Parbokla* Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 476 (1900) (typus: *diffusimarginalis* Hamps.).
- Oedemataarcha* Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 476 (1900) (typus: *xipharesalis* Walk.).
- Antennodes* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 291 (1906) (typus: *radicalis* Walk.).
- (Typus generis: *temira* Cram.)

a) Paläarktische Region.

- noctescens* Moore, Deser. N. Ind. Lep. Ins. Atkinson, p. 218 (1888) (*Charema*) (Darjiling). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 457 (1901) (*Charema*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 619 (1890) (*Omiodes*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 476 (1900) (*Omiodes*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 303, f. 179 (♂) (1896) (*Phryganodes*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 683; p. 677, f. 56 (♂) (1898) (*Phryganodes*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 204, t. 7, f. 17 (1928).
- erithonalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 682 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 304 (♂) (1896) (*Phryganodes*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 684 (1898) (*Phryganodes*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 477 (1900) (*Omiodes*). — Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 291 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 172 (1929).
- caradrinalis* Snellen, Tijds. v. Ent., 35, p. 162, t. 10, f. 7 (1892) (*Polythlita?*) (Java).
- ovenalis* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 289 (1906) (*Omiodes*) (Anda-

Süd- u. Westchina, Japan, N.-O.-Indien (Sikkim), Korea, Formosa, Philippinen

Südchina, Japan, Assam, Tonkin, Sumatra, Java, Borneo, Amboina, Andamanen

manen). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 579 (1903).

- expictalis** Christoph, Bull. Soc. Nat. Moscou, 56 (1), p. 36 (1881) (*Herpetogramma*); Stett. Ent. Zeit., 54, p. 35 (1893) (*Botys*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 271 (1899) (*Pyrausta*). — Staudinger & Rebel, Cat. Lep. Pal. Faun., 2, p. 64, nr. 1186 (1901) (*Pyrausta*). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint. (s. 3) 4, mem. 8, p. 391 (1927) (*Phostria*).
munitalis Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 377, t. 30, f. 15 (1901) (*Phryganodes*). (Japan). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 171 (1929).

b) Orientalische Region.

- obscurata** Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 345, t. 183, f. 12 (♂) (1886) (*Condega*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 304 (♂) (1896) (*Phryganodes*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 678 (1898) (*Phryganodes*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 294 (1901) (*Condega*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 204 (1928) (*Phostria*).
 Indien (Sikkim, Assam), Ceylon, Birma, Singapore, Tonkin, Formosa, St. Aignan, Br. Neu-Guinea
eradicalis Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 579 (1908) (*Phryganodes*).
 Singapore, Andamanen
radicalis Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 219 (1906), part., nec Walker (1865).
 Ceram, Andamanen, Neu-Guinea
radicalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 24, p. 1417 (1865) (*Botys*) (Neu-Guinea, Ceram). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 457 (1894) (*Coptobasis*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 678 (1898) (*Phryganodes*). — Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 291 (1906) (*Antennodes*).
 Ceram, Andamanen, Neu-Guinea
nubilis Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep., p. 14, t. 136, f. 21 (♂) (1874) (*Nosophora?*) (Molukken). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 678 (1898) (*Phryganodes*).
 Molukken
basalticalis Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 407, t. 14, f. 11 (1863) (*Spargeta*) (Amboina). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1490 (1865) (*Spargeta*) (Amboina, Aru). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. 110 (1888). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 678 (1898) (*Phryganodes*). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 199 (1900) (*Spargeta*).
 Amboina, Aru, Ceram, Buru, Bismarck-Archipel, Holl. u. Br. Neu-Guinea
amplipennis Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 5) 10, p. 237 (1882) (*Botys*) (Neu-Pommern). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 223 (1900) (*Botys*).

- origoalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 681 (1859) (*Botys*) (Celebes). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 679 (1898) (*Phryganodes*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 293 (1901) (*Coenostola*). — Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 291 (1906) (*Phostria*). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 578 (1908) (*Phryganodes*).
Sumatra,
Borneo,
Tenimber,
Celebes,
Halmaheira,
Nicobaren,
St. Aignan
- originalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 409 (1863) (*Caenostola*) (Ostindien, Celebes).
- nigriscripta** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 132 (♂) (1896) (*Omiodes*) (Tenimber).
- longipennis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 132 (♂) (1896) (*Charema*) (Khasis). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 303 (♂) (1896) (*Phryganodes*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 679 (1898) (*Phryganodes*).
Assam
(Khasis),
Andamanen
- leucogaster** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 329 (1912) (*Phryganodes*).
Nias,
Borneo,
Pulo Laut,
Ceram
- ab. *niasicola* Strand, Arch. f. Naturg., 82, A 3, p. 10 (1916).
Nias
- nicoalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 700 (♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 461 (1894) (*Saroscelis*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 680 (1898) (*Phryganodes*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 475, t. 8, f. 3 (1900) (*Saroscelis*); Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 291 (1906) (*Saroscelis*). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 578 (1908) (*Phryganodes*).
Assam,
Singapore,
Malakka,
Borneo,
Sumbawa
- earlalis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 290 (1906) (*Saroscelis*) (Borneo). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 578 (1908) (*Phryganodes*). — W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, nr. 15, p. 132 (1915) (*Phryganodes*).
Borneo,
Holl. Neu-Guinea
- margarita** Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 5) 20, p. 120 (1887) (*Nosophora*) (Salomon Ins.). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 680 (1898) (*Phryganodes*).
Ceram,
Salomon
Ins., Br. u.
Holl. Neu-Guinea
- attenuata** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 680 (♂) (1898) (*Phryganodes*).
Amboina, Buru
- diffusimarginalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 680 (1898) (*Phryganodes*) (Pulo Laut). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 426 (1900) (*Parbokla*).
Pulo Laut,
Borneo
- flocculentalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 680, t. 50, f. 4 (♂) (1898) (*Phryganodes*). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 579 (1908) (*Phryganodes*).
N.-W.-
Himalaya
(Kulu),
Ceylon,
Pulo Laut

- xipharesalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., Singapore,
18, p. 687 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak).
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 683 Nias,
(1898) (*Phryganodes*). — Swinhoe, Cat. Lep. Sumatra,
Het. Oxford Mus., 2, p. 476, t. 8, f. 30 Java,
(1900) (*Oedemataarcha*). — E. Hering, Ent. Borneo
Zeit. Stett., 62, p. 233 (1901) (*Hoplisa*). —
Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 68 (1899).
soricalis Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 69,
t. 3, f. 8—10 (1899) (*Hoplisa*) (Java).
- pachycraspedalis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, Assam
4, p. 302 (1896) (*Phryganodes*). — Hampson,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 683 (1898) (*Phry-*
ganodes).
- lophophoralis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, Sikkim
4, p. 302 (♂) (1896) (*Phryganodes*). —
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 683
(1898) (*Phryganodes*).
- chrysalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., Ceylon
18, p. 579, t. E, f. 45 (1908) (*Phryganodes*).
- concolor** Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. Molukken
(Het.), p. 4, t. 136, f. 24 (1874) (*Botys*?)
(Molukken). — Hampson, Proc. Zool. Soc.
Lond., p. 683 (1898) (*Phryganodes*).
- noctescens** Moore, vide sub a) Paläarktische Region.
- palliventralis** Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 225 Nord-, West-
(1880) (*Coenostola*) (Celebes); 27, p. 36, t. u. Südchina,
3, f. 2, 2a (1884) (*Coenostola*). — Snellen, N.-O.-Indien
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 620 (1890) (*Omi-*
odes). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, (Sikkim,
4, p. 303 (1896) (*Phryganodes*); Proc. Zool. Assam),
Soc. Lond., p. 684 (1898) (*Phryganodes*). — Sumatra,
Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, Celebes,
p. 200 (1900) (*Phryganodes*). — E. Hering, Philippinen,
Ent. Zeit. Stett., 62, p. 292 (1901) (*Coeno-* Bismarck-
stola). — Semper, Schm. Philipp. Ins., 2, St. Aignan,
p. 669 (1902) (*Eporidia*) (Luzon). Neu-Guinea
- analis** Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 227 (1880) Südchina,
(*Omiodes*); 27, p. 37, t. 3, f. 5, 5a (1884) Indien
(*Omiodes*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau, (Bengalen,
Ver. Naturk., 41, p. 111 (1888). — Snellen, Sikkim,
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 619 (1890) (*Omi-* Assam),
odes). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, Formosa,
4, p. 504 (1896) (*Phryganodes*); Proc. Zool. Sumatra,
Soc. Lond., p. 684 (1898) (*Phryganodes*). — Java,
Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 200 Borneo,
(1900). — E. Hering, Stett. Ent. Zeit., 62, Pulo Laut,
p. 291 (1901) (*Omiodes*). — Shibuya, Journ. Celebes,
Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, Amboina,
p. 204 (1923) (*Phostria*). Herzog von
albociliata Moore, Descr. N. Ind. Lep. York Ins.,
Ins. Atkinson, p. 219 (1888) (*Charema*) Bismarck-
(Calcutta). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, Archipel,
p. 291 (1901) (*analis* var.). Holl. Neu-
hiracia Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. Guinea
457 (1894) (*Omiodes*) (Pulo Laut).
- crithonalis** Walker, vide sub a) Paläarktische Region.

- piasusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 725 (♂) (1859) (*Botys*) (Moreton Bai). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 684 (1898) (*Phryganodes*).
retractalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1447 (1865) (*Botys*) (Java). Australien
- dispilotalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1487 (♂) (1865) (*Anartes*) (Sula). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 685 (1898) (*Phryganodes*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 292 (1901) (*Coenostola*).
pallicostalis Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 226 (1880) (*Coenostola*) (Celebes); 27, p. 36, t. 3, f. 3, 3a (1884) (*Coenostola*).
lictor Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 227 (♂) (1887) (*Conogethes*) (Townsville, Queensland).
- maculicostalis** Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 171, t. 172, f. 72 (1893) (*Coenostola*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 302 (♂) (1896) (*Phryganodes*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 685 (1898) (*Phryganodes*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 292 (1901) (*Coenostola*). N.-O.-Indien, Ceylon, Tonkin, Sumatra, Br. Neu-Guinea
- discipunctalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 15, p. 214 (1903) (*Phryganodes*). Indien (Kanara), Tonkin
- mimastis** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 88 (1897) (*Phryganodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 685 (1898) (*Phryganodes*). Sangir
- cupriflavalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 332 (1912) (*Phryganodes*). Singapore, Sumbawa
- glyphodalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1488 (1865) (*Botys*) (Sula). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 301 (1896) (*Phryganodes*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 685 (1898) (*Phryganodes*). Indien (O. Himalaya, Bhotan), Ceylon, Birma, Sula, Celebes, Neu-Guinea
- unitalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 349 (♂) (1854) (*Botys*) (Mittel-Indien). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 655 (1859) (*Botys*) (Silhet). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 96 (1867) (*Botys*); p. 850 (1878) (*Botys*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. 267 (1888) (*Botys*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 269 (1890) (*Charema*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 590 (1890) (*Botys*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 38 (1891) (*Charema*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 462 (1894) (*Notarcha*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 301 (1896), part. (*Phryganodes*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 685 Südchina, Indien (Sikkim, Assam), Ceylon, Sumatra, Borneo, Ceram, Amboina, Philippinen, Andamanen, Holl. Neu-Guinea

- (1898) (*Phryganodes*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 477 (1900) (*Eporidia*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 68 (1901) (*Sylepta*).
- megapteralis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1407 (♀) (1865), part. (*Botys*) (Ceram, Darjiling). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 610 (1888) (*Pachynoa*).
- opalinalis* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 620 (1877) (part.) (*Pachynoa*).
- opalinalis** Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 620 (1877) (*Botys*) (Port Blair). — Swinhoe & Cotes, Cat. India Moths, 5, p. 610 (1880) (*Pachynoa*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 590 (1890) (*Botys*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 301 (1896), part. (= *Phryganodes unitalis* Guen.); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 685 (1898), part. (= *unitalis* Guen.). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 477 (1900) (spec. dist.). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 68 (1901) (*Sylepta*) spec. dist.).
- atrisignalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 133 (1912) (*Phryganodes*). Singapore, Tonkin
- imbecilis** Moore, Descr. N. Ind. Lep. Ins. Atkinson, p. 219, f. 7, f. 23 (♂) (1887) (Darjiling). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 686 (1898), part. (*Phryganodes*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 68 (1901) (*Sylepta*). Südchina, N.O. Indien (Sikkim, Assam), Sumatra
- phaennisalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 684 (♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 196 (1899) (= *Tetridia caletoralis*) (ex synonym.).
- scabripennis* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 131 (♂) (1896) (*Charema*) (Khasis). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 686 (1898) (= *imbecilis* Moore).
- imbecilis* Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 302 part. (1896) (*Phryganodes*).
- phaeniussalis* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 18, p. 415 (1906) (*Eporidia*).
- stygalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 21, p. 1264 (1912) (*Phryganodes*). — Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 18, p. 415 (1906). Ceylon
- unitinctalis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 302 (1896) (*Phryganodes*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 686 (1898) (*Phryganodes*). Birma (Typus: O. Pegu)
- schediusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 683 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 301 (♂) (1896) part. (*Phryganodes*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 686 (1898) (*Phryganodes*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 292 (1901) (*Omiodes*). N.O. Indien (Sikkim, Assam), Sumatra, Borneo, Andamanen

carbonalis Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist.,
(s. 6) 14, p. 202 (♂) (1894) (*Charema*)
(Cherra Punji).

albipedalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 686 (♂) (1898). Sangir,
Buru

Species incertae sedis.

aengusalis Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 314, Philippinen
t. 2, f. 4 (♂) (1927). (Luzon)

baratalis Holland, Nov. Zool., 7, p. 586 (1900). Buru

celsusalis Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 315, Philippinen
t. 1, f. 3 (♀) (1927). (Luzon)

druonalis Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 315, Philippinen
t. 2, f. 6 (♂) (1927). (Luzon)

hillalis Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 313, t. 2, Philippinen
f. 2 (♀) (1927). (Luzon)

jansei West, Novit. Zool., 36, p. 215 (1931). Philippinen

orientalis Snellen, Tijds. v. Ent., 43, (1900), p. 273, Borneo,
t. 15, f. 6, 7 (♂) (1901) (*Plectrona*). Philippinen

selenalis Caradja, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 47, China
p. 158 (1934). (Kwangtung)

primulosalis Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 314, Philippinen
t. 2, f. 1 (♂) (1927). (Luzon)

c) *Aethiopische u. Madagassische Region.*

erebusalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 678 Sierra Leone,
(♂) (1898) (*Phryganodes*). Span.
Guinea;
Holl. Neu-
Guinea

fumarialis Dewitz, Verh. Akad. Leop. Car., 42, Guinea
p. 88, t. 3, 19 (1880) (*Botys*) (Chinchoxo,
Guinea). — Hampson, Proc. Zool. Soc.
Lond., p. 272 (1899) (*Pyrausta*). — Karsch,
Ent. Nachr., 26, p. 375 (1900) (*Phryga-*
nodes).

tetrastictalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Goldküste,
8) 9, p. 331 (1912) (*Phryganodes*). S. Nigeria

biguttata Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 681; Sierra Leone,
p. 761, t. 49, f. 21 (♂) (1898) (*Phryga-* Kamerun
nodes). — Karsch, Ent. Nachr., 26, p. 376
(1900).

hesusalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, Span. Guinea,
p. 642 (♀) (1859) (*Botys*) (Sierra Leone). Kamerun,
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 682 Togo,
(1898) (*Phryganodes*). — Karsch, Ent. Congo
Nachr., 26, p. 375 (1900) (*Phryganodes*).

- ducalis** Schaus in Schaus & Clements, Sierra Leone, Sierra Leone,
Lep., p. 40, t. 3, f. 13 (1893) (*Hypena?*). Kamerun
— Karsch, Ent. Nachr., 26, p. 376 (1900)
(*Phryganodes*).
- rutilalis** Walker, Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow, W. Afrika
1 (2), p. 369 (1869) (*Vatica*). — Hampson, (Typus:
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 683 (1898) (*Phry- Congo*)
ganodes).
- aterrimalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) Kamerun
1, p. 129 (♂) (1918) (*Phostria*).
- piasusalis** Walker, vide sub b) Orientalische Region.
- quadriguttata** Walker, Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow, Togo,
1 (2), p. 336 (♂) (1869) (*Soloe*) (Congo). Sierra Leone
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 685
(1898) (*Phryganodes*).
- dariusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, W. Afrika,
p. 541 (1859) (*Eporidia*) (Ashanti). — Hamp- Congo
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 685 (1898)
(*Phryganodes*). — Karsch, Ent. Nachr., 26,
p. 377 (1900) (*Phryganodes*).
- caniusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, Kamerun,
p. 638 (♂) (1859) (*Botys*) (Sierra Leone). Sierra Leone
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 686
(1898) (*Phryganodes*). — Strand, Arch. f.
Naturg., 85, A 12, p. 144 (1920).
- hampsonialis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. Goldküste
206 (1920) (n. nov.).
- tridentalis** Hampson, Ann. Mag. Nat.
Hist., (s. 8) 9, p. 333 (♂) (1912) (*Phry-
ganodes*), nec Hampson (1912).
- albescens** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) Port.
1, p. 130 (1918) (*Phostria*). Ostafrika,
D. Ostafrika
- araeosoma** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, Kamerun
p. 131 (♂) (1918) (*Phostria*).

Species incertae sedis.

- antongilensis** Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr., 68, p. Madagaskar
744 (1899).
- bistigmalis** Strand, Arch. f. Naturg., 79, A 6, p. 112 D. O.-Afrika
(1913).
- flavipectus** Bethune-Baker, Ann. Mag. Nat. Hist., Congo
(s. 8) 3, p. 436 (1909). (Makala)
- melanophthalma** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 403 Belg. Congo
(♀) (1933) (*Phostria*). (Stanleyville)
- ocellalis** Aurivillius, Ergeb. 2. Deutsch. Zentr. Afr. Belg. Congo
Exped., 1. Lief. 18, p. 1353 (♂) (1925) (Kimuenza)
(*Phryganodes*).
- pallas** Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 10 (♀) (1936). Belg. Congo
(Eala)
- sordidalis** Dewitz, Verh. Akad. Leop. Car., 42, p. Lagos
88, t. 3, f. 11 (1880) (*Botys*). — Hampson,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 272 (1899) (*Py-
rausta*).

stygichroa Bethune-Baker, Ann. Mag. Nat. Hist., Congo
(s. 8) 3, p. 437 (♂) (1909) (*Phryganodes*). (Makala)

sexguttata Holland, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., Congo
43, p. 328, f. 9 (1920) (*Phryganodes*). (Bolengi)

d) Hawaiiische Region.

swezei Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. Hawai
252 (1918) (n. nov.) (*Lamprosema*).

meyricki Swezey, Honolulu Sugar Plan-
ters Bull., 5, p. 24 (August) 1907 (*Omiodes*),
nec Swinhoe, (Januar) 1907 (*Merotoma*).

blackburni Butler, Ent. Mon. Mag., 14, p. 48 Hawai
(1877) (*Botys*). — Meyrick, Trans. Ent. (Olaa, Maui,
Soc. Lond., p. 214 (1888) (*Omiodes*). — Oahu, Lanai,
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 699 Kauai)
(1898) (*Nacoleia*). — Meyrick, Fauna Hawaii.,
1, p. 201, 202 (1899) (*Omiodes*); 3, p. 357
(1904) (*Omiodes*).

Biologie: Dyar, Canad. Ent., 32, p. 157
(1900) (*Omiodes*).

noxa: Keuchenius, Meded. Besoekisch Proefst.
no. 13, p. 11—20 (1914). — Capeland, The
Coconut, London, XIV + 212 pp. (1914).
— Ehrhorn, Hawaii Bd. Agric. Forestry
(Honolulu), p. 103—161 (1915). — Swezey,
Proc. Hawaii. Ent. Soc., 7 (2), p. 271—273
(1929); Insect Pest Surv. Bull., 13 (10), p.
340—341 (Wash.) (1934).

Parasiten: Swezey, Proc. Hawaiian Ent.
Soc. Honolulu, 3 (2), p. 99—109 (1915);
3 (5), p. 379—380 (1918); 6 (2), p. 296—
297 (1926); Journ. Econ. Ent., 19 (5), p.
714—720 (Geneva) (1926). — Simmonds,
Agric. Journ. Dept. Agric. Fiji (Sion), 1
(1928), no. 3, p. 16—21 (1929).

euryprora Meyrick, Fauna Hawaii., 1, p. 201, 202, Hawai
t. 5, f. 18 (1899) (*Omiodes*). (Olaa, Hilo)

asaphombra Meyrick, Fauna Hawaii., 1, p. 202 Hawai
(♂) (1899) (*Omiodes*). (Kauai)

Parasiten: Swezey, Proc. Hawaiian Ent.
Soc. Honolulu, 3 (2), p. 99—109 (1915).

iridias Meyrick, Fauna Hawaii., 1, p. 202, 203, t. 5, Hawai
f. 19 (♂, ♀) (1899) (*Omiodes*). (Kilauea)

epicentra Meyrick, Fauna Hawaii., 1, p. 201, 203 Hawai
(♂, ♀) (1899); 3, p. 357 (1904) (*Omiodes*). (Oahu)

anastrepta Meyrick, Fauna Hawaii., 1, p. 202, 204 Hawai
(♀) (1899); 3, p. 358 (1904) (*Omiodes*). (Kona,
Molokai,
Oahu)

antidoxa Meyrick, Fauna Hawaii., 3, p. 358 (♂) Hawai
(1904) (*Omiodes*). (Oahu)

telegrapha Meyrick, Fauna Hawaii., 1, p. 201, 204, Hawai
t. 5, f. 20 (♂) (1899) (*Omiodes*). (Olaa)

- accepta** Butler, Ent. Mon. Mag., 14, p. 49 (1877) Hawaii
(*Botys*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., (Hilo, Kona,
p. 214 (1888) (*Omiodes*). — Hampson, Proc. Maui,
Zool. Soc. Lond., p. 699 (1898) (*Nacoleia*). Molokai,
— Meyrick, Fauna Hawaii., 1, p. 201, 204 Kauai)
(1899) (*Omiodes*); 3, p. 358 (1904) (*Omiodes*).
Biologie: Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash., 6,
p. 65 (1904) (*Omiodes*).
Parasiten: Swezey, Proc. Hawaiian Ent.
Soc. Honolulu, 3 (2), p. 99–109 (1915);
Journ. Econ. Ent. (Concord), 8 (5), p. 450–
456 (1915). — Williams, Hawaiian Planters
Record (Honolulu), 26 (2), p. 95–97 (1922).
— Swezey, Journ. Econ. Ent. (Geneva), 19
(5), p. 714–720 (1926). — Muir & Swezey,
Rept. Comm. Expt. Stat. Hawaiian Sugar
Pl. Assoc. f. 1925/26 (Honolulu), p. 16–29
(1927). — Bradley & Burgess, Techn. Bull.
U. S. Dept. Agric. no. 441, 15 pp., (1934).
- giffardi** Swezey, Proc. Hawaiian Ent. Soc., 4, p. 469 Hawaii
(1920) (*Omiodes*). (Kilauea)
- continuatalis** Wallengren, Eugen. Resa, p. 381 Hawaii
(1861); Wien. Ent. Monatschr., 4, p. 175 (Oahu,
(1860) (*Salbia*). — Butler, Ent. Mon. Mag., Lanai,
15, p. 270 (1879) (*Botys*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 215 (1888) (*Omiodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 699 (1898) (*Nacoleia*). — Meyrick, Fauna Molokai,
Hawaii., 1, p. 202, 205 (1899) (*Omiodes*); Kauai)
3, p. 358 (1904) (*Omiodes*).
continentalis Hampson, Proc. Zool. Soc.
Lond., p. 699 (1898) (err. typ.).
- hemimbra** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Hawaii
9, p. 442 (♂) (1912) (*Nacoleia*).
- scotala** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Hawaii
p. 442 (1912) (*Nacoleia*).
- monogramma** Meyrick, Fauna Hawaii., 1, p. 202, Hawaii
205 (♂), t. 5, f. 21 (1889); 3, p. 358 (Oahu,
(1904) (*Omiodes*). Kauai)
- demaratalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., Hawaii
19, p. 1009 (♀) (1859) (*Botys*) (Patria?). (Oahu,
— Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 216 Kauai,
(1888) (*Omiodes*). — Hampson, Proc. Zool. Kona)
Soc. Lond., p. 699 (1898) (*Nacoleia*). —
Meyrick, Fauna Hawaii., 1, p. 202, 205
(1899) (*Omiodes*); 3, p. 358 (1904) (*Omiodes*).
- monogona** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lon., p. 216 Hawaii
(1888) (*Omiodes*). — Hampson, Proc. Zool. (Olaa, Kona,
Soc. Lond., p. 704 (1898) (*Nacoleia*). — Oahu,
Meyrick, Fauna Hawaii., 1, p. 202, 206 Kauai)
(1899) (*Omiodes*); 3, p. 358 (1904) (*Omiodes*).
- liodyta** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p.
217 (♀) (1888) (*Omiodes*). — Hampson, Proc.
Zool. Soc. Lond., p. 704 (1898) (*Nacoleia*).

- localis** Butler, Ent. Mon. Mag., 15, p. 271 (1879) Hawaii
(*Botys*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., (Kona, Oahu,
p. 217 (1888) (*Omiodes*). — Hampson, Proc. Molokai,
Zool. Soc. Lond., p. 699 (1898) (*Nacoleia*). Lanai,
— Meyrick, Fauna Hawaii., 1, p. 202, 216 Kauai)
(1899) (*Omiodes*); 3, p. 358 (1904) (*Omiodes*).

Species incertae sedis.

- anastreptoides** Swezey, Proc. Hawaiian Ent. Soc., Hawaii
2, p. 272 (1912) (*Omiodes*).
fullawayi Swezey, Proc. Hawaiian Ent. Soc., 2, p. Hawaii
272 (1912) (*Omiodes*).
laysanensis Swezey, Proc. Hawaiian Ent. Soc., 3, Ins. Laysan
p. 19 (1914) (*Omiodes*).
maia Swezey, Proc. Hawaiian Ent. Soc., 2, p. 74 Hawaii
(1909) (*Omiodes*).
musicola Swezey, Proc. Hawaiian Ent. Soc., 2, p. 40 Hawaii
(1908) (*Omiodes*).

c) Australische Region.

- obscurata** Moore, vide sub b) Orientalische Region.
radicalis Walker, vide sub b) Orientalische Region.
erebusalis Hampson, vide sub c) Aethiopische Region.
basalticalis Lederer, vide sub b) Orientalische Region.
lasioenemis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Br. Neu-
9, p. 329 (1912) (*Phryganodes*). Guinea
origoalis Walker, vide sub b) Orientalische Region.
fuscicilia Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, St. Aignan,
p. 330 (♂) (1912) (*Phryganodes*). Br. Neu-
(Typus: Guinea
Mt. Kebea)
ab. rufior Strand, Arch. f. Naturg., 82, St. Aignan
A 3, p. 10 (1916) (*Phryganodes*).
assimilis W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, Holl. Neu-
nr. 15, p. 131 (♂) (1915) (*Phryganodes*). Guinea
earlealis Swinhoe, vide sub b) Orientalische Region.
margarita Butler, vide sub b) Orientalische Region.
tetraplagalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Fergusson
681 (1898) (*Phryganodes*). Ins., Neu-
Guinea
purpureonitens Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Woodlark
(s. 9) 1, p. 128 (♂) (1918). Ins.
regalis Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 5) 10, p. Bismarck-
236 (♂, ♀) (1882) (*Hoterodes*). — Hampson, Archipel
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 681 (1898) (*Phry- (New*
ganodes). Britain)
centralballs Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Fergusson
681, t. 49, f. 17 (♀) (1898) (*Phryganodes*). Ins., Holl.
Neu-Guinea
lanialis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 681; Fergusson
p. 761, t. 49, f. 19 (♂) (1898) (*Phryganodes*). Ins.,
Neu-Guinea

- setifera** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 682 (1898) (*Phryganodes*). — Candèze, Encycl. Ent. B 3, Lepid., 2 (3—4), p. 130 (1927). Fergusson Ins., Holl. Neu-Guinea, Annam (sec. Candèze)
- palliventralis** Snellen, vide sub b) Orientalische Region.
- piasusalis** Walker, vide sub b) Orientalische Region.
- hamiferalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 684 (♂) (1898) (*Phryganodes*). Neu-Guinea
- maculicostalis** Hampson, vide sub b) Orientalische Region.
- glyphodalis** Walker, vide sub b) Orientalische Region.
- odontosticta** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 685 (1898) (*Phryganodes*). Oinainisa, Fergusson Ins., Br. Neu-Guinea, Queensland
- unitalis** Guenée, vide sub b) Orientalische Region.
- germanalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1418 (♂) (1865) (*Botys*). Neu-Guinea
- unitalis* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 685 (1898), (part.) (*Phryganodes*).
- tagtadalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 686 (1898). Fergusson Ins., Neu-Guinea

Species incertae sedis.

- griseopalizans** W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, nr. 15, p. 131 (♂, ♀) (1915) (*Phryganodes murinus*). Holl. Neu-Guinea
- ocomori** Tams, Ins. Samoa, 3, (4), p. 276, t. 6, f. 23, t. 16, f. 7 (1935). Samoa
- violotincta** W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, nr. 15, p. 131 (♂) (1915) (*Phryganodes*). Holl. Neu-Guinea

f) Neotropische Region.

- tridentalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 328 (♂) (1912). Peru
- cleodalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 206 (♂) (1920). Bolivien
- prolongalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 353 (♂) (1854) (*Botys*) (*Brasilien*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 620 (1859) (*Botys*). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 433, t. 16, f. 17 (1863) (*Microthyris*). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 243 (1895) (*Microthyris*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 678 (1898) (*Phryganodes*). Mexiko, Guatemala, Costarica, Panama, Haiti, Jamaika, St. Domingo, Grenada, Trinidad, Dominica, Ecuador, Brasilien
- sectalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 353 (♂) (1854) (*Botys*) (*Brasilien*). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 243 (1895) (*Microthyris*).
- eurytalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 576 (♂) (1859) (*Botys*) (Jamaika, St. Domingo).

- agenoralis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 617 (♂) (1859) (*Botys*) (Brasilien).
- rotundalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 328 (♂) (1912) (*Phryganodes*). Surinam, Brasilien (Amazonas), Peru
- productalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 678 (♂) (1898) (*Phryganodes*). Surinam
- milvalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 253, t. 63, f. 21 (1895) (*Phryganodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 679 (1898) (*Phryganodes*). Costarica, Panama
- buckleyi** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 9, p. 332 (♂) (1902). Ecuador
- tedea** Cramer, Pap. Exot., 4, p. 48, t. 312, f. G (1782) (*Phaelana Pyralis*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 679 (1898) (*Phryganodes*). Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Panama, Jamaika, Surinam, Brasilien (Amazonas), Rio)
- oajacalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1393 (♂) (1865) (*Botys?*) (Mexiko).
- pelialis* Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 4, t. 135, f. 46 (♂) (1874) (*Botys*) (Mexiko).
- temira** Cramer, Pap. Exot., 4, p. 160, t. 371, f. E (♀) (1782). — Hübner, Verz. bek. Schmett., p. 130 n. 1401 [1819] (*Phostria*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 679 (1898) (*Phryganodes*). Brasilien
- persiusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 623 (♀) (1859) (*Botys*) (Rio de Janeiro). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 679 (1898) (*Phryganodes*). Brasilien
- confluentalis* Warren, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 277 (1889) (*Phostria*) (Rio de Janeiro).
- varialis** Walker, Trans. Ent. Soc., (s. 3) 1, p. 122 (♀) (1862) (*Salbia*) (Amazonas). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 679 (1898) (*Phryganodes*). Panama, Brasilien
- lithosialis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 325 (♂) (1854) (*Botys?*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 679 (1898) (*Phryganodes*). Brasilien
- samealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 330 (1912) (*Phryganodes*). Br. Guayana, Surinam, Brasilien (Amazonas)
- perfulvalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 679; p. 761, t. 49, f. 16 (♂) (1898). Peru
- mctalobalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 331 (♂) (1912). Br. Guayana
- truncatalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 331 (♂) (1912). Panama
- xanthoproctalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 128 (♂) (1918). Venezuela

- alblrenalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 682 (♂, ♀) (1898) (*Phryganodes*). Panama, Br. Guayana, Brasilien (Pará)
- plicatalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 354, t. 10, f. 6 (♂) (1854) (*Phryganodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 682 (1898) (*Phryganodes*). Fr. Guayana, Brasilien
- flaviceps** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 128 (♀) (1918). Peru
- eucharisalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 618 (♀) (1859) (*Botys*) (Ega). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 682 (1898) (*Phryganodes*). Westindien, Brasilien, Venezuela, Antillen
- venosa* Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 395 (1863) (*Cirrocephala*).
- evanidalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 299 (♂) (1912) (*Phryganodes*). Costarica (Tuis, Sixda)
- purpuralis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 226, t. 61, f. 21 (♀) (1895) (*Phryganodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 682 (1898) (*Phryganodes*). Costarica
- leucothyris** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 53, p. 92 (1909) (*Phryganodes*). Guayana
- omphalobasis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 683, t. 49, f. 20 (♂) (1898) (*Phryganodes*). Guatemala, Venezuela
- Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 559, t. 101, f. 14 (1899).
- mostella** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 42, p. 102 (♂) (1912). Mexiko (Orizaba)
- capillalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 355 (♂) (1854) (*Lonchodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 683 (1898) (*Phryganodes*). Fr. Guayana
- insolutalis** Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. 301 (♂) (1890) (*Omiodes*) (Portorico). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 684 (1898) (*Phryganodes*). Panama, Portorico, Venezuela
- fulvicauda** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 684 (♂) (1898) (*Phryganodes*). Venezuela
- grandis** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 9, p. 332 (♂) (1902) (*Phryganodes*). Ecuador, Bolivien
- humeralis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 356 (♂) (1854) (*Omiodes*) (Haiti). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 684 (1898) (*Phryganodes*). Costarica, Panama, St. Domingo, Kolumbien
- peleusalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 575 (♂) (1859) (*Botys*) (St. Domingo). Peru
- gnomalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 580 (♀) (1859) (*Botys*) (St. Domingo).
- cuniculalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 356, t. 5, f. 9 (♂) (1854) (*Omiodes*) (Cayenne). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 253 (1895) (*Phryganodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 684 (1898) (*Phryganodes*). Mexiko, Guatemala, Panama, Fr. Guayana, Ecuador, Brasilien

- leporalis* Guenée, Delt. & Pyral., p. 357 (♀) (1854) (*Omiodes*) (Brasilien).
- ochrosoma** Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), 1, p. 14, t. 136, f. 5 (♂) (1875) (*Omiodes*) (Amazonas). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 684 (1898) (*Phryganodes*).
- simialis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 357 (♀) (1854) (*Omiodes*) (Cayenne). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 685 (1898) (*Phryganodes*).
- jasonalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 575 (♂) (1859) (*Botys*) (St. Domingo).
- rontesalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 614 (1859) (*Botys*) (Ega, Venezuela).
- eruptalis* Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 409, 479, t. 15, f. 1 (1863) (*Coenostola*?) (Brasilien).
- apicalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 409, 479 (♂, ♀), t. 14, f. 16 (1863) (*Coenostola*) (Brasilien). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 252 (1895) (*Phryganodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 685 (1898) (*Phryganodes*).
- selenophera** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 332 (♂) (1912) (*Phryganodes*).
- delilalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 376 (♀) (1859) (*Hyalea*) (Ega). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 685 (1898) (*Phryganodes*).
- atyriasis* Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 4, t. 135, f. 30 (♂) (1874) (*Botys*) (Amazonas).
- carusalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 207 (♂) (1920).
- chrysomera** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 129 (♂) (1918).
- crocceps** Walker, Cat. Het. Lep. Brit. Mus., 34, p. 1375 (1865) (*Erilusa*) (Ega). — Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 9, t. 136, f. 31 (1875) (*Erilusa*) (Amazonas). — Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 1, p. 62, t. 20, f. 4 (1877) (*Erilusa*) (Ega). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 226, t. 61, f. 20 (1895) (*Phryganodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 685 (1898) (*Phryganodes*).
- disciiridescens** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 129 (♂) (1918).
- glyphodoides** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 332 (♂) (1912) (*Phryganodes*).
- cayennalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 206 (♂) (1920).
- eurycleucalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 130 (♂) (1918).
- internervalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 131 (♂) (1918).

Brasilien

Mexiko,
Panama,Haiti,
Kolumbien,
Venezuela,
Fr. Guayana,Brasilien
(Amazonas),
AntillenPanama,
Kolumbien,
Brasilien

W. Kolumbien

Costarica,
Kolumbien,
Brasilien
(Amazonas)

Bolivien

Peru

Panama,
Brasilien
(Pará,
Amazonas)

Peru

Kolumbien

Fr. Guayana
(Cayenne)

Peru

Kolumbien

- euagra** Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. Brasilien, (Het.), p. 9, t. 136, f. 34 (♂) (1874) Peru
(*Erilusa*) (Amazonas). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 685 (1898) (*Phryganodes*). — Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 65 (1899) (*Erilusa*).
- hypoxantha** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 48, p. 128 (1904) (*Phryganodes*). Ecuador
- martyralis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 409, 479, t. 14, f. 15 (1863) (*Coenostola*) Brasilien
(Brasilien). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 686 (1896) (*Phryganodes*).
- confusalis** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 48, p. 71 (1905) (*Caenostola*). Ecuador

Species incertae sedis.

- albicillialis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 298 (♂) (1912) (*Phryganodes*). Costarica
(Tuis, Juan Vinas)
- anchoritalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 42, p. 102 (♀) (1912) (*Phryganodes*). Mexiko
(Misantla)
- anxiferalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 298 (♂) (1912) (*Phryganodes*). Costarica
(Sixola)
- argetilgualis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 298 (♂) (1912) (*Phryganodes*). Costarica
(Esperanza, Sixola)
argetilgualis Sharp, Zool. Rec. Ins., 49 (1912), p. 359 (1913).
- clementalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 299 (♂) (1912) (*Phryganodes*). Costarica
(Guapiles), Panama
- ctenuchalls** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 51, p. 240 (1907) (*Phryganodes*). Peru
- dohrni** Snellen, Tijds. v. Ent., 38, p. 142, t. 6, f. 6, 8 (1895) (*Plectrona*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 686 (1898). S. Amerika
- dupllicata** Kaye, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 997, t. 1, f. 22 (1922/II) (1923). Trinidad
- gazalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 299 (♂) (1912) (*Phryganodes*). Costarica
(Juan Vinas, Tuis)
- indignalls** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 206 (♀) (1920). Guatemala
(Cayuga)
- latlaplicalls** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 299 (♂) (1912) (*Phryganodes*). Costarica
(Juan Vinas)
- leucophasma** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 42, p. 104 (♂) (1912) (*Phryganodes*). Mexiko
(Sierra de Guerrero)
- mendelalis** Druce, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 9, p. 332 (♂) (1902) (*Phryganodes*). Ecuador
- obliqualis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 300 (♂) (1912) (*Phryganodes*). Costarica
(Sixola)

- patricialis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 9, p. 300 (♂) (1912) (*Phryganodes*).
 (Sixola, Banana River)
- rufalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 301 (♂) (1912) (*Phryganodes*).
 (Juan Vinas, Sixola, Tuis, Avangarez)
- seminitidalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 301 (♂) (1912) (*Phryganodes*).
 (Guapiles, Tuis, Juan Vinas)
- vitrifera** Dognin, Hét. Nouv. Amér. du Sud, fasc. 1, Fr. Guayana
 p. 44 (♂) (1910) (*Phryganodes*).
 180

72. Genus **Eupilocera** Dognin

Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 53, p. 93 (1909).

(Typus generis: *gravidalis* Dogn.)

- gravidalis** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 53, p. 93 (1909).
 1

73. Genus **Proconica** Hampson

Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 598, 687 (1898); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 12, p. 708 (1899).

(Typus generis: *nigrocyanalis* Hamps.)

- flaviguttalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 687 (♂) (1898).
 Niger River, Warri
- flavimaculalis** Gaede, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 8, p. 394 (♂, ♀) (1917).
 Kamerun (Lolodorf)
- nigrocyanalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 687, f. 1 (♂) (1898).
 Assam (Khasis)
 3

74. Genus **Oligocentris** Hampson

Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 304 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 597, 687 (1898).

(Typus generis: *deciusalis* Walk.)

- deciusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 696 (♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak); 19, p. 994 (♂) (1859) (*Botys*) (Ceylon). — Pulo Laut, Borneo
- Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 344 (1886) (*Lotanga*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 172, 173, f. 13 (1893) (*Lotanga*); Fauna Brit. India Moths, 4, p.

305, f. 180 (♂) (1896) (*Oligocentris*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 687, f. 58 (♂), p. 688 (1898).

decialis Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 463 (1894) (*Notarcha*).

uniformalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Sula Mangoli 9, p. 133 (♂) (1912).

2

75. Genus **Marwitzia** Gaede

Gaede, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 8, p. 395 (1917).

(Typus generis: *centiguttalis* Gaede)

centiguttalis Gaede, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 8, D.O. Afrika p. 395 (♀) (1917). (Mkalama)

1

76. Genus **Dichocrocis** Lederer

Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 447 (1863). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 305 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 597, 688 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 201 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 94 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 171, 205 (1928); *ibid.*, 25, p. 157, 172 (1929).

Conogethes Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 314 (1884) (typus: *punctiferalis* Guen.). — Snellen, Tijds. v. Ent., 38, p. 128.

Gadessa Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 278 (1886) (typus: *albifrons* Moore).

Dadessa Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 333 (1886) (typus: *evaxalis* Walk.).

Phaedropsis Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 6, p. 476 (1890) (typus: *chromalis* Guen.).

Orthospila Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 6, p. 477 (1890) (typus: *plutusalis* Walk.).

Zebrodes Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 104 (1896) (typus: *rigidalis* Snell.).

(Typus generis: *frenatalis* Led. = *pandamalis* Walk.)

a) Paläarktische Region.

surusalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, Mittel- u. p. 695 (♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Süchina, Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. Japan, 311 (1896) (*Dichocrocis*); Proc. Zool. Soc. Formosa, Lond., p. 689 (1898). — Swinhoe, Cat. Ceylon, Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 479 (1900). Singapore, — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 456 Sumatra, (1901). — E. Hering, Ent. Zeit. Stettin, 62, p. 80 (1901) (*Sylepta*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 205 (1928); 25, p. 173 (1929). Christmas
subjunctalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1404 (♂) (1865) (*Botys*) (Ceylon). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 290, t. Mysol, 181, f. 6 (1885) (*Rehimena*). — Swinhoe Neu-Guinea

& Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 606 (1889).
triferalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1428 (♂) (1865) (*Botys*) (Mysol).

semifascialis Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 214 (♂, ♀) (1880) (*Botys*) (Celebes); 26, p. 131, t. 7, f. 12, 12a-c (1883) (*Botys*).

punctiferalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 320 (1854) (*Astura*) (Zentr.-Indien). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 548 (1859) (*Astura*) (Hindustan, Nordchina, Shanghai). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 375 (1863) (*Botys*). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 96 (1867) (*Astura*). — Snellen in Veth, Midden-Sumatra, 4, Lep., p. 63 (1880) (*Botys*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassan. Ver. Naturk., 37, p. 268 (1884) (*Botys*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 314 (1884) (*Conogethes*). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 172 (1885) (*Astura*). — Pryer, Trans. Asiat. Soc. Jap. 13 (1), p. 63 (1885). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 333 (1886) (*Conogethes*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. 267 (1888) (*Botys*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 268 (1890) (*Conogethes*); p. 592 (1890) (*Conogethes*). — Röber, Tijds. v. Ent., 34, p. 333 (1891) (*Conogethes*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 38 (1891); 9, p. 48 (1893) (*Conogethes*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc., p. 459 (1894) (*Conogethes*). — Snellen, Tijds. v. Ent., 38, p. 128 (1895) (*Conogethes*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 307, f. 181 (♂) (1896) (*Dichocrocis*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 88 (1897) (*Conogethes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 690; p. 688, f. 59 (1898) (*Dichocrocis*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 480 (1900). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), II, 29, p. 201 (1900). — Matsumura, Ill. Zeit. Ent. Berlin, 24, p. 332 (1900). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 456 (1901). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 97 (1901). — Miyake, Annot. Zool. Jap., 6 (3), p. 210 (1907). — Suzuki, List Sp. Hanazono Ent. Labr., p. 25 (1915). — Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 44 (1918). — Marumo, Journ. Col. Agr. Tokyo Imp. Univ., 8, p. 191 (1923). — Okamoto, Bull. Agr. Exp. Stat. Gov.-Gen. Chosen, 1 (2), p. 149 (1924). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 206, t. 7, f. 26 (1928); 25, p. 173 (1929).
ersealis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 980 (♀) (1859) (*Astura*) (Moreton-Bai). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 480 (1900) (*Dichocrocis*). — West-, Mittel- u. Südchina, Japan, Korea, Formosa, Indien (Sikkim, Khasis), Ceylon, Birma, Tonkin, Malakka, Singapore, Sumatra, Sumbawa, Java, Borneo, Sangir, Celebes, Amboina, Sula, Ceram, Philippinen, Batjan, Karolinen, Aru, Bali, Salomon Ins., Bismarek-Archipel, Mysol, Neu-Guinea, O. Australien, Queensland, Kap York, Viti Ins., Key Ins.

- Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 342 (1925).
- erscalis* Hampson, Proc. Zool. Soc. London, p. 690 (1898) (ex synon.).
- detracta* Walker, Journ. Linn. Soc. Lond., 3, p. 186 (1859) (*Deioplia*) (Singapore); Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 31, p. 262 (1864) (*Deioplia*).
- nicippealis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 999 (♂) (1859) (*Botys*) (Ceram).
- guittatalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1381 (1865) (*Astura*) (Mysol, Batjan, Aru, Ceram). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 400 (1900).
- nigralis* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 6) 18, p. 168 (1896) (*Conogethes punctiferalis* var.).
- var. *jocata* Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (s. 2) 7, p. 264 (1892) (*Conogethes punctiferalis* var.).
- Biologie: De Joannis, Ann. Soc. Ent. Fr., 98 (1929), p. 671 (1930) (larva).
- noxa: Queensland Agr. Journ. Brisbane, 7 (3), p. 142 (1917). — Tryon, Queensland Ann. Rep. Dep. Agric. & Stock (Brisbane) f. 1916-17, p. 49-63 (1917). — Wimshurst, Admin. Rep. Agric. Directorate f. 1919 (Baghdad), p. 39-41 (1920). — Van Hall, Meded. Inst. Plantenziekten (Buitenzorg), nr. 53, 46 pp. (1922). — Subramania Jyer, Journ. Mysore Agric. & Exptl. Union (Bangalore) 3 (3), p. 120-127 (1921). — Hutson, Ceylon Dep. Agric. Rep. f. 1921, p. C 23—C 26 (*Peradeniya*) (1922). — Fletcher, Sci. Reps. Agric. Res. Inst. Pusa f. 1921-22 (Calcutta), p. 51-67 (1922). — Kalshoven, Tectona (Buitenzorg), 15, p. 944-950 (1922). — Frogatt, Agric. Gaz. N. S. Wales (Sydney), 34 (5), p. 343-348 (1923); Queensland Agric. Journ., 21 (2), (Brisbane), p. 120-123 (1924). — Ballard, Queensland Agric. Journ., 22 (1), p. 31 (1924). — Empire Cotton Growing Rev. (Lond.), 2 (1), p. 40-41, 2 (3), p. 237-240 (1925), 3 (3), p. 276-279, 3 (4), p. 365-373 (1926). — Jepson, Ceylon Admin. Reps. Agric. f. 1923 (Colombo), p. D 19—D 21 (1924). — Husain, Rep. Dep. Punjab f. 1922-23 (Lahore), 2 (2), p. 177-204 (1924). — Gater, Malayan Agric. Journ. (Kuala Lumpur), 13 (6), p. 160-167 (1925). — Young, Australian Cotton Grower, Farmer & Dairyman (Brisbane), 1 (12), p. 4-7 (1925). — Bull. Imp. Inst. (London), 24 (4), p. 667-682 (1927). — Van der Meer Mohr, Inst. Plantenziekten (Buitenzorg) Bull., 22, 22 pp. (1927). — Ballard, Bull. Ent. Res., 17 (3), p. 295-300 (1927). — Wells, Empire Cotton Growing Corp., Rep. Exp. Sta. f. 1925-26 (London), p. 5-18

Hamilton
Scrub b.
Brisbane
(Queensland)

(1927). — Clausen, Tech. Bull. U. S. Dep. Agr. n. 15, 15 pp. (1927). — Chopra, Rep. Dep. Agric. Punjab f. 1925-26, 2 (1), p. 67—125 (Lahore) (1928). — Frogatt, Queensland Agric. Journ. (Brisbane), 29 (1), p. 15—35 (1928). — Ballard, Emp. Cott. Growing. Corp. Rep. Exp. Stat. f. 1926-27, p. 35—48 (1928). — Kalshoven, Tectona (Buitenzorg), 21, p. 593—623 (1928). — Kondo & Miyahara, Journ. Plant Prot. (Tokyo), 17, p. 85—94 (1930). — Grünwald, Ricinus, Beih. Tropenpfl., 27 (1), 58 pp. (Berlin) (1930). — Veitch, Ann. Rep. Dep. Agric. Queensland f. 1930-31 (Brisbane), p. 43-46 (1931). — Jepson, Adm. Rep. Dir. Agric. Ceylon 1934, p. D 132—D 147 (Colombo) (1935). — Ramakrishna Ayyar, Trop. Agriculturist, 86 (2), p. 113—117 (1936). — Isaac, Sci. Rep. Ind. Agric. Res. Pusa 1933—34, p. 168—174 (Delhi) (1936).

chlorophanta Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 2, p. 58, t. 39, f. 8 (1878) (*Botys*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 310 (1896) (part.) (= *nilusalis* Walk.); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 692 (1898) part. (*remidata* Fabr.). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 457 (1901) (= *nelusalis* Walk.). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 75 (1901) (*Sylepta*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 207, t. 7, f. 36 (1928); 25, p. 174 (1929) (*Dichocrocis*).
nox a: Hirose, Insect World, 40 (1), p. 18—20 (1936).

China, Japan,
Korea,
Formosa

b) Orientalische Region.

xuthusalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 691 (♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 312 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 689 (1898) (*Dichocrocis*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 79 (1901).

onustalis Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 587 (♂) (1890) (*Botys*) (Sikkim).

xuthalis Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 462 (1894) (*Notarcha*) (S.O.-Borneo).

surusalis Walker, vide sub a) Paläarktische Region.

evaxalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 995 (♂) (1859) (*Botys*) (N.-Hindustan). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 333, t. 183, f. 3 (1886) (*Dadessa*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 305 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 689 (1898) (*Dichocrocis*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 479 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 96 (1901).
aureolalis Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 375, 473 (♂) (1863) (*Botys*) (Himalaya).

Indien
(Sikkim,
Assam),
Tonkin,
Sumatra,
Borneo,
Celebes,
Amboina

Indien
(Sikkim,
Assam,
Kalkutta),
Ceylon,
Tonkin,
Sumatra,
Java,
Ceram,
Buru,
Br. u. Holl.
Neu-Guinea

- semistrigalis* Snellen, Tijds. v. Ent., 38, p. 128, t. 5, f. 6, 7 (1895) (*Conogethes*) (Sumatra, Java).
 var. *biagiialis* Strand, Arch. f. Naturg., 85 Br. Neu-Guinea A. 12, p. 145 (1920).
- bistrigalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1348 (♂) (1865) (*Zebronia*) (Darjiling). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 92 (1867) (*Pycnarmon*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 632 (1890) (*Zebronia?*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 306 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 690 (1898) (*Dichocrocis*). Indien (Bhotan, Sikkim)
- pandamalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 999 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 461 (1894) (*Dichocrocis*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 306 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 690 (1898) (*Dichocrocis*). Assam, Java, Pulo Laut, Borneo, Sumbawa, Nicobaren, Buru
- frenatalis* Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 448, t. 17, f. 15 (1863) (*Dichocrocis*) (Nicobaren). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1331 (1865).
- bicodula** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 94 (♂, ♀) (1901); 64, t. 1, f. 18 (1903). Sumatra, Borneo
- atrisectalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 580 (1908). Andamanen
- bilinealis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 306 (♀) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 690 (1898). Birma, Malakka
- clioalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 549 (♀) (1859) (*Astura*) (Sarawak). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 459 (1894) (*Conogethes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 690 (1898), part. (*Dichocrocis*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 479, t. 8, f. 27 (1900). Borneo, Pulo Laut, Ceram
- orissusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 701 (♂, nec ♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 690 (1898) (= *clioalis* Walk.). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 481 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 91 (1901). — Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 556 (1906) (*orissusalis*). Assam, Borneo, Philippinen, Amboina, Ceram, Key Ins., Aru, Neu-Guinea, Queensland
- orissalis* Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 258 (1886) (*Notarcha*) (Neu-Guinea, Amboina, Borneo).
- trigalis* Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 375, t. 10, f. 18 (1863) (*Botys*) (Amboina, Borneo). — Snellen, Tijds. v. Ent., 26, p. 128 (1883) (*Botys*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 37, p. 267 (1884) (*Botys*). — Ribbe, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 1, p. 89 (1886) (*Botys*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk.,

- 39, p. 168 (1886) (*Botys*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 226 (1887) (*No-tarcha*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. 267 (1888) (*Botys*). — Röber, Tijds. v. Ent., 34, p. 333 (1891) (*Botys*). — Pagenstecher in Kükenthals Reise, Lep., p. 461 (1897) (*Botys*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 728 (1898) (= *Lygropia obrinusalis* Walk.).
- clioalis* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 690 (1898) (part.) (*Dichocrocis*).
- punctiferalis** Guenée, vide sub a) Paläarktische Region.
- acolithalis** West, Novit. Zool., 36, p. 216 (♀) (1931) Philippinen (Luzon).
- semifascialis** Walker, Cat. Het. Lep. Brit. Mus., 34, p. 1381 (♀) (1865) (*Astura*) (Moreton-Bai). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 314 (1884) (*punctiferalis* Walk. var.?). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 872 (1885) (*Astura*); Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 480 (1900).
- punctiferalis* Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 307 (1896), part. (*Conogethes*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 690 (1898) (part.) (*Dichocrocis*).
- macrostidza** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 21, p. 1264 (1912). Burma, Tonkin
- latipunctalis** Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 343, t. 2, f. 42 (1925). Südchina
- pluto** Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 5) 20, p. 121 (1887) (*Omiodes*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 307 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 690 (1898). Birma, Salomon Ins. (Typus: Alu)
- loxophora** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 335 (♂) (1912). Bali
- actinialis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 690 (♂) (1898); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 12, p. 709 (1899). Assam (Khasis)
- tripunctapex** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 691; p. 761, t. 50, f. 5 (♂) (1898). Amboina, Buru
- diminutiva** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 168 (1896) (*Conogethes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 691 (1898); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 12, p. 709 (1899). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 343 (1925). Assam, (Typus: Khasis), Südchina
- haemactalis** Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 592 (♂, ♀) (1890) (*Conogethes*) (Sikkim). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 307 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 691 (1898). N.O. Indien (Sikkim), Pulo Laut, Java, Sumbawa
- ferialis** De Joannis, Ann. Soc. Ent. Fr., 98 (1929), p. 671, t. 4, f. 12 (1930). Tonkin
- festivalis** Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 872 (1885) (*Astura*) (Bombay). — Hampson, Indien

- Fauna Brit. India Moths, 4, p. 308 (♀) (1896) (*Dichocrocis*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 691 (1898).
- punctilinealis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 691 (♂) (1898). Tenimber Ins.
- nigrilinealis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1410 (♀) (1865) (*Botys*) (Sula). — Hampson, Brit. India Moths, 4, p. 308 (1896) (part.) (*Dichocrocis*); Proc. Zool. Soc. London, p. 691 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 90 (1901). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 481, t. 8, f. 9 (1900). Sikkim, Birma, Tonkin, Cambodja, Sumatra, Sumbawa, Celebes, Sula, Ceram, Mysol, Br. u. Holl. Neu-Guinea
- demeter** Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., (♂) p. 586 (1890) (*Botys*) (Sikkim).
- tigrina** Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 312, t. 182, f. 5 (1886) (*Haritala*) (Ceylon). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 587 (1890) (*Botys*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 38 (1891) (*Orthospila*); 9, p. 48 (1893) (*Haritala*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 691 (1898) (= *nigrilinealis* Walk.). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 481 (1900) (*Dichocrocis*). — W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, nr. 15, p. 132 (1915). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 206, t. 7, f. 35 (1928). Assam, Sikkim, Ceylon, Borneo, Sumbawa, Formosa
- compsogramma** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., (♀) p. 461 (1894) (*Notarcha*) (Sumbawa). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 691 (1898) (= *nigrilinealis* Walk.).
- definita** Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 7, p. 97, t. 133, f. 9 (1889) (*Haritala*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 308 (1896) (*Dichocrocis*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 691 (1898). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 456 (1901). West-, Mittel- u. Südchina, Indien (Himalaya, Sikkim, Assam)
- plutusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 478 (1859) (*Zebronia*) (Indien). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 849 (1878) (*Zebronia*); Journ. Linn. Soc. Lond. Zool., 21, p. 59 (1886) (*Zebronia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 92 (1887) (*Pycnarmon*). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 637 (1888) (*Haritala*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 586 (1890) (*Botys*); p. 281 (1890) (*Notarcha*). — Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 6, p. 477 (1890) (*Orthospila*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 38 (1891) (*Orthospila*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 309 (1896) (*Dichocrocis*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 691 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 91 (1901). N. O. Indien, Sikkim, Tonkin, Samatra, Flores

- discinotalis* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 617 (1877) (*Haritala*) (Andamanen). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 636 (1888) (*Haritala*).
- recurrens* Moore, Descr. N. Ind. Lep. Ins. Atkinson, Sikkim, p. 215, t. 7, f. 11 (♂) (1887) (*Haritala*) Assam, (Darjiling). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 309 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 692 (1898) (*Dichocrocis*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 89 (1901). Sumatra
- philippinensis* Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Philippinen 8) 9, p. 335 (1912).
- pyrrhialis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, S. Indien p. 483 (♂) (1859) (*Zebronia*) (Sarawak). (Nilgiris), — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 462 Ceylon, (1894) (*Notarcha*). — Hampson, Fauna Brit. Sumatra, India Moths, 4, p. 309 (1896) (*Dichocrocis*); Borneo, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 692, (1898). — Pulo Laut E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 90 (1901).
- angulifascia* Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 136, t. 155, f. 10 (1891) (*Haritala*) (Nilgiris).
- leptalis* Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., Indien 15, p. 214 (1903). (Simla)
- plenistigmalis* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Assam, 6) 16, p. 477 (1895) (*Pachybotys*) (Khasia Tonkin hills). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 309 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 692 (1898).
- rigidalis* Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 631 (♀) N.O. Indien (1890) (*Zebronia*) (Sikkim). — Hampson, (Sikkim, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 310 (♀) Assam), (1896) (*Dichocrocis*); Proc. Zool. Soc. Lond., Birma, p. 692 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Sumatra, Stett., 62, p. 330 (1901). Pulo Laut
- strigulosa* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 201 (♂) (1894) (*Ravanoa*) (Shillong).
- zebralis* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 91, t. 7, Südchina, f. 12 (1867) (*Pycnarmon*) (Darjiling). — Indien — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 631 (Sikkim, (1890) (*Zebronia*). — Hampson, Fauna Brit. Assam) India Moths, 4, p. 310 (1896) (*Dichocrocis*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 692 (1898).
- chlorophanta* Butler, vide sub a) Paläarktische Region.
- nilusalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, West-, Mittel- p. 685 (♂) (1859) (*Botys*) (Borneo). — u. Südchina, Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, Indien p. 484 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., (Assam, 62, p. 74 (1901) (= *Sylepta renidata* Sikkim, Hamps.). — De Joannis, Ann. Soc. Ent. Fr., Nilgiris), 98 (1929), p. 672 (1930). Ceylon, Tonkin, Sumatra,
- straminea* Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 278, t. 188, f. 5 (1885) (*Hedylepta*) (Ceylon). —

- E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 75 (1901). Borneo, Pulo Laut, Andamanen
- albifrons* Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 279, t. 180, f. 6 (♂, ♀) (1885) (*Gadessa*) (Ceylon). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 482 (1900).
- nelusalis* Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 310 (1896) (part.) (*Dichocrocis*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 456 (1901).
- subalbalis* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 103 (♂) (1896) (*Gadessa*?) (Khasis).
- poenalis* Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 313 (1896) (part.). — De Joannis, Ann. Soc. Ent. Fr., 98 (1929), p. 672 (1930) (*Dichocrocis*).
- renidata* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 692 (1898) (*Dichocrocis*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 74 (1901) (*Sylepta*).
- attemptalis* Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 590 (♂) (1890) (*Botys*) (Sikkim). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 310 (1896) (= *nelusalis* Walk.). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 77 (1901) (*Sylepta*). Sikkim, Sumatra
- megillalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 700 (♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 311 (1896), (part.) (*Dichocrocis*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 692 (1898). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 483, t. 8, f. 2 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 79 (1901) (*Sylepta*). Assam, Ceylon, Malakka, Sumatra, Borneo
- ordidalis* Snellen (Warren, *Haritala* s. MS), Trans. Ent. Soc. Lond., p. 589 (1890) (*Botys*) (Sikkim).
- characteristica* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 103 (1896) (*Gadessa*) (Khasis).
- visealis* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 292 (1906) (Khasis). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 580 (1908) (= *megillalis* Walk.).
- noxia*: Hutson, Trop. Agriculturist, 63 (2), p. 91—93 (*Peradeniya*) (1924).
- credulalis* Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 590 (1890) (♂) (*Botys*) (Sikkim). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 311 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 693 (1898). N. O. Indien (Assam, Sikkim)
- planalis* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 208 (1894) (*Pleonectusa*) (Khasis).
- aurifincta* Butler, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 431 (1886) (*Scopula*) (Peak Downs). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 693 (1898); in Andrews, Monogr. Christmas Isl., p. 74, t. 9, f. 74 (1900). Bali, Tenimber, Christmas Ins., Australien

pallidalis Warren, Ann. Mag. Nat. Hist.,
(s. 6) 17, p. 134 (♂) (1896) (*Rehimena*)
(Tenimber).

Species incertae sedis.

dorsipunctalis Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 317, t. 1, f. 5 (♂) (1927). Philippinen
(Luzon)

galmeralis Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 317, t. 1, f. 4 (♂) (1927). Philippinen
(Luzon)

grossepunctalis (Snellen i. l.) E. Hering, Ent. Zeit. Nias
Stett., 62, p. 96 (♀) (1901).

infundibulalis Snellen in Veth, Midden-Sumatra, Sumatra,
Lep., 4, p. 64, t. 5, f. 5, 5a (1880) (*Botys*). Bismarek-
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 693 Archipel,
(1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), Australien
H. 29, p. 204 (1900).

liparalis West, Novit. Zool., 36, p. 216 (♀) (1931). Philippinen
(Luzon)

pulalis Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 18, Birma
p. 448 (1916).

sisyroptila Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 403 (♂, Java
♀) (1933).

spirostieha Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 502 (♂) Java
(1934).

Biologie: Meyrick, Exot. Microlep., 4, p.
502 (1934).

tyranthes Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 89 Sangir
(♂) (1897).

e) Aethiopische u. Madagassische Region.

surusalis Walker, vide sub a) Paläarktische Region.

xanthoplagalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., S. Nigeria
(s. 8) 9, p. 333 (♂) (1912). (Lagos)

polystidzalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Goldküste
9) 1, p. 131 (♀) (1918).

usticinetalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Mashonaland,
9, p. 334 (♂) (1912). — Janse, Check List S. Afrika
S. Afr. Lep. Het., p. 159 (1917).

rubritinctalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Br. Zentr.
9) 1, p. 132 (♀) (1918). Afrika

fuscoalballs Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 692 Sierra Leone
(♂) (1898).

blplagialis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, Gambia,
p. 133 (♂) (1918). N. Nigeria

Species incertae sedis.

crocodora Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 542 (♀) Belg. Congo
(1934) (*Conogethes*). (Eala)

Biologie: Meyrick, l. c., p. 543 (1934).

euryatma Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 542 (♀) (1934) (*Conogethes*).
Delagoa Bai,
Belg. Congo
(Elisabeth-
ville)

tigrldalis Mabille, Ann. Soc. Ent. Belg., 68, (1899), Madagascar
p. 745 (1900).

d) Australische Region.

pseudopoeonalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., Neu-Guinea
p. 688 (♂) (1898).

fluminalis Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 5) 11, Fidji
p. 428 (1883) (*Astura*). — Hampson, Proc.
Zool. Soc. Lond., p. 689 (1898) (*Dichocrocis*).

xanthocyma Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Br. u. Holl.
689 (♂) (1898). Neu-Guinea

nigriretinalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Trobriand
9, p. 334 (♂) (1912). Ins.
(Kiritivini)

fuscifimbria Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) Neu-Guinea
18, p. 170 (1896). — Hampson, Proc. Zool.
Soc. Lond., p. 690 (1898).

orissusalis Walker, vide sub b) Orientalische Re-
gion.

punctiferalis Guenée, vide sub a) Paläarktische Re-
gion.

semifaseialis Walker, vide sub b) Orientalische Re-
gion.

jubata Lucas, Proc. Roy. Soc. Queensland, 15, p. Queensland
152 (1900).

piuto Butler, vide sub b) Orientalische Region.

tharsalea Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 225 Queensland
(♂, ♀) (1887) (*Notarcha*). — Hampson, (Cooktown,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 691 (1898) (*Di- Townsville*)
chocrocis).

nigrilinealis Walker, vide sub b) Orientalische Re-
gion.

paetolea Butler, Ann. Mag. Nat. Hist. (s. 5) 20, Salomon
p. 122 (1887) (*Haritala*). — Hampson, Proc. Ins. (Typus:
Zool. Soc. Lond. p. 692 (1898). Alu)

albiflunalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Br. Neu-
9, p. 315 (♀) (1912). Guinea

aurlincta Butler, vide sub b) Orientalische Region.

Species incertae sedis.

bimaeculalis Kenrick, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 81, Br. Neu-
t. 4, f. 121 (1907). Guinea

infundibulalis Snellen, vide sub b) Orientalische Re-
gion.

leptophaes Turner, Proc. Roy. Soc. Queensland, 24, Queensland
p. 144 (♀) (1913). (Stradbroke
Isl.)

- nubifera** Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (s. 2) 7, p. 264 (1892). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 693 (1898). Australien (Brisbane)
- pardalis** Kenrick, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 81, t. 4, f. 120 (1907). Br. Neu-Guinea
- umbrosa** Meyrick, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (s. 2) 1, p. 256 (1886) (*Conogethes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 693 (1898). Neu-Guinea
- xanthias** Turner, Proc. Roy. Soc. Queensland, 24, p. 144 (♀) (1913). N. Queensland (Kurzuda)

e) Neotropische Region.

- sabatalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 252, t. 62, f. 18 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 690 (1898). Mexiko, Guatemala, Panama
- spoliatalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 375, 473, t. 11, f. 8 (1863) (*Botys*) (N.-Amerika) (?). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 693 (1898) (Brasilien).
- strigimarginalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 693 (1898). Brasilien (Amazonas)
- cernalis** var. Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 366 (♀) (1859) (*Asopia*) (Villa Nova), nec Guenée (1854).
- sernalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 693 (1898) (err. typ.).
- eubulealis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 595 (♂) (1859) (*Botys*) (Brasilien). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 693 (1898). Brasilien
- gyacalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 207 (♀) (1920). Brasilien (S. Paulo)
- leucostotalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 133 (♂) (1918). Peru

Species incertae sedis.

- clystalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 208 (♂) (1920). Guatemala (Cayuga)
- nimalis** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus., 65, art. 7, p. 63 (♂) (1924). Bolivien
- penniger** Dyar, Insec. Insc. Menstr., 1, p. 98 (1914). Br. Guayana
- terricolalis** Möschler, Verh. z. b. Ges. Wien, 31, p. 424 (♂) (1881). — Strand, Arch. f. Naturg., 85, A 12, p. 144 (1920). Surinam (Paramaribo), Trinidad
- tlapalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 208 (♂) (1920). Mexiko (Orizaba)

77. Genus **Dichocrocopsis** Dyar

Dyar, Zoologica (N. York), 1, p. 133 (1910).

(Typus generis: *maculiferalis* Dyar).

maculiferalis Dyar, Zoologica (N. York) 1, p. 133, Br. Guayana f. 42 (1910).

1

78. Genus **Mysficomima** Meyrick

Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 115 (1931).

(Typus generis: *M. desmoteria* Meyr.).

desmoteria Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 115 (♂, Costarica ♀, (1931). (San José)

1

79. Genus **Lamprosema** Hübner

Hübner, Zutr. z. Sammlg. exot. Schmett., 2, p. 21 (1823) (*L. lunulalis* Hübn.); id., Verz. bek. Schm., p. 361 [1825]. — Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 133 (1918). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 207 (1928); *ibid.*, 25, p. 157, 174 (1929). — Hemming, Hübner, 2, p. 215 (1937).

Isopteryx Guenée, Delt. & Pyral., p. 227 (1854), nec Pictet (1841) [*Neuroptera*].

Nacoleia Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 934 (1859) (typus: *rhoealis* Walk.). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 461 (1890). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 312 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 597, 693 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 201 (1900). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 171 (1928).

Hedylepta Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 409 (1863) (typus: *indicata* Fabr.). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 483 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 301 (1901).

Blepharomastix Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 422 (1863). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford, 2, p. 485 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 316 (1901). — Forbes, Lep. N. York, p. 546 (1923).

Blepharomastix Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 700 (1898).

Pelecyntis Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 315 (1884) (typus: *diemenalis* Guen.).

Pterygusus Butler, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 429 (1886) (typus: *ochreipennis* Butl.).

Semioceros Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 318 (1884) (typus: *amphicedalis* Walk.).

Thysanodesma Butler, Ill. Typ. Spec. Brit. Het. Mus., 7, p. 96 (1889) (typus: *praeteritalis* Walk.).

Apromastix Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 6, p. 478 (1890) (typus: *moninalis* Warr.).

- Loxocreon* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 9, p. 432 (1892) (typus: *continuatalis* Wallgr.).
- Metasiodes* Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 8, 465 (1894) (typus: *heliale* Meyr.).
- Metasciodes* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 693 (1898) (ex synon.).
- Merotoma* Meyrick, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 9, p. 460 (1894) (typus: *dairalis* Walk.). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 2, p. 483 (1900).
- Tylostega* Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 457 (1894) (typus: *chrysanthos*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 306 (1901).
- Macrospectrodes* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 94 (1896) (typus: *subargentalis* Snell.).
- Idusia* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 98 (1896) (typus: *benepictalis* Warr.).
- Preneopogon* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 146 (1896) (typus: *barbata* Warr.).
- Orthocona* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 214 (1896) (typus: *eximialis* Warr.).
- Glycythyma* Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral., 32, p. 90 (1908) (typus: *chrysorycta* Meyr.); Proc. Roy. Soc. Queensland, 24, p. 145 (1913) (= *Nacoleia*).

(Typus generis: *lunulalis* Hübn.)

a) Paläarktische Region.

- commixta** Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 5) 4, p. 453 (1879) (*Samea*) (Japan). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 624 (1889) (*Samea*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Brit. Mus., 9, p. 172, t. 173, f. 24 (1893) (*Thysanodesma*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 322 (1896) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 694 (1898) (*Nacoleia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 462 (1901) (*Nacoleia*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 209, t. 7, f. 9 (1928); 25, p. 176 (1929) (*Lamprosema*).
- costisignalis** Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 273 (1885) (*Nacoleia*). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 642 (1889) (*Nacoleia*).
- sibirialis** Millière, Le Naturaliste, 1, p. 139 (1879) (*Stenia*) (Askold Ins.); Mém. Soc. Cannes, p. 3, t. 8, f. 4 (1879—1881) (*Stenia*). — Staudinger & Rebel, Cat. Lep. Pal. Faun., 2, p. 54, nr. 990 (1901) (*Nacoleia*). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3), 3, mem. 7, p. 344 (1925) (*Lamprosema*).
- fenestralis** Christoph, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 56 (1), p. 39 (1881) (*Agrotera*) (Amur). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 460 (1890) (*Nacoleia*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 630 (1898) (*Agrotera*).
- maculalis** South in Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 462, t. 14, f. 7 (1901) (*Nacoleia*). — Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 379 (1911) (*Nacoleia*). — Shibuya, Ins. Matsum., 2, p. 99 (1927) (*Lamprosema*);
- West-, Mittel- u. Südchina, Japan, Formosa, Indien (Assam), Nilgiris), Ceylon, Borneo, Tonkin
- Ussuri, Amur, Mittel- u. Westchina, Japan, Korea

- Journ. Fac. Agr. Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 176 (1929).
- satsumalis** South in Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 461 (1901) (*Nacoleia*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 176 (1929) (*Lamprosema*). Japan (Typus: Kyushu)
- catenalis** Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 378 (♂) (1911) (*Nacoleia*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 176 (1929) (*Lamprosema*). West-u. Südchina, Japan (Typus: Osumi, Kyushu)
- chrysorycta** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 320 (♂, ♀) (1884) (*Scmioceros*) (Queensland). — Hampson, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 213 (1897) (*Piletocera*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 443 (1901) (*Piletocera*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stettin, 64, p. 48 (1903) (*Piletocera*). — Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 15, p. 105 (1905) (*Nacoleia*). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 575 (1908) (*Piletocera*). — Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral., 32, p. 90 (1908) (*Glycythyma*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 209, t. 7, f. 27 (1928); 25, p. 177 (1929) (*Lamprosema*). Westchina, Japan, Formosa, Indien (Sikkim, Assam), Ceylon, Birma, Indochina, Sumatra, Borneo, Celebes, St. Aignan, Australien (Queensland)
- contingens** Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 273, t. 179, f. 8 (♂, ♀) (1885) (*Nacoleia*) (Ceylon). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 642 (1889). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 238 (1896) (*Piletocera*); Trans. Ent. Soc. Lond., p. 213 (1897) (*Piletocera*).
- tamplusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 704 (♂, nec ♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 318 (1896) (part.) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 702 (1898) (*Nacoleia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 460 (1901) (*Nacoleia*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 485, t. 8, f. 13 (1900) (*Blepharomastix*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 316 (1901) (*Blepharomastix*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 177 (1929). Südchina, Japan, Indien (N. W. Himalaya, Sikkim, Assam, Nilgiris), Sumatra, Java, Pulo Laut, Borneo, Celebes
- omicronalis** Snellen in Veth, Midden-Sumatra, 4, Lep., p. 63 (1880) (*Botys*) (Sumatra). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 271 (1899) (*Pyrausta*).
- lilliputalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 229 (♂, ♀) (1880); 27, p. 39, t. 3, f. 8 (1884) (*Metasia*) (Celebes, Java). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 239 (1899) (*Metasia*).
- mimula** Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 138, t. 155, f. 23 (1891) (*Aplo-mastyx*) (Dharsala).
- calliophis** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 466 (♂) (1894) (*Metasiodes*) (Pulo Laut).

- tanypialis* Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 465 (1894) (*Metasia*) (Pulo Laut, S.O.-Borneo).
- similis** Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 286, t. 180, f. 12 (1885) (*Acharana*) (Ceylon). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 274 (1890) (*Acharana*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 314 (1896) (= *poconalis* Walk, part.); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 698 (1898) (= *poconalis* Walk., part). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 458 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 177 (1929). China, Japan, Korea, Indien, Ceylon
- pallidinotalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 443 (1912) (*Nacoleia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 459 (1901). — Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 378 (1911). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 178 (1929). West-u. Mittelchina, Japan, Korea
- tristrialis** Bremer, Lep. Ost-Sib. (Mém. Acad. Sci. St. Petersburg) p. 68, t. 6, f. 7 (1864) (*Botys*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 441 (1890) (*Omiodes*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 313 (1896) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 698 (1898). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 458 (1901). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 303 (1901) (*Hedylepta*). — Matsumura, Journ. Col. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 15 (3), p. 188 (1925). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 210, t. 8, f. 1 (1928); 25, p. 178 (1929) (*Lamprosema*). Amur, West-u. Mittelchina, Japan, Korea, Formosa, N.O. Indien (Assam, Sikkim), Sumatra, Celebes, Neu-Guinea
- confusalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 98 (1896) (*Hedylepta*) (Japan). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 698 (1898) (*Nacoleia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 458 (1901) (*tristrialis* var.). — W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, nr. 15, p. 135 (1915) (*Nacoleia*).
- indistincta** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 9, p. 436 (1892) (*Acharana*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 484 (1901) (*Pachyzancla*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 178 (1929). Japan
- misera** Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 3, p. 74, t. 59, f. 5 (1879) (*Asopia*) (Japan). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 698 (1898) (= *poconalis* Walk.). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 458 (1901) (= *poconalis* Walk.). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 179 (1929). China, Japan, Korea
- invalidalis** South in Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 467, t. 15, f. 26 (♂) (1901) (*Sylepta*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 179 (1929). Mittel-u. Westchina, Japan

- indicata** Fabricius, Syst. Ent., p. 640 (1775) (*Phalaena*); Ent. Syst., 3 (2), p. 218 n. 330 (1794) (*Phalaena*). — v. Hedemann, Ent. Zeit. Stett., 55, p. 291 (1894) (*Hedylepta*). — Aurivillius, Entom. Tidskr., 18, p. 168 (1897) (*Hedylepta*). — Hampson, Proc. Zool. Lond., p. 699 (1898) (*Nacoleia*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 306 (1901) (*Hedylepta*). — Fernald, Bull. U. S. Nat. Mus., nr. 52, p. 376, nr. 4299 (1902) (*Hedylepta*). — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 129, nr. 4949 (1917) (*Hedylepta*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 211, t. 8, f. 25 (1928); 25, p. 179 (1929).
- vulgalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 202, t. 6, f. 8 (1854) (*Asopia*) (Brasilien, Guayana, Antillen). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 364 (1859) (*Asopia*). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 409 (1863) (*Hedylepta*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1322 (1865) (*Hedylepta*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 276 (1885) (*Hedylepta*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 283 (1890) (*Hedylepta*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 619 (1890) (*Hedylepta*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 39 (1891); 9, p. 49 (1893) (*Hedylepta*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 6 (1894) (*Hedylepta*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 315 (1896) (*Nacoleia*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 87 (1897) (*Hedylepta*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 699 (1898) (*Nacoleia*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 483 (1900) (*Hedylepta*). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 202 (1900) (*Nacoleia*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 306 (1901) (*Hedylepta*). — Fletcher, Trans. Linn. Soc. Lond., 13, p. 305 (1910) (*Nacoleia*). — Freyer, Trans. Linn. Soc. Lond., 15, p. 26 (1912) (*Nacoleia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 458, (1901).
- sabalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 631 (♂) (1859) (*Botys*) (Rio de Janeiro).
- moeliusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 703 (♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak).
- connexalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1394 (♀) (1865) (*Botys*) (St. Domingo).
- reductalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1412 (♂) (1865) (*Botys*) (Amoy).
- forma **pigralis** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 53, p. 93 (1909) (*indicata* ab.).
Biologie: Cherian, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 33 (4), p. 857—860 (1929). —
- Nord-, West-, Mittel- u. Südchina, Japan, Formosa, Indien, Ceylon, Malakka, Tonkin, Singapur, Birma, Sumatra, Borneo, Seychellen; Sierra Leone, Congo, Kamerun, N. Nigeria, Uganda, D. u. Port. Ostafrika, Kapland, Madagaskar; Florida, Cuba, Jamaika, Haiti, Portorico, Virgin. Ins., Barbados, Mexiko, Guatemala, Honduras, Panama, Venezuela, Br. Guayana, Brasilien
- Fr. Guayana (Typus), Panama

De Joannis, Ann. Soc. Ent. Fr., 98 (1929), p. 674 (1930) (larva).

n o x a: Andrews, Quaterly Journ. Sci. Dept. Ind. Tea Assoc. (Calcutta), pt. 1, p. 18—21 (1916). — Harland, Rept. Agric. Dep. St. Vincent (Barbados) f. 1916-17, p. 10—11 (1917). — Cotton, Journ. Dep. Agric. Porto Rico (Rio Piedras), 2 (4), p. 265—313 (1918). — Smyth, Rev. Agric. Puerto Rico (San Juan), 4 (5), p. 11—21 (1920). — Pillai, Travancore Dept. Agric. (Trivandrum) 53 pp. (1921). — Wilson, Virgin Islands Agric. Exp. Stat. (St. Croix) Bull. nr. 4, 351 pp. (Wash.) (1923). — Gater, Malayan Agric. Journ. (Kuala Lumpur), 13 (6), p. 160—167 (1925). — Ghosh, Rep. Entom. Mandalay, Seric. Work f. 1925 (Rangoon), 1078 pp. (1925). — Dupont, Seychelles: Ann. Rep. Dep. Agric. (Victoria, Seychelles) f. 1926, p. 3—4 (1927). — Hargreaves, Rep. Dep. Agric. Uganda (Entebbe), f. 1928, p. 44—45 (1929). — Cherian, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 33 (4), p. 857—860 (1929). — Hargreaves, Ann. Rep. Dep. Agric. Sierra Leone (Freetown) f. 1931, p. 18—20 (1932).

Parasiten: Bruner, Informe del depart. ent. fitopat. 1929-1930, 74 pp. (Santiago de las Vegas, Cuba) (1931). — Gahan, Mem. Soc. Cubana Hist. Nat. (Havana), 8 (3), p. 125—134 (1934).

fumidalis Leech, Entom., 22, p. 70, t. 4, f. 8 (1889) Japan (*Samia*). — Hampson, Japan Proc. Zool. Soc. Lond., p. 647 (1898) (*Samea*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 453 (1901) (*Samea?*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 180 (1929) (*Lamprosema*).

b) Orientalische Region.

pectinalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) Mittelchina, 1, p. 133 (♂) (1918). Borneo

commixta Butler, vide sub a) Paläarktische Region.

ustulalis Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., Indien 15, p. 265 (1903) (*Nacoleia*). (Nilgiris)

ustalis Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 138 (1891) (♀, nec ♂) (*Aplomastix*) (Nilgiris).

conisota Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., Madras 21, p. 1266 (♀) (1912) (*Nacoleia*).

megaspilalis Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., Madras, 21, p. 1267 (1912) (*Nacoleia*). Queensland

rectistrialis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8), Key Ins. 9, p. 433 (1912).

- marionalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 930 (♀) (1859) (*Desmia*?) (Sarawak). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 321 (♂) (1896) (part.) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 695 (1898) (part.) (*Nacoleia*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 483, t. 7, f. 11 (1900) (*Nacoleia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 458 (1901) (*Nacoleia*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 318 (1901) (*Nacoleia*). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 344 (1925). West-, Mittel-, u. Südchina, Indien (N.W. Himalaya, Sikkim), Birma, Sumatra, Borneo
- biformis** Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 7, p. 94, t. 135, f. 2, 3 (1889) (*Danaga*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 209, t. 7, f. 18 (1928). China, Indien, Tonkin, Formosa
- marionalis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 321 (1896) (part.) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 695 (1898) (part.) (*Nacoleia*).
- secunda** Strand, Ent. Mitt., 8, p. 104 (♂) (1919) (*Symphonia*) (Formosa).
- praeteritalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 372 (♂) (1859) (*Asopia*?) (Ceylon). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 321 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 695 (1898) (*Nacoleia*). Indien, Ceylon, Birma
- cyanealis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 405 (♀) (1859) (*Isopteryx*) (Sarawak). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 321 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 695 (1898) (*Nacoleia*). Südchina, ? Japan (sec. Wileman), Indien (Assam, Nigiris), Ceylon, Birma, Tonkin, Malakka, Borneo
- zanclogramma** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 8 (♀) (1894) (*Metasia*) (Birma, Koni).
- tiasalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 994 (♀) (1859) (*Botys*) (Ceylon). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Brit. Mus., 9, p. 172, t. 173, f. 20 (1893) (*Thysanodesma tiasale*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 321 (1896) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 695 (1898) (*Nacoleia*). Ceylon, Tonkin, Australien
- microrchrysalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1306 (♂) (1865) (*Asopia*?) (Moreton-Bai).
- fuscicillialis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 580 (1908) (*Nacoleia*). Sikkim
- nigricostalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 580 (1908) (*Nacoleia*). Birma
- mellealis** Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 282 (1890) (*Pachyzancla*) (Birma). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 315 (♀) (1896) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 696 (1898) (*Nacoleia*). Indien (Bengalen), Birma, Malakka

- silvosalis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 18, Assam
p. 416 (♂) (1906) (*Pyrausta*). — Hamp-
son, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p.
580 (1908) (*Nacoleia*).
- barbata** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, Assam
p. 146 (♂, ♀) (1896) (*Preneopogon*). — (Typus:
Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. Khasis)
320 (1896) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 696 (1898) (*Nacoleia*).
- tumidicostalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Indien
Soc., 18, p. 580, t. E, f. 27 (1908). (Madras)
- lophotalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Singapore
p. 434 (♂) (1912).
- valvata** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. Assam
104 (♂) (1896) (*Tylostega*). — Hampson, (Typus:
Fauna Brit. India Moths, 4, p. 316 (1896) Khasis)
(*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 696
(♂) (1898) (*Nacoleia*).
- phothias** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 458 (♂) Pulo Laut,
(1894) (*Tylostega*). — Hampson, Proc. Zool. S.O. Borneo
Soc. Lond., p. 696 (1898) (*Nacoleia*).
- mesodora** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 458 Pulo Laut
(♂) (1894) (*Tylostega*). — Hampson, Proc.
Zool. Soc. Lond., p. 697 (1898) (*Nacoleia*).
- chrysanthies** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. Pulo Laut
458 (♂, ♀) (1894) (*Tylostega*). — Hampson, (Typus),
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 697 (1898) (*Nacoleia*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62,
p. 307 (1901) (*Nacoleia*). Sumatra
- lophophoralis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Singapore,
8) 9, p. 435, (1912) (*Nacoleia*). — Wileman, Japan
Trans. Ent. Soc., p. 379 (1911) (non descr.). (Typus:
Fustiki)
- subargentalis** Snellen (Swinhoe, *Achar. s.* MS), Westchina,
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 579 (♂, ♀) Sikkim
(1890) (*Botys*) (Sikkim, Darjeeling). —
Hampson, Fauna India Moths, 4, p. 312 (♂)
(1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 697 (1898)
(*Nacoleia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond.,
p. 458 (1901) (*Nacoleia*). — Strand, Arch.
f. Naturg., 85, A 12, p. 146 (1920) (*Naco-
leia*).
- subalbalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Westchina
9, p. 436 (♀) (1912) (*Nacoleia*).
- pachytornalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Indien
Soc., 21, p. 1267 (1912) (*Nacoleia*). (Madras)
- dairalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. Nord-, West-
698 (♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hamp- u. Südchina,
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 697 (1898) Malakka,
(*Nacoleia*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Ox- Borneo,
ford Mus., 2, p. 483 (1900) (*Merotoma*): Celebes,
Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 19, p. 55 (1907) Pulo-Laut,
(*Nacoleia*) (Malakka), nec Meyrick (1899). Philippinen
- annubilata* Caradja, Acad. Rom. Mem., (s. 3) 3, mem. 7, p. 344 (1925), nec Swinhoe
(1894) (*Nacoleia*) (West-, Nord- u. Süd-

- china); (s. 3) 4, p. 409 (1927) (= *dairalis* Walk.) (err. Warr.).
 Biologie: Semper, Schm. Philipp. Ins., 2, p. 671, t. 5, f. 5, 6 (1900) (*Merotoma*) (larva, pupa).
meyricki Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 19, p. 55 (1907) (*Merotoma*) (nom. nov.).
dairalis Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 460 (1899) (*Merotoma*), nec Walker (1859).
perdentalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 697 (1898) (*Nacoleia*).
 Pulo Laut, Celebes
 Amboina, Buru, Ferguson Ins., Holl. Neu-Guinea
chrysorycta Meyrick, vide sub a) Paläarktische Region.
tampiusalis Walker, vide sub a) Paläarktische Region.
similis Moore, vide sub a) Paläarktische Region.
tristrialis Bremer, vide sub a) Paläarktische Region.
karenkonalis Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 210, t. 5, f. 24 (♀) (1928).
 Formosa
sauterialis Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 46 (♂, ♀) (1918) (*Hedylepta*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 213, t. 8, f. 17 (1928).
 Formosa
perstygialis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 440 (♀) (1912).
 Mittelchina
poeonalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 639 (♀) (1859) (*Botys*) (Sierra Leone). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 313, f. 182 (1896) (part.) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 693; p. 694, f. 60 (♂) (1898) (part.) (*Nacoleia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 458 (1901) (*Nacoleia*). — Caradja, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 40, p. 270 (1926) (Ussuri [?], Westchina) (var.).
praeteritalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1405 (♀) (1865) (*Botys*) (Ceylon). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 165, t. 173, f. 3 (1893) (*Acharana*).
fuscipennis Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 202 (♂) (1894) (*Charema*) (Shillong, Chorra Funji).
granulata Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 174 (1896) (*Pachyzancla*) (Khasis).
forma decisalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1451 (♀) (1865) (*Botys*) (Java). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 345 (1925) (*decidialis* err. typ.).
 West-, Mittel- u. Südchina, Indien (Sikkim, Assam), Ceylon, Birma, Sumatra, Java, Borneo, Flores, Sula, Bismarck-Archipel; Sierra Leone, Congo, D. Ostafrika
 Mittelchina, Indien, Ceylon, Java, Bismarck-Archipel, West- u. Ostafrika

- nilusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 685 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 484 (1900) (*Hedylepta*). Borneo, Pulo Laut
- nilalis** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 459 (1894) (*Conogethes*) (Pulo Laut).
- poeonalis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 313 (1896) (part.) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 698 (1898) (part.) (*Nacoleia*).
- bianoralis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 1001 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 228 (♂, ♀) (1887) (*Pachyzancla*); p. 6 (1894) (*Omiodes*); p. 86 (1894) (*Omiodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 698 (1898) (= *Nacoleia poeonalis* Walk.). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 212 (1928). Birma, Ceylon, Borneo, Formosa, Australien (Queensland)
- annubillata** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 203 (♂) 1894) (*Charema*) (Cherra Punji). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 314 (♂) (*Nacoleia*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 302 (1901). Indien (Khasis), Ceylon, Birma, Sumatra, Borneo
- Parasiten: Hutson, Ceyl. Dep. Agric. Rep. f. 1921 (*Paradeniya*), p. C 23—26 (1922). — Ferrière, Bull. Ent. Res., 21 (3), p. 353—360 (1930). — Baranoff, Ent. Nachr.-Bl., 8 (2), (Troppau) p. 41—49 (1934).
- trizonalis** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 303 (♂) (1901) (*Hedylepta*). Lombok (Sapit)
- halmusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 693 (♂, nec ♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak). Borneo, Sula
- poeonalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 698 (1898) (part.) (*Nacoleia*).
- korndörfferi** Snellen in Veth, Midden-Sumatra, 4, Lep., p. 62 (1880) (*Botys*) (Sumatra); Tijds. v. Ent., 26, p. 127 (1883) (Celebes). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. 185 (1888) (*Botys*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 698 (1898) (= *Nacoleia poeonalis* Walk.). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 305 (1901) (*Hedylepta*). Indien (Assam, Sikkim), Celebes, Sumatra, Amboina
- korndorfferi** Hampson, Proc. Zool. Soc. London, p. 698 (1898) (ex synonym.).
- minoralis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1420 (♀) (1865) (*Botys*) (Sula). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 698 (1898) (= *Nacoleia poeonalis* Walk.). — Caradja, Acad. Rom. Mem., (s. 3) 3, mem. 7, p. 344 (1925); (s. 3) 4, mem. 8, p. 409 (1927) (*Lamprosema*). West-u. Südchina, Sula, Bali, Bismarck-Archipel, Queensland
- niphealis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 638 (♀) (1859) (*Botys*) (Sierra Leone). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 313 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 698 N. O. u. W. Indien, Ceylon, Tonkin,

- (1898) (*Nacoleia*). — Candèze, Encycl. Ent. B, 3, Lepid., 2 (3—4), p. 130 (1927).
epastalis Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 874, t. 57, f. 13 (1885) (*Botys*) (Bombay).
 Chagos Ins., Seychellen, Malediven, Mirikoi; Sierra Leone
- vittifera* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 699 (1898) (*Nacoleia*).
 Amboina, Fergusson Ins., Neu-Guinea,
- selenalis* Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 443 (♂) (1912).
 Borneo
- indicata* Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.
- stigmatalis* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 101 (♀) (1896) (*Notarcha*) (Khasis).
 — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 314 (♀) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 699 (1898) (*Nacoleia*).
 Südchina, Assam (Typus: Khasis)
- diemenalis* Guenée, Delt. & Pyral., p. 203 (♂) (1854) (*Asopia*) (Vandiemensland). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 409 (1863) (*Hedylepta*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 316 (1896) (part.); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 699 (1898) (part.) (*Nacoleia*). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 202 (1900). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 458 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 211, t. 8, f. 2 (1928).
 West- u. Südchina, Indien, Ceylon, Tonkin, Birma, Malakka, Singapore, Formosa, Sumatra, Java, Borneo, Ceram, Andamanen, Malediven, Nicobaren; Südafrika; Bismarck-Archipel, Neu-Hebriden, Salomon Ins., Neu-Guinea, Fidji Ins., Samoa, Tasmanien, Queensland
- abssistalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 311 (♀) (1859) (*Pyrausta*) (Ceylon, Hindustan). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 270 (1885) (*Pelecyntis*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 283 (1890) (*Pelecyntis*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Lep. Het. Brit. Mus., 9, p. 49 (1893) (*Hedylepta*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 484 (1900) (*Hedylepta*).
- lydialis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 374 (♀) (1859) (*Asopia*) (Moreton-Bai).
- ustalis* Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 375, 471, t. 10, f. 14 (1863) (*Botys*) (Amboina). — Snellen, Tijds. v. Ent., 27, p. 37 (1884) (*Hedylepta*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. 195 (1888) (*Hedylepta*).
- incertalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1247 (1865) (*Pyralis*) (Patria?).
- pyraustalis* Snellen in Veth, Midden-Sumatra, 4, Lep., p. 71 (1880) (*Hedylepta*).
- abstitalis* Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 316 (1884); p. 225 (1887) (*Pelecyntis*) (Tahiti).
- kosempo* Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 85 (♂) (1918) (*Pyrausta*?).

- noxia**: Gater, Malayan Agric. Journ. (Kuala Lumpur), 13 (7), p. 220—226 (1925); 13 (10), p. 312—329 (1925). — Hopkins, Bull. Ent. Res., 18 (1), p. 23—32 (1927). — Corbett, Malayan Agric. Journ. (Kuala Lumpur), 17 (8), p. 261—276 (1929). — Bunting & Milsum, The Culture of Vegetables in Malaya, Bull. Dep. Agric. S. S. & F. M. S. Gen. Ser. nr. 1, 75 pp. (Kuala Lumpur) (1930). — Jepson, Adm. Rep. Dir. Agric. Ceylon 1934, p. D 132—D 147 (Colombo) (1935). — Lever, Brit. Salomons Is. Agric. Gaz., 3 (4), p. 3—5 (Tulayi) (1935).
- Parasiten**: Wilkinson, Bull. Ent. Res., 17 (4), p. 417—420 (1927); 19 (1/2), p. 79—105, 109—146 (1928). — Ferrière, Bull. Ent. Res., 20 (4), p. 411—423 (1929); 21 (3), p. 353—360 (1930). — Miller, Malayan Agric. Journ., 21 (2), p. 66—72 (1933). — Baranoff, Ent. Nachr.-Bl. (Troppau), 8 (2), p. 41—49 (1934).
- albiciliialis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 15, p. 215 (1903) (*Nacoleia*). Ceylon
- albiflavialis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 15, p. 215 (1903) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 701 (1898) (sine descr.) Ceylon, Celebes, Sumbawa
- aurantifascialis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 314 (♀) (1896) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 699 (1898) (*Nacoleia*). Indien (Manipur); Mao
- fuscifimbrialis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 315 (♂, ♀) (1896) (*Nacoleia*) (Ceylon). Ceylon, Holl. Neu-Guinea
- cuprealis** Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 616, t. 60, f. 13 (♀) (1877) (*Coptobasis*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 315 (♀) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 699 (1898) (*Nacoleia*). — Semper, Schm. Philipp. Ins., 2, p. 671 (1902) (*Hedylepta*). Assam, Birma, Andamanen, Buru, Philippinen (Luzon)
- binotalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 177 (♂) (1896) (*Platamonia*) (Birma).
- wildersalis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7), 6, p. 313 (1900) (*Hedylepta*) (Cherra Punji). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 15, p. 215 (1903) (*Nacoleia*).
- ochrizonalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 21, p. 1265 (1912). Indien (Himalaya, Sikkim, Assam)
- insolitalis** Walker, Trans. Ent. Soc. Lond., (s. 3) 1, p. 125 (1862) (*Astura*) (Sarawak); Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1380 (1865) (*Astura*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 317 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 700 (1898) (*Nacoleia*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 486, t. 8, f. 31 (1900) Borneo, Celebes, Philippinen, Nicobaren

- (*Blepharomastix*). — Semper, Schm. Philipp. Ins., 2, p. 607 (1902) (*Nacoleia*).
- benepictalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 99 (♂, ♀) (1896) (*Idiusia*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 317 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 700 (1898) (*Nacoleia*). Assam (Khasis)
- chromalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 626 (♀) (1912) (*Nacoleia*). Bali
- scitalis** Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 869 (1885) (*Hydrocampa*) (Bombay). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 317 (1896) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 701 (1898) (*Nacoleia*). Indien (Bombay)
- ilusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 705 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Butler, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 168 (1883) (*Botys*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 270 (1890) (*Hapalia*). Borneo
- tampiusalis* Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 318 (1896) (part.) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 702 (1898) (*Nacoleia*).
- dascylusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 1003 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 486 (1900) (*Blepharomastix*). Borneo
- tampiusalis* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 702 (1898) (part.) (*Nacoleia*).
- moninalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 373 (♂) (1859) (*Asopia*) (Sarawak). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 702 (1898) (*Nacoleia*). Borneo
- heliaula** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 8 (♀) (1894) (*Metasiodes*) (Birma). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 318 (♀) (1896) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 702 (1898) (*Nacoleia*). — Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 8, p. 137 (1901) (*Metasiodes*). Birma (Koni), Malakka
- fusalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 142 (♀) (1896) (*Thysanodesma*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 318 (♀) (1896) (*Nacoleia*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 702 (1898) (*Nacoleia*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 458 (1901) (*Nacoleia*). Mittelchina, Assam
- disemalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 630 (1912). Borneo
- immundalis** R. South in Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 460, 7, 15, f. 4 (1901) (*Nacoleia*). (Mittelchina). — Caradja, Mat. Microlep. Chin. Prov., p. 37 (1935) (? *Piletocera*). Mittelchina (Typus: Chang-yang, Ichang), Tonkin
- oeaxalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 718 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 467 (1894) (*Metasiodes*). — Hampson, Fauna Brit. In-

- dia Moths, 4, p. 318 (♂) (1896) (*Nacoleia*);
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 708 (1898) (*Nacoleia*).
- discalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 140 (♂) (1896) (*Thysanodesma*) (Khasis). — Assam
De Joannis, Ann. Soc. Ent. Fr., 98 (1929),
p. 674 (1930).
- oeaxalis** Hampson, Fauna Brit. India
Moths, 4, p. 318 (1896) (part.); Proc. Zool.
Soc. Lond., p. 702 (1898) (part.) (*Nacoleia*).
- fuscifusalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 21, p. 1265 (1912) (*Nacoleia*). Ceylon,
Woodlark
Ins.
- leucosemalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 21, p. 1266 (1912) (*Nacoleia*). Ceylon
- puncticostalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 702 (1898) (*Nacoleia*). Batjan
- rufiterminalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 703 (1898) (*Nacoleia*). Batjan, Hal-
maheira
- major** Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 7, p. 96, t. 135, f. 5 (1889) (*Thysanodesma*) Indien (N.W.
(Dharmasala). — Hampson, Fauna Brit. India Himalaya,
Moths, 4, p. 319 (1896); Proc. Zool. Soc. Assam,
Lond., p. 703 (1898) (*Nacoleia*). Sikkim)
- ossea** Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 7, p. 96, t. 135, f. 6 (1886) (*Gadessa?*) (Dharm- Indien (N.W.
sala). — Hampson, Fauna Brit. India Himalaya)
Moths, 4, p. 319 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p.
703 (1898) (*Nacoleia*).
- octasema** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 259 Java,
(♀) (1886) (*Notarcha*) (Neu-Hebriden). — Malayischer
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 703 Archipel,
(1898) (*Nacoleia*). — Swinhoe, Cat. Lep. Neu-
Het. Oxford Mus., 2, p. 486, (1900) (= Hebriden,
charesalis Walk.) Salomon
- Biologie: Hopkins, Bull. Ent. Res., 18, p. 29, f. 1 (1927) (larva). — Tams, Ins. Samoa, 3 (4), p. 278 (1935). Ins.,
Fidji,
Samoa,
- noxa**: Fawcett, The Banana (London), X + 287 pp. (1915). — Leefmans, Meded. Laboratorium v. Plantenziekten (Buitenzorg) nr. 23, 22 pp. (1916). — Van Hall, Meded. Lab. v. Plantenziekten (Buitenzorg) nr. 20, 47 pp. (1916). — Jepson, Dept. Agric. Fiji, Ann. Rep. (Suva) f. 1916, p. 16—25 (1917). — Knowler, Fiji Dep.-Agric. Ann. Rep. f. 1917 (Suva), Council Paper, nr. 60, p. 8—12 (1918). — Van Hall, Meded. Inst. Plantenziekten (Buitenzorg), nr. 53, 46 pp. (1922); nr. 58, 42 pp. (1923); nr. 64, 47 pp. (1924); nr. 67, 53 pp. (1925). — Swezey, Hawaiian Planters Record, 28 (2) (Honolulu) p. 214—219 (1924). — Simmonds, Fiji Dep. Agric. Ann. Rep., f. 1925, p. 7—9 (Suva) (1926). — Froggatt, Queensland Agric. Journ. (Brisbane), 29 (1), p. 15—35 (1928). — Simmonds, Ann. Bull. Div. Repts. Dep. Agric. Fiji (Suva) f. 1931, p. 9—12 (1932). —

- Lever, Brit. Salomon Is. Agric. Gaz., 3 (4), p. 3—5 (Tulagi) (1935).
- Parasiten:** Simmonds, Agric. Journ. Dep. Agric. Fiji (Suva), 1. (1928), nr. 3, p. 16—21 (1929). — Taylor, Agric. Journ. Dep. Agric. Fiji (Suva), 6 (1), p. 5—14, 33 (1933). — Simmonds, Ann. Bull. Rep. Dep. Agric. Fiji 1934, p. 12—16 (Suva) (1935).
- charesalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 709 (♀) (1859) (*Botys*) (Borneo). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 462 (1894) (part.) (*Notarcha*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 319 (♀) (1896) (part.); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 703 (1898) (*Notarcha*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 486, t. 8, f. 19 (1900) (*Blepharomastix*). — Fryer, Trans. Linn. Soc. Lond., 15, p. 26 (1912) (*Nacoleia*). — Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 47 (1918) (*Nacoleia*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 212, t. 8, f. 9 (1928) (*Lamprosema*).
- molusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 993 (♀) (1859) (*Botys*) (Ceylon). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 296 (1885) (*Nistra?*). — Forsayeth, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 417 (larva) (1884) (*Botys*).
- vetustalis** Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 55 (♀) (1918) (*Lampridia?*) (Kosempo).
- humilis** Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 65 (1918) (*Archernis*), nec Swinhoe (1894). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 29 (1928).
- pedicialis** Snellen, Tijds. v. Ent., 38, p. 151, t. 6, f. 11 (♂, ♀) (1895) (*Ercta*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 703 (1898); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 12, p. 709 (1899) (*Nacoleia*).
- apicalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 216 (♂) (1896) (*Metasiodes?*) (Khasis).
- phaleasalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 713 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 320 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 703 (1898) (*Nacoleia*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 486, t. 8, f. 21 (1900) (*Blepharomastix*).
- eximialis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 141 (♂) (1896) (*Thysanodesma*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 320 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 703 (1898) (*Nacoleia*).
- didasalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 707 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Meyrick, Trans. Zool. Soc. Lond., p. 465 (1894) (*Metasia*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 703 (1898) (*Nacoleia*).
- Südchina,
Indien,
Ceylon,
Tonkin,
Singapore,
Formosa,
Borneo,
Sumbawa,
Philippinen,
Br. Neu-
Guinea,
Seychellen
- Assam,
Java
(Typus)
- Südchina,
Assam,
Borneo
- Südchina,
Assam
(Typus:
Khasis)
- Borneo,
Sumbawa

achromatias Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 465 (♂) (1894) (*Metasiodes*) (Sumbawa).

platyproctalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Key Ins. 9) 1, p. 259 (♂) (1918).

tholeropa Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 466 Sumbawa (♂) (1894) (*Metasiodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 704 (1898) (*Nacoleia*).

Species incertae sedis.

alicialis Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 316, t. 2, f. 5 (♂) (1927). Philippinen (Luzon)

bonitalis Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 316, t. 2, f. 8 (♂) (1927). Philippinen (Luzon)

camphorae Tams, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 10) 1, p. 632 (1928). Malakka (Kuala Lumpur)
noxa: Corbett, Malayan Agric. Journ., 17 (8), p. 261—276 (1929).

chagosalis B. Fletcher, Trans. Linn. Soc. Lond., 13, p. 304, t. 17, f. 9 (♂) (1910). Chagos Ins.

chlorandra Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 502 Java (♂, ♀) (1934). (Telawa)
Biologie: Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 502 (1934).

dixialis Snellen, Tijds. v. Ent., 38, p. 149, t. 6, f. 12 Java (♂) (1895) (*Ercta*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 704 (1898) (*Nacoleia*).

dollograpta Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 402 Malakka (♂) (1935). (Kuala Lumpur)

hedychroalis Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) Audamanen 19, p. 54 (1907) (*Blepharromastix*).

hoenei Caradja, Bull. Acad. Roum, 15, p. 150 (♂) Südchina (1932).

insulicola B. Fletcher, Entom., 55, p. 231 (1922) Seychellen (nom. nov.).

maculalis B. Fletcher, Trans. Linn. Soc. Lond., 13, p. 304, t. 17, f. 8 (1910), nec South (1901).

ochrimaculalis R. South in Leech, Trans. Ent. Soc. Mittel- u. Lond., p. 460, t. 15, f. 28 (♀) (1910) (*Nacoleia*). Südchina — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. (Typus: Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 346 (1925) Ichang) (*Lamprosema*).

salomonalis B. Fletcher, Trans. Linn. Soc. Lond., Chagos Ins. 13, p. 305, t. 17, f. 10 (1910).

tienmushanus Caradja, Mat. Microlep. Chin. Prov., Südchina p. 37 (1935) (*Piletoecera*).

c) Aethiopische und Madagassische Region.

acyperalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) S. Nigeria 9, p. 437 (♂) (1912).

trichopygialis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Niger 9, p. 438 (♂) (1912) (*Nacoleia*). (Warri), Kamerun, Fr. Congo

- bryalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 136 (♂) (1918). Br. Ostafrika
- aurotinctalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 698 (♂) (1898) (*Nacoleia*). Niger (Warri)
- epipaschialis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 439 (♀) (*Nacoleia*). Sierra Leone
- inglorialis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 252 (♀) (1918). Kamerun
- ladonalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 637 (♂) (1859) (*Botys*) (Westafrika). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 698 (1898) (*Nacoleia*). Westafrika
- pervulgalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 439 (1912) (*Nacoleia*). Goldküste
- poeonalis** Walker, vide sub b) Orientalische Region.
- auronitens** Gaede, Ent. Zeit. Stett., 77, p. 134 (♂) (1916) (*Nacoleia*). Kamerun (Buea)
- niphealis** Walker, vide sub b) Orientalische Region.
- hottentota** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 252 (1918) (nom. nov.). Kapland
- fusalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 441 (♂) (1912) (*Nacoleia*), nec Warren (1896). — Janse, Check-List S. Afr. Lep. Het., p. 159 (1917) (*Nacoleia*).
- indicata** Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.
- lateritialis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 252 (1918). Br. Zentr.-Afrika
- aurealis** Gaede, Ent. Zeit. Stett., 77, p. 133 (♀) (1916) (*Nacoleia*). Kamerun (Buea)
- diemenalis** Guenée, vide sub b) Orientalische Region.
- aurantifascialis** Hampson, vide sub b) Orientalische Region.
- leucographalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 444 (1912) (*Nacoleia*). Sierra Leone, Goldküste
- attenualis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 625 (1912) (*Nacoleia*). Br. Ostafrika
- lunidiscalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 700 (♀) (1898) (*Nacoleia*). Westafrika (Aburi)
- ommatalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 626 (♂) (1912) (*Nacoleia*). Br. Ostafrika, Transvaal
- chrysanthales** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 253 (1918). Kamerun
- kingdoni** Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 5) 4, p. 246 (1879) (*Botys*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 700 (1898) (*Nacoleia*). Madagaskar
- rubralis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 701 (♂) (1898) (*Nacoleia*). Madagaskar
- fuscirenalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 257 (♀) (1918). Kapland

Species incertae sedis.

- argyropalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 1, p. 478 (♂) (1908) (*Nacoleia*). Comoren (Mayotta)

- chloromochla** Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 14 Belg. Congo
(♀) (1936) (*Hedylepta*).
(Eala)
- dnopheralis** Mabilie, Ann. Soc. Ent. Fr., 68 (1899), Madagascar
p. 745 (1900) (*Nacoleia*).
- epicapna** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 403 (1933) Belg. Congo
(♂, ♀) (*Hedylepta*).
(Yambata,
Stanleyville)
- haesitans** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 502 (♀) Belg. Congo
(1934) (*Nacoleia*).
(Yumbi)

d) Australische Region.

- allicosma** Meyrick, Traus. Ent. Soc. Lond., p. 242 Fidji Ins.
(♂) (1886) (*Semioceros*). — Hampson, Proc.
Zool. Soc. Lond., p. 694 (1898) (*Nacoleia*).
- megaspilalis** Hampson, vide sub b) Orientalische Re-
gion.
- rhoeoalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 933 Australien,
(♂) (1859) (*Desmia?*) (Sydney). — Hamp- Queensland,
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 694 (1898) N.S. Wales,
(*Nacoleia*). Tasmanien
- musculusalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit.
Mus., 19, p. 935 (1859) (*Nacoleia*) (Moreton-
Bai, Sydney). —
- hypsidentalis* Walker, Cat. Lep. Het.
Brit. Mus., 19, p. 1006 (♀) (1859) (*Botys*)
(Australien).
- irruptalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit.
Mus., 34, p. 1303 (♀) (1865) (*Samea*)
(Moreton-Bai).
- murcalis* Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond.,
p. 319 (1884) (♂, ♀) (*Semioceros*).
- sordidalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit.
Mus., 34, p. 1317 (♀) (1865) (*Isopteryx*)
(Moreton-Bai).
- murcusalis* Hampson, Proc. Zool. Soc.
Lond., p. 694 (1898) (ex synonym.) (err. typ.).
- hypsidentalis* Hampson, Proc. Zool. Soc.
Lond., p. 694 (1898) (ex synonym.) (err. typ.).
- parapsephis** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. Australien
221 (♂, ♀) (1887) (*Semioceros*). — Hamp- [Typus:
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 694 (1898) Duaringa,
(*Nacoleia*). Queensland]
- amphicedalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, Ostaustralien,
p. 363 (♂) (1859) (*Salbia?*) (N. S. Wales). Queensland
— Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 318
(1884) (*Semioceros*). — Hampson, Proc. Zool.
Soc. Lond., p. 694 (1898) (*Nacoleia*).
- bilunatalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit.
Mus., 34, p. 1316 (♂) (1865) (*Isopteryx*)
(Moreton Bai).
- obliqualis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 695 Queensland
(1898) (*Nacoleia*). (Cedar Bai,
Cooktown)
- mesochlora** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. Australien,
313 (1884) (*Deuterarcha*) (Queensland); id., N.S. Wales
p. 220 (1887) (*Semioceros*). — Hampson,

- Proc. Zool. Soc. Lond., p. 695 (1898) (*Nacoleia*).
- annuligera* Butler, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 427 (1886) (*Endotricha*).
- tricrossa** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 243 (1886) (*Nacoleia*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 695 (1898) (*Nacoleia*). Neu-Guinea
- leucopis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 134 (♂) (1918). Holl. Neu-Guinea
- flasalis** Walker, vide sub b) Orientalische Region.
- chlorura** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 222 (♂) (1887) (*Ceratoclasia*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 695 (1898) (*Nacoleia*). Australien (Typus: Queensland)
- holophaea** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 695 (♂) (1898) (*Nacoleia*). Queensland (Cooktown)
- progonialis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 696; p. 761, t. 49, f. 8 (♂) (1898) (*Nacoleia*). Neu-Guinea
- xanthota** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 435 (♂) (1912) (*Nacoleia*). Br. Neu-Guinea
- paracausta** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 541 (♂) (1934) (*Blepharomastix*). Salomon Ins. (Tulagi)
- aurantia** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 135 (♂) (1918). Holl. Neu-Guinea
- perdentalis** Hampson, vide sub b) Orientalische Region.
- chrysorycta** Meyrick, vide sub a) Paläarktische Region.
- asiaphalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 438 (1912) (*Nacoleia*). St. Aignan
- tristrialis** Bremer, vide sub a) Paläarktische Region.
- poeonalis** Walker, vide sub b) Orientalische Region.
- bianoralis** Walker, vide sub b) Orientalische Region.
- minoralis** Walker, vide sub b) Orientalische Region.
- leucostrepta** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 254 (1886) (*Nacoleia*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., 698 (1898) (*Nacoleia*). Fidji Ins.
- dizona** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 441 (♂) (1912) (*Nacoleia*). Holl. Neu-Guinea
- ab. *dizonana* Strand, Arch. f. Naturg., 82, A 3, p. 10 (1922). Holl. Neu-Guinea
- vittifera** Hampson, vide sub b) Orientalische Region.
- fuscifimbrialis** Hampson, vide sub b) Orientalische Region.
- flavizonalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 254 (♀) (1918). Holl. Neu-Guinea
- junctithyralis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 701, t. 49, f. 9 (1898) (*Nacoleia*). Fergusson Ins.
- perfenestrata** Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 5) 10, p. 237 (1882) (*Botys*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 701 (1898) (*Nacoleia*). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 223 (1900). Bismarck-Archipel (Neu-Pommern)

- leonina** Butler, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 425 (1886) (*Asopia*) (Peek Downs). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 702 (1898) (*Nacoleia*). Australien
- thymedes** Turner, Trans. Roy. S. Austral., 32, p. 91 (♂, ♀) (1908) (*Glycythyma*) (Queensland); id., Proc. Roy. Soc. Queensland, 24, p. 145 (1913) (*Nacoleia*).
- euryphaealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 630 (1912) (*Nacoleia*). Br. Neu-Guinea
- melaprocta** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 631 (♂) (1912) (*Nacoleia*). Ron Ins.
- fuseifusalis** Hampson, vide sub b) Orientalische Region.
- phacopasta** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 632 (♀) (1912) (*Nacoleia*). Salomon Ins.
- truncellornalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 257 (♂) (1918). Queensland
- octasema** Meyrick, vide sub b) Orientalische Region.
- oharesalis** Walker, vide sub b) Orientalische Region.
- niphosemalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 258 (♂) (1918). Br. Neu-Guinea
- oediproctalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 259 (♂) (1918). Salomon Ins.
- Species incertae sedis.
- affinis** W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, nr. 15, p. 133 (♂, ♀) (1915) (*Nacoleia*) (Utakwa R.). Holl. Neu-Guinea
- alinea** Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral., 32, p. 90 (♂, ♀) (1908). Queensland (Townsville)
- aurantiimaculalis** W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, nr. 15, p. 133 (♂, ♀) (1915) (*Nacoleia*) (Utakwa Riv.). Holl. Neu-Guinea
- distinctalis** W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, nr. 15, p. 134 (♂, ♀), t. 2, f. 51 (1915) (*Nacoleia*). Holl. Neu-Guinea
- distinctifascia** W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, nr. 15, p. 133 (♂) (1915) (*Nacoleia*). Holl. Neu-Guinea
- fuscalis** W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, nr. 15, p. 133 (♂, ♀) (1915) (*Nacoleia*). Holl. Neu-Guinea
- glageropa** Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral., 32, p. 89 (♂) (1908) (*Nacoleia*). Queensland (Kuranda)
- leucophrys** Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral., 50, p. 131 (1926) (*Nacoleia*). Queensland (Yeppoon)
- marmaropa** Meyrick, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4, p. 111 (1889) (*Eclipsiodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 704 (1898) (*Nacoleia*). Australien (N.S. Wales)
- melanauges** Turner, Trans. Roy. Soc. Queensland, 24, p. 145 (♀) (1913) (*Nacoleia*). N. Queensland (Kuranda)

- oncophragma** Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral., Queensland
32, p. 89 (♂, ♀) (1908) (*Nacoleia*).
(Brisbane,
Bunya Mts.)
- opsocausta** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 547 Fidji Ins.
(♂, ♀) (1935) (*Blepharomastix*). (Vunidawa)
- sordidalis** W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, nr. Holl. Neu-
15, p. 134 (♂) (1915) (*Nacoleia*). Guinea
- syngenicia** Turner, Proc. Roy. Soc. Queensland, 24, N. Queensland
p. 145 (♀) (1913). (Atherton)
- wollastoni** W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, Holl. Neu-
nr. 15, p. 134, t. 2, f. 68 (♀) (1915) Guinea
(*Nacoleia*).
- xanthoscota** Lower, Trans. Roy. Soc. S. Austral., Queensland
27, p. 63 (♀) (1903). (Brisbane)

e) Nearktische Region.

- lunulalis** Hübner, Zuträge Samml. Exot. Schm., 2, U.S.A. (Texas,
p. 21, nr. 152, f. 303, 304 (1823) (*Lampro- Neu-
sema*) (Surinam). — Guenée, Delt. & Pyral., Mexiko),
p. 205 (1854) (*Asopia*). — Hampson, Proc. Mexiko,
Zool. Soc. Lond., p. 697 (1898) (*Nacoleia*). Guatemala,
— Fernald, Bull. U. S. Nat. Mus., nr. 52, Costarica,
p. 376, nr. 4298 (1902). — Barnes & Mc Panama,
Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., Haiti,
p. 129, nr. 4828 (1917). — Hübner, Verz. Kolumbien,
bek. Schmett., p. 361 n. 3454 (1816) [1825]. Surinam,
— Kirby in Hübner & Geyer, Zutr. Samml. Brasilien (N.
Exot. Schmett. (n. Ausg.), p. 70 n. 470, Amazonas,
p. 95, t. 544 (53), f. 303, 304 (1908—1912). Pernambuco),
Venezuela
- indicata** Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.
- ebulealis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 196 (1854) (*Sa- U.S.A.
mea*) (N. Amerika). — Druce, Biol. Centr. (Florida),
Amer. Het., 2, p. 245, (1895) (*Mimorista*). Honduras,
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 701 Guatemala,
(1898) (*Nacoleia*). — Fernald, Bull. U. S. Panama,
Nat. Mus., nr. 52, p. 376, nr. 4300 (1902) Brasilien,
(*Blepharomastix*). — Barnes & Mc Peru
Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p.
130, nr. 4951 (1917) (*Blepharomastix*).
- apicalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 229 (♂) (1854) U.S.A.
(*Isopteryx*) (Georgia). — Hampson, Proc. (Texas)
Zool. Soc. Lond., p. 701 (1898) (*Nacoleia*).
— Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep.
Bor. Amer., p. 130, nr. 4952 (1917) (*Ble-
pharomastix*).
- xeniolalis** Hulst, Trans. Amer. Ent. Soc.,
13, p. 159 (1886) (*Isopteryx*).
- acutangulalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 201, Texas,
t. 11, f. 11 (♂) (1875) (*Botys*) (Kolumbien). Panama,
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 273 Kolumbien
(1899) (*Pyrausta*). — Barnes & Mc Dun-
nough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 130,
nr. 4953 (1917) (*Blepharomastix*).

- santatalis* Barnes & Mc Dunnough, Contr. Nat. Hist. Lep. N. Amer., 2 (6), p. 226, t. 1, f. 5 (1914) (*Blepharomastix*).
- ranalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 243 (♂) (1854) (*Stenia*) (N. Amerika). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 702 (1898) (*Nacoleia*). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 561 (1899) (*Blepharomastix*). — Fernald, Bull. U. S. Nat. Mus., nr. 52, p. 376, nr. 4302 (1902) (*Blepharomastix*). — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 130, nr. 4955 (1917) (*Blepharomastix*). — Forbes, Lep. N. York, p. 546 (1923) (*Blepharomastix*).
- archasialis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 365, (1859) (*Asopia*) (U.S.A.).
- ofellusalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 732 (1859) (*Botys*) (Patria?).
- olliusalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 982 (♀) (1859) (*Botys*) (U.S.A.).
- strictalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1392 (♂) (1865) (*Botys*) (N. Amerika).
- gracilis* Grote & Robinson, Trans. Amer. Ent. Soc., 1, p. 25, t. 2, f. 15 (♂, ♀) (1867) (*Botys*) (Massachusetts bis Pennsylvanien).
- var. *datialis* Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 269, t. 63, f. 3 (1895) (*Blepharomastix*). — Fernald, Bull. U. S. Nat. Mus., nr. 52, p. 376 (1902) (= *ranalis* Guen.). — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 130, nr. 4955 (1917) (*ranalis* var.).
- occidentalis* Haimbach, Ent. News, 19, p. 263 (1908) (*Blepharomastix*) (Arizona). — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 130, nr. 4955 a (1917) (*ranalis* var.).
- magualis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 230, t. 9, f. 6 (1854) (*Isopteryx*) (N. Amer.). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 41, p. 268 (1914) (*Bocchoris*). — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 130, nr. 4954 (1917) (*Blepharomastix*). — Forbes, Lep. N. York, p. 546 (1923) (*Blepharomastix*).
- medealis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 353 (♂) (1859) (*Samea*) (St. Domingo).
- belusalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 583 (♀) (*Botys*?) (St. Domingo).
- curtalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1305 (♂) (*Asopia*?) (St. Domingo).
- magnalis* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 703 (1898) (*Nacoleia*). — Fernald, Bull. U. S. Nat. Mus., nr. 52, p. 376, nr. 4303 (1902) (*Blepharomastix*).
- stenialis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 231 (♀) (1854) (*Isopteryx*) (Georgia). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 703 (1898) (*Nacoleia*).

U.S.A.
(N. York bis
Missouri),
Mexiko,
Zentral-
Amerika

Arizona,
Panama

U.S.A.
(Illinois,
Texas,
Florida),
Westindien
(St.
Domingo)

U.S.A.
(Atlantische
Staaten),

- Fernald, Bull. U. S. Nat. Mus., nr. 52, p. 377, nr. 4304 (1902) (*Blepharomastix*). — Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 130, nr. 4956 (1917) (*Blepharomastix*). — Forbes, Lep. N. York, p. 547, f. 322 (1923) (*Blepharomastix*).
acstealis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 352 (♂) (1859) (*Samea*) (St. Domingo).
phaerusalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 368 (1859) (*Asopia*) (Honduras).
sagralis Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 270, t. 63, f. 7 (♂) (1895) (*Blepharomastix*) (Mexiko, Panama).
hampsoni Barnes & Mc Dunnough, Contr. Nat. Hist. Lep. N. Amer., 2 (4), p. 173, t. 4, f. 2 (♀) (1913) (*Nacoleia*); iid., Check List Lep. Bor. Amer., p. 130, nr. 4957 (1917) (*Nacoleia*). — Dyar, Insec. Insc. Menstr., 5, p. 70 (1917) (*Nacoleia*). Florida, Cuba

Species incertae sedis.

- subbasalis** Dyar, Insec. Insc. Menstr., 11, p. 26 Kalifornien (♀) (1923).
victoriae Dyar, Insec. Insc. Menstr., 11, p. 25 Texas (♂, ♀) (1923).
 subsp. *sinaloanensis* Dyar, Insec. Insc. Menstr., 11, p. 25 (♂, ♀) (1923). Mexiko

f) Neotropische Region.

- subulalis** Gueneé, Delt. & Pyral., p. 221 (♂) (1854) (*Endotricha*) (Brasilien). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 694 (1896) (*Nacoleia*). Costa Rica, Jamaika, Surinam, Brasilien
preciosalis Möschler, Verh. z. b. Ges. Wien, 31, p. 431, t. 18, f. 38 (♀) (1881) (*Leucinodes?*) (Paramaribo). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 237 (1895) (*Agrotera*).
pretiosalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 694 (1893) (ex synonym.).
anaemicalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 134 (♂) (1918). Peru
progonotornalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 135 (♂) (1918). Peru
zollusalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 603 (♀) (1859) (*Botys*) (Honduras). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 696 (1898) (*Nacoleia*). Honduras, Guatemala, Panama, Bahama Ins., Haiti, Dominica, Ecuador, Brasilien (Amazonas)
iarchasalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 983 (♀) (1859) (*Botys*) (St. Domingo). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 696 (1898) (*Nacoleia*). Bahama Ins., St. Domingo

- differalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1228 (♂) (1865) (*Pyralis*) (St. Domingo).
- ptyonota* Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 434 (♂) (1912) (*Nacoleia*). Peru
- cirrosalis* Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 4, t. 135, f. 37 (♂) (1874) (*Botys*?) (Amazonas). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 696 (1898) (*Nacoleia*). Brasilien (Amazonas)
- dorialis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 616 (♀) (1859) (*Botys*) (Villa Nova). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 271 (1914) (*Nacoleia*). Kolumbien, Brasilien, Panama
- dorsalis* Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 697 (1898) (*Nacoleia*) (err. typ.).
- codrusalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 616 (♀) (1859) (*Botys*) (Bogotá).
- aenippealis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 619 (♂) (1859) (*Botys*) (Bogotá).
- noctalis* Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 183 (♂) (1920). Guatemala (Cayuga)
- brunnescens* Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 271 (♀) (1914) (*Nacoleia*). Costarica, Panama
- fovilferalis* Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 436 (1912) (*Nacoleia*). Panama, Paraguay
- ancylosema* Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 53, p. 93 (1909) (*Nacoleia*). Fr. Guayana
- oxlperalis* Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 436 (♂) (1912) (*Nacoleia*). Jamaika, Kolumbien
- excurvalis* Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 437 (♀) (1912) (*Nacoleia*). Guatemala
- lunulalis* Hübner, vide sub e) Nearktische Region.
- pelealis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 7, p. 338 (♀) (1859) (*Desmia*) (St. Domingo, Santarem, Venezuela). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 698 (1898) (*Nacoleia*). Panama, Haiti, Venezuela, Brasilien (Santarem)
- cayugalis* Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 184 (♂) (1920). Guatemala (Cayuga)
- santialis* Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 184 (♂) (1920). Cuba (Santiago)
- canacealls* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 343 (♀) (1859) (*Desmia*) (Pernambuco). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 698 (1898) (*Nacoleia*). Panama, Venezuela, Brasilien (Pernambuco)
- clausalls* Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 54, p. 119 (1910) (*Nacoleia*). Fr. Guayana
- lentlcurvalis* Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 440 (♀) (1912) (*Nacoleia*). Venezuela
- nitida* Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 440 (♂) (1912) (*Nacoleia*). Kolumbien

- indicata** Fabricius, vide sub b) Orientalische Region.
- xanthodysana** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 272 (♀) (1914) (*Nacoleia*). Panama, Costa Rica
- atircnalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 444 (♂) (1912) (*Nacoleia*). Paraguay
- salbialis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 699—700 (♂) (1898) (*Nacoleia*). Mexiko
- epistenialis** Klima, (nom. nov.).
- stenialis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 625 (♂) (1912) nec Guenée (1854). Peru
- olivia** Butler, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 494 (♀) (1878) (*Botys*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 700 (1898) (*Nacoleia*). Jamaika
- semicostalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 700; p. 761, t. 49, f. 22 (♂) (1898) (*Nacoleia*). Brasilien (S. Paulo)
- xanthialis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 343 (♂) (1854) (*Botys*) (Cuba). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 210 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 700 (1898) (*Nacoleia*). Mexiko, Guatemala, Costa Rica, Panama, Cuba,
- superbalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1397 (♂) (1865) (*Botys*) (Cuenca). Kolumbien, Ecuador, Westindien
- incalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 202, t. 11, f. 13 (1875) (*Botys*) (Rio Magdalena).
- ebulealis** Guenée, vide sub e) Nearktische Region.
- retractalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 627 (1912) (*Nacoleia*). Mexiko
- dircealis** Druce, nec Walker (1859), Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 253 (1895) (part.) (*Hedylepta*).
- persinualis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 701 (1898) (nom. nov.) (*Nacoleia*). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 272 (1914). Panama, Brasilien (Amazonas)
- major** Warren (nec Butler, 1889), Trans. Ent. Soc. Lond., p. 293 (1889) (*Voliba*).
- terminalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 627 (♂) (1912) (*Nacoleia*). Jamaika
- acutangularis** Snellen, vide sub e) Nearktische Region.
- vestialis** Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 245, t. 14, f. 1 (1875) (*Blepharomastix*) (Westindien). Kolumbien, Peru, Westindien
- Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 701 (1898) (*Nacoleia*). (Typus)
- pallidipennis** Warren, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 285 (♂) (1889) (*Hapalia*) (Amazonas). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 701 (1898) (*Nacoleia*). Brasilien (Amazonas)
- leucophaea** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 628 (1912) (*Nacoleia*). Panama
- adalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 558 (1899) (part.) (*Epichronistis*).
- indentata** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. 628 (♀) (1912) (*Nacoleia*). Costa Rica
- adalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 558 (1899) (part.) (*Epichronistis*).

- cervinicosta** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) Kolumbien
1, p. 254 (1918).
- griseicosta** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) Peru
1, p. 255 (♂) (1918).
- rufilinealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) Ecuador
1, p. 255 (♂) (1918).
- monocampialis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Kolumbien
(s. 9) 1, p. 256 (♂) (1918).
- stramineata** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Mexiko
9, p. 628 (♀) (1912) (*Nacoleia*).
vilialis Druce, nec Guenée (1854), Biol.
Centr.-Amer. Het., 2, p. 561 (1899).
- eylonalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 258, Guatemala,
t. 62, f. 25 (1895) (*Epichronistis* ?). — Hamp- Panama
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 701 (1898)
(*Nacoleia*).
- inflexalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Mexiko
p. 629 (♂) (1912) (*Nacoleia*).
colubralis Druce, nec Guenée (1854), Biol.
Centr.-Amer. Het., 2, p. 268 (1895) (part.).
- leuconeuralis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Kolumbien
(s. 9) 1, p. 256 (♀) (1918).
- coencusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., Honduras
18, p. 604 (♀) (1859) (*Botys*) (Honduras).
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 702
(1898) (*Nacoleia*).
- veritalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 272 Panama
(1914).
- ranalis** Guenée, vide sub e) Nearktische Region.
- eborinalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 81 (♀) Panama
(1899) (*Blepharomastix*). (Chiriqui),
Kolumbien
- apertisigna** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Mexiko
9, p. 629 (♀) (1912) (*Nacoleia*).
terricola Druce, nec Möschler (1881),
Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 269 (1895)
(*Blepharomastix*) (part.).
- obscuralis** Snellen, Tijds. v. Ent., 42, p. 82 (♂) Panama
(1899) (*Blepharomastix*). (Chiriqui)
- coatepecensis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, Mexiko,
p. 270, t. 63, f. 8 (1895) (*Nacoleia*). — Brasilien
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 702
(1898) (*Nacoleia*).
- vilialis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 244 (1854) (*Ste-* Mexiko,
nia) (Brasilien). — Hampson, Proc. Zool. Guatemala,
Soc. Lond., p. 702 (1898) (*Nacoleia*). Panama,
pulverulalis Druce, Biol. Centr.-Amer. Brasilien
Het., 2, p. 269, t. 63, f. 2 (1895) (*Blepharo-*
mastix).
- magualis** Guenée, vide sub e) Nearktische Region.
- stenialis** Guenée, vide sub e) Nearktische Region.
Nearktische Region.
- hampsoni** Barnes & Mac Dunnough, vide sub e)
- victoriae** Dyar, vide sub e) Nearktische Region.
- schistisemalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Panama,
8) 9, p. 632 (♂) (1912) (*Nacoleia*). Bahama
Ins.,
Paraguay,
Argentinien

- strigivenalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Ecuador 9) 1, p. 258 (♂) (1918).
flaviterminalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Peru (s. 9) 1, p. 260 (♂) (1918).
pantheralis Geyer in Hübner, Zuträge Samml. Exot. Schm., 4, p. 20, nr. 337, f. 673, 674 (1832) Panama, Kolumbien, (Ochlia) (N. Amerika). — Hampson, Proc. Ecuador, Zool. Soc. Lond., p. 704 (1898) (*Nacoleia*). Brasilien
ledalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., (Amazonas), 17, p. 474 (1859) (*Zebronia*) (Ega). Westindien
seppalis Snellen, Tijds. v. Ent., 18, p. 258, t. 14, f. 12 (♀) (1875) (*Ledereria*) (Westindien).

Species incertae sedis.

- albicinctalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Bahama Ins. 7) 14, p. 184 (♀) (1904) (*Nacoleia*).
albisectalis Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 49, p. 71 Costarica (♀) (1905) (*Nacoleia*).
albalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 347 (♂) (1854) Fr. Guayana (*Botys*) (Cayenne).
angulinea Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 11, Costarica p. 262 (♀) (1913) (*Nacoleia*). (Carillo)
baracoalis Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. Cuba 186 (1920).
binocularis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) Bahama Ins. 14, p. 185 (♀) (1904) (*Nacoleia*).
brunnealis Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 186 Guatemala (♂) (1920). (Cayuga)
caeruleonigra Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Costarica 9, p. 301 (♂) (1912) (*Nacoleia*). (Juan Vinas, Carillo)
caradocalis Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 29, p. Peru 185 (1927) (*Nacoleia*).
craftsialis Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 271 Panama (1914) (*Nacoleia*).
diaphanal Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. Guatemala 209 (♂) (1920). (Volcan de S. Maria)
esperanzalis Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) Costarica 8, p. 302 (♀) (1912) (*Nacoleia*). (Esperanza)
iufuscalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) Bahama Ins. 14, p. 185 (♀) (1904) (*Nacoleia*).
lehialis Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 558, Mexiko t. 102, f. 11 (1899) (*Hedylepta*).
lentistrialis Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 50, p. Paraguay 184 (1906) (*Nacoleia*).
malticalis Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 185 Guatemala (♂) (1920). (Cayuga)
marginalis Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 271 Panama (♂) (1914) (*Nacolia*).
minima v. Hedemann, Ent. Zeit. Stett., 55, p. 295 Bahama (♀) (1894) (*Synclera*). — Hampson, Proc. Zool. Ins., Soc. Lond., p. 652 (1898) (*Bocchoris*). — Jamaika, Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 271 St. Thomas, (1914) (*Nacoleia*). Haiti

- mizaralis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. Panama
558, t. 101, f. 10 (♂) (1899) (*Hedylepta?*)
(Panama).
- mocealis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 185 Guatemala
(♂) (1920). (Cayuga)
- nannalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 271 Panama
(♀) (1914) (*Nacoleia*).
- salaconalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. Panama,
245, t. 62, f. 16 (1895) (*Mimorista*) (Pana- Mexiko
ma). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 704 (1898) (*Nacoleia*).
- stygalis** Hampson, (ubi?), — Dyar, Proc. U. S. Panama
Nat. Mus., 47, p. 272 (1914) (*Nacoleia*).
- variospilalis** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 52, S.O. Peru
p. 27 (♂) (1908). (Oconeque,
Carabaya)
- vulpina** Meyrick, Arb. morph. taxon. Ent. Berlin- Portorico
Dahlem, 3 (2), p. 100 (♂, ♀) (1936).
- zethcalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Costarica
p. 302 (♀) (1912) (*Nacoleia*). (Carillo)

263

80. Genus **Goniorhynchus** Hampson

Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 322 (1896); Proc. Zool.
Soc. Lond., p. 595, 704 (1898). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido
Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 170, 213 (1928); *ibid.*, 25, p. 157,
180 (1929).

(Typus generis: *gratalis* Led.)

a) Paläarktische Region.

- marginalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) China,
18, p. 115 (1895) (*Goniorhynchus*). — Hamp- Japan,
son, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 404 (♂) Indien
(1896) (*Pachyzancla*); Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 205 (1899) (*Pachyzancla*). — Leech, Trans.
Ent. Soc. Lond., p. 484 (1901). (*Pachyzancla*).
— Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp.
Univ. Sapporo, 25, p. 180 (*Goniorhynchus*),
p. 205 (*Psara*) (1929).
- obliquistriga** Warren, Ann. Mag. Nat.
Hist., (s. 6) 18, p. 115 (1896) (*Goniorhyn-*
chus).
- exemplaris** Hampson, Proc. Zool. Soc.
Lond., p. 705 (♀) (1898) (*Goniorhynchus*)
(Japan). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond.,
p. 463 (1901).
- euryclealis** Wileman, Trans. Ent. Soc.
Lond., p. 380 (1911) (*Lygropia*), nec Wal-
ker (1859).
- butyrosa** Butler, Ill. Typ. Spec. Brit. Mus., 3, Mittelchina,
p. 73, t. 59, f. 1 (1879) (*Samea*) (Japan). Japan,
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 705 Formosa,
(1898) (*Goniorhynchus*). — Leech, Trans. Tonkin
Ent. Soc. Lond., p. 463 (1901). — Shibuya,
Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sap-
poro, 22, p. 214, t. 8, f. 10 (1928); 25, p.
181 (1929).

b) Orientalische Region.

- obscurus** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 704 (1898). Amboina, Buru
- pectinalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 705 (1898). Malakka (Padang Rengas)
- plumbeizonalis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 323, f. 183 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 704, f. 61 (♂), p. 705 (1898). Assam, Birma, Philippinen (Luzon)
- flaviguttalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 140 (♂) (1896) (*Goniorhynchus*) (Khasis). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 323 (♂) (1896). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 705 (1898). — Snellen, Tijds. v. Ent., 43, p. 281 (1901). Assam (Khasis), Java
- marginalis** Warren, vide sub a) Paläarktische Region.
- butyrota** Butler, vide sub a) Paläarktische Region.
- gratalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 376, 475, t. 11, f. 18 (1863) (*Botys*?) (Amboina). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1390 (1865) (*Botys*). — Snellen, Tijds. v. Ent., 26, p. 133, t. 8, f. 2, 2a (1883) (*Botys*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 318 (1884) (*Semioceros*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 322 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 706 (1898) (*Goniorhynchus*). — Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 8, p. 137 (1901) (*Nacoleia*). — Semper, Schm. Philipp. Ins., 2, p. 672 (1902) (*Semioceros*). — Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 292 (1906) (*Nacoleia*). N. O. Indien (Assam, Sikkim), Birma, Malakka, Tonkin, Java, Celebes, Philippinen (Luzon), Flores, Amboina; Rhodesia; Br. Neu-Guinea
- minnalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1449 (♀) (1865) (*Botys*) (Java). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 706 (1898) (= *gratalis* Led.). — Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 8, p. 137 (1901). Java
- octosema** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 2 (♂) (1912). Singapore
- marasmialis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 706 (♂) (1898). Bali, Dili

Species incertae sedis.

- guliemalis** Holland, Novit. Zool., 7, p. 587 (1900). Buru

c) Aethiopische und Australische Region.

- gratalis** Lederer, vide sub b) Orientalische Region.

d) Neotropische Region.

- lasygualis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 1 (♂) (1912). Paraguay

- hampsoni** Klima (nom. nov.) Peru
marginalis Hampson, nec Warren (1895),
 Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 2 (♀)
 (1912).
philenoralis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., Jamaica
 18, p. 577 (♂) (1859) (*Botys*) (Jamaika).
 — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 706
 (1898) (*Goniorhynchus*).
 15

81. Genus **Erinothus** Hampson

Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 595, 706 (1898).
 (Typus generis: *E. lolialis* Walk.)

- lolialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, Borneo
 p. 1005 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). —
 Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 706,
 f. 62 (♂) (1898) (*Erinothus*).
 1

82. Genus **Achantodes** Guenée

Guenée, Noct., 2, p. 396 (1852). — Hampson, Proc. Zool. Soc.
 Lond., p. 595, 707 (1898).
 (Typus generis: *A. cerusicosta* Guen.)

- cerusicosta** Guenée, Noct., 2, p. 386, t. 13, f. 3 Kolumbien,
 (1852) (*Achantodes*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Venezuela
 Soc. Lond., p. 707, f. 63 (♂) (1898).
 1

83. Genus **Piletosoma** Hampson

Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 595, 707 (1898).
 (Typus generis: *novalis* Walk.)

a) Orientalische Region.

- holophaealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Singapore,
 8) 10, p. 2 (1912). Borneo

b) Neotropische Region.

- novalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. Panama,
 1399 (♂) (1865) (*Botys?*) (Villa Nova). — Fr. Guayana,
 Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 707, Brasilien
 f. 64 (♂) (1898). — Dyar, Proc. U. S. Nat.
 Mus., 47, p. 274 (1914).
ignedorsalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Peru
 708, t. 49, f. 7 (♂); p. 761 (1898).

Species incertae sedis.

- argoponalis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 274 Panama
 (1914).
chaquimayalis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus., 65, Peru
 art. 7, p. 69 (♂) (1924). (Chaquimaya)

guianalis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus., 65, art. 7, Fr. u. Br.
p. 64 (♂) (1924). Guayana

tacticalis Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus., 65, art. 7, Guatemala
p. 63 (♂) (1924). (Tactic)

thialis Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 274 (♂) Panama
(1914).

8

84. Genus **Deba** Walker

Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1494 (1865). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 373 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 595, 708 (1898).

Phycidicera Snellen in Veth, Midden-Sumatra, 4, Lep., p. 71 (1880) (typus: *manicalis* Snellen). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 287 (1901).

(Typus generis: *surrectalis* Walk.)

surrectalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, Assam,
p. 1495 (♀) (1865) (*Deba*) (Ceylon). — Ceylon,
Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 344 (♂) (1886). — Java,
Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 324, Celebes,
f. 184 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., Philippinen,
p. 708, f. 65 (♂) (1898). — E. Hering, Br. Neu-
Ent. Zeit. Stett., 62, p. 289 (1901) (*Phyci- Guinea*
dicera).

salebrialis Snellen, Midden-Sumatra, 4 (1),
Lep., p. 71 (1880) (*Phycidicera*); id., Tijds.
v. Ent., 23, p. 228 (1880) (*Phycidicera*)
(Celebes); 27, p. 37, t. 3, f. 6 (♂) (1884).

althealis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, Borneo,
p. 361 (♂) (1859) (*Salbia*) (Borneo). — Sumatra,
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 708 Celebes
(1898) (*Deba*). — E. Hering, Ent. Zeit.
Stett., 62, p. 28 (1901).

cydipeialis Walker, Cat. Lep. Het. Brit.
Mus., 18, p. 694 (♂) (1859) (*Botys*) (Sa-
rawak).

tisiassalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit.
Mus., 18, p. 696 (♀) (1859) (*Botys*) (Sa-
rawak).

manicalis Snellen in Veth, Midden-Suma-
tra, 4, Lep., p. 72, t. 5, f. 10, 10 a (1880)
(*Phycidicera*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett.,
62, p. 288 (1901) (*Phycidicera*).

2

85. Genus **Cerataarcha** Swinhoe

Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 200 (1894). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 324 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 595, 709 (1898). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 170, 214 (1928); ibid., 25, p. 157, 181 (1929).

(Typus generis: *umbrosa* Swinh.)

- umbrosa** Swinhoe, Anu. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 200 (1894) (*Ceratareha*). — Hampson, Japan, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 325, f. 185 Formosa, (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 709, Indien f. 66 (♂) (1898). — Snellen, Tijds. v. (Assam, Ent., 43, p. 276, t. 15, f. 9, 10 (♂) (1901). Sikkim, — Wileman, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 380 Kalkutta) (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 214, t. 8, f. 18 (1828); 25, p. 181 (1929).
- dohertyi** Warren, Nov. Zool., 4, p. 197, t. 5, f. 28 Bali (♂) (1897) (*Banisa?*). — Snellen, Tijds. v. Ent., 43, p. 276 (1901) (*Ceratareha*).

2

86. Genus **Botyodes** Guenée

Guenée, Delt. & Pyral., p. 320 (1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 550 (1859). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 394 (1864). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 334 (1886). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 325 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 595, 709 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 203 (1900). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 214 (1928); *ibid.*, 25, p. 156, 181 (1929).

Endocrossis Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 515 (1889) (typus: *flavibasalis* Moore). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 487 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 226 (1901).

(Typus generis: *asialis* Guen.)

a) Paläarktische Region.

- principalis** Leech, Entom., 22, p. 69, t. 3, f. 9 West-, (1889) (*Botyodes*) (Japan). — Hampson, Mittel-u. Fauna Brit. India Moths, 4, p. 326 (1896); Südchina, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 710 (1898). — Japan, E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 225 Korea, (1901). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., Formosa, p. 463 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Assam, Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 215, Sumatra t. 8, f. 11 (1928); 25 p. 281 (1929).
- maculalis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 198 (1894) (*Botyodes*).

b) Orientalische Region.

- asialis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 321, (♀) (1854) Beludschistan, (*Botyodes*) (Indien). — Walker, Cat. Lep. Indien, Het. Brit. Mus., 18, p. 551 (1859). — Lederer, Ceylon, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 394, Annam, t. 5, f. 6, t. 13, f. 8 (1863). — Moore, Proc. Birma, Zool. Soc. Lond., p. 96 (1867). — Snellen, Singapore, Tijds. v. Ent., 26, p. 139 (1883). — Swinhoe, Formosa, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 873 (1885). — Sumatra, Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 335, t. 183, f. 1, Java, Borneo, 1 a (larva) (1885). — Meyrick, Trans. Ent. Celebes, Soc. Lond., p. 228 (1887). — Pagenstecher, Philippinen, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. 270 Ternate, (1888); 43, p. 13 (1890). — Swinhoe, Trans. Amboina;

- Ent. Soc. Lond., p. 268 (1890). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 605 (1890). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 37 (1891). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 6 (1894). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 325, f. 186 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 709, f. 67 (♂); p. 710 (1898). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 487 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 225 (1901). — Janse, Check-List S. Afr. Lep. Het., p. 159 (1917). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 215, t. 8, f. 3 (1928).
- forma *liliputalis* Strand, Arch. f. Naturg., 78, A 12, p. 76 (1913).
- Congo, Port. Ostafrika (Delagoa Bai), Südafrika; Br. u. Holl. Neu-Guinea, Fidji Ins., Lord Howe Ins.
- Span. Guinea
- flavibasalis** Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 96 (1867) (*Botyodes*). — Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 4, t. 135, f. 41 (1874). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 38, p. 58 (1885). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 515 (1889) (*Endocrossis*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 605 (1890) (*Endocrossis*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 326 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 710 (1898) (*Botyodes*). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 203 (1900) (*Botyodes*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 487 (1900) (*Endocrossis*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 226 (1901).
- Indien (O.-Himalaya, Assam, Sikkim, Bengalen, Kalkutta), Birma, Malakka, Tonkin, Sumatra, Nias, Philippinen; Bismarck-Archipel, Br. Neu-Guinea
- subsp. *interruptalis* Caradja, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 47, p. 159 (1934).
- China (Kwangtung)
- rufalis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 327 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 710 (1898).
- Birma
- caldusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 650 (♂) (1859) (*Botys*) (Hindustan). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 850 (1878) (*Botys*); Journ. Linn. Soc. Lond. Zool., 21, p. 59 (1886) (*Botys*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 580 (1890) (*Botys*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 269 (1890) (*Hapalia*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 327 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 710 (1898) (*Botyodes*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 488 (1900) (*Endocrossis*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 463 (1901) (*Botyodes*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 216, t. 8, f. 19 (1928).
- West- u. Südchina, N.O. Indien (Assam, Sikkim), Birma, Tonkin, Singapore, Java, Formosa
- rosemponis* Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 53 (1918) (*Sylepta*) (Formosa). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 32 (1928).

- patulalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1405 (♀) (1865) (*Botys*) (Darjiling). — West- u. Südchina, Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 97 (1867) (*Botys*). — Indien (Himalaya, Moths, 4, p. 327 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 710 (1898) (*Botyodes*). — Caradja, Assam, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, Sikkim mem. 7, p. 346 (1925); (s. 3) 4, mem. 8, p. 409 (1927).
- croceopteralis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 710 (♀) (1898); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 12, p. 710, t. A, f. 17 (1899). Sikkim
- quinquemaculalis** Sauber in Semper, Schm. Philipp. Ins., 2, p. 673, t. 63, f. 10 (♀) (1902) (*Endo-crossis*). Philippinen (Luzon)

c) Aethiopische Region.

- asialis** Guenée, vide sub b) Orientalische Region.
- hirtusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 642 (♀) (1859) (*Botys*) (Port Natal). — Port. Ostafrika, Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 710 Natal (1898).
- noxia**: Jack, Rhodesia Agric. Journ., 19 (5, 6), p. 569—582, 664—674 (1922); 20 (1), p. 59—72 (1933); Rhodesia Dep. Agric. Bull., nr. 450, 40 pp. (1923).

d) Australische Region.

- asialis** Guenée, vide sub b) Orientalische Region.
- flavibasalis** Moore, vide sub b) Orientalische Region.
- brachytorna** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 3 (1912). Br. u. Holl. Neu-Guinea
- kenricki** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 18, p. 488 (1916). Br. Neu-Guinea
- fulviterminalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 710, t. 49, f. 15 (♂), p. 761 (1898). Neu-Guinea (Kapaur, Humboldt Bai)

87. Genus **Authaeretus** Meyrick

Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 252 (1886). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 596, 711 (1898).

(Typus generis: *eridora* Meyr.)

- eridora** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 252 Fidji Ins. (♂, ♀) (1886). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 711, f. 63 (♂) (1898).
- limata** Lucas, Proc. Roy. Soc. Queensland, 13, p. 82 (♂) (1898). Queensland (Brisbane)
- exaereta** Tams, Ins. Samoa, 3, (4), p. 278, t. 13, Samoa f. 6, t. 16, f. 8 (1935).

88. Genus **Prorodes** Swinhoe

Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 205 (1894). — Hampson, Fauna Brit. India Motbs, 4, p. 328 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 597, 711 (1898). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 171, 216 (1928).

(Typus generis: *mimica* Swinh.)

mimica Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 205 (1894) (*Prorodes*) (N. O. Indien). — Hampson, Fauna Brit. India Motbs, 4, p. 328, f. 187 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 711, f. 69 (♂) (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 294 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 216, t. 8, f. 27 (1928).
triparalis Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 102 (1896) (*Notarcha*).
 NO. Indien (Assam),
 Birma,
 Tonkin,
 Formosa,
 Sumatra,
 Nias, Java,
 Borneo,
 Celebes,
 Pulo Laut,
 Philippinen;
 Holl.
 Neu-Guinea,
 Queensland

leucothyralis Mabilie, Ann. Soc. Ent. Fr., 68 (1899), p. 746 (1900).

2

89. Genus **Sylepta** Hübner

Hübner, Verz. bek. Schm., p. 356 [1825] (sine fixatione typi generis; 2 sp.). — Hampson, Fauna Brit. India Motbs, 4, p. 328 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 595, 712 (1898). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 203 (1900). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 65 (1901). — Rebel in Spuler, Schm. Eur., 2, p. 225 (1906) (*Sylepta*). — Wahlgren, Svensk Insektfauna, 10 (2), p. 54, 55 (1915) (*Sylepta*). — Forbes, Lep. N. York, p. 548 (1923). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 170, 217 (tab. anal. spec. formos. p. 218–220) (1928); *ibid.*, 25, p. 157, 182 (tab. anal. spec. japon. p. 182, 183 (1929)). — M. Hering, Tierwelt Mitteleur. (Ergbd. 1), p. 288 (1932). — Eckstein, Schm. Deutschl., 5, p. 64 (1933). — Hemming, Hübner, 2, p. 257 (1937).

Sylepta Hübner, Verz. bek. Schmett., Index, p. 58 [1826].

Lyptotigris Hübner, Verz. bek. Schm., p. 361 [1825] (typus: *reginalis* Cram.). — De Joannis, Amat. Papill., 4, p. 282 (1929).

Hyalitis Guenée, Delt. & Pyral., p. 289 (1854) (typus: *reginalis* Cram.).

Astura Guenée, Delt. & Pyral., p. 318 (1854) (typus: *elevata* Fabr.).

Asciodes Guenée, Delt. & Pyral., p. 374 (1854) (typus: *gordialis* Guen.). — Berg, An. Soc. Cient. Argent., 15, p. 168 (1883) (= *Ceratoclasia* Led.).

Pantographa Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 387 (1863) (typus: *scriptusalis* Guen.).

Pantographa Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 712 (1898) (ex synonym. (err. typ.)).

- Sathria* Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 411 (1863) (typus: *intermialis* Guen.).
Herpetogramma Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 430 (1863) (typus: *serralis* Led.).
Eirilusa Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1375 (1865) (typus: *croceiceps* Walk.).
Nagia Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1320 (1865) (typus: *desmialis* Walk.).
Notarcha Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 310 (1884); p. 443 (1890) (typus: *derogata* Fabr.).
Patania Moore, Descr. N. Ind. Lep. Ins. Atkinson, p. 209 (1888) (typus: *concatenalis* Walk.). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 329 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 716 (1898) (Sect. C. Sylepta Hübner.). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 491 (1900).
Pramadea Moore, Descr. N. Ind. Lep. Ins. Atkinson, p. 211 (1888) (typus: *denticulata* Moore). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 488 (1900).
Crocidocnemis Warren, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 268 (1889) (typus: *pellucida* Meyr.).
Pleuroptya Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 443 (1890) (typus: *aurantiacalis* Fischer v. Rösl. = *balteata* Fabr.). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 491 (1900).
Loxoscia Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 6, p. 476 (1890) (typus: *scipisalis* Walk.).
Haritalodes Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 6, p. 476 (1890) (typus: *derogata* Fabr.).
Epherema Snellen, Tijds. v. Ent., 35, p. 170 (1892) (typus: *abyssalis* Snell.). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 180 (1900).
Idiostrophe Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 133 (1896) (typus: *albipunctata* Warr.).
Haliotigris Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 163 (1896) (typus: *cometa* Warr.).
Polycoris Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 172 (1896) (typus: *seminigralis* Warr.).
Phryganodes Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 677 (1898), part., nec Guenée (1854).
Haitufa Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 491, t. 7, f. 7 (1900) (typus: *Botys fabiusalis* Walk.).
Subhedylepta Strand, Deutsche Ent. Zeitschr., 32, p. 44 (1918) (Typus: *Hedylepta* (subgen. *Subhd.*) *pilocrocialis* Strand).
Epicorsia (part.) Hübner, Verz. bek. Schmett., p. 355 n. 3400 (1816) [1825] (*E. iridialis* Hbn.).

(Typus generis: *amandalis* Hübner = *amando* Cram.)

a) Paläarktische Region.

- satanas** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 69 Japan, (♂, ♀) (1901); 64, t. 1, f. 14 (1903) (*Sylepta*). Sumatra
 — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 182, 183 (1929) (*satanas*).
luctuosalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 290 (♀) (1854) Sibirien, (*Hyalitis*) (Ostindien). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 403 (1863) (*Hyalitis*). Ussuri,
 — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, Japan, Amur,

- p. 345 (♀) (1859) (*Desmia?*). — Oberthür, Ann. Soc. Ent. Fr. Bull., p. 157 (1885) (*Hyalitis*). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 627 (1889) (*Desmia?*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 626 (1890) (*Coptobasis*). — Hampson, Fauna Brit. India Mus., 4, p. 340 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 715 (1898) (*Sylepta*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 490 (1900) (*Pramadea*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 464 (1901). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 300 (1901). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., p. 211 (1905). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 221, t. 8, f. 1 (1928); 25, p. 184 (1929).
- oemealis* Walker, Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 671 (♀) (1859) (*Botys*) (Hindustan). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 629 (1889) (*Coptobasis*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 627 (1890) (*Coptobasis*).
- cosialis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 685 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak).
- zelleri* Bremer, Lep. Ost-Sib. (Mém. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg), p. 70, t. 6, f. 12 (1865) (*Ebulea*). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 346 (1925) (*luctuosalis* fa.); 4, mem. 8, p. 409 (1927).
- andamanalis* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 615, t. 60, f. 14 (1877) (*Coptobasis*) (Port Blair). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 628 (1889).
- erebina* Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 2, p. 57, t. 39, f. 1 (1878) (*Hymenia*) (Yokohama).
- tricolor** Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 3, p. 75, t. 59, f. 6 (1879) (*Hymenia*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 715 (1898) (*Sylepta*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 464 (1901). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., p. 211 (1905). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 346 (1925) (? var.). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 221, t. 8, f. 26 (1928); 25, p. 184 (1929).
- signalis** Leech, Entom., 22, p. 65, t. 4, f. 4 (1889) (*Coptobasis*) (Japan). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 715 (1898) (*Sylepta*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 464 (1901). — Staudinger & Rebel, Cat. Lep. Pal. Faun., 2, p. 259 (1901) (= *luctuosalis* Guen.). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., p. 211 (1905). — Caradja, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 30, p. 23 (1917). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 184 (1929).
- Korea,
West-
Mittel- u.
Südchina,
Formosa,
Indien
(Himalaya),
Malakka,
Tonkin,
Borneo,
Sumatra,
Andamanen
- Ussuri,
West- u.
Mittelchina,
Japan,
Korea
- Trans-
baikalien,
Ussuri,
Mittelchina,
Japan,
Korea

- maculalis** Leech, Entom., 22, p. 67, t. 2, f. 11 (♂) (1889) (*Botys*) (Japan). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 718 (1898) (*Sylepta*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 465 (1901). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., p. 211 (1905). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 185 (1929).
- taiwanalis** Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 222, t. 8, f. 12 (♂) (1928) (*Sylepta*); 25, p. 185 (1929).
- maculalis** Strand, nec Leech (1889), Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 49 (1918).
- balteata** Fabricius, Ent. Syst., Supplem., p. 457, n. 300 (1798) (*Phalaena*) (Ostindien). — Aurivillius, Ent. Tidskr., 18, p. 167 (1897). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 718 (1898) (part.) (*Sylepta*). — Rebel in Spuler, Schm. Eur., 2, p. 225 (1906). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 4, mem. 8, p. 409 (1927) (var.). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 223, t. 8, f. 5 (1928); 25, p. 183, 185 (1929).
- crocealis** Duponchel, Hist. Nat. Lép. Fr., 8 (2), p. 365 (1831); t. 235, f. 6, (1835) (*Botys*).
- aurantiacalis** Fischer v. Röslerstamm, Abbild. Ber. Erg. Schm., p. 213, t. 75, f. 3 (1840) (*Botys*). — Herrich-Schaeffer, Syst. Bearb. Eur. Schm., 4, p. 28 (1848) (*Botys*). — Guenée, Delt. & Pyral., p. 329 (1854) (*Botys*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 553 (1859) (*Botys*). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 370 (1863) (*Botys*). — Berce, Faune Ent. Fr. Lép., 6, p. 134 (1878) (*Botys*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 444 (1890) (*Pleuroptya*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 281 (1890) (*Notarcha*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 444 (1890) (*Pleuroptya*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 38 (1891) (part.) (*Notarcha*); 9, p. 48 (1893), (part.) (*Notarcha*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 463 (1894) (*Pleuroptya*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 337 (1896) (part.) (*Sylepta*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 491 (1900) (*Pleuroptya*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 465, (1901) (*Sylepta*). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., p. 211 (1905). — Marumo, Journ. Col. Agr. Tokyo Imp. Univ., 8 (11), p. 193 (1923). — Müller-Rutz, Mitt. Schweiz. Ent. Ges., 14 (5), t. 4 (genit.) (1929).
- accipitrals** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1422 (♂, nec ♀) (1865) (*Botys*) (Ceram). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 491 (1900) (*Pleuroptya*).
- aurea** Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 3, p. 76, t. 59, f. 12 (1879) (*Botys*)
- West-, Mittel- u. Südchina, Japan
- Japan, Formosa
- Südeuropa, Syrien, Armenien, West-, Mittel- u. Südchina, Japan, Korea, Formosa, Indien (Assam, Nilgiris, Kalkutta), Ceylon, Birma, Malakka, Tonkin, Sumatra, Sula, Ceram, Buru; S. Sahara, N. Nigeria, Kamerun, D. Ostafrika, Rhodesia; Br. u. Holl. Neu-Guinea, Melville Ins.

- (Japan). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 163 (1883) (*Botys*). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 873 (1885) (*Botys*). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 593 (1889) (*Botys*). — Caradja, Bull. Acad. Rom., 15, p. 151 (1932) (*aurantiacalis* fa.).
- fraterna* Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 338, t. 183, f. 9 (1885) (*Hapalia*) (Ceylon). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 270 (1890) (*Hapalia*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 78 (1901).
- evergestialis* Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 51 (1918) (*Sylepta*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 29 (1928).
- Biologie, Constant, Ann. Soc. Ent. Fr., (s. 6) 3, p. 5 (1883) (*aurantiacalis*). — De Joannis, Ann. Soc. Ent. Fr., 95 (1929), p. 677 (1930). — Lhomme, Cat. Léop. France Belg., 2 (1), p. 116 (1935). — Uchida, Zool. Mag., 48 (4), p. 220—221 (Tokyo) (1936).
- noxia**: Corbet, Malayan Agric. Journ. (Kuala Lumpur), 16 (4), p. 136—140 (1924); Gen. Ser. Dep. Agric. S. S. & F. M. S., nr. 6, p. 48—64 (Kuala Lumpur) (1931).
- perpendicularis** Duponchel, Hist. Nat. Léop. Fr., 8 (2), p. 324, t. 232, f. 5 (1831) (*Botys*). — Guenée, Delt. & Pyral., p. 333 (1854) (*Botys*). — Berce, Faune Ent. France, Léop., 6, p. 128 (1878) (*Botys*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 450 (1890) (*Pyrausta*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 725 (1898) (*Sylepta*); *ibid.*, p. 270 (1899) (*Pyrausta*). — Rebel in Spuler, Schm. Eur., 2, p. 226 (1906). — Lhomme, Cat. Léop. France Belg., 2 (1), p. 115 (1935) (*Lypotigris*).
- pernitescens** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 203 (♂) (1894) (*Charema*) (Cherra Punji). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 337 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 719 (1898) (*Sylepta*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 466 (1901). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., p. 211 (1905). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 185 (1929).
- fuscalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 165 (♂) (1896) (*Pleuroptya*) (Khasis).
- insignis** Butler, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 587 (♂) (1861) (*Botyodes*) (Japan). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 719 (1898) (*Sylepta*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 466 (1901). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., p. 211 (1905). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 186 (1929).
- ruralis** Scopoli, Ent. Carn., p. 242 (1763) (*Pha-laena*). — Heinemann, Kleinschm., 1, H. 2, p. 72 (1865). — Wallengren, Öfvers. K.
- Frankreich
- Südechina, Japan, Indien (Assam), Br. Neu-Guinea
- West- u. Mittelchina, Japan
- Mittel- u. Südeuropa, Finnland,

- Vet.-Akad. Förh., 28 (8), p. 996 (1871) (*Botys*). — Berce, Faune Ent. Fr. Lép., 6, p. 133, t. 3, f. 15 (1878) (*Botys*). — Snellen, Vlinders Nederl., 2 (1), p. 58 (1882). — Leech, Brit. Pyral., p. 35, t. 4, f. 8 (1886) (*Botys*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 443 (1890) (*Notarcha*); id., Handb. Brit. Lep., p. 406 (1895) (*Notarcha*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 721 (1898) (*Sylepta*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 75 (1901) (*Pyrausta*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 466 (1901). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., p. 212 (1905). — Rebel in Spuler, Schm. Eur., 2, p. 226, t. 82, f. 45 (1906). — Wahlgren, Svensk Insektfauna, 10 (2), p. 55, t. 3, f. 63 (1915). — Tullgren & Wahlgren, Svenska Insekter, p. 395, 315 j (1922). — Costantini, N. Beitr. Syst. Ins., 2, p. 105 (1923). — Matsumura, Journ. Col. Agr. Hokkaido Imp. Univ., 15 (3), p. 189 (1925). — Meyrick, Revis. Handb. Brit. Lep., p. 423 (1928) (*Notarcha*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 225, t. 8, f. 29 (1928); 25, p. 186 (1929). — Müller-Rutz, Mitt. Schweiz. Ent. Ges., 14 (5), t. 4 (genit.) (1929). — M. Hering, Tierwelt Mitteleur. (Ergbd. 1), p. 288 (1932). — Eckstein, Schm. Deutschl., 5, p. 64, t. 1, f. 27 (1933).
- verticalis* [Schiffermüller & Denis], Verz. Schm. Wien, p. 120 (1776) (*Pyralis*), nec Linné (1758). — Hübner, Samml. Eur. Schm., 6. Horde, p. 22, t. 9, f. 57 (1796) (*Pyralis*). — Schrank, Fauna Boica, 2 (2), p. 59, nr. 1707 (1802) (*Pyralis*). — Haworth, Lep. Brit., p. 376 (1811) (*Pyralis*). — Donovan, Nat. Hist. Brit. Ins., 16, t. 556, fig. (1813) (*Pyralis*). — Treitschke, Schm. Eur., 7, p. 101 (1829) (*Botys*). — Duponchel, Hist. Nat. Lép., 8 (2), p. 116, t. 217, f. 1, 2 (1831) (*Botys*). — Stephens, Ill. Brit. Ent. Haust., 4, p. 48 (1834) (*Margaritia*). — Wood, Index Entom., p. 124, t. 28, f. 810 (1839) (*Margaritia*). — Zetterstedt, Lns. Lapp., p. 971 (1840) (*Botys*). — Herrich-Schaeffer, Syst. Bearb. Schm. Eur., 4, p. 29 (1848) (*Botys*). — Guenée, Delt. & Pyral., p. 337 (1854) (*Botys*). — Stainton, Mon. Brit. Butt. Moths, 2, p. 149 (1859) (*Botys*).
- iridialis* Hübner, Verz. bek. Schm., p. 355 n. 3400 (1816) [1825] (*Epicorsia*).
- dubia* Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 136, t. 155, f. 16 (1891) (*Notarcha*); 9, p. 48 (1893) (*Notarcha*); Proc. Zool. Soc., p. 721 (1898) (= *sabinusalis* Walk.). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 73 (1901) (= *ruralis* var.).
- sabinusalis* Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 466 (1901), nec Walker (1859). — Shi-

Estland,
Schweden,
Lappland,
Kleinasien,
Ciskaukasien,
Armenien,
Ostsibirien,
Sajan-
gebirge,
Amur,
Ussuri,
Algier,
Westchina,
Japan,
Korea,
Formosa,
Indien
(Assam,
Sikkim),
Tonkin,
Sumatra

- buya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 187 (1901).
- subsp. *flavescens* Rebel, Ann. Naturh. Hofmus. Wien, 30, p. 149 (1916). Kreta
- forma *flava* Skala, Ent. Zeitschr. Frankfurt, 42, p. 106 (1928). Mähren (Nikolsburg)
- forma *opacata* Meder, Schr. Naturw. Ver. Schleswig Holstein, 20, p. 149 (1916). N. Friesische Ins.
- Biologie: Treitschke, Schm. Eur., 7, p. 102 (1829) (*B. verticalis*). — Buckler, Larvae Brit. Butt. Moths, 9, p. 124, t. 103, f. 3 (1901). — Rebel in Spuler, Schm. Eur., 2, Nachtr.-Taf., 9, f. 60 (1906). — Schulze, Biol. Kleinschm., p. 83, 98 (1931). — Lhomme, Cat. Léop. France Belge, 2 (1), p. 115 (1935).
- moderatalis** Christoph, Bull. Soc. Nat. Moscou, 56 (1), p. 25 (1881) (*Botys*) (Amur). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 450 (1890) (*Pyrausta*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 257 (1899) (*Pyrausta*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 500 (1901) (*Pyrausta*). — Shibuya, Ins. Matsum., 2 (2), p. 101 (1927); Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 228 (1929) (*Pyrausta*). Amur, Ussuri, West-, Mittel- u. Südchina, Japan, Korea
- fuscomarginalis** Leech, Entom., 22, p. 68, t. 3, f. 4 (1889) (*Botys*) (Japan). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 722 (1898) (*Sylepta*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 468 (1901). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., p. 212 (1905). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 25, p. 183, 186 (1929). Amur, West-Thian, West-, Mittel- u. Südchina, Japan
- ultimalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 659 (♀) (1859) (*Botys*) (Ceylon). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 339 (1886) (*Hapalia*). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 601 (1889) (*Hapalia*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 271 (1890) (*Hapalia*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 48, t. 172, f. 8 (1893) (*Notarcha*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 333 (1896) (*Sylepta*); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 722 (1898) (*Sylepta*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 468 (1901). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 70 (1901). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 349 (1925) (var.). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 226 (1928); 25, p. 187 (1929). Südchina, Japan, Formosa, Assam, Ceylon, Birma, Sumatra, Java
- oberthüri** Turati, Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 51, p. 349, t. 9, f. 32 (1912); id., Ent. Rec., 25, p. 18 (1913) (*Botys* [*Sylepta*?]). Sardinien, Korsika
- corsicalis* Caradja, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 42, p. 290, 293 (1928) (*Pionca*).

- mysialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 634 (♀) (1859) (*Botys*) (Sierra Leone). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 335 (1896).
- mysissalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 722 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 74 (1901). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 350 (1925).
- impuralis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 167 (♂) (1896) (*Gadessa*) (Khasis).
- derogata** Fabricius, Syst. Ent., p. 641 (1775) (*Phalaena*) (Ind. or.); Ent. Syst., 3 (2), p. 218 n. 331 (1794) (*Phalaena*). — Aurivillius, Ent. Tidskr., 18, p. 168 (1897) (*Synclera*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 722 (1918) (*Sylepta*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 70 (1901). — Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 51 (1918). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 226 (1923); 25, p. 187 (1929).
- multilinealis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 337, t. 8, f. 11 (1854) (*Botys*) (Ostindien). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 661 (1859) (*Botys*) (Ceylon, Hindustan, China). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 375, t. 11, f. 3 (1863) (*Botys*). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 96 (1867) (*Botys*). — Semper, Journ. Mus. Godeffroy, 2, p. 64, t. 8, f. 13, 14 (1873) (*Botys*). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 619 (1877) (*Botys*); Journ. Linn. Soc. Lond. Zool., 21, p. 59 (1886) (*Botys*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 39, p. 56 (1886) (*Botys*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 315 (1886) (*Synclera*). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 634 (1889) (*Synclera*). — Pagenstecher, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 3, p. 31 (1890) (*Botys*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 588 (1890) (*Botys*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 443 (1890) (*Notarcha*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 280 (1890) (*Synclera*). — Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 6, p. 476 (1890) (*Haritalodes*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 39 (1891); 9, p. 48 (1893) (*Haritalodes*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 334 (1896) (*Sylepta*). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 203 (1900) (*Sylepta*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 495 (1900). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 468 (1901). — Matsu-mura, Cat. Ins. Jap., p. 212 (1905).
- Syrien,
West-,
Mittel- u.
Südchina,
Indien
(Assam,
Sikkim,
Nilgiris,
Goa),
Sumatra,
Nias;
Westafrika
(Sierra
Leone),
Madagaskar

Ostsibirien,
Amur,
Ussuri,
Nord-,
West-,
Mittel- u.
Südchina,
Japan,
Korea,
Formosa,
Indien,
Siam,
Birma,
Indochina,
Malakka,
Singapore,
Ceylon,
Nias,
Borneo,
Celebes,
Sumbawa,
Flores,
Sula,
Ceram,
Amboina,
Buru, Phi-
lippinen,
Key Ins.,
Malediven,
Andamanen,
Seychellen;
Sierra
Leone,
Goldküste,
Nigeria,
Anglo-
Aegypt.
Sudan,
Belg. Congo,
Uganda,
D. Ost-
Afrika,
Sansibar,

- salomealis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 476 (1859) (*Zebonia*) (Sierra Leone). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1348 (♀) (1865) (*Zebonia*) (Hindustan). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 870 (1885) (*Zebonia*).
- otysalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 723 (♀) (1859) (*Botys*) (Moreton Bai).
- basipunctalis* Bremer, Ost-Sib. (Mém. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg), p. 68, t. 6, f. 8 (1864) (*Botys*).
- annuligeralis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1424 (♂) (1865) (*Botys*) (Sula, Flores, Neu-Guinea, Java).
- Biologie*: Matsumura, Ill. Zeitschr. f. Ent., 5, p. 380—382 (1900). — Semper, Schm. Philipp. Ins., 2, p. 676, t. 5, f. 1 (1902) (larva). — Ind. Mus. Notes, 5, p. 132, 182, t. 14, f. 4 (1903) (*multilinealis*). — Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 15, p. 216 (1903) (larva). — Maxwell, Lep. Mem. Dep. Agric. Ind., 2, p. 95, t. 9 (1908). — Shiraki, Bull. Agr. Exp. Gov.-Gen. Formosa, 1, p. 117, t. 32, f. 5 (1910); 5, p. 144, t. 14, f. 9, 10 (1913). — Vaysière & Mimeur, Agron. Colon., nr. 90, p. 255—260 (1925). — De Joannis, Ann. Soc. Ent. Fr., 98 (1929), p. 677 (1930).
- noxa*: Morstatt, Der Pflanze (Daressalam), 9 (6), p. 288—296 (1913). — Zacher, Arb. K. Biol. Anst. Land- & Forstwirtsch. (Berlin), 9 (1), p. 121—230 (1913). — Peacock, Bull. Ent. Res., 4 (3), p. 191—220 (1913). — Ballard, Bull. Ent. Res., 4 (4), p. 347—351 (1913). — Dupont, Bull. Econ. Indochine (Hanoi-Haiphong) (n. s.), nr. 99 (1912); nr. 102, 105 (1913). — Morstatt, Beiheft Pflanze, 10 (1), 50 pp. (1914). — Aders, Zanzibar Protect. Med. & Sanit. Rep. f. 1913, p. 84—93 (1914). — Lamborn, Bull. Ent. Res., 5 (3), p. 197—214 (1914). — Mason, Rep. Entom. f. 1915, Dep. Agric. Nyassaland Protectorate (Zomba), 16 pp. (1915). — Senior White, Trop. Agric. (Paradeniya), 48 (2), p. 115—121 (1917). — Speyer, Ceylon Admin. Reps., f. 1917, Dep. Agric., p. C10—13 (1918). — Mason, Nyassaland Prot. Ann. Rep. Dep. Agric. (Zomba) f. 1917, p. 9—13 (1918). — Hutson, Trop. Agric. (Paradeniya), 53 (2), p. 139—141 (1919). — Burt, Rep. Cawnpore Agric. Stat. Unit. Provinces (Allahabad) f. 1915/16, 41 pp. (1916); f. 1916/17, 89 pp. (1918). — Penzer, Cotton in Brit. West-Africa, Federation of Brit. Industries (London), 53 pp. (1920). — Fletcher & Misra, Rep. Proc. 3. Entom. Meeting Pusa f. 1919 (Calcutta), 2, p. 443—472 (1920). — Misra, *ibid.*, p. 547—561 (1920). — Fletcher, Sci. Reps. Agric.

Tanganyika,
Rhodesia,
Nyassaland;
Holl.
Neu-Guinea,
Bismarck-
Archipel,
Salomon
Ins., Neu-
Hebriden,
Palau Ins.,
Viti Ins.,
Fidji Ins.,
Samoa;
Südamerika

Res. Inst. 1919/20 (Calcutta), p. 68—94 (1920). — Hutson, Ceylon Dept. Agric. Admin. Repts. f. 1919 (Padadeniya), p. C8—C10 (1920) (*multilinealis*). — Pillai, Travancore Dep. Agric. (Trivandrum), 53 pp. (1921). — Subramania Jyer, Journ. Mysore Agric. & Exp. Union (Bangalore), 3 (4), p. 189—194 (1921). — Pomeroy, Nigeria Ann. Rep. Agric. Dep. Southern Provinces f. 1920/21 (Lagos), p. 21—23 (1921). — Hutson, Ceylon Dep. Agric. Rep. f. 1921 (Peradeniya), p. C23—C26 (1922). — Woodworth, Philippine Agriculturist (Los Baños), 11 (2), p. 49—55 (1922). — Jack & Sands, Malayau Agric. Journ. (Kuala Lumpur), 10 (10—12), p. 248—258 (1922). — Sen, Bengal Agric. Journ. (Decca), 3 (1), p. 23 (1923). — Rep. Dep. Agric. Tanganyika Territory f. 1922, p. 19—21 (1923). — Hutson & Jardine, Ceylon Admin. Repts. Agric. (Colombo) f. 1922, p. D18—D20 (1923). — Hutson, Trop. Agriculturist (Peradeniya), 62 (5), p. 288—289 (1924); 63 (2), p. 91—93 (1924). — Ghosh, Rep. Ent. Mandalay f. 1922, p. 14 (1923); f. 1923, p. 1—19 (Rangoon) (1924). — Husain, Rep. Dep. Agric. Punjab (Lahore) (pt. 2) (1920—23). — Hector, Repts. Agric. Bengal (Calcutta) (1921—24). — Hargreaves, Uganda Ann. Rep. Dep. Agric. f. 1923, p. 15—21 (Entebbe) (1924). — Jepson, Ceylon Admin. Repts. Dep. Agric. f. 1923 (Colombo), p. D19—D21 (1924). — Vayssière & Mimeur, Agron. Colon., nr. 90, p. 244—268 (Paris) (1925). — Burkill, Ann. Rep. Dir. Gardens (Straits Settlement) f. 1924 (Singapore), 6 pp. (1925). — Gater, Malayan Agric. Journ. (Kuala Lumpur), 13 (4), p. 92—115 (1925). — South, *ibid.*, 13 (7), p. 189—202 (1925). — Hutson, Ceylon Admin. Rep. Dep. Agric. (Colombo) f. 1924, p. D15—D16 (1925). — Austin, Trop. Agriculturist, 66 (4/5), p. 241—247 (1926). — Husain, Rep. Dep. Agric. Punjab (Lahore) f. 1923/24, (pt. 2) 1, p. 55—90 (1925). — South, Malayan Agric. Journ., 14 (6), p. 146—159 (1926). — Pomeroy, Nigeria, 4. Ann. Bull. Agric. Dep. (Lagos), p. 89—108 (1925). — Simmonds, Fiji Dep. Agric. Ann. Rep. f. 1925 (Suva), p. 7—9 (1926). — Dejong, Bull. Agric. Congo Belge (Bruxelles), 18 (4), p. 451—536 (1927). — Smee, Rep. Dep. Agric. Nyassaland f. 1926, p. 13—20 (Zomba) (1927). — Hopkins, Bull. Ent. Res., 18 (1), p. 23—32 (1927). — Ramachandra Rao & Cherian, Yearb. Dep. Agric. Madras f. 1926 (Madras), p. 39—50 (1927). — Goding, 7. Ann. Bull. Agric. Dep. Nigeria (Lagos), p. 17—37 (1928). — Husain, Rep. Dep. Agric. Punjab (Lahore), 1927/28 (pt. 2),

p. 55—79 (1929). — Gupta, Rep. Dep. Agric. Assam (Shillong) 1928/29, p. 44—45 (1929). — Bunting & Milsum, Bull. Dep. Agric. S. S. & F. M. S. Gen. Ser. nr. 1 (Kuala Lumpur), 78 pp. (1930). — Jepson, Techn. Rep. 1929, Dep. Agric. Ceylon (Colombo), 25 pp. (1930). — Commun, Bull. Econ. Indochine, 33 (3 B), C. R. Trav. 1928—29 II-Ent. Cryptog. (Hanoi), p. 1—28 (1930). — Hutson, Rep. Ceylon Dep. Agric. (Peradeniya) f. 1932, 23 pp. (1933). — Monteil, Agron. Colon. (Paris), nr. 193, p. 11—18 (1934). — Li(Feng-swen) & Ma (Tsing-chao), Yearb. Bur. Ent. Hangchow, 3 (1933), p. 185—187 (1934). — Isaac, Sci. Rep. Inst. Agric. Res. Pusa 1932/33 (Delhi), p. 161—166 (1934). — Kambe, Ann. Agric. Exp. Stat. Chosen, 7 (4), p. 359—404 (Suigen, Korea) (1934). — Otanes & Butac, Philipp. Journ. Agric., 6 (2), p. 147—174 (Manila) (1935). — Soyer, Bull. Agric. Congo Belge, 26 (4), p. 496—498 (1935). — Woo, Spec. Publ. Nat. Agric. Res. Bur. China, nr. 12, 34 pp. (Nanking, Minist. Ind.) (1935).

Parasiten: Waterston, Bull. Ent. Res., 5 (4), p. 343—372 (1915); 6 (3), p. 231—247, fig. (1915). — Vincens, Bull. Agric. Inst. Scientif. (Saigon), 3 (10), p. 307—323 (1926). — Vayssière & Mimeur, Agron. Colon., nr. 90, p. 255—268 (Paris) (1925). — Sonan, Rep. Dep. Agric. Res. Inst. Formosa, nr. 29 (Taihoku), 132 pp. (1927). — Chopra, Rep. Dep. Agric. Punjab (Lahore) f. 1925/26 (pt. 2) 1, p. 67—125 (1928). — Hancock, Rep. Dep. Agric. Uganda f. 1926, p. 27—29 (Entebbe) (1927). — Ritchie, Rep. Dep. Agric. Tanganyika Terr. (Daressalam) 1927—28, p. 34—40 (1929). — Wilkinson, Bull. Ent. Res., 20 (1), p. 103—114 (1929). — Ferrière, Bull. Ent. Res., 20 (4), p. 411—423 (1929). — Simmonds, Agric. Journ. Dep. Agric. Fiji (Suva), 1 (3), p. 16—21 (1928) (1929). — Ferrière, Bull. Ent. Res., 22 (1), p. 127—135 (1931). — Whitfield, Bull. Wellcome Trop. Res. Lab. Sudan Gov. Ent. Sect., nr. 31, p. 76—78 (Kartoum) (1930). — Wilkinson, Trans. Ent. Soc. Lond., 80, p. 301—344 (1932). — Curran, Amer. Mus. Novit., nr. 751, 25 pp. (1934). — Li(Feng-swen), Techn. Bull. Bur. Ent. Chekiang, nr. 12; Chekiang Agric., 1 (3), p. 73—98 (Hangchow) (1933). — Watanabe, Kontyu, 7 (5/6), p. 245—248 (Tokyo) (1933). — Anantanarayanan, Bull. Ent. Res., 25 (1), p. 55—61 (1934). — Bredo, Bull. Agric. Congo Belge, 25 (1), p. 3—20 (Bruxelles) (1934). — Uchida, Ins. Matsum., 9 (3), p. 81—84 (1935). — Watanabe, Ins. Matsum., 10 (1/2), p. 43—51 (1935).

- paleacalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 331 (♂) (1854) Syrien,
(*Botys*) (Judaea). — Meyrick, Trans. Soc. Palästina
Ent. Lond., p. 443 (1890) (*Notarcha*). —
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 725
(1898).
- magna** Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 3, Süd- u.
p. 74, t. 59, f. 2 (1879) (*Samea*). — Hamp- Mittelchina,
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 723 (1898) Japan,
(*Sylepta*). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., Korea,
p. 469 (1901). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., Formosa
p. 212 (1905). — Shibuya, Journ. Fac. Agr.
Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 228
(1928); 25, p. 188 (1929).
- deficiens** Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 556, t. 215, West-,
f. 12 (1887) (*Coptobasis*). — Swinhoe & Süd- u.
Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 628 (1889) Ostchina,
(*Coptobasis*). — Hampson, Fauna Brit. India Japan,
Moths, 4, p. 337 (1896); Proc. Zool. Soc. Formosa,
Lond., p. 724 (1898) (*Sylepta*). — Leech, Indien
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 489 (1901). — (Himalaya,
Matsumura, Cat. Ins. Jap., p. 212 (1905). Assam),
difficiens Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hok- Ceylon,
kaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 229, t. 8, Birma,
f. 6 (1928); 25, p. 188 (1929). Sumatra,
suisharyella Strand, Deutsche Ent. Zeit. Borneo.
Iris, 32, p. 81 (1918) (*Pyrausta*). — Shi-
buya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ.
Sapporo, 22, p. 33 (1928).
- sounkeana* Matsumura, Ins. Matsum., 1,
p. 118 (1927) (*Nacoleia*). — Shibuya, Journ.
Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo,
25, p. 188 (1929).
- inferior** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 724 Mittelchina,
(1898) (nom. nov.). — Leech, Trans. Ent. Japan,
Soc. Lond., p. 470 (1901). — Matsumura, Korea,
Cat. Ins. Jap., p. 212 (1905). — Swinhoe, Formosa,
Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 293 Indien
(1906) (part.). — Shibuya, Journ. Fac. Agr.
Hokkaido Univ. Sapporo, 22, p. 228 (1928);
25, p. 189 (1929).
- quadrimaculalis* Motschulsky, nec Kollar (1844), Etud. Entom., 9, p. 37 (1860)
(*Botys*?) (Japan). — Matsumura, Journ. Col.
Agr. Hokkaido Imp. Univ., 15, p. 189 (1925)
(*Glyphodes*).
- incomitata* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist.,
(s. 7) 8, p. 251 (1900) (*Chalcidoptera*).
- quadrimaculalis** Kollar in Hügel, Kaschmir, 4 (2), Ussuri,
p. 492 (1844) (*Scopula*). — Lederer, Wien. West-,
Ent. Monatschr., 7, p. 430, t. 16, f. 12 (♀) Mittel- u.
(1863) (*Coptobasis*?). — Meyrick, Trans. Ent. Südchina,
Soc. Lond., p. 441 (1890) (*Omiodes*). — Japan,
Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 589 Korea,
(1890) (*Botys*). — Hampson, Fauna Brit. Sachalin,
India Moths, 4, p. 336 (1896); Proc. Zool. Formosa,
Soc. Lond., p. 724 (1898) (*Sylepta*). — Indien
Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, (N. W.
p. 496 (1900) (*Sylepta*). — Leech, Trans. Himalaya,

- Ent. Soc. Lond., p. 470 (1901). — Matsumura, Cat. Ins. Jap., p. 212 (1905); Journ. Agr. Hokkaido Imp. Univ., 15, p. 188 (1925). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 350 (1925). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 218, 229, t. 8, f. 14 (1928); 25, p. 189 (1929).
- desmialis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1320 (♀) (1865) (*Nagia*) (Sarawak). — Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, p. 293 (1906) (*Sylepta*).
- maculalis* Matsumura, Journ. Col. Agr. Tohoku Imp. Univ. Sapporo, 4, p. 58 (1911) (*Sylepta*), nec Leech (1889).

Assam,
Sikkim),
Borneo

b) Orientalische Region.

- plumifera** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 712; p. 761, t. 49, f. 10 (♂) (1898). Amboina, Fergusson Ins., Neu-Guinea
- curiusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 688 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 713 (1898) (*Sylepta*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 490, t. 8, f. 1 (1900) (*Pramadea*). Borneo, Sumatra
- denticulata** Moore, Descr. N. Ind. Lep. Ins. Atkinson, p. 211 (1887) (*Pramadea*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 338 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 713 (1898). N.O. Indien (Assam, Sikkim) (Typus: Cherra Punji)
- agraphalis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 21, p. 1267 (1912). Indien (Bhotan, Assam)
- carbatinalis** Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 288, t. 8, f. 13 (1890) (*Pramadea*) (Birma). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 338 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 713 (1898). Assam, Birma
- seminigralis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 172 (♂) (1893) (*Polycoris*) (Khasis). *carbatinalis* Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 338 (1896), part.; Proc. Zool. Soc. Lond., p. 713 (1898) (part.). Assam, Tonkin
- cohaesalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1418 (♂, nec ♀) (1865) (*Botys*) (Sula). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 338 (1896) (part.); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 713 (1898) (*Sylepta*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 298 (1901). Indien (Assam, Nilgiris), Nias, Celebes, Sula, Tenimber, Sumatra, Borneo, Celebes; Australien, Fidji Ins.
- halurga* Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 259 (♂, ♀) (1886) (*Notarcha*) (Fiji).
- biocellata* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 171 (1896) (*Coptobasis*) (Tenimber).

- crotonalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 997 (♀) (1859) (*Botys*) (Ceylon). — (Assam, Sikkim), Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 292 (1885) (*Coptobasis*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 9, p. 49 (1893) (*Coptobasis*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 339 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 713 (1898) (*Sylepta*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 489 (1900) (*Pramadea*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 220 (1928).
- sulcialis** Snellen (nec Walker (1859)), Trans. Ent. Soc. Lond., p. 625 (1890) (*Coptobasis*) (Sikkim).
- pilocrocialis** Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 44 (1918) (*Hedylepta* subgen. *Subhedylepta*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 29 (1928).
- leucodontia** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 713 (♂, ♀) (1898). Celebes, Amboina, Fergusson Ins., Holl. Neu-Guinea
- fraterna** Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 292, t. 181, f. 8 (♂) (1885) (*Coptobasis*) (Colombo). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 339 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 714 (1898) (*Sylepta*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 297 (1901). — Janse, in Van Straelen, Result. Scient. Voy. Ind. Orient. Néerland., 4 (12), p. 9, t. 6, f. 82 (1935). S. Indien (Nilgiris), Ceylon, Sumatra, Java, Celebes, Philippinen (Luzon)
- vanbraekeli** Janse in Van Straelen, Result. Scient. Voy. Ind. Orient. Néerland., 4 (12), p. 9, f. 81, t. 6, f. 90 (1935). Assam, Fergusson Ins., Holl. Neu-Guinea
- ridopalis** Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 18 (1892) (*Coptobasis*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 339 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 714 (1898) (*Sylepta*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 297 (1901). Indien (Sikkim, Assam), Burma, Sumatra, Java, Philippinen (Luzon)
- microspilalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 4 (1912). Singapore
- lunalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 352 (1854) (*Botys*) (Coromandel). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 662 (1859) (*Botys*). — Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 616 (1877) (*Coptobasis*); Lep. Ceylon, 3, p. 291 (1885) (*Coptobasis*). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 867 (1885); Trans. Ent. Soc. Lond., p. 277 (1890) (*Coptobasis*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 626 (1890) (*Coptobasis*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Indien (Darjiling, Nilgiris, Kalkutta), Ceylon, Birma, Malakka, Indochina, Formosa, Sumatra,

- Het. Brit. Mus., 8, p. 39 (1891) (*Coptobasis*).
 — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 457 (1894) (*Coptobasis*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 339 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 714 (1898) (*Sylepta*).
 — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 489 (1900) (*Pramadea*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 298 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 221 (1928).
- thyasalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 734 (♂) (1859) (*Botys*) (Patria?). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 873 (1885) (*Botys*).
- thiasalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 1007 (♀) (1859) (*Botys*) (Ceylon).
- thyadalis* Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 429 (1863) (*Botys*).
- contigualis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1441 (♀) (1865) (*Botys*) (Java). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 714 (1898) (*Sylepta*). — W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, nr. 15, p. 137 (1915) (Holl. Neu-Guinea).
- subjunctalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1441 (♀) (1865) (*Botys*) (Java).
- incrassata* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 171 (1896) (*Coptobasis*) (Khasis).
- microsema** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 21, p. 1267 (1912). Ceylon, Singapore, St. Aignan, Holl. Neu-Guinea
- adductalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 669 (1859) (*Botys*) (Ceylon). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 292, t. 181, f. 7 (1885) (*Coptobasis*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 39 (1891); 9, p. 49 (1893) (*Coptobasis*); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 339 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 714 (1898) (*Sylepta*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 399 (1901).
- luminalis* Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 429, 483, t. 16, f. 10 (1863) (*Coptobasis*) (Ostindien).
- arectalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 290 (1854) (*Hyalitis*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 347 (1859) (*Desmia?*). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 403 (1863) (*Hyalitis*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 340 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 714 (1898) (*Sylepta*).
- opisalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 17, p. 346 (♀) (1859) (*Desmia*) (Patria?). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 429, t. 16, f. 11 (1863) (*Coptobasis*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p.
- Nias, Java, Borneo, Celebes, Lombok, Sumbawa, Philippinen, Andamanen, Christmas Ins., Holl. Neu-Guinea; Venezuela
- S. Indien, Ceylon, Sumatra, Java, Ceram
- Indien (Bombay)

- 1319 (1863) (*Coptobasis*). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 867 (1885); p. 458 (1886) (*Coptobasis*).
- textalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 429, 482, t. 16, f. 9 (♂) (1863) (*Coptobasis*) (Ostindien). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1319 (1865) (*Coptobasis*). — Snellen in Veth, Midden-Sumatra, 4, p. 75 (1880) (*Coptobasis*); Trans. Ent. Soc. Lond., p. 626 (1890) (*Coptobasis*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 39 (1891); Fauna Brit. India Moths, 4, p. 340 (1896) (*Sylepta*). — Pagenstecher in Küken-thal, Reise Lep., p. 464 (1897) (*Coptobasis*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 714 (1898) (*Sylepta*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 490 (1900) (*Pramadea*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 299 (1901).
- uenealis** Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 867 (1885) (*Coptobasis*) (Bombay); p. 458 (1886) (*Coptobasis*).
- incerta** Semper, Schm. Philipp. Ins., 2, p. 506, t. 59, f. 10 (♀) (1899) (*Scaptosyle?*) (Mindanao); p. 674, nota (1902).
- ovialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 636 (1859) (*Botys*) (Congo). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 715 (1898) (*Sylepta*). — Strand, Arch. f. Naturg., 85, A 12, p. 150 (1920).
- pseudovialis** Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 21, p. 1268 (1912) (nom. nov.).
- ovialis** Hampson, nec Walker (1859), Fauna Brit. India Moths, 4, p. 340 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 715 (1898) (part.).
- lactiguttalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 131 (♂) (1896) (*Arthriobasis*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 340 (1898); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 715 (1898) (*Sylepta*).
- leucographalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 5 (♂) (1912).
- satanas** E. Hering, vide sub a) Paläarktische Region.
- luctuosalis** Guenée, vide sub a) Paläarktische Region.
- tricolor** Butler, vide sub a) Paläarktische Region.
- segnalis** Leech, vide sub a) Paläarktische Region.
- Indien
(Pandschab,
Indore,
Sikkim,
Nilgiris,
Bombay),
Sumatra,
Borneo,
Philippinen
(Luzon,
Mindanao)
- Indien
(Assam,
Sikkim);
Abessinien,
Kamerun,
Uganda, D.-
Ostafrika,
Sansibar,
Principe Ins.,
Rhodesia
- Südechina,
Indien
(Ost-
Himalaya,
Assam,
Sikkim,
Bhotan),
Ceylon,
Tonkin,
Pulo Laut,
Borneo
- Assam
(Typus:
Khasis),
Birma
- Bali

- oblilquifascialis** Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 330 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 715 (1898). Sikkim, Birma
- pyranthes** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 462 (1894) (*Notarcha*) (S. O. Borneo). — Sumatra, Borneo
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 715 (1898) (*Sylepta*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 88 (1901).
- chromalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1453 (♂) (1865) (*Botys?*) (Java). — Sikkim, Java, Br.
Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 330 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 715 (1898). Neu-Guinea
- floccosa** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 100 (1901); 64, t. 1, f. 19, 19 a (♂) (1903) Sumatra
(*Patania*).
- concatenalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1408 (♀) (1865) (*Botys*) (Darjiling). Sikkim, Assam
— Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 97 (1867) (*Botys*); Descr. N. Ind. Lep. Ins. Atkinson, p. 204 (1888) (*Patania*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 329 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 716 (1898) (*Sylepta*).
- nulngpoalis** Leech, Entom., 22, p. 68, t. 3, f. 1 (♂) (1889) (*Botys*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 716 (1898). — Leech, Trans. West-, Mittel-,
Ent. Soc. Lond., p. 465 (1901). — Caradja, Süd- u.
Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. Ostchina, Sikkim
7, p. 346 (1925).
- tibialis** Moore, N. Ind. Lep. Ins. Atkinson, p. 216 (1888) (*Synclera*). — Snellen, Trans. Indien
Ent. Soc. Lond., p. 632 (1890) (*Zebonia*). (Assam, Sikkim,
— Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, Nilgiris),
p. 329 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. Tonkin
717 (1898) (*Sylepta*).
- fabiussalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, Sumatra,
p. 715 (♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Borneo,
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 717 Pulo Laut,
(1898) (*Sylepta*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Buru,
Oxford Mus., 2, p. 491, t. 7, f. 7 (1900) Ceram,
(*Haitufa*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., Philippinen
62, p. 67 (1901) (*Sylepta*). (Mindanao)
- subsp. *mokanalis* Caradja, Bull. Acad. Südchina
Roum., 15, p. 151 (1932). (Mokanshan)
- abyssalis** Snellen, Tijds. v. Ent., 35, (1891—1892), Sumatra,
p. 172, t. 10, f. 11, 12 (♂) (1891) (*Epherema*) Java,
(Java). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), Amboina,
H. 29, p. 180 (1900) (*Epherema*). — Hampson, Buru,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 718 (1898). Bismarck-
— E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 64, p. 45 Archipel
(1903). (Neu-
Pommern),
Neu-Guinea
- pauelstrialis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) Mittel- u.
17, p. 139 (♂) (1896) (*Cyclarcha*) (Kha- Südchina,
sis). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, Indien

- 4, p. 337 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., (Bhotan,
p. 718 (1898) (*Sylepta*). — Leech, Trans. Assam),
Ent. Soc. Lond., p. 465 (1901). Tonkin
- maculalis** Leech, vide sub a) Paläarktische Region.
- taiwanalis** Shibuya, vide sub a) Paläarktische Region.
- pogonodes** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Batjan,
718 (♂) (1898) (*Sylepta*). Amboina
- macallalis** West, Novit. Zool., 36, p. 217 (♀) (1931) Philippinen
(Luzon).
- balteata** Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.
- hoenci** Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., Südchina
(s. 3) 3, mem. 7, p. 347, t. 2, f. 44 (1925). (Amoy,
Lienping)
- distinguenda** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 77 Assam,
(♂, ♀) (1901); 64, t. 1, f. 16 (1903). — Sumatra,
Hampson, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., Philippinen
18, p. 581 (1908). (Luzon)
- quadriguttalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., Sula Ins.
34, p. 1435 (♀) (1865) (*Botys*). — Swinhoe,
Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 492, t. 8,
f. 24 (1900) (*Pleuroptya*).
- balteata** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 718 (1898), part.
- proctizonalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Mittelchina
9) 1, p. 266 (♂) (1918).
- ochrotichroa** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Assam
9) 1, p. 266 (♂) (1918). (Khasis)
- pernitescens** Swinhoe, vide sub a) Paläarktische Region.
- insignis** Butler, vide sub a) Paläarktische Region.
- pronaxalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, Ceylon,
p. 688 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Birma,
Hampson, Brit. India Moths, 4, p. 329 (♂) Borneo
(1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 719 (1898)
(*Sylepta*).
- acutalis** Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit.
Mus., 9, p. 171, t. 174, f. 16 (1893) (*Par-*
domima) (Ceylon).
- chalyblfascia** Hampson, Fauna Brit. India Moths, Assam,
4, p. 330 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., Ceylon,
p. 719 (1898). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Formosa,
Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 224 Br.
(1928). Neu-Guinea
- karenkonis** Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Formosa
Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 224, t. 1, f. 11,
t. 2, f. 11, t. 8, f. 13 (♂) (1928).
- cometa** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, Assam
p. 164 (♂) (1896) (*Haliotigris*) (Khasis).
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 719
(1898); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 12,
p. 710, t. A, f. 15 (1899).
- subsp. **tamsi** Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Westchina
Stiint., (s. 3) 4, mem. 8, p. 409 (1927).

- picalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 719, t. 49 (♂ ♀); p. 761, f. 14 (♂) (1898); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 15, p. 216, t. C, f. 9 (1903). Assam (Khasis)
- gastralis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1356 (♀) (1865) (*Glyphodes*) (Darjiling). Indien (Himalaya,
— Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 93 Assam,
(1867) (*Glyphodes*). — Hampson, Fauna Brit. Sikkim)
India Moths, 4, p. 331 (1896); Proc. Zool.
Soc. Lond., p. 720 (1898) (*Sylepta*).
- bipartalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 720 (♂) (1898). Pulo Laut
- scinialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 648 (♂) (1859) (*Botys*) (Hindustan). Indien (N.W.
— Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 96 Himalaya,
(1867) (*Botys*); p. 619, t. 60, f. 11 (1877) Sikkim,
(*Botys*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., Assam),
p. 583 (1890) (*Botys*). — Swinhoe & Cotes, Birma,
Cat. Moths India, 5, p. 593 (1888) (part.) Sumatra
(*Botyodes*). — Hampson, Fauna Brit. India
Moths, 4, p. 331 (♂) (1896); Proc. Zool.
Soc. Lond., p. 720 (1898) (*Sylepta*). —
E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 65 (1901).
restrictalis Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 584 (♂) (1890) (*Botys*) (Sikkim).
- costalis** Moore, Descr. N. Ind. Lep. Ins. Atkinson, p. 221 (1888) (*Botyodes*). — Snellen, Trans. Süd- u.
Ent. Soc. Lond., p. 583 (1890) (= *Botys Westchina,*
scinialis). — Hampson, Fauna Brit. India Iudien
Moths, 4, p. 331 (♂) (1896) (*Sylepta*); Proc. (Sikkim,
Zool. Soc. Lond., p. 720 (1898) (*Sylepta*). Assam),
— Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., Tonkin,
(s. 3) 3, mem. 7, p. 345 (1925). — Shibuya, Formosa
Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 224, t. 8, f. 21 (1928).
- sellalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 330 (♀) (1854) Westchina,
(*Botys*) (Silhet). — Walker, Cat. Lep. Het. Indien
Brit. Mus., 18, p. 648 (1859) (*Botys*); 34, (Benares,
p. 1481 (1865) (*Pachynoa*). — Swinhoe & Sikkim,
Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 611 (1888) Assam),
(*Pachynoa*). — Hampson, Fauna Brit. India Ceylon,
Moths, 4, p. 332, f. 188 (♂) (1896); Proc. Birma,
Zool. Soc. Lond., p. 720; p. 712, f. 70 (♂) Malakka,
(1898) (*Sylepta*). — E. Hering, Ent. Zeit. Singapore,
Stett., 62, p. 66 (1901). — Shibuya, Journ. Formosa,
Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, Sumatra,
22, p. 225 (1928). Ternate,
consimilalis Lederer, Wien. Ent. Monat- Amboina,
schr., 7, p. 374, 471 ♀ (1863) (*Botys*) (Ter- Buru,
nate, Amboina). — Walker, Cat. Lep. Het. Ceram,
Brit. Mus., 34, p. 1389 (1865) (*Botys*). — Andamanen,
Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 585 Neu-Guinea
(1890) (*Botys*).
- disjunctalis* Walker, Char. Undescr. Lep. Het., p. 96 (1869) (*Botys*) (Benares).
- scinialis* Moore, nec Walker (1859), Proc. Zool. Soc. Lond., p. 619, t. 60, f. 11 (1877) (*Botys*).

- mundalis** South, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 511, China,
t. 15, f. 19 (1901) (1901) (*Pyrausta*). — Formosa
Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp.
Univ. Sapporo, 22, p. 225 (1928) (*Sylepta*).
- bipunctalis** Warren, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 333 Indien
(1888) (*Samea?*). — Hampson, Fauna Brit. (N. W.)
India Moths, 4, p. 332 (1896); Proc. Zool. Himalaya)
Soc. Lond., p. 720 (1898).
- verecunda** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) Indien
18, p. 167 (1896) (*Loxoscia*) (Khasis). — (Assam,
Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. Sikkim,
333 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 720 Nilgiris),
(1898) (*Sylepta*). Ceylon
- fraterna* Moore, Descr. N. Ind. Lep. Ins.
Atkinson, p. 221, t. 7, f. 16 (1888) (*Botyodes*)
(Darjiling). — Snellen, Trans. Ent. Soc.
Lond., p. 584 (1890) (*Botys*). — Hampson,
Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 38
(1891); 9, p. 48 (1893) (*Loxoscia*). — Swin-
hoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 494
(1900) (*Sylepta*).
- angustalis** Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 585 Sikkim,
(♂) (1890) (*Botys*) (Sikkim). — Hampson, Assam
Fauna Brit. India Moths, 4, p. 333 (1896); (Khasis)
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 720 (1898).
- polydonta** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 721 Amboina,
(1898). Fergusson
Ins., Holl.
Neu-Guinea,
Queensland
- ruralis** Scopoli, vide sub a) Paläarktische Region.
- lucidalis** Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., West- u.
(s. 3) 3, mem. 7, p. 348, t. 2, f. 46 (1925). Mittelchina,
Sikkim
- sabinusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, West- u.
p. 708 (♂, nec ♀) (1859) (*Botys*) Sarawak). Mittelchina,
— Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, Indien
p. 333 (1896) (part.); Proc. Zool. Soc. (Himalaya,
Lond., p. 721 (1898) (*Sylepta*). — Pagen- Sikkim,
stecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 204 Assam,
(1900). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Bombay,
Mus., 2, p. 493 (1900). — E. Hering, Ent. Nilgiris),
Zeit. Stett., 62, p. 71 (1901). — Caradja, Formosa,
Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, Ceylon,
mem. 7, p. 349 (1925). Sumatra,
- puricollalis* Snellen, Tijds. v. Ent., 23, Java,
p. 213 (1880) (*Botys*); 26, p. 130, t. 7, f. 9, Borneo,
9 a (1883) (*Botys*). — E. Hering, Ent. Zeit. Celebes,
Stett., 62, p. 72 (1901) (Sumatra, Borneo, Sumbawa,
Darjiling, Assam). Ceram,
- butyrina* Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., Buru;
p. 260 ♀ (1886) (*Notarcha*). — Swinhoe, Cat. Kamerun,
Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 493 (1900) Uganda,
(= *imbutalis* Walk.). D. O.
- ruralis* Snellen, nec Scopoli (1763), Trans. Afrika,
Ent. Soc. Lond., p. 588 (1890) (*Botys*) Somaliland,
(Sikkim). Rhodesia;

Biologie: De Joannis, Ann. Soc. Ent. Fr.,
98 (1929), p. 677 (1930).

Coetivy Ins.,
Holl.
Neu-Guinea,
Bismarck-
Archipel,
Salomon
Ins.,
Fidji Ins.,
Samoa

- amoyalis** Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint.,
(s. 3) 3, mem. 7, p. 348, t. 2, f. 47 (1925). Südchina
(Amoy)
- sublittoralis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus.,
34, p. 1452 (♂) (1865) (*Botys*) (Java). — Südchina,
Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 873
(1885) (*Botys*). — E. Hering, Ent. Zeit.
Stett., 62, p. 71 (1901). — Caradja, Bull.
Acad. Roum., 15, p. 151 (1932); Mat. Mi-
crolep. Chin. Prov., p. 37 (1935). Indien
sabinusalis Hampson, Fauna Brit. India
Moths., 4, p. 333 (1896) (part.); Proc. Zool.
Soc. Lond., p. 721 (1898) (part.) (*Sylepta*).
luteolalis R. South, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 467, Westchina
t. 15, f. 18 (1901).
- imbutalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, Indien
p. 1442 (♀) (1865) (*Botys*) (Java). — (Assam,
Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 333
(1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 721 (1898)
(= *sabinusalis* Walk.). — E. Hering, Ent.
Zeit. Stett., 62, p. 72 (1901). Sikkim),
Java
- subsp. *taihokuensis* Strand, Deutsche Ent. Formosa
Zeit. Iris, 32, p. 49 (♂) (1918) (*imbutalis*
var.?). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hok-
kaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 33, 219,
226 (1928).
- faecalis* Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris,
32, p. 86 (♀) (1918) (*Pyrausta*) (Kosempo).
- capnosalis** Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., West- u.
(s. 3) 3, mem. 7, p. 348, t. 2, f. 45 (1925). Südchina
- fuscomarginalis** Leech, vide sub a) Paläarktische
Region.
- euryterminalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Südchina,
(s. 9) 5, p. 269 (♂) (1918). — Shibuya, Formosa
Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sap-
poro, 22, p. 222, t. 8, f. 20 (1928). —
Caradja, Bull. Acad. Roum., 15, p. 151
(1932).
- ultimalis** Walker, vide sub a) Paläarktische Re-
gion.
- homomorpha** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 462 Pulo Laut,
(♂) (1894). — Hampson, Proc. Zool. Soc. (typus),
Lond., p. 722 (1898); Journ. Bombay Nat. Ceylon
Hist. Soc., 15, p. 216 (1908).
- straminea** Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 4) 16, Ceylon,
p. 416 (1875) (*Botys*) (Natal). — Hampson, Natal,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 722 (1898); Journ. Farquhar
Bombay Nat. Hist. Soc., 15, p. 216 (1908). Ins.,
— B. Fletcher, Trans. Linn. Soc. Lond., Amiranten
13, p. 307 (1910). — Janse, Check-List
S. Afr. Lep. Het., p. 160 (1917).

- mysisalis** Walker, vide sub a) Paläarktische Region.
derogata Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.
penthodes Meyrick in Gardiner, Fauna Geogr. Maldivae et Laccadive Arch., 1, p. 125 (1902) (*Notarcha*). Malediven (Ins. Minikoi)
- iophanes** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 462 (♂) (1894). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 722 (1898). Borneo
- rhyparialis** Oberthür, Etud. Entom., 18, p. 45, t. 11, f. 26 (1893). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 722 (1898). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 469 (1901). West- u. Mittelchina
 ab. *alba* Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 469 (1901).
- venustalis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 199 (♂) (1894). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 335 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 722 (1898). Nord-, West- u. Südchina, Assam (Khasis) (Typus: Shillong, Cherra Punji)
- nigriflava** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 199 (♂) (1894). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 335 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 722 (1898). Sikkim, Assam (Typus: Cherra Punji)
- haryoalis** Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 52 (♀) (1918). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 227 (1928). Formosa (Suisharyo)
- iopasalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 652 (♂) (1859) (*Botys*) (Birma); 19, p. 993 (1859) (*Botys*). — Butler, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 5) 5, p. 226 (1880) (*Botys*). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 525 (1884) (*Botys*). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 599 (1889) (*Hapalia*). — Snellen, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 585 (1890) (*Botys*). — Swinhoe, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 270 (1890) (*Hapalia*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 38 (1891); 9, p. 48 (1893) (*Sylepta*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 459 (1894) (*Conogethes*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 334 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 722 (1898) (*Sylepta*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 494 (1900) (*Sylepta*). — Pagenstecher, Zoologica (Chun), H. 29, p. 205 (1900). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 469 (1901). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 80 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 227 (1928). West-, Mittel- u. Südchina, Formosa, Indien (Sikkim, Assam, Nilgiris), Ceylon, Tonkin, Birma, Sumatra, Nias, Java, Borneo, Andamanen, Amboina, Sumbawa, Timor Laut, Sula, Buru, Karolinen, Philippinen; Neu-Guinea, Bismarck-Archipel, Salomon Ins.,
- jopasalis* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 550 (1878) (*Botys*); Lep. Ceylon, 3, p. 337, t. 182, f. 14 (1886) (*Hapalia*).

- plagiatalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 673 (♀) (1859) (*Botys*) (Ceylon). — Swinhoe, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 876 (1885) (*Botys*). — Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 337 (1886) (*Harpaia?*). — Hampson, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 8, p. 38 (1891) (*Sylepta*).
- boteralis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 716 (♀) (1859) (*Botys*) (Sarawak); 19, p. 994 (1859) (*Botys*). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 6 (1894) (*Conogethes*).
- orobentalis* Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 211 (♂) (1880) (*Botys*) (Celebes); 26, p. 130, t. 7, f. 7, 7a (1883) (*Botys*); Trans. Ent. Soc. Lond., p. 586 (1890) (*Botys*) (Sikkim). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 82 (1901). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 350 (1925).
- tardalis* Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 210 (1880) (*Botys*) (Celebes); 26, t. 7, f. 6 (1883) (*Botys*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 725 (1898). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 78 (1901).
- tenuis* Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 102 (♂) (1896) (*Notarcha*) (Queensland).
- leopardalis* Strand, nec Moore (1888), Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 48 (1918) (*iopasalis* var.).
- subsp. *leopardalis* Moore, Descr. N. Ind. Lep. Ins. Atkinson, p. 221, t. 7, f. 26 (1888) (*Sylepta leopardalis*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 83 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 228 (1928).
- nox a: Leefmans, Meded. Inst. Plantenziekten (Buitenzorg), nr. 51, 83 pp. (1921) (*tardalis* Snellen).
- magna** Butler, vide sub a) Palaäarktische Region.
- lygropialis** West, Novit. Zool., 36, p. 217 (♀) (1931) (Luzon).
- dissipatalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 376, 474 (♀), t. 11, f. 13 (1863) (*Botys*) (Amboina). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 335 (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 723 (1898) (*Sylepta*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 84 (1901). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 223, t. 8, f. 28 (1928).
- quinquigera* Moore, Descr. N. India Lep. Ins. Atkinson, p. 207, t. 7, f. 14 (1888) (*Samea*).
- fatualis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 376, 475 (♀), t. 11, f. 15 (1863) (*Botys*) (Java). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 83 (1901).
- clathralis* Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 200 (♂, ♀) (1894) (*Cera-*
- St. Aignan, Australien; Guatemala
- Celebes (Takalar & Balanguipa)
- Indien, Formosa, Sumatra, Salomon Ins.
- Philippinen
- Süchina, Indien (Assam, Sikkim), Ceylon, Birma, Formosa, Sumatra, Borneo, Amboina, Buru, Br. Neu-Guinea
- Assam, Birma, Sumatra, Java

- tarcha?*) (Shillong). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 286 (1896) (*Bocchoris*); id., Proc. Zool. Soc. Lond., p. 652 (1898) (*Bocchoris*).
- subalbidalis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 14, p. 201 (1894) (*Charema*). — Hampson, Fauna Brit. India Moths, 4, p. 336 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 723 (1898) (*Sylepta*). Assam (Khasis) (Typus: Shillong, Cherra Punji)
- ogooalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 689 (♂) (1859) (*Botys*) (Sarawak). — Hampson, Brit. India Moths, 4, p. 336 (♂) (1896); Proc. Zool. Soc. Lond., p. 723 (1898) (*Sylepta*). — E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. 299 (1901). Ceylon, Malakka, Sumatra, Nias, Borneo
- colomboensis* Moore, Lep. Ceylon, 3, p. 556, t. 215, f. 13 (1887) (*Ooptobasis*) (Ceylon). — Swinhoe & Cotes, Cat. Moths India, 5, p. 628 (1888) (*Ooptobasis*).
- deficiens** Moore, vide sub a) Paläarktische Region.
- machinalis** Felder & Rogenhofer, Reise Novara, Lep. (Het.), p. 4, t. 136, f. 36 (♀) (1874) (*Botys*) (Molukken). — Snellen, Tijds. v. Ent., 26, p. 132 (1883) (*Botys*). — Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 41, p. 268 (1888) (*Botys*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 724 (1898). — Semper, Schm. Philipp. Ins., 2, p. 688 (1902) (*Omphisa*). Molukken (Amboina), Celebes, Philippinen
- inferior** Hampson, vide sub a) Paläarktische Region.
- quadrinaculalis** Kollar, vide sub a) Paläarktische Region.
- lulalis** Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, p. 50 (♂) (1918) (*Sylepta?*). — Shibuya, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, 22, p. 229 (1928). Formosa
- albipunctata** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 133 (1896) (*Idiostrophe*) (Mackay). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 724 (1898). Amboina, Queensland (Mackay)
- paucinotalis** Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 18, p. 166 (♂) (1896) (*Notarcha*). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 347 (1925). Assam (Khasis)
- nigriscriptalis* Hampson, nec Warren (1896), Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 12, p. 711 (1899).
- mandarinalis** Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, t. 2, f. 43 (1925). China

Species incertae sedis.

- albitorquata** Tams, Journ. Nat. Hist. Soc. Siam, 6, p. 286, t. 17, f. 9 (♂) (1924). Bangkok
- azadesalis** Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 320, t. 3, f. 7 (♂) (1927). Philippinen (Luzon)
- banosalis** Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 318, t. 2, f. 3 (♂) (1927). Philippinen (Los Baños, Surigao)

- beneditalis** Holland, Novit. Zool., 7, p. 588 (1900). Buru
- berambalis** Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 318, Philippinen
t. 3, f. 3 (♂) (1927). (Mindanao)
- cathanal** Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 318, Philippinen
t. 3, f. 9 (♂) (1927). (Luzon)
- delicatalis** Strand, Deutsche Ent. Zeitschr. Iris, 32, Formosa
p. 52 (1918).
- dottoalis** Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 321, Philippinen
t. 1, f. 2 (♂) (1927). (Luzon)
- elegans** West, Novit. Zool., 36, p. 217 (♂) (1931). Philippinen
(Luzon)
- elphegalis** Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 320 Philippinen
t. 3, f. 6 (♂) (1927). (Luzon)
- inanitalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. Ostindien,
371, 464, t. 9, f. 3 (1863) (*Botys*). — Hamp- Amboina
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 725 (1898).
- macarealis** Schaus, Philippin. Journ. Sci., 34, p. Philippinen
321, t. 3, f. 8 (♂) (1927). (Mindanao)
- marcidalis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 7) 17, Sumatra
p. 382 (1906).
- melanopalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Comoren
8) 1, p. 478 (♀) (1908). (Mayotta)
- mildredalis** Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 321, Philippinen
t. 2, f. 9 (♀) (1927). (Luzon)
- möllingeri** Snellen, Tijds. v. Ent., 38, p. 152, t. 5 Java
f. 12 (♂) (1895) (*Coptobasis*). — Hampson,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 725 (1898).
- nigro dentalis** Pagenstecher, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., 37, p. 268, t. 6, f. 3 (♀) (1884); Amboina
(*Botys*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 725 (1898).
- paucilinealis** Snellen, Tijds. v. Ent., 23, p. 212 Celebes
(♂) (1880); 26, p. 133, t. 7, f. 8, 8 a (1883) (Makassar)
(*Botys*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 725 (1898).
- petroalis** Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 319, Philippinen
t. 3, f. 4 (♀) (1927). (Luzon)
- phalangiodalis** E. Hering, Ent. Zeit. Stett., 62, p. Sumatra
93 (1901); 64, t. 1, f. 15 (♂) (1903).
- simealis** Schaus, Philipp. Journ. Sci., 34, p. 319, Philippinen
t. 1, f. 1 (♂) (1927). (Luzon)
- spretalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. Amboina
430, 482 (♂) (1863) (*Coptobasis*). — Hamp-
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 725 (1898).

c) Aethiopische und Madagassische Region.

- purpurascens** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., Br. Ostafrika,
p. 714 (♂) (1898). Daressalam,
Congo

- disciselenalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Br. Ostafrika 9) 1, p. 260 (♂) (1918).
- orbiferalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Natal 715 (1898). (Karkloof)
- ovialis** Walker, vide sub b) Orientalische Region.
- parvipuncta** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. Sierra Leone, 8) 10, p. 5 (1912). Goldküste
- bitjecoia** Strand, Arch. f. Naturg., 85, A 12, p. 149 Kamerun (1920).
- sarronalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, Sierra Leone p. 636 (♂) (1859) (*Botys*) (Sierra Leone).
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 715 (1898) (Westafrika).
- torsipex** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 715, Sierra Leone, t. 49, f. 12 (♂) (1898). Congo, Rhodesia
- butleri** Dewitz, Nova Act. Acad. Leop. Carol., 42, Sierra Leone, p. 87, t. 3, f. 13 (1880) (*Botys*) (Guinea). Togoland,
— Karsch, Ent. Nachr., 26, p. 259 (1900). Kamerun,
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Span. 272 (1899) (*Pyrausta*). Guinea,
clementsi Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., Congo, p. 716; p. 761, t. 49, f. 11 (♂) (1898) D. Ostafrika,
(*Sylepta*) (Sierra Leone). Rhodesia, Caffraria
- tumidipes** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Sierra Leone 10, p. 6 (♂) (1912). (Typus),
ab. *hampsoniana* Strand, Arch. f. Na- Goldküste, turg., 82, A 3, p. 10 (1917). S. Nigeria
- neodesmialis** Klima (nom. nov.). S. Nigeria
desmialis Hampson, (nec Walker (1865)), Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 8 (♂) (1912).
- melanomma** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. S. Nigeria 8) 10, p. 8 (♀) (1912).
- xylocraspis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Natal 10, p. 9 (♀) (1912). — Janse, Check-List S. Afr. Lep. Het., p. 160 (1917).
- balteata** Fabricius, vide sub y) Paläarktische Region.
- semiugens** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Westafrika 10, p. 9 (♂) (1912). (Kamerun,
noxa: Hargreaves, Sierra Leone, Ann. Rep. (Sierra Lands & Forests Dep. f. 1925 (Freetown), Leone) p. 16—18 (1926); Proc. I. W. Afr. Conf. Ibadan, Nigeria f. 1927 (Lagos), p. 113—128 (1927).
- subcyaneoalba** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Kamerun (s. 9) 1, p. 261 (♂) (1918).
- retraetalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Goldküste 10, p. 10 (♂) (1912).
- brunneiterminalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Br. Ostafrika, (s. 9) 1, p. 265 (♂) (1918). S. Nigeria
- hyalescens** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Niger 719 (♂) (1898). (Warri)

- attenualis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Br. Ostafrika
10, p. 11 (1912).
- atrisquamalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) D. Ostafrika
10, p. 13 (♀) (1912). (Bucui)
- straminea** Butler, vide sub b) Orientalische Region.
- mysialis** Walker, vide sub a) Paläarktische Region.
- derogata** Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.
- pseudoderogata** Strand, Arch. f. Naturg., 85, A 12, Kamerun
p. 148 (1920).
- polycymalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Br. Ostafrika,
10, p. 15 (1912). Uganda,
Br. Zentr.
Afrika
(Zonaba),
Port.
Ostafrika
(Gaza),
Natal
- rogationis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) Br. Zentr.-
1, p. 269 (1918). Afrika,
Port.
Ostafrika
- sulphureotincta** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Br. Zentr.-
(s. 9) 1, p. 270 (1918). Afrika, Port.
Ostafrika
- holochralis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Br. Ostafrika
10, p. 17 (♀) (1912). (Tanga)
- achromalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Sierra Leone,
10, p. 18 (♀) (1912). Nigeria,
Kamerun
- xanthothorax** Meyrick, Exot. Microlep., 4, p. 405 Belg. Congo
(♂) (1933). (Kitobola,
Kisala)
- megastigmalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., Sierra Leone,
p. 723 (♂) (1898); p. 498, t. 41, f. 26 (1910). Kamerun,
Rhodesia
- dentilinea** Gaede, Ent. Zeit. Stett. 77, p. 134 (♂) Kamerun
(1916). (Musake)
- microstrictalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Kamerun
(s. 9) 1, p. 270 (1918).
- nasonalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 724 Natal
(♀) (1898). — Janse, Check-List S. Afr.
Lep. Het., p. 160 (1917).
- maculilinealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Uganda
(s. 9) 1, p. 271 (♂) (1918).
- mesoleucalis** Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. Natal
724 (♂) (1898). — Janse, Check-List S. (Karkloof)
Afr. Lep. Het., p. 160 (1917).

Species incertae sedis.

- acutipennalis** Kenrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 99 Madagaskar
(1917).

- agilis** Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 11 (♀) (1936). Belg. Congo
(Ifuta, Stan
à Coq, Bena-
Dibele)
- batraehina** Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 10 (♀) Belg. Congo
(Lulua)
- fulviceps** Bethune-Baker, Ann. Mag. Nat. Hist., Congo
(s. 8) 3, p. 437 (1909). (Makale)
- hemichionalis** Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr., 68 Madagaskar
(1899), p. 745 (1900).
- leonalis** Schaus in Schaus & Clements, Lep. Sierra Leone, p. 45, t. 3, f. 9 (1893) (*Coptobasis*).
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 725
(1898).
- malgassiea** Kenrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 99, Madagaskar
t. 6, fig. (1917).
- nyauzana** Grünberg, Sitzungsber. Ges. Naturf. Sesse Ins.
Freunde Berlin, p. 178 (♂ ♀) (1910). (Victoria
Nyanza),
Congo
- patagialis** Zeller, Kgl. Vet. Acad. Handl. Lep. Micropt. Caffr., p. 37 (1852) (*Botys*) (Limpopo,
Gariep). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond.,
p. 716 (1898). Südafrika,
Kamerun,
Komoren;
Mexiko,
Guatemala,
Costarica,
Panama,
Kolumbien,
Brasilien
- servalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr.,
7, p. 430, t. 16, f. 16 (1863) (*Herpeto-*
gramma) (Brasilien).
- undulalis** Pagenstecher in Voeltzkow, Reise
Ostafrika, 2, p. 134 (♂) (1907) (Komoren).
— Gaede, Ent. Zeit. Stettin, 77, p. 134
(1916).
- rubrifucalis** Mabille, Ann. Soc. Ent. Fr., 68 (1899), Madagaskar
p. 746 (1900).
- secreta** Meyrick, Exot. Microlep., 5, p. 10 (♀) Belg. Congo
(1936). (Stan à Coq)
- trifidalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Aden, Br.
1, p. 491 (♂) (1908). Ostafrika
(Typus),
Port.
Ostafrika

d) Australische Region.

- plumifera** Hampson, vide sub b) Orientalische Re-
gion.
- monoleuea** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Holl.
10, p. 3 (♂) (1918). Neu-Guinea
- cohaesalis** Walker, vide sub b) Orientalische Region.
- leueodontia** Hampson, vide sub b) Orientalische Re-
gion.
- vanbraeckeli** Janse, vide sub b) Orientalische Region.
- microsema** Hampson, vide sub b) Orientalische Re-
gion.
- albirivalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Holl.
10, p. 4 (♀) (1912). Neu-Guinea
(Kapaur)

- chromalis** Walker, vide sub b) Orientalische Region.
abyssalis Snellen, vide sub a) Paläarktische Region.
balteata Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.
mysotalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1423 (♂, nec ♀) (1865) (*Botys*). — Swinhoe, Cat. Lep. Het. Oxford Mus., 2, p. 492, t. 8, f. 5 (1900) (*Pleuroptya*).
balteata Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 718 (1898) (part.) (*Sylepta*).
acridentalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 10 (♂) (1912). Holl. u. Br. Neu-Guinea
molybdopasta Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 260 (♂) (1918). Bismarck-Archipel (Rook Ins.)
crenilincalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 261 (♀) (1918). Holl. Neu-Guinea
pernitescens Swinhoe, vide sub a) Paläarktische Region.
solilucis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 718, t. 49, f. 13 (1898). Br. Neu-Guinea
heliochroa Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 11 (1912). Br. Neu-Guinea
tetrathryalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 11 (♂) (1912). Holl. Neu-Guinea
chalybifascia Hampson, vide sub b) Orientalische Region.
sellalis Guenée, vide sub b) Orientalische Region.
polydonta Hampson, vide sub b) Orientalische Region.
ochrifusalis Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 721 (♀) (1898). Fergusson Ins., Br. Neu-Guinea
ochritinctalis Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 268 (♂) (1918). Fergusson Ins.
derogata Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.
planctflava Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 17 (♀) (1912). Br. Neu-Guinea
iopasalis Walker, vide sub b) Orientalische Region.
dissepatalis Lederer, vide sub b) Orientalische Region.
disticta Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 18 (♂) (1912). Holl. Neu-Guinea
albipunctata Warren, vide sub b) Orientalische Region.
ochrotozona Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 724 (1898). Queensland (Cedar Bai, Cooktown)
nigriscriptalis Warren, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 6) 17, p. 100 (♂) (1896) (*Notarcha?*) (Queensland). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 725 (1898). — Caradja, Acad. Rom. Mem. Sect. Stiint., (s. 3) 3, mem. 7, p. 347 (1925). Neu-Guinea, Queensland

Species incertae sedis.

- agneta** Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral., 32, N. Queensland
p. 92 (♀) (1914). (Cardwell)
- chrysampyx** Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral., N. Queensland
32, p. 92 (♀) (1914). (Kuranda)
- commotes** Tams, Ins. Samoa, 3 (4), p. 279, t. 16, Samoa
f. 6 (1935).
- crocophanes** Lower, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Queensland
26, p. 667 (♀) (1902). (Mackay)
- crucifera** W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, Holl.
nr. 15, p. 136, t. 2, f. 77 (♂) (1915). Neu-Guinea
- dinawa** Kenrick, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 551, t. Br.
68, f. 11 (1912). Neu-Guinea
- emmetris** Turner, Proc. Roy. Soc. Queensland, 27, N. Australien
p. 40 (♀) (1915). (Port Darwin)
- exculta** Lucas, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (s. Queensland
2) 7, p. 262 (1892) (*Notarcha*). — Hamp- (Brisbane)
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 725 (1898).
- hicana** Turner, Proc. Roy. Soc. Queensland, 27, N. Australien
p. 40 (♂) (1915). (Port Darwin)
- Irregularis** W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, Holl.
nr. 15, p. 136 (♂) (1915). Neu-Guinea
- klossi** W. Rothschild, Rep. B. O. U. Exp., 2, nr. 15, Holl.
p. 135, t. 2, f. 76 (♂) (1915). Neu-Guinea
- obliqualis** Lucas, Proc. Roy. Soc. Queensland, 13, Queensland
p. 83 (♂ ♀) (1898) (*Notarcha*). (Brisbane)
- phaeoplcura** Turner, Proc. Roy. Soc. Victoria, 35, N. Queensland
p. 50 (♂) (1922). (Claudie River)
- phricostlecha** Turner, Trans. Roy. Soc. S. Austral., Queensland
32, p. 93 (♂ ♀) (1914). (Brisbane)
- placophaca** Turner, Proc. Roy. S. Queensland, 27, N. Queensland
p. 41 (♀) (1915). (Kuranda)
- polytimcta** Turner, Proc. Roy. Soc. Queensland, 27, Australien
p. 39 (♂) (1915). (Port Darwin)
- spilocrossa** Turner, Proc. Roy. Soc. Queensland, N. Queensland
24, p. 148 (♂ ♀) (1913). (Kuranda)
- symphonodes** Turner, Proc. Roy. Soc. Queensland, N. Queensland
24, p. 147 (♂, ♀) (1913). (Kuranda)
- trachelota** Turner, Proc. Roy. Soc. Queensland, 24, N. Queensland
p. 148 (♀) (1913). (Evelyn Scrub)

- zarialis** Swinhoe, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 19, Br.
p. 342 (♂) (1917). Neu-Guinea
- zophosticta** Turner, Proc. Roy. Soc. Queensland, 27. N. Australien
p. 40 (♂) (1915). (Port
Darwin)

c) Nearktische Region.

- gordialis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 374, t. 5, U.S.A.
f. 10 (1854) (*Asciodes*) (Cayenne). — Druce, (Florida);
Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 265 (1895). Mexiko,
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 713 Panama,
(1898). — Dyar, Journ. N. York Ent. Soc., Bahama Ins.,
9, p. 20 (1901). — Barnes & Mc Dunnough, St. Domingo,
Check List Lep. Bor. Amer., p. 130, nr. Fr. Guayana,
4958 (1917) (*Asciodes*). Brasilien
- quietalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit.
Mus., 19, p. 825 (1859) (*Scoparia*) (Do-
mingo).
- confusalis** Hulst, Trans. Amer. Ent. Soc.,
13, p. 158 (1886) (*Desmia*) (Florida).
- anormalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 352 (♂) U.S.A.
(1854) (*Botys*) (Cayenne). — Dyar, Journ. (Florida);
N. York Ent. Soc., 9, p. 20 (1901). — Barnes Bahama Ins.,
& Mc Dunnough, Check List Lep. Bor. St. Domingo,
Amer., p. 130, nr. 4959 (1917) (*Asciodes*). Jamaika,
alvinalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 352 Honduras,
(♂) (1854) (*Botys*) (Brasilien). Kolumbien,
helcitalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Brasilien
Mus., 18, p. 574 (1859) (*Botys*) (Domingo,
Jamaica). — Hampson, Proc. Zool. Soc.
Lond., p. 713 (1898) (*Sylepta*).
- orphnealis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit.
Mus., 18, p. 736 (♂) (1859) (*Botys*) (Pa-
tria?).
- dracusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit.
Mus., 19, p. 983 (♀) (1859) (*Botys*) (Hon-
duras).
- subaequalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit.
Mus., 34, p. 1394 (♂) (1865) (*Botys*) (Bo-
gotá).
- noxia**: Ballou, West Indian Bull. (Barbados),
15 (2), p. 121—147 (1915) (*helcitalis* Walk.).
— Hudson, Agric. News (Barbados), 16,
nr. 388, p. 74, nr. 392, p. 138—139 (1917)
(*helcitalis* Walk.). — Wilson, Virgin Islands
Agric. Exp. Stat. St. Croix Bull., nr. 4,
35 pp. (Wash.) (1923) (*helcitalis* Walk.).
- limata** Grote & Robinson, Ann. N. York Lyc., 8, U.S.A.
p. 464, t. 16, 17 (1867). — Fernald, Can. (Maine,
Ent., 16, p. 26 (1884). — Comstock, Man. Massa-
Ins., p. 231, f. 274, 275 (1895) (*Pantographa*). chusetts,
— Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 717 Virginia,
(1898). — Fernald, Bull. U. S. Nat. Mus., Minnesota),
nr. 52, p. 377, nr. 4307 (1902) (*Panto- Mexiko,
grapha*). — Holland, Moth Book, p. 393, Costarica,
t. 47, f. 38 (♂) (1903). — Barnes & Mc Brasilien,
Dunnough, Check List Lep. Bor. Amer., Patagonien
p. 130, nr. 4900 (1917) (*Pantographa*). —

- Forbes, Lep. N. York, p. 548 (1923) (*Pantographa*).
suffusalis Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 240, t. 62, f. 10 (1895) (*limata* subsp.) (*Pantographa*).
- penumbrales** Grote, Canad. Ent., 9, p. 106 (1877) U.S.A.
 (*Sylepta*). — Barnes & Mc Dunnough, Check (Colorado,
 List Lep. Bor. Amer., p. 130, nr. 4901 Missouri,
 (1917). — Forbes, Lep. N. York, p. 548 Illinois,
 (1923). Ohio,
 Florida)
 (Typus:
 Ohio)
- fluctuosalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 375, 473, t. 11, f. 7 (♂) (1863) (*Botys*) (N. U.S.A.
 Amerika). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash., (Florida)
 4, p. 460 (1901). — Barnes & Mc Dunnough,
 Check List Lep. Bor. Amer., p. 130, nr.
 4962 (1917).
- silicalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 349 (1854) U.S.A.,
 (*Botys*) (Brasilien, Cayenne). — Lederer, Mexiko,
 Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 375, t. 11, f. 5 Guatemala,
 (1863) (*Botys*). — Hampson, Proc. Zool. Panama,
 Soc. Lond., p. 720 (1898) (*Sylepta*). — Costa Rica,
 Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 273 Venezuela,
 (1914). Fr. Guayana,
 Ecuador,
 Brasilien
- cypracalis* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 596 (♂) (1859) (*Botys*) (Brasilien).
- sublucalis* Warren, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 285 (♂, ♀) (1889) (*Hapalia*) (Amazonas).
 — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 211, t. 60, f. 26 (1895) (*Condylorrhiza*).
- cephalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, U.S.A.
 p. 623 (♀) (1859) (*Botys*) (Venezuela). — (Texas),
 Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 721 Mexiko,
 (1898) (*Sylepta*). Guatemala,
 Costa Rica,
 Panama,
 Venezuela
- brumalis* Barnes & Mc Dunnough, Contr. Nat. Hist. Lep. N. Amer., 2 (6), p. 227, t. 1, f. 4 (1914) (Texas); Check List Lep. Bor. Amer., p. 130, nr. 4965 (1917). — Dyar, Insec. Insc. Menstr., 5, p. 71 (1917).
- obscuralis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 375, 472 (♂, ♀), t. 11, f. 9 (1863) (*Botys*) (N. U.S.A.
 Amerika). — Hampson, Proc. Zool. Soc. (Missouri,
 Lond., p. 722 (1898) (*Sylepta*). — Barnes Arizona,
 & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., Texas,
 p. 130, nr. 4963 (1917). — Forbes, Lep. Florida)
 N. York, p. 548 (1923).
- elevata** Fabricius, Ent. Syst., 3 (2), p. 216 (1794) U.S.A.
 (*Phalaena*). — Druce, Biol. Centr.-Amer. (Florida),
 Het., 2, p. 247 (1895) (*Astura*). — Hampson, Mexiko,
 Proc. Zool. Soc. Lond., p. 722 (1898). — Guatemala,
 Barnes & Mc Dunnough, Check List Lep. Costa Rica,
 Bor. Amer., p. 130, nr. 4966 (1917). Panama,
 Jamaica,
 Haiti,
- elevatis* Guenée, Delt. & Pyral., p. 319, t. 10, f. 3 (♂) (1854) (*Astura*) (Cayenne).

- Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 548 (1859) (*Astura*).
 Dominica,
 Fr. Guayana,
 Brasilien
 (Pará,
 Amazonas)
 (Typus: „S.
 Amerika“)
- var. *grandimacula* Dognin, Mém. Soc. Fr. Guayana
 Ent. Belg., 19, p. 175 (1912) (*Astura*).
- miamialis** Dyar, Insec. Insc. Menstr., 5, p. 71 U.S.A.
 (♂, ♀) (1917). (Florida)
- pimalis** Barnes & Benjamin, Insec. Insc. Menstr., 14, U.S.A.
 p. 7 (1926). (Arizona)

f) Neotropische Region.

- gordialis** Guenée, vide sub e) Nearktische Region.
anormalis Guenée, vide sub e) Nearktische Region.
- scopulalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 375 (♂) (1854) Brasilien
 (*Botys*) (Brasilien). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 713 (1898) (*Sylepta*). Peru
- ? *verecundalis* Berg, Bol. Acad. Nac. Cordova, 1, p. 177, nr. 15 (1874) (*Ceratoclasia*).
- birdalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 187 Venezuela
 (♀) (1920). (Aroa)
- patagialis** Zeller, vide sub c) Aethiopische Region.
- ceresalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 581 (♂) (1859) (*Botys*?) (St. Domingo). Bahama Ins.,
 Haiti,
 St. Domingo
- candacalis* Felder & Rogenhofer, Reise Novara Lep. (Het.), p. 4, t. 135, f. 43 (1874) (*Botys*?) (St. Domingo).
- excelsalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, 303 (♂) (1912). Costa Rica
 (Sixola,
 Juan Vinas,
 Guapiles),
 Panama
- mitanalis** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus., 65, art. 7, Peru
 p. 64 (♀) (1924). (Yahuar-
 mayo)
- secta** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 7, p. 1652 (♀) (1856) (*Agyrta*) (Amazonas). — Guatemala,
 Panama,
 Venezuela,
 Ecuador,
 Brasilien
 (Pará)
- dioptoides* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1377 (♀) (1865) (*Erilusa*)
 (Pará). — Butler, Ill. Typ. Spec. Het. Brit. Mus., 1, p. 62, t. 20, f. 2 (1877) (*Erilusa*).
 — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 225 (1895) (*Erilusa*).
- radialis* Felder & Rogenhofer, Reise Novara Lep., (Het.), p. 9, t. 136, f. 32 (♂) (1874) (*Erilusa*) (Amazonas).

- microdontalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 6 (1912). Venezuela, Fr. Guayana
- idmonalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 240, t. 62, f. 11 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 717 (1898). Mexiko
- expansalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 376, t. 11, f. ♀ 12 (1863) (*Botys*) (*Patria?*). Panama, — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 717 (1898). Brasilien
- orsonalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 240, t. 62, f. 14 (1895) (*Pantographa*) (Costa Rica, Panama).
- limata** Grote & Robinson, vide sub e) Nearktische Region.
- sillicalis** Guenée, vide sub e) Neotropische Region.
- cephalis** Walker, vide sub e) Neotropische Region.
- leucinalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 7 (♀) (1912). Peru
- scripturalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 373, t. 4, f. 11 (1854) (*Pionea*) Brasilien). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 388, t. 12, f. 12 (1863) (*Pantographa*). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 237 (1895) (*Pantographa*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 717 (1898). Mexiko, Panama, Ecuador, Brasilien (Pará)
- acoetesalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 1011 (♂) (1859) (*Pionea?*) (Bogotá). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 717 (1898) (*Sylepta*). Panama, Ecuador, Kolumbien
- cybelealis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 240, t. 62, f. 8 (1895) (*Pantographa*) (Panama).
- pellucida** Warren, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 269 (♂) (1889) (*Crocidocnemis*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 717 (1898). Brasilien (Amazonas)
- gorgonalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 240, t. 62, f. 13 (♀) (1895) (*Pantographa*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 717 (1898). Mexiko
- reginalis** Cramer, Pap. Exot., 4, p. 163, t. 372, f. C (1782) (*Phalaena Pyralis*). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 233 (1895) (*Lypotigris*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 718 (1898). Mexiko, Guatemala, Honduras, Panama, Fr. u. Holl. Guayana, Haiti
- holophacalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 9 (♂) (1912). Paraguay
- grisealis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) 1, p. 261 (♂) (1918). Peru
- glaucalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 12 (1912). Venezuela, Paraguay
- imbroglialis** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 273 (♀) (1914). Panama, Fr. u. Holl. Guayana, Venezuela

- syleptalis** Strand, Arch. f. Naturg., 85 A 12, p. 147 Ecuador
(1920) (*Agathodes*).
- viridivertex** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, Venezuela
p. 210 (♂) (1920). (Aroa)
- mnemusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, Panama,
p. 593 (♂) (1859) (*Botys*) (Amazonas). — Venezuela,
Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 239 Br. u. Fr.
(1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., Guayana,
p. 720 (1898). Brasilien
(Amazonas)
- sanguiflualis** Lederer, Wien. Ent. Mo-
natschr., 7, p. 374, 470, t. 11, f. 1' (1863)
(*Botys*) (Venezuela).
- caudalis** Felder & Rogenhofer, Reise No-
vara Lep. (Het.), p. 4, t. 135, f. 45 (♂)
(1874) (*Botys*) (Fr. Guayana).
- hemipolialis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) Kolumbien
1, p. 267 (♀) (1918).
- philetalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, Brasilien
p. 621 (♂) (1859) (*Botys*) (Santarem). — (Amazonas,
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 720 Pará)
(1898) (*Sylepta*).
- palmaris** Felder & Rogenhofer, Reise No-
vara Lep. (Het.), p. 4, t. 135, f. 33 (♀)
(1874) (*Botys*) (Amazonas).
- laticalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 375, Panama,
472, t. 11, f. 4 (♂) (1863) (*Botys*) (Vene- Kolumbien,
zuela). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., Venezuela
p. 720 (1898) (*Sylepta*).
- glaucoxia** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Mexico,
10, p. 12 (1912). Guatemala,
cephalis Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, Panama
p. 242 (1895) (part.) (*Sathria*), nec Walker
(1859).
- albicostalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. Guatemala
210 (♂) (1920). (Volcan de
S. Maria)
- diacymalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) Mexiko,
10, p. 12 (1912). Guatemala,
butyrota Druce, nec Butler (1878), Biol. Costarica,
Centr.-Amer. Het., 2, p. 212 (1895) (*Epicor- Panama*
sia) (part.).
- albipunctalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) Ecuador,
1, p. 267 (♂) (1918). Bolivien
- aibicupralis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 9) Peru
1, p. 268 (1918).
- angulifera** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 222, Guatemala,
t. 61, f. 4 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Südamerika
Soc. Lond., p. 721 (1898).
- striginervalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 342, t. 10, Brasilien
f. 5 (♀) (1854) (*Botys*). — Hampson, Proc.
Zool. Soc. Lond., p. 721 (1898).
- phaeophlebalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Peru
(s. 8) 10, p. 13 (♂) (1912).
- neofulviceps** Klima (nom. nov.).
- fulviceps** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., Kolumbien
(s. 9) 1, p. 268 (1918), nec Bethune-Baker
(1908).

- belialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 602 (♀) (1859) (*Botys*) (Villa Nova). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 721 (1898) (S. Amerika).
molliculalis Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1398 (♀) (1865) (*Botys*) (Honduras).
- brunnescens** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 13 (♀) (1912).
terricola Druce, nec Möschler (1881), Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 269 (1895) (part.) (*Hedylepta*).
- mysticalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 211 (♀) (1920).
 Brasilien (Rio de Janeiro)
- derogata** Fabricius, vide sub a) Paläarktische Region.
- prorogata** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 14 (1912).
 noxa: Bondar, Correio Agric. (Bahia), 2 (9), p. 260—265 (1924). — De Azevedo, Correio Agric. (Bahia), 3 (9/10), p. 249—252, 270—274 (1925).
 Surinam, Br. Guayana, Brasilien (Pará)
- amando** Cramer, Pap. Exot., 3, p. 92, t. 247, f. E (1782) (*Phalaena Nectua*) (Coromandel, Surinam). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 722 (1898).
amandalis Hübner, Verz. bek. Schmett., p. 356 [1825].
amplalis Guenée, Delt. & Pyral., p. 330, t. 10, f. 4 (1854) (*Botys*) (Cayenne, Surinam).
 Panama, Venezuela, Trinidad, Fr. u. Holl. Guayana, Brasilien (Amazonas)
- strigicincta** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 15 (♀) (1912). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 273 (1914) (= *dialis* Schaus ♀).
 Panama, Ecuador
- hecalialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 573 (♂) (1859) (*Botys*) (St. Domingo). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 722 (1898).
 St. Domingo
- stictigramma** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 16 (1912). — Barnes & McDunnough, Check List Lep. Bor. Amer., p. 130, nr. 4968 (1917) (*Lygropia*).
 Bahama Ins. (Nasamu), Cuba
- orthogramma** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 16 (♂) (1912).
 Cuba
- citrinalis** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 224, t. 61, f. 18 (♀) (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 722 (1898).
 Mexiko
- aechmisalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 982 (♀) (1859) (*Botys*). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 722 (1898) (*Sylepta*).
 Mexiko
- elevata** Fabricius, vide sub e) Nearktische Region.
- iopasalis** Walker, vide sub b) Orientalische Region.
- prumnides** Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 212, t. 60, f. 28 (♀) (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 723 (1898).
 Mexiko

- pactolalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 346 (1854) (*Botys*) (Guadeloupe). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 246 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 723 (1898). Costarica, Panama, Guadeloupe, Brasilien
- quirinalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 609 (♀) (1859) (*Botys*) (Rio de Janeiro). (Rio de Janeiro), Venezuela
- matutinalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 195 (1854) (*Samea*) (Cayenne). — Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 376, t. 11, f. 14 (1863) (*Botys*) (Brasilien). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 723 (1898). — Strand, Arch. Naturg., 85, A 12, p. 150 (1920). Costarica, Panama, Jamaika, St. Vincent, Trinidad, Fr. Guayana,
- odiusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 627 (♀) (1859) (*Botys*) (Brasilien). Ecuador, Brasilien (Amazonas)
- methyalinalis** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 17 (♂) (1912). Br. Guayana
- internitalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 375 (♀) (1854) (*Asciodes*) (Haiti). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 241 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 723 (1898). Mexiko, Cuba, Dominica, Guatemala
- stercoralis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 411, t. 15, f. 4 (1863) (*Sathria*) (Cuba).
- serenalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1309 (1865) (*Megaephyssa?*) (St. Domingo).
- simialis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 735 (♂) (1859) (*Botys*) (Patria?). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 723 (1898) (*Sylepta*). Jamaika, Dominica
- disparalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, p. 1227 (♂) (1865) (*Pyralis*) (Jamaika).
- onophasalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 735 (♂) (1859) (*Botys*) (Patria?). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 723 (1898) (*Sylepta*). West-Indien, Bahama Ins.
- thisoalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 737 (♂) (1859) (*Botys*) (Patria?).
- gryllusalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 19, p. 915 (♂) (1859) (*Pyralis*) (Patria?).
- elathealis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 18, p. 615 (♂) (1859) (*Botys*) (Amazonas). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 723 (1898) (*Sylepta*). Brasilien (Amazonas)
- neglectalis** Lederer, Wien. Ent. Monatschr., 7, p. 381 (1863) (*Lygropia*).
- amissalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 351 (♂) (1854) (*Botys*) (Brasilien). — Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 242 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 723 (1898). Mexiko, Guatemala, Costarica, Panama, Brasilien

- purpuralis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, Kolumbien
p. 1398 (♀) (1865) (*Botys*) (Bogotá). —
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 723
(1898) (*Sylepta*).
- diophtalis** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, Guatemala,
p. 1376 (♀) (1865) (*Erilusa*) (Ega). — Panama,
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 725 Brasilien
(1898) (*Sylepta*). (Ega)
- secta** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus.,
31, p. 313 (♂) (1864) (*Halesidota*) (Limas,
Honduras), praecoc.
- pseudauzo** Felder & Rogenhofer, Reise No-
vara, Lep. (Het.), p. 9, t. 136, f. 30 (♂) (1874).
(*Erilusa*) (Amazonas). — Hampson, Proc.
Zool. Soc. London, p. 717, n. 35, p. 725 n. 120
(1898) (ex synonym.).
- minimalis** Felder & Rogenhofer, Reise No-
vara, Lep. (Het.), p. 9, t. 136, f. 33 (♂)
(1874) (*Erilusa*) (Guatemala).
- coelivitta** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, Mexiko,
p. 1377 (♂) (1865) (*Erilusa*) (Pará). — Panama,
Druce, Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 226, Brasilien
t. 61, f. 19 (1895). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 725 (1898). (Pará)
- nitealis** Felder & Rogenhofer, Reise No-
vara, Lep. (Het.), p. 9, t. 136, f. 35 (♂)
(1874) (*Erilusa*) (Amazonas).
- rosalina** Strand, Arch. f. Naturg., 85, A 12, p. 148 Peru
(1920) (*Erilusa*).
- cyanea** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 34, Brasilien
p. 1376 (♂) (1865) (*Erilusa*) (Ega). —
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 725
(1898) (*Sylepta*).

Species incertae sedis.

- albifurcalis** Dognin, Mém. Soc. Ent. Belg., 22, p. Kolumbien
53 (1913).
- anchuralis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. Guatemala
209 (♂) (1920). (Cayuga)
- crocealis** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 50, p. 185 Ecuador
(♂) (1906). (Loja)
- dialis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, p. Costarica
302 (♂) (1912). (Sixola)
- dianalis** Möschler, Verh. z. b. Ges. Wien, 32, p. Surinam
358, t. 18, f. 44 (1882) (*Erilusa*). — Hamp-
son, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 725 (1898).
- escuintalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. Guatemala
187 (1920).
- falsalis** Schaus, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 9, Costarica
p. 303 (♂) (1912). (Juan
Vinas)
- flavipennis** Kaye, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 155, Trinidad
t. 5, f. 7 (1901). — Strand, Arch. f. Na-
turg., 85, A 12, p. 149 (1920).

- glaucopidalis** Guenée, Delt. & Pyral., p. 207 (♂), Bolivien
t. 8, f. 7 (1854) (*Hyalea*) (Patria?). —
Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 642
(1898) (*Hyalea*). — Meyrick, Exot. Micro-
lep., 5, p. 11 (1936) (*Sylepta*).
boliviensis Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg.,
49, p. 68 (1905) (*Hyalea*) (Bolivien).
illustralis Dognin, Mém. Soc. Ent. Belg., 22, p. 53 Kolumbien,
(♂) (1913). Peru
(Typus Chan-
chamayo)
- isozona** Meyrick, Arb. morph. taxon. Ent. Berlin- Bolivien
Dahlem, 3 (2), p. 100 (♀) (1936). (Songo)
- nebulalis** Schaus, Proc. Ent. Soc. Wash., 22, p. 211 Peru
(♂) (1920).
- nigralis** Kaye, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 424, t. 45, Trinidad
f. 17 (1924). (Verdant
Vale)
- nigripunctalis** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 54, Fr. Guayana
p. 120 (♀) (1910) (*Astura*).
sceletogramma Dyar, Insec. Insc. Menstr., 13, p. Mexiko
10 (1925).
- kayel** Klima (nom. nov.).
seminigralis Kaye (nec Warren (1896)), Trinidad
Trans. Ent. Soc. Lond. (1924), p. 424, t. (Palmiste)
45, f. 18 (1925).
- titubalis** Möschler, Abh. Senckenb. Ges., 16, p. Portorico
303, f. 6 (♀) (1890) (*Asciodes*). — Hampson,
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 725 (1898).
292

90. Genus **Syngropia** Hampson

- Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, p. 18 (1912).
(Typus generis: *S. stictica* Hpn.).
- stictica** Hampson, Ann. Mag. Nat. Hist., (s. 8) 10, Guatemala
p. 18 (1912).
aechmisalis Druce, nec Walker (1859),
Biol. Centr.-Amer. Het., 2, p. 248 (1895)
(*Notarcha*).

1

91. Genus **Endographis** Meyrick

- Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 464 (1894). — Hampson, Proc.
Zool. Soc. Lond., p. 595, 725 (1898).
(Typus generis: *E. acrochlora* Meyr.)

- acrochlora** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 465 Pulo Laut,
(1894). — Hampson, Proc. Zool. Soc. Lond., Malakka
p. 726, f. 71 (♂) (1898).

1

- Pars 36: H. Neustetter, Heliconiidae. 1929. 136 p.
38, 40, 41, 44: H. Stichel, Riodinidae 1930—1931. 795 p.
42: F. Bryk, Dioptidae. 1930. 65 p.
43, 46, 48: M. Gaede, Satyridae. 1931. 759 p.
45: F. Bryk, Pericopinae. 1931. 57 p.
47, 64, 69, 74: H. H. Shepard, Hesperidae: Pyrginae. 1931—36.
679 p.
49: M. Gaede, Drepanidae. 1931. 60 p.
50: M. Gaede, Mimallonidae. 1931. 21 p.
51: H. Stichel, Brassolidae. 1932. 115 p.
52: M. Gaede, Aganidae. 1932. 39 p.
53, 60, 66: G. Talbot, Pieridae. 1932—1935. 697 p.
54: H. Stichel, Amathusiidae [incl. Discophoridae et Hyantidae]. 1933. 171 p.
55, 56, 58, 65: H. Schüssler, Saturniidae. 1933—1934. 769 p.
57: H. H. Shepard, Hesperidae: Ismeninae. 1933. 55 p.
59: M. Gaede, Notodontidae. 1934. 351 p.
61, 63, 68: L. B. Prout, Geometridae: Sterrhinae. 1934—1935.
486 p.
62: F. Bryk, Lymantriidae. 1934. 441 p.
67: A. Busck, Stenomidae. 1935. 73 p.
70: H. Schüssler, Syssphingidae. 1936. 230 p.
72: J. Draeseke, Lycaenidae I. 1936. 48 p.
73: W. A. Collier, Lasiocampidae. 1936. 484 p.
75: H. Schüssler, Oxytenidae. 1936. 20 p.
76: H. Schüssler, Cercophanidae. 1936. 12 p.
77: H. H. Shepard, Hesperidae: Euschemoninae, Trapezitinae. 1936. 35 p.
78, 80: F. Bryk, Danaidae. 1937. 702 p.
79: M. Gaede, Gelechiidae. 1937. 630 p.
81: M. Hering, Ratardidae. 1937. 3 p. — F. Bryk Cossidae II: Argyrotypinae et Eulophonotinae. 1937. 4 p.
82: F. Bryk, Arctiidae: Callimorphinae, Nyctemerinae. 1937. 126 p.
83, 90: H. H. Shepard, Hesperidae: Hesperinae I—II. 1937—1938. 206 p.
84: A. Klima, Pyralidae: Scopariinae, Nymphulinae. 1937. 226 p.
86: H. Stichel †, Nymphalidae I. 1938. 374 p.
88: M. Gaede, Oecophoridae I. 1938. 208 p.

Im Druck:

- 85: H. Schüssler, Eupterotidae.
87: H. Schüssler, Epicopeiidae.
91: H. Stichel †, Nymphalidae II.
92: M. Gaede, Oecophoridae II.
93: H. Stichel †, Nymphalidae III.
94: A. Klima, Pyralidae: Pyraustinae II.
95: H. H. Shepard, Hesperidae: Hesperinae III.

In Vorbereitung:

F. Bryk, Noctuidae, Arctiidae: Microarctiinae.

W. A. Collier, Geometridae (partes ultimae.)

J. Draeseke, Lycaenidae [Continuatio].

M. Gaede , Incurvariidae	Opostegidae	Elachistidae
Tischeriidae	Tineidae	Cosmopterygidae
Heliozelidae	Oleophoridae	Lyoniidae
Nepticulidae	Momphidae	Cemiostomidae.

A. Klima, Pyralididae: Pyraustinae [Continuatio], Phycitinae, Anerastiinae, Schoenobiinae, Macropiratiniae, Crambinae, Galleriinae, Macrothecinae.

H. Schüssler, Thaumetopoeidae, Bombycidae, Endromididae, Morphidae.

H. H. Shepard, Hesperidae [Continuatio].

† **H. Stichel**, Nymphalidae [Continuatio].

H. Zerny, Pyralididae: Subfam. Pyralidinae, Endotrichinae, Chrysauginae, Pococerinae.

M. HERING: *Nunmehr vollständig!*

Die Blaffminen

Mittel- und Nord-Europas einschl. Englands.

Bestimmungs-Tabellen der von Insekten-Larven aller Ordnungen erzeugten Minen

XII und 631 Seiten mit 7 Tafeln und 500 Text-Abbildungen.

Geheftet Reichsmark 66.—,

in Halbleder-Band gebunden Reichsmark 71.—.

Durch dieses erste Minen-Bestimmungswerk ist den angewandten Entomologen und Phytopathologen ein für den täglichen Gebrauch wichtiger Handapparat geschaffen. — Prof. Dr. Wolff-Eberswalde: „Wir Zoologen schätzen das Werk als wichtigste und willkommenste Neuerscheinung der letzten Jahrzehnte. Es ist die glänzendste Leistung auf dem Gebiete der modernen zoologischen Phytopathologie.“

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt.