+ AG811

W. G. FARLOW.

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
BHL-SIL-FEDLINK

The Property of
W. G. FARLOW.

ICONOGRAPHIA PHYCOLOGICA

SEU

PHYCEARUM

NOVARUM ET RARIORUM

ICONES ATQUE DESCRIPTIONES.

AUCTORE

Johann (JOHN) ERHARD ARESCHOUTE.

PHIL. DR., REG. SOC. BOT. RATISBONN., NAT. SCRUTATOR. HALENS., ETC. MEMBRO.

DECAS PRIMA.

GOETHEBURGI.

SUMTIBUS N. J. GUMPERT.

HOLMIÆ apud BAGGE et BONNIER.

CHRISTIANIÆ apud DAHL.

LONDINI apud BROWN, GREEN et LONGMAN.

HAUNIÆ apud GYLDENDAL.

LIPSIAE apud BROCKHAUS et AVENARIUS.

PARISIIS apud BROCKHAUS et AVENARIUS.

Cum nulla fere rei herbariæ pars, quam Phycologia, diligentius a botanicis excoli atque celebrari videatur, mirari soleo, L. B., cur nemo, Kützingio excepto, species novissime detectas l. minus cognitæ figuris descriptionibusque in uno opere illustrare sibi proposuerit. Opus Turneri quanti omnibus fere temporibus sit momenti atque auctoritatis, neminem fugit. At post editum illud opus innumeræ detectæ sunt Phycearum species atque descriptæ, e maribus extra Europam sitis præsertim allatæ, quarum figuras atque descriptiones pro viribus edere diu in animo volvi. Vix tamen ejusdem generis quidquam suscipere ausus fuisssem, nisi ab amicis littora remotissima visitantibus mihi adportata fuisset cum novarum Phycearum, tum minus cognitarum, magna copia; a quibus fautoribus cum et in posterum plura sperare liceat, hoc opus edere constitui, sperans fore ut, quod desit facultati, id resolvat voluntas.

Species quidem novas l. rariores continebit opus, præcipue vero a me primum limitatas in sequentibus decadibus recipere conabor. Omnes tabulæ a me ipso delineantur; delineandi facultas certe tenuis, nullus vero sum artifex, qui cum artificibus contendere velim; "vilis Algæ" solummodo dare volo imaginem, quæ si Phycologo non displicuerit, valde lætabor. Meliora dabit longior excercitatio.

Quæ creta in lapide pinguntur tabulæ, in iis nullæ fructificationis atque structuræ exhibentur analyses, quæ, quo meliores fiant, in sequente quadam lapidi insculpta tabula proponentur.

Dabam Gothoburgi, die xv Juli MDCCCXLVII.

John Erh. Areschoug.

DECAS TABULARUM PRIMA.

I. *Fucus chondrophyllus* Brown.

Thallo complanato ecostato coriaceo margine integerrimo regulariter dichotomo sursum attenuato, apicibus sporocarpia gerentibus tumescentibus, extimis furcatis l. emarginatis.

Fucus chondrophyllus Brown Mscr. — Turn. Hist. Fucor. tom. IV p. 63 t. 222.

Sphaerococcus chondrophyllus Ag. Sp. Alg. vol. I. p. 251. — Syst. p. 217.

Hab. "apud Portum Dalrymple, in Novæ Hollandiæ" (insulæ van Diemen) oris. *D. Brown.* Turn. l. c. — Mea specimina ad ostium Portus Phillip Novæ Hollandiæ meridionalis, mense *Junio* lecta.

Callus radicalis neque *Turnero*, nec mihi visus. Thallus pedalis, madefactus colore nigro-olivaceo, exsiccatus plus minus nigrescens, immo nigerrimus, ecostatus, complanatus, margine integerrimus, coriaceus, semilineam vix crassus, inferne 3—5 lineas latus, sursum vero sensim ita attenuatus, ut in speciminibus majoribus basi que latissimis apices steriles semilineam l. lineam latitudine vix superent, inferne ad 8—6, superne ad 4—3 linearum spatium regulariter et repetite dichotomus, dichotomiis plus minus rotundatis l. acutis; apices fructiferi tumescentes, sterilibus paululum latiores. Sporocarpia extus tuberculiformia, ascos pauciores nec non fila paraphysioidea simplicia, cellulis diametro 3—4-plo longioribus constituta, includentia.

Specimina *Turneri* quamquam non vidi, tamen ab eo data figura *Fuci chondrophylli* atque descriptio cum nostris speciminibus, in quibus etiam sæpe thallus, ut apud *Turnerum*, "ipsam juxta basin interdum ligulis aliquot homogeneis, novarum frondium, ut videtur, rudimentis, vage obsitus," quod in multis *Fucis* observatur non raro, tam bene conveniunt, ut de utriusque plantæ identitate nulla plane subesse possit dubitatio. Hic primum descripta fructificatio nostram plantam verum esse *Fucum* clare ostendit.

Fig. 1. *Fucus chondrophyllus*; f. 2. sectio transversalis apicis fructiferi atque sporocarpii, microscopio aucta.

II. *Phyllophora crenulata* J. Ag.

Thallo stipitato, stipite filiformi expanso in laminam ecostatam subpalmato-fissam l. cuneatam e margine discove proliferationes elongatas simplices l. fissas denticulatas protrudentem, denticulis subbicuspidatis.

Phyllophora crenulata J. Ag. in Linnæa 1841 p. 48.

Hab. "in mari Brasiliæ: J. Ag. l. c. Mea specimina ad Pernambuco mensibus Decembr. atque Mart. lecta.

Callus radicalis mihi nondum visus, sine dubitatione parvus, discoideus. Thallus 8-pollicaris l. infra, coloris rubri, interdum flavescentis l. virescentis, superne papyraceo-membranaceus, margine denticulatus, denticulis subbicuspidatis, stipitatus; stipes simplex l. ramosus, 3—5 lineas altus, mox in laminam l. palmato-fissam, segmentis elongatis, l. cuneatam, proliferationes elongatas simplices l. fissas, immo subdichotomas, e margine l. ora protrudentem expansus. — Neque sporocarpia neque tetragonidia in meis speciminibus adsunt, unde cui generi sit adnumeranda nescio.

Fig. 4—2. *Phyllophora crenulata*; f. 3. sectio transversalis laminæ.

III. *Haliseris dichotoma* v. Suhr.

Stipite compresso longiori repetite dichotomo, laminis membranaceis evenosis sublingulatis simplicibus l. bipartitis margine integerrimis, sporocarpis....

Haliseris dichotoma von Suhr in Reg. bot. Zeitung 1840, erster Band. p. 259.

Hab. "ad Caput bonæ spei: Drege. v. Suhr. l. c.

Callus radicalis stuposus. Thallus 14 circiter pollices longus. Stipes 9-pollicaris lineamque latus, compressus, ubique fere ejusdem latitudinis, ad unumquodque duarum unciarum spatium repetite et regulariter dichotomus, denique laminas longitudine 5-pollicares, $\frac{3}{4}$ unciam latas margine integerrimas membranaceas lineari-lingulatas apiceque rotundatas simplices l. bipartitas costa percurrens; costa in laminarum apicibus sæpe bipartitur, unde earum divisio in hac specie eadem ac in reliquis. Neque sporocarpia in hac specie vidi neque hologonidia. Soredia tamen adsunt, licet quam in aliis speciebus rariora atque minora. Structura a ceteris, præsestim *H. ligulata*, tam parum recedit, ut ejus analysin dare mihi visum sit inutile.

Fig. unica: *Haliseris dichotoma* v. Suhr, secundum specimen originale in Ejus herbario asservatum.

IV. *Haliseris Justii* (Lamour.).

Stipite tereti breviori dichotomo, laminis subcoriaceis evenosis oblongis simplicibus l. bipartitis margine integerrimis, sporocarpis in disco laminarum.

Dictyopteris Justii Lamour. extr. Journ. Philom. p. 18. t. 6. f. A. (sec. Ag. Spec.)

Haliseris Justii Ag. Spec. vol. 4. pag. 442. Syst. p. 262.

Hab. "in Antillis" sec. Ag. Spec. — Mea specimina in mari Brasiliæ prope Pernambuco, ubi frequenter ejicitur in litus, lecta sunt mensibus Jun. et Jul.

Callus radicalis stuposus. Thallus longitudine usque 14-pollicaris; stipes teres, vix subcompressus, 3—4-pollicaris, modo simplex, modo semel l. bis dichotomus, dein in laminas usque 9 pollices longas duosque latas subcoriaceas margineque integerrimas oblongas apiceque rotundatas sim-

plices l. bipartitas costa percurrentes; costa divisa, bipartitur, ut in ceteris, lamina. Sporocarpia in disco laminarum, quæ, cum fructu non sunt ornata, sorediis adspersuntur.

Obs. Iam alio loco (Phycar. Scand. Enumeratio) sporarum atque hologonidiorum (granulorum sparsorum apud Auctores) differentiam proponere sum conatus. Utraque multiplicationis organa in genere *Haliseridis* adsunt, et utrorumque evolutio fere eadem, i. e. utraque e cellulis strati corticalis transmutatis oriuntur. Sporæ cellulis maternis (i. e. cellulis strati corticalis in ascos mutatis) inclusæ, strato thalli intermedio impositæ (neque ut in Kütz. Phyc. gen. t. 23 f. 3, de Halys. polypodioid., strato corticali quasi heterogeneum quidquam innatæ), extra stratum corticale valde exsertæ sunt (ut in tab. nostra V. f. 4). Hologonia vero, semper sparsa, non exseruntur, sed intra thallum recondita manent (cfr tab. nostra VI f. 3, tab. IX f. 4). Eodem modo soredia illa, filis cellularibus arcte stipatis composita (cfr Kütz. l. c. t. 23 f. 9, tab. nostra IV f. 5) metamorphosi quadam strati corticalis exorta, intermedio imposita sunt (neque corticali, ut perperam apud *Kützing*. l. c.)

Fig. 1. *Haliseris Justii*, sorediis adpersa; f. 2 ejusdem lamina, sporocarpis ornata; f. 3 sporocarpium pars, microscopio aucta; f. 4 sectio transversalis sporocarpium, microscopio aucta; f. 5 soredium auctum; f. 6 sectio transversalis laminæ crassioris, minus aucta.

V. *Haliseris macrocarpa* Aresch.

Stipite tereti, lamina membranacea evenosa lineari dichotoma margine integerrima, sporocarpis subellipticis secus costam ordinatis.

Hab. in litus prope Port Natal Africae australis parcius ejecta, mens. *Augusto* lecta.

Callus radicalis stuposus. Thallus foliaceus usque 14 pollices longus, semiunciam, raro supra, latitudine æquans, membranaceus, coloris sordide flavescenti-olivacei, dichotomus. Sporocarpia elliptica, utrinque secus costam subregulariter per totam laminæ longitudinem coordinata. — Forma, quam f. 2 ostendit, videtur mihi specimen detersum prolificans. — Ceterum specimina, quæ possideo, quamquam valde læsa, tamen ad speciem perpulchram limitandam certe sufficiunt.

Fig. 1. *Haliseris macrocarpa*; f. 2 ejusdem specimen detersum; f. 3 pars sporocarpium, microscopio aucta; f. 4 sectio transversalis sporocarpium, microscopio quam f. 3 minus aucta.

VI. *Haliseris ligulata* v. Suhr.

a. Thallo primario tereti cauliformi, laminis imbricatis membranaceis evenosis oblongis utrinque attenuatis simplicibus l. fissis margine integerrimis, sporocarpis....

Haliseris ligulata von Suhr in Reg. bot. Zeit. 1834 zweiter Band t. II f. 21.

b. Costa laminas evenosas membranaceas oblongas utrinque attenuatas simplices l. fissas margine integerrimas maculatas protrudente.

Hab. a. in Algoa Bai Africae australis, ubi a *Drege* lecta est, sec. Cel. v. *Suhr*; b. in Tafel Bay Cap. b. spei, sec. Cel. v. *Suhr*, qui utriusque formæ specimina depingenda tradidit.

Plenior harum formarum descriptio, cum nulla descriptis meliora adsint specimina, vix mihi videtur necessaria. Forma *a*. laminis hologonidiis ubique, extima ora excepta, unde marginatæ apparent, adpersis certe valde insignis. In laminis formæ *b*. maculæ coloris obscurioris ubique sparsæ, quæ maculæ eo oriuntur modo, quod novum cellularum corticalium stratum supra normale formatur, formatio quædam formationi solediorum analoga (cfr. f. 3). — Utraque ceterum forma valde mihi dubia, forsân specimina prolificantia atque hologonidifera *H. macrocarpæ*, cum qua colore convenit, l. aliis cujusdam.

Fig. 1 forma *a*; f. 2 pars laminæ hologonidifæræ, microscopio aucta; f. 3 ejusdem sectio transversalis, microscop. aucta; f. 4 forma *b*; f. 5 pars ejus laminæ maculifæræ, microscopio parum aucta.

VII. *Haliseris serrata* Aresch.

Stipite tereti, lamina venosa membranacea sublineari dichotoma margine remote serrata, sporocarpis....

Hab. in litus prope Port Natal rarius ejecta, lecta mense *Augusto*.

Callus radicalis magnus, stuposus. Thallus stipitatus circiter 12-uncialis, stipite 1—2 unciali mox laminam costa percurrens; lamina ad unumquodque duarum l. trium linearum spatium repetite dichotoma, superne latitudine increescens, l. l. 1 ½ unciam circiter lata, margine remote serrata, venosa, venis alternantibus 1 ½ lineam distantibus, angulo acuto exeuntibus, solediiis perspicuis adpersa, apicibus lingulato-acuminatis.

Fig. 1 *Haliseris serrata*; f. 2 eadem, callo radicali majori; f. 3 pars laminæ, microscopio aucta; f. 4 sectio transversalis laminæ, microscopio minus aucta; f. 5 soledium, filis dejectis, i. e. alveolus, in quo adfuerunt illa soledii fila.

VIII. *Haliseris Plagiogramma* Mont.

Stipite capillari-filiformi tereti, lamina venosa membranacea sublineari subdichotoma margine integerrima, sporocarpis....

Haliseris Plagiogramma Mont. Flor. cub. p. 63 t. 3 f. 3 (sec. Endlicher).

Hab. ad Antillas sec. *Montagne*; ad insulas Sandwichenses sec. specimina a Cel. *Binder* benevole communicata; in litus prope Bahian Brasilie non infrequenter ejicitur; mea specimina ibidem lecta mens. *Jul*.

Callus radicalis minimus, stuposus. Thallus longitudine 5—6-pollicaris, stipitatus, stipite filiformi quam filum sutorium parum crassiori, semel l. bis dichotomo l. ramoso, laminam costa percurrente; lamina lineam l. duas latitudine æquans, subregulariter dichotoma, margine integerrima, venosa, venis suboppositis, secus costam utrinque hologonidiis adpersa.

Fig. 1 *Haliseris Plagiogramma*; f. 2 pars laminæ hologonidiis adpersæ, microscopio aucta.

IX. *Dictyota Schröderi* (Mert.).

Callo radicali stuposo, thallo subdichotomo-fisso, segmentis basi attenuatis linearibus laxè dentatis simplicibus l. denuo fissis, sporocarpis

Ulva Schröderi Mert. in lit. (sec. Ag. Syst.)

Zonaria Schröderi Ag. Syst. p. 265.

Dictyota Schröderi Grev. Alg. Brit. Syn.

Hab. in mari atlantico ad litora americana, inter capricornum atque cancerem, v. c. ad Bahiam! Pernambuco! insulas Antillarum, prope Vera Cruz etc frequenter. Mea specimina e Pernambuco, mensibus *Decembr.* et *Januar.* lecta.

Callus radicalis stuposus. Thallus coloris virescenti-olivacei, longitudine usque 10—12-pollicaris, basi (cfr. f. 2) plus minus regulariter dichotomus, segmentis elongatis, uncia vix latioribus, plerumque grosse dentatis, dentibus plus minus distantibus. Sporocarpia a me nunquam visa, sed hologonia frequenter per thallum sparsa. Proxima certe est *Dictyota Solierii*, cui accedit strato intermedio duobus l. pluribus cellularum stratis confecto, at differt segmentis magis elongatis atque angustioribus.

Fig. 1 *Dictyota Schröderi*; f. 2 eadem, pars thalli inferioris alius speciminis; f. 3 stratum corticale thalli, in quo hologonia; f. 4 sectio transversalis thalli, in quo hologonium; f. 5 stratum corticale thalli, in quo soredium; f. 6 sectio transversalis thalli inferioris. — Omnes figuræ 3—6 microscopio auctæ.

X. *Macrocystis Diübenii* Aresch.

Vesiculis longe petiolatis elongatis lineari-subclavatis, laminis subplanis petiolatis, petiolo vesicula triplo angustiori.

Hab. ad ostium Port Phillip Novæ Hollandiæ meridionalis, mens. *Junio* lecta.

Callus radicalis ut in ceteris hujus generis speciebus. Thallus primarius ("caulis") in iis, quæ vidi, speciminibus, usque 8 orgyis longus, teres, at, ubi vesicularum petioli atque laminarum exeunt compressus. Vesiculæ ipsæ 5 ½ l. 6 uncias longæ et, ubi latissimæ, 4—5 lineas diametro æquantes, petiolo tereti et 2 uncias circiter longo suffutæ, elongatæ, lineari-subclavatæ, rectæ l. plerumque leviter arcuatæ l. flexæ. Laminæ e basi plus minus rotundata l. acuta in petiolum 4 ½ pollicarem l. rarius 2-pollicarem planum, 4 l. 4 ½ lineam latum attenuatæ, 3 l. 4 pedes longæ, 1 ½ uncia parum latiores, semper (in meis speciminibus) planæ, margine dentatæ, coloris sordide flavescentis. Hoc in medio thallo primario et versus basin; in apice ejusdem vesiculæ atque laminæ, ut par est, magnitudine decrescunt, et hæ magis rugoso-plicatæ evadunt.

Obs. Species *Macrocystidis*, quæ apud auctores descriptæ sunt, tam esse affines, ut omnes unam speciem habeant multi, quamquam perbene scio, tamen, cum omnes specificè conjungere non

liceat, supra descriptam plantam speciem diversam proponere cogor. Differt præcipue forma vesicularum, laminis angustis etc, nec ulli earum, quæ jam descriptæ sunt, specierum videtur affinior quam *M. latifoliæ*, a qua tamen in multis differt. — Denique liceat mihi concedere, species hujus generis descriptas maxime quidem esse affines, sed unamquamque speciem in sua patria omnes suos characteres servare videri; ita ex. gr. e *Capite bonæ spei* accepi singulis annis lecta singula *Macrocystidis pyriferae* specimina, quoad notas inter se semper simillima. — Aliam speciem, forsân verum *Fuc. pyrifera* Linnæi, ex insula S. Paul, in sequente decade, si voluerit Deus, describam.

Dixi speciem in memoriam Lib. Bar. *M. W. von Düben*, amici dilectissimi, nimis præmatura morte scientiis erepti.

Fig. *dextra*: *M. Dübenii*, pars thalli medii; f. *sinistra superior*: apex thalli; f. *sinistra inferior*: pars inferior thalli, cum nonnullis fibris calli radicalis.

W. H. C. del.

Fucus chondrophyllus Brown

W. H. C. sculp.

Halimolobos dichotoma L.

Halimolobos fusca (Linn.)

Thalassia macrocarpa . Trsch.

Halimolobos serrata. Presch.

Halysia, Hagiogramma, Hal

Dictyota Schröderi (Nert.)

Macrocyclus Dübeneri Aesch.

6. 1. 1860

Præsens opus si a cultoribus rei Phycologicæ benigno animo acceptum fuerit, decas ejus
secunda, cujus tabulæ jam delineatæ sunt, mox in publicum emittetur. In hac decade nonnullæ
adsunt tabulæ nigræ impressæ, quod ex eo pendet, quod primum totam editionem tabulis nigris
ornare consilium fuit; quo mutato omnes in posterum coloribus erunt imprimendæ.

Bibliopola *N. J. Gumpert*, Gothoburgi, opus suis sumtibus edit, a quo venditur

Decas, cum 10 tabulis colore impressis, 6 fr.

Exemplaria cum tabulis coloratis, duplicis circiter pretii, non nisi mandatu accepto mittuntur