D. D.

EXAMEN

CLASSIS MONOECIAE

CUJUS PARTEM PRIMAM

VENIA EXP. FACULT. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

C. P. THUNBERG

COMMENDATORE REG. ORD. DE WASA

MED. DOCT. PROF. MED. ET BOT. REG. ET ORD. REG. COLL. SANIT. MEMB.
HON. ACAD. CÆSAR. PETROPOL. ET NAT. CURIOS. REG. SCIENT. UPS. LOND.
HOLM. AGRIC. MED. ET EVANG. SOCIET. OECON. UPSAL. PATR. HOLM. ET.
CIV. OECON. FINL. HONOR. WERMEL. JUNEC. WESTM. CALM. ET ÖREBR.
BEROL. ET. FRANCOF. ET LIPS. NAT. SCRUT. PARIS. HAFN. MOSCOU. ET HALENS.
HIST. NAT. GORENK. PHILAD. LUND. HARL. M. AMSTELD. BONNENS.
OECON. ET INST. LITT. ZELAND. NIDROSIENS. TURICENS. IENENS. LINN.
LONDIN. MEDICO-BOTAN. ET HORTI-CULTUR. REG. SCIENT. PHYS. ET
PHYTOGRAPH. GÖTTINGENS. SCIENT. GOTHOB. MONACH. ERLANG.
WETTER. NANCIENS. MARPURG. MED. PARIS. EMUL. ET LINN.
MONSPEL. MED. MATRITENS. MED. ET NAT. STUDIOS. EDIMBURG. ET PETROP.
MEDICO-CHIR. ET PHARMAC. MEMBRO NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS. ET
INSTITUT. NATION MONSPELIENS. AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN. SCAN-
DINAV. FLORENTIN. ET BATAVIN. IND. OR. CORRÉSPOND.

P. P.

JOH. LIDÉN

VERMELANDUS.

IN AUDIT. BOTANICO DIE IV MAJI MDCCCXXV.

H. A. M. S.

UPSALIÆ

EXCUDEBANT PALMBLAD ET C.

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

EXAMEN

CLASSIS MONOECIAE

In universo Vegetabili Regno lex illa maxime est communis, qua intra eundem thalamum mares cum feminis cohabitant, et flores formant hermaphroditos. Cum vero nulla sit sine omni exceptione regula, interdum ludere videtur Natura, et variae quandoque occurrunt mutationes, unde oriuntur diversae nuptiae, scilicet monoicae, dioicae et polygamae, quibus demonstrare voluit Sapientissimus et omnipotens Creator, se non unica regula, vel paucis legibus esse circumscriptum; sed formis, millies mutatis, ad eundem obtinendum finem favere, sic ut natura in infinitum variata sensus hominis sapientis blandire possit.

Vegetabilia monoica facile et sine difficultate examinari et determinari possunt, cum in eadem planta, in eadem arbore, vel etiam eodem frutice uterque sexus quaeri et inveniri possit, idque vel in diversis ramis, vel in eodem receptaculo sive spicato, sive racemoso, vel in eadem umbella. Secundum numerum staminum herba quaestionis facillime reducitur ad Classem, et secundum numerum pistillorum, ad ordinem. Sic secundum hanc methodum multa gramina intrare possunt Triandriae Classem, et Sociis suis dispersis conjungi.

A

CASU-

CASUARINÆ masculi flores in receptaculo interstincti sunt squamis bifidis, includentibus filamentum solitarium: receptaculum, strobilus dictum, etiam est elongatum et Styli, squamis distincti, sunt solitarii. Locus itaque ejus erit in *Monandria*, *Monogynia*.

RADERMACHIA in multis convenit cum *Casuarina*. Spica mascula flores approximatos separat calyce diphylo, intra quem filamentum unicum, dum femina, absque calyce et corolla, fructum profert totum constantem germinibus plurimis cum pistillo in singulo, solitario. Pertinet ergo ad *Monandriam*, *Monogyniam*; vel potius, si mavis, ad *polygyniam*.

CYNOMORIUM, cum quo SCHREBER conjunxit *Balanophoram*, flores spicatos, in receptaculo elongato, masculos cum femineis mixtos, et quoque hermaphroditos producit. Testatur LINNÉ, se vidisse flosculos hermaphroditos monandros reliquis immixtos, sed retulit plantam ad Monoeciam, licet debuisset, secundum suam methodum, referre illam ad Polygamiam. Dum vero in spica adsunt flores hermaphroditi, facillime refertur ad *Monandriam*, *Monogyniam*.

PHYLLACHNE licet flores producat monoicos, calyce tamen triphylo et corolla monopetala regulariter filamenta separat solitaria a stylis solitariis, atque generis locum assignat in *Monandria*, *Monogynia*. MURRAY retulit hocce genus ad Monoeciam, *Monandriam*; et SCHREBER ad Dioeciam, *Monandriam*.

ÆGOPRICON flores habet incompletos absque corolla, masculos tamen in racemo (amento) et femineos sparsos. Perianthium maris includit unicum filamentum et femi-

feminæ stylos tres. *Monandra* itaque erit planta et *Trigyna*.

CERATOCARPUS. In utroque sexu calyx regularis absque corolla, et filamentum unicum in flore masculo, locum hujus generis in *Monandria*, *Digynia* satis ostendunt.

CAULINIA, simplex planta aquatica, quæ monoica habetur floribus axillaribus sessilibus nudis, anthera et stylo sessili in diversis foliorum axillis, referri debet ad *Monandriam*, *Monogyniam*.

CHARA. Mirum valde est, quod in flore, sic dicto, masculo, Anthera sessilis sit extra calycem floris feminei, et hæc quidem anthera non dehiscens: et quod etiam calyx in flore femineo deficiat interdum. Florescentia hujus plantæ aquaticæ adhuc melius observari meretur. Interim ad *Monandriam*, *Pentagyniam* referenda erit.

ZANNICHELLIA. Singulare est phenomenon, quod duplex dissimilis flosculus masculus occurrat, alter nudus absque calyce et corolla, alter incompletus cum calyce integro, dum in flore femineo calyx sit tridentatus. Cum vero filamentum sit solitarium, optime collocatur genus in *Monandria*, *Tetragynia*.

NAJAS, ut aliæ plantæ aquaticæ, floribus instruitur incompletis; femineus flos stylum habet nudum sine calyce et corolla; masculus, antheram sessilem intra calycem et corollam. LINNÉ in Dioecia, *Monandria*, WILDENOW in Monoecia, *Tetrandria*, quod incertitudinem *Diclinia* commonstrat, genus hoc collocavit, quod rectius collocatum erit in *Monandria*, *Monogynia*.

LEM-

LEMNA, simplicissima fofarum planta aquatica natans, calyce monophyllo instruitur atque corolla, cum filamentis interdum sparsis et stylo abortiente. WOLFF Lemnas polygamas declarat, et ex observationibus EHRHARTII et HEDWIGII flores occurrunt hermaphroditi, sic ut omni jure pertineat ad *Monandriam*, *Monogyniam*.

PODOSTEMON, planta aquatica, floribus incompletis absque et calyce et corolla, axillaribus et solitariis masculis ad basin femineorum insertis, ad Monoeciam fuit relata. Cum vero filamenta describantur duo, et styli duo sessiles, releganda erit ad *Diandriam*, *Digyniam*.

ELATERIUM in alterutro flore filamentum unicum, in altero stylum solitarium gerit. Locus hujus generis, secundum artificiale Systema, itaque erit in *Monandria*, *Monogynia*. Frutificationis reliquæ partes et Anthera linearis, quinquies plicata, affinitatem satis cum Cucumerinis prodere videtur, sic ut optandum foret, ut cum illis in *Triandria* conjungi posset.

ANGURIAE Genus MURRAY relatum voluit ad Monoeciam, Gynandriam: SCHREBER ad Monoeciam, Monadelphiam. Flos est valde regularis cum calyce monophyllo, et corolla pentapetala, ut in aliis Cucumerinis. Ab illis separata fuit, cum in floribus femineis filamenta absque Antheris sint castrata. Filamenta tantum duo dicuntur, et Antheræ sursum deorsumque repentes. Si genus hoc vere sit distinctum, a ceteris sui Ordinis naturalis separari non debet, sed Classem *Triandriæ* ingredi.

CUCUMERINÆ plantæ in eo, in universum, conveniunt, quod Perianthium sit monophyllum, Corolla pentapetala, Filamenta tria et Stylus unicus. Paucae sunt, quæ aberrant.

errant. Relatæ fuerunt ad Monoeciam ideo, quod in floribus femineis interdum filamenta sint castrata. In plurimis Antheræ striatæ videntur indicare Syngeniam. Quare varie a variis Auctoribus ad Classes ablegatæ sunt. In *Melone* et aliis speciebus GLEICHEN atque Alii observarunt flores perfecte hermaphroditos. Inter *Bryoniae* species occurrit quædam dioica. In *Sisyoide* filamenta sunt coalita monadelphæ cum Antheris discretis, sic ut infinite variet et ludat hæc singularis fane familia, speciosa fructibus grandibus, et caulibus in terra prostratis, cujus omnia genera jure debito debent referri ad *Triandriam*, *Monogyniam*, ut

CUCUMIS, CUCURBITA, MOMORDICA, SISYOS, TRICHOSANTHES et BRYONIA.

SECHIUM. Flores ejus Monoici conveniunt calyce, corolla et nectario. In flore masculo filamenta quinque connata sunt. Antheræ, apice linea bis deorsum, semelque sursum, repente pollinifera. Stylus in flore femineo unicus. Retulit genus ad Monoeciam, Syngeniam SCHREBER; ad Monoeciam, Monadelphiam WILDENOW; cum vero præter numerum staminum, qui in hoc Ordine naturali variare solet, cum Cucumerinis conveniat, debet potius *Triandriæ*, *Monogyniæ* inseri.

TRAGIÆ flos etiam absque corolla incompletus est. Masculo flori calyx tripartitus est cum filamentis tribus, femineo quinquephyllus cum stylo unico. Ad *Triandriam* ergo, et *Monogyniam* amandanda erit.

ACHARIA flores completos habet, licet distinctos in diversis sedibus, calyce diphylo, et corolla trifida; masculos filamentis tribus instructos et femineos stylo simplici. In *Triandria*, *Monogynia* plantæ huic capensi locum assignavit Floræ capensis Auctor.

HER-

HERNANDIA umbellata est, in qua flores masculi laterales sunt, et femineus intermedius. Filamenta numerantur tria et Stylus unicus, designantia locum generis in *Triandria*, *Monogynia*.

SPARGANIUM in Receptaculo rotundo flores colligit incompletos absque corolla, intra calycem triphyllum. Maris filamenta tria, stylus unicus referunt Genus ad *Triandriam*, *Monogyniam*.

AXYRIS. Flores masculi (amentacei) triandri, feminei sparsi, digyni intra perianthium maris tripartitum, et feminae pentaphyllum. *Triandria*, *Digynia* genus excipiet.

COMPTONIAE amentum absque corollis squamosum. Maris perianthium diphyllum includit filamenta tria: feminae hexaphyllum, stylum duplicem, sic ut aptior illi locus adsignetur in *Triandria*, *Digynia*.

TYPHA, graminis Genus valde singulare floribus suis numero millenis, insidentibus superiorem apicem culmi, instar receptaculi communis, spicatis: masculis superioribus interstitio exiguo a femineis inferioribus remotis. Marium filamenta includuntur calyce triphyлло absque corolla. Stylus simplex. Refertur ad *Triandriam*, *Monogyniam*.

ZEA in supremo culmo gerit spicas marium cum calyce et corolla biglumibus, filamenta tria includentibus. Femina inferius in medio fere culmo erumpens, intra corollam quadrivalvem Stylum unicum fovet. Ad *Triandriam*, *Monogyniam* referri debet, licet relata fuerit ad Monoeciam, triandriam ideo, quod e quatuor corollae

=====

?

læ femineæ valvulis, duæ flosculum sterilem efficere videantur.

COIX, Flores masculi spicati gemini sunt cum intermedio minori pedicellato; feminei ad basin spicæ. Maris flos exterior filamenta profert tria antherifera: interior, filamenta tenuissima, castrata. Feminei floris involucrum continet pedunculum floris masculi, et florem simul femineum, atque rudimenta duo alia flosculorum. Stylus unicus est. Accedere debet ad socia gramina in *Triandria*, *Monogynia*.

OLYRA flores masculos infra femineos gerit, et femineos terminales in eadem panicula. Filamenta tria et stylus unicus. Genus in *Triandria*, *Monogynia* inferendum svadent.

TRIPSACUM. Flores masculi, gemini, unilaterales, spicati, superiores; feminei inferiores in eadem spica inveniuntur. Maris flosculi exterioris, filamenta tria antherifera; interioris subconnata, castrata. Stylus femineæ unicus. Proxime accedit ad Olyram in *Triandria*, *Monogynia*.

CAREX plerumque floret in spicis masculis et femineis distinctis in eadem planta; in non nullis tamen speciebus flores inveniuntur masculi atque feminei intra eandem spicam, et nonnullæ species sunt dioicæ. Stamina tria, rarius duo, et stylus simplex. Genus Caricis polymorphum et amplum aliis graminibus associant in *Triandria*, *Monogynia*.

SCLERIA, Caricibus proximum genus, flores masculos profert in eadem spicula vel panicula cum femineis mixtos, et præterea spiculas femineas, solitarias, axillares. Intra flores masculos filamenta tria, et intra femineos
Sty-

Stylus unicus. In *Triandria*, *Monogynia* fructu imprimis a *Carice* differt.

ZEUGITIS. Calyx communis biglumis, exteriori valvula majori invenitur; intra hunc flores duo muscoli cum femineo; filamenta tria. Flos femineus intra glumam calycinam majorem, sessilis est cum stylo bifido. In *Triandria*, *Monogynia* cum graminibus cohabitare et debet et potest.

KOBBRESIÆ flores incompleti, absque corolla, intra squamas Amenti masculini profert Stamina tria, et intra squamas floris feminei Stylos tres. Locus insertionis ergo erit in *Triandria*, *Trigynia*.

PHYLLANTHI flores incompleti absque corolla, cum calyce deprehenduntur. Maris filamenta tria, basi approximata (annon connata monadelphæ?) et styli tres, Genus referunt ad *Monadelphiam*, *Trigyniam*.

CICCA adeo affinis est et consimilis *Phyllanthis*, ut cum illis conjungi et debeat et possit, licet numerus partium in hac, æque ac in *Phyllanthis* variet. In hac enim numerus quadrinarius, in *Phyllanthis* trinarius sæpius est. Si conservari deberet hocce genus, referretur ad *Tetrandriam*, *tetragyniam*, cæjus tamen Auctores esse non volumus; veresimile enim est, quod *Cicca* sit *Phyllanthi* species tetrandra.

LITTORELLA primo intuitu videtur esse *Plantaginis* species uniflora, uti antea diu considerata fuit, donec **BERGIUS**, forsan immerito, illam a Congenere separavit. Flos omnino est *Plantaginis*, licet fructus (an vere?) dicatur alienus. Cum vero, si retineri debeat separatum genus, partes maris numerum quadrinarium servant, debet juxta *Plantaginem* in *Tetrandria*, et *Monogynia* collocari.

SERPICULA gerit flores solitarios cum perianthio quadrifido, et corolla tetrapetala, quæ includunt seorsim marinum filamenta quatuor, et feminarum stylum, sic ut inter *Tetrandras*, *Monogynas* numerari queat.

AUCUBA, arbor monoica, flores habet completos, scilicet calyce monophyllo, et corolla tetrapetala. Mas ostendit filamenta quatuor, femina stylum simplicem, ut in *Tetrandria*, *Monogynia* perbene collocari possit.

DIOTIS. Flores incompleti absque ulla corolla sunt. Masculi flores distinguuntur perianthio tetraphyllo et filamentis quatuor: feminei, perianthio monophyllo et stylo unico. Facile in *Tetrandria*, *Monogynia* quærenda erit.

URTICA dioica interdum est, sæpius tamen monoica observatur. Masculus flos intra perianthium tetraphyllum includitur absque corolla cum staminibus quatuor; femineus intra perianthium diphyllum sine corolla cum stigmate sessili. Referri itaque potest ad *Tetrandriam*, *Monogyniam*.

PROCRIS flores gerit sessiles, axillares, monoicos, incompletos intra calycem quadriphyllum, masculos tetrandros, et femineos, in eadem planta. In *Tetrandria* sine dubio erit collocanda, juxta *Urticam*, cum qua, uti et cum *Boehmeria* convenire videtur.

BOEHMERIA, uti et *Parietaria* et *Procris* cum *Urtica* valde similia et affinia genera sunt. *Boehmeriæ* flores masculi et feminei vel mixti sunt vel distincti in eadem planta. Marium perianthium est monophyllum absque corolla, cum filamentis vel nullis vel quatuor et pistilli rudimento; feminis nec calyx, nec corolla sunt, sed

tantum squamæ cum stylo unico. Genus est, quasi medium inter Urticam et Parietariam, in *Tetrandia*, *Mono-gynia* inferendum.

MORUS ad Monoeciam fuit relata, licet dentur flores et masculi et feminei distincti in distincto individuo, ut dioica. Perianthium maris quadripartitum includit filamenta quatuor; feminae perianthium tetraphyllum includit stylum duplicem; sic ut genus locum suum debitum in *Tetrandria*, *Digynia* inveniet.

BETULÆ florescentia consistit in spica squamosa absque corolla. Flores masculi sunt tetrandri intra calycem tetraphyllum, et feminei trigyni. Inferitur *Tetrandria*, *Trigynia*.

ALNUS cum *Betula* idem genus constituere debet, uti antea cum *Betula* rite fuit conjuncta. Nulla enim alia intercedit differentia, quam quod in *Betula* squamæ sint trifurcatae et semina duplici ala laterali ornata, et quod in *Alno* squamæ sint subrotundæ ac semina aptera. Nota exigua est pro genere naturali dilacerando.

BUXUS flores masculos et femineos intra eandem gemmam habet. Maris perianthium est triphyllum cum petalis duobus et filamentis quatuor; feminae quadriphyllum cum petalis tribus, et Stylis tribus, sic ut genus facile locum suum invenire possit in *Tetrandria*, *Trigynia*.

TRICERÆ florescentia umbellata cum floribus masculis paniculatis, et femineo in medio sessili. Maribus perianthium absque corolla est monophyllum cum filamentis quatuor; et feminae perianthium est quinquephyllum cum Stylis tribus. Nihil igitur potest esse facilius, quam hocce genus in *Tetrandria*, *Trigynia* quærere et invenire.

D. D.

EXAMEN

CLASSIS MONOECIAE

CUJUS PARTEM SECUNDAM

VENIA EXP. FACULT. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

C. P. THUNBERG

COMMENDATORE REG. ORD. DE WASA

MED. DOCT. PROF. MED. ET BOT. REG. ET ORD. REG. COLL. SANIT. MEMB.
HON. ACAD. CÆSAR. PETROPOL. ET NAT. CURIOS. REG. SCIENT. UPS. LOND.
HOLM. AGRIC. MED. ET EVANG. SOCIET. OECON. UPSAL. PATR. HOLM. ET.
CIV. OECON. FINL. HONOR. WERMEL. JUNE. WESTM. CALM. ET ÖREBR.
BEROL. ET. FRANCOF. ET LIPS. NAT. SCRUT. PARIS. HAFN. MOSCOU. ET HALENS.
HIST. NAT. GORENK. PHILAD. LUND. HARL. M. AMSTELD. BONNENS.
OECON. ET INST. LITT. ZELAND. NIDROSIENS. TURICENS. IRNENS. LINN.
LONDIN. MEDICO-BOTAN. ET HORTI-CULTUR. REG. SCIENT. PHYS. ET
PHYTOGRAPH. GÖTTINGENS. SCIENT. GOTHOB. MONACH. ERLANG.
WETTER. NANJIENS. MARPURG. MED. PARIS. EMUL. ET LINN.
MONSPEL. MED. MATRITENS. MED. ET NAT. STUDIOS. EDIMBURG. ET PETROP.
MEDICO CHIR. ET PHARMAC. MEMBRO NEC NON ACAD. SCIENT. PARIS. ET
INSTITUT. NATION MONSPELIENS. AGRICULT. PARIS. MEDIC. LONDIN. SCAN-
DINAV. FLORENTIN. ET BATAVIN. IND. OR. CORRESPOND.

P. P.

JACOBUS BÅGENHOLM

VERMELANDUS.

IN AUDIT. BOTANICO DIE IV MAJI MDCCCXXV.

H. P. M. S.

UPSALIÆ

EXCUDEBANT PALMELAD ET C.

Älskade Föräldrar

af

en tacksam Son.

ARGYTHAMNIÆ racemus est utrique sexui communis. Masculi floris perianthium tetraphyllum includit filamenta quatuor cum styli rudimento, et feminae perianthium quinquephyllum includit stylos tres. *Tetrandriam Trigyniam* genus facillime agnoscat.

PACHYSANDRA facile videtur collocari posse in *Tetrandria*, *Trigynia*, cum flores absque corolla masculi separati a femineis includantur calyce tetraphyllo, tetrandro, et stylis tribus.

CENTELLA æque ac **SOLANDRA LINNÆI** revera *Hydrocotyles* species iunt. Utraque valde variat floribus etiam polygamis.

XANTHIUM. Perianthium commune ployphyllum, corolla tubulosa in flore masculino cum filamentis quinque distinctis, et in flore femineo cum perianthio diphylo, et stylis duobus paribus describitur; collocari potest in *Pentandria*, *Monogynia*.

PARTHENIUM habet regulariter perianthium quinquephyllum, et corollam monopetalam cum filamentis quinque, et stylo unico. Flores feminei a tergo duos obtinet hermaphoditos, sed feminae abortiunt. Debuisset genus hocce, jam ad monoeciam, pentandriam relatum, potius fuisse relatum ad Polygamiam. Corollulae hermaphroditæ plures videntur in disco, femineæ quinque in radio. Videtur esse Syngenesis antheris discretis; sed forsan (an vere) inferatur *Pentandriæ*, *Monogyniæ*.

AMBROSIAE flores feminei infra masculos in eadem planta sunt collocati. Maris perianthium et corolla monophylla includit filamenta quinque; feminae corolla est nulla, sed stylus simplex. Relata erit ad *Pentandriam*, *Monogyniam*, forsan Syngenesis antheris liberis.

IVA flores masculos separatos a femineis habet, scilicet mares in disco, feminas in radio. Corolla maris monopetala, feminae nulla. Filamenta quinque, styli duo.

duo. Videtur esse Syngenesista antheris discretis. In *Pentandria*, *Digynia* facile locari potest, simul cum *Xanthio*, *Parthenio*, *Ambrosia*.

AMARANTHUS flores servat masculos et femineos in eodem racemo. intra perianthium quinquephyllum absque corolla. Filamenta variant a tribus sæpius ad quinque. Styli tres sunt sic ut in *Pentrandria*, *Trigynia* locum invenire possit.

CLIBADIUM instruitur calyce communi imbricato, et floribus compositis, uti in Syngenesistis. Flores disci hermaphroditi, pedicellati; feminei radii sessiles. In floribus hermaphroditis filamenta quinque et stylus solitarius. Ad *Pentandriam*, *Monogyniam* releganda. *Parthenium*, *Iva*, *Clibadium*, *Xanthium*, *Ambrosia*, forsan omnes Syngenesiæ tribuendæ.

CROTONOPSIS floribus suis monoicis pentandris, et monogynis collocari potest in *Pentandria*, *Monogynia*, uti et

POLYCHROA floribus incompletis, atque.

FRANSERIA cum stylis quatuor in *Pentandria*, *Tetragynia*.

NEPHELIUM flores producit masculos et femineos separatos in eodem racemo, cum calyce monophyllo, absque corolla. Stamina sunt quinque et styli duo, adeoque genus erit *Pentandrum*, *Digynum*.

ANDRACHNES flores habentur monoici in eadem planta; maris intra calycem pentapylum et corollam monopetalam foveant filamenta quinque, styli cujusvis rudimento inserta. Præterea adest flos nudus absque calyce, corolla et staminibus cum stylis tribus. Pertinet ad *Pentandriam*, *trigyniam*, genus hoc *Clutiae* affine.

SCHISANDRA in flore masculo antheris suis sessilibus, apice cohærentibus ad Syngenesistas accedere videtur; cumque pistillis numerosis a **WILDENOWIO** ad *Monociam*,
Penta-

Pentandriam relata fuerit, forsan in' *Pentandria*, *Polygynia* melius collocanda.

LUFFA, vere planta Cucumerina staminibus quinque cum Cucumerinis in eadem Classe conjungi debet, cum numerus staminum et pistilli varie et multum in hoc ordine variare soleat.

LEEAE eadem est planta cum Aquilicia.

EMPETRUM describitur monoicum calyce quadrifido, corolla nulla, filamentis quatuor et capsula unica, cum stigmate sessili, licet revera videatur *Diosma* partibus plurimis vel paucioribus, vel deficientibus. Profert tamen interdum capsulas duas ex eodem calyce, et *Diosmæ* nonnullæ pauciores, quam quinque capsulas interdum maturant. Si genus, ut distinctum, retinendum erit, referri tamen debet ad *Pentandriam*, *Monogyniam*, *Diosmis* vicinum. *Diosmæ* LINNÆI polymorphum genus, sexu, nectariorum figura, capsularum numero antea svasit divisionem in *Diosmata* et *Hartogias*; sed utraque demum observationes retulerunt in unum; aliæ enim species floribus monoicis, aliæ hermaphroditis; aliæ staminibus decem, quorum quinque sterilia; aliæ aliter a congeneribus differunt.

POMETIÆ mares a feminis separati sede cohabitant in eodem racemo. Utriusque sexus perianthium est polyphyllum, et corolla hexapetala. Filamenta in masculo, sic dicto, flore sunt sex cum pistilli rudimento, et stylus in femineo dicto flore unicus cum rudimentis staminum. Relatum fuit genus ob partes quasdam abortientes in omnibus floribus hermaphroditis, tam a SCHREBERO, quam WILDENOWIO ad *Monoeciam*, *Hexandriam*, licet omnium facillime in *Hexandria*, *Monogynia*, quæri debuisset.

EPIBATERIUM. Flores masculi et feminei in eadem planta instructi perianthio et corolla, staminibus sex et stylis tribus. Sed in masculo flore observatur rudimentum

tum pistili, et in femineis interdum rudimentum staminum. Ergo facile reduci potest ad *Hexandriam*, *Trigyniam*.

PHARUS habet flores masculos pedunculatos, femineos sessiles in eadem panicula. Filamenta sex, et stylus simplex Gramen hoc ad *Hexandriam*, *Monogyniam* referri jubent.

ZIZANIA et *Pharus* forsan sola sunt genera, in amplissima familia graminum, quæ constanter staminibus sex a Triandris ceteris sese distinguunt. In *Zizania* prodit et flos masculus staminibus sex fertilibus; et flos femineus hermaphroditus antheris tamen sterilibus, digynus. Monoicum hocce genus facile refertur ad *Hexandriam*, *Digyniam*.

GVETTARDÆ flores completi, masculi et feminei dicti obveniunt in eadem arbore. Marium stamina sunt sex, usque novem cum stylo filiformi, sic ut flos vere sit hermaphroditus. Stylus floris feminei dicitur filiformis, staminibus longior, sic ut flos femineus etiam videatur hermaphroditus. Relatum fuit hocce genus a LINNÆO et SCHREBERO ad *Monoeciam*, *Hexandriam*, licet forsan melius referri possit vel ad *Heptandriam*, vel si ita placuerit ad *Octandriam*.

CORYLUS habet flores femineos sine corolla remotos a masculis in eodem frutice. Maris in amento squamoso filamenta sunt octo. Feminae involucri est diphyllum cum stylis duobus. *Carpino* summa jungitur affinitate et locum suum habet in *Octandria*, *Digynia*.

MYRIOPHYLLUM cum perianthio tetraphyllo producit flores femineos infra masculos. Filamenta sunt Octo, stylus nullus, verum stigmata quatuor, sic ut ad *Octandriam*, *Tetragyniam* reduci queat.

HERITIERA flores masculos in eadem profert panicula cum femineis. Perianthium adest in utroque flore
absque

absque corolla. Stamen maris dicitur columnare, cinctum infra apicem antheris quinque, usque decem, connatis in cylindrum. In flore femineo germina sunt quinque cum totidem stylis, et præter hos antheræ absque filamentis decem, receptaculo ad basin germinum insertæ, duæ inter singula germina steriles. Flos itaque non dici potest gynandrus. Referatur ad *Decandriam*, *Pentagyniam*.

CERATOPHYLLUM flores masculinos et femineos in eadem aperit planta, intra perianthium sine ulla corolla. Filamenta sunt sedecim usque viginti; stylus nullus, sed stigma simplex. Pertinet ad *Dodecandriam*, *Monogyniam*.

THELIGONUM monoicum quidem est cum calyce sine corolla. Maris filamenta sunt duodecim et ultra, et feminae stylus unicus, quare referendum ad *Dodecandriam*, *Monogyniam*.

MABEA monoica, bene distingvenda a *Maba* dioica, ornatur perianthio monophyllo, sine corolla. Cumque filamenta variant a novem usque ad duodecim, et stylus sit unicus, referri potest ad *Dodecandriam*, *Monogyniam*.

CARPINUS in eadem planta marem et feminam associatos habet. Maris filamenta decem et ultra. Feminae perianthium tridentatum cum stylo solitario. Locus indicatur in *Dodecandria*, *Monogynia*.

OSTRYA vix genere differt a *carpino*.

FAGUS ostendit marem et feminam ejusdem plantæ cohabitantes, diversis locis, intra perianthium sine corolla. Filamenta floris masculi sunt variantia, a quinque ad viginti. Feminae stylus simplex. Aptissimus locus erit in *Dodecandria*, *Monogynia*.

CASTANEA in paucis deffert a *Fago*. Differunt calyce et corolla. Stamina in utroque variant. Juxta *Fagum* in systemate collocata erit. Filamenta sunt decem usque viginti et styli tres.

JUG-

JUGLANS floret amento squamoso sine corolla. Maris perianthium sexpartitum continet filamenta octodecim usque viginti quatuor. Feminae perianthium est tantum quadrifidum cum corolla et stylo. *Dodecandria, Monogynia* excipiet genus.

QUERCUS monoica est arbor, corolla destituta. Maris calyx monophyllus comprehendit filamenta quinque usque decem, et feminae perianthium sexfidum, stylum unicum. Referatur ergo ad *Dodecandriam, Monogyniam*.

SAGITTARIÆ flores feminei, secundum suetum Naturæ ordinem, infra masculos collocati sunt, intra perianthium triphyllum et corollam tripetalam, cum filamentis viginti quatuor et stylis numerosis, sic ut optime referatur ad *Polyandriam, Polygyniam*.

PLATANUS floret in eadem arbore floribus masculis et femineis separatis. Maris absque corolla, filamenta plurima, in quibus a parte inferiori antheræ sunt circumnatae. Styli plures. Collocari debet in *Polyandria, Polygynia*.

BEGONIA monoica habetur planta hæc singularis, cum corolla colorata, sine calyce. Maris petala quatuor et filamenta decem usque quinquaginta. Feminae petala quinque vel sex cum stylis tribus. Accedit ad *Polyandriam, Trigyniam*.

POTERIUM flores spicatos habet; in eadem spica feminae supra proveniunt, mares inferiores. Maris perianthium tetraphyllum, et corolla quadripartita includit filamenta triginta et ultra; feminae perianthium simile et corolla quinquepartita includit stylos duos. In *Poterio sanguisorba* pistilla duo debilia flori masculo inserta sunt, sic ut florem formant hermaphoditam, et genus in *Polyandria, Digynia* collocandum esse commonstrent.

LIQUIDAMBAR flores habet spicatos. Femina ad basin spicae masculae videtur cum involucrio absque corolla.
Fila-

Filamenta sunt numerosa et styli duo, quare in *Polyandria*, *Diandria* genus erit inferendum.

HEDYOSMUM in eadem arbore marem et feminam profert. Maris receptaculum tectum est antheris plurimis sine filamentis, et femina unicum producit stylum. Pertinet ad *Polyandriam*, *Monogyniam*.

ACIDOTON. Flos femineus in eadem vel diversa arbore cum masculo provenit, sic ut et monoica et simul dioica sit. Flores incompleti sine corolla. Est igitur arbor *Polyandra*, *Monogyna* cum maris filamentis triginta quinque - quadraginta et stylo unico.

THOÆ flores spicati sunt, masculi superiores, feminei ad basin spicæ nudi absque et calyce et corolla. Filamenta numerosa sunt, et stylus unicus. Est ergo *Polyandra Monogyna*.

PARIANÆ flores masculi sunt verticillati verticillis spicatis. Femineus flos solitarius in singulo verticillo, axi spicæ affixus. Adest calyx biglumis et corolla bivalvis. Filamenta sunt quadraginta et stylus solitarius. Gramen hocce est *Polyandrum*, *Polygynum*.

ZOSTERA. Hujus uti et aliarum plantarum aquaticarum fructificatio peculiaris valde est. Intra folium occultatur receptaculum (spadix) lineare, altero supremo staminibus, inferne pistillis instructum. Relata fuit ad *Hexandriam*, et ad *Monoeciam*, *Monogyniam*. Vero similis, cum filamenta sint plurima, et stylus solitarius, locus ejus erit inter *Polyandras*, *Monogynas*.

AMBROSINIA spatham habet monophyllam cucullatam, in duo loculamenta superne communicantia divisa. In superiori parte dissepimenti antheræ sessiles plurimæ distincto ordine digestæ sunt in floribus masculis. Germen et stylus in loculo anteriori partis inferioris dissepimenti, in floribus femineis. Est igitur planta *Monoica Polyandra*, et referri debet ad *Polyandriam*, *Monogyniam*.

ACI-

ARUM et CALLAMINIME dici possunt monoica, dum flores receptaculo communi insedentes intra spatham communem includuntur, masculi femineique. LINNÉ hæc genera retulit primum ad *Gynandriam*, *Polyandriam* cum receptaculum commune pro Pistilli filamentis habuerint, SCHREBER deinde retulit ad *Monoeciam*, *Monandriam*, cum Antheræ superiorem, feminae inferiorem receptaculi partem occupant. WILDENOW ad *Monoeciam*, *Polyandriam* relatum genus voluit, licet nullum sit interstitium inter mares et feminas in *Aro.* Rectius tamen locum suum habebit in *Polyandria*, *Polygynia*.

CALLA proxime accedit ad *arum*, floribus nudis, masculis et femineis mixtis intra spatham communem, insidentes receptaculo oblongo vel elongato, spadix dicto. Juxta *Arum* collocata erit in *Polyandria*, *Polygynia*. *Calla* æthiopica videtur plus convenire cum *Aris* genere, quam cum *Callis*.

HOULTYRIA quasi intermedium genus inter *Arum* et *Callam* constituit. Sexus in receptaculo oblongo mixti sunt et nudi. Spatha tetraphylla genus distinctum reddit, ceterum *Callæ* proximum, juxta quam collocatum erit in *Polyandria*, *Polygynia*.

SALISBURIA videtur inter *Piperitas* proxime accedere ad *arum* antheris multis imbricatis in amento nudo, sine corolla et calyce. Idem etiam valere videtur de,

CALADIO, cujus antheræ multiloculares in spiram ad apicem (spadicis) receptaculi dispositæ sunt, dum in basi germina absque stylis inserta inveniuntur.

GARCIAE adeo brevis et obscurus est character in Speciebus WILDENOWII, ut nihil omnino certi possit determinari.

PINUS flores gerit spicatos, mares et feminas in eadem arbore, sed diversis ramis, sine corolla. Intra squamas filamenta plurima connata. Stylus unicus. Referri potest ad *Monadelphiam*, *Monogyniam*.

CUPRESSUS corollam neque ullam habet, sed in spica squamæ (calycinæ dictæ) inferne adnascuntur quatuor antheræ absque filamentis. Si ergo squama consideratur, ut filamenta connata, *Monadelphus* erit flos masculus. Cumque in femineo flore (strobilus dicto) germina absque stylis sint numerosa, flos erit *Polygynus*.

THUJA valde affinis est *Cupresso* floribus nudis, quorum mares dicuntur absque filamentis habere antheras quatuor cum basi squamæ calycinæ connatas. Et dum stylus feminæ sit simplex, *Thuja* pertinebit ad *Monadelphiam*, *Monogyniam*.

PLUKENETIÆ mas sine calyce corollam habet tetrapetalam cum filamentis octo coalitis; et femina calycem tetraphyllum, petala quatuor, et stylum unicum. Facile itaque referri potest ad *Monadelphiam*, *Monogyniam*.

DALECHAMPIA duplex explicat involucrum, alterum commune et alterum parziale, in mare diphyllum, in femina triphyllum. Præterea mas habet perianthium quinquephyllum et femina polyphyllum, uterque sine corolla. Filamenta plurima connata et stylus simplex. Genus referunt ad *Monadelphiam*, *Monogyniam*.

ACALYPHA sine corolla, intra involucrum triphyllum includit florum masculinorum filamenta plurima, connata, octo usque sedecim, et florum femineorum stylos tres, sic ut planta sit *Monadelpha*, *Trigyna*.

CROTONIS flores masculi et feminei occurrunt quidem in eodem frutice vel arbore, sed in diversis ramis.

Mares habitant infra perianthium quinquedentatum ac petala quinque, cum filamentis decem, usque quindecim connatis; et feminae intra perianthium polyphyllum cum stigmatibus tribus, sic ut prolixum hoc genus quærendum sit in *Monadelphiam*, *Trigyniam*.

JATROPHÆ mares et feminae cohabitant intra communem umbellam. Singulare est, quod maris filamenta decem in medio dicantur approximata. (nec connata). Difficile ergo classificatio determinatur, sed pertinere tamen videtur ad *Monadelphiam*, atque ob stylos tres ad *Trigyniam*.

RICINUS frutex est vere monoicus, cum perianthio monophyllo, absque corolla. Filamenta in floribus masculis numerosa et in varia corpora connata. Deberet ideo referri ad classem *Polyadelphiam*, si posset a *Monadelphis* vicinis cognatis separari. Femina est *Trigyna*.

STERCULIAM ad *monoeciam*, *monadelphiam* retulerunt LINNÉ et MURRAY; reduxit vero postea SCHREBER ad *Dodecandriam*, ubi stamina dicuntur inserta nectario. Cum autem hoc nectarium non aliud sit, quam basis filamentorum, in cylindrum connatorum, genus vere est *Monadelphum*, *Monogynum*.

HURÆ florescentia valde singularis est, sine corolla, filamentis tuberculis duobus innatis; certe itaque dici non potest, cui ordini propius accedit. Ob affinitatem vero cum prioribus pertinere videtur ad *Monadelphiam*, *Monogyniam*.

HIPPOMANES mas situs est in amento terminali, et femina solitaria terminalis in eadem planta, intra perianthium maris monophyllum et feminae triphyllum, sine corolla. Filamentum unicum est antheris quatuor apici cruciatim affixis (forfan filamenta quatuor coalita), et eo casu ad *Monadelphiam*, *Monogyniam*, referenda erit.

CUPANIAM Murray relatam voluit ad *Monoeciam*,
Mona.

Monadelphiam, adjecta quæstione, a SCHREBERO, an ad Polygamiam referenda? Deinde tam a LINNÉO, quam SCHREBERO rectius ad *Octandriam*, *Monogyniam* amandata fuit.

STILLINGIA, quam nonnulli volunt eandem cum Antidesma, flores habet completos. Filamenta licet duo tantum adfuerint, basi tamen coalita sunt, et florem reddunt *Monadelphum*.

GNETUM a SCHREBERO describitur ut monoicum, in amento verticillato filamento unico, et stylo solitario in verticillo cum adjecta indicatione, se vidisse etiam amentum vere masculum. Rumphius dioicum dixit. Præses flores hujus in India Orientali examinavit, nec aliud invenire potuit, quam quod genus hocce proxime accedat ad *Michelias*, *Uvarias*, *Magnolias*, in *Polyandria*, *Polygynia*. Receptaculum convexum recipit enim basi filamenta plurima, et supra feminam absque ulla interruptione vel interstitio. Ex ejus sententia locus ejus erit in *Polyandria*, *Polygynia*.

GYMNANTHES a SCHREBERO refertur quidem ad *Monoeciam*, *Monadelphiam*; sed addit, flores femineos prodire in eodem vel diverso frutice, adeoque et dioicam declarat. Filamenta dicuntur nuda, vel pedicelli tripartiti (filamenta forsan tria connata) et stigmata tria in floribus nudis.

SIPHONIAE flores racemosi, et femineus flos dicitur solitarius, terminalis. Antheræ quinque dicuntur adnatæ columnæ filamentum infra apicem, et stigmata tria. Pertinere debet ad *Monadelphiam*, *Trigyniam*.

SAPIUM flores gerit et femineos et masculos in eadem spica, intra perianthium monophyllum, sine corolla. Filamenta duo coalita sunt, et stylus unicus, sic ut genus vere referatur ad *Monadelphiam*, *Monogyniam*.

ALEURITES in eodem corymbo flores colligit masculos et femineos, inter calycem, corollam et nectarium. Filamenta heic sunt numerosa, connata in receptaculum, conicum columnare, et stigmata duo. Facile reducitur ad *Monadelphiam*, *Digyniam*.

BRAD-

BRADLEJA producit filamenta tria, singulum ornatum anthera cylindrica ex antheris tribus connatis, ut in Syngenesia, sed ideo tamen genus ad Syngenesiam non fuit relatum, verum ob flores masculos et femineos in eadem planta divisos, a SCHREBERO ad *Monoeciam*, *Monadelphiam*. SCHREBER describit flores masculos intra corollam hexapetalam cum filamentis tribus, quorum antheræ cylindricæ constant antheris tribus connatis didymis; et florem femineum intra corollam monopetalam cum stigmatibus sex usque octo absque ullo stylo, sic ut planta foret Syngenesiis affinis. Forsan verus ejus locus erit in *Triandria*, *Hexagynia*.

HYPHYDRA a SCHREBERO et WILDENOWIO considerata fuit ut planta monocia, gynandra. Feminei flores maxime nudi sunt sine calyce et corolla, cum unico stylo; sed flores masculi instructi sunt non solum filamentis sex, supra germen ad angulos insertis, verum etiam stylo, ut in Polygamiis; referri non aliter potest, quam ad *Hexandriam*, *Monogyniam*.

AGYNEIAM retulit MURRAY ad *Monoeciam*, *Gynandriam*, licet nullus adfuerit vel stylus, vel stigma; et SCHREBER ad *Monoeciam*, *Monadelphiam*. In ejusdem plantæ superiori parte proveniunt flores feminei, et masculi infra feminas. Filamentum columnare est antheris tribus vel quatuor, infra apicem adnatum. In germine nullus vel stylus vel stigma observatur, sed eorum loco foramen in medio perforatum, sex crenatum. Referri debet ad *Monandriam*, *Agyniam*. WILDENOW stylos tres memorat.

CYTINUS a WILDENOWIO ad *Monoeciam*, *Monadelphiam* relatus fuit, a SCHREBERO forsitan rectius ad *Gynandriam*, *Octandriam*, a nobis ad *Octandriam*, *Monogyniam*.

EPISTYLIIUM habet filamentum columnare cum antheris duobus et triplici stigmate in diversis sexus floribus. Est itaque *Monandra*, *Trigyna*.

HECATEA imperfecto valde caractere a WILDENOWIO fuit relata ad *Monoeciam*, *Monadelphiam*, licet ne verbum affertur, si filamenta sint connata, vel non.

MYRIANTHUS, qui ad Cucumerinas referri oportet, æque leviter ac *Hecatea* in Speciebus plantarum illata fuit, sic ut difficile semper erit, illi alium locum in Systemate adjudicare, quam in vicinia cognatorum in *Triandria*.

OMPHALEÆ filamentum columnare est, cujus apici antheræ binæ seu tres insident; referenda ideo erit ad *Monandriam*, *Monogyniam*. LINNÉ illam retulit ad *Monoeciam*, *Triandriam*.