29, 131 / A

~~2/10/13~~

g.) () () (1 measured after
A d d e n d a

DEUTSCHLANDS FLORA

ODER

BOTANISCHES

TASCHENBUCH

ZWEYTER THEIL

FÜR DAS JAHR 1795.

CRYPTOGAMIE.

VON

GEORG FRANZ HOFFMANN.

ERLANGEN

BÈY IOHANN IACOB PALM.

WELLS BROS. CO.

1200 N. 11th St.

Ex Libris
C. la CROIX.
ph.

DIE ERKLÄRUNG DES TITELKUPFERS

Findet man im ersten Theil des botanischen Taschenbuchs.

Einige dabei angebrachte Veränderungen beziehen sich auf die Jahreszeit selbst, in welcher Cryptogamen anfangen hervorzugehen und der Blumentragenden Flora zu folgen.

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN
SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Abbildungen der Schwämme 3. H. 4. Berl. 1793.
 Abercrombie's, Propagation and botanical arrangements of Plants and Trees. 2 vol. 3. Lond. 84.
 Adanson, Histoire naturelle du Senegal. 4. Par. 57. (Leipz. 8. 73. Nachr. von seiner Reise).
 Afzelius, Ad. De vegetabilibus succanis observ. et experim. 4. Ups. 85.
 Allioni, C. Auctarium ad Flor. pedemont. 4. A. Taur. 89.
 Baldinger, E. G. Ueber Litterar - Geschichte der theoret. u. pract. Botanik. 8. Marb. 94.
 Banks, I. Icon. select. pl. fol. Lond. 91.
 Barbeau du Bourg, le Botaniste françois. 2. T. 8. Par. 67.
 Barnades, M. Introductio in oryctogr. et zoolog. Arrag. 8. Matr. 84.
 Bartram's, Will. Travels in the inter. parts of Nordamerica. 8. 92.
 Batsch, A. I. G. C. Elenchus Fungorum, 4. Hal. Magd. 85. Cont. 1 - 2. 89.
 Baumgarten, I. C. G. Sertum lipsicum. 8. Lips. 90.
 Beauvois, Pal. The first memoir of Observ. on the Plants denomin. Cryptogamick (Trans. of the Americ. Soc. vol. 3. 95.)
 Becker Thes. univ. r. herb. 8. Aug. Vind. 87.
 — — H. F. Beschreib. der Bäume und Str. im Mecklenb. 8. Rost. 91.
 Bellardi, L. Osserv. botaniche. 8. Torino, 88.
 Bellermaun, I. B. Abbild. zum Cabinet d. vorzügl. Holzarten Fol. Erf. 88.
 Bergius, P. J. Observat. nonnull. bot. (Act. succ. 78.)
 Berkenhout's Botanical lexicon. 8. Lond. 89.

BRYUM UNDULATUM.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA MUSCI (CALYPTRATA).

Radiculae numerosissimae, ex fibrillis patulis flexuosis, in tomentum ab alibili terra vix separabile conflatae, fuscellae; aliae e surculi parte supra terrae superficiem erumpentes rariores, profundius coloratae.

Surculi erecti (a) simpliciusculi adscendentes, cespitosi, basi etiam ramosi, vel novas propagines, turionum ab initio speciem habentes, agunt, quae debitam proceritatem adeptae, de sua extremitate florent, vel mere feminei, vel masculi, distincti individui. Inferne surculi nudiusculi ea qua spectant terram parte rutilant, sensim adscendendo sunt dilutiores.

Folia inferiora breviora, rariores, adpressa, erecta, inde multo longiora patula, recurva, lanceolata (b), serrata (c), carinata, transversim undata, nervo per medium ducto notabili, pallidiore.

Flos masculus in summitate crassioris surculi, rigidioris, disciformis; a foliis perigonialibus, extimis maximis recurvis; inter haec folliculi spermatici (Stam. Antherae Hedw. cylindraceae uniloculares, apice dehiscentes, ejaculantes pollen granulosum; singulis filamentum breve, filiforme) perquam numerosi (g), aut explosionem brevioribus, subin longioribus filis succulentis, (*paraphysibus*) muniti. Absoluta impraegnatione e centro surgit innovatio (more *Polytrich.*), saepe in femineum florem mutata.

Flos femineus etiam in summitate surculi simplicis vel ejus divisionum intra perigonium, e maximis foliis, demum decrescentibus oriundus;

Bryum undulatum L.

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN
SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Billardiere, la, I. I. Icones plantar. Syriae rar.
descript. et observ. ill. 2. Dec. 4. Par. 91.
Blackstone Specimen botan. 12. Lond. 46.
Blond le, Catal. plant. e Cayen. miss. conscr. a
L. Richard (Act. de la Soc. d'Hist. nat.
de la Par. Par. fol. T. 1. 92.)
Böhmer, G. B. Technische Geschichte der Pfl.
8. 2. Th. Leipz. 94.
Bolton, I. Filices britannicae. 4. Lond. 86.
Bondt, N. Verhand. over de overeenk. tusschen
Dieren en Planten. 8. 92.
Bonato, G. A. Pisaura automorpha. 4. Pad. 93.
Borch, C. de Lettres sur les Truffes du Piemont.
8. Milan, 80.
Bordiga, B. Storia delle Piante forastieri - 4.
Mil. 91.
Borkhausen, M. B. Tentamen disposit. plant.
Germ. seminifer. 8. Darmst. 92.
Bosc, L. Lycop. axatum Decum. sarment. (Act.
de la Soc. d'Hist. nat. T. 1.)
Bosc, E. G. Pr. de nodis plant. Lips. 76.
Bosseck, H. O. De Antheris flor. 4. Lips. 58.
Buchoz, P. I. Traité physique et oecon. —
2 Tom. Par. 87.
Bradley, Rich. History of succulent Plants. 5.
Dec. 4. Lond. 39.
Brez, I. La Flore des insectophiles. 8. Utrecht,
91.
Broussonet, I. L. V. Corona florae monspeliensis.
8. Monsp. 90.
Brusati, Catal. plant. hort. reg. bot. Ticinensis,
S. Pap. 93.

tribus, rarissime quatuor genitalibus (m) filis. que succulentis articulatis (n) brevibus ditatur, quorum 1, nonnunquam 2, rarius 3 vel 4 impregnata reperiuntur; unde

Pedunculus (Seta) unius ejusdemque Perichacii, solitarius, gemellus, tri-quadrimellus. que erectus, rubellus, rigidulus, siccitate contortus.

Vaginula (d) pyramidata, nuda, ore pedunculo et

Gymnocidio (tuberculo setae) arcte adhaerens.

Calyptra mediae aetatis (i) cylindrica, in summitate brevissimis processibus muricata, (genitalia ad basin sterilia: *adductores* Hedw.); maturescente capsula lateraliter fissa, obliqua, glabra, acuminata (e) decidua.

Capsula (Theca Hedw. Pyxidium Ehrh.) cylindrica, circumscissa magis minusve cernua, ex viridi demum fusca unilocularis; ad orificii aperturam, vel potius

Operculi basin eleganter rubens; hoc tenue subulam deorsum vel sursum directam emittit (f) dilutioris coloris.

Annulus nullus.

Peristoma (s. Peristomium) simplex (k), e dentibus 32 angustis, dilute fuscis, linea alba marginatis, basi coalitis, apice

Epiphragmate, seu membranula tenui plicatili imperforata connexis, exstructum est.

Sporangidium (columnella) longitudine fere capsulae, cylindricum.

Semina (l) Papaveris in modum per interstitia dentium sicca tempestate elabentia, intro sunt viridia, sphacrica, laevia, demum fusca.

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN
SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Bryant's historical account of 2 Species of Lycopodons. 8. Lond. 83.
- Bulliard, Histoire des Champignons. Tom. 1. fol. Par. 91.
- Burmah, I. Indic. Flor. Malab. et Herb. amb. fol. Amstel. 69.
- — — N. L. De Geraniis. 4. L. B. 59.
- Cavanilles, Ant. Jos. Icones et descript. plant. 2. vol. fol. Madrit. 91 - 95.
- Canlinus, Ph. Zosteræ oceanicæ anthesis. fol. Nap. 92.
- Colbiörnsen, Progr. de sexu plant. fol. Hafn. 82.
- Comparetti, Andr. Riscontri fisico - bot. 3. Pad. 93.
- Couleii, A. Plantarum libri sex. 3. Bas. 93.
- Crantz, H. I. N. Institut. rei herb. 2. vol. 3. Vien. 66. (Lips. 67.)
- Croix, de la, Connubia florum. Ed. Rich. Clayton. 8. Lond. 92.
- Culpepper's, Medical Herbal enlarged by Hamilton. 3. vol. 8. Lond. 92.
- Curtis, W. Botanical Magazin. 88. Numb. 3. Lond. 87 - 94.
- Cuttler, Man. An account of the veget. product in the Neighb. of Ipswich (Mem. of the Americ. acad. Vol. 1. 4. Boston 85.)
- Cyrillo, D. Fundamenta botanica. 2. vol. 8. 87.
- Darwin's Botanic Garden a Poem. 2. vol. 4. 91.
- Dancer, Th. Catalogue of Plants in the botan. Gart. at Jamaica. 4. 92.
- Demidof, Proc. a, Enum. plant. hort. propr. rec. P. S. Pallas. 8. Petrop. 81.

IUNOERMANNIA CILIARIS.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA HEPATICAE (MULTIVALVIA).

Radiculae vix ullae, brevissimae tomentosae.

Surculi inferne nudiusculi, cespites efformant densos pulvinatos, e viridi rubiginosos, vel siccitate flavo-fuscos; adscendentes, alternè ramosi: ramis vagis, antèrius confertis, incrassatis recurvis, subpinatis; supra convexi, subtus planiusculi, e foliorum ciliis quasi villosi (a); feminei (b) breviores minus ramosi, semiconsumpti, erectiusculi, apice numerosis perianthiis obsiti; alii steriles decumbentes longiores ramosioresque.

Foliola ordine duplici imbricata, superne convexa (f) se invicem semitegèntia recurva; superiora subquadrata, tri- s. quadripartita (d e), inferiora lanceolata (d), utraque margine in numerosissimas lacinulas ciliares (quae per lentem ex ovatis articulis compositae apparent) divisa.

Perianthia numerosa terminalia, ventricosa laevia, glabra, pallide subfusca, apice conniventia, quadridentata (ad lentem subciliata) basi foliis perichaetialibus cincta.

Pedunculi (Setae) tetragoni, pollicares, argentei.

Capsula subglobosa, fusca, unilocularis, longitudinaliter dehiscens in valvulas quatuor aequales, patentes oblongas, obtusas persistentes.

Semina subfusca filis tortis elasticis adhaerentia.

Jungermannia ciliaris.

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN
SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Pott, I. F. Harbkesche wilde Baumz. ed. 2. 8. 95.
 Ramatuelle, de, Descript. de la Chamomille à
 grandes fleurs (Journ. d'hist. naturelle. n. 18:
 4. Par. 92.)
 Reichel, G. C. De vasis plant. spir. Lips. 58.
 Reichard, I. I. Sylloge optisc. bot. 3. Francof. 82.
 Reiner, I. und Hohenwarth, S. Bot. Reisen.
 1. R. 8. Klagenf. 92.
 Reitter, I. D. und Abel, G. F. Abbildung 100
 deutsch. Holzarten — 4. Stuttg. 92.
 Relhan, R. Flora Cantabrig. (c. trib. suppl.)
 8. Cant. 85 — 90.
 Retzii, A. I. Florae scand. Prodr. 2. P. 8. Holm.
 79.
 Reufs, C. F. Dictionarium botan. — 8. Leipz. 81.
 Reynier, Memoires pour servir a l'histoire —
 nat. T. 1. 8. Lausanne, 88.
 Römer, I. I. Neues Mag. für die Botanik. 1. B.
 8. Zürich, 94.
 Rodschied, E. C. Verz. merkwürd. auf Guia-
 na wachs. Pfl. (Bald. med. Journ. 28. St.
 N. Mag. 16. B.)
 Rooke's Descript. and Sketches of remark. Oaks —
 4. 90.
 Roth, A. W. Botau. Abhandl. und Beob. 4.
 Nürnberg. 87.
 Rotherham, I. the sexes of plants vindicated. 8.
 Lond. 90.
 Rothhöll, C. F. Descript. rar. plant. 4. Hafn. 78.
 Roucel, Traité des plantes — qui croissent na-
 tur. dans les env. des villes de Gand
 d'Aost etc. 8. Liège, 92.

TRICHODERMIA ROSEA.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (HYMENOCARPA).

Expansio mollis fibroso-lanuginosa in cortice vel ligno, sine ordine, ad marginem depressior araneosa, medio pulvinata, amoene carnea vel pallide rosea, sub qua latitat farina concolor, quae lente subjecta ex acervulis conglomeratis interspersis filis constare videtur. Haec intra aquam in minuta granula pellucida dissolvuntur. Aliam observo plantam Stilbosporae similem in cortice Fagi, compactiorem, sparsam vel conglomeratam, ejusdem penitus coloris, cujus seminiformia corpuscula s. Besimina, ad lentem majora oblonga et quasi lomentacea, seu septulo in duas partes divisa; fila ex contorsione articulata.

STILBUM HIRSUTUM.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (MUCORACEA).

Intra rimosum corticem Mucores persistentes sine ordine sparsi.

Stipiti ochraceo capillari, setis erectis deciduis hirsuto, sensim attenuato, insidet

Capitulum globosum album solidum diaphanum. Substantia sicca fragilis. Farina fibrosa hinc inde substrata.

Blasia pusilla.

AVCTORES BOTANICI

seculi XVIII.

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Rousseau and Martyn's Letters on the Elements
of Bot. Ed. 3. 8. Lond. 91.
- Roxburgh, *Nerium tinct.* (Dalrymple orient.
Repert. 4. Lond. 91. Asiatick Researches —
4. Calcutta, 92.)
- Rozier, *Demonstrat. element. de Bot.* 3. t. 8.
Lyon, 87.
- Ruiz, Hipol. *Quinologia.* Matr. 8. 92. (Della
China. 8. Roma, 92. Von dem offic. Fic-
berrindenbaum. 8. Gott. 94.)
- Russel, Alex. *the Nat. Hist. of Aleppo.* 4. Lond.
56.
- — Patr. An acc. of the Tabasheer (Phil.
Trans. v. 80. 4. 80.)
- Rutty's Essay towards a nat. hist. of the county
of Dublin. 8. 2. vol. 72.
- Sabbati, L. *Synops. plant. in solo romano* —
4. Ferr. 45.
- Salisbury, *Icones stirp. rar.* fol. Lond. 91.
- Saunders's, short and easy *Introduct. to scientif.*
and philosophic Bot. 8. Lond. 92.
- Scanagata, I. *Syst. veget.* Ed. 15. 8. Pav. —
- Schaeffer, I. C. *Botanica expedition* — 4. Ra-
tisb. 60.
- Scherer, I. A. *Beob. über das pflanzenähnliche*
Wesen in den warm. Karlsb. Wässern. 4.
Dresd. 88.
- Schinz, C. S. Ioh. Gessners *phytograph. Tafeln.*
fol. Zürich, 94.
- Schkuhr, C. *Botan. Handb.* 14. H. 8. (t. 209.)
Wittenb. 90. 94.
- Schleicher, I. C. *Cent. pl. exsicc.* C. 3. fol. 94.

AECIDIUM ANEMONES.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (UTRICULOSA).

In aversa pagina foliorum Anemones puncta lutescentia distincta solitaria, adpersa, quae accuratius inspecta

Aggedulae sunt ab initio granulis minutis globosis, semiglobosis similes, membranula tectis, demum in semicupulam apertis intusque Utriculis nudis concoloribus, vel rufescentibus, ad lentem subrotundis pellucidis, massa granulosa refertis.

AECIDIUM RUMICIS.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (UTRICULOSA).

Folia Rumicis aquatici, maculis in aversa pagina notantur rotundis variis, variaque magnitudinis, planiusculis, per ambitum rotundis et magis depressis vel sine ordine confluentibus, amoenae sanguineis, etiam pallidiore colore variegatis. Hae ex

Aggedulis dense et orbiculatim confertis, centrifugis compountur, per ambitum in pustulas elevatis. Cuticula disparere incipit, aperiuntur Aggedulae, ore retracto denticulato pallescente.

Besimina (sen Utriculi seminales in spatiis disci contenti) unda concoloria, neque fabrica a priori diversa, in granulosam massam demum dissoluta.

AVCTORES BOTANICI

seculi XVIII.

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Schmidel, C. C. Ic. plant. et anal. part. 3. m.
(t. 75.) fol. Erl. 93.
- Schmidt, F. W. Flora boemica. 4. C. fol. Prag.
93.
- — — Fr. Oestreichs allg. Baumz. 2. B. fol.
Wien, 94.
- Scholler, F. A. Suppl. Flor. barb. 8. Barb. 93.
- Schrader, H. A. Spicil. Fl. germ. 8. Hannov. 94.
- Schrank, Fr. d. P. Primit. flor. salisb. 8. Fran-
cof. 92.
- Schreber, I. C. D. Spicileg. Florae lips. 8.
Lips. 71.
- Schwegman, H. et G. V. Schneevogt Ic. plant.
rar. fol. Haarl. 92 - 93.
- Scopoli, I. A. Dissert. ad scient. natur. part.
P. 1. (plant. subterr. descript. et delin.)
8. Prag. 72.
- Sennebier, I. Encyclop. meth. physiologie ve-
getale — 4. Par. 91.
- Segnier, I. F. Bibl. bot. 4. L. B. 60.
- Smith, B. Barth. A botan. descript. of the Po-
doph. diaphyll. (Trans. of the amer. Soc.
V. III. 4. 93.)
- — I. E. Car. Linnaei Flora Lappon. Ed. 2.
8. Lond. 92.
- Sonnerat, P. Voyages aux Ind. orient. et a la
Chine. 2. T. 4. Par. 82.
- Sowerby's, I. English Botany. 2. vol. 8. Lond.
90 - 92.
- Spielmann, I. R. Olera argent. 2. D. 4. Argen-
tor. 76.

SPHAERIA MINIATA.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (LOMENTACEA).

Sphaerulae gregatim nasci solent lignumque Salicum cavernosum incolunt globosae, miniatæ, ætate coccineae, magnitudine seminis Milii; pellucens et carnosae substantiae. Ad basin fibrosum breve tomentum non raro per lentem observatur. Ex orificio tenui farinosam massam in fila contortam emittunt; exsiccatione subsidente ac corrugato ore, inde saepe concavae, et ab ejecta farinosa materia quasi conspersae. Haec ad augmenta lentis considerata et aqua diluta, ex innumeris

Lomentis seu articulatis leguminibus componitur, radiatim intra fibrosam gelatinam divergentibus filiformibus, articulis ipsis oblongis pellucidis subimbricatis, dispermis, sponte secedentibus.

MUCILAGA RETICULATA.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (BYSSACEA).

Ambigit inter Fungos et Byssos, araneosa expansio in disco reticulatim fibrosa, candidissima. Spatiola intra reticulum depressa, angulosa variae magnitudinis ac figurae, pulvere tenui respersa concolore, ad lentem pellucido granuloso. Autumno post pluvias ad truncos putrescentes, Exsiccatione non mutatur.

Langermannia caphylla

AVCTORES BOTANICI.
seculi XVIII.

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN
SCHRIFTEN
des 18 Jahrhunderts.

- Sprengel, C. K. das entdeckte Geheimniß der
Nat. in der Befruchtung der Blumen. 4.
Berl. 93.
- Steeles, Essay on Gardening. 8. Lond. 93.
- Stephani, F. Enumer. stirp. agri Moscov. 8.
Mosc. 92.
- Stillingfleet's, B. Tracts on Natural History. 8.
Lond. 91.
- Stöver, D. H. Leben des Ritters C. v. Linné.
2. Th. 8. Hamb. 92.
- Ström, H. Ueber einige seltene Moosarten in
Norwegen (Schrift. der Naturforsch. Ge-
sellsch. zu Kopenhag. aus dem dän. 1. B. 8.
Kopenh. 93.)
- Suckow, G. A. Diagnose der Pflanzengatt. 8.
Leipz. 92.
- Swartz, O. Icon. plant. inœogn. Ind. occident.
fasc. 1. fol. Erl. 94.
- Thuillier, Flore des environs de Paris. 8. Par. 90.
- Thunberg, C. P. Resa uti Eur. Africa, Asia —
3. T. 8. Ups. 89. (Deutsch. Uebers. Berl.
92. 8.)
- Tillesius, G. G. Musae parad. icon. 8. Lips. 92.
- Timm, I. C. Vorläufige Nachlese zur Flora me-
gapolit. (Mag. für die Naturk. u. Oekon.
Meklenb. herausgeg. von A. C. Siemsen.
1. B. 8. Leipz. 91.)
- Tode, H. I. Fungi mecklenburg. select. 2. F.
4. Lun. 92.
- Tozzetti, G. Viaggi — 12. T. 3. Firenze 79.
- Trattinnick, L. Flora austriaca sicca. C. b. fol.
Vien. 95.

DEMATIUM VERTICILLATUM.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA ALGAE (BYSSACEA).

In putrescentibus stipitibus herbarum tenuissima ac subcinerea, quasi pruina obductis, Byssus per lentem ostendit fila (seu stipites) inferius nuda erecta, simplicia, superius verticillatis et articulatis ramulis in verticillo fere 3-4, cincta, versus apicem approximatis, brevioribus, pellucidis, persistentibus.

DEMATIUM ANTENNAEFORME.

In arborum laesis truncis nigerrimae maculae quasi ex panno sericeo, longe lateque extensae, quae ad lentem vitream examinatae; fibris componuntur simplicibus articulatis fusco nigris: articulis oblongis, aqua pellucidibus, in medio opacioribus, facile discedentibus. Vel conservas articulatas cum Byssis coniungit, vel ad lomentacea praesertim. Stilbospora pertinet.

STILBOSPORA ASTEROSPORA.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (LOMENTACEA).

Maculae nigrae variae, figuratae, radiatae serpentinae, confluentes, ex effusis sub epidermide corticis

Lomentis compactis nudis conflatae. Haec ad vitra augmentiora apparent triangularia stellarum in modum radiata: radiis 3-4; ex lomentis varie connatis sibi que impositis, oblongis, per transversa septula (3-4) in loculamenta divisis, demum intra aquam turbinatis inque granulosa massam dissolutis.

T. 5

Anthoceros punctatus.

AVCTORES BOTANICI
seculi XVIII.

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN
SCHRIFTEN

des 18 Iuhrhunderts.

-
- König, I. G. Descript. Epidendror. (Retz. fasc. observ. bot. VI. fol. Lips. 91.)
- Krapf, C. Exper. de nonnull. Rarunc. qualit. ven. 8. Vien. 76.
- Lachenal, W. de, Emend. et Auctar. ad Halleri hist. stirp. helv. spec. 1. (nov. act. helv. v. 1. 4. Basil. 87.)
- Laicharding, I. N. Manuale botanicum. 8. Lips. 94.
- Latourrette, A. L. Voyage au mont. Pilat. 8. Avign. 70.
- Leers, I. D. Flora herborens. 8. Berol. 89.
- Leonhardi, G. F. Naturgesch. für alle Stände. 2. B. Pflanzenr. 8. Leipz. 92.
- Linné, Car. a, Genera plantarum. Ed. octava (c. I. C. D. Schreber) 2. vol. 8. Franc. ad Moen. 91.
- — — F. Dissert. botanicae (amoenit. acad. vol. 10. 8. Erlang. 90.)
- Lilieblad, S. Swenska ört - slagen — 8. Ups. 91.
- Linck, H. F. Annalen der Naturgesch. 2. St. Gott. 94.
- Löwe, I. C. C. Physik - ökon. Bem. über das Riesengeb. (Oekon. cam. Schr. 2 T. 8. Bresl. 89.)
- Loureiro, I. d. Flora cochinchinensis. 2. T. 4. Ulyssip. 90. (Ed. Wild. Berol. 8. 93.)
- Ludwig, C. F. Ep. de pulvere Anther. Lips. 78.
- — — C. G. Ectypa vegetab. 8 fasc. fol. Hal. Sal. 64.
- Maertens, I. F. Verz. der österreich. Bäume, Staud - und Buschgew. 8. Wien, 81.

ARCYRIA LEUCOCEPHALA.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (HYMENOCARPA).

Foliorum Fagi superficiei exsiccatorum innascuntur capitula seu

Aggedulae pyriformes e rufescenti spadicea testa conflatae, rigida; a medio superiora versus attenuatur testa in cuticulam fragilem obsolete albam, aliquantum farinosam, quae varie dehiscit et comminui incipit.

Stipiti insident rigido lineari subfusco demum nigricante, ejusdem fere cum aggedulis longitudinis, eleganter inter se coordinatis. Diutius integrae in foliis remanere solent, successive vero temporis, vel acu privata particulatim abolitur a medio ad verticem tenerrima cuticula, atque interiora patefieri incipiunt, quae primo intuitu ex mera farina componi videntur. Oculo vero armato duplex adparet substantia, testanempe et solutum ab ista ovuli oblongi sub specie

Capillitium s. reticulum candidum, rigidiusculis et brevissimis turbinatis filis compactum, cum interiori et inferiori pariete testae cohaerens. Nec excutitur reticulum ex ipso pariete inferiori, sed impalpabilis pulvisculus, nudo oculo ex meris globosis solidisque nigris granulis compositus, seu

Besimina in spatiis reticuli vacuis contenta et sensim excussa, circa testae inferiorem solidiorem et durabiliorem partem quasi intra calycem potissimum discumbunt.

THELEPHORA COLLICULOSA.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (HYMENOCARPA).

Ad ramos emortuos crusta varie et sine ordine in maculas minores seu majores, confluentes, undatim expansa. Superficies monticulosa, verrucosa, polygonia rimosa, ex carneo pallida, pruinosa. Colliculorum color sit rufescens, croceus cinnabarinus, humectate vel detritione. Substantia tenax coriacea, madefacta mollescit fungosa.

1. *Arctia leucoccephala*.
 2. *Thaetacphora colliculosa*.

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN
SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Magazin, botanisches, herausgeg. von I. I. Römer und P. Usteri. 4. B. 8. 91.
- Maratti, I. F. de vera flor. exist. in plant. dorsif. ed. 2. (Nuova Raccolta d'Opuscoli filosof. T. 20.) 8. Rom. 68.
- Marck, de la Encyclop. meth. Botan. 3. T. 4. Planch. (200) de la Botan. prem. Livr. Par. 91.
- Martelli, N. Braschiae plantae nov. gen. descr. 4. Rom. 91.
- Marterstock, I. C. Bonnische Flora. 8. Bonn. 92.
- Martius, W. E. Gesammlete Nachr. über den macassar. Giftbaum. 8. Erl. 92.
- Martyn's, I. Hist. plant. rar. fol. Ed. germ. Norimb. 94.
- Martyn, Th. The Language of Botany. 8. Lond. 93.
- Matuschka, H. G. v. Enumerat. stirp. in Siles. sponte nascent. 8. Vratisl. 79.
- Mayer, I. Samml. phys. Aufs. die böhmische Naturgesch. betreffend. 4. Th. 8. 91 - 94.
- — P. I. Pomona Francon. 3. T. 4. Nürnberg.
- — I. C. A. De vasis plant. (Mem. de l'Acad. des Sc. et B. l. de Berlin, 4. 93.)
- Medicus, F. C. Critische Bemerk. über Gegenst. aus dem Pflanzenreiche. 2. St. 8. Mannh. 93.
- Meen's, Miss. Exotic plants of the Royal Garden at Kew. 2. N. fol. Lond. 90.
- Meese, D. Flora Frisica. 8. Franck. 60.
- Meyer, B. Semina (propr. hort.) 8. Hanov. 95.
- Meyrick, W. The new Family - Herbal. 8. Lond. 91.

CLAVARIA STRIATA

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (UTRICULOSA).

E putrescente ligno Clavulae prorumpunt simplices.

Capitula instructae oblongo in obtusum apicem attenuato, erecto vel obliquo, simplici ut plurimum, rarius duplicato vel diviso, subinde de compressiusculo aut plicato - sulcato.

Stipes brevis teres. Substantia uniformis carnosus - gelatinosa. Color obsolete lutescens, exsiccatione resinosus. Primordia hujus plantae clavam simplicem teretem, apice plus minusve obtusam vel acuminatam longiori insidentem stipite, imitari solent.

CLAVARIA ACROSPERMUM.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (UTRICULOSA).

Ad stipites herbarum exsiccatos clavulae simplices sparsae, pistilli inversi forma, omnium minutissimae, subobliquae, sursum modicum quantum ampliatur in

Capitulum obtusum, eleganter rosei coloris, vesiculis per lentem farinosi quasi saccharo obductum.

Stipes brevis pellucidus. Substantia car. nosa.

2

1. *Clavaria striata* 2. *Clavaria*
Acrospermum.

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN
SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Michant, M. A. Notice de quelques plantes —
observées dans l'Amérique Septentr. (Journ.
d'hist. nat. T. 1. 4. Par. 1792.)
- Micheli, P. A. Catal. plant. hort. Florent. fol.
Flor. 48.
- Milne, C. and Al. Gordon's Indigenous Bota-
ny — 8. Lond. 93.
- Millers, I. Illustr. of the sex. Syst. of Lin. 2. vol.
Lond. 79. (Edit. Germ. c. Weis Frankf. 89.)
- I. F. Figures of non descript. Quadr. —
Plants. 10. N. fol. Lond. 93.
- Miller, Ph. Figures of pl. descr. in the Gardn.
Dict. 2. vol. fol. Lond. 60. (Abbild. der sel-
tensten Pfl. seines Gärtn. Lex. 2. Th. fol.
Nürnb. 78.)
- Moench, C. Meth. Plant. — 8. Marb. 94.
- Mühlenberg, H. Index florae lancastr. (Trans.
of the Amer. Soc. v. III. 4. 93.)
- Müller, O. F. Esterrättning om Svampe. 4. Co-
penh. 63.)
- Murray, I. A. Car. a Linne Syst. Veget. Ed. 14-
8. Gott. 84.
- Mutis, I. C. Batschia nov. Gen. (nov. Act. R.
S. Ups. vol. V. Ups. 4. 92.)
- Naumburg Ehscheid. der Orch. (An. d. Bot.
9. St. 8. 94.)
- Necker, N. I. d. Traité sur la Mycitologie. 8.
Mauh. 88.
- Nenenhahn der Jüngere, bot. Beobacht. (Ehr-
hart's Beitr. 6-7. B. 8. Hanov. 92.)
- Nocca, D. Observ. bot. (u. An. d. Bot. 5. St.)
- Nomenclator Fungor. P. 1. Agarici. 8. Berl. 89.
Cont. 1. 90.

SOLENIA CANDIDA.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (UTRICULOSA).

Ex minutissimis fungilli gregatim ligno putrido innascentes

Tubulis tenuissimis membranaceis cylindricis intus cavis similes, ore ab initio clauso, dein dilatato obtuso revoluti. Color albus, aetate obsoletus. Substantia tenera sicca fragilis, tamen persistens.

SOLENIA OCHRACEA.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (UTRICULOSA).

Praecedentem magnitudine et crassitie paulo superans, emortuorum truncorum cortici inspersa. Gregarie vel confertim nasci solent

Tubuli rarius erecti, frequenter inclinati, vel quasi imbricati; ex ovata basi cylindricam formam assunt, etiam obconicam; externe pilis adpressis rigidis ochracei coloris hirsuti, in obtusum apicem coeunt. Interne pallidiores glaberrimi nitentes, cavi. Substantia uniformis, sicca fragilis, humectata mollis fungosa. Magnitudine diversa occurrunt, subjecto non raro pulverulento tenui cinerascete fibroso strato, una cum tubulis persistente.

Solenia candida. 2. *Solenia ochracea.*

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN
SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Notter, F. P. *Flora rustica* — with descr. by
Th. Martyn. 2. vol. 8. Lond. 92.
- Oeder, G. C. *Elementa bot.* 2. P. 8. Hafn. 64-66.
(Edit. germ. Kopenh. 66.)
- Oestreichs *Flora.* 2. B. 8. Wien, 94.
- Olivieri, G. *Delle conferve irritab.* (Mem. della
Soc. ital. T. 6. Veron. 92.)
- Onomatol. *Botan.* 10. vol. 8. Frankf. 77.
- Ortega, G. d. *Curso elementar di Botanica.* 8.
Matr. 85.
- Oskamp, T. L. *Tab. plant. terminol.* fol. L. B. 93.
- Pallas, P. S. *Reisen durch verschied. Prov. des
russ. Reichs.* 3. Th. 4. Pct. 76. (5. Th. 8.
Frankf. 78.)
- Palau, Ant. y Verd. *Explicat. de la Philosoph.
y Fund. botan. de Lin.* Matr. 78. Parte
pract. 34-5. vol. 8.
- Panzer, G. W. F. *Vers. ein. nat. Gesch. der
Lanb. und Lebermoose.* 8. Nürnberg. 87.
- Paulet, I. I. *Tabula plantar. fungos.* 4. Par. 91.
- Persoon, C. H. *Neuer Versuch einer syst. Ein-
theil. der Schwämme* (N. Mag. für die Bot.
1. B. 94.)
- Pilleri et Mitterbush. *Iter per Posegan. Slavon.*
4. Bud. 85.
- Planer, I. I. *Index plant. in agro Erfurt. sp.
proven.* 8. Goth. 88.
- Plaz, A. G. *Progr. de natura plant. muniente.*
4. Lips. 61.
- Plenk, I. I. *Physiolog. et Pathologia plantar.*
8. Vien. 94.
- Pohl, I. E. *animadv. in struct. ac fig. foliorum*
4. Lips. 71.

SCLEROTIUM AEGERITA.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (HYMENOCARPA).

Fungilli ligno emortuo ut farina dense intrati, accuratius et per lentem inspecti referunt grana panici magnitudine et forma; globosae nempe sunt vel ellipticae, magis tamen rotundae figurae. Substantia solida, tamen friabilis, ad vitra argentia intus ex rotundis seminiformibus corpusculis turbinatis, ut in Sclerotiiis pellucidis intra aquam, composita. Color lacteus vel quasi rotularum ex saccharo confectarum, demum obsolete albidus. Persistunt et cohaerent.

DIDERMA CONTORTUM.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (HYMENOCARPA).

Muscorum foliis inhaerent rotulae candidissimae compressae rotundae vel ovatae, in sulcos contortae medio in umbilicum unum alterumve depressae, cortice duplici instructae. Exterior nempe fragilis crassior, alba, interior obsolete flavescens tenuior membranacea pellucens, nigrum continens pulverem (ad lentem ex globosis *Besiminibus* compositum) filis intertextis.

DIDERMA OCHRACEUM.

Iisdem cum praecedente locis, apicibus foriorum saepe per medium ductis; globosum; ochraceum exterius et membranaceum, interne membrana tenuior et pallidior rugulosa, pulvere nigro compacto repleta, ad lentem priori non dissimili.

1. *Sclerotium Aegerita.*
 2. *a Diderma contortum.*
 h _____ *ochraceum.*

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN
SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Desfontaines, R. *Plantae rar.* (Act. de la Société d'Hist. Nat. de Par. fol. a Par. 92.)
 Dickson, I. *Fasc. plant. crypt. Britan.* 3. F. 4. Lond. 93. (Zurich. 8. 94.)
 Dietrich, C. F. *Pflanzenreich.* 2. Th. 8. Erf. 70.
 Dillenius, I. I. *Hort. Elthamensis.* fol. Lond. 32. (63.) (Lugd. 74.)
 Donaven, E. *Instruct. for Collect. var. Subj. of Nat. hist.* 8. Lond. 94.
 Dörrien, C. H. *Verz. oran. nass. Gew.* 9. 77.
 Dryander, Ion. *Obs. on the Gen. Begonia* (Trans. of the Linnean. Soc. vol. 1. 4. Lond. 91.)
 Du Hamel, du Monceau la Physique des Arbres. 2. P. 4. 33. (Germ. Nürnberg. 64.)
 Du Roi, I. P. *Observat. botan.* 4. Helmst. 71.
 East, Hint. *Hortus Eastensis.* 4. Kingst. 92.
 Ebermaier, I. C. *Vergl. Beschr. derj. Pflanzen, welche in den Apoth. mit einander verwechselt werden.* 8. Braunschw. 94.
 Edward's, *select collection of one hundred plates, cons. of exotic and british Flowers.* fol. Lond. 75.
 Ehrhart, Fr. *Plantae cryptogamae Lin. (exsicc.)* Dec. 53. fol. Hannov. 85 - 93.
 Ellis's, *Directions for bringiny Seeds and Plants from distant Counts.* P. II.
 Erdmann, C. G. *Einige botan. Beobacht. (bot. Anal. 5 St.)*
 Eschenbach, I. F. *Ep. de Nectarior. usu.* Lips. 76.
 Esmarch, G. P. C. *Beschr. der Gräser — in den Herz. Schlesw. u. Holst.* 8. Leipz. 94.

Classis et Ordo :

CRYPTOGAMIA HEPATICAE (RADICALIA).

Radiculae succosae et tenerae, pellucidae ac albae, ut plurimum simplices descendunt, quae medium et praesertim nervum tenent, quibusque humo leviter inhaerent

Frondes prima aetate valde minutae et simplices, margine undosae, magis ampliatae simplices vel bi-tri-quadrifidae et per dichotomiam subdivisae, basi saepe connatae et in omnem plagam rosaceae vel gregatim expansae (a), margine rotundis segmentis vario undoso quasi exciso (b), latitudine variabili. Dantur specimina angustioribus et longioribus, vel obtusis latioribus frondibus (in his tubuli etiam breviores). Nervus per simplicem vel ramosam frondem ductus, reliqua tenera et pellucida virescente substantia albidior.

Flores masculi granula (Antherae Schmid. Hedw.) prope marginem frondis sparsa, immersa, cuticula tecta, pellucida, virescentia (lucida objecta aeruginosa), demum punctorum nigrorum iustar in conspectum prodeunt; interne granulosa massa repleta (c).

Flores feminei tubercula (Germina Schmid. Hedw.) in medio disco versus extrema frondis vel rami sita, inverse ovata, introrsum (qua parte radicem plantulae spectant) nempe arcuata et depressiora, extrorsum sensim latescunt, superne et inferne prominent (d. e.) Nervus ad apicem tuberculi interiorem pertingit unicus, ex communi trunco in tot ramos discerptus, quod tubercula frons gerere solet. Vertex tuberculi erigitur conicae formae (tunc temporis insidet

1

2

1. *Trichoderma rosea*. 2. *Stilbum hirsutum*

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN
SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Evelyn's silva et terra — with notes by Dr. Hunter 2. vol. 8. 86.
 Fibig, I. Einl. in die Naturgesch. des Pflanzenreichs. 8. Mainz, 91.
 Fabregou, Plantes aux environs de Paris. 6tom. 8. Par. 40.
 Fischer, I. B. Versuch einer Naturgesch. von Livland. 8. Königsb. 91.
 Forster, G. Florula Insularum austr. 8. Gott. 86.
 — — — I. R. Enchirid. Hist. nat. inserv. 8. Hal. 88.
 Forsyth, Will. On the Diseases of Trees and method of cure. 8. Lond. 92. (über die Krankh. — der Bäume. Aus dem Engl. von G. Forster. 8. Mainz, 91.
 Gaertner, I. De fructibus et semin. plant. 2 tom. 4. Stuttg. 91.
 Gaterceau, Description des plantes qui croiss. aux environs de Montauban. 8. Mont. 90.
 Gefsner, I. De Ranunc. bellidifloro. 4. Tig. 53.
 Genns, S. I. v. Verhand. over de inlandsche Plantgewassen. 8. Haarl. 89.
 Gilibert, E. I. Exercitia phytologica. 2. vol. 8. Lugd. 92.
 Giseke, P. D. Car. a Linné praelect. in ordin. nat. plant. 8. Hamb. 92.
 Gleditsch, I. G. Systema plantar. a stam. situ. 8. Berol. 64.
 Gleichen, W. Fr. Neuestes aus dem Reiche der Pfl. fol. Nürnberg. 64.
 Gmelin, I. Fr. Car. a Linné Syst. Nat. Ed. 15. (Tom. 2. part. 2. regn. veget.) 8. Lips. 91.
 — — K. C. Catal. pl. hort. bot. Carolruh. 8. 91.

tenerrimus stylus, caducus, fuscilli coloris Hedw.) accedens, sensim vero cylindricus (e) tubaeformis (f) demum mutatus in

Capsulam ovatam obliquam, unilocularem, coronatam, tubo truncato apiceque hiantem, ex quo corpuscula

Semina (Schmid. Hedw.) acervatim propullulant et disperguntur (d e) compressiuscula lutescentia, in fronde mascula saepe vivipara; cadente ultimo et consumto tubo.

10

1. *Acridium Unemones*. 2. *Ac. Rumicis*.

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN
SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Gmelin, P. Fr. *Otia botanica*. 4. Tub. 60.
 Gorter, D. v. *Flora Ingrica*. 8. Petrop. 61.
 Gouan, A. *Flora monspel.* 8. Lugd. 65.
 Graefer, I. A. *descriptive Catal. of 1100 herb.*
plants. 8. Lond. 91.
 Guettard, I. St. *De Pilis et Gland.* (Mem. de
 l'Acad. de Par. 45 — 56. Von den Neben-
 gefäßen der Pfl. Schrank. 8. Halle, 94.)
 Greenway, I. *An Account of the Cassia Cha-*
maecrista (Trans. of the amer. Soc. v. 3.
 4. Philadelp. 95.)
 Hacquet's, *Neneste physikal. polit. Reisen durch*
die dacisch. und sarmat. Karpath. 8. Nürnberg. 90.
 Haenke, F. *Linnei Gen. plant.* 2. vol. 8. Vien.
 91.
 Hagen, C. G. *De Ranunculis pruss.* 4. Reg. 84.
 Hales's, St. *Statical Essays*. 2. vol. 8. Lond. 69.
 Halle, I. S. *Deutsche Giftpfl.* 3. Berl. 84.
 Haller, A. v. *Biblioth. botan.* 2. vol. 4. Tiguri
 72.
 Happe, A. F. *Flora crypt. depicta*. 4. Dec. fol.
 Berol. 84.
 Hanbury's, *complete Body of plant. and garde-*
ning. 2. vol. fol. Lond. 70.
 Hedwig, I. *Theoria gen. et fructif. plant. crypt.*
 4. Petrop. 84.
 Hellenius, C. N. *Spec. Calendar. Florae et Fau-*
nae Aboënsis. 4. Ab. 86.
 Heritier, P. C. L. *Geraniologia*. fol. Par. 88.
 Hill's, I. *History of plants*. fol. Lond. 51.
 Holmskiöld, Theod. *Beata ruris otia, s. Cory-*
phaci Clavar. Ramariasque complect. fol. Havn.
 Homann, C. *De Monarda*. 4. Traj. ad Viadr. 91.

IUNGERRMANNIA EPIPHYLLA.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA HEPATICAE (MULTIVALVIA).

Radiculae mucrosae fibrosae densae e nervo quasi medio oriundae, quibus humo tenaciter adhaerent

Frondes in longum porrectae, extremitate latiores subrotundae, margine sinuato-lobatae, medio depressae, laeves, pellucidae, lacte virescentes.

Masculi flores (Antherae Hedw.) tubercula sessilia in frondis depressiori disco, congesta numerosa atroviridia (a) vel lutescentia (b), e quibus (transversim una cum substantia frondis sectis, m) massam granulosa, per vesiculosam opus cuticulae scatinientem (d) observavit Hedwigius.

Feminei flores ab extrema frondis primariae, aut lobi lateralis squamula (calycina) concava laciniata (b. c), continuata continuo frondis vegetatione intra ipsius frondis discum apparente (c), originem ducunt. Machinulae pistilliformes (f) intra hanc squamulam, de quibus una exsurgit calyptrata, stylo coronata in vertice, adhaerente de latere illis machinulis, junior globulis hirsuta (g) dein glabra (h), maturitate rumpenda, turbinata quadridentata (i).

Pedunculus (Seta) 2-3 pollicaris, albissimi pellucetis coloris, erectus, celeri elongatione

Capsulam elevat globosam (i) fuscam, in 4 valvulas longitudinaliter dehiscentem, aequales patentes, demum reflexas.

Semina plurima, ovata (l) adhaerentia filis longis, ex helicibus duabus, circa communem axin circumvolutis, elasticis, in valvularum centro demum barbulae confusae instar surrectis.

2

1 *Sphaeria menziesii*. 2 *Mucilago reticulata*.

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN
SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

- Honckeny, G. A. Synops. plantar. Germ. Tom. 1.
8. Berol. 92. (c. Car. L. Willdenow).
- Hope, T. C. De plantar. mot. et vita. 8. Edin-
burg. 87.
- Hoppe, D. H. Botanisches Taschenb. 8. Regensb.
90 — 94.
- Host, N. (Jacq. collect. 4. Vien. 88.)
- Houstoun, G. Reliq. plant. 8. (ed. germ.) No-
rimb. 94.
- Humboldt, F. A. ab, Florae friberg. specimen.
4. Berol. 93. (Aphorismen übers. von B.
Fischer. 8. Leipz. 94.)
- Jacquin, N. I. v. Oxalis. 4. Vien. 94.
- — — I. F. a, Tria gen. plant. nova. (nov.
act. helvet. v. 1. 4. Basil. 87.)
- Jefferson, Th. An account of the Sugar Maple
Tree. 8. Philadelph. 92.
- Jundzilla, B. S. Opisanie roslin w Prowincyi
Wielkiego Xiestwa Litewskiego naturalnie
(Beschr. der im Großh. Lithauen wild-
wachs. Pfl.) 8. Warsch. 91.
- Junghans, P. C. Icon. plant. offic. Cent. 1. fol.
Hal. Sal. 92.
- Jussieu, Ant. Laur. Genera plantarum. Recu-
di curav. notisque aux. P. Usteri. 8. Tur. 91.
- Kerner, I. S. Giftige und essbare Schwämme.
8. Stuttg. 86.
- Klipstein, I. C. G. De Nectariis plant. 4. Ien. 74.
- Knorr, G. W. Regn. Florae v. Thes. r. herb.
2. Tom. fol. Nürnberg. 66.
- Koelreuter, I. G. Das entdeckte Geheimn. der
Cryptogamie. 8. Carlsr. 77.
- Kölpin, A. B. Comment. de stylo. 8. Gryph. 84.

ANTHOCEROS PUNCTATUS.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA HEPATICAE (RADICALIA).

Radiculae ex basi descendunt satis longae simplices vel parum ramosae (d f), passim etiam ex trunci frondosi (d) latere, tenerrimae, pellucidae, virescentes aequam terram attingunt; cui adhaerent

Frondes ex angustiori basi in orbem expansae, disco concavo, margine elevatae (f) undoso plicatae, lacinatae: lacinulis sinuatis, crenulatis, quasi crispae. Frequenter lacinulae aliquae vario modo incisae super ipsum discum adsurgunt (d) quasi viviparae (a) vel ex ipsa basi prodeunt. Ubi gregatim frondes crescunt interdum graciliores adnascuntur ita profunde (ex observatione *Schmidelii*) sectae, ut pinnatam formam *Anthoc. multifidi*, magis minusve regularem aut compositam, tamen semper turbintam, bene expriment.

Masculi flores verruculae in disco frondis elevatae sparsae, apice in lacinias fissae, calyciformes, recondunt globulos (Antheras *Hedw.*) obovatos, crocci intensi coloris, vesiculares molles, et perlucetes, apice deorsum calyci inhaerentes (b c d). Post aliquam horum adparitionem

Feminei flores in eadem planta, ut cornicula s. vascula per hiatum corticalis substantiae dilatatae (Calyx monophyllus, cylindricus truncatus) (g) in conspectum veniunt; ex oblonga forma sensim in teretem mutantur, vertice calyptra et brevi stylo, croceo colore tincto coronata (h), succrescunt denique cornicula (a) in

Capsulam subulatam (*Raphida Neck.*) semibivalvem (f), vel bivalvem: valvulis externe convexis (g), varie flexam. Columella (dissepimentum) libera a basi ad apicem extensa, cui adhaerent

Semina numerosa (h) globosa, extus tenerrimo reticulo exarata et quasi tuberculata, matura nigerrima solida, filis ex fusco croceis, e duobus helicibus contortis, elasticis columellae adfixa (i).

Dematium verticillatum. 2. *Stilbospora pyriformis*. 3. *Stilbospora pyriformis*. 4. *Dematium antennaeforme*. 5. *Peziza lenticularis*.

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN
SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

- Trew, C. I. Cedrorum Libani hist. 4. Norimb.
57.
- Turra, Farsetia novum genus 4. Venet. 65.
- Uslar, I. von, Fragmente neuerer Pflanzenkun-
de. 8. Braunschw. 94.
- Usteri, P. Annalen der Botanik 12. St. 8. Zü-
rich, 91 - 94.
- Vahl, M. Symb. botan. 3. P. fol. Havn. 90 - 94.
- Vaillant, S. Sermo de structura florum. 4. L.
B. 48.
- Vandelli, D. Viridar. Grisley lusit. 8. Olisip.
89.
- Vellozo, Ios. Flora fluminensis. 6. vol. fol. Lisb.
(inedita).
- Ventenat, sur les parties des Mousses qui ont
été regardées comme fleurs mâles ou fleurs
femelle. (Journ. d'hist. natur. T. 1. 4. Pa-
ris. 92.)
- Viborg, E. Forsög til syst. Danske Navne af
indenlandske Planter. 8. Kopenh. 95.
- Villars, Hist. des Plantes de Dauph. 4. T. 8.
Gratianop. 87.
- Vitman, Fulg. Summa plantarum — 6. T. 8. Me-
diol. 89 92.
- Vogel, B. C. Supplem. plant. select. 2. Dec. fol.
92.
- Wachendorf Hort. ultraject. 8. Tr. ad Rh. 47.
- Walther, F. L. Theoret. pract. Handbuch der
Naturgesch. der Holzarten. 8. Bayr. 95.
- Weber, G. H. Supplem. Flor. holsat. 8. Kilon.
87.
- Weigel, C. E. Flora pomerano - rugica. 8. Be-
rol. 69.

STILBOSPORA PYRIFORMIS.

A priori differt: convexis lituris, oblongis, sinuatis, angulosis, divaricatis, confluentibus, compactis, ope lentis obovatis

Lomentis vel pyriformibus; intra septula transversa pellucens granula demum prorumpentia.

PEZIZA LENTICULARIS.

Classis et Ordo:

CRYPTOGAMIA FUNGI (UTRICULOSA).

Dematio insidebat nitida ac durabilis plantula brevi stipite instructa, qui sensim dilatatur in

Cupulam seu potius Acetabulum modice cavum, etiam disco convexo vel plano instructum, marginatum. Color ex terreo lutens. Substantia carnea fibrosa, intra quam ad lentis augmentum apparent

Utriculi e basi angusta cylindrici, tenuissimi e pellucida alba membrana pro more hujus ordinis continent

Besimina 8 - 10, contigua minutissima, pellucida, granulosa.

AVCTORES BOTANICI

seculi XVIII.

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Weinmann, I. Tract. de Chara Caesaris. Carls-
ruh. 8. 69.
- Weis, F. W. Vorbereit. zum Unter. in den
Grundk. der Bot. 4. Gött. 81.
- Weizenbeck, G. A. Bot. Unterh. 2. I. 8. Münch.
85.
- Wendland, I. C. Ericarum icones — 1. F. 4.
Tur. 94.
- Wernischeck, I. Genera plantar. 8. Vien. 64.
- Wilcke, S. G. Hort. Gryph. 8. 65.
- Willdenow, C. L. Phytographia. F. 1. fol. Erl.
94.
- Willemet, Monographie — de la Fam. des plant.
étoilées. 8. Strasb. 91.
- Willich, C. L. Observat. bot. 8. Gott. 62.
- Winterl, I. I. Index horti botan. Univ. hun-
gar. quae Pestini est. 8. 88.
- Withering, W, and Stokes, I. Bot. Arrang. of
British Plants. Ed. 2. 3. vol. 8. 92.
- Woodward, T. I. The hist. of a new spec. of
Fucus (Lin. Trans. v. 1.)
- Woodville, W. Medical Botany. 3. v. 4. Lond.
92.
- Wolf, N. M. de, Gen. et Spec Plant. vocab.
charact. definita. 8. in Marienwerd. 81.
- Wolff, I. P. De filicum seminibus Ien. 70. (Lud-
wig delect. opusc. ad sc. nat. spect. v. 1.
8. 90.)
- Wright, W. An account of the Med. Pl. gro-
wing in Iamaica (Lond. medic. Journ. v. 3.
P. III.)
- Wulfen, F. X. a, Plantae rar. Carinth. (Jacq.
Collect. 4. vol. 4. Vind. 86 - 90.)

AVCTORES BOTANICI

seculi XVIII.

VERZEICHNIS DER BOTANISCHEN
SCHRIFTEN

des 18 Jahrhunderts.

-
- Wünsch, C. E. Briefw. über die Nat. product.
27. 8. Leipz. 87.
- Xuarez, G. et L. Gily, Osservazioni fitolog. —
4. Roma, 89.
- Zannichelli, G. G. Istoria della Piante di Lidi.
fol. Venet. 35.
- Zinn, I. G. Observ. bot. et anat. (Com. Gott.
a. 55. 4.)
- Zorn, I. Americ. Gewächse (Jacq. select. stirp.
americ.) 3. Cent. 8. Nürnberg. 88.
- Zuccagni, Att. Dissertazione — di una pianta
pauz. dell' Abiss. 8. Firenze, 75.

DEUTSCHLANDS FLORA.

.....

— Cum rerum Natura nunquam magis quam
in minimis tota sit. PLIN.

VORBERICHT.

Es gereicht dem Forschungsgeist unseres Zeitalters zur Ehre, daß man angefangen hat, die sonst wohl für überflüssig, oder doch für minder wichtig angesehenen kleinen Vegetabilien *), welche im gemeinen Leben unter der Benennung von Mooss, Schwamm, Schimmel bekannt sind, im linneischen Pflanzensystem, als Servi, Vernaculi, Nomades — die letzte, 24te Klasse einnehmen — daß man *angefangen* hat, diese sorgfältiger, und an ihnen derselben mannigfaltigen, zum Theil mit größern Gewächsen übereinstimmenden, zum Theil auch sehr davon verschiedenen innern und äußern Bau zu beobachten. Nothwendig mußte auch die Anzahl der Arten zu gleicher Zeit dadurch vermehrt werden. Nur für Deutschland berechnet, kann man gegenwärtig verborgenblühende Gewächse (Cryptogama), wo nicht mehrere, doch gewiß eben so viele annehmen, als

(2

sicht-

*) Muscos et qui Muscas legit, huic aliud non suppetit negotium. — Projecta vilior Alga.

sichtbarblühende (phaenogama). Auch mich belehrte unter der Ausarbeitung dieses Taschenbuchs, die beständig zunehmende, noch lange nicht erschöpfte Anzahl, von der Unmöglichkeit, alle diese, nach und nach mir bekanntgewordene Cryptogamisten, bequem in einem Jahrgange unterzubringen. — Ich überliefere also hier dem botanischen Publicum vorläufig eine Abtheilung derselben; die vier sogenannten erstern linneischen Ordnungen, oder vielmehr Familien: *Miscellaneae*, *Filices*, *Musci*, *Hepaticae*. Eine diesen ähnliche Familie, besser, natürliche Ordnung, setzte ich zu: die *Lichenes*. Ausserdem versuchte ich nach dem Standort, der äussern Form, der Umhüllung, der Vermehrungs- und Fruchtheile, oder was man zur Zeit sonst dafür annehmen kann, Ordnungen, welche nur allein darauf begründet sind, zu errichten, deren Benennung und ausführliche Erklärung die zunächstfolgenden Blätter in der Kunstsprache enthalten. Zugleich muß ich hier bemerken, daß einige (den Knöpfen 2. 5. gegenüberstehende) Aufschriften der Ordnungen, welche sich auf eine frühere, aber nicht beibehaltene Eintheilung beziehen, nach diesen abzuändern sind.

In der Wahl der leichtern von sichtbaren äussern Theilen hergenommenen Charactere, so
wie

wie der Ordnungsfolge der Gattungen, glaube ich kaum bei der guten Absicht, die Kenntniß Manchem dadurch zu erleichtern — Entschuldigung zu bedürfen. Denn auch für diejenigen, welche eine schärfere und mühsamere Untersuchung der verborgenen Theile, oder eine grössere Anzahl von Gattungsnahmen, zumahlen bei den Laubmoosen, nicht scheuen, sind die Hedwigischen Charactere derselben, nach der *achten Ausgabe* der Linneischen *Gen. Pl.* mitgetheilt worden. Ich benutzte verschiedene zu Unterabtheilungen bei den Laubmoosen; in der Uebersetzung, daß es Anfangs leichter ist, Arten unter wenigen schon bekannten, aber schärfer bestimmten und abgetheilten Gattungen aufzufinden, als neue Gattungsnahmen und Charactere sich bekannt zu machen. Die zahlreiche Familie der Flechten, welche beinahe alle vorhergehende zusammengenommen an Menge der Arten und Halbarten übertrifft, suchte ich deswegen auf so wenige Gattungen zurückzuführen, als es nur immer die große Mannigfaltigkeit ihrer äußern Gestalt erlauben wollte. So wird man z. B. unter *Lobaria*, *Verrucaria*, verschiedene meiner ehemaligen Gattungen in Unterabtheilungen verwandelt finden, um dem Ungeübten das Aufsuchen der Arten zu erleichtern, oder doch durch minder auffallende Gattungscharacterenicht zu erschweren. Viele Arten und Gattun-

gen, welche man bisher unter die Flechten versetzte, wie *Lich. polyphyllus* Wulf., *pruinatus*, *ericetorum*, *capitatus* — *Endocarpon*, *Opegrapha* u. a. mussten nach denen zur Grundlage angenommenen Kennzeichen der Ordnung, davon getrennt und in andere Ordnungen verwiesen werden.

Das Verzeichniß der Arten ist zugleich eine getreue Angabe von dem, was ich vor mir hatte und was ich mit Ueberzeugung aufnehmen zu können glaubte. Die nach einer *differentia specifica* gesetzten Punkte zeigen auf eine damit vorgenommene Veränderung. Es folgen darauf die Nahmen der nachgesehenen und mit meinen Exemplaren verglichenen Schriften, die Anzeige des mir bekannten oder mitgetheilten Standorts, bei seltenen Arten, und in den Anmerkungen Einiges zur Berichtigung oder nähern Kenntniß derselben.

Der vorgesezte Asterisk deutet auf Arten, welche um Göttingen oder auf dem Harzgebürge zu finden sind. Varietäten, Halbarten (*subspecies*), auch Arten, welche ich als solche aufzuführen noch unentschlossen war, findet man entweder in Klammern () den Anmerkungen, oder ohne Bezifferung der nächstverwandten Art beigestellt.

Alles

Alles übrige, sowohl in Beziehung auf Schriften und Schriftstellerverzeichniß, als auf die Kupfer und ihre Beschreibung ist so wie bei dem ersten Jahrgang dieses Taschenbuchs. Hier mußte noch ein vollständiges Register angehängt werden, zur Erleichterung der öfters sehr verschiedenen Benennungen einer und derselben Art, oder zur Rückweisung der Verschiedenheit mehrerer gleichnamiger Arten.

Aufangs bin ich Willens gewesen, dem Werkchen eine ausführliche Erzählung aller aufeinander folgenden Entdeckungen in dieser Classe und ihre Würdigung vorzusetzen. Allein ich sahe mich genöthigt aus Mangel an Zeit — auch in der Erwartung Manches in der Folge vollständiger sagen zu können — mehrere Nachträge nebst einer bereits fertigen Carpo-logischen Tafel für einen künftigen Jahrgang zu versparen. Eine Verzögerung von der Art, hoffe ich, wird meiner Absicht in so fern zum Vortheil gereichen, da wahrscheinlich bis dahin neuere Entdeckungen sich an die Reihe der frühern werden anschließen und vieles deutlicher erkennen lassen, was gegenwärtig noch als unbekanntes Land in Dunkelheit verhüllt ist.

Es ist noch ein großer Theil zurück und auch noch Raum genug übrig zur Belehrung,
die

die ich mit Dank von Kunst- und Naturge-
weilten annehmen und mich dadurch mehr
oder weniger berufen fühlen werde, auf diesem
noch ungebalmten Wege fortzuwandeln und
ihn von Hindernissen zu reinigen, oder es an-
dern zu überlassen, einen bessern Weg, zur
Kenntniß cryptogamischer Gewächse, auszu-
mitteln.

Göttingen, im Lenzmonat
1796.

G. F. H.

Nachschrift.

Der jüngsten Aeusserung des Hrn. Verf. ge-
mäßs, sollen von Zeit zu Zeit in kleinen Nach-
trägen die Zusätze den Liebhabern der hier
beschriebenen Gewächse (vielleicht bis Ostern
1797. die Fortsetzung davon, oder eine neue
Angabe des ersten Theils) überliefert und zur
Bekanntmachung und Mittheilung ihrer Beiträ-
ge alle um Deutschlands *Flora* verdiente Ge-
lehrte aufgefordert werden. Die *addenda et*
emendanda bittet man gehörigen Orts einzu-
tragen, das Blat 91 aber, welches der zweiten
Lieferung beigedruckt worden, von der erstern
wegzunehmen.

Der Verleger.

Classis XXIV.

C R Y P T O G A M I A.

ORDINES partibus fructus ratione situs vel figuræ exstructæ sequentes sunt:

I. **RADICALIA.** Fructificationes inter radices vel folia sitæ.

1. Marsilea. Fructificat. 2 - 3. pedicellatæ subcompressæ e petiolo folii paulo supra radicem egredientes.
2. Salvinia. Fructificat. 4 - 9. glomeratæ inter radices verticillatæ.
3. Pilularia. Fructificat. solitariae inter folia et radicem subsessiles.
4. Isoetes. Fructificat. intra basin dilatam foliorum.

II. **PELTATA.** Fructificationes in clavam ovato - oblongam terminalem digestæ, verticillatæ, stipitatae. Singula peltata, orbiculato - polygonæ, inferne adnectens tubos 4 - 7. stipiti

) () (

paral.

CRYPT. ANNULATA.

parallelus, apice rotundatus, interne deliscentes, in quibus grana (*Semina Hedw.*) plurima subglobosa apiculata, quibus basi adnexa fila quatuor per paria coadunata, elastica, terminata spathula (*Anthera Hedw.*) pulverulenta.

5. *Equisetum*. Fructificat. angulatae inferne deliscentes 4-7 loculatae.

Haec secundum octavam editionem *Gen. pl. Lin.* adnumerato *Lycopodio* audiunt: MISCELLANAE.

III. ANNULATA. Fructificationes in aversa pagina frondium in lineas, puncta, in disco vel margine vel per totam paginam digestae. Squama s. *involucrum* e folio enatum varie deliscentis, sub quo capsulae subglobosae stipitatae annulo articulado elastico cinctae, transversim rupientes emittentes corpuscula seminiformia.

6. *Polypodium*. Capsulae distributae in puncta subrotunda.

7. *Ono-*

7. Onoclea. Capsulae distributae sub frondis pinnis pinnulisque recurvato contractis.
8. Pteris. Capsulae distributae in lineam subtus cingentem marginem frondis.
9. Asplenium. Capsulae distributae in lineas rectas, saepe confluentes.

IV. BIVALVIA. Fructificationes in spicas connatae, in racemos collectae vel in axillis squamarum vel ipsorum foliorum sessiles. Capsulae annulo destitutae, transversim dehiscentes, bivalves.

10. Ophioglossum. Spica articulata: articulis transversim dehiscentibus.
11. Osmunda. Spica racemosa; capsulae distinctae subglobosae sessiles vel substipitatae.
12. Lycopodium. Capsulae reniformes in axillis squamarum imbricatim digestarum spiciformium, vel in axillis foliorum sessiles.

CRYPT. CALYPTRATA.

Haec secundum octavam editionem
Gen. pl. Lin. excepto Lycopodio
audiunt: FILICES.

V. CALYPTRATA. Fructificationes femineae involutae *calyptra*, stylo coronata, nuda vel pilosa, laxa magna vel coarctata, quae capsulae adolescentis apici adhaeret eamque desuper tegit. *Capsula* (*Theca Hedw.*) unilocularis interne a basi ad apicem *columella* (sporangidio) instructa, *pedunculo* (setae) insidens, *perichaetio*, *vaginula* cineto, in plerisque transversim deliscens operculata: *operculo* annulato s. exannulato; basi interdum intumescens, dilatata in *apophysin* orbicularem, subglobosam, umbraculiformem; *orificio* nudo vel obsito *epiphragmate*, *peristomio* simplici: *dentibus* s. *ciliis* 4-80, erectis s. reflexis, rectis s. tortis capillaribus, triangularibus, lanceolatis s. setaceis, acutis s. obtusis, integris s. bifidis, bipartitis s. pertusis, margine lacinulatis

tis s. crenulatis; vel peristomio composito, duplici: interiori membranaeo, reticulato s. varie laciniato s. e pluribus distinctis dentibus, ciliis cum exterioribus alternantibus, constructo. Semina minuta, alternante contractione vel dilatatione peristomii emissa.

13. *Trentepohlia*. Partes fructificationis masculae et femineae ut in reliquis muscis. Capsula incognita. Corpuscula gemmiformia intra axillas foliorum ovata colorata squamis adnatis tecta.

14. *Phascum*. Capsula sessilis clausa cum rudimento operculi.

15. *Buxbaumia*. Capsula ovata obliqua basi ventricosa.

16. *Sphagnum*. Capsula apophysi orbiculari insidens, saepe calyptrae parte inferiore abrupta basi cincta.

17. *Splachnum*. Capsula apophysi maximae subglobosae s. umbraculiformi insidens. (Perist. simplex dentibus 8. geminatis.)

18. *Polytrichum*. Capsula interdum apophysi quadrangulae insidens. Calyptra ex apice deorsum pilosa. (Perist. simplex dentibus plusquam 30 membranula (epiphragmate) apice connexis.)
19. *Orthotrichum*. Calyptra sursum pilosa.
20. *Encalypta*. Calyptra campanulata, magna laxa, glabra.
21. *Gymnostomum*. Peristomium nullum.
22. *Tetraphis*. Peristomium simplex: dentibus 4 pyramidalibus. (Calyptra plicato - striata glabra.)
23. *Bryum*. Peristomium simplex: dentibus s. ciliis plusquam 4; calyptra glabra capsulae insidens coarctata; seta terminalis; flos gemmi-vel capituliformis. (Caulis erectus.)
24. *Mnium*. Peristomium duplex: exterius dentibus 16; interius membranaceum lacinulatum, pertusum; calyptra

lyptra glabra; flos masculus femineus-
que terminalis. (Caulis erectus.)

25. Hypnum. Peristomii dentes simpli-
ci duplicive ordine; flos masculus fe-
mineusque axillaris, gemmaceus. (Cau-
lis frondosus, ramosus.)

26. Fontinalis. Peristomium duplex: ex-
terius dentibus 16; interius reticula-
tum. Capsulae seta brevis perichaetio
imbricato obvoluta.

27. Andreaea. Capsula setae perichaetio
imbricato obvolutae, insidens, uni-
ocularis, medio dehiscens 4 - valvis:
valvulis apice calyptra connexis.

Haec secundum octavam editionem

Gen. pl. Lin. exceptis Trentepoh-
lia et Andreaea, audiunt: MUSCI,
quorum genera secundum metho-
dum *Hedwigii* sequentia assumpta
sunt:

PHASCUM. CAPS. ovata, subsessilis 1.
setae brevis insidens, undique clausa,
interdum cum rudimento operculi,
nunquam dehiscente. Masc. subdi-

) () (4

scoi.

CRYPT. CALYPTRATA.

scoides terminales, vel gemmacei axillares.

SPHAGNUM. CAPS. sessilis in orbiculo, pedunculum terminante; saepe calyptrae parte inferiore abrupta cincta. *Peristomium* nullum.

GYMNOSTOMUM. CAPS. ovata. *Peristomium* nullum. MASC. gemmacei in eadem, vel discoidei in distincta planta.

Obs. *Gymnostomum Hedw. Masc. discoidei in distincto individuo.*

Hedwigia H. Masc. gemmacei in eodem, axillares.

TETRAPHS. CAPS. oblonga. *Peristomium simplex: dentibus quatuor, pyramidalibus.*

MASC. discoidei, terminales, in distincta planta.

OCTOBLEPHARIS. CAPS. ovata. *Peristomium simplex: dentibus octo, triangularibus.*

MASC.

CRYPT. CALYPTRATA.

MASC. subdiscoidei, axillares, in eadem planta.

SPLACHNUM. CAPS. cylindracea, *apophysi umbraculiformi*, s. subglobosae intus cavae, insidens. *Peristomium simplex: dentibus octo, geminatis.*

Masc. gemmaceo - discoideo; pedunculati soli fertiles.

GRIMMIA. CAPSULA ovata. *Peristomium simplex: dentibus sedecim, latiusculis.*

MASC. gemmacei, in eadem vel distincta planta.

OBS. *Grimmia H. Perist. dentes reflexiles. Masc. axillares gemmacei, terminales capitulif. in eadem planta.*

Weissia H. Perist. dentes integri. Masc. capitulif. terminales in diversa.

ENCALYPTA. CAPS. cylindracea. *Peristomium simplex: dentibus sedecim, angustis. Calyptra campanulata, magna, laxa, glabra.*

CRYPT. CALYPTRATA.

MASC. gemmacei, axillares, in eodem individuo.

DICRANUM. CAPS. ovato-oblonga. *Peristomium* simplex: *dentibus* sedecim, latiusculis, bifidis.

MASC. gemmacei axillares, in eadem s. distincta planta.

OBS. Fissidens II. *Masc. fl. gemmacei axillares in eadem planta.*

Dicranum II. *Masc. capitulif. terminales in distincta planta.*

TRICHOSTOMUM. CAPS. oblonga. *Peristomium* simplex: *dentibus* sedecim, bipartitis: laciniis setaceis rectis longis.

MASC. gemmacei axillares.

DIDYMODON. CAPS. oblonga. *Peristom.* simplex: *dentibus* 32, filiformibus, per paria approximatis.

Masc. axillares s. terminales.

TORTULA. CAPS. oblonga s. cylindracea. *Perist.* simplex: *dentibus* capillaribus, spiraliter convolutis.

MASC.

CRYPT. CALYPTRATA.

MASC. gemmacei in eodem vel diverso individuo.

OBS. Tortula H. *Masc. gemmac. in eodem individuo.*

Barbula H. *Masc. capitulif. in diverso individuo.*

WEISSIA. CAPS. ovata. *Peristomium duplex: exterius dentibus sedecim, latiusculis: interius dentibus totidem, latiusculis, erosis; s. nullum. Calyptra conica, pilis erectis.*

MASC. gemmacei axillares et terminales.

POHLIA. CAPS. ovato-oblonga, *apophysi obconicae, angustiori insidens. Peristomium duplex: exterius dentibus sedecim, latiusculis; interius membrana sedecimpartita.*

MASC. gemmacei in distincta planta.

FUNARIA. CAPS. obconica. *Peristomium duplex: exterius dentibus sedecim, obliquis, apice cohaerentibus; interius*

CRYPT. CALYPTRATA.

rius ciliis totidem, membranaceis, planis.

MASC. discoidei in diversa planta.

BRYUM. CAPS. ovato-oblonga. *Peristomium duplex: exterius dentibus sedecim, latiusculis, acutis; interius membranaceum, plicato-carinatum, laciniatum; laciniis latiusculis capillari-busque alternis.*

MASC. capitati s. discoidei s. gemmacei in eadem s. diversa planta.

OBS. Bryum H. *Masc. capituliformes.*

Mnium H. *Masc. discoidei.*

Webera H. *Peristomium interius cum et absque ciliis.*

TIMMIA. CAPS. ovata. *Peristomium duplex: exterius dentibus sedecim, latiusculis; interius obsolete sulcatum, laciniatum: laciniis subaequalibus, pertusis.*

MASC. gemmacei, pedunculati, axillares.

MEESIA.

CRYPT. CALYPTRATA.

MEESIA. CAPS. oblonga. *Peristomium* duplex: *exterius* dentibus sedecim, brevibus, obtusis; *interius* ciliis totidem, acutis, distinctis vel opere reticulato connexis.

MASC. femineis approximati vel discoidei in diversa planta.

BARTRAMIA. CAPS. sphaerica, striata. *Peristomium* duplex: *exterius* dentibus sedecim, cuneiformibus; *interius* membranaceum, plicato - carinatum, apice lacinulatum.

MASC. Femineis approximati.

FONTINALIS. CAPS. insidens setae brevi, *perichaetio* imbricato obvolutae, oblongae. *Peristomium* duplex: *exterius* dentibus sedecim, latiusculis; *interius* reticulatum.

MASC. gemmacei axillares.

HYPNUM. CAPS. oblonga. *Peristomium* duplex: *exterius* dentibus sedecim, latiusculis; *interius* membranaceum, aequale,

CRYPT. CALYPTRATA.

quale, laciniatum: laciniis latiusculis, cum interjectis capillaribus.

MASC. gemmacei in diversis plantis.

LESKIA. CAPS. oblonga. *Peristomium* duplex: *exterius* dentibus sedecim, acutis; *interius* membranaceum, partitum in lacinias aequales.

MASC. gemmacei in diversis individuis.

NECKERA. CAPS. oblonga. *Peristomium* duplex: *exterius* dentibus sedecim, acutis; *interius* ciliis sedecim distinctis, cum dentibus exterioris alternantibus.

MASC. gemmacei in distinctis plantis.

BUXBAUMIA. CAPS. ovata, obliqua, basi hinc ventricosa, depressa, in altera specie marginata. *Peristomium* duplex: *exterius* dentibus sedecim, truncatis; *interius* membranaceum, plicatum.

MASC. discoidei.

POLYTRICHUM. CAPS. oblonga, interdum quadrangula, *apophysi* quadrangulae

gulae insidens. *Peristomium* duplex: *exterius* dentibus 32, brevibus, basi coalitis, incurvis; *interius* membrana plana, transversa, apicibus dentium exterioris adglutinata. *Calyptra* pilosa.

MASC. discoidei.

* PTERIGYNANDRUM. *Hedw. stirp.* 4. 1. p. 16. *Hypni* sp. *Linn.* *Peristomium* simplex sedecimdentatum. *Flos* masculus femineusque alaris.

VI. ECALYPTRATA. Fructificationes femineae involutae calyptra; quae apice finditur capsulamque vel seminiiformia corpuscula transmittit. Capsula apice, longitudinaliter, irregulariter dehiscens foeta seminibus, funiculo in helicem torto s. e binis helicibus constructo elastico, plerumque adfixis.

28. *Jungermannia*. Capsula subglobosa unilocularis 4-valvis: apice dehiscens longitudinaliter.

29. *Mar-*

29. *Marchantia*. Capsula subglobosa unilocularis apice dehiscens: dentibus suboctonis; receptaculo communi pedunculato affixa.

30. *Targionia*. Capsula subsessilis globosa intra calycem bivalvem, sub apice frondis situm, pericarpium mentientem.

31. *Anthoceros*. Capsula longissima subulata apice dehiscens semibivalvis, basi calyce vaginata.

32. *Blasia*. Capsula obliqua frondi immersa, tubo extrorsum coronata persistente.

33. *Riccia*. Capsula subglobosa frondi immersa tubo coronata trajecto.

Haec secundum octavam editionem

Gen. pl. Lin. adnumerato Sphaerocarpo, audiunt: HEPATICAE.

VII. SCUTELLATA. Fructificationes femineae in scutellis orbicularibus, planis, convexis, radiatis vel nudis, marginatis s. immarginatis, vel spiraliter contortis,

Classis XXIV.

C R Y P T O G A M I A

R A D I C A L I A (Miscellaneae).

MARSILEA (Marsilio) *Lin. Gen. pl. ed. 8.*
1614.

Fructificationes radicales 2-3, pedicellatae, subcompressae ovales.

M. quadrifolia, foliis quaternis integerrimis *L. Iuss. A. G. 1740. t. 15.*

In aquis stagnantibus paludosis (Alsat. Palat. Salisb. *Funck*; March. Brand. *Ioachimi*; Bavar. *Schranck*, *Schmidt*; Francon. *Frischmann.* —) Iul. Aug.

2. SALVINIA (Salvinie) *G. pl. 1617.*

Fructificationes 4 - 9, glomeratae, inter radices verticillatas.

s. natans, foliis oppositis simplicibus *L. (Marsil. natans) Mich. Gen. t. 58. Neck. A. P. 3. t. 21.*

In aquis stagnantibus, fossis (Palat. Bavar. *Schranck*; Siles. *Matt.* Barbi *Scholl.* Berol. *Wild.* —) Iun. Aug.

3. PILULARIA (Pillenkraut) *G. pl. 1619.*

Fructificationes solitariae, instar pilularum inter folia et radicem subsessiles.

* *P. globulifera* L. *Bull. herb. t. 375. Bolt. fil. 40.*

In inundatis (Holsat. Megap. Brem. Oldenb. Hannover. Hanov. Erlang. etc.) Inn. Sept.

4. *ISOETES* (Brachsenkraut) *G. pl. 1620.*

Fructificatio intra basin dilatatam foliorum.

1. *lacustris*, foliis subulatis semiteretibus *L. Bolt. fil. 41. Fl. dan. t. 191.*

In pratis paludosis (Holsat. *Wigg.*) Inn. Sept.

PELTATA (Miscellaneae).

5. *EQUISETUM* (Kandelwisch) *G. pl. 1614.*

Spica ovata. Fructificationes peltatae, angulatae, inferne deliscentes, 4-7 loculares.

* 1. *E. hiemale*, caule nudo scabro, basi subramoso *L. Bolt. fil. 39.*

In sylvaticis uliginosis, Maj. Aug. (Vaginae breves apice crenulatae nigrae.)

* 2. *E. limosum*, caule subnudo laevi *L. Bolt. fil. 38.*

In paludosis stagnantibus; Maj. Inn.

* 3. *E. fluviatile*, caule striato, frondibus subsimplicibus *L. Bolt. fil. 36.*

In fossis, ad ripas; Maj. Inn. (Utramque speciem conjungit *Ehrhart* et vocat: *Equisetum Heleocharin*, canibus aequalibus, subramosis teretibus, striatis, fistulosis viridibus; ramis sub.

subsimplicibus 3 - sulcatis sterilibus; dentibus vaginalium plurimis subulatis acutissimis: vaginalium quinis, dorso minime sulcatis Beitr. 2. 159. Var. frondibus longissimis internodia ter quaterve superantibus, et frondibus subsedecim internodia non aequantibus: Eq. *polymorphum* Schrank, *Donaumoor*, 91. 4. 1794.)

*4. *E. palustre*, caule angulato, frondibus simplicibus L. *Bolt. fil.* 33.

In fossis, pratis paludosis; Maj. Iul. (Equisetum *polystachyum*, foliis apice spicatis, spica terminali majore. *Raj. Angl. Ed. 3. t. 5. t. 3.* *Equis. nodosum*, stipite sulcato, ramoso aphylo; geniculis incrassatis, cum ramis florifero Schrank, *Donaumoor* 91.)

*5. *E. arvense*, scapo fructificante nudo, sterili frondoso L. *Fl. lond. Bolt. fil.* 34.

In agris, arvis; Mart. Apr. (Equisetum *pratense*, caulibus ramosis, sulcatis scaberrimis. *Ehrh. Beitr.* 3. 77.)

*6. *E. sylvaticum*, caule spicato, frondibus compositis L. *Bolt. fil.* 32. 33.

In nemorosis; Apr. Maj. (Equis. *capillare*, frondibus tenuissimis compositis sterilibus.)

7. *E. Telmateja*, scapo fructificante dense vaginato, fronde sterili ramoso - verticillata. *Ehrh. pl. crypt. exsicc.* 31.

In nemorosis (Hanover., in monte Deister *Ehrh. Erlang. Schreb. Com. lipp. Schrader*; Stuttgart. *Vulpinus Ehrh. Beitr.* 6. 69. Hanov. *Gaertner Ehrh. Beitr.* 5. 167. —) Maj. Aug. (Speciosissima stirps caulibus inaequalibus, teretibus levibus glabris: fructificante simplicissimo, albo rubello mar-

cescente; sterili ramoso, fistuloso-poroso, albo, ramis subquadrigenis octosulcatis: sulcis alternis majoribus; dentibus vaginarum subulato-setaceis, scariosis: vaginularum quaternis, dorso sulcatis *Ehrh. Beitr.* 2. 159.)

ANNULATA

(Filices.)

6. POLYPODIUM (Tüpfelfarn) *G. pl.* 1632.

Capsulae distributae in puncta subrotunda, per paginam frondis aversam.

Fronde pinnatifida.

* 1. *P. vulgare*, frondibus pinnatifidis: pin-
nis oblongis subserratis obtusis; radice
squamata *L. Fl. lond. Bull. herb.* t. 191.
Bolt. fil. 18.

In montosis nemorosis; *Maj. Oct.* (Var. pin-
nis lobatis, proliferis *Bolt. fil.* 2. t. 5. a. b. *Pol.*
cambricum. — Involucrum obsoletum, quod
etiam in aliis *Polyp.* speciebus observatur.)

Fronde pinnata.

2. *P. Lonchitis*, frondibus pinnatis: pin-
nis lunulatis ciliato-serratis declinatis; sti-
pit. strigosis *L. Fl. dan.* 497. *Bolt. fil.* 19.

In sylvis montosis subalpinis (*Siles. Carn.*
Austr. Bavar. Salisb. Tyrol. etc.) *Maj. Oct.*
(Involucrum subumbilicatum.)

Fronde

Fronde bipinnatifida.

* 3. p. *Thelypteris*, fronde pinnata: pinnis pinnatifidis: pinnulis triangularibus reflexis. L. *Schmid. ic. t. 11, 13.*

In nemorosis humidis; Jun. Oct. (Involucrum subreniforme margine laciniatum.)

* 4. p. *Phegopteris*, fronde pinnata: pinnis pinnatifidis, basi angustatis coadunatis. L. *Bolt. fil. 20.*

In sylvaticis, montosis humidis; Maj. Oct.

5. p. *Marantae*, frondibus bipinnatifidis: pinnis opposito-coadunatis subtus hirsutissimis, basi subdentatis. L. (Acrost. *Marantae.*)

In rupibus abruptis (Bohem. In arce Tollenstein Lusatae contermina; in monte Kleis, in ditione Furstenberg, in Styria *Haenke.*)

* 6. p. *Oreopteris*, fronde pinnata: pinnis lanceolatis pinnatifidis: pinnulis integris oblongis obtusis. *Ehrh. Bolt. fil. 22.* (Pol. *Thelypteris.*)

In nemorosis montosis (Salisb. *Funck*; Berol. *Wild. Hass. Vogler*; Com. lipp. *Schrader*; Saxon. infer. Hannov. *Schwalenb.* in monte Deister; *Ehrh. Ratisb. Masr* etc. Pol. *montanum Vogl. Wild. Roth.*) Jun. Jul. (Radices fibrosae copiosissimae, implicatae. Rhizoma basibus stipitum totum obtectum. Stipites subpaleacei. frondes subbipinnatae. Pinnae primariae ensiformes, subpatentissimae, minime reflexae. Pinnae secundariae obtusae, integerrimae glomeruli seminum solitarii, submarginales, remotiusculi *Ehrh. Beitr. 4. 44.*)

7. P. *Callipteris*, fronde pinnata: pinnis ovato - oblongis profunde pinuatifidis vel pinnatis: pinnulis ovatis, ovato - oblongis, duplicato serratis: serraturis mucronatis. *Ehrh. pl. crypt.* 55. *Seguier. Veron.* 5. t. 1. fig. 1.

In nemorosis montosis (*Megap. Timm*; *Hannov. Ehrh.* -) Jul. Aug. (Var. major serraturis acutis.)

* 8. P. *Filix mas*, fronde pinnata: pinnis pinatifidis vel pinnatis: pinnulis oblongis obtusis crenulatis; stipite paleaceo. L. *Bolt. fil.* 24. *Bull. herb.* t. 183.

In nemorosis; Maj. Oct. (Involucrum reniforme.)

Fronde bipinnata.

9. P. *rigidum*, fronde bipinnata: pinnulis ovato - lanceolatis incis: laciniis conniventi 2 - 3 dentatis; stipite paleaceo.

In montosis subalpinis (*Salisb. Funck.* stipite paleaceo, statura pyramidata, pedali et ultra, colore ex flavescente viridi, acervulis fructific. crassis, rigidiore et angustiore fronde, pinnis pinnulisque, differt a *Polyp. Callipt.* et dentato, nec non a *Pol. rigido* *Syst. nat.* ed. 13. (*Acrost. longifol.* 1294.) Involucrum reniforme dilute ru. fescens.)

* 10. P. *Filix femina*, fronde bipinnata: pinnulis ovatis serratis obtusiusculis: serraturis 2 - 3 fidis. L. *Bolt. fil.* 25. *Pluk. phyt.* 181. fig. 2. *Bot. Mag.* 9. fig. 12.

In nemorosis; Maj. Oct.

* 11. P.

* 11. *P. dentatum*, fronde bipinnata: pinnulis ovato-lanceolatis incisive dentatis; fructificationibus biserialibus crassis. *Mull. Fridr. t. 2. fig. 3.*

In sylvaticis montosis; Maj. Oct. (Affine *P. trillido* excepta rigidior texture, saturatiore colore, pinnulis et fructificat. majoribus. Involucrum semiumbilicatum costam versus dehiscens.)

12. *P. incisum*, fronde bipinnata: pinnulis angustis, lineari-vel ovato-lanceolatis, margine argute incisive dentatis, fructificat. biserialibus crassis, demum confluentibus. *Pluk. phyt. t. 90. fig. 4. Bot. Mag. l. c. fig. 13.*

In sylvaticis, umbrosis; Maj. Oct. (Involucrum semiumbilicatum costam versus dehiscens.)

* 13. *P. trifidum*, fronde bipinnata: pinnulis lineari-lanceolatis incisive: laciniis apice conniventi-trifidis; fructificat. sparsis.

In nemorosis hinc inde cum sequenti, molli-
tie ac habitu conveniens; Maj. Oct.

14. *P. molle*, fronde bipinnata: pinnulis lanceolatis pinnatifidis: laciniis linearibus apice conniventi-serratis. *Schreb. Ehrh. pl. crypt. 91.*

In nemoribus ad arborum radices; Maj. Oct.

* 15. *P. dilatatum*, fronde bipinnata, stipite foliolis et pinnis basi dilatatis, pinnatifidis: pinnulis serrato-incisive mucronatis

natis linearibus; fructificat. sparsis in angulorum incisuris. *Mull. Fridr. t. 2. fig. 4.*

In sylvaticis montosis; Maj. Oct. (Stipite ad foliolorum conjugationem et pinnis inferioribus dilatatis, pinnulisque angustioribus facile a *P. cristato* distinguitur. Pol. aristatum *Bellardi Append. ad flor. pedemont. v. Mem. de l'Acad. R. d. Sc. de Turin v. 5. p. 155.*)

16. *P. tanacetifolium*, fronde bipinnata, stipite et pinnis basi aequalibus, pinnatifidis: pinnulis linearibus inciso - serratis mucronatis; fructificat. sparsis in angulorum serraturis.

In sylvaticis montosis hinc inde; Maj. Oct. (Involucrum subreniforme.)

* 17. *P. cristatum*, fronde bipinnata: pinnis pinnatifidis, pinnulis ovato - oblongis duplicato - serratis: serraturis spinoso - ciliatis conniventibus. *L. Flor. dan. 707. Bolt. fil. 25. Mull. Fridr. t. 2. fig. 2. Bot. Mag. l. c. fig. 11.*

In nemorosis montosis; Maj. Oct.

* 18. *P. aculeatum*, fronde bipinnata: pinnulis lunulatis ciliato - dentatis; stipite strigoso. *L. Bolt. fil. 26. Pluk. phyt. 180. fig. 2.*

In sylvis montosis (Bav. Carn. Hercyn. Francon. Tyrol. Nassov. Palat. etc.) Jun. Oct. (*Pol. appendiculatum*, fronde bipinnata, pinnulis lunulatis appendiculatis ciliato - dentatis. *Pluk. phyt. 180. fig. 1.*)

* 19.

* 19. *P. fragile*, fronde bipinnata: pinnulis ovatis incisiss crenulatis. L. *Bolt. fil.* 27. *Flor. dan.* 401. *Bot. Mag. l. c. fig.* 14. a, b.

In muris, fissuris rupium; Iun. Sept. (Pol. *denticulatum*, frond. bipinnatis, pinnis ovatis obtusis incisiss dentatis *Dicks. Fasc. tert. pl. crypt. t. 7. fig.* 1.

* 20. *P. anthriscifolium*, fronde bipinnata: pinnulis pinnatifidis, inciso - denticulatis. *Bot. Mag. l. c. fig.* 14. c. *Pluk. phyt.* 180. *fig.* 5.

In rupestribus, sylvaticis; Iun. Sept. (Pol. *angustatum*, frondibus bipinnatis: pinnulis lanceolatis pinnatifidis, inciso - denticulatis; fructificat. crassioribus. *Bot. Mag. l. c. e.*)

* 21. *P. cynapifolium*, fronde bipinnata: pinnis pinnulisque cuneiformibus, incisiss denticulatis, venosis.

Hinc inde cum priori; Iun. Sept.

22. *P. tenue*, fronde bipinnata: pinnulis pinnatifidis angustis margine denticulatis. *Bot. Mag. l. c. fig.* 14. d. *Pluk. phyt.* 79. *fig.* 3.

In montosis; Iul. Sept.

23. *P. fumarioides*, fronde bipinnata: pinnis pinnulisque distantibus margine exscissis. *Seguier. veron.* 3. t. 2. *fig.* 3. (quoad habitum.)

In montosis subalpinis; Iul. Sept. (Involucrum in spec. 19 - 25. ut plurimum operculatum s. convexum sine umbilico.)

24. *P.*

24. *P. alpinum*, frondibus alterne tripinnatis, pinnulis oblongis, vage incis: laciniis obtusis apice brevissime bifidis *Wulf. Jacq. coll. 2. 171. ic. pl. Vol. 2. fasc. 6.*

In summitate alpium (lithopolitanarum *Wulf.*)

25. *P. pedicularifolium*, fronde bipinnata: pinnulis linearibus crenulatis: crenis cristatis; involucris semilunatis. *Pluk. phyt. 180. fig. 6. Bolt. fil. 2. fig. 6. (Polypod. rhaeticum.)*

In subalpinis, montosis; Jul. Sept. (Excepto Polyp. fontano (in Helvetia minime raro, in Germania vix unquam reperto) *Bolt. fil. 2. Pluk. phyt. 89. fig. 2. rhaeticum et regium* Lin. incertae species.)

Fronde supradecomposita.

26. *P. montanum*, fronde tenera triangulari triplicato - pinnata: pinnulis pinnatifidis: laciniis (subfalcatis) obtusis argute incis. *Allion. Pluk. phyt. 89. fig. 4.*

In sylvaticis subalpinis (Aust. Tyrol. *Haenke.* — Ad Cyatheam refertur a cel. I. E. *Smith* in methodica sua dispositione Filicum ab involucro desumpta v. *Mem. de l'Acad. R. d. Sc. de Turin, v. 5. p. 40. 4. 1795.*)

* 27. *P. Dryopteris*, frond. supradecompositis, foliolis ternis bipinnatis L. *Bolt. fil. 28.*

Ad arborum truncos, in fissuris rupium; Jun. Sept.

7. *ONOCLEA* (Rollfarrn) *G. pl.* 1622.

Capsulae sub frondis pinnis pinnulisque recurvato contractis.

* 1. o. *Struthiopteris*, frondibus sterilibus bipinnatifidis, fructificante bipinnatifida disticha. *L. Flor. dan. t.* 169. (*Osm. Struthiop.*)

In nemorosis montosis (Siles. Thuring. Hercyn. Saxon. Tyrol. etc.) Jun. Jul.

* 2. o. *Spicant*, frondibus sterilibus pinnatifidis, fructificante pinnata disticha. *L. Flor. Lond. Bolt. fil. t.* 6. (*Osm. Spicant.*)

In nemorosis rupestribus (Siles. Bavar. Salisb. Carn. Holsat. Saxon. Franc. Hass. Brem. Oldenb. Hannov. etc.) Maj. Jun. (*Blechnum Spicant Smith. l. c.*) *Roth in Annalen d. Bot.* 10. p. 36.

3. o. *crispa*, frondibus sterilibus et fructificantibus supradecompositis; foliolis alternis subrotundis incis. *L. Bolt. fil. t.* 7. *Flor. dan. t.* 490. (*Osm. crispa.*)

In sylvis humidis (Siles. *Mattuschk. Haenke.*) Maj. Jun. (Omnes species, nec non *Onoclea sensibilis*, quas examinavi capsulis gaudent annulatis.)

8. *PTERIS* (Saumfarrn) *G. pl.* 1626.

Capsulae in lineam continuam, subtus cingentem marginem frondis, digestae.

* 1. *P. aquilina*, frondibus supradecompositis: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis, superioribus minoribus. L. *Bolt. fil. t. 10. Bull. herb. t. 207.*

In sylvis, nemorosis ad margines; Iul. Aug.

9. *ASPLENIVM* (Strichsarn) *G. pl. 1631.*

Capsulae in lineas rectas disco frondis subjectas, dispositae.

1. *A. Adiantum nigrum*, frondibus subtripinnatis: foliolis alternis: pinnis lanceolatis inciso serratis. L. *Bot. Mag. 9. t. 1. f. 7.*

In rupium fissuris; Apr. — Oct.

*(*Adiantum lanceolatum*, frondibus duplicato - pinnatis lanceolatis: foliolis alternis, pinnis obovatis inciso - serratis. *Huds. With. Bolt. fil. t. 17. A priori pinnulis latioribus obovatis, statura diversum.*)

* 2. *A. Ruta muraria*, frondibus alternim decompositis: foliolis cuneiformibus crenulatis. L. *Bull. herb. t. 195. Bolt. fil. t. 16.*

Ad muros, in rupium fissuris; Iun. Oct.

* 3. *A. septentrionale*, frondibus bifurcatis laciniatis linearibus. L. *Bolt. fil. t. 8. (Acrost. septentr.)*

In rupium fissuris (Austr. Siles. Carn. Carinth. Bavar. Palat. Saxon. Thur. etc.) Iun. Oct. (Caps. acer.

acervuli in juniori stirpe distincta lineares, dum confluentes.)

* 4. *A. germanicum*, frondibus pinnatis: pinnis alternis cuneiformibus superne incis, 2-3-fidis. *Weis. Jacq. misc. 2. t. 5.* (*Asplen. alternifolium.*)

In muris, ad rupes (Austr. Carinth. Holsat. Nassov. Lips. etc.) Inn. Oct.

* 5. *A. Trichomanes*, frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis. L. *Bolt. fil. t. 13.* *Bull. herb. t. 185.*

Ad muros, rupes; Apr. — Oct. (Var. pinnis lobatis crenatis *Bolt. l. c. t. 2. f. 2.*)

6. *A. viride*, frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis, basi truncatis *Huds. With. Bolt. fil. t. 14.*

Hinc inde cum priori (in praefect. Lanenst. *Ehrh. plant. crypt. 71.*) Jul. Sept. (Fronde ramosa *Bolt. l. c. t. 2. f. 3.* Stipes viridis, basi fuscus.)

* 7. *A. Ceterach*, frondibus pinnatifidis: lobis alternis confluentibus obtusis. L. *Bull. herb. t. 383.* *Bolt. fil. t. 12.*

In fissuris rupium (Hercyn. Nassov. Carn. Tyrol. Francon. Norimb. *Panzer*; prope Miltenberg ad Moen.; in montibus Schauenb. *Ehrh. pl. crypt. 211.*) Inn. Aug. (frondes squamulis fuscis reticulatis subtus tectae.)

8. *A. Scolopendrium*, frondibus simplicibus cordato - ligulatis integerrimis, stipi-

tipus hirsutis L. *Curt. fl. lond. Bolt. fil. t. 11.*

In montosis asperis (Siles. Carn. Bavar. Salsb. Palat. Voigtl. Tub. Thuring. Saalf. ad muros bei Grimme *Baumg.* prope Springen *Fhrh.* Ratisb. *Hoppo* —) Aug. Sept. (Var. frondibus divisis, crispis. Involucra in spec. 1-6. costam versus, in Asplen. Scolopendrio sutura longitudinali dehiscunt, inde novum Genus *Scolopendrium* constituit cel. *Smith.* v. *Mémoires de l'Acad. R. des sc. de Turin l. c. p. 410.*)

BIVALVIA (Filices.)

10. OPHIOGLOSSUM (Natterzunge) *G. pl. 1621.*

Spica articulata disticha: articuli transversim dehiscentes, bivalves.

* *o. vulgatum*, fronde ovata, scapo simplici. L. *Bolt. fil. t. 3.*

In pratis, pascuis humidis; Maj. Iun. (Var. spica composita.)

11. OSMUNDA (Traubenfarne) *G. pl. 1622.*

Spica racemosa; capsulae subglobosae, transversim dehiscentes, bivalves.

* 1. *o. Lunaria*, fronde pinnata, scapo solitario, racemo laterali. L. *Bolt. fil. t. 4.*

In pratis, pascuis apricis; Maj. Iun. (*Osmunda ramosa*, racemis lateralibus, frondibus bipinnatis: pinnulis incisis *Syst. nat. 1293. Flor. dan. t. 19.*)

2. *o.*

2. *o. regalis*, fronde bipinnata, racemo terminali supradecomposito L. *Bolt. fil. t. 5.*

In nemorosis humidis (Siles. Holsat. Saxon. Francon. Brunsvig. Oldenb. Brem. Hanov. Berol. etc.) Iul. Iul.

12. *LYCOPodium* (Bärlapp) *G. pl. 1615.*

Fructificationes in axillis foliorum vel squamarum sessiles, bivalves.

* 1. *L. clavatum*, foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculatis geminis L. *Dill. Hist. Muse. t. 58. f. 1.*

In ericetis montosis sylvaticis; Iul. Aug.

* 2. *L. annotinum*, foliis sparsis quinquefariis subserratis, surculis annotinis articulatis, spicis terminalibus glabris erectis L. *Dill. t. 63. f. 9.*

In sylvis montosis; Iul. Sept.

* 3. *L. complanatum*, foliis bifariis connatis: superficialibus solitariis, spicis geminis pedunculatis L. *Dill. t. 59. f. 3.*

In sylvis montosis; Iul. Aug.

* 4. *L. alpinum*, foliis quadrifariam imbricatis acutis, caulibus erectis bifidis, spicis sessilibus teretibus L. *Dill. t. 58. f. 2. Flor. lapp. ed. 2. t. 11. f. 6. Flor. dan. t. 79.*

In montosis subalpinis (Hercyn. Salisb. Tyrol. Carn. etc.) Iul. — Oct.

5. *L. inundatum*, foliis sparsis integerrimis; spicis terminalibus foliosis L. *Dill.* t. 61. f. 7.

In pascuis turfosis inundatis; Inn. Sept.

6. *L. Selago*, foliis sparsis octofariis, caule dichotomo erecto fastigiato, capsulis sparsis L. *Dill.* t. 56. f. 1. *Flor. dan.* t. 104.

In sylvis montosis, ericetis humidis (Hercyn. Thuring. Megap. Duc. Oldenb. Palat. Bavar. Tyrol. Carn. etc.) Aug. Sept.

7. *L. Selaginoides*, foliis sparsis ciliatis lanccolatis; spicis solitariis terminalibus foliosis L. *Dill.* t. 68. *Flor. dan.* t. 70. *Hall. Hist.* t. 46. f. 1.

In ericetis, pascuis muscosis (prope Barbi, Vegesack Duc. Brem. Salisb. Tyrol. Bavar. Siles. etc.) Jul. Sept. (Capsularum in hac specie duplex genus: inferiores appendici humilatae insident, inde dehiscentes 4 valves apparent; corpuscula continent nucamentacea 4, foveola excavata; superiores exacte bivalves. Corpuscula intus foveant ut in reliquis *Lyc.*, ad lentem vero rotundata, echinata, pollium antherarum similia.)

8. *L. radicans*, foliis quadrifariis: binis patulis, binis imbricatis, spica filiformi bifurca, caule ramisque repentibus dichotomis compressis. *Syst. Nat. ed.* 13. 1291. *Dill.* t. 65. f. 2.

Ad radices arborum (Bavar. Schrauck, Tyrol. Salisb. *Tunck*: *L. helveticum* etc. Capsulae, duplicis generis, pulvis in bivalvibus croceus. *Species*

cies affines *L. helveticum* et *denticulatum*, sexu distinctae?)

CALYPTRATA (Musci.)

13. TRENTEPOHLIA (Trentepohlie) Roth. Bot. An. 10. 53.

Corpuscula sessilia intra axillas foliorum, ovata, perichaetio cincta, clausa decidua.

T. erecta. Flor dan. 215.

Locis arenosis inundatis (Ducat. Oldenb. *Trentepohl*; variis German. locis *Ehrh. Beitr.* 3. 73.) Aestate, Autumno. (De peculiari hac stirpe, de cujus naturali Ordine, multo magis partibus fructificationis, usque ad hunc diem Botanici incerti haerebant, observationes meas ad exemplaria ab ipso rev. I. F. *Trentepohl* mecum quam humanissime communicata, institutas ac repetitas, paucis hic enarrabo et annexa tabula illustrabo. *Surculi* vel caules adscendunt simplices, innovationibus tamen elongati, vel basi ramosi, plerumque masculi; inferne undiusculi saturate purpurei, superne dilutioris coloris. Folia sparsa, in hac ovato-lanceolata, saturatius viridia (a a nativa et aucta magnitudine), in illa stirpe potius lanceolata, pallidiora (b b); semiamplexicaulia, superne confertiora imbricata, tamen erecta, carinata, dorso ex densiori fasciculo ductulorum nervosa, apice ad leutem serrulata et venis anastomosantibus reticulata, quarum longitudinales recta excurrentes, aliis transversalibus minoribus connectuntur. *Flos masculus* (c c) in distincto individuo, vel ex basi surculorum qui propagationis organa gerunt, capituliformis, ex foliis componitur perigonialibus, extimis cordato-lanceolatis, apice productis recurvis, remote serrulatis, interioribus ovatis

brevioribus, basi purpurascens, reticuli areolis laxis rhomboideis, apice virescentibus, areolis magis coarctatis (d). Inter haec folliculi spermatici (antherae *Hedw.*) ovato-cylindracei (e) pallidi coloris, uniloculares, apice dehiscentes (f. folliculus evacuatur fuscus venosus), ejaculantes pollen granulosum; fere sessiles, perquam numerosi: 10-12; filis succulentis (paraphysibus) clavatis articulatis: articulis superne brevioribus, pallide roseis, lutescentibus, etiam albidis muniti (g). *Illos femineos* (h) etiam in summitate distincti individui, intermixti priorum, plerumque steriles, capituliformis, ex longissimis foliis lanceolatis carinatis perigonialibus, sensim interiora versus decrescentibus, arctius quam in masculis reticulatis, structus, ad basin tantum thalamo purpurascens concoloribus. Genitalia haec amplexantur 6-8, instructa stylis ex violaceo dilute purpureis (i), duobus ductulis saturatoris coloris, opere celluloso transversali conjunctis, demum confluentibus, percursis; stigma tubae in modum ampliatum, non raro laciniatum. Cum stylo immediate *calyptra* connexa, ovarium, germen f. capsulae rudimentum cingit oblongum, etiam, sed dilutius, coloratum, brevissime pedunculatum, reti vasculoso ejusdem formae ac in stylo, magis tamen ab incremento ovarii distento, septum. Alia succulentia (sterilia organa feminea *Hedw.*) illis immixcentur, pallide viridula, aequali fere latitudine, inferne parum latiora, superne obtusa, celluloso-granulosa (k). Fila succulenta etiam adstant non pauca, linear. lanceolata, articulata, decolora (l, unum ex his vesiculis longitudinalibus interceptum). *Corpuscula illa*, pro capsulis venditata, exigua, tamen nudo oculo conspicua, intra axillas foliorum sessilia vel potius haerentia (m), ovata, in prima aetate ex viridi, dein ex rubro, demum ex fusco purpureo colorata, intumescunt, nitent, foliolis undique inclusa im-

Trentepohlia erecta.

imbricatis, ea qua parte ultra corpusculum prominent viridibus, pellucidis, reticulatis conniventibus vel patentibus (n), inferne corpusculo adnatis, concoloribus, reticuli areolis subrotundis. Tactu facillime matura desiliunt. Semina intus observare non potti; at inter surculorum confertissimas et capillares radículas quaedam occurrebant, quæ ex apice foliorum novum surculum emittebant, foliolis et radículis instructum (o). An igitur potius vivi partus? cum capsulae verae in apice distincti individui sessiles sint hucusque praetervisae? Anne simile quid accadat, ut in istis stirpibus, quarum vita partum, semel perfectum excedit novellis surculis, gemmis, bulbillis in spem sequentis anni propagandis? Vel Fructus ideo raro maturecant, quia, more bulbosarum, omnis vegetatio- nis vis in bulbos deferatur? —)

14. PHASCUM (Olinum) G. pl. 1636.

Capsula subsessilis clausa cum rudimento operculi.

* 1. *P. cuspidatum*, caulescens, foliis ovatis cuspidatis patulis: terminalibus erectis conniventibus. Schreb. Phasc. t. 1. fig. 1, 2.

In agris, hortis, ad fossas; Mart. Apr.

* 2. *P. piliferum*, caulescens, foliis oblongis piliferis erectis Schreb. Phasc. t. 1. fig. 6, 7.

In muris argillaceis; Maj. Iun.

* 3. *P. subulatum*, caulescens, foliis lanceolato-linearibus patulis Schreb. Phasc. p. 8. Hedw. Musc. 1. t. 35. Flor. dan. 249. fig. 1. Flor. lond.

In arenosis ad aggeres, vias; Mart. Iun.

4. *P. crispum*, caulescens, foliis lanceolatis longe acuminatis revolutis - contortis. Hedw. *Musc.* 1. t. 9.

Locis pinguibus, ad semitas tenui gramine vestitas gregatim; Inn.

P. patens, caulescens, fol. lanceolatis serratis patulis. Hedw. *Musc.* 1. t. 10.

Locis udis umbrosis; Maj. Inn.

6. *P. nitidum*, subcaulescens, foliis subulato - carinatis subfasciatis. Hedw. 1. t. 54. Dicks. *fasc.* 1. t. 1. fig. 3. (Phase. axillare.)

In ericetis, solo glareoso humido; Inn. Inn. (capsulis pedunculatis submersis Dicks.)

* 7. *P. curvicollum*, fol. subulato - lanceolatis patulis, capsulae pedunculo incurvo. Ehrh. Hedw. 1. t. 11.

In depressis sabulosis; Maj.

* 8. *P. serratum*, acaule foliis ovato - lanceolatis planis serratis erectis Schreb. Phase. t. 2. fig. 1, 2.

In pratis pinguibus limosis, solitarie; Vere Autumno.

* 9. *P. velutinum*, acaule, surculis filamentaceis geniculatis ramosis. foliis ovato - lanceolatis serratis. Dicks. *fasc.* 1. t. 1. fig. 1. (Phase. *serratum*.)

In pratis Byssis filamentosae vel Conservae similis; Vere, Autumno. (Phase. *stoloniferum*, surculis filamentaceis geniculatis ramosis, foliis peri-

perichaetii lanceolatis dentatis Dicks. fasc. 3. t. 3. fig. 2. habitu prioris, statura paulo majore, surculis interstitiisque longioribus fuscellis.)

* 10. *P. muticum*, acaule, foliis ovatis muticis concavis conniventibus *Schreb. Phasc. t. 1. fig. 11, 12.*

In agris, ad fossas, sparsim; Mart. Apr.

15. *BUXBAUMIA* (Buxbaumie) *G. pl. 1659.*

Capsula ovata obliqua basi ventricosa.

* 1. *B. foliosa*, acaulis, capsula subsessili foliis cincta *L. Schmid. Buxb. fig. I. Flor. dan. 249. Hedw. fund. t. 9. fig. 51.*

In sylvaticis ad terram pinguem, arborum petrarum radices; Aug. Sept.

* 2. *B. aphylla*, pedunculo elongato, capsula altero latere depressa marginata. *L. Schmid. Buxb. fig. 11, 12. Hedw. fund. t. 9. fig. 52. t. 3. fig. 10. Flor. dan. t. 44. Martini's allg. Gesch. der Nat. 10 Th. 589.*

In terra ex putrefactis plantis orta declivi, locis sylvaticis; Jan. Apr.

16. *SPHAONUM* (Torfmoos) *G. pl. 1637.*

Capsula apophysi orbiculari insidens, saepe calyptrae parte inferiore abrupta basi cincta.

* 1. *S. obtusifolium*, ramis deflexis, foliis ovato-cordatis obtuse acutis, concavis. *Dill. Musc. t. 32. fig. 1. Ehrh. crypt. 241.*

In aquis, fossis; Iun. Aug. (*s. tenellum* caule foliis et capsulis minoribus. *Schmid. ic. t. 58. fig. 6.* (quoad capsulae figuram.) Ex *Hercyn. Pers.*

* 2. *s. intermedium*, ramis deflexis, foliis ovatis oblongis concavis acutis. *Dill. Musc. t. 32. fig. 2. A.*

In paludosis, uliginosis ericetis; aestate. (Var. angustioribus ramis et capsulis, foliis acuminatis, magis adpressis, caule humiliore; color frequenter rubescit. *Sphagn. acutifolium Ehrh. crypt. 72.*)

3. *s. cuspidatum*, ramis deflexis, foliis subulatis patentibus, planis undulato-acuminatis. *Dill. Musc. t. 32. fig. 2. B. Ehrh. crypt. 251.*

In aquosis fluitare solet, caulibus ad pedalem et amplius longitudinem extensis. Aestate.

17. SPLACHNUM (Blasenmoos) *G. pl. 1641.*

Capsula apophysi maximae subglobosae s. umbraculiformi insidens; (peristomium simplex: dentibus octo geminatis.)

* 1. *s. sphaericum*, foliis spatulato-acuminatis, apophysi globosa. *L. Hedw. Musc. 2. t. 16.*

In turfosis (*Hercyn. Ehrh. pl. crypt. 261.*)

* 2. *s. vasculosum*, apophysi subglobosa sanguinea. *L. Hedw. Musc. 2. t. 15.*

In paludosis cespitosis (*Bruct. Hannov. Ehrh.*)

3. *s.*

3. *s. ampullaceum*, apophysi inverse ampullaeformi colloque longo virente. L. Hedw. *Musc.* 2. t. 14.

In paludosis turfosis (Austr. Saxon. Francon. Megap. Oldenb. Francof. Lips. Salisb. etc.) Jul. Aug.

* 4. *s. ligulatum*, apophysi inverse conica attenuata.

In rupestribus (Hercyn. Persoon) inenute Autumnó. (Hujus loci: *Spl. tenue* Dicks. fasc. 2. tab. 4. fig. 2: foliis ovato-oblongis (in nostra folia superiora potius ovato-spatulata, setae breviores quam in icone Dicks.) — *Spl. froelichianum* Hedw. *Musc.* 3. t. 40: fol. inferioribus lingulatis, superioribus spatulatis obtusis (in nostra acutis.) Peristomium octo paribus dentium ut in reliquis spec. siccitate reflexis, transversim tenuissime striatis. Caps. oblongo pyriformis, luci obversa apophysis inverse conica.)

18. POLYTRICHUM (Widerthon) G. pl. 1660.

Capsula interdum apophysi quadrangulae insidens. Calyptra ex apice deorsum pilosa; (peristomium simplex: dentibus plus quam 30, membranula apice connexis.)

* 1. *p. commune*, caule simplici, capsula parallelepipeda. L. Dill. *Musc.* t. 54. fig. 1.

In sylvaticis uliginosis; Jun. Jul. (Foliis omnibus serratis. Pol. *yuccaefolium* Ehrh. *crypt.* 214. Peristomium dentibus 64.)

* 2. *P. juniperifolium*, caule et foliis brevioribus rigidis mucronatis. *Willd.* (*P. juniperinum*.) *Dill. Musc. t. 54. fig. 2.*

Locis siccioribus, pascuis uliginosis; Iun.

* 3. *P. piliferum*, caule simplici, foliis integerrimis piliferis, capsula parallelepipedica. *Schreb. Dill. Musc. t. 54. fig. 3.*

In editoribus apricis, ericetis; Autumno, vere.

* 4. *P. alpinum*, caula ramoso, foliis serratis, capsula ovata obliquata. *L. Dill. Musc. t. 55. fig. 4.*

In montosis subalpinis (Hercyn. *Web. Ehrh.*)

* 5. *P. urnigerum*, caule ramoso, foliis rigidis subserratis, capsula oblonga erecta. *L. Dill. Musc. t. 55. fig. 5.*

In sylvaticis montosis (Hercyn. *Nassov. Meap. —*) Vere, Autumno.

* 6. *P. aloides*, foliis lineari lanceolatis planis, apice serratis, capsula cylindrica obliquata. *Hedw. Musc. 1. t. 14. Dill. Musc. t. 55. fig. 7.*

In argillosis umbrosis; Autumno et Vere. (*Pol. nanum*, foliis lingulatis planis undique serratis, capsula ovata erecta, operculi rostello brevior. Hinc inde cum priori.)

* 7. *P. ericoides*, foliis linearibus carinatis siccitate incurvis convexis obscure serratis, capsula subrotunda demum nutante. *Hedw.*

Hedw. Musc. 1. t. 15. (P. nanum.) Curt. fl. lond. (Pol. subrotundum.)

In ericetis; Hieme, Vere.

19. ORTHOTRICHUM (Goldhaar) *Hedw. Musc. II. 96. G. pl. 1648. (Weissia.)*

Calyptra sursum pilosa.

* 1. o. *hercynicum*, foliis lanceolato-linearibus concavis incurvis, capsula erecta urceolata. *Hedw. Musc. 1. t. 15. (Polytr. hercynicum.)*

In montosis (Hercyn. *Ehrh. Catharinaea hercynica. Pl. crypt. 11. Bavar. Schrank.)* Inl.

* 2. o. *crispum*, foliis lanceolato-linearibus confertis siccitate crispis, capsulis pedunculatis ex ampliata seta obovatis. *Hedw. Musc. 2. t. 35. Dill. Musc. t. 55. fig. 11.*

In saxis, arborum truncis; Febr. Maj. (Peristomium externum: dentibus 16 reflexilibus; internum e totidem processulis filiformibus erectilibus.)

* 3. o. *anomalum*, caule ramoso, foliis lanceolato-carinatis patulis, capsulis pedunculatis oblongis striatis. *Hedw. Musc. 2. t. 37. Dill. Musc. t. 55. fig. 9.*

Ad saxa, arborum truncos; Mart. Apr. (Peristomium dentibus 16 unius ordinis.)

* 4. o. *striatum*, caule ramosissimo, foliis lanceolato-carinatis patulis, summis apice

ce erosio, capsulis oblongis subpedunculatis. *Hedw. Musc. 2. t. 36. Dill. Musc. t. 55. fig. 8.*

In saxis, ad truncos putridos; Maj. Inn. (Peristomium internum ciliato-articulatum.)

* 5. o. *affine*, caule subramoso, foliis lanceolatis patulis; capsulis subsessilibus oblongis striatis. *Schrader Spicil. 67.*

In asseribus et arborum truncis hinc inde cum antecedentibus; Hieme, Aestate. (Peristomium internum capillaceum.)

* 6. o. *cupulatum*, caule superne ramoso, foliis lanceolatis patulis, capsulis subsessilibus oblongis striatis, calyptra semiglobosa. *Dill. Musc. t. 55. fig. 10.*

In arborum truncis, saxis hinc inde; Autumno. (Peristomium: dentibus 16 unius ordinis, introflexis.)

* 7. o. *diaphanum*, foliis lanceolato-acuminatis apice diaphanis canescentibus, capsula subsessili oblonga striata. *Schrad. Spicil. 69.*

In asseribus, arborum truncis; Vere. (Peristomii dentes interni capillacei cum exterioribus alternantes.)

20. ENCALYPTA (Glockenhuth) *G. pl.* 1643.

Calyptra campanulata, magna, laxa, glabra,

* 1. *E. vulgaris*, calyptra laxa conica aequali, vaginulae membrana pileiformi. *Hedw. Musc.* 1. t. 18. (*Leersia vulgaris*.)
Dill. Musc. t. 45. fig. 8.

Ad muros et terram; Apr. Maj.

* 2. *E. ciliata*, calyptra laxa conica, ore laciniata, vaginulae membrana cylindrica. *Hedw. Musc.* 1. t. 19. (*Leersia ciliata*.)
Dill. Musc. t. 45. fig. 9.

Ad saxa, lapides, aggeres; Iun. Iul.

21. GYMNOSTOMUM (Kahlmund) *G. pl.*
 1638.

Peristomium nullum.

* 1. *G. ovatum*, foliis ovatis concavis piliferis, capsulis ovatis. *Hedw. Musc.* 1. t. 6.

In muris, agris limosis: Apr. (*Pottia cavifolia* Ehrh. Beitr. 1. 187. Foliis canescentibus statim a sequenti distinguitur.)

* 2. *G. truncatulum*, foliis explanatis apiculatis, capsulis truncatis. *Hedw. Musc.* 1. t. 5. *Dill. Musc.* t. 45. fig. 7. (*Br. truncat. L.*)

In campis, agris, ad fossas, sepes; Hieme, Vere. (*Pottia eustoma major*, pyxidio ovali; *Pottia eustoma minor*, pyxidio subgloboso Ehrh. Beitr. 1. 183.)

* 3. *G. pyriforme*, foliis explanatis ovato-lanceolatis patentibus, capsula obovata. *Dill. Musc.* t. 44. fig. 6. (*Br. pyriforme L.*)

In humidis, ad fossas; Febr. Apr. (Pottia pyriformis *Ehrh.* 1. c.)

4. *g. Heimii*, caule erecto, foliis spatulato-acuminatis apice denticulatis, capsulis oblongis erectis, operculo oblique rostrato. *Hedw. Musc.* 1. t. 30.

Ad latera fossarum (Berol. prope Spandau *Heim*; Megapol. *Timm.* —) Maj.

* 5. *g. curvirostrum*, caulibus elongatis pallidis subramosis confertis, foliis subulatis canaliculatis in siccitate recurvis. *Hedw. Musc.* 2. t. 24.

In rupibus gypsaceis (Hercyn. prope Osterode et Niedersachswerfen *Ehrh. pl. crypt.* 93: Pottia curvirostra. *Bryum fasciculatum*, capsulis erectis ovatis nudis, surculis ramosis, foliis capillaceis interrupte fasciculatis subrecurvis *Dicks. fasc.* 3. 3.)

* 6. *g. Osmundaceum*, caule simplici frondoso pinnatifido, pinnato, foliis distichis lanceolatis integerrimis. *Dicks. fasc.* 1. t. 1. fig. 4. (Mn. *Osmundaceum*.) *Hedw. Musc.* 1. t. 29. (*G. pennatum*.)

In cavitatibus aggerum, sub sepibus antiquis, solo pingui (Hercyn. Pyrmont. Misn. etc. *Dicksonia pusilla Ehrh. pl. crypt.* 65.) Maj. Iun.

* 7. *g. Hedwigia*, caule ramoso, foliis ovato-lanceolatis concavis, apice diaphano denticulato, perigonialium ciliato. *Hedw. Musc.*

1. *t.* 40. *Dill. Musc. t.* 32. *fig.* 5. (Br. apocarpum β L.)

In montanis supra saxa; Autumno, Vere. (*Hedwigia ciliata Ehrh. anodon Ej. Beitr.* 1. 172.)

8. *c. aquaticum*, caule tenui declinato, extremitatibus foliisque linearibus acuminatis reclinatis, capsulis oblongis. *Hedw. Musc.* 3. *t.* 11. (*Hedw. aquatica.*) *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 290. (*Hypn. aquat.*)

Scopulis aquarum fluentium submersis innascitur (ad pedes alpium Schneeberg et Breyn Austr. *Jacq.* Etiam ex Tyrol. subalpinis accepi. A Fontinali falcata distinguitur deficiente peristomio, et fasciculo ductulorum satis crassum nervum in foliis angustis efficiente.)

* 9. *c. lapponicum*, foliis elongato-lanceolatis siccitate crispis, capsulis striatis. *Hedw. Musc.* 3. *t.* 5.

In nemorosis (Hercyn. primum legit *Ehrh. Beitr.* 7. 182. — *Schrader.*) Autumno.

* 10. *c. microstomum*, foliis e latiori basi lanceolatis siccitate crispulis, capsula operculoque obliquis, ora exigua. *Hedw. Musc.* 3. *t.* 30.

In ambulacris sabulosis umbrosis; in piscina lutosa exiecata (Hannov. *Ehrh.*) Vere. Feminea genitalia masculis juncta, in eodem individuo spec. 7-9; in distincto spec. 1-6.

22. TETRAPHIS (Vierzahn) G. pl.
1639.

Peristomium simplex: dentibus quatuor pyramidalibus; calyptra plicato-striata glabra.

* *T. pellucida*. Schmid. ic. 3. (Mnium pellucidum L.) Dill. Musc. t. 31. fig. 2. Hedw. fund. 2. t. 7. fig. 32.

Locis umbrosis humidis; Apr. Maj. (Georgia Mnemosynum Ehrh. Beitr. 1. 188. flos masc. capituli - vel disciformis in distincto individuo.)

23. BRYUM (Stammmoos) G. pl. 1640 -
1647.

Peristomium simplex: dentibus plus quam 4; calyptra glabra capsulae insidens; seta terminalis; flos gemmi - vel capituliformis. (Caulis erectus.)

Dentibus 16 indivisis.

* 1. *B. apocarpum*, capsulis subsessilibus terminalibus, calyptra minima. L. Hedw. Musc. 1. t. 39. (Grimmia apocarpa.) Dill. Musc. t. 32. fig. 4.

Super arborum truncos; Autumno, Vere.

* (*B. apocaulon*, capsulis subsessilibus terminalibus; caule brevi subsimplici. Schmid. icon t. 57. fig. 1. (*B. apocarpon*).

In muris, saxis; differt a priori operculi acumine longiore, caule et loco natali. Folia perigonia

gonialia apice caua; in specim. ex America septentr. obtentis viridia.)

* 2. *B. cribrosum*, caule simpliciusculo, fol. lanceolatis confertim imbricatis patulis, summorum apicibus canis, peristomii dentibus pertusis. *Hedw. Musc. 3. t. 31.* (*Grimmia cribrosa*.)

In Hercyniae, Hassiae montosis (*Persoon, Schræder*) Majo.

* 3. *B. recurvatum*, capsulis pyriformibus, pedunculis recurvatis, foliis setaceis. *Dicks. 2. 7. Hedw. Musc. 1. t. 38.* (*Grimmia recurvata*.)

In nudis rupibus (Carinth. Klagenf. *Wulfen v. Jacq. Misc. 2. p. 96. t. 12. Br. setaceum.*) Vere, Autumno.

* 4. *B. pulvinatum*, capsulis subrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis. *L. Dill. Musc. t. 50. fig. 65.*

In rupibus ad muros, saxa, vulgare; Vere Autumn.

* 5. *B. lanceolatum*, capsulis erectis ovatis, caule erecto simplici divisoque, foliis lanceolatis concavis aristatis. *Dicks. fasc. 3. 4. Hedw. Musc. 2. t. 23.* (*Leersia lanceolata*.)

Ad aggeres, supra lapides, in muris argillaceis (*Lips. Hedwig, Megap. Timm* — — vulgare per omnem Germaniam; sed latuit procul dubio ideo, quod habitu, herba, capsulis operculo perquam similis sit haec species *Gymnostomo truncato*,

cujus et consortio saepe fruitur. Hujus loci est etiam *Halleri* plantula Hist. helv. n. 1809, sub *Brvo viridulo* Lin. citata, ut ex speciminibus quae *Hallerus* ad *Willichium* misit, video.) Autumno, Vere.

6. B. *Starkeanum*, caule lineari, foliis lanceolatis acutis apiculatis, capsula ovata recta, operculo obtuse conico. *Hedw. Musc.* 3. t. 34. (*Weissia starkeana*.)

Inter *Gymnost. truncatum* (circa *Groß-Tschirma* pouc *Lissam* polon. *Starke*.) Autumno.

7. B. *Dicksoni*, capsulis erectis ovato-cylindraceis, caule ramoso, foliis linearibus carinatis siccitate subcrispis. *Dicks. fasc.* 3. 4. t. 7. fig. 7.

In lignis, arborum truncis emortuis; Hieme. (*Weissia Dicksoni Willdenow, prodr.* 907.)

8. B. *crispatum*, capsulis erectis ovato-oblongis, caule ramoso, foliis linearibus canaliculatis contortis. *Dicks. fasc.* 3. 3. t. 7. fig. 4.

In paludosis (*Hannov. Ehrh. pl. crypt. exs.* 232. (*Afzelia cirrata*.)

* 9. B. *curvirostrum*, capsulis erectis oblongis, operculi rostro subrecurvo, foliis lanceolatis parvis, siccitate crispis. *Dicks. fasc.* 2. 7. *Hedwig Musc.* 1. t. 7. (*Weissia recurvirostra*.)

Gregatim locis sylvaticis arenosis, lapidosis (*Chemnitz. Lips. Hedwig, Berol. Willd. Megap. Timm* —) Iun. Aug.

10. *B. nigratum*, capsulis sphaeroideis cernuis minutulis nigris splendentibus, caule subdiviso erecto foliisque cordato acuminatis nigrescentibus. *Hedw. Musc. 3. t. 39.* (*Weissia nigrita*.)

Locis argillosis humentibus (circa Oberdorf Algoviae *Froelich* — *B. nigratum*, capsulis cernuis ovalis denticulatis, foliis lanceolatis acutis carinatis, surculis fasciculatis *Dicks. fasc. 3. 9.*)

* 11. *B. Weissia*, capsulis erectis oblongo ovatis annulatis, foliis secundis lineari subulatis rigidis. *Dicks. 2. 5. Hedw. Musc. 1. t. 8.* (*Weissia heteromalla*.)

In sylvaticis ad vias cavas (*Chemnit. Hedw. Hercyn. Ehrh. plant. crypt. exsicc. 173.* *Afzelia heteromalla*.) Maj. Jul. (Capsula erecta et dentibus indivisis a *Br. heteromallo*, simplicibus a *B. capillaceo* valde simili distinguendum.)

* 12. *B. pusillum*, capsulis ovatis erectis, caule simplici exiguo, foliis capillaribus rectis. *Hedw. Musc. 2. t. 29.* (*Weissia pusilla*.)

In duris lapidosis (*Hannov. Ehrh. pl. crypt. exsicc. 183.* *Afzelia pusilla*.) Vere, Autumno.

* 13. *B. rubellum*, capsulis ovato-cylindraceis erectiusculis, foliis lanceolatis erectis patulis cum nervo rubellis, siccitate contortis.

Inter *Encalyptam* vulgarem frequenter occurrit; Vere, Autumno. (Caulis simpliciusculus erectus, superne foliis imbricatis tectus, brevis.

seta terminalis vel lateralis semuncialis, purpurascens cum caule; capsula parva; peristomii dentes 16, e latiuscula basi angustati, margine subdenticulati.)

* 14. *B. controversum*, capsulis ovatis erectis, fol. acute lanceolatis siccitate contortis. *Hedw. Musc. 3. t. 5.* (*Weissia controversa*.)

Locis submontanis, ad semitas declives grege diffusa (*Lipsiae Hedwig* —) Vere. (*Afzelia crispa Ehrh. crypt. exsicc. 222?*)

15. *B. viridulum*, capsulis erectis ovatis, foliis lineari lanceolatis acuminatis imbricato-patulis. *L. Dicks. fasc. 1. 3. t. 1. f. 5.*

Locis humidis, umbrosis; Vere.

* 16. *B. luteolum*, capsulis erectis oblongis, foliis (in siccitate) linearibus carinatis, crispis. (*Weissia crispa Tim. prodr. 736.*)

In agris, aggeribus gregatim; Vere. (Capsula oblonga, oblongo-ovata, seta longior lutescens magis, quam in *B. controverso*. Hujus loci videntur: *Br. viridulum* (et paludosum) quorundam; *Br. virens Dicks.* *Br. viridulum Curt. lond.*)

Dentibus 16 divisis.

* 17. *B. parvulum*, capsulis erecto-cernuis, caule erecto, foliis erectis capillaribus rigidiusculis enerviis. *Dicks. fasc. 3. 7. Hedw. Musc. 2. t. 29* (*Dicranum pusillum*.)

Berolini (*Wüldenow*) In uliginosis umbrosis (*Hercyn. Schrader.*) Autumno.

* 18. *B. simplex*, capsulis ovatis cernuis, foliis subulatis, caule simplici innovationibus ramoso, medio pedunculifero. L. *Hedw. Musc.* 2. t. 34. (*Dicranum varium*.) *Dill. Musc.* t. 50. fig. 59.

In agris humidiusculis, argillosis; Autumno, vere.

19. *B. ovale*, capsulis ovalibus operculo-que rectis, caule erecto subsimplici ramosoque: ramis fastigiatis, foliis lanceolato-subulatis, pilo cano terminatis. *Hedw. Musc.* 3. t. 34. (*Dicranum ovale*.)

In montosis, densis saepe cespitulis (Saxon. *Hedwig.*) Vere.

20. *B. aquaticum*, capsulis obliquis subcernuis, caule erecto subsimplici ramosoque: ramis fastigiatis, foliis acute lanceolatis, siccitate contortis. *Ehrh. crypt. exs.* 213. (*Dicranum aquaticum*.)

Hannoverae (*Ehrhart.*)

21. *B. virens*, capsulis incurvis obliquis, foliis e basi subvaginante flexuosa lanceolatis acutis carinatis. *Swartz. Hedw. Musc.* 3. 32. (*Dicranum virens*.)

In sylvis Lapponiae Finlandiae collegit O. *Swartz*; In paludosis sylvaticis (Nassoviae *Leers*: *Br. pellucidum*, ex fide exemplarium eodem indicato loco collectorum —) Autumno. (*Dillenii* figura 23, tab. 16. *Br. pellucidum* L., hanc speciem non inde exprimeret. Operculum conicum acuminatum obliquum.)

* 22. *B. purpureum*, capsulis obliquis cernuis siccitate striatis, operculo conico, foliis lanceolatis carinatis. L. (Mn. purpureum.) *Dill. Musc. t. 49. fig. 51.*

In sylvis, hortis, tectis, muris, ad vias; Vere (sequentes subspecies frequenter occurrunt: *B. longicaule*, capsulis obliquis, foliis lanceolatis acuminatis, caulibus setae longitudinis. *B. brevicaulis*, capsulis obliquis suberectis, foliis lanceolatis capillaceis, seta caule duplo triplove longiore, subdichotomo, vel simplici. *Dill. figura 51. E. Dentes per paria transversim con-*
nexi.)

* 23. *B. bipartitum*, capsulis erectis subobliquis, surculis bifidis, foliis lanceolatis acutis carinatis imbricato-patulis. *Dicks. fasc. 2. 7. Dill. Musc. t. 49. fig. 50.*

Ad aggeres; Vere.

* 24. *B. strictum*, capsulis obliquis cernuis, foliis alternis subulatis strictis, caule ramoso dichotomo. *Dill. Musc. t. 49. fig. 52.*

Locis humidis turfosis; Vere, Autumno. (*B. purpureo longicauli*, exceptis angustioribus foliis, cauli magis nudo et ramoso in siccitate valde adpressis simile.)

* 25. *B. strumiferum*, capsulis erectiusculis subpyriformibus basi interiore strumosis; foliis lanceolato-linearibus subsecundis siccitate tortilibus. *Dicks. fasc. 3. 8. Hedw. Musc. 2. t. 52. (Fissidens strumifer.)*

In pratis uliginosis. Ad saxa et rupes (in monte Bructero Hercyn. Schrader — Dicranum strumiferum Ehrh. pl. crypt. exs. 74.) Autumno.

* 26. *B. polycarpum*, capsulis ovatis erectis subobliquis, operculo incurvo, foliis linearibus siccitate tortilibus. Hedw. Musc. 2. t. 31. (Fissidens polycarpus.)

In sylvaticis (Hercyn. Ehrhart, pl. crypt. exs. 84. Dicranum polycarpum.) — (quoad habitum, excepta operculi directione respondet; Fig. 41. tab. 48. Dill., *B. polyphyllum*, capsulis erectis oblongo ovatis denticulatis, surculis ramosissimis, foliis confertis lanceolatis siccitate crispis. Dicks. fasc. 3. 7.)

* 27. *B. aciculare*, capsulis erectis: operculo aciformi recto, foliis confertis erectis subsecundis. L. Hedw. Musc. 2. t. 33. (Dicranum aciculare.) Dill. Musc. t. 46. fig. 25.

In montosis ad saxa alveorum fluviorumque; Vere. (*B. rivulare*, foliis patulis, caule diffuso, Dill. Musc. tab. 46. fig. 26. *Br. aciculare* aquaticum Web. spicil. 84.)

28. *B. flagellare*, capsulis erectiusculis subcylindraceis: operculo longe rostrato incurvo, foliis subulatis canaliculatis secundis, caule ramoso interrupte flexuoso. Dicks. fasc. 3. 6. Hedw. Musc. 5. t. 1. (Dicranum flagellare.

In sylvis, in truncis arborum dejectis (Primum detexit Timm.) In rupibus etiam, variis Germaniae locis collectam habeo; Autumno. (Figura

gura Dill. 38. tab. 47. *Bryum pilosum interrupte falcatum*, habitum non male exprimit.)

* 29. *B. heteromallum*, capsulis ovatis obliquis, foliis setaceis secundis. L. *Hedw. Musc.* 1. t. 26. (*Dicranum heteromallum*.) Dill. *Musc.* t. 47. fig. 37.

In sylvaticis ad aggeres pinetorum, in humidis, ad latera fossarum; Vere, Autumno.

30. *B. fragile*, capsulis erectis ovatis, setis flexuosis, foliis lineari-capillaceis subsecundis. Dicks. fasc. 3. 5. Dill. *Musc.* t. 47. fig. 53. F. G.

In rupestribus sylvaticis prope Erlangam collecti; Vere. (In statu sicco valde fragile, operculum acutum obliquum; an diversa species a *Br. flexuoso*? —)

31. *B. flexuosum*, capsulis operculisque erectis, foliis setaceis, pedunculis flexuosis. L. Dill. *Musc.* t. 47. fig. 55.

In sylvaticis (prope Giessam Dillenius — Canibus altioribus, operculis erectis praecipue a priori, an constanter diversum? —)

* 32. *B. glaucum*, capsulis cernuis, foliis erectiusculis imbricatis concavis, fragilibus, caule ramoso. L. Dill. *Musc.* t. 46. fig. 20.

In ericetis sterilibus, sylvis; Vere.

33. *B. spurium*, capsulis cernuis, foliis nitidis acute lanceolatis concavis, in summitate

mitate confertioribus patulis. *Hedw. Musc.*
 2. t. 30. (*Dicranum spurium.*)

In sylvaticis arenosis (Megap. primus detexit
Timm.) Majo, Inuiio.

* 34. *B. longifolium*, capsulis obliquis; foliis e lanceolata concava basi longe canaliculatim capillaribus, arcuatim heteromallis. *Hedw. Musc.* 3. t. 9. (*Dicranum longifolium Ehrh. crypt. exs. 114.*) *Dicks. fasc.* 3. 7.

Dubitanter adduco plantam Gottingae et in Hercyn. montosis absque capsulis lectam. Eandem vero *Hallerus* N. 1778. Hist. suae indicasse, specimina ejus manu in Helvetia lecta, evincunt.)

* 35. *B. scoparium*, capsulis erectiusculis, cernuis; pedunculis aggregatis, foliis secundis recurvatis, caule declinato L. *Dill. Musc. t. 46. fig. 16. Fl. lond.*

In sylvaticis, ad radices arborum vulgare; Vere.

* 36. *B. rugosum*, capsulis ovatis cernuis; foliis lanceolatis apice serratis rugoso-undulatis subsecundis. *Ehrh. pl. crypt. exs. 271.* (*Dicranum undulatum.*)

In uliginosis turfosis (Hercyn. *Weber, Schrader spicil. 59.*) Vere. (Variis Germaniae locis promiscue cum priori collectum habeo, a quo differt: foliis latioribus lanceolatis patulis apice argute serratis, rugoso undulatis, caule tomento denso ferrugineo obducto.)

Den-

Dentibus 32 integris, vel capillaribus erectis, per paria approximatis, basi connatis.

* 37. *B. undulatum*, capsulis erectiusculis, pedunculis subsolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus serratis L. *Curt. fl. lond. Dill. Musc. t. 46. fig. 18. Hedw. Musc. 1. t. 16. (Polytrichum undulatum.)*

In sylvaticis humidis ubique; Vere — Augusto. (*P. juniperifolium*, capsulis foliisque angustioribus erectiusculis, caule simplici. *Dill. Musc. tab. 46. fig. 19. Hedw. Musc. 1. tab. 17.*)

* 38. *B. rigidulum*, capsulis ovato-oblongis: operculo subulato curvulo, foliis lanceolatis erectis patulis, e vasorum fasciculo cuspidatis rigidulis siccitate tortilibus, caule erecto superne ramoso. *Hedw. Musc. 3. t. 4. (Didymodon rigidulum.)*

In saxis, rupibus, interstitiis muri (Lips. *Hedwig. Gött. Schrader: Trichostomum angustatum.*) Autumno, Vere.

* 39. *B. heterostichum*, capsulis oblongis, foliis lanceolatis, in apicem canum denticulatum productis, nigrescentibus. *Hedw. Musc. 2. t. 25. (Trichostomum heterostichum.)*

In montosis, ad saxa frequens; in sylvis supra lapides (Megap. *Timm. Chemnitz Hedwig.*) Aestate. (*Br. fastigiatum*; caule ramoso: ramis fastigiatis, foliis lanceolatis in apicem canum denticulatis.)

denticulatum productis flavescenti viridulis, capsulis ovatis: operculis breviter subulatis. *Dill. Musc. tab. 47. fig. 50.?*)

*40. *B. canescens*, capsulis oblongo-subulatis: operculo longissimo aciformi, foliis lanceolato-carinatis enerviis, in apicem canum argute denticulatum productis flavescenti-viridulis. *Dill. Musc. tab. 47. fig. 27. Hedw. Musc. 3. tab. 3. (Trichostomum canescens.)*

In ericetis, sterilibus vulgare; Autumno, Vere. (Variat surculis crassioribus, foliis confertis recurvis *Dill. l. c. E.*)

*41. *B. elongatum*, caule elongato superne ramoso: ramulis alternis pinnatis, foliis confertis recurvis in apicem canum denticulatum brevem productis. *Dill. Musc. tab. 47. fig. 31.*

In ericetis montosis; Vere. (*Trichostomum elongatum Ehrh. pl. crypt. exs. 233. Trichost. ericoides Schrader spicil. 62.*)

*42. *B. lanuginosum*, caule procumbente, ramis lateralibus alternis fertilibus, foliis lineari-lanceolatis in apicem canum longum eroso-denticulatum productis. *Hedw. Musc. 3. tab. 2. (Trichostomum lanuginosum.) Dill. Musc. tab. 47. fig. 32.*

In sylvis montosis, inter saxa, ad terram; Autumno, Vere. (*Trichostomum ramigerum Timm. Megap. 215. Trichost. serratum Ehrh. pl. crypt. exs. 94. — Spec. 1-4. sub Bryo hypnoide*

noide Lin. militant; quoad habitum ab Hypnīs differunt: vel caule erecto, vel seta in ramis terminali.)

*43. *B. microcarpon*, caule ramoso: ramis fastigiatis elongatis fertilibus, foliis lanceolatis carinatis nervo medio valido in apicem caumi brevem denticulatum producto, capsula ovata minuta. *Dill. Musc. tab. 47. fig. 29.*

In montosis (Hercyn.) promiscue cum sequenti; Autumno (Folia superius in ramis virescunt, inferne ex fuso nigricant, setae perbreves. *Br. microcarpon*, surculo ramoso, foliis patulis, setis terminalibus, capsulis subrotundis *Gmel. Syst. Nat. 1352.*)

*44. *B. fasciculare*, caule procumbente, ramulis confertis brevibus, foliis lanceolatis margine revolutis patulis, capsulis ovato-oblongis. *Dill. Musc. tab. 47. fig. 28.*

In montosis ad saxa (Bructeri Hercyn.) Autumno, Vere (*Trichostomum fasciculare Schrader, spicil. 61.*)

*45. *B. capillaceum*, capsulis erectis oblongis, pedunculis terminalibus, foliis setaceis patulis decurrentibus. *Dicks. fasc. 1. 4. t. 1. fig. 6. Hedwig Musc. 2. tab. 26. (Swarzia capillacea.)*

In palustribus montosis (prope Nieder-Sachsen et Neuhoß *Ehrhart pi. crypt. exs. 164.* in montibus gypsaceis prope Steigerthal, ad ripas fluvii Bode pone Blankenburg *Schrader spicil. 64. Didymodon capillaceum.*)

*46.

46. B. *Didymodon*, capsulis erectis oblongis, foliis ex ovato-concava basi subulatis. *Hedw.* 1. t. 27. (*Trichostomum pusillum*.)

In arenoso-lutosis apricis (*Lipsiae Hedwig. Berol. Willd. Megap. Timm. Dirichum pusillum.*) Autumno.

47. B. *pallidum*, capsulis urceolatis erectis, pectine spirali, foliis capillaceis, surculis acaulibus. *Schreber spicil.* 1039. *Hedw. Musc.* 1. t. 27. (*Trichostomum pallidum*.)

Ad latera fossarum aggerumque (*Lips. Schreber Dresdae Hedw. Berol. Willd.*) Majo, Inl. (Specimina *Halleri* hist. 1805 eandem indigitant plantam. Similem habeo ex America septentrionali, ex aureo pallidam, dentibus peristomii ad basin fissis.)

Dentibus capillaribus, spiraliter convolutis.

48. B. *convolutum*, capsulis erectis oblongis, foliis lanceolatis, perigonalibus in cylindrum convolutis obtusis. *Hedw. Musc.* 1. t. 32. (*Barbula convoluta*.)

In ericetis arenosis; Vere. (Br. *convolutum Dicks. hort. sicc. britann. fasc.* 1. 20.)

49. B. *setaceum*, capsulis erectis oblongo-subulatis: operculis filiformibus longitudine fere capsularum. L. (*Mnium setaceum*.)

Ad muros et aggeres; Vere. (A priori differt: foliis ovato lanceolatis acuminatis, caule innovationibus ramoso, foliis perigonalibus lanceolatis, operculis longissimis tenuissimis.)

* 50. *B. mucronulatum*, capsulis erectis oblongis, surculis erectis subsimplicibus, foliis lanceolatis carinatis mucronatis in humido patulis. *Dicks. fasc. 3. 3.*

In ericetis, muris, ad vias frequens Vere. (E longinquo *Br. purpureo* simile. Var. caule crassiori, seta breviori *Hedw. Musc. 1. t. 23. Barbula unguiculata*.)

* 51. *B. cirratum*, capsulis ovato-oblongis: operculis acuminatis, foliis congestis lanceolatis patulis, capillaribus, siccitate convolutis. *Dill. Musc. t. 48. fig. 42.*

In muris, tectis, ad aggeres sepes; Vere.

* 52. *B. fallax*, capsulis oblongis, operculo oblique rostrato, foliis e lata basi lanceolatis carinatis recurvato-patulis, in siccitate convolutis, caule innovationibus ramoso. *Hedw. Musc. 1. t. 24. (Barbula fallax.)*

Ad muros, in ambulacris (*Lipsiae Hedw.*) Autumno, Vere. (Folia humectata statim recurva, patula.)

53. *B. nervosum*, capsulis oblongis superioribus paulo angustioribus, operculo subulato subobliquo, foliis erectis imbricatis lanceolatis nervosis: nervo medio crasso fuscidulo, caule subramoso: ramis incrassatis. *Dill. Musc. t. 48. fig. 47.*

In muris ad terram; Vere. (A *Bryo mucronulato* differt: caule longiori superne ramoso, foliis rigidioribus, densioribus, nervo medio crasso fusco, in peculiarem mucronem non producto,
setis

setis brevioribus, capsulis longioribus. Var. foliis et capsulis longioribus. Vix satis a B. nervoso diversum: Br. unguiculatum *Dicks. foliis et caule brevioribus hort. sicc. britann. fasc. 6. 21.*)

54. B. *barbatum*, foliis lanceolatis acutis: summis patulis, capsulis erectis oblongis: operculo acuminato obliquo, pedunculo laterali. *Curt. fl. lond. Dill. Musc. tab. 48. fig. 48.*

In muris; autumno, Vere (Var. Br. unguiculati *Schreb. spicil. 1037.*)

* 55. B. *rurale*, capsulis erectis cylindricis, foliis piliferis recurvatis, caule erecto ramoso. L. *Dill. Musc. tab. 45. fig. 12.*

In tectis, muris, agris, vulgare; Vere.

* 56. B. *murale*, capsulis erectis oblongis, foliis piliferis erectis, caule brevissimo subdiviso. L. *Dill. Musc. t. 45. fig. 14.*

In muris, tectis vulgare; Vere. (Hujus loci *Barbula hercynica Schrad. spicil. 65.*)

57. B. *cuneifolium*, capsulis erectis cylindricis, surculis subacaulibus, foliis cuneiformi-ovatis reticulatis pellucidis. *Dicks. fasc. 3. 7. Dill. Musc. t. 45. fig. 15.*

In arenosis hinc inde cum priori (*Schreb. spicil. 747.*) Vere.

58. B. *stellatum*, capsulis oblongis erectis, foliis patentibus margine involutis,
D 2 caule

caule exiguo. *Schreb. spicil.* 1640. *Hedw. Musc.* 1. *tab.* 25. (*Barbula rigida.*) *Dill. Musc.* t. 49. *fig.* 55.

In muris e limo constructis (*Lips. Schreber, Hedwig. Hildes. Schrader.*) *Hannoverae Ehrh. pl. crypt. exs.* 34. *Br. rigidum Huds.*) *Jun. Sept.*

* 59. *B. subulatum*, capsulis subulatis; foliis lanceolato - concavis acutis, caule exiguo. *L. Dill. Musc.* t. 45. *fig.* 10. *Curtis Flor. lond.*

In subhumidis umbrosis frequens; Vere.

60. *B. tortuosum*, capsulis erectis, foliis setaceis inermibus arefactione retortis cinnatis *L. Hall. hist.* t. 45. *fig.* 2. *Dill. Musc.* t. 48. *fig.* 40.

In montosis, rupestribus, subalpinis (*Nassov. Leers. Tortula tortuosa. Hannoverae Ehrh. pl. crypt. exs.* 204. *Palat. Tyrol. etc.*) Autumno, Vere. (Nec linearia, nec serrata sunt folia.)

24. MNIMUM (*Sternmoos*) *Gl. pl.* 1649-1654.

Peristomium duplex: exterius dentibus 16, interius membranaceum, lacinulatum. Calyptra glabra; flos masculus femineusque terminalis. Caulis erectus.

* 1. *M. androgynum*, caule ramoso vel simplici, foliis lanceolatis, masculis capitulis nudis globosis. *L. Dill. Musc.* t. 31. *fig.* 2. *Schmid. anal.* t. 56. *fig.* 1.

In

In sylvaticis umbrosis, ad radices arborum; Vere.

* 2. *M. palustre*, caule dichotomo, foliis lanceolato - subulatis carinatis. L. *Dill. Musc. t. 31. fig. 3. Schmid. anal. t. 56. fig. 2.*

In pratis paludosis; Vere, Aestate.

* 3. *M. squarrosum*, caule ferrugineo tomentoso, foliis quinquesariis imbricatis recurvis, capsulis obliquis. L.

In pratis uliginosis (Hinter Möllen Ducat. Brunsvic. Luneb. *Ehrhart. Megap. Timm.*) — (Caulis superne elongatus vel ramosus, folia per lentem argute serrulata; seta longa innovationibus inferior, capsula erectiuscula obliqua, operculum obtusum. *Paludella Ehrhart phytophyl. 69.*)

* 4. *M. triquetrum*, foliis trifariis patulis subulato - lanceolatis carinatis, capsulis obliquis. L. *Hedw. Musc. 1. 21, 22. (Meesia longiset.)*

In turfosis paludosis; Vere, Aestate. (Peristomii dentes exteriores, 16, breves, obtusi; interiores per paria approximati. *Tristichis Ehrh. phytophyl. 59.*)

* 5. *M. trichodes*, foliis lineari - lingulatis obtusis, capsulis obliquis. L. (Br. *trichodes.*) *Hedw. Musc. 1. t. 1, 2. (Meesia uliginosa.) Dill. Musc. t. 49. fig. 58.*

In pratis paludosis, turfosis; Vere, Aestate. (Peristomii dentes exteriores 16, breves, obtusi; interiores reticulato - laciniati.)

6. *M. Pohlia*, foliis lineari - lanceolatis, capsulis oblique erectiusculis basi elongatis. *Hedw. Musc.* 1. t. 56. (*Pohlia elongata*) Br. elongatum *Dicks. fasc. pl. crypt.* 2. 8.

In sylvaticis ad vias cavas (Chemnitzii in Saxonia. *Hedw. Hannov. Ehrh. pl. crypt. exs.* 64.) Vere, Aestate. (Caps. ovato oblonga, apophysi quasi obconicae angustiori insidens. Peristomii dentes exteriores 16; interioris membrana sedecimpartita.)

* 7. *M. hornum*, caule simplici, foliis margine acute serratis, capsulis cylindricis pendulis. *L. Dill. Musc.* t. 51. fig. 71.

In nemorosis udis; Vere.

* 8. *M. crudum*, caule simplici, foliis ovato - lanceolatis, summis elongato - linearibus apice denticulatis, capsulis pendulis. *L. Hedw. Musc.* 1. t. 57. *Dill. Musc.* t. 51. fig. 70.

In nemorosis umbrosis; Vere.

9. *M. bimum*, caule rubiginoso, foliis lanceolatis alternis, capsulis pendulis pyriformibus obtusis. *Schreb. spicil.* 1047. (Br. bimum.) *Dill. Musc.* t. 51. fig. 73.

In pratis paludosis; Vere (Br. triquetrum *Leers flor. herb.* 826. var. β . Foliis acutioribus apice subserratis, magis quam capsulis a sequenti differt.)

* 10. *M. pseudotriquetrum*, foliis ovato-lanceolatis acutis patentibus, capsulis oblongo-ovatis pendulis. *Hedw. Musc. 3. t. 7. Dill. Musc. t. 51. fig. 72.*

In paludosis, apricis udis; Vere. (quoad *Dillen.* citatam figuram *Br. ventricosum Dicks. fasc. 1. 4.* hujus loci, at in differentia specifica folia subulato-lanceolata dicuntur.)

* 11. *M. turbinatum*, foliis rubentibus ovato-lanceolatis patulis, capsulis pyriformibus pendulis. *Hedw. Musc. 3. t. 8. Dill. Musc. t. 51. fig. 74.*

In arenosis udis (vallis Zschopaviensis *Hedwig.*) Vere. (Truncus statura et dimensione constanter inferior praecedentis speciei, eodem vero colore fuscatus. *Hedw.* Nervus cum reticulo foliorum inferiorum rubens. Capsula constanter pendula pyriformis; operculum papillatum.)

* 12. *M. annotinum*, foliis ovatis acuminatis pellucidis, pedunculis subradicalibus, capsulis nutantibus. L. *Dill. Musc. t. 50. fig. 68.*

Locus udis, sylvaticis; Inu. (quoad folia hujus loci: *Mn. ramosum L. Mu. prolixum Neck. meth. 235.*)

* 13. *M. nutans*, foliis lanceolatis subulatis, capsulis oblongis nutantibus. *Hedw. Musc. 1. t. 4. (Webera nutans). Br. nutans Schreb. spicil. 1043. Dill. Musc. 1. t. 50. fig. 61.*

In sylvis abiegnis, solo areoso; Vere (Exemplaria novis e trunculo emissis ramificationibus, quales *Dillenius* l. c. dedit, *Timmio* nostro de-
beo.)

* 14. *M. pyriforme*, caule simplicissimo, foliis perichaetii capillaribus longissimis recurvis, capsula pyrifor-*mi*. L. *Hedw. Musc.* 1. t. 3. (Webera pyrifor-*mis*.) *Dill. Musc.* t. 50. fig. 60.

Locis lapidoso sabulosis, septentrionem ver-
ticaliter spectantibus; in fissuris rupium, inter-
stitiis murorum; Vere. (Br. *pendulum Ehrh.*
pl. crypt. exs. 165.)

* 15. *M. caespititium*, foliis lanceolatis acu-
minato - setaceis, capsulis pendulis pen-
dunculis longissimis. L. (Br. *caespititium*.)
Dill. Musc. t. 50. fig. 66.

In muris, siccis sterilibus graminosis fre-
quens; Vere. (Var. capitulis et setis breviori-
bus, foliis longe capillaceis, locis siccis. *Dill.* l.
c. *E. F.*

* 16. *M. capillare*, foliis ovatis setiferis ca-
rinatis, capsulis pendulis, pedunculis lon-
gis. L. *Dill. Musc.* t. 50. fig. 67.

Ad muros, in uliginosis; Vere.

* 17. *M. hygrometricum*, foliis oblongis
concavis acuminatis conniventibus, ca-
psulis obliquis pyrifor-*mibus*, pedunculis
arcuatis. L. *Dill. Musc.* t. 52. fig. 75.

In

In humidis, umbrosis, ad sepes, muros; Vere. (Peristomii dentes obliqui apice cohaerentes: *Koelreutera* Hedw. fund. 2. 95. *Funaria* Schreb. Gen. pl. 1650.)

* 18. *M. argenteum*, foliis ovatis concavis imbricatis conniventibus setiferis, surculis teretibus, capsulis pendulis. L. *Dill. Musc. t. 50. fig. 62. Flor. dan. t. 880.*

Ad terram sabulosam, in muris; Autumno, Hieme. (Vl. *holosericeum*, foliis ovatis concavis imbricatis conniventibus acuminatis, surculis angustioribus, capsulis pendulis. *Dill. Musc. t. 50. fig. 63.*)

* 19. *M. carneum*, foliis lanceolatis alternis pellucidis, capsulis ovatis pendulis. L. *Hedw. Musc. 1. t. 20. (Br. delicatulum.) Dill. Musc. t. 50. fig. 69.*

Locis humidis, umbrosis, ad fossulas pratorum; Vere.

20. *M. stellare*, foliis ovatis aristatis serratis, pedunculis cauleque simplicibus, capsulis nutantibus. *Timm flor. megap. 846. Dill. Musc. t. 52. fig. 78.*

In umbrosis, ad vias cavas; Vere. (Specimina ab ipso Timmio accepta folia ostendunt per lentem serrata. Hujus etiam loci esse: *Br. serratum*, surculis simplicibus, foliis ovato-acutis: summis angustioribus serratis, thecis ovatis nutantibus, operculi rostello (in juniori planta ut jam Dillenius l. c. annotaverat) recurvo *Schrad. spici'*. — evincunt peristomii interioris similis fabrica: membranacea carinata divisa

marginē in lacinias pyramidales reticulato-denticulatas apice quasi erosas — et viva Auctoris exemplaria.)

* 21. *M. cuspidatum*, foliis ovatis acutis serratis, surculis reptantibus, caule simplici, pedunculis aggregatis vel simplicibus, capsulis nutantibus. *Schreb. spicil.* 1049. (Br. cuspidatum.) *Dill. Musc. t.* 53. fig. 79.

Locis umbrosis, Vere, Aestate.

* 22. *M. serpillifolium*, foliis obovatis obtusis integerrimis, pedunculis aggregatis vel simplicibus, capsulis ovatis cernuis. L. *Dill. Musc. t.* 53. fig. 81. *Schreb. spicil.* 755. (Br. punctatum.)

In graminosis, umbrosis, sylvaticis; Vere, Aestate.

23. *M. ellipticum*, foliis oblongis ellipticis subserratis apice obtusis emarginatis mucronulatis, pedunculis aggregatis vel simplicibus, capsulis oblongis cernuis, operculis cuspidatis. *Dill. Musc. t.* 53. fig. 80.

Hinc inde cum priori; Vere. — An hujus loci:

* 24. *M. rostratum*, surculo simplici, foliis ovato-ligulatis subserratis, thecis ovatis nutantibus: operculi rostello recurvo. *Schrad. spicil.* 72.

In sylvaticis rupestribus; Vere, Aestate. (Folia ut in Mu. serpillifolio; per lentem maxime argentem subserrata, obtusa cum brevi mucrone.)

* 25. *M. roseum*, foliis rosacee congestis lanceolatis acutis denticulatis, caulibus simplicibus vel proliferis, pedunculis aggregatis, capsulis nutantibus. *Schreb. spicil.* 1048. (Br. rosenm.) *Dill. Musc. t. 52. fig. 77.*

Locis udis umbrosis; Vere, Aestate.

* 26. *M. undulatum*, foliis oblongis undulatis serratis, pedunculis aggregatis, capsulis nutantibus. L. *Schreb. spicil.* 753. (Br. ligulatum.) *Dill. Musc. t. 52. fig. 76.*

In nemorosis, pomariis, ad sepes; Vere. (Inter praecedentia speciosissimum.)

27. *M. Timmia*, foliis lineari-lanceolatis serratis patulis, capsula cernua, operculo convexo centro depresso. *Hedw. Musc. 1. t. 31.* (*Timmia megapolitana.*)

In pratis turfoso-paludosis (prope oppidum Malchin Ducat. Megapolitani *Timm.*) Majo. (Peristomii interioris laciniae articulatae appendiculatae perforatae, apice conjugatae. Eleganter plantulam non solum oculatissimo Timmio debeo, sed eandem ex America septentr. a D. *Mühlenberg* accepi).

28. *M. marchicum*, foliis ovato-lanceolatis integris, caule erectiusculo superne ramoso,

moso, capsulis subrotundis obliquis. *Hedw. Musc. 2. t. 39. Willd. flor. berol. 944. t. 6. fig. 12.* (*Leskia marchica.*)

In ligno putrido natante (prope Spandan, *Willdenow*) Majo, Junio. (Peristomii interni lacinae bifidae.)

* 29. *M. fontanum*, foliis lanceolato - subulatis subsecundis apice denticulatis, caule simplici geniculis inflexo superne ramoso, capsulis subrotundis obliquis. *L. Dill. Musc. t. 44. fig. 2.*

In pratis udis, uliginosis; Vere. (Peristomium inter columnulas simplices, e dorso carinarum eminentes, tenerrime ciliatum.)

* 30. *M. laterale*, foliis lanceolato - setaceis subsecundis denticulatis, capsulis ovatis pedunculatis lateralibus. *Huds. angl. 2. 485.* (Br. laterale.) *Hedw. Musc. 2. t. 40.* (*Bartramia halleriana.*) *Hall. Hist. t. 46. fig. 8.*

In montosis sylvaticis supra scopulos (Saxon. *Hedw. Baumgarten. Hercyn. Ehrh. pl. crypt. exs. 53. Carinth. Wulfen: Br. recurvum Jacq. Coll. 2. 224.*) Vere. (Peristomii externi dentes 16, subulati, interius plicato - carinatum laciniatum.)

* 31. *M. pomiforme*, foliis lanceolato - setaceis patulis, denticulatis, capsulis sphaericis erectis. *L. (Br. pomiforme.) Dill. Musc. t. 44. fig. 1.*

In umbrosis, cavernulis rupium; Vere. (Peristomii dentes ut in priori. Folia lentius a subulata basi in setaceum acumen contrahuntur. Insignem varietatem ex alpinis Tyrolis habeo, foliis multo brevioribus, cauliculis angustioribus et longioribus, inferne rubiginoso tomento obvolutis. Capsulae laterales, sed longe pedunculatae. Intermedia quasi species inter hanc et antecedentem.

25. HYPNUM (Astmoos) G. pl. 1656 - 1658.

Peristomii dentes simplici duplicive ordine; flos masculus feminensque axillaris, gemmaceus. Caulis frondosus vel ramosus.

Fronde simplici, subramosa, pinnata.

* 1. *H. bryoides*, fronde simplici decumbente pinnata lanceolata apice pedunculifera, capsulis erectis. L. *Hedw. Musc.* 3. t. 29. (Fissidens bryoides.) Dill. *Musc.* t. 34. fig. 1.

Locis umbrosis, cavis; Hieme, Vere.

* 2. *H. taxifolium*, fronde simplici decumbente pinnata lanceolata, basi pedunculifera. L. Dill. *Musc.* t. 34. fig. 2.

In sylvaticis humidis, cavernulis ad terram; Autumno, Vere.

* 3. *H. adiantoides*, fronde simplici vel subramosa pinnata, medio pedunculifera. L. *Hedw.*

Hedw. Musc. 3. t. 26. (Fissidens adiantoides.) *Dill. Musc.* t. 34. fig. 5.

In paludosis prope aquas; Vere (Peristomii dentes in spec. 1 — 3. ordine simplici, 16, bifidi. Folia H. adiant. jam per lentem modice augmentem apice serrulata.)

* 4. *H. denticulatum*, fronde simplici pinnata duplicata, basi pedunculifera. L. *Dill. Musc.* t. 34. fig. 5.

In umbrosis ad terram, arborum radices; Vere.

* 5. *H. sylvaticum*, fronde subramosa pinnata, supra basin pedunculifera. *Huds. angl.* 2. 419. *Dill. Musc.* t. 34. fig. 1.

In umbrosis ad terram, radices arborum; Vere.

* 6. *H. lucens*, fronde subramosa pinnata imbricata, foliis reticulatis planis, supra basin pedunculifera. L. *Dill. Musc.* t. 34. fig. 10.

Locis umbrosis, paludosis (Hercyn. *Web. Hannov.* in monte Deister *Lammersdorf, Ehrhart.* —)

Frondibus ramosis pinnatis.

* 7. *H. trichomanoides*, fronde ramosa, foliis distichis imbricatis acinaciformibus obtusis. *Schreb. spicil.* 1053. *Dill. Musc.* t. 34. fig. 8.

In

Ad arborum radices, in nemoribus umbrosis; Vere. (*Leskia trichomanoides Ehrh. crypt. exs.* 23. Sequenti affinis, quocum ab Auctoribus confunditur.)

* 8. *H. complanatum*, fronde ramosa pinnata, foliis distichis imbricatis acinaciformibus acuminatis. L. *Schreb. spicil.* 778. *Dill. Musc. t.* 34. *fig.* 37.

Ad arborum truncos frequens: Vere. (Surculi s. ramuli in fila attenuati; setae axillares breves longo perichaetio cinctae; capsulae ovatae.)

9. *H. pennatum*, fronde ramosa pinnata, foliis bifariis lanceolatis resime acuminatis, capsula perichaetio immersa. L. (*Fontinalis pennata. Hedw. Musc. 3. t.* 19.) (*Neckera pennata.*) *Dill. Musc. t.* 32. *fig.* 9. *Hall. hist. t.* 46. *fig.* 2.

In arborum cortice (Siles. Francon. Erlangae Nassov. *Leers Herb.* 826. *Hypn. undulatum*: fide exemplarium l. c. collectorum.) Vere. (Peristomii dentes ordine duplici: alternatim breviores ciliares. Halleri et Dillenii *fig. cit.* hujus loci esse, evincunt prioris exemplaria ad Willichium missa. *Neckera pumila Hedw. l. c. t.* 20. differt praecipue seta perichaetio longiore.)

* 10. *H. undulatum*, frondibus ramosis vage pinnatis, foliis undulatis complicatis nitidis. L. *Dill. Musc. t.* 56. *fig.* 11.

In umbrosis sylvaticis montosis Hercyn. Vere. (Peristomii dentes duplici ordine: exteriores 16, integri; interiores e membrana difformi ciliati.)

* 11. *H. crispum*, frondibus ramosis pinnatis: foliis undulatis planis. L. *Dill. Musc.* t. 36. fig. 12.

In sylvaticis saxosis, rupestribus, passim frequens; Autumno.

Caulibus vel surculis ramosis pinnatis.

* 12. *H. purum*, surculis pinnato - sparsiteretibus, foliis ovatis concavis mucronatis conniventibus. L. *Dill. Musc.* t. 40. fig. 45. *Curt. flor. lond.*

In pratis, pascuis, nemoribus, Vere. (Setis prae-longis, surculis pinatis attenuatis ab *H. illecebro* distinguitur. Hujus loci *Hypn. elegans Ehrh. crypt. exs.* 242.)

* 13. *H. compressum*, surculis plano - pinnatis apice attenuatis, foliis ovato - lanceolatis. *Schreb. spicil.* 1067. *Dill. Musc.* t. 40. fig. 47.

In nemorosis declivibus; Hieme, Vere. (Hujus loci: *Hypn. purum Ehrh. crypt. exs.* 311. *Hypn. cuspidatum* inerne *Weis. crypt.* 255. *Hypn. muicicum* vñ *Genus spicil.* 76. *Hypn. Schreberi Willd.* 935; non confundendum cum *Hypn. compresso* Lin.)

* 14. *H. cuspidatum*, surculis pinnato - ramosis, apice convolutis acuminatis. L. *Dill. Musc.* t. 59. fig. 34.

In pratis, pomariis humidis, paludosis; Maj. Jun. (Folia in hoc et compresso enervia, caulina

lina magis cordata, in illo ovata. Canlis in utroque purpurascens, compressus magis in priori, in hoc setae caule et surculis longiores. Var. caule simplici sparsim pinnato, fol. longioribus acutioribus.)

* 15. *H. triquetrum*, surculis pinnato-sparsis recurvis, foliis triangularibus patulis. L. Dill. Musc. t. 38. fig. 28.

In sylvaticis, ad terram; Hieme, Vere.

* 16. *H. nitens*, surculis erectis brevissime pinnato-sparsis, foliis lanceolatis subulatis striatis. Schreb. spicil. 1062. Dill. Musc. t. 39. fig. 37.

In pratis paludosis; Vere. (Hypn. trichodes Neck. Gallob. 483. Perichaetia praelonga. Setae caule surculisque longiora. Capsulae inclinatae operculo conico brevi. Ab hoc differt capsulis erectis, nec cernuis, perichaetio brevissimo, surculis paucis elongatis: Hypn. refuscens ramis compressis, fol. pilo aristatis nitentibus, capsulis erectis, operculis conicis Dicks. crypt. 5. 9. t. 3. fig. 4. Hall. hist. 1784, quod ex alpinis Helvetiae habeo, ab ipso Hallero collectum.

* 17. *H. abietinum*, caule surculisque pinnatis remotis filiformibus superne incrassatis. L. Dill. Musc. t. 35. fig. 17. Vaill. Paris. t. 29. fig. 12.

In aridioribus, sylvis abietinis; absque capsulis. (Folia ovata, nervo medio robusto in acumen fere producta, sicca adpressa, marginata.)

* 18. *H. proliferum*, surculis proliferis triplicato - pinnatis - capsulis incurvis, L. Dill. *Musc. tab. 35. fig. 14. Curt. lond.*

In sylvis, pratis humidis, Vere. (Folia et surculi vire-sunt abque nitore, caulina ovato-cordata, medio nervo in acumen producto. Hujus loci Hypn. delicatum Ehrh. *crypt. exs. 301.*) Schrader. *spicil. 73.*

* 19. *H. umbratum*, surculis proliferis bipinnato - sparsis attenuatis, capsulis obliquis. Ehrh. *crypt. exs. 66.*

In Hercyniae umbrosis (Ehrh. *l. c.* Folia cordato - ovata acuminata striata, margine per lentem serrata; setae vix unciales.)

* 20. *H. parietinum*, surculis proliferis plano - bipinnatis, capsulis obliquis. L. Dill. *Musc. t. 55. fig. 13. Schmid. Ic. t. 58. fig. 3.*

In sylvis ad terram; Vere. (Surculi pellucidi rubent; folia majora, splendentia enervia, ovato acuminata. Hujus loci Hypn. *proliferum* Ehrh. *crypt. exs. 95.* Hypn. *splendens*, surculis subtriplicato - pinnatis proliferis, foliis lanceolatis confertis splendentibus, pedunculis aggregatis. Sibth. *Flor. oxon. 804.*)

Foliis secundis vel reflexis.

* 21. *H. commutatum*, caule procumbente, surculis ramoso - pinnatis setiferis, foliis
secun-

secundis. *Hedw. Musc. 4. t. 26. Vaill. par. t. 29. fig. 9.*

In palustribus, ad rivulos; Aestate. (Hujus loci: *Hypn. filicinum* ramoso - pinnatum *Weis crypt. 229. Dill. fig. 22. tab. 36.* formam non male exprimeret, quae vero ab Hedwigio ad *Hypn.* suum molluscum refertur. Setae ex ramis foliorum, nervus apicem non attingens, caulina nervoso - striata uncinata.)

* 22. *H. affine*, caule procumbente ramoso - pinnato setifero, foliis subsecundis nervosis: nervo ad apicem ducto. *Dill. t. 36. fig. 19. A.*

In humidis, paludosis. (Differt a priori cum foliorum figura et magnitudine, tum horum fasciculo ductulorum extra paginae apicem emergente apicula facta; fructu semper truncos decumbentes occupante, neque ramos proceriores surrectiusculos *Hedw. l. c.* Folia caulina et ramea subsecunda usque ad apicem nervosa, rectiora e latiori basi lanceolata; perichaetia lanceolata acuminata nervosa.)

* 23. *H. filicinum*, caule erecto simplici pinnato setifero, foliis uncinatis secundis striatis. *Dill. Musc. t. 36. fig. 19. B. F.*

In humidis; Aestate. Canlem simplicem vel parum ramosum erectiorem observo, folia longiora molliora per lentem striata, apiceque, praesertim caulina, obiter denticulata. Foliola perigonia interiora longissime apiculata lanceolato - subulata nervoso - striata, capsulae incurvae. Perist. dentes exteriores integri, interio-

res membrana striata connexi intermediis ciliis. Operculum breve. Hujus loci: Hypn. Crista castrensis *Ehrh. crypt. exs. 5.*)

* 24. *H. crista castrensis*, surculis pinnatis: ramulis approximatis, apicibus recurvis. *L. Dill. Musc. t. 36. fig. 20.*

In sylvis ad radices rupium; Autumno; Vere. (Folia secunda cincinnata ad lentem enervia. Hujus loci: *Hypnum molluscum*, procumbens, ramis simplicibus curvatis, foliis confertis varie distortis incurvis, ductulorum fasciculo destitutis. *Hedw. Musc. 4. t. 22.*)

* 25. *H. extricatum*, caule decumbente sessifero, foliis uncinatis, surculis erectis pinnatis sensim attenuatis apice convoluto - secundis.

In humidis uliginosis. (Surculi decrescendo pinnati, etiam simplices. Folia caulina in humido aequae ac sicco secunda, caulina patula magis, laete virescentia, instructa nervo valido in cuspidem extenso; per margines etiam subtilissime denticulata; perigonia ovali lanceolata apice saepe turbinata striato - nervosa. Capsula incurva. Operculum breve conicum apiculatum. Perist. exterioris dentes 16, denticulati; interioris membrana reticulata connexi absque ciliis.)

26. *H. uncinatum*, caule prostrato, foliis subulato - carinatis striatis, heteromalle uncinatis, perichaetiis gracilibus longis. *Hedw. Musc. 4. t. 25.*

Locis

Locis montosis (ex subalpinis Tyrol. habeo. Saxon. circa Chemnitzium, Tschopau Hedw.)
 Inn.

* 27. *H. cupressiforme*, caule et surculis vage pinnatis, foliis ovato-acuminatis incurvatis secundis enerviis. L. Dill. Musc. t. 37. fig. 23. Hedw. Musc. 4. t. 23.

Ad terram, arborum truncos et saxa; Vere. (Hypn. *extenuatum*, caule et surculis filiformibus, foliis ovato-acuminatis incurvatis secundis enerviis. Dill. l. c. fig. B, D, C. Hypn. *lacunosum*, caule et surculis incrassatis, foliis ovato-acuminatis incurvatis secundis enerviis lacunosus. Dill. l. c. fig. 24. C. Colore ex viridi vel fusco-rufescente nitenti, foliis lacunosis crassioribus a cupressiformi, setarum frequentia aliisque notis a sequenti differt.)

* 28. *H. rugosum*, caule et surculis vage pinnatis erectiusculis incrassatis recurvis, foliis secundis recurvatis basi rugosis. L. Dill. Musc. t. 37. fig. 24. A, B. Ehrh. crypt. exs. 291.

Locis sylvaticis montosis; Absque capsulis. (A priori differt foliis ductulorum fasciculo instructis versus summitatem evanescente (Hedw. Musc. 4. t. 23. A.) apicibus longioribus productis tenuissime serrulatis.)

29. *H. scorpioides*, ramis vagis procumbentibus apice incrassatis complicatis incurvis, foliis ovatis concavis secundis. L.

Dill. Musc. t. 57. fig. 25. Dicks. hort. sicc. brit. fasc. 3. 22.

Locis paludosis turfosis (Megap. *Timm. H. squarrosus*, errore typographi *Flor. megap. No. 326. Füssen Natterer* —) Absque capsulis. (Ex maximis quoad caules, et folia, medio caule ovata concava enervia, ad lentem apice brevissime mucronulata s. apiculata, summa etiam acuminata, perigonia interiora lanceolata acuminata. Setae longae, capsulae incurvae.)

30. *H. palustre*, caule decumbente repente, surculis confertis erectiusculis setis brevioribus, foliis ovato - acutis concavis secundis. *L. Dill. Musc. t. 37. fig. 27. Hedw. Musc. 4. t. 1. (Leskea paludosa.)*

Locis paludosis, aquosis; Aestate. (Perichaetia plerumque ex caule proveniunt. Folia sicca heteromalla, ad lentem medio nervosa. Capsulae erectiusculae: perist. ext. 16 dent.; inter. membranaceum 16 partitum.)

* 31. *H. aduncum*, caule erectiusculo ramoso - pinnato, surculis patulis recurvis, foliis ovato - acuminatis recurvatis, foliolis perichaetii apiculatis. *L. Dill. Musc. t. 37. fig. 26. Hedw. Musc. 4. t. 24.*

In paludosis; Aestate. (Folia ductulorum fasciculo instructa, circa extremitatem evanido. Var. sterilis submersa, caulibus duplo triplo longioribus, foliis laxioribus.)

32. *H. Halleri*, caule prostrato, surculis erectiusculis simplicibus; foliis lanceolatis fasciculo destitutis, undique e basi imbricata recurvis. *Hedw. Musc. 4. t. 21.*

Ad Bockstein Salisburgi *Froelich* — ex Alpibus Helvetiae habeo ab ipso Hallero collecta et Hist. suae n. 1734. designata exemplaria — diversum ab hoc foliis enerviis recurvis apice secundis margine tenuissime serratis, surculis ramoso-pinnatis; est: *Hypn. Halleri Timm. Fl. megap. n. 329*, ut specimina viva Auctoris docent.)

* 33. *H. stellatum*, caule erecto, surculis sparsis; foliis ovatis longe mucronatis erecto-patulis. *Schreb. spicil. 1061. Dill. Musc. t. 39. fig. 35. Dicks. fasc. pl. crypt. 1. 5. t. 1. fig. 7.*

In paludosis (pratorum Schoenfeldicorum *Schreb.*) turfosis *Megap. Timm. Gotting. Heyder*; Aestate. (Folia ex ovato triangula enervia, longe mucronata patula, apicibus parum recurvis, in summitate caulis et surculorum stellatum expansa lutescentia. Foliola Perigonia lanceolata subulata longissime mucronata substriata. Setae longae. Capsula obliqua incurva: operculum breve conicum apiculatum. Perist. exter. 16 dentatum, interius membranaceum venoso reticulatum 16 partitum: ciliis interpositis geminis. flujus loci, nisi eadem species, ut exemplaria docent *Halleri* ad *Willd.* missa: *Hypnum* foliis aptulis, subulatis, operculis conicis. *Hall. hist. 1752.*)

* 34. *H. squarrosum*, surculis vagis erectiusculis, foliis complicatis ovato-lanceola-

tis apice subulatis undique reflexis. L. *Dill. Musc. t. 39. fig. 38.*

In subhumidis sylvaticis, pomariis: Autumno Vere (Var. minor: *Dill. l. c. fig. 79.*)

* 35. *H. curtispendulum*, surculis vagis ramoso-pinnatis; foliis ovatis acuminatis patulis, perichaetiis longissimis. L. *Dill. Musc. t. 45. fig. 69.*

Ad arborum truncos; Vere. (Surculi vel ramuli apice incrassati stellatim expansi. Setae perichaetio vix longiora. Capsulae pendulae demum erectae. Folia ovata nervo medio, apicem versus longe productum serrulatum, evanido percursa; sicca subsecunda. *Neckeria curtispendula Timm. meg. n. 801.* Butilli s. gemmae in distinctis individuis continent organa sexus.)

* 36. *H. loreum* surculis vagis erectiusculis recurvis, foliis subsecundis. L. *Dill. Musc. t. 39. fig. 40.*

. In sylvis ad terram; Vere. (Foliis basi ovatis convexis striatis apice falcatis serratis, statim dignoscitur. Var. minor: *Hypn. heterophyllum*, foliis caulibus squarrosis, surculorum ovalis acuminatis undique serratis; capsulis ovato-oblongis.)

* 37. *H. sciuroides*, surculis erectis subramosis incurvatis. L. *Dill. Musc. t. 41. fig. 54.*

In sylvis, pomariis ad arborum truncos. (Bulbilli s. gemmae in distinctis individuis continent organa sexus. Folia subsecunda, per lentem striata acuminata. Dicranum sciuroides *Sibth. oxon.* 280. *Ehrh. crypt. oxs.* 223.)

*38. *H. viticulosum*, surculis erectis subramosis flexuosis, foliis patulis. L. *Dill. Musc. t.* 39. *fig.* 43.

In sylvis ad rupes, arborum truncos; Hieme. (Folia crispa subsecunda, in humida planta patula, per lentem flexuosa, apice linearia obtusa, nervo medio crasso. *Neckera viticulosa Timm. meg. n.* 799.)

39. *H. attenuatum*, surculis ramosissimis, ramis incurvatis apice gracilescentibus incrassatisque, foliis ovato-acuminatis subsecundis. *Schreb. spicil.* 1073. *Hedw. Musc. 1. t.* 12. (*Leskia attenuata.*) *Dill. Musc. t.* 42. *fig.* 66.

Ad radices arborum (Lips. *Schreb.* Chemnitzii *Hedw.* in Comit. Pyrmont. *Schrad.*) In sylvis supra lapides (*Megap. Timm.*) (Folia in humido patula e basi ovata concava semiamplexicaulia, apice lanceolato-linearia brevissime acuminate, nervo medio valido evanido prope apicem. Perist. ext. dent. 16, intern. ciliis 16, basi tenerrima connexis.)

40. *H. medium*, surculis repentibus ramosis confertis, foliis lato-lanceolatis acutis subsecundis imbricato-patulis, capsulis

lis erectis. *Dicks. fasc. crypt. 2. 12. Dill. Musc. t. 42. fig. 65.*

Ad arbores (circa Giessam *Dillen. Nassov. collectam* accepi.); Vere. (Cauliculi repunt, undique surculos incrassatos confertim et pinnatim ramosos: ramis attenuatis varie, plerumque tamen reflexis, emittentes; folia ovata, vel lato-lanceolata acuta, nervo medio valido instructa, humida patula, sicca adpressa subsecunda. Setae longiores surculis, caulinae, foliolis perichætiatibus lanceolato-subulatis acque nervosis cinctae; Capsulae erectae cylindricae; rarius obliquae vel nutantes. Operculum breve conicum.)

Foliis rectis, surculis fasciculatis, vel dendroidibus.

41. *H. palatinum*, caule vago, surculis ramoso-fasciculatis subsecundis, foliis ovato-oblongis acutis, capsulis erectis oblongis. *Neck. meth. 182. Dicks. fasc. crypt. 1. 6. Dill. Musc. t. 41. fig. 55.*

In arborum truncis, praesertim Fagis (*Nassov. collectum habeo* — etiam ad saxosa *Palat. Neck.*) Autumno, Vere. (Surculi attenuati plus minusve incurvi, folia in siccitate adpressa nitentia, per lentem enervia, ex ovato-acuminata integerrima, hinc inde quasi luteo tincta colore. An hujus loci *Hypn. gracile Linn. Ehrh.?* saltem diversum quoad figuram *Hedwigii Musc. 4. t. 5. Pterigynandrum gracile.*)

42. *H. albicans*, surculis erectiusculis, foliis ex ovato longe acuminatis adpressis, capsu-

capsulis cernuis. Neck. meth. 180. Dill. *Musc.* t. 42. fig. 63. Hedw. *Musc.* 4. t. 5. Dicks. hort. sicc. brit. fasc. 5. 21.

In arenosis declivibus (Nassov. Francon. collectum habeo Palat. Neck. Lips. Hedw.) Annumino, Vere. (A priori differt: colore pallidore, surculis minus densis ac ramosis, foliis majoribus ex ovato longius acuminatis ad lentem tribus nervis, medio validiore, pone apicem evanescentibus, instructis, capsulis cernuis, operculis apiculatis.)

*43. *H. myosuroides*, surculis erectis, ramis fasciculatis attenuatis incurvis, foliis ovatis, capsulis erectis. Hedw. *Musc.* 4. t. 8. Dill. *Musc.* t. 41. fig. 50.

In sylvaticis ad radices arborum, rupium; Vere. (Folia ad lentem ovata, concava acuta, pallido nervo medio instructa, apicem non attingente. Occurrunt specimina foliis acutioribus ternerviis, capsulis obliquis, ovalibus potius quam ovatis Hujus loci Hypn. myosurum. Linn. Dill. l. c. fig. 51.? Hypn. viviparum Neck. Ehrh. crypt. exs. 57. Leskia vivipara Timm. Habeo crassiora halleriana exemplaria hujus Hypni sub nomine *H. illecebri* ad Willichium missa, nec non alia sub nomine *illecebri* collecta plane Hypn. puro aemula.)

*44. *H. dendroides*, caule erecto simplici, ramis fasciculatis terminalibus simpliciusculis; capsulis erectis. L. Dill. *Musc.* t. 40. fig. 48.

In pratis sylvaticis, pomariis; Autumno, Vere. (Folia caulina adpressa, ramea striato-nervosa, apice serrata.)

*45. *H. alopecurum*, caule erecto simplici, ramis fasciculatis terminalibus subdivisis, capsulis subnutantibus. L. *Dill. Musc.* t. 41. fig. 49.

In nemorosis truncos arborum ripesque operiens; Autumno. (Folia caulina patula, ramea nervosa subserrata.)

Foliis rectis, surculis intricatis vel vagis.

46. *H. polycarpon*, caule et surculis decumbentibus filiformibus ramosis, foliis adpressis nervosis, capsulis erectis. *Ehrh. crypt. exs.* 96. (*Leskia polycarpa*.)

Ad terram et arborum truncos. Primo aspectu gracilescentibus vel incrassatis ramis, etiam incurvatis, similitudinem habet cum *Hypno attenuato*, a quo vero capsularum cylindricarum multitudine, caulibus et surculis decumbentibus, ramulis brevissimis, foliis ovato-lanceolatis; a filiformi vero nervo eorum crasso per medium usque ad apicem ducto, operculo breviter rostrato, vel potius conico, neque non peristomio duplici distinguitur.)

*47. *H. subtile*, caule decumbente reptante, ramulis erectiusculis confertis, foliis exiguis patulis, capsulis erectis. *Hedw. Musc.* 4. t. 9. (*Leskea subtilis*.)

Ad

Ad truncos arborum (Gottug. *Schrad.* Occurrit variis Germ. locis.) (Folia in humido remotiuscula, nudo oculo capillaria, ad lentem lanceolato - acuminata enervia, concava, varie etiam curva. Capsula oblonga erecta vel subcernua: operculum conicum. Setae ramis duplo longiores.)

48. *H. filiforme*, caule surculisque filiformibus, foliis adpressis concavis, capsulis erectis. *Timm megap.* 817. *Hedw. Musc.* 4. t. 7. (*Pterigyanthrum filiforme*.)

In saxis sylvarum (*Megap. Timm.*) Vere. (Folia per lentem ovalia concava enervia parum acuminata, imbricata etiam humida. Capsulae cylindricae, operculum rostratum, peristomium simplex 16 dentatum.)

* 49. *H. serpens*, caule repente, surculis filiformibus simplicibus, subramosis, foliis lanceolatis acuminatis remoto patulis, capsulis oblongis cernuis. L. *Dill. Musc.* t. 42. fig. 64. *Hedw. Musc.* 4. t. 18.

Locis umbrosis, humidis; Vere, Autumnus. (Folia nudo oculo oblitterata, per lentem enervia, integra, acuminata. Capsulae basi angustatae erectae, demum cernuae; operculum breve vix acutum.)

50. *H. dubium*, caule subdecumbente, ramis adproximatis filiformibus erectiusculis vagis subpinnatis, foliis lanceolatis acutis erecto-patulis, capsulis oblongis incurvis.

curvis. Neck. meth. 161. Dicks. fasc. crypt. 3. 10. Dill. Musc. t. 36. fig. 21.

In ericetis, paludosis (Priori statura majori. Folia per lentem integerrima margine, pellucida, crenulato-reticulata, usque ad apicem nervosa, lanceolata acuta vel acuminata, in humido patula, in sicco erecta vel subsecunda, apicem ramulorum versus quasi in cuspidem convoluta. Setae longae glabrae. Capsulae cylindricae demum incurvae, operculum breve, conico acutum.)

* 51. *H. praelongum*, caule decumbente, surculis subpinnatis: ramulis remotis, foliis ovato-lanceolatis patentibus, operculis rostratis. L. Dill. Musc. t. 35. fig. 15. Hedw. Musc. 4. t. 29.

In umbrosis, humidis; Vere. (Folia per lentem margine serrata, nervosa. Setae exasperatae. Capsulae ovatae ceruinae.)

* 52. *H. intricatum*, surculis repentibus, ramis brevibus, foliis lanceolatis acuminatis patulis, capsulis ventricosis obliquis cernuis, operculo conico. Schreb. spicil. 1072.

In corticibus arborum, ad truncos cespitulis densis; Vere. (Folia margine ad lentem denticulata, nervo valido versus apicem evanescente percursa. Setae breves scabriusculae. Capsulae obliquae sub annulo contractae. Annulus tenuis, fimbria composita; operculum conicum apice apiculam brevem obscurioris coloris gerens. Var. setis longioribus; foliis et capsulis gracilioribus.)

* 53.

*53. *H. velutinum*, caule repente, surculis confertis erectis, foliis ovato-lanceolatis denticulatis, perichaetialibus interioribus crinitis, capsulis obliquis, setis exasperatis. L. *Dill. Musc. t. 42. fig. 61.* Hedw. *Musc. 4. t. 27.*

Ad arbores, muros, aggeres; Vere. (Folia lanceolata, nervo apicem versus evanescente instructa, denticulata. Foliola perigonialia interiora obtusa in processum filiformem extensa. Annulus simpliciter fimbriatus. Hedw. l. c.

54. *H. decipiens*, caule ramisque depressis pinnato erectiusculis vagis, foliis imbricatis lanceolato-acuminatis concavis nerviis, capsulis erectiusculis cylindraceis.

In arborum cortice, ligno emortuo. (Color sericei; folia in siccitate erecta, vel subsecunda ut in cupressiformi; ad lentem integerrima nervia longo cuspidate terminata. Surculi ramosi apicem versus vagi pinnati breviores sensim, ex quibus setae breves glabrae, Capsulae cylindraceae demum obliquae. Operculum acutum conicum.)

55. *H. plumosum*, caule reptante, ramis brevibus pinnato-erectiusculis incrassatis confertis, foliis imbricatis subulatis acuminatis, capsulis erectiusculis. L. *Dicks. hort. sicc. brit. 5. 22.* *Dill. Musc. t. 35. fig. 16.*

In saxis et arboribus. (Color splendens sericens ex luteo rufescens. Folia per lentem integerrima ovato vel lanceolato subulata in longum

gum acumen producta uninervia: nervo apicem non attingente. Setae breves glabrae. Capsulae erectiusculae demum subcernuae. Var. minor: foliis angustioribus, ramis brevioribus, operculis conico - acutis.) Ab hoc itaque diversum: *Hypnum plumosum*, trunco reptante ramisque primariis bifariis depressis; foliis longius acuminatis, striatis; thecis e pedunculo laevi cernuis; operculo conico. *Hedw. Musc. 4. t. 15.*, quod ob locum naturalem non male diceretur:

* *H. salebrosum*, caule reptante, ramis confertis pinnato - depressis; foliis ovalis acutis 3-striatis: striis oppositis inaequalibus; capsulis e seta laevi cernuis, operculo conico.

Locis saxosis; Vere.

* 56. *H. polyanthes*, caule repente ramossissimo multifloro, ramulis capsulisque erectis. *Schreb. spicil. 1070. Hedw. Musc. 4. t. 2. (Leskea polyantha.)*

Ad truncos arborum annosarum, cum primis salicum (Lips. *Schreb. Hedw. Megap. Timm.*) Vere, Autumno. (Folia ex ovato in longum cuspidem, pilum nudo oculo facile mentientem, protensa, concava, vasorum fasciculo destituta *Hedw. l. c.* In sicco folia subsecunda, ramuli saepe incurvi.)

* 57. *H. sericeum*, caule repente, surculis confertis erectis, foliis lanceolato - acuminatis striato - nervosis, capsulis erectis, setis tuberculatis. L. *Dill. Musc. t. 42. fig. 59.*
Curt.

Curt. lond. Hedw. Musc. 4. t. 17. (Leskea sericea.)

Ad arborum truncos frequens; Vere. (Surculi juniores in siccitate curvati (A priori differt: surculis crassioribus et longioribus, foliis per lentem tristriatis acutioribus; setis exasperatis.)

* 58. *H. lutescens*, caule surculisque vagis depressis exporrectis; foliis ovato-lanceolatis acuminatis striatis, capsulis cernuis, operculis oblique conicis, setis exasperatis. *Schreb. spicil. 1071. Dill. Musc. t. 42. fig. 60. Hedw. Musc. 4. t. 16.*

In pratis, nemoribus ad terram; Vere. Longitudine et colore satis a prioribus diversum. Theca nunquam basi apophyseos in modum angustata. Folia tristriata *Hedw. l. c.* Hypnum ramosum *Neck. Leers, herb. 880. Leskea longifolia Ehrh. crypt. exs. 281.*

59. *H. piliferum*, caule decumbente, ramis vage pinnatis, foliis ovatis concavis obtusis apice piliferis; operculis cuspidatis, setis exasperatis. *Schreb. spicil. 1059. Hedw. Musc. 4. t. 14.*

In nemorosis umbrosis uidis hinc inde cum priori (a quo statim foliis et operculis dignoscitur.) Vere. (Var. ramis brevioribus fasciculatis, operculis brevius cuspidatis; foliis ovato-lanceolatis in pilum abeuntibus. V. *Hedw. l. c. fig. 5.*)

* 60. *H. striatum*, caule decumbente, ramis vagis recurvis; foliis patentibus pli-

F

oato.

cato-striatis; operculis mucronatis, setis glabris. *Schreb. spicil.* 1058. *Hedw. Musc.* 4. t. 13.

In nemorosis udis; Vere. (Folia caulina semi-amplexicaulia, cordato-triangularia, ramia ovato cordata plus minusve acuta, in siccitae praesertim striato-plicata, uninervia: nervo apicem non attingente, margine tenuissime serrulata; pallide viridia, aquose pellucida: *Hypnum longirostrum Ehrh. crypt. exicc.* 75. *Hypnum brevirostrum*, caule decumbente, ramis vagis recurvis, foliis patentibus multi-striatis apice inflexis apiculatis serratis. *Ehrh. l. c.* 85.)

61. *H. strigosum*, caule repente, circulis ramisque abbreviatis erectis approximatis; foliis ovato-lanceolatis imbricato-patulis; capsulis cernuis.

Ad terram; (Folia per lentem ovato-oblonga serrulata nervosa. Setae ex caule, glabrae perigonialibus interioribus lanceolatis longe acuminatis piliferis quasi foliis cinctae. Operculum acuminatum conicum. Ramuli attenuati, seta duplo breviores. Setae et foliis, illis glabris istis haud vel parum acuminatis brevioribus, operculis acuminatis longioribus praecipue ob *H. velutino* dignoscitur. Hujus loci etiam videtur *Hypn. intricatum Timm, megap.* 1200, quoad specimina viva Auctoris.)

62. *H. murale*, caule repente, ramis compressiusculis; foliis ovatis acutis; capsulis subcernuis, operculis tenuissime rostratis. *Hedw. Musc.* 4. 30.

Ad muros, ad sylvas montosas; Vere. (Folia ovata, ad lentem concava brevissime acuta tenera, nervo tenui apicem non attingente percursa, seta ramulis vix longior, laevis. Operculum in tenue et longum rostrum productum, varie curvum. Surculi in siccitate compressiusculi.)

63. *H. ruscifolium*, caule repente, surculis ramosis erectiusculis teretiusculis, foliis ovalibus concavis; capsulis subrotundis cernuis, operculis rostratis. *Neck. Meth.* 181. *Dicks. fasc. crypt.* 3. 10. *Dill. Musc.* 38. fig. 51.

Ad saxa, in sylvis umbrosis. (A priori differt: surculis crassioribus, foliis majoribus, ovalibus brevissime acutis, nervo breviori insignitis pellucidis viridibus. Capsulae crassiores.)

* 64. *H. rutabulum*, caule procumbente vario, surculis subramosis erectis curvatis, foliis lanceolato-acuminatis patulis; capsulis cernuis, operculo conico, setis muricato-exasperatis. L. *Dill. Musc. t.* 58. fig. 29. *Hedw. Musc. 4. t.* 12.

Locis humidis; Vere. (Folia ovato-acuminata concava nervosa: nervo apicem non attingente; apice tenuissime serrulata. Operculum conicum brevissime apiculatum. Variat colore, setarum longitudine et ramorum crassitie.)

65. *H. riparium*, caule prostrato varie diviso, surculis radican-
tibus, foliis ovato-
acutis distichis; capsulis cernuis, opercu-

lo acutò, setis glabris. L. *Dill. Musc. t. 40. fig. 44. C. Hedw. Musc. 4. t. 3.*

In aquosis; aestate. (Folia integerrimà acuminata adpressa bifariam patula nervosa: nervo apicem versus evanescente; perigonia multa breviora quam in priori et minus acuminata; setae breviores, capsulae graciliores.)

*66. H. *rivulare*, caule surculisque elongatis, foliis ovatis acutis concavis; capsulis ovatis, cernuis, operculis acuminatis. *Ehrh. crypt. exs. 252. Hedw. Musc. 4. t. 4. (Hypnum riparioides.)*

In aquosis, rivulis; aestate. (Folia ovata, ovato-lanceolata plus minusve acuta, plerumque atro virentia, per margines ad lentem denticulata nervoque apicem non attingente instructa. Setae glabrae breves; capsulae crassiusculae, operculum rostratum, incurvum, recurvum. Habeo exemplaria pedali longitudine inferius penitus nuda, residuis foliorum exasperata. Hujus loci: *Hypn. rusciforme Weis, pt. crypt. 225. Hypn. proluxum*, surculis ramosis elongatis inferne subnudis, capsulis ovatis ciliatis, setis adscendentibus abbreviatis *Dicks. fasc. crypt. 2. 13. Dill. Musc. t. 38. fig. 32.*

*67. H. *fluitans*, foliis lanceolatis, alternis remotis L. *Vaill. par. t. 33. fig. 6.*

In aquis stagnantibus (Nassov. — Gott. *Weis, Lips. Schreb. Berol. Willd. —*) absque capsulis. (Var. foliis et caulibus minoribus; caulibus pinatis; foliis angustioribus quasi in pilum extenuatis, subrecurvis capillaribus *Dill. Musc. t. 83. fig. 7. Weis. l. c.*)

68. *H. fontinaloides*, caule longo ramoso; foliis lanceolatis patulis; capsulis lateralibus. *Hedw. Musc. 3. t. 14.* (Trichostomum fontinaloides.)

In aquosis, arborum ripariarum radicibus (Füssen *Natterer Klagenfurthi Wulsen*. Fontinalis minor *Dicks. collect. of dned pl. 17.* Seta perbrevis cum capsula foliis perigonalibus cincta. Perist. dentes 16, apice in processus filiformes 2-4 fissi, basi perforati.)

26. FONTINALIS (Hüllmoos) *G. pl.*

1655.

Peristomium duplex: exterius dentibus sedecim, interius reticulatum. Capsulae seta brevis, perichaetio imbricato obvoluta.

* 1. *f. antipyretica*, foliis complicato-carinatis trifariis acutis, capsulis lateralibus *L. Dill. Musc. t. 33. fig. 1.*

In aquis, stagnantibus; Aestate, Autumno.

* 2. *f. squamosa*, foliis imbricatis subulato-lanceolatis, capsulis lateralibus *L. Dill. Musc. t. 33. fig. 5. Hedw. Musc. 3. t. 12. Dicks. hort. sicc. 5. 25.*

In rivulis montanis, subalpinis (Hercyn. *Lammersdorf 1780. Persoon.*) Aug. Sept. (Folia atroviridia, nudo oculo subulata, ad lentem energia acuminata, laxè imbricata; perigonalia lata obtusa capsulam involvunt. Calyptra magna conica acuta, fusca, operculum breve obtuse conicum.)

nicum. — Omitto dubiam *Font. minorem*, quae neque inter exsiccatos Muscos *Dillenii* amplius occurrit, ut praesens eorum possessor me edocuit, ill. *Sibthorp*, neque eodem a Dilleno indicato loco praeter *Trichostomum fontinaloides Sibth. Flor. oxon.* 777. vicinior species reperta.)

27. ANDREAEA (Andree) Ehrh. Beitr.

1. 15.

Capsula setae perichaetio imbricato obvolutae, insidens, unilocularis 4. valvis: medio dehiscens.

* *A. petrophila*. EHRH. l. c. 192. (*Jungmannia alpina* L.) *Dill. Musc.* t. 73. fig. 59.

Ad saxa (Hercyn. *Web. Hassiac, Schrad.*) In monte Spitzberg bey Steehen, *Humboldt.*) Autumno; Vere. (*Flos masculus* terminalis aut lateralis, ex foliis perigonalibus gradatim minoribus compositus. Folliculi spermatici s. antherae oblongae, ovatae pallidae, filamento brevi instructae. *Flos femineus* terminalis vel axillaris, ex foliis perigonalibus gradatim majoribus compositus, genitalia complectens, calyptra et stylo instructa. Capsula oblonga subtetragona, calyptrae parte inferiore abrupta cincta, attollens calyptram minutam albam pellucidam, apice ex persistente stylo nigram, acutam; sub qua rudimentum operculi. Semina exigua rotunda lutescentia.)

E C A L Y P T R A T A (Hepaticae.)

28. IUNGERMANNIA (Jungermannie)

G. pl. 1662.

Capsula subglobosa unilocularis 4 - valvis: apice dehiscens; setae insidens.

Frondeb caulescentibus.

* 1. *I. excisa*, frondibus caulescentibus, brevissimis teretibus subcompressis: foliolis et perianthiis arcte imbricatis, acute emarginatis.

In umbrosis sylvaticis; Autumno. (Ex minutissimis; confertim nascuntur caulescentes frondes depressae radiculosae, parum ramosae, vix unam alteramve lineam longae, apice incrassatae, undique foliolis semiaplexicaulibus distichis, concavis, adpressis tectae. Capsulae ex apice ramorum, brevi pedunculo instructae. Apices foliolorum ad lentem excisae ad angulum acutum, fuscellae. Hujus videtur loci: *Inug. excisa*, surculis repentibus ramosis apice floriferis, foliis imbricatis concavis emarginatis, vaginis obovatis *Dicks. fasc. crypt. 3. 11. t. 3. fig. 7.*)

* 2. *I. emarginata*, frondibus caulescentibus teretibus subcompressis: foliolis distichis imbricatis concavis patulis, obtuse emarginatis. *Ehrh. Beitr. 3. 82. Crypt. exs. n. 7.*

In sylvis montosis (Hercyn. Ehrh. Gött. Heyder.) — (Color viridis, vel ex viridi plus minusve fuscus. Longitudo uncialis sescuncialis.)

* 3. *1. julacea*, frondibus caulescentibus, teretibus subcompressis: foliolis arcte imbricatis adpressis bifariis argenteis. L. Dill. Musc. tab. 73. fig. 38.

In montosis (Hercyn. Bruct. Web. Ehrh. Hassiae Schrad.) Absque caps. (Folia ad lentem obtuse emarginata. Frondes apicem versus incrassatae.)

* 4. *1. setiformis*, frondibus caulescentibus simplicibus teretibus filiformibus, erectis: foliolis partitis: laciniis lato-subulatis, externe canaliculatis, interne carinatis. Ehrh. Beitr. 5. 80. Crypt. exs. n. 17.

In Hercynia (Ehrh.). Absque capsulis. (Folia per lentem modique imbricata canaliculata simplicia adparent, accuratius inspecta usque ad basin quadripartita, margine hinc inde ciliata, colore dilute ex fusco vel viridi colorata. — ? Hujus loci: tang. *concinata*, surculis teretibus subcompressis dense imbricatis compactis, foliis convexo-concavis glabris, floribus pedunculatis Lightf. scot. 786.)

Frondibus pinnatis: foliolis ciliatis.

* 5. *1. trichophylla*, frondibus teretiusculis: foliolis capillaceis fasciculatis. L. Dill. Musc. t. 73. fig. 37. Schmid. Icon. t. 42.

Locis montosis, umbrosis; Autumno; Vere. (Foliola verticillatim vel alterne posita, ad lentem subulata, ex binis frequentius ternis, rari-

us quaternis ciliis, isthmis interceptis, conflata. Perianthia frequenter terminalia, apice lacini lata.)

* 6. 1. *Tomentella*, frondibus decompositis bipinnatis: foliolis tomentosissimis: ciliato-multifidis. *Ehrh. crypt. exs. n. 8. Dill. Musc. t. 73. fig. 35.*

Locis udis umbrosis, sylvaticis; Absque capsulis. *Mart. Lill. ad ramorum divaricationes.* (Ciliorum color ex quibus folia constant pallidus, articula geniculata longiora quam in praecedentibus. — Lung. succulis pinnatis, repentibus, supra tomentosissimis: foliis integris, tomentosissimis; stipulis nullis; amphigastriis integris, tomentosissimis; perisphaeriis cylindraccis, hirsutis. *Ehrh. Beitr. 2. 150. Hujus locis Lung. ciliaris Weis. Web. Neck. Huds. etc.)*

* 7. 1. *pulcherrima*, frondibus surculisque pinnatis: foliolis stipulisque imbricatis apice 2 - 3 - fidis, ciliatis. *Web. spicil. 214. Dill. Musc. t. 69. fig. 3.*

Ad truncos arborum, locis humidis; absque capsulis; Octobr. *Web.* (Fronde surculique crassiores longiores 2 - 3 unciales, rami breves alterni interrupte pinnati. Color ex viridi vel fusco rubiginosus, etiam lacte virens. Folia latiora ciliis brevioribus, aequalibus inter articulorum spatia laud contractis, reticulo angustiori stipata. Hujus loci: Lung. ciliaris L. *Ehrh. crypt. exs. n. 18. Lung. surculis pinnatis, repentibus, impubibus; foliis bifidis, punctatis, ciliatis; stipulis nullis; amphigastriis bifidis, ciliatis; perisphaeriis punctatis nudis. Ejusd. Beitr. 2. 149.)*

* 8. *I. ciliaris*, frondibus decompositis: foliolis duplici ordine imbricatis ciliatis; perianthiis terminalibus. *Leers, herb. 907.*

In Ligno semiputrido; Aprili. (Var. frondibus angustioribus quam in specimine depicto. Foliis multo tenerioribus, ad lentem reticuli spatiis laxioribus, ciliis longioribus articulatis: articulis distinctis ovatis a sequenti facile distinguitur.)

Frondibus pinnatis: foliolis auriculatis.

* 9. *I. albicans*, frondibus pinuatis: foliolis auriculisque lineari-lanceolatis recurvis distichis. *L. Dill. Musc. t. 71. fig. 20. t. 73. fig. 36.*

In nemorosis, ndis umbrosis; Vere. (Frondes variant longitudine ab unciali ad sescuncialem. Foliola plus minusve distantia vel approximata, superne auriculata: auriculis plerumque dimidio foliolo brevioribus; ad lentem apice argute denticulata. Perianthia ex apice frondis.)

* 10. *I. resupinata*, frondibus pinnatis: foliolis imbricatis rotundatis, superne auriculatis denticulatis. *L. Dill. Musc. t. 71. fig. 19.*

In fissuris rupium; Vere. (Frondes reclinatae breves semunciales, parum ramosae. Foliola rotundata concava, per ambitum rarius, versus auriculas frequentius denticulata.)

* 11. *I.*

* 11. *undulata*, frondibus pinnatis: foliolis auriculisque integris. L. *Dill. Musc. t. 71. fig. 17.*

- In uliginosis montosis. Absque capsulis. (Foliola ut in precedenti superne auriculata.)

* 12. *nemorosa*, frondibus pinnatis: foliolis auriculisque ciliatis. L. *Dill. Musc. t. 71. fig. 18.*

In nemorosis; Vere. (Autumno in apice foliorum nigricantes antherae. *Hedw. Theor. Musc. t. 15.*)

* 13. *complanata*, frondibus decompositis pinnatis: foliolis imbricatis complanatis rotundatis inferne auriculatis. L. *Dill. Musc. t. 72. fig. 26. Flor. dan. 1062.*

Ad arborem cortices; Vere. (Frondibus latioribus, surculis et ramis aequalibus, pallide virentibus, perianthiis compressis truncatis, facile a priori dignoscitur.)

Frondibus pinnatis, inferne stipulis s. amphigastriis tectis.

* 14. *dilatata*, frondibus decompositis pinnatis: foliolis imbricatis convexis rotundatis, subtus stipulis triplici ordine tectis. L. *Dill. Musc. t. 72. fig. 27. Ehrh. crypt. exs. n. 215.*

In arborum truncis, rupibus; Vere. (Frondes ut in priori lineares, angustae, magis tamen hinc inde apicem versus dilatatae, colore plus

Plus minusve ex viridi fusco, sicco. Stipulae laterales rotundatae, mediae sparsae ovato-oblongae remotae, apice bifidae.)

* 15. 1. *tamariscifolia*, frondibus decompositis pinnatis: foliolis imbricatis adpressis subrotundis, subius stipulis triplici ordine tectis. L. Dill. Musc. t. 72. fig. 51. Schmidel ic. t. 67.

In arborum truncis, rupibus; Vere. (Frondes colore plus minusve fusco, nitente. Stipulae laterales oblongae parvae transversim affixae; mediae stipiti adnatae margine revolutae, latiores, apice emarginatae, obovatae. Foliola perigonialia serrata.)

* 16. 1. *supina*, frondibus pennatis subpinnatis, foliolis imbricatis bidentatis, stipulis in prona parte ovato-lanceolatis imbricatis.

In umbrosis; absque capsulis. (Frondes breves lineares simplices vel parum ramosae, superne depressae inferne convexae, stipulis minutis appressis tectae; apice convolutae.)

17. 1. *reptans*, frondibus simpliciter pinnatis: foliolis stipulisque subquadridentatis. L. Dill. Musc. t. 71. fig. 24. Schmidel ic. t. 68.

In umbrosis, ad vias, truncos putridos; Autumno vere. (Ex tenuerrimis. Frons ramosa; stipites satis validus. Foliola ex ovato quadrata, apice profunde 2-4-dentata: dentibus acutis. Stipulae simplici ordine remotae, 5-4-dentatae. Perianthia ad basim egrediuntur, albican- tia (ut tota planta) apice tenuissime laciniata.)

* 18. 1.

* 18. 1. *platyphylla*, frondibus pinnatis: foliolis imbricatis adpressis cordatis; subtus stipulis triplici ordine tectis. L. *Dill. Musc. t. 72. fig. 32.* (Lichenastrum arboris vitæ facie.)

In sylvis ad truncos arborum, rupium; Vere. (Stipulae laterales oblongae, mediae adnatae stipiti, apice reflexae, latiores.)

* 19. 1. *radicans*, frondibus pinnatis: foliolis imbricatis, apice contractis 3-dentatis; subtus flagellatis, simplici ordine stipularum tectis. *Mich. gen. t. 6. fig. 2.*

Locis montosis sylvaticis; Absque capsulis. (Flagella filiformia longa undique ex stipulis minutis dentatis, in inferiore frondis pagina egredientia. Hujus loci: *Iung. trilobata Web. sp. cil. 207. Ehrh. crypt. exs. n. 48.*)

Frondibus pinnatis: foliolis integris.

* 20. 1. *pallescens*, frondibus simpliter pinnatis: foliolis subrotundis integerrimis; stipulis lanceolatis apice bifidis. *Ehrh. crypt. exs. n. 302.*

In Hercynia (*Ehrhart.*) Absque capsulis.

* 21. 1. *asplenioides*, frondibus simpliciter pinnatis: foliolis ovatis recurvis ciliatis. L. *Dill. Musc. t. 69. fig. 5. Flor. dan. 1061.*

In nemorosis udis; Vere. (Var. foliolis alternis minoribus *Dill. l. c. fig. 6.*)

* 22. 1. *viticulosa*, frondibus simpliciter pinnatis: foliolis subrotundis integerrimis. *Dill. Musc. t. 69. fig. 7.*

In nemorosis udis; Vere. (Fronde breviores ex media latiori parte vel basi pedunculiferae. Var. minor foliolis alternis ex subrotundo linearibus.)

* 23. 1. *polyanthos*, frondibus simpliciter pinnatis: foliolis subrotundis integerrimis subimbricatis convexis. L. *Dill. Musc. t. 70. fig. 9.*

In umbrosis udis, sylvaticis; Vere. (Perianthia axillaria, apice per lentem laciniata.)

* 24. 1. *sphagni*, frondibus reptantibus simpliciter pinnatis latere floriferis, foliolis subrotundis integerrimis imbricatis secundis *Dicks. fasc. pl. crypt. 1. 6. tab. 1. fig. 10.*

In palustribus, Sphagno palustri adhaerens; Vere.

25. 1. *lanceolata*, frondibus simpliciter pinnatis lanceolatis apice capsuliferis, foliolis planis integerrimis obtusis. L. *Dill. Musc. t. 70. fig. 10.*

Ad terram locis udis, umbrosis; Hieme, Vere. (Fronde quam prioris breviores, minus ramosae.)

* 26. 1.

* 26. 1. *bidentata*, frondibus simpliciter pinnatis apice capsuliferis, foliolis bidentatis L. *Dill. Musc. t. 70. fig. 11.*

In sylvaticis, umbrosis; Autumno, Vere.

* 27. 1. *bicuspidata*, frondibus simpliciter pinnatis medio capsuliferis, foliolis imbricatis bidentatis. L. *Dill. Musc. t. 70. f. 13. Schmid. ic. t. 63.*

In montosis sylvaticis, umbrosis; Vere. (Folia quam praecedentis duplo minora, apice non raro in sterilibus globulifera. Hujus videtur loci: *Mnium fissum Neck. meth. 277. fig. 11.*)

* 28. 1. *bicornis*, frondibus simpliciter pinnatis, foliolis alternis distichis bidentatis globuliferis. *Flor. dan. t. 888. (Mn. fissum Lin.?)*

In sylvaticis; Aestate. (Hujus loci: I. globulifera *Timm, megap. 865.* Frondes filiformes multo longiores quam prioris.)

29. 1. *barbata*, frondibus simpliciter pinnatis apice medioque capsuliferis, foliolis 3 - 4 - dentatis. *Schmid. ic. t. 48. Schreb. spicil. 1084.*

In umbrosis, sylvaticis; Vere. (Frequenter occurrit, nomine *Lung. 4 - vel - 5. dentatae venditata.*)

30. 1. *scalaris*, frondibus simpliciter pinnatis: foliolis integerrimis ovatis, extremo caule distichis alternis, globulifero. *Schmid. Lung. fig. 17. Dill. Musc. t. 51. fig. 5.*

In

In nemorosis, rupestribus; Vere. (Perianthium ad basin caulis observo, neque vero foliola auriculata, dubitanter itaque adduco: L. *Trichomanis*, surculis repentibus subtus auriculatis, foliis ovato-subrotundis subemarginatis, vagina oblonga-cylindracea hirsuta infera *Dicks. fasc. 3. t. 8. fig. 5.* Hujus vero loci: Mu. *Trichomanis Leers, herb. 817.*)

* 31. 1. *pasilla*, frondibus brevissimis simpliciter pinnatis: foliolis obtuse lobatis. *Schmid. Ic. t. 22. Mich. t. 5. fig. 10.*

In umbrosis, humidis; Aestate, Autumno. (Perianthium magnum campanulatum. Hujus loci: L. *angulosa*, frondibus simpliciter pinnatis, foliolis latiusculis truncatis obtuse tridentatis, medio floriferis, theca campanulata *Dicks. fasc. crypt. 1. 7. Ej. hort. sicc. brit. fasc. 1. 25.*)

Frondibus acaulibus.

52. 1. *palmata*, acaulis, frondibus digitato-palmatis, basi capsuliferis. *Hedw. Theor. Musc. t. 18. fig. 93-95.*

Ad terram humidam, in cortice arborum dejecto, in nemorosis (Nassov. *Leers, herb. 913.* *lung. pusilla*. Saxon. *Hedw. l. c. 87.* *lung. palmata*. Megap. *Timm, prodr. 879.* *lung. palmata* — Autumno; Vere. Hujus loci vel peculiaris species videtur: *lung. multilida Schmid. lcon. t. 55.*)

* 33. 1. *furcata*, acaulis, frondibus linearibus ramosis: extremitatibus furcatis obtusiusculis L. *Dill. Musc. t. 74. fig. 45.* *Hedw. Theor. Musc. t. 19. 20.*

In sylvis ad truncos arborum; Vere. (A sequenti dignoscitur: frondibus apice frequenter emarginatis subreflexis, simul cum margine, nervo et perianthio ad lentem piloso-ciliatis, subpellucidis: reticuli arcibus rotundis. Hujus etiam loci: Img. *furcata* Leers herb. 912, ut ejus descriptio et specimina viva auctoris evincunt.)

* 34. 1. *tomentosa*, acaulis, frondibus ramoso-furcatis linearibus, obtusis, tomentosis.

Ad rupes; arborum truncos; absque capsulis. (Hujus loci: Img. *pubescens*, Schrank, primit. Flor. salisb. 860. Schrad. spicil. 76. 1. *furcata*. Var. *Teesdale's pl. eborac. Transact. of Lin. soc.* 2. 120. — Frondes elongatae; coloris in sicco prioris, pallidi; ad lentem opacae, denso tomento undique obductae, neque visibili reticulo instructae.)

* 35. 1. *multifida*, acaulis, frondibus bipinnatifidis L. Dill. t. 74. fig. 43.

In pratis udis, sylvaticis, ad latera rivulorum, putridos truncos; Vere. (Conferunt nascitur; ex una basi frondes 4-5. diffusae, inferius per mediam partem radiculosae, margine undique liberae. Perianthia cylindrica apice obtusa angustiora, ad lentem subhirsuta, ex axillis pinnarum prope basin adscendunt.)

* 36. 1. *pinguis*, acaulis, frondibus oblongis sinuatis ex inferiore parte capsuliferis L. Dill. Musc. t. 74. fig. 42. Mich. Gen. t. 4. fig. 2. Schmid. Icon. t. 55.

Locus udus, umbrosus, ad parietes rivulorum; Vere. (Variabili indit magnitudine ac forma, pro ratione aetatis vel sexus. Perianthia cylindrica obtuse crenulata. Color lacte viridis, substantia succulenta.)

* 37. 1. *epiphylla*, acaulis, frondibus sinuatis medio capsuliferis. L. Dill. Musc. t. 74. f. 41. Mich. Gen. t. 4. f. 1. Schmid. Jung. fig. 1. Hedw. Theor. Musc. t. 21-23.

Locis udis sylvaticis, ad fossas et rivulos; Vere.

29. MARCHANTIA (Marchantie) G. pl.
1661.

Capsula subglobosa unilocularis apice deli-
scent: dentibus plusquam 4; receptaculo
communi pedunculato affixa.

* 1. *M. conica*, receptaculo communi ma-
sculo sessili, femineo conico. L. Dill.
Musc. t. 75. fig. 1. Schmid. ic. t. 31. Hedw.
Theor. t. 25. 26.

In nemorosis paludosis, rupestribus; Vere.
(March. androgyna Web. spic. 230., quoad speci-
mina eodem loco, in introitu speluncae Bauman-
nianae collecta, frondibus substantia teneriore,
areolis vix conspicuis, poris magis sparsis mino-
ribus, ceterum ejusdem magnitudinis quam in
M. conica.)

* 2. *M. hemisphaerica*, receptaculo commu-
ni masculo peltato, femineo hemisphaeri-
co. Schmid. ic. t. 34.

In rupestribus umbrosis; Vere. (Hercyn. —
Pyrmont. Hannov. Ehrh. — Loculamentorum
anguli 3-8.)

* 3. *M. polymorpha*, receptaculo communi
masculo peltato, femineo radiato. L. Dill.
Musc. t. 76. fig. 6. t. 77. fig. 7. Schmid. ic.
t. 9.

t. 9. f. 29. *Bull. herb.* t. 291. *Hedw. Theor.* t. 24.

Locis udis, ad scaturigines et fontes aquarum; Vere. (Cupulae gemmiferae s. viviparae, substantiae frondis insidentes margine deutatae.)

30. TARGIONIA (Targionie) *G. pl.*
1663.

Calyx bivalvis pericarpium mentiens, sub apice frondis.

t. hypophylla L. *Mich. Gen.* t. 3. *Schreb. Naturforsch.* 15. t. 5.

In rupestribus. (Dresdae *Schreb.* — Exemplaria debeo cel. *Smith*, in Italia circa Neapolin collecta: *A sketch of a Tour on the continent* Vol. 2. 73. — Frondes steriles ac fructificantes, Marchantiae similes, quoad viridem impellucidam superficiem punctis albidioribus exuberantibus adpersam, inferne nigricantes fibrillosa, arcte terrae adglutinata. Fructificantes compositae obovatae, oblongae, apice obtusae, rarius obcordatae, inferius sub apice immescentes in semitundum compressum bivalve veluti pericarpium, anterius prominulum, duplici membrana structum: interiori hinc objecta purpurascente. Fructus globosus albidus, araneosis filis cum pariete valvularum connexus, apice stylo fugaci coronatus sessilis, demum major lutescens irregulariter dehiscens, turgescente nunc magis sic dicto calyce, et seminiformia demittens lutescentia granulosa corpuscula (quae immatura albida veluti semina margine pellucido cincta emittere per microscopium mihi visa sunt) filis ex duplici helice membrana connexis, tortis mobilibus adnexa.)

31. ANTHOCEROS (Nadelschorf) G. pl. 1664.

Capsula longissima subulata semibivalvis, calyce vaginata.

* 1. *laevis*, fronde plana sinuata L. Dill. Musc. t. 68. fig. 2. Schmid. ic. t. 19. Hedw. Theor. t. 27.

Locis graminosis, udis sylvaticis; Autumno. (Capsularum et frondis magnitudine saturatiore colore a sequenti statim distinguitur.)

* 2. *A. punctatus*, fronde crispa laciniata L. Dill. Musc. t. 68. fig. 1. Schmid. ic. t. 47.

In agris humidis, limosis; Autumno. (Particula fibrosa calyptrae in utraque specie capsulae saepe adhaeret caduca.)

32. BLASIA (Blasie) G. pl. 1665.

Capsula obliqua frondi immersa, tubo extorsum coronata persistente.

* 1. *B. pusilla*, L. Mich. gen. t. 7. Dill. Musc. t. 31. fig. 7. Schmid. Blas. Hedw. Theor. t. 28.

Ad latera fossarum, rivulorum; Autumno. Vere.

33. RICCIA (Riccie) G. pl. 1666.

Capsula subglobosa frondi immersa tubo coronata trajecto.

* 1. *R. minima*, frondibus bi- tripartitis dichotomis linearibus canaliculatis acutis.

In terra limosa. (Superficies etiam per lentem aequabilis, reticulo inconspicuo. Occurrit apicibus obtusis, cordato-acutis.)

* 2. *R. ciliata*, frondibus bipartitis, dichotomis, margine ciliatis. *Mich. gen. t. 57. fig. 5. Schmid. ic. t. 45. fig. 4.*

In terra limosa, agris post messem; Autumno. (Fronde angustiores, latiores, ad lentem reticulato-punctatae.)

* 3. *R. minoriformis*, frondibus multipartitis dichotomis acutis reticulato-cavernosis.

In terra limosa. (R. minori similis, frondes ad lentem laxè reticulatae.)

* 4. *R. cavernosa*, frondibus imbricatis cavernoso-punctatis obtusis. *Schmid. ic. t. 45. fig. 5. (Riccia crystallina.)*

In terra limosa, ad piscinas. Iul. — Autumno. (Fronde orbiculares dilute ex luteo virentes.)

5. *R. bifurca*, frondibus multipartitis dichotomis apice bifurcatis, sulcatis. *Schmid. ic. t. 44. fig. 1. (Riccia glauca.) Mich. gen. t. 57. fig. 4.*

In terra limosa, humida. (Ex maximis, undique saepe capsulis et granulis tecta, diffusa, apice bifurca vel excisa.)

* 6. *R. glauca*, frondibus planis dilatatis bipartitis dichotomis obtusis. *Hedw. Theor. t. 29. Ehrh. crypt. exs. n. 115. (Riccia glauca.)*

In terra limosa, agris post messem; Autumno. (Color in recenti ex viridi glaucus; superficies

ficies ad lentem aequabilis reticulato - punctata. Occurrit frondibus minoribus *Schmid. ic. t. 44. fig. 2.* Riccia minima segmentis brevioribus etc.)

7. *R. pyramidata*, frondibus indivisis oblongis, apice inferne triangulariter incrassatis, fructibus pyramidatis. *Willd. in Bot. Mag. 4. 9. Mich. gen. t. 57. fig. 2.*

In rupe tenui terra tecta. (Hal. saxou. ad Giebichenstein *Willd. Luze*: etiamsi postea sollicitè quaesita, non amplius reperta *Blottner.*)

* 8. *R. fluitans*, frondibus planis dichotomie multifidis divaricatis, furcatis apice obtusis, reticulato - venosis.

In fossis piscinis. (Ad terram humidam frondes breviores latiores saepe conformes *f. 2. t. 19. Vaill. paris.*; aquae innatantes longissimae filiformes; pellucidae. Corpuscula lutea sparsa nidulantur in tenera substantia, alia subtus conspicua seminifera globosa, superne in porum aperta. *Ehrh. Beitr. 3. 81.*)

9. *R. canaliculata*, frondibus canaliculatis lineari - multifidis, dichotomis opacis.

Ad terram humidam, in fossis. (Per superficiem frondes angustae, hinc inde ad lentem reticulato - cavernosa impellucidae.)

* 10. *R. natans*, fronde obcordata plana, subtus longis compressis radiculis tecta *L. Dill. Musc. t. 78. fig. 18. Schmid. ic. t. 74.*

Inter Lemnas, in aquis stagnantibus. (Gott. *Web. Palat. Neck. Poll. Barbi Scholl.* —) Vere.

11. *R. pellucida*, fronde simplici membranacea tenera lobata: lobis obtusis obcordatis

datis. *Mich. gen. t. 57. fig. 3. Dill. t. 78. fig. 12.*

Ad terram humidam umbrosam, in nemorosis (Nassov. — *Leers*; *Riccia crystallina herb.* 252. Frondes ab initio bilobae, sensim 5-5-lobae et ultra, ad lentem reticulo venoso omnium maximo, areolis pellucidissimis, margine hinc inde denticulis, centro inferne radiculis instructae.) Autumno; Vere.

SCUTELLATA (Lichenes.)

34. COLLEMA (Gallertflechte) G. pl. 1668.

Frondes diaphanae, gelatinosae. Scutellae marginatae.

* 1. c. *Vespertilio*, orbiculatum lobatum, plicato - rugosum nigrescens. Pl. lich. t. 37. fig. 2 - 3.

In saxis, arborum truncis.

2. c. *prasinum*, gelatinoso - carnosum lobatum: lobis obtusis sinuatis subimbricatis, tuberculis concoloribus; scutellis rufescentibus.

In rupibus ad terram. (Nassov. *Leers*, herb. 948. Lich. pulcher. Color in humido eleganter prasinus (lauchgrün). Frondes orbiculares, vel tuberculiferae, vel scutelliferae, in distinctis individuis; scutellarum margo tumidulus parum crenulatus.)

* 3. c. *auriculatum*, imbricatum sinuoso - lobatum crenulatum; scutellis depressis muricatis rufescentibus.

In saxis, muscosis. (Hercyn. — Mont. pinif. variisque Germ. locis. Ad radices arbor. A Coll. Vespert. differt: substantia crassiori lobis

con.

confertis margine erectiusculis, medio depressis granulosis; colore in humido ex glauco virescente, nigricante, in sicco sordide virescente ex glauco et luteo mixto. Granula superficiei demum in folia explicantur. Scutellae infrequentes, margine saepe crenulato vel foliaceo cinctae, disco rufescente. H. v. l. Lich. cochleatus, foliaceus membranaceus lobatus plicatus obscure vires, scutellis rufis *Dicks. fasc. 1. t. 2. fig. 9.*

* 4. *c. tomentosum*, subimbricatum sinuatum lobatum, granulis superne villis inferne obsitum; scutellis planis rufescentibus.

In saxis, rupibus Arborum truncis; (Rarissime cum scutellis, margine foliis concolore cinctis. Colore obscure plumbeo, substantia semi-diaphana a priori statim dignoscitur. Occurrit fronde latiore rotunde lobata h. l. Lich. *saturatus*, foliaceus rotunde lobatus supra nigricans subtus villosus cinereus, scutellis rufis marginatis *Dicks. fasc. 2. t. 6. fig. 3.* Lich. *myochrous* *Ehrh. crypt. exs. 286.*

* 5. *c. granuloseum*, imbricato - aggregatum, crenulato - sinuatum gyrosum plicatum granuloseum. *Dill. Musc. tab. 19. fig. 24.*

In rupibus ad terram, absque scutellis. (Color nigrescens. Magnitudo uncialis sescuncialis.)

*6. *c. crispatum*, imbricato - aggregatum undulatum crispum, laciniatum; scutellis terminalibus.

In rupibus, saxis. (Orbiculatim expansum. A sequenti differt: fronde crispa undique, laciniis erectis latioribus, peripheriam versus expansis, margine granulosis in plicis cum scutellis terminalibus. Occurrit scutellis rufis margine granulatis.)

*7. *c. laciniatum*, imbricatum laciniatum: laciniis multifidis lineari-cauliculis crenulatis; scutellis marginalibus. *Dill. Musc. t. 10. fig. 25.*

In rupibus, saxis. (Var. magis crispa angustior.)

*8. *c. glaucescens*, subimbricatum aggregatum crispo - lobatum obtusum, siccitate cinereo - glaucum.

Ad aggeres, muros. (In prima aetate frondes parvae ex umbilicali radice lobato-divisae, irrigatae nigrescentes. Scutellae amplae fusco-sanguineae. Substantia pulposo-gelatinosa semi-diaphana. H. vid. l. Lich. cristatus *Wulfen in Jacq. coll. 5. t. 12. fig. 1.*)

* 9. *c. crispum*, subimbricatum lobatum: lobis abbreviatis; depressum erectiusculum rotundatum crassiusculum; scutellis plano-convexis marginatis. *Dill. Musc. t. 19. fig. 23.*

Ad muros, saxa, terram. (*c. crenulatum*, subimbricatum depressum sparsum, lobis abbreviatis; scutellis crenulatis.)

10. *c. obscurum*, depressum foliis oblitteratis; scutellis rufescentibus depressis obscure marginatis crenulatis.

Ad terram, nigrescens, arctissime terrae conatum; frequenter in consortio *Br. stellati*.

11. *c. cristatum*, imbricato - aggregatum laciniatum margine cristatum.

In rupestribus. (Color ex prasino vel fusco virescens. Margo foliorum incrassatus dentato-cristatus. *H. vid. l. Dill. Musc. t. 19. fig. 26. A. B.* fronde altius divisa et subdivisa canaliculata; *c.* fronde brevissime laciniata undique scutellis tecta.)

* 12. *c. marginale*, subimbricatum lobatum: lobis erectiusculis sinuato - crenulatis concavis; scutellis crenulatis.

Ad

Ad muros, saxa, terram. (Gott. *Bernhardi* —
Foliola luci obversa diaphana viridia, margine
saturatione cincta, semitremellosa.)

* 13. *c. polycarpon*, subimbricatum aggregatum lobatum rugosum: rugis elevatis scutelliferis.

In rupibus ad terram. (Scutellae numerosissimae mediocri magnitudinis, ex rugis elevatis quasi pedunculatae, terminales, discum frondis penitus obtegentes.)

* 14. *c. conglomeratum*, laciniatum erectiusculum; scutellis fasciculatis fronde majoribus. *Ehrh. crypt. exs.* 256. (Lich. fascicularis.) *Dill. Musc. t.* 19. *fig.* 27. *B.*

In lignis putridis, cortice, saxis. (H. v. l. Lich. fascicularis *Huds.*)

* 15. *c. fasciculare*, aggregatum erectum gyroso-crispum; scutellis minutis obverse conicis stipatissime coronatum. *Iacq. coll.* 3. *t.* 11. *fig.* 2. (Lich. fascicularis *Wulf.*)

In saxis, inter Muscos. (Gott. *Bernhardi* —
Colore praecipue differt: *c. argillosum*, aggregatum gyroso-crispum pulposum sordide lutescens scutellis concoloribus stipatissime marginalibus et disci coronatum. *Ibid.*)

* 16. c. *Botrytis*, aggregatum crispum substipitatum polycéphalum.

Inter Muscos cum sequenti. Color niger. Scutellae minutae obovatae convexae, apice hinc inde depressae, in capitula quasi granulosa substipitata connatae.)

* 17. c. *pannosum*, aggregatum, multifidociliatum.

Inter Muscos (panno nigro sericeo ad nudos oculos simile pulvinatum; Per lentem usque ad basin multipartitum: laciniis erectis acutis linearibus confertissimis.)

* 18. c. *nigrum*, byssinum nigrum; scutellis immersis concoloribus. Enum. Lich. t. 3. fig. 6. (Lich. niger.)

In rupibus, saxis. (Cavendum ne cum stereocaul. corallinoid. vel Byss. velut. confundatur. Per lentem foliolis subpellucidis tremellois linearibus subdivisis, aquam citissime bibulis compositum; scutellis immersis.)

19. c. *tenuissimum*, aggregatum fusco-virescens, digitato multifidum; scutellis subimmersis fusco-rufescentibus marginatis. Dicks. fasc. 1. t. 2. fig. 8. (Lich. tenuissimus.)

Ad terram aggeres sabulosos. (Laciniæ ad lentem acutæ. Colore, foliorum divisura et scutellis æque a paucos ac sequenti diversum.)

* 20. *c. pulvinatum*, aggregatum erectum laciniatum truncatum crenulatum. *Dill. Musc. t. 19. fig. 34.*

Inter Muscos, ad muros. (Absque scutellis. Substantia semigelatinosa. Frondes confertissimæ pulvinatæ nigrae.)

* 21. *c. ciliatum*, erectum aggregatum, membranaceum lividum, laciniatum planiusculum, margine ciliatum. *Dill. Musc. t. 19. fig. 31. A. B. Leers, herb. 947. (Lich. tremelloides.)*

Ad terram inter Muscos. (Scutellæ rarissimæ, minutæ frondi insidentes eaque pallidiores, hinc inde ciliatæ, disco carneo concavo, Var. magnitudine et colore plus minusve in plumbeum vel caeruleum vergente, fronde saepe plane nuda. *c. simbriatum*, erectum aggregatum, foliis membranaceis laciniatis, margine dense simbratis. *Dill. l. c. C.* Absque scutellis. Iisdem cum priori locis, a quo differt: colore magis fusco, ciliis densis, ad lentem ramosis.)

22. *c. corniculatum*, laciniatum membranaceum convolutum multifidum corniculatum. *Dill. Musc. t. 19. fig. 30?*

Ad terram. (Color in sicco lividus hinc inde subfuscus. Substantia tenuis non multum gelatinosa. Frondes cucullatae.)

23. *c. lobatum*, depressum subimbricatum margine crenato - lobatum: lobis rotundis; scutellis depressis concavis fulvis margine fronde concoloribus.

In terra, Muscis. (Color è glauco viridis, substantia crassiuscula. Colore occurrit nigrescente, livido.)

* 24. *c. subtile*, depressum, foliolis minutis angustis divisis: laciniis inaequalibus *Schrad. spic. 95.* (Lich. subtilis.)

Ad terram limosam in viis cavis sylvaticis. (Gott. *Schrad.* —)

* 25. *c. byssinum*, depressum, foliolis minutis granulosis scutellisque demum convexis.

Ad terram limosam. (Foliola nudo oculo granulis minutis simillima; ad lentem inaequaliter et brevissime laciniata.)

* 26. *c. graniforme*, depressum foliolis graniformibus; scutellis margine crenulatis.

Ad terram limosam. (Foliola nudo oculo graniformia, ad leuitem hinc inde inciso-crenata; scutellae quam praecedentis duplo maiores, integrae vel crenulatae, disco depresso.)

35. PELTIGERA (Schildflechte) *G. pl.*
1668.

Frondes coriaceae. Scutellae compressae margine adnatae.

* 1. *P. canina*, plana obtuse lobata subtus venoso-villosa. *Iacq. coll. 4. t. 14. fig. 1.* (Lich. caninus *Wulf.*)

In sylvis ad terram. (Occurrit paucioribus subrotundis scutellis, fronde latissima: lobis obtusis rotundatis sine verrucis glabra: *P. amplissima*, aphthosae simillima.)

2. *P. polydactyla*, adscendens polydactyla, subtus venoso-villosa. *Pl. lich. t. 4. fig. 1. Iacq. coll. 4. t. 14. fig. 2.* (Lich. polydactylus *Wulf.*)

In sylvis ad terram. (Var. minor tenerior pellucida. *Dill. Musc. t. 28. fig. 103.* Scutellae quam praecedentis duplo minores.)

3. *P. rufescens*, plana laciniato - lobata: lobis sinuato - crispis, subtus venoso - villosa. *Jacq. coll. 4. t. 15.* (Lich. *rufescens* *Wulf.*) *Dill. Musc. t. 27. fig. 103.*

: In sylvaticis, rupestribus, ad terram. (Scutellae subrotundae, demum adscendentes cum foliorum lobis.)

* 4. *P. horizontalis*, plana laciniato - lobata; scutellis horizontalibus planis. *Jacq. coll. 4. t. 16.* (Lich. *horizontalis* *Wulf.*) *Dill. Musc. t. 28. fig. 104.*

: In sylvaticis, rupestribus. (Subtus margine avenia, nigricans reticulata. Individua alia margine pulverulenta. Var. *polydactyla* scutellis minoribus.)

* 5. *P. aphthosa*, plana diffusa obtuse lobata, superne verrucis nigris, inferne venis concoloribus fibrillisque longissimis tecta. *Pl. lich. t. 6. fig. 1.* *Jacq. coll. 4. t. 17.* (Lich. *aphthosus* *Wulf.*)

In sylvaticis rupestribus, ad terram.

* 6. *P. venosa*, adscendens, subtus venosa; scutellis horizontalibus planis orbiculatis. *Pl. lich. t. 6. fig. 2.*

Locis umbrosis elatis, ad margines viarum. (Totius generis minima, fronde ovata, obovata, flabelliformi.)

*7. *P. papyracea*, subcoriacea, laciniata obtuse lobata utrinque glabra; scutellis posticis.

In abietum cortice, ramulis dejectis. (Ab murali usque ad semipalmarem latitudinem. Scutellae rufo-ferrugineae, demum amplissimae, a fronde marginatae. Etiam, ad lentem maxime argenteam subtus vix tomentosa; diversa itaque videtur:)

8. *P. tomentosa*, subcoriacea, laciniata lobata utrinque tomentosa; scutellis posticis.

In montosis rupestribus ad terram. (Substantia tenaciori, tomento ad lentem superne, in convexa potissimum scutellarum parte, inferne nudis oculis facile observabili, denso, dilute fusco, hinc inde punctis albidis, excavatis, quod etiam in exemplaribus in Svecia lectis coram video, interspersis, *P. sequentis* in modum, saltem ut subspecies distinguatur a praecedenti. Synonyma *Dill. Musc. t. 28. fig. 5. Jacq. coll. 4. t. 12. fig. 1. Lich. resupinatus Wulf. Web. spicil. 267.* hanc vel illam indicant. Inter papyraceam

raceam non raro occurrunt individua ascutellata, margine glauco pulvere adpersa, crispa.)

* *Q. P. sylvatica*, subcoriacea, sinuato-laciniata scabra, subtus tomentoso-villosa punctis excavatis albidis conspersa. *Pl. lich. t. 4. fig. 2. Iacq. coll. 4. t. 12. fig. 2: (Lich. sylvaticus Wulf.)*

Locus sylvaticis rupestribus. (Scutellae infrequentes, parvae, in extimis laborum laciniis, adscendentes, quibus praeter odorem gravem in humido, distinguitur a consimili planta; Lobaria fuliginosa: Lich. fuliginosus, foliacens repens sinnato-lobatus scaber, subtus spongioso-villosus lacunosus, scutellis planis ferrugineis, marginibus pallidis. Dicks. fasc. 1. 13. Dill. Musc. t. 29. fig. 100.)

36. UMBILICARIA (Nabelflechte) *G. pl. 1668.*

Frondes foliaceae peltatae. Scutellae contortae.

* *1. u. polyphylla*, imbricata utrinque glabra, superne fusco-aenea, inferne atra.

In montosis rupestribus. (Hercyn. — raro scutellifera; irrigata fusco-virens. Etiam fronde simplici occurrit, h. 1: Lich. glaber *Achar.*

in kongl. Vet. Acad. Handl. 15. t. 2. fig. 5. — utrinque atra h. 1:).

* *U. anthracina*, subimbricata glabra, superne et inferne atra. *Iacq. Misc.* 2. t. 9. fig. 4. (Lich. anthracinus *Wulf.*)

In saxis montosis. (Hercyn. — frondes obtuse lobatae rigidiusculae, irrigata vix colore diversae. Specimina e Carinthia a rev. *Wulfen* missa, tenuiora, margine crispato lobata.)

2. *U. flocculosa*, undique nuda sublaevis, fusco-nigra, inferne sparsim lacunosa. *Iacq. coll.* 3. t. 1. fig. 1. (Lich. flocculosus *Wulf.*)

In saxis montosis. (Exemplaria in Carinth. lecta rigidiuscula farina adpersa nigricante, per lentem in papillae conicas elevata, lacunae subtus parum impressae — Upsaliae lecta tenuiora, pulvere etiam per lentem similari, conspersa, inferne distincte lacunosae. Scutellae rarissimae depressae contortae. H. vid. 1: Lich. densus, umbil. integer sublaevis ater, subtus impresso-punctatus rugulosus, peltis depressis *Westr.* in kongl. Vet. Acad. Handl. 14. 43.)

* 3. *U. hyerborea*, fusco-nigricans utrinque nuda, superne rugoso-papulosa, sub-

tus

tus laevis obsolete lacunosa. *Achar. l. c. t. 2. fig. 2.*

In montosis rupestribus. (Hercyn. — Frondibus etiam imbricato-lobatis.)

* 4. v. *grisea*, subcinerea laeviuscula, subtus nigro-fusca papillosa. *Achar. l. c. t. 2. fig. 3.*

In montosis rupestribus (Hercyn. —)

* 5. v. *erosa*, nigricans, inciso-lobata, laciniato-cribrosa. *Achar. l. c. t. 2. fig. 1. Ehrh. crypt. exs. 306. (Lich. corrosus.)*

In montosis rupestribus (Hercyn. — II. l. Lich. *Cribellum Retz. scand. ed. 2. 1613. Inferne dilutior, hinc inde reticulato-fibrillosa. Occurrit etiam parum erosa luci obversa tamen cribrosa.)*

* 6. v. *pustulata*, superne pustulata inflata furfuracea, subtus lacunosa. *Pl. lich. t. 28. fig. 1-2. t. 29. fig. 4.*

In montosis, saxosis frequens. (Scutellas distincte et spiraliter contortas observo in exemplari et America septentr. a *D. Muhlenberg* accepto. Hercyn. rarius scutellifera margine simplici, disco depresso.)

* 7. *U. corrugata*, undique nuda, superne reticulato - rugosa. *Pl. lich. t. 43. fig. 4-7. Ehrh. crypt. exs. 89. (Lich. mesenteriformis.)*

In montosis rupestribus. (Hercyn. — Fibrillae hinc inde sparsae. Substantia tenuiori, magis plus minusve elevatis concentricis a sequenti diversa. H. vid. 1. *Lich. pullus Wulf. in Jacq. Misc. 2. t. 9. fig. 3.)*

* 8. *U. crinita*, imbricato - plicata margine undique crinita. *Pl. lich. t. 44. f. 1-9. Hedw. stirp. 2. t. 1. A. (Lich. proboscideus.)*

In montosis, rupestribus frequens. (Aetate frondes corrosae, rugosae, hinc inde tantum crinitae. Color e cinereo nigricans, subius dilutior fuscus. *U. rigida*, imbricato - plicata undique nuda. Cum priori. H. 1. *Lich. mesenteriformis Wulf. in Jacq. Misc. 2. t. 9. fig. 5.)*

9. *U. hirsuta*, cinerea laeviuscula, lobata: lobis inflexis; subtus hirsutissima fibrillis simpliciusculis. *Achar. l. c. t. 3. fig. 1.*

In montosis. (Superne cinerea, per lentem utrinque granulata, subtus fusco - cinerea, radicem versus nigricans. Fibrillae cinereae simplices,

plices, hinc inde furcatae. In exemplaribus Upsaliae lectis, 1 - 4 uncialibus, nigra scutelliformia impressa puncta observo. Praeter minorem uncialem magnitudinem et rigidiorum in sicco texturam parum differt:)

* *U. spadochroa*, cinereo - glauca, laeviuscula, subtus sparsim fibrillosa papillosa subfusca. *Ehrh. crypt. exs.* 317. (Lich. spadochrous.)

In montosis. (Hercyn. — H. l. quoad specimina a cel. *Smith* ex herbario linneano mecum communicata: Lichen polyrrhizos *Lin.*, inferne cinereus subfuscus vel fusco - nigricans, scutellis distinctis contortis. Irrigata parum virescit frons, etiam polyphylla. Aliena et cum *U. cirrhosa* *pl. lich. t. 2. fig. 3.* potius conveniens species est: Lich. polyrrhizos *Achar. l. c. t. 2. fig. 4.*)

* 10. *U. pelloa*, fusco aenea - glabra lobata, subtus margineque hirsutissima atra. *Pl. Lich. t. 26. fig. 3.* *Achar. l. c. t. 3. f. 2.* (Lich. pellitus.)

In saxis, rupibus montosis. (Hercyn. — Var. fronde minori polyphylla, subtus atra centrum versus unda, papillis exasperata. — H. l. Lich. hirsutus *Swartz. Westr. l. c. 47.* Magnitudine palmari aequae ac fibrillarum structura differt:

Lich. velleus quorundam Dill. Musc. t. 82. fig. 5, ut specimina lecta eodem a Dillenio indicato loco, e Pennsylvania a D. Muhlenberg accepta, evincunt.)

37. CLADONIA (Strunkflechte) G. pl. 1668.

Frondes caulescentes teretes intus cavae. Scutellae tuberculosae.

Fruticulosae.

- * 1. *C. rangiferina*, perforata ramosissima: ramulis fastigiatis nutantibus. Dill. Musc. t. 16. fig. 30.

In ericetis, montosis; sylvaticis: (*C. sylvatica*, longioribus saepe palmaribus caulibus erectis ramoso - fastigiatis nutantibus, scutellis fuscis minutis.)

- * 2. *C. racemosa*, perforata ramosa: ramulis scutelliferis racemosis erectis.

In ericetis sylvaticis denso cespite. (Caulis nudiusculi hinc inde foliolis adspersi, superne parum ramosi, ultimo racemosi, undique scutellis rufescentibus oblecti.)

- * 3. *C. rangiformis*, perforata ramosissima: ramulis nudis brevissimis furcatis erectis fastigiatis.

In ericetis, montosis. (Apices ramulorum fuscae. Scutellae sparsae. Caules tenuiores humiliores magis divaricati quam in *C. rangiferina*. *Fig. 9. Ser. 3. Sect. 15. t. 7. Moris.* habitum non male exprimit.)

* 4. *c. furcata*, perforata ramoso-divaricata: ramulis furcatis nudis scutelliferis radiatis. *Dill. Musc. t. 16. fig. 27.*

In ericetis sylvaticis. (H. l. Lich. *furcatus Reich. francof. 859*, quoad specimina viva Auctoris. Semifusca in siccitate. Caulibus longioribus ramulisque subulatis *Moris. hist. Sect. 13. t. 7. Ser. 2. fig. 1. Dill. l. c. B.* Ramis reflexis attenuatis, foliosis glauco-virescentibus *C. recurva. Dill. l. c. D. Vaill. bot. t. 7. fig. 7. C. furcato-subulata*, perforata simpliciuscula erecta superne ramosa furcato-subulata, ultimis ramulis brevissimis. *Vaill. paris. t. 26. fig. 7.*

* 5. *c. spinosa*, perforata ramosa diffusa: ramis divaricatis: ramulis digitato-multifidis scutelliferis. *Dill. Musc. t. 16. fig. 25.*

In ericetis montosis, sylvaticis. (Cinereo-virescens, foliolis adspersa, superne ex cinereo hinc inde subfusca. c. *spinescens*, ramis trifidis: ramulis sterilibus, brevissimis fastigiatis.)

* 6. *c. ceranoides*, perforata diffusa ramosa: ramis divaricatis nudis superne incrassatis: ramulis fastigiatis truncatis.

In ericetis montosis. (Hercyn. — Color superne ex cinereo subfuscus; magnitudine unciali sescunciali. H. 1. Lich. *ceranoides*, fronde tereti aculeata, alis perforata laevi ventricosa: ramulis terminalibus subradiatis Neck. meth. 63, quoad viva exemplaria Auctoris. Axilli ramulorum hinc inde perforati.)

* 7. *c. uncinata*, axillis perforata radiatim uncinata, incana, inaequaliter ramulosa. Dill. Musc. t. 16. fig. 21. A.

In ericetis montosis. (Hercyn. — Pulverulenta incana superficie, ramulorum divisione, magnitudine bi - triunciali, facile a sequenti dignoscitur.)

* 8. *c. biuncialis*, axillis perforata spinulosa simpliciuscula nuda, ramulis brevissimis fastigiatis acutis. Dill. Musc. t. 16. fig. 21. B.

In ericetis montosis. (Parum ramosa: ramulis sterilibus brevissimis subulatis 2 - 3, stellatis, cuspidatis apice subfuscis, rarius scutellis pallide carneis vel subfuscis terminatis, in figura 2. Mich. t. 40. bene expressis. Morisoniana t. 7.

fig. 7.

fig. 7. Sect. 15, habitum nostrae stirpis melius quam *Dilleniana* repraesentat. Color pallide ex luteo albidus.)

* 9. *c. uncialis*, perforata nuda breviter ramosa et ramulosa: ramulis acutis. *Dill. Musc. t. 16. fig. 22.*

In ericetis. (Ex humilioribus; vel incrassata vel attenuata apicem versus; in quibusdam superficie tuberculosam, vel papulosam potius observo.)

10. *c. Papillaria*, simpliciuscula ventricosa, obtusa, apice subfusca, adscendens ramulosa scutellifera. *Iacq. coll. 3. t. 3. fig. 2.* (Lich. madraeporiformis *Wulf.*)

Ad terram in ericetis, montosis. (H. l. Lich. *Papillaria*, fruticulosus, fistulosus, aphyllus, albidus; ramis paucissimis, obtusis, brevissimis; tuberculis terminalibus, carneis *Ehrh. Beitr. 2. 105.* Crusta albida.)

* *c. molariformis*, adscendens brevissime ramulosa: ramulis confluentibus truncato-fastigiatis apice fusco-nigricantibus. *Dill. Musc. t. 16. fig. 28.*

Iisdem cum priori locis.

Subu.

Subulatae.

* 11. *c. subulata*, perforata simpliciuscula erecta, ramis simplicibus subulatis. *Dill. Musc. t. 16. fig. 26.*

In ericetis, montosis. (Glabra, cinerea, virescens, semifusca; ramulis hinc inde dichotomis ramosis.)

12. *c. subuliformis*, adscendens filiformi-subulata nuda simpliciuscula albida. *Pl. lich. t. 29. fig. 1 - 3.*

In montosis inter muscos. (Hercyn. — *Elvth. Lich. subuliformis*, fruticulosus tubulosus, filiformi-subulatus, simplex, cespitosus, adscendens, laevis, albissimus, ramulis paucissimis, brevissimis, saepe nullis. *Beitr. 3. 82. Lich. vermicularis Lin. fil. musc. 37.*)

13. *c. taurica*, adscendens cespitosa ventricoso-subulata, subramosa nuda virescenti-albida. *Pl. lich. t. 34. fig. 2.*

In montosis. (Carinth. Wulf. Tyrol. —)

14. *c. furcellata*, simpliciuscula incana, superne dichotoma furcata; ramis subulatis. *Hag. lich. t. 2. fig. 10.*

In ericeis, sylvaticis.

Subu-

Subulato - scyphiferae.

* 15. *c. cornuta*, fronde foliacea stipite incano obscure scyphifero, ventricosissimo subulato. *Pl. lich. t. 25. fig. 1.*

In ericetis, putrescente ligno. (Var. longis cylindricis, stipitibus simplicibus, brevioribus ventricosissimis, subramosis, foliolosis, coccineis vel subfuscis scutellis apice terminatis. *Dill. Musc. t. 15. fig. 14. A — F.*)

* 16. *c. hybrida*, fronde stipiteque foliacea simplici, obscure scyphifero margine scutellifero, prolifero subulato. *Dill. Musc. t. 14. fig. 15. C. D.*

In ericetis, sylvaticis.

* 17. *c. gracilis*, fronde foliacea, stipite erecto gracili scyphifero, margine scutellifero prolifero subulato. *Dill. Musc. t. 14. fig. 15.*

In ericetis, sylvaticis.

* 18. *c. elongata*, stipite erecto obscure scyphifero margine elongato, prolifero, subulato. *Iacq. Misc. 2. t. 11. f. 1. (Lich. elongatus.)*

In montosis subalpinis. (Tyrol. — Colore cinereo, dilute castaneo prioris, magnitudine et crassi.

crassitie diversa. Margo in scyphos vel cornicula elongatus, saepe stipite longiora, denticulatus etiam, et scutellis prolifer.)

* 19. *c. radiata*, fronde foliacea, stipite erecto incano superne dilatato, margine corniculato, simplici proliferoque. *Dill. Musc. t. 15. fig. 16. A. B. Schreb. spicil. 1114. (Lich. radiatus.)*

In nemorosis, ericetis, putridis truncis. (Occurrit: stipite elongato gracili, margine cornibus simplicibus vel scutellatis radiato. *Dill. l. c. D*; stipite crassiori ventricoso margine cornibus inaequalibus, saepe simplici radiato; stipite subulato simplici, vel uno alterove laterali cornu instructo; stipite superne tri-quadrifurcato. — *c. polyceras*, stipite erecto simplici ramoso - corniculato scutelliformibus tuberculis prolifero. *Dill. l. c. C. E. c. furcellato radiata*, stipite erecto maximo simplici furcellato ramoso subulato cylindrico prolifero scutellato. — Stipite crassiori ventricoso praeter farinam candidam squamulis foliolosis tecto. *Dill. l. c. G.*)

* 20. *c. deformis*, fronde foliacea incana; stipite ventricoso subulato, scyphifero.

In sylvis montosis, lignis putridis. (Hercyn. — Colore sulphureo, crassitie semunciali, altitudine

itudine fere biunciali; etiam Upsaliae lectam habeo; scyphi ampli margine scutellis obscure coccineis vel fuscis obsito. H. l. *Lin. flor. lapp.* t. 11. fig. 5. statura minore superficie ex rufescenti incana quasi tomentosa, margine denticulato, contracto; H. l. *Dill. Musc.* t. 15. fig. 18.)

Scyphiferae.

21. *c. pyxidata*, fronde foliacea, stipite in scyphum distinctum dilatato.

In ericetis, montosis (sequenti occurrit forma.)

* *c. exilis*, fronde foliacea, stipite erecto brevissimo scyphifero. *Dill. Musc.* t. 14. fig. 11.

In ericetis sylvaticis, arborum truncis, saxis.

* *c. simplex*, fronde foliacea, stipite erecto scyphifero margine integro crenulato. *Dill. Musc.* t. 14. fig. 6. *A. Vaill. paris.* t. 21. fig. 7, 8.

In ericetis. (Margo hinc inde minutis fuscis scutellis obsitus.)

* *c. incana*, fronde foliacea, stipite erecto scyphifero incano. *Dill. Musc.* t. 14. f. B.

In ericetis. (Magnitudine proinde actate variabilis, margine crenato, scutellato, prolifero.)

* *c. tubaeformis*, frondē foliacea, stipite erecto gracili scyphifero. *Dill. Musc. t. 14. fig. 10. Vaill. par. t. 21. fig. 6.*

In ericetis montosis.

* *c. fimbriata*, fronde foliacea, stipite erecto scyphifero margine dentato fimbriato, simplici proliferoque. *Dill. Musc. t. 14. fig. 8.*

In ericetis montosis.

* *c. verticillata*, fronde foliacea, stipite erecto scyphifero, disco vel margine bis, ter, quaterve prolifero. *Dill. Musc. t. 14. fig. 6. D - H. Vaill. par. t. 21. fig. 5.*

* *c. prolifera*, fronde foliacea, stipite erecto scyphifero disco vel margine prolifero aggregato. *Vaill. paris. t. 21. fig. 9. Michx. Gen. t. 42. fig. P.*

In ericetis cum prioribus.

* 22. *c. tuberculosa*, fronde foliacea, stipite erecto scyphifero margine scutellis fuscis prolifero. *Dill. Musc. t. 14. fig. 6. C. Vaill. paris. t. 21. fig. 11.*

* *c. marginalis*, fronde foliacea, stipite erecto scyphis margine vel disco scyphiferis scutellatis prolifero. *Dill. Musc. t. 14. fig. 6. I - M.*

In ericetis sylvaticis, saxosis cum priori.

* 23. *c. coccinea*, fronde foliacea, stipite erecto scyphifero, scutellis sessilibus, sub-stipitatis coccineis. *Dill. Musc. t. 14. fig. 7.*

In ericetis, sylvaticis. (Occurrit: stipite squamoso margine prolifero tuberculoso *Dill. l. c. K. L.*; centro prolifero scyphifero tuberculoso *Dill. l. c. M.*; margine producto tuberculoso vel novis scyphis tuberculosus prolifero, stipite longiori et crassiori: *c. extensa. Vaill. par. t. 21. fig. 4.*

* 24. *c. phyllophora*, fronde foliacea, stipite erecto in foliola desinente scyphulis minutis obsita. *Ehrh. crypt. exs. 287. (Lich. phyllophorus.) Vaill. par. t. 21. fig. 3.*

In ericetis sylvaticis putrescenti ligno. (Scyphuli e foliolis quibus superne cinctus stipes, oriuntur.)

25. *c. foliacea*, fronde expansa foliacea multifido-laciniata adscendente scyphis verrucisque obsita. *Mich. Gen. t. 42. fig. 1 - 2.*

In apricis, inter Muscos. (Scyphi variant magnitudine, margine integri, crenulati, fimbriati. Verrucae sessiles in superficie frondis. H. vid. l. Lich. foliaceus Huds. Schreb. spicil. 1115.)

26. *c. cristata*, fronde foliacea, stipite erecto scabriusculo obscure scyphifero, margine foliolis crispo prolifero ramoso subfuscis scutellis cristato. Dill. Musc. t. 14. fig. 9.

In ericetis. (Occurrit: stipite hinc inde foliolis tecto sescunciali, minori unciali, margine foliolis vix conspicuis, cristato, Dill. l. c. B. Etiam centro hinc inde majoribus scutellis prolifero.)

27. *c. turgida*, fronde foliacea, stipite erecto perforato vel obscure scyphifero ramisque turgidis fastigiatis truncatis apice brevissime ramulosis denticulatis fuscis. Ehrh. crypt. exs. 297. (Lich. turgidus.)

In ericetis montosis (Comit. Schwartzburg; Rudolstadt Heyder. — Quoad habitum crassiori biunciali similis.)

28. *c. digitata*, fronde foliacea, stipite erecto incano, cylindrico, simplici ramosoque

soque scyphifero: cylindricis ramulis digitato - palmato. *Dill. Musc. t. 15. fig. 19.*
A. B.

In ericetis montosis. (Fines ramulorum tuberculatis scutellis minutis coccineis obsitae.)

29. *c. squamosa*, fronde foliacea, stipite erecto foliolis multifidis squamoso, superne ramoso obscure scyphifero.

In montosis sylvaticis. (Sequenti occurrit forma:)

c. attenuata, erecta, axillis dilatatis ramulis furcatis attenuatis stellatis. *Dill. Musc. t. 16. fig. 22. H.*

* *c. denticollis*, erecta perforata, ramulis truncatis denticulatis.

* *c. irregularis*, erecta perforata simpliciuscula, superne ramosa: ramis inaequalibus scutelliferis. *Mich. gen. t. 42. Ord. 9.*
Dill. Musc. t. 15. fig. 20.

In ericetis, truncis putridis,

* *c. coronata*, erecta perforata simpliciuscula, superne ramoso - coronata scutellifera.
Dill. Musc. t. 15. fig. 19.

Cum prioribus.

30. *c. dilatata*, fronde foliacea, stipite gracili erecto nudo superne dilatato radiato scutellifero.

In ericetis.

31. *c. ventricosa*, fronde foliacea, stipite erecto superne dilatato ventricosissimo maximo margine prolifero scutellifero. *Dill. Muse. t. 15. fig. 17.*

In ericetis montosis.

Aggregatae.

32. *c. polycephala*, fronde foliacea, stipite squamoso-folioloso erecto, superne dilatato scutellis atro-purpureis aggregatis tecto. *Vaill. paris. t. 21. fig. 10.*

In ericetis.

33. *c. macilenta*, fronde foliacea, stipite cylindrico erecto margine scutellis coccineis tecto. *Ehrh. crypt. exs. 267. (Lich. macilentus.) Mich. gen. t. 42. fig. 1-2.*

In cortice putrido, ericetis, (stipite superne ramoso vel simplici, scutellis lacte vel saturatis coccineis.)

c. Fi-

c. *Fibula*, fronde foliacea, stipite cylindrico erecto incano, superne dilatato truncato, scutellis subfuscis clauso. *Dill. Musc.* t. 15. fig. 15.

In ericetis.

34. c. *fusca*, fronde foliacea: foliolis laciniatis minutis imbricatis, stipite cylindrico scutellis fuscis aggregatis terminato. *Enum. Lich.* t. 8. fig. 4. (*Tubercularia fusca.*) *Ehrh. crypt. exs.* 257. (*Lich. symphycarpus.*)

In ericetis.

35. c. *parasitica*, fronde stipiteque foliolis crustaceis albidis minutis tectis, scutellis terminalibus fuscis. *Enum. Lich.* t. 8. fig. 5. (*Tubercularia parasitica.*)

In terra, arborum truncis, lignis putridis. (Iam nudo oculo foliola distinguenda, ad lentem laciniata lineari — multifida. Stipes simplex vel racematim divisus; scutellae tuberculosae subfuscae, fuscae, nigricantes. Occurrit etiam foliolis obscurioribus leproso farinaceis crustaeformibus magnitudine et aetate vix a priori diversus *Lich. delicatus* *Ehrh. crypt. exs.* 247.)

36. *c. botrytes*, fronde foliacea, stipite lineari simplici superne diviso, scutellis globosis magnis terminato. *Hag. Lich. t. 2. fig. 9.* (*Lich. botrytes.*) *Jacq. coll. 4. t. 4. fig. 3.* (*Lich. botrytes Wulf.*)

In sylvaticis ad radices Abietum. (Pomus. *Hagen*, Carinth. *Wulfen*, Hanoviae D. *Meyer*. Exemplaria mea ex Insula *Montserrat* accepi. Scutellae dilute ochreae vel ex luteo rufescentes. Stipes gracilis.)

* 37. *c. cornucopioides*, fronde foliacea ascendente convoluta sinuato-laciniata pinnatifida crispa scyphifera: scypho folio brevior, margine scutellis rufo-fuscis aggregatis tecto. *Mich. gen. t. 42. fig. 3.*

In ericetis sterilibus, ad terram, saxa. (H. l. *Lich. indivisus*, foliaceus contortus superne flavo-virescens, inferne albidus, tuberculis marginalibus rufis *Dicks. fasc. 3. 17.* *Baeomyces cespitius Pers. in An. bot. 7. 155.* *Michellii* citata figura, excepta magnitudine majori quam in meis exemplaribus, non spernenda.)

38. STEREOCAULON (Korallenflechte) G.
pl. 1668.

Frondes caulescentes teretes solidae. Scutellae tuberculosae, globosae.

Tu.

Tuberculosae.

* 1. st. *Corallina*, crustaceum tartareum intus obscure ramulosum: ramis fastigiatis confertissimis teretibus; scutellis tuberculis nigris. *Enum. Lich. t. 4. fig. 2. Jacq. coll. 2. t. 15. (Lich. corallinus Wulf.)*

In rupibus, saxis. (An huius etiam loci: *Lich. tuberculosus Enum. Lich. t. 2. fig. 1. ? Isidium Westringii Achar. in Kongl. Acad. Vet. Handl. 15. t. 6. f. 2. ? Lich. oculatus Dickr. fasc. 2. t. 6. fig. 3. ?* — In meo corallino observo ramulos obtusos apice hinc inde fuscis, post lapsum foveolas relinquentes. Scutellae nigrae convexae in superficie crustae, infrequentes.

2. st. *madraeporiforme*, crustaceum tartareum, intus obscure ramulosum: ramis nodulosis fastigiatis obtusis candidis.

In rupibus, saxis, priori immixtum.

3. st. *corallinoides*, crustaceum atro-cinereum ramulosum; scutellis convexis nigris.

In saxis rupibus, ligno. (H. l. *Lich. niger Huds.*, quoad specimina a cel. D. *Smith* mecum benevole communicata. Nudo oculo et in prima aetate nigrae (in humido pannosae aterrimae) maculae, ad lentem innumeris tectae ramulis

subcinereis, sensim erectis confertissimis; scutellae depressae, demum convexae.)

4. *st. quisquiliare*, crustaceum albidum tenerime fruticulosum; scutellis confertis tuberculis lateralibus atro - fuscis. *Mich. Gen. t. 53. fig. 8.*

In rupium cavernulis, muscis intermixtum. (Nassov. *Leers, herb. 993, Lich. quisquiliaris.*)

5. *st. confine*, fruticulosum ramosum: ramis teretibus incrassatis nigris. *Flor. Dan. t. 879. fig. 2. Deutsches gemeinnütz. Mag. Vol. 1. t. 23. fig. 3. (Lich. confinis Mull.)*

In rupibus ad terram, arborum radicem (Frans. — Vix semipollicare, ex minutissimis; fruticuli rigidi fragiles, apice hinc inde attenuati.)

* 6. *st. condensatum*, crustaceum foliolosum adscendens fruticulosum solidum: ramis brevissimis condensatis scutellis immixtis nigris turbinatis.

In ericetis, montosis. (Quoad foliola tartarea ab initio terrae instrata sequenti simile.)

* 7. *st. paschale*, fruticulosum solidum crusta foliolosa tectum scutellisque tuberculis

culosis ab initio marginatis subfuscis. *Pl. Lich. t. 5. fig. 1.* (Coralloides paschale.)

In ericetis montosis. (In saxis variat caule et ramis brevioribus simpliciusculis; cujus exemplaria ex monte Vesuvio Lavae innascentia debeo liberalitati Ill. Schoepf.)

Globifera.

*8. st. *globiferum*, fruticulosum solidum ramosum: ramis diffusis globiferis, latere ramuliferis. *Pl. lich. t. 31. fig. 2.* (Corall. globiferum.)

In montosis ericetis saxosis. (Hercyn. — Scutellae globosae, juniores clausae; semina intra stupam filamentosam; adultiores apertae, nigro pulvere, a seminibus alienissimo, repletae. Affinitatem et transitum praecedentium Lichenum cum his ostendunt: *Lich. aggregatus* et *ramulosus cel. O. Swartz, gen. 142*, quoad caules et foliola globifero et fragili simillima, scutellis vero *Lich. paschali*.)

*9. st. *fragile*, fruticulosum solidum ramosum: ramis fastigiatis, globiferis solitariis. *Pl. lich. t. 33. fig. 3.* (Corall. fragile.) *Fl. dan. t. 960.* (*Lich. globiferus*.)

Iisdem in locis cum priori. (*Lich. melanoparvus Swartz, gen. 147* convenit scutellis glo-

basis apertis intus atro tomentosis; caule foliolisque subcompressis differt a nostro.)

39. USNEA (Haarflechte) G. pl. 1668.

Frondes loreae vel filamentosae. Scutellae radiatae aut nudaе.

Articulatae.

* 1. U. *plicata*, loris pendulis ramosis implexis; scutellis radiatis. Dill. Musc. t. 11. fig. 1.

In sylvis, ad arbores (Hercyn.)

* 2. U. *barbata*, loris pendulis ramosis filamentosis: filamentis patentibus. Dill. Musc. t. 12. fig. 6.

In sylvis, ad arbores. (A priori vix specie diversa. In meis exemplaribus, in variis Europae locis collectis, lora nunc crassiora nunc tenuiora, ultimo filamentosa implexa; ad latera filamentis transversalibus obiecta. Superficies punctis exasperata, hinc inde transversim rimosa, in articulos quasi secedens, pro more hujus subdivisionis, filo trajecto conspicuo. Scutellae ut in priori sparsae, orbiculatae, planae, margine radiatae. Inter has aliae occurrunt minores tuberculosae rufescentes, carnosae in humido, margine nudaе, vel subtus ex filamento prodeunte radiatae.)

*3. *u. hirta*, loris erectis ramosis filamentosis; scutellis nudis. *Pl. lich. t. 30. fig. 1.*
Dill. Musc. t. 13. fig. 12.

Ad corticem arborum, dumeta, sepes, saxa.
 (Scutellae rufescentes, tuberculosae, margine
 nudaе, ab initio leniter excavatae, similes prae-
 cedentis *Usneae*, longe infrequentiores quam in
 sequenti.)

*4. *u. florida*, loris erectis ramosis fila-
 mentosis; scutellis radiatis. *Pl. lich. t. 30.*
fig. 2. Dill. Musc. t. 13. fig. 13.

Ad corticem arborum, ramos, virgulta cum
 priori. (Variat scutellis majoribus et minoribus,
 etiam minutissimis radio conspicuo cinctis.)

5. *u. articulata*, loris articulatis articu-
 lis incrassatis; scutellis nudis. *Dill. Musc.*
t. 11. fig. 4.

In sylvis ad arbores. (In monte Dino non
 longe Gissa dissito *Dill. Palatin. ? Nassov. ? Bo-*
russ. ? Carinth. ? — Etiam in arenosis collectam
 habeo. Scutellae in exemplaribus meis in Italia
 collectis tuberculosae, similes iis, quas *Mich.*
in gen. t. 59. fig. 1. expressit; aliae orbiculatae
 nudaе.)

*6. *u. flaccida*, loris pendulis flaccidis
 compresso-lacunosis. *Dill. Musc. t. 12. f. 5.*

In

In abietum cortice. (Hercyn. *Web. spicil.* 227. Lich. divaricatus. In comit. Schwartzburg Rudolstadt *Heyder*. Etiam in arenosis. H. l. Lich. arenarius, fruticulosus rugosus ramosissimus candidus, ramis diffusis *Weig. Retz. scand. ed.* 2. 1642.)

Inarticulatae vel filamentosae.

* 7. *u. dichotoma*, loris pendulis dichotomis compressis glabris, filamentosis, ochroleucis.

In montosis sylvaticis. (Hercyn. *Blrch.* 3. Frondes pedales dichotomo-multifidae glabrae, ultimo capillares, pallide e cinereo flaventes; crassiores rami compresso-lacunosi; in siccitate rigidiusculi. Ad lentem apices filamentorum nigricant. *Dill. musc. t.* 13. *fig.* 15., bene, quoad formam, nostram exprimit, in descriptione coloris obscure lutei ad rufum tendentis, per se nium forsitan mutati, differentiam monstrat. Etiam ex Alpinis Norvegiae accepi cum nomine Lich. *rigidi Villarsii.*)

* 8. *u. jubata*, filamentosa pendula, axillis compressis. *Dill. Musc. t.* 12. *fig.* 7.

In sylvis ad arbores. (Praeter cinereum occurrit ad saxa et cortices arborum colore fusco, nigricante: *u. implexa*, filamentosa de-

cum.

cumbens implexa, filis longis divaricatis simpliciusculis. Filamenta crassiora in tubercula farinosa efflorescunt.)

* *U. ramulosa*, filamentosa implexa pendula dichotome divisa, filis apice vel latere ramulosis multifidis cinereis.

In sylvis ad arbores (hinc inde cum priori, colore ex ochreo vel flavescenti cinereo.)

* *U. bicolor*, filamentosa erectiuscula, inferne nigricans opaca, superne dilatior fusca nitida. *Ehrh. crypt. exs.* 40.

In sylvaticis montosis, ad arbores, saxa. (Hercyn. *Ehrh. Beitr.* 3. 82; Lich. bicolor, filamentosus, ramosissimus, erectiusculus, steres, inarticulatus, glaber, nitidus, inanis, infra nigricans, supra sordide albidus, intus griseus: ramis patentissimis: extremitatibus simplicibus, subulatis. — Gott. Heyd.)

* *U. chalybeiformis*, filamentosa decumbens simpliciuscula vage ramosa flexuosa. *Dill. Musc. t.* 15. *fig.* 10.

Ad cortices arborum, saxa, scpimenta.

11. *U. lanca*, filamentosa decumbens ramosissima implexa fusca nitida. *Ehrh. crypt. exs.* 70. (Lich. laneus.)

In montosis ad saxa. arbores. (Fila divaricata implexa ramosissima teretia, ultimo multifida, furcata, fusco-nigricantia, rigidiuscula. A priori defectu nitoris et colore nigricante distinguui potest:

* *u. lanata*, filamentosa decumbens ramosissima implexa nigricans opaca.

In montosis ad rupes, saxa. (Hercyn: inter Lich. Fahlm.)

* 12. *u. pubescens*, filamentosa decumbens ramosissima implexa atra, scutellis planis concoloribus. Jacq. Misc. 2. t. 9. fig. 7. (Lich. pubescens Wulf.)

In montosis (Hercyn., scutellae atrae nitentes, per lentem radiatae; Carinth., scutellae magis integrae. A priori filamentis tenuioribus confertissimis atris et ramosis, etiam absque scutellis distinguitur. Ab utraque subtilitate byssacea fere differt:

* 13. *u. intricata*, decumbens implexa capillacea atra; scutellis planis concoloribus. Ehrh. crypt. exs. 80. (Lich. intricatus.)

In montosis, rupibus. (Exemplaria mea Upsal. liae ab *Ehrharto* lecta, ad lentem fila transversim rugulosa habent, ut in Lich. scabro *Huds.*)

* 14. *U. hippotrichodes*, filamentosa simplex capillaris. *Web. spicil.* 251. (Lich. hippotrich.)

In foliis dejectis acerosis. (Non rara per omnes sylvas Germaniae. Aliam in Hercyn. montosis et subterraneis legi crassioribus filis subcompressis, quibus corpuscula adnascuntur ovata, intra substantiam corpusculis seminiformibus ad lentem fuscis oblongis plena, qualem indicare videntur: *Dill. musc. t. 3. fig. 11. 13.*; Lich. *setosus*, filamentosus simplex subcompressus nigricans, tuberculis globosis acuminatis nigris *Leyb. hal. 2. 286.*; *Hypoxylon loculiferum*, caulescens nigrum, super ramis criniformibus sparsos gerens locellos *Bull. herb. t. 495. fig. 1. p. 74.* quoad fructificationem certe a Lichenum ordine alienam.)

Fruticuliformes.

* 15. *U. ochroleuca*, erecta teres dichotoma ramosa: ramis divaricatis filamentosis furcatis apice nigricantibus. *Pl. lich. t. 26. fig. 2.*

In montosis (Hercyn. Siles. — H. l. Lich. subvirescens *Gmel. Syst. Nat. 1878.* Lich. flavidus *ib. 1379.*)

16. *U. vulpina*, compresso - lacunosa - ramosa dichotoma fastigiata citrina. *Jacq. Misc. 2. tab. 10. fig. 4.* (*Lich. vulpinus Wulf.*)

In sylvis acerosis montosis. (*Carinth. Wulf. Schrank, bavar. 2. 1560. Lich. citrinus?* In muris, tectis, sepimentis *Ducat. Brem. Roth, germ. 1. 516.* — *H. 1. Lich. citricolorus Gmel. syst. nat. 1378. Dill. musc. t. 13. fig. 15. Hall. hist. 1974*, quoad viva Exemplaria Auctorum, magnitudine unciali et binunciali. Ad lentem puncta nigra inter farinam sparsa observo. Scutellae in hac et priori adhuc desiderantur.

40. LOBARIA (Vieltheilige Flechte) *G. pl. 1668.*

Fronde lobatae, laciniatae, multifidae, erectae, depressae. Scutellae marginatae.

(PLATISMA:)

Fronde lacunosa erecta.

* 1. *L. fraxinea*, erecta laciniata compressa nuda; scutellis undique sparsis subpedunculatis. *Pl. Lich. t. 18. fig. 1 - 2.* (*Platisma fraxineum.*)

In

In cortice arborum, Fraxino, Quercu. (A lineari ad biuncialem latitudinem.)

* 2. L. *farinacea*, erecta laciniata compressa margine verrucoso - farinacea. *Dill. Musc. t. 23. fig. 63. Vaill. paris. t. 20. fig. 13 - 14.*

In cortice et ramis arborum. (Scutellae pallidae concolores.)

* L. *squarrosa*, erecta laciniata squarrosa compressa fastigiata margine eroso - farinacea. *Vaill. paris. t. 20. fig. 15.*

In cortice ramisque arborum. (Scutellae ut in priori, terminales. H. l. Lich. *squarrosus*, cespitosus ramis confertis flaccidis multifidis, crispis, latere subfarinaceis; scutellis urceolatis concoloribus. *Pers. in An. bot. 14. 35.*)

* 3. L. *calycaris*, erecta laciniata compressa nuda rigida; scutellis subtus calcaratis. *Dill. Musc. t. 23. fig. 62.*

In cortice Arborum, rupibus. (Occurrit angustioribus laciniis, margine, sed raro, hinc inde verrucoso - farinaceis, nigro - maculatis. *H. vid. l. Fl. dan. t. 959. fig. 1. Vaill. paris. t. 20. fig. 7.* Multo latioribus, sequenti populino similis, ramis vero subter scutellas compressis. *Dill. l. c. C. Magnitudo nucialis; palmaris.*

Fl. dan. l. c. fig. 2., quoad habitum; margo integer vel lacinulatus:)

* *L. dilacerata*, erecta laciniata squarrosa compressa rigida nuda.

In cortice arborum, saxis (uncialis *Dill. Musc. t. 21. fig. 55. G.*; quoad habitum, et latioribus biuncialibus laciniis, squarrosae similis, scutellis subtus obscurius calcaratis.)

* 4. *L. populina*, erecta cespitosa laciniata: laciniis superne dilatatis turgidis fastigiatis. *Ehrh. crypt. exs. 276.* (Lich. populinus.)

In cortice arborum, Populo, Salice. (Scutellae concolores terminales, subtus nudaе vel calcaratae turgidae. (E Hispania Fico indicæ adnascentem similem plantulam attulit ill. Prof. *Abildgaard*, necumque communicavit, in qua scutellae tenui nigricante margine cinctae sunt. — *H. vid. l. Dill. Musc. t. 21. fig. 55. I, G, B. Vaill. paris. t. 20. fig. 12. t. 21. fig. 2.* Lich. fastigiatus, cespitosus ramosus: ramis sursum dilatatis fastigiatis inermibus: scutellis subterminalibus *Pers. in An. bot. 7. 256.*)

* 5. *L. prunastri*, erecta laciniata compressa subtus incana, margine verrucoso-farinacea. *Dill. Musc. t. 21. fig. 55. A.* (Lichenoi-

chenoides cornutum bronchiale molle sub-
tus incanum.)

In truncis ramisque arborum, fruticum. (Scu-
tellae rufescenti-fuscae, extus convexae frondi
concolores. In aliis individuis ascutellatis ob-
servo tubercula conglomerata nigro-fusca. Oc-
currit laciniis utrinque nudis concoloribus an-
gustis, scutellis amplis, h. 1: Lich. *cornicula-
tus*, foliaceus erectiusculus sublacunosus glaber,
laciniis angustis corniculatis *Kelch. cantabr.* 453.
Dill. Musc. t. 21. *fig.* 54.)

6. *L. denudata*, erecta laciniata lacerata
compressa; scutellis deundatis terminali-
bus fulvis. *Pl. lich. t.* 31. *fig.* 1. (Platis-
ma denudatum.)

In cortice Tiliae. (Palatin. rarissimam plau-
tam collegit mecumque communicavit *Gaertner
jun.* Hauoviensis, exquisitus plantarum cultor.)

* 7. *L. tinctoria*, erecta subcompressa la-
ciniata: laciniis anastomosantibus, ultimo
furcatis liberis fastigiatis farinaceis. *Web.
spic.* 241. *Ehrh. crypt. exs.* 266. (Lich.
tinctorius.)

In montosis saxosis (Hercyn. *Web.* prope
Nordhausen, Blankenburg *Ehrh.* Scutellae
frondi concolores; hinc inde ad lentem nigra

sparsa sunt puncta per superficiem frondis, in sicco rigidae; aqua calida perfusa purpurascen- te statim tingit colore.)

* 8. *L. rigida*, erecta subcompressa adscen- dens cornea lineari - multifida fusco - ni- gra: scutellis terminalibus concoloribus. *Pl. lich. t. 24. fig. 1.* (Cornicularia tristis.) *Enum. Lich. 74.* (Lich. rigidus.)

In saxis montosis (Hercyn. *Web. spic. t. 5.* Lich. tristis. *Ehrh.* — *Garinth. Wulf.* Lich. fucoides. *In Jacq. Coll. 5. t. 12. fig. 3.* Lich. fucinus *Gmel. Syst. Nat. 1378.* Scutellae et la- tiores rami subtus lacunosi. Ob peculiarem cor- neam naturam peculiare genus ex ea l. c. con- sistit.)

* 9. *L. aculeata*, erecta subcompressa la- cunosa fruticulosa castanea, ramis scutellis- que hispidis. *Pl. lich. t. 5. fig. 2.* (Coral- loides aculeatum.)

In ericetis, montosis. (Occurrit caule ramis- que crassioribus nudis, dilute castanea, Islan- dicae minori similis. — *H. l.* Lich. spadiceus *Roth. in Mag. bot. 2. t. 1. fig. 1.*; caule ramis- que tenuioribus: *L. tenuissima*, ramosissima fu- sco nigra, apice spinuloso - furcata. *Dill. Musc. t. 17. fig. 52.* *Pl. lich. l. c. fig. 2, a.* Lich. is- land.

land. nigricans *Retz. scand. 2. 1576.* Lich. islandicus tenuissimus *Ehrh. Beitr. 5. 35.* Iisdem cum priori locis.)

* 10. *L. islandica*, erecta laciniata compressa canaliculata: laciniis bicornibus scutellisque ciliatis. *Pl. lich. t. 9. fig. 1.* (Lichenoides islandicum.) *Jacq. coll. 4. t. 8.* (Lich. islandicus *Wulf.*)

In montosis, ericetis. (Basis sanguinea. Occurrit latissima palmari fronde, et angustiore crispa *Dill. Musc. t. 28. fig. 112.* Etiam margine aciliata.)

11. *L. nivalis*, erecta adscendens laciniata, lacunoso - canaliculata crispa albida. *Dill. Musc. t. 21. fig. 56.* *A. Flor. dan. t. 227.* *Flor. lap. 2. t. 11. fig. 1.*

In montosis subalpinis (Tyrol. Silcs. Bohem. — Semper absque scutellis accepi, saepissime cum sequenti confusam.)

12. *L. cucullata*, erecta laciniata alba, margine complicata sinuata crenulata. *Belardi, observ. 54.* *Trans. lin. 1. t. 4. fig. 7.* (Lich. cucullatus *Smith.*) *Dill. Musc. t. 21. fig. 56. B.*

In montosis, subalpinis (promiscue cum priori, ejusdemque coloris ex dilute flavo vel viridi candicantis. Scutellae ut in Lich. islandico frondem terminant, dilute rufescentes. Occurrit angustiore et latiore fronde.)

* 13. *L. furfuracea*, adscendens dichotome laciniata: laciniis acutis, inferne nigris canaliculatis. *Pl. lich. t. 9. fig. 2.* (Lichenoides furfuraceum.)

Ad truncos arborum. (Scutellae rarissimae, in superficie convexa ramorum sessiles semicupulares ut in *L. prunastri* intus rufescentes; extus convexae, furfure concolore adpersae. Occurrit angustioribus et longioribus laciniis, brevioribus et latioribus.)

* 14. *L. ciliaris*, erectiuscula laciniata: laciniis linearibus inferne canaliculatis margine ciliatis palmatis. *Pl. lich. t. 3. fig. 4.* (Lichenoides ciliare:) *Jacq. coll. 4. t. 13. fig. 1.* (Lich. ciliaris *Wulf.*)

Ad truncos arborum, saxa. (Scutellae pedunculatae crenatae. Color in sicca cinereus, in humida virescens. Eandem ex *America septentr.* a *D. Muhlenberg* accepi fronde utrinque permanenter albida, scutellis lividis ciliatis; e *Norlandia* laciniis angustis fusco-nigricantibus.)

Fronde

Fronde lacunosa depressa.

* 15. *L. saxatilis*, depressa scabra, reticulato-lacunosa, sinuata; scutellis rufo-fuscis. *Enum. Lich. t. 15. f. 1. t. 16. f. 1. Jacq. coll. 4. t. 20. fig. 2.* (*Lich. saxatilis Wulf.*)

In saxis, arboribus. (Frondis laciniis angustioribus vel latoribus cinereis, ferrugineo-fuscis. *L. omphalodes*, diffusa lacunosa glabra nigro-fusca; scutellis concoloribus. *Vaill. paris. t. 20. fig. 10.* Exemplaria possideo eodem a Vailantio collecta loco. Etiam ex Hercynia. — *L. adusta*, diffusa scabra reticulato-lacunosa granulosa cinereo-nigra; scutellis concoloribus. In montosis rupestribus cum priori.)

16. *L. sepincola*, depressa adscendens laciniata castanea, subtus reticulato-lacunosa; scutellis terminalibus concoloribus. *Pl. lich. t. 14. fig. 1.* (*Platisma sepincola.*)

In arboribus, lignis, saxis.

17. *L. juniperina*, adscendens depressa laciniata crispa flava; scutellis terminalibus fuscis. *Pl. lich. t. 7. fig. 2.* (*Squamaria juniperina.*) *Fl. dan. t. 1004.*

In cortice arborum, Junipero. (Nassov.? Holst.? Thuring.? Hal. Sal.? Carinth.? — An un-

quam in Germania reperta vel potius cum sequenti confusa? —)

* *L. pinastri*, adscendens depressa laciniata crispa flava, margine pulvere concolore simbricata. *Pl. Lich. t. 7. fig. 1.* (Squamar. pinastri.)

In truncis arborum pinearum frequens. (Absque scutellis.)

* 19. *L. verrucosa*, depressa rotunde-lobata scrobiculata verrucosa farinosa; scutellis centralibus rufo-fuscis. *Pl. Lich. t. 1. fig. 1.* (Pulmonaria verrucosa.) *Iacq. Coll. 4. t. 18. fig. 2.* (Lich. verrucosus.) *Wulf. Flor. dan. t. 1007.* (Lich. pulmonarius.)

In arborum truncis, saxis, rupibus. (H. 1. *Lich. plumbeus Roth. Germ. 507. In bot. Mag. 2. 2. t. 1. fig. 2.* *Lich. verrucarius Gmel. syst. nat. 1356.*)

* 20. *L. pulmonaria*, depressa laciniata sinuata truncata reticulato-lacunosa; scutellis marginalibus rufo-fuscis. *Pl. Lich. t. 1. fig. 2.* (Pulmon. reticulata.)

In arborum truncis, Quercu, Fago. (Var. vivipara *Roth in bot. Mag. 1. c. t. 1. fig. 3.*)

Fron-

Fronde dilatata.

21. *L. herbacea*, subimbricata depressa obtuse lobata crenata; scutellis fulvis. *Pl. Lich. t. 10. fig. 2.* (Pulmon. lobata.)

In saxis arboribus. (Hannover. in monte Deister *Ehrh.* — In humido laete virens. *H. l. Lich. laciniosus. Gmel. syst. Nat. 1372.*)

* 22. *L. saccata*, subimbricata depressa obtuse lobata; scutellis subtus saccatis. *Dill. Musc. t. 30. fig. 120. Fl. dan. t. 531.* (Lich. saccatus.)

In terra locis montosis rupestribus. (Semina intra scutellarum substantiam coordinata, facilius quam in ullo alio Lichene conspicienda. *Mich. gen. t. 52.*)

* 23. *L. acetabulum*, subimbricata depressa obtuse lobata; scutellis corrugatis duplicato-marginatis. *Enum. Lich. t. 18. fig. 2. Jacq. Coll. 3. t. 9. fig. 1.* (Lich. Acetabulum *Wulf.*)

In cortice arborum. *Palat. Neck. Comit. Benth. Hannover. Ehrh. Nassov. Leers.* — *H. l. Lich. corrugatus Smith, Transact. lin. 1. 83. Lich. serratus Gmel. syst. nat. 1372. Lich. patellatus ib. 1366.*)

* 24. *L. aquatica*, subimbricata depressa plicato - lobata verrucosa; scutellis fusco-rufescentibus. *Pl. Lich. t. 45. fig. 1. 5.* (*Platisma aquaticum.*) *Web. spicil. t. 4.* (*Lich. fluviatilis.*)

Ad saxa intra aquarum rivulos. (Hercyn. Francof. *Reich. flor.* 849. — Intra aquam saturate virens.)

* 25. *L. glomulifera*, subimbricata depressa sinuato - lobata glomulifera; scutellis fulvis. *Lightf. scot.* 853. (*Lich. glomulifer.*) *Dill. Musc. t. 26. fig. 99.* *Mich. gen. t. 46.*

In arborum truncis Fag. sylv. (Gott. *Pers. Lich. grandis An. bot.* 11. 13. *Palat. Guertn.*)

* 26. *L. caperata*, subimbricata depressa rugoso - lobata pallide lutea; scutellis fusco-rufescentibus. *Pl. Lich. t. 38. 39. fig. 1. t. 42. fig. 1.* (*Platisma caperatum.*)

In cortice arborum, saxis.

* 27. *L. perlata*, subimbricata adscendens depressa crispato lobata simbricata verrucoso farinosa. *Jacq. coll. 4. t. 10.* (*Lich. perlatus Wulf.*)

In cortice arborum, saxis. (Scutellae subpendunculatae fusco rufae in disco saepe perforatae.)

* 28. *L. glauca*, subimbricata depressa adscendens laciniata crispa. *Enum. Lich. t. 20. fig. 1.*

In cortice, ligno. (Priori tenerior, margine lacinulis crispato. Similem plantam, memorabilem propter lacinias frondis angustiores adscendentes, in capitula inflata abeuntes turbinata, anne monstrosam varietatem dicam nec ne? dubius haerco.)

* 29. *L. fallax*, diffusa laciniata adscendens crispa; scutellis terminalibus spadiceis. *Pl. lich. t. 46. fig. 1-3.* (*Platisma fallax.*)

In cortice Abiet. (Hercyn. *Web. spic. 244.* *Lich. fallax.* *Lich. fraudulentus.* *Gmel. syst. Nat. 1371.*)

* 30. *L. tiliacea*, subimbricata depressa rotunde lobata sinuata albido - cinerea; scutellis fusco rufescentibus. *Enum. Lich. t. 16. fig. 2.* (*Lich. tiliaceus.*) *Jacq. coll. 3. t. 9. fig. 2.* (*Lich. quercifolius Wulf.*) *Willd. berol. t. 7. fig. 13.* (*Lich. quercinus.*) ,

In

In cortice ramisque Tiliae, Quercuum aliarumque arborum. (Fronde pulverulenta vel nuda. H. l. Lich. lobatus *Gmel. syst. Nat.* 1372.)

* 31. *L. olivacea*, subimbricata depressa, rotunde lobata olivacea; scutellis concoloribus crenulatis. *Enum. Lich. t.* 13. *fig.* 3-5. (Lich. olivac.)

In cortice arborum, rupibus, saxis. (Occurrit fronde crispa exasperata scutellifera, vel sterili orbiculata nuda. Etiam imbricata foliolis multifidis olivaceis scutellis integerrimis. H. l. Lich. *pullus Schreb. spicil.* 1127.)

* 32. *L. parietina*, subimbricata depressa, lobata crispa fulva; scutellis concoloribus. *Enum. Lich. t.* 13. *fig.* 1. (Lich. pariet.)

In cortice arborum, lignis. (Var. colore flavo, virescenti, fronde sterili pulverulenta; scutellis proliferis *Humb. frib. t.* 2. *fig.* 2.)

(P H Y S C I A.)

Fronde inflata.

* 33. *L. physodes*, subimbricata depressa, adscendens laciniata multifida inflata, marginis deliscentis farinosa. *Enum. Lich. t.* 15. *fig.* 2. (Lich. physod.) *Jacq. coll.* 3. *t.* 8. (Lich. physodes. *Wulf.*)

In cortice arborum, saxis. (Scutellae subfuscae inflato ruguloso pedunculo insidentes. Frondes teretes, compressae, subfuscae.)

34. *L. terebrata*, subimbricata depressa laciniata multifida inflata punctis perforata. *Jacq. l. c. Fig. sinistr.*

In cortice arborum, hinc inde c. priori, sed rarius. (H. 1. Lich. pertusus *Schranck havar.* 2. 1513. *Schrad. spic.* 96.)

35. *L. hispida*, depressa adscendens semitubulosa inflata ciliata farinosa. *Pl. lich. t. 3. fig. 2-3.* (Lichenoides hispid.) *Jacq. coll. 4. t. 6.* (Lich. hispidus *Wulf.*)

In cortice ramis arborum, fruticum, saxis. (H. 1. Lich. semipinnatus *Gmel. syst. Nat.* 1572.)

(S Q U A M A R I A :)

Fronde angustata.

36. *L. semipinnata*, subimbricata depressa multifida ciliata subtus canaliculata; scutellis nigricantibus. *Dill. Musc. t. 20. f. 46. A, B. Wulf. l. c. a, b, c.*

In cortice arborum; saxis, (orbiculatim expansa 2 — 3 Uncias lata, undique pilis citiatis hispida, quoad colorem et divisionem stellari-formi similis.)

* 37. *L. stellaris*, subimbricata depressa orbicularis multifida: foliolis linearibus; scutellis cinereis, pullis. *Enum. lich. t. 13. fig. 2.*

In cortice ramisque arborum, fruticum. (H. l. Lich. ambiguus *Ehrh. crypt. exs. 207. L. stellari-formis*, foliolis latioribus depressis, margine lobatis crenulatis; scutellis fusco-nigricantibus. *Enum. Lich. l. c. fig. 1.*)

* 38. *L. aipolia*, subimbricata depressa orbicularis multifida: foliolis laciniatis lobatis convexis; scutellis cinereis integris, fusco-nigricantibus. *Enum. Lich. t. 12. f. 2. C. Ehrh. crypt. exs. 197. (Lich. aipolius.)*

In cortice arborum. (Scutellae in sicco quasi pruinatae.)

* 39. *L. pulverulenta*, subimbricata depressa orbicularis multifida: foliolis lobatis linearibus obtusis crenulatis apice impressis, pruinatis. *Pl. lich. t. 8. fig. 2. (Squamaria pulverulenta.)*

In arborum cortice, saxis. (Color in sicco cinereus, glaucus, aetate fuscus, in humido virescens. Scutellae juniores ut granula per superficiem sparsae, integrae vel crenulatae polli-

ne conspersae, demum fusco-nigrae. H. 1.
 Lich. omphalodes *Wulf.* in *Jacq. coll.* 2. t. 15.
fig. 2. a. b. Lich. allochrous. *Ehrh. crypt. exs.*
 187. Occurrit foliolis multifidis linearibus diffu-
 sis scutellisque pruinatis: *L. angustata*, *Enum.*
lich. t. 11. fig. 2.

*40. *L. pulveracea*, subimbricata depressa
 orbicularis multifida: foliolis margine cris-
 pis pulveraceis, apice lobatis obtusis cre-
 nulatis impressis pruinatis. *Ehrh. crypt.*
exs. 285. (Lich. pulverulentus.)

In cortice arborum. (Scutellae rarius occur-
 runt hinc inde sparsae aequae pulveraceae. Mus-
 cis instrata, centrum versus penitus pulvere
 granuloso cinerascenti, caesio tecta.)

41. *L. speciosa*, subimbricata depressa
 suborbicularis multifida: foliolis alte divi-
 sis linearibus obtusis sinuato-crenulatis
 apice impressis; scutellis hemisphaericis.
Jacq. coll. 3. t. 7. (Lich. speciosus *Wulf.*)

In rupibus, super Muscos (*Carinth. Wulfen* —
Eandem ex America sept. accepi a D. *Muhlen-*
berg. — Scutellae in disco rufescentes, margi-
 ne introflexae; foliola margine pulverulenta vel
 nuda, in sicco ex albido cinerea, in recenti vi-
 rescentia, ciliis margine prominulis.)

* 42. *L. pulla*, subimbricata depressa multifida: foliolis subteretibus linearibus apice dilatatis fuscis, multipunctatis; scutellis rufo - fuscis. *Pl. lich. t. 32. fig. 2.* (Squam. pulla.) *Transact. lin. 1. t. 4. fig. 6.* (*Lich. encaustus Smith.*)

In rupibus montosis (Hercyn. — *Elrh. crypt. exs. 305.* *Lich. multipunctus.* Foliola intus solida, apparent iurgida convexa. *Lich. fuscus Huds.* diversa et caute distinguenda planta.)

* 43. *L. centrifuga*, subimbricata depressa multifida: foliolis adpressis centrifugis viridantibus; scutellis rufo - fuscis. *Pl. lich. t. 16. fig. 2.* (Squam. centrifuga.)

In saxis, lignis.

* 44. *L. stygia*, subimbricata depressa multifida: foliolis palmatis recurvis nigris. *Pl. lich. t. 25. fig. 2.* (Squam. stygia.)

In rupibus, saxis (Hercyn. —)

* 45. *L. fahlunensis*, subimbricata depressa multifida: foliolis dichotomis canaliculatis nigris. *Pl. lich. t. 36. fig. 2.* (Squam. fahlun.)

In rupibus saxis (Hercyn. —)

(PLACODIUM:)

Fronde crustacea.

*46. *L. ciliata*, subimbricata suborbicularis depressa multifida: foliolis laciniatis scutellisque subtus ciliatis. *Enum. Lich.* t. 14. fig. 1.

In cortice arborum. (Occurrit foliolis angustioribus vel latioribus, cinereis, fusco-nigricantibus, margine integris vel verrucoso-pulverulentis; scutellis plus minusve subtus ciliatis, fusco nigricantibus, nigris. *H. l. Lich. obscurus Ehrh. crypt. exs. 177.*)

*47. *L. orbicularis*, imbricata depressa cinerea, foliolis lobato-multifidis margine elevatis pulverulentis. *Enum. Lich.* t. 9. fig. 1.

In cortice arborum (promiscue c. priori et *L. candelari.*)

*48. *L. ambigua*, diffusa subimbricata depressa: foliolis lineari-multifidis flavo-virentibus, tuberculis concoloribus; scutellis subfuscis. *Pl. lich.* t. 40. fig. 2-4. (*Psora ambigua.*)

In cortice Abiet. lignis. (*H. l. Lich. diffusus Web. spicil. 250.* Colore occurrit in cinereum vergente.

* 49. *L. diffusa*, subimbricata suborbicularis depressa: foliolis lobato-multifidis farinosis crispis subcinereis; scutellis elevatis ferrugineo-fuscis.

In cortice Abiet. Palis, sepimentis. (Margo scutellarum crusta concolor. H. 1. Lich. diffus. *Dicks. fasc. 5. t. 9. f. 6*; excluso syn. *Web.* — *L. pallescens*. Orbicularis centrifuga rugoso multifida cervina farinosa; scutellis prominulis subfuscis. *Enum. Lich. t. 10. fig. 1-2.*)

50. *L. dubia*, subimbricata orbicularis depressa foliolis lineari-multifidis albido-cinereis, centrifugis pulverulentis nigris. *Enum. Lich. 70.* (Lich. diffusus.)

In tectorum tegulis, saxis. (Stellari vel caesia quoad folia similis.)

* 51. *L. caesia*, subimbricata depressa orbicularis multifida: foliolis albido-cinereis; scutellis tuberculisque caesiis. *Pl. lich. t. 8. fig. 1.* (*Psora caesia.*)

In saxis, tectis, lignis, Muscis. (H. 1. Lich. pulchellus *Wulf. in Jacq. Coll. 2. t. 16. fig. 2.* Lich. *Psora Dicks. fasc. 3. 17.*)

* 52. *L. incurva*, subimbricata depressa orbicularis multifida: foliolis semiteretibus viridantibus apice incurvis.

In saxis. (H. 1. Lich. *incurvus* Pers. in *An. bot.* 7. 24. Lich. *multifidus* Dicks. *fasc.* 3. t. 9. fig. 7. Tubercula pulverulenta, scutellae fuscæ.)

* 53. L. *radiosa*, subimbricata orbicularis depressa: foliolis lobato-multifidis radiantibus cinereis; scutellis confertis, fusco-nigris. *Enum. Lich.* t. 4. fig. 5. (Lich. *radiosus*.) Achar. in *kongl. Vet. Acad. n. Handl.* 15. t. 6. fig. 5.

In rupestribus, saxis. (H. 1. Lich. *subimbricatus* Relh. *capt.* 427. c. ic. Lich. *circinnatus* Pers. in *An. bot.* 7. 25.)

* 54. L. *versicolor*, subimbricata orbicularis depressa: foliolis lobato-multifidis, pallidis, viridantibus; scutellis confertis subfuscis.

In rupestribus, saxis. (H. 1. Lich. *versicolor* foliis tartareis imbricatis dilatatis, virescente-cinereis albidisque; scutellis parvis confertis, planiusculis subnigris. Pers. in *An. bot.* 7. c. 24.

* 55. L. *muralis*, subimbricata orbicularis depressa: foliolis lobato-multifidis concoloribus, scutellis confertis subfuscis con-

stanter marginatis. *Pl. lich. t. 16. fig. 1.*
(*Psora muralis.*)

In muris, saxis, tectis, lignis. (H. 1. *Lich. ochroleucus Wulf. in Jacq. coll. 2. t. 13. fig. 4.*)

* 56. *L. saxicola*, subimbricata suborbicularis depressa: foliolis lobato-multifidis pulposis luteis scutellis concoloribus. *Pl. lich. t. 17. fig. 3.* (*Psora saxicola.*) *Enum. Lich. t. 9. fig. 2.* (*Lich. murorum.*)

In muris, saxis, lignis (foliolis integris, pulverulentis centrifugis, scutellarum disco concolore vel aurantio. — Etiam in tectorum tegulis, rupibus, colore pallido, virescenti luteo, fulvo, aurantio, miniato, h. 1:)

* *L. tegularis*, orbicularis subimbricata depressa: foliolis lineari-multifidis pulposis aurantiis, scutellis concoloribus. *Ehrh. crypt. exs. 504. Pl. lich. l. c. a.)*

* 57. *L. miniata*, crustacea sparsa suborbicularis: foliolis minutis scutellisque miniatis. *Enum. Lich. 62.* (*Lich. miniatus.*)

In rupibus, cum priori, saxis arenosis. (Nudis oculis foliola minutissima vix a scutellis distinguenda, usque saepe oblitterata.)

* 58. *L. candelaris*, crustacea depressa: foliolis minutis multifidis confertis flavis pulverulentis; scutellis margine concoloribus. *Enum. Lich. t. 9. fig. 5.*

In cortice arborum, saxis. (Foliola vix nisi ope lentis conspicienda; Scutellarum discus margine concolor, vel livescens. Sterilis occurrit confertissimis foliolis pulverulentis parum divis. Similem ex America septentr. a D. *Muhlenberg* accepi plantulam elegantius constructam, foliolis multifidis scutellisque albido-ciliatis.)

* 59. *L. concolor*, crustacea subimbricata: foliolis minutis congestis brevissime lobatis flavescenti-aurantiis crispis; scutellis concoloribus. *Dicks. fasc. 3. t. 9. fig. 8. Enum. Lich. 59. (Lich. flavesceus.)*

In arborum cortice, ligno vetusto. (Ad lentem foliola saepe pulverulenta oblitterata. *L. fulva*, subimbricata depressa: foliolis multifidis crispis aurantiis fulvis, scutellis concoloribus. In cortice.)

60. *L. polycarpa*, subimbricata: foliolis laciniatis flavescentibus, luteis, congestis, oblitteratis; scutellis undique tectis elevatis,

tis, margine concoloribus. *Ehrh. crypt. exs.* 136. (Lich. polycarpus.)

In cortice arborum, fruticum. (Scutellarum discus etiam in exemplaribus ex America obtentis saturatior margine.)

61. *L. laqueata*, subimbricata lobato-oreната virescens; scutellis convexis rufescentibus. *Jacq. Coll.* 3. t. 5. fig. 2. (Lich. laqueatus *Wulf.*)

In montosis ad saxa. (Garinth. *Wulf.* — Margo juniorum scutellarum aetate deletur, color virescens crustaceae frondis, subtus albidus, siccitate.)

* 62. *L. crassiformis*, imbricata obtuse lobata virescens, subtus margineque nigricans.

In montosis terrae instrata. (Specimina Lich. crassi *Huds.* ex Anglia, Italia, Gallia et regno Tunetano ad me delata, omnia in eo conveniunt, quod crustacea magis foliola sordide e fusco virescentia sint, subtus parum fusca albo margine cincta, scutellis copiosis albo-marginatis ex fusco foliis concoloribus, tecta. Odorem etiam spirant debilem veteris Tabaci similem. Nostra planta Gott. et in vicinitate lecta, et pro Lich. crasso venditata, colore magis virescente, etiam

in

in siccitate, scutellarum et odoris illius defectu, margine nigricante constanter differt. *Fig. Flor. dan. t. 1006*, foliorum colore convenit quidem, at *L. crassiformis* nunquam orbiculatim crescere solet. Illam potius cum *Lich. chryssoleuco Smith, in Trans. lin. vol. 1. t. 4. fig. 2*, depicto, et nostra *Squamaria rubina Pl. lich. t. 19. f. 1*, quoad viva exemplaria conjungere vellem.)

41. PSORA (Schorfflechte) *G. pl. 1686.*

Crusta effigurata. Scutellae marginatae, convexae.

* 1. *P. squamata*, crustacea imbricata: foliolis sinuatis rotundatis; scutellis nigris convexo - planis. *Dicks. fasc. 2. 20. Ej. hort. sicc. brit. 3. 25.* (*Lich. squamatus.*)

In montosis, ad rupes, terram. (Interspersum observo *Collema ramulosum* nigrum multifidum teres obtusum.)

* *P. turbinata*, crustacea imbricata: foliolis abbreviatis crenulatis; scutellis turbinatis rugulosis nigris.

Cum priori.

2. *P. carnosa*, crustacea imbricata: foliolis confertissimis erectiusculis rotundatis rufescenti carnosis margine albido cre-

nulato farinoso; scutellis crassis crustae conformibus.

In montosis, rupestribus. (Etiam ex Alpibus Norveg. habeo. An h. l. Lich. carnosus *Dicks. fasc. 2. t. 6. fig. 7?* Aliam ex Hercyn. montosis observo plantulam: foliolis depressis rimoso-angulosis; scutellis planis rufis marginatis: margine crusta concolore: p. *gelidiformis*, a Lich. gelido *Flor. dan. t. 470. fig. 2*, certe diversissima.)

*3. p. *decipiens*, crustacea frustulosa aggregata lateritia; scutellis convexis marginalibus nigris. *Pl. lich. t. 43. fig. 1-5. Jacq. coll. 3. t. 3. fig. 3.* (Lich. elveloides *Wulf.*)

In montosis ad terram. (Eandem ex America et Africa habeo. Foliola juniora scutelliformia. Variat colore obscure vel dilute testaceo etiam carneo, h. l: p. *gypsophila*, crusta globulosa carnea; scutellis nigris. *Schrad. spic. 89.* (Lich. *gypsophilus.*)

4. p. *testacea*, crustacea frustulosa aggregata cinerea; scutellis convexis marginalibus rufis. *Pl. lich. t. 22. fig. 5-6.*

In rupibus montosis. (In humido cinereo-virescent.)

- * 5. *P. paradoxa*, crustacea frustulosa aggregata convexa umbrino rufo-fusca; scutellis pruinatis albido-marginatis, demum convexo-planis nigris. *Ehrh. crypt. exs.* 206. (Lich. paradoxus.)

Ad terram locis montosis. (Fronde juniores scutelliformes, marginatae, dein convexae frustulosae, in humido virescentes.)

- * 6. *P. vesicularis*, polymorpha inflata albido-cinerea; scutellis plano-convexis nigricantibus. *Pl. lich. t. 52. fig. 3.* (Patellaria vesicularis.) *Flor. dan. t. 1064. f. 1.* (Lich. candidus.)

Ad terram locis montosis saepe cum priori consimili. (Jam ab initio globosa substipitata pruinata.)

- * 7. *P. similis*, crustacea frustulosa aggregata convexa albida; scutellis concoloribus marginatis.

In saxis montosis, in lignis rarius. Fronde globulosae, etiam ex carneo albae.)

8. *P. ostreata*, crustacea frustulosa aggregata, imbricata superne convexa marginata: margine pulverulento.

In cortice Abiet. ligno. (Color virescenti griseus.)

* 9. *P. candida*, crustacea tartarea conglomerata candida sublobata: lobis deflexis; scutellis pruinatis. *Pl. lich. t. 33. fig. 2.* (Patellaria candida.)

Ad rupes, in terra.

10. *P. epigeja*, crustacea tartarea rugosa albida sublobata; scutellis marginatis convexis nigris.

Ad terram, inter Muscos (H. vid. 1. Lich. candicans, crustaceus sublobatus albido-candicans scutellis pulvinatis nigrescenti-fuscis albo-marginatis. *Dicks. fasc. 3. tab. 9. fig. 5.* Lich. melanocarpus Pers. in *An. bot.* 7. 25.)

* 11. *P. Muscorum*, crustacea leproso-tartarea ruguloso-lobata; scutellis immersis concavis nigricantibus. *Pl. lich. t. 21. f. 1.* (Patellaria Muscorum.)

In terra substratis Muscis. (v. scrupos. similis. H. 1. Lich. bryophilus Ehrh. *crypt. exs.* 236.)

* 12. *P. lentigera*, crustacea tartarea lactea lobata: lobis depressis rotundatis; scutellis lenti-

lentiformibus albo - marginatis. *Pl. lich.*
t. 48. fig. 1.

In montosis rupestribus, ad terram.

13. *p. canescens*, crustacea suborbicularis
caudicans farinosa lobato - corrugata; scutel-
lis marginatis plano - convexis nigris. *Dicks.*
fasc. 1. t. 2. fig. 5. (*Lich. canescens.*)

In arborum cortice, palis, muris. (Raro cum
scutellis; crusta plus minusve orbiculata in fo-
liola obtusa subimbricata, margine expansa.)

* 14. *p. albens*, crustacea suborbicularis
albicans, lobato - corrugata; scutellis pal-
lidis.

In muris, saxis rupibus. (Scutellae depres-
sae, crusta margine concolore, demum oblitte-
rato, disco dilute e cinereo carneo.)

* 15. *p. citrina*, crustacea leproso - tarta-
rea sublobata lobis rugosis depressis; scu-
tellis rufescentibus. *Pl. lich. t. 48. fig. 2.*

Ad terram, in montosis. (Eandem e regno
Tunetano a cel. *Olof Linden* collectam habeo.
H. 1. *Lich. fulgens Swartz*, in *nov. Act. upsal.*
4. 246. Var. colore dilutiore ex albo et citrino
mixta crusta.)

16. *P. caelata*, crustacea tartarea lobata crispa: lobis depressis albo - marginatis; scutellis rufescentibus.

In subalpinis, montosis. (Tyrol. Fuessen *Nat. terer* — E cinereo flavescit subtus albida.)

* 17. *P. Hypnorum*, crustacea leprosa granuloso - foliolosa; scutellis rufescentibus, margine crusta concolore crenulato crispo.

Ad terram, Muscis substratis. (Colore virescenti - cinereo, flavescente: *P. deaurata*, crustacea leproso - granuloso - foliolosa flavescens; scutellis rufescentibus margine crusta concolore crispo cinctis. Ad lentem foliolosa quasi crusta conspicienda. Etiam ex Norvegiae alpinis habeo. Scutellis majoribus sparsis elevatis margine crispo s. granulato cinctis, a sequenti dignoscitur. H. vid. 1. Lich. *Hypnorum Flor. dan. t. 956.*)

* 18. *P. pezizoides*, leprosa granuloso - foliolosa subcinerea; scutellis depressis fusco - rufis margine crenulatis.

Ad terram, Muscis substratis. (Occurrit Terrae vel lapidibus innascens confertissimis scutellis, crusta ad lentem obscurius folioloso granulosa; *P. nebulosa. Pl. lich. t. 49. fig. 1.*)

* 19. *P. brunnea*, leprosa granuloso-foliolosa brunnea; scutellis depressis concoloribus.

Ad saxa, in terra. (H. forsan 1: Lich. brunneus Swartz, multiflorus *Thrh. crypt. exs.* 153. Scutellis in terra majoribus, in saxo adpressis a crusta vix distinguendis.)

* 20. *P. microphylla*, crustacea granuloso-foliolosa cinerea; scutellis convexis rufescentibus.

In cortice arborum, ad terram. (H. 1. Lich. *microphyllus* Schrad. *spicil.* t. 1. fig. 4. Ad lentem foliolis granulosis minutis cinereis crusta composita; aetate nigrescentibus.)

* 21. *P. grisea*, crustacea granuloso-foliolosa griseo-cinerea; scutellis nigris a crusta marginatis: margine crenulato; demum convexis.

In arenosis, turfosis. (Per lentem granula crustae in foliola coagmentata, nunc dilutiora nunc obscuriora colore.)

* 22. *P. variabilis*, crustacea leproso-tartarea margine sublobata dilute umbrina, albedo-cinerea; scutellis confertis fusco-oesiis albedo-marginatis.

In saxis, lapidibus. (H. l. Lich. *variabilis* Pers. in *An. bot.* 7. 26.)

* 23. *P. dendritica*, crustacea cinereo-nigrescens dendritica; scutellis convexis concoloribus. *Pl. lich.* t. 19. fig. 4. (*Verrucaria dendritica*.)

Crystallo quarzosae, etiam calcario lapidi innascitur. (In montosis Hercyn., saepe in consortio *V. contig.*)

24. *P. upsaliensis*, crustacea tartarea fruticuliformis depressa; scutellis pallidis, margine crusta concolore candido. *Pl. lich.* t. 21. fig. 2. (*Patellaria upsaliensis*.)

Locis montosis, sterilibus. (E variis Germ. locis accepi Muscis vel graminibus instratam eaque incrustantem, unde facies fruticulosa vel subuliformis, quod etiam in *L. tartareo* sed rarius fieri solet. Scutellae *Perellae* similes. Aliam ab *Ehrharto* *Upsaliae*, etiam in *Nordlandia* ab *O. Linden*, lectam accepi plantam, lignis, corticibus, innascentem, quoad scutellas *Upsaliensi* similem, hinc inde lividas, crusta verrucosa: *P. alabastrina*. Scutellarum colore differt: *P. frigida*, crustacea fruticuliformis candida; scutellis planis ochraceo-carneis albo-marginatis. *Dicks. fasc. crypt.* 2. 19. *Ej. coll. of dried pl.*

2. 49. *Isidium frigidum*. Achar. in K. Vet. Acad. n. Handl. 15. t. 6. fig. 2.)

25. *p. lactea*, crustacea tartarea orbicularis candida, margine sublobata centro rimoso - radiosa. Enum. Lich. tab. 4. fig. 6. Jacq. coll. 3. t. 4. (Lich. lacteus Wulf.)

In rupibus, saxis. (Crusta in globulos farinaceos efflorescit, rarius scutellifera: scutellis atris.)

26. *p. bracteata*, crustacea orbicularis farinosa rugulosa margine sublobata citrina.

In montosis rupestribus. (Absque scutellis.)

42. VERRUCARIA (Warzenflechte) G. pl. 1668.

Crusta aphylla: leprosa, tartarea. Scutellae marginatae, immarginatae.

Scutellis decoloratis.

1. *v. Perella*, tartarea verrucoso albida; scutellis concoloribus obtusis marginatis. Pl. lich. t. 12. fig. 5. (Patellaria Perella.)

In rupibus, muris. (Crusta ex cinereo etiam rufescit.)

* *v. tumidula*, crustacea albida; scutellis concoloribus margine tumidulis.

In cortice. (H. l. Lich. tumidulus Pers. in An. bot. 11. 18.)

* 2. *v. faginea*, crustacea; verrucoso, candida scutellis concoloribus.

In cortice arborum, saxis. (Occurrit:

* *v. orbiculata*, margine zonata, disco scutellifero. Enum. Lich. t. 7. fig. 2.

In cortice arborum.

* *v. discoidea*, crustacea effusa; scutellis farinaceis, nudis. Enum. Lich. l. c. fig. 5.

In cortice.

* *v. tuberculosa*, crustacea effusa; scutellis verrucoso-farinaceis, confluentibus. Enum. Lich. t. 2. fig. 4.

In arboribus, saxis.)

* *v. nodulosa*, crustacea nodulosa candida; scutellis excavatis margine concoloribus.

In cortice, super Muscos. (Occurrit crusta nodulosa: nodulis apice rugulosis, scutellisque pallide e carneo rufescentibus *v. rugulosa*. H. l. quoad saltem figuram Lich. albo-flavesceus Wulf. in Jacq. Coll. 3. t. 5. fig. 1.)

3. v. *farinosa*, pulverulenta candida; scutellis pallidis margine concoloribus.

In cortice. (H. vid. 1. *Lepra farinosa Enum. Lich. t. 1. fig. 1.* Rarissime cum scutellis, sine his crusta farinosa similis lactea.)

* 4. v. *umbilicata*, leprosa cinerea; scutellis candidis minutis umbilicatis.

In rupibus, saxis. (Gott. *Heyd.*)

* v. *albella*, crustacea lactea; scutellis concoloribus.

In cortice arborum. (Ad lentem discus pallidissime carneus. H. 1. *Lich. albellus Pers. in An. bot. 11. 18.*)

* 5. v. *pallida*, crustacea albido - cinerea; scutellis pallidis albido - marginatis.

In cortice arborum. (Discus e cinereo pallide carneus. V. *angulosa*, scutellis confertis demum angulosis convexis. *Jacq. Coll. 3. t. 5. fig. 3. a.* *Lich. pallescens Wulf. Schreb. spic. 1132, 1137.* *Lich. pallidus, angulosus.* Occurrit scutellis crassioribus margine tumidis crusta aequabili albido cinerea, qualem ex America habeo: V. *cancrisiformis.* Etiam crusta margine zonata sed rarissime.)

*6. v. *impolita*, crustacea exasperata albidocinerea; scutellis difformibus pallidis. *Elrh. crypt. exs.* 274. (Lich. *impolitus*.)

In cortice rimoso, saxis. (Scutellae quasi pruinatae e cinereo caesiae, intus leniter rufescentes. H. l. Lich. *pruinatus Pers. in An. bot.* 11. 19. — Occurrit scutellis in crustam impressis; crusta in rupibus e cinereo rufescente, scutellis emersis, etiam levissime nigricantibus.)

*7. v. *glaucoma*, crustacea, tartarea albidocinerea; scutellis velatis pallidis, crusta concoloribus, caesiis, demum nigricantibus. *Pl. lich. t.* 52, 53.

In saxosis rupestribus. (H. l. Lich. *sordidus Pers. in An. bot.* 7. 26. Lich. *albido-caesius Schrad. spicil.* 87. Lich. *varius Davies, in Transact. lin. 2. t.* 28. *fig.* 5.)

Scutellis rufescentibus vel lateis.

8. v. *detrita*, crustacea albidocinerea; scutellis confertis difformibus detritis, a crusta marginatis.

In cortice arborum. (Ab initio scutellae pallidae, a crusta vix distinguendae, demum emersae rufescentes subfuscae, marginatae.)

* 9. v. *tartarea*, tartarea globulosa albida; scutellis planis albo - marginatis ochraceo - rufescentibus. *Flor. dan. t. 712. Jacq. coll. 4. t. 8. fig. 2.* (Lich. tartareus *Wulf.*)

In rupibus, cortice. (H. l. Lich. androgynus *Enum. Lich. t. 7. fig. 3.* Crusta globulosa; farinosa, in recenti e cinereo virescens; muscis instrata aegre a *P. frigida* distinguenda.)

10. v. *granulosa*, leprosa incana; scutellis convexis rufescentibus. *Pl. lich. t. 30. fig. 5.*

Ad terram, super muscos. (Scutellae ab initio planiusculae, mox vero convexae. Occurrit scutellis pallide e carneo rufescentibus vel fusco rufis, ab initio globosis vel convexis; crusta etiam virescenti incana. Aliam e Norlandia accepi plantulam scutellis globosis carnosius fusco - rufescentibus, muscis ut prior instratam; nomine Lich. *leucophaei* *Flor. dan. t. 955. fig. 2.*)

11. v. *rufescens*, leprosa cinerea, nigricans; scutellis convexis immarginatis rufis. *Pl. lich. t. 17. fig. 1.*

In rupibus, saxis. (Occurrit: crusta obscura, scutellis dilutioribus depressis, vel sordide rufescentibus, vel crusta olivaceo - flavescente.

H. vid. l. quoad fig. Lich. *viridi-flavescentis* Wulf. in Jacq. Coll. 3. t. 2. fig. 1.

* 12. v. *effusa*, leprosa cinerea dilute aeruginosa; scutellis rufescentibus, margine crusta concolore cinctis.

In ligno, praesertim Salicum, quas interne saepe longe lateque investit. (Gott. Pers. Lich. *effusus*. Lich. salignus Schrad. spicil. 84. Scutellae occurrunt pallide e carneo rufescentes, vel fusco-rufae confertissimae r. pezizoides similes, margine tenui flavescenti-virescente cinctae; disco demum convexo.)

* 13. v. *conglomerata*, leprosa cinereo-virescens; scutellis convexis globosis dilute ex carneo et flavo rufescentibus, in acervulos congestis.

In ericetis ad terram, in cortice. (Gott. Pers. Lich. *conglomeratus*. Heyd. — H. vid. l. Lich. sphaeroides, leprosus cinereo-virescens, tuberculis globosis incarnatis. Dicks. fasc. 1. t. 2. fig. 2. Margo in junioribus scutellis ad lentem hinc inde conspiciendus disco concolor.)

* 14. v. *rubella*, leprosa albido-flavescenti cinerea; scutellis rufescentibus, margine pallidiore cinctis. Ehrh. crypt. exs. 196. (Lich. rubellus.)

In cortice. (Occurrit: crusta leprosa flavescente scutellis demum convexis rufescentibus margine disco concolore *V. vernalis*. *Lich. vernalis* *Enum. Lich. t. 5. fig. 1.* — Scutellis turbinatis. Color marginis in sicco pallide carneus. Scutellis dilutioribus margine concolore, crusta fere nulla *Lich. luteolus* *Schrad. spicil. 85.* — *V. fusco-rubella*, scutellis elevatis fusco-rubellis, disco plano, margine concolore.)

15. *v. coronata*, crusta cinerea leproso-granulosa; scutellis rufescentibus depressis a crusta granuloso margine cinctis, disco convexo.

In rupibus, ad terram. (Duplicem varietatem coram habeo, unam e Gallia rupibus innascentem crusta cinerea distincte granulosa; scutellis e carneo vel ferrugineo rufescentibus; alteram in terra, Gottingae lectam, crusta e cinereo nigricante ad lentem tantum granulosa scutellis minoribus, e fusco rufescentibus, in siccitate nigricantibus.)

16. *v. rubra*, crustacea albida; scutellis concavis carneo-rufis, albido-crenatis. *Pl. lich. t. 17. fig. 2.* (*Patellaria rubra.*) *Enum. Lich. t. 5. fig. 2.* (*Lich. pallidus.*)

In cortice arborum, ligno, muris. (H. l. Lich. ulmi Swartz. in act. ups. 4. 247. Lich. pruinosis Humb. frib. 9. Color, disci ex pallide carneo sensim in carneo-rufescentem vel fuscum transit.)

* 17. v. *rosella*, leprosa crustacea cinereo-albida; scutellis convexo-planis incarnato-rufis, margine pallidioribus.

In cortice arborum. (H. l. Lich. *rosellus* Pers. in An. bot. 7. 25. Lich. albo-incarnatus, leproso-crustaceus, tener, globulosus, albus, tuberculis lentiformibus incarnatis Wulf. in Jacq. Coll. 3. t. 2. fig. 3. Partes fructificationis per microspium compositum spectatae, affinitatem ostendunt c. Lich. *Bacomycès*.)

* 18. v. *cupularis*, leprosa; scutellis excavatis carneo-rufis, margine tumido exteriorius deliscente.

In rupibus, saxis. (Crusta tenuissima occurrit colore nigricante, cinereo, miniato. Scutellae juniores ore contractae, margine expanso deliscenti, per lentem radioso. H. l. Lich. *cupularis* Ehrh. Beitr. 4. 45. Hedw. stirp. 2. t. 20. Lich. fusco-rubens Wulf. in Jacq. Coll. 3. t. 2. fig. 2. Lich. *marmoreus* Enum. Lich. t. 6. fig. 4.)

* 19. v. *decolorans*, leproso-granulosa cinerea; scutellis planis marginatis rufescenti carneis, nigricantibus. *Pl. lich. t. 39. fig. 2.* (*Patellaria decolorans.*)

In terra turfosa. (Hercyn. Pers. — Aliam in monte Rammelsberg ab *Ehrharto* collectam speciem habeo v. *incoloratam*: crusta leprosa cinerea; scutellis planis marginatis pallidis minutis, margine crusta concolore; juniori graniformi similibus. In terra.)

* 20. v. *clausa*, leprosa; scutellis immersis clausis, demum expansis concavis crustae foveolis immersis albis. *Enum. Lich. 48.* (*Lich. clausus.*) *Trans. lin. 1. t. 4. fig. 1.* (*Lich. exanthematicus Smith.*)

In saxis, rupibus calcareis. (Scutellarum discus pallidissime rufescens, elabens.)

* 21. v. *ferruginea*, leproso-crustacea albedo-cinerea; scutellis rufescenti-ferrugineis margine concolore. *Pl. lich. t. 12. f. 1.* (*Patellaria cinereo-fusca*) *t. 25. fig. 1.* (*Patellaria ferruginea.*)

In cortice arborum. (H. 1. *Lich. ferrugineus Huds.* quoad specimina ex Anglia accepta. Crustam, sed rarius, etiam lutescentem observavi.)

* 22. *v. arenaria*, crustacea leprosa cinerea albido-caesia; scutellis rufescenti-ferrugineis margine dilutiore.

Ad saxa arenaria. (H. l. Lich. *arenarius*, crusta leprosa pulverulenta caesia; scutellis croceo-rubris *Pers. in An. bot.* 7. 27.)

* *v. caesio-rufa*, crustacea albido-caesia; scutelliis rufescenti ferrugineis, margine flexuoso albido.

Ad saxa arenaria. (H. l. Lich. *caesio-rufus*, crusta tenuissima granulosa caesia; scutellis sparsis rufis *Schrad. spic.* 80. Scutellae aetate discolores.)

* 23. *v. aurantiaca*, leprosa subcinerea; scutellis aurantiis rufescentibus flavo-marginatis. *Enum. Lich.* 45.

In cortice arborum, saxis. (H. l. quoad specimen ex Anglia accepta: Lich. flavo-rubescens *Huds.* Praeter crustam huic valde similis:)

* 24. *v. oblitterata*, leproso-crustacea globulosa sparsa flavescens; scutellis confertis plano-convexis rufescenti aurantiis.

In rupibus, saxis. (Crusta a scutellis angulatis oblitterata. H. l. Lich. *oblitteratus*, rupibus stris,

stris, crusta globulosa effusa flava, margine subfoliascente, scutellis medio congestis aurantiis *Pers. in An. bot.* 11. 15. *V. holocarpa*, leprosa aurantia; scutellis confertis rufescenti - aurantiis. *Ehrh. crypt. exs.* 284. *Lich. holocarpus*. In sepimentis, ligno. Aliam ex subalpinis Norvegiae nomine *Lich. Jungermanniae Flor. dan.* 1055. *fig. 1*, accepi: crusta leprosa cinerea; scutellis rufescenti - aurantiis sparsis planis demum convexis, margine concolore. In Muscis, *Jungermannia alpina*.)

25. *v. viridi - rufa*, leproso - crustacea flavo - virescens; scutellis marginatis rufescenti - aurantiis. *Jacq. coll.* 2. t. 15. *fig. 4. b.* (*Lich. flavo - virescens Wulf.*)

In rupibus, saxis.

26. *v. cerina*, leproso - crustacea subcinerea; scutellis cerinis albido - marginatis. *Fl. lich.* t. 33. *fig. 1.* (*Patellaria cerina*.)

In cortice, ligno. (Occurrit pro ratione subiectae crustae, margine plus minusve cinereo. Crusta fere nulla; scutellis sordide cerinis cinereo - marginatis: *v. gilva*. In ligno. Scutellis rufescenti - cerinis albido - marginatis demum convexis: *v. aureo - cerina*. Etiam occurrit scutellis minutissimis flavis albido vel tamen pallidius disco marginatis *Vitellino similis*.)

* *v. rarula*, scutellis confertis umbrino-fusco luteis, crusta cinerea margine concolore.

In cortice.

* *v. stillicidiorum*, leprosa viridi-cinereascens; scutellis cerinis, viridantibus cinereo-marginatis. *Flor. dan. t. 1063. fig. 2.* (Lich. stillicidiorum.)

Muscis inpersa ad terram. (Göttingae lecta scutellis psittacinis minutis cinereo-marginatis hinc inde cerinis, demum lividis, plumbeis; Norvegiae, scutellis parum viridantibus magis cerinis, ceterum plane similis.)

Scutellis fuscis vel nigricantibus.

27. *v. flavo-fusca*, crustacea obscure flavescens; scutellis sparsis convexis rufescenti-fuscis.

In saxis arenosis. (Epicosp. Hildes. *Schrad. spic. 86.* Lich. *flavo-fuscus.*)

28. *v. subfusca*, crustacea cinereo-albicans; scutellis rufescenti fuscis, margine crusta concolore. *Enum. Lich. t. 5. fig. 3.*

In cortice, saxis, muris. (Occurrit:

* *v. argenteo - fusca*, crusta albida; scutellis saturate rufescenti fuscis, margine albidó cinctis.

In cortice. In saxis, muris; crusta subcinerea saepe orbiculatim expansa; scutellae confertae saturate ex nigro fuscae.

* *v. pallide-fusca*, crusta albida; scutellis pallide rufescenti fuscis, albido - marginatis.

In cortice arborum, Pin. sepimentis. Scutellae pallidae, discolores, angulosae.

* *v. umbrino - fusca*, crusta cinerea; scutellis umbrino-fuscis, cinereo - marginatis.

In cortice. (H. l. Lich. umbrinus *Ehrh. crypt. exs.* 245.)

* *v. fusca*, crustacea cinerea; scutellis confertis depressis nigro - fuscis albido - marginatis.

In rupibus, saxis. (Copia scutellarum crustam obfuscante, ex meris scutellis nigris videtur constare.)

29. *v. fusco - atra*, crustacea cinereo-fusca rimosa; scutellis nigris depressis contiguís. *Jacq. coll.* 2. t. 14. fig. 3. (Lich. fusco-ater *Wulf.*) *Pl. lich.* t. 54. fig. 1.

In saxis rupestribus. (Occurrit crusta e griseo dilute fusca.)

* *v. cinereo-atra*, crustacea cinereo-griseo-albida rimosa frustulosa; scutellis nigris depressis subcontiguis. *Jacq. coll. 2. t. 14. fig. 1.* (Lich. atro-albus *Wulf.*)

In rupestribus, saxosis. (Crusta dilute e griseo in cinereo carneum hinc inde tendit, particulis rotundatis.)

* *30. v. badia*, crustacea olivaceo-cinerea rimosa; scutellis plano-convexis badiis, margine crusta concolore. *Pl. lich. t. 51. fig. 2.*

In montosis rupestribus (Hercyn. *Ehrh. Pers. Lich. badius in An. bot. 7. 27.*)

* *v. griseo-atra*, crustacea griseo-cinerea rimosa; scutellis nigris depressis contiguis.

In rupestribus saxosis. (Scutellae ad lentem marginatae crustae impositae, in ultima et penultima crustam aequantes.)

* *31. v. atro-alba*, crustacea rimosa frustulosa atro alboque mixta.

In montosis, saxis. (Hercyn. — Eandem in Galliae et Sveciae montosis collectam observo albidis

albidis particulis crustae nigro conspersis pulvere.)

32. v. *coracina*, crustacea nigra rimosa; scutellis confertis impressis atris.

In saxis rupestribus. (Nudo oculo nigra, rimosa; ad leutem subcinerea, scutellis intra particulas crustae immersis. Occurrit crusta inaequali frustulosa, scutellis atris cinereo-marginatis, e crusta emergentibus. H. l. Lich. atro-cinereus, crustaceus ater, scutellis confertissimis planis nigris cinereo-marginatis *Dicks. fasc. 3. t. 9. fig. 2.*)

*33. v. *atra*, crustacea cinereo-albicans; scutellis atris albo-marginatis. *Enum. lich. t. 4. fig. 6.* (Lich. ater.)

In rupibus, cortice. (Crusta aequabilis, rimosa, grumosa. H. l. Lich. cinereus *Wulf. in Jacq. Coll. 2. t. 14. fig. 5. b.* Lich. tephromelas *Ehrh. crypt. exs. 313.* v. *atrata*, crustacea cinereo-albicans; scutellis minutis atris albo-marginatis. In cortice.)

34. v. *ocellata*, crustacea tessellato-verrucosa cinerea, scutellis nigris ocellata. *Pl. lich. t. 20. fig. 2.*

In montosis saxosis. (v. *ocellulata*, crustacea rimosa tessellata cinerea; scutellis minutis
simis

simis ocellata. In tectorum tegulis, rupibus, saxis.)

* 55. v. *confluens*, crusta acquabili fumoso-cinerea; scutellis convexis atris confluentibus. *Pl. lich. t. 19. fig. 1.*

In rupibus saxis (Hercyn. *Web. spic. t. 1. fig. 2.* *Lich. confluens.* Occurrit scutellis ad lentem rugulosis.)

* 56. v. *contigua*, crustacea rimosa subcinerea; scutellis nigris depressis contiguis.

In saxis. (Scutellae ad lentem nigro-marginatae. Occurrit crusta albido-cinerea, scutellis convexis, vel crustae insidentibus; crustae areolis cicatricosis: v. *cicatricosa*.)

* v. *petraea*, crustacea subcinerea; scutellis nigris depressis concentricis. *Jacq. coll. 5. t. 6. fig. 2.* (*Lich. petraeus Wulf.*) *Pl. lich. t. 50.*

In saxis, rupibus. (Crusta etiam albida.)

* v. *pantherina*, crustacea albida; scutellis depressis nigris margine concolore cinctis nigris contiguis excentricis.

In saxis, rupibus. (Ab ultima differt scutellis excentricis a penultima crusta et scutellarum parvitate.)

* *v. tigrina*, crustacea, aequabilis lacteo-candida; scutellis nigris depressis a crusta marginatis demum convexis, contiguis excentricis.

In rupibus saxis. (Scutellarum magnitudine sim ac forma, facile a sequenti distinguitur.)

* 37. *v. calcaria*, crustacea effusa lactea; scutellis convexis atris a crusta marginatis.

In saxo, lapide calcario. (Occurrit crusta farinosa cretacea: Lich. cretaceus *Ehrh. Beitr.* 7. 12.)

* 38. *v. tessellata*, crustacea cinereo-lactea aequabilis rimoso-tessellata; scutellis impressis a crusta marginatis. *Flor. dan. t.* 468. *fig. 2.*

In rupibus, saxis, lapidibus, praesertim calcariis. (Areolae ab initio punctatae disco sensim expanso scutelliformi concavo, cinerascente, nigricante, in areolas tessellatas quasi immerso, aetate simul cum areolis emergente. *H. v. l.* Lich. punctatus *Dicks. fasc. 3. 15.* Lich. rimosus *Retz. scand. 2. 1529. exclusa fig. 5. t. cit. Fl. dan.*)

* 39. *v. multipuncta*, crustacea cinereo-lactea aequabilis rimoso-tessellata; scutellis intra

intra areolam pluribus impressis contiguis, demum prorumpentibus marginatis.

In montosis rupestribus. (Hercyn. —)

* 40. v. *scruposa*, crustacea verrucoso-rimosâ cinerea; scutellis immersis concavis nigricantibus. *Pl. lich. t. 11. fig. 2.* (Patellaria scruposa.)

In rupibus, saxis, muris, palis vetustis, muscis. (Variabilis Lichen occurrit crusta semper asperiore quam antecedens species, albido-cinerea tartarea, scutellis lividis; cinereo-cassia, dilute ferruginea, vel eleganter pallide sulphurea, scutellis plus minusve nigricantibus, margine crenulato vel integro aperto, contracto. *H. l. Lich. pertusus Wulf. in Jacq. Coll. 2. t. 15. fig. 5*, ut specimina viva rev. auctoris evincunt, a *Lich. pertuso* aliorum auctorum, quem etiam rupes inhabitantem possideo et quam longissime a Lichenum ordine diversum puto, distinguendus. — *Lich. ocellatus Gmel. Syst. Nat. 1361. Lich. impressus Swartz. in nov. Act. ups. 245.* — Similem crusta albicante scutellis impressis lividis in Regno tunetano lectam coram habeo.)

* 41. v. *contorta*, crustacea albida; scutellis immersis nigris margine spiraliter contortis. *Pl. lich. t. 22. fig. 1-4.*

Ad rupes, saxa, lapides. (Occurrit scutellis simplici duplicive margine contortis; confluentibus vel distinctis. Crusta parasitica nigra.)

* 42. v. *immersa*, cinereo - albida, lactea; scutellis immersis nigris. *Pl. lich. t. 12. fig. 2 - 4.*

In rupibus, saxis. (V. *calcivora*, scutellis nigris planis in calcem immersis. *Ehrh. crypt. exs. 244. Lich. calcivorus*. V. *immersa* scutellis ad lentem marginatis, frequenter in consortio vegetabilis alius ordinis: *Lich. antiquitatis Enum. Lich. t. 3. fig. 5*, et V. *rupestris Schrad. spic. 109. occurrit.*)

43. v. *purpurascens*, roseo - purpurea; scutellis immersis nigris. *Pl. lich. t. 15. fig. 1.*

In rupibus calcariis. (Carinth. *Wulf. Lich. marmoreus*. In *Jacq. Coll. 2. t. 13. fig. 1.*)

* 44. v. *silacea*, crustacea silacea; scutellis convexis nigris margine introflexis. *Pl. lich. t. 19. fig. 2.* (*Patellaria silacea.*)

In montosis rupestribus. (Hercyn. — Margo scutellarum introflexus, in papillam saepe elevatus.)

* v. *Oederi*, crustacea silacea; scutellis depressis nigris, difformibus, contiguis. *Flor. dan. t. 470. fig. 1.*

Iisdem cum priori locis. (H. vid. 1. Lich. *Oederi*, leproso . crustaceus rimosus ferrugineo . rubens, tuberculis congestis imanis difformibus atris submarginalis *Dicks. fasc. 2. 11.* Lich. *Koenigii Humb. frib. 47.* — Crustia hinc inde cinerea colore prioris, scutellae majores v. coniguae similes.)

* 45. v. *grumosa*, crustacea grumosa caerulescenti cinerea; scutellis sparsis depressis nigris albido . marginatis crenulatis.

Ad saxa arenaria. (Gott. *Pers. Lich. caerulescens*, in *An. bot. 11. 15.* Lich. *grumosus l. c. 14. 34.*)

* 46. v. *caerulescens*, leprosa crustacea ex albido caerulescens; scutellis concoloribus margine pallidiore cinctis, demum nigricantibus. *Hag. Lich. t. 1. fig. 5.* (Lich. *caerulescens.*) *Enum. Lich. 45.*

In rupibus, arborum cortice.

47. v. *albo-caerulescens*, crustacea aequalis albicans; scutellis complanatis pruinatis albo-caerulescentibus nigro-marginatis. *Pl. lich. t. 14. fig. 2.* (*Patellaria albo-caerulescens.*)

In saxis, lapidibus. (*Carinth. Wulf. Lich. albo-caerulescens*, in *Jacq. Coll. 2. t. 15. fig. 1.* In rupibus Friberg. *Humb. Verrucaria annulata Flor. frib. 45.* — Aetate et intus nigrescunt scutellae. Crusta hinc inde etiam lineolis septa. Excepto loco natali et rufescente intus disco huic similis:)

* v. *cyanescens*, leprosa albicans; scutellis, complanatis pruinatis rufo-caerulescentibus nigro-marginatis. *Pers. in An. bot. 11. 17.* (*Lich. cyanescens.*)

In cortice arborum. (Etiam linea nigra septa crusta.)

* 48. v. *dispersa*, crusta leprosa subnulla; scutellis sparsis umbrinis margine subtusque albidis.

Ad saxa calcaria, lapides. (*H. l. Lich. dispersus*, crusta leprosa subnulla; scutellis dis-

spersis minutis subfuscis caesiis nigrisque Pers.
in An. bot. 7. 27.)

*49. v. *fumosa*, crustacea rimosa fuliginosa; scutellis inmersis nigris marginatis disco convexo prominulo. Pl. lich. t. 49. fig. 2.

In saxis arenosis.

*50. v. *fasciculata*, crustacea rimosa fruticulosa fusco-lurida; scutellis minutis confertis nigris, expansis marginatis.

In rupestribus montosis (Hercyn. —)

*51. v. *uliginosa*, leprosa ferrugineo-fusca; scutellis minutis depressis nigris plano-convexis.

In uliginosis turfosis (Hercyn. Schrad. spic. 88. Lich. *uliginosus*, crusta granulosa e ferrugineo-fusca, verrucis subrotundis nigrescentibus. Scutellae minutae absque lente vix a crusta distinguenda. Occurrit: crusta leprosa distincte granulosa cinereo-ferruginea, scutellis nigris convexis contiguis confluentibus V. *humosimilis*.)

52. v. *humosa*, leprosa nigricans; scutellis convexis confertis fusco - nigris. *Ehrh. crypt. exs.* 155. (Lich. humosus.)

In terra. (Hannover. — Ehrh. Aliam observo; v. *viridem*, in terra: crusta granulosa byssacea, tuberculis scutelliformibus fusco - nigris. — Inter Phascum serratum et subulatum, ratione habita partium fructus (semina enim ope microscopii compositi intra thecas liberas coordinata apparent) ad alium ordinem amandanda.)

53. v. *Muscorum*, leprosa incana cinerea; scutellis planis, convexis nigris. *Fl. dan. t.* 1003. *fig.* 1. *Jacq. Coll.* 4. *t.* 7. *f.* 1. (Lich. Muscorum *Wulf.*)

In muscorum stratis. (Occurrit: scutellis constanter convexis immarginatis, vel ab initio planis marginatis demum convexis, a sequenti forsàn loco natali tantum diversa; scutellis dilute ex fusco nigris crusta vix discernenda, leucophaeo vel graniformi similis.)

54. *v. punctata*, crusta leprosa subcinerea; scutellis nigris planis, convexis.

In cortice, ligno, saxis. (Etiam acrustacea. Occurrit:)

* *v. limitata*, crusta subcinerea; scutellis nigris linea repanda septis. *Enum. Lich. t. 5. fig. 3.* (Lich. sanguinarius.)

In cortice, saxis. (Etiam acrustacea.)

* *v. guttata*, crusta leprosa subcinerea; scutellis nigris planis, convexis guttatis.

In saxis. (Etiam acrustacea.)

* *v. atro - sanguinea*, crusta inconspicua; scutellis planis atro - sanguineis, nigro - marginatis. *Enum. Lich. 29. D.*

In saxis, lapidibus. (Fere acrustacea. Scutellae minutae, numerosae adpressae, humectatae atro vel fusco - sanguineae.)

* *v. olivacea*, crusta leprosa e cinereo dilute olivaceo - virescens; scutellis nigris.

In cortice, ligno; in saxis (sordide olivacea. Scutellae hinc inde ex nigro fuscescunt.)

* *v. punctiformis*, crusta leprosa albedo - cinerea, scutellis minutissimis nigris punctiformibus.

In cortice rimoso Abiet., saxis. (Scutellae ad lentem marginatae, crustae innumerae insidentes.)

55. *v. abietina*, crusta leprosa sparsa albidula; scutellis nigris convexis albo - marginatis, demum hemisphaericis. *Ehrh. crypt. exs.* 166. (Lich. abietinus.)

In cortice rimoso Abiet. (Scutellae *V. calcareae* similes, hinc inde etiam discolores basi subfusca vel diluioze, centro nigro, disco elapso, excavationes nudas observo. Vel ad hanc vel ad sequentem spectat: Lich. pilularis, crustaceus cinereo - albidus tuberculis pilulae formibus nigris *Davies*, in *trans. lin.* 2. t. 28. fig. 1.)

* *v. pilularis*, crusta albidula; scutellis nigris convexis hemisphaericis immarginatis.

In cortice Abiet. (Scutellae juniores ad lentem margine concolore instructae.)

56. *v. albo - atra*, crustacea albidula; scutellis nigris pruinatis. *Pl. lich.* t. 15. f. 2.

In cortice, saxis. (Occurrit scutellis ab initio pruinatis, demum convexis nudis; scutellis complanatis difformibus minutis pruinatis crusta amylacea: *V. amylacea*, *Ehrh. crypt. exs.* 303. *Lich. amylaceus*. *Pers. in. an. bot.* 11. 18. *Sphaeria byssacea* *Weig. Obs.* 42.

* 57. *v. escharoides*, crusta crassa leproso-granulosa cervina cohaerens, inaequabilis; scutellis nigricantibus convexis turbinatis. *Ehrh. crypt. exs.* 313. (*Lich. escharoid.*)

In turfosis. (Crusta crassa semipollicari, interne nigricante, superficie hinc inde e cinereo ferruginea. — *Hercyn. Gott.* —)

* 58. *v. capitellata*, crustacea albido-cinerea rimoso-verrucosa cicatricosa; scutellis minutis nigris sessilibus stipitatisve. *Enum. Lich. t.* 4. *fig.* 3. (*Lich. cinereus.*)

In saxis, crusta crassiore; in cortice arborum; etiam orbiculatim expansa.

* 59. *v. sanguinaria*. crustacea cinereo-virescens, albicans; scutellis convexis nigris intus sanguineis. *Pl. lich. t.* 41. *fig.* 1.

In arborum cortice. (*Hercyn. Gott.* — *Par-tium fructus ad microscopium compositum examinati,*

nati, ratione habita, vix inter Lichenum ordinem amplius militabit.)

Crusta flavescente.

* 60. v. *quernea*, leproso-farinosa e viridi cinereo-lutescens; scutellis sparsis nigris. *Dicks. fasc. 1. t. 2, fig. 3.* (Lich. *querneus*.)

In quercuum truncis putridis. (Innascitur saepe crustae *Opegrapha pulicaris*, cante a scutellis orbiculatis convexiusculis confluentibus vel distinctis, distinguenda.)

* 61. v. *lutescens*, leproso-farinosa lutescens verrucosa; scutellis margine concoloribus, *Pl. lich. t. 23. fig. 1 - 2.* (Lepra *lutescens*.)

In cortice rimoso arborum, intercurrentes saepe *V. faginea*. (Scutellae rarissimae ab initio marginatae, demum disco convexo margine flexuoso, oblitterato. Discus e carneo et flavo dilutissime rufescit. *Opegrapha* ut in priori saepe crustae insidens.)

* v. *maculiformis*, leproso-farinosa lutescens maculiformis; scutellis margine concoloribus.

In cortice Betular, Abietis. (Maculas efformat semipollicares, pollicares lutescentes; scutellae plerumque confertae, colore ut in priori, hinc inde paulo obscurioris coloris. Eandem ex Norvegia habeo.)

* 62. v. *varia*, crusta flavo-virescens scutellis oblitterata variis, umbrino-fuscis, margine crusta concolore cinctis. *Pl. lich. t. 23. fig. 4.* (Patellaria varia.)

Ad ligna sicca, asseres. (H. l. Lich. pallens Schrank, *bavar.* 1504, quoad specimina viva Auctoris.)

* 63. v. *polytropa*, flavo-virens scutellis undique conspersa plano-convexis e dilute carneo flavescens. *Ehrh. crypt. exs. 294.*

In saxis montosis. (H. l. Lich. atro-virens Wulf. in Jacq. *coll. 2. t. 14. fig. 2*, quoad viva exemplaria Auctoris. Etiam e Finmarkia habeo. Hercyn. — Gott.)

64. v. *sulphurea*, crustacea verrucosa sulphurea; scutellis velatis convexis nigris. *Pl. lich. t. 20. fig. 2.*

In montosis rupestribus, saxis. (Crusta occurrit etiam sordide vel e ferrugineo lutescens.)

65. v. *flavo-virescens*, crustacea flavo-virescens; scutellis fusco-aurantiis flavo-marginatis. *Pl. lich. t. 20. fig. 1.* (Patellaria flavo-virescens.)

In rupibus. (Carinth. *Wulf. Lich. flavo-virescens*; *Jacq. coll. 2. t. 14. fig. 5. a.*)

* 66. v. *salicina*, leproso-crustacea flavescens; scutellis aurantiis margine pallidioribus.

In cortice Salicum. (Lich. *salicinus Schrad. spicil. 32.*)

* 67. v. *vitellina*, leproso-crustacea vitellina; scutellis concoloribus. *Pl. lich. t. 26. fig. 2.* (Patellaria vitellina.)

Ad ligna sicca, asseres. (Ad rupes scutellis acrustaceis sparsis minutis: V. *aurella*. Crusta vitellina, scutellis lividis sordidis V. *arcuata* *Pl. lich. t. 17. fig. 2.* Crusta parasitica? — nigra, leproso-granuloso scutellis sparsis minutis vitellinis V. *byssina*. *Enum. lich. t. 4. fig. 7.* Lich. *byssinus*.)

* 68. v.

* 68. v. *citrina*, leprosa pulverulenta citrina; scutellis aurantiis minutis flavo-marginatis.

In saxis, rupibus. (In ligno: scutellis fulvis crusta leprosa citrina P. candelari similis, V. *fulva*. Crusta pulverulenta flava; scutellis minutis sparsis lividis V. *flava*. In cortice. Crusta farinosa tenuissima aurea, flavissima, citrina ligna, sepimenta saxa operiens, in qua nunquam hucusque scutellas observare potui, microscopio subjecta differre a prioribus et alio generi subjienda videtur. H. l. Lepra candelaris *Ehrh. crypt. exs.*)

* 69. v. *cruenta*, crustacea tartarea rimoso- verrucosa flavescens; scutellis plano-convexis marginatis cruentis. *Pl. lich. t. 27. fig. 1.*

In montosis rupestribus (Hercyn. — crusta occurrit fusco-flavescens, albida. H. l. Lich. ventosus *Dicks. hort. sicc. brit. 5. 23.*)

70. v. *Haematomma*, leproso-crustacea albida; scutellis difformibus cum crusta elevatis sanguineis. *Pl. lich. t. 40. fig. 1.*

In rupibus, saxis montosis. (H. l. Lich. coccineus *Dicks. hort. sicc. brit. 5. 24.*)

* *v. porphyria*, leproso - crustacea albida; scutellis marginatis saturate sanguineis. *Pl. lich. t. 51.*

In rupibus, saxis. (H. l. *Lich. porphyrius Pers. in an. bot. 11. 17.* A priori vix nisi marginis regularitate diversa.)

* *v. frondosa*, crustacea farinosa expansa viridi - flavescens; scutellis coccineis margine crusta concolore farinoso cinctis. *Pl. lich. t. 49. fig. 1.*

In saxis. (Occurrit Crusta cinerea albida dilute flavescens. Scutellae margine farinoso cinctae. H. l. *Lich. coccineus, saxatilis late effusus, crusta farinosa leprosa flava; scutellis immersis difformibus coccineis Pers. in an. bot. 11. 17.* Absque scutellis vid. h. l. *Lepra sulphurea Ehrh. crypt. exs. 208.*)

* 71. *v. geographica*, crustacea rimosa tessellata flavescens; scutellis depressis nigris contiguis. *Enum. Lich. t. 3. fig. 1.* (*Lich. geographicus.*) *Pl. lich. t. 54. fig. 2.*

In montosis rupestribus, saxis. (Occurrit Areolis variae magnitudinis, aliis minutissimis vix nudo oculo distinguendis, aliis majoribus
ogel.

ocellatis ; dispersis aliis minutis : *V. atro-virens*,
crusta sparsa flavescens margine scutellisque
nigris. *Pl. lich. t. 17. fig. 4.* — Quoad fructus
conformationem accedit ad *Opegraphas*, thecis
vero stupae filamentosae adnatis, scutellis cru-
stae adnatis ad *Lichenes*.)

I N D E X.

A.

<i>Acrostichum longif.</i>	6
<i>marantae</i>	5
<i>septentrionale</i>	12
<i>Afzelia cirrata</i>	32
<i>crispa</i>	34
<i>heteromalla</i>	33
<i>pusilla</i>	ib.
<i>Andreaea</i>	80
<i>petrophila</i>	ib.
<i>Andree</i>	ib.
<i>Anthoceros</i>	94
<i>laevis</i>	ib.
<i>punctatus</i>	ib.
<i>Asplenium</i>	12
<i>Adiantum lanc.</i>	ib.
<i>nigrum</i>	ib.
<i>alternifolium</i>	13
<i>Ceterach</i>	ib.
<i>germanicum</i>	ib.
<i>Ruta muraria</i>	12
<i>Scolopendrium</i>	11
<i>septentrionale</i>	12
<i>Trichomanes</i>	13
<i>viride</i>	ib.
<i>Astmoos</i>	56

B.

<i>Baeomyces cespit.</i>	128
<i>Baerlapp</i>	15
<i>Barbula convoluta</i>	43
<i>fallax</i>	44
<i>hercynica</i>	45
<i>rigida</i>	ib.
<i>unguiculata</i>	44
<i>Bartramia haller.</i>	54
<i>Blasenmoos</i>	22
<i>Blasia</i>	94
<i>pusilla</i>	ib.
<i>Blasie</i>	ib.
<i>Blechnum Spicant</i>	11
<i>Brachsenkraut</i>	2
<i>Bryum</i>	30
<i>aciculare</i>	37
<i>apocarpon</i>	30
<i>apocarp.</i>	α ib.
<i>apocarp.</i>	β 29
<i>apocaulon</i>	30
<i>aquaticum</i>	35
<i>barbatum</i>	45
<i>bimum</i>	48
<i>bipartitum</i>	36
<i>Bryum</i>	

INDEX.

<i>Bryum brevicaule</i>	36	<i>Bryum lanceolat.</i>	31
<i>caespititium</i>	50	<i>lanuginosum</i>	41
<i>canescens</i>	41	<i>laterale</i>	54
<i>capillaceum</i>	42	<i>ligulatum</i>	ib.
<i>cirratum</i>	44	<i>longicaule</i>	36
<i>controversum</i>	34	<i>longifolium</i>	39
<i>convolutum</i>	43	<i>luteolum</i>	34
<i>cribrosum</i>	31	<i>microcarpum</i>	42
<i>crispatum</i>	32	<i>microcarpum</i>	ib.
<i>cuneifolium</i>	45	<i>mucronulat.</i>	44
<i>curvirostrum</i>	52	<i>murale</i>	45
<i>cuspidatum</i>	52	<i>nervosum</i>	44
<i>delicatulum</i>	51	<i>nigratum</i>	33
<i>Dicksoni</i>	32	<i>nigritum</i>	ib.
<i>Didymodon</i>	45	<i>nutans</i>	49
<i>elongatum</i>	41	<i>ovale</i>	35
<i>elongatum</i>	48	<i>pallidum</i>	43
<i>extinctor.</i>	26	<i>paludosum</i>	34
<i>n. 1. 2. sup.</i>		<i>parvulum</i>	ib.
<i>fallax</i>	44	<i>pellucidum</i>	35
<i>fasciculare</i>	42	<i>pendulum</i>	50
<i>fasciculatum</i>	28	<i>polycarpum</i>	37
<i>fastigiatum</i>	40	<i>polyphyll.</i>	ib.
<i>flagellare</i>	37	<i>pomiforme</i>	54
<i>flexuosum</i>	38	<i>pulvinatum</i>	31
<i>fragile</i>	ib.	<i>punctatum</i>	52
<i>glaucum</i>	ib.	<i>purpureum</i>	36
<i>heteromallum</i>	ib.	<i>pusillum</i>	33
<i>heterostichum</i>	40	<i>pyriforme</i>	27
<i>hypnoides</i>	42	<i>recurvatum</i>	31
<i>juniperifol.</i>	40	<i>recurvum</i>	54

Bryum

INDEX.

<i>Bryum rigidulum</i>	40	<i>Buxbaumia</i>	21
<i>rigidum</i>	46	<i>aphylla</i>	ib.
<i>rivulare</i>	37	<i>foliosa</i>	ib.
<i>roseum</i>	53	<i>Buxbaumie</i>	ib.
<i>rubellum</i>	33		
<i>rugosum</i>	39	C.	
<i>rurale</i>	45	<i>Catharinea</i>	25
<i>scoparium</i>	59	<i>hercynica</i>	ib.
<i>seriatum</i>	51	<i>Cladonia</i>	114
<i>setaceum</i>	43	<i>attenuata</i>	125
<i>setaceum</i>	51	<i>biuncialis</i>	116
<i>simplex</i>	35	<i>botrytes</i>	128
<i>spurium</i>	58	<i>ceranoides</i>	116
<i>starkianum</i>	32	<i>coccinea</i>	123
<i>stellatum</i>	45	<i>cornuta</i>	119
<i>strictum</i>	36	<i>cornucop.</i>	128
<i>strumiferum</i>	ib.	<i>coronata</i>	125
<i>subulatum</i>	46	<i>cristata</i>	124
<i>tortuosum</i>	ib.	<i>deformis</i>	120
<i>trichodes</i>	47	<i>denticollis</i>	125
<i>triquetrum</i>	48	<i>digitata</i>	124
<i>truncatulum</i>	27	<i>dilatata</i>	126
<i>undulatum</i>	40	<i>elongata</i>	119
<i>unguiculat.</i>	45	<i>exilis</i>	121
<i>ventricosum</i>	49	<i>extensa</i>	123
<i>virens</i>	35	<i>Fibula</i>	127
<i>virens</i>	34	<i>imbriata</i>	122
<i>viridulum</i>	ib.	<i>foliacea</i>	123
<i>viridulum</i>	ib.	<i>furcata</i>	115
<i>Weissia</i>	33	<i>furcato-sub.</i>	ib.

O

Clado.

- Cladonia furcell.* 118
furcell.-rad. 120
fusca 127
gracilis 119
hybrida ib.
incana 121
irregularis 125
macilenta 126
marginalis 123
molariform. 117
Papillaria ib.
parasitica 127
phyllophora 123
polycephala 126
polyceras 120
prolifera 122
pyxidata 121
racemosa 114
radiata 120
rangiferina 114
rangiformis ib.
recurva 115
simplex 121
spinescens 115
spinosa ib.
squamosa 125
subulata 118
subuliformis ib.
sylvatica 114
taurica 118
tubaeformis 122
- Cladonia tubercul.* 122
turgida 124
uncialis 117
uncinata 116
ventricosa 126
verticillata 122
- Collema auriculat.* 98
argillosum 102
Botrytis 103
byssinum 105
ciliatum 104
conglomer. 102
corniculat. 105
crenulatum 101
crispatum 100
crispum 101
cristatum ib.
fasciculare 102
fimbriatum 104
glaucescens 100
graniforme 106
granulosum 99
laciniatum 100
lobatum 105
marginale 101
nigrum 103
obscurum 101
pannosum 103
polycarpon 102
prasinum 96
pulvinatum 104
 Colle-

Collema subtile 105
tenuissimum 103
tomentosum 99
Vespertilio 98

Coralloides acul. 142
fragile 131
globiferum ib.
paschale ib.

Cornicularia trist. 142

Cyathea 10

D.

Dicranum acicul. 37
aquaticum 35
flagellare 37
heteromall. 38
longifolium 39
ovale 35
polycarpum 37
pusillum 34
sciuroides 67
spurium 39
strumiferum 37
undulatum 39
varium 35
virens ib.

Didymodon capill. 42
rigidulum 40

Ditrichum pusill. 43

E.

Encalypta 26
ciliata 27
vulgaris ib.

Equisetum 2
arvense 3
capillare ib.
eburneum ib.
fluviale 2
Heleocharis ib.
hiemale ib.
limosum ib.
nodosum 3
palustre ib.
polymorph. ib.
polystach. ib.
pratense ib.
sylvaticum ib.
Telmateja ib.

F.

Fissidens adiant. 56
bryoides 55
polycarpus 37
strumifer 36

Fontinalis 79
antipyretica ib.
minor ib.
minor 80

INDEX.

Fontinalis pennata 57
squamosa 79
 Funaria 51

G.

Gallertflechte 98
 Georgia Mnemos. 30
 Glockenhuth 26
 Goldhaar 25
 Grimminia apocarpa 30
 cribrosa 31
 recurvata ib.
 Gymnostomum 27
 aquaticum 29
 curvirostrum 28
 Hedwigia ib.
 Heimii ib.
 lapponicum 29
 microstom. ib.
 Osmundac. 28
 ovatum 27
 pennatum 28
 pyriforme 27
 truncatulum ib.

H.

Haarflechte 132
 Hedwigia anodon 29
 aquatica ib.
 ciliata ib.

Hypnum 55
 abietinum 59
 adiantoides 55
 aduncum 64
 assine 61
 albicans 68
 alopecurum 70
 aquaticum 29
 attenuatum 67
 brevirostrum 76
 bryoides 55
 commutatum 59
 complanat. 57
 compressum 58
 compress. ib.
 crispum ib.
 crista castr. 62
 crista castr. ib.
 cupressif. 63
 curtipendul. 66
 cuspidatum 58
 cuspidat. ib.
 decipiens 73
 delicatum 59
 dendroides 69
 denticulatum 56
 dubium 71
 elegans 58
 extenuatum 63
 extricatum 62
 filicinum 61
 Hypnum

Hypnum filicinum 61
filiforme 71
fluitans 78
fontinaloides 79
gracile 68
Halleri 3
Halleri ib.
heterophyll. 66
illecebi. 58, 69
intricatum 72
intricatum 76
lacunosum 63
longirostr. 76
loreum 66
lucens 56
lutescens 75
medium 67
molluscum 62
murale 76
muticum 58
myosuroides 69
mysorum ib.
nitens 59
palatinum 68
palustre 64
parietinum 59
pennatum 57
piliferum 75
plumosum 73
plumosum 74
polyanthes ib.

Hypnum polycarp. 70
praelongum 72
proliferum 59
proliferum ib.
prolixum 78
purum 58
purum ib.
ramosum 75
resuscens 59
riparioides 78
riparium 77
rivulare 78
ragosum 63
ruscifolium 77
ruscifolium 78
rutabulum 77
salebrosum 74
Schreberi 58
sciuroides 66
scorpioides 63
sericeum 74
serpens 71
splendens 59
squarrosum 65
squarrosum 64
stellatum 65
striatum 75
strigosum 76
subtile 70
sylvaticum 56
taxifolium 55

INDEX.

Hypnum <i>trichodes</i>	59	Jungerm. epiph.	92
<i>trichomanoid.</i>	56	<i>excisa</i>	81
<i>triquetrum</i>	59	<i>furcata</i>	91
<i>umbratum</i>	ib.	<i>julacea</i>	82
<i>uncinatum</i>	62	<i>lanceolata</i>	88
<i>undulatum</i>	57	<i>multifida</i>	91
<i>undulatum</i>	ib.	<i>multifida</i>	90
<i>velutinum</i>	73	<i>nemorosa</i>	85
<i>viticulosum</i>	67	<i>pallescent</i>	87
<i>viviparum</i>	69	<i>pinguis</i>	91
Hypoxylon <i>locul.</i>	137	<i>platyphylla</i>	87
I.		<i>polyanthos</i>	88
Isidium <i>Westr.</i>	129	<i>pubescens</i>	91
<i>frigidum</i>	169	<i>pulcherrima</i>	85
Isoetes <i>lacustris</i>	2	<i>pusilla</i>	90
Jungermannia	81	<i>pusilla</i>	ib.
<i>albicans</i>	84	<i>quadrident.</i>	89
<i>alpina</i>	80	<i>quinguedent.</i>	ib.
<i>angulosa</i>	90	<i>radicans</i>	87
<i>asplenioides</i>	87	<i>reptans</i>	86
<i>barbata</i>	89	<i>resupinata</i>	81
<i>bicornis</i>	ib.	<i>scalaris</i>	89
<i>bicuspidata</i>	ib.	<i>setiformis</i>	82
<i>bidentata</i>	ib.	<i>sphagni</i>	88
<i>complanata</i>	85	<i>supina</i>	86
<i>concinna</i>	82	<i>tamariscifol.</i>	ib.
<i>ciliaris</i>	84	<i>Tomentella</i>	85
<i>ciliaris</i>	85	<i>tomentosa</i>	91
<i>dilatata</i>	85	<i>Trichomanis</i>	90
<i>emarginata</i>	81	<i>trichophylla</i>	82
		<i>trilobata</i>	87
			Junger-

INDEX.

Jungerm.	undul.	85	Lichen	aculeatus	142
	viticulosa	88		adustus	145
	K.			aggregatus	131
				alabastrin.	168
				albellus	171
Kahlmund		27		albescens	165
Kandelwisch		2		albido-caes.	172
Koelreutera		51		albo - ater	193
Korallenflechte		128		albo-caerul.	189
				albo-flavesc.	170
	L.			albo-incarn.	176
				aipolius	152
Leersia ciliata		27		allochrous	153
	lanceolata	31		ambiguus	155
	vulgaris	27		ambiguus	152
Leskia attenuata		67		amplissimus	106
	longifolia	75		amylaceus	194
	marchica	54		androgynus	173
	paludosa	64		angulosus	171
	polyantha	74		angustatus	153
	polycarpa	70		annulatus	189
	sericea	75		anthracinus	110
	subtilis	70		antiquitatis	187
	trichoman.	57		aphthosus	107
	vivipara	69		aquaticus	148
Lepra farinosa		171		arcuatus	197
	lutescens	195		arenarius	134
	candelaris	198		arenarius	178
	sulphurea	199		arg.-fuscus	181
Lichen abietinus		193		articulatus	153
	Acetabulum	147		atro - albus	182

INDEX.

Lichen attenuat.	125	Lichen calcivorus	187
<i>ater</i>	183	<i>calycaris</i>	139
<i>atratus</i>	183	<i>cancriformis</i>	171
<i>atro-cinereus</i>	ib.	<i>candelaris</i>	159
<i>atro-sang.</i>	192	<i>candicans</i>	164
<i>atro-virens</i>	200	<i>candidus</i>	ib.
<i>atro-virens</i>	196	<i>candidus</i>	163
<i>argillosus</i>	102	<i>canescens</i>	165
<i>aurantiacus</i>	178	<i>caninus</i>	106
<i>aurellus</i>	197	<i>caperatus</i>	148
<i>aureo-cerin.</i>	179	<i>capitellatus</i>	194
<i>auriculatus</i>	98	<i>carnosus</i>	161
<i>badius</i>	182	<i>centrifugus</i>	154
<i>Baeomyces</i>	176	<i>ceranoides</i>	116
<i>barbatus</i>	132	<i>cerinus</i>	179
<i>bicolor</i>	135	<i>chalybeif.</i>	135
<i>biuncialis</i>	116	<i>cicatricosus</i>	134
<i>botrytes</i>	128	<i>ciliaris</i>	144
<i>Botrytis</i>	105	<i>ciliatus</i>	104
<i>bracteatus</i>	169	<i>ciliatus</i>	155
<i>brunneus</i>	167	<i>cinereo-ater</i>	182
<i>bryophilus</i>	164	<i>cinereus</i>	185
<i>byssinus</i>	105	<i>cinereus</i>	194
<i>byssinus</i>	197	<i>circinatus</i>	157
<i>caelatus</i>	166	<i>cirrosus</i>	113
<i>caesio-rufus</i>	178	<i>citrinus</i>	138
<i>caesius</i>	156	<i>citrinus</i>	198
<i>caerulescens</i>	188	<i>citrinus</i>	165
<i>caerulescens</i>	ib.	<i>citricolorus</i>	138
<i>ealcarius</i>	• 185	<i>clausus</i>	177

Lichen

INDEX.

Lichen coccineus	123	Lichen crispus	101
<i>coccineus</i>	198	<i>cristatus</i>	124
<i>cochleatus</i>	99	<i>cristatus</i>	101
<i>concolor</i>	159	<i>cristatus</i>	100
<i>condensatus</i>	130	<i>cruentus</i>	198
<i>confinis</i>	ib.	<i>cucullatus</i>	143
<i>confluens</i>	184	<i>cupularis</i>	176
<i>conglomer.</i>	102	<i>cyanescens</i>	189
<i>conglomer.</i>	174	<i>decipiens</i>	162
<i>contiguus</i>	184	<i>deauratus</i>	166
<i>contortus</i>	186	<i>decolorans</i>	177
<i>coracinus</i>	183	<i>deformis</i>	120
<i>corallinoid.</i>	129	<i>delicatus</i>	127
<i>corallinus</i>	ib.	<i>dendriticus</i>	168
<i>corniculatus</i>	141	<i>denticollis</i>	125
<i>corniculatus</i>	105	<i>detritus</i>	172
<i>cornucop.</i>	128	<i>densus</i>	110
<i>cornutus</i>	119	<i>dichotomus</i>	134
<i>coronatus</i>	125	<i>denudatus</i>	141
<i>coronatus</i>	175	<i>diffusus</i>	156
<i>corrosus</i>	111	<i>diffusus</i>	155
<i>corrugatus</i>	147	<i>diffusus</i>	156
<i>corrugatus</i>	112	<i>digitatus</i>	124
<i>crassiformis</i>	160	<i>dilaceratus</i>	140
<i>crassus</i>	ib.	<i>dilatatus</i>	126
<i>crenulatus</i>	101	<i>discoideus</i>	170
<i>cretacens</i>	185	<i>dispersus</i>	189
<i>cribellum</i>	111	<i>divaricatus</i>	134
<i>crinitus</i>	112	<i>dubius</i>	156
<i>crispatus</i>	100	<i>effusus</i>	174

INDEX.

Lichen elongatus	119	Lichen flavus	198
elveloides	162	flocculosus	110
encaustus	154	floridus	133
endivifol.	128	fluviatilis	148
epigeius	164	foliaceus	123
erosus	111	fragilis	131
escharoides	194	fraudulent.	149
exanthem.	177	fraxineus	138
exilis	121	frigidus	168
extensus	123	frondosus	199
fagineus	170	lucinus	142
fahlunensis	154	fucoides	ib.
fallax	149	fulgens	165
farinaceus	139	fuliginosus	109
farinosus	171	fulvus	198
fascicularis	102	fumosus	190
fascicularis ib.		furcato-sub	115
fasciculatus	190	furcatus	ib.
fastigiatus	140	furc. - rad.	120
ferrugineus	177	furcellatus	118
Fibula	127	surfuraceus	144
fimbriatus	104	fusco - ater	181
fimbriatus	122	fusco - rub.	175
flaccidus	133	fusco - rub.	176
flavescens	159	fuscus	127
flavidus	137	fuscus	181
flavo - rub.	178	fuscus	154
flavo - vir.	179	geographic.	199
flavo - vir.	197	gelidiform.	162
flavo - fusc.	130	gilvus	179

Lichen

INDEX.

Lichen glaber	109	Lichen hypnor.	166
<i>glaucescens</i>	100	hypnorum	ib.
<i>Glaucoma</i>	172	immersus	187
<i>glaucus</i>	149	implexus	134
<i>globiferus</i>	131	impolitus	172
<i>glomulifer</i>	148	impressus	186
<i>gracilis</i>	119	incanus	121
<i>grandis</i>	148	incoloratus	177
<i>graniformis</i>	106	incurvus	157
<i>granulosus</i>	99	intricatus	136
<i>granulosus</i>	173	irregularis	125
<i>griseo-ater</i>	182	islandicus	143
<i>griseus</i>	167	jubatus	134
<i>grisens</i>	111	<i>Jungermann.</i>	179
<i>grumosus</i>	188	<i>juniperinus</i>	145
<i>guttatus</i>	192	<i>Koenigii</i>	188
<i>gypsophilus</i>	162	<i>lacteus</i>	169
<i>Haematomm.</i>	198	<i>laciniatus</i>	100
<i>herbaceus</i>	147	<i>lacinosus</i>	147
<i>hippotrichod.</i>	137	<i>lanatus</i>	136
<i>hispidus</i>	151	<i>laneus</i>	135
<i>hirsutus</i>	112	<i>laqueatus</i>	160
<i>hirsutus</i>	113	<i>lentigerus</i>	164
<i>hirtus</i>	133	<i>leucophaeus</i>	173
<i>holocarpus</i>	179	<i>limitatus</i>	192
<i>horizontalis</i>	107	<i>lobatus</i>	105
<i>humosimilis</i>	190	<i>lobatus</i>	150
<i>humosus</i>	191	<i>luteolus</i>	175
<i>hyperboreus</i>	110	<i>lutescens</i>	195
<i>hybridus</i>	119	<i>macilentus</i>	126

Lichen

INDEX.

Lichen maculif.	195	Lichen ocellatus	186
<i>madraeporif.</i>	129	<i>ocellulatus</i>	185
<i>madraeporif.</i>	117	<i>ochroleucus</i>	158
<i>marginalis</i>	123	<i>obscurus</i>	155
<i>marginalis</i>	101	<i>obscurus</i>	101
<i>marmoreus</i>	176	<i>ochroleucus</i>	157
<i>marmoreus</i>	187	<i>oculatus</i>	129
<i>melanocarp.</i>	131	<i>Oederi</i>	188
<i>melanocarp.</i>	164	<i>olivaceus</i>	192
<i>mesenterif.</i>	112	<i>olivaceus</i>	150
<i>microphyllus</i>	167	<i>omphalodes</i>	145
<i>miniatus</i>	158	<i>omphalodes</i>	153
<i>molariformis</i>	117	<i>orbicularis</i>	155
<i>multifidus</i>	157	<i>orbiculatus</i>	170
<i>multiflorus</i>	167	<i>ostreatus</i>	163
<i>multipunct.</i>	154	<i>pallescens</i>	49
<i>multipunctus</i>	185	<i>pallesc.</i>	171 196
<i>muralis</i>	157	<i>pallescens</i>	156
<i>murorum</i>	158	<i>pallide fusc.</i>	181
<i>muscorum</i>	191	<i>pallidus</i>	171
<i>muscorum</i>	164	<i>pallidus</i>	175
<i>myochrous</i>	99	<i>pamosus</i>	103
<i>nebulosus</i>	166	<i>pantherinus</i>	184
<i>niger</i>	129	<i>Papillaria</i>	117
<i>niger</i>	103	<i>papyraceus</i>	108
<i>nigricans</i>	143	<i>paradoxus</i>	163
<i>nivalis</i>	ib.	<i>parasiticus</i>	127
<i>nodulosus</i>	170	<i>parietinus</i>	150
<i>obliteratus</i>	178	<i>paschalis</i>	130
<i>ocellatus</i>	185	<i>patellatus</i>	147

Lichen

INDEX.

Lichen pellitus	113	Lichen Psora	156
Perellus	169	pubescens	136
perlatus	148	punctellus	156
pertusus	151	pulcher	98
pertusus	186	pullus	150
petraeus	184	pullus	154
pezizoides	166	pullus	112
phyllophorus	123	pulvinonarius	146
physodes	150	pulveraceus	153
pilularis	193	pulverulentus	152
pilularis	ib.	pulverulent.	153
pinastri	146	pulvinatus	104
plicatus	132	punctatus	185
plumbeus	146	punctatus	192
polyc.	159-160	punctiformis	193
polycarpus	102	purpurascens	187
polycephalus	126	pustulatus	111
polyceras	120	pyxidatus	121
polydactylos	106	quercifolius	149
polyphyllus	109	quercinus	ib.
polyrhizos	113	quernens	195
polytropus	196	quisquiliaris	150
populinus	140	racemosus	114
porphyrius	199	radiatus	120
prasinus	98	radiosus	157
proboscideus	112	ramulosus	151
prolifer	122	ramulosus	161
pruinatus	172	ramulosus	135
pruinosis	176	rangiferinus	114
prunastri	140	rangiformis	ib.

Lichen

INDEX.

<i>Lichen recurvus</i>	115	<i>Lichen simplex</i>	121
<i>ravidus</i>	180	<i>sordidus</i>	172
<i>resupinatus</i>	108	<i>spadicens</i>	142
<i>rimosus</i>	185	<i>spadochrous</i>	113
<i>rigidus</i>	112	<i>speciosus</i>	153
<i>rigidus</i>	134	<i>sphaeroides</i>	174
<i>rigidus</i>	142	<i>spinescens</i>	115
<i>rosellus</i>	176	<i>spinosus</i>	ib.
<i>rubellus</i>	174	<i>squamatus</i>	161
<i>ruber</i>	175	<i>squamosus</i>	125
<i>rufescens</i>	173	<i>squarrosus</i>	139
<i>rufescens</i>	107	<i>stellariiform.</i>	152
<i>saccatus</i>	147	<i>stellaris</i>	ib.
<i>salicinus</i>	197	<i>stillicidior.</i>	180
<i>salignus</i>	174	<i>stygius</i>	154
<i>sanguinarius</i>	192	<i>subfuscus</i>	180
<i>sanguinarius</i>	194	<i>subimbricat.</i>	157
<i>saturninus</i>	99	<i>subtilis</i>	105
<i>saturninus</i>	99	<i>subvirescens</i>	137
<i>saxatilis</i>	145	<i>subulatus</i>	118
<i>saxicola</i>	158	<i>subuliformis</i>	ib.
<i>scaber</i>	136	<i>sulphureus</i>	196
<i>scruposus</i>	186	<i>sylvaticus</i>	109
<i>semipinnatus</i>	151	<i>sylvaticus</i>	109
<i>semipinnatus</i>	ib.	<i>symphy carp.</i>	127
<i>sepincola</i>	145	<i>tartareus</i>	173
<i>serratus</i>	147	<i>tauricus</i>	118
<i>setosus</i>	137	<i>tegularis</i>	158
<i>silacens</i>	187	<i>tenuissimus</i>	142
<i>similaris</i>	163	<i>tenuissimus</i>	103

Lichen

INDEX.

Lichen tephrom.	183	Lichen velleus	114
<i>terebratus</i>	151	<i>venosus</i>	107
<i>tessellatus</i>	185	<i>ventosus</i>	198
<i>testaceus</i>	162	<i>ventricosus</i>	126
<i>tigrinus</i>	185	<i>vermicularis</i>	118
<i>tiliaceus</i>	149	<i>vernalis</i>	175
<i>tinctorius</i>	141	<i>verrucarius</i>	146
<i>tomentosus</i>	108	<i>verrucosus</i>	ib.
<i>toumentosus</i>	99	<i>versicolor</i>	157
<i>tremelloides</i>	104	<i>verticillatus</i>	122
<i>tristis</i>	142	<i>vesicularis</i>	163
<i>tubaeformis</i>	122	<i>vespertilio</i>	98
<i>tuberculosus</i>	ib.	<i>viridis</i>	191
<i>tuberculosus</i>	129	<i>viridi-flavesc.</i>	174
<i>tuberculosus</i>	170	<i>viridi-rufus</i>	179
<i>tumidulus</i>	ib.	<i>vitellinus</i>	197
<i>turbinatus</i>	161	<i>vulpinus</i>	138
<i>turgidus</i>	124	Lichenoid. ciliare	144
<i>uliginosus</i>	190	<i>corn. bronch.</i>	141
<i>ulmi</i>	176	<i>sulfuraceum</i>	144
<i>umbilicatus</i>	171	<i>hispidum</i>	151
<i>umbrino fusc.</i>	181	<i>islandicum</i>	143
<i>umbrinus</i>	ib.	Lobaria	138
<i>uncialis</i>	117	<i>Acetabulum</i>	147
<i>uncinatus</i>	116	<i>aculeata</i>	142
<i>upsaliensis</i>	168	<i>adusta</i>	145
<i>varians</i>	172	<i>aipolia</i>	152
<i>variabilis</i>	167-168	<i>ambigua</i>	155
<i>varius</i>	196	<i>angustata</i>	153
<i>velleus</i>	113	<i>aquatica</i>	148

Lobaria

INDEX.

Lobaria caesia	156	Lobaria muralis	157
<i>calycaris</i>	139	<i>nivalis</i>	145
<i>candelaris</i>	159	<i>olivacea</i>	150
<i>caperata</i>	148	<i>omphalodes</i>	145
<i>centrifuga</i>	154	<i>orbicularis</i>	155
<i>ciliaris</i>	144	<i>pallescent</i>	156
<i>ciliata</i>	155	<i>parietina</i>	150
<i>concolor</i>	159	<i>perlata</i>	148
<i>corniculata</i>	141	<i>physodes</i>	150
<i>crassiformis</i>	160	<i>pinastri</i>	146
<i>cucullata</i>	145	<i>polycarpa</i>	159
<i>denudata</i>	141	<i>populina</i>	140
<i>diffusa</i>	156	<i>prunastri</i>	ib.
<i>dilacerata</i>	140	<i>pulla</i>	154
<i>dubia</i>	156	<i>pulmonaria</i>	146
<i>fahl'ensis</i>	154	<i>pulveracea</i>	153
<i>fallax</i>	149	<i>pulverulenta</i>	152
<i>farinacea</i>	159	<i>radiosa</i>	157
<i>fraxinea</i>	158	<i>rigida</i>	142
<i>fuliginosa</i>	109	<i>saccata</i>	147
<i>fulva</i>	159	<i>saxatilis</i>	145
<i>furfuracea</i>	144	<i>saxicola</i>	158
<i>glauca</i>	149	<i>semipinnata</i>	151
<i>glomulifera</i>	148	<i>sepincola</i>	145
<i>herbacea</i>	147	<i>speciosa</i>	153
<i>hispida</i>	151	<i>squarrosa</i>	139
<i>incurva</i>	156	<i>stellariiformis</i>	152
<i>islandica</i>	143	<i>stellaris</i>	ib.
<i>juniperina</i>	145	<i>stygia</i>	154
Lobaria laqueata	160	<i>tegularis</i>	158
<i>miniata</i>	158	<i>tenuissima</i>	142

Lobaria

INDEX.

<i>Lobaria terebrata</i>	151	<i>Mnium androgyn.</i>	46
<i>tiliacea</i>	149	<i>annotinum</i>	49
<i>tinctoria</i>	141	<i>argenteum</i>	51
<i>verrucosa</i>	146	<i>bimum</i>	48
<i>versicolor</i>	157	<i>caespititium</i>	50
<i>Lycopodium</i>	15	<i>capillare</i>	ib.
<i>alpinum</i>	ib.	<i>carneum</i>	51
<i>annotinum</i>	ib.	<i>crudum</i>	48
<i>clavatum</i>	ib.	<i>cuspidatum</i>	52
<i>complanat.</i>	ib.	<i>ellipticum</i>	ib.
<i>denticulat.</i>	17	<i>fissum</i>	89
<i>helveticum</i>	ib.	<i>fontanum</i>	54
<i>inundatum</i>	16	<i>holosericeum</i>	51
<i>radicans</i>	ib.	<i>hornum</i>	48
<i>selaginoides</i>	ib.	<i>hygrometric.</i>	50
<i>selago</i>	ib.	<i>laterale</i>	54
M.		<i>marchicum</i>	53
<i>Marchantia</i>	92	<i>nutans</i>	49
<i>androgyna</i>	ib.	<i>osmundac.</i>	28
<i>hemisphaeric.</i>	ib.	<i>palustre</i>	47
<i>polymorpha</i>	ib.	<i>pellucidum</i>	30
<i>conica</i>	ib.	<i>Pohlia</i>	48
<i>Marsilea</i>	1	<i>pomiforme</i>	54
<i>natans</i>	ib.	<i>prolixum</i>	49
<i>Marsilie</i>	ib.	<i>pseudotrig.</i>	ib.
<i>Meesia longiseta</i>	47	<i>purpureum</i>	36
<i>uliginosa</i>	ib.	<i>pyriforme</i>	50
<i>Mnium</i>	46	<i>ramosum</i>	49
		<i>roseum</i>	53
		<i>rostratum</i>	52

INDEX.

<i>Mnium serpillif.</i>	52
<i>setaceum</i>	43
<i>squarrosum</i>	47
<i>stellare</i>	51
<i>Timmia</i>	53
<i>trichodes</i>	47
<i>Trichoman.</i>	90
<i>triquetrum</i>	47
<i>turbinatum</i>	49
<i>undulatum</i>	53

N.

Nabelflechte	109
Nadelschorf	94
Natterzunge	14
Neckera curtispind.	66
<i>pennata</i>	57
<i>pumila</i>	ib.
<i>viticulosa</i>	67

O.

Ohnmund	19
Onoclea	11
<i>crispa</i>	ib.
<i>sensibilis</i>	ib.
<i>spicant</i>	ib.
<i>struthiopteris</i>	ib.
Ophioglossum	14
<i>vulgatum</i>	ib.

<i>Orthotrichum</i>	25
<i>affine</i>	26
<i>anomalum</i>	25
<i>crispum</i>	ib.
<i>cupulatum</i>	26
<i>diaphanum</i>	ib.
<i>hercynicum</i>	25
<i>striatum</i>	ib.
<i>Osmunda</i>	14
<i>crispa</i>	11
<i>Lunaria</i>	14
<i>ramosa</i>	ib.
<i>regalis</i>	ib.
<i>spicant</i>	11
<i>struthiopt.</i>	ib.

P.

<i>Paludella</i>	47
<i>Patellaria candida</i>	164
<i>Perella</i>	169
<i>rubra</i>	175
<i>decolorans</i>	177
<i>ferruginea</i>	ib.
<i>cinereo-fusc.</i>	ib.
<i>cerina</i>	179
<i>serriposa</i>	186
<i>silacea</i>	187
<i>flavo-vir.</i>	197
<i>albo-caerulea</i>	189
<i>upsaliensis</i>	168
Patel.	

INDEX.

Patellaria varia	196	Pilularia	i
vitellina	197	globulifera	
muscorum	164	Placodium	155
nebulosa		Platisma aquatic.	148
vesicularis	163	caperatum	ib.
Peltigera ampliss.	106	denudatum	141
aphthosa	107	fallax	149
canina	106	fraxineum	138
horizontalis	107	sepincola	145
papyracea	108	Pohlia elongata	48
polydactyl.	106	Polypodium	4
rufescens	107	aculeatum	8
sylvatica	109	alpinum	10
tomentosa	108	angustatum	9
venosa	107	anthriscifol.	ib.
Phascum	19	appendiculat.	8
axillare	20	aristatum	ib.
crispum	ib.	Callipteris	6
curvicollum	ib.	canibricum	4
cuspidatum	19	cristatum	8
muticum	21	cynapifolium	9
nitidum	20	dentatum	7
patens	ib.	denticulatum	9
piliferum	19	dilatatum	7
serratum	20	Dryopteris	10
serratum	ib.	Filix femina	6
stoloniferum	ib.	Filix mas	ib.
subulatum	19	fontanum	10
velutinum	20	fragile	9
Pillenkraut	1	sumarioides	ib.

INDEX.

Polypodium incis.	7	Polytrich. urnig.	24
<i>Lonchitis</i>	4	<i>yuccaeifol.</i>	23
<i>Marantae</i>	5	Pottia cavifolia	27
<i>molle</i>	7	<i>curvirostra</i>	28
<i>montanum</i>	10	<i>eust. major</i>	27
<i>montanum</i>	5	- - <i>minor</i>	ib.
<i>Oreopteris</i>	ib.	<i>pyriformis</i>	28
<i>pedicularif.</i>	10	Psora	161
<i>Phegopteris</i>	5	<i>atabastrina</i>	168
<i>regium</i>	10	<i>albescens</i>	165
<i>rhaeticum</i>	ib.	<i>ambigua</i>	155
<i>rigidum</i>	6	<i>bracteata</i>	169
<i>tanacetifolium</i>	8	<i>brunnea</i>	167
<i>tenue</i>	9	<i>cuculata</i>	166
<i>Thelypteris</i>	5	<i>caesia</i>	156
<i>trifidum</i>	7	<i>candida</i>	164
<i>vulgare</i>	4	<i>canescens</i>	165
Polytrichum	23	<i>carnosa</i>	161
<i>aloides</i>	24	<i>citrina</i>	165
<i>commune</i>	23	<i>deaurata</i>	166
<i>ericoides</i>	24	<i>decepiens</i>	162
<i>hercynicum</i>	25	<i>dendritica</i>	168
<i>juniperifol.</i>	24	<i>epigeia</i>	164
<i>juniperifol.</i>	40	<i>frigida</i>	168
<i>juniperinum</i>	24	<i>gelidiformis</i>	162
<i>nanum</i>	ib.	<i>grisea</i>	167
<i>nanum</i>	25	<i>gypsophila</i>	162
<i>piliferum</i>	24	<i>hypnorum</i>	166
<i>subrotund.</i>	25	<i>lactea</i>	169
<i>undulatum</i>	40	<i>lentigera</i>	164

Psora

INDEX.

<i>Psora microphylla</i>	167	<i>Riccia bifurca</i>	95
<i>muralis</i>	158	<i>glauca</i>	ib.
<i>muscorum</i>	164	<i>pyramidata</i>	96
<i>nebulosa</i>	166	<i>fluitans</i>	ib.
<i>ostreata</i>	163	<i>canaliculata</i>	ib.
<i>paradoxa</i>	ib.	<i>natans</i>	ib.
<i>pezizoides</i>	166	<i>pellucida</i>	ib.
<i>saxicola</i>	158	Rollfarn	12
<i>similaris</i>	163		
<i>squamata</i>	161	S.	
<i>testacea</i>	162		
<i>turbinata</i>	161	<i>Salvinia</i>	1
<i>upsaliensis</i>	168	<i>natans</i>	ib.
<i>variabilis</i>	167	<i>Salvinie</i>	ib.
<i>vesicularis</i>	163	<i>Sammfarn</i>	11
<i>Pteris</i>	11	<i>Schildflechte</i>	106
<i>aquilina</i>	12	<i>Schorfflechte</i>	161
<i>Pterigynand. filif.</i>	71	<i>Scolopendrium</i>	14
<i>gracile</i>	68	<i>Sphagnum</i>	21
<i>Pulmonaria lobat.</i>	147	<i>acutifolium</i>	22
<i>reticulata</i>	146	<i>cuspidatum</i>	ib.
<i>verrucosa</i>	ib.	<i>intermedium</i>	ib.
		<i>obtusifolium</i>	21
R.		<i>tenellum</i>	22
<i>Riccia</i>	94	<i>Sphaeria byssacea</i>	104
<i>minima</i>	ib.	<i>Splachnum</i>	ib.
<i>ciliata</i>	95	<i>ampullaceum</i>	23
<i>minoriformis</i>	ib.	<i>froelichian.</i>	ib.
<i>cavernosa</i>	ib.	<i>ligulatum</i>	ib.
		<i>sphaericum</i>	22

INDEX.

Splachnum tenue	23	Timmia megapol.	53
<i>vasculosum</i>	22	Torfmoos	21
Squamaria centr.	154	Tortula tortuosa	46
<i>fahinnensis</i>	ib.	Traubenfarn	14
<i>juniperina</i>	145	Trentepohlia	17
<i>pinastri</i>	146	<i>erecta</i>	ib.
<i>pulla</i>	154	Trentepohlie	ib.
<i>pulverul.</i>	152	Trichost. angustat.	40
<i>stygia</i>	154	<i>canescens</i>	41
Stanimoos	50	<i>elongatum</i>	ib.
Stereocaulon	128	<i>ericoides</i>	ib.
<i>condensat.</i>	150	<i>fasciculare</i>	42
<i>confine</i>	ib.	<i>fontinal.</i>	79, 80
<i>Corallina</i>	129	<i>heterostich.</i>	40
<i>corallinoides</i>	ib.	<i>lanuginos.</i>	41
<i>fragile</i>	151	<i>pallidum</i>	43
<i>globiferum</i>	ib.	<i>pusillum</i>	ib.
<i>madraepor.</i>	129	<i>ramigerum</i>	41
<i>paschale</i>	150	<i>serratum</i>	ib.
<i>quisquiliare</i>	ib.	Tristichis	47
Sternmoos	46	Tubercular. fusca	127
Strichfarn	12	<i>parasitica</i>	ib.
Strunkflechte	114	Tüpfelfarn	4
Swartzia capillac.	42		

T.

Targionia	93
<i>hypophylla</i>	ib.
Tetraphis	50
<i>pellucida</i>	ib.

U.

Umbilicaria	109
<i>anthracina</i>	110
<i>cirrosa</i>	115
<i>corrugata</i>	112
<i>crinita</i>	ib.
Umbi-	

Umbilicaria erosa 111

flocculosa 110*grisea* 111*hirsuta* 112*hyperborea* 110*polyphylla* 109*pustulata* 111*rigida* 112*spadocirca* 113*vellea* ib.

Usnea 132

articulata 133*barbata* 132*bicolor* 135*chalybeif.* ib.*dichotoma* 134*flaccida* 133*florida* ib.*hippotrich.* 137*hirta* 133*implexa* 134*intricata* 136*jubata* 134*lanata* 136*lanea* 135*ochroleuca* 137*plicata* 132*pubescens* 136*ramulosa* 135*vulpina* 138

V.

Verrucaria 169

abietina 193*albella* 171*albo-atra* ib.*albo-caerul.* 189*amylacea* 194*angulosa* ib.*annulata* 189*arcuata* 197*arenaria* ib.*argent.-fusc.* 181*atra* 183*atrata* ib.*atro-alba* 182*atr. sanguin.* 192*atro-virens* 199*aurantiaca* 187*aurella* 197*aureo-cerina* 179*badia* 182*byssina* 197*caerulescens* 188*caesio-rufa* 178*calcuria* 185*calcivora* 187*cancriformis* 171*capitellata* 194*cerina* 179

Verruc. cicâtricos.	184	Verruc. fusco-atra	181
<i>ciner. atra</i>	182	<i>fusco-rubel.</i>	175
<i>citrina</i>	198	<i>frondosa</i>	199
<i>clausa</i>	177	<i>geographica</i>	199
<i>confluens</i>	184	<i>gilva</i>	179
<i>conglomer.</i>	174	<i>glaucoma</i>	171
<i>contigua</i>	ib.	<i>granulosa</i>	175
<i>contorta</i>	186	<i>griseo-atra</i>	182
<i>coracina</i>	183	<i>grumosa</i>	188
<i>coronata</i>	175	<i>guttata</i>	192
<i>cruenta</i>	198	<i>Haematom.</i>	198
<i>cupularis</i>	176	<i>holocarpa</i>	179
<i>cyanescens</i>	189	<i>humosa</i>	191
<i>decolorans</i>	177	<i>humosimilis</i>	190
<i>dendritica</i>	168	<i>immersa</i>	187
<i>detrita</i>	172	<i>impolita</i>	172
<i>discoidea</i>	170	<i>incolorata</i>	177
<i>dispersa</i>	189	<i>Jungerman.</i>	179
<i>effusa</i>	174	<i>limitata</i>	192
<i>escharoides</i>	194	<i>lutescens</i>	195
<i>faginea</i>	170	<i>maculiform.</i>	195
<i>farinosa</i>	171	<i>multipuncta</i>	185
<i>fasciculata</i>	190	<i>muscorum</i>	191
<i>ferruginea</i>	177	<i>nodulosa</i>	170
<i>flava</i>	198	<i>oblitterata</i>	178
<i>flavo-fusca</i>	180	<i>ocellata</i>	183
<i>flavo-viresc.</i>	197	<i>ocellulata</i>	ib.
<i>fulva</i>	198	<i>Oederi</i>	188
<i>fumosa</i>	190	<i>olivacea</i>	192
<i>fusca</i>	181	<i>orbiculata</i>	170

Verru-

INDEX.

<i>Verrucaria pallid.</i>	171	<i>Verrucar. tigrina</i>	185
<i>pallide fusc.</i>	181	<i>tuberculosa</i>	170
<i>pantherina</i>	184	<i>tumidula</i>	ib.
<i>Perella</i>	169	<i>uliginosa</i>	190
<i>petraea</i>	184	<i>umbilicata</i>	171
<i>pilularis</i>	193	<i>umbr.-fusca</i>	181
<i>polytropia</i>	196	<i>varia</i>	196
<i>porphyria</i>	199	<i>vernalis</i>	175
<i>punctata</i>	192	<i>viridis</i>	191
<i>punctiform.</i>	193	<i>viridi-rufa</i>	179
<i>purpureasc.</i>	187	<i>vitellina</i>	197
<i>quernea</i>	195	<i>Vieltheil.Flechte</i>	138
<i>ravida</i>	180	<i>Vierzahn</i>	30
<i>rosella</i>	176		
<i>rubra</i>	175		
<i>rubella</i>	174		
<i>rufescens</i>	173		
<i>rugulosa</i>	170		
<i>rupestris</i>	187		
<i>salicina</i>	197		
<i>sanguinaria</i>	194		
<i>scruposa</i>	186		
<i>silacea</i>	187		
<i>stillicidior.</i>	180		
<i>subfusca</i>	ib.		
<i>sulphurea</i>	196		
<i>tartarea</i>	173		
<i>tessellata</i>	185		

ADDENDA ET EMENDANDA.

AUCTORES BOTANICI.

- Acharius, Er. Lichenes — in Kon. Vet. Acad.
nya Handl. 15. 1794. 16. 1795.
Andrew's Engravings of Heaths — Lond. Fol. 1795.
Bartalini, B. Catal. delle piante — 8. Siena, 1776.
Bauer, Fr. Delineat. of exotick plants — Fol.
Lond. 1796.
Bolten, I. Fibic. brit. 2. Vol. 4. Lond. 86-90.
Borkhausen M. B. Flora der ob. Grafsch. Ca-
tzenelenbogen, in Rhein. Mag. 1 B. 1795.
Coyte's, D. Hortus bot. gippovicensis — Lond.
4. 1796.
Davies, H. Descript. of four new brit. Lichen's
— in Trans. lin. 2. 126.
Forsyth, W. A botanical nomenclator — 8.
Lond. 1794.
Frölich, I. A. De gentiana — 8. Erl. 1796.
Goodenough, S. Observat. on the brit. spec. of
Carex — in Trans. lin. 2. 126.
Haworth's Observations on the Genus Mesem-
bryanthemum — 8. Lond. 1794.
Hoy, T. and I. Fairbairn, an acc. of two new
Gen. of Plants — in Trans. lin. 2. 346.

Kun.

ADDENDA ET EMENDANDA.

- Klingsohr, J. G. W. de Geoffroea inermi Erl. 1789.
 Kunze, C. S. H. Deutschl. crypt. Gewächse —
 8. Hamb. 1796.
 Lée's introduction to Botany — Ed. 5. 3. Lond.
 1794.
 Lindsay's, I. Acc. of the Germin. and Raif. of
 Ferrins from the Seed — in Trans. lin. 2. 93.
 Maerter, I. F. Verzeichn. der östr. Bäume —
 8. Wien 1796.
 Magaz. des Pflanzenreichs — 5. Erl. 1795.
 Maratti — nuova Raccolt. d'opuscoli scientif. e
 filolog. 12. Ven. 1770. T. 20.
 Micheaux —
 Miller, I. F. Cimelia physica — Fol. Lond. 1796.
 Moser, H. C. Deutschl. ökonomische Flora —
 8. Leipz. 1796.
 Oestreichs Flora — 8. Wien, 1794.
 Pulteney, R. Descript. of a min. epiphyl. Lycop. — in Trans. lin. 2. 305.
 Relhan — 93.
 Retz, A. I. Flor. scand. — Ed. 2. 3. Lips. 1795.
 Röhling, I. C. Deutschl. Flora — 8. Brem. 1796.
 Römer, I. I. Garten-Encyklop. 4. Tub. 1796.
 Rousseau and Mart. Letters on Bot. — Ed. 4.
 8. Lond. 1794.
 Roxburgh, W. Plants of the Coast of Coromandel. Fol. Lond. 1795.
 Russel, Al. — Ed. 2. 4. Lond. 1794.

Sower.

ADDENDA

- Sowerby's coloured Figures of english Fungi
— Fol. Lond. 1796.
- Sibthorp, I. Flora oxoniensis. 8. Oxon. 1794.
- Stackhouse, I. Nereis britannica — Fol. Lond.
1795.
- Stillingfleet's, Miscellan. Tracts; — Ed. 4. 8;
Lond. 1794.
- Stöver — Ed. angl. by Trapp. 4. Lond. 1794.
- Teesdale's, R. Plant. eborac. — in Trans. lin.
2. 103.
- Velley, T. Plant. marit. icon. pict. Fol. Bat-
thon. 1795.
- White, G. Naturalist's Calendar — 8. Lond. 1795.
- Willemet, D. Flora mauritiana inch. 8. Lips.
1796.
- Wytttenbach, I. I. A. v. Haller icones plantar.
Helvet. Fol. Bern. 1795.
-

IN PRAEFAT.

- P. 1. l. 10. lege denselben
- P. 3. — 1. — — wie in der Ordnungsfolge —
— — 6. — — größere
— — 16. — — Gattungsnahmen
- P. 4. l. 2. leg. Lich. miniatus Lin. loco pruinatus.
- P. 5. l. 14. — — ich sahe mich genöthiget jene —
-

- P. 2. l. 23. *Equiset. fluv. del. Bolt. fil. 36.*
- P. 3. l. 27. — — *Telmateja, ad. Bolt. fil. t. 36.*
 (Equis. fluviale) — *Equis. eburneum Schreb.*
Hoppe herb. viv. l. 2. 96.) In paludosis prope
Gott. Dorste Pers.
- P. 5. l. 4. ad. *Bolt. fil. t. 43. (Acrost. Thelypt.)*
 — — 21. ad. *Mag. d. Pfl. r. i. T. 1, 2. (Pol.*
Oreopteris.)
- P. 6. l. ult. ad. obs. fronde utrinque pyramidata,
 pinnis inferioribus sensim brevioribus.)
- P. 7. l. 8. ad. obs. A sequenti differt fructificata,
 hand confluentibus. Var. fronde angustiore.)
 — — 19. Post trifidis ins. dente intermedio pro-
 minente incurvo.
 — — 21. ad. obs. Occurrit fructificat. biseriatis
 angustis minoribus; pinnulis sessilibus; fron-
 de variat angustiore.
 — — ult. ad. pinnulis pedicellatis.
- P. 8. l. 8. ad. Var. crispa.)
- — l. 29. P. appendiculat. ad. P. lobatum *Huds.*
angl. 2. 459.
- P. 9. l. 16. P. anthriscifol. ad. obs. H. vid. l. P.
rhaeticum Bolt. fil. t. 45.
- P. 12. Asplen. Rut. mur. ad. obs. occurrit varie-
 tas frondibus et foliolis multo angustioribus.)
- P. 10. ad. . 28. *Polypodium robertianum*, fron-
 de triangulari, foliolis ternis bipinnatis: pin-
 nis pinnulisque inferne pinnatifidis.

ADDENDA

- In montosis, rupestribus. Inn. (Gott. — Polypod. Dryopt. simile. Stipes glaucus uno latere sulcatus. Frons tenera. Uterque nudo oculo subtili tomento, ad lentem brevissimis glandulis obsitus. Odor debilis Geran. robert. Fructif. minuta.)
- P. 14. A. Scolopendr. ad. Erford. *Bernhardi*.
- P. 17. Trentepohlia ad. Hercyn.
- P. 19. Phasc. cuspid. ad. var. minor.
- P. 20. — — patens, ad. .
- — — nitid. ad. obs. A Ph. subulato statura minori caute distinguendum.)
- P. 21. Buxb. foliosa, ad. Webera Diphyscium *Elrh. Beitr. 1. 177.*
- P. 22. Splachn. sphaericum, ad. obs. A sequenti . longiore seta e longinquo distinguendum.)
- P. 23. Polytr. Yuccaeifol. ad. foliis basi decurrentibus, caule longissimo, etiam prolifero, rarius ramoso occurrit.)
- P. 24. l. 10. leg. caule.
- P. 27. Encal. vulg. ad. Br. extensorium L.
- — — ciliat. ad. obs. Priori statura major.)
- — ins. . ii. Gymnostomum *pulvinatum*, foliis ovatis concavis superioribus piliferis; capsulis sessilibus terminalibus operculo minimo.

In rupestribus (Gött. — Autumno, Vere. Br. pulvinato caespitulis, apocarpio capsulis simile.)

— — — — truncat. ad. Autumno.

— — — — ovat. ad. Var. minor.)

P. 31. Br. recurvatum, del. .

— — lanceolat. ad. Var. minor brevicaulis.)

P. 33. l. 16. ad. et operculo obtuso.

P. 34. controversum, ins. caps. suberectis, operculis obliquis.

P. 35. l. 16. aquatic. ad. . — ad aquas puras, rivulos scaturientes (Gott. Heyder.) Autumno. Colore pallidiore, capsulis et foliis brevioribus facile a seq. distinguitur.)

— — — ins. Br. *crispum*, capsulis obliquis, foliis subulatis basi dilatatis undulatis demum tortilibus, cauliculis erectis Schreb. *spic.* 1033.

Ad fossas (Lips. Schreb. —)

P. 37. l. 17. Br. aciculare, leg. nigricantibus. Hedw. *Musc.* 3. t. 33.

P. 41. l. 12. leg. foliis confertis integris.

P. 42. ins. Br. *aciculariforme*, caule ramisque erectis fastigiatis, foliis lanceolatis margine revolutis - patulis; capsulis ovato-oblongis. Dill. *Musc.* t. 47. fig. 30

In montosis (Hercyn. Rehberg. Ehrh. a Br. aciculari diversum: perist. dentibus capillari-bus ad basin usque fissis erectis. Dill. cit. fig. potius

potius hoc, quam Br. fastigiatum indicare videtur.)

P. 43. Br. Didymodon ad. — *Hedw. Musc.* 1: t. 23.

— — pallidum ad. — (Gott. Heyder.)

P. 44. l. 23. leg. superius.

P. 47. l. 10. ad. (Br. squarrosus.)

P. 48. Mn. Polilia, ad. — (Gott. Heyder.)

— — bimum, ad. —

P. 50. l. 5. loco dedit lege depinxit.

P. 50. l. 15.) leg. pedunculis.

— — sypu. bryoides, ad. obs. Iisdem in locis Gott. peculiaris occurrit omnibus partibus longe minor ac constanter tenerior andicam species? — multis modis conveniens cum *Piss. palmata*, trunculo brevissimo subdecumbente, foliis scalpelliformibus acutis, pinnatim divaricatis, thecis cernuis *Hedw. Musc.* 4. t. 80. fig. 1.)

P. 56. l. 16. leg. Bulbilli.

— — H. sylvaticum, leg. *Dill. Musc.* t. 54. fig. 6. *Iluds. angl.* 2. 94. ad. Obs. In H. denticulato meo folia ad lentem lanceolata, longe acuminata, reticuli areolae parallelae; in H. sylvatico, folia ovata acuta, reticuli areolae laxae disjunctae. Nervus foliorum brevis apice bifidus.)

P. 58. l. 13. leg. pinnatis.

P. 60. l. 5. leg. absque.

P. 62. l. 17. ins. Autumno.

P. 63. Hypn. uncinatum, ad. Hercyn. Oderbr. —
magnitudine variabili; surculis etiam pin-
natis.)

P. 65. Hypn. stellatum, ad. (Hercyn. Ehrh.)
— — l. 31. leg. patulis.

P. 67. l. 1. ins. Autumno, Vere.

— — — Hypn. attenu. ad. — Autumno.

P. 68. l. 4. leg. collectum.

P. 69. l. 4. — Francon.

— — ins. — Hypn. gracile, caule repente surcu-
lis erectis ramisque fasciculatis recurvis tereti-
bus; capsulis oblongis erectis. Hedw. musc.
4. t. 6. (Pterigynandr. gracile.)

In montosis (Hercyn. Eggeberg. Ehrh. —
Folia ovato-lanceolata apice denticulata.)

P. 71. Hypn. filiforme ad. — Heroyn.

P. 73. l. 20. leg. vage.

P. 74. l. 10. leg. natalem.

P. 76. l. 26. leg. ab.

P. 77. ins. — Hypn. stramineum, surculis erectis
filiformibus subramosis, foliis ovato-lanceola-
tis nervibus imbricatis Dicks. fasc. crypt. 1.
6. t. 1. fig. 9.

In locis paludosis (Hercyn. Hamoy. Ehrh.)

ADDENDA

P. 77. ins. Hypn. *illecebrum*, surculis ramisque vagis teretibus erectiusculis obtusis Schreb. *spic.* 1066. *Dill. Musc. t.* 40. *fig.* 46.

In aggeribus pratis (Lips. Schreb. Setae brevses uncia non longiores ut plurimum curvae l. c. — a me nondum observatae.)

P. 78. Hypn. *fluitans*, ad. obs. setis longissimis glabris, capsulis oblongis incurvis, peristom. dent. duplici serie, caute ab adunco distinguendum.)

P. 83. l. 12. leg. surculis.

— — l. 16. leg. hujus loci.

P. 85. l. 28. leg. ut in sequente (Jung. *tamariscifolia*.)

P. 86. l. 9. leg. truncis.

P. 87. leg. *Frondeb. pinnatis, foliolis integris vel divisis.*

— — Jung. *pallens*, ex hac subdivisione in antecedentem est transferenda.

P. 88. l. 22. Jung. *Sphagni*, ad. obs. Folia fuscolutescentia.)

P. 89. — — leg. dentatis.

P. 90. l. 27. leg. species.

P. 93. l. 19. leg. fibrillosae — adglutinatae.

P. 94. l. 4. ins. A.

P. 96. l. 3. leg. minima.

— — 25. — cavernosae.

P. 98.

P. 98. lin. ult. ins. vix diaphana.

P. 99. lin. 10. ad. Lich. flaccidus, gelatinosus,
fol. membranaceis laxis obtuse lobatis atro-
viridibus, scutellis sparsis concoloribus *Achar.*
Vet. Acad. Handl. 16. t. 1. fig. 4. medius quasi
inter hoc et Coll. Vespertil. — rupestris.)

— — 1. 15. ad. Gott.

— — 1. 25. ins. Lich. discolor *Achar.* l. c. t. 1.
fig. 5.)

P. 100. l. 10. leg. scutellis.

— — 1. 17. ad. H. 1. Lich. marginalis *Achar.*
l. c. 8.

— — 1. 25. leg. fusco - sanguin.

P. 101. l. 20. leg. C.

P. 102. l. ult. — discoideis.

P. 104. ius. . *Collema sinuatum*, imbricatum
sinuato - laciniatum truncatum denticulatum;
scutellis concoloribus. *Dill. Musc.* t. 19. f. 33.

In terra, ad lapides.

P. 105. l. 13. ad. H. 1. Lich. tenax *Achar.* l. c.
T. 1. fig. 1.

P. 110. l. 7. leg. irrigatae.

— — lin. penultima leg. v. *hyperborea*,

P. 111. — antepenultima leg. ex.

P. 129. leg. *Tuberculosa*.

P. 131. l. 7. ad. obs. Iisdem in locis collecta a
cel. *Smith*, vid. *Sketch*, vol. 2. 113.)

P. 132. l. 15. leg. variis *Enr.*

ADDENDA

- P. 134. l. 20. del. cum.
 P. 139. l. 16. ad. Lich. pollinarius *Westr. Kongl. Vet. Handl.* 16. 56.
 P. 145. l. 12. ad. Saltem ut subspecies a L. saxatili distinguenda.)
 P. 146. l. 3. ad. 18.
 P. 147. l. 16. leg. *Acetabulum*.
 P. 151. l. 8. ad. Saltem ut subspecies a L. phys. distinguenda.)
 P. 163. l. 21. leg. glebulosae.
 P. 172. l. 10. — *Glaucoma*.
 P. 173. l. 1. — glebulosae.
 P. 179. — — glebulosa.
 — — 16. ad. Saltem ut subspecies à priori distinguenda.)
 P. 182. l. 17. leg. granuloso-rimosa.
 P. 184. l. 19. ad. H. 1. Lich. concentricus *Davies*, in *Trans. lin.* 2. 284.
 — — 1. 22. del. nigris.
 P. 190. l. 19. leg. distinguendae.
 P. 192. l. 17. ad. disco elabente scrobiculatae.)
 P. 194. lin. ultima leg. microscopium.
 P. 200. l. 5. del. adnatis.

P. 39. ins. Jung. *bicrenata*, fronde simpliciter pinnata: foliolis conniventibus bidentatis; apice capaulifera. Schmid. icon. t. 64. fig. 1.

ET EMENDANDA.

In umbrosis rupestribus, ad terram. (Fron-
des breves terrae affixae, perianthia foliolis
plicatis cincta. Inter hanc Jung. *bifida* oc-
currit minutissima, perianthio subquadrifido
plicato angulato l. c. fig. 2. depicta, a me non-
dum observata.)

P. 89. Jung. *bicuspidata* ad. Obs. Schmid. cit.
fig. a Dillenii et meis exemplaribus, rariori-
bus minoribus hinc inde 3-4 dentatis praeci-
pue differt foliis.)

E R L A N G A E

EX P I S K U N S T M A N N I A N I S .

tortis, centro vel margine affixis frondibus variis: gelatinosis, coriaceis, umbilicatis, caulescentibus, loreis, filamentosis, foliaceis, tartareis, leprosis, perennantibus, in propagines (Besimina Neck.) varie efflorescentibus. Singula scutellata intra substantiam filamentoso - stupeam connata recondit semina.

34. Collema. Frondes diaphanae gelatinosae. Scutellae marginatae.

35. Peltigera. Frondes coriaceae. Scutellae (Peltae) compressae margine adnatae.

36. Umbilicaria. Frondes foliaceae peltatae. Scutellae contortae.

37. Cladonia. Frondes caulescentes teretes intus cavae. Scutellae tuberculosae.

38. Stereocaulon. Frondes caulescentes teretes solidae. Scutellae tuberculosae, globosae.

39. Usnea. Frondes loreae vel filamentosae. Scutellae radiatae aut nudae.

CRYPT. SCUTELLATA.

40. Lobaria. Frondes lobatae, laciniatae, multifidae, erectae, depressae. Scutellae marginatae.

* Platism. Frondes lacunosae erectae, vel depressae.

** Physcia. Frondes inflatae.

*** Squamaria. Frondes subimbricatae angustatae.

**** Placodium. Frondes subimbricatae crustaceae.

41. Psora. Crusta effigurata. Scutellae imarginatae, convexae.

42. Verrucaria. Crusta aphylla: leprosa, tartarea. Scutellae marginatae, immarginatae.

Haec secundum octavam editionem *Gen. pl. Lin.* adnumeratis: Tremella, Ulva, Fucus, Conferva, Byssus, audiunt: ALGAE; ab his separandos existimavi LICHENES.

CATALOGVS

Librorum ex Historia naturali, Botanica,
Medicina, et Chirurgia, quos propriis
sumtibus impressit

IOANNES IACOBVS PALM

Bibliopola Erlangensis. 1796.

I o h a n n I a k o b P a l m

Universitäts - Buchhändler in Erlangen

hat nachstehende Werke aus der Naturge-
schichte, Botanik, Medicin, Physik, und
Chirurgie theils selbst verlegt, theils mit
den Verlagsrechten an sich gekauft.

1796.

Delii, D. H. F. principia diaetetica, Edi-
tio 2da et aucta. 8. 1781. 15 kr. 4 Ggr.

- - primae lineae semiologiae pathol. 8.
1776. 24 kr. 6 Ggr.

- - vom Preussischen Blau und Blutlau-
ge. 8. 1778. 15 kr. 4 Ggr.

- - vom ausseizenden Puls, einigen andern
Pulsarten und Angelegenheiten des Her-
zens, eine semiotisch - practische Erläu-
terungsschrift. 8. 1784. 24 kr. 6 Ggr.

Gotthards Leitfaden für angehende Aerzte
und Wundärzte, Kranke zu prüfen und
Krankheiten zu erforschen, mit einer

- Kranken . und Witterungsbeobachtungstabelle. gr. 8. 1794. 1 fl. 16 Ggr.
- Gotthards Versuch eines vollständigen system. Lehrplans für Thierarzneyschulen. gr. 8. 1796. 45 kr. 12 Ggr.
- Grämborg, D. G. A. de vera notione et cura morborum primarum viarum comment. cui alterum praemium ill. Acad. Imp. nat. cur. 1792. decrevit. 8. maj. 1793.
- auf Drukpap. 40 kr. 10 Ggr.
 charta script. 54 kr. 14 Ggr.
- Hildebrand dulcis mercurii laudes, libellus medicus. 8. maj. 1794. 12 kr. 3 Ggr.
- - über Arzneykunde oder Methodologie. 8. 1795. 24 kr. 6 Ggr.
- - Lehrbuch der Physiologie. 8. 1796. 1 fl. 30 kr. 1 Rth.
- Hofers, F. I. Lehrsätze des chirurgischen Verbands, 3 Theile mit 31 Kupfertafeln. gr. 8. 1790-92. 6 fl. 50 kr. 4 Rth. 12 Ggr.
- Hoffmanni, G. F. vegetabilia cryptogamica fasc. 1. et 2dus cum 16. tab. aen. 4. maj. 1787. u. 90. (jeder 2 Rth.) 6 fl. 4 Rth.
- - de vario lichenum usu. 4. maj. 1786: 20 kr. 5 Ggr.
- - observationes botanicae. 4. 78. 8 kr. 2 Ggr.
- - memoires sur l'utilité des lichens dans la medecine et dans les arts, avec. fig. gr. 8. 1787. 2 fl. 30 kr. 1 Rth. 16 Ggr.
- - Deutschlands Flora oder botanisches Taschenbuch 1ter Jahrgang. 1791. die

erste bis 23te Classe des Linneischen
Syst. enth. mit 1. Tittelkupfer von Cho-
dowieki gezeichnet und gestochen, und
12 Pflanzenkupfern. 12.

mit illum. Kpf. broch. 5 fl. 1 Rth. 16 Gg.

mit schw. Kpf. broch. 2 fl. 6 kr. 1 Rth. 4 Gg.

ungebunden und ohne alle Kupfer
1 fl. 15 kr. 20 Ggr.

- desselben 2ter Jahrgang auf 1795. die
Cryptogamie mit 14. illum. Pflanzen-
und 1. Tittelkupfer. 12.

broch. mit Futt. 4 fl. 12 kr. 2 Rth. 10 Gg.

brochirt mit Futteral und 2 Schreib-
tafeln 4 fl. 18 kr. 2 Rth. 12 Gg.

gebunden mit Futteral und Schreibta-
feln 4 fl. 24 kr. 2 Rth. 16 Ggr.

ungeb. ohne alle Kpf. 1 fl. 15 kr. 20 Ggr.

Beyde Jahrgänge für Ausländer sind auch
sowohl mit französischen als englischen
Titteln zu haben:

le même livre:

la Flore de l'Allemagne ou etrennes
botaniques, Partie 1. et 2de, avec
fig. illum. 12. 1791 - 96. broché

the Flora of Germany or a botanical
Pocket-Companion, Vol. I-II. 1791-
1796. broché

Hoppe enumeratio insectorum elytratorum
circa Erlangam indigenarum, cum tab.
aen. 8. maj. 1795. illum. 40 kr. 10 Ggr.
c. fig. nigris 24 kr. 6 Ggr.

- Klingsohr de geoffraea inermi ejusque cortica. 4. 1789. 15 kr. 4 Ggr.
- Knigge, Th. de mentha piperitide, cum tab. aen. 4. 1780. 15 kr. 4 Ggr.
in charta script. 24 kr. 6 Ggr.
- Kobbs, I. A., wahre Ursache der Baum-, trockniß der Nadelwälder durch die Naturgeschichte der Forstphaläne erwiesen, und durch eigene Versuche erörtert, mit drey illuminirten Kupfern. gr. 4. 1793. 2 fl. 1 Rth. 8 Ggr.
- Koelle, I. L. C. spicilegium observationum de aconito, cum tab. aen. 8. maj. 1788. 20 kr. 5 Ggr.
- Linne, Car. à, Amoenitates academicae seu Diss. variae physicae, med. botan. Edit. 2da novissima et emendata cura Schreberi, cum tab. aen. 10. Volumina 8. maj. 1787 - 92. 27 fl. 18 Rth.
- - termini botanici. 8. maj. 1792. 8 kr. 2 Ggr.
- Loschge de sceleto corporis hum. symetrico. 8. maj. 1795. 36 kr. 9 Ggr.
in charta script. 45 kr. 12 Ggr.
- Marc allgemeine Bemerkungen über die Gifte und ihre Wirkungen im menschlichen Körper, nach Brownischem System. 8. 1795. 1 fl. 12 kr. 18 Ggr.
- Mayer, Tob. über die Gesetze und Modification des Wärmestoffs. 8. 91. 1 fl. 16 Ggr.
- Modeer, Ad. Bibliotheca helminthologica seu enumeratio auctorum, qui de vermibus scripserunt. 8. maj. 86. 1 fl. 16 Ggr.

Müller, Joh. Heur. über einige Fehler
der körperlichen Erziehung der Kinder.
8. 1790. 30 kr. 8 Ggr.

Namen der Gattungen von Käfern in 5.
Tabellen 86. 24 kr. 6 Ggr.

Panzers Beyträge zur Geschichte der Inse-
cten, siehe Voet.

Rosenmüllers, Joh. Christ., Abbildungen
und Beschreibungen merkwürdiger Hö-
len um Muggendorf im bayreuth. Ober-
lande für Freunde der Natur u. Kunst,
1s Heft mit 2 gemahlten Kupfern. gr.
Real Folio. 1796. 3 fl. 36 kr. 2 Rth.

Schmidel, C. C. Icones plantarum et ana-
lyses partium aeri incisae atque vivis co-
lor. insignitae. Editio nova, Manipulus
1. et 2dus seu 5. Sectiones, cum 50. tab.
aen. pictis. fol. maj. 1793. (jeder Heft
einzeln 6 fl. 43 kr. oder 4 Rth. 14 Ggr.
34 fl. 22 Rth. 22 Ggr.

- - ejusdem libri Manipulus Illins. c. Tab.
LI - LXXV. 1795. 20 fl. 13 Rth. 8 Ggr.

- - Vorstellungen merkwürdiger Versteine-
rungen mit Anmerkungen 4 Hefte mit
24 illuminirt. Kupfertafeln. gr. 4. 1793.
15 fl. 10 Rth.

- - iter per Helvetiam, Galliam et Ger-
maniae partem 1773 et 74. cum 2 tab.
pictis rei botan. 4. maj. 1795.
2 fl. 30 kr. 1 Rth. 16 Ggr.

Schoepffi, I. D. Historia testudinum ico-
nibus illustrata, particula I - V. cont.

- Tab. I - XXV. et Text. A - O. cum praefat.
4. maj. 1792 - 95.
illuminirt 18 fl. 54 kr. 12 Rth. 14 Ggr.
- - idem liber mit schwarzen Kupfern
10 fl. 30 kr. 7 Rth.
- - Naturgeschichte der Schildkröten vom
Verf. selbst übersetzt, 1 - 5r Heft enth.
- Tab. I - XXV. und Text A - R. gr. 4.
1792 - 95.
mit illum. Kpf. 19 fl. 24 kr. 12 Rth. 12 Ggr.
mit schw. Kpf. auf Schweizer Papier
11 fl. 30 kr. 7 Rth. 16 Ggr.
- Text auf Druckpapier mit schw. Kupfern
auf deutschem Papier 7 fl. 4 Rth.
- Von allen 5 Heft. compl. sind Exempl.
auf holl. Postpap. mit fein gemahlt. Ku-
pfern für 18 Rth. zu haben.
- - Materia medica Americana. 8. maj. 86.
45 kr. 12 Ggr.
- - von der Wirkung des Mohusafs in
der Lustseuche, nebst andern zur Arz-
neygelahrtheit und Naturlehre gehörigen
Beobachtungen Nordamerika betr. mit
einer Vorrede von Delius. gr. 8. 1781.
15 kr. 4 Ggr.
- - Beyträge zur mineralogischen Kennt-
niss von Nordamerika. gr. 8. 1787.
45 kr. 12 Ggr.
- - Beschreibung seiner Reise durch eini-
ge der mittlern und südlichen vereinigt-
en Nordamerikan. Staaten nach Ostflori-
da und der Behama - Insel, unternomi-

men in den Jahren 1783. n. 84. 2 Thle.
gr. 8. 1788. 5 fl. 3 Rth. 8 Ggr.

Swartz, Ol. observationes botanicae quibus
plantae Indiae occidentalis aliaeque sys-
tematis vegetab. Ed. XIV. illustrantur
earumque characteres emendantur, cum
XI. tab. aen. 8. maj. 1791.

auf Drukpapier 3 fl. 2 Rth.
charta script. 4 fl. 30 kr. 3 Rth.

• • Icones plantarum novarum minusque
cognitarum Indiae occidentalis, Fasc. 1.
Sectio I. cont. Tab. I. VI. pictas fol. maj.
1794. 3 fl. 54 kr. 2 Rth. 14 Ggr.

Thomann Geschichte einer metastatischen
Augenentzündung, mit 1. Kupfer gr. 4.
Würzb. 1796. 36 kr. 9 Ggr.

Thunberg, C. P. prodromus plantarum
Capensium in promontorio bonae spei
Africes, Pars I. cum 3. fig. aen. gr. 8. Up-
saliae 1794. 2 fl. 45 kr. 1 Rth. 12 Ggr.

Udmanni, Is. novae insectorum species,
Editio 2da curante Panzero, cum 2 fig.
4. 1793. 40 kr. 10 Ggr.

Voets, Joh. Ens. Beschreibungen und Ab-
bildungen hartschaligter Insecten, über-
setzt, mit der Synonymie vermehrt und
mit Commentarien erläutert von G. W.
F. Panzer; des Originals 1r Theil oder
der deutschen Ausgabe 1 und 2ter Theil,
in 27 Ausgaben mit 50 illum. Kupfern.
gr. 4. 1793. 17 fl. 11 Rth. 3 Ggr.

• • desselben 2r Theil des Originals, oder
der deutschen Ausgabe 3r und 4ter Th.

- mit 50 illum. Kupfertafeln, gr. 4. 1793 -
1796. 20 fl. 15 Rth. 8. Ggr.
- - desselben 5ter Theil oder G. W. F.
Panzers Beyträge zur Insectengeschichte
mit illum. Kupf. 1ter Theil 1ste Ausga-
be endl. Tab. I - VI. Text A - C. gr. 4.
1793. 2 fl. 15 kr. 1 Rth. 12 Ggr.
- Wendts, D. Fr., Nachrichten von dem
Kranken - Institut zu Erlangen, 6 Stücke.
gr. 8. 1786. 45 kr. 12 Ggr.
- - de febribus remittentibus semestris hi-
bernii. 8. 1796.
- Wulfen, Abts Xav., Abhandl. vom Kärn-
thenschen pflanenschweifigen Helmintho-
lith, oder dem opalisirenden Muschel-
marmor, mit 12 illumin. Kupfertafeln,
nebst dem Grundriss des Gebirges gr. 4.
1795. 7 fl. 4 Rth. 16 Ggr.
- Die übrigen vorrätigen Zeichnungen, wel-
che ohngefähr noch 18 Kupfertafeln ausfül-
len werden, sind unter der Künstler Hän-
den.
- Medicinische Handbibliothek oder alpha-
betisches Verzeichniß derer Bücher aus
der Arzneygelahrtheit, Chirurgie, Anato-
mie, Botanik, Naturgeschichte, Che-
mie, Apothekerkunst etc. mit Preissen.
8. 1788. 1 fl. 16 Ggr.