3 2044 106 312 127

BOT DIC
H51

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
BHL-SIL-FEDLINK

11
**Nomenclator botanicus
hortensis...**

oder

alphabetische und synonymische

A u f z ä h l u n g

der

**in den Gärten Europa's cultivir-
ten Gewächse,**

nebst Angabe

ihres Autors, ihres Vaterlandes, ihrer

Dauer und Cultur,

bearbeitet

von

Gustav Heynhold,

nebst

einer Vorrede

von

Dr. Ludwig Reichenbach,

Königl. Sächs. Hofrathe, Ritter des K. S. Civilverdienst-
ordens, Director des mineralogischen und zoologischen Mu-
seums, sowie des botanischen Gartens zu Dresden, Mitglieder
mehrer gelehrten Gesellschaften, etc. etc.

Dresden und Leipzig,

in der Arnoldischen Buchhandlung.

1840.

S.

AA

Bot. Dict

H 51

1840

Ein botanischer Nomenclator für Gärtner wird mit jedem Tage dringenderes Bedürfnis. Alljährlich tritt für dieselben die Nothwendigkeit ein, neue Verzeichnisse ihrer Vorräthe drucken zu lassen, sie finden aber keinen Anhaltungspunkt in der Literatur, diese, ihre Verzeichnisse den Anforderungen der schnellen Fortschritte in der Pflanzenkenntnis, gemäß zu entwerfen. *De Candolle's* für den wissenschaftlichen Botaniker unentbehrlicher *prodromus* ist erst zur Hälfte erschienen, und in seinen ersten Bänden schon wieder höchst unvollständig geworden; von *Steudel's* schätzbarem *Nomenclator botanicus*, welcher einen ganz verschiedenen Zweck hat, ist wenig über ein Zehnthel des Ganzen erschienen, und beide Werke dürften wegen ihres hohen Preises nur von wenigen Gärtnern in Deutschland angeschafft werden, *Sweet's* und *Lou- don's Hortus britannicus* sind theils viel zu theuer, theils sehr unzweckmäßig eingerichtet und deshalb für die Benutzung zu zeitraubend.

Unter diesen Umständen dürfte der Vorsatz des Verfassers, einen für Gärtner bestimmten Nomenclator zu bearbeiten, nur ein den Anforderungen der Zeit sehr entsprechender genannt werden können, da er denselben hierdurch das Mittel in die Hand giebt, die Kataloge ihrer Vorräthe wissenschaftlich richtig abzufassen, oder von schon vorhandenen Irrthümern und Synonymen reinigen zu können. Der Verfasser hat sich nämlich bemüht, diejenigen Gewächse, welche man bis jetzt in Europa's Gärten cultivirt, nach ihrem lateinischen und deutschen Namen, ihrem Autor, ihrer Dauer, ihrem Vaterlande und ihrer Culturweise, auch

mit Angabe der natürlichen Familie und Linnéischen Classe und Ordnung, in welche die Gattung gehört, **alphabetisch** möglichst vollständig zu ordnen, dabei hat er nach dem Vorgange der Engländer, welche in dergleichen Kataloge auch die Flora Britanniens aufnehmen, auch den Gewächsen der Flora Deutschlands ihr Plätzchen vergönnt. Nöthige Synonymen endlich verweisen auf die angenommenen Hauptnamen, und deren Kenntniss schützt vor dem Uebelstande, dem so viele Nichtkenner ausgesetzt sind, eine und dieselbe Pflanze unter verschiedenen Namen anzukaufen oder Anderen anzubieten.

In Hinsicht auf Vollständigkeit wie auf Kritik kann ein dergleichen Werk niemals vollkommen sein, und so fühlt auch der Verfasser die Nothwendigkeit, durch schnell beizufügende Nachträge seinem Werke noch höheren Werth und noch grössere Brauchbarkeit verleihen zu müssen, indessen giebt er sich doch der angenehmen Hoffnung hin, daß das vollständig ihm vorliegende Manuscript, schon zur Michaelismesse complet gedruckt in die Hände Derer gelangend, welche des Werkes bedürfen, den Fleiß und die Mühe bewähren soll, die er auf dasselbe verwendet hat.

Diese wenigen Bemerkungen erlaube ich mir auf den Wunsch des Herrn Verlegers diesem wohlfeilen und, wie ich glaube, für praktische und gebildete Gärtner wirklich nützlichen und unentbehrlichen Gartenbuche vor auszusen- den, und ich wünsche, daß der Erfolg unserer Hoffnung entsprechen möge.

Dresden, im August 1840.

Dr. Ludwig Reichenbach.

Autoren und citirte Bücher.

- A. B.*, Arboretum et fruticetum Britannicum von Loudon.
Abb., Abbott, engl. Gartenfreund und Botaniker.
A. P. Th. s. Thouars.
A. P., Alexander Pope, engl. Handelsgärtner.
Abel, engl. Arzt, bereiste China.
Adams, M. F., bereiste Sibirien.
Adans., Mich. Adanson, französ. Akademiker, Botaniker und Reisender. † 1806.
A. DC., Alphons de Candolle, Prof. der Botanik zu Genf.
Afzel., Adam Afzelius, Prof. d. Botan. zu Upsala. † 1837.
Ag., C. A. Agardh, Prof. der Botanik zu Lund, dann Bischof von Wermland.
Ag. fil., J. G. Agardh, Prof. der Botan. zu Lund, des Vor. Sohn.
Ait., W. Aiton, Vorsteher des kön. Gartens zu Kew. † 1793.
Ait. fil., G. T. Aiton, des Vorigen Sohn und Nachfolger.
All., C. Allioni, Prof. der Bot. zu Turin. † 1804.
Alp., Prosper Alpini, Prof. der Medicin zu Padua. † 1617.
Alsch., A. Alschinger, Professor am Lyceum zu Zara.
Amm., J. Amman, Akademiker in Petersburg. † 1741.
S. Amand, französ. Botaniker.
Anders., Georg Anderson, Vorsteher des Gartens zu Chelsea.
Wilhelm Anderson, engl. Arzt und Botaniker.
Andr., H. Andrews, berühmter Pflanzenmaler in London.
Andrz., A. Andrzejowski, russischer Botaniker.
Anguill., L. Anguillara, Prof. der Botanik zu Padua und Ferrara. † 1570.
Arbr., A. de l'Arbre, französischer Botaniker.
Arduin., P. Arduino, Prof. der Botanik und Landwirthschaft zu Padua. †
Arnott, G. A. Walker Arnott, schottländischer Botaniker.
Arrabid., Don Antonio da Arrabida, Bischof von Anemuria in Brasilien, Herausgeb. einer Flora von Rio de Janeiro.
Ass., J. de Asso, spanischer Botaniker. †
Aub., d. P. Th. s. Thouars.
Aubl., Fusée Aublet, französ. Botaniker und Reisender. †
Audib., Audibert, französischer Gärtner und Botaniker.
Balb., J. B. Balbis, Prof. der Botanik zu Turin und Lyon. † 1831.
Bab., Babington, engl. Botan.
Baldw, G. Baldwyn, Arzt zu Savannah in Nordamerika.
— G. Baldwin, Botaniker in Philadelphia.
Banc., J. Bancroft, Arzt und Botaniker auf Jamaika.
Banks, J. Banks, Präsident d. k. Societät der Wissenschaften zu London. † 1820.
P. Barker Webb. s. Webb.
Barnades, spanischer Botaniker.
Barrel., J. Barrelier, französ. Botan. u. Reisender. † 1673.
Barth., F. G. Bartling, Prof. der Botanik zu Göttingen.
— et *Wendl.*, Wendland, Gartenmstr. zu Herrenhausen.
Bast., Bastard oder Bâtard, französischer Botaniker.
Bart., B. C. Barton, Prof. der Botanik zu Philadelphia.
Bartr., J. et W. Bartram, Vater und Sohn, Gutsbesitzer in Nordamerika, welche dasselbe in botanischer Hinsicht bereisten. †
Batem., J. Bateman, engl. Botaniker, Herausgeber eines Prachtwerkes über mexicanische etc. Orchideen.
Bau., Franz und Ferdinand († 1826) Bauer, berühmte Pflanzenmaler.
Bauh., C. Bauhin, Prof. der Medicin und Botanik zu Basel. † 1624.
— J. Bauhin, † 1613 als Leibarzt des Herzogs von Württemberg.
Baumg., J. C. G. Baumgarten, Arzt zu Schäsburg in Siebenbürgen und Bearbeiter der Flora dieses Landes.
Baxt., W. Baxter, engl. Botaniker und Reisender.
Beaup., Beupret, französischer Botaniker.
Beck, L. C., nordamerikanischer Botaniker
Beck., O. Becker, Botaniker zu Frankfurt a. M. † 1833.
Beauv., Palisot de Beauvois, franz. Akademiker, Botaniker u. Reisender. Vgl. auch *P. B.*
Bedf., Herzog von Bedford in England, großer Beförderer der Botanik.
Belang, C. Belanger, französ. Botaniker und Reisender.

- Bellard.*, L. Bellardi, Vorsteher des botan. Gartens zu Turin. †.
- Benth.*, G. Bentham, Secretair der Gartenbaugesellschaft zu London, ein ausgezeichnete Botaniker.
- Berg.*, P. J. Bergius, Prof. zu Stockholm. † 1790.
- C. H. Bergius, Pharmaceut und Botaniker aus Cüstrin, bereiste das Vorgebirge d. g. Hoffn. † 1817.
- Berger.*, J. Bergeret, französ. Botaniker.
- Berhh.*, J. le Francq v. Berhhey, holländ. Botaniker. †.
- Berk.*, M. J. Berkeley, engl. Botaniker.
- Berl.*, Berlandier, französischer Botaniker.
- Bernh.*, J. J. Bernhardt, Prof. der Botanik zu Erfurt. † 1839.
- Berter.*, C. J. Bertero, piemontesischer Botan. u. Reisender.
- Berthel.*, Sabin. Berthelot, Director des botan. Gartens zu Orotavas auf Teneriffa.
- Bertol.*, A. Bertolone, Prof. der Botanik zu Bologna.
- Befs.*, S. J. G. Besser, Prof. der Botanik zu Kiew.
- Bevis* s. J. B.
- Biasolet.*, B. Biasoletto, Apotheker u. Botaniker zu Triest.
- Bichen.*, Bicheno, schottischer Botaniker.
- Bigel.*, J. Bigelow, Prof. der Botanik zu Boston.
- Bir.*, J. A. J. Biria, französ. Botaniker.
- Birol.*, G. Birolì, Prof. der Botanik zu Turin.
- Bishop*, Vorsteher des botan. Gartens zu Belfast in Irland.
- Bivon.*, A. Bivone Bernardi, L. B. de Alta turre, Botaniker zu Palermo. † 1837.
- Blan.*, G. Blane, Arzt zu London.
- Bluff*, et *Fingerh.*, Bluff und Fingerhuth, Verfasser einer deutschen Flora.
- Blum.*, K. L. Blume, Prof. der Botanik zu Leyden, bereiste Java.
- Bocc.*, S. P. Boccone, sicilian. Botaniker. † 1704.
- Boeb.*, J. v. Boeber, Director des adeligen Erziehungsinstituts zu Petersburg. † 1820.
- Böhm.*, G. R. Böhmer, Prof. d. Medic. zu Wittenberg. † 1803.
- Bönningh.*, C. M. F. v. Bönninghausen, Regierungsrath und Botaniker in Münster.
- Boerh.*, Hermann Boerhaave, Prof. der Medicin und Botanik zu Leyden. † 1738.
- Boj.*, Rojer, Prof. der Botan. auf der Insel Mauritius.
- Boisduv.*, Boisduval, französ. Botaniker.
- Boiss.*, C. V. de Boissieu, französischer Botaniker.
- Bolt.*, J. Bolton, engl. Botan. †.
- Bonam.*, F. Bonamy, französ. Botaniker. †.
- Bong.*, H. G. v. Bongard, k. russ. Staatsrath, Bearbeiter der russischen Flora.
- Bonpl.*, A. Bonpland, französ. Botaniker und Reisender, Begleiter des A. v. Humboldt.
- Booth*, William Beatti, hat die Camellien beschrieben, welche Chandler abgebildet.
- C., Handelsgärtner zu Flotbeck bei Hamburg.
- Borkh.*, M. B. Borkhausen, Botaniker zu Darmstadt.
- Borrer*, W., engl. Handelsgärtner.
- Bory*, J. B. Bory de St. Vincent, französ. Oberst, Akademiker, Naturforscher und Reisender.
- Bosc.*, L., Vorsteher des kön. Gartens zu Paris, bereiste Spanien und Carolina.
- Bot. Cab.*, Botanical Cabinet.
- Bot. Mag.*, Botanical Magazine.
- Bot. Reg.*, Botanical Register.
- Bot. Repos.*, Botanical Repository.
- Bouch.*, J. A. G. Boucher, französischer Botaniker.
- Bouch.*, Bouché, Gärtner und Botaniker zu Berlin.
- Boul.*, G. E. Merlet de la Boulaye, französ. Botaniker.
- Bowd.*, Edward Bowdich, engl. Naturforscher und Reisender.
- Bow.*, J. Bowie, engl. Gärtner, Botaniker und Reisender.
- Bradl.*, Rich. Bradley, Prof. der Naturgeschichte zu Cambridge. † 1732.
- Braun.*, F. a. v. Braune, Botaniker in Salzburg. †.
- Brébiss.*, A. de Brébisson, französischer Botaniker.
- Breda*, J. G. S. van, Prof. u. Director des bot. Gartens zu Gent.
- Bree*, W. T., engl. Botaniker.
- Breyn*, J., Kaufmann und Botaniker zu Danzig. † 1697.
- Brigant.*, Briganti, sicilian. Botaniker.
- Bridg.*, Bridges, engl. Botaniker und Reisender.
- Brignol.*, J. Brignole, Prof. der Naturgeschichte zu Urbino, dann zu Verona.
- Brong.*, Ad. Brongniart, Prof. der Naturgeschichte zu Paris.
- Brondeau*, Louis de, französ. Botaniker.
- Brot.*, F. A. Brotero, Prof. der Botanik zu Coimbra, später Vorsteher des kön. Gartens zu Lissabon. † 1829.
- Brouss.*, P. M. A. Broussonet, Prof. der Botanik zu Montpellier, bereiste die canarischen Inseln. † 1807.
- P. Br.*, Patrick Browne, ein Irländer, bereiste als Arzt

- und Botaniker Jamaika. † 1790.
- R. Br.*, Robert Brown, Custos des Banksischen Museums, berühmt als Botaniker und Reisender.
- Buchanan s. Hamilton.*
- Bull.*, P. Bulliard, Demonstrator der Botanik zu Paris. † 1793.
- Bung.*, Alexander v. Bunge, Prof. und Director des botan. Gartens zu Dorpat, bereiste das Altai-Gebirge, die Mongolei etc.
- Burch.*, W. J. Burchell, engl. Naturforscher und Reisender.
- Burgsd.*, F. A. L. v. Burgsdorf, k. preuss. Oberforstmeister, Bearbeiter d. Forstbotanik. †
- Burm.*, J. Burmann, † 1780, und N. L. Burmann, dessen Sohn, † 1793, Professoren der Botanik zu Amsterdam.
- Burnet*, G. T., Prof. der Botanik zu London.
- Burb.*, J. C. Buxbaum, Botaniker und Arzt aus Merseburg, bereiste Kleinasien etc. † 1730.
- Caes.*, A. Caesalpin, Prof. der Botanik zu Pisa. † 1603.
- Caley*, G., engl. Botaniker und Reisender, Vorsteher des botan. Gartens zu St. Vincent.
- Cambess.*, J. Cambessèdes, französischer Botaniker.
- Camer.*, J. Camerarius, Arzt zu Nürnberg. † 1598.
- Cameron*, David, Vorsteher des botanischen Gartens zu Birmingham.
- Camp.*, A. Campana, Gärtner und Botaniker zu Ferrara.
- Campd.*, F. Campdera, spanischer Botaniker.
- Carey*, W., Arzt und Botaniker zu Serampore in Ostindien.
- Carmich.*, D. Carmichael, engl. Schiffscapitain.
- Cass.*, H. Cassini, Akademiker und Botan. zu Paris. † 1832.
- Castag.*, (C. et R.) Castagne et Robillard, franz. Botaniker.
- Castigl.*, L. Graf Castiglione, ein Mailänder, welcher Nordamerika bereiste.
- Catesb.*, M. Catesby, ein engl. Naturforscher, welcher Nordamerika bereiste. † 1744.
- Catros*, Handelsgärtner zu Bordeaux.
- Cav.*, A. J. Casanilles, Prof. der Botanik zu Madrid. † 1804.
- Cels.*, J. M., Besitzer eines reichen Pflanzengartens zu Paris. H. Cels. Hort. Celsianus.
- Cesat.*, V. de Cesati, Botaniker zu Mailand.
- Cervant.*, V. Cervantes, Prof. der Botanik zu Mexico.
- Chair*, französischer Botaniker und Geistlicher. †
- Cham.*, A. v. Chamisso, Inspector des botan. Museums zu Berlin, begleitete Kotzebue auf seiner Reise um die Welt. † 1838.
- Chand.*, A. Chandler, engl. Gartencultivateur, Herausgeber eines Werkes über Camellien.
- Chaub.*, Chaubard, franz. Botaniker und Mitarbeiter des Bory de St. Vincent.
- Cherl.*, J. H. Cherler, Mitarbeiter und Schwiegersohn des J. Bauhin. † 16?
- Cheval.*, F. F. Chevallier, franz. Botaniker.
- Chois.*, J. D. Choisy, Botaniker zu Genf, ein Schüler De-Candolle's.
- Clarion*, franz. Botaniker.
- Clairv.*, Clairville, schweizer Botaniker.
- Clark*, Daniel Clark, General, Begleiter von Lewis (Statthalter von Louisiana) durch das westl. Nordamerika.
- E. D. Clarke*, engl. Geistlicher und Reisender.
- Clayt.*, J. Clayton, ein engl. Arzt, der in Virginien Pflanzen sammelte. †
- Clement.*, Clemente, Prof. der ökonom. Botanik zu Madrid.
- Clus.*, C. Clusius (Charles de l'Ecluse), † 1609 als Prof. der Botanik zu Leyden.
- Colebr.*, H. Th. Colebrooke, Präsident der bengalischen Societät, bereiste in botan. Hinsicht Ostindien.
- Coll.*, Aloys Colla, Besitzer eines reichen Gartens zu Rivoli bei Turin.
- Collad.*, T. F. Colladon, Genfer Botaniker.
- Collv.*, C. Collville's Catalog.
- Commel.*, J. Commelin, Senator und Vorsteher des botan. Gartens zu Amsterdam, † 1698. Desgl. dessen Neffe Caspar Commelin († 1731).
- Commers.*, P. Commerson, franz. Botan. u. Reisender († 1773.).
- Cornut.*, J. P. Cornutus, ein Arzt u. Botaniker zu Paris. †
- Corr.*, J. F. Correa de Serra, portugiesischer Staatsmann und Botaniker. † 1823.
- Coult.*, Th. Coulter, Genfer Botaniker.
- Court.*, R. J. Courtois, Prof. und zweiter Director des botanischen Gartens zu Lüttich. † 1835.
- Cr.*, H. J. N. v. Crantz, Prof. der Medicin zu Wien. † 1799.
- Cunn.*, Allan Cunningham und Richard Cunningham (letzterer wurde vor einigen Jahren im Innern Neuhollands von den Eingeborenen ermordet), engl. Reisende und Botaniker.
- Curt.*, W. Curtis, engl. Botaniker und Apotheker, Grün-

- der des Botanical Magazine's, † 1799.
- Cuss.*, P. Cusson, Prof. zu Montpellier. † 1783.
- Cust.*, Custor, schweiz. Botaniker.
- Cyrill.*, D. Cyrillo, Prof. der Botanik zu Neapel, ermordet daselbst 1799.
- Dahl*, Andreas, Demonstrator der Botanik zu Abo. † 1789.
- Dalech.*, J. Dalechamp, Arzt und Botaniker zu Caen und Lyon. † 1588.
- Dalm.*, Dalman, schwedischer Botaniker.
- Danth.*, Danthoine, französ. Botaniker.
- Darlingt.*, W. Darlington, engl. Botaniker.
- Dav.*, H. Davies, engl. Botaniker.
- Decaisn.*, J. Decaisne, Adjunct beim naturhistorischen Museum zu Paris.
- DC.*, Aug. Pyr. de Candolle, Prof. der Botanik zu Montpellier, Genf etc., einer der berühmtesten Botaniker unserer Zeit.
- — Alph. de Candolle, dessen Sohn, Prof. zu Genf.
- Degl.*, Degland, französ. Botaniker.
- Delany*, engl. Pflanzenmaler.
- Delaun.*, Mordant de Launay's, franz. Botaniker.
- Delil.*, A. R. Delile, Prof. zu Montpellier, welcher Aegypten in botanischer Hinsicht bereiste.
- Dens.*, J. Denson, engl. Gärtner und Botaniker.
- Depp.*, F. Deppe, Botaniker aus Berlin, bereiste Mexico.
- Descourt.*, E. Descourtilz, lebte als Arzt auf St. Domingo und lieferte ein Werk über die Pflanzen der Antillen.
- Desf.*, R. Desfontaines, Prof. der Botanik zu Paris, bereiste das nördliche Afrika. †.
- Desmaz.*, Desmazières, belgischer Botaniker.
- Desport.*, Desportes, französ. Botaniker.
- Desrouss.*, Desrousseaux, franz. Botaniker. †.
- Desv.*, N. A. Desvaux, französ. Botaniker.
- Dethard.*, Detharding, Arzt u. Botaniker zu Rostock.
- Dew.*, C. Dewey, nordamerik. Botaniker.
- Dicks.*, J. Dickson, schottländischer Botaniker. † 1822.
- Dierb.*, J. H. Dierbach, Prof. der Medicin zu Heidelberg.
- Dietr.*, F. G. Dietrich, Hofgärtner zu Eisenach, Verfasser des Lexicons für Gärtnerei und Botanik. A. Dietrich, Botaniker in Berlin.
- Dill.*, J. J. Dillen, aus Darmstadt, starb als Prof. der Botanik zu Oxford 1747.
- Domb.*, J. Dombey, französ. Botaniker, welcher Peru, Chili etc. bereiste, † 1795.
- Don.*, David Don und George Don, berühmte engl. Botaniker.
- Don F.*, Don v. Forfar, schottischer Botaniker.
- Donn*, J. Vorsteher des botan. Gartens zu Cambridge.
- Dorthes*, französ. Botaniker.
- Dougl.*, D. Douglas, ein Schottländer, eifriger Botaniker u. Reisender, kam vor einigen Jahren auf den Sandwichinseln um.
- Drege*, J. F. aus Königsberg, bereiste in neuester Zeit als Bot. das Vorgeb. der guten Hoffnung und machte daselbst zahlreiche Entdeckungen.
- Drev.*, F. Dreves s. Hayne.
- Drumm.*, J. Drummond, eifriger engl. Botaniker und Reisender, † 1835 auf Cuba.
- Dryand.*, J. Dryander, ein Schwede, Bibliothekar des berühmten Banks. † 1811.
- Dubois*, französ. Botaniker.
- Dub.*, J. E. Duby, französ. Botaniker.
- Duchesn.*, A. N. Duchesne, französ. Botaniker, gab eine Monographie d. Erdbeeren. †.
- Dufour*, franz. Arzt u. Botaniker.
- Dufr.*, P. Dufresne, französ. Botaniker, gab eine Monographie der Valerianeen.
- Duham.*, H. L. Duhamel du Monceau, Oberaufseher des Seewesens in Frankreich und Akademiker, berühmt als Dendrolog, Pomolog etc. † 1782.
- Dum. Cours.*, Dumont-Courset, Bearbeiter der Gartenbotanik.
- d'Urvill.*, J. Dumont d'Urville, franz. Seefahrer u. Botaniker.
- Dumort.*, B. C. Dumortier, Mitglied der belgischen Ständekammer und eifriger Botaniker.
- Dun.*, M. F. Dunal, Prof. der Botanik zu Montpellier.
- Dur.*, P. Durand, französ. Botaniker. †.
- Durb.*, Durborough, ? engl. Gärtner.
- Du Roi*, J. P., Arzt und Botaniker zu Braunschweig. † 1785.
- Duv.*, J. Duval, Professor zu Regensburg. †.
- — F. Duval, belg. Botan.
- E. B.*, English Botany von Sowerby und Smith.
- Eaton*, A., nordamerikanischer Botaniker, Verf. einer Flora von Nordamerika.
- Eckl. et Zeyh.*, C. F. Ecklon et C. Zeyher, zwei deutsche

Botan., welche das Vorgeb.
d. g. H. fleißig durchsuchten.
Eddy, ein engl. Gärtner (Hort.
Elginensis 1816).
Edw., Sydenham Edwards, Grün-
der des Botanical Register.
E. F., English Flora v. Smith.
Ehrbg., C. G. Ehrenberg, Prof.
etc. zu Berlin, berühmt als
Reisender u. Naturforscher;
Karl Ehrenberg, dessen Bru-
der, sammelte in Westindien
Pflanzen.
Ehrh., F. Ehrhart, † 1795 als
kön. Botanicus zu Hannover.
Ell., Steph. Elliot, Prof. der
Botanik zu Charlestown in
Nordamerika.
Ellis, J., Kaufmann u. Natur-
forscher zu London. † 1776.
Endl., Steph. Endlicher, Prof.
und Director des botanischen
Gartens zu Wien.
Eschsch., J. F. Eschscholtz, be-
gleitete Otto von Kotzebue
als Naturforscher auf seiner
zweiten Reise um die Welt.
Etl., A. E. Etlinger, ein deut-
scher Botan., welcher über
die Gattung *Salvia* schrieb. †.
Fabric., P. K. Fabricius, Prof.
der Medic. zu Helmstaedt. †.
Fenzl, E., Custos am k. k. bot-
anischen Museum zu Wien.
Feuill., L. Feuillée, k. französ.
Astronom, Botaniker u. Rei-
sender. † 1732.
Fic. et Heynh., Ficinus et Heyn-
hold, Bearbeiter der Flora
von Dresden.
Fingerhuth s. Bluff.
Fisch., E. E. Ferd. v. Fischer,
kais. russischer Staatsrath,
Director des kaiserl. botan.
Gartens zu Petersburg.
F. et M., Fischer und C. A.
Meyer s. diese.
Fl. Wetter., Flora d. Wetteran
v. Gärtner, Meyer et Scherbius.
— *Brit.*, Flora Britannica von
J. E. Smith.
— *Dan.*, Flora Danica von
Oeder Hornemann etc.
— *Graec.*, Flora Graeca von
Sibthorp et Smith.
— *Lond.*, Flora Londinensis
von Curtis und Hooker.
— *Peruv.*, Flora Peruviana von
Ruiz und Pavon.
Flörk., H. G. Flörke, Prof. d.
Botanik zu Rostock. † 1835.
Flügg., J. Flügge, Verfass. einer
Monographie über Gräser. †.
Forbes, J., Gärtner des Herzogs
von Bedford.
Forsk., Pet. Forskol, schwed.
Botaniker, welcher Aegypten
u. Arabien bereiste. † 1763.
Forst., J. R. Forster († 1798
als Prof. d. Naturgeschichte
zu Halle) und G. Forster,
dessen Sohn († 1794 als Geh.
Rath und Prof. zu Mainz),
begleiteten als Naturforscher

Capitain Cook auf seiner Reise
um die Welt.
Fras., C. Fraser, engl. Gärt-
ner und Reisender. †.
Fres., G. Fresenius, Director
des botanischen Gartens zu
Frankfurt am Main.
Fr., E. M. Fries, Professor der
Botanik zu Upsala.
Friw., E. Friwaldsky von Fri-
wald, ungarisch. Naturforsch.
Fröl., J. A. v. Frölich, Arzt
und Botaniker zu Ellwangen
in Württemberg.
F. S., F. W. Smith, englischer
Pflanzencultivateur.
Fuchs, Leonh., Profess. zu Tü-
bingen. † 1565.
Funck, H. C., Apotheker und
Bot. zu Gefrees in Franken.
G. et A., Greville et Arnott,
schottische Botaniker.
G., J. Gärtner, Arzt u. Bot. zu
Calw im Würtemb. † 1791.
G. fil., C. F. Gärtner, des Vor.
Sohn.
G. et H., Gillies und Hooker.
G. M., Garten-Magazin von
London.
G. B. K., G. B. Knowles, eng-
lischer Gärtner u. Botaniker.
Gal., Galliotti, Bearbeiter der
Cacteen.
Gaudich., Gaudichaud, französ.
Botaniker und Reisender.
Gaud., J. Gaudin, † 1833 als
Pastor zu Nyon im Canton
Waadt, bearbeitete die Flora
der Schweiz.
Gaw., J. Bellenden Gawler s.
Ker.
Gay, J., französischer Bota-
niker und Reisender.
Ger., L. Gerard, französischer
Arzt und Botaniker.
Gesn., C. Gesner, Arzt und Na-
turforscher zu Zürich † 1565.
Gilib., J. E. Gilibert, Professor
zu Wilna. †.
Gill., Gillies, schottischer Bot.
Ging., Baron F. de Gingins-
Lalsaraz, französ. Botaniker.
Gled., J. G. Gleditsch, Profes-
sor der Botanik und Akade-
miker zu Berlin. † 1786.
Glox., P. B. Gloxin, Botaniker
zu Straßburg. †.
Gmel., C. C. Gmelin, Prof. u.
Director des botanischen Gar-
tens zu Karlsruhe. † 1837.
— — J. G. Gmelin, Akademi-
ker zu Petersburg, welcher
Sibirien bereiste. † 1755.
— — J. F. Gmelin. † 1804 als
Professor zu Göttingen.
— — S. G. Gmelin, Akademik.
zu Petersburg, welcher die
südl. Gegenden des russischen
Asiens bereiste. † 1774.
Gochn., F. C. Gochnat, Bota-
niker zu Straßburg.
God., Godefroy, französischer
Handelsgärtner.

- Goldb.*, C. L. Goldbach, † 1824 als Professor zu Moskau.
- Gold.*, Goldie, ein schott. Gärtner, welcher Canada bereiste.
- Good.*, S. Goodenough, Bischof zu Carlisle in England, bearbeitete die Gattung *Carex*.
- Goua.*, A. Gouan, Prof. u. Vorsteher des botanisch. Gartens zu Montpellier. † ? 1816.
- Gow.*, J. R. Gowen, englischer Gärtner, welcher mehrere interessante Hybriden von Azaleen und Rhododendron erzogen hat.
- Govan*, Vorsteher des botanisch. Gartens zu Saharumpur.
- Grab.*, H. Grabowski, Apothek. und Botaniker zu Oppeln, vergl. Wimmer et Grabowski.
- Grah.*, Graham, Prof. u. Dir. des bot. Gart. zu Edinburgh.
- Grev.*, R. K. Greville, schott. Botaniker.
- Griff.*, Griffiths, engl. Handelsgärtner und Botaniker.
- Gron.*, J. F. Gronovius, Senator u. Botan. zu Leyden. † 1762.
- Güldenst.*, J. A. Güldenstädt, † 1781 als russischer Akadem., bereiste die caucasischen Geb.
- Günth.*, J. C. Günther, Apoth. u. Medicinalassessor zu Breslau, bearbeitete die schlesische Flora. † 1833.
- Guers.*, L. B. Guersent, französischer Botaniker.
- Gunn.*, J. E. Gunner, † 1773 als Bischof zu Drontheim in Norwegen, Bearbeiter der norwegischen Flora.
- Guss.*, G. Gussone, Vorsteher des königl. Gartens in Bocca-difalco bei Palermo.
- H. et A.*, Hooker und Arnott.
- H. B. K.*, Humboldt, Bonpland und Kunth.
- H. et G.*, Hooker u. Greville.
- H. S.*, Gartenbau-Gesellschafts-Garten zu Chiswick.
- H. et T.*, Hooker und Taylor.
- Haage jun.*, F. A., Handelsgärtner in Erfurt.
- Haberl*, Prof. zu Pesth. † 1831.
- Habliz.*, C. L. Hablizl, Aufseher der Landwirthschaft in Taurien, bereiste das nördliche Persien. †.
- Hacq.*, B. Hacquet, † 1814 als Professor zu Lemberg, bereiste die krainerischen Alpen.
- Hänk.*, Thadd. Hänke, ein böhmischer Botaniker, bereiste Südamer. u. † 1817 daselbst.
- Hagen*, C. G., † 1829 als Professor zu Königsberg, Bearbeiter der preussischen Flora.
- Hagenb.*, Hagenbach, Professor der Botanik zu Basel.
- Hall.*, A. v. Haller, berühmter schweiz. Botan. etc. † 1777.
- Hall. fil.*, des Vorigen Sohn, † 1823 als Senator zu Bern.
- Hamilt.*, F. Hamilton, früher Buchanan, ein schottländisch. Arzt und Botaniker, welcher Ostindien und Nepal bereiste.
- — W. Hamilton, Bearbeiter der Flora Westindiens.
- Hartm.*, K. L. Hartmann, Provinzialarzt in Südermanland, bearbeitete die scandinavische Flora.
- Harv.*, Harvey, engl. Botaniker.
- Hasselq.*, F. Hasselquist, ein Schwede, welcher Syrien, Kleinasien etc. ber. † 1752.
- Hayne*, F. G., Hayne, † 1832 als Professor der Botanik zu Berlin. Gab auch früher mit F. Dreves (Drev. et Hayn.) getreue Abbildungen u. Zergliederungen deutscher Gewächse heraus.
- Hedw.*, J. Hedwig, † 1799 als Prof. der Botanik zu Leipzig.
- — R. Hedwig, dessen Sohn. † 1806.
- Hegetsch.*, J. Hegetschweiler, Arzt, Regierungsrath, Botan. etc. zu Zürich. † 1839.
- Heist.*, L. Heister, Professor zu Helmstädt. † 1758.
- Hell.*, F. Heller, Professor der Botanik zu Würzburg.
- Hellen.*, C. N. Hellenius, Professor zu Abo.
- Henck.*, Graf Henkel v. Donnersmark, preuss. Regierungsrath zu Merseburg, auch Bot.
- Hensl.*, Henslow, Professor der Botanik zu Cambridge.
- Herb.*, W. Herbert, Geistlicher und Botaniker zu Spofforth in England. † 1825.
- Herbich*, F., österreichischer Militärarzt und Botaniker.
- Herit.* s. L'Heritier.
- Herm.*, P. Hermann, † 1695 als Professor der Botanik zu Leyden, bereiste Ceylon.
- Heuffel*, J., ungarischer Botan.
- Heyn.*, Benj. Heyne, ein deutsch. Botan. † 1819 in Ostindien.
- Hil.*, Aug. St.-Hilaire, Akademiker zu Paris, welcher Südamerika in botanischer Hinsicht bereiste.
- — Jaume St.-Hilaire, Akademiker und Bot. zu Paris.
- Hill*, John, Arzt und Botaniker zu London. † 1775.
- Hilsenb.*, Hilsenberg, deutscher Gärtner, Botaniker u. Reisender. † 1824 in Madagascar.
- Hladn.*, Hladnik, Prof. z. Laibach.
- Hochst.*, Ch. F. Hochstetter, Professor u. Stadtpfarrer zu Esslingen. †.
- Hökert*, Bot. zu Abo in Finnland.
- Hoffm.*, G. F. Hoffmann, † 1826 als Prof. d. Bot. zu Moskau.
- Hffmsg.*, J. C. Graf von Hoffmannsegg, Botanik. zu Dresden, bereiste Portugal.
- Hodg.*, Hodgins, engl. Handelsgärtner.

- Höfs*, Franz v., österr. Forstmann.
Hohenack., R. F. Hohenacker, ein Würtemberger, Arzt zu Elisabethpol, bereiste als Bot. d. caucasisch-georgische Flor.
Holl., Hollwell, engl. Botaniker.
Hook., G. J. Hooker, Professor der Botanik zu Glasgow, einer der berühmtesten Botaniker.
Hopp., D. H. Hoppe, Professor und Director der botanischen Gesellschaft zu Regensburg.
Hornem., J. W. Hornemann, Prof. u. Direct. d. botanischen Gartens zu Kopenhagen.
Hornsch., F. Hornschuch, Prof. der Botanik zu Greifswalde.
Hort., Hortorum, der Gärten.
Hortul., Hortulanorum, der Gärtner.
Hort. s. H. Berol., H. Berolinensis. *H. Dresd.*, H. Dresdensis. *H. Kew.*, H. Kewensis. *H. Monac.*, H. Monacensis. *H. Par.*, H. Parisensis. *H. Taur.*, H. Taurinensis. *H. Vindob.*, H. Vindobonensis etc.
H. Tr., Transactions of the London Horticultural Society.
Host, N. Th., k. k. österreich. Leibarzt, Bearbeiter der österreichischen Flora. + 1834.
Houst., G. Houston, engl. Bot. + 1733 in Neuspanien.
Houtt., Mart. Houttuyn, Arzt u. Naturforsch. z. Amsterdam. +
Huds., W. Hudson, Apotheker und Bot. zu London. + 1793.
Hüg., C. Baron v. Hügel, Director der botanischen Anstalten zu Wien, bereiste Neuholland und Ostindien.
Humb., A. Baron v. Humboldt, k. preufs. Kammerherr etc., berühmt als Naturforscher und Reisender.
Hunt., W. Hunter, Arzt und Botaniker in Ostindien.
J. B., J. Bevis, engl. Gärtner.
J. C., J. Cree, engl. Handelsgärtner.
J. Sm., J. Smith, Gehülfe am k. botanischen Garten zu Kew.
Jack, Wilhelm, engl. Botaniker, welcher Sumatra etc. untersuchte.
Jacks., G. Jackson, engl. Bot.
Jacq., N. J. Baron v. Jacquin, Prof. u. Direct. d. botanischen Gartens zu Wien. + 1820.
— *fil.*, J. F. Baron v. Jacquin, dessen Sohn u. Nachfolg. + 1839.
James., W. Jameson, englischer Botaniker und Reisender.
Jan, Georg, Prof. der Botanik zu Parma.
John., Dr. Johnstone, englischer Botaniker.
Jon., W. Jones, Obrichter in Bengalen, durchforschte in botanischer Hinsicht dieses Land. + 1794.
Isert, Paul Erdm., ein Däne, bereiste Guinea und sammelte daselbst Pflanzen. +
Isn., An. Dauty d'Isnard, Prof. der Botanik zu Paris. + 1724.
Juss., A. L. v. Jussieu, + 1836 als Akademiker und Professor der Botanik zu Paris.
Ad. Juss., Adrian von Jussieu, des Vor. Sohn u. Nachfolger.
K., W. D. J. Koch, Hofrath, Profess. u. Direct. des botan. Gartens zu Erlangen.
K. et W., Knowles und Westcott, engl. Gärtner und Bot.
Kämpf., E. Kämpfer, aus Lemgo, Arzt und Botaniker, auch berühmt als Reisender. + 1716.
Kalm, Peter, Prof. der Bot. zu Abo, bereiste Nordam. + 1779.
Karw., Baron v. Karwinski, ein Baier, bereiste in neuester Zeit Brasilien und Mexico.
K. et Z., Karwinski u. Zuccarini.
Kaulf., G. F. Kaulfufs, + 1830 als Professor zu Halle.
Ker, J. Bellender Ker, früher Gawler, englisch. Botaniker.
Kit., Kitaibel, + 1817 als Prof. u. Vorsteher des bot. Gartens zu Pesth, vergl. auch W. K.
Kl., M. Klotzsch, Custos am k. botanisch. Museum zu Berlin.
Knight s. Salisbury.
Köl., G. L. Köler, Professor d. Naturgeschichte zu Mainz.
Köll., J. L. Kölle, Verfasser von Beobachtungen über die Gattung Aconitum. +
Kön., J. G. König, ein Däne, + 1785 als Missionsarzt in Tranquebar, war eifriger Botaniker.
Kört., Franz Körte, bearbeitete mit Schweigger die Phanerogamen der Gegend von Erlangen.
Kon., C. König, gab mit Sims die Annales of Botany heraus.
Krock., A. J. Krockner, Verfasser einer Flora von Schlesien.
Kütz., F. T. Kützing, Lehrer d. Naturgesch. zu Nordhausen.
Kth., K. S. Kunth, Professor der Botanik zu Berlin, Mitbearb. der v. Humboldt'schen und Bonpland'schen botanischen Schätze, daher H. B. K.
Kunz., G. Kunze, Professor u. Director des botanisch. Gartens zu Leipzig.
L., Carl von Linné, der berühmte schwed. Naturforscher, + 1778 als Professor zu Upsala.
L. fil., dessen Sohn und Nachfolger. + 1783.
La Bill., J. L. La Billardière, französ. Akademiker und Botaniker, bereiste Syrien und Neuholland. + 1834.
Lallem., Avé Lallemand, Mitdirector oder Adjunct am k. botan. Garten zu Petersburg.
Laestad., L. L. Laestadius, ein schwed. Geistlicher, welcher Lappland in bot. Hins. bereiste.

- Lagasc.*, M. Lagasca, Prof. u. Vorsteher des botan. Gartens zu Madrid, wurde durch die politischen Unruhen 1823 aus seinem Vaterlande vertrieben.
- Lam.*, J. B. Monet de Lamarck, französischer Akademiker u. Naturforscher. † 1836.
- Lamb.*, Aylmer Bourke Lambert, Vicepräsident der Linné'schen Societät zu London.
- Lang*, Apotheker und Botaniker zu Neutra in Ungarn.
- Langsd.*, G. v. Langsdorf, kais. russ. Consul in Brasilien, begleitete als Naturforscher den Capitain Krusenstern auf seiner Reise um die Welt.
- Lapeyr.*, P. Picot-Lapeyrouse, Praefect etc. zu Toulouse, Bearb. der Pyrenäen Flor. †.
- La Roch.*, F. La Roche, französischer Botaniker.
- Lauth*, Th., Verf. einer Monographie der Gattung *Acer*.
- Lawrence*, engl. Pflanzenmaler.
- Laws.*, Ch. Lawson, Verfasser des *Agriculturist's Manual*.
- Laxars.*, J. Laxarsa, s. *Lexarza*.
- Laxm.*, Erik Laxmann, ein Schwede, Pastor zu Kolywan in Sibirien, lieferte Beiträge zur dasigen Flora. † 1796.
- Leandr.*, P. Leandro do Sacramento, Präfect des botanisch. Gartens zu Rio Janeiro.
- Lechen* s. *Leschen*.
- Lec.*, Leconte, amerik. Botan.
- Ledeb.*, K. F. v. Ledebour, k. russ. Staatsrath, früher Professor zu Dorpat.
- Lee et Kenned.*, Lee u. Kennedy, berühmte engl. Handelsgärtner zu Hammersmith bei London.
- Leers*, J. D., Apotheker zu Herborn, Verfasser der dasigen Flora. † 1774.
- Lehm.*, J. C. G. Lehmann, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Hamburg.
- Lejeun.*, A. L. S. Lejeune, Arzt zu Verviers, Bearbeiter der belgischen Flora.
- Lem.*, Lemaire, Bearbeiter der Cacteen.
- Lem.*, Leman. franz. Botaniker.
- Lepech.*, Ivan Lepechin, Akademiker zu Petersburg, bereiste das nördliche Rußland.
- Leprieur* vergl. *Perrotet*.
- Lepellet.*, Lepelletier, französischer Botaniker.
- Lesch.*, Leschenault, de la Tour, französ. Naturforscher und Reisender. † 1826.
- Less.*, C. F. Lessing, deutscher Botaniker u. Reisender, vorzügl. Bearbeiter der Synanthereen.
- Lestib.*, Lestiboudois, J. B. † 1805, F. J. † 1815 et T., Großvater, Sohn und Enkel, Botaniker und Professoren zu Lille; letzterer Bearbeiter einer Monographie der Cyperaceen.
- Lewis*, Viceconsul in Louisiana, bereiste auch in botanischer Hinsicht Nordamerika.
- Lexarza*, gab mit P. de la Llave ein Werk über mexicanische Pflanzen heraus.
- Lex. et Lalav.*, Lexarza et de la Llave.
- Leyss.*, F. W. v. Leyfser, Kriegs- und Domainentath zu Halle, Bearbeiter der dasigen Flora. † 1825.
- L'Her.*, C. L. L'Heritier de Bruttelle, Botaniker zu Paris, ermordet daselbst 1800.
- Lib.*, M. A. Libert, Botanikerin zu Malmedy.
- Libosch.*, J. Liboschitz, Bearbeiter der russischen Flora.
- Lichtenst.*, H. Lichtenstein, Prof. und Director des zoologischen Museums zu Berlin etc., bereiste das Vorgebirge der guten Hoffnung.
- Liebig*, Handelsgärtner zu Dresden.
- Ligthf.*, J. Lightfoot, Pfarrer zu Gothham, gab eine schottische Flora heraus. † 1788.
- Liljebl.*, S. Liljeblad, Prof. zu Upsala. † 1815.
- Lindb.*, A. E. Lindblom, Botaniker und akademischer Docent zu Lund.
- Lindl.*, J. Lindley, Professor der Botanik zu London.
- Lk.*, H. F. Lk., Geheim. Rath, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Berlin etc.
- Lk. et Otto*, vergl. *Otto*.
- Llav.*, P. de la Llave, mexicanischer Botaniker, vergl. *Lexarza*.
- Lobel.*, M. Lobelius, ein Belgier, † 1616 als kön. engl. Botanikus.
- Lock.*, Lockhart, Intendant des botanischen Gartens auf Trinidad.
- Lodd.*, K. Loddiges, berühmter Handelsgärtner zu London, Herausgeber des *Botanical Cabinet*.
- Löfl.*, P. Löffling, ein Schwede, bereiste Spanien und Südamerika. † 1756.
- Loes.*, J. Loesel, Prof. zu Königsberg, † 1656. Bearbeiter der preussischen Flora.
- Lois.*, J. L. A. Loiseleur-Deslongchamps, französ. Arzt und Botaniker.
- Lotterm.*, T. Lottermoser, preussischer Botaniker.
- Loud.*, J. C. Loudon, Verfasser der *Encyclop. of Gardening*, of plants, des *Hortus britannicus*, des *arboret. britann.* Vergl. auch A. B.
- L. Tr.*, Linnean Society's Transactions.

- Lour.**, J. de Loureiro, ein portugiesischer Missionär, welcher Cochinchina bereiste und eine Flora dieses Landes herausgab. †.
- Low**, Hugh, engl. Handelsgärtner zu Clapton.
- Lowe**, R. T., engl. Naturforscher, welcher Madeira und Porto Santo bereiste. †.
- Lumn.**, St. Lumnitzer, bearbeit. die Flora von Preßburg.
- Lunan**, John, bearbeitete die Flora von Jamaika.
- Lyon**, J., nordamerik. Botaniker.
- Macb.**, J. Macbride, Arzt in Carolina.
- Ma. C.**, Mackays Catalogue, Handelsgärtner zu Clapton.
- Mack.**, J. T. Mackay, Verfasser einer Flora von Irland.
- Mak.**, J. Makoi, Handelsgärtner zu Lüttich.
- M. B.**, F. M. v. Bieberstein, kais. russ. Staatsrath, Bearbeiter der taurisch-caucasischen Flora. †. 1826.
- M. et S.**, Mocino und Sessé, mexicanische Botaniker.
- Mal.**, W. Malcolm, Handelsgärtner zu Kensington.
- Marcgr.**, G. Marcgrav, ein deutscher Naturforscher und Maler, welcher Brasilien bereiste. † 1644.
- Marn.**, R. Marnock, Vorsteh. des botan. Gartens zu Sheffield.
- Marsh.**, Humphry Marshall, ein Besitzer nordamer. Ländereien, welcher über die daselbst einheimischen Bäume und Sträucher schrieb. †.
- Mart.**, K. F. P. von Martins, Hofrath, Professor und Director des botan. Gartens zu München; bereiste Brasilien.
- Mass.**, F. Masson, ein englisch. Gärtner, Botaniker und Reisender. † 1805 in Canada.
- Mast.**, W. Masters, Inspector des Museums zu Canterbury.
- Maton**, G. G., englischer Arzt und Botaniker.
- Matth.**, Patrick Matthew, englischer Botaniker.
- Maund**, B., englischer Gärtner und Botaniker.
- Maur.**, E. Mauri, italienischer Bot., vergl. auch Sebastiani.
- Mayc.**, J. D. Maycock, Bearb. einer Flora Barbadiens.
- May.**, J. Mayer, ein Arzt und Botaniker zu Prag. †.
- Medic.**, F. K. Medicus, Vorsteh. d. Gartens zu Schwetzingen. † 1809.
- Meerb.**, N. Meerburg, Inspector des botan. Gart. zu Leyden.
- Meisn.**, V. F. Meisner, Profess. der Botanik zu Basel.
- Menouv.**, Menonville, französischer Botaniker.
- Menz.**, A. Menzies, ein Schottländer, Begleiter Vancouver's auf der Reise nach den nordwestlichen Küsten Amerikas.
- Mérat**, X. V., Bearbeiter einer Flora von Paris.
- Mert.**, F. C. Mertens, Vorsteher der Handelsschule zu Bremen, Mitarbeiter des Hofraths Koch an der großen deutschen Flora. † 1831.
- Meyen**, J. F., deutscher Naturforscher, begleitete den Capitain Wendt (1830 — 1832) auf seiner Reise um die Erde.
- Mey.**, E. H. F. Meyer, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Königsberg.
- — G. F. W. Meyer, Professor zu Göttingen.
- — C. A. Meyer, Mitdirector oder Adjunct am kais. botanischen Garten zu Petersburg.
- Metzg.**, J. Metzger, Garteninspector zu Heidelberg.
- Mchx.**, A. Michaux, franz. Bot. und Reisender. † 1803.
- Michel.**, P. A. Micheli, Vorsteher des botanischen Gartens zu Florenz. † 1737.
- Mielichh.**, Mielichhofer, Bergbeamter u. Bot. in Salzburg.
- Mik.**, J. C. Mikan, Prof. d. Bot. zu Prag, bereiste Brasilien. †.
- Mill.**, Philipp Miller, Vorsteher des Gartens zu Chelsea, berühmt durch sein Gärtner-Lexicon. † 1771.
- Miq**, F. A. Miquel, holländischer Botaniker.
- Mirb.**, F. F. Brisseau-Mirbel, Akademiker u. Prof. zu Paris.
- Mitch.**, J. Mitchell, Arzt und Botaniker in Virginien. †.
- Moc**, Mocino, † 1819, s. M. et S.
- Möhr.**, P. H. Möhring, Arzt u. Botaniker zu Jever. † 1792.
- Mch.**, C. Mönch, Professor und Director des botanischen Gartens zu Marburg. † 1805.
- Mohr**, D. M. H., Prof. zu Kiel. †.
- Molin.**, J. J. Molina, Missionair und Botaniker in Chili. †.
- Monn.**, J. P. Monnard, Vorsteh. des Collegs zu Nyon, Mitarbeiter an Gaudin's Schweizer-Flora.
- Monni.**, A. Monnier, Botaniker in Nancy, gab eine Monographie der Hieracien heraus.
- Montbr.**, G. Coquebert de Montbret, französischer Botaniker, bereiste mit Aucher-Eloy den Orient. † 1834.
- Mont.**, Lars Montin, schwedischer Arzt und Bot. † 1785.
- Moon.** Cat., Moon's (englischer Handelsgärtner) Catalog.
- Mord.**, Mordant de Launay, französ. Botaniker s. Delaun.
- Morett.**, G. Moretti, Professor der Botanik zu Pavia.
- Moq. Tand.**, Moquin-Tandon, französischer Botaniker.
- Moric.**, St. Moricand, Botaniker zu Genf.

- Moris**, G. H., Professor und Vorsteher des botanischen Gartens zu Turin.
- Moris.**, R. Morison, † 1683 als Professor und Vorsteher des botanisch. Gartens zu Oxford.
- Morren**, Ch., Professor der Botanik zu Lüttich.
- Mout.**, J. P. Mouton-Fontenille de la Clotte, französ. Botan.
- Mühlbg.**, H. Mühlenberg, Prediger und Botaniker zu Lancaster in Pensylvanien. † 1815.
- Müll.**, A. F. Müller, Professor der Naturgeschichte zu Copenhagen. † 1784.
- Münch.**, O. v. Münchhausen, hanöverscher Oekonom, Gartenfreund u. Naturforscher. †
- Murr.**, J. A. Murray, Professor und Director des botanischen Gartens zu Göttingen. † 1791.
- Muss.**, A. Graf Mussin-Puschkin, bereiste den Caucasus. † 1805.
- Mutel**, A., französ. Botaniker.
- Mut.**, J. B. Mutis, durchforschte 40 Jahre Südamerika als Botaniker. † 1809.
- Neck**, N. J. von, † 1793 als churpfälzischer Botaniker zu Manheim.
- Nect.**, H. Nectoux, begleitete Napoleon Buonaparte als Botaniker nach Aegypten.
- Née**, Louis, französischer Botaniker und Reisender, welcher Malaspina auf seiner Reise um die Erde begleitete. †
- N. E.**, B. G. Nees v. Esenbeck, Präsident der kaiserl. Leopoldinisch-Karolinischen Akademie der Naturforscher, Professor und Director des botanischen Gartens zu Breslau.
- — T. F. L. Nees von Esenbeck, dessen Bruder, Profess. u. Mitdirect. des botanischen Gartens zu Bonn. † 1837.
- Neill**, Dr., engl. Botaniker und Gartenfreund.
- Nestl.**, B. G. Nestler, Professor zu Straßburg.
- Neuw.**, Maximilian Fürst von Wied Neuwied, rühmlichst bekannt als Naturforscher, bereiste Brasilien.
- Niss.**, F. Nissolle, franz. Bot. †
- Niv.**, Niven, englischer Botaniker und Reisender.
- Nocc.**, Domenico Nocca, Professor und Vorsteher des botanischen Gartens zu Pavia.
- Nois.**, L. Noisette, berühmter französisch. Handelsgärtner.
- Nolt.**, E. F. Nolte, Professor der Botanik zu Kiel.
- Noronna** (Noronha), Ferdinand de, ein spanischer Naturforscher und Reisender. † 1787 auf Isle de France.
- Nutt.**, Th. Nuttall, Professor der Botanik zu Philadelphia.
- Oed.**, G. B. von Oeder, Präfect des Oldenburger Kreises in Holstein, Begründer der Flora Danica. † 1791.
- Oliv.**, G. A. Olivier, französ. Arzt und Naturforscher, bereiste das türkische Reich, Persien u. Aegypten. † 1814.
- Opitz**, Botaniker etc. zu Prag.
- Orteg.**, B. G. de Ortega, Professor u. Direct. des botanischen Gartens zu Madrid. †
- Osb.**, P. Osbek, schwedischer Schiffsprediger, bereiste als Naturforscher China und die ostindischen Inseln. † 1805.
- Ott.**, F. Otto, Inspector des botanischen Gartens zu Berlin.
- Lk. et Otto**, Link und Otto, vergl. Lk.
- Othh**, französischer Botaniker und Mitarbeiter an De Candolle's Prodrömus.
- P. B.**, A. M. F. J. Palisot de Beauvois, franz. Akademiker, Bot. und Reisender. † 1820.
- Pall.**, P. S. Pallas, Akademiker zu Petersburg, berühmt als Reisender und Naturforscher. † 1811.
- Panz.**, G. W. Panzer, Arzt, Botaniker und Entomolog zu Hersbruck b. Nürnberg. † 1829.
- P.**, C. H. Persoon, † 1836 als Botaniker zu Paris.
- Park.**, C. Parker, Botaniker in Demerara.
- Parm.**, Parmentier, berühmter Pflanzencultivateur zu Engghien in Belgien.
- Patrin**, E. L. M., bereiste das Imausgebirge. †
- Pav.**, J. Pavon, vergl. R. et P.
- Paxt.**, J. Paxton, Gärtner und Botaniker des Herzogs von Devonshire zu Chatsworth.
- Penny**, George, englischer Botaniker und Gärtner.
- Perpent.**, Helena Perpent, Botanikerin zu Como.
- Perrot.**, S. Perrotet, französ. Botaniker, bereiste mit Leprieux Senegambien.
- Petagn.**, V. Petagna, Botaniker zu Neapel. †
- Petiv.**, J. Petiver, englischer Botaniker. † 1718.
- Pett.**, F. Petter, Bearbeiter der dalmatischen Flora.
- Pfr.**, L. Pfeiffer, Medic. Doctor zu Cassel, Bearbeiter der Cacteen.
- Pill. et Mitterp.**, M. Piller et L. Mitterpacher von Mitterburg, bereisten die slavonische Provinz Posega.
- Pio**, ein piemontesischer Botaniker, gab eine Monographie der Gattung Viola heraus.
- Piso**, G., Arzt u. Naturforsch., welcher Brasilien bereiste. †
- Pluk.**, L. Pluknet, Vorsteher der königl. Gärten bei London. † 1706.
- Plum.**, C. Plumier, königl. fran-

- zösischer Botaniker, bereiste Westindien und Südamerika. † 1704.
- Pöpp.*, Ed. Pöppig, Prof. der Naturgeschichte zu Leipzig, bereiste Pensylvanien, Cuba, Chili, Peru etc.
- Pohl*, J. J., Prof. und Custos des brasilianischen Museums zu Wien, bereiste Brasilien. † 1834.
- Poir.*, J. L. M., Poiret, franz. Botaniker, bereiste das nördliche Afrika.
- Poit.*, A. Poiteau, franz. Botaniker, bereiste St. Domingo.
- Poit. et Turp.* vergl. *Turpin*.
- Poll.*, J. A. Pollich, Arzt etc. † 1780 zu Kaiserslautern.
- Pollin.*, C. Pollini, Prof. und Vorsteher des botanischen Gartens zu Verona. † 1833.
- Portensch.*, F. v. Portenschlag-Ledermeyer, österreichischer Botaniker. † 1821.
- Pour.*, A. Pourret, franz. Botaniker.
- Pr. C.*, Prince's (Handelsgärtzu Neu-York) Catalog.
- Presl*, J. S., Custos am naturhistor. Museum zu Prag.
- — K. B., Prof. an der Universität zu Prag.
- Puer.*, Puerari, Prof. zu Copenhagen.
- Pursh*, Friedr. Pursh (Pursch), ein Gärtner u. Botaniker aus Sachsen, bereiste Nordamerika und gab eine Flora dieses Landes heraus. † 1820.
- Pyl.*, Bachelot de la Pylaie, franz. Botaniker u. Reisender.
- Quer Josef y Martinez*, Prof. zu Madrid. † 1764.
- R. (H.B.)*, Rupp aus Gießen, Bearbeiter der Flora von Jena. † 1719.
- R. et P.*, Ruiz et Pavon; *R. et S.*, Römer et Schultes.
- Raddi*, G., früher Aufseher des Naturaliencabinet's zu Florenz, bereiste als Botaniker Brasilien, Madeira u. Aegypten, wo er 1829 starb.
- Rafn.*, C. F. Rafinesque-Schmalz, bearbeitete früher die Naturgeschichte Siciliens, später Nordamerikas, wo er als Prof. der Naturgesch. zu Lexington lebt.
- Ram.*, L. F. E. Ramond de Carbonnières, Préfect des Departements du Puy-de-Dome, Bearbeiter d. Pyrenäen-Flora.
- Rasp.*, Raspail, französ. Botaniker.
- Rau*, Ambr., Prof. zu Würzburg, † 1830.
- Ray*, John (Rajus), engl. Naturforscher. † 1705.
- Rebent.*, J. F. Rebentisch, Verfasser einer Flora der Neumark.
- Redout.*, P. J. Redouté, berühmter Pflanzenmaler zu Paris.
- Redows.*, Redowsky, russischer Botaniker. †.
- Reich.*, J. J. Reichard, Arzt und Botaniker zu Frankfurt am Main. † 1789.
- Rehb. (Rchbch.)*, H. G. L. Reichenbach, Hofrath, Professor und Director des botan. Gartens u. naturhistorischen Museums etc. zu Dresden.
- Reboul*, franz. Botaniker.
- Reinw.*, H. G. C. Reinwardt, Professor und Director des botan. Gartens zu Leyden, bereiste Java.
- Relh.*, Rich. Relhan, ein Geistlicher, Bearbeiter der Flora von Cambridge.
- Renault.*, P. A., Verfasser einer Flora der Normandie.
- Req.*, Requien, franz. Botaniker.
- Retz.*, A. J. Retzius, Prof. der Naturgesch. zu Lund. † 1821.
- Reyn.*, L. Reynier, Arzt und Botaniker zu Lausanne. † 1824.
- Rheed.*, H. van Rhee de tot Drakenstein, Statthalter der holländisch-ostindischen Compagnie auf Malabar, Verfasser des Hortus malabaricus. † 1691.
- Rich.*, L. C. Richard, Akademiker und Prof. der Botanik an der medicinischen Schule zu Paris. † 1821.
- Achill. Richard*, dessen Sohn und Nachfolger.
- Richards.*, J. Richardson, Chirurg und Botaniker, Begleiter des Capitain Franklin nach den Polarländern.
- Richt.*, H. E. Richter, Prof. der Medicin zu Dresden, bearbeitete mit Th. Klett († 1827) eine Flora von Leipzig, und veranstaltete eine neue Ausgabe der Linnéischen Werke.
- Ridd.*, J. L. Riddel, bearbeitete eine Flora der westlich-nordamerik. Staaten.
- Ried.*, Riedel, bereiste mit G. v. Langsdorf als Botaniker, im Auftrage der russischen Regierung, Brasilien.
- Riss.*, A. Risso, aus Nizza, (mit Poiteau) Verfasser einer Naturgeschichte der Orangenbäume etc.
- Rivin.*, A. Q. Rivinus, Prof. d. Botanik zu Leipzig. † 1725.
- Robill et Cast.* vergl. *Castag.* et *Rob.*
- Rob.*, Robson, ein engl. Botaniker.
- Roch.*, A. Rochel, Gartenmeister am Universitätsgarten zu Pesth, durchforschte die ungarische Flora.
- Rodrig.*, Rodriguez, spanischer Botaniker. †.
- Röhl*, J. C. Röhling, Inspector zu Massenheim, Verfasser

- einer deutshen Flora, deren neue Auflage von Koch und Mertens bearbeitet wird. †.
- Röm.*, J. J. Römer, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Zürich. † 1819.
- Röm. v. L.*, Rudph. v. Römer auf Löthhain und Neumark in Sachsen, ausgezeichnete Botaniker und Besitzer eines reichen Herbariums etc.
- Ron.*, Ronalds, Handelsgärtner zu Brentfort.
- Röp.*, J. Röper, Prof. der Botanik zu Rostock (früher zu Basel).
- Röpert*, Freih. v., Botaniker zu Coburg.
- Rohd.*, M. Rhode, Arzt und Botaniker aus Bremen, bereiste das südl. Frankreich. †.
- Rol.*, D. Rolander, ein Schüler des Linné, bereiste Surinam etc. †.
- Rosc.*, W. Roscoe, Botaniker zu Liverpool, gab ein Prachtwerk über Scitamineen heraus.
- Rostk.*, F. G. T. Rostkovius, Arzt und Botaniker in Stettin.
- Roth*, A. W., Arzt und Botaniker zu Vegesack in Niedersachsen, Herausgeber einer deutschen Flora. †.
- Rottb.*, C. F. Rottböll, Prof. zu Kopenhagen. † 1797.
- Rottl.*, Rottler, evangel. Missionair in Ostindien. †.
- Rorb.*, G. Roxburgh, Arzt der engl.-ostindischen Compagnie und Vorsteher des botanischen Gartens zu Madras. †.
- Roy.*, A. van Royen, Prof. u. Director des botan. Gartens zu Leyden. † 1779.
- Royle*, J. Forbes Royle, Arzt der ostindischen Compagnie und Director des botanischen Gartens zu Saharumpore.
- Ruch.*, J. Ruchinger, Gärtner am botan. Garten zu Venedig.
- Rudg.*, L. Rudge, englischer Botaniker.
- Rud.*, J. F. Rudolph, Akademiker und Botaniker zu Petersburg. † 1809.
- Rudolph.*, C. A. Rudolphi, Geheime Rath und Prof. der Anatomie zu Berlin. †.
- Ruiz* (R. et P.), Hippol. Ruiz et J. Pavon, zwei spanische Botaniker, bereisten Peru u. Chili. †.
- Rumpf* (Rumphius) G. E., aus Hanau, Oberkaufmann und Mitglied der holländischen Rathversammlung zu Amboina, berühmt als Naturforscher. † 1706.
- Ruthe.* J. F., Oberlehrer in Berlin, bearbeitete eine Flora der Mark Brandenburg und Niederlausitz.
- Russ.*, A. Russel, Arzt u. Naturforscher zu Aleppo. † 1768.
- S. et W.*, Schrader et Wendland.
- Sabin.*, J. Sabine, engl. Botaniker.
- Sadl.*, J. Sadler, Prof. der Botanik zu Pest.
- Salisb.*, R. A. Salisbury, engl. Botaniker.
- Salm.*, J., Fürst von Salm-Reifferscheidt - Dyck, Besitzer eines schönen Gartens zu Dyck bei Düsseldorf; berühmt als Kenner der Saftpflanzen.
- Salzm.*, P. Salzmann, Botaniker zu Montpellier.
- Sanguin.*, P. Sanguinetti, ital. Botaniker.
- Santi*, G., Naturforscher zu Pisa.
- Sauv.*, F. Boissier de Sauvages, Prof. in Montpellier. †.
- Sav.*, G. Savi, Prof. der Botanik zu Pisa.
- Savign.*, Savigny, franz. Botaniker.
- Schang.*, P., Schangin, Insp. der Bergwerke zu Barnaul in Sibirien, sammelte auch daselbst Pflanzen. † 1816.
- Schauer*, Dr., Assistent am botanischen Garten zu Breslau.
- Scheidw.*, Scheidweiler, Bearbeiter der Cacteen.
- Schelh.*, Schelhase, Handelsgärtner zu Cassel.
- Scheuch.*, J. Scheuchzer, † 1737, et J. J. Scheuchzer, † 1753, Professoren zu Zürich.
- Schied.*, C. J. W. Schiede, Botaniker aus Hessencassel, bereiste mit F. Deppe aus Berlin Mexico und † 1836 daselbst als praktischer Arzt.
- S. et D.*, Schiede und Deppe.
- Schimp.*, C. Schimper, Botaniker zu Heidelberg. W. Schimper, Botaniker u. Reisender für den württemberg. Reiseverein.
- Schk.*, C. Schkuhr, Universitätsmechanikus u. Botaniker zu Wittenberg. † 1811.
- Schltld.*, D. F. L. v. Schlechtendal, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Halle. S. et C., Schlechtendal und Chamisso.
- Schlchr.*, J. C. Schleicher, Botaniker zu Bex in der Schweiz.
- Schmid.*, C. C. Schmidel, Prof. zu Erlangen. † 1793.
- Schm.*, F. W. Schmidt, Prof. zu Prag. † 1796.
- Schneev.*, G. Vorhelm Schneevooft, Gärtner zu Harlem.
- Schomb.*, Rob. Schomburgk, bereiste als Naturforscher in neuester Zeit Surinam.
- Schott*, H., Inspector des botanischen Gartens zu Wien, † 1819, und H. Schott, dessen Sohn, Garteninspector zu

- Schönbrunn bei Wien, bereiste Brasilien. S. et E., Schott und Endlicher.
- Schousb., P. K. A. Schousboe, dänischer Consul in Marokko.
- Schrad., H. A. Schrader, Hofrath, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Göttingen. † 1836.
- Schrk., F. v. Paula Schrank, Akademiker und Director des botan. Gartens zu München. †.
- Schreb., J. C. D. v. Schreber, Hofrath und Prof. der Naturgesch. zu Erlangen. † 1810.
- Schübl., G. Schübler, Prof. zu Tübingen. † 1834.
- Schult., J. A. Schultes, Director der chirurgischen Schule zu Landshut. † 1831.
- — fil., J. H., dessen Sohn, † 1840 als praktischer Arzt zu München.
- Schultz., K. F., Arzt u. Botanik. zu Neubrandenburg. † 1837.
- Schultz, F. W., Arzt und Botaniker zu Zweibrücken.
- Schumach., C. F. Schumacher, Prof. der Anatomie zu Kopenhagen. † 1830.
- Schwägr., F. Schwägrichen, Prof. der Naturgeschichte zu Leipzig.
- Schweig., A. F. Schweigger, Prof. der Naturgeschichte u. Director des botan. Gartens zu Königsberg, wurde 1821 in Sicilien ermordet.
- Schwein., L. D. v. Schweiniz, Missionair und Botaniker zu Bethlehem in Pensylvanien.
- Scop., J. A. Scopoli, † 1788 als Prof. der Naturgeschichte zu Pavia.
- Sebast., A. Sebastiani, Prof. zu Rom.
- Seg., J. F. Seguieur, aus Nismes, lebte als Botaniker zu Verona. † 1784.
- Seidel, Traug. Jacob, Handeldsgärtner in Dresden, vorzüglich berühmt durch seine Camellienculturen und deren Verbreitung.
- Sellow., Fr., aus Potsdam, bereiste als Botaniker Brasilien und starb daselbst 1831.
- Sering, N. C. Seringe, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Lyon.
- Sessé, mexicanischer Botaniker, a. Mocino.
- Sibth., J. Sibthorp, Prof. der Botanik zu Oxford, bereiste Griechenland und Kleinasien. † 1796.
- Sieb., F. W. Sieber, Botaniker aus Prag, berühmt als Reisender und fleißiger Pflanzensammler.
- Siebold., P. F. v., holländischer Stabsarzt, durchforschte in naturhistorischer Hinsicht in neuester Zeit Japan.
- Siegesb., J. G. Siegesbeck, Akademiker und Vorsteher des botanischen Gartens zu Petersburg. †.
- Sims., Jac., engl. Botaniker, setzte das Botanical Magazine von 1784—1826 fort. — John Sims bearbeitete mit Karl König die Annals of Botany.
- Sin., Sinclair, engl. Handeldsgärtner.
- Sinning, Inspector des botan. Gartens in Bonn.
- Sloan., H. Sloane, k. Leibarzt, Präsident der kön. Societät zu London, bereiste Westindien in naturhistorischer Hinsicht. † 1753.
- Sm., J. E. Smith, Präsident der Linnéischen Gesellschaft zu London, einer der ausgezeichnetsten Botaniker. † 1828. G. E. Smith, engl. Botaniker.
- Christ. Smith, Professor zu Christiania, bereiste die canarischen Inseln und das südwestl. Afrika. † 1816.
- Sm. Ayr., Smith, Handeldsgärtner zu Ayr.
- Soland., D. C. Solander, Begleiter des Sir. Joseph Banks auf einer Reise mit Capit. Cook. † 1786.
- Sonner., P. Sonnerat, französ. Reisender und Naturforscher. † 1781.
- Sowerb., J. Sowerby, ausgezeich. Pflanzenmaler. † 1822.
- Soy. Willem., H. F. Soyer Willemet, Botaniker zu Nancy.
- Spach., E., Adjunct am kön. naturhistorischen Museum zu Paris.
- Sparrm., A. Sparrman, schwedischer Naturforscher und Reisender. † 1820.
- Spenn., F. C. L. Spenner, Prof. der Botanik zu Freiburg im Breisgau.
- Spin., M., sardinischer Oberst und Garten-Botaniker.
- Spgl., C. Sprengel, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Halle. † 1833. Ant. Sprengel, dessen Sohn.
- Stechm., J. P. Stechmann, gab eine Monographie der Gattung Artemisia. †.
- Steph., F. Stephan, Prof. zu Moskau. † 1817.
- Stbg., K. Graf v. Sternberg, böhmischer Botaniker, gab eine Monographie der Steinbrecharten. † 1838.
- Steud., E. Steudel, Amtsphysikus zu Eßlingen, Verfasser des großen Nomenclator botanicus und Vorsteher des württemberg Reisevereins.
- Stev., C. v. Steven, k. russ. Staatsrath und eifriger Pflanzenforscher.

- Str.**, W. F. Strangways, engl. Botaniker.
- Sturm.**, J., Maler und Kupferstecher zu Nürnberg, Herausgeber einer deutsch. Flora.
- Sut.**, J. R. Suter, Prof. zu Bern, Herausgeber einer Schweizer-Flora. † 1827.
- Sutt.**, C. Sutton, engl. Botaniker.
- Sw.**, Ol. Swartz, Prof. und Botaniker zu Stockholm, bereiste Westindien. † 1818.
- Sweet**, Rob., Gärtner und Botaniker zu London. † 1839.
- Sym.**, M. Symes, engl. Gesandter in Ava.
- Szov.**, J. Szovits, ein Pharmaceut, bereiste als Botaniker Ungarn, Galicien, Cherson, Taurien, Persien. † 1831.
- T.**, J. Pitton de Tournefort, Prof. d. Botan. z. Paris. † 1708.
- Tabern.**, J. T. Tabernaemontanus (Jacob Theod. v. Bergzabern), † 1590 als Medicus und pfalzgräfl. Leibarzt zu Heidelberg.
- Targion.**, O. Targioni-Tozzetti, Prof. u. Director des botanischen und ökonom. Gartens zu Florenz. † 1829.
- Tausch**, J. F., Prof. und Botaniker zu Prag.
- Tenor.**, M. Tenore, Prof. und Vorsteher des botanischen Gartens zu Neapel.
- Thib.**, Thibaud de Chanvalon, französ. Botaniker.
- Thom.**, L. († 1823 zu Neapel) und E. Thomas, schweiz. Botaniker.
- Thor.**, J. Thore, Arzt u. Botan. zu Dax in Gascogne. † 1823.
- Thory**, C. A., franz. Botanik., Bearbeiter des Textes zu Réduit's Rosen.
- Thoua.**, (A. P. Th.) Aubert du Petit Thouars, franz. Akademiker, Botan. u. Reisender.
- Thoui.**, A. Thouin, Intendant des botanischen Gartens zu Paris. † 1824.
- Thuill.**, J. L. Thuillier, Prof. zu Paris und Herausgeber einer Flora dieser Gegend. † 1822.
- Thbg.**, C. P. Thunberg, Prof. der Botanik zu Upsala, bereiste Südafrika, Japan, Ceylon, Java etc. † 1828.
- Till.**, M. A. Tilli, Vorsteher des botan. Gartens zu Pisa. †
- Tin.**, V. Tineo, Prof. der Botanik zu Palermo.
- Tongue**, R., engl. Botaniker und Gärtner.
- Torr.**, J. Torrey, Arzt u. Prof. der Botanik zu New-York.
- Towns.**, R. Townson, bereiste Ungarn.
- Tratt.**, L. Trattinik, Custos d. bot. Museums zu Wien. †
- Trautv.**, E. R. v. Trautvetter, Directorgehilfe am kais. botan. Garten zu Petersburg.
- Trevir.**, L. C. Trevianus, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Bonn.
- Trin.**, K. B. v. Trinius, kais. russ. Staatsrath und Akademiker zu Petersburg, einer der gründlichsten Graskenner unserer Zeit.
- Turcz.**, Nik. v. Turczaninow, k. russ. Botanik. u. Reisender.
- Turn.**, Dawson Turner, engl. Botaniker.
- Turp.**, P. J. F. Turpin, franz. Botaniker und Pflanzenmaler, gab mit Poiteau eine Flora von Paris heraus.
- Turr.**, A. Turra, Prof. zu Vicenza.
- Tuss.**, F. R. de Tussac, franz. Botaniker, Verfasser einer Flora der Antillen.
- Twed.**, Tweedie, engl. Botaniker und Reisender.
- Uc.**, Ucria, Demonstrator der Botanik zu Palermo.
- Urv.** s. d'Urville.
- V.** (Vaill.), S. Vaillant, Prof. der Botanik zu Paris. † 1721.
- Vahl**, Martin, Prof. der Botanik zu Kopenhagen. † 1804.
- Vand.**, D. Vandelli, Prof. der Botanik zu Coimbra, bereiste Brasilien. †
- Van Eeden**, Madam, Pflanzencultivateur in Harlem.
- Vent.**, S. P. Ventenat, Prof. zu Paris. † 1808.
- Vest.**, L. v., Prof. und Proto-medicus zu Grätz in Steyermark. †
- Vib.**, E. Viborg, oder Wiborg, Prof. zu Kopenhagen. † 1822.
- Vigu.**, L. G. A. Vignier, Verfasser einer Naturgeschichte der Mohne und Argemonen.
- Vill.**, D. Villars, Arzt u. Prof. zu Grenoble, später zu Straßburg. † 1814.
- Vitm.**, F. Vitmann, Prof. zu Pavia. †
- Vis.**, R. v. Visiani, ital. Arzt und Botaniker, Bearbeiter der Flora von Dalmatien.
- Viv.**, R. v. Viviani, Prof. und Director des botanischen Gartens zu Genua.
- Volckam.** J. G. Volckamer, Arzt u. Botan. zu Nürnberg. † 1693.
- W.** (Willd.), L. Willdenow, Prof. und Director des botan. Gartens zu Berlin. † 1812.
- Wahlb.**, P. F. Wahlberg, Prof. der Botanik zu Stockholm.
- Wahlenb.**, G. Wahlenberg, Prof. der Botanik zu Upsala.
- Walk.** Arn., G. A. Walker-Arnott, schottländ. Botaniker.
- W. K.**, Graf F. A. v. Waldstein-Wartenberg und Prof. Kitabel, sieh. *Kit.*, Herausgeber der Flora von Ungarn. †
- Wall.**, N. Wallich, Oberintendant des botan. Gartens zu

- Calcutta. *Wall. et Royle*,
Wallich et Royle.
- Wallr.*, W. Wallroth, Kreis-
physikus und Botaniker zu
Nordhausen.
- Walt.*, Th. Walter, Herausge-
ber einer Flora v. Carolina. †
- Wangenh.*, F. A. J. v. Wangen-
heim, preuss. Oberforstmei-
ster, verweilte längere Zeit
in Nordamerika und gab ein
Werk über die dasigen Holz-
arten heraus. †
- Wats.*, H. C. Watson, engl.
Botaniker.
- Webb*, P. Barker, engl. Bota-
niker, bereiste die canarischen
Inseln.
- Web.*, G. H. Weber, Prof. zu
Kiel. † Vergl. *Wigg.* F.
Weber, dessen Sohn, Prof.
der Naturgeschichte zu Kiel
† 1823.
- Weig.*, C. E. v. Weigel, Prof.
zu Greifswalde. †
- W. H. B.*, Baxter jun., am bo-
tanischen Garten zu Oxford.
- Weih.*, Aug. Weihe, Arzt zu
Herfort in Westphalen, gab
mit C. G. Nees v. Esenbeck
ein Werk über die deutschen
Brombeersträucher heraus.
† 1834.
- Weinm.*, J. A. Weinmann, kais.
Garteninspector zu Pawlowsk.
- Weis.*, F. W., Herausgeber ei-
ner kryptogamischen Flora
von Göttingen (1770). †
- Weld.*, Baron von Welden,
k. k. österreichischer General,
durchforschte die Flora von
Dalmatien.
- Welw.*, Welwitsch, österreich.
Arzt, Botaniker u. Reisender.
- Wender*, G. W. F. Wenderoth,
Prof. und Vorsteher des botan.
Gartens zu Marburg.
- Wendl.*, J. C. Wendland, In-
spector des Gartens zu Her-
renhausen, Herausgeber mehr-
erer schätzbarer botanischen
Werke. †
- Wendl.*, H. L., dessen Sohn
und Nachfolger, gab mit
Bartling Beiträge zur Bota-
nik heraus.
- Westcott*, engl. Gärtner und
Botaniker.
- Wib.*, A. G. E. C. Wibel, Arzt
und Botaniker zu Wertheim.
† 1814.
- Wight.*, Rich., Wundarzt und
Director des botan. Gartens
zu Madras.
- — Rob., Oberfeldarzt in
Diensten d. ostind. Compagnie.
- Wigg. et Web.*, Wiggers gab
mit G. H. Weber eine Flora
von Holstein heraus. †
- Wikst.*, J. E. Wikstroem, Cu-
stos am akademischen Mu-
seum zu Stockholm.
- Willem.*, Remig. Willemet,
Arzt und Botaniker zu Nan-
cy. † 1807.
- — P. R. Willemet, dessen
Sohn, bereiste als Botaniker
Isle de France und † 1790
in Ostindien.
- Will.*, C. L. Willich, Arzt u.
Botan. zu Clausthal. † 1776.
- Wils.*, Wilson, engl. Botaniker.
- Wimm. et Grab.*, F. Wimmer
(Oberlehrer in Breslau) und
H. Grabowski (Apotheker
in Oppeln) bearbeiteten in
neuester Zeit die Flora von
Schlesien.
- Wint.*, J. J. Winterl, Prof.
zu Pesth. † 1789.
- With.*, G. Withering, Arzt u.
Botaniker zu Birmingham,
Herausgeber einer engl. Flo-
ra. † 1799.
- Wolff*, bairischer Botaniker.
- Wohlleb.*, J. F. Wohlleben,
Mitarbeiter an der Flora von
Halle. †
- Woods*, F., engl. Botaniker.
- Woodw.*, T. J. Woodward,
engl. Botaniker.
- Wormsk.*, M. Wormskiold, be-
gleitete als Naturforscher
1815 Kotzebue auf seiner Rei-
se um die Erde.
- Wrang.*, Baron v. Wrangel,
durchforschte in neuester Zeit
als Botaniker Neukalifornien.
- Wray*, Dr., Consul zu Augusta
in Georgia (Nordamerika).
- Wred.*, J. C. L. Wredow, ein
Prediger, Verfasser einer
mecklenburg. Flora. † 1823.
- Wright.*, G., engl. Arzt und
Botaniker.
- Wulf.*, F. X. v. Wulfen, Abt
zu Klagenfurt, ein verdienst-
voller Botaniker. † 1804.
- Wydl.*, Wydler, Prof. zu Bern.
- Youell*, Handelsgärtner zu Yar-
mouth.
- Young*, engl. Botaniker.
- Zahlbr.*, J. Zahlbruckner,
österreichischer Botaniker.
- Zannich.*, G. J. Zannichelli,
Apotheker und Botaniker in
Venedig. † 1729.
- Zan*, J. Zanoni, Prof. zu Bo-
logna. † 1682.
- Zawad.*, A. Zawadzki, Prof.
zu Lemberg.
- Zeyh.*, Karl Zeyher, vergl.
Ecklon.
- Zollick.*, Zollikofer, Arzt und
Botaniker in St. Gallen.
- Zuccag.*, A. Zuccagni, Vor-
steher des botanischen Gar-
tens zu Florenz. †
- Zuccar.*, J. G. Zuccarini, Prof.
der Botanik. zu München.
- Baum.*, Gebrüder Baumann,
Handelsgärtner zu Bollwyl-
ler im Elsass.
- Soul.*, Soulangue Bodin, Be-
sitzer einer Gärtnerei bei
Fromont, unweit Paris.

Erklärung der gebräuchlichen Zeichen und Abkürzungen.

- h. Bäume und Sträucher.
 - h. Kleine Sträucher.
 - 4. Ausdauernde (Stauden-) Gewächse.
 - ♂. Zweijährige Gewächse.
 - ⊙. Jährige Gewächse.
 - Kn. Knollengewächse.
 - Sch. Schlingende, windende oder kletternde Gewächse.
 - Wa. Wassergewächse.
 - Zw. Zwiebelgewächse.
 - f. Gewächse, die im freien Lande ausdauern.
 - f. b. Dergl., die aber im Winter bedeckt werden müssen.
 - m. Dergl., die im Mistbeete gezogen werden.
 - m. f. Dergl., die anfänglich im Mistbeete gezogen, dann
aber in's Freie gepflanzt werden.
 - k. Dergl., die im kalten oder Orangerie überwintert
werden.
 - t. Dergl. des temperirten oder Caphauses.
 - w. Dergl. des warmen Hauses.
-

- Abama anthericoides* DC. vid. *Narthecium ossifragum*.
- Abelia** RB., (Clarke Abel, engl. Botaniker und Arzt), XIV. i. Caprifoliaceae.
chinensis RB., chinesische, f. k. China.
- Abelmoschus* Medic. v. *Hibiscus*.
- Abies* T., vid. *Pinus*.
- Abildgaardia** Vahl (Abildgaard, Prof. zu Copenha-
 gen), III. i. Cyperaceae.
monostachya Vahl, einährige, 4. k. Ostindien, Neuholl.
schoenoides RB., knopfgrasähnliche, 4. k. Neuholland.
tristachys Vahl, dreiährige, 4. k. Ostindien, Neuholl.
- Abroma** Jacq., Cacaomalve, XVIII. i. Malvaceae — Bütt-
 nerieae.
augustum L., suppl. (*fastuosum* Jacq.), herrliche, f. w. Ostindien.
fastuosum Salisb., prächtige, f. w. Molucken, Neuholl.
- Abronia* Juss. Lam. vid. *Tricratus* L'Her.
- Abrus** L., Paternosterbohne, XVII. iv. Leguminosae —
 Papilionaceae.
precatorius L., f. Sch. w. Moluck., Ostindien, Arabien.
- Abuta** Aubl. (guianischer Name), XXII. x. Menispermaceae.
rufescens Aubl., fuchsrothe, f. Sch. w. Guiana.
- Abutilon* Dill. vid. *Sida*.
- Acacia** Tournef., Neck. Acacie, Schotendorn, XVI. vii.
 (XXIII. i.) Leguminosae — Mimosaceae.
acanthocarpa W., stachelfrüchtige, f. t. Neuspanien.
acantholoba W., stachelappige, f. w. Südamerika.
acapulcensis, Kunth, Acapulco, f. t. Neuspanien.
acicularis W., nadelstachelige, f. w. Südamerika.
affinis Swt., ähnliche, f. t. Neuholland.
amara W., bittere, f. w. Ostindien.
amoena Wendl., liebliche, f. t. Neuholland.
anceps DC., zweikantige, f. t. Neuholland.
angulata Desv., kantige, f. t. Neuholland.
angustifolia Wendl., schmalblättrige, f. t. Neuholl.
arabica W., arabische, f. w. Arabien, Ostindien.
arborea W., baumartige, f. w. Jamaica, Caraib. Inseln.
arceuthos Speg., Wachholder, f. t. Neuholland.
arcuata La Bill., bogenförmige, f. t. Neuholland.
armata RB., bewaffnete, f. t. Südl. Neuholland.
asparagoides Cun., spargelähnliche, f. t. Neuholland.
aspera Ma. C., rauhe, f. t. Neuholland.
aspidioides Meyer, schildfarrenblättrige, f. w. Guiana.
Bancroftiana Berter., Bancroft's, f. w. Jamaica.
Baxteri H. Angl., Baxter's, f. t. Neuholland.
biflora RB., zweiblumige, f. t. Neuholland.
binervata DC., zweinervige, f. t. Neuholland.
bivenosa DC., zweiaderige, f. t. Neuholland.
brachyacantha W., kurzdornige, f. w. Südamerika.
brasiliensis Speg., brasilianische, f. w. Brasilien.
brevifolia Lodd., kurzblättrige, f. w. Neuholland.

Acacia

- Brownii* Steud., Brown's, f. t. Neuholland.
buxifolia Cun., buchsbaumblättrige, f. t. Neuholland.
caesia W., hechtblaue, f. w. Ostindien.
caffra W., caffer'sche, f. t. Südafrika.
calamifolia Lindl., rohrblättrige, f. t. Neuholland.
canaliculata Swt., rinnenblättrige, f. t. Neuholland.
caracasana W., Caracas, f. w. Caracas.
cassioides W., cassiaähnliche, f. w. ?
Catechu W., Catechu, f. w. Ostindien.
centrophylla DC., spornblättrige, f. w. Jamaica.
Ceratonia W., johannisbrotähnliche, f. w. Westindien.
chrysostachys Swt., goldährige, f. w. t. Mauritius.
ciliata W., gefranzte, f. w. Südamerika.
cinerascens Sbr., graublättrige, f. t. Neuholland.
cochlearis Wendl. ?, schneckenfrüchtige, f. t. Nördl. Neuholland.
concinna DC., nette, f. w. Ostindien.
conferta Cun., gedrängte, f. t. Neuholland.
contorta DC., gedrehte, f. w. Brasilien.
copallina Lodd. Copal, f. w. ?
coriacea DC., lederblättrige, f. t. Neuholland.
cornigera W., horntragende, f. w. Cuba, Mexico.
coronillaefolia DC., kronenwickenblättrige, f. w. t. Afrika.
crassaecarpa Cun., dickfrüchtige, f. t. Neuholland.
crassiuscula Wendl., dickblättrige, f. t. Neuholland.
cultriformis, Ma. C., messerförmige, f. t. Neuholland.
cuneata Hügl., keilförmige, f. t. Neuholland.
Cunninghamii H. Anglor., Cunningham's, f. t. Neuholl.
Courrantiana DC., Courrant's, f. t. Canar. Inseln.
Cyclopis Ma. C., cirkelförmige, f. t. Neuholland.
cymiphylla Bts. C., sprossenblättrige, f. t. Neuholland.
daviesiaefolia Cun., daviesienblättrige, f. t. Neuholl.
dealbata Lk., weißbestäubte, f. t. Neuholland.
decipiens RB., täuschende, f. t. Westl. Neuholland.
decora Rchb., zierliche, f. t. Neuholland.
decurrens W., herablaufende, f. t. Neuholland.
detinens Burch., aufhaltende, f. t. Cap d. gut. Hoffn.
diffusa Ker., ausgebreitete, f. t. Neuholland.
dillwyniaefolia Cun., dillwynienblättrige, f. t. Neuholl.
diptera Humb., zweiflügelige, f. w. Südamerika.
discolor W., ungleichfarbige, f. t. Neusüdwallis.
divaricata W., ausgespernte, f. w. Westindien.
divergens *, ausgebreitete, f. t. Neuholland.
doratoxylon Cun., Lanzenholz, f. t. Neuholland.
dumosa Roxb., Hecken, f. w. Ostindien.
eburnea W., elfenbeinweißse, f. w. Ostindien.
echinula DC., igelborstige, f. t. Neuholland.
eglandulosa DC., drüsenlose, f. t. Neuholland.
elongata Sbr., verlängerte, f. t. Neuholland.
emarginata Wendl., ausgerandete, f. t. Neuholland.
esculenta DC., eßbare, f. t. w. Mexico.
exarata Rchb., ausgefurchte, f. t. Neuholland.
falcata W., sichelblättrige, f. t. Neusüdwallis.
falciformis DC., sichelförmige, f. t. Neuholland.
Farnesiana W., farnesische, f. w. Westindien.
ferruginea DC., rostfarbige, f. w. Ostindien.
flexuosa W., vielbeugige, f. w. Südamerika.
floribunda W., blüthenreiche, f. t. Neusüdwallis.
 a) *brachyphylla*, kurzblättrige.

Acacia

β) leptophylla, schlankblättrige.

γ) pendula, herabhängende.

foliosa Bs. C., blätterreiche, f. t. Neuholland.

formosa Kunth, wohlgestaltete, f. t. w. Mexico.

frondosa W., belaubte, f. w. Ostindien.

fruticosa Roxb., strauchige, f. w. Ostindien.

fulgens La Bill., leuchtende, f. t. Neucaledonia.

fuscata Lodd., bräunliche, f. w. ?

genistaefolia Lk., ginsterblättrige, f. t. Neuholland.

Giraffae W., Giraffen-A., f. t. w. Südafrika.

glauc W., blaugrüne, f. w. Brasilien, Westindien.

β) biceps. W.

glaucescens W., blaugrünliche, f. t. Neuholland.

grandiflora W., großblumige, f. w. Ostindien.

grata W., angenehme, f. w. Brasilien.

graveolens Cun., starkkriechende, f. t. Neuholland.

guianensis W., guianische, f. w. Guiana.

Guilandina DC., guilandinaähnliche, f. Sch. w. Cayenne.

gummifera W., gummigebende, f. t. w. Mauritanien.

Habbas Del., Habbas, f. w. Aegypten.

Haematoxylon W., Blutholz, f. w. t. Südafrika.

hastulata Sm., spontonförmige, f. t. Neuholland.

hebecephala Cun., stumpfköpfige, f. t. Neuholland.

hebeclada DC., sprossenästige, f. t. Cap d. g. Hoffn.

heteracantha Burch., verschiedenstachelige, f. t. Cap d. gut. Hoffnung.

heteromalla Swt., verschiedenwendige, f. t. Neuholl.

heterophylla W., verschiedenblättrige, f. t. Mascarenische Inseln.

β) latifolia Hort., (wird auch mit A. Melanoxy-
lon verwechselt).

hispidissima DC., steifhaarige, f. w. Jamaica.

hispidula W., kurzsteifhaarige, f. t. Neusüdwallis.

Hoffmannseggii DC., Hoffmannsegg's, f. w. Brasilien.

homomalla Wendl., gleichwendige, f. t. Neuholland.

horrida W., großdornige, f. t. Ostindien, Arabien.

Hügelii Benth., Hügel's, f. t. Neuholland.

hybrida Swt., Bastard-A., f. t. Neuholland.

hypacantha Hffsgg., unterstachelige, f. t. Südafrika.

incana Spgl., weißlichgraue, f. w. Brasilien.

Instia W., Instia, f. w. Ostindien.

intertexta Sbr., verwebte, f. t. Neuholland.

irrorata Sbr., bethaute, f. t. Neuholland.

Jacaranda Lodd., jacarandaähnliche, f. w. Südamerika.

Julibrissin W., morgenländische, f. k. t. Levante.

juniperina W., wachholderähnliche, f. t. Neuholland.

Kalkora Roxb., Kalkora, f. w. Ostindien.

kermesina H. Berol., kermesinrothe, f. w. t. Brasilien.

Lambertiana Ker., Lambert's, f. t. Mexico.

lanigera Cun., wollige, f. t. Neuholland.

lasiocarpa Hüg., wollfrüchtige, f. t. Neuholland.

latisiliqua W., breitschotige, f. w. Caraimische Inseln.

latronum W., Diebes-Inseln-A., f. w. Ostindischer Archipelagus.

laurifolia W., lorbeerblättrige, f. t. Südseeinseln, Neuholland.

laxa W., lockere, f. w. Caracas.

Lebbek W., Lebbek, f. w. Aegypten.

lentiscifolia Dsf., mastixblättrige, f. t. Mexico.

Acacia

- leprosa* Sbr., schorfblättrige, f. t. Neuholland.
leucocephala Berter, weisköpfige, f. w. Portorico.
leucophloea W., weisse, f. w. Ostindien.
leucophylla Swt., weisblättrige, f. t. Neuholland.
linearis Ker., linienblättrige, f. t. Neuholland.
lineata Cun., linierte, f. t. Neuholland.
linifolia W., leinblättrige, f. t. Neuholland.
lomatocarpa DC., saumfrüchtige, f. w. Ostindien.
longifolia W., langblättrige, f. t. Neusüdwallis.
 β) *florida* (serotina), vielblumige.
 γ) *stenophylla* (angustifolia plur. Hortul. non Wendl., floribunda Hort.).
longissima Wendl., sehr langblättrige, f. t. Neusüdwallis.
lophantha W., büschelblüthige, f. t. Neuholland.
 α) *coarctata*, dichtästige.
 β) *speciosa*, schöne.
lophanthoides DC., lophanthaähnliche, f. w. Jamaica.
lucida Roxb., starkglänzende, f. w. Ostindien.
lunata Lodd., mondförmige, f. t. Neuholland.
macracantha W., großstachelige, f. w. Südamerika.
macracanthoides Berter., ähnlichgroßstachelige, f. w. Jamaica.
Mangium W., moluckische, f. w. Molucken.
marginata RB., geränderte, f. t. Westl. Neuholland.
mauroceana DC., mauritanische, f. t. Mauritaniën.
Melanoxylon RB., schwarzholzige, f. t. Van Diem. Land.
microphylla W., kleinblättrige, f. w. Caracas.
mollissima W., weichblättrige (? pubescens var.), f. t. Neuholland.
monacantha W., einstachelige, f. w. Brasilien.
mucronata W., weichspitzige, f. t. Neuholland.
mucronulata Ma. C., kleinspitzige, f. t. Neuholland.
muricata W., weichstachelige, f. t. w. Antillen, Neucaledonia.
myrtifolia W., myrtenblättrige; f. t. Neuholland.
Nemu W., japanische, f. t. Japan.
nervosa DC., nervigblättrige, f. t. Neuholland.
nigricans RB., schwärzliche, f. t. Neuholland.
obovata H. Angl., verkehrt-eiförmige, f. t. Neuholland.
obtusata Sbr., stumpfblättrige, f. t. Neuholland.
odoratissima W., sehr wohlriechende, f. w. Ostindien.
oleifolia Cun., ölbaumblättrige, f. t. Neuholland.
ornithophora Swt., vogelklauenfrüchtige, f. t. Neuholl.
Oxycedrus Sbr., oxycedrusblättrige, f. t. Neuholland.
paniculata W., rispenblumige, f. w. Brasilien.
papuliformis Cun., blätterige, f. t. Neuholland.
paradoxa DC., wunderbare (? hybrida), f. t. Neuholl.
patula W., abstehende, f. w. Südamerika.
pedunculata W., gestielte, f. w. t. Java.
pendula Cun., hängende, f. t. Neuholland.]
pennata W., fiederige, f. w. Ceylon.
penninervis Sbr., fiedernervige, f. t. Neuholland.
pentadenia Lindl., fünfzählige, f. t. Neuholland.
peregrina W., fremdartige, f. w. Südamerika.
Persoonii *, Persoon's, f. w. Peru.
peruviana W., peruanische, f. w. Peru.
pilosa Spgl., behaarte, f. w. Jamaica.
pilosiuscula H. Hüg., wenighaarige, f. t. Neuholland.

Acacia

- plagiophylla* Speg., schiefblättrige, f. t. Neuholland.
planisiliqua H. Hoffg., blattschotige, f. t. w. Java.
platyphylla Swt., breitblättrige, f. t. Neuholland.
plectrocarpa Cun., spornfrüchtige, f. t. Neuholland.
podalyriaefolia Cun., podalyrienblättrige, f. t. Neuholl.
polyacantha W., vielstachelige, f. w. Ostindien.
polygalaefolia Cun., kreuzblumenblättrige, f. t. Neuholland.
polyphylla DC., vielblättrige, f. w. Westindien.
portoricensis, Portorico, f. w. Portorico.
prismatica Hoffg., prismatische, f. w. t. ?
procera W., hohe, f. w. Ostindien.
prominens Cun., hervorragende, f. t. Neuholland.
pubescens RB., weichhaarige, f. t. Neuholland.
pugioniformis Wendl., dolchblättrige, f. t. Neuholland.
pulchella RB., hübsche, f. t. Neuholland.
 β) *gracilis*.
 γ) *speciosa*.
pulcherrima W., schönste, f. w. Brasilien.
punctata W., punktirtästige, f. w. Südamerika.
pungens Speg., stechende, f. t. Neuholland.
pyrifolia DC., birnblättrige, f. t. Neuholland.
reticulata W., netzförmige, f. t. Cap d. gut. Hoffnung.
revoluta Kunth, zurückgerollte, f. w. Peru.
rhodacantha DC., rothstachelige, f. w. ?
Richardsonii Swt., Richardson's, f. t. Neuholland.
rigens Cun., starre, f. t. Neuholland.
robusta Burch., starke, f. t. Cap d. gut. Hoffnung.
Rohriana DC., Rohr's, f. w. Südamerika.
Rossii Lodd., Ross's, f. w. ?
rubida Cun. (? *rubicunda* Hort.), röthliche, f. t. Neuholland.
ruscifolia Cun., mäusedornblättrige, f. t. Neuholland.
saligna Wendl., weidenblättrige, f. t. Nördl. Neuholl.
sapindoides Cun., seifenbaumartige, f. t. Neuholland.
sarmentosa Desv., wurzelrankende, f. Sch. w. ?
scandens W., kletternde, f. Sch. w. Brasilien.
scleroxyla Tuss., hartholzige, f. w. Westindien.
semicordata Roxb., halbherzförmige, f. w. Ostindien.
Senegal W., Senegal, f. w. Aegypt. Afrika. (Zweifelhaft, zumal für deutsche Gärten, wo sie wohl nie gezogen worden).
Seyal Delil., Seyal, f. w. t. Oberaegypten.
Smithiana Roxb., Smith's, f. w. Ostindien.
Sophora RB., sophorafrüchtige, f. t. Van Diem. Land.
speciosa W., prächtige, f. w. Ostindien.
spectabilis H. Hüg., ansehnliche, f. t. Neuholland.
Spini Balb., Spinis, f. w. ?
spiralis H. Hüg., spiralförmige, f. t. Neuholland.
spirorbis La Bill., schraubenfrüchtige, f. t. Neucaledon.
stipulata DC., zwischenblättrige, f. w. Bengalen.
striata W., gestreifte, f. w. Südamerika.
stricta W., steife, f. t. Neusüdwallis.
strigosa Lk., striegelige, f. t. Neuholland.
strombulifera W., gedrehtfrüchtige, f. w. Peru.
suaveolens W., lieblichriechende, f. t. Neusüdwallis.
subcoerulea H. Angl., bläulichblättrige, f. t. Neuholl.
subulata Bonpl., pfriemenblättrige, f. t. Neuholland.
sulcata RB., gefurchtblättrige, f. t. Neuholland.

Acacia

Sundra Spgl., Sundra-A., f. w. Ostindien.
 tamarindifolia W., tamarindenblättrige, f. w. Westind.
 taxifolia W., taxusblättrige, f. t. China, Cochinchina.
 (Wird schwerlich in deutschen Gärten kultivirt).

tenuiflora W., dünnblüthige, f. w. Caracas.
 tetragona W., vierkantige, f. w. Caracas.
 Thibaudiana DC., Thibaud's, f. w. Südamerika.
 tomentosa W., filzige, f. w. Ostindien.
 tortuosa W., gedrehte, f. w. Jamaica, Guadalupe.
 trichodes W., haarige, f. w. Caracas.
 trigonocarpa Cun., dreikantigfrüchtige, f. t. Neuholl.
 trinervata Sbr., dreinervige, f. t. Neuholland.
 umbrosa Cun., schattenliebende, f. t. Neuholland.
 uncinata Lodd., hakigblättrige, f. t. Neusüdwallis.
 undulaefolia Cun., wellenblättrige, f. t. Neuholland.
 undulata W., wellenförmige, f. t. Neuholland.
 vaga W., vielwendige, f. w. Brasilien.
 venusta W., schöne, f. w. Südamerika.
 vestita Ker., bekleidete, f. t. Neuholland.
 vera J. Bauh., wahre, f. w. Aegypten.
 verniciflua Cun., firnisgebende, f. t. Neuholland.
 verticillata W., wirtelblättrige, f. t. Van Diem. Land.

β) angusta.

γ) latifolia (robusta Hortul.).

virgata Lodd., ruthenförmige, f. t. Neuholland.
 viridiflora Kunth, grünblüthige, f. c. Südamerika.
 viridiramis Burch., grünästige, f. t. Cap d. gut. Hoffn.
 viscosa Wendl., schmierige, f. t. Neuholland.
 Wallichiana DC., Wallich's, f. c. Ostindien.
 xylocarpa W., holzfrüchtige, f. c. Ostindien.

abietina Hort. vid. *linifolia*. *acicularis* RB. vid. A.
 Brownii. *ambigua* Salisb. v. *suaveolens*. *ampelisopia*
 Hortul. v. *floribunda* a. *australis* Hort. vid. *lunata*.
brachyoloba W. v. *Darlingtonia brachyoloba*. *caffra*
 Zeyh. v. *hypacantha*. *ciliata* RB. v. *strigosa*. *coerules-*
cens Hort. v. *glaucescens*. *conspicua* Hort. v. *vestita*.
contortuplicata Hort. v. *Darlingtonia glandulosa*. *cor-*
data s. *cordifolia* Hort. v. *biflora*. *cumanensis* W. v.
Prosopis cuman. *decurrens speciosa* v. *angulata*. *di-*
varicata Cun. v. *divergens*. *dodonaefolia* W. v. *vi-*
scosa. *dolabriformis* Wendl. v. *decipiens*. *edulis* W.
 v. *Prosopis dulcis*. *elephantorrhiza* Burch. v. *Proso-*
pis eleph. *Esterhazyana* Hort. v. *angulata*. *falcata*
 Sbr. v. *plagiophylla*. *floribunda* Sbr. et plur. Hort.
 v. *longifolia*. *glandulosa* W. v. *Darlingtonia glandu-*
losa. *granulosa* La Bill. v. *muricata*. *Houstoni* W.
 v. *Inga Houstoni*. *impressa* Cun. v. *penninervis*. *ju-*
liflora W. v. *Prosopis juliflora*. *juniperina* Sbr. v. *Ar-*
ceuthos. *juniperoides* Sbr. v. *juniperina*. *leptophylla*
 DC. v. *acicularis* W. *linearis* Lodd. v. *longissima*.
linifolia plur. Hort. v. *mucronata*. *mollis* B.R. v.
molliissima. *pallida* W. v. *Prosopis pallida*. *pectinata*
 Hffg. v. *Hoffmannseggii*. *pinifolia* Hort. v. *linifolia*.
prostrata Lodd. v. *diffusa*. *quadrangularis* Lk. v. *te-*
tragona. *robusta* Hortul. v. *verticillata*. *rutaeifolia*
 Lk. v. *nigricans*. *speciosa* Hort. v. *lophantha*. *ste-*
noptila Hffgg. v. *angulata*. *strigosa* Spgl. vid. *Per-*
soonii. *sulcipes* Sbr. v. *angulata*. *tamariscina* W. v.
Gagnebina tamar. *taxifolia* H. Angl. v. *Oxycedrus*.

Acacia

trapezoides DC. vid. *decipiens*. *truncata* Hort. vid. *pendula*. *ulicifolia* Wendl. v. *juniperina*. *virescens* DC. v. *peruviana*.

Acaena Vahl, Stachelnüsschen. II. 1. Rosaceae-Sanguisorbeae.

adscendens Vahl, aufsteigendes, 4. k. f. Patagonien.
agrimonoides Kunth, odernennigähnliches, 4 k. Mexico.
argentea R.P., silberfarbiges, 4. k. Chili.
Eupatoria Schlecht., brasilianisches, 4. t. Brasilien.
laevigata Ait., glattes, 4. k. Patagonien.
latebrosa Ait., schattiges, 4. k. Cap d. gut. Hoffnung.
lucida Vahl, starkglänzendes, 4. k. Falklandsinseln.
magellanica Vahl, magellanisches, 4. k. Patagonien.
myriophylla Lindl., vielblättriges, 4. k. Mendoza.
ovalifolia R. et P., eiblättriges, 4. k. Peru.
pinnatifida R. et P., fiederspaltiges, 4. k. Chili.
sanguisorbae Vahl, Wiesenknopf, 4. k. Neuseeland.
sericea Jacq., seidenhaarige, 4. k. ?

Acalypha L., Brennkraut. XXI. x. Tricoccae-Euphorbiaceae.

alopecuroides Jacq., fuchsschwanzähnliches, ☉. m. Venezuela, Caracas.
brachystachya Hornem., kurzähriges, ☉. m. China.
caroliniana Walt., carolinianisches, ☉. f. Carol., Florida.
ciliata Forster, gefranztes, ☉. m. Arabien, Ostindien, Guinea.
cuspidata Jacq., zugespitztes, ♀. w. Caracas, Portorico.
diversifolia Jacq., verschiedenblättriges, ♀. w. Caracas.
hispida W., steifhaariges, ☉. m. Ostindien, China, Cochinchina.
indica L., indisches, ☉. m. Ostindien.
integrifolia W., ganzblättriges, ♀. w. Mauritius.
laevigata Sw., glattes, ♀. w. Jamaica.
macrostachya Jacq., großähriges, ♀. w. Caracas.
mollis Kunth, weichblättriges, ☉. m. Mexico.
pauciflora, Hornem., wenigblumiges, ☉. m. f. China.
polystachya Jacq., vielähriges, ☉. m. Hispaniola.
prunifolia Kunth., pflaumenblättriges, ☉. m. f. Mexico.
pruriens Nees, juckendes, ☉. m. Brasilien.
reptans Sw., kriechendes, ♀. w. Jamaica, Hispaniola.
rubra W., rothes, 4. w. ?
scabrosa Sw., scharfes, ♀. w. Jamaica.
virgata L., ruthenförmiges, ♀. w. Jamaica.
virginica L., virginisches, ☉. f. Nordamerika.
cucullata Poir. vid. *macrostachya*. *pastoris* DC. vid. *rubra*.

Acanthus L., Bärenklau. XIV. II. Labiatae-Acanthaceae.

carduifolius Thbg., distelblättriger, 4. k. Cap d. g. H.
mollis L., unbewehrter, 4. k. — f. b. Ital., Griechenl.
niger Mill., schwärzlicher, 4. k. — f. b. Portugal.
spinosus L., dorniger, 4. k. — f. b. Italien.
capensis Thbg. v. *Blepharis capens*. *ebracteatus* Vahl.
v. *Dilivaria ebracteata*. *edulis* Forsk. v. *Bleph. edulis*.
furcatus Thbg. v. *Blepharis furcata*. *glomeratus* Lam.
v. *Blepharis procumbens*. *ilicifolius* L. v. *Dilivaria ilicifolia*.
integrifolius Thbg. vid. *Blepharis saturejaefolia*.
maderaspatensis v. *Blepharis boerhaaviaefolia*.
procumbens Thbg. v. *Blepharis procumbens*.
repens Vahl v. *Blepharis molluginifolia*.

Acarna W., Zwergdistel. XIX. 1. Compositae-Cynarocephalae.

caespitosa W., rasenartige, $\frac{1}{2}$ k. Numidien.

cancellata W., gitterhüllige, $\odot$. f. m. Südeuropa, Barbarei.

gummifera W., v. *Carlina gummifera. macrocephala* W., *Carlina Fontanesii*.

Acer Tourn., Ahorn. XXIII. 1. (VIII. 1.) Sapindacei-Acerineae.

acuminatum Don., zugespitzter, $\frac{1}{2}$ k. Nepal.

barbatum Mchx., bärtiger, $\frac{1}{2}$ f. Carolina.

campestre L., Feld-A., Mafsholder, $\frac{1}{2}$ f. Europa, Taurien.

α) austriacum Tratt.

β) macrocarpum Opitz.

γ) molle Opitz (hebecarpum).

δ) nanum.

ϵ) variegatum.

circinatum Pursh., kreisförmiger, $\frac{1}{2}$ f. Westlich. Nordamerika.

creticum L., cretischer, $\frac{1}{2}$ k. Griechenland.

dasycarpon Ehrh., wollfrüchtiger, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

heterophyllum W., $\frac{1}{2}$ k., verschiedenblättriger. Kleinas.

ibericum M.B., georgischer, $\frac{1}{2}$ f. Caucasus.

lobatum Fischer, gelappter, $\frac{1}{2}$ f. Sibirien.

macrophyllum Pursh., großblättriger, $\frac{1}{2}$ f. Westlich. Nordamerika.

• monspessulanum L., südeuropäischer, $\frac{1}{2}$ f. Südeuropa.

montanum Ait., Berg-A., $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

nigrum, Mchx., schwarzer, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

oblongum, Wall., langblättriger, $\frac{1}{2}$ k. Nepal.

obtusatum Kit., stumpflappiger, $\frac{1}{2}$ f. Ungarn, Italien.

(var. von *A. opalifolium*).

obtusifolium Sm., stumpfblättriger, $\frac{1}{2}$ k. Creta.

opulifolium Vill., wasserholderblättriger, $\frac{1}{2}$ f. Frankreich, Italien, südliche Schweiz.

palmatum Thbg., handförmiger, $\frac{1}{2}$ k. — f. b. Japan.

pensylvanicum L., pensylvanischer, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

platanoides L., Spitz-A. (Lenne), $\frac{1}{2}$ f. Europa.

β) lacinosum (crispum).

γ) Lobelii. Tenore.

δ) pubescens.

ϵ) variegatum (fol. aur. et argent. varieg.).

Pseudoplatanus L., gemeiner, $\frac{1}{2}$ f. Europa.

α) longifolium.

β) lutescens.

γ) macropterum.

δ) micropterum.

ϵ) purpureum.

ζ) stenopterum.

η) variegatum (fol. aur. et argent. varieg.).

θ) lutescens.

rubrum L., Ehrh., rother, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

β) coccineum Hortul.

saccharinum L., Zucker-A., $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

tataricum L., tatarischer, $\frac{1}{2}$ f. Nordasien, Galizien u. Ungarn.

Folgende weniger bekannte Arten sind zum Theil noch nicht eingeführt:

Acer

- A. caudatum Wall.
- cultratum Wall.
- laevigatum Wall.
- sterculiaceum Wall.
- villosum Wall.
- glabrum Torrey. Nordamerika.
- dissectum Thbg.
- japonicum Thbg.
- pictum Thbg.
- septemlobum Thbg.
- trifidum Thbg.
- truncatum Bunge. Südliches Rußland.
- recurvatum Bs. C.

Nepal.

Japan.

sempervirens L. v. *heterophyllum*. *spicatum* Lam.
v. *montanum*. *striatum* du Roi v. *pensylvanicum*.

Aceras RB., Ohnhorn, XX. 1. Orchideae.

anthropophora, wunderbarblühendes, 4. f. England,
Mittel- und Südeuropa.

Acerates longifolia Ell. vid. *Gomphocarpus longifolius*.**Achania** Sw., Schampappel, XVI. VIII., Malvaceae.

cordata Mart., herzblättrige, 5. w. Brasilien.

Malvaviscus Sw., gemeine, 5. w. Jamaica.

mollis Ait., weichblättrige, 5. w. t. Mexico.

pilosa Sw., behaarte, 5. w. t. Westindien, Mexico.

Achillea Garbe, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

abrotanifolia L., stabwurzelblättrige, 4. f. Kleinasien.

acuminata Ledeb., spitzblättrige, 4. f. Rußland.

aegyptiaca L., ägyptische, 4. 5. — k. Aegypten, Levante.

Ageratum L., gewürzhafte, 4. f. Südfrankreich, Italien.

albicaulis C. A. Mey, weißstängelige, 4. f. Caucasus.

albida W., weißliche, 4. f. ?

alpina L., Alpen-G., 4. f. Europäische Alpen, Sibirien.

anglica, G. Don., englische, 4. f. England.

anthemoides W., chamillenähnliche, 4. f. ?

asplenifolia Vent., strichfarnblättrige, 4. f. Nordamerika.

atrata L., schwärzliche, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

aurea Lam., goldfarbige, 4. f. k. Kleinasien.

auriculata W., geöhrt, 4. f. k. Kleinasien.

banatica Kit., banatische, 4. f. Banat.

biserrata MB., doppeltsägezähne, 4. f. Georgien.

cartilaginea Ledeb., knorpelige, 4. f. Rußland.

chamaemelifolia Pourr., chamillenblättrige, 4. f. Pyrenäen.

Clavennae L., bittere, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *glabrata*.

Clusiana Tausch., *Clusiu's*, 4. f. Oestereich., steiermarkische etc. Alpen.

clypeolata Sm., schildförmige, 4. f. k. Macedonien.

compacta W., dichtblühende, 4. f. Bannat. Bessarabien.

coronopifolia W., krähenfußblättrige, 4. f. Kleinasien.

cretica L., cretische, 4. k. f. Creta.

cristata Retz, kammlättrige, 4. f. Italien.

crithunifolia Kit., meerfenchelblättrige, 4. f. Ungarn.

crustata Roch., krustirte, 4. f. Ungarn.

cuneifolia Lam., keilblättrige, 4. f. Südfrankr., Oberitalien.

decolorans Schrad., entfärbte, 4. f. ?

Achillea

decumbens Lam., niederliegende, 4. f. Kamtschatka.
 dubia Fisch., zweifelhafte, 4. f. Sibirien.
 falcata L., sichelförmige, 4. k. Aegypt., Kleinasien.
 filipendulina Lam., farnkrautblättrige, 4. f. Caucasus.
 Gerberi W., Gerber's, 4. f. Caucasus, Sibirien.
 grandiflora MB., großblumige, 4. f. Caucasus.
 Haenkeana Tausch, Hänke's, 4. f. Voralpen Deutschlands, Schweiz.

β) flore albo.

holosericea Sm., sammethaarige, 4. k. Parnassus.
 imbricata Vent., dachziegelförmige, k. f. Persien.
 Impatiens L., sibirische, 4. k. Sibirien.
 lanata Spgl., wollige, 4. f. Ungarn, Oesterreich, Litorale.
 leptophylla MB., dünnblättrige, 4. f. Podol., Taurien.
 ligustica All., ligurische, 4. f. Italien, Griechenland.
 lingulata Kit., zungenförmige, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen.
 macrophylla L., großblättrige, 4. f. Schweizeralpen.
 microphylla W., kleinblättrige, 4. f. Spanien.
 Millefolium L., gemeine, 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

β) collina Beck.

γ) purpurea Hort.

δ) sordida (polyphylla) Schlchr.

ε) sylvatica Becker.

mongolica Fisch., mongolische, 4. f. Sibirien.
 moschata Wulf., moschusduftende, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
 myriophylla W., vielblättrige, 4. f. ?
 nana L., Zwerg-G., 4. f., Oberitalien, Schweiz, Tyroler Alpen.

nobilis L., edle, 4. f., Mittel- u. Süddeutschl., Schweiz.

β) ochroleuca Auctor non Ehrh.

ochroleuca Ehrh., Kit., gelblichweisse, 4. f. (Ungarn, Siebenbürgen, Podolien.

odorata L., wohlriechende, 4. f. Ungarn, Süddeutschl.
 pauciflora Lam., wenigblumige, 4. f. Spanien, Kleinasien.

pilosa, W., behaarte, 4. f. ?

Ptarmica L., Sumpf-G., 4. f. Europa, Asien, Nordamer.

β) flore pleno.

pubescens L., feinhaarige, 4. f. Caucasus.
 recurvifolia Lapeyr., gekrümmtblättrige, 4. f. Pyrenäen.
 Santolina L., santolinablättrige, 4. f. Kleinasien.
 santolinoides Lagasc., santolinaähnliche, 4. k. Süds Spanien.

serrata Retz., sägeblättrige, 4. f. Schweiz.

setacea Kit., borstenblättrige, 4. f. Mitteldeutschland, Schweiz, Ungarn, Siebenbürgen, Podolien etc.

β) brevifolia Roch.

speciosa Henckel, schöne, 4. f. ? Sibirien.

squarrosa Ait., sparrige, 4. f. ?

tanacetifolia All., reinfarnblättrige, 4. f. Krain, Ungarn, Schweiz, Piemont etc.

α) dentifera.

β) purpurea.

γ) stricta.

δ) angustifolia (gehört kaum hierher).

Achillea

taurica MB., taurische, 4. f. Taurien.
tenuifolia Lam., feinblättrige, 4. k. f. Kleinasien.
Thomasiana Hall. fil., Thomas's, 4. f. Canton Waadt.
tomentosa L., filzige, 4. f. Südeuropa, Tartarei.
vallesiaca Sut., Walliser, 4. f. Wallis.

abrotanifolia Hort. v. *myriophylla*. *ambigua* Poll.
 v. *tanacetifolia*. *banatica* H. bot. v. *lanata*. *bi-*
pinnata L. v. *Tanacetum myriophyllum*. *capillaris*
 Poir v. *setacea*. *capillata* Lapeyr. v. *chamaemeli-*
folia. *coarctata* Poir. v. *compacta*. *compacta* Lam.
 v. ? *tanacetifolia* δ . *crassifolia* Hortul. v. *crustata*.
cylindrica Poir v. *nobilis* var. β . *dentifera* Rchb.
 v. *Haenkeana*. *dentifera* DC. v. *tanacetifol.* var. α .
distans Kit. v. *tanacetifol.* *Eupatorium* MB. vid.
filipendulina. *falcata* Lapeyr. v. *recurvifolia*. *fili-*
folia MB. v. *filipendulina*. *glomerata* MB. v. *com-*
pacta. *Herbarota* All. v. *cuneifolia*. *incisa* Clairv.
 v. *vallesiaca*. *leucanthema* P. v. *grandiflora*. *livia*
 Scop. v. *moschata*. *macrophylla* Pill. et Mitt. vid.
Pyrethrum macrophyllum. *magna* All. et L. v. *ta-*
nanacetifolia. α . *magna* Haenk. v. *Haenkeana*. *ma-*
gna Roch. v. *tanacetifolia*. β . *magna* W. v. *lanata*
 var. *magna* plur. auctor. v. *Millefolium* var. *mi-*
crantha W. v. *pubescens*. *montana* Schlchr. vid.
Thomasiana. *pectinata* W. v. *ochroleuca*. *pecti-*
nata Lois. v. *chamaemelifolia*. *polyphylla* Schlchr.
 v. *Millefolium* var. δ . *punctata* Tenore v. *nobi-*
lis. β . *rosea* Poir. vid. *asplenifolia*. *sambucifolia*
 Dsf. v. *Pyrethrum macrophyllum*. *scabra* Host. v.
crustata. *Schkuhrii* Spgl. vid. *nobilis*. β . *Seidlii*
 Presl. v. *Haenkeana*. β . *serrata* Sm. v. *anglica*.
sicula Rafin. v. *microphylla*. *stricta* Schlchr. v. *tana-*
cetifolia var. γ . *sudetica* Opiz. v. *Haenkeana*.

Achimenes coccinea Pers. v. *Trevirania coccinea*.

Achlys DC., Achlys. XIII. 1., Papaveraceae-Podophylleae.
triphylla DC., dreiblättrige, 4. f. Nordamerika.

Achnatherum Calamagrostis P.B. v. *Lasiagrostis Calam.*

- - *lanceolatum* P.B. v. *Calamagrostis lanceol.*

Achnodon (*Achnodonton*) *arenarius* Lk., v. *Phleum arenar.*

- - *Bellardi* P.B. v. *Phleum tenue*.

Achras L., Breiäpfel, VI. 1., Sapotaceae.

Sapota L., gemeiner, $\frac{1}{2}$. w. Westindien.

Achyranthes L., Spreublume, V. 1., Aizoideae-Ama-
 rantheae.

argentea Lam., silberfarbige, 4. $\frac{1}{2}$. t. Sicilien.

aspera L., rauhe, $\frac{1}{2}$. w. Aegypten, Ostindien, Cap, Ja-
 maica, Sardinien.

australis RB., neuholländische, 4. t. Neuholland.

brachiata L., armförmige, $\odot$. m. Ostindien.

crispa Poir, krause, $\frac{1}{2}$. w. Südamerika.

fruticosa Lam., strauchige, $\frac{1}{2}$. w. Ostindien.

porrigens Jacq., sperrige, $\frac{1}{2}$. w. Peru.

pubescens Roth, feinhaarige, $\frac{1}{2}$. w. ?

alopecuroides Lam. v. *Aerva javanica*. *alternifolia*
 L. v. *Cladostachys alternifolia* Swt. *altissima* L.
 v. *Chamissoa altissima* Humb. et Bonpl. *amaran-*
thoides Lam. v. *Gomphrena amaranthoides* Roth.
axillaris W. v. *Alternanthera spinosa*. *bengalensis*

Achyranthes

Lam. v. *Paronychia* bengal. *corymbosa* W. v. *Polycarpaea corymbosa*. *echinata* Retz v. *Desmochaeta flavescens*. *ficoidea* Lam. v. *Alternanthera ficoidea*. *halimifolia* Lam. v. *Alternanthera frutescens*. *lappacea* L. v. *Desmochaeta atropurpurea*. *mucronata* Lam. vid. *Alternanthera Achyrantha*. *nivea* Ait. vid. *Polycarpaea memphit*. *patula* L. vid. *Desmochaeta flavescens*. *polygonoides* Lam. v. *Alternanthera polygon*. *prostrata* v. *Desmochaeta prostrata*. *radicans* Cav. v. *Alternanthera Achyrantha*. *repens* L. v. *Alternanthera Achyrantha*. *spinosa* Hornem. v. *Alternanthera spinosa*.

Achyronia Wendl., Spreuling, XVII. iv., Leguminosae-Papilionaceae.

villosa Wendl., zottiger, ♀. t. Neuholland.

arborea Spgl. v. *Carmichaelia australis*.

Achyropappus Kunth, Spreukelch, XIX. ii., Compositae-Corymbiferae.

anthemoides, chamillenähnlicher, ☉. f. Neuspanien.

Achyrophorus maculatus Scop., *minimus* Hornem. et *radicatus* Scop. v. Hypochoeris.**Acianthus** R.B., Spitzblume, XX. i., Orchideae.

caudatus R.B., geschwänzte, ♀. t. Neuholland.

exsertus R.B., hervorstehende, ♀. t. Neuholland.

fornicatus R.B., gewölbte, ♀. t. Neuholland.

Acicarpa Juss., Spitzkelch, XIX. iv., Compositae-Calycereae.

spatulata RB., spatelblättriger, ♀. w. Brasilien.

tribuloides Juss., stachelfrüchtiger, ♂. w. Südamerika.

Acidoton Sw., Spitzhaar, XXI. ix., Euphorbiaceae.

urens Sw., brennendes, ♀. w. Jamaica.

Acilepis Don., Spitzschuppe, XIX. i., Compositae-Cynarocephalae.

squarrosa Don., sparrige, ♀. t. China, Nepal.

Aciotis D. Don., Spitzblatt, X. i., Lythriariae-Melastomeae.

aquatica D. Don., Wasser-Sp., ♀. w. Südamerika.

discolor D. Don., verschiedenfarbiges, ♀. w. Trinidad.

Acis Salisb., Acis VI. i., Narcisseae-Amaryllideae.

grandiflorus Swt., großblumige, ♀. Zw. k. f. Numidien.

roseus Swt., rosenfarbene, ♀. Zw. k. f. Corsica.

trichophyllus Swt., haarblättrige, ♀. Zw. k. f. Portugal, Spanien, Sardinien, Corsica.

Acisanthera Juss., Spitzbeutel, X. i., Lythriariae-Melastomeae.

quadrata P., vierkantige, ♀. w. Jamaica.

Acmadenia Bartl. et Wendl., Spitzdrüse, V. i., Rutaceae-Diosmeae.

juniperina B. et W., wachholderblättrige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffnung.

laevigata B. et W., glatte, ♀. t. Cap d. gut. Hoffnung.

obtusata B. et W., stumpfblättrige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffnung.

tetragona B. et W., vierseitige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

Acmella Rich., Spitzling, XIX. ii., Compositae-Corymbiferae.

biflora Spgl., zweiblumiger, ☉. m. Ostindien.

brasiliensis Spgl., brasilianischer, ☉. m. Brasilien.

globosa Spgl., kugelblüthiger, ☉. f. Mexico.

Acme

mauritiana Pers., St. Moriz, ☉. m. Mascarenische Inseln.

repens Pers., kriechender, ☉. f. Carolina.

buphthalmoides P. v. *Heliopsis buphthalmoides*. *in-*

termedia Rich. v. *Heliopsis dubia*. *lanceolata* Lk.

v. *Spilanthes Pseudacmella*. *occidentalis* P. v. *He-*

liopsis dubia. *trilobata* Spgl. v. *Zaluzania triloba*.

Acmena DC., *Acmena*, XII. 1., Myrtaceae.

floribunda DC., blüthenreiche, ☿. t. Neuholland.

Acnida L., virginianischer Hanf, XXII. v., Aizoideae-Oleraceae (Chenopodeae).

cannabina L., gemeiner, ☉. f. Wa. Virginien.

Aconitum T., Sturmhut (Eisenhut), XIII. III., Ranunculaceae.

acuminatum Rchb., zugespitzter, 4. f. Südl. Schweiz.

acutum Rchb., spitziger, 4. f. Tyroler, steyermärker und ungarische Alpen.

angustifolium Bernh., schmalblättriger, 4. f. Wocheiner Alpen.

Anthora L., feinblättriger, 4. f. Oestliche, mittlere u. südeuropäische Alpen, Sibirien.

β) *tenuifolium*.

autumnale Clus., Herbst-St., 4. f. Belgien.

barbatum Patr., härtiger. 4. f. Oestl. Sibirien.

Bernhardianum Rchb., Bernhards, 4. f. Oestereich u. steyermärkische Alpen.

β) *albidum*.

biflorum Fisch., zweiblumiger, 4. f. Sibirien.

camtschaticum Rchb., camtschatischer, 4. f. Oestl. Sibirien, Camtschatca.

cernuum Wulf., übergebogener, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

Chamissoi Rchb., Chamisso's, 4. f. Aleutische Inseln.

delphinifolium DC., ritterspornblättriger, 4. f. Nördliche Polargegenden Asiens und Amerikas.

dissectum Rchb., schlitzbilättriger, 4. f. Rußland.

eminens Koch, stattlicher, 4. f. Eiffel (Rheingegend).

exaltatum Bernh., sehr hoher, 4. f. Riesengebirge.

excelsum Rchb., hoher, 4. f. Rußland.

formosum Rchb., schöner, 4. f. Salzburg.

Funkianum Rchb., Funk's 4. f. Salzburg.

β) *pubescens* Mch.

Gmelini, Rchb., Gmelin's, 4. f. Oestl. Sibirien.

hians Rchb., klaffender, 4. f. Riesengebirge.

Hoppeanum Rchb., Hoppe's, 4. f. Tyroler u. kärnthner Alpen.

Koelleianum Rchb., Kölle's, 4. f. Mittel- und osteuropäische Alpen.

laetum Rchb., schöngrüner, 4. f. Sudeten.

Lamarckii Rchb., Lamarck's, 4. f. Pyrenäen.

lasiosomum Rchb., wolligblumiger, 4. f. Mittelrußland, Podolien.

laxum Rchb., lockerer, 4. f. Steyermark. Alpen.

leptanthum Rchb., schlankhelmiger, 4. f. Davurien.

Lubarscii Rchb., Lubarsci's, 4. f. Camtschatca.

Lycotomum L. flor. suec., Wolf's, 4. f. Norwegen, Rußland, Lappland.

macrophyllum H. Angl., großblättriger, 4. f. ?

maximum Pall., größter, 4. f. Camtschatca.

molle Rchb., weichhaariger, 4. f. Schweiz.

Aconitum

multifidum Koch, vieltheiliger, 4. f. Sudeten, Mähren, südliche Schweiz.

β) *calibotryon*.

Myoctonum Rchb., Mäuse-St., 4. f. Mitteldeutschland.

Napellus Dod., wahrer, 4. f. Steyermärker, Tyroler, Schweizer Alpen.

β) *album*.

γ) *rubellum*.

Neubergense Clus., Neubergischer, 4. f. Alpen von Steyermark, Krain, Kärnthen, Baiern, am Harz, in Hessen, bis Schweden.

Nuttallii Swt., Nuttall's, 4. f. Nordamerika.

orientale Mill., morgenländisch, 4. f. Pers., Caucasus.

Pallasii Rchb., Pallas's, 4. f. Caucasus, Sibirien.

pallidum Rchb., bleicher, 4. f. Mittelrussland.

palmatifidum Rchb., handspaltiger, 4. f. Carpathen, Sudeten.

paniculatum Lam., rispiger, 4. f. Schweiz, südliches Frankreich.

productum Rchb., verlängerter, 4. f. Sibirien, Camtschatka.

pyramidale Mill., pyramidaler, 4. f. Mittel- bis Norddeutschland.

pyrenaicum L., pyrenäischer, 4. f. Pyrenäen, Sibirien, Oberitalien.

semigaleatum Pall., niedrighelmiger, 4. f. Camtschatka, West- und Nordamerika, Polargegend,

Sieboldii Hort., Siebold's, 4. k. Japan. China (sinense Hort.).

Störkianum Rchb., Störk's, officineller, 4. f. Mitteleuropa, Bergwälder und Alpen.

β) *bicolor*, zweifarbiger.

strictum, Bernh., steifer, 4. f. Wocheiner Alpen, Sudeten.

tauricum Wulf., tauer'scher, 4. f. Salzburger Tauern.

Thelyphonum Rchb., hoher Wolfs-St., 4. f. Vom Harz bis Oberitalien in Gebirgswäldern.

β) *altissimum* Mill.

tortuosum W., gewundener, 4. f. Sibirien.

Toxicum Rchb., siebenbürgischer, 4. f. Siebenbürgen.

uncinatum, hakenförmiger, 4. f. Nordamerika, Japan.

variegatum L., bunter, 4. f. Mitteleuropäische Alpen und Thäler.

b) *leucanthum*.

c) *rhynchanthum* Rchb.

β) *rostratum* Bernh.

b) *album* Ait.

γ) *Cammarum* Jacq. (*altigaleatum* Hayne).

a) *gracile* Rchb. (*nasutum* Fisch. *Bernhardianum* Wallr.).

b) *Judenbergense* Clus.

c) *macranthum* Rchb.

villosum Rchb., zottiger, 4. f. Sibirien.

volubile Pall., windender, 4. k. Sibirien, Imaus.

Vulparia Rchb., Fuchs-St., 4. f. Oestl. Europa bis Salzburg und Tyrol auf Kalkgebirgen.

a) *Phthora* Rchb.

b) *rubicundum* Fisch.

β) *Cynoctonum* Rchb.

Aconitum

b) lilacinum (triste Fisch.).

c) purpureum (moldavicum, septentrionale).

γ) Tragoctonum Rchb.

δ) Galoctonum Rchb.

albidum Bernh. vid. *Bernhardianum* var. β. *album* Ait. vid. variegatum β. *altigaleatum* Hayne v. variegatum γ. *altissimum* Mill. v. *Thelyphonum* β. *amoenum* Rchb. v. multifidum. *angustifolium* W. E. spl. v. *Funkianum*. *anthoroideum* Rchb. v. *Anthora*. *australe* Rchb. v. *Thelyphonum* flor. purp. *Bernhardianum* Wallr. vid. variegatum γ. *Braunii* Rchb. v. *neubergense*. *bulbiferum* Rchb. v. variegatum var. *callibotryon* Rchb. vid. multifidum β. *Cammarum* Jacq. et M.B. v. variegatum γ. *Cammarum* L. Fries v. *Stoerkianum*. *Candollei* Rchb. v. *Anthora*. *canescens* Schlchr. v. multifidum. var. *ciliare* DC. v. *villosum* Rchb. *Clusianum* Rchb. v. *hians*. *commutatum* Rchb. v. *tauricum*. *Cynoctonum* Rchb. v. *Vulparia* β. *decorum* Rchb. v. *exaltatum*. *delphinifolium* et *sibiricum* DC. v. *productum*. *elatum* Salisb. vid. *pyramidale*. *eulophum* Rchb. v. *Anthora*. *eustachyum* Rchb. v. *Napellus*. *Fischeri* Rchb. v. variegat. γ. *firmum* Rchb. vid. *acutum*. *flaccidum* Rchb. vid. *villosum*. *flexicaule* Hoppe v. *cernuum*. *Galoctonum* Rchb. v. *Vulparia* var. *grandiflorum* Pall. vid. *productum*. *hamatum* Rchb. v. *exaltatum*. var. β. *hebegynum* DC. v. *paniculatum*. *humile* de l'Arbré v. *cernuum*. *intermedium* DC. v. *Störkianum*. *intermedium* Hoppe v. *Myoctonum*. *intermedium* Host. vid. *Thelyphonum*. *inunctum* Koch v. *strictum*. *Jacquini* Rchb. v. *Anthora*. *Jacquinianum* Host v. *Vulparia*. *japonicum* Thbg. v. *uncinatum*. *Judenburgense* Clus. v. variegat. γ. *Kochleri* Rchb. v. *laetum*. *laxiflorum* Schlchr. v. multifidum. *Luparia* Rchb. v. *Thelyphonum*. *Lycoctonum* Jacq. v. *Vulparia*. *macranthum* Rchb. vid. variegat. γ. *medium* Schrad. vid. *Stoerkianum*. *microphyllum* Gaud. vid. multifidum. *Mielichhoferi* Rchb. vid. *Hoppeanum*. *moldavicum* Bess. v. *Vulparia* β. fl. purp. *Napellus* L. suec. v. *neubergense*. *Napellus* Mill. vid. *Stoerkianum*. *Napellus* Wulf. Koell. vid. *Koelleianum*. *nasutum* Fisch. v. variegatum γ. *nemorosum* MB. vid. *Anthora*. *neomontanum* Baumg. v. *Toxicum*. *neomontanum* Willd. v. *Stoerkianum*. *neomontanum* Wulf. v. *Neubergense*. *nitidum* Fisch. v. *Gmelini*. *nutans* Hortul. vid. *pyramidale*. *ochotense* Rchb. vid. *camtschaticum*. *ochroleucum* W. v. *orientale*. *oligocarpum* Rchb. vid. *angustifolium*. *pallidum* Nutt. v. *Nuttalii*. *pauciflorum* Host. vid. *Thelyphonum*. *Phthora* Rchb. v. *Vulparia* α. *plicatum* Koehl. v. *laetum*. *pubescens* Mönch v. *Funkianum* β. *rectum* Bernh. v. *Thelyphonum* β. *rhynchanthum* Rchb. v. variegatum L. *rostratum* Bernh. v. variegatum β. *rubicundum* Fisch. v. A. *Vulparia* α. *septentrionale* Baumg. vid. *Vulparia* β. *septentrionale* Koell. vid. *Lycoctonum*. *Schleicheri* Rchb. v. *Napellus*. *squarrosus* DC. v. *pyrenaicum*. *tauricum* W. v. *pyramidale*. *Theriophonum* Rchb. v. *Thelyphonum*. *Tra-*

Aconitum

goctonum Rehb. v. *Vulparia* γ. *triste* Fisch. v. *Vulparia* β. florib. pallide lilacinis. *variegatum* Hort. v. *Stoerkianum* bicolor *venustum* Rehb. vid. multifidum.

Acorus Tourn, Calmus, VI. 1., Aroideae-Orontiaceae.

Calamus L., gemeiner, 4. f. Wa. Europa, Asien.
gramineus Ait., grasartiger, 4. k. China.

Acratherum Lk., III. 11., Gramineae.

miliaceum Lk., hirsegrasähnliches, 4. w. Nepal.

Acrocephalus Benth., Kopfbasilicum, XIV. 1., Labiatae.

capitatus Benth., chinesischer, ♂. f. China.

Acrocomia Mart., Schopfpalme, XXI. VI., Palmae.

aculeata Lod., stachelige, 5. w. Westindien.
fusiformis Swt., spindelförmige, 5. w. Trinidad.
globosa Lod., kugelfrüchtige, 5. w. St. Vincent.
guianensis Lod., guianische, 5. w. Demerara.
horrida Lod., starkstachelige, 5. w. Trinidad.
minor Lod., kleine, 5. w. Trinidad.
sclerocarpa Mart., knorpelfrüchtige, 5. w. Südamerika.
tenuifolia Lod., feinblättrige, 5. w. Brasilien.

Acroglochin Schrad., Spitzamaranth, XXI. v. (V. 11.), Aizoideae-Amaranthaceae.

chenopodioides Schrad., gänsefußähnlicher, ♂. f. Nepal.

Acrostichum L., Vollfarn, XXIV. 1., Pterioideae.

alcicorne Sw., elendshornwedeliger, 4. w. Tropisches Afrika, Java, Neuholland.
aureum L., goldfarbiger, 4. w. Südamerika, tropisches Afrika.

bifurcatum Sw., zweigabeliges, 4. w. St. Helena.

crinitum Sw., langhaariger, 4. w. Martinique.

fimbriatum H. Liverp. an Cav.? gefranzter, 4. w. Brasil.

glandulosum Hook, drüsiger, 4. w. Jamaica.

longifolium Jacq., langblättriger, 4. w. Westindien.

simplex Sw., einfacher, 4. w. Jamaica.

viviparum Hamilt., lebiggegebärender, 4. w. Ostind.

albidulum W. vid. *Nothochlaena nivea*. *alpinum*

Bolt. vid. *Woodsia hyperborea*. *appendiculatum*

Hook v. *viviparum*. *bifurcatum* Cavan. v. *alcicorne*.

bonariense W. vid. *Nothochlaena rufa*. *Calo-*

melanos L. v. *Gymnogramma Calomelanos*. *cana-*

riense W. vid. *Nothochlaena Marantae*. *cervinum*

Sw. vid. *Polybotrya cervina*. *chrysophyllum* Sw. v.

Gymnogramme chrysophylla. *cordatum* L. v. *Gym-*

nogramme cordata. *dichotomum* Cav. v. *Schizaea*

bifida. *dichotomum* L. v. *Schizaea dichotoma*. *he-*

terophyllum L. v. *Nothochlaena piloselloides*. *hy-*

perboreum Liljebl. v. *Woodsia hyperborea*. *ilvense*

L. v. *Woodsia ilvensis*. *lanuginosum* Desf. v. *No-*

thochlaena lanuginosa. *Lingua* Thbg. v. *Niphobol-*

us Lingua. *Marantae* L. v. *Nothochlaena Maran-*

tae. *rufum* L. v. *Gymnogramme rufa*. *septentrio-*

nale L. vid. *Asplenium septentrionale*. *Stemaria*

P.B. v. *alcicorne*. *sulfureum* Sw. v. *Gymnogram-*

me sulfurea. *tartareum* Sw. v. *Gymnogramme tar-*

tarea. *thalictroides* L. v. *Ceratopteris thalictroides*.

Thelypteris L. v. *Aspidium Thelypteris*. *trifoliatum*

L. vid. *Gymnogramme trifoliata*. *velleum* Ait. vid.

Nothochlaena lanuginosa.

Acrotriche RB., (Spitzhaar), Acrotriche, V. I., Ericaceae-Epacrideae.

cordata RB., herzblättrige, ♂ t. Neuholland.

divaricata RB., ausgespernte, ♂ t. Neuholland.

ovalifolia RB., eiblättrige, ♂ t. Neuholland.

patula RB., ausgebreitete, ♂ t. Neuholland.

ramiflora RB., astblühende, ♂ t. Neuholland.

serrulata RB., sägezähnige, ♂ t. Neuholland.

Actaea L., Christophskraut, XIII. I., Ranunculaceae.

alba Mill., weißbeeriges, 4. f. Nordamerika.

rubra W., rothbeeriges, 4. f. Nordamerika.

spicata L., ähriges (schwarzbeeriges), 4. f. Europa, Caucasus, Sibirien.

americana Pursh v. *rubra*. *brachypetala* a DC. v.

alba. *brachypetala* β. DC. vid. *rubra*. *podocarpa*

DC. v. *Cimicifuga americana*. *racemosa* L. v. *Cimicifuga*

Serpentaria.

Actinella *lanata* Pursh v. *Eriophyllum caespitosum*.

Actinocarpus RB., Strahlenfrucht, VI. IV., Alismaceae.

Damasonium RB., sternförmige, 4. f. Wa. England, Frankreich.

minor RB., kleinere, 4. t. Wa. Neusüdwallis.

Actinochloa *procumbens* R. et S., *prostrata* R. et S. etc., v. *Chondrosium tenue*, *prostratum* etc.

Actinomeris Nutt., Actinomeris, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

alata Swt., flügel förmiges, 4. f. Nordamerika.

helianthoides Nutt., sonnenrosenähnliches, 4. f. Nordamerika.

oppositifolia Fres., gegenblättriges, 4. f. Nordamerika.

procera Nutt., hohes, 4. f. Nordamerika.

squarrosa Nutt., sparriges, 4. f. Nordamerika.

Actinophyllum *conicum* R. et P. et *digitatum* Wall. vid. *Sciodaphyllum conicum* et *digitatum*.

Actinotus *Helianthi* La Bill. vid. *Eriocalia major*.

Acynos *alpinus* Mch., *canus* Rehb., *graveolens* Lk., *grandiflorus* G. Don, *herba barona* G. Don, *heterophyllus* G. Don (*Thym. acinoides* Tenor.), *patavinus* P. *purpurascens* P., *rotundifolius* P., *suaveolens* G. Don. *villosus* P., *vulgaris* P. (*thymoides* Mönch), vid. *Calamintha*.

Adambea *glabra* Lam. v. *Lagerstroemia Reginae*. *Adambea hirsuta* Lam. v. *Lagerstroemia hirsuta*.

Adamia Wall. (J. Adam M. D. zu Calcutta), X. v., Saxifrageae-Cunonieae.

cyanea Wall., kornblumenblaue, ♂ t. Nepal.

Adamsia *scilloides* W. v. *Puschkinia scilloides*. *Adamsia* Fisch. v. *Sieversia*.

Adansonia L. (Mich. Adanson, franz. Botaniker), Affenbrothbaum. XVI. VIII., Malvaceae-Bombaceae.

digitata L., fingerförmiger, ♂ w. Guinea.

Adelia L., Kleinblüthler, XXII. XIII. (XVI. VIII.), Trioccae-Euphorbiaceae.

Acidoton L., spitzästiger, ♂ w. Jamaica, Hispaniola.

Bernardia L., Bernard v. Jussieu's, ♂ w. Jamaica.

myrtifolia Vent., myrtenblättriger, ♂ w. ?

ovata Dsf., eiförmiger, ♂ w. ?

Ricinella L., ricinusähnlicher, ♂ w. Jamaica, Hispan.

Adenandra W., Drüsenmännlein, V. 1., Tricoccae-Rutaceae.

acuminata Lodd., zugespitztes, ♀. f. Cap. d. g. Hoffn.
amoena Bartl. et Wendl., liebliches, ♀. t. Cap. d. g. H.
biseriata G. F. W. Meyer, zweireihigpunktirtes, ♀. t. C.
 d. gut. Hoffn.

coriacea Lichtenst., lederblättriges, ♀. t. C. d. gut. H.
cuspidata G. F. W. Meyer, langspitziges, ♀. t. Cap. d.
 gut. Hoffn.

fragrans R. et S., wohlriechendes, ♀. t. Cap. d. g. Hoffn.
linearis Hil., gleichbreitblättriges, ♀. t. C. d. g. Hoffn.
marginata R. et S., randblättriges, ♀. t. C. d. g. Hoffn.

umbellata W., doldiges, ♀. t. Cap. d. gut. Hoffn.

α) *speciosa*. β) *glandulosa*.

villosa Lichtenst., zottiges, ♀. t. Cap. d. gut. Hoffn.

alba R. et S. vid. *Coleonema album*. *amoena* Lk.

v. *fragrans*. *cordata* Lk. v. *Barosma serratifolia* β.

crenata W. v. *umbellata* β. *glandulosa*. *ovata* Lk.

v. *amoena*. *serratifolia* Lk. v. *Barosma serratifolia*.

speciosa Lk. v. *umbellata* α.

Adenanthera L., Drüsenstaubbeutel, X. 1., Leguminosae - Mimosaceae.

falcata L., sichelförmiger, ♀. w. Ostindien.

pavonina L., Pfauen-D. ♀. w. Ostindien.

Adenanthos La Bill., Drüsenblume, IV. 1., Proteaceae.

cuneata La Bill., keilförmige, ♀. t. Neuholland.

obovata La Bill., verkehrteiförmige, ♀. t. Neuholland.

sericea La Bill., seidenhaarige, ♀. t. Neuholland.

terminalis RB., endständige, ♀. t. Neuholland.

Adenocalyx racemosus Bert. v. *Coulteria mollis*.

Adenocarpus DC., Drüsenfrucht, XVII. 1v. (vi.) (Xvi. vi.).

foliolosus DC., dichtblättrige, ♀. k. Canar. Inseln.

frankenoides Choi., frankenienblättrige, ♀. k. Canarische Inseln.

hispanicus DC., spanische, ♀. k. Spanien, Portugal.

intermedius DC., mittlere, ♀. k. Portugal.

parvifolius DC., kleinblättrige, ♀. k. Südfrankreich, Spanien.

telonensis DC., toulonische, ♀. k. Südfrankr., Italien.

anagyris Spgl. v. *frankenoides*. *volgensis* Spgl. v. *Calophaca wolgarica*.

Adenogramma Rchb., Drüsenfruchtknoten, V. v., Portulacaceae - Paronychieae.

Mollugo Rchb., wirtelblättriger, ☉. f. Cap. d. g. Hoffn.

Adenophora Fisch., Drüsenträger, V. 1., Campanulaceae.

coronopifolia Fisch., krähensfußblättriger, 4. f. Dahuria, Altai.

β) *angustifolia*. γ) *latifolia*.

Gmelini Fisch., Gmelin's, 4. f. Dahuria.

Lamarckii Fisch., Lamarck's, 4. f. Altai.

β) *angustifolia*.

latifolia Fisch., breitblättriger, 4. f. Dahuria.

lilifolia Ledeb., lilienblättriger, 4. f. Sibirien, Ost-Europa.

β) *infundibuliformis* A. DC. (*suaveolens* Schrad.).

γ) *spretia* A. DC.

marsupiflora Fisch., beutelblumiger, 4. f. Dahuria, Sibirien.

Adenophora

periplocifolia Fisch., A. DC., periplocablätteriger, 4. f. Sibirien.

reticulata Fisch., netzförmiger, 4. f. Sibirien.

sinensis A. DC., chinesischer, 4. k. China.

tricuspidata Fisch., dreispitziger, 4. f. Dahuria.

verticillata Fisch., wirtelblätteriger, 4. f. Sibirien.

communis Fisch. v. *lilifolia*. *coronata* A. DC. vid.

marsupiiiflora. *denticulata* Ledeb. v. *tricuspidata*.

Fischeri G. Don v. *lilifolia*. *intermedia* Swt. vid.

latifolia. *pereskiaefolia* Fisch. vid. *lilifolia*. *pom-*

poniifolia Fisch. v. Gmelini. *Rabelaisiana* G. Don

v. Gmelini. *suaveolens* Schrad. v. *lilifolia* β.

Adenophyllum *coccineum* P. v. *Schlechtendalia glandulosa*.

Adenostemma Forst., Drüsengranne, XIX. I., Compositae-Eupatorieae.

decumbens Don, niederliegende, ☉. w. Jamaica, Hispaniola.

viscosa Forst., schmierige, ☉. w. Ostind., Societ. Inseln.

Adenotrichia Lindl., Drüsenhaar, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

amplexicaulis Lindl., stengelumfassendes, ♂. 4. k. f., Chili.

Adesmia DC., Freifaden, XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

glutinosa Gill. et Hook, klebriger, ♂. k. Chili.

microphylla Hook, kleinblätteriger, ♂. k. t. Valparaiso.

muricata DC., weichstacheliger, ♂. 4. k. Patagonien.

papposa DC., fruchtkroniger, 4. k. Chili.

pendula DC., herabhängender, ☉. f. Buenos Ayres.

Adiantum L., Frauenhaar, XXIV. I., Pterioideae (Polypodiaceae).

assimile Sw., ähnliches, 4. t. w. Neuholland.

Capillus veneris L., gemeines, 4. f. k. t. Mittel- und Südeuropa, Nordafrika, Westindien, Mascarenas.

cuneatum Langsd. et Fisch., keilförmiges, 4. w. Brasil.

deltoidum Sw., deltablätteriges, 4. w. Jamaica.

formosum RB., schönes, 4. t. w. Neuholland.

hispidulum Sw., RB., steifhaariges, 4. t. w. Neuholl.

lunulatum N. L. Burm., (lunatum Cav.), mondförmiges, 4. t. w. Ostindien, Philippinen, Mexico.

macrophyllum Sw., großblätteriges, 4. w. Westindien, Südamerika.

pedatum L., fußförmiges, 4. f. Nordamerika.

pubescens Schrk., weichhaariges, 4. t. w. Neuholland.

pulverulentum L., bestäubtes, 4. w. Westindien.

radiatum L., strahliges, 4. t. w. Westindien.

reniforme L., nierenförmiges, 4. t. Canarische, Mascarenasinseln.

rhomboideum Kunth, rautenförmiges, 4. w. Südamer.

serrulatum L., sägezahniges, 4. w. Jamaica.

tenerum Sw., zartes, 4. w. Jamaica, Chili.

ternatum Humb., dreizähliges, 4. w. Südamerika.

trapeziforme L., trapezenförmiges, 4. w. Westindien.

varium Humb., ungleichblätteriges, 4. w. Südamerika.

villosum L., zottiges, 4. w. Westindien, Brasilien.

Adina Salisb., Kopfblüthler, IV. I., Rubiaceae.

globifera Salisb., kugelblumiger, ♂. t. w. China.

Adlumia Rafin. (Adlum, amerikanischer Weinbauer), XVII. II. (IV.).

Adlumia

cirrhus Rafin., wickelrankige, ♂. Sch. f. Nordamerika.

Adonis Rupp. Dill., Adonisröschen, XIII. vi., Ranunculaceae genuinae.

aestivalis L., Sommer-A., ☉. f. Mitteleuropa, Nordasien, Afrika.

β) *pallida*.

apennina L., Apenninen-A., 4. f. Apenninen.

autumnalis L., Herbst-A., ☉. f. Mittel- u. Südeuropa.

β) *micrantha* DC.

davurica Rchb., dahurisches, 4. f. Sibirien.

flammea Jacq., feuerfarbiges, ☉. f. Mitteleuropa.

β) *pallida*.

microcarpa DC., kleinfrüchtiges, ☉. f. Spanien.

pyrenaica DC., pyrenäisches, 4. f. Pyrenäen.

sibirica Patrin., sibirisches, 4. f. Sibirien.

vernalis L., Frühlings-A., 4. f. Europa, Sibirien.

villosa Ledeb., zottiges, 4. f. Tatarei.

volgensis Steven, russisches, 4. f. Rußland.

aethiopica Thbg. v. *Knowltonia daucifolia*. *ambigua* Gaud. v. *aestivalis*. *anomala* Wallr. v. *flammea*.

capensis L. v. *Knowltonia rigida*. *capensis* Lam. v. *Knowltonia vesicatoria*. *capensis* Thbg. v.

Knowltonia gracilis. *citrina* Hoffm. v. *aestivalis* β.

daucifolia Lam. v. *Knowltonia daucifolia*. *filia* L.

suppl. v. *Knowltonia daucifol.* *flava* Vill. DC. vid.

aestivalis β. *gracilis* Poir. v. *Knowltonia gracilis*.

hirsuta Poir. v. *Knowltonia hirsuta*. *laserpitiifolia*

Poir. v. *Knowltonia vesicatoria*. *maculata* Wallr.

v. *aestivalis*. *miniata* Jcq. v. *aestivalis*. *parviflora*

Fisch. v. *autumnalis* β. *vernalis* β. *Menzelii* DC.

v. *apennina*.

Adoxa L., Bisamkraut, VIII. iv., Viniferae-Araliaceae. (Saxifrageae).

Moschatellina L., gemeines, 4. f. Europa, Caucasus.

Adysetum calycinum Scop. etc. v. *Alyssum calycinum* etc.

Adysetum edentulum Lk. etc. v. *Koniga*.

Aegilops L., Hartgras, III. ii. (XXIII. i.), Gramineae.

caudata L., geschwänztes, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

ovata L., eiförmiges, ☉. f. Südeuropa.

squarrosa L., sparriges, ☉. ♂. f. Kleinasien.

triaristata W., dreigranniges, ☉. f. Süd- u. Osteuropa.

β) *triticoides*.

cylindrica Host v. *caudata*. *echinata* Presl. v. *truncialis*.

incurvata L. v. *Lepturus incurvatus*.

Aeginetia capitata Grah. vid. *Lipostoma campanuliflora* D.

Don. *Aeginetia longiflora* Cavan. v. *Bouvardia longiflora*.

Aegiphila L., Geißstrauch, IV. i., Labiatae-Verbenaceae.

arborescens W., baumartiger, ♀. w. Guiana, Trinidad.

diffusa Andr., weitschweifiger, ♀. w. Westindien.

elata Sw., erhabener, ♀. w. Jamaica.

foetida Sw., stinkender, ♀. w., Jamaica.

martinicensis L., martiniquischer, ♀. w. Martinique.

obovata Andr., verkehrt-eirundblättriger, ♀. w. Westindien.

trifida Sw., dreiblütthiger, ♀. w. Jamaica.

Aegle Coreia, Orangenbeere, XIII. i., Hesperideae-Aurantaceae.

Aegle

Marmelos Corr., unbewehrte, ♀. w. Ostindien.
 sepriaria DC., dornige, ♀. t. w. Japan.

Aegopodium L., Giersch., V. II., Umbelliferae.

Podagraria L., Zipperlein-G., 4. f. Europa, Sibirien.
 β) variegata Dens.

Aegopogon Humb., Geißbart, III. II., Gramineae.

pusillus P. B., kleiner, ☉. f. Neugranada.
 trisetus R. et S., dreiganniger, ☉. f. Mexico.

Aeollanthus Mart., Irrblume, XIV. II., Labiatae-Verbenaceae.

suaveolens Mart., wohlriechende, ☉. m. f. Brasilien.

Aëranthus Lindl., Luftblume, XX. I., Orchideae.

grandiflora Lindl., großblumige, 4. w. Madagascar.
 sesquipedalis Lindl., höhere, 4. w. Madagascar.

Aërides Sw., Luftstendel, XX. I., Orchideae.

arachnites Sw., spinnenblumiger, 4. w. Japan.
 cornutum Roxb., gehörnter, 4. w. Ostindien.
 odoratum Lour., wohlriechender, 4. w. China, Cochinchina.

Aërobium maculatum Spgl. v. Angraecum maculatum.**Aërva**-Forsk., (arabischer Name), V. I., Aizoideae-Amaranthaceae.

javanica Juss., javanische, ♀. w. Ostindien, Aegypten.
 lanata Juss., wollige, ☉. ♂. w. Ostindien.

Aeschynomene L., Schampflanze, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

americana L., amerikanische, ☉. w. Jamaica.
 arborea L., baumartige, ♀. w. Ostindien.
 aspera L., rauhe, ☉. w. Ostindien.
 crepitans Jcq., knarrende, ♀. w. Caracas.
 hispida W., steifhaarige, ☉. f. Nordamerika.
 indica L., indische, ☉. ♂. w. Ostindien.
 patula Poir., ausgebreitete, ♀. w. Mascarenas.
 pendula Boj., herabhängende, ♀. w. Mascarenas.
 pumila L., niedrige, ☉. w. Ostindien.
 Roxburghii Spgl., Roxburgh's, ☉. w. Ostindien.
 sensitiva Sw., empfindliche, ♀. w. Westindien, Brasilien, Guinea.

viscidula Mchx., schmierige, ☉. m. f. Florida.

aristata Jcq. v. Pictetia aristata. bispinosa Jcq. v. Sesbania aculeata. cannabina Retz. vid. Sesbania cannabina. coccinea L. suppl. vid. Agati coccinea. grandiflora L. v. Agati grandifl. longifolia Cav. v. Daubentonia longifol. miniata Orteg. vid. Daubentonia punicea. papposa Lag. vid. Adesmia papposa. picta Cav. v. Sesbania picta. platycarpa Mchx. v. Glottidium floridanum. prostrata Poir. v. viscidula. Sesban v. Sesbania aegyptiaca. subviscosa Roxb. v. Roxburghii. triflora Poir. v. Desmodium triflorum. viscidula W. v. Roxburghii.

Aesculus L., Rosskastanie, VII. I., Sapindaceae-Hippocastaneae.

glabra W., glatte, ♀. f. Nordamerika.

Hippocastanum L., gemeine, ♀. f. Tibet.

α) flore pleno. β) foliis variegatis. γ) incisum.

δ) nigrum. ε) praecox. ζ) tortuosum.

Lyoni Hort., Lyons, ♀. f. Nordamerika.

ohioënsis Mchx., Ohio, ♀. f. Nordamerika.

Aesculus

pallida W., bleiche, ♀. f. Nordamerika.

rubicunda Lois. DC., hochrothe, ♀. f. Nordamerika.

carnea Wats. et *coccinea* Hortul. et *rosea* Hortul. et *Whitleys fine scarlet* vid. *rubicunda*. *discolor* Pursh. vid. *Pavia hybrida*. *flava* Ait. (*lutea* Wangerh.). *macrostachya* Mchx. (*parviflora* Walt.). *neglecta* Lindl. v. *Pavia flava*, *macrostachya* etc. *Aescul.* *Pavia* L. v. *Pavia rubra*.

Aetheilema imbricatum RB. *longifolium* Spgl. *parviflorum* Spgl. v. *Phaylopsis imbricata* etc.

Aethionema RB., Steintäschel, XV. II., Cruciferae.

Buxbaumii DC., Buxbaum's, ☉. f. Kleinasien, Caucasus.

coridifolium DC., corisblättriges, ♂. f. k. Libanus.

cristatum DC., kammiges, ☉. f. Syrien, Persien.

membranaceum DC., häutiges, ♂. f. k. Persien.

monospermum RB., einsamiges, ☉. ♂. f. Spanien.

parviflorum Swt., kleinblumiges, ☉. f. k. Persien.

polygaloides DC., kreuzblumenähnliches, ♂. f. k. Insel Chios.

saxatile DC., gemeines, ☉. ♂. f. Mittel- u. Südeuropa.
β) *gracile* DC.

stylosum DC., langgriffeliges, ♂. f. k. Syrien.

cappadocicum Spgl. v. *Buxbaumii*. *Aethonia fruticosa* D. Don vid. *Polychaetia fruticosa* etc.

Aethusa L., Gleifse, V. II., Umbelliferae.

cynapioides M.B., östliche, ☉. f. Osteuropa.

Cynapium L., gemeine Garten-Gl., ☉. f. Europa.

α) *elata* Hoffm. β) *pygmaea* Koch (agrest. Wallr.).

γ) *segetalis* v. Boenningh.

Bunius L. vid. *Ptychotis heterophylla*. *divaricata* Nutt. v. *Sison divaricatus*. *fatua* Ait. v. *Sium verticillatum*. *leptophylla* Nutt. v. *Sison capillaceum*. *Meum* Ait. v. *Meum athamanticum*. *montana* Lam. v. *Ptychotis heterophylla*.

Afzelia Sm., (Afzelius, schwedischer Botaniker), X. I., Leguminosae-Caesalpinieae.

africana Sm., afrikanische, ♀. w. Westafrika.

cassioides J. G. Gmelin vid. *Seymeria tenuifolia*.

grandis Hort. v. *Erythrophleum guineense*. *splendens* Hort. v. *Carapa guianensis*.

Agapanthus L'Her., Schmucklilie, VI. I., Coronariae-Asphodeleae (Hemerocallideae).

minor Lodd., kleine, 4. k. Cap d. gut. Hoffn.

praecox W., frühe, 4. k. Cap d. gut. Hoffn.

umbellatus L'Her., doldenblüthige, 4. k. f. b. C. d. g. H.

α) *albiflorus*. β) *multiflorus*. γ) *foliis variegatis*.

Agastachys RB., Wunderähre, IV. I., Proteaceae.

odorata RB., wohlriechende, ♀. t. Van Diemens Land.

Agathaea Cass., Bläuling, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

coelestis Cass., amellusblüthiger, ♀. k. C. d. g. Hoffn.

linifolia G. Don, linienblättriger, ♀. k. C. d. g. Hoffn.

tenella *, zarter, ☉. f. Cap d. gut. Hoffn.

Agathis australis Lindl. et **loranthifolia** Salisb. (*Agathis Dammara* Rich.) v. *Dammara australis* et *orientalis*.**Agathophyllum** Juss., Gewürzblatt, XI. I., ? Laurineae.

aromaticum W., madagascarisches, ♀. w. Madagascar.

Agathosma W., Wohlgeruch, V. 1., Tricoccae-Rutaceae.

acuminata W., zugespitzter, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) *cordata*.

apiculata G. F. W. Meyer, kurzspitziger, ♂. t. C. d. g. H.

bifida Bartl. et Wendl., zweispaltiger, ♂. t. C. d. g. H.

bisulca Bartl. et Wendl., zweifurchiger, ♂. t. C. d. g. H.

Cerefolium Bartl. et Wendl., Kerbel-W., ♂. t. C. d. g. H.

ciliata Lk., gefranzter, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

concinna Hoffm. gg., netter, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

cuspidata Bartl. et Wendl., langspitziger, ♂. t. C. d. g. H.

β) *bruniades*.

erecta Bartl. et Wendl., aufrechter, ♂. t. C. d. gut. H.

glabrata Bartl. et Wendl., glatter, ♂. t. Cap d. gut. H.

hirta Bartl. et Wendl., kurzhaariger, ♂. t. C. d. gut. H.

hispida Bartl. et Wendl., steifhaariger, ♂. t. C. d. gut. H.

hybrida Bartl. et Wendl., Bastard W., ♂. t. C. d. g. H.

imbricata W., ziegeldachförmiger, ♂. t. C. d. gut. H.

β) *virgata* Spgl. γ) *obtusata* Wendl.

laxa Bartl. et Wendl., lockerer, ♂. t. Cap d. gut. H.

linifolia Lichtnst., gleichbreitblättriger, ♂. t. C. d. g. H.

lycopodioides Bartl. et Wendl., bärlappartiger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

microphylla G. F. W. Meyer, kleinblättriger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

mollis Bartl. et Wendl., weicher, ♂. t. Cap d. gut. H.

obtusata Bartl. et Wendl., stumpfblättriger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

α) *pubescens* W. β) *oblonga* Wendl.

orbicularis Bartl. et Wendl., kreisblättriger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

parviflora Bartl. et Wendl., kleinblumiger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

patula G. F. W. Meyer, ausgebreiteter, ♂. t. C. d. g. H.

prolifera Bartl. et Wendl., sprossender, ♂. t. C. d. g. H.

? *reflexa* Lk., zurückgebogener, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

rubra W. et Lichtnst., röthlicher, ♂. t. Cap d. g. H.

rugosa Lk., runzeliger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

serpyllacea Lichtnst., quendelblättriger, ♂. t. C. d. g. H.

squamosa Bartl. et Wendl., schuppiger, ♂. t. C. d. g. H.

tenuissima Otto, zarter, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

Thunbergiana Bartl. et Wendl., Thunberg's, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

Ventenatiana Bartl. et Wendl., Ventenat's, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

vestita W., bekleideter, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

villosa W., zottiger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

virgata Bartl. et Wendl., ruthenförmiger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

barbatum Spgl. v. *Macrostylis lanceolata*. *foetidissima* Hortul. v. *Barosma foetidissima*. *hirta* Bot.

reg. H. Kew. v. *villosa*. *lanceolatum* Spgl. v. *ciliata* Lk.

patens Hortul. v. *Cerefolium*. *pubescens* W. v. *obtusata* α.

pulchellum Lk. v. *Barosma pulchella*. *subcordatum* Hoffm. gg. vid. *acuminata* β.

virgata Spgl. v. *imbricata* β.

Agathyrus, *alpinus* D. Don. *sibiricus* D. Don etc. vid. *Mulgedium alpinum* etc.

Agati Rheed. (ostindischer Name), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae,

Agati

coccinea Desv. DC., scharlachfarbige, f. w. Ostindien.

grandiflora Desv. DC., großblumige, f. w. Ostindien.

Agave L., amerikanische (Wunder-) Aloe, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae (Bromeliaceae alior.).

I. *Agave* L.

americana L., amerikanische, 4. k. Südamerika.

β) *foliis variegat.*

angustifolia Haw., schmalblättrige, 4. t. ?

atrovirens H. Berol., schwarzgrüne, 4. t. Mexico.

brachystachys H. Berol., kurzährige, 4. t. Mexico.

elegans Hort., nette, 4. w. ?

flaccida Haw., schlaffe, 4. t. Südamerika.

flavescens H. Berol., gelbliche, 4. t. Südamerika.

glaucescens H. Berol., graugrüne, 4. t. Südamerika.

Keratto Haw., Keratto, 4. t. Südamerika.

latifolia H. Berol., breitblättrige, 4. t. Mexico.

laxa H. Berol., schlaffblättrige, 4. t. Mexico.

lophantha H. Berol., büschelblumige, 4. t. Mexico.

lurida Jcq., schmuziggelbe, 4. k. Veracruz.

macracantha H. Berol., großstachelige, 4. t. k. Mexico.

mexicana Haw., mexicanische, 4. t. k. Mexico.

Milleri Haw., Miller's, 4. k. Nordcarolina.

polyacantha Haw., vielstachelige, 4. t. ?

polyacanthoides H. Berol., vielstacheligähnl., 4. t. Mexico.

potatorum H. Berol., Trinker-A., 4. t. k. Mexico.

Saponaria Lindl., Seifen-A., 4. w. Peru.

tehuacanensis H. Berol., Tehuacana, 4. t. k. Mexico.

univittata Haw., einstreifige, 4. t. k. Mexico.

virginica L., virginische, 4. k. Virginien, Nordcarolina.

vivipara L., lebendiggebärende, 4. t. Südamerika.

yuccaefolia W., yuccablättrige, 4. t. Neuspanien.

II. *Littaea* Brign, Tagliab.

geminiflora Ker., doppeltblüthige, 4. w. t. Südamerika.

? *gracilis* Hoffinsegg., schlanke, 4. w. t. Südamerika.

spicata DC., ährenblüthige, 4. w. t. Südamerika.

Cantala Wall. *cubensis* Jcq. *foedita* L. (*gigantea*).

madagascariensis, *rigida* Mill. *tuberosa* Mill. vid.

Fourcroya Cantala etc.

Ageratum L., Leberbalsam, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

conyzoides L., dürrwurzähnlicher, ☉. f. m. Ostindien, Afrika, Südamerika, Westindien.

β) *coeruleum* Pers. (*obtusifolium* Lam.). γ) *lati-*

folium Hort. non Cav. δ) *mexicanum* Sims.

strictum Sims., steifer, ☉. f. Nepal.

angustifolium Spgl. v. *Eriophyllum angustifolium*.

coelestinum B. mag. v. *Coelestina micrantha*. *co-*

rymbosum Zuccagn. v. *Coelestina ageratoides*. *li-*

neare Cav. v. *Palafoxia linearis*. *obtusifolium* Lam.

v. *conyzoides* β. *pedatum* Orteg. v. *Hymenopap-*

pap pedatus. *punctatum* Orteg. v. *Stevia hyssopi-*

folia. *viscosum* Orteg. v. *Stevia salicifolia*.

Aglaja Lour., Glanzbaum, XVI. 11. (111.), Hesperideae-Aurantiaceae.

odorata Lour., wohlriechender, f. w. China, Cochinchina.

Agnostus Cun., (Provinzialname) ? IV. 1., Proteaceae.

sinuata Cun., buchtigblättrige, f. t. Neuholland.

Agraulis alpinus P. B. *caninus* P. B. etc. vid. *Agrostis alpina* etc

Agrimonia L., Odernennig, XI. II., Rosaceae.

Eupatoria L., gemeiner, 4. f. Europa, Nordamerika.

β) dahurica (daurica).

nepalensis D. Don, nepalischer, 4 f. Nepal.

odorata, Camer. Ait., wohlriechender, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

parviflora, Ait., kleinblumiger, 4. f. Nordamerika.

pilosa, Ledeb., weichhaariger, 4. f. Sibirien.

repens L., kriechender, 4. f. Armenien.

striata, Mchx., gestreifter, 4. f. Nordamerika.

suaveolens, Pursh, wohlriechender, 4. f. Nordamerika.

agrimonoides L. vid. Aremonia agrimonoides Neck.

decumbens L. v. Acaena latebrosa.

Agropyrum acutum R. et. S. caesium Presl. etc. v. Triticum acutum etc.**Agrostemma** L., Rade, X. IV., Caryophyllaceae-Sileneae.

Githago L., gemeine (Korn-R.), ☉. f. Europa.

β) nicaeensis W.

Coelirosa L. coronaria L. decumbens Dens. (perennans Haw.). flos jovis L. vid. Lychnis Coeli rosa etc.

Agrostis L., Straußgras, III. II., Gramineae.

aemula RB., liebliches, 4. k. Neuholland.

alba L., Schrad., weißliches, 4 f. Europa.

β) gigantea Roth. (sylvatica W.). γ) maritim. Lam.

δ) stolonifera L. (diffusa Host. decumbens Auctor).

alpina Scop., Alpen-St., 4. k. Europäische Alpen.

anomala W., abweichendes, ♂. 4. f. Nordamerika.

canina L., Hunds-St., 4. f. Europa.

β) diffusa Lk.

capillaris L., haarförmiges, ♂. f. Portugal, Caucasus.

elegans Thore, nettes, ☉. f. Frankreich.

hygrometrica Nees, hygrometrisches, ☉. f. Brasilien.

lachnantha Nees, wollblüthiges, ☉. ♂. f. ?

laxa Schrb., lockerblüthiges, ♂. f. Nordamerika.

monandra Hornem., einmänniges, ☉. f. ? Nordamerika.

nitens Guss., glänzendes, ☉. ♂. f. Sicilien.

rubra L., rothes, 4. f. Lappland.

rupestris All., Felsen-St., 4. f. Europäische Alpen.

setacea Curt., borstiges, 4. f. England.

tenuifolia MB., feinblättriges, 4. f. Caucasus.

verticillata Vill., wirtelblüthiges, 4. f. Frankreich.

vulgaris Wither., gemeines, 4. f. Europa.

frondosa Tenore v. alba γ. interrupta W. vid. aemula. Die übrigen, als Agrost. algida Wahlenb., Spica venti L., tenacissima L. suppl. etc. vid. die Gattungen: Apera, Cinna, Colpodium, Echinopogon, Mühlenbergia, Phippsia et Sporobolus etc.

Agyneja L., Ohnnarbe, XXI. x. (XVI. I.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

impubes L., unbehaarte, ☉. f. China.

pubera L., behaarte, ♀. t. China.

Aidelus micranthus Spgl. v. Veronica micrantha.**Ailanthus** Dsf., Stinksumach (Götterbaum), V. III., (XXIII. I.), Amyrideae-Terebinthaceae.

excelsa Roxb., hoher, ♀. w. Ostindien.

glandulosa Dsf., drüsiger, ♀. f. China.

Aira L., Schmiele, III. II., Gramineae.

I. muticae.

Aira

arundinacea L., rohrartige, 4. f. Mittelasien.

semineutra Kit., halbzwittrliche, 4. f. Ungarn.

II. aristatae (Deschampsia P. Beauv., Campella Lnk.).

alpina L., Alpen-Schm., 4. f. Lappland, Schottland.

ambigua Mchx., zweifelhafte, 4. f. Nordamerika.

bottnica Wahlenb., bottnische, 4. f. Schweden.

brevifolia MB., kurzblättrige, 4. f. Caucasus.

caespitosa L., Rasen-Sch. (gemeine), 4. f. Europa.

β) pallida (altissima Lam., parviflora Thuill.).

γ) vivipara.

* grandis Bess., große, 4. f. Podolien.

media, Gouan., mittlere, 4. f. Südfrankreich.

discolor Thuill. v. media. laevigata Sm. v. alpina.

montana? L. v. bottnica. agrostidea Lois. v. Airopsis

Candollii. brevifolia Pursh. globosa Thore.

minuta L. v. Airopsis brevifol. globosa etc. atropurpurea

Wahlb. capillaris Host., (elegans W.).

caryophyllea L. paludosa Roth. praecox L. pulchella W. etc. vid. Avenaira (Avena) atropurpurea

etc. articulata Dsf. canescens L. v. Corynephorus

articulatus etc. obtusata Mchx. (truncata Mühlbg.)

v. Eriachne obtusa. aquatica L. v. Glyceria aquatica.

cristata L. glauca Spgl. hirsuta Hall. fil.

pensylvanica Spgl., (mollis Mühlb.). vallesiaca All.

etc. v. Koeleria cristata etc. coerulea L. v. Molinia coerulea.

involucrata Cav. v. Periballia hispanica.

subspicata L. v. Trisetum subspicatum.

Airochloa, albescens, Lk. cristata Lk. v. Koeleria albes-

scens etc.

Airopsis Desv., Zwergschmiele, III. II., Gramineae.

brevifolia R. et S., kurzblättrige, 4. f. Nordamerika.

Candollei Desv., Candolle's, 4. f. Spanien, Westfrank-

reich, Sicilien.

globosa Desv., kugelförmige, ☉. ♂. f. Westfrankreich.

minuta Desv., kleinste, ☉. f. Aegypten, Spanien.

involucrata R. et S. v. Periballia hispanica. pulchella

Hort. v. Avena pulchella.

Aitonia L. fil. (W. Aiton, engl. Botaniker u. Gärtner),

XVI. v., ? Hesperideae-Meliaceae.

capensis, capische, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

Aizoon L., Zaserling (Immergrün), XII. II., Aizoideae-

Ficoideae.

canariense L., canarischer, ☉. f. Canarische Inseln,

Nordafrika.

fruticosum L., stranchiger, ♂. k. Cap d. gut. Hoffn.

glinoides L., glinusähnlicher, ☉. ♂. f. k. Cap d. gut.

Hoffn.

hispanicum L., spanischer, ☉. f. Spanien.

paniculatum L., rispiger, ☉. ♂. f. k. Cap d. g. Hoffn.

perfoliatum L., durchwachsener, ♂. k. Cap d. g. Hoffn.

lanceolatum Murray v. paniculatum.

Ajuga L., Günsel, XIV. I., Labiatae.

australis RB., neuholländischer, 4. f. k. Neuholland.

Chamaepitys Schreb., Acker-G., ☉. f. Mittel- u. Süd-

europa, Kleinasien, Nordafrika.

chia Schreb., griechischer, ☉. f. Insel Chios, Klein-

asien.

genevensis L., gemeiner, 4. f. Europa.

β) rubra. γ) alba. δ) foliosa Tratt.

Ajuga

integrifolia Don, ganzblättriger, 4. f. Nepal.

Iva Schreb., moschusduftender, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

oblongata MB., langblättriger, 4. f. Caucasus.

orientalis L., morgenländischer, 4. f. Kleinasien.

pyramidalis L., pyramidaler, 4. f. Europa.

reptans L., kriechender, 4. f. Europa.

α) *alba*. β) *rubra*. γ) *alpina* Vill. δ) *variegata*.
salicifolia Schrbr., weidenblättriger, 4. f. Kleinasien, Caucasus.

Tenorii Presl., Tenorischer, 4. f. Neapel, Sicilien.

alpina L. v. *genevensis*. *furcata* Lk. v. *Craniotome* *versicolor*. *italica* Hort. v. *Tenorii*. *montana* Rchb. v. *genevensis*. *moschata* Schrb. v. *Iva*. *rugosa* Host v. *genevensis*. *rupestris* Schlchr. v. *pyramidalis*.

Alangium Juss. (Alangi, malabarischer Name), XII. 1.,
Onagrariae-Granateae (Alangieae).

decapetalum Lam., zehnblättriges, ♀. w. Ostindien.

hexapetalum Lam., sechsblättriges, ♀. w. Ostindien.

tomentosum Lam., filziges, ♀. w. Ostindien.

Albua L., Weisblume (Stiftblume), VI. 1., Coronariae-
Asphodeleae.

abyssinica Jacq., abyssinische, 4. Zw. t. Mittel- und Südafrika.

altissima Jacq., hohe, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

aurea Jacq., goldfarbige, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

caudata Jacq., geschwänzte, 4. Zw. t. Cap d. g. Hoffn.

coarctata Dryand., gedrungene, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

exuviata Ker, nachenblättrige, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

fastigiata Dryand., gipfelständige, 4. Zw. t. Cap d. g. Hoffn.

filifolia Ker, fadenblättrige, 4. Zw. t. Cap d. g. Hoffn.

flaccida Ker, schlaffe, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

fragrans Jacq., wohlriechende, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

fugax Ker., vergängliche, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

major Dryand., grössere, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

minor L., kleinere, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

physodes B. Mag., aufgeblasene, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

setosa Jacq., borstige, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

spiralis L., spiralförmige, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

viridiflora Jacq., grünblumige, 4. Zw. t. Cap d. g. Hoffn.

viscosa L., schmierige, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

vittata Ker, gestreifte, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

Alcea ficifolia L., *rosea* L. v. *Althaea ficifolia* etc.

Alchemilla T. L., Löwenfuß, Frauenmantel, IV. 1.,
Rosaceae-Sanguisorbeae.

alpina L., Alpen-L., 4. f. Europ. Alpen, Nordamerika.

Aphanes L., Acker-L., ☉. f. Europa, Amerika.

capensis Thbg., capischer, 4. k. Cap d. gut. Hoffn.

cornucopioides Lagasc., spanischer, ☉. f. Spanien.

fissa Schum., spaltblättriger, 4. f. Sudeten, mittelpäpische Alpen.

Alchemilla

pentaphylla L., fünfblätteriger, 4. f. Schweizer- u. Tyroler-Alpen.

pubescens MB., feinhaariger, 4. f. Caucasus, Kärnten und Tyrol.

sericea W., seidenhaariger, 4. f. Caucasus.

sibbaldiaefolia Kunth, *sibbaldiablätteriger*, 4. k. Mexico.

vulgaris L., gemeiner, 4. f. Europa.

β) *montana* W. (hybrida W.). γ) *variegata*.

alpina MB. v. *sericea*. *arvensis* Scop. v. *Aphanes*.

pyrenaica Duf. v. *fissa*.

Alcina ovatifolia Lagasc. v. *Melampodium paludosum*. *Al-*

cina perfoliatu Cav. v. *Melampodium perfoliatum*.

Aldeaea circinnata v. *Phacelia circinnata*.

Aldrovanda Monti (Aldrovandus, italien, Naturforscher), V. v., Cistineae-Droseraceae.

vesiculosa L., blasige, 4. Wa. f. Ital., Südfrankreich.

Alectorolophus Hall., M. B., Klaffer, Klappertopf, XIV. II., Personatae-Rhinantheae (Pediculareae).

alpinus * (Rhinanth. Baumg.), Alpen-K., ☉. f. Sudenten, Karpaten.

angustifolius * (Rhinanth. Gmel.), schmalblätteriger, ☉. f., Berge, Subalpinen, Deutschland.

hirsutus All., rauchhaariger, ☉. f. Felder Mittel-, Ost- und Südeuropa's.

major Rchb., größer, ☉. f. Europa, Asien, Nordamerika.

minor Rchb., kleiner, ☉. f. Europa, Asien, Nordamerika.

Crista galli M.B. v. *major* etc. *grandiflorus* Wallr.

v. *major*. *parviflorus* Wallr. vid. *minor*. *Trixago*

M.B. v. *Trixago rhinanthina*.

Aletris L., Hyacinthaloe, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

aurea Mchx., goldfarbige, 4. k. f. b. Nordamerika.

alba Mchx. v. *farinosa*. *arborea* W. vid. *Dracaena*

arborea. *capensis* L. v. *Veltheimia viridifolia*. *co-*

chinchinensis Lour. v. *Sansevieria laete-virens*. *fra-*

grans Jacq. v. *Dracaena fragrans*. *glauc* Ait. vid.

Veltheimia glauca. *hyacinthoides* L. v. *Sansevieria*

zeylanica. *pumila* Ait. vid. *Tritomanthe pumila*.

punicea La Bill. vid. *Blandfordia grandiflora* RB.

sarmentosa Andr. v. *Tritomanthe media*.

Aleurites Forst., Mehlbaum, XXI. V. (XVI. VIII.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

triloba Forst., dreilappiger, 5. w. Molucken, Soc. Inseln.

Alhagi Tour., Mannapflanze, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

camelorum Fisch., Camels-M., 4. k. Caucasus, Mittelasien.

maurorum T., maurische, 5. k. Asien, Griechenland, Arabien, Persien.

Alisma Dill., Froschlöffel, Wasserwegerich, VI. IV. Alismaceae.

cordifolium L., herzblätteriger, 4. Wa. w. Südamerika.

natans L., schwimmender, 4. Wa. f. Europa, Nordamer.

parnassifolium L., parnassienblätteriger, 4. Wa. f. Brandenburg, Mecklenburg, Italien.

Plantago L., gemeiner, 4. Wa. f. Europa, Mittelasien, Nordamerika.

αβ) *graminifolium* Ehrh. γ) *lanceolatum* With.

δ) *parviflorum* Pursh.

ranunculoides L., ranunkelähnlicher, 4. Wa. f. Europa.

Alisma

reniforme Don, nierenförmiger, 4. Wa. k. Nepal.
repens Cav., kriechender, 4. Wa. f. Spanien, Barbarei,
England.

sagittifolium W., pfeilblättriger, 4. Wa. w. Guinea.

Damasonium L. v. *Actinocarpus Damasonium*. *flava*
L. v. *Limnocharis Plumieri*.

Allamanda L. (Allamand, Professor zu Leyden), V. 1.,
Contortae-Apocynae.

cathartica L., purgirende, 5. w. Guiana.

verticillata Dsf., wirtelblättrige, 5. w. ? Ostindien.

Allantodia RB., Hautfarn, XXIV. 1., Pterioideae
(Polypodiaceae).

australis RB., südlicher, 4. I. Vandiemensland.

axillaris Kaulf., winkelständiger, 4. I. Madeira.

tenera RB., zarter, 4. t. Neuholland.

umbrosa RB., schattenliebender, 4. t. Madeira.

Alliaria Adans., Lauchkraut, XV. III., Cruciferae.

brachycarpa Andrz., kurzschotiges, ♂. f. Caucasus.

officinalis Andrz., gebräuchliches, ♂. f. Europa, Mittel-
asien.

Allionia L. (C. Allioni, Prof. der Botanik zu Turin),
IV. 1., Nyctagineae.

aggregata Spgl., angehäuften, 4. k. Neuspanien, Süd-
carolina.

decumbens Spgl., niederliegende, 4. f. Nordamerika.

hirsuta Pursh, rauhhaarige, 4. f. Nordamerika.

incarnata L., fleischfarbige, ☉. f. Peru.

linearis Pursh, linienblättrige, 4. f. Nordamerika.

nyctaginea Mchx., wunderblumenähnliche, 4. f. Nord-
amerika.

ovata Pursh., eiförmige, 4. f. Nordamerika.

violacea L., violette, ☉. f. Cumana.

albida Walt. v. *aggregata*.

Allium T. L., Lauch, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

acutangulum Schrad., spitzkantiger, 4. Zw. f. Europa,
Mittelasien.

acutiflorum Loisel., spitzblumiger, 4. Zw. f. Süd-
frankreich.

albidum Fisch., weißlicher, 4. Zw. f. Taurien, Caucasus.

album Savi., weißer, 4. Zw. f. Italien, Griechenland.

Ampeloprasum L., breitblättriger, 4. Zw. f. England,
Italien, Rheingegend.

Andersonii G. Don, Anderson's, 4. Zw. f. Sibirien.

angulosum L., kantiger, 4. Zw. f. Europa, Mittelasien.

ascalonicum L., Schalotten-L, 4. Zw. f. Syrien, Kleinasien.

β) majus.

asperum G. Don, rauher, 4. Zw. f. Südeuropa.

atropurpureum Kit., dunkelpurpurfarbiger, 4. Zw. f.
Ungarn.

azureum Fisch., himmelblauer, 4. Zw. f. Sibirien.

bisulcum Red., zweifurchiger, 4. Zw. f. ?

brachystemon DC., kurzfadiger, 4. Zw. f. Südeuropa.

canadense L., canadischer, 4. Zw. f. Nordamerika.

carinatum L. Sm., rinnenblättriger, 4. Zw. f. Europa.

carneum W., fleischfarbiger, 4. Zw. f. ?

carolinianum DC., carolinianischer, 4. Zw. Carolina.

caspium MB., caspischer, 4. Zw. Asiatisch Rußland.

Allium

- Cepa* L., Bollen (gemeine Zwiebel), ♂. Zw. ?
 β) *aggregatum* G. D. γ) *hispanicum* (album et rubrum). δ) *parsum* Jcq. ε) *pauciflorum* Trevir.
cepaeforme G. Don, bollenähnlicher, 4. Zw. f. ?
ceratophyllum Bess., hornblättriger, 4. Zw. f. Rußland.
cernuum Roth, übergebogener, 4. Zw. f. Nordamerika.
Chamaemoly L., Zwerg-L., 4. Zw. f. Südeuropa, Nordafrika.
cinereum Lehm., aschgrauer, 4. Zw. f. Sibirien.
congestum, G. Don, gedrängtblättriger, 4. Zw. f. Sibirien.
controversum Schrad., streitiger, 4. Zw. f. Osteuropa.
Cowanii Ker., Cowans-L., 4. Zw. f. Chili.
descendens L., herabsteigender, 4. Zw. f. Schlesien, Oberitalien, Schweiz.
erectum G. Don, aufrechter, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
evosmon Lk. et Otto, gutriechender, 4. Zw. f. ?
exsertum G. Don, hervorstehender, 4. Zw. f. Rußland.
Fischeri Swt., Fischer's, 4. Zw. f. Rußland.
fistulosum L., röhriger, 4. Zw. f. Sibirien.
flavescens Bess., gelblicher, 4. Zw. f. Podolien, Taurien.
flavum L., gelber, 4. Zw. f. Oestreich, Tyrol, Siebenbürgen, Taurien.
flexum Kit., gebogener, 4. Zw. f. Deutschland, Schweiz, Ungarn.
 β) *capsuliferum* Koch.
foliosum DC., vielblättriger, 4. Zw. f. Frankreich.
fragrans Vent., wohlriechender, 4. Zw. f. Nordamerika.
fuscum Kit., braunblumiger, 4. Zw. f. Bannat.
glandulosum Lk. et Otto, drüsiger, 4. Zw. f. ?
globosum MB., kugeldoldiger, 4. Zw. f. Caucasus.
graecum Urvill., griechischer, 4. Zw. f. Griechenland.
guttatum Steven, getüpfelter, 4. Zw. f. Podolien, Taurien, Griechenland.
Halleri G. Don, Haller's, 4. Zw. f. Südeuropa.
hymenorrhizum Ledeb., hautwurzelliger, 4. Zw. f. Rußl.
incarnatum Hornem., fleischfarbiger, 4. Zw. f. Südeuropa.
intermedium Lam. DC., mittlerer, 4. Zw. f. Südfrankreich, Oberitalien, Podolien.
juncifolium G. Don, simsensblättriger, 4. Z. f. Chili.
laxum G. Don, lockerer, 4. Zw. f. Sibirien.
lineare L., linienblättriger, 4. Zw. f. Mittelasien.
litoreum Bertol., Ufer-L., 4. Zw. f. Südfrankreich, Italien.
longifolium Humb. Knth., langblättriger, t. 4. Zw. k. Mexico.
magicum L., Zauber-L., 4. Zw. f. Südeuropa.
majale Tenor., Mai-L., 4. Zw. f. Neapel.
medium G. Don, mittlerer, 4. Zw. f. Ungarn.
Moly L., goldfarbener, 4. Zw. f. Süd- u. Osteuropa, Nordafrika.
montanum Sm., Berg-L., 4. Zw. f. Griechenland.
moschatum L., moschusduftender, 4. Zw. f. Süd- und Osteuropa, Taurien.
multiflorum, Dsf., vielblumiger, 4. Zw. f. Südfrankreich, Nordafrika.
mutabile Mchx., veränderlicher, 4. Zw. f. Carolina.
narcissiflorum Vill., narcissenblumiger, 4. Zw. f. Südfrankreich.
neapolitanum Cyrill., neapolitanischer, 4. Zw. f. Neapel.
nudicaule Lehm., nacktschaftiger, 4. Zw. f. ?

Allium

nutans L., nickender, 4. Zw. f. Sibirien.
 obliquum L., schieflätteriger, 4. Zw. f. Sibirien.
 ochroleucum Kit., weißgelber, 4. Zw. f. Krain, Croatien, Siebenbürgen, Italien, Frankreich.
 odoratissimum Dsf., riechender, 4. Zw. f. Nordafrika.
 odorum L., wohlriechender, 4. Zw. f. Sibirien, Südeuropa.
 β) acuminatum.

oleraceum L., Gemüse-L., 4. Zw. f. Europa.
 Ophioscorodon J. Bauh., Perl-L., 4. Zw. f. Griechenl.
 oxypetalum G. Don, schmalblüthiger, 4. Zw. f. Südeuropa.
 Pallasii Murray, Pallas's, 4. Zw. f. Sibirien.
 pallens L., bleicher, 4. Zw. f. Südeuropa.
 paniculatum L., rispiger, 4. Zw. f. Südeuropa.
 paradoxum G. Don, wunderbarer, 4. Zw. f. Caucasus.
 parviflorum L., kleinblumiger, 4. Zw. f. Nordafrika.
 pendulinum Tenore, herabhängender, 4. Zw. f. Neapel.
 pedemontanum W., piemontesischer, 4. f. Zw. Piemont.
 Porrum L., Porree, ♂. Zw. f. ?
 proliferum Schrad., sprossender, 4. Zw. f. ?
 prostratum Trev., gestreckter, 4. Zw. f. Sibirien.
 pruinatum Lk., bereifter, 4. Zw. f. Portugal.
 pulchellum G. Don, schöner, 4. Zw. f. Taurien.
 Purshii G. Don, Pursh's, 4. Zw. f. Nordamerika.
 pusillum Cyril., niedriger, 4. Zw. f. Sicilien.
 ramosum G. Don, ästiger, 4. Zw. f. Sibirien.
 reticulatum Fras., netzförmiger, 4. Zw. f. Nordamerika.
 roseum L., rosafarbiger, 4. Zw. f. Illyrien, Dalmatien, Italien.

β) bulbiferum.

rotundum L., runder, 4. Zw. f. Europa, Mittelasien.
 rubellum MB., röthlicher, 4. Zw. f. Caucasus.
 rubicundum Niv., rothwerdender, 4. Zw. f. k. Cap d. g. H.
 rupestre MB., Felsen-L., 4. Zw. f. Caucasus.
 sativum L., gebauter (Knoblauch), 4. Zw. f. Sicilien.
 saxatile MB., Stein-L., 4. Zw. f. Caucasus, Taurien, Illyrien.
 Schoenoprasum L., Schnitt-L., 4. Zw. f. Deutschland, Schweiz, England, Sibirien.

b) albiflorum. c) carneum.

β) alpinum Gaud. (sibiricum L.)

Scorodoprasum L., Rocambollen-L., 4. Zw. f. Europa.
 scorzoneraefolium DC., haferwurzblätteriger, 4. Zw. f. Südeuropa.
 senescens, L., alternder, 4. Zw. f. Sibirien.
 β) spirale W.

sphaerocephalum L., rundköpfiger, 4. Zw. f. Deutschland, Schweiz.
 spurium G. Don, unächter, 4. Zw. f. Sibirien.
 stellatum Sims., sternförmiger, 4. Zw. f. Nordamerika.
 striatellum Lindl., schmalstreifiger, 4. Zw. f. Chili.
 striatum Jacq., gestreifter, 4. Zw. f. Nordamerika.
 strictum Schrad., steifer, 4. Zw. f. Deutschland, Schweiz, Volhynien, Mittelasien.
 suaveolens Jacq., feinriechender, 4. Zw. f. Süddeutschland, Italien, Frankreich.
 subhirsutum L., wenighaariger, 4. Zw. f. Südeuropa.
 Synnotii G. Don, Synnot's, 4. Zw. f. Cap. d. g. H.
 tricoccum Ait., dreiknöpfiger, 4. Zw. f. Nordamerika.

Allium

- triquetrum* L., dreikantiger, 4. Zw. f. Italien, Südfrankreich, Spanien.
uliginosum Ledeb., Sumpf-L., 4. Zw. f. Rußland.
ursinum L., Bären-L., 4. Zw. f. Europa.
verrucosum G. Don, warziger, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
Victorialis L., Schlangen-L. (Allermanns-Harnisch), 4. Zw. f. Deutschland, Schweizer Alpenwiesen.
 β) *angustifolium*.
vineale L., Weinbergs-L. (Acker-L.), 4. Zw. f. Mitteleuropa.
Waldsteinii G. Don, Waldstein's, 4. Zw. f. Ungarn.
 acutum Spgl. vid. *foliosum*. *ambiguum* DC. vid. *ochroleucum*. *ambiguum* Sm. v. *incarnatum*. *amoenum* G. Don v. *roseum* β . *angulosum* Pursh vid. *reticulatum*. *appendiculatum* Ram. v. *ochroleucum*. *arenarium* L. v. *vineale*. *arenarium* Sm. v. *Scorodoprasum*. *baicalense* W. v. *senescens*. *capillare* Cav. v. *moschatum*. *carneum* Bertol. v. *roseum* β . *caucasicum* Sims. v. *globosum*. *ciliatum* Cyril. v. *subhirsutum*. *Clusianum* Retz v. *subhirsutum*. *compactum* Thuill. v. *vineale*. *danubiale* Spgl. v. *acutangulum*. *deflexum* W. v. *strictum*. *ericetorum* Thor. v. *ochroleucum*. *fallax* Don v. *angulosum*. *flexuosum* Host. v. *flexum*. *foetidum* W. v. *oleraceum*. *glaucum* Schrad. v. *senescens*. *gracile* Ait v. *fragrans*. *graminifolium* P. v. *ochroleucum*. *grandiflorum* Lam. v. *narcissiflorum*. *illyricum* Jcq. v. *roseum*. *inodorum* Ait v. *fragrans*. *lacteam* Sm. v. *album*. *longispathum* Red. v. *paniculatum*. *microcephalum* Tausch vid. *strictum*. *monspessulanum* Gouan v. *magicum*. *monspessulanum* W. v. *litorum*. *montanum* Schmidt v. *angulosum*. *multibulbosum* Jcq. v. *magicum*. *nigrum* All. v. *pedemontanum*. *nigrum* L. v. *magicum*. *Ophioscorodon* Lk. v. *controversum*. *ornithogaloides* Bosc. v. *striatum*. *paniculatum* Vill. v. *intermedium*. *ramosum* Jcq. v. *obliquum*. *reticulatum* Presl. v. *strictum*. ? *rubens* Schrad. v. *bisulcum*. *setaceum* Kit. v. *moschatum*. *siculum* Ue. v. *Nectaroscordum siculum*. *speciosum* Cyrill. v. *magicum*. *stellatum album* Sims v. *reticulatum*. *tataricum* L. Sppl. v. *odorum*. *tricorne* Poir v. *cernuum*. *umbellatum* Hall. v. *odorum*. *veronense* Poll. v. *sphaerocephalum*. *violaceum* W. v. *flexum*. *volhynicum* Bess. v. *strictum*.
Allocatheros lepturoides Ell. v. *Gymnopogon racemosus*.
Allosorus Bernh., Krausfarn, XXXIV. 1. Pterioideae (Polypodiaceae).
crispus Bernh., Alpen-K., 4. f. Europäische Alpen.
Alnus Tourn., Erle, XXI. iv., Amentaceae.
barbata Mey., bärtige, 5. f. Rußland.
cordifolia Tenore, herzblättrige, 5. f. Neapel, Corsica.
glauca Mchx., graugrüne, 5. f. Nordamerika.
glutinosa Gärtn., gemeine, 5. f. Europa, Nordasien, Afrika und Amerika.
 β) *emarginata*. γ) *foliis variegatis*. δ) *laciniata* (incisa). ϵ) *macrocarpa*. ζ) *oxyacanthaefolia*.
 η) *quercifolia*. θ) *rubra*. ι) *subrotunda*.
incana W., weißlichgraue, 5. f. Nord- und Osteuropa, Japan, Nordamerika.
 β) *pinnatifida* (laciniata). γ) *angulata*.

Alnus

nepalensis Don, nepalische, 5. k. Nepal.

oblongata W., langblättrige, 5. f. Südeuropa.

β) *pumila*.

obtusifolia Royle, stumpfblättrige, 5. k. Nepal.

rugosa Spgl., runzelige, 5. f. Nordamerika.

serrulata W., sägezähnige, 5. f. Nordamerika.

subcordata Meyer, fast herzblättrige, 5. f. Rußland.

undulata W., wellenblättrige, 5. f. Canada.

viridis DC., grüne, 5. f. Frankreich, Mittel- und Ostdeutschland, Ungarn, Galicien.

americana Mill. v. *glauca*. *canadensis* Hort. v. *rugosa*. *crispa* Mchx. v. *undulata*. *macrophylla* Dsf. v. *oblongata*. ? *plicata* Hortul. v. *undulata*.

Aloë (arabischer Name), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae-

I. *Apicra* W. (*Haworthia* Duval. Haw.), Bilabiatae.

albicans Haw., weißliche, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *laevis* Haw.

altilinea Haw., starklinirte, 4. k. t. Cap d. g. H.

angustifolia Haw., schmalblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.

anomala Haw., abweichende, 4. k. t. Cap d. g. H.

arachnoides Thbg., spinnewebenartige, 4. k. t. C. d. g. H.

β) *minor*.

aspera Haw., rauhe, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.

atrovirens DC., schwarzgrüne, 4. k. t. Cap d. g. H.

attenuata Haw., verdünnte, 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *clariperla* Haw.

chloracantha Haw., grünstachelige, 4. k. t. Cap d. g. H.

coarctata Haw., gedrängte, 4. k. t. Cap d. g. H.

cordifolia Haw., herzblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.

curta Haw., kurze, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.

cymbaeformis Curt., cymbelblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.

fasciata Salm, querbändrige, 4. k. t. Cap d. g. H.

Haworthii Hortul. Haworth's, 4. k. t. Cap d. g. H.

hybrida Salm, Bastard-A., 4. k. t. Cap d. g. H.

indurata Haw., verhärtete, 4. k. t. Cap d. g. H.

laetevirens Haw., freudiggrüne, 4. k. t. Cap d. g. H.

margaritifera Mill., Perl-A., 4. k. t. Cap d. g. H.

α) *major*. β) *minor*. γ) *minor*. δ) *brevis* Haw.

mirabilis Haw., wunderbare, 4. k. t. Cap d. g. H.

multifaria Haw., vielreihige, 4. k. t. Cap d. g. H.

mutica Haw., unbespitzte, 4. k. t. Cap d. g. H.

obtusa Haw., stumpfe, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

papillosa Salm, weichwarzige, 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *semipapillosa*.

pseudotortuosa Salm, unächtgewundene, 4. k. t. C. d. g. H.,

Radula Jacq., Raspel-A., 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *asperior* Haw. γ) *pluriperlata*.

ramifera Haw., ästige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

recurva Haw., zurückgekrümmte, 4. k. t. Cap d. g. H.

Reinwardti Salm, Reinwardt's, 4. k. t. Cap d. g. H.

reticulata Haw. (*Pumilio* Jacq.), netzförmige, 4. k. t.

Cap. der guten Hoffnung.

retusa L., eingedrückte, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

rigida DC., starre, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *expansa* W.

semimargaritifera Salm, Haw., halbgeperlte, 4. k. t. Cap d. g. H.

α) *maxima*. β) *major*. γ) *minima*.

sordida Haw., schmutzige, 4. k. t. Cap d. g. H.

torquata Haw., gedrehte, 4. k. t. Cap d. g. H.

Aloë

tortuosa Haw. (*rigida* W.), gewundene, 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *tortella* Haw.

translucens Haw., durchscheinende, 4. k. t. Cap d. g. H.

venosa Lam., aderige, 4. k. t. Cap der g. Hoffn.

viscosa L., schmierige, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.

β) *concinna* Haw.

virescens Haw., grünliche, 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *minor*.

granata W. v. *margaritifera*. *patula* W. v. *rigida*.

pseudorigida Salm v. *tortuosa*. *pumila* Haw. vid.

atrovirens. *semiglabrata* Haw. v. *hybrida*.

II. *Haworthia* Salm (*Apicra* Haw.) (Parviflorae).

bicarinata Haw., zweikielige, 4. k. t. Cap d. g. H.

bullulata Jcq., bauschige, 4. k. t. Cap d. g. H.

foliolosa Haw., blätterreiche, 4. k. t. Cap d. g. H.

imbricata Haw. (*spiralis* DC.), dachziegelförmige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

nigra Haw., schwarze, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.

spiralis L., spiralförmige, 4. k. t. Cap der g. Hoffn.

β) *spirella* Haw.

pentagona Jacq. v. *spiralis*.

III. *Gasteria* Haw. (Curviflorae Salm).

acinacifolia Jcq., säbelblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *minor*.

angulata W., kantige, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.

β) *minor*.

bicolor Haw., zweifarbig, 4. k. t. Cap der g. Hoffn.

candicans Haw., weißsschimmernde, 4. k. t. Cap d. g. H.

carinata Ait., gekielte, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.

conspurcata Haw. Salm, befleckte, 4. k. t. Cap d. g. H.

crassifolia Haw., dickblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.

disticha Haw., zweizeilige, 4. k. t. Cap der g. Hoffn.

β) *major*.

ensifolia Haw., schwertblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.

excavata W., ausgehöhlte, 4. k. t. Cap d. g. H.

formosa Haw., wohlgestaltete, 4. k. t. Cap d. g. H.

glabra Haw. Salm., kahle, 4. k. t. Cap der g. H.

intermedia Haw., mittlere, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *asperima* Haw.

laetipunctata Haw., freudig-punctirte, 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *denticulata*.

laevis Haw. Salm., glatte, 4. k. t. Cap der g. Hoffn.

Lingua Thbg., Zungen-A., 4. k. t. Cap der g. H.

β) *major*.

linita Hw. (*latifolia*), beschmierte, 4. k. t. Cap d. g. H.

nigricans Haw., schwärzliche, 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *fasciata*. γ) *laxa* Haw. δ) *marmorata* Haw.

nitida Haw. Salm., glänzende, 4. k. t. Cap d. g. H.

obliqua Salm., schiefblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *fallax* Haw. ? γ) *picta* Haw.

obscura W., dunkelfarbige, 4. k. t. Cap d. g. H.

obtusifolia Haw., stumpfblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.

parva Haw., kleine, 4. k. t. Cap d. guten Hoffn.

perviridis Haw. (*brevifolia* Haw.), dunkelgrüne, 4. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

β) *magnipunctata* Haw.

pseudo-angulata Salm., unächt-kantige, 4. k. t. Cap d. g. H.

pseudo-nigricans Salm., unächt-schwärzliche, 4. k. t.

Cap der guten Hoffnung,

Aloë

β) glabrior.

pulchra Jacq. (*obliqua* DC.), schöne, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

repens Haw., kriechende, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

retata Haw., genetzte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

subcarinata Haw., Salm, weniggekielte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) viridior.

subverrucosa Haw., Salm, wenigwarzige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) parvipunctata.

sulcata Haw., gefurchte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

trigona Haw., dreiseitige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

undata Haw., wogenförmige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

venusta Haw., liebliche, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

verrucosa Ait., warzige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

angulata striata W. v. *pseudo-angulata. angustifolia* (et *longifolia*) Haw. v. *Lingua. decipiens* Haw. v. *nigricans. maculata* (Thbg.) Haw. W. v. *obliqua. nitens* Haw. v. *glabra. subnigricans* Haw., Spgl. v. *pseudonigricans*.

IV. *Bowiea* Haw.

africana (capensis) Haw., afrikanische, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

myriacantha Haw., vielstachelige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

V. *Grandiflorae* Salm. (*genuinae*).

abyssinica Lam., abyssinische, 4. k. t. Afrika.

acuminata Haw. (*humilis* Sims.), zugespitzte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

africana Haw., afrikanische, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

albispina Haw., weißstachelige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

alboincincta Haw., weißsumgürtete, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

arabica Lam., arabische, 4. k. t. Arabien.

arborescens Mill., DC., baumartige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

aristata Haw., begrannete, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

brevifolia Haw., kurzblättrige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

caesia Salm., hechtblaue, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

chinensis Haw., chinesische, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

ciliaris Haw., gefranzte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

Commelini W., (*mitraeformis* DC.) Commelin's, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

depressa Haw. (*serra* W.), niedergedrückte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

dichotoma L. suppl., gabelästige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

distans Haw., entferntstehende, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *reflexa* Salm.

echinata W., igelborstige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

ferox DC., starkbewehrte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

flavispina Haw., gelbstachelige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

frutescens Salm., strauchige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

glaucia Mill., blaugrüne, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

gracilis Haw., schlanke, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

humilis Thbg., niedrige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

incurva Haw., einwärtsgekrümmte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

Aloë

latifolia Haw., breitblättrige, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.
lineata Haw., linirte, ⚔. k. t. Cap d. gut. Hoffn.
micracantha Sims., kleinstachelige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

mitraeformis Ait., mützenförmige, ⚔. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

nobilis Haw., edle, ⚔. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

pallescent Haw., bleiche, ⚔. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

paniculata Jcq., rispenblüthige, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

picta DC., bemalte, ⚔. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) *glauclor* Haw. γ) *magnidens* Haw. (? *grandidentata*).

plicatilis Ait., fächerblättrige, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

pluridens Haw., vielzählige, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

principis Haw., fürstliche, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

prolifera, Salm, Haw. (*brevifolia* W.), sprossende, ⚔. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) *major*.

pseudoafricana Salm, unächte afrikanische, ⚔. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) *angustior*.

pseudoferox Salm, rothstachelige, ⚔. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

rubescens DC., rothfarbige, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Serra, DC., sägeblättrige, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

serrulata Sims., feingesägte, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

socotrina DC., Socotra, ⚔. k. t. Insel Socotra, Arabien.

spicata L. suppl., ährige, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

spinosior Haw., starkstachelige, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

*stenophylla**, schmalblättrige, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

striatula Haw., wenigstreifige, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

suberecta Haw., fastaufrechte, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *semiguttata* Haw.

subtuberculata Haw., wenighöckerige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

supralaevis Haw., halbglatte, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

tenuifolia Haw., dünnblättrige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

tenuior Haw., dünnere, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

tuberculata Haw., höckerige, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

umbellata DC., doldige, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *lutea striata*.

variegata L., bunte, 4. ⚔. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

virens Haw., grünliche, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

vulgaris DC., gemeine, ⚔. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

xanthacantha W., gelbstachelige, ⚔. k. t. Cap d. g. Hoffn.

angustifolia Haw. v. *stenophylla*. *barbadensis* Mill. v.

vulgaris. *hexapetala* Salm v. *Lomatophyllum* Jacquini.

hyacinthoides L. v. *Sansevieria zeylanica*. *macra* Haw.

v. *Lomatophyllum macrum*. *maculosa* Lam. (*maculata*

Hort.) v. *umbellata*. *marginalis* DC. v. *Lomatophyllum*

borbonicum. *obscura* Haw. vid. *picta*. ? *purpurascens*

Haw. vid. *rubescens*. *purpurea* Lam. vid. *Lomato-*

phyllum borbonicum. *rhodacantha* DC. v. *glauca*.

rufocincta Haw. vid. *Lomatophyllum rufocinctum*.

saponaria Haw. v. *umbellata*. *Uvaria* L. v. *Tri-*

tomanthe Uvaria. *vera* Lam. v. *rubescens*.

Alomia Kunth., Ohnling, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

Alomia

ageratoides Kunth., leberbalsamähnlicher, 4. k. Neu-spanien.

Alonsoa R. et P. (Zanoni Alonso, spanischer Beamter zu Santa Fé de Bogota), XIV. II., Personatae-Veroniceae.

acutifolia R. et Pav., spitzblättrige, ♂. ♀. t. Neugranada, Peru.

caulialata R. et Pav., flügelstängelige, ♂. t. Peru, Caracas.

incisifolia R. et Pav., schlitzblättrige, ♂. ♀. t. Südamerika.

linearis H. Kew., linienblättrige, ♀. t. Südamerika.

β) *grandiflora* Hortul. (*hybrida*, *intermedia* Lod.).

Alopecurus L., Fuchsschwanz, III. II., Gramineae.

agrestis L., Acker-F., ☉. f. Europa, Asien.

alpinus Sm., Alpen-F., 4. f. Schottland, Nordamerika.

angustifolius Sibth., Sm., schmalblättriger, 4. f. Osteuropa, Taurien, Caucasus.

brachystachys MB., kurzähriger, 4. f. Sibirien.

bulbosus Gouan, knolliger, 4. f. England, Frankreich.

colobachnoides Trin., sibirischer, 4. f. Sibirien.

creticus Trin., cretischer, ☉. f. Istrien, Dalmatien, Griechenland.

echinatus Thbg., igelborstiger, ☉. f. m. Cap d. g. Hoffn.

fulvus Sm., fahlgelber, 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.

geniculatus L., geknieter, 4. Wa. f. Europa, Mittel-asien, Nordamerika.

Gerardi Vill., Gerard's, 4. f. Südeuropäische Alpen.

lanatus Sm., wollblättriger, 4. f. Griechenland, Bithynien.

lasiostachyus Lk., wollähriger, 4. f. Spanien.

macrostachyus Poir., großähriger, 4. f. Barbarei.

nigricans Hornem., schwärzlicher, 4. f. Deutschland, Schweden, Rußland.

pratensis L., Wiesen-F., 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

ramosus Poir., ästiger, 4. f. Carolina.

utriculatus Pers., schlauchförmiger, ☉. f. Südeuropa.

arundinaceus Poir. v. *nigricans*. *capitatus* Lam. v.

Gerardi. *foliosus* Clark v. *angustifolius*. *indicus* L.

v. *Penicillaria ciliata*. *monspeliensis* L. v. *Polypogon monspeliensis*.

Pallasii Trin. v. *angustifolius*.

paludosus P.B. v. *fulvus*. *repens* MB. v. *nigricans*.

ruthenicus Weinm. v. *nigricans*. *subaristatus* Mchx.

v. *fulvus*.

Aloysia Orteg., Punschpflanze (Maria Louisa, Königin von Spanien), XIV. II., Labiatae-Verb.

citriodora, citronenduftende, ♀. k. Chili, Peru.

Alpinia Plum. (Prosper Alpini, italien. Naturforscher), I. I., Scitamineae.

Allughas Rosc., Allughas, 4. w. Bengalen, Ceylon.

aromatica Jcq., gewürzhafte, 4. w. St. Domingo, Guiana.

auriculata Rosc., geöhrte, 4. w. Molucken.

bracteata Roxb., deckblättrige, 4. w. Bengalen.

calcarata Rosc., spornblumige, 4. w. Coromandel, China.

Cardamomum Roxb., Kardamomen, 4. w. Malabar.

cernua Ker., geneigte, 4. w. Ostindien.

difissa Rosc., zweispaltige, 4. w. China.

Galanga Sw., Galgand, 4. w. China, Ostind., Sumatra.

Alpinia

linguaeformis Roxb., zungenförmige, 4. w. Bengalen.
magnifica Boj., prächtige, 4. w. Mascarenas (St. Mauritius).

malaccensis Rosc., malaccische, 4. w. Malacca, Java.
media Spgl., mittlere, 4. w. Silhet (Ostindien).

mutica Roxb., ungespornte, 4. w. Ostindien.

nutans Rosc., nickende, 4. w. Ostindien.

occidentalis Sw., westindische, 4. w. Jamaica, Hispaniola.

penicillata Rosc., pinselförmige, 4. w. China.

punicea Roxb., hochrothe, 4. w. Sumatra.

racemosa Sw., traubige, 4. w. Antillen.

Roscoeana R. et S., Roscoes, 4. w. Ostindien.

spicata Roxb., ährige, 4. w. Sumatra.

alata Diet. vid. *Roscoeana*. *caribaea* G. vid. *racemosa*. *comosa* Jacq. v. *Costus comosus*. *exaltata* Meyer v. *Renealmia exaltata*. *jamaicensis* G. vid. *occidentalis*. *multicaulis* Aubl. v. *aromatica*. *spiralis* Jacq. vid. *Costus spiralis*. *striata* H. Angl., Lk. v. ? *tubulata* Ker. v. *Renealmia exaltata*.

Alsine L., Wahlenb., Miere, X. (v.). III. Caryophyllaceae - Alsineae.

I. *Spergularia* Pers., Presl. (*Stipularia* Haw., *Lepigonum* Fries).

canadensis Pers., canadische, ☉. f. Nordamerika.

glandulosa Jacq., drüsige, ☉. f. Cap d. gut. Hoffn.

glutinosa MB., klebrige, ☉. f. Rußland.

marina Koch, Strand-M., ☉. f. Europa.

α) minor (*salina* Presl.).

β) obesior (*marginata* DC. *marina* Wahlenb.).

molluginea Lagasc., weichlingartige, ☉. f. Neuspanien.

prostrata Forsk., Delil., gestreckte, ☉. f. Aegypten.

purpurea Pers., purpurfarbige, ☉. f. Spanien.

radicans Presl., wurzelnde, ☉. f. Sicilien.

rubra Wahlenb., rothe, ☉. f. Europa, Nordafrika.

segetalis L., Saat-M., ☉. f. Norddeutschland, Belgien, Frankreich.

succulenta Delil., fleischige, ☉. f. Aegypten.

II. *Honckenia* Ehrh. (*Halianthus* Fries., *Adenarium* Rafin.).

peplodes Wahlenb., peplisähnliche. Am Strande, vorzüglich der nordischen Meere.

III. *Sabulina* Rchb. (*Arenaria* m. Sering).

aretioides Koch, aretiaähnliche, 4. f. Obersteyermärker und tyroler Alpen.

austriaca Koch, österreichische, 4. f. Oesterr., tyroler und italien. Alpen.

bannatica Rchb., (Sabul.) bannatische, 4. f. Bannat.

biflora Wahlenb., zweiblumige, 4. f., Lappland.

caespitosa Rchb., (Sabul.), Rasen-M., 4. f. Mittel- und südeuropäische Alpen und Voralpen.

β) Gerardi Wahlenb. (*saxatilis* Wahlenb.).

fasciculata Gouan, büschelförmige, ☉. f. Südfrankreich, Griechenland.

glomerata MB., knaulförmige, ☉. f. Taurien.

graminifolia Rchb. (Sabul.), grasblättrige, 4. f. k. Italien, Dalmatien.

hirsuta (*Arenaria* MB.), rauchhaarige, 4. f. Caucasus..

Alsine

imbricata MB., dachziegelförmige, 4. f. Caucasus.
Jacquini Koch, Jacquin's, ☉. f. Ost- u. Süddeutschland, die Schweiz und Italien.
lanceolata Koch, lanzettblättrige, 4. f. Krainer, tyroler und italien. Alpen.

α) *cherlerioides* Vill. (*condensata* Koch). β) *flacida* Fröl, γ) *rupestris* Scop. (*Stellaria*).

laricifolia Wahlenb., lerchenblättrige, 4. f. Mittel- u. osteuropäische Alpen.

β) *glandulosa* Koch.

macrocarpa (*Arenaria* Pursh.), großfrüchtige, ♂. f. Nordamerika.

mucronata L., weichspitzige, ☉. f. Südeuropa.

pinifolia (*Arenaria* MB.), nadelblättrige, 4. f. Caucasus.

recurva Wahlenb., zurückgekrümmte, 4. f. Mittel- u. osteuropäische Alpen.

rostrata Koch, geschnäbelte, 4. f. England, südliche Schweiz, Frankreich.

rubella Wahlenb., röthliche, 4. f. Schweden, Norwegen, Schottland, Grönland.

sedoides Fröhl., sedumähnliche, 4. f. Tyrol, England.

setacea Koch, borstenblättrige, 4. f. Mittel- u. Ost-Deutschland, Ungarn, Frankreich.

β) *frutescens* Kit.

stricta Wahlenb., steife, 4. f. Lappländische, baierische, tyroler und schweizer-Alpen.

tenuifolia Wahlenb., feinblättrige, ☉. f. Europa, Nordamerika.

β) *viscosa* Schreb.

verna Bartl., Frühlings-M., ♂. 4. f. Deutschland, Ungarn, Illyrien.

Villarsii Koch, Villar's, 4. f. Kärnthen, südliche Schweiz. Oberitalien, Frankreich.

β) *villosula*.

villosa (*Arenaria* Fisch.), zottige, 4. f. Sibirien.

fasciculata M. et K. v. Jacquin. *fastigiata* Rchb.

v. Jacquin. *media* L. v. *Stellaria media*. *mucronata* Lam. v. Jacquin.

Alsodea A. P. Thou., Laubveilchen, V. 1., Violaceae.

latifolia Thou., breitblättriges, ♀. w. Madagascar.

pauciflora Thour., wenigblumiges, ♀. w. Madagascar.

Alsophila RB., Hainfarn, XXIV. 1., Pteroideae - (Polypodiaceae).

australis RB., neuholländischer, 4. t. w. Neuholland. Van Diemes-Land.

munita Kaulf., bewaffneter, 4. ♀. w. Brasilien.

Alstonia R.B., (C. Alston, Prof. d. Med. zu Edinburgh), V. 1., Contortae-Apocynae.

neriifolia Wall., oleanderblättrige, ♀. t. Nepal.

scholaris RB., Schüler-A., ♀. w. Ostindien, Molucken.

oleandraefolia Lodd. v. *scholaris*.

Alstonia theaeformis L. suppl. v. *Symplocos* *Alstonia*.

Alstroemeria L., (C. Alstroemer, schwed. Botaniker), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae (Amaryllideae).

acutifolia Lk. et Otto, spitzblättrige, 4. Kn. k. f. b. Südamerika.

aurantiaca, D. Don. (*versicolor* variet.), orangenfarbige, 4. Kn. k. Chili.

aurea H. Berol., goldgelbe, 4. Kn. k. t. Chili.

Alstroemeria

- Barclayana Hook, Barclay's, 4. Kn. w. ?
 Berteroniana Penny., Bertero's, 4. Kn. t. Chili.
 bicolor Ait., zweifarbige, 4. Kn. w. Chili.
 chilensis J. C., chilesische, 4. Kn. t. Chili.
 edulis J., efsbare, C. Kn. Sch., 4. Trinidad.
 Errebaulti C. Bel., Errebault's, 4. Kn. k. t. Chili.
 flos Martini, Ker., Martinsblume, 4. Kn. k. t. Chili.
 haemantha R. et P., blutrother, 4. Kn. k. t. Chili.
 hirtella Kunth, kurzhaarige, 4. Kn. Sch. k. t. Mexico.
 Hookeri Swt., Hooker's, 4. Kn. k. t. Chili.

β) pallida J. C. (?pallida Grah.).

- Ligtu L., rachenförmige, 4. Kn. k. t. Lima.
 lineatiflora R. et P., gestrichelte, 4. Kn. k. t. Peru.
 Neillii Gill., Neill's, 4. Kn. k. t. Chili (Mendoza).
 ovata Cavan., eiförmige, 4. Kn. Sch. k. t. Peru.
 pallida Grah., bleiche, 4. Kn. Sch. k. t. Chili.
 pauciflora Kunth, wenigblumige, 4. Kn. Sch. k. t. Neu-
 granada.

- Pelegriana L., stolze, 4. Kn. k. t. Peru, Chili.

β) alba.

- pilosa Lindl., behaarte, 4. Kn. k. t. Chili.
 psittacina Lehm., Papageien-A., 4. Kn. k. t. Mexico.
 purpurea R. et P., purpurfarbige, 4. Kn. Sch. k. t.
 Peru.

- revoluta R. et P., zurückgerollte, 4. Kn. k. t. Chili.

- rosea R. et P., rösafarbige, 4. Kn. Sch. k. t.
 Peru.

- Salsilla L., windende, 4. Kn. Sch. k. t. Peru.

- secundifolia R. et P., einseitsblättrige, 4. Kn. k. t. Peru.

- Simsii Swt., Sim's, 4. Kn. k. t. Peru, Chili.

- tomentosa R. et P., filzige, 4. Kn. Sch. k. t. Peru.

- tricolor Hook, dreifarbige, 4. Kn. t. Chili.

- versicolor R. et P., verschiedenfarbige, 4. Kn. t. Chili.

Hookeriana Spgl. vid. Simsii. oculata Lodd. vid.

Salsilla. pulchella Sims v. Hookeri. Simsii Spgl.

v. Hookeri. rosea Hook v. Simsii.

Alternanthera Forsk., RB., Wechselstaubbeutel, V.1.,
 Aizoideae-Amaranthaceae.

- axillaris DC., achselblumiger, ☉. m. f. ?

- Achyrantha RB., spreublumiger, 4. w. Westindien, Süd-
 amerika.

- canescens H. B. K., weißgraulicher, 4. w. Cumana.

- caracasana H. B., Caracas, ♂ w. Südamerika.

- ficoides RB., zaserblumenartiger, ♂. 4. w. Westindien.

- frutescens R. B., strauchiger, ♂. t. Peru, Lima.

- polygonoides RB., knöterichähnlicher, 4. t. Südamerika.

- procumbens R. et P., niederliegender, ♂. 4. w. Brasilien.

- sericea H. B. K., seidenhaariger, 4. w. Quito.

- sessilis RB., stielloser, ☉. m. f. Ostindien.

nodiflora RB. v. ? caracasana. repens Lk. v. Achy-
 rantha. spinosa R. et S. v. axillaris.

Althaea L., Eibisch, Wintermalve (Heilmalve), XVI.
 VIII. Malvaceae.

I. Althaeastrum.

- cannabina L., hanfblättriger, 4. f. Südfrankreich, Ita-
 lien, Oesterreich, Ungarn, Dalmatien, Siebenbürgen,
 Podolien, Taurien.

- hirsuta L., rauhaariger. ☉. f. Südeuropa, England.

- Ludwigii L., Ludwig's, ☉. f. Sicilien, Aegypten.

narbonensis Pourr., südfranzösischer, m. f. Südfrankreich, Spanien.

officinalis L., gebräuchlicher, 4. f. Deutschland, die Schweiz, Frankreich, England, Caucasus.

taurinensis DC., turiner, 4. f. Oberitalien.

II. Alcea.

acaulis Cav., stengelloser, ☉. f. Syrien.

caribaea Sims, caribäischer, ♂. w. Westindien.

ficifolia Cav., feigenblättriger, ♂. Podolien, Griechenland, Kleinasien, Sibirien.

flexuosa Sims, vielbeugiger, 4. w. Ostindien.

Froloviana Fisch., Frolov's, ♂. f. Sibirien.

leucantha Fisch., weißblumiger, ♂. 4. Sibirien.

pallida WK., bleicher, ♂. f. Ungarn.

rosea Cav., Stockrosen-E., ♂. f. Syrien, China.

β) *biloba* DC. (*grandiflora* Hortul.).

Sieberi H. Berol., Sieber's, ♂. f. Sicilien.

sinensis Cav., sinesischer, ☉. ♂. f. China.

striata DC., gestreifter, ♂. f. ?

Altingia Noron., Rasamalabaum, XXI. x. (XXII. xiii.),
Amentaceae-Myricaceae.

excelsa Nor., hoher, ♀. t. Java, Neuguinea.

Cunninghami G. Don. et *excelsa* Loud. v. *Araucaria*.

Alysicarpus Neck., Kettenfrucht, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

bupleurifolius DC., durchwachsblättriger, 4. w. Ostindien.

monilifer DC., perlschnurförmiger, 4. w. Ostindien.

nummularifolius DC., pfennigkrautblättriger, 4. w. Ostindien.

styracifolius DC., storaxblättriger, ♀. w. Ostindien.

vaginalis W., scheidiger, 4. w. Ostindien.

Alyssum T., Steinkraut, XV. i., Cruciferae.

alpestre L., Voralpen-St., 4. f. Mittel- und Osteuropa, Taurien.

β) *majus* (*serpyllifolium* MB.). γ) *elatus* (*alpestre*
β) *argenteum* Gaud.).

argenteum Vitm., silberfarbiges, 4. f. Oberitalien, Banat, Siebenbürgen, Dalmatien, Taurien, Sibirien.

β) *murale* WK.

atlanticum Desf., nordafrikanisches, ♀. 4. f. k. Creta, Atlasgebürge.

calycinum L., gekelchtes, ☉. f. Mitteleuropa.

campestre L., Feld-St., ☉. f. Süd- und Osteuropa, Caucasus, Taurien.

β) *hirsutum* MB.

gemonense Wulff., illyrisches, 4. ♀. f. Oberkärnthen, Krain, Dalmatien.

Marschallianum Andr., Marschalls-St., 4. f. Taurien, Caucasus.

micranthum C. A. Meyer, kleinblumiges, ☉. f. Rußland.

micropetalum Fisch., schmalblumiges, ☉. f. Rußland.

minimum W., kleinstes, 4. f. Süd- und Osteuropa.

montanum L. Berg-St., 4. f. Mitt-, Süd- u. Osteuropa.

β) *cuneifolium* Tenore. γ) *diffusum* Tenore.

nebrodense Tin., sicilianisches, 4. f. Sicilien, Dalmatien.

orientale Ard., morgenländisches, 4. ♀. f. k. Griechenl.

β) *variegatum*.

? *procumbens* Hortul., niederliegendes, 4. f. ?

Alyssum

rostratum Stev., geschnäbeltes, 4. f. Bessarabien, Taurien.

savranicum Andrv., podolisches, 4. f. Podolien.

saxatile L., Felsen-St., 4. f. Deutschl., Ungarn etc. serpyllifolium Dsf., quendelblättriges, 4. f. k. Nordafrika, Spanien.

sibiricum W., sibirisches, ☉. ♂. f. Sibirien.

β) Fischerianum DC.

spathulatum Steph., spatelblättriges, 4. f. Sibirien.

umbellatum Desv., doldiges, ☉. f. Taurien.

vernale Horn, Frühlings-St., 4. f. ?

Wierzbickii Roch, Wierzbicki's, 4. f. Ungarn.

Wulfenianum Bernh., Wulfen's, 4. f. Kärnthen, Krain, Steyermark, Italien.

alpestre MB. v. Marschallianum. arenarium Lois.

vid. montanum. Bertolonii Desv. vid. argenteum.

brachystachyon MB. vid. umbellatum. campestre

Hoffm. vid. calycinum. clypeatum L. vid. Farsetia

clypeata. cretaceum Adam v. spathulatum. creti-

cum L. v. Vesicaria cretica. dasycarpon Steph. v.

Koniga dasyc. deltoideum L. v. Aubrietia delt. den-

siflorum Desf. v. Koniga densifol. dentatum Nutt.

vid. Drabaincana β. Draba W. vid. campestre β.

edentulum Kitb. v. Kon. edent. halimifolium W. v.

Koniga halimifol. illyricum W. vid. Meniocus lini-

fol. incanum L. vid. Berteroa incana. linifolium

Steph. v. Meniocus linifol. lunarioides W. v. Far-

setia lunarioides. macrocarpon DC. v. Koniga ma-

crocarpa. maritimum Lam. vid. Koniga maritima.

minimum Pall. v. Meniocus linifol. mutabile Vent.

v. Berteroa mutabilis. obliquum Sm. vid. Berteroa

obliq. obtusifolium Stev. v. argenteum. orbicula-

tum Urv. v. Berteroa orbic. paniculatum W. vid.

Neslia paniculata. parviflorum MB. vid. micropeta-

lum. podolicum Bess. vid. Schivereckia podolica.

pyrenaicum Lapeyr. vid. Koniga pyren. rupestre

Tenor. v. Koniga rupest. rupestre W. v. Kerneria

saxatilis. serpyllifolium MB. v. alpestre β. sibili-

cum Trevir. v. Koniga dasycarpa. sinuatum L. v.

Vesicaria sinuata. spathulatum Adam v. argenteum.

spinatum L. v. Koniga spinosa. strictum W. vid.

Koniga densiflora. tortuosum Kit. v. alpestre. utri-

culatum L. vid. Vesicaria utriculata. Vesicaria L.

v. Vesicaria reticulata.

Alyxia Banks, Alyxia, V. 1. (II.), Contortae-Apocynae.

buxifolia RB., buchsbaumblättrige, f. t. Neuholland.

daphnoides Cun., seidelbastblättrige, f. t. Norfolk.

Forsteri Cun., Forster's, f. t. Norfolk.

pugioniformis Cun., dolchblättrige, f. t. Neuholland.

ruscifolia RB., mäusedornblättrige, f. t. Neuholland.

spicata RB., ährige, f. t. Neuholland.

Richardsonii Swt. vid. ruscifolia.

Alzatea R. et P. (J. A. de Alzate, spanischer Naturfor-

scher), V. 1., Evonymae-Celastrineae.

verticillata, wirtelförmige, f. t. Peru.

Amaranthus T., Amaranth (Fuchsschwanz), XXI. v.

(V. II.), Aizoideae - Amaranthaceae.

albus L., weißer, ☉. f. Pennsylvanien. Oberitalien.

angustifolius MB., schmalblättriger, ☉. f. Iberien.

Amaranthus

- atropurpureus Roxb., dunkelpurpurfarbiger, ☉. f. m. Ostindien.
- bicolor Nocca, zweifarbiger, ☉. f. m. Ostindien.
- Blitum L., Spinat-A, ☉. f. Europa.
- β) adscendens Loisel.
- bullatus Bess., bauschiger, ☉. f. ?
- campestris W., Feld-A., ☉. f. m. Ostindien.
- caracasanus Kunth, Caraccas-A, ☉. f. m. Südamerika.
- Caracu Zucc., Caracu-A, ☉. f. Südamerika.
- caudatus L., geschwänzter, ☉. f. Mittel- u. Südasien.
- β) maximus.
- celosioides Kunth., hahnekammähnlicher, ☉. f. Südamerika.
- chlorostachys W., grünähriger, ☉. f. ?
- cruentus L., schmuzigrother, ☉. f. China.
- curvifolius Spgl., krummblättriger, ☉. f. Caucasus.
- deflexus L., herabgebeugter, ☉. f. ?
- fasciatus Roxb., bandirter, ☉. f. m. Ostindien.
- flavus L., hellgelber, ☉. f., Ostindien.
- frumentaceus Roxb., Getreide-A, ☉. f. m. Ostindien.
- gangeticus L., bengalischer, ☉. f. Ostindien.
- gracilis Poir., schlanker, ☉. f. m. Guinea.
- graecizans L., virginischer, ☉. f. Virginien.
- hybridus L., Bastard, ☉. f. Virginien.
- β) hecticus W.
- hypochondriacus L., düsterer, ☉. f. Virginien.
- inamoenus W., häßlicher, ☉. f. Japan.
- incomtus W., ungeputzter, ☉. f. ?
- interruptus RB., unterbrochenähriger, ☉. f. Neuholland.
- laetus W., freudiger, ☉. f. Italien.
- lanceaefolius Roxb., lanzettblättriger, ☉. f. m. Ostind.
- lineatus RB., linirter, ☉. f. Neuholland.
- lividus L., leichenfarbiger, ☉. f. Virginien.
- mangostanus L., ostindischer, ☉. f. Ostindien.
- melancholicus L., melancholischer, ☉. f. Ostindien.
- morosus Rchb., wunderlicher, ☉. f. Oberitalien.
- oleraceus L., Gemüße-A., ☉. f. Ostindien.
- pachystachys Rchb., dickähriger, ☉. f. ? Südeuropa.
- paniculatus L., rispiger, ☉. f. Nord- u. Südamerika.
- polygamus L., vielehiger, ☉. f. Ostindien.
- polygonoides L., knöterichartiger, ☉. f. Ost- u. Westindien.
- polystachys W., vielähriger, ☉. f. Ostindien.
- prostratus Balb., hingestreckter, ☉. f. Oesterreich, Litorale, Oberitalien, Frankreich.
- pumilus Nutt., niedriger, ☉. f. Nordamerika.
- retroflexus L., zurückgeschlagener, ☉. f. Mittel- und Südeuropa, Nordamerika.
- sanguineus L., blutrother, ☉. f. m. Westindien.
- scandens L., klimmender, ☉. f. Südamerika.
- speciosus Ker, Sims, prächtiger, ☉. f. Nepal.
- spinosus L., stacheliger, ☉. f. m. Westindien.
- strictus W., steifer, ☉. f. ?
- sylvestris Desf., wilder, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.
- tenuifolius W., dünnblättriger, ☉. f. m. Ostindien.
- tricolor L., dreifarbiger, ☉. f. m. Ostindien.
- tristis L., trauriger, ☉. f. m. China, Ostindien.
- viridis L., grünlicher, ☉. f. m. Jamaika, Brasilien.

Amaranthus

Acroglochin v. *Acroglochin chenopodioides*. *cauliflorus* Lk. vid. *Acroglochin chenopodioides*. *dianthus* Spgl. vid. *Acroglochin chenopod*. *laxiflorus* Comoll. v. *retroflexus*. *littoralis* Host v. *sylvestris*. Noch werden nachstehende in das System nicht aufgenommene, zum Theil zweifelhafte Arten oder Hybriden in den Gärten kultivirt: *aureus* Dietr., *bahiensis* Bess., *Berchtoldi* Seidel, *canariensis* H. Dorpat, *carneus* Tausch., *capitatus* Hort., *clavatus* Bess., *decorus* Tausch., *giganteus* Dietr., *gongilodes* H. Turin., *incarnatus* Hort., *lucidus* Bess., *mollissimus* H. Gryph., *rigidus* Schulz, *rotundatus* Bess.

Amaryllis L., Amaryllenschwertel, VI. 1. Narcisseae-Amaryllideae.

acuminata Ker, zugespitzter, 4. Zw. w. Südamerika.

Hybriden und Varietäten: a) *aurantiaca*, b) *inconspans*, c) *longipedunculata*, d) *major*, e) *nobilis*, f) *platypetala*, g) *spuria*, h) *venosa* etc.

advena Ker, gefranzter, 4. Zw. w. Chili.

β) *cerina*.

aulica Ker, Kronen-A., 4. Zw. w. Brasilien.

Varietäten: α) *nervosa*, β) *platypetala*.

Belladonna L., Frauen-A., 4. Zw. t. f. b. Westindien, Cap der gut. Hoffnung.

β) *major*.

blanda Ker, lieblicher, 4. Zw. t. f. b. Cap d. g. Hoffn.

calyptrata Ker, haubenförmiger (grünblumiger), 4. Zw. w. Brasilien.

crocata Ker, safranfarbiger, 4. Zw. w. Brasilien.

Hybrid.: b) *ardens*, c) *Brockesii*, d) *Cooperi*, e) *rigida*.

equestris Jacq., Ritter-A., 4. Zw. w. Westindien, Südamerika.

β) *major*. γ) *plena*.

flammea R. et P., feuerfarbiger, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffnung.

Forbesii Lindl., Forbes's, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) *purpurea*.

formosissima L., wohlgestalteter, 4. Zw. t. Mittägliche Amerika.

fulgida Ker, leuchtender, 4. Zw. w. Brasilien.

β) *vittata*.

Johnsonii Swt., Johnson's, 4. Zw. w. Brasilien.

Hybrid. u. Variet.: b) *augusta*, *concinna*, d) *discolor*, e) *praeclara*, f) *Sweetii*, g) *tricolor* (*beata*), h) *tristis*.

kermesina Booth, karminrother, 4. Zw. w. Brasilien.

lineata Coll., gestrichelter, 4. Zw. w. Cap d. g. Hoffn. u. Südamerika.

Hybrid.: *pulchra*, *variabilis*.

miniata R. et P., mennigrother, 4. Zw. w. Peru.

nervosa Humb., nerviger, 4. Zw. t. Mexico.

pallida Herb., bleicher, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.

peruviana Ker, peruvianischer, 4. Zw. w. Peru.

Principis Salm., fürstlicher, 4. Zw. w. Brasilien.

psittacina Ker, Papageien-A., 4. Zw. w. Brasilien.

Hybrid. und Variet.: b) *campanulata*, c) *canaliculata*, d) *Griffini*, e) *multistriata*, f) *pretiosa*,

Amaryllis

g) quadricolor, h) recurviflora, i) retiflora, k) retinervia, l) sexmaculata, m) tortuosa.

pudica Ker, schamhafter, 4. Zw. t. Cap d. gut. Hoffn.
Reginae L., königlicher, 4. Zw. w. Westindien, Südamerika.

Hybrid. u. Variet.: *brasiliensis* Andr., *Hoodii*, *intermedia*, *pulverulenta*, *vittata* etc.
reticulata Ait., genetzter, 4. Zw. w. Brasilien.

Hybrid.: *Colvillii*, *gloriosa*, *pulchra* etc.
rutila Ker., hochrother, 4. Zw. w. Brasilien.

Hybrid. und Variet.: *attenuata*, *micans*, *punctata*, *sanguinea*, *splendens*, *vittata* etc.

solandraeflora Lindl., *solandrablüthiger*, 4. Zw. w. Cayenne.

Hybrid. und Varit.: *Haglockii*, *Herberti*, *purpurascens*, *rubro-sriata*.

striatifolia Swt., gestreiftblättriger, 4. Zw. w. Brasilien.
stylosa Sims, langgriffeliger, 4. Zw. w. Brasilien.

Hybrid. u. Variet.: *Highcleriana*, *lugubris* etc.

tatarica Pall., tatarischer, 4. Zw. k. f. b. Sibirien, Tatarei.

tubiflora L'Her., langröhrige, 4. Zw. w. Lima.

vittata Ait., bandstreifige, 4. Zw. w. Cap d. g. Hoffn. Südamerika.

Hybrid. u. Variet.: *Carnarvoni*, *major*, *maxima*, *sinistra*, *venosa* etc.

Noch werden nachstehende zunächst von *acuminata*, *Reginae*, *reticulata* etc. erzielte Hybriden cultivirt: *accedens*, *anabilis*, *amoena*, *Andersonii*, *Annesleyana*, *atrorubens*, *bracteata*, *breviflora*, *brevifolia*, *Caeciliana*, *carnescens*, *coccinea*, *compacta*, *consanguinea*, *consobrina*, *costata*, *crispiflora*, *cuprea*, *decora*, *delecta*, *dioica*, *expansa*, *fulva*, *glaucescens*, *grandiflora*, *ignescens*, *imbuta*, *imperialis*, *lateritia*, *macrantha*, *mutabilis*, *nervifolia*, *obscura*, *pallascens*, *palliiflora*, *patens*, *patentissima*, *phoenicea*, *princeps*, *recurvata*, *ringens*, *roseo-alba*, *rubescens*, *rubicunda*, *rubro-crocea*, *rugosa*, *spathacea*, *stenantha*, *striatiflora*, *sulcata*, *superba*, *tortuliflora*, *umbellata*, *undulaeflora*, *Valleti*, *variegata*, *versicolor*, *vittifera*, *Wellsiana* etc.

Atamasco L. vid. *Zephyranthes Atamasc.* *aurea* Ait. v. *Nerine aur.* *aurea* R. et P. v. *peruviana.* *australasica* Ker (*australis* Spgl.) v. *Crinum flaccidum.* *bifida* Spgl. v. *Habranthus bifidus.* *candida* Ker v. *Zephyranthes cand.* *capensis* L. v. *Hypoxis stellata.* *capensis* Mill. vid. *Crinum capens.* *carinata* Spgl. vid. *Zephyranthes carinata.* *Carolinæ* H. Monac. vid. *striatifolia.* *caspia* W. v. *Allium caspium.* *chloroleuca* Ker. vid. *Zephyr. chlorol.* *ciliaris* L. v. *Brunsvigia cil.* *citrina* Im. vid. *Sternbergia citrina.* *clavata* L'Her. v. *Gastronema clavat.* *Clusiana* Sims v. *Sternbergia Clusian.* *coranica* Burch. vid. *Brunsvig. coran.* *corusca* Ker v. *Nerine corusc.* *crispa* Jacq. vid. *Strumaria crisp.* *curvifolia* Jacq. vid. *Nerine curvifol.* *cyrtanthoides* Sims v. *Phycelia cyrtanth.* *disticha* L. suppl. vid. *Brunsvig. toxicaria.* *elata* Jacq. v. *Vallota purpurea.* *exigua* Schousb. v. *Sternberg. exigua.* *fulca-*

Amaryllis

ta Ait. v. *Brunsvig. falcata*. *flexuosa* Jacq. v. *Nerine flexuosa*. *Fothergillia* Andr. v. *Nerine curvifolia*. *gigantea* Ait. v. *Crinum* gigant. *gracilis* Spgl. vid. *Habranthus gracilifolius*. *humilis* Jacq. vid. *Nerine humil.* *hyacinthina* Ker vid. *Griffinia hyacinthin.* *ignea* Lindl. v. *Phycelia ign.* *insignis* Ker v. *Crinum insign.* *intermedia* Spgl. v. *Griffinia intermed.* *Josephinae* Redout. v. *Brunsvigia* Joseph. *laticoma* Ker. v. *Brunsvig. lucida*. *latifolia* L'Her. v. *Crinum latifol.* *longifolia* Ait. v. *Crinum capense*. *lutea* L. vid. *Sternbergia lutea*. *maranensis* Ker vid. *stylosa*. *marginata* Jcq. v. *Brunsvigia marg.* *minuta* Humb. vid. *Zephyranthes grandiflora*. *moluccana* Ker vid. *Crinum moluccanum*. *montana* La Bill. v. *tatarica*. *orientalis* L. v. *Brunsvigia multiflora*. *ornata* Ait. v. *Crinum distichum*. *pulchella* Spgl. v. *Nerine pulchella*. *pumila* Spin. vid. *Zephyranthes pum.* *Pumilio* Ait. v. *Gastronem. Pumil.* *purpurea* Ait. vid. *Vallota purp.* *radiata* Ait. v. *Nerin. rad.* *Radula* Jcq. vid. *Brunsvigia Radul.* *revoluta* Ait. v. *Crinum Herberti*. *rosea* Spgl. vid. *Zephyranthes rosea*. *sarniensis* L. v. *Nerine sarniensis*. *speciosa* L'Her. v. *Vallota purpurea*. *spectabilis* Andr. vid. *Crinum Broussoneti*. *spectabilis* Lodd. vid. *Johnsonii*. *stellaris* Jacq. vid. *Strumar. stellar.* *striata* Jcq. v. *Brunsv. striata*. *subbarbata* Sims v. *miniata*. *Umbella* L'Her. v. *Cyrtanthus obliquus*. *undulata* Jcq. v. *Nerine undul.* *variabilis* Jcq. v. *Belladonna*. *venusta* Ker vid. *Nerine ven.* *versicolor* Spgl. v. *Habranthus versic.* *zeylanica* L. v. *Crinum zeylan.*

Amasonia L. (Thomas Amason, amerikanischer Reisender), XIV. II. Labiatae - Verbenaceae.

punicea Vahl, hochrothe, ♀. w. Trinidad.

erecta L. v. *Taligalia campestris*.

Ambinux Commers. v. *Aleurites triloba*.

Ambirion camtschatense H. Berol. v. *Fritillaria camt.*

Ambrosia T., Götterspeise (Traubenkraut), XXI. v. Compositae - Ambrosiaceae.

artemisifolia L., beifußblättriges, ☉. f. Nordamerika,

bidentata Mchx., zweizähliges, ☉. f. Nordamerika, Portorico.

cumanensis Kunth, Cumanisches, ☉. f. Cumana.

elator L., erhabenes, ☉. f. Nordamerika.

heterophylla Mühlenb., verschiedenblättriges, ☉. f. Nordamerika.

integrifolia Mühlenb., ganzblättriges, ☉. f. Nordamerika.

maritima L., Meerstrands-T., ☉. f. Nordamerika,

paniculata Mchx., rispiges, ☉. f. Nordamerika,

tenuifolia Spgl., feinblättriges, ☉. f. Monte Video.

trifida L., dreispaltiges, ☉. f. Nordamerika.

absynthifolia Dsf. vid. *heterophylla*. *peruviana* W. v. *heterophylla*.

Amelanchier Med., Beermispel, XII. II. Rosaceae - Pomaceae.

Botryapium DC., Trauben-B., ♀. f. Nordamerika.

florida Lindl., reichlichblühende, ♀. f. Nordamerika.

β) *parvifolia* Loud.

Amelanchier

orbicularis Bork., kreisblättrige, ♀. f. Salzburg, Tyrol, Griechenland.

ovalis DC., eiblättrige. ♀. f. Nordamerika.

β) *subcordata* DC. γ) *semiintegrifolia* Hook.

sanguinea DC., blutrothe, ♀. f. Nordamerika.

vulgaris Mch., gemeine, ♀. f. Mitteleuropa.

Amellus L., Sternbläuling, XIX. II. Compositae-Corymbiferae.

annuus W., jähriger, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

Lychnitis L., Lichtnelken-St., ♀. k. Cap der g. H.

tenuifolius Burm. Lam., feinblättriger, ♀. k. Cap d. g. H.

alternifolius Roth. v. *annuus*. *pedunculatus* Orteg.

v. *Tridax procumbens*. *spinulosus* Pursh v. *Aplopappus spinulos.*

umbellatus L. v. *Liabum Brownei*,

villosus Pursh v. *Chrysopsis villosa*.

Amerimum Br., Blatthülse, XVII. IV, (VI.) (XVI. VI.). Leguminosae-Papilionaceae.

Brownei Jacq., Brown's B., ♀. w. Westindien.

strigosum H. B. K., striegelhaarige, ♀. w. Südamerika.

Ebenus Sw. v. *Brya Ebenus*, *latifolium* W. v. *Lonchocarpus latifolius*.

Amethystea, Amethystkraut. II. I. Labiatae.

coerulea L., blaues, ☉. f. Sibirien.

Amherstia Wall. (Gräfin Amherst). X. I. Leguminosae-Caesalpinieae.

nobilis Wall., edle, ♀. w. Martaban (Ostindien).

Amicia H. B. K. (J. B. Anici, berühmter Physiker).

XVII. IV. (VI.) (XVI. VI.). Leguminosae-Papilionaceae,

Zygomeres DC., paarblättrige, ♀. Sch. w. t. Mexico.

Amirola nitida P. v. *Laguna nitida*.

Ammannia Houst. (Paul Ammann, Prof. zu Leipzig und Johann Ammann, dessen Sohn, Akademiker zu St. Petersburg), IV. I. Lythraeae-Salicariae.

aegyptiaca W. ägyptische, ☉. f. Aegypten.

arenaria Kunth, Sand-A., ☉. f. m. Caraccas.

auriculata W., geöhrt, ☉. f. Aegypten.

baccifera W., beerentragende, ☉. f. m. Ostindien.

borysthenica DC., borystenische, ☉. f. Rußland (Kiew).

caspica, MB. Ledeb., caspische, ☉. f. Rußland.

cordata Wight et Arn., herzförmige, ☉. f. m. Ostindien.

debilis Ait, schwache, ☉. f. Ostindien.

densiflora Roth, dichtblüthige, ☉. f. Ostindien.

diffusa W., weitschweifige, ☉. f. ? Ostindien.

dodecandra DC., zwölfmännige, ☉. f. m. Senegal.

elatinoides DC., tännelähnliche, ☉. f. m. Senegal.

filiformis DC., fadenförmige, ☉. f. m. Senegal.

glaucia Wight et Arn., blaugrüne, ☉. f. Ostindien.

hastata DC., spontanblättrige, ♀. Wa. t. w. Peru.

humilis Mchx., niedrige, ☉. f. Nordamerika.

indica Lam., indische, ☉. f. m. Ostindien.

latifolia L., breitblättrige, ☉. f. m. Westindien, Carolina.

microcarpa DC., kleinfrüchtige, ☉. f. m. Insel Timor.

multiflora Roxb., vielblumige, ☉. ♂. f. t. Ostindien.

nana Roxb., Zwerg-A., ☉. ♂. f. t. Ostindien.

octandra L., achtmännige, ☉. ♂. f. t. Ostindien.

pallida Lehm., bleiche, ☉. f. ?

parviflora DC., kleinblumige, ☉. f. Ostindien.

pentandra Roxb., fünfmännige, ☉. ♂. f. t. Ostindien.

peplodes Spgl., peplisähnliche, ☉. f. Ostindien.

Ammannia

- ramosior* L., ästige, ☉. f. Virginien, Carolina.
rotundifolia Buchan. Roxb., rundblättrige, ☉. f. Nepal, Bengalen.
rubra Hamilt., rothe, ☉. f. Nepal.
sanguinolenta Sw., blutfarbige, ☉. f. Jamaica.
senegalensis Lam., Senegal-A., ☉. f. m. Westafrika.
verticillata Lam., wirtelblättrige, ☉. f. Ober- u. Mittelitalien, Ostindien, China.
coccinea Pers. v. *octandra*. *purpurea* Lam. v. *ramosior*. *racemosa* Roth v. *auriculata*. *ramosior* Torr. vid. *humilis*. *vesicatoria* Roxb. v. *baccifera*.
viridis Hornem. v. *aegyptiaca*.

Ammi L., Sanddolde, V. II. Umbelliferae.

- acaule* Spgl., stengellose, ♂. f. k. Caucasus.
Boeberi Hökert, Böber's, ♂. f. k. Creta.
glaucofolium Lapeyr., blaugrünblättrige, ♂. f. k. Südfrankreich, Griechenland.
majus L., grofse, ☉. f. Südeuropa, Orient.
Visnaga Lam., Zahnstocher-S., ☉. f. Südeuropa, Kleinasien, Nordafrika, Monte Video.
anethifolium Lam. v. *Torilis crinita*. *capillaceum* Mchx. v. *Sison capillac.* *cicutae-folium* W. v. *Boeberi*. *copticum* L. v. *Trachyspermum copticum*.
costatum Ell. v. *Sison capillaceus*. *ferulaceum* Lk. v. *Ligusticum ferulaceum*.

Ammobium RB., Sandimmortelle, XIX. I. Compositae-Helichryseae.

- alatum* RB., flügelstengeliche, 4. k. f. b. Neuholland.
plantagineum G. Don, wegrittblättrige, 4. k. Neuholl.
Ammocharis coranica Herb. et *falcata* Herb. v. *Brunsvigia coranica* et *falcata*. *Ammyrsine buxifolia* Pursh v. *Leiophyllum thymifolium*.

Ammophila arenaria Host v. *Psamma arenaria*.**Amomum** L., Kardamome, I. I. Scitamineae (Bananeae).

- aculeatum*, stacheliche, 4. w. Malacka.
Afzelii Rosc., Afzelius's-K., 4. w. Sierra Leona.
angustifolium Sonner., schmalblättrige, 4. w. Madagascar.
aromaticum Roxb., gewürzhafte, 4. w. Bengalen.
Cardamomum L., ächte, 4. w. Ostindien, Molucken.
ciliatum Blum., gefranzte, 4. w. Java.
dealbatum Roxb., weifslliche, 4. w. Bengalen.
echinatum W., igelstachelige, 4. w. Ostindien.
gracile Blum., schlanke, 4. w. Java.
grandiflorum Sm., großblumige, 4. w. Sierra Leona.
Grana paradisi L., Paradieskörner-K., 4. w. Guinea, Malaguetta, Madagaskar.
heteranthum Blum., verschiedenblumige, 4. w. Java.
latifolium Afzel., breitblättrige, 4. w. Sierra Leona.
Leonurus König, Löwenschwanz-K., 4. w. Malacka.
maximum Roxb., größte, 4. w. Malacka.
Melegueta Rosc., Melegueta-K., 4. w. Demerary.
parviflorum Presl., kleinblumige, 4. w. Insel Luzon.
racemosum R. et P., traubige, 4. w. Peru.
scyphiphorum König, bechertragende, 4. w. Malacka.
sericeum Roxb., seidenhaarige, 4. w. Bengalen.
subulatum Roxb., pfriemenförmige, 4. w. Bengalen.
sylvestre Sw., wilde, 4. w. Jamaica.
thyrsoides R. et P., straufsformige, 4. w. Peru.

Amomum

uliginosum König, Sumpf-K., 4. Wa. w. Ostindien.

villosum Lour., zottige, 4. w. Cochinchina.

exscapum Sims. v. *Afzelii*. *hirsutum* Lam. v. *Costus*

speciosus. *Mioga* Roxb. v. *Zingiber* Miog. *repens*

Sonn. v. *Alpinia* *Cardamomum*. *sylvestre* Lam. v.

Zingiber *Zerumbet*. *Zerumbet* König v. *Curcuma*

Zedoaria. *Zerumbet* L. v. *Zingiber* *Zerumbet*. *Zin-*

giber L. v. *Zerumbet officinale*.

Amonia agrimonioides Nestl. v. *Aremonia agrim.*

Amorpha L. Uniform, Bastard-Indigo, XVII. IV. (VI.).

(XVI. VI.). Leguminosae-Papilionaceae.

canescens Nutt., weißgrauliche, ♀. f. b. Louisiana.

croceo-lanata Wats., gelbwollige, ♀. f. Nordamerika.

fragrans Swt., wohlriechende, ♀. f. Nordamerika.

fruticosa L., strauchartige, ♀. f. Nordamerika.

a) *angustifolia* Ph. β) *coerulea* Lodd. γ) *elata*.

δ) *emarginata* Ph. ε) *Lewisii* Lod.

glabra Dsf., kahle, ♀. f. Nordamerika.

herbacea Walt., krautige, ♀. f. b. Carolina, Florida.

nana Nutt., Zwerg-B., ♀. f. b. Nordamerika am Missouri.

microphylla Pursh v. *nana*. *pubescens* W. v. her-

bacea. *pumila* Mchx. v. *herbacea*.

Ampelodesmus Lk., Hügelrohr, III. II., Gramineae

bicolor Kunth, zweifarbiges, 4. f. b. k. Nordafrika.

tenax L., zähes, 4. f. k. Süditalien, Nordafrika.

Ampelopsis Mchx., wilder Wein. V. I., Viniferae.

(*Ampelideae*).

bipinnata Mchx., doppeltgefiederter, ♀. k. f. b. Nordamer.

capreolata G. Don, astrankiger, ♀. Sch. k. t. Nepal.

cordata Mchx., herzblättriger, ♀. f. Nordamerika.

hederacea Mchx., epheuähnlicher (gemeiner), ♀. Sch. f.

Nordamerika.

heterophylla Blume, verschiedenblättriger, ♀. Sch. w.

Java.

hirsuta Don, rauhhaariger, ♀. Sch. f. Nordamerika.

quinquefolia Mchx. v. *hederacea*.

Ampherephis H. B. K., Doppelhülle. XIX. I., Com-

positae-Eupatorineae.

aristata H. B. K., begrannte, ☉. ♂. f. m. w. Neu-Granada.

intermedia Lk., mittlere. ☉. ♂. f. m. w. Brasilien.

mutica H. B. K., unbewehrte, ☉. ♂. f. m. w. Neu-Granada.

Amphicarpa Ell., Erdhülle. XVII. IV. (VI.), Legu-

minosae-Papilionaceae.

comosa G. Don, schopfige, ☉. Sch. f. Nordamerika.

monoica Ell., einhäusige, ☉. Sch. f. Nordamerika.

sarmentosa Ell., wurzelrankige, ☉. Sch. f. Nordamerika.

Amphicome Royle, Rundschof. XIV. II., Bignoniaceae.

arguta Royle, feinspitziger, 4. Sch. k. f. b. Himalaja.

Amphilophium H. B. K., Saumkelch. XIV. II., Per-

sonatae-Bignoniaceae (Bignoniaceae).

Mutisii H. B. K., Mutis's, ♀. Sch. w. Neu-Granada.

paniculatum H. B. K., rispighlumiger, ♀. Sch. w. West-

indien, Südamerika.

pubescens Spl., weichhaariger, ♀. Sch. w. Brasilien.

Amphipogon RB., Hüllbart, III. II., Gramineae.

laguroides RB., sammtgrasähnlicher, 4. t. Neuholland.

strictus RB., steifer, 4. t. Neuholland.

Amphodus Lind., Zahnbohne, XVII. IV. (VI.), Legu-

minosae-Papilionaceae.

Amphodus

ovatus Lindl., eiförmige, 4. Sch. w. Trinidad.

Amsinckia Lehm., Amsinckie, V. 1., Asperifoliaceae.

angustifolia Lehm., schmalblättrige, ☉. f. Nordamerika.
 β) parviflora Bernh.

intermedia Fisch. et C. A. Mey., mittlere, ☉. f. Neu-Californien.

lycopsoides Lehm., krummhalsähnliche, ☉. f. Chili.

spectabilis Fisch. et C. A. Meyer, ansehnliche, ☉. f. Neu-Californien.

Amsonia Walt. (Charles Amason, amerikanischer Reisender), V. 1., Contortae-Apocynae.

angustifolia Mchx., schmalblättrige, 4. f. Virginien, Carolina.

latifolia Mchx., breitblättrige, 4. f. Virginien, Carolina.

salicifolia Pursh., weidenblättrige, 4. f. Carolina.

Amygdalus T. L., Mandel, XII. 1., Amygdalaceae. (*Drupaceae*).I. *Amygdalus* T.

amara Hayne, bittere, f. f. b. Orient.

campestris Bess., Feld-M., f. f. Volhynien.

cochinchinensis Lour., cochinchinesische, f. k. f. b. China, Cochinchina.

communis L., gemeine, f. f. b. Nordafrika, Griechenland, Palästina.

β) flore pleno. γ) foliis varieg.

fragilis Borkh., Krach-M., f. f. b. Orient.

β) macrocarpa.

microphylla Humb., kleinblättrige, f. k. Mexico.

nana L., Zwerg-M., f. f. Ostdeutschland, Ungarn, Rußland.

β) georgica DC. ? γ) sibirica Lodd.

orientalis Mill. Ait., morgenländische, f. f. b. Kleinasien.

pedunculata Ledeb. (Loud. hort.), gestielte, f. f. ? Asiat. Rußland.

Persico-Amygdala (compressa Hortul.), Dalech., Rchl. (Pfersichmandel), Bastard-M. f. f. b. Orient.

II. *Persica* T. Pfirsich.

Nucipersica C. Bauh. (P. laevis DC.), Nectarinen, f. f. b. Persien.

α) carne adhaerente. β) carne secedente.

Persica L. (*P. vulgaris* Mill.), gemeine P., f. f. b. Persien.

α) carne adhaerente s. duracina (a. leucocarpa.

b. xanthocarpa). β) carne secedente (a. haema-

tocarpa. b. leucocarpa. c. xanthocarpa). γ) flore

pleno. δ) flore albo. ε) foliis varieg.

argentea Lam. v. *orientalis*. *communis persicioides*

DC. v. *Persico-Amygdala*. *dulcis* Mill. v. *commu-*

nis et fragilis. *incana* Pall. v. *Prunus prostrata*.

pumila L. v. *Prunus japonica*.

Amyris L., Balsammyrte, VIII. 1., Amyrideae.

acuminata Roxb., zugespitzte, f. w. Ostindien.

brasiliensis Spgl., brasilianische, f. w. Brasilien.

heptaphylla Roxb., siebenblättrige, f. w. Ostindien.

Lunani Spgl., Lunan's, f. w. Jamaica.

maritima L. Jacq., Meerstrand's, f. w. Westindien, Brasilien.

nana Roxb., Zwerg-B., f. w. Ostindien.

? nervosa Zeyh., nervige, f. t. Cap d. g. Hoffn.

Plumieri DC., Plumier's, f. w. Westindien, Carolina.

sylvatica Jacq., Wald-B., f. w. Carthagera.

Amyris

Tecomaca DC., *Tecomaca-B.*, ♀. w. Mexico.

toxifera L., giftige, ♀. t. Carolina.

ambrosiaca L. v. *Icica Tacamahaca*. *Elaphrium* Spgl. v. *Elaphrium glabrum*. *elemifera* Lam. vid. Plumieri. *enneandra* W. v. *Icica enneandra*. *gileadensis* v. *L. Balsamodendron gileadense*. *heterophylla* W. v. *Icica heterophylla* DC. *polygama* Cav. vid. *Duvaua dependens*. *tomentosa* Spgl. v. *Elaphrium tomentosum*. *zeylanica* Retz v. *Balsamodendron zeylanicum*.

Anabasis L., Beerensalzkraut, V. II., Aizoideae - Atripliceae (*Chenopodeae*).

aphylla L., blattloses, ♀. k. Mittel- und Kleinasien, Spanien, Nordafrika,

florida MB., blüthenreiches, ☉. f. Iberia.

oppositiflora Schrad., gegenständigblühendes, ☉. f. Kleinasien.

tamariscifolia L., tamariskenblättriges, ♀. k. Spanien.

foliosa L. vid. *Salsola foliosa*. *tatarica* Pall. vid. *aphylla*.

Anacampteros Sims., Fettblatt, XI. I., Portulacaceae.

angustifolia Haw., schmalblättriges, ♀. t. Cap d. g. H.

arachnoides Sims., Spinnweben-F., ♀. t. Cap d. g. H.

filamentosa Sims, fadiges, ♀. t. Cap d. g. H.

intermedia Haw., mittleres, ♀. t. Cap d. g. H.

lanceolata Haw., lanzettblättriges, ♀. t. Cap d. g. H.

polyphylla Haw., vielblättriges, ♀. t. Cap d. g. H.

rotundifolia Swt., rundblättriges, ♀. t. Cap d. g. H.

rubens Haw., röthliches, ♀. t. Cap d. g. H.

rufescens Haw., fuchsröthliches, ♀. t. Cap d. g. H.

varians Swt., veränderliches, ♀. t. Cap d. g. H.

albicans Haw. v. *Sedum albicans*. *ciliaris* Haw. v.

Sedum spurium. *maxima* Haw. v. *Sedum maximum*. *triphylla* Haw. vid. *Sedum Telephium* β.

vulgaris Haw. v. *Sedum Fabaria*.

Anacamptis pyramidalis Rich. v. *Orchis pyramidalis*.

Anacardium L., Nieren - (Acajou-)baum, IX. I. (XXIII. II., Amyrideae-Terebinthaceae (*Cassuvieae*).

occidentale L., westindischer, ♀. w. Westindien.

β) *indicum* DC. Ostindien.

Anacyclus L., Ringblume, XIX. II., Compositae - Corymbiferae.

clavatus P., keulenförmige, ☉. f. Barbarei, Sicilien.

orientalis L., morgenländische, ♂. f. Griechenl., Türkei.

pedunculatus P., gestielte, ☉. f. Barbarei.

pulcher Bess., schöne, ☉. ♂. f. Podolien, Volhynien, Litthauen, Thüringen.

Pyrethrum DC., officinelle, ♀. k. f. b. Mittelasien, Nordafrika.

radiatus Loisel., strahlige, ☉. f. Südeuropa, Afrika, Barbarei.

β) *purpurascens* P.

tomentosus DC., filzige, ☉. f. Südeuropa, Barbarei.

valentinus L., spanische, ☉. f. Spanien, Südfrankreich.

alexandrinus W. v. *Cyrtolapis alexandrina*. *anthe-*

moides Lagasc. v. *Lyonnetia abrotanifolia*. *aureus*

L. v. *Anthemis aurea*. *Barrelieri* Guss. v. *Anthem.*

Barr. bicolor P. v. *radiatus*. *creticus* L. v. *Lyon-*

netia pusilla. *mucronulatus* Guss. vid. *Anthem.*

Anacyclus

mucronul. *officinarum* Hayn. v. *pulcher. pectinatus* Bor. et Chaub. v. *Lyonnetia tenuiloba. pubescens* Rchb. v. *tomentosus*.

Anadenia RB., Anadenie, IV. 1. Proteaceae.

ilicifolia RB., stechhülsenblättrige, ♀. t. Neuholland.
pulchella RB., schöne, ♀. t. Neuholland.

Anagallis T., Gauchheil, V. 1., Primulaceae.

arvensis L., Acker-G., ☉. f. Europa, Mittelasiem, Cap d. g. H. Nordamerika.

β) *carnea* Schrk.

coerulea Schreb., blauer, ☉. f. Europa, Mittelasiem, Cap der guten Hoffnung.

collina Schousb., Hügel-G., ♂. ♀. t. Marocco, Sardinien.

β) *coerulea*.

crassifolia Thore, dickblättriger, 4. ♂. f. Westl. Frankr.

latifolia L., breitblättriger, ☉. f. Spanien, Ungarn.

linifolia L., leinblättriger, ☉. f. Spanien, Portugal.

Monelli L., aufrechter, ♂. ♀. t. Italien, Portug., Taurien.

β) *Webbiana* Penny. γ) *lilacina* D. Don. δ)

Willmoreana Bot. Mag. (Madeira).

parviflora Link, kleinblumiger, ☉. f. Portugal.

repens DC., kriechender, 4. ♂. f. Südfrankreich.

tenella L., zarter, 4. ♂. f. Süd- und Norddeutschland, England, Frankreich, Schweiz, Italien.

Hybrid. *Maryattae* Swt. ♀. t. *Wellsiana* Penny ♀. t.

fruticosa Vent. v. *collina. phoenicea* Lam. vid.

arvensis. verticillata All. v. *Monelli*.

Anagyris T., Stinkstrauch, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

foetida L., gemeiner, ♀. k. f. b. Spanien, Italien, Sicilien.

β) *glauca*.

latifolia Brouss., breitblättriger, ♀. k. Teneriffa.

chinensis Spgl. et *foetida* Lour. v. *Macrotropis foetida. indica* Wal. v. *Piptanthus nepalensis*.

Anamenia coriacea Vent. v. *Knowltonia rigida. laser-*

pitiifolia Vent. vid. *Knowlton. vesicator. daucifol.*

Vent., *gracilis* Vent. et *hirsuta* Vent. v. *Knowlt. daucifolia* etc.

Ananassa Thunb. Lindl., Ananas, VI. 1., Bromeliaceae.

bracteata Lindl., deckblättrige, 4. w. Brasilien.

debilis Lindl., schwache, 4. w. ? Brasilien.

lucida Lindl., starkglänzende, 4. w. Südamerika.

β) *denticulata. γ) foliis varieg.*

sativa Lindl., gemeine, 4. w. Westindien, Surinam.

β) fol. *argenteo-striatis. γ) fol. atrorubent.*

δ) fol. *aureo-striat. ε) fol. incarnat. striatis.*

ζ) fol. *nigricant. η) fol. rubicund. θ) fol. vio-*

laceo striat. ι) fol. viridib. κ) fruct. acid.

λ) fruct. *albido. μ) fruct. dulcissim. ν) fruct.*

maximo (new Providence). ξ) fruct. ovato. ο)

fruct. pyramidal. π) fruct. rubro etc.

semiserrata (Bromelia W.), halbsägezähnlige, 4. w. Südamerika.

β) fol. *rubicund.*

Anandria Siegesb., Maßliebenlattig, XIX. 11., Compositae-Eupatorineae.

Bellidiastrum DC., sibirischer, 4. f. Sibirien, Nordchina.

α) *vernale* Turcz. β) *autumnale* Turcz.

Anantherix viridis Nutt. v. *Gomphocarpus viridis*.

Anarrhinum Desf., Lochschlund, XIV. II., Personatae-
* Antirrhineae (*Scrophul.*).

bellidifolium W., masliebenblättriger, ♂. f. Südeuropa.
fruticosum Desf., strauchiger, ♂. ♀. k. Nordafrika, Palästina.
pedatum Dsf., fufsförmiger, ♂. k. Portugal, Nordafrika.

crassifolium W. v. *Linaria origanifolia*. ? *pubescens*
Hort. v. *pedatum*. *tenellum* W. v. *Linaria tenella*.

Anastatica L., Jerichorose, XV. II., Cruciferae.

hierochuntica L., gemeine, ☉. f. Aegypten, Palästina.

Anatherum P. B., Stumpfspelze III. II. (XXIII. I.),
Gramineae.

muricatum P. B., weichstachlige, 4. w. Ostindien.

Anaxeton Gärt. Cass., Silberkelch.

arborescens Gärt., baumartiger, ♀. t. Cap d. g. H.

asperum DC., rauher, ♀. t. Cap d. g. H.

Anaxeton crispum et *foetidum* G. v. *Helichrysum*
crispum etc. *eximium* Schk. vid. *Helipterum* *exi-*
mium. *racemosum* Schk. v. *Helichrysum mucronatum*.

Anchietea Hilar. (P. Anchietea, brasilianischer Bota-
niker), V. I., Violaceae.

pyrifolia Hilar., birnblättrige, ♀. w. Brasilien.

Anchonium DC., Schnabelschötchen, XV. I., Cruciferae.

Billardieri DC., Billardier's, ♀. t. Libanus.

Anchusa L., Ochsenzunge, V. I., Asperifoliaceae.

Agardhii Lehm., Agardh's, 4. f. ? Sibiriën.

aggregata Lehm., dichtblühende, ♂. f. Griechenland.

angustifolia Lehm. ? L., schmalblättrige, ♂. f. Süd- u.
Osteuropa.

arvalis Rchb., Acker-O., ♂. f. Europa.

Barrelieri Gmel. Bess., Barrelier's, ♂. f. Süd- u. Osteuropa.

caespitosa Lam., rasenartige, 4. k. Creta.

capensis Thbg., capische, ♂. k. Cap d. g. H.

crispa Moris, krause, ☉. Sardinien, Corsica.

Gmelini Ledeb., Gmelin's, 4. f. Podolien, Sibirien.

hispida Forsk., hackerige, 4. f. b. k. Aegypten.

latifolia Lehm., breitblättrige, ♂. f. ?

leucoifolia Lehm., levkoiblättrige, 4. f. b. Armenien.

macrophylla Desf., großblättrige, ♂. k. Marocco.

myosotidiflora Lehm., vergiftsmeinnichtblumige, 4. f.
Caucasus.

ochroleuca MB., weißgelbliche, ♂. f. Siebenbürg., Taurien.

officinalis L., officinelle (gemeine), ♂. f. Europa.

β) *incarnata* Schrad. γ) *maculata* Horn.

paniculata Ait., rispige, ♂. 4. f. Südeuropa, Nordafrika.

β) *angustifolia* Rchb. γ) *azurea* Mill. δ) *italica* Retz.

procera Bess., hohe, ♂. f. Podolien.

rupestris R. B., Felsen-O., ♂. 4. f. Sibirien.

sericea R. et S., seidenhaarige, ♂. 4. f. Sibirien.

strigosa La Bill., striegelige, 4. f. k. Syrien.

stylosa MB., langgriffelige, ♂. f. Taurien.

tenella Hornem., zarte, ☉. f. China, Ostindien.

tinctoria L., färbende, 4. f. b. Südeuropa, Orient.

undulata L., wellenblättrige, 4. f. Südeuropa.

β) *hybrida* Tenore.

verrucosa Lam., warzige, ☉. f. Südeuropa, Aegypten.

β) *perlata* Hort.

alpestris Stev. v. *Nonnea alp.* *amoena* Gmel. v.

paniculata. *amplexicaulis* Sm. v. *Omphalodes sem-*

pervirens. *angustifolia* Auctor. v. *arvalis*. *arvensis*

Achusa

MB. v. *Lycopsis* arv. *arvensis* Tausch. v. *arvalis*.
aserrima Delil. vid. *Dioclea hispidissima*. *dubia*
Nocca vid. *Nonnea lutea*. *echioides* M. B. v. *Ly-*
copsis echioid. *flava* Forsk. vid. *verrucosa*. *his-*
pidissima Sbr. vid. *Dioclea hispidissima*. *italica*
Retz vid. *paniculata* δ . *lanata* L. v. *Cynoglossum*
cheirifolium. *laxiflora* DC. vid. *Borrage laxiflora*.
leptophylla R. et S. vid. *angustifolia*. *lutea* MB.
 vid. *Nonnea lutea*. *lycopsoides* Bess. v. *officinalis*.
microcalyx Vis. vid. *angustifolia*. *Milleri* W. v.
verrucosa. *nigricans* Brot. vid. *Nonnea nigricans*.
orientalis L. vid. *Lithospermum orientale*. *ovata*
 Lehm. vid. *Lycopsis orientalis*. *parviflora* Sm. v.
aggregata. *picta* MB. vid. *Nonnea picta*. *pulla* MB.
 vid. *Nonnea pulla*. *rosea* MB. v. *Nonnea rosea*.
sempervirens L. vid. *Omphalodes sempervirens*.
variegata Lehm. vid. *Lycopsis variegata*. *versicolor*
 Stev. vid. *Nonnea versicol.* *virginica* L. v. *Litho-*
spermum sericeum. *zeylanica* Jacq. v. *tenella*.

Ancistrocarpus maypurensis H. B. K. v. *Microtea maypu-*
rensis. *Ancistrum decumbens* Thbg. v. *Acaena la-*
tebrosa. *diandrum* Forst. v. *Acaena Sanguisorbae*.

Andersonia RB. (W., A., W. u. G. Anderson), V. 1.,
 Epacrideae.

coerulea RB., blauë, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
depressa RB., niedergedrückte, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
micrantha RB., kleinblumige, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
parvifolia RB., kleinblättrige, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
sprengelioides RB., sprengeliaähnliche, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
squarrosa RB., sparrige, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.

Andira Lam. (brasilianischer Name), XVII. iv. (vi.),
 Leguminosae-Caesalpinieae.

inermis H. B. K., unbewehrte, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
racemosa Lam., traubige, $\frac{1}{2}$ w. Trinidad, Guiana, Bra-
 silien.

Andrachne L., *Andrachne*, XXI. x., *Tricoccae*-Eu-
 phorbiaceae.

telephioides L., telephiumähnliche, $\odot$. $\frac{1}{2}$ f. Süd- und
 Osteuropa, Arabien.

Andraspis elongata Dub. v. *Androsace elongata*.

Andreoskia DC. (Ant. Andrzejowski, russischer Botani-
 ker), XV. iii.

eglandulosa DC., drüsenlose, $\odot$. f. Sibirien.
integrifolia DC., ganzblättrige, $\frac{1}{2}$ f. Sibirien.
pectinata DC., kammförmige, $\frac{1}{2}$ f. Sibirien.
 β) *pinnatifida*.

Andreusia glabra Vent. v. *Myoporum ellipticum*.

Andrewsia autumnalis Spgl. et *verna* Spgl. vid. *Centau-*
rella verna et autumnalis. *Androcera lobata* Nutt. v.
Nycterium heterandrum.

Androcymbium W., Cymbelfaden, VI. 1., Corona-
 riae-Colchicaceae (*Melanthaceae*).

eucomoides W., schopflilienähnlicher, 4. Zw. t. Cap
 d. gut. Hoffnung.

leucanthum W., weisblühender, 4. Zw. t. Cap der
 gut. Hoffnung.

melanthoides W., melanthiumähnlicher, 4. Zw. ut. Cap d.
 gut. Hoffnung.

Andromachia H. B. K., (Andromachus, Arzt des Nero),

XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

grandiflora H. W. K., großblumige, 4. w. Quito.

igniaria, feuerfangende, 4. w. Quito.

Andromeda L., Andromede, X. I., Ericaceae.

bracteosa DC., deckblättrige, f. k. f. b. Neucaliforn.

polifolia L., poleiblättrige, f. f. Europa, Asien, Nordamerika.

a) *angustifolia*, β) *ericoides*, γ) *grandiflora*, δ) *latifolia*, ε) *media*, ζ) *miniata*, η) *revoluta*, θ) *scotica*, ι) *stricta*.

rosmarinifolia Pursh., rosmarinblättrige, f. f. Nordamer.
venulosa DC., aderige, f. k. f. b. Naucalifornien.

americana Hort. et *canadensis* Hort. et *glaucifolia* Wender. et *oleaeifolia* Hortul. vid. *polifolia* δ. et *glaucophylla* Lk. v. *rosmarinifolia*. *subulata* v. *polifolia* β.

acuminata Ait. vid. *Leucothoe acum.* *anastomosans* L. vid. *Gaultheria anast.* *angustifolia* Pursh vid. *Cassandra* ang. *arborea* L. v. *Oxydendrum arboreum*.

axillaris Ait. v. *Leucothoe axillaris*. *baccata* Wangerh. vdi. *Vaccinium resinosa*. *bryantha* L. vid. *Bryanthus* Gmelini.

buxifolia Sm. vid. *Leucothoe buxifolia*. *calyculata* L. vid. *Cassandra calyculata*.

capricornia Hamilt. v. *Pieris ovalifolia*. *cassineifolia* Vent. v. *Zenobia speciosa*. *Catesbaei* Walt. v. *Leucothoe spinulosa*.

cerea L. vid. *Vaccinium cereum*. *coerulea* L. vid. *Phyllodoce taxifolia*. *coerulea* β.

viridifolia Pall. v. *Phyllodoce Pallasiana*. *coriacea* Ait. v. *Leucothoe coriac.* *coriifolia* Thbg. v. *Leucothoe coriifolia*.

crispa Poir. v. *Cassandra angustifolia*. *cupressiformis* Wall. v. *Cassiope fastigiata*.

Daboecia L. vid. *Daboecia polifolia*. *dealbata* Lindl. vid. *Zenobia speciosa* β. *droseroides* Berg.

v. *Erica glutinosa*. *ericoides* Pall. v. *Cassiope ericoides*. *eucalyptoides* Schlecht. Cham. vid. *Leucothoe eucalyptoides*.

fasciculata Sw. vid. *Lyonia fasciculata*. *fastigiata* Wall. v. *Cassiope fastigiata*. *ferruginea* Walt. v. *Lyonia ferruginea*.

ferruginea W. vid. *Lyonia rigida*. *floribunda* Pursh vid. *Zenobia floribunda*.

formosa Wall. v. *Pieris formosa*. *formosissima* Bartr. v. *Leucothoe acuminata*. *frondosa* Pursh. v. *Lyonia frondosa*.

globulifera Hortul. v. *Lyonia ligustrina*. *glomerata* Cav. vid. *Gaultheria anastomosans*.

ilicifolia P. v. *Leucothoe ilicifolia*. *jamaicensis* Sw. v. *Lyonia jamaicensis*. *japonica* Thbg. vid. *Pieris japonica*.

lanceolata Dsf. v. ? *Leucothoe spinulosa*. *lanceolata* Don. v. *Pieris lanceolata*.

ledifolia Humb. vid. *Arctostaphylos polifolia*. *ligustrina* Mühlbg. v. *Lyonia ligustrina*.

lucida Jacq. vid. *Leucothoe coriacea*. *lycopodioides* Pall. v. *Cassiope hypnoides*.

marginata Veill. vid. *Leucothoe coriacea*. *Mariana* L. vid. *Leucothoe Mariana*.

Mariana Jacq. vid. *Leucothoe coriacea*. *Mertensiana* Bong. v. *Cassiope Mertens.* *myrsinites* Lam. vid. *Pernetia microphylla*.

nitida Mchx. vid. *Leucothoe ligustrina*. *nummularia* Schlecht. Cham. v. *Leucothoe nummularia*.

ovalifolia Wall. v. *Pieris ovalifolia*. *ovata* Soland. vid. *Zenobia speciosa*.

paniculata L. v. *Zenobia racemosa*. *pani-*

Andromachia

culata W. v. *Lyonia ligustrina. populifolia* Lam. v. *Leucothoe acuminata. prostrata* Cav. vid. *Pernettya prostrata. pulverulenta* Bartr. vid. *Zenobia speciosa* β. *racemosa* Lam. vid. *Lyonia ligustrina. racemosa* L. v. *Zenobia racemosa. racemosa* Walt. v. *Lyonia frondosa. Redowskii* Cham. vid. *Cassiope Redowskii. reticulata* Walt. v. *Leucothoe acuminata. revoluta* Spgl. v. *Leucothoe revol. rhomboidalis* Veill. v. *Leucothoe coriacea. rigida* Humb. v. *Gaultheria rigida. rigida* Pursh v. *Lyonia rigida. rubiginosa* P. v. *Lyonia rubiginosa. rupestris* Forst. v. *Gaultheria rupestris. salicifolia* Comers. v. *Leucothoe salicifolia. ? secunda* Mch. v. *Leucothoe ? secunda. serratifolia* H. Cels v. *Leucothoe acuminata. sinensis* Lodd. Bot. Cab. vid. ? *speciosa* Mchx. vid. *Zenobia speciosa. spicata* Wats. v. *Zenobia spicata (racemosa nach DC.). squamulosa* D. Don v. *Pieris lanceolata. Stelleriana* Pall. v. *Cassiope Stelleriana. taxifolia* Pall. v. *Phyllodoce taxifolia. tetragona* L. v. *Cassiope tetragona. Walteri* W. v. *Leucothoe spinulosa. Androphylax scandens* Wendl. v. *Cocculus carolinus.*

Andropogon L., Bartgras, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.

annulatus Forsk., beringtes, 4. t. w. Aegypten, Ostindien.
argenteus DC., silberfarbiges, 4. t. w. Mexico, Quito.
Bladhii Retz, Bladh's, 4. t. w. China.
comosus Spgl., schopfiges, 4. t. Neuholland.
furcatus Mühlbg., gabeliges, 4 f. Südeuropa.
hirtus L., steifhaariges, 4. f. Südeuropa.
Ischaemum L., fingerförmiges, 4. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.
laguroides DC., sammetgrasähnliches, 4. k. Neuspanien.
provincialis Lam., südfranzösisches, 4. f. b. Südfrankreich.
pubescens Vis., weichhaariges, 4. f. Dalmatien.
saccharoides Sw., zuckerrohrähnliches, 4. w. Jamaica.
serrulatus Lk., feingesägtes, 4. w. ?
stenophyllus R. et S., schmalblättriges, 4. t. Mexico.
serratus Thbg., sägezähniges, 4. k. Japan.

Agardhi Hort. v. *Bladhii. Allionii* DC. v. *Heteropogon Allon. alopecuroides* L. v. *Erianthus saccharoides. angustifolius* K. B. K. vid. *stenophyllus. angustifolius* Sm. vid. *Ischaemum. arundinaceus* Scop. v. *Sorghum halep. avenaceus* H. B. K. vid. *Sorghum halepens. citratus et citriodorus* Hortul. vid. *Cymbopogon Schoenanth. contortus* L. vid. *Heteropogon. contort. contortus* Allion. vid. *Heteropogon Allionii. distachyos* L. v. *Pollinia distachys. Erianthus* Lk. vid. *Erianthus saccharoides. fasciculatus* L. v. *Chloris radiata. fastigiatus* Sw. v. *Dictomis fastigiata. Gryllus* L. v. *Chrysopogon Gryl. halepensis* Sibth. v. *Sorghum halep. involucratus* Kön. v. *Apluda aristata. Iwarancusa* Blan. v. *Vetiveria Iwaranc. muricatus* Retz v. *Anatherum muricat. polydactylum* L. vid. *Chloris polydactyla. Ravennae* L. v. *Erianthus Ravennae. Schoenanthus* L. vid. *Cymbopogon Schoen. squarrosus* W. vid.

Andropogon

Anatherum muricatum. strictus Host. vid. *Erianthus strictus*.

Androsace T., Mannschild, V. 1., Primulaceae.**I. Aretia** Hall. L.

alpina Lam., Alpen-M., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

caespitosa Lehm., rasenartiges, ♀. k. Persien.

dasyphylla Bunge, behaartes, 4. f. Altai.

diapensioides Lapeyr., *diapensia*ähnliches, 4. f. b. Pyrenäen.

frutescens Lapeyr., strauchiges, ♀. k. f. b. Pyrenäen.

helvetica Gaud., schweizerisches, 4. f. Baierische, Tyroler, Schweizer und französische Alpen.

β) Heerii Heg.

imbricata Lam., dachziegelförmiges, 4. f. Südschweizer und französische Alpen.

β) argentea Gärtn.

pubescens DC., feinhaariges, 4. f. Südschweizer und französische Alpen.

alpina Gaud. v. *pubescens*. *Aretia* Lapeyr. v. *imbricata*. *bryoides* DC. v. *helvetica*. *cylindrica* DC. v. *frutescens*. *pennina* Gaud. v. *alpina*. *Vitaliana* Lapeyr. v. *Aretia Vitaliana*.

II. Androsace T. (et *Andraspis* Dub. et *Chamaejasme* Koch).

acaulis Lk. et Otto, stengelloses, ♂. f. Sibirien.

albana Steven, albanisches, 4. f. Caucasus.

brevifolia Vill., kurzblättriges, ☉. ♂. f. Südfrankreich.

carinata Torr., gekieltes, 4. f. Nordamerika.

carnea L., fleischfarbiges, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

Chamaejasme Host., trügerisches, 4. f. Mitteleurop. Alpen, Sibirien.

elongata L., verlängertes, ☉. f. Mitteleuropa.

β) nana Hornem.

filiformis Retz, fadenförmiges, ☉. f. Sibirien.

Gmelini Gärtn., Gmelin's, 4. f. Sibirien.

lactea L., milchweißes, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

lactiflora Fisch., weißlichblühendes, ♂. f. Sibirien.

linearis Grah., gleichbreitblättriges, 4. f. Nordamerika.

macrocarpa Ledeb., großfrüchtiges, ☉. f. Sibirien.

maxima L., größtes, ☉. f. Mitteleuropa, Sibirien.

obtusifolia All., stumpfblättriges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

septrionalis L., nördliches, ☉. f. Europa.

valerianoides Lehm., baldrianähnliches, ☉. f. Kleinasien.

villosa L., zottiges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

alismoides Hrn. v. *lactiflora*. *Chamaejasme* Wulf.

vid. *obtusifolia*. *coronopifolia* Andr. vid. *lactiflora*.

Lachenalii Gmel. vid. *obtusifolia*. *pauciflora* Vill. v. *lactea*.

Androsacemum T., All., Blutheil, XVIII. II. (XVI. VIII.), Hypericineae.

officinale All., officinelles, 4. ♀. England, Frankreich, Italien, Griechenland, Caucasus.

Andryala L., Wollsalat, XIV. 1., Compositae-Cichoriaceae.**I. Euandryala** DC., *Andryala* Roth., Schreb.

? *crithmifolia* Ait., meerfenchelblättriger, ♂. k. Madeira.

dentata Sibth., gezahnter, ♂. f. k. Griechenland.

nigricans Poir., schwärzlicher, ☉. ♂. f. k. Barbarei.

Andryola

pinnatifida Ait., fiederspaltiger, ♂. k. Madeira, Teneriffa.

ragusina L., ragusanischer, 4. k. Dalmatien, Griechenland.

β) lyrata Guss., γ) arenaria Boissier.

II. *Rothia* Schreb. (*Voigtia* Roth non Spgl.).

integrifolia L., ganzblättriger, ♂. f. Südeuropa.

α) vulgaris (*lanata* Vill.), β) undulata Pers., γ) angustifolia (*mollis* Asso), δ) diffusa Jan.

laxiflora DC., lockerblumiger, ♂. f. Südspanien, Nordafrika.

Rothia P. Roth's, ♂. f. Spanien.

sinuata L., buchtiger, ♂. f. k. Südfrankreich.

β) intermedia.

varia Lowe, veränderlicher, 4. k. Madeira.

α) candidissima Dsf., β) angustifolia (*ragusina* Hort.), γ) subglabrata, δ) aprica, ε) cheiranthifolia L'Her. (*glandulosa* Lam., *tomentosa* Scop.).

chondrilloides Scop. v. *Crepis chondrilloides*.

lanata L. vid. *Hieracium lanatum*.

nemausensis Vill.

nudicaulis Lam. v. *Pterotheca nemausensis*.

pontana Vill. vid. *Crepis montana*.

Andrzeiowska Cardamine Rehb. vid. *Notoceras cardaminaefolium*.

Aneilema RB., *Aneilema*, III. 1., Commelinaceae.

acuminata RB., zugespitzte, 4. t. Neuholland.

aequinoctialis Loud., guineische, 4. w. Guinea.

affinis RB., verwandte, 4. t. Neuholland.

ambigua Loud., zweifelhafte, 4. w. Sierre Leona.

biflora RB., zweiblumige, 4. t. Neuholland.

crispata Ait., krausblättrige, 4. t. Neuholland.

hispida Don, steifhaarige, 4. t. Nepal.

longifolia Hook, langblättrige, 4. w. Mozambique.

nudicaulis RB., nacktstengelige, 4. w. Ostindien.

nudiflora Loud., nacktblumige, ♂. t. Ostindien.

radicans Don, wurzelnde, 4. t. Nepal.

serrulata Loud., feingesägte, 4. w. Cayenne, Trinidad.

Aneimia Swz., Nacktähre, XXIV. 1. Osmundaceae.

adiantifolia Sw., frauenhaarblättrige, 4. w. Westindien.

asplenifolia Sw., strichfarnblättrige, 4. w. Südamerika.

?coccinea Lk. et Otto, scharlachfarbige, 4. w. Südamerika.

collina Radd., Hügel-St., 4. w. Brasilien.

flexuosa Sw., gebogene, 4. w. Westindien.

hirsuta Sw., rauhhaarige, 4. w. Westindien.

humilis Sw., niedrige, 4. w. Caribische Inseln.

β) repens Radd., kriechende. Brasilien.

?laciniata Lk. et Otto, schlitzblättrige, 4. w. Westindien.

lanceolata Hook, lanzettblättrige, 4. w. Westindien.

longifolia Radd., langblättrige, 4. w. Brasilien.

phyllitidis Sw., hirschezungenblättrige, 4. w. Westind.

β) fraxinifolia Radd., eschenblättrige, 4. w. Brasilien.

radicans Radd., wurzelnde, 4. w. Brasilien.

villosa Humb., zottige, 4. w. Südamerika.

Anemone T., Windblume, XIII. VI., Ranunculaceae.

alba Juss., weisse, 4. f. Sibirien.

Anemone

- apennina L., apenninische, 4. f. England, Italien, Griechenland, Caucasus.
- baldensis L., baldische, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
- caroliniana Walt., carolinische, 4. f. Carolina.
- coerulea DC., blaue, 4. f. Sibirien.
- Commersoniana Rich., Commerson's, 4. f. b. Feuerland.
- coronaria L., Kronen- (Garten-) W., 4. f. b. k. Süd-europa, Kleinasien.
- β) flore pleno.
- deltoidea Hook, deltaförmige, 4. f. b. k. Columbia.
- dichotoma L., zweizinkige, 4. f. Sibirien, Canada.
- Fischeriana DC., Fischer's, 4. f. Sibirien.
- formosa Clarke, schöne, 4. f. b. k. Kleinasien.
- hortensis L., Garten-W., 4. f. b. k. Süd- u. Osteuropa.
- β) miniata J. C., γ) purpurea Swt.
- Hudsoniana Richards., Hudson's, 4. f. Nordamerika.
- isopyroides Juss., isopyrumähnliche, 4. f. Sibirien.
- multifida Poir., vieltheilige, 4. f. b. Feuerland.
- narcissiflora L., narcissenblumige, 4. f. Europäische, sibirische und nordamerikanische Alpen.
- nemorosa L., Busch-W., 4. f. Europa, Asien, Nordamer.
- β) flore pleno, γ) coerulea Hortor.
- obtusiloba Don, stumpflappige, 4. k. Nepal.
- palmata L., handförmige, 4. f. k. Portugal, Spanien, Nordafrika.
- β) flore pleno, γ) flore albedo.
- parviflora Mchx., kleinblumige, 4. f. Nordamerika.
- pavonina Lam., Pfauen-W., 4. f. b. k. Frankreich.
- β) fulgens Gay (*coccinea*), γ) lilacina, δ) plena.
- pennsylvanica L., pennsylvanische, 4. f. Nordamerika, Sibirien.
- polyanthes Don, vielblumige, 4. k. Nepal.
- quinquefolia L., fünfblätterige, 4. f. Nordamerika.
- ranunculoides L., ranunkelähnliche, 4. f. Europa, Sibirien.
- reflexa Steph., zurückgebogene, 4. f. Sibirien.
- Richardsonii Hook., Richardson's, 4. f. Nordamerika.
- sibirica L., sibirische, 4. f. Sibirien.
- sylvestris L., Wald-W., 4. f. Mitteleuropa.
- trifolia L., dreiblätterige, 4. f. Mitteleuropäische Alpen-thäler, Nordamerika.
- β) lancifolia Pursh., lanzettblätterige.
- umbellata L., doldige, 4. f. b. k. Kleinasien.
- virginiana L., virginische, 4. f. Nordamerika.
- β) grandiflora Hort.
- vitifolia Buchan., weinblätterige, 4. f. b. k. Nepal.
- aconitifolia* Mchx. vid. *pennsylvanica*. *borealis* Rich. v. *pennsylvanica*. *cuneifolia* Juss. v. *parviflora*. *fasciculata* Vahl v. *umbellata*. *fragifera* Jacq. v. *baldensis*. *Hepatica* L. v. *Hepatica triloba*. *ochotensis* Fisch. v. *alba*. *stellata* Lam. v. *hortensis*. *tenella* Pursh. v. *caroliniana*. *thalictroides* L. v. *Syn-desmon thalictroides*. *uralensis* Fisch. v. *coerulea*. — *albana* Stev. (*obsoleta* Sims), *alpina* L., *apiifolia* Scop., Wulf. (*grandiflora* Hoppe, *millefoliata* Bertol., *myrrhidifolia* Vill., *sulfurea* L. mant.), *capens.* DC., *cernua* Thbg., *dahuria* Fisch., *Halleri* All., *montana* Hoppe (*intermedia* Hoppe), *Nuttalliana* DC. (*ludoviciana* Nutt.), *patens* L., *pratensis*

Anemone

L., *Pulsatilla* L. (*acutipetala* Schlecht. et *tenuifolia* Schlecht.), *tenuifol.* DC., *vernalis* L., *Wolfgangiana* Bess. v. *Pulsatilla alana*, *alpina* etc.

Anethum T., Dill., V. II., Umbelliferae.

graveolens L., gemeiner (starkkriechender), ☉. ♂. f. Mittel- und Südeuropa, Westasien, Afrika.

segetum L., Saat-D., ☉. f. Südeuropa, Griechenland, Persien.

Sowa Roxb., Sowa-D., ☉. f. Ostindien.

Foeniculum L. *piperitum* Ucr., Bertol. vid. *Foeniculum officinale* etc.

Angelica L., Angelica, V. II., Umbelliferae.

flavescens Bess., gelbliche, 4. f. Galicien.

lucida L., starkglänzende, ♂. f. Nordamerika.

montana Schlecht., Berg-A., 4. f. Oestliche, mittlere u. südeuropäische Alpen.

pyrenaea Spgl., Pyrenäen-A., 4. f. Elsaß, Pyrenäen.

Razoulii Gouan, Razoul's, 4. f. Pyrenäen.

sylvestris L., Wald-A., 4. f. Europa, Kleinasien.

triquinata Mchx., drei- bis fünfzählige, 4. f. Nordamer.

Anguillaria Lam. G. *bahamensis* G. v. *Ardisia excelsa*.

latifolia Lam. *solanacea* Poir. et *tinifolia* Lam.

v. *Ardisia latifol.* etc. *zeylanica* Lam. vid. *Ardis.*

humilis.

Anguloa R. et P. (Fran. de Angulo, spanischer Naturforscher), XX. I. Orchideae.

grandiflora H. K. B., großblumige, 4. w. Quito.

lurida Lk., gelbbraune, 4. w. Brasilien.

superba H. K. B., stolze, 4. w. Peru.

Anguria L., Birnengurke, XXI. II. (II. I.), Cucurbitaceae.

pedata L., fußförmige, 4. Sch. w. Westindien.

rosea H. B. K., rosafarbene, 4. Sch. w. Neu-Granada.

trifoliata L., dreiblättrige, 4. Sch. w. St. Domingo.

trilobata L., dreilappige, 4. Sch. w. Carthagera.

umbrosa H. B. K., schattenliebende, 4. Sch. w. Südamerika.

Anigozanthos La Bill., Röhrenschwertel, VI. I., Narcisseae-Haemodoraceae.

coccinea ? Lindl., scharlachfarbiger, 4. t. Neuholland (Schwanenfluß).

flavida RB., gelblichgrüner, 4. t. Neuholland.

β) *bicolor* Lindl.

Manglesii D. Don, Mangle's, 4. t. Neuh. (Schwanenfl.).

β) *angustifolia* Lindl. Neuholland?

rufa La Bill., fuchsrother, 4. t. Neuholland.

Anisacantha RB., Stachelmelde, IV. I., Aizoideae-Atripliceae (*Chenopod.*).

divaricata RB., ausgesperrte, ♂. t. Neuholland.

Anisanthus Swt., Lippenschwertel, III. I., Irideae.

Cunonia Swt., cunonischer, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

quadrangularis Swt., vierkantiger, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

splendens Swt., glänzender, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

Anisochilus Wall., Ungleichlippe, XIV. I., Labiatae.

carnosa Benth., fleischblättrige, ♂. w. Ostindien.

Anisoderis rubra H. Cass. v. *Barkhausia rubra*.**Anisodus** Lk., Ungleichzahn, V. I., Solanaceae.

luridus Lk., grünlichbräunlicher, 4. f. Nepal.

stramonifolius G. Don, stechapfelblättriger, 4. f. Nepal.

Anisomeles RB., Ungleichbeutel, XIV. I., Labiatae.

malabarica RB., malabarischer, 4. ♂. w. Ostindien.

Anisomeles

moschata RB., moschusduftender, 4. f. t. Neuholland.

ovata RB., eiförmiger, ☉. m. f. Ostindien.

nepalensis Spgl. v. *Craniotome versicolor*.

Anisopetalum Hook, Ungleichkrone, XX. I., Orchideae.

Careyanum Hook, Carey's, 4. w. Nepal.

Anisophyllum *ocymoides* Haw. v. *Euphorbia ocymoides*.**Anneslea** Andr., Stachelnixe, XIII. I., Nymphaeaceae.

spinosa Andr., ostindische, 4. Wa. w. Südchina, Ostind.

Anneslea *grandiflora* et *Houstoni* H. Berl. vid. *Inga anomala* et J. *Houstoni*.**Anoda** Cav., Sommermalve, XVI. VIII. Malvaceae.

acerifolia DC., ahornblättrige, ☉. m. f. Mexico.

Dilleniana Cav., Dillen's, ☉. m. f. Mexico.

hastata Cav., spontonblättrige, ☉. ♂. m. f. Mexico, Cuba, Südamerika.

incarnata K. H. B., fleischfarbige, ☉. ♂. m. f. Südamer.

parviflora Cav., kleinblumige, ☉. m. f. Neuspanien.

triangularis DC., dreikantige, ☉. m. f. Neuspanien.

triloba Cav., dreilappige, ☉. m. f. Mexico.

brachyantha Rchb. v. *incarnata*. *crenatiflora* Orteg.

v. *parviflora*. *punicea* Lagasc. v. *Periptera punicea*.

Anodonte *edentula* DC. *obovata* Ledeb. etc. vid. *Koniga edentula obovata* etc.**Anoectochilus** Blume, Offenlippe, XX. I., Orchideae.

setaceus Blume, borstige, 4. w. Java.

Anomatheca Ker., Anomatheca, III. I., Irideae.

cruenta Lindl., blutrothe, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

juncea Ker., simsensblättrige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

Anona L., Flaschenbaum, XIII. VI., Anonaceae.

amplexicaulis Lam., stengelumfassender. f. w. Mauritius, Madagascar.

asiatica L., asiatischer, f. w. Ceylon.

Cherimolia Mill. Lam., *Cherimolia-F.*, f. w. Südamer.

cinerea Dun., aschgrauer, f. w. Caraib. Inseln, Cumana.

glabra L., kahler, f. t. Carolina, Neuspanien.

grandiflora Lam., großblumiger, f. w. Mauritius, Madagascar.

laurifolia Dun., lorbeerblättriger, f. w. t. Westindien, Florida.

longifolia Aubl., langblättriger, f. w. Guiana.

mexicana Lodd. Cat., mexicanischer, f. w. Mexico.

mucosa Jacq., schleimiger, f. w. Martinique.

muricata L., weichstacheliger, f. w. Westindien.

obtusiflora Tuss., stumpfblüthiger, f. w. Hispaniola.

paludosa Aubl., Sumpf-F., f. w. Guiana.

palustris L., sumpfliebender, f. w. Jamaica, Südamer.

punctata Aubl., punctirter, f. w. Guiana.

reticulata L., netzförmiger, f. w. Westindien.

senegalensis Dunal, Senegal-F., f. w. Guinea.

hexapetala L., Suppl. et *uncinata* Lam. vid. *Artabotrys*

odoratissima. *grandiflora* Bartr. *pygmaea*

Bartr. *triloba* L. v. *Asimina grandifl.* etc. *Myristica*

G. vid. *Monodora Myristica*. *tripetala* Ait. vid.

Cherimolia.

Anonymos *ciliatus* Walt. *paniculatus* Walt. etc. v. *Liatris pilosa* etc.**Anotis** DC., Anotis, IV. I., Rubiaceae.

ciliolosa G. Don, gefranzte, 4. f. k. Nordamerika.

Antennaria G., Fühlhorn (Katzenpfötchen), XIX. II.,
Compositae-Helichryseae.

- alpina G., Alpen-F., 4. f., lappländische Alpen.
carpathica RB., carpathisches, 4. f. Carpathen, deutsche
Alpen, Schweiz, Piemont.
contorta D. Don, gedrehtes, 4. k. Nepal.
dioica G., gemeines, 4. f. Europa.
hyperborea D. Don, nördliches, 4. f. Schottland.
margaritacea RB., perlartiges, 4. f. Mittel- und Süd-
deutschland, Schweiz, England, Kamtschatka, Nord-
amerika.
plantaginea RB., wegetrittblätteriges, 4. f. Virginien.
Timmua D. Don, Timmua-F., 4. k. Nepal.
triplinervis Sims, D. Don, dreinerviges, 4. k. Nepal.

Anthemis L., Chamille, XIX. II. Compositae-Corym-
biferae.

- aetnensis Schouw., Spgl., Aetna-Ch., 4. f. Sicilien.
alpina L., Alpen-Ch., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
altissima L., hohe, ☉. f. Süd- u. Osteuropa, Persien.
anglica Spgl., englische, ☉. f. England.
arvensis L., Acker-Ch., ☉. f. Europa, Orient, Aegypten.
β) agrestis Wall.
aurea DC., goldfarbige, 4. f. Südeuropa, Orient.
austriaca Jcq., österreichische, ☉. f. Mittel-, Ostdeutsch-
land, Ungarn, Italien, Griechenland.
β) Triumphetti All.

- Barrelieri Tenor., Barrelier's, 4. f. Neapel.
candidissima W., blendendweiße, ☉. f. Caucasus.
canescens Brot., weißgrauliche, ☉. f. Portugal.
Chamomilla W., mutterkrautähnliche, 4. f. b. k. Süd-
frankreich, Neapel.
chia L., griechische, ☉. f. Griechenl., Kleinasien, Calabrien.
erucaefolia Presl., raukenblättrige, 4. f. b. k. Sicilien.
fruticulosa MB., strauchige, 4. f. Caucasus.
hyalina DC., durchsichtige, ☉. f. Asiat. Türkei.
iberica MB., iberische, 4. f. Iberien.
incrassata Lois., verdickte, ☉. f. Frankreich, Oberitalien.
Kitahelii Spgl., Kitaibel's, 4. f. Ungarn.
maritima L., Meerstrands-Ch., 4. f. Frankreich, Ital.,
Griechenland, Kleinasien.

Marschalliana W., Marschall's, 4. f. Caucasus.
β) subglabrescens C. A. Mey. γ) Rudolphiana MB.

Melampodia Delil., ägyptische, ☉. f. Aegypten, Griechenl.
β) campestris.

- mucronulata Bertol., stachelspitzige, 4. f. Italien.
nobilis L., edle, 4. f. England, Südeuropa.
β) flore pleno.

peregrina L., fremde, ☉. f. Unteritalien, Griechenland,
Arab. Aegypten.

β) hirsuta DC.

- petraea Ten., Felsen-Ch., 4. f. Unteritalien.
pontica W., pontische, 4. f. Levante, Gebiet von Odessa.
porrigens Hort. Angl., ausgestreckte, f. 4. f. ?
punctata Vahl, punctirte, 4. f. k. Nordafrika (Atlasgeb.).
retusa Delil., eingedrückte, ☉. f. Aegypten, Neapel.
rigescens W., starre, 4. f. Caucasus, Nordpersien.
ruthenica MB., russische, ☉. f. Taurien, Ukraine, Podolien.
scariosa DC., trockenhäutige, ☉. f. Orient (Bagdad).
secundiramea Bivon., einseitigästige, ☉. f. Sicilien.
β) Urvilleana DC., Malta. γ) indurata Delil., Aegypt.

Anthemis

sphacelata Presl., brandige, 4. f. b. Sicilien.
tinctoria L., färbende, ♂. 4. f. Mittel- und Südeuropa, Kleinasien.

β) *discoidea* W. γ) *monantha* W. δ) *pallida*.
tomentosa L., filzige, 4. f. Calabrien, Levante.

Wiedemanniana Fisch. et Mey, Wiedemann's, ☉. f. Natolien.

apiifolia RB. v. *Pyrethrum Parthenium* β *arabica* L. vid. *Cladanthus* prolif. *artemisiaefolia* W. vid. *Pyrethrum sinense*. *australis* W. vid. *incrassata*. *biaristata* Bivon. v. *Anacycl. clavatus*. *biaristata* DC. v. *Anacycl. tomentosus*. *buphthalmoides* Jacq. vid. *Heliopsis buphthalmoides*. *carpathica* WK. v. *Kitaibelii*. *caucasica* Adams vid. *Pyrethr. caucasica*. *caucasica* Hornem. v. *rigescens*. *coarctata* Sibth. Sm. vid. *tinctoria* γ. *coronopifolia* W. v. *Ormenis mixta*. *corymbosa* Haenk. v. *Achillea atrata*. *Cotula* L. v. *Maruta Cotula*. *fallax* W. v. *Maruta fuscata*. *foetida* Lam. v. *Maruta Cotula*. *fuscata* Brot. v. *Maruta fuscata*. *globosa* Orteg. v. *Chiliophyllum globosum*. *grandiflora* Ramat. v. *Pyrethrum sinense*. *hispanica* Zucc. v. *Ormenis mixta*. *hungarica* Hornem. v. *austriaca*. *incrassata* Lk. v. *Anacyclus clavatus*. *lithuanica* Bess. v. *Maruta Cotula* β. *millefolia* L. v. *Pyrethrum millefoliatum*. *mysorensis* H. Madrit. v. *Guizotia oleifera*. *nicaeensis* W. vid. *incrassata*. *occidentalis* W. v. *Spilanthes Mutisii*. *odorata* Ait. v. *Sphenogyne odorata*. *oppositifolia* Lam. v. *Spilanthes Mutisii*. *ovatifolia* Orteg. vid. *Heliopsis buphthalmoides*. *parthenioides* Bernh. v. *Pyrethrum Parthenium flore pleno*. *pedunculata* Dsf. v. *Anacyclus peduncul.* *peregrina* MB. vid. *candidissima*. *praecox* Lk. v. *Maruta fuscata*. *prolifera* Mch. v. *Cladanth. prolif.* *psorosperma* Ten. v. *Maruta Cotula*. *ptarmicaefolia* Adams v. *Achillea grandiflora*. *pubescens* W. v. *Anacyclus tomentosus*. *Pyrethrum* L. v. *Anacyclus Pyrethrum*. *ramosa* Lk. v. *Maruta Cotula*. *repanda* L. vid. *Lepidophorum repand.* *repens* Walt. v. *Spilanthes repens*. *saxatilis* W. v. *Kitaibelii*. *sinuata* Lallav. vid. *Zaluzania triloba*. *styriaca* Vest. v. *Kitaibelii*. *tomentosa* Gouan vid. *Anacycl. tomentos.* *tomentosa* W. Ten. v. *peregrina*. *trilobata* Orteg. v. *Zaluzania trilob.* *valentina* L. v. *Anacyclus radiat.*

Anthephora Schreb., Blüthenträger, III. II., Gramineae.

elegans Schreb., zierlicher, ☉. ♂. t. Westindien, Südamer.

villosa Spgl., zottiger, ☉. ♂. t. Westindien.

Anthericum L., Zaunlilie. VI. I., Coronariae-Asphodelae.

coeruleum R. et P., blaue, 4. t. Chili.

croceum Mchx., safranfarbige, 4. f. Nordamerika.

divaricatum Jacq., sparrige, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

falcatum Thbg., sichelförmige, 4. t. k. Cap d. g. H.

filiforme Ait., fadenförmige, 4. t. k. Cap d. g. H.

flexifolium L., gebogenblättrige, 4. t. k. Cap d. g. H.

floribundum Ait., reichlichblühende, 4. t. k. Cap d. g. H.

glaucum R. et P., blaugrüne, 4. t. w. Peru.

graminifolium W., grasblättrige, k. t. Cap d. g. H.

hirsutum Thunb., rauhhaarige, 4. t. Cap d. g. H.

japonicum Thunb., japanische, 4. t. Japan, China, Java.

Anthericum

- Liliago, L., gemeine, 4. f. Europa.
 longifolium Jacq., langblättrige, 4. t. Cap d. g. H.
 nepalense Spgl., nepalische, 4. k. Nepal.
 pomeridianum Ker., nachmittägige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.
 ramosum L., ästige, 4. f. Europa.
 revolutum L., zurückgerollte, 4. t. Cap d. g. H.
 spirale L., spiralförmige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.
 squameum L., schuppige, 4. Kn. t. Cap d. g. H.
 sulfureum Kit., schwefelfarbige, 4. Zw. f. Ungarn.
 triflorum Ait., dreiblumige, 4. t. Cap d. g. H.
 β) bipedunculatum Jacq.
 vespertinum Jacq., abendliche, 4. t. Cap d. g. H.
 villosum Labill., zottige, 4. Zw. k. Kleinasien.

elongatum W. v. *filiforme*. *fimbriatum* Thbg. vid.
longifolium. *Lagopus* Thbg. v. *floribundum*. *undulatum* Jacq. v. *graminifolium*. — *exuviatum* Jacq.
filifolium Jacq. et *fragrans* Jacq. v. *Albuca exuiat* etc.
 — *aloides* L. *annuum* L. *asphodeloides* L. *bulbosum* RB. (*australe*) *canaliculatum* Ait. *caudatum* Thbg. (*Cauda felis* L. suppl.). *ciliatum* Thbg.
frutescens L. *hispidum* L. *latifolium* Thbg. *longiscapum* Jacq. (*favosum* Thbg.). *nutans* Thbg.
praemorsum Jacq. *pugioniforme* Jacq. *rostratum* L. *scabrum* Thbg. *semibarbatum* RB. *triquetrum* Thbg. *undulatum* Thbg. v. *Bulbine aloides* etc. — *albucoides* Ait. v. *Ornithogalum albucoides*. *calyculatum* L. v. *Tofieldia calyculata*. *dendroides* Steven vid. *Asphodelus prolifer*. *elatum* Ait. vid. *Chlorophytum elatum*. *esculentum* Spgl. vid. *Scilla esculenta*. *Liliastrum* L. v. *Czackia Liliastrum*. *marginatum* Thbg. vid. *Caesia physodes*. *milleflorum* Redout. v. *Arthropodium paniculatum*. *ossifragum* L. v. *Narthecium ossifragum*. *paniculatum* Andr. v. *Arthropodium panicul.* *pauciflorum* Thbg. vid. *Caesia pusilla*. *pendulum* Hornem. v. *Arthropodium pendulum*. *physodes* Jacq. vid. *Caesia physodes*. *pilosum* Jacq. v. *Ornithogalum hispidum*. *plumosum* ? R. et P. vid. *Trichopetalum stellatum*. *pusillum* Jacq. v. *Caesia pusilla*. *reflexum* Cav. v. *Conanthera Echeandia*. *serotinum* L. v. *Lloydia serotina*. *subtrigynum* Jacq. v. *Helonias erythrosperma*.

Antheresteria Lam. (Anthistiria), Stielgras, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.

- australis* RB., neuholländisches, 4. t. Philippinen, Neuholland, Vandiemensland.
barbata Desf., härtiges, ☉. ♂. t. m. f. Mascaren-Inseln. Cap d. g. H.
ciliata Retz, gefranztes, ☉. w. m. f. Ostindien.

Anthocercis, Strahlenblume, XIV. I., ? Solanaceae.

- albicans* Cun., weifslische, ♀. t. Neuholland.
litorea La Bill., Meerstrand-St., ♀. t. Neuholland.
viscosa RB., schmierige, ♀. t. Neuholland.

Anthocleista Afz., Blütenklaffer, V. I., Contortae-Loganieae.

- macrophylla* G. Don, großblättriger, ♀. w. Sierra Leone.
Anthodendron Rchb. v. *Azalea* spec.

Anthodon R. et P., Blumenzahn, III. I., Evonymaceae-Hippocrateaceae.

Anthodon

ellipticum Mart., elliptischer, ♀. w. Brasilien.

paniculatum Mart., rispenblumiger, ♀. w. Brasilien.

Antholoma La Bill., Haubenblume, XIII. 1., Guttiferae-Marcgraviaceae.

montana La Bill., Berg-H., ♀. t. Neuholland.

Antholyza L., Rachenlilie, III. 1., Irideae.

aethiopica L., aethiopische, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

Lucidor L., glänzende, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

montana Ker, Berg-R., 4. Zw. t. Cap d. g. H.

praealta DC., hohe, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

coccinea Spgl. et *Cunonia* Thbg. v. *Anisanthus Cunonia*.

fulgens Andr. v. *Watsonia iridifolia*. *Meriana*

Curt. v. *Watsonia* Mer. *Merianella* Curt. v. *Watsonia*

aletroides. *plicata* Thbg. v. *Babiana Thunbergii*.

quadrangularis Vahl. v. *Gladiol. quadrang.*

ringens Andr. v. *aethiopia*. *ringens* L. v. *Babiana*

ringens. *spicata* Andr. v. *Watsonia brevifol.* *spicata*

Mill. v. *Gladiol. Milleri*. *tubulosa* Andr. vid.

Watsonia aletroides.

Anthospermum L., Ambrastrauch, IV. 1. (XXII. 1v.)

Rubiaceae.

aethiopicum L., äthiopischer, ♀. k. Cap d. g. H.

Anthoxanthum L., Ruchgras, II. 11. Gramineae.

amarum Brot., bitteres, 4. f. Portugal.

gracile Bivon., schlankes, 4. f. Sicilien.

odoratum L., gemeines, 4. f. Europa.

ovatum Lag., eiförmiges, 4. f. Spanien.

Anthriscus P., Klettenkörbel, V. 11. Umbelliferae.

Cerfolium Hoffm., Garten-K., 4. f. Südeuropa.

fumarioides Spgl., erdrauchähnlicher, 4. f. Croatien, Krain, Istrien.

hispida DC., steifhaariger, 4. f. Frankreich.

nemorosa Spgl. MB., Hain-K., 4. Ungarn, Caucasus, Kamschatka, Deutschland.

sylvestris Hoffm., wilder, 4. f. Europa.

taurica Fisch., taurischer, 4. f. Taurien.

trichosperma Schult., haarsamiger, 4. f. Ungarn, Böhmen.

tuberculata R. et S., kleinhöckeriger, 4. f. Syrien.

β) *alpestris* Wimm. γ) *torquata* Dub.

vulgaris P., gemeiner, 4. f. Europa, Taur., Kleinasien.

Caucalis M. B. v. *vulgaris*. *humilis* Bess. et *proc-*

erus (elatior) Bess. vid. *sylvestris*. *nodosa* P. vid.

Chaerophyllum nodosum. *trichosperma* P. v. *Tori-*

lis trichosperma.

Anthurium Sch. et Endl., Blüthenschwanz, XXI. 1. (IV. 1.), Aroideae.

gracile Lindl., schlankkolbiger, 4. w. Trinid., Demerar.

Anthyllis L., Wollblume, XVII. vi. (XVI. vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

Aspalathi DC., witschenblättrige, ♀. t. C. d. g. Hoffn.

aurea Visian., goldfarbige, 4. f. Dalmatien.

Barba Jovis L., Jupiterbart-W., ♀. k. Süd-, West- und Osteuropa, Kleinasien.

β) *splendens* W.

cornicina L., hornhülsige, 4. f. Spanien.

cytisoides L., geißkleeähnliche, ♀. k. Spanien.

erinacea L., stachelige, ♀. k. Südspanien, Nordafrika.

Gerardi L., Gerard's, 4. f. Provence.

hamosa Desf., hackenhülsige, 4. f. Barbarei.

Anthyllis

Hermanniae L., Herrmann's, $\frac{1}{2}$ k. Creta.

heterophylla L., verschiedenblättrige, $\frac{1}{2}$ k. Portugal, Spanien.

incisa W., eingeschnittene, 4. f. b. k. Griechenland.

linifolia L., schmalblättrige, $\frac{1}{2}$ k. Cap d. g. Hoffn.

lotoides L., schotenkleeähnliche, $\odot$ f. Portugal, Spanien.

montana, Berg-W., 4. f. Oesterreich, Krain, Schweiz, Oberitalien, Südfrankreich, Spanien.

β) *alba*.

onobrychioides Cav., esparsettähnliche, 4. $\frac{1}{2}$ f. b. k. Spanien.

polycephala Desf., vielköpfige, 4. f. b. k. Nordafrika.

tetraphylla L., vierblättrige, $\odot$ f. Italien, Sicilien.

Vulneraria L., gemeine, $\frac{1}{2}$ 4. f. Europa.

β) *alpestris* Rchb. γ) *Dillenii* Schult. (*rubriflora* DC., *rubra* Hoppe). δ) *albiflora*. ϵ) *maritima* Schwegg. ζ) *polyphylla* Kit (*bicolor* Schlchr.).

vulnerarioides Bonj., zottige, $\frac{1}{2}$ f. Mont Cenis.

cretica Lam. vid. *Ebenus cretica*. *cuneata* Hamilt.

vid. *Lespedezia eriocarpa*. *sericea* W. v. *Ebenus*

pinnata. *Tournefortii* Schult. v. *Vulneraria* ϵ .

Webbiana Penny, Webb's, 4. k. Teneriffa.

Antidesma L., *Antidesma*, V. I. (XXII. v.), *Tricoccae-Euphorbiaceae*.

alexiterium L., giftheilendes, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

guineensis G. Don, guineisches, $\frac{1}{2}$ w. Guinea.

paniculatum Roxb., rispiges, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

pubescens Roxb., weichhaariges, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

zeylanicum Lam., zeylanisches, $\frac{1}{2}$ w. Ceylon.

Antirrhinum T., Löwenmaul, XIV. II., *Personatae-Antirrhin.* (*Scrophul.*).

Asarina L., gundermannblättriges, 4. f. b. Italien, Frankreich.

calycinum Vent., Brot., großkelchiges, $\odot$ f. Portugal, Spanien.

glandulosum Lindl., drüsiges, $\odot$ f. Californien.

latifolium Mill., breitblättriges, $\frac{1}{2}$ f. Südeuropa.

majus L., großes (Garten-L.), $\frac{1}{2}$ 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

β) *angustifolium* Urv. γ) *bicolor*. δ) *coccineum* (*sanguineum*). ϵ) *montevidense* Lnk. ζ) *flore pleno*. η) *tortuosum* Bosc, θ) *variegatum* Dens, i) *caryophylloides* Hort.

meonanthum Lk., schmalblumiges, 4. f. Südeuropa.

molle L., weiches, 4. k. Spanien, Portugal.

ochroleucum Hort., weißgelbes, 4. f. ?

Orontium L., Acker-L., $\odot$ f. Europa.

sempervirens Lapeyr., immergrünes, 4. f. b. Pyrenäen.

siculum Ucr., sicilianisches, $\frac{1}{2}$ 4. f. Sicilien,

aerugineum Gouan. v. *Linaria tristis*. *album* Lam.

v. *Linaria chalepensis*. *bicorne* L. v. *Nemesia bi-*

cornis. *bipunctatum* Cav. vid. *Linaria amethystina*.

Broussoneti Poir. vid. *Linar. multicaulis*. *capitella-*

tum Vent. v. *Linar. multicaulis*. *crassifolium* Cav.

v. *Linar. organifolia*. *diffusum* Bernh. vid. *latifo-*

lium. *duriminium* Desf. vid. *Anarrhinum pedatum*.

galiioides Vent. v. *Linaria striata*. *hexandrum* Forst.

v. *Tittmannia ovata*. *lanigerum* Broter. v. *Linaria*

dealbata. *linarioides* L. v. *Linar. hians*. *longicor-*

Antirrhinum

ne Thbg. vid. *Diascia Thunbergiana*. *lusitanicum* Lk. vid. *Linar. transtagana*. *macrocarpon* Ait. vid. *Nemesia chamaedryfolia*. *medium* Hort. vid. *majus* var. *monspessulanum* L. v. *Linaria striata*. *multipunctatum* Broter. vid. *Linaria multicaulis*. *neglectum* Clark v. *Linaria triphylla*. *odorum* MB. v. *Linaria Loeselii*. *Osyris* Cyril. v. *Linar. chalepensis*. *pallidum* Tenor. v. *Lin. pubescens*. *parviflorum* Jacq. v. *Linar. simplex*. *pinifolium* Poir. vid. *Linar. reticulata*. *polygalaefolium* Poir. vid. *Linar. linifolia*. ? *pubescens* Poir. v. *Linaria saxatilis*. *repens* L. v. *Linaria stricta*. *sapphirinum* Broter. v. *Linar. amethystin.* *saxatile* Bonam. v. *Linar. arenaria*. *spurium* Broter. v. *Linar. lanigera*. *Thui-lierii* Merat. v. *Linar. pyrenaic.* *Tournefortii* Poir. v. *Linar. saxatil.* *tricolor* Pourr. vid. *Linar. amethystina*. — *alpinum* L. *amethyst.* Vent. u. übrige v. *Linaria alpina* etc.

Antrophyum Kaulf., Höhlenfarn, XXIV. 1., Pterioideae. *lanceolatum* Kaulf., lanzettblättriger, 4. w. Westindien.

Anychia Mchx., *Anychia*, V. 1., Portulacae-Paronychieae. *dichotoma* Mchx., gabelästige, ☉. ♂. f. Nordamerika.

Aotus Sm., Haarkelch, X. 1., Leguminosae-Papilionac. *gracilis* Ait., schlanker, ♀. t. Neuholland.

incana Ma. C., weißgrauer, ♀. t. Neuholland.

α) *ericoides*. β) *ferruginea*.

virgata DC., ruthenförmiger, ♀. t. Neuholland.

Apargia (Scop.) Less., *Apargie*, XIX. 1., Compositae-Cichoraceae.

Taraxaci W., löwenzahnähnliche, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *longiscapa*.

alpina Jacq. v. *Leontodon squamosus*. *angustifolia* Schlchr. v. *Leont. tenuiflorum*. *arenaria* Mor. v. *Leontod. Berinii*. *aspera* W.K. v. *Leont. asp. aurantiaca* W. et K. v. *Leontod. croceum* β. *aurea* Hoppe v. *Crepis aurea*. *autumnalis* Hoffm. W. v. *Oporinia autumnalis*. *bulbosa* Balb. vid. *Thrincia tuberosa*. *caucasia* MB. v. *Leont. cauc. cichoracea* Cyril. vid. *Millina leontodontoides*. *coronopifolia* W. v. *Leont. coronopifoli.* *crispa* Steud. vid. *Leont. crisp.* *crisp. macrorhiza* Tenor. vid. *Leont. biscutellaefol.* *crocea* Haenk. vid. *Leontod. croc. danubialis* Scop. vid. *Leont. hostile*. *dubia* Hoppe v. *Leontod. dubium*. *fasciculata* Biv. vid. *Millina leontodontoid.* *guestfalica* Bönningh. v. *Leont asperum*. *hastilis* Host, W., (*heterophylla* Mch.) v. *Leontod. hastil.* *hirta* Scop. vid. *Thrincia hirta*. *hispanica* W. v. *Asterothrix hispanica*. *hispida* W. v. *Leont. hisp.* *hyoseroides* Sbr. v. *Millina hyoseroid.* *incana* Scop. v. *Leont. incan.* *lyrata* Ten. vid. *Thrincia tuberosa*. *pratensis* Lk. v. *Oporinia autumnal.* β. *saxatilis* Tenor. v. *Leontod. saxatil.* *strigosa* MB. vid. *Asterothrix asperima*. *tenuiflora* Gaud. v. *Leontod. tenuiflor.* *tergestina* Hopp. v. *Leont. saxatil.* *tuberosa* W. v. *Thrincia tuberosa*. *Villarsii* Loisel. v. *Leont. Villars.* *verna* Salzm. v. *Kalbfufsia Salzmanni*.

- Apeiba** Aubl. (guianischer Name), XIII. I., Tiliaceae.
 aspera Aubl., rauhe, ♀. w. Guiana, Cayenne.
 glabra Aubl., kahle, ♀. w. Guinea.
 Petoumo Aubl., Petoumo, ♀. w. Guiana.
 Tibourbou Aubl., Tibourbou, ♀. w. Westind., Südamer.
- Apera** Adans., Windhalm, III. II., Gramineae.
 interrupta P. Beauv., unterbrochener, ☉. f. Ost- und Südeuropa.
 Spica venti P. Beauv., gemeiner, ☉. f. Europa.
- Aphananthe** Lk., Aphananthe, VIII. II., Aizoideae-Atripliceae.
 celosioides, hahnekammähnliche, ♀. w. Brasilien.
Aphanis arvensis L., v. *Alchemilla Aphanes*.
- Aphanochilus** Benth., Kleinlippe, XIV. I., Labiatae.
 blandus Benth., liebliche, 4. k. Nepal.
 incisus Benth., eingeschnittene, 4. k. Nepal.
- Aphelandra** R.B., Aphelandra, XIV. II., Acanthaceae.
 cristata R.B., kammige, ♀. w. Westindien.
 β) nitida N. Esenb.
 marginata N. E., berandete, ♀. w. Brasilien.
- Aphelexis fasciculata** D. Don. *filiformis* D. Don. *humilis* D. Don. *sesamoides* D. Don vid. *Helipterum fascicul.* etc. *Aphel. ericoides* Swt. vid. *Helichrysum ericoides*.
- Aphyllantes** T., Joncinelle (Nelkenlilie), VI. I., Juncaceae-Xyrideae.
 monspeliensis L., französische, 4. f. b. k. Südfrankreich,
- Apicra** W. v. Aloë.
- Apios** Boerh., Erdnufs, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
 tuberosa Pursh., knollige, 4. Sch. f. Nordamerika.
 chinensis Spgl. *frutescens* Pursh. v. *Wistaria chin.* etc.
- Apium** T. Selleri, V. II., Umbelliferae.
 fractophyllum Hoffm., gebrochenblättriger, ♂. f. ?
 graveolens L., gemeiner, ♂. f. Europa.
 β) dulce Mill. γ) rapaceum Mill. δ) lusitanicum Mill.
 prostratum La Bill., gestreckter, 4. k. Van Diem. Land.
 ternatum Pall., dreizähliger, 4. f. Ostsibirien.
Petroselinum L. v. *Petroselinum sativum*.
- Aplectrum** Swt., Winterstendel, XX. I. Orchideae.
 hyemale Swt., nordamerikanischer, 4. f. Nordamerika.
- Aplopappus** Cass., Borstenfederchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
 ciliatus DC., gefranztes, ♂. f. Nordamerika.
 spinulosus DC., feinstacheliges, 4. f. Nordamerika.
- Aplophyllum** Ad. Juss. v. *Haplophyllum*.
- Apluda** L., Hüllgras, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.
 aristata L., granniges, 4. w. Ostindien, Südafrika.
Gryllus P. B. v. *Pollinia Gryllus*.
- Apocynum** T., Hundswolle, V. I., Contortae-Apocyneae.
 androsaemifolium L., fliegenfangende, 4. f. Nordamer.
 cannabinum L., grünblumige, 4. f. Nordamerika.
 hypericifolium L., johanniskrautblättrige, 4. f. Nordamerika, Sibirien.
 pubescens R.B., weichhaarige, 4. f. Nordamerika.
 venetum L., venetianische, 4. f. Italien, Dalmatien, Thracien, Caucasus.
frutescens L. vid. *Ichnocarpus frutesc.* *hastatum* Thbg. v. *Eustegia hastata*.

Aponogeton Thbg., Wasserährchen, VI. III. (XI. IV.),
Aroideae-Saurureae.

angustifolius Ait., schmalblättriges, 4. Wa. t. Cap d.
gut. Hoffn.

crispus Thbg., krauses, 4. Wa. w. Ceylon.

distachys Ait., zweispaltiges, 4. Wa. Cap d. g. Hoffn.

linearis Vahl, linienblättriges, 4. Wa. w. Ostindien.

monostachys L., Suppl., einfaches, 4. Wa. w. Ostin-
dien, Südchina.

Aporum Blume, *Aporum*, XX. I., Orchideae.

anceps Lindl., zweischneidiges, 4. w. Bengalen.

Aquartia Jacq. (B. Aquart., Jacquin's Reisegefährte in
Amerika), IV. I. Solanaceae.

aculeata Jacq., stachelige, 5. w. Westindien.

microphylla Lam., kleinblättrige, 5. w. Westindien.
tomentosa Lam. v. *aculeata*.

Aquilaria Lam., Adlerholz, X. I., ? Thymelaeaceae-
Aquilarinae.

malaccensis Lam., malackisches, 5. w. Malacka.

ovata Cav. v. *malaccensis*.

Aquilegia T., Akelei, XIII. v., Ranunculaceae.

alpina L., Alpen-A., 4. f. Schweiz.

β) *grandiflora* Pall., Sibirien.

anemonoides W., anemonenähnliche, 4. f. Altai.

arctica Hort., nördlichste, 4. f. ? Sibirien.

atrata Koch, schwarzviolette, 4. f. Baiern, Tyrol, Salz.

atropurpurea W., dunkelrothe, 4. f. Sibirien.

β) *Fischeriana* DC.

bicolor Ehrh., zweifarbig, 4. f. Sibirien.

canadensis L., kanadische, 4. f. Canada, Virginien,
Dahurien.

β) *elata* Ledeb. γ) *lutea*.

formosa Fisch., wohlgestaltete, 4. f. Camtschatka.

Gebleri Fisch., Gebler's, 4. f. Sibirien.

glandulosa Fisch., drusige, 4. f. Sibirien.

α) *concolor*. β) *discolor*.

leptoceras Fisch. et Mey., leichtspornige, 4. f. Dahuria.

nigricans Baumg., schwärzliche, 4. f. Sibirien.

parviflora Ledeb., kleinblumige, 4. f. Sibirien.

praecox P., frühe, 4. f. ? Sibirien.

pyrenaica DC., pyrenäische, 4. f. Pyrenäen, Apenninen,
Tyrol.

sibirica Lam., sibirische, 4. f. Sibirien.

Sternbergii Rchb., Sternberg's, 4. f. Kärnthen, Krain.

viridiflora Pall., grünblumige, 4. f. Sibirien.

viscosa Gouan., schmierige, 4. f. Südfrankreich.

vulgaris L., gemeine, 4. f. Europa.

β) *corniculata*. γ) *degener*. δ) *inversa*. ε) *platysepala* Rchb. ζ) *stellata*. η) *elegans* A.P. etc.

Hybrid., wozu schon einige der obigen gehören:

Garnieriana Swt., *hybrida* Sims, *marginata* Hort.

alpina Auctor vid. *pyrenaica* et *Sternbergii*. *davu-*

rica Patr. v. *viridiflora*. *montana* Stbg. v. *alpina*.

vulgaris dahurica W. vid. *sibirica*. *vulg. speciosa*

Ait. v. *bicolor*.

Aquilicia sambucina L. v. *Leea sambucina*.

Arabis L., Gänsekrout, XV. III., Cruciferae.

albida Steven, weißliches, 4. f. Caucasus, Persien.

β) *longiflora* DC. γ) *variegata* Hortul.

Allionii DC., Allione's, 4. f. Piemont.

Arabis

alpina L., Alpen-G., 4. f. Europäische Alpen, Island, Grönland, Labrador, Nordafrika.

β) *Clusiana*. γ) *nana*. δ) *crispata* W.

ambigua DC., zweifelhaftes, ♂. f. Kamtschatka.

arenosa Scop., sandiges, ☉. ♂. f. Europa.

auriculata Lam., geöhrt, ☉. f. Mittel- u. Südeuropa.

β) *puberula* Koch,

bellidifolia Jacq., tausendschönblättriges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

brassicaeformis Wallr., kohlähnliches, 4. f. Mitteldeutschland, Schweiz, Frankreich, Spanien, Siebenbürgen.

canadensis L., canadisches, 4. f. Nordamerika.

cebennensis DC., Cevennen-G., ♂. f. Südfrankreich.

ciliata RB, gefranztes, ♂. f. Mittel- u. südeuropäische Voralpen und Alpen.

α) *glabrata* Koch, β) *hirsuta* Koch,

coerulea Hænke, blaues, 4. f. Deutsche und Schweizer Alpen, Siebenbürgen.

collina Tenor. Hügel-G., 4. f. Neapel.

dasycarpa Andr., haarfrüchtiges, ☉. f. Podolien, Siebenbürgen.

flexuosa Tenor., gebogenes, ♂. f. Neapel.

Gerardi Bess., Gerard's, ♂. f. Galizien, Schlesien, Rheingegend.

Halleri L., Haller's, 4. f. Mittel- u. Süddeutschland, Italien, Ungarn, Siebenbürgen.

β) *stolonifera* Hornem, DC. γ) *ovirensis* Wulf.

δ) *diversifolia* Koch. ε) *tenella* Host.

hirsuta Scop., rauhhaariges, ♂. 4. Europa, Nordamer.

β) *curtisiliqua* Fr. γ) *glaberrima* Wahlenb. δ) *glastifolia* Rchb.

laevigata DC., glattes, 4. f. Nordamerika.

lasioloba Lk., haarlappiges, ♂. k. t. Mexico.

lilacina Schr., lilablumiges, ♂. f. ?

longisiliqua Presl, langschotiges, ♂. f. Sicilien.

β) *purpurascens* Presl.

lucida L., starkglänzendes, 4. f. Ungarn.

β) *variegata*.

lyrata L., leierförmiges, ☉. f. Nordamerika.

mollis Steven, weichblättriges, 4. f. Caucasus.

muralis Bertol., Mauer-G. 4. f. Schweiz, Oberitalien.

oxyota DC., spitzöhriges, ☉. w. f. m. Ostindien.

pendula L., herabhängendes, ☉. f. Sibirien.

β) *Patriniana* DC.

petraea Lam., Felsen-G., ♂. 4. f. Mittel- und Ostdeutschland, England, Dänemark, Schweden.

β) *hastulata*. γ) *hirta* (*hispida*).

procurrens W. Kit., auslaufendes, 4. f. Krain, Bannat, Servien.

β) *variegata*.

pubescens Poir., weichhaariges, ♂. f. b. Barbarei.

pumila Jacq., kleines, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *laxa* Koch.

retrofracta Grah., zurückgeknicktes, 4. f. Nordamerika.

rosea DC., rosafarbenes, ♂. f. Calabrien.

saxatilis All., Gestein-G., ♂. f. Südl. Schweiz, Oberitalien, Südfrankreich.

serpyllifolia Vill., quendelblättriges, ♂. f. Süd. Schweiz. Südfrankreich.

Arabis

spathulata DC., spatheblättriges, ♂. f. b. k. Monte Video, bonarische Inseln.

stellulata, Bertol., sternhaariges, 4. f. Italien.

stenopetala DC., schmalblüthiges, ☉. f. ?

stricta Huds., steifes, 4. f. England, südl. Schweiz, Frankreich, Italien, Siebenbürgen, Nordamerika.

toxophylla M.B., bogenblättriges, ♂. f. Wolgaufer.

Turrita L., thurmkrautartiges, ♂. f. Süd- und Osteuropa, England.

β) *umbrosa* Steven.

undulata Lk., wellenblättriges, 4. f. Südeuropa.

verna R.B., Frühlings-G., ☉. f. Südeuropa, Atlas.

vochinensis Spgl., Wocheiner, 4. f. Krain, Oberkärnthen.

aspera All. v. *auriculata*. *bursifolia* Lam. vid. *Sisymbrium bursifol.* *caucasica* W. v. *albida*. *ciliaris* W.E. v. *pumila* β. *contracta* Spen. v. *hirsuta*. *Crantziana* Ehrh. v. *petraea* γ. *grandiflora* L. vid. *Neuroloma arabidiflor.* *grandiflora* Pall. vid. *Andreoskia pectinata*. *hirsuta sessilifolia* et *incana* Gaud. v. *ciliata* β. *hirta* Lam. v. *stricta*. *hispida* L. fil. v. *petraea* γ. *hispida* Ait. v. *stricta*. *incana* Roth. v. *auriculata*. *incana* W.E. v. *muralis*. *intermedia* Hoppe v. *pumila* β. *longisiliquosa* Wallr. v. *hirsuta* δ. *nemorensis* Rchb. vid. *hirsuta* δ. *nivalis* Spgl. v. *Macropodium nival.* *nova* Vill. vid. *saxatilis*. *nutans* Mch. vid. *pumila*. *patula* Wallr. v. *auriculata*. *perfoliata* Lam. v. *Turritis glabra*. *pinnatifida* Lam. vid. *Sisymb.* *pinnatifid.* *praeco* W. vid. *proccurrens*. *pumila* Poll. vid. *stellulata*. *recta* Baumg. v. *dasycarpa*. *recta* Vill. vid. *auriculata*. *sagittata* DC. v. *Gerardi* et *hirsuta*. *scabra* Lam. v. *Sisymb.* sup. *tuberosa* P. v. *Cardamine rhomboidea*. *umbrosa* Crantz v. *Turrita*.

Arachis L., Erdnuß, XVII. VI. (IV.), Leguminosae-Caesalpinieae.

hypogaea L., jährige, ☉. w. m. Südamerika, Asien, Afrika.

aprica Walt. v. *Stylosanthes elatior*. *fruticosa* Retz v. *Stylosanthes mucronata*.

Aralia L., Aralie, Beerangelika, V. v., Araliaceae.

aculeata G. Don, stachelige, ♀. w. t. Nepal.

arborea L., baumartige, ♀. w. Jamaica, Portorico.

capitata Jacq., kopfblumige, ♀. w. Westindien.

cochleata Lam., löffelblättrige, ♀. w. Molucken.

digitata Roxb., fingerförmige, ♀. w. Ostindien.

ferruginea Humb. Bonpl., rostfarbige, ♀. w. Quito.

fragrans G. Don, wohlriechende, ♀. w. t. Nepal.

hispida Mchx., steifhaarige, ♀. f. b. Nordamerika.

japonica Thbg., japanische, ♀. 1. Japan.

macrophylla Cun., großblättrige, ♀. t. Insel Norfolk.

micans W., schimmernde, ♀. w. Trinidad.

Mühlenbergiana R. et S., Mühlenberg's, ♀. 4. f. b. Nordamerika.

nudicaulis L., nacktstengelige, 4. f. Nordamerika.

pentaphylla Thbg., fünfblättrige, ♀. t. k. Japan, China.

pubescens DC., weichhaarige, ♀. w. Neuspanien.

racemosa L., traubige, 4. f. Nordamerika.

sambucifolia Cun., fliederblättrige, ♀. t. Neuholland.

Aralia

spinosa L., dornige, ♂. ♀. f. b. Nordamerika.
umbraculifera Roxb., schirmblättrige, ♂. w. Ostindien.
Sciodaphyllum Sw. v. *Sciodaphyllum* Brownii.

Araucaria Juss. (chilesischer Name), Schmucktanne, XXII. XIII., Coniferae.

brasiliensis Rich., brasilianische, ♂. t. Brasilien.
Cunninghamii RB., Cunningham's, ♂. t. Neuholland.
excelsa RB., hohe (Norfolktanne), ♂. t. Norfolkinsel, Neu-Caledon.

imbricata R. et P., dachziegelförmige, ♂. t. Chili.

Arbutus T., Erdbeerbaum. X. I. Ericaceae.

Andrachne L., morgenländischer, ♂. k. Levante.
canariensis Lam., canarischer, ♂. t. Canarische Inseln.
densiflora Kunth, dichtblumiger, ♂. t. Mexico.
ferruginea L. Suppl., rostfarbener, ♂. w. Neu-Granada.
hybrida Ker., Bastard-E., ♂. k. ?

β) *Milleri* Swt.

laurifolia L. Suppl., lorbeerblättriger, ♂. k. Nordamerika, Mexico.

longifolia Loisel. (hybrid. ex *A. Andrachne* et *canariensis*), langblättriger, ♂. k. t. ?

Menziesii Pursh, Menzies, ♂. k. f. b. Westl. Nordamer., Neu-Californien, Mexico.

β) *elliptica*. γ) *oblongifolia*.

nepalensis H. Engl., nepalischer, ♂. t. Nepal.

speciosa H. Engl., prächtiger, ♂. t. ? Mexico.

Unedo L., gemeiner, ♂. k. f. b. Südeuropa, Ireland.

β) *crispa*. γ) *integrifolia*. δ) *plena*. ε) *rubra*.

ζ) *salicifolia*. η) *schizopetala*.

alpina L. v. *Arctostaphylos* alp. *Andrachne serratifolia* Hort. et *andrachnoides* Lk. v. *hybrida*. *butxifolia* Stockh. v. *Arctostaphyl.* *uva ursi*. *callicarpus* Brouss. vid. *canariensis*. *empetrifolia* Lk. vid.

Pernettya empetrifolia, *filiformis* Lam. vid. *Phalerocarpus hispidulus*. *laurifolia* Hamilt. vid. *Gaultheria fragrantissima*. *microphylla* Forst. vid. *Pernettya microphylla*. *mucronata* Forst. v. *Pernettya mucronata*. *phyllireaefolia* P. v. *Pernettya phyllireaefol.* *pilosa* Grah. vid. *Arctostaph.* *pumila* L. fil. v. *Pernettya empetrifol.* *pungens* Hook vid.

Arctostaphyl. *Hookeri*. *scrpyllifolia* Lam. v. *Pernet.* *microphyll.* *thymifolia* Ait. vid. *Phalerocarp.* *hispid.* *tomentosa* Pursh v. *Arctostaphyl.* *tomentos.*

Uva ursi L. v. *Arctostaphyl.* *uva ursi*. *xalapensis* Andr. v. *Arctostaphyl.* *Oaxacana*.

Archangelica Hoffm., Engelwurz, V. II., Umbelliferae.

atropurpurea Hoffm., dunkelpurpurfarbige, ♂. 4. f. Canada.

decurrens Ledeb., herablaufende, ♂. 4. f. ? Sibirien.

officinalis Hoffm., officinelle, ♂. f. Nordeuropa, Süd-deutschland.

Arctium Dalech. Lam. Bärendistel, XIX. I. Compositae-Cynarocephalae.

lanuginosum Lam., wollige, 4. f. b. Südfrankr., Piemont.

Bardana L. v. *Lappa tomentosa*. *Carduelis* L. v. *Carduus arctioides*. *Lappa* α) et β) L. v. *Lappa* maj. et min. et *tomentosa*. *majus* et *minus* Schk. v. *Lappa* maj. et min. *montanum* Schweig. v. *Lappa* minor. *Personata* L. v. *Carduus Personata*. *tomentosum* P. v. *Lappa toment.*

Arctopus L., Bärenfuß. V. II. (xxiii. II.) Umbelliferae.
echinatus L., igelstacheliger, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

Arctostaphylos Adans, Bärentraube, X. I. Ericaceae.
alpina Spgl., Alpen-B., f. f. Nordeuropa, Asien und Amerika, Deutschl. und Schweiz, Alpen.

cordifolia Lindl., herzblättrige, f. f. b. Nordamerika.

glauca Lindl., blaugrüne, f. f. b. k. Californien.

Hookeri G. Don, Hooker's, f. f. b. k. Californien.

Oaxacana DC., mexikanische, f. k. Mexico, Oaxacana.

pilosa, * haarige, f. k. Mexico.

tomentosa Dougl. Lindl., filzige, f. k. f. b. Westliches Nordamerika, Californ., Mexico.

β) *nuda* H. et A.

Uva ursi Spgl. (*officinalis* Wim. et Grab.), gemeine, f. f. Nordeuropa und Nordamerika, deutsche u. Schweiz, Alpen.

Arctotheca Wendl., Bärenbüchse, XIX. III. Compositae-Corymbif. (Cynareae).

grandiflora Schrad., großblumige, 4. k. Cap d. g. H.

repens Wendl., kriechende, 4. k. Cap d. g. H.

hirta Schrad. v. ? *grandiflora*.

Arctotis L., Bärenohr, XIX. IV., Compositae-Corymbiferae (Cynareae).

acaulis L., stengelloser, 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *tricolor* Jacq. γ) *undulata* Jacq. δ) *speciosa* Jacq.

adpressa DC., angedrücktes, f. k. t. Cap d. g. H.

aenea Jacq., metallfarbiges, f. k. t. Cap d. g. H.

angustifolia L., schmalblättriges, f. k. t. Cap d. g. H.

argentea Thbg., silberfarbiges, f. k. t. Cap d. g. H.

aspera L., rauhes, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

α) *arborescens* Jacq. β) *aureola* Ker. γ) *cichoracea* Berg. δ) *cuprea* Jacq. ε) *scabra* Berg. *maculata* Jacq.).

auriculata Jacq., geöhrt, k. t. Cap d. g. H.

β) *melanocyclus* Willd. Enum.

bellidifolia Berg., tausendschönblättriges, f. k. t. C. d. g. H.

α) *integrifolia*. β) *incisa*.

candida Thbg., reinweißes, 4. k. t. Cap d. g. H.

Cineraria Jacq., aschenkrautähnliches, f. k. t. C. d. g. H.

decurrens Jacq., herablaufendes, f. 4. k. t. C. d. g. H.

elatior Jacq., erhabenes, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

elongata Thbg., verlängertes, f. k. t. Cap d. g. H.

fastuosa Jacq., prächtiges, ♂. k. t. Cap d. g. H.

β) *spinulosa* Jacq.

flaccida Jacq., schlaffes, ☉. f. m. Cap d. g. H.

laevis Thbg., glattes, f. k. t. Cap d. g. H.

leucanthemoides Jacq., weißblumenähnliches, ☉. f. m.

Cap d. g. Hoffn.

petiolata Thbg., langstieliges, 4. k. t. C. d. g. H.

reptans Jacq., kriechendes, 4. k. t. Cap d. g. H.

revoluta Jacq., zurückgerolltes, 4. k. t. Cap d. g. H.

β) *fruticosa*.

stoechadifolia Berg., stöchasblättriges, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

α) *grandis* Less. β) *decumbens* Less. (Thbg.).

γ) *Bergii* Less. δ) *rosea* Less.

virgata Jacq., ruthenförmiges, ☉. f. m. Cap d. g. H.

β) *obtusifolia*.

Arctotis

abrotanifolia Steud. vid. *Sphenogyne abrotanifol.*
acaulis Jcq. v. *adpressa.* *angustifolia* Jcq. v. *Venidium angustifolium.* *anthemoides* L. v. *Sphenog. anthem.* *bicolor* W. vid. *aspera* γ. *Calendula* L. (*calendulacea* Jacq.) v. *Cryptostemma calend.* *cernua* Thbg. vid. *Sphenogyn. anthem. L.* *crithmoides* Berg. v. *Sphen. crithmifol.* *decumbens* Jacq. vid. *angustifolia.* *dentata* L. vid. *Sphenog. dentata.* *denudata* Thbg. v. *laevis.* *elegans* Thbg. v. *Chrysanthemum indicum.* *foeniculacea* Jacq. vid. *Sphenog. foenicul.* *formosa* Thbg. v. *aspera* γ. *glabrata* Jacq. v. *laevis.* *glaucoophylla* Jacq. v. *candida.* *glutinosa* Sims vid. *Dimorphotheca cuneata.* *grandiflora* Ait. v. *elongata.* *grandiflora* Jacq. v. *laevis.* *grandis* Thbg. v. *stoechadifol. α.* *hispidella* Juss. v. *Hispidella hispanica.* *humilis* Salisb. v. *acaulis.* *hypochondriaca* L. v. *Cryptostema hypochond.* *incisa* Thbg. v. *auriculat.* *lyrata* W. v. *aspera* γ. *maculata* Jcq. vid. *Chrysanthemum nodosum.* *odorata* W. v. *Sphenogyne odorata.* *paniculata* Jcq. v. *bellidifol.* *paradoxa* Ait. v. *Sphenogyne anthemoides.* *paradoxa* L. vid. *Ursinia paradoxa.* *pectinata* Thbg. vid. *Sphenogyne dentata.* *pilifera* Thbg. v. *Sphenog. pilif.* *pinnata* Thbg. v. *Sphenog. anthemoid.* *prostrata* Salisb. v. *Arctotheca repens.* *repens* Jacq. v. *Arctoth. rep.* *rosea* Jcq. v. *stoechadifolia β.* *scapigera* Thbg. v. *acaulis.* *scariosa* Ait. v. *Sphenog. scarios.* *spinulosa* Jacq. v. *fastuosa β.* *squarrosa* Jacq. vid. *laevis.* *staticefolia* Poir. vid. *Gazania subulata.* *superba* L. et *tristis* L. vid. *Cryptost. hypochondr.* *tenuifolia* Poir. vid. *Dimorphotheca graminifol. — undulata* Thbg. v. *aspera β.* *unicolor* Hort. vid. ?

Ardisia Sw., Spitzblume, V. r., Sapotaceae-Myrsineae (Ardisiaceae).

acuminata W., spitzblättrige, ♀. w. Guiana.
canaliculata Lodd., rinnenförmige, ♀. t. ?
capensis Zeyh., capische, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
colorata Link., farbige, ♀. w. Ostindien.
complanata Wall., verflachte, ♀. w. Malacka.
coriacea Sw., lederblättrige, ♀. w. Antillen.
crenulata Vent., gekerbte, ♀. w. Antillen.
elegans Andr., zierliche, ♀. w. Ostindien.
excelsa Ait., hohe, ♀. t. Bahamische Inseln, Madeira.
humilis Vahl, niedrige, ♀. w. Ostindien.
hymenandra Wall., hautbeutelige, ♀. w. Silhet.
lanceolata Roxb., lanzettblättrige, ♀. w. Ostindien.
lateriflora Sw., seitenblumige, ♀. w. Westindien.
latifolia R. et S., breitblättrige, ♀. w. Antillen.
lentiginosa Ker, scharlachfrüchtige, ♀. w. China.
litoralis Bot. Reg., Meerstrands-Sp., ♀. w. Ostindien.
odontophylla Wall., zahnblättrige, ♀. w. Bengalen.
paniculata Roxb., rispenblumige, ♀. w. Ostindien.
pubescens Lodd., weichhaarige, ♀. w. ?
punctata Lindl., punktirte, ♀. w. China, Nepal.
pyramidalis Cav., pyramidenförmige, ♀. w. Antill., Südamerika.
serrulata Sw., feingesägte, ♀. w. Westindien.
solanacea Roxb., nachtschattenähnliche, ♀. w. Ostindien.

Ardisia

thyrsiflora D. Don, straufsblumige, $\frac{1}{2}$ t. Nepal.

tinifolia Sw., lorbeerblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Jamaika.

crenata Bot. Mag. et Hortul. vid. *lentiginosa*.

macrocarpa Wall. v. *punctata*. *pyramidalis* Roth vid.

paniculata. *umbellata* Roth v. *litoralis*.

Arduina L. (P. Arduino Botan. zu Padua), V. 1., Con-
tortae-Apocynaeae.

bispinosa L., zweidornige, $\frac{1}{2}$ t. w. Cap d. g. Hoffn.

Areca L., Arecapalme, XXI. x. (VI. III.), Palmae.

Catechu L., Catechu, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

crinita Bory, bemähnte, $\frac{1}{2}$ w. Mascarenas-Inseln.

exilis Lodd., dünne, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.

humilis W., niedrige, $\frac{1}{2}$ w. Amboina.

lutescens Bory, gelbliche, $\frac{1}{2}$ w. Mascarenas-Inseln.

Manicot Lodd., Manicot, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.

montana Lodd., Berg-A., $\frac{1}{2}$ w., Südamerika.

rubra Bory, rothe, $\frac{1}{2}$ w. Mascarenas-Inseln.

triandra Roxb., dreimännige, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

oleracea Jacq. v. *Euterpe caribaea*.

Aremonia Neck., Steinwurzel, VIII. II., Rosaceae.

agrionoides Neck., dreiblättrige, 4. f. Croatien, Krain,
Italien.

Arenaria L., Sandkraut (Sandmiere), X. III., Caryo-
phyllaceae-Alsineae.

balearica L., balearisches, 4. k. f. b. Balearische In-
seln, Corsica.

biflora L., zweiblumiges, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

buxifolia Poir., buchsbaumblättriges, ①. f. Canada.

calycantha Ledeb., kelchblüthiges, ①. f. Oestl. Sibirien.

calycina Poir., großkelchiges, ①. ♂. f. Barbarei.

ciliata L., gefranztes, 4. f. Mitteleuropäische Alpen,
Ireland, Island.

β) *multicaulis* L. (*frigida* Koch).

cinerea DC., aschfarbiges, ①. f. Südfrankreich, Sicilien.

coimbricensis Brot., coimbrisches, ①. f. Portugal.

densa Kit., dichtes, 4. f. Ungarn.

filifolia Forsk., fadenblättriges, 4. k. Arabien.

grandiflora All., großblumiges, 4. f. Mähren, Krain,
Schweiz und ital. Alpen.

Helmii Fisch., Helms-S., 4. f. Ural.

juniperina L., wachholderähnliches, 4. f. Armenien.

laricina Schlecht., lerchenblättriges, 4. f. Sibirien.

marginata M.B. (secund. Loud.), berandete, 4. f. Caucas.

montana L., Berg-S., 4. f. Westfrankreich, Spanien,
Portugal.

nemorosa Kunth, Hain-S., 4. k. Quito, Neugranada.

pendula Kit., herabhängendes, 4. f. Ungarn.

procumbens Vahl, niederliegendes, 4. k. Aegypten, Bar-
barei, Südspanien, Sicilien.

pubescens Urv., weichhaariges, 4. f. Griechenland.

rotundifolia M.B., rundblättriges, 4. f. Caucasus.

scabra Poir., scharfes, ? 4. f. Südeuropa.

serpyllifolia L., quendelblättriges, ①. f. Europa, Nord-
amerika.

β) *alpina*. γ) *glutinosa*.

Arenaria

- stricta* Mchx., steifes, 4. f. Nordamerika.
tetraquetra L., vierkantiges, 4. f. Pyrenäen.
triflora L., dreiblumiges, 4. f. Italien, franz. Alpen.
trinerva L., dreinerviges, ③. f. Europa.
verticillata W., wirtelblättriges, 7. 4. k. Armenien.
amabilis Bory vid. *tetraquetra*. *aretioides* Port.
v. *Alsine aret.* *austriaca* All. vid. *Alsine Villarsii*.
austriaca Jacq. v. *Alsine austr.* *Bartolotti* Tin. v.
cinerea. *bavarica* L. v. *Möhringia* Ponae. *brevi-*
caulis Stbg. v. *Alsine lanceolata*. *caespitosa* Ehrh.
v. *Alsine caespitosa*. *canadensis* P. vid. *Alsine can-*
ad. *capillacea* All. v. ? *Alsine caespitosa* β. *ca-*
pillaris Poir. v. *Eremogone longifolia*. *cherlerifo-*
lia G. Don v. *Alsine rubella*. *cherlerioides* Vill. v.
Alsine lanceolata β. *clandestina* Portensch. v. *Al-*
sine graminifol. *cucubaloides* Sm. vid. *Eremogone*
cuc. *dahurica* Fisch. v. *Eremogone juncea*. *dian-*
thoides Sm. vid. *Eremogone dianthoid.* *fasciculata*
Gouan. v. *Alsine fascicul.* *fasciculata* Jacq. v. *Al-*
sine Jacquini. *fastigiata* Sm. vid. *Alsine rostrata*.
filifolia MB. vid. *Eremogone graminifol.* *formosa*
Fisch. v. *Eremogone formosa*. *frutescens* Kit. vid.
Alsine setacea. *Gerardi* W. v. *Alsine caespit.* β.
glandulosa Jacq. vid. *Alsin. gland.* *glutinosa* Jacq.
v. *Alsin. glut.* *graminifolia* Schrad. W. vid. *Ere-*
mogone gram. *herniariaefolia* Desf. v. *procumbens*.
heteromalla P. v. *Alsine setacea.* *hirsuta* M. B. v. *Alsine*
hirsuta. *holostea* M. B. v. *Eremogone holost.* *im-*
bricata M. B. v. *Alsine imbr.* *juncea* M. B. v. *Ere-*
mogone junc. *juniperina* Vill. v. *grandiflora.* *lan-*
ceolata All. v. *Alsine lonceolata.* *lapponica* Spgl.
v. *Alsine stricta.* *laricifolia* L. v. *Alsine laricifol.*
liniflora Jacq. v. *Alsine caespitosa* β. *liniflora* L. fil. v.
Alsine laricifolia β. *longifolia* M. B. (*sibirica* P.) v. *Ere-*
mogone longifol. *macrocarpa* Hornem. vid. *Alsine*
laricifolia. *macrocarpa* Pursh vid. *Alsine macroc.*
marginata DC. v. *Alinse marina* β. *marina* Roth,
Sm. v. *Alsin. mar.* *media* L. vid. *Alsin. marina* β.
mediterranea Ledeb. vid. *mucronata.* *molluginea*
Sering. v. *Alsin. moll.* *mucronata* DC. vid. *Alsine*
rostrata. *mucronata* L. vid. *Alsine m.* *multicaulis*
L., Wulf. v. *ciliata* β. *nardifolia* Ledeb. v. *Ere-*
mogone nard. *otitoides* Adams v. *Eremogone otit.*
peploides L. v. *Alsin. peploid.* ? *pinifolia* M. B. v.
Alsin. pin. *polygonoides* Wulf. v. *Möhringia polyg.*
Ponae Rchb, v. *Möhringia* Ponae. *propingua* R. B.
v. *Alsine caespit.* *prostrata* Sering. v. *Alsine pro-*
strata. *pungens* Steph. v. *Eremogon. pung.* *pur-*
purea P. v. *Alsine purp.* *radicans* Spgl. v. *Alsine*
radic. *ramosissima* W. vid. *Alsine verna.* *recurva*
All. vid. *Alsine recur.* *rigida* M. B. vid. *Eremog.*
rigid. *rosea* Presl. vid. *procumbens.* *rostrata* Kit.
v. *Alsin. laricifol.* *rostrata* P. v. *Alsine rostr.* *ru-*
bella Hook v. *Alsine sedoides.* *rubra* L. v. *Alsin.*
ruhr. *rubra* β. L. v. *Alsine marina.* *saxatilis* L.
v. *Alsine setacea.* *scandinavica* Spgl. v. *Alsine bi-*
flora. *segetalis* Lam. v. *Alsine seg.* *setacea* Thuill.
v. *Alsine set.* ? *striata* L. v. *Alsine recurva.* *su-*
bulata Sering. v. *Eremog. pungens.* *tenuifolia* L.

Arenaria

v. *Alsin. tenuif. thymifol.* Pursh v. *buxifolia. triandra* Schrk. v. *Alsine mucronata. uliginosa* Schlecht. vid. *Alsine stricta. verna* L. vid. *Alsin. verna. Villarsii* Balb. v. *Alsine Vill. villosa* Wulf. v. *Moehringia villosa. viscida* Hall. fil. v. *serpyllifolia* β . *viscosa* Pers. Thüll. v. *Alsine tenuif. \beta*.

Areng saccharifera La Bill. v. *Gomutus saccharifer*.

Arethusa L. (Nymphen der Diana), *Arethuse*, XX. 1., Orchideae.

bulbosa L., knollige, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

plicata Andr., faltige, 4. Kn. w. Ostindien.

ciliaris L. Suppl. (*pectinata*) vid. *Bartholina pectinata. ophioglossoides* L. et *pendula* W. v. *Pogonia ophiog.* etc.

Aretia Hall. Gaud. (B. Aretius, ehemaliger Professor zu Bern), V. 1., Primulaceae.

Vitaliana L., Vital's, 4. f. Südl. Tyroler und Walliser Alpen, Pyrenäen.

Die übrigen siehe Androsace.

Argania Schousb., (Argam, einheimischer Name), V. 1., Sapotaceae.

Sideroxylon Schousb., Eisenholz-A., 5. k., Marocko.

Argemone T., Stachelmohn, XIII. 1., Papaveraceae.

albiflora Sims, weißblumiger, $\odot$. ♂. f. Mexico.

Barclayana, Penny, Barclay's, ♂. ? 4. f. k. Mexico.

grandiflora Swt., großblumiger, $\odot$. ♂. f. k. Mexico.

Hunnemanni H., Berol., Hunnemann's, $\odot$. ♂. f. k. Mittelamerika.

mexicana L., mexicanischer, $\odot$. f. Mexico.

ochroleuca Swt., weißgelblicher, $\odot$. f. Mexico.

platyceros H. Berol., flachhörniger, 4. k. Mittelamerika.

armeniaca L. v. *Papaver armeniacum. intermedia*

Swt. v. *Barclayana. pyrenaica* L. v. *Papaver pyren.*

sulphurea Swt. v. *ochroleuca*.

Argolasia plumosa Juss. v. *Lanaria plumosa*.

Argyreia Lour., Silberwinde, V. 1., Convolvulaceae.

bona nox Swt., nachtblühende, 5. Sch. w. Ostindien.

cuneata Ker., keilblättrige, 5. Sch. w. Ostindien.

cymosa Swt., afterdoldige, 5. Sch. w. Ostindien.

ornata Swt., geschmückte, 5. Sch. w. Ostindien.

pomacea Swt., äpfelfrüchtige, 5. Sch. w. Ostindien.

speciosa Swt., prächtige, 5. Sch. w. Ostindien.

splendens Swt., glänzende, 5. Sch. w. Ostindien.

uniflora Swt., einblumige, 5. Sch. w. Ostindien.

Arisarum Tourn., Kugelwurz, XXI. 1., Aroideae.

vulgare Kunth, gemeine, 4. k. Südeuropa, Nordafrika.

Aristea L., Borstenlilie, III. 1., Irideae.

cyanea Ait., kornblumenblaue, 4. k. t. Cap d. g. H.

major Andr., große, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

melaleuca Ker., schwarzweiß, 4. k. t. Cap d. g. H.

pusilla Ker., kleine, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

spiralis Vahl, spiralförmige, 4. k. t. Cap d. g. H.

capitata Ker et *coerulea* Vahl v. *major*.

Aristida L., Haargranne, III. 1., Gramineae.

Ascensionis L., Ascensions-H., 4. w. Westindien.

capensis Thbg., capische, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

coerulescens Desf., bläuliche, $\odot$. f. Spanien, canarische Inseln, Barbarei, Westindien.

divaricata K. B., sparrige, 4. k. t. Mexico, Brasilien.

Aristida

gigantea L., grofse, ☉. f. Teneriffa.

Hystrix L., borstige, 4. w. Malabar.

plumosa L., federige, 4. t. Persien, Armenien, Nordamerika, Südafrika.

stipoides RB., pfriemengrasähnliche, 4. t. Neuholland.

vagans Cav., zerstreutblühende, 4. t. Neuholland.

Aristolochia T., Osterluzei. XX. III. (IV.), *Aristolochiae*.

acuminata Lam., zugespitzte, ♀. Schl. w. Mascaren. Inseln.

altissima Desf., hohe, ♀. Sch. k. Creta, Numidien.

arborescens L., baumartige, ♀. k. t. Amerika.

Arkansa Lodd., Arkansa-O., ♀. Sch. k. f. Nordamerika.

baetica L., spanische, ♀. Sch. k. f. b. Spanien, Sicilien, Creta.

barbata Jacq., bärtige, ♀. Sch. w. Caracas.

bilobata L., zweilappige, ♀. Sch. w. Hispaniola.

bracteata Retz., deckblättrige, 4. w. Ostindien.

brasiliensis Mart., brasilianische, ♀. Sch. w. Brasilien.

caudata L., geschwänzte, ♀. Sch. w. Hispaniola.

chilensis Lindl., chilesische, ♀. Sch. t. Chili.

ciliosa G. B. Know., gefranzte, ♀. Sch. w. N. Patagon.

Clematitis L., gemeine, 4. f. Europa.

cymbifera Mart., cymbelförmige, ♀. Sch. w. Brasilien.

foetens Lindl., übelriechende, ♀. Sch. w. Westindien.

foetida Kunth, stinkende, ♀. Sch. w. t. Mexico.

glauca Desf., blaugrüne, ♀. Sch. k. Portugal, Nordafrika.

grandiflora Sw., grofsblumige, ♀. Sch. w. Jamaica.

hastata Kunth, spontonblättrige, ♀. Sch. w. Cuba.

hirta L., steifhaarige, 4. k. Griechenland.

indica L., indische, ♀. Sch. Ostindien, Neuholland.

labiosa Ker., lippige, ♀. Sch. w. Brasilien.

longa L., langwurzelige, 4. f. Südeuropa.

macrura Gomez, langschwänzige, ♀. Sch. w. Brasilien.

maxima L., grösste, ♀. Sch. w. Neuspanien, Westindien.

odoratissima L., wohlriechende, ♀. Sch. w. Jamaica, Mexico.

pallida W. Kit., bleiche, 4. f. Croatien, Krain, Istrien.

panduriformis W., geigenförmige, ♀. Sch. w. Caracas.

Pistolochia L., kleine, 4. f. b. k. Südfrankreich.

ringens Vahl, rachenförmige, ♀. Sch. w. Westind., Brasil.

rotunda L., rundwarzliche, 4. f. Südeuropa.

saccata Wall., sackförmige, ♀. Sch. w. Silhet.

sagittata Mühlenb., pfeilblättrige, 4. f. Carolina.

sempervirens L., immergrüne, ♀. 4. Sch. f. b. k. Creta.

Serpentaria L., Schlangenwurz-O., 4. f. Virginien.

Sipho L'Her., grofsblättrige, ♀. Sch. f. Nordamerika.

surinamensis W., surinamische, ♀. Sch. w. Surinam.

tomentosa Sims., filzige, ♀. Sch. f. Südcarolina, Louisiana.

trifida Kunth, Lam., dreitheilige, ♀. Sch. w. Caracas.

trilobata L., dreilappige, ♀. Sch. w. Westindien.

caracasana Spg. vid. *trifida*. *hastata* Nutt. v. *sagittata*.

hirsuta Mühlenb. v. *tomentosa*. *macrophylla*

Lam. vid. *Sipho*. *microphylla* W. vid. *bracteata*.

polyrrhizos Plukn. Spgl. v. *sagittata*. *subglauca* Lam.

v. *glauca*. *trilobata* Jacq. v. *surinamensis*.

Aristotelia L'Her. (Aristoteles, berühmter griechischer Naturforscher und Philosoph), XI. I., Tiliaceae-Elaeocarpeae.

Aristotelia

Macqui L'Her., chilesische, 5. k. f. b. Chili.

β) variegata Dens., buntblättrige.

Armeniaca vulgaris Lam. etc. v. *Prunus Armeniaca*.

Armeria W., Grasnelke, V. v., Plumbagineae.

alliacea W., lauchblättrige, 4. f. k. Spanien, Nordafrika.

alpina W., Alpen-G., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

denticulata Bertol., gezähnelte, 4. f. Oberitalien.

dianthoides Hornem., nelkenähnliche, 4. f. Südeuropa.

fasciculata W., büschelförmige, 5. k. Corsica, Portugal.

hirta W., kurzhaarige, 4. f. b. k. Spanien, Nordafrika.

humilis Lk., niedrige, 4. f. b. k. Südl. Portugal.

juniperifolia W., wachholderblättrige, 4. f. b. k. Spanien, Corsica.

latifolia W., breitblättrige, 4. f. b. k. Portugal.

leucocephala Koch, weisköpfige, 4. f. Südeuropa.

litoralis W., Ufer-G., 4. f. Portugal.

maritima W., Meerstrands-G., 4. f. Schweden, England.

montana G., Berg-G., 4. f. Schottland.

pinifolia R. et S., nadelblättrige, 4. f. b. Portugal, Spanien.

plantaginea W., wegrittblättrige, 4. f. Südeuropa.

pungens R. et S., stechende, 4. f. b. Spanien, Portugal.

purpurea Koch, purpurfarbige, w. f. Sumpfwiesen in Baiern.

sardoa Spgl., sardinische, 4. f. Sardinien, Corsica.

scorzoneraefolia W., haferwurzblättrige, 4. f. Südeuropa.

vulgaris W., gemeine, 4. f. Europa.

β) alba. γ) coccinea. δ) pubescens Dethar.

Hybrid: hybrida A. P. Popeana Hort.

arenaria P. v. vulgaris. cephalotes P. v. latifolia.

elongata Hoffm. v. vulgaris.

Armoracia Rupp. G. M. S., Meerrettig. XV. II., Cruciferae.

macrocarpa (*Cochlearia* W. K.), großfrüchtiger, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen.

rusticana G. M. S. (*sativa* Bernh.), gemeiner, 4. f. Europa.

Arnica L., Wolverley. XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

angustifolia Vahl, schmalblättriger, 4. f. Lappland, Dahurien.

fulgens Pursh, feuerfarbiger, 4. f. Nordamerika am Missouri.

montana L., wahrer, 4. f. Europa.

β) helvetica G. Don.

nudicaulis Ell., nacktstengeliger, 4. f. Virgin., Florida, Carolina.

plantaginea Pursh, wegrittblättriger, 4. f. Labrador.

Bellidiastrum Vill. vid. *Bellidiastrum* Michellii. A.

Clusii All. v. *Aronicum Doronicum*. cordata Thbg.

v. *Gerbera cordata*. cordata Wulf. v. *Doronicum*

Columnae. corsica Lois. vid. *Aronicum corsicum*.

crenata Thbg. v. *Mairia crenata*. crocea L. v. *Gerbera*

Burmanni. Doronicum Jacq. v. *Arnica Doronicum*.

floccosa Bertol. v. *Senecio arachnoideus*.

glacialis Jacq. v. *Aronicum scorpioides* γ. incana

P. v. *Trichocline incana*. lanigera Tenor. v. *Senecio*

arachnoideus. pyrolaeifolia P. vid. *Gerbera*

Burmanni. rotundifolia W. v. *Bellium rotundifolium*.

scorpioides L. v. *Aronicum scorpioides*. sinuata

Less. v. *Gerbera Burmanni*. styriaca Vill.

Arnica

v. Aronicum Doronicum. *Wulfeniana* Poll. v. Doronicum Columnae.

Arnopogon asper W. *capensis* W. *Dalechampii* W. et *picroides* W. v. *Urospermum Dalechampii* et *picroides* etc.

Arnoseris Gärtn., Lämmersalat. XIX. 1., Compositae-Cichoraceae.

pusilla G., niederiger, ☉. t. Europa.

Aromadendron Blume, Gewürzbaum. XIII. VI., Magnoliaceae.

elegans Blum., zierlicher, ♀. w. Java.

Aronia Botryapium P. *rotundifolia* P. etc. vid. *Amelanchier Botryapium*, vulgaris etc.

Aronicum Neck., Ziegenwurz, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

altaicum DC., altaische, 4. f. Sibirien.

corsicum DC., corsische, 4. f. Corsica.

Doronicum Rchb., behaarte, 4. f. Mittel- u. westeurop. Alpen.

scorpioides Rchb., gemeine, 4. f. Mittel- u. südeurop. Alpen.

α) *latifolium*. β) *medium*. γ) *glaciale*. δ) *Bauhini* Rchb.

Arpophyllum La Llave, Sichelblatt. XX. 1., Orchideae.

spicatum La Llav., ährenförmiges, 4. w. Mexico.

Arracacia Bancroft. (Arracacha, einheimischer Name). V. II., Umbelliferae.

esculenta DC., essbare, 4. Kn. w. Südamerika, (Santa Fè).

Arrhenatherum P. Beauv., Glatthafer (Franz. Raygras). III. II. (XXIII. 1.), Gramineae.

elatus M. et Koch (*avenaceum* P. B.), hoher, 4. f. Europa.

β) *bulbosum* v. Schlecht.

Artabotrys RB., Birnentraube. XIII. 6. Anonaceae.

odoratissima RB., wohlriechende, ♀. w. China, Ostindien, Madagascar.

Artanema D. Don, Zahnfaden. XIV. II., Personatae-Antirrheae.

fimbriatum D. Don, gefranzter, 4. t. Neuholland.

Arteria L. (P. Artea, schwedischer Naturforscher). V. II., Umbelliferae.

squamata L., schuppige, ☉. f. Griechenland, Kleinasien, Syrien.

Artemisia T. (et Absinthium T. G.), Beifuß. XIX. II., Compositae-Eupatorineae.

Abrotanum L., Stabwurz-B. (Eberraute), ♀. f. Südeuropa, Kleinasien, China.

β) *humile* Hort. γ) *tobolskianum* Hort.

Absinthium L., Wermuth-B., 4. f. Europa, Taurien, Sibirien, Mauritan., Nordamerika.

β) *grandiflora* Bess. γ) *insipida* Bess.

Adamsii Bess., Adam's, ♀. f. Tatarei, Dahuria, Mongolei.

afra Jacq., afrikanischer, ♀. k. Cap d. gut. Hoffn.

anethifolia Stechm., dillblätteriger, ♂. f. Sibirien.

β) *Stelleriana* Bess. γ) *multicaulis* Bess. Ledeb.

annua L., jähriger, ☉. f. Ostsibirien, Eriwan.

aragonensis Lam., aragonischer, ♀. k. Spanien.

β) *valentina* Lam.

arborescens L., baumartiger, ♀. k. f. b. Süditalien, Corsica, Südfrankreich, Mauritanien.

arenaria DC., Sand-B., ♀. f. Südlich. Rußland.

argentea L'Her., silberfarbiger, ♀. k. Madeira, Sicilien.

argyrophylla Ledeb., silberblätteriger, ♀. 4. f. Sibirien.

Artemisia

armeniaca Lam., armenischer, ꝥ. 4. f. Armenien, Persien, Sibirien.

β) *potentillaefolia* Fisch.

austriaca Jacq., österreichischer, ꝥ. 4. f. Osteuropa, Caucasus, Armenien, Sibirien, Dahurien.

α) *Jacquini*ana. β) *nivea* Bess. (Redowski). γ) *repens* Pall. δ) *orientalis* Fisch. (Willd.).

biennis W., zweijähriger, ♂. f. Nordamerika, Neuseeland.

borealis Pall., nördlicher, 4. f. Nordamerika, Sibirien, Grönland.

β) *Woronskioldii* Bess. γ) *Ledebouri* Bess.

boschniakiana DC. (Bess.), boschniakischer, ꝥ. 4. f. Taurien (Odessa).

camphorata Vill., kampferduftender, ꝥ. f. Ost-, Süd- und Westeuropa.

β) *canescens*. γ) *garganica*. δ) *humilis*. ε) *saxatilis*.

campestris L., Feld-B., ꝥ. 4. f. Europa, Sibirien, südl. Schweiz.

β) *alpina* DC.

cana Pursh, weißgrauer, ꝥ. 4. f. Nordamerika.

canadensis Mchx., canadischer, 4. ♂. f. Canada.

canariensis Less., canarischer, ꝥ. k. Teneriffa.

capillifolia Fisch., haarblättriger, ꝥ. 4. f. Dahuria.

carvifolia Wall., karbeblättriger, Nepal, Sicilien.

caudata Mchx., geschwänzter, 4. f. Nordamerika.

chamaemelifolia Vill., kamillenblättriger, ꝥ. f. Dauphiné, Piemont.

β) *iberica* Bess. Caucasus.

chinensis L., chinesischer, ꝥ. 4. f. Sibirien, Nordchina.

coerulescens L., bläulicher, ꝥ. 4. Ufer des adriatischen und mittelländischen Meeres.

α) *latifolia*. β) *angustifolia*.

commutata Bess., verwechselter, 4. f. Sibirien, Persien, Nordamerika.

crithmifolia? L., meerfenchelblättriger, ꝥ. 4. f. Westeuropa.

Deliliana Bess., Delil's, ꝥ. k. Aegypten.

desertorum Spgl., Wüsten-B., 4. f. Sibirien, Persien, Kaschmyre.

α) *Sprengeliana* Bess. β) *Fontanesiana* Bess.

γ) *Willdenowiana* Bess.

dracunculoides Pursh, dragonähnlicher, 4. f. Louisiana.

Dracunculus L., Dragon-B. (Esdragun), 4. f. Oestl. u. südl. Rußland, Sibirien, Mongolei.

fasciculata M. B., büschelförmiger, ꝥ. 4. Caucasus, Armenien.

α) *iberica* Bess. β) *armeniaca* Bess. (*fascicul. tenuiloba* Fisch. et Mey.).

Fontanesiana Bess., Desfontain's, ꝥ. f. ?

fragrans W., wohlriechender, ꝥ. 4. f. Armenien, Caucasus.

frigida W., kalter. ꝥ. 4. f. Sibirien, Dahuria.

β) *Fischeriana* Bess.

gallica W., französischer, 4. ꝥ. f. Frankreich, Spanien.

glacialis L., Gletscher-B., 4. f. Schweizer, savoyer, piemonteser und französische Alpen.

glauca Pall. W., blaugrüner, 4. f. Sibirien, Dahuria, Mongolei.

Artemisia

- glomerata Ledeb., knaulförmiger, $\frac{1}{2}$. 4. Arctisches Amerika, Kamtschatka.
- glutinosa Gay., kleberiger, $\frac{1}{2}$. f. Neapel, Südfrankreich.
- Gmelini Stechm., Gmelin's, $\frac{1}{2}$. f. Sibirien.
- gnaphalioides Nutt., ruhrkrautähnlicher, 4. f. Nordamerika.
- grata Wall., angenehmer, $\frac{1}{2}$. 4. k. Ostindien.
- herbacea Ehrh., krautiger, 4. f. Sibirien.
- hispanica Lam., spanischer, $\frac{1}{2}$. k. Spanien.
- japonica Thbg., japanischer, $\frac{1}{2}$. k. Japan.
- inculta Delil., unbebauter, 4. f. Aegypten.
- indica W., indischer. 4. $\frac{1}{2}$. k. f. b. Ostindien, Nepal, China, Japan.
- inodora MB., geruchloser, $\frac{1}{2}$. f. Rußland.
- α) Steveniana DC. β) incana DC.
- insipida Vill., unschmackhafter, 4. f. Dauphiné.
- integrifolia L., ganzblättriger, $\frac{1}{2}$. 4. f. Sibirien.
- judaica L., israelitischer, $\frac{1}{2}$. k. Aegypten, Arabien, Palästina, Numidien.
- laciniata W., schlitzeblättriger, $\frac{1}{2}$. 4. f. Sibirien, Thüringen.
- α) glabriuscula Led. β) incana Ledeb. γ) Mertensiana Wallr. δ) Turczaninowii Bess. (Mongolei).
- lactiflora Wall., milchweißblumiger, $\frac{1}{2}$. 4. k. China, Nepal.
- lanata W. DC., wolliger, 4. f. Spanien, Italien, Taurien.
- α) caucasica. β) alpina. γ) pedemontana. δ) nitida.
- latifolia Ledeb., breitblättriger, $\frac{1}{2}$. 4. f. Sibirien, Oeland.
- β) oelandica Bess.
- lednicensis Roch, lednitzer, $\frac{1}{2}$. 4. f. Carpathen.
- Lerchiana Stech., Lerches, $\frac{1}{2}$. 4. f. Mittelsibirien, Astrachan etc.
- α) humilis DC. β) Gmeliniana DC.
- longifolia Nutt., langblättriger, $\frac{1}{2}$. 4. f. Westl. Nordamer.
- β) serrata Nutt.
- macrantha Ledeb., großblumiger, $\frac{1}{2}$. 4. f. Ural, Altai.
- macrobotrys Ledeb., großstraubiger, $\frac{1}{2}$. 4. f. Ostsibirien.
- β) latifolia Bess. (*tanacetifolia* L.).
- maritima L., Meerstrands-B., $\frac{1}{2}$. 4. f. Nordfrankreich, Thüringen, Norddeutschland, England, Schweden, Dänemark.
- β) salina W. γ) suaveolens Lam.
- Messerschmidiana Bess., Messerschmidt's, $\frac{1}{2}$. f. Ostsibir.
- α) viridis Bess. (*sacrorum* Ledeb.). β) incana Bess.
- mexicana W., mexicanischer, $\frac{1}{2}$. 4. f. k. Mexico.
- mollissima D. Don, weicher, $\frac{1}{2}$. 4. f. k. Nepal, Ostindien.
- monogyna W. Kit., einweibiger, 4. f. Ungarn.
- monosperma Delil., einsamiger, $\frac{1}{2}$. k. Aegypten.
- montevidensis Spgl., montevidensischer, $\frac{1}{2}$. t. Montevideo.
- Moxa Lindl. Bess., Moxa-B., $\frac{1}{2}$. k. China.
- Mutellina Vill., kleiner, 4. f. Mittel- u. westeurop. Alpen.
- nana Gaud., Zwerg-B., 4. f. Walliser Alpen.
- β) Allionii DC. (*parviflora* Bess. *tanacetifolia pedemontana* L.).
- norvegica Vahl, 4. f., norwegischer. Norwegen.
- nutans W., nickender, 4. $\frac{1}{2}$. f. Taurien, Ukraine.
- α) glabriuscula DC. β) incana DC. γ ? Hablitziana DC.
- odoratissima Dsf., starkkriechender, $\frac{1}{2}$ k. Barbarei.
- palustris L., Sumpf-B., $\odot$. f. Dahuria, Mongolei.
- parviflora Roxb. Hamilt., kleinblumiger, $\frac{1}{2}$. f. k. Nepal.
- β) villosior DC.

Artemisia

- pauciflora* Stechn., wenigblumiger, 4. f. f. Sibirien.
pectinata Pall., kammförmiger, ☉. f. Dahur., Mongol.
pontica L., pontischer (römischer), f. 4. f. Mittel-, Süd-
 u. Osteuropa, Mittelasien, Mauritanien.
 β) *Balsamita* W. γ) *intermedia* Bess.
pubescens Ledeb., weichhaariger, 4. f. Ostsibirien.
 β) *Siversiana* Ehrh. non Willd.
procera W., hoher, f. f. Italien, Frankreich, Sibirien.
 α) *Willdenowiana* Bess. β) *Sieberiana* Bess.
 γ) *Stephaniana* Bess. (*altissima* Ehrh.). δ) *Ledebouriana* Bess. ε) *Steveniana* Bess. ζ) *Fischeriana* Bess. η) *Visianiana* Bess.
ramosa C. Sm., ästiger, f. k. Canarische Inseln.
Redowskii Ledeb., Redowski's, 4. f. Dahuria.
reptans Buch, kriechender, f. k. Canarische Inseln.
rupestris L., Felsen-B., 4. f. Oeland, Thüringen, Sibirien.
 α) *oelandica*. β) *thuringiaca*. γ) *viridifolia* Ledeb. δ) *viridis* W.
salsoloides L., salzkrautähnlicher, f. f. Ukraine.
scoparia W. Kit., besenartiger, ☉. ♂. f. Osteuropa, Asien (von Sibirien bis Indien).
sericea Stechn., seidenhaariger, 4. f. f. Sibirien.
Sieberii Bess., Sieber's, f. 4. k. Palästina.
Sieversiana W. (non Ehrh.), Sievers's, ♂. f. Sibirien, Dahur. Mongol.
spicata Jacq., ährenförmiger, 4. f. Ost-, Mittel-, Süd- und westeuropäische Alpen.
 β) *eriantha* Tenor.
splendens W., schimmernder, 4. f. Armenien.
 β) *peduncularis* Bess. MB.
tanacetifolia All., rheinfarnblättriger, 4. f. Dauphiné, Piemont.
taurica MB., taurischer, f. 4. f. Taurien (Odessa), Caucas.
Tilesii Ledeb., Tilesiu's, 4. f. Kamtschatka, Unalaschka.
 β) *arctica*.
Tournefortiana Rchb., Tournefort's, ☉. f. Armenien.
trifurcata Stephan, dreigabeliger, 4. f. Sibirien.
valesiaca All., Walliser, f. 4. f. k. Mittel- u. Unter-Wallis, Piemont.
variabilis Tenor., veränderlicher, f. f. k. Neapel, Spanien.
 α) *virescens* Tenor. β) *canescens* Tenor.
vestita Wall., bekleideter, f. k. Ostind., Kaschmyre.
vulgaris L., gemeiner, 4. f. Europa, Nordafrika, Sibirien bis Ostindien.
 α) *vulgatissima* Bess. (*communis* Ledeb.). β) *rubriflora* Bess. γ) *parviflora* Bess. δ) *kamtschatica* Bess. (*leucophylla* Turcz.). ε) *tenuifolia* Turcz. (*mongolica* Bess.). ζ) *variegata* Hortul. θ) *coarctata* Bess.
abrotanoides Jacquem. v. *vestita*. *albida* Ledeb. v. *Lercheana* β. *alpina* MB. vid. *lanata* β. *altaica* Dsf. v. *pontica* γ. *altissima* Ehrh. vid. *procera* δ. *ambigua* L. v. *Trichogyne loricifolia*. *ambigua* Thbg. v. *Seriphium vermiculatum*. *anethifolia* Fisch. vid. *procera* β. *anglica* H. Par. v. *maritima*. *annua* β. Lam. v. *biennis*. *aprica* Ledeb. v. *frigida* *atrata* Lam. v. *tanacetifolia*. *australis* Ehrh. v. *biennis*.

Artemisia

baicalensis W. v. *Messerschmidiana* β . *Balsamita* W. v. *pontica* β . *Baumgartenii* Bess. v. *spicata* β . *Biasoletiana* Vis. v. *camphorata*. *canescens* W. v. *armeniaca*. *capillifolia* Lam. v. *Eupatorium foeniculaceum* β . *caucasica* W. v. *lanata* α . *cernua* Nutt. v. *dracunculoides*. *chinensis* Vahl v. *Crossostephium artemisioides*. *chrysantha* Fisch. v. *frigida* β . *cinerea* H. P. v. *camphorat*. *coarctata*? W. v.? *vulgaris* $\mathfrak{f}$. *Columnae* Tenor. v. *camphor*. *Contra*? L. v. *Sieberi*. *controversa* Jan. v. *Sieversiana*. *corymbosa* Lam. v. *camphorat*. *dentata* W. v. *rupestris* α . *divaricata* Fisch. v. *anethifolia*. *elegans* Roxb. v. *scoparia*. *exilis* Fisch. v. *annua*. *furcata* MB. v. *trifurcata*. *garganica* Ten. v. *camph*. γ . *glacialis* Wulf. v. *Mutellina*. *glomerata* Sbr. v. *Sieberi*. *groenlandica* Wormsk. v. *borealis* β . *helvetica* Schlr. v. *nana*. *Herba alba* Ass. v. *aragonensis*. *hirsuta* Rottl. vid. *Cyathocline lyrata*. *hispanica* Jcq. v. *biennis*. *holosericea* Ledeb. v. *sericea*. *humilis* Wulf. v. *camphorata* δ . *humilis* MB. v. *Lercheana* α . *Jani* Bess. v. *camphorata* β . *incisa* Lk. Loud. v. *indica*. *inculta* Sbr. v. *Deliliana*. *inodora* W. v. *Redowskii*. *Krascheninnikowiana* Bess. vid. *macrobotrys*. *laciniata* Wahlenb. v. *latifolia* β . *lanata* Lam. v. *variabilis* β . *leucanthemifolia* Dsf. v. *desertorum*. *maderaspata* L. v. *Grangea maderasp*. *Marschalliana* Spgl. v. *inodora*. *minima* L. v. *Sphaeropsis centipeda*. *multicaulis* Ledeb. v. *anethifolia* γ . *naronitana* Visian. v. *procera* $\mathfrak{f}$. *neapolitana* Ten. v. *variabilis* β . *neglecta* Spgl. v. *desertorum* γ . *nilotica* L. v. *Cotula anthemoides*. *nivea* Redows. v. *austriaca* β . *novae-Zelandiae* Hort. v. *biennis*. *nutans* Fras. v. *dracunculoides*. *orientalis* W. v. *austriaca* δ . *palmata* Lam. v. *coerulescens* β . *paniculata* Hort. (? non Lam.) v. *procera* β . *pauciflora* MB. vid. *arenaria*. *pauciflora* Spgl. v. *desertorum* γ . *pedemontana* Balb. v. *lanata* γ . *peduncularis* MB. v. *splendens* β . *petrosa* Jan. vid. *spicata* β . *pinnatifida* Jacquem. v. *Tournefortiana*. *plumosa* Fisch. v. *annua*. *potentillaefolia* Fisch. v. *armeniaca* β . *procumbens* DC. Schrad. v. *frigida* β . *punctata* Bess. v. *macrobotrys*. *repens* Pall. v. *austriaca* γ . *riparia* Hamilt. v. *carvifolia*. *rubella* Mch. v. *coerulesc.* β . *rupestris* All. v. *Mutellina*. *rupestris* Pall. v. *lanata* α . *rupestris* Scop. v. *camphorata*. *rupestris* Vill. v. *spicata*. *sacrorum* Ledeb. vid. *Messerschmidiana* α . *sabulosa* Stev. v. *procera* ζ . *santonica* Lam. v. *coerulescens* β . *santonica* Woodv. v. *maritima* γ . *saxatilis* Kit. v. *camphorata* ϵ . ? *serrata* Nutt. v. *longifolia*. *suaveolens* Fisch. v. *annua*. *suaveolens* Lam. v. *maritima* β . *subcanescens* W. v. *camphorata*. *subviscosa* Turcz. Bess. v. *capillifolia*. *tanacetifolia* L. v. *macrobotrys* β . *tanacetoides* Less. v. *Tanacetum multiflorum*. *tenuifolia* Adams v. *Adamsii*. *tenuifolia* W. v. *Eupator. foeniculaceum* β . *trifurcata* Dsf. v. *Fontanesiana*. *umbelliformis* Lam. v. *Mutellina*. *vermiculata* L. v. *Seriphium vermiculatum*. *violacea* Ledeb. v. *borealis* γ . *violacea* H. Par. v. *vulgaris* δ .

Artemisia

viridifolia Ledeb. v. *rupestris* γ. *viridis* W. v. *rupestris* δ.

Arthrolobium Desv. v. *Ornithopus*.

Arthrolobus Stev. v. *Sterigma*.

Arthropodium RB., Gliederlilie, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

cirrhatum RB., rankentragende, 4. t. k. Neu-Zeeland.

fimbriatum RB., gefranzte, 4. t. k. Neuholland.

minus RB., kleine, 4. t. k. Neuholland.

paniculatum RB., rispige, 4. Zw. t. k. Neuholland.

pendulum Spgl., hängende, 4. t. k. ? Neuholl., Teneriffa.

caespitosum Spl. *glaucum* Spgl. *umbellatum* Spl.
v. *Stypandra caespitosa* etc.

Arthrostachya Lk., Gliederähre, III. II., Gramineae.
coarctata Lk., gedrungene, ☉. f. ?

Arthrostemma Pav., Gliederfaden, VIII. I. (X. I.),
Lythraeae-Melastomaceae.

nitidum Grah., glänzender, ♀. t. Buenos Ayres.

paniculatum D. Don, rispenblumiger, ♀. t. Nepal.

versicolor DC., buntfarbiger, ♀. w. Brasilien.

Arthrozamia Rchbch. v. *Zamia*.

Artocarpus Forst., Brotfruchtbaum, XXI. I., Urticaeae-Artocarpeae.

incisa L. fil., schlitzbblätteriger, ♀. w. Moluck., Südseeins.
β) *nucifera*.

integrifolia L. Suppl. (*Jaca* Lam.), ganzblättriger, ♀.
w. Ostindien, Molucken,

β) *heterophylla* Lam.

Arum T. L., Zehrwurz, Drachenwurz, XXI. IX., Aroideae-Callaceae.

atrorubens Ait., schwarzrothe, 4. f. Virginien.

bulbiferum Roxb., zwiebeltragende, 4. w. Bengalen.

campanulatum Roxb., glockenförmige, 4. w. Ostindien.

Colocasia L., ägyptische, 4. Kn. Wa. w. Griechenland,
Kleinasien, Syrien, Ostindien, Molucken, Aegypten.

costatum Wall., gerippte, 4. w. Nepal.

crinitum Ait., bemähnte, 4. k. Balearische Inseln, Sardinien.

divaricatum L., sparrige, 4. Kn. w. Ostindien.

Dracontium L., ächte, 4. f. Nordamerika.

Dracunculus L., langscheidige, 4. Kn. f. k. Südeuropa.

filiforme Mack. Cat., fadenförmige, 4. w. ? Java.

flagelliforme Lodd., peitschenförmige, 4. w. Bengalen.

gramineum Lam., grasblättrige, 4. f. ?

haematophyllum ? Blum., blutfleckige, 4. w. Java.

hederaceum L., epheublättrige, 4. ♀. w. Südamerika.

indicum Lour., indische, 4. ♀. w. Cochinchina.

integrifolium Lk., ganzblättrige, 4. ♀. w. ?

italicum Mill. Lam., italienische, 4. f. k. Süd- u. West-
europa.

lingulatum L., zungenförmige, 4. ♀. w. Westindien.

macrorrhizon L., großswurzelige, 4. Kn. w. Ceylon.

maculatum L., gemeine, 4. Kn. f. Mittel- u. Südeuropa.
β) *immaculatum*.

marginatum Lod., berandete, 4. w. Ostindien.

minutum W., kleine, 4. Kn. w. Ostindien.

nepenthoides Wall., wasserschlauchähnliche, ♀. w. Nepal.

obtusilobum Lk., stumpflappige, 4. ♀. w. ?

orientale MB., morgenländische, 4. f. Taurien, Caucasus.

orixense Roxb., orixanische, 4. Kn. w. Ostind., Neuholl.

Arum

- palmatum Lod., handförmige, 4. f. ?
 pedatum Fisch., fußförmige, 4. w. Südamerika.
 pentaphyllum L., fünfblättrige, 4. w. Ostindien.
 pictum L. suppl., bemalte, 4. w. k. Balear. Inseln, Corsica.
 polyphyllum Lk., vielblättrige, 4. w. Südamerika.
 proboscideum L., rüsselförmige, 4. f. Apenninen.
 ramosum Lk., ästige, 4. f. w. ?
 ringens Thbg., rachenförmige, 4. t. w. Japan.
 sagittifolium Lk., pfeilblättrige, 4. w. ?
 sarmentosum? Otto, wurzelrankige, 4. w. Brasilien.
 speciosum Wall., prächtige, 4. w. Nepal.
 spirale Retz, spiralförmige, 4. w. Ostindien.
 syriacum Spgl., syrische, 4. w. k. Syrien.
 tenuifolium L., feinblättrige, 4. k. f. Südeuropa.
 ternatum Thbg., dreizählige, 4. t. k. Japan.
 trilobatum L., dreilappige, 4. Kn. Ceylon.

β) auriculatum.

- triphyllum L., dreiblättrige, 4. f. Nord- u. Südamerika.

β) zebrinum.

- venosum Ait., aderige, 4. w. ?

- ventricosum Hoffmannsegg, bauchige, 4. w. Brasilien.

Arisarum L. v. *Arisarum vulgare*. *cannaefolium* L.
 suppl. vid. *Pothos cannaefolia*. *corsicum* Lois. vid.
pictum. *gramineum* Russ. v. *syriacum*. *muscivorum*
 L. suppl. v. *crinitum*. — *arborescens* L., *auritum*
 L., etc. v. *Caladium arborescens* etc.

Arundina Blume, Rohrstendel, XX. 1., Orchideae.

- bambusifolia Blum., bambusblättriger, 4. w. Java.

Arundinaria macrosperma Mchx. vid. *Ludolfia mac-*
rosperma. *Arundinella Acratherum* N. E. v. *Acrat-*
therum miliaceum.

Arundo T. L., Wasserrohr, III. 11., Gramineae.

- altissima Benth., hohes, 4. k. f. b. Südfrankreich.

- bengalensis Retz, bengalisches, 4. w. Bengalen.

- Donax L., breitblättriges. (spanisches), 4. k. f. b. Süd- und Osteuropa, Sibirien, Nordafrika.

β) versicolor (fol. variegat.). γ) procerior.

- mauritanica Desf., mauritanisches, 4. f. k. f. b. Nordafrika, Italien, Spanien.

acutiflora Schrad. v. *Calamagrostis acutiflora*. *ae-*
gyptiaca Delil. v. *Donax γ*. *alpina* Vill. v. *Calam.*
Hallerian. *Ampelodesmos* Cyril. v. *Ampelodesmos*
tenax. *arenaria* L. et *baltica* Flüggé vid. *Psamma*
arenar. et *balt.* *Bambos* L. vid. *Bambusa arundi-*
nacea. *bicolor* Dsf. v. *Ampelod. bicolor*. *Calama-*
grostis Hall. fil. v. *Calam. Halleriana*. *canadensis*
 Mchx. v. *Calamag. canad.* *canescens* Wigg. v. *Ca-*
lamag. lanceolata. *Clarionis* Loisel. vid. *Calamag.*
Hallerian. *colorata* Ait. vid. *Baldingera arundinac.*
collina Tenor. v. *mauritanica*. *confinis* W. v. *Ca-*
lamagrost. conf. *dioeca* Spgl. v. *Gynerium argen-*
teum. *effusa* Gmel. (*litorea* Schrad.). *Epigejos* L.
 v. *Calamag. litor.* et *Epig.* *festucea* W. v. *Sco-*
lochloa festus. *festucoides* Dsf. vid. *Ampelodesmos*
tenax. *glauc.* MB., *Halleriana* Gaud. v. *Calamag.*
glauc. et *Haller.* *humilis* R. et S. vid. *Calamag.*
tenella β. *isiaca* Delil. v. *Phragmit. isiac.* *Langs-*
dorffii Link, *lapponica* Wahlenb., *litorea* Schrad.
 et *maritima* Ag. vid. *Calamagrost*, *Langsdorff.* etc.

Arundo

mauritanica Poir. vid. *Ampelod. tenax. micrantha* Lamarck vid. *mauritanica. montana* Gaudin, *neglecta* Ehrh. (*stricta* Timm.) vid. *Calamag. mont. et stricta. Phragmites* L. v. *Phragmites communis. Plinii* Turr. v. *mauritanica. praeformis* La Bill. v. *Poa australis. Pseudophragmites* Hall. fil, *Calamag. litorea. Pseudophragmites* Schrad. vid. *Calamag. Halleriana. purpurea* Trin. v. *Calamagr. purpur. semiannularis* La Bill. v. *Danthonia sem. speciosa* Schrad. v. *Lasiagrostis Calamagrost. stricta* Timm., *strigosa* Wahlenb., *sylvatica* Schrad. vid. *Calamag. stricta* etc. *tenax* Vahl vid. *Ampelodesm. ten. tenella* Schrad. vid. *Calamag. tenella. varia* Schrad. v. *Calamag. montana.*

Asarum T., Haselwurz, XI. 1., Aristolochieae (Asarineae). *arifolium* Mchx., zehrwurzblätterige, 4. f. k. Carolina, canadense L., canadische, 4. f. Nordamerika. *europaeum* L., europäische (gemeine), 4. f. Europa. *grandifolium* Lod., großsblätterige, 4. f. Nordamerika. *virginianum* L., virginische, 4. f. k. Nrdamer., China, Japan. *carolinianum* Walt. v. canadense. *latifolium* Salish. v. ? canadense (? grandifolium).

Ascaricida anthelminthica Swt. (*indica* Cass.) et *tripliner-via* G. Don v. *Vernonia anthelminth* et *triplinerv.*

Asclepias T., L., Schwalbenwurz (Seidenpflanze) V. II., Asclepiadeae.

alexica Jacq., zaubertreibende, 4. Sch. w. Ceylon. *amoena* L., liebliche, 4. f. Nordamerika. *amplexicaulis* Mchx., stengelumfassende, 4. f. Carolina. *asthmatica* L., brustheilende, 4. Sch. w. Ceylon. *citrifolia* Jacq., citronenblätterige, 4. w. Florida. *curassavica* L., curassavische, 4. w. Südamerika.

β) *alba.*

debilis Mchx., schwache, 4. f. Nordamerika. ? *decumbens* L., niederliegende, 4. Kr. f. Virginien. *exaltata* Lk., hohe, 4. f. Nordamerika. *Greeniana* Nutt., Green's, 4. w. ? *incarnata* L., fleischfarbene, 4. f. Nordamerika. *laurifolia* Mchx., lorbeerblätterige, 4. f. Nordamerika. *Linaria* Cav., leinkrautblätterige, 4. t. Mexico. *linifolia* Lagasc., flachsblätterige, 4. k. Mexico. *mexicana* Cavan., mexicanische, 4. k. Mexico. *nivea* L., schneeweiße, 4. f. Nordamerika, Hispaniola. *obtusifolia* Mchx., stumpfblätterige, 4. f. Carolina. *parviflora* Ait., kleinblumige, 4. k. Carolina, Florida. *paupercula* Mchx., wenigblumige, 4. f. Nordamerika. *phytolaccoides* Pursh, kermesbeerähnliche, 4. f. Carolina. ? *polystachya* Walt., vielährige, 4. k. Carolina. *pulchra* Ehrh., schöne, 4. f. Nordamerika. *purpurascens* L., purpurfarbige, 4. f. Nordamerika. *quadrifolia* Jacq., vierblätterige, 4. f. Nordamerika. *rosea*, H. B. K., rosafarbene, 4. t. Mexico. *rubra* L., rothe, 4. f. Virginien.

salicifolia Lodd., weidenblätterige, 4. t. ? Mexico. *syriaca* L., syrische, 4. f. Orient, Nordamerika.

β) *illinoensis* Mchx., P. ? γ) *obovata* Ell.

tuberosa L., knollige, 4. k. f. b. Nordamerika.

variegata L., bunte, 4. f. Nordamerika.

verticillata L., wirtelblätterige, 4. f. Nordamerika.

Asclepias

acuminata Pursh v. *laurifolia*. *angustifolia* W. vid. *linifolia*. *aphylla* Thbg. v. *Sarcostemma aphyll.* *arborescens* L. vid. *Gomphocarpus arboresc.* *carnosa* L. vid. *Hoya carnosa*. *cinerea* Walt. vid. *Enslenia cinerea*. *connivens* Baldw. vid. *exaltata*. *cordata* Walt. v. *laurifolia*. *crispa* L. vid. *Gomphocarpos crispus*. *davurica* W. v. *Cynanchum roseum*. *floridana* Lam. v. *Gomphocarpus longifolius*. *foetida* Cav. vid. *Cynanchum foetidum*. *fruticosa* L. vid. *Gomphocarpus fruticosus*. *fuscata* W. vid. *Cynanchum fuscatum*. *gigantea* L. v. *Calotropis procera*. *grandiflora* L. vid. *Xysmalobium grandiflorum*. *humistrata* Walt. v. *amplexicaulis*. *hybrida* Mchx. v. *purpurascens*. *lactifera* L. v. *Gymnema lactiferum*. *longifolia* Mchx. v. *Gomphocarpus longifolius*. *nigra* L. v. *Cynanchum nigrum*. *?obovata* Ell. vid. *syriaca* γ. *pedicellata* Walt. v. *Podostigma pubescens*. *periplocaefolia* Nutt. v. *laurifolia*. *procera* Ait. v. *Calotropis procera*. *purpurascens* Walt. vid. *obtusifolia*. *sibirica* Murr. vid. *Cynanchum sibiricum*. *tenacissima* Roxb. vid. *Gymnema tenacissimum*. *tingens* Roxb. vid. *Gymnema tingens*. *?to mentosa* Ell. v. *syrica*. *undulata* L. vid. *Xysmalobium undulatum*. *viminalis* Sw. vid. *Sarcostemma vininale*. *Vincetoxicum* L. vid. *Cynanchum Vincetoxicum*. *virgata* Balb. v. *?linifolia*. *viridis* Walt. v. *Gomphocarpus viridis*. *volubilis* L. v. *Hoya viridiflora*.

Ascyrum L., Hartheu, XXI. VIII. (XVIII. II.), Hypericineae.

amplexicaule Mchx., stengelumfassendes, ♀. k. Florida.
Crux Andreae L., Andreaskreuz - H., ♀. k. Jamaica, Georgia (Nordamerika).

hypericoides L., johanniskrautähnliches, ♀. k. Jamaica, Virginien.

pumilum Mchx., kleines, 4. k. Georgia (Nordamerika).
stans Mchx., dreiblumiges, ♀. k. Carolina.

violaceum Aubl. v. *Norantea guianensis*.

Asimina Adans. (canadisch. Name). XIII. VI., Anonaceae. *grandiflora* Dun., großblumige, ♀. f. b. k. Georgia, Florida.

parviflora Dun., kleinblumige, ♀. f. b. k. Carol., Georgia.

pygmaea Dun., zwergige, ♀. f. b. k. Georgia.

triloba Dun., dreilappige, f. b. k. Virginien, Carolina.

Aspalathus L., Witschen, XVII. VI. (IV.), (XVI. VI.), Leguminosae - Papilionaceae.

affinis Thunb., ähnlicher, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

albens L., weißlicher, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

araneosus L., besponnener, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

argenteus L., silberfarbiger, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

asparagoides Thbg., spargelähnlicher, ♀. t. C. d. g. H.

astroides L., sternblättriger, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

callosus L., schwieliger, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

capitatus L., kopfförmiger, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

carnosus Berg., fleischiger, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

Chenopus Sogl. (*chenopoda* L.), Gänsefuß-W., ♀. t. C. d. g. Hoffn.

ciliaris L., gefranzter, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

crassifolius Andr., dickblättriger, ♀. t. C. d. g. H.

Aspalathus

- ericaefolius L., heideblättriger, ♀. t. Cap d. g. H.
 galioides Berg., labkrauthblättriger, ♀. t. C. d. g. H.
 genistoides L., ginsterähnlicher, ♀. t. C. d. g. H.
 globosus Bot. Rep., kugelblumiger, ♀. t. C. d. g. H.
 hispidus Thbg., steifhaariger, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
 Hystrix Thbg., igelstacheliger, ♀. t. Cap d. g. H.
 indicus L., indischer, ♀. w. Ostindien.
 laricinus DC., lerchenähnlicher, ♀. t. Cap d. g. H.
 mucronatus Thbg., stachelspitziger, ♀. t. Cap d. g. H.
 multiflorus Thbg., vielblumiger, ♀. t. Cap d. g. H.
 niveus Thbg. (*candicans* Ait.), schneeweißer, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
 pedunculatus L'Her., Curt., gestielter, ♀. t. C. d. g. H.
 quinquefolius L., fünfblättriger, ♀. t. C. d. g. H.
 sericeus Thbg., seidenhaariger, ♀. t. C. d. g. H.
 spinosus L., dorniger, ♀. t. Cap d. g. H.
 squarrosus Thbg., sparriger, ♀. t. Cap d. g. H.
 subulatus Thbg., pfriemenblättriger, ♀. t. C. d. g. H.
 thymifolius Thbg., thymianblättriger, ♀. t. C. d. g. H.
 uniflorus L., einblumiger, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

Ebenus L. v. *Brya Ebenus*.

Asparagus T., Spargel, VI. 1., Asparagineae (*Sarmentaceae*).

- acutifolius L., spitzblättriger, ♀. k. f. b. Südeuropa.
 aethiopicus L., aethiopischer, ♀. k. t. Cap d. g. H.
 albus L., weißer, ♀. k. Portugal, Spanien, Barbarei.
 amarus DC., bitterer, 4. f. Oberitalien, südl. u. westl. Frankreich.
 aphyllus L., blattloser, ♀. k. Süd- und Westeuropa, Barbarei.
 asiaticus L., asiatischer, ♀. t. Ostindien.
 Broussoneti Jacq., Broussonet's, 4. k. t. Canarische Inseln.
 capensis L., capischer, ♀. t. Cap d. g. H.
 dahuricus Fisch., dahurischer, 4. f. Dahuria.
 declinatus L., abwärtsgeneigter, 4. k. t. C. d. g. H.
 decumbens Jacq., niederliegender, 4. k. t. C. d. g. H.
 dependens Thbg., herabhängender, ♀. t. C. d. g. H.
 falcatus L., sichelblättriger, ♀. w. Ceylon.
 flexuosus Thbg., vielbeugiger, 4. Sch. t. C. d. g. H.
 horridus L., starkstacheliger, ♀. k. Sicilien, Spanien.
 longifolius Fisch., langblättriger, 4. f. Sibirien.
 maritimus Pall., Meerstrands-S., 4. f. Sibirien, am caspischen Meere.
 officinalis L., gemeiner, 4. f. Europa.
 plocamoides P. B. Webb., plocamaähnlicher, 4. k. t., Teneriffa.
 racemosus W., traubiger, ♀. t. w. Ceylon.
 retrofractus L., zurückgeknickter, ♀. Sch. t. Südafrika.
 sarmentosus L., wurzelrankiger, ♀. Sch. w. Ceylon.
 scandens Thbg., kimmender, ♀. Sch. k. t. C. d. g. H.
 Smithianus P. B. Webb, Smith's, 4. k. t. Teneriffa.
 stipulaceus Lam., afterblättriger, ♀. k. t. C. d. g. H.
 subulatus L., pfriemenförmiger, ♀. 4. k. t. C. d. g. H.
 tenuifolius Lam., feinblättriger, 4. f. Süd- u. Osteuropa.
 verticillaris L., wirtelblättriger, 4. f. Caucasus.
marinus Rchb. et *scaber* Brign. v. *amarus*. *phyl-lacanthus* Lam. v. *aphyllus*. *sylvaticus* Kit. v. *tenuifolius*.

Aspasia Lindl., Aspasie, XX. 1., Orchideae.
epidendroides Lindl., baunstendelähnliche, 4. w. Panama.
variegata Lindl., bunte, 4. w. Südamerika.

Asperugo T., Scharfkraut, V. 1., Asperifoliaceae (*Boraginaceae*).
procumbens L., niederliegendes, ☉. f. Europa.

Asperula L., Waldmeister, IV. 1., Rubiaceae.
alpina MB., Alpen-W., 4. f. Caucasus.
Aparine Schott, Klebkraut-W., 4. f. Schlesien, Mähren, Osteuropa.

β) *rivalis* Sibth.

- arcadiensis* Ker, arcadischer, 4. f. Griechenland.
aristata L. suppl., gegrannter, 4. f. Südeuropa.
arvensis L., Acker-W., ☉. f. Mittel- u. Südeuropa.
brevifolia Vent., kurzblättriger, 4. k. Kleinasien.
crassifolia L., dickblättriger, 4. k. f. b. Levante.
cynanchica L., Hügel-W., 4. f. Europa.
galioides M.B., labkrautähnlicher, 4. f. Deutschland, Schweden, Taurien.
hexaphylla All., sechsblättriger, 4. f. Oberitalien, Ungarn, Siebenbürgen.
hirsuta Desf., rauhhaariger, 4. k. f. b. Portugal, Nordafrika.
hirta Ram., kurzhaariger, 4. f. k. Pyrenäen.
humifusa Bess., gestreckter, 4. f. Podolien, Caucasus.
incana Sm., weißlichgrauer, 4. f. Süd- u. Osteuropa.
laevigata L., glatter, 4. f. Südeuropa.
longiflora Kit., langblumiger, 4. f. Croatien, Krain, Kärnthen, Italien.
longifolia Sm., langblättriger, 4. f. Griechenland.
montana Kit., Berg-W., 4. f. k. Ungarn.
nitida Sm., glänzender, 4. f. k. Griechenland.
odorata L., wohlriechender, 4. f. Europa.
pyrenaica L., pyrenäischer, 4. f. b. Pyrenäen.
rigida Sm., starrer, 4. f. b. k. Griechenland.
rupestris Rchb. (Visian.), Felsen-W., 4. f. k. Dalmatien.
scabra Link, Presl., scharfer, 4. f. Sicilien.
scutellaris Vis., schüsselförmiger, 4. f. ? Dalmatien, Rußland.
supina MB., niederliegender, 4. f. Podolien, Caucasus.
taurina L., turiner, 4. f. Südl. Ungarn, Schweiz, Oberitalien.
tinctoria L., färbender, 4. f. Europa.
tyraica DC., tyrischer, 4. f. k. Levante.
algerica P. et *repens* Brot. vid. *hirsuta*. *calabrica* L. vid. *Ernodea montana*. *suaveolens* Schrad. vid. *longiflora*. *tomentosa* Tenor. v. *incana*.

Asphodeline *liburnica* et *lutea* Rchb. v. *Asphodel*.

Asphodelus T., Affodillilie, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

- aestivus* Broter, Sommer-A., 4. k. f. b. Span., Portugal.
albus W. (*ramosus* β. L.), weißer, 4. f. b. Oberitalien.
clavatus Roxb., keulförmiger, ☉. t. w. Ostindien.
creticus Lam., cretischer, 4. k. Creta.
fistulosus L., röhriger, 4. k. f. b. Südeuropa.
intermedius Hornem., mittlerer, 4. k. f. b. Istrien.
liburnicus Scop., istrianischer, 4. k. f. b. Istrien.
luteus L., gelber, 4. f. Südeuropa, Taurien, Sibirien.
β) *sibiricus* Lindl.

Asphodelus

microcarpus Visian., kleinfrüchtiger, 4. Zw. f. b. k. Dalmatien.

neglectus Schult., übersehener, 4. f. k. Istrien.

prolifer MB., sprossender, 4. f. b. k. Armenien.

ramosus L., ästiger, 4. f. b. k. Südeuropa.

tauricus, taurischer, 4. f. b. k. Taurien.

tenuior MB., dünner, 4. f. b. k. Caucasus.

altaicus Pall. v. *Eremurus spectabilis*. ? *capillaris*

Redout. v. *liburnicus*.

Aspicarpa Rich., Schildfrucht, I. II., Malpighiaceae.

urens Lagasc. (*hirtella* Rich.), brennende, 4. Sch. w. Südamerika.

Aspidistra Ker, Schildblume, VIII. I., Aroideae.

elatio H. Anglor., höhere, 4. w. Japan.

β) *variegata*.

lurida Ker, gelbbraune, 4. w. China.

punctata Lindl., punktirte, 4. w. China.

Aspidium Sw., Schildfarn, XXIV. I., Pteridoideae (*Polypodiaceae*).

acrostichoides Schw., vollfarnähnlicher, 4. f. Nordamer.

aculeatum Sw., feinstacheliger, 4. f. Europa, Nordafrika.

angulare Kit., kantiger, 4. f. Ungarn.

auriculatum Sw., geöhrter, 4. w. Ostindien.

cicutarium Sw., schierlingblättriger, 4. w. Jamaica.

cordifolium Sw., herzblättriger, 4. w. Westindien.

coriaceum Sw., lederblättriger, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

Mascarenas, Westindien, Brasilien etc.

crinitum Boj., bemähter, 4. w. Mauritius-Inseln.

cristatum Sw., kammiger, 4. f. Nordeuropa, Nordamer.

Cunninghamii J. Sm., Cunningham's, 4. t. w. Neuseeland.

decompositum Spgl., vieltheiliger, 4. w. Neuholland.

dilatatum Sw., verbreiteter, 4. f. Europa, Nordamerika.

drepanum, Sw., sichelblättriger, 4. t. w. Madeira.

dumetorum Sm., Hecken-S., 4. f. England.

exaltatum Sw., hoher, 4. w. Westindien, Südamerika, Neuholland.

Filix mas Sw., gemeiner, 4. f. Europa, Nordasien u. Afrika.

fragrans Sw., wohlriechender, 4. f. Sibirien.

Goldianum Hook, Goldie's, 4. f. Nordamerika.

Hippocrepis Sw. (*apiifolium* Sckk.), sellerieblättriger, 4. w. Westindien.

intermedium Mühlenb., mittleres, 4. f. Nordamerika.

invisum Sw., dichtkörniger, 4. w. Jamaica, Cuba.

irriguum Sm., Bach-S., 4. f. England.

laetevirens Bevis, freudiggrüner, 4. t. w. Madeira.

lobatum Sw., gelappter, 4. f. England, Deutschland, Frankreich.

Lonchitis Sw., buchtenfarnähnlicher, 4. f. Europäische Voralpen.

β) *asperimum* H. Angl. Nordamerika.

lucens Boj., starkglänzender, 4. f. Mauritius-Inseln.

macrophyllum Sw., großblättriger, 4. w. Westindien.

marginale Sw., randkörniger, 4. f. Nordamerika.

molle Sw., weichblättriger, 4. w. Westindien, Neuholland, Mascarenas etc.

mucronatum Sw., stachelspitziger, 4. w. Jamaica.

noveboracense Sw., newyorkischer, 4. f. Nordamerika.

Oreopteris Sw., Felsen-S., 4. f. Europäische Haine.

Aspidium

- parasiticum* Sw., schmarotzender, 4. w. Ost- u. Westindien, Molucken.
patens Sw., abstehender, 4. w. Westindien.
pectinatum W., kammförmiger, 4. w. Westindien.
pennigerum Sw., fiederiger, 4. w. t. Westindien, Neuseeland.
proliferum RB., sprossender, 4. w. t. Van Diem. Land.
propinquum Kaulf., verwandter, 4. w. Ostindien.
pubescens Sw., weichhaariger, 4. w. Jamaica.
pungens Kaulf., stechender, 4. w. t. Cap d. g. H.
rhizophyllum Sw., wurzelblättriger, 4. w. Westindien.
rigidum Sw., starrer, 4. f. Salzburger u. französische Voralpen.
Serra Sw., sägezähniger, 4. w. Westindien, Marianeninseln, Neuseeland.
spinulosum Sw., borstigblättriger, 4. f. Europa.
Thelypteris Sw., Sumpf-S., 4. f. Wa. Europa, Nordamerika.
trapezoides Sw., trapezenförmiger, 4. w. Jamaica.
trifoliatum Sw., dreiblättriger, 4. w. Westindien, Mascarenas.
unitum Sw., vereinigter, 4. w. Ostindien, Mascarenas, Neuholland, Manila.
villosum Sw., zottiger, 4. w. Jamaica, Hispan., Mexico.
violascens H. Berol., violetter, 4. w. Mexico.
aemulum Sw., *alpinum* Sw., *bulbiferum* Sw., *fragile* Sw. etc. v. *Cystopteris aemula* etc. *angustum* W. v. *Asplen. Michauxii*. *asplenioides* W. v. *Aspl. Athyrium*, *Filix femina* Sw., *fontanum* W. etc. v. *Asplenium* F. fem. etc. *lanosum* Sw. v. *Cheilanthes vestita*.

Asplenium L., Strichfarn, XXIV. 1., Pterioideae (*Polypodiaceae*).

- acutum* Bory, spitzer, 4. t. f. b. Illyrien, Oberitalien, Spanien, canarische Inseln.
Adiantum nigrum L., schwarzer (schwarzes Frauenhaar), 4. k. f. Mittel- und Südeuropa.
alatum Humb., geflügelter, 4. w. Neu-Granada.
angustifolium Mchx., schmalblättriger, 4. k. f. Nordamerika.
Athyrium Spgl., blasenfarnähnlicher, 4. f. Nordamerika.
attenuatum RB., verdünnter, 4. t. w. Neuholland.
auritum Sw., gehörter, 4. w. Westindien.
biauritum H. Angl., zweiöhriger, 4. w. Westindien.
bipartitum W., zweitheiliger, 4. w. Mascarenas, Westindien.
bisectum Sw., weispaltiger, 4. w. Jamaica.
brasiliense Sw., brasilianischer, 4. w. Brasilien.
bulbiferum Forst., knollentragender, 4. t. w. Neuseeland.
cicutarium Sw., schierlingblättriger, 4. w. Westindien.
cultrifolium L., messerblättriger, 4. w. Martinique, Neugranada.
cuneatum Lam., keilblättriger, 4. w. Westindien, Mascarenas.
dentatum L., gezählter, 4. w. Westindien.
depressum H. angl., niedergedrückter, 4. w. ?
difforme RB., ungleichförmiger, 4. t. w. Neuholland.
diversifolium Cun., verschiedenblättriger, 4. t. w. Neuseeland, Norfolk.

Asplenium

- ebeneum* Ait., schwarzstieliger, 4. k. f. Nordamerika.
falcatum Lam., sichelförmiger, 4. w. Ostindien, Neapel, Mascarenas, Neuholland, Jamaika.
Filix femina. Bernh., weiblicher, 4. f. Europa.
fissum, Kit., gespaltener, 4. f. Croatien, Salzb., Krain.
flabellifolium Cav., fächerblättriger, 4. w. Neuholland, Van-Diemensland.
fontanum RB., Quellen-St., 4. f. k. England, Ungarn, Sibirien.
formosum W., wohlgestalteter, 4. f. w. Westindien, Neugranada.
fragrans Sw., wohlriechender, 4. w. Jamaica, China.
furcatum Thbg., gabeliger, 4. w. Südafrika, Mascarenas, Ostindien.
germanicum Weis, deutscher, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.
Halleri RB., Haller's, 4. f. k. Süddeutschl., Schweiz, Frankreich.
lanceolatum Huds., lanzettförmiger, 4. f. England, Azoren, Böhmen, Ungarn.
lepidum Presl., schilferiger, 4. f. Böhmen.
lunulatum Sw., mondförmiger, 4. t. W. Cap d. g. H.
maderense Penny, maderensischer, 4. t. Madeira.
marinum L., Meerstrands-St., 4. k. t. England, Spanien, Nordafrika, canarische Inseln.
melanocaulon W., schwarzstengeliger, 4. f. k. Nordamerika.
Michauxii Spreng., Michaux's, 4. f. Nordamerika.
monanthemum Sm., einhäufiger, 4. t. w. Cap d. g. H., Südamerika, Philippinen.
montanum L., Berg-St., 4. k. f. b. Carolina.
multicaule Presl., vielstengeliger, 4. f. Böhmen, Thüring.
Nidus L., Vogelnest-St. (dickblättriger), 4. w. Mascarenas, ostind. Inseln d. stillen Meeres, Neuholland.
obtusatum Forst., stumpfer, 4. w. Martinique, Cuba.
palmatum Lam., handförmiger, 4. t. w. Westl. Europa, Nordafrika, Canarische Inseln, Azoren.
Petrarchae DC., Petrarca's, 4. k. f. Südfrankreich.
praemorsum Sw., abgebissener, 4. w. Ostindien, Mascarenas, Neuholland, Jamaica.
pulchrum Bevis, schöner, 4. w. Jamaica.
pumilum Sw., kleiner, 4. w. Westindien, Philippinen.
rhizophorum L., wurzeltragender, 4. w. Jamaica.
rhizophyllum L., wurzelblättriger, 4. k. f. Nordamerika.
Ruta muraria L., Mauer- (Raute)-St. 4. f. Europa, Nordamerika.
 β) *obtusum* Kit.
salicifolium L., weidenblättriger, 4. w. Westindien.
septentrionale Sw., nördlicher, 4. f. Europa.
serratum L., sägezahniger, 4. w. Westindien.
Shepherdii Spgl., Shepherd's, 4. w. Jamaica.
striatum L., gestreifter, 4. w. Westindien.
thelypteroides Mchx., sumpffarnähnlicher, 4. f. Nordamer.
Trichomanes L., schwarzrother, 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.
viride Huds., grüner, 4. f. England, Mittel- u. Südeuropa.
viviparum H. Kew., lebendiggebärender, 4. w. Mauritiusinsel.
zamiaefolium W., zamienblättriger, 4. w. Westindien, Südamerika.

Asplenium

acrostichoides Sw. vid. *thelypteroides*. *adiantoides* Lam. v. *furcatum*. *anthriscifolium* Jacq. v. *pumilum*. *crassifolium* Hoffmannsegg v. *Nidus*. *glandulosum* Loisel. v. *Petrarchae*. *obliquum* La Bill. v. *obtusatum*. *Vallisclausae* Req. v. *Petrarchae*. Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Caenopteris*, *Ceterach*. *Diplazium*, *Gymnogramme*, *Meniscium*, *Scolopendrium*.

Asprella Hystrix Cav. v. *Gymnostichum*. *Asprella* Schreb. Lam. v. *Leersia*.

Assonia Cav. (Ignatius v. Asso, spanischer Botaniker), XVI. VII., *Malvaceae*-*Dombeyaceae*.

populnea Cav., pappelblättrige, 5. w. Mascarenas.

viburnoides Cav., schneeballähnliche, 5. w. Mascarenas.

Astartea DC., *Astartea*, XVIII. II. *Myrtaceae*.

fascicularis DC., büschelblättrige, 5. t. Nördl. Neuhol.

Astelia RB., *Astelia* VI. I., *Coronariae*-*Asphodeleae*.

Banksii RB., Bank's, 4. t. Neuzeeland.

Astelma canescens D. Don. *eximium* RB. etc. v. *Helipterum canescens* etc. *fruticans* RB. vid. *Helichrysum fruticans*.

Astephanus RB., Nacktkrone, V. II., *Asclepiadeae*.

linearis RB., linienblättrige, 4. Sch. t. Cap d. g. H.

triflorus RB., dreiblumige, 4. Sch. t. Cap d. g. H.

Aster T., Sternblume, XIX. II., *Compositae*-*Corymbiferae**).

I. *Aster* N. E. DC. (*genuinae*).

abbreviatus N. E. (*acuminatus* N. E. *Cornuti* Müll.), abgekürzte, 4. f. Nordamerika.

adulterinus W., verschwärgerte, 4. f. Nordamerika.

aestivus Ait., Sommer-St., 4. f. Nordamerika,

alpinus L., Alpen-St., 4. f. Mittel- u. westeuropäische. caucasische und sibirische Alpen.

β) *nivalis* Adams. γ) *albiflorus*. δ) *ramosus*.

amelloides Bess. Rchb. (*elegans* N. E. *pseudo Amellus* Wend. DC.), unächte, Virgils, 4. f. Osteuropa.

β) *bessarabicus* Bernh.

Amellus L., Virgil's, 4. f. Mittel-u. Südeuropa, Taurien. *amplexicaulis* Mühlenb., stengelumfassende, 4. f. Nordamerika.

amplus Lindl., herrliche, 4. f. Nordamerika.

argunensis DC., argunische, 4. f. Dahuria.

argutus N. E., spitzsägezähne, 4. f. Nordamerika.

asper N. E., rauhe, 4. f. Nordamerika.

auritus Lindl., geöhrt, 4. f. Nordamerika.

azureus Lindl., azurblaue, 4. f. Louisiana.

bellidiflorus W., maßliebenblumige, 4. f. Nordamerika.

β) *angustus* N. E. γ) *rigidulus* N. E. δ) *salicinus* N. E.

biflorus Michx. (*strictus* Pursh), zweiblumige, 4. f. Nordamerika.

bifrons Lindl., belaubte, 4. f. Nordamerika.

blandus Pursh, liebliche, 4. f. Canada.

*) Da die größere Zahl der Gärtner die neueren von *Aster* getrennten Gattungen noch als *Aster* in ihren Verzeichnissen aufführen, so sind sie größerer Bequemlichkeit und Raumersparnis wegen hier als Untergattungen aufgeführt.

Aster

- brumalis N. E., winterliche (*laevigatus* Lam. *serotinus* Nutt.), 4. f. Nordamerika.
- canescens Pursh, weifsgrauliche, ♂. f. Nordamerika.
- carolinianus Walt., carolinische, 4. f. Sch. f. b. k. Carolina.
- ciliolatus Lindl., gefranzte, 4. f. Nordamerika.
- concinus W., nette, 4. f. Nordamerika.
- β) strictior.
- concolor L., einfarbige, 4. f. Nordamerika.
- confertus N. E., gedrängtblumige, 4. f. Nordamerika.
- conspicuus Lindl., augenfällige, 4. f. Nordamerika.
- cordifolius L., herzblättrige, 4. f. Nordamerika.
- cyaneus Hoffm., kornblumenblaue, 4. f. Nordamerika.
- α) glaucus N. E. (*decorus* Dsf.), β) politus N. E. (*rubricaulis cyaneus* Poir.).
- diffusus Ait., weitschweifige, 4. f. Nordamerika.
- divergens Ait., divergirende, 4. f. Nordamerika.
- diversifolius Mchx., verschiedenblättrige, 4. f. Nordamer.
- Douglassi Lindl., Douglas's, 4. f. Nordamerika.
- Drummondii Lindl., Drummond's, 4. f. Louisiana.
- dumosus L., Hecken-St. (*foliosus* P. *foliolosus* N. E.), 4. f. Nordamerika.
- ericoides L., heideähnliche, 4. f. Nordamerika.
- firmus N. E. (*amoenus* et *punicens* Hort.), feste, 4. f. Nordamerika.
- fragilis W., zerbrechliche, 4. f. Nordamerika.
- β) scoparius N. E.
- glabellus N. E., kahle, 4. f. Nordamerika.
- α) pilosus (*sparsiflorus* W.) β. glaber (*dumosus* N. E. *sparsiflorus* Mchx. *leptophyllus*, *ramosissimus* et *subulatus* Hort.).
- ? gracilis Nutt., schlanke, 4. f. Nordamerika.
- graminifolius Pursh, grasblättrige, 4. f. Nordamerika.
- grandiflorus L., großblumige, 4. f. Nordamerika.
- heterophyllus W., ungleichblättrige, 4. f. Nordamerika.
- β) glabriusculus. γ) scaber N. E..
- hirsuticaulis Lindl., haarstengelige, 4. f. Nordamerika.
- hyemalis N. E. (*salicifolius* N. E.), Winter-St., 4. f. Nordamerika.
- ircutianus DC., (*conspicuus* Turcz.) ircutische, 4. f. Dahuria.
- laevigatus W., geglättete, 4. f. Nordamerika.
- laevis L. (*lucidus* Ait.), glatte, 4. f. Nordamerika.
- Lamarckianus N. E. (*paniculatus* Lam., *Tradescanti* Hrt.), Lamarck's, 4. f. Canada.
- lanceolatus W., lanzettblättrige, 4. f. Nordamerika.
- laxus W., lockere, 4. f. Nordamerika.
- leucanthemus Dsf. (*dracunculoides* W. non Lam.), weifsblumige, 4. f. Nordamerika.
- longifolius Lam., langblättrige, 4. f. Nordamerika.
- β) major. γ) eminens W. N. E. δ) densiflorus. ε) laevigatus. ζ) brevrameus. η) albiflorus.
- lucidus Wender., glänzende, 4. f. Nordamerika.
- luxurians Spgl., üppige, 4. f. Nordamerika.
- marginatus H. B. K., berandete. 4. k. f. b. Neugranada.
- miser L., dürrtge, 4. f. Nordamerika.
- β) myrtifolius W.
- modestus Lindl., bescheidene, 4. f. Nordamerika.
- montanus Nutt., Berg-St., 4. f. Nordamerika.

Aster

- multiceps Lindl., vielköpfige, 4. f. Louisiana.
 multiflorus Ait., vielblumige, 4. f. Nordamerika.
 β) ciliatus W. N. E.
 mutabilis L. Ait. (*versicolor* Hort.), veränderliche, 4. f. Nordamerika.
 novae-angliae L., neuenglische, 4. f. Nordamerika.
 α) agrestis N. E. (*spurius* W.). β) hortensis N. E. γ) roseus (*pudibundus* et *ruber* Hort.).
 novi Belgii L. N. E., neubelgischer, 4. f. Nordamerika.
 α) ampliflorus N. E. (*serotinus* N. E.). β) squarrosus N. E. γ) serus N. E. δ) floribundus W. (*minor* N. E.).
 nudiflorus Nutt., nacktblumige, 4. f. Nordamerika.
 obliquus N. E., schiefblättrige, 4. f. Nordamerika.
 oblongifolius Nutt. (*graveolens* Nutt.), verlängertblättrige, 4. f. Nordamerika.
 onustus N. E., überladene, 4. f. Nordamerika.
 β) squarrosus Lindl. (*Tradescanti* coer. H. Angl.).
 paniculatus Ait., rispige, 4. f. Nordamerika.
 parviflorus N. E. (*miser* Ait. non L.), kleinblumige, 4. f. Nordamerika.
 patens Ait., abstehende, 4. f. Nordamerika.
 patentissimus Lind., weitabstehende, 4. f. Louisiana.
 patulus Lam. (*paniculatus* W., *Cornuti* Wendl., *Tradescanti* Hoffm.), ausgebreitete, 4. f. Nordamerika.
 β) pallens W.
 pendulus Ait. (*horizontalis* Dsf.), herabhängende, 4. f. Nordamerika.
 peregrinus Pursh, fremde, 4. f. Westl. Nordamerika.
 phlogifolius Mühlenb., phloxblättrige, 4. f. Nordamer.
 pilosus W., behaarte, 4. f. Nordamerika.
 praealtus Poir. (*virgatus* N. E. non Mönch), hohe, 4. f. Nordamerika.
 praecox W., frühe, 4. f. Nordamerika.
 prenanthoides Mhlbg., hasenlattichähnliche, 4. f. Nordamerika.
 Prescotti Lindl., Prescott's, 4. f. Dahuria.
 puniceus L. (*amoenus* et *hispidus* Lam.), rothstengelige, 4. f. Nordamerika.
 β) demissus Lindl.
 purpuratus N. E., purpurfarbige, 4. f. Nordamerika.
 pyrenaeanus Dsf. (*sibiricus* Hort. non L.), pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.
 racemosus Ell., traubige, 4. f. Nordamerika.
 Radula Ait., raspelige, 4. f. Nordamerika.
 recurvatus N. E., zurückgekrümmte, 4. f. Nordamerika.
 retroflexus Lindl., zurückgebogene, 4. f. Nordamerika.
 rubricaulis Lam., rothstengelige, 4. f. Nordamerika.
 sagittaeifolius W., pfeilblättrige, 4. f. Nordamerika.
 salignus W. (*salicifolius* Scholl.). weidenblättrige, 4. f. Deutschland, Ungarn.
 salsuginosus Richards, Salinen-A., 4. f. Nordamerika.
 sericeus Vent., seidenhaariger, 4. f. b. k. Nordamerika.
 β) microphyllus DC., Texas. k.
 sibiricus L. (*inuloides* Fisch. non Don, *lacerus* Lindl.), sibirische, 4. f. Sibirien.
 simplex W., einfache, 4. f. Nordamerika.
 spathulatus Lindl., spatelblättrige, 4. f. Nordamerika.

Aster

spectabilis Ait., ansehnliche, 4. f. Nordamerika.

β) *bellidifolius*.

squarrosus Walt., sparrige, 4. f. Nordamerika.

stenophyllus Lindl., schmalblättrige, 4. f. Nordamerika.

strictus Poir., steife, 4. f. Nordamerika.

subasper Lindl., wenigraue, 4. f. Louisiana.

subspicatus N. E., wenigährige, 4. f. Westl. Nordamerika.

surculosus Mchx., sprossende, 4. f. Nordamerika.

? β) *liatroides* Mühlenb.

tardiflorus N. E.?, späthblühende, 4. f. Nordamerika.

β) *caespitosus* Lindl.

tataricus L. fil. (*rhomboideus* Lindl.), tatarische, 4. f. Sibirien, Dahuria.

tenuifolius L. (*junceus* N. E. Pursh), dünnblättrige, 4. f. Nordamerika.

β) *recurvatus*.

thyrsiflorus Hoffm. (*recurvatus* W.), strauchblumige, 4. f. Nordamerika.

β) *squarrosus* Lindl.

Tradescanti L. (*vimineus* Lam., *pinifolius* N. E.), *Tradescant's*, 4. f. Nordamerika.

turbinellus Lindl., aufgetriebene, 4. f. Louisiana.

versicolor W. (*mutabilis* Hort.), buntfarbige, 4. f. Nordamerika.

vimineus W., ruthenartige, 4. f. Nordamerika.

β) *glaber* Meyer.

angustus N. E. v. *bellidiflorus* β. *argenteus* Mchx.

v. *sericeus*. *biennis* Nutt. vid. *canescens*. *ciliatus*

N. E. v. *multifl.* β. *Cornuti* Wendl. vid. *patulus*.

elegans W. v. *spectabilis*. *eminens* W. vid. *longi-*

fol. γ. *floribundus* W. v. *novi Belgii* δ. *junceus*

Ait. v. *longifol.* *laxiflorus* Lk. v. *glabellus*. *pau-*

ciflor. Lindl. v. *Prescottii*. *polyphyll.* W. v. *tenui-*

fol. *pubescens* Hornem. v. *heterophyll.* *pulchellus*

W. v. *alpinus*. *rigidulus* Dsf. v. *obliquus*. *salici-*

fol. Ait. v. *praealtus*. *scandens* Mchx. vid. *carolin.*

scaber Ell. v. *diversifol.* *scoparius* N. E. v. *fragi-*

lis. *secundiflor.* Dsf. v. *diffusus*. *speciosus* Hornem.

v. *spectabilis*. *spurius* W. v. *novae angliae* α. *un-*

dulatus L. spec. I. vid. *patens*. *undulatus* L. spec.

II. v. *diversifol.* *villosus* Mchx. v. *pilosus*. *virgi-*

neus N. E. v. *longifol.*

II. *Biotia* DC. non Cass.). (*Eurybia* Cass. N. E.

commixta (N. E.) (*ornatus* H. Angl.? *Eur. Jussieui* Cass.),

vermischte, 4. f. Nordamerika.

corymbosa (Ait.), (*cordifol.* Mchx.), doldentraubige, 4. f. Nordamerika.

β) *alatus* Bartr.

glomerata (Bernh.), knaulförmige, 4. f. Pennsylvanien.

latifolia (Dsf.), breitblättrige, 4. f. Nordamerika.

macrophylla (L.), großblättrige, 4. f. Nordamerika.

β) *divaricata* (L.), (*macroph. carneus* Hort.).

Schreberi (N. E.), (*ambiguus* et *subcymosus* Bernh.), Schreber's, 4. f. Nordamerika.

III. *Calimeris* N. E. (*Kalimeris* Cass.).

altaica (W.), altaische, 4. f. Sibirien.

exilis Lindl., dünne, 4. f. Sibirien.

Gebleri Bess., Gebler's, 4. f. Sibirien.

Aster

hispida Lindl. non N. E., steifhaarige, 4. f. Sibirien.
incisa (Fisch.), eingeschnittene, 4. f. Sibir., Dahuria.
rosea (Steven), rosafarbene, 4. f. Ostcaucasus.
tatarica Lindl., tatarische, 4. f. Dahuria, Mongolei.
canescens N. E. vid. *Gebleri*. *pumilis* Fisch. vid.
altaica.

IV. *Callistephus* Cass. (*Callistemma* Cass.).

chinensis (L.), chinesische, ☉. f. China, Japan.

β) *fistulosus*. γ) *multiplex*. δ) *nanus*.

Heyneanus DC., (*indicus* Heyne non L.) Heyne's, ☉. f. Ostindien.

V. *Diplopappus* DC. Cass. (*Diplostephium* N. E.).

asper Less., rauhe, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

asperimus (Wall.), sehr rauhe, 4. t. Nepal.

caucasicus (W.), caucasische, 4. f. Caucasus.

extenuatus (N. E.), schwächte, ♀. t. Cap d. g. H.

filifolius (Vent.), fadenblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.

fruticulosus (W.), (*fruticosus* L.), strauchige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *Hookeri*.

incanus Lindl., weißlichgraue, 4. f. Californien.

linariaefolius (L.), (*rigidus* Mchx.), leinkrautblättrige, 4. f. Nordamerika.

obtusatus (W.), stumpfliche, ♀. t. Cap d. g. H.

rigidus (L.), (*linarifol.* Mchx.), starre, 4. f. Nordamer.

chrysanthemifol. Hort. v. *filifolius*. *coriaceus* Hort.

v. *extenuatus*. *pluriflorus* G. Don vid. *fruticulosus*.

pulcherrimus Lodd. v. *rigidus*. *rosmarinifol.* Spgl.

v. *obtusatus*.

VI. *Diplostephium* Cass. (*Doellingeria* N. E.).

acuminatum (Mchx.), zugespitzte, 4. f. Nordamerika.

amygdalinum (Lam.), mandelblättrige, 4. f. Nordamerika, Terra nova.

β) *humilius*.

cornifolium (Mühlbg.), hartriegelblättrige, 4. f. Pensylv.

dichotomum (Ell.), zweizinkige, 4. f. Nordamerika.

obovatum (Ell.), (*boreale* Spgl.), verkehrteblättrige, 4. f. Nordamerika.

umbellatum (Ait.), doldenblumige, 4. f. Nordamerika.

divaricatus Spgl. et *humilis* W. vid. *amygdal. infirmus* Mchx. v. *cornifol.*

VII. *Eurybia* Cass. (et *Spongotrichum* N. E.).

aculeata (La Bill.), stachelige, ♀. t. Neuholland, Van Diem. Land.

argophylla (La Bill.), silberblättrige, ♀. t. Neuholland, Van Diem. Land.

Dampieri (A. Cunningh. sub *Conyza*), Dampier's, ♀. t. Neuholland.

erubescens (Sieb.), röthliche, ♀. t. Neuholland, Van Diem. Land.

furfuracea (Rich. et Less.), kleiige, ♀. t. Neuseeland.

glandulosa (La Bill.), drüsige, ♀. t. Neuholland, Van Diem. Land.

ilicifolia (Cunn.), stechhülsenblättrige, ♀. t. Neuholland.

lepidophylla (P.), (*microphyll.* LaBill.), schülferigblättrige, ♀. t. Neuholland, Van Diem. Land.

lirata (Sims), furchige, ♀. t. Neuholland.

microphylla (Vent.), kleinblättrige, ♀. t. Oestl. Neuholl.

Aster

myrsinoides (La Bill.), myrsinenblättrige, ♀. t. Neuhol-
land, Van Diem. Land.

β) *serrata*.

pimeleoides (Cunn.), pimeleaähnliche, ♀. t. Neuholland.

ramosissima DC., starkästige, ♀. t. Neuholland.

ramulosa (La Bill.), kleinästige, ♀. t. Neuholland, Van
Diem. Land.

viscosa (La Bill.), schmierige, ♀. t. Neuholland, Van
Diem. Land.

australis Hort. v. *ramulosa*. *exasperatus* Lk. vid.

aculeata. *elaeagnifol.* Cunn. v. *furfurac.* *pulveru-*

lentus Hffinsg. vid. *lirata*. *rutaeodorus* Cunn. vid.

glandulos.

VIII. *Felicia* Cass. (et *Polyarrhena* Cass.).

angustifolia (Jacq.), schmalblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.

β) *villosa* (Thbg.).

echinata (Less.), igelborstige, ♀. t. Cap d. g. H.

hirsuta DC., rauhhaarige, ♀. t. Cap d. g. H.

reflexa (L.), zurückgebogene, ♀. t. Cap d. g. H.

comyzoides Dsf. v. *angustifol.* β. *lanuginosus* Wendl.

v. *hirsut.* *tenellus* L. v. *Agathaea tenella*.

IX. *Galatella* Cass. (*Galatea* Cass.).

acris (L.), scharfe, 4. f. Südfrankreich, Span., Italien.

cana (W. et K.), graue, 4. f. Ungarn.

β) *intermedia* Cass.

dahurica DC., dahurische, 4. f. Dahuria.

dracunculoides (Lam.), dragunblättrige, 4. f. Sibirien,
Taurien, Caucasus.

β) *discoidea*.

fastigiata (Lehm.), gipfelständige, 4. f. Sibirien.

Hauptii (Ledeb.), Haupt's, 4. f. Sibirien (Altai).

hyssopifolia (L.), isopblättrige, 4. f. Nordamerika.

linifolia (L.), (*albiflora* Cass.), leinblättrige, 4. f. Nord-
amerika.

nemoralis (Ait.), Hain-A., 4. f. Nordamerika.

β) *uniflorus* Mchx.

obtusifolia Lehm., stumpfblättrige, 4. f. Nordamerika.

punctata (W. K.), (*insculpta* N. E.), punktirte, 4. f.
Sibirien.

trinervis (Desf.), (*rigida* Cass.), dreinervige, 4. f. Frankr.

acris W. et Hort. vid. *trinervis*. *bifidus* N. E. vid.

dracunculoid. *leptophyllus* Fisch. v. *tenuifol.*

X. *Heleastrum* DC.

album (W.), weiß, 4. f. Nordamerika.

paludosum (Ait.), Sumpf-St. 4. f. Nordamerika.

XI. *Machaeranthera* N. E.

tanacetifolia (H. B. K.), (*A. chrysanthemoides* W.), rain-
farnblättrige, 4. k. Mexico.

XII. *Munychia*. Cass.

Cymbalariae (L.), cymbelkrautartige, 4. t. C. d. g. H.

hirsuta DC., rauhhaarige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

XIII. *Olearia* Mönch.

dentata (Andr.), (*A. ferrugineus* Wendl. et *tomentosus*
Schröd.), gezähnelte, ♀. t. Neuholland.

phlogopappa (La Bill.), röthlichfederige, ♀. t. Neuhol-
land, Van Diem. Land.

quercifolia (Sieb.), eichenblättrige, ♀. t. Neuholland.

rotundifolia DC., rundblättrige, ♀. t. Neuholland.

Aster

stellulata (La Bill.), sternhaarige, ♀. t. Neuholl., Van Diem. Land.

phlochotrichus Spgl. v. *phlogopapp. sinuatus* Cun. v. *quercifol.*

XIV. Sericocarpus N. E.

concolor (L.), einfarbige, 4. f. Nordamerika.

conyzoides (W.), dürrwurzähnliche, 4. f. Nordamerika.

β) *plantaginifolius* N. E.

solidagineus (Mchx.), goldruthenähnliche, 4. f. Nordamerika.

tortifolius (Mchx.), gedrehtblättrige, 4. f. Nordamerika.

XV. Tripolium N. E.

angustum Lindl., schmale, 4. f. Nordamerika.

flexuosum (Nutt.), gebogene, 4. f. Nordamerika.

? *pauciflorum* N. E., wenigblumige, 4. f. Nordamerika.

subulatum (Mchx.), pfriemenblättrige, ☉. ♂. f. Nordamerika.

vulgare N. E., gemeine Salz-St., ♂. f. Europa, Sibirien.

β) *pannonicum* (Jacq.). γ) *diffusum*. δ) *salinum* (Schrad.).

longifolius Dsf. vid. *subulat.* *Tripolium* L. vid. *T. vulgare*.

XVI. Turczaninovia DC.

fastigiata DC., gipfelständige, (*A. fastigiatus* Fisch.), ♂. 4. Sibir. Dahur.

annuus L. vid. *Stenactis annua. bonariensis* Spgl.

v. *Erigeron glaucum. capensis* Less. v. *Agathaea*

amelloides. crenatus Less. v. *Mairia crenata. crinitus* L. vid. *Athrixia heterophylla. crinitus* Thbg.

v. *Athrixia capensis. heterophylla* Thbg. vid. *Athr.*

heterop. indicus L. v. *Asteromaea indica. vernus*

L. v. *Stenactis verna.* Die übrigen s. die Gattungen

Erigeron, Inula, Pulicaria.

Asteracantha N. E., Stachelklau, XIV. II., Acanthaceae.

longifolia N. E., langblättrige, ♂. w. Ostindien.

Asteranthus Dsf., Sternstrauch, XIII. I., ? Sapotaceae - Olacineae.

brasiliensis, brasilianischer, ♀. w. Brasilien.

Asterocephalus Vaill. v. *Scabiosa*.

Asterolinon Lk., Sternlein, V. I., Primulaceae - Lysimachieae.

stellatum Lk., ästiges ☉. f. Süd- u. Westeuropa, Griechenland.

Asteromaea Blum., Kronenaster, XIX. II., Compositae - Corymbiferae.

indica Blum., indische, ☉. f. m. Ostindien, China.

Asterothrix Cass., Sternhaar, XIX. I., Compositae - Cichoraceae.

asperrima Cass., rauhes, 4. f. Caucasus, Nordpersien.

hispanica DC., spanisches, ☉. f. Spanien.

Astible Hamilt., Astible, X. II., Saxifrageae.

decandra D. Don, zehn männige, 4. f. Carolina.

Astragalus T., Tragant, XVII. IV. (VI.), Leguminosae - Papilionaceae.

adsurgens Pall., W., aufgerichteter, 4. f. Sibirien.

β) *prostratus* Fisch.

aduncus W., gebogener, 4. f. Armenien, Caucasus.

Aegiceras W., ziegenhorniger, ☉. f. ?

Alopecias Pall., Fuchs-T., 4. f. Tatarei.

Astragalus

- alopecuroides L., (*alopecurus* Pall.), fuchsschwanzähnlicher, 4. f. Mongolei, Kamtschatka.
 Ammodytes Pall., Sandotter-T., 4. f. Tatarei.
 ancylotus F. et Mey., gelenkverbundener, ☉. f. Gegend des caspischen Meeres.
 annularis L., ringförmiger, ☉. f. Aegypten.
 arenarius L., Sand-T., 4. f. Deutschland, Schweden.
 argenteus Visian., silberfarbiger, 4. f. Istrien, Dalmatien.
 aristatus L'Her., begrannter, ☿. f. b. k. Wallis, Piemont, Südfrankreich.
 asper Jacq., rauher, 4. f. Ungarn, Caucasus.
 austriacus L., österreichischer, 4. f. Osteuropa, Cauc.
 baeticus L., spanischer, ☉. f. Spanien, Sicil., Kleinasien.
 Barba Jovis DC., Jupiters-Bart-T., ☿. k. Armenien.
 bayonensis Lois., bayonnischer, 4. f. Südfrankreich.
 brachycarpus MB., kurzfrüchtiger, 4. f. Caucasus.
 brachyceras Ledeb., kurzhorniger, ☉. f. Taurien.
 breviflorus DC., kurzblumiger, 4. ☿. k. f. b. Armenien.
 buchtormensis Pall., buchtormischer, 4. f. Sibirien.
 calycinus MB., langkelchiger, 4. f. Caucasus.
 campylorrhynchus Fisch. et Mey., krummschnabeliger, ☉. f. Nordpersien.
 canadensis L., canadischer, 4. f. Nordamerika.
 capitatus L., kopfförmiger, 4. k. f. b. Kleinasien.
 caprinus L., Ziegen-T., 4. k. f. b. Griechenl., Nordafrika.
 carolinianus L., carolinischer, 4. f. Nordamerika.
 caryocarpus Ker., nussfrüchtiger, 4. f. Nordamerika.
 caspicus MB., caspischer, ☿. f. b. k. Caucasus.
 caucasicus Pall., caucasischer, ☿. f. b. k. Cauc., Armenien.
 chinensis L., chinesischer, 4. k. t. China.
 chlorostachys Lindl., grünähriger, 4. k. f. Nepal.
 christianus L., christlicher, 4. f. b. k. Armenien.
 Cicer L., kicherartiger, 4. f. Europa, Caucasus.
 β) microphyllus Auctor.
 compactus Lam., dichtblumiger, ☿. f. b. Cauc., Armen.
 contortuplicatus L., ineinandergefalteter, ☉. f. Kleinasien, Caucasus, Sibirien.
 creticus Lam., cretischer, ☿. k. Creta.
 cruciatus Lk., kreuzförmiger, ☉. f. ?
 cymbaecarpus Brot., cymbelfrüchtiger, ☉. f. Portugal, Spanien.
 dasyanthus Pall., wollblumiger, 4. f. Ungarn, Caucasus, Sibirien.
 dasyglottis Fisch., wollzungiger, 4. f. Sibirien.
 depressus L., niedergedrückter, 4. f. Südeuropa.
 diffusus W., weitschweifiger, 4. f. Taurien, Mittelasien.
 Donianus Spgl., Don's, 4. f. b. k. Nepal.
 emarginatus LaBill., ausgerandeter, 4. f. b. k. Syrien, Kleinasien.
 epiglottis L., vielzungiger, ☉. f. Südeuropa, Kleinasien.
 exscapus L., schaftloser, 4. f. Mitteldeutschland, Schweiz, Ungarn, Kleinasien.
 falcatus Lam. Pall., sichelfrüchtiger, 4. t. Cauc., Sibir.
 falciformis DC., sichelförmiger, 4. f. Nordafrika.
 fragiformis W., Erdbeeren-T., 4. f. Altai.
 fruticosus Pall., strauchiger, ☿. f. Ostsibirien.
 galegiformis L., geisrautenähnlicher, 4. f. Armenien, Caucasus.
 glaucus MB., blaugrüner, 4. f. Taurien, Caucasus.

Astragalus

Glaux L., milchkrautartiger, ☉. f. Westeuropa, Kleinasien.

glycyphylloides DC., süßholzähnlicher, 4. f. Taurien.

glycyphyllos L., süßholzblättriger, 4. f. Europa.

gracilis Nutt., schlanker, 4. f. Nordamerika.

halicacabus Lam., schluttenkelchiger, 4. f. Armenien.

hamosus L., hackenförmiger, ☉. f. Südeuropa.

β) Buceras W. γ) macrocarpus.

hispidulus DC., steifhaariger, 4. f. Aegypten.

hypoglottis L. (*microphyllus* W.), stielfrüchtiger, 4. f.

Europa, Mittelasien, Nordafrika und Amerika.

β) albiflorus.

?hymenocarpus Loud., hautfrüchtiger, 4. f. Rußland.

incanus L., weißlichgrauer, 4. f. b. k. Südfrankreich.

inflatus Gill., aufgeblasener, 4. t. Mendoza.

juvenalis Del., jugendlicher, ☉. f. Aegypten.

lactiflorus Ledeb., milchweißblumiger, 4. f. Sibirien.

lanigerus Desf., wolliger, 4. f. b. k. Nordafrika, Griechenl.

Laxmanni Jacq., Laxmann's, 4. f. Sibirien.

leontinus Wulf., Lienzer, 4. f. Krainer, Tyrol, Schweiz.

Alpen.

leucophaeus Sm., weißlichblumiger, 4. f. ?

longiflorus Pall., langblumiger, 4. f. Caucasus, Mittelasien.

lotoides Lam., schotenkleeähnlicher, ☉. f. China.

macrocephalus W., grofsköpfiger, 4. f. Caucasus.

mareoticus Del., mareotischer. ☉. f. Aegypten.

maximus W., grofsjähriger, 4. f. Armenien, Sibirien.

melilotoides Pall., steinkleeähnlicher, 4. f. Ostsibirien.

micranthus Desv., schmalblumiger, 4. f. ?

microphyllus L., kleinblättriger, 4. f. Sibirien.

monspeulanus L., französischer, 4. f. Frankreich,

Schweiz, Istrien und Osteuropa.

β) albus.

narbonensis Gouan, narbonnischer, 4. f. Südfrank., Span.

neglectus Fisch., übersehener, 4. f. Sibirien.

Nuttallianus DC., Nuttall's, ☉. f. Nordamerika.

odoratus Lam., wohlriechender, 4. f. Kleinasien.

onobrychioides MB., süßkleeähnlicher, 4. f. Cauc., Persien.

Onobrychis L., Süßklee.-T., 4., Osteuropa, Caucasus.

ornithopodioides Lam., vogelfußähnlicher, 4. f. Armen.

otopterus DC., gehörter, 4. f. Altai.

oxyglottis Stev., schmalzungiger, ☉. f. Taurien.

Pallasii Fisch., Pallas's, 4. f. Geg. des Caspisch. Meeres.

pallescens MB., bleicher, 4. f. Bessarabien, Podolien.

pentaglottis L., fünfzungiger, ☉. f. Spanien.

physodes L., kugelhülsiger, 4. f. Taurien, Sibirien.

platyphyllus Fisch., breitblättriger, 4. f. Sibirien.

ponticus Pall., pontischer, 4. f. b. k. Taurien.

Poterium Pall., becherblumenähnlicher, ‡. f. b. k. Spanien, Taurien.

procumbens H. et A., niederliegender, 4. k. Chili.

Pseudo-*Tragacantha* Pall., unächter, ‡. f. b. k. Caucasus, Armenien.

purpureus Lam., purpurfarbiger, 4. f. Südfrankreich.

reptans Humb., kriechender, 4. k. Mexico.

resupinatus MB., umgekehrter, 4. f. Caucasus.

reticulatus MB., netzförmiger, ☉. f. Caucasus.

rupifragus Pall., Felsen-T., 4. f. Taurien.

Schanganianus Pall., Schangin's, 4. f. Sibirien.

Astragalus

scorpioides Pourr., raupenkleeeähnlicher, ☉. f. Spanien.
semibilocularis DC., halbzweifächeriger, 4. f. Sibirien.
sesameus L., sesamähnlicher. ☉. f. Südeuropa, Kleinasien.
Stella L., Gouan, Stern-T., ☉. f. Südeuropa, Kleinasien, Nordafrika.

β) *acutifolius* DC.

stipulatus D. Don, zwischenblättriger, 4. f. b. k. Nepal.
subulatus Pall., pfriemenförmiger, 4. f. Sibirien.
succulentus Richard's., fleischiger, 4. f. Nördl. Amerika.
sulcatus L., gefurchter, 4. f. Sibirien, Unterösterreich.
tanaiticus Fisch., tanaitischer, 4. f. Sibirien.
tauricus Pall., taurischer, 4. f. Taurien.
tenuifolius L. (*linearifol.* P.), feinblättriger, 4. f. Sibirien.
testiculatus Pall., hodenförmiger, 4. f. Taur., Cauc., Sibir.
tomentosus Lam., filziger, 4. k. Aegypten.
Tragacantha L., gemeiner, ♂. k. Südeuropa.
triangularis DC., dreikantiger, ☉. f. ? Spanien.
tribuloides Del., bürzeldornähnlicher, ☉. f. Aegypten.
trimestris L., Sommer-T., ☉. f. Nordafrika.
trimorphus Viv., veränderlicher, ☉. f. Nordafrika.
tumidus W., aufgeschwollener, ♂. k. Span., Syrien, Aegypt.
tunetanus W., tunesischer, ♂. 4. k. Nordafrika.
uliginosus L., Sumpf-T., 4. f. Sibirien.

β) *ciceriformis* Bernh.

utriger Pall., langhälsiger, 4. f. Taurien.
vesicarius L., blasiger, 4. f. Süd- u. Osteuropa.
vimineus Pall., girtenartiger, ♂. f. Bessarab., Cauc., Sibir.
virgatus Pall., ruthenförmiger, ♂. f. Ungarn, Podolien, Nordpersien.
vulpinus W. (*alopecuroides* Pall.), fuchsschwanzähriger, 4. f. Caucasus.

albidus Kit. W. v. *vesicarius*. *alpinus* L. v. *Phaca astragalina*. *anthylloides* Pall. v. *fragiformis*. *canaliculatus* W. v. *scorpioides*. *canescens* DC. (et *cephalotes* Pall.) v. *onobrychioides*. *carnosus* Nutt. v. *caryocarpus*. *carnosus* Pursh vid. *Sophora sericea*. *chloranthus* Pall. v. *asper*. *clandestinus* Roth vid. *cymbaecarpus*. *cristatus* Gouan vid. *pentaglottis*. *danicus* Retz vid. *hypoglottis*. *echinatus* Murr. vid. *pentaglottis*. *hians* Jacq. vid. *Oxytropus deflexa*. *inflatus* DC. vid. *fragiformis*. *leptophyllus* Dsf. v. *tunetanus*. *leptostachys* Pall. v. *sulcatus*. *macrorrhizus* D. Don v. *Denianus*. *malacophyllus* Hort. v. *galegiform*. *micranthus* Nutt. v. *Nuttallianus*. ? *Pateronii* Hort. v. *odoratus*. *praeco* Baumg. v. *monspesulanus*. *pycnophyllus* Stev. v. *compactus*. *Rauwolfii* Vahl vid. *tumidus*. *retroflexus* Pall. vid. *Oxytrop. deflexa*. *sempervirens* Lam. vid. *aristatus*. *sinicus* L. v. *lotoides*. *varius* Gmel. v. *virgatus*. *virescens* Ait. v. *falcatus*. Die übrigen s. die Gattungen *Guldenstaedtia*, *Oxytropis* et *Phaca*.

Astranthus Lour., Sternbaum, VII. III. (X. v.) *Amygdalaceae-Homalineae*.

cochinchinensis Lour., cochinchinesischer, ♂. t. China, Cochinchina.

Astrantia T., Sterndolde, V. II., *Umbelliferae*.

Biebersteinii Fisch. et Mey. (*major* MB.) *Bieberstein's*, 4. f. Caucasus.

carniolica Wulf., krainerische, 4. f. Krain, Baiern.

Astrantia

- caucasica W., caucasische. 4. f. Caucasus.
heterophylla MB., verschiedenblättrige, 4. f. Caucasus.
major L., große, 4. f. Europ. Thäler u. Voralpen.
 β) pallida Presl.
minor L., kleine, 4. f. Mittel- u. südeurop. Alpen.
 carinthiaca Hopp. vid. major β. *Epipactis* L. v.
Hacquetia Ep. *helleborifolia* Salisb. vid. hetero-
phylla. *intermedia* MB. vid. caucasica. *maxima*
Bot. mag. v. heterophylla.

Astrapaea Lindl., Prachtnalve, XVI. VII., Malvaceae-Dombeyaceae.

- tiliaefolia Swt., lindenblättrige, 5. w. Ins. Bourbon.
viscosa Swt., schmierige, 5. w. Madagascar.
Wallichii Lindl., Wallich's, 5. w. Madagascar.

Astrocaryon Mey., Sternnuß, VI. I. (XXI. VI.), Palmaceae.

- acaule Mart., stengellose, 4. w. Brasilien.
aculeatum Mey., stachelige, 5. w. Guiana.
campestre Mart., Feld-St., 4. w. Brasilien.
Murumura Mart., Murumura-St., 5. w. Brasilien.
vulgare Mart., gemeine, 5. w. Brasilien.

Astrolobium durum etc. DC. v. *Ornithopus durum* etc.**Astroloma** R. B., Sternheide, V. I., Epacrideae.

- denticulatum RB., gezähnelte, 5. t. Neuholland.
humifusum RB., niedergestreckte, 5. t. Neuholland.

Atalanta serrulata Nutt. v. *Peritoma serrulata*.**Atalanthus arboreus** D. Don *pinnatus* D. Don et *spinosus* D. Don v. *Sonchus arboreus*, *leptocephalus* et *spinosus*.**Atalantia** Corr. *Atalantia*, X. I., Hesperideae-Aurantiaeeae.

- monophylla DC., einblättrige, 5. w. Ostindien.

Athamanta L., Hirschwurz, V. II., Umbelliferae.

- annua L., jährige, ☉. f. Candia.
cretensis L., cretische, 4. f. Mittel- u. südeurop. Alpen.
 β) mutellinoides DC. (*glabra* Gaud. *rupestris* Vill.).
incana W., graue, 4. f. Sibirien.
Matthioli Wulf. (*rupestris* Rchb.), Matthioli's, ♂. f. Steyer-
mark, Krain, Litorale.
panacifolia Spgl., kraftwurzblättrige, 4. k. Spanien,
Portugal, Sicilien, Nordafrika.
sicala L., sicilianische, 4. f. b. k. Sicilien, Nordafrika.
tortuosa Spgl., gedrehte, 5. k. Aegypten, Nordafrika.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Bubon*, *Cnidium*, *Libanotis*, *Ligusticum*, *Meum*, *Peucedanum*, *Selinum*, *Seseli*.

Athanasia, Athanasie, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

- crenata L., gekerbte, 5. t. Cap d. g. Hoffn.
crithmifolia L., meerfenchelblättrige, 5. t. Cap d. g. H.
filiformis L. fil., fadenförmige, 5. t. Cap d. g. Hoffn.
pubescens L. (*canescens* Thbg.), weichhaarige, 5. t. Cap
d. g. Hoffn.

β) *tricuspis* Poir.

- virgata Jacq., ruthenförmige, 5. t. Cap d. g. Hoffn.

annua L. v. *Lonas inodora*. *capitata* L., *lanuginosa* Cav. et *punctata* Thbg. v. *Holophyllum capitata* etc.
genistaefolia L. v. *Eclopes genistaefol.* *longifolia* Lam. *pectinata* L. fil. et *pinnata* L. v. *Morysia longifolia* etc.

Atheropogon Mühlenb., Borstenbart, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.

apludoides W., apludaähnlicher, 4. f. Nordamerika.

Atherosperma La Bill., Atherosperma, XXI. VII. ? Calycantheae.

moschatum La Bill., moschusduftende, 5. t. Neuholland.

Athrixia Ker., Athrixia, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

capensis Ker, capische, 5. t. Cap der guten Hoffn.

Athyrium filix femina Roth v. Asplen. filix f.

Atractylis L., Spindelkraut, XIX. I., Compositae-Cyarocephalae.

humilis L., niederiges, ♂. f. Süd- u. Westeuropa.

cancellata L. v. Acarna cancell. gummifera Dsf. et macrocephala Dsf. v. Carlina gummifera etc.

Atragene L., Atragene, XIII. VI., Ranunculaceae.

alpina L. (austriaca Scopol.), Alpen-A., 5. Sch. f. Mitteleuropäische Alpen.

americana Sims, amerikanische, 5. Sch. f. Nordamerika.
β) obliqua Dougl.

macropetala Ledeb., großblumige, 5. Sch. f. Sibirien.

occidentalis Hornem., abendländische, 5. Sch. f. ?

ochotensis Pall., ochotensische, 5. Sch. f. Sibirien.

sibirica L., sibirische, 5. Sch. f. Sibirien.

Wenderothii Schld., Wenderoth's, 5. Sch. f. Schweiz.

capensis L. et tenuifolia L. fil. v. Pulsatilla. Die übrigen v. Clematis et Naravelia.

Atraphaxis L., Strauchmelde, VI. II., Portulacaeae-Polygoneae.

spinosa L., stachelige, 5. k. Mittel- u. Nordasien.

undulata L., wellenblättrige, 5. k. Cap d. Hoffn.

Atriplex T., Melde, V. II. (XXIII. I.), Aizoideae-Atripliceae.

alba Scop., weisse, ☉. f. Italien.

albicans Ait. (odorata P.), weisliche, 5. k. Cap d. g. H.

canescens Nutt., grauliche, 5. k. f. Nordamerika.

crassifolia Ledeb., dickblättrige, ☉. f. Rußland.

diffusa Tenor., ausgebreitete, ☉. f. Neapel.

erecta Sm., aufrechte, ☉. f. England.

foliolosa Lk., blätterreiche, ☉. f. Spanien, Portugal.

glaucula L., blaugrüne, 5. k. Südfrankreich, Spanien.

Halimus L., Meer-M., 5. k. f. b. Ost- u. Westeuropa, Nordafrika, Neuholland.

hastata L., spontonblättrige, ☉. f. Nordeuropa.

hortensis L., Garten-M., ☉. f. Europa, Tatarei.

β) rubra.

incana R. et S., graugrüne, ☉. f. Spanien.

laciniata L., schlitzbilättrige, ☉. f. Europa, Nordamerika.

latifolia Wahlenb., breitblättrige, ☉. f. Europa.

linifolia H. B. K., linienblättrige, 5. t. Neuspanien.

litoralis L., Seestrands-M.; ☉. f. Europa, Nordasien.

β) microsperma Kit. (ruderalis Wallr. γ) salina Kch.
montevidensis Spgl., montevidensische, ☉. f. Monte-Video.
nitens Schk. (acuminata W. K.), glänzende, ☉. Deutschland, Osteuropa.

oblongifolia W. K. (tatarica Schk.), langblättrige, ☉. f. Deutschland, Ungarn.

obtusula W., stumpfblättrige, ☉. f. Sibirien.

parvifolia Kunth, kleinblättrige, ☉. f. Mexico.

patula L. (virgata Hoffm.), ausgebreitete, ☉. f. Europa.

Atriplex

- prostrata Bouch., gestreckte, ☉. f. Nordfrankreich.
 reniformis R. B., nierenförmige, ☿. t. Neuholland.
 rosea L., weilsröthliche, ☉. f. Europa.
 sibirica L., sibirische, ☉. f. Sibirien.
 sulcata Schrad., gefurchte, ☉. f. ?
 tataria L., tatarische, ☉. f. Mittelasiën.
 triangularis W., dreikantige, ☉. f. Am adriat. Meer.
 veneta W., venetianische, ☉. f. Am adriat. Meer.
 verticillata Lagas., wirtelförmige, ☉. f. Spanien.
 virgata Roth, ruthenförmige, ☉. f. Ostindien.
 angustifolia Sm. vid. *patula*. *incisa* MB. v. *rosea*.
 oppositifolia DC. (*Sackii* Rost c.) v. *latifolia* γ. *pedunculata* L. et *portulacoides* L. v. *Halimus peduncul.*
 et port.

Atropa L., Tollkirsche, V. 1., Solanaceae.

- arborescens L. (*solanacea* W.), baumartige, ☿. w. Jamaica.
 Bella donna L., gemeine, 4. f. Mitteleuropa.
 Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Mandragora*,
Nicandra, *Physalis* et *Saracha*.

Attalia Humb., Prachtpalme, XIII. III. (XXI. IX.), Palmae.

- compta Mart., dickstämmige, ☿. w. Brasilien.
 excelsa Mart., hohe, ☿. w. Brasilien.
 funifera Mart., spitzbeerige, ☿. w. Brasilien.
 humilis Mart., niedrige, ☿. w. Brasilien.
 Rossii Lod., Ross's, ☿. w. Brasilien.
 speciosa Mart., prächtige, ☿. w. Brasilien.
 spectabilis Lod., ansehnliche, ☿. w. Brasilien.

Aubrietia Adans. (berühmter Pflanzenmaler), XV. II., Cruciferae.

- Columnae H. Hoffmannsg. 4. f. b. k. ? Neapel.
 deltoidea DC., deltablätterige, 4. f. b. k. Neapel, Sicilien,
 Levante.
 hesperidiflora G. Don., nachtvioleublätterige, 4. f. b.
 Südeuropa.
 purpurea DC. (*Arabis* Sm.), purpurfarbige, 4. f. b. k.
 Griechenland.

Aucuba L. Thbg. (japan. Name), XXII. IV. ? Corneae.

- japonica L. Thbg., japanische, ☿. f. b. k. Japan.

Audibertia Benth. (Audibert, Handelsgärtner), II. I., Labiatae.

- incana Beuth., weilsgraue, ☿. k. t. Columbia.
pusilla Benth. v. *Muntha* Requieni.

Audouinia Brong. (Audouin, franz. Entomolog), V. I., Corniculatae-Bruniaceae.

- capitata Brong., kopfförmige, ☿. t. Cap d. g. H.

Aulax Berg., Bartnufs, IV. I. (XXII. IV.), Proteaceae.

- pinifolia, kieferblätterige, ☿. t. Cap d. g. Hoffn.
 umbellata RB., doldige, ☿. t. Cap d. g. H.

Aurelia decurrens Cass. v. Grindelia glutinosa.**Avena T., Hafer, III. II., Gramineae.**

- I. *Avena* (genuinae).
 alba Vahl, weisser, ☉. f. Südfrankreich, Nordafrika.
 brevis Roth (*atheranta* Presl.), kurzer, ☉. f. Deutsch-
 land, Italien.
 fatua L., Wind-H., ☉. f. Europa, Asien.
 hirsuta Roth (*barbata* Brot.), rauhhaariger, ☉. f. Südeuropa.
 nuda L., nackter, ☉. f. Südeuropa.
 orientalis Schreb., morgenländischer, ☉. f. Europa, Asien.
 sativa L., gemeiner, ☉. f. ? Mittelasiën.

Avena

β) chinensis. γ) georgiana. δ) leucosperma.
 ε) nigra (*melanosperma*), ζ) norwegica. η) podolica. θ) trisperma.

sterilis L., unfruchtbarer, ☉. f. Südeuropa.

strigosa Schreb. (*nervosa* Lam.), striegeliger, ☉. f. Europa.

II. *Avena* *aira* Rchb. (*Aira* Auctor, *Avenella* Blff. et Fght.).

atropurpurea Lk. (Wahlenb.), dunkelrother, 4. f. Lappland.

capillaris M. et K. (Host), haarförmiger, ☉. f. Südeuropa.

caryophylla Wigg. (L.), nelkenduftender, ☉. f. Europa.

flexuosa M. et K. (L.), biegsamer, 4. f. Europa, Amerika.

β) montana Auctor.

paludosa* (Roth) (*Aira uliginosa* Weih.), Sumpf-H., 4. f. Norddeutschland.

praecox P. B. (L.), früher, ☉. f. Europa.

pulchella Lk. (W.), schöner, ☉. f. Spanien.

III. *Avena* *astrum* Koch.

alpina Sm. (*praecusta* Rchb.), Alpen-H., 4. f. Schottland, Krain.

carpathica Host., carpathischer, 4. f. Carpathen.

fallax DC., trügerischer, 4. f. Südeuropa.

planiculmis Schrad. (*latifolia* Host), plattthalmiger, 4. f. Schlesien, Ungarn.

pratensis L., Wiesen-H., 4. f. Europa.

pubescens L., weichhaariger, 4. f. Europa.

β) bromoides L.

sempervirens Vill. (*stricta* Lam., *sedanensis* DC.), immergrüner, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

setacea Vill., borstiger, 4. f. Frankreich, Spanien.

versicolor Vill., bunter, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

Scheuchzeri All. v. *versicolor*.

IV. *Trisetum* P.

? *Alopecurus* R. et S., Fuchsschwanz-H., ☉. f. ?

alpestris Host, Voralpen-H., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

Cavanillesii Koch, Cavanille's, ☉. f. Wallis, Spanien.

condensata Guß., dichtähriger, ☉. f. Sicilien.

distichophylla Vill., zweireihigblättriger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) argentea W.

flavescens L., gelblicher, 4. f. Europa.

Löfflingiana L., Löffling's, ☉. f. Spanien.

micrantha R. et S., kleinblumiger, ☉. f. ?

neglecta Savi., übersehener, ☉. f. Italien.

parviflora Dsf., kleinblumiger, ☉. f. Italien, Nordafrika.

pennsylvanica L., pennsylvanischer, ☉. f. Nordamerika.

pilosa MB., haariger, ☉. f. Iberia.

rigida MB., starrer, 4. f. Caucasus.

subspicata Clairvill. (*airoides* Koel), ähriger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

tenuis Mch. (*triaristata* Vill.), dünner, ☉. f. Europa.

brevifolia Host. v. *distichophylla*. *sicula* Spgl. v. *condensata*.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Arrhenatherum*, *Danthonia*, *Gaudinia*, *Trichaeta*.

Averrhoa L. (*Averrhoes*, arab. Arzt), X. IV., Oxalideae.

Bilimbi L., Bilimbi-A., f. w. Ostindien.

Carambola L., Carambola-A., f. w. Ostindien.

Avicennia L., (*Avicenna*, persischer Philosoph u. Physiker), XIV. II., Verbenaceae.

tomentosa L., filzige, f. w. Ost- und Westindien.

Avicennia

Axonopus aureus P.B., *cimicinus* P.B. et *digitatus* P. B.
v. *Paspalum*.

Axyris L., Amaranthmelde, XXI. III., Aizoideae-Amaranthaceae.

amaranthoides L., gewöhnliche, ☉. f. Sibirien.

hybrida L., Bastard-A, ☉. f. Sibirien.

prostrata L., gestreckte, ☉. f. Sibirien.

ceratoides L. v. *Diotis cerat*.

Ayenia L. (Herzog D'Ayen von Noailles), V. I., Malvaceae-Büttneriaceae.

laevigata Sw., glatte, ♀. w. Jamaica.

pusilla L., kleine, ♂. w. Westindien, Südamerika.

Azalea L. (*Rhododendron* D. et G. Don.), Felsenstrauch, V. I., Ericaceae-Rhodoraceae.

arborescens Pursh, baumartiger, ♀. f. Nordamerika.

bicolor Pursh, zweifarbiger, ♀. f. Nordamerika.

calendulacea Mchx., ringelblumenfarbiger, ♀. f. Nordamerika.

Variet. und Hybrid.: a. *chrysolecta*, b. *crocea*, c. *cuprea*, d. *flammea*, e. *fulgida* Hook, *grandiflora*, g. *ignescens*, h. *lepida* Gow, i. *Morterii*. Swt, k. *splendens*, l. *Stapletoniana* Lindl, m. *subcuprea*, n. *triumphans*.

canescens Mchx. (? *subnudiflora* Pursh), graublättriger, ♀. f. Nordamerika.

decumbens (G. Don), niederliegender, ♀. t. China.

glauca Lam., blaugrüner, ♀. f. Nordamerika.

β) *hispida* Pursh.

macrantha Bunge, großblumiger, ♀. t. China.

mollis Blum., weichblättriger, ♀. t. China.

nitida Pursh, glänzender, ♀. f. Nordamerika.

nudiflora L., nacktblumiger, ♀. f. Nordamerika.

β) *periclymenoides* Mchx.

Variet. und Hybrid.: a. *alba*, b. *blanda*, c. *carnea*, d. *coccinea*, e. *eximia*, f. *Goweniana*, g. *mixta*, h. *papilionacea*, i. *partita*, k. *polyandra*, l. *rubra*, m. *rutilans*, n. *thyrsiflora*, o. *scintillans* Lindl. etc.

pontica L., pontische, ♀. f. Kleinasien, Caucasus.

Variet. und Hybrid.: a. *alba*, b. *ardens*, c. *aurantiaca*, d. *candida*, e. *coronaria*, f. *crocata*, g. *cuprea*, h. *flammea*, i. *fulgens*, k. *glauca*, l. *ignescens*, m. *ochroleuca*, n. *pallida*, o. *quadricolor*, p. *tricolor*, q. *versicolor* Lindl.

sinensis Lodd., chinesischer, ♀. t. k. China.

β) *flavescens* Swt.

speciosa W., prächtiger, ♀. f. Nordamerika.

b. *acutifolia*, c. *aurantiaca*, d. *ciliata*, e. *coccinea*, f. *crispa*, g. *cucullata*, h. *major*, i. *obliqua*, k. *prunifolia*, l. *revoluta*, m. *tortulifolia*, n. *undulata* etc.

viscosa L., schmieriger, ♀. f. Nordamerika.

b. *crispa*, c. *dealbata*, d. *fissa*, e. *odorata*, f. *ornata* DC. (*pontica rubescens* Gow.), g. *penicillata*, h. *rubescens*, i. *variegata*, k. *violae odore*, i. *vittata* etc.

fragrans Adams (*multiflor.* Turcz.) vid. *Osmanthus fragrans*. *hybrida enneandra* Lindl. v. *Rhododend. enneandr.* *indica* L. *javanica* Blum. *ledifolia*

Azalea

Hook. *retusa* Blum. *rosmarinifol.* Burm. *Seymouri* Lindl. *tubiflora* Blum. v. *Rhodod. indicum* etc. *procumbens* L. v. *Loiseleuria procumbens*.

Azara R. et P. (J. N. Azara, spanischer Naturforscher), XIII. 1., Bixaceae.

dentata R. et P., gezähnelte, ♀. t. Chili.

integrifolia R. et P., ganzblättrige, ♀. t. Chili.

Babiana Ker, Babiana, III. 1., Irideae.

angustifolia Ker, schmalblättrige, 4. Zw. C. d. g. H.

disticha Ker, zweizeilige, 4. Zw. Cap d. g. H.

mucronata Ker, stachelspitzige, 4. Zw. Cap d. g. H.

nana Spgl., Zwerg-B., 4. Zw. Cap d. g. H.

obtusifolia Ker, stumpfblättrige, 4. Zw. C. d. g. H.

plicata Ker, gefaltete, 4. Zw. Cap d. g. H.

β) *multiplex* J. C.

purpurea Ker, purpurfarbige, 4. Zw. Cap d. g. H.

ringens Ker, rachenförmige, 4. Zw. C. d. g. H.

rubro-cyana Ker, rothblaue, 4. Zw. C. d. g. H.

sambucina Ker, fliederduftende, 4. Zw. C. d. g. H.

spathacea Ker, blüthenscheidige, 4. Zw. C. d. g. H.

stricta Ker, steife, 4. Zw. Cap d. g. H.

sulfurea Ker, schwefelgelbe, 4. Zw. C. d. g. H.

tenuiflora Swt., dünnblüthige, 4. Zw. C. d. g. H.

Thunbergii Ker, Thunberg's, 4. Zw. C. d. g. H.

tubata H. Angl., geröhrte, 4. Zw. C. d. g. H.

tubiflora Ker, röhrenblumige, 4. Zw. C. d. g. H.

villosa Ker, zottige, 4. Zw. C. d. g. H.

Bacazia R. et P. (Georg Bacaz, Prof. d. Bot. zu Carthage), XIX. 1., Compositae-Eupatorineae (*Pordicieae*).

spinosa R. et P., dornige, ♀. t. Peru.

Baccharis L., Baccharis (Bachuspflanze), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

adnata Humb., angewachsene, ♀. t. Südamerika.

alata Hort., geflügelte, ♀. t. ?

conferta Kunth, dichtblumige, ♀. t. Mexico.

Dioscorides L., Dioscorides, ♀. k. Syrien, Aegypten.

glomeruliflora Mchx., knaulblumige, ♀. k. f. Nordamerika.

glutinosa P., klebrige, ♀. t. w. Peru.

halimifolia L., meldenblättrige, ♀. k. f. Nordamerika.

indica L., indische, ♀. w. Ostindien.

ivaefolia L., ivablättrige, ♀. k. Nordamerika, Peru.

parviflora P., kleinblumige, ♀. w. Peru.

scoparia Sw., besenartige, ♀. w. Jamaica.

neriifolia L. v. *Brachylaena neriifol.*

Bactris Jacq., Bactris, XXI. VI., Palmae.

caryotaefolia Mart., brennpalmenblättrige, ♀. w. Brasil.

cuspidata Mart., langspitzige, ♀. w. Brasilien.

guianensis Lod., guianische, ♀. w. Guiana.

macracantha Mart., grofstachelige, ♀. w. Brasilien.

major Jacq., grofse, ♀. w. Brasilien, Neugranada.

minor Jacq., kleine, ♀. w. Brasilien, Neugranada.

pectinata Mart., kammlättrige, ♀. w. Brasilien.

Baeria F. et Mey. (Bär, Prof. zu Königsberg), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

chrysostoma F. et Mey., goldfarbige, ☉. f. Californien.

Baeckia L. (A. Baeck, schwedischer Arzt), VIII. 1., Myrtaceae.

camphorata Sm., kampherduftende, ♀. t. Neuholland.

Baeckia

- densifolia* Sm., dichtblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.
diosmaefolia Rudge, diosmablättrige, ♀. t. Neuholland.
frutescens L., strauchartige, ♀. t. China.
gracilis Cun., schlanke, ♀. t. Neuholland.
linifolia Rudg., linienblättrige, ♀. t. Neuholland.
ramosissima Cun., ästige, ♀. t. Neuholland.
saxicola Cun., felsenliebende, ♀. t. Neusüdwallis.
virgata Ker, ruthenförmige, ♀. t. Neucaledonien.

Baeobotrys Forst., Traubenmyrte, V. 1., Myrsineae (*Ardisiaceae*).

- argentea* Wall., silberfarbige, ♀. w. Ostindien.
indica Roxb., indische, ♀. w. Ostindien, Madagascar.
macrophylla Wall., großblättrige, ♀. w. Ostindien.
pubescens Lodd., weichhaarige, ♀. w. Westindien.
tomentosa Hamilt., filzige, ♀. w. Nepal.

Balantium Kaulf., Beutelfarn, XXIV. 1., Pterioideae (*Polypodiaceae*).

- Culcita* Kaulf., Polster-B., 4. f. Madeira.

Balbisia Cav. (J. B. Balbis, berühmt. franz. Botaniker), X. v., Oxalideae.

- peduncularis* D. Don, gestielte, ♀. t. Chili.
Balbisia elongata W. v. *Tridax procumbens*. *suffruticosa* Diet. v. *Aster* (*Eurybia*) *viscosa*.

Ballota L., Ballote, XIV. 1., Labiatae.

- ? *disticha* L., zweireihige, ☉. w. Ostindien.
nigra L., gemeine (schwärzliche), 4. Europa.
 a) *foetida* Lam. a. *alba* L. b. *borealis* Schwg.
 c. *hirta* H. Berol.
 β) *ruderalis* Fries (*vulgaris* Hoffm. und Lk.)
 b. *urticaefolia* Ortmann.

- cinerea* D. Don vid. *Roylea elegans*. *lanata* L. v. *Panzeria lanata*. *orientalis* Presl. vid. *Beringeria orient.*

Balsamina Riv., Balsamine, V. 1., Balsamineae.

- bifida* DC., zweispaltige, ☉. m. f. Japan.
capensis DC., kapische, ☉. m. f. Cap d. g. H.
chinensis DC., chinesische, ☉. m. f. China.
coccinea DC., scharlachfarbige, ☉. m. f. Ostindien.
cornuta DC., gehörnte, ☉. m. f. Ceylon.
hortensis Desp., Garten-B., ☉. m. f. Ostindien.
latifolia DC., breitblättrige, ☉. m. f. Ostindien.
madagascariensis DC., madagascarische, ☉. m. f. Madagascar.
minor DC., kleine, ☉. m. f. Ostindien.
mysorensis DC., mysorensische, ☉. m. f. Ostindien.
setacea Hook, borstige, ☉. m. f. Ostindien.

Balsamita Vaill. Dsf., Frauenmünze, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

- ageratifolia* Dsf., leberbalsamblättrige, ♀. k. Cap d. g. H.
annua Delil. (Lk.), jährige, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.
flabelliformis P., fächelförmige, ♀. k. t. Cap d. g. H.
grandiflora Dsf., großblumige, ♂. f. k. Nordafrika.
virgata Dsf., ruthenförmige, 4. k. f. Italien.
vulgaris W. (*major* Dsf., *suaveolens* P.), gemeine (römische Salbei), 4. f. Südeuropa.

Balsamodendron Kunth, Balsambaum, VIII. 1., Amyrideae.

- gileadense* Kunth, arabischer, ♀. w. Arabien.
zeylanicum Kunth, zeylonischer, ♀. w. Ceylon.

Baltimora L. (Lord Baltimore, ehemaliger Besitzer von Maryland), XIX. iv., Compositae-Corymbiferae, recta L., aufrechte, ☉. f. Neuspanien.

β) alba.

Bambusa Schreb. P. (*Bambos*. Retz), Bambusrohr, VI. 1., Gramineae.

aristata Lod. C., begranntes, 4. f. w. Ostindien.

arundinacea W., ächtes, 4. f. w. Ostindien.

glaucula Lod. C., blaugrünes, 4. f. w. Ostindien.

nigricans Lod. C. (*nigra*), schwärzliches, f. f. w. Ostind.

pubescens Lod. C., weichhaariges, 4. f. w. Ostindien.

spinosa Hamilt., dorniges, 4. f. w. Ostindien.

stricta Roxb., steifes, 4. f. w. Ostindien.

verticillata W., wirtelförmiges, 4. f. w.

vulgaris Schrad. (*arundinacea* Ait. Kew. *Thouarsii* Kunth.), gemeines, 4. f. Mascarenas, Madagascar.

baccifera Roxb. v. *Melocanna bambusoides. latifolia* Hamb. v. *Nastus latifol.*

Banffya Baumg. v. *Gypsophila*.

Banisteria L. (John Banister, engl. Botan.), X. III., Malpighiaceae.

ciliata Lam., gefranzte, f. Sch. Brasilien.

ferruginea Cav., rostfarbige, f. Sch. Südamerika.

fulgens L., leuchtende, f. Sch. Westindien.

Humboldtiana DC., Humboldt's, f. Sch. Neugranada.

laurifolia L., lorbeerblättrige, f. Sch. Westindien.

ovata Cav., eiförmige, f. w. Hispaniola.

periplocaefolia Desf., periplocablättrige, f. Sch. w. Portorico.

sericea Cav., seidenhaarige, f. w. Brasilien.

splendens DC., schimmernde, f. Sch. w. Westindien.

tenuis Lindl., dünne, f. Sch. t. w. Buenos Ayres.

tomentosa Dsf., filzige, f. Sch. w. Südamerika.

zanzibarica Boj., zanzibarische, f. Sch. Zanzibar.

bengalensis L. et *unicapsularis* Lam. vid. *Hiptage* Matablota. Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Heteropteris* et *Stigmaphyllon*.

Banksia L. fil., Drahtblume, (Joseph Banks, berühmter engl. Naturforscher), IV. 1., Proteaceae.

aemula RB., tiefgesägte, f. t. Neuholland.

attenuata RB., verschälerte, f. t. Neuholland.

australis RB., südlichere, f. t. Neuholl., Van Diemens L.

Baueri RB., Bauer's, f. t. Neuholland.

Baxteri RB., Baxter's, f. t. Neuholland.

Brownii Baxt., Brown's, f. t. Neuholland.

Caleyi RB., Caley's, f. t. Neuholland.

coccinea RB., scharlachfarbige, f. t. Südl. Neuholl.

collina RB., Hügel-D., f. t. Neuholland.

compar RB., verwandte, f. t. Neuholland.

Cunninghamii Shr., Cunningham's, f. t. Neuholland.

dentata L. fil., gezähnelte, f. t. Neuholland.

depressa RB., niedergedrückte, f. t. Neuh., Van Diem. L.

dryandroides RB., dryandraähnliche, f. t. Neuholland.

elatio RB., erhabene, f. t. Neuholland.

ericaefolia L. fil., heideblättrige, f. t. Neuholland.

fagifolia Hort., buchenblättrige, f. t. Neuholl.

Goodii RB., Good's, f. t. Neuholland.

grandis W., großblumige, f. t. Neuholland.

Hügelii RB., Hügel's, f. t. Neu-Südwallis.

ilicifolia RB., stechhülsenblättrige, f. t. Neuholland.

Banksia

- insularis* RB., Insel-D., h. t. Südseeinseln.
integrifolia Cav., ganzblättrige, h. t. Neuholland.
Lamberti Hort. Berol., Lambert's, h. t. Neuholland.
latifolia RB., breitblättrige, h. t. Neuholland.
litoralis RB., Meerstrands-D., h. t. Südl. Neuholland.
marcescens RB., welkende, h. t. Neuholland.
marginata Cav., berandete, h. t. Neuholland.
media RB., mittlere, h. t. Neuholland.
Menziesii RB., Menzie's, h. t. Neuholl. (Schwanenflufs).
nutans RB., nickende, h. t. Südl. Neuholland.
oblongifolia Cav., langblättrige, h. t. Neuholland.
occidentalis RB., westliche, h. t. Südwestl. Neuholl.
paludosa RB., Sumpf-D., h. t. Neuholland.
prostrata RB., gestreckte, h. t. Neuholland.
pulchella RB., schöne, h. t. Südl. Neuholland.
quercifolia RB., eichenblättrige, h. t. Neuholland.
repens La Bill., kriechende, h. t. Neuholland.
serrata L. fil., gesägte, h. t., Neu-Südwallis.
Solandri RB., Solander's, h. t. Neuholland.
speciosa RB., prächtige, h. t. Neuholland.
sphaerocarpa RB., kugelfrüchtige, h. t. Südl. Neuholland.
spinulosa Sm., stachelspitzige, h. t. Neuholland.
verticillata RB., wirtelblättrige, h. t. Neuholland.
ferrea Vent. vid. *marginata*. *grandidentata* Dum.
 Cours. v. *speciosa*. *ledifolia* Cunn. v. *Cunninghami*.
microstachya Cav. v. ? *litoralis*. *oleaeifolia* Cav. v.
 ? *integrifolia*. *praemorsa* Andr. v. *marcescens*. *Robur*
 Cav. vid. *latifolia*. *spicata* G. v. *integrifolia*.
 Die übrigen s. *Hakea*.

Baphia Afzel, Baphie, X. 1., Leguminosae-Swartzieae.
nitida Lod., glänzende, h. w. Sierra Leone.

Baptisia Vent., Baptisie, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

- alba* RB., weisse, 4. f. Nordamerika.
australis RB., südlichere, 4. f. Carolina.
exaltata Swt., hohe, 4. f. Nordamerika.
minor Lehm., kleine, 4. f. Nordamerika.
mollis Nutt., weiche, 4. f. Carolina.
perfoliata RB., durchwachsene, 4. k. f. b. Carolina.
tinctoria RB., färbende, 4. f. Nordamerika.
uniflora Nutt., einblumige, 4. f. Nordamerika.
versicolor Lod., buntfarbig, 4. f. Nordamerika.
villosa Ell., zottige, 4. f. Nordamerika.
lanceolata Ell. vid. *uniflora*. *nepalensis* Hook. v.
Piptanthus nepalensis. *nitida* Hort. v. ? *alba*.

Barbacenia Vand. (Barbacena, vornehmer Portugiese),
 VI. 1., Narcisseae-Haemodoraceae.

purpurea Hook., purpurfarbige, 4. w. Brasilien.

Barbarea RB., Erdkresse (Barberkraut), XV. III.,
 Cruciferae.

arcuata RB., bogenschotige, 4. f. Deutschland, Volhynien, Taurien.

β) flore pleno.

plantaginea DC., wegrittblättrige, 4. f. Kleinasien.

praecox RB., frühe, 4. f. England, nördl. Deutschl.

stricta Andr., steifschotige, 4. f. Mittel-, Nord- und Osteuropa.

vulgaris RB., gemeine, 4. f. Europa, Sibirien.

β) flore pleno.

Barbarea

iberica DC. vid. *stricta*. *orthoceras* Lod. et *parviflora* Fr. v. *stricta*. *taurica* DC. v. *arcuata*.

Barbieria DC, (J. B. G. Barbier, französischer Botaniker), XVII. IV. (VI.).

polyphylla DC., vielblättrige, ♀. w. Westindien.

Barkeria K. et W. (G. Barker, engl. Botan.), XX. I. *elegans* K. et W., zierliche, 4. w. Mexico.**Barkhausia** Mch. (Barkhaus, wenig bekannter deutscher Botaniker (*Borkhausia* Lk. Spgl. et *Lagoseris* Lk. non M. B.).

alpina Lk., Alpen-B., 4. f. Italien, Sibirien.

aspera Lk. (*Nemauchenes asp.* Cass.), rauhe, ☉. f. Süd- und Osteuropa, Kleinasien.

bellidifolia DC., maßliebenblättrige, ☉. f. Corsica.

bursifolia Spgl., täschelkrautblättrige, ☉. f. Sicilien.

Candollei Spgl., De Candolle's, ☉. f. Sicilien.

caroliniana Nutt., carolinische, ☉. f. Carolina.

cernua Rchb., übergebogene, ☉. f. Illyrien, Italien.

β) *stricta* Rchb.

foetida DC., stinkende, ☉. f. Mittel- u. Südeuropa.

β) *graveolens* Lk. γ) *pinguis* Rchb.

leontodontoides Spgl., löwenzahnähnliche, ♂. f. Italien.

macrophylla Spgl., großblättrige, ☉. f. Nordamerika.

nicaeensis Lk., ligurische. ☉. t. Oberitalien.

purpurea Bivon., purpurfarbige, ♂. f. Sicilien.

raphanifolia Spgl., rettigblättrige, 4. f. ?

rhoadifolia MB., mohnblättrige, ☉. f.

rubra Mönch, rothe, 4. f. Osteuropa, Italien.

senecioides Spgl., kreuzkrautähnliche, ☉. f. Aegypten.

setosa DC. (*hispida* Lk.), borstige, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

Suffreniana DC., Suffren's, ☉. f. Südfrankreich.

taraxacifolia Thuill., löwenzahnblättrige, ♂. f. Süd-deutschland, Italien, Frankreich.

β) *praecox* Rchb. γ) *intybacea* DC.

versicolor Spgl. (Fisch. Lk.), buntfarbige, 4. f. Dahurien.

vesicaria Spgl., blasige, ♂. f. Süd- und Osteuropa.

β) *scariosa* Rchb.

Barleria L. (J. Barrelier, berühmter französischer Botaniker), XIV. II., Acanthaceae.

? *alba* Hort., weisse, ♀. w. ? Neuholland.

buxifolia L., buchsbaumblättrige, ♀. w. Ostindien.

coerulea Roxb., blaue, ♀. w. Ostindien.

cristata L., kammförmige, ♀. w. Ostindien.

dichotoma Roxb., zweizinkige, ♀. w. Ostindien.

flava Jacq., gelbe, ♀. w. Ostindien, Arabien.

Hystrix L., starkstachelige, ♀. w. Ostindien, Molucken.

longiflora L., langblumige, ♀. w. Malabar.

lupulina, Lindl., hopfenartige, ♀. w. Mauritius.

Prionitis L., fußangelförmige, ♀. w. Ostind., Arabien.

purpurea Lodd., purpurfarbige, ♀. w. Ostindien.

solanifolia L., nachtschattenblättrige, ♀. w. Westindien.

strigosa W., striegelige, ♀. w. Ostindien.

coccinea L. v. *Ruellia cocc.* *longifolia* L. (*hexacantha* Bertol. v. *Asteracantha longifol.* *mitis* Ker v. *flava*).

Barnardia Lindl. (E. Barnard, Vice-Secret. der Lond. Gartenbau-Gesellsch.), VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

scilloides Lindl., meerzwiebelähnliche, 4. Zw. k. t. China.

Barosma W. E. (*Baryosma* R. et S.), Barosme, V. I.,
Tricoccae-Rutaceae.

angustifolia Bartl. et Wendl., schmalblättrige, ♂. t. C.
d. gut. Hoffn.

betulina Bartl. et Wendl., birkenblättrige, ♂. t. Cap
d. gut. Hoffn.

dioica Bartl. et Wendl., zweihäusige, ♂. t. C. d. g. H.

foetidissima Bartl. et Wendl., stinkende, ♂. t. C. d. g. H.

latifolia R. et S., breitblättrige, ♂. t. Cap. d. g. H.

oblonga Bartl. et Wendl., eiförmige, ♂. t. C. d. g. H.

pulchella, Bartl. et Wendl., hübsche, ♂. t. C. d. g. H.

serratifolia W., sägeblättrige, ♂. t. C. d. g. H.

β) odorata W. (*crenata* Hort.).

Barringtonia Forst. (Barrington, englischer Gelehrter),
XVI. VIII., Myrtaceae.

speciosa Forst., prächtige, ♂. w. Ostind., Südseeinseln.

acutangula Roxb. et racemosa Spgl. vid. Stravadium
acut. etc.

Bartholina RB. (Th. Bartholini, dänischer Arzt u. Ana-
tom), XX. I., Orchideae.

pectinata R. B., kammförmige, 4. Kn. w. C. d. g. H.

Bartlingia scoparia Rchb. v. *Plocama pendula*.

Bartonia Sims (Barton, Botaniker zu Philadelphia),
XII. I., Loasaceae.

albescens Gill., weifsliche, ☉. f. m. Chili.

aurea Lindl., goldfarbige, ☉. f. Californien.

nuda Pursh, nacktkapselige, ♂. f. Nordamerika.

ornata Pursh (*decapetala* Sims), zierliche, ♂. f. Nord-
amerika.

Bartsia L. (John Bartsch, M. D. Freund von Linné)
XIV. II., Personatae-Rhinantheae.

alpina L., Alpen-B., 4. f. Nord- und mitteleuropäische
Alpen.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen: Castilleja,
Euchroma, Odontites et Trixago.

Baryosma Tongo G. v. *Dipterix odorata*.

Basella L. (malabarischer Name), V. III., Aizoideae-
Atriplicineae.

alba L., weisse, ☉. ♂. Sch. w. Ostindien.

cordifolia Lam., herzblättrige, ☉. ♂. Sch. w. Ostindien.

lucida L., starkglänzende, ☉. ♂. Sch. w. Ostindien.

marginata Humb., berandete, ☉. ♂. Sch. w. Quito,
Mexico.

nigra Lour., schwarze, ☉. ♂. Sch. w. China.

rubra L., rothe, ☉. ♂. Sch. w. Ostindien.

tuberosa Humb., knollige, 4. Kn. w. Neugranada.

Bassia König (F. Bassi, Vorsteher des botanischen Gar-
tens zu Bologna), XI. I., Sapotaceae.

butyracea Roxb., buttergebende, ♂. w. Ostindien.

latifolia Roxb., breitblättrige, ♂. w. Ostindien.

longifolia Kön., L., langblättrige, ♂. w. Malabar.

Batemannia Lindl. (James Bateman, engl. Garten-
freund), XX. I., Orchideae.

Colleyi Lindl., Colley's, 4. w. Demerara.

Batschia canescens Mch., *carolinensis* P. (*Gmelini* Mchx.),
longiflora Pursh v. *Lithospermum canesc.* etc.

Bauera Andr. (Franz u. Ferd. Bauer, berühmte Pflan-
zenmaler), XIII. II., Corniculatae-Cunoniaceae.

galioides Sbr., labkrautähnliche, ♂. t. Neuholland.

Bauera

humilis Swt., niedrige, f. t. Neuholland.

rubroides Andr., rötheähnliche, f. t. Neuholland.

Bauhinia Plum. (J. u. C. Bauhin, berühmte Botaniker),

X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

aculeata L., stachelige, f. w. Westindien, Südamerika.

acuminata L., zugespitzte, f. w. Ost- u. Westindien.

? *alba* Hort., weisse, f. w. ? Südamerika.

? *americana* Dum. Cours., f. w. Südamerika.

anatomica H. Anglor., Lk., hautblättrige, f. w. Südamerika.

Anguina Roxb., Schlangen-B., f. Sch. w. Ostindien.

armata Otto, bewaffnete, f. Sch. w. Brasilien.

aurita Ait., geöhrt, f. w. Jamaica.

candida Ait., reinweisse, f. w. Ostindien.

chinensis DC., chinesische, f. w. China.

cumanensis Kunth, cumanische, f. Sch. w. Cumana.

divaricata L., sparrige, f. w. Westindien.

emarginata Mil., ausgerandete, f. w. Carthagen.

ferruginea Roxb., rostfarbige, f. Sch. w. Ostindien.

forficata Lk., scheerenförmige, f. w. Brasilien.

glabra Jacq., kahle, f. Sch. w. Carthagen.

glaucescens DC., blaugrüne, f. w. Cumana.

grandiflora Juss., großblumige, f. w. Peru.

guianensis Aubl., guianische, f. Sch. w. Guiana.

heterophylla Kth, verschiedenblättrige, f. w. Caraccas.

indica Lod., C., indische, f. w. Ostindien.

inermis P., unbewehrte, f. w. Südamerika.

Lamarckiana DC. (*divaricata* Lam.), f. w. Südamerika.

latifolia Cav., breitblättrige, f. w. Westindien.

leptopetala DC., schmalkronige, f. w. Neuholland.

Lunaria Cav., mondblättrige, f. w. Neuspanien.

madagascariensis Desv., madagascarische, f. w. Madagascar.

malabarica Roxb., malabarische, f. Sch. w. Malabar.

microphylla Hort., kleinblättrige, f. w. Südamerika.

multinervia DC., vielnervige, f. w. Caraccas.

parviflora Vahl, kleinblumige, f. w. Ostindien.

Pauletia P., Paulet's, f. w. Panama.

porrecta Ait., hervorgestreckte, f. w. Westindien.

pubescens DC., weichhaarige, f. w. Jamaica.

purpurea L., purpurfarbige, f. w. Westindien.

racemosa Lam., traubige, f. Sch. w. Ostindien.

retusa Poir., abgestutzte, f. w. Ostindien.

rufescens Lam., fuchsröthliche, f. w. Afrika.

scandens L., klimmende, f. Sch. w. Ostindien.

semibifida Rox., halbzeispaltige, f. Sch. Ostindien.

spathacea DC., scheidige, f. w. Mexico.

speciosa Hort., prächtige, f. Sch. w. ?

subrotundifolia Cav., rundlichblättrige, f. w. Neuspan.

tomentosa L., filzige, f. w. Ostindien.

triandra, Roxb., dreimännige, f. Sch. w. Ostindien.

ungulata L., klauenförmige, f. w. Südamerika.

variegata L., bunte, f. w. Ostindien.

Beaufortia RB. (Herzogin v. Beaufort, Beförderin der Botanik), XVIII. 11., Myrtaceae.

Dampieri Cun. (*carinata* Cun.), Dampier's, f. t. Neuholland.

decussata RB., kreuzweifsblättrige, f. t. Neuholland.

Beaufortia

sparsa RB., zerstreutblättrige, f. t. Neuholland.

splendens Baxt., starkglänzende, f. t. Neuholland.

Beaumontia Wall. (Lady Beaumont), V. 1., Contortae-Apocynaeae.

grandiflora Wall., großblumige, f. Sch. w. Ostindien.

longifolia Lod., langblättrige, f. Sch. w. Ostindien.

Beckmannia Host. (Beckmann, Prof. zu Göttingen), III. II., Gramineae.

erucaeformis Host., raupenförmige, ©. f. Süd- u. Osteuropa, Sibirien,

Befaria Mutis, Befarie, XI. 1., Ericaceae.

glauca Humb., blaugrüne. f. w. Neugranada.

racemosa Vent., traubige, f. k. Florida.

Begonia L. (Michael Begon, französischer Beförderer d. Botanik), Schiefblatt, XXI. IX. (XIII. III.), Portulacaeae-Polygoneae.

acerifolia H.B.K., ahornblättriges, f. w. Südamerika.

acuminata Dryand., zugespitztes, f. w. Jamaica.

acutifolia Jacq. (*purpurea* Sw.), spitzblättriges, f. w. Westindien.

argyrostigma Fisch., Lk. u. Otto, perlmutterfleckiges, f. w. Brasilien.

bulbilifera Lk., zwiebeltragendes, 4. Kn. w. Brasilien.

castaneaefolia Fisch., Schott., kastanienblättriges, f. w. Brasilien.

dichotoma Jacq., zweizinkiges, f. w. Südamerika.

dipetala Grah., zweiblättriges, f. w. Bombay,

diptera Dryand., zweiflügeliges, f. w. Brasilien, Cap d. gut. Hoffn.

discolor RB., verschiedenfarbiges, 4. w. China, Martinique.

disticha Lk., zweizeiliges, f. 4. w. ? Südamerika.

diversifolia Grah., verschiedenblättriges, 4. w. Brasilien.

Dregei H. Berol., Drege's, f. t. Cap d. g. Hoffn.

dubia Haw., zweifelhaftes. 4. w. Brasilien.

fagifolia Fisch., buchenblättriges, f. w. ?

Fischeri, Otto, Fischer's, f. w. Brasilien.

geraniifolia Hook, storchschnabelblätt., 4. Kn. w. Lima.

heracleifolia Schldl. et Ch., bärenklaublättriges, 4. Kn. w. Mexico.

hirsuta Aubl., rauhaariges, ©. ♂. w. Guiana.

hirtella Lk., kurzhaariges, f. 4. w. ?

humilis Dryand., niedriges, ©. ♂. w. Westindien.

incarnata Lk. et Otto, fleischfarbiges, f. w. Brasilien.

insignis Grah., ausgezeichnetes, f. w. Südamerika.

longipes Hook, langstieliges, f. w. Mexico.

lucida Haw., starkglänzendes, f. w. Westindien.

macrophylla Dryand. (*grandifolia* Jacq.), großblättriges, f. w. Jamaica.

Martiana Lk. et Otto, Martius's, 4. w. Mexico.

Meyeri Lk. et Otto, Meyer's, f. w. Brasilien.

monoptera Otto, einflügeliges, 4. Kn. w. Brasilien.

multibulbulosa Mart. (? *bulbilifera*), vielzwiebeliges, 4. Kn. w. Brasilien.

nitida Ait., glänzendes, h. w. Jamaica.

octopetala L'Her., achtblättriges, 4. Kn. w. Peru.

odorata W., riechendes, 4. w. Südamerika.

Ottoniana * (*parvifolia* Otto), Otto's, 4. Kn. w. t. C. d. g. Hoffn.

palmata D. Don, handförmiges, 4. t. Nepal.

Begonia

- papillosa* Grah., weichwarziges, ♀. w. Brasilien.
parvifolia Schott., kleinblättriges, ♀. w. Brasilien.
patula Haw., ausgebreitetes, ♀. w. Westindien.
pauciflora Lindl., wenigblumiges, 4. w. ?
petaloides Lindl., großblumiges, ♀. 4. w. Brasilien.
picta Sm. (Hamilt.), bemaltes, 4. Kn. w. Nepal.
platanifolia Schott., platanenblättriges, ♀. 4. w. Brasil.
pulchella Radd., hübsches, ♂. w. Brasilien.
reniformis Dryand., nierenförmiges, ♀. 4. w. Brasilien.
sanguinea Radd., blutrothes, ♀. w. Brasilien.
scandens Sw., klimmendes, 4. Sch. Kn. w. Jamaica, Guiana.
Sellowii ? Otto, Sellow's, ♀. w. Brasilien.
semperflorens Lk., immerblühendes, ♀. w. Mexico, Brasil.
spathulata Hornem., spathelblättriges, 4. w. Westindien.
suaveolens Haw., wohlriechendes, ♀. w. Westindien.
tuberosa Dryand., knolliges, 4. Kn. w. Molucken.
ulmifolia Humb., ulmenblättriges, ♀. w. Südamerika.
undulata Schott., wellenblättriges, ♀. w. Brasilien.
villosa, Bot. reg., zottiges, ☉. w. Südamerika.
vitifolia Schott., weinblättriges, ♀. w. Brasilien.

Evansiana Andr. v. *discolor*. *glabra* Aubl. v. *scandens*. *grandiflora* Knowl. v. *octopetala*. *maculata* Radd. vid. *argyrostigma*. *minor* Jacq. et *obliqua* L'Her. v. *nitida*. *radiata* Grah. v. *heracleifolia*.

Behrinia chondrilloides Sieb. v. *Crepis chondr.*

Belis jaculifolia Salisb. v. *Cunninghamia lanceolata*.

Bellevallia Lapeyr. (P. R. Belleval, französischer Botaniker), VI. 1., (Coronariae-Asphodeleae).

romana (L.) (*operculata* Lap.), römische, 4. Zw. f. Italien.

dubia (Guss.), zweifelhafte, 4. Zw. Sicilien.

Bellidiastrum Cass., Bergmaßliebe, XIX. 11., Compositae Corymbiferae.

Micheli Cass. (*montanum* Bl. et Fing.), Micheli's, 4. f., Mitteleuropäische Alpen.

Bellis T., Gänseblümchen (Tausendschön), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

annua L., jähriges, ☉. f. Südamerika.

hybrida Ten., Bastard-M., 4. f. Neapel.

integrifolia Michx., ganzblättrig., ☉. f. Nordam., Texas.

perennis L., gemeines, 4. f. Europa.

b. *hortensis*, c. *fistulosa*, d. *prolifera*.

sylvestris Cyril., wildes, 4. f. Neapel, Sicilien.

Bellium L., Maßliebe, XIX. 11., Composit. Corymbiferae. *bellidioides*, gänseblumähnliche, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

crassifolium Moris, dickblättrige, 4. k. Sardinien.

intermedium J. C., mittlere, 4. f. ?

minutum L., kleine, ☉. f. Levante.

Beloperone N. E., Beloperone, II. 1., Acanthaceae.

oblongata N. E., langblättrige, ♀. w. Brasilien.

Benincasa Savi (Benincasa, italienischer Edelmann), XXIII. 1., Cucurbitaceae.

cerifera Savi, wachsgebende, ☉. w. Ostindien.

cylindrica N. E., cylinderförmige, ☉. w. Ostindien.

Benthamia Lindl. (G. Bentham, berühmter englischer Botaniker), V. 1., Corneae.

fragifera, erdbeertragende, ♀. k. t. Ostindien.

Berardia subacaulis Vill. v. *Arctium lanuginosum*.

Berberis T., Sauerdorn, VI. 1., Berberiderae.

asiatica Roxb., asiatischer, $\frac{1}{2}$. k. f. b. Ostind., Nepal.
buxifolia Lam., buchsbaumblättriger, $\frac{1}{2}$. k. Magellani-
 sche Meerenge.

canadensis Mill., canadischer, $\frac{1}{2}$. f. Nordamerika.

cerasina Schrad. (*emarginata* H. Hafn.), kirschenähnli-
 cher, $\frac{1}{2}$. f. Nordamerika.

Chitria Hamilt., gegrannter, $\frac{1}{2}$. f. b. k. Nepal.

Coriaria Wall. et Roysl., Gerber-S., $\frac{1}{2}$. f. b. k. Nepal.

crataegina DC., weifsdornähnlicher, $\frac{1}{2}$. f. Kleinasien.

crenulata Schrd. (*canadensis* Big.), gekerbter, $\frac{1}{2}$. f. Nord-
 amerika.

cretica L., cretischer, $\frac{1}{2}$. f. Candia.

β) *glauca* Schrad.

daurica Lod., daurischer, $\frac{1}{2}$. f. Dahuria.

dealbata Lindl., weifsllicher, $\frac{1}{2}$. k. Mexico.

declinata Schrad. (*sinensis* H. Monspel.), niedergebeug-
 ter, $\frac{1}{2}$. f. Mittelasien.

dulcis Swt., süfser, $\frac{1}{2}$. f. Magellanische Meerenge.

emarginata W., ausgerandeter, $\frac{1}{2}$. f. Sibirien.

empetrifolia Lam., rauschbeerenblättriger, $\frac{1}{2}$. k. Ma-
 gellanische Meerenge.

floribunda Wall., blüthenreicher, $\frac{1}{2}$. f. b. k. Nepal.

heterophylla Juss., verschiedenblättriger, $\frac{1}{2}$. k. Magel-
 lanische Meerenge.

iberica Steven, iberischer, $\frac{1}{2}$. f. Caucasus.

ilicifolia Forst., stechhülsenblättriger, $\frac{1}{2}$. f. b. k. Feuerland.

laxiflora Schrad. (*canadensis* H. Vindob.), lockerblumige,
 $\frac{1}{2}$. f. Nordamerika.

lucida Schrad., starkglänzender, $\frac{1}{2}$. f. Caucasus.

macracantha Schrad., großstacheliger, $\frac{1}{2}$. f. Pennsylvanien.

macrocarpa Schrad. (*sinensis*, *monspeliensis*, *glauca* Hort.),
 großfrüchtiger, $\frac{1}{2}$. f. ? Mittelasien.

mitis Schrad. (*crataegina* Hort.), unbewehrter, $\frac{1}{2}$. f. Nord-
 amerika.

nepalensis Lodd., nepalischer, $\frac{1}{2}$. f. b. k. Nepal.

nitens Schrad., glänzender, $\frac{1}{2}$. f. ?

obovata Schrad., verkehrteiförmiger, $\frac{1}{2}$. f. b. k. Creta.

provincialis Audib. (*ilicifol.* H. Vind.), ausländischer, $\frac{1}{2}$. f. ?

ruscifolia Lam., mäusedornblättriger, $\frac{1}{2}$. t. Buenos Ayres.

sanguinolenta Schrad., blutrother, $\frac{1}{2}$. f. ?

sibirica Pall., sibirischer, $\frac{1}{2}$. f. Sibirien.

sinensis Dsf., sinesischer, $\frac{1}{2}$. f. Nordchina.

virgata R. et P., ruthenförmiger, $\frac{1}{2}$. t. Peru.

vulgaris L., gemeiner, $\frac{1}{2}$. f. Europa, Mittelasien.

β) *apyrena*. γ) *flava*. δ) *sanguinea*. ϵ) *sero-*
tina. ζ) *violacea*.

Wallichiana CC., Wallich's, $\frac{1}{2}$. f. b. k. Nepal.

Aquifol. Pursh. *fasciculat.* Sims. *glumacea* Spgl.
 etc. vid. *Mahonia Aquifol.* etc.

Berchemia Neck., Berchemie, V. 1., Rhamneae.

lineata DC., linirte, $\frac{1}{2}$. Sch. k. t. Ostindien, China.

volubilis DC., windende, $\frac{1}{2}$. Sch. k. f. b. Virgin., Carolina.

Berkheya Ehrh. (van Berkhey, holländischer Botan.),
 Compositae-Corymbiferae.

cernua RB., übergebogene, ♂. t. Cap d. g. H.

cuneata W., keilförmige, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. H.

cynaroides W., distelähnliche, 4. t. Cap d. g. H.

grandiflora W., großblumige, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. H.

Berkheya

incana W., weißgraue, ⚥. t. Cap d. g. H.

obovata W., verkehrt-eiförmige, ⚥. t. Cap d. g. H.

palmata W., handförmige, ⚥. t. Cap d. g. H.

pectinata W., kammförmige, ⚥. t. Cap d. g. H.

spinosissima W., stachelige, 4. t. Cap d. g. H.

uniflora W., einblumige, ⚥. t. Cap d. g. H.

ciliaris W. *setosa* W. et *squarrosa* W. v. *Cullumia* cil. etc.

Bergera König (C. J. Berger, Prof. zu Kiel), X. 1., Hesperideae-Aurantiaceae.

integerrima Roxb., ganzblättrige, ⚥. w. Ostindien.

Königii Roxb., Königs-B., ⚥. w. Ostindien.

Bergia L. (P. J. Bergius, Prof. der Naturgeschichte zu Stockholm), XI. 1v., Lythriaceae.

verticillata W., wirtelblättrige, ☉. f. Aegypt., Ostind.

Beringeria Necker (*Marrub. spec. Auctor*), Beringerie, XIV. 1., Labiatae.

acetabulosa Benth. (L.), sauerblättrige, ⚥. k. Candia.

africana Benth. (L.), afrikanische, 4. k. Cap d. g. H.

cinerea Benth. (Desr.), aschgraue, 4. f. Spanien.

crispa Benth. (L.), krausblättrige, 4. f. Südeuropa.

hirsuta Benth. (W.), rauhhaarige, 4. f. ?

hispanica Benth. (L.), spanische, 4. f. Spanien.

orientalis Benth. (Spgl.), morgenländische, 4. k. Kleinasien.

Pseudo-dictamnus Benth. (L.), dostartige, ⚥. k. Candia.

Bernhardia W. (J. J. Bernhardt, berühmter Botaniker zu Erfurt), XXIV. 111., Lycopodiaceae.

dichotoma W., zweizinkige, 4. w. Westind., Mascarenas, Neuholland.

Berrya Roxb. (Dr. Berry, engl. Botan.), XIII. 1., Tiliaceae.

Amomilla Roxb., Amomilla-B., ⚥. w. Ceylon.

Berteroa DC. (C. J. Bertero, berühmter französischer Botaniker und Reisender), XV. 11., Cruciferae.

incana DC., graugrüne, ♂. f. Europa.

β) *viridis* Rehb. Tausch.

mutabilis DC., veränderliche, ⚥. k. f. b. Dalmatien, Griechenland.

obliqua DC., schiefe, ⚥. 4. k. Sicilien, Neapel.

Bertholletia Humb. Bonpl. (J. C. Berthollet, berühmter franz. Chemiker), XIII. 1., Myrtaceae-Lecythideae.

excelsa Humb. Bonpl., hohe, (bras. Nufs), ⚥. w. Para.

Berzelia Brong. (Berzelius, berühmter schwedischer Chemiker), V. 1., Corniculatae-Cunoniaceae.

abrotanoides Brong. (Thbg.), stabwurzelähnliche, ⚥. t. Cap d. g. H.

lanuginosa Brong. (L.), wollige, ⚥. t. Cap d. g. H.

Besleria L. (Basil. Besler, Apotheker in Nürnberg), XIV. 11., Personatae-Bignoniaceae.

coccinea Aubl., scharlachfarbige, ⚥. Sch. w. Guiana.

cristata L., kammförmige, ⚥. Sch. w. Westindien, Südamer.

dichrus Spgl. (*bicolor* Schott), zweifarbig, ⚥. w. Brasilien.

grandifolia Schott, großblättrige, ⚥. w. Brasilien.

grandiflora Bonpl., großblumige, ⚥. w. Neugranada.

hirtella Schott., kurzhaarige, ⚥. w. Brasilien.

incarnata Aubl., fleischfarbig, 4. w. Guiana.

lutea L., gelbblumige, ⚥. w. Westindien, Guiana.

melittaeifolia L., melissenblättrige, ⚥. w. Westindien.

mollis Hook., weiche, ⚥. w. Südamerika.

pulchella Don, schöne, ⚥. w. Trinidad.

Besleria

serrulata Jacq., sägezähnige, ♀. Sch. w. Westindien.

violacea Aubl., violette, ♀. Sch. Guiana.

Beta T. Mangold, V. II., Aizoideae-Atripliceae.

orientalis Roth, morgenländischer, ♂. Asien.

patula Ait., ausgebreiteter, ♂. k. Madeira.

trigyna W. Kit., dreiweibiger, 4. f. Ungarn, Taur., Caucas.

vulgaris L., gemeiner, ♂. f. Europa, Afrika u. Mittelasien.

β) maritima. γ) macrorrhiza Steven. δ) Cicla

L. ε) hortensis (*brasiliensis* Hort.), a) alba, b) rubra,

c) lutea.

bengalensis Roxb. *foliosa* Ehrenb. et *maritima* MB.

v. *orientalis*.

Betckea DC. (Betcke hat über Valerianeen geschrieben),

III. I., Valerianeae.

major Fisch. et Mey., größere, ☉. f. Neucalifornien.

samolifolia DC., pungenblättrige, ☉. f. Chili.

Betonica L., Zehrkrut, XIV. I., Labiatae.

Alopecurus L., Fuchsschwanz-Z., 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

grandiflora W., großblumiges, 4. f. Sibirien, Caucasus.

heraclea L., dichtähriges, 4. f. Kleinasien.

hirsuta L., rauhhaariges, 4. f. Südeuropa, Caucasus.

β) incana Ait.

nivea Steven, schneeweißes, 4. f. Caucasus.

officinalis L., officinelles, 4. f. Europa.

α) hirta Rchb. β) glabrata. γ) stricta Ait. δ) lati-

folia (*serotina* Host.). ε) alba.

orientalis L., morgenländisches, 4. f. Kleinasien.

densiflora Benth. *macroua* Host. *Monnieri* Gouan

v. *hirsuta*.

Betula T., Birke, XXI. IV., Amentaceae.

alba L., gemeine weiße, ♀. f. Europa, Asien.

a) aurea Borkh. b) dalecarlica L. c) hybrida

Bechst. d) laciniata Wahlenb. e) macrocarpa.

f) pendula. g) pontica W. h) urticifolia A. B.

i) verrucosa Ehrh.

carpinifolia Ehrh., hainbuchenblättrige, ♀. f. Nordamer.

dahurica Pall., dahurische, ♀. f. Sibirien.

β) parvifolia.

excelsa Ait., hohe, ♀. f. Nordamerika.

fruticosa Pall., strauchige, ♀. f. Deutschl., Sibirien.

glandulosa Mchx., drüsige, ♀. f. Nordamerika.

grandis Schrad., großzähnige, ♀. f. Nordamerika.

lanulosa Mchx., wollige, ♀. f. Nordamerika.

lenta L. (*nigra* du Roi), zähe, ♀. f. Nordamerika.

nana L., Zwerg-B., ♀. f. Europ. Alpen, Sibirien, Canada.

β) stricta Lod.

nigra L. (*angulata* Lodd.), schwarze, ♀. f. Nordamerika.

papyracea Ait. (*papyrifera* Mchx.), *canadensis* et *rubra*

Lod. Cat. (*lanceolata* Hort.), papiergebende, ♀. f.

Nordamerika.

β) fusca Bosc. γ) platyphylla Hortul. δ) tri-

choclada Hort.

populifolia Ait. (*lenta* du Roi), pappelblätt., ♀. Nordamer.

β) laciniata Lod. γ) pendula Lod.

pubescens Ehrh., weichhaarige, ♀. f. Deutschl., Ungarn,

Volhynien.

β) carpathica Kit. (*glutinosa* Wallr.).

pumila L., kleine, ♀. f. Nordamerika.

rubra Mchx., röthliche, ♀. f. Nordamerika.

Betula

- tristis* Wormsk., trauernde, ♀. f. Kamtschatka.
acuminata Ehrh. vid. *populifolia*. *humilis* Schrk.
 v. *fruticosa*. *lutea* Mchx. vid. *excelsa*. *ovata* Schrk.
 et *oycoviensis* Bess. v. *Alnus viridis*. Hinsichtlich
 der übrigen s. *Alnus*.

Beureria Jacq., *Beurerie, V. I., Asperifol.

- exsucca* Jacq., saftlose, ♀. w. Westindien.
succulenta Jacq., fleischige, ♀. w. Westind., Südamer.

Bidens T., Zweizahn, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

- angustissima* Kunth, schmalblättriger, 4. t. Neuspanien.
Berteriana Spgl., Bertero's, 4. w. Portorico.
bipinnata L., doppeltgefiederter, ♂. f. Nordamer., südl. Tyrol.
bullata L., blasiger, ♂. f. Nordamerika, Oberitalien.
cernua L., übergebogener, ♂. f. Europa, Nordamerika.
 β) *radiata*.

- chinensis* W., chinesischer, ♂. f. China.
chrysantha Ortega, goldblumiger, ♂. f. Südamerika.
chrysanthemoides Mchx., wucherblumenähnlicher, ♂. f.
 Nordamerika.

- connata* W., verwachsener, ♂. f. Nordamerika.

- coronata* Ait., gekrönter, ♂. t. ?

- crithmifolia* H. B. K., meerfenchelblättriger, 4. k. Mexico.

- cynapifolia* H. B. K., gleißblättriger, ♂. f. m. Cuba.

- foliosa* W., blätterreicher, ♂. f. ?

- frondosa* L., belaubter, ♂. f. Nordamerika.

- grandiflora* Balb. (*odorata* Hort.), großblumiger, ♂. f. m
 Südamerika.

- helianthoides* H. B. K., sonnenblumenähnlich, ♂. f. Mexico.

- heterophylla* Ortega, verschiedenblättriger, 4. k. Mexico.

- hirtella* H. B. K., kurzhaariger, ♂. f. Mexico.

- leucantha* W., weißblumiger, ♂. f. m. Ost- u. Westindien.

- luxurians* W., üppiger, ♂. k. Mexico.

- macrosperma* Fisch., großsamiger, 4. f. Sibirien.

- nodiflora* L., knotenblumiger, ♂. m. f. Ostindien.

- odorata* Cav., wohlriechender, ♂. f. Mexico.

- parviflora* W., kleinblumiger, ♂. f. Sibirien.

- pilosa* L., haariger, ♂. f. Nordamerika, Westindien.

- procera* D. Don, hoher, 4. k. Mexico.

- procumbens* H. B. K., niederliegender, 4. f. Mexico.

- reflexa* Lk., zurückgebogener, ♂. k. t. Mexico.

- repens* D. Don, kriechender, 4. k. Nepal.

- sambucifolia* Cav., fliederblättriger, 4. k. Mexico.

- serrulata* Ait., sägezahniger, ♂. t. ?

- striata* Schott., gestreifter, ♂. f. Mexico.

- tripartita* L., dreitheiliger, ♂. f. Europa.

- arborea* Roxb. v. *Petrobium arboreum*. *nivea* L. v. *Me-*
lananthera hastata. *scandens* L. v. *Salmea scandens*.

Bifora Hoffm. (*Biforis* Spgl.), Doppelkorn, V. II., Umbelliferae.

- radians* MB., strahlendes, ♂. f. Südeuropa, Taurien.

- testiculata* DC. (*flosculosa* MB.), gleichblumiges, ♂. f.
 Südeuropa.

Bifrenaria Lindl., Doppelstendel, XX. I., Orchideae.

- aurantiaca* Lindl., orangenfarbiger, 4. w. Demerara.

- longicornis* Lindl., langsporniger, 4. w. ?

Bigelovia Spgl. (*Borrera Meyer* DC.) (Prof. Bigelow in
 Boston) IV. I., Rubiaceae.

- commutata* Spgl., verwechselte, 4. w. Westindien.

- cornifolia* (Fisch. DC.), cornusblättrige, ♂. f. m. Brasil.

Bigelovia

parviflora Spgl., kleinblumige, ☉. f. k. Südamerika.

stricta Spgl., steife, ♂. w. Ostindien.

tenera (DC.), zarte, ☉. f. m. Brasilien.

tenuis (DC.), dünne, ☉. f. m. Brasilien.

vaginata Spgl., scheidige, ♀. w. Hispaniola.

verticillata Spgl., wirtelförmige, ♀. w. Guinea, Jamaica.

Bignonia T. (Abbé Bignon, Bibliothekar Ludwig's des XIV.), XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.

adenophylla Wall., drüsenblättrige, ♀. w. Ostindien.

aequinoctialis L., cajennische, ♀. Sch. w. Guiana.

aesculifolia H. B. K., rofskastanienblättrige, ♀. w. Mexico.

alliacea Lam., knoblauchduftende, ♀. Sch. w. Guiana.

amoena Wall., liebliche, ♀. w. Ostindien.

apurensis H. B. K., apurische, ♀. Sch. w. Südamerika.

bijuga Vahl, zweipaarige, ♀. w. Madagascar.

candicans Rich., weißliche, ♀. Sch. w. Cayenne.

capreolata L., rankende, ♀. Sch. k. f. b. Nordamerika.

Chamberlaynii B. Reg., Chamberlayn's, ♀. Sch. w. Brasil.

chelonoides L., schildblumenähnliche, ♀. w. Ostindien.

Chica Humb., Chica-B., ♀. Sch. Südamerika.

chrysantha Jacq., goldblumige, ♀. w. Caracas.

chrysoleuca Bonpl., gelbweißse, ♀. Sch. w. Südamerika.

Clematis H. B. K., Waldreben-B., ♀. Sch. w. Caracas.

crenata Lod. C., gekerbte, ♀. Sch. w. ? Ostindien.

crucigera, L., kreuzblättrige, ♀. Sch. w. t. Virginien, Westindien.

decipiens Lod. C., täuschende, ♀. Sch. w. ? Ostindien.

digitata H. angl. Lk. E., fingerförmige, ♀. Sch. w. ?

diversifolia H. B. K., andersblättrige, ♀. Sch. w. Mexico.

elongata Vahl, verlängerte, ♀. Sch. w. Südamerika.

floribunda H. B. K., blüthenreiche, ♀. Sch. w. Mexico.

fluviatilis Aubl., Fluß-B., ♀. w. Guiana.

gracilis Lod., schlanke, ♀. Sch. w. Südamerika.

grandifolia Jacq., großblättrige, ♀. Sch. w. Südamerika.

heterophylla W. (*Cherere* Aubl.), verschiedenblättrige, ♀. Sch. w. Guiana.

jasminifolia H. B. K., jasminblätt., ♀. Sch. w. Südamerika.

jasminoides Cunn., jasminähnliche, ♀. Sch. t. Neuholl.

incarnata Aubl., fleischfarbige, ♀. Sch. w. Guiana.

lactiflora Vahl, milchweißblumige, ♀. Sch. w. Caraib. Ins.

latifolia Rich., breitblättrige, ♀. Sch. w. Cayenne.

laurifolia Vahl, lorbeerblättrige, ♀. Sch. w. Cayenne.

Leucoxydon L., Weißholz-B., ♀. w. Jamaica.

litoralis H. B. K., Seestrands-B., ♀. Sch. w. Mexico.

mollis Vahl, weiche, ♀. Sch. w. Cayenne.

mollissima H. B. K., weichblättrige, ♀. Sch. w. Caracas.

multifida Lod. Cat., vieltheilige, ♀. Sch. w. ? Ostindien.

pallida Lindl., blaßblumige, ♀. Sch. w. Westindien.

picta H. B. K., bemalte, ♀. Sch. w. Südamerika.

pubescens L., weichhaarige, ♀. Sch. w. Neuspanien.

purpurea Lodd., purpurfarbige, ♀. w. Südamerika.

rigescens Jacq., starre, ♀. w. Caracas.

salicifolia H. B. K., weidenblättrige, ♀. Sch. w. Südamer.

serratifolia Vahl, sägeblättrige, ♀. w. Caraib. Inseln.

serrulata Wal., feinsägige, ♀. w. Ostindien.

spectabilis Vahl, ansehnliche, ♀. Sch. w. Westindien.

spicata Lock., ährenförmige, ♀. Sch. w. Trinidad.

staminea Lam., langfadige, ♀. Sch. w. Hispaniola.

suberosa Roxb., korkige, ♀. Sch. w. Ostindien,

Bignonia

- triphylla L., dreiblättrige, ♂. w. Mexico.
 Unguis L., klauenförmige, ♂. Sch. w. Westindien.
 variabilis Jacq., veränderliche, ♂. Sch. w. Caracas.
 venusta Ker, anmuthige, ♂. Sch. w. Brasilien.
 viridiflora Lod., grünblumige, ♂. Sch. w. Südamerika.
 alba Aubl., *brasiliانا* Lam., *coerulea* L., *echinata*
 L. etc. vid. *Jacaranda alba* etc. *linearis* Cav. vid.
 Chilopsis salign. *paniculata* W. vid. *Amphilobium*
 panicul. *radicans* L. etc. v. *Tecoma radicans* etc.
sempervirens L. v. *Gelsemium semperv.* *tomentosa*
 Thbg. v. *Incarvillea toment.* *uncata* Sims etc. vid.
Spathodea uncata etc.

Billardiera Sm. (J. J. LaBillardière, berühmter französischer Botaniker), V. 1., Pittosporaeae.

- angustifolia* DC., schmalblättrige, ♂. Sch. t. Neuholl.
longiflora La Bill., langblumige, ♂. Sch. t. Van-Diem. L.
mutabilis Salisb., veränderliche, ♂. Sch. t. Neusüdwallis.
ovalis Lindl., eiförmige, ♂. Sch. t. Van-Diemen's Land.
parviflora DC., kleinblumige, ♂. Sch. t. Neuholland.
fusiformis La Bill. v. *Sollya angustifolia*.

Billbergia Thbg. (J. G. Billberg, schwedischer Botaniker), VI. 1., Bromeliaceae.

- amoena* Lindl., liebliche, 4. w. Südamerika.
bicolor Lod., zweifarbige, 4. w. Rio Janeiro.
clavata Lind., (*melanantha* Ker.), keulenförmige, 4. w. Trinidad.
cruenta Hook, blutrothe, 4. w. Rio Janeiro.
fasciata Bot. reg., bandförmige, 4. w. Rio Janeiro.
iridifolia Bot. reg., schwertelblättrige, 4. w. Rio Janeiro.
nudicaulis Lindl., nacktstengelige, 4. w. Trinidad.
purpureo-rosea Hook, purpurrosafarbige, 4. w. Brasilien.
pyramidalis Lindl., pyramidalische, 4. w. Rio Janeiro.
zebrina Lindl., gescheckte, 4. w. Südamerika.

Billotia Coll. (*Baudinia* Lesch.), (Madame Teophila Billoti zu Turin), XVIII. 11., Myrtaceae.

- acerosa* Coll., nadelblättrige, ♂. t. Neuholland.

Biophytum DC., Wunderklee, X. v., Oxalideae.

- sensitivum* DC., empfindsamer, ☉. m. f. China.

Biscutella L., Brillenschote (Doppelschild), XV. 11., Cruciferae.

- apula* L., apulische, ☉. f. Südl. Italien, Griechenland.
auriculata L., geöhrt, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.
 β) *erigerifolia* DC.
cichoriifolia Lois. (*picridifol.* Lapey.), cichorienblättrige,
 ♂. 4. f. b. k. Pyrenäen.
ciliata DC. (*coronopifolia* et *didyma* W.), gefranzte, ☉.
 f. Südeuropa.

- Columnae* Ten., *Columna's*, ☉. f. Süditalien.

β) *microcarpa* DC.

- coronopifolia* L., krähensfußblättrige, 4. f. Südeuropa.
depressa W., niedergedrückte, ☉. f. Aegypten.
eriocarpa DC., wollfrüchtige, ☉. f. Mauritanien.
hispida DC., hackerige, ☉. f. Südfrankreich, Italien.
laevigata L., glatte, 4. f. Mittel-, Ost- u. Südeuropa.

β) *alpestris* Kit. γ) *obcordata* Rchb.

- lucida* DC. (*subspatulata* Lam.), glänzende, 4. f. b. Neapel.

- lyrata* L., leierförmige, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.
maritima Tenor., Seestrands-B., ☉. f. Neapel.

Biscutella

montana Cav., Berg-B., 4. f. b. k. Südspanien.

β) *ovata* DC.

raphanifolia Poir., rettigblättrige, ☉. f. Sicil., Mauritan.
saxatilis DC., Felsen-B., 4. f. Südeuropa.

sempervirens L., immergrüne, 4. k. Westeuropa.

? *stenophylla* Dsf., schmalblättrige, 4. f. b. k. Spanien.

ambigua DC. v. *coronopifolia*. *didyma* β. L. v. Co-

lurnae. *intermedia* Gouan. *leiocarpa* DC. v. ra-

phanifol. *longifol.* Vill. (et *subspatulata* Sut.) v. sa-

xatilis. *megalocarpa* Fisch. v. *Megacarpaea laciniata*.

Biserrula L., Sägekraut, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-
Papilionaceae.

pelecinus L., gemeines, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

Bivonaea DC. (A. Bivoni Bernardi, italienischer Botaniker), XV. II., Cruciferae.

lutea DC., gelbe, ☉. f. Sicilien.

Bixa L., Orleanbaum, XIII. I., Bixaceae.

Orellana L., gemeiner, ♀. w. Westindien.

purpurea Hort., purpurfarbiger, ♀. w. Ostindien.

Urucurana W., Uruca-O., ♀. w. Brasilien.

Blackwellia Commers. (Elisab. Blackwell, botanische
Malerin), XI. v., Amygdaleae-Homalineae.

axillaris Lam., achselblumige, ♀. w. Madagascar.

cerasifolia Vent., kirschblättrige, ♀. N. Madagascar.

glauca Vent., blaugrüne, ♀. w. Mascarenas.

grandiflora Lindl., großblumige, ♀. t. China.

padifolia Lindl., traubenkirschenblättrige, ♀. t. Chili.

paniculata Lam., rispige, ♀. t. Mascarenas.

spiralis Wall., spiralförmige, ♀. t. Mascarenas.

Blairia L. (P. Blair, engl. Naturf.), IV. I., Ericaceae.

articulata L., gegliederte, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

ciliaris L., gefranzte, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

depressa Lichtenst., niedergedrückte, ♀. t. C. d. g. H.

dumosa Wendl., heckige, ♀. t. Cap d. g. H.

ericoides L., heideähnliche, ♀. t. Cap d. g. H.

fasciculata W., büschelförmige, ♀. t. Cap d. g. H.

glabella Wendl., glatte, ♀. t. Cap d. g. H.

muscosa Ait., moosähnliche, ♀. t. Cap d. g. H.

paucifolia Wendl., wenigblättrige, ♀. t. C. d. g. H.

purpurea L., purpurfarbige, ♀. t. Cap d. g. H.

scabra W., scharfe, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.

bracteata Wendl. v. *Sympieza capitellata*. ? *hirsuta*

Lichtenst. v. *fasciculata*.

Blakea P. Br. (M. Blake, englischer Gelehrter), X. I.,
Lythriariae-Malastomeae.

quinquenervia Aubl., fünfnervige, ♀. w. Guiana.

trinervia L., suppl., dreinervige, ♀. w. Jamaica.

Blandfordia Sm. (Georg Marq. v. Blandford), VI. I.,
Coronariae-Asphodeleae.

grandiflora RB., großblumige, 4. t. Neusüdwallis.

nobilis Sm., edle, 4. t. Neusüdwallis.

Blandfordia cordata Andr. v. *Galax aphylla*.

Blechnum L., Rippenfarn, XXIV. I., Pteroideae. (*Po-*
lypodiac.).

angustifolium W., schmalblättriger, 4. w. Guiana, Bras.

australe L., südlicher, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

brasiliense Desv., brasilianischer, 4. w. Brasilien.

cartilagineum Sw., knorpeliger, 4. w. Neuholland.

glandulosum Lk., drüsiger, 4. w. Brasilien.

Blechnum

- gracile Kaulf., schlanker, 4. w. Brasilien.
 hastatum Kaulf., spontonförmiger, 4. w. Chili.
 laevigatum Cav., glatter, 4. w. Neuholland.
 Lanceola Sw., lanzettblättriger, 4. w. Brasilien.
 ? β) lanceolatum Radd.
 longifolium Humb., langblättriger, 4. w. Neugranada.
 occidentale L., abendländischer, 4. w. Westindien, Philippinen.
 pectinatum Presl, kammförmiger, 4. w. Marianeninsel.
 polypodioides Radd., tüpfelfarnähnlicher, 4. w. Brasil.
 serrulatum Mchx., feinsägiger, 4. t. k. f. b. Florida.
 striatum RB., gestreifter, 4. w. Neuholl., Neucaled.
calophyllum Langsd. et Fisch. v. angustifol. *corcovadense* Radd. v. brasiliense. *stamineum* La Bill.
 vid. striatum. Hinsichtlich der übrigen s. Lomaria und Woodwardia.

Blechnum Juss., Blechnum, XIV. II., Acanthaceae.

- angustifolium RB., schmalblättriges, 4. w. Westindien.
 brasiliense Lod. C., brasilianisches, 4. w. Brasilien.
 Brownei Juss., Brown's, 4. w. Jamaica.
 laxiflorum Juss., lockerblumiges, 4. w. Jamaica.

Blepharis Juss., Doppelkelch, XIV. II., Acanthaceae.

- boerhaaviaefolia P., boerhaaviablättriger, $\odot$. w. f. m. Ostindien.

- capensis P., capischer, σ . k. Cap d. g. Hoffn.
 edulis P., genießbarer, $\mathfrak{f}$. t. Persien, Arabien.
 furcata P., gabeliger, $\mathfrak{f}$. t. Cap d. g. Hoffn.
 linariaefolia P., leinkrautblättriger, $\odot$. w. Senegambien.
 molluginifolia P., weichlingblättriger, $\odot$. 4. w. Ostind.
 procumbens P., niederliegender, $\mathfrak{f}$. t. Cap d. g. H.
 saturejaefolia P., satureiblättriger, $\odot$. f. m. C. d. g. H.

Blephilia ciliata et **hirsuta** Rafin. v. **Monarda ciliata** etc.**Bletia** R. et P. (Louis Blet, spanischer Apotheker u. Botaniker), XX. I. Orchideae.

- acutipetala Hook, spitzblumige, 4. Kn. w. t. Südcarolina.
 capitata RB., kopfförmige, 4. Kn. w. Westindien.
 florida RB., blüthenreiche, 4. Kn. w. Westindien.
 gracilis Lod., schlanke, 4. w. Mexico.
 guineensis G. Don, guineische, 4. Kn. w. Sierra Leone.
 havannensis Booth, Havanna-B., 4. Kn. w. Havanna.
 hyacinthina RB., hyacinthenähnliche, 4. Kn. w. China.
 pallida Lod., bleiche, 4. Kn. w. Westindien.
 patula Hook, ausgebreitete, 4. Kn. St. Domingo.
 reflexa Lindl., zurückgebogene, 4. Kn. w. Mexico.
 speciosa H. B. K., prächtige, 4. Kn. w. Mexico.
 Tankervilliae RB., Tankervillie's, 4. Kn. w. China, Cochinchina.

- verecunda RB., schamhafte, 4. Kn. w. Florida, Westind.
 β) **Shepherdii** Hook: Jamaica.

- Woodfordii** Hook., Woodford's, 4. w. Trinidad.

Blighia König, (Bligh, englischer Capitain), VIII. I., Sapindaceae.

- sapida König, wohlschmeckende, $\mathfrak{f}$. w. Guinea.

Blitum L., Erdbeerspinat, I. II., Aizoideae-Atripliceae.

- capitatum L., kopfförmiger, $\odot$. f. Südeuropa.
 chenopodioides Lam. (*petiolare* Lk.), gänsefußähnlicher, $\odot$. f. Tatarei.
 maritimum Nutt., Seestrands-E., $\odot$. f. Nordamerika.

Blitum

virgatum L., ruthenförmiger, ☉. f. Mittel- u. Südeuropa.
Bonus Henricus C. A. Meyer. *glaucum* Koch. *rubrum* Rchb. v. Chenopod. Bonus Hen. etc.

Blumea DC. (C. L. Blume, niederländischer Botaniker), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

longifolia L., langblättrige, ☉. 4. t. Ostindien.

Blumenbachia Schrad. (J. F. Blumenbach, berühmter deutscher Naturforscher), XVIII. II., Loasaceae.

insignis Schrad., ausgezeichnete, ☉. 5. w. Chili.
multifida Hook, vieltheilige, ☉. w. Buenos-Ayres.

Blysmus Panz., Quellenriet, III. I., Cyperaceae.

compressus Panz., plattes, 4. f. Deutschland.

rufus Lk., fuchsrothes, 4. f. Norddeutschland.

Bobartia L. (J. Bobart, Prof. der Botanik zu Oxford), III. I.

aurantiaca Zuc., orangefarbene, 4. t. C. d. g. H.

gladiata Swt., schwertförmige, 4. t. Cap d. g. H.

spathacea L., scheidenblüthige, 4. t. Cap d. g. H.

Bocconia L. (P. Boccone, sicilianischer Botaniker), X. I., Papaveraceae.

frutescens L., strauchige, 5. w. Westind., Südamerika.

integrifolia H. B. K., ganzblättrige, 5. w. Neuspanien.

cordata W. v. *Macleaya cordata*.

Boebera chrysanthemoides etc. v. *Dyssodia chrysanthemoides etc.***Boehmeria** Jacq. (G. R. Böhmer, Prof. zu Wittenberg), XXI. IV., Urticaceae.

castaneaefolia Cunn., kastanienblättrige, 5. w. Norfolk.

caudata Sw., geschwänzte, 5. w. Jamaica.

cylindrica W., cylinderförmige, 4. f. Virginien.

elongata Fisch., verlängerte, ☉. m. f. Brasilien.

frondosa D. Don, belaubte, 5. t. Neapel.

frutescens Thbg., strauchige, 5. t. Japan, Nepal.

hirta Sw., kurzhaarige, 5. w. Jamaica.

interrupta W., unterbrochene, 4. w. Ostindien.

lateriflora Mühlenb., seitenblumige, 4. f. Nordamerika.

macrophylla D. Don, großblättrige, 5. t. Nepal.

platyphylla D. Don, breitblättrige, 5. t. Nepal.

ramiflora Jacq., astblumige, 5. w. Westindien.

rotundifolia D. Don, rundblättrige, 4. t. Nepal.

rubescens Jacq., röthliche, 5. t. k. Canar. Inseln.

salicifolia D. Don, weidenblättrige, 4. k. f. b. Nepal.

urticaefolia Spgl. v. *Parietaria urticaefol.*

Boenninghausenia Rchb. (v. Bönninghausen, Regierungsrath zu Münster), X. I., Tricoccae-Rutaceae.

albiflora Rchb., weißblumige, 5. t. Nepal.

Boerhaavia L. (H. Boerhaave, berühmter holländischer Arzt u. Botaniker), II. I., Nyctagineae.

discolor H. B. K., verschiedenfarbige. 4. w. Südamer.

erecta L., aufrechte, 4. w. Westindien.

excelsa W., hohe, 5. w. Südamerika.

hirsuta L., rauhhaarige, 4. 5. w. Westind., mittägl. Amer.

mutabilis Ait., veränderliche. 4. t. Neuholland.

plumbaginea Cav., bleiwurzähnliche, 4. t. k. Spanien.

procumbens Roxb., niederliegende, 4. w. Ostindien.

scandens L., klimmende, 5. Sch. w. Westindien.

viscosa Lagasc., schmierige, 4. w. Peru.

diffusa W. v. *hirsuta*.

- Boldoa** Cav. (D. Boldo, span. Botan.), III. I., Nyctagineae.
lanceolata Lagasc., lanzettblättrige, ♀. w. Neuspanien.
purpurascens Cav., purpurfarbige, 4. w. Cuba.
- Boleum** Desv., *Boleum*, XV. II., Cruciferae.
asperum Desv., rauhes, ♀. 4. k. Spanien.
- Bolivaria** Schlechtd. (Bolivar, Befreier Südamerika's),
 II. I., Jasmineae.
trifida Schlechtd., dreitheilige, ♀. w. Chili.
- Boltonia** L'Her. (J. B. Bolton, englischer Botaniker),
 XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
asteroides L'Her., sternblumenähnliche, 4. f. Nordamer.
glastifolia L'Her., glatthblättrige, 4. f. Nordamerika.
- Bombax** L., Wollblume, XVI. VIII., Malvaceae-Bombaceae.
Ceiba L., fünfblättrige, ♀. w. Westindien.
globosum Aubl., kugelfrüchtige, ♀. w. Cayenne.
malabaricum DC., malabarische, ♀. w. Ostindien.
septenatum Jacq., siebenblättrige, ♀. w. Neugranada.
heptaphyllum L. v. *septenatum*. *heptaphyllum* Roxb.
 v. *malabaricum*. *quinatum* Jacq. vid. *Ceiba*. Hin-
 sichtlich der übrigen s. die Gattungen *Cochlospermum* et *Eriodendron*.
- Bonatea** W. (Bonato, Prof. der Botanik zu Padua),
 XX. I., Orchideae.
speciosa W., prächtige, 4. w. Cap d. g. H.
- Bongardia** C. A. Mey. (von Bongard, k. rufsischer Staatsrath u. Botaniker), VI. I., Berberideae.
Rauwolfii C. A. Mey., Rauwolf's, 4. Kn. f. Griechenland, Kleinasien.
- Bonnaya** Lk., *Bonnaya* II. I., Personatae-Antirrhineae
brachiata L., armförmige, ☉. w. Brasilien.
reptans Spgl., kriechende, 4. w. Ostindien.
veronicaefolia Spgl., ehrenpreisblättrige, ♂. w. Ostind.
- Bonnetia meridionalis** Sw. (*palustris* Vahl) vid. *Mahurea*
palustris. *racemosa* Sw. v. *Mahurea speciosa*.
- Bonplandia** Cav. (A. Bonpland, berühmter französischer Botaniker u. Reisender), V. I., Acanthaceae.
geminiflora Cav., doppelblumige, ♂. 4. w. Neuspanien.
- Bontia** L. (J. Bontius, Arzt zu Batavia), XIV. II., Globulariaceae (*Myoporinae*).
daphnoides L., seidelbastähnliche, ♀. w. Ostindien.
- Boothia** Dougl. v. *Platystemon*.
- Borassus** L., Weinpalme, XXII. VI., Palmae.
flabelliformis L., fächerförmige, ♀. w. Ostindien.
- Borbonia** L. (Gaston de Bourbon, Sohn Heinrich IV. von Frankreich), XVII. IV. (VI.), (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
barbata Lam., härtige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
ciliata W., gefranzte, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
cordata L., herzförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
crenata L., gekerbte, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
lanceolata L., lanzettblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.
ruscifolia Ker, mäusedornblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.
trinervia L., dreinervige, ♀. t. Cap d. g. H.
undulata Thbg., wellenblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.
ericaefolia L. vid. *Priestleya ericaefol.* *perfoliata*
 Thbg. v. *Vascoa perfoliat.*
- Borkausia** Auctor v. *Barkhausia*.

Boronia Sm. (F. Borone, Begleiter von Sibthorp), VIII.

I., Tricoccae-Rutaceae.

alata Sm., geflügelte, ♀. t. Neuholland.*anemonefolia* Cunn., windblumenblättrige, ♀. t. Neuholl.*crenulata* Sm., gekerbte, ♀. t. Neuholland.*denticulata* Sm., gezähnelte, ♀. t. Neuholland.*ledifolia* Gay, borstblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.*paradoxa* DC., wunderbare, ♀. t. Neuholland.*pilonema* La Bill., weichhaarige, ♀. t. Südl. Neuholl.*pinnata* Sm., gefiederte, ♀. t. Neusüdwallis.*polygalaefolia* Sm., kreuzblumenblättrige, ♀. t. Neuholl.*serrulata* Sm., sägezahnige, ♀. t. Neuholland.*tetrandra* La Bill., viermännige, ♀. t. Westl. Neuholl.**Borrigo** T., Borretsch, V. I., Asperifoliaceae.*crassifolia* Vent., dickblättriger, 4. k. Persien.*cretica* W., cretischer, 4. k. Creta.*laxiflora* Hornem., lockerblumiger, ♂. f. k. Corsica.*longifolia* Desv., langblättriger, ♂. f. Nordafrika.*officinalis* L., officineller, ♂. f. Kleinasien, Europa.β) *albiflora*.*orientalis* L., morgenländischer, 4. k. Türkei.**Borrera** G. F. W. Meyer v. Bigelovia.**Borya** W. (Bory de St. Vincent, berühmter franz. Naturforscher), XXII. II., Tricoccae-Euphorbiaceae.*acuminata* W., zugespitzte, ♀. k. Carolina, Georgien.*ligustrina* W., rheinweidenblättrige, ♀. k. Nordamerika.*nitida* W., glänzende, ♀. k. Nordamerika.*porulosa* W., poröse, ♀. k. Florida.*prinoides* W., winterbeerenähnliche, ♀. k. Nordamerika.*retusa* W., eingedrückte, ♀. k. Nordamerika.**Boscia** Lam. (J. Bosc, franz. Botan.), XI. I., Capparideae.*senegalensis* Lam., senegambische, ♀. w. Senegambien.**Bosea** L. (E. G. Bose, Prof. zu Leipzig), V. II., Aizoideae - Phytolacceae.*Yervamora* L., Goldruthen-B., ♀. k. Canarische Inseln.**Bossiaea** Vent. (Boissieu-Lamartinière, Begleiter von La Peyrouse), XVII. IV. (VI.), XVI. VI., Leguminosae-Papilionaceae.*buxifolia* Cunn., buchsbaumblättrige, ♀. t. Neuholl.*cinerea* RB., aschgraue, ♀. t. Neuholland.*cordifolia* Swt., herzblättrige, ♀. t. Neuholland.*ensata* Sbr., schwertförmige, ♀. t. Neuholland.*eriocarpa* Benth., wollfrüchtige, ♀. t. Neuholland.*foliosa* Cunn., blattreiche, ♀. t. Neuholland.*heterophylla* Sm., verschiedenblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.*lenticularis* Sbr., linsenförmige, ♀. t. Neuholland.*linophylla* RB., leinblättrige, ♀. t. Neuholland.*microphylla* RB., kleinblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.*prostrata* RB., gestreckte, ♀. t. Neuholland.*rhombifolia* Sieb., rautenförmige, ♀. t. Neuholland.*rotundifolia* DC., rundblättrige, ♀. t. Neuholland.*rufa* RB., fuchsrothe, ♀. t. Neuholland.*Scolopendrium* RB., hirschezungenblättrige, ♀. t. Neuholl.*lanceolata* Sims v. *heterophylla*.**Boswellia** Roxb. (Colebr.), (Dr. John Boswell zu Edinburgh), X. I., Amyrideae.*glabra* Roxb., kahle, ♀. w. Coromandel.*serrata* Stackh., sägezahnige, ♀. w. Ostindien.**Botryadenia Gmelini** Fisch. et Mey. v. *Myriactis Gmelini*.

- Botryceras** W., Traubenhorn, IV. I., Aquifoliaceae.
laurinum W., lorbeerblättriges, ♀. t. Neuholland.
- Botrychium** Sw., Traubenfarn, XXIV. I., Osmundaceae.
australe RB., südlicher, 4. t. w. Neuholland.
dissectum Spgl., schlitzblättriger, 4. f. k. Nordamer.
fumarioides W. (*Fumariae* Spgl.), erdrauchähnlicher, 4. k. t. Carolina.
Lunaria Sw., Mondrauten-T., 4. f. Europa, Nordasien.
 β) *rutaceum* Sw.
Matricariae Spgl. (*matricarioides* W.), mutterkrautähnlicher, 4. f. Europa.
virginicum Sw., virginischer, 4. f. Nordamerika.
- Bothryspermum** Bunge, Traubensamen, V. I., Asperifoliaceae.
bicarunculatum Bung., zweiwarziger, ♂. f. Nordchina.
chinense Bung., chinesischer, ☉. f. China.
tenellum F. et Mey., zarter, ☉. f. China, Ostindien.
- Botrophis actaeoides** Rafin. v. *Cimicifuga* Serpent.
- Boussingaultia** H. B. K. (J. B. Boussingault, französischer Naturforscher), V. I., Aizoideae-Phytolacceae.
baselloides H. B. K., beerblumenähnliche, ♀. Sch. w. Südamerika.
- Bouvardia** Salisb. (Dr. Bouvard, französischer Botaniker), IV. I., Rubiaceae.
Jacquini H. B. K. (*triphylla* Sal.), Jacquin's, ♀. k. t. Mexico.
 β) *glabra*. γ) *pubescens*.
longiflora H. B. K., langblumige, ♀. t. Mexico.
versicolor Ker, buntfarbige, ♀. k. t. Südamerika.
- Bowiea** Haw. v. Aloe.
- Bowlesia** R. et P. (W. Bowles, ireländischer Botaniker), V. II., Umbelliferae.
tenera Spgl., zarte, ☉. f. Monte Video.
- Brabejum** L., Scepterblume, IV. I. (XXIII. I.), Proteaceae.
stellatum Thbg. (*stellatifolium* L.), sternförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- Brachycome** F. et Mey., Kurzschopf, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
diversifolia Fisch. et M., verschiedenblättriger, 4. t. Neuholland.
- Brachyglottis** Forst., Kurzstrahl, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
repanda Forst., ausgeschweifert, ♀. t. Neuzeeland.
- Brachylaena** RB., Kurzhülle, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
neriifolia RB., oleanderblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.
- Brachypodium** P. B., Zwenke, III. II., Gramineae.
brevisetum R. et S., kurzborstige, ☉. f. ?
distachyum R. et S., zweiährige, ☉. f. Südeuropa, Nordafr.
genuense R. et S., genesische, 4. f. Genua.
longifolium R. et S., langblättrige, 4. f. k. Spanien, Nordafr.
mexicanum Lk., mexikanische, ☉. f. Mexico.
obtusifolium Lk., stumpfblättrige, 4. f. k. Spanien.
phoenicoides R. et S., schwingelähnliche, 4. f. Südfrankr.
pinnatum P. B., gemeine, 4. f. Europa, Sibirien.
 β) *caespitosum*. γ) *rupestre* R. et S.
ramosum R. et S. (*Plukenetii* Lk.), ästige, 4. f. Südeuropa, Orient, Nordafrika.
rigidum Lk. (*asperum* R. et S., starre, ☉. f. Spanien.
strigosum R. et S., striegelige, 4. f. Taurien.

Brachypodium

sylvaticum R. et S., Wald-Z., 4. f. Europa, Caucasus.
Tenorianum R. et S., Tenore's, 4. f. Neapel.

Hosti Lk. vid. *ramosum*. Hinsichtlich der übrigen
 s. die Gattungen *Brizopyrum*, *Catapodium*, *Festuca*
 (*Nardurus*), *Sclerochloa*.

Brachysema RB., Kurzfahne, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

latifolium RB., breitblättrige, ⚥. Sch. t. Neuholland.
undulatum Ker, wellenblättrige, ⚥. Sch. t. Neusüdwallis.

Brachystelma RB., Kurzkrone, V. 11., Asclepiadeae.

crispum Grah., krause, 4. Kn. Sch. t. Cap d. g. H.
tuberosum RB., knollige, 4. Kn. Sch. t. Cap d. g. H.

Bradleya nitida Roxb. et *sinica* G. v. *Glochidion nitid.* etc.

Brassavolea RB. (A. M. *Brassavola*, italienischer Botaniker), XX. 1., Orchideae.

angustata Lindl., verschmälerte, 4. w. Demerara.
cordata Lindl., herzlippige, 4. w. Brasilien.
cucullata RB., kappenförmige, 4. w. Westindien.
grandiflora Lindl., großblumige, 4. w. Honduras.
Martiana Lindl., Martius's, 4. w. Brasilien.
nodosa Lindl., knotige, 4. w. Mexico.
Perrinii Lindl., Perrin's, 4. w. Brasilien.

Brassenia peltata Pursh v. *Hydropeltis purpurea*.

Brassia R. B. (Wilh. Brafs, Pflanzensammler auf der Westküste von Afrika), XX. 1., Orchideae.

caudata Lindl., geschwänzte, 4. w. Westindien.
cochleata K. et W., schneckenförmige, 4. w. Demerara.
Lanceana Lindl., Lance's, 4. w. Surinam.
maculata RB., gefleckte, 4. w. Jamaica.
macrostachya Lindl., großährige, 4. w. Demerara.

Brassica T., Kohl, XV. 111., Cruciferae.

balearica P., balearischer, 4. k. Minorca.
bracteolata Fisch. et Mey., deckblättrig., ☉. f. Aegypt., Arab.
Cheiranthus Vill. (*cheiranthiflora* DC.) lackblumiger, ♂.
 f. Süd- und Westeuropa.

chinensis L., chinesischer, ♂. f. China.

elongata Ehr., verlängerter, ♂. f. Ungarn.

Erucastrum L., Rauken-K., ☉. f. Südeuropa.

fruticulosa Cyril., strauchiger, 4. ⚥. f. k. Italien.

Gravinae Tenor, Gravina's, 4. f. k. Neapel.

Heleniana Burch., St. Helena-K., ♂. k. t. St. Helena.

humilis DC., Zwerg-K., ♂. f. Südfrankreich.

hybrida Tenor., Bastard-K., ⚥. ♂. f. k. Neapel.

incana Tenor., weißgrauer, ⚥. ♂. f. k. Neapel.

laevigata Lagasc., glatter, ☉. f. Spanien.

monensis Huds., schottischer, ☉. f. Schottland.

montana Rafin., Berg-K., ⚥. 4. f. k. Sicilien.

Napus L., Rübsen-K., ⚥. ♂. f. England, Belgien.

α) oleifera. β) annua. γ) esculenta. b) alba.

c) flava. d) nigricans.

nigra Koch, schwarzer, ☉. f. Süddeutschl., Schweiz.

oleracea L., gemeiner, ♂. f. England, Griechenland.

α) capitata. β) rubra. γ) botrytis. δ) sabauda.

ε) sabellica. ζ) gemmifera. η) viridis. θ) crispa.

(*laciniata*). ι) selenisia. x) exaltata. λ) caulorapa etc.

pinnatifida Dsf., fiederspaltiger, ♂. f. k. Spanien.

Pseudo-erucastrum Brot., unächter K., ☉. f. Westeuropa.

Rapa L., Rüben-K., ☉. ♂. f. Europa.

Brassica

a) campestris L. *β)* oleifera Metzg. *γ)* annua Metzg. (*praecox* W. K.).

repanda DC., ausgeschweifert, 4. f. Süd- u. Westfrankr.
Richerii Vill., Richeri's, 4. f. Süd-u. Westfrankr., Oberital.
Sabularia Brot., Sand-K., ☉. f. Westeuropa.

Tournefortii Gouan, Tournefort's, ☉. f. Spanien, Aegypt.
valentina DC., valentinischer, ☉. f. Spanien.

villosa Bivon., zottiger, ♂. 4. k. f. b. Sicilien.

β) glabrata.

violacea L., violetter, ☉. ♂. f. China.

alpina L. v. *Arabis brassicaeformis*. *arvensis* L. v.

Moricandia arvensis. *austriaca* L. (et *orientalis* L.)

vid. *Erysimum austriac.* *crassifolia* L. v. *Erucaria*

crassifol. *Eruca* L. v. *Eruca sativa*. ? *mesopota-*

mica Bernh. v. *Tournefortii*. *polymorpha* Murr. v.

Sisymbrium junceum. *sempervirens* Schrk. v. *Balearica*.

Bravoa ? Herb. Bravoa ? VI. 1., ? *Narcisseae-Amaryllideae*.
geminiflora Llex. et La Llave, doppeltblumige, 4. Zw.
w. Mexico.

Braya Stbg. et Hoppe (Graf Bray, ehem. Präsident der
Regensburger bot. Gesellsch.), XV. 11., *Cruciferae*.

alpina Stbg. et Hoppe, Alpen-B., 4. f. Kärnthien.

pilosa Hook., haarige, 4. f. Nordamerika.

Bremontiera DC. (M. Bremontier, Agronom), XVII.
IV. (VI.), *Leguminosae-Papilionaceae*.

Ammoxylon DC., Sandholz-B., ♂. w. Mauritius.

Brexia Noronh., Brexie, V. 1., *Aquifoliaceae*.

chrysophylla Swt., goldblättrige, ♂. w. Madagascar.

madagascariensis Ker, madagascarische, ♂. w. Madagasc.

spinosa Lindl., stachelzähne, ♂. w. Madagascar.

Bridelia W. (Bridel Brideri, berühmter Muscolog), XVI.
III. (XXIII. 1.), *Tricoccae-Euphorbiac.*

montana W., Berg-B., ♂. w. Ostindien.

scandens W., klimmende, ♂. Sch. w. Ostindien.

spinosa W., dornige, ♂. w. Ostindien.

Brignolia Bertol. (J. L. Brignoli, italienischer Bota-
niker), V. 11., *Umbelliferae*.

panacifolia Brign., kraftwurzblättrige, 4. f. b. k. Sici-
lien, Nordafrika.

Briza L., Zittergras, III. 11., *Gramineae*.

auriculata Trevir., geöhrt, 4. w. Chili.

elatior Sibth., hohes, ♂. f. Griechenland.

geniculata Thbg., geknietes, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

humilis MB., niederiges, ☉. f. Griechenland, Taurien.

maxima L., größtes, ☉. f. Südeuropa, Cap d. g. H.

media L., mittleres, 4. f. Europa, Nordamerika.

minor L., kleines, ☉. f. Engl., Südeuropa, Asien, Afrika.

rubra Lam., rothes, ☉. f. Ostindien.

virens L., grünliches, ☉. f. Südeuropa, Kleinas., Südafr.

capensis Thbg. v. *Eragrostis* (Poa) *brizoides*. *Era-*

grostis L. vid. *Eragrost.* (Poa. *megastach.*) *spicata*

Sibth. v. *humilis*.

Brizopyrum Lk., Zitteraehrchen, III. 11., *Gramineae*.

americanum Lk., amerikanisches, 4. f. Nordamer., Chili.

siculum Lk., sicilianisches, ☉. f. Sicilien, Nordafrika.

Brodiaea Sm. (J. J. Brodie, schottischer Kryptogamo-
log), III. 1., *Coronariae-Asphodeleae*.

congesta Sm., dichtblumige, 4. k. Nordamerika.

Brodiaea

grandiflora Sm., großblumige, 4. k. (Nordamer. (Georg.).

Hinsichtlich der übrigen s. *Leucocoryne*.

Bromelia L. (Olaus Bromel, schwedischer Botaniker),

VI. 1., Bromeliaceae.

Acanga L., *Acanga-B.*, 4. w. Brasilien,

bracteata Sw., deckblättrige, 4. w. Jamaica.

chrysantha Jacq., goldblumige, 4. w. Caracas.

cruenta Grah., blutrothe, 4. w. Rio Janeiro.

discolor Lindl., verschiedenfarbige, 4. w. Südamerika.

exsudans Lod., ausschwitzende, 4. w. Westindien.

fastuosa Lindl., prächtige, 4. w. Mexico.

humilis Jacq., niedrige, 4. w. Westindien.

Karatas L., wilde, 4. w. Westindien.

lingulata L., zungenblättrige, 4. w. Westindien.

paniculigera Sw., rispige, 4. w. Westindien.

Pinguin L., *Pinguin-B.*, 4. w. Westindien.

sessiflora Lod. C., stiellosblumige, 4. w. Südamerika.

sylvestris W., Wald-B., 4. w. Brasilien.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Ananassa* und *Billbergia*.

Bromus L., Trespe, III. 11., Gramineae.

A. Genuini (Annui).

Alopecurus Vahl (*contortus* Dsf.), Fuchsschwanz, T. ☉.

f. Spanien, Nordafrika.

brachystachys Hornung, kurzährige, ☉. ♂. f. Thüringen.

brizaeformis Fisch. et C. A. Mey., zittergrasähnliche,

☉. f. Nordpersien.

commutatus Schrad. (*simplex* Gaud.), verwechselte, ☉.

♂. f. Deutschland, Illyrien, Taurien.

confertus MB. (*intermedius* Gufs.), gedrängtrispige, ☉. f.

Istrien, Italien, Caucasus.

grossus Dsf. (DC.), dickährige, ☉. f. Mittel- u. Südeuropa.

β) *velutinus* Schrad.

lanceolatus Roth, lanzettliche, ☉. f. Am caspisch. Meere.

lanuginosus Poir. (*divaricatus* Rohd. Loisel.), wollige,

☉. f. Südeuropa.

macrostachys Dsf., großährige, ☉. f. Spanien, Nordafrika.

madritensis L. (*diandrus*) Curt.), spanische, ☉. f. Eng-

land, Süd- und Westeuropa.

β) ? *jubatus* Tenor.

maximus Dsf., größte, ☉. f. Nordafrika.

mollis L., weiche, ☉. ♂. f. Europa.

β) *conglomeratus* P.

patulus M. et K., ausgebreitete, ☉. f. Mittel-, Süd- u.

Osteuropa.

β) ? *parviflorus* Hort.

racemosus L. (*pratensis* Ehrh.), traubige, ☉. ♂. f. Europa.

rigidus Roth, (*rubens* Host.), starre, ☉. f. Südeuropa.

scoparius L., besenartige, ☉. f. Westeuropa, Nordafrika.

secalinus L., Getreide-T., ☉. f. Europa, Mittelasien.

β) *elongatus* Gaud.

squarrosus L., sparrige, ☉. f. Europa, Nordasien, Nord-

afrika.

β) *villosus* Gmel.

sterilis L., unfruchtbare, ☉. f. Europa.

tectorum L., Dach-T., ☉. f. Europa.

β) *murorum* Bernh.

vestitus Schrad., bekleidete, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

wolgensis Spgl., russische, ☉. f. Mittelrussland.

Bromus

B. Ceratochloa P. B.

arduennensis Kunth, ardennische, ♂ f. Ardennen.

pendulinus Sess., herabhängende, ☉. f. Neuspanien.

Schraderi Kunth. (*Cerat. pendula* Schrad.), Schrader's, ☉. f. Carolina.

unioloides H. B. K., spitzgrasähnliche, ☉. f. Quito.

Willdenowii Kunth (*Ceratoch. unioloid.* PB., *Festuca unioloid.* W.), Willdenow's, ☉. f. Carol., Montevideo.

c. *Festucei* (perennes).

altissimus Pursh., hohe, 4. f. Nordamerika.

asper L. (*hirsutus* Curt, *hirsutissimus* Cyril., *montanus* Poll.), rauhe, 4. f. Europa.

australis RB., neuholländische, 4. t. Neuholland.

canadensis Mchx., canadische, 4. f. Canada.

catharticus Vahl, purgirende, 4. k. f. b. Chili.

ciliatus L., gefranzte, 4. f. Canada.

erectus Huds. (*agrestis* All., *angustifolius* M. B.), aufrechte, 4. f. Mittel-, Ost- u. Südeuropa.

β) *laxus* Hornem. (*caucasicus* Hort.), γ) *stenophyllus* Lk., (*angustifolius* Hornem., ? *glaucus* Hort.).

giganteus L., große, 4. f. Europa.

inermis L., unbewehrte, 4. f. Europa.

longiflorus W., langährige, 4. f. ?

pubescens Mühlenb., weichhaarige, 4. f. Nordamerika.

purgans L., reinigende, 4. f. Nordamerika.

variegatus M. B., bunte, 4. f. Ostcaucasus.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen *Arthrostachya*,

Brachypodium, *Festuca*, *Rostraria*, *Trichaeta*, *Vulpia*.

Brongniartia H. B. K. (Adolph Brongniart, franz. Botaniker), XVII. iv.), *Leguminosae-Caesalpinieae*.

podalyrioides H. B. K., *podalyrienähnliche*, ♂. t. Neuspanien.

Brosimum Sw., Brodnufs, I. II. (XXIII. II.), *Urticaceae*.

Alicastrum Sw., weichfrüchtige, ♂. w. Jamaika.

B. Galactodendron Auct. v. *Galactodendr. utile*.

Broteroa W. (P. A. Brotero, portugiesischer Botaniker), XIV. v.), *Compositae-Cynarocephalae*.

corymbosa W., doldentraubige, 4. f. Süd- u. Osteuropa, Nordafrika.

B. Contrayerva Spgl. (*trinervata* DC.) v. *Flaveria repanda*.

Broughtonia RB. (Arthur Broughton, Botaniker zu Bristol), XX. i., Ostindien.

nitida Herb., glänzende, 4. w. Ostindien.

sanguinea RB. (*coccinea* Hook), blutrothe, 4. w. Jamaica.

Broussonetia Vent. (Broussonet, französischer Naturforscher), XXII. iv.), *Urticaceae*.

papyrifera Vent., papiergebende, ♂. f. Japan, Südseeinseln.

β) *cucullata* A. B. (*navicularis* Lod. Cat., *spathulata* Hort.). γ) *fructu albo*.

tinctoria Kunth v. *Maclura tinctoria*.

Browallia L. (J. Browallius, Bischof zu Abo), XIV. II., *Personatae-Antirrhineae*.

demissa L., niedrige, ☉. m. f. Südamerika.

elata L., höhere, ☉. m. f. Südamerika.

β) *alba*.

elongata Kunth (*lactea* Hortul.), verlängerte, ☉. m. f. Südamerika.

grandiflora Graham., großblumige, ☉. m. f. Peru.

- Brownea** Jacq. (Patrick Browne, ireländischer Botaniker u. Reisender), XVII. IV. (VI.). (XVI. VI.), Leguminosae-Caesalpiniae.
 coccinea Jacq., scharlachfarbige, f. w. Westindien.
 latifolia Jacq., breitblättrige, f. w. Trinidad.
 racemosa Jacq., traubige, f. w. Caracas.
 Rosa W. (*Rosa de Monte* Berg., *speciosa* Auctor), Rosen-B. f. w. Südamerika.
- Brownlowia** Roxb. (Lady Brownlow, A. Humes Tochter), XIII. I., Tiliaceae.
 elata Roxb., erhabene, f. w. Ostindien.
- Brucea** Mill., L'Her. (J. Bruce, berühmter Reisender in Afrika), XXII. IV. (IV. I.), Zanthoxyleae.
 ferruginea L'Her., rostfarbige, f. w. Abyssinien.
 gracilis DC., schlanke, f. w. Ostindien.
 sumatrana Roxb., sumatranische, f. w. Sumatra.
trichotoma Sogl. v. *Tetradium trichotom.*
- Brugmansia** P. (S. J. Brugmans, Prof. der Naturgeschichte zu Leyden), V. I., Solanaceae.
 candida P., reinweisse, f. t. w. Peru.
 sanguinea D. Don (R. et P.), *bicolor* P.), blutrothe, f. t. Peru.
 suaveolens W., wohlriechende, f. t. w. Peru.
 β) flava.
- Waymanni Paxt., Wayman's, f. w. Südamerika.
- Brünnichia** G. Banks (F. Brünnich, dänischer Naturforscher, VIII. III., Polygoneae.
 cirrhosa G., rankende, f. Sch. k. f. b. Carolina, Bahamische Inseln.
- Brunfelsia** L. (Otto Brunfels, alter deutscher Botaniker), XIV. II., ?Solanaceae.
 americana L., amerikanische, f. w. Westindien.
 α) angustifolia. β) latifolia.
 montana Lod. C., Berg-B., f. w. ?Südamerika.
 undulata L., wellenblumige, f. w. Jamaica.
 violacea Lod. C., violette, f. w. Westindien.
uniflora Hort. v. *Franciscea uniflora.*
- Brunia** L. (C. Brun, der die Levante und Rußland bereiste), V. I., Corniculatae-Cunoniaceae.
 alopecuroides Thbg., fuchsschwanzähnliche, f. t. Cap d. gut. Hoffn.
 ciliata L., gefranzte, f. t. Cap d. gut. Hoffn.
 comosa Thbg., schopfige, f. t. Cap d. g. Hoffn.
 deusta Thbg., brandige, f. t. Cap d. g. Hoffn.
 ?elegans Dum. C., nette, f. t. Cap d. g. Hoffn.
 ericoides Wendl., heideähnliche, f. t. C. d. g. Hoffn.
 ?formosa Dum. C., schöne, f. t. Cap d. g. Hoffn.
 fragarioides W., erdbeerähnliche, f. t. C. d. g. H.
 hirsuta Lod., rauhhaarige, f. t. Cap d. gut. Hoffn.
 laevis Thbg., glatte, f. t. Cap d. gut. Hoffn.
 macrocephala W., großköpfige, f. t. Cap d. g. H.
 nodiflora L. (*globosa* Thbg.), knotenblumige, f. t. C. d. gut. Hoffn.
 plumosa Lam., federige, f. t. Cap d. gut. Hoffn.
 squarrosa Thbg., sparrige, f. t. Cap d. gut. Hoffn.
 superba Don (*arachnoides* Wendl., *speciosa* Hort.), stolze, f. t. Cap d. gut. Hoffn.
 verticillata Thbg., wirtelblättrige, f. t. C. d. g. H.
abrotanoides L. (et *lanuginosa* L.) vid. Berzelia

Brunia

abrot. etc. *ciliata* L. v. *Staavia cil. laxa* Thbg.
v. *Linconia thymifol. microphylla* Thbg. vid. *Raspailia microph. paleacea* L. (et *phylicoides* Thbg.).
v. *Berardia paleacea* etc.

Brunonia Sm. (Rob. Brown, berühmter englischer Botaniker), V. 1., Campanulaceae-Goodenovieae).

australis Sm., neuholländische, 4. t. Neuholland.

Brunsvigia Heist., Ker, (zu Ehren des herzoglichen Hauses Braunschweig).

ciliaris Ker, gefranzte, 4. Zw. w. Cap d. g. Hoffn.

coranica Ker, coranische, 4. Zw. w. Cap d. g. H.

β) *pallida*.

disticha Swt., zweizeilige, 4. Zw. w. Cap d. g. H.

falcata Ker, sichelförmige, 4. Zw. w. Cap d. g. H.

grandiflora Lindl., großblumige, 4. Zw. C. d. g. H.

Josephinae Ker, Josephinen's, 4. Zw. w. C. d. g. H.

β) *minor* Bot. reg. γ) *stricta* Bot. mag.

lucida Herb., starkglänzende, 4. Zw. w. C. d. g. H.

marginata Ker, berandete, 4. Zw. w. Cap d. g. H.

minor Lindl., kleine, 4. Zw. w. Cap d. gut. Hoffn.

multiflora Heist., Sims, vielblumige, 4. Zw. w. C. d. g. H.

radula Ker, raspelige, 4. Zw. w. C. d. g. Hoffn.

striata Ker, gestreifte, 4. Zw. w. Cap d. g. Hoffn.

toxicaria Ker, giftige, 4. Zw. w. C. d. g. Hoffn.

Brya P.Br., Sprossenstrauch, XVII. iv. (vi.). (XVI. vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

Ebenus DC., Ebenholz-Sp., f. w. Jamaica.

leonensis Lod., C., afrikanischer, f. w. Sierra, Leone.

Bryobium Lindl., Sprossenstendel, XX. i., Orchideae.

pubescens Lindl., weichhaariger, 4. w. Ostindien.

Bryonia T., Zaurrübe, XXI. x. (XVI. i.), Cucurbitaceae.

africana Thbg., afrikanische, 4. Sch. t. Cap d. g. H.

alba L., gemeine, 4. Sch. f. Europa.

cordata Thbg., herzblättrige, 4. Sch. k. C. d. g. H.

cretica L., cretische, 4. Sch. f. Creta.

dioica L., zweihäusige, 4. Sch. f. Schweiz, Süd- und Osteuropa, Nordafrika.

dissecta L. (*africana* L.), feinschlitzige, 4. Sch. C. d. g. H.

epigaea W., bodenblumige, 4. Sch. w. Ostindien.

ficifolia Lam., feigenblättrige, 4. Sch. w. Buen. Ayres.

filiformis Roxb., fadenförmige, 4. Sch. w. Ostindien.

Garcini W., Garcin's 4. Sch. w. Ceylon.

grandis L., großblumige, 4. Sch. w. Ostindien.

laciniata L., schlitzblättrige, 4. Sch. w. Ostindien.

latebrosa Ait., schattige, 4. Sch. k. Canar. Inseln.

nitida Lk., glänzende, 4. Sch. t. ?

palinata L., handförmige, 4. Sch. w. Ceylon.

pinnatifida Burch., fiederspaltige, 4. Sch. t. C. d. g. H.

quinqueloba Thbg., fünflappige, 4. Sch. t. C. d. g. H.

scabra L. suppl., scharfe, 4. Sch. t. C. d. g. H.

scabrella L. suppl., schärfliche, ☉. Sch. w. Ostindien.

Tajuja Mart., Tajuja-Z. 4. Sch. w. Brasilien.

tenella Roxb., zarte, 4. Sch. Ostindien.

triloba Thbg., dreilappige, 4. Sch. Cap d. g. Hoffn.

verrucosa Ait., warzige, 4. Sch. Canarische Inseln.

Bryophyllum Salisb., Sprossenblatt, VIII. iv., Corniculatae-Crassulaceae.

calycinum Salisb., gekelchtes, 4. f. w. Mascarenas.

Bubon L., Steineppig, V. II., Umbelliferae.

Galbanum L., Galban-St., $\frac{1}{2}$. 4. t. Cap d. g. Hoffn.
gummiferum W., gummigebender, $\frac{1}{2}$. 4. t. C. d. g. H.
laevigatum Ait, glatter, $\frac{1}{2}$. 4. t. Cap d. gut. Hoffn.

buchtormensis, *dichotomus* Spgl. etc. v. *Seseli* buch-
 tormens. etc. *tortuosus* Lk., Hoffinsg. v. *Tragium*
 Broteri.

Bubroma Schreb. v. *Guazuma* Plum.

Bucco Wendl., R. et S. v. *Agathosma*.

Buchananian Roxb. (C. F. Buchanan-Hamilton, Vor-
 steher des botanischen Gartens zu Calcutta), X. IV.,
 Terebinthaceae.

angustifolia Roxb., schmalblättrige, $\frac{1}{2}$. w. Ostindien.

latifolia Roxb., breitblättrige, $\frac{1}{2}$. w. Ostindien.

Buchozia *coprosmoides* L'Her. v. *Serissa foetida*.

Bucida L., Ochsenhorn, X. I., Combretaceae.

Buceras L., westindisches, $\frac{1}{2}$. w. Jamaica.

Buddlea L. (A. Buddle, englischer Botaniker), IV. I.,
 Personatae-Antirrhoneae.

americana L., amerikanische, L. w. Mexico.

brasiliensis Jacq. fil. (*Neemda* Hortul.), brasilianische,
 $\frac{1}{2}$. w. Brasilien.

connata R. et P., verwachsene, $\frac{1}{2}$. w. Peru.

diversifolia Vahl (*indica* Lam.), verschiedenblättrige,
 $\frac{1}{2}$. w. Java.

globosa Lam., kugelblumige, $\frac{1}{2}$. k. Chili, Peru.

heterophylla Bot. reg., ungleichblättrige, $\frac{1}{2}$. w. Südamer.

madagascariensis Vahl, madagascarisches, $\frac{1}{2}$. w. Madagasc.

Neemda Buchan. (Roxb.), *Neemda*-B., $\frac{1}{2}$. w. Ostindien.

paniculata Wall., rispenblumige, $\frac{1}{2}$. w. Nepal.

salicifolia Vahl, weidenblättrige, $\frac{1}{2}$. w. Südamerika.

saligna W. (*salicifolia* Jacq.), weidenähnliche, $\frac{1}{2}$. w. C. d. g. H.

salvifolia Lam., salbeiblättrige, $\frac{1}{2}$. w. Cap d. g. H.

Büchnera L., Büchnere, XIV. II., Personatae-Antirrhoneae.

americana L., amerikanische, 4. f. Nordamerika.

cuneifolia Thbg., keilblättrige, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. H.

hispidula Hamilt., hackerige, $\frac{1}{2}$. t. Nepal.

urticaefolia RB., nesselblättrige, $\frac{1}{2}$. t. Neuholland.

capensis W. *foetida* Andr. *viscosa* Ait vid. *Ma-*
nulea cap. etc.

Büttneria Loeffl. (D. S. A. Büttner, deutscher Bota-
 niker), V. I. (v.), Malvaceae-Büttneriaceae.

catalpaefolia Jacq., catalpablättrige, $\frac{1}{2}$. w. Caracas.

*cistifolia** (Cunn.), ciströschenblättrige, $\frac{1}{2}$. t. Neuholl.

cordata Lam., herzbblättrige, 4. $\frac{1}{2}$. w. Peru.

*corylifolia** (Cunn.), haselnufsblättrige, $\frac{1}{2}$. t. Neuholl.

dasyphylla Gay, wollblättrige, $\frac{1}{2}$. t. Van-Diemens-Land.

grandifolia DC., großblättrige, 4. w. Ostindien.

herbacea Roxb., krautige, 4. w. Ostindien.

hermannifolia Gay, hermannienblättrige, $\frac{1}{2}$. t. Neuholl.

microphylla L., kleinblättrige, $\frac{1}{2}$. w. Westindien.

pannosa DC. (*australis* Sbr.), wollige, $\frac{1}{2}$. t. Neuholland.

scabra L., scharfe, $\frac{1}{2}$. w. Südamerika, Westindien.

Buffonia Sauv. L. (Graf Buffon, berühmter Naturfor-
 scher), IV. II., Caryophyllaceae-Alsineae.

annua DC., jährige, 4. f. England, Südfrank., Taurien.

tenuifolia L. (*perennis* Pour.), feinblättrige, $\frac{1}{2}$. 4. f.
 Wallis, Südfrankreich.

Buginvillea Commers. (Bougainville, französischer Schiffscapitain), VIII. 1. (VII. 1.), Nyctagineae.

spectabilis Juss., ansehnliche, ♀. Sch. w. Südamerika.

Bulbine W., Bulbine, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

aloides W., aloeähnliche, 4. k. t. Cap d. g. Hoffn.

annua W., jährige, ☉. f. m. Cap d. g. Hoffnung

asphodeloides Spgl., affodilähnliche, ♂. k. t. Cap d. g. H.

australis Spgl., neuholländische, 4. Zw. t. Neuholland.

bisulcata Haw., zweifurchige, 4. Zw. t. Neuholland.

canaliculata Spgl., nachenförmige, 4. t. Cap d. g. H.

caudata Spgl., geschwänzte, 4. t. Cap d. g. H.

ciliata Lk., gefranzte, 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.

floribunda Schrad., blumenreiche, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

frutesceus L., strauchige, ♀. 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.

glauca R. et S., blaugrüne, 4. Zw. t. Chili.

graminea Haw., grasartige, 4. t. k. Cap d. g. H.

hispida Swt., hackerige, 4. t. k. Cap d. g. H.

latifolia Spl., breitblättrige, 4. t. k. Cap d. g. H.

longiscapa W., langschaftige, ♀. 4. t. k. Cap d. g. H.

mesembryanthoides Haw., zaserblumenähnliche, 4. t. k.

Cap der guten Hoffnung.

nutans Spl., überhängende, 4. t. k. Cap d. g. H.

praemorsa Spgl., abgebissene, 4. t. k. Cap d. g. H.

pugioniformis Lk., dolchförmige, 4. t. k. Cap d. g. H.

rostrata W., schnabelförmige, ♀. 4. t. k. Cap d. g. H.

scabra Spgl., scharfe, 4. t. k. Cap d. g. Hoffn.

semibarbata Spgl., halbbärtige, 4. t. k. Neuholland.

suavis Lindl., wohlriechende, 4. t. k. Neuholland.

triquetra Spgl., dreikantige, 4. t. k. Cap d. g. H.

undulata Spgl., wellenförmige, 4. t. k. Cap d. g. H.

Bulbocodium L., Lichtblume, VI. 1., Colchicaceae.

ruthenicum Fisch. et Mey., russische, 4. f. Südl. Rufsl.

vernum L., Frühlings-L., 4. f. Spanien.

versicolor Spgl., buntfarbige, 4. f. Südl. Rufsl.

tryginum Adams v. *Merendera caucasica*.

Bulbophyllum A. P. Th., Zwiebelblatt, XX. 1., Orchideae.

apiferum Bate, bienenblumiges, 4. w. Gambia.

barbigerum Lindl., bärtiges, 4. w. Sierra Leone.

bracteolatum Lindl., deckblättriges, 4. w. Demerara.

cocoinum Lindl., Cocos-Zw., 4. w. Sierra Leone.

cupreum Lindl., kupferfarbiges, 4. w. Manilla.

leopardinum Lindl., leopardfleckiges, 4. w. Ostindien.

saltatorium Lindl., tanzendes, 4. w. Sierra Leone.

setigerum Lindl., borstiges, 4. w. Demerara.

umbellatum Lindl., doldiges, 4. w. ? Calcutta.

Bulliardia DC. (M. Bulliard, französischer Botaniker),

IV. 111., Corniculatae-Crassulaceae.

aquatica DC., Wasser-B., ☉. Wa. f. Böhmen, Sachsen.

β) prostrata DC.

Vaillantii DC., Vaillant's, ☉. Süd- u. Osteuropa.

Bumalda Thbg. (J. A. de Bumalda, Botaniker zu Bologna), V. 11., Sapindacei-Staphyleaceae.

trifolia Thbg., dreiblättrige, ♀. t. Japan.

Bumelia Sw., Bumelie, V. 1., Sapotaceae.

borbonica Lod. C., bourbonische, ♀. w. Mascarenas.

cuneata Sw., keilförmige, ♀. w. Westindien.

foetidissima W., stinkende, ♀. w. Westindien.

lanuginosa Pursh, wollige, ♀. k. Carolina.

lycioides W., hocksbornartige, ♀. k. Carolina.

Bumelia

- nervosa* Vahl, nervige, ♀. w. Guiana.
nigra Sw., schwarze, ♀. w. Jamaica.
oblongifolia Nutt., langblättrige, ♀. k. Nordamerika.
reclinata Vent., zurückgebeugte, ♀. k. Nordamerika.
rotundifolia Sw., rundblättrige, ♀. w. Westind., Südamer.
salicifolia Sw., weidenblättrige, ♀. w. Westindien.
serrata Pursh, sägezahnige, ♀. k. Nordamerika.
strigosa Spgl., striegelige, ♀. k. Nordamerika.
tenax W., zähe, ♀. k. Carolina.

Bunchosia Juss., Bunchosie, X. 1., Malpighiaceae.

- argentea* DC., silberfarbige, ♀. w. Südamerika.
canescens DC., grauliche, ♀. w. Westindien.
cumanensis G. Don, cumanische, ♀. w. Cumana.
glandulifera H. B. K., drüsige, ♀. w. Westind., Südamer.
glandulosa DC., drüsenstielige, ♀. w. Westindien.
media DC., mittlere, ♀. w. Westindien.
nitida DC., glänzende, ♀. w. Westindien.
odorata DC., wohlriechende, ♀. w. Südamerika.
paniculata DC., rispige, ♀. w. Jamaica.
polystachya DC., vielöhrige, ♀. w. Westindien.
tuberculata DC., höckerige, ♀. w. Caracas.

Bunias L., Zackenschote, XV. 1., Cruciferae.

- Erucago* L., senfblättrige, ☉. f. Südeuropa.

β) *aspera* Retz.

- orientalis* L., morgenländische, ♂. 4. f. Nord- u. Osteuropa.
aegyptiaca L. v. *Ochtodium aegypt.* *balearica* L.
 vid. *Succowia balearica.* *cochlearioides* L. v. *Cale-*
pina Corvini. *myagroides* L. v. *Erucaria aleppica.*
prostrata Dsf. v. *Muricaria prostrat.* *spinosa* L. v.
Zilla myagroid. *syriaca* G. v. *Euclidium syriac.*

Bunium L., Erdknoten, V. 11., Umbelliferae.

- ammoides* Lk., ammiähnlicher, 4. Kn. f. Portugal.
flexuosum Wither. Sm., gebogener, 4. Kn. f. England,
 Südeuropa.
pyrenaeum Loisel, pyrenäischer, 4. Kn. f. Pyrenäen.
acaule MB. vid. *Ammi acaul.* *alpinum* Kit. v. Li-
 gustic. alp. *Bulbocastanum* L. vid. *Carum Bulb.*
copticum Spgl. v. *Trachysperm. coptic.* *denudatum*
 DC. vid. *Conopodium denud.* *peucedanoides* MB.
 (et *ferulacaeum* Sm.) v. *Sium peuced.* etc.

Buonaparteia R. et P. (Napoleon Buonaparte), VI. 1., Bromeliaceae.

- juncea* R. et P., sinsenförmige, 4. w. Peru.
 ?*gracilis* Swt. v. *Agave (Littaea) grac.* *juncea* Haw.
 et Hortul. v. *Agave (Littaea) geminiflor.*

Buphone ciliaris Herb., *disticha* Herb. et *toxicaria* Herb.
v. *Brunsvigia disticha* etc.**Bupthalmum** L., Rindsauge, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

I. *Asteriscus* T. Mönch.

- aquaticum* L., Wasser-R., ☉. f. Südeuropa.
elegans Brouss. (*chrysanthomoides* Poir), nettes, ♀. Ca-
 narische Inseln.
graveolens Forsk., starkriechendes, ♀. 4. k. Aegypten.
laevigatum Brouss. (*coriaceum* Hort.), glattes, ♀. k. Teneriffa.
maritimum L., Seestrands-R., ♀. 4. k. Südeuropa.
odorum Schousb., wohlriechendes, ♀. k. Mauritanien.
sericeum L. suppl., seidenhaariges, ♀. k. Teneriffa.
stenophyllum Lk., schmalblättriges, ♀. k. Canar. Inseln.

Bupthalmum

II. Bupthal. genuina.

salicifolium L., weidenblättriges, 4. f. Mittel-u. Südeuropa.
β) grandiflorum L.

III. Pallenis Cass.

spinosum L., dorniges, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

IV. Telekia Baumg.

cordifolium W. K. (*speciosum* Schreb.), herzblättriges,
4. f. Osteuropa, Caucasus.speciosissimum Ard., prächtiges, 4. f. Rhaetische und
Julische Alpen.arborescens L. *frutescens* L. v. *Diomedea arboresc.*
etc. *helianthoides* L. v. *Heliopsis laevis*.**Bupleurum** T., Hasenöhrchen, V. II., Umbelliferae.

altaicum Fisch., altaisches, 4. f. Altai.

arborescens Thbg., baumartiges, ♀. t. k. Cap d. g. H.

aristatum Bartl., gegranntes, ☉. f. Südeuropa.

β) nanum.

aureum Fisch., goldfarbiges, 4. f. Sibirien.

cernuum Tenor., übergebogenes, ☉. f. Neapel.

coriaceum Ait., lederblättriges, ♀. k. t. Südspan., Maurit.

difforme L., verschiedenblättriges, ♀. t. Cap d. g. H.

exaltatum M. B., hohes, 4. f. Taurien.

falcatum L. (*scorzonerifol.* W.), sichelförmiges, 4. f. Europa.

fruticescens L., kleinstrauchiges, ♀. k. Spanien.

fruticosum L., strauchartiges, ♀. k. Südeuropa, Nordafr.

Gerardi Jacq., Gerard's, ☉. f. Oesterreich.

glaucum C. et R. DC., blaugrünes, ☉. f. Südfrankreich.

glumaceum Sibth. Sm., spelzenhülliges, ☉. f. Griechenl.

graminifolium Vahl (*petraeum* Wulf), grasblättriges, 4.
f. Mitteleuropäische Alpen.heterophyllum Lk. (*aegyptiacum* W.), verschiedenblätteri-
ges, ☉. f. ? Aegypten.

junceum L., simsenartiges, ☉. f. Südeuropa.

lancifolium Hornem., lanzettblättriges, ♂. f. ? Taurien.

longifolium L., langblättriges, 4. f. Mittel-u. Südeuropa.

multinerve DC., vielnerviges, 4. f. Altai.

nodiflorum Sm., knotenblumiges, ☉. f. Griechenland.

nudum Ait., nacktes, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

Odontites L., sparriges, ☉. f. Südeuropa.

oppositifolium Lapeyr., gegenblättriges, ☉. f. Pyrenäen.

paniculatum Broter., rispiges, 4. f. Portugal.

petraeum L., Felsen-H., 4. f. Südeuropäische Alpen.

plantagineum Dsf. (*canescens* Schousb.), wegrittblätteri-
ges, ♀. k. Nordafrika.

polyphyllum Ledeb., vielblättriges, 4. f. Caucasus.

protractum Lk. et Hoffinsg. (*subovatum* Hoppe), verläng-
ertes, ☉. f. Oesterreichisches Litorale, Portugal.

pyrenaicum Gouan, pyrenäisches, 4. f. Pyrenäen.

ranunculoides L., ranunkelblättriges, 4. f. Mitteleuro-
päische Alpen.α) angulosum L. β) caricifolium W. (*Burseria-*
num Schlchr., *gramineum* Vill.). γ) caricinum DC.

rigidum L., starres, 4. f. Südfrankreich.

rotundifolium L., rundblättriges, ☉. f. Europa, Cauc., Sibir.

semicompositum L., ästiges, ☉. f. Südeuropa, Taurien.

β) ? gracile MB.

spinosum L., dorniges, ♀. k. t. Spanien, Mauritien.

stellatum L., sternförmiges, 4. f. Schweiz, Tyroler Al-
pen, Pyrenäen.

Bupleurum

tenuissimum L. (*junceum* et *Pollichii* Gmel.), feines, ☉.
f. Nord- und Mitteldeutschland.

trifidum Tenor, dreitheiliges.

baldense MB. vid. *exaltatum*. *baldense* Host. vid.
ranunculoides.

Burchardia RB. (J. H. Burkhard, deutscher Botaniker), VI. I., Colchicaceae (*Melanthaceae*).

umbellata RB., doldige, 4. t. Neuholland.

Burchellia RB. (W. Burchell, englischer Reisender in Afrika), V. I., Rubiaceae.

capensis RB., capische, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

parviflora Lindl. (*bubalina* RB.), kleinblumige, ♀. t. C. d. g. H.

Burlingtonia Lindl. (Gräfin von Burlington), XX. I., Orchideae.

candida Lindl., reinweisse, 4. w. Demerara.

Burmanna L. (J. et N. L. Burmann, berühmte holländische Botaniker), III. I., Narcisseae-Burmannieae.

biflora L., zweiblumige, 4. Wa. k. Virginien, Carolina.

Bursaria Cav., Beutelblume, V. I., Pittosporeae.

spinosa Cav., dornige, ♀. k. t. Neusüdwallis.

Bursera Jacq. (J. Burser, Schüler des Caspar Bauhin), X. I. (XXIII. II.), Terebinthaceae.

gummifera Jacq., gummigebende, ♀. w. Westindien.

serrata Roxb., sägezähne, ♀. w. Ostindien.

Burtonia RB. (D. Burton, Sammler für den Garten zu Kew), X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

conferta DC., dichtblättrige, ♀. i. Südwestl. Neuholl.

minor DC., kleine, ♀. t. Neuholland.

scabra RB., scharfblättrige, ♀. t. Neuholland.

sessilifolia DC., stiellosblättrige, ♀. t. Neuholland.

Butea Roxb. (John, Graf von Bute, großmüthiger Beschützer der Botanik), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

frondosa Roxb., belaubte, ♀. w. Ostindien.

parviflora Roxb., kleinblumige, ♀. w. Ostindien.

superba Roxb., prächtige, ♀. w. Ostindien.

Butomus T., Blumenbinse, XIX. III., Alismaceae-Butomeae.

latifolius D. Don, breitblättrige, 4. Wa. k. f. b. Nepal.

umbellatus L., doldige, 4. Wa. f. Europa, Nordasien.

Butonica speciosa Lam. v. *Barringtonia speciosa*.

Buxus T., Buchsbaum, XXI. IV., Tricoccae-Euphorbiaceae.

australis Cunn., neuholländischer, ♀. t. Neuholland.

balearica Lam., balearischer, ♀. k. f. b. Balearische Inseln.

chinensis Lk., chinesischer, ♀. t. k. China.

sempervirens L., gemeiner, ♀. ♀. t. Südeuropa, Nordpers.

a) *arborescens* Mill. a) *argentea*, b) *aurea*, c) *marginata*. β) *angustifolia* Mill. b) *variegata*. γ)

suffruticosa Mill. (*humilis* Dod. *nana* Dutham.).

δ) *myrtifolia* Lam.

Byblis Salisb. Byblis, V. v., Cistineae-Drosereae.

liniflora Salisb., leinblumige, 4. Wa. t. Neuholland.

Byrsonima Rich., Byrsonima, X. III., Malpighiaceae.

altissima DC., hohe, ♀. w. Guiana.

chrysophylla H. B. K., goldblättrige, ♀. w. Südamer.

coriacea DC., lederblättrige, ♀. w. Jamaica.

crassifolia DC., dickblättrige, ♀. w. Guiana.

laurifolia H. B. K., lorbeerblättrige, ♀. w. Cumana.

Byrsonima

- lucida DC., glänzende, ♀. w. Westindien.
 Moureila DC., Moureila-B., ♀. w. Südamerika.
 nervosa DC., nervige, ♀. w. Brasilien.
 pallida DC., bleiche, ♀. w. Cayenne.
 reticulata DC., netzförmige, ♀. w. Cayenne.
 spicata DC., ährige, ♀. w. Antillen.
 verbascifolia DC., wollkrautblättrige, ♀. w. Guiana.
 volubilis DC., windende, ♀. Sch. w. Westindien.

Bystropogon L'Her., Kelchbart, XIV. 1., Labiatae.
 canariensis L'Her., canarischer, ♀. k. Canarische Inseln.
 origanifolius L'Her., dostenblättriger, ♀. k. Canar. Inseln.
 plumosus L'Her., federiger, ♀. k. Canarische Inseln.
 punctatus L'Her., punctirter, ♀. k. Madeira.**Cacalia** L., Cacalie (Pestwurz), XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

- Anteuphorbium L., wolfsmilchähnliche, ♀. t. Cap d. g. H.
 appendiculata L. suppl., geöhrte, ♀. t. Teneriffa.
 articulata Thbg., gegliederte, ♀. 4. t. Cap d. g. H.
 atriplicifolia L., meldenblättrige, 4. f. Nordamerika.
 bicolor Roxb., zweifarbige, ♀. w. Ostindien.
 canescens W. (*Haworthii* Swt.), weißgraue, ♀. t. C. d. g. H.
 carnosa Ait., fleischige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
 cordifolia H. B. K., herzblättrige, 4. Kn. t. Mexico.
 cylindrica Lam., cylinderförmige, ♀. t. Cap d. g. H.
 ficoides L., zaserblumenähnliche, ♀. t. Cap d. g. H.
 hastata L., spontonförmige, 4. f. Sibirien.
 Kleinia L., canarische, ♀. t. Canarische Inseln.
 longifolia Haw. (*pugioniformis* Lk.), langblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
 macrophylla MB. (*rhombofolia* W.), großblättrige, 4. f. Caucasus.

- ovalis Ker, eiförmige, 4. w. Ostindien.
 papillaris L., weichwarzige, ♀. t. Cap d. guten Hoffn.
 peltata H. B. K., schildförmige, 4. k. Mexico.
 radicans Thbg., starkwurzelnde, 4. t. Cap d. g. H.
 radulaefolia H. B. K., raspelblättrige, 4. k. Mexico.
 reniformis W., nierenförmige, 4. f. Nordamerika.
 repens L., kriechende, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
 reticulata Vahl, netzförmige, ♀. t. Mascarenas.
 runcinata H. B. K., schrotsägenförmige, 4. k. Mexico.
 sagittata Vahl, pfeilförmige, ♂. f. m. Java.
 scandens Thbg., klimmende, 4. Sch. t. Cap d. g. H.
 sonchifolia L., gänsedistelblättrige, ♂. f. m. Ostindien.
 β) coccinea Curt.

- suaveolens L., wohlriechende, 4. f. Nordamerika.
 tomentosa Thbg., filzige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
 tuberosa Nutt., knollige, 4. Kn. f. Nordamerika.

B. Adenostyles Cass.

- albifrons (L. fil.), (*Petasites* Lam., *tomentosa* Jacq.), weißblättrige, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
 alpina (L.), Alpen-C., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
 leucophylla (W.) (*tomentosa* Vill.), schneeweißblättrige, 4. f. Schweiz, Dauphiné.

β) hybrida Vill.

- salicina La Bill. v. *Culcitium* salic. *saracenica* L.
 v. *Senecio* *Cacaliaster*.

Cachrys T., Nufsdolde, V. 11., Umbelliferae.

- alata MB., geflügelte, 4. f. Caucasus, Kleinasien.

Cachrys

- alpina MB., Alpen-B., 4. f. Taurien.
 athamantoides MB., hirschwurzförmliche, 4. f. Taurien.
 cretica Lam., cretische, 4. f. b. k. Griechenland.
 Libanotis L., weihrauchwurzförmliche, 4. f. Sicilien.
 microcarpa MB., kleinfrüchtige, 4. f. Caucasus.
 Morisoni All., Morison's, 5. f. Süd- u. Westeuropa, Nordafri.
 odontalgica Pall., Zahn-N., 4. f. Sibirien.
 seseloides MB., seseliähnliche, 4. f. Sibirien, Taurien.
 taurica W., taurische, 4. f. Taurien.

Hinsichtlich der übrigen s. Athamanta, Caucalis et Laserpitium.

Cactus L., s. die Gattungen Cereus, Echinocactus, Epiphyllum, Mammillaria, Melocactus, Opuntia, Pereskia und Rhipsalis.

Cadia Forsk. (arabischer Name), X. 1., Leguminosae-Caesalpineae.

purpurea Forsk. (*varia* L'Her.), purpurfarbige, 5. w. Arab.

Caenopteris Berg, Neufarn, XXIV. 1., Pterioideae (*Polypod.*).

appendiculata La Bill., vielspaltiger, 4. w. Van-Diem.L.
 ?dissecta H. Berol., zerschnittener, 4. w. Westindien.

furcata Berg, gabeliger, 4. w. Mascarenas.

myriophylla Sw., viellappiger, 4. w. Westindien.

Odontites Thbg., zahnappiger, 4. w. Südafrika, Neuhol.

rhizophylla Sm., wurzelwedeliger, 4. w. Westind., Brasil.

thalictroides Hortul. v. Ceratopteris thalictroid.

Caesalpinia Plum. (A. Caesalpin, berühmter italienischer Botaniker), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

bahamensis Lam., bahamische, 5. t. w. Bahamische Inseln.

bijuga Sw., zweipaarige, 5. w. Jamaica.

brasilensis Sw. (? L.), brasilianische (Brasilienholz-C.), 5. w.

Cacalaco Humb., Cacalaco-C., 5. w. Mexico.

cassiodora W., cassiaähnliche, 5. w. Südamerika.

chinensis Roxb., chinesische, 5. w. Ostindien, China.

Crista L., kammförmige, 5. w. Westindien.

enneaphylla Roxb., neunblättrige, 5. w. Ostindien.

Gilliesii Wall., Gillie's, 5. w. Mendoza.

mimosoides Lam., sinnpflanzenähnliche, 5. w. Malabar.

mucronata W., stachelspitzige, 5. w. Brasilien.

Nuga RB., Nuga-C., 5. w. Ostindien.

oleosperma Roxb., ölsamige, 5. w. Ostindien.

paniculata Desf., rispige, 5. w. Malabar.

procera Poeppig, hohe, 5. w. Cuba.

punctata W., punctirte, 5. w. Brasilien.

Sappan L., Rothholz-C., 5. w. Ostindien, Molucken.

scandens Roth, kletternde, 5. Sch. w. Ostindien.

suberosa Lod., korkige, 5. w. Ostindien.

tortuosa Roxb., gedrehte, 5. w. Ostindien.

visicaria Lam. v. bijuga. Hinsichtlich der übrigen s. Coulteria, Poinciana et Reichardia.

Caesia RB., Caesie, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

vittata RB., verschleierte, 4. k. t. Neusüdwallis.

Caesulia Roxb., Caesulie, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

axillaris Roxb., achselblumige, 6. ♂. w. Ostindien.

Cajanus DC. (malabarischer Name), Taubenklee, XVII. IV. (VI.).

bicolor DC., zweifarbig, 5. w. Ostindien.

flavus DC., hellgelber, 5. w. Ostindien.

Cakile T., Meersenf, XV. 1., Cruciferae.

americana Nutt., amerikanischer, ☉. f. Nordamerika.

maritima Scop., gemeiner, ☉. Europa, Nordafrika etc.

β) *sinuatifolia* DC. (*aegyptiaca* W. *latifolia* Poir.).

Hinsichtlich der übrigen s. *Rapistrum*.

Caladenia RB., Schöndrüse, XX. 1., Orchideae.

alata RB., geflügelte, 4. Kn. w. t. Neuholland.

alba RB., weisse, 4. Kn. w. t. Neuholland.

carnea RB., fleischfarbige, 4. Kn. w. t. Neuholland.

clavigera, Ait., keulige, 4. Kn. w. t. Neusüdwallis.

coerulea RB., blaue, 4. Kn. w. t. Neuholland.

congesta RB., gedrängte, 4. Kn. w. t. Van-Diem. L.

dilatata RB., verbreiterte, 4. Kn. w. t. Van-Diem. L.

flava RB., hellgelbe, 4. Kn. w. t. Südl. Neuholland.

gracilis RB., schlanke, 4. Kn. w. t. Van-Diemens L.

Patersonii RB., Paterson's, 4. Kn. w. t. Van-Diem. L.

testacea RB., scherbengelbe, 4. Kn. w. t. Neuholland.

Caladium Vent., Caladium, XXI. 1x., Aroideae-Callaceae.

arborescens Vent., strauchartiges, ½. w. Westind., Brasil.

arboresum H. B. K., baumartiges, ½. w. Cumana.

auritum Vent., geöhrt, 4. w. Westindien.

bicolor Vent., zweifarbiges, 4. w. Brasilien.

cucullatum P., kappenförmiges, 4. w. Südchina.

discolor H. Berol., verschiedenfarbiges, 4. w. Südamer.

edule Mey., genießbares, 4. w. Surinam.

esculentum Vent., eßbares, 4. w. Amboina, Westindien, Brasilien.

grandifolium W., großblättriges, ½. w. Caracas.

helleborifolium Vent., niesswurzblättriges, 4. w. Westind.

lacerum W., schlitzbilättriges, ½. w. Westindien.

lividum Lod., blaubraunes, 4. w. Westindien.

maculatum Lod., geflecktes, ½. 4. w. Südamerika.

nymphaeaeifolium Vent., seerosenblättriges, 4. w. Ostind.

odoratum Roxb., wohlriechendes, ½. 4. w. Pegu.

ovatum Vent., eiförmiges, 4. w. Ostindien.

pedatum Hook., fußförmiges, ½. 4. w. Brasilien.

pinnatifidum W., fiederspaltiges, 4. w. Caraccas.

pumilum D. Don, kleines, 4. w. t. Nepal.

sagittaeifolium Vent., pfeilblättriges, 4. w. Westindien.

scandens W., klimmendes, ½. Sch. Guinea.

seguinum Vent., giftiges, ½. w. Westindien.

Simsii Hook. (*grandifol.* Sims), Sims's, ½. w. Südamer.

tripartitum W., dreitheiliges, 4. w. Caracas.

virginicum Hook., virginisches, 4. f. Virginien.

viviparum Roxb., lebendiggebärendes, 4. w. Ostindien.

xanthorrhizon W., gelbwurzeliges, ½. w. ? Südamerika.

zamiaefolium Lod., keulpalmenblättriges, 4. w. Brasil.

Calamagrostis Adans. Roth, Schilfrohr, III. 11., Gramineae.

acutiflora DC. (*subulata* Dumort.), spitzblumiges, 4. f.

Mittel- und Süddeutschland, Frankreich.

canadensis Nutt., canadisches, 4. f. Nordamerika.

confinis Spgl., verwandtes, 4. f. Nordamerika.

epigejos Roth., Land-S., 4. f. Europa.

Halleriana DC., Haller's, 4. f. Mittel- u. Südeuropa, Sibir.

β) *nutans* Saut. γ) *pulchella* Saut.

Gaudiniana Rehb., Gaudin's, 4. f. Schweden, Deutschland, Schweiz.

lanceolata Roth. (*ramosa* Host.), lanzettförmiges, 4. f. Europa.

Calamagrostis

Huebneriana Rech., Hübner's, 4. f. Sachsen.
 Langsdorffii Spgl. (Link.), Langsdorf's, 4. f. Sibirien.
 lapponica Spgl. (Wahlbg.), lappländisches, 4. f. Lappl.
 litorea DC. (*effusa* Gmel), Ufer-S., 4. f. Mittel- und
 Osteuropa, Nordamerika.

β) *glauca* MB. γ) *laxa* Host.
montana Host. (*varia* Auct., *Hostii* R. et S.), Berg-S.,
 4. f. Europa, Caucasus, Sibirien.
purpurea (Trin.), purpurfarbiges, 4. f. Sibirien.
stricta Spgl. (*neglecta* Ehrh.), steifes, 4. f. Nordeuropa,
 Nordamerika.
strigosa Hart. (Wahlenb.), striegeliges, 4. f. Lappland,
 Grönland.
sylvatica DC. (*pyramidalis* Host.), Wald-S., 4. f. Eu-
 ropa, Sibirien.
tenella Host. (*alpina* Host.), zartes, 4. f. Mitteleurop, Alpen.
argentea DC. (*speciosa* Host.) v. *Lasiagrostis Calamagrostis*.

Calamintha T., Bergmünze, XIV. 1., Labiatae.I. *Acynos* P. (*Acinos* Dill.);

Acynos Clairv., gemeine, ☉. f. Europa, Mittelasien.
 β) *villosa* (P.).
alpina Lam., Alpen-B., 4. f. Mittel- u. südeurop. Alpen.
graveolens Lk. (MB.), starkkriechende, ♀. f. Taurien,
 Caucasus, Griechenland.
Herba barona G. Don (Loisel.), Baronskraut-B., ♀. k.
 Corsica.
heterophylla G. Don (Poir.), verschiedenblättrige, ☉.
 ♂. f. Neapel.
patavina (P.), italienische, ♂. f. Südeuropa.
purpurascens (P.), purpurfarbiges, ♂. 4. Spanien.
rotundifolia (P.), rundblättrige, ♀. f. b. k. Spanien.
suaveolens G. Don (Sm.), wohlriechende, ☉. f. Griechenl.

II. *Calamintha genuina*.

alba Lk. (WK.), weisse, 4. f. Ungarn.
caroliniana Swt., carolinische, 4. f. Carolina.
cretica P., cretische, ♀. k. Süd- und Westeuropa.
dilatata Schrad., verbreiterte, 4. f. Carolina.
fruticosa P., strauchige, ♀. k. Spanien.
grandiflora Lam., großblumige, 4. f. Südeuropa.
 β) *variegata*.
marifolia P., gamanderblättrige, 4. f. Spanien.
Nepeta Clairv. (*rotundifolia* Host., *obliqua* Host.), po-
 leiartige, 4. f. England, Südeuropa.
 β) *athonica* (Bernh. Benth.).
officinalis Mch. (*montana* Lam., *menthaefolia* Host.), ächte,
 4. England, Süd- und Osteuropa.
 β) *umbrosa* Rchb.
subnuda (WK.), fastnackte, 4. f. Ungarn.
thymifolia Rchb., thymianblättrige, 4. f. Krain, Kärn-
 then, südliche Schweiz.

Calampelis D. Don, Schönranke, XIV. 11., Personatae-Bignoniaceae.

scabra D. Don, scharfe, 4. ♀. Sch. t. Chili.

Calamus L., Rotang, VI. 1., Palmae.

Draco W., Drachenblut-R., ♀. w. Ostindien.
niger W., schwarzer, ♀. w. Molucken.
rudendum Lour. (*albus* P.), weißer, ♀. w. Ostindien,
 Cochinchina.

Calamus

verus Lour., wahrer, ♂. w. Ostindien, Cochinchina.
Zalacca G., Zalacca-R., ♂. w. Molucken.

Calandrinia H. B. K. (J. L. Calandrini, Genfer Botaniker), XI. 1., Portulacaceae.

acaulis H. B. K., stengellose, ☉. f. Quito.
arenaria Lindl., Sand-C., 4. w. Valparaiso.
caulescens H. B. K., stengelige, ☉. f. Quito, Mexico.
ciliata H. B. K., gefranzte, ☉. f. Chili.
discolor Schrad., verschiedenfarbige, 4. w. t. Chili.
grandiflora Lindl., großblumige, 4. w. Chili.
Llavea Ait., La Llave's, 4. w. Mexico.
micrantha, Schlchdl., kleinblumige, ☉. f. Mexico.
monandra DC., einmännige, ☉. f. Südamerika.
paniculata DC., rispige, 4. w. Südamerika.
pilosiuscula DC., wenighaarige (*compressa* Schrad., *adscendens* Hort.), ☉. f. Südamerika.
procumbens Moris, (*adscendens*, *glandulosa*, *lingulata*, *parviflora* Hort. ? *tenella* Hook.), niederliegende, ☉. f. Südamerika.
speciosa Lindl. Hook. (*spectabilis* Hort.), prächtige, 4. w. Chili.

Calanthe RB., Schönstendel, XX. 1., Orchideae.

australis Ait., neuholländischer, 4. w. Neusüdwallis.
bicolor Lindl., zweifarbig, 4. w. Java.
densiflora Lindl., dichtblumiger, 4. w. Silhet.
discolor Lindl., verschiedenfarbiger, 4. w. Japan, ? Java.
furcata Bate, gabeliger, 4. w. Insel Luzon.
sylvestris Lindl., waldiger, 4. w. Madagascar.
veratrifolia RB., niefswurzblättriger. 4. w. Amboina.

Calathea G. F. W. Meyer, Calathea I. 1., Scitamineae-Cannaceae.

Allouya (Jacq.), Allouya-C., 4. w. Westindien.
flavescens Lindl., gelbliche, 4. w. Brasilien.
grandifolia Lindl., großblättrige, 4. w. Brasilien.
longebracteata Lindl., langdeckblättrige, 4. w. Brasil.
orbiculata Lindl., kreisblättrige, 4. w. Westindien.
Rossii Lod. C., Rofs's, 4. w. Brasilien.
villosa Lod. C., zottige, 4. w. Brasilien.
violacea Lindl., violette, 4. w. Brasilien.
zebrina Lindl., gescheckte, 4. w. Brasilien.

Calceolaria L., Pantoffelblume, II. 1., Personatae Antirrhineae (*Scrofular.*).

adscendens Lindl., aufsteigende, ♂. k. t. Cordilleren.
angustiflora R. et P., schmalblumige, ♂. k. t. Peru.
arachnoidea Grah., besponnene, 4. k. t. Chili.
b. alba Hort. c. refulgens D. Don.
bicolor R. et P. (*diffusa* Lindl.), zweifarbig, ♂. k. t. Peru.
chiloensis Lindl., chilesische. ♂. k. t. Chili.
connata Hook. (*floribunda* Lindl.), verwachsene, ♂. k. t. Chili.
corymbosa R. et P., traubendoldige, ♂. k. t. Chili.
crenatiflora Cav. (*anomala* P., *pendula* D. Don), gekerbtblumige, 4. k. t. Chili.
Fothergillii Ait., Fothergill's, ♂. 4. k. t. Falklandsinsel.
Herbertiana Lindl., Herbert's, ♂. 4. k. t. Chili, Valparaiso.
β) parviflora Lindl.
Neeana Spgl. (*Fothergillii* Cav.), Nee's, 4. k. t. Peru.
ovata Sm., eiförmige, ♂. 4. k. t. Peru.

Calceolaria

petiolaris Cav., gestielte, 4. k. t. Chili.

pinnata L., gefiederte, ☉. f. m. Peru.

plantaginea Sm., wegrittblättrige, 4. k. t. Chili.

polifolia Hook., poleiblättrige, ☿. 4. k. t. Cordilleras.

punctata Vahl, punctirte, ☿. k. t. Chili.

purpurea Grah., purpurfarbige, 4. k. t. Chili.

b) *elegans* D. Don. b) *picta* D. Don.

rugosa R. et P. (*salviaefolia* P.), runzelige, ☿. k. t. Chili.

β) *angustifolia* (*integrifolia* L.).

b) *excelsa* Hort. c) *robusta* Hort. d) *quercifolia*. e) *cinnamomea*. f) *marmorea* Hort.

salicifolia R. et P., weidenblättrige, ☿. k. t. Peru.

scabiosaefolia Sims, scabiosenblättrige, ☉. f. m. Peru.

sessilis R. et P., stiellose, ☿. k. t. Valparaiso.

thyrsiflora Grah., straußblumige, ☿. k. f. Chili.

viscosissima Lindl. (*rugosa latifolia* et *macrophylla* Hort.), schmierige, ☿. k. t. Chili.

Hybrid.: *Alexandrina*, *Atkinsiana* D. Don, *atropurpurea*, *atrosanguinea*, *coerulescens*, *cuprea*, *formosa*, *Gellianiana* Penny, *Harlequina*, *hians* Penny, *Hopeana* Morris., *knypersliensis* D. Don, *Leonidas*, *Martineauae*, *mirabilis* K. et W., *Morrisoni* Penny, *pardantha*, *polyantha* Penny, *Pressii aurantiaca* et *purpurea*, *tricolor brunnea* et *picta*, *turbinata*, *versicolor*, *velutina*, *Wheelerii* Swt., *Youngii* Penny (*atra* Penny, *dilecta* Penny et *pallidior* Penny), etc.

Calcitrapa Hippophaestrum G. v. *Centaurea Calcitrapa*.

Caldasia heterophylla W. v. *Bonplandia geminiflora*.

Calea L. RB., Schönkraut, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae (? *Corymbiferae*).

cordifolia Sw., herzblättriges, 4. w. Jamaica.

jamaicensis L., Jamaica-S., 4. w. Jamaica.

solidaginea H. B. K., goldruthenähnliches, ☿. w. Caracas.

aspera Jacq. v. *Melananthera deltoidea*. *scoparia*

L. v. Bachar. *scopar*.

Caleacte RB., *Caleacte*, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

urticifolia RB., nesselblättrige, 4. ☿. w. Vera Cruz.

Calendula L., Ringelblume, XIX. 1v., Compositae-Corymbiferae.

aegyptiaca Dsf., ägyptische, ☉. f. Aegypten.

arborescens Jacq. (*rigida* Ait., *muricata* Thbg.), strauchartige, ☿. t. Cap der guten Hoffnung.

arragonensis Fisch., arragonische, ☉. f. Spanien.

arvensis L., Acker-R., ☉. f. Europa.

β) *bicolor*.

Asterias F. et Mey., Stern-R., ☉. f. ? Westeuropa.

dentata Bot. Reg., gezahnte, 4. ☿. t. Cap d. g. H.

denticulata Schousb., gezähnelte, ☿. t. k. Cap d. g. H.

eriocarpa DC., wollfrüchtige, ☉. f. ?

gracilis Fisch. et Mey. DC., schlanke, ☉. f. Persien.

incana W. (*tomentosa* Dsf.), weißgraue, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

marginata W. (*fruticosa* et *hispanica* Hort.), berandete, ☿. k. Gibraltar.

officinalis L., gemeine officinelle, ☉. f. Südeuropa.

b) *prolifera*.

parviflora Rafin. (*sicula* W.), kleinblumige, ☉. f. Sicilien.

persica C. et Meyer, persische, ☉. f. Persien.

Calendula

? *sancta* L., heilige, ☉. f. Palästina.

sicula Cyril. (? *ceratosperma* Viv.), sicilische, ☉. f. Sicilien.

stellata Cav., sternförmige, ☉. f. Sicilien, Nordafrika.

β) *spatulata* Hoffm. (undulata Rafin.). β) ?
fulgida Raf. (*cornuta* Poir.)

suffruticosa Vahl, halbstrauchig, ♀. ♀. t. Nordafr., Portug.
chrysanthemifolia Vent., flaccida Vent. (*aurantiaca*),
fruticosa L., *graminifolia* L., *hybrida* L., *nudicaulis*
L., *oppositifolia* Ait., *pluvialis* L. (*decurrens* Thbg.),
Tragus Jacq. *viscosa* Andr. vid. *Dimorphotheca*
chrysanthemifolia etc.

Calepina Adans., *Calepina*, XV. 1., Cruciferae.

Corvini Desv., *Corvin's*, ☉. f. Südeuropa.

prostrata Spgl. v. *Muricaria* prostr.

Caleya RB. (George Caley, Vorsteher des botanischen Gartens zu St. Vincent.), XX. 1., Orchideae.

major RB., große, 4. Kn. t. w. Südwallis.

minor RB., kleine, 4. Kn. t. w. Neuholland.

Calla L., Schlangenkraut, VII. 1. (XXI. vi.), Aroideae-Callaceae.

palustris L., Sumpf-S., 4. f. Europa.

pertusa Kunth, durchbohrtes, 4. w. Westind., Südamer.

aethiopica L. etc. v. *Richardia aethiop.*

Callicarpa L., Schönfrucht, IV. 1., Verbenaceae.

americana L., amerikanische, ♀. k. Carolina, Virginien.

arborea Roxb., baumartige, ♀. w. Ostindien, Nepal.

cana L. (*tomentosa* Lam.), graufilzige, ♀. w. Ostindien, Cochinchina.

ferruginea Sw., rostfarbige, ♀. w. Jamaica.

incana Roxb., weißgrau, ♀. w. Ostindien.

lanata L., wollige, ♀. w. Ostindien, Neuholland.

lanceolaria Roxb., lanzettliche, ♀. w. Ostindien.

longifolia Lam. (*japonica* Thbg.), langblättrige, ♀. t.

China, Japan.

macrophylla Vahl, großblättrige, ♀. w. Ostindien.

purpurea Juss., purpurfarbige, ♀. w. Südchina.

reticulata Sw., netzförmige, ♀. w. Westindien.

rubella Lindl., rötliche, ♀. t. China.

Callicephalus C. A. Mey., Schönpf., XIX. III. Compositae-Cynarocephalae.

nitens C. A. Mey., glänzender, 4. f. Taurien.

Callichroa Fisch. et Mey., Schönstrahl, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

platyglossa Fisch. et Mey., breitzungiger, ☉. f. Neucaliforn.

Callicoma RB., Schönschopf, X. II., Corniculatae-Cunoniaceae.

serratifolia RB., sägeblättriger, ♀. t. Neusüdwallis.

Calligonum L., Schönknöterig, XI. v., Polygoneae.

Pallasia Ait., Pallas's, ♀. f. k. Südliches Rußland.

polygonoides L. (*comosum* L'Her.), schopfger, ♀. k.

Armenien, Nordafrika.

canescens Pursh. v. *Atriplex canesc.*

Calliopea aurea D. Don v. *Crepis aurea*.**Calliopsis** Reichenb., Schöngesicht, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

Atkinsoniana Dougl. Hook., 4. f. Columbia.

bicolor Rchb., zweifarbig, ☉. f. Nordamer. (Arkansa).

Calliopsisb) *atrosanguinea* Hort.*Drummondii* D. Don, Drummond's, ♂. f. ? Californien.*palmata* Spgl. et *rosea* Spgl. v. *Creopsis palmat.* etc.**Calliphysa** Fisch. et Mey., Kahlknöterig, ? XI. v., Polygoneae.*junceae* Fisch. et Mey., simsenförmiger, ♂. f. k. Am caspischen Meere.**Calliprora** Lindl., Prachtaffodile, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.*lutea* Lindl., gelbe, 4. Zw. f. Neucalifornien.**Callisace** Fisch., Schöndolde, V. 11., Umbelliferae.*dahuria* Fisch., dahurische, 4. f. Dahurien.**Callisia** L., Callisie, III. 1., Commelineae.*repens* L., kriechende, 4. w. Westindien.**Callista** Salisb. v. *Erica*.**Callistachys** Vent., Schönähre, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.*cuneata* Sm., keilförmige, ♂. t. Neuholland.*lanceolata* Vent., lanzettblättrige, ♂. t. Neuholland.*linariaefolia* Mac. Cat., leinblättrige, ♂. t. Neuholland.*ovata* Sims, eiblättrige, ♂. t. Neuholland.*retusa* Lod., eingedrückte, ♂. t. Neuholland.**Callistemma** Cass. (*Callistephus* Cass.) v. *Aster*.**Callistemon** RB., Schönfaden, XII. 1, Myrtaceae.*formosus* Ma. C., schöner, ♂. t. Neuholland.*juniperinus* (Rchb.), wachholderblättriger, ♂. t. Neuholl.*lanceolatus* Swt., lanzettblättriger, ♂. t. Neuholland.*leptostachyus* Swt., leichtähriger, ♂. t. Neuholland.*linearifolius* (Lk.), schmalblättriger, ♂. t. Neuholland.*linearis* Swt., linienblättriger, ♂. t. Neuholland.*lophanthus* Swt., büschelblumiger, ♂. t. Neuholland.*marginatus* Swt., berandeter, ♂. t. Neusüdwallis.*microphyllus* Ma. C., kleinblättriger, ♂. t. Neuholland.*microstachys* Lindl., kleinähriger, ♂. t. Neuholland.*pinifolius* Swt., kieferblättriger, ♂. t. Neusüdwallis.*pungens* G. Don, stechender, ♂. t. Neusüdwallis.*rigidus* RB., starrer, ♂. t. Neusüdwallis.*rugulosus* G. Don, runzeliger, ♂. t. Neusüdwallis.?β) *scaber* Lod.*salignus* DC., weidenblättriger, ♂. t. Neuholland.β) *ruber*.*semperflorens* Lod., immerblühender, ♂. t. Neusüdwallis.*speciosus* Swt., prächtiger, ♂. t. Neusüdwallis.*vininalis* G. Don, ruthenförmiger, ♂. t. Neusüdwallis.*viridiflorus* Swt., grünblumiger, ♂. t. Neuholland.**Callitriche** L., Wasserstern, I. 11., Callitrichineae (? Halorageae).*autumnalis* L., Herbst-W., 4. Wa. f. Nordeuropa.*hamulata* Kützing, hakenförmiger, 4. Wa. f. Europa.*platycarpa* Kützing, breitfrüchtiger, 4. Wa. f. Europa.*stagnalis* Scop., Weiher-W., 4. Wa. f. Europa.*verna* L. (*vernalis* Kütz.), Frühlings-W., 4. Wa. f. Europa, Amerika.β) *pedunculata* DC.**Callitris** Vent., Schmuckcypresse, XXI. x., Coniferae.*conglobata* Sbr., zusammengeballte, ♂. t. Neuholland.*cupressiformis* Vent. (? *australis* Sbr.), neuholländische, ♂. t. Neuholland.

Callitris

elegans Sbr., zierliche, ♀. t. Neuholland.

Fothergilli Loud., Fothergill's, ♀. k. t. ?

macrostachya Loud. (*macrocarpa* Hort.), grofsährige, ♀. t. Neuholland.

montana Sbr. (? *pyramidalis* Hort.), Berg-Sch., ♀. t. Neuholland.

oblonga Rich. (*fruticosa* RB.), längliche, ♀. t. Port Jackson.

quadrivalvis Vent., vierklappige, ♀. t. k. Nordafrika.

rhomboidea RB., rautenförmige, ♀. t. Neuholland.

triquetra Loud., dreikantige, ♀. t. Cap d. guten Hoffn.

Calluna Salisb., Heidekraut, VIII. 1., Ericaceae.

vulgaris Salisb., gemeines, ♀. f. Europa.

a) *purpurea* G. Don. b) *spuria* G. Don. c) *decumbens* G. Don.

d) *tomentosa* G. Don. e) *alba* G. Don.

f) *flore pleno* G. Don. g) *foliis varieg.* G. Don.

h) *aurea* G. Don. i) *coccinea* G. Don.

k) *spicata* G. Don. l) *atrorubens* Loud. m) *serotina* Loud.

Calobotrya sanguinea Spach etc. v. *Ribes sanguin.*

Calochilus RB., Schönlippe, XX. 1., Orchideae.

campestris RB., Feld-S., 4. kn. t. w. Neuholland.

paludosus RB., Sumpf-S., 4. kn. t. w. Neuholland.

Calochortus Pursh, Graslilie, VI. III., Colchicaceae.

elegans Pursh, zierliche, 4. Zw. k. Louisiana, Californ.

luteus Dougl., gelbe, 4. Zw. k. Californien.

macrocarpus Dougl., grofsfrüchtige, 4. Zw. k. Californ.

nitidus Dougl., glänzende, 4. Zw. k. Californien.

splendens Dougl., schimmernde, 4. Zw. k. Californien.

venustus Dougl., annehmliche, 4. Zw. k. Californien.

Calodendron Thbg., Schönbaum, V. 1., Tricoccae Rutaceae.

capense Thbg., capischer, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

Calophaca Fisch., Schönlinse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

wolgarica Fisch., sibirische, ♀. f. Sibirien.

Calophanes D. Don, Schönklau, XIV. II., Acanthaceae.

oblongifolia D. Don, langblättriger, 4. t. w. Carolina.

Calophyllum L., Schönblatt, XVI. 1., Guttiferae.

Calaba Jacq., Calaba S., ♀. w. Westindien.

Inophyllum L., wohlriechendes, ♀. w. Ostindien.

spurium DC. (*Calaba* L.), unächt, ♀. w. Malabar.

Tacamahaca W., Tacamahaca S., ♀. w. Mascarenas.

Calopogon RB., Bartstendel, XX. 1., Orchideae.

pulchellus RB., schöner, 4. t. Nordamerika.

Calorophus elongat La Bill. v. *Restio lateriflorus*.**Calostemma** RB., Prachtkrone, VI. 1., Narcisseae Amaryllideae.

album RB., weisse, 4. Zwt. w. Neuholland.

Cunninghami Ait., Cunningham's, 4. Zw. t. w. Neuhol.

luteum Ker, gelbe, 4. Zw. t. w. Neuholland.

purpureum RB., purpurfarbige, 4. Zw. t. w. Neuhol.

Calothamnus La Bill., Schönstrauch, XVIII. II., Myrtaceae.

clavata Ma. C., keulförmiger, ♀. t. Neuholland.

gracilis RB., schlanker, ♀. t. Südliches Neuholland.

quadrifida RB., vierspaltiger, ♀. t. Südl. Neuholland.

? *robusta* Hortul., starker, ♀. t. Neuholland.

Calothamnus

sanguinea La Bill., blutrother, $\frac{1}{2}$ t. Südl. Neuholl.
villosa RB., zottiger, $\frac{1}{2}$ t. Südl. Neuholland.

Calotheca P. B., Schönbüchse, III. II., Gramineae.

brizoidea P. B. (*elegans* H. B. K.), zittergrasähnliche,
 4. w. Montevideo.

β) *dilatata* Lk.

litoralis Spgl. et *repens* Spgl. vid. *Dactylis* lit. etc.

Calotis RB., Schönfederchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

cuneifolia RB., keilblättriges, 4. K. A. Neuholland.

Calotropis RB., Calotropis, V. II., Asclepiadeae.

gigantea RB., große, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

procera RB., hohe, $\frac{1}{2}$ w. Aegypten, Ostindien.

Caltha L., Dotterblume, XIII. VI., Ranunculaceae.

asarifolia DC., haselwurzblättrige, 4. Wa. f. Aleutische Inseln.

biflora DC., zweiblumige, 4. f. Nordamerika.

flabellifolia Pursh, fächerblättrige, 4. Wa. f. Nordamerika.

leptosepala DC., schmalkronige, 4. f. Nordamerika.

natans Pall., schwimmende, 4. Wa. f. Ostsibirien.

palustris L., Sumpf-D., 4. Wa. f. Europa, Asien, Nordamerika.

b) *flore pleno*. c) *minor* Mill.

parnassifolia Rafin. (*ficarioides* Pursh), parnassienblättrige, 4. Wa. f. Nordamerika.

radicans Forst., wurzelnde, 4. f. Schottland.

Calycanthus L., Gewürzstrauch (*Kelchblume*), XII. III., Calycantheae.

floridus L. (*sterilis* Walt.), blüthenreicher, $\frac{1}{2}$ f. Carolina.

a) *oblongus* Ait. b) *ovatus* Ait. c) *asplenifolius* Lod. d) *longifolius* Lod. e) *variegatus* Lod.

f) ? *inodorus* Lod.

glaucus W. (*fertilis* Walt., *acuminatus* Hort.), blaugrüner, $\frac{1}{2}$ f. Carolina.

β) *oblongifolius* Nutt.

laevigatus W. (*pensylvanicus* Lod., *nanus* Hort., *ferax* Mchx.), glatter, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

β) *heterophyllus* Hort.

prunifolius Hort., pflaumenblättriger, $\frac{1}{2}$ f. Carolina.

praecox L. vid. *Chimonanthus fragrans*.

Calycotome spinosa Lk. et *villosa* Lk. vid. *Cytisus spinos.* etc.

Calymenia angustifol. Nutt. et *decumbens* Nutt. v. *Allionia linearis* et *decumb.*

Calypso Salisb., Calypso XX. I., Orchideae.

americana RB. (*borealis* Hook.), amerikanische, 4. f. Nordamerika.

borealis Salisb., nördliche, 4. f. Lappland, Finnland.

Calyptranthes Sw., Deckelblume, XII. I., Myrtaceae.

caryophyllifolia W., gewürznelkenblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

Chytraculia Sw., *Chytraculia*-D., $\frac{1}{2}$ w. Jamaica.

Jambolana W., *Jambolana*-D., $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

Syzygium Sw. (*Zuzygium* L.), *Syzygium*-D., $\frac{1}{2}$ w. Jamaica.

Calyptrion Gingins vid. *Corynostyles*.

Calystegia RB., Bärwinde, V. I., Convolvulaceae.

Catesbeiana Pursh, *Catesbai's*, 4. Sch. f. Nordamer.

Calystegia

dahurica Fisch., dahurische, 4. Sch. f. Dahuria.
 marginata RB., gerandete, 4. f. b. k. Neuholland.
 paradoxa Pursh, wunderbare, 4. f. Nordamerika.
 reniformis RB., nierenförmige, 4. f. b. k. Neuholland.
 sepium RB., Zaum-B., 4. Sch. f. Europa, Asien, Nordamerika, Neuholland.

β) incarnata. γ) novae hollandiae.

Soldanella RB., rundblättrige, 4. f. b. k. Europa.
 spithamaea Pursh, spannenlange, 4. Sch. f. Nordamer.
 sylvestris R. et S., Wald-B., 4. Sch. f. Ungarn.
 tomentosa Pursh, filzige, 4. f. Nordamerika.

Calythrix La Bill., Haarkelch, XII. 1. Myrtaceae.

glabra RB. (*floribunda* Hort.), glatter, $\S$. t. Neuholl.
 scabra DC. (? *pubescens* Swt.), schärflicher, $\S$. t. Neu-Süd-Wallis.

virgata Cunn. (*ericoides* Cunn), ruthenförmiger, $\S$. t. Neuholland.

Camaridium Lindl., Bogenstendel, XX. 1., Orchideae.
 ochroleucum Lindl., weißgelber, 4. w., Trinidad.**Camassia** Lindl. (*Quamash* oder *Camass*, nordwestamerikanischer Name), VI. 1., Coronariae — Asphodeleae.
 esculenta Lindl., genießbare, 4. Zw. f. b. Columbia.**Camelina** Crtz., Leindotter, XV. 11., Cruciferae.

dentata P. (*pinnatifida* Hornem.), gezählelter, $\odot$. f. Europa, Mittelasien.

sativa Crtz., gemeiner, $\odot$. f. Europa, Mittelasien.

β) microcarpa Andr. (*sylvestris* Wallr.) γ) glabrata DC.

austriaca RB. et *barbareaefolia* DC. vid. Nasturtium austr. etc.

Camellia L. (G. J. Kamel [Camellus], Apotheker der mährischen Brüder-Mission auf Manila), XVI. VIII., Theaceae (*Camelliaceae*).

euryoides Lindl., euryablättrige, $\S$. t. China.

japonica L., japanische, Japan, China.

Vorzügl. Varietäten: Aitonia, alba plena, alb. semiduplex, alb. simplex, alb. striata, Alnuts alba et splendens et superba, althaeiflora, anemoneflora (Waratah) alba et purpurea et rosea et striata et variegata, ardens et superba, atropurpurea, atrorubens, aucubaefolia, augusta, bicolor, blanda, Blackburniana, candidissima, conchaeiflora, concinna, conspicua, corallina, crassinervia, dahliaeflora, decora, delecta, delicatissima, dianthiflora, Dorsetii et pendula, Donckelaerii, Eclipsis, elegans, elegantissima, Elphinstonian, epsomensis Chand., excelsa, expansa, eximia Chand., fimbriata, flavescescens (Buff), florida, fulgens, gigantea, hybrida Mack C., gloria belgica et mundi, grandiflora simpl. et superba, Griffini, heptangularis, hexangularis, humilis (*nana*), imbricata, incarnata, insignis alba et rubra, involuta, Kew blush, Knightii Lod., Lady Admiral Campbell et Humes blush, longifolia, monstrosa, myrtifolia, nivea, ornata, oxoniensis, paeoniflora, rubra et alba, Palmeri, Palmer's striped et white, papaveracea, paradoxa, Parksii, Parmentieri, pomponia alba et incarnata, Pressii et rosea princeps, pulchella, punctata et major, Reevesiana, Reevesii, Rollinsoniana, Rosa mundi, Rosa sinensis

Camellia

Rossii, rotundifolia, rubra plena, rubricaulis, rubropunctata, sanguinea, Sabiniana, Simsii, spathulata, splendens (*coccinea*) speciosa, straminea, Sussanna Sweetiana, Taylori, tricolor, triumphans, variabilis, variegata, versicolor, Wadieana, Welbankiana, Weymouriana, Wiltonii, Woodsii u. v. a.

Kissi Wall. (*Keina* D. Don), nepal'sche, ♀. t. Nepal.

maliflora Lindl. (*Sasanqua plena rubra (rosea)*), äpfelblumige, ♀. t. China.

oleifera Abel, ölgebende, ♀. t. China.

β) latifolia.

reticulata RB., netzförmige, ♀. t. China.

Sasanqua Thbg., theegebende, ♀. t. Japan, China.

b) plena. c) semiplena.

axillaris Sims v. Polyspora axillaris. *Thea et viridis* Lk. v. *Thea Bohea et viridis*.

Cameraria Plum. (J. Camerarius, Botaniker zu Nürnberg), V. 1., Apocynae.

angustifolia L., schmalblättrige, ♀. w. Südamerika.

dubia Sims, zweifelhafte, ♀. w. Ostindien.

latifolia L., breitblättrige, ♀. w. Ostindien.

Campanula T., Glockenblume, V. 1., Campanulaceae.

Adami MB., Adam's, 4. f. Caucasus.

affinis R. et S., ähnliche, 4. f. w. Spanien.

alliarafolia W., lauchkrautblättrige, 4. f. Cappadocien.

Allionii Vill., Allione's, 4. f. Oberitalien, Südfrankreich.

alpina Jacq., Alpen-G. 4. f. Osteuropäische Alpen.

altaica A. DC. (*sanensis* Fisch. *pilosa* Ledeb. non Pall.), altaische, 4. f. Altai, Dahur., Persien.

americana L. (*acuminata* Mchx., *declinata* Mch. *obliqua* Jacq.), amerikanische, 4. f. Nordamerika.

anchusaeflora Sibth., ochsenzungenblumige, ♂. f. Griechenland.

Andrewsii A. DC. (*laciniata* Andr.) Andrew's, ♂. f. Griechenland.

? aspera Mch., rauhe, ♂. f. ? ?

barbata L., bärtige, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) cyanea.

bellidifolia Lapeyr., maßliebenblättrige, 4. f. Pyrenäen.

betonicaefolia Sibth. et Sm., betonienblättrige, ♂. f. Griechenland.

Biebersteiniana R. et S. (*rupestris* MB.), Bieberstein's, 4. f. Caucasus.

bononiensis L. (*Thaliana* Wallr.), Bologneser-G., 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

β) lychnitis Hornem. γ) obliquifolia Tenor.

δ) ruthenica MB. ε) simplex Lam. et DC.

caespitosa Scop. (*pumila* Curt., *Bellardi* All.), Oesterreich, krainerische Alpen.

b) fl. albo.

carnica Schiede, karnische, 4. f. Krain, Kärnthen.

carpathica Jacq., karpathische, 4. f. Siebenbürgen, Carpathen.

b) fl. albo.

caucasica MB., caucasische, 4. f. Caucasus.

cenisia L., savoyische, 4. f. Savoyen.

Celsii A. DC., Cels's, ♂. k. f. b. Griechenland.

Cervicaria L., natterkopfbliättrige, ♂. f. Mittel- und Nordeuropa, Sibirien.

Campanula

- cichoracea Sibth. (? *capitata* Bot. mag.), cichorienblättrige, ♂. n. f. b. Thessalien.
- ciliata Stev., gefranzte, 4. f. Altai, Dahur., Pers.
- collina MB., Hügel-G., 4. f. Caucasus.
- corymbosa Dsf., traubendoldige, 4. k. f. b. Creta.
- crispa Lam., krause, 4. k. f. b. Armenien.
- dasyantha MB., wollblumige, 4. f. Sibirien.
- decumbens A. DC., niederliegende, ☉. f. Spanien.
- dichotoma L., (*afra* Cav., *decipiens* R. et S.), zweizinkige, ☉. f. Süditalien, Griechenland.
- divaricata Mchx. (? *virgata* Rafin.), sparrige, 4. f. Nordamerika.
- divergens W. (*spathulata* W. K., *nutans* Vahl, Hornem.), divergirende, ♂. f. Ungarn, Siebenbürgen, Sibirien.
- drabaefolia Sibth., hungerblümchenblättrige, ☉. f. Griechenland, Kleinasien.
- Elatines L., Wasserpfeffer-G., 4. f. Oberital., Dauphiné.
- elatinoides Morett., langgriffeliges, 4. f. Südliches Tyrol, Oberitalien.
- elegans R. et S. (*speciosa* W.), nette, 4. f. Sibirien.
- erinoides L., erinusähnliche, ☉. f. Spanien, Nordafrika.
- Erinus L., schmalblumige, ☉. f. Südeuropa.
- excisa Schlchr., schlitzkronige, 4. f. Südliche Schweiz.
- fastigiata Dufour, gipfelständige, ☉. f. Arragonien, Südrussland.
- foliosa Tenor., blattreiche, 4. f. Neapel.
- fragilis Cyril. (*cochlearifol.* Vahl, *crassifol.* N. E., *Cavolini* a Ten., *diffusa* Vahl), zerbrechliche, 4. k. Neapel.
- β) *hirsuta* (*Barrelieri* Presl), Cavolini β) Ten.
- garganica Ten., apulische, 4. f. Apulien, Dalmatien.
- glomerata L., knaulblumige, 4. f. Europa, Armenien, Sibirien.
- β) *aggregata* W. γ) *elliptica* Kit. δ) *cervicarioides* R. et S. ε) *farinosa* Befs. ζ) *nicaeensis* R. et S. η) *speciosa* Hornem.
- Gart. Var.: b) *alba elata*. c) *pallida*. d) *lilacina*. e) *coerulea elata*. f) *flore pleno purpureo*.
- grandis Fisch., große, ♂. 4. f. Natolien.
- Grossekii Heuf., Grossek's, 4. f. Ungarn.
- Herminii Hoffinsg. et Link, Hermin's, ? ☉. f. Portugal.
- heterophylla L., verschiedenblättrige, 4. k. Griechenl.
- Hostii Baumg., Host's, 4. f. Siebenbürgen.
- illinoensis Fresen., illinoensische, 4. f. Nordamerika.
- isophylla Morett., (*floribunda* Viv.), gleichblättrige, 4. f. Ligurien.
- Kitaibelii R. et S. (*microphylla* Kit.), Kitaibel's, 4. f. Ungarn.
- laciniata L., schlitzblättrige, ♂. k. f. b. Griechenland.
- lactiflora MB., milchweißblumige, 4. f. Caucasus, Iberien.
- lamiifolia MB., taubnesselblättrige, 4. f. Caucasus.
- β) *macrophylla* Sims.
- latifolia L., breitblättrige, 4. f. Europa, Altai, Nordpersien, Nepal.
- β) *macrantha* Hornem. γ) *eriocarpa* MB.
- b) *alba*. c) *polyantha* Hook.
- ligularis Lam., bandförmige, 4. f. ?
- lingulata W. K., zungenförmige, ♂. f. Ungarn, Dalmatien.
- linifolia Lam., gleichbreitblättrige, 4. f. Mitteleuropäische Voralpen, westliches Nordamerika.

Campanula

- β) *valdensis* All. (*uniflora* Vill.) γ) Scheuchzeri Vill. δ) *Langsdorffiana* Fisch. (? *heterodoxa* Bong.)
Loeflingii Brot., (*Broussonetiana* R. et S.), Loeffling's,
 ☉. f. Spanien, Portugal, Nordafrika.
Loreyi Poll. (*baldensis* Balb., *ramosissima* Host.), Lorey's,
 ☉. f. Oberitalien, Dalmatien.
 b) fl. albo.
lunariaefolia W., mondviolenblättrige, 4. f. Caucasus.
lyrata Lam., leierförmige, 4. f. Orient.
macrorhiza Gay, großwurzelige, 4. f. Südfrankreich.
madritensis A. DC., madritische, ☉. f. Spanien.
Medium L., Marien-G., ♂. f. Südeuropa, Taurien.
 b) flore albo. c) fl. albo pleno. d) fl. coerul. plen.
mollis L., weiche, 4. f. b. k. Spanien, Neapel, Creta, Mauritien.
 β) *microphylla* Cav.
Morettiana Rchb. (*filiformis* Morett.), Moretti's, 4. f. Südliches Tyrol, Oberitalien, Dalmatien.
multiflora W. K., vielblumige, ♂. f. Banat.
muralis Maund, mauerliebende, 4. f. Südeuropa.
nemorosa A. DC. (*elongata* Portenschl.), Hain-G., 4. f. Oesterreich, Mähren.
Nuttalli Penny, Nuttal's, 4. f. Nordamerika.
parviflora Lam., kleinblumige, 4. f. Iberien.
patula L., ausgebreitete, ♂. f. Europa, Nordafrika.
 β) *neglecta* R. et S. b) fl. albo Hortul.
peregrina L. (*alata* Bové, *lanuginosa* Lam.), fremde. ♂. k. Syrien, Mauritien.
persicaefolia L., pfirsichenblättrige, 4. f. Mitteleuropa, Altai.
 β) *macrantha* (*maxima*) Curt. γ) *dasycarpa* Kit. δ) *hispida* Lejeun. ϵ) *calycina* Rchb. b) fl. albo pleno. c) fl. coerul. pleno.
petraea Lam., steinliebende, 4. f. Oberital., Südfrankr.
planiflora Lam. (*nitida* Ait.), glänzende, 4. f. k. Nordamerika.
 b) flore albo. c) fl. albo plen. d) fl. coerul. pleno.
Portenschlagiana R. et S., (? *muralis* Hort.), Portenschlag's, 4. f. Dalmatien.
primulaefolia Broter, primelblättrige, ♂. k. Portugal.
propinqua Fisch. et Mey., verwandte, ☉. f. Nordpersien.
ptarmicaefolia Lam., dorantblättrige, 4. f. k. Armenien, Cappadocien.
pulla L., schwarzblaue, 4. f. Oestreichische Alpen.
punctata Lam., punctirte, 4. f. Ostsibirien, Dahurien, Japan.
pusilla Haenk., kleine, 4. f. Mitteleuropäische Voralpen.
 β) *pubescens* Schm.
pyramidalis L., pyramidale, ♂. 4. f. Südeuropa.
Raineri Perpent., Rainer's, 4. f. Südtirol, Oberitalien.
ramosissima Sibth., starkästige, ☉. f. Griechenland.
rapunculoides L., rapunzelähnliche, 4. f. Europa, Caucasus, Westsibirien.
 β) *crenata* Lk. (*ucranica* et *neglecta* Bess., *infundibuliformis* B. Mag.) γ) *macrophylla* Hort. δ) *trachelioides* MB. b) flore pleno.
Rapunculus L., Rapunzel-G., ♂. f. Europa, Caucasus.
 β) *calycina* Boeb.
rhomboidalis L. (*azurea* B. Mag.), rautenförmige, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

Campanula

- β) lanceolata Lapeyr. b) rubra Hort.
 rotundifolia L. (*Baumgartenii* Beck), rundblättrige, 4. f.
 Europa, Sibirien, westliches Nordamerika.
 β) tenuifolia Hoffm. b) flore albo. c) fl. albo
 pleno. d) fl. coerul. pleno.
 sarmatica Ker (*betonicaefolia* Redows., *gummifera* W.,
commutata R. et S.). russische, 4 f. Caucasus.
 β) glabra A. et DC.
 saxatilis L., Gestein-G., 4. k. Creta.
 Saxifraga MB., Steinbrech-G., 4. f. Caucasus.
 sibirica L., sibirische, ♂. f. Nordasien, Caucasus, Ost-
 europa, Piemont.
 silenifolia Fisch. (*Infundibulum* Rchb.), silenenblättrige,
 4. f. Ostsibirien, Dahurien.
 spathulata Sibth. et Sm., spathelblättrige, 4. f. b. k.
 Griechenland.
 speciosa Pourr. (*longifolia* Lapeyr.), prächtige, 4. f.
 Pyrenäen.
 β) bicaulis Lapeyr.
 spicata L., ährenförmige, ♂. f. Mitteleuropa.
 β) ramosa. γ) interrupta.
 Steveni MB. (*simplex* Stev., *Vittinghoffiana* R. et S.),
 Steven's, 4. f. Caucasus, Armenien, Ukraine.
 β) sibirica A. DC. (?*Infundibulum* Vest non Rchb.)
 stricta L., steife, 4. f. b. k. Armenien, Griechenland.
 Tenorii Morett. (*corymbosa* Ten., *Rosani* Ten., *versicolor*
 Guf.), Tenore's, 4. f. Neapel.
 thyrsioidea L., straußförmige, 4. f. Mitteleurop. Alpen.
 tomentosa Lam., filzige, 4. k. Levante.
 Trachelium L., Halskraut-G., 4. f. Europa.
 β) urticaefolia Schm. b) flore pleno. c) flore
 albo. d) fl. albo pleno.
 trichocalycina Ten., haarkelchige, 4. f. Süditalien, Creta.
 uniflora L., einblumige, 4. f. Lappland, Grönland.
 Vandesii G. Don, Vandes's, 4. f. ?
 velutina Dsf., sammethaarige, 4. f. Nordafrika, Südeuropa.
 versicolor Sibth. et Sm. (*Willdenowiana* R. et S., *pla-*
niflora W. non Lam.), verschiedenfarbige, 4. f.
 Griechenland.
 β) multiflora.
 violaefolia Lam., veilchenblättrige, 4. f. Sibirien.
 Waldsteiniana R. et S. (*flexuosa* WK., *rupestris* Host),
 Waldstein's. 4. f. Croatien.
 Wanneri Roch., Wanner's, 4. f. Banat.
 Zoisii Wulfen, Zoys's, 4. f. Steyerm., Kärnthen, Krain.
Alpini L. v. *Adenophora liliifolia*. *allariaefolia*
 Reichb. v. *Symphyandra pendula*. *armena* Steven.
 v. *Symphyandra armena*. *aurea* L. vid. *Musschia*
aurea. *capensis* L. (*elongata* W.) et *cernua* Thhg.
hederacea L., *litoralis* LaBill., *lobelioides* L. etc. v.
Wahlenbergia capensis etc. *coronata* Ker. (*mar-*
supiflora R. et S.) et *coronopifolia* R. et S. etc. v.
Adenophora marsupiflora etc. *fruticosa* L. v. *Light-*
footia subulata. *graminifolia* L. et *tenuifolia* W. K.
 etc. v. *Edraianthus graminifol.* etc. *grandiflora*
 Jacq. v. *Pladycodon grandiflor.* *hybrida* L. et *per-*
foliata L. et *Speculum* L. etc. v. *Specularia hy-*
brida etc. *porosa* Thhg. v. *Samolus campanu-*
loid. etc.

Campelia Rich., Campelia, VI. 1., Commelineae.

Zanonia Rich., scheidenblüthige, 4. w. Westindien.

Camphorosma L., Kampferkraut, IV. 1., Aizoideae-Atripliceae.

annua Pall., jähriges, ☉. f. Südrussland.

monspeliaca L., französisches, ♀. 4. k. Südeuropa, Mittelasien.

ovata Kit., eiförmiges, ☉. f. Ungarn.

ruthenica MB., russisches, ☉. f. Taurien, Caucasus.

? *acuta* L. v. *Hemichroa erinacea*.

Campylanthus Roth, Krummröhre, II. 1., Acanthaceae, salsoloides Roth, salzkrautähnliche, ♀. k. b. Canarische Inseln.]

Canarina L., Canarienkraut, VI. 1., Campanulaceae.

Campanula L., glockenblumiges, 4. k. Canarische Ins.

laevigata G. Don., glattes, 4. k. Canarische Inseln.

Canavalia DC. (malabarischer Name), XVII. 1v. (v1.), XVI. vi.

bonariensis Lindl., bonarische, ♀. Sch. Buenos-Ayres.

ensiformis DC., schwertförmige, ☉. Sch. w. Ostindien.

gladiata DC., degenfrüchtige, ♀. Sch. w. Ostindien.

obtusifolia DC., sumpflätterige, ♀. Sch. w. Ostindien.

rosea DC., rosafarbige, 4. w. Jamaica.

Candollea La Bill. (Aug. Pyr. de Candolle, berühmter Botaniker zu Genf), XVIII. 11., Dilleniaceae.

Brunonis Hügel, Brown's, ♀. t. Neuholland (Schwanenfluß).

cuneiformis La Bill., keilblätterige, ♀. t. Südl. Neuholl.

fasciculata RB., büschelförmige, ♀. t. Südl. Neuholland.

Hügelii Endl., Hügel's, ♀. t. Neuholl. (Schwanenfluß).

pedunculata RB., gestielte, ♀. t. Neuholland.

Canella P. Br., Canellbaum, XI. 1., Guttiferae.

alba Murr., weißer, ♀. w. Westindien.

axillaris Murr., achselblumiger, ♀. w. Südamerika.

? *laurifolia* Hortul., lorbeerblättriger, ♀. w. Südamerika.

Canna L., Blumenrohr, I. 1., Scitamineae - Cannaceae.

Achiras Gill., Achiras-B., 4. w. Mendoza.

Altensteinii Bouché, Altenstein's, 4. w. Mittägl. Amerika.

? *angustifolia* L., schmalblättriges, 4. w. Südamerika.

aurantiaca Rosc., orangefarbiges, 4. w. Brasilien.

brasiliensis Rosc., brasilianisches, 4. w. Brasilien.

carnea Rosc., fleischfarbiges, 4. w. Brasilien.

chinensis W., chinesisches, 4. w. China, Cochinch., Brasil.

coccinea Mill. Ait. (? *rubra* W.), scharlachfarbiges, 4. w.

Jamaica, Südamerika.

commutata Bouché (*lutea* Hort.), verwechseltes, 4. Südamerika.

compacta Rosc., dichtähriges, 4. w. Ostindien, Westind.

denudata Rosc., entblöstes, 4. w. Ostindien.

discolor Lindl., verschiedenfarbiges, 4. w. Trinidad.

edulis Ker. (*indica* R. et S., *rubricaulis* Lk.), eßbares, 4. w. Peru.

Ehrenbergii Bouch., Ehrenberg's, 4. w. St. Thomas.

flaccida Rosc. Salisb., schlaffes, 4. w. Carolina.

flavescens Lk., gelbliches, 4. w. Ostindien.

gigantea Dsf. (*latifolia* Rosc., *gemella* N. E., *excelsa* Löd.), riesenhaftes, 4. w. Brasilien.

glauca L., blaugrünes, 4. w. Westindien.

b) *rubro-lutea* Hook.

heliconiaefolia H. Berol., heliconienblättrig. 4. w. Mexico.

Canna

- humilis Bouché, niedriges, 4. w. China.
 indica L. (*variabilis* W.), indisches, 4. w. Ostindien.
 iridiflora R. et P., schwertelblumiges, 4. w. Peru.
 ?juncea RB., simsenförmiges, 4. w. China.
 lagunensis Lindl., lagunisches, 4. w. Mexico.
 Lamberti Rosc. (*maxima* Lod.), Lambert's, 4. w. Südamerika, Trinidad.
 lanceolata Lod., lanzettliches, 4. w. Brasilien.
 lanuginosa Rosc., wolliges, 4. w. Ostindien.
 leptochila Bouché, schmallippiges, 4. w. ?
 limbata Rosc. (*aureovittata* Lod., *patens* Hook.), gerandetes, 4. w. Brasilien.
 Linkii Bouché, Link's, 4. w. Brasilien.
 lutea Ait., gelbes, 4. w. Südamerika.
 maculata Lk., geflecktes, 4. w. Westindien.
 mexicana H. Berol. (*glauca rufa* Bot. mag., *liturata* Lk.), mexicanisches, 4. w. Mexico.
 miniata Bouché, zinnoberrothes, 4. w. Brasilien.
 nepalensis H. Par., nepalisches, 4. w. Nepal.
 occidentalis Rosc., abendländisches, 4. w. Westindien.
 orientalis Rosc. (*indica* Roxb.), morgenländisches, 4. w. Ostindien.
 pallida Rosc., bleiches, 4. w. Südamerika.
 patens Rosc. (*thyrsiflora* Hegetsch., ?*crocea* Lag.), offestehendes, 4. w. St. Helena.
 pedunculata Sims (*Buchii* Weinm. *reflexa* N. E.), gestieltes, 4. w. Brasilien.
 polymorpha Lod., vielgestaltiges, 4. w. ?
 Reevesii Lindl., Reeves's, 4. w. China.
 Roscoeana H. Berol., Roscoe's, 4. w. Ostindien.
 sanguinea Lod., blutrothes, 4. w. Südamerika.
 Sellowii H. Berol., Sellow's, 4. w. Brasilien.
 speciosa Rosc. (*bifida* Herb.), prächtiges, 4. w. Nepal.
 stolonifera H. Berol., sprossendes, 4. w. Montevideo.
 sylvestris Rosc., Wald-B., 4. w. Südamerika.
 tenuiflora Bouché, dünnblumiges, 4. w. Westindien.
 violacea H. Berol., violettes, 4. w. Westindien.
 xalapensis H. Berol., xalapensisches, 4. w. Xalapa.

Cannabis T., Hanf, XXII. v., Urticaceae.

- sativa L., gemeiner, ☉. f. Taurien, Sibirien, Persien, Ostindien.

β) indica L.

Canthium Lam. (malabarischer Name), V. I., Rubiaceae.

- dubium Lindl., zweifelhaftes, ☿. t. w. Ostindien.
chinense P. v. *Gardenia spinosa*. *coronatum* Lam.
 v. *Gardenia dumetorum*. *corymbosum* P. et *cymosum* P. v. *Webera corymb.* etc.

Cantua ligustrifolia Juss. v. *Vestia lycioides*.**Capnophyllum** G., Erdrauchdolde, V. II., Umbelliferae.

- africanum G., afrikanische, ☉. f. Cap d. guten Hoffn.

Capparis T., Kaper, XIII. I., Capparideae.

- acuminata W., zugespitzte, ☿. w. Ostindien,
 acutifolia Swt., spitzblättrige, ☿. w. Südamerika.
 aegyptiaca Lam., ägyptische, ☿. w. t. Aegypten.
 amygdalina Lam., mandelähnliche, ☿. w. Westindien.
 aphylla Roth., blattlose, ☿. w. Ostindien.
 auriculata Lod. C., geöhrt, ☿. w. ?
 Baducca L., Baducca K., ☿. w. Ostindien.

Capparis

- Brassii DC., Brass's, f. w. Westafrika.
 Breynia L., Breyn's, f. w. Westindien.
 ceylanica L., ceylonische, f. w. Ceylon.
 chinensis G. Don, chinesische, f. w. China.
 citrifolia Lam., citronenblättrige, f. w. Südafrika.
 cynophallophora Mill. (*flexuosa* L.), langfrüchtige, f. w.
 Eustachyana Jacq. St., Eustachische, f. w. Caraibische Inseln.
 ferruginea L. (*octandra* Jacq.), rostfarbige, f. w. Westindien.
 Fontanesii DC. (*ovata* Dsf.), Desfontaine's, f. t. k. Süd-europa, Nordafrika.
 frondosa Jacq., belaubte, f. w. Carthagen, Domingo.
 herbacea W. (*ovata* MB.), krautartige, 4. k. Taurien, Caucasus.
 jamaicensis Jacq., jamaische, f. w. Jamaica.
 linearis Jacq., linienblättrige, f. w. Westindien,
 longifolia Sw., langblättrige, f. w. Jamaica.
 mariana Jacq., marianische, f. w. Marianen-Inseln.
 odoratissima Jacq., wohlriechende, f. w. Hispaniola, Südamerika.
 peltata Lock., schildförmige, f. w. Trinidad.
 pulcherrima Jacq. (*arborescens* Mill.), schöne, f. w. Südamerika.
 saligna Vahl, weidenblättrige, f. w. Caraibische Inseln.
 sepiaria L., Hecken-K., f. w. Ostindien.
 spinosa L., gemeine dornige, f. k. t. Südeuropa, Nordafrika.
 tenuisiliqua Jacq., dünnschotige, f. w. Südamerika.
 torulosa Sw., höckerige, f. w. Westindien.
 triflora Mill., dreiblumige, f. w. Südamerika.
 undulata Lod. C., wellenblättrige, f. w. ?
 verrucosa Jacq., warzige, f. w. Carthagen.
heteroclita Roxb. v. *Niebulria longifolia*, *Morisonia* Sw. v. *Morisonia americana*. *paradoxa* Jacq. v. *Stephania cleomoides*. *trifoliata* Roxb. v. *Crataeva* Roxburghii.

Capraria L., Herzblume, XIV. II., Personatae - Antirrhineae.

- biflora L., zweiblumige, 4. w. Westindien, Südamerika.
 cuneata RB., keilblättrige, f. w. Südamerika.
 humilis Ait., niedrige, ①. w. Ostindien.
 lanceolata L. suppl., lanzettblättrige, f. k. Cap der guten Hoffnung.
 undulata L. suppl., wellenblättrige, f. k. t. C. d. g. H.
durantifolia L. v. *Stemodia durantifol.* *lucida* Ait. v. *Teedia lucida*.

Caprifolium T. v. Lonicera.**Capsella Med., Hirtentäschel, XV. II., Cruciferae.**

- Bursa pastoris, Mch., gemeines, ①. f. Europa etc.
 pauciflora Koch, wenigblumiges, ①. f. Südtirol.
 procumbens Fr. (*elliptica* C. A. Mey.), niederliegendes, ①. f. Schweden, Thüringen, Spanien, Taurien.

Capsicum T., Beifsbeere (spanischer Pfeffer), V. I., Solanaceae.

- angulosum Mill., kantigfrüchtige, ①. m. f. Ostind., Südamer.
 annuum L., einjährige (gemeine), ①. m. f. Ostid., Südamer.
 baccatum L., rundfrüchtige, f. w. Ostindien.
 bicolor Jacq. (*violaceum* Hort., *nigrum* W.), zweifarbige, f. w. Westindien.

Capsicum

β) *purpureum* Hornem.

cerasiforme W., kirschfrüchtige, ♀. w. ? Westindien.

chinense L., chinesische, ♀. w. China.

ciliare W. (? *cerasiflorum* Lk.), gefranzte, ♀. w. ?

conicum Lam., kegelfrüchtige, ☉. m. f. Guiana.

conoides Mill., kegelnährliche, ♀. w. Ostindien, Südamer.

cordiforme Mill., herzförmige, ☉. m. f. Ostind., Südamer.

frutescens L., strauchige, ♀. w. Ostindien.

b) *torulosum* Jacq.

globiferum Mey., kugelfrüchtige, ♀. w. Guiana.

grossum W., dicke, ☉. ♂. w. Ostindien.

β) *globosum*. c) *luteum*.

longum DC., langfrüchtige, ☉. m. f. Ostindien.

luteum Lam., gelbfrüchtige, ♀. w. Ostindien.

micranthum Lk., kleinblumige, ♀. w. Brasilien.

microcarpum DC., kleinfrüchtige, ♀. w. ?

Milleri R. et S. (*cerasiforme* Mill.), Miller's, ☉. m. f.

Westindien.

ovatum DC., eiförmige, ♀. w. ?

pendulum W., hängende, ♀. w. ?

pyramidale Mill., pyramidenförmige, ♀. w. Aegypten.

sphaericum W., rundfrüchtige, ♀. w. ?

tetragonum Mill., vierkantige, ☉. m. f. Ostindien.

ustulatum Paxt., brandige, ☉. m. f. Chili.

Gartenvarietäten: *falcatum*, *teretiusculum*, *tomatiforme* etc.

Caragana Lam., Erbsenbaum, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

Altagana Poir., dahurischer, ♀. f. Dahurien.

arborescens Lam., baumartiger, ♀. f. Sibirien.

b) *inerinis*.

arenaria Sims, Sand-E., ♀. f. Sibirien.

Chamlagu Lam., chinesischer, ♀. f. b. Nordchina.

frutescens DC., strauchiger, ♀. f. Podol., Caucas., Mittelas.

a) *angustifolia*. b) *latifolia*.

grandiflora DC., großblumiger, ♀. f. Georgien.

jubata Poir., bemähter, ♀. f. b. Dahurien.

microphylla DC., kleinblättriger, ♀. f. Sibirien.

mollis Bess., weicher, ♀. f. Podol., Bessarab., Caucas.

pygmaea DC., zwergiger, ♀. f. Sibir., Mongol., Nordchina.

Redowskii DC. (Fisch.), Redowski's, ♀. f. Sibirien.

b) *praecox*.

spinosa DC. (*ferox* Lam.), dorniger, ♀. f. Sibirien.

b) *albida*.

tragacanthoides Poir. (*macracantha* Lod.), tragantähnlicher, ♀. Sibirien.

glomerata Booth Cat. et *mongolica* Hort. sind nicht in das System aufgenommen.

Caraguata Plum. (südamerikanischer Name), VI. I., Bromeliaceae.

lingulata Lindl., zungenblättrige, 4. w. Mittägliches Amerika, Jamaica.

Carallia Roxb. (hindostanisch. Name), X. I., Rhizophoreae.

lucida Roxb., glänzende, ♀. w. Ostindien.

Caralluma RB. (ostind. Name), V. II., Asclepiadeae.

adscendens RB., aufsteigende, ♀. 4. w. Ostindien.

umbellata Haw., doldige, ♀. 4. w. Ostindien.

Carapa Aubl. (guianischer Name), X. 1., Hesperideae-Meliaceae.

guianensis Aubl., guianische, f. w. Guiana.

guineensis G. Don, guineische, f. w. Sierra Leone.

moluccensis Lam., moluckische, f. w. Molucken.

procera DC., hohe, f. w. Westindien.

Cardamine T., Schaumkraut, XV. III., Cruciferae.

africana L., afrikanisches, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

alpina W., Alpen-S., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

amara L., bitteres, 4. Wa. f. Europa, Sibirien.

β) hirta Wimm. et Grab. (*pubescens* Lej. *umbrosa* Lej. *Libertiana* Lej.). γ) subalpina Koch (*Opicii* Presl.).

asarifolia L., haselwurzblättriges, 4. f. Südeurop. Alpen.

bellidifolia L., maßliebenblättriges, 4. f. Nordeuropäische Alpen, Nordamerika, Sibirien.

chelidonia L., schöllkrautblättriges, 4. f. Croatien, Ital.

chilensis DC., chilesisches, 4. k. Chili.

granulosa All., körniges, 4. Wa. f. Oberitalien.

hirsuta (*umbrosa* Andr.), rauhhaariges, 4. f. Europa.

impatiens L., Spring-S., ♂. f. Europa, Mittelasien.

latifolia Vahl, breitblättriges, 4. Wa. f. Spanien, Italien.

macrophylla W., großblättriges, 4. f. Sibirien.

maritima Portenschl., Meerstrands-S., ♂. f. Südeuropa.

microphylla Adam, kleinblättriges, 4. f. Nordsibirien.

parviflora L., kleinblumiges, 4. f. Nord-, Ost- u. Südeuropa, Nordamerika.

pennsylvanica Mühlbg., pennsylvanisches, 4. f. Pennsylvanien.

pratensis L., Wiesen-S., 4. f. Europa, Nordas. u. Amer.

β) dentata Schult. (*sylvatica* Bess.). b) fl. pleno.

c) fl. albo pleno A. P.

prorepens Fisch., kriechendes, 4. Wa. f. Ostsibirien.

resedaefolia L., resedablättriges, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

rhomboidea DC., rautenförmiges, 4. f. Nordamerika.

rotundifolia Mchx., rundblättriges, 4. f. Nordamerika.

sylvatica Lk., Wald-S., 4. f. Europa.

thalictroides All., wiesenrautenähnliches, ♂. f. Istrien, Oberitalien.

trifolia L., dreiblättriges, 4. f. Oesterreich etc. Ungarische Alpen.

uliginosa MB., Sumpf-S., 4. Wa. f. Taurien, Sibirien.

carnosa W. K. (et *glauca* Spgl., *graeca* L.) vid.

Pteroneuron carnosum, graec. *nivalis* Pall. v. *Macropodium nivale*.

Cardiospermum L., Herzsame, VIII. III., Sapindacei.

canescens Wall., weißsgraulicher, 4. Sch. w. Ostindien.

coluteoides H. B. K., blasenstrauchähnlicher, f. 4. Sch. w. Südamerika.

Corindum L., brasilianischer, 4. Sch. w. Brasilien.

grandiflorum Sw., großblumiger, 4. Sch. w. Jamaica.

Halicacabum L., glatter, 4. Sch. w. Ost- u. Westindien.

hirsutum W., rauhhaariger, 4. Sch. w. Guinea.

pubescens Lagasc., weichhaariger, f. 4. Sch. w. Neuspan.

Cardopatum corymbosum Juss. v. *Brotera corymbosa*.

Carduncellus Adans., Zwergdistel, XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

caeruleus DC., blaue, 4. k. Griechenland, Corsica, Westeuropa, Nordafrika.

β) tingitanus DC.

Carduncellus

- mitissimus DC., unbewehrte, 4. f. Frankreich.
 monspeliensium All., französische, 4. f. Südfrankreich,
 Spanien, Italien.
 pinnatus DC., gefiederte, 4. k. f. b. Sicil., Nordafrika.
 β) acaulis Guss. γ) humilis DC.

Carduus T., Distel, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.
I. Genuini.

- acanthoides L., krebssdistelartige, ♂. f. Europa, Taurien.
 arabicus Jacq., arabische, ♂. f. Griechenland, Arabien, Sicilien.

- arctioides W., klettenähnliche, 4. f. Kärnthen, Krain, Croat.
 Argemone Pourr., stachelmohnähnliche, 4. f. Pyrenäen.
 argentatus L., silberweißse, ♂. f. Aegypten, Griechenl.
 argyrea Bivon., silberfarbige, ♂. f. Sicilien.

β) fastigiatus Moris.

- candicans W. Kit., weißliche, ♂. f. Ungarn, Siebenb.
 carlinaefolius Lam., eberwurzblättrige, 4. f. Südfrankr.
 carlinoides Gouan, eberwurzähnliche, ♂. f. Pyrenäen,
 Piemont.

- chrysacanthus Tenor., goldstachelige, 4. f. Neapel.

- cinereus MB., aschgraue, ♂. f. Taurien.

- collinus W. K., Hügel-D., ♂. f. Ungarn.

- corymbosus Tenor., traubendoldige, ♂. f. Neapel.

- crispus L., krause, ♂. f. Europa, Sibirien, Nordchina.

β) multiflorus Gaud. (*polyanthemos* Schlr.).

- defloratus L., Wald-D., 4. f. Mitteleuropa.

β) alpestris W. K. γ) cirsioides Vill. (*spinulosus* Bertol.).
 δ) rhaeticus Thom. ε) transalpinus Sut. (*glaucophyllus* Hortul.).
 ζ) sumanus Poll. (*crassifolius* W. E.).

- dubius Balb., zweifelhafte, 4. f. ?

- glaucus Ledeb., blaugrüne, 4. f. ?

- hamulosus Ehrh., kurzhackige, ♂. f. Ungarn, Siebenbürgen, Podolien.

- Hystrix C. A. Meyer, starkstachelige, ♂. f. Caucasus.

- lanuginosus W., wollige, ♂. f. Armenien.

- macrocephalus Desf., grofsköpfige, ♂. f. Nordafrika, Neapel, Taurien.

- medius Gouan, mittlere, 4. f. Pyrenäen.

- neglectus Tenor., übersehene, ♂. f. Neapel.

- nigrescens Vill., schwärzliche, ♂. f. Frankreich.

- nutans L. (*apenninus* Jan., *montosus* Poll.), nickende, ♂. f. Europa.

b) flore albo.

- onopordioides Fisch., onopordumähnliche, 4. f. Iberien.

- Personata Jacq., klettenartige, ♂. f. Mitteleurop. Alpen.

- platylepis Saut., breitschuppige, ♂. f. Tyrol.

- podacanthus DC., flügelstachelige, ♂. f. Dauphiné, Pers.

- seminudus MB., halbnackte, ♂. f. Taurien.

- tenuiflorus Curt., Sm., dünnblumige, ♂. f. Nord- und Südeuropa, Taurien, Madeira.

- tenuifolius Gaud. (*crassifolius* Hornem., *pannonicus* Schlch.), dünnblättrige, 4. f. Schweiz.

β) albidus MB. γ) pycnocephalus L.

- uncinatus MB., hackige, ♂. f. Taurien.

II. Clavena DC.

- canariensis DC. (*clavulatus* Lk.), ♂. f. Canarische Inseln.

- squarrosus DC., sparrige, ♂. f. Canarische Inseln.

Acarna L. v. *Picnomon* *Acarna*. *acaule* L. etc. v.

Carduus

Cirsium acaule etc. *asfer* Jacq. etc. vid. *Chamaepeuce* *afra* etc. *alatus* Don vid. *Jurinea* *alata*. *atriplicifol.* Trevir. vid. *Rhaponticum* *atriplicifol.* *benedictus* Cam. v. *Cnicus* *benedictus*. *cyanoides* L. etc. v. *Jurinea* *cyanoid.* etc. *leucanthus* Cav. v. *Serratula* *leucantha*. *leucographus* L. v. *Tyrimnus* *leucographus*. *Marianus* L. v. *Silybum* *Marianum*. *orientalis* Adam. (et *wolgensis* MB.) etc. v. *Cousinia* *carduiformis* etc. *pygmaeus* Jacq. etc. v. *Saussurea* *pygmaea* etc. *pyrrochroos* Less. vid. *Erythrolaena* *conspicua*. *syriacus* L. v. *Notobasis* *syriaca*. Hinsichtlich der übrigen s. *Cirsium* u. *Serratula*.

- Carex** Dill., Segge (Riedgras), XXI. III., Cyperaceae.
acuminata W. (*cuspidata* Host.), zugespitzte, 4. f. Istrien.
acuta L., spitze, 4. f. Europa, Nordamerika.
alba Scop. (*nemorosa* Schrk.), weißse, 4. f. Süddeutschland, Nordamerika.
alpestris All. (*gynobasis* Vill., *diversiflora* Host.), Vor-alpen-S., 4. f. Mittel- und Südeuropa.
amblyocarpa W. (*Micheliana* Sm.), stumpffrüchtige, 4. f. Italien, England.
ampullacea Good., flaschenfrüchtige, 4. f. Europa.
anceps Mühlbg., zweischneidige, 4. f. Nordamerika.
angustifolia Sm., schmalblättrige, 4. f. Schottland.
appressa RB., angedrückte, 4. k. Neusüdwallis.
aquatis Wahlenb., wasserliebende, 4. f. Lappl., Schwed.
arenaria L., Sand-S., 4. f. Europa.
aterrima, Hoppe, violett-schwarze, 4. f. Mitteleurop. Alpen.
atrata L., schwärzliche, 4. f. Europäische Alpen.
axillaris Good., achselständige, 4. f. Norddeutschland, England, Japan.
baldensis L., baldische, 4. f. Süd-Tyrol.
Bertolonii Schk. (*cuspidata* Bertol), Bertolone's, 4. f. Ital.
bicolor All. (*androgyna* Balb.), zweifarbig, 4. f. Schweizer, Tyroler, Piemonteser Alpen, Lappland.
binervis Sm., zweinervige, 4. f. Norddeutschland, Frankreich, England, Schweden.
Boenninghausiana Weihe, Boenninghausen's, 4. f. Westphalen.
brizoides L., zittergrasähnliche, 4. f. Europa.
bullata W., bauschige, 4. f. Nordamerika.
Buxbaumii Wahlenb. (*polygama* Schk.), Buxbaum's, 4. f. Nord- und Mitteldeutschland, Schweiz.
caespitosa L., rasenartige, 4. f. Europa.
canescens L. (*curta* Good.), grauliche, 4. f. Europa.
β) brunnescens P. (*Gebhardi* Hoppe, *Personii* Sbr.).
capillaris L., haarförmige, 4. f. Europäische Alpen.
capitata L., kopfförmige, 4. f. Scandinavien, Baiern, Tyrol.
chordorrhiza Ehrh., langwurzelige, 4. f. Nord- und Süddeutschland, Schweiz, Schweden.
clavaeformis Hoppe, keulförmige, 4. f. Kärnthen.
conglobata Kit., zusammengeballte, 4. f. Ungarn.
corsicana Lk., corsische, 4. f. Corsica.
crinita Lam., beinähnte, 4. f. Nordamerika.
curvula All., gekrümmte, 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Siebenbürgen, Caucasus.
cyperoides L., cypergrasähnliche, 4. f. Deutschl., Sibir.
Davalliana Sm., Davall's, 4. f. Europa.
depauperata Good. (*triflora* W., *monilifera* Thuill.),

Carex

- arnblumige, 4. f. England, Mittelfrankreich.
 digitata L., fingerförmige, 4. f. Europa.
 dioica L., zweihäusige, 4. f. Europa, Nordamerika.
 distans L., entferntblumige; 4. f. Europa.
 disticha Huds. (*intermedia* Good.), zweizeilige, 4. f. Europa.
 divisa Huds. Good., unterbrochenährige, 4. f. England, österreichisches Litorale.
 divulsa Good., entferntährige, 4. f. England, Nord- und Süddeutschland, Caucasus.
 Ecklonii N. B., Ecklon's, 4. k. Cap der guten Hoffn.
 elongata L., verlängerte, 4. f. Europa.
 ericetorum Poll. (*ciliata* W.), Heide-S., 4. f. Deutschland, Schweden.
 erythraea Schrad., röthliche, 4. f. k. Nepal.
 evoluta Hartm. (*Kochiana* Schübl. et Mart.), ausgewickelte, 4. f. Scandinavien, Württemberg.
 extensa Good. (*Balbisi* Schk.), erweiterte, 4. f. Norddeutschland, österreichisches Litorale.
 ferruginea Scopol. (*Mielichhoferi* Schk., *Scopolii* Gaud.), rostfarbige, 4. f. Europäische Alpen.
 festucacea W., schwingelartige, 4. f. Nordamerika.
 filiformis Good. (*lasiocarpa* Ehrh.), fadenförmige, 4. f. Europa.
 firma Host., hartblättrige, 4. f. Mittel- u. osteurop. Alpen.
 flava L., hellgelbe, 4. f. Europa, Nordamerika.
 β) patula Host.
 flexuosa Mühlbg. (*tenuis* Rudg.), gebogene, 4. f. Nordamerika.
 foenea W., Heu-S., 4. f. Nordamerika.
 foetida Hall. All., stinkende, 4. f. Schweiz, Südtirol etc.
 formosa Dewey, schöne, 4. f. Nordamerika.
 Fraseri Sims, Fraser's, 4. f. k. Nordcarolina.
 frigida All., kalte, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
 fuliginosa Schk., rußige, 4. f. Salzburg, Kärnthen.
 fulva Good., gelbbraune, 4. f. Nordeuropa, Deutschl.
 Gaudiniana Guthnick, Gaudin's, 4. f. Schweiz, Tyrol.
 glareosa Wahlenb., kiesliebende, 4. f. Scandinavien.
 glauca Scop. (*recurva* Huds., *flacca* et *pendula* Schreb.), blaugrüne, 4. f. Europa.
 globularis L., kugelfrüchtige, 4. f. Lappland.
 granularis Mühlbenb., körnige, 4. f. Nordamerika.
 Grypus Schk., kleinährige, 4. f. Wallis.
 gynomane Bertol. (*Linkii* Schk., *distachya* Dsf.), zweijährige, 4. f. Istrien, Oberitalien.
 Heleonastes Ehrh., concavfrüchtige, 4. f. Lappland. Baiern, Salzburg.
 hirta L., rauhhaarige, 4. f. Europa.
 hordeiformis Wahlb. (*secalina* W.), gerstenähnliche, 4. f. Unterösterreich, Litorale.
 Hornschuchiana Hoppe (*speirostachya* Sm.), Hornschuch's, 4. f. Europa.
 humilis Leyss. (*clandestina* Good.), niedrige, 4. f. Europa.
 incurva Light. (*juncifolia* All.), einwärtsgekrümmte, 4. f. Mittel- und nordeuropäische Alpen.
 inversa RB., umgekehrte, 4. k. Neuholland.
 irrigua Sm., Wahlbg., Wasser-S., 4. f. Nord- und mitteleuropäische Alpen.
 juncea W., simsenförmige, 4. f. Nordamerika.

Carex

laevigata Sm. (*biligularis* DC.), glatte, 4. f. Norddeutschland, England, Belgien, Frankreich.

lagopina Wahlenb. (*leporina* W., *Lachenalii* Schk., *approximata* Hoppe), Rypen-S., 4. f. Nord- und mitteleuropäische Alpen.

lagopodioides W., stumpfährige, 4. f. Nordamerika.

leporina L. (*ovalis* Good), Hasen-S., 4. f. Europa.

β) *argyroglochin* Hornem.

limosa L., Schlamm-S., 4. f. Europa.

loliacea L. (*tenella* Schk.), lolchähnliche, 4. f. Schweden, Norddeutschland.

longifolia Host. (*umbrosa* Hoppe, *polyrrhiza* Wallr.), langblättrige, 4. f. Mittel- und Süddeutschland.

longipes D. Don, langstielige, 4. k. f. b. Nepal.

lucorum W. (? *Collinsii* Nutt.), Hain-S., 4. f. Nordamer.

maritima Müll., Meerstrands-S., 4. f. Norwegen, Island.

maxima Scop. (*agastachys* Ehrh., *pendula* Good.), größte, 4. f. Europa.

membranacea Hoppe, häutige, 4. f. Kärnten, Schweiz.

Michellii Host., Michelis, 4. f. Ost- u. Südeuropa, Cauc.

microglochin Wahlenb., grannige, 4. f. Scandinavien, Baiern, Wallis.

microstachya Ehrh., kleinährige, 4. f. Schweden, Norddeutschland.

montana L. (*collina* W.), Berg-S., 4. f. Europa.

mucronata All., stachelspitzige, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

Mühlenbergii W., Mühlenberg's, 4. f. Nordamerika.

multiflora Mühlenb., vielblumige, 4. f. Nordamerika.

muricata L., weichstachelige, 4. f. Europa.

β) *virens* Lam. (*loliacea* Auctor, *nemorosa* Lumn.),

nepalensis Spgl. (*macrolepis* D. Don), nepal'sche, 4. f. k. Nepal.

nigra All., schwarze, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

nitida Host., glänzende, 4. f. Oesterreich, Krain, südliches Tyrol, Istrien.

norwegica Wahlenb., norwegische, 4. f. Scandinavien.

nutans Host., überhängende, 4. f. Oesterreich.

Oederi, Ehrh., Oeder's, 4. f. Europa.

ornithopoda Willd, vogelkrallige, 4. f. Europa.

pallescent L., bleiche, 4. f. Europa.

paludosa Good. (*acutiformis* Ehrh.), Sumpf-S., 4. f. Europa.

β) *Kochiana* DC. (*spadicea* Roth.).

panicea L., fennichähnliche, 4. f. Europa.

paniculata L., rispige, 4. f. Europa.

paradoxa W., wunderbare, 4. f. Schweden, Deutschland, Ungarn.

pauciflora Lightf. (*leucoglochin* L. suppl.), wenigblumige, 4. f. Mittel- und Nordeuropa.

pennsylvanica Lam. (*varia* Mühlbg.), pennsylvanische, 4. f. Nordamerika.

peregrina Lk., fremde, 4. w. Congo.

phaeostachya Sm. (*salina* G. Don), braunährige, 4. f. Schottland.

pilosa Scop., weichhaarige, 4. f. Mittel- und Süddeutschland, Italien.

pilulifera L., pillenfrüchtige, 4. f. Europa.

plantaginea Lam. (*latifolia* Schk.), wegrittblättrige, 4. f. k. Nordamerika.

podocarpa RB., stielfrüchtige, 4. f. Nördl. Amerika.

Carex

praecox Jacq. (*stolonifera* Ehrh., *umbrosa* Host.), Frühlings-S., 4. f. Europa.

Pseudo-Cyperus L., unächte Cyper-S., 4. f. Europa, Neuholdland.

pulicaris L. (*psyllophora* L. suppl.), Floh-S., 4. f. Europa.

punctata Gaud., punctirte, 4. f. Salzburg, ital. Schweiz.

pyrenaica Wahlenb. (*spicata* Schk.), pyrenäische, 4. f.

Pyrenäen, Gegend von Leipzig.

rariflora Sm., sparsamblumige, 4. f. Scandinav., Schottl.

remota L., einzelnährige, 4. f. Europa.

rigida Good., starre, 4. f. England, Mitteldeutschland.

riparia Curt. Good. (*crassa* Ehrh.), Strand-S., 4. f. Europa.

rosea Schk., rosafarbene, 4. f. Nordamerika.

rostrata Mühlenb., geschnäbelte, 4. f. Nordamerika.

rotundata Wahlbg. (*globularis* Vahl.), rundfrüchtige, 4. f. Lappland.

rupestris All. (*petraea* Schk.), Felsen-S., 4. f. Europ. Alpen.

salina Wahlbg., Salinen-S., 4. f. Norwegen.

saxatilis L. (*pulla* Good.), Stein-S., 4. f. Nordeuropa, Nordasien.

schoenoides Host. (*austriaca* Schk.), knopfgrasähnliche, 4. f. Unterösterreich.

Schraderi W., Schrader's, 4. f. Galicien.

Schreberi Schrk. (*praecox* Schrbr.), Schreber's, 4. f. Europa.

scoparia W., besenförmige, 4. f. Nordamerika.

scotica Spgl. (*Mielichhoferi* Sm.), schottische, 4. f. Schottl.

secalina Wahlbg., getreideähnliche, 4. f. Nordeuropa.

sempervirens Vill., immergrüne, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

stellulata Good., sternfrüchtige, 4. f. Europa.

stenophylla Wahlbg. (*juncifolia* et *glomerata* Host.), feinblättrige, 4. f. Osteuropa.

stictocarpa Sm., punctfrüchtige, 4. f. Schottland.

stipata Mühlbg., dichtährige, 4. f. Nordamerika.

straminea W., strohfarbige, 4. f. Nordamerika.

stricta Good., steife, 4. f. Nordeuropa, Deutschl., Nordamer.

strigosa Huds. (*leptostachys* Ehrh.), striegelige, 4. f. Norddeutschland, England, Schweiz.

supina Wahlbg. (*campestris* Host.), kleine, 4. f. Deutschl.

sylvatica Huds. (*Drymeja* Ehrh.), Wald-S., 4. f. Europa.

tenuis Host. (*brachystachys* Schk.), dünne, 4. f. Mitteleuropäische Alpen und Voralpen.

teretiuscula Good., rundhalmige, 4. f. Nordeuropa, Deutschland.

β) major.

tomentosa L. (*sphaerocarpa* Ehrh.), filzige, 4. f. Europa, Caucasus.

β) thuringiaca Schk.

ustulata Wahlbg. (*atrofusca* Schk.), brandige, 4. f.

Scandinavische, kärnthner, salzburg. und Krain-Alpen.

vaginata Tausch (*salina* Don, *tetanic* Rehb. *subsp. thacea* Wormskiöld), scheidige, 4. f. England, Schweden, Deutschland (Brocken, Sudeten).

VahlII Schk. (*alpina* Sw.), Vahl's, 4. f. Lappl., Schottl.

vesicaria Huds., blasige, 4. f. Europa.

vulpina L., Fuchs-S., 4. f. Europa.

β) nemorosa W.

Bellardi All. et *myosuroides* Vill. v. *Elyna spicata*.

hybrida Schk. v. *Kobresia caricina*. *uncinata* Sw.

v. *Uncinia jamaicensis*.

- Careya** Roxb. (William Carey, Arzt zu Serampore in Ostindien), XVI. VIII., Myrtaceae.
 arborea Roxb., baumartige, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
 herbacea Roxb., krautartige, 4. w. Ostindien.
 sphaerica Roxb., kugelige, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
- Cargillia** RB. (James Cargill, Arzt zu Aberdeen), VIII. I. (XXIII. II.), Sapotaceae-Ebenaceae.
 australis RB., südliche, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 laxa RB., lockerästige, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
- Carica** L., Melonenbaum, XXII. IX., Cucurbitaceae.
 cauliflora Jacq., stammlumiger, $\frac{1}{2}$ w. Caracas.
 citriformis Jacq. fil., citronenfrüchtiger, $\frac{1}{2}$ w. Guinea.
 digitata Aubl. (*spinosa* W.) fingerblättriger, $\frac{1}{2}$ w. Guiana.
 microcarpa Jacq., kleinfrüchtiger, $\frac{1}{2}$ w. Caracas ? Chili.
 β) monoica Dsf.
 Papaya L., gemeiner, $\frac{1}{2}$ w. Ost- und Westindien.
 pyriformis W., birnförmiger, $\frac{1}{2}$ w. Lima.
- Carissa** L., Carissa, V. I., Contortae-Apocynaceae.
 Carandas L., netzblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
 lanceolata RB., lanzettblättrige, $\frac{1}{2}$ t. w. Neuholland.
 ovata RB., eiblättrige, $\frac{1}{2}$ t. w. Neuholland.
 spinarum L., dornige, $\frac{1}{2}$ w. Molucken.
 Xylopicron Thouar., mascarenische, $\frac{1}{2}$ w. Mascarenas.
Arduina Lam. v. *Arduina hispinosa*.
- Carlina** T., Eberwurz, XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.
 acanthifolia All. (*utzka* Hacq.), bärenklaubblättrige, ♂. 4. f. Krain, Piemont, Frankreich.
 β) *Cynara* Pourr. (*onopordifolia* Bess.), Pyrenäen, Podolien.
 acaulis L. (*Subacaulis* DC.), stengellose, ♂. 4. f. Europa.
 β) caulescens Lam. γ) simplex W. K., aggregata W.
 corymbosa L. (*hispanica* Lam., *Lobeliana* Tausch., *longifolia* Viv., *racemosa* Gouan), traubendoldige, ♂. f. Süd-, Ost- und Westeuropa, Nordafrika.
 Fontanesii DC. (*macrocephala* Less.), Desfontaine's, 4. k. Nordafrika.
 gummifera Less., gummigebende, 4. k. Griechenland, Süditalien, Spanien, Nordafrika.
 lanata L., wollige, ☉. f. Ost-, Süd- und Westeuropa, Nordafrika.
 macrocephala Moris, grofsköpfige, ☉. f. Sardinien, Sicilien.
 nebrodensis Guss. (*longifolia* Rehb. non Viv.), langblättrige, ♂. Tyrol, Vogesen, Sicilien.
 β) monocephala (*Pola* Hacq.). γ) prolifera.
 racemosa L. (*sulfurea* Desf., *radiata* Viv.), traubige, ☉. f. Süditalien, Westeuropa, Nordafrika.
 β) glabriuscula DC. (? *Biebersteinii* Bernh. Hornem.)
 falicifolia Less., weidenblättrige, $\frac{1}{2}$ k. Canarische Ins.
 β) corymbosa (Cass.).
 sicala Tenor. (*bracteata* Presl), sicilianische, ♂. f. k. Sicilien.
 β) purpurascens Jan.
 vulgaris L., gemeine, ♂. f. Europa, Orient.
 β) sublanata DC. (*lanata* Pall.).
Acarna MB. v. *Picnomon* Acarna. *Echinus* MB. v. *Eche-nais carlinoides*. *pyrenaica* L. v. *Carduus carlinoides*.
- Carlowitzia salicifolia* Mch. v. *Carlina salicifol*.
- Carludovicia** R. et Pav. (Carl IV., König v. Spanien, und Louisa, dessen Gemahlin), XXI. IX., Palmae-Cyclanthaeae (Callaceae Alior).

Carludovicia

angustifolia R. et P., schmalblättrige, 4. w. Peru.
funifera (Poit.), schnurähnliche, 4. Sch. w. Trinidad, Guiana.

latifolia R. et P., breitblättrige, 4. w. Peru.

jamaicensis Lod. C., jamaische, 4. Sch. w. Jamaica.

palmata R. et P., handförmige, 4. w. Peru, Neugranada.

Carmichaelia R. B. (Capit. Dugald Carmichael), XVII.

IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

australis RB., neuholländische, 5. t. Neuholland.

Carolinea L. fil. (Princess Sophia Carolina v. Baden),

XVI. VIII., Malvaceae-Bombaceae.

alba Lodd., weisse, 5. w. Brasilien.

insignis Sw., ausgezeichnete, 5. w. Westindien, Südamerika.

minor Sims, kleine, 5. w. Guiana.

princeps L. fil., fürstliche, 5. w. Südamerika.

insignis Hortul. v. *Sciadaphyllum anomalum* G. Don.

Carpesium L., Kragenblume, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

cernuum L., gebogene, 4. f. Süd- und Osteuropa.

pubescens Wall., weichhaarige, 4. f. Nepal.

abrotanoides L., stabwurzähnliche, 4. f. Oesterreich, Litorale, Dalmatien, Caucasus, China, Nepal.

Carpinus T., Hainbuche (Weißbuche), XXI. IX. Amentaceae.

americana Mchx., nordamerikanische, 5. f. Nordamer.

Betulus L., gemeine, 5. f. Europa.

b) *incisa* Lod. (*quercifolia* Dsf., *heterophylla* Hort.)

c) *variegata* Lod.

orientalis Lam. (*duinensis* Scop.), morgenländische, 5. f.

Krain, Ungarn, Caucasus, Armenien.

Ostrya L. et *virginiana* Lam. v. *Ostrya vulgaris* etc.

Carpodinus RB., Rundfrucht, V. I., Apocynae.

dulcis G. Don, süsse, 5. w. Sierra Leone.

Carpodontos (*Carpodon* Spgl.), La Bill, Fruchtzahn, XIII. v., Hypericineae.

lucidus La Bill, glänzender, 5. t. Nördl. Neuholland.

Carpopogon *giganteus* Roxb. et *imbricatus* Roxb. v. *Mucuna gigantea* et *imbricata*.**Carrichtera** Adans. Carrichtera, XV. III., Cruciferae.

Vellae DC., jährige, ☉. f. England, Südeuropa.

Carthamus T., Saflor., XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

tinctorius L., färbender, ☉. f. Ostindien, Aegypten.

Oxyacantha MB., starkstacheliger, ☉. f. Caucasus, Persien, Ostindien.

arborescens L., *creticus* L. etc. v. *Kentrophyllum*

arborescens etc. *cynaroides* MB. v. *Cousinia cyna-*

roides, *integrifolius* Hortul. v. *Carlina salicifolia*.

mitissimus L. (et *Carduncellus* L.) v. *Carduncellus*

mitissimus et *monspel.*

Cartonema RB., Kahlfaden, VI. I., Commelineae.

spicatum RB., ähriger, 4. w. Neuholland.

Carum R., Kümmel (Karbe), V. I., Umbelliferae.

Bulbocastanum Koch, Erdnuß-K., 4. f. Mittel- und Südeuropa.

Carvi L., gemeiner, ♂. f. Europa.

divaricatum Koch, sparriger, 4. f. Istrien.

Carum

verticillatum Koch, wirtelförmiger, 4. f. England, Südeuropa.

Bunius L. v. *Ptychotis heterophylla*.

Caruncularia Haw. v. *Stapelia*.

Carya Nutt., Hickorynußs, XXI. ix., Amyrideae-Iuglandaceae.

alba Nutt. (*compressa* G. Don), weiße, 5. f. Nordamer.

amara Nutt., bittere, 5. f. Nordamerika.

aquatica Nutt., Wasser-H., 5. f. Nordamerika.

integrifolia Spgl., ganzblättrige, 5. f. Louisiana.

microcarpa Nutt., kleinfrüchtige, 5. f. Pennsylvanien.

myristicaeformis Nutt., muscatnußsähnliche, 5. f. Südcarolina.

olivaeformis Nutt., olivenfrüchtige, 5. f. Louisiana.

porcina Nutt. (*obcordata* Swt.), Ferkel-H., 5. f. Nordamer.

β) glabra (Mühlbg.).

? rigida Loud. (Lod. C.), starre, 5. f. Nordamerika.

sulcata Nutt., gefurchte, 5. f. Nordamerika.

tomentosa Nutt., filzige, 5. f. Nordamerika.

β) maxima Swt. γ) pubescens (W.).

Caryocar L., Butternußs, XIII. iv., Malvaceae-Bombaceae (Rhizoboleae).

glabrum P., glatte, 5. w. Guiana.

nuciferum L., ächte, 5. w. Guiana.

tomentosum W., filzige, 5. w. Guiana.

Caryophyllus T., Gewürznelkenbaum, XII. i., Myrtaceae.

aromaticus L., gewöhnlicher, 5. w. Moluckische Inseln.

Caryota L., Brennpalme, XXI. ix. (XIII. iii.), Palmae.

horrida Jacq., stachelige, 5. w. Südamerika.

mitis Lour., unbewehrte, 5. w. China.

urens L., ächte, 5. w. Ostindien, moluckische Inseln.

Casearia Jacq. (J. Casearius, Mitarbeiter am Hort. malabar.), X. i., Amygdalaceae-Samydeae.

hirsuta Sw., rauhhaarige, 5. w. Jamaica.

parviflora W., kleinblumige, 5. w. Westindien.

parvifolia W., (*decandra* Jacq.), kleinblättrige, 5. w. Martinique.

ramiflora Vahl, astblumige, 5. Westindien, Guiana.

serrulata Sw., sägezähnige, 5. w. Jamaica.

sylvestris Sw., Wald-C., 5. w. Jamaica.

Cassandra D. Don (*Baumannia* DC. Hort. Genev. *Diplaria* Rafin.), Cassandra, X. i., Ericaceae.

angustifolia D. Don, schmalblättrige, 5. f. b., Nordamer.

β) anomala (Vent.).

calyculata G. et D. Don, gekelchte, 5. f. Nordeuropa, Nordasien und Amerika.

a) ventricosa Sims. b) latifolia Lod. c) nana Sims.

Cassia T. (arabischer Name), X. i., Leguminosae-Caesalpinieae.

Absus L., Absus-C., ☉. w. Ceylon, inneres Afrika.

acapulcensis H. B. K., Acapulco-C., 5. w. Mexico.

acuminata W. (*Apoucouito* Aubl.), zugespitzte, 5. w. Guiana.

aegyptiaca W., aegyptische, 5. w. Aegypten.

Aeschynomene DC., schampflanzenähnl., ☉. w. Westind.

alata L., geflügelte, 5. w. Westindien.

Cassia

- angustissima Lam., schmalblättrige, ☉. w. Java.
 arenaria H. B. K., Sand-C., ☿. w. Südamerika.
 artemisioides Gaud. DC., beifußähnliche, ☿. t. Neuholl.
 aspera Mühlenb., rauhe, ☉. f. m. Carolina, Georg.
 atomaria L., feinpunktirte, ☿. w. Südamerika.
 auriculata L., geöhrte, ☿. w. Ostindien.
 australis Sims, neuholländische, ☿. t. Neuholland.
 aversiflora Herb., verkehrtblumige, ☿. w. Brasilien.
 bacillaris L., Stöcklein-C., ☿. w. Südamerika.
 Barclayana Swt., Barclay's, ☿. t. Neuholland.
 Berteri Coll., Bertero's, ☿. w. Westindien.
 bicapsularis L., zweikapselige, ☿. t. w. Westindien, Madeira.
 biflora L., (? *geminiflora* Collad.), zweiblumige, ☿. w. Westindien.
 bifoliolata DC., zweiblättrige, ☿. w. Brasilien.
 bracteata L. deckblättrige, ☿. w. Surinam, Westindien.
 brevifolia Lam., kurzblättrige, ☿. w. Madagascar.
 Burmanni DC. (*flexuosa* Burm.), Burmann's, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung.
 capensis Thbg., capische, ☿. t. Cap der guten Hoffn.
 Chamaecrista L., niedrige, ☉. m. f. Westindien, Virgin.
 chinensis Lam., chinesische, ☿. w. China.
 ciliaris Collad., gefranzte, ♂. w. Ostindien.
 ciliata Hoffmsg., gewimperte, ☿. w. Cuba.
 coromandeliana Jacq., coromandelische, ☿. w. Coromandel.
 corymbosa Lam. (*crassifolia* Orteg.), traubendoldige, ☿. w. Buenos Ayres.
 cubensis Hoffmsg., cubensische, ☿. w. Cuba.
 cuspidata H. B. K., feinspitzige, ☿. w. Südamerika.
 diphylla L., zweilappige, ☉. ☿. w. Westindien.
 dispar W., ungleichblättrige, ☿. w. Südamerika.
 elliptica H. B. K., elliptische, ☿. w. Cumana.
 emarginata L., ausgerandete, ☿. w. Westindien.
 fastigiata Vahl, gipfelständige, ☿. w. Ostindien.
 Flindersii Ait., Flinder's, ☿. w. t. Neu-Südwallis.
 floribunda Cav., blüthenreiche, ☿. w. Neuspanien.
 florida Vahl, schönblühende, ☿. w. Ostindien.
 flexuosa L., gebogene, ☉. w. Brasilien.
 frondosa Ait., belaubte, ☿. w. Westindien.
 glandulosa L., drüsige, ☿. w. Westindien.
 glauca Lam., blaugrüne, ☿. w. Ostindien.
 glutinosa DC., klebrige, ☿. t. Neuholland.
 gracilis H. B. K., schlanke, ☿. w. Südamerika.
 Herbertiana Lindl., Herbert's, ☿. w. Barbados.
 hirsuta L., rauhhaarige, ☿. w. Südamerika.
 hirta W., kurzhaarige, ☿. w. Südamerika.
 humilis Collad., niedrige, ♂. w. Südamerika.
 laevigata W. (*grandiflora* Dsf.), glatte, ☿. w. Südamer.
 lanceolata Forsk. (*orientalis* P., ? *Senna* a L.), lanzettblättrige, ☿. Oberaegypten.
 ligustrina L., ligusterblättrige, ☿. w. t. Südamerika, Bahamische Inseln.
 ligustrinoides Schrad., ligusterähnliche, ☿. w. Arabien.
 linearis Mchx., schmalschotige, ☿. k. t. Carolina.
 lineata Sw., linirte, ☿. w. Jamaica.
 longisiliqua L., langschotige, ☿. w. Westindien.
 lotoides H. B. K., schotenkleeähnliche, ☿. w. Südamer.
 macranthera DC., großbeutelige, ☿. w. Brasilien.
 marginata W., randige, ☿. w. Surinam.

Cassia

marilandica L., marilandische, 4. f. Nordamerika.
 mexicana Jacq., mexicanische, ♀. w. Mexico.
 microphylla W., kleinblättrige, ☉. w. Caraibische Ins.
 mimosoides L., sinnpflanzenähnliche, ☉. w. Ceylon.
 mollissima H. B. K., weiche, ♀. w. Südamerika.
 nictitans L., nickende, ☉. w. m. f. Virginien, Westind.
 nigricans Vahl, schwärzliche, ♀. w. Arabien, Aegypten.
 obovata Collad. (*Senna* Lam., *β. italic.* L.), verkehrt-
 eiblättrige, ☉. w. Aegypten.
 obtusata Hayn. (*Senna* Jacq., *italica* Lam.), ♀. w. Aegypt.
 obtusifolia L., stumpfblättrige, ☉. w. Jamaica, Cuba.
 occidentalis L. (*glaucescens* Hoffmsg.), westindische, ♀. w.
 Westindien, Südamerika.

β) homophylla Hoffmsg.

pallida Vahl, bleichblumige, ♀. w. Südamerika.
 Parkeriana DC., Parker's, ♀. w. Demerara.
 patula Ait., ausgebreitete, ♀. w. Westindien.
 pendula Humb., hängende, ♀. w. Südamerika.
 pentagona Mill., fünfkantige, ♂. w. Peru.
 pilosa L., behaarte, 4. w. Jamaica.
 planisiliqua L., plattschotige, ♀. w. Westindien, Südamer.
 polyphylla Jacq., vielblättrige, ♀. w. Westindien.
 procumbens L., niederliegende, ☉. f. m. Virgin., Carolina.
 prostrata Humb., gestreckte, 4. w. Mittägl. Amerika.
 puberula H. B. K., wenighaarige, ♀. w. Neugranada.
 pubescens Jacq., weichhaarige, ♀. w. Südamerika.
 pulchella Boj., schöne, ♀. w. t. Mascarenas.
 pumila Lam., kleine, ☉. w. m. f. Ostindien, China, Japan.
 purpurea Carey, purpurfarbige, ♀. w. Bengalen.
 quinquangularis Rich., fünfeckige, ♀. w. Cayenne.
 reticulata W., netzförmige, ♀. w. Brasilien.
 Richardiana H. B. K., Richard's, ♀. w. Cumana.
 robinoides W., schotendornähnliche, ♀. w. Südamerika.
 ruscifolia Jacq., mäusedornblättrige, ♀. t. Madeira.
 sennoides Jacq., sennaähnliche, ♀. w. Ostindien.
 sericea Sw. (*sensitiva* Jacq.), seidenhaarige, ☉. w. Jamaica.
 Sophora L., sophoraähnliche, ♀. w. Ostindien, Südchina,
 Aegypten.
 speciosa Schrad., prächtige, ♀. w. Brasilien.
 spectabilis DC., ansehnliche, ♀. w. Caracas.
 stipulacea Ait., zwischenblättrige, ♀. w. Chili.
 suffruticosa Kön., halbstrauchige, ♀. w. Ostindien.
 sulcata DC. (*cernua* Balb.), gefurchte, ♀. w. Südamer.
 sulfurea DC. (*arborescens* Vahl), schwefelgelbe, ♀. w.
 Südamerika.
 Tagera Lam., Tagera-C., ♂. w. Ostindien.
 Tarantan H. B. K., Tarantan-C., ♀. w. Cumana.
 tenella H. B. K., zarte, ♀. w. Südamerika.
 Thonningii DC., Thonning's, ☉. w. Guinea.
 tomentosa L. (*multiglandulosa* Jacq.), filzige, ♀. w. Südamer.
 Tora L., viereckigfrüchtige, ☉. w. Ostindien, Arabien.
 torosa Cav. (*chinensis* Jacq.), angeschwollene, ♀. w. t.
 Nordchina.
 triflora Jacq., dreiblumige, ☉. w. Westindien.
 viminea L., peitschenförmige, ♀. w. Jamaica.
 virgata Sw., ruthenartige, ♀. w. Westindien.
 Wallichiana DC. (*dimidiata* Roxb.), Wallich's, ☉. m. f.
 Nepal.

Fistula L. v. *Cathartocarpus* *Fistula*.

Cassia

grandis L. suppl. v. Cathartoc. brasil. *marginata* Roxb. v. Cathartoc. Roxburghii. *speciosa* H. B. K. v. Cathartoc. Humboldtianus.

Cassine L., Cassine, V. III., Aquifoliaceae.

aethiopica Thbg., aethiopische, ♀. t. Südafrika.
barbara L., fremde, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
capensis L., capische, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
Colpoon Thbg., langrispige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
discolor Wall., verschiedenfarbige, ♀. w. Silhet.
excelsa Wall., hohe, ♀. t. Nepal.
Maurocenia L., lederblättrige, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.
laevigata Lam. v. *Celastrus tricuspidatus. xylocarpa* Vent. v. *Elaeodendrum xylocarp.*

Cassinia R. B. (Heinrich Cassini, berühmter französischer Botaniker), XIX. v., Compositae-Eupatorineae.

affinis RB., ähnelnde, ♀. t. Neuholland.
aurea RB., goldfarbige, ♀. t. Neuholland.
leptophylla RB., schmalblättrige, ♀. t. Neuseeland.
longifolia RB., langblättrige, ♀. t. Neuholland.
?speciosa Ait., prächtige, 4. ♀. t. Neuholland.
aurea H. Kew. v. *Angianthus tomentosus* Nachtr.
spectabilis var. RB. v. *Apalochlamys* Billardieri, Nachtr.
spectabilis Ker. v. *Apalochlam. Kerrii* Nachtr.

Cassiope D. Don, Cassiope, X. I., Ericaceae.

ericoides D. et G. Don, heideähnliche, ♀. f. k. Sibirien, Dahurien.
fastigiata D. et G. Don, gipfelständige, ♀. k. Nepal, Nordchina.
hypnoides D. et G. Don, moosähnliche, ♀. f. k. Nördliches Europa, Asien und Amerika.
Mertensiana D. et G. Don, Mertens's, ♀. f. k. Sitcha.
Redowskii G. Don, Redowski's, ♀. f. k. Ostsibirien.
tetragona D. et G. Don, vierkantige, ♀. f. k. Nördliches Europa und Amerika.

Cassytha L., Schlinglorbeer, IX. I., Laurineae, *filiformis* L., fadenförmige, 4. Sch. w. Ostindien, Südafrika. *glabella* RB., glatte, 4. Sch. t. w. Neuholland.**Castanea** T., Kastanie (Maronenbaum), XXI. IX., Amentaceae.

chinensis Spgl., chinesische, ♀. k. f. b. China, Cochinchina.
indica Roxb., indische, ♀. w. Ostindien.
pumila Mchx., niedrige, ♀. f. Nordamerika.
vesca G., gemeine, ♀. f. Südeuropa, Nordamerika.
 β) *americana* P. b) *asplenifolia* Lodd. C. (*heterophylla laciniata* et *salicifolia* Hort.). c) *cochleata* Lodd. d) *glabra* Lodd. (*lucida* Hort.), *glauca* A. B., *variegata* A. B. (*foliis aureo varieg.* Lodd. C.)

Castanospermum Cun., Kastaniensame, XVII. IV. (VI), Leguminosae-Caesalpinieae.

australe Cun., neuholländischer, ♀. t. Neuholland.

Castela Turp. (M. Castel, Verfasser eines Gedichts über Pflanzen), V. III. (I.), Tricoccae-Ochnaceae.

erecta Turp., aufrechte, ♀. w. Westindien.

Castilleja Mut. (Don Castilleja, spanischer Botaniker), XIV. II., Personatae-Rhinantheae.

integrifolia L. suppl., ganzblättrige, ♀. w. Südamerika.
moranensis Kunth, mexicanische, ♀. w. Mexico.

Castilleja

pallida Spgl. (L.), (*sibirica* Lindl.), sibirische, 4. f. Sibirien.
septentrionalis Lindl., nördlichste, ☉. 4. f. Labrador.
serrata Hort., sägezähnige, ♀. w. ?

sessiliflora Pursh (*grandiflora* Spgl.) v. *Euchroma grandiflora*.

Casuarina L., Casuarbaum (Streitkolbenbaum), XXI. 1., Casuarineae.

distyla Vent., zweigriffeliger, ♀. t. Neuholland.
equisetifolia Forst., schachtelhalmblättriger, ♀. t. Südseeinseln.

glauca Sbr., blaugrüner, ♀. t. Neuholland.

lateriflora Lam., seitenblumiger, ♀. t. Mascarenas.

muricata Roxb., weichstacheliger, ♀. t. Molucken.

nana Sbr. (*pumila* Hort.), zwergiger, ♀. t. Neuholland.

nodiflora Forst., knotenblumiger, ♀. t. Neu-Caledonien.

paludosa Sbr., Sumpf-C., ♀. t. Neuholland.

quadrivalvis La Bill., vierklappiger, ♀. t. Van-Diemens-Land.

stricta Ait. (*truncata* W.), steifer, ♀. t. Neuholland.

tenuissima Sbr., feinästiger, ♀. t. Neuholland.

torulosa Ait., aufgetriebener, ♀. t. Neuholland.

Catabrosa aquatica P. B. v. *Glyceria aquatica*.**Catalpa** Juss., Catalpabaum, II. 1., Bignoniaceae.

cordifolia Mönch. (*syringifolia* Sims), herzblättrige, ♀. f. Carolina, Japan.

longissima Sims, langblättrige, ♀. w. Westindien.

microphylla Spgl., kleinblättrige, ♀. w. Hispaniola.

Catananche T. Vaill., Rasselblume, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

coerulea L., blaue, ♂. 4. f. b. K., West- und Südeuropa, Nordafrika.

β) *bicolor* Penny.

lutea L., gelbe, ☉. f. Griechenland, Ober- und Süditalien, Nordafrika.

Catasetum Rich., Fadenstendel, XX. 1., Orchideae.

atratum Lindl., schwärzlicher, 4. w. Brasilien.

Claveringii Lindl., Clavering's, 4. w. Brasilien.

cristatum Lindl., kammförmiger, 4. w. Brasilien.

floribundum Hook., blüthenreicher, 4. w. Trinidad.

Hookeri Lindl., Hooker's, 4. w. Brasilien.

luridum Lindl., bleifarbig, 4. w. Brasilien.

maculatum H. B. K., gefleckter, 4. w. Neu-Granada.

Milleri Lod., Miller's, 4. w. Brasilien.

poriferum Lindl., löcheriger, 4. w. Demerara.

semiapertum Hook. (*inapertum* Hook., ? *purum* N. E.), halbgeöffneter, 4. w. Brasilien.

tridentatum Hook., dreizähniger, 4. w. Brasilien.

Catesbaea Gronov (M. Catesby, englischer Naturforscher und Reisender), IV. 1., Rubiaceae.

latifolia Lindl., breitblättrige, ♀. w. Westindien.

parviflora Sw., kleinblumige, ♀. w. Westindien.

spinosa L., dornige, ♀. w. t. Bahamische Inseln.

Cathartocarpus P. Purgirfrucht, XVII. 1. (VI.), Leguminosae-Caesalpinieae.

brasilianus DC. (*grandis* P.), brasilianische, ♀. w. Südamerika, Westindien.

conspicuus G. Don, ansehnliche, ♀. w. Sierra Leone.

Fistula P., aechte, ♀. w. Ostindien, Aegypten, Südamer.

fistuloides Coll., fistulaähnliche, ♀. w. Mexico.

Humboldtianus DC., Humboldt's, ♀. w. Caraccas.

Cathartocarpus

- javanicus P., javanische, $\frac{1}{2}$ w. Java, Molucken.
 Roxburghii DC., Roxburgh's, $\frac{1}{2}$ w. Coromandel.
 Trinitatis Rich., Trinidad's, $\frac{1}{2}$ w. Trinidad.

Cattleya Lindl. (W. Cattley, Mitglied der Londoner Gartenbaugesellschaft), XX, 1., Orchideae.

- bicolor Lindl., zweifarbige, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.
 citrina Lindl., citronengelbe, $\frac{1}{2}$ w. Mexico.
 crispa Lindl., krause, $\frac{1}{2}$ w. Rio Janeiro.
 elatior Lindl., erhabene, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.
 Forbesii Lindl., Foibe's, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.
 guttata Lindl., getropfte, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.

β) Russeliana Hook.

- intermedia Grahl., mittlere, $\frac{1}{2}$ w. Rio Janeiro.

β) angustifolia Hook. (Perrinii Lindl.). γ) pallida Lindl.

- labiata Lindl., lippige, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.
 Loddigesii Lindl., Loddiges's, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.
 Mossiae Hook., Mofs's, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.
 odoratissima Bate, wohlriechende, $\frac{1}{2}$ w. Demerara.
 pumila Hook., kleine, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.
 Skinneri Bate, Skinner's, $\frac{1}{2}$ w. Rio Janeiro.
 coccinea Lindl. v. Sophronitis grandiflora.

Caucalis T., Haftdolde, V. 11., Umbelliferae.

- daucoides L., möhrenblättrige, $\odot$ f. Mitteleuropa.
 glabra Forsk. Delil., glatte, $\odot$ f. Aegypten.
 hispida Desf., hackerige, $\odot$ f. Italien, Südfrankreich.
 leptophylla L. (humilis Jacq.), schmalblättrige, $\odot$ f. Südeuropa, Nordafrika.

- mauritanica L., mauritanische, $\odot$ f. Mauritien.

grandiflora L. etc. v. Orlaya grandiflora etc. latifolia L. vid. Turgenia latifolia. orientalis Buxb. etc. v. Platyspermum orient. etc. Hinsichtlich der übrigen s. Torilis.

Caulophyllum Mchx., Stengelblatt, VI. 1., Berberideae.

- thalictroides Mchx., wiesenrautenähnliches, $\frac{1}{2}$ Kn. f. Nordamerika.

Ceanothus L., Säckelbaum, V. 1., Rhamneae.

- americanus L., amerikanischer, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
 azureus Dsf. (coeruleus Lag.), azurblauer, $\frac{1}{2}$ k. t. Mexico.
 capensis DC., capischer, $\frac{1}{2}$ t. Cap der guten Hoffn.
 infestus H. B. K., schädlicher, $\frac{1}{2}$ t. Mexico.
 intermedius Pursh, mittlerer, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
 laevigatus DC., glatter, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
 macrocarpus Cav., großfrüchtiger, $\frac{1}{2}$ w. Neuspanien.
 microphyllus Mchx., kleinblättriger, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
 Mocinianus DC., Mocino's, $\frac{1}{2}$ w. Mexico.
 mystacinus DC., abyssinischer, $\frac{1}{2}$ f. Abyssinien.
 nepalensis Wall., nepal'scher, $\frac{1}{2}$ t. Nepal.
 ovatus Dsf., eiförmiger, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
 perennis Pursh, krautiger, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
 sanguineus Pursh, blutrother, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
 sphaerocarpus DC., kugelfrüchtiger, $\frac{1}{2}$ w. Jamaica.
 tardiflorus Hornem., spätblumiger, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
 zeylanicus Roth, zeylanischer, $\frac{1}{2}$ w. Ceylon.

africanus L. Mill. v. Willemetia afric. asiaticus L., colubrinus Lam. etc. v. Colubrina asiat. capsularis Forst., discolor Vent., globulosus La Bill. etc. v. Pomaderris discolor etc.

Cecropia L., Hohlschaft (Kanonenbaum), XXII. II.,
Urticaceae.

concolor W., gleichfarbiger, f. w. Brasilien.

palmata W., handförmiger, f. w. Brasilien.

peltata L., schildförmiger, f. w. Westindien, Südamer.

Cedrela P. Br. (Bastardceder), V. I., Hesperideae-
Cedreleae.

australis Ait., neuholländische, f. w. t. Neusüdwallis.

odorata L., wohlriechende, f. w. Westind., Südamer.

Toona Roxb., Toona-B., f. w. Ostindien.

velutina DC., samanthaarige, f. w. ?

Cedrus T. vid. *Pinus*.

Celastrus L., Celaster, V. I., Celastrineae.

bullatus L., blasiger, f. Sch. k. f. Virginien, Westind.

buxifolius L., buchsbaumblätteriger, f. k. Cap d. g. H.

cassinoides L'H., cassinenähnlicher, f. k. t. Canar. Inseln.

cernuus Thbg., gebogener, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

cymosus Soland. (? *multiflorus* Lam.), afterdoldiger, f.

k. t. Cap der guten Hoffnung.

emarginatus W., ausgerandeter, f. w. Ostindien.

flexuosus Thbg., beugsamer, f. k. t. Cap d. g. H.

ilicifolius Schrad., stechhülsenblätteriger, f. w. Brasilien.

ilicinus Burch., stechhülsenähnlicher, f. k. t. Cap d. g. H.

laurinus Thbg., lorbeerblätteriger, f. k. t. Cap d. g. H.

lucidus L., glänzender, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

mexicanus M. et S., mexicanischer, f. w. Mexico.

multiflorus Roxb. (*dependens* Wall.), vielblumiger, f. w.

Nepal.

myrtifolius L., myrtenblätteriger, f. w. Westindien.

nutans Roxb., überhängender, f. Sch. w. Ostindien.

oleoides Lam., ölbaumähnlicher, f. k. t. Cap d. g. H.

plerocarpus DC., vollfrüchtiger, f. k. t. Cap d. g. H.

punctatus Thbg., punctirter, f. k. t. Cap d. g. H.

pyracanthus L., rothdorniger, f. k. t. Cap d. g. H.

quadrangulatus Schrad., vierkantiger, f. w. Brasilien.

retusus Poir (*emarginatus* R. et S.), abgestutzter, f. w.

Peru.

rigidus Thbg., starrer, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

scandens L., kletternder, f. Sch. Nordamerika.

tetragonus Thbg., vierseitiger, f. k. t. Cap d. g. H.

tricuspidatus Lam., dreispitziger, f. k. t. Cap d. g. H.

trigynus Lam., dreiweibiger, f. w. Mascarenas.

undatus Thbg., welliger, f. k. t. Cap d. g. H.

verticillatus Roxb. v. *Senecia nepalensis*. *zeylanicus*

Schult. v. *Ceanothus zeylanicus*.

Celosia L., Hahnenkamm, V. I., Aizoideae-Amarantheae.

argentea L., silberfarbiger, ☉. w. Ostindien, China.

castrensis L., langähriger, ☉. w. Ostindien.

cernua Andr., übergebogener, ☉. w. China.

coccinea L., scharlachfarbiger, ☉. w. China.

comosa Retz, schopfiger, ☉. w. Ostindien.

crinata L., gewöhnlicher, ☉. w. Ost- u. Westindien.

a) *elata*. b) *compacta*. c) *flavescens*.

dichotoma Roth, zweizinkiger, ☉. w. Ostindien.

echinata H. B. K., stacheliger, ☉. w. Südamerika.

glaucia Wendl., blaugrüner, f. k. t. Cap d. g. H.

margaritacea L. (*argentea* Hortul.), perlartiger, ☉. w.

Ost- und Westindien.

Monsoniae Retz, Monson's, ☉. w. Ostindien.

Celosia

- nitida* Vahl, glänzender, ☉. w. Westindien.
nodiflora L., knotenblumiger, ☉. w. Ceylon.
pyramidalis Burm., pyramidenförmiger, ☉. w. Ostindien.
baccata Retz vid. *Deeringia indica*. *lanata* L. vid.
Aerva lanata. *paniculata* L. v. *Lestibudesia paniculata*.

Celsia L. (Olaus Cels, Professor zu Upsala), XIV. II., Personatae-Veroniceae.

- Arcturus* L., langstielige, ♂. k. Griechenl., Kleinasien.
betonicaefolia Dsf., betonienblättrige, ♂. k. Nordafrika.
coromandelina Vahl, coromandelische, ♂. ☉. w. Ostind.
cretica L., cretische, ♂. k. Creta, Nordafrika.
heterophylla P., verschiedenblättrige, ♂. k.
lanata Jacq., wollige, ♀. k. t. ?
lanceolata Vent., lanzettblättrige, ♂. k. Syrien.
orientalis L., morgenländische, ☉. f. Levante.
viscosa Roth, schmierige, ☉. w. ?
linearis Jacq. v. *Alonsoa linearis*.

Celtis T., Zuergelbaum, V. II. (XXIII. I.), Urticaceae-Ulmaceae.

- aculeata* Sw., stacheliger, ♀. w. Westindien.
australis L., südeuropäischer, ♀. f. Südeuropa, Nordafrika.
chinensis P. (*caucasica* W.), chinesischer, ♀. f. Mittel- und Südasien.
crassifolia Lam. (*cordata* Dsf., *cordifolia* L'Her.), dickblättriger, ♀. f. Nordamerika.
laevigata W., glatter, ♀. f. Louisiana.
Lima Sw., westindischer, ♀. w. Westindien.
micrantha Sw., kleinblumiger, ♀. w. Westind., Südamer.
occidentalis L., abendländischer, ♀. w. Nordamerika.
 β) *cordata*. γ) *scabriuscula* (*aspera* Lod., *orientalis* Hort.).
orientalis L., morgenländischer, ♀. w. Ost- u. Südasien.
pumila Pursh, zwergiger, ♀. f. Nordamerika.
Tournefortii Lam. (*orientalis* Mill.), Tournefort's, ♀. Armenien.

Cenchrus L., Stachelgras, III. II., Gramineae.

- australis* RB., neuholländisches, ☉. f. Neuholland.
catharticus H. Monspil., purgirendes, ☉. ♂. m. Nubien.
echinatus L., gemeines, ☉. ♂. f. w. Westindien.
pungens H. B. K., stechendes, ☉. f. Südamerika.
spinifex Cav., herzblättriges, ♂. w. Südamerika.
tribuloides L., hürzeldornfrüchtiges, ☉. f. Nordamerika.
capitatus L. v. *Echinaria capitata*. *laevigatus* Trin. v. *Antheophora elegans*. *lappaceus* L. vid. *Centothea lappacea*. *racemosus* L. vid. *Lappago racemosa*. *villosus* Spgl. v. *Antheophora villosa*. Hinsichtlich der übrigen s. *Penicillaria et Pennisetum*.

Cenia Commers., Cenie (Blasenkelch), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- turbinata* P., aufgetriebene, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.

Centaurea L., Flockenblume, XIX. III., Compositae-Cynarocephalae.

- A. *Amberboa* DC. (et *Chryseis* Less. Cass.),
crupinoides Dsf., zweifarbige, ☉. f. Nordafrika.
erucaefolia L., rankenblättrige, ☉. ? 4. f. ?
Lippii L., Lipp's, ☉. f. Arabien, Nordafrika.
moschata L. (*glauca* W.), moschusduftende, ☉. f. m. Kleinasien, Griechenland.

Centaurea

b) alba.

muricata L. (*pubigera* P.), weichstachelige, ☉. f. Spanien.
spectabilis DC. (*Balsamita* Don), ansehnliche, 4. f.
Nordpersien.

suaveolens W. (*odorata* DC.), wohlriechende, ☉. f. m.
Persien, Taurien, Iberien.

II. Centaur. genuin.

Adami W., Adam's, ☉. f. Taurien, Caucasus, Persien.

aegyptiaca L. (*cancellata* Sbr.), ägyptische, ☉. f. Aegypt.

africana Lam., afrikanische, 4. k. Nordafrika.

alata Lam., geflügelte, 4. f. Pers., Armenien, Caucas.

alba L., weiße, 4. f. Süd- u. Westeuropa, Taurien.

α) concolor DC. (*splendens* Ten., *globosa* Hort.),

β) densta Ten. γ) angustifolia Guss. (*splendens*
Auct. ? L.).

alexandrina Delil. (*pallescens* Bové), alexandrinische, ☉.
♂. f. Aegypten.

alpina L. (*baldensis* P.), Alpen-F., 4. f. Oberitalien.

amara L., bittere, 4. f. Südeuropa.

β) angustifolia Schk. γ) bracteata Bertol.

ambigua Guss., zweifelhafte, 4. f. Neapel.

americana Nutt. (*Nuttallii* Spgl.), amerikanische, ☉. f.
Nordamerika (Arkansa).

apiculata Led., kurzspitzige, 4. f. Taurien.

aplolepis Moretti, borstenschuppige, 4. f. Mittel- und
Süditalien.

apula Lam. (*lyrata* P.), apulische, ☉. f. Süditalien,
Südfrankreich, Nordafrika, Brasilien, Chili etc.

arenaria MB., Sand-F., 4. f. Südrussland, Podolien.

argentea L., silberfarbige, 4. k. Creta.

arguta N. E., spitzzahnige, ⚥. k. Teneriffa.

argyrophylla W. (*jacobaeifolia* Spgl.), silberweißblättrige,
4. f. ?

aspera L., rauhe, 4. f. Süd- und Westeuropa.

? astracantha Spgl. (? *auriculata* Spgl.), astracanthische, 4.
f. Astrachan.

aurea Ait., goldfarbige, 4. f. Südeuropa.

austriaca W. (*phrygia* Jacq. non L.), 4. f. Nord-, Mit-
tel-, Ost- und Südeuropa.

β) cirrhata Rchb.

axillaris W., achselblumige, 4. f. Ost- u. Südeuropa.

α) carniolica Host, β) stricta WK. γ) seusana
Vill. (*variegata* Lam.). δ) Fischeri W.

babylonica L., babylonische, 4. f. b. k. Orient, Palästina.

Balsamita Lam., Frauenmünzen-F., ☉. f. Armenien,
Cappadocien.

Behen L., Behen-F., ☉. f. Persien, Cappadocien.

Biebersteinii DC. (*paniculata* MB.), Bieberstein's, ☉. f.
Caucasus, Bessarabien.

Calcitrapa L., Sterndistel-F., ☉. ♂. f. Europa, Taurien,
Griechenland, Aegypten, Madeira.

β) autumnalis DC. (*horrida* Ténor).

calcitrapoides L., sterndistelähnliche, ☉. ♂. f. Cauca-
sus, Persien, Palästina, Aegypten.

calocephala W., schönköpfige, 4. f. Osteuropa.

α) flava (*glauca* Dsf.). β) mixta. γ) atropur-
purea WK. (*calophylla* Steudel).

canariensis Brouss. W., canarische, ⚥. k. Teneriffa.

Centaurium L., Güldenkraut-F., 4. f. Italienische Alpen.

Centaurea

- centauroides L., güldenkrautähnliche, 4. f. Südeuropa.
 ceratophylla Tenor. (*eriophylla* Spgl.?), hornblättrige, 4. f. Süditalien.
 cerinthefolia Sibth. et Sm. (*Behen* Lam.), wachsblumenblättrige, 4. f. b. Griechenland, Kleinasien.
 cheiranthifolia W. (*ochroleuca* Sims), levkoiblättrige, 4. f. Armenien, Persien, Caucasus.
 chilensis Hook., chilesische, 4. k. Chili.
 Cineraria L., Aschenkraut-F. 4. k. Süditalien, Nordafr.
 cinerea Lam. (*Cineraria* Jacq.), aschfarbige, 4. f. b. k. Süditalien.
 coerulescens W. (*maculosa* β . DC.), bläuliche, 4. f. k. Südeuropa, Taurien.
 collina L. (*cicutae* fol. Horn.), Hügel-F., 4. f. b. Südeuropa, Orient.
 coronopifolia Lam., krähenhufsblättrige, $\odot$. f. Ostiberien.
 Crocodylium L., syrische, $\odot$. f. Syrien, Creta.
 cruenta W., blutfarbige, 4. f. ?
 Cyanus L., Korn-F., $\odot$. f. Europa.
 dealbata W. MB., weifsliche, 4. f. Caucasus, Persien.
 declinata M. B. (*taurica* Stev.), niedergebeugte, 4. f. Taurien, Iberien.
 decumbens DC. (*procumbens* Habl.), niederliegende, 4. f. Caucasus.
 decurrens DC., herablaufende, 4. f. ?
 depressa MB. (*pygmaea* Hoffm.), hinabgedrückte, $\odot$. σ . Iberien, Persien.
 diffusa Lam. (*sabulosa* Hornem.), weitschweifige, σ . f. Taurien, Griechenland, Südfrankreich.
 diluta Ait. (*elongata* Schousb., *raphanifolia* Salzm. ? *subspinosa* Roch.), hellrothe, 4. f. Nordafrika.
 dissecta Tenor., schnitzblättrige, 4. f. Süditalien.
 eriophora L., wolköpfige, $\odot$. f. Portugal.
 eryngioides Lam., mannstreuähnliche, 4. f. b. k. Griechenland, Aegypten.
 ferox Dsf., grosstachelige, 4. f. b. k. Nordafrika.
 flosculosa Balb., fruchtstrahlige, 4. f. Siebenbürgen, Krain, Piemont, Belgien.
 fuscata Dsf., bräunliche, 4. f. Süditalien, Nordafrika.
 β) *xanthina* Spgl. (*aurea* Hort.).
 glastifolia L., waidblättrige, 4. f. Armenien, Caucasus, Südsibirien.
 glomerata Vahl (*prolifera* Vent., *straminea* W.), knaulförmige, $\odot$. f. Aegypten.
 Grafiana DC. (*sordida* Graf), Graf's, 4. f. Krain.
 horrida Badaro (? *spinosa* W.), rauhe, $\frac{1}{2}$. k. Süditalien.
 hybrida All. (*solstitialipaniculata* Schied.), Bastard-F., σ . f. Oberitalien.
 hyssopifolia Vahl, ysopblättrige, 4. f. Spanien.
 Jacea L., gemeine, 4. f. Mitteleuropa.
 β) *pratensis* Thuill. (*banatica* Hortul.). γ) *decumbens* Dubois. δ) *mollis* Schlchr. ϵ) *decipiens* Thuill.
 jacobaeaefolia Lam., jacobskrauthblättrige, 4. f. ?
 iberica Trev., iberische, $\odot$. σ . f. Caucasus, Iberien, Armen.
 incana Tenor., weifsgraue, 4. f. Süditalien.
 intybacea Lam., endivienähnliche, $\frac{1}{2}$. f. Südfrankreich.
 β) *leucantha* Pourr.
 Isnardi L., Isnard's, 4. f. Süd- und Westeuropa,
 Kartschiana Scop., krainerische, 4. f. Oesterr. Litorale.

Centaurea

latisquama DC., breitschuppige, 4. f. Ost- u. Südeuropa.
 leucolepis DC., weißschuppige, 4. f. Ital., östr. Litorale.
 leucophylla MB., weißblättrige, 4. f. Caucasus.

a) taurica (? tatarica W.), β) salonitana Vis.

lingulata Lagasc., zungenförmige, 4. f. Spanien.

linifolia L. Vahl (*linearifolia* Lam. P.), leinkrautblättrige, 4. f. Spanien.

livonica Ledeb., liefländische, 4. f. Liefland.

macrocephala W., großköpfige, 4. f. Armenien, Iberien.

maculosa Lam. (*corymbosa* Pourr.), gefleckte, ♂. 4. Südfrankreich.

margaritacea Ten., perlartige, 4. f. Taurien.

Marschalliana Spgl., Marschall's, 4. f. Caucas., Podolien.

melitensis L., maltaische, ☉. f. Süditalien, Nord- und Südafrika, Südamerika.

mexicana DC. (*grandiflora* Sessé), mexican., ☉. f. Mexico.

montana L. (*mollis* Kit.), Berg-F., 4. f. Mitteleuropa.

muricata L., weichstachelige, ☉. f. Spanien.

mutabilis St. Am., veränderliche, 4. f. Frankreich.

myacantha DC., rinnenstachelige, ☉. ♂. f. Frankreich.

napifolia L., rübsenblättrige, ☉. f. Süditalien, Griechenland, Nordafrika.

nigra L., schwarze, 4. f. Mittel-u. Südeuropa, Nordamer.

nigrescens W. (*vochinensis* Bernh., *transalpina* Schlei.), schwärzliche, 4. f. Oesterreich, Ungarn, Pyrenäen.

nitens MB. (*setifera* Lag.), glänzende, ☉. f. Caucasus.

ochroleuca W. (*leucantha* Adam.), gelbweißse, 4. f. Caucas.

orientalis L. (*tatarica* L.), morgenländische, 4. f. Taurien, Siebenbürgen, Sibirien.

ornata W., zierliche, 4. f. Spanien.

ovina Pall., Schaf-F., 4. f. Caucasus, Sibirien.

pallescens Delill., bleiche, ☉. f. Aegypten.

paniculata L., rispige, ♂. f. Mittel- und Südeuropa.

parviflora Dsf., kleinblumige, ☉. f. Nordafrika, Persien.

pectinata L., kammförmige, 4. f. Ungarn, Südfrankr.

phrygia L., phrygische, 4. f. Nord-, mittel-u. südeurop. Alp.

β) nervosa W.

polyacantha W., vielstachelige, ☉. f. ?

pratensis Hornem. (? *banatica* Hort.), Wiesen-F., 4. f. Ungarn.

procumbens Balb., niederliegende, 4. f. Piemont.

procurrens Sbr., hervorlaufende, ☉. f. Palästina.

pterolopha DC. (*ovina* Hort. ruth.), flügelkelchige, 4. f. ?

pubescens W. (*incana* Dsf.), weichhaarige, 4. f. b. k. Nordafr.

pulchella Ledeb., hübsche, ☉. f. Persien.

β) glabra.

pulcherrima W., schönste, 4. f. Iberien.

pulchra (*pulcherrima* Wight et Royle), schöne, ☉. f. Ostind.

pullata L., schwarzbraune, ☉. ♂. f. Südeuropa, Orient. Nordafrika.

pumila (*mucronata* Forsk.), kleine, 4. k. Aegypt., Griechenl.

ragusina L., ragusanische, 4. k. Süddalmatien.

reflexa Lam., zurückgebogene, 4. f. Caucas., Armenien.

Reichenbachii DC. (*arenaria* Rchb.), Reichenbach's, 4. f. ? Südrussland.

rigida W. (*rigescens* Hornem.), starre, 4. f. ?

rigidifolia Bess. (*sulphurea* Lag.), steifblättrige, 4. f. ?

? rivularis Brot., Bach-F., 4. k. f. Portugal.

rupestris L., Felsen-F., 4. f. Krain, Italien.

β) adonifolia Rchb.

Centaurea

ruthenica Lam., russische, 4. f. Siebenb., Rußland.
 sabulosa Ledeb., sandige, 4. f. Sibirien.
 salicifolia MB., weidenblättrige, 4. f. Caucasus.
 Scabiosa L., Scabiosen-F., 4. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.
 β) italica P. γ) coriacea WK. δ) adpressa Ledeb.
 sempervirens L., immergrüne, 4. f. k. Süditalien, Süd-
 frankreich, Portugal.

Seridis L., Seridia-F., 4. f. Spanien.
 sibirica L., sibirische, 4. f. Sibirien, Ural.
 sicala L., sicilianische, 4. f. Sicilien.
 solstitialis L., Sonnenwenden-F. 4. f. Mittel- u. Südeuropa.
 β) lappacea Tenor.

sonchifolia L., gänsedistelblättrige, 4. f. Italien, Frank-
 reich, Nordafrika.

β) dimorpha DC. (bimorpha Viv.).

spathulata Tenor., spatelblättrige, 4. f. Neapel.
 sphaerocephala L., kugelblumige, 4. f. Süditalien, Spa-
 nien, Nordafrika.

β) romana L. (Zanonii Sebast. et Maur.).

spinosa L., dornige, 4. k. Griechenland.
 spinosociliata Bernh. (cristata Bartl.), franzenstachelige,
 4. Istrien.

spinulosa Roch., feinstachelige, 4. f. Banat.
 stereophylla Bess., podolische, 4. f. Südpodolien, Odessa.
 Steveni MB., Steven's, 4. f. Iberien.
 sulphurea W. (Pottii Hort.), schwefelgelbe, 4. f. ?
 tagana Broter., portugiesische, 4. k. f. b. Westeuropa,
 Nordafrika.

tenuiflora DC. (ovina MB.), dünnblumige, 4. f. Tau-
 rien, Caucasus.

trichacantha Spgl. (penicillata Delill., pterocephala H.
 Monspel.), haarstachelige, 4. f. ?

trichocephala W., haarköpfige, 4. f. Südpodolien, Cauc.
 trinervia Steph., dreinervige, 4. f. Caucasus, Taurien.

Triumfetti All., Triumfetti's, 4. f. Oberitalien.

uliginosa Brot., Sunpf-F., 4. f. b. Portugal.

uniflora L., einblumige, 4. f. Schweiz, Piemont, Südfrankr.

Verutum L., spiefsartige, 4. f. Orient.

Wiedemanniana Fisch. et Mey., Wiedemann's, 4. f. Natol.

wolgensis DC., wolgaische, 4. f. Südrußland.

Zuccariniana DC., Zuccarini's, 4. f. b. k. Griechenland.

III. Microlonchus Cass. DC.

salmantica L. (tenella et tenuiflora Hortul.), salman-
 tische, 4. f. Südeuropa, Mauritanien.

IV. Crupina Cass.

Crupina L., bartblumige, 4. f. Orient, Süd- u. West-
 europa, Nordafrika.

altaica Fisch. (et conifera L. etc.) v. Leuzea altaica
 conifera etc. benedicta L. vid. Cnicus benedictus.
 cretica Spgl. v. Kentrophyllum tauricum. Galactites
 L. v. Galactites tomentosa. lanata DC. v. Kentro-
 phyllum lanat. nudicaulis L. et radiata L. v. Ser-
 ratula xeranthemoides et nudic. repens L. vid.
 Acroptilon repens Nachtr. Rhapontica L. v. Rha-
 ponticum scariosum.

Centotheca Desv., Stechspelze, III. II., Gramineae.

lappacea Desv., klettenähnliche, 4. f. m. w. Ostindien,
 Societätsinseln.

Centranthus Neck., Spornbaldrian, I. I., Valerianeae.

angustifolius DC., schmalblättriger, 4. f. Südeuropa.

Centhranthus

Calcitrapa Dufresn., portugiesischer, ☉. f. Süd- und West-europa.

intermedius Hortul., mittlerer (Bastard-S.), 4. f. ?

rubra DC., rother, 4. f. b. Südeuropa.

b) *flore albo.*

Centrocarpha D. Don v. *Rudbeckia*.

Centroclinium D. Don v. *Onoseris*.

Centrospermum Chrysanthemum Spgl. vid. *Chrysanthemum viscosum*.

Centunculus L., Centunkel, V. 1., Primulaceae.

minimus L., kleinst, ☉. f. Europa.

Cephaelis Sw., Kopfbeere, V. 1., Rubiaceae.

axillaris Sw. (*calycina* Lindl.), achselblumige, ♀. w. Westindien, Brasilien.

elata Sw., (*punicea* Vahl) erhabene, ♀. w. Jamaica.

involuta W., großshüllige, ♀. w. Guiana.

pedunculata Salisb., gestielte, ♀. w. Sierra Leone.

purpurea W., purpurfarbige, 4. w. Guiana.

tomentosa Vahl, filzige, ♀. w. Südamerika, Westind.

violacea Sw., violette, ♀. w. Westindien, Guiana.

Cephalanthera Rich., Kopfbeutel, XX. 1., Orchideae.

ensifolia Rich., schwertblättriger, 4. f. Europa, Nordafri.

pallens Rich., blafsblumiger, 4. f. Europa.

rubra Rich., rothblumiger, 4. f. Europa.

Cephalanthus L., Knopfsbaum, IV. 1., Rubiaceae.

occidentalis L., abendländischer, ♀. f. Nordamerika.

Cephalaria Schrad. v. *Succisa*.

Cephalophora Cav., Köpfchenträger, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

aromatica Schrad., gewürzhafter, ☉. f. Chili.

glauca Cav., blaugrüner, ♂. ♀. t. w. Chili.

Cephalotus La Bill., Drüsenköpfchen, XI. vi., ? Rosaceae.

follicularis La Bill., halbfrüchtiges, 4. t. Neuholland.

Ceranthra P. B., Hornbeutel, V. 1., Violaceae.

subintegrifolia P. B., fastganzblättriger, ♀. w. Guinea.

Cerastium L., Hornkraut, X. iv., Caryophyllaceae-Alsineae.

alpinum L., Alpen-H., 4. f. Europäische Alpen.

β) *lanatum* Lam. γ) *glutinosum* Koch (*Soleirolia Sering.*). δ) *glabratum* Hartm.

argenteum MB., silberfarbiges, 4. f. Iberien.

arvense L., Acker-H., 4. f. Europa, Asien, Nordafrika, Nordamerika.

β) *strictum* Hänke. γ) *suffruticosum* L. (*laricifolium* Vill.).

brachypetalum Desport. P. (*barbulatum* Wahlenb., *strigosum* Fr.), kleinkroniges, ☉. f. Europa.

campanulatum Viv. (*praecox* Tenor.), glockenblumiges, ☉. ♂. f. Schweiz, Italien, Ungarn.

caucasicum Fisch. (*elongatum* MB.), caucasisches, ☉. f. Caucasus.

chloraefolium Fisch. et Mey., chlorablättriges, ☉. ♂. f. Natolien.

ciliatum W. Kit. (*matrense* Kit.), gewimpertes, 4. f. Croatien.

Colsmanni Lehm., Colsmann's, 4. k. Magellanische Meerenge.

dahuricum Fisch. (*amplexicaule* MB.), dahurisches, 4. f. Dahurien.

dichotomum L., zweizinkiges, ☉. f. Spanien, Nordafrika.

Cerastium

- ? diffusum P., ausgebreitetes, 4. f. ?
 dioicum Ait., zweihäusiges, 4. f. Spanien.
 fimbriatum Ledeb., gefranztes, 4. f. Sibirien.
 frigidum MB. (*purpurascens* Adam, *collinum* Hort.), kaltes, 4. Caucasus.
 glomeratum Thuill. (*ovale* P., *rotundifolium* Stg., Hoppe), knaulförmiges, ☉. f. Europa.
 grandiflorum WK., großblumiges, 4. f. Ungarn.
 β) bannaticum Roch. (? *suffruticosum* L.).
 hirsutum Ten., rauhhaariges, 4. f. Neapel.
 incanum Ledeb., graugrünes, 4. f. Sibirien.
 inflatum H. C., aufgeblasenes, ☉. f. ?
 latifolium L., breitblättriges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
 β) glaciale Gaud. (*uniflorum* Murr.). γ) intermedium Gaud. (*flexuosum* Hegetschw.). δ) pedunculatum Gaud. (*filiforme* Schlchr.).
 Ledebouri Spgl., Ledebour's, 4. f. Sibirien.
 maximum L., größtes, ☉. f. Sibirien.
 microspernum Fisch. et Mey., kleinsamiges, ☉. f. Südliches Rußland.
 multiflorum C. A. Mey., vielblumiges, ☉. f. Südl. Rußland.
 nemorale MB., Hain-H., ☉. f. Caucasus.
 ovatum Hoppe (*carinthiacum* Vest.), eiblättriges, 4. f. Kärnthen, Steyermark.
 pauciflorum Stev., wenigblumiges, ☉. f. Sibirien.
 pensylvanicum Hornem. (*tenuifolium* Pursh, *glutinosum* Nutt.), pensylvanisches, 4. f. Pennsylvanien.
 pentandrum L., fünf männiges, ☉. f. Spanien, Taurien.
 perfoliatum L., durchwachsenes, ☉. f. Griechenland, Sibirien.
 pilosum Ledeb., haariges, 4. f. Sibirien.
 pubescens Gol., weichhaariges, 4. f. Nordamerika.
 pumilum Curt. (*semidecandrum* P., *ovale* Bess.), niederiges, ☉. f. Europa.
 β) glandulosum.
 repens L., kriechendes, 4. f. Südeuropa.
 ruderales MB., Schutt-H., ☉. f. Taurien.
 rupestre Fisch., Felsen-H., ♂. f. Sibirien.
 Scarani Tenor., Scarani's, 4. f. Neapel.
 semidecandrum L. (*viscidum* Lk., *viscosum* P., *pellucidum* Chaub.), fünfbeuteliges, ☉. f. Europa, Nordamerika.
 β) glutinosum Fr. (*glandulosum*). γ) macilentum Aspegren.
 serpyllifolium MB., lavendelblättriges, ♂. f. Sibirien.
 sylvaticum W. K., Wald-H., ♂. f. Oesterreich, Ungarn, Illyrien.
 tauricum Spgl., taurisches, ☉. f. Taurien.
 Tenoreanum Ser. (*pilosum* Ten.), Tenore's, ☉. f. Neapel.
 tetrandrum Curt., vier männiges, ☉. f. Nordeuropa.
 tomentosum L. (*Biebersteinii* DC.), filziges, 4. f. Südeuropa, Taurien.
 triviale Lk. (*vulgatum* Wahlbg. ? L.), gemeines, ☉. ♂. f. Europa.
 β) glandulosum (*viscosum* L.). γ) holosteoides Fr.
 aquaticum L. et *manticum* L. v. *Malachium aquaticum* et *manticum*.

Cerasus T. Juss. v. *Prunus*.

Ceratiola Mchx., Hornnarbe, XXI. II. (II. I.), *Tricoccae-Empetreae*.

- ericoides L., heideähnliche, ♂. k. Georgien, Florida.
- Ceratocarpus** L., Hornfrucht, XXI. 1., Aizoideae-Atripliceae.
- arenarius L., sandliebende, ☉. f. Südsibirien, Tartarei.
- Ceratocephalus** Mch., Hornköpfchen, V. VI. (XI. VII.), Ranunculaceae.
- falcatus P., sichelförmiges, ☉. f. Süd- und Osteuropa.
- orthoceras DC., gerades, ☉. f. Taurien, Südsibirien.
- Ceratochilus grandiflorus** Lod., *insignis* Lindl. et *oculatus* Lod. v. *Stanhopea grandiflora* etc.
- Ceratochloa** P. B. v. Bromus.
- Ceratonia** L., Johannisbrodbaum, V. 1. (XXIII. II.), Leguminosae-Caesalpinieae.
- Siliqua L., gemeiner, ♂. k. Südeuropa, Kleinasien, Syrien.
- Ceratopetalum** Sm., Hornblatt, X. 1. Corniculatae-Cunoniaceae.
- gummiferum Sm., gummigebendes, ♂. t. Neuholland.
- Ceratophyllum** L., Wasserhorn, XXI. IX., Ceratophylleae.
- demersum L. (*oxyacanthum* Cham.), rauhes, 4. Wass. f. Europa, Nordamerika.
- platyacanthum Chamiss., breitstacheliges, 4. Wa. f. Brandenburg.
- submersum L. (*muticum* Cham.), glattes, 4. Wa. f. Europa, Ostindien.
- Ceratopteris** Brongn., Hornfarn, XXIV. 1. Pteroidae.
- thalictroides Brongn., wiesenrautenähnlicher, 4. w. Ostind.
- Ceratosanthes** Burm., Hornblume, XXI. x. (XVI. 1.).
- tuberosa Juss., knollige, 4. Kn. Sch. Westindien.
- Cerbera** L., Schellenbaum, V. 1., Contortae-Apocynae.
- Ahovai L., brasilianischer, ♂. w. Brasilien.
- fruticosa Roxb., strauchiger, ♂. w. Pegu.
- lactaria Hamilt. (*Manghas* G.), milchender, ♂. w. Molucken.
- laurifolia Lod., lorbeerblättriger, ♂. w. Ostindien.
- Odallam Hamilt. (*Manghas* Ait.), Odallam-S., ♂. w. Ostindien.
- ovata Cav., eiförmiger, ♂. w. Neuspanien.
- Thevetia** L., Thevetia-S., ♂. w. Westindien.
- thetetioides Bonpl., thevetiaähnlicher, ♂. w. Neuspanien.
- borbonica* Spgl. v. *Ochrosia borbonica*. *chinensis* Spgl. v. *Dissolena verticillata*. *Tanghin* Bot. Reg. v. *Tanghinia veneniflua*.
- Cercis** L., Judasbaum, X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.
- canadensis L., kanadischer, ♂. f. b. Nordamerika.
- β) pubescens.
- Siliquastrum L., gemeiner, ♂. f. b. k. Südeuropa, Taurien, Japan.
- b) parviflorum DC. c) flore albido. d) flore roseo.
- Ceresia elegans** P. v. *Paspalum membranaceum*.
- Cereus** Juss. Haw., Fackeldistel, XII. 1., Cactaeae.
- abnormis Swt. (W.), (*monstrosus* Dsf.), abweichende, ♂. w. Südamerika.
- acutangulus Otto (*undulatus* Hort.), spitzkantige, ♂. w. Südamerika.
- albispinus Salm. (*octogonus* Hort.), weißstachelige, ♂. w. Südamerika.
- armatus Otto (*Royeni* Hort.), bewaffnete, ♂. w. Südamer.
- aureus Salm., goldfarbige, ♂. w. Südamerika.
- azureus Parmentier, azurblaue, ♂. w. Südamerika.
- Baxaniensis Karwinsk, baxaniensische, ♂. w. Mexico.
- Bonplandii Parm., Bonpland's, ♂. w. Südamerika.

Cereus

candicans Gill. (*Montezumae* Hort.), weifslliche, ♀. w. Südamerika.

chilensis Colla (*subrepandus*, *pyramidalis* Hort.), chile-sische, ♀. w. Chili.

β) tenuispinus Haw,

cinerascens DC. (*Deppei* Otto), aschfarbige, ♀. w. Mexico.

β) acinaciformis.

coccineus Salm., scharlachfarbige, ♀. w. Südamerika.

coerulescens Salm. (*Mendory* Hort.), bläuliche, ♀. w. Südamer.

conicus Otto, kegelförmige, ♀. w. Südamerika.

crenulatus Lk. Salm., gekerbte, ♀. w. Westindien.

cylindricus Haw., cylinderförmige, ♀. w. Peru.

divaricatus Lum. (? *fimbriatus* Hort.), sparrige, ♀. w. Sdamer.

divergens Otto (? *imbricatus* Haw., *monoclonus* Hort.), divergirende, ♀. w. Südamerika.

eburneus Salm. (*peruvianus* W., *coquimbanus* Hort., *polygonatus* Hort.), elfenbeinweise, ♀. w. Südamerika.

erectus Karw., aufrechte, ♀. w. Mexico.

eriophorus Otto (*cubensis* Zucc., *subrepandus* Hort.), wolltragende, ♀. w. Südamerika.

β) laetevirens Salm.

extensus Salm., ausgestreckte, ♀. w. ? Südamerika.

flagelliformis Mill., peitschenförmige, ♀. w. Südamerika.

β) minor.

flagriformis Zucc., geißelförmige, ♀. w. Südamerika.

flavispinus Haw., gelbstachelige, ♀. w. Westindien.

glaucus Salm., blaugrüne, ♀. w. Südamerika.

gracilis Haw. Salm. (*humilis* DC., *myriacaulon* Hort., *Mariculi* Hort.), schlanke, ♀. w. Südamerika.

grandiflorus Mill., großblumige, ♀. w. Jamaica.

griseus Haw. (*polygonatus* Hort.), grauliche, ♀. w. Südamer.

hexagonus Haw., sechskantige, ♀. w. Südamerika.

Hystrix Salm, Haw., starkstachelige, ♀. w. Südamer.

Jamacaru Pison, (*laetevirens* Hort., *glaucus* Hort.), ♀. w. Südamerika.

lanuginosus Haw., wollige, ♀. w. Südamerika.

leptophis DC., lockerstachelige, ♀. w. Südamerika.

lividus Pfeiff. (*Parotetti* Hort.), bräunliche, ♀. w. Südamer.

marginatus DC. (*incrustatus* Lk. Otto, *cupulatus* Hage), gerandete, ♀. w. Südamerika.

β) gemmatus Zucc.

Martianus Zucc., Martius's, ♀. w. Brasilien.

multangularis Haw., vielkantige, ♀. w. Südamerika.

β) ochrocanthus.

Napoleonis Grah., Napoleon's, ♀. w. Südamerika.

niger Haw., schwarze, ♀. w. ? Südamerika.

nobilis Haw. (*recurvus* Mill.). edle, ♀. w. Westindien.

nycticalus Lk. et Otto (*pteranthus* Otto, *brevispinus* Salm, *Antoini* Hort., *rosaceus* Hort., *obtusus* Hort.), nächtliche, ♀. w. Südamerika.

Olfersii Lk. et Otto Olfer's, ♀. w. Brasilien.

ovatus G. Don, eiförmige, ♀. w. Chili.

pellucidus Otto, durchschimmernde, ♀. w. Südamerika.

pentagonus Haw. (*reptans* Hort.), fünfkantige, ♀. w. Sdamer.

pentalophus DC., (*propinquus* Salm.), fünfsamige, ♀. w. Mexico.

β) leptacanthus DC. (*subarticulatus* Pfeiff.).

peruvianus (DC. L.), *heptagonus* Hort. et ? *hexagonus* Hort., peruvianische, ♀. w. Südamerika.

platyacanthus Pfeiff., breitstachelige, ♀. w. Südamerika.

Cereus

- polygonus (Lam.), vielkantige, ♀. w. Hispaniola.
 prismaticus (W.), prismatische, ♀. w. Südamerika.
 radicans DC. (biformis Hort.), wurzelnde, ♀. w. Südamer.
 ramosus Karw., ästige, ♀. w. Mexico.
 reductus Lk. (*Haworthii* DC., *nobilis* Mill.), zurückgekrümmte, ♀. w. Südamerika.
 repandus (L.), ausgeschweifte, ♀. w. Westindien.
 roridus Otto, bereifte, ♀. w. Südamerika.
 Royeni Haw. (L.), *gloriosus* Hort., Royen's, ♀. w. Südamer.
 Schrankii Zucc., Schrank's, ♀. w. Südamerika.
 Scopa (Spgl.), Scopa-F., ♀. w. ?Südamerika.
 senilis DC. (*Bradypus* Lehm.), greise, ♀. w. Mexico.
 serpentinus Lag., Schlangen-F., ♀. w. Südamerika.
 setaceus Salm., borstige, ♀. w. Brasilien.
 speciosissimus (Dsf.), (*speciosus* Haw. Dsf.), prächtige, ♀. w. Mexico.
 splendidus Paxt., ansehnliche, ♀. w. Mexico.
 spinibarbis H. Berol, bartige, ♀. w. Südamerika.
 spinulosus DC., feinstachelige, ♀. w. Südamerika.
 strictus (W.), (*mollis*, *nigricans*, *repandus spin. aureis* Hort.), steife, ♀. w. Südamerika.
 strigosus Salm. (*myriophyllus* G. M.), striegelige, ♀. w. Südamerika.
 tenuis Salm., dünne, ♀. w. Brasilien.
 tetragonus Haw. (L.), (*quadrangularis* Hort.), vierkantige, ♀. w. Südamerika.
 tilophorus Pfeiff. (*retroflexus* Hort.), zurückgebogene, ♀. w. Südamerika.
 triangularis Haw. (L.), dreikantige, ♀. w. Westindien.
 β) variegatus.
 tripteris Salm., dreiflügelige, ♀. w. ?Südamerika.
 triquetus Haw. (? *trigonus* Haw.), dreiseitige, ♀. w. Südamer.
 validus Haw., starkstachelige, ♀. w. Südamerika.
 variabilis Pfeiff.,
 (? *polymorphus* G. Don), *Pitaiaya* Jacq., *rosaceus*, *formosus*, *grandis*, *obtus*, *cognatus* H. Vindob., *affinis et prismatiformis* Hort.), veränderliche, ♀. w. Südamerika.
 virens DC. (*affinis* H. Berol.), grünliche, ♀. w. Südamer.
 Engl. Hybrid: *Colvillii* Swt., *Mallisonii* Hort., *Vandesii* Hort. Hinsichtlich der übrigen s. *Epiphyllum* et *Lepismium*.

Cerinth T., Wachsblume, V. I., Asperifoliaceae.

- alpina Kit. (*quinquemaculata* Wahlbg., *suevica* Mart., *glabra* Gaud., 4. f. Ungarn, Oesterreich, Süddeutschland, Schweiz.
 aspera Roth, rauhe, ♂. f. Südeuropa.
 maculata L., gefleckte, ♂. f. Südeuropa, Taurien.
 major L. (*glabra* DC., *glauca* Mch.), große, ♂. f. Süddeutschland.
 minor L., kleine, ♂. f. Ost-, Mittel- und Südeuropa.
 retorta Sm., zurückgekrümmte, ♂. f. Griechenland, Kleinasien.

Ceropegia L., Leuchterblume, V. II. Asclepiadeae.

- acuminata Roxb., zugespitzte, 4. Kn. w. Ostindien.
 africana RB., afrikanische, 4. Sch. t. w. Cap d. g. H.
 aphylla Haw., blattlose, 4. ♀. Sch. t. w. Canarische Ins.
 australis Lod., südliche, 4. ♀. Sch. t. w. ?Neuholland.
 bulbosa Roxb., zwiebelige, 4. Kn. Sch. w. Ostindien.

Ceropegia

- dichotoma Haw., zweizinkige, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
 elegans Wall., zierliche, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.
 juncea Roxb., binsenförmige, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.
 Lushii Grah., Lush's, $\frac{1}{2}$ Kn. Sch. w. Ostindien.
 stapeliaeformis Haw., stapelienförmige, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ t. w. Cap
 der guten Hoffnung.
 tuberosa Roxb., knollige, $\frac{1}{2}$ Kn. w. Ostindien.
 Wightii Grah., Wight's, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.
sagittata L. et ? *sinuata* Poir v. *Microloma sagittat.*
 et *Microlom. linear.*

Cestrinus carthamoides Cass. v. *Rhaponticum acaule.*

Cestrum L., Hammerstrauch, V. I. Solanaceae.

- acuminatum Swt., zugespitzter, $\frac{1}{2}$ t. Mexico.
 alaternoides ? Poir., wegdornähnlicher, $\frac{1}{2}$ w. Trinidad.
 angustifolium Lod., schmalblättriger, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
 auriculatum L'Her., geöhrt, $\frac{1}{2}$ w. Peru.
 bracteatum Grah., deckblättriger, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.
 cauliflorum Jacq., stamblumiger, $\frac{1}{2}$ w. Martinique.
 citrifolium Retz., citronenblättriger, $\frac{1}{2}$ w. ?
 confertum R. et Pav., dichtblättriger, $\frac{1}{2}$ w. Peru.
 diurnum L., Tag-H., $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
 exstipulatum Ledeb., achselblattloser, $\frac{1}{2}$ w. ?
 fastigiatum Jacq., gipfelständiger, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
 foetidissimum Jacq., stinkender, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
 hirtum Sw., kurzhaariger, $\frac{1}{2}$ w. Jamaica.
 latifolium Lam., breithblättriger, $\frac{1}{2}$ w. Trinidad.
 laurifolium L'Her., lorbeerblättriger, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.
 macrophyllum Vent., großblättriger, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
 nocturnum L., nächtlicher, $\frac{1}{2}$ w. Westindien, Südamer.
 odontospermum Jacq., gezahntsamer, $\frac{1}{2}$ w. ? Westind.
 Parqui L., chilesischer, $\frac{1}{2}$ k. Montevideo, Chili.
 pendulinum Jacq., überhängender, $\frac{1}{2}$ w. Neu-Granada.
 salicifolium Jacq., weidenblättriger, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
 suberosum Jacq., korkiger, $\frac{1}{2}$ w. ?
 tinctorium Jacq., färbender, $\frac{1}{2}$ w. Caracas.
 tomentosum L., filziger, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.
 undulatum R. et P., wellenblättriger, $\frac{1}{2}$ w. Peru.
 venenatum Thbg., giftiger, $\frac{1}{2}$ k. t. Cap der gut. Hoffn.
 vespertinum L., Abend-H., $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
campanulatum Lam. v. *Atropa arborescens. lycoi-*
des Lichtenst. v. *Lycium cinereum.*

Ceterach W., Milzfarn, XXIV. I. Pterioideae (*Polypodiaceae*).

- officinarum W., officineller, $\frac{1}{2}$ k. f. Mittel-, Süd- und
 Westeuropa, Nordafrika.

Chaenanth Lindl., Chaenanth, XX. I. Orchideae.

- Barkeri Lindl., Barker's, $\frac{1}{2}$ w. Para.

Chaerophyllum T., Kälberkropf, V. II. Umbelliferae.

- angelicaefolium MB., angelicablättriger, $\frac{1}{2}$ f. Caucasus.
 aromaticum L., wohlriechender, $\frac{1}{2}$ f. Mittel- u. Südeuropa.
 aureum L., goldfarbiger, $\frac{1}{2}$ f. Mittel-, Ost- u. Südeuropa.
 β) *maculatum* W. γ) *monogonum* Kit. (? *angu-*
latum Kit. et *ciliatum* R. et S. Auctor).
 Biebersteinii R. et S., Bieberstein's, $\frac{1}{2}$ f. Caucasus.
 bulbosum L., knolliger, $\frac{1}{2}$ f. Europa, Nordasien.
 capense Thbg., capischer, $\frac{1}{2}$ f. Cap der guten Hoffn.
 coloratum L., farbiger, $\frac{1}{2}$ f. Dalmatien.
 elegans Gaud., zierlicher, $\frac{1}{2}$ f. Wallis.

Chaerophyllum

- gracile Bess. Trev. (*Cyminum* Fisch.), schlanker, 4. f. ?
 hirsutum L., rauhhaariger, 4. f. Mitteleuropa.
 humile MB., niedriger, 4. f. Iberien.
 nodosum Lam., knotiger, ☉. f. Südeuropa.
 procumbens Lam., niedergestreckter, ☉. f. Virginien.
 roseum MB. (*tenuifolium* Stev.), rosafarbener, 4. f.
 Armenien, Caucasus.

- temulum L., betäubender, ♂. f. Europa.
 tenuifolium Poir., feinblättriger, ♂. f. b. Marocco.
 torquatum DC., gelenkiger, ♂. f. Südfrankreich.
 Villarsii Koch (*Cicutaria* Rchb.), Villars's, 4. f. Mittel-
 europäische Alpen.

- canadense P. et Claytoni P. v. *Conopodium* canad.
 etc. sativum C. Bauh. et sylvestre L. v. *Anthriscus* Cerefol. et sylvestr.

Chaetachlaena odorata D. Don v. *Onoseris* odorata.

Chaetanthera R. et Pav., Schweifbeutel, XIX. II.
 Compositae-Eupatorineae.

- chilensis DC., chilesischer, 4. k. t. Chili.
 ciliata R. et P., gefranzter, ☉. f. Chili.
 incana Poepp. (*chilensis* Hook. et Arn.), graugrüner, ☉. f.
 Chili.

- multicaulis DC. (*flabellata* Don), vielstengeliger, ☉. f. Chili.
 serrata R. et P., sägezahniger, 4. k. t. Chili.

Chaetaria coerulescens P. B. etc. v. *Aristida* coerulescens etc.

Chaetocalix DC. (*Böninghausia* Spgl.), Schweifkelch,
 XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

- vincentina DC., St. Vincent's, ♂. Sch. w. Westindien.

Chaetogastra DC., *Chaetogastra* X. I., Lythraeae-
 Melastomaceae.

- gracilis Hook., schlanke, 4. w. Brasilien.
 lanceolata DC., lanzettblättrige, ☉. w. Trinidad.

Chaetospora RB., Schweifried, III. I., Cyperoideae.

- circinalis Schrad., eingerolltes, 4. k. t. Cap d. gut. H.
 dispar (Spgl.), ungleiches, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.
 turbinata RB., aufgetriebenes, 4. k. t. Cap d. gut. H.

Chaeturus Lk., Schweifgras, III. II., Gramineae.

- fasciculatus Lk., büschelförmiges, ☉. f. Spanien, Portugal.

Chailletia DC. (M. Chaillet, schweizerischer Botaniker), V. II., Amyrideae-Chailletieae.

- Toxicaria G. Don, giftige, ♂. w. Sierra Leone.

Chamaedorea W., Bergpalme, XXII. VI. (VI. III.),
 Palmae.

- elatio H. Berol., hohe, ♂. w. Mexico.
 elegans H. Berol., zierliche, ♂. w. Mexico.
 fragrans Mart., wohlriechende, ♂. w. Peru.
 gracilis W., schlanke, ♂. w. Südamerika.
 Schiedeana H. Berol., Schiede's, ♂. w. Mexico.

Chamaelirium W., Zwergglilie, VI. I., Colchicaceae.

- carolinianum W., carolinische, 4. f. Nordamerika.

Chamaenerion T. v. *Epilobium*.

Chamaepeuce Pr. Alp. DC., Sterndistel, XIX. I.
 Compositae-Cynarocephalae.

- afra DC., afrikanische, ♂. f. k. Griechenland, Nordafrika.
 Casabonae DC., Casabonische, ♂. k. Süditalien.
 cynaroides DC., artischockenähnliche, ♂. f. k. Creta,
 Ostcaucasien.
 diacantha DC., zweistachelige, ♂. f. k. Syrien.

Chamaepeuce

- echinocephala DC., stachelköpfige, 4. f. Taurien, Caucasus.
 fruticosa DC., strauchige, 7. k. Griechenland.
 gnaphalodes DC., ruhrkrautähnliche, 7. k. Neapel.
 mutica DC., unbewehrte, 7. k. Griechenland, Kleinasien, Nordafrika.
 stellata DC., gemeine, 10. f. Ober- u. Süditalien, Orient.
 stricta DC., steife, 4. f. b. k. Neapel.

Chamaerops L., Zwergpalme, VI. III. (xxiii. II.), Palmae.

- excelsa Wall., hohe, 7. w. t. Nepal.
 gracilis Lod., schlanke, 7. w. Südamerika.
 guianensis Lod., guianische, 7. w. Guiana.
 humilis L., gemeine, 7. t. w. Südeuropa, Nordafrika.
 Hystrix Fras., starkstachelige, 7. t. w. Georgia (Nordamer.).
 Palmetto Mchx., graugrüne, 7. t. w. Carolina, Florida.
 serrulata Mchx., feingesägte, 7. t. w. Georgia.
excelsa Thbg. v. *Rhapis flabelliformis*.

Chamagrostis minima Borkh. v. Mibora verna.**Chamissoa Humb. B. K. (A. Chamisso, berühmter Reisender und Botaniker zu Berlin), V. I., Aizoideae-Amaranthaceae.**

- altissima H. B. K., hohe, 7. w. Westindien, Südamer.
muricata Spgl. v. *Cladostachys frutescens*.

Chamorchis Rich. (Chamaerepes Spgl.), Zwergstendel, XX. I. Orchideae.

- alpina Rich., Alpen-Z., 4. f. Nord- und mitteleuropäische Alpen.

Chaptalia Vent. (M. Chaptal, berühmter französischer Chemiker, XIX. IV., Compositae-Eupatorieae).

- tomentosa Vent., filzige, 4. f. b. k. Carolina, Florida.
Anandria Spgl. vid. *Anandria Bellidiastrum* β . *lyrata* Spgl. v. *Anandria Bellidiastrum* a.

Chardinia Dsf., Chardinia, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

- xeranthemoides Dsf., strohblumenähnliche, 10. f. Armenien, Syrien, Persien.

Charieis Neesii Cass. v. Kaulfussia amelloid.**Charlwoodia Swt. (G. Charlwood, englischer Botaniker), VI. I., Coronariae-Asphodeleae.**

- australis G. Don, südliche, 7. t. Neuzeeland.
 congesta Swt., gedrängtblumige, 7. t. Neuholland.
 indivisa G. Don, ungetheilte, 7. t. Neuzeeland.
 stricta Swt., steife, 7. t. Neuzeeland.

Chasmonia Lindl., Stachelkelch, XIV. I., Labiatae.

- incisa Lindl., schlitzblättriger, 10. f. Calabrien, Griechenland.

Cheilanthes Sw., Schuppenfarn, XXIX. I., Pteroideae (Polypod.).

- angustifolia H. B. K., (*decomposita* W.), schmalblättriger, 4. w. Mexico.
 capensis Sw., capischer, 4. t. w. Cap der guten Hoffn.
 caudata RB., geschwänzter, 4. w. t. Neuholland.
 crenulata Lk. et Otto, gekerbter, 4. w. ? Südamerika.
 cuneata Lk. et Otto, keilförmiger, 4. w. ? Südamerika.
 dicksonioides J. Bevis, dicksonienähnlicher, 4. w. ?
 ferruginea W., rostfarbiger, 4. w. Peru.
 fragrans Sw., wohlriechender, 4. t. w. Madeira, Ostind.

Cheilanthes

- gracilis* Kaulf., schlanker, 4. f. k. Canada.
hirsuta H. Berol., rauhhaariger, 4. w. Mexico.
hirta Sw., kurzhaariger, 4. w. t. Cap der gut. Hoffn.
lendigera Sw. (*elegans* Desv.), körnertragender, 4. w.
 Neuspanien, Quito, Chili.
macrophylla J. Bevis, großblättriger, 4. w. Westind.
micromera H. Berol., feiner, 4. w. Mexico.
microphylla Sw., kleinblättriger, 4. w. Westindien.
micropteris Sw., kleiner, 4. w. Quito, Montevideo.
myriophylla Desv., vielzertheilter, 4. w. Südamerika.
odora Sw., riechender, 4. t. k. Schweiz, Italien, Südfrankreich.
profusa Kunze, großer, 4. t. w. Cap der gut. Hoffn.
pteroides Sw., saumfarnähnlicher, 4. t. w. C. d. g. H.
repens Kaulf., kriechender, 4. w. Westindien.
rufa Don, braunrother, 4. w. Nepal.
rufescens Lk., bräunlicher, 4. w. Mexico.
sinuosa J. Bevis, buchtiger, 4. w. Westindien.
spectabilis Kaulf., ansehnlicher, 4. w. Brasilien.
suaveolens Sw., starkkriechender, 4. t. Griechenland, Kleinasien, Nordafrika.
tenuifolia Sw., feinblättriger, 4. w. Ostindien, Neuholland, Inseln des stillen Meeres.
tomentosa H. Berol., filziger, 4. w. Mexico.
vestita Sw., bekleideter, 4. t. w. Pennsylvanien, Carolina.

Cheiranthus L., Lack, XV. III., Cruciferae.

- alpinus* L., Alpen-L., 4. f. Scandinavien.
Cheiri L., Gold-L., ♂. ♀. f. k. Mittel- u. Südeuropa.
 β) *fruticulosus* L.
 Garten-Varietäten: *ferrugineus*, *flavescens*, *flore pleno*, *grandiflorus*, *haemanthus*, *maximus*, *patulus*, *purpurascens*, *purp. variegatus*, *sanguineus*, *serratus*, *thyrsoides*, *variegatus*, *varius* etc.
linifolius P., leinblättriger, ♀. k. Spanien.
mutabilis L'Her., veränderlicher, ♀. 4. t. k. Canar. Inseln.
 β) *longifolius* Vent.
scoparius Brouss., besenartiger, ♀. 4. t. k. Teneriffa.
 β) *aeruginosus* DC. γ) *chamaeleo* Ker.
semperflorens Schousb. (*linearis* Vent.), immerblühender, ♀. 4. t. k. Barbarei.
 β) *frutescens* P.
tenuifolius L'Her., feinblättriger, ♀. 4. k. t. Madeira.
annuus L. etc. v. *Matthiola annua*. *cuspidatus* MB. (*bithymicus* P.) etc. v. *Erysimum cuspidat. lyratus* Sibth. Sm., *maritimus* L. v. *Malcolmia lyrat. maritima* etc.
mollis Hornem. vid. *Arabis albid. pinnatifidus* W. v. *Andreoskia pectinata*. *tomentosus* W. et *torulosus* MB. vid. *Sterigma toment.* etc. Hinsichtlich der meisten übrigen s. *Erysimum* und *Matthiola*.

Cheirostemon Humb. Bonpl., Fingerbaum, XVI. VI., Malvaceae-Sterculiaceae.

- platanoides* Humb., Bonpl., platanenblättriger, ♀. w. Neuspanien.

Cheirostylis Lindl., Fingerstendel, XX. I., Orchideae.

- parvifolia* Lindl., kleinblättriger, 4. w. Ceylon.

Chelidonium T., Schöllkraut, XIII. I., Papaveraceae.

- grandiflorum* DC. (*dahuricum* Hort.), großblumiges, 4. f. Dahurien.

Chelidonium

laciniatum Mill., schlitzbliätteriges, 4. f. Südeuropa.

majus L., gemeines, 4. f. Europa.

b) flore pleno.

Hinsichtlich der übrigen s. Glaucium et Roemeria.

Chelone L., Schildblume, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

barbata Cav. (*formosa* Wendl., *ruelloides* Andr.), bärtige, 4. f. b. k. Mexico.

β) major.

centranthifolia Benth., spornbaldrianbliätterige, 4. f. Californien.

glabra L., glatte, 4. f. Nordamerika.

Lyoni Pursh. (*major* Ker), Lyon's, 4. f. Carolina.

nemorosa Dougl., Hain-S., 4. f. Nordwestl. Amerika.

obliqua L., schiefe, 4. f. Nordamerika.

Hinsichtlich der übrigen s. Pentstemon.

Chenolea diffusa L. v. *Kochia sericea*.

Chenopodium T., Gänsefuß, V. II., Aizoideae-Atripliceae.

acuminatum W., zugespitzter, ☉. f. Sibirien.

album L. (*leiospermum* DC.), weißlicher, ☉. f. Europa, Asien, Afrika, Amerika.

β) glomerulosum Rchb. γ) paganum Rchb. δ) viride L.

ambrosioides L., wohlriechender, ☉. f. Mittel- u. Südamerika, Cap d. g. H., Mittel- und Süddeutschland.

anthelminticum L., wurmtreibender, ♂. 4. k. Nord- u. Südamerika.

aristatum L., gegrannter, ☉. f. Sibirien, Virginien.

Atriplicis L., Melden-G., ☉. f. China.

Biebersteinianum R. et S., Bieberstein's, ☉. f. Caucasus.

Bonus Henricus L., Dorf-G., 4. f. Europa.

botryoides Sm., traubenähnlicher, ☉. f. England.

Botrys L., Trauben-G., ☉. f. Südeuropa, Nord- und Südasien, Nordamerika.

carthagenense Zucc., neuspanischer, ☉. f. Südamerika.

caudatum Jacq., geschwänzter, ☉. f. m. Guinea.

ficifolium Sm. (*serotinum* Huds.), feigenbliätteriger, ☉. f. Deutschland, England.

foetidum Schrad. (*Schraderianum* R. et S.), stinkender, ☉. f. ? Südeuropa.

giganteum D. Don, riesenhafter, ☉. f. Nepal.

glaucum L., blaugrüner, ☉. f. Europa.

graveolens W. (*incisum* Poir.), starkkriechender, ☉. f. Mexico.

hircinum Schrad., Bock's-G., ☉. f. Brasilien.

humifusum Zuc., gestreckter, ☉. f. ?

hybridum L., Bastard-G., ☉. f. Europa, Asien, Nordamer.

lanceolatum W., lanzettbliätteriger, ☉. f. Nordamerika.

laterale Ait., seitenblumiger, ☉. f. Canarische Inseln.

leiospermum Schrad., weißsämiger, ☉. f. Chili.

marginatum Hornem., gerandeter, ☉. f. ?

multifidum L., vieltheiliger, 4. k. Südamerika.

murale L., Mauer-G., ☉. f. Europa, Asien, Afrika, Amer.

β) guinense Jacq.

opulifolium Schrad. (*microspermum* Wallr., *concatenatum* Thuill.), wasserholderbliätteriger, ☉. f. Europa.

patulum Roth, ausgebreiteter, ☉. f. Ostindien.

petiolare H. B. K., gestielter, ☉. f. Quito.

Chenopodium

polyspermum L., vielsamiger, ☉. f. Europa.

β) *acutifolium* Kit.

punctulatum Scop., punctirter. ☉. f. ?

Quinoa W., *Quinoa-G.*, ☉. f. Südamerika.

b) *rubrum*.

rubrum L. (*blitoides* Lej., *crassifolium* Hornem.), rother, ☉. f. Europa.

sepium Mayer, Zaun-G., ☉. f. Böhmen, Mähren.

serotinum L., spätblühender, ☉. f. Westeuropa, Sibirien.

suffruticosum W., halbstrauchiger, ♀. 4. Pensylv., Mexico.

triangulare RB., dreieckiger, ☉. f. Neuholland.

Tournefortianum Fisch., *Tournefort's*, ☉. f. Armenien.

urbicum L. (*melanospermum* Wallr., *chrysomelanospermum* Balb.), Stadt-G., ☉. f. Europa.

β) *rhombifolium* Mdhlg. (*intermedium* Koch).

Vulvaria L. (*foetidum* Lam., *olidum* Sm.), übelriechender, ☉. f. Europa.

altissimum RB. v. *Schanginia altissima*. *arenarium* Flor. Wett. (et *hirsutum* Wahlbg. etc.) v. *Kochia arenaria* etc. *baccatum* La Bill. vid. *Rhagodia Billardieri*. *crassifolium* Dsf. vid. *Cochliospermum Cavanillesii*. *hortense* R. et S. vid. *Suaeda hortensis*. *maritimum* L. etc. v. *Schoberia maritima* etc.

Cherleria L. (J. H. Cherler, Gehilfe von Johann Bauhin), X. III., Caryophyllaceae-Alsineae.

sedoides L., sedumähnliche, 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Schottland.

octandra Sbr. (*imbricata* Sering.) v. *Alsine aretioides*.

Chilochloa P. B. v. *Phleum*.

Chilophyllum DC., Garbenchamille, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

globosum DC., kugelblumige, 4. k. t. Mexico.

Chilodia RB., Lippenzahn, XIV. I., Labiatae.

scutellarioides RB. (*australis* Hort.), schildkrautähnlicher, ♀. t. Neusüdwallis.

Chiloglottis RB., Zungenstendel, XX. I., Orchideae.

diphylla RB., zweiblättriger, 4. Kn. w. t. Neuholland.

Chilopsis D. Don, Lippenmaske, XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.

saligna D. Don, weidenblättrige, ♀. t. Mexico.

Chimaphila Pursh v. *Pyrola*.

Chimonanthus Lindl., Winterblume, XII. III., Calycanthaceae.

fragrans Lindl. (*praecox* Lk.), wohlriechende, ♀. f. b. k. Japan, China.

β) *grandiflorus* Lindl. γ) *luteus*. δ) *parviflorus*.

Chiococca P. Br., Schneebeere, V. I., Rubiaceae.

anguifuga Mart. (*paniculata* Hoffmannsegg), rispenblumige, ♀. w. Brasilien.

racemosa L., traubenblumige, ♀. w. Westind., Südamer.

Chionanthus L., Schneeflockenbaum, II. I., Sapotaceae-Oleinae.

axillaris RB., achselblumiger, ♀. t. Neuholland.

virginica L., virginischer, ♀. f. Nordamerika.

β) *latifolia* Catesb. (*montana* Pursh). γ) *angustifolia* Ait. (*trifida* Mch.). δ) *maritima* Pursh Lod.

- Chironia** L., Chironie, V. I., Contortae-Gentianeae.
baccifera L., beerentragende, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
decussata Vent., kreuzblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.
frutescens L., strauchige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
 β) *angustifolia* Bot. mag. (? *grandiflora* Hort.)
 γ) *albiflora* Hort.
jasminoides L., jasminblumige, 4. ♀. t. Cap d. g. H.
linoides L., leinblättrige, 4. ♀. t. Cap d. g. H.
lychnoides L., lychnisartige, 4. ♀. t. Cap d. g. H.
nudicaulis L., nackstengelige, ♀. t. Cap d. g. H.
peduncularis Lindl. (*Barclayana* et *trinervia* Hortul.), gestielte, 4. ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
tetragona L., vierkantige, 4. ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
 Centaurium L. etc. v. *Erythraea* Cent. etc. *gracilis* Mchx. v. *Sabbatia gracilis* etc.
- Chitonia albicans** D. Don etc. v. *Diplochita albicans* etc.
- Chlidanthus** Herb., Weichblume, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.
fragrans Lindl., wohlriechende, 4. Zw. w. Chili.
- Chloanthes** RB., Grünling, XIV. II., Verbenaceae.
glandulosa RB., drüsiger, ♀. t. Neuholland.
rosmarinifolia Cunn., rosmarinblättriger, ♀. t. Neuholl.
Stoechadis RB., stoechasblättriger, ♀. t. Neuholland.
- Chlora** L., Chlore, VIII. II., Contortae-Gentianeae.
imperfoliata L., undurchwachsene, ☉. f. Oberitalien.
perfoliata L., durchwachsene, ☉. f. England, Mittel- und Südeuropa.
serotina Koch (*acuminata* Koch et Ziz.), spätblühende, ☉. f. Süddeutschland.
- Chloraea** Lindl., Grünstendel, XX. I., Orchideae.
longibracteata Benth., deckblättriger, 4. w. Chili.
- Chloranthus** Sw., Grünblume, IV. I. (XX. III.), Sandalaceae-Chlorantheae.
elatio RB., erhabene, ♀. t. w. China.
inconspicuus Sw., unansehnliche, ♀. t. w. China, Japan.
monander RB., einmännige, ♀. t. w. China.
monostachys Lindl., einährige, ♀. 4. t. w. China.
- Chloris** Sw., Chloris, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.
barbata Sw. (*caribaea* Spgl.), bärtige, ☉. w. Westindien, Südamerika.
ciliata Sw., gefranzte, ☉. w. Westindien, Südamerika.
elegans H. B. K., zierliche, ☉. w. f. Mexico.
fasciculata Schrad., büschelförmige, ☉. w. Brasilien.
gracilis Durand. (*Durandiana* R. et S.), schlanke, ☉. w. f. Mexico.
inflata Lk., aufgeblasene, 4. k. t. Californien.
polydactyla Sw. (*compressa* DC.), vielährige, ☉. w. Westindien, Südamerika.
polystachya Roxb. (*Roxburghiana* R. et S.), Roxburgh's, ☉. w. Ostindien.
pubescens Lagasc., weichhaarige, ☉. w. ? Peru.
radiata Sw. (*pallida* W.), strahlige, ☉. w. f. Westindien, Cap der guten Hoffnung.
retusa Lag., eingestutzte, ☉. m. f. Bonarische Inseln.
submutica H. B. K. (*imberbis* DC.), unbewehrte, ☉. w. f. Mexico, Brasilien.
truncata RB. (*doligostachya* Lag., *elongata* Poir., *megastachya* Schrad.), abgestutzte, 4. w. Neuh., Philippinen.
ventricosa RB., bauchige, 4. t. Neuholland.

Chloris

- curtipendula* Mchx. vid. *Atheropogon apludoides*.
monostachya W. vid. *Chondrosium tenue*. *petraea*
 Thbg. v. *Eustachys petraea*. *poaeformis* H. B. K.
 v. *Leptochloa virgata*.

Chlorophytum Ker, Grünlilie, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

elatum RB., erhabene, 4. t. Cap d. g. Hoffnung.

inornatum Ker, ungezierte, 4. w. Sierra Leone.

Orchidastrum Lindl., orchisähnliche, 4. w. Sierra Leone.

Chloroxylon DC., Grünholz, X. 1., Hesperideae-Cedreleae.

Swietenia DC., van Swieten's, 5. w. Ostindien.

Choisya H. B. K. (J. D. Choisy, Genfer Botaniker), X. 1., Tricoccae-Rutaceae.

ternata H. B. K., dreizählige, 5. w. Mexico.

Chomelia Jacq. (J. B. Chomel, französischer Naturforscher), IV. 1., Rubiaceae.

fasciculata Sw., büschelförmige, 5. w. Jamaica.

spinosa Jacq., dornige, 5. w. Caracas.

Chona D. et G. Don v. *Erica*.

Chondrilla L., Knorpelsalat, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

aspera Poir., rauher, ♂. f. ?

brevirostris Fisch. et Mey. (*juncea* Ledeb.), kurzschnebeliger, ♂. f. Altai.

graminea MB., grasartiger, 4. f. Caucasus.

juncea L., gemeiner, ♂. f. Europa, Sibirien.

β) *rigens* Rchb. (*latifolia* Koch, *Gaudini* Hegetsch. *virgata* Presl). γ) *acantophylla* Wallr.

latifolia MB., breitblättriger, ♂. f. Taurien, Griechenl.

pauciflora Ledeb., wenigblumiger, 4. f. Sibirien.

prenanthoides Vill., hasenlattichartiger, 4. f. Baiern, Krain, südliche Schweiz.

stricta Ledeb., steifer, ♂. f. Taurien.

Choretis Herb., Choretis, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

glaucula Herb., blaugrüne, 4. Zw. w. Mexico.

Chorisporea DC., Griffelrettig, XIX. 1., Cruciferae.

iberica DC., iberischer, ♂. f. Ostcaucasus.

sibirica DC., sibirischer, ♂. f. Sibirien.

stricta DC., steifer, ♂. f. Sibirien.

tenella DC., zarter, ♂. f. Podolien, Taurien, Sibirien.

β) *arcuata*.

Chorizema La Bill., Chorizema, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

cordatum Lindl., herzblättrige, 5. t. Neu-Südwallis.

Dicksonii R. G., Dickson's, 5. t. Neuholland.

Henchmanni RB., Henchmann's, 5. t. Neuholland.

ilicifolium La Bill., stechhülsenblättrige, 5. t. Neuholl.

nanum Sims, Zwerg-Ch., 5. t. Neuholland.

ovatum Lindl., eiförmige, 5. t. Neuholland.

rhombeum RB., rautenförmige, 5. t. Neuholland.

spartioides Lod., pfriemenähnliche, 5. t. Neuholland.

triangulare Lindl., dreieckige, 5. t. Neuholland.

scandens Sm. v. *Podolobium scandens*.

Chrysanthellum Rich., Zwergwucherblume, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

procumbens Rich., niederliegende, ♂. f. m. Westindien.

Chrysanthemum T. L., Wucherblume, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

Chrysanthemum

I. Genuini.

Broussonetii Balb., Broussonet's, $\frac{1}{2}$ k. Canarische Inseln.

β) parvifolium.

carinatum Schousb. (*tricolor* Andr.), nachenförmige, $\odot$. f. m. Nordafrika.

carnosulum DC. (*frutescens* Thbg.), fleischige, $\frac{1}{2}$ k. t. Cap der guten Hoffnung.

coronarium L., gekrönte, $\odot$. f. Orient, Südeuropa, Nordafrika.

β) matricarioides Hortul.

foeniculaceum DC., fenchelblättrige, $\frac{1}{2}$ k. Canarische Ins.

frutescens L., strauchige, $\frac{1}{2}$ k. Canarische Inseln.

a) crithmifolium (W.). β) pinnatifidum (*foeniculaceum* W.). γ) bipinnatifidum (*anethifolium* W.).

grandiflorum W., großblumige, $\frac{1}{2}$ k. Canarische Inseln.

a) adauctum (*tanacetifolium* H. Par.). β) intermedium (*foliosum* Brouss.). γ) subnudum. δ)

cuneiforme (*coronopifolium* W.).

pinnatifidum L. suppl., fiederspaltige, $\frac{1}{2}$ k. Madeira.

Roxburghii Dsf. (*senecioides* Dunal), Roxburgh's, $\odot$. f. m. Ostindien.

a) discoideum. β) breviradiatum Hortul. γ) radiatum.

segetum L., Saat-W., $\odot$. f. Scandinavien, Deutschland, Frankreich, England.

viscosum Dsf., schmierige, $\odot$. f. Südspanien.

II. Leucanthemum T. DC.

arcticum L., nördliche, 4. f. Kamtschatka.

atratum L., schwärzliche, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

cebnense DC. (*monspeliense* L.), französische, 4. f. Frankreich.

corsicum Sieb., corsische, 4. f. Corsica.

graminifolium L., grasblättrige, 4. f. West- und Südeuropa, Rußland.

heterophyllum W., verschiedenblättrige, 4. f. Piemont.

integrifolium Richard's, ganzblättrige, 4. f. Nordamer.

ircutianum DC., sibirische, 4. f. Sibirien.

lanceolatum P., lanzettblättrige, 4. f. Südfrankreich.

latifolium (W.), (*grandiflorum* Hort.), breitblättrige, Pyrenäen, Portugal.

β) lacustre Brot.

Leucanthemum L. (*sylvestre* W.), gemeine, 4. f. Europa.

maximum Ramond (*grandiflorum* Lapeyr.), größte, 4. f. Pyrenäen.

montanum L., Berg-W., 4. f. Süddeutschland, Oberitalien, Frankreich.

pallens Gay (*hispidum* A. Rich.), bleiche, 4. f. Südfrankreich.

rotundifolium W. K., rundblättrige, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen.

setabense Dufour (*paludosum* Dsf., *glabrum* Poir., *carnosum* P.), spanische, $\odot$. f. Spanien, Nordafrika.

sibiricum Turcz. (*monspeliense* H. Par.), *arcticum* Ledeb.), 4. f. Sibirien, Dahurien.

sinuatum Ledeb. (*absinthifolium* Fisch.), buchtige, $\frac{1}{2}$ 4. f. Sibirien.

Hinsichtlich der übrigen s. *Matricaria* et *Pyrethrum*.

Chryseis californica Lindl., *crocea* Benth etc. v. *Eschscholtzia californica* etc.

Chryseis Cass. Less. v. *Centaurea moschata* etc.

Chrysiphiala Lamb. Ker, Goldnarcisse, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

curvidendata Herb., krümmzähnige, 4. Zw. w. t. Peru.

flava Ker, hellgelbe, 4. Zw. w. t. Peru.

pauciflora Lindl., wenigblumige, 4. Zw. w. t. Peru.

crocea Loud. v. *Stenomesson croceum*.

Chrysobalanus L., Goldpflaume, XII. 1., Amygdalaceae-Chrysobalaneae.

Icaco L., westindische, 5. w. Westindien, Südamerika.

oblongifolius Mchx., langblättrige, 5. k. t. Carolina, Florida.

Chrysobotrya Spach. v. *Ribes aureum* etc.

Chrysocoma L., Goldhaar, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

I. genuin.

ciliata L. (*ciliaris* W.), gefranztes, 5. k. Cap d. g. H.

Coma aurea L., aechtes, 5. k. Cap der guten Hoffn.

β) *patula* L. γ) *cernua* L.

? *nivea* W., schneeweisses, 5. k. Cap der guten Hoffn.

II. *Bigelowia* DC.

dracunculoides Pursh (*graveolens* Nutt.), dragunähnliches, 5. 4. f. Nordamerika.

missouriensis DC. (*nauseosa* Pursh), missourisches, 4. f. Nordamerika.

nudata Mchx., kahles, 4. f. Nordamerika.

virgata Nutt., ruthenförmiges, 4. f. Nordamerika.

III. *Linosyris* Lob. (*Crinitaria* Less., *Crinita* Mch.).

divaricata Fisch., sparriges, 4. f. Astrachan.

glabrata Lindl., glattes, 4. f. Altai.

Linosyris L. (*vulgaris* Cass.), flachsblättriges, 4. f. Europa.

punctata Cass. (*dracunculoides* Lam., *biflora* L. spec.), punktirtes, 4. f. Sibirien.

villosa L., zottiges, 4. f. Ungarn, Caucasus, Sibirien.

amara Schum. v. *Decaneuron senegalense*. *biflora*

Lam. v. *Aster* (*Galatella*) *dracunculoides*. β) *cam-*

phorata Rob. et Cast. (*saxatilis* DC.) v. *Jasonia*

glutinosa. *cinerea* La Bill. v. *Ozothamnus cinereus*.

graminifol. L. (*virginiana* H. Par.) v. *Solidago graminifol.*

scabra Thb. v. *Aster* (*Felicia*) *reflexus*,

squamata La Bill. v. *Leptorhynchus squamatus*.

Chrysogonum L., Goldkante, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

Diotostephus DC. (*virginianum* Mchx.), zweiöhrige, 4. f. Carolina.

virginianum L., virginische, 4. f. Virginien, Carolina.

Chrysophyllum L., Goldblatt, V. 1., Sapotaceae.

angustifolium Lam., schmalblättriges, 5. w. Westindien.

argenteum Jacq., silberblättriges, 5. w. Westindien.

Cainito L., Sternapfel-G., 5. w. Westindien.

β) *jamaicense*. γ) *coeruleum*. δ) *microphyllum*.

glabrum Jacq., glattes, 5. w. Westindien.

macrophyllum G. Don, großblättriges, 5. w. Sierra Leone.

monopyrenum Sw. (*acuminatum* Lam.), einkörniges, 5. w. Westindien.

macrophyllum Lam. v. *Bumelia nervosa*. *splendens*

Spgl. v. *Nycterisition ferrugineum*.

Chrysopogon Trin., Goldbart, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.

Gryllus Trin., südlicher, 4. f. b. Südeuropa.

Chrysopsis Nutt., Goldalant, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

villosa Nutt., zottiger, 4. f. Nordamerika.

Chrysosplenium T., Goldmilz (*Milzkraut*), X. II., Saxifrageae.

alternifolium L., wechselblättriges, 4. f. Europa, Japan.

nepalense D. Don, nepal'sches, 4. f. Nepal.

oppositifolium L., gegenblättriges, 4. f. Europa.

Chrysostemma tripteris Less. v. *Coreopsis tripteris*.

Chrysurus P., Goldschwanz, III. II., Gramineae.

cynosuroides P. (*aureus* P. B.), kammgrasähnlicher, ☉. f. Südeuropa, Levante, Nordafrika.

echinata P. B., *effusus* P. B. et *elegans* P. B. v.

Cynosurus echinatus etc.

Chymocarpus D. Don, Capucinerbeere, VIII. I., Tropaeoleae.

? *brachyceras** (Hook), kurzspornige, 4. Sch. t. Chili.

? *Jarattii** (Youell), Jaratti's, 4. Sch. t. Santiago.

pentaphyllus D. Don, fünfblättrige, 4. Sch. t. k. Monte Video.

? *polyphyllus** (Cav.), vielblättrige, 4. Sch. t. Chili.

*tricolor** (*tricolorum* Swt.), dreifarbig, 4. Sch. t. Valparaiso.

? *tuberosus* (Maund), 4. Kn. Peru.

Chysis Lindl., Chysis, XX. I., Orchideae.

aurea Lindl., goldfarbig, 4. w. Venezuela.

Cibotium Kaulf., Knorpelfarn, XXIV. I., Pterioideae.

Billardieri Kaulf., Billardier's, 4. 5. w. Neuholland.

Schiedei H. Berol., Schiede's, 4. w. Mexico.

Cicca L., Cicca, XXI. IV., Tricoccae-Euphorbiaceae,

disticha L., zweizeilige, 5. w. Ostindien.

Cicer T., Kichern, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

arietinum L., gemeine, ☉. f. Südeuropa.

Lens W. v. *Ervum* Lens.

Cichorium T., Wegwart, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

Endivia L., Endivien-W., ☉. ♂. f. Ostindien, Nepal.

a) *Cosnia* Hamilt. β) *sativa*.

Intybus L., Cichorien-W., 4. f. Europa.

β) *divaricatum* Schousb. Ost- und Westeuropa, Nordafrika.

pumilum Jacq., kleine, ☉. f. ?

spinosum L., stechende, ☉. ♂. f. k. Griechenland, Sicilien.

Ciconium Swt. v. *Pelargonium*.

Cicuta L., Wasserschieferling, V. II., Umbelliferae.

bulbifera L., knolliger, 4. f. Nordamerika.

dahurica Fisch., dahurischer, 4. f. Sibirien.

maculata L., gefleckter, 4. f. Nordamerika,

virosa L., giftiger, 4. f. Europa, Sibirien.

β) *tenuifolia* Fröl. (*angustifolia* Kit., *stricta* Schulz).

venenata Nutt. v. *Ferula villosa*.

Cimicifuga L., Wanzenkraut, XIII. V., Ranunculaceae.

I. *genuina*.

americana Mchx., amerikanisches, 4. f. Carolina.

cordifolia Pursh, herzblättriges, 4. f. Carolina.

Cimicifuga

foetida L., stinkendes, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen, Galizien, Sibirien, Nordamerika.

β) simplex Wormsk. (*macropoda* Turcz.).

II. *Botrophis* Rafin. (*Macrotis* Rafin.).

Serpentaria Pursh, Schlangen-W., 4. f. Nordamerika. *palmata* Mchx. v. *Trautvetteria palmata*.

Cinchona L., Fiebertindenbaum, V. 1., Rubiaceae.

Condaminea Humb. (*officinalis* L.), Condamine's, 5. w. Peru, Südamerika.

? *scabra* Lod., scharfer, 5. w. Südamerika.

excelsa Roxb. et *thyrsiflora* Roxb. v. *Hymenodictyon excelsum* etc. *gratissima* Wall. v. *Luculia gratissima*.

Cineraria L., Aschenpflanze, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

? *alliariaefolia* Dsf., lauchkrautblättrige, 5. k. t. ?

aurita L'Her., geöhrte, 5. k. t. Madeira.

canescens Wendl. (*parviflora* Ait., *Aitoniana* Spgl.), weisgraue, 5. k. t. Cap der guten Hoffnung.

cruenta Mass. (*aurita* Andr.), blutrothe, 4. k. t. Teneriffa.

β) ? *lactea* Jacq. fil.

geifolia L., geumblättrige, 4. 5. k. t. Cap d. gut. H. *geraniifolia* DC. (? *angulosa* Lam.), storchschnabelblättrige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

humifusa L'Her., niedergestreckte, 4. k. t. Cap d. g. H.

hybrida W., Bastard-A., 5. k. t. ?

lanata L'Her., wollige, 5. k. t. Teneriffa.

lobata L'Her., gelappte, 4. 5. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

malvaefolia L'Her., malvenblättrige, 4. k. t. Azoren, canarische Inseln.

multiflora L'Her., vielblumige, 4. k. t. Canarische Inseln.

β) ? *elatio*r Bouché.

Petasites Sims (*platanifolia* Schrk.), pestwurzblättrige, 5. k. t. Mexico.

populifolia L'Her. (*appendiculata* L. fil.), pappelblättrige, 5. k. t. Canarische Inseln.

β) *leucantha* Vent. (*lactea* W. non Jacq. *alba* Hortul.).

ramentacea L'Her., schuppige, 4. k. t. Teneriffa.

tomentosa Less., filzige, 4. 5. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

? *viscosa* Ait., schmierige, ♂. 5. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

altaica Meyer, *macrophylla* Ledeb., *sibirica* L., *speciosa* Schrad. (*Fischeri* Ledeb.) v. *Ligularia*

altaica etc. *amelloides* L., *tenella* Lk. v. *Agathaea*

amelloides etc. *aurantiaca* Hoppe, *campestris* Retz

etc. v. *Senecio aurantiacus* etc. *cymbalariaefol.* L.

Thbg., *elongata* L. fil. (*scordifolia* H. Berol.) v.

Brachyrhynchos cymbalariaefol. etc. *hirsuta* Vent.

v. *Munychia* (*Aster*) *hirsut.* *linifolia* L. v. *Euryops*

linifol. *Tussilaginis* L'Her. v. *Pericallis Tussilag.*

Cinna L., Cinna, III. 11., Gramineae.

arundinacea L., rohrartige, 4. f. Nordamerika.

filiformis Lk., fadenförmige, 4. f. Nordamerika.

lateriflora Kunth, seitenblüthige, 4. f. Nordamerika.

mexicana Lk., mexicanische, 4. f. k. Mexico.

racemosa Kunth, traubige, 4. f. Nordamerika.

sobolifera Lk., sprossende, 4. f. Nordamerika.

Hinsichtlich der übrigen s. *Mühlenbergia*.

Cinnamomum R. B. N. E., Zimmtbaum, IX. 1., Laurineae.

Cinnamomum

- Beiologota Swt. (*Hamilt.*), Beiologota-Z., $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
 Camphora Swt., Kampferbaum, $\frac{1}{2}$ k. Japan, China.
 Cassia D. Don, Kassien-Z., $\frac{1}{2}$ w. Ceylon, Cochinchina.
 Culilaban Swt., Nelken-Z., $\frac{1}{2}$ w. Molucken.
 dulce, G. Don, süßser, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien, Java.
 glaucum, G. Don, blaugrüner, $\frac{1}{2}$ t. k. Japan.
 gracile Swt., schlanker, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
 Malabattrum G. Don, malabarischer, $\frac{1}{2}$ w. Malabar.
 montanum G. Don, Berg-Z., $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
 nitidum Hook., glänzender, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
 verum Swt., wahrer, $\frac{1}{2}$ w. Ceylon, Cochinchina.

Cipura Aubl., Sumpfschwertel, III. 1., Irideae.

- coelestis* (Lehm.), himmelblauer, 4. w. Brasilien, Mexico.
 coerulea* (Ker), blauer, 4. w. Brasilien.
 gracilis* (Herb.), schlanker, 4. w. Brasilien.
 humilis Humb., niedriger, 4. w. Neu-Granada,
 longifolia* (Lk. et Otto), langblättriger, 4. Kn. w. Brasilien.

- martinicensis Humb., martiniquischer, 4. w. Westindien.
 Northiana* (Schneev.), breitstieliger, 4. w. Brasilien.
 paludosa Aubl., guianischer, 4. w. Guiana.

β) graminea Humb.

- Sabini* (Lindl.), Sabine's, 4. w. St. Thomas.
 semiaperta* (Lod.), halbgeöffnete, 4. w. Brasilien.

Circaea T., Hexenkraut, II. 1., Onagrariae.

- alpina L., Alpen-H., 4. f. Europa, Nordamerika.
 intermedia Ehrh., mittleres, 4. f. Europa, Nordamerika.
 lutetiana L., gemeines, 4. f. Europa, Nordamerika.

Cirrhaea Lindl., Cirrhaea, XX. 1., Orchideae.

- fuscolutea Lindl., braungelbe, 4. w. Brasilien.
 Loddigesii Lindl. (*dependens* Bot. reg.), Loddiges's, 4. w. Brasilien.

obtusata Lindl., stumpfe, 4. w. Brasilien.

Seideliana Rchb., Seidel's, 4. w. Brasilien.

tristis Lindl., traurige, 4. w. Mexico.

viridipurpurea Lod., grünpurpurfarbige, 4. w. Brasilien.

Warreana Lod., Warre's, 4. w. Brasilien.

Cirrhopetalum Lindl., Braunstendel, XXI. 1., Orchideae.

caespitosum Wal., rasenartiger, 4. w. Ostindien.

Thouarsii Lindl., Thouar's, 4. w. Societätsinseln.

Wallichii Lindl., Wallich's, 4. w. Nepal.

Cirsium T., Federdistel, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

acaule All., stengellose, 4. f. Europa, Caucasus.

β) caulescens. γ) Gmelini Sggl.

aciculare Tausch (*orgyale* Hort.), nadelartige, ♂. f. ?

aduncum Fisch. et Mey., hackenförmige, ♂. f. Persien.

altissimum Lk., höchste, 4. f. Nordamerika.

ambiguum All., zweifelhafte, 4. f. Piemont, Dauphiné.

β) hastatum. γ) albidum.

anglicum Lobel DC. (*pratens.* Huds.), englische, 4. f.

Süddeutschland, England, Frankreich, Oberitalien.

angustifolium DC., schmalblättrige, 4. f. ?

arachnoideum MB., spinnwebenhaarige, ♂. f. Caucasus.

arvense Scop., Acker-F., ♂. f. Europa, Nordamerika.

β) neglectum Fisch., Sibirien.

Bertolonii Sggl., Bertolone's, ♂. f. Italien.

Cirsium

bulbosum DC. (*tuberosum* All. et *medium* All.), knollige, 4. f. England, Deutschl., Schweiz, Frankr., Piemont.
canum MB., graublätterige, 4. f. Ostdeutschl., Taurien.
carniolicum Scop. (*rufescens* Ram.), krainerische, 4. f. Krain, Kärnthen, Pyrenäen.

cernuum Lag. (*lappac.* H. Par.), übergebogene, 4. k. Mexico.
Chailletii Gaud., Chaillet's, ♂. f. Oesterreich, Schweiz.
chium DC., griechische, 4. f. Chios.

ciliatum MB., gefranzte, 4. f. Taurien, Caucasus, Persien, Sibirien.

controversum DC., streitige, 4. f. Schweiz, Piemont.

α) *purpureum* All. (*tricephaloides* β. DC. Cervini Thom.). β) *albidum*.

creticum d'Urv., cretische, 4. f. b. k. Creta.

dealbatum MB., weisblätterige, 4. f. Nordcaucasus.

desertorum Fisch., Wüsten-F., 4. f. Sibirien.

discolor Lk., verschiedenfarbige, 4. f. Nordamerika.

echinatum DC., starkstachelige, ♂. f. Südfrankr., Nordafr.

echinocephalum MB., stachelköpfige, 4. f. Caucasus.

eriphorum Scop., wolkköpfige, ♂. f. Süd- u. Osteuropa.

β) *spurium*.

erucagineum DC., rankenähnliche, 4. f. Dauphiné, südliche Schweiz.

β) *Hallerianum*.

ferox DC., wilde, ♂. f. Südeuropa.

β) *Lobellii* Ten.

fimbriatum Spgl., gefranzte, 4. f. Caucasus.

giganteum Spgl., riesenförmige, ♂. f. Süditalien, Nordafr.

glabro-monspessulanum Gay, glatte, 4. f. Pyrenäen.

glabrum DC., kahle, 4. f. Pyrenäen.

glutinosum Lam. (*Erisithales* Lk.), kleberige, 4. f. Europäische Alpen.

heterophyllum All., verschiedenblätterige, 4. f. Europa, Nordasien.

β) *helenioides* All.

horridum MB., abschreckende, ♂. f. Caucas., Armenien.

hybridum Koch (*palustri-oleraceum* Schied.), Bastard-F., ♂. f. Deutschland.

incanum Fisch., weißgraue, 4. f. Sibirien, Taurien, Pers.

inermis Lk., unbewehrte, 4. f. ? Pyrenäen.

italicum DC. (*samniticum* Ten.), italienische, ♂. f. Italien, Griechenland.

Lachenalii Koch (*pallens* DC. *tuberos. olerac.* Schied.), Lachenal's, 4. f. Europa.

lanceolatum Scop., lanzettige, ♂. f. Europa, Nordamer.

β) *hypoleucum* Rchb. γ) *brevedecurrens* DC.

laniflorum MB., wollblumige, ♂. f. Taurien.

lappaceum MB., klettenartige, ♂. f. Caucasus.

lucidum DC., glänzende, 4. f. ?

macrocephalum C. A. Mey., großköpfige, ♂. f. Ostcaucas.

mite Fisch., milde, ♂. f. ? Sibirien.

montanum Spgl., Berg-F., 4. f. Croatien, Oberitalien.

monspessulanum All., französische, 4. f. Oberitalien, Südfrankreich, Spanien.

β) *pyrenaicum* DC. γ) *dissectum* DC.

munitum MB., verwahrte, 4. f. Caucasus.

muticum Mchx., kurzspitzige, 4. f. Nordamerika.

neglectum Fisch., übersehene, 4. f. Sibirien.

nemorale Rchb., Hain-F., ♂. f. Sachsen.

Cirsium

Nuttallii DC., Nuttall's, 4. f. Nordamerika.

obvallatum MB., verhüllte, ♂. f. Caucasus.

ochroleucum All., weißgelbe, 4. f. Mitteleuropa.

β) *arachnoideum* DC. γ) *mixtum* DC. (*hybrid.*
Schlchr. non Koch).

oleraceo-rivulare Schied. (*praemorsum* Michl.), Bastard-
gemüse-F., 4. f. Deutschland.

oleraceum All., Gemüse-F., 4. f. Mittel- und Nord-
europa, Sibirien.

orgyale Lk., klastelhohe, 4. f. ?

palustre Scop., Sumpf-F., 4. f. Europa, Sibirien.

palustri-bulbosum DC. (*tuberosum* Schied.), 4. f. Deutschl.

pannonicum Gaud., ungarische, 4. f. Ungarn, Kärn-
then, Oesterreich, Schweiz.

parviflorum DC., kleinblumige, 4. f. Deutschland.

pauciflorum Spgl., wenigblumige. 4. f. Steiermark.

polyanthemum Spgl. (et *pungens* Spgl., *elatus* Lk.),
vielblumige, ♂. f. Italien.

pratense DC., Wiesen-F., 4. f. Südfrankreich.

rigens Wallr. (*tataricum* Auctor. *decoloratum* Koch, *acauli-*
olerac. Schied.), starre, 4. f. Deutschland.

rigidum DC., steife, ♂. f. Iberien.

rivulare Lk. (*tricephaloides* DC.), Bach-F., 4. f. Mittel-
europäische Voralpen.

β) *faliburgense* (W.).

semidecurrens DC. (? *paniculatum* Spgl.), halbherablauf-
ende, 4. f. ? Pyrenäen.

sempipectinatum Ledeb., halbkaminförmige, 4. f. ? Sibirien.

serratuloides DC., scharfenähnliche, 4. f. Sibirien.

serratum Tausch., gesägte, 4. f. Südeuropa.

serrulatum MB., feingesägte, ♂. f. Mittelrussland.

setosum MB. (*argenteum* Peyer), borstige, ♂. f. Ost-
europa, Taurien.

siculum Spgl., sicilianische, ♂. f. Sicilien, Armenien.

β) *pungens*.

sorocephalum Fisch. et Mey., dichtköpfige. ♂. f. Nord-
persien.

spathulatum Gaud., spathelförmige, ♂. f. Oberitalien,
südliche Schweiz.

spinosissimum Scop., langstachelige, 4. f. Mitteleuro-
päische Alpen, Sibirien.

squarrosus Fisch., sparrige, 4. f. Sibirien.

strictum Tenor., steife, 4. f. Neapel.

strigosum Fisch. et Mey., striegelige, ♂. f. Caucasus,
Armenien.

subalpinum Gaud., Voralpen-F., 4. f. Süddeutschland,
Schweiz.

β) *lacteum* Schlchr.

sylvaticum Tausch, Wald-F., ♂. f. Böhmen.

tataricum Wim. et Grab., tatarische, 4. f. Osteuropa,
Sibirien.

Tauschii DC. (*angustifol.* Tausch), ♂. f. ?

uliginosum MB., Sumpf-F., 4. f. Caucasus.

Zizianum Koch, Ziz's, 4. f. Süddeutschland.

Acarna Mch. v. *Picnomon* *Acarna*. *afrum* DC.,
Casabonae DC. etc. v. *Chamaepeuce* *afra* etc. *salin-*
um MB. v. *Leuzea* *salina*. *scleranthum* MB. (*car-*
linoides Fisch.) v. *Echenais* *carlinoides*, *syriacum*
G. v. *Notabasis* *syriaca*.

Cissampelos L., Pareirawurzel, XXII. XIII., Menispermaceae.

- Caapeba L., Caapeba-P., 4. Sch. w. Westindien.
 capensis Thbg., capische, 5. Sch. t. Cap d. gut. Hoffn.
 hirsuta Hamilt., rauhhaarige, 5. Sch. t. Nepal.
 mauritiana Thouars, mascarenische, 5. Sch. w. Mascarenas.
 microcarpa DC., kleinfrüchtige, 5. Sch. w. Westindien.
 Pareira L., ächte, 4. Sch. w. Westindien, Südamerika.
 smilacina W. v. Menispermum smilac.

Cissus L., Klimme, IV. I., Viniferae.

- acida L., saure, 5. Sch. Westindien.
 adnata Roxb., verwachsene, 5. Sch. Ostindien.
 angustifolia Roxb., schmalblättrige, 5. Sch. w. Ostindien.
 antarctica Vent., südliche, 5. Sch. t. Neuholland.
 auriculata Roxb., geöhrt, 5. Sch. w. Ostindien.
 caesia Afzel., hechtblaue, 5. Sch. w. Guinea.
 capensis Thbg., capische, 5. Sch. t. w. Cap der guten
 Hoffnung, Mascarenas.
 diversifolia DC. (*heterophylla* W.), verschiedenblättrige,
 5. Sch. w. ?
 glandulosa Gmel., drüsige, 5. Sch. w. Arabien, Ostindien.
 glauca Roxb., blaugrüne, 5. Sch. w. Malabar.
 latifolia Lam., breitblättrige, 5. Sch. w. Ostindien.
 microcarpa Vahl, kleinfrüchtige, 5. Sch. w. Westindien.
 orientalis Lam., morgenländische, 5. Sch. w. Ostindien.
 ovata Lam., eiförmige, 5. Sch. w. Westindien.
 pentaphylla W. (*tenuis* P.), dünne, 5. Sch. t. Japan.
 punctulosa Rich., feinpunctirte, 5. Sch. w. Cayenne.
 quadrangularis L., vierkantige, 5. Sch. w. Arab., Ostind.
 quinata Ait., fünfzählige, 5. Sch. w. t. Cap d. g. H.
 quinquefolia Soland., fünfblättrige, 5. Sch. w. Brasilien.
 repens Lam., kriechende, 5. Sch. w. Malabar.
 sicyoides L., sicyosähnliche, 5. Sch. w. Jamaica.
 smilacina Kunth, smilaxähnliche, 5. Sch. w. Südamerika.
 trifoliata L. (*alata* Jacq.), dreiblättrige, 5. Sch. w. Jamaica.
 trilobata Lam., dreilappige, 5. Sch. w. Ostindien.
 vitiginea L., weinblättrige, 5. Sch. w. Ostindien.

Cissus Ampelopsis P. v. *Ampelopsis cordata*.

hederacea P. v. *Ampelopsis hederacea*.

Cistus T., Ciströschen, XIII. I., Cistineae.

- albidus L., weißliches, 5. k. Spanien, Portugal.
 asperifolius Swt., rauhblättriges, 5. k. Südeuropa.
 candidissimus Dun., weißfilziges, 5. k. Canarische Inseln.
 canescens Swt., grauliches, 5. k. ?
 Clusii Dun. (*Libanotis* Dsf., *stenophyllus* Lk.), Clusius's,
 5. k. Spanien, Nordafrika.
 complicatus Lam., gefaltetes, 5. k. Kleinasien, Spanien.
 corbariensis Pourr. (*hybridus* Pourr.), corbierisches, 5. k.
 Südfrankreich, Spanien.
 cordifolius, Swt., herzblättriges, 5. k. ?
 creticus L., cretisches, 5. k. Creta, Kleinasien, Taur.
 β) tauricus Presl.
 crispus L., krausblättriges, 5. k. Südeuropa.
 Cupanianus Presl., Cupani's, 5. k. Sicilien.
 β) acutifolius Swt. (*salviaefolius* β. *humifusus* DC.).
 cymosus Dun., afterdoldiges, 5. k. Spanien.
 cyprius Lam. (*ladaniferus* B.M.), cyprisches, 5. k. Cyprus.
 Dunalianus Swt. (*undulatus* Dun.), Dunal's, 5. k. ?
 florentinus Lam., florentinisches, 5. k. ? Italien.
 heterophyllus Dsf., verschiedenblättriges, 5. k. Nordafrika.

Cistus

hirsutus Lam., rauhhhaariges, f. k. Spanien, Portugal.
incanus L., weifsgraues, f. k. Südeuropa.
ladaniferus L., Ladanum-C., f. k. Spanien, Portugal.

β) *albiflorus* γ) *maculatus*.

latifolius Swt., breitblättriges, f. k. Barbarei.
laurifolius L., lorbeerblättriges, f. k. Südfrankr., Span.
laxus Ait., lockeres, f. k. Spanien, Portugal.
Ledon Lam., mittelländisches, f. k. Südfrankreich.
longifolius Lam. (*nigricans* Pourr.), langblättriges, f. k. Spanien, Südfrankreich.

lusitanicus Hort., portugiesisches, f. k. Portugal.
monspeliensis L., französisches, f. k. Süd-u. Westeuropa.
oblongifolius Swt., verlängertes, f. k. Südeuropa.

obtusifolius Swt., stumpfblättriges, f. k. ?

parviflorus Lam., kleinblumiges, f. k. Creta.

platysepalus Swt., breitblumiges, f. k. ?

populifolius L., pappelblättriges, f. k. Südfrankreich, Spanien, Portugal, Nordafrika.

psilosepalus Swt., schmalkroniges, f. k. ?

purpureus Lam., purpurfarbiges, f. k. Kleinasien.

salvifolius L., salbeiblättriges, f. f. b. k. Südeuropa.

β) *erectusculus*. γ) *ochroleucus*.

sericeus Vahl, seidenhaariges, f. k. Spanien.

undulatus Lk., wellenblättriges, f. k. Spanien.

vaginatus Ait., scheidiges, f. k. Teneriffa.

villosus Lam., zottiges, f. k. Südeuropa, Nordafrika.

β) *virescens* DC. (? *rotundifolius* Swt.). Hinsichtlich der übrigen s. *Helianthemum*.

Citharexylum L., Geigenholz, XIV. II., Verbenaceae.

caudatum L. (*erectum* Jacq.), geschwänztes, f. w. Jamaica.

cinereum L., aschfarbiges, f. w. Westindien, Brasilien.

dentatum Lod., gezähntes f. w. ? Ostindien.

molle Jacq., weiches, f. w. Westindien.

pentandrum Vent. (*pulverulentum* P.), f. w. Portorico.

quadrangulare Jacq., vierkantiges, f. w. Westindien.

sericeum Lod., seidenhaariges, f. w. Ostindien.

suberratum Sw., feinsägezähniges, f. w. Westindien.

villosum Jacq., zottiges, f. w. St. Domingo.

Citriobatus Cun., Orangendorn, V. I., Pittosporaeae.

multiflora Cun., vielblumiger, f. t. Neusüdwallis.

pauciflora Cun., wenigblumiger, f. t. Neuholland.

Citrullus Neck. Schrad. v. Cucumis.**Citrus** T., Orangenbaum, XVIII. II., Hesperideae-Aurantiaceae.

angulata W., kantiger, f. t. Ostindien.

Aurantium Risso (*dulcis* Hort.), süßser, f. k. Asien, Nordafrika, Süd- und Westeuropa.

β) *sinensis* Mill.

buxifolia Poir., buchsbaumblättriger, f. China, Mascar.

decumana L., Pompelmus-O., f. k. China, Ostindien.

Hystrix DC., langdorniger, f. t. k. Ostindien.

japonica Thbg., japanischer, f. k. Japan.

Limetta Risso, Bergamotten-O., f. k. Asien.

Limonium Risso, Limonien-O., f. k. Asien.

madurensis Lour., madurische, f. t. Ostindien.

Margarita Lour., Perllimonie, f. t. k. China.

medica, Citronenbaum, f. k. Asien, Nordafrika, Süd- und Westeuropa.

Citrus

- b) *dulcis*. c) *elongata*. d) *flore pleno*. e) *maxima*. f) *romana*.
nobilis Lour., edler, *h. t.* China, Cochinchina.
 β) *minor*.
spinosissima Meyer, starkdorniger, *h. w.* Surinam.
vulgaris Risso, gemeiner, *h. k.* Asien, Nordafrika, Süd- und Westeuropa.
 b) *crispa*. c) *flore pleno*. d) *fol. variegat.* e) *gibbosa*. f) *latifolia*. g) *longifolia*. h) *macrocarpa*. i) *multiflora*. k) *myrtifolia*. l) *Pomum Adami*. m) *salicifolia* etc.
trifoliata L. v. *Aegle sepiaria*.

Cladanthus Cass., Sprossenkamille, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

- arabicus* Cass. (*proliferus* DC.), arabische, ☉. f. m. Nordafrika, ? Arabien.
canescens Swt., weißgrau, *h. k.* Canarische Inseln.

Cladium P. Br., Sumpfgras, III. 1., Cyperaceae.

- glomeratum* RB., knaulförmiges, 4. t. Neuholland.
juncum RB., binsenförmiges, 4. t. Neuholland.
Mariscus RB. (*germanicum* Schrad.), gemeines, 4. f. Europa, Amerika, Neuholland.
occidentale Schrad., westindisches, 4. w. Jamaica, Hispaniola.

schoenoides RB., knopfgrasähnliches, *h. t.* Neuholland.

Cladostachys D. Don, Aestchenähre, V. 1., Aizoideae-Amarantheae.

- alternifolia* Swt., wechselblättrige, ♂. w. f. m. Ostindien.
frutescens D. Don, strauchige, *h. w.* Ostindien.

Clarkia Pursh. (Clark, engl. Kapitän u. Reisender), VIII. 1.

- elegans* Doug., schöne, ☉. f. Californien.
 b) *flore pleno*.
gauroides Doug. (*rhomboidea* Doug.), nachtkerzenähnliche, ☉. f. Californien.
pulchella Pursh, niedliche, ☉. f. Nordamerika.
 b) *flore albo*.

Clausena Burm., Clausena, X. 1., Hesperideae-Aurantiaeeae.

- pentaphylla* DC., fünfblättrige, *h. w.* Coromandel.

Clavija R. et P. (J. Clavijo Faxardo, spanischer Naturforscher), V. 1., Sapotaceae-Myrsineae.

- macrophylla* R. et P., großblättrige, *h. w.* Südamerika.
ornata D. Don, zierliche, *h. w.* Caraccas.

Claytonia L. (J. Clayton, Arzt, welcher in Virginien Pflanzen sammelte), V. 1., Portulacaceae.

- acutifolia* Pall., spitzblättrige, 4. f. Sibirien.
acutiflora Swt. (*virginica* Bot. mag.), spitzblumige, 4. Kn. f. Nordamerika.
californica F. et Mey., californische, ☉. f. Californien.
caroliniana Mchx., carolinische, 4. Kn. f. Nordamerika.
grandiflora Swt., großblumige, 4. Kn. f. Nordamerika.
gypsophiloides Fisch. et Mey., gypskrautähnliche, ☉. f. Neucalifornien.
Ioannea R. et S., Ioanne's, ☉. f. Sibirien.
lanceolata Pall., lanzettliche, 4. k. f. Sibirien, Nordamer.
longifolia Penny, langblättrige, 4. Kn. f. Nordamerika.
perfoliata Don (*cubensis* Humb.), durchwachsene, ☉. f. Nordamerika, Westindien.

Claytonia

polyphylla Penny, vielblättrige, 4. Kn. f. Nordamerika.

sibirica L., sibirische, ☉. f. Sibirien.

unalaschkensis Fisch. (*bifida* W.), Unalaschka-C., ☉. f. Unalaschka.

Vestiana Fisch., Vest's, 4. f. Altai.

virginica Ait., virginische, 4. Kn. f. Virginien.

Cleisostoma Lindl., Mundstendel, XX. 1., Orchideae.

roseum Lindl., rosafarbiger, 4. w. Manilla.

tridentatum Lindl., dreizähner, 4. w. Neuholland.

Clematis L., Waldrebe, XIII. VI., Ranunculaceae.

americana Mill., amerikanische, ♀. Sch. w. Südamerika.

angustifolia Jacq. (*sibirica* Lam., *Pallasii* Gmel., *hexapetala* Pall.), schmalblättrige, 4. f. Sibirien.

aristata RB., grannige, ♀. Sch. t. Neuholland.

balearica Rich. (*calycina* Ait.), balearische, ♀. Sch. k. Balearische Inseln.

bicolor Lindl. (*Sieboldii* D. Don), zweifarbige, ♀. Sch. t. k. Japan.

brachiata Ker, armförmige, ♀. Sch. k. t. Cap d. g. H.

brasiliانا DC., brasilianische, ♀. Sch. w. Brasilien.

campaniflora Broter., glockenblumige, ♀. Sch. Portugal.

caripensis H. B. K. (*caracasana* Bonpl.), caripensische, ♀. Sch. w. Südamerika, Westindien.

chinensis Retz, chinesische, ♀. Sch. t. k. China.

cirrhusa L. (*balearica* P.), gabelrankige, ♀. Sch. k. Süditalien, Griechenland, Kleinasien, Spanien, Nordafrika.

coerulea Lindl. (*coerulea grandiflora* Hort., *azurea* Hort.), blaue, ♀. Sch. t. k. Japan.

coriacea DC. (*australis* Lod.), lederartige, ♀. Sch. t. Neuholland.

crispa L., krause, ♀. Sch. f. Nordamerika.

cylindrica Sims (*crispa* Lam., *Viorna* Andr., *divaricata* Jacq.), cylinderförmige, ♀. Sch. f. Nordamerika.

dahurica Pers., dahurische, ♀. Sch. f. Dahurien.

dioica L., zweihäusige, ♀. Sch. w. Westindien.

diversifolia DC., verschiedenblättrige, 4. f. ?

erecta L. (*corymbosa* Poir.), aufrechte, 4. f. Mitteleuropa, Sibirien.

β) *hispanica*.

Flammula L., scharfe, 4. f. Südeuropa, Cauc., Nordaf.

β) *fragrans* Tenor. (*rotundifol.*). γ) *maritima* L.

δ) *rubella* P. ε) *caespitosa* Scop.

florida Thbg., schönblühende, ♀. Sch. k. Japan.

glauca W., blaugrüne, ♀. Sch. f. Südsibirien.

glycinoides DC., glycinenähnliche, ♀. Sch. t. Neuholl.

grandiflora DC. (*chlorantha* Lindl.), großblumige, ♀. Sch. w. Sierra Leone.

hedysarifolia DC., hahnenkopflättrige, ♀. Sch. w. Ostind.

Hendersonii Hort., Henderson's, ♀. 4. f. ?

integrifolia L., ganzblättrige, 4. f. Ost- u. Südeuropa, Caucasus, Sibirien.

b) *latifolia* Hort.

lathyrifolia H. Berol., wickenblättrige, 4. f. Sibirien.

lineariloba DC., gleichbreitlappige, 4. f. b. Südcarolina.

Massoniana DC., Masson's, ♀. Sch. k. t. Cap d. g. H.

montana Buchan. (*anemonaeiflora* D. Don), Berg-W., ♀. Sch. k. t. Nepal.

nepalensis DC. (*montana* D. Don), nepal'sche, ♀. Sch. k. t. Nepal.

Clematis

ochroleuca Ait. (*sericea* Mchx.), weißgelbe, 4. f. Nordamer.
odorata Wall., wohlriechende, ♀. Sch. t. k. Nepal.
orientalis L., morgenländische, ♀. Sch. f. Kleinasien, Cauc.
paniculata Thbg., rispige, ♀. Sch. k. Japan.
pedicellata Swt. (*cirrhus* β. DC.), gestielte, ♀. Sch. k.
 Majorca.

reticulata Walt., netzförmige, ♀. Sch. f. Nordamerika.
semitriloba Lag. (*polymorpha* a Vis.), halbdreilappige,
 ♀. Sch. f. b. k. Spanien, Corsica.

Simsii Swt. (*cordata* Sims), Sims's, ♀. Sch. f. Nordamer.
smilacifolia Wall., smilaxblättrige, ♀. Sch. w. Ostind.
triternata DC., dreizählige, ♀. Sch. w. ?

Viorna L., glockenblumige, ♀. Sch. f. Nordamerika.
viornoides Schrad., glockenblumenähnliche, ♀. Sch. f.
 Nordamerika.

virginiana L., virginische, ♀. Sch. f. Nordamerika.

β) *bracteata* Mchx.

Vitalba L., gemeine, ♀. Sch. f. Mittel- und Südeuropa,
 Kleinasien.

β) *integrata* A. B.

Viticella L., italienische, ♀. Sch. f. Südeuropa, Kleinasien.

b) *purpurea*. c) *multiplex* (*pulchella* P.).

capensis Poir. et *tenuifolia* Poir. v. *Pulsatilla* *africana* et *tenuifolia*. Hinsichtlich der übrigen s. Atragene.

Cleome L., Senfkapper, VI. 1. (XV. III.), Capparideae.

aculeata L., stachelige, ☉. w. Südamerika.

arabica L., arabische, ☉. w. m. f. Arabien.

arborescens Weimn., baumartige, ♀. w. Brasilien.

cardinalis DC., scharlachblumige, ☉. w. Mexico.

dendroides Schult., strauchige, ♀. w. Brasilien.

diffusa Banks, ausgebreitete, ☉. w. Brasilien.

Dilleniana DC. (? *ornithopodioides* Lk.), Dillen's, ☉. m. f. Levante.

Eckloniana Schrad., Ecklon's, ☉. f. m. Cap d. g. H.

gigantea L. (*arborescens* Kunth, *viridiflora* Schbr.), große,
 ♀. w. Südamerika.

heptaphylla L., siebenblättrige, ☉. w. Ost- u. Westind.

Houstoni RB., Houston's, ☉. w. Jamaica.

iberica DC. (*ornithopodioides* MB.), iberische, ☉. f. Iberien.

monophylla L., einblättrige, ☉. w. Ostindien.

β) *ceylanica* DC.

polygama L., vielehige, ☉. w. Westindien.

procumbens L., niederliegende, 4. w. Westindien.

pubescens Sims, weichhaarige, ☉. w. ?

pungens W. (*spinosa* Sims), stechende, ♂. w. Westindien, Südamerika.

rosea Vahl, rosafarbige, ☉. w. Brasilien.

speciosissima Deppe, prächtige, ☉. f. m. w. Mexico.

spinosa L., stachelige, ♀. ♂. w. Westindien, Brasilien.

viminea Schrad., ruthenförmige, ☉. w. m. f. Cap d. g. H.

violacea L., violette, ☉. w. f. m. Südamerika, Portugal.

virgata Steven, ruthenförmige, ☉. f. m. Iberien, Nordamer.

Candelabrum Sims etc. v. *Gynandropsis* *Candelabrum* etc. *capensis* L. vid. *Heliophila* *cleomoides*.

Chelidonii L. suppl. (et *dodecandra* L., *viscosa* L. etc.) v. *Palanisia* *Chelidon*. etc. *pinnata* Pursh v.

Stanleya *pinnatifida*. *prostrata* Hortul. vid. *Rothia* *trifoliata*. *serrulata* Pursh v. *Peritoma* *serrulata*.

Cleonia L., Cleonie, XIV. 1., Labiatae.

lusitanica L., portugiesische, ☉, f. Portugal.

Clerodendron L., Loosbaum, XIV. 11., Verbenaceae.

angustifolium Spgl., schmalblättriger, f. w. Mascarenas.

attenuatum RB., verschmälerter, f. w. Neuholland.

buxifolium L., buchsbaumblättriger, f. w. ?

calamitosum L., kümmerlicher, f. w. Java.

cernuum Wall., übergebogener, f. w. Ostindien.

coromandelinum Spgl. (*ovatum* Poir., *madagascarense*

Lod.), coromandelischer, f. w. f. w. Coromandel.

costatum RB., gerippter, f. w. Neuholland.

emirnense Boj., madagascarischer, f. w. Madagascar.

foetidum D. Don, stinkender, f. w. Nepal.

floribundum RB., blumenreicher, f. w. Neuholland.

fortunatum L., glücklicher, f. w. China.

fragrans Vent., wohlriechender, f. w. t. Japan, China.

b) flore pleno.

glaucum Wall., blaugrüner, f. w. Ostindien.

hastatum Wall., spontonblättriger, f. w. Ostindien.

helianthifolium Wall., sonnenrosenblättriger, f. w. Ostind.

heterophyllum RB., verschiedenblättriger, f. w. Mascar.

inermis RB., unbewehrter, f. w. China, Ostind., Neuholl.

infortunatum L., unglücklicher, f. w. Ceylon.

Leucosceptrum D. Don, weifsähriger, f. w. Nepal.

ligustrinum RB., ligusterähnlicher, f. w. Mascarenas.

lividum Lindl., blaubrauner, f. w. China.

macrophyllum Sims, großblättriger, f. w. Mascarenas.

nutans Wall., überhängender, f. w. Ostindien.

paniculatum L. (*pyramidale* Andr.), f. w. Java, Cochinchina.

phlomoides L. suppl., phlomisähnlicher, f. w. Ostind.

pubescens Lindl., weichhaariger, f. w. Westindien.

salicifolium Lod., weidenblättriger, f. w. Ostindien.

serratum Spgl., sägezahniger, f. w. Ostindien.

Siphonanthus RB., röhrenblumiger, f. w. Ostind., Java.

squamatum Vahl (*speciosissimum* Paxt.), schuppiger, f.

w. China, Japan.

ternifolium H. B. K., dreiblättriger, f. w. Südamerika.

tomentosum RB., filziger, f. w. t. Neusüdwallis.

trichotomum Thbg., dreizinkiger, f. w. t. Japan.

urticaefolium Roxb., nesselblättriger, f. w. Ostindien.

verticillatum D. Don, wirtelblättriger, f. w. Nepal.

violaceum Zeyh., violetter, f. w. ?

viscosum Vent., schmieriger, f. w. Ostindien.

volubile P. B., windender, f. Sch. Guinea.

? *coccineum* Hort. v. *Holmskioldia sanguinea*.

Clethra L., Else, X. 1., Ericaceae.

acuminata Mchx. (*glauca* Hort.), zugespitzte, f. f. b. Carolina.

alnifolia L., erlenblättrige, f. f. b. Nordamerika.

arborea Ait., baumartige, f. k. Madeira.

β) minor. γ) variegata.

ferruginea Lk., rostfarbige, f. t. Peru.

nana Lod., Zwerg-E., f. f. b. Nordamerika.

paniculata Ait., rispige, f. f. b. Carolina.

scabra P., scharfe, f. f. b. Georgien.

tinifolia Sw., lorbeerblättrige, f. w. Jamaica.

tomentosa Lam. (*incana* P., *pubescens* W., *glauca* Hort.),

filzige, f. f. b. Nordamerika.

Cleyera Thbg. (A. Cleyer, ein Hesse, welcher Japan und China bereiste), XIII. 1., Ternstroemiaceae.

japonica Thbg., japanische, f. t. Japan.

Clianthus Sol., Prachtwicke, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

puniceus Sol., dunkelrothe, f. t. Neuzeeland.

Clidemia D. Don, Clidemia, X. i., Lythraeae-Melastomaceae.

aggregata D. Don, angehäuften, f. w. Peru.

agrestis D. Don, Acker-C., f. w. Guiana.

alata G. Don, geflügelte, f. w. Guiana.

cernua D. Don, übergebogene, f. w. Peru.

elegans D. Don, zierliche, f. w. Guiana.

hirta D. Don, scharfhaarige, f. w. Jamaica.

holosericea D. Don, seidenhaarige, f. w. Brasilien.

microphylla D. Don, kleinblättrige, f. w. Südamerika.

nivea D. Don, schneeweiße, f. w. Südamerika.

rubra G. Don, rothe, f. w. Guiana.

spicata D. Don, ährenförmige, f. w. Guiana.

velutina D. Don, sammethaarige, f. w. Westindien.

Cliffortia L. (G. Cliffort, berühmter Beförderer der Botanik), XIII. ii. (XXII. xii.), Rosaceae.

cinerea Thbg., aschfarbige, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

cordifolia Lam., herzblättrige, f. k. t. Cap d. g. H.

crenata L., gekerbte, f. k. t. Cap der guten Hoffn.

cuneata Ait., keilblättrige, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

ericaefolia L., heideblättrige, f. k. t. Cap d. g. Hoffn.

falcata L., sichelförmige, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

ilicifolia L., stechhülsenblättrige, f. k. t. Cap d. g. H.

obcordata L., verkehrtherzblättrige, f. k. t. Cap d. g. H.

pulchella L., hübsche, f. k. t. Cap der guten Hoffn.

ruscifolia L., mäusedornblättrige, f. k. t. Cap d. g. H.

sarmentosa L., rankende, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

strobilifera L., zapfenähnliche, f. k. t. Cap d. gut. H.

ternata L., dreizählige, f. k. t. Cap der guten Hoffn.

tridentata W., dreizählige, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

trifoliata L., dreiblättrige, f. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

Cliftonia Banks, Cliftonie, X. i., Ericaceae.

ligustrina Sims, ligusterähnliche, f. k. f. b. Georgia (Nordamerika).

Clinopodium T., Wirbelborste, XIV. i., Labiatae.

aegyptiacum Lam., ägyptische, 4. f. Aegypten.

organifolium La Bill., dostenblättrige, 4. f. Syrien.

vulgare L., gemeine, 4. f. Europa, Asien, Nordamer.

Clintonia Dougl. (De Witt. Clinton, Gouverneur von Neu-York), XVI. ii, Campanulaceae-Lobeliaceae.

elegans Dougl., zierliche, ①. f. m. Columbien.

pulchella Lindl., hübsche, ①. f. m. Columbien.

Clitoria L., Clitorie, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

arborescens Anders., baumartige, f. w. Trinidad.

brasiliensis L., brasilianische, ①. w. Brasilien.

coerulea Schr., scharlachfarbige, f. Sch. w. Brasilien.

formosa H. B. K., schöne, 4. f. Sch. w. Südamerika.

gracilis Fisch., schlanke, 4. f. Sch. w. Südamerika.

heterophylla Lam., verschiedenblättrige, 4. f. Sch. w. Ostindien.

lascivia Boj., üppige, f. Sch. w. Madagascar.

mariana L., maryländische, 4. f. b. Nordamerika.

mexicana Lk., mexicanische, 4. Sch. t. w. Mexico.

Plumieri Turp., Plumier's, 4. Sch. w. Westindien.

ternatea L., moluckische, 4. f. Sch. w. Molucken.

Clitoria

virginiana L., (*amoena* Roth), virginische, 4. Sch. t. w.
 Virginien, Westindien.

Broussonetii Balb. v. *Cologania Broussonetii*. *Galactia* L. v. *Galactia pendula*. *multiflora* Sw. v. *Vilmorinia multiflora*. *polyphylla* Poir. v. *Barbieria polyphylla*.

Clivea Lindl. (zu Ehren der Herzogin von Northumberland so genannt), VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.
nobilis Lindl., edle, 4. Zw. t. w. Cap der gut. Hoffn.

Clusia Plum. (Charles de l'Ecluse [Clusius], berühmter Botaniker), XIII. 1. (XXIII. 1.), Guttiferae.

alba L., weiße, 5. w. Westindien.

flava L., gelbe, 5. w. Jamaica.

nemorosa Meyer, Hain-C., 5. w. Surinam.

rosea L., rosafarbige, 5. w. Carolina, Hispaniola.

venosa L., aderige, 5. w. Martinique.

scandens Roxb. v. *Bridelia scandens*.

Cluytia Ait. (*Clutia* Boerh.), (Cluyt, Professor der Botanik zu Leyden), XVI. III. (XXII. XIII.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

alaternoides L., schmalblättrige, 5. k. t. Cap d. g. H.
collina Roxb., Hügel-C., 5. w. Ostindien.

daphnoides W., kellerhalsähnliche, 5. k. t. Cap d. g. H.

ericoides Thbg., heideähnliche, 5. k. t. Cap d. g. H.

heterophylla Thbg., verschiedenblättrige, 5. k. t. Cap der guten Hoffnung.

patula Roxb., ausgebreitete, 5. w. Ostindien.

polifolia Jacq., poleiblättrige, 5. k. t. Cap d. gut. H.

polygonoides L., knöterichähnliche, 5. k. t. Cap d. g. H.

pubescens Thbg., weichhaarige, 5. k. t. Cap d. g. H.

pulchella L., hübsche, 5. k. t. Cap der guten Hoffn.

tenuifolia W., feinblättrige, 5. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

tomentosa L., filzige, 5. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Clypeola L., Schildkraut, XV. 1., Cruciferae.

echinata DC. (*lasiocarpa* P.), stacheliges, 6. f. Kleinasien.

eriphora DC., wolköpfiges, 6. f. Spanien.

Jonthlaspi L., ausgebreitetes, 6. f. Südeuropa, Mittelasien.

maritima L. v. *Koniga maritima*.

Cnemidostachys Mart., Spindelähre, XXI. III., Tricoccae-Euphorbiaceae.

Chamaelea Spgl., stachelfrüchtige, 6. w. Ostindien.

Cneorum L., Zeiland, III. 1., Tricoccae-Stachhouseae.

pulverulentum Vent., aschfarbiger, 5. k. Teneriffa.

tricocon L., dreiköpfiger, 5. k. Südeuropa.

Cnestis Juss., Hornkapsel, X. IV., Amyrideae-Connaraceae.

corniculata Lam., schmale, 5. w. Guinea.

glabra Lam., glatte, 5. w. Mascarenas.

polyphylla Lam., vielblättrige, 5. w. Mascarenas.

Cnicus Vaill., Benediktenkraut, XIX. III., Compositae-Cynarocephalae.

benedictus L. G., gemeines, 6. f. Griechenland, Kleinasien, Südeuropa.

Acarna L. v. *Picnomon Acarna*. *afer* Tenor (et *Cassabonae* W. etc.) v. *Chamaepeuce nivea*, *carlinoides* Schr. v. *Echenais carlinoides*. *carthamoides*

Cnicus

Lk. v. *Leuzea carthamoides*. *cernuus* L. v. *Silybum* (Alfredia) *cernuum*. *pinnatifidus* W. v. *Serratula pinnatifida*. *pygmaeus* L. v. *Saussurea pygmaea*. *rectus* H. Par. v. *Chamaepeuce stricta*. *syriacus* W. (*obvallatus* Salzm.) v. *Notobasis syriaca*. *uniflorus* L. v. *Rhapontica uniflora*. Hinsichtlich der übrigen s. *Cirsium*.

Cnidium Cass., *Cnidium*, V. II., Umbelliferae.

apioides Spgl., selleriähnliches, 4. f. Krain, österreichisches Litorale.

atropurpureum Spgl., schwarzpurpurfarbiges, 4. f. Nordamerika.

canadense Spgl., canadisches, 4. f. Canada.

dahuricum Fisch. et Mey. (*striatum* Turcz.), dahurisches, 4. f. Dahurien.

Fischeri Spgl., Fischer's, 4. f. Sibirien.

Monnieri Cass. (*confertum* Mch.), Monnier's, 4. f. Krain, südliches Frankreich.

palustre Rchb. (*venosum* Koch), Sumpf-C., 4. f. Deutschland, Schweden, Podolien.

pyrenaicum Spgl., pyrenäisches, 4. f. Pyrenäen.

alsaticum Spgl. v. *Peucedanum alsaticum*. *Silau* Spgl. v. *Silau pratensis*.

Cnidoscolus Pohl, Brennnufs, XXI. x. (XVI. vi.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

fragrans Pohl (Kunth), wohlriechende, 4. w. Cuba.

herbaceus Pohl (L.), krautige, 4. w. Carolina, Neuspan.

napaeifolius Pohl (Desr.), napaeablätterige, 4. w. Westindien.

urens Pohl (L.), ächte, 4. w. Südamerika.

vitifolius Pohl, weinblätterige, 4. w. Brasilien.

Cobaea Cav. (B. Cobo, spanischer Botaniker), V. I., Convolvulaceae-Cobaeaceae.

scandens Cav., klimmende, 4. 4. Sch. t. k. Mexico.

Coburgia Swt. (zu Ehren des Hauses Sachsen-Coburg so genannt), VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.

fulva Herb., rothbraune, 4. Zw. w. Südamerika.

incarnata Swt., fleischfarbige, 4. Zw. w. Quito.

reticulata Herb. v. *Amaryllis*.

Coccocypselum P.Br., Beerenröthe, IV. I., Rubiaceae.

repens P.B. (*herbaceum* Lam.), kriechende, 4. w. Jamaica.

buxifolium Spgl. v. *Fernelia buxifolia*.

Coccoloba L., Seetraube, VIII. III., Portulacae-Polygoneae.

acuminata H. B. K., zugespitzte, 4. w. Neu-Granada.

barbadensis Jacq., barbadensische, 4. w. Westindien, Südamerika.

brasiliensis Spgl., brasilianische, 4. w. Brasilien.

diversifolia Jacq., verschiedenblätterige, 4. w. Hispaniola.

emarginata Jacq., ausgerandete, 4. w. Südamerika.

excoriata L., rindenlose, 4. w. Westindien.

flavescens Jacq., gelbliche, 4. w. Hispaniola.

latifolia Lam., breitblätterige, 4. w. Südamerika.

laurifolia Jacq., lorbeerblätterige, 4. w. Caraccas.

longifolia Lk., langblätterige, 4. w. Westindien.

nivea Jacq., schneeweiße, 4. w. Westindien.

obovata H. B. K., verkehrteiförmige, 4. w. Südamer.

obtusifolia Jacq., stumpfblätterige, 4. w. Südamerika.

Coccoloba

- orbicularis* Lod., rundblättrige, ♀. w. Südamerika.
pubescens L. (*grandifolia* Jacq.), weichhaarige, ♀. w. Westindien.
punctata L. (*coronata* Jacq.), punktirte, ♀. w. Westind.
tenuifolia L., feinblättrige, ♀. w. Jamaica.
uvifera L., ächte, ♀. w. Westindien, Südamerika.
virens Lindl., grünliche, ♀. w. ? Westindien.

Cocculus C. Bauh., Fiskkörnerbaum, XXII. VI. (VI. III.), Menispermaceae.

- carolinus* DC., carolinischer, ♀. Sch. k. Carolina, Georgien.
cordifolius DC., herzblättriger, ♀. Sch. w. Ostindien.
crispus DC., krauser, ♀. Sch. w. Ostindien.
incanus Coleb., weißgrauer, ♀. Sch. w. Ostindien.
laurifolius DC., lorbeerblättriger, ♀. Sch. w. Ostindien.
orbiculatus DC., kreisblättriger, ♀. Sch. w. Ostindien.
palmatus DC., handförmiger, ♀. Sch. w. Ostindien.
Plukenetii DC., Plukenet's (*ächter*), ♀. Sch. w. Ostind.
rotundifolius DC., rundblättriger, ♀. Sch. w. ?
suberosus DC., korkiger, ♀. Sch. w. Ostindien.
tomentosus Coleb., filziger, ♀. Sch. w. Ostindien.
villosus DC., zottiger, ♀. Sch. w. Ostindien.
 β) *hirsutus* DC.

Cochlearia T., Löffelkraut, XV. III., Cruciferae.

I. Genuinae.

- anglica* L., englisches, ☉. f. Nördl. Europa, Sibirien.
danica L., dänisches, ☉. f. Nordeuropa.
fenestrata RB., gitterförmiges, ♂. f. Grönland.
glastifolia L., waidblättriges, ♂. f. ? Süddeutschland, Frankreich.
integrifolia DC., ganzblättriges, ☉. f. Sibirien.
officinalis L., officinelles, ♂. f. Nordeuropa, Deutschland, Schweiz etc.

β) *groenlandica* L. (*minor* Sm.).

- pyrenaica* DC., pyrenäisches, ♂. f. Pyrenäen, Steyermark.

II. *Jonopsidium* DC.

- acaulis* Dsf. (*pusilla* et *olysiponensis* Brot.), stengelloses, ♂. f. k. Portugal, Nordafrika.
Armoracia L. et *macrocarpa* W. K. v. *Armoracia rusticana* etc. *auriculata* Lam. et *saxatilis* Lam. v. *Kerneria saxatilis* etc. *Draba* L. v. *Lepidium* *Draba nilotica* Del. v. *Senebiera nilotica*.

Cochliospermum Lagasc., Schneckensame, V. II., Aizoideae-Atripliceae.

- Cavanillesii* Lagasc., Cavanille's, ☉. f. Spanien.
Clemente Lagasc., Clemente's, ☉. f. Spanien.

Cochlospermum H. B. K. v. Wittelsbachia.**Cocos** L., Kokospalme, XXI. VI. (VI. I.), Palmae.

- flexuosa* Mart., gebogene, ♀. w. Brasilien.
nucifera L., wahre, ♀. w. Ost- und Westindien.
plumosa Lod. (? *comosa* Mart.), federige, ♀. w. Brasilien.
aculeata Jacq. et *fusiformis* Sw. v. *Acrocomia acul. maldivica* Gmel. v. *Lodoicea Sechellarum*.

Codarium Soland., Mehlhülse, II. I., Leguminosae-Caesalpinieae.

- acutifolium* Afzel. (*nitidum* Vahl), spitzblättrige, ♀. w. Guinea.
obtusifolium Afzel., stumpfblättrige, ♀. w. Guinea.

Codon L., Codon, X. 1., Convolvulaceae.

Royeni L., Royen's, ♂. k. t. Cap der guten Hoffnung.
Codonophora grandiflora Lindl. v. *Gesneria prasinata. lanceolata* Lindl. v. *Rytidophyllum tomentosum*.
Codonoprasum Rchb. v. *Allium*.

Coelestina Cass., Coelestine, XIX. x., Compositae-Eupatorineae.

ageratoides H. B. K., ageratumähnliche, 4. ♀. k. t. Mexico.

β) latifolia DC. γ) corymbosa DC. (*coerulea* Cass.).
 micrantha Spgl., kleinblumige, 4. ♀. k. t. Neuspanien.

Coelogyne Lindl., Hohnarbe, XX. 1., Orchideae.

cristata Lindl., kanmige, 4. w. Nepal.
 fimbriata Lindl., gefranzte, 4. w. China.
 flaccida Lindl., schlaffe, 4. w. Ostindien.
 nitida Lindl., glänzende, 4. w. Ostindien.
 maculata Lindl., gefleckte, 4. w. Pundua.
 Gardneriana Lindl., Gardner's, 4. w. Ostindien.
 ocellata Lindl., geäugelte, 4. w. Nepal.
 ovalis Lindl., eiförmige, 4. w. Ostindien.
 prolifera Lindl., sprossende, 4. w. ? Ostindien.
 punctulata Lindl., feinpunktirte, 4. w. Ostindien.
 Wallichiana Lindl., Wallich's, 4. w. Pundua.

Coffea L., Kaffeebaum, V. 1., Rubiaceae.

arabica L., arabischer, ♀. w. Arabien, Ostafrika.

occidentalis L. v. *Tetramerium odoratissimum*.

Coix L., Thränengras, XXI. III. (III. 1.), Gramineae.

agrestis W., Acker-T., 4. w. Ostindien.
 arundinacea Lam., rohrartiges, 4. w. Mexico.
 exaltata Jacq., hohes, 4. w. China.
 Koenigii Spgl., König's, 4. w. Ostindien.
 Lacryma L., gemeines, ☉. w. m. f. Ostindien.

Colax Barringtoniae Lindl. etc. v. *Maxillaria Barringtoniae* etc.

Colbertia Salisb. (M. Colbert, berühmter französischer Minister), XIII. v., Dilleniaceae.

coromandelina Salisb., coromandelische, ♀. w. Coromandel.

scabrella D. Don, schärfliche, ♀. w. Nepal.

Colchicum T., Zeitlose, VI. III., Colchicaceae (*Melanthaceae*).

alpinum DC. (*montanum* All.), Alpen-Z., 4. f. Südliche Schweiz, Apenninen.

arenarium Kit., Sand-Z., 4. Zw. f. Ungarn, Oberitalien, Taurien.

autumnale L., Herbst-Z., 4. Zw. f. Europa.

b) album. c) atropurpureum. d) fol. variegat.

e) flore pleno. f) purpureo striatum. g) striatum flore pleno.

byzantinum Ker, byzantinische, 4. Zw. f. Thracien, Kleinasien.

crociflorum Sims, safranblumige, 4. Zw. f. Südeuropa.

montanum L. (*bulbocodioides* Brot.), Berg-Z., 4. Zw. f. Süd- und Westeuropa.

Szovitsii Fisch. et Mey., Szovits's, 4. Zw. f. Sonchetien.

tessellatum Mill., würfelige, 4. Zw. f. Südeuropa.

umbrosum Fisch., schattenliebende, 4. Zw. f. Krim.

variegatum L., bunte, 4. Zw. f. Sicilien, Creta, Portugal.

Colchicum

caucasicum Spgl. v. *Merendera caucasica*. *versicolor* Ker v. *Bulbocodium versicolor*.

Coldenia L. (C. Colden, nordamerikanischer Botaniker), IV. III., *Asperifoliaceae*.

procumbens L., niederliegende, ☉. m. f. w. Ostindien.

Coleanthus subtilis Seid. v. *Schmidtia subtilis*.

Colebrookea Sm. (H. F. Colebrooke, englischer Botaniker), XIV. II., *Verbenaceae*.

oppositifolia Sm., gegenblättrige, ☼. t. Nepal.

ternifolia Roxb., dreiblättrige, ☼. w. t. Ostindien.

Coleonema Bartl. et Wendl., Scheidenfaden, V. I., *Tricoccae-Rutaceae*.

album Bartl. et Wendl., weißer, ☼. t. k. Cap d. g. H.

pulchrum Hook. (? *erubescens* Hort.), schöner, ☼. t. Cap der guten Hoffnung.

Coleus Lour., Scheidenlippe, XIV. I., *Labiatae*.

aromaticus Benth. (? *amboinicus* Lour.), wohlriechende, ☼. w. Ostindien.

barbatus Benth., bärtige, ☼. w. Abyssinien.

Collaea procumbens Spgl. v. *Chrysanthellum procumbens*.

Colletia Commers. (Collet, französischer Botaniker), V. I., *Rhamneae*.

horrida Brogn. (*ferox* Gill.), rauhe, ☼. k. t. Chili.

serratifolia Vent., sägeblättrige, ☼. w. Peru.

spinosa Lam. (*horrida* W.), dornige, ☼. w. Peru.

Ephedra Vent. et *obcordata* Vent. v. *Retanilla Ephedra* et *obcordata*.

Collinsia Nutt. (Z. Collins, Vicepräsident der naturforschenden Gesellschaft zu Philadelphia), XIV. II., *Personatae-Antirrhineae*.

bicolor Benth., zweifarbig, ☉. f. Californien.

grandiflora Lindl., großblumige, ☉. f. Columbien.

heterophylla Nutt., verschiedenblättrige, ☉. f. Columbien.

parviflora Lindl., kleinblumige, ☉. f. Columbien.

verna Nutt., Frühlings-C., ☉. f. Nordamerika.

sparsiflora Fisch. et Méy., zerstreutblumige, ☉. f. Neu-Californien.

Collinsonia L. (P. Collinson, ein Beförderer der Botanik), II. I., *Labiatae*.

anisata Sims, gewürzhafte, 4. f. b. Südcarolina, Georgien.

canadensis L., canadische, 4. f. Nordamerika.

β) *cordata*. γ) *ovata*.

ovalis Pursh, eiförmige, 4. f. b. Südcarolina.

scabra P. (*praecox* Walt., *scabriuscula* Ait.), scharfe, 4. f. b. Südcarolina.

tuberosa Mchx. (*serotina* Walt.), knollige, 4. Kn. f. b. Carolina.

Collomia Nutt., *Collomia*, V. I., *Polemoniaceae*.

Cavanillesii H. et A., Cavanille's, ☉. f. Chili.

coccinea Lehm. (*lateritia* D. Don), scharlachfarbig, ☉. f. Nordwestliches Amerika.

gilioides Benth., giliaähnliche, ☉. f. Californien.

glutinosa Benth., kleberige, ☉. f. Californien.

gracilis Dougl., schlanke, ☉. f. Nordwestliches Amerika, Californien.

grandiflora Dougl., großblumige, ☉. f. Nordwestliches Amerika.

heterophylla Hook., verschiedenblättrige, ☉. f. Nordwestliches Amerika.

Collomia

linearis Nutt., gleichbreitblätterige, ☉. f. Nordwestliches Amerika.

Colobachne Gerardi P. Beauv. et *vaginata* P. Beauv. v. *Alopecurus Gerardi* et *angustifol.*

Colocynthis T. Schrad., Coloquinte, XXI. x., Cucurbitaceae.

amarissima Schrad., bittere, ☉. m. f. Cap d. gut. H.

officinalis Schrad., officinelle, ☉. m. f. Cap d. gut. H.

Cologania H. B. K., Cologanie, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

angustifolia H. B. K., schmalblätterige, 4. Sch. w. Mexico.

Broussonetii DC., Broussonet's, 4. Sch. w. ?

Colophonia Commers., Colophonie, VI. i., Amyrideae.

mauritiana Kunth, mascarenische, 5. w. Mascarenas.

Colpodium Trin., Kielgras, III. ii., Gramineae.

altaicum Trin., altaisches, 4. f. Altai.

latifolium RB., breitblättriges, 4. f. Nördlichstes Amerika, Sibirien.

Steveni Trin. (*Agrostis versicolor* Stev.), Steven's, 4. f. Caucasus.

Colubrina Brong., Natterbaum, V. i., Rhamneae.

asiatica Brong., asiatischer, 5. w. Ceylon.

cubensis Brong., cubaischer, 5. w. Cuba.

ferruginosa Brong., rostfarbiger, 5. w. Bahama.

reclinata Brong., zurückgebogener, 5. w. Jamaica.

Columellea biennis Jacq. v. *Nestlera biennis*.

Columnea L. (Fab. Columna [Colonna], berühmter italienischer Botaniker), XIV. ii., Personatae-Bignoniaceae (*Gesneriaceae*).

hirsuta Sw., rauhhaarige, 5. w. Jamaica.

rutilans Sw., rothgelbe, 5. w. Jamaica.

scandens L. (*villosa* P.), klimmende, 5. Sch. w. Westindien, Südamerika.

erecta Lam. v. *Trevirania coccinea*. *trifoliata* Lk. (*violacea* Jacq. fil.) v. *Stemodia trifoliata*.

Coluria RB., Colurie, XII. iii., Rosaceae.

potentilloides RB., fingerkrautähnliche, 4. f. Sibirien.

Colutea T., Blasenstrauch, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

arborescens L., baumartiger, 5. f. Mittel- u. Südeuropa.

cruenta Ait. (*orientalis* Lam., *sanguinea* Pall., *humilis* Scop.), blutfarbiger, 5. f. Süddeutschland, Italien, Taurien.

media W., mittlerer (Bastard-B.), 5. f. ?

nepalensis Sims, nepal'scher, 5. f. b. k. Nepal.

Pocockii Ait. (*haleppica* Lam., *istria* Mill., *procumbens* L'Her.), Pocock's, 5. f. Levante.

caspica MB. et *davurica* MB. v. *Sphaerophysa caspica* etc. *frutescens* L. v. *Sutherlandia frutescens*.

herbacea L. (*annua* Murray) et *perennans* Jacq. v. *Lessertia annua* etc.

Colvillea Boj. (Sir Charles Colville, Gouverneur der Insel Mauritius), XVII. iv., Leguminosae-Papilionaceae.

racemosa Boj., traubige, 5. w. Mascarenas.

Colymbea excelsa Sogl. et *quadrifaria* Salisb. v. *Araucaria excelsa* et *imbricata*.

Comandra Nutt., Schopfbeutel, V. i., Sandalaceae.

umbellata Nutt., doldiger, 4. f. Nordamerika.

- Comaropsis** Rich., Sumpfbeere, XIII. III., Rosaceae.
Doniana DC., Don's, 4. f. Nordamerika.
fragarioides DC., erdbeerähnliche, 4. f. Nordamerika.
- Comarum** L., Sumpfröschen, XII. III., Rosaceae.
palustre L., fünfblättriges, 4. f. Europa, Asien, Nordamer.
- Combretum** Löffl., Langfaden, VIII. I., Onagrariae-Combretaceae.
elegans H. B. K., zierlicher, ♂. Sch. w. Brasilien.
farinosum H. B. K., mehlig, ♂. Sch. w. Mexico.
grandiflorum G. Don, großblumiger, ♂. w. Sierra Leone.
nanum Hamilt. D. Don, zwergiger, ♂. t. w. Nepal.
paniculatum G. Don, rispiger, ♂. Sch. w. Guinea.
racemosum P. Beau., traubiger, ♂. Sch. w. Guinea.
secundum Jacq. (*laxum* Aubl.), einseitiger, ♂. Sch. w. Westindien, Südamerika.
Afzelii G. Don. *barbatum* G. Don. *comosum* G. Don, *decandrum* Roxb., *intermedium* G. Don, *purpureum* Vahl v. *Poivrea Afzelii* etc.
- Comesperma** La Bill., Schopfsame, XVII. v. (XVI. v.), Polygalaceae.
cordifolium Cunn., herzblättriger, ♂. t. Neuholland.
ericinum DC., heideähnlicher, ♂. t. Neuholland.
gracile Pox., schlanker, ♂. t. Neuholland.
- Commelina** Plum. (Joh. et Casp. Commelin, berühmte holländische Botaniker), III. I., Commelinaceae.
africana L., afrikanische, 4. k. t. Cap d. g. H.
angustifolia Mchx. (*truncata* W.), schmalblättrige, 4. k. Carolina.
caripensis Humb., caripensische, 4. w. Südamerika.
caroliniana Walt., carolinische, 4. k. Carolina.
cayennensis Rich., cayennische, 4. w. Cayenne.
clandestina Mart., heimlichblüthige, 4. w. Brasilien.
coelestis W. (*urania* Hortul.), himmelblaue, 4. k. ? Mexico.
communis L., gemeine, ☉. m. f. w. Westindien.
cucullata L. (*bengalensis* Murr.), kappenförmige, 4. w. Ostind.
cyanea RB., kornblumenblaue, 4. k. t. Neuholland.
deficiens Herb., abfallende, 4. w. Brasilien.
dianthifolia Red., nelkenblättrige, 4. Kn. w. ?
dubia DC., zweifelhafte, 4. w. ?
gracilis R. et Pav., schlanke, 4. k. t. Lima.
hirtella Vahl, kurzhaarige, 4. f. Nordamerika.
longicaulis Jacq., langstengelige, 4. w. Caracas.
mollis Jacq., weiche, 4. w. Caracas.
obliqua Vahl, schieflättrige, 4. w. ?
orchioides Booth., orchisähnliche, 4. t. w. Mexico.
pallida Humb., Bonpl., bleiche, 4. w. Südamerika.
parviflora Lk., kleinblumige, 4. t. ?
polygama Roth, vielehige, 4. w. Japan, China, Ostind.
rosea Schlchd., rosafarbige, ☉. m. f. Mexico.
tuberosa L., knollige, 4. Kn. k. t. Mexico.
variabilis Schlchd., bunte, 4. w. Mexico.
- Hinsichtlich der übrigen s. Asteilema.
- Commersonia** Forst. (Commerson, berühmter französischer Reisender u. Botaniker), V. v., Büttneriaceae.
echinata Forst., stachelige, ♂. w. Molucken.
 β) *platyphylla* Andr.
Fraseri Gay, Fraser's, ♂. t. Neuholland.
Gaudichaudii Gay, Gaudichaud's, ♂. t. Westl. Neuholl.
diphylla Andr. et *dasyphylla* Bot. Rep. v. Büttneria *dasyphylla*. *speciosa* Sonn. v. *Barringtonia speciosa*.

- Commiphora** Jacq., Gummibeere, XXII. VII. ?
madagascarensis Jacq., madagascarisches, f. w. Madagascar.
- Comocladia** P. Br., Schopfast, III. I., Amyrideae.
dentata Jacq., gezähnelter, f. w. Westindien.
ilicifolia Sw., stechhülsenblättriger, f. w. Westindien.
integrifolia L., ganzblättriger, f. w. Westindien.
- Comparettia** Pop. (A. Comparetti, italienischer Botaniker), XX. I., Orchideae.
coccinea Lindl., scharlachfarbige, 4. w. Brasilien.
falcata Pöpp., sichelförmige, 4. w. Mexico.
- Comptonia** Banks (H. Compton, Bischof zu London, Freund des J. Banks), XXI. III. Amentaceae.
asplenifolia Ait., strichfarnblättriger, f. f. Nordamer.
- Conanthera** R. et Pav., Kegelbeutel, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.
bifolia R. et P., zweiblättriger, 4. Zw. t. Chili.
Simsii Swt. (*bifolia* Sims), Sims, 4. Zw. t. Chili.
campanulata Hook. v. *Cummingia campanul.*
- Condalia** Cav. (A. Condal, spanischer Naturforscher), V. I., Rhamneae.
microphylla Cav., kleinblättriger, f. k. t. Chili.
Condonocarpus australis Cun. v. *Gyrostemon attenuatus*.
- Condyllocarpus officinalis** Hofm. v. *Tordylium officinale*.
- Conium** L., Schierling, V. II., Umbelliferae.
maculatum L., ächter, ♂. f. Europa.
β) croaticum Kit.
moschatum Humb. Bonpl., moschusduftender, 4. w. Südamerika.
africanum L. v. *Capnophyllum africanum*. *Arracacha* Hook. vid. *Arracacia esculenta*. *dichotomum* Brouss. v. *Oenanthe nodiflora*. *dichotomum* Dsf. v. *Ulopermum dichotomum*. *rigens* L. vid. *Trachyspermum rigens*.
- Connarus** L., Baumbohne, XVI. VI., Amyrideae-Connaraceae.
nitidus Roxb., glänzende, f. w. Silhet.
paniculatus Roxb., rispige, f. w. Ostindien.
pubescens DC., weichhaarige, f. w. Guiana.
africanus Lam. v. *Omphalobium africanum*.
- Conocarpus** Jacq., Kegelzapfen, V. I., Onagrariae-Combretaceae.
acutifolius H. B. K., spitzblättriger, f. w. Südamerika.
erectus Jacq., aufrechter, f. w. Jamaica.
procumbens Jacq., niederliegender, f. w. Cuba.
racemosus L. Jacq., traubiger, f. w. Südamerika.
- Conocephalus** Blume, Kegelnessel, XXI. IV., Urticaceae.
naucleiflorus Lindl., naucleablumige, f. w. Ostindien.
- Conopodium** Koch, Kegeldolde, V. II., Umbelliferae.
canadense Koch, canadische, S. f. Nordamerika.
Claytoni Koch, Clayton's, S. f. Nordamerika.
denudatum Koch, kahle, 4. f. England, Südeuropa, Taurien.
- Conospermum** Sm., Kegelsame, IV. I., Proteaceae.
capitatum RB., kopfförmiger, f. t. Neuholland.
coeruleum RB., blauer, f. t. Neuholland.
ellipticum RB., elliptischer, f. t. Neuholland.
ericifolium RB., heideblättriger, f. t. Neuholland.
longifolium Sm., langblättriger, f. t. Neuholland.

Conospermum

taxifolium Sm., taxusblättriger, ♂. t. Neuholland.

triplinervium RB., dreinerviger, ♂. t. Neuholland.

Conostylis RB., Kegelgriffel, VI. 1., Narcisseae-Haemodoraceae.

aculeata RB., stacheliger, 4. t. Neuholland.

serrulata RB., feinsägiger, 4. t. Neuholland.

setigera RB., borstiger, 4. t. Neuholland.

americana Pursh v. *Lophiola aurea*.

Conringia Lk. Heist. v. *Erysimum*.**Convallaria** L., Maiblume, VI. 1., Asparagineae.

majalis L., gemeine, 4. f. Europa, Nordamerika.

b) rubra. b) flore pleno.

bifolia L. etc. v. *Majanthemum bifolium*. *japonica*

L. v. *Ophiopogon japonicus*. *Polygonatum* L. etc.

v. *Polygonatum vulgare*.

Convolvulus T., Winde, V. 1., Convolvulaceae.

albivenus Lindl., weifsaderige, ♂. Sch. w. Algoa-Bai.

althaeoides L. (*argyreus* DC.), eibischähnliche, 4. Sch.

k. Südeuropa, Nordafrika.

arborescens Humb. Bonpl., baumartige, ♂. w. Mexico.

arvensis L., Acker-W., 4. Sch. f. Europa.

β) corsicus R. et S.

bicolor Vahl, zweifarbig, ☉. Sch. w. Ostindien.

bicuspidatus Fisch., zweispitzi, 4. Sch. f. Dahurien.

bogotensis W., bogotische, 4. Sch. w. Südamerika.

bonariensis Cav., bonarische, 4. Sch. t. Chili.

bryonifolius Sims, zaunrübenblättrige, 4. Sch. k. t. China.

canariensis L., canarische, ♂. Sch. k. t. Canarische Inseln.

candicans W., weifsbühende, 4. Sch. t. w. Ostindien.

Cantabrica L., cantabrische, 4. f. Südeuropa.

chinensis Ker, chinesische, 4. Sch. k. China.

ciliatus Vahl, gefranzte, 4. Sch. w. Cayenne.

Cneorum L., candische, ♂. k. Süditalien, Griechenland.

dentatus Vahl, gezähnelte, 4. Sch. w. Ostindien.

Dorycnium L., griechische, ♂. k. Griechenland.

ebracteatus Desr., kahle, 4. Sch. w. Südamerika.

elongatus W. (*pseudosiculus* Cav.), verlängerte, ☉. f.

Canarische Inseln.

emarginatus Lk., ausgerandete, 4. Sch. f. ?

erubescens Sims, röthliche, ♂. Sch. k. t. Neuholland.

farinosus L., mehlig, ☉. Sch. f. Madeira.

filicaulis Vahl, fadenstengelige, 4. w. Guinea.

floridus L., blüthenreiche, ♂. k. Westind., canar. Inseln.

Gerardi R. et S., Gerard's, 4. f. Südeuropa.

glaber Aubl., kahle, ♂. Sch. w. Guiana.

guianensis Aubl., guianische, ♂. Sch. w. Guiana.

Hermanniae L'Her. (*crenatus* Jacq.), Herrmann's, 4.

Sch. w. Peru.

hirsutus MB., rauhhaarige, 4. Sch. f. Taurien.

hirtus L., rauhe, ☉. w. f. m. Ostindien.

Imperati Vahl, Imperati's, 4. f. Neapel, Nordafr., Paläst.

intermedius Lois., mittlere, 4. f. Südfrankreich.

italicus R. et S. (*hirsutus* Ten., *alceaefolius* Lam.), ita-

lienische, 4. Sch. k. Süditalien.

lanuginosus Vahl, wollige, 4. Sch. w. Ostindien.

linearis Curt. (*Tournefortii* Sbr.), schmalblättrige, 4.

k. Südfrankreich, Creta.

lineatus L., linirte, 4. k. Spanien, Portugal, Griechenl.

macrocarpus L., grofsfrüchtige, ☉. Sch. w. m. f. Südamer.

Convulvulus

maximus L., größte, 4. Sch. w. Ceylon.
 micranthus W., kleinblumige, ⚥. Sch. w. Westindien.
 multifidus Thbg., vieltheilige, ☉. f. Cap d. gut. Hoffn.
 ochraceus B. Reg., ochergelbe, 4. Sch. w. Guinea.
 panduratus L., geigenförmige, 4. t. k. Virginien, Carolina.
 pannifolius Dry., starrblättrige, ⚥. Sch. k. Canarische Inseln.

pentanthus Jacq., fünfblumige, ⚥. Sch. w. Ostindien.
 pentapetaloides L., fünfblättrige. ☉. f. Majorca.
 quinquefolius L., fingerblättrige, ☉. w. Westindien.
 reptans L., kriechende, 4. w. Ostindien.
 salvifolius Sbr., salbeiblättrige, 4. w. Palästina.
 saxatilis Vahl, felsige, 4. f. Südeuropa, Kleinasien, Sibirien.

Scammonia L., Scammonium-W., 4. Sch. k. Kleinasien.
 scoparius L., besenartige, ⚥. k. Canarische Inseln.
 scrobiculatus Bot. Reg., grubige, 4. w. Südamerika.
 serotinus DC., späte, 4. Sch. f. ? Nordamerika.
 Sibthorpii R. et G. (*sagittifolius* Sibth.), Sibthorp's, 4. f. Griechenland.

sicus L., sicilianische, ☉. f. Süditalien.
 suberosus W., korkige, ⚥. w. ?
 suffruticosus Dsf., halbstrauchige, ⚥. Sch. k. Nordafrika, Griechenland.

tiliaceus W., lindenblättrige, 4. Sch. w. Brasilien.
 tricolor L., dreifarbig, ☉. f. Südeuropa.
 undulatus Cav. (*humilis* Jacq., *decumbens* Orteg., *evolvuloides* Dsf., *ciliatus* Roth), wellenblättrige, ☉. f. Spanien, Nordafrika.

verticillatus L., wirtelförmige, ⚥. Sch. w. Westindien.
Catesbaei Spgl. etc. v. *Calystegia Catesbaeiana* etc.
nervosus Burm. v. *Argyrea speciosa*. Hinsichtlich der übrigen s. *Ipomoea*.

Conyza T., Dürrwurz, XIX. II., Compositae-Corymbiferae. I. Genuin.

aegyptiaca Ait. (*spathulata* Hornem.), ägyptische, ☉. f. Aegypten.

albida W., weißliche, ☉. w. f. m. Brasilien.

altaica DC., altaische, ♂. f. Sibirien.

ambigua DC., zweifelhafte, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.

amoena Lk., liebliche, 4. w. Congo.

arguta Less., scharfgesägte, 4. w. Brasilien.

candida L., weißliche, ⚥. k. Candia.

chilensis Spgl., chilesische, 4. k. f. Südamerika, westliches Nordamerika.

diversifolia Weinm., verschiedenblättrige, 4. k. t. Chili, Nordindien.

fastigiata W. (*paniculata* Dsf.), gipfelständige, ☉. w. m. f. Südafrika.

floribunda H. B. K., blüthenreiche, 4. w. Quito.

Gouani W., Gouan's, 4. k. t. Canarische Inseln.

Grahami DC., Graham's, 4. t. Bonarische Inseln.

incisa Ait., eingeschnittene, 4. ⚥. k. t. Cap d. gut. H.

a) stipulacea Dsf. β) hirta Less.

ivaefolia Less., ivablättrige, ⚥. k. t. Cap d. gut. H.

laurifolia Lam., lorbeerblättrige, ⚥. w. Mascarenas.

limonifolia Sm. (*candida* W.), limonienblättrige, ⚥. k. Griechenland.

pinnatifida Roxb., fiederspaltige, 4. w. Ostindien.

Conyza

squarrosa L., sparrige, 4. f. Europa.
thapsoides MB., thapsusähnliche, 4. f. Südrufsland.
verbascifolia W., königskerzenblättrige, 4. k. Sicilien,
 Griechenland.

II. Commidendrum DC.

gummifera Roxb., gummigebende, ♀. w. t. St. Helena.
rugosa Ait., runzelige, ♀. w. t. St. Helena.

amplexicaulis Lam. v. *Blumea amplexans* Nachtr.
angustifolia H. Par. v. *Bacharis Pingraea* Nachtr.
arborescens L. v. *Vernonia arborescens*. *aurita* L.
 fil. etc. v. *Blumea aurita* etc. *balsamifera* L., *bi-*
frons L. etc. v. *Pluchea balsamifera* etc. *cinerea*
 L. v. *Vernonia cinerea*. *geminiflora* Ten. v. *Phag-*
nalon rupestre. *glutinosa* Lam. v. *Psiadia glutinosa*.
inuloides Ait. v. *Jasonia dichotoma*. *patula* Ait.
 v. *Cyanopsis pubescens*. *prolifera* Lam. v. *Micro-*
glossum proliferum. *rigida* Sw. v. *Vernonia rigida*.
saxatilis L. v. *Phagnalon saxatile*. *sericea* Ait. v.
Schizogyne sericea. *sordida* L. v. *Phagnalon sord-*
didum. *Tenorii* Spgl. v. *Phagnalon rupestre*. *vir-*
gata L. v. *Pterocaulon virgatum*. *viscosa* Hortul.
 v. *Inula viscosa*.

Cookia Sonn. (Capit. Cook, berühmter Seefahrer), X. 1.,
 Hesperideae-Aurantaceae.

punctata Sonn., punktirte, ♀. w. Südchina, Molucken.

Cooperia Herb. (J. Cooper, englischer Garten-Cultivator),
 VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

chlorosolen Herb., grünröhrige, 4. Zw. t. Texas.

Drummondii Herb., Drummond's, 4. Zw. t. Texas.

Copaifera L., Copaivbalsambaum (*Copaiba*, brasilia-
 nischer Name), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

guianensis Desf., guianische, ♀. w. Guiana.

officinalis L., officinelle, ♀. w. Südamerika.

Coptis Salisb., *Coptis*, XIII. VI., Ranunculaceae.

asplenifolia Salisb., strichfarnblättrige, 4. f. Westliches
 Nordamerika.

trifolia Salisb., dreiblättrige, 4. f. Nordamerika, Grön-
 land, Sibirien.

Corallorrhiza RB., Korallenwurz, XX. 1., Orchideae.

innata RB., verwachsene, 4. Kn. f. Europa, Nordamer.

multiflora Nutt., vielblumige, 4. Kn. f. Canada.

odontorrhiza Spgl., zahnige, 4. Kn. f. Nordamerika.

hyemalis Nutt. v. *Aplectrum hyemale*.

Corbularia Sal., Corbularie, VI. 1., Narcisseae-Ama-
 ryllideae.

serotina Haw., spätblühende, 4. Zw. f. k. Portugal.

Corchorus L., Mufspflanze, XIII. 1., Tiliaceae.

acutangulus Lam., spitzkantige, ♀. w. Ostindien.

aestuanus L., hitzige, ☉. w. Südamerika.

capsularis L., kapseltragende, ☉. w. Ostindien.

hirsutus L., rauhaarige, ♀. w. Westindien.

hirtus L., rauhästige, ♀. w. Südamerika.

olitorius L., gemeine, ☉. w. Ost- und Westindien etc.

pilolobus Lk. (*lasiolobus* Spgl.), rauhlapfige, ♀. w.
 Südamerika.

siliquosus L., schotige, ♀. w. Westindien.

tridens L., dreizählige, ♀. w. Ostindien.

Corchorus

trilocularis L., dreifächerige, ☉. w. Arabien.

japonicus L. v. *Kerria japonica*.

Cordia Plum. (E. et V. Cordus, alte deutsche Botaniker),
Brustbeere, V. I., Asperifoliaceae.

Collococca L., zottigfrüchtige, ♀. w. Jamaica.

dentata Vahl, gezähnelte, ♀. w. Westindien.

dichotoma Forst., zweizinkige, ♀. t. Neuholland.

Dillenii Spgl. (*Sebestena* W.), Dillen's, ♀. w. Bahamische Inseln.

domestica Roth, gebaute, ♀. w. Ostindien.

elliptica Sw., elliptische, ♀. w. Antillen.

flavescens Aub., gelbliche, ♀. w. Guiana.

Gerascanthus Jacq., knaulblumige, ♀. w. Westindien,

grandiflora Lindl., großblumige, ♀. w. Südamerika.

Mexico.

laevis Jacq., glatte, ♀. w. Neu-Granada.

latifolia Rumpf., breitblättrige, ♀. w. Ostindien.

macrophylla L., großblättrige, ♀. w. Westindien.

micrantha Sw., kleinblumige, ♀. w. Jamaica.

monoica Roxb., einhäusige, ♀. w. Ostindien,

Myxa L., schwarze, ♀. w. Ostindien.

nervosa Lam., nervige, ♀. w. Guiana.

nodosa Lam., knotige, ♀. w. Guiana.

obliqua W., schiefblättrige, ♀. w. Ostindien.

parviflora Dsf., kleinblumige, ♀. w. Jamaica.

reticulata Roth, netzförmige, ♀. w. Ostindien,

rugosa W., runzelige, ♀. w. Südamerika.

Sebestena L., *Sebestena*-C., ♀. w. Westindien.

spinescens L., dornige, ♀. w. Ostindien.

angustifolia R. et S., *martinicensis* R. et S. v. *Varronia angustifol.* etc. *Patagonula* Ait. v. *Patagonula americana*.

Cordyline Commers., *Cordyline*, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

australis Endl., südliche, ♀. t. Norfolkinsel.

cannaefolia RB., blumenrohrblättrige, ♀. t. Neuholland.

hemichrysa Commers., goldfarbige, ♀. w. Ostindien, Mascarenas.

Corema D. Don, *Corema*, XXII. III., Tricoccae-Empetreae.

alba D. Don, weißse, ♀. k. Portugal.

Coreopsis L., Wanzenblume, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

alba L., weißse, 4. w. Jamaica.

angustifolia Ait., schmalblättrige, 4. f. Nordamerika.

arguta Pursh, spitzzahnige, 4. f. Nordamerika.

aurea Ait. (*trichosperma* β *aurea* Nutt.), goldfarbige, ♂. f. Nordamerika.

auriculata L., geöhrte, 4. f. Nordamerika.

β) *glabrata*.

chrysantha L., goldfarbige, ♂. w. Westindien.

coronata Hook., gekrönte, ?☉. f. Texas.

diversifolia DC., Hook., verschiedenblättrige, 4. f. Carolina, Texas.

ferulaefolia Jacq., steckenkrautblättrige, 4. k. Mexico.

filifolia Hook., fadenblättrige, ?☉. f. Mexico.

grandiflora Hogg., großblumige, 4. f. Nordamerika.

incisa Ker, eingeschnittene, 4. Sch. t. w. Jamaica.

Coreopsis

integrifolia Poir., ganzblättrige, 4. f. Carolina.
lanceolata L., lanzettblättrige, 4. f. Nordamerika.

β) *glabella* Mchx. γ) *crassifolia* Ait.

latifolia Mchx., breitblättrige, 4. f. Carolina.
longipes Hook., langfüßige, ? ⊙. f. Texas.
pauciflora Lehm., wenigblumige, 4. f. Nordamerika.
reptans L., kriechende, 4. Sch. t. Westindien.
senifolia Mchx., kurzhaarige, 4. f. Nordamerika.

β) *rigida* Nutt.

tenuifolia Ehrh. (*verticillata* Lam.), feinblättrige, 4. f. Nordamerika.

trichosperma Mchx., haarsamige, ♂. 4. f. Nordamerika.
Tripteris L., dreiblättrige, 4. f. Nordamerika.

verticillata L. (*delphinifolia* Lam.), wirtelblättrige, 4. f. Nordamerika.

alata Pursh., *alternifolia* L. etc. v. *Actinomeris*
alata et squarrosa. amplexicaulis Cav. v. *Simsia*
amplexicaulis. artemisiaefolia Jacq. v. *Cosmea sul-*
furea. Atkinsoniana Dougl. v. *Calliopsis Atkinso-*
niana. heterophylla Cav. v. *Echinacea heterophylla.*
parviflora Jacq. v. *Cosmea parviflora. procera* Ait.
 v. *Actinomeris squarrosa. tinctoria* Nutt. v. *Cal-*
liopsis tinctoria. Hinsichtlich der übrigen s. *Bidens.*

Coreosma viscosissima Spach v. *Ribes viscosissimum.*

Coriandrum T., Coriander, V. II., Umbelliferae.

sativum L., gemeiner, ⊙. f. Südeuropa.

testiculatum L. v. *Bifora radians.*

Coriaria Nifs., Gerberstrauch, XXII. IX., Tricoccae-Corarieae.

myrtifolia L., myrtenblättriger, ♀. k. f. b. Südeuropa, Nordafrika.

sarmentosa Forst., starkwurzelnde, ♀. k. t. Neuzeeland.

Coris T., Coris, V. I., Globulariaceae.

monspeliensis L., französische, ♀. ♂. k. Südeuropa.

Corispermum L., Wanzensame, I. II., Aizoideae-Amaranthaceae.

canescens Kit., grauer, ⊙. f. Ungarn.

glomeratum Lag., knaulförmiger, ⊙. f. ?

hyssopifolium L., ysopblättriger, ⊙. f. Süd- und Osteuropa.

intermedium Schweig., mittlerer, ⊙. f. Preußen.

Marschallii Steven, Marschall's, ⊙. f. Taurien.

nitidum Kit., glänzender, ⊙. f. Ungarn.

patens R. et S., absteher, ⊙. f. ?

polygaloides Fisch. et Mey., kreuzblumenähnlicher, ⊙. f. Nordpersien.

pungens Vahl, stechender, ⊙. f. Caucasus.

Redowskyi Fisch., Redowsky's, ⊙. f. Sibirien.

squarrosus L. (*spicatus* W., *hyssopifol.* Pall.), sparriger, ⊙. f. Osteuropa, Asien.

tenuis Lk., feiner, ⊙. f. ?

Cornucopiae L., Füllhorngras, III. II., Gramineae.

cucullatum L., kappenförmiges, ⊙. f. Griechenland, Kleinasien.

Cornus T., Hartriegel, IV. I., Corneae.

alba L. (*stolonifera* Mchx., *tatarica* Mill.), weißer, ♀. f. Sibirien, Canada.

alternifolia L., wechselblättriger, ♀. f. Nordamerika.

Cornus

asperifolia Mchx. Ell., scharfblättriger, ♀. f. Südcarolina.
canadensis L., canadischer, ♀. f. Canada.

circinnata L'Her. (*tomentosa* Mchx., *rugosa* Lam., *virginiana* H. P.), kreisblättriger, ♀. f. Nordamerika.
florida L., schönblühender, ♀. f. Nordamerika.

mascula L., Corneliuskirschen-H., ♀. f. Europa.

a) fruct. ceræ coloris Duh. b) variegatus.

oblonga Wall., länglichblättriger, ♀. f. b. k. Nepal.

paniculata L'Her. (*albida* Ehrh., *racemosa* Lam., *citri-folia* H. Par.), rispiger, ♀. f. Nordamerika.

b) *radiata* Pursh.

sanguinea L. (*foemina* Raj.), gemeiner, ♀. f. Europa, Asien, Nordamerika.

b) *Purshii* Don. c) fol. variegat.

sericea L'Her. (*Amomum* du Roi, *rubiginosa* Ehrh., *coerulea* Lam., *lanuginosa* Mchx., *candidissima* Mill., *cyanocarpos* Mch.), seidenhaariger, ♀. f. Nordamerika.

β) *oblongifolia* Rafin.

stricta Lam. (*fastigiata* Mchx., *canadensis* H. Par., *cyanocarpos* Gmel.), steifer, ♀. f. Nordamerika.

b) *sempervirens* Lod.

suecica L., schwedischer, 4. f. Nordeuropa.

Cornutia L. (J. P. Cornutus, französischer Botaniker), II. 1., Verbenaceae.

pyramidata L., pyramidale, ♀. w. Mexico.

punctata W. v. *Hosta coerulea*.

Coronilla T., Kronenwicke, XVII. 1v. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

argentea L., silberfarbige, ♀. k. Creta.

cappadocica W. (*orientalis* Mill.), cappadocische, 4. f. Cappadocien.

coronata L. DC., gekrönte, ♀. 4. f. b. k. Süd- und Westeuropa.

cretica L., cretische, ☉. f. Creta, Taurien, Istrien.

Emerus L., Scorpions-K., ♀. f. Süd-, West- und Osteuropa.

glauca L. (*odorata* Hort.), blaugrüne, ♀. k. Südfrankreich.

β) *variegata*.

globosa Lam., kugelblumige, 4. k. Creta.

iberica MB., iberische, 4. f. Kleinasien, Caucasus.

junceae L., binsenförmige, ♀. k. Südfrankreich.

minima L., kleinste, ♀. 4. k. Süd- und Westeuropa.

montana Riv. Jacq., Berg-K., 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

pentaphylla Dsf., fünfblättrige, ♀. k. Numidien.

squamata Cav., schuppige, 4. f. Spanien.

vaginalis Lam. (*minima* Jacq.), scheidige, ♀. 4. f. Mittel- und Südeuropa.

valentina L. (*stipularis* Lam.), spanische, ♀. k. Süd- und Westeuropa.

varia L., gemeine, 4. f. Mitteleuropa.

viminalis Salisb., ruthenförmige, ♀. k. Mauritanien.

Securidaca L. v. *Securigera* Coronilla.

Coronopus *didyma* Sm. v. *Senebiera pinnatifida*, *nilotica* Del. *Ruellii* G. vid. *Senebiera nilotica* et *Coronopus*.

Corraea Sm. (J. Correa de Serra, berühmter portugiesischer Botaniker), VIII. 1., Tricoccae-Rutaceae.

Corraea

- alba Andr., weisse, ⚥. t. Neusüdwallis.
 pulchella RB., hübsche, ⚥. t. Neuholland.
 rufa G., gelbrothe, ⚥. t. Neuholland.
 speciosa Andr., prächtige, ⚥. t. Neusüdwallis.
 virens Sm. (*viridiflora* Andr.), grünliche, ⚥. t. Neusüdwallis.

Corrigiola L., Hirschsprung, V. III., Portulacaceae.

- capensis Thbg., kapischer, ☉. f. Cap d. g. H.
 litoralis L., Strand-H., ☉. f. Europa.
 telephiifolia Pourr., telephiumblättrige, ☉. f. Südfrankr.

Cortusa Clus. L. (J. A. Cortusus, Professor der Botanik zu Padua), V. I., Primulaceae.

- Matthioli L., Matthioli's, 4. f. Oesterreichische, baierische, tyroler Alpen, Sibirien.

Corvisartia Helenium Merat. Cass. v. *Inula Helenium*.**Coryanthes** Hook. v. *Corysanthes*.**Corycarpus** Zea, Helmspelze, II. II., Gramineae.

- arundinaceus Zea, rohrartige, 4. f. Nordamerika.

Corycium Sw., Helmstendel, XX. I., Orchideae.

- crispum Sw., krauser, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.
 orobanchoides Sw., sommerwurzähnlicher, 4. Kn. t.
 Cap der guten Hoffnung.

Corydalis Vent., Kappenmohn, XVII. II. (IV.), Papaveraceae-Fumarieae.

- acaulis P., stengelloser, 4. f. Oesterreichisches Litorale.
 angustifolia DC., schmalblättriger, 4. Kn. f. Caucasus.
 aurea W., goldfarbiger, ♂. f. Nordamerika.
 β) flavula Rafin.

- ? bicalcarata Haw., zweisporniger, 4. Kn. f. ?

- bracteata P., deckblättriger, 4. Kn. f. Sibirien.

- breviflora DC., kurzblumiger, ☉. f. Kamtschatka.

- bulbosa P. (*tuberosa* DC., *cava* Schwg.), hohlknolliger,
 4. Kn. f. Europa, Nordasien.

- β) albiflora Kit.

- capnoides P., weißer, ♂. f. Südeuropa.

- caucasica DC., caucasischer, 4. Kn. f. Caucasus.

- claviculata DC. P., rankender, ☉. f. Sch. Nördl. Europa.

- fabacea P. (? *pumila* Host.), kleiner, 4. Kn. f. Europa.

- Gebleri Ledeb., Gebler's, 4. f. Altai.

- glauca Pursh, blaugrüner, ♂. ☉. f. Nordamerika.

- Halleri W. (*bulbosa* DC., *solida* Sm., *digitata* P.), Hal-
 ler's, 4. Kn. f. Europa, Sibirien.

- impatiens Fisch. DC., springschotiger, ☉. f. Sibirien.

- longiflora P., langblumiger, 4. Kn. f. Altai.

- lutea DC. P., gelber, 4. f. England, Deutschl., Frankr.

- Marschalliana P., Marschall's, 4. Kn. f. Taurien.

- nobilis P., edler, 4. Kn. f. Sibirien.

- ochroleuca Koch, weißgelber, 4. f. Oesterr. Litorale.

- paeonifolia P., pänienblättriger, 4. f. Sibirien.

- pauciflora P., wenigblumiger, 4. Kn. f. Sibirien.

- sibirica P., sibirischer, 4. f. Sibirien.

- stricta Fisch., steifer, ♂. f. Sibirien.

- uralensis DC., uralischer, ♂. f. Altai.

- bracteosa* Spgl., *canadensis* Gold., *Cucullaria* P.,
eximia Spgl., *formosa* Pursh etc. v. *Dielytra bracteosa*
 etc. *fungosa* Vent. v. *Adlumia cirrhosa*.

Corylus T., Haselnufs, XXI. IX., Amentaceae.

- americana Mchx., amerikanische, ⚥. f. Nordamerika.

- Avellana L., gemeine, ⚥. f. Europa, Nordasien, Japan.

Corylus

- b) *pumila* A. B. c) *heterophylla* A. B. Lod. (*laciniata* Hort., *urticifolia* Hort.), d) *purpurea* Lod. (*atropurp.* Hort.). e) *tubulosa* W. (*maxima* Mill. *sativa* Bauh.). f) *tubulosa alba*. g) *crispa*. h) *tenuis* Lod. i) *glomerata* Bauh. k) *barcelonensis* Lod. (*grandis* Lod.). l) *Lamberti* Lod. etc.
- Columna** L. (*arborea* Hort.), türkische, $\frac{1}{2}$ f. Thracien.
- b) *intermedia* Lod. c) *arborescens* Fisch.
- humilis** W. (*americana humilis* Wang.), niedrige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- rostrata* Ait. (*cornuta* Hort.), geschnäbelte, $\frac{1}{2}$ f. Nordamer.
- Corymbium** L., Straußdolde, XIX. v., Compositae-Vernoniaceae (*Eupatorineae*).
- glabrum* Thbg., glatte, 4. t. Cap der guten Hoffnung.
- nervosum* Thbg., nervige, 4. t. Cap der guten Hoffn.
- scabrum* L. fil., scharfe, 4. t. Cap der guten Hoffn.
- Corynandra** Schrad., Keulenfaden, XIII. i., Capparideae.
- pulchella* Schrad., schöner, $\odot$. w. Neapel, China.
- Corynephorus** P. Beauv., Keulengras, III. ii., Gramineae.
- articulatus* P. B., gegliedertes, 4. f. k. Südeuropa, Nordafr.
- canescens* P. B., graues, 4. f. Europa.
- Corynocarpus** Forst., Keulenfrucht, V. i., Sapota-ceae-Myrsineae.
- laevigatus* Forst., glattes, $\frac{1}{2}$ t. Neuzeeland.
- Corynostyles** Mart., Keulengriffel, V. i., Violaceae.
- Hybanthus* Mart., guianischer, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Guiana.
- pyrifolia* Mart., birnblättriger, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.
- Corypha** L., Schirmpalme, VI. iii., Palmae.
- australis* RB., neuholländische, $\frac{1}{2}$ w. Neuholland.
- elata* Roxb., hohe, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
- glaucescens* Hort., blaugrüne, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
- Pumos* Humb., mexicanische, $\frac{1}{2}$ w. Mexico, Cuba.
- tectorum* Humb., Dach-Sch., $\frac{1}{2}$ w. Neugranada.
- umbraculifera* L., ächte, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
- Utan* Lam., moluckische, $\frac{1}{2}$ w. Molucken.
- minor* Jacq. v. *Sabal Adansoni*. *Palmetto* Walt. v.
- Chamaerops* Palm. *Talieria* Roxb. v. *Taliera* bengalensis.
- Corysanthes** RB., Helmstendel, XX. i., Orchideae.
- bicalcarata* RB., zweisporniger, 4. Kn. w. t. Neuholland.
- fimbriata* RB., gefranzter, 4. Kn. w. t. Neuholland.
- macrantha* Hook., großblumiger, 4. w. Caracas.
- maculata* Hook., gefleckter, 4. w. Demerara.
- unguiculata* RB., nagelförmiger, 4. Kn. w. t. Neuholland.
- Coscinium** Col., Lochkeim, XXII. vi., Menispermeae.
- fenestratum* Col., windender, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ceylon.
- Cosmanthus** Nolte, Franzenblume, V. i., Hydrophyllae.
- fimbriatus* Nolt., carolinische, $\odot$. f. Carolina.
- Cosmea** Cav. (W.), Cosmea, XIX. iii., Compositae-Corymbiferae.
- bipinnata* Cav., doppeltgefiederte, $\odot$. m. f. Mexico.
- β) *exaristata*.
- caudata* H. B. K., geschwänzte, 4. w. Westindien.
- chrysanthemoides* H. B. K. (*chrysanthemifol.* Spgl.), wucherblumenähnliche, $\odot$. 4. t. m. f. Mexico.
- crithmifolia* H. B. K., meerfenchelblättrige, $\odot$. m. f. Mexico.
- diversifolia* Hort., verschiedenblättrige, $\odot$. f. Nordamer.
- lutea* Sims, gelbe, 4. t. Mexico.

Cosmea

- parviflora H. B. K., kleinblumige, ☉. m. f. Mexico.
 pilosa H. B. K., haarige, ? 4. w. Mexico.
 scabiosoides H. B. K. (*Scabiosae* Spgl.), scabiosenähnliche, 4. ? Kn. Mexico.
 sulfurea W., schwefelgelbe, ☉. 4. m. f. t. Mexico.
 tenella H. B. K., zarte, ☉. m. f. Mexico.
 tenuifolia Lindl., feinblättrige, ☉. m. f. Mexico.

Cosmelia RB., Cosmelie, V. 1., Epacrideae.

- rubra RB., rothblumige, ☿. t. Neuholland.

Cossignia Commers. (*Cossinia* Spgl.), VI. 1., Sapindacei.

- horbonica DC. (*triphylla* Lam., *pinnata* Lam.), borbonische, ☿. w. Mascarenas.

Costus L., Kostwurz, I. 1., Scitamineae-Amomeae.

- af Ker, afrikanische, 4. w. Sierra Leone.
 comosus Jacq., schopfige, 4. w. Caracas.
 discolor Rosc., verschiedenfarbige, 4. w. Südamerika.
 glabratus Sm., kahle, 4. w. Westindien.
 maculatus Rosc., gefleckte, 4. w. Tropisches Afrika.
 nepalensis Rosc. (*speciosus* β . *angustifolius* Bot. reg.), nepal'sche, 4. w. Nepal.
 pictus D. Don, gemalte, 4. w. Mexico.
 Pisonis Lindl., Piso's, 4. w. Brasilien.
 speciosus Sm. (*arabicus* L.), prächtige, 4. w. Ostindien.
 spicatus Sm., ährige, 4. w. Westindien.
 spiralis Rosc., spiralige, 4. w. Caracas.

Cotoneaster Medic., Quittenmispel, XII. 11., Rosaceae-Pomaceae.

- acuminata Lindl., zugespitzte, ☿. k. f. b. Nepal.
 affinis Lindl., ähnelnde, ☿. k. f. b. Nepal.
 buxifolia Wall., buchsbaumblättrige, ☿. k. f. b. Nepal.
 frigida Wall., kalte, ☿. k. f. b. Nepal.
 laxiflora Jacq. (*vulgaris* β . *laxiflora* Lindl.), lockerblumige, ☿. f. Osteuropa.
 b) uniflora Fisch.
 microphylla Wall., kleinblättrige, ☿. k. Nepal.
 Nummularia Lindl., pfennigkrauthlättrige, ☿. k. Nepal, Nordpersien.
 rotundifolia Wall. (*microphylla* β . *Uva ursi* Lindl.), rundblättrige, ☿. k. Nepal.
 tomentosa Lindl., filzige, ☿. f. Schweiz, Oesterreich, Salzburg etc.
 vulgaris Lindl., gemeine, ☿. f. Mittel- u. Osteuropa, Sibir.
 a) erythrocarpa Led. β) melanocarpa Led. γ) depressa Fr.

Cotula L. G., Laugenblume, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

- anthemoides L., kamillenähnliche, ☉. f. Spanien, Aegypten, Cap der guten Hoffnung.
 aurea L., goldfarbige, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Orient, Aegypten.
 coronopifolia L., krähensfußblättrige, ☉. f. Norddeutschland, Spanien, Afrika, Amerika.
 filifolia Thbg., fadenblättrige, ☉. f. Cap d. g. H.
 nudicaulis Thbg., nacktstengelige, ☉. f. Cap d. g. H.
 pusilla Thbg., niedrige, ☉. f. Cap der guten Hoffn.
 sphaerantha Lk., kugelblumige, 4. w. Congo.
 bicolor Roth. (*latifolia* Dsf.) v. *Dichrocephala latifolia*. *caneifolia* et *minuta* W. v. *Myriogyne minuta*. *maderaspatana* Dsf. v. *Grangea maderaspa-*

Cotula

tana. *stricta* L. vid. *Lidbeckia pectinata*. *tanacetifolia* W. v. *Tanacetum multiflorum*. *viscosa* L. v. *Egletes viscosa*.

Cotyledon T., Fettblatt (Nabelblatt), X. iv., Corniculatae-Crassulaceae.

acalioides Thbg., acaliaähnliches, ⚥. t. Cap d. g. H.
 canaliculata Haw., nachenförmiges, ⚥. t. Cap d. g. H.
 clavifolia Haw., keilblättriges, 4. t. Cap d. g. H.
 coruscans Haw., blitzendes, ⚥. t. Cap d. g. Hoffn.
 crassifolia Haw., dickblättriges, ⚥. t. Cap d. g. H.
 cristata Haw., kammförmiges, 4. t. Cap d. g. Hoffn.
 cuneata Thbg., keilblättriges, ⚥. t. Cap d. g. Hoffn.
 cuneiformis Haw., keilförmiges, ⚥. t. Cap d. g. H.
 curviflora Sims (*purpurea* Haw.), krummblumiges, ⚥. t.

Cap der guten Hoffnung.

decussata Lindl. Sims (*papillaris* Haw. non Thbg.),
 kreuzblättriges, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.
 dichotoma Haw., zweizinkiges, ⚥. t. Cap d. g. H.
 elata Haw., erhabenes, ⚥. t. Cap der guten Hoffn.
 fascicularis Ait., büschelförmiges, ⚥. t. Cap d. g. H.
 gracilis Haw., schlankes, ⚥. t. Cap der guten Hoffn.
 hemisphaerica L., halbkugelförmiges, ⚥. t. Cap d. g. H.
 interjecta Haw., zwischenliegendes, ⚥. t. Cap d. g. H.
 jasminiflora Salm, jasminblumiges, ⚥. t. Cap d. g. H.
 maculata Salm (*alternans* Haw.), geflecktes, ⚥. t. C. d. g. H.
 mammillaris Thbg., warzenförmiges, ⚥. t. Cap d. g. H.
 mucronata Lam. (*undulata* Haw.), stachelspitziges, ⚥. t.

Cap der guten Hoffnung.

oblonga Haw., längliches, ⚥. t. Cap der guten Hoffn.
 orbiculata L., kreisförmiges, ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.
 ovata Haw., eiförmiges, ⚥. t. Cap der guten Hoffn.
 papillaris Haw., weichwarziges, ⚥. t. Cap d. g. H.
 ramosa Haw. (*ramosissima* Mill.), ästiges, ⚥. t. C. d. g. H.
 ramosissima Salm, Haw., starkästiges, ⚥. t. C. d. g. H.
 rhombifolia Haw., rautenblättriges, ⚥. t. Cap d. g. H.
 rotundifolia Haw., rundblättriges, ⚥. t. Cap d. g. H.
 spuria L., unächt, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.
 teretifolia Thbg., rundblättriges, ⚥. t. Cap d. g. H.
 tricuspidata Haw., dreispitziges, ⚥. t. Cap d. g. H.
 triflora Thbg., dreiblumiges, ⚥. t. Cap d. g. Hoffn.
 tuberculosa Lam., höckeriges, ⚥. t. Cap d. g. Hoffn.
 ungulata Lam., klauenförmiges, ⚥. t. Cap d. g. H.
 viridis Haw., grünes, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

crenata Ait. v. *Kalanchoe crenata*, *calycina* Lam.
 v. *Bryophyllum calycinum*. *coccinea* Cav. etc. v.
Echeveria coccinea etc. *hispanica* L. v. *Pistorinia*
hispanica. *Livenii* Ledeb., *lutea* Huds., *Malacophyllum* Pall.,
serrata L., *spinosa* L., *Umbilicus* L.
 v. *Umbilicus Livenii* etc.

Coulteria H. B. K. (Th. Coulter, Genfer Botaniker),
 X. i., Leguminosae-Caesalpineae.

horrida H. B. K., stachelige, ⚥. w. Südamerika.

mollis H. B. K., weiche, ⚥. w. Südamerika.

tinctoria DC. H. B. K., färbende, ⚥. w. Südamerika.

Cousinia Cass. (Cousin, französischer Staatsmann und
 Gelehrter), XIX. i., Compositae-Cynarocephalae.

carduiformis Cass. et Mey., distelartige, ♂. f. Nordpers.

cynaroides C. A. Meyer, artischokenähnliche, ♂. f.
 Ostcaucasus.

Cousinia

Hohenackeri Fisch. et Mey., *Hohenacker's*, 4. f. Nordpersien.

macrocephala C. A. Mey., großköpfige, ♂. f. Nordpersien.

tenella Fisch. et Mey., zarte, ☉. f. Armenien.

Coutarea Aubl. (guianischer Name), V. 1., Rubiaceae.

speciosa Aubl., prächtige, ♀. w. Guiana.

Coutoubea Aubl. (guianischer Name), IV. 1., Contortae-Gentianeae.

ramosa Aubl., ästige, ☉. w. Guiana.

spicata Aubl., ährige, ♂. w. Guiana.

verticillata G. Don, wirtelblättrige, ♂. w. Trinidad.

Cowania D. Don (James Cowan, englischer Kaufmann), XII. III., Rosaceae.

mexicana D. Don, mexicanische, ♀. t. w. Mexico.

plicata D. Don, gefaltete, ♀. t. Mexico.

Crambe T., Meerkohl, XV. 1., Cruciferae.

aspera MB., rauher, 4. f. Taurien.

cordifolia Stev., herzblättriger, 4. f. Caucasus.

filiformis Jacq., fadenförmiger, ☉. ♂. f. Patagonien.

fruticosa L., suppl., strauchiger, ♀. k. Madeira.

grandiflora Stev., großblumiger, 4. f. Südl. Rußland.

hispanica L., spanischer, ☉. f. Westeuropa.

β) *cordifolia* Duf.

junceae MB., binsenförmiger, 4. f. Caucasus.

maritima L., gemeiner, 4. f. Europa.

orientalis L., morgenländischer, 4. f. Kleinasien.

pinnatifida RB. (*orientalis* Jacq.), fiederspaltiger, 4. f.

Ungarn, Taurien, Caucasus.

reniformis Dsf., nierenförmiger, ☉. f. Nordafrika.

strigosa L'Her., striegeliger, ♀. k. Canarische Inseln.

Tataria Jacq. (*laciniata* Lam.), ungarischer, 4. f. Mähren, Ungarn, Siebenbürgen, Taurien.

macrocarpa MB. v. *Sobolewsia lithophila*.

Craniolaria L., Craniolarie, XIV. II., Personatae-Bignoniaceae (Sesameae).

annua L., jährige, ♂. t. w. Südamerika.

Craniotome Rchb., Craniotome, XIV. 1., Labiatae.

versicolor Rchb., buntfarbige, ☉. m. f. Nepal.

Craspedia Forst., Craspedie, XIX. 1., Compositae-Helichryseae.

fimbriata DC. (*uniflora* Forst.), gefranzte, 4. t. Neuseeland.

macrocephala Hook., großköpfige, 4. t. Van-Diemensland.

Richea Cass. (*glauca* et *pilosa* Spgl.), blaugrüne, 4. t. Van-Diemensland, Neuholland.

Crassula L., Dickblatt, V. v., Corniculatae-Crassulaceae.

A) *Genuinae*.

acutifolia Lam., spitzblättriges, ♀. t. Cap d. gut. H.

albiflora DC. Sims, weißblumiges, ♀. t. Cap d. g. H.

andegaviensis DC., anger'sches, ☉. f. Frankreich.

arborescens Mill. (*Cotyledon* Jacq., *portulacacea* W.), baumartiges, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

bibracteata Haw., doppeltdeckblättriges, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *major* Haw.

Crassula

biplanata Haw., doppeltgeebnetes, ♀. t. Cap d. gut. H.
 bullulata Haw., blasiges, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
 centauroides L., flockenblumenähnliches, ♂. t. Cap der
 guten Hoffnung.

ciliata L., gefranztes, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) media Haw. γ) minor Haw.

coccinella Haw., scharlachpunctirtes, ♀. t. Cap d. g. H.

columnaris L., säulenförmiges, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

concinna Haw., nettes, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

cordata Ait., herzblättriges, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

corymbulosa Lk., traubendoldiges, ♀. t. Cap d. g. H.

Cotyledonis L., nabelblattähnliches, ♀. t. Cap d. g. H.

dejecta Jacq., niedergebeugtes, ♀. t. Cap der gut. H.

diffusa Ait., weitschweifiges, ☉. m. f. t. Cap d. g. H.

expansa Ait., ausgebreitetes, ☉. m. f. t. Cap d. g. H.

filicaulis Haw., fadenförmiges, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

glabra Haw. (*glomerata* β. Ait.), kahles, ☉. m. f. t. Cap
 der guten Hoffnung.

glomerata L., knauförmiges, ☉. m. f. t. Cap d. g. H.

imbricata L., dachziegelförmiges, 4. ♀. t. Cap d. g. H.

lactea Ait., milchweißes, 4. ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

lineolata Ait., linirtes, ♂. t. Cap der guten Hoffnung.

Magnolii DC. (*caespitosa* Cav.), Magnol's, ☉. f. Süd-
 frankreich, Oberitalien, Istrien.

marginalis Ait., berandetes, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

moschata Forst., moschusduftendes, ☉. m. f. Neu-
 südwallis.

obliqua Ait. (*portulacea* Lam.), schiefes, ♀. t. Cap der
 guten Hoffnung.

obtusa Haw., stumpfes, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

orbicularis L., kreisförmiges, 4. t. Cap der gut. Hoffn.

pellucida L., durchscheinendes, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

perfilata Scop. (*perfossa* Lam., *perforata* L.), durch-
 stochenes, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

perforata Thbg., durchbohrtes, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

pulchella Ait., hübsches, ☉. m. f. t. Cap d. gut. Hoffn.

punctata L., punkirtes, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

ramosa Ait., ästiges, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

ramuliflora Lk., astblumiges, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

retroflexa L., zurückgebeugtes, ☉. m. f. t. Cap der
 guten Hoffnung.

revolvens Haw., zurückgewickeltes, ♀. t. Cap d. g. H.

rosularis Haw., rosenförmiges, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.

rubens L., röthliches, ☉. f. Süddeutschland, Schweiz,
 Frankreich etc.

scabra L., scharfes, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

scabrella Haw., schärfliches, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

sparsa Ait., zerstreutstehendes, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.

spathulata Thbg., spathelblättriges, 4. ♀. k. t. Cap
 der guten Hoffnung.

squamulosa Haw., schuppiges, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

subulata L., pfriemenförmiges, ☉. t. m. f. Cap d. g. H.

telephioides Haw., telephiumähnliches, ♀. t. Cap d. g. H.

tetragona L., vierseitiges, ♀. t. Cap der gut. Hoffnung.

verticillaris L., wirtelförmiges, ☉. f. Südeuropa.

B) Turgosia Haw.

aloides Ait. Haw., aloeähnliches, ♂. t. Cap d. gut. H.

Capitella L. Haw., kopfförmiges, ♂. t. Cap d. gut. H.

linguaefolia Haw., zungenblättriges, ♀. t. Cap d. g. H.

Crassula

obovata Haw., verkehrteiförmiges, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.
 pertusa Haw., durchlöcherter, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.
 tomentosa L., filziges, 4. t. Cap der guten Hoffn.
 Turrita L., thurmformiges, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.

β) rosea Haw.

C) Globulea Haw.

atropurpurea Haw., dunkelpurpurfarbiges, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
 canescens Schult. Haw., grauliches, 4. t. Cap d. g. Hoffn.
 capitata Haw., kopfförmiges, 4. t. Cap der gut. Hoffn.
 cultrata L., messerförmiges, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
 hispida Haw., hackeriges, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
 impressa Haw., eingedrücktes, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) minor Haw.

lingua Haw., Zungen-F., ♀. t. Cap der guten Hoffn.
 lingula Haw., gezüngeltes, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
 mesembryanthoides Haw., zaserblumenähnliches, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

β) altior Haw.

mollis L. suppl. Ait., weiches, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.
 nudicaulis L., nacktstengeliges, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.
 obvallata L., verhülltes, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
 paniculata Haw., rispiges, 4. t. Cap der guten Hoffn.
 radicans Haw., starkwurzelndes, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
 subincana Haw., fastgraues, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

β) erecta Haw.

sulcata Haw., gefurchtes, 4. t. Cap der guten Hoffn.
 coccinea L., jasminea Ker, odoratissima Andr., versicolor Burch. etc. v. Dietrichia coccinea etc. dichotoma L. v. Grammanthes dichotoma. falcata L., perfoliata L. v. Rochea falcata etc. rotundifolia Haw. v. Kalanchoe rotundifolia. undulata Haw. v. Cyrtogyne undulata.

Crataegus T., Weißdorn, XII. II., Rosaceae-Pomaceae.
 apiifolia Mchx. (*Oxyacantha* Walt.), sellerieblättriger, ♀. f. Nordamerika.

b) minor.

Aronia Bosc., levantischer, ♀. f. Levante.

Azarolus L., Azarol-W., ♀. f. Südeuropa.

coccinea L., scharlachfarbiger, ♀. f. Nordamerika.

b) corallina Lod. (*pyriformis* Lod.). c) indentata Lod. d) maxima Lod. (*spinosa* Godefroy, ? *flabellata* Hort.).

cordata Mill. (*populifolia* Walt.), herzblättriger, ♀. f. Nordamerika.

Crusgalli L. (*lucida* Wangenh.), langsporniger, ♀. f. Nordamerika.

β) splendens DC. (*arbutifolia* Hort.). γ) pyracanthifolia DC. δ) salicifolia DC. ε) linearis DC. ζ) nana DC.

Douglassii Lindl. (*punctata* var *brevispina* Doug.), Douglas's, ♀. f. Nordamerika.

flava Ait. (*glandulosa* Mchx., *viridis* Walt., *Michauxii* P.), gelber, ♀. f. Nordamerika.

glandulosa Ait. (*sanguinea* Pall., *rotundifolia* Booth), drüsiger, ♀. f. Nordamerika, Sibirien.

heterophylla Flügge (*neapolitana* Hort.), verschiedenblättriger, ♀. f. Ost- und Südeuropa.

lobata Bosc. (*lutea* Hort.), gelappter, ♀. f. ?

Crataegus

macracantha Lodd., großstacheliger, *h. f.* Nordamerika.
β) *minor*.

maroccana P. (*maura* L. suppl.), marockanischer, *h. f.* Nordafrika, Neapel.

melanocarpa MB. (*platyphylla* Lindl., *fissa* Lee), schwarzfrüchtiger, *h. f.* Taurien.

mexicana Moc. et Sess. (*stipulacea* Lod.), mexicanischer, *h. k. t.* Mexico.

monogyna Jacq., einweibiger, *h. f.* Europa, Sibirien.

a) *kyrtostyla* Fingerh. b) *sibirica* Lod. c) *transylvanica* Hortul. d) *quercifolia* Booth. e) *lacinata* Lod. f) *pteridifolia* Lod. (*pectinata* Hort.). g) *eriocarpa* Lindl. h) *purpurea* Penny. i) *Oliveriana* Bosc. (*orientalis* Hortul.). k) *aurea*. l) *aurantiaca*. m) *leucocarpa*. n) *rosea*. o) *punicea*. p) *punicea fl. pleno*. q) *Celsiana*. r) *prae-cox*. s) *capitata*. t) *flexuosa*. u) *pendula*. v) *reginae* Hortul. etc. (Zum Theil auch Bastarde von *orientalis*, *nigra* und *Oxyacantha*).

nigra W. K. (*carpathica* Lodd.), schwarzer, *h. f.* Ungarn, Siebenbürgen.

β) *rubra*.

orientalis MB. (*odoratissima* Hort.), morgenländischer, *h. f.* Taurien.

ovalifolia Horn. (*elliptica* Lod.), eiblätteriger, *h. f.* Nordamerika.

Oxyacantha L., gemeiner, *h. f.* Europa.

b) *obtusata* (*oxyacanthoides* Thuill.). c) *multiplex* (*fl. pleno*). d) *stricta* Lod. (*rigida* Ronalds.).

Hinsichtlich der übrigen Variet. s. *C. monogyna*.

parvifolia Ait. (*tomentosa* L., *uniflora* du Roi, *viridis* et *axillaris* et *betulifolia* et *florida* et *linearis* Hort.), kleinblättriger, *h. f.* Nordamerika.

pentagyna W. K., fünfweibiger, *h. f.* Ungarn.

prunifolia Bosc (*caroliniana* Lod.), pflaumenblättriger, *h. f.* Nordamerika.

β) *ingestria* Lod.

punctata Ait. (*Crusgalli* du Roi), punktirter, *h. f.* Nordamer.

a) *rubra* Pursh (*edulis* Ronalds). *β)* *stricta* Ronalds.

γ) *aurea* Pursh (*flava*, *dulcis*, *edulis* Hortul.)

purpurea Bosc (*sanguinea* Hort.), purpurfarbiger, *h. f.* ? Sibirien.

β) *altaica*.

Pyracantha P., immergrüner (Feuerdorn), *h. f.* Süd- und Osteuropa.

b) *crenulata* A. B.

pyrifolia Ait. (*leucophleos* Mch., *radiata* Lodd., *tomentosa* du Roi, *latifolia* Ronalds, *cornifolia* Booth), birnblättriger, *h. f.* Nordamerika.

sanguinea Schrad. (? *purpurea* Bosc.), blutrother, *h. f.* Osttaurien.

? *β)* *altaica* Hortul.

spathulata Mchx. Ell. (*microcarpa* Lindl.), spathelblättriger, *h. f.* Nordamerika.

tanacetifolia P., rainfarnblättriger, *h. f.* Griechenland, Kleinasien.

b) *glabra* Lodd. c) *Leeana* Loud. (*incisa* Lee).

trilobata Lodd. (*spinosissima* Lee), dreilappiger, *h. f.* ?

turbinata Pursh, aufgetriebener, *h. f.* Nordamerika.

virginica Lodd., virginischer, *h. f.* Nordamerika.

Crataegus

arbutifolia Ait. fil. v. *Photinia arbutifolia*. *Aria* L. v. *Sorbus Aria*. *glabra* Thbg. v. *Photinia glabra* (*serrulata*), *glauca* Wall. v. *Stranvaesia glauca* (*glaucescens*). *indica* L. v. *Raphiolepis indica*. *latifolia* Lam. (*dentata* Thuill.) vid. *Sorbus latifolia*. *torminalis* L. v. *Sorbus torminalis*.

Crataeva L. (*Crataevus*, griechischer Kräuterkenner), XI. 1., Capparideae.

gynandra L., weibliche, 5. w. Jamaica.

Roxburghii RB., Roxburgh's, 5. w. Ostindien.

Tapia L., *Tapia-C.*, 5. w. Ost- und Westindien.

tapioides DC., *tapia*ähnliche, 5. w. Südamerika.

caffra Burch. v. *Niebulria caffra*. *fragrans* Sims v. *Richiea fragrans*.

Crepidaria Haw. v. *Pedilanthus*.**Crepis** L., Pippau, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.A) *Genuinae*.

adenantha Visian, drüsiger, ☉. f. Dalmatien.

agrestis W. K. (*Bauhiniana* Tausch), Acker-P., ☉. f. Deutschland, Ungarn, Taurien.

andryaloides Low., wollsalatähnlicher, ♂. k. Madeira.

baicalensis Ledeb., baical'scher, 4. f. Sibirien

biennis L., zweijähriger, ♂. f. Europa, Amerika.

β) *americana*. γ) *prolifera*.

Bungei Ledeb. (*Bungeana* Mey.), Bunge's, 4. f. Sibirien.

corymbosa Tenor., traubendoldiger, ☉. f. Neapel.

fuliginosa Sibth. Sm., rusiger, ☉. f. Griechenland.

interrupta Sibth. Sm., unterbrochener, ♂. f. Griechenl.

lodomiriensis Bess. (*banatica* Roch., *Gmelini* Schult.),

lodomirischer, ♂. f. Deutschland, Galicien, Ungarn.

parviflora Dsf., kleinblumiger, ☉. f. ?

pauciflora Dsf., wenigblumiger, ☉. f. Aegypten.

rhagadioloides L., rissiger, ☉. f. Spanien.

rigens Ait., starrer, ♂. 4. k. Azoren.

scabra W., scharfer, ☉. f. Südfrankreich, Oberitalien.

stenoma Turz., schmalkandiger, ♂. f. Dahurien.

tectorum L. (*stricta* Schultz), Dach-P., ☉, f. Europa.

β) *segetalis* Roth. (*Lachenalii* Gochn.).

virens Vill. (*diffusa* Auctor., *pinnatifida* W., *polymorpha* Wallr.), grünlicher, ☉. f. Europa.

II. *Brachyderea* Cass.

lacera Tenor., schlitzeblättriger, ♂. 4. f. Neapel.

rigida W. K. (*latialis* Sebast.), steifer, 4. f. Osteuropa, Caucasus, Italien.

III. *Phaeasium* Cass.

pulchra L., schöner, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

IV. *Geracium* Rchb. (*Intybellia* Mon., *Intybus* Fries).

Fröhlichiana DC. (*incarnata lutea* Koch), Fröhlich's, 4. f. Schweiz und südliches Tyrol.

Gmelini Fröhl., *Gmelin's*, 4. f. Sibirien.

incarnata Tausch, fleischfarbiger, 4. f. Krain, Tyrol.

multicaulis Ledeb., vielstengelig, 4. f. Sibirien.

praemorsa Tausch, abgebissener, 4. f. Europa.

V. *Aetheorrhiza* Cass.

alpestris Tausch, Voralpen-P., 4. f. Mittel- und süd-europäische Voralpen.

β) *discolor*.

aurea Tausch, goldfarbiger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

Crepis

bulbosa Tausch, knolliger, 4. f. Südeuropa.

VI. Berinia Brign. (*Wibelia* Hoppe).

chondrilloides Jacq. (*foeniculacea* Fröl., *Adonis*, Spgl.), knorpelsalatblättriger, 4. f. Krain, östreich. Litorale.

? tenuifolia W. (*graminifol.* Ledeb., *pulcherrima* Fisch.), feinblättriger, 4. f. Sibirien.

VII. Catonia Mch. (*Hapalostephium* D. Don, *Lepicaune* Lapeyr., *Omalocine* Cass., *Soyeria* Monnier).

blattarioides Vill. (*austriaca* Jacq., *multicaulis* Lapeyr.), mottenkrautähnlicher, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

chrysantha Fröl., goldfarbiger, 4. f. Altai.

grandiflora W., Tausch., großblumiger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

hyoseridifolia Tausch., hyoserisblättriger, 4. f. Steiermark, Schweiz, Dauphiné.

Jacquini Tausch. (*chondrilloides* Fröl.), Jacquin's, 4. f. Oesterreich, Steiermark, tyroler Alpen.

lampsanoides Tausch., rainkohlblättriger, 4. f. Pyren.

? lyrata * (L.), leierblättriger, 4. f. Sibirien.

montana Tausch., Berg-P., 4. f. Mitteleurop. Alpen.

paludosa Mönch, Sumpf-P., 4. f. Europa.

pygmaea L., zwergiger, 4. f. Schweizer, franz. Alpen.

sibirica L., sibirischer, 4. f. Ungarn, Volhyn., Sibir., Cauc.

spinulosa Lapeyr., feinstacheliger, 4. f. Pyrenäen.

succisaefolia Tausch., scabiosenblättriger, 4. f. Mittel- und Osteuropa.

β) hieracioides WK. (*integrifol.*).

Zweifelhafte:

coriacea Hornem., lederartiger, ♂. f. ?

sagittata Wender., pfeilblättriger, 4. f. ?

albida Vill. vid. *Barkhausia albida* Nachtr. *alpina*

L. vid. *Barkhaus.* alpin. *altissima* Balb. v. *Tolpis*

altissim. ? *banatica* W. v. *Barkhausia setosa.* *bar-*

bata L. v. *Tolpis barbata.* *coronopifolia* Dsf. vid.

Tolpis coronopifol. *crithmifolia* Lk. vid. *Tolpis*

crithmifol. *croatica* Hornem. et *Dioscoridis* W. (? W.).

v. *Gatyona globifera.* *filiformis* Ait. v. *Tolpis fili-*

formis. *globifera* Hall. fil. et *heterosperma* Schrad. v.

Gatyona globifera. *glandulosa* Guss. v. *Barkhaus.*

glandul. Nacht. *hispida* WK. v. *Barkhausia setosa.*

hyemalis Guss. v. *Barkhausia taraxacifol.* *macrorrhiza*

Lam. vid. *Tolpis macrorrhiz.* *muricata* Sibth. vid.

Barkhaus. aspera. *nemausensis* L. vid. *Lagoseris*

nemaus. *pinnatifida* Hort. v. *Achyropappus pinna-*

tifid. Nacht. *pterosperma* Hortul. v. *Gatyona globif.*

purpurea MB. v. *Intybellia purpurea.* *Sprengeriana* W.

v. *Picris pauciflora.* *tomentosa* Mch. v. *Gatyona glo-*

bifera. *versicolor* Fisch. v. *Ixeris versicolor.* *vesi-*

caria L. v. *Barkhaus.* vesicar. *vesicar.* Balb. vid.

Barkhausia taraxacifol. *virgata* Dsf. vid. *Tolpis*

altissima.

Crescentia L. (Pietro Crescenti, Gelehrter zu Bologna),

XIV. II., Solanaceae.

acuminata Bonpl., zugespitzte, ♂. w. Cuba.

cucurbitina L., ächte, ♂. w. Westindien, Südamerika.

Cujete L., großfrüchtige, ♂. w. Westindien, Südamer.

pinnata Jacq. v. *Tanaecium pinnatum.*

Cressa L., Cresse, V. II., Convolvulaceae.

cretica L., cretische, ♂. 4. k. Creta.

Crinum L., Hackenlilie, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.
 algoense Herb., Algoa-H., 4. Zw. w. Cap d. g. H.
 amabile Don (*superbum* Roxb.), liebliche, 4. Zw. w.
 Bengalen.

americanum L., amerikanische, 4. Zw. w. Südamerika.
amoenum Roxb., angenehme, 4. Zw. w. Ostindien.

β) *laeve*. γ) *angustifolium*.

angustifolium RB., schmalblättrige, 4. Zw. w. Neuholl.

anomalum Herb., ungewöhnliche, 4. Zw. w. China.

aquaticum Burch. (*campanulatum* B. Mag.), Wasser-H.,
 4. Zw. w.

arenarium Sims, Sand-H., 4. Zw. w. Neuholland.

β) *blandum*.

asiaticum L. (*toxicarium* Roxb.), asiatische, 4. Zw. w. China.

augustum Roxb., herrliche, 4. Zw. w. Mascarenas.

brachyandrum Carey, kurzfadige, 4. Zw. w. Neuholl.

bracteatum W. (*brevifolium* Bot. Reg.), deckblättrige,
 4. Zw. w. Ostindien.

β) *angustifolium* Herb.

brevilimbium Carey, kurzsaumige, 4. Zw. w. Inseln des
 stillen Meeres.

Broussoneti Herb., Broussonet's, 4. Zw. w. Sierra Leone.

caffrum Herb., caffrische, 4. Zw. w. Cap d. g. H.

canaliculatum Roxb., rinnenförmige, 4. Zw. w. Ostind.

canalifolium Carey, röhrenblättrige, 4. Zw. w. Ostind.

capense Herb., capische, 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.

β) *Gowenianum*.

Careyanum Herb., Carey's, 4. Zw. w. t. Mascarenas.

Commelini Jacq., Commelin's, 4. Zw. w. Südamerika.

confertum Herb., dichte, 4. Zw. w. Neuholland.

crassifolium Herb. (*capense* β. *viridifolium* Bot. mag.),

dickblättrige, 4. Zw. w. t. Cap der guten Hoffn.

cruentum Ker, blutrothe, 4. Zw. w. Ostindien.

declinatum Ker, Herb., niedergebeugte, 4. Zw. w. Ostind.

defixum Ker, hineingewachsene, 4. Zw. w. Ostindien.

distichum Herb., zweizeilige, 4. Zw. w. Guinea.

elegans Herb. Carey, zierliche, 4. Zw. w. Ostindien.

ensifolium Roxb., schwertförmige, 4. Zw. w. Ostindien.

erubescens Ait., röthliche, 4. Zw. w. Südamerika.

a) *rubro-limbium*. b) *majus*. c) *minus*. d) *viridifolium*. e) *berbicense*.

erythrophyllum Carey, rothblättrige, 4. Zw. w. Ostind.

exaltatum Herb., hohe, 4. Zw. w. Ostindien.

flaccidum Herb., schlaffe, 4. Zw. w. Neuholland.

formosum Herb., schöne, 4. Zw. w. Brasilien.

giganteum Andr., riesenhafte, 4. Zw. w. Guinea.

Herberti G. Don (*revolutum* H. Kew.), Herbert's, 4.

Zw. w. Cap der guten Hoffnung.

humile Sims, niedrige, 4. Zw. w. Ostindien.

insigne Herb., ausgezeichnete, 4. Zw. w. Ostindien.

Lancei Herb., Lance's, 4. Zw. w. Surinam.

latifolium Herb. Andr., breitblättrige, 4. Zw. w. Ostind.

longifolium Roxb., langblättrige, 4. Zw. w. Bengalen.

longiflorum Herb., langblumige, 4. Zw. w. Cap d. g. H.

lorifolium Roxb., riemenblättrige, 4. Zw. w. Pegu.

macrocarpum Carey, großfrüchtige, 4. Zw. w. Pegu.

mauritanum Lod., mascarenische, 4. Zw. w. Mascarenas.

moluccanum Roxb. Herb., moluckische, 4. Zw. w. Molucken.

multiflorum Desf., vielblumige, 4. Zw. w. ?

pedunculatum RB., gestielte, 4. Zw. w. Neusüdwallis.

Crinum

- plicatum* Hort., gefaltete, 4. Zw. w. China.
procerum Carey, erhabene, 4. Zw. w. Pegu.
purpurascens Herb., purpurfarbige, 4. Zw. w. Südamer.
revolutum Lindl., zurückgerollte, 4. Zw. w. Südamer.
riparium Herb., Ufer-H., 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.
scabrum Sims, scharfe, 4. Zw. w. Brasilien.
sinicum Carey, chinesische, 4. Zw. w. China.
speciosum Herb., prächtige, 4. Zw. w. Ostindien.
strictum Herb., steife, 4. Zw. w. Ceylon.
submersum Herb., untergetauchte, 4. Zw. w. Ceylon.
sumatranum Roxb., sumatranische, 4. Zw. w. Sumatra.
undulatum Hook., wellenförmige, 4. Zw. w.
venosum RB., aderige, 4. Zw. w. Neuholland.
venustum Carey, holdselige, 4. Zw. w. Ostindien.
verecundum Herb., schamhafte, 4. Zw. w. Ostindien.
Yuccaeoides Herb., yuccaähnliche, L. Zw. w. Guinea.
zeylanicum Herb., zeylanische, 4. Zw. w. Ceylon.

Engl. Hybrid.: *Baconi* Herb. *hybridum* Bot. mag.
africanum L. v. *Agapanthus umbellatus. angustifol.*
 L. suppl. (et *obliquum* L. suppl.) vid. *Cyrtanthus*
angustifol. etc. *caspium* Pall. v. *Allium casp. nervosum* Roxb. v. *Eurycles nervosa*.

Cristaria Cav., Kammmalve, XVI. VIII., Malvaceae.

coccinea Pursh, scharlachfarbige, 4. f. b. Nordamer.

Critamus *agrestis* Bess. v. *Falcaria* Rivini. *Critamus heterophyllus* Koch v. *Ptychotis heterophylla*.**Crithmum** T., Meerfenchel, V. II., Umbelliferae.

latifolium L., breitblättriger, 4. k. Canarische Inseln.

maritimum L., gemeiner, 4. f. Engl., Südeuropa, Taurien.

Crithodum Lk., *Crithodum* III. II., Gramineae.

aegyptiacum Trin., ägyptisches, ①. f. Aegypten.

Critonia *eupatorioides* G. et *Kuhnia* G. v. *Kuhnia eupatorioides* etc.**Crocus** T., Safran, III. I., Irideae.

albiflorus Kit., weißblumiger, 4. Zw. f. Ungarn, Illyrien.

autumnalis Mill. (*sativus* All.), Herbst-S., 4. Zw. f. Griechenland, Kleinasien.

biflorus Mill. (*vernus* MB.), zweiblumiger, 4. Zw. f. Taur.

b) *stigmatosus* Sab. c) *Parkinsoni* Sabin.

candidus Clark. (? *argenteus* Sab.), reinweißser, 4. Zw. f. Kleinasien.

Imperati Ten. (*recurvus* J. Don), *Imperati's*, 4. Zw. f. Neapel.

lacteus Haw. Sab., milchweißser, 4. Zw. f. Kleinasien. b) *striatus*.

lagenaeiflorus Salisb., flaschenblumiger, 4. Zw. f. Griechenland.

b) *flavus*.

luteus Lam. (*aureus* Sm.), gelber, 4. Zw. f. Griechenl. β) *moesiacus* Ker.

minimus Red., kleinsten, 4. Zw. f. Corsica.

β) *striatus* Link.

nudiflorus Sm. (*multifidus* Poir., *serotinus* Salisb.), nacktblumiger, 4. Zw. f. England, Pyrenäen.

odorus Bivon., wohlriechender, 4. Zw. f. Sicilien.

Pallasii Goldb. (*autumnalis* MB.), *Pallas's*, 4. Zw. f. Taur.

pusillus Tenor., niedriger, 4. Zw. f. Neapel.

reticulatus Stev., netzförmiger, 4. Zw. f. Illyrien, Dalmatien, Taurien, Caucasus.

Crocus

β) variegatus Hoppe.

sativus L., ächter, 4. Zw. f. Griechenland, Kleinasien.
 speciosus MB., prächtiger, 4. Zw. f. Taurien, ? Dalmatien.
 stellaris Haw., sternförmiger, 4. Zw. f. ?
 suaveolens Ten., starkriechender, 4. Zw. f. Neapel.
 sulfureus Ker, schwefelgelber, 4. Zw. f. ?

b) albidus Sab. c) flavus. d) isabellinus. e)
 striatus Sab. f) striatulus Sab.

Susianus Curt., türkischer, 4. Zw. f. Kleinasien.

b) minor Sab.

Thomasii Tenor., Thomas's, 4. Zw. f. Neapel.

vernus All., Frühlings-S., 4. Zw. f. Mittel- u. Südeuropa.

Garten-Varietäten: puniceus Sab. purpureus Sab.
 marginatus Sab. Sabini Anders. grandis Sab. obo-
 vatus Sab. concinnus Sab. Phäeton Sab. pur-
 purascens J. C. gracilis J. C. maculosus Sab.
 plumosus J. C. turbinatus Sab. clavatus Sab.
 violacens Sab. dubius Sab. pruinosis Sab. fusi-
 formis Sab. stylosus Sab. plumbeus Sab. infla-
 tus Sab. tulipaceus Sab. pallens Sab. minutus
 Sab. nanus J. C. pallidus Sab. neapolitanus
 Ten. neapolit. praecox Sab. lilacinus maculatus
 J. C. lilacinus praecox J. C. pictus Sab. fuca-
 tus Sab. dorsalis Sab. unguis Sab. unguis ma-
 jor Sab. leucorhynchus Sab. pulchellus Sab. li-
 neatus Sab. striatus Sab. Glorianella Sab. Glo-
 riana Sab. elegans J. C. speciosus J. C. va-
 riegate Sab. propinquus Sab. dentosus Sab. de-
 corus J. C. bicolor Sab. affinis J. C. emargi-
 natus J. C. tortuosus J. C. reticulatus Sab. gri-
 seus Sab. pectinatus Sab. incurvus Sab. lineellus
 Sab. obesus Sab. spectabilis J. C. obtusus J.
 C. crassus Sab. Andersoni Sab. penicillatus J. C.
 stellatus J. C. albidus J. C. parvulus Sab. uni-
 lineatus J. C. trilineatus Sab. undulatus J. C.
 obsoletus Sab. albus major Sab. albus minor Sab.
 delectus Sab. alpinus Sab. aprilis Sab. tardi-
 florus Sab.

versicolor Ker, buntfarbiger, 4. Zw. f. Südeuropa.

Garten-Varietäten: Gawleri Sab. neglectus Sab.
 similis Sab. plumosus Sab. venustus Sab. ele-
 gans Sab. purpureus Sab. violaceus Sab. Ha-
 worthii Sab. lineatus Sab. vittatus J. C. flori-
 bundus Sab. pectinatus Sab. spectabilis J. C. stria-
 tulus J. C. Morleon Sab. inconspicuus Sab. stella-
 tus Sab. penicillatus J. C. pulchellus J. C. pro-
 pinquus Sab. affinis Sab. urbanus Sab. pallidus J. C.

Crossandra Salisb., Franzenbeutel, XIV. II., Acan-
 thaceae.

undulaefolia Salisb., wellenblättriger, ♀. w. Ostindien.

Crotalaria T., Klapperschote, XVII. IV. (VI.), XVI.

VI., Leguminosae-Papilionaceae.

acuminata DC., zugespitzte, ☉. w. f. m. Cap d. g. H.

alata Hamilt., geflügelte, ♂. w. Nepal, Ostindien.

anagyroides H. B. K., anagyrisähnliche, ♀. w. Caracas.

angulata Mill., kantige, ☉. w. Südamerika.

angustifolia Jacq. (elongata Thbg.), schmalblättrige, ♀.
 t. Cap der guten Hoffnung.

anthylloides Lam., wollblumenähnliche, ♀. w. Java, Neuholl.

Crotalaria

- arborescens Lam. (*capensis* Thbg., *incanescens* L. suppl.),
 baumartige, ♀. t. Cap der guten Hoffn., Mascarenas.
 argentea Jacq., silberfarbige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
 axillaris Ait., achselblumige, ♂. w. Guinea.
 bengalensis Lam., bengalische, ♀. w. Ostindien.
 Berteriana DC. (*pellita* Bert.), Bertero's, ♀. w. Jamaica.
 bialata Schrk., zweiflügelige, ♂. w. ? Südamerika.
 bifaria W., zweireihige, ♀. w. Ostindien.
 biflora L. (*nana* Burm.), zweiblumige, ♀. w. Ostindien.
 bracteata Roxb., deckblätterige, ♀. w. Ostindien.
 Brownei Bert., Brown's, 4. w. Jamaica.
 Burmanni DC. (*sericea* Burm.), Burmann's, ♂. w. Ostind.
 cajanifolia H. B. K., cajanblättrige, ♀. w. Mexico.
 calycina Schrk., gekelchte, ♂. w. Ostindien.
 chinensis L., chinesische, ♀. w. China.
 cubensis DC. (*hirta* Lag.), cubensische, ♂. w. Cuba.
 cuneiformis Lam., keilförmige, ♀. t. Südafrika.
 curtata Lk., abgekürzte, ♂. w. ?
 cytisoides Roxb., cytissusähnliche, ♀. w. Ostindien.
 dichotoma Roth, zweizinkige, ♀. w. Ostindien.
 diffusa Lk., weitschweifige, ♂. w. ?
 fenestrata Ker, gitterförmige, ♀. w. Ostindien.
 foliosa W., blätterreiche, ? 4. ♀. w. Ostindien.
 fruticosa Mill., strauchige, ♀. w. Jamaica.
 fulva Roxb., braungelbe, ♂. w. Ostindien.
 glauca W., blaugrüne, ♀. w. Guinea.
 Grahami* (*dichotoma* Grah.), Graham's, ♀. t. Mexico.
 hirsuta W., rauhhaarige, ♀. w. Ostindien.
 hirta W. (*pilosa* Rottl.), kurzhaarige, ♂. w. Ostindien.
 incana L., weißgraue, ♂. w. Westindien.
 juncea L., binsenförmige, ♂. w. Ost- und Westindien.
 laburnifolia L., bohnenbaumblättrige, ♂. w. Ostindien.
 Langsdorfii Fisch., Langsdorf's, ♂. w. ? Brasilien.
 leioloba Bartl., leichtlappige, ♀. w. Java.
 linifolia L. suppl., leinblättrige, ♀. w. Ostindien, Nepal.
 lotifolia L., schotenkleeblättrige, ♀. w. Westindien.
 medicaginea Lam. (*Trifolium* W., *stricta* Roth),
 schneckenkleeähnliche, ♂. w. Ostindien.
 micans Lk. (*lotifolia* Hort.), schimmernde, 4. w. ?
 micrantha Lk., kleinblumige, ♂. w. Ceylon.
 nepalensis Lk., nepal'sche, ♂. w. Nepal.
 novae Hollandiae DC., neuholländische, 4. ♀. t. Neuholl.
 obscura DC., dunkle, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
 orixensis Rottler W., Orix-K., ♂. w. Ostindien.
 ovalis Pursh (*sagittalis* γ. Mchx.), eiförmige, ♂. t.
 Carolina.
 pallida Ait., bleiche, ♂. w. Abyssinien.
 paniculata W. (*chinensis* Lam.), rispige, ♀. w. Ost-
 indien, China.
 parviflora Roth, kleinblumige, ♂. w. Ostindien.
 paulina Schrank, Paulinische, 4. w. Brasilien.
 pendula Berter, überhängende, ♀. w. Jamaica.
 platycarpa Lk., breitfrüchtige, ♂. f. m. Nordamerika.
 procumbens M. et S., niederliegende, 4. w. Mexico.
 prostrata Rottl., gestreckte, ♂. w. Ostindien.
 pulchella (*pulchra*) Andr., hübsche, ♀. w. Ostindien.
 pulcherrima Roxb., sehr schöne, ♀. w. Ostindien.
 pumila Orteg., kleine, ♂. w. Cuba.
 purpurascens Lam., purpurfarbige, ♂. w. Madagascar.

Crotalaria

purpurea Vent., purpurblumige, ♀. t. Cap der gut. H. Purshii Spgl. (*laevigata* Pursh), Pursh's, ☉. m. f. Nordamer.
pusilla Roxb. (? *pumila* Schk.), kleine, ☉. w. Ostindien.
quinquefolia L., fünfblätterige, ☉. w. Ostindien.

retusa L., abgestutzte, ☉. w. Ostindien.
Roxburghii DC. (*stricta* Roxb., *anthylloides* D. Don),
 Roxburgh's, ♀. w. Ostindien.

rubiginosa W., röthliche, ☉. w. Ostindien.
sagittalis L., pfeilförmige, ☉. w. Westindien, Nord- und Südamerika.

Saltiana Bot. Rep., Salt's, ♀. w. Abyssinien.

semperflorens Vent., immerblühende, ♀. w. Ostindien.

senegalensis DC., senegal'sche, ☉. w. Senegal.

sericea Retz, seidenhaarige, ☉. w. Ostindien.

speciosa Roth, prächtige, ♀. w. Ostindien.

spectabilis Roth, ansehnliche, ? ☉. w. Ostindien.

stipularis Desv., zwischenblätterige, ☉. w. Cayenne.

striata DC., gestreifte, ☉. w. Ostindien.

tenuifolia Roxb., feinblätterige, 4. ♀. w. Ostindien.

tetragona Andr., vierseitige, ♂. w. Ostindien.

thebaica DC., thebaische, ♀. t. Aegypten.

triantha M. et S., dreiblumige, ☉. w. Mexico.

tuberosa Hamilt. D. Don, knollige, ♀. 4. Kn. Sch. Nepal.

turgida Dum. Cours., aufgetriebene, ♀. w. ?

verrucosa L. (*angulosa* Lam., *coerulea* Jacq.), warzige,
 ☉. ♀. w. Ost- und Westindien.

villosa Thbg., zottige, ☉. t. f. m. Cap der gut. Hoffu.

virgata Roxb., ruthenförmige, ♀. w. Ostindien.

vitellina Ker (*holosericea* N. E.), dottergelbe, ♀. w. Brasilien.

amplexicaulis Lam. v. *Vascoa perfoliata*. *cordifolia*
 L. v. *Hypocalyptus obcordatus*. *elegans* Hort. v.
 ? *Goodia pubescens*. *floribunda* Lodd. (*obcordata*
 Berg.) v. *Viborgia obcordata*. *guianensis* Aubl. (*longi-*
folia Lam. v. *Neurocarpum guianense*. *opposita* L.
 v. *Rafnia opposita*.

Croton L., Croton, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

argenteum L., silberfarbener, ☉. w. Südamerika.

aromaticum L., wohlriechender, ♀. w. Ostindien, Molucken.

astroides Ait. (*venosus* N. E.), sternförmiger, ♀. w. Westindien.

Cascarilla L., Cascarilla-C., ♀. w. Bahamische Inseln.

digitatum Fisch., fingerförmiger, ♀. w. t. Neuholland.

Eluteria L., Eluteria-K., ♀. w. Westindien.

flabellifolium Lod., fächerblätteriger, ♀. w. ?

flavens L., gelblicher, ♀. w. Westindien.

glabellum L., glatter, ♀. w. Jamaica.

glandulosum L., drüsiger, ☉. w. Westindien, Quito.

gossypifolium Vahl, baumwollenblätteriger, ♀. w. Trinidad.

hibiscifolium H. B. K. (*digitatum* Hort.), eibischblätteriger,
 ♀. w. Neugranada, Mexico.

humile L., niedriger, ♀. w. Westindien.

lacerum Dsf. (*palmatum* H. Cels), schlitzbblätteriger,
 ♀. w. ?

lineare Jacq. (*Cascarilla* Mill.), gleichbreitblätteriger, ♀. w. Westindien.

lobatum L., gelappter, ☉. w. Südamerika.

lucidum Sw., starkglänzender, ♀. w. Jamaica.

Croton

- macrophyllum Sw., großblättriger, ♂. w. Jamaica.
 maritimum Walt. (*disjunctiflorum* Mchx.), Seestrand's-K.,
 ♂. t. Carolina, Mexico.
 micans Sw., schimmernder, ♂. w. Jamaica.
 nitens Sw., glänzender, ♂. w. Jamaica.
 niveum Jacq., schneeweiß, ♂. w. Jamaica.
 penicillatum Vent. (*ciliato glandulosum* Orteg.), pinsel-
 förmiger, ♂. w. Cuba.
 pictum Roxb., gemalter, ♂. w. Ostindien.
 pungens Jacq., stechender, ♂. w. Neugranada, Peru.
 Tigilium L., Purgir-C., ♂. w. Ostindien, Molucken.
 tomentosum H. Par. Lk. Enum., filziger, ♂. w. ?
 xalapensis H. P. K., xalapensischer, ♂. w. Mexico.
castaneaefol. L. v. *Caperonia castaneaefol.* Nachtr.
 ?*moluccanum* Hort. v. *Aleurites triloba.* *palustre*
 L. v. *Caperonia palust.* Nachtr. *paniculatum* Lam.
 v. *Rottlera panicul.* *tinctorum* L. v. *Crozophora*
tinctoria. *variegatum* L. v. *Codiaeum chrysosticton*
 Nachtr.

Crotonopsis Mchx., Krebsblümchen, XXI. v., Tricoccae-Euphorbiaceae.

- elliptica Mchx., elliptisches, ☉. f. Carolina.
 linearis Mchx., gleichbreitblättriges, ☉. f. Carolina.

Crowea Sm. (J. Crowe, englischer Botaniker), X. i., Tricoccae-Rutaceae.

- latifolia Lod., breitblättrige, ♂. t. Neusüdwallis.
 saligna Sm., weidenblättrige, ♂. t. Neusüdwallis.

Crozophora Neck., Crozophore, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

- tinctoria Adr. Juss., färbende, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

Crucianella L., Kreuzpflanze, IV. i., Rubiaceae.

- aegyptiaca L. (*herbacea* Forsk.), ägyptische, ☉. f. Aegypten.
 angustifolia L. (*mucronata* Roth), schmalblättrige, ☉. f. Südeuropa.

- aspera MB. (*prostrata* Adams), rauhe, 4. f. Iberien.

- ciliata Lam. (*diffusa* Roth), gefranzte, ☉. f. Orient.

- gilanica Trin., gilanische, 4. f. Persien.

- glomerata MB., knaulförmige, 4. f. Iberien.

- hispidula Fisch. et Mey., hackerige, ☉. f. Ararat.

- latifolia L., breitblättrige, ☉. f. Südeuropa, Griechenl.

- maritima L., Meerstrands, 4. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Nordafrika.

- molluginoides MB. (? *anomala* Loud.), weichlingähnliche, 4. f. Caucasus, Ungarn.

- monspeliaca L., französische, ☉. f. Südeuropa, Griechenl.

- patula L. (*pentanda* Duf.), ausgebreitete, ☉. f. Spanien.

- pubescens W., weichhaarige, ☉. f. Creta.

- stylosa Trin., langgriffelige, 4. f. Persien.

- suaveolens C. A. Mey., wohlriechende, 4. f. Südrussl.

- tuberculosa Cav., höckerige, ☉. f. Spanien.

C. americana Mill. et hispida Mill. sind zweifelhaft.

Cruickshanksia cistiflora Hook. v. *Balbisia peduncularis*.**Crusea** Chamiss. et Schld. (Cruse, deutscher Botaniker), IV. i., Rubiaceae.

- calocephala DC., schönköpfige, ☉. m. f. Mexico.

- coccinea DC., scharlachblumige, ♂. w. Neuspanien.

- rubra Cham. et Schld., rothe, ☉. m. f. Vera-Cruz, Cuba.

Crybe Lindl., Hüllstendel, XX. i., Orchideae.

Crybe

rosea Lindl., rosafarbiger, 4. t. w. Mexico.

Crypsis Ait., Dornengras, III. II., Gramineae.

aculeata Ait., stechendes, ☉. f. Süd- und Osteuropa, Sibirien.

alopecuroides Schrad., fuchsschwanzähnliches, ☉. f. Oesterreich, Mähren, Sibirien.

phalaroides MB., glanzgrasähnliches, ☉. f. Caucasus.

schoenoides Lam., knopfgrasähnliches, ☉. f. Oesterreich, Litorale, Caucasus, Sibirien.

squarrosa Nutt., sparriges, ☉. f. Nordamerika.

Cryptandra Sm., Hüllbeutel, V. I., Rhamneae.

amara Sm., bitterer, ♀. t. Neuholland.

arbutiflora Fenzl, erdbeerbaumblüthiger, ♀. t. Neuholland (Schwanenflufs).

ericifolia Sm., heideblättriger, ♀. t. Neuholland.

obovata Sbr., verkehrteiförmiger, ♀. t. Neuholland.

spinescens Sbr., dorniger, ♀. t. Neuholland.

Cryptantha Lehm., Kleinblümchen, V. I., Asperifoliaceae.

glomerata Lehm., knaulförmiges, ☉. f. Chili.

microcarpa Fisch. et Mey., schmalfrüchtiges, ☉. f. Chili.

Cryptarrhena RB., Schnabelstendel, XX. I., Orchideae.

lunata RB., mondförmiger, 4. w. Jamaica.

Cryptocarpha Cass. v. Acicarpha.**Cryptocarya** RB., Kelchnufs, IX. I., Laurineae.

glaucescens RB., blaugrünliche, ♀. t. Neuholland.

obovata RB., verkehrteiblättrige, ♀. t. Neuholland.

Cryptochilus Wall., Hülllippe, XX. I., Orchideae.

sanguinea Wall., blutrothe, 4. t. w. Nepal.

Cryptolepis RB., Hüllschuppe, V. I., Contortae-Apocynae.

elegans Lod., zierliche, ♀. Sch. w. Brasilien.

Cryptolobus *americanus* Spgl. et *sarmentosus* Spgl. v. *Amphicarpa monoica* et *sarmentosus*.**Cryptospermum** P., Verstecktsame, IV. I., Rubiaceae-Opercularieae.

Youngii P., Young's, ♀. t. Neusüdwallis.

Cryptostegia RB., Cryptostegie, V. II., Asclepiadeae.

grandiflora RB., großblumige, ♀. Sch. w. Ostindien.

madagascariensis Lod., madagascarische, ♀. Sch. w. Madagascar.

Cryptostemma RB., Verstecktfaden, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

calendulaceum RB., ringelblumenähnlicher, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung.

hypochondriacum RB., hypochondrischer, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung.

runcinatum RB., schrotsägeförmiger, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung.

Cryptostylis RB., Verstecktgriffel, XX. I., Orchideae.

erecta RB., aufrechter, 4. w. Neuholland.

longifolia RB., langblättriger, 4. w. Neuholland.

Cubaea speciosa Spgl. v. *Moldenhawera floribunda*. *Cucifera thebaica* Delil. v. *Hyphaene coriacea*.**Cucubalus** T., Taubenkropf, X. III., Caryophyllaceae.

bacciferus L., beerentragender, 4. f. Europa.

Behen L. etc. v. *Silene inflata* etc.

- Cucumis** T., Gurke, XXI. x. (VIII.), Cucurbitaceae.
 africanus L., afrikanische, ☉. m. Cap der guten Hoffn.
 Anguria L., Angurien-G., ☉. m. Jamaica.
 caffer Eckl. (*Citrullus caffer* Schrad.), caffer'sche, ☉. m.
 Cap der guten Hoffnung.
 Chate L., rauhfrüchtige, ☉. m. Aegypten, Arabien.
 Citrullus Ser., Wasser-G., ☉. m. f. Südeuropa.
 a) Pasteca Sering. β) Jace Sering.
 deliciosus Roth, süfse, ☉. m. Ostindien.
 Dudaim L., Dudaim-G., ☉. m. Ostindien.
 flexuosus L., gebogene, ☉. m. Ostindien.
 integrifolius Roxb., ganzblättrige, ☉. m. Ostindien.
 jamaicensis Berter., Jamaica-G., ☉. m. Jamaica.
 lineatus Boss., linirte, ☉. m. Guiana.
 maculatus W., gefleckte, ☉. m. ? Guinea.
 maderaspatanus L., maderaspatanische, ☉. m. Ostindien.
 Melo L., Melonen-G., ☉. m. Ostindien.
 a) reticulatus Sering. β) Cantalupo Sering. γ)
 maltensis Sering.
 Momordica Roxb., springkürbisähnliche, ☉. m. Ostind.
 muricatus W., weichstachelige, ☉. m. Ostindien.
 prophetarum L., Propheten-G., ☉. m. Arabien, Nord-
 und Südafrika.
 pubescens W., weichhaarige, ☉. m. ?
 sativus L., gemeine, ☉. m. f. Ostindien.
 a) viridis Sering. β) flavus Sering. γ) albus Se-
 ring. δ) variegatus Sering. ε) fastigiatus Sering.
 utilissimus Roxb., nutzbare, ☉. m. Ostindien.
 acutangulus L. v. Luffa acutangul, anguinus L. v.
 Trichosanthes anguina. Colocynthis L. v. Colocyn-
 this officinal. s. vulg. ? pseudocolocynthis Wender.
 v. Colocynth. amarissima.
- Cucurbita** T., Kürbis, XXI. x. (VIII.), Cucurbitaceae.
 aurantia W., orangefrüchtiger, ☉. m. ?
 a) orangina Sering. β) colocynthoides Sering.
 mammosa Molin., zitteriger, ☉. m. Chili.
 maxima Duchesn., größter, ☉. f. ?
 Melopepo L., Türkenbund-K., ☉. f. Ostindien.
 moschata Duch., moschusduftender, ☉. f. ?
 ovifera L., eiförmiger, ☉. f. Astrachan.
 a) pyriformis Sering. β) subglobosa Sering. γ)
 grisea Sering.
 Pepo L., gemeiner, ☉. f. Levante, Ostindien.
 a) subrotunda W. β) oblonga W.
 Potira Duch., Potiron-K., ☉. f. ?
 a) viridis Sering. β) gourgera Ser.
 siceraria Molin., berauschender, ☉. m. f. Chili.
 subverrucosa W., leichtwarziger, ☉. m. f. ?
 tuberculosa Schrad., höckeriger, ☉. m. f. ?
 urnigera Schrad., becherförmiger, ☉. m. f. ?
 verrucosa L., warziger, ☉. m. f. ?
 caffer Eckl. v. Cucumis caffer. cerifera Fisch. v.
 Benincasa cerifera. Citrullus L. (*Anguria* Duch.,
 pinnatifida Schrk.) v. Cucumis Citr. Lagenaria L.
 v. Lagenaria vulgaris.
- Culcasia scandens** P. Beauv. v. *Caladium scandens*.
Culcitium Bonpl., Culcitium, XIX. i., Compositae-
 Eupatocineae.
 salicinum Spgl., weidenblättriges, ⚔. t. Van-Diemens-
 Land.

- Cullumia** RB. (Sir Thomas Cullum, englischer Gelehrter), XIX. III., Compositae-Corymbiferae.
ciliaris RB., gefranzte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
setosa RB., borstige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung,
squarrosa RB., sparrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- Cuminum** T., Kreuzkümmel, V. II., Umbelliferae.
Cyminum L., officineller, ☉. f. Aegypten, Griechenland.
- Cunningia** D. Don (zu Ehren der Lady Gordon Cumming), VI. I., Coronariae-Asphodeleae.
campanulata D. Don, glockige, 4. Zw. k. t. Chili.
tenella D. Don, zarte, 4. Zw. k. t. Chili.
trimaculata D. Don, dreifleckige, 4. Zw. k. t. Chili.
- Cunila** L., Cunile, II. I., Labiatae.
coccinea Nut. Hook., scharlachrothe, 4. k. f. b. Florida.
mariana L., maryländische, 4. f. Virginien.
capitata L. v. *Ziziphora clinopodioides*. *pulegioides* L. et *thymoides* L. v. *Hedeoma puleg.* etc.
- Cunninghamia** RB. (J. und A. Cunningham, berühmte englische Botaniker und Reisende), XXI. x., Coniferae.
lanceolata RB. (*sinensis* Rich.), lanzettblättrige, ♀. k. China.
- Cunonia** L. (J. C. Cuno zu Amsterdam, Freund des Linné), X. II., Corniculatae-Cunoniaceae.
capensis L., capische, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- Cupania** Plum. (F. Cupani, italienischer Botaniker), VIII. I., Sapindacei.
canescens P., weißgraue, ♀. w. Ostindien.
dentata Sessé, gezähnte, ♀. w. Mexico.
excelsa H. B. K., hohe, ♀. w. Mexico.
glabra Sw., kahle, ♀. w. Jamaica.
saponarioides Sw. (*Saponaria* P.), seifenbaumähnliche, ♀. w. Westindien.
setigera Cun., borstige, ♀. t. Neuholland.
tomentosa Sw., filzige, ♀. t. Westindien.
- Cuphea** P. Br. Jacq., Krummkapsel, XI. I., Lythriariae (*Salicariae*).
circaeoides Ker, Sims, hexenkrautähnliche, ☉. w. m. f. Südamerika,
decandra RB., zehnmännige, ♀. w. Jamaica.
gracilis H. B. K. (*fruticosa* Spgl. N. E.), schlanke, ♀. w. Südamerika.
lanceolata RB., lanzettliche, ♂. w. Mexico.
Llavea DC., Llave's, ♀. t. Mexico.
Melvilla Lindl., Melville's, ♀. w. Guiana.
micropetala H. B. K., kleinkronige, ♀. w. Mexico.
multiflora Lod., vielblumige, ♀. w. Trinidad.
parviflora Hook., kleinblumige, ♀. w. Demerara.
procumbens Cav., niederliegende, ☉. m. f. Mexico.
scabrida H. B. K., schärfliche, ♀. t. Mexico, Brasilien.
serpyllifolia H. B. K., quendelblättrige, ♀. Neugranada, Trinidad.
silenooides N. E., silenähnliche, ☉. m. f. Mexico.
virgata Cav., ruthenförmige, ☉. m. f. Mexico.
viscosissima Jacq., schmierige, ☉. f. m. Virginien, Südamer.
- Cupressus** T., Cypresse, XXI. x., Coniferae.
bacciformis W., beerenförmige, ♀. k. ?
glauca Lam. (*lusitanica* T. ? *Tournefortii* Audib. *pendula* L'Her.), blaugrüne, ♀. k. t. Ostindien, Portugal.
pendula Thbg., überhängende, ♀. k. t. Japan, China.

Cupressus

sempervirens L., immergrüne, ♂. k. f. b. Südeuropa, Griechenland.

a) *stricta* Mill. b) *horizontalis* Mill. (*expansa* Targ., *thurifera* H. B. K., weihrauchgebende, ♂. k. t. Mexico. *torulosa* Lamb. D. Don, aufgetriebene, ♂. k. t. Nepal. *triquetra* Lod., dreiseitige, ♂. k. t. Cap d. g. Hoffn.

australis P. Hort. vid. ? *Callitris cupressiformis*.

disticha L. vid. *Taxodium distichum*, *juniperoides*

L. v. *Taxodium juniperoid*. *thyoides* L. v. *Thuja sphaeroidea*.

Curatella L., Polirholz, XIII. II., Dilleniaceae.

alata Vent., geflügeltes, ♂. w. Guiana.

americana L., amerikanisches, ♂. w. Südamerika.

Curculigo G. Curculigo, VI. I., Narcisseae-Hypoxydeae.

brevifolia Dryand., kurzblättrige, 4. w. Ostindien.

latifolia Dryand., breitblättrige, 4. w. Amboina.

orchioides Roxb., orchisähnliche, 4. w. Ostindien.

plicata Dryand., gefaltete, 4. t. Cap d. guten Hoffn.

β) *glabra*.

recurvata Dryand., zurückgekrümmte, 4. w. Bengalen.

sumatrana Roxb., sumatranische, 4. w. Sumatra.

Curcuma L., Gelbwurz, I. I., Scitamineae-Amomeae.

aeruginosa Roxb., kupferfarbige, 4. w. Pegu.

Amada Roxb., Amada-G., 4. w. Bengalen.

angustifolia Roxb., schmalblättrige, 4. w. Ostindien.

aromatica Salisb. (*Zedoaria* Roxb.), gewürzhafte, 4. w. Ostindien.

caesia Roxb., hechtblaue, 4. w. Bengalen.

comosa Roxb., schopfige, 4. w. Pegu.

elata Roxb., erhabene, 4. w. Pegu.

ferruginea Roxb., rostfarbige, 4. w. Bengalen.

latifolia Rosc., breitblättrige, 4. w. Ostindien.

leucorrhiza Roxb., weißwurzelige, 4. w. Ostindien.

longa L., lange, 4. w. Ostindien.

montana Roxb., Berg-G., Ostindien.

parviflora Wall., kleinblumige, 4. w. Ostindien.

petiolata Roxb., gestielte, 4. w. Pegu.

reclinata Roxb., zurückgebeugte, 4. w. Ostindien.

rubescens Roxb., röthliche, 4. w. Bengalen.

rubricaulis Lk., rothstengelige, 4. w. Ostindien.

viridiflora Roxb., grünblumige, 4. w. Sumatra.

xanthorrhiza Roxb., gelbwurzelige, 4. w. Amboina.

Zedoaria Rosc. (*Zerumbet* Roxb.), *Zedoaria*-G., 4. w. Ostindien.

rotunda L. v. *Kaempferia pandurata*.

Curtisia Ait. (W. Curtis, berühmter englischer Botaniker), IV. I., Sapotaceae-Aquifoliaceae.

faginea Ait., rothbuchenblättrige, ♂. t. Cap d. g. H.

Cuscuta T., Flachsseide, V. II., Aizoideae-Phytolacceae (*Cuscutinae*).

americana L., amerikanische, 4. w. Westind., Nordamer.

australis RB., neuholländische, 4. k. t. Neuholland.

chilensis Ker, chilesische, 4. f. k. Chili.

chinensis Lam., chinesische, 4. f. k. China.

Epilinum Weihe, ächte, ☉. f. Deutschland.

Epithymum Murr., Thymian-F., ☉. f. Europa.

europaea L., gemeine, ☉. f. Europa.

Hookeri Swt. (*reflexa* var., *verrucosa* Hook.) ♂. w. Ostind.

Cuscuta

monogyna Vahl (*lupuliformis* Krock.), ☉. f., einweibige, Osteuropa, Kleinasien, Caucasus.

planiflora Ten., flachblumige, ☉. f. Südtirol, Italien.

verrucosa Swt., warzige, 4. f. k. Nepal.

Cussonia Thbg. (M. Cusson, französischer Botaniker), V. II., Araliaceae.

spicata L., ährenförmige, ♂. t. Cap der guten Hoffn.

thyrsiflora L., strauchblumige, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.

tripteris Coll., dreiflügelige, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.

Cyamopsis DC., Afterbohne, XVII. IV. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

psoraleoides DC., psoraleaähnliche, ☉. f. Arabien.

Cyamus *Nelumbo* Salisb. v. *Nelumbium speciosum*.

Cyanella L., Cyanelle, VI. I., Coronariae-Asphodelaceae.

alba Thbg., weisse, 4. Zw. k. t. Cap der g. Hoffn.

capensis L., capische, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.

lineata Burch., linirte, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.

lutea Thbg., gelbe, 4. Zw. k. t. Cap d. g. Hoffn.

odoratissima Lindl., wohlriechende, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

orchidiformis Jacq., orchisähnliche, 4. Zw. k. t. C. d. g.

Cyanopsis *pubescens* DC. v. *Scheuchleria patula*.

Cyanotis D. Don., Blauhaar, VI. I., Commelineae.

axillaris D. Don, achselständiges, ♂. t. Ostindien.

barbata D. Don, härtiges, 4. f. b. k. Nepal.

cristata D. Don, kammiges, ♂. t. w. Ceylon.

Cyathea Sm., Becherfarn, XXIV. I., Pterioideae.

arborea Sm., baumartiger, ♂. w. Westindien.

excelsa Sw. (*arborea* Bory), hoher, ♂. w. Mascarenas.

Cyathodes LaBill., Becherheide, V. I., Epacrideae.

acerosa RB., nadelartige, ♂. t. Neuholland.

glauca LaBill., blaugrüne, ♂. t. Van-Diemens-Land.

Oxycedrus RB., vierblättrige, ♂. t. Van-Diemens-Land.

Cycas L., Farnpalme. XXII. XII., Cycadeae.

angulata RB., kantige, ♂. w. Neuholland.

circinalis L., kreisförmige, ♂. w. Molucken.

glauca Lk., blaugrüne, ♂. w. Ostindien.

revoluta Thbg., zurückgerollte, ♂. w. China, Japan.

squarrosa Lod., sparrige, ♂. w. Ostindien.

Cyclachaena Fresen., *Cyclachaena*, XIX. IV., Compositae-Ambrosiaceae.

xanthiifolia Fresen., spitzklettenblättrige, ☉. f. Nordamer.

Cyclamen T., Erdscheibe, Schweinsbrot, V. I., Primulaceae.

coum Mill., rundblättrige, 4. Kn. k. Südeuropa, Taurien, Griechenland.

europaeum L. (*Clusii* Lindl.), gemeine, 4. Kn. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.

ficariaefolium Rchb., schöllkrautblättrige, 4. Kn. k. f. b. Dalmatien.

hederaefolium Ait., epheublättrige, 4. Kn. k. f. b. Südeuropa.

a) *albidum*. b) *purpurascens*.

ibericum Goldie, iberische, 4. Persien.

indicum L., indische, 4. Kn. t. Ceylon.

latifolium Sibth., breitblättrige, 4. Kn. f. b. Süd- und Osteuropa.

linearifolium DC., schmalblättrige, 4. Kn. k. Südfrankr.

neapolitanum Ten., neapolitanische, 4. Kn. k. Istrien, Ital.

Cyclamen

persicum Mill. (*cyprium* Hoffmsg.), persische, 4. Kn. k. Griechenland.

a) *inodorum*. b) *odoratum*. c) *albiflorum* (? *alepicum* Hort.). d) *laciniatum*. e) *lilacinum*. f) *punctatum*.

repandum Sibth., ausgeschweifte, 4. Kn. k. f. b. Italien, Griechenland.

subhastatum Rchb., spontonblättrige, 4. Kn. k. Südeuropa.

vernum Mill., Frühlings-E., 4. Kn. k. f. b. Südeuropa.

Cyclanthus Poit., Scheibenblume, XXI. ix., Palmae-Cyclantheae.

Plumieri Poit., Plumier's, 4. w. Westindien.

Cyclobothra Swt., Scheibentraube, VI. i., Coronariae-Tulipaceae.

alba Benth., weisse, 4. Zw. f. b. k. Californien.

barbata Swt., bärtige, 4. Zw. t. Mexico.

lutea Lindl., gelbblumige, 4. Zw. t. Mexico.

pulchella Benth., hübsche, 4. Zw. f. b. k. Californien.

purpurea Swt., purpurfarbige, 4. Zw. t. Mexico.

Cyclopia Vent., Cyclopie, X. i., Leguminosae-Papilionaceae.

galioides DC., labkrautähnliche, f. t. Cap d. g. H.

genistoides Vent., ginsterähnliche, f. t. Cap d. g. H.

latifolia DC., breitblättrige, f. t. Cap d. g. Hoffn.

tenuifolia Lehm., feinblättrige, f. t. Cap d. g. H.

Cycnches Lindl., Schwanenstendel, XX. i. Orchideae.

Loddigesii Lindl., Loddiges's, 4. w. Surinam.

ventricosus Bate, bauchiger, 4. w. Guatamala.

Cydonia T., Quitte, XII. ii., Rosaceae-Pomaceae.

chinensis Thouin, chinesische, f. f. China.

japonica P., japanesische, f. f. b. Japan.

b) *flore albo*, c) *flore semipleno*.

vulgaris P., gemeine, f. f. Griechenl., Taur., Siebenb.

a) *maliformis* Mill. b) *pyriformis* Mill. c) *lusitanica* Mill. Duham.

Cylista Ait., Cyliste, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

albiflora Sims, weisblumige, f. Sch. w. Mascarenas.

polystachya DC., vielährige, f. Sch. w. Westafrika.

scariosa Roxb., trockenhäutige, f. Sch. w. Ostindien.

tomentosa Roxb., filzige, f. Sch. w. Ostindien.

villosa Ait., zottige, f. Sch. w. Cap d. g. Hoffnung.

Cymation laevigatum Spgl. et *undulat.* Spgl. vid. *Lichtensteinia laevigata* etc.**Cymbaria** L., Cymbelkapsel, XIV. ii., Personatae-Antirrhineae (*Scroful.*).

borysthenica Pall., chersonische, 4. f. Südrussland.

dahurica L. (*daurica*), dahurische, 4. f. Dahurien.

Cymbidium Sw., Cymbelstendel (Kahnlippe), XX. i., Orchideae.

aloëfolium Sw., aloëblättriger, 4. w. Ostindien.

chinense W., chinesischer, 4. w. China.

ensifolium Sw., schwertförmiger, 4. w. China, Japan.

β) *estriatum* Lindl.

giganteum Sw., riesenhafter, 4. w. Cap d. g. Hoffn.

lancifolium Hook., lanzettblättriger, 4. w. Ostindien.

marginatum Lindl., gerandeter, 4. w. Rio Janeiro.

suave RB., wohlriechender, 4. w. Neuholland.

trippterum Sw., dreiflügeliger, 4. w. Jamaica.

Cymbidium

virescens Lindl., grünlicher, 4. w. Japan,

xiphiifolium Ker, schmalblättriger, 4. w. China.

dependens Lod. v. *Cirrhaea dependens*. *graminoides* Sw. v. *Isochilus graminifolius*. *reflexum* RB. v. *Sturmia reflexa*. *scriptum* Sw. vid. *Grammatophyllum speciosum*. *tessellatum* Roxb. vid. *Vanda tessellata*.

Cymbopogon Spgl., Cymbelbart, III. II. (XXIII. 1.), Gramineae.

Schoenanthus Spgl., wohlriechender, 4. w. Ostindien, Arabien, Cap der guten Hoffnung.

Cyminosma G., Cyminosma, VIII. I., Tricoccae-Rutaceae.

oblongifolia Hook., langblättrige, ♂. t. Neusüdwallis.

odorata DC., wohlriechende, ♂. t. China.

pedunculata DC., gestielte, ♂. t. Ostindien.

Cynanchum L., Hundswürger, V. II., Asclepiadeae.

acutum L., spitziger, 4. Sch. f. b. k. Süd- u. Westeuropa.

capense L., capischer, ♂. Sch. t. Cap der gut. Hoffn.

cirrhosum Sw., wickelrankiger, 4. Sch. f. ?

crassifolium RB., dickblättriger, ♂. 4. Sch. t. Cap der guten Hoffnung.

excelsum Dsf., hoher, 4. Sch. k. Nordafrika.

foetidum H. B. K., stinkender, ♂. Sch. w. t. Mexico.

fuscum Lk. (*medium* RB.), bräunlicher, 4. f. Süd-europa, Portugal.

Heynianum R. et S., Heyne's, ♂. Sch. w. Ostindien.

luteum Spgl., gelber, 4. f. b. k. Creta.

? *melanthos* Dsf., schwarzblumiger, 4. Sch. f. Frankreich.

monspeliacum L., französischer, 4. Sch. f. Spanien.

mucronatum H. B. K., stachelspitziger, ♂. Sch. w. Neugranada.

nigrum P., schwarzer, 4. Sch. f. Ostrußland.

pauciflorum RB., wenigblumiger, ♂. Sch. w. Ostindien.

pilosum RB., weichhaariger, ♂. Sch. t. Cap d. g. H.

roseum RB., rosafarbiger, 4. Sch. f. Dahurien.

sibiricum RB., sibirischer, 4. f. Sibirien.

undatum B. Rep., welliger, ♂. Sch. w. Westindien.

Vincetoxicum P., Schwalbenwurz, H. 4. f. Europa.

viridiflorum Ker, grünblumiger, ♂. Sch. w. Ostindien.

Argel Delil. vid. *Solenostemma Argel*. *bicolor* Bot.

rep. vid. *Doemia bicolor*. *discolor* Sims v. *Gonolobus*

discolor. *extensum* Ait. vid. *Doemia extensa*. *fimbriatum*

Kunth. vid. *Metaplexis fimbriata*. *hirsutum* Vahl v. *Macroscelis*

obovata. *nigrum* Cav. *parviflorum* Sw. v. *Metastelma*

parviflorum. *viminale* L. v. *Sarcostemma viminale*.

Cynara T., Artischocke, XIX. I., Compositae-Gynarcephalae.

Cardunculus L., Cardi-A. (spanische), ♂. f. Westeuropa, Griechenland, Nordafrika.

horrida Ait., rauhe, 4. k. Madeira,

humilis L., niedrige, 4. f. Spanien, Nordafrika, Griechenland.

pygmaea W., zwergige, 4. f. Spanien.

Scolymus L., ächte, ♂. 4. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Nordafrika.

spinosissima Presl., starkstachelige, 4. f. Sicilien.

Cynodon Rich., Hundsgras, III. II., Gramineae.

- Dactylon* Rich. P., fingerförmiges, 4. f. Südeuropa, Caucasus, Amerika, Afrika, Neuholland.
linearis W., schmalähhriges, 4. k. Ostindien.
stellatus W., sternförmiges, 4. k. St. Helena.
virgatus W., ruthenförmiges, 4. w. Ostindien.

Cynoglossum T., Hundszunge, V. I., Asperifoliaceae.

- apenninum* L., apenninische, ♂. f. Italien.
australe RB., neuholländische, 4. k. t. Neuholland.
canescens W. (*hirsutum* Jacq., *micranthum* DC.), grau-liche, ☉. f. m. Ostindien.
cheirifolium L. (*argenteum* Lam.), levkoiblätterige, ♂. f. b. Südeuropa, Kleinasien, Nordafrika.
clandestinum Dsf. (*fulvum* Rudolph.), heimlichblumige, ♂. f. Portugal, Nordafrika.
Columnae Tenor., *Columna's*, ♂. f. Neapel, Sicilien.
divaricatum Lehm., ausgesperrte, ♂. f. Sibirien.
elongatum Hornem., verlängerte, ♂. f. ?
grandiflorum Benth., großblumige, 4. f. b. k. Cashmire.
holosericeum Stev., sammethaarige, ☉. f. Sibirien.
lanceolatum Forsk. (*hirsutum* Thbg.), lanzettblätterige, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.
latifolium RB., breitblätterige, 4. k. Neuholland.
montanum Lam. (*sylvaticum* Haenke, *Haenkei* Schult., *Dioscoridis* Vill.), Berg-H., ♂. f. Deutschl., Frankr. etc.
officinale L., officinelle, ♂. f. Europa, Asien, Nordafrika und Amerika.
 β) *bicolor* W.
pictum Ait. (*cheirifol.* Scop., *creticum* Vill.), bemalte. Südeuropa.
sylvaticum Sm. (*apenninum* Roth.), Wald-H., ♂. f. England, Südeuropa.
umbellatum Kit., doldige, ♂. f. Ungarn, Sibirien.
virginicum L. (*amplexicaule* Mchx.), virginische, 4. f. Nordamerika.
glomeratum Pursh v. *Myosotis glomerata*. *linifolium* L., *nitidum* W., *Omphalodes* L., *scorpioides* Haenk. etc. v. *Omphalodes linifol.* etc. *Rindera* Pall. vid. *Rindera laevigata*.

Cynometra L. (*Cynomorium* Rumpf.), Hundsfuß, X. I., Leguminosae-Caesalpineae.

- cauliflora* L., stengelblumiger, ♀. w. Ostindien.
polyandra Roxb., vielmänniger, ♀. w. Ostindien.

Cynorchis Thouars, Hundsstendel, XX. I., Orchideae.

- fastigiata* Thouars, Lindl., gipfelständiger, 4. Kn. w. Mascarenas.

Cynosurus L., Kammgras, III. II., Gramineae.

- cristatus* L., gemeines, 4. f. Europa.
echinatus L., stacheliges, ☉. f. Südeuropa.
elegans Dsf. (*effusus* Lk.), zierliches, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.
aureus L. v. *Chrysosurus cynosuroides*. *coeruleus* L. etc. vid. *Sessleria coerulea* etc. *coracanus* L. etc. vid. *Eleusine coracana* etc. *distichus* Hoffm. v. *Oreochloa disticha*. *domingensis* Jacq. etc. vid. *Leptochloa domingensis*. *durus* L. v. *Sclerochloa dura*. *erucaeformis* W. v. *Beckmannia erucaeformis*. *Lima* L. v. *Wangenheimia Lima*. *retroflexus* Vahl v. *Dineba aegyptiaca*.

- Cynthia** Don (*Luthera* Schulz), Cynthie, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.
virginica Don, virginische, 4. f. Nordamerika.
- Cypella** Herb., Cypelle, XVI. 1., Irideae.
Drummondii Grah., Drummond's, 4. Kn. w. Südamerika.
Herberti Bot. mag., Herbert's, 4. Zw. t. Buenos Ayres.
plumbea Lindl. v. *Phalocallis plumbea*.
- Cyperus** T., Cypergras, III. 1., Cyperaceae.
Aitoni R. et S., Aiton's, 4. t. Cap der guten Hoffn.
alopecuroides Rottb., fuchsschwanzähnliches, 4. w. Südafrika, Neuholland.
alternifolius L., wechselblättriges, 4. w. Madagascar.
articulatus L. (*nodosus* W.), gegliedertes, 4. w. Ost- und Westindien.
aureus Humb. (*quitensis* Speg.), goldfarbiges, 4. w. Südamer.
auricomus Sbr. (*xanthocomus* Lk.), goldschopfiges, 4. w. Aegypten.
australis Schrad. (*glomeratus* Host.), südliches, 4. k. f. Südeuropa.
badius Dsf. (*thermalis* Dumort.), kastanienbraunes, 4. f. k. Westdeutschland, Frankreich, Nordafrika.
brachiatus Poir., armförmiges, 4. w. Madagasc., Manilla.
brizaeus Rich., zittergrasähnliches, 4. w. Westindien.
brunneus Sw., braunes, 4. w. Westindien.
caricinus D. Don, riedgrasähnliches, 4. k. t. Nepal.
chrysomelinus Lk., goldfarbiges, 4. w. ? Nepal.
comosus Sm., schopfiges, 4. k. Griechenland.
compactus Retz (*congestus* Poir.), dichtes, 4. w. China.
compressus L., flaches, 4. w. Ost- und Westindien.
conglomeratus Rottb. (*arundinaceus* Forsk.), zusammengehalttes, 4. w. Arabien.
cruentus Rottb. (*globosus* Forsk.), blutfarbiges, 4. w. Arab.
densiflorus Meyer, dichtblumiges, 4. w. Surinam.
difformis L., unförmliches, 4. w. Ostind., Afr., Neuholl.
distans L. suppl. (*elatus* Rottb.), entferntstehendes, 4. k. w. Ost- und Westindien, Nordamerika.
Dives Delil. (*fastigiatus* Forsk.), göttliches, 4. w. Aegypt.
elatus L., hohes, 4. w. Ostindien.
elegans Vahl, zierliches, 4. w. Westindien, Südamerika.
Eragrostis Vahl, schönes, 4. w. Tranquebar.
erythraeus Schrad. (*erubescens* Lk., *globosus* Hort.), röthliches, 4. w. ?
esculentus L., Erdmandel-C., 4. Kn. Südeuropa, Griechenland, Aegypten.
fasciculatus Ell., büschelförmiges, 4. f. k. Nordamerika.
fastigiatus Rottb. (? *venustus* RB.), gipfelständiges, 4. w. Ostindien, Neuholland.
flavescens L., gelbliches, 4. ♂. f. Europa, Nordamerika.
fuscus L., dunkelbraunes, 4. f. Europa, Nordamerika.
 β) *virescens* Hoffm. (*glaber* Sturm).
glaber L. (*pictus* Ten.), glattes, 4. f. Italien, Sicilien, Griechenland.
globosus All., kugelhähriges, 4. k. Italien, Nordafrika.
glomeratus L., knaulförmiges, 4. f. Italien.
holosericeus Hornem., sammetartiges, 4. w. ?
Hydra Mchx., langhülliges, 4. k. Süd- u. Nordamerika.
Jacquini Schrad. (*elatus* H. Vindob.), Jacquin's, 4. w. ? Ostindien.
incarnatus Lk., fleischfarbiges, 4. w. Brasilien.
Iria L., entferntschuppiges, 4. w. Ostindien.

Cyperus

kyllingioides Vahl, kyllingiaähnliches, 4. k. Nordamer.
leucocephalus Retz (*dubius* Rottb.), weifsköpfiges, 4. w.
Ostindien.

ligularis L., blattthäutiges, ☉. w. Jamaica.

longus L., langes, 4. f. England, Südeuropa, Griechenl.

Luzulae L., Rottb. (*polycephalus* Lam.), aftersimsen-
ähnliches, 4. w. Ost- und Westindien.

Monti L. (*serotinus* Rottb.), Monti's, 4. f. k. Südeuropa.

mucronatus Retz (*lateralis* Forsk., *maritimus* Gouan,
junciformis Dsf. *distachys* All.), stachelspitziges, 4. k.

Südeuropa, Asien, Nordafrika.

niloticus Forsk., ägyptisches, ☉. m. f. Aegypten.

nudus Humb., nacktes, 4. w. Südamerika.

pallescens Dsf. (*radicosus* Sm., *olivaris* Targ.), bleiches,
4. k. Italien, Nordafrika, Griechenland.

Pangorei Rottb., Pangore's, 4. w. Ceylon.

paniculatus Rottb., rispiges, 4. w. Westindien.

pannonicus Jacq., ungarisches, ☉. f. Ungarn, Griechenl.

paramattensis Lk. (*Paramatta* Mart.), paramattisches,
4. w. Südamerika.

patens Vahl, abstehendes, ☉. w. Guinea.

patulus Kit., ausgebreitetes, ☉. f. Ungarn.

polycephalus Lk. (*multiceps* Lk.), vielköpfiges, 4. k.
Süd- und Osteuropa.

polystachys Rottb., vielähriges, 4. w. Ostindien, Afrika,
Neuholland.

protractus Delil., verlängertes, ☉. f. m. Aegypten.

pygmaeus Rottb., zwergiges, 4. w. Ostindien.

rigidus Vahl, starres, 4. w. Ostindien.

scaber Lagasc., scharfes, 4. w. ?

Sellowii Lk., Sellow's, ☉. w. Montevideo.

Sieberianus Lk. (*esculentus* Sbr.), Sieber's, 4. Kn. w. Aegypt.

spectabilis Schreb. ? H. Erf., ansehnliches, ? Ostindien.

strigosus L., striegeliges, 4. w. k. Jamaica, Virginien.

tenellus L. suppl. (*minimus* Thbg.), zartes, ☉. t. w. C. g. H.

Tenorii Lk. (*aureus* Tenor.), Tenore's, 4. k. Neapel.

tenuiflorus Rottb., dünnblüthiges, 4. k. t. Kleinasien.

trisulcus D. Don, dreifurchiges, 4. k. Nepal.

tuberosus Rottb., knolliges, 4. Kn. w. Ostindien.

vegetus W. (*monandrus* Roth, *compressus* Jacq., *Eragrostis*
Lam.), lebhaftes, 4. w. t. Mittelamerika, Carolina.

viscosus Ait. (*elegans* Rottb.), schmieriges, 4. w. Westind.

incompletus Lk. v. *Mariscus patulus*. *Michelianus*

Lk. et *pygmaeus* Hortul.) v. *Dichostylis Micheliana*.

Papyrus L. v. *Papyrus antiquorum*.

Cyphia Berg., Krummnarbe, V. I., Campanulaceae-Lo-
beliaceae (Cyphiaceae).

bulbosa Berg., knollige, ♂. Kn. t. Cap d. g. Hoffn.

Cardamines W., springkressenähnliche, 4. t. Cap d. g. H.

incisa W., schlitzblättrige, ☉. m. f. Cap d. g. Hoffn.

volubilis W., windende, ☉. ♂. Sch. m. f. t. Cap d. g. H.

Cyphonema Hook., Cyphonéma, VI. I., Narcisseae-
Amaryllideae.

Loddigesianum Hook., Loddigs's, 4. Zw. w. Valparaiso.

Cypripedium L., Frauenschuh, XX. II., Orchideae,

arietinum RB., canadischer, 4. Kn. f. k. Canada.

Calceolus L., gemeiner, 4. Kn. f. Mitteleuropa.

candidum W., reinweißser, 4. Kn. f. k. Nordamerika.

guttatum Sw., getüpfelter, 4. Kn. f. k. Sibirien.

Cypripedium

humile Sw. (*acaule* Ait. Mchx.), niedriger, 4. Kn. f. Nordamerika.

insigne Wall., ausgezeichneter, 4. Kn. w. Nepal.

macranthon Sw., großblumiger, 4. Kn. f. k. Sibirien.

parviflorum Sw., kleinblumiger, 4. Kn. f. k. Virginien.

pubescens W. (*flavescens* Redout.), weichhaariger, 4. Kn. f. k. Nordamerika.

purpuratum Lindl., purpurfarbiger, 4. Kn. f. k. Nordamer.

spectabile Sw. (*album* Ait., *canadense* Mchx.), ansehnlicher, 4. Kn. f. k. Nordamerika.

ventricosum Sw., bauchiger, 4. Kn. f. k. Sibirien.

venustum Wall., lieblicher, 4. Kn. w. Nepal.

Cyrilla L. (Cyrillo, Professor der Botanik zu Neapel), V. I., Corniculatae-Cunoniaceae.

antillana Mchx., antillische, ⚥. t. w. Westindien.

caroliniana Mchx. (*racemiflora* L.), carolinische, ⚥. k. f. b. Carolina.

Cyrilla pulchella L'Her. v. *Trevirana coccinea*.

Cyrtanthus Ait., Bogenlilie, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.

angustifolius Ait., schmalblättrige, 4. Zw. w. t. Cap der guten Hoffnung.

collinus Burch., Hügel-B., 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.

obliquus Ait., schiefe, 4. Zw. w. t. Cap d. gut. Hoffn.

odorus Ker, wohlriechende, 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.

pallidus Sims, bleiche, 4. Zw. w. t. Cap der gut. H.

spiralis Burch., spiralförmige, 4. Zw. w. t. Cap d. g. H.

ventricosus W. (*angustifolius* Jacq.), bauchige, 4. Zw. t. Cap des guten Hoffnung.

vittatus Dsf., verschleierte, 4. Zw. w. Cap d. gut. H. *uniflorus* Ker v. *Gastronema clavatum*.

Cyrtochilum H. B. K., Bogenlippe, XX. I., Orchideae.

bictoniense Bate, bictonische, 4. w. Südamerika.

flavescens Lindl., gelbliche, 4. w. Mexico.

maculatum Lindl., gefleckte, 4. w. Mexico.

mystacinum Lindl., bärtige, 4. w. ?Südamerika.

Cyrtogyne Haw., Cyrtogyne, V. v., Corniculatae-Grassulaceae.

undata Haw., wellige, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

undulata Haw., schmalwellige, ⚥. t. Cap d. gut. Hoffn.

Cyrtolepis DC., Bogenschuppe, XIX. II., Compositae-Corymbif.

alexandrina DC., ägyptische, ☉. f. Aegypten.

Cyrtopodium RB., Bogenfuß, XX. I., Orchideae.

Andersonii RB., Anderson's, 4. w. Westindien.

flavum Lk. et Otto, gelber, 4. w. Südamerika.

glutinosum Mey., klebriger, 4. w. Südamerika.

punctatum Lindl., punktirter, 4. w. Brasilien.

Willmorei K. et W., Willmore's, 4. w. Venezuela.

Woodfordii Sims, Woodford's, 4. w. Südamerika.

Cyrtostylis RB., Bogengriffel, XX. I., Orchideae.

reniformis RB., nierenförmiger, 4. Kn. t. w. Neuhol.

Cysticapnos Boerh. G., Blasenrauch, XVII. II. (IV.), Papaveraceae-Fumariaeae.

africana G., afrikanischer, ☉. Sch. f. Cap der gut. H.

alexandrina G. Don., alexandrinischer, ☉. Sch. f. Aegypten.

Cystanthe RB., Blasenblümchen, V. I., Epacrideae.

sprengelioides RB., sprengeliaähnliches, ⚥. t. Van-Diemens-Land.

Cytisus T., Geißklee, Bolnenbaum, XVII. IV. (VI.),

Leguminosae-Papilionaceae.

aeolicus Guss., liparischer, $\S$. f. b. Liparische Inseln.albidus DC., weißlicher, $\S$. f. Südeuropa.albus Lk., weißer, $\S$. k. Portugal, Nordafrika.

b) incarnatus. c) luteus.

alpinus Mill., Alpen-G., $\S$. f. Schweiz, Kärnten, Tyrol, Krain, Italien, Ungarn.arhoreus DC., baumartiger, $\S$. t. k. Numidien.argenteus L., silberfarbiger, $\S$. k. f. b. Krain, Südfrankreich, Spanien.austriacus L., österreichischer, $\S$. f. Osteuropa, Ital., Caucas.

b) pendulus. c) odoratus.

biflorus L'Her. (*supinus* Jacq.), zweiblumiger, $\S$. f. Süd- und Ostdeutschland, Ungarn. β) minor (*cinereus* Host.). γ) glaber L.calycinus MB. (*pauciflorus* W.), großkelchiger, $\S$. f.

Taurien, Caucasus, Kleinasien, Persien.

canescens W., graulicher, $\S$. k. Teneriffa.capitatus Jacq., kopfförmiger, $\S$. f. Süd- u. Osteuropa.elegans Ait., zierlicher, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.elongatus W. K., verlängerter, $\S$. f. Ungarn.glabratus Lk., glatter, $\S$. k. Portugal.glomeratus Boj., knaulförmiger, $\S$. w. Zanzibar.grandiflorus Spgl., großblumiger, $\S$. k. Portugal.hirsutus L. (*polytrichus* MB., *falcatus* W. K., ? *Tournefortianus* Lois., *virgatus* Vest.), rauhhaariger, $\S$. f.

Ost- und Südeuropa, Spanien.

Laburnum L., gemeiner, $\S$. f. Südeuropa.b) quercifolium Hortul. (*incisum* Hort.). c) pen-

dulum Hort. d) fol. variegat. e) purpurascens

Hortul. (*Adami* Poir., *coccineum* Baum.).laniger DC., wolliger, $\S$. k. Portugal, Spanien. β) rigidus DC.leucanthus W. K., weißblumiger, $\S$. f. Ungarn, Galicien, Podolien.mollis W., weicher, $\S$. k. ?multiflorus G. Don, Lindl. (*elongatus* Hort.), vielblumiger, $\S$. $\S$. f. Osteuropa.nanus W., zwergiger, $\S$. f. Kleinasien.nigricans L., schwärzlicher, $\S$. f. Mitteldeutschland, Südeuropa.nubigenus Lk. (*fragrans* Lam.), wohlriechender, $\S$. k. Teneriffa.orientalis Lois., morgenländischer, $\S$. f. Kleinasien.patens L., abstehender, $\S$. k. Spanien, Portugal.ponticus W., pontischer, $\S$. f. Kleinasien.procerus Lk., hoher, $\S$. k. Portugal.proliferus L. suppl., sprossender, $\S$. t. k. Teneriffa.prostratus Scop. (*bisflorens* Host.), gestreckter, $\S$. f. Krain, Tyrol, Ungarn. β) ciliatus Wahlenb.purpureus Scop., purpurfarbiger, $\S$. f. Krain, Croatien, Tyrol, Oberitalien.

b) albiflorus.

pygmaeus W., kleiner, $\S$. f. b. Türkei.ruthenicus Fisch., russischer, $\S$. f. Südrussland.sessilifolius L., stielloser, $\S$. f. Südeuropa.spinescens Sieb. (*argyreus* Rchb., *ramosissimus* Ten.), feindorniger, $\S$. f. b. Istrien, Dalmatien.

Cytisus

spinosus Lam., dorniger, ♀. k. f. b. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

supinus L., niedriger, ♀. f. Oesterreich.

triflorus L'Her., dreiblumiger, ♀. f. Spanien, Italien, Nordafrika.

uralensis Ledeb., uralischer, ♀. f. Ural.

Weldenii Visian., Welden's, ♀. f. Dalmatien.

Hybrid: *bracteolatus* Hort., *tetragonocladus* Hort., *racemosus* Marnock.

Cajan L. v. *Cajanus flavus*. *complicatus* Brot. v. *Adenocarpus intermedius*. *divaricatus* L'Her. (*parvifolius* Lam.) v. *Adenocarpus parvifol.* *foliolosus* L'Her., *hispanic.* Lam. v. *Adenocarp. foliolos.* etc. *pinnatus* Pall. (*wolgaricus* L. suppl.) v. *Calophaca wolgarica*. *Pseudocajan* Jacq. v. *Cajanus bicolor*, *psoralioides* L. v. *Indigofera psoraleoid.* *rhombifol.* Fras. Pursh v. *Termopsis rhombifol.* (fabacea). *sagittatus* Koch (et *radiatus* Koch) v. *Genista sagittat.* etc. *scoparius* Lk. v. *Sarothamnus scoparius.* *telonensis* Lois. v. *Adenocarpus telonens.* *tomentosus* Andr. v. *Goodia polysperma.* *violaceus* Aubl. v. *Rhynchosia violacea.*

Czackia Andr. (A. Czack, russischer Botaniker), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

Liliastrum Andr., lilienähnliche, 4. f. Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Oberitalien.

Daboecia D. Don, Daboecie, VIII. 1., Ericaceae.

polifolia D. Don, poleiblätterige, ♀. f. b. k. Irland.

b) flore albo Swt.

Dacrydium Banks Soland., Gummitanne, XXI. X. Coniferae-Taxineae.

cupressinum Soland., cypressenähnliche, ♀. t. Neuseeland.

elatum Wall., hohe, ♀. t. w. Ostindien.

Dactylanthus Anacantha Haw., *globosa* Haw., *tuberculata* Haw. etc. v. *Euphorbia Anacantha* etc.

Dactylicapnos Wall., Fingerfrucht, XVII. 11., Papaveraceae-Fumarieae.

thalictrifolia Wall., wiesenrautenblättrige, 4. Sch. t. Nepal.

Dactylis L., Knaulgras, III. 11., Gramineae.

abbreviata Bernh., abgekürztes, 4. f. ?

capitellata Lk., kleinköpfiges, 4. f. Südfrankreich.

cynosuroides Roth, kammgrasähnliches, ♂. w. Ostindien.

glaucescens W., blaugrünes, 4. f. Südeuropa.

glomerata L., gemeines, 4. f. Europa, Sibirien, Nordamerika.

hispanica Roth (*cylindrica* Brot.), (*villosa* Tenor.), spanisches, 4. f. Süd- und Westeuropa.

β) *altaica* Bess. γ) *nemoralis*.

litoralis W. (*maritima* Schrad., *distichophylla* Brignol.), Seestrands-K., 4. f. Südeuropa.

pungens Dsf., stechendes, 4. f. k. Griechenland, Nordafrika.

repens Dsf., kriechendes, 4. f. Caucasus, Griechenland, Südfrankreich, Nordafrika.

adscendens Schrad. (et *ciliaris* Thbg. et *hispida*

Dactylis

Thbg.) v. *Lasiochloa adscendens* etc. *cristata* MB.
(et *lobata* MB.) v. *Koeleria cristata*, *glauca* etc.
paspaloides W. v. *Dineba aegyptiaca*.

Dactyloctenium W., Muschelgras, III. II., Gramineae.
aegyptiacum W., aegyptisches, ☉. f. Aegypten, Sicilien,
Ost- und Westindien.

aristatum Lk., gegranntes, ☉. f. Aegypten.

mucronatum W., stachelspitziges, ☉. f. Nordamerika,
Antillen.

prostratum W., gestrecktes, ☉. w. Malabar.

Dactylon officinale Vill. v. *Cynodon Dactylon*. *Dahlia Cervantesii* Lag., *coccinea* Cav., *rosea* Cav. v. *Georgina Cervantesii*, *coccinea* etc.**Dais** L., Dais, X. I., Thymeleaceae.

cotinifolia L. (*laurifolia* Jacq.), lorbeerblättrige, ♀. t.
Cap der guten Hoffnung.

Dalbergia L. fil. (N. Dalberg, schwedischer Botaniker), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

alata Roxb., geflügelte, ♀. w. Ostindien.

Barclayi Hook., Barclay's, ♀. Sch. w. Mascarenas.

Crowei Roxb., Crowe's, ♀. w. Ostindien.

emarginata Roxb., ausgerandete, ♀. w. Ostindien.

frondosa Roxb., belaubte, ♀. w. Ostindien.

latifolia Roxb., breitblättrige, ♀. w. Ostindien.

marginata Roxb., berandete, ♀. Sch. w. Ostindien.

ougeiensis Roxb., ougeinische, ♀. w. Ostindien.

paniculata Roxb., rispige, ♀. w. Ostindien.

rimosa Roxb., rissige, ♀. Sch. w. Ostindien.

robusta Roxb., rüstige, ♀. w. Ostindien.

rubiginosa Roxb., verrostete, ♀. w. Ostindien.

scandens Roxb., kletternde, ♀. Sch. w. Ostindien.

Sissoo Roxb., Sissoo-D., ♀. w. Ostindien.

stipulacea Roxb., zwischenblättrige, ♀. w. Ostindien.

tamarindifolia Roxb., tamarindenblättrige, ♀. Sch. w.
Ostindien.

Telfairii Hook., Telfair's, ♀. Sch. w. Mascarenas.

timoriensis DC., timorische, ♀. w. Ostindien.

volubilis Roxb., windende, ♀. Sch. w. Ostindien.

Diphaca P. v. *Diphaca cochinchinensis*. *domingensis*
P. v. *Lonchocarpus domingensis*.

Dalea L. (Thomas Dale, englischer Botaniker), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

alopecuroides W., fuchsschwanzähnliche, ☉. m. f. Nordamerika.

aurea Nutt., goldfarbige, 4. f. Nordamerika.

bicolor W., zweifarbige, ♀. w. Südamerika.

citriodora W., citronduftende, ☉. w. Südamerika.

Cliffortiana W., Cliffort's, ☉. m. f. Vera-Cruz.

enneaphylla W., neunblättrige, ♀. w. Westindien,
Neugranada.

Lagopus W., zottigährike, ☉. f. m. Mexico.

laxiflora Pursh, lockerblumige, 4. f. b. Louisiana.

mutabilis W., veränderliche, 4. t. w. Neuspanien.

nutans W., nickende, 4. w. t. Mexico.

phymatodes W., drüsige, ♀. w. t. Caracas.

reclinata W., zurückgebeugte, 4. w. Mexico.

sericea Lagasc., seidenhaarige, 4. w. Mexico.

Thouini Schrk., Thouin's, ☉. m. f. ?

Dalea

tuberculata Lag., höckerige, ♀. w. Mexico.

Kuhnistera W. v. *Petalostemon corymbosum*.

Dalechampia L. (J. Dalechamp, alter französischer Botaniker), XXI. x. (XVI. viii.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

brasiliensis Lam., brasilianische, ♀. Sch. w. Brasilien.

ficifolia Lam., feigenblättrige, ♀. Sch. w. Brasilien.

scandens L., kletternde, ♀. Sch. w. Westindien, Südamer.

Dalibarda L. (Denis Dalibard, französischer Botaniker), XII. iii., Rosaceae.

repens L. (*violaeoides* Mchx.), kriechende, 4. f. Nordamerika.

fragarioides Mchx. v. *Comaropsis fragar.*

rioides Bot. mag. v. *Comaropsis Doniana*.

Dalrymplea Roxb. (Alex. Dalrymple, englischer Gelehrter), V. i. (XXIII. ii.), Celastrineae.

pomifera Roxb., orangenfrüchtige, ♀. w. t. Ostindien, Nepal.

Damasonium Schreb., Wasserschalt, VI. iv., Hydrocharideae.

indicum W., indischer, 4. Wa. w. Ostindien, Aegypten.

ovalifolium RB., eiblättriger, 4. Wa. w. t. Neuholland.

stellatum P. v. *Actinocarpus Damasonium*.

Dammara Rumpf., Dammaratanne (Amboinischer Name), XXI. x., Coniferae.

australis Lamb., südliche, ♀. t. w. Neuzeeland.

orientalis Lamb. (*alba* Rumpf.), morgenländische, ♀. w. Molucken.

Dampiera RB. (Cap. Dampier, berühmter Seefahrer), V. i., Campanulaceae-Goodenovieae.

ovalifolia RB., eiblättrige, 4. ♀. t. Neusüdwallis.

stricta RB., steife, 4. ♀. t. Neuholland.

Danaea Sw. (P. M. Dana, piemontesischer Botaniker), XXIV. i., Osmundaceae.

alata Sm., geflügelte, 4. w. Westindien.

Danthonia DC. (M. Danthoine, französischer Botaniker), III. ii., Gramineae.

calycina R. et S., gekelchte, 4. t. Cap der gut. Hoffn.

lanata Schrad., wollige, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

Linkii Kunth, Link's, 4. t. Neuholland.

longifolia RB., langblättrige, 4. t. Neuholland.

micrantha Trin., kleinblüthige, ☉. ♂. f. t. Cap d. g. H.

pilosa RB., haarige, 4. t. Neuholland.

provincialis DC. (*alpina* Vest., *calycina* Rehb.), südeuropäische, 4. f. Südeuropa, Taurien.

semianularis RB., halbringförmige, 4. t. Neuholland.

sericea Nutt., seidenhaarige, 4. f. Nordamerika.

spicata R. et S., ährige, 4. f. Nordamerika.

calycina Hort. v. *Schismus marginatus*.

DC. v. *Triodia decumbens*.

discolor R. et S. v. *Aira media*.

glandulosa Schrad. (et *curvifolia* Schr.,

macrantha Schrad., *papillosa* Schrad.) v. *Pentameris*

glandulosa etc.

Daphne L., Seidelbast, VIII. i., Thymeleaceae.

alpina L., Alpen-S., ♀. f. Mitteleuropäische Alpen.

altaica Pall., altaisches, ♀. f. Sibirien.

Blagayana Rehb., Blagay's, ♀. f. b. k. Krain.

Daphne

chinensis Lam., chinesischer, ♀. t. China.

Cneorum L., rosmarinblättriger, ♀. k. f. b. Mittel- und Südeuropa.

b) fol. variegat. c) fl. albo.

collina Sm., Hügel-S., ♀. k. f. b. Italien.

Gnidium L., rispenblumiger, ♀. k. Südeuropa, Nordafrika.

hybrida Swt. (*Dauphinii* Hortul.), Bastard-S., ♀. k. ?

jasminea Sm., jasminähnlicher, ♀. k. Griechenland.

indica L., indischer, ♀. t. China.

Laureola L., lorbeerblättriger, ♀. f. Ost- und Mitteleuropa.

Mezereum L., gemeiner (Kellerhals), Europa, Nordasien.

b) flore albo. c) autumnalis.

neapolitana Lod. (? *australis* Cyril., *collina* β) *neapolitana* Bot. Reg.), neapolitanischer, ♀. k. Süditalien. •

odora Thbg., wohlriechender, ♀. t. k. Japan.

b) variegata. c) rubra.

oleoides Schreb., ölbaumähnlicher, ♀. k. Creta, Caucasus, Sardinien.

papyracea Wall. (*cannabina* Wall.), nepal'scher, ♀. t. Nepal.

pontica L., pontischer, ♀. k. Kleinasien.

b) rubra. c) fol. variegat.

salicifolia Lam. (*caucasica* Pall.), weidenblättriger, ♀. k. Caucasus.

sericea Vahl (*oleaeifolia* Lam.), seidenhaariger, ♀. k. Creta, Kleinasien, Neapel.

striata Tratt., gestreifter, ♀. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

viridiflora Ait., grünblumiger, ♀. t. Nepal.

calycina Berg. v. *Passerina dioeca*. *calycina* Lap.

v. *Passerina calycina*. *coridifolia* Lam. (*pubescens*

L.) v. *Passerin*. *corifol*. *Lagetta* Sw. v. *Lagetta*

linteraria. *Tartonraira* L. et *Thymelaea* L. (*villosa*

L.) v. *Passerina Tarton-raira* etc.

Darea appendiculata W. et *Odontites* W. etc. v. *Caenopteris*.

Darlingtonia DC. (W. Darlington, nordamerikanischer Botaniker), V. 1., Leguminosae-Mimosaceae.

brachyloba DC., kurzlappige, 4. k. Nordamerika.

glandulosa DC., drüsige, 4. k. Nordamerika.

Darwinia Rudg. (Darwin, englischer Gelehrter und Dichter), X. 1., Thymeleaceae.

fascicularis Rudg., büschelförmige, ♀. t. Neuholland.

taxifolia Cun., taxusblättrige, ♀. t. Neuholland.

Dasyanthus Salisb. v. *Erica*.

Datisca L., Strichkraut, XXII. x., Datisceae.

cannabina L., hanfartiges, 4. f. Creta, Kleinasien.

hirta L., rauhes, 4. f. Pennsylvanien.

Datura L., Stechapfel, V. 1., Solanaceae.

ceratocaula Jacq. Orteg. (*macrocaulis* Roth), gehörnter,

⊙. m. f. Cuba, Mexico.

fastuosa L., schöner, ⊙. m. f. Südamerika, Aegypten.

b) flore pleno. c) fl. albo pleno.

ferox L., wilder, ⊙. f. China.

guayaquilensis Bonpl., guayaquil'scher, ⊙. m. f. Quito.

laevis L., glatter, ⊙. f. Afrika.

Metel L., weißer, ⊙. f. Südasien, Afrika.

muricata Lk., weichstacheliger, ⊙. f. ?

quercifolia H. B. K., eichenblättriger, ⊙. m. f. Mexico.

Datura

Stramonium L., gemeiner, ☉. f. Europa, Asien, Amerika.
Tatula L., blafsblauer, ☉. f. Südeuropa, Nordamerika.
arborescens Hort. v. *Brugmansia suaveolens arborescens*
 L. v. *Brugmansia candida bicolor* P. v. *Brugmansia sanguinea*.

Daubentonia DC. (Daubenton, berühmter französischer Zoolog), XVII. II. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
longifolia DC., langblättrige, ☿. w. Neuspanien.
punicea DC., dunkelrothe, ☿. w. Neuspanien.

Daubenia Lindl. (D. C. Daubeny, Professor der Botanik zu Oxford), VI. I., Coronariae-Asphodeleae.
aurea Lindl., goldfarbige, 4. Zw. t. Cap der gut. H.

Daucus T., Möhre, V. II., Umbelliferae.

* *aureus* Dsf., goldfarbige, ☉. f. Sicilien, Nordafrika, Kleinasien.

Carota L., gemeine, ♂. f. Europa, Mittelasien, Amerika.
 b) *hortensis*. c) *aurantia*. d) *praecox*.

crinitus Dsf. (*meifolius* Brot.), bemähnte, ♂. f. Portugal, Nordafrika.

Gingidium L. (*lucidus* L.), glänzende, ♂. f. Südeuropa.
gummifer Lam., harzige, ♂. f. Italien.

hispidus Dsf., hackerige, ♂. f. Südeuropa, Nordafrika.

litoralis Sm., Strand-M., ☉. f. Griechenland, Aegypten.

maritimus Lam. (*bicolor* Sm.), Seestrands-M., ♂. f. England, Südeuropa.

mauritanicus L., mauritanische, ♂. f. Nordafrika.

maximus Dsf., größte, ♂. f. Nordafrika.

montevidensis Lk., südamerikanische ♂. f. Monte-Video.

parviflorus Dsf., kleinblumige, ♂. f. Sicilien, Nordafrika.

polygamus Gouan, vielehige, ♂. f. Süd- u. Westeuropa.

siculus Tin., sicilische, ☉. f. Sicilien.

copticus P. v. *Trachyspermum copticum muricatum*

L. v. *Platyspermum muricatum*. *Visnaga* L. v.

Ammi Visnaga.

Davallia Sm. (E. Davall, schweizer Botaniker), XXIV. I., Pteridoideae.

canariensis Sw., canarische, 4. k. t. Canarische Inseln.

dubia RB., zweifelhafte, 4. t. w. Neuholland.

elegans Sw. (*bidentata* Schk.), zierliche, 4. w. Ostindien, Neuholland.

flaccida RB., schlaffe, 4. t. w. Neuholland.

gibberosa Sw., höckerige, 4. t. w. Inseln des stillen Meeres.

pyxidata Cav., büchsenförmige, 4. t. w. Neuholland, Philippinen.

Daviesia Sm. (H. Davies, englischer Botaniker), X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

acicularis Sm., nadelblättrige, ☿. t. Neusüdwallis.

alata Sm., geflügelte, ☿. t. Neusüdwallis.

cordata Sm., herzblättrige, ☿. t. Neuholland.

corymbosa Sm., traubendoldige, ☿. t. Neusüdwallis.

genistoides Ait., ginsterähnliche, ☿. t. Neuholland.

incrassata Sm., verdickte, ☿. t. Neuholland.

juncea Sm., binsenförmige, ☿. t. Neuholland.

juniperina Lod., wachholderähnliche, ☿. t. Neuholland.

latifolia RB., breitblättrige, ☿. t. Neusüdwallis.

leptophylla Cun., schlankblättrige, ☿. t. Neuholland.

linearis Lod., gleichbreitblättrige, ☿. t. Neusüdwallis.

Daviesia

mimosoides RB. (*glauca* Lod.), acacienähnliche, ♀. t. Neusüdwallis.

physodes Cun., aufgeblasene, ♀. t. Neuholland.

racemulosa DC., traubige, ♀. t. Neuholland.

squarrosa Sm., sparrige, ♀. t. Neuholland.

ulicina Sm. (*ulicifolia* Andr.), stechginsterähnliche, ♀. t. Neusüdwallis.

umbellata Sm., doldige, ♀. t. Neuholland.

virgata Cun., ruthenförmige, ♀. t. Neuholland.

humifusa Sbr. (*umbellata* Sbr.) v. *Podolobium* scan-

dens. *reticulata* Sm. v. *Jacksonia reticulata*.

Deastella vacciniifolia Kng. v. *Mimetes vacciniifolia*.

Decaneuron DC., Decaneuron, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

senegalense DC., senegalischer, ♀. w. Westafrika.

Decaspermum fruticosum Forst. v. *Nelitris Jambosella*.

Deckera C. A. Mey., Deckera, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

canescens C. A. Mey., grauliche, 4. f. Caucasus.

Decodon Gmel., Zahnkelch, X. I., Lythraeae-Salicariae.

verticillatus Ell., wirtelförmiger, 4. f. Nord- u. Südamer.

Decumaria L., Decumarie, XI. I., Philadelphaeae.

barbara L., carolinische, ♀. Sch. f. k. Carolina.

prostrata Lod., gestreckte, ♀. Sch. f. k. Carolina.

sarmentosa Bosc, starkwurzelnende, ♀. Sch. f. k. Carolina.

Deeringia RB. (C. Deering, englischer Botaniker), V. I., Aizoideae-Amarantheae.

celosioides RB., hahnenkammähnliche, ♂. t. w. Neuholland, Ostindien.

indica Spgl., indische, ♂. w. Ostindien.

Delima L., Delima, XIII. I., Dilleniaceae.

nitida DC., glänzende, ♀. Sch. w. Trinidad.

sarmentosa L., starkwurzelnende, ♀. Sch. w. Ceylon, Malabar.

Delphinium T., Rittersporn, XIII. III., Ranunculaceae.

Aconiti L. (*monogynum* Forsk.), sturmhutähnlicher, ☉. f. Levante.

Ajaxis L., Garten-R. ☉. f. Südeuropa, Taurien.

β) flore pleno.

albiflorum DC., weißblumiger, 4. f. Armenien.

ambiguum L., zweifelhafter, ☉. f. Nordamerika.

amoenum Stev., lieblicher, 4. f. Sibirien.

azureum Mchx., azurblauer, 4. f. Nordamerika.

cardiopetalum (*peregrinum* Lam.), herzblättriger, ☉. f. Pyrenäen.

cheilanthum Fisch., lippenblumiger, 4. f. Sibirien.

b) multiplex (*Barlowii* Hort.).

ciliatum Stev. (*flexuosum* MB.), gefranzter, 4. f. Caucasus.

Consolida L., Feld-R., ☉. f. Europa, Nordamerika.

b) flore pleno.

dasycarpon Stev., wollfrüchtiger, 4. f. Cauc., Nordpersien.

decorum Fisch. et May., zierlicher, 4. f. Neucaliforn.

discolor Fisch., verschiedenfarbiger, 4. f. Sibirien.

elatum L., hoher, 4. f. Mittel- und Osteuropa, Sibirien, Nordamerika.

β) alpinum Kit. et b) chrysopogon Hort. γ) al-

taicum Fisch. δ) americanum Mill. ε) cunea-

tum Stev. ζ) dictyocarpon DC. η) crassicaule

Schrad. θ) intermedium Ait. (*Clusianum* Host.).

Delphinium

b) altissimum. c) corymbosum. d) ranunculi-
folium. e) strictum. i) lazulinum Rchb. z) la-
xiflorum DC. λ) montanum DC. (elatum All.,
hirsutum Roth). μ) palmatifidum DC. ν) revo-
lutum Dsf. ξ) speciosum MB. o) urceolatum
Jacq. et b) lilacinum W. π) villosum Stev. ρ)
spurium Fisch. (? decumbens H. Dorp.). Andere
Garten-Varietäten: coerulescens Lindl. densiflo-
rum Hort. pallidum Lindl. sapphirinum Lindl.
moschatum Hortul. vitifolium Hortul. etc.

elegans DC., zierlicher, 4. f. Nordamerika.

b) flore pleno.

exaltatum Ait., höchster, 4. f. Nordamerika.

fissum Kit. (velutinum Bertol.), gespaltener, 4. f. Un-
garn, Illyrien, Italien.

grandiflorum L., großblumiger, ♂. 4. Sibirien.

β) chinense Fisch. (virgatum Jacq. fil.).

Gartenvarietäten: album, album fl. plen. pallidum,
lilacinum, purpurascens, Hulmii.

halteratum Sm., stielkroniger, ☉. f. Sicilien.

hybridum W., Bastard-R., ♂. 4. f. Taurien, Caucasus.

junceum DC. (peregrinum L.), binsenförmiger, ☉. f.

Südeuropa, Nordafrika, Syrien.

Menziesii DC., Menzie's, 4. Kn. f. Nordamerika.

mesoleucum Sk., gelblichblauer, 4. f. ?

ochroleucum Stev., weißgelber, ♂. 4. Iberien.

officinale Wender., officineller, ♂. f. k. Süd- u. Osteuropa.

Oliverianum DC., Olivier's, ☉. f. Westpersien.

pentagynum Lam., fünfweibiger, ♂. 4. f. k. Port., Nordaf.

pictum W., bemalter, ♂. f. k. Südeuropa.

pseudoperegrinum Fisch., fremder, 4. Sibirien.

pubescens DC. (ambiguum Lois.), weichhaariger, ☉. f.

Südfrankreich.

puniceum L., dunkelrother, ♂. 4. f. Caucasus, Sibirien.

Requienii DC., Requien's, ♂. k. Majorka.

Staphisagria L., scharfer, ♂. f. k. Istrien, Dalmatien,
Griechenland.

tenuissimum Sm. (? divaricatum Ledeb.), feiner, ☉. f.

Griechenland.

tricolor Bernh., dreifarbiger, ♂. 4. f. Iberien.

tricorne Mchx., dreihörniger, 4. Kn. f. Nordamerika.

tridactylum Mchx., dreitheiliger, 4. f. Nordamerika.

triste Fisch., trauriger, ♂. 4. f. Dahurien.

vimineum D. Don, schlanker, 4. f. Nordamerika.

Dendrobium Sw., Baumstendel, XX. I., Orchideae.

aemulum RB., lieblicher, 4. w. Neuholland.

aggregatum Roxb., angehäufter, 4. w. Ostindien.

amplum Lindl., herrlicher, 4. w. ?

Calceoaria Hook., pantoffelblumenähnlicher, 4. w. Ostind.

canaliculatum RB., nachenförmiger, 4. w. Neuholland.

candidum Wall., reinweißser, 4. w. Ostindien.

cassythoides R. Cun., schlinglorbeerähnlicher, 4. w. Neuholl.

chrysanthum Wall., goldfarbiger, 4. w. Nepal.

coerulescens Wall., bläulicher, 4. w. Ostindien.

crumenatum Sw., taschenförmiger, 4. w. Amboina.

cucullatum RB. (Pierardi Roxb.), kappenförmiger, 4.
Ostindien.

cupreum Herb., kupferfarbiger, 4. w. Ostindien.

densiflorum Wall., dichtblumiger, 4. w. Nepal.

Dendrobium

- denudans Don, entblößter, 4. w. Ostindien.
 fimbriatum Hook., gefranzter, 4. w. Ostindien.
 floribundum D. Don, blüthenreicher, 4. w. Nepal.
 formosum Lindl., schöner, 4. w. Ostindien.
 Gibsonii Paxt., Gibson's, 4. w. Ostindien.
 heterocarpum Lindl., verschiedenfrüchtiger, 4. w. ?
 linguaeforme Sw., zungenförmiger, 4. w. Neuholland.
 longicorne Lindl., langhorniger, 4. w. Nepal.
 macrostachyum Lindl., großähriger, 4. w. Ceylon.
 moniliforme Sw., armbandförmiger, 4. w. Japan, China.
 moschatum D. Don Wall., moschusduftender, 4. w. Nepal.
 Myosurus Sw., geschwänzter, 4. w. Societätsinseln.
 nobile Lindl., edler, 4. w. China.
 pulchellum B. C., hübscher, 4. w. Ostindien.
 pygmaeum Cun., zwergiger, 4. w. Neuholland.
 rigidum RB., starrer, 4. w. Neuholland.
 secundum Lindl., einseitiger, 4. w. Sumatra.
 speciosum Sw., prächtiger, 4. w. Neuholland.
 stuposum Lindl., wunderbarer, 4. w. Ostindien.
 sulcatum Lindl., gefurchter, 4. w. Ostindien.
 teretifolium RB., rundblättriger, 4. w. Neuholland.
 undulatum RB., wellenblumiger, 4. w. Neuholland.

album Hook. v. *Camaridium ochroleucum*. *anceps* Sw. v. *Aporum anceps*. *longifolium* H. B. K. (et *squalens* Bot. reg.) v. *Xylobium longifol.* et *squalens*. *polystachyum* Sw. v. *Polystachya luteola*. *pubescens* Hook. v. *Eria pubescens*. *punctatum* Sm. v. *Dipodium punctatum*. *retusum* La Llave etc. vid. *Specklinia retusa* etc. *sanguineum* Swt. v. *Broughtonia sanguinea*.

Dendromecon Benth., Strauchmohn, XIII. 1., Papaveraceae.

- rigida* Benth. (*rigidum*), starrer, f. k. t. Californien.

Dentaria T., Zahnwurz, XV. III., Cruciferae.

- bulbifera* L. zwiebeltragende, 4. Kn. f. Europa, Mit-telasien.
dasyloba Turcz., wolllappige, 4. Kn. f. Südrussland.
digitata Lam. (*pentaphyllos* Scop.), fingerförmige, 4. Kn. f. Krain, Tyrol, Salzburg etc.
diphylla Mchx., zweiblättrige, 4. Kn. f. Nordamerika.
enneaphylla L., neunblättrige, 4. Kn. f. Mitteleuropa.
glandulosa Kit., drüsige, 4. Kn. f. Schlesien, Ungarn, Siebenbürgen.
laciniata Mühlbg. (*concatenata* Mchx.), schlitzbliättrige, 4. Kn. f. Nordamerika.
maxima Nutt., größte, 4. Kn. f. Nordamerika.
pinnata Lam. (*heptaphyllos* C. Bauh. Vill.), gefiederte, 4. Kn. f. Süddeutschland, Schweiz, Oberital., Frankr.
polyphylla W. K. (*ochroleuca* Gaud.), vielblättrige, 4. Kn. f. Ungarn, Croatien, Schweiz, Oberitalien.
quinquefolia MB., fünfblättrige, 4. Kn. f. Taurien, Caucasus, Ukraine.
tenella Pursh, zarte, 4. Kn. f. Nordamerika.
trifolia WK., dreiblättrige, 4. Kn. f. Croatien.

Dentella Forst., Zahnling, V. 1., Rubiaceae.

- repens* Forst., kriechender, 4. f. t. Ostind., Neucaledonien.

Deschampsia caespitosa P. B. etc. v. *Aira caespitosa*.

Desmanthus W., Schopflume (Büschelschopf), X. 1.

(XXIII. 1.), Leguminosae-Mimosaceae.

- callistachys DC., schönährige, ♀. w. t. Teneriffa.
 cinereus W., aschgraue, ♀. w. Ostindien.
 diffusus W., ausgebreitete, ♀. w. Südamerika.
 divergens W., divergirende, ♀. w. ? Abyssinien.
 lacustris W., Teich-S., 4. Wa. w. Südamerika.
 leptostachys DC., schlankährige, ♀. w. Guinea.
 natans W., schwimmende, ♂. Wa. w. Ostind., Cochinchina.
 plenus W., volle, ♂. Wa. w. Neuspanien.
 punctatus W., punctirte, ♀. w. Jamaica.
 strictus Berter, steife, ♀. w. Westindien.
 triquetrus W., dreiseitige, 4. Wa. w. Ostindien.
 virgatus W., ruthenförmige, ♀. w. Ostindien.

Desmia Salisb. v. Erica.**Desmochaeta** DC., Bandhaar, V. 1., Aizoideae-Amarantheae.

- atropurpurea DC., dunkelpurpurrothes, 4. ♀. w. Ostind.
 flavescens DC., gelbliches, ♂. ♂. w. m. f. Ostindien.

β) patula R. et S.

- globosa R. et S., kugeliges, ♂. m. f. Ostindien.
 micrantha DC., kleinblumiges, ♂. m. f. Ostind., Mascarenas.
 prostrata DC., gestrecktes, ♀. w. Ostindien, Westafrika.
 tomentosa Spgl., filziges, ♀. w. Ostindien.
 uncinata R. et S., hackiges, ♂. m. f. Ostindien.

alternifolia DC. v. Cladostachys alternifol.

Desmodium Desv. DC., Desmodium, XVII. 1v. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

- acuminatum DC., zugespitztes, 4. f. Nordamerika.
 adscendens DC., aufsteigendes, ♀. w. Jamaica.
 alatum DC., geflügeltes, ♂. w. Ostindien.
 angustifolium DC., schmalblättriges, ♀. w. Mexico.
 Aparines DC., klebkrautähnliches, 4. ♀. w. Mexico.
 asperum Desv., rauhes, 4. ♀. w. ?
 auriculatum DC., geöhrt, ♂. w. Timor.
 bracteatum DC., deckblättriges, 4. f. Nordamerika.
 brasiliense Poir., brasilianisches, ♀. w. Brasilien.
 cajanifolium DC., cajanblättriges, ♀. w. Caracas.
 canadense DC., canadisches, 4. f. Nordamerika.
 canescens DC., grauliches, 4. f. Nordamerika.
 capitatum DC., kopfförmiges, 4. ♀. w. Ceylon.
 cephalotes Roxb., grofsköpfiges, ♀. w. Ostindien.
 ciliare DC., gefranztes, 4. f. Nordamerika.
 cinereum DC., aschgraues, 4. ♀. w. Mexico.
 collinum Roxb., Hügel-D., 4. ♀. w. Ostindien.
 cuspidatum DC., langspitziges, 4. f. Nordamerika.
 diffusum DC., ausgebreitetes, 4. ♀. w. Ostindien.
 diversifolium DC., verschiedenblättriges, 4. ♀. w. Ostind.
 dubium Lindl., zweifelhaftes, 4. ♀. w. Nepal.
 gangeticum DC., Ganges-D., ♂. w. Ostindien.
 glabellum DC., glattes, 4. f. Nordamerika.
 guianense DC., guianisches, ♀. w. Guiana.
 gyrans DC., bewegliches, ♂. w. Ostindien.
 gyroides DC., ähnliches, ♂. w. Ostindien.
 hamosum Roxb., kurzhackiges, ♀. w. Ostindien.
 heterophyllum DC., manchfaltigblättriges, 4. w. Ostind.
 incanum DC., weifsgraues, ♀. w. Jamaica.
 lacteum Boj., milchweisses, ♀. w. Mauritius.
 lasiocarpum DC., wollfruchtiges, ♀. w. Guinea.
 latifolium DC., breitblättriges, ♀. w. China, Ostindien.

Desmodium

- Lechenaultii* DC., Lechenault's, f. w. Ostindien.
Lindleyi Hort., Lindley's, f. w. ?
maculatum DC., geflecktes, $\odot. w.$ Ostindien.
malacophyllum DC., weichblättriges, $4. w.$ Manila.
marilandicum DC., marylandisches, $4. f.$ Nordamerika.
multiflorum DC., vielblumiges, f. w. Nepal.
nudiflorum DC., nacktblumiges, $4. f.$ Nordamerika.
nutans Wall., überhängendes, f. w. Ostindien.
obtusum DC., stumpfes, $4. f.$ Nordamerika.
paniculatum DC., rispiges, $4. f.$ Nordamerika.
pauciflorum DC., wenigblumiges, $4. f.$ Nordamerika.
pseudotriquetrum DC., unächtdreikantiges, f. w. Nepal.
reniforme DC., nierenförmiges, f. w. Ostindien.
retusum D. Don, abgestutztes, f. w. Nepal.
rotundifolium DC., rundblättriges, $4. f.$ Nordamerika.
sagittatum DC., pfeilblättriges, f. w. Ostindien.
serotinum DC., spätes, $4. f. k. ?$
spectabile Boj., ansehnliches, f. w. Mauritius.
spirale DC., spiralförmiges, $4. \text{Sch. w.}$ Jamaica.
stipulaceum DC., zwischenblättriges, $4. w.$ Mexico.
supinum DC., niedriges, f. w. Westindien.
tenellum DC., zartes, $\odot. w.$ Caracas.
tomentosum DC., filziges, $4. t.$ China.
tortuosum DC., gedrehtes, f. w. Jamaica.
triflorum DC., dreiblumiges, $4. w.$ Ostindien.
trigonum DC., dreiseitiges, f. w. Jamaica.
trinervium Fisch., dreinerviges, f. w. ?
triquetrum DC., dreikantiges, f. w. Ostindien.
umbellatum DC., doldiges, f. w. Ostindien.
viridiflorum DC., grünblumiges, $4. f.$ Nordamerika.
sambuense DC. v. *Ototropis sambuenensis*.

Desmoncus Mart., Bandpalme, XXI. VI., Palmae.
americanus Lod., amerikanische, f. w. Westindien.
dubius Lod., zweifelhafte, f. w. Trinidad.

orthacanthus Mart., geradstachelige, f. w. Brasilien.
polyacanthus Mart., vielstachelige, f. w. Brasilien.

Desvauxia RB. (N. A. Desvaux, französischer Botaniker), I. IV., Restiaceae.

Billardieri Ait., Billardier's, $\odot. \text{f. w. t.}$ Neuholland.

Deutzia Thbg. (J. Deutz, Rathsherr zu Amsterdam, Beförderer der Botanik), X. III., Philadelphaeae.

scabra Thbg. (*grandiflora* Hortul.), scharfe, f. t. Japan.

Dianella Lam., Dianelle, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

coerulea Sims, blaue, $4. \text{Kn. t.}$ Neuholland.

congesta RB., gedrängte, $4. \text{Kn. t. w.}$ Neuholland.

divaricata RB., sparrige, $4. \text{Kn. t. w.}$ Neusüdwallis.

laevis RB., glatte, $4. \text{Kn. t. w.}$ Neuholland.

longifolia RB., langblättrige, $4. \text{Kn. t. w.}$ Neuholland.

nemorosa Lam. (*ensifolia* Sims), schwertblättrige, $4.$

Kn. t. w. Ostindien.

revoluta RB. (*strumosa* Ker), zurückgerollte, $4. \text{Kn. t. w.}$ Neuholland.

Dianthus L., Nelke, X. II., Caryophyllaceae.

albens Ait., weißliche, $4. t. k.$ Cap der guten Hoffn.

alpestris Hoppe Stbg., Voralpen-N., $4. f.$ Süddeutsche Alpen.

alpinus L., Alpen-N., $4. f.$ Oesterreich, Steyermark, Sibirien.

Dianthus

- arboreus L., baumartige, ♂. k. Creta.
 Arbuscula Lindl., strauchartige, ♂. k. China.
 arenarius L., Sand-N., 4. f. Nordeuropa.
 Armeria L., Büschel-N., ☉. f. Mitteleuropa.
 armerioides Rafin. (? *carolinianus* Walt.), büschelähnliche,
 ☉. f. Nordamerika.
 Arrostri Presl, Arrosts, 4. f. Süditalien.
 atrorubens All., schwarzrothe, 4. f. Oesterreichisches Li-
 torale, Südtirol, Oberitalien.
 barbatus L., bärtige, 4. f. Süddeutschland, Frankreich.
 β) aggregatus Poir. γ) latifolius W. (*pumilus*
 Hort.). b) flore pleno.
 bicolor MB., zweifarbige, 4. f. Taurien.
 biflorus Sm. (*geminatus* Kit., *furcatus* Hornem., *Horne-*
manni Sering.), zweiblumige, 4. f. Ungarn, Ober-
 italien, Griechenland.
 buchtormensis Ledeb., buchtormische, 4. f. Sibirien.
 caesius Sm., hechtblaue, 4. f. England, Mitteldeutschl.
 campestris MB., Feld-H., 4. f. Podolien, Taurien.
 capitatus DC. (*atrorubens* MB.), kopfförmige, 4. f. Tau-
 rien, Caucasus.
 Carthusianorum L., Karthäuser-N., 4. f. Europa,
 Kleinasien,
 β) vaginatus Vill. b) flore pleno.
 Caryophyllus L., Garten-N., 4. ♂. f. k. Nordfrankreich,
 England, Italien.
 β) clavatus Spgl. b) flore pleno. c) fruticans.
 d) imbricatus.
 caucasicus MB., caucasische, 4. f. Caucasus.
 cephalotes Sering., großköpfige, 4. f. ?
 chinensis L., chinesische, ♂. 4. f. China.
 b) hybridus.
 crenatus Thbg., gekerbte, 4. k. Cap der guten Hoffn.
 Cyri Fisch. et Mey., Cyrus's, ☉. ♂. f. Natolien.
 deltoides L., deltaförmige, 4. f. Europa, Taurien etc.
 β) wolgensis Fisch. et Mey.
 dentatus Fisch., gezähnte, 4. f. Sibirien.
 diffusus Sm., weitschweifige, 4. f. Cyprus.
 discolor Sims, verschiedenfarbige. 4. f. Caucasus.
 diutinus Kit. (*polymorphus* MB.), langblühende, 4. f.
 Ungarn.
 divaricatus Urvill. (*tripunctatus* Sm.), sparrige, 4. f.
 Griechenland.
 ferrugineus L., rostfarbige, 4. f. Calabrien.
 b) sulphureus. Hens.
 fimbriatus MB. (*orientalis* Sims, *contortus* Sm.), gefranzte,
 4. f. Iberien, Sibirien.
 fragrans MB., wohlriechende, 4. f. Caucasus.
 fruticosus L., strauchige, 4. ♂. k. Griechenland.
 furcatus Balb., gabelige, 4. f. Piemont.
 gallicus P. DC., französische, 4. f. Frankreich.
 giganteus Urv., riesenhafte, 4. ♂. k. Griechenland.
 glacialis Haenk., Gletscher-N., 4. f. Salzburg, Kärnthen,
 Tyrol, Schweiz.
 glaucus Huds. Sm., blaugrüne, 4. f. Deutschland, Eng-
 land, Ungarn.
 guttatus MB., getüpfelte, 4. f. Caucasus.
 hirtus Vill., rauhe, 4. f. Südfrankreich.

Dianthus

- hortensis* Schrad., Garten-Feder-N., 4. f. Ungarn, Südfrankreich.
- japonicus* Thbg., japanische, 4. f. b. k. Japan.
- leptopetalus* W. (*pomeridianus* MB., *bicolor* Hornem., *cretaceus* Adam), schlankkronige, 4. f. Caucasus.
- Libanotis* La Bill., Libanon-N., 4. f. k. Libanon.
- Liboschitzianus* Sering. (*petraeus* MB., *bracteatus* W. herb.), Liboschitz's, 4. f. Armenien.
- liburnicus* Barth. Wendl., illyrische, 4. f. Illyrien, Oberitalien.
- ?β) *Balbisii* Sering. (*glaucophyllus* Hornem., *collinus* Balb.).
- longicaulis* Tenor., langstengelige, 4. f. Neapel.
- marginatus* Poir., berandete, 4. f. Südeuropa.
- monadelphus* Vent. (*procumbens* P.), einbrüderige, 4. f. k. Syrien.
- moussespulanus* L. (*erubescens* Trev., *acuminatus* Tausch.), südfranzösische, 4. f. Südeuropa.
- β) *plumosus* Spgl. (*Waldsteinii* Stbg.).
- montanus* MB. (*Fischeri* Spgl.), Berg-N., 4. f. Caucasus.
- neglectus* Lois. (*glacialis* DC., *tener* Balb., ? *nanus* Swt.), übersehene, 4. f. Französische und schweizer Alpen.
- nitidus* Kit., glänzende, 4. f. Ungarn.
- pallidiflorus* Sering. (*pallens* MB.), *ramosissimus* Poir.), blafsblumige, 4. f. Caucasus.
- petraeus* W. Kit., Klippen-N., 4. f. Ungarn, Siebenbürgen.
- b) *grandiflorus*.
- pinifolius* Sm., kieferblättrige, 4. f. k. Griechenland.
- plumarius* L. (*moschatus* Hort., *dubius* Hornem.), Feder-N., 4. f. Oesterreich, Ungarn, Siebenbürgen, Podolien.
- b) *flore pleno*.
- Poiretianus* Sering., Poiret's, 4. f. ?
- b) *flore pleno*.
- pomeridianus* L., nachmittägige, 4. f. Palästina.
- pratensis* MB. (*ochroleucus* Lk.), Wiesen-N., 4. f. Caucasus.
- prolifer* L. (*diminutus* L.), sprossende, 4. f. Europa, Mittelasien.
- prostratus* Jacq., gestreckte, 4. f. k. Cap der gut. Hoffn.
- Pseudarmeria* MB., unächte Büschel-N., 4. f. Taurien.
- pubescens* Sm., weichhaarige, 4. f. Griechenland.
- pulchellus* Schrad., schöne, 4. f. ?
- punctatus* Spgl., punktirte, 4. f. ?
- pungens* L. (*hispanicus* Asso), stechende, 4. f. Spanien.
- pyrenaicus* Bernh., pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.
- rigidus* MB., starre, 4. f. Südrufsländ.
- Rupicola* Bivon. (*Bisignani* Ten.), Felsen-N., 4. f. k. Sicilien, Calabrien.
- ruthenicus* Roem., russische, 4. f. Rufsländ.
- saxatilis* P., Felsen-N., 4. f. Frankreich.
- Seguieri* Vill. (*collinus* Gaud.), Segulier's, 4. f. Mittel- und Südeuropa.
- a) *asper* W. (*scaber* Schlchr., *Courtoisii* Rehb.).
- β) *sylvaticus* Hoppe. γ) *collinus* W. K. δ) *controversus* Gaud. (*Sternbergii* Schlchr.).
- serotinus* Kit., spätblühende, 4. f. Ungarn.
- serratus* Lapeyr., sägezähnige, 4. f. Pyrenäen.
- siculus* Presl., sicilianische, 4. f. Sicilien.
- spinosus* Dsf., stachelige, 4. f. k. Persien.

Dianthus

squarrosus MB. (*arenarius* Pall., *Mussini* Hornem.),
sparrige, 4. f. Caucasus.

strictus Sm., steife, 4. f. Griechenland.

suavis W., starkkriechende, 4. f. ?

suffruticosus W., halbstrauchige, 4. f. Kleinasien.

superbus L., stolze, ♂. f. Europa, Caucasus.

sylvestris Wulf., Wald-N., 4. f. Illyrien, Krain, Kärn-
then, Tyrol, Schweiz.

β) *caryophylloides* Rchb. (*virginicus* Jacq.). γ)

Scheuchzeri Rchb. δ) *frigidus* Hoppe.

umbellatus DC. (*patens* W., *ruthenicus* Hort.), doldige,
4. f. Rußland.

velutinus Guss. (? *ciliatus* Hort.), sammthaarige, ☉. f.
Italien.

versicolor Fisch., hunte, 4. f. Südrußland.

virginicus L., Jungfern-N., 4. f. Südfrankreich.

Willdenowii Lk. (*ibericus* W.), Willdenow's, 4. f.
? Caucasus.

hyssopifolius Hort. et *tauricus* Hort. sind ungewifs.

Diapensia L., Diapensie, V. 1., Ericaceae.

lapponica L., lappländische, 4. f. Lappland, Nordamer.

cuneifolia Pursh. v. *Pyxidanthra* barbulate.

Diarrhena americana P. B. v. *Corycarpus* arundinaceus.**Diascia** Lk., Doppelnapf, XIV. 11., Personatae-Antirrhineae.

Bergiana Lk., Bergius's, ☉. m. f. Cap der gut. Hoffn.

Thunbergiana Spgl., Thunberg's, ☉. m. f. Cap d. g. H.

Diasia DC., Diasie, III. 1., Irideae.

graminifolia DC., grasblättrige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

intermedia (Sw.), mittlere, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

iridifolia DC., irisblättrige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

Diastrophis Fisch. et Mey., Doppelbogen, XV. 111., Cruciferae.

cristata Fisch. et Mey., kammiger, 4. 4. f. b. Armenien.

Dicera Forst., Doppelhorn, XI. 1., Tiliaceae-Elaeocarpeae.

dentata Forst., gezähneltes, 4. t. Neuzeeland.

Diceratium prostratum Lagasc. v. *Notoceras* hispanic.**Dicerma** DC., Doppelblättchen, XVII. 1v. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

biarticulatum DC., zweigliederiges, 4. w. Ostindien.

elegans DC., zierliches, 4. w. China.

pulchellum DC., schönes, 4. w. Ostindien.

Dichilus DC., Doppellippe, XVII. 1v. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

lebeckioides DC., lebeckiaähnliche, 4. t. Cap d. g. H.

Dichoglottis Fisch. et Mey., Doppelzüngelchen, X. 111., Caryophyllaceae-Alsineae.

linearifolia Fisch. et Mey., gleichbreitblättriges, ☉. f.
Gegend des caspischen Meeres.

Dichondra Forst., Doppelkorn, V. 11., Convolvulaceae.

argentea W., silberfarbiges, 4. w. Südamerika.

carolinensis Mchx., carolinisches, 4. t. k. Carolina.

repens Forst., kriechendes, 4. t. w. Neuzeeland, Ja-
maica, Quito, Mascarenas.

sericea Sw., seidenhaariges, 4. w. Westindien, Südamer.

Dichorisandra Mik., Doppelbeutel, VI. 1., Commelineae.

gracilis Mart., schlanker, 4. w. Brasilien.

Dichorisandra

picta Lod., bunter, 4. w. Südamerika.

puberula Mart., feinhaariger, 4. w. Brasilien.

oxypetala Hook., schmalkroniger, 4. w. Brasilien.

thyrsiflora Mik., straußblumiger, 4. w. Brasilien.

Dichosma bifida DC. v. *Agathosma bifida*.

Dichostylis N. E., Zinkengriffel, III. 1., Cyperaceae.

Michelianus N. E., Micheli's, ☉. f. Mittel- u. Südeuropa.

Dichrocephala DC., Doppelköpfchen, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

latifolia DC., breitblättriges, ☉. w. m. f. Ostindien, Java.

sonchifolia DC., gänsedistelblättriges, ☉. f. Caucasus.

Dicksonia L'Her. (J. Dickson, englischer Botaniker), XXIV. 1., Pterioideae.

adiantoides Humb., frauenhaarähnliche, 4. w. Westindien, Südamerika.

arborescens L'Her., baumartige, 4. f. St. Helena.

davallioides RB., davalliaähnliche, 4. w. Neuhollland.

dissecta Sw. (*tenera* Presl), schlitzblättrige, 4. w. Westindien.

pilosiuscula W. (*pubescens* Schk.), weichhaarige, 4. f. Nordamerika.

rubiginosa Kaulf., rostfarbige, 4. w. Brasilien, Westindien.

scandens Loud. suppl., klimmende, 4. Sch. w. ?

antarctica La Bill. v. *Cibotium* Billardieri. *Culcita* L'Her. v. *Balanium* *Culcita*.

Dicliptera Juss., Doppelklappe, II. 1., Acanthaceae.

assurgens Juss., aufsteigende, f. w. Westindien.

bivalvis Juss., ächte, f. w. Ostindien, Arabien.

chinensis Juss., chinesische, 4. w. Ostindien, China, Arabien.

martinicensis Juss., westindische, f. w. Westindien.

pectinata Juss., kamnige, f. w. Ostindien.

peruviana Juss., peruvianische, f. w. Peru.

resupinata Juss., umgekehrte, ☉. w. Südamerika.

retusa Juss., abgestutzte, 4. w. Westindien.

scorpioides Juss., rauhlblättrige, f. w. Westindien.

sexangularis Juss., sechskantige, ☉. w. Jamaica.

verticillaris Vahl, wirtelförmige, f. t. Cap der gut. H. *spinosa* Lod. v. *Barleria lupulina*.

Dicrypta Lindl., Dicrypte, XX. 1., Orchideae.

bicolor Bate, zweifarbig, 4. w. Demerara.

crassifolia Lindl., dickblättrige, 4. w. Brasilien.

iridifolia Bate, schwertelblättrige, 4. w. Trinidad.

Dictamnus L., Diptam, X. 1., Tricoccae-Rutaceae.

angustifolius Swt., schmalblättriger, 4. f. Altai.

Fraxinella P. (*albus* L.), gemeiner, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

a) *ruber*. β) *albus*.

obtusiflorus Koch, stumpfblumiger, 4. f. Südtyrol, Oesterreichisches Litorale.

Didelta L'Her., Didelte, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

carnosum Ait., fleischige, f. t. Cap der guten Hoffn.

cernuum Less., übergebogene, f. t. Cap d. gut. Hoffn.

spinousum L'Her. Ait., feinstachelige, f. t. Cap d. g. H.

Didesmus Desv., Kreuzbändchen, XV. 1., Cruciferae.

aegyptiacus Desv., aegyptisches, ☉. f. Aegypten.

Didesmus

hipinnatus DC., doppeltgefiedertes, ☉. f. Nordafrika.

Didiscus coeruleus DC. v. *Hügelia coerulea*. *Didymocarpus* Rexii Bow. v. *Henckelia* Rexii.

Didymochlaena Desv., Doppelschleierchen, XXIV. 1., Pterioideae.

sinuosa Desv., buchtiges 4. w. Westind., Brasilien, Java.

Diectomis H. B. K., Diectome, III. 11., Gramineae.

fastigiata H. B. K. (P. Beauv.), gipfelständige, 4. w. Westindien, Südamerika.

laxa N. E., lockere, ☉. w. Brasilien.

Dielytra Borkh., Doppelsporn, XVII. 11. (1v.), Papaveraceae-Famariaceae.

bracteosa DC., deckblättriger, 4. f. Nordamerika.

canadensis DC., canadischer, 4. f. Nordamerika.

Cucullaria DC., kappenförmiger, 4. f. Nordamerika.

eximia DC., ausgezeichnet, 4. f. Nordamerika.

formosa DC., schöner, 4. f. Nordamerika.

lachenaliaeflora DC., lachenalienblumiger, 4. f. Sibirien.

speciosa Nois., prächtiger, 4. f. ?

spectabilis DC., ansehnlicher, 4. f. Sibirien.

tenuifolia DC., feinblättriger, 4. f. Kamtschatka, Nordamerika.

Diervilla T. (Dierville, französischer Arzt und Reisender), V. 1., Caprifoliaceae.

canadensis W. (*Tournefortii* Mchx., *humilis* P., *lutea* Pursh., *trifida* Mchx., *arcadiensis* Duh.), canadische, 4. f. Nordamerika.

Dietes Salisb., Dietes, III. 1., Irideae.

bicolor Swt., zweifarbige, 4. t. Neuhollland.

catenulata Swt., kettenförmige, 4. w. Madagascar.

iridioides Swt., irisähnliche, 4. t. k. Cap d. gut. Hoffn.

Digitalis T., Fingerhut, XIV. 11., Personatae-Antirrhineae.

aurea Lindl. (*ferruginea* Sm.), goldfarbiger, 4. f. Griechenland, Kleinasien.

eristachya Fisch., wollähriger, ♂. f. Südrussland.

ferruginea L., rostfarbiger, ♂. f. Oesterreichisches Littorale, Italien, Caucasus.

fulva Lindl., braungelber, 4. f. ?

fuscescens W. Kit., bräunlicher, 4. f. Ungarn, Croatien.

grandiflora Lam. (*ambigua* Murr.), großblumiger, 4. f. Mitteleuropa.

laevigata W. Kit., glatter, ♂. f. Krain, Croatien.

lanata Ehrh. (*Winterli* Roth), wolliger, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen, Sicilien.

leucophaea Sm., weißlicher, 4. f. Griechenland.

lutea L., gelber, ♂. 4. f. Süddeutschland, Schweiz, Italien, Frankreich.

lutescens Lindl., gelblicher, 4. f. ?

media Roth (*intermedia* P., *ambiguo-lutea* Mey.), ♂. f. Westdeutschland.

micrantha Roth (*australis* Ten.), kleinblumiger, 4. f. Süditalien, ? Schweiz.

minor L., kleiner, 4. f. Spanien.

obscura L., dunkler, ♂. k. Spanien.

ochroleuca Jacq. (*ambigua* Schk.), weißgelber. 4. f. Deutschland.

orientalis Lam., morgenländischer, 4. f. Kleinasien.

Digitalis

parviflora Jacq., kleinblumiger, 4. f. ?

purpurascens Roth (*erubescens* Ait., *longiflora* Lej., *purpureo-lutea* Mey.), purpurfarbiger, ♂. Westdeutshl. *purpurea* L., gemeiner, ♂. f. Europa.

b) *alba*.

rigida Lindl., starrer, 4. f. ?

Thapsi L., wollkrautähnliche, ♂. 4. f. Spanien.

tomentosa Lk. (*Thapsi* Brot.), filziger, ♂. 4. f. Portugal.

tubiflora Lindl., röhrenblumiger, 4. f. ?

viridiflora Lindl., grünblumiger, ♂. 4. f. Griechenland.

canariensis L. et *Sceptrum* L. v. *Isoplexis cana-*

riensis et *Sceptr. glutinosa* G. v. *Rehmannia chi-*

nensis.

Digitaria Scop. Hall., Fingergras, III. II., Gramineae.

aegyptiaca W., ägyptisches, ☉. f. Aegypten.

affinis R. et S., ähnliches, ☉. f. w. Südamerika.

barbata W., bärtiges, ☉. f. w. Ostindien.

bicornis R. et S., zweihörniges, ☉. f. w. Ostindien.

biformis W., mascarenisches, ☉. f. w. Mascarenas.

brevifolia Lk., kurzblättriges, ☉. f. w. Mexico.

ciliaris W. (*commutata* Schult.), gefranztes, ☉. f. Mittel- und Südeuropa, Asien, Ost- und Westindien.

denudata Lk., kahles, ☉. f. ?

domingensis R. et S. (*repens* H. Par.), westindisches, ☉. f. w. Westindien.

erigona Schrad., wollkantiges, ☉. f. w. ?

fascicularis Schrad., büschelförmiges, ☉. f. ?

filiformis Mühlbg. (? *villosa* P.), fadenförmiges, ☉. f. Nordamerika.

fimbriata Lk., gefranztes, ☉. f. w. Brasilien.

horizontalis W. (*setigera* Roth), wagerechtes, ☉. f. w. Südamerika, Westindien, Madeira.

humifusa P. (*glabra* R. et S., *filiformis* Koel.), niedergestrecktes, ☉. f. Europa.

inaequalis Spgl. Lk., ungleiches, ☉. f. w. Manila.

linearis P., schmalähriges, ☉. f. w. Ost- u. Westindien.

marginata Lk., gerandetes, ☉. f. w. Brasilien.

mollissima Schrad., weiches, ☉. f. ?

paspaloides Mchx. (*foliosa* Lag.), paspalumähnliches, ☉. f. Nordamerika, Cuba.

puberula Lk., feinhaariges, ☉. f. w. ?

Roxburghii Spgl., Roxburgh's, ☉. f. w. Ostindien.

sanguinalis Scop., gemeines, ☉. f. Europa, Nordamer. etc.

β) *praecox* W.

undulata Schrk., welliges, ☉. f. w. Südamerika.

violascens Lk., violette, ☉. f. w. Brasilien.

stolonifera Schrad. v. *Cynodon Dactylon*.

Digraphis colorata Trin. v. *Phalaris* (Baldingera) arundinacea.**Dilatris** L., *Dilatris*, III. I., Narcisseae-Haemodoraceae.

corymbosa Thbg. (*umbellata* L.), doldentraubige, 4. t.

Cap der guten Hoffnung.

paniculata Thbg., rispige, 4. t. Cap der guten Hoffn.

viscosa Thbg., schmierige, 4. t. Cap der guten Hoffn.

Dillenia L. (J. J. Dillen, berühmter deutscher Botaniker), XIII. VI.

speciosa Thbg. (*indica* L.), prächtige, f. w. Ostindien.

dentata Thbg. v. *Wormia dentata*. *pentagyna* Roxb.

v. *Colbertia coromandeliana*. *scandens* W. (*volubilis* Vent., *speciosa* Curt.) v. *Hibbertia volubilis*.

Dillwynia Sm. (L. W. Dillwyn, englischer Botaniker),

X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

acicularis Sieb., nadelblättrige, ♀. t. Neuholland.

cinerascens RB., grauliche, ♀. t. Neusüdwallis.

ericaefolia Sm., heideblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

floribunda Sm., blüthenreiche, ♀. t. Neusüdwallis.

glaberrima Sm., glatte, ♀. t. Neusüdwallis.

glycinifolia Sm., glycinenblättrige, ♀. t. Neuholland.

juniperina Lod. (? Sbr.), wachholderähnliche, ♀. t. Neuholland.

parvifolia RB., kleinblättrige, ♀. t. Neuholland.

phylicoides Cun., phylicaähnliche, ♀. t. Neuholland.

rudis Sbr., rauhe, ♀. t. Neuholland.

β) *brevifolia*. γ) *teretifolia*. δ) *hispidula*.

sericea Cun., seidenhaarige, ♀. t. Neuholland.

tenuifolia Sbr., feinblättrige, ♀. t. Neuholland.

myrtifolia Sm. (*obovata* La Bill.) v. *Eutaxia myrtifol.*

pungens Mack. Cat. v. *Eutaxia pungens*.

Dimocarpus Litchi Lour. et *Longan* Lour. vid. *Euphoria Litchi* etc.

Dimorpha grandiflora W. v. *Parivoa grandiflora*.

Dimorphotheca Vaill., Mch., Wechselsame, XIX. iv.,
Compositae-Corymbiferae.

aurantiaca DC., orangefarbener, ♀. t. Cap d. g. H.

chrysanthemifolia DC., goldblumenblättriger, ♀. t. Cap
der guten Hoffnung.

cuneata DC., keilblättriger, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

fruticosa DC., strauchiger, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

graminifolia DC., grasblättriger, 4. t. Cap d. g. H.

hybrida DC. (*incrassata* Mch.), Bastard-W., ☉. f. m.
Cap der guten Hoffnung.

nudicaulis DC., nacktstengeliger, ☉. f. m. Cap d. g. H.

pluvialis Mch., Regen-W., ☉. f. m. Cap d. g. Hoffn.

sinuata DC., buchtiger, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

Tragus DC., Bocks-W., ♀. t. Cap der guten Hoffn.

Dineba Delil. (*Dinebra* Auct.) (arabischer Name), III.
II., Gramineae.

aegyptiaca Del. (*arabica* P. B.), aegyptische, ☉. f. Ae-
gypten, Arabien, Persien, Indien.

curtipendula DC. v. *Atheropogon apludoides*. Lima
P. B. v. *Wangenheimia* Lima.

Dinetus Swt., Rispwinde, V. 1., Convolvulaceae.

paniculata Swt., ostindische, ☉. Sch. w. Ostindien.

racemosa Swt., nepal'sche, ☉. Sch. f. Nepal. . .

Dioclea Spgl., Diocles Carystinus, alter griechischer
Arzt und Kräuterkenner), V. 1., Asperifoliaceae.

hispidissima Spgl., hackerige, ☉. ♂. f. Aegypten.

Dioclea mollis DC. et *sericea* Kunth. vid. *Hymenospron*
molle et seric.

Diodia L., Diodia, IV. 1., Rubiaceae.

prostrata Sw., gestreckte, ♀. w. Westindien.

sarmentosa Sw., starkwurzelnde, ♀. w. Westindien.

verticillata Vahl, wirtelförmige, 4. w. Westindien.

virginica L., virginische, 4. f. Virginien.

Diomedea Cass., Diomedea, XIX. vi., Compositae-
Corymbiferae.

argentea H. B. K., silberfarbiger, ♀. t. w. Südamerika.

bidentata Cass., zweizählige, ♀. t. w. Westindien.

glabrata H. B. K., glatte, ♀. t. w. Südamerika.

Dionaea Ell., Fliegenfänger, X. 1., Cistineae-Drosereae.

Muscipula L., wunderbarer, 4. k. t. Carolina.

Dioscorea L., Yamswurzel, XXII. VI. (VI. III.), Asparagineae-Dioscoreae.

aculeata L., stachelige, 4. Kn. w. Ostindien.

alata L., geflügelte, 4. Kn. w. Ostindien, Molucken.

altissima Lam. (*martinicensis* Spgl.), höchste, 4. Kn. w. Martinique.

anguina Roxb., Schlangen-Y., 4n. w. Ostindien.

angustifolia Lam., schmalblättrige, 4. Kn. w. Peru.

atropurpurea Roxb., dunkelpurpurrothe, 4. Kn. w. Ostind.

brasiliensis W., brasilianische, 4. Kn. w. Brasilien.

bulbifera L., knollige, 4. Kn. w. Ostindien, Neuholl.

cinnamomifolia Hook., zimtblättrige, 4. Kn. w. Brasil.

coriacea Humb., lederblättrige, 4. Kn. w. Quito.

crispata Roxb., krause, 4. Kn. w. Ostindien.

fasciculata Roxb., büschelförmige, 4. Kn. w. Ostindien.

glabra Roxb., glatte, 4. Kn. w. Ostindien.

globosa Roxb., kugelige, 4. Kn. w. Ostindien.

heterophylla Roxb., verschiedenblättrige, 4. Kn. w. Ostind.

leonensis G. Don, leonische, 4. Kn. w. Sierra Leone.

nepalensis Swt., nepal'sche, 4. Kn. w. Sierra Leone.

Nummularia Lam., nummularienähnliche, 4. Kn. w. Molucken.

oppositifolia L., gegenblättrige, 4. Kn. w. Ostindien.

pentaphylla L., fünfblättrige, 4. Kn. w. Ostind., Molucken.

piperifolia Humb., pfefferblättrige, 4. Kn. w. Südamer.

pulchella Roxb., schöne, 4. Kn. w. Ostindien.

purpurea Roxb., purpurfarbige, 4. Kn. w. Ostindien.

quaternata Walt., vierblättrige, 4. Kn. f. Nordamer.

quinqueloba Thbg., fünfflappige, 4. Kn. t. k. Japan.

rubella Roxb., röthliche, 4. Kn. w. Ostindien.

sativa L., ächte, 4. Kn. w. Ostindien, Molucken.

scabra Humb., scharfe, 4. Kn. w. Südamerika.

trifida L. suppl., dreispaltige, 4. Kn. w. Surinam, Trinid.

trifoliata Humb., dreiblättrige, 4. Kn. w. Caracas.

triphylla L., dreizählige, 4. Kn. w. Ostind., Molucken.

villosa L., zottige, 4. Kn. f. Nordamerika.

Diosma Berg., Göttergeruch, V. 1., Tricoccae-Rutaceae.

ambigua Bartl. et Wendl., zweifelhafter, 4. t. C. d. g. H.

? *corymbosa* Mont., traubendoldiger, 4. t. Cap d. g. H.

cupressina L. (*dichotoma* Berg.), cypressenartiger, 4. t.

Cap der guten Hoffnung.

ericoides L., heideähnlicher, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

glabrata G. F. W. Meyer (? *aspalathoides* Lam.), glatter, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

hirsuta L., rauhhaariger, 4. t. Cap der guten Hoffn.

longifolia Wendl. (*tenuifolia* W., *linifolia* Hort.), langblättriger, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

oppositifolia L. (*pectinata* Thbg. W., *subulata* Wendl., ? *pinifolia* Fisch.), gegenblättriger, 4. t. Cap d. g. H.

ramosissima Bartl. et Wendl. (*cupressina* Lam.), starkästiger, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

rubra L. (*ericifolia* Andr.), rother, 4. t. Cap d. g. H.

scabra Lam. (*succulenta* Wendl., Willd., Lk.), scharfer, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

scoparia Lod., besenartiger, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

? *sphaerocephala* Lod., kugelblumiger, 4. t. Cap d. g. H.

succulenta Berg. (*rigidula* W. *tetragona* Hortul.), saftiger, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

Diosma

- ?tenella Lodd., zarter, f. t. Cap der guten Hoffnung.
 ?teretifolia Lk. (*ferulacea* H. Kew.), rundblättriger, f. t. Cap der guten Hoffnung.
 ?ulicina Lodd., stechginsterähnlicher, f. t. Cap d. g. H.
 virgata Meyer, ruthenförmiger, f. t. Cap d. g. Hoffn.
 alba Thbg. (et *angustifolia* Hort.) vid. Coleonema album et pulchrum. amoena Ker v. Adenandra amoena etc. barbiger L. suppl. v. Macrostylis barbiger. betulina Thbg. etc. vid. Barosma betulina etc. bifida Jacq., bruniodes Lk. etc. v. Agathosma bifida, cuspidata etc. capitata L. v. Audouinia capitata. cuspidata Thbg. (et *deusta* Thbg.) v. Limonia cuspidata etc. glandulosa Hort. (*orbicularis* Hort.) v. Barosma ovata. glomerata Mey. vid. Euchaetis glomerata. hirta Vent. v. Agathosma Ventenatiana. hispida Hortul. vid. Agathosma Cerefolium. mixta H. Kew. (acuta Lee) v. Agathosma cuspidata. myrtifolia Hort. angl. v. Agathosma ciliata. obtusata Thbg. (et *tetragona* L. fil.) v. Acmadenia obtusata etc. purpurea Hort. (rubra Hort.) vid. Agathosm. villosa. rugosa H. angl. v. Agathosma laxa. speciosa Sims v. Adenandra umbellata. virgata Hortul. v. Agathosma imbricata β .

Diospyros L., Dattelpflaume, VIII. I. (XXIII. II.), Sapotaceae-Ebenaceae.

- Chloroxylon Roxb., Grünholz-D., f. w. Ostindien.
 cordifolia Roxb., herzblättrige, f. w. Ostindien.
 discolor W., verschiedenfarbige, f. w. Philippinen.
 Ebenaster Retz, Ebenaster-D., f. w. Bengalen.
 Ebum Retz, Ebenholz-D., f. w. Ceylon, Madagascar.
 edulis Lod., wohlschmeckende, f. w. Ostindien.
 Embryopteris P., kleberige, f. w. Ostindien.
 hirsuta L. suppl., rauhhaarige, f. w. Ceylon.
 Kaki L., suppl., japanische, f. k. Japan.
 lobata Lour., gelappte, f. t. China, Cochinchina.
 Lotus L., gemeine, f. f. b. k. Südeuropa, Nordafrika.
 lucida Lod., glänzende, f. f. b. Nordamerika.
 lycioides Dsf., bocksdornähnliche, f. k. t. ?
 Mabola Roxb., Mabola-D., f. w. Philippinen.
 Melanoxylon Roxb., Schwarzholz-D., f. w. Ostindien.
 montana Roxb., Berg-D., f. w. Ostindien.
 obovata Jacq. (*tetrasperma* Sw., *revoluta* Poir.), verkehrteiförmige, f. w. Westindien.
 pubescens Pursh, weichhaarige, f. f. b. Nordamerika.
 reticulata W., netzförmige, f. w. Mascarenas.
 rugulosa RB, runzelige, f. t. Neuholland.
 sylvatica Roxb., Wald-D., f. w. Ostindien.
 vaccinioides Hook., heidelbeerähnliche, f. t. China.
 virginiana L., virginische, f. f. b. Nordamerika.
- Diotis Schreb., Doppelohr, XXI. IV., Aizoideae-Atripliceae.**
 ceratoides W., gehörntes, f. f. Mähren, Oesterreich, Caucasus, Armenien, Sibirien etc.
 atriplicoides MB. (*atriplicina* Sogl.) v. Halimus pendunculatus. candidissima Dsf. v. Otanthus maritimus.
- Diphaca Lour., Doppellinse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.**
 cochinchinensis Lour., cochinchinesische, f. w. China, Cochinchina.

- Diphylleja** Mchx., *Diphylleja*, VI. I., Berberideae.
cymosa Mchx., afterdoldige, 4. Kn. f. Nordamerika.
- Diphysa** Jacq., *Diphysa*, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
carthagenensis Jacq., *carthaginensis* Sche. f. w. Carthager.
- Diplachne** P. Beauv., Büschelgras, III. II., Gramineae.
fascicularis P. B., nordamerikanisches, 0. f. Nordamer.
fusca P. Beauv., braunes, ♂. f. Aegypten, Palästina.
serotina Lk., spätblühendes, 4. f. Südeuropa.
- Diplacus** Nutt., *Diplacus*, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.
puniceus Nutt., hochrother, 4. f. k. Californien.
- Diplasia** Rich., *Diplasie*, III. I. (VI. II.), Cyperaceae.
karataefolia P., ananasblättrige, 4. w. Guiana.
- Diplazium** Sw., Aderfarn, XXIV. I., Pterioideae.
acuminatum Radd., zugespitzter, 4. w. Brasilien.
arborescens, Sw., baumartiger, f. w. Mascarenas.
auriculatum Kaulf., geöhrt, f. w. Neugranada, Brasil.
castaneaefolium Sw., kastanienblättriger, 4. w. Guinea.
esculentum Sw., genießbarer, 4. w. Ostindien.
grandifolium Sw., großblättriger, 4. w. Jamaica.
juglandifolium Sw., nußblättriger, 4. w. Jamaica.
malabaricum Spgl., malabarischer, 4. w. Ostindien.
plantagineum Sw., wegrittblättriger, 4. w. Westindien, Brasilien.
serampurens Spgl., serampur'scher, 4. w. Ostindien.
pulcherrimum Radd. v. *Didymochlaena sinuosa*.
- Diplocoma** D. Don, Doppelschopf, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
villosa D. Don, zottiger, 4. f. Mexico.
- Diplolepis** RB. v. *Sonninia*.
- Diplolaena** Dsf. RB., *Diplolaena*, X. I., Tricoccae-Rutaceae.
Dampieri Dsf. Dampier's, f. t. Westl. Neuholland.
grandiflora Dsf., großblumige, f. t. Westl. Neuholland.
- Diplonyx** Rafin., Spornflügel, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
elegans Raf., zierlicher, f. Sch. k. Louisiana.
- Diplopappus** DC. Cass. v. *Aster*, V.
- Diplopeltus** Endl., Doppelschild, ? VIII. I., Sapindaceae.
Hügelii Endl., Hügel's, f. t. Neuholl. (Schwanenfluß).
- Diplophyllum** Lehm., Doppelblatt, II. I., Personatae-Veroniceae.
veronicaeforme Lehm., ehrenpreisähnliches, 0. f. Caucas.
- Diplostephium** Cass. v. *Aster* VI.
- Diplotaxis** DC., Mauersenf, XV. III., Cruciferae.
Barrelieri DC., Barrelier's, 0. f. Südfrankr., Spanien.
catholica DC., spanischer, 0. f. Calab., Spanien, Portug.
crassifolia DC., dickblättriger, 0. f. Sicilien.
erucoides DC., rankenähnlicher, 0. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.
hispidula DC., hackeriger, 0. f. Aegypten, Syrien.
muralis DC., gemeiner, 0. f. England, Schweiz, Nord- und Süddeutschland.
pendula DC., hängender, 0. f. Nordafrika.
saxatilis DC., steiniger, 4. f. Südeuropa.
tenuifolia DC., feinblättriger, 0. f. Mittel- u. Südeuropa.
viminea DC., schlanker, 0. f. Frankreich, Italien.
virgata DC., ruthenförmiger, 0. f. Spanien.

- Diplothemium** Mart., Doppelscheide, XXI. ix. (XIII. III.), Palmae.
 campestre Mart., Feld-D., ♀. w. Brasilien.
 maritimum Mart., Seestrands-D., ♀. w. Brasilien.
- Dipodium** RB., Dipodium, XX. i., Orchideae.
 punctatum RB., punctirtes, 4. w. Neuholland.
- Dipsacus** Vaill., Karden, IV. i., Dipsaceae.
 ferox Lois., wilde, ♂. f. Südeuropa.
 fullonum Mill., gemeine, ♂. f. England, Südeuropa.
 Gmelini MB., Gmelin's, ♂. f. Caucasus.
 inermis Wall. (*mitis* D. Don), unbewehrte, ♂. f. Nepal.
 laciniatus L. (? *divaricatus* Presl.), schlitzbblätterige, ♂. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa, Persien.
 pilosus L., behaarte, ♂. f. Europa.
 strictus D. Don (*inermis* a Wall.), steife, ♂. f. Nepal.
 sylvestris Mill., wilde, ♂. f. Europa.
- Dipteracanthus** N. E., Flügelklau, XIV. II., Acanthaceae.
 Schauerianus N. E., Schauer's, ♀. w. Brasilien.
 strictus N. E., steifer, 4. k. Carolina.
 viscidulus N. E., schmieriger, ♀. w. Brasilien.
- Dipterix** Schreb., Tonkabohne, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Caesalpineae.
 odorata W., wohlriechende, ♀. w. Guiana.
- Dipterocoma** Fisch. et Mey., Flügelschopf, XIX. i., Compositae-Cichoriaceae.
 pusilla Fisch. et Mey., niedriger, ☉. f. Nordpersien.
- Dirca** L., Lederholz, VIII. i., Thymeleaceae.
 palustris L., Sumpf-L., ♀. f. Virginien.
- Disa** Berg., Disa, XX. i., Orchideae.
 chrysostachya Sw., goldährige, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.
 cornuta Sw., gehörnte, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.
 draconis Sw., buntaderige, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.
 ferruginea Sw., rostfarbige, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.
 flexuosa Sw., gebogene, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.
 grandiflora L. suppl., großblumige, 4. Kn. t. w. Cap der guten Hoffnung.
 lacera Sw., schlitzbblumige, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.
 prasinata Ker, grünblumige, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.
- Disandra** L., Disandra, VII. i., Personatae-Antirrhoneae.
 prostrata L., gestreckte, 4. k. Nordafrika, Madeira.
- Dischidia** RB., Spaltkrone, V. II, Asclepiadeae.
 bengalensis Coleb., bengalische, 4. ♀. w. Bengalen.
 Nummularia RB., rundblättrige, 4. w. Amboina, Neuholl.
- Disemma** La Bill., Doppelkrone, XVI. II., Passifloreae.
 adiantifolia DC., frauenhaarblättrige, ♀. 4. Sch. w. Norfolkinseln.
 Herbertiana DC., Herbert's, ♀. 4. Sch. w. Neuholland.
- Disperis** Sw., Disperis, XX. i., Orchideae.
 capensis Sw., capische, 4. Kn. t. Cap d. gut. Hoffn.
 cucullata Sw., kappenförmige, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.
 secunda Sw., einseitige, 4. Kn. t. w. Cap d. g. H.
- Disporum** Salisb., Lochlilie, VI. i., Coronariae-Colchicaceae (*Melanthaceae*).
 fulvum Salisb., gelbbraune, 4. t. China.
 parviflorum D. Don, kleinblumige, 4. t. Nepal.
- Dissolena** Lour., Doppelröhre, V. i., Contortae-Apocynaceae.
 verticillata Lour., wirtelförmige, ♀. w. t. China.

- Distreptus** Cass., Drehdosten, XIX. V., Compositae-Eupatorieae.
 spicatus Cass., ährenförmiger, 4. w. Jamaica.
- Diuris** Sm., Schweifstendel, XX. I., Orchideae.
 aurea Sm. (*spathulata* Sw.), goldfarbiger, 4. t. w. Neuholl.
 maculata Sm., gefleckter, 4. Kn. t. w. Neuholland.
 pedunculata RB., gestielter, 4. Kn. t. w. Neuholland.
 sulfurea RB., schwefelgelber, 4. Kn. t. w. Neuholland.
- Dodartia** L. (D. Dodart, französischer Akademiker und Botaniker), XIV. II., Personatae-Antirrhineae.
 orientalis L., morgenländische, 4. f. Kleinasien, Caucasus, Südsibirien.
- Dodecatheon** L., Götterblume, V. I., Primulaceae.
 frigidum Chamiss., nördlichste, 4. Westl. Nordamerika.
 integrifolium Mchx., ganzblättrige, 4. f. Nordamerika.
 Meadia L., virginische, 4. f. Nordamerika.
 a) albiflorum Swt. b) elegans Swt. c) giganteum Swt. d) lilacinum Swt.
- Dodonaea** L. (Rembert Dodoens [*Dodonaeus*], alter berühmter holländ. Botaniker), VIII. I., Sapindaceae.
 angustissima Hortul., schmalblättrige, ♀. t. ?
 asplenifolia Rudg., strichfarnblättrige, ♀. t. Neuholl.
 attenuata Cun., verdünnte, ♀. t. Neuholland.
 bialata H. B. K., zweiflügelige, ♀. w. Neugranada.
 Burmanniana DC. (*angustifolia* Roxb.), Burmann's, ♀. w. Ostindien.
 ceratocarpa Lindl., hornfrüchtige, ♀. t. ? Neuholland.
 cuneata Sm., keilförmige, ♀. t. Neuholland.
 dioica Roxb. (*heterophylla* Hort.), zweihäusige, ♀. w. Ostind.
 elaeagnoides Rudg., oleasterähnliche, ♀. w. St. Domingo.
 filiformis Lk., fadenförmige, ♀. t. ?
 jamaicensis DC. (*viscosa* Cav., *angustifolia* Sw.), westindische, ♀. w. Jamaica.
 laurina Sbr. (*laurifolia* Lour.), lorbeerblättrige, ♀. t. Neuholland.
 microcarpa DC., kleinfrüchtige, ♀. w. Mascarenas.
 oblongifolia Lk., länglichblättrige, ♀. t. Neuholland.
 paulliniaefolia Cunn., paullinienblättrige, ♀. t. Neuholl.
 pinnata Sm., gefiederte, ♀. t. Neuholland.
 salicifolia DC. (*angustifolia* Lam.), weidenblättrige, ♀. t. Neuholland.
 scabra Lod., scharfe, ♀. t. Neuholland.
 spathulata Sm., spatelblättrige, ♀. t. Australien.
 triquetra Andr., dreiseitige, ♀. t. Neuholland.
 truncata Lod., abgestutzte, ♀. t. Neuholland.
 viscosa L., schmierige, ♀. t. Westindien, Westafrika.
- Doemia** RB. (*Daemia* et *Dimia* Auctor, arabischer Name), V. II., Asclepiadeae.
 bicolor Swt., zweifarbig, ♀. Sch. w. Ostindien.
 cordata RB., herzblättrige, ♀. Sch. w. Arab., Aegypt.
 extensa RB., ästige, ♀. Sch. w. Ostindien.
 scandens G. Don, steigende, ♀. Sch. w. Gambia.
- Dolichonemia** speciosa N. E. v. Moldenhawera floribunda.
- Dolichos** L., Faseole, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
 angulosus DC., kantige, ☉. f. Nordamerika.
 biflorus L., zweiblumige, 4. Sch. w. Ostindien.
 capensis L., capische, 4. Sch. t. Cap d. g. Hoffn.
 Catiang L., schmalfrüchtige, ☉. w. Ostindien.
 chinensis L., chinesische, ☉. Sch. f. Ostindien, Java.

Dolichos

frutescens Hamilt., strauchige, ♀. t. Nepal.
gangeticus Roxb., Ganges-F., 4. Sch. w. Ostindien.
heterophyllus Horn., verschiedenblättrige, ☉. Sch. f.
 Canarische Inseln.

hirsutus Thbg., rauhhaarige, ♀. Sch. t. Japan.

Jacquini DC., Jacquin's, ♀. Sch. w. Südamerika.

lignosus L., holzige, ♀. Sch. w. Molucken.

lobatus W., gelappte, ☉. Sch. f. Cap der guten Hoffn.

Lubia Forsk., *Lubia*-F., ☉. f. m. Aegypten.

luteus Sw., gelbe, ♀. Sch. w. Jamaica.

melanophthalmus DC., schwarze, ☉. Sch. f. Italien.

monachalis Broter., Mönchs-F., ☉. f. Spanien, Portugal.

pilosus W., haarige, ☉. Sch. w. Ostindien.

reticulatus Ait., netzförmige, ♀. Sch. t. Neusüdwallis.

sesquipedalis L., langhülsige, ☉. Sch. w. Westindien.

setaefolius Boj., borstenblättrige, ♀. Sch. w. Mauritius.

sphaerospermus DC., kugelsamige, ☉. w. Jamaica.

tetraspermus W., viersamige, 4. Sch. w. Ostindien.

tranquebaricus Jacq., tranquebarische, ☉. Sch. w. Ostind.

unguiculatus L. Jacq., hackenhülsige, ☉. Sch. w. Ost-
und Westindien.

vexillatus H. B. K., großsfahnige, ☉. w. Sch. West-
indien, Südamerika.

albus Lour., *bengalensis* Jacq., *cultratus* Thbg. (et
Lablab L. et *purpureus* L.) etc. v. *Lablab* peren-
 nans beng. cultrat. vulgaris etc. *bulbosus* L. v.
Pachyrhizus angulatus. *ensiformis* L. etc. v. Cana-
 valia ensiform. etc. *luteolus* Jacq. v. *Vigna* glabra.
minimus L. (et *scarabaeoides* L. etc. v. *Rhynchosia*
 minima etc. *mollis* Jacq. v. *Hymenospron* moll.
polystachys L. v. *Phaseolus* perennis, *polystachyus*
 Thbg. v. *Wistaria* floribunda. *psoraleoides* Lam.
 (*fabaeformis* L'Her.) v. *Cyamopsis* psoral. *Soja* L.
 v. *Soja* hispida. *tetragonolobus* L. v. *Psophocarpus*
tetragonol. *urens* L. v. *Mucuna* *urens*.

Doliocarpus Roland., Schlingbeere, XIII. r., Dilleniaceae.

Calinea J. F. Gmel., guianische, ♀. Sch. w. Guiana.

Dombeya Cav. (J. Dombey, französischer Botaniker und
 Reisender), XVI. VII., Malvaceae-Dombeyaceae.

cannabina Humb. Bonpl., hanfähnliche, ♀. w. Mauritius.

cordifolia DC., herzblättrige, ♀. w. Ostindien.

ferruginea Cav., rostfarbige, ♀. w. Mascarenas.

ovata Cav., eiförmige, ♀. w. Mascarenas.

punctata Cav., punktirte, ♀. w. Mascarenas.

tiliaefolia Cav., lindenblättrige, ♀. w. Mascarenas.

Dombeya Lam. v. *Araucaria*. *Dombeya lappacea* L'Her. v.
Tourrettia lappacea.

Donax arundinaceus P. B. v. *Arundo* *Donax*. *borealis* Trin.
 (*festucaceus* P. B.) v. *Scolochloa festucacea*. *tenax*
 P. B. v. *Ampelodesmos* *ten*.

Dondia, *Epipactis* Spgl. v. *Hacquetia* *Epipactis*.

Donia ciliata Nut., *glutinosa* RB., *squarrosa* Pursh. v. *Grin-*
delia ciliata etc. *Donia punicea* G. Don v. *Clianthus*
puniceus.

Doodia RB. (Samuel Doody, englischer Botaniker),
 XXIV. r., Pterioideae.

aspera RB., rauhe, 4. t. w. Neusüdwallis.

caudata RB., geschwänzte, 4. t. w. Neuholland.

Doodia

maxima J. Bevis, größte, 4. t. w. Neuholland.

media RB., mittlere, 4. t. w. Neuholland.

Dorema G. Don, Gummidolde, V. II. Umbelliferae.

armeniaceum G. Don, armenische, ♂. 4. f. b. k. Armenien.

glabrum Fisch. et Mey., glatte, 4. f. b. Armenien.

Doronicum T., Gemswurz, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

altaicum Pall., altaische, 4. f. Altai.

austriacum Jacq., österreichische, 4. f. Mittel-, ost- und westeuropäische Alpen.

caucasicum MB. (*orientale* Adams), caucasische, 4. f. Caucasus, mitteleuropäische Alpen, Südtalien.

β) *Columnae* Tenor. (*cordifolium* Stbg.).

dentatum Lk. (*plantagineum* W.), gezähnte, 4. f. ?

macrophyllum Fisch., großblättrige, 4. f. Sibirien, Cauc.

oblongifolium DC. (*plantagineum* C. A. Meyer), 4. f. Ostcaucasus.

Pardalianches L., gemeine, 4. f. Mitteleuropa.

β) *latifolium* Clus. Rchb. (*Matthioli* Tausch.).

plantagineum L., wegrittblättrige, 4. f. Frankreich, Spanien, Portugal.

scorpioides W., gegliederte, 4. f. Mittel-, süd- und westeuropäische Alpen.

Bellidiastrum L. v. *Bellidiastrum* Michellii. *mexicanum* Cerv. (*villosum* Sessé) v. *Diplocoma villosa*. *peruvianum* Lam. v. *Werneria peruviana*.

Dorstenia Plum., *Dorstenia*, IV. I. (XXI. IV.), Urticaceae.

arifolia Lam., arumblättrige, 4. w. Brasilien.

brasiliensis Lam., brasilianische, 4. w. Brasilien.

ceratosanthes Lod., hornblumige, 4. w. Südamerika.

Contrayerva L., wurmtreibende, 4. w. Westind., Südamer.

cordifolia Lam., herzblättrige, 4. w. Westind., Südamer.

Drakenia L., drakenische, 4. w. Neuspanien.

Houstonii L., Houston's, 4. w. Südamerika.

tubicina R. et P., röhrlige, 4. w. Peru, Trinidad.

Doryanthes Correa RB., Spießblume, I. I., Bromeliaceae.

excelsa Corr., hohe, 4. t. Neuholland.

Dorycnium T., *Dorycnium*, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

herbaceum Vill. (*intermedium* Ledeb., *sabaudum* Rchb.), krautartiges, 4. f. Süd- und Osteuropa.

latifolium W. M. B. (*ibericum* W.), breitblättriges, 4. f. f. Taurien, Caucasus.

rectum Sering., gerades, f. f. k. Südeuropa.

suffruticosum Vill. (*monspeliense* W., *pentaphyllum* Rchb.), halbstrauchiges, 4. f. Süd- und Westeuropa.

hirsutum Sering. etc. v. *Bonjeania hirsuta* Nachtr.

Douglasia Lindl. (D. Douglas, englischer Reisender und Botaniker), V. I., Primulaceae.

navalis Lindl., Schnee-D., 4. f. Nordamerika.

Draba Dill., Hungerblümchen, XV. II., Cruciferae.

A) *Genuina*.

aizoides L., immergrünes, 4. f. Mitteleuropa.

β) *affinis* Host. γ) *Aizoon* Wahlenb. (*elongata* Host.).

alpina L. (*pauciflora* RB.), Alpen-H., 4. f. Lapland.

aurea Vahl, goldfarbiges, ♂. ☉. f. Grönland.

brachystemon DC., kurzfadiges, 4. f. ? Schweiz.

Draba

- bruniaefolia* Stev., brunienblättriges, 4. f. Caucasus.
carinthiaca Hoppe (*hirta* Gaud., *Johannis* Host., *nivalis* DC. Gaud.), kärnthnerisches, 4. f. Kärnthen, Salzburg, Tyrol, Schweiz.
ciliata Scop. (*androsacea* W., *fladnizensis* DC.), gefranztes, 4. f. Krain.
cinerea Adams, aschgraues, ♂. f. Sibirien.
confusa Ehrh., verwechseltes, ♂. f. Tyrol, Schweiz.
corymbosa RB., traubendoldiges, 4. f. Baffins-Bay.
crassifolia Grah., dickblättriges, 4. f. Nordamerika.
cuspidata MB., langspitziges, 4. f. Taurien.
dahurica DC., dahurisches, ♂. f. Dahurien.
ericaefolia Steven., heideblättriges, 4. f. Caucasus.
fladnizensis Wulf. (*helvetica* Schlchr., *sclerophylla* Gaud.), Fladnizer, 4. f. Kärnthen, Tyrol, Schweiz.
frigida Saut. (*stellata* Auctor.), kaltes, 4. f. Schweiz, Tyrol, Salzburg etc.
glacialis Adams, eisiges, 4. f. Ostsibirien.
Gmelini Adams, Gmelin's, 4. f. Sibirien.
gracilis Grah. (*lutea* β *longipes* Rich.), schlankes, ☉. f. Nordamerika.
grandiflora C. A. Mey., großblumiges, 4. f. Altai.
hirta L. (*pyrenaica* Oed., *nivalis* DC.), rauhes, 4. f. Scandinavien, Nordamerika.
Hoppeana Rchb. (*Zahlbruckneri* Host., *glacialis* Auctor), Hoppe's, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
incana L. (*contorta* Ehrh.), weißsgraues, ♂. f. Nord-europa, Schweiz.
incompta Stev., ungeziertes, 4. f. Caucasus.
laevigata Hoppe, glattes, 4. f. Kärnthen.
lapponica W. (*androsacea* Wahlbg., *ciliaris* Wahlbg., *Wahlenbergii* Hartm.), lappländisches, 4. f. Scandinavien, Schweiz, Kärnthen.
lasiocarpa Roch., wollfrüchtiges, 4. f. Ungarn.
Liljebladii Wallm. (*hirta* Oed., *nivalis* Liljeb., *muricella* Wahlbg.), Liljeblad's, 4. f. Scandinavien, Nordamer.
lutea Gilib., gelbes, ☉. f. Nordamerika.
muralis L. (*nemorosa* All.), Mauer-H., ☉. f. Europa, Nordafrika.
nemoralis Ehrh. (*pontica* Dsf.), Hain-H., ☉. f. Schweden, Rußland, Ungarn, Mittelasien.
Nummularia Ehrenb. Lk., nummularienähnliches, ☉. f. ?
oblongata RB., verlängertes, 4. f. Nordamerika.
pilosa Adams, haariges, 4. f. Ostsibirien.
repens MB., kriechendes, 4. f. Caucasus.
rigida W. (*bryoides* DC.), starres, 4. f. Caucasus.
rivularis Bernh., Bach-H., ♂. f. Mitteleuropäische Alpen.
rupestris RB. (*hirta* Sm.), Felsen-H., 4. f. Schottland, Norwegen.
Sauteri Hoppe, Sauter's, 4. f. Salzburg, Steyermark.
 β) *Spitzelii* Hoppe.
siliquosa MB., langschotiges, 4. f. Caucasus.
stellata Jacq. (*austriaca* Crtz., *saxatilis* Koch), sternförmiges, 4. f. Oesterreich, Steyermark.
stylaris Gay., langgriffeliges, ♂. ?
tomentosa Wahlbg., filziges, 4. f. Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Salzburg.
Traunsteineri Hoppe, Traunsteiner's, 4. f. Kärnthen, Tyrol etc.

Draba

tridentata DC., dreizähniges, ♂. 4. f. Caucasus.
 unalascensis DC., Unalashka-H., ☉. f. Unalashka.

B) *Erophila* DC.

americana DC. (*caroliniana* Bart.), amerikanisches, ☉. f. Nordamerika.

praecox Stev., frühes, ☉. f. Caucasus, Ostdeutschland.
 verna L. (*E. vulgaris* DC.), Frühlings-H., ☉. t. Europa.

hesperidiflora Lam. v. *Aubrietia hesperidiflor.* *pyrenaica* L. v. *Petrocallis pyrenaica.* *uralensis* W. v. *Schivereckia podolica.*

Dracaena L., Drachenbaum, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

arborea Lk., baumartiger, ♀. w. Sierra Leone.

brasiliensis Parm., brasilianischer, ♀. w. Brasilien.

Draco L., ächter, ♀. w. Ostindien.

ensifolia Haw., schwertblättriger, ♀. w. Neuspanien.

ferrea L., eisenfarbiger, ♀. w. Ost- u. Westind., China.

β) *terminalis* Jacq.

fragrans Ker., wohlriechender, ♀. w. Afrika.

interrupta Haw., unterbrochener, ♀. w. Sierra Leone.

leonensis Lod., guineischer, ♀. w. Sierra Leone.

nodosa Lod., knotiger, ♀. w. ?

ovata Sims, eiförmiger, ♀. w. Sierra Leone.

purpurea Lod., purpurfarbiger, ♀. w. Ostindien.

reflexa Lam., zurückgebogener, ♀. w. Mascarenas, Madagascar.

salicifolia Ait., windenblättriger, ♀. w. ?

striata L. suppl. ? Lod., gestreifter, ♀. w. t. Cap der guten Hoffnung.

surculosa Lindl., ästiger, ♀. w. Sierra Leone.

tessellata W. (*marginata* Lam.), gewürfelter, ♀. w. Madagascar.

umbraculifera Jacq., schattengebender, ♀. w. Mascarenas.

australis Forst. (et *indivisa* Forst., *stricta* Sims) v.

Charlwoodia australis etc. *ensifolia* L. v. *Dianella nemorosa.* *marginata* Ait. v. *Lomatophyllum borbonicum.*

Dracocephalum L., Drachenkopf, XIV. 1., Labiatae.

altaianse Laxm. (*grandiflorum* Bot. mag.), altaischer, 4. f. Altai.

argunense Fisch., argunischer, 4. f. Sibirien.

austriacum L., österreichischer, 4. f. Oesterreich, Ungarn, Siebenbürgen, Caucasus.

botryoides Stev., traubiger, 4. f. Caucasus.

canariense L., canarischer, ♀. k. Canarische Inseln.

canescens L., graulicher, ☉. f. Kleinasien.

chamaedryoides Balb., gamanderähnlicher, 4. f. ?

grandiflorum L., großblumiger, 4. f. Sibirien.

ibericum Stev. (*odoratissimum* Poir.), iberischer, 4. f. Georgien, Taurien.

mexicanum H. B. K., mexicanischer, 4. k. t. Mexico.

Moldavica L., moldauischer, ☉. f. Südpodolien, Moldau, Sibirien.

nutans L., überhängender, 4. f. Sibirien.

origanoides W., dostenähnlicher, 4. f. Sibirien.

palmatum W., handförmiger, 4. f. Sibirien.

parviflorum Nutt., kleinblumiger, 4. f. Nordamerika.

peltatum L., schildförmiger, ☉. f. Levante,

peregrinum L., fremder, 4. f. Sibirien.

Dracocephalum

pinnatum L., gefiederter, 4. f. Sibirien.

Ruyschiana L., Ruysch's, 4. f. Nord-, Ost- u. Südeuropa.

sibiricum L., sibirischer, 4. f. Sibirien.

thymiflorum L., thymianblumiger, ☉. f. Sibirien.

cordatum Nutt., *denticulatum* L., *speciosum* Swt.
variegatum Vent., *virginianum* L. v. *Physostegia*
cordata etc.

Dracontium L., Drachenwurz, VII. 1., Aroideae.

lanceaefolium Jacq., lanzettblättrige, 4. w. Caracas.

polyphyllum L., vielblättrige, 4. w. Südamerika.

sagittaeifolium Meyer, pfeilblättrige, 4. w. Guiana.

foetidum L. v. *Symplocarpus foetidus*. *pertusum*

Mill. v. *Calla pertusa*. *spinosum* L. v. *Pothos heterophyllum*.

Dracophyllum RB., Drachenblatt, V. 1., Epacrideae.

capitatum RB., kopfförmiges, ♀. t. Neuholland.

longifolium RB., langblättriges, ♀. t. Neuholland.

secundum RB., einseitiges, ♀. t. Neuholland.

gracile RB. v. *Sphenotoma gracilis*.

Drepanophyllum *agreste* Hoffm. (*sioides* Wib.) v. *Falcaria* Rivini.**Drepania** Juss. v. Tolpis.**Drepanocarpus** Mey., Sichelhülse, XVII. 1v. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

lunatus Mey., mondförmige, ♀. w. Südamerika.

Drimia Jacq., Drimia, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

acuminata Lod., zugespitzte, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

altissima Ker., höchste, 4. Zw. t. Cap der gut. Hoffn.

ciliaris Jacq., gefranzte, 4. Zw. t. Cap der gut. Hoffn.

elata Jacq., erhabene, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffn.

lanceaefolia Ker., lanzettblättrige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

longipedunculata Loud., langstielige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

media Jacq., mittlere, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffn.

purpurascens Jacq., purpurfarbige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

pusilla Jacq., niedrige, 4. Zw. t. Cap der gut. Hoffn.

revoluta Sims (*lanceaefolia* β Bog. mag., *lanceolata* R.

et S.), zurückgerollte, 4. Zw. Cap der guten Hoffn.

undulata Jacq., wellige, 4. Zw. t. Cap der gut. Hoffn.

villosa Lindl., zottiger, 4. Zw. t. Cap der gut. Hoffn.

Drimys Forst., Gewürzrinde, X. 111. (iv.), Magnoliaceae.

chilensis DC., chilesische, ♀. w. t. Chili.

Winteri Forst., Winter's, ♀. w. t. Magellanische Meerenge.

Drosera L., Sonnentau, V. v., Cistineae-Drosereae.

acaulis Thbg., stengelloser, 4. Wa. t. Cap d. gut. H.

americana W., amerikanischer, 4. Wa. f. Nordamerika.

binata La Bill, zweitheiliger, 4. Wa. t. Neuholland.

cistiflora L., cistusblumiger, 4. Wa. t. Cap d. gut. H.

filiformis Pursh (*tenuifolia* W.), fadenförmiger, 4. Wa. f.

Nordamerika.

intermedia Hayn. (*longifolia* Sm.), mittlerer, ♂. 4. Wa. f.

Europa.

linearis Goldie, gleichbreitblättriger, 4. Wa. f. Nordamer.

longifolia L. (*anglica* Huds.), ♂. 4. Wa. f. Mittel- und

Nordeuropa.

obovata Mert. et Koch, verkehrteiförmiger, ♂, 4. Wa. f.

Salzburg, Baiern, Vogesen.

pauciflora Banks (*trinervia* Spgl.), wenigblumiger, 4. Wa. t.

Cap der guten Hoffnung.

Drosera

rotundifolia L., rundblättriger, ♂. 4. Wa. f. Europa.
lusitanica L. v. *Drosophyllum lusitanicum*.

Drosophyllum Lk., Thaublatt, X. v., Cistineae-Drosereae.

lusitanicum Lk., portugiesisches, ♂. 4. Wa. k. t. Portugal, Nordafrika.

Drummondia DC. (J. Drummond, englischer Botaniker, eifriger Reisender und Sammler), V. II., Saxifrageae.
mitelloides DC., mitellaähnliche, 4. f. Nordamerika.**Drusa** DC. (M. le Dru, französischer Botaniker), V. II., Umbelliferae.

oppositifolia DC., gegenblättrige, 4. Sch. k. t. Teneriffa.

Dryandra RB. (Jonas Dryander, berühmter Botaniker, Bibliothekar des Sir J. Banks), IV. I., Proteaceae.

arctotides RB., bärenohrblättrige, ♀. t. Neuholland.

armata RB., bewaffnete, ♀. t. Neuholland.

Baxteri RB., Baxter's, ♀. t. Neuholland.

bipinnatifida RB., doppeltgefiederte, ♀. t. Neuholland.

blechnifolia RB., rippenfarnblättrige, ♀. t. Neuholland.

calophylla RB., schönblättrige, ♀. t. Neuholland.

concinna RB., nette, ♀. t. Neuholland.

cuneata RB., keilblättrige, ♀. t. Neuholland.

a) *brevifolia*. β) *longifolia*.

floribunda RB., blüthenreiche, ♀. t. Neuholland.

foliolata RB., blätterreiche, ♀. t. Neuholland.

formosa RB., schöne, ♀. t. Neuholland.

Fraseri RB., Fraser's, ♀. t. Neuholland.

longifolia RB., langblättrige, ♀. t. Neuholland.

mucronulata RB., stachelspitzige, ♀. t. Neuholland.

nervosa RB., nervige, ♀. t. Neuholland.

nivea RB., schneeweiße, ♀. t. Neuholland.

obtusa RB., stumpflappige, ♀. t. Neuholland.

plumosa RB., federige, ♀. t. Neuholland.

pteridifolia RB., saumfarnblättrige, ♀. t. Neuholland.

seneciifolia RB., kreuzkrautblättrige, ♀. t. Neuholland.

Serra RB., sägezahnige, ♀. t. Neuholland.

squarrosa RB., sparrige, ♀. t. Neuholland.

tenuifolia RB., feinblättrige, ♀. t. Neuholland.

Noch findet man nachstehende in den Garten-Katalogen
 verzeichnet: *dentata*, *planifolia*, *spinosa*.

falcata RB. v. *Hemiclidia Baxteri*.

Dryas L., Waldgöttinkraut, XII. III., Rosaceae.

Drummondii Hook. (*octopetala* Pursh), Drummond's, 4.
 ♀. f. Nordamerika.

integrifolia Vahl, ganzblättriges, 4. ♀. f. Grönland.

intermedia Cham., mittleres, 4. ♀. f. Nordamerika,
 Aleutische Inseln.

octopetala L., gemeines, 4. ♀. f. Mitteleuropäische
 Alpen, Nordeuropa, Asien und Amerika.

b) *minor* J. C.

tenella Pursh, zartes, 4. ♀. f. Canada.

anemonoides Pall. (*pentapetala* L.) et *geoides* Pall.
 v. *Sieversia anem.* etc. *trifoliata* Pall. v. *Comaropsis fragarioides*.

Drymaria W., Hainling, V. III., Caryophyllaceae-Alsineae.

cordata W., herzförmiger, 4. w. Südamerika.

gracilis Lk., schlanker, 4. w. Brasilien.

- Drymonia** Mart., Waldglocke, XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.
 calcarata Mart., gespornte, 4. w. Brasilien.
 serrulata Mart. (*Jacquini* G. Don, *bicolor* Lindl.), sägezähnlige, 4. f. Sch. w. Westindien.
- Drypetes** Vahl, Schlitzdorn, XXII. IV., Tricoccae-Euphorbiaceae.
 crocea Poit., safranfarbener, f. w. Westindien.
- Drypis** L., Knotenkraut, V. III., Caryophyllaceae.
 spinosa L., stacheliges, ♂. 4. f. k. Krain, Istrien, Italien, Nordafrika.
- Dulichium** P., Dulichium, III. I., Cyperaceae.
 spathaceum P., scheidiges, 4. f. k. Nordamerika.
- Dumasia** DC. (M. Dumas, französischer Naturforscher), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
 pubescens DC., weichhaarige, 4. Sch. t. Nepal.
 villosa DC., zottige, 4. Sch. t. Nepal.
- Dumerilia** Lagasc. (M. A. M. Constant Dumeril, französischer Zoolog), XIX. I., Compositae-Eupatorineae.
 paniculata DC., rispige, f. w. Peru.
- Duranta** L. (Castor Durantes, alter italienischer Arzt und Kräutersammler), XIV. II., Verbenaceae.
 argentea Lod., silberfarbige, f. w. ? Ostinden.
 Ellisia L., Ellis's, f. w. Westindien.
 inermis Mill., unbewehrte, f. w. Südamerika.
 macrocarpa H. B. K. (? *dentata* P.), großfrüchtige, f. Südamerika.
 Mutisii L., Mutis's, f. w. Neugranada.
 Plumierii L., Plumier's, f. w. Südamerika.
 xalapensis H. B. K., xalapensische, f. w. Mexico.
- Durio** L. (malayischer Name), XVIII. I., Malvaceae.
 Zibethinus L., wohlschmeckender, f. w. Molucken.
- Duvalia** Haw. v. *Stapelia*.
- Duvaua** Kunth (M. Duvau, französischer Botaniker), XXI. VII., Amyrideae.
 dependens DC., herabhängende, f. k. t. Chili.
 dentata DC., gezähnelte, f. k. t. Sandwichinseln.
 latifolia Gill. (*dependens* γ) Hook.), breitblättrige, f. k. t. Chili.
 ovata Lindl., eiförmige, f. t. Chili.
- Dyckia** Schult. fil. (Fürst von Salm-Dyck, berühmter Kenner der Saftpflanzen), VI. I., Bromeliaceae.
 rariflora Sch. fil. (*remotiflora*), entferntblumige, 4. w. Brasilien.
- Dysodium divaricatum** Rich. v. *Malampod divaricatum*.
- Dyssodia** Cav., Dyssodia, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
 appendiculata Lagasca, anhängselige, ♂. f. m. Mexico.
 chrysanthemoides DC. (*glandulosa* Cav.), wucherblumenähnliche, ♂. f. m. Mexico.
 incana Lagasca, weißgraue, ♂. f. m. Mexico.
 Porophyllum Cav., drüsenblättrige, ♂. f. m. Neuspan.
 pubescens Lagasca, weichhaarige, ♂. f. m. Mexico.
Porophyllum W. non Cav. v. *Lebetina cancellata*.
- Dyssophylla** Blume, Stinkmünze, XIV. I., Labiatae.
 pumila Benth., kleine, 4. f. k. Nepal.
 quadrifolia Benth., vierblättrige, 4. f. t. Nepal, Ostind.

- Ebenus** L. (Abnous, arabischer Name), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
cretica L., cretische, ♀. k. Creta.
pinnata Ait. Dsf., gefiederte, ♂. k. Nordafrika, Kleinasien.
- Ecastaphyllum** P. Br., Kreishülse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
Brownei Rich. P., Brown's, ♀. Sch. w. Westindien.
Plumieri P., Plumier's, ♀. Sch. w. Südamerika.
Sieberi Rchb., Sieber's, ♀. Sch. w. Guinea.
- Eccremocarpus** R. et P., Hängkapsel, XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.
longiflorus Humb., langblumige, ♀. Sch. t. Peru.
scaber R. et P. v. *Calampelis scabra*.
- Echenais** Cass., Rauschdistel, XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.
carlinoides Cass., eberwurzähnliche, ♂. f. Caucasus.
- Echeveria** DC., Echeverie, X. IV., Corniculatae-Crassulaceae.
coccinea DC., scharlachfarbige, ♀. k. t. Mexico.
grandifolia Haw., großblättrige, ♀. t. Mexico.
gibbiflora DC., höckerigblumige, ♀. t. Mexico.
lurida Haw., bleifarbig, 4. t. Mexico.
racemosa Otto, traubige, 4. t. Mexico.
secunda Booth., einseitige, 4. t. Mexico.
- Echinacea** Mch., Stachelkopf, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.
angustifolia DC., schmalblättriger, 4. f. b. k. Texas.
Dicksonii Lindl., Dickson's, 4. f. b. k. Mexico.
heterophylla D. Don, verschiedenblättriger, 4. f. b. k. Mexico.
napifolia Swt., rübenblättriger, 4. k. t. Mexico.
purpurea Mönch, purpurfarbiger, 4. f. Nordamerika.
serotina D. Don, spätblühender, 4. f. Nordamerika.
- Echinaria** Dsf., Stachelgras, III. II., Gramineae.
capitata Dsf., kopfförmiges, ♂. f. Südeuropa, Kleinasien, Nordafrika.
- Echinocactus** Salm., Igelfackeldistel, XII. I., Cactaeae.
 I. *Cereastri*.
denudatus Lk. et Otto, kahle, ♀. w. Südbrasilien.
Eyriesii Turp., Eyries's, ♀. w. Buenos Ayres.
 β) *glaucus* Lind. γ) *Lehmanni* H. Dresd.
gibbosus DC., höckerige, ♀. w. Jamaica.
leucanthus Gillies, weißblumige, ♀. w. Chili.
multiplex Hort. Berol., vielfältigende, ♀. w. Südbrasilien.
 β) *monstrosus*.
oxygonus Lk. et Otto, schmalkantige, ♀. Südbrasilien.
pulchellus Mart., schöne, ♀. Mexico.
Schelhasii Pfr. (*Boutillieri* Parm.), Schelhase's, ♀. w. ? Südamerika.
tubiflorus H. Angl., röhrenblumige, ♀. w. Mexico.
turbيناتus H. Berol. Pfr., aufgetriebene, ♀. w. ? Südamer.
- II. *Genuini*.
aciculatus Salm., feinstachelige, ♀. w. Brasilien.
acuatus Lk. et Otto, scharfkantige, ♀. w. Montevideo.
acutissimus H. Berol., spitzigste, ♀. w. Chili.
anfractuusus Mart., gewundene, ♀. w. Mexico.
armatus Salm., bewaffnete, ♀. w. ? Südamerika.
? aureus Mey., goldfarbige, ♀. w. Peru.
centeterius Lehm., dichtblumige, ♀. w. Südamerika.
Ceratistes Otto, gehörnte, ♀. w. Chili.

Echinocactus

- ?cereiformis DC., cereusähnliche, f. w. Mexico.
 cornigerus DC., hornstachelige, f. w. Mexico.
 corynodes H. Berol. (*acutangulus* Zucc., *rosaceus* et *Sellowianus* Hort.), spitzkantige, f. w. Mexico.
 crispatus DC., krause, f. w. Mexico.
 depressus DC., niedergedrückte, f. w. Südamerika.
 dichroacanthus Mart., verschiedenstachelige, f. w. Mexico.
 Echidne DC., starrstachelige, f. w. Mexico.
 exsculptus Otto (*subgibbosus* Haw., *Acanthion* et *interruptus* H. Berol., *Cereus montevidensis* Hortul.), webtstachelige, f. w. Chili, Mexico.
 formosus H. Angl., schöne, f. w. Mendoza.
 gladiatus Lk. et Otto, degenförmige, f. w. Mexico.
 glaucescens DC., blaugrüne, f. w. Mexico.
 Hoffmannseggii H. Dresd., Hoffmannsegg's, f. w. Südamer.
 hybocentrus Lehm., braunstachelige, f. w. Brasilien.
 ingens Zucc., große, f. w. Mexico.
 intortus DC., einwärtsgedrehte, f. w. Antigua.

β) purpureus Plum.

- intricatus H. Berol., verworrene, f. w. Montevideo.
 Karwinskii Zucc., Karwinski's, f. w. Mexico.
 Langsdorffi Lehm., Langsdorf's, f. w. Brasilien.
 leucacanthus Zucc., weißstachelige, f. w. Mexico.
 Linkii Lehm., Link's, f. w. Mexico.
 Mackieanus Hook., Mackie's, f. w. Chili.
 macrodiscus Mart., großscheibige, f. w. Mexico.
 mammillarioides Hook., mammillarienähnliche, f. w. Chili.
 melocactiformis DC., melonenähnliche, f. w. Mexico.
 muricatus H. Berol., weichstachelige, f. w. Südbrasilien.
 obvallatus DC., verschanzte, f. w. Mexico.
 oligacanthus Mart., wenigstachelige, f. w. Mexico.
 ornatus DC., gezielte, f. w. Mexico.
 orthacanthus Lk. et Otto, geradstachelige, f. w. Montevideo.
 Ottonis Lehm., Otto's, f. w. Mexico.

β) tenuispinus Lk. et Otto. Brasilien.

- oxypterus Zucc. (? *Hystrix* DC.), schmalflügelige, f. w. Mexico.

- pachycentrus Lehm., dickköpfige, f. w. Brasilien.
 parvispinus DC., kleinstachelige, f. w. Westind., Südamer.
 Pfeifferi Zucc., Pfeiffer's, f. w. Mexico.
 phyllacanthus Mart., blattstachelige, f. w. Mexico.
 platyacanthus Lk. et Otto, breitstachelige, f. w. Mexico.
 polyacanthus Lk. et Otto, vielstachelige, f. w. Brasilien.
 pruinosis Otto (*Cereus roridus* Hort.), bereifte, f. w. Brasil.
 recurvus Lk. et Otto (*glaucus* Karw.), zurückgekrümmte, f. w. Peru, Mexico.
 rhodacanthus Salm (*coccineus* H. Berol.), rothstachelige, f. w. Mendoza.

- robustus Otto (*spectabilis subuliferus* Hort. *viviparus* Hort.), starke, f. w. Mexico.

β) prolifer (*agglomeratus* Karw.), γ) monstrosus.

- sclerothrix Lehm., harthaarige, f. w. Südamerika.
 Sellowianus Lk. et Otto, Sellow's, f. w. Montevideo.
 sessiliflorus Hook., stiellose, f. w. Mexico.
 Sickmanni Lehm., Sickmann's, f. w. Südamerika.
 Spina Christi Zucc. (*Fischeri* H. Berol.), Christdorn-J., f. w. Brasilien.
 spiralis Karw. (*Besleri*, *affinis agglomeratus* Hortul.), spiralförmige, f. w. Mexico.

Echinocactus

- subuliferus Lk. et Otto, pfriemenförmige, $\frac{1}{2}$ w. Mexico
- tephracanthus Lk. et Otto, strahlstachelige, $\frac{1}{2}$ w. Brasil.
- tortuosus Lk. et Otto (*muricatus* Hort.), gedrehte, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.

tuberculatus Lk. et Otto, höckerige, $\frac{1}{2}$ w. Mexico.

Scopa H. Berol. v. *Cereus Scopa*.

Echinochloa P. B. v. *Oplismenus*.

Echinophora L., Stacheldolde, V. II., Umbelliferae.
spinosa L., gemeine, 4. f. b. k. Südeuropa, Engl., Nordafrika.
tenuifolia L., feinblättrige, 4. f. b. k. Süditalien, Griechenland, Taurien.

trichophylla Sm., haarblättrige, 4. k. Creta.

Echinopogon P. B., Stachelbart, III. II., Gramineae.
ovatus P. B. (*Agrostis ovata* LaBill.), eiförmiger, 4. k. t. Neuholland, Neuzeeland.

Echinops L., Kugeldistel, XIX. v., Compositae-Echinopeae.

banaticus Roch., banatische, 4. f. Banat.

b) *albus*.

dahuricus Fisch., dahurische, 4. f. Dahurien.

β) *angustilobus* (*ruthenicus* Bess. non MB.).

exaltatus Schrad. (*strictus* Fisch.), hohe, ♂, f. ? Osteuropa.
glaberrimus DC. (*Prescottii* Fisch. et Mey.), glatte, 4. f. Syrien.

Gmelini Turz., Gmelin's, ♂. f. Sibirien.

graecus Mill. (*lanuginosus* Lam.), griechische, 4. f. Griechenland.

horridus Dsf., rauhe, 4. f. Persien.

humilis MB., niedrige, 4. f. Ostsibirien.

persicus Stev. et Fisch., persische, ♂. f. Caucasus.

platylepis Trautv. (*humilis* Rchb.), breitschuppige, ♂. 4. f. ?

Ritro L., italienische, ♂. f. Südeuropa, Südrussland.

β) *tenuifolius* Fisch. γ) *polycephalus* Gouan (*virgatus* Lam.).

ruthenicus MB. (*tauricus* W.), russische, ♂. f. Südrussl.

sphaerocephalus L. (*viscosus*, *ruthenicus*, *villosus*, *altai-cus*, *giganteus*, Auctor. et hortul.), gemeine, 4. f.

Mittel-, Süd- u. Westeuropa, Siebenbürg., Taur., Sibir.

β) *glabratus* (*paniculatus* Bot. reg.). γ) *paniculatus* Jacq.

spinosa L. (*tunetanus* Vahl), stachelige, 4. $\frac{1}{2}$ k. Creta, Nordafrika.

strigosus L., striegelige, ♂. f. Spanien.

Szowitzii Fisch. et Mey., Szowitz's, ♂. f. Nordpersien.

Tournefortii Ledeb. (*strigosus* MB.), Tournefort's, 4. f. Caucasus.

viscosus MB., schmierige, 4. f. Taurien.

Unbestimmt: *pungens* Loud., ♂. f. Russland.

Echinosperrum Sw. Lehm., Stachelsame, V. I., Asperifoliaceae.

barbatum Lehm., bärtiger, ♂. f. Taurien, Caucasus.

caspicum Fisch. et Meyer, caspischer, ♂. f. Turcomanien.

consanguineum Fisch. et Mey., verwandter, ♂. f. Südrussl.

deflexum Lehm., herabgebogener, ♂. f. Deutschland, Schweiz, Ungarn, Lappland.

gracile Lehm., schlanker, ♂. f. Chili.

Lappula Lehm., gemeiner, ♂. f. Europa, Asien, Nordamer.

β) *squarrosus* Rchb.

leiocarpum Fisch. et Mey., glatter, ♂. f. Neucalifornien.

Echinosperrum

- leucanthum Ledeb., weifsblumiger, ☉. f. Südrufsland.
 marginatum Lehm., gerandeter, ☉. f. Caucasus.
 minimum Lehm., kleinster, ☉. f. Sibirien.
 patulum Lehm. (*squarrosus* MB., *Redowskii* Hornem.),
 ausgebreiteter, ♂. f. Caucasus, Sibirien.
 Szovitsianum Fisch. et Mey., Szowits's, ☉. f. Nordpersien.
 virginicum Lehm., virginischer, ♂. f. Virginien.

Echites L., Klammerstrauch, V. 1., Contortae-Apocynae.

- antidysenterica Roth, ruhrvertreibender, ♂. Sch. w. Ostind.
 biflora Jacq., zweiblumiger, ♂. Sch. w. Westindien.
 hispinosa Thbg., zweidorniger, ♂. t. Cap d. g. Hoffn.
 caryophyllata Roxb., nelkenähnlicher, ♂. Sch. t. Ostind.
 cymosa W., afterdoldiger, ♂. Sch. w. Ostindien.
 difformis Walt., unförmlicher, ♂. Sch. t. Carolina.
 domingensis Sw., domingensischer, ♂. Sch. w. Westind.
 frutescens Roxb., strauchiger, ♂. Sch. w. Ostindien.
 grandiflora Roth (*macrantha* Spgl.), grofsblumiger, ♂.
 Sch. w. Ostindien.

- Heynii Spgl. (*dichotoma* Roth), Heyne's, ♂. Sch. w. Ostind.
 longiflora Dsf., langblumiger, ♂. Sch. w. Brasilien.
 malabarica Lam., malabarischer, ♂. Sch. w. Malabar.
 paniculata Poir., rispiger, ♂. Sch. w. Südamerika.
 peltata Lock., schildförmiger, ♂. Sch. w. Trinidad.
 reticulata Roth, netzförmiger, ♂. Sch. w. Ostindien.
 Richardii R. et S., Richard's, ♂. Sch. w. Guiana.
 stellaris Lindl., sternförmiger, ♂. Sch. w. Brasilien.
 suberecta Jacq., fastaufrechter, ♂. Sch. w. Jamaica.
 succulenta Thbg., saftiger, ♂. t. Cap d. gut. Hoffn.
 tomentosa Vahl, filziger, ♂. Sch. w. Cayenne.
 torosa Jacq., wulstiger, ♂. Sch. w. Jamaica.
 tuberosa Haw., knolliger, ♂. Kn. Sch. t. Cap d. g. H.
 umbellata Jacq., doldiger, ♂. Sch. w. Jamaica.

caudata L. v. *Strophanthus dichotomus*. *corymbosa*
 Jacq. et *floribunda* Sw. vid. *Parsonsia corymb.* et
floribund. *nutans* Anders. (*sanguinolenta* Juss.) v.
Haemadictyon venosum.

Echium T., Natterkopf, V. 1., Asperifoliaceae.

- aculeatum DC., stacheliger, ♂. k. Canarische Inseln.
 ambiguum DC., zweifelhafter, ♂. k. Canarische Inseln.
 amoenum Fisch. et Mey., lieblicher, ♂. 4. Nordpersien.
 argenteum L. (*fruticosum* Jacq., *ferocissimum* Andr.),
 silberfarbiger, ♂. k. t. Cap der guten Hoffnung.
 australe DC., südlicher, ☉. f. Südeuropa.
 banaticum H. Vindob., banatischer, ♂. 4. f. Banat.
 bifrons DC., zweiflügeliger, ♂. t. Canarische Inseln.
 brachyanthum Hornein., kurzblumiger, ♂. k. Canar. Inseln.
 candicans L. (*nervosum* Ait.), weifslicher, ♂. k. Madeira.
 capitatum L., kopfförmiger, ♂. k. t. Cap d. g. Hoffn.
 caudatum Thbg., geschwänzter, 4. ♂. k. t. Cap d. g. H.
 creticum L. (*rubrum* Mch.), cretischer, ☉. f. Griechenl.
 cynoglossoides R. et S., hundsungenähnlicher, ♂. k.
 Canarische Inseln.
 densiflorum DC., dichtblumiger, ♂. k. Canarische Inseln.
 diffusum Sibth., weitschweifiger, ☉. f. Creta.
 elegans Lehm. (*hispidum* Sibth., *Siphthorpii* R. et S.), zier-
 licher, ♂. f. Süditalien, Griechenland.
 fastuosum Jacq., prächtiger, ♂. k. Canarische Inseln.
 foliosum Lehm., blätterreicher, ♂. k. Canarische Inseln.

Echium

formosum P. (*grandiflorum* Andr.), schöner, ⚥. t. k.

Cap der guten Hoffnung.

fruticosum L., strauchiger, ⚥. k. t. Cap d. g. Hoffn.

giganteum L., riesenhafter, ⚥. k. Teneriffa.

glabrum Vahl (*falcatum* Lam.), kahler, ⚥. k. t. Cap d. g. H.

glaucophyllum Jacq., blaugrüner, ⚥. k. t. Cap d. g. H.

grandiflorum Dsf. (*macranthum* R. et S.), großblumiger,

⊙. f. Nordafrika.

hispidum Thbg., hackeriger, ⚥. t. k. Cap d. g. H.

italicum L. (*asperimum* MB., *altissimum* Jacq.), ♂. f.

England, Südeuropa, Caucasus.

laevigatum L., glatter, ⚥. k. t. Cap d. guten Hoffn.

lineatum Jacq., linirter, ⚥. k. Canarische Inseln.

longifolium Delil., langblättriger, ⊙. f. Aegypten.

longiflorum Dum., langblumiger, ⚥. k. t. Cap d. g. H.

lusitanicum L., portugiesischer, ⊙. f. Portugal.

macrophyllum Lehm., großblättriger, ⚥. k. Canarische Inseln.

maritimum W. (*setosum* Delil.), Meerstrand-N., ⊙. f. Sicilien, Nordafrika, Aegypten.

Mertensii Lehm., Merten's, ♂. 4. f. Spanien.

molle Lagasc. (*lasiophyllum* Lk.), weicher, ⚥. k. Canarische Inseln.

orientale L., morgenländischer, ⊙. f. Armenien.

paniculatum Thbg., rispiger, ⚥. t. k. Cap der gut. H.

parviflorum Roth (*micanthum* Schousb., ? *calycinum* Viv.), kleinblumiger, ⊙. f. Südeuropa, Nordafrika.

? β) prostratum Ten.

plantagineum L., wegrittblättriger, ⊙. f. Süd- und Westeuropa.

prostratum Delil., niedergestreckter, ⊙. f. Aegypten.

pustulatum Sibth. Sm., blättriger, ♂. f. Istrien, Dalmatien, Süditalien, Griechenland.

pyramidatum Dum., pyramidenförmiger, ⚥. k. t. Cap der guten Hoffnung.

pyrenaicum L. (*pyramidale* Lapey.), pyrenäischer, ♂. f. Südfrankreich, Italien, Nordafrika.

rubrum Jacq., rother, ♂. f. Oesterreich, Ungarn, Galicien, Taurien, Sibirien.

salmanticum Lagasc., spanischer, ♂. f. Spanien.

simplex DC., einfacher, ⚥. k. Canarische Inseln.

spathulatum Viv., spathelförmiger, ⚥. k. Nordafrika.

spicatum L., ährenförmiger, 4. k. t. Cap der gut. H.

strictum L., steifer, ⚥. k. Canarische Inseln.

strigosum Sw., striegeliger, ⚥. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

tenuis Roth (*humile* Dsf.), dünner, ♂. f. Nordafrika, Sicilien.

thyrsoideum Juss., straußförmiger, ♂. f. ? Südeuropa.

tuberculatum Lk., höckeriger, ♂. f. Portugal.

verrucosum Sw., warziger, ⚥. k. Cap der guten Hoffn.

violaceum L. (*valentinum* Lagasc.), violetter, ⊙. f. Süd- und Westeuropa.

virescens DC., grünlicher, ⚥. k. Canarische Inseln.

vulgare L., gemeiner, ♂. f. Europa, Nordamerika.

β) Wierzbickii Haberl.

Eclipta L., Mehlblume, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

erecta L., aufrechte, ⊙. f. Aegypten, Kleinasien, Nord- und Südamerika.

Eclipta

- latifolia L. suppl., breitblättrige, ♂. t. Ostindien.
 longifolia Schrad., langblättrige, ☉. f. m. Westindien.
 procumbens Mchx., niederliegende, ☉. f. Carolina.
 prostrata L., niedergestreckte, ♂. f. m. Ostindien.
 punctata L., punktirte, ♂. t. w. Westindien.
 undulata W., wellenförmige, ♂. t. w. Ostindien.

Ectasis D. et G. Don v. *Erica*.

- Edrajanthus** A. DC., Zwergglocke, V. 1., Campanulaceae.
 graminifolius A. DC., grasblättrige, 4. f. Ungarn, Italien.
 Kitaibelii A. DC., Kitaibel's, 4. f. Ungarn.
 Pumilio A. DeC., kleine, 4. f. b. k. Dalmatien.
 serpyllifolius A. DC., quendelblättrige, 4. f. b. Dalmatien.
 tenuifolius A. DC., feinblättrige, 4. f. Istrien, Dalmatien.

Edwardsia Salisb. (S. Edwards, englischer Botaniker),
 X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

- chilensis Miers, chilesische, ♀. k. t. Chili.
 chrysophylla Salisb., goldblättrige, ♀. k. Sandwichinsel.
 denudata DC., kahle, ♀. w. Mascarenas.
 grandiflora Salisb. (*tetraptera* Lk.), großblumige, ♀. k. Neuzeeland,
 microphylla Salisb., kleinblättrige, ♀. k. Neuzeeland.
 minima Lod. (*myriophylla* Hort.), kleinste, ♀. k. Neuzeel.
 nitida DC., glänzende, ♀. w. Mascarenas.

Egletes Cass. Less., *Egletes*, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

- bellidiflora Less., maßliebenblumige, ♀. w. Südamerika.
 domingensis Cass., westindische, ♀. w. St. Domingo.

Ehretia L. (D. G. Ehret, deutscher Botaniker), V. 1.,
 Asperifoliaceae.

- acuminata RB., zugespitzte, ♀. t. Neuholland.
 aspera Roxb., rauhe, ♀. w. Ostindien.
 buxifolia Roxb., buchsbaumblättrige, ♀. w. Ostindien.
 divaricata DC. (*Radula* Poir.), ausgespreizte, ♀. Westind.
 dubia Jacq., zweifelhafte, ♀. w. Jamaica.
 internodis L'Her., zwischenknotige, ♀. w. Mascarenas.
 laevis Roxb., glatte, ♀. w. Ostindien, Neuholland.
 laxa Jacq., lockere, ♀. w. Mascarenas.
 microphylla Lam., kleinblättrige, ♀. w. Ostindien.
 serrata Roxb., sägeblättrige, ♀. w. Ostindien.
 tinifolia L., lorbeerblättrige, ♀. w. Westindien.

Bourreria Lam. v. *Beureria succulenta*. *halimifolia* L'Her. v. *Grabowskia boerhaaviaefolia*.

Ehrharta Thbg. (F. Ehrhart, deutscher Botaniker),
 VI. 1., Gramineae.

- calycina Sm., gekelchte, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.
 distichophylla LaBill., zweizeiligblättrige, 4. k. t. Neuholl.
 gigantea Ehrh., riesenhafte, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.
 panicea Sm., fennichartige, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.
stipoides LaBill. v. *Microlaena stipoides*.

Ekebergia Sparm. (C. G. Ekeberg, schwedischer Naturforscher und Reisender), X. 1. (XVI. VI.),
 Hesperideae-Meliaceae.

- capensis Sparm., capische, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

Elaeagnus T., Oleaster, IV. 1., Sandalaceae.

- acuminata Lk., zugespitzter, ♀. k. t. ?
 angustifolia L. (*hortensis* MB.), schmalblättriger, ♀. f.
 Südeuropa, Kleinasien, Taurien, Aegypten.

Elaeagnus

- β) dactyliformis Hort. γ) orientalis L. δ) spinosa L.
 arborea Roxb., baumartiger, f. k. t. Nepal.
 argentea Pursh, silberfarbiger, f. f. Nordamerika.
 conferta Roxb., dichtblumiger, f. k. t. Nepal.
 latifolia L. (*macrophylla* Thbg.), breitblättriger, f. f.
 Ceylon, Japan.
 salicifolia ? D. Don, weidenblättriger, f. f. b. ?

Gartenvariet.: flava, fusca, nepalensis, songarica.

- Elaeis** Jacq., Oelpalme, XXII. vi. (VI. iii.), Palmae.
 guineensis Jacq., guineische, f. w. Guinea, Westindien.
 melanococca G., schwarzfrüchtige, f. w. Neugranada.
 occidentalis W., westindische, f. w. Westindien.
 pernambucana Lod., pernambucanische, f. w. Brasilien.

- Elaeocarpus** L., Oelfrucht, XI. i., Tiliaceae-Elaeocarpeae.

- grandiflorus Wall., großblumige, f. w. Ostindien.
 reticulatus Sm. (*cyaneus* Sims), netzförmige, f. t. Neuholl.
 serratus L., sägezahnige, f. w. Ostindien.

dentatus Vahl v. *Dicera dentata*. *peduncularis* La Bill. v. *Friesia peduncularis*.

- Elaeodendron** Jacq., Oelstrauch, V. i., Evonymeae.
 australe Vent., neuholländischer, f. t. Neuholland.
 glaucum P., blaugrüner, f. w. Ceylon.
 integrifolium Trat., ganzblättriger, f. t. Neuholland.
 orientale Jacq., morgenländischer, f. w. Madagascar.
 xylocarpum DC., holzfrüchtiger, f. w. Antillen.

Argan W. v. *Argania Sideroxylon*.

- Elaphrium** Jacq., Elaphrium, VIII. i., Amyrideae.

- glabrum Jacq., glattes, f. w. Neugranada.

- Elate** L., Tannenpalme, XXI. vi., Palmae.

- sylvestris L., Wald-T., f. w. Ostindien.

- Elaterium** L., Springkapsel, XXI. x. (XVI. iii.), Cucurbitaceae.

- carthagenense L., carthagenensische, ♂. Sch. m. Südamer.
 tamnoides W., schmeerwurzähnliche, ♂. Sch. m. Mexico.

- Elatine** T., Tannenwedel, VIII. iv., Lythriariae (*Salicariae*).

- Alsinastrum L., quirlblättriger, ♂. f. Europa.
 hexandra DC. (*tripetala* Sm.), sechsmänniger, ♂. f. Europa.
 Hydropiper L., gemeiner, ♂. f. Europa.
 major A. Braun, größer, ♂. f. Westdeutschland, Frankreich.

- Schkuhriana Drev. et Hayne, Schkuhr's, ♂. f. Deutschl.
 triandra Schk., dreimänniger, ♂. f. Deutschland.

- Elegia** Thunb., Elegie, III. iii. (XXII. iii.), Restiaceae.
 juncea Thbg., simsenförmige, 4. k. t. Cap d. gut. H.
 racemosa Lam., traubige, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

- Eleiotis** DC., Eleiotis, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

- sororia DC., verschwisterte, ♂. Sch. w. Ostindien.

- Eleocharis** Auctor. v. *Heleocharis*.

- Eleogenus* ovatus N. E. v. *Heleocharis ovata*.

- Eleogiton fluitans* Lk. et *parvula* Lk. v. *Scirpus fluitans* etc.

- Elephantopus** L., Elefantenfuss, XIX. v., Compositae-Echinopeae.

- angustifolius Sw., schmalblättriger, 4. w. Jamaica.
 carolinianus W. (? *tomentosus* L.), carolinischer, 4. k. t.
 Carolina, Virginien.

Elephanthopus

- mollis* H. B. K., weicher, 4. w. Südamerika.
nudicaulis Poir., nacktstengeliger, 4. t. Carolina.
nudiflorus W., nacktblumiger, 4. w. Westindien.
scaber L., scharfer, 4. w. Ostindien.

spicatus Juss. v. *Distreptus spicatus*.

Elephantosis Fisch. et Mey., Elephantose, XIX. 1.,
Compositae-Eupatorieae.

- liatroides* Fisch. et Mey., schartenähnliche, 4. w. Brasilien.

Eleusine G., Eleusine, III. 11., Gramineae.

- calycina* Roxb., großkelchige, ☉. f. Ostindien.
coracana G., krummährlige, ☉. f. Ostindien, Japan.
distans Lk., entferntstehende, ☉. f. ?
indica G., indische, ☉. f. Aegypten, Ost- und Westindien, Süd- und Nordamerika.
oligostachya Lk. (*rigida* Spgl.), wenigährige, ☉. f. ?
Tocussa Fresen., *Tocussa-E.*, ☉, f. Abyssinien.
verticillata Roxb., wirtelförmige, ☉. f. Ostindien.
filiformis P., *tenerrima* Hornem. etc. v. *Leptochloa filiformis* etc.

Elichrysum W. v. *Helichrysum*.**Elisena** Lindl., Elisena, ? VI. 1., ? Coronariae-Asphodeleae.
longipetala Lindl., langkronige, 4. Zw. t. w. Lima.**Elliotia** Mühlbg. (Stephan Elliot, nordamerikanischer Botaniker), VIII. 1., Ericaceae.

- racemosa* Mühlbg., traubige, f. f. b. k. Georgia (Nordamer.)

Ellisia L. (J. Ellis, berühmter englischer Naturforscher), V. 1., Asperifoliaceae-Hydrophyllae.

- Nyctelaea* L., virginische, ☉. f. Virginien.

Ellobocarpus oleraceus Kaulf. v. *Ceratopteris thalictroides*.**Elodea** Mchx., Elodea, III, 111., Hydrocharideae.

- canadensis* Mchx., canadische, ☉. Wa. f. k. Nordamerika, Westindien.

Elodea pulchella Loud. v. ?**Elsholtzia** W. (J. S. Elsholtz, preussischer Botaniker), XIV. 1., Labiatae.

- cristata* W., kammige, ☉. f. Sibirien.
ocymoides P., basilicumähnliche, 4. w. Ostindien.
paniculata W., rispige, ♂. w. Ostindien.

Elymus L., Haargras, III. 11., Gramineae.

- arenarius* L., Sand-H., 4. f. Europa, Sibirien.
canadensis L., canadisches, 4. f. Nordamerika.
Caput Medusae L. (*crinitus* MB.), langborstiges, ♂. f. Spanien, Portugal, Taurien, Ungarn.
crinitus Schreb. (*intermedius* MB.), bemähntes, ☉. f. Ungarn, Taurien, Orient, Nordafrika.
dahuricus Ledeb. Loud., dahurisches, 4. f. Dahurien.
Delileanus Schult. (*aegyptiacus* Spgl.), Delil's, ☉. f. Aegypten.
europaeus L., europäisches, 4. f. Europa, Caucasus, Nordamerika.
geniculatus Curt., gegliedertes, 4. f. England, Schweden, Holland.
giganteus Vahl (? *mexicanus* Cav., *macrostachyus* Spgl.), riesenhaftes, 4. f. ?
glaucifolius Mühlbg., blaugrünblättriges, 4. f. Nordamer.
philadelphicus L., philadelphisches, 4. f. Nordamerika.
platatherus Ehrbg. Lk., langgranniges, ☉. f. Aegypten.

Elymus

- propinquus Fresen., verwandtes, 4. f. Nordamerika.
 sabulosus MB., sandliebendes, 4. f. Taurien, Sibirien, Caucasus.
 sibiricus L. (*tener* L. suppl.), sibirisches, 4. f. Sibirien.
 β) ramosus Dsf.
 striatus W. (*hordeiformis* R. et S.), gestreiftes, 4. f. Nordamerika.
 villosus Mühlbg., zottiges, 4. f. Nordamerika.
 virginicus L., virginisches, 4. f. Nordamerika.
Hystrix L. v. *Gymostichum Hystrix*.

Elyna Schrad., Hüllried, III. 1., Cyperaceae.

- spicata Schrad., ährenförmiges, 4. f. Europäische Alpen.
caricina M. et K. v. *Kobresia caricina*.

Elytraria Mchx., Elytrarie, II. 1., Acanthaceae.

- caulescens Loud., stengelige, ♂. w. Ostindien.
 crenata Vahl, gekerbte, 4. w. Ostindien.
 imbricata Vahl, dachziegelförmige, ♂. w. Westindien.
 lyrata Vahl, leierförmige, ♂. w. Ostindien.
 marginata Vahl, berandete, ♂. w. Guinea.
 ramosa Humb., ästige, ♂. w. Mexico.
 virgata Mchx., ruthenförmige, 4. k. Südcarolina.

Embelia Burm. (*Aembilla*, zeylamischer Name), V. 1., Sapotaceae-Ardisieae.

- robusta Roxb., starke, ♀. w. Ostindien.

Emblica G. (moluckischer Name), XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

- officinalis G., officinelle, ♀. w. Ostindien.
 racemosa Spgl., traubige, ♀. w. Ostindien.

Embothrium Forst., Prachtstrauch, IV. 1., Proteaceae.

- strobilinum La Bill, zapfentragender, ♀. t. Neuholland.
buxifolium Sm. etc. v. *Grevillea buxifolia* etc. *herbaceum* Cav. et *myricoides* G. (*silatifolia* Sm.) v. *Lomatia silatifolia* et *longifolia*. *salignum* Andr. v. *Hakea saligna*. *speciosissimum* Sm. v. *Telopea speciosissima*.

Embryopteris *glutinifera* Roxb. (*peregrina* G.), v. *Diospyros Embryopteris*.**Emex** Neck., Zwergampfer, VI. III., Portulaccae-Polygoneae.

- spinosus Campd., stacheliger, ♂. f. Süditalien, Portugal, Griechenland, Nordafrika, Cap der guten Hoffnung.

Empetrum T., Rauschbeere, XXII. III., Tricoccae-Empetreae.

- nigrum L., schwarze, ♀. f. Europa, Mittel- u. Nordamer.
 β) scoticum Hook.
 rubrum Vahl, rothe, ♀. k. Magellanische Meerenge.
album L. v. *Corema alba*,

Empleurum Soland., Empleurum, XXI. IV. (IV. 1.), Tricoccae-Rutaceae.

- serrulatum Ait., sägezähniges, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

Enarthrocarpus La Bill, Gliederschote, XV. 1., Cruciferae.

- arcuatus La Bill., bogenförmige, ♂. f. Syrien.
 pterocarpus DC., flügelige, ♂. f. Aegypten.

Encelia Adans., Encelie, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

- canescens Cav., grauliche, ♀. t. Peru.

Encelia

halimifolia Cav., meldenblättrige, ♂. t. Mexico.

Encephalartos Lehm. v. *Zamia* II.

Encyanthus Lour., Prachtglocke, X. 1., Ericaceae.

biflorus Lour., zweiblumige, ♂. t. China.

quinqueflorus Lour., fünfblumige, ♂. t. China.

reticulatus Lindl., netzförmige, ♂. t. China.

Encyclia Hook., Kreisstendel, XX. 1., Orchideae.

viridiflora Hook., grünblumiger, 4. w. Brasilien.

patens Hook. v. *Epidendrum odoratissimum*.

Enneapogon Desv. v. *Pappophorum*.

Enodium Gaud. v. *Molinia*.

Entada Adans. (malabarischer Name), X. 1. (XXIII. 1.),
Leguminosae-Mimoseae.

Adenanthera DC., drüsige, ♂. Sch. w. Südseeinseln.

Gigalobium DC., westindische, ♂. Sch. w. Westindien.

monostachya DC., einährige, ♂. Sch. w. Ostindien.

polystachya DC., vielährige, ♂. Sch. w. Westindien.

Pursaetha DC., ostindische, ♂. Sch. w. Ostindien.

Entelea RB., Entelea, XIII. 1., Tiliaceae.

arborescens RB., baumartige, ♂. t. Neuzeeland.

palmata Lindl., handförmige, ♂. t. ?

Epacris Forst., Felsbusch, V. 1., Epacrideae.

apiculata Cunn., kurzspitziger, ♂. t. Neusüdwallis.

auriculata Benth., geöhrt, ♂. t. Neuholland.

campanulata Lodd., glockenblumiger, ♂. t. Neuholland,
Van-Diemens-Land.

β) *alba*.

ceraeflora Grah., wachsbäumiger, ♂. t. Van-Diemens-Land.

coriacea A. Cunn., lederartiger, ♂. t. Neu-Cambria.

crassifolia RB., dickblättriger, ♂. t. Neuholland.

exserta RB., langfadiger, ♂. t. Van-Diemens-Land.

grandiflora Sm. (*longiflora* Cav.), großblumiger, ♂. t.
Neuholland.

heteronema LaBill., haariger, ♂. t. Van-Diemens-Land,
Neuholland.

β) *subreflexa* DC. (*heteronema* Hook.).

impressa LaBill., eingedrückter, ♂. t. Neuholland.

β) *parviflora* Lindl.

lanuginosa LaBill., wolliger, ♂. t. Van-Diemens-Land.

microphylla RB., kleinblättriger, ♂. t. Neuholland.

mucronulata RB., stachelspitziger, ♂. t. Van-Diemens-Land.

myrtifolia LaBill., myrtenblättriger, ♂. t. Van-Diemens-Ld.

nivea DC. (*nivalis* Grah.), schneeweiß, ♂. t. Neuholl.

obtusifolia Sm., stumpfblättriger, ♂. t. Neuholland,
Van-Diemens-Land.

onosmaeflora Cunn., lotwurzblumiger, ♂. t. Neuholland.

paludosa RB., sumpfliebender, ♂. t. Neuholland.

pauciflora Less. et Rich., wenigblumiger, ♂. t. Neuzeel.

pedicellata DC. (*microphylla* Gaudich.), gestielter, ♂. t.
Neuholland.

pulchella Cav., schöner, ♂. t. Oestliches Neuholland.

purpurascens RB., purpurfarbiger, ♂. t. Neuholland.

h) *rubra*.

rigida Sbr. (*carinata* Cunn.), starrer, ♂. t. Neuholland.

riparia RB., uferliebender, ♂. t. Neuholland.

ruscifolia RB., mäusedornblättriger, ♂. t. Neuholland.

serpyllifolia RB., quendelblättriger, ♂. t. Van-Diemens-
Land.

Epacris

sparsa RB., zerstreutblumiger, ♂. t. Neuholland.
variabilis Lodd., veränderlicher, ♂. t. Neuholland, Van-
 Diemens-Land.

villosa Cav., zottiger, ♂. t. Neuholland.

attenuata Lod. etc. v. *Lysinema pungens* β. *capitata* Poir. v. *Sphenotoma capitata*. *fasciculata* Forst.
 v. *Leucopogon fascicul.* *frondosa* G. v. *Dracophyl-
 lum longifolium.* *gracilis* Poir. v. *Sphenot.* *gracil.*
odorata Sm. v. *Lysinema pungens.* *rosea* Lodd. v.
Lysinema pungens β.

Ephedra L., Meerträubel, XXII. XIII. (XVI. v.), Taxineae (? Casuarineae).

altissima Dsf., höchstes, ♂. Sch. k. Nordafrika.

distachya L., zweiähriges, ♂. f. Südeuropa.

monostachya L., einähriges, ♂. f. Ungarn, Bessarabien,
 Taurien, Sibirien.

Ephemerum Dodon. v. *Lysimachia*.

Ephielis *fraxinea* W. v. *Matayba guianensis*.

Epidendrum L., Baumstendel, XX. I., Orchideae.

aemulum Lindl., ähnlicher, 4. w. Para.

anceps Lod., zweikantiger, 4. w. Ostindien.

angustifolium Sw., schmalblättriger, 4. w. Jamaica.

armeniaceum Lindl., aprikosenblättriger, 4. w. Brasilien.

aromaticum Bate., gewürzhafter, 4. w. Guatemala.

asperum Lindl., rauher, 4. w. ? Südamerika.

aurantiacum Bate., orangefarbiger, 4. w. Guatemala.

bicornutum Hook., zweihörniger, 4. w. Trinidad.

bifidum Aubl., weispaltiger, 4. w. Westind., Guiana.

Boothianum Lindl., Booth's, 4. w. Cuba.

calamarium Lindl., rohrartiger, 4. w. Brasilien.

cauliflorum Lindl., stengelblumiger, 4. w. Brasilien.

chloranthum Lindl., grünblumiger, 4. w. Demerara.

chloroleucum Hook., grünweißlicher, 4. w. Demerara.

ciliare L., gefranzter, 4. w. Westindien.

clavatum Lindl., keulförmiger, 4. w. Cumana.

cochleatum L., löffelförmiger, 4. w. Westindien.

conopseum Bartr. (*Magnoliae* Mühlbg.), schneckenblu-
 miger, 4. k. t. Südcarolina, Florida.

coriaceum Park., lederartiger, 4. w. Demerara.

cucullatum Lindl., kappenförmiger, 4. w. Para.

cuspidatum Lodd., langspitziger, 4. w. Westindien.

dichotomum Lindl., zweizinkiger, 4. w. Brasilien.

diffusum Sw., weitschweifiger, 4. w. Jamaica.

ellipticum Grah. Hook., elliptischer, 4. w. Brasilien.

elongatum Jacq., verlängerter, 4. w. Neugranada.

equitans Lindl., reitender, 4. w. Vera Cruz.

floribundum H. B. K., blüthenreicher, 4. w. Südamerika.

fragrans Sw. (*cochleatum* Curt.), wohlriechender, 4. w.
 Jamaica.

fucatum Lindl., geschmückter, 4. w. Havannah.

fuscum Sm. (*anceps* Jacq.), bräunlicher, 4. w. Westind.

gracile Lindl., schlanker, 4. w. Bahama.

Harrisoniae Hook., Harrison's, 4. w. Brasilien.

jonosmum Lindl., feinriechender, 4. w. Essequibo.

lacerum Lindl., zerschlitzter, 4. w. Havannah.

lividum Lindl., blaubrauner, 4. w. Columbia.

longicollis Lindl., langhälsiger, 4. w. Demerara.

macrochilum Hook., großlippiger, 4. w. Mexico.

monophyllum Hook., einblättriger, 4. w. Jamaica.

Epidendrum

nocturnum L., nächtlicher, 4. w. Westindien.

β) latifolium Lindl.

nutans Sw., überhängender, 4. w. Jamaica.

ochraceum Lindl., ockerfarbiger, 4. w. Mexico.

odoratissimum Lindl., starkkriechender, 4. w. Brasilien.

oncidoides Lindl., oncidiumähnlicher, 4. w. Südamerika.

pachyanthum Lindl., dickblumiger, 4. w. Guiana.

papillosum Bate., weichwarziger, 4. w. Mexico.

pastoris Llav., Hirten-B., 4. w. Mexico.

pictum Lindl., bemalter, 4. w. Demerara.

primulinum Lindl. (*altissimum* Bate.), primelblumiger, 4. w. Bahama.

pumilum Lindl., kleiner, 4. w. Calcutta.

pygmaeum Hook., zwergiger, 4. w. Brasilien.

rhizophorum Bate., wurzeltragender, 4. w. Guatemala.

rigidum Jacq., starrer, 4. w. Westindien.

Schomburgkii Lindl., Schomburgk's, 4. w. Südamerika.

secundum L., einseitiger, 4. w. Westindien.

selligerum Bate., sattelähnlicher, 4. w. Südamerika.

Skinneri Bate., Skinner's, 4. w. Cumana.

smaragdinum Lindl., smaragdfarbiger, 4. w. Demerara.

stenopetalum Hook., schmalkroniger, 4. w. Jamaica.

tessellatum Bate., würfeliger, 4. w. Guatemala.

tibicinis Bate., pfeifenähnlicher, 4. w. Honduras.

tridactylum Lindl., dreigabeliger, 4. w. Brasilien.

umbellatum Sw. (*difforme* Jacq.), doldiger, 4. w. Jamaica.

varicosum Bate., dickaderiger, 4. w. Guatemala.

variegatum Hook., bunter, 4. w. Brasilien.

verrucosum Sw., warziger, 4. w. Jamaica.

vesicatum Lindl., blasiger, 4. w. Brasilien.

viridipurpureum Hook., grünlichrother, 4. w. Jamaica.

aloëfolium L. (et *ensifolium* L. etc.) v. *Cymbidium*

aloëfolium etc. *altissimum* Jacq. v. *Oncidium*

altissimum. *amabile* L. vid. *Phalaenopsis amabilis*.

caudatum L. v. *Brassia caudata*. *flos aëris* L. v.

Aerides arachnites. *juncifolium* L. vid. *Oncidium*

juncifolium. *punctatum* L. v. *Cyrtopodium puncta-*

tum. *sanguineum* Swt. vid. *Broughtonia sanguinea*.

scriptum L. v. *Grammatophyllum speciosum*. *Vanilla*

L. v. *Vanilla aromatica*.

Epigaea L., Grundstrauch, X. 1., Ericaceae-Rhodoraceae.

repens L., kriechender, f. f. Nordamerika.

β) rubicunda D. Don.

Epilobium L., Weidenröschen. VIII. 1., Onagrariae.

alpestre Jacq. (*trigonum* Schk.), Voralpen-W., 4. f. Mitteleuropäische Voralpen.

alpinum L. (*anagallidifolium* Lam.), Alpen-W., 4. f. Europäische Alpen.

β) nutans Tausch.

angustifolium L. (*spicatum* Lam.), schmalblättriges, 4. f. Europa.

b) album.

angustissimum Ait. (*angustifolium* Lam., *Dodonaei* Vill., *Halleri* Retz.), schmales, 4. f. Europäische Alpen.

coloratum Mühlbg., farbiges, 4. f. Nordamerika.

crassifolium Lehm., dickblättriges, 4. f. ?

dahuricum Fisch., dahurisches, ©. f. Dahurien.

hirsutum L. (*grandiflorum* All.), rauhaariges, 4. f. Europa, Asien.

Epilobium

β) *tomentosum* Vent. (*incanum* P.) γ) *intermedium* Merat. — δ) *variegatum* Dens.
hypericifolium Tausch., johanniskrautblättriges, 4. f. Böhmen.

latifolium L., breitblättriges, 4. f. Nördlichstes Europa und Asien.

mexicanum DC., mexicanisches, 4. k. Mexico.

minutum Lindl., kleinstes, 4. f. ? Rußland.

montanum L., Berg-W., 4. f. Europa, Caucasus.

β) *lanceolatum* Sebast. (*nitidum* Host.). γ) *collinum* Gmel.

nutans Hornem., nickendes, 4. f. Dänemark.

obscurum Schreb., dunkles, 4. f. Deutschland.

organifolium Lam. (*alsinefolium* Vill.), dostenblättriges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Schottland.

palustre L., Sumpf-W., 4. f. Europa, Nordamerika.

β) *simplex* Tratt.

parviflorum Schreb. (*pubescens* Roth, *villosum* Ait.), kleinblumiges, 4. f. Europa.

β) *rivulare* Wahlenb.

persicinum Rchb. (*foliosum* *), pfirsichblüthfarbiges, 4. f. Deutschland.

roseum Schreb. (*purpureum* Fries), rosafarbiges, 4. f. Europa.

rosmarinifolium Hänke (*Fleischeri* Hochst., *denticulatum* Wender.), rosmarinblättriges, 4. f. Tyrol, Schweiz etc.

sericeum Bernh., seidenhaariges, 4. f. ?

squamatum Nutt. (*lineare* Mühlbg., *rosmarinifolium* Pursh), schuppiges, 4. f. Pennsylvanien.

strictum Mühlbg. (*molle* Torr.), steifes, 4. f. Nordamer.

tetragonum L. (*ramosissimum* Mch., *trigonum* Hortul.), vierkantiges, 4. f. Europa, Nordamerika.

villosum Thbg., zottiges, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

virgatum Fries (*Schmidtianum* Rostk.), ruthenförmiges, 4. f. Norddeutschland, Dänemark, Schweden.

Epimedium T., Sockenblume, IV. 1., Berberideae.

alpinum L., Alpen-S., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

diphyllum Lodd. (*album* Hort.), zweiblättriges, 4. k. f. b. Japan.

hexandrum Hook., sechsmännige, 4. f. Nordamerika.

macranthum Lindl. (*grandiflorum* Siebold), großblumige, 4. k. f. b. Japan.

pinnatum Fisch., gefiederte, 4. k. f. b. Nordpersien.

violaceum Siebold, violette, 4. k. f. b. Japan.

Epipactis Sw., Sumpfwurz, XX. 1., Orchideae.

atrorubens Hoffm. (*purpurata* Sm., *latifolia*, β . *rubiginosa* Koch), schwarzrothe, Kn. 4. f. Deutschl., Engl.

latifolia All. Sw., breitblättrige, 4. Kn. f. Europa.

microphylla Sw., kleinblättrige, 4. Kn. f. Nord- und Mitteldeutschland.

palustris Sw., gemeine, 4. Kn. f. Europa.

viridiflora Rchb., grünblumige, 4. Kn. f. Deutschland.

cucullata La Bill. v. *Eriochilus autumnalis*. *ensiflora*

Sw. etc. v. *Cephalanthera ensifolia* etc. *Nidus avis*

All. Sw. v. *Neottia* Nid. av.

Epiphyllum Herm. Haw., Flügelblatt, XII. 1., Cacteeae.

A. *Cereastri* (et *Rhipsalis* Pfeiffer).

Ackermanni Haw., Ackermann's, $\frac{1}{2}$ w. Mexico.

Epiphyllum

alatum Haw., ächtes, f. w. Jamaica.
crispatum Haw., krauses, f. w. ? Südamerika.

β) *latior* Salm.

Hookeri Haw., Hooker's, f. w. Brasilien.
latifrons Zucc., breites, f. w. Mexico.
oxypetalum Hort., schmalkroniges, f. w. Mexico, Guatemala.
pachypterum (Pfeiff.), (*Cereus alat.* Lk. et Otto et Bot. mag.), dickes, f. w. Westindien.

β) *crassior* Salm.

Phyllanthus Haw., milzfarnähnliches, f. w. Südamerika,
platycarpum Zucc., breitfrüchtiges, f. w. Brasilien.
ramulosum Hort. (*ciliare*, *ciliatum* Hort.), ästiges, f. w. Jamaica.

rhombeum Hort. (*crenulatum* Hort.), rautenförmiges, f. w. ?
speciosum Haw. (*Cactus phyllanthoides* DC. *elegans* Lk. *alat.* Hortul.), prächtiges, f. t. w. Mexico.

Bastarde mit *Cereus speciosissimus* und *Epiphyll. speciosum*: β) *hybridum* Hort. γ) *Jenkinsonii* Hort. Angl. δ) *Vandesii* H. Angl. ε) *ignescens* H. Dresd. ζ) *Guillardieri*. η) *Curtisii*. θ) *Roydii*. ι) *Desvauxii*. κ) *Linkii*. λ) *Kiardi*. μ) *coccineum grandiflorum*. ν) *unduliflorum*. ξ) *Eugenia*. ο) *May fly*. π) *Makoyi*. ρ) *aurantiacum*. σ) *albiflorum*. τ) *grandiflorum* (mit *Cereus grandiflorus* befruchtet *).

B. Genuini.

Altensteinii Pfeiff. (*truncatum multiflorum* Hort.), Altenstein's, f. w. Brasilien.

truncatum Haw., abgestutzter, f. w. Brasilien.

β) *coccineum* Hort. γ) *aurantiacum* Hort.

Epipogium Gmel. RB., Schuppenstendel, XX. 1., Orchideae.

Gmelini Rich., Gmelin's, 4. f. Deutschland, Schweiz, Caucasus, Sibirien.

Epithecia K. et W., Epithecie, XX. 1., Orchideae.

glauca K. et W., blaugrüne, 4. w. Mexico.

Equisetum T., Schachtelhalm, XXIV. II., Equisetaceae.

arvense L., Acker-S., 4. f. Europa, Asien, Nordamer.

Drummondii Hook., Drummond's, 4. f. Schottland.

fluviatile L. (*Telmateia* Ehrh., *eburneum* Roth.), Fluß-S., 4. f. Europa, Sibirien, Nordafrika.

hyemale L., Winter-S., 4. f. Europa, Asien,

limosum L., Teich-S., 4. f. Europa.

palustre L., Sumpf-S., 4. f. Europa, Nordamerika.

pannonicum Kit., ungarischer, 4. f. Ungarn.

pratense Ehrh., Wiesen-S., 4. f. Deutschl., Oberitalien.

reptans Wahlbg. (*scirpoides* Mchx.), kriechender, 4. f. Scandinavien, Schweden, Nordamerika.

sylvaticum L., Wald-S., 4. f. Europa, Asien, Nordamer.

umbrosum Mey., schattenliebender, 4. f. Norddeutschland, Sachsen, Pyrenäen, Nordamerika.

variegatum W. (*multiforme* Vauch.), bunter, 4. f. Mitteleuropa, Schweiz, Italien, Frankreich.

*) Vorstehende Arten und Abarten gehören nach Dr. Pfeiffer theils zu *Cereus*, theils zu *Rhipsalis*, da aber die meisten Gärtner gewohnt sind, sie nach ihrer Blattgestalt als *Epiphyllum* aufzuführen, so haben wir sie einstweilen hier stehen lassen.

Eragrostis P. B. (et *Megastachya* P. B.), Liebesgras,
III. II., Gramineae.

- abyssinica R. et S., abyssinisches, ☉. f. Abyssinien.
aegyptiaca R. et S., aegyptisches, ☉. f. Aegypten.
amabilis P. B., liebliches, ☉. w. Ostindien.
amboinensis R. et S., amboinisches, ☉. w. Molucken.
capensis Trin. (*brizoides* R. et S.), capisches, 4. k.
Cap der guten Hoffnung.
capillaris Lk., haarförmiges, ☉. f. Nordamerika.
ciliaris Lk., gefranztes, ☉. w. Ost- und Westindien.
comta Lk., geziertes, 4. w. Monte-Video.
cynosuroides R. et S., kammgrasähnliches, ☉. f. Aegypten, Ostindien.
elongata Lk. (*dependens* Hornem.), verlängertes, 4. w. Ostindien.
expansa Lk., ausgestrecktes, 4. w. Montevideo.
filiformis Lk. (*tenella* Pursh. ? *Purshii* Bernh.), fadenförmiges, ☉. f. Nordamerika.
Megastachya Lk. (*major* Host.), grofsähriges, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.
mexicana Lagasc., mexicanisches, ☉. f. Mexico.
namaquensis N. E., namaquisches, ☉. f. Cap d. g. H.
nigricans R. et S., schwärzliches, 4. w. Südamerika.
nitida Lk., Ehrenbg., glänzendes, ☉. f. Aegypt., Nubien.
pilosa P. B., haariges, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.
pilosissima Lk., starkhaariges, ☉. f. ? ?
plumosa Lk. (*despiciens* R. et S., *tenella* Lk.), federiges, ☉. f. Ostindien, Neuholland.
poeaeoides P. B. (*poeaeformis* Lk.), rispiges, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.
punctata R. et S., punctirtes, ☉. w. Malabar.
purpurascens Lk. Spgl., purpurfarbiges, ☉. f. ?
rufescens Schrad., röthliches, ☉. f. ?
senegalensis N. E., senegal'sches, 4. t. Senegal.
tephrosanthes R. et S., grauähriges, ☉. w. Malabar.
verticillata R. et S., wirtelförmiges, ☉. f. Spanien.

Eranthemum L. RB., Frühlingsblume, II. I., Acanthaceae.

- ambiguum R. et S., zweifelhafte, ⚥. w. ?
armatum RB., bewaffnete, ⚥. w. Jamaica.
bicolor Schrank., zweifarbiges, ⚥. w. Philippinen.
? capense L., capische. ⚥. w. Aethiopien, Ostindien.
crenatum Wall., gekerbte, ⚥. w. Nepal.
elegans RB., zierliche. ⚥. w. Guinea.
microphyllum RB. (? *parvifolium* Lk.), kleinblättrige, ⚥. w. Westindien.
nervosum RB. (*pulchellum* Andr.), nervige, ⚥. w. Ostind.
roseum RB., rosafarbiges, ⚥. w. Ostindien.
secundum Lindl., einseitige, ⚥. w. Brasilien.
spinosum RB., dornige, ⚥. w. Südamerika.
strictum Colebr., steife, ⚥. w. Ostindien.
variabile RB., veränderliche, ⚥. t. Neuholland.
flavum W. v. Barleria flava.

Eranthis Salisb., Winter-Sturmhut, XIII. VI., Ranunculaceae.

- hyemalis Salib., gemeiner, 4., Kn. f. Mittel- u. Südeuropa.
sibirica DC., sibirischer, 4. Kn. f. Ostsibirien.

Eremia D. Don v. Erica.

Eremurus MB., Schweifaffodile, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

Eremurus

spectabilis MB., ansehnliche, 4. f. Sibirien, Caucasus, Taurien.

Eria Lindl., Wollstendel, XX. 1., Orchideae.

bicolor Lindl., zweifarbiger, 4. w. Ceylon.

densiflora Lindl., dichtblumiger, 4. w. Java.

paniculata Lindl., rispiger, 4. w. Ostindien.

pubescens Lindl., weichhaariger, 4. w. Ostindien.

rosea Lindl., rosafarbiger, 4. w. China.

stellata Lindl., sternförmiger, 4. w. Ostindien.

Eriachne RB., Wollspelze, III. 11., Gramineae.

obtusata RB., stumpfe, 4. f. Nordamerika.

Erianthus Mchx., Wollgras, III. 11., Gramineae.**A. Genuin.**

brevibarbis Mchx., kurzbärtiges, 4. f. Nordamerika.

Ecklonii N. E., Ecklon's, 4. t. Cap der guten Hoffn.

saccharoides Mchx., zuckerrohrähnliches, 4. k. f. b. Nordamerika.

B. Ripidium Trin.

Ravennae P. B., italienisches, 4. f. Italien.

strictus Trin. (non Ell.), steifes, 4. f. Ungarn.

Erica T., Heide, VIII. 1., Ericaceae.

1. *Ectasis* s. *Acrostemon* Klotzsch. — *Macrostemum* Dryand. *Gypsocallidis* spec. et *Eriodesmia* et *Desmia* D. et G. Don.

accomodata Klotzsch, gefällige, 4. t. Cap d. g. H.

adunca Benth., hackenförmige, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

aequalis D. et G. Don, gleichförmige, 4. t. Cap d. g. H.

azaleaefolia Salisb., azaleenblättrige, 4. t. Cap d. g. H.

Banksii W. (*monadelpha* Curt., *fragilis* Salisb.), Bank's,

4. t. Cap der guten Hoffnung.

barbigera Klotzsch, härtige, 4. t. Cap der gut. Hoffn.

bruniades L., brunienähnliche, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

a) *velleriflora* Salisb. (*capitata* Thbg.), β) *car-*

basina Salisb. (*lasiocephala* et *eriantha* Klotzsch).

bruniaefolia Salisb., brunienblättrige, 4. t. Cap d. g. H.

capitata L. (*byssina* Salisb.), kopfförmige, 4. t. Cap d. g. H.

carnea L. (*herbacea* L., *purpurascens* L., *saxatilis* Salisb.),

fleischfarbige, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

chrysantha Klotzsch, goldfarbige, 4. t. Cap d. g. H.

conferta Andr., dichtblumige, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

crassiseppala Benth., dickkronige, 4. t. Cap d. g. H.

desmantha Benth., büschelblumige, 4. t. Cap d. g. H.

humilis Benth., niedrige, 4. t. Cap der guten Hoffn.

imbricata L. (*flexuosa* Andr., *divaricata* Wendl., *actaea*

Hort. non Lk., *caesia* et *stylosa* Salisb., *ramulosa*,

imbricata, *ornata*, *leptocephala*, *trifaria*, *densiflora*

sparsa, *paleacea*, *pyramidalis*, *squamaeflora*, *stylosa* et

violacea Auctor.), dachziegelförmige, 4. t. Cap d. g. H.

intermedia Klotzsch, mittlere, 4. t. Cap d. g. H.

involuta Klotzsch, breithüllige, 4. t. Cap d. g. H.

invovens Benth., eingehüllte, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

lanata Andr. (*flaccida* Lk.), wollige, 4. t. Cap d. g. H.

Lehmanni Klotzsch, Lehmann's 4. t. Cap d. g. Hoffn.

lineata Benth., linienförmige, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.

lycopodioides Lodd., bärlappähnliche, 4. t. ? Cap d. g. H.

mediterranea L. (*lugubris* Salisb.), mittelländische, 4. k.

f. b. Süd- und Westeuropa.

monadelpha Andr. (*surfurosa* Salisb.), einbrüderige, 4.

t. Cap der guten Hoffnung.

Erica

nutans Wendl. (*pudibunda* Salisb.), überhängende, ♀. t.

Cap der guten Hoffnung.

obtusata Klotzsch, stumpfliche, ♀. t. Cap der gut. H.
 penicillata Andr. (*Plukenetii inflata et conferta* Wendl.),
 pinselförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

penicilliflora Salisb. (*calyculata* Wendl., *rostellia* Bedf.,
Rastellum Spgl., *rostrata* Bartl.), pinselblumige, ♀. t.

Cap der guten Hoffnung.

petiolata Thbg. (*petiolaris* Salisb.), gestielte, ♀. t. Cap
 der guten Hoffnung.

Petiveri W. (*follicularis* Salisb.) Petiver's, ♀. t. Cap d. g. H.
 physantha Benth., aufgeblasene, ♀. t. Cap der gut. H.

β) *Melastoma* Andr.

Plukenetii L. (*penicillata* Lod., *fusiformis* Salisb., *revol-*
vens Bartl.), Plukenet's, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

pogonantha Bartl. (*tiaraeflora* β *squarrosa* Klotzsch),
 purpurbeutelige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

polifolia Salisb. (*cuspidata* Klotzsch), poleiblätterige, ♀. t.
 Cap der guten Hoffnung.

Sebana Dryand. (*Petiveri* L., *coccinea* L., *baculiflora* et
cothurnalis Salisb.), Seba's, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

senilis Klotzsch, greisige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

setifera Klotzsch, borstige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

sexfaria Dryand. (*spumosa* Thbg.), sechsreihige, ♀. t.

Cap der guten Hoffnung.

socciflora Salisb. (*Sebana lutea* Andr. et *viridis* Andr.,
demissa Bedf.), sockenblumige, ♀. t. Cap d. gut. H.

spumosa L. (*scariosa* Berg. Wendl.), schaumige, ♀. t.

Cap der guten Hoffnung.

stellata Lod. (*solandroides* Andr., *incurva* Wendl., *stella-*
ris Nois.), sternförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

stylaris Spgl. (*congesta* Lodd.), langgriffelige, ♀. t. Cap
 der guten Hoffnung.

suffulta Wendl. (*tiaraeflora a stricta* Klotzsch), unter-
 stützte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

tiaraeflora Andr. (*leptophylla* Kl., *placentaeiflora* Salisb.),
 mützenblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

triceps Lk. (*spumosa* Wendl.), dreiköpfige, ♀. t. Cap
 der guten Hoffnung.

turmalis Salisb., säulenförmige, ♀. t. Cap der gut. H.

vestiflua Salisb. (*Petiveri hirsuta* Andr. *picta* Bedf.),
 schönbekleidete, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

villosa Pluk. (*canescens* Dryand., *?eriocephala* Andr., *pi-*
losa Lodd.), zottige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

viridiflora Andr., grünblumige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

β) *?clavata* Andr.

II. *Syringodea* s. *Tubiflorae*, et *Dasyanthes*, *Chona*,
Eurylepis et *Eurystegia* D. et G. Don.

abietina L. (*Patersonia* Andr., *spissifolia* Salisb.), tannen-
 ähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

aurea Andr. (*grandiflora brevifolia* Wendl.), goldfarbige,
 ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *viscosissima* Lee.

blanda Andr. (*mammosa* Thbg., *doliiformis* Salisb.),
 liebliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Bowieana Lodd. (*Bowei* Bedf., *Bauerea* Andr.), Bowie's,
 ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

brachialis Salisb., armförmige, ♀. t. Cap der gut. H.

Erica

Broadleyana Andr., Broadley's, f. t. Cap der guten H. buccinaeformis Salisb. (*curvisflora* L. Andr., *simpliciflora* Wendl. W.), posaunenblumige, f. t. Cap d. gut. H. Burchellii Benth., Burchell's, f. t. Cap der gut. Hoffn. cerinthoides L., wachsblumenähnliche, f. t. Cap d. g. H.

b) major. c) nana.

chloroloma Lindl., grünsaumige, f. t. Cap d. gut. H. clavaeflora Salisb. (*sessiliflora* Andr.), keulenblumige, f. t. Cap der guten Hoffnung.

coccinea Berg. (*frondosa* Salisb.), scharlachblumige, f. t. Cap der guten Hoffnung.

β) echiiflora Andr. (*glandulosa* Wendl., *ostrina* Lodd., *pulviniformis* Salisb.). γ) Archeriana Lodd. δ) Rollinsonia Bedf. G. Don. ϵ) sanguinea Bedf. Lodd.

colorans Andr. Lodd., farbändernde, f. t. Cap d. g. H. concinna Soland. (*paludosa* Salisb.), nette, f. t. Cap der guten Hoffnung.

conspicua Soland., ansehnliche, f. t. Cap der gut. H. a) longiflora Andr. β) splendens Kl. Wendl. (*elata* Andr., *laniflora glabra* Andr.). γ) lanata Wendl. (*verticillaris* et *longiflora* Salisb.). δ) laniflora Wendl. (*sordida* Andr., *floccosa* Salisb.).

cruenta Soland. (*melliflua* Salisb.), blutfarbige, f. t. Cap der guten Hoffnung.

β) lucida Benth. (*concinna* Drege). $? \gamma$) mutabilis Lodd. non Salisb.

curvisflora Thbg. L. (*simpliciflora* W. et *fastuosa* Salisb.), gekrümmtblumige, f. t. Cap der guten Hoffnung. cylindrica Wendl., cylinderblumige, f. t. Cap d. g. H. dichrus Spgl. (*dichromata* Lodd., *bicolor* Andr., *quadriflora* Kl., *refulgens brevifolia* Kl.), zweigabelige, f. t. Cap der guten Hoffnung.

discolor Andr. (*cupressiformis* Salisb.), verschiedenfarbige, f. t. Cap der guten Hoffnung.

β) puberula.

elongata Lodd. (*transparentis* Thbg., *strigilifolia* Salisb., *venusta* Kl.), verlängerte, f. t. Cap der gut. Hoffn. erubescens Andr. (*cerinthoides* β . Thbg., *pectinifolia* Salisb.), schönrothe, f. t. Cap der guten Hoffnung. exurgens Andr. (*pharetraeformis* Salisb.), aufgerichtete, f. t. Cap der guten Hoffnung.

$? \beta$) hybrida Andr. $? \gamma$) formosa Andr. (*curvisflora rubra* Hortul.).

fascicularis L. fil. (*octophylla* Thbg., *coronata* Andr., *radiiflora* Salisb.), büschelförmige, f. t. Cap der guten Hoffnung.

Hybrid.: imperialis Andr.

flammea Andr. (*bibax* Salisb.), flammende, f. t. Cap der guten Hoffnung.

foliacea Andr., blätterreiche, f. t. Cap der gut. Hoffn. fulgida Bedf. Lodd. (*speciosissima* Klot.), brennendrothe. f. t. Cap der guten Hoffnung.

gelva Wendl. (*gelida* Andr., *alveiflora* Salisb.), fahlgelbe, f. t. Cap der guten Hoffnung.

grandiflora L. fil. (*grandiflora* β ., *longifolia* Wendl., *strictifolia* Kl.), großblumige, f. t. Cap d. gut. H. Halicacaba L. (*rupestris* Salisb.), judenkirschartige, f. t. Cap der guten Hoffnung.

Erica

hebecalyx Benth. (*speciosa tomentosa* Kl.), stumpfkelchige, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

Hesseana Wendl., Hesse's, $\S$. t. Cap der guten Hoffn.

Hibbertiana Andr., Hibbert's, $\S$. t. Cap der gut. Hoffn.

ignescens Andr. Wendl. (*tubiflora* L. spec. Salish., *cuspidigera* Wendl., *procera* Wendl.), feuerfarbige, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

insulsa Bedf., zweifelhafte, $\S$. t. Cap der guten Hoffn.

lanuginosa Andr., wollige, $\S$. t. Cap der guten Hoffn.

Leeana Dryand., Lee's, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

a) aurantiaca Benth. (*costaeflora* Salish.). β) candida Bartl. (*pinca* Wendl., ? *pura* Andr.). γ) viridis Andr. δ) glutinosa minor Andr. ϵ) glaucescens Bartl. ζ) pulchella Thbg. (*argentifolia* Salish.)

longifolia Ait. (*pinca* et *pinifolia* Andr., *vestita coccinea* Bot. mag. et Lodd., *pithyophylla* Spgl.), langblättrige, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

mammosa L. (*abietina* Berg., *speciosa* Schneev., *verticillata* Andr. Lodd.), zitzenartige, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

β) albiflora Hort. (*gelida* Hort.). γ) ? pallida Hort. Massoni L. fil. (*Massonia* Andr., *lycopodiifolia* Salish.), Masson's, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

Mertensiana Wendl., Merten's, $\S$. t. ? Cap d. gut. H.

Meuroni Benth. (*verecunda* Lodd., *metulaeflora* Kl.), Meuron's, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

β) minor Hort. (*gemmifera* Lod.).

Monsoniana L. fil. (*variifolia* Salish.), Monson's, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

nana Salish. (*depressa* Andr.), Zwerg-H., $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

Niveni Andr. (*embothrifolia* Salish., *Chona sanguinea* D. et G. Don), Nieven's, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

β) longiflora Andr.

oblongiflora Benth., verlängertblumige, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

onosmaeflora Salish. (*glutinosa* Andr., *viscida* Wendl.), lothwurzblumige, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

pallens Andr. (*Dickensoni* Lodd.), bleiche, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

pellucida Andr., durchschimmernde, $\S$. t. Cap d. g. H.

a) rubra Andr. (*pelluc. tenera* Kl.) *glandulosa*

Thbg., *Syringod. exposita* et *Bedfordiana* G. Don.

β) media Kl. γ) exsudans Andr. δ) hirtiflora

Benth. (? *exsudans* Lodd., *glandulosa* Drege).

ϵ) ? *breviflora* Benth.

perspicua Wendl. (*Linnaeana* Andr. Lod.), durchsichtige, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

* *linnaeoides* Andr. (*hirsuta* Lodd.), *Linnaea superba* Andr. Lod.).

puberula Kl., feinhaarige, $\S$. t. Cap der guten Hoffn.

purpurea Andr. Wendl. (*phylicifolia* Salish., *formosa* Andr., *pinca purpurea* Lod., *rigidiuscula* Wendl.), purpurfarbige, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

β) argentiflora Andr.

regia Bartl., königliche, $\S$. t. Cap der guten Hoffn.

sacciflora Salish. (*epistomia* Lodd.), sackblumige, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.

Erica

- serratifolia Andr. (*cyindriflora* Salib.), sägeblättrige,
 ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
 β) plumosa Wendl. non Andr.
- Sparmanni L. (*aspera* Andr., *hystriciflora* Salib., *armata* Spgl.), Sparmann's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- speciosa Andr., prächtige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
 β) hirta Andr. γ) calycina Benth. (*speciosa* Lod.).
 spicata Thbg. (*sessiliflora* L. fil., *favosa* Salib.), ährenförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
 β) ciliata (*sceptriformis* Salib.).
- sulcata Benth., gefurchte, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
- sulfurea Andr. (*stagnalis* Salib.), schwefelgelbe, ♀. t.
 Cap der guten Hoffnung.
- transparens Andr. (*diaphana* Spgl.), durchleuchtende, ♀. t.
 Cap der guten Hoffnung.
- tubiflora W., röhrenblumige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
- tumida Ker (*splendens* Andr.), aufgeschwollene, ♀. t.
 Cap der guten Hoffnung.
- Uhria Andr. (*decora* Salib.), Uhrsche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- versicolor Andr., buntfarbige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
 β) major Andr. (*refulgens* Andr.). γ) costata Andr. Salib. (*versic. ciliata* Wendl.).
- vestita Thbg. (*longifolia carnea* Bot. mag., *pinifolia* Salib.), bekleidete, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
 * rosea Andr. Lodd. a) alba. b) blanda. c) incarnata. d) purpurea. e) rosea. f) fulgida. g) coccinea. h) lutea. i) mutabilis. k) elegans.
- virescens Lk. (*viridescens* Lodd., *hirta viridiflora* Andr., *unicolor* Wendl.), grünliche, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.
- Wendlandiana Kl., Wendland's, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.
- Hybriden, von Tubiflor. et Limbat. erzogen: A. Syringodoideae: cylindrica Andr. Lodd. (*ambigua* Wendl., *hybrida* Hortul.). b) alba. Patersonioides Bedf. (*Patersonia coccinea* Andr., *Andrewsii* Kl.), magnifica Andr., rubida Lodd. (*rubercalix* Andr.), pallida Lodd. B. Evanthis-stellatae: radiata Andr. (*calamiformis* Salib.), radiata-discolor. Swainsonia Andr., undulata Lodd. Andr. (*Westphalingia* Hortul.), rigida Lodd., spuria Andr. (*culcitiaeflora* Salib., *tubulosa* Wendl., *translucens* Andr.), perspicuoides Bedf. (*Syringod. Bedfordiana* G. Don), buccinaeflora Sims, calostoma Lodd., stellifera Andr. Lodd. (*bibracteata* Kl.). C. Pleurocalli-stellatae: acuminata Andr. Lodd., carinata Lodd. (*acuminata angustiflora* Andr.), pseudovestita Benth., rugosa Andr. D. Dasyanthi-stellatae: princeps Andr. Lodd., oblonga Bedf., metulaeflora Curt. Lodd. non Andr., adjuvans parviflora Kl., Andrewsii Hort. (*metulaefl.* Andr.), Templea Andr. (*Callista Templeana* G. Don), quadrangularis Andr. (*erosa* Lodd.).
- III. Stellanthae seu Limbatae (et *Calycinae* Lk.), Euryloma, Callista et Lamprotis D. et G. Don.
- Aitoniana Mass. (*jasminiflora* Salib.), Aiton's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- albens L. mant. Wendl. (*albida* Thbg., *viminalis* Salib.).
 weißliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
 β) longiflora.

Erica

ampullacea Curt. And. (*ampullaeformis* Salisb.), flaschenblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

aristata Andr. Lodd., gegrannte, ♀. t. ? Cap d. g. H.

Hybrid.: (von Massoni, retorta, ampullacea und aristata), crinita Lodd. (*Hartnelli* Roll.), pinguis Kl. (*tricolor comosa* et *Clowieana* Hort.), aristella Bedf. (*Sprengelii* Hort., *aristata minor* Andr., *eximia* Lodd., *equestris* Kl.), Forbesiana Kl. (*Euryloma ampullaceoides* G. Don), tricolor Nois. non Spgl. ducalis Kl.

articularis L. non Thbg., gegliederte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Bartlingiana Kl., Bartling's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn. Blandfordiana Andr., Blandford's, ♀. t. Cap d. gut. H. borboniaefolia Salisb. (*togata* Sims, *aperta* Spgl.), borbonienblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

bracteata Thbg. (*obvallaris* et *hyssopifol.* Salisb., *obcordata* Bedf., *togatoides* Hortul., *Lamprotis calycina* G. Don), deckblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffn. caledonica Spgl. fil. (*marginata* Bartl.), caledonische, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

chlorosepala Benth., grünelchige, ♀. t. Cap d. gut. H. comosa L. (*transparens* Berg, *galiiflora* Salisb.), schopfige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

corifolia L. (*calycina* Andr., *corifol. spicata* Wendl., *articularis* Curt., *tunicata* Bartl., *alopecias* Tausch), erdkieferblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Corydalis Salisb., kappenmohnähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

curvifolia Salisb. (*Comptoniana* Andr., *terminal.* Kl.), krummblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

daphniflora Salisb. (*incerta* et *ingesta* Kl.), kellerhalsblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

denticulata L. mant. (*dentata* Thbg., *venusta* Hort.), gezähnelte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

dianthifolia Salisb. (*biflora* Lk. Lodd., *oppositifolia major* Andr.) nelkenblättrige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

eripus Benth., wollstielige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn. fastigiata L. Wendl. (*fasciformis* Salisb., *mundula* Andr., *Humeana* Lodd.), gipfelständige, ♀. t. Cap d. g. H.

* *primuloides* Andr. Lodd.

glandulifera Kl., drüsige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

glomerata Andr. (*rubella* Ker Lodd., *Lambrotes calycinodes* et *rubida* G. Don), knaulförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

glutinosa Berg. (*droseroides* Andr.), kleberige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

jasminiflora Andr. (*lagenaeformis* Salisb.), jasminblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

* *minor* Andr.

incarnata Thbg. non Andr. (*amoena* Salisb. non Wendl.), fleischfarbige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

inflata Thbg. (*amabilis* Salisb., *Sainsburyana* Andr., *cariniula* Lodd., *carneola* G. Don), blasigröhrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *ollula* Andr. Lodd.

Irbyana Andr. Lodd., Irby's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

* *Bandonia* Andr.

Erica

laevigata Bartl. (*oppositifolia rubra* Lodd.), glatte, ♀. t.

Cap der guten Hoffnung.

lamprotes Kl., glänzendblumige, ♀. t. Cap der gut. H.

Lawsoniana Andr. (*infundibuliformis* Bartl., *leptocarpa* Spgl.), Lawson's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

lutea L. (*imbellis* Salisb.), gelbe, ♀. t. Cap d. gut. H.

β) albiflora Benth. (*oppositifol.* Andr. Lodd., *bi-flora* Hort.)

Meyeriana Kl. (*pallescens* Kl.), Meyer's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Muscari Andr. Wendl. (*moschata* Lodd., *fragrans* Salisb.),

Moschus-H., ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) trossula Lodd. γ) cruciformis Andr. (*denticulata lutescens* et *fastigiata lutea* Hort., *Callist. cuneiformis* et *Bedfordiana* G. Don). δ) nidiflora Salisb. ε) Bonplandiana Lodd. (*scoliostoma* Kl.).

nodiflora Kl., knotenblumige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

obobata Andr., topfblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

pallidiflora Salisb. (*pallida* Wendl. non Sal.), bleichblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

patula Kl. (*calycanthoides* Kl.), ausgebreitete, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

pavettaeflora Salisb. (*infundibuliformis* Andr., *hypocrateriformis* Tausch), pavettablumige, ♀. t. Cap d. g. H.

* Coventryana Andr. Lodd.

pectinata Kl., kammförmige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

pedicellata Kl., kurzgestielte, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

polygalaefflora Kl., polygalablumige, ♀. t. Cap d. g. H.

β) major.

praecox Kl. (*Behen* E. Mey.), frühe, ♀. t. Cap d. g. H.

praestans Andr., vortreffliche, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

Hybrid.: daphnoides Lodd., laxiflora Lodd. (*praestans* Lodd.), hyacinthoides Andr., Parmentieri Lodd., mirabilis Lodd.

pycnantha Benth., schartenblumige, ♀. t. Cap d. g. H.

retorta L. fil. (*gorteriaefolia* Salisb.), zurückgedrehte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

rufescens Kl., fuchsrothe, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

Russeliana Andr., Russel's, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

Savileana Andr. (*Savilliae* Lodd.), Saville's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Shannoniana Andr. (*Shannoni* Lodd.), Shannon's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

squarrosa Salisb. (*ferruginea* Andr.), sparrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnang.

Steinbergiana Wendl. fil., Steinberg's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

taxifolia Dryand. (*turgida* Lk. non Salisb.), taxusblät- terige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) major Andr.

tenuiflora Andr. (*cylindrica* Thbg. non Wendl. nec Andr.), dünnblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

* carnea Andr. * Cliffortiana Lodd. (*tenuiflora alba* Andr.).

tenuifolia L. (*oppositifolia rubra* Andr., *linifolia* Salisb.), dünnblät- terige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

teretiuscula Wendl. (*flagelliformis* Andr., *flagellaris* Lk., *struthiolaefolia* et ? *filiformis* Bartl.), rundliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Erica

tetragona Thbg. Andr. (*pugionifolia* Salisb.), vierkantige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Thunbergii L. fil. (*medioliflora* Salisb.), Thunberg's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

trichroma Benth. (*tricolor* Niven), dreiständige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

ventricosa Thbg. (*venusta* Salisb.), bauchige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) praegnans Andr. * densa Andr. (*glabra* Link).

Garten-Varietäten: a) coccinea, b) stellifera, c) carnea, d) alba, e) superba, f) erecta, g) nana, h) hirsuta.

venusta Bedf. (*dentata* Wendl., *pellucida* Salisb.), holdselige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

virginalis Kl., jungfräuliche, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

Walkeriana Andr. (*pulchra* Salisb., *juliana* Salisb.),

Walker's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) platysepala Benth. (*fastigiata* Andr. non L.).

γ) rubra Andr. δ) ?grandiflora Benth.

Zeyheri A. Sogl., Zeyher's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

IV. Euerica s. Brevisflorae — *Brevisflorae* et *Calycinarum spec.* Dryand. — Erica, Pachysa, Ceramia, Lophandra, Octopera et Gypsocallis et Eurystegia D. et G. Don.

absinthoides L., wermuthähnliche, ♀. t. Cap d. g. H.

acrophya Fresen., abyssinische, ♀. t. Abyssinien.

acuta Andr. (*crossota* Sogl.), spitze, ♀. t. Cap d. g. H.

affinis Benth. (*Zeyheri* Bartl., *Bartlingiana* Kl.), ähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

aggregata Wendl., angehäuften, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn. b) rubra.

albescens Kl., weißliche, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

andromedaeiflora Andr. (*holosericea* Salisb., *pomifera* Hort.), andromedenblumige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

* triumphans Lodd. (*andromedaeiflora alba* Hort.).

angustata Bartl., verschmälerte, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

arborescens L. (*caffra* L., *scoparia* Thbg., *procera* Salisb.), baumartige, ♀. k. f. b. Griechenland, Süd- u. Westeuropa, Madeira.

b) stylosa Don. c) squarrosa Hort. d) minima Hort.

ardens Andr., funkelnde, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

argentea Kl., silberfarbige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

aristifolia Niven, grannenblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.

armata Kl., bewaffnete. ♀. t. Cap der guten Hoffn.

australis L., südliche, ♀. t. Westeuropa, Nordafrika.

axilliflora Bartl., achselblumige, ♀. t. Cap der gut. H.

baccans L. (*bacciformis* Salisb.), beerenförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

barbata Andr. (*pannosa* Salisb.), bärtige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

Bergiana L. (*quadriflora* Andr., *lacunaeiflora* Salisb.), Bergius's, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

bicolor Thbg. (*calathiflora* Salisb., *concaua* Lodd.), zweifarbige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

brachycentra Benth., kurzgrannige, ♀. t. Cap d. g. H.

brevifolia Salisb. (*callosa* Wendl., *obtusata* Lodd., *pachyphylla* Sogl.), kurzblättrige, ♀. t. Cap der gut. H.

campanulata Andr., glockenblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

Erica

canaliculata Andr., rinnenförmige, ⚔. t. Cap d. gut. H.
capillaris Bartl. (? *scariosa* Thbg.), haarförmige, ⚔. t.

Cap der guten Hoffnung.

carduifolia Salisb. (*aprica* Kl.), distelblättrige, ⚔. t.

Cap der guten Hoffnung.

carinata Kl., nachenförmige, ⚔. t. Cap d. gut. Hoffn.

catervaeiflora Salisb. (*compacta* Bartl., *pubescens villosa*

Thbg.), häufigblumige, ⚔. t. Cap der guten Hoffn.

β) ? *glabrata* Benth. (*corymbosa* Bartl., *Sieberiana* Kl.).

? *cephalotes* Thbg., grofsköpfige, ⚔. t. ? Cap d. g. H.

cernua L. fil., übergebogene, ⚔. t. Cap d. gut. Hoffn.

? *cerviciflora* Salisb., gabelblumige, ⚔. t. ? Cap d. g. H.

Chamissonis Kl., Chamisso's, ⚔. t. Cap der gut. Hoffn.

chlamydiflora Salisb. (*plumigera* Bartl.), dickbeutelige,

⚔. t. Cap der guten Hoffnung.

ciliaris L., gefranzte, ⚔. k. f. b. Westeuropa, England.

b) *alba*.

* *Watsoni* Benth.

cinerea L. (*mutabilis* Salisb.), aschgraue, ⚔. k. f. b.

Westeuropa.

b) *atropurpurea* Lodd. c) *alba* Lodd. d) *pallida*

Lodd. e) *carnescens* Lodd. f) *prolifera* Lodd.

g) *stricta* Lodd.

β) *madeirensis* Benth., Madeira.

coarctata Wendl. (*axillaris* Soland., *brevipes* Bartl.), ge-

drungene, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.

β) ? *longipes* Bartl.

condensata Benth., gedrängte, ⚔. t. Cap d. gut. Hoffn.

conica Lodd., kegelförmige, ⚔. t. ? Cap der gut. Hoffn.

Constantia Nois., *Constantia*-H., ⚔. t. Cap d. gut. H.

cordata Andr. (*punctata* Bartl.), herzförmige, ⚔. t. Cap

der guten Hoffnung.

β) *angustifolia*.

cornuta Roxb. (*blanda* Salisb.), gehörnte, ⚔. t. Cap

der guten Hoffnung.

coronifera Benth., gekrönte, ⚔. t. Cap der gut. Hoffn.

crassifolia Andr. (*complanata* Nois.), dickblättrige, ⚔. t.

? Cap der guten Hoffnung.

cristaeiflora Salisb. (*melananthera* Thbg. non L.), kamm-

blumige, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.

cubica L. (*hottoniaeflora* Salisb.), cubische, ⚔. t. Cap

der guten Hoffnung.

cumuliflora Salisb. (*horizontalis* Andr., *tricolor* Spgl.),

überfülltblumige, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.

cupressina Bedf. (*turrigera* Salisb.), cypressenähnliche,

⚔. t. ? Cap der guten Hoffnung.

b) *major*.

curvirostris Salisb. (*declinata* Lodd.), gekrümmtschnabe-

lige, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.

cymosa E. Mey., afterdoldige, ⚔. t. Cap d. gut. Hoffn.

decipiens Spgl. (*Constantia* H. Angl.), täuschende, ⚔. t.

Cap der guten Hoffnung.

decora Andr. (*viscaria* Bauer), verzierte, ⚔. t. Cap der

guten Hoffnung.

deflexa Bedf., herabgebeugte, ⚔. t. ? Cap d. gut. Hoffn.

deliciosa Wendl. (*umbellata* Bartl.), beliebte, ⚔. t. Cap

der guten Hoffnung.

Erica

demissa Kl. (*globuliflora* Kl.), niedrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

depressa L. (*humilis* Salisb., *rupestris* Andr.), niedergedrückte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

dilatata Wendl. fil. (*hirta* Wendl. non Thbg.), erweiterte, ♀. t. ? Cap der guten Hoffnung.

diosmaefolia Salisb. (*serrulata* Bedf.), göttergeruchblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

dioetaeflora Salisb., feinstielige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

distorta Bartl., verdrehte, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

dumosa Andr. (*longipedunculata* Lodd.), heckige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

dysantha Benth., haarkronige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

elegans Andr., zierliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

empetrifolia L. (et *malleolaris* Salisb.), rauschbeerенblätterige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

* intertexta Lodd.

empetrioides Andr. (*empetrifolia glauca* Wendl., *pyxidiflora* Salisb.), rauschbeerенähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

exigua Salisb., kleinste, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
β) inermis Kl.

fabrilis Salisb. (*confertifolia* Wendl., *montana* Bedf.), dichtblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

fausta Salisb., glückliche, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

filiformis Salisb. (*divergens* Wendl., *flavida* et *connivens* Kl.), fadenförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

filipendula Benth., fadenhängende, ♀. t. Cap d. g. H.

fimbriata Andr. Lodd., gefranzte, ♀. t. Cap d. gut. H.

flacca E. Mey., schlaffe, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

flavicans Kl., gelbliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

flavicoma Bartl., gelbschopfige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

flocciflora Benth., flockigblumige, ♀. t. Cap d. gut. H.

floccosa Bartl., flockige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

floribunda Lodd. (*sparsa* Lodd., *galiiflora* Bartl., *macrostoma* Kl.), blüthenreiche, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

β) micrantha Kl. (*nemorosa* Kl.).

florida Thbg. (*Bergiana* Wendl.), schönblühende, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) parviflora Kl. (*campylophylla* Speg.).

formosa Thbg. (*quadrata* Lodd., *grandinosa* G. Don), schöne, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

fragrans Andr., feinriechende, ♀. t. ? Cap d. gut. Hoffn.

fucata Kl., geschminckte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

genistaefolia Salisb. (*sessiliflora* Wendl.), ginsterblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

gibbosa Kl., höckerige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

gigantea Kl., riesenhafte, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

Gillii Benth., Gilli's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

glauca Andr., blaugrüne, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

globosa Andr. (*perlata* Lee), kugelblumige, ♀. t. Cap d. g. H.

glumaeflora Kl. (*leucosepala* Kl.), spelzenblumige, ♀. t.

Cap der guten Hoffnung.

β) setula Kl.

gnaphalodes Thbg. (*gnaphaliiflora* Salisb., *calycina minor* Andr., *paniculata* Lodd.), ruhrkrautähnliche, ♀. t.

Cap der guten Hoffnung.

hirta Thbg. (*urceolaris* Salisb.), kurzhaarige, ♀. t. C. d. g. H.

Erica

- hirtiflora* Curt. (*pubescens* Andr., *pubesc. major* Hort., *ovata* Lodd., *mitraeformis* Salib.), rauhblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- β) *minor* (*pubescens* Lodd., *pubesc. pilosa* Wendl., *tardiflora* Salib., *puberula* Bartl., *grisea* Kl.).
- humifusa* Salib., niedergestreckte, ♀. t. Cap d. g. H.
- inclusa* Wendl. fil., eingeschlossene, ♀. t. Cap d. g. H.
- incompta* Kl., angeputzte, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
- inconspicua* Bartl., unansehnliche, ♀. t. Cap d. g. H.
- incurva* Thbg., einwärtsgekrümmte, ♀. t. Cap d. g. H.
- intervallaris* Salib. (*alopecuroides* Lodd. non Wendl.), zwischenräumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- irregularis* Benth. (*rupestris rubra* Andr.), unregelmäßige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- ixanthera* Benth., fadenbeutelige, ♀. t. Cap d. g. H.
- Lachnaea* Andr. (*lachnaeaeifolia* Salib., *Pohlmanni* Lodd.), lachnaeablätterige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- lactiflora* Lodd. (*lactea* et *Kennedyana* Kl.), milchweißblumige, ♀. t. ? Cap der guten Hoffnung.
- laeta* Bartl., freudige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- lasciva* Salib. (*exserta* Hort. non Bedf., *pachycephala* Kl.), üppige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- lateralis* W. (*guttaeflora* Salib., *incarnata* Andr. Lodd., *rubens humilis* Wendl., *fibula* Lk., *pedunculata* Wendl.), seitenständige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- β) *arbuscula* Lodd.
- latifolia* Andr. (*suaveolens* Lodd., *crassifolia* Kl.), breitblätterige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- lavandulaefolia* Salib. (*monticola* Kl., lavendelblätterige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- laxa* Andr. (*rigens* Bartl.), lockere, ♀. t. Cap d. g. H.
- leiophylla* Benth., leichtblätterige, ♀. t. Cap d. g. H.
- leptopus* Benth. (*patula* E. Mey.), schlankstielige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- leucantha* Kl. Hort. (*leucanthera* Andr., *luteo-alba* Bedf.), weißblumige, ♀. t. ? Cap der guten Hoffnng.
- leucanthera* L. fil. (*spiraeaeiflora* Salib.), weißbeutelige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- leucodesmia* Benth., weißliche, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
- longiaristata* Benth., langgrannige, ♀. t. Cap d. g. H.
- longipes* Kl., langgestielte, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
- β) *parviflora*.
- lucida* Salib. (*rigidifolia* Wendl., *nitens* Bartl.), glänzende, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- Mackayi* Hook., Mackay's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
- macroloma* Benth., großsäumige, ♀. t. Cap d. g. H.
- macrophylla* Kl., großblätterige, ♀. t. Cap d. g. H.
- margaritacea* Sol. Wendl. (*obesa* Salib.), perlfarbige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- marifolia* Soland., gamanderblätterige, ♀. t. Cap d. g. H.
- β) *helianthemifolia* Salib.
- media* Kl., mittlere, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- melanthera* L. (*lysimachiaeiflora* Salib., *Mundtiana* Kl.), schwarzbeutelige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- ? β) *adenophylla* Benth.
- minutissima* Kl., aller kleinste, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
- mira* Kl., seltsame, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- modesta* Salib. (*leucophylla* Kl.), bescheidene, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Erica

- mollis* Andr. (*modesta* Bedf., *pubescens* Sbr., *albiflora* Kl.), weiche, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.
moschata Andr. (*florida* Lodd., *anthina* Spgl.), moschusduftende, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.
mucosa L. (*pilulifera* Andr., *pilularis* Lod.), schleimige, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *mucosoides* Lodd. γ) *crenata* E. Mey.

- mucronata* Andr., weichspitzige, ⚔. t. Cap d. g. H.
multiflora L. (*multifl. longipedunculata* Wendl., *peduncularis* Presl., *vagans* DC.), vielblumige, ⚔. k. Westeuropa.

- nidularia* Lodd., nistende, ⚔. t. Cap der guten Hoffn.
nigrita L. (*volutaeflora* Salisb., *laricina* Berg., *nitidula* Hort., *Gypsocallis nigricans* G. Don), schwärzliche, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *Niveni* Benth. γ) *acutangula* Lodd. δ) *lyri-gera* Salisb. (*ochroleuca* Wendl. fil.). ε) *marginata* Andr. ζ) *melanthera* Lodd.

- nitida* Andr. Lodd. (*fragulifera* Salisb.), schimmernde, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.

- nivalis* Andr. (*peziza* Lodd.), Schnee-H. ⚔. t. C. d. g. H.
nivea Bedf., schneeweiße, ⚔. t. Cap der guten Hoffn.
nudiflora L. (*floribunda* Wendl., *alopecuroides* Lodd., *microstoma* Berg., *sertiflora* Salisb.), nacktblumige, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.

- obliqua* Thbg., schiefe, ⚔. t. Cap der guten Hoffn.
odorata Andr., gutriechende, ⚔. t. Cap d. g. Hoffn.

* *suaveolens* Andr. * *Beaumontiana* Andr. * *Willmoreana* Knowl.

- opulenta* Wendl., reichlichblühende, ⚔. t. Cap d. g. H.
ovina Kl., Schaf-H., ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.
oxycoccifolia Salisb., moosbeerenblättrige, ⚔. t. C. d. g. H.
palustris Andr. Lodd. (*cyrillaeiflora* Salisb.), sumpfliebende, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.

- paniculata* L. (*sodalis* Kl.), rispige, ⚔. t. Cap d. g. H.
parilis Salisb., gleichmäfsige, ⚔. t. Cap d. g. Hoffn.

β) *flava* Andr. (*festae* Salisb.). γ) *parviflora* Benth. (*fallax* Salisb.).

- parviflora* L. (*pubescens* Bot. mag. Wendl., *pubescens minima* Andr., *tubiuscula* Lodd., *tardiflora* Salisb.), kleinblumige, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.

- Passerinae* L. fil., Spatzenstrauch-H., ⚔. t. Cap d. g. H.
patens Andr. Wendl. (*expansa* Hort.), abstehende, ⚔. t. ? Cap der guten Hoffnung.

- peduncularis* Salisb. (? *rubens* Thbg.), kurzstielige, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.

- peltata* Andr. (*Actaea* Lk., *exserta* Bedf.), schiedförmige, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.

- pelviformis* Salisb. (*persoluta* Bot. mag., *regerminans* Andr., *multumbellifera* Hort.), beckenförmige, ⚔. t. Cap der guten Hoffnung.

- periplocaeflora* Salisb., periplocablumige, ⚔. t. C. d. g. H.
perlata Bedf. (*barbata minor* Andr.), Perl-H., ⚔. t.

Cap der guten Hoffnung.

- persoluta* L., ausgebreitete, ⚔. t. Cap d. gut. Hoffn.

α) *assurgens* Lk. (*subdivaricata* Berg., *prolifera* Salisb., *congesta* Wendl., *strigosa* Wendl., *cafra* Andr., *regerminans* Hortul., *murina*, *exserens* et *pallidiflora* Kl., *setacea* Dreg.). β) *laevis* Andr.

Erica

- (*caffra* Lod., *cyathiformis* Salisb., *paniculata alba* Wendl., *persoluta major* Wendl.). γ) ? *subcarnea* Benth. (*regerminans* Lodd., *persoluta* var. Hortul.).
- petraea* Benth., Felsen-H., $\frac{1}{2}$. t. Cap der gut. Hoffn.
- physodes* L. (*sequax* Salisb.), blasige, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. H.
* *Lambertiana* Andr.
- physophylla* Benth., blasenblättrige, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. H.
- pilulifera* L. (*nudicaulis* Berg., *pilulaeformis* Salisb., *pedunculata* Andr., *unica* Spgl.), pillenförmige, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffnung.
- planifolia* L. (*thymifol.* α . et β . Salisb.), plattblättrige, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffnung.
- plumosa* Andr. Lodd. (*amoena* Wendl., *nolaeiflora* Salisb., *Scholliana* Lodd.), federige, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. Hoffn.
- podophylla* Benth., stielblättrige, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. H.
- polyantha* Kl., zahlreichblühende, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. H.
- polycodon* Benth., schönblumige, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. H.
- polycoma* Benth., vielschopfige, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. Hoffn.
- polytrichifolia* Salisb. (*codonodes* Lindl., *lusitanica* Rudolph.), haarmoosblättrige, $\frac{1}{2}$. t. Westeuropa.
- procumbens* Lodd., liegende, $\frac{1}{2}$. t. ?
- propendens* Andr. Lodd., herabhängende, $\frac{1}{2}$. t. C. d. g. H.
- pubescens* L. Thbg. (*pallida* Salisb., *pura* Lodd., *incana* Wendl., *purialis* Hortul.), weichhaarige, $\frac{1}{2}$. t. C. d. g. H.
- pubigera* Salisb. (*praeusta* Bartl.), wenighaarige, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffnung.
- pulchella* Houtt. Andr. (*articularis* Thbg., *retroflexa* Wendl., *caduceifera* Salisb., *phylicoides* W.), schöne, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffnung.
- pumila* Andr. (*coniflora* Kl.), kleine, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. H.
- pusilla* Salisb. (*villosiuscula* Lodd., *canescens* Wendl.), niedrige, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffnung.
- pyramidalis* Soland. (*obpyramidalis* Salisb.), pyramidale, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffnung.
 β) *vernalis* Lodd.
- pyramidiformis* Wendl., pyramidenförmige, $\frac{1}{2}$. t. C. d. g. H.
- quadraeflora* Salisb. (*corusca* Lichtenst.), vierseitigblumige, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffnung.
- racemosa* Thbg. (*flexilis* Salisb., *hispida* Andr.), traubige, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffnung.
- ramentacea* L. (*granulata* L., *multumbellifera* et *pilularis* Berg., *bullularis* Salisb.), ausschlagschuppige, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffnung.
- recurvata* Andr., zurückgekrümmte, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. H.
- reflexa* Lk. Andr. (*glomiflora* Salisb., *nitida* var. Kl.), zurückgebogene, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffnung.
- regerminans* L. (*uncifolia* Salisb., *Smithiana* Lodd., *Lichtensteinii* Kl., *racemifera* Andr., *juncea* Bartl.), sprossende, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffnung.
- Roxburghii* Benth., Roxburgh's, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. Hoffn.
- rubens* Andr. (*pendula* Lodd., *nutans* G. Don), rötliche, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffnung.
- rupicola* Kl., Gestein-H., $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffn.
- sagittata* Kl., pfeilbeutelige, $\frac{1}{2}$. t. Cap der gut. Hoffn.
- salax* Salisb., üppige, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffnung.
- scabriuscula* Lodd., schärfliche, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. Hoffn.
- scoparia* L. (*fucata* Thbg. et Wendl., *virgulata* Wendl.), besenförmige, $\frac{1}{2}$. k. Süd-Westeuropa, Madeira.

Erica

- β) *parviflora* Benth., Azoren, Portugal.
selaginifolia Salish., selagoblätterige, ♀. t. Cap d. g. H.
seriphiifolia Salish. (*cubica minor* Andr., *bella* Spgl.),
 seriphiumblätterige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
setacea Andr. (*asperifolia* Salish.), borstenblätterige, ♀.
 t. Cap der guten Hoffnung.
setosa Bartl., borstige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
setulosa Benth., feinborstige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
sicaefolia Salish. (*pygmaea* Andr., *sanguinolenta* Lodd.),
 dolchblätterige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
sitiens Kl., trockene, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
Solandriana Andr., Solander's, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
spectabilis Kl., ansehnliche, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
sphaerocephala Wendl., kugelblumige, ♀. t. ? C. d. g. H.
squamosa Andr. (*tegulaefolia* Salish.), schuppige, ♀. t.
 Cap der guten Hoffnung.
staminea Andr. (*thalictrifolia* Lodd.), langfadige, ♀. t.
 Cap der guten Hoffnung.
stenantha Kl., schmalkronige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
stenophylla Benth., schmalblätterige, ♀. t. Cap d. g. H.
stricta Don, Andr. (*pendula* Wendl., *multicaulis* Salish.,
ramulosa Viv., *corsica* DC.), steife, ♀. k. Süditalien,
 Spanien, Irland, Orient.
strigosa Soland. (*arborea* Thbg., *axillaris* Salish., *prae-*
cox Lodd., *pilulifera* Wendl., *lasiophylla* Spgl., *sca-*
briuscula Drege), striegelige, ♀. t. Cap d. g. H.
subterminalis Kl., endständige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
subulata Wendl., pfriemenförmige, ♀. t. Cap d. g. H.
tenella Andr., zarte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
tenuicaulis Kl., feinstengelige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
tenuis Salish. (*divaricata* Bedf., *longifolia* Kl.), feine,
 ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
Tetralix L., Moor-H., ♀. t. Europa, Surinam.
 b. *carnea* Loud. c. *alba* Hort. Woburn.
 β) *Martinesii* Lagasc. Spanien.
tetrathecodes Benth., breatkronige, ♀. t. Cap d. g. H.
thymifolia Andr. (*planifolia* Wendl., *distans* Spgl. fil.),
 thymianblätterige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
tomentosa Salish. (*velutina* Bartl.), filzige, ♀. t. C. d. g. H.
trichophora Benth. (*pilifera* Kl.), haartragende, ♀. t.
 Cap der guten Hoffnung.
trichophylla Benth., haarblätterige, ♀. t. Cap d. g. H.
triflora L. (*pyrolaeflora* et *fugax* Salish.), dreiblumige,
 ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
triphylla Lk., dreiblätterige, ♀. t. ? Cap d. g. Hoffn.
tristis Bartl., traurige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
turbiniiflora Salish., kreiselblumige, ♀. t. Cap d. g. H.
turgida Salish. (*mellifera* Lk., *Gypsocallis Bedfordiana*
 Don), aufgedunsene, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
umbellata L. (*lentiformis* Salish.), doldige, ♀. t. C. d. g. H.
umbelliflora Kl., doldenblumige, ♀. t. Cap d. g. H.
unibracteata Kl., eindeckblätterige, ♀. t. Cap d. g. H.
unilateralis Kl., einseitige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
urceolaris Berg. (*pentaphylla* L., *cassia* L., *lamellaris*
 Salish.), becherförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
vagans L. (*manipuliflora* Salish., *didyma* Stokes, *verti-*
cillata Forsk., *multiflora* DC.), zerstreute, ♀. k.
 West-, Süd- und Osteuropa, Levante.

Erica

varia Lodd. (*Cassonii* et *Caroliniana* Hort., *muricata* Wendl. fil.), bunte, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.
variabilis Kl. (*holocalycina* et *cumulata* Kl.), veränderliche, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

velitaris Salisb., scharmuzirende, ⚥. t. Cap d. g. H.
 β) *rigidior* Benth. (*hemisphaeria* Kl.).

verecunda Salisb. (*cernua* Andr. Lodd.), schamhafte, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *lanceolata* Wendl. (*ignorata* Kl.).

verniciflua Salisb., firnifsgebende, ⚥. t. Cap d. g. H.

vernix Andr. (*resinosa* Hortul., *blenna* Salisb.), Firnifs-H., ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

vesicularis Salisb. (*conacea* Hort.), kleinblasige, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

vespertina L. fil. (*calycina* Thbg., *gnidiaefolia* Salisb., *Dickensoniana alba* Bedf.), abendliche, ⚥. t. C. d. g. H.

viscaria L. (*viscida* Salisb.), schmierige, ⚥. t. Cap d. g. H.

Ungewisse: *adenophora* Spgl. *Aphanes* Spgl. *appressa* Spgl. *caduca* Thbg. *cinerascens* W. *cistifolia* Lk. *flexicaulis* Dryand. (*glandulosa* Andr.).

lachnaeoides G. Don. *nitens* Bedf. *pilifera* Thbg.

protrudens Lk. *sphaerantha* Spgl. *teucrifolia* Spgl.

V. *Eremia* D. Don.

Bartlingiana Kl. (*totta* Bartl., *ferox* Salisb.), Bartling's, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

brevifolia Benth., kurzblättrige, ⚥. t. Cap d. g. Hoffn.

lanata Benth. (*xeranthemifolia* Salisb.), wollige, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

totta Thbg. (*pectinata* Bartl.), kammförmige, ⚥. t. C. d. g. H.

tubercularis G. Don (*notabilis* Wendl.), kleinwarzige, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

VI. *Grisebachia* Klotzsch.

ciliaris Kl. (*E. plumosa* Thbg.), wimperige, ⚥. t. C. d. g. H.

hispida Kl. (*E. hirsuta* Salisb., *Blaeria Thunbergii* G. Don), hackerige, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

plumosa Kl. (*E. nodiflora* Salisb., *Blaeria nodiflora* G. Don), federige, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

arctica Waitz. (*coerulea* W.) v. *Phyllodoce taxifolia*.

articulata Thbg. v. *Syndesmanthus articulatus*. *Blaeria*

Thbg. etc. v. *Blaeria ericoides*. *Bruckenthalii* Spgl.

(*spiculiflora* Salisb.) vid. *Bruckenthalia spiculiflora*

Nachtr. *Daboecia* L. v. *Daboecia polifolia*. *embolifera*

Salisb. (et *expromta* Spgl.) vid. *Simocheilus depressus*.

exilis Salisb., *fasciculata* Thbg. v. *Syndesmanthus scaber* et *fascicul.*

labialis Salisb. v. *Symbieza capitellata*. *sicula* Guss. v. *Pentapera sicula*.

vulgaris L. v. *Calluna vulgaris*.

Erigeron L., Flöhkraut (Berufskraut), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

acris L., scharfes, ♂. f. Europa.

β) *serotinus* Weihe.

alpinus L., Alpen-B., 4. f. Nord- und mitteleuropäische Alpen.

β) *glabratus* Hoppe. γ) *grandiflorus* Hoppe.

angulosus Gaud. (*acris angustatus* Hort.), kantiges, ♂. f. Schweiz, Tyrol.

armeriaefolius Fisch., grasnelkenblättriges, 4. f. Baical,

asper Nutt., rauhes, 4. f. Nordamerika.

Erigeron

- bellidifolius W. (*Serpentarius* Banks), maßliebenblättriges, 4. f. Nordamerika.
 bonariensis L., bonarisches, ☉. f. Südamerika, Westind.
 canadensis L., canadisches, ☉, f. Nordamerika, Westindien, Europa.
 carolinianus L., karolinisches, 4. f. Nordamerika.
 caucasicus Stev., kaukasisches, 4. f. Caucasus.
 chinensis Jacq., chinesisches, ☉. f. China.
 ciliatus Ledeb., gefranztes, ☉. f. Sibirien.
 compositus Pursh, zusammengesetztes, 4. f. Nordamer.
 contortus Dsf., gedrehtes, ♂. f. ?
 divaricatus Mchx., aufgesperrtes, ♂. f. Nordamerika.
 elongatus Ledeb., verlängertes, ☉. f. Sibirien.
 glabellus Nutt., kahles, 4. f. Nordamerika.
 glaucus Ker, blaugrünes, 4. t. Buenos-Ayres.
 gramineus L., grasblättriges, 4. f. Sibirien.
 graveolens L., starkkriechendes, ☉. f. Südfrankr., Kleinasien.
 humilis Grah., niedriges, 4. f. Nordamerika.
 jamaicensis L., westindisches, ☉. w. Jamaica.
 involucratu Lk., umhülltes, 4. w. Brasilien.
 laevigatus Rich., glattes, ♂. w. Cayenne.
 Lehmanni Spgl., Lehmann's, 4. f. ?
 longifolius Dsf., langblättriges, 4. f. Nordamerika.
 maximus Otto, größtes, 4. k. f. b. Mexico.
 montevidensis Spgl., montevidensisches, ☉. f. Montevideo.
 nudicaulis Mchx., nacktstengeliges, 4. f. Nordamerika.
 philadelphicus L., philadelphisches, 4. f. Nordamerika.
 podolicus Bess. (? *dröbachensis* Retz, ? *asteroides* Lk.),
 podolisches, ♂. f. Nordeuropa.
 pulchellus DC. (*alpinus* β. *criocalyx* DC.), schönes, 4. f. Caucasus, Dahurien.
 purpureus Ait., purpurfarbiges, 4. f. Nordamerika.
 pusillus Nutt., zwergiges, ☉. f. Nordamerika.
 speciosus DC., prächtiges, 4. f. Californien.
 strigosus W. (*australis* Hornem.), striegeliges, ♂. f. Nordamerika.
 uniflorus L., einblumiges, 4. f. Europäische Alpen.
 Villarsii Bell. (*atticum* Vill., *rupestris* Hoppe, *intermedius* Trachs.), Villar's, 4. f. Kärnthen, Schweiz, Piemont, Dauphiné.
delphinifolius W. v. *Polyactidium* delph. *heterophyllus* W. v. *Stenactis* annua. *viscosum* L. v. *Pulicaria viscosa*.

Erinus L., Leberbalsam, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

- alpinus L., Alpen-L., 4. f. Schweiz, Pyrenäen.
 hispanicus P., spanischer, 4. f. k. Spanien.
fragrans Ait., *gracilis* Lehm., *Lychnidea* Thbg. etc.
 v. *Nycterinia fragrans* etc.

Eriobotrya Lindl., Wolltraube, XII. II., Rosaceae-Pomaceae.

- elliptica Lindl., elliptische, 5. k. t. Nepal.
 japonica Lindl., japanische, 5. k. t. Japan.

Eriocalia Sm., Wolldolde, V. II., Umbelliferae.

- major Sm., große, 4. t. Neuholland.
 minor Sm., kleine, 4. t. Neuholland.

Eriocaulon L., Wollstengel, III. III. (XXI. III.), Restiaceae.

Eriocaulon

decangulare L. (*serotinum* Walt.), zehnkantiger, 4. f. k. Nordamerika.

septangulare With., siebenkantiger, 4. f. k. Schottl.

sexangulare L., sechskantiger, 4. w. t. Ostindien.

Eriocephalus Dill., Wollkopf, XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.

africanus L., afrikanischer, 5. k. Cap der guten Hoffn.

decussatus Burch., kreuzständiger, 5. k. Cap d. g. H.

purpureus Burch., purpurfarbiger, 5. k. Cap d. g. H.

racemosus L., traubiger, 5. k. Cap der guten Hoffn.

spinescens Burch., stacheliger, 5. k. Cap d. gut. Hoffn.

Eriochilus RB., Wolllippe, XX. i., Orchideae.

autumnalis RB., Herbst-W., 4. Kn. t. w. Neuholland.

Eriocoma H. B. K., Wollschopf, XIX. iii., Compositae-Corymbiferae.

fragrans D. Don, wohlriechender, 5. k. t. Mexico.

floribunda H. B. K., blüthenreicher, 4. k. t. Mexico.

heterophylla Schrad., verschiedenblättriger, 4. 5. k. t. Mexico.

Eriodendron DC., Wollbaum, XVI. viii., Malvaceae-Bombaceae.

anfractuosum DC., gewundener, 5. w. Ostindien.

caribaeum Hook., caribäischer, 5. w. Westindien.

guineense G. Don, guineischer, 5. w. Guinea.

leiantherum DC., schmalbeuteliger, 5. w. Brasilien.

Eriodesma Don v. Erica.**Eriogonum** Mchx., Wollknöterig, IX. i. (ii.), Polygoneae.

compositum Dougl., ästiger, 4. f. Nordamerika.

longifolium Nutt., langblättriger, 4. f. Nordamerika.

pauciflorum Pursh, wenigblumiger, 4. f. Louisiana.

sericeum Pursh (*flavum* Fras.), seidenhaariger, 4. f. Nordamerika.

tomentosum Mchx., filziger, 4. f. b. k. Carolina, Neuspanien.

Eriolaena DC., Wollkelch, XVI. viii., Malvaceae-Dombeyaceae.

Candollii Wall., DeCandolle's, 5. w. Ostindien.

Wallichii DC., Wallich's, 5. w. Ostindien.

Eriopappus paniculatus Hort. v. *Eupatorium paniculatum*.**Eriophorum** L., Wollgras, III. i., Cyperaceae.

A. *Trichophorum* Rich. P.

alpinum L., Alpen-W., 4. f. Europa.

cyperinum L., cypergrasähnliches, 4. f. Nordamerika.

Lockharti G. Don, Lockhart's, 4. w. Trinidad.

montevidense Lk., montevidensisches, 4. w. Monde-Video.

B. *Eriophorum* Rich. P.

gracile Koch (*triquetrum* Hoppe), schlankes, 4. f. Europa.

latifolium Hoppe (*pubescens* Sm., *vulgare* P.), breitblättriges, 4. f. Europa, Nordamerika.

polystachyum L. (*angustifolium* Roth), vielähriges, 4. f. Europa, Nordamerika.

β) *longifolium* Hoppe.

Scheuchzeri Hoppe (*capitatum* Host.), Scheuchzer's, 4. f. Europäische Alpen.

Eriophorum

vaginatum L. (*caespitosum* Host), scheidiges, 4. f. Europa, Nordamerika.

virginicum L., virginisches, 4. f. Nordamerika.

Eriophyllum Lagasc., Wollblatt, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

caespitosum Lagasc., rasenartiges, 4. f. Nordamerika.

oppositifolium Nutt., gegenblättriges, 4. f. Nordamer.

Eriospermum Jacq., Wollsame, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

Bellendeni Swt. (*latifolium* a Bot. Mag.), Bellenden's, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

folioliferum Ker, blattrreicher, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

lanceaefolium Jacq., lanzettblättriger, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

lanuginosum Jacq., ächter, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

latifolium Jacq., breitblättriger, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

paradoxum Jacq., wunderbarer, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

parvifolium Jacq., kleinblättriger, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

pubescens Jacq., weichhaariger, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

Eriosphaera Less., Wollimmortelle, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

Oculus cati Less., Katzenaugen-W., 5. t. Cap d. g. H.

Eriostemum Sm., Wollfaden, X. I., Tricoccae-Rutaceae.

buxifolius Sm., buchsbaumblättriger, 5. t. Neuholland.

cuspidatus Cunn., langspitziger, 5. t. Neuholland.

ericifolius Mack. Cat., heideblättriger, 5. t. Neuholland.

glaucescens Ait., blaugrüner, 5. t. ? Neuholland.

gracilis Grah., schlanker, 5. t. Neuholland.

lanceolatus G., lanzettblättriger, 5. t. Neuholland.

linearifolius DC., gleichbreitblättriger, 5. t. Neuholland.

myoporoides Sm. DC., myoporumähnlicher, 5. t. Neuholl.

neriifolius Sbr., oleanderblättriger, 5. t. Neuholland.

obovatus Cunn., verkehrteiförmiger, 5. t. Neuholland.

salicifolius Sm., weidenblättriger, 5. t. Neuholland.

dentatus Coll. v. *Dicera dentata*. *salsoloides* Sm.

v. *Philotheca australis*. *squameus* LaBill. v. *Phebalium* Billardieri.

Eriosynaphe DC., Banddolde, V. II., Umbelliferae.

longifolia DC., langblättrige, ♂. f. Südrussland.

tortuosa Fisch. et Mey., gewundene, ♂. f. Natolien.

Erisma Rudg., Erisma, I. I., Lythriariae-Vochysieae.

floribundum Rudg., blüthenreiches, 5. w. Guiana.

Erithalis L., Lederkrapp, V. I., Rubiaceae.

fruticosa L. (*odorifera* et *inodora* Jacq.), strauchiger, 5. w. Westindien.

Timon Spgl., amboinischer, 5. w. Amboina.

Ernodea Sm., Aströthe, IV. I., Rubiaceae.

montana Sm., Berg-A., 5. k. Sicilien, Calabrien, Creta.

Erodendron Salisb. v. Protea.**Erodium** L'Her., Reiherschnabel, XVI. II., Geraniaceae.

alpinum L'Her., Alpen-R., 4. f. Italien.

anthemifolium MB., kamillenblättriger, 4. f. Georgien.

arborescens W., strauchartiger, 5. k. Nordafrika.

bipinnatum W., doppeltgefiederter, ♂. f. Numidien.

Erodium

Botrys Bertol., traubiger, ☉. f. Italien, Spanien, Nordafrika.

Bovei H. Monsp., Bove's, ☉. f. Sinai.

caucalifolium Swt. (*alpinum* Dsf.), haftdoldenblättriger, 4. f. Frankreich.

chamaedryoides L'Her. (*Reichardi* DC., *Bocconi* Salzm.), gamanderähnlicher, 4. k. Corsica, balearische Inseln.

chium W., griechischer, ☉. f. Griechenland.

ciconium W., langschnabeliger, ☉. f. Südeuropa.

cicutarium Sm. (*romanum* W.), gemeiner, ☉. f. Europa, Nordafrika, Mittelasien.

β) *pimpinellifolium* W. γ) *pilosum* Thuill. δ) *cicutaefolium* Thuill.

crassifolium Ait., dickblättriger, 4. k. Nordafrika, Cyprus.

geoides S. Hil., geumähnlicher, ☉. f. Südamerika.

glandulosum W. (*graveolens* Lapey., *macradenum* L'Her.), drüsiger, 4. k. Spanien.

glaucohyllum Ait., blaugrüner, ☉. f. Aegypten.

gruinum Ait., kandischer, ☉. f. Süd- und Osteuropa, Nordafrika.

Gussonii Ten., Gussone's, 4. k. Neapel, Sicilien.

hirtum W., rauher, 4. k. Aegypten.

hymenodes L'Her. (*trilobatum* Jacq., *geifolium* Dsf.), dreilappiger, 4. k. Nordafrika.

incarnatum L'Her., fleischfarbiger, ♀. f. Cap d. g. H. *laciniatum* W., schlitzeblättriger, 4. k. Creta, Nordafrika, Portugal.

litoreum Lem. DC., Ufer-R., ♂. 4. k. Südfrankreich.

malacoides W., malvenähnlicher, ☉. f. Südeuropa, Nord- und Südafrika.

β) *ribifolium* Jacq.

malopoides W., malopaähnlicher, 4. k. Sicilien, Corsica, Nordafrika.

β) *corsicum* Lem.

maritimum Sm., Meerstrands-R., 4. f. England, Frankreich.

melanostigum H. Monsp., schwarznarbiger, 4. k. t. ?

moschatum Ait., moschusduftender, ☉. f. Südeuropa, Nord- und Südafrika, Südamerika.

muricicum L'Her., spanischer, ☉. f. Südspanien, Nordafrika.

muricatum Hort., weichstacheliger, ☉. f. ?

petraeum W., Felsen-R., 4. f. k. Südfrankreich.

romanum Ait., römischer, ♂. f. Italien.

Salzmanni H. Monsp., Salzmann's, ? ☉. f. Spanien, Südfrankreich.

serotinum Stev. (*ruthenicum* MB., *multicaule* Lk.), spätblühender, 4. f. k. Südrussland.

stellatum H. Monsp., sternförmiger, ? ☉. f. Südfrankr.

Stephanianum W. (*multifidum* Patr.), Stephan's, ☉. f. Dahurien.

Steveni MB., Steven's, ♂. 4. f. Kaukasus.

stylatum DC., langgriffeliger, ♂. 4. f. ?

Erpetion Swt., Erpetion, V. 1., Violaceae.

hederaceum G. Don, epheublättriges, 4. k. Neuholland.

reniformis Swt., nierenförmiges, 4. k. Neuholland.

Eruca T., Ranke, XV. III., Cruciferae,

hispida DC., hackerige, ☉. f. Neapel.

Eruca

sativa Lam., gemeine, ☉. f. Südeuropa.

b) *alboglabra*. c) *albopilosa*. d) *flavoglabra*. e) *turgida*. f) *erucoides*. g) *exotica*.

vesicaria Cav., blasige, ☉. f. Spanien.

Erucastrum Baung. v. *Brassica Erucastrum*.

Erucaria G., Räumling, XV. III., Cruciferae.

aleppica G., aleppischer, ☉. f. Levante.

crassifolia Delil., dickblättriger, ☉. f. Aegypten.

tenuifolia DC., feinblättriger, ☉. f. Spanien.

Erucastrum Rchb., Mauerrauke, XV. III., Cruciferae.

arabicum Fisch. et Mey., arabische, ☉. f. Arabien.

incanum Koch, weißgraue, ♂. f. Südeuropa.

inodorum Rchb. (*Pollichii* Schimp. et Spenn.), geruchlose, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

obtusangulum Rchb., stumpfbuchtige, 4. f. Schweiz, Süddeutschland, Frankreich.

Ervum T., Erve, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

agrigentinum Guss., sicilianische, ☉. Sch. f. Sicilien.

Camelorum Spgl., Kameel's, ☉. Sch. f. ?

dispermum Roxb., zweisamige, ☉. Sch. f. Ostindien.

Ervilia L., kleine, ☉. Sch. f. Mittel- und Südeuropa.

gracile DC. (*tenuifolium* Lag., *tenuissimum* P., *longifolium* Ten.), schlanke, ☉. Sch. f. Mittel- und Südeuropa.

hirsutum L., rauhhülsige, ☉. Sch. f. Europa.

Hohenackeri Fisch. et Mey., Hohenacker's, ☉. Sch. f. Nordpersien.

Lens L., Linse, ☉. Sch. f. Europa.

Lenticula Schreb. (*uniflorum* Ten.), schmalfrüchtige, ☉. Sch. f. Kärnten, Illyrien, Italien.

Loiseleurii MB., Loiseleur's, ☉. Sch. f. Frankreich, Taurien.

monanthos L., einblumige, ☉. Sch. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

nigricans MB. (*lentoides* Ten.), schwärzliche, ☉. f. Istrien, Italien, Taurien.

nigrum Hort., schwarze, ☉. Sch. f. ?

pubescens DC., weichhaarige, ☉. Sch. f. Südfrankreich.

punctatum Bess., punktirte, ☉. Sch. f. Südrußland.

sardoum Moris, sardinische, ☉. Sch. f. Sardinien.

subglobosum Rchb., buntfrüchtige, ☉. Sch. f. ?

tetraspermum L., viersamige, ☉. Sch. f. Nordamerika.

viciaeforme Spgl. (*vicioides* Dsf.), wickenähnliche, ☉. Sch. f. Numidien.

soloniense L. v. *Vicia lathyroides*. *volubile* Walt. v. *Galactia glabella*.

Eryngium T., Mannstreu, V. II., Umbelliferae.

alpinum L. (*rigidum* Lam.), Alpen-M., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

amethystinum L. (? *azureum* Dsf.), amethystblaue, 4. f. Tyrol, Krain, Croatien, Sicilien.

Andersonii Lag., Anderson's, 4. f. ?

aquaticum L., Wasser-M., 4. Wa. f. Nordamerika.

Aquifolium Cav. (*ilicifolium* Brot.), stechlülsenblättrige, 4. f. b. k. Südspanien, Portugal.

asperifolium Laroche, rauhlättrige, 4. f. ?

Bourgati Gouan (*amethystinum* Lam.), Bourgati's, 4. f. Südfrankreich.

Eryngium

bromeliaefolium Laroch., ananasblättrige, 4. w. Neuspan. *campestre* L., gemeine, 4. f. Europa.

Cervantesii Laroch., Cervantes's, 4. t. k. Mexico.

coeruleum MB., blaue, 4. f. Taurien.

comosum Laroch., schopfige, 4. w. t. Neuspanien.

corniculatum Lam., gehörnte, 4. k. f. b. Portugal.

dichotomum Dsf., gabelästige, 4. k. Nordafrika.

dilatatum Dsf., erweiterte, 4. f. b. k. Nordafrika, Portugal, Sicilien.

ebracteatum Lam., hülllose, 4. w. t. Monte-Video.

foetidum L., stinkende, ♂. t. w. Florida, Westindien, Surinam.

frutescens Moris, strauchige, ♀. t. Chili.

galioides Lam., labkrautähnliche, 4. f. b. k. Portugal.

giganteum MB., riesenhafte, 4. f. Armenien, Caucasus.

glomeratum Lam., knaulblumige, 4. f. Creta.

gracile Laroch., schlanke, 4. w. Neuspanien.

longifolium Cav., langblättrige, 4. w. Mexico.

macrophyllum Hort., großblättrige, 4. f. ?

maritimum L., Meerstrand's, 4. f. Europa, Nordafrika.

multifidum Sm., vieltheilige, 4. f. b. Griechenland.

planum L., flachblättrige, 4. f. Europa, Nordafrika.

pusillum L. (? *odoratum* Lam.), kleine, 4. f. b. k. Spanien, Portugal, Nordafrika.

rigidum Lam. (*Spinaalba* Vill.), starre, 4. f. Frankreich.

serratum Cav., sägezahnige, 4. t. w. Neuspanien.

tenuis Lam., dünnhüllige, ♂. f. Spanien, Portugal, Nordafrika.

tricuspidatum L., dreispitzige, ♂. f. Nordafrika, Sicilien, Griechenland.

triquetrum Vahl, dreikantige, 4. f. b. k. Sicilien, Nordafrika.

virgatum Lam. (*ovalifolium* Mchx., *integrifolium* Walt.), ruthenförmige, 4. f. Nordamerika.

Erysimum T., Hederich, XV. III., Cruciferae.

I. *Cheirinia* Lk. (*Erysimastrum* DC.).

Andrzejowskianum Bess. (*diffusum* MB.), Andrzejowski's, ♂. f. Taurien.

asperum DC., rauher, ♂. f. Nordamerika.

aureum MB., goldfarbiger, ♂. f. Caucasus.

bicolor DC., zweifarbiger, ♂. f. ?

caespitosum DC., rasenartiger, ♀. ♂. f. Nordpersien.

canescens Roth (*diffusum* Ehrh.), graulicher, ♂. f. Mittel- und Südeuropa.

cheiranthoides L. (*parviflorum* P.), lackähnlicher, ♂. ♂. f. Europa.

collinum Andrz., Hügel-H., ♂. f. Caucasus.

crassipes Fisch. et Mey., dickstieliger, ♂. f. Nordpersien.

crepidifolium Rchb. (*hieracifolium* DC.), crepisblättriger, ♂. f. Mitteldeutschland.

dubium DC., zweifelhafter, ♂. f. ?

exaltatum Andrz., hoher, ♂. f. Südpodolien.

helveticum DC. (*pallens* P., *pumilum* Hornem.), schweizerischer, ♂. 4. f. Schweiz, Tyrol.

β) *rhaeticum* DC. γ) *ochroleucum* DC.

hieracifolium L. (*strictum* Flor, Wett.), habichtskrautblättriger, ♂. f. Europa.

ibericum DC., iberischer, ♂. f. Armenien.

Erysimum

- lanceolatum* RB. (*Cheiranthus* P., *firmum* Swt.), lanzettblättriger, ♂, 4. f. Mittel- und Südeuropa.
leptophyllum Andr., schlankblättriger, ♂. f. Caucasus.
leptostylum DC. (*grandiflorum* MB.), schlankgriffeliger, ♂. f. Caucasus.
longifolium DC. (*grandiflorum* Dsf.), langblättriger, ♂. 4. k. Nordafrika.

odoratum Ehrh., wohlriechender, ♂. f. Ungarn, Krain.

β) *carniolicum* Dollin.

Perofskianum Fisch. et Mey., Perofski's, ♂. f. Cabul.

Redowskii Weinm., Redowski's, ♂. f. Sibirien.

repandum L. (*ramosissimum* Crtz), ausgeschweifeter, ☉. f. Mitteleuropa, Mittelasien.

strigosum DC., striegeliger, ♂. f. Sibirien.

suffruticosum Spgl. (*virgatum* Lej.), halbstrauchiger, ♂. f. Spanien, Belgien.

versicolor Andr., buntfarbiger, ♂. f. Caucasus.

virgatum Roth (*durum* Presl, *altissimum* Lej.), ruthenförmiger, ♂. f. Mitteldeutschland, Schweiz.

β) *longisiliquosum* Schlchr.

II. Syrenia Andr.

angustifolium Ehrh., schmalblättriger, ♂. f. Ungarn, Siebenbürgen, Podolien.

cuspidatum DC., langspitziger, ♂. f. Ungarn, Taurien, Kleinasien.

sessiliflorum RB. (*cornutum* P.), stielloser, ♂. f. Sibirien, Taurien.

siculum Spgl., sicilianischer, ♂. f. Sicilien.

siliculosum DC., kleinschotiger, ♂. f. Caucasus, Taurien.

III. Conringia Lk. (Coringia P. DC.).

austriacum Baumg., österreichischer, ☉. f. Unterösterreich, Ungarn, Siebenbürgen.

orientale RB. (*perfoliatum* Crtz), morgenländischer, ☉. f. Europa, Mittelasien.

Alliaria L. v. *Alliaria officin.* *Barbarea* L. (et *praecox* Sm.) v. *Barbarea vulgaris* etc. *officinale* L. v. *Sisymbrium officinale.* *quadricorne* Steph. (et *bicornae* Ait. v. *Notoceras quadricorn.* et *canariens.*

Erythraea Rich., Tausendgüldenkraut, V. 1., Contortae-Gentianeae.

aggregata Swt., angehäufter, ♂. t. Südeuropa.

Cachanlahuan Mol., chilesisches, ☉. f. Chili.

Centaureum P., gemeines, ♂. f. Europa.

conferta P., dichtblumiges, 4. k. Spanien.

emarginata W. K., ausgerandeter, ☉. f. Ungarn.

grandiflora Bivon., großblumiges, ♂. f. Istrien, Italien.

latifolia Sm., breitblättriger, ☉. f. England.

linariaefolia P. (*angustifolia* Wallr., *uliginosa* W. K., *litoralis* Fr., *compressa* Hayn.), leinkrautblättriger, ☉. f. Europa.

lutea Bertol., gelbes, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

maritima P., Meerstrand's, ♂. k. f. Südeuropa.

Massoni Swt., Masson's, 4. k. Azoren.

pulchella Fr. (*inaperta* Schltd., *ramosissima* P.), schönes, ♂. f. Europa.

spicata P., ähriges, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

Erythrina L., Korallenbaum, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

- abyssinica Lam., abyssinischer, f. w. Abyssinien.
 aculeatissima Dsf., starkstacheliger, f. w. ?
 arborescens Roxb., baumartiger, f. w. Ostindien, Nepal.
 australis Cunn., neuholländischer, f. w. Neuholland.
 caffra Thbg., caffrischer, f. t. Cap der guten Hoffn.
 carnea Ait., fleischfarbiger, f. w. Südamerika,
 Corallodendron L., ächter, f. w. Westindien.
 Cristagalli L., Hahnenkamm-K., f. w. Brasilien.
 enneandra DC. (*velutina* Jacq.), neunmänniger, f. w. ?
 fulgens Hort., leuchtender, f. w. Ostindien.
 fusca Lour., braunblumiger, f. w. Ostindien, Cochinch.
 glauca W., blaugrüner, f. w. Caracas, Surinam.
 herbacea L., krautartiger, f. 4. t. k. Carolina, Florida.
 horrida DC., rauher, f. w. Mexico.
 Humeana Spgl. (*caffra* Bot. reg.), Hume's, f. w. ?
 Hunnemanni Hort., Hunnemann's, f. w. ?
 incana W., weißgrauer, f. w. Ostindien.
 indica Lam., indischer, f. w. Ostindien, Cochinchina.
 laurifolia Jacq., lorbeerblättriger, f. 4. t. w. Südamer.
 macrophylla DC., großblättriger, f. w. ? Teneriffa.
 mitis Jacq., unbewehrter, f. w. Caracas.
 nana Bowie, zwergiger, f. w. ?
 ovalifolia Roxb., eiblättriger, f. w. Ostindien.
 ovalis Wall., eiförmiger, f. w. Nepal.
 picta L., bemalter, f. w. Ostindien.
 piscidioides Hort., piscidiaähnlicher, f. w. Ostindien.
 poeanthes Brot., grasblumiger, f. w. Südamerika.
 portoricensis Dsf., portoricensischer, f. w. Porto Rico.
 princeps Hort., fürstlicher, f. w. Ostindien.
 resupinata Roxb., verkehrtblumiger, 4. f. w. Ostindien.
 rubrinervia H. B. K., rothnerviger, f. w. Neugranada.
 secundiflora Brot., einseitigblumiger, f. w. Brasilien.
 spathacea DC., scheidiger, f. w. Westindien.
 speciosa Andr., prächtiger, f. w. Westindien.
 stricta Roxb., steifer, f. w. Ostindien.
 suberosa Roxb., korkiger, f. w. Ostindien.
 umbrosa H. B. K. (*arborea* Hort.), schattiger, f. w. Caracas.

velutina W., sammthaariger, f. w. Neugranada.

Ungewifs: *triacantha* W. E. suppl.

Erythrolaena Swt., Rothkelch, XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

conspicua Swt., ansehnlicher, f. f. b. k. Mexico.

Erythronium L., Hundszahn, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

album Nutt., weißlicher, 4. Zw. f. b. Louisiana.

Dens Canis L., gemeiner, 4. Zw. f. Südeuropa.

β) *longifolium* Mill. a) *rubrum* Swt. b) *album* Swt.

giganteum Lindl., größer, 4. Zw. f. b. Nordwestamerika.

grandiflorum Pursh., großblumiger, 4. Zw. f. b. Nordamerika.

lanceolatum P. (*americanum* Ker, *luteum* Hort.), lanzettblättriger, 4. Zw. f. b. Nordamerika.

Erythrophleum RB., Rothwasserbaum, X. I., Leguminosae-Mimosaceae.

guineense G. Don, guineischer, f. w. Sierra Leone.

Erythropogon DC., Rothbart, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

imbricatum DC., dachziegelförmiger, ♀. t. Cap d. g. H.

umbellatum DC., doldiger, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

Erythrorrhiza rotundifolia Mchx. v. Galax aphylla.

Erythroxylon L., Rothholz, X. Itr., Caryophyllaceae-Erythroxyleae.

havanense Jacq., westindisches, ♀. w. Westindien.

hypericifolium Lam., johanniskrautblättriges, ♀. w. Mascarenas, Hispaniola.

laurifolium Lam., lorbeerblättriges, ♀. w. Mascarenas.

monogynum Roxb. v. *Sethia indica*.

Escallonia Mut. (Escallon, ein Spanier, welcher Südamerika bereiste), V. I., Grossularieae-Escallioneae.

floribunda H. B. K., blüthenreiche, ♀. k. t. Südamer.

glandulosa Sm., drüsige, ♀. k. f. b. Chili.

illinita Presl., geschminkte, ♀. k. f. h. Chili.

montevidensis DC. (*bifida* Lk. et Otto, ?*stenopetala* et *floribunda* Hort.), montevidensische, ♀. k. f. b. Südamerika.

pulverulenta P., bestäubte, ♀. k. f. b. Chili.

rubra P., rothe, ♀. k. f. b. Chili.

Tubar Mut. (*discolor* Vent.), verschiedenfarbige, ♀. k. f. b. Chili.

viscosa Lk. et Otto, schmierige, ♀. k. Mendoza.

Eschscholtzia Chamiss. (J. F. Eschscholtz, deutscher Naturforscher), XIII. IV., Papaveraceae.

californica Cham., californische, ♂. 4. f. Californien.

compacta (Lindl.), dichte, ♂. 4. f. Californien.

crocea Benth., safranfarbige, ♂. 4. f. Californien.

fumariaefolia Bot. mag., erdrauchblättrige, ♂. 4. f. b. k. Mexico.

Ethulia L., Ethulie, XIX. I., Compositae-Eupatorineae.

brasiliensis Lk., brasilianische, 4. w. Brasilien.

conyzoides L., dürrwurzähnliche, ☉. f. m. Aegypten, Ostindien.

a) *indica*. β) *africana*.

divaricata L., ausgespernte, ☉. f. m. Malabar.

integrifolia D. Don (*sinapifolia* Roxb.), ganzblättrige, ☉. f. Nepal.

ageratoides Spgl. v. *Alomia ageratoides*.

Eucalyptus L'Her., Schönmütze, XII. I., Myrtaceae.

amygdalina LaBill., mandelblättrige, ♀. k. t. Neuholl.

angustifolia Lk., schmalblättrige, ♀. k. t. Neuholland.

botryoides Sm., traubige, ♀. k. t. Neuholland.

capitellata Sm., kopfblüthige, ♀. k. t. Neuholland.

cordata LaBill., herzblättrige, ♀. k. t. Neuholland.

cornuta LaBill., gehörnte, ♀. k. t. Neuholland.

cotinifolia Lod., cotinusblättrige, ♀. k. t. Neuholland.

Cunninghamii (*microphylla* Cunn.), Cunningham's, ♀. t. k. Neuholland.

curvula Sbr., gekrümmte, ♀. k. t. Neuholland.

elongata Lk., verlängerte, ♀. k. t. Neuholland.

eugenoides Sbr., eugenienähnliche, ♀. k. t. Neuholland.

Globulae LaBill., dickblättrige, ♀. k. t. Neuholland.

haemastoma Sm., rothmündige, ♀. k. t. Neuholland.

heterophylla Swt., verschiedenblättrige, ♀. k. t. Neuholland.

hirsuta Lk., rauhhaarige, ♀. k. t. Neuholland.

Eucalyptus

hypericifolia Dum. Cours., johanniskrautblättrige, f. k. t. Neuholland.

incrassata LaBill, verdickte, f. t. k. Neuholland.

longifolia Lindl. (*Lindleyana* H. Hügel.), langblättrige, f. t. k. Neuholland.

marginata Sm., berandete, f. t. k. Neuholland.

media Lk., mittlere, f. t. k. Neuholland.

microphylla, kleinblättrige, f. t. k. Neuholland.

mucronata Lk., weichspitzige, f. t. k. Neuholland.

multiflora Poir. (? *longifolia* Lk.), vielblumige, f. t. k. Neuholland.

myrtifolia Lk., myrtenblättrige, f. t. k. Neuholland.

obliqua Sm., schiefe, f. t. k. Neuholland.

orbicularis Lod., kreisförmige, f. t. k. Neuholland.

ovata LaBill, eiförmige, f. t. k. Neuholland.

paniculata Sm., rispige, f. t. k. Neuholland.

pauciflora Sbr., wenigblumige, f. t. k. Neuholland.

persicifolia Loud., pfirsichblättrige, f. t. k. Neuholland.

phillyreoides Lodd., steinlindenähnliche, f. t. k. Neuholland.

pilularis Sm., pillenförmige, f. t. k. Neuholland.

piperita Sm., pfefferähnliche, f. t. k. Neuholland.

pulchella Lod., hübsche, f. t. k. Neuholland.

pulverulenta Lk. (*cordata* Lodd., ? *perfoliata* Hort.), bestäubte, f. t. k. Neuholland.

pulviger Cunn., feinstäubige, f. t. k. Neuholland.

purpurascens Lk., purpurfarbige, f. t. k. Neuholland.

resinifera Sm., harzgebende, f. t. k. Neuholland.

reticulata Lk., netzförmige, f. t. k. Neuholland.

robusta Sm., große, f. t. k. Neuholland.

rostrata Cav., schnabelförmige, f. t. k. Neuholland.

saligna Sm., weidenähnliche, f. t. k. Neuholland.

scabra Nois., scharfe, f. t. k. Neuholland.

stenophylla Lk., gleichbreitblättrige, f. t. k. Neuholl.

stricta Sbr., steife, f. t. k. Neuholland.

tereticornis Sm., rundhörnige, f. t. k. Neuholland.

triantha Lk., dreiblumige, f. t. k. Neuholland.

viminalis LaBill, gartenartige, f. t. k. Neuholland.

virgata Sbr., ruthenförmige, f. t. k. Neuholland.

Nachstehende unbestimmtere Abarten oder Arten findet man in den Gartenverzeichnissen: *albicaulis* Hort., *alpina* Hort., *alata* Hort., *coronata* H. Hügel., *discolor* H. Hügel., *gibbosa* H. Hügel., *glaucophylla* H. Hügel., *lanceolata* H. Hügel., *nervosa* H. Hügel., *populifolia* H. Hügel., *rotundifolia* H. Hügel., *tuberculata* Hort., *undulata* Hort., *variabilis* Hort., *verrucosa* Hort.

Euchaetis Bartl. et Wendl., Schönbart, V. 1., *Tricoccae-Rutaceae*.

glomerata Bartl. et Wendl., knaulblumiger, f. t. Cap der guten Hoffnung.

Eucharidium Fisch. et Mey., Schönkerze, IV. 1., *Onagrariae*.

concinnum Fisch. et Mey., nette, ©. f. Neucalifornien.

Euchilus RB., *Euchilus*, X. 1., *Leguminosae-Papilionaceae*.

obcordatus RB., herzförmiger, f. t. Neuholland.

Euchroma Nutt., *Euchroma*, XIV. 11., *Personatae-Rhinanthaeae*.

Euchroma

- coccinea* Nutt., scharlachfarbige, ☉. f. Nordamerika.
grandiflora Nutt., großblumige, ☉. f. Nordamerika.

Euclea L., *Euclea*, XXII. x. (XI. II.), ?Aquifoliaceae, ?Euphorbiaceae.

- racemosa* L., traubige, ☿. k. t. Cap der guten Hoffn.
undulata Thbg., wellenblättrige, ☿. k. t. Cap d. g. H.

Euclidium RB., Schnabelschötchen, XV. I., Cruciferae.
syriacum RB., syrisches, ☉. f. Osteuropa, Klein- und Mittelasien.

- tataricum* DC., tatarisches, ☉. f. Tatarei.

Eucomis L'Her., Schopflilie, VI. I., Coronariae-Asphodelaeae.

- bifolia* Jacq., zweiblättrige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.
nana Ait., zwergige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.
punctata L'Her., punktirte, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.
purpureo-caulis Dryand., purpurstengelige, 4. Zw. k.
 Cap der guten Hoffnung.

- regia* Ait., königliche, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.
striata H. Kew., gestreifte, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.
undulata Ait. (*regia* Redout.), wellenförmige, 4. Zw. k.
 Cap der guten Hoffnung.

Eucrosia Ker, *Eucrosie*, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.
bicolor Ker, zweifarbig, 4. Zw. w. t. Südamerika.**Eudesmia** KB., *Eudesmie*, XVIII. II., Myrtaceae.
tetragona RB., vierseitige, ☿. t. Neuholland.**Eugenia** Mich. (Prinz Eugen v. Savoyen, berühmter Feldherr und Beschützer der Wissenschaften), XII. I., Myrtaceae.

- acuminata* Roxb., zugespitzte, ☿. w. Ostindien.
auriculata Lodd., geöhrte, ☿. t. w. ?
axillaris W., achselblumige, ☿. w. Jamaica, Südamerika.
balsamica Jacq., balsamische, ☿. w. Jamaica.
baruensis Jacq., baru'sche, ☿. w. Baru (Südamerika), Westindien.
 ? *bracteata* Räusch., deckblättrige, ☿. w. Ostindien.
buxifolia W., buchsbaumblättrige, ☿. w. Westindien.
cerasoides Roxb., kirschähnliche, ☿. w. Ostindien.
elliptica Sm., elliptische, ☿. k. t. Neusüdwallis.
floribunda West, blüthenreiche, ☿. w. Westindien.
fragrans W., wohlriechende, ☿. w. Jamaica.
glandulifera Roxb., drüsige, ☿. w. Ostindien.
glauca Fisch., blaugrüne, ☿. w. ?Südamerika.
gracilis Lod., schlanke, ☿. w. Ostindien.
javanica Lam., javanische, ☿. w. Java.
latifolia Aubl., breitblättrige, ☿. w. Guiana.
ligustrina W., ligusterähnliche, ☿. w. Hispaniola.
macrocarpa Roxb., großfrüchtige, ☿. w. Ostindien.
Mini Aubl., Mini-E., ☿. w. Guiana.
obovata Poir., verkehrteiförmige, ☿. w. Mascarenas.
obtusifolia Roxb., stumpfblättrige, ☿. w. Ostindien.
petalomoides Lod., petalomaähnliche, ☿. w. Ostindien.
pulchella Roxb., schöne, ☿. w. Ostindien.
rugosa Lod., runzelige, ☿. w. Ostindien.
sinemariensis Aubl., guianische, ☿. w. Guiana.
sumatrana Lod., sumatranische, ☿. w. Sumatra.
ternifolia Roxb., dreiblättrige, ☿. w. Ostindien.
uniflora L. (*Michellii* Lam.), einblumige, ☿. w. Brasilien.

Eugenia

aquea Roxb. (et *amplexicaulis* Roxb.), *australis* Wendl. (*myrtifolia* Ker), *Jambos* L., *macrophylla* Lam., *malacensis* L. etc. v. *Jambosa aquea* etc. *caryophyllata* Roxb. v. *Calyptranthes caryoph.* *racemosa* L. v. *Stravadium racemos.* *zeylanica* W. v. *Syzygium zeylanic.*

Eulophia RB., Kammstendel, XX. I., Orchideae.

barbata Spgl. Lindl., bärtiger, 4. Kn. w. t. Cap der guten Hoffnung.

ensata Lindl., schwertförmiger, 4. Kn. w. t. Cap d. g. H.

gracilis Lindl., schlanker, 4. Kn. w. Sierra Leone.

guineensis Ker, guineischer, 4. Kn. w. Sierra Leone.

longicornis Spgl., langsporniger, 4. Kn. w. t. Cap der guten Hoffnung.

lurida Lindl., bleifarbig, 4. Kn. w. Sierra Leone.

macrostachya Lindl., großsähriger, 4. w. Ceylon.

streptopetala Lindl., gedrehter, 4. Kn. w. t. Cap d. g. H.

tristis Spgl., trauriger, 4. Kn. w. t. Cap der gut. H.

virens Spgl., grünlicher, 4. Kn. w. t. Cap d. gut. H.

crinita Lindl., *Mackaiana* Lindl. et *maxillaris* Lindl. v. *Zygopetalum crinitum* etc.

Eunomia DC., Eunomie, XV. II., Cruciferae.

oppositifolia DC., gegenblättrige, 4. k. Syrien.

Eupatorium T., Walddost, XIX. I., Eupatorineae.

I. Genuini.

adenophorum Spgl. (*glandulosum* H. B. K.), drüsen-tragender, 4. w. Mexico.

ageratifolium DC., ageratumbblätteriger, 4. w. Cuba.

ageratoides L., ageratumähnlicher, 4. f. Nord- und Südamerika.

album L., weißer, 4. f. Pensylvanien, Japan.

altissimum L., hoher, 4. f. Nordamerika.

amoenum Pursh, lieblicher, 4. f. Nordamerika.

aromaticum L., gewürzhafter, 4. f. Nordamerika.

australe, Bartl., südlicher, 4. w. t. Chili.

Ayapana Vent., *Ayapana-W.*, 4. w. Brasilien.

baccharoides H. B. K., *baccharis*ähnlicher, 4. w. Neu-Granada.

Berterianum Colla, Bertero's, 4. w. Westindien.

canescens Vahl, graulicher, 4. w. Westindien.

cannabinum L., hanfähnlicher (gemeiner), 4. f. Europa.

ceanothifolium W., säckelbaumblätteriger, 4. f. Nordamerika, Jamaica.

chamaedryfolium H. B. K., gamanderblätteriger, 4. w. Peru.

coriaceum Vahl, lederartiger, 4. w. Westindien.

coronopifolium W. (*compositifolium* Walt.), krähenußblätteriger, 4. f. Carolina.

deltoides Jacq., deltablätteriger, 4. t. w. Mexico.

falcatum Mchx., sichelförmiger, 4. f. Nordamerika.

floribundum H. B. K., blüthenreicher, 4. w. Peru.

foeniculaceum W., fenchelblätteriger, 4. f. Nordamer.

Fraseri Poir., Fraser's, 4. f. Carolina.

glandulosum Mchx., drüsiger, 4. f. Carolina.

hyssopifolium L., ysoptblätteriger, 4. f. Nordamerika.

iresinoides H. B. K., iresinenähnlicher, 4. Sch. w. Neu-Granada.

ivaefolium L., ivablätteriger, 4. w. Westindien.

lamiifolium H. B. K., taubnesselblätteriger, 4. w. Quito.

Eupatorium

- lanceolatum* W., lanzettblättriger, 4. f. Nordamerika.
linearifolium Walt. (*crassifolium* Raf.), gleichbreitblättriger, 4. f. Nordamerika.
macranthum Sw. (*atriplicifolium* Vahl, *triangulare* Poir.), großblumiger, 4. w. Caribäen.
maculatum L., gefleckter, 4. f. Nordamerika.
Maximiliani Schrad., Maximilian's, 4. w. Brasilien,
melissoides W. (*cordatum* Walt.), melissaähnlicher, 4. f. Nordamerika.
nepalense Spgl. (*acuminatum* D. Don), nepal'scher, 4. w. t. Nepal.
nutans H. B. K., nickender, 4. w. Mexico.
odoratum L., riechender, 4. w. Westindien, Brasilien.
paniculatum Schrad., rispiger, 4. f. m. Brasilien.
parviflorum Sw. (*Dalea* Hort.), kleinblumiger, 4. 4. w. Jamaica.
perfoliatum L. (*connatum* Mchx.), durchwachsener, 4. f. Nordamerika.
populifolium H. B. K., pappelblättriger, 4. w. Mexico.
pubescens W., weichhaariger, 4. f. Nordamerika.
pulchellum H. B. K., schöner, 4. w. Mexico.
punctatum W. (*dubium* Poir.), punktirter, 4. f. Nordamerika.
purpureum L., purpurfarbiger, 4. f. Nordamerika.
repandum W. (*atriplicifolium* Lam.), ausgeschweiffter, 4. w. Westindien,
rotundifolium L., rundblättriger, 4. f. Nordamerika.
salvifolium H. B. K., salbeiblättriger, 4. w. Südamer.
scandens Lk., kletternder, 4. Sch. w. ?
Schiedeanum Schrad., Schiede's, 4. 4. t. w. Mexico.
 β) *virgatum* Schrad. γ) *diversifolium* Schrad.
Schraderi DC. (*rugosum* Schrad.), Schrader's, 4. w. Südamerika.
sessilifolium L., stielloser, 4. f. Nordamerika.
sordescens DC. (*lamiifolium* W.), befleckter, 4. w. Südamerika.
squarrosus Cav., sparriger, 4. t. Mexico.
syriacum L., syrischer, 4. f. Macedonien, Syrien.
tetragonum Schrad., vierkantiger, 4. 4. t. w. Mexico.
teucriifolium W. (*pilosum* Walt., *verbenaefolium* Mchx.),
 *teucrium*blättriger, 4. f. Nordamerika.
toментellum Schrad., feinfilziger, 4. 4. t. w. Mexico.
triflorum Aubl., dreiblumiger, 4. w. Guiana.
trifoliatum L., dreiblättriger, 4. f. Virginien.
truncatum W., abgestutzter, 4. f. Nordamerika.
urticaefolium Mut., nesselblättriger, 4. t. w. Neugranada.
veronicaefolium H. B. K., ehrenpreisblättriger, 4. t. w. Mexico.
villosus Sw., zottiger, 4. 4. w. Westindien.
xalapense H. B. K., xalapischer, 4. t. w. Mexico.
II. Bulbostylis DC.
pendulum Schrad. (*scariosum* Wallr.), hängender, 4. t. w. Mexico.
III. Conoclinium DC.
coelestinum L. (*deltoideum* Rafin.), himmelblauer, 4. f. Nordamerika.
IV. Hebeclinium DC.

Eupatorium

macrophyllum L. (*molle* Sw.), großblättriger, 4. w. Jamaica.

ferrugineum La Bill. (et *rosmarinifol.* La Bill.) v. *Ozothamnus ferrugin.* etc. *Houstoni* et *Gouani* Hort. v. *Salmea Eupatoria melissaefolium* Lam. v. *Nothites melissaefol.*

Hinsichtlich der übrigen s. *Mikania*.

Euphorbia L., Wolfsmilch, XI. III. (XXI. III.), *Triococcae-Euphorbiaceae*.

achanocarpa Guss., festkapselige, ☉. f. Sicilien.

affinis DC., ähnelnde, 4. f. Frankreich.

agraria MB. (*nitens* Trev.), Acker-W., 4. f. Taurien.

aleppica L., aleppische, 4. k. Griechenland, Syrien.

ambigua W. Kit., zweifelhafte, 4. f. Ungarn.

amygdaloides L. (*sylvatica* Jacq.), mandelähnliche, 4. f. England, Mittel- und Südeuropa.

b) *variegata*.

Anacantha L., dreizählige, ♀. t. Cap der guten Hoffn. *androsaemifolia* Schousb. (*isatidifolia* Lam.), androsaeumblättrige, 4. k. Spanien, Portugal.

angulata Jacq., kantige, 4. f. Oesterreich, Mähren.

angustifolia Hamilt., schmalblättrige, 4. t. Nepal.

antiquorum L., wahre, ♀. w. Aegypten, Ostindien.

aphylla Brouss., blattlose, ♀. t. Teneriffa.

Apios L., knollige, 4. Kn. k. Griechenland.

atlantica P. (*bupleuroides* Dsf.), atlantische, 4. t. Nordafrika.

atropurpurea Brouss., schwarzpurpurrothe, ♀. k. t. Teneriffa.

balsamifera Ait., balsamische, ♀. k. t. Canarische Inseln.

bialata Lk., zweiflügelige, ☉. f. ?

biglandulosa W., zweidrüsige, ♀. w. Mascarenas.

biumbellata Poir., zweidoldige, 4. k. Nordafrika.

Bojeri Hook. (? *Bryoni* Hort.), Bojer's, ♀. w. Madagascar.

bracteata Jacq., deckblättrige, ♀. w. ?

brasiliensis Lam., brasilianische, ☉. f. Brasilien.

bupleurifolia Jacq., hasenöhrchenblättrige, ♀. t. w. Cap der guten Hoffnung.

canariensis L., canarische, ♀. k. t. Canarische Inseln.

Caput Medusae L., Medusenhaupt-W., ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *humilis*.

carniolica Jacq., krainerische, 4. f. Krain.

ceratocarpa Ten., hornfrüchtige, 4. k. Neapel.

cereiformis L., fackeldistelähnliche, ♀. t. Südafrika.

Chamaesyce L. (*canescens* L.), grauliche, ☉. f. Südeuropa.

Characias L., Thal-W., ♀. k. Südeuropa.

clandestina Jacq., heimlichblühende, ♀. t. Cap d. g. H.

Clava Jacq., keulige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

coccinea Roth, scharlachfarbige, 4. w. Ostindien.

condensata Fisch., dichtblättrige, ☉. f. Iberien.

condylocarpa MB., gliederfrüchtige, 4. Kn. f. Caucasus.

congesta W., gedrängte, 4. k. Spanien.

coralloides L. (*lanuginosa* Lam.), corallenähnliche, 4. k. f. b. Südeuropa, Nordafrika, Orient.

Corderiana DC., Corderi's, 4. f. Südeuropa.

corifolia Lam., corisblättrige, 4. ♀. t. Cap d. gut. H.

corollata L., kronenhüllige, 4. f. Nordamerika.

cretica Haw., cretische, 4. k. Creta.

Euphorbia

- crispa Haw., krause, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
 crispata Hornem., krausblättrige, 4. f. ?
 cruentata Grah., blutrothe, 4. t. St. Louis.
 cyathophora Jacq., geigenblättrige, ♂. ♀. w. Westind.
 Cyparissias L., cypressenartige, 4. f. Europa.
 dendroides L. (*divaricata* Jacq.), strauchartige, ♀. k.
 Italien, Sicilien, Creta.
 dentata Mchx., gezähnte, ☉. f. Nordamerika.
 denticulata Lam., gezähnelte, 4. k. Kleinasien.
 dictyosperma Fisch. et Mey., netzsamige, ☉. f. Neu-
 californien,
 diversifolia P. (*heterophylla* Dsf.), verschiedenblättrige,
 ☉. f. Nordafrika.
 dulcis L., (*solisqua* Rchb.), süsse, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.
 β) purpurata Thuill.
 emarginata Ait., ausgerandete, 4. f. k. Italien.
 enneagona Haw., neunkantige, ♀. t. ? Cap der gut. H.
 epithymoides L., gelblättrige, 4. f. Oesterreich, Italien.
 erosa Willd., ausgebissene, ♀. t. ?
 Erythrina Lk., purpurrandige, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.
 Esula L., gemeine, 4. f. Europa.
 exigua L., kleinste, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.
 β) retusa Roth. γ) tricuspidata Lap. (*rubra* DC.,
diffusa Jacq.).
 falcata L., sichelförmige, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.
 fragifera Jan., erdbeerfrüchtige, 4. f. k. Oesterreich-
 isches Litorale.
 Fructus-pini Haw., kieferfrüchtige, ♀. t. Cap d. g. H.
 b) geminata Haw.
 fulgens Karw. (*jacquiniaeflora* Hort.), leuchtende, ♀. w.
 Mexico.
 geminispina Haw., doppelstachelige, ♀. w. Mexico.
 genistoides L. (*spartioides* Jacq.), ginsterähnliche, ♀. t.
 Cap der guten Hoffnung.
 Gerardiana Jacq. (*Cajogala* Ehrh.), Gerard's, 4. f. Mit-
 tel- und Südeuropa.
 glareosa MB., kiesliebende, 4. f. Caucasus.
 glaucophylla P., blaugrüne, ☉. w. Westafrika.
 globosa Sims, kugelige, ♀. t. Südafrika.
 grandidens Haw., grofszähnlige, ♀. t. Cap der gut. H.
 grandifolia Haw., grofsblättrige, ♀. t. w. Sierra Leone.
 granulata Forsk., körnige, ☉. f. Arabien.
 hamata Haw., hackige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
 Haworthii Swt., Haworth's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
 helioscopia L., Sonnenzeiger-W., ☉. f. Europa.
 heptagona L., siebenkantige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
 heterophylla L., veränderlichblättrige, ♀. w. Westindien,
 Südamerika.
 hibernica Spgl. (*hiberna* L.), irländische, 4. f. h. k.
 Irland, Pyrenäen.
 hirta L. (*tomentosa* P.), rauhhaarige, ☉. w. f. Ost-
 und Westindien, Westafrika.
 humifusa W., niederliegende, ☉. f. ?
 hypericifolia L., johanniskrautblättrige, ☉. f. Nordamer.
 hyssopifolia L., ysopblättrige, ☉. f. w. Westindien.
 Hystrix Jacq., igelstachelige, ♀. t. w. Südafrika.
 imbricata Vahl, dachziegelförmige, 4. k. Nordafrika,
 Portugal.

Euphorbia

- Ipecacuanhae L., Ipecacuanha-W., 4. f. Nordamerika.
italica Lam. (*seticornis* Poir., *provincialis* W.), italienische, ☉, f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.
juncea Ait. (*pinifolia* W.), schlanke, 4. k. t. Madeira.
?juncoides Haw., binsenförmige, ☉. w. ?
Kunzei Lehm., Kunze's, ☉. f. ?
lactea Haw., milchweisse, ☿. w. Ostindien.
laeta Ait., freudige, ☿. k. t. ?
Lagasciae Spgl. (*terraccina* Lag.), Lagasca's, ☉. f. Spanien.
Lamarckii Haw. (*virgata* P. non W. K.), Lamarck's, ☿. t.
Cap der guten Hoffnung.
lanifera Haw., wolltragende, ☿. w. Mexico.
Lathyris L., kreuzblättrige, ♂. f. Mittel- u. Südeuropa.
laurifolia Lam., lorbeerblättrige, ☿. w. Peru.
linarifolia W. (*linifolia* Jacq.), linienblättrige, ☿. w. ?
linearis Retz, gleichbreite, 4. w. Westindien.
linifolia Vahl, leinblättrige. ☿. w. Westindien.
Lockharti * (*angustifolia* Lockh.), Lockhart's, ☿. w. Trinidad.
longifolia Hamilt., langblättrige, 4. f. k. Nepal.
lophogona Lam., saumkantige, ☿. w. Madagascar.
lucida WK., spiegelnde, 4. f. Ungarn.
β) pallida W.
macroceras Fisch. et Mey., grofshörnige, ☉. f. Karabagh.
maculata L., gefleckte, ☉. f. Westindien, Nordamerika, Italien.
magnimamma Haw., grofszitzige, ☿. w. Mexico.
mammillaris L., Zitzen-W., ☿. t. Cap der guten Hoffn.
marginata H. B. K., berandete, 4. t. w. Südamerika.
mauritanica L., mauritanische, ☿. t. Mauritanien.
mellifera Ait., honiggebende, ☿. k. Madeira.
meloniformis Ait., melonenähnliche, ☿. t. w. Südafrika.
Mercurialis Mchx., bingelkrautähnliche, 4. f. Nordamer.
micrantha MB., kleinblumige, ☉. f. Nordpersien.
microphylla Lam., kleinblättrige, ☉. f. Ostindien.
?multicorymbosa Haw., vieldoldige, 4. f. ?
Myrsinitis L. (*Baselisis* Ten.), immergrüne, 4. f. k. Südfrankreich, Italien, Taurien.
myrtifolia L., myrtenblättrige, ☿. w. Jamaica.
neapolitana Ten. (?*segetalis* L.), neapolitanische, ☉. f. Neapel.
neriifolia Ait., oleanderblättrige, ☿. w. Ostindien.
nicaeensis All. (*glaucescens* W., *oleaefolia* Gouan), südliche, 4. f. Süd- und Osteuropa, Caucasus.
nudiflora Jacq. (*cymosa* Poir.), nacktblumige, ☿. w. Jamaica.
nummulariaefolia W. (*pulchella* Brouss.), pfennigkrautblättrige, 4. ☿. k. Westeuropa, Nordafrika.
obscura Lois., dunkle, ☉. f. Südfrankreich.
ocymoides L., basilicumähnliche, ☉. w. Südamerika.
odontophylla W., zahnblättrige, ☿. t. ? Cap d. gut. H.
officinarum L., officinelle, ☿. t. w. Mittel- u. Südafrika.
ophthalmica Commers., augenheilende, ☉. w. Südamer.
orientalis L., morgenländische, 4. f. k. Medien.
Ornithopus Jacq., Vogelfufs-W., ☿. t. Cap der gut. H.
palustris L., Sumpf-W., 4. f. Europa.
Paralias L. (*maritima* Berger), Meerstrands-W., ☿. 4. f. k. Südeuropa.
b) suffruticosa.

Euphorbia

- parviflora L., kleinhüllige, ☉. w. Ceylon.
 patula Mill., ausgebreitete, ☿. t. Cap der guten Hoffn.
 pendula Haw., hängende, ☿. t. ?
 pentagona Haw., fünfkantige, ☿. t. Cap der gut. Hoffn.
 Peplis L., peplisähnliche, ☉. f. Südeuropa, England.
 peplodes Gouan (*rotundifolia* Lois., *minima* Hort.),
 rundblättrige, ☉. f. Südeuropa.
 Peplus L., Garten-W., ☉. f. Europa.
 petalioides Loud. (*rigida* Haw.), petalumähnliche, 4.
 ☿. f. ?
 petiolaris Sims, gestielte, ☿. w. Westindien.
 picta Jacq., gemalte, ☉. ♂. w. f. Südamerika.
 β) Humboldtii W.
 pilosa L. (*carinthiaca* Traunf.), behaarte, 4. f. Kärn-
 then, Ungarn, Taurien.
 pilulifera L., pillentragende, ☉. f. w. Ost- u. Westind.
 pinea L. (*caespitosa* et *linifolia* Tenor.), kieferähnliche,
 4. f. k. Italien.
 piscatoria Ait., Fischer-W., ☿. t. k. Canarische Inseln.
 Pithyusa L., wachholderähnliche, 4. f. k. Süd- und
 Westeuropa.
 platyphyllos L. (*serrulata* Thuill., *subciliata* Bernh.),
 breitblättrige, ☉. f. Europa.
 β) literata Jacq. γ) ? truncata P.
 ? plumosa Hort., federige, ☉. f. ?
 polygona Haw., vielkantige, ☿. t. Südafrika.
 polygonifolia L., knöterichblättrige, ☉. f. Nordamerika.
 portlandica L. (*purpurascens* Schousb. Hornem., ? *Artau-*
diana DC.), portlandische, 4. ☿. k. f. England,
 Frankreich, Nordafrika.
 portulacoides L., portulakähnliche, 4. k. t. Chili.
 procera MB., hohe, 4. f. Podolien, Taurien, Caucasus.
 procumbens DC. (*decumbens* W.), niederliegende, ☉. f.
 Westindien.
 prostrata Ait., gestreckte, ☉. f. w. Westindien.
 prunifolia Jacq. (*geniculata* Orteg.), pflaumenblättrige,
 ☉. w. Westindien.
 pterococca Brot. (*stellulata* Salzm.), flügelkapselige, ☉. f.
 Portugal.
 pubescens Vahl, weichhaarige, ☉. f. Nordafrika.
 pulcherrima Hort., schönste, ☿. w. Mexico.
 pulverulenta Kit. Schult. (*pannonica* Host.), bestäubte,
 4. f. Ungarn, Oesterreich.
 punicea Sw., hochrothe, ☿. w. Jamaica,
 pyrifolia Lam., birnblättrige, ☿. w. Mascarenas.
 reflexa Spgl., zurückgebogene, 4. f. ?
 repanda Swt., ausgeschweifte, ☿. w. Ostindien.
 rigida MB., starre, 4. f. k. Taurien.
 rosea Retz, rosafarbige, ☿. ☉. w. Ostindien.
 salicifolia Host, weidenblättrige, 4. f. Ungarn, Süd-
 frankreich.
 saxatilis Jacq., Gesteins-W., 4. f. Ost-, Süd- und
 Westeuropa.
 scordifolia Jacq. (*mutans* Lagasc.), lauchkrautblättrige,
 ☉. w. Westindien.
 segetalis ? L., Saat-W., ☉. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.
 β) taurica Bess.
 serpens H. B. K., Schlangen-W., ☉. f. Südamerika,
 Westindien.

Euphorbia

serpyllifolia P., quendelblättrige, ☉. f. Südamerika.
 silenifolia Haw., silenenblättrige, ☿. t. Cap d. gut. H.
 β) glauca Haw.

spathulaefolia Haw., spatelblättrige, ☿. t. ?

spathulata Lam., spatelförmige, ☉. w. f. Südamerika.

splendens Boj., schimmernde, ☿. w. Mascarenas.

spinosa L., dornige, ☿. k. Italien, Frankreich, Griechenland.

squarrosa Haw., sparrige, ☿. t. ?

stellaespina Haw., sternstachelige, ☿. t. Cap d. gut. H.

stricta L. (*dubia* Dierb.), steife, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.

Szowitsii Fisch. et Mey., Szowits's, ☉. f. Nordpersien, Armenien.

tannensis Spgl., tannensische, ☉. w. f. Tanna.

taurinesis All. (*valentina* W., *diversifolia* W., *heterophylla* et *marginata* Hort.), turinische, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

tenuifolia Lam. (*leptophylla* P.), feinblättrige, ☉. f. Südeuropa.

terraccina L. (*obtusifolia* Lam.), italienische, ☉. f. Italien, Spanien.

tessellata Haw., würfelige, ☿. t. ?

tetragona Haw., vierkantige, ☿. t. ?

thymifolia L., thymianblättrige, ☉. f. Ostindien.

Tirucalli L., malabarische, ☿. w. Malabar.

toxicaria Afz., giftige, ☿. w. Guinea.

trigona Haw., dreikantige, ☿. w. Ostindien.

trigonacarpa Fisch., dreikantigfrüchtige, ☉. f. ? Südrussland.

tuberculata Jacq., höckerige, ☿. t. Cap der gut. Hoffn.

tuberosa L., knollige, 4. Kn. t. Südafrika.

uncinata DC., spitzhackige, ☿. t. Cap der gut. Hoffn.

undulata MB., wellenblättrige, 4. f. Caucasus.

uniflora Haw., einblumige, 4. Kn. t. w. Südamerika.

valerianaefolia Lam., baldrianblättrige, 4. f. k. Griechenland.

varians Haw., veränderliche, ☿. w. Ostindien.

variegata Sims, bunte, ☉. f. Louisiana.

verrucosa ? L. Lam., warzige, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.
 β) flavicoma DC.

villosa W. K., zottige, 4. f. Ungarn.

virgata W. K., ruthenförmige, 4. f. Osteuropa, Taurien.
 β) uralensis Fisch. Link.

Wulffeni Hopp. (*veneta* W.), Wulffen's, ☿. k. Oesterreichisches Litorale.

canaliculata Lam., *tithymaloides* L. etc. v. *Pedilanthus canalicul.* etc.

Euphoria Commers., Euphorie, VIII. 1., Sapindaceae.

Litchi Dsf. (*punicea* Lam.), schuppenfrüchtige, ☿. w. Ostindien, China.

Longan Lam., glattfrüchtige, ☿. w. China, Cochinchina.

Nephelium DC., mähenfrüchtige, ☿. w. Java, Cochinchina.

verticillata Bot. reg., wirtelförmige, ☿. w. Ostindien.

Euphrasia T., Augentrost, XIV. 11., Personatae-Rhinantheae.

alpina Lam. (*salisburgensis* Funk), Alpen-A., ☉. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) pectinata Tenor.

Euphrasia

micrantha Rchb., kleinblumiger, ☉. f. Europa.

minima Jacq., kleinsten, ☉. f. Alpen.

nemorosa Rchb. (*stricta* Host), Hain-E., ☉. f. Europa.

officinalis L., gemeiner, ☉. f. Europa.

pratensis Fries (*Rostkoviana* Hay.), Wiesen-A., ☉. f. Europa, Caucasus.

β) *mollis* Ledeb.

tricuspidata L., dreispitziger, ☉. f. Tyrol, Oberitalien.

latifolia L. v. *Trixago latifol.* *linifolia* L., *Odontites* L. etc. v. *Odontites linifolia* etc.

Eupomatia RB., Eupomatie, XII. III., ?Myristicaceae.

laurina RB., lorbeerblättrige, ♀. t. Neuholland.

Eurya Thbg., Eurya, XI. I. (XXIII. I.), Ternstroemiaceae.

chinensis RB., chinesische, ♀. t. China.

japonica Thbg., japanische, ♀. t. Japan.

multiflora DC., vielblumige, ♀. t. Nepal.

Euryale ferox Salisb. v. *Anneslea spinosa*.

Eurybia Cass. v. Aster.

Eurycles Salisb., Eurycles, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.

amboinensis Salisb., amboinische, 4. Zw. w. Amboina.

australasica G. Don, neuholländische, 4. Zw. w. Neuholland.

Cunninghamii Ait., Cunningham's, 4. Zw. w. Neuholl.

nervosa G. Don, nervige, 4. Zw. w. Ostindien.

Eurylepis D. et G. Don, *Euryloma* D. et G. Don (et *Eurystegia* D. et G. Don) v. Erica.

Euryops Cass., Euryops, XIX. IV., Compositae-Corymbiferae.

abrotanifolius DC., stabwurzblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Athanasiae DC., athanasienähnlicher, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

lateriflorus Less., seitenblumiger, ♀. k. t. Cap d. g. H.

multifidus DC., vieltheiliger, ♀. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

pectinatus Cass., kammförmiger, ♀. k. t. Cap d. g. H.

tenuissimus Less., feiner, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

trifurcatus Cass., dreigabeliger, ♀. k. t. Cap d. g. H.

Euryspermum frondosum Salisb., *grandiflor.* Salisb. etc. v. *Leucadendron adscendens* etc.

Eustachys Desv., Schönähre, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.

distichophylla N. E., zweizeiligblättrige, 4. w. Chili, Brasilien.

petraea Desv., Felsen-Sch., 4. t. Cap der guten Hoffnung, Westindien, Süd- und Nordamerika.

Eustegia KB., Schönkranz, V. II., Asclepiadeae.

hastata RB., spontonförmiger, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.

Eustephia Cav., Eustephie, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.

coccinea Cav., scharlachfarbige, 4. Zw. t. w. ?Südamer.

Eustoma Salisb., Schönmund, V. I., Contortae-Gentianeae.

silenifolium Salisb., silenenblättriger, ☉. f. ?

Eustrephus RB., Schlingaffodile, VI. I., Asparagineae.

angustifolius RB., schmalblättrige, 4. Sch. t. Neuholl.

Eustrephus

latifolius RB., breitblättrige, 4. Sch. t. Neuholland.

Eutaxia RB., Hülseneibe, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

Baxteri K. et W., Baxter's, 5. t. Neuholland.

myrtifolia RB., myrtenblättrige, 5. t. Neuholland.

pungens Swt., stechende, 5. t. Neuholland.

Euterpe G., Euterpe, XXI. VI. (VI. III.), Palmae.

caribaea Spgl., caribäische, 5. w. Westindien.

globosa G., kugelförmige, 5. w. Mauritius.

oleracea Mart., kohlgebende, 5. w. Brasilien.

pisiformis G., erbsenförmige, 5. w. Madagascar.

Euthales RB., Euthales, V. 1., Campanulaceae-Goodeniaceae.

trinervis RB., dreinervige, 4. t. Neuholland.

Euthamia graminifol. Nutt. et *tenuifolia* Nutt. v. *Solidago graminifol.* etc.**Eutoca** RB., Eutoca, V. 1., Asperifoliaceae-Hydrophyllae.

divaricata Benth., ausgesperrte, ☉. f. Californien.

Franklini RB., Franklin's, ♂, f. Nordamerika.

multiflora Dougl., vielblumige, ☉. ♂. f. Californien.

sericea Grah., seidenhaarige, ♂. 4. f. Nordamerika.

viscida Benth., schmierige, ☉. f. Californien.

Wrangeliana Fisch. et Mey., Wrangel's, ☉. f. Neucalifornien.

parviflora RB. v. *Nemophila parviflora*.

Euxenia Chamiss., Euxenie, XIX. v., Compositae-Corymbiferae.

grata Chamiss., angenehme, 5. t. Chili, Brasilien.

Mitiqui DC., Mitiqui-E., 5. t. Chili.

Evax umbellata G. v. *Micropus pygmaeus*.**Evodia** Forst., Evodia, IV. 1., Tricoccae-Rutaceae.

triphylla DC., dreiblättrige, 5. w. Ostindien.

Evolvulus L., Faltenblume, V. II., Convolvulaceae.

alsinoides L., meyerähnliche, ☉. m. f. Ostindien, Neuholland.

emarginatus Burm., ausgerandete, ☉. w. Ostindien.

gangeticus L., Ganges-F., ☉. w. Ostindien.

hirsutus Lam., rauhhhaarige, ☉. w. Ostindien.

incanus P. (*sericeus* R. et P.), grauhaarige, ☉. w. f. m. Südamerika.

latifolius Ker, breitblättrige, 5. Sch. w. Brasilien.

linifolius L., leinblättrige, ☉. w. Jamaica.

nummularius L., pfennigkrautblättrige, ☉. w. Jamaica.

Nuttallianus Schult., Nuttal's, ☉. f. Nordamerika.

sericeus Sw., seidenhaarige, ☉. w. Westindien.

villosus R. et P., zottige, 4. w. Südamerika.

Evonymus T., Spindelbaum, V. 1., Evonymaceae.

americanus L., amerikanischer, 5. f. Nordamerika.

angustifolius Pursh, schmalblättriger, 5. f. Nordamer.

atropurpureus Jacq., schwarzpurpurrother, 5. f. Nordamerika.

bullatus Lodd., blasiger, 5. k. t. Nepal.

? *chinensis* Lou., chinesischer, 5. k. China.

echinatus Wall, stachelkapseliger, 5. k. Nepal.

europaeus L. (*vulgaris* Scop.), gemeiner, 5. f. Europa.

b) fol. varieg. c) leucocarpus.

garciniaefolius Roxb. (*lacerus* Hamilt., *caucasicus* Lodd.),

garcinienblättriger, 5. f. b. Nepal.

Eronymus

grandiflorus Wall., großblumiger, f. f. b. Nepal.

grossus Wall., dicker, f. f. b. Nepal.

Hamiltonianus Wall. (*atropurpureus* Hamilt.), Hamilton's, f. f. b. Nepal.

japonicus Thbg., japanischer, f. f. b. k. Japan.

b) *maculatus*. c) *variegatus*.

indicus Heyn., indischer, f. t. Ostindien.

latifolius Scop., breitblättriger, f. f. Mitteleuropa.

lucidus D. Don, glänzender, f. k. Nepal.

micranthus D. Don, kleinblumiger, f. k. Nepal.

nanus MB. (*pumilus* Hort.), zwergiger, f. f. Caucasus.

obovatus Nutt., verkehrteblättriger, f. f. Pennsylvanien.

sarmentosus Nutt. (*scandens* Hort., *americanus sarmentosus* DC.), starkwurzelter, f. f. Nordamerika.

velutinus Fisch. et Mey., sammethaariger, f. f. Nordpersien.

verrucosus Scop., warziger, f. f. Osteuropa.

Colpoon L. v. Cassine *Colpoon*. *Tobira* Thbg. v.

Pittosporum Tobira.

Evosma albiflora Andr. v. *Logania floribunda*.

Evosmus Nutt., *Evosme*, IX. 1. (XXII. VIII.), Laurineae.

albida Nutt., weißblättrige, f. f. Carolina.

Exacum L., Bitterblatt, IV. 1., Contortae-Gentianeae.

pulchellum Pursh, schönes, c. f. Nordamerika.

sessile L., sitzendes, c. 4. w. Ceylon.

tetragonum Roxb., vierkantiges, c. f. Nepal.

aureum L. (et *cordatum* L. suppl. et *guianense* Aubl.)

v. *Sebaea aurea* etc. *filiforme* W., *pusillum* DC. v.

Microcale filiformis etc. *hyssopifolium* W. (et *verticillatum* W. et *viscosum* Sm.) v. *Hippion hyssopifolium* etc.

ramosum Vahl etc. v. *Coutoubea ramosa*.

vaginata LaBill. v. *Logania latifolia*.

Excoecaria L., Blindbaum, XXII. XIII. (XVI. III.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

Agallocha L., ceylonischer, f. w. Ostindien, Ceylon.

glandulosa Sw., drüsiger, f. w. Jamaica, Brasilien.

serrata H. Kew., sägezähniger, f. w. Chili.

Exocarpus LaBill., Nacktnuß, XXI. v. (V. 1.), Sandalaceae.

cupressiformis LaBill., cypressenähnliche, f. t. Neuholland, Van-Diemens-Land.

humifusus RB., niedergestreckte, f. t. Van-Diemens-L.

latifolius RB., breitblättrige, f. t. Neuholland.

strictus RB., steife, f. t. Neuholland, Van-Diemens-L.

Exostemma Humb. Bonpl., Fadenchina, V. 1., Rubiaceae.

brachycarpon R. et S., kurzfrüchtige, f. w. Jamaica.

caribaeum W., caribäische, f. w. Westindien.

floribundum W., blüthenreiche, f. w. Westindien.

longiflorum R. et S., langblumige, f. w. Hispaniola, Guiana.

Faba T., Buff(*Sau*)bohne, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

vulgaris Mch., gemeine, c. f. Aegypten, Nordpersien.

b) *equina*. c) *purpurea*.

Fabago T. Ledeb., Bohnenkaper, X. 1., Zygophylleae.
major D. Don, große, 4. f. Syrien, Taurien, Nordafrika.

Fabiana R. et P., Fabiane, V. I., ?Personatae-Antirrhineae.

imbricata R. et P., schuppenblättrige, ♀. t. Chili.

Fabricia G. (J. C. Fabricius, berühmter dänischer Entomolog), XII. I., Myrtaceae.

laevigata Sm., glatte, ♀. k. t. Neusüdwallis.

myrtifolia G., myrtenblättrige, ♀. k. t. Neuholland.

sericea Nois., seidenhaarige, ♀. k. t. Neuholland.

stricta Lodd., steife, ♀. k. t. Neuholland.

Fagara L. (arabischer Name), IV. I., Tricoccae-Zanthoxyleae.

microphylla Dsf., kleinblättrige, ♀. w. ?

australis Cun., *Budrunga* Roxb. (et *Pteroda* L. [lenticifol. W.] et *tragodes* Jacq.) v. *Xanthoxylum*

australe etc. *Elaphrium* W. v. *Elaphrium glabrum*.

triphylla Lam. v. *Evodia triphylla*.

Fagelia Neck., Fagelia, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

bituminosa Neck. DC., harzige, ♀. Sch. w. t. Cap der guten Hoffnung.

Fagonia T. (Fagon, berühmter Beförderer der Botanik), X. I., Zygophylleae.

arabica L., arabische, ♂. ♀. k. Arabien, Aegypten.

cretica L., cretische, ☉. ♂. k. Creta, Nordafrika.

glutinosa Delil., kleberige, ♂. k. Aegypten.

Fagopyrum T. v. *Polygonum*.

Fagraea Thbg. (J. T. Fagraeus, Freund d. Thunberg), V. I., Contortae-Loganieae.

fragrans Roxb., wohlriechende, ♀. w. Ostindien.

obovata Wall., verkehrteiförmige, ♀. w. Silhet.

zeylanica Thbg., zeylanische, ♀. w. Ceylon.

Fagus T., Buche, XXI. IX., Amentaceae.

antarctica Forst., Südpol-B., ♀. f. Feuerland.

betuloides Mirb., birkenähnliche, ♀. f. Feuerland.

Dombeyi Mirb., Dombey's, ♀. k. Chili.

dubia Mirb., zweifelhafte, ♀. f. Magellanische Strafe.

ferruginea Ait., rostfarbige, ♀. f. Nordamerika.

b) caroliniana Lodd. c) latifolia Lee.

obliqua Mirb., schiefblättrige, ♀. k. Chili.

sylvatica L., gemeine, Roth-B., ♀. f. Europa, Nordamer.

b) purpurea Ait. (*atrorubens du Roi*). c) cuprea

Lodd. d) foliis variegat. e) heterophylla Loud.

(*laciniata* Lodd., *asplenifolia* Lodd., *incisa* Hort.,

salicifolia Hort.). f) cristata Lodd. (*crispa* Hort.).

g) pendula Lodd. h) americana Loud. (*sylvestris* Mchx.).

Castanea L. etc. v. *Castanea vesca* etc.

Falcaria Dill., Sichelholde, V. II., Umbelliferae.

latifolia Koch, breitblättrige, ♂. f. Krain.

Rivini Host., Rivin's, ♂. f. Europa, Kleinasien, Sibirien.

Falkia L. (J. P. Falk, schwedischer Botaniker), V. II., Convolvulaceae.

repens L., kriechende, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

Farsetia Turr. (Philip Farseti, venetianischer Botaniker), XV. II., Cruciferae.

aegyptiaca Turr. (*cheiranthoides* MB.), aegyptische, ♀. k. Nordafrika.

?cheiranthifolia DC., lackblättrige, ☉. f. Levante.

Farsetia

clypeata RB., schildige, ♂. f. Süditalien, Griechenland, Taurien, Kleinasien.

eriocarpa DC., wollfruchtige, ♀. k. Cypern.

lunarioides RB., lunarienähnliche, ♀. k. Griechenland.

suffruticosa DC., halbstrauchige, ♀. k. Persien.

deltoides RB. v. *Aubrietia deltoid.* *incana* RB. et

mutabilis RB. v. *Berteroa incana* etc.

Fedia Mch., Fedie, II. 1., Valerianeae.

Cornucopiae Vahl, fühlhornartige, ☉. f. Südeuropa.

Hinsichtlich der übrigen s. *Valerianella*.

Fenzlia Benth. (Dr. Fenzl, österreichischer Botaniker), V. t., Polemoniaceae.

dianthiflora Benth., nelkenblumige, ☉. f. Californien.

Fernandezia R. et P. (G. Garcias Fernandez, spanischer Botaniker), XX. 1., Orchideae.

acuta Lindl., spitze, 4. w. Trinidad.

elegans Lindl., nette, 4. w. Trinidad.

Fernelia Commers. (J. Fernel, Arzt Heinrich II. von Frankreich), IV. 1., Rubiaceae.

buxifolia Lam., buxusblättrige, ♀. w. Mascarenas.

obovata Lam., verkehrteiförmige, ♀. w. Mascarenas.

Feronia Corr., Feronie, X. 1., Hesperideae-Aurantiaceae.

Elephantum Roxb., Elephanten-F., ♀. w. Ostindien.

Ferraria L. (J. B. Ferrari, italienischer Botaniker), III. 1. (XVI. 1.), Irideae.

angustifolia Swt., schmalblättrige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

antherosa Ker (*viridiflora* Bot. reg.), grünblumige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

atrata Lodd., schwärzliche, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

divaricata Swt., ausgespernte, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

elongata Grah., verlängerte, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

Ferrariola Thbg. (*minor* P.), kleine, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

obtusifolia Swt., stumpfblättrige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

uncinata Swt., hackige, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

undulata L. (*punctata* P.), wellenförmige, 4. Zw. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

ixioides W. v. *Libertia ixioides.* *tricuspis* W. v.

Vieusseuxia tricusp. *Pavonia* L. v. *Tigridia Pavonia.*

Ferreola *buxifolia* Roxb. v. *Maba buxifolia.***Ferula** T. (et *Ferulago* Koch), Steckenkraut, V. II., Umbelliferae.

ammoniaca Fisch., ammoniakgebendes, 4. f. Nordpers.

Asa foetida L., ächtes, 4. f. b. K. Persien.

campestris Bess., Feld-H., 4. Taurien.

capillaris Lk., haarförmiges, 4. f. b. k. Portugal.

caspica MB. (*cachryoides* Fisch.), kaspisches, 4. f. Taurien, Caucasus, Sibirien.

communis L., gemeines, 4. f. Südeuropa.

Ferulago L. (*nodiflora* Jacq., *Ferulago galbanifera* Koch), kleineres, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.

glaucula L., blaugrünes, 4. f. b. k. Sicilien, Griechenl.

meoides L., meumähnliches, 4. f. Kleinasien.

nodiflora L. (*sulcata* Dsf.), knotenblumiges, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.

Ferula

nuda Spgl., nacktes, 4. f. Sibirien.

obtusifolia Spgl., stumpfblättriges, 4. f. Griechenland, Kleinasien.

orientalis T., morgenländisches, 4. f. b. k. Nordafrika, Griechenland, Kleinasien.

persica W. (*Asa foetida* Hope), persisches, 4. f. b. k. Persien.

seselioides C. A. Mey., seseliähnliches, 4. f. Caucasus.

sibirica Spgl., sibirisches, 4. f. Croatien, Bessarabien, Caucasus, Sibirien.

stricta Spgl., steifes, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

sylvatica Bess., Wald-St., 4. f. Vollhynien, Podolien.

thyrsiflora Sm., straußblumiges, 4. k. Creta.

tingitana Herm., afrikanisches, 4. k. Nordafrika.

villosa Walt., zottiges, 4. f. Nordamerika.

laevigata Spgl. v. *Bubon laevig.* *longifolia* Fisch.

v. *Eriosynaphe longifol.* *Opopanax* Spgl. v. *Opopanax*

Chironium. rablensis Wulf. v. *Peucedanum rablense.*

Festuca L., Schwingel, III. II., Gramineae.

alpina Gaud., Alpen-S., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

amethystina Host., amethystfarbiger, 4. f. Oesterreich, Ungarn.

arundinacea Schreb. (*elator* Sm.), rohrähnlicher, 4. f. Europa.

aurata Gaud., goldfarbiger, 4. f. Schweiz.

coerulescens Dsf., bläulicher, 4. k. Nordafrika.

decolorans M. et Koch (*laxa* Gaud.), entfärbter, 4. f. Schweiz.

duriuscula L. (*intermedia* R. et S., *ovina* Schrad., *hirsuta* Host.), härlicher, 4. f. Europa.

β) *stricta* Host. γ) *nemoralis* M. et K. δ) *curvula* Gaud.

elator L. (*pratensis* Huds.), hoher Wiesen-S., 4. f. Europa.

Fenas Lagasc. (*tenax* Lk.), spanischer, 4. f. Spanien.

flavescens Ball. (*xanthina* R. et S., *alpina* Host.), gelblicher, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

glabra Spgl., glatter, 4. f. Nordamerika.

glauca Lam. (*pungens* R. et S., *laevigata* Clairv., *pallens* Host., ? *caesia* Sm.), blaugrüner, 4. f. Europa.

grandiflora Lam., großblumiger, 4. f. Nordamerika.

Halleri All. (et *Gaudini* Kunth), Haller's, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

heterophylla Lam., Haenk. (*duriuscula* L. syst. Schrad., *nemorum* Leyfs.), verschiedenblättriger, 4. f. Europa.

latifolia DC., breitblättriger, 4. f. ?

laxa Host., lockerer, 4. f. Krain.

longifolia Viv., langblättriger, 4. f. Ligurien.

nigrescens Lam. (*nigricans* Schlchr.), schwärzlicher, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

ovina L. spec. (*tenuifolia* Sibth., *paludosa* Gaud.), Schaf-Schw., 4. f. Europa.

β) *vivipara* Sm. γ) *capillata* Lam.

pannonica Wulf., ungarischer, 4. f. Ungarn.

picta Kit., schattirter, 4. f. Ungarn.

pilosa Hall. fil. (*rhactica* Sut., *poaeformis* Host.), haariger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

pubescens Lk., weichhaariger, 4. f. Ungarn.

pumila Vill., kleiner, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

Festuca

rubra L., rothlieber, 4. f. Europa.

β) *dumetorum* L. (*barbata* Schrk.). γ) *cinerea* DC. (*arenaria* Osb.).

Scheuchzeri Gaud. (*pulchella* Schrad., *nutans* Host.), Scheuchzer's, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

spadicea L., brauner, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

spectabilis Jan. (*spadicea* β. *nemorosa* Poll.), ansehnlicher, 4. f. Südtirol, Oberitalien.

triflora Dsf., dreiblümiger, 4. f. Nordafrika.

vaginata Kit., langscheidiger, 4. f. Ungarn, Süddeutschl.

vallesiaca Schlchr., Gaud. (*pallens* Panz., *guestfalica* Boenningh.), Walliser-Sch., 4. f. Deutschland, Schweiz.

varia Haenk. (*acuminata* Gaud.), bunter, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *crassifolia* Koch (*Eskia* Ramond).

violacea Gaud., violetter, 4. f. Schweiz.

Zweifelhafte: *balearica* Guatt., *cambrica* Sin., *glomerata* Russ. (Aleppo), *Hemipoa* Delil. (Montpellier), *hordeiformis* Sin. (England).

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen: *Brachypodium*, *Brizopyrum*, *Bromus*, *Corycarpus*, *Dactylis*, *Diplachne*, *Lolium*, *Nardurus*, *Schismus*, *Sclerochloa*, *Scolochloa* (et *Catapodium*), *Triticum*, *Vulpia*.

Feuillaea pedata Sm. v. *Jolifia africana*.

Ficaria Dill., Feigwarzenkraut, XIII. VI., Ranunculaceae.

calthaefolia Rchb., dotterblumenblättriges, 4. f. Kn. Dalmatien.

verna Huds. (*ranunculoides* Roth, Mch.), Frühlings-F., 4. Kn. f. Europa.

b) *plena*. c) *pallida*.

Ficinia Schrad. (H. Ficinus, Professor der Physik und Chemie zu Dresden), III. I., Cyperaceae.

atrata Schrad. N. E., schwärzliche, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

truncata Schrad. N. E., abgestutzte, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Ficus T., Feigenbaum, XXIII. II. (XXI. I.), Urticaceae.

acuminata Hamilt. (*cerasiformis* H. Glasg.), zugespitzter, 5. w. Silhet.

adhatodaefolia Schott., adhatodablättriger, 5. w. Brasilien.

Afzelii G. Don, Afzelius's, 5. w. Sierra Leone.

americana Aubl., amerikanischer, 5. w. Guiana.

aquatica W. (*heterophylla* L. suppl.), wasserliebender, 5. w. Ostindien.

arbutifolia Lk., erdbeerbaumblättriger, 5. w. ?

aspera Forst., rauh, 5. w. Hebriden.

astrifolia H. Vindob., sternblättriger, 5. w. Brasilien.

aurantiaca Lodd., orangenähnlicher, 5. w. ?

australis W. (*rubiginosa* Dsf.), neuholländischer, 5. t. k. Neuholland.

bengalensis L., bengalischer, 5. w. Bengalen.

Benamina L., Benjamin's, 5. w. Ostindien.

brasiliensis Lk., brasilianischer, 5. w. Brasilien.

Brassii RB., Brass's, 5. w. Sierra Leone.

calyculata Mill., gekelchter, 5. w. Neuspanien.

capensis Thbg., kapischer, 5. t. k. Cap der gut. Hoffn.

Carica L., gemeiner, 5. f. b. k., Südeuropa, Nordafrika, Kleinasien.

Ficus

- cestrifolia Schott., hammerstrauchblättriger, f. w. Brasilien.
 ciliolosa Lk. (*citrifolia*, *americana* Hortul.), gefranzter, f. w. ?
 citrifolia Lam., citronblättriger, f. w. Neuspanien.
 clusiaefolia Schott., clusiablättriger, f. w. Brasilien.
 cotinifolia H. B. K., cotinusblättriger, f. t. w. Mexico.
 cotoneaefolia Vahl (*indica* Lam.), mispelblättriger, f. w. Ostindien.
 cordata Thbg., herzblättriger, f. w. Cap d. gut. H.
 coriacea Ait., lederblättriger, f. w. Ostindien.
 costata Ait., rippiger, f. w. Ostindien.
 clethraefolia W., clethrablättriger, f. w. Caracas.
 crassinervia Dsf., dicknerviger, f. w. Jamaica.
 dumosa Lodd., Hecken-F., f. w. ?
 elastica Roxb., elastischer, f. t. w. Ostindien.
 elliptica H. B. K., elliptischer, f. w. Südamerika.
 exasperata Vahl (*scabra* W., *glandulosa* Hort., *coronata* Spin.), scharfblättriger, f. w. Guinea.
 eximia Schott., ausgezeichneter, f. w. Brasilien.
 glabrata H. B. K., glatter, f. w. Südamerika.
 glomerata Roxb., knaulförmiger, f. w. Ostindien.
 heterophylla Lam., verschiedenblättriger, f. w. Ostind.
 holosericea Schott., sammethaariger, f. w. Brasilien.
 Hookeri Swt. (*nitida* Hook.), Hooker's, f. w. Westind.
 indica Vahl, indischer, f. w. Ostindien.
 laevigata Vahl, kahler, f. w. Caribäen.
 lanceolata Roxb., lanzettlicher, f. w. Ostindien.
 lasiophylla Lk. (*bengalensis* Hortul.), wollblättriger, f. w. ? Ostindien.
 laurifolia Lam. (*virens* Ait., *martinicensis* W.), lorbeerblättriger, f. w. Westindien.
 lentiginosa Vahl, fleckiger, f. w. Caribäen.
 leucotoma Poir. (*leucosticta* Spgl., *venosa* W.), weispunktirter, f. w. Ostindien.
 Lichtensteinii Link, Lichtenstein's, f. w. t. Cap der guten Hoffnung.
 Loganii G. Don, Logan's, f. w. Caracas.
 longifolia Schott, langblättriger, f. w. Brasilien.
 lucens H. Vindob., leuchtender, f. w. Brasilien.
 lucida Ait., glänzender, f. w. Ostindien.
 lutescens Nois., gelblicher, f. w. ?
 macrophylla Dsf., großblättriger, f. w. t. Neuholland.
 microcarpa Vahl, kleinfrüchtiger, f. w. Guinea.
 mollis Vahl (*mysorensis* Roth), weicher, f. w. Ostindien.
 Muntia Lk., Muntia-F., f. w. Ostindien, Neuholland.
 Murrayana H. Berol., Murray's, f. w. Südamerika.
 myrtifolia Lk., myrtenblättriger, f. w. ?
 nitida Thbg., schimmernder, f. w. Ostindien.
 nymphaeaefolia L., nixblumenblättriger, f. w. Ostindien.
 oblongata Lk., verlängerter, f. w. Cap der gut. Hoffn.
 oblongifolia D. Don, langblättriger, f. w. t. Nepal.
 obtusata Lk. (*mauritiana* Hortul., *an* Lam.), stumpflicher, f. w. ?
 obtusifolia H. B. K., stumpfblättriger, f. w. t. Mexico.
 oppositifolia Roxb. (*hispida* Thbg., *scabra* Jcq.), gegenblättriger, f. w. Ostindien.
 pedunculata Ait., gestielter, f. w. Caribäen.
 pendula Lk., hängender, f. w. ?

Ficus

- pertusa L. suppl., durchlöcherter, f. w. Surinam.
 pisiformis Hort., erbsenfrüchtiger, f. w. ?
 populifolia Vahl (*religiosa* Forsk.), pappelblättriger, f. w. Arabien.
 populnea W., pappelähnlicher, f. w. Südamerika, Westindien.
 pulchella Schott, schöner, f. w. Brasilien.
 pumila L., kleiner, f. w. China, Japan, Molucken.
 racemosa L., traubiger, f. w. Ostindien.
 Radula W. (*anthelminthica* Rich.), raspeliger, f. w. Südamerika.
 religiosa L., religiöser, f. w. Ostindien, Cochinchina.
 repens W. Roxb., kriechender, f. w. Ostindien.
 retusa L., abgestutzter, f. w. Ostindien.
 rubrinervia Lk., rothnerviger, f. w. Brasilien.
 rufa Schott., fuchsrother, f. w. Brasilien.
 rugosa G. Don, runzlicher, f. w. Sierra Leone.
 sagittata Vahl, pfeilförmiger, f. w. Ostindien.
 salicifolia Vahl (*indica* Forsk., *speciosa* Hort.), weidenblättriger, f. w. Arabien.
 scabra Forst. (*turbinata* W.), scharfer, f. w. t. Freundschaftsinseln.
 Schottii H. Berol., Schott's, f. w. ? Brasilien.
 stipulata Thbg. (*scandens* Lam.), zwischenblättriger, f. Sch. w. China, Japan.
 superstitiosa Lk. (? *drupacea* Thbg.), abergläubischer, f. ? Ostindien.
 Sycomorus L., ägyptischer, f. k. t. Aegypten.
 terebrata W., durchbohrter, f. w. Mascarenas, ? Ostindien.
 tinctoria Forst., färbender, f. w. Societätsinseln.
 tomentosa Roxb., filziger, f. w. Ostindien.
 ulmifolia Lam., ulmenblättriger, f. w. Java, Philippinen.
 urophylla Wall., schlankblättriger, f. w. Ostindien.
 umbellata Vahl, doldiger, f. w. Guinea.
 venosa Ait. (*infectoria* W.), aderiger, f. w. Ostindien.
 virgata Roxb., ruthenförmiger, f. w. Ostindien.
 viscifolia Lod., schmierigblättriger, f. w. ?

Fieldia Cunn. (Baron Field, Oberrichter in Neusüdwallis), XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.

australis Cunn., südliche, f. t. Neuholland.

Filago L., Faden- (Filz-) kraut, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

arvensis L. (*montana* L.), Acker-F., ☉. f. Europa, Sibirien.

β) *Lagopus* Steph. γ) *alpestris* Presl (*Cupaniana* Guss.).

congesta Guss., gedrängtes, ☉. f. Sicilien.

gallica L., französisches, ☉. f. Süddeutschland, Frankreich, Italien, England.

germanica L., deutsches, ☉. f. Europa.

β) *pyramidata* L. γ) *lanuginosa* Req. δ) *spatulata* Presl.

minima Fries (*arvensis* Wahlbg., *montana* Gaud.), kleines, ☉. f. Europa.

β) *supina* DC.

neglecta DC. (*Soy.* Willem.), übersehenes, ☉. f. Lothringen.

Filago

acaulis All. (*pygmaea* L.) v. *Micropus pygm. supina* Lam. v. *Micropus supinus*.

Fimbristylis Vahl, Franzengriffel, III. II., Cyperaceae.
angularis Lk. (*Isolepis ang.* Schrad.), kantiger, 4. w. Ostindien.

annua R. et S., jähriger, ☉. f. Südeuropa.

bromeliaefolia A. Spgl. (*Rudg.*), ananasblättriger, 4. w. Surinam.

complanata Lk. (*Isolepis comp.* R. et S.), flachhalmiger, 4. w. Ostindien.

dichotoma Vahl, zweizinkiger, ☉. f. Südeuropa, Afrika, Ost- und Westindien.

diphylla Vahl, zweiblättriger, 4. f. Ostindien, Nepal.

foliosa Lk. (? *Isolepis curvifol.* Schrad.), blattreicher, 4. w. Ostindien.

mezostachya Lk. (*dichotoma* Hort.), langähriger, ☉. w. ?

miliacea Vahl, hirseähnlicher, ☉. w. Ostindien.

pallescens Lk., bleicher, ☉. w. Caracas.

puberula Vahl, feinhaariger, 4. f. Nordamerika.

pubigera Lk., haariger, ☉. f. Nordamerika.

umbellata Vahl, doldiger, 4. w. ?

Fingerhuthia Lehm. (C. A. Fingerhuth, deutscher Botaniker), III. II., Gramineae.

africana Lehm., afrikanische, ☉. f. Cap der gut. Hoffn.
a) major. β) minor.

Fischera *buxifolia* Sw. v. *Leiophyllum thymifolium*.**Flacourtia** Commers. (Etienne de Flacourt, französischer Statthalter auf Madagascar), XXII. XII. (XIII. I.), Capparideae-Flacourtieae.

cataphracta Roxb., geharnischte, ♀. w. Ostindien.

flavescens W., gelbliche, ♀. w. Guinea.

inermis Roxb., unbewehrte, ♀. w. Ostindien, Molucken.

Ramontchi L'Her., Ramontchi-F., ♀. w. Madagascar.

rhamnoides Burch., wegdornähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

rotundifolia Roxb., rundblättrige, ♀. t. w. Ostindien.

sapida Roxb., wohlgeschmeckende, ♀. w. Ostindien.

sepiaria Roxb., Zaun-F., ♀. w. Ostindien.

Flagellaria L., Peitschenstrauch, VI. III., Commelinaceae.

indica L., indischer, ♀. Sch. w. Ostindien, Molucken.

Flaveria Juss., Gelbling, XIX. v., Compositae-Corymbiferae,

angustifolia P., schmalblättriger, ☉. f. Mexico.

Contrayerva P., peruvianischer, ☉. f. m. Peru.

maritima H. B. K. (*linearis* Lag.), Seestrands-G., ☉. f. m. Cuba.

repanda Lagasc., ausgeschweiften, ☉. f. Südamerika.

Flemingia Roxb. (John Fleming, englischer Gelehrter), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

congesta Roxb., gedrängtblumige, ♀. w. Ostindien.

guineensis G. Don, guineische, ♀. w. Guinea.

lineata Roxb., linirte, ♂. ♀. w. Ceylon.

nana Roxb., zwergige, ♀. w. Ostindien.

procumbens Roxb., niederliegende, 4. w. Ostindien.

prostrata Roxb., hingestreckte, 4. w. Ostindien.

semialata Roxb., halbflügelige, ♀. w. Nepal.

Flemingia

stricta Roxb., steife, 4. w. Ostindien.

strobilifera RB., zapfentragende, 5. w. Ostindien.

Flindersia RB. (Capitain M. Flinders, berühmter Seefahrer), X. 1., Hesperideae-Meliaceae.

australis RB., neuholländische, 5. t. Neuholland.

Flüggea W. (J. Flügge, deutscher Botaniker), XXII. v. (V. 1.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

Leucopyrus W., weifsfrüchtige, 5. w. Ostindien.

Foeniculum T., Fenchel, V. 11., Umbelliferae.

officinale All. (*vulgare* G.), gemeiner, ♂. 4. f. England, Südeuropa, Caucasus.

b) *dulce*.

piperitum (Bertol.), Pfeffer-F., ♂. f. Italien.

Foetidia Commers., Stinkholz, XII. 1., ? Onagrariae, ? Philadelphaeae.

mauritiana Lam., mascarenisches, 5. w. Mascarenas.

Fontanesia LaBill. (Desfontaines, berühmter französ. Botaniker), II. 1., Sapotaceae-Oleinae.

phillyreoides LaBill., steinlindenähnliche, 5. k. Syrien.

Forskolea L. (Peter Forskol, schwedischer Botaniker). XXI. 1., Urticaceae.

angustifolia Retz, schmalblättrige, ☉. f. Teneriffa.

candida L. suppl. (*scabra* Retz), weisse, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

fruticosa W., strauchige, 5. k. Teneriffa.

tenacissima L. (*latifolia* Retz), zähe, ☉. f. Aegypten.

Fothergilla L. fil. (John Fothergill, Beförderer der Botanik), XIII. 11., ? Cunoniaceae, ? Hamamelideae.

alnifolia L. fil. (*Gardeni* Mchx.), erlenblättrige, 5. k. f. b. Carolina.

a) *obtusa* Sims (*major* Lodd.). β) *acuta* Sims (*Gardeni* Jacq.). γ) *major* Sims. δ) *serotina* Sims.

Fothergilla mirabilis Aubl. v. *Diplochita* Fothergilla Nachtr.**Fragaria** T., Erdbeere, XII. 111., Rosaceae-Potentilleae.

bonariensis Juss., bonarische, 4. k. f. Buen. Ayres.

canadensis Mchx., canadische, 4. f. Canada.

chilensis Molin., chilesische, 4. f. Chili.

collina Ehrh. (*hispida* Duches.), Hügel-E., 4. f. Europa.

β) *pratensis* L. (*Breslingia* Duch.).

*elatio*r Ehrh., hohe, 4. f. Europa.

grandiflora Ehrh., großblumige, 4. f. Surinam.

β) *calycina* Loisel.

indica Andr., indische, 4. k. t. Nepal.

monophylla Duches., einblättrige, 4. f. ?

platanoides Sering, platanusblättrige, 4. f. Nordamer.

vesca, L., gemeine, 4. f. Europa.

β) *majausa* Duch. γ) *semperflorens* Hey. (*alpina* P.). δ) *eflagellis* Duch. ε) *muricata*. ζ) *fruct. albo*.

virginiana Ehrh., virginische, 4. f. Nordamerika.

Franciscea Pohl (Franz II., Kaiser von Oesterreich, großer Beförderer der Botanik), XIV. 11., Solanaceae.

uniflora Pohl (*Hopeana* Hook), einblumige, 5. w. Brasilien.

Francoa Cav. (F. Franco von Valencia, Beförderer der Pflanzenkunde, im XVI. Jahrh.), VIII. 1v., ? Saxifrageae.

Francoa

- appendiculata Cav., anhängselige, 4. k. Chili.
 ramosa D. Don, ästige, 4. k. Chili.
 sonchifolia Spgl., gänsedistelblättrige, 4. k. Chili.

Frankenia L. (J. Frankenius, Professor der Botanik zu Upsala), VI. 1., Cistineae-Frankeniaceae.

- corymbosa Dsf., traubendoldige, 4. k. Nordafrika.
 ericaefolia C. Sm., heideblättrige, 4. k. Canarische Inseln.
 fruticulosa DC., strauchige, 4. t. Neuholland.
 hirsuta L., rauhhaarige, 4. k. Nordafrika.
 hispida DC. (*hirsuta* Sibth.), hackerige, 4. f. k. Kleinasien, Sibirien.
 intermedia DC., mittlere, 4. k. Nordafrika.
 laevis L., glatte, 4. k. f. England, Südeuropa.
 mollis MB., weiche, 4. f. Caucasus.
 nodiflora Lam., knotenblumige, 4. k. Cap d. gut. H.
 Nothria Thbg., Nothria-F., 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.
 pulverulenta L., bestäubte, 4. f. England, Südeuropa, Nordafrika, Taurien.

Franseria Cav. (A. Franser, ? spanischer Botaniker), XIX. v., Compositae-Ambrosiaceae.

- ambrosioides Cav., ambrosiaähnliche, 4. t. Mexico.
 artemisoides W., beifufsähnliche, 4. t. Peru.

Fraseria Walt. (J. Fraser, welcher in Nordamerika Pflanzen sammelte), IV. 1., Contortae-Gentianeae.

- carolinensis Walt. (*Walteri* Mchx.), karolinische, ♂. f. Carolina, Virginien.

Fraxinus T., Esche, II. 1. (XXIII. 11.), Sapotaceae-Oleinae.

- acuminata Lam. (*concolor* Mchx.), zugespitzte, 4. f. Nordamerika.
 alba Bosc. (*caroliniana* alba s. *americana* alba Hortul.), weisse, 4. Nordamerika.
 americana L. (*alba* Bartr., *discolor* Mühlbg.), amerikanische, 4. f. Nordamerika.
 β) latifolia.
 angustifolia Vahl, schmalblättrige, 4. f. Spanien, Portugal.
 argentea Loisel., silberfarbige, 4. f. Corsica.
 caroliniana Lam. (*serratifolia* Mchx., *lanceolata* Borkh.), karolinische, 4. f. Nordamerika.
 chinensis Roxb., chinesische, 4. k. China.
 cinerea Bosc., aschgraue, 4. f. Nordamerika.
 elliptica Bosc., elliptische, 4. f. Nordamerika.
 epiptera Mchx. (*canadensis* G., *lancea* Bosc.), lanzettblättrige, 4. f. Virginien, Carolina.
 excelsior L., gemeine, 4. f. Europa, Asien.
 a) argentea. b) aurea. c) aurea pendula. d) crispa (*atrovirens* Dsf.). e) erosa. f) fungosa. g) horizontalis. h) jaspidea. i) Kincairniae. k) lutea. l) nana Lodd. (*humilis* Hort.). m) pendula Ait. n) purpurascens. o) verrucosa Dsf. p) verrucosa pendula. q) striata. r) verticillata. s) villosa.

- expansa W. (*caroliniana* Hort.), ausgebreitete, 4. f. Nordamerika.

- fusca Bosc., bräunliche, 4. f. Nordamerika.

Fraxinus

heterophylla Vahl (*simplicifolia* W., *monophylla* Dsf., *excelsior diversifolia* Ait.), verschiedenblättrige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

β) *variegata*.

juglandifolia Lam., nufsblättrige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

β) *subintegerrima* Vahl (*novae-Angliae et caroliniana* Mill.).

lentiscifolia Dsf. (*tamariscifolia* Vahl, *parvifolia* Lam.), pistacienblättrige, $\frac{1}{2}$ f. Syrien.

β) *pendula*.

longifolia Bosc, langblättrige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

macrophylla Thouin, grofsblättrige, $\frac{1}{2}$ f. ?

mixta Bosc, gemischte, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

nana Bosc (*polemoniifolia* Poir., *appendiculata* P.), Zwerg-E., $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

nigra Bosc, schwarze, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

ovata Bosc, eiblättrige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

oxycarpa W. (*oxyphylla* W.), schmalfrüchtige, $\frac{1}{2}$ f. Taurien.

pallida Bosc, bleiche, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

pannosa Vent., faserlappige, $\frac{1}{2}$ f. Carolina.

parvifolia W., kleinblättrige, $\frac{1}{2}$ f. Kleinasien, Nordafrika.

platycarpa Mchx., breitfrüchtige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

pubescens Walt. (*nigra* du Roi, *tomentosa* Mchx.), weichhaarige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

β) *latifolia* W. γ) ? *subpubescens* P. (? *subvillosa* Bosc).

pulverulenta Bosc, bestäubte, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

quadrangulata Mchx. (*tetragona* Cels), vierkantige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

β) *nervosa* Lodd.

Richardi Bosc, Richard's, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

rubicunda Bosc, röthliche, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

rufa Bosc, gelbrothe, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

sambucifolia Lam. (*nigra* Mch.), fliederblättrige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

β) *crispa* Lodd.

Schiedeana Schltd., Schiede's, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

triptera Nutt., dreiflügelige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

viridis Bosc (*virens* Lodd.), grünende, $\frac{1}{2}$ f. Nordamer.

b) *variegata*.

Unbestimmte: *amarissima* Lodd., *appendica* Lodd., *lucida* Lodd.

floribunda Wall., *Ornus* L. etc. v. *Ornus floribund. europaea* etc. *laevigata* H. Par. v. *Pterocarya caucasica*.

Freziera Sw. (A. F. Frezier, bereiste Peru und Chili), XIII. 1., Ternstroemiaceae.

theaeoides Sw., theeähnliche, $\frac{1}{2}$ w. Jamaica.

Friesia DC. (E. M. Fries, berühmter schwedischer Botaniker), XI. 1., Tiliaceae-Elaeocarpeae.

peduncularis DC., gestielte, $\frac{1}{2}$ t. Van-Diemens-Land.

Friesia argentea Spgl. v. *Crotonopsis linearis*.

Fritillaria T., Schachblume, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

I. *Genuina*.

alba Nutt., weisse, 4. Zw. f. Nordamerika.

cuprea Grah., kupferfarbige, 4. Zw. k. Mexico.

Fritillaria

lanceolata Pursh (*camtschutensis* Hort.), lanzettliche, 4.

Zw. f. Kamtschatka, Nordamerika.

latifolia W., breitblättrige, 4. Zw. f. Caucasus.

leucantha Fisch., weißblumige, 4. Zw. f. Sibirien.

lusitanica Wickstr., portugiesische, 4. Zw. f. Portugal.

lutea MB. (*collina* Adam), gelbe, 4. Zw. f. Caucasus.

macrophylla D. Don, großblättrige, 4. Zw. f. Nepal.

meleagroides Fisch., ähnelnde, 4. Zw. f. Sibirien.

Meleagris L., gemeine, 4. Zw. f. Mittel- u. Südeuropa.

b) *multiplex*.

messanensis Rafin. (? *plantaginifolia* Lam.), sizilianische,

4. Zw. f. Sicilien.

minor Ledeb. (*meleagroides* Patr.), kleine, 4. Zw. f.

Altai.

nervosa W. (*latifolia* β , *minor* Bot. mag.), nervige, 4.

Zw. f. Caucasus.

nigra Bot. mag. (*pyrenaica* Bot. mag.), schwärzliche, 4.

Zw. f. Pyrenäen.

obliqua Bot. mag., schiefblättrige, 4. Zw. f. Caucasus.

persica L., persische, 4. Zw. f. Persien.

praecox Swt. (*meleagris* β , *alba* Hort.), frühe, 4. Zw. f.

Südeuropa.

b) *minima* Swt.

pudica Spgl., schamhafte, 4. Zw. f. Nordamerika.

pyrenaica L. (*racemosa* Bot. mag.), pyrenäische, 4. Zw. f.

Pyrenäen, Rußland.

ruthenica Wikstr. (*verticillata* MB., *pyrenaica* Pall., *per-*

sica S. G. Gmel.), russische, 4. Zw. f. Taurien,

Caucasus.

tenella MB. (*racemosa minor* Bot. mag.), zierliche, 4.

Zw. f. Illyrien, Istrien, Caucasus.

β) *montana* Hoppe.

tulipifolia MB. (*caucasica* Adam), tulpenblättrige, 4.

Zw. f. Caucasus.

verticillata W., wirtelblättrige, 4. Zw. f. Sibirien, Japan.

II. *Petilium* L. (*Imperialis* Juss. Dumont Cours.).

Imperialis L., Kaiserkrone, 4. Zw. f. Persien.

b) *lutea* (*flava*). c) *lutea plena*. d) *rubra plena*.

e) *aurantiaca*. f) *fol. variegat.*

barbata Kunth et *purpurea* Kunth v. *Cyclobothra*

barbata etc.

Froelichia lanata Mch. v. *Hoplotheca interrupta*.

Frolovia DC. (Frolow, russischer Botaniker), XIX. 1.,

Compositae-Cynarocephalae.

lyrata Ledeb., leierförmige, 4. f. Altai.

Fuchsia Plum. (et *Dorvalia* Commers. Hffinsg. et Alo-

pecia Hffinsg.), (L. Fuchs, berühmter deutscher Bo-

taniker), VIII. 1., Onagrariae.

apetala R. et P., kronenlose, $\frac{1}{2}$ k. t. Peru.

arborescens Sess., baumartige, $\frac{1}{2}$ k. t. Mexico.

bacillaris Lindl., starkästige, $\frac{1}{2}$ t. Mexico.

coccinea L., scharlachfarbige, $\frac{1}{2}$ k. Chili, Patagonien.

b) *Groomiana* Hort.

conica Lindl., D. Don, kegelförmige, $\frac{1}{2}$ k. t. Chili.

corymbiflora R. et P., traubendoldige, $\frac{1}{2}$ k. t. Peru.

cylindracea Lindl., cylinderblumige, $\frac{1}{2}$ k. t. Mexico.

decussata R. et P., kreuzblättrige, $\frac{1}{2}$ t. Peru.

denticulata R. et P., gezähnelte, $\frac{1}{2}$ t. Peru.

Fuchsia

excorticata L., rindenlose, ♀. t. Neuzeeland.

fulgens DC., feuerfarbige, ♀. t. Texas.

gracilis Lindl. (*decussata* Grah.), schlanke, ♀. k. t. Mexico.

b) *multiflora*.

lycioides Andr., bocksdornähnliche, ♀. k. t. Chili.

macrostemma R. et P., grobsfadige, ♀. k. t. Chili.

microphylla Kunth, kleinblättrige, ♀. k. t. Mexico.

b) *grandiflora*,

ovalis R. et P., eiförmige, ♀. t. Peru.

parviflora Lindl., kleinblumige, ♀. t. Mexico.

serratifolia R. et P., sägeblättrige, ♀. k. t. Peru.

tenella Loud., zarte, ♀. k. t. Chili.

thymifolia Kunth, thymianblättrige, ♀. k. t. Mexico.

venusta Kunth, liebliche, ♀. t. k. Mexico.

virgata Swt., ruthenförmige, ♀. k. t. Chili.

Hybriden: *elegans* Paxt., *eximia* Hort., *Fourgettii* Hort., *globosa* D. Don (et *major* Hort.), *Harrisonii* Hort., *grandiflora* Hort., *hybrida* Swt., *longiflora* Hort., *multiflora* Hort., *Thompsonii* Hort. *Youngii* Hort.

involucrata Sw. v. *Schradera cephalotes*.

Fuirena Rottb. (Georg Fuiren, dänischer Botaniker), III. 1., Cyperaceae.

umbellata Rottb., doldige, 4. w. Westindien, Neuholl.

Fumaria T., Erdrauch, XVII. II. (IV.), Papaveraceae-Fumarieae.

capreolata L., rankender, ☉. Sch. f. Mittel- und Südeuropa.

densiflora DC., dichtblumiger, ☉. f. Südfrankreich.

officinalis L., gemeiner, ☉. f. Europa, Asien etc.

β) *media* Loisel.

parviflora Lam, (*tenuifolia* Flor. Wett., *micrantha* Lag.), kleinblumige, ☉. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa.

spicata L., ähriger, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

Vaillantii Loisel., *Vaillant's*, ☉. f. Europa.

acaulis Wulf. etc. v. *Corydalis acaulis* etc. *Cucullaria* L. etc. v. *Dielytra Cucullaria* etc. *enneaphylla* L. v. *Sarcocapnos enneaphylla*. *fungosa* Ait. v. *Adlumia cirrhosa*. *vesicaria* L. v. *Cysticapnos africana*.

Funkia Spgl. (H. Funk, berühmter deutscher Mooskenner), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae (*Hemerocallideae*).

albo-marginata Hook., weisrandige, 4. f. k. Japan.

cucullata Hort., kappenförmige, 4. k. f. Japan.

lancifolia Spgl. (? *lanceaefolia* Dens, *japonica* Hort.), lanzettblättrige, 4. k. f. Japan.

b) *fol. variegat*.

ovata Spgl. (*coerulea* Hort.), eiförmige, 4. f. Japan.

Sieboldtiana Dens, *Sieboldt's*, 4. f. k. Japan.

subcordata Spgl. (*alba* Hort.), herzblättrige, 4. f. Japan.

undulata J. C., wellenblättrige, 4. f. k. Japan.

b) *fol. variegatis*.

Furcraea Vent. (*Fourcroya* Auct., *Fourcroy*, berühmter französischer Chemiker), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae (*Bromeliaceae*).

australis Haw., neuholländische, 4. ♀. t. Neuholland.

Furcraea

Cantala Wall., Cantala-F., 4. $\frac{1}{2}$. t. China.
 cubensis Haw., cubaische, 4. $\frac{1}{2}$. w. Cuba.
 gigantea Vent. (*foetida* Hort.), riesenhafte, 4. $\frac{1}{2}$. w. Südamerika.

longaeva Karw. et Zucc., langlebende, 4. $\frac{1}{2}$. w. Mexico.
 madagascariensis Haw., madagascarische, 4. $\frac{1}{2}$. w. Madagascar.

rigida Haw., starre, 4. $\frac{1}{2}$. w. Südamerika.
 tuberosa Haw., knollige, 4. $\frac{1}{2}$. w. Südamerika.

Fusanus L., Spindelstrauch, IV. 1. (XXIII. II.), Sandalaceae.

compressus L., plattästiger, $\frac{1}{2}$. k. t. Cap d. g. Hoffn.

Gärtnera Lam. (J. Gärtner, berühmter deutscher Botaniker), V. 1., Contortae-Loganieae.

vaginata Lam., scheidige, $\frac{1}{2}$. w. Mascarenas.

Gärtnera obtusifolia Roxb. et **racemosa** Roxb. v. **Hiptage obtusifol.** et **Madablota**.**Gagea** Salisb. (Sir Thomas Gage, englischer Botaniker), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

arvensis R. et S. (*villosa* Loud., *stellaris* Salisb.), Acker-G., 4. Zw. f. Europa, Caucasus.

bohemica R. et S., böhmische, 4. Zw. f. Böhmen, Mähren, Schlesien, Sachsen.

bulbifera R. et S., vielzwiebelige, 4. Zw. f. Caucasus, Sibirien.

chlorantha (MB.), grünblumige, 4. Zw. f. Caucasus, Sibirien.

circinata (L.), kreisförmige, 4. Zw. f. Taurien, Caucas.

Liottardi R. et S. (? *glauca* Swt.), Liottardi's, 4. Zw. f. Mitteleuropäische Alpen.

lutea R. et S. (? *fascicularis* Salisb., *sylvatica* Loud.), gelbe, 4. Zw. f. Europa, Caucasus.

minima R. et S. (*Sternbergii* Hopp.), kleinste, 4. Zw. f. Europa, Mittel- und Nordasien.

podolica R. et S., podolische, 4. Zw. f. Podolien.

pratensis Koch, Wiesen-G., 4. Zw. f. Baireuth.

pusilla R. et S. (? *Clusiana* Tausch), niedrige, 4. Zw. f. Böhmen, Ungarn, Siebenbürgen, Caucasus, Sibirien.

pygmaea G. Don, Zwerg-G., 4. Zw. f. Spanien, Creta.

saxatilis Koch, Gesteins-G., 4. Zw. f. Mittel- und Westdeutschland, Schweiz.

spathacea R. et S. (? *bracteolaris* Salisb.), scheidige, 4. Zw. f. Norddeutschland.

stenopetala Rchb. (*pratensis* R. et S.), schmalkronige, 4. Zw. f. Europa.

β) *Schreberi* Rchb.

uniflora G. Don, einblumige, 4. Zw. f. Sibirien.

serotina Bot. mag. (*striata* Swt.) v. *Lloydia serotina*.

Gagnebina Neck., **Gagnebina**, X. 1., Leguminosae-Mimosaceae.

axillaris DC., achselblumige, $\frac{1}{2}$. w. Mascarenas.

tamariscina DC., tamariskenähnliche, $\frac{1}{2}$. w. Mascarenas.

Gahnia Forst. (H. Gahn, schwedischer Botaniker), VI. 1., Cyperaceae.

procera Forst., hohe, 4. $\frac{1}{2}$. t. k. Neuzeeland.

Gaillardia Foug., Lam. (M. Gaillard de Marentonneau, Freund der Botanik), XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

Gaillardia

aristata Pursh, gegrannte, 4. f. Nordamerika.

Drummondii DC. (*bicolor Drummondii* Hook., *picta* D. Don, *coccinea* Hort.), Drummond's, ☉. ♂. f. k. Texas.

lanceolata Mchx. (*rustica* Cass., *bicolor* Ell.), lanzettblättrige, 4. f. Nordamerika.

pulchella Foug. (*bicolor* Lam., *amara* Rafin.), hübsche, 4. f. Carolina, Florida.

? *Richardsonii* Penny, Richardson's, 4. f. Nordamerika.

Galactia P. Br., Milchhülse, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

glabella Mchx., glatte, 4. Sch. f. Nordamerika.

mollis Mchx., weiche, 4. Sch. k. f. Nordamerika, Westindien.

pendula P., hängende, ♂. Sch. w. Westindien, Brasilien.

sericea P., seidenhaarige, ♂. Sch. w. Mascarenas.

pinnata P. v. *Barbieria polyphylla*.

Galactites Mch., Milchdistel, XIX. iii., Compositae-Cynarocephalae.

australis Swt., neuholländische, ☉. f. Neuholland.

tomentosa Mch., filzige, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

Galactodendron H. B. K., Kuh (Milch)baum, XXIII. ii., Urticaceae.

utile H. B. K., nutzbarer, ♂. w. Südamerika.

Galanthus L., Schneeglöckchen, VI. i., Narcisseae (*Amaryllideae*).

nivalis L., gemeines, 4. Zw. f. Europa.

b) *flore pleno*.

plicatus MB., gefaltetes, 4. Zw. f. Caucasus, Mittelasien.

Galatella Cass. v. Aster.

Galax L., Milchblume, V. i., Saxifrageae.

aphylla L., blattlose, 4. f. Nordamerika.

Galaxia L., Galaxie, III. i. (XVI. i.), Irideae.

ciliata P. (*ovata* Andr.), gefranzte, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

graninea Thbg., grasartige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

grandiflora Andr. (*multiflora* Spgl.), großblumige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

mucronularis Salisb., feinspitzige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

ovata Thbg., eiförmige, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

versicolor Salisb., bunte, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

ixiaeflora Red. v. *Ixia monadelpha*. *plicata* Jacq.

v. *Lapeyrousia fasciculata*. *ramosa* DC. v. *Ixia columellaris*.

Galedupa uliginosa Roxb. v. *Pongamia uliginosa*.

Galega T., Geißraute, XVII. iv. (XVI. vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

biloba Swt., zweilappige, 4. f. ?

officinalis L., officinelle, 4. f. Mittel-, Süd- u. Westeuropa.

b) *alba*.

orientalis Lam. (*montana* Schult., *elatio* Hort.), morgenländische, 4. f. Caucasus, Kleinasien.

persica P., persische, 4. f. Persien.

b) *lilacina* Penny.

tricolor Hook., dreifarbig, 4. f. ?

biflora Poir., *caribaea* Jacq. etc. v. *Tephrosia biflora*, *caribaea* etc, *filiformis* Jacq. etc. v. *Sweetia filiformis* etc.

- Galenia** L. (C. Galenus, berühmter griechischer Arzt), VIII. II., ? Aizoideae.
africana L. (*linearis* Thbg.), afrikanische, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- Galeobdolon** Huds., Waldnessel, XIV. I., Labiatae.
luteum Huds., gelbe, 4. f. Europa.
 b) *variegatum*.
- Galeopsis** T., Hohlzahn, XIV. II., Labiatae.
bifida Bönningh., zweispaltiger, ☉. f. Deutschland.
canescens MB. (*grandiflora* Bl. et Finger.), graulicher, ☉. f. Osteuropa, Caucasus.
intermedia Vill. (*parviflora* Lam., *Lad. β. latifolia parviflora* Koch), mittlerer, ☉. f. Frankreich, West-, Ost- und Norddeutschland.
Ladanum L., *Ladanum*-H., ☉. f. Europa, Mittelasien.
 β) *angustifolia* Ehrh.
ochroleuca Lam. (*grandiflora* Ehrh., *villosa* Huds.) gelbweißser, ☉. f. West- u. Norddeutschland, Frankreich.
pubescens Bess. (*Walterina* v. Schltld., *cannabina* Gmel.), weichhaariger, ☉. f. Deutschland, Galicien.
Tetrahit L., gemeiner, ☉. f. Europa, Nordamerika.
versicolor Curt. (*cannabina* Roth), bunter, ☉. f. Europa.
Galeobdolon L. v. *Galeobdolon luteum*.
- Galinsoga** Cav. (M. M. Galinsoga, Inspector des Madrider botanischen Gartens), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
balbisoides H. B. K., *balbisia*ähnliche, ☉. f. Mexico.
trilobata Cav., dreilappige, ☉. f. Neuspanien.
parviflora W. v. *Wiborgia* Acme. *discolor* Speg. v. *Verbesina atriplicifolia*.
- Galipea** Aubl. (guianischer Name), II. I., Tricoccae-Rutaceae.
odoratissima Lindl., wohlriechende, f. w. Brasilien.
trifoliata Aubl., dreiblättrige, f. w. Guiana.
- Galium** L. (*Gallium* et *Aparine* T.), Labkraut, IV. I., Rubiaceae.
anglicum Huds., englisches, ☉. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa, England.
 β) *litigiosum* DC. (*parisiense* DC.). γ) *minutiflorum* Brot.
Aparine L., klebendes, ☉. f. Europa, Asien, Afrika etc.
 β) *Vaillantii* DC. (*infestum* W. K., *agreste* a Wallr.). γ) *spurium* L. (*hispidum* Roth), *agreste* β. Wallr.).
arenarium Lois., Sand-L., 4. f. Westfrankreich.
aristatum L. (*laevigatum* L.), gegranntes, 4. f. Südeuropa, Ungarn.
 β) *linifolium* Lam.
articulatum R. et S., gegliedertes, 4. f. Aegypten, Kleinasien.
Barrelieri Hort., *Barrelier's*, 4. f. ?
boreale L., nördliches, 4. f. Europa, Mongolei.
 β) *hyssopifolium* Hoffm.
brachyphyllum R. et S. (*brevifolium* Stev.), kurzblättriges, 4. f. Caucasus.
brevifolium Sm., kleinblättriges, 4. k. f. Kleinasien.
campestre Schousb., Feld-L., ☉. f. Nordafrika.
capillare Cav., haarförmiges, ☉. f. Südspanien, Creta.

Galium

capillipes Rchb., haarstieliges, 4. f. Ungarn.
causicum Lagasc., caucasisches, 4. f. Caucasus.
chersonense R. et S., chersonisches, 4. f. Taurien.
cinereum All., aschgraues, 4. f. Oberitalien.
Cruciata Scop. (*cruciatum* Sm.), kreuzblättriges, 4. f. Europa.

Cucullaria R. et S., kappenförmiges, 4. f. Kleinasien.
debile W. (*helodes* Lk.), schwaches, 4. f. Spanien, Portugal.

diffusum Schrad., weitschweifiges, 4. f. Südeuropa.
divaricatum Lam., ausgesperartes, 4. f. Südfrankreich.
ellipticum W. Presl, elliptisches, 4. f. Sicilien, Spanien.
erectum Huds., aufrechtes, 4. f. England.
fragile Poir., zerbrechliches, 4. f. Südeuropa.
fruticosum W. (*junceum* Sm., *dichotomum* Lehm.), strauchiges, 4. k. Creta.

glabrum Thbg., glattes, 4. k. Cap der gut. Hoffnung.
graecum L., griechisches, 4. f. k. Griechenland.

granulatum Schrad., körniges, 4. f. ?

helveticum Weig. (*baldense* Spgl.), schweizerisches, 4. f. Schweiz, Tyrol, Oberitalien, Frankreich.

insubricum Gaud., mailändisches, 4. f. Südliche Schweiz, Oberitalien.

Jussieu Vill., Jussieu's, 4. f. Frankreich.

lithospermifolium Fisch., steinsamenblättriges, 4. f. Rußland.

lucidum All., glänzendes, 4. f. Südeuropa.

maritimum L., Seestrands-L., 4. f. Südfrankreich.

megalospermum All., großsamiges, 4. f. Oberitalien und französische Alpen.

microcarpum Vahl (*setaceum* Lam., *floribundum* Sm.), kleinfrüchtiges, 4. f. Nordafrika, Kleinasien, Corsica, Südfrankreich.

microspermum Dsf., kleinsamiges, 4. f. Nordafrika.

Mollugo L., weisses, 4. f. Europa.

β) *tyrolense* W.

murale All. (*minimum* R. et S., *verticillatum* Danth.), Mauer-L., 4. f. Südeuropa.

ochroleucum Kit., weißgelbes, 4. f. Ungarn.

palustre L., Sumpf-L., 4. f. Europa.

pedemontanum All. (*retrosum* DC.), piemontesisches, 4. f. Südeuropa, Ungarn.

pilosum Ait., haariges, 4. f. Nordamerika.

pumilum Lam. (*trichophyllum* All.), kleines, 4. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa.

a) *hypnoides* Vill. β) *pubescens* DC. (*hirtellum* Gaud.). γ) *majus* Koch (? *austriacum* Jacq.).

purpureum L., purpurfarbiges, 4. f. Südeuropa.

reflexum Presl (*tauricum* R. et S.), zurückgebogenes, 4. f. Taurien, Sicilien.

rigidum Ait., starres, 4. k. ? Azoren.

rotundifolium L., rundblättriges, 4. f. Europa.

rubioides L., rötheähnliches, 4. f. Südeuropa.

rubrum L., rothblumiges, 4. f. Südeuropa.

β) *obliquum* Vill. (*mucronatum* Lam.).

rugosum DC., runzeliges, 4. f. ?

ruthenicum W., russisches, 4. f. Taurien, Vohynien, Georgien.

Galium

saccharatum All. (*verrucosum* Sm.), warziges, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.

saturejaefolium Trevir., satureiblätteriges, 4. f. Astrachan, Caucasus.

saxatile L. (*hercynicum* Weig., *montanum* Huds., *procumbens* Wither.), Gestein-L., 4. f. Europa.

scaberrimum Vahl, Hornem. (*hispidum* W. E.), scharfes, ☉. f. Aegypten.

sylvaticum L. (*laevigatum* Vill., *Schultesii* Vest), Wald-L., 4. f. Europa.

sylvestre Poll. (*pusillum* L., *multicaule* Wallr.), vielstengeliges, 4. f. Europa.

a) *glabrum* Schrad. (*umbellatum* Lam., *laeve* Thuill., *anisophyllum* et *montanum* Vill.). β) *hispidum* Schrad. γ) *pubescens* Schrad. (*Bocconi* All.), *umbellatum* β. Lam. *scabrum* P., *asperum* Schrb., *nitidulum* Thuill.). δ) *supinum* Lam. ε) *alpestre* Gaud. (*argenteum* Vill.).

tataricum Treviran., tatarisches, 4. f. Astrachan.

tenerum Schlchr., zartes, ☉. f. Schweiz.

tenuifolium All. (*corrudaefolium* Vill.), feinblätteriges, 4. f. Frankreich, Italien.

tenuissimum MB., feinstes, ☉. f. Taurien, Aegypten.

tinctorium L., färbendes, 4. f. Nordamerika.

tricornе Wither. (*spurium* Roth), dreihörniges, ☉. f. Europa.

trifidum L., dreispaltiges, 4. f. Steyermark, Norwegen, Lappland.

triflorum Mchx. (*suaveolens* Wahlbg.), dreiblumiges, ☉. f. Pennsylvanien, Nordschweden, Grönland.

uliginosum L. (*Witheringii* Sm., *montanum* Wither.), Morast-S., 4. f. Europa.

valantioides MB., valantiaähnliches, 4. f. Caucasus.

vernum Scop. (*Halleri* R. et S.), Frühlings-L., 4. f. Ost-, Mittel- und Süddeutschland, Schweiz, Italien.

β) *Bauhini* R. et S.

verum L., ächtes (gelbes), 4. f. Europa.

β) *intermedium* (*ochroleucum* Wolf non Kit., *hybridum* Auctor).

Villarsii Req., Villars's, 4. f. Frankreich, südl. Schweiz.

villosum Lam., zottiges, 4. f. Südfrankreich.

campanulatum Vill. (*glaucum* L. Jacq., *montanum* Poll.), *humifusum* MB., *rupestre* Visian. v. *Asperula galioides* etc.

Galphimia Cav. (Anagramm von *Malpighia*), X. III., *Malpighiaceae*.

glauca Cav., blaugrüne, ♀. Sch. w. Mexico.

hirsuta Cav., rauhaarige, ♀. w. Mexico.

Gamolepis Less., *Gamolepis*, XIX. II., *Compositae-Corymbiferae*.

Tagetes DC. (*annua* Less.), sammetblumenähnliche, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

Garcinia L. (L. Garcin, welcher Indien bereiste), XI. I., *Guttiferae-Garcinieae*.

Cambogia Desr., Gutti-G., ♀. w. Ostindien.

cornea L., hornartige, ♀. w. Molucken.

Cowa Roxb. (*dioeca* Sm.), Cowa-G., ♀. w. Ostindien.

Mangostana L., Mangosta-G., ♀. w. Molucken.

Gardenia Ellis (A. Garden, englischer Naturforscher),
V. 1., Rubiaceae.

- amoena Ker, liebliche, ♀. w. China, Ostindien.
angustifolia Lodd., schmalblättrige, ♀. w. ?
armata Sw., bewaffnete, ♀. w. Westindien.
campanulata Roxb., glockige, ♀. w. Ostindien.
dumetorum Retz, Hecken-G., ♀. Ostindien.
florida L., blüthenreiche, ♀. t. w. Ostindien, Molucken.

b) flore pleno.

- fragrans Roxb., wohlriechende, ♀. w. Ostindien.
grandiflora Lour., großblumige, ♀. w. Cochinchina.
latifolia Ait., breitblättrige, ♀. w. Ostindien.
longispina Spgl., langdornige, ♀. w. Ostindien.
lucida Roxb., glänzende, ♀. w. Ostindien.
mexicana Loud., mexicanische, ♀. w. Mexico.
micrantha Thbg., kleinblumige, ♀. w. Ostindien.
montana Roxb., Berg-G., ♀. w. Ostindien.
Mussaenda L., mussaendaähnliche, ♀. w. Südamerika.
nutans Spgl., überhängende, ♀. w. Ostindien.
pannea Lindl., tuchige, ♀. w. Südamerika.
Pavetta Fisch., Pavetta-G., ♀. w. Ostindien.
propinqua Lindl., verwandte, ♀. w. Ostindien.
pubescens Roth, weichhaarige, ♀. w. Ostindien.
radicans Thbg., starkwurzeln, ♀. t. w. Japan, China.
Rothmannia L., Rothmann's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
spinosa Thbg., dornige, ♀. t. w. Ostindien, China.
theobromaefolia Fisch., kakaoblättrige, ♀. w. Südamer.
Thunbergia L., Thunberg's, ♀. t. w. Cap d. gut. Hoffn.
uliginosa Retz, Sumpf-G., ♀. w. Ostindien.
 esculenta Spgl. v. *Genipa esculenta*. *multiflora* W.
 et *Randia* Sw. v. *Randia longiflora* et *aculeata*.
 tubiflora Andr. v. *Oxyanthus speciosus*.

Gardoquia R. et P. (D. Diego Gardoqui, spanischer Edelmann), XIV. 1., Labiatae.

- betonicoides Lindl., betonienähnliche, 4. t. k. Mexico.
discolor H. B. K., verschiedenfarbige, 4. ♀. t. w. Neugranada, Peru.
Gilliesii Grah., Gillies's, ♀. t. Chili.
Hookeri ? Benth., Hooker's, ♀. t. Chili.
multiflora R. et P., vielblumige, ♀. t. Chili.

Garidella T. (P. Garidel, französischer Botaniker), X. 11., Ranunculaceae.

- Nigellastrum L., schwarzkümmelähnliche, ☉. f. Südfrankreich.

Garrya Lindl. (Nicholas Garry, Secretair der Hudsonsbay-Compagnie), XXII. 11., Garryaceae.

- elliptica Lindl., elliptische, ♀. k. Neucalifornien.

Garuga Roxb. (indischer Name), X. 1., Amyrideae.

- pinnata Roxb., gefiederte, ♀. w. Ostindien.

Gasteria Duv., Haw. v. Aloe.

Gastonia Commerz. Juss. (Gaston de Bourbon, Sohn Heinrich's IV., Gönner der Botanik), XI. v., Araliaceae.

- palmata Roxb., handförmige, ♀. w. Ostindien.

Gastridium P. B., Bauchspelze (Nüschengras), III. 11., Gramineae.

- australe P. B., südliche, ☉. f. Südeuropa.
muticum Spgl. (*scabrum* Presl, *siculum* Trin.), unbewehrte, ☉. f. Sicilien.

- Gastrocarpha runcinata* D. Don v. *Moscaria pinnatifida*.
- Gastrochilus** Wall., D. Don, Bauchlippler, I. 1.
(?XX. 1.), Scitamineae, ?Orchideae.
pulcherrimus Wall., schönster, 4. w. Ostindien.
- Gastrodia** RB., Zahnstendel, XX. 1., Orchideae.
sesamoides RB., schuppiger, 4. w. Neuholland.
- Gastrolobium** RB., *Gastrolobium*, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.
bilobum RB., zweilappiges, ♀. t. Neuholland.
retusum Lindl., abgestutztes, ♀. t. Neuholland.
- Gastronema** Herb., Sims, Bauchfaden, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.
clavatum Herb., Sims, keulenförmiger, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.
- Gatyna** Cass., *Gatyna*, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.
globulifera Cass., kugelblumige, ☉. f. Südeuropa.
- Gaudichaudia** H. B. K. (Ch. Gaudichaud, französischer Naturforscher), V. 1., Malpighiaceae.
cynanchoides H. B. K., cynanchumähnliche, ♀. Sch. w. Mexico.
- Gaudinia** P. Beauv. (Gaudin, schweizerischer Botaniker), III. 11., Gramineae.
fragilis P. Beauv., spröde, ☉. f. Südeuropa.
- Gaultheria** L. (Gaulthier, französischer Arzt und Naturforscher), X. 1., Ericaceae.
anastomosans H. B. K., aderige, ♀. t. Südamerika.
antipoda Forst., südliche, ♀. t. k. Neuzeeland.
erecta Vent., aufrechte, ♀. t. Peru.
fragrantissima Wall. (*fragrans* D. Don), wohlriechende, ♀. t. Nepal.
procumbens L., niederliegende, ♀. f. Nordamerika.
rigida H. B. K., starre, ♀. t. Südamerika.
rupestris DC., Felsen-G., ♀. t. k. Neuzeeland.
Shallon Pursh, Shallon-G., ♀. f. k. Nordamerika.
serpyllifolia Pursh v. *Phalerocarpus hispidulus*.
- Gaura** L., Prachtkerze, VIII. 1., Onagrariae.
angustifolia Mchx., schmalblättrige, ♂. f. Nordamerika.
biennis L., zweijährige, ♂. f. Nordamerika.
coccinea Fras., scharlachfarbige, 4. f. Louisiana.
fruticosa Jacq., strauchige, ♀. w. Südamerika.
mutabilis Cav., veränderliche, ♂. k. Neuspanien.
oenotheraeflora Zucc., oenotherablumige, ♂. k. Südamer.
parviflora Doug., kleinblumige, ♂. f. Nordamerika.
tripetala Cavan., dreikronige, ☉. f. Mexico.
- Gazania** G., Gazanie, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.
heterophylla Hort., verschiedenblättrige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
pavonia RB., Pfauen-G., 4. ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
rigens RB., starre, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
subulata RB., pfriemenförmige, 4. ♀. k. Cap d. g. H.
uniflora Ker., einblumige, 4. ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
- Geblera** Fisch. et Mey. (Gebler, welcher als Botaniker Rußland bereiste), ?XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.
suffruticosa Fisch. et Mey., halbstrauchige, 4. ♀. k. f. Dahurien.
- Geissomeria** Lindl., Ziegelkelch, XIV. 11., Acanthaceae.

Geissomeria

longiflora Lindl., langblumiger, ♀. w. Brasilien.

Geissorrhiza Ker, Dachzwiebel, III. 1., Irideae.

ciliaris Salisb., gefranzte, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

excisa Ker, ausgeschnittene, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

hirta Ker, rauhe, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.

humilis Ker, niedrige, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

imbricata Ker, ächte, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.

juncea (Lk.), simsenförmige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

obtusata Ker, stumpfblättrige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

Rochensis Ker (*Larochei* R. et S.), La Roche's, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffn.

secunda Ker, einseitige, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

setacea Ker, borstige, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.

sublutea Ker, gelbliche, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

vaginata Swt., scheidige, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

Geitonoplesium Cunn., Südaaffodile, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

asperum Cunn., rauhe, 4. t. Neuholland.

cymosum (RB.), afterdoldige, 4. Sch. t. Neusüdwallis.

montanum (RB.), Berg-S., 4. t. Neuholland.

Gela lanceolata Lour., *oblongifolia* Cunn. v. *Cyminosma pedunculata*, *oblongifolia*.**Gelonium** Roxb. (?indischer Name), XXII. XI., *Tricoccae-Euphorbiaceae*.

bifarium Roxb., zweireihiges, ♀. w. Ostindien.

fasciculatum Roxb., büschelförmiges, ♀. w. Ostindien.

lanceolatum Roxb., lanzettblättriges, ♀. w. Ostindien.

Gelsemium Juss., Jasmin-Bignonié, XIV. II. (V. 1.), *Personatae-Bignoniaceae*.

sempervirens P. (*nitidum* Mchx.), immergrüne, ♀. Sch. f. b. k. Virginien, Carolina.

Genipa T. (guianischer Name), V. 1., *Rubiaceae*.

americana L., amerikanische, ♀. w. Südamerika.

edulis Rich., genießbare, ♀. w. Guiana.

Merianae Rich., Merian's, ♀. w. Guiana.

oblongifolia R. et P., länglichblättrige, ♀. w. Südamer. *esculenta* Lour. v. *Randia triflora*.

Genista L., Ginster, XVII. IV. (XVI. VI.), *Leguminosae-Papilionaceae*.

aetnensis Spgl., DC., Aetna-G., ♀. f. b. k. Sicilien.

anglica L., englischer, ♀. f. England, Dänemark, Deutschland.

angulata Rafin., kantiger, ♀. f. Nordamerika.

aphylla DC., blattloser, ♀. f. Sibirien.

arcuata Koch, bogenförmiger, ♀. f. Oesterreichisches Litorale.

biflora Spgl., DC., zweiblumiger, ♀. k. Nordafrika.

bracteolata Lk., deckblättriger, ♀. k. ?

canariensis L., canarischer, ♀. k. Canarische Inseln.

candicans L., weißlicher, ♀. k. f. Südfrankreich, Italien.

cinerea DC. (*scoparia* Vill.), aschgrauer, ♀. f. b. Dauphiné, Italien.

clavata Poir., keulförmiger, ♀. k. Mauritanien.

congesta DC., gedrängter, ♀. k. Teneriffa.

corsica DC., corsischer, ♀. k. Corsica.

Cupani Guss., cupanischer, ♀. f. b. k. Sicilien.

dalmatica Bartl., dalmatischer, ♀. f. b. k. Dalmatien.

depressa MB., niedergedrückter, ♀. f. Südtaurien.

Genista

diffusa W. (*humifusa* Wulff.), weitschweifiger, ♀. f. Südösterreich, Illyrien.

ephedroides DC., ephedraähnlicher, ♀. f. b. k. Sardinien.
exaltata Lk. (*polygalaeophylla* Brot., *polygalaeifolia* DC.),
hoher, ♀. f. b. Portugal.

ferox Poir., wilder, ♀. k. Nordafrika.

florida L., blüthenreicher, ♀. f. Spanien.

germanica L., deutscher, ♀. f. Deutschland, Frankreich.

b) inermis DC.

Halleri Reyn. (*prostrata* Lam., *pedunculata* L'Her., *decumbens* W.), Haller's, ♀. f. Frankreich, westliche Schweiz.

hirsuta Vahl, rauhhaariger, ♀. f. b. k. Spanien, Portugal.
hispanica L., spanischer, ♀. f. Spanien.

horrida DC. (*erinacea* Gilib.), abschreckender, ♀. f. Pyrenäen.

humifusa L., niedergestreckter, ♀. f. k. Thracien.

?italica Lodd., italienischer, ♀. f. Italien.

linifolia L., leinblättriger, ♀. f. b. Südeuropa, Nordafrika, Kleinasien.

Lobelii DC., Lobel's, ♀. f. b. Südfrankreich, Corsica.

lusitanica L., portugiesischer, ♀. f. b. Westeuropa.

mantica Poll., veronesischer, ♀. f. Oberitalien.

microphylla DC., kleinblättriger, ♀. f. b. Spanien.

monosperma Lam., einsamiger, ♀. k. Spanien, Sicilien, Aegypten.

ovata W. K., eiförmiger, ♀. f. Ungarn, Illyrien, Italien, Schweiz.

β) nervata Kit.

parviflora Broter., kleinblumiger, ♀. f. b. k. Portugal, Mauritanien.

patens DC., abstehender, ♀. f. b. Spanien.

patula MB., ausgebreiteter, ♀. f. Caucasus.

pilocarpa Lk., haarhülsiger, ♀. k. ?

pilosa L., behaarter, ♀. f. Europa.

procumbens W. K., niederliegender, ♀. f. Mähren, Oesterreich, Ungarn.

purgans L., reinigender, ♀. f. Frankreich.

radiata Scop., strahliger, ♀. f. Krain, Ungarn, Italien.

sagittalis L., pfeilförmiger, ♀. f. Deutschland, Illyrien, Schweiz, Frankreich.

b) minor DC.

scariosa Viv. (*januensis* Bertol, *genuensis* P., *triquetra* WK., *triangularis* W.), trockenhäutiger, ♀. f. Ungarn, Untersteiermark, Krain, Italien.

β) anxantica Tenor.

Scorpius DC., Scorpion-G., ♀. f. b. k. Südfrankreich, Spanien.

sericea Wulf., seidenhaariger, ♀. f. b. Oesterreichisches Litorale.

sibirica L. (*virgata* W.), sibirischer, ♀. f. Sibirien, österreichisches Litorale, Ungarn.

sphaerocarpa Lam., kugelfrüchtiges, ♀. f. b. k. Griechenland, Italien, Spanien.

sylvestris Scop. (*hispanica* Wulf.), Wald-G., ♀. f. b. k. Krain, österreichisches Litorale.

tetragona Bess., vierkantiges, ♀. f. Podolien.

Genista

tinctoria L., färbender, ⚔. f. Europa, Mittelasien.

b) *flore pleno*. c) *latifolia* DC. d) *hirsuta* DC.
(? *pubescens* Lang). e) *pratensis* Poll.

triacantha Broter. (*ericetorum* Hoffm. nsg.), dreistacheliger,
⚔. f. b. k, Portugal.

β) *interrupta* DC.

triquetra Lam., dreiseitiger, ⚔. k. Corsica, Calabrien.
umbellata DC., doldiger, ⚔. k. Nordafrika.

β) *capitata* DC.

virgata DC. (*gracilis* Poir.), ruthenförmiger, ⚔. k.
Madeira.

buxifolia Burm. v. *Cyclopia latifolia*, *divaricata* Lk.

v. *Adenocarpus parvifolius*. *juncea* Scop. v. *Spartium junceum*. *scoparia* Lam. vid. *Sarothamnus scoparius*.

Gentiana T., Enzian, V. II., Contortae-Gentianeae.

acaulis L. (*angustifolia* Vill.), stengelloser, 4. f. Europa, Sibirien.

adscendens Pall. (*decumbens* L.), aufsteigender, 4. f. Sibirien, Karpathen.

algida Pall., häutiger, 4. f. Sibirien, Kamtschatka.

altaica Pall. (*longiflora* Lam., *grandiflora* Lam.), altaischer, 4. f. Sibirien.

Amarella L., bitterer, ☉. f. Europa.

β) *uliginosa* W.

angulosa MB. (*aestiva* R. et S., *verna* β. *angulosa* Wahlbg.), kantiger, 4. f. Osteuropa, Caucasus, Altai.

angustifolia Mchx., schmalblättriger, 4. f. Nordamer.

asclepiadea L., schwalbenwurzartiger, 4. f. Mitteleuropa, Voralpen, Caucasus.

b) *major*. c) *ochroleuca*.

aurea L. (*quinquefolia* Flor. dan.), goldfarbiger, 4. f. Lappland, Norwegen, Island.

barbata Fröl. (*detonsa* Rottb., *ciliata* B. M., *serrata* Gunn.), bärtiger, 4. f. Sibirien, Island, Norwegen.

bavarica L. (*prostrata* Wahlbg.), baierischer, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *rotundifolia* Hoppe (*imbricata* Schlchr. non Fröl.).

biloba DC., zweilappiger, 4. f. Französische Alpen.

brachyphylla Vill. (? *tergloviensis* Hacq.), kurzblättriger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

Burseri Lapeyr., *Burser's*, 4. f. Pyrenäen.

β) *punctata*.

campestris L., Feld-E., ☉. f. Europa.

carpathica Kit., karpthischer, 4. f. Karpathen.

Catesbaei Walt., Nutt, *Catesbaei's*, 4. f. Nordamerika.

caucasica MB., caucasischer, ♂. f. Caucasus.

chloraefolia N. E., chlorablättriger, ☉. f. Mitteldeutschland.

ciliata L., gewimperter, ☉. ♂. f. Europa.

clavata Bot. mag., keulförmiger, 4. f. ?

crinita Fröl. (*fimbriata* Bot. Rep.), bemähter, ♂. f. k. Nordamerika.

Cruciata L., kreuzblättriger, 4. f. Europa, Sibirien.

b) *major* Hortul.

excisa Presl. (*acaulis* Vill.), ausgeschnittener, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *alpina* Vill.

Gentiana

fimbriata W. (*ciliata* MB.), gefranzter, ♂. f. Caucasus.
frigida Hänk., kalter, 4. f. Steyermark, krainer, karpathische und dinarische Alpen.

Frölichii Jan., Hladnik. (*carnica* Welw., *Hladnikiana* Host.), Fröhlich's, 4. f. Krain.

Gebleri Ledeb., Gebler's, 4. f. Imaus.

gelida MB., eisiger, 4. f. Caucasus.

germanica W. (*uniflora* W.), deutscher. ☉. f. Deutschl.

glacialis Vill. (*tenella* Fröl.), Gletscher-E., ☉. f. Europäische Alpen.

humilis MB., niedriger, ☉. f. Caucasus.

hybrida Schlchr. (*Thomasii* Hall. fil., *rubra* Clairv.),

Bastard-E., 4. f. Schweizer und französische Alpen.

imbricata Fröl., dachziegelförmiger, 4. f. Tyrol, Krain.

incarnata Sims, fleischfarbiger, 4. f. Nordamerika.

intermedia Sims, mittlerer, 4. f. Nordamerika.

linearis Fröl. (*puberula* Mchx.), gleichbreiter, 4. f. Nordamerika.

lutea L., gelber (*ächter*), 4. f. Mitteleuropäische Voralpen.

macrophylla Pall., großblättriger, 4. f. Sibirien.

nana Wulf., Zwerg-E., ☉. f. Norische u. karnische Alpen.

nivalis L., Schnee-E., ☉. f. Europäische Alpen, Nordamer.

obtusifolia W. (*spathulata* Bartl., *montana* N. E., *pyramidalis* N. E.), stumpfblättriger, ☉. f. Deutschland.

ochroleuca Fröl., weißgelber, 4. f. Nordamerika.

pannonica Scop., ungarischer, 4. f. Mittel- und osteuropäische Alpen.

plebeja Ledeb., gemeiner, 4. f. Sibirien.

Pneumonanthe L., schmalblumiger, 4. f. Nordeuropa, Asien und Amerika.

b) *alba*. c) *guttata*.

pratensis Fröl., Wiesen-E., ☉. f. Sibirien.

pumila Jacq., kleiner, 4. f. Oesterreich, Steyermark, krainer Alpen.

punctata L., punktirter, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *concolor* Koch (*campanulata* Jcq.).

purpurea L., purpurfarbiger, 4. f. Nordeuropäische, Schweizer-Alpen etc.

pyrenaica L., pyrenäischer, 4. f. Pyrenäen.

quinqueflora Lam. (*amarelloides* P. Mchx.), fünfblumiger, 4. f. Nordamerika.

Saponaria L., seifenkrautblättriger, 4. f. Nordamerika.

b) *flore albo*.

septemfida Pall., siebentheiliger, 4. f. Caucasus, Ost-russland.

b) *guttata*.

triflora Pall., dreiblumiger, 4. f. Ostsibirien.

umbellata MB., doldiger, 4. f. Caucasus.

utriculosa L., schlauchiger, ☉. 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

verna L., Frühlings-E., 4. f. Europa, Asien.

b) *flore albo* A. P.

carinthiaca Froel. v. *Lomatogonium carinthiac.* *fili-formis* L. v. *Microcale filiform.* *viscosa* Ait. v. *Hippion viscosum.* Hinsichtlich der übrigen siehe *Erythraea*.

Geodorum Jacks., Erdstendel, XX, 1, Orchideae.

citrinum Andr., citrongelber, 4. w. Ostindien.

Geodorum

dilatatum RB., verbreiteter, 4. w. Ostindien.

fucatum Lindl., geschminkter, 4. w. Ceylon.

purpureum RB., purpurfarbiger, 4. w. Ostindien, Neuholland.

pictum Lk. v. *Angraecum maculatum* Nachtr.

Geoffroya Jcq. (E. F. Geoffroy, französischer Naturforscher), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Caesalpinieae.

spinosa L., dornige, 5. w. Südamerika.

violacea P., violette, 5. w. Guiana.

inermis Sw., *racemosa* Poir. v. *Andira inermis* et *racemosa*.

Geonoma W., Erdpalme, XXII. VI. (VI. I.), Palmae.

acaulis Mart., stammlose, 5. 4. w. Brasilien., Guiana.

macrostachya Mart., großkolbige, 5. 4. Südamerika.

pinnatifrons W., fiederwedelige, 5. w. Peru, Caracas.

Schottiana Lod. C., Schott's, 5. w. Brasilien.

simplicifrons W., einfachwedelige, 5. w. Trinidad.

Spixiana Mart., Spix's, 5. w. Südamerika.

Geophila D. Don, Erdröthe, V. I., Rubiaceae.

reniformis D. Don, nierenförmige, 4. w. Ostindien.

Georgina W. (*Georgia* Spgl.), (J. G. Georgi, Akademiker zu Petersburg, der als Botaniker das Uralgebirge bereiste), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

Cervantesii (Lagasc.), Cervante's, 4. Kn. f. b. k. Mexico,

coccinea W. (*crocata* Lagasc., *frustranea* DC.), scharlachfarbig, 4. Kn. f. b. k. Mexico.

scapigera Hort., schafttragende, 4. Kn. f. b. k. Mexico.

variabilis W. (*rosea* et *purpurea* W., *superflua* DC.), veränderliche, 4. Kn. f. b. k. Mexico.

Gartenvarietäten und Hybriden: a) *anemoneflora*.

b) *globiflora*. c) *nana*. d) *striata* etc.

Geranium T., Storchschnabel, XVI. VI., Geraniaceae.

aconitifolium L'Her. (*rivulare* Vill.), sturmhutblättriger, 4. f. Schweiz, Dauphiné.

albiflorum Ledeb., weißblumiger, 4. f. Sibirien.

altaicum Hort., altaischer, 4. f. Altai.

anemonefolium L'Her. (*palmatum* Cav.), anemonenblättriger, 4. 5. k. Madeira.

β) *glandulosum*.

angulatum Curt. (*venosum* P.), kantiger, 4. ?

argenteum L., silberfarbiger, 4. f. b. k. Krain, Italien, Frankreich.

asphodeloides Burm. (*subcaulescens* L'Her.), affodilähnlicher, 4. f. b. k. Griechenland, Kleinasien.

batrachioides Cav., rauhhaariger, 4. f. Südeuropa.

bifolium Patr., zweiblättriger, 4. f. Dahurien.

bohemicum L., böhmischer, 4. f. Böhmen, Schlesien, Lausitz, Schweiz.

canescens L'Her., graulicher, X. k. Cap d. gut. Hoffn.

carolinianum Jacq., karolinischer, 4. f. Nordamerika.

β) *lanuginosum* Jacq.

coeruleum Patr., blauer, 4. f. Dahurien.

collinum Steph., Hügel-St., 4. f. Ukraine, Taurien, Sibirien.

columbinum L., feintheiliger, 4. f. Europa.

cristatum Stev. (*albanum* MB.), kammiger, 4. f. Caucasus.

dahuricum DC., dahurischer, 4. f. Dahurien.

Geranium

- dissectum L., schlitzbblätteriger, ☉. f. Europa, Nordamer.
 divaricatum Ehrh. (*Winterli* Roth), ausgesperrter, ☉. f.
 Deutschland, Schweiz, Ungarn, Caucasus, Sibirien.
 eriostemon Fisch., haarfadiger, 4. f. Dahurien.
 β) pallidum Swt.
 gymnocaulon Stev., nacktstengeliger, 4. f. Caucasus.
 ibericum Cav., iberischer, 4. f. Caucasus.
 incanum L., weißgrauer, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.
 ?inodorum Pursh, geruchloser, ☉. f. Nordamerika.
 Lamberti Swt., Lambert's, 4. f. Nepal.
 lanuginosum Lam., wolliger, ☉. f. Numidien.
 lividum L'Her., Ait., braunblauer, 4. f. Schweiz,
 Frankreich.
 Londesii Fisch. (*longipes* DC.), Londes's, 4. f. Süd-
 rufsland.
 lucidum L., glänzender, ☉. f. Europa.
 macrorrhizum L., großwurzeliger, 4. f. Südeuropa.
 maculatum L., gefleckter, 4. f. Nordamerika.
 mexicanum H. B. K. (*hirtum* W., *Hernandesii* Sess.),
 mexicanischer, 4. k. t. Mexico.
 molle L., weicher, ☉. f. Europa.
 multifidum D. Don, vieltheiliger, 4. t. k. Nepal.
 nepalense Swt., nepal'scher, 4. f. k. Nepal.
 nodosum L., knotiger, 4. f. England, Frankreich, Italien.
 pallens MB., bleicher, ☉. f. Caucasus.
 palustre L., Sumpf-St., 4. f. Europa, Nordasien.
 parviflorum W., kleinblumiger, 4. k. t. Nördliches
 Neuholland.
 phaeum L. (*fuscum* L.), brauner, 4. f. Europa.
 pilosum Forst, haariger, 4. k. t. Neuzeeland.
 platypetalum Fisch. et Mey., breitkroniger, 4. f.
 Georgien.
 potentilloides L'Her., fingerkrautähnlicher, 4. k. t,
 Neuholland.
 pratense L., Wiesen-St., 4. f. Europa.
 b) flore albo. c) flore albo pleno. d) flore va-
 riegat. e) dauricum. f) flore pleno.
 prostratum Cav. (*lancastriense* Wither.), hingestreckter,
 4. f. England, Schweden.
 purpureum Vill., purpurfarbiger, ☉. f. Südeuropa.
 pusillum L., niedriger, ☉. f. Europa.
 pyrenaicum L. (*umbrosum* WK., *nemorosum* Tenor.),
 pyrenäischer, ♂. 4. f. England, Mittel-, Ost- und
 Südeuropa.
 reflexum L., zurückgebogener, 4. f. Italien.
 Richardsonii Fisch. et Mey. (*albiflorum* Hook.), Richard-
 son's, 4. f. Nordamerika.
 Robertianum L., Robert's, ☉. f. Europa, Nordamerika.
 b) flore albo (*Briceanum* Swt.).
 rotundifolium L. (*viscidulum* Fr., *malvaceum* Wahlenbg.),
 rundblättriger, ☉. f. Europa.
 sanguineum L., blutfarbiger, 4. f. Europa.
 β) villosissimum DC.
 sibiricum L., sibirischer, 4. f. Sibirien.
 striatum L., gestreifter, 4. f. b. k. Italien.
 sylvaticum L., Wald-St., 4. f. Europa.
 tuberosum L., knolliger, 4. f. Süd- und Osteuropa.
 varium L'Her. (*cinereum* Cavan.), bunter, 4. f. Pyre-
 näen, Italien.

Geranium

β) villosum Tenor.

Ulassovianum Fisch., Ulassow's, 4. f. Dahurien.

Wallichianum Swt., Wallich's, 4. k. f. b. Nepal.

Ungewiss: affine Loud. Cameron.

Hinsichtlich der übrigen s. *Erodium*, *Pelargonium* und *Sarcocaulon*.

Gerardia L. (John Gerard, alter englischer Botaniker, Louis Gerard, französischer Botaniker), XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

aphylla Nutt., blattlose, ♂. f. Carolina.

delphinifolia L., ritterspornblättrige, 4. w. Ostindien.

flava L., hellgelbe, 4. f. Nordamerika.

maritima Rafin. (*crinita* Eddy), Seestrands-G., ♂. f. Nordamerika.

purpurea L., purpurfarbige, ♂. f. Nordamerika.

quercifolia Pursh, eichenblättrige, 4. f. Nordamerika.

tenuifolia Vahl, feinblättrige, ♂. f. Nordamerika.

Afzelii Mchx. v. *Seymeria tenuifolia*. *glutinosa* L. v. *Rehmannia chinensis*.

Gerbera Gron. (*Gerberia* H. Cass.), T. Gerber, deutscher Gelehrter, welcher Rußland bereiste), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

Burmanni DC., Burmann's, 4. t. Cap der gut. Hoffn. *crenata* Ker v. *Mairia crenata*.

Gerontogea Chamiss., Gerontogea, IV. I., Rubiaceae. *Deppeana* Lk. et Otto, Deppe's, ♂. t. w. Mexico.

Geropogon L., Graubart, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

calyculatus Jacq., gekelchter, 4. f. ?

glaber L. (*australis* Spgl.), glatter, ♂. f. Italien, Griechenland, Kleinasien, Aegypten.

hirsutus L. (*australis* Spgl.), rauhhaariger, ♂. f. Italien, Griechenland etc.

Gesneria Plum. (Conrad Gesner, berühmter schweizer. Naturforscher), XIV. II., Personatae-Bignoniaceae (*Gesneriaceae*).

acaulis L., stengellose, 4. Kn. w. Jamaica.

aggregata Ker, gehäufte, 4. Kn. w. Brasilien.

allagophylla Mart., veränderlichblättrige, ♂. w. Brasilien.

barbata Mart., bärtige, 4. Kn. w. Brasilien.

bibracteata Loud., Camer. (? *tribracteata* Hort.), zweiblättrige, 4. Kn. w. ?

bulbosa Ker, knollige, 4. Kn. w. Brasilien.

calycina Sw., großkelchige, ♂. w. Jamaica.

Cooperi Paxt., H. Woburn. (*bulbosa* Hook.), Cooper's, 4. Kn. w. Brasilien.

corymbosa Sw., afterdoldige, ♂. w. Jamaica.

Douglassii Lindl., Douglas's, 4. Kn. w. Brasilien.

elongata Humb., verlängerte, ♂. w. Südamerika.

faucialis Lindl. (*fascialis* Hook.), großschlundige, 4. Kn. w. Brasilien.

hirsuta Humb., Bonpl., rauhhaarige, ♂. w. Cumana.

humilis L., niedrige, ♂. w. Cuba.

lateritia Lindl., ziegelfarbige, 4. Kn. w. Brasilien.

latifolia Mart., breitblättrige, 4. Kn. w. Brasilien.

Lindleyi Hook. (*rutila atrosanguinea* Lindl.), Lindley's, 4. w. Brasilien.

macrostachya Lindl., großährige, 4. Kn. w. Brasilien.

Gesneria

- magnifica* Loud., prächtige, 4. Kn. w. Brasilien.
Marchii Hook., March's, 4. Kn. w. Brasilien.
oblongata Hort., längliche, ½. w. ?
prasinata Ker, grünblumige, ½. w. Brasilien.
rupestris Paxt., Felsen-G., 4. Kn. w. Jamaica.
rutila Lindl., röthliche, 4. w. Brasilien.
Sceptrum Mart., gelbliche, ½. w. Brasilien.

β) *ignea* Mart.

- Sellowii* Mart., Sellow's, 4. Kn. w. Brasilien.
spicata Humb., ährige, 4. Kn. w. Südamerika.
Suttoni Booth, Sutton's, 4. Kn. w. Brasilien.
tubiflora Cav., röhrenblumige, 4. Kn. w. Südamerika.
ulmifolia Humb., Bonpl. (*pendulina* Lindl.), ulmenblät-
 terige, 4. w. Südamerika.
verticillata Hook., wirtelblättrige, 4. Kn. w. Brasilien.
odorata Hort. v. *Coleus amboinicus*. *tomentosa* L.
 v. *Rytidophyllum tomentosum*. *ventricosa* Sw. v.
Pentaraphia longiflora.

Gethyllis L., Gethyllis, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae
(? *Hypoxideae*).

- afra* Lindl., afrikanische, 4. Kn. k. t. Cap d. gut. H.
ciliaris L., gefranzte, 4. Kn. k. t. Cap der gut. Hoffn.
lanceolata L., lanzettliche, 4. Kn. k. t. Cap d. g. H.
spiralis L., spiralförmige, 4. Kn. k. t. Cap d. gut. H.
villosa L., zottige, 4. Kn. k. t. Cap der gut. Hoffn.

Getonia Roxb., Getonie, X. 1., Onagrariae-Com-
bretaceae.

- floribunda* Roxb., blüthenreiche, ½. Sch. w. Ostindien,
 Madagascar.
nutans Roxb., nickende, ½. Sch. w. Ostindien.

Geum L., Nelkenwurz, XII. III., Rosaceae.

- agrimonoides* Pursh, odernennigähnliche, 4. f. Nordamer.
album Gmel. (*canadense* Jcq.), weisse, 4. f. Nordamer.
atlanticum Dsf. (*sylvaticum* Pour., *biflorum* Brot.), at-
 lantische, 4. f. Südfrankreich, Nordafrika.
brachypetalum Sering., kurzchronige, 4. f. ?
chilense Balb. (*Quellyon* Swt., *coccineum* Hort.), chile-
 sische, 4. f. b. k. Chili.

- b) *grandiflorum* Hort. γ) *atrosanguineum* Hort.
ciliatum Pursh, gefranzte, 4. f. Nordamerika.
coccineum Sibth., Sm. (*Sadleri* Friwald.), scharlachfar-
 bige, 4. f. Kleinasien, Rumelien.
hirsutum Mühlbg., rauhhaarige, 4. f. Nordamerika.
hispidum Fr., steifhaarige, 4. f. Südschweden.
intermedium Ehrh. (? *hirtum* Wahlbg., *hederaefolium*
 Gmel.), mittlere, 4. f. Nord- und Westdeutschland,
 Schweden.

β) *rubifolium* Lej.

- macrophyllum* W. (*radiatum* Mchx.), grofsblättrige, 4. f.
 Kamtschatka, Nordamerika.
nutans Rafin., nickende, 4. f. Nordamerika.
Portenschlagianum Tratt., Portenschlag's, 4. f. ?
pyrenaicum Ramond (*inclinum* Schlchr., *Tournefortii*
 Lapeyr.), pyrenäische, 4. f. Sudeten, Schweiz,
 Pyrenäen.
rivale L. (*nutans* Crtz.), Wasser-N., 4. f. Europa,
 Asien, Nordamerika.

β) *hybridum* Wulff.

Geum

strictum Ait. (*aleppicum* Jcq., *canadense* Murray, *heterophyllum* Hort., *intermedium* Fisch., *ranunculoides* Serling.), steife, 4. f. Nordamerika.

urbanum L., gemeine, 4. f. Europa, Asien.

virginianum L. (*geniculatum* Mchx.), virginische, 4. f. Nordamerika.

potentilloides Ait. v. *Coluria potentill.* Hinsichtlich der übrigen s. *Sieversia*. *Ghinia mutica* Sw. et *spinosa* W. (*verbenacea* Sw.) v. *Tamonea mutica* etc.

Gilia R. et P. (P. S. Gilio, spanischer Botaniker), V. 1., Polemoniaceae.

I. *Dactylophyllum* Benth.

liniflora Benth., leinblumige, ☉. f. Californien.

pharnaceoides Benth., pharnaceumähnliche, ☉. f. Californien.

pusilla Benth., zwergige, ☉. f. Chili.

II. *Ipomopsis* Mchx.

arenaria Benth., Sand-G., ☉. f. Californien.

Beyrichiana Schldt., Beyrich's, ♂. f. b. k. Nordamer.

coronopifolia P. (*Ipomopsis elegans* Sm.), krähenfußblättrige, ♂. k. Carolina.

crassifolia Benth., dickblättrige, ☉. f.

pulchella Dougl. (*Ipomopsis elegans* Mchx., Lindl. *Gilia aggregata* D. Don), schöne, ♂. k. Nordwestliches Amerika.

tenuiflora Lindl., Benth., dünnblumige, ☉. f. Californien.

III. *Eugilia* Benth.

achilleaefolia Benth. (? *millefoliata* Fisch. et Mey.), garbenblättrige, ☉. f. Californien.

capitata Dougl., Hook., kopfförmige, ☉. f. Nordwestliches Amerika.

b) *albiflora*.

inconspicua Dougl. (*parviflora* Speg.), kleinblumige, ☉. f. Nordamerika.

laciniata R. et Pav., schlitzblättrige, ☉. f. Chili.

multicaulis Benth., vielstengelige, ☉. f. Californien.

tricolor Benth., dreifarbig, ☉. f. Californien.

b) *albida*.

gracilis Dougl. v. *Collomia gracilis*. *mucronata* Lehm. et *pungens* Dougl., Hook. v. *Aegochloa eryngioides* etc. Nachtrag.

Gillenia Mch., Gillenie, XII. II., Rosaceae-Spiraeaceae.

stipulacea Nutt., zwischenblättrige, 4. f. Louisiana.

trifoliata Mch., dreiblättrige, 4. f. Nordamerika.

b) *major*.

Gilliesia Lindl. (Dr. Gillies, zu Conception in Chili), III. I. (XVI. III.), Coronariae-Gilliesiae.

graminea Lindl., grasblättrige, 4. Zw. k. t. Chili.

Ginkgo Thbg., Ginkgobaum, XXI. IX., Taxineae (? *Amentaceae*).

biloba Thbg., L., zweilappiger, 5. f. Japan.

Giseckia L. (P. D. Gisecke, dänischer Botaniker), V. v., Aizoideae.

pharnaceoides L., pharnaceumähnliche, ☉. w. m. f. Ostindien.

Gladiolus T., Siegwurz, III. I., Irideae.

alatus L., geflügelte, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *algoensis* Herb.

Gladiolus

angustus L., schmale, 4. Zw. f. b. k. Cap d. gut. H.
blandus Ait. (*albidus* Jacq.), liebliche, 4. Zw. f. b. k.
 Cap der guten Hoffnung.

β) *pictus* Bot. mag.

Boucheanus v. Schltdt. (? *palustris* Gaud.), Bouché's, 4.
 Zw. f. Deutschland, Schweiz.

byzantinus Mill., orientalische, 4. Zw. f. Osteuropa.

campanulatus Andr., glockige, 4. Zw. f. b. k. Cap
 der guten Hoffnung.

Cardinalis Curt., scharlachrothe, 4. Zw. f. b. k. Cap
 der guten Hoffnung.

carneus Jacq. (*cuspidatus* Andr.), fleischfarbige, 4. Zw.
 f. b. k. Cap der guten Hoffnung.

cochleatus Swt., löffelförmige, 4. Zw. f. b. k. Cap
 der guten Hoffnung.

Colvillii Swt., Colville's, 4. Zw. f. b. k. Hybride.

communis L., gemeine, 4. Zw. f. b. k. Mittel- und
 Südeuropa.

commutatus Bouché, verwechselte, 4. Zw. f. Taurien.

cuspidatus L. (*undulatus* L.), langspitzige, 4. Zw. f. b. k.
 Cap der guten Hoffnung.

debilis Sims, schwache, 4. Zw. f. b. k. Cap d. g. H.

Ecklonii Lehm., Ecklon's, 4. Zw. f. b. k. Cap d. g. H.

edulis Burch., essbare, 4. Zw. f. b. k. Cap d. gut. H.

elongatus Thbg., verlängerte, 4. Zw. f. b. k. Cap
 der guten Hoffnung.

flexuosus Thbg., hin- und hergebogene, 4. Zw. f. b. k.
 Cap der guten Hoffnung.

floribundus Jcq. (*grandiflorus* Andr.), blüthenreiche, 4.
 Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.

fragrans Hort., wohlriechende, 4. Zw. f. b. k. Hybride.

gracilis Jacq. (*setifolius* L., *laevis* Thbg., *liliaceus* Houtt.,
 schlanke, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.

hastatus Thbg., spontonförmige, 4. Zw. f. b. k. Cap
 der guten Hoffnung.

hirsutus L. (*roseus* Redout., *brevifolius* Jcq., *carneus*
 Andr., *ambiguus* Lam.), rauhhaarige, 4. Zw. f. b. k.
 Cap der guten Hoffnung.

β) *Merianellus* Thbg.

hyalinus Jacq., durchscheinende, 4. Zw. f. b. k. Cap
 der guten Hoffnung.

illyricus Koch, illyrische, 4. Zw. f. Krain, österreich-
 isches Litorale.

imbricatus L. (*rossicus* P., *tenuis* MB., *neglectus* Schult.,
galiciensis Bess.), schuppige, 4. Zw. f. Osteuropa.

involutus LaRoch., eingehüllte, 4. Zw. f. b. k. Cap
 der guten Hoffnung.

leucanthus Bouché, weißblumige, 4. Zw. f. ?

Milleri Ker, Miller's, 4. Zw. f. b. k. Cap d. gut. H.

*Mortoni*us Herb., Morton's, 4. Zw. f. b. k. Cap d. g. H.

namaquensis Ker (*galeatus* Andr., *equitans* Vahl), nama-
 quische, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.

pallidus Bouché, bleiche, 4. Zw. f. ?

permeabilis LaRoch., schmalblättrige, 4. Zw. f. b. k.
 Cap der guten Hoffnung.

psittacinus Lindl. (*natalensis* Reinw.), papageifarbige,
 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.

pudibundus Swt., schamhafte, 4. Zw. f. b. k. Hybride.

Gladiolus

- ramosus Hort., ästige, 4. Zw. f. b. k. Hybride.
 recurvus L. (*carinatus* Ait., *punctatus* Jacq., *pingens* Andr.), zurückgekrümmte, 4. Zw. f. b. k. Cap d. gut. H.
 segetum Ker (*Ludoviciae* Jan., *italicus* Gaud., *communis* Sibth. et Sm.), italienische, 4. Zw. f. Südeuropa, Griechenland.
 Spofforthianus Hort., Spofford's, 4. Zw. f. b. k. Hybride.
 tenellus Jacq., zarte, 4. Zw. f. b. k. Cap d. gut. H.
 trichonemifolius Ker, haarblättrige, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.
 trimaculatus Vahl, dreifleckige, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.
 tristis L. (*concolor* Salib.), traurige, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.
 undulatus Jcq. (*striatus* Andr.), wellige, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.
 b) pallidus. c) carneus.
 versicolor Andr., buntfarbige, 4. Zw. f. b. k. Cap d. g. H.
 β) binervis Bot. mag. γ) tenuior Ker.
 viperatus Ker (*alatus* Jcq., *orchidiflorus* Andr.), Nattern-S., 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.
 Watsonia Thbg., Watson's, 4. Zw. f. b. k. Cap der guten Hoffnung.
 abbreviatus Andr. (*quadrangularis* Ker) et *Cunonia* G. v. *Anisanthus quadrangularis* etc. *bicolor* Thbg. etc. v. *Sparaxis bicolor* etc. *excisus* Jcq. etc. v. *Geissorhiza excisa* etc. *flavus* Ait. etc. v. *Waitzia flava* etc. *fragrans* Jcq. etc. v. *Babiana disticha* etc. *galeatus* Jcq. etc. v. *Synnotia galeata* etc. *gramineus* L., Jacq. v. *Diasia gram.* *iridifolius* Jacq. etc. v. *Watsonia iridifol.* etc. *juncus* Thbg. v. *Anomatheca juncea.* *silenoides* Jacq. etc. v. *Lapeyrouisia silen.* etc.
 Glandulifolia umbellata Wendl. et *uniflora* Wendl. v. *Adenandra umbellata* et β.

Glaucium T., Hornmohn, XIII. 1., Papaveraceae.

- elegans* Fisch. et Mey., zierlicher, ☉. f. Nordpersien.
Fischeri Bernh., Fischer's, ♂. f. Persien.
luteum Scop., Sm. (*flavum* Crtz.), gelber, ♂. f. Mittel- und Südeuropa.
 β) *fulvum* Sm.
phoeniceum G. (*corniculatum* Curt.), hochrother, ☉. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.
 β) *flaviflorum*.
rubrum Sm., rother, ☉. f. Griechenland, Kleinasien.
tricolor Bernh., dreifarbiger, ☉. f. Thüringen, Podolien.
refractum Stev. et *violaceum* Sm. v. *Roemeria refracta* et hybrida.

Glaux T., Milchkraut, V. 1., ?Primulaceae, ?Portulacae.

- maritima* L., Meerstrands-M., 4. f. Europa.
 b) *alba*.

Glechoma L., Gundermann, XIV. I., Labiatae.

- hederacea* L., gemeiner, 4. f. Europa, Nordamerika.
 β) *major* Gaud. γ) *heterophylla* Opitz. δ) *rosea* Dens. ε) *variegata* Dens.
hirsuta W. K., rauhhaariger, 4. f. Ungarn.
grandiflora DC. v. *Stachys corsica*.

Gleditschia L. (J. G. Gleditsch, deutscher Botaniker),
XXIII. II., Leguminosae-Caesalpinieae.

brachycarpa Pursh. (*triacantha* β . Mchx.), kurzhülsige,
f. f. Nordamerika.

chinensis Lam. (*horrida* W., *indica* H. Par.), chinesische,
f. f. China.

b) *inermis* Duh. (*japonica* Lodd.). c) *major* Hort.

d) *nana* Hort. e) *purpurea* Hort.

ferox Dsf. (*macracantha* W., *orientalis* Bosc.), wilde,
f. f. China.

macracantha Dsf. (*ferox* Baudr.), grofsstachelige, f. f.
China.

monosperma Walt. (*carolinensis* Lam., *aquatica* Marsh),
einsamige, f. f. Carolina.

triacantha L. (*meliloba* Walt., *spinosa* Duh.), dreidornige,
f. f. Nordamerika.

b) *inermis* DC. (*laevis* Hort.).

Gartenvarietäten oder unbestimmte Arten: *Boqui*
Hort. *latisiliqua* Lodd. *micracantha* Lodd. *prae-*
cox Hort.

caspiica Dsf. v. *Lagonychium* *Stephanianum*. *javanica*
P. v. ? *Sesbana* *cannabina*.

Gleichenia Sm. (W. F. v. Gleichen, deutscher Natur-
forscher), XXIV. I., Osmundaceae.

flabellata RB., fächerförmige, 4. t. w. Neuholland.

microphylla RB., kleinblättrige, 4. t. w. Neuholland,
Van-Diemens-Land.

pectinata Presl, kammförmige, 4. w. Neugranada.

pubescens H. B. K., weichhaarige, 4. w. Westindien,
Neugranada, Brasilien.

Speluncae RB., grubige, 4. t. w. Neuholland.

Glinus L., *Glinus*, XI. v., Aizoideae.

lotoides L., schotenkleeähnlicher, ©. f. Süd- und West-
europa, Indien.

Globba L., Roxb. (moluckischer Name), I. I., Scitami-
neae-Amomeae.

bulbifera Roxb., zwiebeltragende, 4. w. Ostindien.

Careyana Roxb., Carey's, 4. w. Pegu.

cuspidata Mart., N. E., langspitzige, 4. w. Brasilien.

Hura Roxb. (*versicolor* Sm., *Königiana* Spgl.), bunte,
4. w. Ceylon, Malacka.

marantina L., marantaähnliche, 4. w. Ostindien.

orixensis Roxb., orixensische, 4. w. Ostindien.

pendula Roxb., überhängende, 4. w. Ostindien.

racemosa Sm., traubige, 4. w. Nepal.

saltatoria Rose. (*subulata* Roxb., *radicalis* Roxb., *pur-*
purea Andr.), purpurfarbige, 4. w. Ostindien.

sessiliflora Sims, stiellose, 4. w. Pegu.

spathulata Roxb., spatelförmige, 4. w. Silhet.

erecta Redout., DC. et *nutans* W. v. *Alpinia* *cal-*
carata etc.

Globularia L., Kugelblume, IV. I., Globulariaceae.

Alypum L., dreizählige, f. k. Südeuropa.

β) *integrifolia*.

bellidifolia Tenor., maßliebenblättrige, f. k. Calabrien.

bisnagarica L., bisnagarische, f. w. Ostindien.

cordifolia L., herzblättrige, 4. f. f. Mittel- und süd-
europäische Alpen.

incanescens Viv. (*punctata* Lapeyr.), weißgrauliche, 4. f.
b. k. Ober- und Mittelitalien, Pyrenäen.

Globularia

linifolia Lam. (*vulgaris* Brot.), gleichbreitblättrige, 4. k. Spanien, Portugal.

nana Lam., Zwerg-K., 5. k. Südfrankreich.

nudicaulis L., nacktstengelige, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

salicina Lam. (*longifolia* Ait.), weidenblättrige, 5. k. Madeira.

spinosa Mill., stachelige, 4. k. Südspanien.

trichosantha Fisch. et Mey., haarblumige, 4. f. b. k. Natolien.

vulgaris L., gemeine, 4. f. Europa.

Globulea Haw. v. *Crassula*.

Gloriosa L., Prachtlilie, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

nepalensis G. Don (*simplex* D. Don), nepal'sche, 4. Kn. t. w. Nepal.

simplex L., einfache, 4. Kn. w. Senegal.

superba L., stolze, 4. Kn. Sch. w. Malabar.

virescens Lindl., grünliche, 4. Kn. Sch. w. Senegambien.

Glossodia RB., Zungendingel, XX. 1., Orchideae.

major RB., größer, 4. Kn. t. w. Neuholland.

minor RB., kleiner, 4. Kn. t. w. Neuholland.

Glossula Lindl. (*Glossaspis* Spgl.), Züngelwurz, XX. 1., Orchideae.

tentaculata Lindl., randzaserige, 4. Kn. w. China.

Glottidium Desv., Züngelhülse, XVII. 1v. (v1.), Leguminosae-Papilionaceae.

floridanum Desv., floridanische, 6. f. m. Florida.

Gloxinia L'Her. (B. P. Gloxin, elsasser Botaniker), XIV. 11., Personatae-Bignoniaceae (*Gesnerieae*).

I. *Gloxinia* genuin. N. E. Lindl.

antirrhinea DC., löwenmaulblumige, 4. Kn. w. Mexico.

caulescens Lindl., stengelige, 4. Kn. w. Südamerika.

gracilis Mart., schlanke, 4. Kn. w. Brasilien.

hirsuta Lindl., rauhhhaarige, 4. Kn. w. Brasilien.

macrophylla N. E., Mart., großblättrige, 4. Kn. w. Brasilien.

maculata L'Her., gefleckte, 4. Kn. w. Südamerika.

speciosa Lodd. (*formosa* Hort.), prächtige, 4. Kn. w. Brasilien.

Hybriden und Varietäten: a) alba, b) alba maxima

A. P. (*candida* Hort.), c) hybrida Hort. (? *maxima*

A. P., d) Menziesii A. P., e) pallida maxima A. P.,

f) violacea A. P., g) Youngii.

II. *Sinningia* N. E., Lindl. (W. Sinning, Universitäts-gärtner zu Bonn).

calycina Hort., breitkelchige, 4. 5. w. Jamaica.

guttata Mart., getropfte, 4. 5. w. Brasilien.

Helleri Mart. (*Schottii* Mik.), Heller's, 4. 5. w. Brasilien.

velutina Mart., sammethaarige, 4. 5. w. Brasilien.

villosa Mart., zottige, 4. 5. w. Brasilien.

Glyceria RB. (et *Catabrosa* P. B., *Reboulea* Kunth, *Hydrochloa* Hartm.), Süßgras, III. 11., Gramineae.

aquatica Presl (*airoides* Rchb.), Wasser-S., 4. Wa. f. Europa, Caucasus, Sibirien, Nordamerika.

arundinacea Kunth (*Poa arund.* MB.), rohrähnliches, 4. Wa. f. Caucasus.

delawarica * (*Poa delaw.* Lk., *Festuca* Kunth), delawarisches, 4. f. Nordamerika.

Glyceria

distans Wahlenb. (*capillaris* Wahlbg.), entferntähriges, 4. f. Europa, Nordamerika.

festucaeformis *, schwingelähnliches, 4. f. Oesterreichisches Litorale, Frankreich, Caucasus.

fluitans RB., schwimmendes (*ächt*es), 4. Wa. f. Europa, Caucasus, Amerika, Neuholland.

humilis * (*Aira humilis* MB., *Colpodium bulbosum* Trin.), niedriges, 4. f. Caucasus.

maritima Mert. et Koch, Seestrands-S., 4. f. Europa, Sibirien.

β) *convoluta* Hartm.

Michauxii Kunth (*Poa striata* Mchx., *nervata* W., *lineata* P.), Michaux's, 4. f. Nordamerika.

pennsylvanica * (*Reboulea gracilis* Kunth, *Koeleria* DC., *Aira* Spgl., *A. truncata* Mühlbg.), pennsylvanisches, 4. f. Nordamerika.

spectabilis Mert. et Koch (*aquatica* Whlbg., *Hydrochloa aquatica* Hartm.), ansehnliches, 4. Wa. f. Europa, Sibirien, Neuholland, Nordamerika.

viridula * (*Catabrosa virid.* R. et S., *Aira virid.* Poir., *scabra* Hortul.), grünliches, 4. f. ?

Glycine L., *Glycine*, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

biloba Lindl., zweilappige, ♀. Sch. t. Mexico.

clandestina Wendl., heimlichblühende, ♀. Sch. t. Neuholland.

debilis Ait., schwache, ♂. w. Ostindien.

hedysaroides W., hahnenkopfähnliche, ♀. w. Guinea.

heterophylla Thbg., verschiedenblättrige, 4, Sch. t. Cap der guten Hoffnung.

malacophylla Spgl. (*mollis* Hook.), weichblättrige, 4. Sch. w. Westindien.

minima W., kleinste, 4. Sch. t. Neuholland.

parviflora Lam., kleinblumige, ♂. Sch. w. Ostindien.

secunda Thbg., einseitige, 4. t. Cap der guten Hoffn.

striata L. suppl., gestreifte, ♀. Sch. w. Südamerika.

angustifolia Jacq. (et *caribaea* Jacq. etc.) v. *Rhynchosia angustifol.* etc. *Apios* L. v. *Apios tuberosa*. *bituminosa* L. v. *Fagelia bituminosa*. *chinensis* Curt. etc. v. *Wistaria chinensis*. *comosa* L. etc. v. *Amphicarpa comosa* etc. *humifusa* W. v. *Rothia trifoliata*. *lignosa* Turp. v. *Sweetia lignosa*. *punctata* W. v. *Poiretia scandens*. *rubicunda* Curt. etc. v. *Kennedya rubicunda* etc. *sagittata* Humb. v. *Rudolphia dubia*. *subterranea* L. v. *Voandzeja subterranea*. *vincentina* Ker v. *Chaetocalyx vincentina*.

Glycosmis Corr., Süßbaum, X. i., Hesperideae-Aurantiaceae.

arborea Corr., gezähnelter, ♀. w. Ostindien, Mascarenas.

pentaphylla Corr., fünfblättriger, ♀. w. Ostindien.

Glycyrrhiza T., Süßholz, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

asperima L. suppl. (*aspera* Pall., *hispida* Pall.), rauhes, 4. f. Westsibirien.

dubia Bernh. (*foetida* H. Par., Jacq. non Dsf., *foetidissima* Tausch.), zweifelhaftes, 4. f. ?

echinata L., stachelhülsiges, 4. f. Italien, Taurien, Ungarn, Mittelasien.

Glycyrrhiza

- foetida Dsf., stinkendes, 4. f. Nordafrika.
 glabra L., glattes, 4. f. Mittel- und Südeuropa.
 glandulifera W. Kit. (?*laevis* Pall.), drüsiges, 4. f.
 Ungarn, Siebenbürgen, Taurien, Mittelasien.
 hirsuta L., rauhhaariges, 4. f. Caspisches Meer.
 lepidota Pursh, schuppiges, 4. f. Nordamerika.
 triphylla Fisch. et Mey., dreiblättriges, 4. f. Cas-
 pisches Meer.
 uralensis Fisch., uralisches, 4. f. Sibirien.

Gmelina L. (J. G. Gmelin, deutscher Naturforscher, welcher Sibirien bereiste), XIV. II., Verbenaceae.

- arborescens Roxb., baumartige, 5. w. Ostindien.
 asiatica L., asiatische, 5. w. Ostindien.
 parviflora Roxb. (*parvifolia* Speg.), kleinblumige, 5. w.
 Ostindien.
 speciosissima D. Don, prächtige, 5. w. t. Nepal.
 villosa Roxb., zottige, 5. w. Ostindien.

Gnaphalium Vaill., Ruhrkraut, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

- albescens Sw., weißliches, 5. w. Jamaica.
 americanum L., amerikanisches, 4. t. w. Jamaica.
 cephaloideum W., köpfiges, 6. f. ?Neuholland.
 coarctatum W. (*spicatum* Lam.), gedrängtes, 6. f.
 Südamerika.
 decurrens Jves, herablaufendes, 4. f. Nordamerika.
 involucratum Forst., eingehülltes, 4. t. Neuholland.
 luteo-album L., gelbweißes, 6. f. Europa, Aegypten.
 norvegicum Gunn. (*sylvaticum* Sm., *sylvat. β. fuscum* Wahlbg., *fuscum* Lam.), norwegisches, 4. f. Euro-
 päische Voralpen.
 obtusifolium L. (*polycephalum* Pursh), stumpfblättriges,
 6. f. Nordamerika, Westindien.
 pennsylvanicum W. (*spathulatum* Lam., *obtusifolium* Hort.),
 pennsylvanisches, 6. f. Nordamerika.
 polycephalum Mchx., vielköpfiges, 4. f. Nordamerika.
 purpureum L., purpurfarbiges, 5. f. Nordamerika.
 sanguineum L., blutfarbiges, 4. f. b. k. Palästina, Syrien.
 Schraderi DC. (*pellitum* Schrad.), Schrader's, 4. f.
 ?Nordamerika.
 sphaericum W. (?*hemisphaericum* Hornem.), kugeliges,
 4. k. t. Neuholland.
 stachydifolium Lam., stachysblättriges, 6. f. Südamer.
 supinum L. (*pusillum* Haenk., *Omalotheca supina* DC.),
 niedriges, 4. f. Europäische Alpen.
 β) *fuscum* Scop. γ) *pusillum* W.
 sylvaticum L. (*rectum* Sm.), Wald-R., 4. f. Europa.
 uliginosum L., Sumpf-R., 6. f. Europa, Ostindien,
 Cap der guten Hoffnung.
 ?β) *nudum* Hoffm.

undulatum L., wellenblättriges, 6. f. Afrika.

alpinum L. etc. v. *Antennaria alpina*. *asperum* Thbg. (*stenocladum* Schrk.) v. *Anaxetum asperum*.
candidissimum MB., *crassifolium* L. etc. vid. *Helichrysum candidiss.* etc. *eximium* L. etc. v. *Helipterum eximium* etc. *fastigiatum* Thbg. etc. v. *Metalasia fastigiat.* *glomeratum* L. etc. v. *Leontonyx* (*Spiralepis* D. Don), glomerat. etc. *Leontopodium* L. vid. *Leontopodium alpinum*, *leysseroides* Dsf.

Gnaphalium

vid. *Leyssera capillifolia*. *Oculus cati* Thbg. v.
Eriosphaera O. c.

Hinsichtlich der übrigen s. *Filago* und *Helichrysum*.

Gnetum Forsk., L. (ostindischer Name), XXI. 1., *Chloranthaeae*.

Gnemon L., ternatisches, ♀. w. Molucken.

Gnidia L., Gnidie, VIII. 1., *Thymeleaceae*.

argentea Thbg., silberfarbige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
biflora Thbg., zweiblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
capitata W., kopfförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
flava Lodd. (*aurea* Hortul.), hellgelbe, ♀. t. Cap der
 guten Hoffnung.

imberbis Dryand. (*pinifolia* Wendl., *simplex* Andr.), un-
 bärige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

imbricata L. fil. (*denudata* Lindl.), dachblättrige, ♀. t.
 Cap der guten Hoffnug.

juniperifolia L. (*acerosa* Gmel.), wachholderblättrige, ♀.
 t. Cap der guten Hoffnung.

linoides Wickström, flachsblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.
ochroleuca Lodd., weißgelbe, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

oppositifolia L. (*laevigata* Thbg.), gegenblättrige, ♀. t.
 Cap der guten Hoffnung.

pinifolia L. (*radiata* Wendl.), kieferblättrige, ♀. t. Cap
 der guten Hoffnung.

sericea L., seidenhaarige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

simplex L., einfache, ♀. t. k. Cap der guten Hoffn.

stricta Wikstr., steife, ♀. t. k. Cap der guten Hoffn.

tomentosa L., filzige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

filamentosa L. fil. v. *Lachnaea buxifolia*.

Godetia Spach, Godetie, VIII. 1., *Onagraceae*.

lepida Lindl., schilferige, ☉. f. Californien.

rubicunda Lindl., röthliche, ☉. f. Californien.

vinosa Lindl., weinige, ☉. f. Californien.

Godoya A. et P. (Emanuel de Godoy [Friedensfürst],
spanischer Minister), XIII. 1., *Guttiferae*.

gemmiflora Mart., knospenblumige, ♀. w. Brasilien.

Goldbachia DC. (C. L. Goldbach, Botaniker zu Mos-
kau), XV. 1., *Cruciferae*.

laevigata DC., glatte, ☉. f. Astrachan.

torulosa DC., höckerige, ♂. f. Persien.

Goldfussia N. E. (Goldfuss, Professor der Zoologie
zu Bonn), XIV. 1., *Acanthaceae*.

anisophylla N. E., ungleichblättrige, 4. ♀. t. Nepal.

Gomezia RB. (Gomez, spanischer Apotheker), XX. 1.,
Orchideae.

recurva RB., zurückgekrümmte, 4. w. Brasilien.

recurva Lodd. v. *Rodriguezia planifolia*. *tenuiflora*
 Lodd. v. *Notylia punctata*.

Gomphia Schreb., Gomphie, X. 1., *Tricoccae-Ochnaceae*.

Jabotapita Sw., Jabotapita-G., ♀. w. Brasilien, Westind.

laevigata Lod., glatte, ♀. w. ?

laurifolia Sw., lorbeerblättrige, ♀. w. Jamaica.

nitida Sw., glänzende, ♀. w. Jamaica.

obtusifolia DC., stumpfblättrige, ♀. w. Madagascar.

zeylanica DC., zeylonische, ♀. w. Ceylon.

Gomphocarpus RB., Nagelfrucht, V. 11., *Asclepiadeae*.

arborescens RB., baumartige, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

Gomphocarpus

- crispus* RB., krause, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
fruticosus RB., strauchige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
longifolius Spgl., langblättrige, 4. f. b. k. Carolina.
viridis Spgl., grüne, 4. f. b. k. Florida.

Gompholobium Sm., Nagelhülse, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

- aduncum* Cunn., hackige, ♀. t. Neusüdwallis.
angustifolium Ait., schmalblättrige, ♀. t. Neuholland.
aristatum Benth., grannige, ♀. t. Neuholland (Schwabenflufs).
barbigerum DC. (*fimbriatum* Sbr.), bärtige, ♀. t. Neuholland.
capitatum Cunn., kopfförmige, ♀. t. Neuholland.
glabratum DC., glatte, ♀. t. Neuholland.
glaucescens Cunn., blaugrüne, ♀. t. Neuholland.
grandiflorum Sm., grofsblumige, ♀. t. Neusüdwallis.
Knightianum Lindl., Knight's, ♀. t. Neuholland.
lanatum Cunn., wollige, ♀. t. Neuholland.
latifolium Sm. (*fimbriatum* Sm., *psoraleaefolium* Salisb.), breitblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.
marginatum RB., berandete, ♀. t. Neuholland.

β) *setifolium* Sbr.

- mirbelioides* Ma. C., mirbelienähnliche, ♀. t. Neuholl.
pedunculare DC., gestielte, ♀. ♂. t. Neuholland.
pinnatum Sm., gefiederte, ♀. ♂. t. Neuholland.
polymorphum RB., vielgestaltige, ♀. t. Neuholland.
reticulatum Ma. C., netzförmige, ♀. t. Neuholland.
tenellum Ma. C., zarte, ♀. t. Neuholland.
tenue Lindl., dünne, ♀. t. Neuholland.
tetrathecoides Sieb., tetrathecaähnliche, ♀. t. Neuholl.
tomentosum LaBill., filzige, ♀. t. Neuholland.
venulosum Lindl., feinaderige, ♀. t. Neuholland.
venustum RB., liebliche, ♀. t. Neuholland.
virgatum Sieb., ruthenförmige, ♀. t. Neuholland.

Celsianum Hort. v. *Platychilum Celsianum*. *minus* Sm. v. *Burtonia minor*.

Gomphrena L., Kugelamaranth, V. 1., Aizoideae-Amaranthaceae.

- amaranthoides* Roth, fuchsschwanzähnlicher, ♂. w. Ostind.
arborescens L., baumartiger, ♀. w. Südamerika.
decumbens Jacq., niederliegender, ☉. w. m. Mexico.
globosa L., indischer, ☉. w. m. Ostindien.

b) *alba*.

- lanata* RB., wolliger, ☉. ♂. t. Neuholland.
perennis L., ausdauernder, 4. w. Südamerika.

brasiliensis Jacq. v. *Mogiphanes Jacquini*. *floridana* Spgl., *lactea* DC. etc. v. *Hoplotheca floridana* etc.

Gomutus Rumpf. (malabarischer Name), Zuckerpalme, XIII. III., Palmae.

- saccharifer* Spgl., moluckische, ♀. w. Molucken, Cochinchina.

Gongora R. et P. (A. C. Gongora, ein Spanier, Freund des Mutis), XX. 1., Orchideae.

- atropurpurea* Hook., schwarzpurpurrothe, 4. w. Trinidad.
maculata Lindl., gefleckte, 4. w. Demerara.
speciosa Hook., prächtige, 4. w. Brasilien.
viridipurpurea Hook. v. *Cirrhaea viridipurpurea*.

Goniocarpus Thbg., Kön., Kantennufs, V. I., Halorageae.

micranthus Thbg., kleinblumige, ☉. f. Japan, China.

Gonolobus Mchx., Ringelkranz, V. II., Asclepiadeae.
carolinensis RB. (*hirsutus* Lodd.), karolinischer, 4. Sch. k. Carolina.

crispiflorus RB., krausblumiger, ♀. Sch. w. Südamer.
diadematus Ker, gezierter, ♀. Sch. w. Mexico.

discolor R. et S., verschiedenfarbiger, 4. Sch. f. Nordamerika,

echinatus Lodd., igelstacheliger, ♀. Sch. w. ?

grandiflorus RB., großblumiger, ♀. Sch. w. Trinidad.

hirsutus Mchx., rauhaariger, 4. Sch. f. Nordamerika.

laevis Mchx., glatter, 4. Sch. f. Nordamerika.

macrophyllus Mchx., Nutt., großblättriger, 4. Sch. f. Nordamerika.

maritimus RB., Seestrands-R., ♀. Sch. w. Neugranada.

niger RB., schwarzer, ♀. Sch. w. Mexico.

Nuttallianus Spgl. (*viridiflorus* Nutt.), 4. Sch. f. Nordamerika.

obliquus RB., schiefer, 4. Sch. f. b. Florida, Carolina.

planiflorus RB., ebenblumiger, ♀. Sch. w. Trinidad.

prostratus RB., gestreckter, 4. t. k. Mexico.

racemosus RB., traubiger, ♀. Sch. w. Neugranada.

rostratus RB., geschnabelter, ♀. Sch. w. Caribäen.

undulatus RB., wellenblättriger, ♀. Sch. w. Neugranada.

uniflorus H. B. K., einblumiger, ♀. Sch. w. Mexico.

viridiflorus Meyer, grünblumiger, ♀. Sch. w. Südamer.

Gonospermum Less., Kantensame, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

elegans DC., zierlicher, ♀. k. Canarische Inseln.

fruticosum Less., strauchiger, ♀. k. Canarische Inseln.

multiflorum DC., vielblumiger, ♀. k. Canarische Inseln.

Gonostemon Haw. v. *Stapelia*.

Goodenia Sm. (Dr. Goodenough, englischer Botaniker), V. I., Campanulaceae-Goodenovieae.

bellidifolia Sm., mafsliebenblättrige, 4. k. t. Neuholl.

gracilis RB., schlanke, 4. k. t. Neuholland.

grandiflora Sims, großblumige, ♀. k. t. Neusüdwallis.

hederacea Sm., epheuähnliche, 4. k. t. Neuholland.

heterophylla Sm., verschiedenblättrige, ♀. k. t. Neuholl.

ovata Sm., eiförmige, ♀. k. t. Neusüdwallis, Van-Diemens-Land.

paniculata Sm., rispige, 4. ♀. k. t. Neuholland.

albida Sm., *calendulacea* Andr., *ramosissima* Sm. v. *Scaevola microcarpa suaveolens et hispida*.

Goodia Salisb. (Peter Good, Pflanzensammler für den Kew-Garten), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

lotifolia Salisb., schotenkleeblättrige, ♀. t. Van-Diemens-Land.

polysperma DC. (*lotifolia* Hortul.), vielsamige, ♀. t. Van-Diemens-Land.

pubescens Sims, weichhaarige, ♀. t. Van-Diemens-Land.

Goodyera RB. (John Goodyer, wenig gekannter englischer Botaniker), XX. I., Orchideae.

discolor Ker, verschiedenfarbige, 4. w. Brasilien.

procera Hook., hohe, 4. w. Nepal.

pubescens RB., weichhaarige, 4. f. k. Nordamerika.

Goodyera

repens RB., kriechende, 4. f. Europa, Nordamerika.
tessellata Lod., würfelige, 4. f. k. Nordamerika.

Gordonia Ell. (James Gordon, englischer Handeltgärtner), XVI. VIII., Theaceae (*Camelliaceae*, *Ternstroemiaceae*).

Franklini L'Her., Franklin's, ♀. f. b. Nordamerika.
Haematoxylon Sw., Blutholz-G., ♀. w. Jamaica.
Lasianthus L., filzkelchige (langstielige), ♀. f. b. Carolina, Florida.
pubescens L., weichhaarige, ♀. f. b. Carolina, Georgia.
anomala Spgl. v. *Polyspora axillaris*.

Gorteria L. (David Gorter, holländischer Botaniker), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

ciliata Thbg., gefranzte, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.
personata L., maskige, ♂. f. m. Cap der gut. Hoffn.
 Hinsichtlich der übrigen s. *Gazania*.

Gossypium L., Baumwolle, XVI. VIII., Malvaceae.

acuminatum Roxb., zugespitzte, ♀. w. Ostindien.
arborescens L., baumartige, ♀. w. Ostindien.
barbadense L., barbadensische, ♂. w. Caribäen.
chinense Fisch. (*Nanking* Auctor.), chinesische, ♂. ♀. w. China, Ostindien.
herbaceum L., krautartige, ♂. ♂. w. Ostindien.
hirsutum L., rauhhaarige, ♂. w. Westindien.
indicum Lam. (*eglandulosum* Cav.), indische, ♂. w. Ostindien.
latifolium Murr., breitblättrige, ♀. w. ?
micranthum Cav., kleinblumige, ♂. t. w. Persien.
obtusifolium Roxb., stumpfblättrige, ♀. w. Ostindien.
religiosum L., heilige, ♀. w. Ostindien.
vitifolium L., weinblättrige, ♂. ♀. w. Ostindien.
Gothofreda cordifolia Vent. vid. *Oxypetalum Gothofreda*.

Gouania L. (A. Gouan, Professor der Botanik zu Montpellier), V. I. (XXIII. II.), Rhamneae.

cordifolia Radd., herzblättrige, ♀. Sch. w. Brasilien.
domingensis L., domingensische, ♀. Sch. w. Westindien.
integrifolia Lam., ganzblättrige, ♀. Sch. w. ?
mauritiana Lam., mascarenische, ♀. Sch. w. Mascarenas.
tiliaefolia Lam., lindenblättrige, ♀. Sch. w. Ostindien, Mascarenas.
tomentosa Jacq., filzige, ♀. Sch. w. Westindien.

Gouffeia Robil. et Cast. (Gouffé de la Cour, Botaniker zu Marseille), V. II., Caryophyllaceae-Alsineae.

holosteoides Fisch. et Mey., spurrenähnliche, ♂. f. Südrussland.

Govenia Lindl. (J. R. Goven, englischer Pflanzencultivator), XX. I., Orchideae.

Gardneri Hook., Gardner's, 4. w. ? Südamerika.
liliacea Lindl., lilafarbige, 4. Kn. w. Mexico.
superba Lindl., aesehnliche, 4. w. Mexico.

Grabowskia Schlecht. (H. Grabowski, schlesischer Botaniker), V. I., Solanaceae.

boerhaaviaefolia Schlecht., boerhaavienblättrige, ♀. k. t. Peru.

Grahamia (*Graemia*) *aromatica* Hook. v. *Cephalophora glauca*.

- Grammanthes** DC., Schriftblumchen, V. v., Corniculatae-Crassulaceae.
dichotoma DC., zweizinkiges, ☉. f. m. Cap d, gut. H.
- Grammatophyllum** Blume, Schriftstendel, XX. 1., Orchideae.
multiflorum Lindl., vielblumiger, 4. w. Manilla.
speciosum Blume, prächtiger, 4. w. Ostindien.
- Grammitis** Sw., Schriftfarn, XXIV. 1., Pteroideae.
Billardieri W. (*australis* RB.), Billardièr's, 4. w. Neuholland.
elongata Sw., länglicher, 4. w. Jamaica.
lanceolata Sw., lanzettlicher, 4. w. Mascarenas.
Ceterach Sw. v. *Ceterach officinarum. heterophylla* LaBill. et *serrulata* W. vid. *Xiphopteris heterophylla* etc.
- Grangea** Adans., Juss., Grangea, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.
cinerea Del., aschgraue, ☉. f. Aegypten.
maderaspatana Lam., ostindische, ☉. f. Ostindien, Aegypten.
bicolor Dsf. v. *Dichrocephala latifolia. chinensis* Lam.,
decumbens Dsf., *minima* W. v. *Myriogyne minuta*.
- Grangeria** Commers. (N. Granger, welcher Aegypten und Judaea bereiste), XI. 1., Chrysobalaneae.
borbonica Lam., borbonische, ♀. w. Mascarenas.
- Gratiola** L., Gnadenkraut, II. 1., Personatae-Antirrhineae.
aurea Mühlbg., Pursh, goldfarbiges, 4. f. Nordamerika.
latifolia RB., breitblättriges, 4. k. t. Neuholland.
officinalis L., officinelles, 4. f. Europa.
quadridentata Mchx., vierzähniges, 4. f. Carolina.
virginica L., virginisches, 4. f. b. k. Virginien, Carolina, Westindien.
veronicaefolia Retz v. *Bonnaya verticillata, viscosa* Hornem. v. *Tittmannia viscosa*.
- Grevillea** RB. (C. F. Greville et R. K. Greville, englische Botaniker), IV. 1., Proteaceae.
acanthifolia Sbr., Cunn. (? *aquifolia* Lodd., Cat.), bärenklaublättrige, ♀. t. Neusüdwallis.
acuminata RB., zugespitzte, ♀. t. Neusüdwallis.
arenaria RB., sandliebende, ♀. t. Neusüdwallis.
aspera RB., rauhe, ♀. t. Neusüdwallis.
aspensifolia RB., milzfarnblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.
Banksii RB., Bank's, ♀. t. Neuholland.
Baueri RB., Bauer's, ♀. t. Neuholland.
berberifolia Swt., berberizenblättrige, ♀. t. Neuholland.
buxifolia RB., buchsbaumblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.
Caley RB. (*blechnifolia* Cunn.), Caley's, ♀. t. Neuholl.
canescens RB., grauliche, ♀. t. Neuholland.
ceratophylla RB., hornblättrige, ♀. t. Nördl. Neuholl.
cinerea RB., aschgraue, ♀. t. Neusüdwallis.
collina Kn., Hügel-G., ♀. t. Neusüdwallis.
concinna RB., nette, ♀. t. Neusüdwallis.
Dryandri RB., Dryander's, ♀. t. Nördliches Neuholland.
dubia RB., zweifelhafte, ♀. t. Neusüdwallis.
Flindersii Cunn., Flinders's, ♀. t. Neusüdwallis.
heterophylla Hort., verschiedenblättrige, ♀. t. Neuholl.
juniperina RB., wachholderähnliche, ♀. t. Neusüdwallis.
linearis RB., gleichbreitblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

Grevilleab) *alba* Lod. c) *incarnata* Bot. mag.

- Manglesii* Mack, C., *Mangles's*, f. t. Neuholland.
montana RB., Berg-G., f. t. Neusüdwallis.
mucronulata RB., stachelspitzige, f. t. Neusüdwallis.
phylicoides RB., *phylica*ähnliche, f. t. Neuholland.
planifolia RB. (*concinna* Lindl., *Seymouriae* Swt.), eben-
 blätterige, f. t. Neuholland.
podaliriaefolia Swt., *podalirien*blätterige, f. t. Neuholl.
podocarpifolia Swt., *podocarpus*blätterige, f. t. Neuholl.
pubescens Hook., weichhaarige, f. t. Neuholland.
punicea RB., hochrothe, f. t. Neusüdwallis.
riparia RB., Ufer-G., f. t. Neusüdwallis.
robusta Cunn., rüstige, f. t. Neuholland.
rosmarinifolia Cunn., *rosmarin*blätterige, f. t. Neusüdwallis.
sericea RB., seidenhaarige, f. t. Neusüdwallis.
sphacelata RB., brandige, f. t. Neuholland.
stricta RB., steife, f. t. Neusüdwallis.
stylosa Kn., langgriffelige, f. t. Neusüdwallis.
sulphurea Cunn., schwefelgelbe, f. t. Neusüdwallis.
trifurcata Swt., dreigabelige, f. t. Neuholland.
venusta RB., liebliche, f. t. Neuholland.

Grewia L. (N. Grew, berühmter englischer physiologischer Botaniker), XIII. 1., Tiliaceae.

- affinis* Lindl., ähnelnde, f. w. China.
asiatica L., asiatische, f. w. Coromandel, Mascarenas.
aspera Roxb., rauhe, f. w. Ostindien.
bicolor Juss., zweifarbige, f. w. Guinea.
bracteata Roth, deckblätterige, f. w. Ostindien.
carpinifolia P. B., hainbuchenblätterige, f. w. Guinea.
flava DC., hellgelbe, f. t. w. Südafrika.
hirsuta Vahl, rauhhaarige, f. w. Ostindien.
Mallococca L., zottigfrüchtige, f. w. Freundschaftsins.
Microcos L., kleinfrüchtige, f. w. Ostindien.
obtusifolia W., stumpfblätterige, f. t. Cap d. gut. H.
occidentalis L., westliche, f. t. Cap der guten Hoffn.
oppositifolia Hamilt., gegenblätterige, f. t. Cap d. g. H.
orientalis L., morgenländische, f. w. Ostindien.
ovalifolia Juss., eiblätterige, f. w. Ostindien.
paniculata Roxb., rispige, f. w. Ostindien.
pilosa Lam. (*orientalis* Vahl), haarige, f. w. Ostindien.
Rothii DC. (*bicolor* Roth), Roth's, f. w. Ostindien.
salvifolia Roth, salbeiblätterige, f. w. Ostindien.
serrulata DC., sägezähnige, f. w. Ostindien.
subinaequalis DC., ungleiche, f. w. Ostindien.
terebinthinacea DC., Terpentin-G., f. t. ?
tiliaefolia Vahl (*arborea* Roxb.), lindenblätterige, f. w. Ostindien.

- tomentosa* Juss. (*hirsuta* Sm.), filzige, f. w. Java.
ulmifolia Roxb., ulmenblätterige, f. w. Ostindien.
umbellata Roxb., doldige, f. w. Ostindien.
villosa Roxb., zottige, f. w. Ostindien.

Grias L., Stammpfirsiche, XIII. 1., Guttiferae.

- cauliflora* L., westindische, f. w. Jamaica.

Grielum L., *Grielum*, X. iv., ? Aizoideae.

- humifusum* Thbg., niederliegendes, 4. t. k. Cap d. g. H.
laciniatum G., schlitzblätteriges, 4. t. k. Cap d. gut. H.
tenuifolium L., feinblätteriges, 4. t. k. Cap d. gut. H.

Griffinia Ker, Herb. (W. Griffin, Esq., Freund der Botanik), VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

Griffinia

hyacinthina Herb., hyacinthenähnliche, 4. Zw. w. Brasilien.

intermedia Lindl., mittlere, 4. Zw. w. Brasilien.

parviflora Ker, kleinblumige, 4. Zw. w. Südamerika.

Grindelia W. (D. H. Grindel, Professor der Botanik zu Dorpat), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

angustifolia H. B. K., schmalblättrige, 4. k. Mexico.

arguta Schrad., scharfzahnige, 4. k. f. b. Mexico.

ciliata Spgl., gefranzte, ♂. f. Nordamerika.

coronopifolia Lehm., krähensfußblättrige, 4. k. Mexico.

Dunalii Spgl. (*angustifolia* Dun.) Dunal's, 4. k. Mexico.

glutinosa Dun., klebrige, ♂. k. t. Mexico.

integrifolia DC., ganzblättrige, 4. f. Nordamerika.

inuloides W. (*spathulata* Bernh.), alantähnliche, 4. ♂. k. t. Mexico.

Lamberti G. Don, Lambert's, ♂. k. t. Mexico.

nitida Bernh., glänzende, 4. f. ? Nordamerika.

squarrosa Dun., sparrige, ♂. k. Nordamerika.

incisa Spgl. v. Aster (*Calimeris*) *incisa*. *sibirica* Lk. v. ? Aster *conspicuus*.

Grislea Löffl. (G. Grisley, portugiesischer Wundarzt und Schriftsteller), VIII. I., Lythraeae.

secunda L., einseitige, ♂. w. Cumana.

tomentosa Roxb., filzige, ♂. w. Ostindien.

Grobya Lindl. (Lord Grey of Groby, Beförderer der Gartenkultur), XX. I., Orchideae.

Amherstiae Lindl., Amherst's, 4. w. Brasilien.

Gronovia L. (J. F. Gronow, holländischer Botaniker), V. I., Cucurbitaceae.

Humboldtiana R. et S., Humboldt's, ♂. Sch. w. Südamer.

scandens L., klimmende, ♂. Sch. w. Südamerika.

Grossularia T. v. *Ribes*.

Guajacum Plum., Guajackholz, X. I., Zygophylleae.

arborescens H. B. K., baumartiges, ♂. w. Südamerika, Trinidad.

officinale L., officinelles, ♂. w. Westindien.

verticale Ortega, scheitelrechtes, ♂. w. Südamerika, Westindien.

Guarea L. (westindischer Name), VIII. I. (XVI. v.), Hesperideae-Meliaceae.

ramiflora Vent. (*humilis* Berter.), astblumige, ♂. w. Porto Rico.

Swarzii DC. (*trichilioides* Sw.), Swarz's, ♂. w. Westind.

trichilioides L. (*grandiflora* DC.), großblumige, ♂. w. Westindien, Südamerika.

Guatteria R. et P. (J. B. Guatteri, Professor der Botanik zu Parma), XIII. VI., Anonaceae.

cerasoides Dun., kirschbaumähnliche, ♂. w. Coromandel.

laurifolia Dun., lorbeerblättrige, ♂. w. Westindien, Südamerika.

rufa Dun., fuchsrothe, ♂. w. Ostindien, China.

suberosa Dun., korkige, ♂. w. Coromandel.

virgata Dun., ruthenförmige, ♂. w. Jamaica, Cuba.

Guazuma Plum. (mexicanischer Name), XVIII. I., Malvaceae-Büttneriaceae.

polybotrya Cav., vieltraubige, ♂. w. Südamerika, Caribäen.

Guazuma

- tomentosa H. B. K., filzige, $\frac{1}{2}$ w. Neugranada.
 ulmifolia Lam., ulmenblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.

Güldenstaedtia Fisch. (J. A. Güldenstaedt, ein Lief-
länder, welcher als Botaniker die Caucasischen Gebirge
bereiste), XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.
 monophylla Fisch., einblättrige, 4. f. Sibirische Alpen.
 pauciflora Fisch., wenigblumige, 4. f. Ostsibirien.

Günthera elongata Andr. v. *Brassica elongata*.

Guepinia *Lepidium* Dsf. et *nudicaulis* Bat. vid. *Teesdalia*
Lepidium et *nudicaulis*.

Guettarda L. (Etienne Guettard, französischer Bota-
niker), V. i. (XXI. vi.), Rubiaceae.

- hirsuta Poir., rauhhaarige, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika, Hispaniola.
 lucida R. et S., spiegelnde, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
 odorata R. et S., wohlriechende, $\frac{1}{2}$ w. Cuba, Jamaica.
 rugosa Sw., runzelige, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
 scabra Lam., scharfe, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
 speciosa L., prächtige, $\frac{1}{2}$ w. Java.
 tomentosa R. et S., filzige, $\frac{1}{2}$ w. Jamaica.
 coccinea Aubl. v. *Isertia coccinea*.

Guevina Molin., Guevine, IV. i., Proteaceae.

Avellana Molin., nufstragende, $\frac{1}{2}$ t. Chili.

Guilandina Juss. (M. Wieland [Guilandinus], ein
Preufse, welcher in naturhistorischer Hinsicht die
Levante bereiste), X. i., Leguminosae-Caesalpinieae.

- Bonduc L., Bonduc-G., $\frac{1}{2}$ w. Ost- und Westindien.
 Bonducella L., zweistachelige, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

dioica L. v. *Gymnocladus canadensis*.

Guizotia DC. (Guizot, französischer Staatsmann und
Gelehrter), XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.

oleifera DC., ölige, $\odot$ $\frac{1}{2}$ f. m. w. Ostindien, Abyssinien.

Gundelia T. (A. Gundelsheimer, ein Deutscher, welcher
mit Tournefort den Orient bereiste), XIX. v., Com-
positae-Echinopeae.

Tournefortii L., Tournefort's, 4. f. b. k. Levante.

Gunnera L. (E. Gunner, norwegischer Botaniker), II.
i., Urticaceae.

perpensa L., nierenblättrige, 4. k. t. Cap d. gut. H.

Gustavia L. (Gustav III., König von Schweden, Be-
schützer des Linné), XVI. viii., Myrtaceae.

- augusta L., herrliche, $\frac{1}{2}$ w. Guiana, Brasilien.
 fastuosa L., schöne, $\frac{1}{2}$ w. Guiana.

Guzmania R. et P. (A. Guzmán, ein Spanier, Sammler
naturhistorischer Gegenstände), VI. i., Bromeliaceae.

tricolor R. et P., dreifarbig, 4. w. Südamerika.

Gymnadenia R. B., Rich., Händleinwurz, XX. i.,
Orchideae.

- albida Rich., weißliche, 4. Kn. f. Europa.
 angustifolia Spgl., schmalblättrige, 4. Kn. f. Taurien,
 Caucasus.
 conopsea Rich., fliegenartige, 4. Kn. f. Europa.
 b) alba.
 cucullata Rich., kappenförmige, 4. Kn. f. Galicien,
 Podolien, Sibirien.
 odoratissima Rich., wohlriechende, 4. Kn. f. Europa.
 ornithia Spgl., vogelartige, 4. Kn. f. Oesterreich,
 Calabrien.

Gymnadenia

viridis Rich., grüne, 4. Kn. f. Europa, Nordamerika.

Gymnema RB., Nacktkrone, V. II., Asclepiadeae.

lactiferum RB., milchende, 4. Sch. w. Ceylon.

sylvestre RB., Wald-N., 5. Sch. w. Ceylon.

tenacissimum Spgl., zähe, 5. Sch. w. Ostindien.

tingens Spgl., färbende, 5. Sch. w.

Gymnocladus Lam., Schusserbaum, XXII. IX. (X. I.), Leguminosae-Caesalpinieae.

canadensis Lam., canadischer, 5. f. Canada.

Gymnogramma Desv., Schriftfarn, XXIV. I., Pteridoideae (*Polypodiaceae*).

asplenoides Sw., strichfarnähnlicher, 4. w. Brasilien.

Calomelanos Kaulf., schwarzstieliger, 4. w. Westindien, Südamerika.

chaerophylla Dsf., kerbelblättriger, 4. w. Brasilien, Paraguay.

chrysophylla Kaulf., goldblättriger, 4. w. Westindien.

distans H. Berol., entferntfiederiger, 4. w. Brasilien.

leptophylla Desv., schlankblättriger, 4. k. f. b. Südeuropa.

myriophylla Sw., vielblättriger, 4. w. Brasilien.

ochracea Presl, ockerfarbiger, 4. w. Peru.

pedata Kaulf., fußförmiger, 4. w. Südamerika.

peruviana Desv. (*dealbata* Presl), peruvianischer, 4. w. Peru, Panama.

polypodioides Spgl. (*Raddiana* Bevis), tüpfelfarnähnlicher, 4. w. Brasilien.

rufa Desv., fuchsrother, 4. w. Südamerika.

sulfurea Desv., schwefelgelber, 4. w. Jamaica.

tartarea Desv., bestäubter, 4. w. Jamaica, Südamerika.

tomentosa Desv., filziger, 4. w. Brasilien.

trifoliata Desv., dreiblättriger, 4. w. Westindien, Südamerika.

Ceterach Spgl. v. *Ceterach* offic. *cordata* Hook. et Grev. et *cordata* Schlcht. v. *Ceterach* capensis et *cordata* Nachtr.

Gymnoloma H. B. K., Nacktsaum, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

connatum Spgl., verwachsener, 5. w. Brasilien.

maculatum Ker, gefleckter, 5. w. Brasilien.

triplinerve H. B. K., dreinerviger, 5. w. Neugranada.

Gymnostachys RB., Nacktähre, IV. I., Aroideae.

anceps RB., zweikantige, 4. Kn. t. Neuholland.

Gymnostichum Schreb., Nacktspindel, III. II., Gramineae.

Hystrix Schreb., struppige, ♂. 4. f. Orient, Nordamer.

majus (Fresen.), größere, 4. f. ? Nordamerika.

Gymnostylis anthemifolia Juss. etc. v. *Soliva anthemifol.* etc.**Gynandropsis** DC., Zwitterkapper, VI. I. (XV. III.), Capparideae.

Candelabrum Swt., kerzenartige, ☉. w. ?

pentaphylla DC., fünfblättrige, ☉. w. Ost- u. Westind.

pulchella Lindl., schöne, ☉. w. m. Südamerika.

sessiliflora DC., ungestielte, ☉. w. m. Westindien.

speciosa DC., prächtige, ♂. w. Südamerika.

triphylla DC., dreiblättrige, ☉. w. m. Westindien.

Gynopogon Alyxia Forst. v. *Alyxia* Forsteri.**Gypsocallis** Salisb., *carnea* D. Don, *multiflora* D. Don, *vagans* Salisb. etc. v. *Erica carnea* etc.

Gypsophila L., Gypskraut, X. II., Caryophyllaceae.

acutifolia Fisch., spitzblättriges, 4. f. Caucasus.

adscendens Jacq., aufsteigendes, 4. f. Südeuropa.

altissima L., hohes, 4. f. Sibirien.

β) *conferta*.

capitata Pall., kopfförmiges, 4. f. b. Mittelasien.

collina Stev., Hügel-G., 4. f. Podolien, Bessarabien.

dichotoma Bess. (*dubia* W. suppl.), zweizinkiges, 4. f.

Galicien, Sibirien.

elegans MB., zierliches, 4. f. Caucasus.

fastigiata L., gipfelständiges, 4. f. Deutschland, Schweden, Ungarn, Siebenbürgen, Sibirien.

β) *arenaria* WK.

glauca Stev. (*repens* MB., *Steveni* Fisch., *armerioides* Sering.), blaugrünes, 4. f. Caucasus, Armenien, Mittelasien.

glomerata Pall., knaulförmiges, 4. f. Taurien, Caucasus.

Gmelini Ledeb., Gmelin's, 4. f. Sibirien.

graminea Sm., grasartiges, 4. f. Griechenland.

grandiflora Poir., großblumiges, 4. f. ?

muralis L., gemeines, 4. f. Europa.

β) *serotina* Hayn.

paniculata L., rispiges, 4. f. Mähren, Ungarn, Sibirien.

perfoliata L., durchwachsenes, 4. f. Kleinasien.

prostrata L., gestrecktes, 4. f. Mittelasien.

pubescens Ledeb., weichhaariges, 4. f. Sibirien.

repens L. (*prostrata* All.), 4. f. Mittel- und Südeuropa, Sibirien.

rigida L., starres, 4. f. Südfrankreich.

Rokeika Delil., ägyptisches, 4. f. Aegypten.

sabulosa Stev. (*scorzonerifolia* Dsf., *perfoliata* MB.), Sand-G., 4. f. Taurien, Caucasus.

saligna Schrad., weidenartiges, 4. f. ?

Stevenii Fisch., Steven's, 4. f. Caucasus, Armenien.

Struthium L., spanisches, 4. f. b. Spanien.

tenella Poir., zartes, 4. f. Südeuropa.

tenuifolia MB., feinblättriges, 4. f. Caucasus.

trichotoma Wender., dreizinkiges, 4. f. ?

viscosa Murr., schmieriges, 4. f. Kleinasien.

compressa Dsf., *cretica* Sm., *dianthoides* Sm., *illyrica* Sm., *ochroleuca* Sm., *Saxifraga* L., *stricta*

Bunge v. *Tunica compressa* etc. *Vaccaria* Sm. v. *Vaccaria pyramidata*.

Gyrenia K. et W., Gyrenie, VI. I., ? Coronariae-Asphodeleae.

biflora K. et W., zweiblumige, 4. Zw. t. Mexico.

Gyrocarpus Jacq., Rundnufs, IV. I. (XXIII. I.), Onagrariae-Combretaceae.

americanus Jacq., amerikanische, 4. w. Westindien, Neugranada.

asiaticus W. (*Jacquini* Roxb.), asiatische, 4. w. Ostindien.

Gyromia virginica Nutt. v. *Medeola virginica*.**Gyrostemon** Dsf., Kreisfädler, XIII. VI. (XXII. XII.), ? Malvaceae-Tiliaceae.

attenuatus Hook., verschmälerter, 4. t. Westliches Neuholland.

cotinifolius Dsf., cotinusblättriger, 4. t. Westliches Neuholland.

ramulosus Dsf., ästiges, 4. t. Westliches Neuholland.

- Habenaria** W., RB., Zügelstendel, XX. 1., Orchideae.
alata Hook., geflügelter, 4. Kn. w. Westindien.
Blephariglottis Hook., weifsblumiger, 4. Kn. f. Nordamer.
bracteata RB., deckblättriger, 4. Kn. f. b. Nordamer.
ciliaris RB., gefranzter, 4. Kn. f. b. Nordamerika.
cristata RB., kammiger, 4. Kn. f. b. Nordamerika.
dilatata Hook., verbreiteter, 4. Kn. f. b. Nordamerika.
fimbriata RB., gefranzter, 4. Kn. f. b. Nordamerika.
flava RB., hellgelber, 4. Kn. f. b. k. Virginien.
gigantea Don, gröfser, 4. w. Bombay.
goodyeroides Don, goodyeraähnlicher, 4. w. Bombay.
gracilis Hook., schlanker, 4. Kn. w. Ostindien.
Herbiola RB., kleiner, 4. Kn. f. b. Nordamerika.
hyperborea RB., nördlicher, 4. Kn. f. Island, Grönland.
incisa Spgl., eingeschnittener, 4. Kn. f. b. Nordamerika.
lacera RB., zerrissener, 4. Kn. f. b. Carolina.
leptoceras Hook., schlankhorniger, 4. Kn. w. ?
macroceras W., grofshorniger, 4. Kn. w. Jamaica.
marginata Hook., berandeter, 4. Kn. w. Ostindien.
ochroleuca RB., weifsgelber, 4. Kn. w. Neuholland.
orbiculata Hook., kreisförmiger, 4. Kn. f. b. Nordamer.
procera Lindl., hoher, 4. w. Sierra Leone.
psychodes Spgl., goldfarbiger, 4. Kn. f. b. Nordamer.
spectabilis Spgl., ansehnlicher, 4. Kn. f. b. Nordamer.
Susannae RB., asiatischer, 4. Kn. w. Amboina, Südchina.
tridentata Hook., dreizahniger, 4. Kn. f. b. Nordamer.
virescens Spgl., grünlicher, 4. Kn. f. b. Pennsylvanien.
albida RB. (et *viridis* RB.) v. *Gymnadenia albida*
 etc. *bifolia* RB. vid. *Platanthera bifolia*. *cordata*
 Hook. v. *Herminium cordatum*.

Hablizia MB. (K. L. Hablizl, welcher Nordpersien und Taurien bereiste), V. 1., Aizoideae-Phytolacceae.
tamnoides MB., schneerwurzähnliche, 4. Sch. f. Caucasus.

Habranthus Herb., Jugendblume, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

Andersoni Herb., Anderson's, 4. Zw. t. Montevideo, Texas.
 β) *texanus* Herb.

angustus Herb., schmale, 4. Zw. w. t. Brasilien.
Bagnoldi Herb., Bagnold's, 4. Zw. k. t. Chili.
bifidus Herb., zweispaltige, 4. Zw. t. Buenos Ayres.
gracilifolius Herb., schlankblättriger, 4. Zw. k. t. Südamerika.

β) *Boothianus* Herb.

lorifolius Bot. Mag., riemenblättriger, 4. Zw. t. Südamer.
miniatus D. Don, mennigrothe, 4. Zw. k. t. Chili.
pallidus Bot. Cab., bleiche, 4. Zw. k. t. Valparaiso.
phycelloides Herb., phycellähnliche, 4. Zw. k. t. Chili.
pumilus Herb., niedrige, 4. Zw. k. t. Chili.
robustus Herb., kräftige, 4. Zw. t. Buenos Ayres.
roseus Swt., rosafarbige, 4. Zw. k. t. Chili.
spathaceus Herb., scheidige, 4. Zw. t. k. Buenos Ayres.
versicolor Herb., buntfarbige, 4. Zw. t. Südamerika.

Haemadictyon Lindl., Blutling, V. 1., Contortae-Apocynae.

venosum Lidln., aderiger, 4. Sch. w. Ostindien.

Haemanthus L., Blutblume, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

Haemanthus

- amarylloides Jacq., amaryllisähnliche, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- carinatus Mill., nachenförmige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- carneus Ker, fleischfarbige, 4. Zw. t. w. Cap d. g. H.
- coarctatus Jacq., gedrängte, 4. Zw. t. w. Cap d. g. H.
- coccineus L., scharlachfarbige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- crassipes Jacq., dickstielige, 4. Zw. t. w. Cap d. g. H.
- humilis Jacq., niedrige, 4. Zw. t. w. Cap d. gut. H.
- hyalocarpus Jacq., klarfrüchtige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- lanceaefolius Jacq., lanzettblättrige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- maculatus Jacq., gefleckte, 4. Zw. t. w. Cap d. g. H.
- moschatus Jacq., moschusduftende, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- multiflorus L., vielblumige, 4. Zw. w. Sierra Leone.
- orbicularis Fisch, kreisförmige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- pubescens L. (*albiflos* Jcq.), weichhaarige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- Pumilio Jacq., kleine, 4. Zw. t. w. Cap der gut. H.
- puniceus Jacq., hochrothe, 4. Zw. t. w. Guinea, Cap der guten Hoffnung.
- quadrivalvis Jacq. (*pubescens* Thbg.), vierklappige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- rotundifolius Sims, rundblättrige, 4. Zw. t. w. Cap der guten Hoffnung.
- sanguineus L., ächte, 4. Zw. t. w. Cap der gut. H.
- tigrinus Jacq., getigerte, 4. Zw. t. w. Cap d. g. H.
- ciliaris* L., *falcatus* Thbg., *toxicarius* Ait. v. *Brunsvigia ciliaris* etc.

Haematoxylon L., Blutholz, X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

campechianum L., Kampeche-B., 5. w. Südamerika.

Haemodorum Sm., Blutnarzisse, III. 1., Narcisseae-Haemodoraceae.

planifolium RB., flachblättrige, 4. t. Neusüdwallis.

teretifolium RB., rundblättrige, 4. t. Neuholland.

Hakea Schrad. (Baron Hake, ein Deutscher, Gönner der Pflanzenkunde), IV. 1., Proteaceae.

acanthophylla Lk., stechende, 5. t. Neuholland.

acicularis RB. (*sericea* Schrad.), nadelblättrige, 5. t. Neusüdwallis.

amplexicaulis RB., stengelumfassende, 5. t. Neuholland.

angustifolia Mack. C., schmalblättrige, 5. t. Neuholl.

arborescens RB., baumartige, 5. t. Neuholland.

attenuata RB., verschmälerte, 5. t. Südl. Neuholland.

Baxteri RB., Baxter's, 5. t. Neuholland.

carduifolia Lodd., distelblättrige, 5. t. Neuholland.

ceratophylla BB., hornblättrige, 5. t. Neuholland.

cinerea RB. (*canescens* Lk.), aschfarbige, 5. t. Neuholl.

clavata La Bill., keulförmige, 5. t. Neuholland.

cristata RB., kammige, 5. t. Neuholland (Schwanenfl.).

cucullata Cunn., kappenförmige, 5. t. Neuholland.

cycloptera RB., rundflügelige, 5. t. Südliches Neuholl.

dactyloides Cav., genervte, 5. t. Neusüdwallis.

denticulata RB., gezähnelte, 5. t. Neuholland.

Hakea

- echinata* Mack. C., igelstachelige, ♀. t. Neuholland.
elliptica RB., elliptische, ♀. t. Neuholland.
Epiglottis La Bill., krummfrüchtige, ♀. t. Nördliches Neuholland.
ferruginea Cunn., rostfarbige, ♀. t. Neuholland.
flexilis RB., biegsame, ♀. t. Neuholland.
florida RB., blüthenreiche, ♀. t. Neuholland.
gibbosa Cav. (*pubescens* Schrad.), höckerige, ♀. t. Neusüdwallis.
ilicifolia RB., stechhülsenblättrige, ♀. t. Neuholland.
Lamberti Swt., Lambert's, ♀. t. Neusüdwallis.
lanigera Ten., wollige, ♀. t. Neuholland.
latifolia Lodd., breitblättrige, ♀. t. Neuholland.
laurina RB., lorbeerähnliche, ♀. t. Neuholland.
linearis RB., gleichbreitblättrige, ♀. t. Neuholland.
marginata RB., berandete, ♀. t. Südliches Neuholland.
microcarpa RB., kleinfrüchtige, ♀. t. Van-Diemens-Land.
myricaefolia Ait., gabelblättrige, ♀. t. Neuholland.
nitida RB., glänzende, ♀. t. Neuholland.
nodosa RB., knotige, ♀. t. Südliches Neuholland.
obliqua RB., schiefe, ♀. t. Südliches Neuholland.
oleaefolia RB., ölbaumblättrige, ♀. t. Neuholland.
pachyphylla Sieb., dickblättrige, ♀. t. Neuholland.
parilis Kn., gleichförmige, ♀. t. Van-Diemens-Land.
pectinata Coll., kammförmige, ♀. t. Neuholland.
petrophiloides Mack. C., petrophilaähnliche, ♀. t. Neuholland.
propinqua Cunn., verwandte, ♀. t. Neusüdwallis.
prostrata RB., gestreckte, ♀. t. Neuholland.
pugioniformis Cav. (*glabra* Schrad.), dolchblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.
rugosa RB., runzelige, ♀. t. Neuholland.
ruscifolia La Bill., mäusedornblättrige, ♀. t. Südliches Neuholland.
saligna RB., weidenähnliche, ♀. t. k. Neuholland.
suaveolens RB., feinriechende, ♀. t. Südliches Neuholl.
subulata Cunn., pfriemenförmige, ♀. t. Neusüdwallis.
sulcata RB., gefurchte, ♀. t. Neuholland.
trifurcata RB., dreigabelige, ♀. t. Südl. Neuholland.
tuberculata RB., kleinknötige, ♀. t. Neuholland.
ulicina Cunn., ulexähnliche, ♀. t. Neusüdwallis.
undulata RB., wellenförmige, ♀. t. Südl. Neuholland.
varia RB., verschiedenblättrige, ♀. t. Südl. Neuholl.
vittata RB., verschleierte, ♀. t. Südliches Neuholland.
 Unbestimmtere: *heterophylla*, *microsperma*, *notata*.
longifolia Dum. (*rubricaulis* Hortul.) vid. *Stenocarpus salignus*.
pyriformis Cav. vid. *Xylomelum pyriforme*.

Halesia L. (S. Hales, berühmter englischer Pflanzen-Physiolog), XI. 1. (XVI. VII.), Sapotaceae-Styraceae.
diptera L., zweiflügelige, ♀. f. Nordamerika.
parviflora Mchx., kleinblumige, ♀. f. Nordamerika.
tetraptera L., vierflügelige, ♀. f. Nordamerika.

Halimodendron Fisch., Meerstrauch, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

- argenteum* Fisch., silberfarbiger, ♀. f. Sibirien.
 β) *brachysema* DC.
subvirescens DC., G. Don, grünlicher, ♀. f. Sibirien.

Halimus Wallr., Meermelde, XXI. v., Aizoideae-Atripliceae.

pedunculatus Wallr., gestielte, ☉. f. Europa, Mittelasien.
portulacoides Wallr., portulakähnliche, ☿. f. Europa, Nordafrika, Sibirien.

Halleria L. (A. v. Haller, berühmter Naturforscher), XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

elliptica Thbg., elliptische, ☿. k. t. Cap der guten H.
lucida L., schimmernde, ☿. k. t. Cap der guten Hoffn.

Hallia Thbg. (Berger Martin Hall, Zögling des Linné), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

alata Thbg., geflügelte, ♂. k. t. Cap der gut. Hoffn.
Asarina Thbg., gundermanblättrige, ♂. k. t. Cap der guten Hoffnung.

cordata Thbg., herzblättrige, 4. k. t. Cap d. gut. H.

flaccida Thbg., schlaffe, ♂. k. t. Cap der gut. Hoffn.

imbricata Thbg., dachblättrige, ☿. k. t. Cap d. g. H.

monophylla Desv. v. *Heylandia hebecarpa*, *sororia* W. v. *Eleiotis sororia*.

Haloragis Forst., Meernüfschen, VIII. IV., Halorageae.

Cercodia Ait. (*Tetragonia* L'Her., *alata* Forst.), sägeblättriges, ☿. k. Neuzeeland.

prostrata Forst., gestrecktes, ☿. k. Neucaledonien.

Hamamelis L., Zaubernufs, IV. II., Laurineae-Hamelideae.

chinensis RB., chinesische, ☿. k. China.

virginica L., virginische, ☿. f. Nordamerika.

β) *parvifolia* Nutt. γ) *macrophylla* Pursh.

Hamelia Jacq. (Duhamel du Monceau, französischer Botaniker), V. I., Rubiaceae.

axillaris Sw., achselblumige, ☿. w. Westindien.

chrysantha Sw., goldblumige, ☿. w. Westindien.

odorata W. (*suaveolens* H. B. K.), wohlriechende, ☿. w. Südamerika,

patens Jacq. (*coccinea* Sw.), abstehende, ☿. w. Südamerika, Westindien.

sphaerocarpa R. et P., kugelfrüchtige, ☿. w. Peru.

ventricosa Sw. (*grandiflora* L'Her.), bauchige, ☿. w. Jamaica.

rostrata Bartl., schnabelfrüchtige, ☿. w. t. Mexico.

Hamiltonia Mühlbg., W. (F. Hamilton, englischer Botaniker), V. I. (XXIII. II.), Sandalaceae.

oleifera Mühlbg., W., ölfrüchtige, ☿. k. Nordamerika.

umbellata Spgl. v. *Comandra umbellata*.

Haplostephium austriacum D. Don, *grandiflorum* G. Don etc. v. *Crepis blattarioides* etc.

Haplophyllum Ad. Juss., Schmalraute, VIII. I. (X. I.), Tricoccae-Rutaceae.

Buxbaumii Juss. (Poir.), Buchsbaum's, 4. ☿. f. b. Taurien, Bessarabien, Kleinasien.

dahuricum Juss. (DC.), dahurische, 4. ☿. f. Nordasien.

linifolium Juss. (L.), linienblättrige, 4. ☿. k. Spanien, Nordafrika.

patavinum Juss. (L.), italienische, 4. ☿. f. b. k, Oberitalien.

pubescens Juss. (W.), weichhaarige, 4. ☿. k. Spanien.

suaveolens Juss. (DC.), starkriechende, 4. ☿. f. b. Taurien.

Haplophyllum

tuberculatum Juss., kleinhöckerige, 4. $\frac{1}{2}$. k. Aegypten.
 villosum Juss. (MB.), zottige, 4. $\frac{1}{2}$. f. b. Caucasus,
 Bessarabien.

Hardenbergia monophylla Benth. etc. vid. *Kennedyia monophylla*.

Hardwickia Roxb. (Hardwick, englischer General und Naturforscher in Ostindien), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

binata Roxb., zweizählige, $\frac{1}{2}$. w. Ostindien.

pinnata Roxb., gefiederte, $\frac{1}{2}$. w. Ostindien.

Haronga A. P. Th. (madagascarischer Name), XVIII. 11., Hypericineae.

madagascariensis Chois. (*paniculata* Lodd.), madagascarisches, $\frac{1}{2}$. w. Madagascar.

Harpalice alba D. Don etc. v. *Prenanthes alba* etc.

Harpalium Cass., *Harpalium*, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

rigidum Cass., starres, 4. f. Nordamerika.

Harrachia speciosa Jacq. fil. v. *Crossandra undulaefolia*.

Harrisonia Hook. (Harrison, englischer Botaniker), V. 11., Asclepiadeae.

loniceroides Hook., loniceraähnliche, $\frac{1}{2}$. w. Brasilien.

Hartmannia DC. (Hartmann, schwedischer Botaniker), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

ciliata DC., gefranzte, $\odot$. f. Neucalifornien.

corymbosa DC., traubendoldige, $\odot$. f. Neucalifornien.

Hartogia Thbg. (J. Hartog, holländischer Botaniker), IV. 1., Sapotaceae-Aquifoliaceae.

capensis Thbg., capische, $\frac{1}{2}$. t. Cap der gut. Hoffn.

betulina Berg. v. *Barosma betulina*. capensis L. v.

Agathosma hispida. ciliata Berg. (*imbricata* L.)

etc. v. *Agathosma imbricata*.

Hartwegia Lindl. (Th. Hartweg, englischer Gärtner und Botaniker), XX. 1., Orchideae.

purpurea Lindl., purpurfarbige, 4. w. Mexico.

Hasselquistia L. (F. Hasselquist, ein Schwede, welcher Aegypten, Syrien etc. bereiste), V. 11., Umbelliferae.

aegyptiaca L., aegyptische, $\odot$. f. Aegypten.

cordata L., herzförmige, $\odot$. f. ?

Hastingsia coccinea Sm. et scandens Roxb. v. *Holmskioldia sanguinea* etc.

Haworthia Duv. v. Aloe. **Huxtonia argophylla** Caley, *foliosa* Hort. Bonn. etc. v. *Aster-Eurybia*, argophylla, aculeata etc.

Haylockia Herb. (Mattheu Haylock, Gärtner des Herrn Herbert), VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

pusilla Herb., zwergige, 4. Zw. t. Buenos Ayres.

Hebenstreitia L. (J. E. Hebenstreit, Professor der Botanik zu Leipzig), XIV. 11., Globulariaceae.

albiflora Lk. (? *alba* Jacq.), weißblumige, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap der guten Hoffnung.

capitata Thbg., kopfige, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap der gut. Hoffn.

chamaedryfolia Lk., gamanderblättrige, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap der guten Hoffnung.

ciliata L., gefranzte, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap der guten Hoffnung.

cordata L., herzblättrige, $\frac{1}{2}$. t. k. Cap der gut. Hoffn.

dentata L., gezähnelte, $\odot$. f. m. Cap der gut. Hoffn.

Hebenstreitia

erinoides Thbg., erinusähnliche, ⚔. t. k. Cap d. g. H.
fruticosa Thbg., strauchige, ⚔. t. k. Cap der gut. H.
integrifolia L. (*aurea* Bot. Repos.), ganzblättrige, ⚔.
 k. t. Cap der guten Hoffnung.

scabra Thbg., scharfe, ⚔. k. t. Cap der gut. Hoffn.

Hedeoma P., Zwergmünze, II. 1. (XIV. 1.), Labiatae.

hispida Pursh, steifhaarige, ☉. f. Nordamerika.

pulegioides P., poleiähnliche, ☉. f. Nordamerika.

thymoides P., thymianähnliche, ☉. f. Südfrankreich.

Hedera T., Epheu, V. 1., Araliaceae.

Helix L., gemeiner, ⚔. Sch. f. Europa, Mittelasien,
 Japan.

b) *foliis argenteis*. c) *fol. aureis*. d) *hibernica*.

e) *arborescens* Lodd. (*poetica* C. Bauh.).

β) *canariensis* W. Teneriffa. γ) *digitata* Lodd.,
 Ostindien. δ) *chrysocarpa* DC. (*Dionysias* J.
 Bauh.). Nordindien.

pendula Sw., hängender, ⚔. w. Jamaica.

aculeata D. Don, *arborea* Sw. etc. vid. *Aralia acu-*

leata etc. *quinquefolia* L. v. *Ampelopsis hederacea*.

Hedwigia Sw. (J. Hedwig, berühmter Kryptogamolog),
 VIII. 1., Amyrideae.

balsamifera Sw., balsamgebende, ⚔. w. Westindien.

Hedychium Koen., Kranzblume, II. 1., Scitamineae-
 Amomeae.

acuminatum Rosc., zugespitzte, 4. w. Ostindien.

angustifolium Roxb. (*coccineum* Wall.), schmalblättrige,
 4. w. Ostindien.

aurantiacum Rosc. (*angustifolium* Bot. mag.), orange-
 farbige, 4. w. Ostindien, Nepal.

carneum Carey, fleischfarbige, 4. w. Ostindien.

coccineum Sm. (*angustifolium* Bog. reg.), scharlachfarbige,
 4. w. Ostindien, Nepal.

coronarium Koenig, gekrönte, 4. w. Ostindien.

elatum RB., hohe, 4. w. Nepal, Ostindien.

ellipticum Sm., elliptische, 4. w. Nepal.

flavescens Carey, gelbliche, 4. w. Ostindien.

flavum Roxb., Wall., hellgelbe, 4. w. Nepal, Ostindien.

Gardnerianum Wall., Gardner's, 4. w. Nepal.

glaucum Rosc., blaugrüne, 4. w. Ostindien.

gracile Roxb., schlanke, 4. w. Ostindien.

heteromallum Ker, verschiedenwendige, 4. w. Ostindien.

longifolium Rosc., langblättrige, 4. w. Ostindien.

maximum Rosc., größte, 4. w. Ostindien.

speciosum Wall., prächtige, 4. w. Ostindien.

spicatum Sm., ährige, 4. w. Nepal.

stenopetalum Wall., schmalkronige, 4. w. Ostindien.

thyrsiforme Sm., straufsblumige, 4. w. Ostindien, Nepal.

trilobum Wall., dreilappige, 4. w. Nepal.

urophyllum Wall., schlankblättrige, 4. w. Ostindien.

villosum Wall., zottige, 4. w. Ostindien.

Hedyotis L., Ohrling, IV. 1., Rubiaceae.

biflora RB., zweiblumiger, ☉. w. m. Ostindien.

mysorensis Heyne, mysorischer, ☉. w. m. Ostindien.

campanuliflora Hook. v. *Lipostoma campanuliflora*.

ciliolata Torr. v. *Anotis ciliolata*. Hinsichtlich der
 übrigen s. *Oldenlandia*.

Hedypnois T., Röhrléinkraut, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

arenaria DC., Sand-R., ☉. f. Mauritanien.

coronopifolia Tenor., krähenfußblätteriges, ☉. f. Südital.

cretica W., kretisches, ☉. f. Süd- und Osteuropa, Persien.

β) *tubaeformis* Tenor. γ) *persica* Fisch.

pendula Balb., hängendes, ☉. f. Südeuropa.

β) *pinnatifida*.

rhagadioloides L. (*polymorpha* DC.), veränderliches, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

α) *monspeliensis* L. β) *mauritanica* W. γ) *furfuracea* Rchb. δ) *crepidiformis* Rchb. ε) *caspica* Hornem. ζ) *sonchea* H. Dresd. η) *laciniiflora* Viv.

autumnalis Huds. v. *Leontodon autumn.* *hirta* Sm. vid. *Thrinicia hirta*. *Taraxaci* Vill. vid. *Apargia Taraxaci*.

Hedysarum T., Hahnenkopf, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

alpinum L., Alpen-H., 4. f. Sibirien.

altaicum Fisch., altaischer, 4. f. Altai.

argenteum L., suppl., silberfarbiger, 4. f. Caucasus.

boreale Nutt., nördlicher, 4. f. Nordamerika.

brachysemum DC. (*obscurum altaicum* Fisch.), kurz-fahniger, 4. f. Nordamerika.

candidum MB. (*argenteum* W.), blendendweißser, 4. f. Taurien.

β) *humile* Habl.

carnosum Dsf., fleischiger, 4. f. Numidien.

caucasicum MB., caucasischer, 4. f. Caucasus.

consanguineum DC., verwandter, 4. f. Sibirien.

coronarium L., gekrönter, ♂. f. Italien.

b) *albiflorum*.

cretaceum Fisch., kreidiger, 4. f. Sibirien.

elongatum Fisch., verlängerter, 4. f. Sibirien.

flexuosum L., biegsamer, ☉. f. Kleinasien, Cyprus.

fruticosum Pall., strauchiger, ♂. f. Sibirien.

grandiflorum Pall. (*sericeum* MB.), großblumiger, 4. f. Caucasus.

humile L., niedriger, 4. f. Südfrankreich.

ibericum MB., iberischer, 4. f. Caucasus, Georgien.

lasiocarpum Ledeb. (*Ledebourei* Spgl.), wollfrüchtiger, 4. f. Sibirien.

obscurum L. (*alpinum* Jacq.), dunkler, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

pallidum Dsf., bleicher, ♂. f. b. Nordafrika.

Razumovianum Fisch., Razumovski's, 4. f. Sibirien.

roseum Sims, rosafarbiger, 4. f. Caucasus.

rytidocarpum DC., netzhülsiger, 4. f. Sibirien.

setigerum Turcz., borstiger, 4. f. Dahurien.

sibiricum Poir., sibirischer, 4. f. Sibirien.

spinosissimum L., stacheliger, ☉. f. Italien, Spanien.

splendens Fisch., schimmernder, 4. f. Sibirien.

tauricum Pall., taurischer, 4. f. Taurien.

varium W., bunter, 4. f. Armenien.

venustum Fisch., lieblicher, 4. f. Sibirien.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen: *Adesmia*, *Alhagi*, *Alysicarpus*, *Desmodium*, *Dicerma*, *Eleiotis*,

Hedysarum

Flemingia, Galactia, Lespedezia, Lourea, Nicolsonia, Onobrychis, Ormocarpum, Ototropis, Pueraria, Stylosanthes, Taverniera, Uraria et Zornia.

Heimia Lk. et Otto (Dr. Heim, berühmter Arzt zu Berlin), XI. 1., Lythriariae.

salicifolia Lk. et Otto, weidenblättrige, ♀. k. Mexico.

Heisteria L. (L. Heister, Professor der Medicin und Botanik zu Helmstädt), X. 1., Sapotaceae-Olacineae.

coccinea L., scharlachfarbige, ♀. w. Westindien.

Helenium L., Helenie, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

autumnale L., herbstliche, 4. f. Nordamerika.

β) pubescens Ait.

canaliculatum Lam., rinnenförmige, 4. f. Nordamerika.

mexicanum Humb., mexicanische, 4. f. Mexico.

puberulum DC., feinhaarige, ☉. f. Californien.

pumilum W., kleine, 4. f. Nordamerika.

quadridentatum LaBill., vierzählige, ☉. f. Louisiana.

quadripartitum Lk., viertheilige, ♂. k. ?

varium Schrad., unbeständige, ☉. f. Mexico.

Heleochoa Host. vid. Crypsis.

Heleocharis Lestib. (*Eleocharis* RB. et *Eleogonus* N. E. et *Scirpidium* N. E.), Teichriet, Sumpfbinsen, III. 1., Cyperaceae.

acicularis RB., nadelförmiges, ☉. f. Europa, Nordamer.

acuta RB., spitziges, 4. k. t. Neuholland.

geniculata RB., geknietes, 4. k. t. Westindien.

glaucescens R. et S., blaugrünes, 4. f. Nordamerika.

multicaulis (Sm.), vielhalmiges, 4. f. England, Norddeutschland, Dänemark.

obtusata R. et S., stumpfes, 4. f. Nordamerika.

ovata RB., eiförmiges, ☉. f. Deutschland, Nordamerika.

palustris RB., gemeines, 4. f. Europa, Nordamerika.

tenuis R. et S., feines, 4. f. Nordamerika.

uniglumis Lk., einspelziges, 4. f. Europa.

vivipara Lk., lebendiggebärendes, 4. w. ? Cap d. g. H.

Helianthemum T., Sonnenröschen, XIII. 1., Cistineae.

acuminatum P., zugespitztes, ♀. f. k. Oberitalien.

aegyptiacum Mill., aegyptisches, ☉. f. Aegypten.

algarviense Dun., algarbisches, ♀. k. Portugal.

alyssoideus Vent., steinkrautähnliches, ♀. f. b. k. Westfrankreich, Spanien.

Andersonii Swt., Anderson's, ♀. f. Südeuropa.

angustifolium P., schmalblättriges, ♀. f. ?

apenninum P., apenninisches, ♀. f. Italien.

arabicum P. (*viscidulum* Stev., *Savi* Bertol.), arabisches, ♀. f. Arabien, Taurien, Italien, Spanien.

asperum Lagasc., Dun., rauhes, ♀. f. Spanien.

atriplicifolium W., meldenblättriges, ♀. k. Spanien.

aureum P., goldfarbiges, ♀. k. f. b. Spanien, Südfrankreich.

barbatum P., bärtiges, ♀. k. f. b. Südfrankreich, Portugal.

Barrelieri Ten., Barrelier's, ♀. k. f. b. Neapel, Sicilien.

brasiliense P., brasilianisches, 4. ♀. t. Brasilien.

cahiricum Delil., cahirisches, ♀. k. Aegypten.

calycinum W., gekelchtes, ♀. k. f. b. Südeuropa.

Helianthemum

- canadense Mchx., canadisches, 4. $\frac{1}{2}$. f. Nordamerika.
 canariense W., canarisches, $\frac{1}{2}$. k. Canarische Inseln.
 candidum Swt., reinweißes, $\frac{1}{2}$. k. f. b. Spanien.
 canescens Swt. (*roseum* Jacq.), grauliches, $\frac{1}{2}$. f. Südeuropa.
 canum Dun., weißgraues, $\frac{1}{2}$. k. f. b. Mittel- und Südeuropa.
 carolinianum Mchx., carolinisches, 4. $\frac{1}{2}$. f. Carolina.
 cheiranthoides P., lackähnliches, $\frac{1}{2}$. k. Portugal.
 ciliatum P., gefranztes, $\frac{1}{2}$. f. b. Nordafrika, Spanien, Italien.
 cinereum P., aschgraues, $\frac{1}{2}$. k. Spanien.
 confertum Dun., gedrängtes, $\frac{1}{2}$. k. Teneriffa.
 confusum Swt., verwechseltes, $\frac{1}{2}$. f. Südeuropa.
 crassifolium P., dickblättriges, $\frac{1}{2}$. k. Nordafrika, Spanien.
 croceum P., safranfarbiges, $\frac{1}{2}$. k. f. b. Spanien, Nordafrika.
 denticulatum Thib., P. (*salicifolium* Gouan), gezähneltes, $\odot$. f. Südfrankreich.
 dichotomum Dun., zweizinkiges, $\frac{1}{2}$. k. Spanien.
 diversifolium Swt., verschiedenblättriges, $\frac{1}{2}$. f. Südeuropa.
 ellipticum P., elliptisches, $\frac{1}{2}$. k. Atlas.
 elongatum P., verlängertes, $\frac{1}{2}$. k. Spanien.
 ericoides Dun., heideähnliches, $\frac{1}{2}$. k. Spanien, Neapel.
 eriocaulon Dun., wollstengeliges, $\odot$. f. Spanien.
 eriosepalum Swt., wollkelchiges, $\frac{1}{2}$. f. Südeuropa.
 foetidum P., stinkendes, $\frac{1}{2}$. f. ?
 formosum Dun., schönes, $\frac{1}{2}$. k. Portugal.
 Fumana Mill., feinblättriges, $\frac{1}{2}$. f. Mittel- und Südeuropa.
 glaucum P., blaugrünes, $\frac{1}{2}$. f. b. Spanien, Italien.
 globulariaefolium P., kugelblumenblättriges, 4, $\frac{1}{2}$. k. Spanien, Portugal.
 glomeratum Lagas., knaulförmiges, $\frac{1}{2}$. k. t. Neuspanien.
 glutinosum P., klebriges, $\frac{1}{2}$. k. Spanien.
 grandiflorum DC., großblumiges, $\frac{1}{2}$. f. Südeuropa.
 guttatum Mill., getüpfeltes, $\odot$. f. Mitteleuropa.
 halimifolium W., meermeldenblättriges, $\frac{1}{2}$. k. Spanien, Portugal.
 hirtum P., rauhkelchiges, $\frac{1}{2}$. k. Spanien, Südfrankreich.
 hispidum Dun., steifhaariges, $\frac{1}{2}$. f. b. k. Portugal.
 hyssopifolium Ten., ysopblättriges, $\frac{1}{2}$. Italien.
 b) cupreum Swt. c) multiplex Swt. d) crocatum Swt.
 inconspicuum P., Thib., unansehnliches, $\odot$. f. Spanien.
 intermedium P., Thib., mittleres, $\odot$. f. Spanien.
 involucratum P., eingehülltes, $\frac{1}{2}$. k. Spanien, Portugal.
 italicum P., italienisches, $\frac{1}{2}$. f. b. k. Italien.
 juniperinum Lagasc., wachholderähnliches, $\frac{1}{2}$. k. Spanien.
 laeve P., kahles, $\frac{1}{2}$. k. Spanien.
 laevipes P., glattstieliges, $\frac{1}{2}$. k. f. b. Südeuropa.
 Lagascae Dun., Lagasca's, $\frac{1}{2}$. k. Spanien.
 lanceolatum Swt., lanzettblättriges, $\frac{1}{2}$. f. Hybride.
 lasianthum P., wollblumiges, $\frac{1}{2}$. k. Portugal.
 lavandulaefolium P., lavendelblättriges, $\frac{1}{2}$. f. b. Süd- und Westeuropa.

Helianthemum

ledifolium Mill., porstblättriges, ☉. f. Südfrankreich, Portugal.

leptophyllum Dun., schlankblättriges, ☿. f. b. Spanien.

Libanotis W., rosmarinblättriges, ☿. k. Spanien, Portugal, Nordafrika.

lignosum Swt., verholzendes, ☿. f. ?

lineare P., gleichbreitblättriges, ☿. k. Spanien, Südfrankreich.

Lippii P., Lippii's, ☿. k. Aegypten.

lucidum Hornem., glänzendes, ☿. f. ?

lunulatum DC., mondfleckiges, ☿. f. Oberitalienische und französische Alpen.

macranthum Swt., schönblumiges, ☿. f. (Hybride).

b) *multiplex*.

majoranaefolium DC., majoranblättriges, ☿. f. b. Südfrankreich.

marifolium P., gamanderblättriges, ☿. f. England, Südeuropa, Taurien, Caucasus.

microphyllum Swt., kleinblättriges, ☿. f. (?Hybride).

Milleri Swt., Miller's, ☿. f. Südeuropa (?Hybride).

molle P., weiches, ☿. k. Spanien.

mucronatum Dun., weichspitziges, ☿. k. Teneriffa.

mutabile P., veränderliches, ☿. f. b. k. Spanien.

b) *roseum* Swt.

niloticum P., Nil-S., ☉. f. Südeuropa, Aegypten.

β) *majus* DC. γ) *procumbens* DC.

nudicaule Lag., Dun., nacktstengeliges, ☿. f. b. Spanien.

nummularium Mill., pfennigkrautblättriges, ☿. f. b. Südfrankreich, Italien.

obovatum Dun., verkehrteiförmiges, ☿. k. Spanien.

obtusifolium Dun., stumpfblättriges, ☿. k. Cypern.

ocymoides P. (*sampsucifol.* Clus.), basilicumähnliches, ☿. k. Spanien, Portugal.

oelandicum Wahlenb., oelandisches, ☿. f. Oeland.

organifolium P., dostenblättriges, ☿. k. Spanien.

ovatum Dun., eiförmiges, ☿. f. b. Italien.

paniculatum Dun., rispiges, ☿. k. Spanien.

papyraceum Swt., papierähnliches, ☿. f. Südeuropa (?Hybride).

penicillatum Dun., pinselförmiges, ☿. f. b. Spanien.

pilosum P., haariges, ☿. f. Südfrankreich.

plantagineum P., wegrittblättriges, 4. f. b. k. Creta, Corsica, Spanien, Nordafrika.

polifolium P., poleiblättriges, ☿. f. England, Frankreich, Spanien.

polygalaefolium Swt., polygalablättriges, ☿. t. Brasilien.

procumbens Dun., niederliegendes, ☿. f. b. k. Südeuropa.

pulchellum Swt. (*alpestre* Spgl.), hübsches, ☿. f. Südeuropa (?Hybride).

pulverulentum DC., bestaubtes, ☿. f. Frankreich.

punctatum W., punktirtes, ☉. f. Westfrankreich.

racemosum P., traubiges, ☿. k. Spanien, Nordafrika, Teneriffa.

ramuliflorum Mchx., astblumiges, 4. f. Carolina.

rhodanthum Dun., rothblumiges, ☿. f. Spanien.

roseum DC., rosafarbiges, ☿. f. Spanien.

b) *multiplex*.

rotundifolium Dun., rundblättriges, ☿. k. Spanien.

Helianthemum

rugosum Dun., runzeliges, ☿. k. Westfrankreich, Portugal.

salicifolium P., weidenblättriges, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

sampsucifolium Mill., diptamblättriges, ☿. f. Frankreich.

sanguineum Lagasc. (*retrofractum* P.), blutfarbiges, ☉. f. Spanien.

scabrosum P., schärfliges, ☿. k. Portugal.

serpyllifolium Mill., quendelblättriges, ☿. f. Mittel- und Südeuropa.

serratum P., sägekroniges, ☉. f. Spanien.

squamatum P., schuppiges, ☿. k. Spanien.

stoechadifolium P., stoechasblättriges, ☿. k. f. b. Spanien, Portugal.

stramineum Swt., strohfarbiges, ☿. f. (Hybride).

b) *multiplex*.

strictum P., steifes, ☿. k. Spanien.

sulfureum W., schwefelgelbes, ☿. k. Spanien.

surrejanum Mill., schmalblumiges, ☿. f. England.

tauricum Fisch., taurisches, ☿. f. Taurien.

thymifolium P., thymianblättriges, ☿. k. f. b. Spanien.

tomentosum Dun., filziges, ☿. f. Schottland.

Tuberaria Mill., stumpfes, 4. f. Südeuropa.

umbellatum Mill., doldiges, ☿. k. Süd- u. Westeuropa.

β) *erectum* DC. γ) *subdecumbens* DC.

variegatum Swt., buntes, ☿. f. Südeuropa (?Hybride).

venustum Swt., liebliches, ☿. f. Südeuropa (?Hybride).

versicolor Swt., verschiedenfarbiges, ☿. f. Südeuropa (?Hybride).

b) *flore pleno*.

villosum P., zottiges, ☉. f. Spanien.

vineale P., Weinbergs-S., ☿. f. Mitteldeutschland.

violaceum P., violettes, ☿. k. Spanien.

virgatum P., ruthenförmiges, ☿. k. Nordafrika.

viride Tenor., grünliches, ☿. k. Sicilien.

vulgare G., gemeines, ☿. f. Europa.

b) *flore pleno*. c) *fl. pleno major*. d) *sanguineum* (?*puniceum* Hort.). e) *fol. varieg.*

Helianthus L., Sonnenrose, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

altissimus L., höchste, 4. f. Nordamerika.

angustifolius L., schmalblättrige, 4. f. Nordamerika.

annuus L., jährige, ☉. f. Peru, Mexico.

b) *flore pleno*. β) *indicus* L. (*nanus* Hort.), Aegypten.

atrorubens L. (*asper* Hortul., *missuricus* Spgl., *diffusus* Sims), schwarzrothscheibige, 4. f. Nordamerika.

cornifolius H. B. K., hartriegelblättrige, 4. f. Mexico.

decapetalus L., zehnblättrige, 4. t. Nordamerika.

divaricatus L., sparrige, 4. f. Nordamerika.

doronicoides Lam. (*pubescens* Vahl non W., *mollis* W. non Lam.), genschwurzähnliche, 4. f. Nordamerika.

giganteus L. (*altissimus* Jacq.), riesenhafte, 4. f. Nordamerika.

Hookeri G. Don (*pubescens* Hook.), Hooker's, 4. f. ?

laetiflorus P. (*atrorubens* Lam., ?*luxurians* Hort.), schönblühende, 4. f. Nordamerika.

lenticularis Dougl. (?*grandiflorus* H. Marb.), linsenförmige, ☉. f. Nordamerika.

Helianthus

- linearis Cav., gleichbreitblättrige, 4. f. b. Mexico.
 longifolius Pursh, langblättrige, 4. f. Nordamerika
 (Georgien).
 macrocarpus DC. (*hybridus* et *longicarpus* Hort., ? *Colossus* Hort.), großfrüchtige, ☉. f. ?
 macrophyllus W., großblättrige, 4. f. Nordamerika.
 Maximiliani Schrad., Maximilian's, 4. f. Nordamerika.
 mollis Lam. (*pubescens* W., *tomentosus* Mchx.), weich-
 blättrige, 4. f. Nordamerika.
 multiflorus L., vielblumige, 4. f. Virginien.
 b) flore pleno.
 orgyalis DC., kletterhohe, ☉. f. ?
 ovatus Lehm., eiförmige, ☉. f. Mexico.
 parviflorus Bernh., kleinblumige, 4. f. Nordamerika.
 patens Lehm., absteigende, ☉. f. Südamerika.
 pauciflorus Nutt., wenigblumige, 4. f. Louisiana.
 petiolaris Nutt. (? *asper* Roth), gestielte, ☉. f. m. Nord-
 amerika (Arkansa).
 procumbens P. (*prostratus* Dsf.), niederliegende, 4. f.
 b. Peru.
 prostratus W., gestreckte, 4. f. Nordamerika.
 strumosus L., kropfige, 4. f. Nordamerika.
 trachelifolius W., halskrautblättrige, 4. f. Nordamerika.
 trilobatus Lk., dreilappige, 4. f. b. k. Mexico.
 tuberosus L., knollige, 4. Kn. f. Brasilien.
 villosus Nutt., zottige, 4. f. Nordamerika.

dentatus Cav. vid. *Viguiera dentata*, *excelsus* W.
 (*giganteus* Cav., *trinervis* Hort.) v. *Tithonia excelsa*.
laevis L. v. *Heliopsis laevis*. *rigidus* Dsf. vid. *Har-*
palium rigidum. *speciosus* Hook. v. *Leighia spe-*
ciosa. *tubaeformis* Ortega. Jacq. vid. *Tithonia tu-*
baeformis.

Helichrysum Vaill., Strohlume, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

- acuminatum Swt. (Lk.), zugespitzte, ♀. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 affine D. Don, ähnelnde, ♀. t. Cap der gut. Hoffnung.
 angustifolium DC. (*italicum* G. Don), schmalblättrige,
 ♀. f. b. k. Süd- und Westeuropa.
 apiculatum D. Don, kurzspitzige, 4. t. Van-Diemens-L.
 arboreum D. Don (L.), strauchige, ♀. t. Cap d. g. H.
 arenarium DC., Sand-St., 4. f. Europa, Mittelasien.
 β) aurantiacum (*ignescens* Hortul.).
 argenteum W., silberfarbige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
 bicolor Lindl., zweifarbig, ☉. f. m. Van-Diemens-Land.
 bracteatum W. (Vent.), deckblättrige, ☉. f. m. Neu-
 holland.

b) album.

- candidissimum D. Don (M. B.), reinweiß, 4. f. Caucasus.
 cephalotes D. Don, großköpfige, ♀. t. Cap d. gut. H.
 congestum D. Don, gedrängte, ♀. t. Cap der gut. H.
 conicum Swt. (W.), kegelförmige, ♀. t. ? Südeuropa.
 crassifolium D. Don (L.), dickblättrige, ♀. t. Cap
 der guten Hoffnung.
 crispum D. Don (L.), krause, 4. t. Cap d. gut. Hoffn.
 cylindricum D. Don, cylinderförmige, 4. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 cymosum D. Don (L.), afterdoldige, 4. t. Cap d. g. H.

Helichrysum

- dasyanthum Swt. (W.), haarblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- dealbatum Swt., weifliche, 4. t. Van-Diemens-Land.
- diosmaefolium Swt. (Vent.), göttergeruchblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- discolorum D. Don (L.), verschiedenfarbige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- divaricatum D. Don (L.), sparrige, ♀. t. Cap d. g. H.
- ericaefolium DC. (L.), heideblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- ericoides P. (Lam.), heideähnliche, ♀. t. Cap d. g. H.
- flaccidum G. Don (Weinm.), schlaffe, 4. t. Brasilien.
- foetidum Cass., stinkende, ♂. k. Cap der gut. Hoffn.
- fruticans D. Don (L.), strauchige, ♀. t. Cap d. g. H.
- fulgidum W., glänzende, ♀. t. Cap der gut. Hoffnung.
- grandiflorum D. Don (L.), großblumige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- graveolens Swt. (MB.), starkkriechende, 4. t. Taurien, Caucasus.
- helianthemifolium D. Don (L.), sonnenröschenblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- herbaceum Swt. (*splendens* B. Mag.), krautartige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- ignescens D. Don, feuerfarbige, 4. k. Cap d. g. H.
- lasiocaulon Swt. (Lk.), wollstengelige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- maritimum D. Don (L.), Meerstrands-St., ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- microphyllum D. Don, kleinblättrige, ♀. k. Creta.
- milleflorum (Thbg.), vielblumige, ♀. t. Cap d. g. H.
- odoratissimum Swt. (L.), wohlriechende, 4. t. Cap der guten Hoffnung.
- orientale T. (L.), morgenländische, ♀. k. Creta.
- paniculatum Swt., rispige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
- patulum D. Don (L.), ausgebreitete, ♀. t. Cap d. g. H.
- rigidum D. Don, starre, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
- rutilans D. Don (L.), goldgelbe, 4. ♀. k. Cap d. g. H.
- scorpioides La Bill. (*macranthum* Benth.), vergiftsmeinnichtblättrige, ♂. m. Neuholland (Schwanenfluß).
- spirale W., spiralförmige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
- Stäbelina W., stäbelinaähnliche, ♀. t. Cap d. gut. H.
- Stoechas DC., dickblättrige, ♀. k. Südeuropa, Nordafrika.
- tephrodes Swt. (Lk.), grauliche, ♀. t. Cap d. gut. H.
- teretifolium D. Don (L.), rundblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
- vestitum W., bekleidete, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
- β) lingulatum D. Don.
- canescens* W. etc. vid. *Helipterum canescens* etc.
- proliferum* W. v. *Phoenocoma prolifera*.

Heliconia L., Heliconie, V. 1., Scitamineae.

- Ballia Rich., Ballia-H., 4. w. Südamerika.
- bicolor Maund., zweifarbige, 4. w. Brasilien.
- Bihai Sw. (*luteo fusca* Jacq.), Bihai-H., 4. w. Westindien, Südamerika.
- brasiliensis Hook., brasilianische, 4. w. Brasilien.
- caribaea Lam., caribäische, 4. w. Caribäen.
- dealbata Lodd., weifliche, 4. w. Südamerika.

Heliconia

- hirsuta* L., suppl., rauhhhaarige, 4. w. Südamerika.
humilis Jacq., niedrige, 4. w. Guiana, Caracas.
indica Lam. (*buccinata* Roxb.), ostindische, 4. w. Molucken.
Psittacorum L., Papageien-H., 4. w. Südamerika.
pulverulenta Lindl., bestäubte, 4. w. Südamerika.
Swartziana R. et S. (*psittacorum* β . Bot. mag.), Swartz's, 4. w. Jamaica.

Helicta Cass., Helicte, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- sarmentosa* Cass., wurzelrankige, $\frac{1}{2}$. w. ?

Helicteres L., Schraubenbaum, XVI. VII., Malvaceae-Bombaceae.

- baruensis* L., westindischer, $\frac{1}{2}$. w. Westindien.
carthagenensis Jacq., carthagenischer, $\frac{1}{2}$. w. Neugranada.
elongata H. C., verlängerter, $\frac{1}{2}$. w. Ostindien.
ferruginea Lk., rostfarbiger, $\frac{1}{2}$. w. Brasilien.
guazumaefolia H. B. K., guazumablätteriger, $\frac{1}{2}$. w. Südamerika.
jamaicensis L., Jamaica-S., $\frac{1}{2}$. w. Jamaica.
Isora L., haselnufsblätteriger, $\frac{1}{2}$. w. Ostindien, Molucken.
lanceolata DC., lanzettlicher, $\frac{1}{2}$. w. Ostindien.
spicata Coleb., ährenförmiger, $\frac{1}{2}$. w. Ostindien.
verbascifolia L'Her., Link, wollkrautblätteriger, $\frac{1}{2}$. w. Brasilien.

apetala Jacq. v. *Sterculia Helicteres*.

Helio carpus L., Sonnenfrucht, XI. I., Tiliaceae.

- americanus* L., amerikanischer, $\frac{1}{2}$. w. Neuspanien.

Heliophila L., Sonnenfreund, XV. III., Cruciferae.

- abrotanifolia* DC., stabwurzblätteriger, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffnung.
amplexicaulis L., stengelumfassender, $\odot$. f. Cap der guten Hoffnung.
arabioides Sims (*pilosa* β . *incisa* DC.), arabisähnlicher, $\odot$. f. Cap der guten Hoffnung.
cleomoides DC., cleomenähnlicher, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. g. H.
coronopifolia L., krähenufsblätteriger, $\odot$. f. Cap der guten Hoffnung.
crithmifolia W., meerfenchelblätteriger, $\odot$. f. Cap der guten Hoffnung.
diffusa DC., weitschweifiger, $\odot$. f. Cap der gut. Hoffn.
digitata L., fingerförmiger, $\odot$. f. Cap der guten Hoffn.
dissecta Thbg., schlitzblätteriger, $\odot$. f. Cap d. g. H.
 β) *pinnata*.
filiformis L., fadenförmiger, $\odot$. f. Cap der gut. Hoffn.
foeniculacea RB., fenchelartiger, $\odot$. f. Cap d. gut. H.
incana Ait., weißgrauer, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffn.
lepidioides Lk., kressenähnlicher, $\odot$. f. Cap d. gut. H.
linearifolia Burch., gleichbreitblätteriger, $\frac{1}{2}$. t. Cap der guten Hoffnung.
pectinata Burch., kammförmiger, $\odot$. f. Cap d. gut. H.
Peltaria DC., schildkrautähnlicher, $\odot$. f. Cap d. gut. H.
pendula W., hängender, $\odot$. f. Cap der guten Hoffn.
pilosa Lam. (*integrifolia* L.), haariger, $\odot$. f. Cap der guten Hoffnung.
platysiliqua RB., breitschotiger, $\frac{1}{2}$. t. Cap d. gut. H.
pusilla L., zwergiger, $\odot$. f. Cap der guten Hoffnung.
scoparia Burch., besenförmiger, $\frac{1}{2}$. t. Cap der gut. H.

Heliophila

stricta Sims, steifer, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.
suavissima Burch., starkkriechender, ☿. t. Cap d. g. H.
trifida Thbg. (*pinnata* L. fil.), dreitheiliger, ☉. f. Cap
 der guten Hoffnung.

Heliopsis P., Sonnengesicht, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

buphthalmoides Dun., buphthalmumähnliches, 4. k. Peru.

canescens H. B. K. (*rugosa* H. Berol.), graues, 4. k. Peru.

dubia Dun., zweifelhaftes, ☉. f. Südamerika, Westindien.

laevis P., glattes, 4. f. Nordamerika.

scabra Dun. (*canescens* Don), scharfes, 4. f. Nordamer.

Heliotropium T., Sonnenwende, V. I., Asperifoliaceae.

anisophyllum Beauv., ungleichblättrige, ☉. w. m. Guinea.

brevifolium Wall., kurzblättrige, ☿. w. Nepal.

capense Sw., Lehm., capische, ☉. m. f. Cap d. g. H.
chenopodioides W., gänsefußähnliche, ☉. w. m. Südamerika.

commutatum R. et S., verwechselte, ☉. f. Südeuropa.

coromandelianum Retz, coromandelische, ♂. w. Ostind.

corymbosum R. et P. (*grandiflorum* Schrk.), traubendol-
 dige, ☿. t. Peru.

curassavicum L., curassavische, ♂. w. Westindien.

ellipticum Ledeb., elliptische, ☉. f. Caspisches Meer.

europaeum L., europäische, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

humile Lam., niedrige, ☿. w. Südamerika.

lasiocarpum Fisch. et Mey., wollfrüchtige, ☉. f. Cas-
 pisches Meer.

linifolium Lehm., leinblättrige, ☿. t. Cap der guten
 Hoffnung, Ostindien.

maroccanum Lehm., maroccanische, ☿. t. Marocco.

oblongifolium Lk., länglichblättrige, ☉. f. Südeuropa.

obovatum Roxb., verkehrteiförmige, ☉. f. m. Nepal.

parviflorum L., kleinblumige, ♂. w. Ostindien.

peruvianum L., peruvianische, ☿. t. Peru.

b) hybridum.

prostratum RB., gestreckte, ☉. m. f. Neuholland.

suaveolens MB., starkkriechende, ☉. f. Caucasus,
 Nordpersien.

supinum L., liegende, ☉. f. Südeuropa, Cap d. g. H.

undulatum Vahl (*crispum* Dsf.), wellenblättrige, ☿. f.
 Nordafrika.

zeylanicum Lam. (*fruticosum* Forsk.), zeylonische, ☿. w.
 Ceylon.

gnaphalodes L. v. *Tournefortia gnaphalodes*. *indi-*
cum L. v. *Tiaridium indicum*.

Helleborine longipetala Tenor. v. *Serapias longip.*

Helipterum DC., Sonnenflügel, Immortelle, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

canescens DC., graulicher, ☿. t. Cap der guten Hoffn.
 β) tricolor.

Dregeanum DC., Drege's, ☿. t. Cap der guten Hoffn.

eximium DC., vortrefflicher, ☿. t. Cap der gut. Hoffn.

fasciculatum DC., büschelförmiger, ☿. t. Cap d. g. H.

a) album. b) rubrum. c) versicolor.

ferrugineum DC., rostfarbiger, ☿. t. Cap der gut. H.

Helipterum

filiforme DC., fadenförmiger, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
 floribundum DC., blüthenreicher, ☉. m. f. Neuholland.
 fragrans (Andr.), wohlriechender, ♀. t. Cap d. gut. H.
 gnaphalodes DC., ruhrkrautähnlicher, ♀. t. Cap der
 guten Hoffnung.

humile DC. (*Helichrys spectabile* Lodd.), niedriger, ♀. t.
 Cap der guten Hoffnung.

imbricatum (W.), dachförmiger, ♀. t. Cap d. gut. H.
 incanum DC. (Hook.), weißgrauer, 4. ♀. Van-Die-
 mens -Land.

β) tricolor.

phlomoides DC., wollkrautähnlicher, ♀. t. Cap der
 guten Hoffnung,

retortum W., rückwärtsgedrehter, ♀. t. Cap d. g. H.
 sesamoides DC., sesamähnlicher, ♀. t. Cap d. gut. H.

β) pseudofasciculatum.

speciosissimum DC., prächtiger, ♀. t. Cap d. gut. H.
 variegatum DC., bunter, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

Helleborus T., Nieswurz, XIII. VI., Ranunculaceae.

atrorubens W. Kit., schwarzröthliche, 4. f. Croatien.

Bocconi Ten. (*dumetorum* Kit., *multifidus* Visian., *an-*
gustifolius Host.), Boccone's, 4. f. Süd- u. Osteuropa.

corsicus Viv., corsische, 4. k. Corsica.

cupreus Host., kupferfarbige, 4. f. Slavonien.

foetidus L., stinkende, 4. f. Mitteleuropa.

graveolens Host., starkriechende, 4. f. Ungarn.

laxus Host. (? *vernalis* D. Don), lockere, 4. f.
 Slavonien.

lividus Ait. (*triphyllus* Lam., *argutifolius* Viv.), blei-
 farbene, 4. k. Corsica.

β) integrilobus.

niger L., schwarze, 4. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.

a) humilifolius Hayn. β) altifolius Hayn.

odorus Kit., riechende, 4. f. Ungarn, Salzburg.

orientalis Lam. (*officinalis* Salish.), morgenländische, 4.
 f. b. k. Griechenland, Kleinasien.

purpurascens Kit., purpurfarbige, 4. f. Südungarn,
 Siebenbürgen, Galizien.

viridis L., grünliche, 4. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa,
hyemalis L. v. *Eranthis hyemalis*. *trifolius* L. v.
Coptis trifolia.

Hellenia W. (C. N. Hellenius, Professor zu Abo), I. I., Scitamineae-Amomeae.

abnormis Lindl., abweichende, 4. w. China.

chinensis W., chinesische, 4. w. China.

coerulea RB., blaue, 4. w. Neuholland.

Allughas W. v. *Alpinia Allugh. grandiflora* Retz v.
Costus speciosus.

Helminthia G. Juss., Wurmsalat, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

echioides G., natterkopfähnlicher, ☉. f. Mittel- und
 Südeuropa, Taurien.

humifusa Trev., gestreckter, ☉. f. ?

spinosa DC. (*echioides* MB.), stacheliger, ☉. f. Süd-
 europa, Taurien.

Helonias L., Schwindblume, VI. I., Coronariae-Colchicaceae (*Melanthaceae*).

angustifolia Mchx., schmalblättrige, 4. f. b. Carolina.

Helonias

erythrosperma Mchx. (*laeta* Sims), rothsamige, 4. f. b. Nordamerika.

latifolia Mchx. (*bullata* L.), breitblättrige, 4. f. Nordamerika.

bracteata Sims, *glaberrima* Sims v. *Zigadenus bracteatus* et *glaberrimus*. *lutea* Sims v. *Chamaelirium carolinianum*. *tenax* Pursh etc. vid. *Xerophyllum tenax*. *virginica* Sims v. *Leimanthium virginicum*.

Helopus Trin. v. *Oedipachne*.

Helosciadium Koch, Sumpfdolde, V. II., Umbelliferae.

Anmi (L.), ammiähnliche, ☉. f. Südeuropa.

bulbosum (Thore), knollige, 4. Kn. f. Frankreich.

crassipes Spgl., dickstielige, 4. f. Corsica.

inundatum Koch, gemeine, 4. Wa. f. Nordeuropa.

nodiflorum Koch, knotenblumige, 4. Wa. f. Mittel- und Südeuropa.

repens Koch, kriechende, 4. f. Süddeutschland, England, Dänemark.

Hemerocallis L., Taglilie, VI. I., Coronariae-Hemerocallideae.

disticha D. Don, zweizeilige, 4. f. b. Nepal.

flava L., hellgelbe, 4. f. Südeuropa.

fulva L., rothbraune, 4. f. Südeuropa.

b) *variegata*. c) *plena*.

graminea Ait., grasartige, 4. f. Sibirien.

alba Andr. et *coerulea* Andr. etc. v. *Funkia subcordata*, *ovata* etc. *Lilium* L. vid. *Czackia Lilium*. *litoralis* δ . *acutifolia* Bot. mag. v. *Pancratium acutifolium*.

Hemiandra RB., Halbbeutel, XIV. I., Labiatae.

pungens RB., stechender, $\frac{1}{2}$. t. Südliches Neuholland.

rupestris Benth., Felsen-H., $\frac{1}{2}$. t. Neuholland (Schwanenflufs).

Hemianthus Nutt., Halbmaske, II. I., Personatae-Antirrhineae.

micranthemoides Nutt., kleinblumige, 4. Wa. k. t. Nordamerika, Jamaica.

Hemiclidia RB., Hemiclidie, IV. I., Proteaceae.

Baxteri RB., Baxter's, $\frac{1}{2}$. t. Neuholland.

Hemidesmus RB., Halbfaden, V. II., Asclepiadeae.

indicus RB., indischer, $\frac{1}{2}$. Sch. w. Ceylon.

Hemimeris L., Halbblume, II. I. (XIV. II.), Personatae-Antirrhineae.

montana Thbg., Berg-H., 4. t. Cap der guten Hoffn. Hinsichtlich der übrigen s. Alonsoa.

Hemionitis L., Netzfarn, XXIV. I., Pterioideae.

palmata L., handförmiger, 4. w. Westindien.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen: *Antrophyum*, *Diplazium*, *Gymnogramma* et *Meniscium*.

Hemisteptia Bunge, Halbkrönchen, XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

lyrata Bunge, leierförmiges, $\frac{1}{2}$. f. b. Nordchina.

Hemitelia RB., Hemitelie, XXIV. I., Pterioideae.

capensis RB., capische, 4. $\frac{1}{2}$. w. Cap der gut. Hoffn.

multiflora RB., vielblumige, 4. $\frac{1}{2}$. w. Jamaica.

speciosa Kaulf., prächtige, $\frac{1}{2}$. w. Südamerika.

Henckelia Spgl. (Graf Henckel von Donnersmark, deutscher Botaniker), XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.

Rexii* Rex's, 4. t. w. Cap der guten Hoffn.

Hepatica Dill., Leberkraut, XIII. VI., Ranunculaceae.

acutiloba DC., spitzlappiges, 4. f. Nordamerika.

americana Ker, amerikanisches, 4. f. Nordamerika.

b) alba J. Cree. c) rubra J. Cree.

angulosa (Lam.), (?pedata Rafin.), kantiges, 4. f. Nordamerika.

triloba Chaix (*nobilis* Volckam., Schreb.), gemeines, 4. f. Europa.

b) coeruleo plena. c) rubra. d) rubro plena.

e) alba. f) nivea.

Heracantha lanata Lk. etc. v. *Kentrophyllum lanatum* etc.

Heracleum L., Heilkraut (Bärenklau), V. II., Umbelliferae.

alpinum L., Alpen-H., 4. f. Südeuropäische Alpen.

angustifolium L. (*flavescens* Bess.), schmalblättriges, 4. f. Mittel- und Osteuropa.

asperum MB. (*cordatum* Presl, *montanum* Schlchr., Gaud.), rauhes, ♂. f. Caucasus, Baiern, Tyrol, Schweiz, Sicilien.

aureum Sm., goldfarbiges, ♂. f. Griechenland.

austriacum L., österreichisches, 4. f. Oesterreich, Steyermark, Krain etc.

β) siifolium Rchb.

decipiens Fisch., täuschendes, ♂. f. Sibirien.

dissectum Ledeb., theilblättriges, 4. f. Altai.

flavescens W., gelbliches, 4. f. Oesterreich.

giganteum Fisch., riesenhaftes, ♂. f. Sibirien.

laciniatum Fisch., schlitzblättriges, ♂. f. Sibirien.

lanatum Mchx., wolliges, 4. f. Nordamerika.

ligusticifolium MB., liebstockelblättriges, ♂. f. Taurien.

marginatum Fisch., gerandetes, ♂. f. Sibirien.

nepalense D. Don, nepal'sches, ♂. 4. f. Nepal.

palmatum Baumg., handförmiges, ♂. f. Siebenbürgen, Salzburg.

Panaces L. (?setosum Lapeyr.), großes, ♂. f. Süd- und Westeuropa.

pubescens MB. (*causicum* Stev.), weichhaariges, ♂. 4. f. Taurien, Caucasus.

pyrenaicum Cuss. (*amplifolium* Lapeyr., *gummiferum* W., *speciosum* Hoffm.), pyrenäisches, ♂. 4. f. Süd- und Westeuropa.

sibiricum L., sibirisches, 4. f. Taurien, Sibirien.

Sphondylium L., gemeines, 4. f. Europa.

β) longifolium Jacq. γ) elegans Jacq.

tauricum Fisch., taurisches, ♂. f. Taurien.

tomentosum Sm., filziges, ♂. f. Griechenland.

trachyloma Fisch. et Mey., rauhlappiges, ♂. f. Nordpersien.

verrucosum Stev., warziges, ♂. f. Taurien.

villosum Fisch., zottiges, ♂. f. Sibirien.

Ungewifs: caspicum Hort., persicum H. Par., subvillosum W.

absinthifolium Vent. v. *Zosimia absinthifolia*. *pumilum* Vill. v. *Peucedanum Vocontiorum*.

Herbertia Swt. (W. Herbert, englischer Botaniker), III. I. (XVI. I.), Irideae.

Herbertia

pulchella Swt., schöne, 4. Zw. k. Chili.

Heritiera Ait. (C. L. L'Heritier de Brutelle, franz. Botaniker), XVI. VI. (XXI. I.), Malvaceae-Herculiaceae.
litoralis Ait., Strand-H., f. w. Ostindien.
minor Lam., kleine, f. w. Ostindien.

Hermannia L. (Paul Hermann, Professor der Botanik zu Leyden), XVI. III. (II.), Malvaceae-Hermanniaceae.

alnifolia L., erlenblättrige, f. k. t. Cap der gut. H.

althaeifolia L. (*aurea* Jacq.), eibischblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

althaeoides Lk. (*ferruginea* Hort.), eibischähnliche, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

angularis Jacq., kantige, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

bipinnata Burch., doppeltgefiederte, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

bryonifolia Burch., zaunrübenblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

candicans Ait., weisliche, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

coronopifolia Lk., krähensfußblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

cuneifolia Jacq., keilblättrige, f. k. t. Cap d. gut. H.

decumbens W., niederliegende, f. k. t. Cap d. g. H.

denudata L., nackte, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

disermaefolia Jacq., wellenblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

disticha Schrad. (*rotundifolia* Jacq.), zweizeilige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

filifolia L., suppl., fadenblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

flammea Jacq., flammenblumige, f. k. t. Cap d. g. H.

fragrans Wendl., Lk., wohlriechende, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

glandulosa Lk., drüsige, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

hirsuta Schrad., rauhhaarige, f. k. t. Cap d. gut. H.

hispidula Rchb., steifhaarige, f. k. t. Cap d. gut. H.

holosericea Jacq., sammethaarige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

hyssopifolia L., ysopblättrige, f. k. t. Cap d. gut. H.

inflata Otto, aufgeblasene, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

involuta Cav., eingehüllte, f. k. t. Cap d. gut. H.

lavandulifolia L., lavendelblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

melochioides Burch., melochiaähnliche, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

micans Schrad. (*latifolia* Jacq.), schimmernde, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

mollis W., weiche, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

multiflora Jacq., vielblumige, f. k. t. Cap d. gut. H.

odorata Ait., riechende, f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

plicata Ait. (*althaeifolia* Jacq.), faltenblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

procumbens Cav., liegende, f. k. t. Cap der gut. H.

pulverata Andr. (*argentea* Sm.), bestäubte, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

salvifolia L., salbeiblättrige, f. k. t. Cap d. gut. H.

scabra Cav. (*aspera* Wendl., *hirta* Sparrm.), scharfe, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

scordifolia Jacq., gamanderblättrige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Hermannia

tenuifolia Sims, feinblättrige, ⚥. k. t. Cap d. gut. H.
trifoliata L., dreiblättrige, ⚥. k. t. Cap d. gut. Hoffn.
trifurcata L., dreigabelige, ⚥. k. t. Cap d. gut. Hoffn.
triphylla Cav., dreizählige, ⚥. k. t. Cap d. gut. Hoffn.
velutina Burch., sammetartige, ⚥. k. t. Cap d. g. H.
glabrata L. suppl., *grossulariaefolia* L. etc. v. Ma-
hernia glabrata, *heterophylla* etc.

Hermas L., Stieldolde, V. II. (XXIII. 1.), Umbelliferae.
capitata Thbg., kopfförmige, ⚥. t. k. Cap d. gut. H.
ciliata Thbg., gefranzte, ⚥. t. k. Cap der gut. Hoffn.
gigantea Thbg., riesenhafte, ⚥. t. k. Cap d. gut. H.
villosa Thbg. (*depauperata* L.), zottige, ⚥. t. k. Cap
 der guten Hoffnung.

Herminium RB., Zwerg-Orche, XX. 1., Orchideae.
Monorchis RB., einhodige, 4. Kn. f. Europa, Caucasus.
cordatum Lindl., herzblättrige, 4. Kn. k. t. Madeira,
 Portugal.

Hermione Salisb. v. *Narcissus*.

Hernandia L. (F. Hernandez, spanischer Naturforscher),
 XXI. III., Laurineae.

guianensis Aubl., guianische, ⚥. w. Guiana.
ovigera L., eiertragende, ⚥. w. Ostindien, Mascarenas.
sonora L., tönende, ⚥. w. Ost- und Westindien.

Herniaria T., Bruchkraut, V. II., Portulacaceae-Paro-
 nychiaeae.

alpina Vill. (*alpestris* Lam.), Alpen-B., 4. f. Süd- und
 Ostfrankreich.

annua Lag., jähriges, ☉. f. Spanien.

cinerea DC., aschfarbiges, ☉. f. Südfrankreich.

fruticosa L., strauchiges, ⚥. k. Südfrankreich, Aegypten.

glabra L., glattes, 4. f. Europa, Sibirien.

hirsuta L., haariges, 4. f. Europa.

incana Lam. (*millegrana* Bess., *Besseri* Hornem., *hirsuta*
 MB.), weißgraues, 4. f. Südfrankreich, Volhynien,
 Taurien.

polygonoides Cav. (*erecta* Dsf.), knöterichähnliches, ⚥. k.
 Südfrankreich, Spanien, Nordafrika.

Herpestes G., Wassermaske, XIV. II., Personatae-
 Antirrhineae.

amplexicaulis Pursh, stengelumfassende, 4. Wa. k. t.
 Carolina.

cuneifolia Pursh, keilblättrige, 4. Wa. k. t. Carolina.

Monniera H. B. K., Monnier's, 4. Wa. w. Südamerika.

portulacea Sims, portulakähnliche, 4. Wa. w. Südamer.

rotundifolia Pursh, rundblättrige, 4. Wa. k. Nordamer.

stricta Schrad., steife, 4. w. ?

micrantha Pursh v. *Hemianthus micranthemoides*.

Herreria R. et P. (C. A. de Herrera, spanischer Agri-
 culturist), VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

parviflora Bot. reg., kleinblumige, 4. Sch. w. Brasilien.

stellata R. et P., sternförmige, 4. Sch. w. Chili.

Hesperantha Ker, Abendschwertel, III. I., Irideae.

angusta Ker, schmaler, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

cinnamomea Ker, Zimmt-A., 4. Zw. k. t. Cap der
 guten Hoffnung.

falcata Ker, sichelförmiger, 4. Zw. k. t. Cap der
 guten Hoffnung.

Hesperantha

graminifolia Swt., grasblättriger, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

pilosa Ker, haariger, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.

radiata Ker, strahliger, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

Hesperis T., Nachtviole, XV. III., Cruciferae.

aprica Poir., sonneliebende, 4. f. k. Sibirien.

bicuspidata Poir., DC., zweispitzige, ♂. f. k. Armenien.

bituminosa Savi, harzige, ♂. f. ?

elata Hornem. (*excelsa* Hort.), hohe, ☉. ♂. f. ?

fragrans Fisch., wohlriechende, ♂. f. Sibirien.

grandiflora Bot. mag., großblumige, 4. f. ?

laciniata All. (*hieracifolia* Vill., *suaveolens* Bess., *villosa* DC.), schlitzbblätterige, ♂. f. Frankreich, Italien, Ukraine.

matronalis L., gemeine, ♂. f. Europa, Sibirien.

b) fl. albo. c) fl. albo pleno. d) fl. purpureo pleno. e) fl. pleno variegato. f) foliiflora.

β) *inodora* L. γ) *sibirica* L.

nivea Baumg., schneeweiße, ♂. f. Siebenbürgen.

pulchella DC., schöne, ☉. f. ? Syrien.

ramosissima Dsf., ästige, ☉. f. Nordafrika, Kleinasien.

repanda Lag., ausgeschweifte, ♂. f. Spanien.

runcinata W., Kit., schrotsägenförmige, ♂. f. Ungarn.

tristis L., traurige, ♂. f. Süd- und Osteuropa.

africana L. etc. v. *Malcolmia africana* etc. *arabidi-*

flora DC. v. *Neurolooma arabidiflor.* *glandulosa* P.

etc. vid. *Andreoskia integrifolia* etc. *speciosa* Swt.

v. *Parrya integerrima.* *verna* L. v. *Arabis verna.*

Hesperoscordum Lindl., Abendaffodile, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

hyacinthinum Lindl., hyacinthähnliche, 4. Zw. f. k. Nordamerika.

lacteam Lindl., milchweisse, 4. Zw. f. k. Californien.

Heteracia Fisch. et Mey., Wechselpippau, XIX. I., Cichoriaceae.

Szovitsii Fisch. et Mey., Szovits's, ☉. f. Nordpersien.

Heteranthera P. Beauv., Ungleichbeutel, III. I., Commelinaceae.

acuta W., spitzer, 4. Wa. k. Virginien.

limosa Vahl, schlammliebender, 4. Wa. k. Nord- und Südamerika, Westindien.

reniformis R. et P., nierenförmiger, 4. Wa. w. Südamerika.

Heterocoma DC., Wechselschopf, XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

albida DC., weißlicher, ♀. w. Brasilien.

bifrons DC., zweiflügeliger, ♀. w. Brasilien.

Heterolepis Cass., Wechselschuppe, XIX. v., Compositae-Corymbiferae.

decipiens Cass., trügerische, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

Heteropogon P., Wechselbart, III. II. (XXI. III.), Gramineae.

Allionii P. Beauv. (*glaber* P.), Allione's, 4. k. Süd-europa, Nordafrika, Mexico.

contortus P. Beauv. (*hirtus* P.), gedrehtes, 4. w. Indien, Neuholland.

Heteropteris H. B. K., Flügelkapsel, X. III., Malpighiaceae.

Heteropteris

appendiculata DC., anhängselige, ♀. w. Südamerika.
 brachiata H. B. K., armförmige, ♀. Sch. w. Westindien.
 coerulea H. B. K., blaue, ♀. Sch. w. Westindien.
 chrysophylla H. B. K., goldblättrige, ♀. Sch. w. Südamerika.

floribunda H. B. K., blüthenreiche, ♀. w. Südamerika.
 nitida H. B. K., glänzende, ♀. w. Südamerika.

β) rufa Lindl.

parvifolia DC., kleinblättrige, ♀. Sch. w. Westindien.
 purpurea H. B. K., purpurfarbige, ♀. Sch. Westindien.

Heterospermum Cav., Wechselsame, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

pinnatum Cav., fiederblättriger, ☉. f. Mexico.

Heterostemon Dsf., Ungleichfädler, XVII. II., Leguminosae-Caesalpinieae.

mimosoides Dsf., mimosenähnlicher, ♀. w. Brasilien.

Heterotaxis Lindl., Reihenstendel, XX. I., Orchideae.

crassifolia Lindl., dickblättriger, 4. w. Jamaica.

Heterotheca inuloides Cass. v. *Diplocoma villosa*.**Heterotropa** Morr., Wechselkraut, ?XI. I., Aristolochiae (*Asarineae*).

asaroides Morr., haselwurzähnliches, 4. k. t. Japan.

Heterotrichum salsum MB. v. *Saussurea salsa*.**Heuchera** L. (J. H. Heucher, Professor der Medicin zu Wittenberg), V. II., Saxifrageae.

americana L. (*viscida* Pursh, *Cortusa* Mchx.), amerikanische, 4. f. Nordamerika.

caulescens Pursh, stengelige, 4. f. Carolina.

cylindracea Lindl., cylinderförmige, 4. f. Nordamerika.

glabra Pall., glatte, 4. f. Nordamerika.

hispida Pursh, steifhaarige, 4. f. Virginien.

macrophylla Lodd., großblättrige, 4. f. Nordamerika.

micrantha Dougl., kleinblumige, 4. f. Columbia.

pilosissima Fisch. et Mey., vielhaarige, 4. f. Neu-Californien.

pubescens Pursh, feinhaarige, 4. f. Nordamerika.

Richardsonii RB., Richardson's, 4. f. Nordamerika.

villosa Mchx., zottige, 4. f. Carolina.

Hevea guianensis Aubl. v. *Siphonia elastica*.**Hexopea** Batem., Zellenstendel, XX. I., Orchideae.

crurigera Batem., schenkelförmiger, 4. w. Südamerika.

Heylandia DC. (M. Heyland, Freund des Herrn de Candolle), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

hebecarpa DC., rauhhülsige, 4. w. Ceylon.

leiocarpa DC., glatthülsige, 4. w. Ostindien.

Heynea Roxb. (Benj. Heyne, ein Deutscher, welcher in Ostindien Pflanzen sammelte), X. I., Hesperideae-Meliaceae.

quinquejuga Spgl., fünfjochige, ♀. w. Java.

trijuga Roxb., dreijochige, ♀. w. Nepal.

Hibbertia Salisb., Andr. (Georg Hibbert, englischer Pflanzensammler), XIII. III., Dilleniaceae.

cistifolia RB., cistusblättrige, ♀. t. Neuholland.

Cunninghamii Hook., Cunningham's, ♀. Sch. t. Neuholland.

dentata RB., gezahnte, ♀. Sch. t. Neuholland.

Hibbertia

- diffusa RB., weitschweifige, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 flexuosa Cunn., biegsame, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 grossulariaefolia Salisb. (*crenata* Andr.), stachelbeer-
 blätterige, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 hermanniaefolia DC., hermannienblätterige, $\frac{1}{2}$ t. Neu-
 holland.
 linearis RB., gleichbreitblätterige, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 obtusifolia DC., stumpfblätterige, $\frac{1}{2}$ t, Van-Diemens-
 Land.
 pedunculata RB. (*corifolia* Sims), gestielte, $\frac{1}{2}$ t.
 Neuholland.
 saligna RB., weidenähnliche, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 virgata RB., ruthenförmige, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 volubilis Andr., windende, $\frac{1}{2}$ Sch. t. k. Neusüdwallis.

Hibiscus L. (et Abelsonschus Med., Ketmia T., Trio-
 num Medic. etc.), Eibisch, XVI. VIII., Malvaceae.

Abelsonschus L., Bisam-E., $\frac{1}{2}$ w. Ost- und Westindien,
 Aegypten.

abutiloides W. (*pernambucensis* Bertol.), abutilonähnlicher,
 $\frac{1}{2}$ w. Westindien, Südamerika.

acerifolius DC., ahornblätteriger, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien, China.

aethiopicus L., aethiopischer, $\frac{1}{2}$ t. Cap d. gut. Hoffn.

aquaticus DC. (*palustris* Savi), Wasser-E., 4. Wa. f.
 Etrurien.

Bammia Tozzett. (*esculentus* Cav.), Bammia-E., $\odot$ w. m.
 Aegypten.

bifurcatus Cav., zweigabeliger, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.

borbonicus Lk., bourbonischer, $\frac{1}{2}$ w. Mascarenas.

Cameroni K. et W., Cameron's, $\frac{1}{2}$ w. Madagascar.

cancellatus Roxb., gegitterter, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

cannabinus L. (*tripartitus* Fors.), hanfblätteriger, $\frac{1}{2}$ w.
 Ostindien.

circinnatus W., kreisförmiger, $\frac{1}{2}$ w. Caracas.

clandestinus Cav., heimlichblumiger, $\frac{1}{2}$ w. Guinea.

clypeatus L., schildkapseliger, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.

collinus Baxt. jun., Hügel-E., $\frac{1}{2}$ w. ?

crinitus Wall., bemähter, 4. $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

cuneiformis DC., keilförmiger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.

digitatus Cav., fingerförmiger, $\odot$ w. Brasilien.

β) Kerianus DC.

diversifolius Jacq. (*ficulneus* Cav.), verschiedenblätteriger,
 $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

elatus Sw., hoher, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.

eriocarpus DC., wollfrüchtiger, $\frac{1}{2}$ w. Bengalen.

esculentus L., genießbarer, $\odot$ w. Ost- und Westindien.

ferrugineus Cav., rostfarbiger, $\frac{1}{2}$ w. Madagascar.

ficulneoides Lindl. (*mauritanus* Spgl.), feigenähnlicher,
 $\frac{1}{2}$ w. Mascarenas, Ostindien.

ficulneus L. (*sinuatus* Cav.), feigenblätteriger, $\frac{1}{2}$ w.
 Ceylon.

furcatus Roxb., W., gabelförmiger, $\odot$ w. m. Ostindien.

gangeticus W., Ganges-E., $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

Genevii Boj., Geneve's, $\frac{1}{2}$ w. Mauritius.

gossypinus Thbg., gossypiumähnlicher, $\frac{1}{2}$ t. Cap der
 guten Hoffnung.

grandiflorus Mchx., großblumiger, 4. k. Florida,
 Louisiana.

guineensis DC., guineischer, $\frac{1}{2}$ w. Guinea.

Hibiscus

heterophyllus Vent. (*grandiflorus* Salisb., *flabellatus* Poir.),
veränderlichblättriger, ♀. t. w. Neusüdwallis.
hirtus L., kurzsteifhaariger, ♀. w. Ostindien.
hispidus Mill., steifhaariger, ♂. ♀. t. Cap d. gut. H.
Humboldtii Mart., Humboldt's, ☉. f. m. Südamerika.
incanus Wendl., weißgrauer, 4. t. k. Carolina.
Lampas Cav., philippinischer, ♀. w. Philippinen.
lilacinus Lindl., lilafarbiger, ♀. w. Neuholland.
liliflorus Cav., lilienblumiger, ♀. w. Mascarenas.

b) hybridus.

Lindleyi Wall., Lindley's, ♀. w. Ostindien.
longifolius W., langblättriger, ☉. w. m. Ostindien.
lunarifolius W., mondviolenblättriger, ♀. w. Ostindien.
Macleyanus Banc., Macley's, ♀. w. Westindien.
macrophyllus Hornem., Roxb., großblättriger, ♀. w. Ostindien.
maculatus Bartl., gefleckter, ♀. w. Ostindien.
Manihot L., schwefelgelber, ♂. w. Ost- u. Westindien.
membranaceus Cav., dünnhäutiger, ♀. w. ?
micans Cav., schimmernder, ♀. w. Java.
micranthus L. (*rigidus* L. suppl.), kleinblumiger, ♀. w. Ostindien.

militaris L., glatter, 4. k. f. b. Louisiana.
Moscheutos L., blattstielblüthiger, 4. k. f. b. Nordamer.
mutabilis L., veränderlicher, ♀. w. Ostindien.

b) flore pleno.

obtusifolius W., stumpfblättriger, ♀. ♂. w. Ostindien.
oxalidiflorus Boj., sauerkleeblumiger, ♀. w. Mauritius.
palmatus Cav., handförmiger, ♀. w. Südamerika, Westindien.
palustris L., Sumpf-E., 4. f. b. Nordamerika.
parviflorus Weinm., schmalblumiger, ♀. w. Südamerika.
Patersonius Andr., Paterson's, ♀. t. w. Norfolkinsel.
pedunculatus Thbg., langstieliger, ♀. t. Cap d. gut. H.
phoeniceus L., schönrother, ♀. w. Ost- u. Westindien.
pruriens Roxb., juckender, ♂. w. Ostindien.
Pseudo-Manihot DC., unächter gelber, ♀. ♂. w. Mascarenas.

pulchellus Lodd., schöner, ♀. w. Ostindien.
quinquefolius Loud., fünfblättriger, ♀. w. ?
racemosus Lindl., traubiger, ♀. w. Nepal.
radiatus Cav., strahliger, ☉. w. m. Ostindien.
rhombifolius Cav., rautenblättriger, ♀. w. Ostindien.
Richardsonii Swt., Lindl., Richardson's, ☉. m. f. Neuholl.
Rosa malabarica Koen., malabarischer Rosen-E., ♀. w. Ostindien.

Rosa sinensis L., chinesischer Rosen-E., ♀. w. Ostindien, China.

b) fl. rubr. plen. c) fl. flav. plen. d) fl. carn. plen. e) fl. variegat. plen. f) fl. luteo.

roseus Thore, rosafarbiger, 4. f. Frankreich.
Sabdariffa L., dreitheiliger, ☉. w. Ost- u. Westindien.
scaber Mchx. (*aculeatus* Walt.), scharfer, 4. k. t. Carolina Florida.
scandens Roxb., kletternder, ♀. Sch. w. Ostindien.
senegalensis Cav., senegambischer, ♀. w. Guinea.
setosus Roxb., borstiger, ♀. w. Ostindien.
speciosus Ait. (*coccineus* Walt.), prächtiger, 4. k. t. Carolina.

Hibiscus

- spiralis* Cav., spiralförmiger, ♀. w. Mexico.
strigosus Lindl., striegeliger, ♀. w. t. Peru.
surattensis L., surattischer, ☉. w. m. Ostindien.
syriacus L., syrischer, ♀. f. b. Syrien, Krain.
 b) fol. variegat. c) flor. variegat. d) flor. pur-
 pur. e) flor. purpureo plen. f) fl. rubro. g) fl.
 albo. h) fl. albo plen. i) marginatus etc.
tetraphyllus Roxb., Hornem., vierblättriger, ♂. w.
 Bengalen.
tiliaceus L., lindenblättriger, ♀. w. Ostindien.
tricuspis Cav., Banks (*hastatus* Forst.), dreispitziger, ♀.
 w. Societätsinseln.
trilobus Cav., dreilappiger, ♀. w. Westindien.
Trionum L., Stunden-E., ☉. f. Süd- und Osteuropa,
 Taurien, Afrika.
 β) *ternatus* Cav. γ) *africanus* Roth.
tubulosus Cav., röhriger, ♂. ☉. w. m. Ostindien.
unidens Ker, Lindl. (? *monodous* Loud.), einzahniger,
 ♀. w. Brasilien.
velutinus DC., sammethaariger, ♀. w. Ostindien.
vesicarius Cav., blasiger, ☉. f. m. Südafrika.
vitifolius L., weinblättriger, ♂. w. Ostindien.

cancellatus L., *pentacarpus* L. etc. vid. *Pavonia*
cancellata etc. *populneus* L. vid. *Thespesia*
populnea.

Hieracium T. Vaill. (et *Pilosella* T. Vaill.), Habichtskraut (Mausöhrchen), XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

1. *Pilosella* T. Vaill.

- angustifolium* Hoppe (*glaciale* Lachen., *Auricula* Sm.),
 schmalblättriges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
aurantiacum L., orangefarbiges, 4. f. Europäische
 Alpenwiesen.
 β) *flavum* Schlchr., Gaud.
Auricula L. (*dubium* Sm., *Lactucella* Wallr.), Triften-
 H., 4. f. Europa.
Bauhini Bess., Schult. (*sarmentosum* Hort.), Bauhin's,
 4. f. Deutschland, Galicien.
hifurcum MB. (*collinum* Bess., *pedunculatum* Wallr.,
 ? *flagellare* W.), zweigabeliges, 4. f. Mittel-, Süd-
 und Osteuropa, Taurien.
 β) *brachiatum* Bertol. (*auriculaefolium* et *Pseud-*
 auricula Tausch.).
breviscapum DC. (*pumilum* Lapeyr., *Candollei* Monn.),
 kurzschaftiges, 4. f. Schweiz, Pyrenäen.
collinum Gochn. (*Gochnati* Spgl., *cymosum* et *Auricula*
 Auctor., *Zizianum* Tausch), Hügel-H., 4. f. Mittel-,
 West- und Südeuropa.
 a) *stoloniferum*. β) *astoloniferum* (*fallax* W.).
cymosum L. (*Nestleri* Vill., *cymigerum* Rchb.), after-
 doldiges, 4. f. Mittel- und Westeuropa.
 β) *Vaillantii* Tausch (*angustatum* Tausch, *cymo-*
 sum β. *longifolium* Rchb.).
echioides Lumn., natterkopfähnliches, 4. f. Nord- und
 Ostdeutschland, Ungarn.
 β) *cinereum* Tausch.
*fulgidum** (*aurantiacum speciosum* Hort.), leuchtendes,
 4. f. ?

Hieracium

- furcatum* Hoppe (*sphaerocephalum* Froel.), gabeliges, 4. f. Tyroler und schweizer Alpen, Dauphiné etc.
 β) *alpicola* Schlchr., Tausch. ? γ) *hybridum* Chaix.
fuscatum Vill., braunes, 4. f. Schweiz, Dauphiné.
glaucescens Bess. (? *densiflorum* Tausch), blaugrünes, 4. f. Ostdeutschland, Galicien.
Hoppeanum Schult. (*pilosellaeforme* Hoppe, *Pilosella grandiflorum* DC.), Hoppe's, 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Illyrien.
incanum MB., graugrünes, 4. f. Caucasus.
obscurum Rchb. (*florentinum* Auctor.), dunkles, 4. f. Deutschland.
Peleterianum Merat. (*Pilosella* β . *pilosissimum* Koch), Lepelet's, 4. f. Westdeutschland, Frankreich.
Pilosella L., gemeines Mausöhrlein, 4. f. Europa.
 β) *Pseudo-Pilosella* Tenor.
piloselloides Vill. (*florentinum* All.), mausöhrleinähnliches, 4. f. Südeuropa.
 β) *Michellii* Tausch.
praealtum Vill. (*florentinum* W. Spgl., *elégans* Rchb.), hohes, 4. f. Mittel-, West- und Südeuropa.
pratense Tausch. (*cymosum* et *Auricula* Auctor., *collinum* Bernh., *Besserianum* Spgl., ? *dubium* Wahlbg.), Wiesen-H., 4. f. Mittel-, Nord- und Osteuropa.
 β) *repens* Hort., ? Willd.
Pseudauricula * (*radiocaulum* Tausch), unächt, 4. f. Mittel- und Ostdeutschland.
sabinum Sebast. et Mauri. (*cymosum* Vill., Rchb.), römisches, 4. f. Südeuropa.
 β) *multiflorum* Schlchr.
scabrum Mchx. (? *verruculatum* Lk.), scharfes, 4. f. Nordamerika.
setigerum Tausch (*simplex* Tausch., *Rothianum* Wallr., *picridifolium* Hort., *cymosum* Spgl.), borstiges, 4. f. Mittel- und Ostdeutschland, Ungarn, Kleinasien.
stoloniflorum WK. (*bifurcum* Hort., ? *dubium* Tausch.), sprossenblumiges, 4. f. Deutschland, Ungarn.
 II. *Hieracium* T. V. (*Aurella* Tausch).
alpinum L., Alpen-H., 4. f. Europäische Alpen.
 β) *tubulosum* (*inapertum* Köhl.). γ) *pumilum* Hoppe.
amplexicaule L., stengelumfassendes, 4. f. Mittel-, süd- und westeuropäische Alpen.
 β) *pulmonarioides* Vill. (*petraeum* Hoppe).
anchusaefolium Bertol. (*verbascifolium* Vill.), ochsenzungenblättriges, 4. f. Dauphiné, Italien.
andryaloides Vill., wellenblättriges, 4. f. Spanien, Frankreich, Schweiz.
 β) *undulatum* Ait.
auriculatum Hornem. (? *bracteolatum* Lk.), gehörtes, 4. f. ?
bifidum Kit., zweispaltiges, 4. f. Ungarn, Schweiz.
bupleuroides Gmel. (*polyphyllum* W., *glaucum* Wahlbg.), hasenöhrleinblättriges, 4. f. Mittel- und osteuropäische Voralpen.
calcareum Bernh. (*humifusum* Hort., ? Spgl.), kalkliebendes, 4. f. Krain, Friaul.

Hieracium

canadense Mchx., canadisches, 4. f. Nordamerika.
cerinthoides L., wachsblumenblättriges, 4. f. Südfrankreich.

compositum Lapeyr., vielästiges, 4. f. Pyrenäen.

corymbosum P., traubendoldiges, 4. f. ?

cydoniaefolium Vill., quittenblättriges, 4. f. Dauphiné.

dentatum Hoppe (*speciosum* Hornem., *speciosissimum* W.),
gezahntes, 4. f. Kärnthner und tyroler Alpen.

denticulatum Sm., gezähneltes, 4. f. Schottland.

denudatum Lapeyr., nacktes, 4. f. Pyrenäen.

eriophorum St. Amans, wolliges, 4. f. Frankreich.

fasciculatum Pursh, büschelförmiges, 4. f. Nordamerika.

flexuosum Kit. (*speciosum* Hort.), gebogenes, 4. f.
Croatien, Illyrien.

foliosum W., Kit., blattreiches, 4. f. Ungarn.

glabratum Hopp. (*flexuosum* DC., *trichocephalum* W.),
glattes, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

glanduliferum Hoppe, drüsiges, 4. f. Kärnthen,
Schweiz,

Halleri Vill. (*atricapillum* Hoppe), Haller's, 4. f. Europäische Voralpen.

β) *nigrescens* W.

hirsutum Bernh., rauhhaariges, 4. f. Südeuropa.

Jacquini Vill. (*humile* Host., *pumilum* Jacq.), Jacquin's,
4. f. Mitteleuropäische Alpen.

intybaceum Jacq. (*albidum* Vill., *calyculatum* Hornem.),
cichorienartiges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *tubulosum*.

Kalmii L., Kalm's, 4. f. Nordamerika.

Lachenalii C. C. Gmel. (*vulgatum* Fr., *sylvaticum* Auctor.,
Mertini Gmel., *diaphanum* Fr., *angustifolium* C. C.
Gmel.), Lachenal's, 4. f. Europa.

β) *maculatum* Hortul. (*pictum* Schlchr.).

laevigatum W., glattes, 4. f. Deutschland.

β) *longifolium* Hortul. γ) *lanceolatum* Vill. δ)
canescens Lk.

lanatum Vill. (*tomentosum* All., *verbascifolium* P.), wolliges,
4. f. Schweiz, Oberitalien, Frankreich.

latifolium Froel. (*croaticum* Lapeyr.), breitblättriges,
4. f. Pyrenäen.

Liottardi Vill. (*lanatum* Kit., *Waldsteinii* Tausch), Liottard's,
4. f. Ungarn, Dauphiné.

longifolium Schlchr. (*flexuosum*, *speciosum* et *cerinthoides*
Hort. et Auctor., *Milleri* Lk.), langblättriges, 4. f.
Schweiz, Dauphiné.

β) *Mougeoti* Fröl. (*cerinthoides vogesianum* Kirschl.).

γ) *Lawsonii* Vill.

macrophyllum Pursh, großblättriges, 4. f. Canada.

murorum L., Mauer-H., 4. f. Europa.

β) *sylvaticum* L. γ) *rotundatum* Kit. δ) *incisum* Hoppe.

pallescens W. Kit., bleiches, 4. f. Ungarn, Schweiz etc.

paniculatum L., rispiges, 4. f. Nordamerika.

picroides Vill. (*ochroleucum* Sbhleh.), picrisähnliches, 4.
f. Schweiz, Dauphiné.

porrifolium L. Jacq., porreiblättriges, 4. f. Oesterreich,
Oberitalien, Dauphiné.

Hieracium

- prenanthoides Vill. (*spicatum* All.), hasenlattichähnliches, 4. f. Mittel-, süd- und westeuropäische Alpen.
 prostratum DC., gestrecktes, 4. f. Frankreich.
 pulmonarium Sm. (*sylvaticum* Gouan), lungenkrautblät-
 teriges, 4. f. England, Frankreich.
 pusillum Pursh, zwergiges, 4. f. Labrador.
 racemosum W. Kit., traubiges, 4. f. Ungarn.
 ramosum W. Kit., ästiges, 4. f. Ungarn, Schweiz.
 rigidum Hartm. (*asperum* Gaud., *affine* Tausch, *triden-
 tatum* Fr.), starres, 4. f. Nord- und Mitteleuropa.
 rupestre All., (*incisum*, *Liottardi*, *Lawsoni*, *flexuosum*
 Auctor, *Schmidtii* Tausch), Felsen-H., 4. f. Mittel-
 und Südeuropa.

β) saxatile Vill.

- sabaudum L. (*barbatum* Tausch, *virgatum* Hort.), Savo-
 ysches, 4. f. Mittel- und Südeuropa.
 saxatile Jacq., (*glaucum* All., *scorzonerifolium* Vill., *Al-
 lionii* Monn.), Gesteins-H., 4. f. Ost-, Mittel- und
 Südeuropa.

Schraderi Schlchr., Schrader's, 4. f. Mitteleuropäische
 Alpen.

- sonchifolium MB., gänsedistelblättriges, 4. f. Caucasus.
 staticefolium Vill. All., grasnelkenblättriges, 4. f. Mit-
 teleuropäische Voralpen.
 sudeticum Stbg. (*pulmonarioides* Presl.), Riesengebirgs-
 H. 4. f. Sudeten.
 sylvestre Tausch (*boreale* Fr., *nemorosum* Dierb., *saba-
 dum* Auctor), Wald-H., 4. f. Mittel- und Nord-
 europa.

β) maculatum Sm.

- umbellatum L. (*Ledebouri* Hornem.), doldiges, 4. f.
 Europa.

β) coronopifolium Bernh. γ) Lactaris Bertol.

- villosum L. (*eriophyllum* W.), zottiges, 4. f. Mitteleu-
 ropäische Alpen.

β) pilocephalum Lk.

- alpestre Jacq., aureum Scop., chondrilloides L., cro-
 aticum W. K., (*molle* Jacq., *integrifolium* Hoppe,
Sternbergii Hornem., *succisaefolium* All.), *incarna-
 tum* Wulff., *lapsanoides* Gouan, *paludosum* L.,
paaemorsum L., *prunellaefolium* Gouan etc. v.
 Crepis alpest., aur., Jacquini, succisaefol., incarn.,
 lapsan., paludos., praemors., pypmaea etc. *fruti-
 cosum* W. etc. v. Tolpis (*Polychaetia*), frutic. etc.
stipitatum Jacq. v. Willemetia apargioides.

Hierochloa Gmel. Pferdegras, III. 11., Gramineae.

alpina R. et S., Alpen-P., 4. f. Lappland.

australis, R. et S., südliches, 4. f. Mittel- und Süd-
 europa.

borealis R. et S., (*odorata* Whlbg., *repens* P. B.), nörd-
 liches, 4. f. Nord-, Mittel- und Osteuropa, Nord-
 asien.

fragrans R. et S., gutriechendes, 4. f. Nordamerika.

Hillia Jacq. (J. Hill, engl. Botaniker), VI. 1., Rubiaceae.

longiflora Sw. (*parasitica* L.), langblumige, ♂. w. Ja-
 maica, Brasilien.

tetrandra Sw., viermännige, ♂. w. Jamaica.

Hippeastrum Herb., Sternnarcisse, VI. 1., Narcisseae-
 Amaryllideae.

Hippeastrum

ambiguum Herb. (*longiflorum* Hook.), zweifelhafte, 4.

Zw. w. Lima.

breviflorum Herb., kurzblumige, 4. Zw. w. Buenos-Ayres.

Hippia L., Pferdechamille, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

frutescens L., strauchige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

integrifolia L. suppl., ganzblättrige, ☉. m. Ostindien.

Hippion Spgl., Kreuzwurz, V. I., Contortae-Gentianeae.

hyssopifolium Spgl., ysopblättrige, ♂. w. Ostindien.

verticillatum Spgl., wirtelblüthige, ♂. w. Trinidad.

viscosum Spgl., schmierige, ♂. ♀. k. t. Canarische Inseln.

Hippocratea L. (Hippocrates, berühmter griechischer Arzt), III. I., Evonymaceae-Hippocrateaceae.

arborea Roxb., baumartige, ♀. w. Ostindien.

indica W., indische, ♀. Sch. w. Ostindien.

obcordata Lam. (*scandens* Jacq.), verkehrtherzblättrige, ♀. Sch. w. Südamerika.

obtusifolia Roxb., stumpfblättrige, ♀. Sch. w. Coromandel.

ovata Lam. (*volubilis* L.), eiförmige, ♀. Sch. w. Westindien.

Hippocrepis L., Hufschote, XVII. IV., (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

balearica Jacq., balearische, ♀. k. Balearische Inseln.

biflora Jacq., zweiblumige, ☉. f. Südeuropa, Nordpersien.

β) *persica* Fisch et Mey.

ciliata W. (*annua* Lag., *dicarpa* M. B.), gefranzte, ☉.

f. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Taurien.

comosa L. (*helvetica* G. Don.), schopfige, 4. f. Mitteleuropa.

glauca Ten., blaugrüne, 4. f. Neapel, Sicilien.

multisiliqua L., vielschotige, ☉. f. f. Südeuropa.

unisiliquosa L. (*monocarpa* MB., *syriaca* Hort.), einschotige, ☉. f. Südeuropa, Caucasus.

Hippomane L., Mancinellenbaum, XXI. X., Tricoccae-Euphorbiaceae.

Mancinella L., gemeiner, ♀. w. Westindien.

spinosa L. v. *Sapium ilicifolium*.

Hippomarathrum Lk., Pferdefenchel, V. II., Umbelliferae.

siculum Lk., sicilianischer, 4. k. Südeuropa.

Hippophaë L., Sanddorn, XXII. IV., Elaeagneae.

rharnoides L., gemeiner, ♀. f. Mittel- u. Nordeuropa.

β) *angustifolia* Lodd.

salicifolia D. Don, weidenblättriger, ♀. f. b. Nepal.

argentea Pursh et *canadensis* L. v. *Shepherdia* argent. etc.

Hippuris L., Wasserwedel, I. I., Halorageae-Hippurideae.

vulgaris L., gemeiner, 4. Wa. f. Europa, Amerika.

β) *maritima* Hell. (*lanceolata* Retz., *tetraphylla* L. suppl.)

Hiptage G., Hiptage, X. I., Malpighiaceae.

Manablota G., ostindische, ♀. Sch. w. Ostindien.

obtusifolia DC., stumpfblättrige, ♀. Sch. w. China.

- Hiraea** Jacq. (J. M. de la Hire, franz. Arzt und Naturforscher), X. III., Malpighiaceae.
glaucescens Lodd., blaugrüne, ♀. Sch. w. Ostindien.
indica Roxb., indische, ♀. Sch. w. Ostindien.
nutans Roxb., nickende, ♀. Sch. w. Ostindien.
oblongifolia DC., länglichblättrige, ♀. Sch. w. Südamerika.
odorata W., riechende, ♀. Sch. w. Guinea.
reclinata Jacq., rückwärts geneigte, ♀. Sch. w. Westindien, Südamerika.
- Hirnellia-cotuloides** Cels. v. *Angianthus tomentosus* Nachtr.
- Hirtella** L., Haarbaum, V. I., Chrysobalanaceae.
racemosa Lam. (*paniculata* Vahl, *americana* Aubl.), traubiger, ♀. w. Südamerika.
triandra Sw. (*paniculata* Lam., *americana* Jacq.), dreimänniger, ♀. w. Westindien.
- Hoffmannseggia** Cav. (Graf v. Hoffmannsegg, ausgezeichnete deutscher Botaniker), X. I., Leguminosae-Caesalpinieae.
Falcaria Cav., sichelförmige, ♀. w. Chili, Buenos Ayres.
- Hohenackeria** Fisch. et Mey. (R. F. Hohenacker, ein Würtemberger, welcher die kaukasisch-georgischen Provinzen botanisch untersuchte), V. II., Umbelliferae.
bupleurifolia Fisch. et Mey., hasenöhrchenblättrige, ♂. f. Sonchetia.
- Hoitzia** Juss. (mexicanischer Name), V. I., Polemoniaceae.
coccinea Cav., scharlachfarbige, ♀. t. Mexico.
coerulea Cav., blaue, ♀. t. Mexico.
glandulosa Cav., drüsige, ♀. t. Mexico.
mexicana Lam., mexicanische, ♀. t. Mexico.
linearis Spgl. v. *Collomia linearis*.
- Holarrhena** RB., Röhrenbeutel, V. I., Contortae-Apocynaeae.
villosa Ait., zottiger, ♀. w. Ostindien.
- Holcus** L., Honiggras, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.
lanatus L., wolliges, 4. f. Europa.
mollis L., weiches, 4. f. Europa.
australis Schrad. etc. v. *Hierochloa australis*. *avenaceus* Scop. etc. v. *Arrenatherum avenaceum*. *cernuus* W. etc. v. *Sorghum cernuum*. *Gryllus* RB. v. *Chrysopogon Gryllus*, *spicatus* L. vid. *Penicillaria spicata*.
- Holigarna** Buchan., Roxb. (ostindischer Name), V. III. (XXIII. I.), Amyrideae-Cassuvieae.
longifolia Roxb., langblättrige, ♀. w. Ostindien.
- Holmskioldia** Retz (Th. Holmskiold, dänischer Botaniker), XIV. II., Verbenaceae.
sanguinea Retz, blutfarbige, ♀. w. Bengalen.
scandens Swt., klimmende, ♀. Sch. w. Ostindien.
- Hologymne glabrata** Bartl. v. *Lasthenia californica*.
- Holoschoenus vulgaris** Lk. v. *Isolepis Holoschoenus*.
- Holosteum** L., Spurre, III. III., Caryophyllaceae-Alsineae.
diandrum Sw., zweimännige, ♂. f. Jamaica.
sperguloides Lehm., sparkähnliche, ♂. f. ?
umbellatum L., doldige, ♂. f. Europa.

Holosteum

cordatum L. v. *Drymaria cordat. liniflorum* Stev.
v. *Alsine glutinosa*.

Homalium Jacq., *Homalium*, XIII. III., Amygdalaceae-Homalineae.

racemosum Jacq., traubiges, ♀. w. Westindien.

Homeria Vent. (Homer, berühmter griechischer Dichter), III. I. (XVI. I.), Irideae.

collina Swt., Hügel-H., 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.
elegans Swt., zierliche, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.
exaltata Swt., hohe, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.
flaccida Swt., schlaffe, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. Hoffn.
flexuosa Swt., gebogene, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.
lineata Swt., linirte, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.
miniata Swt., mennigrothe, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.
porrifolia Swt., porreiblätterige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.
spicata Swt., ährige, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.
virgata Swt., ruthenförmige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

Hookeria coronaria Salisb. v. *Brodiaea grandiflora*.

Hopkirkia scandens Spgl. v. *Salmea scandens*.

Hoplophyllum DC., Stechblatt, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

spinosum DC., kapisches, ♀. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

Hoplotheca Nutt., Schlauchkelch, V. I., Aizoideae-Amarantheae.

floridana Nutt., floridanische, 4. k. Florida.
interrupta Nutt., unterbrochene, ♂. w. Westindien.
lactea Mart., milchweisse, ♀. w. Südamerika.
lanata Mart., wollige, ♂. w. Südamerika.
sericea Mart., seidenhaarige, ♂. w. Brasilien.

Hoppea speciosa Rchbch. v. *Ligularia speciosa*.

Hordeum T., Gerste, III. II., Gramineae.

bulbosum L. (*strictum* Dsf.), knollige, 4. f. Italien, Istrien, Orient, Nordafrika.

capense Thbg., capische, 4. k. Cap der guten Hoffn.
distichum L., zweizeilige, ☉. f. Mitteleuropa, Tatarei.
β) *nudum* Arduin. (*imberbe* R. et S.).

hexastichon L., sechzeilige, ☉. ♂. f. ?

himalayense Rittig (*nepalense* Swt.), Himalaya-G., ☉. f. Nepal.

Hystrix Roth, igelgrannige, ☉. f. Spanien.

jubatum L., mähnige, ☉. f. Nordamerika.

maritimum Wither. (*geniculatum* All., *rigidum* Roth), Seestrands-G., ☉. f. Europa.

marinum L., Mäuse-G., ☉. f. Europa, Orient, Südamerika, Cap.

β) *chilense* Brogn.

nodosum L. (*pratense* Huds., *secalinum* Schreb.), kno-
tige, 4. f. Europa.

vulgare L., gemeine, ☉. f. Sicilien, Tatarei.

β) *coeleste* Viborg. γ) *nigrum* W.

Zeocriton L., Bart-G., ☉. f. Europa.

β) *complanatum* P. B.

Horkelia Chamiss. (J. Horkel, Professor zu Berlin), X. I., Rosaceae.

congesta Doug., gedrängte, 4. f. Nordamerika.

fusca Lindl., braune, 4. f. Nordamerika.

- Horminum** L., Scharlachkraut, XIV. i., Labiatae.
pyrenaicum L., pyrenäisches, 4. f. Oesterreich, Tyrol, Schweiz, Pyrenäen.
virginicum DC., virginisches, 4. f. Virginien.
caulescens Orteg. v. *Lepechinia spicata*.
- Hornemannia** W. (Hornemann, Professor der Botanik zu Koppenhagen), XIV. ii., Personatae-Antirrhineae.
bicolor W., zweifarbig, 4. f. m. Ostindien.
ovata Lk. et *viscosa* W. v. *Tittmannia ovata* etc.
- Hortensia** *opuloides* Lam. (*speciosa* P.) vid. *Hydrangea hortensis*.
- Hosackia** Dougl. (Dr. Hosack, Arzt zu New York), XVII. iv., Leguminosae-Papilionaceae.
bicolor Dougl., zweifarbig, 4. f. Nordamerika.
Purshiana Bot. reg., Pursh's, 4. Sch. f. Nordamerika.
stolonifera Lindl., sprossende, 4. f. Nordamerika.
- Hostia** Jacq. (N. Th. Host, Arzt u. Botaniker zu Wien), II. i., Verbenaceae.
coerulea Jacq., blaue, 4. w. Mexico,
longifolia Humb., langblättrige, 4. w. Mexico.
- Hottonia** Boerh. (P. Hotton, Professor der Botanik zu Leyden), V. i., Primulaceae.
palustris L., sumpfliebende, 4. Wa. f. Europa.
- Houstonia** L. (W. Houston, englischer Botaniker), IV. i., Rubiaceae.
albiflora Grah., weisblumige, 4. k. f. h. Nordamerika.
ciliata Loud., gefranzte, 4. k. Nordamerika.
coerulea L., blaue, 4. k. f. b. Nordamerika.
longifolia W., langblättrige, 4. k. f. b. Nordamerika.
purpurea L. (*varians* Mchx., *pubescens* Rafin.), purpurfarbig, 4. k. f. b. Nordamerika.
coccinea Andr. v. *Bouvardia Jacquini*.
- Houttuynia** Thbg. (D. Houttuyn, holländischer Naturforscher), III. iii., Aroideae.
cordata Thbg., herzförmige, 4. w. Japan.
foetida Hort., stinkende, 4. w. Japan.
- Hovea** RB. (W. How, alter englischer Botaniker, A. P. Hove, polnischer Botaniker nach Loudon), XVII. iv. (XVI. vi.), Leguminosae-Papilionaceae.
apiculata Cunn., kurzspitzige, 4. t. Neuholland.
Celsii Bonpl., Cels's, 4. t. Neuholland.
crispa Lindl., krause, 4. t. Neuholland (Schwanenfluß).
elliptica DC., elliptische, 4. t. Neuholland.
lanceolata Sims, lanzettliche, 4. t. Neuholland.
lanigera Lodd., wollige, 4. t. Neuholland.
latifolia Lodd., breitblättrige, 4. t. Neuholland.
linearis RB., gleichbreitblättrige, 4. t. Neuholland.
longifolia RB., langblättrige, 4. t. Neusüdwallis.
Manglesii Lindl., Mangles's, 4. t. Neuholland (Schwanenfluß).
mucronata Cunn., stachelspitzige, 4. t. Neuholland.
pannosa Cunn., faserlappige, 4. t. Neuholland.
pungens Hügel, stechende, 4. t. Neuholland.
purpurea Swt., purpurfarbig, 4. t. Neuholland.
rosmarinifolia Cunn., rosmarinblättrige, 4. t. Neuholl.
villosa Lindl., zottige, 4. t. Neuholland.
chorizemaefolia DC. et *ilicifolia* Cunn. v. *Plagiolobum chorizemaefol.* etc.

Hovenia Thbg. (D. v. der Hoven, Senator zu Amsterdam), V. I., Rhamneae.

dulcis Th., süsse, f. t. Japan, Nepal,
inaequalis DC. (*dulcis* D. Don, *pubescens* Swt., *acerba* Lindl.), ungleiche, f. t. Nepal.

Hoya RB. (T. Hoy, englischer Gärtner), V. II., Asclepiadeae.

carnosa RB. (*crassifolia* Haw.), fleischige, f. Sch. w. Südasien, Neuholland.

lanceolata Wall., lanzettliche, f. Sch. w. Ostindien.

pallida Lindl. (*lanceolata* Hort., *acuta* Haw.), bleiche, f. Sch. ? China.

Pottsii Hort., Pott's, f. Sch. w. China.

trinervis Hort., dreinervige, f. Sch. w. China.

viridiflora RB., grünblumige, f. Sch. w. Ceylon.

Hudsonia L. (W. Hudson, englischer Botaniker), XI. I., Cistineae.

ericoides L., heideähnliche, f. k. Nordamerika.

Nuttalli Swt., Nuttall's, f. k. Virginien.

tomentosa Nutt., filzige, f. k. Nordamerika.

Hügelia Rehb. (Baron v. Hügel, Director der botanischen Anstalten zu Wien), V. II., Umbelliferae.

cyanea Rehb. (*coerulea* Hort.), kornblumenblaue, c. t. m. Neuholland.

Hügelia densifolia Benth. etc. vid. *Welwitschia densifolia* etc.

Huernia RB. (J. Huernius, Sammler von Cappflanzen), V. II., Asclepiadeae.

barbata RB., bärtige, 4. f. t. w. Cap d. gut. Hoffn.

campanulata RB., glockige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

clavigera Haw., keulige, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

crispa Haw., krause, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

guttata RB., getüpfelte, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

humilis RB., niedrige, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

lentiginosa RB., sommersprossige, 4. f. t. w. Cap der guten Hoffnung.

ocellata R. et S., Spgl., augenfleckige, 4. f. t. w. Cap der guten Hoffnung.

reticulata RB., netzförmige, 4. f. t. w. Cap der guten Hoffnung.

tubata RB., röhrlige, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

venusta RB., schöne, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

Hugonia L. (Dr. A. J. Hugo, ein Hannoveraner, Freund von Haller), XVI. VI., Malvaceae-Dombeyaceae.

Mystax L., bartige, f. w. Ostindien.

serrata Lam., sägezahnige, f. w. Mascarenas.

Humea Sm. (Lady Hume, Freundin der Pflanzenkunde), XIX. I., Compositae-Helichryseae.

elegans Sm., zierliche, f. ♂. t. Neusüdwallis.

Humulus L., Hopfen, XXII. v., Urticaceae.

Lupulus L., gemeiner, 4. Sch. f. Europa, Nordamer.
 b) *variegatus* J. Cree.

Hunnemannia Swt. (J. Hunnemann, englischer Botaniker), XIII. I., Papaveraceae.

fumariaefolia Swt., erdrauchblättrige, 4. t. Mexico.

Huntleya Batem. (John Thomas Huntley, englischer Gartenfreund), XX. I., Orchideae.

meleagris Lindl., schachblumenähnliche, 4. w. Brasilien.

Huntleya

violacea Lindl., violette, 4. w. ?Brasilien.

Hura L., Sandbüchsenbaum, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

brasiliensis W., brasilianischer, 5. w. Brasilien.

crepitans L., rauschender, 5. w. Südamerika.

strepens W., brausender, 5. w. Südamerika.

Hutchinsia RB. (Miss Hutchins, irländische Kryptogamologin), XV. II., Cruciferae.

alpina RB., Alpen-H., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

brevicaulis Hoppe, kurzstengelige, 4. f. Kärnth., Salzburg, Tyrol.

calycina Desv., gekelchte, 4. f. Sibirien.

petraea RB., felsenliebende, ☉, f. Europa.

cepeaefolia DC. (et *rotundifolia* RB.) etc. v. *Thlaspi*

cepeaefol. etc. *procumbens* Desv. v. *Capsella procumbens*.

Hyacinthus T., Hyacinthe, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

amethystinus L., amethystblaue, 4. Zw. f. Spanien.

brumalis Haw., Winter-H., 4. Zw. f. ?

orientalis L., morgenländische, 4. Zw. f. b. Klein- u. Mittelasien.

b. ruber. c. flavus. d. albus. e. multiplex. f. semiplenus.

paradoxus Fsch. et Mey., wunderbare, 4. Zw. f. Südrussland, (Garül).

botryoides L., *comosus* L. etc. v. *Muscari botryoides* etc., *dubius* Guss. (et *romanus* L.) v. *Bellevallia dubia* etc. *non scriptus* L. etc. v. *Scilla nutans* etc. *revolutus* L. v. *Drimia revoluta*, *viridis* L. v. *Zuccagnia viridis*.

Hyaenanche Lamb., Giftstrauch, XXII. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

globosa Lamb., kugeliger, 5. t. Cap der guten Hoffn.

Hydrangea L., Wasserstrauch, X. II., Corniculatae-Cunoniaceae.

arborescens L. (*vulgaris* Pursh, *frutescens* Mönch), baumartiger, 5. f. Virginien.

β) *discolor* Ser.

cordata Mchx., herzblättriger, 5. f. b. Carolina.

heteromalla Wall., verschiedenwendiger, 5. k. f. b. Nepal.

hortensis Sm., Garten-W., (Hortensie), 5. l. k. b. China, Japan.

nivea Mchx. (*radiata* Walt., *glauca* Hortul.), schneeweißser, 5. f. b. Carolina, Louisiana.

β) *glabella* Ser.

quercifolia Bartr. (*radiata* Sm.), eichenblättriger, 5. k. f. b. Florida, Georgia.

Hydrastis L., Sumpfranunkel, XIII. VI., Ranunculaceae.

canadensis L., canadische, 4. Kn. k. f. b. Canada.

Hydrocharis L., Froschbiss, XXII. VIII., (IX. III.), Hydrocharideae.

Morsus ranae L., gemeiner, 4. Wa. f. Europa.

Hydrochloa aquatica Hartm. etc. v. *Glyceria spectabilis* etc.**Hydrocotyle T.**, Wassernabel, V. II., Umbelliferae.

americana L., amerikanischer, 4. Wa. f. Nordamerika.

asiatica L. (*Thunbergiana* Spgl., *natans* Thbg.), asiati-

Hydrocotyle

scher, 4. Wa. k. t. Ost- und Westindien, Cap der guten Hoffnung.

bonariensis Lam. (*multiflora* R. et P.), bonarischer, 4. t. w. Südamerika.

chinensis L., chinesischer, 4. t. China.

hirsuta Sw. (*spicata* Lam.), rauhhaarer, 4. w. Westindien.

natans, Cyrill., schwimmender, 4. Wa. k. Neapel.

nepalensis Hook., nepal'scher, 4. t. Nepal.

nitidula Rich., glänzender, 4. w. Java.

peduncularis RB., gestielter, 4. k. t. Neuholland.

plebeja RB., neuholländischer, 4. Wa. k. t. Neuholland.

prolifera Lk. et Otto, sprossender, 4. w. Brasilien.

ranunculoides L., ranunkelähnlicher, 4. k. Mexico.

reniformis Thbg., nierenförmiger, 4. t. Cap d. g. Hoffn.

repanda P., ausgeschweiffter, 4. Wa. k. Nordamerika.

sibthorpioides Lam., sibthorpiaähnlicher, 4. w. Mascarenas.

triloba Thbg., dreilappiger, 4. t. Cap d. guten Hoffn.

umbellata L., doldiger, 4. k. f. Nordamerika, Westindien.

villosa L., zottiger, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

vulgaris L., gemeiner, 4. Wa. f. Europa, Nordamerika, Japan.

β) Schkuhriana Rchb.

Spananthe W. v. *Spananthe paniculata*.

Hydroglossum hirsutum W., *japonicum* W. etc. v. *Lygodium polymorphum japonicum* etc.

Hydrolea L., Wasserwinde, V. II., Convolvulaceae-Hydroleae.

quadrivalvis Walt. (*caroliniana* Mchx.), vierklappige, 4. k. Carolina.

spinosa L., dornige, 4. Wa. w. Südamerika.

Hydropeltis Mchx., Wasserschild, XIII. VI., Hydrocharideae-Hydropeltideae.

purpurea Mchx., purpurfarbiges, 4. Wa. k. Nordamerika.

Hydrophyllum L., Rinnenblume, (Wasserblatt), V. I., Hydrophyllaeae.

canadense L., canadisches, 4. f. Nordamerika.

virginicum L., virginisches, 4. f. Nordamerika.

appendiculatum Mchx. v. *Nemophila paniculata*.

magellanicum Lam. v. *Phacelia circinata*.

Hydropyrum Lk., Wasserkorn, VI. II., (XXI.), Gramineae.

esculentum Lk., genießbares, ④. Wa. f. Nordamerika.

fluitans Kunth, schwimmendes, ④. Wa. f. Nordamerika.

Hydrotaria Lindl., Wasserstendel, XX. I., Orchideae.

meleagris Lindl., schachblumenähnlicher, 4. w. Mexico.

Hygrophila RB., *Hygrophila*, XIV. II., Acanthaceae.

ringens RB., rachenförmige, 4. w. Ostindien.

Hymenaea L., Heuschreckenbaum, X. I., Leguminosae-Caesalpinieae.

Candolleana, H. B. K., Candolle's, 4. w. Mexico.

Courbaril L., gemeiner, 4. w. Südamerika.

verrucosa G., warziger, 4. w. Madagascar.

Hymenanthera RB., Hautbeutel, V. I., Violaceae.

dentata RB., gezahnter, 4. t. Neuholland.

Hymenocallis Herb., Hautschwertel, VI. 1. Narcis-
seae-Amaryllideae.

Staplesii Herbert, Staples's, 4. Zw. w. Mexico.

Hinsichtlich der übrigen s. *Pancratium*.

Hymenocarpus Savi, Hauthülse, XVII. IV. (VI.), Le-
guminosae-Papilionaceae.

circinatus W. Lk., kieselnde, ☉. f. Spanien, Italien.

numularius W. Lk., pfennigkrautähnliche, ☉. f. Südeu-
ropa, Aegypten.

radiatus W. Lk., strahlige, ☉. f. Italien.

Hymenocrater Fisch. et Mey., Hautlippler, XIV. 1.,
Labiateae.

bituminosus Fisch. et Mey., harziger, ♀. k. Nordpersien.

Hymenodictyon Wall., Netzbaum, V. 1., Rubiaceae.

excelsum Wall., hoher, ♀. w. Ostindien.

thyrsiflorum Wall., straußblumiger, ♀. w. Ostindien.

Hymenogyne Haw., Hautgriffel. XII. II., Aizoideae-
Ficoideae.

glabra Haw., kahler, ☉. m. f. Cap d. guten Hoffnung.

Hymenopappus L'Her., Hautfederchen, XIX. 1., Com-
positae-Eupatorineae.

pedatus Lagasc., fußförmiges, ☉. f. Südamerika.

scabiosaeus L'Her., scabiosenähnliches, ☉. f. Carolina.

tenuifolius Pursh, feinblättriges, ☉. f. Louisiana.

glaucus Sogl. v. *Cephalophora glauca*, *integrifolius*

Sogl. v. *Polypteris integrifolia*.

Hymenophyllum Sm., Hautfarn, XXIV. 1., Pterioideae.

tunbridgense Sw., kleiner, 4. k. f. Süd- und West-
europa, Norwegen, Neuholland etc.

Wilsoni Hook., Wilson's, 4. k. f. England.

alatum Engl. botan. v. *Trichomanes brevisetum*.

Hymenopyramis Wall., Hautkräutel, XIV. II., Ver-
benaceae.

brachiata Wall., armförmiges, ♀. w. Ostindien.

Hymenospron Sogl., Hauthülse, XVII. IV. (VI.), Le-
guminosae-Papilionaceae.

*molle** (Jacq.), weiche, 4. Sch. w. ?

sericeum Sogl., seidenhaarige, 4. Sch. w. Neugranada.

Hyoscyamus T., Bilsenkraut. V. 1., Solanaceae.

albus L., weißes, ☉. f. Südeuropa.

aureus L., goldfarbiges, 4. k. Orient, Süditalien.

β) *auriculatus* Ten.

Camerarii Fisch. et Mey., Camerarius's, ☉. f. Nord-
persien, Syrien.

canariensis Ker, canarisches, 4. ♀. k. Canarische Inseln.

micranthus Ledeb., kleinblumiges, ☉. f. Armenien.

muticus L. (*Datura* Forsk), unbewehrtes, ♂. ♀. k.
Aegypten, Arabien.

niger L., schwarzes, ☉. ♂. f. Europa.

β) *agrestis* W. K. (*annuus*).

orientalis MB., morgenländisches, 4. f. Caucasus.

pallidus W. K., bleiches, ☉. f. Ungarn.

physaloides L., schlottenähnliches, 4. f. Sibirien.

pusillus L., kleines. ☉. f. Persien.

reticulatus L., netzförmiges, ☉. f. Kleinasien, Aegypten.

Senecionis W., kreuzkrautähnliches, 4. ♀. k. Aegypten.

Scopolia L. v. *Scopolia carniolica*.

Hyoseris Juss., Schweinesalat, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

arenaria Schousb., Sand-S., ☉. f. Marocco.

lucida L., glänzender, 4. k. Sicilien, Aegypten.

radiata L., strahliger, 4. f. k. Südeuropa.

scabra L. (*microcephala* Cass.), scharfer, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

foetida L. v. *Lapsana foetida*, *hispida* Schousb. v.

Thrinia maroccana, *virginica* L. etc. v. *Krigia virginica* etc. Hinsichtlich der übrigen s. *Hedypnois*.

Hypecoum T., Lappenblume, IV. 11., Papaveraceae.

erectum L., aufrechte, ☉. f. Sibirien.

litorale Wulf., Ufer-L., ☉. f. Oesterreichisches Litorale, Mauritanien.

pendulum L., hängende, ☉. f. Südeuropa, Caucasus.

procumbens L., niederliegende, ☉. f. Südeuropa.

Hyperanthera *Moringa* Vahl. v. *Moringa pterygosperma*.

Hypericum T., Johanniskraut, XVIII. 11., Guttiferae-Hypericineae.

aegyptiacum L. (*creticum* Hort, *maritimum* Sbr.) aegyptisches, §. k. Aegypten, Creta.

aethiopicum Thbg., aethiopisches, 4. k. Cap d. g. Hoffn.

amoenum Pursh, liebliches, §. 4. Carolina, Georgien.

angulosum Mchx., kantiges, 4. f. Carolina.

Ascyron L., sibirisches, 4. f. b. Sibirien.

b. fol. variegat.

attenuatum Fisch., verdünntes, §. f. Sibirien.

axillare Lam. (*fasciculatum* W., *Coris* Walt.), achselständiges, §. f. Nordamerika.

balearicum L., balearisches, §. k. Balearische Inseln.

barbatum Jacq., härtiges, 4. f. Oesterreich, Ungarn.

calycinum L., großblumiges, §. f. b. Irland, Thracien.

canadense L., canadisches, 4. f. Nordamerika.

canariense L., canarisches, §. k. Canarische Inseln.

chinense Lam. (*monogynum* L.), chinesisches, §. k. China.

ciliatum Lam., gefranztes, 4. k. Griechenland, Süditalien.

cochinchinense Lour., cochinchinesisches, §. t. China, Cochinchina.

cordifolium DC. Chois. (*bracteatum* D. Don), herzblättriges, §. t. Nepal.

Coris L., vierblättriges, §. k. Südeuropa.

corymbosum Mühlbg., traubendoldiges, §. f. Nordamerika.

crispum L., krauses, 4. k. Südeuropa, Nordafrika.

dentatum Lois., gezahntes, 4. f. b. k. Südfrankreich.

dolabriforme Vent., hobelförmiges, 4. f. Nordamerika.

elatum Ait., hohes, §. f. b. ? Nordamerika, canarische Inseln.

elegans Stephani, (*Kohlianum* Spgl., *anagallidifolium* Presl.), zierliches, 4. Mitteldeutschland, Volhynien, Sibirien.

elodes L., Sumpf-J., 4. f. Deutschland, England, Frankreich, Sibirien.

elongatum Ledeb., verlängertes, 4. f. Sibirien.

empetrifolium W., rauschbeerenblättriges, §. k. Creta, Kleinasien.

ericoides L., heideähnliches, §. k. Spanien, Portugal.

fasciculatum Lam. (*aspalathoides* W.) büschelförmiges, §. f. b. k. Carolina.

Hypericum

- finbriatum* Lam. (*Richeri* Vill.), gefranztes, 4. f. Ungarn, Schweiz, franz., italienische Alpen.
 β) *androsaemifolium* Vill. (*alpinum* W. Kit.), ?
 γ) *calabricum* N. E.
floribundum Ait., blüthenreiches, $\frac{1}{2}$. k. Canarische Inseln.
foliosum Ait., blattrreiches, $\frac{1}{2}$. k. Azoren.
frondosum Mchx., belaubtes, 4. f. Nordamerika.
galioides Lam., labkrautähnliches, $\frac{1}{2}$. k. f. b. Nordamerika.
Gebleri Ledeb., Gebler's, 4. f. Altai.
glandulosum Ait., drüsiges, $\frac{1}{2}$. k. Canarische Inseln.
glaucum Mchx., blaugrünes, $\frac{1}{2}$. k. f. b. Nordamerika (Georgien).
grandifolium Chois., großblättriges, $\frac{1}{2}$. k. Canarische Inseln.
heterophyllum Vent., verschiedenblättriges, $\frac{1}{2}$. k. Persien.
hircinum L., stinkendes, $\frac{1}{2}$. f. Italien, Griechenland.
 b. minus.
hirsutum L., haariges, 4. f. Europa.
humifusum L., niedergestrecktes, ♂. 4. f. Europa, Caucasus.
 β) *Liottardi* Vill.
hyssopifolium Vill., ysopblättriges, 4. f. Dauphiné, Caucasus.
japonicum Thbg., japanisches, 4. f. b. Nepal, Japan.
involutum Chois., eingerolltes, 4. k. t. Nördl. Neuholland.
Kalmianum L., Kalm's, $\frac{1}{2}$. f. Virginien.
laevigatum Ait., glattes, 4. f. Nordamerika.
macrocarpon Mchx., (*ascyroides* W., *rostratum* Rafin), großfrüchtiges, 4. f. Nordamerika.
marylandicum Jacq. fil., marylandisches, 4. f. Nordamerika.
montanum L., Berg-J., 4. f. Europa.
myrtifolium Lam., myrtenblättriges, 4. f. Nordamerika.
nepalense Chois. DC. (*pallens* D. Don), nepal'sches, 4. f. b. Nepal.
nervosum D. Don (*elodeoides* Chois.), nerviges, 4. f. b. Nepal.
nudiflorum Mchx., nacktblumiges, 4. $\frac{1}{2}$. f. b. Nordamerika.
nummularium L., randblättriges, 4. f. b. k. Südfrankreich, Italien.
oblongifolium Chois. (*uralum* Hamilt.), länglichblättriges, $\frac{1}{2}$. f. b. k. Nepal.
olympicum L., olympisches, $\frac{1}{2}$. k. Kleinasien, Südchina.
orientale T., morgenländisches, 4. k. Kleinasien.
paludosum Chois., Sumpf-J., 4. f. Nordamerika.
patulum Thbg., ausgebreitetes, $\frac{1}{2}$. k. Japan, Nepal.
perforatum L., gemeines, 4. f. Europa, Nordamerika.
 β) *veronense* Schrk.
procumbens Mchx., liegendes, 4. f. Nordamerika.
prolificum L. (*Kalmianum* du Roi), sprossendes, $\frac{1}{2}$. f. Nordamerika.
pulehrum L., schönes, 4. f. Deutschland, Frankreich, England.
punctatum Lam., punktirtes, $\frac{1}{2}$. f. Nordamerika.
pusillum Chois., kleines, 4. k. Nördliches Neuholland.

Hypericum

pyramidatum Ait. (*amplexicaule* Lam.), pyramidales, 4. f. Nordamerika.

quadrangulare L. (*delphinense* Vill., *maculatum* Crtz., All., *dubium* Leers), vierkantiges, 4. f. Europa.

quinquenervium Walt. (*parviflorum* W.), fünfnerviges, 4. k. Pennsylvanien, Carolina.

reflexum L., suppl., zurückgebogenes, 5. k. Teneriffa.

rosmarinifolium Lam. (*densiflorum* Pursh), rosmarinblättriges, 4. 5. k. Carolina, Virginien.

Salicaria Rchb., weiderichähnliches, 4. f. Sibirien.

serpyllifolium Lam., quendelblättriges, 5. k. Syrien, Persien.

setosum Ait., horstiges, 4. k. Carolina.

simplex Mchx., einfaches, ☉. f. Nordamerika.

tetrapterum Fries (*quadrangulare* Sm., *quadrialatum* Wahlbg.), vierflügeliges, 4. f. Europa.

tomentosum L., filziges, 4. k. Süd- und Westeuropa.

triplinerve Vent., dreinerviges, 4. f. Nordamerika.

undulatum Schousb., wellenblättriges, 4. f. Nordafrika.

verticillatum Thbg., wirtelblättriges, 5. k. t. Cap der guten Hoffnung.

virgatum Lam., ruthenförmiges, 4. f. Nordamerika.

virginicum L., virginisches, 4. f. Nordamerika.

alternifolium La Bill. vid. *Reaumuria hypericoides*.

Androsaemum L. v. *Androsaemum officinale*. *guianense* Aubl. v. *Vismia guianensis*.

Hypphaene G., Lederpalme, XXII. VI. (VI. III.), Palmae..

coriacea G., ägyptische, 5. w. Oberägypten.

Hypocalyptus Thbg., Mützenginster, XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

obcordatus Thbg., verkehrtherzblättriger, 5. t. Cap der guten Hoffnung.

Hypochaeris Vaill., Ferkelkraut, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

arachnites Biv., spinnewebiges, ☉. f. Sicilien, Spanien.

Balbisii Loisel. (*intermedia* Richt.), Balbis's. ☉. f. Deutschland, Italien, Frankreich.

canescens Steven., grauliches, 4. f. Caucasus.

dimorpha Broter., änderndes, ☉. f. Portugal.

glabra L., glattes, ☉. f. Europa.

hispida W., hackeriges, ♂. 4. f. Südeuropa.

macrorrhiza Günth., großwurzeliges, 4. f. Calabrien.

maculata L., geflecktes, 4. f. Europa, Caucasus.

minima Dsf., kleinstes, ☉. f. Nordafrika.

radicata L., langwurzeliges, 4. f. Europa.

uniflora Vill. (*helvetica* Jcq.), einblumiges, 4. f. Mittel-europäische Alpen.

pinnatifida Cyril. v. *Robertia pinnatifida*.

Hypoestes Soland., Hüllklau, II. I., Acanthaceae.

fastuosa RB., prächtiger, 5. w. Ostindien.

involuta Spgl. (Roxb.), häutiger, 5. w. Calcutta.

purpurea RB., purpurfarbiger, 4. w. China.

serpens RB., kriechender, 4. w. Mascarenas.

Hypolaena RB., Hypolaene, III. I. (XXII. II.), Restiaceae.

exsulca RB., ausgefurchte, 4. k. t. Neuholland, Van-Diemens-Land.

Hypolaena

fastigiata RB., gipfelständige, 4. k. t. Neuholland.
Van-Diemens-Land.

Hypolytrum Rich. (*Hypoelytrum* Auctor.), *Hypolytrum*, III. 1., Cyperaceae.

argenteum Vahl, silberfarbiges, 4. w. Ostindien, Westafrika, Südamerika.

senegalense Rich., senegal'sches, 4. w. Senegal.

Hypoxis L., Härtling, VI. 1., Narcisseae-Hypoxideae.

alba L., weißer, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

aquatica L., Wasser-H., 4. Wa. k. t. Cap d. gut. H.

breviscapa H. B. K., kurzschäftiger, 4. t. w. Südamer.

carolinensis Mchx. (*filifolia* Ell.), carolinischer, 4. k. Carolina.

decumbens L., niederliegender, 4. w. Jamaica.

elegans Andr., zierlicher, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

erecta L., aufrechter, 4. f. k. Nordamerika.

gracilis Lehm., schlanker, 4. Zw. t. k. Mexico.

hygrometrica La Bill., hygrometrischer, 4. k. t. Neuholl.

juncea Sm., simsenähnlicher, 4. k. Carolina.

linearis Andr., gleichbreiter, 4. k. t. Cap d. gut. H.

multiflora Rehb., vielblumiger, 4. k. t. Cap d. g. H.

obliqua Jacq., schiefblättriger, 4. k. t. Cap d. g. H.

obtusa Burch., stumpfkroniger, 4. k. t. Cap d. g. H.

ovata Thbg., eiförmiger, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

pratensis RB., Wiesen-H., 4. k. t. Neuholland.

ramosa Lodd., ästiger, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

scabra Lodd., scharfer, 4. Zw. k. t. Cap der gut. H.

serrata L., sägeblättriger, 4. k. t. Cap d. gut. Hoffn.

sobolifera Jacq., wurzelsprossender, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

stellata L., sternförmiger, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

stellipilis Ker, sternhaariger, 4. k. t. Cap d. gut. H.

veratrifolia W. (*plicata* Jcq.), germerblättriger, 4. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

villosa L., zottiger, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Hyptis Jcq., Linksblume, XIV. 1., Labiatae.

albida H. B. K., weißliche, ♀. w. Mexico.

brevipes Poit. (*globifera* Meyer), kurzstielige, ☉. w. Südamerika.

canescens Humb., grauliche, ♂. w. Caracas.

capitata Jacq., kopfförmige, ♂. w. Westindien.

Chamaedrys W., gamanderblättrige, ♂. w. Cayenne, Guiana.

ebracteata RB. (*suaveolens* Poit.), deckblattlose, ☉. w. Westindien.

inflata Spgl., aufgeblasene, ♂. w. Brasilien.

nepetoides Fisch. (*persica* W.), katzenmünzenähnliche, ♀. k. Persien.

pectinata Poit., kammförmige, 4. w. Westindien.

Plumieri Poit., Plumier's, ♂. w. Westindien.

Pohliana Jcq. fil., Pohl's, ☉. w. Brasilien.

polyanthos Poit. (*lamifolia* Weinm.), vielblumige, ♂. w. Südamerika.

polystachya H. B. K., vielährige, ♂. w. Mexico, Westindien.

Pseudo-Chamaedrys Poit., unächte Gamander-L., ♂. w. Westindien.

radiata W., strahlige, 4. k. Carolina, Mexico.

Hyptis

recurvata Poit., zurückgekrümmte, 4. w. Cayenne.
scoparia Poit., besenartige, ☉. w. Westindien, Südamerika.

spicata Poit., ährige, ♂. w. Westindien.

stachyoides Lk., zistähnliche, ☉. w. Brasilien.

Hyssopus T., Ysop, XIV. 1., Labiatae.

angustifolius MB. (*orientalis* W.), schmalblättriger, ♀. f. Causasus.

officinalis L. (*Schleicheri* G. Don), officineller, ♀. f. Südeuropa, Sibirien.

b) *variegatus*. c) *flor. rubro*.

anisatus Nutt. (*discolor* Dsf.) et *Lophantus* L. etc.

v. *Lophantus anisatus* etc. *cristatus* Lam. et *ocymifolius* Lam. v. *Elsholtzia paniculata* et *cristata*.

Iberis Rupp., Dill., Schleifenblume, XV. II., Cruciferae.
amara L., bittere, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

β) *minor* Koch (*ruficaulis* Lej.).

cappadocica W., cappadocische, ♀. k. Kleinasien.

carnosa W. (*cepeaefolia* Pourr., *spathulata* DC., *rotundifolia* Lam.), fleischige, ☉. f. Pyrenäen.

conferta Lagasc., gedrängte, ♀. f. b. k. Spanien.

contracta P., dichtblumige, ♀. f. b. k. Spanien.

corifolia Bot. mag., corisblättrige, ♀. f. b. k. Südeuropa.

coronaria D. Don (*superba* Hort.), gekrönte, ☉. f. ?

divaricata Tausch, ausgesperrte, ☉. f. Oesterreichisches Litorale, Westdeutschland.

Garrexiana All., oberitalienische, ♀. f. b. k. Oberitalien.

gibraltarica L., gibraltarische, ♀. k. Spanien.

hispidula Tenor., steifhaarige, ☉. f. Südeuropa.

intermedia Guers., mittlere, ☉. ♂. f. Frankreich.

Lagascana DC., Lagasca's, ☉. f. Spanien.

linifolia L., leinblättrige, ☉. f. Südeuropa.

odorata L., riechende, ☉. f. Creta.

pinnata L. (*crenata* Lam.), gefiederte, ☉. f. Südeuropa.

Pruiti Tin., sicilianische, 4. ♀. k. Sicilien.

pubescens W., weichhaarige, ♀. k. Spanien.

saxatilis L., Gesteins-Sch., ♀. k. f. b. Südeuropa.

semperflorens L., immerblühende, ♀. k. Sicilien.

sempervirens L., immergrüne, 4. k. f. b. Italien, Creta.

Tenorii DC. (*cepeaefolia* Tenor.), Tenore's, 4. f. b. k. Neapel.

umbellata L., doldige, ☉. f. Griechenland, Spanien, Italien.

virginica Fisch. et Mey., virginische, ☉. f. Virginien.

violacea RB., violette, ☉. f. ?

cepeaefolia Wulf (et *rotundifolia* L. et *stylosa* Ten.)

v. *Thlaspi cepeaefol.* et *rotundifol.* etc. *nudicaulis*

L. v. *Teesdalia nudicaulis*.

Icacorea guianensis Aubl. v. *Ardisia acuminata*.

Ichnocarpus RB., Sohlenfrucht, V. 1., Contortae-Apocynae.

frutescens RB., strauchige, ♀. w. Ostindien.

Icica Aubl. (guianischer Name), X. 1., Amyrideae.

enneandra Aubl., neunmännige, ♀. w. Guiana.

guianensis Aubl., guianische, ♀. w. Guiana, Brasilien.

heterophylla DC., verschiedenblättrige, ♀. w. Guiana.

Ilex L., Stechhölse, IV. III., Sapotaceae-Aquifoliaceae.

angustifolia W. (*myrtifolia* Walt., *rosmarinifolia* Lam.), schmalblättrige, ♂. k. Carolina, Virginien.

β) *ligustrifolia* Pursh.

Aquifolium L., gemeine, ♂. ♂. f. b. Nordamerika, Europa.

b) *heterophyllum* Hort. c) *angustifolium* Hort.
d) *latifolium* Hort. e) *altaclerense* Hort. f) *marginatum* Hort. g) *laurifolium* Hort. h) *ciliatum* Hort. i) *ciliatum minus* Hort. k) *recurvum* Hort. (*recurva* Lk., *myrtifolia* Hort., *serrata* Dsf.). l) *serratifolium* Hort. m) *crispum* Hort. n) *ferox* Hort. (*echinata* Mill.). o) *crassifolium* Hort. p) *senescens* Swt. q) *albo-marginatum* Hort. r) *aureo-marginatum* Hort. s) *albo-pictum* Hort. t) *aureo-pictum* Hort. u) *ferox argenteum* Hort. (*echinat. argent.*). v) *ferox aureum* Hort. w) *fructu luteo* Hort. x) *fructu albo*.

balearica Dsf. (*maderensis* W.), balearische, ♂. ♂. k. Balearische und canarische Inseln.

canariensis Poir., canarische, ♂. ♂. k. Canarische Inseln.

Cassine L., Ait. (*caroliniana* Mill., *cassinoides* Lk., *laurifolia* Hort.), lorbeerblättrige, ♂. k. Carolina.

b) *angustifolia*.

cassinoides Dum. Cours., cassinenähnliche, ♂. k. ?

chinensis Ker, Sims, chinesische, ♂. k. China.

crocea Thbg., safranfarbige, ♂. k. t. Cap d. gut. H. Dahoon Walt., Dahoon-St., ♂. k. Carolina.

β) *laurifolia* Nutt.

laxiflora Lam., lockerblumige, ♂. k. Carolina.

myrtifolia Lam., myrtenblättrige, ♂. w. Westindien.

opaca Ait. (*quercifolia* Meerb.), dunkle, ♂. f. b. k. Carolina.

b) *macrodon*. c) *latifolia*. d) *acuminata*. e) *globosa*.

paraguaiensis A. St. Hil., theegebende, ♂. f. w. Paraguay, Brasilien.

Perado Ait., *Perado*-St., ♂. k. Madeira.

salicifolia Jacq., weidenblättrige, ♂. w. Mascarenen.

vomitaria Ait. (*ligustrina* Jacq., *Cassena* Mchx., *religiosa* Bartr., *floridana* Lam.), brechennerregende, ♂. k. Carolina, Florida.

aestivalis Lam. (*prinoides* Ait., *decidua* Walt.) vid. *Prinos deciduus*. *canadensis* Mchx. v. *Nemopantes canadensis*. *myrsinites* Pursh vid. *Myginda myrtifolia*.

Illecebrum Rupp., Knorpelkelch, V. n., Portulacaceae-Paronychieae.

diffusum W., ausgebreiteter, 4. t. w. Südamerika.

echinatum Poir., stacheliger, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

glomeratum Hffg., knaulförmiger, 4. w. Brasilien.

gomphrenoides W., kugelamaranthähnlicher, ☉. m. f. Peru.

leucurum Lichtstn., weißschwänziger, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

verticillatum L., wirtelförmiger, ☉. f. Europa.

Hinsichtlich der übrigen s. *Paronychia*, *Philoxerus* et *Polycarpaea*.

Illicium L., Anisbaum, XIII. VI., Magnoliaceae.

anisatum L., ächter, ♀. k. Japan, China.

floridanum L., floridanischer, ♀. k. Florida.

parviflorum Mchx., kleinblumiger, ♀. k. Florida.

Imatophyllum Aitoni Hook. v. *Clivea nobilis*.

Impatiens Riv., Springsame (Wolfskraut), V. I., Balsamineae.

borealis Swt., nördlicher, ☉. f. Dänemark.

cristata Wall., kammiger, ☉. f. Mongolei, China.

discolor DC., verschiedenfarbiger, ☉. f. Nepal.

fulva Nutt. (*biflora* W.), rothgelber, ☉. f. Nordamer.

leptoceras Wall. (*micrantha* D. Don, *longicornu* Wall.), schlanksporniger, ☉. f. Nepal.

natans W., schwimmender, ☉. Wa. f. t. Ostindien.

Nolimetangere L., gemeiner, ☉. f. Europa, Nordamerika, Mittelasien.

pallida Nutt., bleicher, ☉. f. Nordamerika, England.

parviflora DC., kleinblumiger, ☉. f. Mongolei, Südrussland.

scapiflora Heyn. (*bulbosa* Morn., *acaulis* Arn.), schaftblumiger, 4. Kn. w. Ostindien.

triflora L., dreiblumiger, ☉. f. m. Ceylon.

tripetala Roxb., dreikroniger, ☉. f. m. Ostindien.

Hinsichtlich der übrigen s. Balsamina.

Imperata Cyril. (Ferrante Imperati, neapolitanischer Botaniker), III. II., Gramineae.

cylindrica P. Beauv. (*arundinacea* Cyril.), cylinderförmige, 4. f. b. k. Südeuropa, Nordafrika etc.

Königii P. Beauv., König's, 4. w. Ostindien.

spontanea P. Beauv., wilde, 4. w. Ostindien, Arabien.

Imperatoria T., Meisterwurz, V. II., Umbelliferae.

angustifolia Bell., schmalblättrige, 4. f. Schweiz, Oberitalien.

mexicana H. C., mexicanische, 4. f. Mexico.

Ostruthium L., ächte, 4. f. Europa, Cypern.

Chabraei Spgl. (*pimpinelloides* Bönningh. et *verticillaris* DC.) v. *Peucedanum Chabraei* etc. *montana* DC. (et *sylvestris* DC.) v. *Angelica montana* et *sylvestris*. *palustris* Bess. v. *Ostericum palustre*. *Seguieri* Spgl. v. *Ligusticum Seguieri*.

Incarvillea Juss., *Incarvillea*, XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.

chinensis Lam., chinesische, ♀. Sch. w. Südchina.

grandiflora Spgl., großblumige, ♀. w. k. China, Cap der guten Hoffnung.

tomentosa Spgl., filzige, ♀. t. Japan.

Indigofera L., Indigo, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

amoena Ait., lieblicher, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

angulata Rottl., kantiger, ☉. m. w. Ostindien.

angustifolia L., schmalblättriger, ♀. t. Cap d. gut. H.

Anil L., sichelfrüchtiger, ♀. w. Ost- und Westindien.

arborea Roxb., baumartiger, ♀. w. Ostindien.

argentea L., silberfarbiger, ♀. w. Ostindien, Arabien, Aegypten.

aspalathioides Vahl., witschenähnlicher, w. Ceylon.

atropurpurea Roxb. Hamilt., schwarzpurpurfarbiger, ♀. t. Nepal.

Indigofera

australis W. (*speciosa* Hort.), südlicher, ♀. t. Neu-Südwallis.
 candicans Ait., weifsllicher, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
 coriacea Ait., lederartiger, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
 cytisoides L. (*mucronata* Lam.), geißkleeähnlicher, ♀. t.

Cap der guten Hoffnung.

denudata Thbg., entblößter, ♀. t. Cap der guten H.
 diphylla Vent., zweiblättriger, ☉. m. f. Westafrika.

divaricata Jacq., ausgesperrter, ♀. t. ?

endecaphylla Jacq., elfblättriger, ☉. w. Guinea.

enneaphylla L., neunblättriger, ☉. w. m. Ostindien.

filifolia Thbg., fadenblättriger, ♀. t. Cap der gut. H.

filiformis Thbg., fadenförmiger, ♀. t. Cap. d. gut. H.

fragrans Retz., wohlriechender, ♀. w. Ostindien.

frutescens Thbg., strauchiger, ♀. t. Cap der guten H.

glabra L., kahler, ☉. w. m. Ostindien.

glandulosa Roxb., drüsiger, ☉. w. m. Ostindien.

Guatemala Lunan (*tinctoria* β. *brachycarpa* DC.), Guatimala-I., ♀. w. Westindien.

hedysaroides Lam., hahnenkopfähnlicher, ♂. w. Ostindien.

hirsuta L., rauhhaariger, ♀. w. Ostindien.

incana Thbg., weißgrauer, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

juncea Dum. Cours. (*filifolia* Ker, *aphylla* Lk.), simsenförmiger, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

lateritia W. (*rufescens* Poir., *hirsuta* Jacq.), ziegelfarbiger, ☉. w. m. Guinea, Ostindien.

leptostachya DC., schlankästiger, ♀. w. Ostindien.

Leschenaultii DC., Leschennault's, ☉. w. m. Ostindien.

linifolia Retz. (*polygonoides* Wendl.), leinblättriger, ☉. w. Ostindien.

lotoides Lam., schotenkleeähnlicher, ♀. t. Cap d. g. H.

microphylla Lam., kleinblättriger, ♀. t. Cap d. g. H.

nuda G. Don, nackter, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

procumbens L., niederliegender, 4. t. Cap d. guten H.

psoraleoides L., psoraleaähnlicher, ♀. t. Cap d. g. H.

pulchra W. Roxb., schöner, ♀. w. Ostindien.

rigida W., starrer, ♀. w. Ostindien.

sarmentosa Thbg., starkwurzelnder, 4. t. Cap d. g. H.

spinosa Forsk., dorniger, ♀. w. t. Arabien, Ostindien.

stipularis Lk., zwischenblättriger, ♀. t. Cap d. g. H.

stricta Thbg., steifer, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

sylvatica Sbr. (*angulata* Lindl.), waldiger, ♀. t. Neuholl.

tinctoria L. (*coerulea* Roxb.), ächter, ♀. w. Ostindien.

trifoliata L., dreiblättriger, ♂. w. Ostindien.

trita L. fil., mehlig, ♂. w. Ostindien.

violacea Roxb., violetter, ♀. w. Ostindien.

virgata DC., ruthenförmiger, ♀. w. Ostindien.

viscosa Lam. (*graveolens* Wendl.), schmieriger, ☉. w. m. Ostindien.

Inga Marcg. (südamerikanischer Name), XVI. VII. (XXIII. I.), Leguminosae-Mimoseae.

affinis DC., ähnelnde, ♀. w. Brasilien.

alba W., weiß, ♀. w. Cayenne.

anomala H. B. K., ungewöhnliche, ♀. w. Mexico.

bigemina W., zweipaarige, ♀. w. Ostindien.

Burgoni DC. (*marginata* W.), Bourgon's, ♀. w. Guiana

cinerea Humb., aschfarbige, ♀. w. Caracas.

circularis W., kreisförmige, ♀. w. Westindien.

comosa W., schopfige, ♀. w. Jamaica.

Inga

- dulcis W., süsse, *h.* w. Ostindien, Philippinen.
 emarginata Humb., Bonpl., ausgerandete, *h.* w. Südamerika, Martinique,
 fastuosa W., prächtige, *h.* w. Südamerika.
 Feuilleei DC., Feuillee's, *h.* w. Lima.
 filicina W., farnblätterige, *h.* w. Brasilien.
 foetida W., stinkende, *h.* w. Westindien.
 Houstoni DC., Houston's, *h.* w. Mexico.
 hymenoides (? *afzeloides* Lodd.), hymenaeaähnliche, *h.* w. Cayenne.
 latifolia W., breitblätterige, *h.* w. Westindien.
 laurina W., lorbeerähnliche, *h.* w. Westindien.
 macrophylla Humb., Bonpl., großblätterige, *h.* w. Südamerika.
 marginata W., berandete, *h.* w. Südamerika.
 mellifera W., honiggebende, *h.* w. Arabien.
 microphylla Humb., kleinblätterige, *h.* w. Cumana.
 nodosa W., knotige, *h.* w. Ceylon.
 pulcherrima Cav., schönste, *h.* w. Mexico.
 punctata W., punktirte, *h.* w. Westindien, Südamerika.
 purpurea W., purpurfarbige, *h.* w. Westindien.
 quassiaefolia W., quassienblätterige, *h.* w. Brasilien.
 rhoifolia W., rhusblätterige, *h.* w. Brasilien.
 setifera DC., borstentragende, *h.* w. Guiana.
 spectabilis W., ansehnliche, *h.* w. Südamerika.
 splendens W., schimmernde, *h.* w. Brasilien.
 spuria Humb., unächte, *h.* w. Südamerika.
 Tapinhuana Jacq. fil., Tapinhuana-L., *h.* w. Südamer.
 tergemina W., dreipaarige, *h.* w. Martinique.
 Unguis cati W., Katzenklauen-L., *h.* w. Westindien.
 velutina W., sammethaarige, *h.* w. Para.
 vera W., wahre, *h.* w. Südamerika, Westindien.
 xylocarpa DC., holzfrüchtige, *h.* w. Ostindien.
 Zygia DC., Zygia-L., *h.* w. Jamaica.

Inocarpus Forst., Fasernufs, X. 1., Sapotaceae.

edulis Forst., genießbare, *h.* w. Molucken, Südseeinseln.

Intybellia Cass., Wegleuchte, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

purpurea DC. (*rosea* Cass., *taurica* Less.), purpurfarbige,
 4. f. Taurien.

incarnata Monn., *praemorsa* Monn., *pulchra* Monn.
 v. *Crepis incarnata* etc. *Intybus praemorsus* Fr. v.
Crepis (Geracium) praemorsa.

Inula L., Alant, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

bifrons L., zweiflügeliger, 4. f. Südfrankreich, Italien,
 Ungarn.

britannica L., britannischer, 4. f. Europa, Mittelasien.
 β) *Oetteliana* Rchb.

Bubonium Jacq., knorpeliger, 4. f. Krain, Oesterreich,
 Schweiz, Taurien.

calycina Spgl. (*montana* Biv.), gekelchter, 4. f. Sicilien.
 campestris Bess., Feld-A., 4. f. Podolien. Taurien.

caspica Ledeb., caspischer, 4. f. Südrussland.

caucasica P., caucasischer, 4. f. Caucasus.

conyzoides Dsf., dürrwurzähnlicher, 4. f. Creta.

crithmoides L. (*crithmifolia* Wither.), meerfenchelähnlicher,
 4. f. b. k. England, Süd- und Westeuropa, Griechenland, Caucasus.

Inula

- ensifolia L., schwertförmiger, 4. f. Mittel-, Ost- und Süddeutschland, Galicien, Siebenbürgen, Taurien.
 foetida L., stinkender, ☉. f. Malta.
 germanica L., deutscher, 4. f. Mittel- und Ostdeutschland.
 glabra Bess., glatter, 4. f. Rußland.
 glandulosa Muss., W. (*orientalis* Lam.), drüsiger, 4. f. Caucasus.
 gossypina Mchx., wolliger, 4. f. b. Carolina, Florida.
 graminifolia Mchx. (*argentea* P.), grasblättriger, 4. f. Nordamerika.
 grandiflora W., großblumiger, 4. f. Caucasus,
 Helenium L., officineller, 4. f. Deutschland, England, Frankreich.
 hirta L., rauher, 4. f. Europa.
 hybrida Baumg., Bastard-A., 4. f. Oesterreich, Siebenbürgen, Podolien.
 mariana L. (*glandulosa* Lam., *trichophylla* Nutt.), marianischer, 4. f. Nordamerika.
 media MB., mittlerer, 4. f. Westdeutschland, Caucasus, Mittelasien.
 mollis Bernh., weicher, 4. f. ?
 montana L., Berg-A., 4. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.
 multicaulis Fisch. et Mey., vielstengelig, 4. f. Caspisches Meer.
 Oculus Christi L., weißblättriger, 4. f. Oesterreich, Croatien.
 quadridentata Lagasc., vierzähliger, 4. f. Spanien.
 salicina L., weidenblättriger, 4. f. Europa.
 saturejoides Mill. (*Saturejæ* Spgl.), satureiähnlicher, ♂. w. Neuspanien.
 squarrosa L. (*spiraeae* folia L. Lam.), sparriger, 4. f. Italien, Frankreich.
 suaveolens Jacq., starkriechender, 4. f. Südeuropa.
 Vaillantii Vill. (*cinerea* Lam.), Vaillant's, 4. f. Schweiz, Frankreich, Oberitalien.
 verbascifolia Poir. (*thapsoides* Spgl.), wollkrautblättriger, 4. f. Caucasus,
 arabica L., *dysenterica* L. etc. v. *Pulicaria arabica* etc. *saxatilis* Lam. et *tuberosa* Lam. vid. *Jasonia glutinosa* et *tuberosa*.

Ipomoea L., Trichterwinde, V. 1., Convolvulaceae.

- acuminata Vahl (*eustachiana* Jacq.), zugespitzte, 4. Sch. w. Westindien.
 Aitoni Lindl., Aiton's, 4. Sch. w. ?
 angularis W., kantige, ☉. Sch. w. Ostindien.
 angustifolia Jacq., schmalblättrige, ☉. w. f. Ostindien.
 armata R. et P. (*muricata* Cav. non Jacq.), bewaffnete, ♂. t. Mexico.
 barbigera Swt., bärtige, ☉. Sch. f. Nordamerika.
 Batatas Poir., R. et S., Bataten-T., 4. Kn. w. Südamerika.
 bicolor Swt. (Vahl), zweifarbige, ♂. Sch. w. Ostindien.
 bignonioides Sims, bignonienähnliche, 4. Kn. w. Cayenne.
 blanda Swt. (Roxb.), liebliche, ♂. Sch. w. Ostindien.
 Bona nox L., stachelige, ☉. Sch. w. m. Westindien, Neuspanien.

Ipomoea

- bonariensis Hook. (*Batatas bonariensis* Lindl.), bonarische, 4. Kn. w. Buenos Ayres.
- brasiliensis Mey., brasilianische, 4. w. Südamerika.
- cairica Swt. (*palmata* Forsk.), ägyptische, ♀. Sch. w. Aegypten.
- campanulata L., glockige, ☉. Sch. w. m. Ostindien.
- candicans Bot. mag., weißliche, 4. Sch. k. Nordamer.
- capitata (Vahl), kopfförmige, ☉. Sch. w. Ostindien.
- carnea Jacq., fleischfarbige, ☉. Sch. w. Südamerika.
- carolina L., carolinische, 4. Sch. f, k. Carolina.
- Cavanillesii R. et S. (*pentaphylla* Cav. non Jacq.), Cavanille's, ♀. Sch. w. Mexico.
- chryseides Ker, goldfarbige, 4. Sch. w. China.
- coccinea L., scharlachfarbige, ☉. m. f. Südamerika.
- coerulea Ker, blaue, ☉. Sch. m. w. Ostindien.
- coerulescens Roxb., bläuliche, 4. Sch. w. Ostindien.
- commutata R. et S., verwechselte, ☉. Sch. f. Nordamer.
- corymbosa Roth, traubendoldige, ♀. Sch. w. Westindien.
- cuspidata P., langspitzige, ☉. Sch. m. f. Südamerika.
- dasyperma Jacq. (*tuberculata* Ker, *senegaleusis* Lam.), rauhsamige, ☉. Sch. w. m. Ostindien, Westafrika.
- denticulata RB., gezähnelte, ☉. Sch. w. m. f. Ostindien, Neuholland.
- digitata L., fingerförmige, 4. Sch. w. Westindien.
- Dillenii Desf., Dillen's, ☉. Sch. w. m. Guinea.
- discolor Jacq., verschiedenfarbige, ☉. Sch. f. ?
- dissecta W., RB., schlitzblättrige, 4. Sch. w. Guinea, Neuholland.
- eriosperma Bert., wollsamige, 4. ☉. Sch. w. Brasilien, Westindien.
- fastigiata Swt. (Roxb.), gipfelständige, 4. Sch. w. Ostindien.
- filiformis Jacq., fadenförmige, ♂. Sch. w. Antillen.
- gangetica Swt. (Roxb.), Ganges-T., ♀. 4. Sch. w. Ostindien.
- glaucofolia L., blaugrünblättrige, 4. Sch. w. Mexico.
- gossypifolia W. (*insignis* Ker), baumwollenblättrige, ♀. Sch. w. Ostindien.
- grandiflora L., großblumige, ♀. Sch. w. Ostindien.
- hastigera H. B. K., spontonförmige, ♀. Sch. w. Mexico.
- hederacea L., Jacq. (*barbata* Roth), epheuähnliche, ☉. Sch. f. Nordamerika.
- hederaefolia L., epheublättrige, ☉. Sch. m. w. Westindien.
- hepaticaefolia Burm., L., leberkrautblättrige, ☉. Sch. f. Ostindien.
- heterophylla Orteg., W., verschiedenblättrige, 4. Sch. w. Westindien.
- hispida (Vahl), steifhaarige, ☉. Sch. w. m. Ostindien.
- Horsfalliae Hook., Horsfall's, 4. Sch. w. Afrika.
- Jalapa Bot. mag. (*Jalapa* β. *rosea* Bot. Reg.), Jalapa-T., 4. Kn. w. Südamerika.
- involucrata P. B., hüllige, ☉. Sch. w. m. Guinea.
- lacunosa L., grubichte, ☉. Sch. f. Nordamerika.
- latiflora Desf., breitblumige, ♀. Sch. w. Westindien.
- laurifolia Swt., (Roxb.), lorbeerblättrige, ♀. Sch. w. Ostindien.
- leucantha Jacq., weißblumige, ☉. Sch. m. w. Südamer.
- longiflora H. B. K., langblumige, 4. Sch. w. Südamer.

Ipomoea

- luteola* Jacq. (*angulata* R. et P.), gelbliche, ☉. Sch. f. Carolina, Südamerika.
macrorrhiza (L.), großswurzelige, 4. Kn. Westindien, Guiana.
malabarica (L.), malabarische, ♀. Sch. w. Ostindien.
maritima RB., Seestrand-T., 4. w. Ostindien.
Michauxii Swt. (*Jalapa* a. Bot. reg., *macrorrhiza* Mchx.), Michaux's, 4. Kn. Georgien.
multiflora Mill., vielblumige, ♂. Sch. w. Jamaica.
muricata Jacq. (*bona nox* β. *purpurascens* Bot. Reg.), weichstachelige, ☉. Sch. w. m. Ostindien.
mutabilis Ker, veränderliche, ♀. Sch. w. Südamerika.
Nil P., himmelblaue, ☉. Sch. m. w. Ostindien, Cap der guten Hoffnung.
noctiluca Herb. (*latiflora* Bot. reg.), leuchtende, ♀. Sch. w. Ostindien.
obscura (L.), dunkle, ☉. Sch. w. m. Ostindien.
paniculata RB. (*mauritiana* Jacq.), rispige, 4. Kn. w. Ostindien, Neuholland.
pandurata Bot. Reg. [(L.), geigenförmige, 4. Sch. f. Nordamerika.
parviflora Vahl, kleinblumige, ☉. Sch. w. m. Westind.
pendula RB., herabhängende, ♀. t. w. Neusüdwallis, Neucaledonien.
pentaphylla Jacq. (*pilosa* Cav.), fünfblätterige, ☉. Sch. w. m. Westindien.
Pes tigridis L., fußförmige, ☉. Sch. w. m. Ostindien.
pilosa Swt. (Roxb.), haarige, 4. Sch. w. Ostindien.
platanifolia (Vahl), platanusblätterige, 4. Sch. w. Westindien, Südamerika.
platensis Ker, Plata-T., 4. Sch. w. Südamerika.
polyanthes R. et S., vielblumige, ♀. Sch. w. Südamer.
pseudomuricata Bernh., unächte weichstachelige, ☉. Sch. w. ?
pudibunda Bot. reg., schamrothe, 4. Sch. w. Westind.
punctata R. et S., punktirte, 4. Sch. w. m. Südamer.
Purga Wender. (*Schiedeana* Zucc.), purgirende, 4. Sch. k. f. b. Mexico.
purpurea Lam., purpurfarbige (gemeine Garten-T.), ☉. f. Sch. Südamerika.
 b) *incarnata*. c) *varia*. d) *leucantha*.
Quamoclit L., gefiederte, ☉. Sch. w. m. Ost- und Westindien.
 b) *flore albo*.
quinqueloba (Vahl), fünflappige, 4. Sch. w. Westindien.
repanda Jacq., ausgeschweifte, ☉. Sch. w. Westindien.
reptans (L.), kriechende, 4. w. Ostindien.
Roxburghii Swt. (*multiflora* Roxb.), Roxburgh's, ♀. Sch. w. Ostindien.
rubro-coerulea Hook., rothblaue, ☉. 4. Sch. w. Mexico.
sagittaeifolia Pursh, Ker, pfeilblätterige, 4. Sch. f. b. Carolina.
sagittata Poir. (*Convolvulus Wheleri* Vahl), pfeilförmige, 4. Sch. f. Spanien, Nordafrika.
salicifolia Roxb., weidenblätterige, 4. Sch. w. Ostind.
sanguinea Vahl, blutrothe, ♀. Sch. w. Westindien.
scabra Gmel., Cav. (*scabrida* R. et S., *hirsutula* Hort. Gorenk., Hornem.), scharfe, ☉. Sch. w. Südamerika.

Ipomoea

- Schiedeana* Hamilt., Schiede's, 4. Sch. t. k. Mexico.
Sellowii Penny, Sellow's, 5. Sch. t. w. Brasilien.
senegalensis Lam., senegalische, 4. Kn. w. Guinea.
sepiaria Roxb., Zaun-T., 5. Sch. w. Ostindien.
setosa Ker, borstige, ①. Sch. w. Brasilien.
sibirica Jacq., sibirische, ①, Sch. f. Sibirien.
sinuata Ortega, buchtige, 4. Sch. k. t. Florida.
solanifolia W., nachtschattenblättrige, ♂. Sch. w. Westindien.
sphaerocephala D. Don, kugelblumige, ♂. Sch. w. Westindien, Nepal.
splendens G. Don, schimmernde, 4. Kn. w. Guinea.
stans Cav., steife, 4. Sch. t. f. b. Mexico.
stipulacea Swt. (Roxb.), zwischenblättrige, 4. w. Ostindien.
strigosa Roth, striegelige, ①. Sch. w. m. Ostindien.
tamnifolia L., schmeerwurzblättrige, ①. Sch. f. Westindien, Carolina.
ternata Jacq., dreizählige, 5. Sch. w. Brasilien.
ternifolia Cav., dreiblättrige, ①. m. w. Neuspanien.
tridentata Roth, dreizähnige, ①. Sch. w. m. Ostindien.
triloba L., dreilappige, ①. Sch. w. Westindien, Südamerika.
triquetra (Vahl), dreiseitige, 5. Sch. w. Westindien.
tuberculata Desr. (*stipulacea* Jacq.), kleinhöckerige, 5. Sch. w. Mascarenas.
tuberosa L., knollige, 4. kn. w. Westindien.
Turpethum (L.), Turbeth-T., 4. Sch. w. Ostindien, Neuholland.
tyrianthina Lindl., purpurblumige, 4. ? Kn. t. Mexico.
varia Roth, bunte, 4. Sch. w. Westindien.
venosa (Vahl), aderige, 5. Sch. w. Mascarenas.
villosa R. et P., zottige, ①. Sch. w. m. Peru.
violacea L., violette, ①. Sch. w. m. Südamerika, Westindien.
vitifolia Swt. (L.) weinblättrige, 5. Sch. w. Ostindien.
speciosa P. v. *Argyrea speciosa*.

Ipomopsis elegans Mchx. etc. (*Ipomeria eleg.* Nutt.) v. *Gilia pulchella* etc.

Iresine Pat. Br., Iresine, V. I., cxxii. v. Aizoideae-Amaranthaceae.

- celosioides* L., hahnenkammähnliche, ①. f. Nordamerika.
diffusa W., weitschweifige, 4. k. t. Südamerika.
*elatio*r Rich., höhere, ①. f. m. Westindien, Südamerika.
elongata Humb., verlängerte, 4. t. Südamerika.
flavescens W., gelbliche, 4. t. Südamerika.

Iris T., Schwertel, III. I. Irideae.

- acuta* W., spitzer, 4. Kn. f. ?
aequiloba Ledeb. (*longiflora* Ledeb.), gleichlappiger, 4. Kn. f. Taurien.
alata Lam. (*microptera* Vahl., *transtagana* Brot.), geflügelter, 4. Zw. k. f. b. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.
arenaria W. Kit., Sand-S. 4. Kn. f. Ungarn.
biflora L., zweiblumiger, 4. Kn. f. Portugal, Sibirien, Caucasus.
bicolor Lindl., zweifarbig, 4. Kn. f. ?
biglumis Vahl (*spuria* Pall., *Pallasii* Fisch., *longispatha*

Iris

- Bot-mag., *haematophylla* Lk. Ledeb.), zweispelziger, 4. Kn. f. Sibirien.
- Blondowii Ledeb., Blondow's. 4. Kn. f. Altai.
- bohémica Schm. (*Fieberi et nudicaulis* Auctor.), böhmischer, 4. Kn. f. Böhmen, Schlesien.
- caricifolia Pall., riedgrasblättriger, 4. Kn. f. Sibirien.
- caucasica MB. Hoffm., caucasischer, 4. Zw. f. Caucasus.
- chinensis Curt. (*fimbriata* Vent.) chinesischer, 4. Kn. k. China.
- clandestina Lehm., heimlichblühender, 4. Kn. w. Brasilien.
- coelestina Swt., himmelblauer, 4. Kn. f. k. Nordamerika.
- crassifolia Lodd., dickblättriger, 4. Kn. k. Cap der guten Hoffnung,
- cristata Ait. (*verna* Walt.), kammförmiger, 4. Kn. f. Virginien.
- cuprea Pursh. (*fulva* Sims.), kupferfarbiger, 4. Kn. f. b. Nordamerika, (Georgien).
- deflexa K. et W., herabgebogener, 4. Kn. k. t. Nepal.
- dichotoma Pall. (*pomeridiana* Fisch.), zweizinkiger, 4. Kn. f. Sibirien.
- elegans P., zierlicher, 4. Kn. f. ?
- ensata Thbg., schnalblättriger, 4. Kn. k. Japan.
- flavescens Redout., gelblicher, 4. Kn. f. ?
- flavissima Pall., hochgelber, 4. Kn. f. Sibirien, Altai.
- florentina L., florentinischer, 4. Kn. f. Italien, Cyprien.
- b. minor.
- foetidissima L., stinkender, 4. Kn. f. b. k. England, Westeuropa.
- b. fol. variegat.
- furcata M. B., gabelförmiger, 4. Kn. f. Caucasus.
- germanica L. (*nostras* Hort.), deutscher, 4. Kn. f. Europa.
- b. alba.
- glaucescens Bunge, blaugrüner, 4. Kn. f. Altai.
- graminea L., grasartiger, 4. Kn. f. Oesterreich.
- Güldenstädtiana Lepech, Güldenstädt's, 4. Kn. f., Taurien, Caucasus, Sibirien.
- β) ochroleuca MB. (*spuria* Bot. mag.) γ. diluta MB. δ) stenogyna DC. ε) aurea Lk. (*ochroleuca* Bot. mag.) ζ) heterophylla H. Par. (*atomaria* Hort.)
- halophila Pall. (*salsa* Pall.), salzliebender, 4. Kn. f. Sibirien, Altai.
- Hookeri Penny, Hooker's (*tripetala* Bot. mag. non Walt.), Hooker's, 4. Kn. f. Nordamerika.
- Humei G. Don (*nepalensis* Bot. mag.), Hume's, 4. Kn. f. Nepal.
- humilis MB., niedriger, 4. Kn. f. Caucasus, Sibirien.
- hungarica WK., ungarischer, 4. Kn. f. Ungarn.
- japonica Thbg., japanischer, 4. Kn. h. Japan.
- iberica Stev., iberischer, 4. Kn. Iberien.
- laevigata Fisch., glatter, 4. Kn. f. Dahurien.
- livida Tratt., braunblauer, 4. Kn. f. b. k. Levante.
- longifolia Swt., langblättriger, 4. Kn. f. ?
- longiflora R. et S., langblumiger, 4. Kn. f. ?
- lusitanica Ker (*junceae* Brot.), portugiesischer, 4. Zw. f. b. Portugal.
- lutescens Lam., gelblicher, 4. Kn. f. Schweiz, Frankreich.

Iris

- mauritanica Clus. (*juncea* Dsf.), mauritanischer, 4. Zw.
f. b. k. Nordafrika.
- Monnierii DC. Monnier's, 4. Kn. f. Griechenland.
- neglecta Hornem., übersehener, 4. Kn. f. ?
- nepalensis Wall. D. Don, nepal'scher, 4. Kn. k. Nepal.
- notha MB. (*halophila* Ker, W.), verwechselter, 4. Kn.
f. Caucasus.
- nudicaulis Lam., (*aphylla* Vahl), nacktstengeliger, 4. Kn.
f. Caucasus.
- pallida Lam. (*odoratissima* Jacq.), bleicher, 4. Kn. f.
Italien, Griechenland.
- paradoxa Stev., wunderbarer, 4. Kn. f. Iberien.
- persica L., persischer, 4. Zw. f. b. k. Persien.
- plicata Lam., (*amoena* Redout.), gefalteter, 4. Kn. f. ?
β) major (*plicata* Red).
- prismatica Pursh (*Boltoniana* R. et S., *gracilis* Bigel.
Bolt.), prismatischer, 4. Kn. f. Nordamerika.
- Pseudacorus L., Wasser-S., 4. Kn. Wa. f. Europa,
Sibirien, Carolina.
b. fol. variegat. c. pallida.
- pumila L., kleiner, 4. Kn. f. Mittel- und Südeuropa,
Taurien.
a. alba. b. albo-coerulea. c. coerulea. d. vio-
lacea Swt.
- reticulata MB., netzförmiger, 4. Zw. f. Iberien.
- ruthenica Ker (*caespitosa* Pall.), russischer, 4. Kn. f.
Sibirien, Dahurien.
- sambucina L., fliederduftender, 4. Kn. f. Südeuropa.
β) lurida Ait.
- scariosa W., trockenhäutiger, 4. Kn. f. Sibirien.
- setosa Pall. (*brachycuspis* Fisch., *brevicuspis* Schul.),
horstiger, 4. Kn. f. Sibirien.
- sibirica W. (*pratensis* P. Red., *flexuosa* Vahl), sibirischer,
4. Kn. f. Europa, Nordasien.
b. alba. c. flore pleno (*missouriensis* plen. Hort.)
β) sanguinea Don, (*haematophylla* Fisch. non
Lk., *nertschinskia* Lodd., *orientalis* Vahl).
- sordida W., schmuziggelber, 4. Kn. f. ?
- spuria L. (*spathulata* Lam.), unächter, 4. Kn. f. Ost-,
West- und Süd-Deutschland, Frankreich.
- squalens L., gelbbunter, 4. Kn. f. Süd- u. Osteuropa.
- subbiflora Brot., zweiblumiger, 4. Kn. f. Portugal.
- susiana L., prächtiger, 4. Kn. f. b. k. Persien.
- Swerti Lam., Swert's, 4. Kn. f. ?
- tangerica H. C., tanger'scher, 4. Kn. f. Nordafrika.
- taurica Lodd., taurischer, 4. Kn. f. Taurien.
- tenax Dougl., zäher, 4. Kn. f. Californien.
- Tigridia Bunge, getigelter, 4. Kn. f. Altai.
- tridentata Pursh. (*tripetala* Ell.), dreizahniger, 4. Kn.
f. b. Carolina.
- triflora, Balb. Red., dreiblumiger, 4. Kn. f. Italien.
- tuberosa L., knolliger, 4. Kn. f. b. k. Südeuropa,
Griechenland.
- variegata L., bunter, 4. Kn. f. Oesterreich.
b. De Berg H. Belg. c. Van de Will H. Belg.
- ventricosa Pall., bauchiger, 4. Kn. f. Sibirien, Dahurien.
- verna Pursh., Frühlings-S., 4. Kn. f. Virginien.
- versicolor L., verschiedenfarbiger, 4. Kn. f. Nord-
amerika.

Iris

- virescens* DC. Red., grünlicher, 4. Kn. f. ?
virginica L., virginischer, 4. Kn. f. Nordamerika.
xiphoides Ehrh. (*anglica* Hortul.), englischer, 4. Zw. f.
 Spanien, Frankreich.

b. fl. pleno.

- Xiphium* L. (*variabilis* Jacq., *hispanica* Hort.), spanischer, 4. Zw. f. Spanien, Portugal.

angusta Tbg., (et *bituminosa* Tbg., *ciliata* Tbg., *longifolia* Andr., *Sisyrinchium* L. etc.) v. *Moraea angusta* etc.
bicolor Lindl. (et *moraeoides* Ker.), v. *Dietes bicolor* et *iridioides*, *Northiana* P. v. *Cipura Northiana*, *pavonia* L., *tricuspis* Tbg. etc. v. *Vieusseuxia pavonia* etc.

Iroucana guianensis Aubl. v. *Caseria ramiflora*.

- Isachne* RB., Gleichspelze, III. II., Gramineae.
australis RB., neuholländische, 4. k. Neuholland.

- Isanthus* Mchx., Gleichlippler, XIV. I., Labiatae.
coeruleus Mchx., blauer, ☉. f. Nordamerika.

- Isatis* T., Waid, XV. I., Cruciferae.

- aleppica* Scop., aleppischer, ☉. f. Kleinasien.
alpina All., Alpen-W., 4. Italienische Alpen.
armena L., armenischer, ☉. f. Armenien, Caucasus.
banatica Lk., banatischer, ☉. f. Banat.
canescens DC. (*iberica* Stev.), graulicher, ♂. f. Süd-europa, Iberien.
costata C. A. Mey, gerippter, ♂. f. Caucasus.
dasycarpa Ledeb., rauhfrüchtiger, ♂. f. Sibirien.
hebecarpa DC. Fisch., zottigfrüchtiger, ♂. f. Taurien.
latisiliqua Stev. (*cappadocica* Desv.), breitfrüchtiger, ♂. f. Kleinasien, Caucasus.
litoralis DC., strandiger, ♂. f. Taurien.
lusitanica Brot. (*glauca* W.), portugiesischer, ☉. f. Portugal.
megacarpa Fisch., großfrüchtiger, ♂. f. Persien.
oblongata DC., langfrüchtiger, ♂. f. Sibirien.
orientalis W., morgenländischer, ☉. f. Kleinasien.
tinctoria L., gemeiner, ♂. f. Mittel-, Süd- und Ost-europa, Taurien.
 β) *campestris* Steven, γ) *praecox* Kit., δ) *Villarsii* Gaud. (*alpina* Vill.), ε) *heterocarpa* Andr., ζ) *taurica* MB.

variegata Ledeb., bunter, ♂. f. Sibirien.

- Ischaemum* L., Blutgras, III. II., (XXIII. I.), Gramineae.

- aristatum* L., gegranntes, 4. w. Ostindien, China.
australe, RB., südliches, 4. w. t. Neuholland.
rugosum Salisb., runzeliges, ☉. m. w. Ostindien.

- Isertia* Schreb. (P. E. Isert, dänischer Wundarzt auf der Guinea-Küste), VI. I., Rubiaceae.

coccinea Vahl, scharlachfarbige, ♀. w. Südamerika.

- Ismelia* Cass., Ismelie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

madeirensis D. Don, madeirensische, ♀. k. Madeira.

- Ismene* Salisb. Herb., Ismene, VI. I., Marcissee-Amaryllideae.

Amancaës Herb., Amancaës-I., 4. Zw. w. Peru.

Ismene

calathina Herb., becherförmige, 4. Zw. w. Brasilien.

b. *sulphurea* Herb. (*Amancaes-calathina*) Engl.
Hybride.

Knightii K. et W., Knight's, 4. Zw. w. Florida.

Macleana Herb., MacLean's, 4. Zw. w. Lima.

nutans Herb., nickende, 4. Zw. w. Brasilien.

Isnardia L. (A. T. D., d'Isnard, französischer Botaniker),
IV. 1., Onagrariae.

palustris L., Sumpf-I., 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.

hastata R. et P., v. *Ammannia hast.*

Isocarpha RB., Gleichboder, XIX. 1., Compositae-Cor-
ymbiferae.

oppositifolia RB., gegenblättriger, ♂. w. Westindien.

Isochilos RB., Gleichstendel, XX. 1., Orchideae.

graminifolium H. B. K., grasblättriger, 4. w. Neu-
Granada, Jamaica.

lineare RB., gleichbreitblättriger, 4. w. Westindien.

proliferum RB., sprossender, 4. w. Westindien.

Isoëtes L., Brachsenkraut, XXIV. 1., Marsiliaceae.
(*Rhizocarpace.*)

lacustris L., Teich-B., 4. Wa. f. Europa, Asien, Nord-
amerika.

Isolepis RB. (et *Eleogiton* Lk. et *Holoschoenus* Lk.),
Zartriet, III. 1., Cyperaceae.

antarctica R. et S., südliches, 4. k. t. Cap d. g. H.

atrovirens (Lk.), schwarzgrünes, 4. f. Nordamerika.

Eckloniana Schrad. (*Saviana* Hort.), Ecklon's, 4. k.
Cap der guten Hoffnung.

fluitans RB. (*Eleogiton fluitans* Lk.), fließendes, 4. Wa.
f. Europa, Neuholland.

Holoschoenus RB., knopfgrasartiges, 4. f. Mittel-, Süd-
und Westeuropa, Asien, Afrika.

α) *Linnaei* Rchb. (*Holoschoenus vulgaris* Lk.),

β) *exserens* Rchb., γ) *filiformis* Rchb., δ) *austra-*
lis Rchb. (*Scirpus romanus* L.)

marginata (Thbg.), berandetes, 4. k. Cap d. g. H.

nodosa RB., knotiges, 4. k. Neuholland.

prolifera RB., sprossendes, 4. k. Cap der guten Hoff-
nung, Neuholland.

Saviana R. et S. (*sicula* Presl.), Savi's, ☉. f. Italien,
Sicilien.

setacea RB., borstiges, ☉. f. Europa, Neuholland.

supina RB., niedriges, ☉. f. Europa, Afrika, Ostindien,
Neuholland.

tenuissima D. Don, feines, ☉. f. Nepal.

angulata Schrad., *complanata* R. et S., *curvifolia*

Schrad. v. *Finbristylis angulata*, *complanata* et fo-

lios, *Micheliana* R. et S. v. *Dichostylis Micheliana*.

Isoplexis Lindl., Prachtfingerhut, XIV. 1., Personatae-
Antirrhinae.

canariensis Lindl., canarischer, ♀. k. t. Canarische
Inseln.

Sceptrum Lindl., scepterförmiger, ♀. k. t. Madeira.

Isopogon RB., Gleichbart, IV. 1., Proteaceae.

anemonifolius RB., anemonenblättriger, ♀. t. Neu-
holland.

anethifolius RB., fenchelblättriger, ♀. t. Neuholland.

Isopogon

- attenuatus RB., verdünnter, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 axillaris RB., achselständiger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 Baxteri RB., Baxter's, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 buxifolius RB., buchsbaumblättriger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 ceratophyllus RB., hornblättriger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 cuneatus RB., keulförmiger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 divaricatus RB., ausgesperrter, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 formosus RB., schöner, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 longifolius, RB., langblättriger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 Loudoni Baxt., Loudon's, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 polycephalus RB., vielköpfiger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 propinquus Cunn., verwandter, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 spathulatus RB., spathelförmiger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 β) linearis RB.
 teretifolius RB., rundblättriger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 trilobus RB., dreilappiger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.

Isopyrum Hall., Doltocke, XIII. v. r. , Ranunculaceae.

- grandiflorum Fisch., großblumige, 4. f. b. k. Imaus.
 thalictroides L. (*aquilegioides* L.) wiesenrautenähnliche,
 4. f. Ost- und Südeuropa.

fumarioides L. v. *Leptopyrum fumarioides*.

Isotoma RB., Gleichsäumler, V. r. , Campanulaceae-*Lo-belieae*.

- axillaris Lindl., achselblumiger, 4. k. Neuholland.
 longiflora Presl., langblumiger, 4. w. Westindien.

Itea L., Itea, V. r. , Corniculatae-Cunoniaceae.

- virginica, L., virginische, $\frac{1}{2}$ f. b. Nordamerika.

Cyrillá Sw. v. *Cyrilla antillana*.

Iva L. Iva, XIX. v. , Compositae-Ambrosiaceae.

- annua L., jährige, $\odot$ m. f. Südamerika.
 ciliata W., gefranzte, $\odot$ f. Nordamerika.
 frutescens L., strauchige, $\frac{1}{2}$ f. b. k. Nord- und Südamerika.

xanthiifolia Nutt. v. *Cyclachaena xanthiifolia*.

Ixeris Cass., Ixeris, XIX. r. , Compositae-Cichoriaceae.

- versicolor DC., verschiedenfarbige, $\odot$ f. Nordchina, Dahurien.

Ixia L., Ixie, III. r. , Irideae.

- aristata Thbg., gegrannte, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
 aulica Ait. (*phlogiflora* Red.), Büschel-I., 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
 capillaris L. (*lancea* Jacq., *rapunculoides* Red.), haarförmige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
 capitata Andr., kopfförmige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
 coccinea Thbg., scharlachfarbige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
 columellaris Ker, säulenförmige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
 conica Salisb. (*dubia* Vent.), kegelförmige, 4. Zw. Cap der guten Hoffnung.
 craterioides Ker (*speciosa* Andr.), großschlundige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
 crispa Thbg., krause, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.
 erecta L. Berg., aufrechte, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
 b. incarnata. c. lutea.
 flexuosa L. (*polystachya* Red., *patens* W.), gebogene, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
 fucata Ker, geschminkte, 4. Zw. k. Cap d. guten H.

Ixia

hybrida Ker, Bastard-I., 4. Zw. k. Cap der guten H.
incarnata Jacq. (*capillaris* Bot. mag.), fleischfarbige, 4.
 Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

linearis L. (*capillaris* Auctor., *gracillima* Ker), gleich-
 breitblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
maculata L., gefleckte, 4. Zw. k. Cap der guten H.

β) *viridiflora* Lam. γ) *ochroleuca*.

monadelpha la Roche, einbrüderige, 4. Zw. k. Cap
 der guten Hoffnung.

β) *curta* Andr.

odorata Hort., wohlriechende, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

ovata Andr., eiförmige, 4. Zw. k. Cap der guten H.

patens Ait. (*filiformis* Vent., *leucantha* Jacq., *candida*
 Red.), absteigende, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.

β) *punicea* Spgl.

retusa Salisb. (*polystachya* Jacq.), abgestutzte, 4. Zw.
 k. Cap der guten Hoffnung.

scillaris L. (*pentandra* Thbg., *reflexa* Andr.), scillaähnliche,
 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

venosa Lk., aderige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.

amoena Lk. etc. v. *Watsonia amoena* etc., *angusta*
 Vahl. (*linearis* Jacq.) etc. v. *Hesperantha angusta*
 etc., *aristata* Ait. (*grandiflora* Curt.) etc. v. *Spara-*
xis grandiflora etc., *bicolor* Bot. Mag. v. *Synnotia*
bicolor, *Bulbocodium* L. et *coelestina* Bartr. etc. v.
Trichonema Bulbocodium etc., *corymbosa* Thbg.
 etc. v. *Lapeyrousia corymbosa* etc. *crocata* L. etc.
 v. *Waitzia crocata* etc., *excisa* Thbg. etc. v. *Geis-*
sorrhiza excisa etc. *fugacissima* L. v. *Galaxia gra-*
minea, *thyrsiflora* La Roch. v. *Aristea major*, *villosa*
 Ait. etc. v. *Babiana villosa*

Ixodia RB., Ixodie, XIX. 1., Compositae-Helichryseae.

achilleoides RB., garbenähnliche, f. t. Neuholland.

Ammobium Spgl. v. *Ammobium alatum*.

Ixora L. (malabarischer Name), IV. 1., Rubiaceae.

arborea Roxb. (*Pavetta* Andr.), baumartige, f. w. Ost-
 indien.

Bandhuca Roxb. (*coccinea* L., *arborea* Lodd.), *Bandhuca-*
I., f. w. Ostindien.

barbata Roxb., bärtige, f. w. Ostindien.

blanda Ker (*alba* Roxb.), weiße, f. w. Ostindien.

brachiata Roxb., armförmige, f. w. Brasilien.

crocata Ker, Lindl. (*chinensis* Lam.), safranfarbige, f.
 w. Ostindien, China.

cuneifolia Roxb., keilblättrige, f. w. Ostindien.

flava Lodd., gelbe, f. w. Ostindien.

fulgens Roxb. (*lanceolata* Lam., *longifolia* Sm.), leuch-
 tende, f. w. Ostindien.

grandiflora Ker (*coccinea* L.), großblumige, f. w. Ost-
 indien.

incarnata DC. Roxb., fleischfarbige, f. w. Ostindien.

obovata Roth (*purpurea* Fisch.), verkehrteiförmige, f.
 w. Ostindien.

parviflora Vahl, kleinblumige, f. w. Ostindien.

rosea Wall., rosafarbige, f. w. Ostindien.

sessilis Wall., sitzende, f. w. Ostindien.

stricta Roxb. (*coccinea* Curt., *speciosa* W.), steife, f. w.
 China, Ostindien.

Ixora

- undulata Roxb., wellige, f. w. Ostindien.
americana Jacq. v. *Bouvardia Jacquini. americana* Sw. v. *Tetramerium odoratissimum. fasciculata* Sw. (et *spinosa* Lam.) v. *Chomelia fasciculata et spinosa. paniculata* Lam., *Pavetta* Roxb. v. *Pavetta indica*.
- Jaborosa** Juss. (arabischer Name), V. 1., Solanaceae.
integrifolia Lam., ganzblättrige, f. t. w. Buenos Ayres.
runcinata Lam., schrotsägenförmige, f. t. Südamerika.
- Jacaranda** Juss. (brasilianischer Name), XIV. 11., Personatae-Bignoniaceae.
bahamensis Bot. mag., bahamische, f. t. Bahamische Inseln.
brasiliana P., brasilianische, f. w. Brasilien.
Copaja D. Don (*procera* Spgl.), *Copaja-J.*, f. w. Guiana.
filicifolia D. Don (*rhombofolia* Mey.), farrnblättrige, f. w. Westindien, Surinam.
mimosaeifolia D. Don, Ker (*ovalifolia* RB.), mimosenblättrige, f. w. Brasilien.
pubescens Lodd., weichhaarige, f. w. ?
tomentosa RB., filzige, f. w. Brasilien.
- Jacksonia** RB. (G. Jackson, englischer Botaniker), X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.
scoparia RB., besenartige, f. t. Neusüdwallis.
spinosa RB., dornige, f. t. Neuholland.
Sternbergiana Hügel, Sternberg's, f. t. Neuholland.
thesioides Ait., thesiumähnliche, f. t. Neuholland.
- Jacobaea* Auctor. v. *Senecio*.
- Jacquinia** L. (N. J. v. Jacquin, berühmter österreichischer Botaniker), V. 1., Sapotaceae-Myrsineae.
arborea Vahl, baumartige, f. w. Westindien.
armillaris Jacq., bewaffnete, f. w. Westindien.
linearis Jacq., gleichbreitblättrige, f. w. Westindien.
macrocarpa Cav. (*aurantiaca* Ait.), grobsfrüchtige, f. w. Mexico.
ruscifolia Jacq., mäusedornblättrige, f. w. Westindien.
- Jaegeria abyssinica* Spgl. v. *Guizotia oleifera. calendulacea* Spgl. v. *Wedelia calendulacea*.
- Jaltomata** Schtdl., Jaltomata, V. 1., Solanaceae.
edulis Schtdl., genießbare, ? $\odot$ m. f. Mexico.
- Jambolifera odorata* Lour. et *pedunculata* Lour. v. *Cymnasma odorata* etc.
- Jambosa** Rmph., Jambusenbaum, XII. 1., Myrtaceae.
amplexicaulis DC., stengelumfassender, f. w. Ostindien.
aquea DC. (Roxb.), wässriger, f. w. Ostindien.
macrophylla DC. (Lam.), grobsblättriger, f. w. Ostindien.
malaccensis DC., malackischer, f. w. Ostindien.
myrtifolia (Ker), myrthenblättriger, f. k. Neuholland.
vulgaris DC., gemeiner, f. w. t. Ostindien.
- Janipha** H. B. K. (brasilianischer Name), XXI. 1., Triococcae-Euphorbiaceae.
aesculifolia H. B. H., kastanienblättrige, f. w. Neuspanien.
angustifolia Pohl, schmalblättrige, f. w. Brasilien.
foetida H. B. K., stinkende, f. w. Neuspanien, Mexico.
Löfflingii H. B. K., Löffling's, f. w. Südamerika.

Janipha

Manihot H. B. K., Cassava-J., $\frac{1}{2}$ w. Westindien, Südamerika.

Jantha pallidiflora Hook. v. *Jonopsis utricularioides*.

Jasione L., Schafrapunzel, V. 1., Campanulaceae.

montana L., gemeine, $\frac{1}{2}$ f. Europa.

perennis Lam., ausdauernde, $\frac{1}{2}$ f. Süd- und Westeuropa.

β) *humilis* P.

Jasminum T., Jasmin, II. 1., Sapotaceae-Jasmineae.

acuminatum RB., zugespitzter, $\frac{1}{2}$ Sch. t. k. Neuholl.

angustifolium W. (*triflorum* P.), schmalblättriger, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.

arborescens Roxb. (*multiflorum* Roth), baumartiger, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ w. Bengalen.

auriculatum Vahl, geöhrt, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Mascarenas.

azoricum L., azorischer, $\frac{1}{2}$ k. Azoren.

bracteatum Roxb., deckblättriger, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostind.

campanulatum Lk., glockiger, $\frac{1}{2}$ w. ?

capense Thbg. (*angulare* Vahl), kapischer, $\frac{1}{2}$ t. Cap der guten Hoffnung.

dispermum Wall., zweisamiger, $\frac{1}{2}$ t. Nepal.

divaricatum RB., ausgesperrter, $\frac{1}{2}$ Sch. t. Neuholland.

elongatum Vahl, verlängerter, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.

flexile Vahl (*mauritianum* W.), gebogener, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.

fruticans L., strauchiger, $\frac{1}{2}$ f. b. k. Südeuropa.

glaucum Ait. (*rivulare* Salisb.), blaugrüner, $\frac{1}{2}$ t. Cap der guten Hoffnung.

gracile Andr. (*geniculatum* Vent.), schlanker, $\frac{1}{2}$ t. Norfolkinsel.

grandiflorum L., großblumiger, $\frac{1}{2}$ Sch. k. t. Ost- und Westindien.

heterophyllum Wall. (Roxb.), verschiedenblättriger, $\frac{1}{2}$ t. Nepal.

hirsutum L. (*pubescens* W., *multiflorum* Andr.), rauhaariger, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien, China.

humile L., niedriger, $\frac{1}{2}$ f. b. k. Südeuropa.

Lanceolaria Roxb., lanzettlicher, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.

latifolium Roxb., breitblättriger, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.

laurifolium Roxb., lorbeerblättriger, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

lineare RB., gleichbreitblättriger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.

odoratissimum L., feinriechender, $\frac{1}{2}$ k. Madeira.

officinale L., officineller, $\frac{1}{2}$ Sch. f. b. k. Südeuropa, Ostindien.

paniculatum Roxb., rispiger, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Südchina.

pubigerum D. Don (*Wallichianum* Lindl.), feinhaariger, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Nepal.

revolutum Sims (*chrysanthemum* Roxb., *triumphans* Hort.), zurückgerollter, $\frac{1}{2}$ Sch. k. t. Nepal.

Sambac L., arabischer, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien, Arabien.

b) *flore pleno*. c) *trifoliatum*.

scandens Vahl, klimmender, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.

simplicifolium Forst., einfachblättriger, $\frac{1}{2}$ Sch. t. Südseeinseln.

stenopetalum Lindl., schmalkroniger, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

tortuosum W. (*flexile* Jacq.), gewundener, $\frac{1}{2}$ Sch. t. Cap der guten Hoffnung.

trinerve Vahl, dreinerviger, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.

Jasminum

- tubiflorum Roxb., röhrenblumiger, ♀. w. Malacka.
 undulatum W., wellenförmiger, ♀. Sch. w. China.
 zeylanicum Mack. C., zeylonischer, ♀. Sch. w. Ceylon.

Jasonia Cass., Jasonie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- glutinosa Cass., DC., klebrige, 4. f. Südeuropa.
 tuberosa DC. (*radiata* Cass.), knollige, 4. ♀. Kn. f. b. k. Südfrankreich.
 sicala DC., sicilianische, ♂. ♂. f. West- und Südeuropa, Creta, Syrien, Nordafrika.
 a) discoidea. β) radiata.

Jatropha L., Brechnuss, XXI. x. (XVI. VI.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

- australis Lodd., neuholländische, ♀. w. t. Neuholland.
 coccinea H., Cels., Lk., scharlachfarbige, ♀. w. ? Cuba.
 Curcas L., schwarze, ♀. w. Cuba, Neugranada.
 glandulosa Vahl, drüsige, ♀. w. Arabien.
 gossypifolia L., baumwollenblättrige, ♀. w. Südamer.
 integerrima Jacq., ganzblättrige, ♀. w. Cuba.
 multifida L., vieltheilige, ♀. w. Südamerika.
 panduraefolia Andr. (*hastata* Jacq., *acuminata* Lam.),
 geigenblättrige, ♀. w. Cuba.
 peltata H. B. K., schildförmige, ♀. w. Südamerika.
elastica L. v. *Siphonia elastica*. *fragrans* H. B. K.
 etc. v. *Cnidoscolus fragrans* etc. *Janipha* L. etc.
 v. *Janipha Löfflingii* etc.

Jaumea linearis P. v. *Kleinia linearifolia*.**Jeffersonia** Bartr. (T. Jefferson, Präsident der vereinigten Staaten), VIII. I., Papaveraceae.

- diphylla Bartr., zweiblättrige, 4. f. Nordamerika.

Johnia Roxb. (John, dänischer Missionär zu Tranquebar), III. I., Evonymeae-Hippocrateaceae.

- coromandeliana Roxb., coromandelische, ♀. Sch. w. Coromandel.

- salacioides Roxb., salaciaähnliche, ♀. w. Bengalen.

Joliffia Boj. (Joliff, Freund von Bojer), XXII. XIII., Cucurbitaceae.

- africana Del., afrikanische, 4. Sch. w. Zanguebar.

Jonesia Roxb. (William Jones, Richter in Bengalen und Pflanzenforscher), VII. I., Leguminosae - Caesalpinieae.

- Asoca Roxb. (*pinnata* W.), gefiederte, ♀. w. Ostindien.
 scandens Roxb., klimmende, ♀. Sch. w. Ostindien.

Jonidium Vent., Strauchveilchen, V. I., Violaceae.

- capense R. et S., capisches, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
 heterophyllum Vent., verschiedenblättriges, ♀. t. w. China.

- polygalaefolium Vent. (*verticillatum* R. et S.), polygalablättriges, ♀. 4. t. Mexico.

- Sprengelianum R. et S., Sprengel's, 4. k. Pensylvanien.
 strictum Vent., steifes, 4. w. Westindien.

- verbenaceum H. B. K., verbenaähnliches, ♂. 4. f. t. w. Mexico.

- Hybanthus* R. et S. vid. *Corynostyles Hybanthus*.

- Ipecacuanha* Vent. v. *Pombalia Ipecac.* *longifolium* R. et S. v. *Noisetia longifolia*.

Jonopsis Kunth, Veilchenstendel, XX. I., Orchideae.

Jonopsis

tenera Lindl., zarter, 4. w. Cuba.

teres Lindl., runder, 4. w. Westindien.

utricularioides Lindl., utriculariaähnlicher, 4. w. Westindien.

Josephinia Vent. (Josephine, Kaiserin der Franzosen, großmüthige Beförderin der Botanik), XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.

Imperatricis Vent., kaiserliche, ♂. t. Neuholland.

Jossinia Commers., Jossinia, XII. I., Myrtaceae.

orbiculata DC., kreisförmige, 5. w. Mascarenas.

pinnata Hort., gefiederte, 5. w. ?Brasilien.

Juannulloa parasitica R. et P. v. Ulloa parasitica.

Juglans L., Wallnufs, XXI. IX., Juglandaceae.

cinerea L., aschfarbige, 5. f. Nordamerika.

nigra L., schwarze, 5. f. Nordamerika.

regia L., gemeine, 5. f. Griechenland, Kleinasien, Persien.

b) maxima. c) tenera. d) serotina. e) laciniata.

fraxinifolia Lam. (*pterocarpa* W.) vid. *Pterocarya*

caucasica. Hinsichtlich der übrigen s. *Carya*.

Juncus T., Simse, VI. I., Juncaceae.

acutus L., spitzige, 4. f. England, Südeuropa, Nordamerika.

alpinus Vill. (*fuscoater* Schrbr., *ustulatus* Hoppe, *nodulosus* Wahlbg., *geniculatus* Schrk., *alpestris* et *rariflorus* Hartm.), Alpen-S., 4. f. Europäische Alpen.

arcticus W. (*acuminatus* Balb.), nördliche, 4. f. Lappland, Island, tyroler und schweizer Alpen.

aristulatus Mchx. (*aristatus* P., *marginatus* Mühlbg.), grannige, 4. f. Nordamerika.

balticus Dethar. (*helodes* Lk.), baltische, 4. f. Nord- und westeuropäische Meerufer.

biglumis L., zweispelzige, 4. f. Nordeuropa.

bufonius L., Kröten-S., ☉. f. Europa.

β) fasciculatus Koch (*hybridus* Brot.).

capensis Thbg., capische, 4. k. Cap der guten Hoffn.

capitatus Weig. (*ericetorum* Poll., *gracilis* Roth, *triandrus* Gouan), kopfförmige, ☉. f. Europa.

castaneus Sm. (*triceps* W.), kastanienbraune, 4. f. Mittel- und nordeuropäische Alpen, Sibirien.

compressus Jacq. (*bulbosus* L.), flachhalmige, 4. f. Europa.

conglomeratus L., knaulförmige, 4. f. Europa.

diffusus Hoppe, weitschweifige, 4. f. Deutschland, Schweiz.

effusus L., weitrispige, 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

filiformis L., fadenförmige, 4. f. Europa.

Gerardi Lois. (*bottnicus* Wahlenb., *consanguineus* Koch et Ziz., *coenosus* Bichen.), Gerard's, 4. f. Europa.

Gesneri Sm. (*gracilis* E. Bot., *tenuis* Hook.), Gesner's, 4. f. Schottland.

glaucus Ehrh., blaugrüne, 4. f. Europa, Asien, Amerika.

Jacquini L. (*atratus* Lam., *biglumis* Jacq.), Jacquin's, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

lamprocarpus Ehrh. (*adscendens* Host, *articulatus* β. L.), glanzfrüchtige, 4. f. Europa.

Juncus

β) fluitans Koch.

maritimus Lam. (*rigidus* Dsf.), Strand-S., 4. f. England, Südeuropa, Nordafrika, Nordamerika.

monanthos Jacq. (*Hostii* Tausch), einblumige, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

nigritellus D. Don (*polycephalus* Hook.), schwärzliche, 4. f. Schottland, Westdeutschland.

obtusiflorus Ehrh. (*bifolius* Hoppe, *retroflexus* Rafn, *divergens* Koch, *Neesii* Hell.), stumpfblumige, 4. f. Europa.

paniculatus Hopp., rispige, 4. f. Oesterreichisches Litorale.

pauciflorus RB., wenigblumige, 4. k. Neuholland.

planifolius RB., flachblättrige, 4. k. Neuholland.

plebejus RB., gemeine neuholländische, 4. k. Neuholl.

polycephalus Mchx., vielköpfige, 4. f. Nordamerika.

pygmaeus Thuill., zwergige, 4. f. Dänemark, Frankreich.

squarrosus L., sparrige, 4. f. Europa.

stygius L., langfadige, 4. f. Scandinavien, Tyrol, Kärnthen.

supinus Mchx. (*uliginosus* Roth, *verticillatus* P., *subverticillatus* Wulff., *fluitans* Lam., *setifolius* Ehrh.), niedrige, 4. f. Europa, Nordamerika.

sylvaticus Reich. (*acutiflorus* Ehrh., *subnodulosus* Schrk.), Wald-S., 4. f. Europa.

β) melananthos Rchb. (*brevirostris* N. E.).

Tenageja Ehrh., Teich-S., 4. f. Mittel- u. Nordeuropa.

tenuis W. (*aristatus* Lk.), feine, 4. f. Nordamerika, Süddeutschland.

trifidus L., dreispaltige, 4. f. Europäische Alpen.

triglumis L., dreispaltige, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

vaginatus RB., scheidige, 4. f. Neuholland.

valvatus Lk., klappige, 4. f. Portugal.

Hinsichtlich der übrigen s. Luzula.

Juniperus T., Wachholder, XXII. XIII., Coniferae.

barbadensis L., westindischer, 5. k. t. Florida, Westindien.

bermudiana L., bermudischer, 5. k. Bermudische Inseln.

chinensis L., chinesischer, 5. k. China.

β) Smithii Loud.

communis L., gemeiner, 5. f. Europa, Mittelasien.

b) suecica Mill. c) oblonga Hort. d) oblonga pendula Hort. e) canadensis Lodd. f) depressa Pursh.

drupacea La Bill., steinfruchtartiger, 5. k. f. b. Syrien.

excelsa MB., hoher, 5. f. Sibirien, Nepal.

macrocarpa Sibth. (*Oxycedrus* Auctor.), großfrüchtiger, 5. f. b. Griechenland, Illyrien.

nana W. (*daurica* et *alpina* Hort., *sibirica* Burgsd., *communis* γ. *montana* Ait., *communis* γ. *alpina* Gaud.), zwergiger, 5. f. Mittel- und Ostdeutschland, Schweiz, Mittel- und Nordasien.

nepalensis Hort., nepal'scher, 5. f. b. Nepal.

oblonga MB., länglicher, 5. f. Caucasus.

Oxycedrus L., spanischer, 5. k. f. b. Südeuropa, Caucasus.

phoenicea L., dichtnadeliger, 5. f. Südeuropa, Mittelasien, Südsibirien.

β) lycia L.

Juniperus

prostrata Mchx. (*repens* Nutt.), gestreckter, ⚥. f. Nordamerika.

recurva Hamilt., zurückgekrümmter, ⚥. f. b. Nepal.

Sabina L., stinkender (Sadebaum), ⚥. f. Süd- und Westeuropa, Sibirien.

a) cupressifolia Ait. (*lusitanica* Mill.). b) tamariscifolia Ait. c) fol. variegat. d) alpina Lodd.

squamata D. Don, Lamb., schuppiger, ⚥. f. b. Nepal.

thurifera L. (*hispanica* Lam.), Weihrauchgebender, ⚥. f. b. k. Spanien, Portugal.

uvifera D. Don, traubiger, ⚥. f. b. Feuerland.

virginiana L. (*caroliniana* du Roi), virginischer, ⚥. f. Nordamerika.

b) humilis Lodd.

Jurinea Cass. (Jurine, französischer Naturforscher), XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

alata Cass., geflügelte, 4. f. Sibirien.

cyanoides DC., kornblumenähnliche, 4. f. Caucasus, Sibirien.

β) Pollichiana DC., Deutschland.

elegans (Stev.), zierliche, 4. f. Sibirien.

humilis DC., niedrige, 4. k. Nordafrika.

linearifolia DC., gleichbreitblättrige, 4. f. Sibirien.

mollis Rchb., weiche, 4. f. Oesterreich, Illyrien, Tau-rien, Sibirien, Griechenland.

polyclonos DC., sparrige, 4. f. Caucasus, Sibirien.

spectabilis Fisch. et Mey., ansehnliche, ♂. f. Süd-rußland.

subacaulis Fisch. et Mey., stengellose, 4. f. Nordpersien.

Jussieua Houst., L. (Familie v. Jussieu, berühmte französische Botaniker), VIII. 1. (X. 1.), Onagrariae.

erecta L. (*angustifolia* Lam.), aufrechte, ☉. f. Ost- und Westindien, Virginien, Carolina.

grandiflora Mchx., großblumige, 4. k. Carolina.

hirta L., kurzhaarige, ♂. ⚥. w. Westindien.

leptocarpa Nutt., schlankfrüchtige, ☉. ♂. f. Nordamer.

linifolia Vahl, leinblättrige, ♂. w. Südamerika.

natans Humb., Bonpl., schwimmende, 4. Wa. w. Neu-Granada.

octonervia Lam. (*octovalvis* Sw.), achternervige, ♂. w. Westindien.

ovalifolia Sims, eiblättrige, ♂. w. Ostindien, Madagascar.

pubescens L., weichhaarige, ♂. ⚥. w. Südamerika.

repens L., kriechende, 4. w. Ostindien.

revolutifolia Bernh., zurückgerollte, ☉. f. ?

sagittata Poir., pfeilblättrige, ♂. w. Westindien.

scabra W. (*acuminata* Sw.), scharfe, 4. Wa. w. Westindien, Brasilien.

suffruticosa L. (*villosa* Lam.), strauchige, 4. ⚥. w. Ostindien.

variabilis Mey., veränderliche, ♂. w. Guiana.

Justicia L. (J. Justice, schottischer Gärtner und Botaniker), II. 1., Acanthaceae.

I. Adhatoda Herm. N. E.

Adhatoda L., malabarische, ⚥. k. t. Ostindien.

Betonica L. (*pseudo-Betonica* Roth, *ochroleuca* Blume), Betonien-J., ⚥. w. Ostindien.

Justicia

ramosissima Roxb., ästige, ♀. w. Coromandel.

II. Andrographis Wall.

echioides L., natterkopfähnliche, 4. w. Ostindien.

paniculata Burm., rispige, ☉. ♀. w. Ostindien.

III. Beloperone N. E.

oblongata Lk. et Otto (*nodosa* Hook.), verlängerte, ♀. w. Brasilien.

plumbaginifolia Jacq., plumbagoblätterige, ♀. w. Brasil.

IV. Cryptophragmium N. E.

venusta Wall., liebliche, ♀. w. Ostindien.

V. Gendarussa Rmph.

furcata Jacq. (*peruviana* Cav.), gabelige, ♀. w. Peru, Neuspanien.

Gendarussa L., weidenblätterige, ♀. w. Ostindien.

β) Dohona Hamilt.

ventricosa Wall., bauchige, ♀. w. Ostindien.

VI. Graptophyllum N. E.

picta L., geschmückte, ♀. w. Ostindien.

b) lurido sanguinea.

VII. Hemiadelpsis N. E.

polysperma Roxb., vielsamige, ☉. ♂. w. Bengalen.

VIII. Justicia genuina N. E.

alba Roxb., weiße, ♀. w. Ostindien.

amabilis Hook., liebliche, ♀. w. ?

bracteolata Jacq., deckblätterige, ♀. w. Caracas.

caracasana Jacq., caracasanische, ♀. w. Caracas.

carnea Lindl., fleischfarbige, 4. ♀. w. Brasilien.

carthagenensis Jacq., carthagenische, ♀. w. Carthagen, Martinique.

ciliaris L. (*ciliata* Jacq.), gefranzte, ☉. w. m. Westind.

coccinea Aubl., scharlachfarbige, ♀. w. Guiana.

comata L., Sw., schopfige, 4. w. Westindien.

cuspidata Vahl, langspitzige, ♀. w. Arabien.

Echbolum L., grünblühende, ♀. w. Ostindien, Arabien.

elongata Vahl, verlängerte, 4. w. Ostindien.

eustachiana Jacq., eustachische, ♀. w. Antillen.

formosa W., schöne, ♀. w. ?

geniculata Sims, gegliederte, ♀. w. Caribäen.

hispida W., steifhaarige, ♀. w. Sierra Leone.

humilis Mchx., niedrige, 4. k. Südcarolina.

hyssopifolia L., ysopblätterige, ♀. k. Canarische Inseln.

Keriana Swt. (*eustachiana* Bot. reg.), Ker's, ♀. w. Ostindien.

ligustrina Vahl, ligusterähnliche, ♀. w. Ostindien.

lithospermifolia Jacq., steinsamenblätterige, ♀. w. Peru.

lucida Andr., spiegelnde, ♀. t. Barbados.

maculata Lodd., gefleckte, ♀. t. Ostindien.

nemorosa Sw., Hain-J., 4. w. Westindien.

nigricans Lour., schwärzliche, ♀. w. Cochinchina.

nitida Jacq. (*brachiata* Rich.), glänzende, ♀. w. Südamerika.

orchiodes L., orchisähnliche, ♀. t. Cap d. gut. Hoffn.

pectoralis Jacq., geharnischte, 4. ♀. w. Antillen.

pedunculosa Mchx. (*americana* Vahl, *ensiformis* Ell.), schwerblätterige, 4. k. Nordamerika.

periplocaefolia Jacq., periplocablätterige, ♀. w. Caracas.

polysperma Roxb., vielsamige, ☉. w. m. Bengalen.

Justicia

- polystachya Lam., vielährige, f. w. Guiana.
 pumila Diet., kleine, f. t. ?
 quadrangularis Hook., vierkantige, 4. w. Mascarenas.
 quadrifida Vahl (*coccinea* Cav.), vierspaltige, f. k.
 Neuspanien.
 reflexiflora Rich., zurückgebogene, 4. f. w. Westindien.
 salicina Juss., weidenähnliche, f. w. Peru.
 salviaefolia H. B. K., salbeiblätterige, f. t. Mexico.
 secunda Vahl, einseitige, f. w. Westindien.
 speciosa Roxb., prächtige, 4. f. w. Bengalen.
 vitellina Roxb., dottergelbe, f. w. Ostindien.

IX. Peristrophe N. E.

- bicalyculata Vahl, doppelkelchige, 4. w. Ostindien.
 Lanceolaria Roxb., lanzettliche, 4. w. Ostindien.
 Roxburghiana R. et S. (*tinctoria* Roxb.), Roxburgh's,
 4. f. w. Ostindien.

X. Phlogacanthus N. E.

- asperula Wall., rauhe, f. w. Ostindien.
 curviflora Wall., krummblumige, f. w. Ostindien.
 guttata Wall., getüpfelte, 4. w. Ostindien.
 thyrsoiflora N. E., straußblumige, f. w. Bengalen.
 tubiflora Hamilt., röhrenblumige, f. w. Ostindien.

XI. Rhinacanthus.

- nasuta L., schnabelförmige, f. w. Ostindien.

XII. Rostellaria N. E.

- diffusa Vahl (*Vahlia* R. et S.), weitschweifige, f. w.
 Ostindien.
 procumbens L., niederliegende, $\odot. f.$ Ostindien.

XIII. Schaueria N. E.

- calycotricha Lk. et Otto (*flavicomma* Lindl.), schönkelchige,
 f. w. Brasilien.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen: Apher-
 landra, Barleria, Crossandra, Dicliptera, Elytraria,
 Eranthemum, Hypoestes.

Kaempferia L. (E. Kaempfer, ein Deutscher, berühmt als Reisender und Naturforscher), I. 1., Scitamineae-Amomeae.

- angustifolia Sm. (*undulata* Lk.), schmalblätterige, 4. w.
 Ostindien.
 diversifolia Lk., verschiedenblätterige, 4. w. Ostindien.
 elegans Wall., zierliche, 4. w. Pegu.
 Galanga L., Galanga-K., 4. w. Ostindien.
 latifolia Don, breitblätterige, 4. w. Ostindien.
 marginata Carey, berandete, 4. w. Ostindien.
 ovalifolia Roxb., eiblätterige, 4. w. Malacka.
 pandurata Roxb. (*ovata* Rosc.), geigenförmige, 4. w.
 Ostindien.

Roscoeana Wall., Roscoe's, 4. w. Nepal.

rotunda L., rundliche, 4. w. Ostindien.

Kageneckia R. et P., Kageneckie, XXII. XI., Rosaceae.

crataegifolia Lindl. (*oblonga* D. Don), weißdornblätterige,
 f. k. ? Chili.

Kalanchoë Adans (chinesischer Name), VIII. IV., Cor-niculatae-Crassulaceae.

- acutiflora Haw., spitzblumige, f. t. Ostindien.
 aegyptiaca DC., ägyptische, f. t. Aegypten.

Kalanchoë

- ceratophylla Haw., hornblättrige, ♀. t. China.
 crenata DC., gekerbte, ♀. t. Westafrika.
 laciniata DC., schlitzbilättrige, ♀. t. Ostindien.
 rotundifolia Haw., rundblättrige, ♀. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 spathulata DC., spatelförmige, ♀. t. China.

Kalmia L. (P. Kalm, ein Schwede, welcher Nordamerika hereis'te), X. 1., Ericaceae-Rhodoraceae.

- angustifolia L., schmalblättrige, ♀. f. b. Nordamerika.
 b. rubra. c. foliis variegatis. d. minima. e. nana.
 f. rosea. g. pumila. h. ovata Pursh.
 cuneata Mchx., keilblättrige, ♀. f. b. k. Carolina.
 glauca Ait. (polifolia Wangenh.), blaugrüne, ♀. f. b.
 Nordamerika.

β) rosmarinifolia Pursh.

- hirsuta Walt. (ciliata Bartr.), rauhhaarige, ♀. f. b. k.
 Carolina.

- latifolia L., breitblättrige, ♀. f. b. Nordamerika.

Kalosanthes Haw., (*Dietrichia* Tratt.), Schöndickblatt,
V. v., Corniculatae-Crassulaceae.

- bicolor, Haw., zweifarbiges, ♀. t. Cap d. guten Hoffn.
 biconvexa Haw., doppeltgewölbt, ♀. t. Cap d. g. H.
 coccinea Haw., scharlachfarbiges, ♀. t. Cap d. gut. H.
 b. flore albo Brad.

- cymosa Haw., afterdoldiges, ♀. t. Cap d. guten Hoffn.
 flava Haw., gelbes, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

- jasminea Haw., jasminblumiges, ♀. t. Cap d. g. H.

- media Haw., mittleres, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

- odoratissima Haw., wohlriechendes, ♀. t. Cap d. g. H.

- versicolor Haw., buntes, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

Kaulfussia N. E. (G. F. Kaulfuss, Professor der Botanik zu Halle), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

- amelloides N. E., amellusähnliche, ☉. f. Cap d. g. H.

Kennedy Vent. (Kennedy, englischer Handelsgärtner),
XVII. 14., (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.**I. Genuinae.**

- dilatata Cunn., verbreiterte, ♀. Sch. t. Neuholland.

- Marryattae Lindl., Marryatt's, ♀. Sch. t. Neuholland.

- nigricans Lindl., schwärzliche, ♀. Sch. t. Neuholland.

- prostrata RB., gestreckte, ♀. t. Neuholland.

b. minor.

- rubicunda Vent., dunkelrothe, ♀. Sch. t. Neuholland.

- Stirlingi Lindl., Stirling's, ♀. Sch. t. Neuholland. (Schwanenflufs.)

II. Hardenbergia Benth.

- inophylla Cunn., nervenblättrige, ♀. Sch. t. Neuholland.

- monophylla Vent. (*Glycine bimaculata* Curt.), einblättrige, ♀. Sch. t. Neuholland.

β) longeracemosa Lindl.

- macrophylla Lindl., grofsblättrige, ♀. Sch. t. Neuholland. (Schwanenflufs.)

- ovata Ker (latifolia Lindl.), eiförmige, ♀. Sch. t. Neuholland.

III. Zichya Hügel, Benth.

- coccinea Vent., scharlachfarbig, ♀. Sch. t. Neuholland.

- Comptoniana Lk., Compton's, ♀. Sch. t. Neuholland.

- glabrata Lindl., glatte, ♀. Sch. t. Neuholland.

Kennedy

heterophylla Mack., verschiedenblättrige, ♀. Sch. t. Neuholland.

Molly Hügel, Molly's, ♀. Sch. Neuholland (Schwanenfluß). *parviflora* Mack., kleinblumige, ♀. Sch. t. Neuholland.

IV. Dubiae.

apetala Lodd., blüthenlose, ♀. Sch. t. ?

sericea Cunn., seidenhaarige, ♀. Sch. t. Neuholland.

Kentrophyllum Neck., Stachelsaflor, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

arborescens Hook., baumartiger, ♀. k. Spanien.

dentatum DC. (*rubrum* Lk.), gezahnter, ♂. f. Griechenl.

glaucum Fisch. et Mey., blaugrüner, ♂. f. Caucasus.

lanatum DC., wolliger, ♂. f. Südeuropa.

mareoticum DC., mareotischer, ♀. k. Aegypten.

tauricum Fisch. et Mey., taurischer, ♂. f. Taurien.

Keraudrenia Gay., Keraudrenia, V. III., Malvaceae-Büttneriaceae.

hermanniaefolia Gay., hermanienblättrige, ♀. t. Westindien, Neuholland.

Keria DC. (*Kerria* Auctor.), (W. Ker, englischer Botaniker), XII. III., Rosaceae-Spiraeaceae.

japonica DC., japanische, ♀. f. Japan.

b) flore pleno.

Kernera Medick. (J. S. Kerner, deutscher Botaniker), XV. II., Cruciferae.

saxatilis Rchb., Gestein's-K., 4. f. Mitteleuropäische Voralpen.

β) *auriculata* Rchb.

Kiggelaria L. (F. Kiggelar, holländischer Botaniker), XXII. IX., Capparideae-Flacourtiae.

africana L., afrikanische, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

integrifolia Jacq., ganzblättrige, ♀. k. Cap d. gut. H.

Kirganelia Juss. (malabarischer Name), XXI. I., Trioccae-Euphorbiaceae.

elegans Juss., zierliche, ♀. w. Mascarenas.

Kitaibelia W. (Paul Kitaibel, Professor der Botanik zu Pesth), XVI. VIII., Malvaceae.

vitifolia W., weinblättrige, 4. f. Ungarn.

Kleinhovia L. (M. Kleinhov, ehemaliger Director des botanischen Gartens zu Java), XVI. VII., Malvaceae-Büttneriaceae.

hospita L., gastliche, ♀. w. Ostindien.

Kleinia Jacq. (*Porophyllum* Vaill.), (J. H. Klein, deutscher Botaniker), XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

colorata H. B. K., farbige, ♂. m. f. Mexico.

decumbens (DC.), (*suffruticosa* Lodd.), niederliegende, 4. ♀. t. Mexico.

Porophyllum W., porenblättrige, ♂. f. m. Westindien, Südamerika.

ruderalis Jacq., schuttliebende, ♂. f. m. Westindien.

suffruticosa W., halbstrauchige, 4. ♀. t. Neuspanien, Brasilien.

tagetoides H. B. K., tagetesähnliche, ♂. m. f. Mexico.

viridiflora H. B. K., grünblumige, ♀. w. Mexico.

linearifolia Juss. v. *Kuhnia linearifolia*. *tomentosa*

Haw. v. *Cacalia canescens*.

Knappia agrostidea Sm. v. *Mibora verna*.

Knautia L., Coult. (*Scabiosa* L.), (C. Knaut, Arzt und Botaniker zu Halle), IV. i., Dipsaceae.

arvensis Coult. (L.), Acker-K., 4. f. Europa.

β) *campestris* (Bess.). γ) *rigidiuscula* (Hladn.).

ciliata Coult., DC. (Spgl.), (*pubescens* Wahlbg.), gefranzte, 4. f. Mähren, Oesterreich, Ungarn.

dipsacifolia (Schott.), kartenblättrige, 4. f. Oesterreich.

diversifolia (Baumg.), verschiedenblättrige, 4. f. Siebenbürgen.

hybrida Coult. (All.), Bastard-S., ☉. f. Südeuropa.

integrifolia (L.), ganzblättrige, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

longifolia Koch (W. K.), langblättrige, 4. f. Oesterreichische und ungarische Alpen, Schweiz.

montana MB., Berg-K., 4. f. Caucasus.

orientalis L. (*propontica* L.), morgenländische, ☉. f. Kleinasien, Thracien.

pubescens (W. K.), weichhaarige, 4. f. Ungarn.

β) *carpathica* Fisch.

Salcedi (Lagasc.), *Salced's*, 4. f. Spanien.

Hinsichtlich der übrigen s. *Ptercephalus*.

Knightia RB. (T. A. Knight, englischer Botaniker), IV. i., Proteaceae.

excelsa RB., hohe, ♀. k. t. Neuzeeland.

Knowltonia Salisb. (T. Knowlton, Vorsteher des botanischen Gartens zu Eltham), XIII. vi., Ranunculaceae.

daucifolia DC., möhrenblättrige, 4. t. Cap d. gut. H.

gracilis DC., schlanke, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

hirsuta DC., rauhhaarige, 4. t. Cap^a der gut. Hoffn.

rigida Salisb., starre, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

vesicatoria Sims, blasenziehende, 4. t. Cap d. gut. H.

Knoxia L. (Robert Knox, englischer Reisender im Jahre 1681), IV. i., Rubiaceae.

corymbosa W., traubendoldige, ♀. w. Ostindien.

umbellata Sol., Banks, doldige, ♀. w. Ostindien.

zeylanica L., zeylanische, ♀. w. Ceylon.

Kobresia W. (v. Kobres, deutscher Gelehrter), XXI. iii., Cyperaceae.

caricina W., riedgrasähnliche, 4. f. Tyroler, schweizer Alpen etc.

Kochia Roth (Dr. Koch, berühmter deutscher Botaniker, Professor zu Erlangen), V. ii., Aizoideae-Atripliceae.

arenaria Roth, sandliebende, ☉. f. Ost- und Westdeutschland, Ungarn.

dasyantha Schrad., wollblumige, ☉. f. Ost- und Südrussland.

dentata W. (*Chenopod. radiatum* Schrad.), gezahnte, ☉. f. Nordamerika.

eriphora Schrad., wollige, ☉. f. Spanien.

hirsuta Nolte, rauhhaarige, ☉. f. Norddeutschland, Dänemark, Taurien, Gallien.

hyssopifolia Roth, Schrad., ysopblättrige, ☉. f. Ungarn, Taurien, Sibirien.

prostrata Schrad., gestreckte, 4. ♀. f. Süd- und Osteuropa, Mittelasien.

scoparia Schrad., besenförmige, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

sedoides Schrad., sedumähnliche, ☉. f. Ungarn, Taurien.

Kochia

sericea Schrad., seidenhaarige, ♀. k. Cap der gut. H. trigyna Lk. v. Schanginia trigyn.

Koeleria P. (Koeler, Professor der Naturgeschichte zu Mainz), III. II., Gramineae.

albescens DC., weifslliche, 4. f. Frankreich.

Alopecurus N. E., Fuchsschwanz-K., 4. k. Cap der guten Hoffnung.

brachystachya DC., kurzährige, ☉. f. Pyrenäen.

cristata P., kammige, 4. f. Europa, Caucasus, Sibirien.

β) gracilis Koch. γ) pyramidata Lam. (lobata Auctor.).

dactyloides Spgl., dactylisähnliche, ☉. f. ?

glauc DC., blaugrüne, 4. f. Europa, Caucasus.

grandiflora Bertol. (gracilis Guss., splendens Presl.), großährige, 4. f. Italien.

hirsuta Gaud., rauhaarige, 4. f. Schweiz, Tyrol.

hispida DC., steifhaarige, ☉. f. Nordafrika, Italien.

intermedia Fr., mittlere, 4. f. Schweden.

laxa Ehrenb., Lk. (aegyptiaca Jacq. fil.), lockere, ☉. f. Aegypten.

macrantha R. et S., großblumige, 4. f. Rußland.

nitida Nutt., glänzende, ☉. f. Nordamerika.

phleoides P., lieschgrasähnliche, ☉. f. Südeuropa, Taurien.

pubescens (Lk.), (Linkii Kunth), weichhaarige, 4. f. Südfrankreich.

valesiaca Gaud., wallisische, 4. f. Wallis, Frankreich, Italien.

β) setacea DC. (tuberosa P.).

villosa P. (pubescens P. B.), [zottige, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

pensylvanica DC. v. Glyceria pensylvan.

Koellea hyemalis Birea v. Eranthis hyemalis.

Koelpinia linearis Pall. v. Rhagadiolus Koelpinia.

Koelreuteria Laxm. (J. G. Kölreuter, deutscher Botaniker), VIII. I., Sapindaceae.

paniculata Laxm., rispige, ♀. f. China.

Königia L. (J. G. König, dänischer Botaniker, Samuel König, schweizerischer Mathematiker nach Loudon), III. III., Polygoneae.

islandica L., isländische, ☉. f. Island, Lappland.

Kolbea Schltdl. (P. Kolbe, ein Deutscher, welcher das Vorgebirge der guten Hoffnung bereiste), VI. III., Colchicaceae.

Breyniana Schltdl., Breyn's, 4. Zw. t. Cap der gut. H.

Koniga RB. (C. König, englischer Gelehrter), XV. II., Cruciferae.

dasycarpa (Steph.), rauschötige, ☉. f. Sibirien.

densiflora (Dsf.), dichtblumige, ? ♂. f. Armenien.

edentula (WK.), zahnlose, ♂. f. Ungarn.

halimifolia (W.), meermeldenblättrige, ♀. k. Oberitalien.

macrocarpa (DC.), großfrüchtige, ♀. k. Frankreich.

maritima RB., Seestrands-K., ♂. ♀. k. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

b) variegata.

nummularia Bunge, rundblättrige, ♀. k. Südrußland.

pyrenaica (Lapeyr.), pyrenäische, ♀. k. Pyrenäen.

rupestris (Ten.), Felsen-K., ♀. k. Neapel.

Koniga

spinosa (L.), dornige, ♀. k. Westeuropa.

Krameria Löffl. (J. G. H. und W. H. Kramer, deutsche Botaniker), XIV. II., Polygalaceae.

pauciflora Sessé, wenigblumige, ♀. w. Mexico.

Krigia Schreb., Krigie, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

caroliniana Nutt., carolinische, ☉. f. Carolina.

Dandelion Nutt., knollige, 4. Kn. f. Virginien.

amplexicaulis Nutt. vid. *Cynthia virginica chilensis* N. E. (*pusilla* Hort., *pinnatifida* Bert.) v. *Microseris pygmaea virginica* Hort. vid. *Hyoseris scabra*.

Kuhnia L. (Adam Kuhn, ein Pensylvanier, Zögling des Linné), XIX. I., Compositae-Eupatorieae.

Critonia W., Critonia-K., 4. f. Nordamerika.

eupatorinoides L., dostenähnliche, 4. f. Nordamerika.

Kunthia Humb. (C. S. Kunth, berühmter Botaniker zu Berlin), XXI. VI., Palmae.

montana Humb., bergliebende, ♀. w. Neu-Granada.

xalapensis H. Berol. v. *Chamaedorea Schiedeana*.

Kydia Roxb. (J. R. Kyd, erster Director des Gartens zu Calcutta), XVI. VII., Malvaceae-Dombeyaceae.

calycina Roxb., breitkelchige, ♀. w. Ostindien.

fraterna Roxb., verbrüderete, ♀. w. Ostindien.

Kyllingia L. fil., Rottb. (P. Kylling, dänischer Botaniker), III. I., Cyperaceae.

brevifolia Rottb., kurzblättrige, 4. w. Ost- und Westindien.

intermedia RB., mittlere, 4. w. Neuholland.

monocephala L., einköpfige, 4. w. Ost- und Westindien, Neuholland.

odorata Vahl, wohlriechende, 4. w. Südamerika.

pungens Lk., stechende, 4. w. ?

triceps L. (*nivea* P.), dreiköpfige, 4. w. Ost- und Westindien.

uncinata Lk., hackige, 4. w. Brasilien.

vaginata Lam., scheidige, 4. w. Südamerika.

polycephala Lk. v. *Mariscus polyceph.*

Labichea Gaudich. (M. Labiche, französischer Schiffsoffizier), II. I., Leguminosae-Papilionaceae.

lanceolata Benth., lanzettliche, ♀. t. Neuholland (Schwanenfluß).

Lablab Adans (*Lablavia* Loud.), (arabischer Name), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

bengalensis G. Don (*vulgaris* β. *albiflorus* DC.), bengalischer, ☉. Sch. w. Ostindien.

cultratus DC., messerförmiger, ☉. Sch. w. Japan.

leucocarpus Savi, weißfrüchtiger, ☉. Sch. w. Ostindien.

microcarpus DC., kleinfrüchtiger, ☉. Sch. w. Ostindien.

nankinicus Savi, chinesischer, ☉. Sch. w. China.

perennans DC., ausdauernder, 4. Sch. t. China.

purpureus G. Don (*vulgaris* γ. *purpureus* DC.), purpurfarbiger, ☉. Sch. w. Ostindien.

vulgaris Savi, gemeiner, ☉. Sch. w. Ostindien.

Lacathea florida Salisb. v. *Gordonia pubescens*.

Lachenalia Jacq. (Werner de la Chenal, schweizer Botaniker), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

anginea Swt., Schlangen-L., 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

angustifolia Jacq., schmalblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

bifolia Ker, zweiblättrige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

contaminata Ait. (*orthopetala* Jacq.), fleckige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

flava Andr., hellgelbe, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

fragrans Jcq., wohlriechende, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

glauca Bot. reg., blaugrüne, 4. Zw. k. Persien.

glaucina Jacq., meergrüne, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

hyacinthoides Jacq., hyacinthähnliche, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

isopetala Jacq., gleichkronige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

lanceaefolia Jacq., lanzettblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

liliflora Jacq., lilienblumige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

lucida Ker, schimmernde, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

luteola Jacq., gelbliche, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

b) *maculata*.

mutabilis Lodd., veränderliche, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

nervosa Ker, nervige, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

orchoides Ait., orchisähnliche, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

pallida Ait., bleiche, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.

β) *minor* Lindl.

patula Jacq., ausgebreitete, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

pendula Ait., hängende, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

b) *maculata*.

punctata Jacq., punktirte, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

purpurea Jcq., purpurfarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

purpureo-coerulea Jacq., purpurblaue, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

pusilla Jacq., kleine, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.

pustulata Jacq., blättrige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

quadricolor Jacq., vierfarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

b) *colorata*.

racemosa Sims, traubige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

rosea Andr., rosafarbige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

rubida Jacq., röthliche, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

sessiliflora Andr., stiellosblumige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

tigrina Jacq., getigerte, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

tricolor Jacq., dreifarbige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

unicolor Jacq., einfarbige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

unifolia Jacq., einblättrige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

violacea Jacq., violette, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

reflexa Andr. vid. *Drimia revoluta*. *serotina* L. et

viridis Thbg. v. *Uropetalum serotin.* etc,

Lachnaea L., Lachnaea, VIII. 1., Thymelaeaceae.

buxifolia Lam., buchsbaumblättrige, 5. t. Cap der guten Hoffnung.

conglomerata L., knaulblumige, 5. t. Cap der gut. H.

eriocephala L., Andr., wolköpfige, 5. t. Cap d. g. H.

Lachnaea

glauca Salisb., blaugrüne, ♂. t. Cap der guten Hoffn.
 purpurea Andr., purpurfarbige, ♂. t. Cap der gut. H.

Lachnanthes Ell., Wollnarcisse, III. 1., Narcisseae-Haemodoraceae.

tinctoria Ell., färbende, 4. k. Carolina,

Lactuca T., Salat, XIX. 1., Corymbiferae-Cichoriaceae.

acuminata Spgl., zugespitzter, ♂. f. Nordamerika.

altissima MB., hoher, ♂. f. Caucasus.

ambigua Schrad. (*virosa* Hayne), zweifelhafter, ♂. f. ?

augustana All., italienischer, ♂. f. Italien, Illyrien, Siebenbürgen, Aegypten.

canadensis L., canadischer, ♂. f. Canada.

Chaixii Vill., Chaix's, ♂. f. Dauphiné.

cretica Dsf., cretischer, ♂. f. Creta.

elongata Mühlbg., verlängerter, ♂. f. Pennsylvanien.

graminea Melx., grasartiger, ♂. f. Nordamerika.

indica L., indischer, ♂. m. Ostindien.

integrifolia Nutt., ganzblättriger, ♂. f. Nordamerika.

intybacea Jacq., endivienblättriger, ♂. m. f. ? Südamer.

maculata Hornem., gefleckter, ♂. f. ?

muralis Mey., DC., Mauer-L., ♂. f. Europa.

perennis L., dauernder, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

quercina L., eichenblättriger, ♂. f. Mittel- und Osteuropa.

β) stricta WK.

sagittata WK., pfeilblättriger, ♂. f. Ungarn, Siebenbürgen.

saligna L., weidenblättriger, ♂. f. Mittel- u. Osteuropa.

sativa L., zahmer, ♂. f. ?

a) capitata Bauh. β) crispa Bauh. γ) laciniata

Roth (*palmata* W.). δ) plicata Balb.

Scariola L., wilder, ♂. f. Europa.

segusiana Balb., segusianischer, ♂. f. Oberitalien.

sonchoides Lapeyr. (*cichoriifolia* DC.), sonchusähnlicher, ♂. f. Pyrenäen.

tenerrima Pourr., zarter, 4. f. Spanien.

tuberosa Jacq. (*sonchifolia* W.), knolliger, 4. f. Taurien, Persien, Creta.

villosa Jacq., zottiger, ♂. f. ?

virosa L., giftiger, ♂. f. Europa.

viminea Presl. Lk. v. *Phoenixopus vimineus*.

Laelia Lindl., Jungfernstendel, XX. 1., Orchideae.

albida Lindl., weißlicher, 4. w. Mexico.

anceps Lindl., zweischneidiger, 4. w. Mexico.

b) Barkeriana.

autumnalis Lex., herbstlicher, 4. w. Mexico.

cinnabarina Batem., zinnoberfarbiger, 4. w. Brasilien.

grandiflora Hort., großblumiger, 4. w. ? Brasilien.

Perrinii Batem., Perrin's 4. w. Brasilien.

Laelia cochlearioides P. v. *Calepina* Corvini. *prostrata* P. v. *Muricaria* prostr.

Laetia L. (J. de Laet zu Antwerpen, Verfasser einer Geschichte von Amerika), XIII. 1., Bixaceae.

Thamnia Sw., westindische, ♂. w. Jamaica.

Lagascea Cav. (Lagasca, spanischer Botaniker), XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

Lagascea

helianthifolia H. B. K. (*Noccaea rigida* Cav.), sonnen-
rosenblättrige, ♀. t. w. Mexico.

latifolia Cerv., breitblättrige, ♀. t. Mexico.

mollis Cav., weiche, ♂. f. m. Cuba.

rubra H. B. K., rothe, ♀. t. Mexico.

suaveolens H. B. K., starkkriechende, ♀. t. w. Mexico.

Lagenaria Ser., Flaschenkürbis, XXI. x., Cucur-
bitaceae.

idololatrica (W.), birnenfrüchtiger, ♂. Sch. m. f. Gui-
nea, Ostindien.

vulgaris Ser., gemeiner, ♂. Sch. m. f. Tropenländer.

b) *Gourda* Ser. c) *depressa* Ser. d) *turbinata*

Ser. e) *clavata* Ser. f) *Courgourda* Ser.

Lagenophora Endl., Flaschenträger, XIX. II., Com-
positae-Corymbiferae.

Forsteri Endl., Forster's, ♀. t. Neuzeeland.

Lagerstroemia L. (Magnus Lagerstroem, ein Schwede
und Freund des Linné), XIII. I., Lythriariae.

grandiflora Roxb., großblumige, ♀. w. Ostindien.

indica L., indische, ♀. w. China, Cochinchina.

b) *rosea* Lodd.

Münchhausia W., Münchhausen's, ♀. w. China.

parviflora Roxb., kleinblumige, ♀. w. Ostindien.

Reginae Roxb., königliche, ♀. w. Ostindien, Java.

Lagetta Juss. (jamaicaischer Name), VIII. I., Thyme-
laeaceae.

linteria Juss., westindische, ♀. w. Westindien.

Lagoecia L., Federknopf, V. II., Umbelliferae.

cuminoides L., kümmelartiger, ♂. f. Griechenland.

Lagonychium MB., Fadenähre, X. I., Leguminosae-
Mimoseae.

Stephanianum MB., Stephani's, ♀. f. b. k. Nordpersien,
Caucasus.

Lagoseris MB., Less. (*Pterotheca* Cass., *Crepinia* Rehb.,
Trichocrepis Vis.), Flügelpippau, XIX. I., Compositae-
Cynarocephalae.

bifida Koch, zweispaltige, ♂. f. Istrien, Croatien, Dal-
matien, Taurien.

β) *Marschalliana (nemausensis)* MB.).

nemausensis Koch, südfranzösische, ♂. f. Südfrankreich.

crepoides et *taurica* MB. vid. *Intybellia purpurea*.

Hinsichtlich der übrigen s. *Barkhausia*.

Lagunaea Cav. (Andreas Laguna, ein spanischer Na-
turforscher), XVI. VIII., Malvaceae.

lobata Cav., gelappte, ♂. w. m. Mascarenas.

sinuata Hornem. (*angulata* Hort.), buchtige, ♂. w.
Ostindien.

squamea Vent. (*Patersonia* Sims) vid. *Hibiscus*
Patersonius.

Lagurus L., Hasenschwanz, III. II., Gramineae.

ovatus L., eiförmiger, ♂. f. Südeuropa.

cylindricus L. v. *Imperata cylindr.*

Lahaya R. et S. v. *Polycarpaea*.

Lalage Lindl. (eine von Horaz besungene Dame), ?X.
I., Leguminosae.

ornata Lindl., zierliche, ♀. t. Neuholland.

Lamarckia Rich., Poir. (J. B. de Lamarck, berühmter
französischer Naturforscher), V. I., Solanaceae.

Lamarckia

coccinea Rich., scharlachfarbige, 4. w. Cayenne.

Lamarckia aurea Mch. DC. vid. *Chrysurus cynosuroides*.
dentata Hortul. v. *Elaeodendrum australe*.

Lambertia Sm. (A. B. Lambert, berühmter englischer Botaniker) IV. 1., Proteaceae.

echinata RB., igelstachelige, ♀. t. Neuholland.

ericifolia RB., heideblättrige, ♀. t. Neuholland.

formosa Sm., schöne, ♀. t. Neuholland.

inermis RB., unbewehrte, ♀. t. Neuholland.

longifolia Lodd., langblättrige, ♀. t. Neuholland.

ovalifolia Camer., eiblättrige, ♀. t. Neuholland.

propinqua RB., verwandte, ♀. t. Neuholland.

uniflora RB., einblumige, ♀. t. Neuholland.

Lamium T., Bienensaug (Taubnessel), XIV. 1., Labiatae.

album L., weißer, 4. f. Europa.

amplexicaule L., stengelumfassender, ☉. f. Europa, Nordamerika.

bifidum Cyril., zweispaltiger, ☉. f. Neapel.

flexuosum Tenor., gebogener, 4. f. Neapel.

garganicum L., italienischer, 4. f. Italien, Griechenland, Kleinasien.

hirsutum Lam., rauhaariger, 4. t. Südeuropa.

incisum W. (*dissectum* Wither., *hybridum* DC., *gustaphalicum* Weih.), schlitzblättriger, ☉. f. Europa.

intermedium Fries, mittlerer, ☉. f. Nordeuropa.

longiflorum Tenor., langblumiger, 4. f. Südeuropa, England.

b) *album*.

maculatum L., gefleckter, 4. f. Europa.

a) *maculatum* Rchb. β) *laevigatum* Rchb. (*rubrum* Wallr., *rugosum* Ait.). b) *flore albo*. γ) *rugosum* Rchb.

molle Ait., weicher, 4. f. ?

moschatum Mill., moschusduftender, ☉. f. Kleinasien.

multifidum L., vielspaltiger, ☉. f. Klein- u. Mittelasien.

Orvala L. (*pannonicum* Scop.), großblumiger, 4. f. Süd- und Osteuropa.

purpureum L., purpurfarbiger, ☉. f. Europa.

b) *albidum*.

tomentosum W., filziger, ☉. f. Armenien, Caucasus.

Lamprotis D. et G. Don v. *Erica*.

Lanaria Ait., Wollnarcisse, VI. 1., Narcisseae-Haemodoraceae.

plumosa Ait., federige, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

Lantana L., Lantane, XIV. 11., Verbenaceae.

aculeata L., stachelige, ♀. w. Westindien.

alba Mill., weiße, ♀. w. Südamerika.

annua L., jährige, ☉. w. m. f. Südamerika.

brasiliensis Lk., brasilianische, ♀. w. Brasilien.

Camara L., veränderliche, ♀. w. Südamerika.

canescens H. B. K., grauliche, ♀. w. Neugranada.

coccinea Lodd., scharlachfarbige, ♀. w. Südamerika.

crocea Lk., safranfarbige, ♀. w. Jamaica.

fucata Ker, geschminkte, ♀. w. Brasilien.

geminata Spgl., paarige, ♀. w. Südamerika.

hirta Grah., kurzhaarige, ♀. w. Mexico.

hispida H. B. K., steifhaarige, ♀. w. Mexico.

Lantana

- horrida H. B. K., starkstachelige, ♀. w. Mexico.
 involucrata L., hüllblättrige, ♀. w. Westindien.
 lavandulacea L., lavendelblättrige, ♀. w. Südamerika.
 Lockharti G. Don, Lockhart's, ♀. w. Trinidad.
 melissaefolia Ait., melissenblättrige, ♀. w. Brasilien.
 mixta L., bunte, ♀. w. Westindien.
 mollis Grah., weiche, ♀. w. Mexico.
 multiflora Hort., vielblumige, ♀. w. ?
 nivea Vent., schneeweisse, ♀. w. Westindien.

β) mutabilis Hook.

- odorata L., wohlriechende, ♀. w. Westindien.
 pilosa H. B. K., haarige, ♀. w. Cuba.
 purpurea Hornem., purpurfarbige, ♀. w. Südamerika.
 Radula Sw., raspeblättrige, ♀. w. Westindien.
 recta Ait. (*parvifolia* Salisb.), gerade, ♀. w. Jamaica.
 salviaefolia Jacq., salbeiblättrige, ♀. w. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 scabrida Ait., schärfliche, ♀. w. Westindien.
 Sellowi Lk. (*speciosa et elegans* Hortul.), Sellow's, ♀. w.
 Montevideo.
 stricta Sw., steife, ♀. w. Jamaica.
 trifolia L., dreiblättrige, ♀. w. Westindien.

Lapeyrousia Pourr., Ker (La Peyrouse, französischer
 Seefahrer, Picot de Lapeyrouse, französischer Bota-
 niker), III. 1., Irideae.

- aculeata Swt., stachelige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.
 anceps Ker, zweischneidige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
 corymbosa Ker, traubendoldige, 4. Zw. k. Cap der
 guten Hoffnung,
 Fabricii Ker, Fabricius's, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.
 falcata Ker, sichelförmige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.
 fasciculata Ker, büschelförmige, 4. Zw. k. Cap der
 guten Hoffnung.
 fissifolia Ker, spaltblättrige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
 silenoides Ker, silenähnliche, 4. Zw. k. Cap der
 guten Hoffnung.

Lappa T., Klette, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.
 major G. (*officinalis* All.), große, ♂. f. Europa.
 minor DC., kleine, ♂. f. Europa.
 tomentosa Lam., filzige, ♂. f. Europa.

Lappago Schreb., Klettengras, III. 11., Gramineae.
 racemosa W., traubiges, ♂. f. Süd- und Osteuropa,
 Orient, Nordafrika, Westindien etc.

Lapsana L., Rainkohl, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

I. Genuina.

- communis L., gemeiner, ♂. f. Europa.
 β) pubescens Bernh.
 crispa W., krauser, ♂. f. ?
 grandiflora MB. (*lyrata* W.), großblumiger, ♂. f.
 Taurien.
 intermedia MB., mittlerer, ♂. f. Taurien, Caucasus.

II. Aposeris Neck.

- foetida Scop., stinkender, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
 pusilla W. v. Arnoseris minima. Hinsichtlich der
 übrigen s. Rhagadiolus et Zacyntus.

Larrea aquatica Ser. v. Malachium aquaticum, *aquatica*
 St. Hilair v. Stellaria uliginosa. *Larix* T. v. Pinus.

Larochaea P. (*Rochea* DC.), (De la Roche, französischer Botaniker), V. v., Corniculatae-Crassulaceae.

falcata DC., sichelförmige, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.
perfoliata Haw., durchwachsene, ♂. t. Cap d. gut. H.
 b) *alba* Haw.

Hinsichtlich der übrigen s. *Kalosanthus*.

Larrea Cav. (J. A. H. de Larrea, spanischer Botaniker), X. 1., Zygophylleae.

divaricata Cav., ausgesperrte, ♂. t. Buenos Ayres.

nitida Cav., glänzende, ♂. t. Buenos Ayres.

Laserpitium T., Laserkraut, V. 11., Umbelliferae.

alpinum W. K. (*trilobum* L.), Alpen-L., 4. f. Krain, Ungarn.

Archangelica Wulf. (*Chironium* Scop.), angelicablätteriges, 4. f. Sudeten, Krain.

Athamantae Spgl., hirschwurzförmiges, 4. f. Sibirien.

aureum W. (*elegans* Clar.), goldfarbiges, 4. f. b. Kleinasien.

caucasicum MB. (*Cnidium carvifolium* MB.), caucasisches, 4. f. Caucasus.

gallicum T., französisches, 4. f. Oberitalien, Südfrankreich.

hirsutum Lam. (*Panax* Gouan, *Halleri* All.), rauhhaariges, 4. f. Schweiz, Tyrol.

latifolium L., breitblättriges, 4. f. Europa.

a) *Libanotis* Lam. (*glabrum* Koch). β) *asperum* Crtz (*Cervaria* Gmel., *pubescens* Lag.).

marginatum W. Kit. (*Gaudini* Morett., *luteolum* Gaud.), herandetes, 4. f. Ungarn, Krain, Schweiz.

meoides Dsf., meumähnliches, 4. k. Nordafrika.

peucedanoides L. (*angustifolium* L.), peucedanumähnliches, 4. f. Krain, Tyrol, Schweiz etc.

pilosum W. (*hispidum* MB.), haariges, 4. f. Taurien, Caucasus.

pruthenicum L., preussisches, ♂. f. Europa.

scabrum Cav., scharfes, ♂. f. b. Südspanien.

Siler L., gebräuchliches, 4. f. Mittel- und südeuropäische Alpen.

β) *garganicum* Till., Ten.

Stevensi Fisch., Steven's, 4. f. ?

triquetrum Vent., dreikantiges, 4. f. Thracien.

ulopterum Trevir., krausflügeliges, ♂. f. Südfrankreich.

aquilegifolium Jacq. v. *Siler trilobum*. *ferulaceum*

L. vid. *Cachrys alata*. *gummiferum* Dsf. (et *thapsioides* Dsf.) vid. *Thapsia gummifera* et *Laserpitii*.

lucidum Ait. v. *Ligusticum ferulaceum*. *silaifolium* Jacq. v. *Cnidium apioides*.

Lasiopetalum Sm., Haarblume, V. 1., Malvaceae-Büttneriaceae.

ferrugineum Sm., rostfarbiges, ♂. Neuholland.

parviflorum Rudge, kleinblumiges, ♂. Neuholland.

arborescens Ait. v. *Seringia platyphylla*, *purpureum* Sims, *quercifolium* Andr. etc. vid. *Thomasia purpurea* etc.

Lasiopus D. Don, Wollfufs, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

sonchoides D. Don, gänse-distelähnlicher, 4. f. Armenien.

- Lasiospermum** Lagas., Haarsame, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.
pedunculare Lagasc., gestielter, ♂. k. Italien, Creta, Kleinasien.
radiatum Trevir., strahliger, ♂. k. Cap der gut. Hoffu.
Lasiospora Cass. (*Lasiospermum* Fisch.), v. Scorzonera.
Lasthenia Cass., Lasthenie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
californica DC. (*glaberrima* DC.), californische, ☉. f. Californien.
glabrata Lindl., glatte, ☉. f. Californien.
obtusifolia Cass., stumpfblättrige, ☉. f. Chili.
Latania Commers., Bourbonpalme (afrikanischer Name), XXII. XIII. (XIII. III.), Palmae.
borbonica Lam. (*chinensis* Jacq.), schirmförmige, ♀. w. Mascarenas.
glaucophylla Lodd., blaugrünblättrige, ♀. w. Ostindien.
rubra Jacq., rothe, ♀. w. Mascarenas.
Lathraea L., Schuppenwurz, XIV. II., Personatae-Orobancheae.
Squamaria L., gemeine, 4. f. Europa.
Lathyrus T., Platterbse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
altaicus Ledeb., altaische, 4. Sch. f. Altai.
amphicarpos L., cyprische, ☉. Sch. f. Cypern, Syrien.
angulatus L., kantige, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Taurien.
 b) flore albo.
annuus L., jährige, ☉. Sch. f. Südeuropa.
Aphaca L., blattlose, ☉. Sch. f. Mittel- u. Südeuropa.
Armitageanus Westc., Armitage's, ♂. t. Brasilien.
articulatus L., gegliederte, ☉. Sch. f. Südfrankreich, Spanien.
auriculatus Bertol. (*tenuifolius* Loisel., *alatus* Ten., *spurius* W., *cornutus* Spgl., *purpureus* Dsf., *tataricus* Schreb.), geöhrte, ☉. Sch. f. Italien, Griechenland.
bithynicus Lam., bithynische, ☉. Sch. f. Italien, Griechenland, Kleinasien.
 b) sessiliflorus Sering.
bruttius Tenor., calabrische, ☉. Sch. f. Calabrien.
californicus Lindl., californische, 4. Sch. f. Californien.
Cicera L., Kiefern-P., ☉. Sch. f. Südeuropa.
ciliatus Guss., gefranzte, ☉. Sch. f. Sicilien.
Clymenum L., orientalische, ☉. Sch. f. Spanien, Nordafrika, Kleinasien.
decaphyllus Pursh, zehnblättrige, 4. Sch. f. Nordamer.
ensifolius Badarr., schwertblättrige, 4. Sch. f. Südfrankreich.
grandiflorus Sibth., großblumige, 4. Sch. f. Griechenland.
Hallersteinii Baumg., Hallerstein's, 4. Sch. f. Siebenbürgen, Banat.
heterophyllus L. (*intermedius* Wallr.), verschiedenblättrige, 4. Sch. f. Europa.
hirsutus L. (*hirtus* Lam.), rauhhülsige, ☉. Sch. f. Mittel- und Südeuropa, England.
inconspicuus L. (*parviflorus* Roth), unansehnliche, ☉. f. Istrien, Südfrankreich, Kleinasien.
incurvus W. (*curvus* Roth), einwärtsgekrümmte, 4. Sch. f. Caucasus.

Lathyrus

italicus Roth, italienische, ☉. Sch. f. Italien.

latifolius L., breitblättrige, 4. Sch. f. Mittel- und Südeuropa.

b) *albiflorus* Swt.

leptophyllus MB., schlankblättrige, ☉. f. Caucasus.

longipedunculatus Ledeb., langstielige, ☉. f. ?

magellanicus Lam., magellanische, 4. Sch. f. Feuerland.

mexicanus Wender., mexicanische, 4. Sch. f. Mexico.

micranthus Gerard, kleinblumige, ☉. f. Südfrankreich.

mutabilis Swt., veränderliche, 4. Sch. f. Sibirien.

myrtifolius Mühlbg. (*polymorphus* Nutt.). myrtenblättrige, 4. Sch. f. Nordamerika.

Napoleonis Wender., Napoleon's, ☉. Sch. f. ?

Nissolia L., einfachblättrige, ☉. f. Mitteldeutschland, England, Südeuropa.

odoratus L., wohlriechende, ☉. f. Sch. Sicilien, Ostindien.

b) *striatus*.

palustris L., sumpfliebende, 4. Sch. f. Europa, Canada.

pisiformis L., erbsenähnliche, 4. Sch. f. Vollhynien, Caucasus, Sibirien.

pratensis L., Wiesen-P., 4. Europa.

β) *sepium* Scop.

purpureo-coeruleus K. et W., purpurblaue, ? 4. Sch. k. Brasilien.

roseus Stev., rosafarbige, 4. Sch. f. West-Caucasus.

rotundifolius W., rundblättrige, 4. Sch. f. Taurien, Caucasus.

sativus L., gebaute, ☉. Sch. f. Südeuropa.

setifolius L. (*prostratus* Brign.), borstenblättrige, ☉. f. Südeuropa, Kleinasien.

sphaericus Retz (*coccineus* All., *axillaris* Lam.), kugelige, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

stipulaceus Lec., zwischenblättrige, 4. Sch. New York.

sylvestris L., Wald-P., 4. Sch. f. Europa.

tenuifolius Dsf., feinblättrige, ☉. Sch. f. Nordafrika, Sicilien.

tingitanus L., tanger'sche, ☉. Sch. f. Nordafrika.

tuberosus L., knollige, 4. Kn. Sch. f. Europa, Mittelasien.

turgidus Lam. (*tumidus* W.), aufgeschwollene, ☉. Sch. f. ?

venosus Mühlbg., W., aderige, 4. Sch. f. Pennsylvanien.

humilis Fisch. v. *Orobis humilis*. *monanthos* W. v. *Ervum monanthos*, *Ochrus* DC. v. *Ochrus palida*. *Lauguieria hirsuta* R. et P. etc. vid. *Guettarda hirsuta* etc.

Laurophyllus Thbg., Lorbeerling, IV. 1. (XXIII. II.), ?Santalaceae.

capensis Thbg., kapischer, ♂. k. Cap der gut. Hoffn.

Laurus T., Lorbeer, IX. 1., Laurineae.

aestivalis L. (*enervia* Mill.), Sommer-L., ♂. f. b. k. Carolina, Virginien.

aggregata Sims, angehäufter, ♂. t. China, Ostindien.

Benzoin L. (*aestivalis* L., *Pseudo-Benzoin* Mchx.), Benzoin-L., ♂. f. Nordamerika.

Borbonica L., borbonischer, ♂. k. Nord- und Südamer.

Laurus

bullata Burch., blasiger, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.
canariensis W., canarischer, ♀. k. Canarische Inseln.
carolinensis Catesb. (*axillaris* Lam.), carolinischer, ♀.
 Carolina, Louisiana.

b) *glabra*. c) *pubescens*. d) *obtusata*.

Catesbiana Mchx., *Catesby's*, ♀. f. h. k. Carolina, Florida.

Chloroxylon L., Grünholz-L., ♀. w. Jamaica.

coriacea Sw., lederartiger, ♀. w. Westindien.

crassifolia Rich., Poir., dickblättriger, ♀. w. Cayenne.

Diospyros P. (*diospyroides* Mchx., *melissaefolia* Walt.),
 diospyrosähnlicher, ♀. f. b. Carolina.

exaltata Sw., hoher, ♀. w. Jamaica.

floribunda Sw., blüthenreicher, ♀. w. Westindien.

foetens Ait. (*maderensis* Lam.), stinkender, ♀. k. Canarische Inseln.

geniculata Walt., Mchx. (*aestivalis* W.), geknieter, ♀.
 f. b. Virginien.

indica L., indischer, ♀. k. Canarische Inseln, Japan.

nivea Lodd., schneeweißer, ♀. w. ?

nobilis L., edler, ♀. k. f. b. Süd-, West- und Osteuropa.

b) *undulata* Mill. c) *salicifolia* Swt. (*angustifolia* Lodd.). d) *variegata* Swt. e) *latifolia* Mill.

f) *crispa* Lodd. g) *flore pleno* Duham.

patens Sw., absteher, ♀. w. Westindien.

pendula Sw., überhängender, ♀. w. Jamaica.

salicifolia Sw., weidenblättriger, ♀. w. Westindien.

Sassafras L., Sassafras-L., ♀. f. Nordamerika.

splendens Loud., schimmernder, ♀. w. Ostindien.

thyrsiflora Poir., straußblumiger, ♀. w. Madagascar.

Persea L. vid. *Persea gratissima*. Hinsichtlich der
 übrigen s. *Cinnamomum*.

Lavandula L., Lavendel, XIV. 1., Labiatae.

abrotanoides Lam., stabwurzähnlicher, ♀. k. Canarische Inseln.

dentata L., gezähnelter, ♀. k. Spanien, Nordafrika.

formosa Dietr., schöner, ♀. k. ?

heterophylla Viv., verschiedenblättriger, ♀. k. ?

latifolia Ehrh., L. (*Spica* DC., *Spica* β. L.), breitblättriger, ♀. f. Süd- und Westeuropa.

multifida L., vielspaltiger, ♂. ♀. k. Spanien, Nordafrika.

pinnata L., gefiederter, ♀. k. Madeira.

Spica L. W. (*vera* DC., *officinalis* Chaix., *angustifolia* Ehrh.), gebräuchlicher (Spike), ♀. f. Süd- und Westeuropa.

β) *pyrenaica* DC.

Stoechas L., schopfiger, ♀. k. Canarische Inseln.

viridis L'Her., grüner, ♀. k. Canarische Inseln.

carnosa W., v. *Anisochilus carnosa*.

Lavatera T. (Lavater, Freund des Tournefort), XVI. VIII., Malvaceae.

acerifolia Cav. (*phoenicea* W.), ahornblättrige, ♀. k. Canarische Inseln.

ambigua DC., zweifelhafte, ♂. f. Südfrankreich, Italien.

arboorea L., baumartige, ♂. ♀. f. k. England, Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

Lavatera

- biennis MB., zweijährige, ♂. f. Caspisches Meer.
 cretica L., cretische, ☉. f. Creta, Sicilien.
 flava Dsf. (*Empedoclis* Ucr., *agrigenina* Tin.), hellgelbe,
 4. f. b. k. Nordafrika, Sicilien.
 hispida Dsf., steifhaarige, ♀. k. Spanien, Nordafrika.
 β) africana Cav.
 lanceolata W., lanzettliche, ☉. f. ?
 maritima Gouan (*rotundifolia* Lam.), Seestrands-L., ♀. k.
 Südfrankreich, Spanien.
 β) hybrida Hort.
 micans L. (*lusitanica* L., *bryonifolia* et *undulata* Mill.),
 schimmernde, ♀. k. Spanien.
 olbia L., olbische, ♀. k. Südfrankreich.
 phoenicea Vent., hochrothe, ♀. k. Canarische Inseln.
 plebeja Sims (*australis* Weinm., ? *Weinmanniana* Bess.),
 neuholländische, ♂. k. Neuholland.
 punctata All., punktirte, ☉. f. Süd- und Westeuropa.
 salvitellensis Brign., salvitellensische, ♂. f. ?
 sylvestris Brot. (*neapolitana* Ten., *sicula* Tin.), wilde,
 ☉. ♂. f. Neapel, Sicilien, Portugal.
 thuringiaca L., thüringische, 4. f. Mittel- u. Osteuropa.
 triloba L. (*calycina* Poir.), dreilappige, ♀. k. Spanien.
 trimestris L., Sommer-L., ☉. f. Süd- und Westeuropa.
 b) alba.
 undulata Dsf. (*Pseudo-Olbia* Poir.), wellenblättrige,
 ♀. k. ?
 unguiculata Dsf., nagelförmige, ♀. k. Griechenland.
Lavenia decumbens Sw. et *erecta* Sw. v. *Adenostemma decumbens* et *viscosa*.
Lavradia Vell. (Vandelli, Marquis von Lavradio, portugiesischer Botaniker), V. I., Violaceae.
 montana Mart., bergige, ♀. w. Brasilien.
Lawsonia L. (J. Lawson, ein Engländer, welcher Carolina bereiste), VIII. I., Lythriaceae.
 inermis L., unbewehrte, ♀. w. Aegypten, Ostindien.
 purpurea Lam., purpurfarbige, ♀. w. Ostindien.
 spinosa L., dornige, ♀. w. Ostindien.
Laxmannia RB. (E. Laxmann, ein Schwede, welcher in Sibirien botanisirte), VI. I., Coronariae-Asphodeleae.
 gracilis RB., schlanke, 4. k. t. Neuholland.
Lebeckia Thbg. (Lebeck, wenig gekannter Botaniker), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
 contaminata Thbg., befleckte, ♀. k. t. Cap d. gut. H.
 cytisoides Thbg., cytissusähnliche, ♀. k. t. Cap d. g. H.
 sepiaria Thbg., Zaun-L., ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.
 sericea Thbg., seidenhaarige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.
 subnuda DC., halbnackte, ♀. k. t. Cap der gut. H.
 subternata Lk., fast dreizählige, ♀. k. t. Cap d. g. H.
 contaminata Ait. v. *Indigofera juncea*.
Lebetina Cass., Lebetine, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
 cancellata Cass., gitterige, ☉. m. f. Mexico.
Lebretonia Schrk. (Manuel le Breton, französischer Botaniker), XVI. VIII., Malvaceae.
 coccinea Schrk., scharlachfarbige, ♀. w. Brasilien.
 latifolia Mart., breithlättrige, ♀. w. Brasilien.
Lechea L. (G. Leche, schwedischer Botaniker), III. III., Cistineae.

Lechea

- major Mchx. (*villosa* Ell.), grofse, 4. f. f. Nordamer.
 minor Pursh, kleine, 4. f. Nordamerika.
racemulosa Mchx. (? *minor* L.), traubige, f. 4. f.
 Nordamerika.
thymifolia Mchx. (? *juncifolia* Walt.), thymianblättrige,
 f. 4. k. Carolina.

Lechenaultia RB. (Lechenault de la Tour, französischer Reisender und Botaniker), V. I., Campanulaceae-Goodenovieae.

- floribunda* Benth., blüthenreiche, f. t. Neuholland.
formosa RB., schöne, f. t. Neuholland.
multiflora Lodd. (*oblata* Swt., *formosa* Sims, *Baxteri* G. Don), vielblumige, f. t. Neuholland.

Lecythis Löffl., Deckelmyrte, XIII. I., Lecythideae.

- amara* Aubl., bittere, f. w. Guiana.
bracteata W., deckblättrige, f. w. Cayenne.
grandiflora Aubl., grofsblumige, f. w. Guiana, Brasilien.
minor Jacq., kleine, f. w. Südamerika.
parviflora Aubl., kleinblumige, f. w. Guiana.

Ledebouria Roth (C. F. v. Ledebour, berühmter russischer Botaniker, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

- hyacinthina* Roth, hyacinthähnliche, 4. Zw. t. w. Ostind.

Ledebouria pimpinelloides Lk. v. *Tragium tauricum*.**Ledocarpon pedunculare** Lindl. v. *Balbisia peduncularis*.**Ledum** L., Porst., X. I., Ericaceae-Rhodoraceae.

- canadense* Lodd., canadischer, f. f. Canada.
latifolium Ait. (*groenlandicum* Retz.), breitblättriger, f.
 f. Nordamerika.
palustre L., Sumpf-P., f. f. Mittel- und Nordeuropa,
 Asien, Nordamerika.
 β) *decumbens* Ait.
buxifolium Berg. (*thymifolium* Lam., *serpyllifolium*
 L'Her.) v. *Leiophyllum thymifolium*.

Leea L. (J. Lee, Vater und Sohn, berühmte englische Pflanzencultivateurs), V. I., Hesperideae-Leeaceae.

- aequata* L., gleiche, f. w. Ostindien.
crispa L. (*pinnata* Andr.), krause, f. t. Cap der
 guten Hoffnung.
macrophylla Roxb., grofsblättrige, f. w. Ostindien.
robusta Roxb., rüstige, f. w. Ostindien.
sambucina W., fiederblättrige, f. w. Ostindien.
scabra Roxb. (*hirta* Hornem.), scharfe, f. w. Ostindien.

Leersia Sw. (J. D. Leers, deutscher Botaniker), III. II., Gramineae.

- australis* RB., neuholländische, 4. Wa. t, k. Neuholl.
oryzoides Sw., reifsartige, 4. Wa. f. Europa, Persien,
 Nordamerika.
virginica W., virginische, 4. Wa. f. Nordamerika.

Leighia Cass., Leighie, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

- speciosa* DC., prächtige, ☉. 4. f. b. k. Mexico.

Leimanthium Mchx., W., Wiesenlilie, VI. I. (XXIII. I.), Coronariae-Colchicaceae.

- hybridum* Swt., Bastard-W., 4. f. Nordamerika.
monoicum Swt., einhäusige, 4. f. Nordamerika.
virginicum W., virginische, 4. f. Nordamerika.

Leiophyllum P., Quendelblatt, X. 1., Ericaceae-Rhodoraceae.

prostratum Loud. (Sw.), (*Ammyrsine Lyoni* Sw.), gestrecktes, f. f. b. Nordamerika.

thymifolium P., thymianblättriges, f. f. b. Nordamer.

Lemna L., Wasserlinse (Entengrün), XXI. 11. (II. 1.), ?Aroideae.

arrhiza L., wurzellose, ☉. Wa. f. Italien, Frankreich.

gibba L., höckerige, ☉. Wa. f. Europa.

minor L., kleine, ☉. Wa. f. Europa, Amerika.

polyrrhiza L., vielwurzelige, ☉. Wa. f. Europa, Nordamerika.

trisulca L., dreifurchige (kreuzblättrige), ☉. Wa. f. Europa, Amerika etc.

Leonotis RB., Löwenohr, XIV. 1., Labiatae.

intermedia Lindl., mittleres, f. k. Cap d. gut. Hoffn.

Leonurus RB., prächtiges, f. k. Cap der gut. Hoffn.

nepetifolia RB., nepetablättriges, ☉. m. w, Ostindien, Cap der guten Hoffnung.

ovata Spgl., eiförmiges, f. k. Cap der guten Hoffn.

Leontice L., Löwenblatt, VI. 1., Berberideae.

altaica Pall., altaisches, 4. Kn. f. b. Sibirien, Bessarabien.

Chrysogonum L., goldwurzelige, 4. Kn. k. Griechenland, Kleinasien.

Leontopetalum L., ächtes, 4. Kn. f. b. Kleinasien, Griechenland, Neapel.

vesicaria Pall., blasiges, 4. Kn. f. b. Sibirien.

thalictroides L. v. *Caulophyllum thalict.*

Leontodon Juss. (et *Oporinea* D. Don), Pfaffenröhrlein (Löwenzahn), XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

I. *Apargia* Auctor.

asperum Rchb. (WK.), rauhes, 4. f. Ungarn, Oberitalien, Westphalen etc.

Berinii Rchb., Berini's, 4. f. Friaul.

biscutellaefolium DC., biscutellablättriges, 4. f. Süditalien, Taurien.

Brumati Schied., Brumati's, 4. f. Istrien, Friaul.

caucasicum Fisch., caucasisches, 4. f. Caucasus.

coronopifolium DC., krähenußblättriges, 4. f. k. Nordafrika.

crispum Vill., krauses, 4. f. Illyrien, Italien, Frankreich.

β) saxatile Rchb. (Tenor.).

croceum Haenk., safranfarbiges, 4. f. Ungarn, Krain etc.

β) aurantiacum (W. K.).

dubium Rchb., zweifelhaftes, 4. f. Mittel- und Süddeutschland.

β) hyoserioides (Welw.).

hastile L. (*danubiale* Jacq., Scop.), spontonförmiges, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

hispidum L. (*caucasicum* Hort.), steifhaariges, 4. f. Europa.

incanum Schrk., weißgraues, 4. f. Mittel-, Ost-, Süd- und Westeuropa.

lucidum DC. (Ten.), starkglänzendes, 4. f. Süditalien.

Rosani DC. (Ten.), Rosani's, 4. f. Neapel.

squamosum Lam. (*pyrenaicum* Gouan, *alpinum* Jacq.), schuppiges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

Leontodon

tenuiflorum (Gaud.), dünnblumiges, 4. f. Südliche Schweiz, Friaul etc.

Villarsii Lois. (*hirtum* Vill.), Villar's, 4. f. Frankreich.

II. *Oporinea* D. Don.

autumnale L., Herbst-P., 4. f. Europa.

β) *pratense* (Lk.).

aureum L. etc. vid. *Crepis aurea*. *hirtum* L. etc.

vid. *Thrinicia hirta*. *Taraxaci* Lois. vid. *Apargia*

Taraxaci. *Taraxacum* L. etc. vid. *Taraxacum*

officinale etc.

Leontonix Cass., Löwenschüppchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

declinatus (L.), niedergebeugtes, 4. k. t. Cap d. gut. H. *glomeratus* DC. (W.), knaulförmiges, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

modestus (Hook.), hübsches, 4. k. t. Cap d. gut. H.

squarrosus DC. (L.), sparriges, 4. k. t. Cap d. g. H.

Leontopodium P., RB., Löwenpfötchen (Edelweiss), XIX. II., Compositae-Helichryseae.

alpinum Cass. (*helveticum* D. Don, *vulgare* RB.), Alpen-L., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

Leonurus L., Löwenschwanz (Wolfstrapp), XIV. I., Labiatae.

altaicus Spgl., altaischer, ♂. f. Altaigebirge.

Cardiaca L., gemeiner, 4. f. Europa, Kleinasien, Nordamerika.

b) *alba*.

condensatus Hornem., gedrängter, ♂. f. Sibirien.

crispus Murr., krauser, 4. f. Sibirien.

heterophyllus Swt., verschiedenblättriger, ☉. f. Südamerika.

lacerus Lindl., schlitzblättriger, 4. f. k. Nepal.

Marrubiastrum L. (*Chaiturus Marrubiastr.* Ehrh.), andornblättriger, ♂. f. Mittel-, Nord- und Osteuropa.

multifidus Dsf., vielspaltiger, ♂. f. ?

neglectus Schult., übersehener, ♂. f. Südeuropa.

sibiricus L., sibirischer, ♂. f. Sibirien.

supinus L., niedriger, 4. f. Sibirien.

tataricus L., tatarischer, ♂. f. Mittelasien.

villosus Dsf., zottiger, ♂. f. Taurien.

lanatus P. v. *Panzeria lanata*.

Leopoldina Mart. (Leopoldine, Kaiserin von Brasilien), XXI. VI. (VI. III.), Palmae.

pulchra Mart., schöne, 4. w. Brasilien.

Lepanthes Sw., Rindenstendel, XX. I., Orchideae.

tridentata Sw., dreizahniger, 4. w. Jamaica.

Lepechinia W. (Iwan Lepechin, russischer Botaniker), XIV. I., Labiatae.

clinopodifolia W., wirbeldostenblättriger, 4. f. Sibirien.

spicata W., ährige, 4. f. k. Mexico.

Lepicaune Lapeyr. v. *Crepis*.

Lepicephalus Lagasc. v. *Succisa*.

Lepidagathis W., Schuppenklau, XIV. II., Acanthaceae.

cristata W., kammiger, 4. w. Ostindien.

Lepidium T., Kresse, XV. II., Cruciferae.

affine Ledeb., ähnelnde, 4. f. Sibirien.

Lepidium

- africanum DC., afrikanische, ⚥. k. Cap d. gut. Hoffn.
 amplexicaule W., stengelumfassende, 4. f. Sibirien.
 bonariense L., bonarische, ☉. f. Südamerika.
 campestre RB., Feld-K., ♂. f. Europa.
 Cardamines L., spanische, ♂. f. Spanien.
 chalepense L., syrische, ☉. f. Syrien.
 cordatum W., herzblättrige, 4. f. Sibirien.
 coronopifolium Fisch., krähenußblättrige, 4. f. Sibirien.
 crassifolium W. K., dickblättrige, 4. f. Ungarn.
 Cumingianum Fisch. et Mey. (*chilense* H. Par.), Cum-
 ming's, ♂. ⚥. k. Chili.
 cuneifolium DC., keilblättrige, ☉. f. Neuholland.
 diffusum DC., weitschweifige, ☉. f. Italien.
 divaricatum Ait., ausgespernte, ⚥. k. Cap der gut. H.
 Draba L., herzschröte, ♂. 4. f. Mittel- u. Südeuropa.
 Ecklonii Schrad., Ecklon's, ☉. f. Cap der gut. Hoffn.
 glastifolium Dsf., waidblättrige, ☉. f. Nordafrika.
 Gussoni Schrad., Gussone's, ♂. f. Sicilien.
 hirtum Sm., Hook., kurzhaarige, ♂. f. England,
 Südeuropa.
 hyssopifolium Dsf., ysopblättrige, ☉. f. Neuholland.
 Iberis L., iberisähnliche, ♂. f. Mittel- und Südeuropa.
 β) graminifolium L.
 incisum Roth (*Pollichii* Roth), schlitzblättrige, ☉. f.
 Caucasus, Bessarabien.
 latifolium L., breitblättrige, 4. f. Europa.
 lineare DC., gleichbreitblättrige, ⚥. k. Spanien.
 lyratum L., leierblättrige, ☉. f. Armenien.
 Menziesii DC., Menzies's, 4. f. Nordamerika.
 micranthum Ledeb. (*densiflorum* Schrad., *incisum* MB.),
 kleinblumige, ☉. f. Caucasus etc.
 oleraceum Forst., Gemüß-K., ☉. f. Neuzeeland.
 perfoliatum P., durchwachsene, ☉. f. Spanien,
 Oesterreich, Siebenbürgen, Persien, Syrien.
 Piscidium Forst., Fischgift-K., ☉. f. Australien.
 ruderales L., Stink-K., ☉. f. Europa.
 sativum L., gebaute, ☉. f. Persien, Syrien, Aegypten,
 Mittel- und Südeuropa.
 β) crispum. γ) latifolium C. Bauh:
 spinosum L., stachelige, ☉. f. Griechenland.
 subulatum L., pfriemenförmige, ⚥. k. Spanien.
 suffruticosum L. (*graminifolium* Cav.), halbstrauchige,
 ⚥. k. Spanien.
 virginicum L., virginische, ☉. f. Nordamerika.
 alpinum L. etc. v. Hutchinsia alpina etc. *didymum*
 L. v. Senebiera pinnatifida, *nudicaule* L. v. Tees-
 dalia *Lepidium*, *oppositifolium* La Bill. v. Eunomia
 oppositifolia.

Lepidonema chilense Fisch. et Mey. v. *Microseris pygmaea*.

Lepidophorum Neck., Schuppenträger, XIX. II.,
 Compositae-Corymbiferae.

repandum DC., ausgeschweifert, ☉. f. Spanien,
 Portugal.

Lepidosperma La Bill., Schuppennüßchen, III. I.,
 Cyperaceae.

gladiatum La Bill., schwertförmiges, 4. k. Neu-
 holland.

Lepidostephanus madioides Bartl. vid. *Achyrachaena mollis* Nachtr.

Leptismium Pfeiff., Schuppenfackeldistel, XII. 1., Cactaeae.

commune Pfr. (*Cereus squamulosus* Salm, *elegans* Hort.), gemeine, ⚔. w. Brasilien.

Knightii Pfr., Knight's, ⚔. w. Brasilien.

Myosurus Pfr. (Salm), (*Cereus tenuispinus* Haw.), mäuseschwanzähnliche, ⚔. w. Brasilien.

paradoxum Salm (*pterocaulis* Hort.), wunderbare, ⚔. w. Brasilien.

Leptaleum DC., Fadenblatt, XV. III., Cruciferae.

filifolium DC., sibirisches, ☉. f. Kasan, Sibirien.

Leptandra sibirica Nutt. et *virginica* Nutt. vid. *Veronica sibirica* et *virginica*.

Leptanthus Mchx., Schlankblümchen, III. 1., Comelinaceae.

gramineus Mchx., grasartiges, 4. Wa. Nordamerika.

Hinsichtlich der übrigen s. *Heteranthera*.

Leptocarpaea DC., Schlankschote, XV. III., Cruciferae.

Loeselii DC., Loesel's, ♂. f. Mittel-, Nord- und Ostdeutschland, Italien, Taurien, Griechenland.

Leptocarpus RB., Schlankknüfschen, XXII. III. (III. 1.), Restiaceae.

dichotomus RB., zweizinkiges, 4. k. t. Cap d. g. H.

imbricatus RB., deckblättriges, 4. k. t. Cap d. g. H.

tenax RB., zähes, 4. k. t. Neuholland.

Leptochloa P. B., Schlankspelze, III. II., Graminae.

cynosuroides R. et S., kammgrasähnliche, ☉. m. f. Ostindien.

domingensis Lk., westindische, 4. w. Westindien, Mexico.

filiformis R. et S., fadenförmige, ☉. f. Ost- und Westindien.

procera N. E., hohe, 4. w. Brasilien.

tenerrima R. et S., zarte, ☉. f. China, Ostindien.

virgata P. Beauv., ruthenförmige, ☉. 4. w. Westindien.

Leptomeria RB., Südseethesie, V. 1., Sandalaceae.

acida RB., säuerliche, ⚔. t. k. Neuholland.

Billardieri RB., Billardiere's, ⚔. t. k. Neuholland.

Leptopyrum Rchb., Dünnsrüchtchen, XIII. VI., Ranunculaceae.

fumarioides Rchb., erdrauchähnliches, ☉. f. Sibirien.

Leptorhynchos Less., Schlankkrachler, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

squamatus Less., Benth., schuppiger, 4. t. Van-Diemens-Land, Neuholland.

Leptosiphon Benth., Dünnröhre, V. 1., Polemoniaceae.

androsaceus Benth., mannsschildähnliche, ☉. f. Californien.

densiflorus Benth., dichtblumige, ☉. f. Californien.

b) *albiflorus*.

grandiflorus Benth., großblumige, ☉. f. Californien.

luteus Benth., gelbe, ☉. f. Californien.

b) *pallidus*.

parviflorus Benth., kleinblumige, ☉. f. Californien.

Leptospermum Forst., Südseemyrte, XX. 1., Myrtaceae.

arachnoideum Sm., spinnewebige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.
 attenuatum Sm., verdünnte, ♂. ♀. t. k. Neuholland.
 baccatum Sm., beerentragende, ♂. ♀. t. k. Neuholland.
 emarginatum Wendl., ausgerandete, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

ericalyx Sbr., wollhaarige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.
 flavescens Sm. (*Thea* W., *multiflorum* Cav.), gelbliche, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

flexuosum Lk. (*resiniferum* Bertol.), gebogene, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

grandifolium Sm., großblättrige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

imbricatum Sm., dichtblättrige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

juniperinum Sm., wachholderähnliche, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

lanigerum Sm., wollige, ♂. ♀. t. k. Neuholland, Van-Diemens-Land.

marginatum LaBill., randfranzige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

multicaule Cunn., vielstengelige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

obtusum Lodd., stumpfblättrige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

ovatifolium Swt., eiblättrige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

pendulum Sbr., hängende, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

persiciflorum Rchb. (? *grandiflorum* Lodd., *purpurascens* H. Berol.), pfirsichblüthfarbige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

porophyllum Cav., durchscheinendpunktirte, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

pubescens Sm. (*canescens* Wendl.), weichhaarige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

rubricaulis Vent., rothästige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

scoparium Forst., besenartige, ♂. ♀. t. k. Neuzeeland.

β) myrtifolium Wendl. γ) grandiflorum Hook.

sericeum LaBill., seidenhaarige, ♂. ♀. t. k. Neuholl.

squarrosum Sbr., sparrige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

stellatum Cav., sternförmige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

thymifolium Cunn., thymianblättrige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

triloculare Vent., dreifächerige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

tuberculatum Poir., höckerige, ♂. ♀. t. k. Neuholland.

Ungewisse: acuminatum, affine, Celsianum, crataegifolium, ambiguum Sm. (punctatum Hort.) vid. Stenospermum corifolium, virgatum Forst. vid. Baeckea virgata.

Leptostelma D. Don, Schlankkrone, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

maximum D. Don, große, 4. k. t. Mexico.

Leptotes Lindl., Schlankstendel, XX. 1., Orchideae.

bicolor Lindl., zweifarbig, 4. w. Brasilien.

Lepturus RB., Dünnschwanz, III. 11., Gramineae.

I. Lepturus genuin. Trin.

cylindricus Trin. (subulatus Kunth), cylinderförmiger,

⊙. f. Südeuropa, Cap der guten Hoffnung.

filiformis Trin., fadenförmiger, ⊙. f. Südeuropa.

incurvatus Trin., gekrümmter, ⊙. f. West- und Südeuropa, Orient, Nordafrika.

II. Pholiurus Trin.

pannonicus Kunth, ungarischer, ⊙. f. Ungarn, Südrussland.

- Lepyrodia** RB., Schuppenrestie, XXII. III. (III. III.),
Restiaceae.
gracilis RB., schlanke, 4, k. t. Neuholland.
- Leria** DC., Lerie, XIX. II., Compositae-Eupatorineae.
albicans DC., weißliche, ☉. m. f. w. Westindien.
nutans DC., nickende, ♂. w. Westindien.
pumila DC., kleine, ♂. w. Jamaica.
- Lespedezia** Mchx. (Lespedez, Gouverneur von Florida,
Beförderer der Botanik), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-
Papilionaceae.
angustifolia Nutt., Torr., schmalblättrige, 4. f. Nord-
amerika.
capitata Mchx., kopfförmige, 4. f. Nordamerika.
divergens Pursh, divergirende, 4. f. Nordamerika.
eriocarpa DC., wollfrüchtige, 4- k. Nepal.
fruticosa P., strauchige, ♀. f. b. k. Virginien, Sibirien.
glomerata Horn., knaulförmige, ☉. Sch. w. Ostindien.
hirta Horn. (*villosa* P.), haarige, 4. f. Nordamerika.
juncea P., simsensförmige, ☉. 4. f. Sibirien, Tatarei.
polystachya Mchx., vielährige, 4. f. Nordamerika.
procumbens Mchx., niederliegende, 4. f. Nordamerika.
prostrata Pursh, gestreckte, 4. f. Nordamerika.
reticulata P., netzförmige, 4. f. Nordamerika.
sessiliflora Mchx., Nutt., stiellose, 4. f. Nordamerika.
Stuvei Nutt., Stuve's, ☉. f. Nordamerika.
violacea P., violette, 4. f. Nordamerika.
- Lessertia** DC. (Benjamin de Lessert, ein Franzose,
berühmt als Freund und Gönner der Botanik), XVII.
IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
annua DC., jährige, ☉. f. m. Cap der guten Hoffn.
annularis Burch., ringförmige, ♀. t. k. Cap d. gut. H.
brachystachya DC., kurzährige, ♀. t. k. Cap d. g. H.
diffusa RB., weitschweifige, ☉. f. m. Cap d. gut. H.
falciformis DC., sichelförmige, ♀. t. k. Cap d. g. H.
fruticosa Bot. reg., strauchige, ♀. t. k. Cap d. g. H.
perennans DC., ausdauernde, 4. t. k. Cap der gut. H.
pulchra Bot. mag., schöne, ♀. t. k. Cap der gut. H.
- Lestibudesia** A. P. Th., RB., (F. J. et Them. Lesti-
boudois, belgische Botaniker), V. I., Aizoideae-Ama-
rantheae.
paniculata RB., rispige, ♂. w. Westindien.
trigyna RB., dreiweibige, ♂. w. Westafrika.
virgata RB., ruthenförmige, ♀. w. Westindien.
- Lettsomia** R. et P. (J. Cockley Lettsom, englischer
Naturforscher), XIII. I., Ternstroemiaceae.
tomentosa R. et P., filzige, ♀. w. Peru.
bona nox Roxb., *cuneata* Roxb. etc. vid. *Argyrea*
bona nox etc.
- Leucadendron** Boerh., Silberbaum, IV. I. (XXII. IV.),
Proteaceae.
abietinum RB., tannenartiger, ♀. ♀. t. Cap d. gut. H.
aemulum RB., ähnelnder, ♀. ♀. t. Cap der guten H.
angustatum RB., verschmälerter, ♀. ♀. t. Cap d. g. H.
argenteum RB., ächter, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
adscendens RB., aufsteigender, ♀. t. Cap der gut. H.
buxifolium RB., buchsbaunblättriger, ♀. ♀. t. Cap
der guten Hoffnung.
cartilagineum RB., knorpelartiger, ♀. ♀. t. Cap der
guten Hoffnung.

Leucadendron

- caudatum Lk., geschwänzter, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.
 cinereum RB., aschfarbiger, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. H.
 comosum RB., schöpfiger, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. H.
 concinnum RB., netter, ⚥. ⚥. t. Cap der guten Hoffn.
 concolor RB., einfärbiger, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.
 corymbosum Berg., traubendoldiger, ⚥. ⚥. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 crassifolium RB., dickblättriger, ⚥. ⚥. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 decorum RB., zierlicher, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.
 decurrens RB., herablaufender, ⚥. ⚥. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 ericaefolium RB., heideblättriger, ⚥. ⚥. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 floridum RB., blüthenreicher, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.
 fusciflorum RB., braunblumiger, ⚥. ⚥. t. Cap d. g. H.
 glabrum RB., kahler, ⚥. ⚥. t. Cap der guten Hoffn.
 Globularia RB., kugelblumiger, ⚥. ⚥. t. Cap d. g. H.
 grandiflorum RB., großblumiger, ⚥. ⚥. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 imbricatum RB., ziegeldachiger, ⚥. ⚥. t. Cap d. g. H.
 inflexum Lk., eingebogener, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.
 Levisanus Berg., quendelblättriger, ⚥. ⚥. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 linifolium RB., leinblättriger, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.
 marginatum Lk., berandeter, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.
 ovale RB., eiförmiger, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.
 platyspermum RB., breitsamiger, ⚥. ⚥. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 plumosum RB., federiger, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.
 pubescens RB., weichhaariger, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.
 retusum RB., abgestutzter, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. H.
 salignum RB., weidenähnlicher, ⚥. ⚥. t. Cap d. g. H.
 scabrum RB., scharfer, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.
 sericeum RB., seidenhaariger, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.
 spathulatum RB., spathelblättriger, ⚥. ⚥. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 squarrosus RB., sparriger, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. H.
 stellatum Swt., sternförmiger, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.
 strictum RB., steifer, ⚥. ⚥. t. Cap der guten Hoffn.
 tortum RB., gedrehter, ⚥. ⚥. t. Cap der guten Hoffn.
 uliginosum RB., sumpfliebender, ⚥. ⚥. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 venosum RB., aderiger, ⚥. ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.
 virgatum RB., ruthenförmiger, ⚥. ⚥. t. Cap d. gut. H.
 Ungewisse: *flavescens*, *polygaloides*, *undulatum*.
thymelaeoides Berg. v. *Mimetes thymelaeoides*.

Leucanthemum T. DC. v. **Chrysanthemum**.

Leucas RB., Weissslippe, XIV. 1., Labiatae.

- aspera Lk., rauhe, ☉. m. f. Südpersien.
 biflora RB. (*procumbens* Dsf.), zweiblumige, ♂. w.
 Ceylon.
 cephalotes Spgl. (*capitata* Dsf.), kopfförmige, ☉. m. f.
 Ostindien.
 chinensis RB., chinesische, ☉. m. f. China.
 flaccida RB., schlaffe, ☉. m. f. Neuholland.
 indica RB., indische, ☉. m. f. Ostindien.
 linifolia Spgl., leinblättrige, ☉. m. t. Ostindien.

Leucas

martinicensis RB., martiniquische, ☉. m. f. Westindien.

Pluknetii Spgl., Pluknet's, ☉. m. f. Ostindien.

zeylanica RB., zeylonische, ☉. m. f. Ceylon.

Leuceria senecioides D. Don v. *Trixis senecioides*.

Leucocarpus D. Don, Weisfrucht, XIV. II., *Personatae-Antirrhineae*.

alatus D. Don (*Conobea alata* Grah.), geflügelte, ☉. m. f. Vera-Cruz.

Leucocoryne Lindl., Weisknöpfchen, III. I., *Coronariae-Asphodeleae*.

alliacea (Miers), lauchähnliche, 4. Zw. k. t. Chili.

ixioides (Sims), ixiaähnliche, 4. Zw. k. t. Chili.

odorata Lindl., wohlriechende, 4. Zw. k. t. Chili.

Leucojum Rupp., Knotenblume, VI. I., *Narcisseae*.

aestivum L., Sommer-K., 4. Zw. f. Süd- und Osteuropa, England.

pulchellum Salisb., schöne, 4. Zw. f. ?

vernum L., Frühlings-K., 4. Zw. f. Europa.

b) *multiplex* Penny. β) *carpathicum* Bot. mag.

autumnale L. etc. v. *Acis autumnalis* Nachtr. etc.

Leucopogon RB., Weisbart, V. I., *Epacrideae*.

amplexicaulis RB., stengelumfassender, ⚥. t. Neuholl.

appressus RB., angedrückter, ⚥. t. Neuholland.

collinus RB., Hügel-W., ⚥. t. Van-Diemens-Land.

ericoides RB., heideähnlicher, ⚥. t. Neuholland.

fastigiatus Sbr., gipfelständiger, ⚥. t. Neuholland.

juniperinus RB., wachholderähnlicher, ⚥. t. Neuholl.

lanceolatus RB., lanzettblättriger, ⚥. t. Neusüdwallis.

microphyllus RB., kleinblättriger, ⚥. t. Neuholland.

obovatus RB., verkehrteiförmiger, ⚥. t. Neuholland.

Richei RB. (*parviflorus* Lindl.), Riche's, ⚥. t. Neuholl.

setiger RB., borstiger, ⚥. t. Neuholland.

striatus RB., gestreifter, ⚥. t. Neuholland.

verticillatus RB., wirtelblättriger, ⚥. t. Neuholland.

virgatus RB., ruthenförmiger, ⚥. t. Neuholland.

Leucosceptrum canum Sm. vid. *Clerodendrum Leucosceptrum*.

Leucospermum RB., Weißsamen, IV. I., *Proteaceae*.

attenuatum RB., verdünnter, ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.

candicans Bot. Reg., weißlichblättriger, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

conocarpum RB., kegelfrüchtiger, ⚥. t. Cap d. gut. H.

ellipticum RB., elliptischer, ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.

formosum Kn., schöner, ⚥. t. Cap der guten Hoffn.

grandiflorum RB., großblumiger, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

hypophyllum RB., unterblättriger, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

lineare RB., gleichbreitblättriger, ⚥. t. Cap d. gut. H.

medium RB., mittlerer, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

parile Kn., gleichmäßiger, ⚥. t. Cap der guten Hoffn.

patulum RB., ausgebreiteter, ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.

puberum RB., feinhaariger, ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.

spathulatum RB., spatelblättriger, ⚥. t. Cap der guten Hoffnung.

tomentosum RB., filziger, ⚥. t. Cap der guten Hoffn.

tottum RB., hottentottischer, ⚥. t. Cap der gut. Hoffn.

Leucostemma vestitum D. Don v. *Helichrysum vestitum*.

Leucothöe D. Don, *Leucothöe*, X. 1., Ericaceae.

acuminata G. Don, zugespitzte, $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. k. f. b. Georgien, Florida.

axillaris D. Don, achselblumige, $\frac{1}{2}$. f. b. Nordamerika.

β) *longifolia* Pursh.

buxifolia DC., buchsbaumblättrige, $\frac{1}{2}$. t. Mascarenas.

coriacea DC., lederartige, $\frac{1}{2}$. k. Carolina, Florida.

b) *rubra* Lodd.

coriifolia DC., corisblättrige, $\frac{1}{2}$. k. Japan.

eucalyptoides DC. (Schltdl.), eucalyptusähnliche, $\frac{1}{2}$. w. t.

Südamerika.

ilicifolia DC. (P.), ilexblättrige, $\frac{1}{2}$. t. Peru.

Mariana DC., marilandische, $\frac{1}{2}$. f. b. Nordamerika.

β) *oblonga* Swt.

nummularia Schltdl., rundblättrige, $\frac{1}{2}$. w. t. Südamer.

revoluta DC. (Spgl.), zurückgerollte, $\frac{1}{2}$. w. t. Brasilien.

salicifolia DC. (Commers.), weidenblättrige, $\frac{1}{2}$. t.

Mascarenas.

secunda DC. (Mch.), einseitige, $\frac{1}{2}$. f. b. Nordamerika.

spinulosa G. Don, feinstachelige, $\frac{1}{2}$. f. b. Carolina.

floribunda D. Don, *spicata* Wats. v. *Zenobia floribunda* et *racemosa*.

Leuzea DC. (DeLeuze, ein Freund Decandolle's), XIX.

III., Compositae-Cynarocephalae.

altaica Lk., Fisch., altaische, 4. f. Altai.

australis Swt., südliche, 4. k. Neuholland.

carthamoides DC., saflorähnliche, 4. f. Sibirien.

conifera DC., kegelförmige, ♂. 4. f. b. k. Süd- und Westeuropa, kanarische Inseln.

salina Spgl., salzige, ♂. 4. f. Sibirien.

serratuloides Fisch. et Mey., scharfenähnliche, 4. f. b. Persien.

Levisticum Koch, Liebstöckel, V. II., Umbelliferae.

officinale Koch (*vulgare* Rchb.), officinelles, 4. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa, Siebenbürgen.

Lewisia Pursh (Capit. M. Lewis, welcher Nordamerika bereiste), XIII. 1., Portulacaceae.

rediviva Pursh, ausdauernde, 4. f. Nordamerika.

Leycesteria Wall. (W. Leycester, Justizchef in Bengalen), V. 1., Rubiaceae.

formosa Wall., schöne, $\frac{1}{2}$. w. Nepal.

Leyssera L. (F. W. v. Lèysser, deutscher Botaniker), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

capillifolia DC. (*discoidea* Spgl.), haarblättrige, ☉. f. Nordafrika.

ciliata Thbg., gefranzte, $\frac{1}{2}$. k. Cap der guten Hoffn.

gnaphalioides L., ruhrkrautähnliche, $\frac{1}{2}$. k. Cap der guten Hoffnung.

polifolia Thbg., poleiblättrige, $\frac{1}{2}$. k. Cap d. gut. H.

ericoides Berg. vid. *Relhania paleacea*. *squarrosa* Thbg. v. *Helipterum gnaphalioides*.

Liabum Adans, *Liabum*, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

Brownei Cass., Brown's, 4. w. Jamaica.

Liatris G., Prachtscharte, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

bellidifolia Mchx., maßliebenblättrige, 4. k. f. b. Nord-Carolina.

Liatris

- borealis Paxt., nördliche, 4. f. Nordamerika.
 corymbosa Nutt., draubendoldige, 4. f. b. Nordamer.
 cylindracea Mchx., cylinderförmige, 4. f. Nordamerika.
 elegans W., zierliche, 4. f. b. Carolina.
 gracilis Mchx., schlanke, 4. f. b. k. Südcarolina.
 graminifolia W., grasblättrige, 4. Kn. k. f. b. Südcarolina.
 heterophylla W., verschiedenblättrige, 4. f. b. Südcarolina.
 intermedia Lindl., mittlere, 4. f. Nordamerika.
 odoratissima W., wohlriechende, 4. k. f. b. Carolina.
 paniculata W., rispige, 4. k. f. b. Virginien, Carolina.
 pilosa W., haarige, 4. f. Nordamerika.
 pycnostachya Mchx., dichtährige, 4. f. Nordamerika.
 resinosa Nutt., harzige, 4. f. b. k. Carolina.
 scariosa W., trockenhäutige, 4. f. Nordamerika.
 sphaeroidea Mchx., kugelblumige, 4. f. Virginien, Carolina.
 spicata W., ährige, 4. f. Nordamerika.

β) macrostachya Mchx. (pumila Lodd.). γ) racemosa DC. (pilosa Botan. Reg., turbinata Swt.).

tenuifolia Nutt., dünnblättrige, 4. k. f. b. Carolina.

Libanotis Crtz., Weihrauchwurz, V. II., Umbelliferae.
 athamantoides DC., athamantaähnliche, ♂. f. Krain, Pyrenäen.

condensata L., gedrängte, ♂. 4. f. Sibirien.

montana All., Berg-W., ♂. f. Europa.

sibirica Koch (L.), (athamantoides C. A. Mey.), sibirische, ♂. f. Nordeuropa, Sibirien.

villosa Turcz., zottige, ♂. 4. f. Tatarei.

Libertia Spgl. (Madem. M. A. Libert in Malmedy, belgische Botanikerin), III. I., Irideae.

formosa Grah., schöne, 4. k. t. Chili.

grandiflora (RB.), großblumige, 4. k. Neuzeeland.

ixioides Spgl., ixiaähnliche, 4. k. t. Neuzeeland.

paniculata Spgl., rispige, 4. k. t. Neuholland.

pulchella Spgl., hübsche, 4. k. t. Neuholland.

Libertia arduennensis Lej. v. Bromus arduennensis.

Lichtensteinia W. (H. Lichtenstein, Professor zu Berlin, berühmt als Reisender und Zoolog), VI. III., Colchicaceae.

laevigata W., glatte, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.

undulata W., wellenblättrige, 4. k. t. Cap d. g. H.

Licuala Thbg. (ostindischer Name), VI. I., Palmae.

peltata Roxb., schildförmige, ♂. w. Ostindien.

spinosa Thbg., dornige, ♂. w. Ostindien, Cochinchina.

Lidbeckia Berg. (E. G. Lidbeck, schwedischer Botaniker), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

lobata Thbg., gelappte, ♂. k. Cap der guten Hoffn.

pectinata Berg., kammförmige, ♂. k. Cap d. gut. H.

turbinata Thbg. v. Cenia turbinata.

Lightfootia L'Her. (J. Lightfoot, schottischer Botaniker), V. I., Campanulaceae.

lanceolata Lk., lanzettliche, 4. k. t. Cap der gut. H.

Loddigesii A. DC. (tenella Lodd.), Loddiges's, ♂. k. t. Cap der guten Hoffnung.

muscosa Lk., moosartige, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

Lightfootia

- oxycoccoides L'Her., moosbeerenähnliche, 4. ♂. k. t.
 Cap der guten Hoffnung.
 subulata L'Her., pfriemenförmige, ♂. k. t. Cap der
 guten Hoffnung.

Ligularia Cass., Bandblume, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- altaica DC., altaische, 4. f. Altai.
 macrophylla DC., großblättrige, 4. f. Sibirien.
 sibirica Cass., sibirische, 4. f. Böhmen, Ungarn, Caucasus, Sibirien.
 β) vulgaris DC. γ) araneosa DC. δ) speciosa
 Fisch. et Mey.

Ligusticum T., Möhrenwurz, V. II., Umbelliferae.

- actaeaeifolium Mchx., actaeablättrige, 4. f. Nordamer.
 alatum Spgl. (*Cnidium myrrhifolium* MB.), geflügelte,
 4. f. Caucasus.
 alpinum Spgl., Alpen-M., 4. Kn. f. Ungarn, julische
 Alpen, Neapel.
 candicans Ait., weißliche, 4. f. ?
 ferulaceum All., ferulaähnliche, ♂. f. Schweiz, Ober-
 italien.
 longifolium L., langblättrige, 4. f. Sibirien.
 obtusifolium Hornem., stumpfblättrige, 4. f. h. k.
 Nordafrika.
 pyrenaicum Gouan, pyrénaische, 4. f. Pyrenäen.
 scoticum L., schottische, 4. f. Nordeuropa, Canada.
 Seguieri Koch, Seguier's, 4. f. Oberitalien, Krain,
 Tyrol.
 splendens Lapeyr. (*tenuifolium* Ram.), schimmernde, 4.
 Kn. k. f. Pyrenäen.

apioides Lam. v. *Cnidium apioides*. *arenarium* Lk.
 etc. vid. *Meum sibiricum* etc. *athamantoides* Spgl.
 v. *Libanotis athamant*. *austriacum* L. v. *Pleuro-*
spermum austriacum. *balearicum* L. vid. *Brignolia*
panacifolia. *carniolicum* Host. v. *Hladnickia gola-*
censis Nachtr. *Cervaria* Spgl. vid. *Peucedanum*
Cerv. *cornubiense* L. (*aquilegifolium* W.) v. *Phy-*
sospermum commutatum. *Gmelini* Cham. (*vagina-*
tum Spgl.) v. *Conioselinum Gmelini* Nachtr. *Le-*
visticum L. vid. *Levisticum officinale*. *nodiflorum*
 Vill. v. *Trochiscanthes nodiflora*. *peloponnesiacum*
 L. v. *Molopospermum cicutarium*. *peregrinum* L.
 vid. *Petroselinum peregrin.* *simplex* All. v. *Gaya*
simplex Nachtr.

Ligustrum T., Rheinweide (Liguster), II. I., Sapotaceae-Oleinae.

- japonicum Thb., japanische, ♂. ♂. k. Japan.
 lucidum Ait., glänzende, ♂. ♂. k. China.
 β) floribundum Donald's.
 spicatum Hamilt., D. Don (*nepalense* Wall.), ährige, ♂.
 ♂. k. Nepal.
 vulgare L., gemeine, ♂. f. Europa.
 b) leucocarpum. c) xanthocarpum. d) chloro-
 carpum. e) sempervirens (*italicum* Mill.). f) va-
 riegatum. g) angustifolium.

Lilium T., Lilie, VI. I., Coronariae (*Liliaceae*).

- atrosanguineum Sieboldt (*fulgens* Hort.), blutrothe, 4.
 Zw. f. b. k. Japan.

Lilium

- bulbiferum L., Feuer-L., 4. Zw. f. Mittel- und Südeuropa.
 b) fl. pleno. c) minus. d) variegatum. e) umbellatum.
- Buschianum Lodd.; Busch's, 4. Zw. f. Sibirien.
- canadense L., canadische, 4. Zw. f. Nordamerika.
 b) rubrum.
 β) penduliflorum Red.
- candidum L., weisse, 4. Zw. f. Südeuropa, Kleinasien.
 b) striatum. c) spicatum. d) variegatum. e) plenum.
- carniolicum Bernh. (*chalcedonicum* Auctor.), krainerische, 4. Zw. f. Krain, österreichisches Litorale.
- carolinianum Mchx. (*autumnale* Lodd., *Michauxii* Poir.), carolinische, 4. Zw. f. b. Carolina.
- Catesbaei Curt. (*carolinianum* Lam., *spectabile* Salisb.), Catesby's, 4. Zw. f. b. Carolina.
- chalcedonicum L., chalcedonische, 4. Zw. f. Kleinasien.
- concolor Salisb., einfarbige, 4. Zw. f. b. China.
- coruscans Hort., schimmernde, 4. Zw. f. ?
- croceum Bernh. (? *aurantiacum* Haw.), safranfarbige, 4. Zw. t. ?
- dauricum Ker (*spectabile* Lk., *pensylvanicum* Bot. mag.), dahurische, 4. Zw. f. Dahurien.
- eximium Sieboldt (*speciosissimum* et *longiflorum* Hort.), ausgezeichnete, 4. Zw. f. b. k. Japan.
- japonicum Thbg., japanische, 4. Zw. f. b. k. Japan, Nepal.
- lancifolium Thbg., lanzettblättrige, 4. Zw. f. b. k. Japan.
- latifolium Lk., breitblättrige, 4. Zw. f. ?
- longiflorum Thbg., langblumige, 4. Zw. f. b. k. Japan.
- maculatum Thbg., gefleckte, 4. Zw. f. b. k. Japan.
- Martagon L., Türkenbund-L., 4. Zw. f. Europa.
 a) pubescens. β) glabrum Spgl.
 b) fl. pleno. c) fl. albo. d) fl. albo pleno.
- monadelphum MB., einbrüderige, 4. Zw. f. Caucasus.
- nepalense Wall., nepal'sche, 4. Zw. f. b. k. Nepal.
- peregrinum Mill. (*candidum* var. L., *byzantinum* Swt.), fremde, 4. Zw. f. Levante.
- philadelphicum L., philadelphische, 4. Zw. f. Nordamerika.
 β) andinum Nutt. (*umbellatum* Pursh).
- pomponium L., pomponische, 4. Zw. f. Spanien, Sibirien.
 b) flore pleno.
- pyrenaicum Gouan, pyrenäische, 4. Zw. f. Südfrankreich.
 b) flore pleno.
- sibiricum W., sibirische, 4. Zw. f. Sibirien.
- speciosum Thbg. (*superbum* Thbg., *lancifolium* Hort.), prächtige, 4. Zw. f. b. k. Japan.
 β) punctatum (*lancifolium roseum* Paxt.).
- superbum Lam., stolze, 4. Zw. f. b. Nordamerika.
- tenuifolium Fisch., Hornem. (*pumilum* Redout.), feinblättrige, 4. Zw. f. b. Dahurien.
- Thunbergianum R. et S. (*aurantiacum* Sieboldt, *bulbiferum* Thbg.), Thunberg's, 4. Zw. f. b. k. Japan.
- tigrinum Ker, getigerte, 4. Zw. f. b. China.
camtschatcense L. et *pudicum* Pursh vid. *Fritillaria lanceolata* et *pudica*.

Limeum L., Pestling, VII. II., Portulacaceae.

africanum L., afrikanischer, 4. k. Cap der gut. H.

Limnanthus RB., Sumpflblume, X. I., Geraniaceae-Limnantheae.

Douglasii RB., Douglas's, ☉. m. f. Californien.

Limnætis *cynosuroides* P., *pungens* P. etc, v. *Spartina cynosuroides* etc.

Limncharis Humb., Bonpl., Sumpfffreund, XIII. VI., Alismaceae-Butomeae.

Humboldtii Rich., Humboldt's, 4. Wa. w. Südamerika.

Plumieri Rich., Plumier's, 4. Wa. w. Westindien, Neu-Granada.

Limnochloa P. B. Rchb., Schlammbinse, III. I., Cyperaceae.

Baeothryon Rchb. (Ehrh.), (*Scirpus pauciflorus* Lightf.), gemeine, 4. f. Europa.

β) *campestris* Roth.

caespitosa Rchb., rasenartige, 4. f. Europa, Nordamerika.

parvula Rchb. (*Scirpus nanus* Spgl.), kleine, ☉. f. Mannsfeld, Lauenburg.

Limodorum T., Dingel, XX. I., Orchideae.

abortivum Sw., violetter, 4. f. Mittel- und Südeuropa, Taurien.

altum Jacq. (*tuberosum* Jacq.) etc. v. *Bletia acutipetala* etc.

Limonia L., (arabischer Name), X. I., Hesperideae-Aurantiaceae.

acidissima L., sauere, 5. w. Ostindien.

australis Cunn., neuholländische, 5. t, Neuholland.

citrifolia W., citronenblättrige, 5. t. China.

crenulata Roxb., gekerbte, 5. w. Ostindien.

parviflora Sims, kleinblumige, 5. t. China.

scandens Wall., klimmende, 5. Sch. w. Ostindien.

Hinsichtlich d. übrigen s. die Gattungen: *Atalantia*, *Clausena*, *Glycosmis* et *Triphasia*.

Limosella L., Schlammling, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

aquatica L., gemeiner, ☉. f. Europa.

Linanthus Benth., Flachsblümchen, V. I., Polemoniaceae.

dichotomus Benth., zweizinkiges, ☉. f. Californien.

Linaria T., Frauenflachs, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

acutiloba Fisch., spitzlappiger, 4. f. Sibirien.

aegyptiaca Dsf., ägyptischer, ☉. f. Aegypten.

aequitriloba Spgl., dreilappiger, 4. k. f. Corsica, Sardinien.

alpina Mill., Alpen-F., ☉. f. Mitteleuropäische Alpen.

alsinefolia Spgl., alsinenblättriger, ☉. f. Corsica.

amethystina Spgl., amethystfarbiger, ☉. f. Portugal, Spanien.

arenaria DC., sandliebender, ☉. f. Frankreich.

arvensis Dsf., Acker-F., ☉. f. Europa.

bipartita W. (*speciosa* Jacq. fil.), zweitheiliger, ☉. f. Nordafrika.

bipunctata Spgl., doppeltpunktirter, ☉. f. Italien, Spanien, Portugal.

Linaria

- canadensis* Spgl., canadischer, ☉. 4. f. Nordamerika.
caucasica Muss., caucasischer, ☉. f. Caucasus.
chalepensis Mill. (*alba* Mch.), weißer, ☉. f. Südeuropa.
chloraefolia Rchb., chlorablättriger, ♂. 4. f. Sachsen.
circinata D. Don, kreiselnder, ☉. f. Nordafrika.
cirrhusa W., wickelrankiger, ☉. f. Aegypten.
commutata Bernh., verwechselter, ☉. f. Istrien.
cretacea Fisch., kriedeliebender, ☉. f. Sibirien.
Cymbalaria Mill., Cymbelkraut-F., 4. f. Europa.
dalmatica Buchsb., dalmatischer, ♂. 4. f. Dalmatien, Armenien.
dealbata Lk., weißlichblättriger, ☉. f. Portugal.
delphinioides Gay., ritterspornähnlicher, ? ☉. f. ?
diffusa Lk., weitschweifiger, ☉. f. Portugal, Spanien.
Elatine Mill., liegender, ☉. f. Europa, Mittelasien, Nordafrika.
elatinoides Dsf., elatineähnlicher, ☉. f. Nordafrika.
flava Dsf., hellgelber, ☉. f. Nordafrika.
flexuosa Dsf., gebogener, ☉. f. Nordafrika.
fruticans Spgl., strauchiger, ♂. k. Cap der gut. Hoffn.
genistaefolia Mill., ginsterblättriger, 4. f. Mittel- und Ostdeutschland, Sibirien.
glauca W., blaugrüner, ☉. f. Kleinasien.
heterophylla Dsf., verschiedenblättriger, 4. k. Nordafrika.
hians Spgl., klaffender, ☉. 4. f. Südeuropa.
hirta W., kurzhaariger, ☉. f. Spanien, Portugal.
incarnata Spgl., fleischfarbiger, ☉. f. Spanien, Portugal.
italica Trev. (*angustifolia* Rchb., *paniculata* Auctor., *linifolia* Roch.), italienischer, 4. f. Süd- und Osteuropa.
juncea DC., simsensförmiger, ? 4. ☉. f. Spanien.
lanigera Dsf., wolliger, ☉. f. Portugal, Nordafrika.
latifolia Dsf., breitblättriger, ☉. f. Nordafrika.
linifolia W. (*Biebersteinii* Bess.), schmalblättriger, 4. f. Italien, Taurien, Podolien.
litoralis Bernh., Seestrands-F., ☉. f. Süd- u. Osteuropa.
 β) *pterospora* Fisch. et Mey.
Löselii Schweig. (*juncea et maritima* Auctor), Lösel's, 4. f. Preußen, Taurien.
lusitanica T., portugiesischer, ☉. f. Portugal.
macroura Lk. (*stricta* Hornem.), großsähriger, 4. f. Südrufßland.
marginata Dsf., berandeter, 4. k. f. b. Nordafrika.
micrantha Spgl., kleinblumiger, ☉. f. Spanien.
minor Dsf. (*viscida* Mch.), kleiner, ☉. f. Europa.
multicaulis Spgl., vielstengelig, ☉. f. Sicilien, Portugal, Nordafrika.
organifolia DC., dostenblättriger, 4. k. Westeuropa.
Pelisseriana DC., Pelisser's, ☉. f. Frankreich, Italien.
pilosa DC., haariger, 4. f. Italien, Pyrenäen.
procera DC., hoher, 4. f. ?
pubescens Presl, weichhaariger, 4. f. b. k. Neapel, Sicilien.
purpurascens Hornem., röthlicher, ♂. f. Südeuropa.
purpurea Mill., purpurrother, 4. f. Süditalien.
pyramidata T. (*silenifolia* Lk.), pyramidal, 4. f. Armenien.
pyrenaica DC., pyrenäischer, ☉. f. Frankreich, Pyrenäen.

Linaria

- reflexa* Dsf., zurückgebogener, ☉. f. Nordafrika.
reticulata Dsf., netzförmiger, 4. k. Nordafrika.
rubrifolia DC., rothblättriger, ☉. f. Südfrankreich.
saxatilis DC., Gesteins-F., 4. f. Westeuropa.
simplex DC., einfacher, ☉. f. Frankreich, Caucasus.
spartea Spgl., pfriemenförmiger, ☉. f. Spanien, Nordafrika.
spuria Mill., unächter, ☉. f. Europa.
striata DC. (*repens* W.), gestreifter, 4. f. England, Belgien, Schweiz, Frankreich, Italien.
supina Dsf., niedriger, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.
thymifolia DC., thymianblättriger, ☉. f. Südfrankreich.
transtagana Spgl., Tajo-F., ☉. f. Portugal, Spanien.
triornithophora W., langsporniger, 4. k. Portugal, Spanien.
triphylla W., dreiblättriger, ☉. f. Südeuropa, Kleinasien.
tristis Mill., trauriger, ♂. k. Spanien.
 b) *lutea* Penny.
versicolor Mönch, buntfarbiger, ☉. f. Südfrankreich.
villosa Spgl., zottiger, 4. k. Spanien.
virgata Dsf., ruthenförmiger, ☉. f. Nordafrika.
viscosa Spgl., schmieriger, ☉. f. Spanien.
vulgaris Bauh., gemeiner, 4. f. Europa, Nordamerika.
 β) *Peloria* (L.).

Linconia L., Linconie, V. II., Corniculatae-Cunoniaceae (Bruniaceae).

- alopecuroides* L., fuchsschwanzähnliche, ♂. k. t. Cap der guten Hoffnung.
cuspidata Sw., feinspitziige, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.
thymifolia Sw., thymianblättrige, ♂. t. Cap d. gut. H.

Lindernia L. (F. B. v. Lindern, elsasser Botaniker), XIV. II., Personatae-Antirrheae.

- Pyxidaria* L., All., büchsenkapselige, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.
 japonica Thbg. v. *Hornemannia bicolor*.

Lindsaea Dryand. (Lindsay, englischer Botaniker), XXIV. I., Pteroideae.

- falcata* Dryand., sichelförmige, 4. w. Westindien, Südamerika.
linearis Sw., schmalwedelige, 4. w. Neuholland.
media RB., mittlere, 4. w. Neuholland.
microphylla Sw., kleinblättrige, 4. w. Neuholland.
trapeziformis Dryand., trapezenförmige, 4. w. Westindien, Brasilien.

Linnaea Gronov (C. v. Linné, bekannter berühmter Naturforscher), XIV. II., Caprifoliaceae.

- borealis* Gronov, L., nördliche, 4. ♂. f. Europa, Nordamerika.

 b) *americana*. c) *australis* Hffmsg.

Linociera Sw. (G. Linocier, ein französischer Arzt), II. I., Sapotaceae-Oleinae.

- compacta* RB., dichtblumige, ♂. w. Westindien.
cotinifolia Vahl, cotinusblättrige, ♂. w. Ceylon.
ligustrina Sw., ligusterähnliche, ♂. w. Antillen.

Linum T., Lein (Flachs), V. v., Hypericineae-Lineae.

- I. *Adenolinum* Rchb.
alpicola Rchb., Voralpen-L., 4. f. Kärnthien.

Linum

- alpinum Jacq., Alpen-L., 4. f. Oesterreich.
 b) album A. P.
 altaicum Fisch., altaischer, 4. f. Altai.
 anglicum Mill. (*perenne* Sm.), englischer, 4. f. England.
 b) album A. P.
 angustifolium Huds., schmalblättriger, 4. f. England, Südeuropa.
 austriacum L., österreichischer, 4. f. Oesterreich, Siebenbürgen.
 decumbens Dsf. (*rubrum* Rafin.), niederliegender, 4. f. b. Nordafrika, Sicilien.
 marginatum Poir. (*angustifolium* W.), berandeter, 4. f. Südeuropa.
 montanum Schlch., DC., Berg.L., 4. f. Schweiz, Frankreich.
 nervosum W. Kit., nerviger, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen, Taurien.
 pallescens Ledeb., bleicher, 4. f. Sibirien.
 perenne L., ausdauernder, 4. f. Sibirien, Westdeutschland.
 pyrenaeum DC. (*narbonense* Lapeyr.), pyrenäischer, 4. f. Pyrenäen.
 reflexum Ait., zurückgebogener, 4. f. Südeuropa.
 sibiricum DC., sibirischer, 4. f. Sibirien.
 squamulosum Rud. (*austriacum* MB.), schuppiger, 4. f. Taurien.

II. Cathartolinum Rchb.

- agreste Brot., Acker-L., ☉. f. Portugal.
 Berendieri Hook. (*Plotzii* Hook.), Berendier's, ☉. ♂. k. Spanien.
 bicolor Dsf., Schousb. (*tenuifolium* β. P.), zweifarbiger, ☉. f. Nordafrika.
 catharticum L. (*C. pratense* Rchb.), Purgir-F., ☉. f. Europa.
 corymbulosum Rchb. (*aureum* DC.), traubendoldiger, ☉. f. Oesterreichisches Litorale.
 gallicum L. (*aureum* W. K.), französischer, ☉. f. Süd- und Westeuropa.
 inaequale Presl, ungleicher, ☉. f. Sicilien.
 rigidum Pursh, starrer, ☉. f. Nordamerika.
 salsoloides L., pfriemenförmiger, ♂. k. Spanien, Frankreich.
 sardoum Mill., sardinischer, ☉. f. Sardinien.
 strictum L. (*liburnicum* Scop.), steifer, ☉. f. Italien, Frankreich, Griechenland.
 suffruticosum L., strauchiger, ♂. k. Spanien.
 tenuifolium L., feinblättriger, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.
 virginianum L., virginischer, ♂. f. Nordamerika.

III. Hololinum *

- monogynum Forst., einweibiger, ♂. t. Neuzeeland.

IV. Linopsis Rchb.

- africanum L., afrikanischer, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.
 Cumingi Lod., Cuming's, ♂. t. Chili,
 maritimum L. (*heterophyllum* Mch.), Meerstrands-L., 4. f. Südeuropa.
 quadrifolium L., vierblättriger, ♂. t. Cap der guten Hoffnung.

Linum**V. Linum** Rchb.

ascyrisfolium Sims, ascyrumblättriger, 4. f. Portugal.
dahuricum Schult. (*africanum* Rchb.), dahurischer, 4. f.
Dahurien.

diffusum Schrad. (*pallens* Hort.), weitschweifiger, 4. f. ?
grandiflorum Dsf., großblumiger, 4. k. Nordafrika.

hirsutum L., rauhhaariger, 4. f. Oesterreich, Tatarei.
humile Mill., niedriger, ☉. f. Südeuropa.

hypericifolium Sal., johanniskrautblättriger, 4. f.
Caucasus.

laeve Scop., glatter, 4. f. Krain, Litorale.

Lewisii Pursh, Lewis's, 4. f. Nordamerika.

monadelphum Mart., einbrüderiger, ☉. f. ?

narbonense L., südfranzösischer, 4. f. Südfrankreich.

usitatissimum L. (*asiaticum* Mart.), gebräuchlicher, ☉. f.
Europa.

β) crepitans Schübl. et Martens (*grandiflorum*
Hort.). γ) fasciculatum Mart.

viscosum L., schmieriger, 4. f. Mittel-, Süd- und
Osteuropa.

VI. Macrolinum Rchb.

trigynum Roxb., Sm., dreiweibiger, ♀. t. Ostindien.

VII. Xantholinum Rchbch.

arborescens L., baumähnlicher, ♀. k. Creta.

campanulatum L., glockiger, 4. f. k. Spanien, Süd-
frankreich.

capitatum Kit., kopfförmiger, 4. f. Croatien, Illyrien.

flavum L. (*monopetalum* Steph.), gelber, 4. f. Mittel-,
Ost- und Südeuropa.

luteolum MB., gelblicher, ☉. f. Taurien, Caucasus.

nodiflorum L., knotenblumiger, ♂. f. Italien, Griechenl.

tauricum W. (*campanulatum* MB.), taurischer, 4. f.
Taurien.

Radiola L. v. *Radiola linoides*.

Liparia L., Liparie, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-
Papilionaceae.

sphaerica L., kugelblumige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
capitata Thbg. etc. v. *Priestleya capitata* etc.

Liparis bituberculata Lindl. etc. v. *Sturmia bituberculata*
etc. *priochilus* Bot. Cab. v. *Microstylis versicolor*.

Lipostoma D. Don. Mundkapsel, IV. i., Rubiaceae.

campanuliflora D. Don, glockenblumige, 4. w. Brasil.

Lippia L. (Augustin Lippi, französischer Arzt und Na-
turforscher, welcher Abyssinien bereiste), XIV. ii.,
Verbenaceae.

dulcis Hort., süsse, 4. ♀. w. Westindien.

purpurea Jacq., purpurfarbige, ♀. w. Mexico.

nodiflora Rich. et *stoechadifolia* H. B. K. v. *Zapa-*
nia nodiflora etc.

Liquidambar L., Amberbaum, XXI. ix., Amentaceae-
Myricaceae b. *Styracifluae*.

orientale Mill., Ait. (*imberbe* W.), morgenländischer, ♀.
f. b. Kleinasien.

Styraciflua L., ahornblättriger, ♀. f. b. Nordamerika.

asplenifolium L. (*peregrinum* L.) vid. *Comptonia*
asplenifolia.

Liquiritia officinalis Mch. v. *Glycyrrhiza glabra*.

Lipochaeta (*Lipotriche* Less.) *monocephala* DC. v. *Zexmenia monocephala*.

Liriodendron L., Tulpenbaum, XIII. VI., Magnoliaceae.

Tulipifera L., gemeiner, ♀. f. Nordamerika.

β) *obtusiloba* Mchx. (*integrifolia* Hort.). γ) *acutifolia* Mchx. δ) *flava* Hort.

Liriope Herb., Liriope, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.
ringens Herb., rachenförmige, 4. Zw. w. Peru.

Lisianthus P. Br., Kahlblume, V. I., Contortae-Gentianeae.

acutangulus R. et P., spitzkantige, 4. w. Peru.

alatus Aubl., geflügelte, ♂. w. Mexico.

angustifolius H. B. K., schmalblättrige, ♀. w. Südamerika.

cordifolius L., herzblättrige, ♀. w. Jamaica.

exsertus Sw., langfadige, ♀. w. Jamaica.

glaucifolius Jacq., blaugrünblättrige, ♀. w. Westindien.

grandiflorus Aubl., großblumige, ♂. w. Guiana.

latifolius Sw., breitblättrige, ♀. w. Jamaica.

longifolius L., langblättrige, ♀. w. Jamaica.

Russelianus Hook. (*glaucifolius* Nutt. non Jcq.), Russel's, ☉. ♂. f. Mexico.

umbellatus Sw., doldige, ♀. w. Jamaica.

Lissanthe RB., Glattblume, V. I., Epacrideae.

ciliata RB., gefranzte, ♀. t. Neuholland.

daphnoides RB., seidelbastähnliche, ♀. t. Neuholland.

sapida RB., wohlschmeckende, ♀. t. Neuholland.

strigosa RB., stiegelige, ♀. t. Neuholland.

subulata RB., pfriemenförmige, ♀. t. Neuholland.

Lissochilus RB., Glatstendel, XX. I., Orchideae.

luteus Swt., gelber, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

parviflorus Lindl., kleinblumiger, 4. w. Algoa Bay.

speciosus RB., prächtiger, 4. w. Cap der gut. Hoffn.

Listera RB. (Martin Lister, englischer Naturforscher), XX. I., Orchideae.

cordata RB., herzblättrige, 4. f. Nord- und Mitteleuropa, Nordamerika.

ovata RB., eiblättrige, 4. f. Europa.

Lithospermum T., Steinsame, V. I., Asperifoliaceae.

apulum L., apulischer, ☉. f. Südeuropa.

arvense L., Acker-St., ☉. f. Europa, Asien, Afrika, Nordamerika.

canescens Lehm., grauer, 4. f. Nordamerika.

dispermum L., zweisamiger, ☉. f. Spanien, Griechenland, Taurien, Sibirien.

distichum Orteg., zweireihiger, 4. t. w. Cuba.

fruticosum L., strauchiger, ♀. k. Südeuropa.

graminifolium Viv., grasblättriger, ♀. k. Ligurien, Sicilien.

hirtum Lehm., kurzhaariger, 4. f. Nordamerika.

latifolium Mchx., breitblättriger, 4. f. Nordamerika.

lineatum Lehm., linirter, ♂. f. ? Griechenland.

longiflorum Spgl. (*incisum* Lehm.), langblumiger, 4. f. Nordamerika.

officinale L., officineller, 4. f. Europa.

orientale Vahl, morgenländischer, 4. f. Griechenland, Kleinasien.

prostratum Lapeyr. (*diffusum* Lag.), gestreckter, 4. k. Südfrankreich, Spanien.

Lithospermum

purpureo-coeruleum L., purpurblauer, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

rosmarinifolium Tenor., rosmarinblättriger, 5. k. Capri.

scabrum Thbg., scharfer, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

setosum Fisch. et Mey., borstiger, ①. f. Caucasus,

strigosum MB., striegeliger, 4. f. Taurien.

tenuiflorum L., dünnblumiger, ①. f. Aegypten, Cypern.

tinctorium DC., färbender, 4. f. Südeuropa.

villosum L., zottiger, 4. k. f. b. Südfrankreich, Calabrien.

cornutum Ledeb. (*decumbens* Vent.) vid. *Arnebia*
cornuta Nachtr. *davuricum* Lehm., *denticulatum*
Lehm., *maritimum* Lehm., *paniculatum* Lehm. etc.
v. *Platynema davuricum* etc.

Litorella L., Uferling, XXI. iv., Plantagineae.

lacustris L., grasblättriger, 4. Wa. f. Europa.

Litsea *Cervantesii* H. B. K., *chinensis* Lam. etc. v. *Tetranthera Cervantesii*, *laurifolia* etc.

Littaea Brignol. v. *Agave*.

Livistonia RB. (Patrik Murray von Livistone, schottischer Gelehrter), VI. iii., Palmae.

humilis RB., niedrige, 5. t. w. Neuholland.

inermis RB., unbewehrte, 5. t. w. Neuholland.

Lagunoa R. et P., *Lagunoa*, XX. ix. (VIII. i.), Sapindaceae.

nitida R. et P., glänzende, 5. w. Peru.

Lloydia Salisb., *Lloydie*, VI. i., Coronariae-Asphodeleae.

serotina Salisb., spätblühende, 4. f. Mitteleuropäische Alpen, England, Sibirien.

Loasa Adans., *Loasa*, XVIII. ii. (XIII. i.), Loasaceae.

acanthifolia Juss., bärenklaubblättrige, ①. m. f. w. Chili.

acerifolia Juss., ahornblättrige, ①. m. f. w. Peru.

grandiflora Lam., großblumige, ①. m. f. w. Peru.

hispida L. (*ambrosiaefolia* Juss.), steifhaarige, ①. m. f. w. Peru.

incana Grah., weißgraue, 4. t. w. Peru.

lateritia Hook., ziegelfarbige, ♂. Sch. t. w. Chili.

nitida Lam., Juss. (*Placei* et *acanthifolia* Bot. reg.),
schimmernde, ①. m. f. w. Peru.

patula Grah., ausgebreitete, ①. m. f. w. Chili.

tricolor Ker., dreifarbige, ①. m. f. w. Chili.

volubilis Juss., windende, ①. Sch. t. w. Chili.

palmata Spgl. v. *Blumenbachia insignis*. *volubilis*
Hort. v. *Scyphanthus grandiflorus*.

Lobelia L. (Matth. Lobel, alter berühmter belgischer Botaniker), V. i., Campanulaceae-Lobeliaeae.

I. *Centropogon* Presl. (*Siphocampylus* G. Don).

surinamensis L., surinamische, 5. w. Südamerika etc.
b) *rubra*.

II. *Dobrowskia* Presl. (*Parastranthus* G. Don).

unidentata Ait. fil. (*bidentata* Don, *scapigera* W.), ein-
zähnlige, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

III. *Enchysia* Presl.

erinoides L. (*Monopsis inconspicua* Salisb.), erinusähn-
liche, ①. ♂. f. k. Cap der guten Hoffnung.

repens Thbg. (*secunda* L. fil., *pubescens* W. non Ait.)
kriechende, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

Lobelia

b) alba.

IV. *Isolobus* A. DC. (*Pratia* G. Don).

campanuloides Thb. (*japonica* Diet.), glockenblumen-
ähnliche, 4. t. Japan.

concolor RB., einfarbige, 4. k. t. Neuholland.

corymbosa Grah., traubendoldige, 4. k. t. Cap der
guten Hoffnung.

Kerii DC. (*campanuloides* Ker), Ker's, 4. t. China.

Roxburghiana A. DC. (*radicans* Roxb. non Thbg.), Rox-
burgh's, 4. t. w. China.

V. *Laurentia* Mich. (*Solenopsis* Presl.).

Laurentia L. (*Gasparrini* Tin., *Salzmanniana* Presl),
italienische, ☉. f. Nordafrika, Italien, Frankreich.

micrantha A. DC. (*minuta* Thbg.), kleinblumige, ☉. f.
Cap der guten Hoffnung.

minuta L., kleine, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

β) *minima* Sims.

tenella Bivon. (*Laurentia* β. W., *setacea* Sm., *Solenopsis*
Bivoneana Presl), zierliche, 4. k. Griechenland,
Süd- und Westeuropa.

VI. *Lobelia genuina* (*Rapuntium* T. Presl.).

algoensis A. DC., Algoa-L., ☉. f. m. Südafrika.

amoena Mchx., liebliche, 4. f. b. Virginien, Caro-
lina, Texas.

anceps Thbg. (*decumbens* Sims, *rhizophyta* Spgl., *belli-
difolia* Ait., *rupicola* Berter.), zweischneidige, 4. k.
t. Cap der guten Hoffnung, Neuholland, Westindien,
Südamerika.

β) *alata* LaBill., RB. γ) *cuneiformis* LaBill.

bellidifolia Thbg., maßliebenblättrige, ☉. f. m. Cap
der guten Hoffnung.

bicolor Sims (*Erinus* Thbg.), zweifarbige, 4. k. t. Cap
der guten Hoffnung.

bracteolata A. DC., deckblättrige, 4. k. ?

campanulata Lam., glockige, ☉. f. m. Südafrika.

cardinalis L., scharlachfarbige, 4. f. b. k. Nordamer.

β) *Milleri* A. DC. (Hybride).

chinensis Lour., chinesische, ☉. f. China.

Cliffortiana L., Clifford's, ☉. f. Nordamerika, Westind.

coelestis Nutt., himmelblaue, 4. f. Nordamerika.

coerulea Hook., blaue, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

colorata Swt. (*hortensis* A. DC.), schönfarbige, 4. f. b.
Nordamerika.

coronopifolia L. (*Thunbergii* Swt.), krähensfußblättrige,
4. k. Cap der guten Hoffnung.

crenata Thbg., gekerbte, 4. Sch. k. Cap der gut. H.

cuneifolia Lk, et Otto, keilblättrige, 4. k. t. Cap der
guten Hoffnung.

decurrens Cav., herablaufende, 4. f. w. t. Chili.

β) *foliosa* H. B. K. (*decurrens* Swt.).

dentata Cav., gezahnte, ☉. f. Neuholland.

Dortmanna L. (*puludosa* Nutt.), Dortmann's, 4. Wa. f.
West- und Nordeuropa, Nordamerika.

Erinus L., *Erinus*-L., ☉. f. k. Cap der gut. Hoffn.

fenestralis Cav. (*spicata* Mocin., *crispa* Grah.), kraus-
blättrige, 4. f. b. k. Mexico.

fulgens W., funkelnde, 4. f. b. k. Mexico.

glandulosa Walt. (*crassiuscula* Mich.), drüsige, 4. Wa.
f. k. Nordamerika.

Lobelia

- glohosa RB., kugelförmige, 4. k. t. Neuholland.
 gracilis Andr. (*dentata* Sbr.), schlanke, ☉. f. m. Cap
 der guten Hoffnung, Neuholland.
 graminea Lam., grasartige, 4. k. Peru.
 hederacea H. Kew. (*arguta* Hortul.), epheuähnliche,
 4. k. ?
 heteramolla Jacq., verschiedenwendige, 4. t. ?
 heterophylla La Bill., verschiedenblättrige, ☉. f. m.
 Neuholland.
 hirsuta L., rauhaarige, 4. ♀. k. t. Cap der gut. H.
 inflata L., aufgeblasene, ☉. f. Nordamerika.
 inundata RB., überschwemmte, 4. Wa. t. Neuholland.
 Kalmii L., Kalm's, ♂. 4. f. Nordamerika.
 Kraussii Grah., Kraus's, 4. w. Westindien.
 laxiflora H. B. K. (*Cavanillesiana* R. et S., *Siphocampylus*
bicolor D. Don), lockerblumige, 4. ♀. k. Mexico.
 β) angustifolia A. DC. (*persicifolia* H. B. K.,
 Cavanillesii Hortul.).
 linearis Thbg., gleichbreitblättrige, ♀. k. Cap der
 guten Hoffnung.
 maculata Penny, gefleckte, 4. t. k. Neuzeeland.
 Michauxii Nutt. (*Cliffortiana* Mchx.), Michaux's, ☉. f.
 Nordamerika.
 mollis Grah., weiche, 4. w. Westindien.
 nicotianaefolia Roth, tabakblättrige, ♂. w. Ostindien.
 Nuttalliana R. et S. (*gracilis* Nutt.), Nuttall's, 4. f.
 Nordamerika.
 Ottoniana A. DC., Otto's, ☉. f. ?
 pauciflora H. B. K. (*commutata* R. et S.), wenigblumige,
 4. k. t. Mexico.
 pinifolia L., kieferblättrige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.
 propinqua Hort., verwandte, 4. k. Hybride.
 puberula Mich., feinhaarige, 4. f. b. k. Nordamerika.
 β) glabella Hook.
 pubescens Ait. (*alysifolia* Salisb., *hirsuta* Andr.), weich-
 haarige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
 purpurascens RB., purpurfarbige. 4. k. t. Neuholland.
 β) ilicifolia Sims.
 pyramidalis Wall., pyramidale, 4. k. Nepal.
 ramosa Benth. (*tenuis* Benth.), ästige, 4. k. t. Neu-
 holland.
 rugulosa Grah., runzelige, 4. k. t. Neuzeeland.
 Schiedeana * Schiede's, 4. f. b. k. Texas, Mexico.
 scutellarioides Hortul., schildkrautähnliche, 4. k. ?
 setacea Thbg., borstige, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.
 simplex Thbg., einfache, 4. ♂. f. k. Cap der gut. H.
 Simsii Swt. (*pedunculata* Sims non RB., *recurvifolia*
 Spgl.), 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
 spicata Lam. (*Claytoniana* Mchx., *goodenioides* W., *pal-*
lida Mühlbg.), ährige, 4. f. b. k. Nordamerika.
 splendens Humb., schimmernde, 4. f. b. k. Mexico.
 syphilitica L., antivenerische, 4. f. Nordamerika.
 b) alba.
 β) maculata. γ) Ludoviciana. δ) hybrida Hook.
 (*speciosa* Swt.).
 texensis Rafin. (*cardinalis* Hort., *Drummondii* Hort.,
atrosanguinea Hort.), texanische, 4. f. b. k. Texas.

Lobelia

tomentosa L., filzige, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

β) multiflora A. DC.

trialata Hamilt. (*micrantha* Hook.), dreiflügelige, ♂. f. m. Nepal.

triquetra L., dreiseitige, ♂. ♂. f. k. Cap der gut. H.

β) comosa A. DC. (*corymbosa* Berg.).

urens L. (*serrulata* Schott., *Farsetia* Vand.), brennende, ♂. ♂. f. Frankreich, Spanien, Madeira, England.

xalapensis H. B. K. (*mollis* Grah.), xalapische, ♂. f. Mexico, Westindien.

zeylanica L., ceylonische, 4. t. w. Ostindien.

Hybriden von *cardinalis*, *fulgens*, *splendens*, *syphilitica*, *texensis* etc. erzogen: *atrocoerulea* A. P., *atrosanguinea* Loud., *coerulea grandiflora* Hort., *grandis* A. P., *longifolia* A. P., *stellata* A. P., *violacea* A. P. etc.

VII. Monopsis Salisb.

debilis L. suppl., schwache, ♂. f. m. Cap d. gut. H.

Speculum Andr. (*M. conspicua* Salisb.), speculariaähnliche, ♂. f. Cap der guten Hoffnung.

VIII. Parastranthus G. Don.

lutea L., gelbe, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

variifolia Sims, verschiedenblättrige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

IX. Piddingtonia A. DC.

nummularia Lam. (*begonifolia* Wall., *obliqua* Hamilt.), schieflättrige, 4. t. w. Nepal, Java.

X. Pratia Gaudich.

serpyllacea Presl (*hederacea* Cham.), quendelähnliche, 4. t. w. Südamerika.

β) odorata Grah. (*hederacea* Hook.).

XI Siphocampylus Pohl.

biserrata Cav., doppeltsägezähne, 4. ♂. k. t. Peru.

Caoutschouc H. B. K., gummielasticumgebende, ♂. w. Südamerika.

gigantea Cav. (*Tupa* Don), riesenhafte, ♂. w. Südamerika.

umbellata H. B. K., doldige, ♂. w. t. Peru.

verbascifolia Presl, kerzblättrige, ♂. t. w. Peru.

XII. Tupa G. Don.

acuminata Sw., zugespitzte, ♂. w. Westindien.

assurgens L., aufstrebende, 4. ♂. t. w. Westindien.

blanda D. Don, liebliche, 4. k. t. Chili.

Bridgesii Hook., Bridges's, ♂. t. Chili.

mucronata Cav., stachelspitzige, 4. ♂. t. Chili.

β) Hookeri A. DC. (*mucronata* Hook.).

persicaefolia Lam., pfirsichblättrige. 4. ♂. w. Westind.

polyphylla Hook. et Arn., vielblättrige, 4. ♂. t. k. Chili.

β) angustifolia Hook. γ) latifolia A. DC.

purpurea Lindl. (*Poeppigiana* Kunze), purpurrothe, ♂. t. k. Chili.

racemosa Sims, traubige, ♂. w. Antillen.

robusta Grah., starke, 4. ♂. w. St. Domingo.

salicifolia Swt. (*Tupa* Ait., *gigantea* Sims, *Brandtii* H. Par., *arguta* Lindl., *neriifolia* Moris), weidenblättrige, ♂. t. k. Chili.

stricta Sw., steife, ♂. w. Westindien.

Lobelia

Tupa L. (*T. Feuillei* G. Don), giftige, 4. k. f. b. Chili.
bulbosa L. etc. v. *Cyphia bulbosa* etc. *hypocrateri-*
formis RB. v. *Isotoma Brownii* Nachtr. *Plumieri*
 L. v. *Scaevola Plumieri. senecioides* Sims v. *Iso-*
toma axillaris. tenella L. vid. *Lightfootia oxycoc-*
coides.

Lobularia maritima Desv. v. *Koniga maritima*.

Lockhartia elegans Hook. v. *Fernandezia elegans*.

Loddigesia Sims (C. Loddiges, berühmter englischer
 Handelsgärtner), XVII. iv. (XVI. vi.), Leguminosae-
 Papilionaceae.

oxalidifolia Sims, sauerkleeähnliche, ♀. t. Cap der
 guten Hoffnung.

Lodoicea Commers., *Lodoicea*, XXII. xii. (XIII. iii.),
 Palmae.

Sechellarum La Bill., Sechellen-L., ♀. w. Sechellen.

Loeflingia L. (P. Loefling, schwedischer Botaniker),
 III. i., Portulacae-Paronychieae.

hispanica L., spanische, ☉. f. Spanien.

pentandra Cav., fünfmännige, ☉. f. Südspanien.

Logania RB. (Jakob Loghan, englischer Botaniker), V.
 i., Contortae-Loganieae.

floribunda RB., blüthenreiche, ♀. t. Neuholland.

latifolia RB., breitblättrige, ♀. t. Neuholland.

ligustrina Cunn., ligusterähnliche, ♀. t. Neuzeeland.

revoluta RB., zurückgerollte, ♀. t. Neuholland.

Loiseleuria Desv. (Loiseur Deslongchamps, fran-
 zösischer Botaniker), (*Chamaeledon* Lk., *Chamaecistus*
 Gray.), V. i., Ericaceae-Rhodoraceae.

procumbens Desv., niederliegende, ♀. f. Europa, Nord-
 amerika.

Lolium L., Lolch (Raigras), III. ii., Gramineae.

arvense Wither. (*remotum* Hoffm.), Acker-L., ☉. f.
 Europa.

Boucheanum Kunth, Bouché's, 4. f. Italien.

canadense Mchx., canadischer, ☉. f. Nordamerika.

complanatum Schrad. (*asperum* W.), verflachter, ☉. f.
 Südeuropa.

festucaceum Link. (*Festuca elongata* Ehrh., *F. loliacea*
 Huds.), schwingelähnlicher, 4. f. Mittel-, Süd- und
 Westeuropa, Nordafrika.

multiflorum Lam., vielblumiger, ☉. f. Süd- und West-
 europa.

perenne L., gemeiner, 4. f. Europa, Asien, Nordamer.

b) *tenue* L. (*Halleri* Gmel.). c) *compositum* R.

et S. d) *ramosum* R. et S. e) *Russelianum*

Sin. f) *Whitwortii* Sin. g) *Stickneyanum* Sin.

h) *paniculatum* Sin. i) *monstrosum* Sin. k) *vi-*

viparum R. et S. l) *humile* R. et S.

rigidum Gaud. (*strictum* Presl), starrer, ☉. f. Schweiz,
 Italien.

speciosum Steven (? *maximum* W.), ansehnlicher, ☉. f.
 Mittel-, Süd- und Osteuropa, Iberien.

β) *robustum* Rehb.

temulentum L., betäubender, ☉. f. Europa, Japan,
 Neuholland etc.

Lomandra longifolia La Bill. et *rigida* La Bill. v. *Xerotes*
longifol. etc.

- Lomaria** W., Saumfarn, XXIV. 1., Pteroideae.
 acrostichoides Kaulf., acrostichumähnlicher, 4. w. Mascarenas.
 attenuata W., verdünnter, 4. w. Mascarenas.
 falcata Spgl., sichelförmiger, 4. w. t. Van-Diemens-L.
 lanceolata Spgl., lanzettlicher, 4. w. t. Van-Diemens-L.
 longifolia Kaulf., langblättriger, 4. w. Westindien.
 nuda W., nackter, 4. w. t. Van-Diemens-Land.
 Patersonii Spgl., Paterson's, 4. w. t. Van-Diemens-L.
 procera Spgl., hoher, 4. w. t. Neuholland, Van-Diemens-Land.
 Spicant Desv., nördlicher, 4. f. Europa, Canarische Inseln.
- Lomatia** RB., Lomatie, IV. 1., Proteaceae.
 dentata RB., gezähnelte, 5. t. Chili.
 ilicifolia RB., stechhülsenblättrige, 5. t. Neuholland.
 longifolia RB., langblättrige, 5. t. Neuholland.
 silaifolia RB., silausblättrige, 5. t. Neuholland.
 tinctoria RB., färbende, 5. t. Van-Diemens-Land.
- Lomatolepis** Cass., Saumschuppe, XIX. v., Compositae-Cichoriaceae.
 glomerata Cass., knaulförmige, 6. f. Aegypten.
- Lomatophyllum** W., Saumblatt, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.
 borbonicum W., borbonisches, 5. w. Mascarenas.
 Jacquini Spgl., Jacquin's, 5. w. ?
 macrum Lk. (Haw.), dünnblättriges, 5. w. Mascarenas.
 rufocinctum (Sw.), rothrandiges, 5. w. Ostindien.
- Lonas** Adans., Lonas, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.
 inodora G., geruchlose, 6. f. Südfrankreich, Nordafrika.
- Lonchitis** L., Lanzenfarn, XXIV. 1., Pteroideae.
 hirsuta L., haariger, 4. w. Westindien.
 pedata L., fußförmiger, 4. w. Jamaica.
- Lonchocarpus** H. B. K., Lanzenhülse, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.
 domingensis DC., St. Domingo-L., 5. w. St. Domingo.
 latifolius H. B. K., breitblättrige, 5. w. Westindien.
 macrophyllus H. B. K., großblättrige, 5. w. Südamer.
 pubescens DC., weichhaarige, 5. w. Südamerika.
 pyxidarius DC., büchsenförmige, 5. w. Cuba.
 roseus DC., rosafarbige, 5. w. Südamerika.
 sepium DC., Zaun-L., 5. w. Westindien.
 sericeus H. B. K., seidenhaarige, 5. w. Westindien.
 violaceus H. B. K., violette, 5. w. Carthagera.
- Longchampsia capillifolia** W, v. Leyssera capillifolia.
- Londesia** Fisch. et Mey. (F. W. Londres, ein Deutscher, Arzt und Botaniker zu Moskau), V. 1. (XXI. v.), Aizoideae-Atriplicineae.
 eriantha Fisch. et Mey., wollblumige, 6. f. Caspisches Meer.
- Lonicera** L. (A. Lonicer, alter deutscher Botaniker), V. 1., Caprifoliaceae.
 I. Caprifolium T., Geißblatt (Jelängerjelier).
 Caprifolium L., italienisches, 5. Sch. f. Südeuropa.
 b) pallida Host. c) rubra Hort. d) fol. variegato.
 ciliosa Poir. (Pursh), feinfranziges, 5. Sch. f. Nordamerika.

Lonicera

confusa DC. (*japonica* Andr.), verwechselte, ♀. Sch. k. Japan.

cyrenaica Viv., cyrenaische, ♀. Sch. f. b. Nordafrika.

Douglasii DC. (Lindl.), Douglas's, ♀. Sch. f. Nordamerika.

etrusca Santi, etrusische, ♀. Sch. f. Südeuropa.

flava Sims (*Caprifolium Fraseri* Pursh), hellgelbe, ♀. Sch. f. Nordamerika.

grata Ait. (*virginiana* Marsh.), schöne, ♀. Sch. f. Nordamerika.

hispidula Dougl., steifhaarige, ♀. Sch. f. Nordamerika.

implexa Ait., verflochtene, ♀. Sch. f. b. Istrien, Italien, Balearen.

β) *balearica* Viv.

japonica Thbg. (*chinensis* H. Kew., *flexuosa* Lodd. non Thbg., *glabrata* Roxb.), japanische, ♀. Sch. k. Japan.

longiflora DC. (*Caprifol. japonicum* D. Don, *nepalense* G. Don), langblumige, ♀. Sch. k. China, Nepal.

occidentalis Lindl., Hook. (? *pilosa* W., *Caprifol. ciliosum* Dougl.), westliche, ♀. Sch. f. Nordamerika.

parviflora Lam. (*dioica* L., *media* Murr., *Caprifol. glaucum* Mch.), kleinblumige, ♀. Sch. f. Nordamerika.

Periclymenum L., gemeine deutsche, ♀. Sch. f. Mitteleuropa.

b) *serotinum*. c) *belgicum*. d) *quercifolium*. e) *variegatum*.

prolifera Booth C., sprossende, ♀. Sch. f. Nordamer.

pubescens Swt. (*hirsuta* Eaton, *Goldii* Spgl.), haarige, ♀. Sch. f. Nordamerika.

sempervirens L., immergrüne, ♀. Sch. f. Nordamerika.

b) *major* Ait. c) *minor* Ait. d) *semiplena* Booths C.

II. *Isika* Adans..

alpigena L., Alpen-L., ♀. f. Mitteleuropäische Voralpen, Sibirien.

β) *sibirica* Vest., DC.

coerulea L., blaue, ♀. f. Schweiz, Frankreich.

iberica MB., iberische, ♀. f. Iberien.

microphylla W. (*alpigena* Sievers), kleinblättrige, ♀. f. Altai.

oblongifolia Hook., länglichblättrige, ♀. f. Nordamer.

orientalis Lam. (*caucasica* Pall.), morgenländische, ♀. f. Iberien, Kleinasien.

villosa Mühlbg., zottige, ♀. f. Nordamerika.

III. *Xylosteum* T., Heckenkirsche.

canescens Schousb., (*biflora* Dsf.), grauliche, ♀. Sch. k. Nordafrika.

ciliata Mühlbg. (*canadensis* Bartr.), gefranzte, ♀. f. Nordamerika.

b) *alba*.

flexuosa Thbg., gebogene, ♀. k. f. b. Japan.

hispida Pall., steifborstige, ♀. f. Altai.

involuta Banks, hüllblättrige, ♀. f. Nordamerika.

nigra L., schwarze, ♀. f. Mitteleuropa.

Pallasii Ledeb. (*montana* Hort. angl., *altaica* Pall.), Pallas's, ♀. f. Sibirien.

b) *campaniflora* Lodd.

punicea Sims, braunrothe, ♀. f. Nordamerika.

Lonicera

pyrenaica L., pyrenäische, ♀. f. Pyrenäen.

tatarica L., tatarische, ♀. f. Sibirien, Tatarei.

β) *albiflora* DC. (*pyrenaica* W., *parvifolia* Hayn.).

γ) *rubriflora* DC. (*grandiflora* Lodd., *sibirica* Hort.). δ) *lutea* Lodd. ε) *latifolia* Lodd.

Xylosteum L., gemeine, ♀. f. Mitteleuropa, Caucasus.

β) *leucocarpa* DC. γ) *xanthocarpa* DC. δ) *melanocarpa* DC.

Diervilla L. v. *Diervilla canadensis*. *symphoricarpos*

L. v. *Symphoria glomerata*.

Lopezia Cav. (T. Lopez, spanischer Botaniker), I. 1., Onagrariae.

cordata Hornem., herzblättrige, ☉. f. m. Mexico.

coronata Andr. (*axillaris* Schweigg., *minuta* Lag.), gekrönte, ☉. f. m. Mexico.

hirsuta Jacq., rauhhaarige, ♂. ♀. t. Mexico.

hispida Swt., steifhaarige, ☉. f. m. Mexico.

mexicana Jacq. (*racemosa* Cav.), mexicanische, ☉. f. m. k. Mexico.

miniata Lag. (*frutescens* R. et S., *fruticosa* Schrk.), mennigrothe, ♀. t. Neuspanien.

minima Lag., kleinste, ☉. f. m. Mexico.

pumila Bonpl., niedrige, ☉. f. m. Mexico.

Lophandra D. et G. Don v. *Erica*.**Lophanthus** Benth., Büschelblume, XIV. 1., Labiatae.

anisatus Benth., anisduftende, 4. f. Nordamerika.

nepetoides Benth. (L.), nepetaähnliche, 4. f. Nordamerika.

obtusifolius * (*Hyssop lophanthus* L.), stumpfblättrige, 4. f. Nordchina, Sibirien.

rugosus Fisch, et Mey., runzelige, 4. f. Nordchina.

scrofularifolius Benth. (W.), braunwurzähnliche, 4. f. Nordamerika.

urticifolius Dougl., nesselblättrige, 4. f. Nordamerika.

Lophiola Ker, Bartkrone, VI. 1., Narcisseae-Haemodoraceae.

aurea Ker, goldfarbige, 4. f. h. k. Nordamerika.

Lophira Banks, *Lophira*, XII. 1., ?Rhizophoreae.

africana Banks, afrikanische, ♀. w. Sierra Leone.

Lophospermum D. Don, Schopfsame, XIV. 11., Personatae-Antirrhineae.

atrosanguineum Zucc. (*Rhodochiton* D. Don), blutrother, ♀. Sch. k. t. Mexico.

erubescens D. Don, röthlicher, ♀. Sch. k. t. Jalapa.

scandens D. Don (? *mexicanum* Hort.), klimmender, ♀. Sch. k. t. Mexico.

Lopimia Mart., *Lopimie*, XVI. VIII., Malvaceae.

malacophylla Mart., weichblättrige, ♀. w. Brasilien.

Loranthus L., Riemenblume, VI. 1., Caprifoliaceae-Loranthaeae.

europaeus Jacq., europäische, ♀. f. Mähren, Oesterreich, Siebenbürgen.

floribundus LaBill. (*terrestris* Swt.), blüthenreiche, ♀. t. Neuholland.

Lorentea atropurpurea Orteg. v. *Sanvitalia procumbens*.**Lotus** T., Schotenklee, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

Lotus

- ambiguus Bess., zweifelhafter, 4. f. Volhynien.
angustissimus L., schmaler, ☉. f. England, Süd- und Westeuropa.
 β) diffusus Soland. (*decumbens* Poir.). γ) gracilis W. K.
anthylloides Vent., anthyllisähnlicher, ⚥. k. t. Cap der guten Hoffnung,
arabicus L., arabischer, ☉. f. Arabien.
arenarius Broter., sandliebender, ☉. f. Portugal, Nordafrika.
argenteus H. C., silberfarbiger, 4. k. ?
 b) angustifolius.
aristatus DC. (*coimbricensis* Brot.), gegrannter, ☉. f. Süd- und Westeuropa.
atropurpureus DC., dunkelpurpurfarbiger, ⚥. Teneriffa.
corniculatus L., gemeiner, 4. f. Europa.
 b) flore pleno.
 β) ciliatus Tenor. γ) villosus Thuill. δ) tenuifolius Poll.
creticus L., cretischer, ⚥. k. Creta, West- und Südeuropa.
cytisoides L., cytissusähnlicher, ♂. 4. k. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.
Dioscoridis All., Dioscorides's, ☉. f. Ligurien.
edulis L., genießbarer, ☉. f. Südeuropa.
flexuosus Desr., gebogener, 4. f. ?
Gebelia Vent., syrischer, 4- k. Syrien.
glaberrimus DC. (*coimbricensis* W.), glatter, ☉. f. Südfrankreich, Corsica.
glaucus Ait., blaugrüner, ♂. k. Madeira.
hispidus Dsf. (*pilosissimus* Poir.), steifhaariger, ☉. f. Südfrankreich, Italien, Nordafrika.
Jacobaeus L., schwarzbrauner, ⚥. k. Insel St. Jacob (Westafrika).
 b) luteus.
indicus Desr., indischer, ☉. m. f. w. Ostindien.
lanuginosus Vent., wolliger, ♂. 4. k. Syrien.
major Scop. (*uliginosus* Schk.), großer, 4. f. Europa.
microphyllus Hook., kleinblättriger, ☉. f. k. Cap der guten Hoffnung.
odoratus Curt. (*suaveolens* P.), wohlriechender, 4. k. Südfrankreich, Nordafrika.
ornithopodioides L., vogelfußsähnlicher, ☉. f. Sicilien, Spanien.
palustris W., sumpfliebender, 4. k. f. Creta.
pedunculatus Cav., langstieliger, 4. k. f. Spanien.
peregrinus L. (*oligoceratus* Lam.), fremder, ☉. f. Sicilien, Nordafrika.
pusillus Vivian., niedriger, ☉. ⚥. f. k. Nordafrika.
sessilifolius DC., stiellosblättriger, ⚥. k. Teneriffa.
spectabilis Choiss., ansehnlicher, ⚥. t. Teneriffa.
strictus Fisch. et Mey., steifer, 4. f. k. Armenien.
tenuis WK. (*depressus* W., *decumbens* Forst., *Forsteri* Sw., *humifusus* W.), dünner, 4. f. Ungarn, England etc.
Wrangelianus Fisch. et Mey., Wrangel's, ☉. f. Neu-Californien.
 australis Andr. (*arboreus* Forst.) vid. Carmichaelia
 australis. *Dorycnium* L. v. *Dorycnium suffruticosum*

Lotus

etc. *hirsutus* L. etc. v. *Bonjeania hirsuta* Nachtr.
pinnatus Hook. et *sericeus* Pursh v. *Hosackia bicol-*
lor et *Purshiana*. *Tetragonolobus* L. etc. vid. *Tetra-*
gonolobus purpureus etc.

Lourea Neck., *Lourea*, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

reniformis DC., nierenförmige, ♂. w. China.

vespertilionis Desv., fledermausblättrige, ♂. w. China.

Loureira Cav. (J. de Loureiro, portugiesischer Missionair und Botaniker, welcher Cochinchina bereiste), XXII. XIII. (XVI. VI.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

cuneifolia Cav., keilblättrige, ♀. w. Mexico.

glandulosa Cav., drüsige, ♀. w. Mexico.

Lowea Lindl. (M. Lowe, englischer Gelehrter), XII. III., Rosaceae.

berberifolia Lindl. (Pall.), berberitzenblättrige, ♀. k. Persien.

Lubinia Vent. (M. de St. Lubin, Reisender in Ostindien), V. I., Primulaceae.

atropurpurea Lk., dunkelpurpurrothe, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

spatulata Vent. (*mauritiana* Sogl.), spatelblättrige, ♂. t. Mascarenas.

Luculia Swt., *Luculia*, V. I., Rubiaceae.

gratissima Swt., angenehme, ♀. t. Nepal.

Lucuma Juss. (peruvianischer Name), V. I., Sapotaceae.

Bonplandii Kunth, Bonpland's, ♀. w. Cuba.

mammosa Juss., zitzenförmige, ♀. w. Ostindien.

obovata Kunth, verkehrteiförmige, ♀. w. Peru.

salicifolia Bonpl., weidenblättrige, ♀. w. Mexico.

Ludia Commers., *Ludia*, XIII. I., Bixaceae.

heterophylla Lam., verschiedenblättrige, ♀. w. Mascarenas.

sessiliflora Lam. (*tuberculata* Jacq.), stiellosblumige, ♀. w. Mascarenas.

heterophylla Bory v. Prockia theaeformis.

Ludolfia W. (Ludolf, preussischer Staatsmann), III. II. (XXIII. I.), Gramineae.

glaucescens W., blaugrüne, 4. ♀. w. Ostindien.

macrosperma W., großsamige, 4. ♀. k. Carolina.

Ludovia *funifera* Poit. v. *Carludovica funifera*.

Ludwigia L. (G. Ludwig, Professor der Medicin zu Leipzig), IV. I., Onagrariae.

alternifolia L. (*microcarpa* Mchx., *salicifolia* Poir., *uniflora* Rafn.), wechselblättrige, ☉. 4. f. Nordamer.

hirsuta Lam., Pursh (*pilosa* W.), haarige, ☉. 4. f. Nordamerika.

parviflora Roxb., kleinblumige, ☉. f. m. Bengalen.

prostrata Roxb., gestreckte, ☉. f. m. Pegu.

Luehea W. (C. Frhr. v. der Luehe, Freund und Gönner der Gartenkunst und Botanik in Oesterreich), XVIII. II., Tiliaceae.

paniculata Mart., rispige, ♀. Sch. w. Brasilien.

Luffa Cav. (arabischer Name), XXI. v., Cucurbitaceae.

acutangula Sering., spitzwinkelige, ☉. f. m. Ostindien.

aegyptiaca Mill., ägyptische, ☉. f. m. Ostindien, Aegypten.

Luffa

foetida Cav., stinkende, ☉. f. m. Ostindien.

Luisia Lindl., Luisia, XX. 1., Orchideae.

alpina Lindl., Alpen-L., 4. w. t. Khoseea Hills.

Lumnitzera capitata Spgl. v. *Acrocephalus capitatus*. *moschata* Spgl., *ocymoides* Jacq. v. *Moschosma Brownii* *ocymoides* etc.

Lunaria T., Mondviole, XV. 11., Cruciferae.

biennis Mch. (*annua* L.), zweijährige, ♂. f. West- und Südeuropa.

b) *albiflora*.

rediviva L., ausdauernde, 4. f. Mittel- und Südeuropa.
canescens W., *graeca* W., *suffruticosa* Vent. v. *Farsesia clypeata*, *lunarioides* et *suffruticosa*.

Lupinaster macrocephalum Pursh, *pentaphyllum* Mch. etc.
v. *Trifolium megacephalum*, *Lupinaster* etc.

Lupinus T., Wolfsbohne, XVII. 14. (XVI. 11.), Leguminosae-Papilionaceae.

affinis Ag. fil. (*nutkatensis* var. *β*. Hook.), ähnelnde, 4. f. Nordamerika.

albifrons Benth., weißliche, ♂. ♀. k. f. Californien.

albus L., weiß, ☉. f. Levante.

angustifolius L., schmalblättrige, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland.

arboreus W. (*fruticosus* Curt.). strauchige, ♀. k. ? Südamerika.

β) *odoratissimus*.

arbustus Dougl., buschige, ♀. k. Californien.

argenteus Pursh, silberfarbige, 4. f. Nordamerika.

aridus Dougl., trockene, 4. f. Nordamerika.

aureus Ag. fil., goldfarbige, ☉. ♂. k. f. Peru.

bicolor Lindl., zweifarbige, ☉. f. Nordamerika.

bimaculatus Desr., zweifleckige, 4. ♀. k. Peru, Texas.

bracteolaris Desr., deckblättrige, ☉. f. Monte Video.

canaliculatus Swt., rinnenförmige, ♂. ♀. k. Buenos Ayres.

concinus Ag. fil., nette, ☉. f. Californien.

Cruikshanksii Hook., Cruikshanks's, ☉. f. Peru.

densiflorus Benth., dichtblumige, 4. f. Californien.

Douglasii Ag. fil., Douglas's, 4. f. ? Californien, Columbia.

elegans H. B. K., zierliche, 4. f. Mexico.

exaltatus Loud., hohe, 4. f. ?

flexuosus Dougl., gebogene, 4. f. Nordamerika.

glabratus Hort., kahle, 4. f. ? Nordamerika.

gracilis H. B. K., schlanke, ♂. ♀. k. Peru.

grandifolius Don (? *macrophyllus* Benth.), großblättrige, 4. f. Nordamerika.

hirsutissimus Benth., sehr rauhe, 4. f. Californien.

hirsutus L., rauhhaarige, 4. f. Westeuropa, Griechenland, Aegypten.

Hornemanni Ag. fil., Hornemann's, 4. ♂. f. k. Peru.

incanus Grah., weißgrau, ♂. ♀. k. Buenos Ayres.

latifolius Lindl., breitblättrige, 4. f. Californien.

laxiflorus Dougl., lockerblumige, 4. f. Columbia.

Lehmanni Hortul., Lehmann's, 4. f. Hybride.

lepidus Dougl., schlüfrige, ♂. 4. f. Columbia.

leptophyllus Benth., schlankblättrige, 4. f. Californien.

Lupinus

leucophyllus Dougl. (? *leucopsis* Ag. fil.), weifsblätterige,
4. f. Columbia.

Lindleyanus Ag. fil., Lindley's, 4. k. Peru.

linifolius Roth, flachsblätterige, ☉. f. Westeuropa.

litoralis Dougl., Strands-W., 4. f. Columbia.

litratus Rchb., bestrichene, ☉. f. ?

lucidus Benth., spiegelnde, 4. f. Nordamerika.

luteus L., gelbe, ☉. f. Südfrankreich, Sicilien,

b) *semiuncialis*.

Marshallianus Swt., Marshall's, 4. f. Engl. Hybride.

Menziesii Ag. fil., Menzie's, ☉. f. Californien.

mexicanus Lagasc., mexicanische, ☉. ♂. f. k. Mexico.

micranthus Dougl., kleinblumige, ☉. f. Nordamerika.

microcarpus Sims, kleinfrüchtige, ☉. f. ?

microphyllus Desr., kleinblätterige, ♂. ♀. k. Peru.

Milleri Hort., Miller's, 4. f. Columbia.

b) *bicolor*.

multiflorus Desr., vielblumige, ♀. k. Monte Video.

mutabilis Swt., veränderliche, ☉. f. Bogota.

nanus Benth., zwergige, ☉. f. Californien.

nootkatensis Don, Sims (*nutcanus* Spgl., *variegatus* Poir.),

Nootkasund-W., 4. f. Westliches Nordamerika.

ornatus Dougl., geschmückte, ♂. 4. f. Columbia.

perennis L., ausdauernde, 4. f. Nordamerika.

pilosus L., haarige, ☉. f. Griechenland, Südeuropa.

plumosus Dougl., federige, 4. f. Californien.

polyphyllus Lindl., vielblätterige, 4. f. Columbia.

b) *albiflorus* Lindl. c) *pallidus* J. C.

prostratus Ag. fil., gestreckte, ☉. f. Peru.

pulchellus Swt., zierliche, ☉. ♀. f. k. Mexico.

pusillus Pursh, kleine, ☉. f. Nordamerika.

rivularis Lindl., Bach-W., 4. f. Californien.

Sabinianus Dougl., Sabine's, 4. f. Nordamerika.

sericeus Pursh, seidenhaarige, 4. f. Nordamerika.

stipulatus Ag. fil., zwischenblätterige, ♀. k. Mexico.

subcarnosus Hook. (? *succulentus* Lindl.), saftige, ☉. f.

Texas, Chili.

Terminus Forsk. (*prolifer* Desr.), sprossende, ☉. f. Aegypten, Sicilien.

texensis Hook., texanische, ☉. f. Texas.

tomentosus Lindl., filzige, 4. ♀. f. k. Peru.

b) *albidus*.

tristis Benth., traurige, 4. f. Nordamerika.

varius L. (*semiverticillatus* Desr.), scheckige, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

versicolor Lindl., buntfarbige, 4. f. Californien.

villosus W., zottige, 4. f. Carolina, Florida.

trifoliatius Cav. v. *Cyamopsis psoraleoides*.

Luzula DC., Astersimse, VI. 1., Juncineae.

albida DC., weifsliche, 4. f. Europa.

β) *rubella* Hoppe (*cuprea* Roch.).

arcuata Sw., bogenförmige, 4. f. Schottland, Lappland.

Berthelottii N. E., Berthelott's, 4. k. Teneriffa.

campestris DC., gemeine, 4. f. Europa, Nordamerika.

flavescens Gaud. (*Hostii* Desv.), gelbliche, 4. f. Mitteleuropäische Voralpen.

Forsteri DC., Forster's, 4. f. England, Süddeutschland, Schweiz, Frankreich.

Luzula

- glabrata Desv., Hoppe, kahle, 4. f. Steyermark, tyroler Alpen etc.
 lutea DC., gelbe, 4. f. Tyroler und schweizer Alpen, Pyrenäen.
 maxima DC., grofse, 4. f. Mittel- und nordeuropäische Voralpen.
 melanocarpa Desv., schwarzfrüchtige, 4. f. Canada.
 multiflora Lej. (*erecta* Desv., *intermedia* Spenn.), vielblumige, 4. f. Deutschland, Schweden, Frankreich.
 β) congesta Lej. γ) nigricans Desv. (*sudetica* DC.)
 nivalis Laestad., Schnee-A., 4. f. Lappland.
 nivea DC., schneeweiße, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
 parviflora Desv., kleinblumige, 4. f. Nordschweden, Sibirien.
 pediformis DC., fußförmige, 4. f. Dauphiné.
 pilosa W. (*vernalis* DC.), haarige, 4. f. Europa.
 spadicea DC., kastanienbraune, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
 spicata DC., ährenförmige, 4. t. Mitteleuropäische Alpen.
Luzuriaga cymosa RB. etc. v. *Geitonoplesium cymosum* etc.
Lychnis L., Lichtnelke, X. 14., Caryophyllaceae-Sileneae.

I. Genuina.

- apetala L., kronenlose, ♂. 4. f. Sibirien, Lappland.
 brachypetala Fisch. (*inclusa* Lehm.), kurzkrönige, ♂. 4. f. Sibirien.
 Bungeana Fisch., Bunge's, 4. f. b. k. Südrufsländ.
 chalconica L., chalconische (brennende Liebe), 4. f. Sibirien, Kleinasien.
 b) alba. c) alba plena Goldie. d) carnea. e) plena.
 Coeli rosa Desr., Himmelsröschen, ☉. f. Südeuropa, Levante.
 coronaria Desr., gekrönte, ♂. 4. f. Mittel- und Südeuropa, Taurien.
 b) alba. c) plena.
 corsica Loisel., corsische, ☉. ♂. f. Corsica.
 flos Jovis Desr., Jupitersröschen, 4. f. Südeuropa.
 fulgens Fisch., leuchtende, ♂. 4. f. b. k. Sibirien.
 grandiflora Jacq. (*coronata* Thbg.), gekrönte, 4. k. Japan, China.
 laeta Ait., angenehme, ☉. f. Portugal.
 media Hort., mittlere, ♂. 4. f. Hybride.
 nivalis Kit., Schnee-L., 4. f. Karpathen.
 pyrenaica Berg. (*nummularia* Lapeyr.), pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.
 saxatilis Turcz., Gesteins-L., 4. f. Dahurien.
 sibirica L., sibirische, 4. f. Sibirien.

II. Flos cuculi.

- Flos cuculi L., Kuckuksblümchen, 4. f. Europa.
 c) flore pleno. c) albiflora. d) fl. albo pleno.

III. Melandrium Clus., Röhl.

- diurna Sibth. (*sylvestris* Hoppe, *dioica* a L.), Tag-L., 4. f. Europa.
 b) flore pleno. c) fl. albo.
 vespertina Sibth. (*alba* Mill., *dioica* β . L. *pratensis* Spgl., *arvensis* Schk.), Abend-L., 4. f. Europa.
 b) flore pleno.

IV. Viscaria Riv.

Lychnis

alpina L., Alpen-L., 4. f. Mittel- und nordeuropäische Alpen, Nordamerika.

β) *helvetica* G. Don (*alpina* Bot. mag.).

Viscaria L., Pech-L., 4. f. Europa.

b) *plena*. c) *alba* (*neglecta* G. Don).

alpestris L. et *quadridentata* Murr. vid. *Silene alpestris* etc. *Githago* Scop. v. *Agrostemma Githago*.

Lycioserissa R. et S., Bocksblatt, V. 1., Solanaceae.
capensis R. et S., capisches, ♀. k. Cap der gut. H.

Lycium L., Bocksdorn, V. 1., Solanaceae.

afrum L., afrikanischer, ♀. k. Nordafrika, Palästina.

barbarum L., fremder, ♀. Sch. f. Südeuropa, Nordafrika.

carolinianum Pursh., karolinischer, ♀. f. Carolina.

chinense Mill., chinesischer (*ovatum* Duham., *barbarum* β. *chinense* Ait.), chinesischer, ♀. Sch. f. China.

cinereum Thbg., aschfarbiger, ♀. k. Cap der gut. H.

europaeum L. (*salicifolium* Mill.), gemeiner, ♀. Sch. f. Mittel- und Südeuropa.

b) *chrysocarpum*. c) *sphaerocarpum*.

lanceolatum Poir., lanzettblättriger, ♀. Sch. f. Südeuropa.

rigidum Thbg. (*carnosum* Duh., *italicum* Mill.), starrer, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

ruthenicum Murr. (*tataricum* Pall.), russischer, ♀. Sch. f. Mittel- und Nordasien.

β) *caspicum* Pall. (*tenue* W., *microphyllum* Duh.).

Shawii R. et S., Shaw's, ♀. Sch. f. b. Nordafrika.

tetrandrum L. (*horridum* Thbg.), viermänniger, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

Trewianum G. Don (*barbarum* Lam., *chinense* Duh.), Trew's, ♀. Sch. China.

turbinatum Duh. (*halimifolium* Mill.), aufgetriebener, ♀. Sch. f. China.

arborescens Spgl. v. *Atropa arborescens*. *boerhaaviaefolium* L. (*heterophyllum* Murr.), v. Grabowskia *boerhaaviaefol*.

Lycopersicum T., Liebesapfel, V. 1., Solanaceae.

cerasiforme Dun. (*Solanum pseudolycopersicum* Jacq.), kirschenförmiger, ☉. f. m. ? Südamerika.

b) *luteum*.

esculentum Mill., Dun., essbarer, ☉. f. m. Südamerika.

a) *erythrocarpum*. b) *chrysocarpum*. c) *leucocarpum*.

Humboldtii Dun. (W.), (*commutatum* Spgl.), Humboldt's, ☉. f. m. Südamerika.

peruvianum Mill., Dun., peruvianischer, 4. k. Peru.

pimpinellifolium Dun., pimpinellablättriger, ☉. f. m. Südamerika.

procumbens Dun., niederliegender, ☉. f. m. Südamerika.

pyriforme Dun., birnenförmiger, ☉. f. m. Südamerika.

regulare Dun., regelmässiger, ☉. f. m. ?

Lycopodium T., Bärlapp, XXIV. III., Lycopodiaceae.

alopeuroides L., fuchsschwanzähnlicher, 4. f. k. Nordamer.

alpinum L., Alpen-B., 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Nordafrika.

annotinum L., wachholderblättriger, 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

Lycopodium

- apodum L., kurzähriger, 4. k. w. Nordamerika, Westindien.
 brasiliense Radd. (*apothecium* Bevis), brasilianischer, 4. w. Brasilien.
 carolinianum L., carolinischer, 4. k. Carolina, Pennsylvania.
 circinale L. (*tamariscinum* Desv.), kreisförmiger, 4. w. Ostindien, Nepal.
 clavatum L., keilförmiger, 4. f, Europa, Asien, Nordamerika.
 complanatum L., verflachter, 4. f. t. Europa, Asien, Nordamerika.
 cordifolium Desv. (? *cordatum* H. Berol.), herzblättriger, 4. f. w. Westindien, Südamerika.
 dendroideum Mchx., strauchartiger, 4. f. k. Nordamer.
 densum La Bill., dichtblättriger, 4. f. w. Neuholland.
 denticulatum L., gezählter, 4. f. k. w. Südeuropa, Nordafrika.
 depressum Sw., niedergedrückter, 4. w. Cap der guten Hoffnung.
 helveticum L. (*radicans* Schrk.), schweizerischer, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.
 inundatum L., überschwemmter, 4. f. Europa, Nordamerika.
 lucidulum Mchx., glänzender, 4. f. k. Nordamerika.
 ornithopodioides L., ornithopusähnlicher, 4. f. w. Ostindien.
 rupestre L., Felsen-B., 4. f. w. Nord- und Südasien, Amerika.
 selaginoides L., Selagoähnlicher, 4. f. Europa, Nordamerika.
 Selago L., tannenähnlicher, 4. f. f. Europa, Nordamerika.
 stoloniferum Sw., sprossender, 4. f. w. Westindien, Südamerika.

Lycopsis L., Krummhals, V. 1., Asperifoliaceae.

- arvensis L., Acker-K., ☉. f. Europa, Nordamerika.
 echioides L., natterkopffähnlicher, ☉. f. Armenien, Caucasus.
 obtusifolia W., stumpfblättriger, ☉. f. Griechenland.
 orientalis L., morgenländischer, ☉. f. Kleinasien, Belgien.
 variegata Lehm. (*bullata* Cyrill.), bunter, ☉. f. Südeuropa, Griechenland.

nigricans Lam., *pulla* L. etc. v. *Nonnea nigricans* etc. *setosa* Lehm. v. *Lithospermum setosum*.

Lycopus T., Wolfsfuß, II. 1., Labiatae.

- australis RB., südlicher, 4. k. Neuholland.
 europaeus L. (*vulgaris* P.), europäischer, 4. f. Europa.
 exaltatus L., hoher, 4. f. Süd- u. Osteuropa, Nordamer.
 intermedius Schrad., mittlerer, 4. f. Europa, Hybride.
 virginicus L. (*rubellus* Wendl.), virginischer, 4. f. Nordamerika.

β) *quercifolius*.

Lycoris aurea Herb. et *radiata* Herb. v. *Nerine aurea* et *radiata*.

Lygeum Loeßl., Bindgras (Nussgras), III. 1., Gramineae.

- Spartum* Loeßl., pfriemenförmiges, 4. f. Spanien, Nordafrika.

Lygodium Sw., Schlingfarn, XXIV. 1., Osmundaceae.
circinatum Sw., kreisförmiger, 4. Sch. w. Molucken,
 Philippinen.

japonicum Sw., japanischer, 4. Sch. w. China, Japan.
mexicanum Presl, mexicanischer, 4. Sch. w. Mexico.

palmatum Sw., handförmiger, 4. Sch. w. k. Nordamerika.
polymorphum H. B. K., vielgestaltiger, 4. Sch. w.
 Südamerika.

venustum Sw. (*Hydroglossum hastatum* W.), schöner, 4.
 Sch. w. Brasilien.

volubile Sw., windender, 4. Sch. w. Westindien,
 Guiana.

Lygodysodea foetida R. et P. etc. v. *Paederia foetida*.

Lyonetia Cass., DC. (P. Lyonet, französischer Natur-
 forscher), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

abrotanifolia Cass., DC., stabwurzblätterige, 4. f. Süd-
 und Westeuropa.

pusilla DC., niedrige, ☉. f. Creta.

tenuiloba DC., feinsappige, ☉. f. Griechenland.

Lyonia Nutt. (J. Lyon, nordamerikanischer Botaniker),
 X. 1., Ericaceae.

fasciculata G. Don, büschelförmige, ♀. w. t. Jamaica.

ferruginea Nutt., rostfarbige, ♀. f. b. k. Georgia,
 Florida.

frondosa Nutt., belaubte, ♀. f. b. k. Nordamerika.

jamaicensis D. et G. Don, jamaicanische, ♀. t. w.
 Jamaica.

ligustrina DC. (*paniculata* Nutt.), ligusterähnliche, ♀. f.
 b. Nordamerika.

β) *capreaefolia* Wats. γ) *salicifolia* Wats.

multiflora Wats., G. Don, vielblumige, ♀. f. b. Carolina.

rigida Nutt., starre, ♀. f. b. k. Carolina.

rubiginosa G. Don, rostfarbige, ♀. w. t. Caribäen.

arborea D. Don v. *Oxydendrum arboreum*. *caly-*

culata Rchb. vid. *Cassandra calyculata*. *marginata*

D. et G. Don, *mariana* D. Don v. *Leucothae co-*

riacea et *mariana*. *racemosa* D. Don v. *Zenobia*

racemosa. *rhomboidalis* G. Don vid. *Leucothoe*

coriacea.

Lyonsia RB. (J. Lyons, englischer Botaniker), V. 1.,
 Contortae-Apocynaeae.

staminea RB., langfadige, ♀. Sch. w. Neuholland.

Lyperanthus RB., Rachenstendel, XX. 1., Orchideae.

ellipticus RB., elliptischer, 4. Kn. w. Neuholland.

nigricans RB., schwärzlicher, 4. Kn. w. Neuholland.

suaveolens RB., wohlriechender, 4. Kn. w. Neuholland.

Lysimachia T., Gelbweidrich, V. 1., Primulaceae-
 Lysimachieae.

I. Genuina.

affinis Penny, ähnlicher, 4. f. ?

angustifolia Mchx., schmalblätteriger, 4. f. Nordamer.

atropurpurea L., schwarzrother, 4. f. Kleinasien.

azorica Hornem., azorischer, 4. f. k. Azoren.

ciliata L., gefranzter, 4. f. Nordamerika, Belgien.

dahurica Ledeb., dahurischer, 4. f. Dahurien.

dubia Ait. (*atropurpurea* Murray), zweifelhafter, 4. f.
 Caucasus, Orient.

Ephemerum L. (*salicifolia* Mill.), schlankblätteriger, 4.
 f. Pyrenäen, Sibirien, Japan.

Lysimachia

hybrida Mchx. (*angustifolia* W.), Bastard-G., 4. f. Carolina.

longifolia Pursh (*quadriflora* Ait.), langblättriger, 4. f. Nordamerika.

maculata RB., gefleckter, 4. k. Neuholland.

nemorum L., Hain-G., 4. f. Europa.

b) *variegata*.

Nummularia L., rundblättriger, 4. f. Europa.

punctata L., punktirter, 4. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.

quadrifolia L., vierblättriger, 4. f. Nordamerika.

β) *hirsuta* Mchx.

stricta Ait. (*racemosa* Mchx.), steifer, 4. f. Nordamer.

verticillata Pall., wirtelblättriger, 4. f. Ungarn, Taurien.

vulgaris L., gemeiner, 4. f. Europa, Asien.

β) *paludosa* Baumg. γ) *guestphalica* Weihe.

II. *Thyrsanthus* Schrk. (*Nauenburgia* Mch.).

capitata Pursh, kopfförmige, 4. f. Nordamerika.

thyrsiflora L., straufsblumige, 4. Wa. f. Europa.

Linum stellatum L. v. *Asterolinon stellatum*.

Lysinema RB., Lysineme, V. 1., Epacrideae.

ciliatum RB., gefranzte, ♀. t. Neuholland.

conspicuum RB., ansehnliche, ♀. t. Neuholland.

lasianthum RB., wollblumige, ♀. t. Neuholland.

pentapetalum RB., fünfblättrige, ♀. t. Neuholland.

pungens RB., stechende, ♀. t. Neuholland.

β) *attenuatum* Lk. b) *roseum* (Lodd.). γ) *Sieberi* Benth.

virgatum DC. (Drummond), ruthenförmige, ♀. t. Neuholland (Schwanenfluß).

ruscifolium Sbr. v. *Epacris onosmaeflora*.

Lythrum L. (*Salicaria* T.), Weidrich, XI. 1., Lythraeae (*Salicariae*).

alatum Pursh (*Vulneraria* Hort.), geflügelter, 4. k. Nordamerika.

diffusum Swt. (*virgatum* Pursh), weitschweifiger, 4. f. Nordamerika.

Gräfferi Tenor., Gräffer's, ♂. f. Italien.

Hyssopifolia L., ysopblättriger, ♂. f. Europa.

Kennedyanum H. B. K., Kennedy's, ♀. t. Neuspanien.

lineare L., gleichbreitblättriger, 4. f. Nordamerika.

myrtifolium Lodd., myrtenblättriger, 4. f. Nordamer.

nummularifolium P., rundblättriger, ♂. f. Frankreich, Corsica.

Salicaria L., gemeiner, 4. f. Europa, Nordamerika.

β) *gracile* DC. γ) *canescens* Koch (*tomentosum* DC., *pubescens* Hort., *dubium* Schult.).

thesioides MB., thesiumähnlicher, ♂. f. Caucasus.

Thymifolia L., thymianblättriger, ♂. f. Südeuropa, Südafrika.

tomentosum Mill., filziger, 4. f. Nordamerika.

virgatum L. (*acuminatum* W.), ruthenförmiger, 4. f. Ost-, Süd- und Westeuropa.

Gartenvarietäten: *densiflorum* Hort., *ramosum* Hort., *villosum* Hort.

grandiflorum Perrot., *multiflorum* Perr. et *ramosum* Perrot. vid. *Ammania dodecandra*, *senegalensis* et *auriculata*. *triflorum* L. vid. *Nesaea triflora*.

Lythrum

verticillatum L. v. *Decodon verticillatus*. *uniflorum* Perrot. v. *Ammannia elatinoides*.

Maba Forst. (ostindischer Name), XXII. VI. (VI. I.), Sapotaceae-Ebenaceae.

buxifolia P., buchsbaumblättrige, ♀. w. Ostindien.

laurina RB., lorbeerähnliche, ♀. t. Neuholland.

Macleya RB. (A. Macleay, Secretair der Linné'schen Societät), XI. I., Papaveraceae.

cordata RB., herzblättrige, 4. f. Nordchina.

Macluria Nutt. (William Maclure, nordamerikanischer Geolog), XXI. IV., Urticaceae.

aurantiaca Nutt., orangenfarbige, ♀. f. Nordamerika.

Plumieri G. Don, Plumier's, ♀. w. Westindien.

tinctoria D. Don, färbende, ♀. w. Westindien, Südamerika.

Macradenia RB., Drüsendingel, XX. I., Orchideae.

lutescens RB., gelblicher, 4. w. Trinidad.

mutica Lindl., unbewehrter, 4. w. Trinidad.

triandra Lindl., dreimänniger, 4. w. Surinam.

lutescens Lodd. v. *Epidendrum odoratissimum*.

Macrochilus K. et W., Großlippe, XX. I., Orchideae.

Fryanus K. et W., Fry's, 4. w. Brasilien.

Macrocnemum L., Stengelblume, V. I., Rubiaceae.

jamaicense L., jamaicaische, ♀. w. Jamaica.

strictum Roxb., steife, ♀. w. Ostindien.

tinctorium Humb., färbende, ♀. w. Südamerika.

coccineum Vahl et *speciosum* Jacq. vid. *Mussaenda coccinea* et *speciosa*.

Macroglyne convallariaefolia Lk. v. *Aspidistra lurida*.

Macrolobium bijugum Coleb. v. *Outea bijuga*.

Macropodium R. Br., Langstieler, XV. III., Cruciferae.

nivale RB., schneeliebender, 4. f. Sibirien.

Macrorhynchium Rchbch. (*Macrorrhynchus* Less.), Schnabelsame, XIX. I., Cichoriaceae.

aurantiacum Fisch. et Mey., orangenfarbiger, ☉. ? 4. f. ?

laevigatum Fisch. et Mey., glatter, ☉. f. Chili.

pterocarpum Fisch. et Mey., flügelfrüchtiger, ☉. f. Chili.

Macrostylis Bartl. et Wendl., Langgriffel, V. I., Tricoccae-Rutaceae.

barbiger Bartl. et Wendl., bartiger, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

lanceolata Bartl. et Wendl., lanzettlicher, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

squarrosa Bartl. et Wendl., sparriger, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Macrotropis DC., Großschiffchen, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

foetida DC., stinkendes, ♀. t. China.

Macrotys racemosa Rafin. v. *Cimicifuga Serpentaria*.

Madaria DC. v. *Madia*.

Madaroglossa DC., Glattzüngelchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

angustifolia DC., schmalblättriges, ☉. f. Californien.

heterotricha DC., verschiedenhaariges, ☉. f. Californien.

Madaroglossa

hieracioides DC., habichtskrautähnliches, ☉. f. Californien.

Madia Molin. (chilesischer Name), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

I. Genuina.

sativa Molin., gebaute, ☉. f. m. Chili.

a) mellosa Jacq. β) viscosa Cav.

stellata Fisch. et Mey., sternförmige, ☉. f. Chili.

II. Madaria DC.

corymbosa DC. (? *quinqueradiata* Hort.), traubendoldige, ☉. f. Westliches Nordamerika.

elegans Dougl., zierliche, ☉. f. Californien.

Maesa Forsk. v. Baeobotrys.**Magnolia** L. (P. Magnol, Professor der Botanik zu Montpellier), XIII. VI., Magnoliaceae.

acuminata L., zugespitzte, ♀. f. b. Nordamerika.

b) Candolli Savi. c) maxima Lodd.

auriculata Lam., geöhrt, ♀. f. b. Nordamerika.

conspicua Salisb. (*precia* Correa, Yulan Dsf.), ansehnliche, ♀. f. b. k. China.

b) Soulangeana Hort. c) Alexandri Hort. d) speciosa Hort. e) citriodora Hort.

cordata Mchx., herzblättrige, ♀. f. b. Nordamerika.

fuscata Andr. (*anonaefolia* Salisb.), braune, ♀. k. China, Japan.

glauca L., blaugrüne, ♀. f. b. Nordamerika.

b) Thompsoniana Hort. (*major* Bot. mag.). c) longifolia Hort.

gracilis Salisb. (*Kobus* Kämpf., *tomentosa* Thbg.), schlanke, ♀. f. b. k. Japan.

grandiflora L., großblumige, ♀. k. f. b. Nordamerika.

b) obovata Ait. c) rotundifolia Swt. d) oxoniensis Hort. e) ferruginea Sims. f) lanceolata Ait. g) elliptica Ait. h) angustifolia Hort. i) praecox Hort. k) calyculata Hort. l) mayardienensis Hort. m) rugosa. n) stricta. o) semiplena. p) canaliculata Hort. etc.

macrophylla Mchx. (*Michauxii* Hort.), großblättrige, ♀. f. b. Nordamerika.

obovata Thbg. (*purpurea* Curt., *discolor* Vent., *denudata* Lam.), purpurrothe, ♀. k. f. b. Japan, China.

odoratissima Reinw., starkriechende, ♀. w. Java.

pumila Andr., kleine, ♀, t. k. China.

pyramidata Bartr., pyramidale, ♀. f. b. Nordamerika.

tripetala L. (*Umbrella* Lam., *frondosa* Salisb.), dreiblättrige, ♀. f. b. Nordamerika.

Hybriden: Norbertiana Hort., striatiflora Hort., speciosa Hort. triumphans Hort.

Mahernia L. (*Anagramm* v. *Hermannia*), XVI. II. (V. v.), Malvaceae-Hermanniaceae.

Burchellii Swt. (*grandiflora* Burch.), Burchell's, ♀. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

diffusa L., weitschweifige, ♀. k. t. Cap der gut. H.

fragrans Rchb., wohlriechende, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

glabrata Cav. (*odorata* Andr.), kahle, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

grandiflora DC., großblumige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Mahernia

heterophylla Cav., verschiedenblättrige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

incisa Jacq., schnitzblättrige, ♀. k. t. Cap d. gut. H. *oxalidisflora* Burch., oxalisblumige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

pinnata L. (*bipinnata* DC.), gefiederte, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

pulchella Cav., hübsche, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

resedaefolia Burch., resedablättrige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

rutula Jacq., rothgelbe, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

seselifolia DC., seseliblättrige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

vernicata Burch., firnifsartige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

verticillata L. (*diffusa* Jacq., ? *coronopifolia* Lk.), wirtelförmige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

vesicaria DC., blasige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

Mahonia Nutt. (Bernard Mahon, nordamerikanischer Botaniker), VI. 1., Berberideae.

Aquifolium Nutt., stechhülsenblättrige, ♀. f. b. k. Westliches Nordamerika.

diversifolia Swt., verschiedenblättrige, ♀. t. Monte Video.

fascicularis DC., büschelförmige, ♀. k. t. Californien, Neuspanien.

glumacea DC., spelzige, ♀. f. b. k. Westl. Nordamer.

japonica DC., japanische, ♀. k. t. Japan.

nepalensis DC., nepal'sche, ♀. k. t. Nepal.

nervosa Nutt., nervige, ♀. f. b. k. Westliches Nordamerika.

repens G. Don, kriechende, ♀. f. b. k. Westliches Nordamerika.

tenuifolia Lindl., feinblättrige, ♀. t. Vera Cruz.

Mairia N. E., *Mairia*, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

crenata N. E., gekerbte, ♂. 4. t. k. Cap d. gut. H.

Majanthemum bifolium DC. etc. v. *Smilacina bifolia* etc.

Malabaila graveolens Hoffm. etc. v. *Pastinaca graveolens* etc.

Malachodendron Mitch., Cav., Weichstrauch, XVI. VIII., Ternstroemiaceae.

ovatum Cav., eiförmiger, ♀. f. b. k. Virginien.

Malachra L., Weichmalve, XVI. VIII., Malvaceae.

alceaefolia Jacq., eibischblättrige, ☉. m. f. Südamer.

bracteata Cav., deckblättrige, ☉. m. f. Südamerika.

capitata L. (*triloba* Poir.), kopfförmige, ☉. f. m. Westindien.

cordata Poir., herzblättrige, ☉. f. m. Westindien.

fasciata Jacq., bandirte, ☉. f. m. Caracas.

heptaphylla Fisch. (*fasciata* Bot. reg.), siebenlappige, ☉. f. Brasilien.

radiata L., strahlige, ☉. ♂. w. Westindien.

rotundifolia Schrank., rundblättrige, ☉. f. Brasilien.

Malaxis Sw., Weichorche, XX. 1., Orchideae.

monophyllos Sw., einblättrige, 4. Kn. f. Nordeuropa, mitteleuropäische Alpen.

paludosa Sw., sumpfliebende, 4. Kn. f. Nordeuropa.

liliifolia Sw., *Loeselii* Sw. v. *Sturmia liliifolia* et *Loeselii*.

Malcolmia RB. (W. Malcolm, englischer Botaniker), XV. 111., Cruciferae.

Malcolmia

africana RB., afrikanische, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

β) *stenopetala* Bernh. γ) *divaricata* Fisch.

arenaria DC., sandliebende, ☉. f. Nordafrika.

chia DC., griechische, ☉. f. Griechenland.

laxa DC., lockere, ☉. f. Sibirien.

litorea RB., Ufer-M., ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

lyrata DC., leierblättrige, ☉. f. Cypern.

maritima RB., Seestrands-M., ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

parviflora DC., kleinblumige, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.

taraxacifolia DC., löwenzahnblättrige, ☉. f. Sibirien.

Malesherbia R. et P. (De Malesherbes, ein Franzose, Gönner der Botanik), XVI. II. (V. III.), Passifloreae-Malesherbieae.

humilis D. Don, niedrige, ☉. f. m. Chili.

linearifolia Poir. (*paniculata* D. Don, *coronata* G. Don), gleichbreitblättrige, ? ☉. f. t. k. Chili.

Mallococca crenata Forst. v. *Grewia Mallococca*.

Malocchia Savi v. *Canavalia*.

Malope L., Malope, XVI. VIII., Malvaceae.

grandiflora Hort., großblumige, ☉. f. m. Nordafrika.

malacoides L., malvenähnliche, ♂. k. Nordafrika.

trifida Cav., dreitheilige, ☉. f. m. Nordafrika, Spanien.

Malpighia Plum. (M. Malpighi, Professor der Medicin zu Bologna, berühmter Pflanzen-Anatom), X. III., Malpighiaceae.

angustifolia L. (*linearis* Jacq.), schmalblättrige, f. w. Südamerika.

aquifolia L., stechhülsenblättrige, f. w. Südamerika.

biflora Poir. (*punicifolia* Cav.), zweiblumige, f. w. Südamerika.

coccifera L., stachelblättrige, f. w. Westindien.

cubensis H. B. K., Cuba-M., f. w. Cuba.

dubia Cav., zweifelhafte, f. w. Jamaica.

faginea Sw., buchenblättrige, f. w. Caribäen.

fucata Ker (*macrophylla* Dsf.), geschminkte, f. w. ? Westindien.

glabra L., kahle, f. w. Südamerika.

punicifolia L., granatenblättrige, f. w. Cayenne.

urens L., brennende, f. w. Westindien.

altissima Aubl., *crassifolia* L., *macrophylla* Juss.

etc. v. *Byrsonima altissima*, *crassifol.*, *nervosa* etc.

nitida L. etc. v. *Bunchosia nitida* etc.

Malus T. v. *Pyrus*.

Malva T. (*Sphaeralcea* Hil.), Malve, XVI. VIII., Malvaceae.

abutiloides L., sidaartige, f. w, t. Bahamische Inseln.

aegyptiaca L., ägyptische, ☉. f. Aegypten.

Alcea L., schlitzblättrige, 4. f. Europa.

β) *italica* Poll.

alchemillaefolia H. Vratisl., frauenmantelblättrige, ☉. f. ?

althaeoides Cav., eibischähnliche, ☉. f. Spanien, Sardinien.

americana L., amerikanische, ☉. f. m. Westindien.

amoena Sims, liebliche, f. k. Cap der guten Hoffn.

angulata Penny, kantige, f. k. t. ?

Malva

angustifolia Ait. (*Sphaeralcea angustifolia* Hil.), schmalblättrige, ♀. k. t. Mexico.

arvensis Presl, Acker-M., ☉. f. Sicilien.

asperrima Jacq., rauhe, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

balsamica Jacq., balsamische, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

betuloides Schrad., birkenähnliche, ♀. w. Java.

bonariensis Cav., bonarische, ☉. f. Buenos Ayres.

borbonica W., mascarenische, ♀. w. Mascarenas.

borealis Wallm., Liljebl. (*parviflora* Huds., *pusilla* Wither., *Henningii* Goldb., *rotundifolia* Fries), nördliche, ☉. f. Nordeuropa.

brasiliensis Desr., brasilianische, ☉. f. m. Brasilien.

bryonifolia L., zaunrübenblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

calycina Cav., großkelchige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

campanuloides Lodd., glockenblumige, 4. f. b. k. Nordamerika.

capensis L., capische, ♀. ♀. k. Cap der guten Hoffn.

capitata Cav., kopfförmige, ♀. t. w. Peru.

caroliniana L., carolinische, ☉. ♂. f. Carolina, Südamerika.

β) decumbens W.

commutata Rchb., verwechselte, ☉. f. ?

concinna K. et W., nette, ♀. w. Südamerika.

Creeana Hook., Cree's, ♀. k. t. ?

cretica Cav., cretische, ☉. f. Creta.

crispa L., krause, ☉. f. Macedonien, Deutschland.

divaricata Andr., sparrige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

elegans Cav., zierliche, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

fastigiata Cav. (*Morenii* Poll., *ulceoides* Tenor., *decumbens* Host., *Bismalva* Bernh.), gipfelständige, 4. f.

Süd- und Westeuropa.

fragrans Jacq., wohlriechende, ♀. k. Cap der gut. H.

gangetica L., Ganges-M., ☉. f. m. Ostindien.

glabra Desr., kahle, ☉. f. China.

grossulariaefolia Cav. (*stricta* Jacq.), stachelbeerblättrige, ♀. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

hispanica L., spanische, ☉. f. Spanien.

lactea Ait. (*vitifolia* Cav.), milchweißse, ♀. k. t. Mexico.

leprosa Orteg., schorfige, ♀. w. Cuba.

limensis L., Lima-M., ☉. f. m. Peru.

mareotica Delil., mareotische, ☉. f. Aegypten.

mauritanica Spgl. (*mauritiana* L., *sinensis* Cav., *obtus* Mch.), mauritanische, ☉. f. Mittel- und Südeuropa, Nordafrika, China.

b) albiflora.

microcalyx Bernh., kleinkelchige, ☉. f. ?

miniata Cav., mennigfarbige. ♀. t. ? Mexico.

Monroana Dougl., Monro's, 4. f. b. k. Columbien.

b) major J. C.

moschata L., Moschus-M., 4. f. Europa.

b) undulata Sims. c) alba Hort.

Mülleri Hort., Müller's, ♂. f. Sardinien.

nicaeensis All., nicaeische, ☉. f. Oberitalien.

obtusiloba Hook., stumpflappige, 4. k. Chili.

ovata Cav., eiförmige, ♀. ♀. w. Westindien, Südamerika.

oxyacanthoides Hornem., weißdornblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

Malva

- parviflora* L. (*microcarpa* Dsf.), kleinblumige, ☉. f. Nordafrika.
peruviana L., peruanische, ☉. f. m. Peru.
polystachya Cav., vielährige, ♂. ♀. w. Peru.
prostrata Cav., gestreckte, 4. k. t. Südamerika.
pulchella Bernh., hübsche, ☉. f. ?
purpurata Lindl., purpurfarbige, 4. k. Chili.
retusa Cav. (*triloba* Thbg.), abgestutzte, ♂. k. Cap der guten Hoffnung.
rotundifolia L. (*vulgaris* Fr., *neglecta* Wallr.), gemeine rundblättrige, ☉. f. Europa, Nordamerika.
scaberrima Lag., schärfste, ☉. f. Spanien.
scabra Cav. (*scoparia* Jacq., *corchorifolia* Desr.), scharfe, ♂. ♀. w. Peru.
scoparia L'Her., besenartige, ♂. ♀. w. Peru.
Sherardiana L., Sherard's, 4. f. Kleinasien.
spicata L., ährenförmige, ♂. w. Westindien.
stipulacea Cav., zwischenblättrige, ☉. f. Spanien.
subhastata Cav., spontonblättrige, ♂. w. Mascarenas, Südamerika.
sylvestris L. (*vulgaris* Ten.), Wald-M., 4. f. Europa.
 β) *albiflora* Presl.
tomentosa L., filzige, ♂. ♀. w. Ostindien.
Tournefortiana L., Tournefort's, ☉. f. Südfrankreich, Spanien.
trachelifolia Lk., halskrautblättrige, ☉. w. ?
tricuspidata RB. (*coromandeliana* L., *americana* Cav., *carpinifolia* Desr., *domingensis* Spgl.), dreispitzige, ♂. w. Westindien.
tridactylides Cav. (*reflexa* Andr.), dreifingerige, ♂. k. Cap der guten Hoffnung.
trifida Cav., dreispaltige, ☉. f. Spanien.
verticillata L. (*glomerata* Hort.), wirtelförmige, ☉. f. China.
 β) *flexuosa* Hornem.
virgata Murr., ruthenförmige, ♂. k. Cap der gut. H.
vitifolia Cerv., weinblättrige, ♂. k. t. Mexico.
waltherifolia Lk., waltherablättrige, 4. w. Java.
 coccinea Nutt. v. *Cristaria coccinea*.
- Malvaviscus arboreus** Cav. etc. vid. *Achania Malvaviscus* etc.
- Mammea** L. (südamerikanischer Name), XIII. 1., Guttiferae.
americana L., amerikanische, ♂. w. Südamerika, Westindien.
 asiatica L. v. *Barringtonia speciosa*.
- Mammillaria** Haw., Zitzendistel, XII. 1., Cactaeae.
acanthophlegma Lehm. (*geminispina* DC., *columnaris* Flor. mexic.), paarstachelige, ♂. w. Mexico.
acanthostephes Lehm., strahlstachelige, ♂. w. Mexico.
aciculata Otto, nadelstachelige, ♂. w. Mexico.
affinis DC. (*cataphracta* Mart.), ähnelnde, ♂. w. Mexico.
albida Haage (*confinis* Haage), weifsliche, ♂. w. Mexico.
angularis H. Berol. (*compressa* DC.), kantige, ♂. w. Mexico.
bicolor Lehm. (*geminispina* Haw.), zweifarbige, ♂. w. Südamerika.
brevimamma Zucc., kurzwarzige, ♂. w. Mexico.

Mammillaria

caespiticia DC., rasenartige, ♀, w. Mexico.

Caput Medusae Otto (*Sempervivi* DC.), Medusenhaupt-Z., ♀, w. Mexico.

carnea Zucc., fleischfarbige, ♀, w. Mexico.

centrispina Pfr., mittelstachelige, ♀, w. Mexico.

chrysacantha H. Berol., goldstachelige, ♀, w. Mexico.

cirrhiifera Mart., rankenförmige, ♀, w. Mexico.

columnaris Mart., säulenförmige, ♀, w. Mexico.

conica Haw., kegelförmige, ♀, w. ?

conoidea DC., kegelähnliche, ♀, w. Mexico.

cornifera DC., horntragende, ♀, w. Mexico.

coronaria Haw. (*Cactus coronatus* W.), gekrönte, ♀, w.

Südamerika.

crebrispina DC., dickstachelige, ♀, w. Mexico.

crinita DC., bemähnte, ♀, w. Mexico.

crucigera Mart., kreuzförmige, ♀, w. Mexico.

cylindracea DC., cylinderförmige, ♀, w. Mexico.

disciformis DC., scheibenförmige, ♀, w. Mexico.

discolor Haw. (*depressa* Haw., *pulchella* H. Berol., *canescens* Hort., *Cactus Spinii* Colla), verschiedenfarbige, ♀, w. Mexico.

divergens DC., divergirende, ♀, w. Mexico.

β) prolifera Pfr. (*Cact. pseudomammillaris* Salm.)

Dyckiana Zucc., Dyck's, ♀, w. Mexico.

echinata DC., borstenstachelige, ♀, w. Mexico.

β) densa Lk. et Otto (*caespitosa* Hort.).

elegans DC. (*supertexta* Hort.), zierliche, ♀, w. Mexico.

elongata DC., verlängerte, ♀, w. Mexico.

eriacantha H. Berol. (*eriantha* et *cylindrica* Hort.), wollstachelige, ♀, w. Mexico.

exsudans Zucc. (*curvata* H. Berol.), ausschwitzende, ♀, w. Mexico.

Fischeri Pfr., Fischer's, ♀, w. Mexico.

flavescens DC. (*C. stramineus* Spgl.), gelbliche, ♀, w. Südamerika.

fulvispina Haw., rothbraunstachelige, ♀, w. Brasilien, Mexico.

fuscata H. Berol., bräunliche, ♀, w. Mexico.

gibbosa Salm., höckerige, ♀, w. ?

gladiata Mart., degenförmige, ♀, w. Mexico.

glochidiata Mart. (*ancistroides* Lehm., *criniformis* DC.), widerhakige, ♀, w. Mexico.

glomerata DC., knaulförmige, ♀, w. St. Domingo.

grandiflora Otto (*canescens* H. Berol.), großblumige, ♀, w. Mexico.

Haageana Pfr. (*Perote* Hortul., *diacantha nigra* Haag.), Haage's, ♀, w. Mexico.

hamata Lehm., hackige, ♀, w. Mexico.

Helicteris DC. (Moç.), schraubenförmige, ♀, w. Mexico.

hexacantha Salm., sechsstachelige, ♀, w. Mexico.

Hystrix Mart., igelstachelige, ♀, w. Mexico.

intertexta DC., verwebte, ♀, w. Mexico.

irregularis DC., unregelmäßige, ♀, w. Mexico.

Karwinskiana Mart., Karwinski's, ♀, w. Mexico.

lanifera Haw., wollige, ♀, w. Mexico.

latimamma DC., breitwarzige, ♀, w. Mexico.

Lehmanni H. Berol. (*leucacantha* DC., *octacantha* DC.), Lehmann's, ♀, w. Mexico.

Mammillaria

- longimamma DC., langwarzige, f. w. Mexico.
 loricata Mart. (*heteracantha* H. Berol., *Cact. canescens* fl. mexic.), bepanzerte, f. w. Mexico.
 macrothele Mart., rothdrüsige, f. w. Mexico.
 magnimamma Haw. (*ceratophora* Lehm.), großwarzige, f. w. Mexico.
 mitis Mill., unbewehrte, f. w. Südamerika.
 Mystax Mart., bartige, f. w. Mexico.
 nivea Wendl. (*Toaldoae* Lehm.), schneeweiße, f. w. Mexico.
 nivosa Link (*tortolensis* H. Berol.), schneefarbige, f. w. Tortola.
 nuda DC., nackte, f. w. Mexico.
 parvimamma Haw. (*prolifera* Hort., *Cactus microthele* Spgl., *prolifer* W.), kleinwarzige, f. w. Westindien.
 Plaschnickii Otto, Plaschnick's, f. w. Mexico.
 polyëdra Mart., vielseitige, f. w. Mexico.
 polythele Mart., vielwarzige, f. w. Mexico.
 prolifera Haw. (*Parmentieri* H. Par.), sprossende, f. w. Südamerika.
 pusilla DC. (*stellaris* Hort., *Cactus stellatus* Lodd.), sternförmige, f. w. Westindien.
 β) major.
 pycnacantha Mart., dichtstachelige, f. w. Mexico,
 quadrispina Mart., vier- bis sechsstachelige, f. w. Mexico.
 radians DC., strahlende, f. w. Mexico.
 recurva Lehm. (*Lehmanni* Hort.), zurückgekrümmte, f. w. Mexico.
 rhodantha Lk. et Otto (*atrata*, *aurata*, *hybrida* Hort.), rothblumige, f. w. Mexico.
 β) prolifera Pfr. γ) Andreae Otto. δ) Wendlandii Pfr. (*erinacea* Wendl.). ϵ) neglecta H. Berol. ζ) rubens Pfr. (*pgramidalis* H. Berol.).
 rutila Zucc., rothgelbe, f. w. Mexico.
 Seitziana Mart., Seitz's, f. w. Mexico.
 setosa Pfr., borstige, f. w. Mexico.
 simplex Haw. (*Cactus mammillaris* L.), einfache, f. w. Westindien, Südamerika.
 spacelata Mart., brandige, f. w. Mexico.
 subangularis DC. (*cirrhiifera* spin. *fuscis* H. Mon.), wenig kantige, f. w. Mexico.
 subcrocea DC., hochgelbstachelige, f. w. Mexico.
 subpolyëdra Salm (*polygona* Zucc., *anisacantha*, *jalapensis* Hort.), vielkantige, f. w. Mexico.
 supertexta Mart., überwebte, f. w. Mexico.
 tentaculata H. Berol. (*pulchra* Haw.), randzaserige, f. w. Mexico.
 tenuis DC., dünne, f. w. Mexico.
 β) media DC. (*stella aurata* Mart.).
 thelocamptos Lehm., bogenwarzige, f. w. Mexico.
 triacantha DC., dreistachelige, f. w. Mexico.
 uberiformis Zucc., fruchtbare, f. w. Mexico.
 uncinata Zucc., hakiggekrümmte, f. w. Mexico.
 vetula Mart., ältliche, f. w. Mexico.
 villifera Otto (*Mystax* Hort.), zottige, f. w. Mexico.
 vivipara Haw., lebendig gebährende, f. w. k. Louisiana.
 Wildiana Otto (*glochidiata* var. *aurea* Hort.), Wild's, f. w. Mexico.

Mammillaria

Zuccariniana Mart., Zuccarini's, ♂. w. Mexico.

Noch sind folgende in Loudon's hortus britannicus aufgeführt:

ambigua G. Don (Gill.), zweifelhafte, ♂. w. Chili.

caudata G. Don (Gill.), geschwänzte, ♂. w. Chili.

coccinea G. Don (Gill.), scharlachfarbige, ♂. w. Chili.

floribunda Hook., blüthenreiche, ♂. w. Chili.

missouriensis Swt. (*Cactus mammillaris* Nutt.), missourische, ♂. w. k. Nordamerika.

quadrata G. Don (Gill.), viereckige, ♂. w. Chili.

solitaria G. Don (Gill.), einzeln stehende, ♂. w. Chili.

speciosa Cill., prächtige, ♂. w. Chili.

spinosa G. Don (Gill.), langstachelige, ♂. w. Chili.

Mandragora T., Alraunwurzel, V. 1., Solanaceae.

autumnalis Bertol., herbstliche, 4. f. Südeuropa, Griechenland.

neglecta G. Don, übersehene. 4. f. ?

vernalis Bertol. (*officinalis* Mill., *acaulis* G., *praecox* Swt.), Frühlings-A., 4. f. Südeuropa.

Manettia Mutis (X. Manetti, Professor der Botanik zu Florenz), IV. 1., Rubiaceae.

coccinea W., scharlachfarbige, ♂. w. Guiana.

cordifolia Hook. (? *glabra* S. et C.), herzblättrige, ♂. Sch. w. Buenos-Ayres.

Lygistum Sw., westindische, ♂. w. Westindien.

Mangifera L., Mangobaum, I. 1. (XXIII. 1.), Terebinthaceae.

indica L., indischer, ♂. w. Ostindien.

foetida Lour., stinkender, ♂. w. Cochinchina, Amboina.

axillaris Desr. v. *Buchanania angustifolia*. *glauca*

Rottb. v. *Elaeodendrum glaucum*. *pinnata* L. vid.

Spondias mangifera.

Manglilla Juss. (peruanischer Name), V. 1., Sapotaceae.

canariensis (W.), canarische, ♂. k. t. Teneriffa.

Milleriana P., Miller's, ♂. k. t. Cap der guten Hoffn.

Manicaria G., Mützenpalme, XXI. 1x. (XIII. III.) Palmae.

saccifera G., sackförmige, ♂. w. Südamerika.

Manihot Adans v. *Janipha*.**Manisuris** L., Schweifgras, III. II., Gramineae.

granularis Sw., körniges, 4. w. West- und Ostindien, China, Afrika.

Mantisia saltatoria Roxb., *Curt.* et *spatulata* R. et S. v. *Globba saltatoria* etc.**Manulea** L., Handblume, XV. II., Personatae - Antirrhineae.

aethiopica Thbg., aethiopische, ♂. t. Südafrika.

alternifolia P., wechselblättrige, ♂. t. Neuholland.

angustifolia Lk. (? *incana* Tkg.), schmalblättrige, ♂. k. t. Cap der guten Hoffnung.

argentea Thbg., silberfarbige, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung.

capensis Thbg. (*villosa* P.), kapische, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung.

capitata Thbg., kopfförmige, ♂. k. t. Cap d. gut. H.

Cheiranthus L., lackblumige, ♂. k. t. Cap d. gut. H.

Manulea

cordata Thbg., herzblättrige, 4. k. t. Cap d. gut. H.
crystallina Weinm., crystallwarzige, ♂. 4. t. Cap der
 guten Hoffnung.

foetida W., stinkende, ☉. f. m. Cap der gut. Hoffn.
hispida Thbg. (*oppositifolia* Vent.), steifhaarige, ♀. k. t.
 Cap der guten Hoffnung.

linifolia Thbg., leinblättrige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.
pedunculata Andr., langstielige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.
rhynchantha Lk., schnabelblumige, ♀. k. t. Cap der
 guten Hoffnung.

rubra Thbg., rothe, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
tomentosa L., filzige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

violacea Lk., violette, 4. w. ?

viscosa W., schmierige, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

Maranta Plum. (B. Maranti, venetianischer Arzt), I. 1.,
 Scitamineae-Cannaceae.

angustifolia Sims, schmalblättrige, 4. w. Westindien.

arundinacea L., rohrartige, 4. ♀. w. Westindien.

bicolor Ker, zweifarbige, 4. w. Brasilien.

b) minor.

compressa H. Berol., glatte, 4. w. ?

cristata N. E. et Mart., kammförmige, 4. w. Brasilien.

cuspidata Rosc., feinspitzige, 4. w. Sierra Leone.

divaricata Rosc., ausgespernte, 4. w. Brasilien.

furcata N. E. et Mart., gabelförmige, 4. w. Brasilien.

gibba Sm., höckerige, 4. ♀. w. Barbados.

gracilis Rudg., schlanke, 4. w. Guiana.

indica Tuss., Rosc. (*sylvatica* Sm.), indische, 4. ♀. w.
 Westindien.

lutea Jacq. (*Jacquini* Schult.), gelbliche, 4. w. Süd-
 amerika.

malaccensis W., malackaische, 4. w. Malacka.

obliqua Rudg., schiefblättrige, 4. w. Guiana.

petiolata Rudg., gestielte, 4. w. Guiana.

purpurascens Lk., purpurfarbige, 4. w. Brasilien.

sylvatica Rosc., Wald-M., 4. ♀. w. Barbados.

Tonchat Aubl., *Tonchat-M.*, 4. ♀. w. Guiana, West-
 indien.

comosa L. fil., *secunda* Grah., *spicata* Aubl. vid.
Phrynium comosum, *setosum*, *ellipticum*. *Zebrina*
 Sims etc. v. *Calathea zebrina* etc.

Marattia Sm. (J. F. Maratti, italienischer Botaniker),
 XXIV. 1., Osmundaceae.

alata Sm., geflügelte, 4. w. Jamaica.

laevis Sm., glatte, 4. w. Hispaniola.

Marcelia aurea Cass. v. *Anthemis aurea*.

Marcgravia Plum. (Georg Marcgraf, deutscher Natur-
 forscher, welcher Brasilien bereiste), XIII. 1., Guttif-
 erae-Marcgraviaeae.

coriacea Vahl, lederblättrige, ♀. ♀. w. Guiana.

umbellata L., doldenblumige, ♀. w. Südamerika.

Margaranthus Schtdl., Perlblume, V. 1., Solanaceae.
solanaceus Schtdl., nachtschattenähnliche, ☉. f. m.
 Mexico.

Margyricarpus R. et P., Perlfrucht, II. 1., Ro-
 saceae.

setosus R. et P., borstige, ♀. w. Brasilien, Peru.

Marica coelestis Lehm., *coerulea* Ker etc. v. *Cipura coelestis* etc. *gladiata* Ker v. *Bobartia gladiata*. *plicata* Ker, *striata* Ker v. *Sisyrinchium plicatum* etc.

Mariscus Vahl, Bollsimse, III. 1., Cyperaceae.
aggregatus W., angehäuften, 4. Wa. ? Südamerika.
conflexus Lk., umgebogene, 4. w. Brasilien.
elatus Vahl, hohe, 4. w. Caracas, Cayenne.
Jacquini Kunth, Jacquin's, 4. w. Caracas.
laevis RB., glatte, 4. k. Neuholland.
ovularis Vahl, eiförmige, 4. k. w. Carolina, Georgien.
panicus Vahl, fennichartige, 4. w. Ostindien, Arabien.
patulus Schrad., ausgebreitete, 4. w. Südamerika.
polycephalus Lk., vielköpfige, 4. w. Brasilien.
umbellatus Vahl, doldige, 4. w. Ostindien.

Marlea Roxb. (bengalischer Name), VIII. 1., Hederaceae.
begoniaefolia Roxb., begoniablätterige, 5. t. w. Bengalen, Südchina.

Marrubium L., Andorn, XIV. 1., Labiatae.
affine Hornem. (*astracanicum* W.), ähnelnder, 4. f. ? Sibirien.
Alyssum L., runzeliger, 4. f. Spanien.
astracanicum Jacq., astrachanischer, 4. f. Astrachan, Caucasus.
candidissimum L., weißlicher, 4. f. Kleinasien, Griechenland, Spanien.
 β) *uncinatum* Hornem.
catariaefolium Desr., münzenblättriger, 4. f. Levante, Caucasus.
creticum Mill. (*peregrinum* Jacq.), cretischer, 4. f. Mittel- und Ostdeutschland, Creta.
leonuroides Desr., leonurusähnlicher, 4. f. Caucasus.
mollissimum D. Don, weicher, 4. k. Nepal.
paniculatum Desr. (*remotum* Kit., *pannonicum* Rchb., *peregrinum* Auctor.), rispiger, 4. f. Deutschland, Ungarn.
parviflorum Fisch. et Mey., kleinblumiger, 4. f. Südrussland (Talüsch).
peregrinum L., Rchb. (*candidissimum* L. Herb., Benth., Koch., *incanum* Desr., *supinum* Scop.), fremder, 4. f. Südeuropa, Kleinasien.
persicum C. A. Mey., persischer, 4. f. Nordpersien.
propinquum Fisch. et Mey., verwandter, 4. f. Südrussland (Talüsch).
supinum L. (*setaceum* Desr.), niedriger, 4. f. Südeuropa.
vulgare L., gemeiner, 4. f. Europa, Mittelasien, Nordamerika.

β) *apulum* Tenor.

acetabulosum L. etc. v. *Beringeria acetabulosa* etc.

Marsdenia RB. (W. Marsden, Verfasser einer Geschichte von Surinam), V. 11., Asclepiadeae.

erecta RB., aufrechte, 5. t. w. Syrien.
flavescens Cunn., gelbliche, 5. Sch. w. Neuholland.
suaveolens RB., wohlriechende, 5. w. Neusüdwallis.

Marshallia Pursh (Humphrey Marshall, nordamerikanischer Botaniker), XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.
angustifolia Pursh, schmalblättrige, 4. k. Carolina.
caespitosa Nutt., rasenartige, 4. k. Texas.

Marshallia

lanceolata Pursh, lanzettliche, 4. k. Carolina.

latifolia Pursh, breitblättrige, 4. k. Carolina.

Marsilea L. (Graf L. F. Marsigli, Stifter der Akademie der Wissenschaften zu Bologna), XXIV. iv., Marsileaceae.

quadrifolia L., vierblättrige, 4. Wa. f. Europa, Nordafrika, Mascarenas, Neuholland.

natans L. v. *Salvinia natans*.

Marsypianthus hyptoides Mart. v. *Hyptis inflata*.

Martia campanulata Sogl. v. *Hypericum virginicum*.

Martynia L. (John Martyn, Professor der Botanik zu Cambridge), XIV. ii., Personatae-Bignoniaceae.

diandra Glox. (*angulosa* Lam.), zweimännige, ☉. f. m. Mexico.

longiflora L. (*capensis* Glox.), langblumige, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

lutea Lindl., gelbe, ☉. f. m. Brasilien.

proboscidea Glox. (*annua* L.), rüsselförmige, ☉. f. m. Nordamerika.

Craniolaria Sw. vid. *Craniolaria annua*. *perennis* L. v. *Gloxinia maculata*.

Maruta Cass., Stinkchamille, XIX. ii., Compositae-Corymbiferae.

fuscata DC., bräunliche, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

Cotula DC. (*foetida* Cass.), gemeine, ☉. f. England, Mittel- und Osteuropa.

Masdevalia R. et P. (Joseph Masdeval, spanischer Botaniker), XX i., Orchideae.

infracta Lindl., eingeknickte, 4. w. Brasilien.

Massonia L. (Franz Masson, englischer Botaniker und Reisender), VI. i., Coronariae-Asphodeleae.

angustifolia L. (*lanceolata* Thbg.), schmalblättrige, 4.

Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

breviscapa Lehm., kurzschäftige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

candida Burch., reinweißse, 4. Zw. t. Cap der gut. H.

cordata Jacq., herzblättrige, 4. Zw. t. Cap d. gut. H.

echinata L., weichstachelige, 4. Zw. t. Cap d. g. H.

ensifolia Ker, schwertblättrige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

?β) *violacea* Andr.

grandiflora Lindl., großblumige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

lanceaefolia Jacq., lanzettblättrige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

latifolia L. (*coronata* Jacq.), breitblättrige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

longifolia Jacq., langblättrige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

muricata Ker, stachelspitzige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

obovata Jacq., verkehrteiförmige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

pauciflora Dryand., wenigblumige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

sanguinea Jacq., blutfarbige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

Massonia

scabra Andr. (*pustulata* Ker), scharfblättrige, 4. Zw.
t. Cap der guten Hoffnung.
undulata Thbg., wellenblättrige, 4. Zw. t. Cap der
guten Hoffnung.

corymbosa Sims v. *Scilla corymbosa*. *lutea* Hort.
v. *Daubenya aurea*.

Matayba Aubl. (guianischer Name), VIII. r., Sapindaceae.

guianensis Aubl., guianische, ♀. w. Guiana, Westindien.
Patrisiana DC., Patris's, ♀. w. Guiana.

Matricaria T., Mutterkraut, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

capensis L., capisches, ☉. ♂. f. k. Cap der guten H.
Chamomilla L., Chamillen-M., ☉. f. Europa.

b) *flore pleno*.

discoidea DC., scheibenförmige, ☉. f. Californien.

pusilla W., kleine, ☉. f. ?

suaveolens L., starkriechende, ☉. f. Ostindien.

maritima L., *Parthenium* L. etc. v. *Pyrethrum maritimum*, *Parthenium* etc.

Matthiola RB. (P. A. Matthioli, italienischer Arzt und Botaniker), XV. III., Cruciferae.

acaulis DC., stengellose, ☉. f. Aegypten.

annua Swt., jährige (Sommer-Levkoje), ☉. f. Südeuropa.

b) *alba*. c) *fl. pleno* etc.

arborescens Sbr., strauchartige, ♀. ♂. k. Griechenland, Nordafrika.

chenopodifolia Fisch. et Mey., gänsefußblättrige, ☉. f. Caspisches Meer.

fenestralis RB., zwergige, ♂. k. ?

glabra DC., kahle, ♂. k. ?

b) *purpurea*. c) *flore pleno* etc.

graeca Swt., griechische, ☉. f. Griechenland.

incana RB. (Winter-Levkoje), weißgraue, ♂. ♀. k. England, Südeuropa.

b) *coccinea*. c) *alba*. d) *multiplex* etc.

longipetala DC. (*macropetala* Spgl.), langkronige, ☉. f. Bagdad.

odoratissima RB., wohlriechende, ♂. ♀. k. Taurien, Caucasus.

β) *fragrans* Fisch.

oxyceras DC., spitzhornige, ☉. f. Persien, Syrien.

parviflora RB. (*lunata* DC.), kleinblumige, ☉. f. Spanien, Nordafrika.

saxatilis Bernh., Gesteins-M., ☉. ♂. f. Portugal.

sicula Presl, sicilianische, ♂. f. Sicilien.

simplicicaulis Sw., einfachstengelige, ♂. f. k. ?

sinuata RB., buchtige, ☉. ♂. f. k. England, Südeuropa, Nordafrika.

tatarica DC., tatarische, ♂. f. Tatarei.

torulosa DC., aufgeschwollene, ♀. k. Cap der gut. H.

tricuspidata RB., dreispitzige, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

tristis RB., traurige, ♀. k. Südeuropa, Nordafrika.

varia DC., bunte, 4. f. b. k. Südliche Schweiz, Oberitalien, Griechenland.

Matthiola

scabra L. v. *Guettarda scabra*. *Mattia umbellata* Schult. v. *Cynoglossum umbellatum*.

Maurandia Jacq. (*Maurandya* Loud.), [Maurandy, Pflanzenkennerin zu Carthagera], XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

antirrhiniflora Humb., löwenmaulblumige, ♀. Sch. k. t. Mexico.

Barclayana Lindl., Barclay's, ♀. Sch. t. k. Mexico.

semperflorens Jacq., immerblühende, ♀. Sch. k. t. Mexico.

Mauritia L. fil. (Moritz v. Nassau Siegen, Beschützer des Piso und Maragraf), XXII. VI., Palmae.

armata Mart., bewaffnete, ♀. w. Brasilien.

flexuosa L. fil., gebogene, ♀. w. Surinam.

vinifera Mart., weingebende, ♀. w. Brasilien.

Maxillaria R. et P., Kerfstendel, XX. I., Orchideae.

aromatica Grah., gewürzhafter, 4. w. Mexico.

atropurpurea Lodd., dunkelpurpurrother, 4. w. Brasil.

aureo-fulva Hook., goldbrauner, 4. w. Südamerika.

Barringtoniae Lindl., Barrington's, 4. w. Westindien.

Boothii Lindl., Booth's, 4. w. Südamerika.

ciliata Lindl., gefranzter, 4. w. Südamerika.

Colleyi Batem., Colley's, 4. w. Südamerika.

cristata Lindl., kammförmiger, 4. w. Trinidad.

crocea Lindl., safranfarbiger, 4. w. Brasilien.

decolor Lindl., farbloser, 4. w. Jamaica.

densa Lindl., dichter, 4. w. Mexico.

Deppei Bot. Cab., Deppe's, 4. w. Neuspanien.

foveata Lindl., grubiger, 4. w. Demerara.

galeata Bot. Cab., halmiger, 4. w. Neuspanien.

gracilis Bot. Cab., schlanker, 4. w. Brasilien.

graminea Lindl., grasartiger, 4. w. Demerara.

Harrisoniae Lindl., Harrison's, 4. w. Südamerika.

Henchmanni Hook., Henchmann's, 4. w. Mexico.

macrophylla Pöpp. et Endl., großblättriger, 4. w. Peru.

madida Lindl., feuchter, 4. w. Brasilien.

ochroleuca Bot. Cab., weißgelber, 4. w. Brasilien.

pallidiflora Hook., bleichblumiger, 4. w. St. Vincent.

Parkerii Hook., Parker's, 4. w. Demerara.

parvula Hook., kleiner, 4. w. Brasilien.

picta Hook., bemalter, 4. w. Brasilien.

platanthera Hook., breitbeuteliger, 4. w. Brasilien.

porrecta Lindl., hervorgestreckter, 4. w. Brasilien.

psittacina Batem., papageifarbiger, 4. w. Mexico.

pumila Hook., niedriger, 4. w. Demerara.

punctata Bot. Cab., punktirter, 4. w. Brasilien.

racemosa Hook., traubiger, 4. w. Südamerika.

Rollisonii Lindl., Rollison's, 4. w. Brasilien.

rufescens Lindl. (*fuscata* Hort.), rothbrauner, 4. w. Trinidad.

sinuosa Batem., buchtiger, 4. w. Demerara.

stapelioides Lk. et Otto, stapelienblumiger, 4. w. Brasilien.

Steelii Hook., Steel's, 4. w. Demerara.

tenuifolia Lindl., feinblättriger, 4. w. Vera-Cruz.

tetragona Lindl., vierseitiger, 4. w. Brasilien.

Maxillaria

variabilis Lindl., veränderlicher, 4. w. Neuspanien (Vera-Cruz).

β) unipunctata Lindl.

viridis Lindl., grüner, 4. w. Brasilien.

vitellina Lindl., dottergelber, 4. w. Brasilien.

Warreana Lodd., Warre's, 4. w. Brasilien.

squalens Hook. vid. *Xylobium squalens*. *superba*

Lex. et Lallav. v. *Govenia superba*.

Maximiliana Mart. (Maximilian, König von Baiern, einer der großmüthigsten Beförderer der Pflanzenkunde, Maximilian, Fürst von Wied Neuwied, berühmt als Reisender und Naturforscher), VI. III. (XXIII. I.), *Palmae*.

insignis Mart., ausgezeichnete, 5. w. Brasilien.

regia Mart., königliche, 5. w. Brasilien.

Maytenus Feul. (chilesischer Name), II. I. (XXIII. II.), *Celastrineae*.

chilensis DC. (? *Boaria* Molin.), chilesischer, 5. k. t. Chili.

octogonus DC. (*Celastrus octog.* L'Her.), achtkantiger, 5. t. Peru.

verticillatus DC. (*Celastrus vert.* R. et P.), wirtelförmiger, 5. t. Peru.

Mazus rugosus Lour. v. *Hornemannia bicolor*.

Meconopsis Vig., DC., Mohnling, XIII. I., *Papa-veraceae*.

cambrica Vig., englischer, 4. f. England, Pyrenäen.

crassifolia Benth., dickblättriger, 5. 4. f. Californien.

heterophylla Benth., verschiedenblättriger, 5. 4. f. Californien.

Medeola L., Medeole, VI. III., *Sarmentaceae* (*Asparagineae-Smilaceae*).

virginica L., virginische, 4. Kn. f. Nordamerika.

asparagoides L. v. *Myrsiphyllum asparagoides*.

Medicago T., L., Schneckenklee, XVII. IV. (VI.), *Leguminosae-Papilionaceae*.

aculeata W., stacheliger, 6. f. ? Südeuropa.

aegagrophila Loud., bockskrautblättriger, 6. f. ?

agrestis Ten., Acker-S., 6. f. Süditalien.

apiculata W., kleinspitziger, 6. f. Südeuropa.

β) confinis Koch.

arborea L., baumartiger, 5. 5. k. Süditalien, Griechenland.

brachycarpa Fisch., kurzschotiger, 6. f. Caucasus.

cancellata MB., gegitterter, 6. f. Caucasus.

carstiensis Jacq., krainerischer, 4. f. Untersteyermark, Krain, Litorale.

caspica Jacq., Fisch., caspischer, 6. f. Caspisches Meer.

catalonica Schrk., catalonischer, 6. f. Catalonien.

ciliaris W., gefranzter, 6. f. Südfrankreich.

coronata Desr., gekrönter, 6. f. Südfrankreich.

corymbosa H. Kil., traubendoldiger, ? 6. f. ?

cretacea MB. (*fruticans* Hornem.), kreideliebender, 4. 5. f. Taurien.

cylindracea DC., cylinderförmiger, 6. f. ?

denticulata W., gezähnelter, 6. f. Süddeutschland, Italien, Taurien, Caucasus.

Medicago

disciformis DC., scheibenförmiger, ☉. f. Südfrankreich, Istrien, Dalmatien.

Echinus DC. (*intertexta* All.), igelförmiger, ☉. f. Südfrankreich, Italien.

elegans Jacq. (*rugosa* Desr.), zierlicher, ☉. f. Sicilien.

falcata L., sichelförmiger, 4. f. Europa.

β) versicolor Wallr. (*media* P.). γ) procumbens Bess. (*intermedia* Schult.).

flexuosa Tenor., gebogener, ☉. f. Italien.

Gerardi W. Kit., Gerard's, ☉. f. Südeuropa, Ungarn.

β) villosa DC. (? *hirsuta* Thuill.).

glomerata Balb. (*annularis* Bess.), knaulförmiger, 4. f. Süd- und Osteuropa.

glutinosa MB., klebriger, 4. f. Caucasus, Taurien.

β) alpestris.

granatensis W., granadischer, ☉. f. Südspanien.

Helix W. (*laevis* Dsf.), schneckenförmiger, ☉. f. Sicilien, Nordafrika.

Hystrix Tenor., stachelfrüchtiger, ☉. f. Italien.

intertexta Desr., verwebter, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

laciniata Gouan, schlitzblättriger, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

lappacea Desr., klettenähnlicher, ☉. f. Südfrankreich.

litoralis Rohde (*arenaria* Tenor.), Strand-Sch., ☉. f. Südfrankreich, Istrien, Italien.

lupulina L., hopfenartiger, ☉. f. Europa, Nordamerika etc.

β) Willdenowii Merat. γ) unguiculata DC. (*mnio-carpa* Loud.). δ) nepalensis H. Pilln.

maculata W. (*cordata* Desr., *arabica* Brot.), gefleckter, ☉. f. England, Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

marginata W. (*applanata* W.), berandeter, ☉. f. Südeuropa.

marina L., Meerstrands-L., 4. k. Süd- u. Westeuropa.

minima Desr., Lam., kleinsten, ☉. f. Europa, Nordafrika.

β) mollissima Spgl. (*graeca* Hornem.). γ) longiseta DC. δ) viscida Koch.

Murex W., kurzstacheliger, ☉. f. ?

muricata Desr., weichstacheliger, ☉. f. England, Süd- und Westeuropa.

muricoleptis Tin., schuppenstacheliger, ☉. f. Sicilien.

nigra W., schwarzer, ☉. f. Südeuropa, Teneriffa.

Noccae Balb., Nocca's, ? ☉. f. Italien.

obscura Retz, dunkler, ☉. f. ? Südeuropa.

olivaeformis H. Par., olivenfrüchtiger, ☉. f. ?

orbicularis Desr., kreisförmiger, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

ovata H. Erf., eiförmiger, ☉. f. ?

pentacycla DC., fünfwindiger, ☉. f. Südfrankreich.

praecox DC., früher, ☉. f. Südfrankreich.

prostrata Jacq., gestreckter, 4. f. Süd- u. Osteuropa.

pubescens DC., weichhaariger, ☉. f. Südfrankreich, Nizza.

recta Dsf., gerader, ☉. f. Nordafrika.

rupestris MB., Felsen-Sch., 4. f. Taurien.

sativa L., gebauter, 4. f. Europa.

β) versicolor.

saxatilis MB., Gesteins-L., 4. f. Taurien.

Medicago

scutellata L., schildförmiger, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

sibirica DC., sibirischer, ☉. f. Sibirien.

sphaerocarpa Bertol. (*globulifera* Dsf.), kugelfrüchtiger ☉. f. Italien.

spinulosa DC. (*apiculata* Bat.), feinstacheliger, ☉. f. Frankreich.

striata Bat., gestreifter, ☉. f. Frankreich.

strumaria H. Erf., kropfiger, ☉. f. ?

suffruticosa Ram., halbstrauchiger, ☿. f. k. Pyrenäen.

Tenoriana Spgl. (*cancellata* Ten.), Tenore's, ☉. f. Neapel.

Terebellum W. (*aculeata* G., *muricata* Lej.), bohrtförmiger, ☉. f. Südeuropa.

tornata Desr., gedrechselter, ☉. f. Südfrankreich, Spanien, Nordafrika.

tribuloides Desr., bürzeldornartiger, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

β) *Hornemanniana* DC. (*pubescens* Hornem.). γ)

rigida Desr. δ) *truncatula* G. (*tentaculata* W.)

tuberculata W., höckeriger, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.

turbinata W., kreiselförmiger, ☉. f. Südfrankreich, Italien.

uncinata W. (*distans* Poir.), hackiger, ☉. f. Südeuropa.

circinata L. etc. v. *Hymenocarpus circinatus* etc.

Medinilla Gaudich., *Medinilla*, ? X. 1., Melastomaceae.

erythrophylla Lindl., rothblättrige, ☿. w. Ostindien.

Megacarpaea DC., Großschötchen, XV. 11., Cruciferae.

laciniata DC., schlitzblättriges, ♂. f. b. k. Südsibirien.

Megaclinium Lindl., Aehrenstendel, XX. 1., Orchideae.

falcatum Lindl., sichelförmiger, 4. Kn. w. Sierra Leone.

maximum Lindl., größter, 4. Kn. w. Sierra Leone.

oxypterum Lindl., schmalflügeliger, 4. Ln. w. Sierra Leone.

Megasea ciliata Haw. etc. v. *Saxifraga ligulata* etc.**Megastachya rigida** P. B. v. *Sclerochloa rigida*. Hinsichtlich der übrigen s. *Eragrostis*.**Melaleuca** L., Kajeputbaum, XVIII. 11., Myrtaceae.

armillaris Sm. (*alba* Hortul., *ericaefolia* Andr., W.), ringförmiger, ☿. k. t. Neuholland.

Cajuputi Roxb. (*minor* Auctor.), ächter, ☿. w. Ostind.

calycina RB., gekelchter, ☿. ☿. k. t. Neuholland.

cuticularis La Bill., lockerrindiger, ☿. k. t. Neuholland.

decussata RB. (*tetragona* Hortul., *parviflora* Otto), kreuzblättriger, ☿. k. t. Neuholland.

densa RB., dichtblättriger, ☿. k. t. Neuholland.

diosmaefolia Andr. (*decussata* W., *chlorantha* Hortul.), diosmablättriger, ☿. k. t. Neuholland.

discolor Rchb., verschiedenfarbiger, ☿. k. t. Neuholland.

dumosa Lodd., buschiger, ☿. k. t. Neuholland.

elliptica La Bill. (*rotundifolia* Hort.), elliptischer, ☿. ☿. k. t. Südliches Neuholland.

ericaefolia Sm. (*armillaris* W.), heideblättriger, ☿. k. t. Neuholland.

eriocephala Sbr., wolköpfiger, ☿. k. t. Neuholland.

Melaleuca

- erubescens Otto (*tenuissima* Hort., *tenuifolia* Mack. Cat.), röthlicher, f. f. k. t. Neuholland.
- euphorbioides Lodd., euphorbiaähnlicher, f. f. k. t. Neuholland.
- Fraseri Hook., Fraser's, f. f. k. t. Neusüdwallis.
- fulgens RB. (*splendens* Hortul.), leuchtender, f. k. t. Neuholland.
- genistaefolia Sm., ginsterblättriger, f. f. k. t. Neusüdwallis.
- gibbosa LaBill., höckeriger, f. f. k. t. Nördliches Neuholland.
- globifera RB., kugelblumiger, f. f. k. t. Neuholland.
- ?grandis Fisch., größer, f. k. t. Neuholland.
- Huegelii Endl., Hügel's, f. f. k. t. Neuholland (Schwanenflufs),
- hypericifolia Sm., johanniskrautblättriger, f. k. t. Neusüdwallis.
- imbricata Lk., dachziegelförmiger, f. k. t. Neuholland.
- incana RB. (*canescens* Otto, *tomentosa* Colla), grauer, f. f. k. t. Neuholland.
- lanceolata Otto, lanzettblättriger, f. f. k. t. Neuholl.
- lateritia H. Berol., ziegelfarbiger, f. k. t. Neuholland.
- Leucadendron L., weifsstämmiger, f. w. Ostindien.
- linarifolia Sm., frauenflachsblättriger, f. k. t. Neusüdwallis.
- nodosa Sm., knotiger, f. f. k. t. Neuholland.
- Ottonis H. Berol., Otto's, f. k. t. Neuholland.
- paludosa RB., sumpfliebender, f. k. t. Neuholland.
- pendulina Lodd., hängender, f. f. k. t. Neuholland.
- pentagona LaBill., fünfkantiger, f. f. k. t. Neuholland.
- pulchella RB. (*fimbriata* Hortul.), schöner, f. k. t. Neuholland.
- scabra RB., scharfblättriger, f. f. k. t. Südliches Neuholland.
- squamea LaBill., schuppiger, f. f. k. t. Van-Diemens-Land.
- squarrosa Sm. (*myrtifolia* Vent.), sparriger, f. k. t. Neusüdwallis.
- striata LaBill., gestreifter, f. f. k. t. Neuholland.
- stypelioides Sm. (*obliqua* Wendl.), schiefblättriger, f. k. t. Neusüdwallis.
- taxifolia Schltdl., taxusblättriger, f. f. k. t. Neuholl.
- theaeformis Cunn., theeähnlicher, f. f. k. t. Neuholl.
- thymifolia Sm. (*gnidiaefolia* Vent., *coronata* Andr.), thymianblättriger, f. k. t. Neusüdwallis.
- thymoides LaBill., thymianähnlicher, f. f. k. t. Neuholland.
- trinervia Sm., dreinerviger, f. f. k. t. Neuholland.
- uncinata RB., hakenförmiger, f. f. k. t. Neuholland.
- uniflora Hortul., Sogl. (? *glauca* Hort.), einblumiger, f. k. t. Neuholland.
- viridiflora Sm., grünblumiger, f. t. Neuholland, Neucaledonien.
- Waeberi Rchb., Waeber's, f. k. t. Neuholland.

Noch findet man folgende unbestimmtere in den Pflanzenverzeichnissen: *agathosmaefolia* Hort., *epacridea* Hort., *glauca* Hort., *virgata* Hort., *vestita* Hortul.

Melaleuca

fascicularis La Bill. v. *Astartea fascicularis. neriifolia* Sims (*salicifolia* Andr.) v. *Tristania neriifolia. scoparia* Forst. et *Thea* Wendl. v. *Leptospermum scopar. et flavescens. virgata* Forst. vid. *Baeckea virgata*.

Melampodium L., Geißfußs, XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.

I. Genuina.

americanum L., amerikanischer, ☉. f. m. Neuspanien.
diffusum Cass., weitschweifiger, ☉. f. m. Südamerika.
Kunthianum DC. (*sericeum* H. B. K.), Kunth's, ☉. f. m. Neuspanien.

sericeum Lag., seidenhaariger, ☉. f. m. Neuspanien.

II. Zarabellia Cass. (*Dysodium* Rich.).

divaricatum DC. (*paludosum* H. B. K., *ovalifolium* Richb.), ausgesperrter, ☉. f. m. Neuspanien, Südamerika.

gracile Less., schlanker, ☉. f. m. Mexico.

heterophyllum Lag. (*hispidum* H. B. K.), verschiedenblättriger, ☉. f. f. m. k. Mexico.

humile Sw., niedriger, ☉. f. m. Westindien.

longifolium Cav., Brouss., langblättriger, ☉. f. m. Neuspanien.

III. Alcina Cav.

perfoliatum H. B. K., durchwachsener, ☉. f. m. Mexico.

Melampyrum T., Wachtelweizen, XIV. ii., Personatae-Rhinantheae.

arvense L., Acker-W., ☉. f. Europa.

β) *argyrocomum* Fisch.

barbatum W. K., bärtiger, ☉. f. Oesterreich, Ungarn, Litorale.

cristatum L., kammförmiger, ☉. f. Europa.

nemorosum L., blauer, ☉. f. Europa.

pratense L. (*vulgatum* P.), gemeiner, ☉. f. Europa.

sylvaticum L. (*alpestre* P.), Wald-W., ☉. f. Europa.

Melananthera Rich., Schwarzbeutel, XIX. i., Compositae-Corymbiferae.

deltoides Mchx., deltablättriger, ♂. w. Westindien.

hastata Mchx., spontonblättriger, ♂. 4. t. k. Carolina, Westindien.

β) *pandurata*.

Melancranis Vahl, Schwarzbinse, III. i., Cyperaceae.

scariosa Vahl, trockenhäutige, 4. k. Cap der gut. H.

Melanopsidium Coll., Schwarzguagave, XII. i., ? Myrtaceae (? *Rubiaceae*).

nigrum Coll., baumartige, f. w. ?

Melanorrhoea Wall., Schwarzfirnisbaum, XXIII. ii., Amyrideae-Terebinthaceae.

usitata Wall., gebräuchlicher, f. w. Ostindien.

Melanthium L., Braunblümchen, VI. iii., Colchicaceae (*Melanthaceae*).

ciliatum Thbg., gefranztes, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

gramineum Cav., grasartiges, 4. Zw. k. Nordafrika.

juncum Jacq. (*triquetrum* Thbg.), simsenförmiges, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

secundum Lam., einseitiges, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Melanthium

sibiricum L., sibirische, 4. Zw. f. Sibirien.

capense L. (*aethiopicum* Thbg.) v. *Androcymbium leucanthum* Nachtr. *densum* Lam. v. *Chaemaelirium carolinianum* Nachtr. *bracteolatum* Desr. v. *Veratrum parviflorum*. *eucomoides* Jacq. vid. *Androcymbium eucom.* *hybridum* Walt. (*latifolium* Lam., *racemosum* Mchx.) etc. v. *Leimanthium hybridum* etc. *monopetalum* L. suppl. et *spicatum* Houtt. et *Wurmbeum* Thbg. vid. *Wurmbea campanulata*, *purpurea* et *longiflora*. *uniflorum* Jacq. v. *Kolbea Bryniana*. *viride* Thbg. v. *Ornithoglossum viride*.

Melaspheerula graminea Ker etc. vid. *Diasia graminifolia* etc.

Melastoma Burm., L., Schwarzsclund, X. 1., Lythrae-Melastomeae.

affine D. Don, ähnelnder, f. w. Ostindien.

Azelianum D. Don, Afzelius's, f. w. Sierra Leone.

asperum L., rauher, f. w. Ostindien.

candidum D. Don, reinweiß, f. w. Ostindien.

corymbosum Sims, traubendoldiger, f. w. Sierra Leone.

cymosum Wendl., afterdoldiger, f. w. Westindien, Südamerika.

ecostatum H. Kew., rippenloser, f. w. Jamaica.

elongatum D. Don, verlängerter, 4. Kn. w. Sierra Leone.

grossum Mut., breitblättriger, f. w. Südamerika.

leonense Lodd., guineischer, f. w. Sierra Leone.

macrocarpum D. Don (*malabathrica* Bot. mag.), großfrüchtiger, f. w. Ostindien.

malabathricum L., malabarischer, f. w. Ostindien.

nepalense Lodd., nepal'scher, f. t. Nepal.

octandrum L., achtmänniger, f. w. Ceylon.

sanguineum Ker, blutrother, f. w. China.

Acinodendron L. etc. v. *Miconia Acinodendron* etc.

albicans Sw. etc. v. *Diplochita albicans* etc. Nachtr.

coerulea Hort., *granulosa* Desr. etc. vid. *Pleroma*

coerulea etc. *discolor* L. vid. *Aciotis discolor*.

elegans Aubl. etc. v. *Clidemia elegans* etc. *osbeckioides* Ker v. *Osbeckia chinensis*. *Phisiphora* Vahl

(*Tococa* Desr.) vid. *Tococa Aubletii*. *villosa* Aubl.

v. *Rhexia hypericoides*.

Melhania Forsk., Melhanie, XVI. 11., Malvaceae-Dombeyaceae.

Burchellii DC., Burchell's, f. t. w. Cap der gut. H.

Erythroxyton RB., Rothholz-M., f. w. St. Helena.

Melanoxyton RB., Schwarzholz-M., f. w. St. Helena.

Melia L., Zedrach, XVI. VI. (X. 1.), Hesperideae-Meliaceae.

australis Swt., neuholländischer, f. t. Neusüdwallis.

Azadirachta L., ostindischer, f. w. Ostindien.

Azedarach L., glatter, f. k. Sicilien, Dalmatien, Syrien, Ostindien.

composita W., zusammengesetztblättriger, f. t. w. Ostindien, Teneriffa.

guinensis G. Don, guineischer, f. w. Guinea.

robusta Roxb., rüstiger, f. w. Ostindien.

sempervirens Sw., immergrüner, f. w. Jamaica.

superba Roxb., stolzer, f. w. Ostindien.

Melianthus T., Honigblume, XIV. II., Zygophylleae.
 comosus Vahl, schuppiger, $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. k. Cap der gut. H.
 major L., großer, $\frac{1}{2}$. k. Cap der guten Hoffnung.
 minor L., kleiner, $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. k. Cap der guten Hoffnung.

Melica L., Perlgras, III. II., Gramineae.

altissima L. (*sibirica* Lam.), hohes, 4. f. Ungarn, Caucasus, Sibirien.

aspera Dsf. (*ramosa* Vill, *pyramidalis* Lam., *minuta* Bertol.), rauhes, 4. f. Südfrankreich, Italien, Griechenland.

Bauhini All. (*setacea* P., *pyramidalis* Dsf.), Bauhin's, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.

ciliata L., gefranztes, 4. f. Mittel- und Südeuropa, Sibirien, Persien.

major Sm., großes, 4. f. ? Griechenland.

nutans L., nickendes, 4. f. Europa.

speciosa Mühlbg. (*altissima* β . W., *glabra* Mchx., *rari-flora* Schrbr.), prächtiges, 4. f. Nordamerika.

uniflora Retz (*Lobellii* Vill.), einblumiges, 4. f. Europa, Orient.

coerulea L. v. *Molinia coerulea*.

Melichrus RB., Honigstrauch, V. I., Epacrideae.

medius Cunn., mittlerer, $\frac{1}{2}$. t. Neuholland.

rotatus RB., radförmiger, $\frac{1}{2}$. t. Neuholland.

Melicocca L., Honigbeere, VIII. I., Sapindaceae.

bijuga L., zweipaarige, $\frac{1}{2}$. w. Westindien.

olivaeformis H. B. K., olivenähnliche, $\frac{1}{2}$. w. Westindien.

paniculata Juss., rispige, $\frac{1}{2}$. w. St. Domingo.

trijuga Juss., dreipaarige, $\frac{1}{2}$. w. Ceylon, Molucken.

Melicope Forst., Honigraute, VIII. I., Tricoccae-Rutaceae.

ternata Forst., dreizählige, $\frac{1}{2}$. t. k. Neuzeeland.

Melilotus T., Steinklee, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

arguta Rchb. (? *altissima* Hornem.), hoher, $\frac{1}{2}$. f. Mittel- und Westeuropa.

* arborea Castagn., strauchartiger, $\frac{1}{2}$. f. Türkei.

Besseriana Sering. (*plicata* Stev.), Besser's, $\frac{1}{2}$. f. Taurien.

Boumeti Hornem., Boumeti's, $\odot$. f. ?

coerulea Desr., blauer, $\odot$. f. Mittel- und Südeuropa, Caucasus, Nordafrika.

β) connata Bernh. γ) procumbens Bess.

dentata P. (WK.), gezähnelter, $\frac{1}{2}$. f. Mittel- und Osteuropa, caspisches Meer.

β) Kochiana Hayne.

globulosa Stev., kugelförmiger, $\odot$. f. Osteuropa.

gracilis DC. (*neapolitana* Tenor.), schlanker, $\odot$. f. Frankreich, Italien.

hamosa MB. (*uncinata* Bess.), hakenförmiger, $\odot$. f. Caucasus.

indica Desr., indischer, $\odot$. f. Ostindien.

italica Lam. (*rotundifolia* Ten.), italienischer, $\odot$. f. Italien.

linearis Cav. P., gleichbreitblättriger, $\odot$. f. Süd- und Westeuropa.

longifolia Tenor., langblättriger, $\odot$. f. Italien.

melanosperma Bess., schwarzfrüchtiger, $\frac{1}{2}$. f. Taurien.

Melilotus

messanensis Desr., sicilianischer, ☉. f. Sicilien, Nordafrika.

officinalis Lam., gebräuchlicher, ♂. f. Europa, Mittelasien, Afrika, Nordamerika.

β) *macrorrhiza* (WK.) γ) *palustris* (WK.)

pallida Bess., bleicher, ♂. f. Volhynien.

parviflora Dsf. (*Baumerti* Hortul.), kleinblumiger, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika, Caucasus.

β) *rugulosa* W.

Petitpierreana Hayne (*diffusa* Koch, *expansa* Hortul., *Kochiana* DC., *arvensis* Wallr.), Petitpierre's, ♂. f. Europa.

β) *albiflora* Koch (? *altissima* Thuill.).

polonica Desr., polnischer, ☉. f. Polen.

ruthenica MB. (*wolgica* Poir.), russischer, ☉. f. Südrussland.

segetalis Sering., Saat-St., ☉. f. Spanien.

suaveolens Ledeb., starkriechender, ♂. 4. f. Sibirien.

sulcata P. (*mauritanica* P.), gefurchter, ☉. f. Nordafrika.

taurica MB., taurischer, ♂. f. Taurien.

vulgaris W. (*alba* Thuill., *leucantha* Koch), gemeiner, ♂. f. Europa.

Ungewisse: *furcata* Hort., *imbricata* ? Bess.

cretica Dsf. vid. *Pocockia cretica*. *ornithopodioides* Lam. v. *Trigonella ornithopod.* *sibirica* Poir. vid. *Medicago sibirica*.

Melissa T., Melisse, XIV. 1., Labiatae.

altissima Sm., hohe, 4. f. Italien, Griechenland.

cordifolia P. (*hirsuta* Balb.), herzblättrige, 4. f. Südeuropa.

officinalis L., officinelle, 4. f. Südeuropa.

b) *romana* Hort.

? *polyanthos* Lodd., vielblumige, 4. f. ?

Calamintha L. etc. v. *Calamintha officinalis* etc.

Melittis L., Immenblatt, XIV. 1., Labiatae.

grandiflora Sm., großblumiges, 4. f. Mittel- und Südeuropa, England.

Melissophyllum L., melissenblättriges, 4. f. Ost- und Südeuropa.

β) *album*.

Melocactus C. Bauh., Melonendistel, XII. 1., Cactaeae.

amoenus Hffgg. (*communis Jördensii* Otto, *rubens* Hort.), liebliche, ♀. w. Columbia.

atrosanguineus H. Berol., dunkelblutrothe, ♀. w. St. Thomas.

communis DC., gemeine, ♀. w. Westindien.

β) *macrocephalus* H. Berol. γ) *oblongus* H. Berol.

δ) *viridis* H. Berol. ε) *laniferus* H. Berol. ζ)

havannensis H. Berol. η) *Grengelii* H. Dresd.

θ) *conicus* Pfr.

curvispinus H. Berol., krummstachelige, ♀. w. Mexico.

macracanthus Salm, großstachelige, ♀. w. Westindien.

mammillariaeformis Salm, zitzenförmige, ♀. w. Mexico.

meonacanthus Lk. et Otto, gelbstachelige, ♀. w. Jamaica.

Miqueuli Lehm., Miquel's, ♀. w. Westindien.

placentiformis Lehm. (*Besleri* Lk. et Otto), kuchenförmige, ♀. w. Mittägliches Brasilien.

pyramidalis Salm, pyramidale, ♀. w. Caracas.

Melocactus

rubens Pfr., röthliche, ♀. w. Westindien.

Salmianus Otto, Salm's, ♀. w. Caracas.

spatangus H. Berol., langstachelige, ♀. w. Caracas.

violaceus Pfr., violette, ♀. w. Brasilien.

ambiguus Hort. (*elegans* Hort.) v. *Echinocactus leucanthus*. *Besleri affinis* Hort. v. *Echinocactus spiralis*. *Gilliesii* Hort. v. *Echinoc. formosus. ingens* Karw., *Langsdorffii* DC. vid. *Echinoc. ingens et Langsdorffii*. *latispinus* Hort. v. *Echinoc. cornigerus. monoclonos* Plum. vid. *Cereus monoclonos* Nachtr. *polyacanthus* DC., *Sellowii* DC. v. *Echinocactus polyac.* etc.

Melocanna Trin., Melonenrohr, VI. 1., Gramineae.

bambusoides Trin., bambusaähnliches, ♀. w. Ostindien.

humilis Trin., niedriges, ♀. 4. w. Amboina.

Melochia L. (arabischer Name), XVI. 11., Malvaceae-Hernandiaceae.

parviflora H. B. K., kleinblumige, ♀. w. Caracas.

parvifolia H. B. K., kleinblättrige, ♀. w. Südamerika, Trinidad.

pyramidata L., pyramidale. ♀. w. Westindien, Südamerika.

tomentosa L., filzige, ♀. w. Westindien.

β) *frutescens* Jacq.

caracasana Jacq. W. etc. v. *Riedleia caracasana* etc.

Melodinus Forst., Beerendrehler, V. 11., Contortae-Apocynae.

monogynus Carey, Roxb., einweibiger, ♀. Sch. w. Ostindien.

scandens Forst., windender, ♀. Sch. w. Neucaledonien.

Melothria L., Kümmerling, XXI. 11., Cucurbitaceae.

foetida Desr., stinkender, ☉. w. f. m. Guinea.

pendula L., hängender, ☉. Sch. f. m. Westindien, Nordamerika.

Melvilla speciosa Andr. v. *Cuphea Melvilla*.**Memecylon** L., Beerenbaum, VIII. 1., ? Melastomaceae-Memecyleae.

capitellatum L., kopfblumiger, ♀. w. Ceylon.

edule Roxb., genießbarer, ♀. w. Ostindien.

Meniocus Desv., Mondschötchen, XV. 11., Cruciferae.

linifolius Desv., DC., gleichbreitblättriges, ♂. f. b. k. Taurien, Caucasus.

Meniscium Schreb., Mondfarn, XXIV. 1., Pteridoideae.

palustre Radd., Sumpf-M., 4. w. Brasilien.

proliferum Sw., sprossender, 4. w. Ostindien.

reticulatum Sw., netzförmiger, 4. w. Westindien.

sorbifolium W., ebereschblättriger, 4. w. Westindien, Brasilien.

triphyllum Sw., dreiblättriger, 4. w. Ostindien, China.

Menispermum T., Mondsame, XXII. x. (VI. 11.), Menispermeae.

canadense L., canadischer, ♀. Sch. f. Nordamerika.

davuricum DC., dahurischer, ♀. Sch. f. Dahurien.

Lyoni Pursh, Lyon's, ♀. Sch. f. Nordamerika.

smilacinum DC., smilaxähnlicher, ♀. Sch. k. Carolina.

virginicum L., virginischer, ♀. Sch. f. Nordamerika.

Menispermum

Cocculus W. vid. *Cocculus Pluknetii. fenestratum*
 G. v. *Coscinium fenestratum. polycarpon* Roxb. v.
Tiliacora racemosa.

Menochilus Fisch. et Mey., Stahlkraut, XIV. 1.,
 Verbenaceae.

gloxinifolius Fisch. et Mey., gloxinienblättriges, 4. w.
 Brasilien.

Menonvillea DC., Menonvillea, XV. 11., Cruciferae.

filifolia Fisch. et Mey., fadenblättrige, ☉. f. Chili.

linearis DC., schmalblättrige, ☿. k. t. Peru, Chili.

Mentha T. (et *Pulegium* Bauh.), Münze, XIV. 1., La-
 biatae.

acutifolia Sm., spitzblättrige, 4. f. England, Deutschl.

aquatica L. (*palustris* Mill., *intermedia* et *purpurea* Host.),
 Wasser-M., 4. f. Europa.

β) *hirsuta* L.

arvensis L. (*agrestis* Sol.), Acker-M., 4. f. Europa.

β) *gentilis* Sm. γ) *praecox* Sole.

Auricularia L., geöhrte, 4. w. Ostindien.

australis RB., neuholländische, 4. k. Neuholland.

balsamea W., balsamduftende, 4. f. Südeuropa.

blanda Wall., liebliche, 4. k. f. Nepal.

borealis Mchx., nördliche, 4. f. Nordamerika.

brevispicata Lehm., kurzährige, 4. f. Sibirien.

canadensis L., canadische, 4. f. Canada.

cervina L., Hirsch-M., 4. f. Südfrankreich.

citrata Ehrh. (*odorata* Sm., *adspersa* Mch.), citronen-
 duftende, 4. f. England, Mittel- und Südeuropa.

coccinea Roxb., scharlachfarbige, 4. w. Ostindien.

crenata Beck., gekerbte, 4. f. Mitteldeutschland.

crispa L., krause, 4. f. Schweiz, Deutschland.

crispata Schrad. (*hercynica* Röhl.), gekräuselte, 4. f.
 Deutschland.

divaricata Lagasc., ausgespernte, 4. f. Spanien.

elegans Lej., zierliche, 4. f. Belgien.

emarginata Rchb., ausgerandete, 4. f. Südeuropa.

gentilis L. (*rubra* Huds., *pratensis* Sole, *gracilis* Sm.),
 Garten-M., 4. f. Mitteleuropa, England.

gibraltarica W., gibraltarische, 4. f. Spanien.

glabrata Vahl (*kahirina* Forsk.), kahle, 4. f. Aegypten.

gratissima Wigg. (*sapida* Tausch, *Halleri* Gmel.), an-
 genehme, 4. f. Deutschland.

hirta W. (*longifolia* Morett., *dumetorum* Schult.), kurz-
 haarige, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

incana W., weißsgraue, 4. f. Südeuropa.

intermedia N. E., mittlere, 4. f. Mitteldeutschland.

laevigata W., glatte, 4. f. ?

lapponica Wahlbg. (? *badensis* C. C. Gmel.), lappländische,
 4. f. Lappland, ? Pfalz.

lavandulacea W. (*capensis* Thbg.), lavendelblättrige, 4.
 f. Spanien, Cap der guten Hoffnung.

nepetoides Lej. (*aquatica sylvestris* Mey., *subspicata*
 Beck), nepetaähnliche, 4. f. Belgien, Hannover etc.

niliaca Jacq., aegyptische, 4. f. Aegypten.

organoides Ten., dostenähnliche, 4. f. Neapel.

Pimentum N. E., gewürzhafte, 4. f. Mitteldeutschland.

piperita L., Pfeffer-M., 4. f. England.

Mentha

pubescens W. (*pyramidalis* N. E.), weichhaarige, 4. f.

Mittel- und Südeuropa.

Pulegium L., Polei-M., 4. f. Europa.

pyramidalis Tenor., pyramidale, 4. f. Italien.

Requieni Benth., Requien's, 4. f. Corsica.

rivalis Sm., Bach-M., 4. f. England.

rotundifolia L. (*rugosa* Lam., Roth, *suaveolens* Ehrh.),

rundblättrige, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

β) *macrostachya* Tenor. γ) *neglecta* Tenor.

sativa L. (*palustris* Mch., *verticillata* Roth, *organifolia*, *tortuosa*, *maculata*, *serotina*, *nemorosa*, *longifolia*, *alata*, *carniolica*, *viridula*, *nitida*, *montana* et *sylvatica* Host.), gebaute, 4. f. Europa.

β) *rubra* Sm. γ) *dentata* Mch. δ) *parviflora* Schultz (*austriaca* Jacq.).

sylvestris L., Wald-M., 4. f. Europa.

β) *canescens* Roth, γ) *candicans* Crtz. δ) *velutina* Lej. ε) *mollissima* Borckh. (*chalepensis* Mill.) ζ) *nemorosa* W. (*serotina* Tenor., *reflexifolia* Opitz.).

tenuis Mchx. (*viridis* Walt.), dünne, 4. f. Nordamer.

undulata W. (*gratissima* Roth, *tomentosa* Hoppe, *foliosa* Op., *hybrida* Schlchr.), wellenförmige, 4. f. Südeuropa.

urticaefolia Tenor., nesselblättrige, 4. f. Neapel.

villosa Sm., zottige, 4. f. England.

viridis L., grüne, 4. f. Europa.

blanda Lindl. vid. *Aphanochilus incisus*. *pumila*

Grah. et *quadrifolia* Roxb. v. *Dysophylla pumila* etc.

Mentzelia Plum. (C. Mentzel, Leibarzt des Churfürsten von Brandenburg), XII. 1., Loasaceae.

aspera L., rauhe, 4. f. w. Westindien.

hispida W., steifhaarige, 4. f. t. Mexico.

oligosperma Sims, wenigsamige, 4. Kn. t. k. Louisiana.

stipitata DC., gestielte, 4. t. Mexico.

Menyanthes T., Zottenblume, V. 1., Contortae-Gentianeae.

americana G. Don (*trifoliata* Mchx.), amerikanische, 4. Wa. f. Nordamerika.

trifoliata L., dreiblättrige (Fieberklee), 4. Wa. f. Europa.

indica L., *nymphoides* L. etc. v. *Villarsia indica* etc.

Menziesia Sm. (A. Menzies, schottländischer Botaniker und Reisender), VIII. 1., Ericaceae.

ferruginea Sm., rostfarbige, 4. f. b. Nordamerika.

globularis Salisb. (*Smithii* Mchx., *pilosa* Juss.), kugelblumige, 4. f. b. Nordamerika.

Bruckenthalii Baumg. v. *Bruckenthalia spiculiflora* Nachtr. *bryantha* Sw. v. *Bryanthus* Gmelini Nachtr. *coerulea* Sw. (et *empetriformis* Sm.) v. *Phyllodoce taxifolia* etc. *polifolia* Juss. (*Daboecia* DC.) vid. *Daboecia polifolia*.

Merciera A. DC., Merciere, V. 1., Campanulaceae.

tenuifolia A. DC., feinblättrige, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Mercurialis T., Bingelkraut, XXII. VIII. (IX. II.), Tricoccae-Euphorbiaceae.

Mercurialis

ambigua L. fil., zweifelhaftes, ☉. f. Spanien, Portugal.
annua L., jähriges, ☉. f. Europa.

elliptica Lam., elliptisches, ♀. k. Balearen, Portugal, Madeira.

ovata Hoppe et Stbg., eiförmiges, 4. f. Oesterreich, Krain etc.

perennis L., dauerndes, 4. f. Europa.

tomentosa L., filziges, ♀. k. Südfrankreich, Spanien.

Merendera MB., Michelsblume, VI. III., Colchicaceae.
caucasica MB., caucasische, 4. Zw. f. Caucasus.

sobolifera Fisch. et Mey., sprossende, 4. Zw. f. Nordpersien.

Bulbocodium Ram. v. *Colchicum montanum*.

Meriania Sw. (M. S. Merian, berühmte Insecten- und Pflanzenmalerin), X. I., Melastomaceae.

coccinea Sw., scharlachfarbige, ♀. w. Jamaica.

leucantha Sw., weisblumige, ♀. w. Jamaica.

purpurea Sw., purpurrothe, ♀. w. Jamaica.

Mertensia H. B. K. (Mertens, Director der Handelsschule zu Bremen, ausgezeichnete Botaniker), V. II. (XXIII. I.), Urticaceae.

iguanea H. B. K., westindische, ♀. w. Jamaica.

laevigata H. B. K., glatte, ♀. w. Mexico.

pulmonarioides Roth v. *Platynema pulchrum*. Hinsichtlich der übrigen s. *Gleichenia*.

Mesembrianthemum Dill., Zaserblume (Mittagsblume), XII. II., Aizoideae-Ficoideae.

abbreviatum Haw., abgekürzte, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

acinaciforme L., säbelblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *longum* Haw.

acuminatum Haw., zugespitzte, ♀. k. Cap der gut. H.

acutum Haw., spitzige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

adscendens Haw., aufsteigende, ♀. k. Cap der gut. H.

aduncum Haw., hakiggekrümmte, ♀. k. Cap d. gut. H.

aequilaterum Haw., gleichseitige, ♀. k. Cap d. gut. H.

agninum Haw., lammrachenartige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *minus* Haw. γ) *erectiusculum* Haw.

Aitoni Jacq. (*papulosum* Ait.), Aiton's, ♂. k. Cap der guten Hoffnung.

albicaule Haw., weisstengelige, ♀. k. Cap der gut. H.

albidum L., weisliche, 4. ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

albinotum Haw., weismarkirte, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

albipunctatum Haw., weispunktirte, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

aloides Haw., aloeähnliche, 4. ♀. k. Cap der gut. H.

alsinefolium Hort., alsineblättrige, ☉. f. m. ? Neuholl.

anatomicum Haw., durchscheinendblasige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *fragile* Haw.

anceps Haw., zweischneidige, ♀. k. Cap der guten H.

β) *pallidum* Haw.

angustum Haw., schmale, 4. ♀. k. Cap der guten H.

β) *pallidum* Haw. γ) *heterophyllum* Jacq.

anomalum W., abweichende, ♀. k. Cap der guten H.

Mesembrianthemum

apetalum Ait. (*copticum* Jcq.), kronenlose, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

asperum Haw., rauhe, ♀, k. Cap der guten Hoffn.

β) *coerulescens* Haw.

attenuatum Haw., verdünnte, ♀, k. Cap der gut. H.

aurantium Haw., orangefarbige, ♀, k. Cap der gut. H.

aureum Ait., goldfarbige. ♀, k. Cap der guten Hoffn.

australe Ait. (*demissum* W.), neuseeländische, ♀, k.

Neuseeland.

barbatum L., bärtige, 4. ♀, k. Cap der guten Hoffn.

bellidiflorum L., maßliebenblumige, 4. ♀, k. Cap der guten Hoffnung.

β) *subulatum* Mill. γ) *viride* Haw.

bibracteatum Haw., paardeckblättrige, 4. ♀, k. Cap der guten Hoffnung.

bicolorum L., zweifarbige, ♀, k. Cap der gut. Hoffn.

β) *patulum* Haw. γ) *minus* Haw.

bidentatum Haw., zweizähnige, ♀, ♀. Cap der gut. H.

β) *majus* Haw.

bifidum Haw., weispaltige, 4. ♀, k. Cap der gut. H.

bigibberatum Haw., zweihöckerige, ♀, k. Cap d. g. H.

blandum Haw., liebliche, ♀, k. Cap der guten Hoffn.

brachiatum Haw., armförmige, ♀, k. Cap der gut. H.

bracteatum L., deckblättrige, ♀, k. Cap der gut. H.

brevicaule Haw., kurzstengelige, ♀, k. Cap d. gut. H.

brevifolium Ait., kurzblättrige, ♀, k. Cap der gut. H.

bulbosum Haw., zwiebförmige, ♀, k. Cap der gut. H.

caducum Ait., hinfällige, ☉. f. m. Cap der gut. Hoffn.

calamiforme L., federkielartige, 4. ♀, k. Cap der guten Hoffnung.

calendulaceum Haw., ringelrosenähnliche, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

calycinum Haw., langkelchige, ♀, k. Cap der gut. H.

canaliculatum Haw. (*repens* Salm.), rinnenförmige, ♀, k. Cap der guten Hoffnung.

candens Haw., weißglänzende, ♀, k. Cap der gut. H.

β) *viridius* Haw.

caninum Haw., hunderachenartige, 4. ♀, k. Cap der guten Hoffnung.

canum Haw., weißgraue, 4. ♀, k. Cap der guten H.

capitatum Haw., kopfförmige, ♀, k. Cap der guten H.

β) *ramigerum* Haw.

carinans Haw., kielförmige, 4. ♀, k. Cap der gut. H.

caulescens Haw., langstengelige, ♀, k. Cap der gut. H.

ciliatum Ait., gefranzte, ☉. f. m. Cap der gut. Hoffn.

clandestinum Haw., heimlichblühende, ♀, k. Cap der guten Hoffnung.

clavatum Jacq., keulstielige, ♀, k. Cap der guten H.

clavellatum Haw., keulblättrige, ♀, k. Neuholland.

β) *minus* Haw. γ) *aggregatum* Haw.

coccineum Haw. (*bicolorum* β. W.), scharlachfarbige, ♀, k. Cap der guten Hoffnung.

β) *acutius* Haw. γ) *minus* Haw.

compactum Ait., dichte, 4. ♀, k. Cap der gut. Hoffn.

compressum Haw., plattstielige, ♀, k. Cap d. gut. H.

confertum Haw., gedrängte, ♀, k. Cap der gut. Hoffn.

conspicuum Haw., ansehnliche, ♀, k. Cap der gut. H.

copticum L., coptische, ☉. f. m. Aegypten.

Mesembrianthemum

corallinum Thbg., korallenförmige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

cordifolium L., herzblättrige, ♂. ♀. k. Cap d. gut. H.

corniculatum L., gehörnte, 4. ♀. k. Cap der gut. H.
β) isophyllum DC.

cornutum Salm., hornförmige, ♀. k. Cap der gut. H.

coruscans Haw., schimmernde, ♀. k. Cap der gut. H.

crassicaule Haw., dickstengelige, ♀. k. Cap d. gut. H.

crassifolium L., dickblättrige, ♀. k. Cap der gut. H.

crassuloides Salm. (*crassulinum* Spgl.), crassulaähnliche, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

croceum Jacq., safranfarbige, ♀. k. Cap der gut. H.

cruciatum Haw., kreuzblättrige, ♀. k. Cap d. gut. H.

crystallinum L., krystallartige (Eiskraut), ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

cultratum Salm., messerförmige, 4. ♀. k. Cap d. g. H.

curtum Haw., kurze, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) majus Haw. γ) politum Haw. δ) minus Haw.
curvifolium Haw. (*ceratophyllum* W.), gekrümmtblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

cylindricum Haw., cylinderförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

cymbifolium Haw., cymbelblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

cymbiforme Haw., cymbelförmige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

debile Haw., schwache, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

decipiens Haw., täuschende, 4. ♀. Cap der guten H.

decumbens Haw., niederliegende, ♀. k. Cap d. gut. H.

deflexum Haw., herabgebogene, ♀. k. Cap der gut. H.

defoliatum Haw., entblättrte, ♀. k. Cap der gut. H.

deltoides Haw., deltablättrige, ♀. k. Cap der gut. H.

densum Haw., dichtblättrige, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.

denticulatum Haw., gezähnelte, 4. ♀. k. Cap d. g. H.
β) glaucum. γ) candidissimum.

depressum Haw., niedergedrückte, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) lividum Haw.

difforme L., ungleichförmige, ♀. k. Cap der gut. H.

digitiforme Thbg. (*digitatum* Ait.), fingerförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

dilatatum Haw., erweiterte, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

diminutum Haw., kleinliche, 4. ♀. k. Cap der gut. H.

β) cauliculatum Haw.

diversifolium Haw., verschiedenblättrige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung,

β) glaucius Haw. γ) brevifolium Haw. δ) laetevirens Haw. ε) atrovirens Haw.

dolabriforme L., hobelförmige, ♀. k. Cap der gut. H.

dubium Haw., zweifelhafte, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

echinatum L., igelstachelige, ♀. k. Cap der gut. H.

β) album Haw.

edule L., genießbare, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

elegans Jacq., zierliche, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

effusum Salm (*geminatum* Jacq., *bracteatum* W.), ergossene, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

elongatum Haw., verlängerte, ♀. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.

β) minus Haw. γ) fusiforme Haw.

Mesembrianthemum

emarginatum L. (*roseum* W.), ausgerandete, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

erectum Lk., aufrechte, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffn.

ermineum Haw., hermelinrachenartige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

expansum L. (*tortuosum* DC.), ausgestreckte, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

falcatum L., sichelblättrige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

falciforme Haw., sichelförmige, ♀. k. Cap der gut. H.

fastigiatum Haw., gipfelständige, ♀. k. Cap d. gut. H.

β) *reflexum* Haw.

felinum Lam., katzenrachenförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

fibulaeforme Haw., schnallenförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

ficiforme Salm., feigenförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

filamentosum L., fadige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

filicaule Haw., fadenstengelige, ♀. k. Cap d. gut. H.

fissum Haw., gespaltene, 4. ♀. k. Cap der guten H.

flavum Haw., hellgelbe, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

flexifolium Haw., biegsamblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *laetevirens* Haw.

flexile Haw., biegsame, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

flexuosum Haw., gebogene, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

floribundum Haw. (*hispidum* β. W.), blüthenreiche, ♀. k.

Cap der guten Hoffnung.

foliosum Haw., blattreiche, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

forficatum L., scheerenförmige, ♀. k. Cap der gut. H.

formosum Haw., schöne, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

fragrans Salm., wohlriechende, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

fulvum Haw., gelbrothe, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

furfureum Haw., kleiige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

geminatum Haw., gepaarte, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

b) *albiflorum*.

geniculiflorum L., gelenkblumige, ☉, ♀. f. m, k. Cap der guten Hoffnung.

gibbosum Haw., höckerige, 4. ♀. k. Cap der gut. H.

glaciale Haw., Gletscher-Z., ☉. f. k. Cap der gut. H.

glaucescens Haw., blaugrünliche, ♀. k. Cap der gut. H.

glaucinum Haw., grünlichgraue, ♀. k. Cap der gut. H.

glaucum L., meergrüne, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

β) *crassum* Haw.

glomeratum L., knaulförmige, ♀. k. Cap der gut. H.

gracile Haw. (*stellatum* Haw.), schlanke, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *gracilius* Haw.

grandiflorum Haw., großblumige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

graniforme Haw., körnerförmige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

granulicaule Haw., körnerstengelige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

grossum Ait., dickstengelige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

Haworthii Donn, W., Haworth's, ♀. k. Cap d. gut. H.

helianthoides Ait. (*Candollii* Haw.), sonnenrosenähnliche, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

Mesembrianthemum

heteropetalon W., verschiedenkronige, $\S$. k. Cap der guten Hoffnung.

heterophyllum Haw., veränderlichblättrige, $\S$. k. Cap der guten Hoffnung.

hirsutum Haw. (*stellatum* DC., *barbatum* β . W.), rauhaarige, 4. $\S$. k. Cap der guten Hoffnung.

hirtellum Haw., kurzhaarige, $\S$. k. Cap der gut. H.

hispidum L., steifhaarige, $\S$. k. Cap der gut. Hoffn.

β) platypetalum Haw.

hispidifolium Haw., hackerigblättrige, $\S$. k. Cap der guten Hoffnung.

β) roseum Haw.

horizontale Haw., horizontalblättrige, $\S$. k. Cap der guten Hoffnung.

humifusum Ait., niedergestreckte, $\S$. k. Cap der guten Hoffnung.

hybridum Haw., Bastard-Z., 4. $\S$. k. Cap der gut. H.

imbricans Haw., ziegeldachblättrige, $\S$. k. Cap der guten Hoffnung.

imbricatum Haw., ziegeldachförmige, $\S$. k. Cap der guten Hoffnung.

β) medium Haw. γ) viride Haw.

inaequale Haw., ungleiche, $\S$. k. Cap der gut. Hoffn.

inclaudens Hnw., geöffnete, $\S$. k. Cap der gut. Hoffn.

incomtum Haw., ungezierte, $\S$. k. Cap der gut. Hoffn.

inconspicuum Haw., unansehnliche, $\S$. k. Cap der guten Hoffnung.

incurvum Haw., einwärtsgekrümmte, $\S$. k. Cap der guten Hoffnung.

β) dilatans Haw. γ) pallidus Haw. δ) densifolium Haw. ϵ) roseum W.

inflexum Haw., eingebogene, $\S$. k. Cap der gut. H.

insititium W. (*purpureo-croceum* Haw.), safranrothe, $\S$. k. Cap der guten Hoffnung.

β) flavo--croceum Haw. γ) minus.

intonsum Haw., ungeschorene, $\S$. k. Cap der gut. H.

β) album Haw.

junceum Haw., simsensförmige, $\S$. k. Cap der gut. H.

lacerum Haw., Salm (*acinaciforme* DC., *gladiatum* Jacq., *dimidiatum* Haw., *carinatum* Vent.), zerschlitzte, $\S$. k.

Cap der guten Hoffnung.

laeve Ait., glatte, $\S$. k. Cap der guten Hoffnung.

lanceolatum Haw., lanzettblättrige, $\odot$. f. m. Cap der guten Hoffnung.

β) roseum Haw.

latum Haw., breitblättrige, 4. $\S$. k. Cap der gut. H.

β) breve Haw.

laxum W., lockerstengelige, $\S$. k. Cap der guten H.

lepidum Haw., schülferige, $\S$. k. Cap der gut. Hoffn.

leptaleon Haw., schlanke, $\S$. k. Cap der guten Hoffn.

limpidum Ait. (*cuneifolium* Jacq.), durchscheinendwarzige, $\odot$. f. m. Cap der guten Hoffnung.

lineolatum Haw., linirte, $\S$. k. Cap der guten Hoffn.

β) minus Haw. γ) laeve Thbg. δ) nitens Haw.

linguaeforme L., zungenförmige, 4. $\S$. k. Cap der guten Hoffnung.

β) rufescens Haw. γ) subcruciatum Haw. δ) prostratum Haw. ϵ) assurgens Haw.

Mesembrianthemum

- longispinulum Haw., langstachelige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- longistylum DC. (*pallens* Jacq.), langgriffelige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- longum Haw., langzungige, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.
 α) depressum Bot. mag. β) declive Haw. γ) angustatum Haw. δ) purpurascens Haw. ε) uncatum Haw. ζ) attollens Haw.
- loratum Haw., riemenblättrige, ♀. k. Cap d. gut. H.
- loreum L., riemenförmige, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.
 β) congestum Haw.
- lucidum Mill., Haw., spiegelnde, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- lunatum W., mondförmige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
- lupinum Haw., wolfsrachenförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- luteolum Haw., gelbliche, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
- luteo-viride Haw., gelbgrüne, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.
- luteum Haw., gelbe, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- macrorrhizum Haw., grofswurzelige, ♀. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.
- maculatum Haw., gefleckte, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
- magnipunctatum Haw., grofspunktige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
 β) unciale.
- marginatum Haw., berandete, ♀. k. Cap d. gut. H.
- maximum Haw., grölste, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
- medium Haw., mittlere, 4. ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
- micans L., schillernde, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
- micranthum Haw. (*parviflorum* Jacq.), kleinblumige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- microphyllum Haw., kleinblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- Milleri W., Miller's, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
- minimum Haw., kleinste, 4. k. Cap der gut. Hoffn.
- minutum Haw., zwergige, 4. k. Cap der gut. Hoffn.
- molle Ait., weiche, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
- moniliforme Thbg., armbandförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- mucronatum Haw., weichspitzige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- mucroniforme Haw., spitzenförmige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- multiflorum Haw., vielblumige, ♀. k. Cap d. gut. H.
 β) minus Haw. γ) rubrum Haw. δ) patens Haw. ε) nitens Haw.
- muricatum Haw., weichstachelige, ♀. k. Cap d. g. H.
 β) minus Haw.
- murinum Haw., mäusezahnartige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- musculinum Haw., kleinzahnige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- mustelinum Haw., Salm, wieselzahnartige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- mutabile Haw. (*filamentosum* DC., *forficatum* Jacq.). veränderliche, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
- nitidum Haw. (*pruinatum* Thbg., *brachiatum* DC.), glänzende, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- nobile Haw., edle, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffn.

Mesembrianthemum

noctiflorum L., nachtblumige, ♀. k. Cap der gut. H.

β) stramineum Haw. γ) elatum Haw.

nodiflorum L., knotenblumige, ☉. f. m. Aegypten, Italien.

nuciforme Haw., nussförmige, 4. k. Cap d. gut. H.

obconellum Haw., verkehrtkegelförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

obcordellum Haw., verkehrtherzförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

obliquum W. (*scalpratum* Haw.), schiefblättrige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

obsubulatum Haw., verkehrtpfriemenförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

obtusum Haw., stumpfblättrige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

octophyllum Haw., achtblättrige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) longiusculum. γ) roseum.

pallens Ait. (*expansum* DC.), bleichblumige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

pallescens Haw., bleiche, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

parviflorum Haw., schmalblumige, ♀. k. Cap d. g. H.

parvifolium Haw., schmalblättrige, ♀. k. Cap d. g. H.

patens W., abstehende, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

patulum Haw., weitabstehende, ♀. k. Cap d. gut. H.

perfoliatum Mill., Haw., durchwachsene, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) monacanthum Bradl.

perpusillum Haw., niedrige, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

perviride Haw., dunkelgrüne, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.

pilosum Haw., gelbhaarige, ☉. f. m. Cap der gut. H.

pinnatifidum L., fiederspaltige, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

pisiforme Haw., erbsenförmige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

polyanthes Haw., häufigblumige, ♀. k. Cap d. gut. H.

polyphyllum Haw., vielblättrige, ♀. k. Cap d. gut. H.

pomeridianum L., nachmittägige, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

β) Andrewsii.

praepinque Haw., feiste, 4. ♀. k. Cap der gut. H.

procumbens Haw., liegende, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.

productum Haw., langkelchige, ♀. k. Cap d. gut. H.

pubescens Haw., weichhaarige, 4. ♀. k. Cap d. g. H.

puberulum Haw., feinhaarige, ♂. k. Cap der gut. H.

pugioniforme L., dolchblättrige, ♀. k. Cap d. gut. H.

β) carneum Haw. γ) purpureum Haw. δ) bienne Haw.

pulchellum W. (*canescens* Haw.), schöne, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

β) revolutum Haw.

pulverulentum Haw., bestäubte, ♀. k. Cap der gut. H.

punctatum Haw., punktirte, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.

puniceum Jacq., hochrothe, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

purpurascens Salm, purpurfarbige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

purpureo-album Haw., weißpurpurfarbige, 4. ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

pustulatum Haw., blättrige, 4. ♀. k. Cap der gut. H.

Mesembrianthemum

pygmaeum Haw., zwergstrauchige, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

quadrifidum Haw., vierspaltige, ⚭. k. Cap der gut. H.

radiatum Haw., strahlige, ⚭. k. Cap der gut. Hoffn.

ramulosum Haw., ästige, ⚭. k. Cap der guten Hoffn.

rectum Haw., gerade, ⚭. k. Cap der guten Hoffn.

reflexum Haw., zurückgebogene, ⚭. k. Cap d. gut. H.

relaxatum Haw., schlaffe, ⚭. k. Cap der gut. Hoffn.

reptans Ait., kriechende, ⚭. k. Cap der guten Hoffn.

retroflexum Haw., zurückgeschlagene, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

rigidicaule Haw., starrstengelige, ⚭. k. Cap d. gut. H.

rigidum Haw., starre, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

robustum Haw., starke, 4. ⚭. k. Cap der gut. Hoffn.

roseum Haw., rosafarbige, ☉. f. m. Cap der gut. H.

β) lineare Thbg. γ) album.

Rossi Haw., Ross's, ⚭. k. Van-Diemens-Land.

rostellum Haw., kleinschnabelige, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

rostratum Haw., schnabelförmige, 4. ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

rubricaule Haw., rothstengelige, ⚭. k. Cap d. gut. H.

β) densius Haw. γ) subvirens Haw.

rubrocinctum Haw., rothrandige, ⚭. k. Cap d. gut. H.

β) compressum Haw. γ) tenerum Haw.

rufescens Haw., fuchsrothe, 4. ⚭. k. Cap der gut. H.

Salmii Haw., Salm's, ⚭. k. Cap der guten Hoffn.

β) semicruciatum Salm. γ) angustifolium Haw.

salmoneum Haw., lachsfarbige, ⚭. k. Cap der gut. H.

sarmentosum Haw., wurzelrankige, ⚭. k. Neuholland.

scabrum L., scharfe, ⚭. k. Cap der guten Hoffn.

β) purpureum Haw.

scapigerum Haw., schafttragende, 4. ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

Schollii Salm. (*aduncum* Jacq., *racemosum* Haw.), Scholl's, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

semicylindricum Haw., halbrundblättrige, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

semidendatum Salm., halbgezahnte, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

serratum L., sägezähnige, ⚭. k. Cap der gut. Hoffn.

serrulatum Haw., feinzähnige, ⚭. k. Cap der gut. H.

β) viridius Haw.

sessiliflorum Ait., stiellosblumige, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

β) album Haw.

simile Haw., ähnelnde, ⚭. k. Cap der guten Hoffn.

spathulatum W., spatelförmige, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

speciosum Haw., prächtige, ⚭. k. Cap der gut. Hoffn.

spectabile Haw., ansehnliche, ⚭. k. Cap der gut. H.

spiniforme Haw., stachelästige, ⚭. k. Cap der gut. H.

β) subaduncum Haw.

spinosum L., dreistachelige, ⚭. k. Cap der guten H.

spinuliferum Haw. (*sordidum* DC.), blätterstachelige, ⚭. k. Cap der guten Hoffnung.

splendens L., glänzende, ⚭. k. Cap der guten Hoffn.

Mesembrianthemum

stelligerum Haw., sternbartige, ⚥. k. Cap der gut. H.
 stenum Haw., schmale, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.
 stipulaceum L., zwischenblättrige, ⚥. k. Cap der
 guten Hoffnung.

stramineum W. (*tricolor* Haw.), strohfarbige, ⚥. k. Cap
 der guten Hoffnung.

sriatum Haw., gestreifte, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.
 β) pallens.

strictum Haw., steife, ⚥. k. Cap der guten Hoffn.

strumosum Haw., kropfige, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

subcompressum Haw., platte, ⚥. k. Cap der gut. H.

β) minus Haw.

subglobosum Haw. (*capillare* Thbg.), kugelblättrige, 4.
 ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

subhispidum Haw., feinhakige, ⚥. k. Cap der gut. H.

subincanum Haw., grauhaarige, ⚥. k. Cap der gut. H.

subrostratum W. (*rostratoides* Haw.), schnabelblättrige,
 4. ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

subulatum Haw. (*bellidiflorum* DC.), pfriemenförmige,
 4. ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

sulcatum Haw., gefurchte, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

surrectum Haw., aufgerichtete. ⚥. k. Cap der gut. H.

β) brevifolium Haw.

taurinum Haw., oxsenhörnige, ⚥. k. Cap der gut. H.

tenellum Haw., zärtliche, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

tenue Haw., dünne, ⚥. k. Cap der guten Hoffn.

tenuiflorum Jacq., dünnblumige, ⚥. k. Cap d. gut. H.

tenuifolium L., dünnblättrige, ⚥. k. Cap der gut. H.

β) erectum Haw.

teretifolium Haw., rundblättrige, 4. ⚥. k. Cap der
 guten Hoffnung.

teretiusculum Haw., rundliche, 4. ⚥. k. Cap der
 guten Hoffnung.

testaceum Haw., scherhengelbe, ⚥. k. Cap der gut. H.

testiculare Ait., hodenförmige, 4. ⚥. k. Cap d. g. H.

tigrinum Haw., getigerte, 4. ⚥. k. Cap der gut. H.

torquatum Haw., gedrehte, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

tortuosum L., gewundene, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

tricolorum W., dreifarbige, ☉. f. m. Cap der gut. H.

Tripolium L., asterblättrige, ♂. ⚥. k. Cap der g. H.

truncatellum Haw., kurzstämmige, 4. ⚥. k. Cap der
 guten Hoffnung.

tuberculatum Mill., DC., kleinhöckerige, 4. ⚥. k. Cap
 der guten Hoffnung.

tuberosum L., knollige, ⚥. Kn. k. Cap der gut. H.

tumidulum Haw., angeschwollene, ⚥. k. Cap der
 guten Hoffnung.

β) minus Haw.

umbellatum L., doldige, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

β) anomalum W.

umbelliflorum Jacq., doldenblumige, ⚥. k. Cap der
 guten Hoffnung.

uncinatum Haw., hakiggekrümmte, ⚥. k. Cap der
 guten Hoffnung.

uncinellum Salm, kurzhakige. ⚥. k. Cap der gut. H.

unidens Haw., einzahnige, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

uvaeforme Haw., traubenförmige, 4. ⚥. k. Cap d. g. H.

vaginatum Haw., scheidige, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.

β) parviflorum Haw.

Mesembrianthemum

unidens Haw., einzahnige, f. k. Cap der gut. Hoffn.
variabile Haw., veränderliche, f. k. Cap der gut. H.

β) *laevius* Haw.

varians Haw., ändernde, f. k. Cap der guten Hoffn.
verruculatum L., kleinwarzige, f. k. Cap der gut. H.
 β) *Candollii* Loud.

versicolor Haw., verschiedenfarbige, f. k. Cap der guten Hoffnung.

villosum L., zottige, f. k. Cap der guten Hoffn.

violaceum DC., violette, f. k. Cap der guten Hoffn.

virens Haw., grünende, f. k. Cap der guten Hoffn.

virescens Haw., grünliche, f. k. Cap der guten Hoffn.

virgatum Haw., ruthenförmige, f. k. Cap d. gut. H.

viride Haw., grünblättrige, f. k. Cap der gut. Hoffn.

viridiflorum Ait., grünblumige, f. k. Cap der gut. H.

vulpinum Haw., fuchsrachenartige, 4. f. k. Cap der guten Hoffnung.

glabrum Ait. v. *Hymenogyne glabra*.

Mespilus T., Mispel, XII. II., Rosaceae-Pomaceae.

germanica L., gemeine, f. f. Europa, Mittelasi.

a) *sylvestris* Mill. β) *stricta* DC. γ) *diffusa* DC.

Smithii DC. (*grandiflora* Sm., *lobata* Poir.), Smith's, f. f. ? Levante.

Amelanchier L. (et *canadensis* L.) etc. v. *Amelanchier vulgaris*, *Botryapium* etc. *bengalensis* Hort. v. *Photinia dubia*. *Chamaemespilus* L. v. *Sorbus Chamaemespilus*. *Cotoneaster* L. etc. vid. *Cotoneaster vulgaris* etc. *cuneifolia* Ehrh. etc. v. *Crataegus punctata* etc. *Cuila* Hamilt. (et *japonica* Thbg.) v. *Eriobotrya elliptica* et *japonica*.

Messerschmidia L. (Messerschmid aus Danzig, welcher Sibirien in botanischer Hinsicht bereiste), V. I., Asperifoliaceae.

hirsutissima R. et S., rauhhaarige, f. w. Westindien.

laurifolia R. et S., lorbeerblättrige, f. Sch. w. Westindien.

scandens R. et S., kletternde, f. Sch. w. Peru.

volubilis R. et S., windende, f. Sch. w. Jamaica.

Arguzia L. v. *Tournefortia Arguzia*.

Metalasia RB., Metalasie, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

aurea RB., goldfarbige, f. t. Cap der guten Hoffn.

divergens D. Don, divergirende, f. t. Cap d. gut. H.

fastigiata RB., gipfelständige, f. t. Cap der gut. H.

mucronata RB., stachelspitzige, f. t. Cap der gut. H.

muricata RB., weichstachelige, f. t. Cap der gut. H.

phylicoides D. Don, phylikaähnliche, f. t. Cap der guten Hoffnung.

seriphioides RB., seriphiumähnliche, f. t. Cap der guten Hoffnung.

Metastelma RB., Glockenkrönchen, V. II., Asclepiadeae.

parviflorum RB., kleinblumiges, f. Sch. w. Westindien.

Metrosideros G., Eisenmaß, XII. I., Myrtaceae.

angustifolius Sm., schmalblättriges, f. t. k. Cap der guten Hoffnung.

glomulifer Sm., knäulförmiges, f. f. t. Cap der guten Hoffnung.

Metrosideros

verus Lindl., wahres, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

asperus Mack. Cat. v. *Callistemon rugulosus. capitatus* Sm. (et *ciliatus* Sm., *corifolius* Vent. etc.) v. *Stenospermum capitatum* etc. *costatus* G. (et *hispidus* Sm. (*hirsutus* Andr., *anomalus* Vent.) v. *Angophora lanceolata* et *cordifolia* Nachtr. *floribundus* Sm. v. *Acmena floribunda*. Hinsichtlich der übrigen s. *Callistemon*.

Metroxylon Sagus Rottb. etc. v. *Sagus Rumphii* etc.

Meum T., Bärwurz, V. II., Umbelliferae.

athamanticum Jacq., gemeine, 4. f. Mitteleuropa.

Mutellina G., Alpen-B., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

sibiricum Spgl., sibirische, 4. f. Sibirien.

Bunius Jacq. (*heterophyllum* Mch.) vid. *Ptychotis heterophylla*. *Foeniculum* Spgl. vid. *Foeniculum officinale. inundatum* Spgl. v. *Helosciadium inundatum*.

Meyera Schreb. (G. A. Meyer, wenig bekannter älterer deutscher Botaniker), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

sessilis Sw., ungestieltblumige, 4. w. Westindien.

orientalis D. Don v. *Caesulia axillaris*.

Michauxia L'Her. (A. Michaux, berühmter französischer Botaniker und Reisender), VIII. I., Campanulaceae.

campanuloides L'Her. (*strigosa* P.), glockenblumenähnliche, ♂. k. Syrien.

laevigata Vent., kahlstengelige, ♂. k. Persien.

Michelaria bromoides Dum. v. *Bromus arduennensis*.

Michelia L. (P. A. Micheli, berühmter italienischer Botaniker), XIII. VI., Magnoliaceae.

Champaca L., wohlriechende, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

Miconia R. et P. (D. Micon, spanischer Botaniker), X. I., Melastomaceae.

Acinodendron D. Don, großstrauchige, $\frac{1}{2}$ w. Westind.

angustata D. Don, verschmälerte, $\frac{1}{2}$ w. Trinidad.

decussata D. Don, kreuzständige, $\frac{1}{2}$ w. Guiana.

grandifolia D. Don, großblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Trinidad.

impetiolearis D. Don, stiellosblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Westind.

laevigata D. Don, geglättete, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.

longifolia G. Don, langblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.

prasina G. Don, grasgrüne, $\frac{1}{2}$ w. Guiana.

purpurascens D. Don, purpurfarbige, $\frac{1}{2}$ w. Guiana.

rubescens D. Don, rötliche, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.

semicrenata D. Don, halbgekerbte, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.

tenuifolia D. Don, feinblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.

tetrandra D. Don, viermännige, $\frac{1}{2}$ w. Jamaica.

trinervia D. Don, dreinervige, $\frac{1}{2}$ w. Jamaica.

Micranthemum Mchx., Kleinblümchen, II. I., Primulaceae.

orbiculatum Mchx., rundblättriges, 4. k. Carolina.

Micranthes Haw. v. *Saxifraga*.

Micranthus Poir., Schmalblümchen, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

cochinchinensis Lour., cochinchinesisches, 4. Sch. w. China, Cochinchina.

appositifolius Wendl. v. *Phaylopsis parviflora*.

Microcale Lk. et Hffg., Genzianelle, IV. I., Contortae-Gentianeae.

filiforme Lk., fadenförmige, ☉. f. Nord- und Westdeutschland, Frankreich etc.

pusilla (DC.), niedrige, ☉. f. Westeuropa.

Microchloa RB., Schmalspelzchen, III. II., Gramineae.

setacea RB., borstenförmiges, ☉. 4. f. k. Ostindien, Neuholland.

Microderis DC., Kurzhals, XIX. I., Cichoriaceae.

rigens DC. (*Crepis rigens* Ait.), starrer, 4. k. Azoren.

Microlaena RB., Schmalrispe, IV. II., Gramineae.

stipoides RB., stipaähnliche, 4. k. t. Neuholland.

Microloma RB., Schuppenkrönchen, V. II., Asclepiadeae.

lineare RB., gleichbreitblättriges, ☿. Sch. k. t. Cap der guten Hoffnung.

sagittatum RB., pfeilblättriges, ☿. Sch. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Micromeria Juliana Benth, *Tencriffae* Benth etc. vid. *Satureja Juliana* etc.

Micropera Lindl., Säckelstendel, XX. I., Orchideae.

Banksii Hook., Bank's, 4. Kn. t. w. Neuzeeland.

media RB., mittlerer, 4. Kn. t. w. Neuholland.

parviflora RB., kleinblumiger, 4. Kn. t. w. Neuholland.

Micropetalum lanuginosum P. v. *Spergulastrum lanuginosum*.

Micropus L., Falzblume, XIX. IV., Compositae-Helichryseae.

hombycinus Lag. (*erectus* Guss., *discolor* P.), wollige, ☉. f. Spanien, Sicilien.

californicus Fisch. et Mey., californische, ☉. f. Neu-Californien.

erectus L., aufrechte, ☉. f. Südeuropa.

pygmaeus Dsf., zwergige, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Nordafrika.

supinus L., liegende, ☉. f. Südeuropa.

Microseris D. Don, Hook., Zwergsalat, XIX. I., Cichoriaceae.

pygmaea Hook et Arn., chilesischer, ☉. f. Chili.

Microstephium Less., Kleinkrönchen, XIX. IX., Compositae-Corymbiferae.

niveum Less., schneeweisses, 4. ☿. k. Cap d. gut. H.

Microstylis Nutt., Kleingriffel, XX. I., Orchideae.

excavata Lindl., ausgehöhlter, 4. w. Mexico.

ophioglossoides Nutt., natterzungenähnlicher, 4. Kn. f. b. k. t. Nordamerika, Mexico.

β) mexicana Lindl.

versicolor Lindl., verschiedenfarbiger, 4. w. China.

Microtea Sw., Kleinachene, V. II., Aizoideae-Phytolacceae,

debilis Sw., schwache, ☉. w. m. f. Jamaica.

maypurensis G. Don, maypurische, ☉. w. m. f. Westindien, Südamerika.

Microtis RB., Kleinöhrchen, XX. I., Orchideae.

alba RB., weisses, 4. Kn. t. w. Neuholland.

pallida Lindl., bleiches, 4. w. Sylhet.

parviflora RB., kleinblumiges, 4. Kn. t. w. Neuhol.

Microtis

pulchella RB., schönes, 4. Kn. t. w. Neuholland.

Miersia Lindl., Miersie, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae (Gilliesiae).

chilensis Lindl., chilesische, 4. Zw. t. Chili.

Mikania W. (J. Mikan, Professor der Botanik zu Prag), XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

amara W., bittere, 5. Sch. w. Guiana, Cuba.

chenopodifolia W., gänsefußblättrige, 4. Sch. w. Guiana.

Guaco Humb., Guaco-M., 4. Sch. w. Südamerika.

hastata W., spontanblättrige, 5. Sch. w. Jamaica, Cuba.

Houstoni W., Houston's, 5. Sch. w. Neuspanien, Jamaica.

opifera Mart., opiumgebende, 4. Sch. w. Brasilien.

orinocensis H. B. K., Orinoco-M., 5. Sch. w. Südamerika.

scandens W., klimmende, 5. Sch. t. Carolina, Westind.

suaveolens H. B. K., wohlriechende, 5. Sch. w. Südamer.

Milium L., Milisgras, III. 11., Gramineae.

effusum L., ausgebreitetes, 4. f. Europa, Sibirien.

β) *confertum* Mill.

microspermum Lag., kleinsamiges, 6. f. Mexico.

vernale MB., Frühlings-M., 4. f. Taurien, Caucasus.

arundinaceum Sm. (*frutescens* Sbr.), *coerulescens* Dsf.,

multiflorum Cav. (*microspermum* Hort.) etc. vid.

Piptatherum frutescens etc, *filiforme* Roxb. vid.

Digitaria Roxburghii. *gallecicum* R. et S. v. *Airopsis Candollei*. *lendigerum* Schreb. v. *Gastridium*

australe. *punctatum* L. vid, *Oedipachne punctata*.

tenellum Cav. v. *Airopsis globosa*. *velutinum* DC.

v. ?*Digitaria ciliaris*. *villosum* Sw. vid. *Monachne*

unilateralis.

Millea Cav. (Julein Milla, Inspector des königl. Gartens zu Madrid), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

biflora Cav., zweiblumige, 4. Kn. t. k. Mexico.

uniflora Grah., einblumige, 4. Zw. t. k. Buenos-Ayres.

Milleria L. (Phil. Miller, berühmter engl. Gärtner), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

biflora L., zweiblumige, 6. w. m. f. Südamerika.

quinqueflora L. (*dichotoma* Cav., *maculata* Mill.), fünfblumige, 6. w. m. f. Südamerika.

angustifolia Cav. et *Contrayerva* Cav. vid. *Flaveria*

angustifolia etc.

Millina Cass., DC., Milline, XIX. 1., Cichoriaceae.

hyoseroides DC., hyoserisähnliche, 4. f. b. k. Creta.

leontodontoides Cass., löwenzahnähnliche, 4. f. b. k. Sicilien.

Millingtonia Roxb. (T. Millington, Professor zu Oxford), II. 1., ?Sapotaceae-Oleinae.

pinnata Roxb., gefiederte, 5. w. Ostindien.

simplicifolia Roxb., einfachblättrige, 5. w. Ostindien.

Miltonia spectabilis Lindl. v. *Macrochilus* Fryanus.**Mimetes** Salisb., RB., Mimenstrauch, IV. 1., Proteaceae.

cucullata RB., kappenförmiger, 5. t. Cap der gut. H.

divaricata RB., ausgesperrter, 5. t. Cap der guten H.

Hartogii RB., Hartog's, 5. t. Cap der guten Hoffn.

Hibbertii RB., Hibbert's, 5. t. Cap der guten Hoffn.

Mimetes

hirta RB., kurzhaariger, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
palustris Kn., sumpfliebender, ♀. t. Cap der gut. H.
pauciflora RB., wenigblumiger, ♀. t. Cap der gut. H.
purpurea RB., purpurfarbiger, ♀. t. Cap der gut. H.
thymelaeoides RB., thymelaeaähnlicher, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

vacciniifolia Sw., heidebeerenblättriger, ♀. t. Cap der guten Hoffnung,

Mimosa T., Sinnpflanze, VIII. 1. (XXIII. 1.), Leguminosae-Mimosaceae.

abstergens Roxb., dichtstachelige, ♀. w. Ostindien.

asperata L., rauhe, ♀. ♀. w. Westindien.

Barclayana Hort., Barclay's, ♀. w. ?

brasiliensis Spgl., brasilianische, ♀. w. Brasilien.

canescens W., weißgrauliche, ♀. w. Guinea.

casta L., keusche, ♀. w. Ostindien.

ciliata W., gefranzte, ♀. w. Brasilien.

dormiens H. B. K., schlafende, ♀. w. Südamerika.

ferruginea Rottl., rostfarbige, ♀. w. Ostindien.

floribunda W., blüthenreiche, ♀. w. Cumana.

Habbas Delil., ägyptische, ♀. ♀. w. Aegypten.

hispidula Humb., kackerige, ♀. w. Trinidad.

latispinosa Lam., breिटdornige, ♀. ♀. w. Madagascar.

marginata DC. (*mexicana*, *prostrata* et *scandens* Hort.), herandete, ♀. w. Südamerika.

microcephala H. B. K., kleinköpfige, ♀. w. Südamerika.

obtusifolia W., stumpfblättrige, ♀. w. Brasilien.

pigra L., verschiedenstachelige, ♀. ♀. w. Westindien.

polydactyla Humb., vielfingerige, ♀. w. Brasilien.

pudibunda W., züchtige, ♀. w. Brasilien.

pudica L., schamhafte, ♀. ♂. ☉. w. Südamerika.

rubicaulis Lam., brombeerstengelige, ♀. ♀. w. Ostind.

sensitiva L., empfindsame, ♀. w. Brasilien.

stipulata H. C., zwischenblättrige, ♀. w. Ostindien.

strigosa W., striegelige, ♀. w. Südamerika.

viscida W., schmierige, ♀. w. Brasilien.

viva L., reizbare, ♂. 4. w. Jamaica.

Entada L. (et *polystachya* L. et *scandens* Sw. etc.)

vid. *Entada monostachya*, *polystachya*, *Gigalobium*

etc. *fagifolia* L., *fagifolia* Jacq. (et *Houstoni* L'Her.

et *Inga* L. etc. v. *Inga Bourgoni*, *laurina*, *Houstoni*,

vera etc.) *glandulosa* Mchx. v. *Darlingtonia glutinosa*.

micrantha Vahl v. *Lagonychium Stephanianum*.

natans Vahl etc. v. *Desmanthus natans* etc.

piliflora Sw. v. *Prosopis juliflora*. *pterocarpa* Lam.

vid. *Gagnebina axillaris*. *quadrivalvis* L. etc. vid.

Schrankia aculeata etc.

Hinsichtlich der übrigen s. *Acacia*.

Mimulus L., Gauklerblume, XIV. 11., Personatae-Antirrhineae.

alatus Ait., geflügelte, 4. f. Nordamerika.

andicola H. B. K., Andes-G., 4. k. Peru, Chili.

cardinalis Dougl., scharlachrothe, ♂. 4. k. f. b. Nordwestliches Amerika, Chili.

floribundus Lindl., blüthenreiche, ☉. f. Nordamerika.

glutinosus Wendl. (*aurantiacus* Curt.), klebrige, ♀. k. t. ? Californien.

guttatus Fisch., DC. (*aureus* Nutt.), betropfte, 4. f. k. Nordwestliches Amerika, Mexico.

Mimulus

lanatus Pursh, wollige, 4. f. b. k. Nordamerika.

Lewisii Pursh, Lewis's, 4. f. Nordamerika.

luteus L., gelbe, 4. k. f. b. Chili.

b) *rivularis* Lindl. c) *Wilsoni* D. Don. d) *Younganus* Lodd.

parviflorus Lindl., kleinblumige, ☉. f. Chili.

propinquus Lindl., verwandte, 4. f. Nordamerika.

ringens L., blaublühende, 4. f. k. Nordamerika.

roseus Lindl., rosenrothe, 4. k. f. b. Neucalifornien, Chili.

variegatus Dougl., bunte, 4. k. Chili.

Hybriden von *luteus*, *variegatus*, *cardinalis* etc. erzogen: *bifrons*, *Harrisonianus* Paxton, *quinquevulnerus*, *roseo-cardinalis* Hens. (*Hodsoni* Hort. angl.) *Smithii* Lindl. etc.

perfoliatus Mut. v. *Leucocarpus alatus*.

Mimusops L., Spitzenblume, VIII. 1., Sapotaceae.

cyanocarpa Cunn., blaufrüchtige, ♀. w. t. Neuholl.

dissecta Spgl., schlitzkronige, ♀. w. Südseeinseln.

Elengi L., *Elengi-S.*, ♀. w. Ostindien, Molucken.

hexandra Roxb., sechsmännige, ♀. w. Ostindien.

Kauki L. (*obtusifolia* Lam.), *Kauki-S.*, ♀. w. Ostindien. Neuholland.

parvifolia RB., kleinblättrige, ♀. t. w. Neuholland.

Minuartia Loebl. (Minuart, ein spanischer Apotheker),

III. 11., Portulacaceae-Paronychieae.

campestris L., Feld-M., ☉. f. Spanien.

dichotoma L., zweizinkige, ☉. f. Spanien.

montana L., Berg-M., ☉. f. Spanien.

Mirabilis L., Wunderblume, V. 1., Nyctagineae.

dichotoma L., zweizinkige, 4. Kn. f. k. Mexico.

hybrida Lepellet, Bastard-W., 4. Kn. f. m. k. Neugranada.

Jalapa L., gemeine (Jalape), 4. Kn. f. m. k. Ost- und Westindien.

a) *flava*. b) *alba*. c) *rubro-alba*. d) *rubra*. e) *rubro-flava*.

longiflora L., langblumige, 4. Kn. f. m. Mexico.

b) *carnea* J. Cree. c) *violacea* J. Cree.

odorata Bernh., starkriechende, 4. Kn. f. m. ? Südamerika.

suaveolens Humb. B. K., lieblichriechende, 4. Kn. f. m. k. Mexico.

aggregata Cav. vid. *Allionia aggregata*. *corymbosa* Cav. etc. v. *Oxybaphus glabrifolius* etc.

Mirbelia Sm. (C. F. B. Mirbel, französischer Botaniker),

X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

Baxteri Mack, Cat., Baxter's, ♀. t. Neuholland.

dilatata RB., verbreiterte, ♀. t. Neuholland.

grandiflora Bot. mag., großblumige, ♀. t. Neuholland.

pungens Cunn., stechende, ♀. t. Neuholland.

reticulata Sm., netzförmige, ♀. i. Neusüdwallis.

speciosa Sieb., prächtige, ♀. t. Neuholland.

triternata Hort. Hügel., dreifach dreizählige, ♀. t. Neuholland.

Mitchella L. (Mitchell, ein englischer Arzt und Botaniker, welcher Virginien bereiste), IV. 1., Rubiaceae.

repens L., kriechende, ♀. f. b. Nordamerika.

- Mitella** L., Bischofskapsel, X. II., Saxifrageae.
cordifolia Lam., herzblättrige, 4. f. Nordamerika.
diphylla L., zweiblättrige, 4. f. Nordamerika.
nuda L. (*reniformis* Lam.), nachtschattige, 4. f. Nordamerika.
pentandra Hook., fünfmännige, 4. f. Nordamerika.
prostrata Mchx., gestreckte, 4. f. Nordamerika.
trifida Grah., dreispaltige, 4. f. Nordamerika.
grandiflora Pursh. v. *Tellima grandiflora*.
- Mitrasacme** LaBill., Mitrasacme, IV. I., Contortae-Gentianeae.
canescens RB., weißgrauliche, 4. t. Neuholland.
polymorpha RB., vielgestaltige, 4. t. Neuholland.
serpyllifolia RB., quendelblättrige, 4. t. Neuholland.
- Mniarum** Forst., Mooskraut, I. II., Portulacae-Paronychieae (-Scleranthaeae).
biflorum Forst., zweiblumiges, 4. k. Neuzeeland.
- Modecca** Jacq. (indianischer Name), XXII. v. (XVI. v.), Passifloreae.
dubia Roxb., zweifelhafte, 5. Sch. w. Ostindien.
lobata Jacq., gelappte, 5. Sch. w. Westafrika.
trilobata Roxb., dreilappige, 5. Sch. w. Ostindien.
tuberosa Roxb., knollige, 5. Sch. Kn. w. Ostindien.
- Möhringia** L. (P. H. G. Möhring, deutscher Arzt und Naturforscher), VIII. II., Caryophyllaceae-Alsineae.
muscosa L., moosartige, 4. f. Mittel- und Südeuropa.
β) sedoides Balb.
polygonoides M. et K., knöterichähnliche, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
Ponae Fenzl, Pona's, 4. f. Südtirol.
villosa Fenzl, zottige, 4. f. Oberkrain.
trinervia Clairv. v. *Arenaria trinervia*.
- Moenchia** Ehr. (Conrad Mönch, Professor der Botanik zu Marburg, IV. IV., Caryophyllaceae-Alsineae.
cerastoides Spgl., hornkrautähnliche, 6. f. Schottland.
erecta G.M.S. (*quaternella* Ehrh., *glauca* P.), aufrechte, 6. f. Mitteleuropa, England.
- Mogiphanes** Mart., Drüsenamaranth, V. I., Aizoideae-Amaranthaeae.
Jacquini Schrad., Jacquin's, 6. ♂. w. Brasilien.
virgata Schrad. (*brasiliensis* Mart.), ruthenförmiger, 6. ♂. w. Brasilien.
- Mohria** Sw. (M. H. Mohr, berühmter Kryptogamolog, Professor zu Kiel), XXIV. I., Osmundaceae.
turifraga Sw. (*crenata* Desv.), gekerbte, 4. w. Cap der guten Hoffnung, Mascarenas.
- Molina** *parviflora* R. et P. v. *Baccharis parviflora*.
- Molineria** Coll. (J. Molinerio, Director des botanischen Gartens zu Turin), VI. I., Narcisseae-Hypoxideae.
plicata Coll., gefaltete, 4. w. Java.
- Molinia** Schrk. (J. J. Molina, ein Spanier, welcher Chili bereiste), III. II., Gramineae.
altissima Lk. (*litoralis* Host., *Enodium sylvaticum* Lk.), hohe, 4. f. Europa.
coerulea Mch. (*varia* Schrk.), blaue, 4. f. Europa.
canescens Roxb. v. *Cupania canescens*. *capillaris* Hartm. v. *Glyceria distans*. *serotina* M. et K. v. *Diplachne serotina*.

Mollia aristata Ait. etc. v. *Polycarpaea aristata* etc.

Mollugo L., Weichling, III. II., Portulacaceae - Paronychieae.

dichotoma Schrk. (*Schrankii* Sering?), zweizinkiger, ☉. f. w. Brasilien.

hirta Thbg., kurzhaariger, 4. f. Cap der guten H.

Linkii DC. (*triphylla* Lk.), Link's, ☉. f. w. Brasilien.

oppositifolia L., gegenblättriger, ☉. f. w. Ostindien.

verticillata L., wirtelblättriger, ☉. f. Virginien.

Molopospermum Koch., Schwiendolde, V. II., Umbelliferae.

cicutarium DC. (*peloponnesiacum* Koch), cicutaähnliche, 4. f. Süd- und westeuropäische Alpen.

Moluccella L., Trichterkelch, XIV. I., Labiatae.

laevis L., glatter, ☉. f. Kleinasien, Syrien.

Marrubiastrum Steph., andornähnlicher, ☉. f. Südsibirien.

tuberosa Pall., knolliger, 4. Kn. f. Südsibirien.

spinosa L. v. *Chasmonia incisa*.

Momordica T., Balsamkürbis, XXI. X., Cucurbitaceae.

Balsamina L., gemeiner, ☉. Sch. w. m. Ostindien.

Charantia L., gurkenartiger, ☉. Sch. w. m. Ostindien.

cylindrica L., cylinderförmiger, ☉. Sch. w. m. China, Ceylon.

dioica Roxb., zweihäusiger, 4. Sch. w. Ostindien.

mixta Roxb., gemischter, 4. Sch. w. Ostindien.

muricata W., weichstacheliger, ♂. Sch. w. Ostindien.

operculata L., deckelfrüchtiger, ☉. Sch. w. m. Südamerika.

senegalensis Lam., senegal'scher, ♂. Sch. w. Westafrika, Brasilien.

umbellata Roxb., doldenblumiger, 4. Sch. w. Ostind.

Elaterium L. v. *Ecballion Elaterium* Nachtr.

Luffa L. v. *Luffa aegyptiaca*.

Monachanthus Lindl., Mönchsstendel, XX. I., Orchideae.

discolor Lindl., ungleichfarbiger, 4. w. Demerara.

β) *viridiflorus* Hook.

fimbriatus Gard., gefranzter, 4. w. Brasilien.

viridis Lindl., grüner, 4. w. Brasilien.

Monachne P. B., Monachne, III. II., Gramineae.

unilateralis P. B., einseitige, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung, Westindien, Südamerika.

Monanthes polyphylla Haw. v. *Sempervivum monanthon*.

Monarda L. (N. Monardez, Arzt zu Sevilla im XVI. Jahrh.), II. I., Labiatae.

affinis Lk. (*clinopodia* W.), ähnelnde, 4. f. Nordamerika.

altissima W., hohe, 4. f. Nordamerika.

b) *pallida*.

aristata Nutt., gegrannte, 4. f. Nordamerika.

Bradburyana Beck., Bradbur's, 4. f. Nordamerika.

ciliata L., gefranzte, 4. f. b. Virginien.

citriodora Cervant., citronenduftende, 4. k. Mexico.

clinopodia L. (*glabra* Lam.), wirbelborstenähnliche, 4. f. Nordamerika.

Monarda

- didyma L. (*purpurea* Lam., *coccinea* Mchx.), scharlachrothe, 4. f. Nordamerika.
 fistulosa L., röhrlige, 4. f. Nordamerika.
 β) *menthaefolia* Grah. (*fistul. macul.* Hook.).
 glabrescens Rchb., kahle, 4. f. Nordamerika.
 gracilis Pursh, schlanke, 4 f. b. k. Südcarolina.
 hirsuta Pursh (*ciliata* Mchx.), rauhhaarige, 4. f. b. Virginien.
 involucrata Wender., großshüllige, 4. f. ?Hybride, Nordamerika.
 Kalmiana Pursh, Kalm's, 4. f. Nordamerika.
 lilacina Wender., lilafarbige, 4. f. ?Hybride, Nordamerika.
 media W., mittlere, 4. f. Nordamerika.
 mollis W., weiche, 4. f. Nordamerika.
 oblongata Ait., langblättrige, 4. f. Nordamerika.
 punctata L. (*lutea* Mchx.), punktirte, 4. f. b. k. Nordamerika.
 purpurea Pursh, purpurfarbige, 4. f. Nordamerika.
 rugosa Ait., runzelige, 4. f. Nordamerika.
 Russeliana Nutt., Russel's, 4. f. b. Nordamerika.
 scabra Beck., scharfblättrige, 4. f. Nordamerika.
 undulata Tausch, wellenblättrige, 4. f. Nordamerika.
 violacea Desf., violette, 4. f. Nordamerika.
Monerma monandra P. B. v. *Psilurus nardoides*, *subulata* P. B. v. *Lepturus subulatus*.
Monesis grandiflora Salisb. v. *Pyrola uniflora*.
Monetia L'Her. (Monet de la Mark, berühmter franz. Naturforscher), IV. 1., ?Contortae-Apocynae.
 barlerioides L'Her., barlerienähnliche, 5. w. Ostindien, Cap der guten Hoffnung.
Monniera Aubl. (M. Le Monnier, französischer Botaniker und Arzt), XVII. 1., Tricoccae-Rutaceae.
 trifolia Löfl., dreiblättrige, 6. w. m. f. Südamerika.
Monnina R. et P. (Monnino Graf von Flora Blanca, ein großer Beförderer der Botanik), XVII. III. (v.), Polygalaceae.
 obtusifolia H. B. K., stumpfblättrige, 5. t. Peru.
Monodora Dun., *Monodora*, XIII. VI., Anonaceae.
 Myristica Dun., myristicaähnliche, 5. w. Jamaica.
Monopsis inconspicua Salisb. v. *Lobelia erinoides*.
Monotaxis Brogn., *Monotaxis*, XXI. III., Tricoccae-Euphorbiaceae.
 simplex Brogn., einfache, 5. t. Neuholland.
Monotoca RB., *Monotoca*, V. 1., Epacrideae.
 albens RB., weißliche, 5. Neuholland.
 elliptica RB., elliptische, 5. Neusüdwallis.
 lineata RB., feinstreifige, 5. Van-Diemens-Land.
 scoparia RB., besenförmige, 5. Neuholland.
Monotropa L., Ohnblatt, X. 1., Ericaceae-Monotropeae.
 Hypopitys L., Fichten-O., 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.
 Hypophegea Wallr. (*Hypoxa* Spgl.), Buchen-O., 4. f. Europa.
 uniflora Mchx., einblumiges, 4. f. Nordamerika.
Monsonia L. fil. (Lady Anne Monson, eifrige Pflanzensammlerin, welche Ostindien bereiste, XVI. VII., Geraniaceae.

Monsonia

lobata Montin (*filia* L. suppl.), gelappte, 4. f. t. Cap der guten Hoffnung.

ovata Cav. (*emarginata* L'Her.), eiförmige, 4. f. t. Cap der guten Hoffnung.

pilosa W. (*speciosa* Auct.), haarige, 4. f. t. Cap der guten Hoffnung.

β) Collae.

speciosa L., prächtige, 4. f. t. Cap der gut. Hoffn.

β) pallida Swt.

spinosa L'Her. v. *Sarcocaulon* L'Heritier.

Montanoa Lal. (Montano, mexicanischer Staatsmann), XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.

grandiflora Lal., großblumige, f. k. t. Mexico.

tomentosa Lal., filzige, f. k. t. Mexico.

Montbretia DC. (Gustave Coquebert de Montbret, französischer Botaniker), III. i., Irideae.

securigera DC., schwielige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

Montezumea M. et Sess. (Montezuma, ehemaliger Kaiser v. Mexico), XVI. vii., Malvaceae-Bombaceae.

speciosissima M. et Sess., prächtige, f. w. Mexico.

Montia L. (Joseph Monti, Professor der Botanik zu Bologna), III. iii., Portulacaceae.

fontana L., Quellen.M., ☉. 4. f. Europa.

a) minor Gmel. (*erecta* P.) β) rivularis Gmel. (*repens* P., *major* K.).

Montinia L. (L. Montin, schwedischer Botaniker), XXII. iv. (iv.), Portulacaceae-Polygoneae.

acris L. (*caryophyllacea* Auctor.), scharfe, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Moraea Mill. L. (More of Shrewsbury, englischer Botaniker, Moraeus, schwedischer Arzt, Schwiegervater des Linné), III. i., Irideae.

angusta Ker, schmalblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

barbigera Salisb., bärtige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

bituminosa Ker, harzige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

ciliata Ker, gefranzte, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

crispa Ker (*Gauleri* Spgl.), krause, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

edulis Ker, genießbare, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

longiflora Ker, langblumige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

longifolia (Andr.), (*edulis* γ. *lutescens* Bot. mag.), langblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

minuta Ker, kleine, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

papilionacea Ker, schmetterlingsförmige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

plumaria Ker, federige, 4. Zw. k. Cap der guten H.

polystachya Ker, vielährige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

ramosa Ker, ästige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.

setacea Ker, borstenblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

Sisyrinchium Ker, zweizwiebelige, 4. Zw. f. Südeuropa.

Tenoreana Swt., Tenore's, 4. Zw. f. Neapel.

Moraea

- tristis* Ker (*vegeta* L., *tricolor* Andr., *sordescens* Red.),
traurige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
viscaria Ker, schmierige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
catenulata Lindl. (et *iridioides* L., *odora* Hook.),
 vid. *Dietes catenulata* etc. *collina* Thbg. etc. vid.
Homeria collina etc. *gladiata* Ker etc. vid. *Bo-*
bartia gladiata etc. *Herberti* Lindl. vid. *Cypella*
Herberti. *ixioides* Thbg. v. *Libertia ixioides*. *lu-*
rida Ker (et *pavonia* Ker, *tenuis* Ker et *tricus-*
pis Ker etc.) v. *Vieusseuxia lurida* etc. *Northiana*
 Schneev. vid. *Cipura Northiana*. *plicata* Sw. vid.
Sisyrinchium plicatum. *undulata* Thbg. vid. *Fer-*
raria undulata.

Morenoa Lal. (P. Moreno, mexicanischer Staatsmann),
V. 1., Convolvulaceae.

- globosa* Lal., kugelförmige, 4. Sch. w. Mexico.
grandiflora Lal., großblumige, 4. Sch. w. Mexico.
patula Lal., ausgebreitete, 4. Sch. w. Mexico.

Moricandia DC. (Stefano Moricand, Botaniker zu
Genf), XV. III., Cruciferae.

- arvensis* DC., Acker-M., ☉. ♂ f. Südeuropa, Nord-
 afrika.

- hesperidiflora* DC., hesperisblumige, ☉. f. Aegypten.

Morina T. (Dr. Morin, französischer Arzt und Botaniker),
II. 1., Labiatae.

- persica* L., persische, 4. f. b. k. Persien.

Morinda L., Morindastrauch, V. 1., Rubiaceae.

- angustifolia* Roxb., schmalblättriger, ♀. w. Ostindien,
bracteata Roxb., deckblättriger, ♀. w. Ostindien.
citrifolia L., citronenblättriger, ♀. w. Ostindien.
jasminoides Cunn., jasminähnlicher, ♀. Sch. t. Neu-
 holland.

- Royoc* L., aufsteigender, ♀. w. Ost- und Westindien.

- umbellata* L., doldiger, ♀. w. Ostindien.

Moringa Burm., Lam. (malabarischer Name), X. 1.,
Tricoccae-Rutaceae-Moringeae.

- pterygosperma* DC., flügelsamige, ♀. w. Ostindien.

Morisia D. Don, Swt. (G. H. Moris, Professor der
Botanik zu Turin), XV. II., Cruciferae.

- hypogaea* D. Don, Swt., erdschotige, 4. k. Sardinien.

Morisonia Plum. (R. Morison, Professor der Botanik
zu Oxford), XVI. VIII., Capparideae.

- americana* L., amerikanische, ♀. w. Westindien, Süd-
 amerika.

Mormodes Lindl., Larvenstendel, XX. r., Orchideae.

- atropurpurea* Lindl., schwarzpurpurfarbiger, 4. w.
 Südamerika.

- pardina* Batem., pantherfleckiger, 4. w. Oaxaca.

Morna Lindl. (nordische Heldin), XIX. II., Compositae-
Helichryseae.

- nitida* Lindl., glänzende, 4. ♀. t. Neuholland (Schwa-
 nenflufs).

- nivea* Lindl., schneeweisse, ☉. m. f. Neusüdwallis.

Morphixia aulica H. Berol. etc. v. *Ixia aulica* etc.**Morrenia** Lindl. (C. Morren, Professor der Botanik zu
Lüttich), ? V. II., Asclepiadeae.

- odorata* Lindl., wohlriechende, ♀. Sch. t. Buenos-
 Ayres.

- Morus** T., Maulbeerbaum, XXI. v. (IV. II.), Urticaceae.
 alba L., weißer, f. f. Persien, Klein- und Mittelasien.
 b) multicaulis Perrott. c) Morettiana Hort. d) macrophylla Lodd. (*latifolia* et *hispanica* Hort.).
 e) romana Lodd. (*ovalifolia* Hort.). f) nervosa Lodd. (*subalba nervosa* Hort.). g) italica Hort.
 h) italica rubra Lodd. i) rosea Hort. k) columbassa Lodd. l) membranacea Lodd. m) sinensis Hort. n) pumila Nois. (*nana* Hort.).
 Calcar galli Cunn., Hahnenstirn-M., f. t. Neusüdwallis.
 constantinopolitana Poir. (*byzantina* Sieb.), türkischer, f. f. Thracien, Creta.
 indica L., indischer, f. w. Ostindien.
 latifolia Poir., breitblättriger, f. w. Mascarenas.
 mauritiana Jacq., mascarenischer, f. w. Mascarenas, Madagascar.
 nigra L., schwarzer, f. f. Persien.
 β) laciniata Mill.
 rubra L. (*virginica* Pluk., *pennsylvanica* Nois.), rother, f. f. Nordamerika.
 scabra W. (*canadensis* Poir.), scharfblättriger, f. f. Nordamerika.
 tatarica Pall., tatarischer, f. f. Tatarei.
 papyrifera L. v. Broussonetia papyrifera. Plumieri Brm. (Broussonet. Plumieri Spgl.) et tinctoria L. v. Macluria Plumieri etc.
- Morysia** Cass. (St. Morys, französischer Botaniker), XIX. I., Compositae-Corymbiferae.
 dentata DC., gezähnelte, f. k. Cap der guten Hoffn.
 fasciculata Less., büschelförmige, f. k. Cap der guten Hoffnung.
 longifolia DC., langblättrige, f. k. Cap der gut. H.
 pectinata DC., kammförmige, f. k. Cap der gut. H.
 pinnata DC., gefiederte, f. k. Cap der guten Hoffn.
- Moscharia** R. et P., Moscharie, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.
 pinnatifida R. et P., fiederspaltige, ♂. f. m. Chili.
- Moschosma** Rchb., Moschusbasilicum, XIV. I., Labiatae.
 Brownii*, Brown's, ♂. m. f. Neuholland.
 ocymoides Benth., langähriger, ♂. w. ?
 polystachya Rchb., vielähriger, ♂. w. Ostindien.
 tenuiflora (Spgl.), dünnblumiger, ♂. ♂. w. Ostindien.
- Mosigia pinnatifida** Spgl. v. Moscharia pinnatifida.
- Mouriria** Juss. (*Mouriri* Aubl.), [guianischer Name], X. I., Memecyleae.
 guianensis Aubl., guianische, f. w. Guiana.
 myrtilloides DC., heidelbeerähnliche, f. w. Westindien.
- Mozinna spathulata** Ortega. et *cordata* Ortega. v. Loureiria cuneifolia et glandulosa.
- Mucuna** Marcg., Adans. (brasilianischer Name), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
 altissima DC., höchste, f. Sch. w. Martinique.
 anguinea Roxb., schlangenförmige, f. Sch. w. Ostind.
 atropurpurea Roxb., dunkelpurpurrothe, f. Sch. w. Ostindien.
 bracteata Roxb., deckblättrige, f. Sch. w. Ostindien.
 gigantea DC., riesenhafte, f. Sch. w. Ostindien.

Mucuna

- imbricata* DC., ziegeldachige, ♀. Sch. w. Ostindien.
macroceratides DC., langhornige, ♀. Sch. w. Brasilien.
mitis DC., milde, ♀. Sch. w. Peru.
monosperma Roxb., einsamige, ♀. Sch. w. Ostindien.
nivea Roxb., schneeweiße, ♀. Sch. w. Ostindien.
pruriens DC., juckende, ♀. Sch. w. Ost- und Westindien.
urens DC., brennende, ♀. Sch. w. Westindien, Südamerika.

Muehlenbergia Schreb. (H. Mühlenberg, Prediger zu Lancaster in Pensylvanien, ein fleißiger Botaniker), III. II., Gramineae.

- aristata* P. (*erecta* Schbr.), langgrannige, 4. f. Nordamerika.
capillaris Trin., haarförmige, 4. f. Nordamerika.
diffusa W., weitschweifige, 4. f. Nordamerika.
elegans Trin., zierliche, ♂. f. Quito.
erubescens Schrad., röthliche, ♂. 4. f. w. Indien.
glomerata Trin., knaulförmige, 4. f. Nordamerika.
microsperma Trin., kleinsamige, ♂. f. Mexico.
Polypogon Trin., dichtstielige, 4. f. Carolina.
Willdenowii Trin. (*Agrostis tenuiflora* W.), Willdenow's, 4. f. Nordamerika.

Müllera L. fil. (O. F. Müller, berühmter dänischer Naturforscher), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

- moniliformis* L. fil., armbandförmige, ♀. w. Surinam.

Münchhausia speciosa L. v. *Lagerstroemia* Münchhausia.**Mulgedium** Cass., Alpenlattich, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

- acuminatum* DC., zugespitzter, ♂. f. Nordamerika.
albanum DC., albanischer, 4. f. Albanien.
alpinum Less., gemeiner, 4. f. Europa, Nordamerika.
azureum DC. (Ledeb.), azurblauer, 4. f. Sibirien.
cacaliaefolium DC. (MB.), cacaliablättriger, 4. f. Iberien.
cyaneum (D. Don), kornblumenblauer, 4. f. Nepal.
floridanum DC. (*lyratum* Cass.), floridanischer, ♂. f. Nordamerika.

- leucophaeum* DC., weißbrauner, ♂. f. Nordamerika.
macrophyllum DC., großblättriger, 4. f. Nordamerika.
Plumieri DC., Plumier's, 4. f. Frankreich, Schweiz.
prenanthoides DC., prenanthesähnlicher, 4. f. Caucasus.
sibiricum Less., sibirischer, 4. f. Sibirien.
tataricum DC., tatarischer, 4. f. Tatarei.

Mundia H. B. K., Mundie, XVII. III., Polygalaceae.

- spinosa* DC., dornige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
 β) *angustifolia* DC.

Muntingia L. (Abraham Munting, Professor der Botanik zu Gröningen), XIII. I., Tiliaceae.

- Calabura* L., westindische, ♀. w. Westindien, Südamerika.

Muraltia Neck. (J. von Muralt, schweizerischer Botaniker), XVII. III., Polygalaceae.

- alopecuroides* DC., fuchsschwanzähnliche, ♀. t. k. Cap der guten Hoffnung.
ciliaris DC., gefranzte, ♀. t. k. Cap der guten Hoffn.
diffusa Burch., weitschweifige, ♀. t. k. Cap d. gut. H.

Muraltia

- ericaefolia* DC., heideblättrige, ⚔. t. k. Cap der guten Hoffnung.
filiformis DC., fadenförmige, ⚔. t. k. Cap der gut. H.
Heisteria DC., Heister's, ⚔. t. k. Cap der gut. Hoffn.
humilis Swt., niedrige, ⚔. t. k. Cap der gut. Hoffn.
juniperifolia DC., wachholderblättrige, ⚔. t. k. Cap der guten Hoffnung.
linophylla Burch., leinblättrige, ⚔. t. k. Cap der guten Hoffnung.
macroceras DC., grofshornige, ⚔. t. k. Cap d. gut. H.
micrantha (Thbg.), kleinblumige, ⚔. t. k. Cap der guten Hoffnung.
mixta DC., heideartige, ⚔. t. k. Cap der gut. Hoffn.
squarrosa DC., sparrige, ⚔. t. k. Cap der gut. Hoffn.
stipulacea Burch., zwischenblättrige, ⚔. t. k. Cap der guten Hoffnung.
virgata Burch., ruthenförmige, ⚔. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Muricaria Desv., Stachelnüsschen, XV. 1. Cruciferae.
prostrata Desv., DC., gestrecktes, ☉. f. Nordafrika, Südeuropa.**Murraya** König (J. A. Murray, Professor der Botanik zu Göttingen), X. 1., Hesperideae.

- exotica* L., fremde, ⚔. w. Ostindien, China.
paniculata DC., rispige, ⚔. w. Cochinchina, China, Molucken.

Murucuja T. (brasilianischer Name), XVI. 11., Passifloreae.

- ocellata* P., geäugelte, ⚔. Sch. w. Westindien.
perfoliata Spgl., durchwachsene, ⚔. Sch. w. Westind.
adiantifolia Swt. et *Herbertiana* Swt. v. *Disemina*
adiantifolia etc.

Musa Plum., Pisang., Paradiesfeige, V. 1. (XXIII. 1.), Scitamineae (*Musaceae Bananeae*).

- coccinea* Andr., scharlachfarbiger, 4. w. China.
glauca Roxb. (? *nepalensis* Wall.), blaugrüner, 4. w. Ostindien.
maculata Jacq., gefleckter, 4. w. Mascarenas.
nepalensis Wall., nepal'scher, 4. w. Nepal.
ornata Roxb., geschmückter, 4. w. Ostindien.
paradisiaca L., gemeiner, 4. w. Ostindien.
rosacea Jacq., rosenrother, 4. w. Mascarenas.
sapientum L., Bananen-P., 4. w. Ost- u. Westindien.
superba Roxb., stolzer, 4. w. Ostindien.
sylvestris Rumph., wilder, 4. w. Molucken etc.

Muscari T., Muscat-(Trauben-)Hyacinthe, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

- botryoides* W., steifblättrige, 4. Zw. f. Südeuropa.
 b) *pallidum*. c) *album*.
ciliatum Ker, gefranzte, 4. Zw. f. Süditalien, Podolien, Taurien, Kleinasien.
comosum W., schopfge, 4. Zw. f. Mittel- und Südeuropa, Mittelasien.
 β) *monstrosum* W.
glaucum Bot. Reg., blaugrüne, 4. Zw. f. Persien.
macrocarpum Swt. (*moschatum* β. *flavum* Bot. mag.), grofsfrüchtige, 4. Zw. f. Levante.

Muscari

- maritimum* Dsf., Meerstrands-M., 4. Zw. f. Nordafrika.
moschatum W., feinriechende, 4. Zw. f. Kleinasien.
pallens Fisch., Bess., bleiche, 4. Zw. f. Podolien,
 Taurien, Caucasus.
parviflorum Dsf., kleinblumige, 4. Zw. f. Nordafrika.
racemosum W., gemeine, 4. Zw. f. Südeuropa.

b) minus.

Mussaenda Herm. (ceylanischer Name), V. 1., Rubiaceae.

- arcuata* Lam., bogenförmige, 5. w. Mascarenas.
citrifolia Lam., citronenblättrige, 5. w. Madagascar.
chinensis Lour., chinesische, 5. t. China.
coccinea Poir., scharlachfarbige, 5. w. Westindien.
frondosa L., belaubte, 5. w. Ostindien.
glabra Vahl, kahle, 5. w. Ostindien.
Landia Lam. (*latifolia* Poir.), breitblättrige, 5. w. Mascarenas.
pubescens Dryand., weichhaarige, 5. w. China.
speciosa Poir., prächtige, 5. w. t. Südamerika.
Luculia D. Don vid. *Luculia gratissima*. *spinosa* Jacq. et *tetracantha* Cav. vid. *Gardenia armata* et *tetracantha* Nachtr.

Musschia Dum., Musschia, V. 1., Campanulaceae.

- aurea* Dum., A. DC., goldfarbige, 5. k. Canarische Inseln.
 β) *angustifolia* A. DC. (*Campan. aurea* Jacq.).

Mutisia L. fil. (J. C. Mutis, ein thätiger Pflanzenforscher, welcher Südamerika durchreiste), XIX. 11., Compositae-Eupatorineae.

- arachnoidea* Mart. (*speciosa* Hook.), prächtige, 5. Sch. k. t. Brasilien.
ilicifolia Hook., ilexblättrige, 5. Sch. t. Chili, Peru.
latifolia D. Don, breitblättrige, 5. Sch. t. Chili.

Myagrimum T. L., Dotterkraut, XV. 1., Cruciferae.

- perfoliatum* L., durchwachsblättriges, ♂. f. Mittel- und Südeuropa.
aegyptiacum L. v. *Didesmus aegyptiacus*. *iberioides* Brot. v. *Calepina* Corvini. *orientale* L. etc. v. *Rapistrum orientale* etc. *paniculatum* L. vid. *Neslia paniculata*. *sativum* L. v. *Camelina sativa*. *saxatile* L. v. *Kerneria saxatilis*.

Myanthus Lindl., Fliegenblume, XX. 1., Orchideae.

- barbatus* Lindl., bärtige, 4. w. Demerara.
 β) *labello albo* Hook. γ) *immaculatus* K. et W.
cernuus Lindl., gebogene, 4. w. Brasilien.
deltoides Lindl., deltaförmige, 4. w. Demerara.

Mygalurus alopecuroides Lk. etc. vid. *Vulpia alopecuroides* etc.**Myginda** Jacq. (Mygind, österreichischer Botaniker), IV. 11., Sapotaceae-Aquifoliaceae.

- integrifolia* Lam., ganzblättrige, 5. w. Westindien.
latifolia Sw., breitblättrige, 5. w. Westindien.
myrtifolia Nutt., myrtenblättrige, 5. f. b. Nordamer.
Rhacoma Sw., *Rhacoma*-M., 5. w. Westindien.
Uragoga Jacq., harntreibende, 5. w. Westindien, Südamerika.

Mylocaryum ligustrinum W. v. *Cliftonia ligustrina*.**Myoporum** Banks, Porenblatt, XIV. 11., Globulariaceae-Myoporineae.

Myoporum

- acuminatum RB., zugespitztes, $\frac{1}{2}$ t. Neusüdwallis.
 adscendens RB., aufsteigendes, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 crassifolium Forst., dickblättriges, $\frac{1}{2}$ t. Neuzeeland.
 debile RB., schwaches, $\frac{1}{2}$ t. Neusüdwallis.
 diffusum RB., weitschweifiges, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 ellipticum RB., elliptisches, $\frac{1}{2}$ t. Neusüdwallis.
 insulare RB., Insel-P., $\frac{1}{2}$ t. Neusüdwallis.
 montanum RB., Berg-P., $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 oppositifolium RB., gegenblättriges, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 parvifolium RB., kleinblättriges, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 tuberculatum RB., kleinhöckeriges, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 viscosum RB., schmieriges, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.

Myoseris purpurea Lk. v. *Intybellia purpurea*.

Myosotis Rupp. Dill., Vergifsmeinnicht (Mausöhrchen),
 V. I., Asperifoliaceae.

I. Genuina.

- arvensis Sibth., Rchb. (*stricta* Lk., *arenaria* Schrad.),
 Acker-V., $\odot$ f. Europa.
 caespitosa Schultz (*lingulata* R. et S., *uliginosa* Schrad.),
 rasenartiges. σ . 4. f. Europa.
 californica Fisch. et Mey., californisches, $\odot$ f. Neu-
 Californien.
 hispida Schldl. (*arvensis* Lk., *collina* Auct.), steifhaa-
 riges, $\odot$ f. Europa.
 intermedia Lk. (*arvensis* Lehm.), mittleres, $\odot$ σ f.
 Europa.

b) alba.

- involucrata Steven, hülliges, $\odot$ f. Caucasus.
 laxiflora Reichenb., lockerblumiges, 4. f. Deutschland.
 palustris With. (*scorpioides* β . *palustris* L.), wahres, 4.
 f. Europa, Asien, Nordamerika.

 β) repens Donn. γ) strigulosa Rchb.

- peduncularis Trevir., langstieliges, $\odot$ f. Astrachan.
 pusilla Lois., zwergiges, $\odot$ f. Corsica.
 sparsiflora Mikan, zerstreutblumiges, $\odot$ f. Nord-, Mit-
 tel- und Osteuropa.
 suaveolens Kit. (*lithospermifolia* Hornem.), wohlriech-
 endes, 4. f. Osteuropäische Alpen.
 sylvatica Ehrh. (*montana* Bess., MB., *decumbens* Host.),
 Wald-V., 4. f. Europa.

 β) alpestris Schm. (*odorata* Poir., *rupicola* Sm.). γ) lactea Bönningh.

- tenuiflora Vivian., dünnblumiges, $\odot$ f. Nordafrika.
 versicolor P. (*scorpioides collina* Ehrh.), buntfarbiges,
 $\odot$ f. Europa.

II. *Eritrichium* Schrad.

nana Vill. (*pauciflora* Vitm.), kleinstes, 4. f. Schweiz,
 Frankreich.

terglovensis Hacq. (*E. Hacquetii* Koch), terglou'sches,
 4. f. Steyermark, Krain, Tyrol etc.

barbata MB. etc. v. *Echinosperrum barbatum* etc.

fruticosa L. vid. *Heliotropium linifolium*. *lutea* P.

v. ? *Lithospermum apulum*. *macrophylla* MB. vid.

Anchusa myosotidiflora. *obtusa* W. K. v. *Anchusa*
 Barrelieri.

Myosurus Dill., Mäuseschwänzchen, V. VI., Ranun-
 culaceae.

minimus L., kleines, $\odot$ f. Europa.

- Myrcia** DC., Myrcie, XII. I., Myrtaceae.
 acris DC., scharfe, f. w. Westindien.
 pimentoides DC. (Lindl.), gewürzhafte, f. w. Westind.
- Myriactis** Less., Myriacte, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
 Gmelini DC., Gmelin's, 4. f. b, k. Persien.
- Myriadenus** Desv., Vieldrüsler, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
 tetraphyllus Desv., vierblättriger, ♂. w. Jamaica.
- Myrica** L., Wachsmyrte, XXII. IV. (IV. II.), Amentaceae-Myricaceae.
 aethiopica L. (? *capensis* Lodd. C.), aethiopische, f. k. Cap der guten Hoffnung.
 cerifera L., wahre, f. f. Nordamerika.
 β) *latifolia* Ait. (*cerif. media* Mchx., *carolinensis* Wangenh., *pensylvanica* Lam., *sempervirens* Hort.).
 γ) *pumila* Mchx.
 cordifolia L., herzblättrige, f. k. Cap der gut. H.
 esculenta Hamilt., genießbare, f. t. k. Nepal.
 Faya Ait., Faya-W., f. k. Azoren.
 Gale L., Gagel-W., f. f. Europa, Nordamerika.
 laciniata W., schlitzbilättrige, f. k. Cap der gut. H.
 mexicana W., mexicanische, f. k. Mexico.
 quercifolia L., eichenblättrige, f. k. Cap d. gut. H.
 b) *hirsuta* Mill.
 segregata Jacq., lanzettblättrige, f. t. Südamerika.
 serrata Lam. (*banksiaefolia* Wendl.), sägeblättrige, f. k. Cap der guten Hoffnung.
Nagi Thbg, v. *Nageja japonica*.
- Myricaria** Desv., Myricarie, X. III. (XVI. VI.), Aizoideae-Tamariscineae.
 dahurica DC., dahurische, f. f. b. Ostsibirien.
 germanica Desv., deutsche, f. f. b. Mitteleuropa, Caucasus.
 herbacea Dsf., krautartige, 4. f. f. b. Nordpersien.
 longifolia DC. (*linearifolia* Desv.), langblättrige, f. f. b. Ostsibirien.
 squamosa Desv., schuppige, f. f. b. Dahurien.
- Myriogyne** Less., Vielweibler, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
 minuta Less., kleiner, ☉. f. Asien, Neuholland.
- Myriophyllum** Vaill., Federkraut (Wassergarbe), XXI. IX., Haloragaceae.
 alterniflorum DC., wechselblumiges, 4. Wa. f. Frankreich, Westdeutschland.
 pectinatum DC., kammförmiges, 4. Wa. f. Mittel-, Ost- und Westeuropa.
 spicatum L., ährenförmiges, 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.
 verticillatum L., wirtelförmiges, 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.
- Myristica** L., Muskatennußbaum, XXII. XIII. (XVI. v.), Myristicaceae ? Laurineae.
 fatua Sw. (*surinamensis* Roland.), unschmackhafter, f. w. Westindien, Surinam.
 moschata Thbg. (*officinalis* L., *aromatica* Lam.), wahrer, f. w. Molucken.
 sebifera Sw., talgebender, f. w. Südamerika.

Myrodia Schreb., Balsammalve, XVI. VIII., Malvaceae-Bombaceae.

turbinata Sw., kreiselförmige, f. w. Westindien.

Myrosma comosa Spgl. et *cannaefolia* L. fil. v. *Phrynium comosum* et *Myrosma*.

Myrospermum Jacq., Balsamholz, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

toluiferum Spgl., toluitanisches, f. w. Südamerika.

Myrrhis Scop., Gewürzkerbel, V. II., Umbelliferae.

odorata Scop., wohlriechender, 4. f. Mittel- und Südeuropa, Kleinasien.

Hinsichtlich der übrigen s. *Chaerophyllum*.

Myrsine L., *Myrsine*, V. I. (XXIII. II.), *Myrsineae* (*Ardisiaceae*).

africana L., afrikanische, f. k. Cap der gut. Hoffn.

bifaria Wall., Roxb., zweireihige, f. t. Nepal.

capitellata Wall., Roxb., kopfblüthige, f. t. Nepal.

coriacea RB., lederblättrige, f. w. Jamaica.

ilicifolia Lodd., ilexblättrige, f. k. t. ?

melanophleos RB., schwarzrindige, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

retusa Ait., abgestutzte, f. k. Azoren.

Samara RB., Samara-M., f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

semiserrata Wall., Roxb., halbsägezahnige, f. t. Nepal.

subspinosa D. Don, feinsägezahnige, f. t. Nepal.

variabilis RB., veränderliche, f. t. k. Neuholland.

venulosa Spgl., vieladerige, f. k. t. Cap der gut. H.

canariensis Spgl. v. *Manglilla canariensis*. *Heber-*

denia R. et S. v. *Ardisia excelsa*. *mitis* Spgl. v.

Manglilla Milleriana.

Myrsiphyllum W., Myrtenblatt, VI. III., *Sarmentaceae* (*Asparagineae*).

angustifolium W., schmalblättriges, 4. Sch. k. Cap der guten Hoffnung.

asparagoides W., spargelähnliches, 4. Sch. k. Cap der guten Hoffnung.

Myrtus T., Myrte, XII. I., *Myrtaceae*.

affinis Hort., ähnelnde, f. t. k. China.

biflora L., zweiblumige, f. w. Jamaica.

communis L., gemeine, f. f. k. Südeuropa.

a) romana Mill. β) tarentina Mill. γ) italica

Mill. δ) baetica Mill. ε) lusitanica Mill. ζ)

belgica Mill. η) mucronata Mill. θ) leucocarpa

DC. Gartenvarietäten: b) flore pleno. c) fol.

aureo variegat. d) fol. argenteo variegat. etc.

coriacea Vahl, lederblättrige, f. w. Westindien.

dumosa Vahl, buschige, f. f. w. Westindien.

Greggii Sw., Gregg's, f. f. w. Westindien.

lucida L., spiegelnde, f. f. w. Surinam.

melastomoides Cunn., melastomaähnliche, f. t. Neuholl.

obscura Bot. reg., dunkle, f. w. Südamerika,

tenuifolia Sm., dünnblättrige, f. t. k. Neuholland.

tomentosa Ait. (*canescens* Lour.), filzige, f. t. w. China.

trinervia Sm., dreinervige, f. t. Neuholland.

virgultosa Sw., ruthenförmige, f. f. w. Westindien.

acris Sm. (et *pimentoides* Lindl.) vid. *Myrcia acris*

etc. *australis* Bot. mag. vid. *Jambosa myrtifolia*.

disticha Sw. v. *Olythia disticha*. *Pimenta* L. v.

Pimenta vulgaris.

- Nageja** G. (Nagi, japanischer Name), XXII. IV. (IV. 1.), Amentaceae-Myricaceae.
 japonica W., japanische, ♀. k. Japan.
 Putranjiva Roxb., ostindische, ♀. w. Ostindien.
- Najas** L., Najade, XXI. v., Najadeae.
 flexilis Rostk. et Schm., biegsame, ☉. Wa. f. Pommern.
 major Roth, All. (*marina* a L., *monosperma* W.), große, ☉. Wa. f. Europa.
 minor All. (*fragilis* Rostk. et Schm.), kleine, ☉. Wa. f. Europa.
- Nandina** Thbg. (japanischer Name), VI. 1., Berberideae.
 domestica Thbg., Garten-N., ♀. ♀. k. China.
- Nanodes** Lindl., Zwergstendel, XX. 1., Orchideae.
 discolor Lindl., grünpurpurfarbiger, 4. w. Brasilien.
- Napaea** dioica L. et *laevis* L. (*hermaphrodita* L.) v. *Sida dioica* et *Napaea*.
- Naravelia** DC. (ceylanischer Name), XIII. VI., Ranunculaceae.
 ceylanica DC., ceylanische, ♀. Sch. w. Ceylon.
- Narcissus** T., Narzisse, VI. 1., Narcisseae (*Amaryllideae*).
 I. Ajax Salisb., Haw.
 albidus* (*albicans* Haw.), schmutzigweißse, 4. Zw. f. Spanien.
 arcuatus* (*cernuus* Haw.), gebogene, 4. Zw. f. b. ? Spanien.
 bicolor L. (*tubiflorus* Salisb.), zweifarbige, 4. Zw. f. b. Spanien.
 cambricus Haw., cambrische, 4. Zw. f. England.
 cyclamineus Haw., cyclamenähnliche, 4. Zw. f. ?
 b) corolla-plena Salisb.
 grandiflorus Haw., Salisb., großblumige, 4. Zw. f. ?
 lobularis Haw., gelappte, 4. Zw. f. ?
 b) amplicoronus. c) plenus. d) scoticus.
 lorifolius Haw. (*bicolor* Bot. mag. non L.), riemenblättrige, 4. Zw. f. ?
 b) breviflos Haw. c) anceps Haw.
 major Curt., große, 4. Zw. f. Spanien.
 maximus D. Don, größte, 4. Zw. f. ?
 minimus Haw., kleinste, 4. Zw. f. b. Spanien.
 minor L., kleine, 4. Zw. f. Spanien.
 b) angustus.
 moschatus L., moschusduftende, 4. Zw. f. b. Südfrankreich, Spanien.
 b) patulus Salisb.
 nanus Haw., zwergige, 4. Zw. f. ?
 nobilis Haw., edle, 4. Zw. f. ?
 obvallaris Salisb., umhüllte, 4. Zw. f. b. Spanien.
 propinquus Salisb., verwandte, 4. Zw. f. b. Spanien.
 Pseudonarcissus L. (*festalis* Haw.), gemeine (Märzbecher), 4. Zw. f. Mittel- und Südeuropa, Taurien.
 a) pallidus. b) albus. c) luteus. d) plenus.
 e) plenissimus. f) ryticarpus.
 pumilus Salisb., Redout., kleine, 4. Zw. f. b. Spanien.
 b) fl. pleno.
 rugilobus Haw., runzellappige, 4. Zw. f. ?
 serratus Haw., gesägte, 4. Zw. f. Südeuropa.
 β) suavis Haw. γ) radians. δ) praecox.
 spurius Haw., unächte, 4. Zw. f. England.

Narcissus

Telamonius Haw., Telamon's, 4. Zw. f. ?

b) grandiplenus. c) pleno-pallidus acuminatus.
tortuosus Haw., gewundene, 4. Zw. f. b. Spanien.

II. Assaracus Haw.

capax Salisb., fruchtbare, 4. Zw. f. b. ?

reflexus ? Brot., zurückgebogene, 4. Zw. f. b. ? Portugal.

III. Chloraster Haw.

viridiflorus Schousb. (*fissus* Haw.), grünblumige, 4. Zw.
f. b. k. Südsanien, Nordafrika.

β) integer Haw.

IV. Corbularia Haw. (Vergl. pag. 217 und hier einzuschalten).

albicans Haw., weißliche, 4. Zw. f. b. k. Spanien.

aureus Haw., goldfarbige, 4. Zw. f. b. Spanien.

Bulbocodium L., aufrechte, 4. Zw. f. b. k. Spanien,
Portugal.

cantabricus Haw., cantabrische, 4. Zw. f. b. Spanien.

conspicuus Salisb., Haw., ansehnliche, 4. Zw. f. b.

Westeuropa.

gigas Haw., riesenhafte, 4. Zw. f. b. ?

lobulatus Haw., schmallappige, 4. Zw. f. b. ?

obesus Haw., feiste, 4. Zw. f. b. ?

tardiflorus * (*Corbul. serotina* Haw.), spätblumige, 4. Zw.
f. b. k. Portugal.

tenuifolius Red., Sal., feinblättrige, 4. Zw. f. b. k.

Westeuropa.

V. Diomedes Haw.

Macleai Lindl., MacLeay's, 4. Zw. f. b. k. Smyrna.

Parkinsoni Salisb., Parkinson's, 4. Zw. f. b. ?

Sabini Lindl., Sabine's, 4. Zw. f. b. ?

VI. Ganymedes Haw.

concolor Haw., einfarbige, 4. Zw. f. ?

infundibularis Salisb., trichterförmige, 4. Zw. f. b. ?

nutans Haw. (*trilobus* Bot. mag.), nickende, 4. Zw. f.
b. Südeuropa.

pulchellus Haw., schöne, 4. Zw. f. b. Spanien.

striatulus Haw., feinstreifige, 4. Zw. f. b. ?

β) parvicoronus.

VII. Helena Haw.

croceo cinctus Haw., safranfarbige, 4. Zw. f. b. ?

gracilis Lindl., schlanke, 4. Zw. f. b. ?

humilis * (*pumilus* Haw.), niedrige, 4. Zw. f. b. ?

planicoronus Haw., flachkronige, 4. Zw. f. b. ?

purpureocinctus Haw., purpursaumige, 4. Zw. f. b. ?

tenuior Curt., dünne, 4. Zw. f. b. Südeuropa.

VIII. Hermione Haw.

aperticoronus Haw., offenkronige, 4. Zw. f. b. Nordafrika.

auranticoronus Haw., orangefarbkronige, 4. f. b. ?

bifrons Sims, zweiflügelige, 4. Zw. f. b. Südeuropa.

biscrenatus Haw., doppelkerbige, 4. Zw. f. b. Südeuropa.

breviflorus Haw., kurzblumige, 4. Zw. f. b. ?

cerinus Haw., wachsfarbig, 4. Zw. f. b. ?

chrysanthus Haw., DC., hochgelbe, 4. Zw. f. b. ?

compressus Haw., platte, 4. Zw. f. b. Spanien.

crenulatus Sal., Haw., gekerbte, 4. Zw. f. b. Spanien.

crispicoronus Haw., krauskronige, 4. Zw. f. b. ?

Cypri Haw., cyper'sche, 4. Zw. f. b. Cypern.

b) semiplenus. c) plenus.

Narcissus

decorus Haw., zierliche, 4. Zw. f. b. ?

deflexicaulis Haw., herabgebogene, 4. Zw. f. b. ?

β) plenus.

dubius Gouan, zweifelhafte, 4. Zw. f. b. Südfrankreich.

elegans Haw., nette, 4. Zw. f. b. ?

fistulosus Haw., röhrlige, 4. Zw. f. b. ?

flaveolus Haw., blafs gelbliche, 4. Zw. f. b. ?

flexiflorus Haw., bogenblumige, 4. Zw. f. b. ?

floribundus Salisb., blüthenreiche, 4. Zw. f. b. Spanien.

flos lactis Haw., milchweifse, 4. Zw. f. b. ?

intermedius Redout., mittlere, 4. Zw. f. b. Pyrenäen.

italicus Gawl. (*praecox* Ten.), italienische, Marseiller Tazette, 4. Zw. f. b. k. Italien, Südfrankreich.

b) semiplenus. c) plenus.

jasmineus Haw., jasmminblumige, 4. Zw. f. b. ?

lacticolor flor. graec., milchfarbige, 4. Zw. f. b. Griechenland.

latifolius Haw., breitblättrige, 4. Zw. f. b. ?

longiflorus W. (*tereticaulis* Haw.), langblumige, 4. Zw. f. b. Neapel, Griechenland, Kleinasien.

Luna Haw., Mond-N., 4. Zw. f. b. ?

multiflorus Haw. (*Tazetta* Bot. mag.), vielblumige, 4. Zw. f. b. ?

b) aureus. c) floribus pallidioribus.

neglectus Tenor., übersehene, 4. Zw. f. Neapel.

obliteratus Haw., vergessene, 4. Zw. f. b. ?

obsoletus Haw., veraltete, 4. Zw. f. b. Spanien.

papyraceus Sims (*unicolor* Ten., *niveus* Lois.), papierähnliche, 4. Zw. f. b. Südfrankreich.

patulus Haw., abstehende, 4. Zw. f. b. ?

perluteus Haw., dunkelgelbe, 4. Zw. f. b. ?

polyanthos Haw., häufigblumige, 4. Zw. f. b. ?

praecox Haw., frühe, 4. Zw. f. b. ?

primulinus Haw., primelblumige, 4. Zw. f. b. Spanien.

rotularis Haw., radförmige, 4. Zw. f. b. ?

serotinus L. (? *Broussoneti* Lag.), späte. 4. Zw. f. b. k.

Sicilien, Spanien, Nordafrika.

solaris Haw., sonnenfarbige, 4. Zw. f. b. ?

stramineus Haw., strohfarbige, 4. Zw. f. b. ?

subcrenatus Haw., wenig gekerbte, 4. Zw. f. b. ?

subalbidus Haw., gelblichweifse, 4. Zw. f. b. ?

subluteus Haw., bleichgelbe, 4. Zw. f. b. ?

sulcicaulis Haw., gefurchtstengelige, 4. Zw. f. b. ?

sulphureus Haw., schwefelgelbe, 4. Zw. f. b. ?

Tazetta L., Tazetten-N., 4. Zw. f. k. Südeuropa, Nordafrika, Kleinasien.

b) luteus Haw. (? *flavus* Lag.).

tenuiflorus Haw., dünnblumige, 4. Zw. f. b. ?

Trewianus Ker, Trew's, 4. Zw. f. b. Spanien.

trifidus Haw., dreispaltige, 4. Zw. f. b. ?

unicolor Haw., einfarbige, 4. Zw. f. b. ?

IX. Illus Haw.

cernuus Salisb. (*triandrus* Bot. mag.), geneigte, 4. Zw. f. b. ? Spanien.

triandrus L. (*Ganymedes albus* Salisb.), dreifädige, 4. Zw. f. b. Spanien.

X. Jonquilla Haw.

Jonquilla L. (*major* Salisb. Haw.), Jonquillen-N., 4. f. b. k. Südfrankreich, Spanien.

Narcissus

b) flore pleno.

β) media Salish. Haw. γ) minor Salish. Haw. (similis Haw.). δ) parvicorona Haw.

XI. Narcissus Haw.

angustifolius Curt. (*radiiflorus* Salish.), schmalblättrige, 4. Zw. f. Südfrankreich.

β) spathulatus Haw. γ) albus Haw. δ) dianthos Haw.

biflorus Curt., zweiblumige, 4. Zw. f. England, Schweiz, Italien.

majalis Curt. (*patellaris* Salish.), Mai-N., 4. Zw. f. Südfrankreich.

b) flore pleno albo-croceo.

ornatus Haw., geschmückte, 4. Zw. f. ?

poeticus L., Poeten-N., 4. Zw. f. England, Südeuropa.

b) exsertus Haw. c) fl. pleno.

recurvus Haw., zurückgekrümmte, 4. Zw. f. Südeuropa.

stellaris Haw., sternförmige, 4. Zw. f. ?

triflorus Haw., dreiblumige, 4. Zw. f. ?

XII. Oileus Haw.

abscissus Haw., kurzschäftige, ☉. Zw. f. b. Spanien.

β) hexangularis Haw. γ) minor Haw. δ) albus Haw. ε) pumilus Haw.

XIII. Philogyne Haw.

Campernelli Haw., Campernellen-N., 4. Zw. f. Südeuropa.

heminalis Haw., halbkronige, 4. Zw. f. ?

b) pluriflorus.

interjectus Haw., untergelaufene, 4. Zw. f. ?

odorus L. (*calathinus* a Bot. mag.), wohlriechende, 4. Zw. f. b. Südeuropa.

rugulosus Haw., runzelige, 4. Zw. f. b. ?

trilobus L. (*tripartitus* Hornem.), dreilappige, 4. Zw. f. b. Spanien.

β) calathinus Salish. γ) Curtisii Haw. δ) minor Haw. b) fl. pleno. c) fl. pleno majore. d) fl. pleno maxim.

XIV. Queltia Salish. Haw.

albus Haw., weiß, 4. Zw. f. b. ?

b) fl. pleno niveo-aurant. (*double Orange Phoenix*).

aurantius Haw., orangefarbige, 4. Zw. f. b. ?

b) fl. pleno.

Gouani Roth, Gouan's, 4. Zw. f. b. Südfrankreich.

Haworthi G. Don (*concolor* Haw.), Haworth's, 4. Zw. f. b. ?

b) fl. pleno sulphureo.

incomparabilis Curt., unvergleichliche, 4. Zw. f. b. Italien, Südfrankreich, Portugal.

niveus Haw., schneeweiß, 4. Zw. f. b. ?

semipartitus Haw., halbtheilige, 4. Zw. f. b. ?

XV. Schisanthes Haw.

orientalis L., morgenländische, 4. Zw. f. b. Levante. ? β) citrinus Haw.

XVI. Tros.

galanthifolius Haw., galanthusblättrige, 4. Zw. f. b. ?

montanus Ker (*Queltia poculiformis* Salish.), Berg-N., 4. Zw. f. b. Portugal.

Nardosmia Cass. v. *Petasites*.

Nardus L., Borstengras, III. 1., Gramineae.

stricta L., steifes, 4. f. Europa.

aristata L. vid. *Psilurus nardoides*. *indica* L. vid. *Microchloa setacea*.

Narthecium Möhr., Sumpffaffodile, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

americanum Ker, amerikanische, 4. f. Nordamerika.

ossifragum Huds., europäische, 4. f. Nordeuropa.

Nasturtium C. Bauh. (et *Brachyolobus* All.), Wasserkresse, XV. III., Cruciferae.

amphibium RB., gemeine, 4. Wa. f. Europa, Asien, Nordamerika.

a) *indivisum* DC. β) *variifolium* DC. γ) *auriculatum* DC. (*riparium* Wallr.).

anceps Rchb., zweischneidige, 4. Wa. f. Europa.

austriacum Crtz., österreichische, 4. f. Osteuropa, Tau-rien, Caucasus, Sibirien.

bengalense DC., bengalische, ☉. f. Ostindien.

bursifolium DC., hirtentäschelblättrige, ☉. f. Kamtschatka.

Camelinae Fisch. et Mey., leindotterähnliche, ☉. ♂. f. Nordchina.

ceratophyllum DC., hornkrauthblättrige, ☉. f. Nordafrika.

clandestinum Spgl., heimlichblumige, ☉. f. Brasilien.

coronopifolium DC., krähensfußblättrige, ☉. f. Nordafrika.

erectum Trevir. (*Mirbelii* Spgl., *chilense* H. Par.), aufrechte, ☉. f. Chili.

globosum Turcz., kugelfrüchtige, ☉. ♂. f. Dahurien.

indicum DC., indische, ☉. f. Ostindien, Java, China.

lippizense DC., illyrische, 4. f. Krain, österreichisches Litorale.

micropetalum Fisch. et Mey., kleinkronige, ☉. f. Nordamerika.

microspermum DC., kleinsamige, ☉. f. China.

natans DC., schwimmende, 4. Wa. f. Sibirien.

officinale RB., officinelle (Quellen-K.), 4. Wa. f. Europa, Asien, Afrika, Nord- und Südamerika.

β) *microphyllum* Rchb.

palustre DC. (*terrestre* RB.), Sumpf-K., ♂. f. Europa, Asien, Afrika, Nordamerika.

pyrenaicum RB., pyrenäische, 4. f. Süddeutschland, Schweiz, Frankreich.

rivulare Rchb., Bach-K., 4. Wa. f. Sachsen, Oesterreich.

sagittatum RB., pfeilblättrige, 4. Wa. f. Caspisches Meer.

siifolium Rchb., merkblättrige, 4. Wa. f. Sachsen.

sylvestre RB., Wald-K., 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

quadricorne DC. v. *Notoceras quadricorne*.

Nastus latifolia Spgl. v. *Guadua latifolia* Nachtr.

Nauclea L., Nauclea, V. 1., Rubiaceae.

Cadamba Roxb., Cadamba-N., ♂. w. Ostindien.

cordifolia Roxb., herzblättrige, ♂. w. Ostindien.

orientalis L., morgenländische, ♂. w. Ostindien.

purpurea Roxb., purpurfarbige, ♂. w. Ostindien.

undulata Roxb., wellenblättrige, ♂. w. Ostindien.

Adina Sm. v. *Adina globiflora*. *Gambir* Hunt. etc.

v. *Uncaria* Gambir etc.

Nauenburgia guttata Mch. v. *Lysimachia thyrsiflora*, *N. trinervata* W. v. *Flaveria repanda*.

Navarretia pusilla H. Par. vid. *Aegochloa eryngioides* Nachtr.

Nectaroscordum Lindl., Honiglauch, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

siculum Lindl., sicilianischer, 4. Zw. f. b. k. Sicilien.

Negundo Mönch (*Negundium* Rafin.), Eschenahorn, VIII. 1. (XXII. v.), Sapindaceae-Acerineae.

fraxinifolium Nutt. (*aceroides* Mch.), ahornähnlicher, 5. f. Nordamerika.

b) *crispum* G. Don. c) *violaceum* Booth.

Neja D. Don, *Neja*, XIX. 11., Compositae.

gracilis D. Don, schlanke, 4. k. Mexico.

Nelitris G., Myrtenbeere, XII. 1., Myrtaceae.

Jambosella G., jambosenähnliche, 5. w. Freundschaftsinseln.

Nelsonia RB. (D. Nelson, Begleiter des Capitain Cook), II. 1., Acanthaceae.

hirsuta R. et S., rauhhaarige, 5. w. Ostindien.

Nelumbium Juss. (*Nelumbo* T.), [ceylanischer Name] XIII. VI., Nymphaeaceae.

caspicum Fisch., caspisches, 4. Wa. w. Caspisches Meer.

jamaicense DC., westindisches, 4. Wa. w. Jamaica.

luteum W. (*codophyllum* Rafin.), gelbes, 4. Wa. w. Carolina.

speciosum W., prächtiges, 4. Wa. w. Mittel- und Süd-asien, Aegypten.

Tamara Rhee., malabarisches, 4. Wa. w. Malabar.

Nematostigma paniculatum A. Diet. etc. v. *Libertia paniculata* etc.

Nemesia Vent., Nemesie, XIV. 11., Personatae-Antirrhineae.

bicornis P., zweihörnige, ☉. f. m. Cap der gut. Hoffn. *chamaedryfolia* Vent., gamanderblättrige, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

floribunda Lehm., Benth., schönblühende, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.

foetens Vent., stinkende, 4. k. Cap der guten Hoffn.

Nemopanthès Rafin., Hainblume, XXII. v., Sapotaceae-Aquifoliaceae.

canadensis DC. (*fascicularis* Rafin.), canadische, 5. f. b. Nordamerika.

Nemophila Bartr., Triftenfreund, V. 1., Asperifoliaceae-Hydrophyllae.

atomaria Fisch. et Mey., punktirte, ☉. f. m. Ca forn. *aurita* Lindl., geöhrte, ☉. f. m. Californien.

insignis Benth., ausgezeichnete, ☉. f. m. Californien.

paniculata Spgl., rispige, 4. f. Nordamerika.

parviflora Dougl., kleinblumige, ♂. 4. f. Nordamerika.

peduncularis Dougl., langstielige, ☉. f. Californien.

phacelioides Bartr., phaceliaähnliche, 4. f. Nordamerika.

Neottia L. Rich., Nestorche, XX. 1., Orchideae.

aphylla Hook., blattlose, 4. w. Trinidad.

grandiflora Hook., großblumige, 4. w. Brasilien.

Nidus avis Sw., ächte, 4. f. Europa.

adnata Sw. v. *Pelexia adnata*, *australis* RB. etc. v. *Spiranthes australis* etc. *calcarata* Sw. (et *speciosa* Jacq. vid. *Stenorrhynchos calcaratum* etc.

Neottia

cordata Rich. etc. v. *Listera cordata* etc. *procera* Ker, *repens* Sw. vid. *Goodyera procera* et *repens*.
speciosa Jacq. v. *Stenorrhynchos specios.*

Nepenthes L., Kannenträger, XXII. XIII. (XVI. VII.), ? Aroideae-Nepentheae.

destillatoria L., ceylonischer, 5. w. Ceylon.

Phyllamphora W. (*destillatoria* Lodd.), moluckischer,
5. w. Molucken, Cochinchina.

Nepeta R. L., Katzenmünze, XIV. I., Labiatae.

acinifolia Spgl., acinusblättrige, 4. f. ?

amethystina Poir. (*paniculata* Mill.), amethystfarbige,
4. f. Südeuropa.

angustifolia Vahl (*aragonensis* Lam.), schmalblättrige,
4. f. Spanien.

botryoides Ait. (*annua* Pall., *bipinnata* Cav., *multifida*
L. suppl.), traubige, 4. f. Sibirien.

Cataria L., gemeine, 4. f. Europa, Nordamerika.

β) *citriodora* Balb.

coerulea Ait., blaue, 4. f. ?

crispa W., krause, 4. f. Kleinasien.

diffusa Fisch., weitschweifige, 4. f. Ostsibirien.

fissa C. A. Mey. (*laxa* Benth.), gespaltene, 4. f.
Caucasus.

frutescens Lk., strauchige, 5. w. St. Vincent.

grandiflora MB. (*colorata* W., *melissaefolia* P.), groß-
blumige, 4. f. Caucasus.

graveolens Vill. (*lanceolata* Lam.), starkriechende, 4. f.
Oberitalien, Südfrankreich.

imbricata Lagasc., dichtblumige, 4. f. Spanien.

incana Ait. (*cyanea* Stev.), weißgraue, 4. f. Caucasus.

italica L., italienische, 4. f. Italien.

lamiifolia W., taubnesselblättrige, 4. f. Armenien.

lanata Jacq., wollige, 4. f. Spanien.

latifolia DC. (*grandiflora* Lapeyr.), breitblättrige, 4. f.
Pyrenäen.

lavandulacea L. suppl. (*multifida* L.), lavendelähnliche,
4. f. Sibirien.

longiflora Vent. (*salviaefolia* P., *Mussini* MB.), lang-
blumige, 4. f. Armenien, Caucasus, Persien.

β) *glabrescens* Hoffm.

macroura Ledeb., langrispige, 4. f. Sibirien.

marrubioides W., andornähnliche, 4. f. ?

melissaefolia Lam., melissenblättrige, 4. f. Creta.

β) *planilabiata* Rchb.

multibracteata Dsf., vieldeckblättrige, 4. f. Nordafrika.

Nepetella All., kleine, 4. f. Südeuropa.

nuda L. (*ucranica* MB.), nackte, 4. f. Mittel- und
Osteuropa, Mittelasien.

pannonica L., ungarische, 4. f. Ost- und Südeuropa,
Sibirien.

parviflora MB., kleinblumige, 4. f. Podolien, Taurien,
Caucasus.

racemosa Lam., traubige, 4. f. Kleinasien.

reticulata Dsf., netzförmige, 4. f. Nordafrika.

Scordotis L., scordiumähnliche, 4. f. Creta, Nordafrika.

serpyllifolia MB., quendelblättrige, 4. f. Taurien.

sibirica MB., sibirische, 4. f. Sibirien.

supina Stev., liegende, 4. f. Caucasus.

Nepeta

teucriifolia W., gamanderblättrige, 4. f. Armenien.
teucrioides Lam., gamanderähnliche, 4. f. Kleinasien.
tuberosa L., knollige, 4. Kn. f. Spanien, Portugal.
ucranica L., ukrainische, 4. f. Podolien, Taurien, Caucasus.

violacea L., violette, 4. f. Südeuropa, Sibirien.
croatica Spgl. v. *Calamintha alba*. *malabarica* L.
 v. *Anisomeles malabarica*. *marifolia* Cav. vid. *Calamintha marifolia*. *pectinata* L. v. *Hyptis pectinata*. *versicolor* Trev. v. *Craniotome versicolor*.

Nephelium lappaceum L. v. *Euphoria Nephelium*.

Nephrodium acrostichoides Mchx. v. *Aspidium acrostichoides*. *asplenioides* Mchx. v. *Asplenium Athyrium*. *filix foemina* Mchx. v. *Asplenium Michauxii*.

Nerine Herb., Nerine, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

aurea Swt., goldfarbige, 4. Zw. t. Cap der gut. H.
corusca Herb., schimmernde, 4. Zw. t. Cap d. gut. H.
curvifolia Herb., krummblättrige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

flexuosa Herb., gebogene, 4. Zw. t. Cap der gut. H.
humilis Herb., niedrige, 4. Zw. t. Cap der guten H.
pulchella Herb., schöne, 4. Zw. t. Cap der guten H.
radiata Swt., strahlige, 4. Zw. t. w. China.

rosea Swt., rosafarbige, 4. Zw. t. Cap der guten H.
sarniensis Ker, japanische (*Guernsey-Lilie*), 4. Zw. k. t. Japan.

undulata Herb., wellenblättrige, 4. Zw. t. Cap der guten Hoffnung.

venusta Herb., liebliche, 4. Zw. t. Cap der gut. H.

b) *minor*.

versicolor Herb., bunte, 4. Zw. t. Hybride.

laticoma Ker v. *Brunsvigia lucida*.

Nerium T., Oleander, Lorbeerrose, V. 1., Contortae-Apocynae.

divaricatum Lour., ausgespreizter, 5. k. t. Cochinchina.

flavescens Spin., gelblicher, 5. k. ?

odorum Ait., wohlriechender, 5. k. t. Ostindien.

b) *carneum*. c) *plenum*.

Oleander L., gemeiner, 5. 5. k. Südeuropa.

β) *album*. γ) *splendens*. b) *pomponium*. c)

multiflorum. d) *atropurpureum*. e) *grandiflorum*.

f) *lutescens*. g) *fol. variegat.* h) *macrophyllum*.

i) *versicolor*. k) *striatum*. l) *aurantiacum* etc.

thyrsiflorum Paxt., strauchblumiger, 5. t. Nepal.

antidysentericum L. et *coccineum* Wall. (et *tinctorium* Roxb.) v. *Wrightia antidysenterica* etc. *coronarium* Ait. vid. *Tabernaemontana coronaria*. *tinctorium* Hort. v. *Alstonia scholaris*.

Nesaea Commers., Nesaea, XI. 1., Lythariae.

triflora H. B. K., dreiblumige, 4. k. Südamerika.

salicifolia H. B. K. vid. *Heimia salicifolia*. *verticillata* H. B. K. v. *Decodon verticillatus*.

Neslia Desv., Neslie, XX. 1., Cruciferae.

paniculata L., rispige, ☉. f. Europa, Nordafrika, Mittelasien.

Nestlera Spgl. (C. G. Nestler, Professor der Botanik zu Straßburg), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

biennis Spgl., zweijährige, ♂. k. Cap der gut. Hoffn.

Neurocarpum Desv., Nervenhülse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

guianense Desv., guianische, ♀. w. Guiana.

simplicifolium Kunth, einfachblättrige, ♀. w. Südamer.

Neurochlaena RB., Nervenkelch, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

lobata RB., gelappter, ♀. w. Westindien.

Neuroloma Andr., Neuroloma, XV. III., Cruciferae.

arabidiflorum DC., arabisblumiges, 4. f. b. k. Ost-sibirien.

Neurosperma Rafin., Nervensame, XXI. x., Cucurbitaceae.

cuspidata Rafin., zugespitzter, ♂. f. Nordamerika.

Nicandra Adans. (Nicander, alter griechischer Arzt), V. I., Solanaceae.

indica R. et S., indische, ♂. f. Ostindien.

physaloides G., schlutenähnliche, ♂. f. Peru.

anomala Lk. v. Anisodus luridus.

Nicolsonia DC. (Nicolson, Bearbeiter der Naturgeschichte St. Domingo's), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

barbata DC., bärtige, ♀. w. Jamaica.

Nicotiana T., Tabak (J. Nicot, französischer Gesandter, welcher den Tabak 1564 zuerst nach Frankreich brachte), V. I., Solanaceae.

acuminata Grah., zugespitzter, ♂. f. m. Buenos Ayres.

alata Lk., geflügelter, ♂. f. m. Südamerika.

angustifolia R. et P., schmalblättriger, ♂. f. m. Chili.

bonariensis Lehm., bonarischer, ♂. f. m. Buenos Ayres.

brasiliensis Lk. et Otto, brasilianischer, ♂. f. Brasilien.

cerinthoides Hornem., wachsb Blumenähnlicher, ♂. f. m. Brasilien.

chinensis Fisch., chinesischer, ♂. f. m. China.

decurrens Ag. (*persica* Lindl.), herablaufender, ♂. f. m. Persien.

dilatata Lk., verbreiteter, ♂. f. m. ?

fruticosa L., strauchiger, ♀. k. t. Südchina, Cap d. g. H.

glauca Grah., blaugrüner, ♀. k. t. Buenos Ayres.

glutinosa L., kleberiger, ♂. f. m. Peru.

humilis Dsf., niedriger, ♂. f. m. Aegypten.

Langsdorfii Weinm., Langsdorf's, ♂. f. m. Brasilien.

longiflora Cav., langblumiger, ♂. f. m. Buenos Ayres.

micrantha W. H. B., kleinblumiger, ♂. f. m. ?

multivalvis Lindl., vielklappiger, ♂. f. m. Columbia.

nana Lindl., zwergiger, ♂. f. Nordamerika.

nepalensis Lk. et Otto, nepal'scher, ♂. f. m. Nepal.

noctiflora Hook., nachtblumiger, ♂. f. m. Chili.

paniculata L., rispiger, ♂. f. m. Peru.

petiolata Ag., gestielter, ♂. f. m. Südamerika.

plumbaginifolia Viv. (*acutifolia* Hilar.), plumbagoblättriger, ♂. ♂. f. m. k. Südamerika.

pusilla L. (*tenella* Cav.), kleiner, ♂. w. Mexico.

quadrivalvis Pursh, vierklappiger, ♂. f. Nordamerika.

repanda W. (*lyrata* Kunth.), ausgeschweiffter, ♂. f. m. Cuba.

rotundifolia Lindl., rundblättriger, ♂. f. m. Schwanenflufs.

rustica L., Bauern-T., ♂. f. Süd- u. Osteuropa, Nordafrika, Amerika.

β) tatarica Schult.

sanguinea Lk. et Otto, blutrother, ♂. f. m. Brasilien.

Nicotiana

scabra Lagasc., scharfer, ☉. f. m. Südamerika.
suaveolens Lehm. (*undulata* Vent. RB.), feinriechender,
 ☉. 4. f. m. k. Neuholland.

Szovitsi ? Fisch., Szovit's, ☉. f. m. ? Persien.

Tabacum L., gemeiner, ☉. f. m. Amerika.

a) *attenuata* R. et S. b) *macrophylla* Spgl. c)
pallescens R. et S. d) *alipes* R. et S. e) *sero-*
tina R. et S. f) *gracilipes* R. et S. g) *Verdan*
 R. et S. h) *lingua* R. et S.

undulata R. et P. (*pulmonarioides* Kunth.), wellenblät-
 teriger, ☉. f. m. Peru.

vincaeflora Lag., *vincablumiger*, ☉. ♂. f. m. k. Süd-
 amerika.

viscosa Lehm., schmieriger, ☉. f. m. Buenos Ayres.

ybarrensis H. B. K., Ybarra-T., ☉. f. m. Südamerika.

nyctaginiflora Lehm. et *parviflora* Lehm. v. *Petunia*
nyctaginiflora etc.

Nierembergia R. et P. (J. E. Nieremberg, ein spa-
 nischer Jesuit, schrieb über naturhistorische Gegen-
 stände), V. 1., Solanaceae.

angustifolia H. B. K., schmalblättrige, ♀. t. Chili.

aristata D. Don, grannige, ☉. ♀. t. Parana.

calycina Hook., großkelchige, 4. t. Uruguay.

filicaulis Lindl., fadenstengelige, 4. t. Buenos-Ayres.

gracilis Hook., schlanke, ♀. t. Chili.

linariaefolia Grah., flachsblättrige, ☉. ♀. t. Uruguay.

intermedia Grah. v. *Petunia intermedia*.

Nigella T., Schwarzkümmel, XIII. v., Ranunculaceae.

aristata Sm., gegrannter, ☉. ♂. f. Griechenland.

arvensis L., Acker-S., ☉. f. Europa.

ciliaris DC., gefranzter, ☉. f. Syrien.

coarctata Gmel., gedrungener, ☉. f. Südeuropa.

corniculata DC., gehörnter, ☉. f. ?

damascena L. (*coerulea* Lam.), Garten-S. (Braut in
 Haaren), ☉. f. Südeuropa.

b. flore pleno.

divaricata DC., ausgesperrter, ☉. f. Aegypten.

hispanica L., spanischer, ☉. f. Spanien.

orientalis L., morgenländischer, ☉. f. Syrien, Caucasus.

sativa L., gebauter, ☉. f. Südeuropa, Aegypten.

β) *cretica* DC. γ) *citrina* DC. δ) *indica* DC.

segetalis MB. (*foeniculacea* DC.), Saat-S., ☉. f. Taurien.

Nigritella Rich., Schwarzstendel, XX. 1., Orchideae.

angustifolia Rich., schmalblättriger, 4. Kn. f. Euro-
 päische Alpen.

globosa Rehb., kugelblumiger, 4. Kn. f. Mittel- und
 Südeuropa.

suaveolens Koch (*fragrans* Saut.), wohlriechender, 4. Kn.
 f. Schweiz, Tyrol.

Nintoa *confusa* Swt. *japonica* Swt. *longiflora* Swt. vid.
Lonicera confusa etc.

Nipa Rumph (moluckischer Name), XXI. x., Palmae.

fruticans Thbg., strauchige, ♀. w. Java, Molucken.

Nipholobolus Kaulf., Häufchenfarn, XXIV. 1., Pterioideae.

adnascens Kaulf., angewachsener, 4. w. Ostindien.

albicans Blume, weißlicher, 4. w. Ceylon.

confluens Spgl., zusammenfließender, 4. w. Neuholl.

lineare G. Don, gleichbreiter, 4. w. Japan.

Lingua Spgl., zungenförmiger, 4. w. Japan.

Nipobolus

- pertusus* Spgl., durchbrochener, 4. w. China, Bengalen.
rupestris Spgl., Felsen-H., 4. w. Neuholland.
sinensis J. Bevis, chinesischer, 4. w. China.

Nissolia Jacq. (F. Nissole, franz. Botaniker), XVII. 14.
 (VI), Leguminosae-Papilionaceae.

- aculeata* Spgl., stachelige, ♀. Sch. w. Südamerika.
fruticosa Jacq. L., strauchige, ♀. Sch. w. Südamerika.
glabrata Lk., kahle, ♀. w. ?
microptera Poir., kleinflügelige, ♀. t. w. Teneriffa.
racemosa DC., traubige, ♀. Sch. w. Westindien.
retusa W., abgestutzte, ♀. Sch. w. Südamerika.
robiniaefolia DC., robinienblättrige, ♀. w. St. Vincent.

Nitraria L., Nitrarie, XI. 1., Aizoideae-Tamariscineae.
 Schoberi L., Schober's, ♀. f. b. Mittelasien, Sibirien.

α) *sibirica* Pall. β) *caspiica* Pall.

- tridentata* Dsf., dreizählige, ♀. k. Nordafrika.

Nivenia RB. (J. Niven, welcher auf dem Cap der guten
 Hoffnung Pflanzen sammelte), IV. 1., Proteaceae.

- crithmifolia* RB., meerfenchelblättrige, ♀. t. C. d. g. H.
Lagopus RB., wollige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
media RB., mittlere, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
parvifolia RB., kleinblättrige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
Sceptrum RB., scepterförmige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
spathulata RB., spathelblättrige, ♀. t. Cap d. g. Hoffn.
spicata RB., ährenförmige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

Noccaea mollis Jacq., *rigida* Cav. etc. v. *Lagascea mollis*,
helianthifolia etc. — *alpina* Rchb., *brevicaulis* Rchb.
 v. *Hutchinsia alpina* et *brevicaulis*, *cepeaefolia* Rchb.
 (et *rotundifolia* Rchb.) v. *Thlaspi cepeaefolium* etc.
procumbens Rchb. v. *Capsella procumbens*.**Noisettia** H. B. K. (L. C. Noisette, berühmter Han-
 delsgärtner zu Paris), V. 1., Violaceae.

- longifolia* H. B. K., langblättrige, ♀. w. Südamerika.
pyrifolia Mart. v. *Anchietea pyrifolia*.

Nolana L., Zymbelblume, V. 1., Solanaceae.

- atriplicifolia* D. Don., meldenblättrige, ☉. f. m. Peru.
grandiflora Lehm., großblumige, ☉. f. m. Chili.
paradoxa Lindl., wunderbare, ☉. f. m. Chili.
prostrata L., niederliegende, ☉. f. m. Peru.
tenella Lindl., zarte, ☉. f. m. Chili.

Nolina Mchx. (P. C. Nolin, amerikanischer Botaniker),
 VI. III., Colchicaceae.

- georgiana* Mchx., georgische, 4. f. b. k. Südcarolina,
 Georgien.

Nonatelia Aubl. (guianischer Name), V. 1., Rubiaceae.

- lutea* Aubl., gelbe, ♀. w. Guiana.
officinalis Aubl., officinelle, ♀. w. Jamaica, Guiana.
racemosa Aubl., traubige, ♀. w. Guiana.
violacea Aubl., violette, ♀. w. Guiana.

Nonnea Medic. (J. P. Nonne, ehem. Prof. d. Botanik
 zu Erfurt), V. 1., Asperifoliaceae.

- ciliata* R. et S., gefranzte, ☉. f. Armenien.
flavescens C. A. Mey., gelbliche, ☉. f. Südrussland.
lutea DC., gelbe, ☉. f. Südeuropa.
nigricans DC., schwärzliche, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.
picta Swt., bemalte, ☉. f. Taurien.
pulla DC., schwarzbraune, ♂. f. Mittel- u. Osteuropa.
rosea Lk., rosafarbige, ☉. f. Caucasus, caspisches Meer.

Nonnea

- sordida Fisch. et Mey. (*heterotricha* Auct.), schmutzig-farbige, ☉. f. Caspisches Meer.
 versicolor Swt., buntfarbige, ☉. f. Caucasus.
 violacea DC., violette, ☉. f. Südeuropa.
arvensis DC. *obtusifolia* R. et S. v. *Lycopsis arvensis* et *obtusifolia*.

Norantea Aubl. (Gonoro-Antegri, guianischer Name), XIII. 1., Guttiferae-Marcgraviaeae.

- brasiliensis Choix., brasilianische, ♀. w. Brasilien.
 guianensis Aubl., guianische, ♀. w. Guiana.

Notelaea Vent., Südolive, II. 1., Sapotaceae-Oleinae.

- ligustrina Vent., ligusterähnliche, ♀. t. Van-Diemens-Land.
 longifolia Vent. (*rigida* Dsf.), langblättrige, ♀. t. k. Neuholland.

ovata RB., eiförmige, ♀. t. k. Neuholland.

punctata RB., punctirte, ♀. t. k. Neuholland.

Nothites Cass., Abkraut, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

- melissaefolia DC. (*latifolia* Cass.), melissenblättriges, 4. w. Peru.

Nothochlaena RB., Wollfarn, XXIV. 1., Pterioideae.

- distans RB. (*remota* Kaulf.), entferntblättriger, 4. w. Neuholland, Neucaledonien.

Eckloniana J. Bevis, Ecklon's, 4. t. w. Cap d. g. H.

lanuginosa Desv., ächter, 4. t. w. Griechenland, Spanien, Nordafrika.

Marantae RB., Maranta's, 4. k. t. Südeuropa, Teneriffa.

nivea Desv., schneeweißer, 4. w. Südamerika.

piloselloides Kaulf., pilosellaähnlicher, 4. w. Ostindien, Japan.

Pumilio RB., kleiner, 4. w. Neuholland.

sinuata Kaulf., buchtiger, 4. w. Neuspanien, Peru.

tenera Gill., zarter, 4. w. Mendoza.

cheilanthoides Spgl. v. *Cheilanthes microphylla*.

Notobasis Cass., Hülldistel, XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

- syriaca Cass., syrische, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Syrien, Nordafrika.

Notoceras RB., Hornschote, XV. 111., Cruciferae.

canariense RB., canarische, ☉. f. Canarische Inseln.

hispanicum DC., spanische, ☉. f. Spanien.

quadricorne DC., vierspitzige, ☉. f. Sibirien.

Notylia Lindl., Schwielenorche, XX. 1., Orchideae.

Barkeri Lindl., Barker's, 4. w. Mexiko.

incurva Lindl., einwärtsgekrümmter, 4. w. Trinidad.

micrantha Lindl., kleinblumiger, 4. w. Demerara.

punctata Lindl., punctirter, 4. w. Trinidad.

tenuis Lindl., dünner, 4. w. Demerara.

Nunnezia fragrans W. v. *Chamaedorea fragrans*.**Nuphar** Sm. (*Nenuphar* Hayne), Neufar, arabischer Name für Nymphaea, XIII. 1. Nymphaeaceae.

advenum Ait., dreifarbige, 4. Wa. f. Nordamerika.

Kalmianum Ait., Kalm's, 4. Wa. f. Nordamerika.

luteum Sm., gelbe, 4. Wa. f. Europa, Asien, Nordamer.

pumilum Sm. (*minima* Sm.), kleine, 4. Wa. f. Nordeuropa.

sagittaeifolium Pursh, pfeilblättrige, 4. Wa. f. k. Carolina, Georgia.

sericeum Lang, seidenhaarige, 4. Wa. f. Ungarn.

Nuphar

Spennerianum Gaud., Spenner's, 4. Wa. f. Süd-
deutschland.

Nuttallia Dick. (Thomas Nuttall, Professor der Bo-
tanik zu Philadelphia), XVI. VIII., Malvaceae.

cordata Lindl., herzblättrige, 4. f. b. k. Nordamerika.

digitata Dick., Hook. (*grandiflora* Paxt., ? *speciosa* Hort.),
fingerförmige, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

malvaeflora Fisch. et Mey., malvenblumige, 4. f. b. k.
Columbia.

Papaver Grah., mohnartige, 4. f. b. k. Louisiana.

pedata Dick., Nutt., fufsförmige, 4. Kn. f. b. k. Nord-
amerika.

Nyctanthes L., Nachtblume, II. I., Sapotaceae-
Jasmineae.

arbor tristis L., baumartige, 5. w. Ostindien.

Nycterinia D. Don, Nachtlarvler, XIX. II., Personatae-
Antirrhineae.

fragrans D. Don, wohlriechender, 5. k. t. Cap der
guten Hoffnung.

lychnidea D. Don, lychnisähnlicher, 5. k. t. Cap der
guten Hoffnung.

tristis D. Don, dunkelblumiger, 5. k. t. Cap der
guten Hoffnung.

Nycterisition R. et P., Fledermausbaum, V. I.,
Sapotaceae.

ferrugineum R. et P., rostfarbiger, 5. w. Südamerika.

Nycterium Vent., Nachtkraut, V. I., Solanaceae.

amazonium Lk. (*Lamberti* Swt.), Amazonen-N., 5. t.
Mexico.

cordifolium Vent. (*Vespertilio* Lk.), herzblättriges, 5. t.
Canarische Inseln.

cornutum Lk., gehörntes, 5. t. Mexico.

Fontanesianum Dun., Desfontaine's, 6. f. m. ? Brasilien.

heterandrum * (*lobatum* Swt.) verschiedenbeuteliges,
6. f. Louisiana.

heterodoxon Dun., veränderliches, 6. f. m. Mexico.

rostratum Lk., schnabelförmiges, 6. f. m. Mexico.

Nymphaea T., Seerose, XIII. I., Nymphaeaceae.

alba L., weisse, 4. Wa. f. Europa, Canada.

β) canadensis.

ampla DC. (*Rudgeana* Mey.), große, 4. Wa. w. West-
indien, Aegypten.

blanda Mey., liebliche, 4. Wa. w. Surinam.

coerulea Savign. (*stellata* var. Bot. mag.), blaue, 4.
Wa. w. Unterägypten.

cyanea Roxb. (*caklara* Donn), kornblumenblaue, 4.
Wa. w. Ostindien.

edulis DC., genießbare, 4. Wa. w. Bengalen.

Lotus L., Lotus-S., 4. Wa. w. Aegypten.

minor DC. (*odorata* β. *minor* Sims), kleine, 4. Wa. f.
Nordamerika.

nitida Sims (*odorata* W.), glänzende, 4. Wa. f.
Sibirien.

odorata Ait., wohlriechende, 4. Wa. f. Nordamerika.

pubescens W., weichhaarige, 4. Wa. w. Ostindien.

pygmaea Ait., zwergige, 4. Wa. w. China.

reniformis Walt., nierenförmige, 4. Wa. k. Carolina.

Nymphaea

rubra Roxb., rothe, 4. Wa. w. Ostindien.

β *rosea* Bot. mag.

scutifolia DC. (*coerulea* Andr.), schildblättrige, 4. Wa. w. Cap der guten Hoffnung.

stellata W., sternförmige, 4. Wa. w. Malabar.

thermalis DC. (*Lotus* W. K.), ungarische, 4. Wa. w. Ungarn.

versicolor Roxb., buntfarbige, 4. Wa. w. Bengalen.

advena Ait. etc. v. *Nuphar advenum*. *Nelumbo* L.

v. *Nelumbium speciosum*.

Nyssa L., Tupelobaum, V. I. (XXIII. II.), Sandalaceae.

aquatica L. (*biflora* Mchx., *caroliniana* Poir.), Wasser-T., f. f. b. Nordamerika.

candicans Mchx. (*capitata* Walt., *coccinea* Bartr.), weislicher, f. f. b. Nordamerika.

denticulata Ait. (*grandidentata* et *angulisans* Mchx., *angulosa* Poir., *uniflora* Wangenh.), gezähnelter, f. f. b. k. Carolina.

tomentosa Mchx., filziger, f. f. b. Nordamerika.

villosa Mchx. (*sylvatica* et *montana* Hort., *multiflora* Wangenh., *integrifolia* Ait.), zottiger, f. f. b. Nordamerika.

Obeliscaria columnaris DC., *pinnata* Cass. etc. vid. *Rudbeckia columnaris* etc.

Oberonia Lindl., Oberonie, XX. I., Orchideae.

recurva Lindl., zurückgekrümmte, 4. w. Bombay.

Obesia Haw. v. *Stapelia*.**Obione muricata** G. v. *Atriplex sibirica*.**Ochna** L., Ochne, XIII. I., Tricoccae-Ochnaceae.

arborea Burch., baumartige, f. t. w. Cap der gut. H. *atropurpurea* DC., schwarzpurpurrothe, f. t. Cap der guten Hoffnung.

lucida Lam. (*squarrosa* Rottb.), schimmernde, f. w. Ostindien.

mauritiana Lam., mascarenische, f. w. Mascarenas.

multiflora DC., vielblumige, f. w. Sierra Leone, Ostindien.

nitida DC., glänzende, f. w. Ostindien.

obtusata DC. (? *squarrosa* L.), stumpfblättrige, f. w. Ostindien.

zeylanica Lam. v. *Gomphia zeylanica*.

Ochroma Sw., Bleichwolle, XVI. II., Malvaceae-Bombaceae.

Lagopus Sw., hasenfußförmige, f. w. Westindien.

tomentosum W., filzige, f. w. Südamerika.

Ochrosia Juss., Bleichholz, V. I., Contortae-Apocynae.

borbonica Juss., borbonisches, f. w. Mascarenas.

Ochrus P., Bleicherbse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

pallida P., südliche, ☉. Sch. f. Südeuropa, Griechenl.

Ochthodium DC., Warzennüßchen, XV. I., Cruciferae.

aegyptiacum DC., aegyptisches, ☉. f. Aegypten, Syrien, Griechenland.

Ocotea turbacensis H. B. K. v. *Laurus exaltata*.**Octomeria** RB., Octomerie, XX. II., Orchideae.

gracilis Lodd., schlanke, 4. w. Brasilien.

Octomeria

graminifolia RB., grasblättrige, 4. w. Westindien.

serratifolia Hook., sägeblättrige, 4. w. Brasilien.

spicata D. Don, ährige, 4. w. Nepal.

teretifolia Batem., rundblättrige, 4. w. Brasilien.

Ocymum T., Basilienkraut, XIV. 1., Labiatae.

album L., weisses, ☉. f. m. w. Ostindien, Java.

americanum L., amerikanisches, ☉. f. m. w. Südamer.

Basilicum L., gemeines, ☉. f. m. Ostindien, Persien.

β) crispum. γ) latifolium. δ) maximum (*bullatum*). ε) nigrum.

canum Sims, weisßgraues, ☉. f. m. China.

caryophyllum Roxb., nelkenduftendes, 4. w. Ostind.

cordifolium Boj., herzblättriges, ♀. w. ? Mauritius.

crispum Thbg., krauses, ☉. f. m. Japan.

febrifugum Ker, Lindl., fiebertreibendes, ♀. w. Sierra Leone.

grandiflorum L'Her., großblumiges, ♀. w. Abyssinien, Arabien.

gratissimum L., angenehmes, ♀. w. Ostindien.

inodorum Lam., geruchloses, ☉. f. m. Ostindien.

menthoides L., münzenähnliches, ☉. f. m. Ostindien.

micranthum W., kleinblumiges, ☉. f. m. ?

minimum L., kleinstes, ☉. f. m. Ceylon.

b) nigrum.

pilosum W., haariges, ☉. f. m. ?

sanctum L., heiliges, ☉. f. m. Ostindien.

suave W. (*urticaefolium* Roth), lieblichriechendes, ♀. w. ?

thyrsiflorum L., strauchsblumiges, ☉. ♂. w. Ost- und Westindien.

villosum Roxb., zottiges, 4. w. Ostindien.

viride W. (*viridiflorum* Roth), grünes, ♀. w. ?

capitellatum L. vid. *Acrocephalus capitatus*. *molle*

Ait., *monachorum* L. (et *scutellarioides* L.) vid.

Plectranthus mollis etc. *polycladum* Lk., *poly-*

stachyon L. etc. v. *Moschosma ocymoides* etc.

Odontarrhena *Marschalliana* C. A. Mey. etc. vid. *Alyssum* *Marschallianum* etc.

Odontites Hall., Zahntrost, XIV. 11., Personatae-Rhinantheae.

linifolia Rehb., flachsblättriger, ☉. f. Italien, Südfrankreich.

lutea Rehb., gelber, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.

serotina Rehb., spätblumiger, ☉. f. Südeuropa.

verna Rehb., Frühlings-Z., ☉. f. Europa.

Odontoglossum H. B. K., Zahnstendel, XX. 1., Orchideae.

cordatum Lindl., herzförmiger, 4. w. Mexico.

Oeceoclades Lindl., Aststendel, XX. 1., Orchideae.

falcata Lindl., sichelförmiger, 4. w. China.

maculata Lindl., gefleckter, 4. w. Afrika.

Oedera L. (G. C. Oeder, dänischer Botaniker), XIX. v., Compositae-Corymbiferae.

prolifera L., sprossende, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

aliena L. fl. Jacq. v. *Heterolepis decipiens*.

Oedipachne Lk., Haarspindel, III. 11., Gramineae.

punctata Lk., punktirte, 4. w. Westindien, Südamerika, Westafrika, Neuholland.

Oenanthe T., Rebendolde, V. II., Umbelliferae.

apiifolia Broter., sellerieblättrige, 4. Kn. f. Portugal.
crocata L., safranfarbige, 4. Kn. f. England, Galicien.
fistulosa L., röhrlige, 4. f. Europa.

β) *Tabernaemontani* Gmel.

globulosa L. (*diffusa* Lag.), kugelfrüchtige, 4. Kn. f.
 b. k. Südeuropa, Nordafrika.

inebrians Thbg., trunkenmachende, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

interrupta Thbg., unterbrochene, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

involuta Cav., hüllige, 4. f. b. Spanien.

Lachenalii Gmel. (*rhenana* DC., *megapolitana* W., *mi-chelfeldensis* Lach., *gymnorrhiza* Brignol.), Lachenal's, 4. f. Nord- und Süddeutschland, Italien, Frankreich, Nordamerika.

nodiflora Schousb., knotenblumige, 4. ♂. f. Nordafrika.

peucedanifolia Poll. (*Pollichii* Gmel., *filipenduloides* Thuill.), haarstrangblättrige, 4. Kn. f. Mitteleuropa, Nordamerika.

β) *approximata* Merat.

pimpinelloides L. (*chaerophylloides* Pour.), bibernellblättrige, 4. Kn. f. Mittel- und Westeuropa.

β) *rapacea* Koch (β. *pimpinellaefolia* DC., *vir-gata* Poir.).

prolifera L., sprossende, 4. Kn. f. b. Süditalien, Creta, Kleinasien.

silaifolia MB. (*virgata* Hort., *prolifera* Host.), silausblättrige, 4. Kn. f. England, Krain, Taurien.

tenuifolia Thbg., feinblättrige, 4. k. Cap der gut. H.

Oenocarpus Mart., Weinfrucht, XXI. VI. (VI. III.), Palmae.

Batava Mart., Batava-W., h. w. Südamerika.

Oenoplia volubilis R. et S. v. *Berchemia volubilis*.**Oenothera** L. (*Onagra* T.), Nachtkerze, VIII. I., Onagrariae.

acaulis Cav. (*taraxucifolia* Swt. et Hort.), stengellose, 4. k. Chili.

albicans Lam., weißliche, ♂. f. k. Peru.

albicaulis Fras., weißstengelige, ♂. f. Nordamerika.

ambigua Nutt. (*canadensis* Gold.), zweifelhafte, 4. f. b. Nordamerika.

anisoloba Swt., ungleichlappige, 4. k. Chili.

biennis L., gemeine, ♂. f. Nordamerika, Europa.

β) *gauroides* Hornem.

bifrons D. Don, zweiflügelige, ♂. k. Texas.

caespitosa Sims (*scapigera* Pursh), rasenartige, 4. f. Nordamerika.

chilensis H. Par., chilesische, ♂. f. Chili.

clavata Kunth, keulförmige, ♂. f. Mexico.

corymbosa Lam., traubendoldige, ♂. 4. f. k. Mexico.

cruciata Nutt., kreuzblumige, ♂. f. Nordamerika.

decumbens Dougl., niederliegende, ♂. f. Westliches Nordamerika.

densiflora Lindl., dichtblumige, ♂. f. Neucalifornien.

Drummondii Hook., Drummond's, 4. k. Texas.

erosa Hornem., ausgebissene, ♂. f. ?

Oenothera

Fraseri Pursh (*tetragona* Roth, *mollis* Goldie), Fraser's,
4. f. Nordamerika.

b) *variegata* J. C.

fruticosa L., strauchige, 4. f. Nordamerika.

glauca Mchx., blaugrüne, 4. f. Nordamerika.

b) *variegata* Hort.

globularis H. C., kugelförmige, ♂. f. ?

gracilis Schrad. (*riparia* Nutt.), schlanke, ♂. 4. f.
Nordamerika.

grandiflora Ait. (*suaveolens* P.), großblumige, ☉. f.
Nordamerika.

β) *spectabilis* Hornem.

humifusa Nutt. (*concinna* D. Don), niedergestreckte, ☉.
f. Florida.

hybrida Mchx., Bastard-N., 4. f. Nordamerika.

incana Bart., greisgraue, ♂. f. Nordamerika.

Lindleyana Dougl., Lindley's, ☉. f. Westl. Nordamer.

linearis Mchx., gleichbreitblättrige, 4. f. b. Nordamer.

longiflora Jacq., langblumige, ☉. ♂. f. Buenos-Ayres.

macrocarpa Pursh, großfrüchtige, 4. f. Nordamerika.

media Lk., mittlere, 4. f. b. k. Nordamerika.

missouriensis Sims (*alata* Nutt.), missourische, 4. f.
Nordamerika.

mollissima L., weichblättrige, ♂. f. Buenos-Ayres.

muricata Murr., weichstachelige, ♂. f. Nordamerika.

nervosa Horn., nervige, ♂. 4. f. ?

nocturna Jacq., nächtliche, ♂. k. Cap der gut. Hoffn.

odorata Jacq. (*undulata* Dryand.), wohlriechende, ♂. f.
Patagonien.

parviflora L., kleinblumige, ♂. f. Nordamerika.

pinnatifida Nutt., fiederspaltige, ☉. f. Nordamerika.

pubescens W., weichhaarige, ♂. f. k. Südamerika.

pumila L., kleine, 4. f. Nordamerika.

purpurea L., purpurfarbige, ☉. f. Westl. Nordamerika.

pusilla Mchx., zwergige, 4. f. Nordamerika.

quadrivulnera Dougl., vierfleckige, ☉. f. Westliches
Nordamerika.

Romanzovii Ledeb., Romanzov's, ☉. f. Westliches
Nordamerika.

rosea Ait., rosafarbige, 4. k. Peru.

roseo-alba Bernh. (*amoena* Hort.), weifs-rothe, ☉. f.
Nepal.

salicifolia Dsf., weidenblättrige, ♂. f. ?

Sellowii Lk. et Otto, Sellow's, ♂. k. Monte-Video.

serotina Hort., spätblumige, ♂. 4. f. ?

serrulata Nutt., sägezähnige, 4. f. b. k. Nordamerika.

sinuata L. (*laciniata* Hill), buchtigblättrige, ☉. f.
Nordamerika.

β) *minima* Hook.

speciosa Nutt., prächtige, 4. f. b. k. Louisiana.

b) *major* J. C.

stricta Ledeb. (*mutabilis* H. P.), steife, ☉. f. ?

tenella Cav., zarte, ☉. f. Chili.

tenuifolia Cav., dünnblättrige, ☉. f. Peru.

tetraptera Cav., vierflügelige, ☉. 4. f. k. Neuspanien.

triloba Bartr. (*rhizocarpa* Spgl.), dreilappige, 4. f.
Nordamerika.

verticillata F. et Mey., wirtelförmige, ☉. f. ? Westliches
Nordamerika.

Oenothera

villosa Thbg., zottige, ☉. ♂. f. k. Cap der gut. Hoffn.
viminea Dougl., gertenartige, ☉. f. Westl. Nordamerika.
virgata R. et P., ruthenförmige, ☉. f. Peru.

Chamissonis Lk. (*dentata* Lindl.), *cheiranthifolia* Hornem., *contorta* Dougl., *hirta* Lk. (*micrantha* Hornem.), *minima* Pursh, *spiralis* Hook. v. *Sphaerostigma Chamissonis*, *cheiranthifolium*, *minutiflorum*, *hirtum*, *minimum* et *spirale*.

Ohlendorffia Lehm. (Ohlendorff, botanischer Gärtner in Hamburg), XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

procumbens Lehm., niederliegende, ♀. k. t. Südafrika.

Olax L., Kelchnuß, III. I., Sapotaceae-Olacineae.

imbricata Roxb., dachblumige, ♀. Sch. w. Ostindien.

scandens Roxb., schlingende, ♀. Sch. w. Ostindien.

Oldenlandia L. (H. B. Oldenland, dänischer Botaniker), IV. I., Rubiaceae.

corymbosa L., traubendoldige, ☉. f. m. Südamerika, Cap der guten Hoffnung.

diffusa Roxb., weitschweifige, ☉. f. m. Ostindien.

herbacea Roxb., krautige, ☉. f. m. Ostindien.

lactea Cham. et Schltdl. (*umbellata* Hort., *Hedyotis lactea* W., *cymosa* Spgl.), milchweisse, ☉. f. m. Ostindien.

ramosissima Fisch., ästige. ☉. 4. w. ?

umbellata L., doldige, ☉. ♂. f. m. w. Ost- und Westindien.

Deppeana Cham. et Schl. v. *Gerontogea Deppeana*.
repens L. v. *Dentella repens*.

Olea T., Oelbaum, II. I., Sapotaceae-Oleaceae.

americana L., amerikanischer, ♀. k. t. Carolina.

capensis L., capischer, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

cernua Vahl (*obtusifolia* Lam.), übergebogener, ♀. ♀. w. Mascarenas.

chrysophylla Lam. (*europaea ferruginea* Ait.), goldblättriger, ♀. k. ?

dioica Roxb., zweihäusiger, ♀. w. Ostindien.

emarginata Vahl, Lam., ausgerandeter, ♀. w. Madagascar.

europaea L. (*sativa* Lk.), gemeiner, ♀. k. Südeuropa, Orient.

β) *longifolia*, γ) *latifolia*. δ) *obliqua*. ε) *buxifolia*.

excelsa Ait. (*exasperata* Jacq.), hoher, ♀. k. t. Canarische Inseln.

? β) *arborea* Lodd.

fragrans Thbg., wohlriechender, ♀. k. t. China, Japan, Cochinchina.

lancea Lam. (*exasperata* W.), lanzettblättriger, ♀. w. Mascarenas.

Oleaster Lk. et Hoffg., wilder, ♀. k. Süd- und Westeuropa.

paniculata RB., rispiger, ♀. k. t. Neuholland.

Roxburghii Spgl. (*paniculata* Roxb.), Roxburgh's, ♀. w. Ostindien.

undulata Jacq., wellenblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

verrucosa Lk., warziger, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

apetala Andr. v. *Notelaea longifolia*.

Olearia dentata Mch. etc. v. *Aster dent.*, etc.

- Oligocarpus** Less., Kargfrüchtler, XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.
calendulaceus Less., calendulaähnlicher, 4. f. k. Cap der guten Hoffnung.
- Olinia** Thbg., Olinie, V. i., Rhamneae.
cymosa Thbg., afterdoldige, f. k. t. Cap der gut. H.
- Oliveria** Vent. (G. A. Olivier, französischer Naturforscher, welcher den Orient und Aegypten bereiste), V. ii., Umbelliferae.
decumbens Vent., niederliegende, o. f. Bagdad.
- Olynthia** Lindl., Olynthie, XII. i., Myrtaceae.
disticha Lindl., zweizeilige, f. w. Jamaica.
- Olyra** L., Olyra, XXI. iii. (III. ii.), Gramineae.
latifolia L. (*paniculata* Sw.), breitblättrige, 4. w. Jamaica.
pauciflora Sw. (*axillaris* Sw.), wenigblumige, 4. w. Jamaica, Cajenne.
- Omalanthus** Ad. Juss., Flachblumig, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.
populifolius Grah., pappelblättrige, f. w. t. Neuhol.
- Omalotheca** *supina* DC. v. *Gnaphalium supinum*.
- Omphalea** L., Omphalea (Nabelanthere), XXI. x. (XVI. i.), Tricoccae-Euphorbiaceae.
diandra L. (*cordata* Sw.), zweimännige, f. w. Westind.
 β) *diversifolia*.
triandra L. (*nucifera* Sw.), dreimännige, f. w. Westindien, Südamerika.
- Omphalobium** G., Nabelstrauch, XVI. vi., Amyrideae-Connaraceae.
africanum DC., afrikanischer, f. w. Westafrika.
indicum G., indischer, f. w. Ceylon, Molucken.
Schotia Jcq. fil. v. *Schotia latifolia*.
- Omphalodes** T., Venusnabel, V. i., Asperifoliaceae.
amplexicaulis Lehm. (*Cynoglossum brassicaefolium* Lag., *lusitanicum* Vahl), stengelumfassender, o. f. Spanien.
linifolia Mch., flachsblättriger, o. f. Süd- und Westeuropa.
litoralis Lehm., Strand-V., o. f. Westfrankreich.
myosotoides Decaisne, mausöhrchenähnlicher, 4. k. Libanus, Creta.
nitida Lehm. (*Cynogl. lusitanicum* Brot.), glänzender, 4. f. b. k. Portugal.
scorpioides Schrk., Lehm., vergiftsmeinnichtähnlicher, 4. f. Böhmen, Mähren, Sachsen etc.
sempervirens D. Don, immergrüner, 4. f. England, Südeuropa.
verna Mch., Frühlings-V. (Garten-Vergiftsmeinnicht), 4. f. Südeuropa.
- Oncidium** Sw., Höckerstendel, XX. i., Orchideae.
altissimum Sw., höchster, 4. w. Westindien.
ampliatum Lindl., breitlippiger, 4. w. Südamerika.
barbatum Lindl., bärtiger, 4. w. Südamerika.
bicornutum Hook., zweihörniger, 4. w. Brasilien.
bifolium Sims, zweiblättriger, 4. w. Südamerika.
carthagenense Sw., carthagenischer, 4. w. Jamaica, Neu-Granada.
Cavendishianum Batem., Cavendish's, 4. w. Guatimala.
Cebolleta Sw., bauchblättriger, 4. w. Neu-Granada.

Oncidium

- ciliatum Lindl., gefranzter, 4. w. Brasilien.
 citrinum Lindl., citronfarbiger, 4. w. Trinidad.
 confragosum Lindl., rauher, 4. w. Mexico.
 cornigerum Lindl., gehörnter, 4. w. Brasilien.
 crispum Lodd., krauser, 4. w. Brasilien.
 deltoideum Lindl., deltaförmiger, 4. w. Peru.
 divaricatum Lindl., ausgesperrter, 4. w. Brasilien.
 Donianum Batem., Don's, 4. w. Guatemala.
 flexuosum Ker, gebogener, 4. w. Brasilien.
 Forbesii Hook., Forbes's, 4. w. Südamerika.
 Harrisonianum Lindl., Harrison's, 4. w. Brasilien.
 hians Lindl., klaffender, 4. w. Brasilien.
 intermedium Berter., mittlerer, 4. w. Jamaica.
 iridifolium H. B. K., schwertelblättriger, 4. w. Surinam.
 juncifolium Spgl., simsensblättriger, 4. w. Westindien.
 Lanceanum Lindl., Lance's, 4. w. Südamerika.
 Lemonianum Lindl., Lemon's, 4. w. Havana.
 leucochilum Lindl., weifslippiger, 4. w. Demerara.
 lunatum Lindl., mondförmiger, 4. w. Demerara.
 luridum Lindl., graubrauner, 4. w. Südamerika.

β) guttatum Lindl. (*Boydii* Hort.).

ornithorrhynchon H. B. K., vogelschnabelähnlicher, 4. w. Mexico.

- Papilio Lindl., schmetterlingsblumiger, 4. w. Trinidad.
 puber Lindl., kammförmiger, 4. w. Brasilien.
 pulchellum Hook., schöner, 4. w. Westindien.
 pulvinatum Lindl., polsterförmiger, 4. w. Brasilien.
 pumilum Lindl., kleiner, 4. w. Brasilien.
 raniferum Lindl., froschlauchähnlicher, 4. w. Brasilien.

β) majus Hook.

- Russelianum Lindl., Russel's, 4. w. Brasilien.
 stramineum Batem., strohfarbiger, 4. w. Vera-Cruz.
 Tayleurii Batem., Tayleur's, 4. w. Mexico.
 tetrapetalum W., vierkronenblättriger, 4. w. Westind.
 triquetrum RB., dreiseitiger, 4. w. Jamaica.
 variegatum Sw., bunter, 4. w. Westindien.

Oncorhynchus Fisch. et Mey., Schnabellippler, XIV. II., Personatae-Rhinantheae.

tenellus Fisch. et Mey., zarter, ☉ ♂. f. k. Chili.

Onobroma G., Kreuzdistel, XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

flavescens Spgl., gelbliche, ☉. f. Armenien.

arborescens Spgl. et *dentatum* Spgl. et *glaucum* Spgl. v. *Kentrophyllum arborescens* etc. *coeruleum* G. (et *mitissimum* Spgl., *monspeliense* Spgl. et *pinnatum* Spgl.) vid. *Carduncellus coeruleus* etc. *corymbosum* Spgl. vid. *Broteroa corymbosa*. *cynaroides* Spgl., *macrocephalum* Mey. v. *Cousinia cynaroides* etc. *salicifolium* Lk. vid. *Carlina salicifolia*.

Onobrychis T., Esparsette, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

alba Spgl., weisse, ♂. 4. f. Ungarn.

arenaria DC. (*carnea* Schlchr.), Sand-E., ♂. 4. f. Südliche Schweiz, österreichisches Litorale, Ungarn.

Buxbaumiana Desv. (*Hedysarum Pallasi* W., *H. Buxbaumianum* Pall., *radiatum* Dsf.), Buxbaum's, 4. f. Armenien, Taurien.

Onobrychis

Caput galli Lam., Hahnenkopf-E., ☉. f. Süd- und Westeuropa.

carpathica (W. Kit.), carpathische, ♂. 4. f. Carpathen.

conferta Spgl., gedrängte, ♂. 4. f. Numidien, Caucasus.

cretica Desv., cretische, ♂. f. Creta, Süditalien.

crinita Spgl., mähnlige, ♀. w. Ostindien.

Crista galli Lam., Hahnenkamm-E., ☉. f. Südeuropa.

exaltata Fisch., hohe, ♂. 4. f. Taurien.

glabra Desv., kahle, ♂. 4. f. Taurien.

gracilis Bess., schlanke, ♂. 4. f. Podolien.

Hohenackeriana C.A.Mey., Hohenacker's, 4. f. Talüsch.

mareotica Stev., mareotische, ♂. 4. f. Osteuropa.

montana DC., Berg-E., ♂. f. Italienisch-franz. Alpen.

orientalis Desv. (*Hedysarum cornutum* L.), morgenländische, ♀. f. b. k. Armenien.

petraea Spgl. (*tanaitica* Spgl.), Felsen-E., ♂. 4. f. Caucasus.

picta Desv. (*Michauxii* DC.), buntfarbige, ♂. 4. f. Levante.

procumbens Stev., niederliegende, ♂. 4. f. Caucasus.

ptolemaica Spgl., ptolemäische, ♂. 4. f. b. k. Aegypten.

sativa Lam. (*viciaefolia* Scop.), gemeine, ♂. 4. f. Europa, Mittelasien.

saxatilis Lam., Gesteins-E., ♂. 4. f. Südfrankreich, Italien.

supina DC., niedrige, ♂. 4. f. Frankreich.

sororia Dsf. v. *Eleiotis sororia*.

Onoclea L., Fühlfarn (Rofsarn), XXIV. I., Pterideae.

obtusiloba Schk., stumpflappiger, 4. f. Pennsylvanien.

sensibilis L., virginischer, 4. f. Virginien.

Spicant Hoffm. v. *Lomaria Spicant*. *Struthiopteris*

Sw. v. *Struthiopteris germanica*.

Ononis T., Hauhechel, XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

alopecuroides L., fuchsschwanzartige, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

angustissima Lam., schmalblättrige, ♀. k. Spanien.

antiquorum L. (*spinosa* γ. *glabra* DC.), kahlstachelige, ♀. f. Südeuropa.

apula Ten., apulische, ♂. f. k. Apulien.

aragonensis Asso. (*dumosa* Lap.), aragonische, ♀. f. b. k. Spanien.

arborescens Dsf., großstrauchige, ♀. k. Numidien.

arenaria DC., sandliebende, ♀. k. Südfrankreich.

biflora Dsf., zweiblumige, ☉. f. Nordafrika.

brachycarpa DC., kurzhülsige, ☉. f. Spanien.

breviflora DC., kurzblumige, ☉. f. Südeuropa.

capensis L., capische, ☉. f. m. Cap der guten Hoffn.

capitata Cav., kopfblumige, 4. k. Südspanien.

cenisia L., cenisische, 4. ♀. f. b. k. Oberitalien, Pyrenäen.

β) *subaristata* DC.

cernua L., gebogenhülsige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

Cherleri L., Cherler's, ☉. f. Südeuropa.

Columnae All. (*parviflora* Lam., *subocculta* Vill., *minutissima* Jacq.), Columna's, ♂. 4. f. b. k. Südeuropa, Nordafrika.

crispa L., krause, ♀. k. Spanien.

Ononis

- cuspidata Dsf., feinspitzige, 4. k. Nordafrika.
 Denhardtii Ten., Denhardt's, ♂. f. k. Neapel.
 diffusa Ten., weitschweifige, ☉. f. Neapel, Sicilien.
 emarginata Boj., ausgerandete, ♀. w. Mauritius.
 falcata Viv., sichelförmige, ♀. k. Italien.
 foetida Schousb., stinkende, ☉. f. Marocko.
 fruticosa L., strauchige, ♀. f. b. Frankreich, Spanien.

β) microphylla DC.

- geminata Ait. (? excisa Thbg.), zweiblumige, 4. k. Cap der guten Hoffnung.
 geminiflora Lag., paarblumige, ☉. f. Spanien.
 glabra Thbg., glättliche, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
 hircina Jcq. (altissima Lam., arvensis L. syst., foetens All.), bockduftende, 4. ♀. f. Nord-, Mittel- und Ostdeutschland, Ungarn, Galicien, Italien.
 hispanica L., spanische, ♀. k. Spanien.
 hispida Dsf. (hirta Poir.), steifhaarige, 4. ♀. k. Nordafrika.
 longifolia W., langblättrige, ♀. k. Teneriffa.
 minutissima L. (saxatilis Lam., barbata Cav.), kleinste, ♂. k. Südeuropa.
 mitissima L., unbewehrte, ☉. f. Portugal, Sicilien, Griechenland.
 monophylla Dsf., einblättrige, ☉. f. Nordafrika.
 Natrix L., gelbe, 4. ♀. f. b. k. Südeuropa.

β) pinguis L.

- oligophylla Tenor., wenigblättrige, ☉. f. Calabrien, Sicilien.
 ornithopodioides L., vogelfußsähnliche, ☉. f. Sicilien, Spanien.
 pallida Horn., bleiche, ☉. f. ?
 parviflora Berg., Thbg., kleinblumige, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung.
 peduncularis Lindl., langstielige, ♀. k. Teneriffa.
 pendula Dsf., überhängende, ☉. f. Nordafrika, Sicilien.
 picta Dsf., bemalte, 4. ♀. k. Nordafrika.
 pubescens L. (calycina Lam., Morisonii Gouan, arthropodia Brot.), weichhaarige, ☉. f. Frankreich, Spanien, Portugal.
 ramosissima Dsf., ästige, ♀. k. Nordafrika, Sicilien, Creta.
 reclinata L., zurückgebeugte, ☉. f. Südfrankreich.
 repens L. (arvensis Sm., procurrens Wallr.), kriechende, 4. ♀. f. Europa.

β) mitis Gmel.

- rotundifolia L., rundblättrige, 4. ♀. f. b. k. Süd- und westeuropäische Voralpen.

β) aristata DC.

- sicula Guss., sicilianische, ☉. f. Sicilien.
 spinosa L. (campestris Koch et Ziz.), gemeine, 4. ♀. f. Europa.

b) alba. β) macracantha Clark.

- striata Gouan (reclinata Lam., aggregata Asso), gestreifte, 4. k. Spanien.
 tribracteata DC., dreideckblättrige, 4. ♀. f. Südeuropa.
 tridentata L., dreizählige, ♀. k. Spanien.
 umbellata Thbg., doldige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
 vaginalis Vahl, scheidige, ♀. k. Aegypten, Nordafrika.

Ononis

- variegata L. (*aphylla* Lam.), bunte, ☉. f. Spanien.
 villosa Thbg., zottige, 4. ♂. k. Cap der guten Hoffn.
 viscosa L., schmierige, ☉. f. Frankreich, Spanien.

Onopordum V., Krebsdistel (Eselsdistel), XIX. 1.,
Compositae-Cynarocephalae.

- Acanthium L., gemeine, ♂. f. Europa.
 acaule L. (*pyrenaicum* DC.), stengellose, ♂. f. b. Pyrenäen.
 arabicum L., arabische, ♂. f. Arabien, Griechenland, Westeuropa.
 elatum Sibth., hohe, ♂. f. Creta.
 graecum Gouan, griechische, ☉. f. Griechenland.
 horridum Viv. (*macracanthum* d'Urv.), rauhe, ♂. f. Südeuropa, Griechenland.
 illyricum L., illyrische, ☉. ♂. f. Südeuropa.
 macracanthum Schousb., großstachelige, ♂. f. Nordafrika.
 tauricum W., taurische, ♂. f. Taurien.
 β) gratum Bess.
 virens DC. (*viscosum* Schrad.), grünliche, ♂. f. Südfrankreich.

cynaroides Stev. v. *Cousinia cynaroides*. *deltoideum* Ait. v. *Rhaponticum atriplicifolium*. *rotundifolium* All. v. *Arctium lanuginosum*.

Onoseris W., Eselskraut, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

- appressa (Hook), angedrücktes, ♂. w. Peru.
 salicifolia H. B. K. (? *Centroclinium reflexum* Hook), weidenblättriges, ☉. f. m. Peru.

Onosma L., Lotwurz, V. 1., Asperifoliaceae.

- albo-roseum Fisch. et Mey., weißrothe, ♂. k. Natolien.
 angustifolium Lehm., schmalblättrige, ♂. f. b. k. Apulien.
 arenarium W. Kit., sandliebende, ♂. f. b. Ungarn, Westdeutschland.
 divaricatum Lehm., ausgesperrte, ♂. 4. f. b. Caucasus.
 echiodes L., natterkopffartige, ♂. 4. f. b. Ost- und Südeuropa.
 giganteum Lam., große, ♂. 4. f. b. k. Taurien, Kleinasien.
 Gmelini Ledeb., Gmelin's, ♂. 4. f. b. Sibirien.
 orientale L., morgenländische, ♂. 4. k. Levante, Aegypten.
 polyphyllum Ledeb., vielblättrige, ♂. 4. f. b. Taurien.
 rigidum Ledeb., starre, ♂. 4. f. b. Taurien.
 rupestre MB., Felsen-L., ♂. 4. f. b. Caucasus.
 sericeum MB., seidenhaarige, ♂. 4. f. b. Caucasus.
 setosum Ledeb., borstige, ♂. 4. f. Südrussland.
 simplicissimum MB. (*sibiricum* Lam.), einfache, ♂. 4. f. Ost- und Südrussland.
 stellulatum W. K. (*tauricum* MB., *cinereum* Schreb.), sternförmige, ♂. 4. f. b. Croatien, Illyrien, Taurien, Griechenland.
 β) montanum Sm.
 tinctorium MB., färbende, ♂. 4. f. b. k. Taurien, Siebenbürgen.
 tricerospermum Lag., dreihornsamige, ♂. 4. k. Spanien.

Onosma

trinervium Lehm. (*strigosum* H. B. K.), dreinervige, 4. w. Mexico.

Onosmodium Mchx., Eselszunge, V. 1., Asperifoliaceae.

hispidum Mchx., steifhaarige, ♂. 4. f. b. Virginien.

molle Mchx., weichhaarige, ♂. 4. f. b. k. Pennsylvania, Carolina.

Onosuris Chamissonis DC. v. *Sphaerostigma Chamissonis*.**Opercularia** G., Deckelkelch, IV. 1., Rubiaceae.

aspera G., rauher, 4. k. t. Neuzeeland.

hispidula Spgl. (*aspera* Juss.), hackeriger, ♂. k. t. Neuholland.

ocymifolia Juss., basilicumblättriger, 4. t. w. Ostindien, Neuholland.

sessiliflora Juss., stiellosblumiger, 4. k. t. Neuholland.

umbellata G., doldenblumiger, ♂. k. t. Neuholland.

paleata Young. v. *Cryptospermum* Youngii.

Ophioglossum T., Natterzunge, XXIV. 1., Osmundaceae-Ophioglosseae.

bulbosum Mchx., knollige, 4. Kn. k. t. Carolina.

costatum RB. (*pedunculatum* Desv.), gerippte, 4. w. Ostindien, Neuholland.

gramineum W., grasartige, 4. w. Ostindien, Neuholl.

lusitanicum L., portugiesische, 4. k. t. Portugal, Corsica, Neapel, Madeira.

petiolatum Hook., langstielige, 4. w. Westindien.

reticulatum L., netzförmige, 4. w. Westindien, Guiana.

vulgatum L., gemeine, 4. f. Europa, Nordamerika.

Ophiopogon Ker, Natterzauke, VI. 1., Sarmenaceae (*Asparagineae*).

japonicus Ker, japanische, 4. k. f. b. Japan.

Jaburan Bot. Cab., Jaburan-N., 4. k. Japan.

spicatus Ker, ährige, 4. k. Japan, China, Nepal.

Ophiorrhiza Forsk., L., Schlangenzwurz, V. 1., Rubiaceae.

Mungos L., ächte, 4. ♂. w. Ostindien.

Ophioxylon Burm., Schlangenzholz, XXIII. 1., Convolvulaceae-Apocynaceae.

serpentinum L., ächtes, ♂. w. Ceylon, Java.

Ophiurus filiformis P. B. etc. v. *Lepturus filiformis* etc.**Ophrys** L., Ragwurz, XX. 1., Orchideae.

apifera Huds., bienenblumige, 4. Kn. f. b. Mittel- und Südeuropa, England.

arachnites All., spinnenartige, 4. Kn. f. b. Mittel- und Südeuropa.

aranifera Huds. (*fuciflora* Curt.), spinnenblumige, 4. Kn. f. b. Mittel-, Süd- und Westeuropa, England.

β) *limbata* Lindl.

atrata Lindl., schwärzliche, 4. Kn. k. Spanien, Italien.

ciliata Bivon., gefranzte, 4. Kn. k. Sicilien, Portugal.

fusca Lk., braune, 4. Kn. k. Portugal.

lutea Cav., gelbe, 4. Kn. k. Spanien.

muscifera Huds. (*myodes* Jacq.), fliegenblumige, 4. Kn. f. Europa.

oestriifera MB., bremsenblumige, 4. Kn. f. b. k. Illyrien, Italien, Taurien.

Ophrys

- Pseudo-Speculum DC., spiegelnde, 4. Kn. f. b. k.
 Illyrien, Italien, Frankreich.
 Scolopax Cav. (*Speculum* Biv.), schnabelförmige, 4. Kn.
 f. b. k. Süd- und Westeuropa.
 Speculum Bertol. (*Bertolonii* Morett.), Spiegel-R., 4.
 Kn. f. b. k. Italien.
 tenthredinifera W., blattwespenblumige, 4. Kn. k.
 Süditalien, Kleinasien, Nordafrika.

β) minor Lindl.

alpina L. v. *Chamorchis alpina*. *anthropophora* L.
 v. *Aceras anthropoph.* *Corallorrhiza* L. v. *Coral-*
lorrhiza innata. *cordata* L. etc. v. *Listera cordata*
 etc. *Monorchis* L. v. *Herminium Monorchis*. *Nidus*
avis L. v. *Neottia Nidus avis*. *spiralis* L. v. *Spi-*
ranthes autumnalis.

Opismenus P. B., Grannenbart, III. II., Gramineae.

- africanus* P. B., afrikanischer, ☉. f. m. Afrika.
Burmanni P. B., Burmann's, ☉. w. f. m. Ost- und
 Westindien.
colonus H. B. K., rundspindeliger, ☉. f. m. Ostindien,
 mittägliches Amerika.
compositus R. et S., vielähriger. ☉. w. f. m. Ceylon,
 Neuholland.
Crus galli Kunth., Hühner-G., ☉. f. Europa, Asien,
 Afrika, Amerika, Neuholland.
 β) *commutatus* (R. et S.), [*Panicum stagninum*
 Host]. γ) *intermedius* (R. et S.). δ) *erythro-*
spermus (R. et S.). ε) *Crus corvi* (L.).

- dubius* Kunth, zweifelhafter, ☉. f. ?
echinatus Kunth. (? *Echinochloa setigera* R. et S.), lang-
 borstiger, ☉. f. Mittägliches Amerika.
frumentaceus Kunth, genießbarer, ☉. f. m. Ostindien.
hirtellus R. et S., kurzhaariger, ♂. w. Westindien,
 Neuholland.
hispidulus Kunth, hackeriger, ☉. f. m. Ostindien.
intermedius Kunth, mittlerer, ☉. f. ?
loliaceus P. B., lolchähnlicher, ☉. f. m. w. Cuba.
margaritaceus Kunth, perlartiger, ☉. f. m. ?
stagninus Kunth, Lachen-G., ☉. f. Ost- u. Westind. etc.
undulatifolius Kunth, R. et S., wellenblätteriger, ☉. f.
 Südeuropa, Caucasus, Ost- und Westindien.

Oplothea Auct. v. *Hoplothea*.**Opopanax** Koch, Kraftdolde, V. II., Umbelliferae.

- Chironium* Koch, Chiron's, 4. f. b. Südeuropa.
glabrum Bernh., kahle, 4. f. b. k. ? Griechenland.

Oporinea autumnalis D. Don v. *Leontodon autumnalis*.**Opuntia** T., Opuntie (indianische Feige), XII. I., Cactei.

- albicans* Salm. (*Prate* Sab.), weißliche, ♀. w. Mexico.
Amyclaea Tenor. (*maxima* Salm), amyclaeische, ♀. k. w.
 Süditalien.
andicola H. Angl. (*horizontalis* Gill.), Anden-O., 4. ♀.
 w. Mendoza.
aurantiaca Gill., orangefarbige, ♀. w. Chili.
brasiliensis Haw. (*Cactus paradoxus* Hornem.), brasi-
 lianische, ♀. w. Brasilien.
caespitosa Nutt., rasenartige, ♀. k. w. Kentucky.

Opuntia

- candelabriformis H. Monac., candelaberförmige, *h.* w. Mexico.
- catocantha H. Berol., nadelstachelige, *h.* w. St. Thomas.
- clavarioides H. Berol. (*microthele* Hort.), keulförmige, *h.* w. Chili.
- coccinellifera Mill. (*mexicana* Hort.), Cochenill-F., *h.* w. Südamerika.
- corrugata H. Angl., runzelfaltige, *h.* w. ?
- crassa Haw., dicke, *h.* w. Mexico.
β) major Pfr. (*glaberrima* H. Berol.).
- crinifera Salm (*senilis* Parm.), mähnentragende, *h.* w. Brasilien.
β) lanigera Parm.
- curassavica Mill., curassavische, *h.* w. Curaçao, St. Thomas.
β) media Haw. *γ)* minor Haw. *δ)* longa Haw. (Brasilien).
- cylindrica DC., cylinderförmige, *h.* w. Peru.
- decipiens DC., trügerische, *h.* w. Mexico.
β) minor H. Dyck.
- Decumana Haw. (*maxima* Mill., *Cact. elongatus* W.), größte, *h.* w. Südamerika.
- decumbens Salm (*repens* Karw., *irrorata* Mart.), niederliegende, *h.* w. Mexico.
- dejecta Salm (*diffusa*, *horizontalis* Hort.), niedergebeugte, *h.* w. Havannah.
- Dillenii DC. (*Tuna β.* Haw.), Dillen's, *h.* w. Südamer.
- elata H. Berol., hohe, *h.* w. Brasilien, Caracas.
- elatioer Mill., schwarzbraunstachelige, *h.* w. Südamerika.
- extensa Salm, ausgebreitete, *h.* w. ?
- exuviata DC. (*undulata* Hort., *decipiens major* H. Vindob.), ausgehäutete, *h.* w. Mexico.
β) angustior DC. *γ)* spinosior DC.
- ferox Haw. (*cruciata*, *dolabriformis* Hort.), wilde, *h.* w. Südamerika.
- Ficus indica Mill. (*vulgaris* Tenore), ächte, *h.* k. t. Südamerika, Italien, Sicilien etc.
a) fructu lutescente. b) fructu albido. c) fructu sanguineo. d) fr. aspermo.
- foliosa Salm (*pusilla* Haw., *Hystrix* Hort.), blätterige, *h.* w. Südamerika.
- fragilis Haw. (*Sabinii* Hort.), spröde, *h.* k. Nordamer.
- fulvispina Salm (? *elongata* Haw.), gelbbraunstachelige, *h.* ? Südamerika.
β) laevior Salm.
- glaucescens H. Berol., blaugrüne, *h.* w. Mexico.
- glaucophylla Wendl., blaugrünblätterige, *h.* w. ?
- glomerata Haw., knaulförmige, *h.* w. Mendoza.
- gracilis H. Monac., schlanke, *h.* w. Mexico.
- grandis H. Angl. (*glaucescens* Hort.), großstachelige, *h.* w. Mexico.
- Hernandezii DC., Hernandez's, *h.* w. Mexico.
- horrida Salm (*humilis* Haw.), rauhe, *h.* w. Italien.
- humifusa Nutt., niedergestreckte, *h.* k. Nordamerika.
- imbricata DC., ziegeldachförmige, *h.* w. Mexico.
- intermedia Salm, mittelständige, *h.* k. ? Süditalien, Dalmatien.
- Kleiniae DC., Klein's, *h.* w. Mexico.
- lanceolata Haw., lanzettliche, *h.* w. Südamerika.

Opuntia

- lasiacantha* H. Vindob. (? *leucacantha* Salm), wollstachelige, f. w. ?
leptocaulis DC. (*virgata* H. Berol.), schlankstengelige, f. w. Mexico.
leucacantha H. Berol. (*subferox* Schott.), weisstachelige, f. w. Mexico.
leucosticta Wendl., weifsbraunstachelige, f. w. Mexico.
leucotricha DC., weifshaarige, f. w. Mexico.
longispina Haw., langstachelige, f. w. Mendoza.
media Haw., mittlere, f. k. Nordamerika.
megacantha Salm (*mexicana* Hort.), dickstachelige, f. w. Mexico.
mesacantha Nutt., büschelstachelige, f. k. Kentucky.
microdasys Lehm., kleinstachelige, f. w. Mexico.
 β) *minor* Salm (*pulvinata* DC.).
missouriensis DC. (*polyacantha* Haw.), missourische, f. k. Nordamerika.
monacantha Haw., einstachelige, f. w. Südamerika.
myriacantha Hort., vielstachelige, f. w. Südamerika.
nigricans Haw., schwärzliche, f. w. Südamerika.
oblongata Wendl., verlängerte, f. w. Mexico.
orbiculata Salm (*longispina* Hort., *sericea* β. *longispina* Hort. Dyck.), kreisförmige, f. w. Chili.
ovata Pfr., eiförmige, f. w. Mendoza.
parvula Salm (*glauca* Hort.), kleine, f. w. Chili.
Poeppigii Otto, Poeppig's, f. w. Chili.
polyantha Haw., vielblumige, f. w. Südamerika.
Pseudo-Tuna Salm, unächte Tuna-F., f. w. Südamer.
 β) *spinosior* H. Dyck. γ) *elongata* Salm.
puberula H. Vindob., feinhaarige, f. w. Mexico.
pubescens Wendl., haarige, f. w. Mexico.
pusilla Salm., zwergige, f. w. Südamerika.
ramulifera Salm, ästige, f. w. Mexico.
robusta Wendl., starke, f. w. Mexico.
rosea DC., rosafarbige, f. w. Mexico.
rubescens Salm, röthliche, f. w. Brasilien.
Salmiana Parment., Salm's, f. w. Brasilien.
sericea Don (*coerulea* Gill.), seidenstachelige, f. w. Chili.
spinosissima Mill., häufigstachelige, f. w. Westindien.
spinulifera Salm (*oligacantha* H. Vind.), wenigstachelige, f. w. Mexico.
splendens H. Angl., schimmernde, f. 4. ?
Stapelia DC., stapelienähnliche, f. w. Mexico.
stricta Haw., steife, f. w. Südamerika.
sulphurea Gill., schwefelgelbe, f. w. Chili.
tomentosa Salm, filzige, f. w. Südamerika.
triacantha DC., dreistachelige, f. w. Südamerika.
tuberculata Haw., kleinhöckerige, f. w. Südamerika.
tuberosa H. Angl. (*alpina* Gill.), knollige, f. w. Mendoza.
 β) *spinosa* Pfr. (*platyacantha* H. Angl.).
Tuna Mill. (*coccinellifera* DC. pl. gr., *coccinea* Hort.), Tuna-F., f. w. Quito, Mexico.
 β) *laevior* Salm (*flexibilis*, *Bonplandii* Hort.).
tunicata H. Berol. (*furiosa* Wendl.), häutige, f. w. Mexico, Brasilien.
vulgaris Mill. (? *italica* Tenore), gemeine, f. w. Amerika, Südeuropa.
 β) *nana* DC. (β. *media* Salm).

Opuntia

articulata H. Berol. (*polymorpha* H. Angl.). *Gil-liesii* H. Berol. (*ovata* H. Angl.). *platyacantha* H. Angl. v. *Cereus articulatus*, *ovatus* et *syringacanthus* Nachtr. *salicornioides* Spgl. vid. *Hariota salicornioides* Nachtr.

Orbea Haw. v. *Stapelia*.

Orchis T., Knabenkraut, Kukuksblume, XX. 1., Orchideae.

acuminata Dsf., zugespitztes, 4. Kn. k. Nordafrika, Portugal, Sicilien, Creta.

coriophora L., stinkendes, 4. Kn. f. Europa.

cruenta Retz, blutfarbiges, 4. Kn. f. Nordeuropa.

fragrans Poll., wohlriechendes, 4. Kn. f. Italien.

fusca Jacq., braunes, 4. Kn. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.

fuscescens L., ?Pursh, bräunliches, 4. Kn. k. Pennsylvanien.

latifolia L. (*angustifolia* Wim. et Grab.), breitblättriges, 4. Kn. f. Mittel- und Nordeuropa.

b) *rosea*.

longibracteata Bivon. (*Robertiana* Lois., *foliosa* Mass.), langdeckblättriges, 4. Kn. k. Sicilien, Südfrankreich, Creta, Madeira.

longicornu Poir., langhorniges, 4. Kn. k. Nordafrika, Sicilien.

maculata L., geflecktes, 4. Kn. f. Europa.

majalis Rchb. (*latifolia* Auctor.), maiblühendes, 4. Kn. f. Europa.

b) *atropurpurea*.

mascula L., ächtes, 4. Kn. f. Europa.

β) *acutiflora* Koch. γ) *speciosa* Host.

militaris L., ansehnliches, 4. Kn. f. Europa, Caucasus.

β) *Smithii* Swt. γ) *Rivini* Swt.

moravica Jacq., mährisches, 4. Kn. f. Mähren.

morio L., Salep-K., 4. Kn. f. Europa, Mittelasien.

b) *albicans*. c) *guttata*. d) *rosea*. e) *purpurea*.

Nicodemi Cyrill., *Nicodemus's*, 4. Kn. k. Neapel.

pallens L., bleiches, 4. Kn. f. Mitteleuropa.

palustris Jacq., Sumpf-K., 4. Kn. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

β) *laxiflora* Lam. (*Tabernaemontani* Gmel., *ensifolia* Vill.).

papilionacea L. (*rubra* Jacq.), schmetterlingsblumiges, 4. Kn. k. Italien, Griechenland, Spanien, Nordafrika.

pauciflora Tenor., wenigblumiges, 4. Kn. f. Italien.

provincialis Balb. (*Cyrilli* Tenor.), südfranzösisches, 4. Kn. k. Südfrankreich, Italien.

pyramidalis L., pyramidales, 4. Kn. f. Mittel- und Südeuropa, Caucasus.

quadripunctata Tenor., vierpunktiges, 4. Kn. k. Neapel.

romana Sebast. (*pseudosambucina* Tenor.), römisches, 4. Kn. f. b. k. Italien.

saccata Tenor., sackförmiges, 4. Kn. k. Calabrien, Sicilien.

sambucina L., fliederduftendes, 4. Kn. f. Europa.

β) *incarnata* L. (*Schleicheri* Swt.).

Simia Lam. (*tephrosanthos* Vill.), wunderbarblumiges, 4. Kn. f. k. England, Südeuropa.

Orchis

Spitzelii Saut., Spitzel's, 4. Kn. f. Tyrol.

sulfurea Lk., schwefelgelbes, 4. Kn. k. Portugal.

β) densiflora Hook.

Traunsteineri Saut. (*haematodes* Rchb.), Traunsteiner's, 4. Kn. f. Tyrol.

undulatifolia Bivon., wellenblättriges, 4. Kn. k. Sicilien.

ustulata L., brandfarbiges, 4. Kn. f. Europa, Caucasus.

variegata All., Jacq., buntfarbiges, 4. Kn. f. Mittel- und Südeuropa.

albida Sw. et *angustifolia* M.B. (*iberica* W.), *conopsea* L. etc. v. *Gymnadenia albida* etc. *bifolia* L. vid. *Platanthera bifolia*. *foliosa* Sw. etc. v. *Habenaria alata* etc. *globosa* L. v. *Nigritella globosa*. *hircina* Scop. v. *Himantoglossum hircinum* Nachtr.

Oreochloa Lk., Felsengras, III. II., Gramineae.

disticha Lk., zweizeiliges, 4. f. Schweizer, tyroler und kärnthner Alpen etc.

Origanum T., Dosten, XIV. I., Labiatae.

aegyptiacum L., aegyptischer, 4. f. k. Aegypten.

benghalense Garc., bengalischer, f. k. t. Bengalen.

creticum L., cretischer, 4. f. k. Griechenland.

β) megastachyum Lk.

Dictamnus L., Diptam-D., f. k. Creta.

heracleoticum L., Winter-D., 4. f. b. k. Südosteuropa.

hirtum Lk., kurzhaariger, 4. k. Südeuropa, Orient.

humile Poir., niedriger, 4. f. ?

indicum Roth, indischer, ♂. f. m. k. Ostindien.

macrostachyon Lk., grofsähriger, 4. k. Portugal.

Majorana L., Majoran-D., ♂. f. m. k. Ostindien, Griechenland.

β) majoranoides W.

Maru L., Maru-D., 4. f. k. Creta, Palästina.

normale D. Don, ächter, 4. f. b. k. Nepal.

oblongatum Lk., verlängerter, 4. k. ?

Onites L., sicilianischer, 4. f. b. k. Sicilien.

paniculatum Koch, rispiger, 4. f. ? Südeuropa.

sipyleum L., sipylischer, f. k. Kleinasien.

smyrnaeum L., smyrnaischer, f. k. Griechenland, Syrien, Kleinasien.

syriacum L., syrischer, ♂. f. Syrien.

Tournefortii Ait., Tournefort's, f. k. Griechenland.

virens Lk., grünlicher, 4. k. Portugal.

vulgare L., gemeiner, 4. f. Europa, Mittelasien, Nordamerika.

β) prismaticum Gaud.

Orlaya Hoffm., Orlaya, V. II., Umbelliferae.

grandiflora Hoffm., grofsblumige, ♂. f. Ost-, Mittel- und Südeuropa.

maritima Koch, Meerstrands-O., ♂. f. Südeuropa, Nordafrika.

platycarpus Koch, breitfrüchtige, ♂. f. Südeuropa, Taurien.

Ormenis H Cass., Ormenis, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

coronopifolia Less. (*mixta* DC., *bicolor* Cass.), krähensfußblättrige, ♂. f. Portugal, Spanien, Italien, Corsica.

Ormocarpum P. B., Armbandhülse, XVII. II. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

sennoides DC., sennaähnliche, ♀. w. Ostindien.

Ormosia Jacks., Ormosie, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

coccinea Jacks., scharlachfarbige, ♀. w. Guiana.

dasycarpa Jacks., filzige, ♀. w. Westindien.

Ornithidium Salisb., Vogelstendel, XX. I., Orchideae.

album Hook., weißer, 4. w. Trinidad.

coccineum Salisb., scharlachfarbiger, 4. w. Westindien.

Ornithocephalus Hook., Vogelkopforche, XX. I., Orchideae.

gladius Hook., schwertblättrige, 4. w. Trinidad.

trichorrhizus Batem., haarwurzelige, 4. w. Trinidad.

Ornithogalum T., Vogelmilch, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

I. Euornithogalum.

alliaceum Lodd., lauchähnliche, 4. Zw. k. t. Chili.

barbatum Jacq., bärtige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

biflorum D. Don, zweiblumige, 4. Zw. k. t. Peru.

bifolium Lodd., zweiblättrige, 4. Zw. k. t. Chili.

brachystachys Fisch., kurzährige, 4. Zw. f. Dahurien.

bulbiferum Pall., zwiebeltragende, 4. Zw. f. Südrussland, Caucasus, Sibirien.

caudatum Ait., geschwänzte, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

chloroleucum Lindl., grünlichweißse, 4. Zw. k. t. Valparaiso.

ciliatum Thbg., gefranzte, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

comosum L., schopfige, 4. Zw. f. Oesterreich, Illyrien, Siebenbürgen.

conicum Jacq., kegeltraubige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

corymbosum R. et P., traubendoldige, 4. Zw. k. t. Chili, Peru.

crenulatum Thbg., gekerbte, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

elatum Andr., hohe, 4. Zw. k. Aegypten.

fimbriatum W., gefranzte, 4. Zw. f. Taurien.

fuscatum Jacq., bräunliche, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

geminiflorum Herb., paarblumige, 4. Zw. k. t. Lima.

juncifolium Jacq., simsensblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

lacteam Jacq., milchweißse, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

latifolium L., breitblättrige, 4. Zw. k. Aegypten, Arabien, Italien.

longebracteatum Jacq. (*bracteatum* Thbg.), langdeckblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

maculatum Thbg. (*secundum* Jacq.), gefleckte, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

maritimum Brot. (*Squilla* Bot. mag.), Meerzwiebel-V., 4. Zw. k. Süd- und Westeuropa.

narbonense L., narbonische, 4. Zw. f. Südeuropa.

niveum Soland., schneeweißse, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

notatum R. et S. (*maculatum* Jacq.), bezeichnete, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

odoratum Jacq., wohlriechende, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

Ornithogalum

ovatum Thbg., eiförmige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
 pilosum Thbg., weichhaarige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
 polyphyllum Jacq., vielblättrige, 4. Zw. k. Cap der
 guten Hoffnung.

prasinum Ker, lauchgrüne, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
 pyramidale L., pyramidale, 4. Zw. f. Spanien,
 Portugal.

pyrenaicum L., pyrenäische, 4. Zw. f. England, Süd-
 und Osteuropa.

refractum W., zurückgekrümmte, 4. Zw. f. Ungarn,
 Neapel.

β) exscapum Tenor.

revolutum Jacq., zurückgerollte, 4. Zw. k. Cap der
 guten Hoffnung.

rupestre L., felsenliebende, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

scilloides Jacq., scillaähnliche, 4. Zw. k. Cap der
 guten Hoffnung.

stachyoides Ait. (*pyrenaicum* Gouan), langtraubige, 4.
 Zw. f. Süd- und Westeuropa.

suaveolens Jacq., feinriechende, 4. Zw. k. Cap der
 guten Hoffnung.

tenellum Jacq. (*graminifolium* Thbg.), zarte, 4. Zw. k.
 Cap der guten Hoffnung.

tenuifolium Redout. (*rupestre* Rudolph., *Rudolphii* Jacq.),
 feinblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

trigynum Redout., dreiweibige, 4. Zw. k. ?

umbellatum L., doldige, 4. Zw. f. Mittel- u. Südeuropa.

β) montanum Tenor.

II. *Albucea* Rchb. (*Myogalum* Lk.).

arabicum L., arabische, 4. Zw. k. Nordafrika, Portugal.

aureum Curt., goldfarbige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

a) *miniaturum* Jacq. β) *flavescens* Jacq. γ) *fla-*
vissimum Jacq.

coarctatum Jacq., dichttraubige, 4. Zw. k. Cap der
 guten Hoffnung.

concinnum Salisb., nette, 4. Zw. k. Portugal.

hispidum Hornem. (*Bergii* Schltdl.), steifhaarige, 4. Zw.
 k. Cap der guten Hoffnung.

ixioides Ait., ixiaähnliche, 4. Zw. k. Californien.

nutans L., nickende, 4. Zw. f. Europa.

thyrsoides Jacq., straufsblumige, 4. Zw. k. Cap der
 guten Hoffnung.

a) *luteum*. β) *albidum*.

unifolium Bot. mag., einblättrige, 4. Zw. k. Gibraltar.

virens Lindl., grünliche, 4. Zw. k. Südafrika.

altissimum L. suppl. (*giganteum* Jacq.) vid. *Drimia*

altissima. *arvense* Pers. etc. v. *Gagea arvensis* etc.

gramineum Sims v. *Allium striatellum*. *paradoxum*

Jacq. vid. *Eriospermum paradoxum*. *striatum* MB.

v. *Lloydia serotina*.

Ornithoglossum glaucum Salisb. (*viride* Salisb.) et *undu-*
latum Swt. v. *Lichtensteinia laevigata* et *undulata*.

Ornithopus L., Vogelfuß, XVII. iv. (vi.), Legumi-
 nosae-Papilionaceae.

I. Genuin.

compressus L., platter, ☉. f. Süd- und Westeuropa,
 Nordafrika.

perpusillus L., kleiner, ☉. f. Mitteleuropa.

β) *intermedius* Roth. γ) ? *nodosus* Mill.

Ornithopus

sativus Brot. (*roseus* Dufour), gebauter, ☉. f. Westeuropa.

II. *Arthrolobium* Desv.

durus Cav., harter, ☉. f. Spanien.

ebracteatus Brot. (*durus* DC., *pygmaeus* Viv., *nudiflorus* Lag., *exstipulatus* Thor.), deckblattloser, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

repandus Poir. (*heterophyllus* Brot., *lotoides* Viv.), ausgeschweiffter, ☉. f. Nordafrika, Portugal.

scorpioides L., großblättriger, ☉. f. Südeuropa.

tetraphyllus L. v. *Myriadenus tetraphyllus*.

Ornitrophe Cominia W. et *serrata* Roxb. vid. *Schmidelia Cominia* et *serrata*.

Ornus Scop., Blüthenesche, II. 1., Sapotaceae-Oleinae.

americana Pursh (*Fraxinus paniculata* Mill.), amerikanische, ♀. f. Maryland, Virginien.

europaea L., europäische, ♀. f. Südeuropa.

b) *globifera* Lodd.

floribunda G. Don, vielblumige, f. b. k. Nepal.

rotundifolia Lk. (*mannifera* Hort.), rundblättrige, ♀. f. Süd- und Osteuropa, Kleinasien.

striata Swt., gestreifte, ♀. f. ? Nordamerika.

Orobanche T., Sommerwurz (Hanfwürger), XIV. II., Personatae-Orobancheae.

alba Steph., weisse, 4. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.

amethystea Thuill. (*Eryngii* Dub.), amethystfarbige, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

arenaria Borkh. (*comosa* Wallr.), Sand-S., 4. f. Mittel- und Südeuropa.

caryophyllacea Sm. (*vulgaris* DC., *bipontina* Schultz), nelkenduftende, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

β) *Galii* Dub. γ) *adenostemon* Rchb.

coerulea Vill. (*purpurea* Jacq.), blaue, 4. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.

coerulescens Steph., bläuliche, 4. f. Osteuropa, Sibirien.

cruenta Bertol. (*caryophyllacea* Viv.), blutfarbige, 4. f. Süddeutschland, Schweiz, Italien.

elatior Sutt. (*rubens* Wallr., *medicaginis* Schultz), höhere, 4. f. England, Mitteleuropa.

Epithymum DC. (*rubra* Sm., *sparsiflora* Wallr.), Thymian-S., 4. f. Mittel- und Südeuropa.

flava Mart., hellgelbe, 4. f. Baiern.

gracilis Sm., schlanke, 4. f. Italien.

laxiflora Rchb., lockerblumige, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

loricata Rchb., bepanzerte, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

lucorum A. Braun, hainliebende, 4. f. Baiern.

minor Sutt., kleine, 4. f. England, Süd- u. Westeuropa.

pallidiflora Wim. et Grab., blafsblumige, 4. f. Schlesien, Sachsen etc.

Picridis F. W., Schultz, Bitterkraut-S., 4. f. Süddeutschland.

procera Koch, hervorragende, 4. f. Pfalz.

pruinosa Lapeyr., bereifte, ☉. 4. f. Süd- und Westeuropa.

ramosa L., ästige, ☉. f. Europa.

Rapum Thuill. (*major* DC.), Rüben-S., 4. f. Süd- und Westeuropa.

Orobanche

Salviae F. W. Schultz, Salbei-S., 4. f. Baiern, Salzburg.

Scabiosae Koch, Scabiosen-S., 4. f. Baiern, Tyrol.

speciosa DC., prächtige, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

strobiligena Rchb., zapfenförmige, 4. f. Sachsen.

Orob. T., Walderbse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

albus L. suppl. (*pannonicus* Jacq.), weiße, 4. Kn. f. Oesterreich, Ungarn, Siebenbürgen, Sibirien, Frankreich.

alpestris W. K., Voralpen-W., 4. f. Croatien.

angustifolius L., schmalblättrige, 4. f. Sibirien.

atropurpureus Dsf., schwarzpurpurrothe, ♂. 4. f. b. Nordafrika, Sicilien.

β) *siculus* Rafin. (*Fischeri* Swt., *quadrangulus* Spgl.).

aurantius Stev., orangefarbige, 4. f. West-Caucasus.

canescens L. suppl. (*filiformis* Lam.), weißgrauliche, 4. f. Südfrankreich.

caucasicus Spgl. (? *erectus* Poir.), caucasische, 4. f. Caucasus.

Clusii Spgl. (*vicioides* DC.), Clusius's, 4. f. Steyermark, Kärnthen, Krain, Ungarn.

? *coccineus* Mill., scharlachfarbige, 4. f. ? Nordamerika.

β) *uniguus* DC,

divaricatus Lapeyr., ausgesperrte, 4. f. Pyrenäen.

formosus Stev., schöne, 4. f. Caucasus.

Gmelini Fisch., Gmelin's, 4. f. Sibirien.

hirsutus L. (*laxiflorus* Dsf.), rauhaarige, 4. f. Griechenland, Taurien.

humilis Sering., niedrige, 4. f. Dahurien.

lacteus MB., milchweiß, 4. f. Podolien, Wolga, Caucasus.

lathyroides L., platterbsenähnliche, 4. f. Macedonien, Sibirien.

luteus L., gelbe, 4. f. Süd-, Ost- und Westeuropa, Kleinasien.

β) *laevigatus* W. K.

niger L. (*tristis* Lang), schwärzliche, 4. f. Nord- und Osteuropa.

ochroleucus W. K., weißgelbe, 4. f. Ungarn.

pallens MB., bleiche, 4. f. Taurien, Podolien, Bessarabien.

pisiformis Maund, erbsenförmige, 4. f. ? Südeuropa.

pyrenaicus L. (*Pluknetii* Lapeyr.), pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.

saxatilis Vent., Gesteins-W., 4. f. Südfrankreich.

stipulaceus Hook., zwischenblättrige, 4. f. ? Nordamer.

sylvaticus L., haarstengelige, 4. f. Norwegen, England, Frankreich.

Tournefortii Lapeyr. (*pyrenaicus* T.), Tournefort's, 4. f. Pyrenäen.

transylvanicus Spgl. (*laevigatus* Baumg.), siebenbürgische, 4. f. Siebenbürgen.

tuberosus L., knollige, 4. Kn. f. Mittel- u. Nordeuropa.

β) *tenuifolius* Roth (*linifolius* Reich., *gracilis* Gaud., *setiformis* Schlchr.).

variegatus Tenor. (*multiflorus* Sbr., *rigidus* Lang, *pyre-*

Orobis

naicus Scop., *venetus* Clus. Rchb., *vernus* b. *latifolius* Roch.), buntfarbige, 4. f. Krain, Illyrien, Ungarn, Tyrol, Italien.

venosus W. (*pauciflorus* Hort.), aderige, 4. f. Sibirien.

vernus L., Frühlings-W., 4. f. Europa, Kleinasien.

b) *carneus* J. C.

versicolor Gmel. (*varius* Curt. Soland.), verschiedenfarbige, 4. Kn. f. Oesterreichisches Litorale, Italien.

cyaneus Stev. et *digitatus* MB. v. *Platystylis cyanea* et *digitata*.

Orontium L., Wasserähre, VI. 1., Aroideae-Orontiaceae. *aquaticum* L., nordamerikanische, 4. Wa. f. k. Nordamerika.

japonicum Thbg. (*cochinchinense* Lour.) v. *Rohdea japonica*.

Orostachys Malacophyllum Fisch. v. *Umbilicus Malacophyll.*

Orsinia Bertol. (Orsini, berühmte italienische Familie), XIX. 1., Compositae-Eupatorieae.

Eupatoria Bertol., walddostähnliche, 4. w. Brasilien.

Ortegia Loeßl. (C. G. de Ortega, spanischer Botaniker), III. 1., Portulacae-Paronychieae.

dichotoma All., zweizinkige, 4. f. k. Piemont.

hispanica L., spanische, 4. k. Spanien, Nordafrika.

Orthoceras RB., Hornorche, XX. 1., Orchideae.

striatum RB., gestreifte, 4. Kn. t. w. Neuholland.

Orthopogon Burmanni RB. etc. v. *Oplismenus Burmanni* etc.

Orthrosanthes Swt., Morgenblume, XVI. 1., Irideae.

multiflora Swt., vielblumige, 4. t. Neuholland.

Orythya uniflora G. Don v. *Gagea uniflora*.

Oryza L., Reifs, VI. 11., Gramineae.

latifolia Dsf., breitblättriger, ☉. w. m. Süd- und Nordamerika.

nepalensis G. Don, nepal'scher, ☉. w. m. Nepal.

sativa L., gemeiner, ☉. w. m. Ostindien, Afrika, Südeuropa.

β) *mutica* Lour. γ) *glutinosa* Lour. δ) *montana* Lour.

Oryzopsis Rich., Mchx., Reifsgras, III. 1., Gramineae.

asperifolia Rich., scharfblättriges, 4. f. Nordamerika.

a) *leucosperma* (Lk.). β) *melanosperma* (Lk.).

mutica Lk., unbewehrtes, 4. f. Nordamerika.

Osbeckia L. (Peter Osbeck, schwedischer Schiffsprediger und Naturforscher, welcher China und die ostindischen Inseln bereiste), X. 1. (VIII. 1.), Lythraeae-Melastomeae.

canescens Mey., weißgrauliche, 4. w. ? Südamerika.

chinensis L., chinesische, 4. w. China.

glomerata DC., knaulförmige, ♂. 4. w. Trinidad, Brasilien.

b) *albiflora* DC.

nepalensis Hook. (*speciosa* D. Don), nepal'sche, 4. w. Nepal.

β) *albiflora* Lindl.

stellata Hamilt., sternförmige, 4. w. Nepal.

zeylanica L., ceylanische, 4. w. Ceylon.

grandiflora Afzel. Sm. v. *Melastoma elongatum*.

Osmites L., Duftblümchen, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

Bellidiastrum L., maßliebenähnliches, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

camphorina L., kampferriechendes, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

dentata Thbg., gezahntes, ⚥. k. Cap der guten Hoffn.

Osmothamnus DC., Duftstrauch, V. I., Ericaceae.

fragrans DC., angenehmriechender, ⚥. f. b. k. Ostsibirien.

pallidus DC. (Turcz.), bleicher, ⚥. f. b. k. Baicalalpen.

Osmunda T., Traubenfarn, XXIV. I., Osmundaceae.

cinnamomea L., zimmtbrauner, 4. f. b. Nordamerika.

Claytoniana L., Clayton's, 4. f. b. Virginien.

gracilis Hort. Liverp., schlanker, 4. f. ?

interrupta Mchx., unterbrochener, 4. f. b. Nordamerika.

palustris Lk. et Otto, Sumpf-T., 4. w. Brasilien.

regalis L., königlicher, 4. f. Europa.

spectabilis W., ansehnlicher, 4. f. b. Nordamerika.

Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen: *Allosorus*, *Aneimia*, *Botrychium*, *Lomaria*, *Lygodium*, *Struthiopteris*, *Todea* et *Woodwardia*.

Osteospermum L., Beinsame, XIX. IV., Compositae-Corymbiferae.

coeruleum Ait. (*pinnatifidum* Thbg.), blauer, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

corymbosum L., traubendoldiger, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

ilicifolium L., stechhülsenblättriger, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

incanum Thbg., weißgrauer, ⚥. k. Cap der gut. H.

moniliferum L., perlschnurförmiger, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

perfoliatum L. suppl., durchwachsener, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

pisiferum L., erbsenförmiger, ⚥. k. Cap der guten H.

polygaloides L., polygalaähnlicher, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

rigidum Ait., starrer, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

spinescens Thbg., dornigwerdender, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

spinosum L., dorniger, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

calendulaceum L. suppl. vid. *Oligocarpus* *calendulaceus*.

niveum L. suppl. vid. *Microstephium* *niveum*.

Ostercicum Hoffm., Sumpfdolde, V. II., Umbelliferae.

palustre Bess. (*pratense* Hoffm.), Wiesen-S., 4. f. Thüringen, Galicien.

verticillare Rchb. v. *Peucedanum verticillare*.

Ostrya Michel., Hopfenbuche, XXI. IX., Amentaceae.

carpinifolia Scop. (*vulgaris* W.), carpinusblättrige, ⚥. f. Süd- und Osteuropa.

virginica W., virginische, ⚥. f. Nordamerika.

Osyris L., Osyris, XXI. III. (III. I.), Sandalaceae.

alba L., weißse, ⚥. k. Südeuropa.

Otanthus Lk., Ohrblümchen, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

maritimus Lk., Seestrands-O., 4. k. England, Süd- und Westeuropa.

Othonna L., Othonna, XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.

- arborescens L., baumartige, ♀. k. Cap der gut. H.
 bulbosa L. (*tuberosa* Thbg.), knollige, 4. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.
 cacalioides Thbg., cacaliaähnliche, 4. ♀. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.
 cheirifolia L., lackblättrige, 4. ♀. k. Nordafrika.
 coronopifolia L., krähensfußblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
 crassifolia L. (*Hertia crassifolia* Less.), dickblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
 denticulata Thbg., gezähnelte, ♀. k. Cap der gut. H.
 digitata Thbg., fingerförmige, 4. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.
 ericoides L., heideähnliche, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
 filicaulis Jacq., fadenstengelige, 4. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.
 frutescens L., strauchige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
 heterophylla Thbg., verschiedenblättrige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
 Lingua Thbg., zungenblättrige, 4. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.
 linifolia Thbg., flachsblättrige, 4. Kn. k. Cap der guten Hoffnung.
 parviflora L., kleinblumige, 4. ♀. k. Cap der gut. H.
 perfoliata Jacq., durchwachsene, 4. k. Cap der gut. H.
 pinnata Thbg., gefiederte, 4. Kn. k. Cap der gut. H.
 pinnatifida Thbg., fiederspaltige, 4. k. Cap d. gut. H.
 retrofracta Jacq., zurückgeknickte, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
 Tagetes L., sammetblumenblättrige, ☉. m. f. Cap der guten Hoffnung.
 virginea Thbg. (*flabellifolia* Bot. Cab.), jungfräuliche, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
 abrotanifolia L., *Athanasiae* Thbg., *lateriflora* Thbg.,
 multifida Thbg., *pectinata* L., *tenuissima* L. (*speciosa* Hortul.) et *trifurcata* Thbg. vid. Euryops
 abrotanifol. etc.

Ototropis N. E., Hahnenstrauch, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

sambuenensis N. E., nepal'scher, ♀. w. t. Nepal.

Ottelia alismoides P. v. *Damasonium indicum*.**Outea** Aubl. (guianischer Name), III. i., Leguminosae-Caesalpinieae.

bijuga DC., zweijochige, ♀. w. Ostindien.

guianensis Aubl., guianische, ♀. w. Guiana.

Ovieda anceps Spgl. etc. v. *Lapeyrousia anceps* etc.**Oxalis** L., Sauerklee, X. iv., Oxalideae.

Acetosella L., gemeiner, 4. f. Europa, Japan.

β) *parviflora* Lej.

alba D. Don, weißer, 4. f. k. ?Amerika.

ambigua Jacq., zweifelhafter, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

americana Bigelow, amerikanischer, 4. f. Nordamerika.

arcuata Jacq., bogenförmiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

asinina Jacq., eselsohrblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

Oxalis

Barrelieri L. (*campestris* Mart.), Barrelier's, 4. f. w. Südamerika.

bifida Jacq., zweispaltiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H. bipunctata Grah. (*spectabilis* Hort., *brasiliensis* Lodd.), doppelpunktirter, 4. Zw. k. t. Brasilien.

Bowiei Ait., Bowie's, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung (? Mexico).

breviscapa Jacq., kurzschäftiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

Burmanni Jacq., Burmann's, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

caprina Thbg. (*Pes caprae* L.), ziegenfußblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

carnosa Molin., fleischiger, 4. k. Chili.

cernua Thbg., übergebogener, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

β) minor.

chinensis Haw., chinesischer, 4. k. China.

ciliaris Jacq., gefranzter, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

Commersonii P. (*sexenata* Savign.), Commerson's, 4. Zw. k. t. Monte-Video.

compressa L., Thbg., plattstieliger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

convexula Jacq., gewölbter, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.

corniculata L. (*pusilla* Salish.), gehörnter, 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

β) villosa MB.

crenata Jacq. (*Arracacha* G. Don), gekerbter, 4. Kn. k. Chili.

crispa Jacq., krauser, 4. Kn. k. Cap der gut. Hoffn.

cruentata Jacq., schweißsfarbiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

Cumingi Herb., Cuming's, 4. k. Chili.

cuneata Jacq., keilförmiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

cuneifolia Jacq., keilblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

cuprea Lodd., kupferfarbiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

Darwalliana Westc., Darwall's, 4. Zw. k. ?

dentata Jacq., gezahnter, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

Deppei Lk. et Otto, Deppe's, 4. Zw. Mexico.

Dillenii Jacq., Dillen's, 4. f. Carolina, Caribäen.

β) florida Salish.

disticha Jacq. (*ebracteata* Savign.), zweizeiliger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

divergens Benth., divergirender, 4. Zw. k. Mexico.

elongata Jacq., verlängerter, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

β) amoena Jacq.

fabaefolia Jacq., buffbohnenblättriger, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

fallax Jacq., trügerischer, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

ferruginata Jacq., rostfarbiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

filiculis Jacq., fadenstengeliger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

filifolia Jacq., fadenblättriger, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

flabellifolia Jacq., fächerblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

. Oxalis

- flaccida* Jacq., schlaffer, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
flava L., hellgelber, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.
 b) *flore pleno*.
floribunda Lehm., blüthenreicher, 4. Zw. k. t. Brasil.
fruticosa Radd. (*rusciformis* Mikan.), strauchiger, 5. w. Brasilien.
fulgida Lindl., funkelnder, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
furcata Lodd., gabelblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
fuscata Jacq., bräunlicher, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
geniculata K. et W., geknieter, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
glabra Thbg., kahler, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.
glandulosa Jacq., drüsiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
gracilis Jacq., schlanker, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
grandiflora Jacq., großblumiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
hirta L., kurzhaariger, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.
 β) *hirtella* Jacq.
incarnata L., fleischfarbiger, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.
laburnifolia Jacq., bohnenbaumblättriger, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.
laevigata W., glatter, ♂. f. m. ? Cap der gut. Hoffn.
lanata L., wolliger, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.
lanceaefolia Jacq., lanzettblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
lateriflora Jacq., seitenblumiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
lepida Jacq., schülferiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
leporina Jacq., hasenohrblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
linearis Jacq., gleichbreitblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
livida Jacq., schlagblauer, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
lobata Sims, gelappter, 4. Kn. k. Chili.
lupinifolia Jacq., wolfsbohnenblättriger, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.
luteola Jacq., gelblicher, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
Lyoni Pursh, Lyon's, 4. f. b. k. Nordamerika.
macrophylla Hornem., großblättriger, ♂. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
macrostylis Jacq., langgriffeliger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
marginata Jacq., berandeter, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.
Martiana Zuccar. (*violacea* Savign., *urbica* Hil.), Martius's, 4. Kn. k. t. Brasilien.
mauritiana Lodd., mascarenischer, 4. Zw. t. Mauritius.
megalorrhiza Jacq., großwurzeliger, 4. Kn. k. t. Chili.
microphylla Poir. (*rubens* Haw.), kleinblättriger, ♂. f. m. k. Neuholland.
miniata Jacq., mennigfarbiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
minuta L., kleinster, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.
monophylla L., einblättriger, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.
multiflora Jacq., vielblumiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung,
natans L., schwimmender, 4. Wa. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Oxalis

- obtusa Jacq., stumpfkelchiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- palustris Hil. (*papilionacea* W.), sumpfliebender, 4. w. Brasilien.
- pectinata Jacq., kammförmiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- pentaphylla Sims, fünfblätteriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- perennans Haw., dauernder, 4. k. t. Neusüdwallis.
- Plumieri Jacq. (*umbraticola* Hilar, *frutescens* L.), Plumier's, 4. w. Westindien, Südamerika.
- polyphylla Jacq., vielblätteriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- pulchella Jacq., schöner, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- punctata L. (*Piotiae* Colla), punktirter, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- purpurata Jacq., purpurblätteriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- purpurea Jacq., purpurfarbiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- β) laxula Jacq.
- pusilla Jacq., niedriger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- reclinata Jacq., niedergebeugter, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- repens Thbg., kriechender, 4. k. t. Cap, Madagascar, Ceylon.
- reptatrix Jacq., wuchernder, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- rigidula Jacq., starrlicher, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- rosacea Jacq., rosenartiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- rosea Jacq. (*floribunda* Bot. reg. non Lehm.), rosafarbiger, 4. k. t. Chili.
- rostrata Jacq., schnabelförmiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- rubella Jacq., röthlicher, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- rubro-flava Jacq., rothgelber, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- sanguinea Jacq., blutrother, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- secunda Jacq., einseitigästiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- sericea L., seidenhaariger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- Simsii Swt. (*rosea* Sims), Sims's, 4. t. k. Chili.
- speciosa Jacq. (*purpurea* L. Thbg.), prächtiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- stricta L. (*corniculata* Auct.), steifer, ♂. ♂. f. Europa, Nordamerika.
- strumosa Jacq., kropfiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- sulfurea Jacq., schwefelgelber, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- tenella Jacq., zarter, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.
- tenera Spgl., dünner, 4. Zw. t. Brasilien.
- tenuifolia Jacq., feinblätteriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
- tetraphylla Cav. (*esculenta* Hort.), vierblätteriger, 4. Kn. f. b. k. Mexico.
- tomentosa Thbg., filziger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- tortuosa Lindl., gewundener, 4. t. Chili.
- tricolor Jacq., dreifarbig, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
- truncatula Jacq., abgestutzter, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

Oxalis

tubiflora Jacq., röhrenblumiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

β) canescens Jacq.

undulata Jacq., wellenblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

variabilis Jacq., veränderlicher, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

β) grandiflora Jacq. γ) Simsii DC.

venosa Savign., aderiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

versicolor L., buntfarbiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

violacea L., violetter, 4. Zw. f. b. k. Nordamerika.

virginica Jacq., jungfräulicher, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

Unbestimmtere: coerulea Hort., macrorrhiza Hort., palmata Hort., umbrosa Hort.

sensitiva L. v. Biophytum sensitivum.

Oxleya Cunn. (John Oxley, Gouverneur von Neusüdwallis), X. 1., Hesperideae-Meliaceae.

xanthoxylon Cunn., gelbholzige, ♀. t. Neuholland.

Oxyadenia attenuata Nutt. v. *Leptochloa filiformis*.

Oxyanthus DC., Spitzenblume, V. 1., Rubiaceae.

speciosus DC., prächtige, ♀. w. Sierra Leone.

Oxybaphus L'Her., Sauerwurz, III. 1., Nyctagineae.

Cervantesii Lag., Cervantes's, 4. k. Mexico.

chilensis Bert., chilesische, 4. k. Chili.

expansus Vahl, ausgebreitete, 4. k. Peru.

glabrifolius Vahl, kahlblättrige, 4. k. Neuspanien.

ovatus Vahl, eiförmige, 4. k. Peru.

prostratus Vahl, gestreckte, 4. k. Peru.

viscosus L'Her., schmierige, 4. k. Peru.

aggregatus Vahl, angustifolius Nutt., decumbens Nutt., hirsutus Nutt. (? pilosus Nutt.) et nyctagineus Nutt. vid. *Allionia aggregata*, linearis, decumbens etc.

Oxycoccus T., Moosbeere (Sauerbeere), VIII. 1., Ericaceae-Vaccinieae.

erythrocarpus P. (erectus Pursh), rothfrüchtige, ♀. f. b. k. Carolina.

macrocarpus P., großfrüchtige, ♀. f. b. k. Nordamer. b) foliis variegatis Hort.

palustris P. (vulgaris Pursh, europaeus Nutt.), gemeine, ♀. f. Europa, Nordamerika.

hispidulus P. v. *Phalerocarpus hispidulus*.

Oxydendron DC., Sauerstrauch, X. 1., Ericaceae.

arboreum DC., baumartiger, ♀. f. b. k. Nordamerika.

Oxylobium Andr., Schmalblatt, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

arborescens RB., baumartiges, ♀. t. Van-Diemens-Land.

capitatum Benth., kopfblumiges. ♀. t. Neuholland (Schwanenflufs).

cordifolium Andr., herzblättriges, ♀. t. k. Neuholland.

ellipticum RB., elliptisches, ♀. t. Van-Diemens-Land.

ferrugineum Lod., rostfarbiges, ♀. t. Neuholland.

obtusifolium Swt., stumpfblättriges, ♀. t. Neuholland.

Pultenaeae DC., Pulteney's, ♀. t. Neuholland.

retusum RB., abgestutztblättriges, ♀. t. Neuholland.

spinosum DC., dorniges, ♀. t. Neuholland.

- Oxypetalum** RB., Spitzenkrönchen, V. II., Asclepiadeae.
 appendiculatum Mart., anhängseliges, ♂. Sch. w. Brasilien.
 Gothofreda R. et S., Gothofred's, ♂. Sch. w. Neu-Granada.
- Oxyria** Hill, Säuerling, VI. II., Portulacaceae-Polygonaceae.
 reniformis Hook. (*digyna* Campd.), nierenblättriger, 4. f. Europäische Alpen, Nordasien, Nordamerika.
- Oxystelma** RB., Spitzkränzchen, V. II., Asclepiadeae.
 esculentum RB., genießbares, 4. Sch. w. Ostindien.
- Oxytropis** DC., Wirbelkraut (Kielschote), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
 ambigua DC., zweifelhaftes, 4. f. b. Sibirien.
 argyrea Fisch. et Mey. (*argyrophyllus* Hort.), perlmutterweißes, 4. f. b. Altai.
 brevisrostra DC. (*altaica* Pall.), kurzschnabeliges, 4. f. Sibirien.
 campestris DC., gelblichblaues, 4. f. b. Europäische Alpen.
 β) sordida Gaud. γ) coerulea Koch. δ) clovensis Loud.
 coerulea DC., blaues, 4. f. b. Sibirien.
 cyanea MB., himmelblaues, 4. f. b. Caucasus, Schweiz.
 dealbata DC., weißliches, 4. f. b. Caucasus.
 deflexa DC., herabgebeugtes, 4. f. b. Sibirien.
 dichoptera DC., doppelflügeliges, 4. f. b. Sibirien.
 Fischeri DC., Fischer's, 4. f. b. Altai.
 foetida DC., stinkendes, 4. f. b. Schweiz, Piemont, Dauphiné.
 glabra DC., kahles, 4. f. b. Dahurien.
 grandiflora DC., großblumiges, 4. f. b. Sibirien.
 β) leptoptera DC.
 Lamberti Pursh, Lambert's, 4. f. b. Nordamerika.
 lapponica Gaud., lappländisches, 4. f. b. Lappland, Schweiz.
 leptophylla DC., schlankblättriges, 4. f. b. Sibirien.
 longirostrata DC. (*Gmelini* Fisch.), langschnabeliges, 4. f. b. Sibirien.
 microphylla DC., kleinblättriges, 4. f. b. Sibirien.
 montana DC., Berg-W., 4. f. b. Ost- und mitteleuropäische Alpen.
 myriophylla DC., vielblättriges, 4. f. b. Sibirien.
 oxyphylla DC., spitzblättriges, 4. f. b. Sibirien.
 Pallasii P., Pallas's, 4. f. b. Taurien.
 pilosa DC., haariges, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.
 prostrata DC., gestrecktes, 4. f. k. Sibirien.
 songarica DC., songarisches, 4. f. b. Sibirien.
 sulphurea Fisch., schwefelgelbes, 4. f. b. Sibirien.
 taurica P. (*filiformis* DC.), taurisches, 4. f. b. Taurien.
 triflora Hoppe, dreiblumiges, 4. f. b. Krain, Tyrol, Schweiz.
 uncata DC., hakiges, 4. f. b. Aleppo.
 uralensis DC., ural'sches, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen, Schottland, Sibirien.
 β) sericea DC.
 verticillaris DC., wirtelförmiges, 4. f. b. Sibirien.

Oxyura DC., Spitzhülle, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

chrysanthemoides DC., wucherblumenähnliche, ☉. f. Neucalifornien.

Ozothamnus RB., Strauchdosten, XIX. I., Compositae-Eupatorieae.

cinereus RB., aschfarbiger, ♀. k. t. Van-Diemens-Land.

terrugineus RB., rostfarbiger, ♀, k. t. Van-Diemens-L.

rosmarinifolius RB., rosmarinblättriger, ♀. k. t. Van-Diemens-Land.

Pachidendron africanum Haw., *angustifolium* Haw., *ferox* Haw., *principis* Haw., *pseudo-africanum* Haw., *pseudo-ferox* Haw. et *supralaeve* Haw. vid. *Aloe africana*, *stenophylla* etc.

Pachynema RB., Dickfädler, X. II., Dilleniaceae.

complanatum RB., plattästiger, ♀. t. k. Neuholland.

Pachypodium succulentum Lindl. et *tuberosum* Lindl. vid. *Echites succulenta* et *tuberosa*.

Pachyrrhizus Rich., Dickwurzler, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

angulatus Rich., kantiger, ♀. Sch. Kn. w. Ostindien.

Pachysandra Mchx., Dickbeutler, XXI. IV., Tricoccae-Euphorbiaceae.

coriacea Hook., lederartiger, ♀. w. Nepal.

procumbens Mchx., niederliegender, 4. f. Nordamerika.

Paederia L., Knackbeere, V. I., Rubiaceae.

foetida L., stinkende, 4. ♀. w. Japan, Ostindien.

Lingun Boj., Lingun-K., ♀. w. Mauritius.

Paederota L., Alpenrodel, II. I., Personatae-Antirrhineae.

Ageria L. mant. (*lutea* L. fil., *urticifolia* Brign.), gelber, 4. f. b. k. Krain, Oberitalien.

β) *Zannichellii* Brignol.

Bonarota L. spec. (*coerulea* L. fil., *chamaedryfolia* Suffr.), blauer, 4. f. b. k. Kärnthen, Krain, Tyrol.

Paeonia T., Paeonie (Pfingstrose), XIII. II., Ranunculaceae.

albiflora Pall. (*edulis* Salisb.), weißblumige, 4. Kn. f. Sibirien, Tatarei, China.

a) *vestalis* Anders. b) *candida* Anders. c) *tatarica*. d) *sibirica*. e) *rubescens*. f) *uniflora*.

g) *Whitleji*. h) *Humei*. i) *fragrans*. k) *Pottsii* Sabin. l) *Reevesii* Sabin. m) *Richardsonii* J. C. n) *festu* Hort. (*Makoya* Hort.).

anomala L. (*laciniata* Pall.), unregelmäßige, 4. Kn. f. Sibirien.

arietina Anders., gehörnte, 4. Kn. f. Sibirien, ?Creta. b) *oxoniensis* (fl. albo).

Brownii Dougl., Brown's, 4. Kn. f. Nordamerika.

corallina Retz, Korallen-P., 4. Kn. f. England, Südeuropa, Griechenland, Bannat.

β) *bannatica* Roch.

cretica Lindl., cretische, 4. Kn. f. Creta.

decora Anders., geschmückte, 4. Kn. f. Thracien, Taurien.

a) *Pallasii*. b) *elatio*.

humilis Retz (*fimbriata* Hort.), niedrige, 4. Kn. f. Spanien.

b) *flore pleno*.

Paeonia

mollis Anders., weiche, 4. Kn. f. ? Sibirien.

Moutan Sims, Sm. (*arborea* Hort., *suffruticosa* Andr., *frutescens* W. E. suppl.), strauchartige, 5. f. b. k. Osttatarei, China, Japan.

a) *papaveracea* Andr. b) *Humei*. c) *rosea-semiplena*. d) *Rawesii*. e) *carnea plena*. f) *albida plena*. g) *variegata* D. Don. h) *lacera* Lindl. i) *punicea* D. Don (*phoenicea*). k) *speciosa*. l) *Banksiae*. m) *rosea*. n) *Anneslei*. o) *monstrosa*. p) *regia*. p) *rosa gallica*. r) *Delachii*. s) *alceiflora*. t) *purpurea plena*. u) *venosa*. v) *papilionacea* etc.

officinalis L. (*lobata* Dsf., *festiva* Tausch), 4. Kn. f. Süd- und Westeuropa.

b) *rosea*. c) *blanda*. d) *rubra*. e) *carnescens*. f) *albicans*. g) *anemoneflora*. h) *Baxteri* Sabin. i) *Sabini* (? *peregrina splendens* Hort.). k) *variegata* J. C. l) *multipetala* etc.

paradoxa Anders., wunderbare, 4. Kn. f. Levante, Südeuropa.

b) *fimbriata* (*tatarica* Mill.).

peregrina Mill. (*promiscua* Tausch), türkische, 4. Kn. f. Südeuropa, Griechenland, Türkei.

b) *Grevillii*. c) *compacta*.

pubens Sims, weichhaarige, 4. Kn. f. Südeuropa.

Reevesiana Paxt., Reeves's, 5. f. b. k. China.

Russi Bivon., Russ's, 4. Kn. f. Italien.

tenuifolia L., feinblättrige, 4. Kn. f. Taurien, Bannat, Sibirien.

b) *flore pleno* Goldie. β) *hybrida* Pall. (*laciniata* W., *latifolia* Hort.).

triternata Pall. (*daurica* Andr.), dreifach-dreizählige, 4. Kn. f. Sibirien.

villosa Swt. (*sessiliflora* Sims), zottige, 4. Kn. f. Südeuropa.

Palafoxia Lagasc. (Palafox, berühmter spanischer Patriot u. General), XIX. 1., Compositae-Eupatorieae.

linearis Lagasc., gleichbreitblättrige, 4. 5. t. Neuspanien.

Palavia Cav. (A. Paula y Verdera, ehemaliger Professor der Botanik zu Madrid), XVI. VIII., Malvaceae.

malvaefolia Cav., malvenblättrige, 6. f. m. Peru.

moschata Cav., moschusduftende, 6. f. m. Peru.

rhombifolia Grah., rautenförmige, 6. f. m. Lima.

Palicourea Aubl., Palicurie, V. 1., Rubiaceae.

crocéa R. et S., safranfarbige, 5. w. Westindien.

Paliurus T., Stechdorn, V. 1., Rhamnaceae.

australis G. (*aculeatus* Lam.), südeuropäischer, 5. f. b. k. Südeuropa.

virgatus D. Don, ruthenförmiger, 5. k. Nepal.

Pallasia *halimifolia* Ait. et *grandiflora* W. v. *Encelia canescens* et *halimifolia*.

Pallenis *spinosa* Cass. v. *Bupthalmum spinosum*.

Panaetia Cass., Panaetie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

fulva Lindl., fahlgelbe, 6. f. m. Neuholland (Schwanenflufs).

- Panax** L., Kraftwurz, V. II. (XXIII. II.), Araliaceae.
 aculeatus Ait., stachelige, f. t. w. China.
 arboreus Forst., baumartige, f. t. Neuzeeland.
 attenuatus Sw., verdünnte, f. w. Westindien.
 chrysophyllus Vahl (*Morototoni* Anbl.), goldblätterige, f. w. Westindien, Guiana.
 conchifolius Roxb., muschelblätterige, f. w. Ostindien.
 fruticosus L., strauchige, f. w. Molucken.
 quinquefolius L., fünfblätterige, 4. f. k. Osttatarei, Nordamerika.
 ? rotundifolius Lk., rundblätterige, f. w. ?
 trifolius L., dreiblätterige, 4. Kn. f. b. k. Nordamer.
fragrans Roxb. v. *Aralia fragrans*.
- Pancratium** L., Gilgen (Machtlilie), VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.
 acutifolium Swt. (*mexicanum* Bot. reg.), spitzblätterige, 4. Zw. w. Mexico.
 americanum Mill., amerikanische, 4. Zw. w. Jamaica.
 amoenum Salisb., liebliche, 4. Zw. w. Guiana.
 angustum Ker, schmale, 4. Zw. w. ? Südamerika.
 biflorum Roxb., zweiblumige, 4. Zw. w. Ostindien.
 canariense Ker, canarische, 4. Zw. t. Canarische Inseln.
 caribaeum L. (*speciosum* Hort.), caribäische, 4. Zw. w. Westindien.
 crassifolium Herb., dickblätterige, 4. Zw. w. Südamer.
 declinatum Jacq., niedergebogene, 4. Zw. w. Westind.
 distichum Herb., zweireihige, 4. Zw. w. Südamerika.
 Dryandri Ker, Dryander's, 4. Zw. w. ?
 expansum Sims, ausgebreitete, 4. Zw. w. Westindien.
 fragrans Salisb. (*caribaeum* Auct.), wohlriechende, 4. Zw. w. Westindien.
 guianense Ker, guianische, 4. Zw. w. Guiana.
 illyricum L., illyrische, 4. Zw. f. b. k. Südeuropa.
 litorale Jacq., Strands-M., 4. Zw. w. Südamerika.
 longiflorum Roxb., langblumige, 4. Zw. w. Ostindien.
 maritimum L., Meerstrands-M., 4. Zw. f. b. k. Südeuropa, Nordafrika, Carolina, Ostindien.
 β) *carolinianum* L.
 mexicanum L., mexicanische, 4. Zw. w. Mexico.
 ornatum Bouché, zierliche, 4. Zw. w. ? Südamerika.
 ovatum Mill. (*amoenum* Andr.), eiförmige, 4. Zw. w. Westindien.
 parviflorum Red., kleinblumige, 4. Zw. w. ?
 patens Red., absteigende, 4. Zw. w. Westindien.
 pedale Lodd., fußslange, 4. Zw. w. Brasilien.
 plicatum Livinst., gefaltete, 4. Zw. w. Macao.
 rotatum Ker (*mexicanum* Walt.), radförmige, 4. Zw. k. t. Carolina.
 b) *biflorum* Bot. mag. (*disciforme* Redout.).
 speciosum Salisb. (*formosum* Hort.), prächtige, 4. Zw. w. Westindien.
 undulatum Kunth, wellenblätterige, 4. Zw. Caracas.
 verecundum Soland., schamhafte, 4. Zw. w. Ostindien.
 Ungewiss: *triflorum* H. Angl.
 zeylanicum L., zeylonische, 4. Zw. w. Ostindien.
Amancaës Ker (et *calathinum* Ker) vid. *Ismene Amancaës* etc. *amboinense* L. (et *australasicum* Ker) vid. *Eurycles amboinensis* etc. *incarnata* Kunth v. *Coburghia incarnata*, *luteum* Poir. vid. *Chlidanthus fragrans*.

- Pandanus** L. fil., Schraubenbaum, XXII. 1., Pandaneae.
 albus Hort., weißer, f. w. Ostindien.
 amaryllidifolius Roxb., amaryllisblättriger, f. f. w. Ostindien.
 Candelabrum P. B., leuchterförmiger, f. w. Guinea.
 edulis Thouars, essbarer, f. w. Madagascar.
 fascicularis Lam., büschelförmiger, f. k. Ostindien.
 foetidus Roxb., stinkender, f. w. Ostindien.
 furcatus Roxb., gabelspaltiger, f. w. Ostindien.
 humilis Rumph., niedriger, f. f. w. Ostindien, Mascarenas, Madagascar.
 inermis Roxb., unbewehrter, f. w. Ostindien.
 integrifolius Lour., ganzblättriger, f. w. Ostindien.
 latifolius Hort., breitblättriger, f. f. w. Ostindien.
 longifolius Lodd., langblättriger, f. w. Ostindien.
 marginatus Roxb., berandeter, f. w. Ostindien, Mauritius.
 odoratissimus L. fil., wohlriechender, f. w. China, Ostindien, Südseeinseln.
 pedunculatus RB., langstieliger, f. w. Neuholland.
 reflexus Hort., zurückgebogener, f. f. w. Ostindien.
 sessilis Boj., stielloser, f. w. Mauritius, Ostindien.
 spiralis RB., spiralförmiger, f. w. Neuholland.
 turbinatus Lodd., kreiselförmiger, f. w. Ostindien.
 utilis Bory, nutzbarer, f. w. Mascarenas, Madagascar.
- Pandera** Fisch. et Mey., Panderie, V. II. (1.), Aizoideae-Atripliceae.
 pilosa Fisch. et Mey., haarige, ♂. f. Talüsch.
- Panicastrella capitata** Mch. v. *Echinaria capitata*.
- Panicum** L., Fennich, III. II., Gramineae.
 altissimum Mey., höchster, ♂. f. m. Westindien.
 anceps Mchx. (*rostratum* Mühlbg.), zweischneidiger, 4. f. Nordamerika.
 arborescens L., baumartiger, 4. f. w. Ostindien.
 arundinaceum Sw. (*patentissimum* Poir.), rohrartiger, 4. w. Westindien.
 asperimum Lag., rauhester, ♂. f. ?
 attenuatum W. (*coloratum* Hort., *proliferum* Lam., *Zéyheri* Hort., *dichotomiflorum* Mchx., *geniculatum* Mühlbg., *gongyloides* Jcq.), verdünnter, ♂. f. Nord- und Südamerika.
 beckmanniaeforme Mikan, beckmanniaähnlicher, ♂. 4. w. Brasilien.
 bicolor RB., zweifarbig, 4. w. Neuholland.
 brevifolium L. (*filamentosum* P., *trichoides* Sw., *capillaceum* Lam.), kurzblättriger, ♂. 4. w. Westindien, Südamerika.
 brizoides L. Juss., zittergrasähnlicher, ♂. w. Ostindien.
 capillare L., haarförmiger, ♂. f. Ost- und Westindien, Nordamerika, Osteuropa.
 carthagenense Sw., carthagenischer, 4. w. Neu-Granada.
 clandestinum L., heimlichblühender, 4. f. Nordamer.
 coloratum L. (*virgatum* Mühlbg.), farbiger, ♂. f. Aegypten, Nordamerika.
 compressum Bivon., flachhalmiger, ♂. ♂. f. Sicilien.
 contractum W. et Arn., schmalrispiger, ? 4. w. Ostind.
 costatum Roxb., gerippter, 4. w. Ostindien, Mascarenas.

Panicum

- cruciforme Sibth., kreuzförmiger, ♂. 4. k. Griechenland (Samos).
 decompositum RB. (*tenuissimum* Hornem.), weitschweifig-rispiger, ♂. w. Ostindien, Neuholland.
 decumbens Flüggl., niederliegender, ♂. ♂. w. Westindien, Südamerika.
 despiciens Lk., übersehener, ♂. f. m. w. ?
 dichotomum L. (*strictum* Pursh), zweizinkiger, ♂. f. Nordamerika.
 diffusum Sw., weitschweifiger, 4. w. Westindien.
 divaricatum L., ausgespreizter, 4. w. Jamaica.
 fasciculatum Sw. (*fusco-rubens* Lam.), büschelförmiger, 4. w. Westindien, Südamerika,
 flavidum Retz (*granulare* Lam., *brizoides* Roxb.), gelblicher, ♂. w. Ostindien, Mascarenas.
 fuscum Sw., brauner, 4. w. Jamaica.
 heteranthum Lk., verschiedenblumiger, ♂. w. Brasilien.
 indicum L., indischer, 4. w. Ostindien.
 interruptum W., unterbrochenrispiger, 4. w. Ostindien.
 jumentorum P. (*polygamum* Sw., *maximum* Jacq., *laeve* Lam.), Pferde-F., ♂. 4. w. Westindien, Südamerika, Afrika.
 latifolium L., breitblättriger, 4. f. Nordamerika.
 laxum Sw., lockerrispiger, ♂. f. m. w. Jamaica.
 marginatum RB., berandeter, 4. w. Neuholland.
 miliaceum L., Hirse-F., ♂. f. Ostindien, Europa.
 h) rubrum.
 molle Sw., weicher, ♂. f. m. w. Westindien.
 muricatum Retz, weichstacheliger, ♂. f. m. Ostindien.
 nervosum Roxb. (*nepalense* Spgl.), nerviger, 4. w. Ostindien, Nepal.
 nitidum Lam., glänzender, ♂. f. Nordamerika.
 numidianum Lam. (*muticum* Lk.), numidischer, ♂. f. Nordafrika.
 oryzoides Sw., reifähnlicher, ♂. f. m. w. Jamaica.
 patens L. (*radicans* Retz), absteher, ♂. w. Ostindien, Mascarenas.
 plantagineum Lk., wegrittblättriger, ♂. f. ?
 pleiophyllum Lk., dichtblättriger, 4. w. ?
 plicatum Lam., gefalteter, 4. w. Ostindien.
 repens L. (*arenarium* Brot.), kriechender, ♂. ♂. f. Süd- und Westeuropa, Mexico.
 Sieberi Lk. (*prostratum* Sbr., *grossarium* R. et S.), Sieber's, ♂. ♂. f. m. w. Aegypten, Ost- und Westindien.
 tenellum Lam., zarter, ♂. f. m. w. Westafrika.
 uliginosum Roxb., sumpfliebender, ♂. f. m. w. Ostind.
 villosum Lam., zottiger, ♂. f. m. w. Ostindien.
 virgatum L., ruthenförmiger, 4. f. Nordamerika.
 aegyptiacum Retz (et *ciliare* Retz etc.) v. *Digitaria aegyptiaca* etc. *alopecuroides* L. vid. *Pennisetum Linnaei*. *Burmanni* Retz (*hirtellum* Burm.) et *colonum* L., *Crus galli* L., *echinatum* W., *frumentaceum* Roxb. etc.) vid. *Oplismenus Burmanni* etc. *cylindricum* Lk. (et *germanicum* Bauh., *helvolum* L., *italicum* L., *indicum* Hort. etc.) vid. *Setaria macrostachya* etc. *Dactylon* L. vid. *Cynodon Dactylon*. *glaucescens* Lam. (*arborescens* Hort.) vid. *Ludolfia glaucescens*. *holcoides* Roxb. et *orientale* W.

Panicum

(et *violaceum* Lam., *vulpinum* W. etc.) vid. Pennisetum holcoides, orientale, violaceum et cenchroides etc. *Teneriffae* Spgl. v. *Tricholaena Teneriffae*.

Panzeria Mönch (Dr. Panzer, Arzt, Botaniker und Entomolog zu Nürnberg), XIV. 1., Labiatae.

lanata (L.), (*multifida* Mch.), wollige, 4. f. b. Sibirien.

Papaver T., Mohn, XIII. 1., Papaveraceae.

alpinum L., Alpen-M., 4. f. b. Mittel- und osteuropäische Alpen.

β) *Burseri* Crtz.

arenarium MB., Sand-M., ☉. f. Caucasus.

Argemone L., Acker-M., ☉. f. Europa.

armeniaceum Lam., armenischer, ☉. f. Armenien.

bracteatum Lindl. (*pulcherrimum* Fisch.), deckblätteriger, 4. f. Sibirien.

caucasicum MB., caucasischer, ☉. ♂. f. Caucasus.

commutatum Fisch. et Mey., verwechselter, ☉. f. Iberien.

croceum Ledeb., safranfarbiger, 4. f. b. Altai.

dubium L., zweifelhafter, ☉. f. Europa.

floribundum Dsf., blüthenreicher, ☉. ♂. f. Armenien.

gariepinum Burch., südafrikanischer, ☉. f. Südafrika.

horridum DC. (? *hispidum* Dsf.), steifborstiger, ☉. f. Neuholland.

hybridum L., Bastard-M., ☉. f. Mittel- u. Südeuropa.

laevigatum MB., kahler, ☉. f. Taurien, Caucasus.

microcarpum DC., kleinfrüchtiger, 4. f. b. Kamtschatka.

nudicaule L., nacktstengeliger, 4. f. b. Norwegen, Grönland, Sibirien etc.

obtusifolium Dsf., stumpfblätteriger, ☉. f. Nordafrika, Sardinien.

officinale Gml., officineller, ☉. f. Osteuropa, Aegypten.

orientale L., morgenländischer, 4. f. Kleinasien.

b) *intermedium* H. Genev.

persicum Lindl., persischer, ☉. f. Persien.

pyrenaicum W. (*aurantiacum* Loisel.), pyrenäischer, 4. f. b. Pyrenäen, Tyrol etc.

b) *puniceum* DC.

Rhoeas L., Klatschrosen-M., ☉. f. Europa.

b) *maculatum*. c) *coccineum*. d) *carneum*. e) *album*. f) *variegatum*. g) *ranunculinum* (*flor. pleno*.)

β) *strigosum* Boenningh. γ) *Roubiae* Vig. δ)

trilobum Wallr. ε) *intermedium* Beck.

rubro-aurantiacum Fisch. (? *miniatum* Rchb.), roth-orangefarbiger, 4. f. b. Dahurien.

setigerum DC., borstiger, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.

somniferum L., Garten-M., ☉. f. Osteuropa, Aegypt. etc.

a) *nigrum*. b) *fimbriatum*. c) *rubro-plenum*.

d) *album*. e) *albo-plenum*. f) *variegatum*.

turbatum DC., kreiselförmiger, ☉. f. Syrien.

Hybriden oder Gartenvarietäten: *sinense* Hort. *spectabile* Hortul.

cumbricum L. v. *Meconopsis cambrica*.

Pappophorum Schreb., Federgranne, III. 1., Gramineae.

nigricans RB., schwärzliche, 4. k. Neuholland.

phleoides Lag., lieschgrasähnliche, 4. w. Südamerika.

- Papyrus** Thouars, Papierstaude, III. 1., Cyperaceae.
 antiquorum Lk., gebräuchliche, 4. w. Aegypten.
 laxiflorus Spgl., lockerblumige, 4. w. Madagascar.
 odoratus W., wohlriechende, 4. w. Westindien, Freundschaftsinseln.
 tuberiferus Schrad., knollige, 4. Kn. w. Ostindien.
- Pardanthus** Ker., Pardelblume, III. 1., Irideae.
 chinensis Ker., chinesische, 4. f. b. k. China.
 nepalensis Swt., nepal'sche, 4. f. b. k. China.
- Pariana** Aubl. (guianischer Name), XXI. 1x. (XIII. 1.), Gramineae.
 campestris Aubl., Feld-P., 4. f. w. Cayenne.
- Parietaria** T., Glaskraut, XXIII. 1. (IV. 1.), Urticaceae.
 cretica L., cretisches, 4. f. Creta.
 diffusa M. et K. (*judaica* Auct.), weitschweifiges, 4. f. Mittel- und Südeuropa.
 floridana Nutt., floridanisches, 4. f. Florida.
 indica L., indisches, 4. w. Ostindien.
 judaica L., israelitisches, 4. f. Süd- und Osteuropa.
 lusitanica L. (*ocymifolia* Poir.), portugiesisches, 4. f. Süd- und Westeuropa.
 maderensis Rchb., madeirisches, 4. f. k. Madeira.
 micrantha Ledeb., kleinblumiges, 4. f. Südrussland.
 officinalis L. (*erecta* M. et K.), officinelles, 4. f. Europa.
 pennsylvanica Mühlbg., pennsylvanisches, 4. f. Pennsylvan.
 polygonoides W., knöterigähnliches, 4. f. Armenien.
 prostrata Spgl., niedergestrecktes, 4. w. Südamerika.
 urticaefolia L. suppl., nesselblättriges, 4. f. m. w. Mascarenas.
- Parinarium** Juss. (*Parinari* Aubl.), (guianischer Name), VII. 1., Chrysobalanaceae.
 campestre Aubl., Feld-P., 4. f. w. Guiana.
 excelsum G. Don, hohe, 4. f. w. Sierra Leone.
 macrophyllum G. Don, großblättrige, 4. f. w. Sierra Leone.
- Paris** L., Einbeere, VIII. 1v., Sargentaceae (*Asparagineae*).
 incompleta MB., unvollkommene, 4. f. Armenien, Iberien.
 quadrifolia L., vierblättrige (gemeine), 4. f. Europa.
 verticillata MB. (*polyphylla* Sm.), wirtelblättrige, 4. f. Ostsibirien, Nepal.
- Parivoo** Aubl. (guianischer Name), XVII. 1v. (vi.), Leguminosae-Caesalpinieae.
 grandiflora Aubl., großblumige, 4. f. w. Guiana.
- Parkeria** Hook. (C. S. Parker, Entdecker dieser Gattung), XXIV. 1., Pterioideae.
 pterioides Hook., saumfarnähnliche, 4. w. Guiana.
- Parkia** RB. (Mungo Park, berühmter Reisender in Afrika), XVI. vi., Leguminosae-Mimosaceae.
 africana RB. (*biglobosa* G. Don), afrikanische, 4. f. w. Guinea.
 uniglobosa G. Don, einkugelige, 4. f. w. Sierra Leone.
- Parkinsonia** Plum. (J. Parkinson, englischer Apotheker und Botaniker), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.
 aculeata L., stachelige, 4. w. Westindien.
- Parnassia** T., Sumpfleberblume, V. 1v., ?Cistineae-Droseraceae.
 asarifolia Vent., haselwurzblättrige, 4. f. b. Nordamerika.
 caroliniana Mchx., carolinische, 4. f. b. k. Nordamerika.

Parnassia

- palustris L., gemeine, 4. f. Europa.
 parviflora DC., kleinblumige, 4. f. Nordamerika.
 speciosa Hort. Angl. (? *grandifolia* DC.), prächtige, 4. f.
 b. Nordamerika.

Parochetus Ham., Höckerbohne, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

- communis Ham., gemeine, 4. k. Nepal.

Paronychia T. Juss., Nagelkraut, V. i., Portulacaceae-Paronychieae.

- alsinefolia Juss., alsinenblättriges, ☉. ♂. f. k.? Spanien.
 bengalensis Juss., bengalisches, ☉. f. Bengalen.
 brasiliana DC., brasilianisches, 4. k. t. Brasilien.
 canariensis Juss., canarisches, 4. ♀, k. Teneriffa.
 capitata Lam. (*cephalotes* MB.), kopfförmiges, 4. f. b. k.
 Süd- und Osteuropa.
 cymosa DC., afterdoldiges, ☉. f. Südeuropa.
 hispanica DC. (*Illecebrum Paronychia* L., *I. narbonense* Schrad.), spanisches, 4. f. b. Süd- u. Westeuropa.
 italica R. et S., italienisches, 4. k. Italien.
 nivea DC., schneeweisses, 4. k. Südfrankreich, Sicilien.
 polygonifolia Juss., knöterigblättriges, 4. f. b. k. Süd- und Westeuropa.
 pubescens DC. (*maritima* Auct.), weichhaariges, 4. f. b. k. Frankreich.
 serpyllifolia Juss., quendelblättriges, 4. f. b. k. Südfrankreich, Pyrenäen.
 tenuifolia Lk., feinblättriges, ☉. f. ?

Parrya RB. (Capitain Parry, berühmter englischer Seefahrer), XV. iii., Cruciferae.

- arctica RB., nördliche, ☉. f. Melvilleinseln.
 integerrima G. Don, ganzblättrige, 4. ♀. k. Sibirien.

Parsonsia RB. (Dr. Parsons, schottischer Botaniker), V. i., Contortae-Apocynae.

- corymbosa RB., traubendoldige, ♀. Sch. w. Südamerika.
 floribunda RB., blüthenreiche, ♀. Sch. w. Jamaika.

Parthenium L., Parthenie, XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.

- Hysterophorus L., feinblättrige, ☉. f. m. Westindien, Südamerika.

- incanum H. B. K., weißgraue, ☉. f. m. Mexico.
 integrifolium L., ganzblättrige, ii. f. Nordamerika.

Pascalialia Orteg. (D. Pascal, Prof. der Medicin zu Parma), XIX. ii., Compositae-Corymbiferae.

- glauca Ort., blaugrüne, 4. k. Chili.

Paspalum L., Pfannengras, III. ii., Gramineae.

- ciliatifolium Mchx. (*pubescens* W., *setaceum* Mchx., *supinum* Bosc., *debile* Mchx., *infirmum* R. et S.), franzenblättriges, 4. w. Carolina, Hispaniola.
 conjugatum Berg. (*tenue* G.), gepaartes, ☉. f. m. w. Südafrika.
 debile Poir., schwaches, ☉. f. Nordafrika.
 difforme Leconte, ungleichförmiges, ☉. f. Nordamerika.
 dissectum L., zerschlitztes, ☉. f. m. w. Südamerika.
 distichum Burm. (*longiflorum* P. B.), zweizeiliges, ♂. w. Ostindien, Mauritius.
 dubium DC., zweifelhaftes, ♂. w. ?
 elegans Flüg. (*tenellum* W., *pubescens* Hort.), zierliches, 4. w. Südamerika.

Paspalum

- ferrugineum* Trin. (*quadrifarium* Hort. Berol.), rostfarbiges, 4. w. Montevideo.
glabrum Poir., kahles, 4. w. Westindien.
lanceolatum Lk., lanzettblättriges, 4. w. Brasilien.
lanuginosum N. E., wolliges, ☉. f. m. Brasilien.
lasiogonum Lk., haarkantiges, ☉. w. f. m. ?
laxum Lam. (*laeve* Mchx.), lockeres, ☉. 4. f. w. Nord- und Südamerika.
litorale RB. (*Kora* Forst.), Strand-P., 4. w. Neuholland, Ostindien, Mauritius.
membranaceum Lam., dünnhäutiges, 4. w. Peru.
notatum Flüg., schwarzpunctirtes, 4. ☉. f. m. Westind.
platense Spgl., la Plata-P., 4. w. Monte-Video.
pusillum Vent. (*orbiculatum* Poir.), kleinstes, 4. w. Westind.
scrobiculatum L. (*Kora* W.), raspelartiges, 4. w. Ostind.
singulare Lk., einfaches, ☉. w. Brasilien.
stoloniferum Bosc, (*racemosum* Jacq.), sprossendes, 4. k. w. Süd- und Nordamerika.
supinum Hornem., niedriges, ☉. f. Nordamerika.
Swartzianum Flüg. (*filiforme* Sw.), Swartz's, ☉. f. m. w. Westindien.
vaginatum Sw., scheidiges, 4. w. Westindien, Afrika, Neuholland.
variegatum Lk., buntes, 4. w. ?
villosum Thbg., zottiges, ☉. f. m. Japan.
virgatum L., ruthenförmiges, ☉. 4. f. m. w. Westindien.
filiforme Flüg. *inaequale* Lk. etc. vid. *Digitaria filiformis* etc.

Passerina L., Spazenstrauch, VIII. 1., Thymelaeaceae.

- annua* Wikstr., jähriger, ☉. f. Mittel- und Südeuropa, Caucasus, Nordafrika.
anthylloides L. fil., anthyllisähnlicher, h. k. t. C. d. g. H.
calycina DC., großkelchiger, ♀. k. Pyrenäen.
capitata L., kopfförmiger, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.
ciliata L., gefranzter, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.
corifolia Wikstr., corisblättriger, ♀. w. Spanien.
dioica Ram. (*empetrifolia* Lap.), zweihäusiger, ♀. k. Pyrenäen.
ericoides L., heideähnlicher, ♀. k. t. Cap d. g. H.
filiformis L., fadenförmiger, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.
grandiflora L. fil., großblumiger, ♀. k. t. Cap d. g. H.
hirsuta L., rauhhhaariger, ♀. k. Südeuropa.
laxa L. fil., lockerästiger, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.
linearifolia Wickstr., gleichbreitblättriger, ♀. k. t. C. d. g. H.
rigida Wickstr., starrer, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.
spicata L. fil., ährenförmiger, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.
Stelleri Wickstr., Steller's, ♀. k. Sibirien.
Tartouira Schrad., silberblättriger, ♀. k. Südfrankreich, Italien.
tenuiflora W., dünnblumiger, ♀. k. Cap d. gut. Hoffn.
thesioides Wickstr., thesiumähnlicher, ♀. k. Spanien.
Thunbergii Wickstr., Thunberg's, ♀. k. Cap d. g. H.
Thymelaea DC., olivenblättriger, ♀. k. Südfrankreich, Spanien.
uniflora L., einblumiger, ♀. k. t. Cap d. g. Hoffn.
villosa L., zottiger, ♀. k. Südeuropa, Kleinasien.
conglomerata Thbg. vid. *Lachnaea conglomerata*.
laevigata L. *stricta* Thbg. v. *Gnidia oppositifolia* et *stricta*.

Passiflora L., Passionsblume, XVI. II., Passifloreae.

Adiantum W., frauenhaarblättrige, ♀. Sch. w. Norfolk-insel.

alata Ait., geflügelte, ♀. Sch. w. Westindien.

b) *alato-coerulea* Hybride.

albicans H. C., weißliche, ♀. Sch. w. Mexico.

albida Ker, weißse, ♀. Sch. w. Brasilien.

Andersonii DC., Anderson's, ♀. Sch. w. St. Lucia.

angulata Swt., kantige, ♀. Sch. w. Mexico.

angustifolia Sw. (*heterophylla* Ait., *longifolia* Lam.), schmalblättrige, ♀. Sch. w. Westindien.

auriculata H. B. K., geöhrte, ♀. Sch. w. Südamerika.

bryonifolia H. B. K., zaunrübenblättrige, ♀. Sch. w.

Mexico, Westindien.

capsularis L., kapselförmige, ♀. w. ?

caracasana L. (*rubricaulis* Jacq.), rothstengelige, ♀. Sch. w. Südamerika.

Cavanillesii DC., Cavanilles's, ♀. Sch. w. Caribäen.

cephaleima Bory, kopfförmige, ♀. Sch. w. Brasilien.

chinensis Swt., chinesische, ♀. Sch. t. k. China.

ciliata Ait., gefranzte, ♀. Sch. w. Jamaica.

coccinea Aubl., scharlachfarbige, ♀. Sch. w. Guiana.

coerulea L., blaue, ♀. Sch. k. f. b. Brasilien.

b) *coeruleo-racemosa*. c) *angustifolia*. d) *glaucophylla*. e) *Colvillii* Swt.

cuneata W. (*lyraefolia* Tussac.), keilförmige, ♀. Sch. w. Westindien.

cuneifolia Cav., keilblättrige, ♀. Sch. w. Südamerika.

cuprea L., kupferfarbige, ♀. Sch. w. Bahama-Inseln.

digitata G. Don, fingerförmige, ♀. Sch. w. Trinidad.

discolor Lk. (*Maximiliana* Bory), verschiedenfarbige, ♀. Sch. w. Brasilien.

edulis Sabin. Ker, genießbare, ♀. Sch. w. Brasilien.

filamentosa Cav. (*palmata* Bot. Cab.), fadige, ♀. Sch. w. Südamerika.

foetida L., stinkende, ☉. Sch. w. Westindien.

glabrata H. B. K. (*hemicycla* Mey.), kahle, ♀. Sch. w. Neugranada, Surinam.

glauca Ait. (*stipulata* Aubl., *amethystina* Mik.), blaugrüne, ♀. Sch. w. Cayenne.

gossypifolia Desv. (*hibiscifolia* DC.), baumwollenblättrige, 4. Sch. w. Westindien.

gracilis Jacq., schlanke, ☉. ♀. Sch. w. ? Brasilien.

hederacea L., epheublättrige, ♀. Sch. w. Westindien.

heterophylla Lam., verschiedenblättrige, ♀. Sch. w. Hispaniola.

hircina Swt. (*foetida* Bot. mag. *hirsuta* Bot. Cab.), bockduftende, ♀. Sch. w. Brasilien.

hirsuta L., rauhhaarige, ♀. Sch. w. Westindien.

holosericea L., sammethaarige, ♀. Sch. w. Neuspanien.

incarnata L., fleischfarbige, 4. k. f. b. Carolina.

kermesina Lk. et Otto, karmoisinrothe, 4. ♀. Sch. w. Brasilien.

laurifolia L., lorbeerblättrige, ♀. Sch. w. Surinam.

ligularis Juss., bandförmige, ♀. Sch. w. Neugranada.

Lockhartii G. Don, Lockhart's, ♀. Sch. w. Trinidad.

Loudoni Atkins, Loudon's, 4. ♀. Sch. w. Hybride.

lunata Sm. (*biflora* Lam.), mondförmige, ♀. Sch. w. Jamaika, Mexico.

β) *acutiloba*.

Passiflora

lutea L., gelbe, ♂. Sch. w. Westindien, Carolina.
maculata Donn (*peltata* Pursh), gefleckte, 4. Sch. k.
 Nordamerika.

maliformis L., apfelfrüchtige, ♂. Sch. w. Westindien.
Mayana Loud., May's, ♂. Sch. k. Hybride.

mexicana Juss., mexicanische, ♂. Sch. w. Mexico.

minima L., kleinblumige, ♂. Sch. w. Westindien.

mucronata Lam., weichspitzige, ♂. Sch. w. Brasilien.

multiflora L., vielblumige, ♂. Sch. w. Antillen.

multiformis Jacq. fil., vielgestaltige, ♂. Sch. w. ?

nigelliflora Hook., schwarzkümmelblumige, ♂. Sch. w.
 Buenos-Ayres.

normalis L., schmallappige, ♂. Sch. w. Jamaica,
 Mexico.

oblongata Sw., länglichblättrige, ♂. Sch. w. Jamaica.

obscura Lindl., dunkle, ♂. Sch. w. Westindien.

pallida L., bleiche, ♂. Sch. w. Hispaniola.

palmata Lk., handförmige, ♂. Sch. w. t. Brasilien.

patula Wendl., absteigende, ♂. Sch. w. ?

pedata L., fußförmige, ♂. Sch. w. Westindien.

peltata Cav., schildförmige, ♂. Sch. w. Westindien.

picturata Ker, bemalte, ♂. Sch. w. Brasilien.

phoenicea Loud., hochrothe, ♂. Sch. w. ?

punctata L., punktirte, ♂. Sch. w. Peru.

quadrangularis L., vierkantige, ♂. Sch. w. Westindien,
 Südamerika.

racemosa Brot. (*princeps* Lodd.), traubige, ♂. Sch. w. t.
 Brasilien.

Raddiana DC., Raddi's, ♂. Sch. w. Brasilien.

rotundifolia L., rundblättrige, ♂. Sch. w. Westindien.

rubra L., rothe, ♂. Sch. w. Westindien.

serrata L., sägezahnige, ♂. Sch. w. Westindien.

serratifolia L., sägeblättrige, ♂. Sch. w. Südamerika.

serrulata Jacq., feingesägte, ♂. Sch. w. Südamerika.

sexflora Juss., sechsblumige, ♂. Sch. w. Hispaniola.

suberosa L., korkige, ♂. Sch. w. Westindien.

Sulivani Booth (*onychina* Lindl.), Sullivan's, ♂. Sch. w.
 Buenos-Ayres.

tiliaefolia L., lindenblättrige, ♂. Sch. w. Peru.

tinifolia Juss., tinusblättrige, ♂. Sch. w. Cayenne.

tripartita Brot., dreitheilige, ♂. Sch. w. ?

tuberosa Jacq. (*punctata* Lodd.), knollige, ♂. Sch. Kn.
 w. Südamerika.

tucumanensis Hook., tucumanische, ♂. Sch. w. Chili.

ulmifolia Ait., ulmenblättrige, ♂. Sch. w. Westindien.

vitifolia H. B. K., weinblättrige, ♂. Sch. w. Südamer.

adiantifolia Ker et *Herbertiana* Ker vid. *Disemma*

adiantifolia et *Herbertiana*. *Murucuja* L. (et *per-*

foliata L.) v. *Murucuja* ocellata et *perfoliata*. *pe-*

duncularis Cav. v. *Tacsonia peduncularis*.

Pastinaca T., Pastinak, V. II., Umbelliferae.

dissecta Vent., schlitzeblättriger, ♂. f. Syrien.

Fleischmanni Hladnik, Fleischmann's, ♂. f. Krain.

foeniculacea Spgl., fenchelähnlicher, 4. f. Nordamerika.

graveolens MB., starkkriechender, ♂. f. Taurien,
 Podolien.

lucida Gouan, spiegelnder, ♂. f. b. k. Balearische
 Inseln.

Pastinaca

nudicaulis Spgl., nacktstengeliger, 4. f. Nordamerika.
 opaca Bernh., dunkler, ♂. f. Illyrien.
 pimpinellifolia MB., bibernellblättriger, ♂. f. Caucasus.
 rigida Spgl., starrer, 4. f. Nordamerika.
 sativa L., gemeiner, ♂. f. Europa.

Anethum Spgl. v. *Anethum graveolens*. *Opopanax*
 L. v. *Opopanax Chironium*.

Patagonula L., *Patagonula*, V. 1., *Asperifoliaceae*.

americana L., amerikanische, ♀. t. w. Patagonien.

Patersonia RB. (W. Paterson, englischer Reisender und Botaniker), XVI. 1. (III. 1.), *Irideae*.

glabrata RB., kahle, 4. t. Neusüdwallis.
glauca RB., blaugrüne, 4. t. Neusüdwallis.
lanata RB., wollige, 4. t. Neusüdwallis.
longifolia RB., langblättrige, 4. t. Neusüdwallis.
longiscapa Swt. (*glauca* Bot. mag.), langschaftige, 4. t. Neusüdwallis.

media RB., mittlere, 4. t. Neusüdwallis.
occidentalis RB., westliche, 4. t. Neusüdwallis.
sericea RB., seidenhaarige, 4. t. Neusüdwallis.

Patrinia Juss. (M. Patrin, welcher Sibirien bereiste), IV. 1., *Valerianeae*.

coronata Fisch., gekrönte, ♂. 4. f. Dahurien.
intermedia Fisch., mittlere, ♂. 4. f. Sibirien.
nudiuscula Fisch., kahlblättrige, ♂. 4. f. Sibirien.
rupestris Juss., Felsen-P., ♂. 4. f. Sibirien.
scabiosaefolia Fisch., scabiosenblättrige, ♂. 4. f. Dahurien.

serratulifolia Fisch., scharfenblättrige, ♂. 4. f. Sibirien.
sibirica Juss., sibirische, ♂. 4. f. Sibirien.

pyrifera Rich. v. *Ryanea speciosa*.

Paullinia L. (S. Paulli, Professor der Arzneikunde zu Copenhagen), VIII. III., *Sapindaceae-Paullinieae*.

barbadensis Jacq., barbadensische, ♀. Sch. w. Caribäen.
bipinnata Poir., doppeltgefiederte, ♀. Sch. w. Brasilien.
caribaea Jacq., caribäische, ♀. Sch. w. Caribäen, Südamerika.

carthagenensis Jacq., carthagenische, ♀. Sch. w. Westindien, Südamerika.

cauliflora Jacq., stengelblumige, ♀. Sch. w. Südamer.
Cupania H. B. K., *Cupani's*, ♀. Sch. w. Südamerika.

curassavica L., curassavische, ♀. Sch. w. Westindien.

Cururu L., *Cururu-P.*, ♀. Sch. w. Westindien.

hispida Jacq., steifhaarige, ♀. Sch. w. Südamerika.

meliaefolia Juss., meliablättrige, ♀. Sch. w. Brasilien.

pinnata L., gefiederte, ♀. Sch. w. Westindien.

polyphylla Schum., vielblättrige, ♀. Sch. w. Westind.

pubescens H. B. K., weichhaarige, ♀. Sch. w. Südamerika.

senegalensis Juss., senegalische, ♀. Sch. w. Guinea.

sphaerocarpa Rich., kugelschalenige, ♀. Sch. w. Guinea.

tetragona Aubl., vierseitige, ♀. Sch. w. Guiana.

Vespertilio Sw., geflügelte, ♀. Sch. w. Caribäen.

Pavetta Rheed. (malabarischer Name), IV. 1., *Rubiaceae*.

arenosa Lour. (*indica* Bot. Reg.), sandliebende, ♀. ♀. w. Südchina.

caffra Thbg., caffer'sche, ♀. ♀. w. Cap der gut. Hoffn.

indica L., indische, ♀. ♀. w. Ostindien.

Pavia Boerh. (P. Paw, Professor der Botanik zu Leyden), VII. 1., Sapindaceae-Hippocastaneae.

flava DC. (*lutea* Poir.), gelbliche, f. f. Nordamerika.

hybrida DC. (*discolor* Swt.), verschiedenfarbige, f. f. Nordamerika.

macrocarpa Hort., großfrüchtige, f. f. ?

macrostachya Lois. (*alba* Poir., *edulis* Poit.), großsährige, f. f. Nordamerika.

neglecta G. Don, übersehene, f. f. ?

rubra Lam., rothblumige, f. f. Nordamerika.

β) *arguta* G. Don. γ) *sublaciniata* Wats. δ)

humilis G. Don. b) *humilis pendula* A. B. ε)

flavescens Hayn.

Pavonia Cav. (J. Pavon, spanischer Botaniker und Reisender), XVI. VIII., Malvaceae.

Berterii Spgl. (*Hibiscus pentaspermus* Hort.), Bertero's, f. w. Jamaica.

cancellata Cav., gitterhüllige, c. w. m. f. Caracas.

ceylanica Cav., ceylonische. c. w. m. f. Ostindien.

coccinea Cav., scharlachfarbige, f. w. St. Domingo.

Columella Cav. (*parviflora* Dsf.), Columella's, f. w. Mascarenas.

corymbosa W., traubendoldige, ♂. f. w. Südamerika, Westindien.

leptocarpa Cav., schlankkapselige, f. w. Surinam.

odorata W., wohlriechende, f. w. Ostindien.

paniculata Cav., rispenblumige, f. w. Südamerika.

pentacarpa Rchb. (*veneta* Spgl.), venetianische, 4. k. Friaul, Venedig.

platanifolia W. (*acerifolia* Lk.), platanusblättrige, 4. f. w. Ostindien.

praemorsa W. (*cuneifolia* Cav.), abgebissene, f. t. k. Cap der guten Hoffnung.

racemosa Sw. (*spicata* Cav.), traubige, f. w. Westind.

sidoides Hornem., sidaähnliche, ♂. f. w. Bengalen.

Spinifex Cav., stachelige, f. w. Westindien.

Typhalaea Cav., kopfblumige, f. w. Westindien.

typhalaeoides H. B. K., langgrannige, f. w. Neu-Granada.

urens Cav., brennende, f. w. Mascarenas.

virginica Spgl., virginische, 4. f. b. k. Virginien.

latifolia Spgl. et *Schrankii* Spgl. vid. *Lebretonia latifolia* et *coccinea*.

Paxtonia Lindl. (J. Paxton, englischer Botaniker und Pflanzen-Cultivateur), XX. 1., Orchideae.

rosea Lindl., rosafarbige, 4. w. Philippinen.

Pectinaria *articulata* Haw. v. *Stapelia articulata*.

Pectidium Less., Pectidie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

punctatum Less., DC., punktirte, c. f. m. Hispaniola.

Pectis L., Kammfederchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

canescens H. B. K., grauliches, c. f. m. Mexico.

ciliaris L., gefranztes, c. f. m. Hispaniola.

humifusa Sw., niederliegendes, c. f. m. Westindien.

linifolia L., flachblättriges, c. f. m. w. Westindien.

prostrata Cav., gestrecktes, c. f. m. Neuspanien, Martinique.

Pectis

Swartziana Less. (*punctata* Sw.), Schwartz's, ☉. f. m. Westindien.

discoidea Hornem. v. *Leyssera capillifolia*.

Pedaliu L., Pedalie, XIV. II., Personatae-Sesameae (*Pedalineae*).

Murex L., stachelfrüchtige, ☉. w. f. m. Ostindien.

Pedicularis T., Scepterkraut, XIX. II., Personatae-Rhinantheae (*Pedicularae*).

acaulis Scop., schaftloses, 4. f. b. Krain, Oberitalien.

asplenifolia Flörk., strichfarnblättriges, 4. f. b. Tyroler, kärnthner, salzburger, steyermärkische Alpen.

atrorubens Schleich., schwarzrother, 4. f. b. Schweizer Alpen.

Barrelieri Rchb. (*adscendens* Gaud.), Barrelier's, 4. f. b. Schweizer Alpen.

canadensis L., canadisches, 4. f. b. Nordamerika.

comosa L., schopfiges, 4. f. b. Süd-, west- und ost-europäische Alpen.

compacta W., dichtblumiges, 4. k. Sibirien.

euphrasioides Steph., euphrasiaähnliches, 4. k. Nord-sibirien, Labrador.

fasciculata Bell., büschelförmiges, 4. f. b. Südliche Schweiz, Oberitalien, Südfrankreich.

flammea L., feuerfarbiges, 4. f. b. k. Nordeuropäische Alpen, Sibirien.

flava Pall., hellgelbes, 4. k. Sibirien, Kleinasien.

foliosa L., blattreiches, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

Friederici-Augusti Tommas., Friedrich-August's, 4. f. b. k. Oesterreichisches Litorale.

gyroflexa Vill., ringförmiges, 4. f. b. Dauphiné.

Hacquetii Graf., Hacquet's, 4. f. b. Krain.

incarnata Jacq., fleischfarbiges, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

Jacquini Koch (*rostrata* Jacq.), Jacquin's, 4. f. b. Tyrol, Oesterreich.

myriophylla Pall., vielblättriges, 4. k. Imaus.

palustris L., Sumpf-S., ♂. f. Europa.

Portenschlagii Saut., Portenschlag's, 4. f. b. Steyermark.

recutita L., beschnittenes, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen, Nordamerika.

resupinata L., schieflippiges, 4. k. Sibirien.

rosea Jacq., rosafarbiges, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

rostrata L., schnabelförmiges, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

Sceptrum Carolinum, Carl's, 4. f. b. Nord- und Osteuropa, Baiern etc.

sudetica W., Riesengebirgs-S., 4. f. b. Riesengebirge.

sylvatica L., Wald-S., ♂. f. Europa.

tuberosa L. (*gyroflexa* b. Vill., *adscendens* Hopp. Schlchr.), dickwurzeliges, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

uncinata Steph. (*incarnata* L.), hackiges, 4. k. Nord-sibirien.

versicolor Wahlbg. (*flammea* Wulf.), buntfarbiges, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

verticillata L., wirtelförmiges, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen, Sibirien.

Pedilanthus Neck., Schublume, XI. III. (XXI. III.),
Tricoccae-Euphorbiaceae.

canaliculatus Swt., rinnenförmige, ♀. w. Südamerika.

carinatus Spgl., kielförmige, ♀. w. ?

cordatus Spgl. (*cordellatus* Haw.), herzblättrige, ♀. w. Südamerika.

padifolius Poit., traubenkirschenblättrige, ♀. w. Südamerika.

subcarinatus (Haw.), gefaltzte, ♀. w. Südamerika.

tithymaloides Poit. (*myrtifolius* Lk.), myrtenblättrige, ♀. w. Südamerika, Westindien.

Peganum L., Harmelraute, XI. I., Tricoccae-Rutaceae.

Harmala L. (*crithmifolium* Retz), gemeine, 4. f. Spanien, Südrufsländ.

dauricum L. β. v. *Haplophyllum dahuricum*.

Pekea tuberculosa Aubl. v. *Caryocar tomentosum*.

Pelargonium L'Her., Kranichschnabel, XVI. IV., Geraniaceae,

I. *Campylia* Swt.

blattarium Jacq., mottenkrautähnlicher, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

canum P., weißgrauer, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

carinatum Swt., kieliger, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

eristemon Jacq., woffadiger, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

holosericeum DC., Swt., sammethaariger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Oenotherae Jacq., Nachtkerzen-K., 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

verbasciflorum Swt., königskerzenblumiger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

II. *Chorisma* Lindl.

tetragonum L'Her., vierseitiger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

b) *variegatum*.

III. *Ciconium* Swt. (*Pelargium* DC.).

abrotanifolium Jacq., stabwurzblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

acerifolium L'Her., ahornblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

acetosum Ait., saurer, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

a) *album*. b) *carneum*. c) *fol. variegat.*

acugnaticum Carm., Thouars, Acunna-K., ♀. k. t. Tristan d'Acunna.

adulterinum L'Her., verschwägerter, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

alchemilloides Ait., löwenfußblättriger, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

alnifolium W., erlenblättriger, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

amplissimum Wendl. (*distentifolium* Hort.), grofszahniger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

anceps Ait., zweischneidiger, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

angulosum Ait., kantiger, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

b) *plicatum* Hort. c) *minimum*.

asperum W., rauher, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

augustum Lk., herrlicher, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

balsameum Jacq., balsamischer, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

b) *latifolium*.

Barringtonii W., Barrington's, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

Pelargonium

- betulinum Ait., birkenblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
 b) incisum. c) latifolium. d) odoratum.
- bicolor Ait., zweifarbiger, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.
 b) lobatum. c) purpureum.
- brancaefolium* (*heracleifolium* Swt.), bärenklaubblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- capitatum Ait., kopfförmiger, ♀. k. t. Cap der gut. H.
 b) latifolium. c) suaveolens. d) fol. varieg.
- cardiifolium Swt., distelblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- cochleatum W. (*concauifolium* Wendl.), löffelblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- conduplicatum W. (*cordifolium* Hort.), zusammengefalteter, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
 b) crispum. c) variegatum.
- consanguineum W., verwandter, ♀. k. t. ?Hybride.
- cordatum Ait., herzblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
 b) fol. variegat.
- cortusaefolium L'Her., cortusablättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
 b) album. c) kermesinum. d) rubrum. e) crispum.
- crassicaule Ait. (*mammillaricaule* s. *mammulosum* Hort.), dickblättriger, 4. ♀. k. t. Südafrika.
 b) maculatum Swt.
- crenatum Andr., Swt., gekerbter, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- crispum Ait., krauser, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.
 b) minus.
- cucullatum Ait., kappenförmiger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
 b) striatiflorum Swt. c) majus Swt. d) grandiflorum Swt. e) parviflorum Swt.
- cuspidatum W. (*glaucophyllum* Wendl.), feinspitziger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- delphinifolium W., ritterspornblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- denticulatum Jacq., gezählter, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
 b) latifolium. c) lucidum.
- discipes Haw., dickstieliger, ♀. k. t. Cap der gut. H.
- diversifolium Wendl. (*tricuspidatum* et *paniculatum* Hort.), verschiedenblättriger, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.
- dondiaefolium Lk., dondiablättriger, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- echinatum Curt. (*hamatum* Jacq.), stacheliger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
 b) purpureum.
- elegans W., zierlicher, 4. ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- exstipulatum Ait., zwischenblattloser, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- filipendulifolium Swt., filipendulablättriger, 4. Kn. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- flavum Ait. (*daucifolium* W.), hellgelber, 4. Kn. k. t. Cap der guten Hoffnung.
 β) daucoides Jcq.

Pelargonium

formosissimum P. (*formosum* Hort.), schöner, ♀. k. t.
Cap der guten Hoffnung.

b) *lineatum* Swt, c) *rubrum*.

Fothergillii Swt., Fothergill's, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

b) *purpureum* Swt.

fragens W., wohlriechender, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

fulgidum Ait., leuchtender, ♀. k. t. Cap der gut. H.

fuscum Jacq., braungefleckter, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

b) *laevigatum*.

gibbosum Ait., höckeriger, ♀. k. t. Cap der gut. H.

glabellum Lk., wenighaariger, ♀. k. t. ?Hybride.

glaucum L'Her., blaugrüner, ♀. k. t. Cap der gut. H.

b) *Tankervilliae* Hortul. γ) *lanceolatum* (Cav.).

glomeratum Donn, Jacq. (*australe* Swt., *aemulum* Hffmsg.), knaulförmiger, ♀. k. t. Neuholland.

glutinosum Ait. (*viscum* Hort.), klebriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

b) *crispum*. c) *laciniatum*. d) *fol. variegat.*

grandiflorum W., großblumiger. ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

β) *Barmanum* Hort. (*Burmanni* Hffmsg.).

gratum W. (*citriodorum* Hort., *citrosus* Voigt), citronenduftender, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

b) *latifolium*.

graveolens L'Her. (*terebinthaceum* Cav.), starkkriechender, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

b) *variegatum* Swt.

grossularioides Ait., stachelbeerblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

hepaticaefolium Spgl., leberkrautblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

hermanniaefolium Jacq., hermannienblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

b) *majus* (*latifolium* Hort.).

heterogamum Ait., L'Her., verschiedenehiger, ♀. k. Hybride.

hirtum Jacq., haarstieliger, ♀. k. t. Cap der gut. H.

hispidum W., steifhaariger, ♀. k. t. Cap der gut. H.

hybridum Ait. (*coccineum* Ehrh.), Bastard-K., ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

a) *coccineum* Hort. b) *lucidum* Hort. c) *roseum* Ehrh. (*carneum* Voigt).

ignescens Swt., feuerfarbiger, ♀. k. t. ?Hybride.

imbricatum Swt., ziegeldachförmiger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

incisum W., eingeschnittener, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

inodorum W., geruchloser, ♀. k. t. Neuholland.

inquinans Ait., befleckter, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

b) *album*. c) *Bentinkianum*. d) *carneum*. e) *coccineum*. f) *parviflorum*. g) *obtusum* (*orbiculare*, *Blücherianum* Hort.). h) *zonale*. i) *purpureum* (*tomentosum* Hort.).

laevigatum W., glatter, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

lateripes L'Her., seitenstieliger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Pelargonium

- b) album. c) zonatum Swt. d) roseum. e) albo-marginatum DC.
- leptopetalum Swt. (*stenopetalum* Andr.), schlankkroniger, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- litorale Hügel, Strand-K., 4. f. k. t. Neuholland.
- lobatum Ait., gelappter, 4. Kn. k. t. Cap der gut. H.
- malvaefolium Jacq., malvenblättriger, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- millefoliatum Swt., garbenblättriger, 4. Kn. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- monstrum Ait., ungestalteter, f. k. t. ?Hybride.
- nigrescens Swt., schwärzlicher, f. k. t. Cap der gut. H.
- nobile Diet., edler, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- nothum W., unächter, f. k. t. Hybride.
- obtusilobum W. (*obtusifolium* Swt.), stumpflappiger, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- odoratissimum Ait., wohlriechendster, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- oxyphyllum Swt. (*miniatum album* Andr.), spitzblättriger, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- ovale L'Her., eiförmiger, 4. k. t. Südafrika.
- pallens Swt., bleichblumiger, 4. f. Kn. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- pallidum W., bleicher, f. k. t. ?Hybride.
- papilionaceum Ait., schmetterlingsblumiger, f. k. Cap der guten Hoffnung.
- patentissimum Wendl., weitabstehender, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- patulum Jacq., abstehender, f. k. t. Cap der gut. H.
- pedicellatum Swt., kurzgestielter, 4. Kn. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- peltatum Ait., schildförmiger, f. k. t. Cap der gut. H.
- b) variegatum Andr.
- penicillatum W., pinselförmiger, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- b) carneum.
- pictum P. (*rubromaculatum* Poir.), bemalter, 4. Kn. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- primulinum Swt., primelblumiger, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- principissae Swt., fürstlicher, f. k. t. Cap der gut. H.
- pulchellum Curt. (*Curtisianum* Spgl.), schöner, 4. Kn. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- pulverulentum Swt., bestäubter, 4. f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- pumilum W., kleiner, f. k. t. Cap der guten Hoffn.
- b) carneum.
- pustulosum Swt., blätteriger, f. k. t. Cap der gut. H.
- quercifolium Ait., eichenblättriger, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- b) bipinnatifidum Swt. c) querceolatum H. Par.
- d) quercinum Hoffmsg.
- quinelobum Coll., fünfflappiger, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- quinevulnerum P., fünffleckiger, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- Radula Ait., L'Her., raspelblättriger, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- β) roseum W.

Pelargonium

- reniforme Curt., nierenförmiger, f. k. t. Cap d. g. H.
 ribifolium Jacq., johannisbeerblättriger, f. k. t. Cap
 der guten Hoffnung.
 rigidum Donn., starrer, f. k. t. Cap der guten Hoffn.
 rubens W., röthlicher, f. k. t. Cap der guten Hoffnung.
 rubro-cinctum Lk., rothrandiger, f. k. t. Cap d. g. H.
 rugosum Sw., runzeliger, f. k. t. Cap der gut. H.
 sanguineum Wendl., blutrother, f. t. k. Cap d. g. H.
 saniculaefolium W., sanikelblättriger, f. t. k. Cap der
 guten Hoffnung.
 scabrum Ait. L'Her., scharfer, f. k. t. Cap d. g. H.
 b) album. c) rubrum.
 scandens Ehrh., kletternder, f. k. t. Cap d. gut. H.
 b) roseum. c) fol. variegat.
 scutatum Lk., wappenschildförmiger, f. k. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 schizopetalum Swt., spaltblättriger, 4. Kn. t. k. Cap
 der guten Hoffnung.
 semitrilobum Jacq., halbdreilappiger, f. k. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 senecioides L'Her., kreuzkrautähnlicher, $\odot. m. f.$ Cap
 der guten Hoffnung.
 sidaefolium W., sidablättriger, f. k. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 sororium W., verschwisterter, f. k. t. Hybride.
 speciosum W. (*speciosissimum* Hort.), prächtiger, f. k. t.
 Cap der guten Hoffnung.
 spinosum W., dorniger, f. k. t. Cap der guten Hoffn.
 splendens W., schimmernder, f. k. t. Cap der gut. H.
 b) laciniatum.
 spurium W., falscher, f. k. t. ?Hybride.
 staphisagrioides Swt., staphisagriaähnlicher, f. k. t.
 Cap der guten Hoffnung.
 stenopetalum Ehrh., schmalkroniger, f. k. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 b) coccineum.
 suaveolens Dietr. (*errans* Hort.), gutriechender, f. k. t.
 Cap der guten Hoffnung.
 tabulare Ait., Tafelbergs-K., 4. k. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 tenuifolium L'Her., feinblättriger, f. k. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 ternatum Jacq., gedreiter, f. k. t. Cap der gut. H.
 tomentosum Jacq., filziger, f. k. t. Cap der gut. H.
 Tormanni Wendl. (*Willdenowii* Dietr.), Tormann's, f.
 k. t. Cap der guten Hoffnung.
 tricuspidatum L'Her., dreispitziger, f. k. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 tripartitum W. (*trifidum* Jacq.), dreitheiliger, f. k. t.
 Cap der guten Hoffnung.
 triste Ait., trauernder, 4. Kn. k. t. Cap der gut. H.
 unicolorum W., einfarbiger, f. k. t. ?Hybride.
 uniflorum Sess., einblumiger, f. k. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 variegatum W., buntblumiger, f. k. t. Cap der
 guten Hoffnung.
 b) albiflorum Spin. c) Bellardi Spin.
 villosum Swt. (? *Collae* et *clandestinum* Spin.), zottiger,
 f. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Pelargonium

viscidum Dietr. (*dissectum* Hort.), schmieriger, ♀. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

viscosissimum Swt., schmierigster, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

vitifolium Ait., weinblättriger, ♀. k. Cap der gut. H.
b) fol. variegat.

Watsoni Lk., Watson's, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

Willdenowii Swt. (*pulchellum* W., *superbum* Dietr.),

Willdenow's, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

zonale Ait., gesäumter, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

b) album. c) carneum. d) coccineum. e) kermesinum. f) miniatum. g) roseum. h) roseum fl. plen. i) fol. argenteo-variegat. (*marginatum* Lk.), fol. aureo-variegat. k) tricolor. l) umbellatum etc.

IV. Cynosbata DC.

cynosbatifolium W., hagerosenblättriger, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

lateritium W., blafsmennigrother, ♀. k. t. ?

V. Dimacria Lindl.

apiifolium Jacq. (Andr.), sellerieblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

aristatum Swt., langgranniger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

astragalifolium P., tragantblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

carneum Jacq., fleischfarbiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

coronillaefolium P., kronenwickenblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

floribundum RB., blüthenreicher, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

foliosum Swt., blattreicher, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

heracleifolium Lodd., heilkrautblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

heterophyllum Jacq. (Andr.), verschiedenblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

incrassatum Curt., verdickter, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

oxaloides W., sauerkleeähnlicher, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

rumicifolium Swet., ampferblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

tenellum (Andr.), zarter, 4. Kn. t. k. Cap der gut. H.

viciaefolium L'Her., wickenblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

VI. Grenvillea Swt.

conspicuum Swt., ansehnlicher, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

VII. Hoarea Swt.

atrum L'Her., schwärzlicher, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

auriculatum W. (*ciliatum* Jaq.), geöhrt, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

barbatum Jacq., bärtiger, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.

bubonifolium P., steineppigblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

ciliatum L'Her., gefranzter. 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.

Pelargonium

- coluteaefolium* Swt., blasenstrauchblättriger, 4. Kn. t. k. Hybride.
- congestum* Swt., gedrängter, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- corydaliflorum* Swt., kappenmohnblumiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- depressum* Jacq., niedergedrückter, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- dioicum* RB., zweihäusiger, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- fissifolium* P., spaltblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- hirsutum* Ait., rauhhaariger, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- laciniatum* P. (Andr.), schlitzbilättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- Leeanum* Swt., Lee's, 4. Kn. t. k. Cap der gut. H.
- lineare* P. (Andr.), gleichbreitkroniger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- longiflorum* Jacq., langblumiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- longifolium* Jacq., langblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- luteum* (Andr.), gelber, 4. Kn. t. k. Cap der gut. H.
- melanantho* Jacq., schwarzblumiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- nervifolium* Jacq., nervenblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- niveum* Swt., schneeweißser, 4. Kn. t. k. ? Hybride.
- nummularifolium* Salisb., pfennigkrautblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- nutans* DC., nickender, 4. Kn. t. k. Cap der guten H.
- orobifolium* Swt., walderbsenblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- ovalifolium* DC., eiblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- oxalidifolium* P., sauerkleeblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- penniforme* P., federförmiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- pilosum* W., haariger, 4. Kn. t. k. Cap der guten H.
- punctatum* W., punctirter, 4. Kn. t. k. Cap der gut. H.
- purpurascens* P. (*centauroides* L'Her.), purpurfarbiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- radiatum* P. (Andr.), strahliger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- radicatum* Vent., grofswurzeliger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- rapaceum* Ait., rübenartiger, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- reflexum* P., zurückgebogener, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- reticulatum* Swt., netzförmiger, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- retusum* Swt., eingedrückter, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- revolutum* P., zurückgerollter, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- roseum* (Andr.), rosafarbiger, 4. Kn. t. k. Cap d. g. H.
- setosum* Swt., borstiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten H.
- spathulatum* P. (Andr.), spatelblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- β) affine Andr.
- Sweetianum* * (*carinatum* Swt.), Sweet's, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.
- triphyllo* Jacq., dreiblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Pelargonium

undulaeflorum Swt., wellenblumiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

undulatum RB., wellenförmiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

violaeflorum Swt., veilchenblumiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

virgineum P. (Andr.), jungfräulicher, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

VIII. Isopetalum Swt.

Cotyledonis L'Her., nabelkrautartiger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

IX. Jenkinsonia Swt.

bullatum Swt., bauschiger ♀, k. t. Cap der gut. Hoffn.

longicaule Swt., langstengeliger, ♀, k. t. Cap d. g. H.

pendulum Swt., herabhängender, ♀, k. t. Cap d. g. H.

quinatum Curt., fünfzähliger, ♀, k. t. Cap der gut. H.

X. Myrrhidium DC.

anemonefolium Jacq., anemonenblättriger, ♀, k. t. Cap der guten Hoffnung.

canariense W., canarischer, ♀, k. t. Cap der guten H.

caucalisfolium Jacq., caucalisblättriger, ♂, k. t. Cap der guten Hoffnung.

coriandrifolium Ait., corianderblättriger, ♂, k. t. Cap der guten Hoffnung.

lacerum Jacq., zeretzter, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.

multicaule Jacq., vielstengeliger, ♂, k. t. Cap d. g. H.

myrrhifolium Ait., kerbelblättriger, ♀, k. t. Cap der guten Hoffnung.

XI. Otidia Lindl.

alternans Wendl., abwechselnder, ♀, k. t. Cap der guten Hoffnung.

carnosum Ait., fleischiger, ♀, k. t. Cap der gut. Hoffn.

ceratophyllum L'Her., hornblättriger, ♀, k. t. Cap der guten Hoffnung.

crithmifolium Sm., meerfenchelblättriger, ♀, k. t. Cap der guten Hoffnung.

dasycaulon Sims., höckerigstengeliger, ♀, k. t. Cap der guten Hoffnung.

laxum Swt., lockerer, ♀, k. t. Cap der guten Hoffnung.

XII. Peristera DC.

aethaeoides L'Her., eibischblättriger, ♂, k. t. Cap d. g. H.

australe W., neuholländischer, 4. ♀, k. t. Neuholland.

chamaedryfolium Jacq., gamanderblättriger, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.

columbinum Jacq., feintheiliger, 4. k. t. Cap d. g. H.

humifusum W., niedergestreckter, ☉, f. m. k. Cap der guten Hoffnung.

XIII. Phymatanthus Lindl.

coronopifolium Jacq., krähenfufsblättriger, ♀, t. Cap der guten Hoffnung.

elatum Swt., hoher, ♀, t. Cap der guten Hoffnung.

tricolor Curt. (*violarium* Jacq.) dreifarbigiger, ♀, t. Cap der guten Hoffnung.

XIV. Polyactium DC.

multiradiatum Wendl., vielstrahliger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

XV. Seymouria Swt.

asarifolium Swt., haselwurzblättriger, 4. Kn. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Pelargonium

dipetalum L'Her., zweikronenblättriger, 4. Kn. t. k.
Cap der guten Hoffnung.

Hybriden und Gartenvarietäten: abutiloides Swt., acanthifolium Hffmsg., aceroides Swt. (*acerinum* et *palmatum* Hort), acetabulosum Swt., acidum Swt., acutidentatum Swt., acutilobum Swt., aemulum Swt., affluens Swt., alatum Swt., albinotum Swt., Alexanderianum Penny, Allenii Sw., Altensteinianum Hort., alutaceum Hffmsg., ambrosiacum Hffmsg., amicum Hffmsg., amoenum Swt., anacampton Swt., anisodonton Swt., anodaefolium Hffmsg. (*pavoninum* et *elegans* Hortul.), anosma Hffmsg., anthriscifolium Swt., Antonianum H. Vind., ardens Swt., ardescens Swt., argutum Swt., aromaticum Hffmsg., asperifolium Swt., astantiaefolium Hffmsg., atrofusum Swt., atropurpureum Swt., atrosanguineum Swt., augustissimum Hort., aurantiacum Swt., Avronianum Swt., bacchantum Hffmsg., Baileyanum Swt., Bakerianum Swt., Barclayanum Sw., Barnardianum Swt., basilicum Swt., Beadoniae Swt., Beaufortianum Swt., bellulum Swt., Besseri Hort., biflorum Swt., bipartitum Swt., bipinnatifidum Swt., Blandfordianum Swt., blandum Swt., Boyleae Swt., brachiatum Hort., Breesianum Swt., Brightianum Swt., Broughtoniae Swt., Brownii Swt., Brugmannianum v. Eed., bryonifolium Swt., Burnelianum Swt., calamistratum Swt., calliston Swt., calycinum Swt., calocephalon Swt., Cameronianum Penny, camphoratum Hffmsg., campyliaeflorum Swt., campylosepalum Swt., candidum Swt., carbasinum Swt., cardiifolium Swt., Carelesianum Penny, carnescens Swt., cartilagineum Swt., chaerophyllum Swt., Charlwoodii Swt., chelidonifolium Swt., chenopodifolium Swt., chrysanthemifolium Swt., clarum Swt., Clintoniae Swt., coarctatum Swt., coilophyllum Swt., Colvillianum Swt., commixtum Swt., compactum Swt., Comptoniae Swt., comptum Swt., concavum Swt., concinnum Swt., conclausum Swt., concolor Swt., concretum Swt., congestum Swt., cordiforme Swt., coruscans Swt., Cosmianum Swt., crataegifolium Swt., crenaeflorum Swt., crenulatum Swt., cruentum Swt., Cummingiae Swt., cuneatum Hffmsg. (*orphanum* Hffmsg.), cuneiflorum Swt., Darnleyanum Swt., Daveyanum Swt. (*Rowanium* Hffmsg.), Deburghae Swt., decorum Swt., delectabile Hffmsg. (*spectabile pulcherrium* v. Eed.), Dennisianum Swt., dentatum Andr., dependens Swt., diadematum Hort., b. coccineum, c. majus, d. superbum, dianthiflorum H. Cels, Diefenbachianum Hort., difforme Swt., dilatatum Swt., dimacriaeflorum Swt., dissectum Swt. (? Hffmsg.) dissimile Swt., distichum Hffmsg., divaricatum Diet., (*Felderi* Hort.), divergens Swt., diversifolium Swt., Dobreeanum Swt., dumosum Swt., egregium H. Belved., electum Swt., elegans Swt., emancipatum Hffmsg., eratinum Swt., erectum Swt., eriocaulon Swt., eriophyllum Swt., eriosepalum Swt., erythraeum Hffmsg. (*reniforme* Swt.), eximium Hffmsg., exornatum Swt., expansum Swt., Exsul Hffmsg., Fairliae Swt., flabellifolium Swt., flaccidum Swt.,

Pelargonium

flagrans Swt., flexuosum Swt., floccosum Swt., floridum Swt., foliosum Swt., Folsjanbeae Swt., fragrantissimum Lk., fraternum Hffmsg., Friederi Guelmi Hort. Berol., frondosum Hort., fulgens Swt., glabrescens Swt., glabrifolium Swt., glaucifolium Swt., gloriosum Hffmsg. (*superbum rubrum* Hort.), Gowerii Swt., grandidentatum Swt., graphicum Swt., Grenvillianum Andr., Gurneyanum Swt., haemasticum Swt., Hammersleiae Swt., Haricortianum Hort., Harwoodiae Swt., hedysarifolium Swt., Heldianum H. Vindob., Helleri Hort., heteromallum Swt., hilare Hffmsg., Hillianum Swt., Hislopianum Penny, hoareaeflorum Swt., Hoareanum Swt., Hoffmannseggii Dietr., honestum Hffmsg. (*ciliatum* v. Eed.), Hornschuchianum Hort., Hospes Hffmsg., Huegelianum H. Vindob., Humei Swt., Huseyanum Swt., hypotrachys Hffmsg., illustre Swt. (*palmatum* v. Eed.), imbricatum Swt., imitans Hort., imperiale Hort. (*venustum* Hffmsg.), incanescens Swt., incarnatum Swt., incursum Swt., inscriptum Swt., insculptum Swt., insigne Hffmsg. (*speciosum* Cels), insignitum Swt., intertextum Swt., involucratum maximum Angl., Jannackii Hffmsg., Jacquinianum H. Vindob., Jenkinsonii Swt., jonquillinum Swt., Keglówichianum Hort., Kenrickae Swt., labyrinthicum Swt., laciniatum Swt., ladanosma Hffmsg., laeve Otto (*tripartitum* et *fragile* Hort.), Lamberti Swt., lasiocaulon Swt., latidentatum Swt., latifolium Swt., latilobum Swt., laxiflorum Swt., Lawrenceanum Swt., Leghkeckae Swt., Lemonianum Hort., leopoldinum Hort., lepidum Swt., lineatum Swt., Littleanum Swt., Loudonianum Swt., Lousadianum Swt., macranthum Swt., macrolobum Hffmsg., magnificum Hffmsg., magnifolium Swt., magnistipulatum Swt., malacophyllum Swt., Mathildinum Hort., Mattockianum Swt., maximum Hffmsg., megalanthum Swt., megaleion Swt., megalostictum Swt., melancholicum Penny, melanostictum Swt., melissinum Swt., Metternichianum H. Vindob., militare Hffmsg., mirabile Swt., mixtum Swt., modestum Swt., molle Hgmsg., b. fol. albo varieg., Mostynae Swt., multiflorum Swt., multinerve Swt., Murrayanum Swt., mutabile Swt., Nairnii Swt., nanum Swt., Napoleonum Hort., nervosum Swt., Newshamianum Swt., nodosum Sw., notatum Swt., nubilum Swt., nutans Swt., oblatum Swt., obovatum Swt., obscurum Swt., Obrienianum Swt., oenanthifolium Swt., olidum Hffmsg. (*hispidum* Hort.), olympicum Hort., optabile Swt., optimum Hffmsg., ornatum Swt., Ottonianum H. Berol., Palkii Swt., pannifolium Swt., papyraceum Swt., particeps Swt., patens Swt., paucidentatum Swt., pavoninum Swt., pectinifolium Swt., pedunculatum Swt., pelagium Hort., penastictum Swt., Pennymanum Young, peramplum Swt., Peytoniae Swt., phoenicum Swt., picturatum Swt., piligerum Hffmsg. (*piliferum* Dietr. *pilosum* Breit.), piperitum Dietr., placidum Hffmsg., planifolium Swt., platanifolium Swt., platypetalum Swt., platyphyllum Hffmsg. (*lappaceum* Hffmsg.), plectophyllum Swt.,

Pelargonium

poculifolium Swt., porphyreum Hort., Potteri Swt.,
 praeclarum Swt., Princeanum Swt., profanum Hort.,
 propugnatum Hffmsg., pruinosa Hoffmsg., psilophyllum Swt., pubescens Andr., pulcherrimum Swt.,
 pulchrum Swt., pulverulentum Swt., puniceum Hffmsg.,
 purum Swt., pyrethrifolium Swt., quadriflorum Swt.,
 ramigerum Swt., ramulosum Swt., recurvatum Swt.,
 recurvifolium Swt., regium Swt., Reinwardtianum Hffmsg. (*trilobum* v. Eed.),
 reticulatum Swt., rhodopetalum Swt., Richianum Swt.,
 Richmondianum Penny, Riedelianum Hort., rigescens Swt.,
 rigens Swt., Robinsoni Swt., Rosula Hffmsg., rotundifolium Swt.,
 rubescens Swt., rugosum Andr., Russelianum Swt.,
 saepeflorens Swt., salebrosum Swt., saturatum Swt.,
 Saundersii Swt., scariosum Wendl., Scarboroughiae Swt.,
 scintillans Swt., scitulum Swt., Scottii Swt.,
 selectum Swt., selenifolium Swt., serratifolium Swt.,
 Seymouriae Swt., Sidoniae Hort., siccifolium Hffmsg.,
 sisynbrifolium Swt., Skelii Hffmsg., Smithianum Swt.,
 Smithii Swt., symyriifolium Swt., solubile Swt.,
 Southcotianum Swt., spectabile Swt. (*purpurascens* v. Eed.),
 sphaerocephalum Swt., sphondyliifolium Swt.,
 Spinii Swt., spirans Hffmsg., Splenianum Hort.,
 Stapletoni Swt., Stewartii Swt., striatum Swt.,
 succulentum Swt., suffusum Swt., sulphureum Swt.,
 Sweetianum Hort., Sylveri Hort., Synnoti Swt.,
 tanacetifolium Swt., Tasmannianum Hort., Taylori Hort.,
 tenebrosum Hort., ternatifidum Diet.,
 thamnoides Hffmsg., Thynneae Swt., Tibbitsianum Swt.,
 tigrinum Hort., tinctum Swt., torrefactum Swt.,
 tortuosum Swt., trachyphyllum Hffmsg.,
 translucens Swt., trilingue Hffmsg., trisectum Hffmsg.,
 triumphans Hort., tumidum Hort., Tursillii Hort.,
 tyrianthinum Swt., undatum Hffmsg., undulifolium Hffmsg.,
 urbanum Swt., ustulatum Hffmsg., Vandesiae Swt.,
 varium Swt., velutinum Hffmsg., veniferum Swt.,
 veniflorum Swt., venosum Swt., venustum Swt.,
 verbasciflorum Swt., verbenaeifolium Swt.,
 verecundum Swt., versicolor Swt., vespertinum Swt.,
 vestifolium Swt., vestitum Hffmsg., Victorianum Swt.,
 villosum Swt., Volucris Hffmsg., (*cordatum varium* v. Eed.),
 vulneratum gallicum Hort., Wawerley Hort.,
 Webbianum Penny, Wedellii Hort., Welsianum Swt.,
 Yeatmanianum Swt., Yongii Swt., Zingiberinum Swt. etc. etc.

Pelexia Poit., Helmorche, XX. I., Orchideae.

adnata Spgl. (*spiranthoides* Lindl.), angewachsene. 4. w. Westindien.

falcata Spgl., sichelförmige, 4. w. Japan.

Peliosanthes Andr., Schlagblaublume, VI. I., Colchicaceae.

humilis Sims, kurzschäftige, 4. w. Ostindien.

Teta Andr., langschäftige, 4. w. Ostindien.

Peltaria L., Scheibenkraut, XV. II., Cruciferae.

alliacea L., knoblauchduftendes, 4. f. Oesterreichisches Siebenbürgen, Oberitalien.

glastifolia DC., waidblättriges, ☉. Syrien, Mesopotamien. *capensis* L. v. *Heliophila Peltaria*.

Penaea L. (P. Pena, ein Franzose, Mitarbeiter des Matthias de L'Obel), IV. 1. ? Thymelaeaceae (Penaeeaceae).

formosa Thbg., schöne, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.
 fruticulosa L., strauchige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
 imbricata Grah., dachblättrige, ♀. l. Cap der gut. H.
 lateriflora L., seitenblumige, ♀. t. Cap der guten H.
 marginata L., berandete, ♀. t. Cap der guten Hoffn.
 mucronata L., stachelspitzige, ♀. t. Cap der guten H.
 myrtoide L., myrtenähnliche, ♀. t. Cap der guten H.
 Sarcocolla Berg., Sarcocolla, P. ♀. t. Cap der g. H.
 squamosa L. (*tetragona* Berg.), schuppige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Penicillaria W., Pinselgras, III. 11., Gramineae.

Pluknetii Lk., Pluknet's, ☉. f. m. ? Ostindien.

spicata W., ährenförmiges, ☉. f. m. Ostindien, Aegypten.
ciliata W. v. Pennisetum Linnaei.

Pennisetum Rich., Federhorstengras, III. 1. (11.), Gramineae.

asperum Lk., rauhes, 4. k. Cap der guten Hoffnung.
 aureum Lk., goldfarbiges, 4. w. ? Ostindien.

barbatum R. et S., bärtiges, ☉. f. m. Ostindien.

cenchroides Rich., cenchrusähnliches, ☉. f. m. Cap der guten Hoffnung, Nordafrika, Westindien.

dichotomum Delil., zweizinkiges, ♂. 4. k. Arabien, Aegypten.

erubescens Lk., röthliches, 4. w. Westindien.

holcoides R. et S., holcusähnliches, ☉. f. m. Ostindien.

Karwinskyi Schrad., Karwinsky's, ☉. f. m. Mexico.

Linnaei Kunth. (*alopecuroides* Spgl. *cylindroides* R. et S.), Linnee's, ☉. f. m. Cap der g. Hoffn., Ostindien.

nepalense Spgl., nepal'sches, ☉. f. m. Nepal.

orientale Rich., morgenländisches, ♂. 4. k. Kleinasien.

polystachyum R. et S., vielähriges, ☉. f. m. Ostindien.

purpurascens H. B. K. (*setosum* Rich.), purpurfarbiges, ♂. 4. w. Westindien, Mexico.

uniflorum H. B. K., einblumiges, ♂. 4. w. Mexico.

violaceum Rich., violettes, 4. w. Senegal.

Alopecurus Jacq. fil., *geniculatum* Jacq. fil., *macrohaetum* Jacq. fil. v. *Setaria macrostachya* etc., *typhoidum* P. v. *Penicillaria spicata*.

Pentacrypta Lehm., Purpurdolde, V. 11. (XXIII. 1.), Umbelliferae.

atropurpurea Lehm., mexicanische, 4. ♀. w. Mexico.

Pentadesma RB., Fünfbündler, (Butterbaum) XVIII. 11., Guttiferae.

butyracea RB., buttergebender ♀. w. Sierra Leone.

Pentameris P. B., Spaltgras, III. 11., Gramineae.

airoides N. E., schmielenähnliches, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

Pentapetes L., Scharlachmalve, XVI. VII., Malvaceae-Dombeyaceae.

ovata DC., eiförmige, ♀. w. Neuspanien.

phoenicea L., ostindische, ☉. ♂. w. Ostindien.

Pentaphyllum Lupinaster P. etc. v. *Trifolium Lupinaster* etc.

Pentaraphia Lindl., Fünffahre, XIV. 11., Personatae-Bignoniaceae (*Gesnerieae*).

longiflora Lindl., langblumige, ♀. w. Jamaica.

Penthorum L., Fünfspitzenkraut, X. iv., Corniculatae-
Crassulaceae.

sedoides L., sedumähnliches, 4. f., Nordamerika.

Pentstemon L'Her., Bartfaden, XIV. ii., Personatae-
Antirrhineae.

acuminatum Dougl., zugespitzter, 4. f. Nordamerika.

album Nutt. (*teretiflorum* Fras.), weißlicher, 4. f.
Nordamerika.

angustifolium Pursh., (*coeruleum* Nutt.), schmalblätteri-
ger, 4 f. Louisiana.

argutum J. B., spitzsägezähniger, 4. f. b. k. Columbien.

atropurpureum G. Don, dunkelpurpurrother, 4. k. Mexico.

attenuatum Dougl., verschmälelter, 4. f. Nordamerika.

Bradburii Pursh. (*grandiflorum* Fras.) Bradbur's, 4. f.
Louisiana.

breviflorum Lindl., kurzblumiger, 4. f. Californien.

Cobaea Nutt., Cobaea-B., 4. k. Texas.

confertum Dougl., dichtblumiger, 4. f. Nordamerika.

crassifolium Lindl., dickblättriger, 4. f. Nordamerika.

Digitalis Nutt., fingerhutähnlicher, 4. f. Nordamerika.

eriantherum Pursh. (*cristatum* Fras.), kammiger, 4. f.
Nordamerika.

gentianoides (H. B. K.) enzianähnlicher, 4. k. Mexico.

glaberrimum J. B., kahlster, 4. f. b. Columbien.

glabrum Pursh. (*eriantherum* Fras.), kahler, 4. w. Loui-
siana.

glandulosum Dougl., drüsiger, 4. f. Nordamerika.

glaucum Grah., blaugrüner, 4. f. Nordamerika.

gracile Nutt., schlanker, 4. f. Nordamerika.

heterophyllum Lindl., verschiedenblättriger, 4. f. b.
Californien.

hirsutum W., rauhaariger, 4. f. Nordamerika.

Kunthii G. Don (*Chelone angustifol.* H. B. K.) Kunth's
4. k. Mexico.

laevigatum Ait., glättlicher, 4. f. Nordamerika.

Mackayanum K. et. W., Mackay's, 4. f. b. Ohio.

Murrayanum Hook., Murray's, 4. f. b. St. Felipe.

ovatum Dougl., eiförmiger, 4. f. Nordamerika.

procerum Dougl., hoher, 4. f. Nordamerika.

pruinatum Dougl., bereifter, 4. f. Nordamerika.

pubescens Ait., weichhaariger, 4. f. Nordamerika.

pulchellum Lindl. (*elegans* G. Don., ? *suffruticosum* Booth.),
schöner, 4. ♀. Cuba, Neuspanien.

remotum Rchb., entferntblumiger, 4. f. Nordamerika.

Richardsonii Dougl., Richardson's, 4. f. b. Columbia.

roseum G. Don., rosafarbiger, 4. k. Mexico.

Scouleri Dougl., Scouler's, 4. f. Nordamerika.

speciosum Dougl. (? *Milleri* Hort.), prächtiger, 4. f.
Nordamerika.

staticifolium Lindl., meernelkenblättriger, 4. f. b. Ca-
lifornien.

triphyllum Dougl., dreiblättriger, 4. f. b. Californien.

Pentzia Thbg. (C. J. Pentz, Schüler des Thunberg)
XIX. i., Compositae-Corymbiferae.

flabelliformis W. (*crenata* Thbg.), fächelförmige, ♀. k.
Cap der guten Hoffnung.

Peperomia alata R. et P. etc. v. *Piper alatum* etc.

Peplis L., Wasserportulak, VI. i., Lythriariae (*Salicariae*).
alternifolia RB., wechselblättriger, ♂. f. Südrussland.
occidentalis Spgl., westlicher. ♂. Wa. f. Westindien.

Peplis

Portula L., gemeiner, ☉. Wa. f. Europa.

borysthénica Befs. v. *Ammannia borysthénica*.

Perdicium Anandria RB. v. *Anandria Bellidiastrum chilense* W. v. *Chaetanthera chilensis*. *brasiliense* L. v. *Trixis brasiliensis*.

Pereskia Plum. (N. F. Peireskios, wenig gekannter französischer Botaniker) XII. I. Cactaceae.

aculeata Plum. Haw., stachelige, ♀. w. Westindien.

β) *rubescens* Pfr. γ) *rotundifolia* H. Dyck. (*acardia* Parm.) δ) *lanceolata* Pfr.

Bleo DC. (*cruenta* Hort.), blutfarbige, ♀. w. Neu-Granada, Mexico.

glomerata Pfr., knaulförmige, ♀. w. Peru.

grandifolia Haw. (*grandiflora* Hort.), großblättrige, ♀. w. Brasilien.

horrida DC. großstachelige, ♀. w. Brasilien.

lychnidiflora DC., lychnisblumige, ♀. w. Mexico.

opuntiaeflora DC., opuntiablumige, ♀. w. Mexico.

Pititache Karw., holzige, ♀. w. Mexico.

? *plantaginea* H. Gött., wegerichähnliche, ? ♀. w. ? Südamerika.

portulacaefolia DC., portulakblättrige, ♀. w. Caribäen.

rotundifolia DC., rundblättrige, ♀. ♀. w. Mexico.

spathulata H. Berol. (*crassicaulis* Zucc.), spatelblättrige, ♀. ♀. w. Mexico.

zinniaeflora DC., zinnienblumige, ♀. w. Mexico.

Pergularia L., Pergularie, V. II., Asclepiadeae.

minor Andr., kleine, ♀. Sch. w. Ostindien.

odoratissima Sw., wohlriechende, ♀. Sch. w. China, Ostindien.

sanguinolenta Lindl., blutfarbige, ♀. Sch. w. Sierra-Leone.

glabra L. v. *Vellaris Pergulanus*.

Periballia Trin., Wirtelschmiele, III. II., Gramineae.

hispanica Trin., spanische, ☉. f. Spanien.

Pericallis D. Don, Schönstrahl, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

Tussilaginis D. Don, huflattichähnlicher, 4. k. Teneriffa.

Perilla L., Perille, XIV. I., Labiatae.

fruticosa D. Don, strauchige, ♀. k. t. Nepal.

ocymoides L., basilicumähnliche, ♀. k. Ostindien

Perilomia H. B. K., Perilomie, XIV. I., Labiatae.

ocymoides H. B. K., basilicumähnliche, ♀. k. Quito.

Periploca L., Schlinge, V. II., Asclepiadeae.

angustifolia LaBill. (*laevigata* Vahl, *rigida* Viv.), schmalblättrige, ♀. Sch. f. b. k. Griechenland, Nordafrika, Syrien.

graeca L., griechische, ♀. Sch. f. Südeuropa, Mittelasien.

laevigata Ait. (*punicaefolia* Cav.), glatte, ♀. Sch. k. Canarische Inseln.

mauritiana Poir. (*nigrescens* Afz.), mascarenische, ♀. Sch. w. Ostindien, Mascarenas, Guinea.

tenuiflora L. v. *Microloma lineare*.

Periptera DC., Röhrenmalve, XVI. VIII., Malvaceae.

punica DC., hochrothe, ♀. w. Neuspanien.

Peristeria Hook., Taubenstendel, XX. I., Orchideae.

Peristeria

Barkeri Batem., Barker's, 4. w. Mexico.

cerina Lindl., wachsgelber, 4. w. Südamerika.

elata Hook., höher, 4. w. Panama.

guttata K. et W., getropfter, 4. w. Südamerika.

pendula Hook., herabhängender, 4. w. Demerara.

Peristrophe speciosa N. E. etc. v. *Justicia speciosa* etc.

Peritoma DC., Cirkelkelch, VI. 1. (XV. III.),
Capparideae.

serrulatum DC., sägezähniger, ☉. f. Nordamerika.

Pernettya Gaudich. (A. J. Pernetty, ein französischer
Geistlicher, welcher die Falklandsinseln bereiste), X.
Ericaceae.

empetrifolia Gaudich., rauschbeerenblättrige, ♀. k.
Magellanische Meerenge.

microphylla Gaudich., kleinblättrige, ♀. k. Magella-
nische Meerenge.

mucronata Gaudich., stachelspitzige, ♀. k. Magellanische
Meerenge.

phillyreaefolia DC., steinlindenblättrige, ♀. t. Peru.

pilosa G. Don, haarige, ♀. t. Mexico.

pumila Gaudich., Hook., kleine, ♀. k. Magellanische
Meerenge.

Perotis Ait., Zottengras, III. II., Gramineae.

latifolia Ait., breitblättriges, ☉. 4. w. Ostindien, Ja-
pan, Cap der guten Hoffnung.

Persea G., Avogatobaum, IX. 1., Laurineae.

gratissima G., schmackhafter, ♀. w. Westindien.

Cinnamomum Sogl. etc. v. *Cinnamomum verum* etc.

Persica T. v. *Amygdalus*.

Persoonia Sm. (C. H. Persoon, einer der berühm-
testen und bekanntesten Botaniker der neueren Zeit),
IV. 1., Proteaceae.

Chamaepithys Cunn., kleine, ♀. t. Neuholland.

ferruginea Sm., rostfarbige, ♀. t. Neusüdwallis.

flexifolia RB., biegsamblättrige, ♀. t. Neuholland.

hirsuta P., rauhhaarige, ♀. t. Neusüdwallis.

juniperina La Bill. (*acerosa* Sbr.), wachholderblättrige,
♀. t. Neusüdwallis.

lanceolata Andr., lanzettblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

latifolia Andr., breitblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

linearis Andr., (*angustifolia* Sm.), schmalblättrige, ♀.
t. Neusüdwallis.

mollis RB., weichblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

myrtilloides Sbr., heidelbeerblättrige, ♀. t. Neu-
südwallis.

nutans RB., nickende, ♀. t. Neuholland.

pallida Grah., bleiche, ♀. t. Neuholland.

pinifolia RB., kieferblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

pruinosa Cunn., bereifte, ♀. t. Neusüdwallis.

salicina P., weidenblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

scabra RB., scharfblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.

spathulata RB., spatelblättrige, ♀. t. Neuholland.

teretifolia RB., rundblättrige, ♀. t. Neuholland.

Perymenium Schrad., Perymenie, XIX. II., Compo-
sitae-Corymbiferae.

discolor Schrad., verschiedenfarbige, ♀. k. Mexico.

verbesinoides DC., verbesinenähnliche, ♀. k. Mexico.

- Pesomeria** Thou., Pesomerie, XX. 1., Orchideae.
 tetragona Thou., vierkantige, 4. w. Mauritius.
- Petaloma Mouriri** Sw. et *myrtilloides* Sw. vid. *Mouriria guianensis* et *myrtilloides*.
- Petalostemon** Mchx., Kronenfaden, XVII. 1v. (XVI. 11.), Leguminosae-Papilionaceae.
 candidum Mchx., blendendweißser, 4. f. b. Nordamer.
 carneum Mchx., fleischfarbiger, 4. f. b. Nordamerika.
 corymbosum Mchx., traubendoldiger, 4. f. b. Nordamer.
 violaceum Nutt., violetter, 4. f. b. Nordamerika.
- Petasites** C. Bauh., Pestilenzwurz, XIX. 11., Compositae-Eupatorineae.
 I. Genuinus.
 albus G., weißer, 4. f. Europa.
 b) foemin.: ramosus (Hoppe).
 niveus Baumg., schneeweiß, 4. f. Mittel- und ost-europäische Alpen.
 b) foem.: paradoxus (Retz).
 officinalis Mchx. (*vulgaris* Dsf.), gemeine, 4. f. Europa.
 b) foem.: hybridus (L.).
 tomentosus DC., filzige, 4. f. Nordeuropa.
 b) subfoemineus: spurius (Retz).
 II. Nardosmia Cass. DC.
 fragrans (Vill.), Rchb., wohlriechende, 4. f. Südfrankreich, Italien, Sicilien.
 frigidus (L.), Hook. (*angulos.* Cass.), kalte, 4. f. Scandinavien, Sibirien, Canada.
 laevigatus Rchb., glättliche, 4. f. Sibirien, Böhmen.
 b) submasculus DC. (*Tussilago bohemica* Hoppe).
 palmatus (Ait.), Hook., handförmige, 4. f. Labrador.
 ?purpureus (H. Kew.), purpurfarbige, 4. k. Cap der guten Hoffnung.
 sagittatus (Pursh), Hook., pfeilblättrige, 4. f. Nordamer.
- Petiveria** Plum. (J. Petiver, englischer Apotheker und Botaniker), VII. 1., Aizoideae-Phytolacceae.
 alliacea L., knoblauchduftende, 5. w. Westindien.
 hexaglochin Fisch. et Mey., sechsspitzige, 5. w. Brasilien.
 octandra Jacq., achtmännige, 5. w. Westindien.
- Petreia** L. (Lord Robert James Petre, ein Gönner der Botanik), XIV. 11., Verbenaceae.
 erecta Hort., aufrechte, 5. w. Südamerika.
 rugosa Humb., runzelige, 5. 5. w. Caracas.
 Stapeliae Paxt., stapelienblumige, 5. Sch. w. ? Sudamer.
 volubilis L., windende, 5. Sch. w. Westindien.
- Petrobium** RB., Felsenweizahn, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.
 arboreum RB., baumartiger, 5. w. St. Helena.
- Petrocallis** RB., Felsenblümchen, XV. 11., Cruciferae.
 pyrenaica RB., pyrenäisches, 4. f. b. Mittel- und west-europäische Alpen.
- Petrocarya campestris** W. v. *Parinarium campestre*.
- Petromarula** P. A.DC., Felsenrapunzel, V. 1., Campanulaceae.
 pinnata P. A.DC., fiederblättrige, 4. k. Creta.
- Petrophila** RB., Felsenprotea, IV. 1, Proteaceae.
 acicularis RB., nadelblättrige, 5. t. Südneuholland.
 canescens Cunn., weißgrauliche, 5. t. Neuholland.
 diversifolia RB., verschiedenblättrige, 5. t. Neuholland.
 fastigiata RB., gipfelständige, 5. t. Neuholland.

Petrophila

- filifolia RB., fadenblättrige, ♀. t. Neuholland.
 pedunculata RB., stielfrüchtige, ♀. t. Neuholland.
 pulchella RB., schöne, ♀. t. Neusüdwallis.
 rigida RB., starre, ♀. t. Neuholland.
 sessilis Sbr., stiellosfrüchtige, ♀. t. Neuholland.
 teretifolia RB., rundblättrige, ♀. t. Neuholland.
 trifida RB., dreispaltige, ♀. t. Neuholland.

Petroselinum Hoffm., Petersilie, V. II., Umbelliferae.

- peregrinum Koch, DC., fremde, ♂. f. Portugal.
 sativum Hoffm., gebaute, ♂. f. Sardinien, Portugal.
 segetum Koch, Saat-P., ☉. f. England, Frankr., Schweiz.

Petunia Juss. (Petun, brasilianischer Name für Tabak), V. I., Solanaceae.

- intermedia D. Don, mittlere, 4. ♀. t. Parama.
 Mirabilis Rchb. (*phoenicea* D. Don, *violacea* Lindl.),
 wunderblumenähnliche, 4. ♀. k. Buenos-Ayres.
 nyctaginiflora Juss., weisblumige, 4. k. Rio de la Plata.
 parviflora Juss., kleinblumige, ☉. 4. k. Rio de la Plata.
 Hybriden: Atkinsiana D. Don, violacea major, purpurea major, hybrida bicolor, hybrida coerulescens, hybrida major, hybrida striata etc.

Peucedanum T., Haarstrang, V. II., Umbelliferae.

- album Hol., weißer, 4. f. Nordeuropa.
 alpestre L., Voralpen-H., 4. f. Bessarabien.
 alsaticum L., elsassischer, 4. f. Mittel-, Ost- und Westeuropa, Taurien.
 arenarium W. K., sandliebender, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen, Podolien.
 aureum Ait., goldfarbiger, 4. k. Teneriffa.
 austriacum K. (*montanum* K.), österreichischer, 4. f. Süd- und Osteuropa.
 baicalense K., baical'scher, 4. f. Ungarn, Sibirien.
 Cervaria Lapeyr., hirschwurzähnlicher, 4. f. Mittel- und Westeuropa.
 Chabraei Rchb. (*carvifolium* Vill.), Chabraei's, 4. f. Ost- und Westdeutschland, Frankreich, Armenien, Caucasus.
 coriaceum Rchb., lederartiger, 4. f. ?
 dahuricum Ledeb., dahurischer, 4. f. Sibirien.
 Fontanesianum K., Desfontaine's, 4. f. Südfrankreich.
 gallicum T. (*officinale* Thuill., *parisiense* DC.), französischer, 4. f. Frankreich, österreichisches Litorale.
 isetense Sgpl., sibirischer, 4. f. Sibirien.
 italicum Mill., italienischer, 4. f. Südfrankreich, Italien.
 longifolium W. K., langblättriger, 4. f. Banat.
 officinale L., officineller, 4. f. Europa.
 Oreoselinum Mch., Steinsilgen-H., 4. f. Europa, Caucasus.
 paniculatum Lois., rispiger, 4. f. Frankreich,
 petraeum K., Gesteins-H., 4. f. Oesterreich. Litorale.
 rablense K., raibel'sches, 4. f. Kärnthen, Krain, Schweiz, Piemont.
 ruthenicum MB. (*tauricum* MB.), russischer, 4. f. Südrussland.
 Schottii Bess., Schott's, 4. f. Krain, Podolien.
 venetum K., venetianischer, 4. f. Schweiz, österreich. Litorale, Oberitalien.
 verticillare K., wirtelförmiger, 4. f. Krain, Oberitalien, südliche Schweiz, Frankreich.

Peucedanum

vocontiorum Spgl., kleiner, 4. f. b. Dauphiné.

caspicum Lk. (et *obtusifolium* Sm., *seselioides* Nutt. et *sibiricum* W.) v. *Ferula caspica* etc. *Matthioli* Spgl. (*tenuifolium* Poir., *serotinum* P.) et *Silau* L. v. *Silau* Matthioli et *pratensis*. *sylvestre* DC. v. *Thysselinum palustre*.

Peumus P. (chilesischer Name), XXII. XI., Monimieae. *fragrans* P., wohlriechender, 5. w. Chili.

Peyrouisia Loud. v. *Lapeyrouisia*.

Phaca L., Berglinse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

alpina Jacq., Alpen-B., 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen, Sibirien.

arenaria Pall., Sand-B., 4. f. b. Ostsibirien.

astragalina DC., tragantähnliche, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

australis L. (*Halleri* Vill.), südliche, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

baetica L., spanische, 4. k. Spanien, Portugal, Griechenland.

canescens H. et A., grauliche, 4. k. Chili.

chilensis N. E., chilesische, 4. k. Chili.

densifolia Sm., dichtblättrige, 4. f. b. Californien.

exaltata Ledeb., hohe, 4. f. b. Altai.

frigida L., kalte, 4. f. b. Lappland, mittel- und osteuropäische Alpen.

Gerardi Vill. (*glabra* Clarim.), Gerard's, 4. f. b. k. Frankreich.

lapponica Wahlbg., lappländische, 4. f. b. Lappland.

lutea Ledeb., gelbe, 4. f. b. Sibirien.

membranacea Fisch., häutige, 4. f. b. Dahurien.

oroboides DC., orobusähnliche, 4. f. b. Norwegen, Lappland.

sordida Fisch., dunkelfarbige, 4. f. b. Sibirien.

triangularis Fisch., dreikantige, 4. f. b. Sibirien.

campestris Wahlbg. etc. vid. *Oxytropis campestris*.

floridana W. vid. *Glottidium floridanum*. *salsula*

Pall. v. *Sphaerophysa dahurica*. *triangularis* Zea

v. *Astragal. triangularis*.

Phacelia Mchx., Phacelie, V. I., Hydrophyllaeae.

bipinnatifida Mchx., doppeltfiederspaltige, 4. f. b. Nordamerika.

circinnata Jacq., kreiselförmige, ♂. f. Patagonien.

β) *californica* Cham. et Schtdl.

congesta Hook., dichtblumige, ♂. f. Texas.

malvaefolia Cham. et Schtdl., malvenblättrige, ♂. f. Californien.

peruviana Spgl. (*Aldeaea* R. et S.), peruvianische, 4. k. Peru.

tanacetifolia Benth., rainfarnblättrige, ♂. f. Californien.

vitifolia Paxt., weinblättrige, ♂. f. Texas.

fimbriata Mchx. v. *Cosmanthus fimbriatus*. *parvi-*

flora Pursh v. *Nemophila parviflora*.

Phacocapnos Bernh., Linsenmohn, XVII. II. (IV.), Papaveraceae-Fumariaeae.

Cracca Bernh., wickenähnlicher, ♂. Sch. f. Cap der guten Hoffnung.

Phacosperma Haw., Linsensame, XI. I., Aizoideae-Ficoideae.

peruviana Haw., peruvianischer, 4. w. Peru.

Phagnalon Cass., Filzstrauch, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

rupestre Cass., felsenliebender, ♀. k. Süditalien.

saxatile Cass., Gesteins-B., ♀. k. Südeuropa, Nordafrika.

sordida Cass., dunkelfarbiger, ♀. k. Südeuropa, Nordafrika.

Phajus Paxt., Prachtstendel, XX. I., Orchideae.

albus Lindl., weißer, 4. w. Nepal.

maculatus Paxt., gefleckter, 4. w. Nepal.

Phalacrodiscus Fisch. et Mey., Scheibenblümchen, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

arvensis Fisch. et Mey., Acker-S., ♂. f. Nordafrika.

Phalaenopsis Blum., Mottenstendel, XX. I., Orchideae.

amabilis Blume, lieblicher, 4. w. Manilla.

Phalangium *croceum* Mchx. etc. vid. *Anthericum croceum* etc. *virgatum* Lam. v. *Nolina georgiana*.

Phalaris L., Glanzgras, III. II., Gramineae.

1. *Genuina*.

appendiculata Schult. (*dentata* Sbr.), anhängseliges, ♂. f. Aegypten.

aquatica L. (*coerulescens* Dsf., *nitida* Presl., *bulbosa* Brot., *variegata* Spgl.), wasserliebendes, 4. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

brachystachya Lk., kurzähriges, ♂. f. Portugal.

canariensis L., canarisches, ♂. f. Canarische Inseln, Südeuropa.

microstachya DC. (*intermedia* Bosc.), kleinähriges, ♂. f. Nordamerika.

minor Retz (*aquatica* Ait., *capensis* Thbg., *commutata* R. et S.), kleines, ♂. f. Südeuropa, Nordafrika.

nodosa MB. (*aquatica* Sibth.), knotiges, 4. f. b. k. Griechenland, Orient.

paradoxa L., wunderbares, ♂. f. Südeuropa, Orient.

pectinata Roth, kammförmiges, ♂. f. ?

quadri-valvis Lagasc., vierspeliges, ♂. f. Spanien.

II. *Baldingera* G. M. S. (*Digraphis* Trin.).

americana Elliot, amerikanisches, 4. f. Nordamerika.

arundinacea L., rohrartiges, 4. f. Europa, Asien.

b) *variegata*.

Ammophila Lk. v. *Psamma arenaria*. *aspera* Retz (*paniculata* Ait.) etc. v. *Phleum asperum*. *bulbosa* L. (*cylindrica* DC.) vid. *Phleum tenue*. *semineutra* R. et S. v. *Aira semineutra*.

Phalerocarpus G. Don, Glanzbeere, VIII. I., Ericaceae.

hispidulus G. Don, seifhaarige, ♀. k. f. b. Nordamer.

Phalocallis Hook., Zapfenschwertel, XVI. I., Irideae.

plumbea Lindl., bleifarbig, 4. Zw. t. ?

Pharbitis Chois., Buntwinde, V. I., Convolvulaceae.

diversifolia Lindl., verschiedenblättrige, ♂. Sch. f. m. Mexico.

Pharium Herb., Pharium, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

fistulosum Herb., röhriges, 4. Zw. k. t. Mexico.

Pharnaceum L., Pharnaceum, V. III., Portulacaceae-Paronychieae.

Cerviana L., doldenblüthiges, ♂. f. Südeuropa, Afrika, Mittelasien.

cordifolium L., herzblättriges, ♂. f. Cap der gut. H.

dichotomum Thbg., zweizinkiges, ♂. f. Cap d. gut. H.

glomeratum Thbg., knaulförmiges, ☉. f. Cap d. g. H.
Hoffmannseggianum R. et S., Hoffmannsegg's, ☉. f. m.
Brasilien.

incanum L., weißlichgraues, ♀. k. Cap der gut. H.
lineare Thbg., gleichbreitblättriges, ♀. k. Cap d. g. H.
Mollugo L., weichlingähnliches, ♀. w. Ostindien.

pruinosa Haw., bereiftes, ♀. k. Cap der guten H.
spatulatum Sw. (*bellidifolium* Poir.), spatelblättriges,
☉. f. m. w. Westindien.

sperguloides Poir., sparkähnliches, ♀. w. Ostindien.
umbellatum Forsk., doldiges. ☉. f. m. Arabien.

verticillatum Spgl. v. *Mollugo verticillata*.

Pharus L., *Pharus*, XXI. vi. (VI. i.), Gramineae.

latifolius L., breitblättriger, 4. w. Jamaica, Guiana.

Phaseolus T., Bohne, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-
Papilionaceae.

aconitifolius L. suppl., sturmhutblättrige, ☉. Sch. f.
m. w. Arabien, Ostindien.

alatus L., geflügelte, ☉. Sch. f. m. ? Carolina.

amoenus Forst., liebliche, ☉. Sch. f. Societätsinseln.

angulosus Orteg., kantige, ☉. Sch. f. ?

aureus Zucc., goldfarbige, ☉. Sch. f. ?

caesareus Jacq. fil., kaiserliche, ☉. Sch. f. ?

candidus Hort., reinweißse, ☉. Sch. m. f. ?

Caracalla L., schneckenförmige, 4. w. Ostindien,
Peru, Chili.

chrysanthus Savi, goldblumige, ☉. f. m. ?

compressus DC., platte, ☉. Sch. f. m. ?

derasus Schrk., kahle, ☉. Sch. w. m. Brasilien.

diversifolius P. (*trilobus* Mchx.), verschiedenblättrige,
☉. f. Nordamerika.

dolichoides Roxb., dolichosähnliche, ☉. Sch. f. k.
Ostindien.

farinosus L., mehliges, ☉. Sch. w. m. Ostindien.

gonospermus Savi, kantensamige, ☉. Sch. f. m. ?

haematocarpus Savi, blutfarbiges, ☉. Sch. f. m. ?

helvolus L., blaßrothe, ☉. Sch. f. Nordamerika.

heterophyllus H. B. K., veränderlichblättrige, ☉. Sch.
m. f. w. Mexico.

hirtus Retz, steifhaarige, ☉. Sch. f. Cap der gut. H.

inamoenus L., unansehnliche, ☉. Sch. f. m. ? Afrika.

lathyroides L., platterbsenähnliche, ☉. m. w. Jamaica.

lunatus L., mondförmige, ☉. Sch. m. f. w. Ostindien.

max L., schnabelhülsige, ☉. f. Ostindien.

mesoleucus Schrk., mittelweißse, ☉. Sch. m. f. w.
Brasilien.

microspermus Orteg., kleinsamige, ☉. m. f. w. Cuba.

multiflorus Lam. (*coccineus* Kniphof), vielblumige (Feuer-
B.), ☉. 4. Sch. f. ? Südamerika.

b) *albus*.

Mungo L., rauhförmige, ☉. f. m. Ostindien.

nanus L., Zwerg-(Busch-)B., ☉. f. m. Ostindien.

nigerrimus Zucc., schwarze, ☉. f. m. ?

oblongus Savi, längliche. ☉. Sch. f. m. ?

perennis Walt. (*paniculatus* Mchx.), ausdauernde, 4.
Sch. f. b. k. ?

philadelphicus Nestl., philadelphische, ☉. Sch. f.
Nordamerika.

radiatus L., strahlige, ☉. f. m. Ostindien, China.

saponaceus Savi, seifenartige, ☉. Sch. f. m. ?

Phaseolus

- scaber Steud., scharfe, ☉. f. m. Ostindien.
 semierectus L., halbaufrechte, ☉. Sch. w. m. f. Westind.
 speciosus H. B. K., prächtige, ☉. Sch. w. m. f. Südamer.
 sphaericus Savi, rundsamige, ☉. Sch. m. f. ?
 stipularis Lam., zwischenblättrige, ☉. m. f. Peru.
 subtrilobus Lk., wenigdreilappige, ☉. Sch. w. m. f. Brasilien.
 sylvestris H. B. K., wilde, ☉. Sch. w. m. f. Mexico.
 torosus Roxb., wulstige, ☉. m. f. Nepal.
 trilobus Ait. (*stipulaceus* Lam.), dreilappige, ☉. w. m. f. Ostindien.

- tumidus Sav., aufgeschwollene, ☉. Sch. m. f. ?
 violaceus Steud., violette, ☉. m. f. Afrika.
 vulgaris L., gemeine, ☉. Sch. f. m. Ostindien.

b) fasciatus. c) variegatus.

- Xuaresii Zuccagn., Xuares's, ☉. Sch. m. f. Südamer.
vexillatus L. v. *Dolichos vexillatus*.

Phaylopsis Juss., W., Phaylopsis, XIV. II., Acanthaceae.

- glutinosa G. Don, klebrige, 4. w. Guinea.
 imbricata Sw., dachblättrige, 4. w. Arabien, Mascarenas, Ostindien.

- longifolia Sims, langblättrige, 5. w. Sierra Leone.

- parviflora W., kleinblumige, ☉. w. Ostindien.

Phebalium Vent., Myrtenraute, X. I., Tricoccae-Rutaceae.

- aureum Cunn., goldfarbige, 5. t. Neuholland.
 elatum Cunn., hohe, 5. t. Neuholland.
 lachnaeoides Cunn., lachnaeähnliche, 5. t. Neuholland.
 lineare Mack. Cat., gleichbreitblättrige, 5. t. Neuholl.
 salicifolium Adr. Juss., weidenblättrige, 5. t. Neuholl.
 squamulosum Vent., schuppige, 5. t. Neuholland.

Phellandrium T., Wasserfenchel, V. II., Umbelliferae.

- aquaticum L., gemeiner, ♂. Wa. f. Europa, Nordamer.

Mutellina L. v. *Meum Mutellina*.

Philactis Schrad., Philactis, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- zinnioides Schrad., zinnienähnliche, 4. 5. t. k. Mexico.

Philadelphus L., Pfeifenstrauch, XII. I., Corniculatae-Philadelphaeae.

- coronarius L., gemeiner, 5. f. Südeuropa.

b) nanus Mill. c) flore pleno Lodd. d) variegatus Lodd.

- floribundus Schrad., blüthenreicher, 5. f. Nordamerika.

- Gordonianus Lindl., Gordon's, 5. f. Californien.

- grandiflorus W. (*inodorus* Hort.), großblumiger, 5. f. Nordamerika.

- hirsutus Nutt. (*villosus* Lodd.), rauhaariger, 5. f. Louisiana.

- inodorus Mill., L., geruchloser, 5. f. Carolina.

- latifolius Schrad. (*pubescens* Cels), breitblättriger, 5. f. Nordamerika.

- laxus Schrad. (*pubescens* Lodd., *humilis* Hort.), lockerer, 5. f. Nordamerika.

- Lewisii Pursh, Lewis's, 5. f. Westnordamerika.

- speciosus Schrad., prächtiger, 5. f. Nordamerika.

- tomentosus Wall. (*nepalensis* Lodd., ? *triflorus* Royle), filziger, 5. f. b. Nepal.

- trinervis Schrad., dreinerviger, 5. f. Nordamerika.

β) gracilis Lodd.

Philadelphus

verrucosus Schrad. (*grandiflorus* Lodd.), warziger, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

Zeyheri Schrad., Zeyher's, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

Philibertia H. B. K. (M. Philibert, französischer Botaniker), V. II., Asclepiadeae.

gracilis D. Don (*grandiflora* Hook.), schlanke, 4. Sch. k. f. b. Buenos-Ayres.

Phillyrea T., Steinlinde, II. I., Sapotaceae-Oleineae.

angustifolia L., schmalblättrige, $\frac{1}{2}$ f. b. k. Südeuropa.
 β) *lanceolata* Ait. γ) *rosmarinifolia* Ait. δ) *brachiata* Ait.

laevis W. (*latifolia* Mill.), glatte, $\frac{1}{2}$ f. f. b. k. Südeuropa.

latifolia L., breitblättrige, $\frac{1}{2}$ f. f. b. k. Südeuropa.

media L., mittlere, $\frac{1}{2}$ f. f. b. k. Südeuropa.

β) *ligustrifolia* Ait. (*virgata* W.). γ) *pendula* Ait. δ) *oleaefolia* Ait. ϵ) *buxifolia* Ait.

obliqua W. (*foliacea* Lk.), schieflättrige, $\frac{1}{2}$ f. f. b. k. Südeuropa.

robusta Roxb., grofse, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

spinosa Mill. (*ilicifolia* W.), stachelige, $\frac{1}{2}$ f. f. b. k. Süd- und Westeuropa.

Philodendron Lindl., Zehrwurzstrauch, XXI. IX., Aroideae.

crassinervium Lindl., dickrippiger, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.

Philogyne Haw. v. Narcissus.**Philotheca** Rudge, Fadenbecherblume, XVI. VI., Tricoccae-Rutaceae.

australis Rudg., neuholländische, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.

Philoxerus RB., Strohkelch, V. I., Aizoideae-Amaranthaceae.

aggregatus H. B. K., gehäuftblumiger, 4. w. Südamer.

brasiliensis RB., brasilianischer, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.

vermicularis RB., wurmförmiger, 4. w. Südamerika.

Philydrum Banks, Spaltlilie, I. I., Commelineae.

lanuginosum Banks, wollige, ♂. 4. k. Südchina, Cochinchina, Neuholland.

Phleum L., Lieschgras, III. II., Gramineae.

I. *Achnodon* Lk. (*Achnodonton* P. B.).

tenue Schrad. (*Bellardi* W.), dünnähriges, ☉. f. Südeuropa, Orient.

II. *Chilochloa* P. B.

annuum MB., jähriges, ☉. f. Caucasus.

arenarium L., sandliebendes, ☉. f. Nord- und südeuropäische Seeküsten.

asperum Vill. (*viride* All., *paniculatum* Huds.), rauhes, ☉. f. England, Mittel-, Süd- und Westeuropa.

Böhmeri Wibel (*phalaroides* Koel., *laeve* MB., *glabrum* Bernh.), Böhmer's, 4. f. Europa, Sibirien.

cuspidatum W. (*trigynum* Schrad., *Hostii* H. Vindob.), feinspitziges, 4. f. Tyrol.

Michelii All. (*hirsutum* Sut.), Micheli's, 4. f. Mittel- und südeuropäische Alpen.

III. *Phleum* P. B.

alpinum L., Alpen-L., 4. f. Europäische Alpen.

β) *commutatum* Gaud. (*Gerardi* Panz.).

Bertolonii DC. (? *stoloniferum* Bertol.), Bertolone's, 4. f. Sarzana.

echinatum Host (*felinum* Sm.), stacheliges, 4. f. Istrien, Dalmatien, Sicilien, Griechenland.

Phleum

pratense L., gemeines, 4. f. Europa, Asien.

b) *minus* Sin. β) *nodosum* L. (*bulbosum* Gouan).

Gerardi All. v. *Alopecurus Gerardi*.

Phlomis T., Flammenlippe (Jerusalem's Salbei), XIV. I., Labiatae.

agraria Ledeb., Acker-F., 4. f. Sibirien.

alpina Pall., Alpen-F., 4. f. Altai.

armeniaca W., armenische, 4. $\frac{1}{2}$. k. Armenien.

cretica Presl (*fruticosa* Sbr.), cretische, $\frac{1}{2}$. k. Creta.

crinita Cav., bemähnte, 4. f. b. k. Spanien.

ferruginea Tenor., rostfarbige, $\frac{1}{2}$. k. Neapel.

floccosa D. Don, flockige, $\frac{1}{2}$. k. Aegypten.

fruticosa L., strauchige, $\frac{1}{2}$. k. Südeuropa.

Herba venti L., Windkraut-F., 4. f. b. k. Süd- und Westeuropa.

italica Sm. (*purpurea* L.), italienische, $\frac{1}{2}$. k. Italien, Portugal.

laciniata L., schlitzblättrige, 4. f. Armenien, Caucasus.

lanata W. (*fruticosa minor* Hort., *angustifolia* DC.), wollige, $\frac{1}{2}$. k. Calabrien, Spanien.

lunarifolia Sm., mondkrautblättrige, 4. f. b. k. Griechenland.

Lychnitis L., schmalblättrige, $\frac{1}{2}$. k. Südfrankr., Spanien.

microphylla Sbr., kleinblättrige, $\frac{1}{2}$. k. Aegypten, Creta.

Nissolii L., Nissole's, 4. $\frac{1}{2}$. k. Kleinasien.

orientalis DC., morgenländische, 4. f. b. Kleinasien.

pungens W., stechende, 4. f. b. Armenien, Caucasus, Persien, Sibirien.

purpurea Sm., purpurfarbige, $\frac{1}{2}$. k. Spanien, Portugal.

Russeliana Lag. (*lunarifolia* β . Bot. mag.), Russel's, 4. f. b. k. Levante.

salviaefolia Jacq., salbeiblättrige, $\frac{1}{2}$. k. ?

samia L., samische, 4. f. b. Griechenland, Nordafrika.

scariosa Presl., trockenhäutige, $\frac{1}{2}$. k. Calabrien.

tuberosa L., knollige, 4. Kn. Ungarn, Taurien, Caucasus, Sibirien.

aspera W. etc. vid. *Leucas aspera*. *Leonurus* etc. v. *Leonotis Leonurus*.

Phlogacanthus N. E. v. *Justicia*.

Phlox L., Flammenblume, V. 1., Polemoniaceae.

acuminata Pursh (*decussata* Lyon), zugespitzte, 4. f. Nordamerika.

acutifolia Swt., spitzblättrige, 4. f. Nordamerika.

amoena Sims, angenehme, 4. $\frac{1}{2}$. k. Nordamerika.

aristata Mchx., pfriemenkelchige, 4. k. Carolina.

carnea Ker (*triflora* Hort.), fleischfarbige, 4. f. Nordamer.

b) *major* A. P.

carolina L. (*triflora* Mchx.), karolinische, 4. f. Nordamer.

cordata Ell., herzblättrige, 4. f. Nordamerika.

b) *grandiflora*. c) *rosea*.

crassifolia Lodd., dickblättrige, 4. f. Nordamerika.

disticha Sab., zweizeilige, 4. f. Nordamerika.

divaricata L., ausgesperrte, 4. f. Nordamerika.

Drummondii Hook., Drummond's, $\odot$. σ . f. k. Texas.

excelsa Penny, hohe, 4. f. Nordamerika.

elata Penny, erhabene, 4. f. Nordamerika.

floridana Nutt. (*Nuttalliana* Hort.), floridanische, $\frac{1}{2}$. k. Florida.

glaberrima L., kahle, 4. f. Nordamerika.

Phlox

Hoodii Richards., Hood's, 4. f. b. Nordamerika.
intermedia Lodd., mittlere, 4. f. Nordamerika.
involuta Nutt., hüllige, 4. f. Nordamerika.
laeta Penny, freudige, 4. f. Nordamerika.
maculata L., gefleckte, 4. f. Nordamerika.
nivalis Swt., Lodd., schneeweisse, 4. f. b. Nordamer.
odorata Swt., gutriechende, 4. f. Nordamerika.
ovata L., eiförmige, 4. f. b. Nordamerika.

b) *Listoniana* Angl.

paniculata L., rispige, 4. f. Nordamerika.

b) *alba*. c) *striata*.

pilosa L. (*canadensis* Hort.), haarige, 4. f. Nordamer.
procumbens Lehm., niederliegende, 4. f. b. Nordamer.
pyramidalis Sm. (*latifolia* Mchx.), pyramidale, 4. f. Nordamerika.

b) *penduliflora* Swt. c) *corymbosa*. d) *alba* J. C. reptans Mchx. (*stolonifera* Curt., *prostrata* Ait. fil.), kriechende, 4. f. b. Carolina.

scabra Swt., scharfblättrige, 4. f. Nordamerika.
setacea L., borstenblättrige, 4. f. b. Nordamerika.
Sickmanni Lehm. (*longiflora* Swt., *tardiflora* Penny), Sickmann's, 4. f. Nordamerika.

b) *purpurea*.

speciosa Pursh, prächtige, 4. f. Nordamerika.
suaveolens Ait., wohlriechende, 4. f. Nordamerika.

b) *fol. variegat.*

subulata L., pfriemenförmige, 4. f. b. Nordamerika.
suffruticosa Vent. (*nitida* Pursh), halbstrauchige, 4. f. k. f. b. Nordamerika.

b) *major*.

undulata Ait., wellenblättrige, 4. f. Nordamerika.
verna Hort., Frühlings-F., 4. f. b. Nordamerika.
virginica Lodd., virginische, 4. f. Nordamerika.

b) *alba*.

Hybriden und Varietäten: *aspera*, *atrocaulis* A. P., *autumnalis*, *bimaculata*, *Brownii*, *elegans*, *Ingramiana*, *omniflora*, *pulchella*, *reflexa* Swt., *Shepherdi* Swt., *Thompsoniana*, *Vernoniana*, *Wheeleriana* Swt.

Phoenix L., Dattelpalme, XXII. III. (VI. III.), Palmae.

acaulis Roxb., stammlose, f. w. Ostindien.
dactylifera L., gemeine, f. w. Mittel- und Südasien, Nordafrika.
farinifera Roxb., mehltragende, f. w. Ostindien.
leonensis Lodd., westafrikanische, f. w. Sierra Leone.
paludosa Roxb., sumpfliebende, f. w. Ostindien.
pygmaea Lodd., Zwerg-D., f. w. Mauritius.
reclinata Jacq., zurückgebogene, f. w. Südafrika.
sylvestris Roxb., Wald-D., f. w. Ostindien.

Phoenocoma D. Don, Rothschof, XIX. II., Compositae-Helichrysae.

prolifera D. Don, sprossender, f. t. Cap der gut. H.

Pholidota Lindl., Schuppenorche, XX. I., Orchideae.

imbricata Lindl., Hook., ziegeldachförmige, 4. w. Nepal.
pallida Lindl., bleiche, 4. w. Ostindien.

Pholiurus pannonicus Trin. v. *Lepturus pannonicus*.**Phormium** L., Flachslilie, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.
tenax Forst., zähe (neuseeländische), 4. k. f. b. Neuseeland.

- Photinia** Lindl., Photinie, XII. 11., Rosaceae-Pomaceae.
arbutifolia Lindl., erdbeerbaublätterige, ♀. k. Californ.
dubia Lindl., zweifelhafte, ♀. k. Nepal.
integrifolia Lindl., ganzblätterige, ♀. k. Nepal.
serrulata Lindl., sägezahnige, ♀. k. China, Japan.
Phragmites Trin., Teichrohr, III. 11., Gramineae.
communis Trin., gemeines, 4. Wa. f. Europa, Asien,
 Amerika, Neuholland.

β) *repens* C. W. Mey. γ) *flavescens* Cust.

isiacus Kunth, ägyptisches, 4. Wa. f. k. Aegypten.

- Phryma** L., Phryma, XIV. 1., Labiatae.

leptostachya L., schlankährige, 4. f. Nordamerika.

- Phrynium** W., Wasseringwer, I. 1., Scitamineae-Cannaceae.

angustifolium Lodd., schmalblätteriger, 4. w. Ostindien.

capitatum W., kopfförmiger, 4. w. Ostindien.

Casupo Rosc., Casupo-W., 4. w. Südamerika.

coloratum Hook., farbiger, 4. w. Brasilien.

comosum Rosc., schopfiger, 4. w. Surinam.

dichotomum Roxb., zweizinkiger, 4. w. Ostindien.

ellipticum Rosc., elliptischer, 4. w. Guiana.

grandiflorum Rosc., großblumiger, 4. w. Brasilien.

imbricatum Roxb., ziegeldachförmiger, 4. w. Ostindien.

Myrosma Rosc., balsamischer, 4. w. Südamerika.

obliquum Lodd., schiefer, 4. w. Ostindien.

ovatum Mart., eiförmiger, 4. w. Brasilien.

Parkeri Rosc., Parker's, 4. w. Südamerika.

parviflorum Roxb., kleinblumiger, 4. w. Ostindien.

setosum Roxb., borstiger, 4. w. Brasilien.

spicatum Roxb., ähriger, 4. w. Pegu.

virgatum Roxb., ruthenförmiger, 4. w. Ostindien.

- Phtheirospermum** Bunge, Würgsame, XIV. 11.,
 Personatae-Rhinantheae.

chinense Bunge, F. et Mey., chinesischer, ♂. f. k.
 Nordchina.

- Phycella** Lindl., Phycella, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

biflora Lindl., zweiblumige, 4. ♂. t. k. ?

corusca Lindl., schimmernde, 4. ♂. w. Coquimbo.

cyrtanthoides Lindl., cyrtanthusähnliche, 4. Zw. w. Chili.

glauca Lodd. (*ignea* β. *glauca* Lodd.), blaugrüne, 4.
 Zw. w. Chili.

Herbertiana Lindl., Herbert's, 4. Zw. w. Chili.

ignea Lindl., feuerfarbige, 4. Zw. w. Chili.

b) *pulchra* D. Don.

- Phylica** L., Heidemyrte, V. 1., Rhamneae.

I. Genuina.

acerosa W., nadelblätterige, ♀. k. t. Cap der gut. H.

acuminata Hort., zugespitzte, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

arborea Thouars, baumartige, ♀. t. Tristan d'Acunna.

bicolor L. (*strigosa* Thbg.), zweifarbige, ♀. k. t. Cap
 der guten Hoffnung.

capitata Thbg., kopfförmige, ♀. k. t. Cap der gut. H.
Commelini Spgl. (*pubescens* W.), Commelin's, ♀. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

cylindrica Wendl., cylinderförmige, ♀. k. t. C.d.g.H.

ericoides L., gemeine, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

eriophora Berg., wollkopfige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

excelsa Wendl., hohe, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.

globosa Thbg., kugelförmige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

Phylica

horizontalis Vent., horizontale, ꝥ. k. t. Cap d. gut. H.
imberbis Thbg. (*brunioides* Lam.), unbärtige, ꝥ. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

imbricata Thbg., dachblättrige, ꝥ. k. t. Cap d. g. H.
papillosa Wendl., weichwarzige, ꝥ. k. t. Cap d. g. H.
parviflora L. (? *australis* Lk.), kleinblumige, ꝥ. k. t. Cap

der guten Hoffnung.

pinifolia L., kieferblättrige, ꝥ. k. t. Cap der gut. H.

plumosa L., federige, ꝥ. k. t. Cap der guten Hoffn.

pubescens Ait. (? *hirsuta* Thbg.), weichhaarige, ꝥ. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

pumila Wendl., kleine, ꝥ. k. t. Cap der gut. Hoffn.

racemosa Thbg., traubige, ꝥ. k. t. Cap der gut. H.

ramosissima DC., vielästige, ꝥ. k. t. Cap der gut. H.

reclinata Wendl., zurückgebogene, ꝥ. k. t. Cap d. g. H.

rosmarinifolia Lam. (*secunda* Thbg.), rosmarinblättrige,

ꝥ. k. t. Cap der guten Hoffnung.

squarrosa Vent., sparrige, ꝥ. k. t. Cap der gut. H.

stipularis Thbg., zwischenblättrige, ꝥ. k. t. Cap d. g. H.

trichotoma Thbg., dreizinkige, ꝥ. k. t. Cap d. g. H.

villosa Thbg., zottige, ꝥ. k. t. Cap der gut. Hoffn.

II. Soulangia Brogn.

axillaris Lam. (*rosmarinifolia* W.), achselblumige, ꝥ. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

buxifolia L. (? *ledifolia* Dsf.), buchsbaumblättrige, ꝥ. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

cordata L. (? *doica* L.), herzblättrige, ꝥ. k. t. Cap

der guten Hoffnung.

oleioides Dsf. (*spicata* Lodd.), ölbaumblättrige, ꝥ. k. t.

Cap der guten Hoffnung.

orientalis W., morgenländische, ꝥ. k. t. ? Cap d. g. H.

paniculata W. (*myrtifolia* Poir), rispige, ꝥ. k. t. Cap

der guten Hoffnung.

spicata L. (*pinea* Thbg.), ährige, ꝥ. k. t. Cap d. g. H.

thymifolia Vent., thymianblättrige, ꝥ. k. t. Cap d. g. H.

III. Trichocephalus Brogn.

callosa Thbg., schwielige, ꝥ. k. t. Cap der gut. Hoffn.

lanceolata Thbg. (*glabrata* Thbg., *atrata* Lichtstn.), lan-

zettliche, ꝥ. k. t. Cap der guten Hoffnung.

rubra W., rothe, ꝥ. k. t. Cap der guten Hoffn.

radiata L. v. *Staavia radiata*.

Phyllanthus L., Blatthlume, XXI. x., Tricoccae- Euphorbiaceae.

angustifolius Sw., schmalblättrige, ꝥ. ꝥ. w. Jamaica.

calycinus La Bill., grofskelchige, ꝥ. t. Neuholland.

cantonensis Hornem., cantonische, ☉. w. Südchina.

ceramicus P., moluckische, ꝥ. ꝥ. w. Molucken.

Conami Sw. (*brasiliensis* Poir.), Conami-B., ꝥ. ꝥ. w.

Westindien, Brasilien.

cuneatus W. (*obcordatus* Hort.), keilförmige, ☉. w. ? China.

elongatus Jacq. fil. (Lodd.), verlängerte, ꝥ. ꝥ. w. Jamaica.

falcatus Sw. (*Epiphyllanthus* L.), sichelförmige, ꝥ. ꝥ. w.

Bahamische Inseln.

gracilis Roxb., schlanke, ♂. w. Ostindien.

grandifolius L. (*ovatus* Poir.), grofsblättrige, ꝥ. ꝥ. w.

Westindien.

juglandifolius W. (? *fraxinifolius* Hort.), wallnufsblättrige,

ꝥ. ꝥ. w. Westindien.

lanceolatus Poir., lanzettblättrige, ꝥ. ꝥ. w. Mascarenas.

Phyllanthus

- latifolius Sw., breitblättrige, f. f. w. Jamaica.
 linearis Sw., gleichbreitblättrige, f. f. w. Westindien.
 longifolius Lam., langblättrige, f. f. w. Mascarenas.
 lucens Poir., spiegelnde, f. f. w. China.
 maderaspatensis L., Madras-B., f. f. w. Ostindien.
 medius (Lodd.), mittlere, f. f. w. Jamaica.
 microphyllus H. B. K., kleinblättrige, f. f. w. Südamer.
 mimosoides Sw., mimosaähnliche, f. f. w. Caribäen.
 montanus Sw., Berg-B., f. f. w. Jamaica.
 Niruri L., weisse, ☉. w. Ostindien.
 nutans Sw., nickende, f. f. w. Jamaica.
 obovatus Mühlbg. (*carolinensis* Walt.), verkehrteiblättrige,
 ☉. f. Nordamerika.
 obscurus Roxb. (? *villosus* Poir.), dunkle, f. f. w. Ostind.
 polyphyllus W., vielblättrige, f. f. w. Ostindien.
 reticulatus Poir., netzförmige, f. f. w. Ostindien.
 rhamnoides Retz., wegdornähnliche, f. f. w. Ostindien.
 scandens Roxb., schlingende, f. f. Sch. w. Ostindien.
 simplex Retz., einfache, ☉. w. Ostindien.
 speciosus Jacq. (*Arbuscula* W.), schöne, f. f. w.
 Westindien.
 strictus Roxb., steife, f. f. w. Ostindien.
 thymoides Loud., thymianähnliche, f. t. Neuholland.
 Urinaria L., urintreibende, ☉. w. Ostindien.
 virosus Roxb., giftige, f. f. w. Ostindien.
Emblica L. (et *racemosus* L.) v. *Emblica officinalis*
 et *racemosa*. *Kirganelia* W. v. *Kirganelia elegans*.
longifolius Jacq. v. *Cicca disticha*.

Phyllis L., *Phyllis*, V. II., Rubiaceae.

Nobla L., edle, f. k. Canarische Inseln.

Phyllolobium Fisch., Blattlappen, XVII. IV. (XVI. VI.),
Leguminosae-Papilionaceae.

- chinense Fisch., chinesischer, 4. k. China.
 zanzibarense Boj., zanzibarischer, 4. w. Zanzibar.

Phyllocladus Rich., Blattästler, XXI. x., Coniferae-
Taxineae.

- rhomboidalis Rich., rautenförmiger, f. t. Van-
 Diemens-Land.

Phyllodoce Salisb., Blattheide, VIII. I., Ericaceae.

- empetriformis D. Don, rauschbeerenähnliche, f. f. b. k.
 Nordwestliches Amerika.

Pallasiana DC., Pallas's, f. f. b. k. Sibirien.

taxifolia Salisb., taxusähnliche, f. f. b. k. Lappland,
 Grönland, Sibirien, Nordamerika.

Phylloma aloesflorum Haw., *Jacquini* G. Don etc. v. *Loma-*
tophyllum borbonicum etc.**Phymatanthus** Lindl. v. *Pelargonium*.**Physalis** L., Schlutte (Judenkirsche), V. I., Solanaceae.

aequata Jacq. fil. (*isocarpa* Brot.), gleichförmige, ☉. f. ?

Alkekengi L., gemeine, 4. f. Mitteleuropa, Italien.

angulata L. (*peruviana* Walt., *minima* Wall.), kantige,
 ☉. f. Nordamerika, Ost- und Westindien.

arborescens L., baumartige, f. k. Westindien, Neuspan.

aristata Ait., grannige, f. k. Canarische Inseln.

chenopodifolia Lam. (*tuberosa* W.), gänsefußblättrige,
 4. w. Peru.

curassavica L., curassavische, 4. f. w. Curassav.

foetens Poir. (*foetidissima* Lag.), stinkende, ☉. f. m.
 Neuspanien.

Physalis

frutescens DC. (*suberosa* Cav.), strauchige, ♀. k. Spanien.
heterophylla N. E. (*tomentosa* et *nutans* Walt.), verschiedenblättrige, 4. k. f. Nordamerika.

indica Lam. (*parviflora* RB., *pseudo-angulata* Blume, *divaricata* D. Don), indische, ♂. f. m. Ostindien, Nepal, Neuholland.

laurifolia H. Berol. (*angulata* R. et P., *lanceolata* Mchx.), lorbeerblättrige, ♂. f. m. Peru.

Linkiana N. E. (*dubia* Lk.), Link's, ♂. f. m. Brasilien.
minima L. (*parviflora* Lag., *Lagascae* R. et S., *villosa* Roth, *peruviana* Nutt., *Rothiana* R. et S.), kleinste, ♂. f. m. Vera-Cruz, Ostindien.

peruviana L. (*edulis* Sims), peruvianische, 4. w. k. Peru.

philadelphica Lam. (*chenopodifolia* W., *atriplicifolia* Jacq., *ovata* Poir., *megistocarpos* Zucc.), philadelphische, ♂. f. Nordamerika.

prostrata L'Her. (*limensis* Retz), gestreckte, ♂. f. m. Peru.
pruinosa L., bereifte, ♂. f. m. Westindien.

pubescens L. (*barbadensis* Jacq.), weichhaarige, ♂. f. Nordamerika, Westindien.

somnifera L. (*flexuosa* L.), gebogene, 4. k. Südeuropa, Ostindien.

viscosa L. (? *pensylvanica* L., *Jacquini* Lk.), schmierige, 4. k. Buenos-Ayres, Nordamerika.

indica Lam. v. *Nicandra indica*.

Physianthus Mart., Blasenblume, V. II., Asclepiadeae.
albens Mart., weifliche, ♀. Sch. w. Brasilien, Buenos-Ayres.

Physinga Lindl., Physinga, XX. I., Orchideae.

prostrata Lindl., gestreckte, 4. w. ? Südamerika.

Physolobium Benth., Blasenblatt, ? XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

elatum Benth., hohes, ♀. t. Neuholland (Schwanenfluß).

Physomatium Kaulf., Blasenhüllchen, XXIV. I., Pterioideae.

molle Kaulf., weiches, 4. w. ? Südamerika.

pubescens Kaulf., weichhaariges, 4. w. Brasilien.

Physosiphon Lindl., Blasenstendel(röhre), XX. I., Orchideae.

carinatus Lindl., kielförmiger, 4. w. ?

emarginatus Lindl., ausgerandeter, 4. w. Brasilien.

Loddigesii Lindl., Loddige's, 4. w. Neuspanien.

spiralis Lindl., spiralförmiger, 4. w. Brasilien.

Physospermum Cuss., Blasensame, V. II., Umbelliferae.

commutatum Spgl., verwechselter, 4. f. b. England, Oberitalien, Portugal, Griechenland.

Physostegia Benth., Blasenkelch, XIV. I., Labiatae.

cordata Benth. (Nutt.), herzblättriger, 4. f. Nordamer.

denticulata Benth. (Ait.), gezähnelter, 4. f. Virginien, Carolina.

imbricata Hook., ? Paxt., ziegeldachförmiger, 4. f. b. k. Texas.

speciosa Benth. (Sw.), prächtiger, 4. f. Sibirien.

truncata Benth., abgestutzter, ♂. f. St. Felipe.

variegata Benth. (Vent.), bunter, 4. f. b. k. Südcarolina.

virginiana Benth. (L.), virginischer, 4. f. Nordamerika.
 b) *alba*.

Phytelephas R. et P., Elephantenpandane, XXII. XII., Pandaneae.

Phytelephas

macrocarpus R. et P., großfrüchtige, h. w. Peru.

Phyteuma L., Rapwurz, V. 1., Campanulaceae.

betonicaefolium Vill. (*persicifolium* Hoppe), betonienblättrige, 4. f. Schweiz, Tyrol, Kärnthen, Dauphiné etc.

campanuloides MB., glockenblumenähnliche, 4. f. Caucasus.

canescens W. Kit., weißgrauliche, 4. f. Ungarn, Galicien, Siebenbürgen.

comosum L., schopfige, 4. k. f. b. Krain, Tyrol, Oberitalien. Alpen.

cordatum Vill. (*Sieberi* Spgl.), herzblättrige, 4. f. Tyrol, Krain, Dauphiné.

Halleri All. (*ovatum* Schm., *urticifolium* Clairv.), Haller's, 4. f. Mitteleuropäische Voralpen.

hemisphaericum L., kugelblumige, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *graminifolium* Shr.

humile Schlchr. (*Carestiae* Biv.), niedrige, 4. f. Südliche schweizer Alpen.

inaequatum Kit., ungleiche, 4. f. Ungarn.

lanceolatum W., lanzettblättrige, 4. f. b. k. Armenien.

limonifolium Sibth., Sm. (*virgata* Lodd., *stricta* Sims, *lanceolata* Dsf., *collinum* Guss., *stylosum* Schrk.), statizenblättrige, 4. f. Griechenland, Süditalien.

Micheli All., Micheli's, 4. f. Schweizer u. piemonteser Alpen, Pyrenäen.

nigrum Schm. (*ovale* Hoppe), schwarze, 4. f. Deutschl. etc.

orbiculare L., kreisförmige, 4. f. Mitteleuropa.

β) *fistulosum* Rehb. γ) *lanceolatum* Vill.

pauciflorum L., wenigblumige, 4. f. Südeuropäische Alpen.

β) *globulariaefolium* Hoppe et Stbg.

pulchellum Fisch. et Mey., schöne, 4. f. Südrussland.

Scheuchzeri All., Scheuchzer's, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

β) *Charmelii* Vill.

scorzoneriaefolium Vill., haferwurzblättrige, 4. f. Schweiz, Dauphiné.

sibiricum Vest., sibirische, 4. f. Sibirien.

spicatum L., ährenförmige, 4. f. Europa.

veronicaefolium Schrad., ehrenpreisblättrige, 4. f. Tyroler Alpen.

virgatum W., ruthenförmige, ♂. f. Syrien.

pinnatum W. v. *Petromarula pinnata*.

Phytolacca T., Kermesbeere, X. v., Aizoideae-Phytolaccaeae.

abyssinica Hoffm., abyssinische, 4. h. w. Abyssinien.

bogotensis H. B. K., bogotische, 4. w. Neu-Granada.

decandra L., zehnmännige, 4. f. Nordamerika.

dioica L., zweihäusige, h. w. Südamerika.

dodecandra L'Her., elffädige, 4. w. Afrika.

icosandra L., zwanzigfädige, 4. w. Ostindien.

mexicana Swt. (*icosandra* Bot. mag.), mexicanische, 4. w. Mexico.

octandra L., achtmännige, 4. w. Mexico.

stricta Hoffm. (*heptandra* Retz), steife, 4. w. Südamer.

Piранthus RB. v. *Stapelia*.**Picea** D. Don v. *Pinus*.

Picotia brassicaefolia R. et S. etc. vid. *Omphalodes amplexicaulis* etc.

Picramnia Sw., Bitterstrauch, XXII. v., Amyrideae-Terebinthaceae (*Cassuvieae*).

Antidesma Sw., antidesmaähnlicher, *h.* w. Jamaica.

pentandra Sw., fünf männiger, *h.* w. Caribäen.

Picridium Dsf., Bitterling, XIX. i., Compositae-Cichoriaceae.

hispanicum Lk. (*pinnatifidum* Lag.), spanischer, *o.* f. Spanien.

ligulatum Vent., zungenblättriger, *h.* k. Nordafrika.

tingitanum Dsf., tanger'scher, *o.* f. Nordafrika.

vulgare Dsf., gemeiner, *o.* f. Südfrankreich, Italien, Nordafrika.

albidum DC. v. *Barckhausia albida* Nachtr.

Picris L., Bitterkraut, XIX. i., Compositae-Cichoriaceae.

altissima Delil., hohes, *o.* f. Aegypten.

asperima Lindl., rauhestes, *h.* k. Van-Diemens-Land.

asplenioides L., strichfarnblättriges, *o.* f. Nordafrika.

barbarorum Lindl., fremdes, *h.* k. Neuholland.

dahurica Fisch., dahurisches, *o.* f. Dahurien.

hieracioides L., gemeines, *h.* f. Europa, Sibirien.

β) *umbellata* N. E. (*paleacea* Vest.). *γ*) *crepoides*

Saut. *δ*) *ruderalis* Schm.

hispidissima Bartl. (*laciniata* Vils.), hackerigstes, *h.* f. Istrien, Dalmatien.

kamtschatica Lodd., kamtschatalisches, *o.* f. Kamtschatka.

lyrata Delil., leierförmiges, *o.* f. Aegypten.

nepalensis Loud., nepal'sches, *h.* k. Nepal.

pauciflora W., wenigblumiges, *o.* f. Oberitalien, Frankreich.

rigida Ledeb. (? *hispidia* Ait.), starres, *o.* f. Taurien.

Sprengeriana Lam. (*Rhagadiolus* P.), Sprenger's, *o.* f. Süd- und Westeuropa.

strigosa MB., striegeliges, *h.* f. Taurien.

echioides L. v. *Helminthia echioides*.

Pictetia DC. (A. Pictet, Arzt und Physiker zu Genf), XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

aristata DC., grannige, *h.* w. Westindien.

squamata DC., schuppige, *h.* w. Westindien.

Pierardia Roxb. (M. Pierard zu Kew Green), VIII. i., Sapindaceae.

sapida Roxb., wohlschmeckende, *h.* w. Sumatra.

Pieris D. et G. Don, *Pieris*, X. i., Ericaceae.

formosa D. et G. Don, schöne, *h.* k. t. Nepal.

japonica D. et G. Don, japanische, *h.* k. t. Japan.

lanceolata D. et G. Don, lanzettliche, *h.* k. t. Nepal.

ovalifolia D. et G. Don, eiblättrige, *h.* k. Nepal.

Pilea Lindl., Haarnessel, XXI. iv., Urticaceae.

muscosa Lindl., moosähnliche, *h.* w. Westindien.

Pilogyne Schrad., Haagriffel, XXII. iii., Cucurbitaceae.

suavis Schrad., angenehmriechender, *h.* Sch. k. Cap der guten Hoffnung.

Pilularia L., Pillenfarn, XXIV. iv., Marsiliaceae.

globulifera L., kugeltragender, *h.* Wa. f. Europa.

Pimelea Forst., Glanzstrauch, II. i., Thymelaeaceae.

arenaria Cunn., sandliebender, *h.* t. Neuzeeland, Neusüdwallis.

cinerea RB., aschfarbiger, *h.* t. Neuholland.

clavata LaBill., keulenförmiger, *h.* t. Neuholland.

Pimelea

- collina RB., Hügel-G., $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 crinita Lindl., bemähter, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland (Schwanenfl.).
 decussata RB., kreuzblättriger, $\frac{1}{2}$ t. Neusüdwallis.
 diosmaefolia Lodd., diosmablättriger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 drupacea La Bill., steinfrüchtiger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 filamentosa Rudg., langfadiger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 glauca RB., blaugrüner, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland, Van-Diemens-Land.
 graciliflora Hook., schlankblumiger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 hispida RB., steifborstiger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 humilis RB., niedriger, $\frac{1}{2}$ t. Van-Diemens-Land.
 hypericina Cunn., johanniskrautblättriger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholl.
 incana RB., weißgrauer, $\frac{1}{2}$ t. Van-Diemens-Land.
 intermedia Lindl., mittlerer, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 lanata RB., wolliger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 ligustrina La Bill., ligusterähnlicher, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland, Van-Diemens-Land.
 linifolia Sm., flachsblättriger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 linoides Cunn., flachsähnlicher, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 longiflora RB., langblumiger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 nivea La Bill., schneeweißer, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland, Van-Diemens-Land.
 pauciflora RB., wenigblumiger, $\frac{1}{2}$ t. Van-Diemens-Land.
 rosea RB., rosafarbiger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 spicata RB., ährenförmiger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 sylvestris RB., Wald-G., $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.

Pimpinella R. L., Bibernell, V. II., Umbelliferae.

- cretica Poir., cretische, 4. f. Griechenland.
 flava C. A. Mey. (*aurea* Hort.), hellgelbe, 4. f. Südrussl.
 lateriflora Lk., seitenblumige, ♂. f. ? Nordafrika.
 lutea Dsf., gelbe, 4. f. b. Nordafrika.
 magna L., große, 4. f. Europa.
 β) rubra Hoppe. γ) laciniata Wallr. (*media* Hoffm., *orientalis* Gouan). δ) dissecta Retz.
 rotundifolia MB., rundblättrige, 4. f. Caucasus.
 Saxifraga L., gemeine, 4. f. Europa.
 a) major Wallr. β) dissectifolia Wallr. γ) potteriifolia Wallr. δ) alpestris Spgl. (*alpina* Host.).
 ϵ) nigra W.
 tenuis Sieb., dünne, 4. k. f. b. Creta.

Anisum L., *apula* Bernh., *bubonoides* Brot. (et *Tragium* Vill.) vid. *Tragium Anisum*, *apulum*, *Broteri*, *Columnae* etc. *dioica* L. (*pumila* Jacq.), *glauca* L. et *glauca* Kit. vid. *Trinia vulgaris*, *Henningii* et *Kitaibelii*.

Pinguicula T., Fettkraut, II. I., Personatae-Lentibulariae.

- alpina L. (*flavescens* Flörk., *purpurea* W.), Alpen-F., ♂. 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Nordeuropa.
 edentula Hook., zahnloses, 4. k. Nordamerika.
 grandiflora Lam. (*leptoceras* Rchb.), großblumiges, 4. f. b. k. Tyrol, Schweiz, Frankreich, Irland.
 longifolia Ramond, langblättriger, 4. f. b. k. Schweiz, Tyrol, Frankreich.
 β) grandiflora DC.
 lusitanica L., portugiesisches, 4. f. b. k. Portugal, England, Schottland.
 lutea Walt. (*campanulata* Lam.), gelbes, 4. k. Virginien, Carolina.
 vulgaris L., gemeines, 4. f. Europa.

Pinkneya Mckx. (M. Pinkney, nordamerikanischer Botaniker), V. 1., Rubiaceae.

pubens Mchx., feinhaarige, $\frac{1}{2}$ k. Südcarolina, Florida.

Pinus T. L., Fichte, XXI. x., Coniferae-Abietinae.

I. **Abies** T. DC., D. Don., Pechtanne (Fichte).

Abies L. (*Picea du Roi* A. *excelsa* DC., *Picea vulgaris* Lk.), gemeine, $\frac{1}{2}$ f. Europa, Nordasien.

a) communis A. B. b) nigra A. B. c) carpathica A. B. d) pendula Lodd. e) fol. variegatis A. B. f) Clanbrasiliana Lodd. g) Clanbrasiliana stricta A. B. h) pygmaea A. B. (*nana* Lodd., *elegans* Sm.). i) tenuifolia Sm. k) gigantea Sm. l) monstrosa A. B. Sm. of Ayr.

alba Ait. (*laxa* Ehrh., *canadensis* du Roi), weisse, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

b) nana Dicks.

canadensis L. (*americana* du Roi), Schierlings-F., $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

cephalonica A. B. (*taxifolia* et *luscombeana* Hort.), cephalonische, $\frac{1}{2}$ f. Cephalonien.

Douglasii Sabine, Lindl. (*taxifolia* Lamb., *californica* Hort.), Douglas's, $\frac{1}{2}$ f. Westliches Nordamerika.

b) taxifolia A. B.

dumosa Lam. (*decidua* Wall. et *Brunoniana* Wall., A. *Brunoniana* Lindl.), Hecken-F., $\frac{1}{2}$ f. b. k. Nepal.

Menziesii Lamb., Dougl., Menzies's, $\frac{1}{2}$ f. Californien.

nigra Ait. (*mariana* Ehrh., *denticulata* Mchx.), schwarze, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

orientalis L., morgenländische, $\frac{1}{2}$ f. Trapezunt.

rubra Lamb., Poir., rothe, $\frac{1}{2}$ f. Neu-Schottland.

b) coerulea Booth.

Smithiana Wall. (*Khutrow* Royle, *Morinda* Hort.), Smith's, $\frac{1}{2}$ f. b. k. Himalaya.

II. **Cedrus**, Barrel. T.

Cedrus L. (*C. Libani* Barrel.), Ceder-F. (von Libanon), $\frac{1}{2}$ k. f. b. Kleinasien, Syrien.

b) fol. argent. c) nana.

Deodara Roxb., Lamb., Deodara-Ceder, $\frac{1}{2}$ k. Nepal.

III. **Larix** T., Lerchenbaum.

Larix L. (*L. europaea* DC.), Lerchen-F., $\frac{1}{2}$ f. Ost- und Mitteleuropa, Mittel- und Nordasien.

a) communis Laws. b) laxa Laws. c) compacta Laws. d) pendula Laws. e) repens Laws. f) flore rubro A. B. g) flore albo A. B. h) sibirica Fisch. (? *archangelica* Laws., *rossica* Sabin.). i) dahurica A. B. Laws. k) intermedia A. B. Lodd. l) Fraseri Anglor.

microcarpa Lamb. (*laricina* du Roi, *L. americana* Mchx. a *rubra* A. B.), kleinfrüchtige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

pendula Ait. (*intermedia* du Roi, *nigra* Marsh., *L. americana* β A. B.), überhängende, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

β) prolifera A. B.

IV. **Picea** D. Don, Weifs-(Edel-)Tanne.

amabilis Dougl., liebliche, $\frac{1}{2}$ f. Californien.

balsamea L., Balsam-T., $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

b) longifolia Booth.

bracteata Lamb. (*venusta* Dougl.), deckblättrige, $\frac{1}{2}$ f. Californien.

Fraseri Pursh, Fraser's, $\frac{1}{2}$ f. Pensylvanien, Carolina.

Pinus

- grandis Dougl., grofse, *h. f.* Neu-Californien.
 nobilis Dougl., edle, *h. f.* Nordamerika.
 Picea L. (*Abies* du Roi, *A. vulgaris* Poir., *A. pectinata* DC., *A. excelsa* Lk., *A. taxifolia* H. Par.), gemeine, Weifs-T., *h. f.* Europa.
 b) tortuosa. c) fol. variegat. d) cinerea.
 Pichta Fisch. (*A. sibirica* Led.), Pichta-F., *h.* Altai.
 Pindrow Royle (*Taxus Lambertiana* Wall.), Pindrow-F., *h. k. f. b.* Himalaya.
 religiosa H. B. K., verehrte, *h. k.* Mexico.
 Webbiana Wall. (*spectabilis* Lamb.), Webb's, *h. f. b. k.* Nepal.
 V. Pinus T., Kiefer.
 austriaca Höss. (*nigricans* Host.), österreichische, *h. f.* Oesterreich.
 Banksiana Lamb. (*rupestris* Mchx., *sylvestris divaricata* Ait., *Hudsonia* Poir.), Bank's, *h. f.* Canada.
 brutia Tenor. (*conglomerata* Graeff.), calabrische, *h. f.* Calabrien.
 californiana Loisel. (*montereyensis* Godefroy, *adunca* Bosc, *montheragensis* H. Angl.), californische, *h. f.* Californien.
 canariensis C. Smith, canarische, *h. k.* Canarische Inseln.
 Cembra L., Zürbelnufs-K., *h. f.* Mitteleuropäische Alpen, Nordasien.
 a) sibirica. b) pygmaea (*pumila* Pall.). c) helvetica Lodd.
 Coulteri D. Don (*Sabiniana* var. Hort., *macrocarpa* Lindl.), Coulter's, *h. f.* Santa Lucia.
 excelsa Wall. (*Dicksonii* Hort.), hohe, *h. k. f. b.* Nepal.
 Gerardiana Wall. (*Neosa* Govan.), Gerard's, *h. t.* Ostind.
 halepensis Ait. (*hierosolymitana* du Ham.), syrische, *h. f.* Syrien.
 inops Ait. (*virginiana* du Roi), Jersey-K., *h. f.* Nordamer.
 insignis Dougl., ausgezeichnete, *h. f.* Californien.
 Lambertiana Dougl., Lambert's, *h. f.* Nordamerika.
 Laricio Poir. (*maritima* Ait.), lerchenähnliche, *h. f.* Südeuropa.
 a) corsicana. b) subviridis du Ham. c) carmanica Bosc, (*romana* H. Angl.). d) calabrica. e) pyrenaica (*hispanica* Cook).
 leiophylla Schiede et Deppe, glattblättrige, *h. k. t.* Mexico.
 Llaveana Otto, La Llaves, *h. k.* Mexico.
 longifolia Roxb., langblättrige, *h. k. t.* Nepal.
 mitis Mchx. (*variabilis* Lamb., *echinata* Mill.), Neu-York-K., unbewehrte, *h. f.* Nordamerika.
 Montezumae Lamb. (*occidentalis* H. B. K.), Montezuma's, *h. k. t.* Mexico.
 monticola Dougl., Berg-K., *h. f. b. k.* Columbien.
 muricata D. Don, weichstachelige, *h. k.* Californien.
 occidentalis Sw., westliche, *h. t.* Westindien.
 Ocote Loud. (*oocarpa* Schiede), Ocote-K., *h. k.* Mexico.
 Pallasiana Lamb. (*taurica* Hort., *tatarica* H. Angl., *maritima* Pall., *Pinea* Habl., *halepensis* MB.), Pallas's, *h. f.* Taurien, Sibirien.
 palustris Mill., Ait. (*australis* Mchx., *serotina* Hort.). Sumpf-F., *h. f. b. k.* Carolina, Florida.
 patula Schiede, ausgebreitete, *h. k. t.* Mexico.
 Pinaster Ait. (*maritima* du Ham.), italienische, *h. f.* Südeuropa.

Pinus

- b) *escarenas (Aberdoniae A. P.)*. c) *Lemoniana Benth.* d) *minor*. e) *fol. variegat.* f) *maritima.* g) *chinensis.* h) *nepalensis.* i) *novae-hollandiae Lodd.* k) *St. helenica.* l) *Massoniana Lamb.*

Pinea L., genießbare, *h. f. b. k.* Südeuropa.

- b) *fragilis du Ham.* c) *cretica Hort.* d) *americana Hort.*

ponderosa Dougl., schwerholzige, *h. f.* Nordamerika.

Pumilio Haenke (P. Mughus Scop.), Krummholz-K., *h. f.* Osteuropäische Alpen, Pyrenäen.

- b) *rubraeflora.* c) *Fischeri Booth.* d) *nana.*

pungens Lamb., Mchx., stechende, *h. f.* Nordcarolina.

pyrenaica Lapeyr., pyrenäische, *h. f.* Pyrenäen.

radiata D. Don, strahlige, *h. k.* Californien.

resinosa Ait. (rubra Mchx.), starkharzige, *h. f.* Nordamer.

rigida Mill. (Taeda β. rigida Ait., canadensis trifolia Du. H.), starre, *h. f.* Nordamerika.

- β) *alopécuroidea Lamb.*

rotundata Lk., zugerundete, *h. f.* Tyrol etc.

Sabiniana Dougl., Sabine's, *h. f.* Nordamerika.

sanguinea Lapeyr. (uncinata DC.), blutfarbige, *h. f.* Pyrenäen.

serotina Mchx., späte, *h. f.* Nordamerika.

sinensis Lamb., chinesische, *h. k.* China.

Strobis L., Weimuths-P., *h. f.* Nordamerika.

- b) *alba Hort.* c) *brevifolia Hort.* d) *compressa Booth (nova Lodd.)*.

sylvestris L., gemeine K., *h. f.* Europa, Mittel- und Nordasien, Japan.

- a) *vulgaris.* b) *horizontalis (rubra Mill.)*. c) *haguenensis.* e) *rigensis.* e) *montana Mill.* f) *Mughus Jacq.* g) *monophylla Hodgins.* h) *scariosa Lodd.* i) *intermedia.* k) *altaica Ledeb.* l) *tortuosa Don.*

Taeda L., dreinadelige, *h. f.* Nordamerika.

Teocote Schiede et Deppe, *Teocote-K.*, *h. k. t.* Mexico.

tuberculata D. Don, höckerige, *h. k.* Californien.

Unbestimmtere: *Fraseri Lodd. Cat.*, *timoriensis Hort.*

Dammara Lamb. v. Dammara orientalis. lanceolata Lamb. v. Cunninghamia lanceolata.

Piper L., Pfeffer, II. III., **Piperaceae.**

I. *Peperomia R. et P.*

acuminatum L., zugespitzter, 4. w. Westind., Südamer.

alatum Vahl, geflügelter, 4. w. Peru.

amplexicaule Sw., stengelumfassender, 4. w. Jamaica.

amplexifolium Lk., umfassendblättriger, 4. w. Jamaica.

blandum Jacq., geschmackloser, 4. w. Caracas.

brachyphyllum W., kurzblättriger, 4. w. Südamerika.

capense L., capischer, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

coriaceum Vahl, lederartiger, *h. w.* Ostindien.

cuneifolium Jacq., keilblättriger, 4. w. Caracas.

distachyon L., zweijähriger, 4. w. Südamerika.

hispidulum Sw., steifhaariger, ♂ w. Jamaica.

humile Vahl, niedriger, 4. w. Caribäen.

inaequalifolium Vahl (aromaticum W.), ungleichblättriger, 4. w. Peru.

incanum Haw., weißgrauer, 4. *h. w.* Brasilien.

macrostachyum Rich., großsähriger, 4. w. Cayenne.

Piper

- maculosum L., gefleckter, 4, w. St. Domingo.
 magnoliaefolium Jacq., magnolienblättriger, 4. f. w. Südamerika.
 nummulariaefolium Sw., pfennigkrautblättriger, 4. w. Jamaica.
 obtusifolium L. (*clusiaefolium* Jacq.), stumpfblättriger, 4. f. Südamerika.
 ovalifolium Hook., eiblättriger, 4. w. Südamerika.
 peireskiaefolium Jacq., pereskiablättriger, 4. f. w. Südamerika.
 pellucidum L., durchsichtiger, ☉. w. Südamerika.
 polystachyum Ait. (*obtusifolium* Jacq.), vielättriger, 4. w. Jamaica.
 pubescens Vahl, weichhaariger, 4. w. Südamerika.
 pulchellum Ait., schöner, 4. w. Jamaica.
 quadrifolium Sw., vierblättriger, 4. w. Südamerika.
 reniforme Poir., nierenförmiger, 4. w. Ostindien.
 repens H. B. K., kriechender, 4. w. Südamerika.
 rotundifolium Sw., rundblättriger, 4. w. Westindien, Südamerika.
 rubellum Haw., röthlicher, 4. w. Westindien.
 rubricaule N. E., rothstengeliger, 4. f. w. Brasilien.
 serpens Sw., geschlängelter, 4. w. Jamaica.
 sidaefolium Lk. (*peltatum* R. et P. *umbellatum* Jacq.), sidablättriger, 4. f. w. Peru, Brasilien.
 stellatum Sw., sternförmiger, 4. w. Jamaica.
 suaveolens Dsf., gutriechender, 4. w. Cuba.
 subrotundum, Haw., rundlicher, 4. w. ?
 talinifolium R. et P., talinenblättriger, 4. w. Neu Granada.
 tenellum Sw., zarter, 4. w. Jamaica.
 tricarinatum Haw., dreikieliger, 4. w. Westindien.
 trifolium L., dreiblättriger, 4. w. Guiana.
 tristachyum, R. et S., dreiähriger, 4. w. Neu-Granada.
 urocarpum Fisch. et Mey., schweiffrüchtiger, m. f. w. Brasilien.
 verticillatum L., wertelblättriger, 4. f. w. Jamaica.
 II. Piper R. et P.
 acutifolium R. et P., spitzblättriger, f. w. Peru.
 aduncum L., hackiggekrümmter, f. w. Westindien.
 Amalago L., Amalago P., f. w. Jamaica.
 Betel L., Betel-P., f. w. Ostindien.
 colubrinum Lk., schlangenähnlicher, f. w. Brasilien.
 decumanum L., größer, f. w. Westindien.
 discolor Swt., verschiedenfarbiger, f. w. Westindien.
 fallax Rich. (*spurium* Lk.), trügerischer, f. Sch. w. Ostindien.
 geniculatum Sw., gelenkiger, f. w. Jamaica.
 glabrum Mill., kahler, f. w. Südamerika.
 hirsutum Sw., rauhaariger, f. w. Jamaica.
 hispidum H. B. K., scharfhaariger, k. w. Neu-Granada.
 laurifolium H. P. K., lorbeerblättriger, f. w. Peru.
 longum L., langer, f. w. Ostindien.
 macrophyllum Sw. (*obliquum* R. et P.), großblättriger, f. w. Westindien.
 marginatum Jacq., berandeter, f. w. Südamerika.
 nigrum L., schwarzer, f. Sch. w. Ostindien.
 nitidum Sw., glänzender, f. w. Jamaica, Surinam.
 nodulosum Lk. (*geniculatum* W.), knotiger, f. w. ?
 peltatum L., schildförmiger, f. w. Westindien.

Piper

plantagineum Lam. (*medium* Jacq.), wegetritähnlicher, ♀. w. Caribäen.

racemosum Vahl., traubiger, ♀. w. Peru.

tomentosum Vahl., filziger, ♀. w. Java.

umbellatum L., doldiger, ♀. w. Südamerika.

unguiculatum R. et P. (*glauescens* Jacq.), nagelförmiger, ♀. w. Peru.

Piptanthus Swt., Fallblume, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

nepalensis Swt., nepal'sche ♀. k. Nepal.

Piptatherum P. B., Fallgranne, III. 11., Gramineae.
coerulescens P. B., bläuliche, 4. f. b. k. Nordafrika, Südeuropa.

frutescens *, strauchige, 4. ♀. k. Griechenland.

multiflorum P. B., vielblumige, 4. f. Südeuropa.

paradoxum P. B., wunderbare, 4. f. b. Südeuropa, Caucasus.

punctatum P. B. v. *Oedipachne punctata*.

Piqueria Cav. (Andreas Piquerio, spanischer Botaniker)
XIX. 1. Compositae-Eupatorieae.

artemisioides H. B. K., beifußähnliche, 4. ♀. k. Quito, Mexico.

ovata G. Don, eiförmige, 4. k. Mexico.

pilosa H. B. K., haarige, 4. k. Mexico.

trinervia Cav., dreinervige, 4. ♀. k. Neuspanien.

Piriqueta racemosa Swt. v. *Turnera racemosa*.

Piscidia L., Fischfängerbaum, XVII. 1v. (vi.) (XVI. vi.)
Leguminosae-Papilionaceae.

carthagenensis Jacq., carthagenischer, ♀. w. Hispaniola, Neu-Granada.

Erythrina L., gewöhnlicher, ♀. w. Westindien.

longifolia W. v. *Daubentonia longifolia*.

Pisonia Plum. (W. Piso, holländischer Arzt und Naturforscher, welcher Brasilien bereiste) VII. 1. Nyctagineae.

aculeata L., stachelige, ♀. w. Westindien.

fragrans Dsf., wohlriechende, ♀. w. ?

grandis RB., grofse, ♀. t. Neuholland.

hirtella H. B. K., kurzhaarige, ♀. w. Mexico.

macrophylla Lk., grofsblättrige, ♀. w. ?

mexicana W. (*Boerhaavia arborescens* P., *arborea* Lag.)
mexicanische, ♀. w. Mexico.

nigricans Sw., schwärzliche, ♀. w. Westindien.

nitida W., glänzende, ♀. w. Madagascar.

obovata Lk., verkehrteiförmige, ♀. w. ?

obtusata Sw., stumpfblättrige, ♀. w. Westindien.

subcordata Sw., herzblättrige, ♀. w. Caribäen.

Pistacia L., Pistazie, XXII. v., Amyrideae-Terebinthaceae.

atlantica Dsf., nordafrikanische, ♀. k. Nordafrika.

fagarioides W., fagaraähnliche, ♀. k. ?

Lentiscus L., Mastix-P., ♀. k. Südeuropa, Kleinasien.

β) *massiliensis* Mill. (*angustifolia* DC.) γ) *chia* Dsf.

Terebinthus L., Terpentin-P., f. b. k. Südeuropa, Mittelasien, Nordafrika.

β) *narbonensis* L. (*reticulata* W.)

vera L. (*officinalis* H. Kew.) wahre, ♀. k. Levante.

β) *trifolia* L.

Pistorinia DC., Pistorinie, X, 1v., Corniculatae-Crasulaceae.

Pistorinia

hispanica DC., spanische, ♂. f. b. k. Spanien.

Pisum T., Erbse, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

arvense L., Acker-E., ☉. Sch. f. Mittel- und Südeuropa.

biflorum Rafn., zweiblumige, ☉. S. h. f. Sicilien.

elatum MB., hohe, ☉. Sch. f. Caucasus.

Jomardi Schrk., Jomardis, ☉. Sch. f. Aegypten.

maritimum L., Meerstrand's-E., 4. f. Nordeuropa, England, Belgien, Canada.

β) *americanum* Mill.

sativum L., gemeine, ☉. Sch. f. Europa.

b) *saccharatum* Sering. c) *macrocarpum* Sering.

d) *umbellatum* L. e) *quadratum* L. f) *humile*

Poir. g) *chlorospermum* Hort.

thebaicum W., griechische, ☉. Sh. f. ? Griechenland.

Ochrus L. v. *Ochrus pallida*.

Pitcairnia L'Her. Ait. (W. Pitcairn, M. Dr. zu London) VI. i., Bromeliaceae.

albiflora Sogl. (*albiflos* Herb.), weißblumige, 4. w. Brasilien.

angustifolia Ait., schmalblättrige, 4. w. Westindien.

bracteata Ait. (*latifolia* Red.), breitdeckblättrige, 4. w. Westindien.

bromeliaefolia Ait., ananasblättrige, 4. w. Westindien.

chilensis Lodd., chilesische, 4. w. Chili.

flamea Bot. Reg., feuerfarbige, 4. w. Brasilien.

humilis Hort., niedrige, 4. w. Südamerika.

integrifolia Sims., ganzblättrige, 4. w. Westindien.

intermedia Hort., mittlere, 4. w. Südamerika.

iridiflora Hort., irisblumige, 4. w. Südamerika.

latifolia Ait., breitblättrige, 4. w. Westindien.

media Hort., mittlere, 4. w. Südamerika.

staminea Sims., langfadige, 4. w. Südamerika.

suaveolens Bot. Reg., gutriechende, 4. w. Brasilien.

sulphurea Andr., schwefelgelbe, 4. w. Westindien.

coarctata P. et *furfuracea* W. v. *Pourretia coarctata* et *pyramidata*.

Pittosporum Klebsame, V. i., Evonymeae-Pittosporae.

Andersonii Fisch., Anderson's, ♂. k. t. Neuholland.

angustifolium Lodd., schmalblättriger, ♂. k. t. Neusüd.

bracteolatum Endl., deckblättriger, ♂. k. t. Norfolkinsel.

coriaceum Ait., lederblättriger, ♂. k. Madeira.

cornifolium Cunn., cornusblättriger, ♂. k. t. Neuseeland.

ferrugineum Ait. rostfarbiger, ♂. w. Guinea.

fulvum Rudg., braungelber, ♂. k. t. Neuholland.

hirtum W. (*hirsutum* Lk.), kurzhaariger, ♂. k. Canarische Inseln.

ligustrifolium Cunn., ligusterblättriger, ♂. k. t. Neuholland.

mauritianum Lodd., mascarenischer, ♂. t. w. Mauritius.

oleifolium Ait., ölbaumblättriger, ♂. k. t. Neuholland.

revolutum Ait., zurückgerollter, ♂. k. t. Neuholland.

tenuifolium G., dünnblättriger, ♂. k. t. Neuholland.

Tobira Ait., chinesischer, ♂. k. t. China.

tomentosum Bonpl. filziger, ♂. k. t. Neuholland.

undulatum Andr., wellenförmiger, ♂. k. t. Neuholland.

b) *variegatum* Dens.

viridiflorum Sims (*capense* et *arbutifolium* Hort., *sinense* Dsf.), grünblumiger, ♂. k. A. Cap der guten Hoffn.

- Pladera** Roxb., *Pladera*, IV. 1., Contortae-Gentianeae.
decussata Roxb., kreuzblättrige, ☉. ♂. t. Bengalen.
virgata Roxb., ruthenförmige, ☉. ♂. t. Ostindien.
- Plagianthus** Forst., Schiefblume, XVI. VII., Malvaceae-Bombaceae.
divaricatus Forst., ausgesperrte, ☿. k. t. Neuseeland.
sidoides Hook., sidaähnliche, ☿. k. t. Van-Diemens-Land.
Lampenii Booth. v. *Sida pulchella*.
- Plagiobothrys** Fisch. et Mey., Schieftraube, V. 1., Asperifoliaceae.
rufescens Fisch. et Mey., braunröthliche, ☉. f. Chili.
- Plagiolobum** Swt., Schieflappen XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
chorizemaefolium Swt., chorizemablättriger, ☿. t. Neuholl.
ilicifolium Swt., stechhülsenblättriger, ☿. t. Neuholland.
- Planera** J. F. Gmel. Mchx., (J. J. Planer, Professor d. Botanik zu Erfurt), IV. III., Urticaceae-Ulmaceae.
Abelicea R. et S., griechische, ☿. k. Creta.
Gmelini Mchx. (*aquatica* Gmel.) Gmelin's, ☿. k. f. b. Carolina.
Richardi Mchx., Richard's, ☿. f. b. k., Süddcaucasus, Nordamerika.
- Plantago** T. L., Wegetritt, IV. 1., Plantagineae.
adspersa Bernh., besprengter, ☿. k. f. b. Portugal, Aegypten.
afra L., afrikanischer, ☿. k. Sicilien, Nordafrika.
alpina L., Alpen-W., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
altissima Jacq. (*dalmatica* Schott.), höchster, 4. f. Ungarn, Krain, Frankreich, Italien.
amplexicaulis Cav., (*lagopoides* Dsf.), stengelumfassender, ☉. f. Spanien, Nordafrika.
argentea Lam., silberfarbiger, 4. f. Frankreich.
asiatica L. (*cordata* Lam., *glabra* Nutt.), asiatischer, 4. Sibirien, China, Nordamerika.
β) *depressa* W. *γ*) *kentuckensis* Mchx.
- Bellardi** All. (*pilosa* Pourret, *holostea* Lam., *sphaerocephala* R. et S., *lanata* Poir.), Bellardi's, ☉. f. Süd- und Westeuropa.
brasiliensis Sims, brasilianischer, 4. k. Brasilien.
brutia Tenor. (*uliginosa* Baumg.), neapolitanischer, 4. f. Calabrien, Siebenbürgen.
camtschatica Lk., kamtschatalischer, 4. f. Kamtschatka.
capensis Thbg., capischer, ☉. f. Cap der guten Hoffn.
ceratophylla Lk., (*coronopifolia* Brot.), ☉. f., hornblättriger. Portugal.
ciliata Dsf., gefranzter, ☉. f. Nordafrika.
Cornuti Gouan (*limosa* Kit. *Gouani* Gmel., *adriatica* Campan.), Cornuti's, 4. f. Südeuropa.
Coronopus L., krähenhufsblättriger, ☉. f. Europa.
β) *Jacquini* R. et S. (*Cornuti* Jacq., *Cupani* Guss.)
crassa W. (*bullata* Don., *crispa* Jacq., *crassifolia* Roth.), dickblättriger, 4. f. Italien.
Cumingiana Fisch. et Mey., Cuming's, 4. k. Chili.
Cynops L., (*genevensis* DC., *suffruticosa* Lam.) strauchartiger, ☿. f. Südeuropa, Sibirien.
decumbens Bernh., niederliegender, 4. f. Deutschland.
d'Urvillei DC., d'Urville's, 4. f. Chili, Neucalifornien.
elongata Pursh, verlängerter, 4. f. Nordamerika.
eristochya Tenor., wollähriger. ☉. f. Italien.

Plantago

- Eschscholtziana Fisch. et Mey., Eschscholtz, 4. f. b. k. Chili.
 exaltata Hornem., hoher, 4. f. ?
 garganica Tenor., gargarischer, ☉. f. Neapel.
 gentianoides Sm., enzianähnlicher, 4. k. Kleinasien.
 hirsuta Thbg., rauhaariger, 4. k. Cap der guten H.
 Hookeriana Fisch. et Mey., Hooker's, ☉. f. Texas.
 humifusa Bernh., niedergestreckter, 4. f. ?
 indica L., (*Psyllium* Auctor.) indischer, ☉. f. Ost-,
 Nord- und Südeuropa, Taurien, Sibirien, Ostindien.
 β) arenaria WK. γ) divaricata Zucc. (*rigida* Hort.
 δ) sicula Presl.
 Ispaghula Roxb., Ispaghula-W., ☉. f. Bengalen.
 Lagopus L. (*intermedia* Lapey., *arvensis* Presl.), hasen-
 fußähnlicher, ☉. f. Süd- und Westeuropa.
 lanceolata L., lanzettblättriger, 4. f. Europa, Asien,
 Nordamerika.
 b) variegata.
 β) hungarica WK. (*lanata* Portensch.) γ) pumila
 K. (*sphaerostachya* K.)
 Lessingii Fisch. et Mey., Lessing's, ☉. f. Sibirien, Mongol.
 Löfflingii L., Löffling's, ☉. f. Spanien, Cap d. g. H.
 lusitanica L. (*pseudolusitanica* Schrad.), portugiesischer,
 ☉. f. Portugal.
 macrophylla H. Par., großblättriger, ☉. f. ?
 macrorrhiza Poir. (*crithmoides* Dsf.) großwurzeliger, 4.
 f. Sicilien, Mauritanien.
 major L., größer, 4. f. Europa, Asien, Amerika,
 β) brasiliensis Fisch. et Mey., γ) scoparia, δ)
 bracteata Mch. (*rosea* Hort.), ε) minima DC.,
 (*nana* Tratt.), ζ) subsinuata Hornem., (*sinuata* Lam.)
 maritima L. (*Wulfenii* Spgl.), Meerstrands-W., 4. f.
 Europa.
 b) variegata, c) vivipara.
 β) dentata Roth., γ) ciliata K. (*alpina* Sbr., *gra-*
 minea Schlchr., *Wulfeni* M. et K.)
 maxima Jacq., (*cucullata* Lam.) größter, 4. f. Sibirien,
 Canada.
 media L., mittlerer, 4. f. Europa.
 mexicana Lk., mexicanischer, 4. k. Mexico.
 montana Lam. (*atrata* Hopp., *alpina* Vill., *sphaerocephala*
 Poir.), Berg-W., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
 notata Lagasc., bezeichneter, ☉. f. Spanien.
 parviflora Dsf., kleinblumiger, ☉. f. Nordafrika.
 patagonica Jacq., patagonischer, ☉. f. Patagonien.
 Preslii Tenor., Presl's, ☉. f. Sicilien.
 Psyllium L., betäubender, ☉. f. Süd- und Osteuropa.
 pumila L. (*exigua* Murr.) kleiner, ☉. f. Griechenland,
 Aegypten, Ostindien.
 recurvata L., zurückgekrümmter, 4. f. Südeurop., Kleinasien.
 salsa Pall., Salinen-W., 4. f. Sibirien, Taurien.
 saxatilis MB., Gesteins-W., 4. f. Caucasus.
 scorzoneraefolia Lam., haferwurzelblättriger, 4. f. Ar-
 menien.
 sericea W. K., (*capitata* Hopp.), seidenhaariger, 4. f.
 Ungarn, oesterreichisches Littorale.
 serpentina Lam. (*carinata* Schrad., *Wulfeni* Schrb., *su-*
bulata Wulf., *Gerardi* Schult., *Holosteum* Scop.),
 kielblättriger, 4. f. Südeuropa.
 β) longebracteata K.

Plantago

Serraria L., sägeblättriger, 4. f. Italien, Nordafrika.
sibirica Dsf., sibirischer, 4. f. Sibirien.

sparsiflora Mchx., (*interrupta* Poir., *pauciflora* Pursh.),
 zerstreutblumiger, 4. f. Nordamerika.

squarrosa Murray (*aegyptiaca* Jacq.), sparriger, 4. f.
 Aegypten.

stricta Schousb. (*rosetana* Poir.) steifer, 4. f. Spanien,
 Marocco, Aegypten.

subulata L. (*pungens* Lapey.), pfriemenförmiger. 4. f.
 Süd- und Westeuropa.

tenuiflora WK., dünnblumiger, 4. f. Ungarn.

teretifolia Sbr., rundblättriger, 4. f. b. k. Aegypten.

truncata Cham., abgestutzter, 4. k. Chili.

tumida Lk. (*chilensis* H. Par.) aufgeschwollener, 4. f. Chili.

vaginata Vent., scheidiger, 4. k. Mauritanien, Canari-
 sche Inseln.

varia RB., veränderlicher, 4. k. Neuholland.

velutina Poir. (*albicans* Schousb., *argentea* Ten.), weifs-
 haariger, 4. f. b. k. Calabrien, Marocco.

Victorialis Poir. (*argentea* Vill., *holosericea* Gaud., *pilosa*
 Kit., *nutans* Lam.), sammethaariger, 4. f. Südeuropa.

villosa Mch. (*lanata* W., *microcephala* W.) zottiger, 4.
 f. Ostindien, Persien.

virginica, L., virginischer, 4. f. Nordamerika.

Weldenii Rchb. (*parvula* et *pumila* Weld.), Welden's, 4.
 f. Dalmatien.

Platanthera Rich., Breitbeutel, XX. 1., Orchideae.

bifolia Rich., zweiblättriger, 4. Kn. f. Europa.

β) *brachyglossa* Wallr.

chlorantha Cust. (*virescens* Zollik. bif. β. *elatio* Gaud.),
 grünblumiger, 4. Kn. f. Mitteleuropa.

dilatata Hook., verbreiteter, 4. Kn. f. b. Canada.

orbicularis Hook., kreisförmiger, 4. Kn. f. b. Canada.

Platanus T. Platane, Kleiderbaum, XXI. 1., Amentaceae-Styracifluae (*Artocarpeae* Auct.).

acerifolia W. (*intermedia* Hort.), ahornblättriger, 4. f.
 Kleinasien.

b) *hispanica* Lodd. (*macrophylla* Cree.)

cuneata W. (*orientalis undulata* Ait.), keilblättriger, 4.
 f. Kleinasien.

occidentalis L., abendländischer, 4. f. Nordamerika.

b) *tortuosa* Hort.

orientalis L., morgenländischer, 4. f. b. Griechenland,
 Kleinasien, Caucasus.

Platycarpum H. B. K., Breitkapsel, XIV. 1., Personatae-Bignoniaceae.

orinocense H. B. K., Orinoco-B., 4. w. Orinoco.

Platychilum Delaun., Breitkrone, XVII. 1. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

Celsianum Delaun., Cels's, 4. t. Neuholland.

Platycodon A. DC., Prachtglocke, V. 1., Campanulaceae.

grandiflorus A. DC., großblumige, 4. f. Sibirien.

Platylobium Sm., Breitlappe, XVII. 1. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

formosum Sm., schöne, 4. t. Neusüdwallis.

Murrayanum Hook., Murray's, 4. t. Van-Diemens-Land.

obtusangulum Hook., stumpfkantige, 4. t. Van-Diemens-L.

ovatum Sbr., eiförmige, 4. t. Neuholland.

parviflorum Sm., kleinblumige, 4. t. Neusüdwallis.

Platylobium

triangulare RB., dreieckige, $\frac{5}{8}$ t. Van-Diemens-Land.

Platynema Schrad., Breitkraut, V. I., Asperifoliaceae.

dahuricum *, dahurisches, 4. f. b. Dahurien.

denticulatum *, gezähneltes, 4. f. b. Nordamerika.

marginatum *, berandetes, 4. f. Nordamerika.

maritimum *, Meerstrands-B., 4. f. Europa, Nordamerika.

paniculatum Schrad., rispenförmiges, 4. f. Nordamerika.

pulchrum * (virginicum Hort.), schönes, 4. f. b. Virg., Carol.

sibiricum *, sibirisches, 4. f. b. Sibirien.

Platypteris H. B. K., Breitflügel, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

crocata H. B. K., safranfarbiger, 4. w. Südamerika.

Platyspermum Hoffm., Breitsame, V. II., Umbelliferae.

litorale K., Seestrands-B., $\odot$ f. f. Caucasus.

muricatum Hoffm., weichstacheliger, $\odot$ f. Nordafrika.

orientale Hoffm., morgenländischer, $\odot$ f. Ostcaucasus.

pulcherrimum K., schönster, $\odot$ f. Caucasus.

grandiflorum M. et K. v. Orlaya grandiflora.

Platystemon Benth., Breitfädler, XIII. I., Papaveraceae.

californicum Benth., californischer, $\odot$ f. Californien.

leiocarpum Fisch. et Mey., glattfrüchtiger, $\odot$ f. Sibirien.

Platystigma Benth., Breitnarbe, XIII. I., Papaveraceae.

lineare Benth., gleichbreitblättrige, $\odot$ ♂ f. Californien.

Platystilis Swt., Breitgriffel, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

cyanea Swt., himmelblauer, 4. f. Caucasus.

digitata * (sessilifolia Swt), fingerförmiger, 4. f. Taurien.

Plectocephalus americanus D. Don v. Centaurea americana.**Plectranthus** L'Her., Spornblume, XIV. I., Labiatae.

asper Spgl., rauhe, $\frac{5}{8}$ w. Ostindien.

australis RB., südliche, $\odot$ m. Neuholland.

Coetsa D. Don Hamilt., Coesta-S., 4. t. Nepal.

coloratus D. Don., farbige, $\frac{5}{8}$ t. Nepal.

comosus Sims, schopfige, $\frac{5}{8}$ t. Nepal.

cordifolius D. Don., herzblättrige, $\frac{5}{8}$ t. Nepal.

fruticosus L'Her., strauchige, $\frac{5}{8}$ k. Cap der guten H.

galeatus Vahl., helmig, $\odot$ f. m. Nepal, Java.

graveolens RB., starkkriechende, $\frac{5}{8}$ k. t. Neuholland.

incanus Lk., weißgraue, 4. ?

mollis Spgl., weiche, $\odot$ f. m. Ostindien.

monachorum Spl., Mönchs-S., $\odot$ f. m. Ostindien.

parviflorus W., kleinblumige, $\frac{5}{8}$ w. Südamerika.

punctatus L'Her., punktirte, $\odot$ m. w. Abyssinien.

rotundifolius Spl., rundblättrige, $\odot$ m. w. Mascarenas.

scutellarioides RB., schildkrautähnliche, $\odot$ f. m. Ostindien.

secundus Roxb., einseitige, $\odot$ m. f. Ostindien.

strobiliferus Roxb., zapfenförmige, $\odot$ m. f. Ostindien.

ternatus Sims, dreizählige, 4. w. Madagascar.

ternifolius D. Don., dreiblättrige, $\odot$ $\frac{5}{8}$ t. Nepal.

thymiflorus Spl., thymianblumige, $\odot$ m. f. Ostindien.

barbatus Andr. (Forskolei W.) v. Coleus barbatus,

moschatus RB. v. Moschosma Brownii.

Plectritis DC., Spornling, III. I., Valerianeae.

congesta DC., gedrängthlummer, $\odot$ f. Nordamerika.

brachystemon Fisch. et Mey., kurzfadiger, $\odot$ f. Westliches Nordamerika

Plectronia L., Stachelsporn, V. I., Rhamneae.

corymbosa Burm. (ventosa L.), traubendoldiger, $\frac{5}{8}$ k.

Cap der guten Hoffnung.

- Pleea** Mchx., *Pleea*, IX. II., Colchicaceae.
tenuifolia Mchx., feinblättrige, 4. k. Carolina.
- Pleopeltis** H, B. K., Schildfarn, XXIV. I., Pteroidae.
ensifolia Carmich., schwertblättriger, 4. w. Cap der guten Hoffnung, ? Südamerika.
latifolia Lodd., breitblättriger, 4. w. Südamerika.
nuda Hook., D. Don, nackter, 4. w. Nepal.
- Pleroma** D. Don, Zellenbeere, X. I., Melastomaceae.
glomerata G. Don, knaulförmige, 5. w. Westindien.
granulosa D. Don, körnige, 5. w. Brasilien.
heteromalla D. Don (*coerulea* *), blaue, 5. w. Brasil.
holosericea D. Don, sammethaarige, 5. w. Brasilien.
viminea D. Don, ruthenförmige, 5. w. Brasilien.
- Pleurandra** LaBill., Rippenbeutel, XIII. II., Dilleniaceae.
acicularis LaBill., nadelförmiger, 5. t. Neuholland.
bracteata RB., deckblättriger, 5. t. Neuholland.
calycina Cunn., breitkelchiger, 5. t. Neuholland.
Cneorum DC., rosmarinblättriger, 5. t. Neuholland.
ericaefolia DC., heideblättriger, 5. t. Neuholland.
stricta Sieb., steifer, 5. t. Neuholland.
- Pleurospermum** Hoffm., Rippensame, V. II., Umbelliferae.
austriacum Hoffm., österreichischer, 4. f. Mittel- und osteuropäische Alpen, Sudeten, Thüringen.
Golacka Rehb. v. *Hladnikia golacensis* Nachtr.
- Pleurothallis** RB., Rippenstendel, XX. I., Orchideae.
aphthosa Lindl., dunkelgelber, 4. w. Mexico.
bicarinata Lindl., zweikieliger, 4. w. Brasilien.
ciliata K. et W., gefranzter, 4. w. Demerara.
foliosa Hook., blattreicher, 4. w. Brasilien.
Grobyi Lindl., Groby's, 4. w. Demerara.
Lanceana Lodd., Lance's, 4. w. Surinam.
marginata Lindl., herandeter, 4. w. Guatemala.
muscoidea Lindl., moosartiger, 4. w. ?
occulta K. et W., verborgenblumiger, 4. w. Brasilien.
ophiocephala Lindl., schlangenköpfiger, 4. w. Mexico.
pectinata Lindl., kammförmiger, 4. w. Brasilien.
picta Lindl., bemalter, 4. w. Demerara.
prolifera Herb., sprossender, 4. w. Südamerika.
racemiflora Lindl., traubenblumiger, 4. w. Westindien.
ruscifolia RB., mäusedornblättriger, 4. w. Caribäen, Südamerika.
saurocephala Lodd., eidechsenköpfiger, 4. w. Brasilien.
stenopetala G. Lodd., schmalkroniger, 4. w. Brasilien.
strupifolia Lindl., zungenblättriger, 4. w. Brasilien.
vittata Lindl., verschleierter, 4. w. Mexico.
coccinea Hook. v. *Rodriguezia secunda*. *emarginata* Lindl. v. *Physosiphon emarginatus*. *punctata* Lindl. v. *Notylia punctata*.
- Plocama** Ait., *Plocama*, V. I., Rubiaceae.
pendula Ait., überhängende, 5. k. Canarische Inseln.
- Pluchea subdecurrens* Cass. v. *Baccharis adnata*.
- Pluknetia** Plum. (L. Pluknet, alter englischer Botaniker), XXI. x. (XVI. VIII.), Tricoccae-Euphorbiaceae.
verrucosa Sm., warzige, 5. Sch. w. Surinam.
volubilis L., windende, 5. Sch. w. Westindien.
- Plumbago** T., Bleiwurz, V. I., Plantagineae-Plumbagineae.

Plumbago

capensis Thbg. (*coerulea* Hort.), capische, ♀. t. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *tristis* Ait.

coerulea Humb., blaue, 4. w. Peru.

europaea L., europäische, 4. f. Südeuropa.

lapathifolia W., ampferblättrige, 4. f. b. k. Iberien.

mexicana Humb., mexicanische, ♀. w. Mexico.

micrantha Ledeb., kleinblumige, 4. f. Sibirien.

occidentalis Scop. (*zeylanica* β. R. et S., *scandens* Hort. non L.), westliche, ♀. Sch. Westindien.

rhombifolia Hook., rautenblättrige, ☉. w. Südamerika.

rosea L., rosafarbige, ♀. w. Ostindien.

scandens L., kletternde, ♀. Sch. w. Neu-Granada.

zeylanica L., zeylonische, ♀. w. Ostindien, Neuholland.

Plumieria T. (C. Plumier, alter berühmter französischer Botaniker und Reisender), V. 1., Contortae-Apocynae.

acuminata Dryand. (*acutifolia* Poir.), zugespitzte, ♀. w. Ostindien, China.

alba L., weisse, ♀. w. Westindien.

bicolor R. et P., zweifarbige, ♀. w. Südamerika.

Blandfordiana Lodd., Blandford's. ♀. w. Südamerika.

conspicua Hort., ansehnliche, ♀. w. Südamerika.

Gouani D. Don, Gouan's, ♀. w. Mexico.

incarnata R. et P., fleischfarbige, ♀. w. Peru.

Lambertiana Lindl., Lambert's, ♀. w. Mexico.

leucantha Lodd., weissblumige, ♀. w. Südamerika.

longifolia Lam., langblättrige, ♀. w. Madagascar.

lutea R. et P., gelbe, ♀. w. Peru.

macrophylla Lodd., großblättrige, ♀. w. Peru.

mexicana Lodd., mexicanische, ♀. w. Mexico.

nivea Lodd., schneeweiße, ♀. w. Südamerika.

Northiana Lodd., North's, ♀. w. Südamerika.

obtusata L., stumpfblättrige, ♀. w. Westind., Südamer.

parvifolia Haw., kleinblättrige, ♀. w. Westindien.

pudica Jacq., schamhafte, ♀. w. Südamerika.

purpurea R. et P., purpurfarbige, ♀. w. Peru.

rubra L., rothe, ♀. w. Westindien, Südamerika.

tenuifolia Lodd., dünnblättrige, ♀. w. Südamerika.

tricolor R. et P., dreifarbige, ♀. w. Peru.

tuberculata Lodd., höckerige, ♀. w. St. Domingo.

Poa L., Rispengras, III. 11., Gramineae.

alpina L., Alpen-R., 4. f. Europäische Alpen und Voralpen.

β) *vivipara*. γ) *brevifolia* Gaud.

annua L., jähriges, ☉. ♂. f. Europa.

β) *varia* Gaud. (*supina* Schrad.).

aspera Jacq., rauhes, 4. w. Westindien.

australis RB., neuholländisches, 4. k. Neuholland.

brachyphylla Pursh, kurzblättriges, 4. f. Nordamerika.

bromoides Vahl, trespenähnliches, 4. w. Peru.

bulbosa L., knolliges, 4. Kn. f. Europa.

β) *vivipara* (*crispa* Thuill.).

caesia Sm. (*glauca* Poir.), hechtblaues, 4. f. Schottland, Schweiz, Schlesien etc.

β) *Gaudini* R. et S. (*aspera* Gaud.).

caespitosa Forst., rasenartiges, 4. k. Neuzeeland.

cenisia All. (*stolonifera* Bell., *distichophylla* Gaud.,

Poa

flexuosa Wahlbg.), Voralpen-R., 4. f. Europäische Alpen und Voralpen.

β) *Halleridis* R. et S. (*pallens* Gaud.).

collina Host. (*badensis* Haenk., *brevifolia* et *Koeleri* DC., *thermalis* P., *Molinieri* Balb., *brizoides* Wohlleb., *cenisia* Auctor.), Hügel-R., 4. f. Mittel- u. Osteuropa.
compressa L., flachhalmiges, 4. f. Europa.

β) *muralis* Wib.

concinna Gaud., nettes, 4. f. Südliche Schweiz.

decipiens RB., täuschendes, 4. k. Neuholland.

diandra RB., zweimänniges, 4. k. Neuholland.

*Drymeja** (*Festuca Drymeja* M. et K., *F. exaltata* Presl., *sylvatica* Host, *montana* Auctor.), Eichenwald-R., 4. f. Ost- und Südeuropa.

fertilis Host (*palustris* Roth, *serotina* Gaud., Ehrh., *effusa* Kit., *angustifolia* L. spec.), fruchtbares, 4. f. Europa.

hirsuta Mchx., rauhhaariges, 4. f. Carolina, Virginien.

hybrida Gaud. (*Festuca montana* Stbg.), Bastard-R., 4. f. Deutschland, Schweiz.

imbecilla Forst., schwaches, 4. k. Neuzeeland.

Langeana Rchb., Lange's, 4. f. Westdeutschland.

laxa Haenk. (*flexuosa* Sm.), lockeres, 4. f. Europäische Alpen und Voralpen.

limbata Lk., gesäumtes, 4. k. Nepal.

melicoidea Lk., perlgrasähnliches, 4. k. ?

microstachya Lk., kleinähriges, ☉. f. Monte-Video.

miliacea Lk. (*Aira mil.* Vill.), hirseähnliches, 4. f. Italien, Frankreich.

minor Gaud., kleines, 4. f. Schweiz, Steyermark, Tyrol.

nemoralis L., Hain-R., 4. f. Europa.

β) *firmula* Gaud. (*coarctata* Hall. fil., *variegata* Hort., *dubia* Sut., *Scheuchzeri* Sut., *caespitosa* Poir.). γ) *rigidula* K. (*palustris* DC., *polymorpha* Wib., *serotina* Schrad.). δ) *glauca* K. ε) *montana* Gaud. ζ) *depauperata* Kit.

nutans Lk. (*Festuca n.* Spgl.), nickendes, 4. f. Nordamer.

pratensis L. (*glabra* Ehrh., *angustifolia* Poll.), Wiesen-R., 4. f. Europa.

β) *latifolia* K. (*subcoerulea* Turn., *depressa* Presl, *humilis* Ehrh.). γ) *angustifolia* L., Sm. δ) *anceps* Gaud.

pumila Host, kleines, 4. f. Krain.

speciosa R. et S. (*elegans* RB.), prächtiges, 4. k. Neuholl.

sterilis MB., unfruchtbares, 4. f. Taurien.

sudetica Haenk. (*rubens* Mchx., *sylvatica* Vill., *quadripedalis* Ehrh., *trinervata* DC.), Riesengebirgs-R., 4. f. Europa.

sylvatica Poll. (*trinervata* Ehrh., *Festuca sylvatica* Vill., *calamaria* Host.), Wald-R., 4. f. Europa.

versicolor Bess., buntfarbiges, 4. f. Podolien, Aleutische Inseln.

viridis Mühlbg., grünes, 4. f. Nordamerika.

agrostidea DC. vid. *Airopsis* Candollei. *airioides* Koel., *aquatica* L. etc. v. *Glyceria aquatica*, *specabilis* etc. *arundinacea* Lk. (et *semineutra* Trin.) v. *Aira arundinacea* etc. *capillaris* L. (*caroliniana* Spgl. et *chinensis* Lk. E., *ciliaris* L.) etc. v. *Eragrostis capillaris*, *verticillata* etc. *cristata* Murray

Poa

etc. vid. *Koeleria cristata*. *decumbens* Schrad. vid. *Triodia decumbens*. *disticha* Wulf. vid. *Oreochloa disticha*, *dura* Scop. etc. v. *Sclerochloa dura*. *litoralis* Gouan etc. v. *Dactylis litoralis* etc. *obtusata* Lk. v. *Glyceria pensylvanica*. *pulchella* Stev. vid. *Sclerochloa rigida*. *quinquefida* Pursh v. *Tridens quinquefida*. *sicula* Jacq. v. *Brizopyrum siculum*. *tenax* Lk. vid. *Festuca tenax*. *virgata* Roth vid. *Leptochloa filiformis*.

Pocockia Sering. (Richard Pococke, ein englischer Bischof, welcher die Levante bereiste), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

cretica Sering, kretische, ☉. f. Creta.

Podalyria Lam. (Podalirius, Sohn des Aesculapius), Podalirie, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

biflora W. (*argentea* Salisb.), zweiblumige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Burchellii DC., Burchell's, ♀. k. t. Cap der gut. H. *buxifolia* W., buchsbaumblättrige, ♀. k. t. C. d. g. H. *calyptata* W., behaubte, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn. *cordata* RB., herzblättrige, ♀. k. t. Cap der gut. H. *cuneifolia* Vent., keilblättrige, ♀. k. t. Cap d. gut. H. *glauca* DC., blaugrüne, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn. *hirsuta* W., rauhhaarige, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn. *liparioides* DC., lipariaähnliche, ♀. k. t. Cap d. g. H. *myrtillifolia* W., heidelbeerblättrige, ♀. k. t. Cap der guten Hoffnung.

oleaefolia Salisb., ölbaumblättrige, ♀. k. t. C. d. g. H. *sericea* RB., seidenhaarige, ♀. k. t. Cap der gut. H. *styracifolia* Sims, styraxblättrige, ♀. k. t. Cap d. g. H. *subbiflora* DC., fastzweiblumige, ♀. k. t. Cap d. g. H. *alba* W. etc. v. *Baptisia alba* etc. *alpina* W. (et *lupinoides* W.) vid. *Thermopsis corgonensis* et *lan- ceolata*. *obcordata* Lam. v. *Requienia obcordata*.

Podanthes Haw. v. *Stapelia*. *Podanthus Mitiqui* Lindl. v. *Euxenia Mitiqui*.

Podocarpus L'Her., Stielfrucht, XXI. x., Coniferae-Taxineae.

chinensis Swt., chinesische, ♀. k. t. China. *elongatus* L'Her., verlängerte, ♀. k. t. Cap d. gut. H. *macrophyllus* Swt., großblättrige, ♀. k. t. China, Japan. *neriifolius* Lamb., oleanderblättrige, ♀. w. Amboina, Nepal. *nucifer* P., nufstragende, ♀. k. t. Japan. *spinulosus* Spgl., feinstachelige, ♀. k. t. Neuholland. *taxifolius* H. B. K., taxusblättrige, ♀. w. Südamerika. *verticillatus* Hort., wirtelblättrige, ♀. t. Japan. *Yacca* G. Don, *Yacca-St.*, ♀. w. Westindien.

asplenifolius La Bill. v. *Phyllocladus rhomboidalis*.

Podolepis La Bill., Stielschuppe, XIX. II., Compositae-Helichryseae.

acuminata Ait., zugespitzte, ? 4. m. Neusüdwallis. *aristata* Benth., grannige, ? ☉. f. m. Neuholland. *contorta* Lindl., gedrehte, ☉. ? 4. f. m. t. V. Diem. L. *gracilis* Graham, schlanke, ☉. f. m. Neuholland. *rugata* La Bill., gefaltete, ♀. t. Südliches Neuholland.

Podolobium RB., Hülsenfufs, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

coriaceum DC., lederblättriger, ♀. t. Neuholland.

Podolobium

heterophyllum Cunn., verschiedenblättriger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholl.
 staurophyllum Sieb. (*Aquifolium* Lodd.), stechhülsen-
 blättriger, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.

scandens DC., kletternder, $\frac{1}{2}$ Sch. t. Neuholland.

(β) humifusum DC.

trilobatum RB., dreilappiger, $\frac{1}{2}$ t. Neusüdwallis.

Podophyllum L., Entenfufs, XIII. 1., Papaveraceae-Podophylleae.

peltatum L., schildblättriger, 4. f. Nordamerika.

diphyllum L. v. Jeffersonia diphylla.

Podopterus H. B. K., Flügelfufs, VI. 1., Portulacaceae-Polygoneae.

mexicanus H. B. K., mexicanischer, $\frac{1}{2}$ t. k. Mexico.

Podoria senegalensis P. v. Boscia senegalensis.**Podosaemum foliosum** Lk., *mexicanum* Lk., *soboliferum*

Lk. vid. Cinna filiformis, mexicana, sobolifera. *glomeratum* Lk. (et *tenuiflorum* Lk.) vid. Mühlenbergia glomerata et Willdenowii. *pungens* Lk. et *virginicum* Lk. v. Sporobolus pungens et virginicus.

Podosperma angustifolia LaBill. v. Podotheca angustifol.**Podospermum** DC., Fufssame, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

calcitrapifolium DC. (*resedifolium* DC.), sterndistelblättriger, $\frac{1}{2}$ 4. f. Mittel-, Süd-, West- und Osteuropa, Nordafrika.

canum C. A. Mey., weifsgrauer, $\frac{1}{2}$ f. Caucasus.

coronopifolium DC. (Dsf.), krähenfufsblättriger, $\frac{1}{2}$ 4. f. b. k. Nordafrika.

intermedium Guss., mittlerer, $\frac{1}{2}$ f. Ober- und Süditalien, Südfrankreich, Caucasus, Persien.

Jacquini K., Jacquin's, 4. f. Unterösterreich, Mähren.

laciniatum DC. (*octangulare* Lk.), schlitzblättriger, $\frac{1}{2}$ f. Europa.

(β) muricatum DC.

pumilum DC. (Cav.), kleiner, $\odot$ f. Spanien.

Tenorii DC., Tenore's, $\frac{1}{2}$ 4. f. Calabrien.

Podostigma Ell., Stielsäulchen, V. 11., Asclepiadeae.

pubescens Ell., weichhaariges, 4. k. Carolina.

Podotheca Cass., Podotheca, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

angustifolia Cass., schmalblättrige, $\odot$ f. m. Südliches Neuholland.

Pogonia RB., Bartorche, XX. 1., Orchideae.

divaricata RB., ausgesperrte, 4. Kn. f. b. k. Nordamer.

ophioglossoides Ker., natterzungenähnliche, 4. Kn. k. Nordamerika.

pendula Spgl., überhängende, 4. Kn. f. b. k. Nordamer.

Pogonia debilis Andr., *glabra* Andr. v. Myoporum debile et ellipticum.**Pogostemon** Dsf., Haarfaden, XIV. 1., Labiatae.

plectranthoides Dsf., spornblumenähnlicher, $\frac{1}{2}$ k. ?

Poinciana L. (M. de Poinci, Gouverneur der Antillen), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

elata L., hohe, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

Gilliesii Hook., Gillies's, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.

insignis H. B. K., ausgezeichnete, $\frac{1}{2}$ w. ?

pulcherrima L., schönste, $\frac{1}{2}$ w. Ost- und Westindien.

regia Boj., königliche, $\frac{1}{2}$ w. Madagascar.

tarra R. et P. v. Coulteria tinctoria.

- Poinsettia** Grah. (M. Poinsette, welcher Mexico bereiste), ? XI. III., Tricoccae-Euphorbiaceae.
pulcherrima Grah., schönste, ♀. t. w. Mexico.
 β) *albida* Hensl.
- Poiretia** Vent. (J. L. M. Poiret, französischer Botaniker und Reisender), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
scandens Vent. (*punctata* Vent.), klimmende, ♀. Sch. w. Westindien.
- Poiretia elliptica** Sm., *linearis* Sm. vid. *Hovea elliptica* et *linearis*.
- Poitea** Vent. (Poiteau, französischer Botaniker und Reisender). XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
galegiformis Spgl. (*galegioides* Vent.), galegaähnliche, 4. ♀. w. Hispaniola.
- Poivreia** Commers. (N. Poivre, Gouverneur der Insel Mauritius), X. I., Onagrariae-Combretaceae.
Afzelii (G. Don), Afzelius's, ♀. Sch. w. Sierra Leone.
barbata (G. Don), bärtige, ♀. Sch. w. Südamerika.
coccinea DC., scharlachfarbige, ♀. Sch. w. Madagascar.
comosa (G. Don), schopfige, ♀. Sch. w. Sierra Leone.
decandra (Roxb.), zehnmännige, ♀. Sch. w. Ostindien.
intermedia (G. Don), mittlere, ♀. Sch. w. Sierra Leone.
- Polanisia** Rafin., Polanisie, XI. I., Capparideae.
Chelidonii DC., schöllkrautähnliche, ♂. m. f. Ostindien.
dodecandra DC., zwölfmännige, 4. m. f. Ostindien.
graveolens Rafin., starkriechende, 4. f. Canada.
uniglandulosa DC., eindrüsige, 4. f. Mexico.
viscosa DC., schmierige, 4. m. f. Ostindien.
 β) *icosandra* DC.
- Polemonium** T., Sperrkraut, V. I., Polemoniaceae.
bursifolium W., täschelkrautblättriges, 4. f. b. Mexico.
coeruleum L., gemeines, 4. f. Europa, Nordasien.
 b) *album*. c) *maculatum*. d) *variegatum*.
 β) *gracile* W.
dissectum Rchb., schlitzblättriges, 4. f. ? Sibirien.
 b) *album*.
humile Pall., niedriges, 4. f. Sibirien.
lacteum Lehm., milchweißes, 4. f. ?
mexicanum Cerv., mexicanisches, 4. f. b. Mexico.
moschatum Wormsk., moschusduftendes, 4. f. Nordamer.
pulcherrimum Hook., schönstes, 4. f. Nordamerika.
reptans L., kriechendes, 4. f. Nordamerika.
 b) *majus* J. C.
- Richardsonii* Grah., Richardson's, 4. f. Nordamerika.
sibiricum Don, sibirisches, 4. f. Sibirien.
villosum Rudolp., zottiges, 4. f. Sibirien.
- Polianthes** L., Tuberose, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.
gracilis Lk., schlanke, 4. Zw. t. Brasilien.
tuberosa L., gemeine, 4. Zw. t. Mexico.
- Pollichia** Soland (J. A. Pollich, deutscher Botaniker), I. I., Portulacae-Paronychieae.
campestris Ait., Feld-P., ♂. k. Cap der guten Hoffn.
- Pollichia Galeobdolon** Schr. v. *Galeobdolon luteum*.
- Pollinia** Spgl. (C. Pollini, Professor der Botanik zu Verona), III. II. (XXIII. I.), Gramineae.
distachya Spgl., zweijährige, 4. f. Südeuropa.
striata Spgl., gestreifte, 4. w. Malabar, Neuholland.
undata Spgl., wellenblättrige, 4. w. Mascarenas.
Gryllus Spgl. v. *Chrysopogon Gryllus*.

Polyactidium DC., Vielkraut, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

delphinifolium DC., ritterspornblättriges, ♂. k. t. Südamer.

Polybotrya H. B. K., Vieltraubenfarn, XXIV. I., Pterioideae.

acuminata Lk. et Otto, zugespitzter, 4. w. ? Westind.

cervina Kaulf., geweihähnlicher, 4. w. Westindien.

Raddiana Kaulf., Raddi's, 4. w. Brasilien.

vivipara H. B. K., lebendiggebärender, 4. w. Ostind.

Polycarpaea Lam., Vielsamler, V. I., Portulacae-Paronychieae.

alsinefolia (Bivon.), mierenähnlicher, ☉. f. Sicilien.

aristata (Ait.), granniger, ☿. k. Canarische Inseln.

Bivoniana * (*Mollia Polycarpon* Spgl., *Hagaea polycarpoides* Bivon.), Bivone's, 4. k. Sicilien.

fragilis Delil., spröder, ☉. f. Aegypten.

indica Lam. (*Mollia corymbosa* W.), indischer, ☿. w. Ceylon.

latifolia (W.), breitblättriger, ☿. k. Canarische Inseln.

memphitica Delil. (*Mollia gnaphalodes* W.), aegyptischer, ☿. k. Nordafrika.

minuartioides (R. et S.), minuartiaähnlicher, ☉. f. Span. stellata (W.), (et *Lahaya tenuifolia* R. et S.), sternförmiger, ☿. w. Guinea.

Teneriffae Lam. (*Mollia diffusa* W.), weitschweifiger, 4. f. Teneriffa.

Polycarpon Loeffl., Wirtelkraut, III. III., Portulacae-Paronychieae.

tetraphyllum L., vierblättriges, ☉. f. Europa, Nordamerika, Südafrika.

β) diphyllum Cav.

Polychaetia Tausch. v. Tolpis.

Polycnemum L., Knorpelkraut, III. I., Aizoideae-Amarantheae.

arvense L. (*inundatum* Schrk. et *pumilum* Hoppe), Acker-K., ☉. f. Europa.

β) recurvum Lois.

brachiatum Pall. (*oppositifolium* R. et S.), armförmiges, ☉. f. Südrussland.

malacophyllum MB., weichblättriges, ☉. f. Caucasus.

sclerospermum Pall., hartsamiges, ☉. f. Taurien, Mittelasien.

sibiricum Pall., sibirisches, ☉. f. Sibirien.

Polygala T., Kreuzblume, XVII. II., Polygalaceae.

alpestris Rchb. (*Vaillantii* Bess., *hybrida* DC.), Vor-alpen-K., 4. ☿. f. Schweiz, Frankreich, Volhynien.

amara L. (*Amarella* Crtz), bittere, 4. ☿. f. Schweden, Mittel- und Ostdeutschland, Norditalien.

β) amblyptera Rchb. (*buxifolia* Rchb., *thuringiaca* Spgl.).

ambigua Nutt., zweifelhafte, ☉. f. Nordamerika.

borboniaefolia Burch. (*oppositaefolia* Bot. mag.), borbonienblättrige, ☿. k. t. Cap der guten Hoffnung.

bracteolata L., deckblättrige, ☿. k. t. Cap d. gut. H.

brevifolia Nutt., kurzblättrige, ☉. f. Nordamerika.

Burmanni DC. (*microlopha* Burch.), Burmann's, ☿. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Chamaebuxus L., buchsbaumblättrige, ☿. f. Mittel- und Süddeutschland.

comosa Schk., schopfige, 4. f. Deutschland.

cordifolia Thbg., herzblättrige, ☿. k. t. Cap d. g. H.

Polygala

cruciata L., kreuzblättrige, ☉. f. Nordamerika.
depressa Wender. (*serpyllacea* Weih.), quendelähnliche,
4. ♀. f. Deutschland.

fastigiata Nutt., gipfelständige, ☉. f. Nordamerika.
flavescens DC., gelbliche, 4. ♀. f. b. k. Italien.
Garcini DC., Garcin's, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.
genistoides Poir., ginsterähnliche, ♀. k. t. C. d. g. H.
graminifolia Poir., grasblättrige, 4. f. b. k. Carolina.
grandiflora Lodd., großblumige, ♀. k. t. Cap d. g. H.
Hohenackeri Fisch. et Mey., Hohenacker's, 4. f. Süd-
russland.

incarnata L., fleischfarbige, ☉. f. Nordamerika.
intermedia DC., mittlere, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.
lanceolata Lodd., lanzettblättrige, ♀. k. t. C. d. g. H.
latifolia Ker, breitblättrige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.
ligularis Ker (*tenuifolia* Lk.), bandförmige, ♀. k. t. Cap
der guten Hoffnung.

?liliifolia Mack. C., lilienblättrige, ♀. k. t. C. d. g. H.
lutea L., gelbe, ☉. f. Nordamerika.

major Jacq., große, 4. ♀. f. Süd- und Osteuropa.

monspeliaca L., südfranzösische, ♂. 4. f. b. k. Süd-
und Westeuropa.

myrtifolia L., myrtenblättrige, ♀. k. t. Cap d. g. H.
nana DC. (*viridescens* Nutt.), zwergige, ☉. f. Nordamer.
niccaensis Riss, Nizzaer, 4. ♀. f. b. Oberitalien.

Nummularia Burch., rundblättrige, ♀. k. t. Cap
der guten Hoffnung.

oppositifolia L., gegenblättrige, ♀. k. t. Cap d. g. H.
β) major Lindl.

paniculata L., rispige, ☉. w. Westindien, Westafrika.

paucifolia W., wenigblättrige, 4. f. b. Nordamerika.

purpurea Nutt. (*sanguinea* Mchx.), purpurfarbige, ☉. f.
Nordamerika.

rubella W. Pursh (*polygama* Walt.), röthliche, 4. f. b.
Nordamerika.

sanguinea L. (*viridescens* Poir.), blutrothe, ☉. f. Nordamer.
Senega L., maryländische, 4. f. b. k. Nordamerika.

simplex Burch., einfache, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

speciosa Sims, prächtige, ♀. k. t. Cap der gut. Hoffn.

teretifolia L. (*pinifolia* Lam.), rundblättrige, ♀. k. t.
Cap der guten Hoffnung.

tetragona Burch., vierseitige, ♀. k. t. Cap der gut. H.

thesioides W. (*gracilis* et *longifolia* Lodd.), thesium-
ähnliche, ♀. t. Chili, Brasilien.

uliginosa Rchb. (*austriaca* Crtz), Sumpf-K., 4. ♀. f.
Mittel- und Osteuropa.

umbellata Thbg., doldige, ☉. f. m. Cap der gut. H.

verticillata L., wirtelblättrige, 4. f. Nordamerika.

virgata Thbg., ruthenförmige, ♀. k. t. Cap d. gut. H.

vulgaris L., gemeine, 4. ♀. f. Europa.

β) oxyptera Rchb. (*multicaulis* Tausch, *monspe-*
liaca Auct.). γ) alpestris K. (*densiflora* Tausch.).

alopecuroides L. etc. v. *Muraltia alopecuroides* etc.,
spinosa L. v. *Mundia spinosa*.

Polygonatum T., Weiswurz, VI. I., Sarmetaceae (*Asparagineae*).

angustifolium Pursh., schmalblättrige, 4. f. Nordamerika.

canaliculatum Pursh., rinnenförmige, 4. f. Nordamerika.

hirtum (Lam.), kurzhaarige, 4. f. Nordamerika.

Polygonatum

- latifolium Dsf., breitblättrige, 4. f. Osteuropa.
 leptophyllum D. Don, schlankblättrige, 4. k. Nepal.
 macrophyllum Swt. (*latifolium* Pursh.), großblättrige,
 4. f. Nordamerika.
 multiflorum Mch., vielblumige, 4. f. Europa.

β) bracteatum (Thom.)

- oppositifolium D. Don, gegenblättrige, 4. k. Nepal.
 polyanthemum (MB.), häufigblumige, 4. f. Caucasus.
 pubescens Push., weichhaarige, 4. f. Nordamerika.
 verticillatum Mch., wirtelblättrige, 4. Europa.
 vulgare Dsf. (*anceps* Mch.), gemeine, 4. f. Europa.

b) flore pleno, c) minor.

Polygonum T., Knöterig, VIII. III., Portulacaceae-Polygonaceae.

- acetosum MB., saurer, ☉. 4. Sch. f. Krim.
 acidulum W., säuerlicher, 4. f. Sibirien.
 acutatum Lehm., zugespitzter, 4. f. ?
 adpressum RB., angedrückter, ⚭. Sch. k. Neuholland.
 alpinum All., Alpen-K., 4. f. Schweiz, Italien.
 amphibium L., Wasser-K., 4. Wa. f. Europa, Asien.

β) terestre (*hirsutum*), γ) maritimum Dethar.

- amplexicaule D. Don, stengelumfassender, 4. k. t. Nepal.
 arenarium Wk., Sand-K., ☉. f. Ungarn.
 arifolium L., zehrwurzblättriger, ☉. Sch. f. Nordamerika.
 articulatum L., gegliederter, ☉. f. Nordamerika.
 australe Spgl. ? P. (*glandulosum* RB.), neuholländischer,
 ♂. k. Neuholland.

- aviculare L., Vogel-K., ☉. f. Europa, Asien, Nordam.

β) erectum Roth.

- barbatum L., bärtiger, 4. f. b. k. China, Japan.
 Bellardi All., (*patulum* MB., *geniculatum* Poir.), Bellar-
 dis, ☉. f. Italien, österreichisches Litorale, Taurien.
 Bistorta L., Wiesen-K. (Natterwurz), 4. f. Europa,
 Mittelasien, Nordamerika.

β) longifolium Fisch. et Mey., Dahurien, γ) nitens

- Fisch. et Mey., Altai, δ) bistortoides Pursh, Nordam.
 chinense L., chinesischer, ☉. Sch. f. China.
 cilinode Mchx., franzenknotiger, ☉. Sch. f. Canada.
 coccineum Mühlbg., scharlachfarbiger, 4. Wa. f. Nordam.
 Convolvulus L., windender, ☉. Sch. f. Europa, Asien,
 Nordamerika.

- cymosum Trevir, afterdoldiger, ☉. f. Nepal.
 decipiens RB., täuschender, 4. k. Neuholland.
 diffusum Pall., weitschweifiger, 4. f. Sibirien.
 divaricatum L., ausgesperrter, 4. f. Sibirien.
 Donianum, Spgl. (*affine* D. Don), Don's, 4. k. Nepal.
 Dryandri Spgl. (*elegans* Dryand), Dryander's, ☉. f.
 Ostindien.

- elegans Ten., zierlicher, 4. ⚭. f. b. k. Neapel.
 ellipticum W., elliptischer, 4. f. Sibirien.
 emarginatum Roth., ausgerandeter, ☉. f. China.
 equisetiforme Sm., schachtelhalmähnlicher, ⚭. k. Aegypten,
 Griechenland, Süditalien.

- erectum L., aufrechter, ☉. f. Nordamerika.
 Fagopyrum L., Buchweizen-K. (Heidekorn), ☉. f. Japan,
 Sibirien.
 floribundum Schltdl., blüthenreicher, ☉. f. Sibirien.
 glabrum Roxb. W., kahler, ☉. f. m. Ostindien.
 glaucum Nutt., blaugrüner, 4. f. Nordamerika.

Polygonum

gracile RB., schlanker, 4. k. Neuholland.
 herniarioides Delil., bruchkrautähnlicher, 4. k. Aegypten.
 hirsutum Walt., rauhhaariger, ①. f. Südcarolina.
 Hydropiper L., scharfer, ①. f. Europa.
 injucundum, Bot. reg., unlieblicher, 4. k. t. Valparaiso.
 lapathifolium L. (*pensylvanicum* Curt.), ampferblättriger,
 ①. f. Europa.

β) *incanum* Schm., (*tomentosum* Schrk.)

Laxmanni Lep. (*davuricum* W.), Laxmann's, 4. f. Dahurien.
 litorale Lk. (*flagellare* Bertol.), Ufer-K., 4. 4. f. b. k.
 Südeuropa.

macrophyllum D. Don, großblättriger, 4. f. b. k. Nepal.
 maritimum L., Seestrand-K., 4. f. b. k. Südeuropa.
 minus Huds. (*pusillum* Lam., *strictum* All., *angustifolium*
 Roth.), kleiner, ①. f. Europa.

mite Schrk. (*laxiflorum* Weih., *dubium* Stein, *Braunii*,
 Blff. et Fing.), gelinder, ①. f. Deutschland etc.

niloticum Leh., ägyptischer, 4. Wa. k. Nordafrika.

nodosum P., dickknotiger, ①. f. Europa.

ocreatum L., grofstütiger, 4. f. Sibirien.

orientale L., morgenländischer, ①. f. Mittelasien, Nord-
 amerika, Neuholland.

b) *album*.

oxyspermum Ledeb., sauersamiger, 4. f. Rußland.

patens D. Don, abstehender, 4. f. b. k. Nepal.

pensylvanicum L., pensylvanischer, ①. f. Nordamerika.

Persicaria L., Flöhkraut-K., ①. f. Europa, Asien, Nordam.

persicarioides H. B. K., flöhkrautähnlicher, ①. f. Mexico.

petiolatum D. Don, langstieliger, 4. f. b. k. Nepal.

plebejum RB., gemeiner neuholländischer, 4. k. Neuh.

ramosissimum Mchx., ästiger, ①. f. Nordamerika.

sagittatum L., pfeilblättriger, ①. Sch. f. Nordamerika.

salignum W., weidenblättriger, 4. f. Sibirien.

salsugineum MB., Salz-K., 4. Wa. f. Südrußland.

scandens L., klimmender, 4. Sch. f. Nordamerika.

senegalense Mill., senegal'scher, ①. Wa. f. Guinea.

sericeum Pall., seidenhaariger, 4. f. Sibirien.

setosum Jacq., borstiger, 4. 4. f. b. k. Kleinasien.

tataricum L., tatarischer, ①. f. Tatarei.

tinctorium Lour. Ait., färbender, ♂. k. Südchina.

undulatum Murr. (*acidum* Pall.), wellenblättriger, 4. f.
 Sibirien.

virginianum L., virginischer, 4. f. Nordamerika.

viviparum L., lebendiggebärender, 4. Europäische Al-
 pen, Mittelasien.

caucasicum Hoffn., (*crispulum* Sims.) *frutescens* L.

et *polygamum* Vent. v. *Tragopyrum buxifolium lan-*
ceolatum et polygamum.

Polymnia L., Polymnie, XIX. iv., Compositae - Co-
 rymbiferae.

aspera Mart., rauhe, 4. k. Mexico.

canadensis L., canadische, 4. f. Canada.

maculata Cav., gefleckte, 4. k. Mexico.

Uvedalia L., carolinische, 4. f. b. k. Nordamerika.

abyssinica L. v. *Guizotia oleifera*.

Polypodium T., Tüpfelfarn, XXIV. I., Pterioideae.
 (*Polypodiaceae*).

alpestre Hoppe (*rhaeticum* DC., *molle* All.), Voralpen-
 T., 4. f. Salzburg, Dauphiné, Oberitalien.

Polypodium

- angustifolium Sw., schmalblättriger, 4. w. Westindien, Brasilien.
- areolatum H. B. K., maschenartiger, 4. w. Neugranada.
- asplenifolium L., strichfarnähnlicher, 4. w. Westindien, Mascarenas.
- attenuatum W., verschmälter, 4. w. Caribäen.
- aureum L., goldfarbiger, 4. w. Westindien.
- auriculatum Presl., geöhrt, 4. w. Brasilien.
- Billardieri RB. (*scandens* Labill.), La-Billardière's, 4. w. Van-Diemens-Land.
- Brownianum Spgl. (*attenuatum* RB.), Brown's, 4. w. Neuholland.
- calcareum Sm. (*Dryopteris* Bolt.), kalkliebender, 4. f. England, Mittel- und Südeuropa, Canada.
- Catharinae Fisch., Catharinen-T., 4. w. Insel Catharina bei Brasilien.
- ciliatum W., gefranzter, 4. w. Südamerika.
- connectile Michx., verbundener, 4. f. Canada.
- crassifolium L., dickblättriger, 4. w. Westindien.
- crenatum Sw., gekerbter, 4. w. Westindien.
- curvatum Sw., gekrümmter, 4. w. Jamaika.
- decumanum W., großer, 4. w. Brasilien.
- deflexum Kaulf., herabgebogener, 4. w. Brasilien.
- dissimile L., ungleicher, 4. w. Jamaika.
- drepanum J. Bevis, sichelförmiger, 4. t. w. Madeira.
- Dryopteris L., Eichenwald-T., 4. f. Europa, Nordasien.
- effusum Sw., weitausgebreiteter, 4. w. Westindien.
- fraxinifolium Jacq., eschenblättriger, 4. w. Neugranada.
- hastatum Thbg., spontonförmiger, 4. w. Japan.
- heterophyllum L., verschiedenblättriger, 4. w. Westind.
- hexagonopterum Mchx., sechsseitiger, 4. f. b. k. Nordam.
- jamaicense Desv., jamaikaischer, 4. w. Jamaika.
- incanum Sw., weißgrauer, 4. w. Westindien.
- incisum Sw., eingeschnittener, 4. w. Westindien.
- irioides Poir., irisblättriger, 4. w. Mascarenas, Neuholl.
- juglandifolium Humb., wallnufsblättriger, 4. w. Neugran.
- lanceolatum L., lanzettblättriger, 4. w. Westindien, Neugranada.
- latipes Fisch., breitstieliger, 4. w. Brasilien.
- lycopodioides L., bärlappähnlicher, 4. w. Westindien.
- nitidum Kaulf., glänzender, 4. w. Südamerika.
- olivaceum J. Bev., olivengrüner, 4. w. Südamerika.
- Otites L., tiefspaltiger, 4. w. Westindien.
- ovariense, Desv., owarischer, 4. w. Guinea.
- Paradiseae Fisch., paradisischer, 4. w. Brasilien.
- pectinatum L., kammförmiger, 4. w. Westindien.
- Phegopteris L., Buchenwald-T., 4. f. Europa.
- Phyllitidis L., Hirschzungen-T., 4. w. Westindien.
- phymatodes L., ceylonischer, 4. w. Ostindien.
- piloselloides L., mausöhrchenblättriger, 4. w. Westind.
- plantagineum Jacq. (*latifolium* Vahl), wegrittähnlicher, 4. w. Caribäen.
- Plumula H. B. K., federähnlicher, 4. w. Südamerika.
- polyanthum H. Liv., vielhäufiger, 4. w. Brasilien.
- Preslianum Spgl. (*longifolium* Presl.), Presl's, 4. w. Brasil.
- proliferum Kaulf. (*viviparum* J. Bevis), sprossender, 4. w. Brasilien.
- pustulatum Forst., blätteriger, 4. w. t. Neusseeland.
- quercifolium L., eichenblättriger, 4. w. Ostindien.

Polypodium

- repandum Sw., randschweifiger, 4. w. Jamaika.
 repens L., kriechender, 4. w. Westindien.
 salicifolium W., weidenblättriger, Neugranada, Brasil.
 Schkuhrii Raddi, Schkuhr's, 4. w. Brasilien.
 scolopendrioides L., hirschzungenähnlicher, 4. w. Westind.
 serpens L., schlangenähnlicher, 4. w. Westindien.
 simile L., gleichförmiger, 4. w. Jamaika.
 stigmosum Sw., brandfarbiger, 4. w. Java.
 taeniosum H.B.K., bandwurmförmiger, 4. w. Neugran.
 tenellum Forst., zarter, 4. w. Neuholland.
 tetragonum Sw., vierseitiger, 4. w. Westindien.
 trichomanoides Sw., trichomanesähnlicher, 4. w. Westindien, Neugranada.
 trifurcatum L., dreigabeliger, 4. w. Martinique.
 tuberosum J. Bevis, knolliger, 4. kn. w. Westindien.
 vacciniifolium Fisch., heidelbeerblättriger, 4. w. Brasil.
 virginianum L., virginischer, 4. k. w. Virginien, Westind.
 vulgare L., gemeiner (Engelsüfs) 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

β) *cambricum* L.

Noch findet man Nachstehende in den Gartenverzeichnissen: *caespitosum concinnum*, *harpeodes*, *sporodocarpum*.

adnascens Sw. etc. v. *Nipholobolus adnascens* etc. *Filix foemina* L. etc. v. *Asplenium Filix foem.* etc. *Filix mas.* etc. v. *Aspidium Filix mas.* etc. *Grammitidis* RB. v. *Xiphopteris serrulata*. Hinsichtlich der übrigen s. die Gattungen: *Allantodia*, *Cheilanthes*, *Gynnogramma* et *Meniscium*.

Polypogon Dsf., Vielbartgras, III. II., Gramineae.

litoralis Sm., Ufer-V., 4. f. England, Norddeutschland, Spanien.

maritimus W. (*tataricus* Fisch.), Seestrands-V., 4. f. Westfrankreich, Sibirien, Ostindien.

monspeliensis Dsf., südliches, 4. f. Südeuropa, Nord- und Südafrika, Orient, Montevideo.

strictus N. E., steifes, 4. f. Cap der guten Hoffnung.

fasciculatus P. (*subspicatus* W.) v. *Chaeturus fasciculatus*, *glomeratus* W. v. *Muehlenbergia glomerata*.

Polypteris Nutt., Vielspreublättchen, XIX. I., Compositae-Eupatorineae.

integrifolia Nutt., ganzblättriges, 4. f. Nordamerika.

Polyspora Swt., Fächersame, XVI. VIII., Evonyneae-Camellaceae.

axillaris Swt., achselblumiger, 4. w. Ostindien.

Polystachya Hook., Vielährenstendel, XX. I., Orchideae.

grandiflora Lindl., großblumiger, 4. w. Sierra Leone.

luteola Hook., gelblicher, 4. w. Westindien, ? Ostind.

puberula Lindl., feinhaariger, 4. w. Sierra Leone.

ramulosa Lindl., ästige, 4. w. Sierra Leone.

zeylanica Lindl. (*Dendrobium polystachyum* Thouars), zeylonischer, 4. w. Ceylon, Madagascar.

Pomaderris La Bill (*Pomatoderris* Hffmng.), V. I., Wersenstrauch.

androsaemifolia Cunn., androsaemunblättriger, 4. k. Neusüdwalis.

apetala La Bill., kronenloser, 4. k. Neuholland.

betulina Cunn., birkenähnlicher, 4. k. Neusüdwallis.

capsularis G. Don, kapseltragender, 4. k. Südseeinseln.

Pomaderris

discolor Vent., (*acuminata* Lk.), verschiedenfarbiger, ♂. k. Neuholland.

elliptica La Bill., elliptischer, ♂. k. Neuholland.

globulosa G. Don, kugelförmiger, ♂. k. Neuholland.

intermedia Sbr., mittlerer, ♂. k. Neuholland.

lanigera Sims, wolliger, ♂. k. Neuholland.

ledifolia Cunn., porstblättriger, ♂. k. Neuholland.

phillyreoides Sieb., steinlindenähnlicher, ♂. k. Neuholl.

phylicaeifolia, Lodd., phylakablättriger, ♂. k. Neuholl.

spathulata G. Don, spathelförmiger, ♂. k. Neuholland.

Wendlandiana Swt., Wendland's, ♂. k. Neuholland.

Pombalia Vand. (Marquis v. Pombal, berühmter portugiesischer Minister), V. 1., Violaceae.

Ipecacuanha Vand., Brechwurzel-P., ♂. w. Brasilien.

Ituba Ging., brasilianische, 4. w. Brasilien.

Ponczetia RB. (M. Ponczet, französischer Botaniker), V. 1., Epacrideae.

sprengelioides RB., sprengeliaähnliche, ♂. t. Neuholl.

Ponera Lindl., Ponera, XX. 1., Orchideae.

graminifolia Lindl., grasblättrige, 4. w. Südamerika.

juncifolia Lindl., simsblättrige, 4. w. Südamerika.

Pongamia Lam. (indianischer Name), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

glabra Vent. P., kahle, ♂. w. Ostindien.

grandiflora Vent., großblumige, ♂. w. Ostindien.

Piscidia Roxb., piscidiaähnliche, ♂. w. Ostindien.

sericea Vent., seidenhaarige, ♂. w. Java.

uliginosa DC., sumpfliebende, ♂. w. Westindien.

Pontederia L. (Julius Ponteder, Professor der Botanik zu Padua), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae (?Commelinaceae).

angustifolia Pursh., schmalblättrige, 4. Wa. f. b. k. Nordam.

azurea Sw., azurblaue, 4. Wa. w. Jamaika.

coerulea Maund, blaue, 4. Wa. f. k. Nordamerika.

cordata L., herzblättrige, 4. Wa. k. Virginien.

crassipes Mart., dickstielige, 4. Wa. w. Brasilien.

dilatata Buchan., verbreiterte, 4. Wa. w. Ostindien.

lanceolata Nutt. (*lancifolia* Mühlbg. Ell.), lanzettblättrige, Wa. k. Georgien, Carolina.

Ponthieuia RB. (von Ponthieu, welcher an Baronet Banks Pflanzen sendete), XX. 1., Orchideae.

glandulosa RB. drüsige, 4. w. Westindien.

petiolata Lindl., langstielige, 4. w. Caribäen.

Populus T., Pappel, XXII. VII. (VIII. 1.), Amentaceae.

alba L., (*major* Mill., *nivea* W.) weiß, ♂. f. Europa, Asien.

angulata Ait., (*heterophylla* du Roi, *macrophylla* Lodd.

angulosa Mchx., *balsamifera* Mill.), kantenästige, ♂. f. Virginien, Florida.

b) nova Audib., c) Medusae Booth.

balsamifera L. (*Tacamahaca* Mill.), Balsam-P., ♂. f. Nordamerika, Sibirien.

b) viminalis Lodd. (*salicifolia* Hort., *longifolia*

Fischer), c) latifolia Hort., d) intermedia Hort.,

e) suaveolens Fisch., f) variegat. Mill.

betulifolia Pursh, (*nigra* et *hudsonica* Mchx., *hudsoniana* Bosc.), birkenblättrige, ♂. f. Canada.

candicans Ait. (*macrophylla* Lindl., *latifolia* Mch., *ontariensis* Dsf., *cordata* Lodd., *canadensis* Mch.), weißliche, ♂. f. Nordamerika.

Populus

canescens Sm., (*alba* Mill.), weißgrau, ♀. f. Europa, Asien.
 b) hybrida MB. (*intermedia* Mertens, *grisea* Lodd.),
 c) acerifolia Lodd. (*quercifolia* et *palmata* Hort.),
 d) arembergica Lodd., e) candicans Lodd., f)
 aegyptiaca Hort. (*pallida* Hort.), g) pendula, i)
 belgica Lodd.

dilatata Ait. (*fastigiata* Dsf., *italica* du Roi, *pyramidata*
 Mch., *pannonica* Jacq.), italienische, 4. f. Italien.

graeca Ait., griechische, ♀. f. Griechenland.

grandidentata Mchx., großzahnige, ♀. f. Canada.

β) pendula Mchx.

heterophylla L. (*cordifolia* Burgsd., *argentea* Mchx.),
 verschiedenblättrige, ♀. f. Nordamerika.

laevigata Ait. (*canadensis* Mchx., *monilifera* H. Par.),
 glattblättrige, ♀. f. Nordamerika.

marylandica Bosc., maryländische, ♀. f. Maryland.

monilifera Ait. (*carolinensis* Mch., *canadensis* Burgsd.,
glandulosa Mch., ? *acladesca* Lindl.), canadische, ♀.
 f. Nordamerika.

b) Lindleyana Booth., c) fol. variegat. Hort.

nigra L., schwarze, f. Europa.

b) viridis Lodd., c) salicifolia Lodd.

tremula L., Zitter-P., ♀. f. Europa.

a) monticola Mertens, b) parvifolia Mertens, c)

c) rotundifolia major Mertens, d) grandifolia
 Mert., e) minor Mert., f) oxyodonta Mert., g) stricta
 Mertens, h) pendula Lodd., i) supina Lodd.

trepida Mühlenb. (*tremuloides* Mchx.), langstielige, ♀.
 f. Nordamerika.

Porana Burm., Porana, V. I., Convolvulaceae.

volubilis Burm., windende, ♀. Sch. w. Ostindien.

paniculata Roxb. et *racemosa* Jacq. fil. v. *Dinetus*
paniculata etc.

Poranthera Rudg., Porenbeutel, V. III., Corniculatae-
 Cunoniaceae.

ericaefolia Rudg., heideblättriger, ♀. t. k. Neuholland.

Porcelia grandiflora P. etc. v. *Asimina grandiflora* etc.

Porliera R. et P. (P. A. Porlier, ein Spanier, Beför-
 derer der Pflanzenkunde), VIII. I., Zygophylleae.

hygrometrica R. et P., hygrometrische, ♀. w. Peru, Chili.

Porophyllum decumbens DC. *ellipticum* Cass. et *linifolium*
 DC. v. *Kleinia decumbens*, *Porophyllum* et *suffruticosa*.

Pörtenschlagia australis Tratt. v. *Elaeodendron australe*.

Portlandia L. (Herzogin von Portland, eine große
 Gönnerin der Botanik), V. I., Rubiaceae.

coccinea Sw., scharlachfarbige, ♀. w. Jamaika.

grandiflora L., großblumige, ♀. w. Jamaika.

hexandra L. Jacq. v. *Coutarea speciosa*.

Portulaca T., Portulack, XI. I., Portulacaceae.

foliosa Lindl., blattreicher, ☉. f. m. Guinea.

Gilliesii Hook., Gillies's 4. ♀. t. k. Chili.

grandiflora Hook., großblumiger, 4. Kn. t. k. Chili.

β) lutea Ait.

guineensis Lindl., guineischer, ☉. f. m. Guinea.

halimoides L., meldenähnlicher, ☉. f. m. Jamaika.

involucrata Haw., hüblblumiger, ☉. f. ?

meridiana L., mittagsblühender, ☉. m. f. Ostindien.

mucronata H. Vidob. Lk., weichspitziger, ☉. m. f. ?

Portulaca

oleracea L. (*olerac. a sylvestris* DC.), gemeiner, ☉. f.

Mittel- und Südeuropa, Südamerika.

parvifolia Haw., kleinblättriger, ☉. m. f. Jamaika.

pilosa L., haariger, ☉. m. f. Südamerika.

pusilla H. B. K., niedrigster, ☉. m. f. Südamerika.

quadrifida L., vierspaltiger, ☉. m. f. Aegypten.

sativa Haw., (*latifolia* Hornem., *oleracea* β. *sativa* DC.), gebauter, ☉. f. Südamerika, Mittel- u. Südeuropa.

crassifolia Jacq., *cuneifolia* Vahl, *fruticosa* L. (*paniculata* L.), *racemosa* L. etc. v. *Talinum* *crassifol.* *cuneifol.* *fruticosum*, *triangulare* etc.

Portulacaria Jacq., Portulackstrauch, V. III., Portulacaceae.

afra Jacq., afrikanischer, ♂. t. Cap der guten Hoffn.

Posoqueria Aubl. (guianischer Name), V. I., Rubiaceae.

gracilis R. et S., schlanke, ♂. w. Guiana.

longiflora Aubl., langblumige, ♂. w. Guiana.

fragrans Wall., *nutans* Roxb. Wall. et *longispina*

Roxb. Wall. v. *Gardenia fragrans*, *nutans* et *longispina*.

Potamogeton T., Samenkraut, IV. IV., Alismaceae-Pontamophileae (*Najadeae*).

acutifolius Lk., spitzblättriges, 4. Wa. f. Europa.

compressus L. (*zosteraefolius* Schum., *complanatus* W., *cuspidatus* Schrad.), flachstengeliges, 4. Wa. Europa.

crispus L., krauses, 4. Wa. f. Europa.

densus L., dichtblättriges, 4. Wa. f. Mitteleuropa. ♂

β) *serratus* L. (*oppositifolius* DC.) γ) *setaceus* L. (*oppositifol.* β. *lancifol.* DC.)

fluitans Roth (*oblongus* Mey.), fließendes, 4. Wa. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa.

gramineus L. (*heterophyllus* Schreb.), grasartiges, 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.

β) *heterophyllus* Fr. (*hybridus* Thuil., *augustanus* Balb., *distachyus* Bell., *crassipes* Kit.). γ) *Zizii* Cham. et Schldtl.

Hornemanni Mey. (*coloratus* Hornem., *plantagineus* Ducros), 4. Wa. f. Nord- und Westdeutschland, Schweiz.

lanceolatus Sm., lanzettblättriges, 4. Wa. f. England.

longifolius Gay (*macrophyllus* Wolfgang), langblättriges, 4. Wa. f. Nordfrankreich, Südrussland.

lucens L. (*serratus* Web.), glänzendes, 4. Wa. f. Europa, Asien.

marinus L. (*filiformis* P., *setaceus* Schum.), Meer-S., 4. Wa. f. Nordeuropa.

natans L., gemeines, 4. Wa. f. Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Antillen.

β) *parnassifolius* Schrad., γ) *oblongus* Viv.

nitens Web. (*curvifolius* Hartm.), schimmerndes, 4. Wa. f. Nordeuropa.

a) *salicifolius* Fr. (*gramineus* Wahlbg.). β) *heterophyllus* Fr. (*lacustris* Cham.)

obtusifolius M. et K. (*gramineus* Sm., *compressus* Roth), stumpfblättriges, 4. Wa. f. Europa.

pectinatus L., kammblättriges, 4. Wa. f. Europa, Asien, Nord- und Südamerika.

perfoliatus L., durchwachsenblättriges, 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.

β) *Loeselii* R. et S.

praelongus Wulf. (*lucens* Web., *flexuosus* Schlchr., *flexi-*

Patamogeton

caulis Dethard., *acuminatus* Wahlbg.), verlängertes,
4. Wa. f. Europa.

pusillus L., kleinstes, 4. Wa. f. Europa.

a) *major* Fr. β) *vulgaris* Fr. γ) *tenuissimus*
M. et K.

rufescens Schrad. (*semipellucidus* K. et Ziz.), *obscurus*
DC., *serratus* Roth, *fluitans* Sm., *annulatus* Bell.,
alpinus Balb., *purpurascens* Seidel, *obtusius* Ducros),
rothbraunes, 4. Wa. f. Europa.

sparganifolius Laestad., *sparganiumblättriges*, 4. Wa. f.
Schweden.

spathulatus Schrad., *spatelblättriges*, 4. Wa. f. West-
deutschland, Nordamerika.

zosteraceus Fr., *zosteraähnliches*, 4. Wa. f. Schweden.

Potamophila RB., Flußgras, VI. 1. (XXIII. 1.),
Gramineae.

parviflora RB., kleinblumiges, 4. Wa. k. t. Neuholland.

Potamophila parviflora Schrk. v. *Microtea maypurensis*.

Potentilla L., Fingerkraut, XII. v., Rosaceae.

agrimonoides MB., odernennigähnliches, 4. f. Arme-
nien, Caucasus.

alba L., weißes, 4. f. Europa, Caucasus.

alchemilloides Lapeyr., frauenmantelähnliches, 4. f. b.
k. Pyrenäen.

Anserina L., Gänserich-F., 4. f. Europa, Asien, Nordamer.

apennina Tenor., apenninisches, 4. f. b. k. Apenninen.

arachnoidea Dougl., spinnewebenartiges, 4. f. Nordamer.

argentea L., silberfarbiges, 4. f. Europa, Asien, Nordam.

β) *sordida* Fr. γ) *impolita* Wahlbg.

arguta Pursh (*confertiflora* Torr., *missurica* Hornem.,
candicans Fisch.), spitzzähniges, 4. f. Nordamerika.

astracantha Jacq., astracantisches, 4. f. Caucasus, Astracan.

ambigua Gaud. (*intermedia* Hegetsch., *alpestris* var. Hall-
fil., *geranioides* Schleich., *aurea* γ. *pectinata* Sering.)
zweifelhaftes, 4. f. Südliche Schweiz.

atrosanguinea D. Don, blutrothes, 4. f. Nepal.

b) *coccinea*. c) *fulgens*. d) *ignescens*.

aurea L. (*Halleri* Sering), goldfarbiges, 4. f. Euro-
päische Alpen.

biflora W., zweiblumiges, 4. f. Ostsibirien.

bifurca L., zweigabeliges, 4. f. Caucasus, Sibirien.

β) *subsericea* Sering.

hipinnatifida Dougl. (*arguta* Lehm. non Pursh), doppelt-
federspaltiges, 4. f. Nordamerika.

bithynica Hornem., bithynisches, 4. f. Bithynien.

Bocconi Nestl., Boccone's, 4. f. b. k. Apenninen.

calabra Tenor., calabrisches, 4. f. b. Unteritalien, Sicilien.

canadensis L., canadisches, 4. f. Nordamerika.

candicans H. B. K., weißliches, 4. k. Mexico.

caulescens L., stengeliges, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

chrysantha Trevir., goldblumiges, 4. f. Mittel- und
Südeuropa.

cicutarifolia W., cicutablättriges, 4. f. Kleinasien.

cinerea Chaix (*arenaria* Borkh., *incana* Mch., *ovata* Poir.),
aschgraues, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

Clusiana Jacq., Clusius's, 4. f. b. Tyrol, Salzburg,
Steiermark, Oesterreich.

collina Wib. (*canescens* Hartm.), Hügel-F., 4. f. Deutsch-
land, Schweden.

Potentilla

crocea Hall. fil. (*salisburgensis* Haenk., *rubens* Vill., *aurea* Sm., *alpestris* Hall. fil., *dubia* Sut.), safranfarbiges, 4. f. Europäische Alpen.

β) *affinis* Host. γ) *filiformis* DC. (*alpestris* Host).
δ) *debilis* Schlchr.

dealbata Lodd., weifsblättriges, 4. f. Altai.

declinata Hornem., niedergebogenes, 4. f. ?

effusa Dougl., langstieliges, 4. f. Nordamerika.

Egedii Wormsk., Egede's, 4. f. Grönland.

*elatio*r Schltld., höheres, 4. f. ? Sibirien.

Filipendula W., filipendulablättriges, 4. f. Dahurien.

flagellaris W., ausläufertreibendes, 4. f. Ostindien.

formosa D. Don (*nepalensis* Hook), schönes, 4. f. Nepal.

b) *Garnieriana* Hort. c) *Mayana* Hort.

Fragariastrum Ehrh. (*Fragaria* Sm., *fragarioides* Vill., *fragariaefolia* Gmel., *Fragaria sterilis* L., *Comarum fragarioides* Roth), Erdbeer-F., 4. f. Europa, Caucasus, Japan.

frigida Vill. (*glacialis* Hall. fil., *helvetica* Schl.), kaltes, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

fruticosa L., strauchiges, 4. f. Nordeuropa, Asien, Nordamerika.

β) *dahurica* Nestl. γ) *tenuifolia* Schltld. (*floribunda* Pursh.).

geoides MB., geumähnliches, 4. f. Taurien.

geranioides W., storchschnabelähnliches, 4. f. Kleinasien, Armenien.

glabra Lodd., kahles, 4. f. Dahurien.

glandulosa Lindl., drüsiges, 4. f. Californien.

β) *incisa* Lindl.

glaucophylla Lehm., blaugrünblättriges, 4. f. Nordamer.

gracilis Dougl., schlankes, 4. f. Nordamerika.

grandiflora L., großblumiges, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen, Caucasus, Sibirien.

Güntheri Pohl (*Wiemanniana* Günth.), Günther's, 4. f. Schlesien, Böhmen, Südschweden.

haematochrus Lehm., blutfarbiges, 4. k. Mexico.

Hippiana Lehmann (*dealbata* Dougl., *leucophylla* Torrey), *Hippiani's*, 4. f. Nordamerika.

hirsuta Mchx., rauhhaariges, 4. f. Nordamerika.

hirta L. (*pilosa* Vill.), kurzhaariges, 4. f. Mittel- und Südeuropa, Sibirien.

β) *angustifolia* DC.

humifusa Nutt., niedergestrecktes, 4. f. Nordamerika.

hybrida Wallr., Bastard-F., 4. f. Thüringen.

incisa Dsf., eingeschnittenes, 4. f. ?

inclinata Vill. (*canescens* Bess., *adscendens* W., *intermedia* Wahlbg., *recta* Jacq.), einwärtsgeneigtes, 4. f. Mittel- und Osteuropa, Caucasus.

intermedia L., mittleres, 4. f. Schweiz, Frankreich.

laciniosa Kit., schlitzbältriges, 4. f. Ungarn, österreichisches Litorale.

leucophylla Pall. (*angustifolia* W. Lehm.), weifsblättriges, 4. f. Ostsibirien.

Lindackeri Tausch., Lindacker's, 4. f. Böhmen.

lineariloba M. et S., gleichbreitlappiges, 4. k. Mexico.

lineata Trevir. (*splendens* D. Dou, *Siemersiana* Lehm.), linirtes, 4. f. b. k. Nepal.

Potentilla

Loddigesii Spgl. (*vinosa* Lodd., Ledeb.), Loddiges's, 4. f. Sibirien.

lupinoides W. (*valderia* Vill., *nivalis* Lapeyr.), wolfsbohnenähnliches, 4. f. b. k. Dauphiné, Pyrenäen.

macrantha Ledeb., großkroniges, 4. f. Ostsibirien.

micrantha Ram. (*breviscapa* Vest.), kleinblumiges, 4. f. Frankreich, Schweiz, Untersteiermark.

millegrana Dougl., vielkörniges, 4. f. Nordamerika.

minima Hall. fil. (*Brauniana* Hoppe), kleinstes, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

mollissima Lehm., weichblättriges, 4. f. ?

monspeliensis L., südfranzösisches, 4. f. Südfrankreich.

Morisonii DC., Morison's, 4. f. Südeuropa.

multifida L., vieltheiliges, 4. f. Schweiz, Schweden, Oberitalien, Taurien, Sibirien.

β) *angustifolia*.

nitida L. Jacq. (*multidentata* Sering.), glänzendes, 4. f. b. k. Mittel- und südeuropäische Alpen.

nivea L., schneeweißes, 4. f. Mittel- u. nordeurop. Alpen. β) *macrophylla* Sering.

norwegica L. (*dichotoma* Mch., *geminiflora* Schrk.), norwegisches, 4. f. Nord-, Mittel- und Osteuropa, Mittelasien.

β) *ruthenica* W. (*diffusa* W.).

obscura W. (*pilosa* W., *recta* Vill.), dunkles, 4. f. Mittel- und Westeuropa, Taurien, Sibirien.

ontopoda Dougl., dickstieliges, 4. f. Nordamerika,

opaca L., dunkles, 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

ornithopoda Tausch, vogelklauenähnliches, 4. f. ?

patula W.Kit., abstehendes, 4. f. Mähren, Schlesien, Ungarn.

pectinata Fisch., kammlättriges, 4. f. Nordamerika.

pedata W. (*rubens* All.), fußförmiges, 4. f. Oesterreichisches Litorale, Oberitalien.

pensylvanica L. (*hispida* Poir.), pensylvanisches, 4. f. Nordamerika.

petiolata Gaud., kurzstieliges, 4. f. Schweiz.

petraea W., Gesteins-F., 4. f. Nordpersien.

pimpinelloides L., bibernellähnliches, 4. f. b. k. Armen.

pumila Poir., kleines, 4. f. Nordamerika.

recta L. (*pallens* Mch., *sulphurea* Lam.), gerades, 4. f. Europa, Caucasus.

reptans L., kriechendes, 4. f. Europa, Nordasien.

b) *flore pleno* J. C. c) *variegata* J. C.

Richardsonii Dougl., Richardson's, 4. f. Nordamerika.

rupestris L., Felsen-F., 4. f. Europa, Sibirien.

Salesovii W., Salesow's, 4. f. Sibirien.

Sanguisorba W., wiesenkopfähnliches, 4. f. Sibirien.

sarmentosa W. (*caroliniana* Poir., *simplex* Mch.), wurzelrankiges, 4. f. Nordamerika.

sericea L., seidenhaariges, 4. f. Sibirien.

speciosa W., prächtiges, 4. f. b. k. Creta, Parnassus.

splendens Ram. (*Vaillantii* Nestl., *montana* Schrad.), schimmerndes, 4. f. Frankreich, Pyrenäen.

Sprengeliana Lehm. (*fragarioides* Hort.), Sprengel's, 4. f. Sibirien.

stipularis L., zwischenblättriges, 4. f. Sibirien.

stolonifera Lehm., sprossendes, 4. f. ?

subcaulis Wulf., stengellooses, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

Potentilla

- supina L., niedriges, ☉. f. Europa, Asien, Nordamerika.
 taurica W. (*hirta* MB.), taurisches, 4. f. Taurien.
 Thomasii Tenor., Thomas's, 4. f. Neapel.
 thuringiaca Bernh. (*parviflora* Gaud.), thüringisches, 4. f. Thüringen, Schweiz.
 tridentata Soland. (*retusa* Retz), dreizähniges, 4. f. Schottland, Grönland, Canada.
 umbrosa Stev., schattenliebendes, 4. f. Taurien.
 uniflora Ledeb., einblumiges, 4. f. Sibirien.
 Valderia All. (*lanata* Lam.), weißfilziges, 4. f. b. k. Oberitalienische Alpen.
 velutina Lehm. (*subacaulis* DC. ? L.), sammethaariges, 4. f. b. Südfrankreich.
 verna L., Frühlings-F., 4. f. Europa, Nordamerika.
 β) aestiva Gaud. γ) pusilla Host.
 verticillaris W. (*multifida* Pall.), wirtelblättriges, 4. f. Sibirien.
 villosa Pall., zottiges, 4. f. Aleutische Inseln, Nordamer.
 virgata Lehm. (*elongata* Bess.), ruthenförmiges, 4. f. Podolien.
 viscosa Donn (*hispida* Nestl., W. E., *pensylvanica* Horn.), schmieriges, 4. f. Sibirien, Taurien.
 Weinmanni Lodd., Weinmann's, 4. f. ? Südrussland.
 Hybriden: Russeliana Swt., Hopwoodiana Swt., Mackayana Swt., tormentillo-formosa Tong. (*Tonguei* Hort., *nemoralis-formosa* Hort.), ferruginea Paxt., conferta, atrosanguineo-pedata Maund. etc. *nemoralis* Nestl. (et *Tormentilla* Schrk., Sibth.) v. *Tormentilla reptans et erecta. palustris* Scop. v. *Comarum palustre*.

Poterium L., Becherblume, XXI. ix. (XIII. ii.), Rosaceae-Sanguisorbeae.

- agrimonifolium Cav., odermennigblättrige, 4. k. Spanien.
 ancistroides Dsf., ancistrumähnliche, 4. k. Nordafrika.
 caudatum Ait., geschwänzte, 4. k. Canarische Inseln.
 hybridum L., Bastard-B., 4. f. Frankreich.
 polygamum W. K., vielehige, 4. f. Ungarn, österreichisches Litorale.
 Sanguisorba L., gemeine, 4. f. Europa.
 β) guestphalicum v. Bönningh.
 spinosum L., dornige, 4. k. Sicilien, Creta, Syrien.
Pothos L. (ceylanischer Name), IV. i. (XXI. i.), Aroideae.
 acaulis L. (*Scolopendrium* Spgl.), stammloser, 4. w. Westindien.
 angustatus H. B. K., verschmälert, 4. w. Südamer.
 cannaefolius Curt., blumenrohrblättriger, 4. w. Südamerika, Westindien.
 cordatus L., herzblättriger, 4. w. Südamerika.
 coriaceus Grah., lederblättriger, 4. w. Brasilien.
 crassinervius Jacq., dicknerviger, 4. w. Südamerika.
 crenatus L., gekerbter, 4. w. Caribäen.
 decursivus Roxb., herablaufender, 4. w. Ostindien.
 digitatus Jacq., fingerförmiger, 4. w. Südamerika.
 giganteus Roxb., riesenhafter, 4. w. Ostindien.
 glaucus Lk. et Otto, blaugrüner, 4. w. Mexico.
 Harrisii Grah., Harris's, 4. w. Brasilien.
 heterophyllus Roxb., verschiedenblättriger, 4. w. Ostind.
 lanceolatus L., lanzettblättriger, 4. w. Südamerika.
 Lasia Roxb., stacheliger, 4. w. Ostindien.

Pothos

longifolius Lk. et Otto, langblättriger, 4. w. Brasilien.
macrophyllus Sw. (*grandifolius* Jacq.), großblättriger,
 4. w. Westindien, Südamerika.

microphyllus Hook., kleinblättriger, 4. w. Brasilien.
obtusifolius Ait., stumpfblättriger, 4. w. Barbados.

officinalis Roxb., officineller, 4. w. Bengalen.

palmatus L., handförmiger, 4. w. Südamerika.

pedatus H. B. K., fußförmiger, 4. w. Neu-Granada.

Peepla Roxb., *Peepla-P.*, 4. w. Ostindien.

pentaphyllus W., fünfblättriger, 4. w. Cayenne.

pertusus Roxb., durchbrochener, 4. w. Ostindien.

pinnatus L., gefiederter, 4. w. Molucken.

reflexus Lk. et Otto, zurückgebogener, 4. w. Brasilien.

reptans Lk. et Otto, kriechender, 5. Sch. w. Brasilien.

rubescens Lk. et Otto, röthlicher, 4. w. Brasilien.

rubrinervius Lk., rothnerviger, 4. w. Südamerika.

sagittatus Sims (*subsagittatus* H. B. K.), pfeilblättriger,
 4. w. Westindien.

scandens L., klimmender, 4. Sch. w. Ostindien, Nepal.

violaceus Sw., violetter, 4. w. Westindien.

foetidus Sims vid. *Symplocarpus foetidus*. *gracilis*
 Rudg. v. *Anthurium gracile*.

Poupartia Commers., Poupartie, X. iv., Amyrideae-Terebinthaceae.

borbonica J. F. Gmel., Lam., borbonische, 5. w. Mascarenas.

Pourretia R. et P. (A. Pourret, französischer Botaniker),
 VI. i., Bromeliaceae.

coarctata R. et P., gedrängtblumige, 4. w. Chili.

coerulea Miers, blaue, 4. w. Chili.

magnispatha Coll., großsscheidige, 4. w. Chili.

pyramidata R. et P., pyramidale, 4. w. Südamerika.

rubricaulis Miers, rothstengelige, 4. w. Chili.

Prasium L., Nicoline, XIV. i., Labiatae.

majus L., grofse, 5. k. Süditalien, Nordafrika.

minus L., kleine, 5. k. Corsica, Südfrankreich, Creta.

Prasophyllum RB., Lauchstendel, XX. i., Orchideae.

elatum RB., hoher, 4. Kn. t. w. Neuholland.

fimbriatum RB., gefranzter, 4. Kn. t. w. Neuholland.

flavum RB., hellgelber, 4. Kn. t. w. Neuholland.

fuscum RB., brauner, 4. Kn. t. w. Neuholland.

patens RB., absteher, 4. Kn. t. w. Neuholland.

rufum RB., fuchsrother, 4. Kn. t. w. Neuholland.

striatum RB., gestreifter, 4. Kn. t. w. Neuholland.

Premna L., Stammeiserich, XIV. i., Verbenaceae.

asperima Wall., rauhester, 5. w. Ostindien.

esculenta ? Roxb., genießbarer, 5. w. Ostindien.

integrifolia L., ganzblättriger, 5. w. Ostindien.

reticulata Juss., netzförmiger, 5. w. Jamaica.

Prenanthes Vaill., Hasenlattich, XIX. i., Cichoriaceae.

alba L. (*suavis* Salisb.), weißer, 4. f. Nordamerika.

altissima L., höchster, 4. f. Nordamerika.

aspera Schrad., rauher, 4. f. ?

cordata W., herzblättriger, 4. f. Nordamerika.

deltoidea MB., deltaförmiger, 4. f. Iberien.

hispida Pall., steifhaariger, 4. f. Ural.

purpurea L., purpurfarbiger, 4. f. Mittel-, Süd- und
 Ostdeutschland, Italien.

racemosa Mchx., traubiger, 4. f. Canada.

Prenanthes

rubicunda W. (*autumnalis* Gronow), röthlicher, 4. f.

Pensylvanien, Virginien.

Serpentaria Pursh, Schlangen-H., 4. f. Nordamerika.

virgata Mchx., ruthenförmiger, 4. f. Nordamerika.

tenuifolia L., feinblättriger, 4. f. Schweiz, Italien.

tuberosa Steven (*hispida* MB.), knolliger, 4. Kn. f.

Armenien, Iberien,

arborea Brouss. (et *pinnata* L. et *spinosa* Brouss.)

vid. *Sonchus arboreus*, *leptocephalus* et *spinosus*.

chondrilloides Ard. vid. *Chondrilla prenanthoides*.

japonica L. vid. *Youngia japonica*, *muralis* L. v.

Lactuca muralis. *viminea* L. v. *Phoenixopus vimineus* Nachtr.

viscosa Baung. (*hieracifolia* W.,

pulchra DC.) v. *Crepis pulchra*.

Prescotia Lindl. (John Prescott, ein zu Petersburg lebender Engländer), XX. 1., Orchideae.

colorans Lindl., farbige, 4. w. Brasilien.

lanceaefolia Lk. et Otto, lanzettblättrige, 4. w. Südamer.

plantaginifolia Lindl., wegetrittblättrige, 4. w. Brasilien.

Prestonia RB. (C. Preston, M. Dr., Freund des Rajus), V. 1., Contortae-Apocynae.

glabrata Bonpl., kahle, 5. Sch. w. Quito.

tomentosa RB., filzige, 5. Sch. w. Brasilien.

Priestleya DC. (M. Priestley, englischer Naturforscher), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

axillaris DC., achselblumige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.

capitata DC., kopfförmige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.

elliptica DC., elliptische, 5. t. Cap der guten Hoffn.

ericaefolia DC., heideblättrige, 5. t. Cap der gut. H.

graminifolia DC., grasblättrige, 5. t. Cap der gut. H.

hirsuta DC., rauhhaarige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.

laevigata DC., glatte, 5. t. Cap der guten Hoffnung.

myrtifolia DC., myrtenblättrige, 5. t. Cap d. gut. H.

sericea DC., seidenhaarige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.

teres DC., rundblättrige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.

tomentosa DC., filzige, 5. t. Cap der guten Hoffnung.

umbellifera DC., doldige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.

vestita DC., bekleidete, 5. t. Cap der gut. Hoffnung.

villosa DC., zottige, 5. t. Cap der guten Hoffnung.

Primula T., Primel (Schlüsselblume), V. 1., Primulaceae.

acaulis All. (*vulgaris* Sm., *grandiflora* Lam., *hybrida*

Schrank., *sylvestris* Scop., *uniflora* Gmel., schaftloses,

4. f. Mittel-. Süd- und Osteuropa, England.

b) *alba*. c) *plena alba*. d) *plena carnea*. e)

plena sulphurea. f) *plena rubra*. g) *plena cuprea*.

h) *plena atropurpurea*. i) *plena violacea*. k) *rubra*.

β) *brevistyla* DC. b) *versicolor*. γ) *caulescens*.

algida Adam (*longifolia* Bot. mag.), eisliebendes, 4. f.

b. k. Caucasus.

Allionii Loisel. (*glutinosa* All.), Allione's, 4. f. b. k.

Piemont.

altaica Lehm., altaisches, 4. f. b. k. Altai.

amoena MB., liebliches, 4. f. b. k. Caucasus.

Auricula L. (*lutea* Lam.), Aurikel-P., 4. f. b. b. Mittel- und südeuropäische Voralpen und Alpen.

b) *lutea plena*. c) *calycantha*. d) *integerrima*.

e) *hortensis*.

Balbisii Lehm., Balbis's, 4. f. b. k. Italien.

Primula

- calycina Dub. (*glauescens* Morett.), großkelchiges, 4. f. b. k. Südliche Schweiz, Frankreich, Italien.
- Candolleana Rchb. (*integrifolia* DC., Gaud.), De Candolle's, 4. f. b. k. Schweiz, Frankreich.
- carniolica Jacq., krainerisches, 4. f. b. k. Krain.
- ciliata Schrk., gefranztes, 4. f. b. k. Mitteleurop. Alpen.
- b) purpurata D. Don. c) alba.
- cortusoides L., cortusablätteriges, 4. f. b. k. Sibirien, Japan.
- davurica Spgl., Lehm., dahurisches, 4. f. b. k. Dahurien.
- decora Bot. mag., zierliches, 4. f. b. k. ? Südeuropa.
- denticulata Sm., gezähneltes, 4. k. Nepal.
- dentiflora Andr., zahnblumiges, 4. f. b. k. Sibirien.
- elator Jacq. (*inodora* Hoffm.), hohes, Garten-P., 4. f. Europa.
- b) polyantha. c) calycantha. d) fl. pleno.
- farinosa L., mehlblätteriges, 4. f. b. k. Europa.
- b) pallidiflora. c) albiflora.
- Floerkeana Schrad., Floerke's, 4. f. b. k. Oberkärnthen, Südtirol.
- gigantea Jacq., riesenhaftes, 4. f. b. k. Sibirien.
- glutinosa Wulf., klebriges, 4. f. b. k. Mitteleurop. Alpen.
- Hornemanniana Lehm. (*stricta* Hornem., *farinosa* Sm.), Hornemann's, 4. f. b. k. Lappland.
- inflata Lehm., aufgeblasenes, 4. f. Ungarn.
- integrifolia L., Jacq. (*spectabilis* Tratt.), ganzblätteriges, 4. f. b. k. Oesterreich, steyerländische etc. Alpen.
- a) Clusiana Tausch. β) denticulata K.
- latifolia Lapeyr. (*villosa* Sieb.), 4. f. b. k. Pyrenäen etc.
- longiflora All., langblumiges, 4. f. b. k. Mittel- und südeuropäische Alpen.
- marginata Curt. (*crenata* Loisel.), berandetes, 4. f. b. k. Südliche Schweiz, französische Alpen.
- minima L., kleinstes, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.
- mistassinica Mchx., canadisches, 4. f. b. k. Canada.
- nivalis Pall., Schnee-P., 4. f. b. k. Sibirien.
- nivea Fisch. (*nivalis* Hort.), schneeweisses, 4. f. b. k. Sibirien.
- norvegica Retz (*finmarchica* Jacq.), norwegisches, 4. f. b. k. Nordnorwegen.
- Palinuri Petagn., Palinuri's, 4. f. k. Neapel.
- Pallasii Lehm., Pallas's, 4. f. b. k. Altai.
- pedemontana Thom. (*hirsuta* All., *helvetica* Donn), piemontesisches, 4. f. b. k. Südliche Schweiz, Oberital.
- b) alba.
- Perreiniana Flügge, Perrein's, 4. f. b. k. Spanien.
- praenitens Ker (*chinensis* Lindl.), chinesisches, 4. k. China.
- b) alba. c) fimbriata rosea. d) fimbriata alba.
- pubescens Wulf. (*villosa* Bot. mag.), weichhaariges, 4. f. b. k. Mitteleuropäische Alpen.
- b) alba (*Simsii* Swt.).
- pusilla Goldie (*farinosa* Nutt.), niedrigstes, 4. f. b. k. Canada.
- scotica Hook., schottisches, 4. f. b. k. Schottland.
- sibirica Jacq. (*intermedia* Ledeb.), sibirisches, 4. f. b. k. Sibirien.
- β) integerrima Hook.
- suaveolens Bertol. (*Columnae* Tenor.), feinriechendes, 4. f. Istrien, Italien.
- truncata Lehm. (*minima angustifolia* Hort.), abgestutztes, 4. f. b. k. Salzburg. Alpen.

Primula

venusta Host (*Freyeri* Hoppe), schönes, 4. f. b. k. Krain.
veris L. (*officinalis* Jacq.), Frühlings-P., 4. f. Europa.

b) *rubra*. β) *uralensis* Fisch., Ural.

verticillata Forsk. (*involucrata* Hort.), wirtelblumiges,
 4. k. t. Arabien.

villosa Jacq. (*hirsuta* All., *viscosa* Lam.), zottiges, 4. f.
 b. k. Mitteleuropäische Alpen.

b) *alba* (*nivea* Hort.).

viscosa All., schmieriges, 4. f. b. k. Piemont.

Vitaliana L. v. *Aretia Vitaliana*.

Prinos L., Winterbeere, VI. 1., Sapotaceae-Aquifoliaceae.

ambiguus Mchx., carolinische, 5. f. b. k. Carolina.

atomarius Nutt., punktirte, 5. f. b. k. Südcarolina,
 Georgia.

coriaceus Pursh, lederblättrige, 5. f. b. k. Georgia.

deciduus DC., hinfällige, 5. f. b. Virginien.

β) *aestivalis* DC.

dubius G. Don (*ambiguus* Pursh), zweifelhafte, 5. f.
 Nordamerika.

glaber L., kahle, 5. f. b. k. Nordamerika.

laevigatus Pursh, glatte, 5. f. b. Nordamerika.

lanceolatus Pursh, lanzettblättrige, 5. f. b. Nordamer.

montanus Swt., Berg-W., 5. w. Westindien.

verticillatus L. (*padifolius* W., *Gronovii* Mchx., *confertus* Mch., *prunifolius* Lodd.), wirtelförmige, 5. f.
 Nordamerika.

lucidus Ait. v. *Nemopanthes canadensis*.

Prismatocarpus L'Her., A. DC., Prismakapsel, V. 1.,
Campanulaceae.

diffusus A. DC., weitschweifige, 4. k. Cap d. gut. H.

fruticosus L'Her., strauchige, 5. k. Cap der gut. H.

interruptus L'Her., unterbrochene, 5. 5. k. C. d. g. H.

nitidus L'Her., glänzende, 6. f. Cap der guten Hoffn.

paniculatus L'Her., rispige, 5. k. Cap der gut. Hoffn.

falcatus Tenor. etc. v. *Specularia falcata* etc.

Priva Adans, *Priva*, XIV. 11., Verbenaceae.

lappulacea P. (*echinata* Juss.), igelstachelige, 4. w.
 Westindien, Südamerika.

mexicana P., mexicanische, 4. w. Mexico.

leptostachya P. v. *Streptium asperum*.

Prockia P. Br., *Prockia*, XIII. 1., Bixaceae.

Crucis L., westindische, 5. w. Westindien, Südamerika.

serrata W., sägeblättrige, 5. w. Caribäen.

theaeformis W., theeähnliche, 5. w. Mascarenas.

Procris Commers., *Procris*, XXI. 14., Urticaceae.

integrifolia D. Don, ganzblättrige, 4. t. Nepal.

punctata Hamilt., punktirte, 4. t. Nepal.

Proiphys amboinensis Herb. v. *Eurycles amboinensis*.**Pronaya** Hügel (Baron Pronay, ein Oesterreicher, Freund
und Gönner der Botanik), V. 1., Pittosporae.

elegans Hügel, schöne, 5. t. Neuholland (Schwanenfl.).

Proselia serrata D. Don v. *Chaetanthera serrata*.**Proserpinaca** L., Kriechling, III. 111., Halorageae.

palustris L., sumpfliebender, 6. Wa. f. Nordamerika.

pectinata Lam., kammbblättriger, 6. Wa. f. Nordamer.

Prosopis L., Harzhülse, X. 1., Leguminosae-Mimoseae.

cumanensis Kunth, cumanische, 5. w. Cumana.

domingensis DC., domingische, 5. w. St. Domingo.

dulcis Kunth, süsse, 5. w. Neuspanien.

Prosopis

juliflora DC., kätzchenblumige, f. w. Westind., Südam.

pallida Kunth, bleiche, f. w. Südamerika.

spicigera L., ährentragende, f. w. Ostindien.

β) Adenanthera.

Stephaniana Kunth v. *Lagonychium* Stephanianum.

Prostanthera La Bill., Geneigtfaeden, XIV. 1., Labiatae.

denticulata RB., gezähnelter, f. k. t. Neuholland.

incisa RB., schlitzblättriger, f. k. t. Neuholland.

lasiantha La Bill., haarblumiger, f. k. t. Neuholland,
Van-Diemens-Land.

linearis RB., gleichbreitblättriger, f. k. t. Neuholland.

rhombea RB., rautenförmiger, f. k. t. Neuholland.

rotundifolia RB., rundblättriger, f. k. t. V.-D.-L.

violacea RB., violetter, f. k. t. Neuholland.

Protea L., Wunderfichte (Silberfichte), IV. 1., Proteaceae.

acaulis Thbg., stammlose, f. t. Cap der gut. Hoffn.

acerosa RB., nadelblättrige, f. t. Cap der gut. H.

acuminata RB., zugespitzte, f. t. Cap der gut. Hoffn.

amplexicaulis RB., stengelumfassende, f. t. C. d. g. H.

angustata RB., verschälerte, f. t. Cap der gut. H.

canaliculata Andr., rinnenförmige, f. t. Cap d. gut. H.

coccinea RB., scharlachfarbige, f. t. Cap der gut. H.

compacta RB., dichtblumige, f. t. Cap der gut. Hoffn.

cordata Thbg., herzblättrige, f. t. Cap der gut. H.

cynaroides L., artischockenblumige, f. t. Cap d. g. H.

elongata RB., verlängerte, f. t. Cap der gut. Hoffn.

formosa RB., schöne, f. t. Cap der guten Hoffn.

glaucophylla Salib., blaugrünblättrige, f. t. Cap
der guten Hoffnung.

grandiflora Thbg., großblumige, f. t. Cap der gut. H.

β) marginata Bot. reg.

humilis RB. (*humiliflora* Andr.), niedrige, f. t. Cap
der guten Hoffnung.

incompta RB., ungezierte, f. t. Cap der gut. Hoffn.

laevis RB. (*longifolia* Salib.), glatte, f. t. C. d. g. H.

latifolia RB., breitblättrige, f. t. Cap der gut. Hoffn.

β) coccinea. γ) viridiflora.

Lepidocarpum RB., schuppenfrüchtige, f. t. C. d. g. H.

ligulaefolia Kn., bandblättrige, f. t. Cap d. gut. H.

longiflora Lam., langblumige, f. t. Cap der gut. H.

longifolia Andr., langblättrige, f. t. Cap der gut. H.

lorea RB., riemenblättrige, f. t. Cap der gut. Hoffn.

macrophylla RB., großblättrige, f. t. Cap d. gut. H.

magnifica Kn., ansehnliche, f. t. Cap der gut. Hoffn.

melaleuca RB. (*coronata* Lam.), schwarzweisse, f. t.

Cap der guten Hoffnung.

mellifera Thbg., honiggebende, f. t. Cap der gut. H.

β) albiflora.

mucronifolia Salib., stachelspitzblättrige, f. t. Cap
der guten Hoffnung.

Mundii H. Berol., Mund's, f. t. Cap der gut. Hoffn.

nana Thbg., zwergige, f. t. Cap der guten Hoffnung.

neriifolia RB. (*speciosa nigra* Andr.), oleanderblättrige,
f. t. Cap der guten Hoffnung.

obtusata Kn. (*speciosa* Bot. mag.), stumpfe, f. t. Cap
der guten Hoffnung.

patens RB., abstehende, f. t. Cap der guten Hoffn.

pendula RB., herabhängende, f. t. Cap der gut. H.

pulchella Andr., hübsche, f. t. Cap der guten Hoffn.

Protea

a) *ciliata* Andr. β) *glabra* Andr. γ) *speciosa* Andr.

repens Thbg., kriechende, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.
revoluta BB., zurückgerollte, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.
scabra RB., scharfblättrige, ♂. t. Cap der gut. Hoffn.
Scolopendrium RB., hirschzungenähnliche, ♂. t. Cap der guten Hoffnung.

Scolymus Thbg., distelköpfige, ♂. t. Cap der gut. H.
speciosa L., prächtige, ♂. t. Cap der guten Hoffnung.
tenax RB., zähe, ♂. t. Cap der guten Hoffnung.
tenuifolia RB., dünnblättrige, ♂. t. Cap der gut. H.
turbiniiflora RB., kreiselblumige, ♂. t. Cap d. gut. H.
umbonalis Kn., buckelige, ♂. t. Cap der guten Hoffn.
villifera Lindl., zottige, ♂. t. Cap der guten Hoffnung.
virgata Andr., ruthenförmige, ♂. t. Cap der gut. H.

abrotanifolia Andr. (et *cyanoides* L., *decumbens* Andr., *glomerata* Andr., *glomerata* L. etc. v. *Serruria* *phylicoides*, *cyanoides*, *pedunculata*, *glomerata* etc. *anemonifolia* Salisb. (*tridactylides* Cav.) et *divaricata* Andr. etc. v. *Isopogon* *anemonifolius* etc. *argentea* L. (et *cinerea* Ait., *densa* W., *globosa* Andr., *pallens* L., *pallens* Thbg., *parviflora* L. etc.) vid. *Leucadendron* *argenteum* *cinereum*, *tortum*, *concolor*, *adscendens*, *decurrens*, *plumosum* etc. etc. *aulacea* Thbg., *bracteata* Thbg. (*pinifolia* L.) vid. *Aulax* *umbellata* et *pinifolia*. *caudata* Thbg. (et *racemosa* Thbg.) etc. vid. *Spatalla* *Thunbergii* et *ramulosa* etc. *concava* Lam., *Lagopus* Thbg., *Sceptrum* Thbg. etc. v. *Nivenia* *spathulata*, *Lagopus* etc. *cucullata* L., *divaricata* L. etc. vid. *Mimetes* *cucullata* etc. *fucifolia* Salisb. (*pulchella* Cav.) etc. vid. *Petrophila* *pulchella* etc. *imbricata* Thbg. etc. v. *Sorocephalus* *imbricatus* etc. *linearis* Thbg. etc. v. *Leucospermum* *lineare*.

Prunella L., Brunelle, XIV. 1., Labiatae.

alba Pall., weisse, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa, Caucasus.

β) *laciniata* Mill.

australis Swt. (*Browniana* Penny), neuholländische, ©. f. Neusüdwallis.

grandiflora Jacq., großblumige, 4. f. Europa, Caucas.

β) *pinnatifida* K. et Ziz.

hastata Brot., spontanblättrige, 4. f. Portugal.

hyssopifolia L., ysopblättrige, 4. f. Südfrankreich.

incisa Lk., schlitzblättrige, 4. f. ?

intermedia Lk., Brot., mittlere, 4. f. Oberital., Portug.

latifolia Lodd., breitblättrige, 4. f. ?

longifolia P., langblättrige, 4. f. Frankreich.

Marryattae Hort., Marryatt's, 4. f. ?

pensylvanica W., pensylvanische, 4. f. Nordamerika.

β) *ovata* Dsf.

vulgaris L., gemeine, 4. f. Europa, Asien, Nordamer. etc.

b) *alba*. c) *plena*. d) *rubra*. β) *hirta* Bernh.

Webbiana Hort., Webb's, 4. f. ?

Prunus T. L., Pflaume, XII. 1., Amygdalaceae-Ceraceae.

1. *Armeniaca* T., Apricose.

Armeniaca L., gemeine Ap., ♂. f. b. Persien, Armen.

a) *ovalifolia* Sering. b) *cordifolia* Sering. c)

foliis variegatis Hort. d) *flore pleno* Hort.

Prunus

brigantiaca Vill., briançonner A., *fr.* Ostfrankreich.
dasyarpa Ehrh. (*atropurpurea* Lois., *nigra* Hort.),
 schwarze (rauhfrüchtige), *fr.* ?

β) *persicifolia* Loisel.

pedunculata Hort., langstielige, *fr.* ?

sibirica L., sibirische, *fr.* Sibirien.

II. *Cerasus* T., Kirsche (et *Padus* R.).

avium L. (*C. sylvestris* Bauh., *C. nigra* Mill.), Vogel-K.,
 süsse, *fr.* Europa.

a) *macrocarpa* Sering. b) *pallida* Sering. c)
multiplex Sering. d) *nigricans* Ehrh. e) *varia*

Ehrh. *β)* *duracina* DC. (Krach o. Knorpelk.).

a) *cordigera* Sering. b) *obtusata* Sering. c)

mammillaris Sering. (*macrophylla* Poir.). *γ)* Ju-

liana DC. (Molkenkirsche). b) *heaumiana* Sering.

c) *pendula* Sering.

borealis Mchx., nördliche, *fr.* Nordamerika.

canadensis W. Lois., canadische, *fr.* Nordamerika.

Capollin DC. (*virginiana* Flor. Mex.), mexicanische, *fr.*
 k. Mexico.

caroliniana Ait., carolinische, *fr.* b. k. Carolina.

cartilaginea Lehm., knorpelige, *fr.* Nordamerika.

Cerasus L. (*C. vulgaris* Mill., *C. caproniana* DC.), saure
 K., *fr.* Europa.

b) *pallescent* Ser. c) *gobbetta* Sering. (*acida*
 Ehrh.). d) *polygyna* Ser. e) *multiplex* Sering.

f) *persiciflora* Sering. g) *variegata* Sering. h)

griotta Sering. i) *cordigera*. k) *semiplena*. *β)*

austera Ehrh. *γ)* *aproniana* Schübl. (*montmorencyana* DC.).

Chamaecerasus Jacq. (*fruticosa* Pall., *intermedia* Poir.,
pumila C. Bauh.), strauchartige (Erdweichsel), *fr.*
 Europa, Mittelasien.

Chicasa Mchx., Chicasa-K., *fr.* Virginien, Carolina.

depressa Pursh (*Susquehanae* W., *pumila* Mchx.), nieder-
 gedrückte, *fr.* Nordamerika.

hyemalis Mchx., Winter-K., *fr.* Nordamerika.

japonica Thbg. (*sinensis* P.), japanische, *fr.* b. Ja-
 pan, China.

b) *multiplex* Sering.

Laurocerasus L., Lorbeer-K., *fr.* b. k. Kleinasien,
 Caucasus.

lusitanica L., portugiesische, *fr.* k. f. b. Portugal.

β) *Hixa* Sering. (*multiglandulosa* Cav.).

Mahaleb L., Mahaleb-K., *fr.* Mittel-, Süd- und
 Osteuropa.

b) *fol. varieg.* c) *fruct. flavo.* d) *latifol.* *β)*
Marasca Rchb.

nepalensis Sering., nepal'sche, *fr.* k. Nepal.

nigra Ait. (*americana* Darlingt.), schwarze, *fr.* Nordam.
occidentalis Sw., westliche, *fr.* w. Westindien.

Padus L., Trauben-K., *fr.* Europa, Asien, Nordamer.

a) *vulgaris* Sering. b) *parviflora* Sering. c) *rubra*
 Sering. d) *bracteosa* Sering.

pensylvanica L. suppl. (*lanceolata* W.), pensylvanische,
fr. Nordamerika.

persicifolia Dsf., pfirsichblättrige, *fr.* Nordamerika.

prostrata La Bill. (*incana* Stev.), gestreckte, *fr.* Cau-
 casus, Armenien, Syrien, Creta.

Prunus

Pseudo-Cerasus Lindl. (*paniculata* Ker non Thbg.),
unächte, $\S$. k. f. b. China.

pubescens Pursh (*sphaerocarpa* Mchx., *sphaerica* W.),
weichhaarige, $\S$. f. Nordamerika.

pumila L. (*glauca* Mchx.), kleine, $\S$. f. Nordamerika.

pygmaea W. (*candicans* W.), zwergige, $\S$. f. Pensyl-
vanien, Carolina.

salicina Lindl., weidenähnliche, $\S$. $\S$. k. f. b. China.

semperflorens Ehrh. (*serotina* Roth), immerblühende, $\S$.
f. Europa, Nordamerika.

serotina Ehrh. (*virgin.* Mill.), spätblumige, $\S$. f. Nordam.
 β) *retusa* Sering.

serrulata Lindl. (*multiplax chinensis* Hort.), feingesägte,
 $\S$. f. b. k. China.

sinensis G. Don (*japonica* Ker), chinesische, $\S$. f. b. k. China.

sphaerocarpa Sw., kugelfrüchtige, $\S$. w. Jamaica.

virginiana L. (*rubra* Ait., W., *arguta* Bigelow), virgi-
nische (rothe), $\S$. f. Nordamerika.

III. *Prunus* T., Pflaume.

candicans Balb., weißblättrige, $\S$. f. ?

cerasifera Ehrh. (*domestica myrobalana* L.), Kirsch-P.,
 $\S$. f. Nordamerika.

b) fol. variegat.

Cocomilla Ten., *Cocomilla*-P., $\S$. f. b. Calabrien.

divaricata Ledeb., ausgesperrte, $\S$. f. Caucasus.

domestica L., gemeine, $\S$. f. Europa.

b) flore pleno. c) foliis variegat. d) armenioi-
des Sering. e) Claudiana. f) damascena. g)
turonensis. h) Juliana. i) Catharina Ser. k)
Aubertiana Sering. l) pruneauliana Sering. (*py-
ramidalis* DC.).

insiticia L., Kriechen-P. (Hafer-P.), $\S$. f. Europa.

a) fructu nigro. b) fructu luteo albo. c) fruct.
rubro. d) flore pleno.

maritima Wangenh., Meerstrands-P., $\S$. f. Nordamerika.

*Poiretiana** (*pubescens* Poir.), Poiret's, $\S$. f. ?

spinosa L., Schlehen-P., $\S$. f. Europa.

a) vulgaris Sering. h) fol. variegat. c) micro-
carpa Wallr. d) macrocarpa Wallr. e) ovata
Sering. f) flore pleno.

Psamma P. B., Sandrohr, III. II., Gramineae.

arenaria L., gemeines, 4. f. Deutschland etc.

baltica P. B., baltisches, 4. f. Ufer d. baltischen Meeres.

Psephellus spectabilis Fisch. et Mey. v. *Centaurea spectabilis*.

Psiadia Jacq., Tropfenpflanze, XIX. IV, Compositae- Corymbiferae.

glutinosa Jacq., klebrige, $\S$. t. Mascarenas.

Psidium L., Guajavabaum, XII. I., Myrtaceae.

aromaticum Aubl., gewürzhafter, $\S$. w. Guiana.

Cattleyanum Sabin., Lindl., Cattley's, $\S$. w. China.

chinense Lodd., chinesischer, $\S$. w. China.

cordatum Sims, herzblättriger, $\S$. w. Westindien.

fragrans Lodd., wohlriechender, $\S$. w. Guiana.

grandiflorum Aubl., großblumiger, $\S$. w. Guiana.

guianense Rich., P., guianischer, $\S$. w. Guiana.

guineense Sw., guineischer, $\S$. w. Guinea.

latifolium Lk., breitblättriger, $\S$. w. Südamerika.

montanum Sw., Berg-G., $\S$. w. Jamaica.

myrtifolium Lodd., myrtenblättriger, $\S$. w. ?

Psidium

oligospermum Lk., wenigsamiger, ♀. w. ?

polycarpon Anders., Lamb., vielfrüchtiger, ♀. w. Trinidad.

pomiferum L., äpfeltragender, ♀. w. Ost- u. Westind.

pyriferum L., birntragender, ♀. w. Ost- u. Westindien.

sapidissimum Jacq., wohlschmeckender, ♀. w. ? Westind.

decaspermum L. suppl. v. Nelitris Jambosella.

Psilotum triquetrum Sw. v. Bernhardia dichotoma.

Psilurus Trin., Borstenschwanz, I. II., Gramineae.

nardoides Trin., nardusähnlicher, ☉. f. Südeuropa.

Psophocarpus Neck., Flügelhülse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

tetragonolobus DC., vierlappige, ☉. Sch. w. m. f. Mascarenas.

Psoralea L., Harzklec, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

acaulis Stev., stengelloser, 4. k. ?

aculeata L., stachelspitziger, ♀. k. Cap der gut. H.

aphylla L. (*decidua* Berg.), blattloser, ♀. k. C. d. g. H.

arborea Ker, baumartiger, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

argentea Thbg., silberfarbiger, ♀. k. Cap der gut. H.

axillaris L. suppl. (*linearis* Thbg.), achselblumiger, ♀. k.

Cap der guten Hoffnung.

bituminosa L., südeuropäischer, ♀. k. Italien, Südfrankr.

brachiata Dougl., armförmiger, 4. Kn. f. Nordamerika.

bracteata L., deckblättriger, ♀. k. Cap der gut. H.

canescens Mchx., graulicher, 4. ♀. k. Carolina, Georgia.

capitata Thbg., kopfförmiger, 4. ♀. k. Cap d. gut. H.

cinerea Lindl., aschfarbiger, ? ☉. f. Australien.

corylifolia L., haselnufsblättriger, ♂. w. Ostind., Arabien.

cuspidata Pursh, langspitziger, 4. Kn. f. b. k. Louisiana.

decumbens Ait. (*mucronata* Thbg.), niederliegender, ♀. k.

Cap der guten Hoffnung.

dentata DC. (*americana* L.), gezählelter, ♀. k. Madeira.

divaricata H. B. K., ausgespreizter, ♀. w. Südamerika.

esculenta Pursh, genießbarer, 4. Kn. f. b. k. Nordamer.

hirta L., kurzhaariger, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

incana Nutt. (*argophylla* Pursh), weißgrauer, 4. k.

Nordamerika.

intermedia Bess., mittlerer, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

involuta Thbg., hüllblättriger, ♀. k. Cap d. g. H.

lanceolata Pursh (*arenaria* Nutt.), lanzettblättriger, 4.

k. Nordamerika.

lathyrifolia Balb., platterbsenblättriger, ♀. k. ?

Lupinella Mchx., wolfsbohnenähnlicher, 4. k. f. b. Carolina, Florida.

macrostachys DC., großsähriger, 4. f. b. k. Westliches Nordamerika.

melilotoides Mchx. (*eglandulosa* Ell.), steinkleeähnlicher, 4. f. b. k. Nordamerika.

multicaulis Jacq., vielstengeliger, 4. k. Cap d. gut. H.

odoratissima Jacq., wohlriechendster, ♀. k. C. d. g. H.

Onobrychis Nutt., esparsettähnlicher, 4. f. b. k. Louisiana.

orbicularis Lindl., kreisförmiger, 4. f. b. Californien.

palaestina L. (*hirsuta* Gouan), orientalischer, ♀. k. Palästina.

pinnata L., gefiederter, 4. ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

pubescens Balb., weichhaariger, ♀. w. ? Mexico, Peru.

repens L., kriechender, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

sericea Poir. (*pedunculata* Ker), seidenhaariger, ♀. k.

Cap der guten Hoffnung.

Psoralea

spicata L., ährenförmiger, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
Stachyos Thbg. (*Stachydis* L. suppl.), stachysblättriger,
 ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

striata Thbg., gestreifter, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
tenuifolia L., feinblättriger, 4. ♀. k. Cap der gut. H.
tomentosa Thbg., filziger, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
verrucosa W. (*angustifolia* Ait.), warziger, ♀. k. Cap
 der guten Hoffnung.

Dalea L. (et *laxiflora* Poir. et *leporina* Ait.) vid.
Dalea alopecuroides, laxifl. et *Lagopus*. *tetrago-*
noloba L. v. *Cyamopsis psoraloides*.

Psychine Dsf., Psychine, XV. III., Cruciferae.

stylosa Dsf. (*numidica* Spgl.), numidische, ☉. f. Nordafrika.

Psychotria L., Psychotrie, V. I., Rubiaceae.

asiatica L., asiatische, ♀. w. Ostindien.

brachiata Sw., arnförmige, ♀. w. Westindien, Südamer.

citrifolia Sw., citronblättrige, ♀. w. Westindien.

coriacea Poir., lederblättrige, ♀. w. Hispaniola, Südamer.

cumanensis W., cumanische, ♀. w. Cumana.

daphnoides Cunn., seidelbastähnliche, ♀. ♀. t. Neuholl.

elliptica Ker, elliptische, ♀. w. Brasilien.

glabrata Sw., kahle, ♀. w. Westindien.

hirsuta Sw., rauhaarige, ♀. w. Westindien, Südamer.

laurifolia Sw., lorbeerblättrige, ♀. w. Westindien.

marginata Sw., herandete, 4. ♀. w. Jamaica.

megalosperma Vahl, großsamige, ♀. w. Westindien.

Myrtiphyllum L., myrtenblättrige, ♀. w. Jamaica.

parasitica Sw., schmarotzende, ♀. w. Caribäen.

pedunculata Sw., langstielige, ♀. w. Jamaica, Südamer.

pubescens Sw., weichhaarige, 4. w. Westindien.

rigida Bredem. W. (*byrsophylla* Spgl.), starre, 4. ♀.
 Cumana.

undata Jacq., wellenblättrige, ♀. w. Bahamische Inseln.

crocea Sw. et *lineata* W. vid. *Palicourea crocea* et

P. apicata Nachtr. *herbacea* L. v. *Geophila reni-*
formis. *involuta* Sw. et *racemosa* W. v. *Nona-*
telia officinalis et *racemosa*.

Ptarmica alpina DC., *atrata* DC. etc. vid. *Achillea*
alpina etc.

Ptelea L., Lederblume, IV. I., Tricoccae-Zanthoxyleae.

trifoliata L., dreiblättrige, ♀. f. Nordamerika.

ovata Lour. v. *Ptelidium ovatum*.

Ptelidium P. Thou., Ptelidie, IV. I., Evonymeae-
Celastrineae.

ovatum P. Thou., eiblättrige, ♀. w. Madagascar.

Pteris L., Saumfarn (Flügel-farn), XXIV. I., Pterioideae.

aculeata Sw. (*arborea* P.), stacheliger, 4. ♀. w. Westind.

Allosorus J. Bevis, krauser, 4. w. ?

ampla J. Bevis, breiter, 4. w. ?

aquilina L., Adler-S., 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.
 β) *brevipes* Tausch.

argentea S. G. Gmel., silberfarbiger, 4. k. Ostsibirien.

arguta Vahl, feingezählter, 4. k. w. Madeira.

atropurpurea L., schwarzpurpurrother, 4. f. b. k. Nordamer.

biaurita L., zweigeöhrter, 4. w. Westindien.

Calomelanos Sw. (*hastata* Thbg.), schwarzstieliger, 4. w.
 Cap der guten Hoffnung.

caudata L., geschwänzter, 4. w. Westindien.

Cervantesii H. Liverp., Cervantes's, 4. w. Mexico.

Pteris

- chinensis Lodd., chinesischer, 4. w. China.
 collina Radd., Hügel-S., 4. w. Brasilien.
 cordata Cav., herzblättriger, 4. w. Mexico.
 crenulata Lodd., gekerbter, 4. w. ?
 cretica L. (*semiserrata* Forsk.), cretischer, 4. k. w.
 Südeuropa, Creta, Arabien.
 denticulata Sw., gezähnelter, 4. w. Hispaniola, Brasilien.
 discolor Kunze (*elegans* Sw.), verschiedenfarbiger, 4. w.
 Brasilien.
 elegans Poir., zierlicher, 4. w. ? Ostindien.
 esculenta Forst., genießbarer, 4. w. Societätsinseln,
 Neuholland.
 falcata RB., sichelförmiger, 4. w. Neuholl., V.-D.-L.
 flexuosa Lk. et Otto, hin- und hergebogener, 4. w.
 Südamerika.
 grandifolia L., großblättriger, 4. w. Westind., Philippinen.
 hastata Sw. (*auriculata* Thbg., *polymorpha* Poir.), spon-
 tonblättriger, 4. w. Cap d. gut. Hoffn., Mascarenas.
 heterophylla Sw., verschiedenblättriger, 4. w. Westind.
 inframarginalis Kaulf., untenrandiger, 4. w. Mexico.
 Lactuca Poir., zartwedeliger, 4. w. Guadaloupe.
 lanuginosa Bory, wolliger, 4. w. Mascarenas.
 latizona Cunn., breitzoniger, 4. w. Neuholland.
 leptophylla Sw., schlankwedeliger, 4. w. Brasilien.
 longifolia L., langblättriger, 4. w. Westindien, Nepal,
 Philippinen.
 nemoralis Bory., W. (*semiovata* Poir.), Hain-S., 4. w.
 Mascarenas, Ostindien, Cochinchina.
 palmata W., handförmiger, 4. w. Westindien.
 pedata L., fußförmiger, 4. w. Südamerika, Neuholland.
 peruviana Poir. (*subverticillata* Cav., *ternifolia* Cav.),
 peruvianischer, 4. w. Peru, Mexico.
 Plumierii W., Plumier's, 4. w. Westindien, Südamer.
 rotundifolia Forst., rundblättriger, 4. w. Neuzeeland.
 sagittaeifolia Radd., pfeilblättriger, 4. w. Brasilien.
 sagittata Cav., pfeilförmiger, 4. w. Quito.
 serrulata L. (*multifida* Poir.), feinsägiger, 4. w. Ost-
 indien, China, Japan.
 spinulosa Radd., stachelsägiger, 4. w. Brasilien.
 sulcata H. Berol., gefurchter, 4. w. Südamerika.
 tremula RB., zitternder, 4. w. Neuholland.
 umbrosa RB., schattenliebender, 4. w. Neuholland.
 Vespertilionis La Bill., fledermausähnlicher, 4. w. Neuholl.
crispa Sw. v. *Allosorus crispus*. *gracilis* Mchx. v.
Cheilanthes gracilis. *lanceolata* L. etc. v. *Taenitis*
lanceolata etc. *piloselloides* L. vid. *Nothochlaena*
piloselloides. *podophylla* Sw. v. *Lonchitis pedata*.
Pterocarpus Löfl., Flügelfrucht, XVII. iv. (XVI. vi.),
 Leguminosae-Papilionaceae.
 dalbergioides Roth, dalbergiaähnliche, 5. w. Ostindien.
 Draco L. (*officinalis* Jacq.), Drachenblut-F., 5. w. West-
 indien, Südamerika.
 indicus W., indische, 5. w. Molucken.
 Marsupium Roxb., sichelhülsige, 5. w. Ostindien.
 Rohrii Vahl, Rohr's, 5. w. Guiana, Brasilien.
 sandalinus L. suppl., Rothholz-F., 5. w. Ostindien.
 sandalinoides H. Angl., sandelholzähnliche, 5. w.
 Sierra Leone.
 scandens Poir., klimmende, 5. Sch. w. Caracas.

Pterocarpus

Ecastaphyllum Berg. vid. *Ecastaphyllum Brownii*.
latifolius Poir. v. *Lonchocarpus latifolius*. *lunatus*
 L. v. *Drepanocarpus lunatus*.

Pterocarya Kunth, Flügelnuß, XXI. ix., Juglandaeae.
caucasica Kunth, caucasische, ♀. f. Caucasus, Nordam.

Pterocephalus Vaill., Federköpfchen, IV. i., Dipsaceae.
brachiatus Spgl., armförmiges, ☉. f. Cypern, Palästina.
diandrus Lagasc., zweimänniges, ☉. f. Portugal, Span.
dumetorum Coult., Hecken-F., ♀. k. Teneriffa.

involucratus Spgl., fiederhülliges, ☉. f. Creta, Cypern.
plumosus Coult., ächtes, ☉. f. Griechenland, Caucasus.
Vaillantii Lagasc. (*Cephalaria papposa* et *Vaillantii* R.
 et S.), Vaillant's, ☉. f. Portugal, Spanien.

Pteroneuron DC., Flügelkresse, XV. iii., Cruciferae.
carnosum DC., fleischige, 4. f. b. Croatien, Dalmatien.
graecum DC., griechische, ☉. f. Italien, Griechenland.
maritimum Rchb. v. *Cardamine maritima*.

Pteronia L., Pteronie, XIX. i., Compositae-Eupatorineae.
camforata L., kampferduftende, ♀. k. Cap d. gut. H.
echinata Thbg., stachelige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
fasciculata Thbg., büschelblumige, ♀. k. Cap d. g. H.
flexicaulis Thbg., gebogene, ♀. k. Cap der gut. H.
glomerata Thbg., knaulförmige, ♀. k. Cap der gut. H.
oppositifolia L., gegenblättrige, ♀. k. Cap d. gut. H.
pallens Thbg., bleiche, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
scariosa Thbg., rauschende, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
stricta Ait., steife, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

Chamaepeuce Spgl. v. *Staehelina Chamaepeuce*.

Pteroselinum alsaticum Rchb., austriacum Rchb., *Chabraei*
 Rchb., *glaucum* Rchb. etc. v. *Peucedanum alsaticum*,
austriacum, *Chabraei*, *Schottii* etc.

Pterospermum Schreb., Flügelkern, XVI. vii., Mal-
 vaceae-Dombeyaceae.

acerifolium W., ahornblättriger, ♀. w. Ostindien.
canescens Roxb., weißgraulicher, ♀. w. Ostindien.
lanceaefolium Roxb., lanzettblättriger, ♀. w. Ostindien.
platanifolium Lodd., platanusblättriger, ♀. w. Ostind.
semisagittatum Roxb., ungleichpfeilblättriger, ♀. w.
 Ostindien.

suberifolium W., spitzblättriger, ♀. w. Ostindien.

Pterostegia Fisch. et Mey., Flügelknöterich, V. iii.
 (VI. iii.), Portulacaeae-Polygoneae.

drymarioides Fisch. et Mey., drymariaähnlicher, ☉. f.
 Neu-Californien.

Pterostylis RB., Flügelorche, XXI. i., Orchideae.

acuminata RB., zugespitzte, 4. Kn. w. Neuholland.
Banksii RB., Banks's, 4. Kn. t. w. Neuzeeland.
concinna BB., nette, 4. Kn. w. Neuholland.
cucullata RB., kappenförmige, 4. Kn. w. Van-Diem.-L.
curta RB., kurze, 4. Kn. w. Neuholland.
gibbosa RB., höckerige, 4. Kn. w. Neuholland.
grandiflora RB., großblumige, 4. Kn. w. Neuholland.
longifolia RB., langblättrige, 4. Kn. w. Neuholland.
nutans RB., nickende, 4. Kn. w. Neuholland.
obtusata RB., stumpflippige, 4. Kn. w. Neuholland.
ophioglossa RB., Natterzungen-F., 4. Ln. w. Neuholl.
reflexa RB., zurückgebogene, 4. Kn. w. Neuholland,
 Van-Diemens-Land.

Pterotheca bifida Fisch. et Mey. etc. v. *Lagoseris bifida* etc.

Pterygodium Sw., Flügelstendel, XX. 1., Orchideae.

alatum Sw., blattreicher, 4. Kn. w. Cap der gut. H.

Volucris Sw., dreiblättriger, 4. Kn. w. Cap d. g. H.

Ptilostephium H. B. K., Federfranze, XIX. 11.,
Compositae-Corymbiferae.

coronopifolium H. B. K., krähensfußblättrige, ☉. f. Mexico.

trifidum H. B. K., dreispaltige, ☉. f. Mexico.

Ptychotis K., Faltendolde, V. 11., Umbelliferae.

ammoides K. (*verticillata* Duby), ammiähnliche, ☉. ♂. f.
Süd- und Westeuropa.

heterophylla K. (*Bunius* Rchb.), verschiedenblättrige,
♂. f. Süd- und Westeuropa.

Pueraria DC. (M. M. N. Puerari, Professor zu Copen-
hagen), XVII. 14. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae-
Papilionaceae.

tuberosa DC., knollige, ♂. Sch. Kn. w. Bengalen.

Wallichii DC., Wallich's, ♂. Sch. t. Nepal.

Pulegium *vulgare* Mill. v. *Mentha Pulegium*.

Pulicaria G., Flöhalant, XIX. 11., Compositae-
Corymbiferae.

arabica Lk., arabischer, ☉. f. Arabien.

dysenterica G., Rulir-F., 4. f. Europa, Mittelasien.

indica (L.), indischer, ☉. f. m. Ostindien.

odora Rchb., wohlriechender, 4. f. Istrien, Italien,
Südfrankreich.

paludosa (Link), morastliebender, ☉. f. Span., Portugal.

uliginosa Stev., sumpfliebender, 4. f. Taurien.

undulata DC., wellenblättriger, ☉. ♂. f. Aegypten, Pers.

villosa Lk., zottiger, ☉. f. Nordamerika.

viscosa Lk., schmieriger, ☉. f. Nordamerika.

vulgaris G., gemeiner, ☉. f. Europa, Mittelasien.

annua G. v. *Stenactis annua*.

Pulmonaria T., Lungenkraut, V. 1., Asperifoliaceae.

angustifolia L. (*tuberosa* Schrk.), schmalblättriges, 4.
Kn. f. Europa.

azurea Bess. (*Clusii* Baumg., *angustifolia* Auctor., *Bes-
sera azurea* Schult.), azurblaues, 4. f. Mittel- und
Osteuropa.

mollis Wolff (*media* Host), weichblättriges, 4. f. Mittel-
und Osteuropa.

oblongata Schrad. (*media* Rchb.), länglichblättriges, 4.
f. Mitteleuropa.

officinalis L., gemeines, 4. f. Europa.

b) *alba* J. C. c) *rosea*.

saccharata Mill. (*grandiflora* DC.), weißfleckiges, 4. f.
West- und Norddeutschland.

daurica Sims, *denticulata* R. et S. (*sibirica* Pursh),

maritima L. (*parviflora* Mchx.), *paniculata* Ait. et

virginica L. etc. v. *Platynema dahurica*, *denticulat.*,

maritim., *paniculat.* et *pulchrum* etc.

Pulsatilla Bauh. T., Küchenschelle, XIII. VI., Ra-
nunculaceae.

africana Herm., afrikanische, 4. k. Cap der gut. H.

albana Spgl. (Stev.), albanische, 4. f. Caucasus.

alpina de l'Arbre (*alba* Rchb.), Alpen-K., 4. f. Mittel-
europäische Alpen und Voralpen.

Burseriana Rchb. (*apiifolia* Schult.), Burser's, 4. f.
Mitteleuropäische Alpen.

cernua Spgl. (Thbg.), übergebogene, 4. k. Japan.

daurica Spgl. (Fisch., DC.), dahurische, 4. f. Dahurien.

Pulsatilla

Hackelii Pohl (*Halleri* Presl, *hybrida* Mikan, *patens* Auctor), Hackel's, 4. f. Mittel- und Osteuropa.

β) *Wolfgangiana* Bess.

Halleri W. (All.), Haller's, 4. f. k. Südliche Schweiz, Oberitalien.

nutans Gaud. (*montana* Hoppe), nickende, 4. f. Oesterreichisches Litorale, südliches Tyrol, Schweiz.

Nuttalliana Spgl., Nuttall's, 4. f. Nordamerika.

patens Mill., ausgebreitete, 4. f. Ost-, Nord- und Mitteleuropa, Sibirien.

b) *ochroleuca* Bot. mag.

pratensis Mill., Wiesen-K., 4. f. Ost-, Mittel- und Nordeuropa.

tenuifolia Spgl., feinblättrige, 4. k. Cap der gut. H. vernalis Mill., Frühlings-K., 4. f. Europa.

b) *flore luteo*.

vulgaris Mill., gemeine, 4. f. Europa, Sibirien.

b) *albida* Hort. c) *rubra* Lam. β) *Bogenhardiana* Rchb. (*tenuifolia* Schlchr.). γ) *schizantha* Rchb.

Pultenaea Sm, (W. Pulteney, M. Dr., englischer Botaniker), X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

argentea Cunn., silberfarbige, f. t. Neuholland.

aristata Sbr., grannige, f. t. Neuholland.

asperata Sbr., rauhlättrige, f. t. Neuholland.

biloba RB. (*deltoidea* Sbr.), zweilappige, f. t. Neuholl.

candida Lodd., weisblättrige, f. t. Neuholland.

canescens Cunn., weisgraue, f. t. Neuholland.

capitellata Sbr., kleinköpfige, f. t. Neuholland,

comosa Sbr., schopfige, f. t. Neuholland.

cordata Grah., herzlättrige, f. t. Van-Diem.-Land.

crassifolia Lodd., dickblättrige, f. t. Neuholland.

cuneata Lodd., keiblättrige, f. t. Neuholland.

daphnoides Sm., seidelbastähnliche, f. t. Neusüdwallis.

dentata La Bill., gezähnelte, f. t. Neuholland.

echinata Sbr., stachelige, f. t. Neuholland.

elliptica Sm., elliptische, f. t. Neuholland.

euchila DC. (*Dillwynia cuneata* Sbr.), ungleichkelchige, f. t. Neuholland.

ferruginea Rudg. (*lanata* Sbr.), rostfarbige, f. t. Neuholl.

flexilis Sm. (*Dillwynia teucroides* Sbr.), biegsame, f. t. Neuholland.

hypolampra Sbr., glänzende, f. t. Neuholland.

incarnata Mack. C., fleischfarbige, f. t. Neuholland.

incurvata Cunn., einwärtsgekrümmte, f. t. Neuholland.

juniperina La Bill., wachholderähnliche, f. t. Nördliches Neuholland.

linophylla Sm., flachblättrige, f. t. Neusüdwallis.

microphylla Sbr., kleinblättrige, f. t. Neuholland.

obcordata Andr., verkehrtherzlättrige, f. t. V.-D.-L.

oxalidifolia Cunn., sauerkleeblättrige, f. t. Neuholland.

paleacea Sm., spelzige, f. t. Neuholland.

parviflora Sbr., kleinblumige, f. t. Neuholland.

pedunculata Hook., langstielige, f. t. Neuholland.

phylicoides Sbr., phylicaähnliche, f. t. Neuholland.

plumosa Sbr., federige, f. t. Neuholland.

polifolia Cunn., poleiblättrige, f. t. Neuholland.

polygalaeifolia Rudg. (? *flexilis* Swt.), polygalablättrige, f. t. Neuholland.

procumbens Cunn., niederliegende, f. t. Neuholland.

Pultenaea

- racemulosa* Sbr., traubige, ♀. t. Neuholland.
retusa Sm., abgestutzte, ♀. t. Neusüdwallis.
rosmarinifolia Lindl. (*mucronata* Lodd.), rosmarinblät-
 terige, ♀. t. Neuholland.
scabra RB., scharfblättrige, ♀. t. Neusüdwallis.
squarrosa Sbr., sparrige, ♀. t. Neuholland.
staphyleoides Cunn., staphyleablättrige, ♀. t. Neuholl.
stenophylla Ait., schmalblättrige, ♀. t. Neuholland.
stipularis Sm. (*psoraleoides* Sbr.), zwischenblättrige, ♀.
 t. Neuholland.
stricta Curt., steife, ♀. t. Van-Diemens-Land.
subumbellata Hook., wenigdoldige, ♀. t. Van-Diem.-L.
tenuifolia RB., dünnblättrige, ♀. t. Van-Diem.-Land.
thymifolia Sieb., thymianblättrige, ♀. t. Neuholland.
vestita RB., bekleidete, ♀. t. Südliches Neuholland.
villifera Sieb., langfranzige, ♀. t. Neuholland.
villosa Sm., zottige, ♀. t. Neuholland.
ericoides Vent. (*rosmarinacea* Sbr.) v. *Aotus villosa*.
ilicifolia Andr. vid. *Podolobium trilobatum*. *nana*
 Andr. vid. *Chorizema nanum*. *retorta* Wendl. vid.
Dillwynia ericaefolia. *rubiaefolia* Andr. v. *Mirbelia*
reticulata. *sylvatica* Sbr. v. *Oxylobium Pultenaeae*.
virgata Sbr. v. *Aotus virgata*.

Punica T., Granate, XII. 1., ? Onagrariae-Granateae.

- Granatum* L., gemeine, ♀. k. f. b. Mittelasien, Südeuropa.
 b) flore rubro pleno. c) albescens. d) albescens
 fl. pleno. e) flavescens.

nana L., Zwerg-G., ♀. k. t. Antillen, Südamerika.

Purshia DC. (F. Pursh, ein Deutscher, welcher Nordamerika in botanischer Hinsicht bereiste und eine Flora dieses Landes schrieb), XII. 1., Rosaceae-Spiraeaceae.

tridentata DC., dreizähnlige, ♀. f. b. k. Nordamerika.

Purshia hispida Lehm. et *mollis* Lehm. vid. *Onosmodium hispidum* et *molle*.

Puschkinia Adams, MB. (Graf Mussin Puschkin, russischer Botaniker), VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

scilloides Adams, MB., scillaähnliche, 4. Zw. f. b. Caucasus, Creta.

Putoria foetida P. v. *Ernodea montana*.

Pycnanthemum Mchx., Ballblume, XIV. 1., Labiatae.

- aristatum* Mchx., grannige, 4. f. Nordamerika.
incanum Mchx., weißgraue, 4. f. Nordamerika.
lanceolatum Pursh, lanzettliche, 4. f. Nordamerika.
linifolium Pursh, flachsblättrige, 4. f. Nordamerika.
Monardella Mchx., monardenähnliche, 4. f. Virginien,
 Carolina.

nudum Nutt., kahle, 4. f. Carolina, Georgia.

ovatum Nestl., eiförmige, 4. f. Nordamerika.

verticillatum P., wirtelblättrige, 4. f. Pensylvan., Carol.

Pycnostachys Hook., Dickähre, XIV. 1., Labiatae.

coerulea Hook., blaue, ☉. w. Madagascar.

Pyrethrum Hall., Bertramwurz, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

- Achilleae* DC. (*tenuifolium* Tenor., *corymbosum* β. Auct.
Matricaria corymbosa Savi), Garben-B., 4. f. Italien.
achilleaefolium MB., garbenblättrige, 4. f. Caucasus,
 Sibirien.

Pyrethrum

- β) pubescens (*Achillea pub.* H. P., *Gymnocline Vaillantii* Cass.).
 alpinum W. (*saxatile* Lodd.), Alpen-B., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
 β) pubescens Duby (*tomentosum* Clairv., Chrys., *minimum* Vill.).
 ambiguum Ledeb., zweifelhafte, 4. f. Altai.
 Balsamita W., frauenmünzenähnliche, 4. f. Nordpersien, Levante.
 bipinnatum W., doppeltgefiederte, 4. f. Sibirien.
 Bocconi W. (*Chrysanthem. aragonense* Ass.), Boccone's, 4. f. Spanien.
 carneum MB. (*roseum* Lindl., *Chrysanth. coccineum* Sims), fleischfarbige, 4. f. Caucasus.
 caucasicum W., caucasische, 4. f. Caucasus.
 ceratophylloides W., Tenor. (*leucanthemoides* Tausch), hornblattähnliche, 4. f. Italien, Dalmatien, Pyrenäen.
 β) dissectum DC.
 cinerariaefolium Trevir. (*Chrysanth. rigidum* Vis., *Turreanum* Vis.), cinerarienblättrige, 4. f. Dalmatien.
 corymbosum W., traubendoldige, 4. f. Europa, Caucasus, Sibirien.
 β) Clusii Fisch. Rchb. (*italicum* Hort.). γ) tenuifolium MB., W.
 decipiens Fisch. et Mey., täuschende, 4. f. Nordpers.
 discoideum Ledeb., scheibenförmige, 4. f. Tatarei.
 fuscum W. (Dsf.), bräunliche, 4. f. Nordafrika.
 glabrum Lagasc., kahle, 4. f. Spanien.
 Halleri W. (*alpestre* Clairv., *Chrysanth. coronopifol.* Vill.), Haller's, 4. f. Schweiz, Oberitalien, Dauphiné.
 β) Barrelieri Dufour.
 incanum Ledeb., weißgraue, 4. f. Sibirien.
 indicum Cass. (*Chrysanth. japonicum* Thbg., *Chr. tripartitum* Swt.), indische, 4. f. k. China, Japan, Ostindien.
 inodorum Sm., geruchlose, 4. f. Europa.
 β) salinum Wallr.
 leptophyllum Stev., schlankblättrige, 4. f. Ostcaucasus.
 macrophyllum W., großblättrige, 4. f. Siebenbürgen, Ungarn, Croatien.
 maritimum Sm., Meerstrands-B., 4. f. England, Gothland, Nordwestfrankreich.
 β) elegans Poll.
 millefolium W., vielblättrige, 4. f. Taurien, Bessarab.
 multifidum DC. (*pinnatifidum* W., *Chrysanth. glaucum* P.), vieltheilige, 4. f. Orient.
 Myconis Mch. (*Coleostephus Myconis* Cass.), spanische, 4. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Syrien, Nordafrika.
 β) hybridum Guss. γ) albidum DC.
 niveum Lagasc. (*parthenifolium* β . MB., *pulverulentum* W., *fruticulosum* Spgl., Schult., *argenteum* Adams), schneeweiße, 4. f. Iberien.
 palustre W., Morast-B., 4. f. Armenien.
 parthenifolium W. (*parthenifolium* a MB., *Chrysanth. praealtum* Vent.), parthenienblättrige, 4. f. Iberien.
 Parthenium Sm., Mutterkraut-B., 4. f. Europa.
 β) flosculosum. γ) plenum.

Pyrethrum

praecox MB., frühe, ☉. f. Taurien, Astrakan.

β) *parviflorum* W.

pulchrum L., schöne, 4. f. Altai.

pulverulentum Lag., bestäubte, ☉. f. Spanien.

radicans Cav., wurzelnde, 4. f. k. Spanien.

roseum MB. (*Chrysanth. coccineum* W.), rosafarbige, 4. f. Caucasus, Persien.

sericeum MB. (*Chrys. argenteum* W.), seidenhaarige, 4. f. Iberien.

serotinum W., späte, 2. f. Nordamerika.

silaifolium Stev., silausblättrige, 4. f. Ostcaucasus.

sinense Sabin. (*Chrysanth. indicum* Thbg.), chinesische, 4. f. f. k. Japan, China.

Gartenvarietäten: purple, changeable white, quilled white, superb white, tapeled white, quilled yellow, sulphur yellow, golden yellow, large lilac, rose or pink, buff or orange, spanish brown, quilled flamed yellow, quilled pink, early crimson, large quilled orange, expanded light purple, quilled light purple, curled lilac, superb clustered yellow, semidouble quilled pink, semidouble quilled white, semidouble quilled orange, late pale purple, quilled salmon-colored, small yellow, paper white, pale buff, early blush, blush *Ranunculus*-flowered, changeable pale buff, two-colored red, starry purple, brown purple, late quilled yellow, double indian yellow, Parks's small yellow, tasseled yellow, tasseled lilac, semidouble quilled pale orange, golden Lotus-flowered, two colored incurved, yellow Waratah, double indian white, clustered blush, starry blush, flat pink, incurving pink, dwarf pale rose, expanded rose, grooved light purple, rosy purple, expanded crimson, sanguineum or blood red, changeable yellow, Wheelerianum etc.

tomentosum DC. (*minimum* DC.), filzige, 4. f. b. k. Corsica.

trifurcatum W., dreigabelige, ☉. f. Nordafrika.

uliginosum W. K., Sumpf-B., 4. f. Ungarn.

Unbestimmtere: *absinthifolium* (Fisch.), 4. f. Sibirien.

ruthenicum (Fisch.), 4. f. Rußland. *tanacetifolium* (W.), 4. f. Orient.

arvense Salzm, v. *Phalacrodiscus arvensis*. *diversifolium* Grah. v. *Brachycome diversifolia*.

indicum Roxb. vid. *Chrysanthemum Roxburghii*. *lanatum* Spgl. vid. *Egletes bellidifolia*.

speciosum W. vid. *Chrysanthemum grandiflorum* γ.

simplicifolium W. vid. *Egletes domingensis*. *Tanacetum* DC. vid.

Balsamita vulgaris. Hinsichtlich der übrigen siehe

Chrysanthemum.

Pyrola T., Wintergrün, X. 1., Ericaceae.

I. *Genuina*.

asarifolia Mchx., haselwurzblättriges, 4. f. b. k. Nordam.

chlorantha Sw. (*convoluta* Bartr., *minor* Pursh, *virens* Schweig., *media* Hayne, *asarifolia* Rad., *rotundifolia* Sturm.), grünblumiges, 4. f. Mittel- u. Nordeuropa, Canada.

elliptica Nutt., elliptisches, 4. f. b. k. Pennsylvanien.

media Sw. (*rotundifolia* Flor. Dan.), mittleres, 4. f. Mittel- und Westdeutschland, Schweiz, Schweden, England etc.

Pyrola

minor L. (*rosea* Sm.), kleines, 4. f. Europa, Sibirien Nordamerika.

rotundifolia L., rundblättriges, 4. f. Europa, Nordam.
β) *arenaria* K.

secunda L., einseitigwendiges, 4. f. f. Europa, Nordam.
II. *Monesis* Salish. (*Parnassioides* K.).

uniflora L. (*M. grandiflora* Salish., DC.), einblumiges,
4. f. Europa, Nordamerika.

III. *Chimophila* Pursh, Nutt.

maculata L., geflecktes, f. f. b. k. Nordamerika.

umbellata L. (*C. corymbosa* Pursh.), doldiges, f. f. Europa, Asien, Nordamerika.

Pyrolirion aureum Herb. v. *Amaryllis peruviana*.

Pyrolaria pubera Mchx. v. *Hamiltonia oleifera*.

Pyrus T., Birne, Apfel. XII. II., Rosaceae-Pomaceae.

I. *Pyrophorum* DC. (*Pyrus* T.).

amygdaliformis Vill. (*sylvestris* Magn., *salicifolia* Lois.),
mandelähnliche, f. f. Istrien, Südfrankreich.

communis L. (*Achras* G.), gemeine, f. f. Europa.

a) *Achras* Wallr. b) *Pyraster* Wallr. c) *foliis*
variegat. d) *fructu variegato.* e) *sanguinolenta.*
f) *flore pleno.* g) *jaspida.* h) *sativa* DC. β)
tomentosa K. (*Pollveria* Lej.).

crenata D. Don, gekerbte, f. f. b. k. Nepal.

cuneifolia Guss., keilblättrige, f. f. Sicilien.

elaeagnifolia Pall. (*orientalis* Horn.), oleasterblättrige,
f. f. Taurien, Caucasus.

Michauxii Bosc, Michaux's, f. f. Nordamerika.

nivalis Jacq., Schnee-B., f. f. Oesterreich.

parviflora Dsf., kleinblumige, f. f. Creta.

Pollveria L. (*bollwylleriana* DC., *auricularis* Knoop,
irregularis du Roi), Bollwyllerische, f. f. Elsass.

salicifolia L., weidenblättrige, f. f. Caucasus, Sibirien.

salvifolia DC., salbeiblättrige, f. f. Frankreich.

sinaica Thouin (*montis Sinai* et *orientalis* Hort., *persica*
P.), sinaische, f. f. Sinai.

sinensis Lindl. (*sinica* Royle), chinesische, f. f. b. China.

variolosa Wall. (*Pashia* Hamilt.), schorfige, f. f. b. k. Nepal.

II. *Malus* T., Apfel.

acerba DC., Merat. (*P. Malus austera* Wallr., *M. com-*
munis sylvestris Dsf.), saurer (Holzapfel), f. f. Europa.

angustifolia Ait. (*coronaria* Wagnenh.), schmalblättriger,
f. f. Nordamerika.

astracana DC., astrakanischer, f. f. Astrakan, Persien.

baccata L., beerentragender, f. f. Sibirien, Japan.

coronaria L., wohlriechender, f. f. Nordamerika.

dioica W. (*apetala* Münchh.), zweihäusiger (grünblühender), f. f. ?

Malus L. (*Malus* β. *mitis* Wallr. β. *tomentosa* K.), ge-
meiner, f. f. Europa, Mittelasien.

β) *praecox* Swt.

prunifolia W. (*Malus* β. Ait., *hybrida* Dsf., *baccata* Hort.,
rubicunda Hfinsgg.), pflaumenblättriger, f. f. Sibirien.

b) *fructu acerbo* Wender.

Sieversii Ledeb., Sievers's, f. f. Sibirien.

spectabilis Ait. (*M. sinensis* Dum.), ansehnlicher, f. f.
b. k. China.

Unbestimmtere: *alnifolia* Hort., *Schottii* Hort.,
florentina Targ., *stipulacea* Hort., *rivularis* Hort.

Pyrus

Aria Ehrh., *aucuparia* G. etc. v. *Sorbus Aria* etc.
Azarolus Scop. v. *Crataegus Azarolus*. *Botryapium*
 L. suppl. (et *Amelanchier* du Roi) etc. vid. *Ame-*
lanchier Botryapium, vulgaris etc. *Cydonia* L. etc.
 v. *Cydonia vulgaris* etc.

Pyxidanthera Mchx., Büchsenanthere, V. 1., Ericaceae.
barbulata Mchx., bärtige, 4. f. k. Nordamerika.

Quadria heterophylla R. et P. v. *Guevina Avellana*.

Qualea Aubl. (guianischer Name), I. 1., Lythriaceae.
Vochysiae.

violacea Mart., violette, f. w. Brasilien.

Quassia L. (Quassi, ein Negerslave in Surinam, der
 zuerst ihre arzneilichen Kräfte entdeckte), X. 1., Tri-
 coccae-Simarubeae.

amara L., bittere, f. w. Surinam.

excelsa Sw. et *Simaruba* L. vid. *Simaruba excelsa*
 et *officinalis*.

Quekettia Lindl. (E. J. Quekett, englischer Pflanzen-
 anatom), XX. 1., Orchideae.

microscopia Lindl., kleine, 4. w. ? Südamerika.

Queltia Salisb. v. *Narcissus*.

Quercus T. L., Eiche, XXI. 1x., Amentaceae.

Aegilops L., Knopper-E., f. f. Süd- und Westeuropa,
 Griechenland, Kleinasien.

b) *latifolia* Hort. c) *pendula*.

agrifolia Nee, stacheligblättrige, f. w. Westl. Nordam.

alba L. (*palustris* Marsh.), weißse, f. f. Nordamerika.

a) *pinnatifida* Mchx. β) *repanda* Mchx. γ) *si-*
nuata Mchx.

ambigua Humb., zweifelhafte, f. t. Mexico.

annulata Sm. (*Phullata* Ham., *glauca* Lodd., ? *Kamroopii*

D. Don, *acuminata* Hort.), beringte, f. k. Nepal.

apennina Lam. (*conglomerata* P.), apenninische, f. f.
 Südfrankreich, Elsaß, Italien.

aquatica Walt. (*uliginosa* Wangenh.), Wasser-E., f. f.
 Nordamerika.

β) *hemisphaerica* Bartr. (*maritima* Auct.).

australis Lk. (*hybrida* Brot.), südliche, f. f. b. k. Portugal.

Ballota Dsf., langfrüchtige, f. k. f. b. Spanien, Portu-
 gal, Nordafrika.

bicolor W. (*Prinus tomentosa* Mchx., *Michauxii* Nutt.),
 zweifarbig, f. f. Nordamerika.

borealis Mchx. (*ambigua* W.), nördliche, f. f. Nordam.

brutia Tenor., calabrische, f. f. Calabrien.

Castanea W. (*Prinus acuminata* Mchx.), Kastanien-E.,
 f. f. Pennsylvanien.

Catesbaei Mchx., Catesbai's, f. f. Carolina, Georgia.

Cerris L. (*crinita* Lam., *haliphloeos* Juss., Lam.), bur-
 gundische, f. f. Südeuropa, Kleinasien.

a) *vulgaris* (*frondosa* Mill.). b) *pendula* Neill. c)

variegata Lodd. β) *austriaca* Jacq. W. (*Cerris* Host).

b) *cana major* Lodd. c) *cana minor* Lodd. d)

Ragnal Lodd. γ) *fulhamensis* Loud. (*dentata* Wats.,

hybrida var. *dentata* Swt.). b) *Lucombeana* Swt.

(*exoniensis* Lodd.). δ) *crispa* A. B. (*Lucombeana*

crispa Hort.). b) *suberosa* Hort. c) *incisa* Hort.

d) *dentata* Hort. e) *heterophylla* Hort. f) *bul-*

lata Hort. g) *dentata pendula* Hort.

Quercus

- cinerea Mchx. (*Phellos* β . Ait., *humilis* Walt.), aschfarbige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- coccifera L., Kermes-E., $\frac{1}{2}$ k. f. b. Südeuropa, Kleinasien, Syrien.
- coccinea Wangenh. (*rubra* β . Ait.), Scharlach-E., $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- Cookii Loud., Cook's, $\frac{1}{2}$ k. f. b. Gibraltar.
- dealbata Lindl., weifshlätterige, $\frac{1}{2}$ k. Nepal.
- discolor Ait. (*tinctoria sinuosa* Mchx.), verschiedenfarbige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- Esculus L., griechische, $\frac{1}{2}$ k. f. b. Griechenl., Kleinasien.
- faginea Lam., buchenähnliche, $\frac{1}{2}$ f. Span., Südfrankr.
- falcata Mchx. (*elongata* W., *discolor* Hort., *lyrata* Lodd., *cuneata* et *triloba* Hort.), sichelförmige, $\frac{1}{2}$ f. Nordam.
- falkenbergensis Booth, falkenbergische, $\frac{1}{2}$ f. ?
- Fontanesii Guss. (*pseudo-coccifera* Dsf.), Desfontaine's, $\frac{1}{2}$ k. f. b. Calabrien, Nordafrika.
- gramuntia L. (*rotundifolia* et *hispanica* β . Lam.), wellenblätterige, $\frac{1}{2}$ k. f. b. Spanien.
- heterophylla Mchx., verschiedenblätterige, $\frac{1}{2}$ f. Nordam.
- hybrida nana Loud. (*pedunculat. Ilex*, Hort. Angl., *humilis* Hort.), Bastardzwerg-E., $\frac{1}{2}$ f. Hybride.
- iberica Stev., iberische, $\frac{1}{2}$ f. Caucasus.
- Ilex L. (*heterophylla* Lam.), immergrüne, $\frac{1}{2}$ k. f. b. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.
- a) *integrifolia* Loud. b) *serratifolia* Lodd. c) *fagifolia* Lodd. d) *crispa* Lodd. e) *latifolia* Lodd. (*oblonga* Hort.). f) *longifolia* Lodd. g) *variegata* Hort.
- ilicifolia Wangenh. (*Banisteri* Mchx.), stechhülsenblätterige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- imbricaria Mchx. (*latifolia* Hort.), breitschuppige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- imbricata Hamilt., schuppenfrüchtige, $\frac{1}{2}$ k. Nepal.
- infectoria Oliv., Färber-E., $\frac{1}{2}$ k. f. b. Orient.
- lanata Sm. (*lanuginosa* D. Don, *Banja* Hamilt., ? *oblongata* D. Don, ? *incana* Royle), wollige, $\frac{1}{2}$ k. Nepal.
- laurifolia Mchx., lorbeerblätterige, $\frac{1}{2}$ k. f. b. Südcarol.
- β) *hybrida* Mchx. (*obtusa* Ait.).
- lyrata Walt. (*lobata* Nee), leierblätterige, $\frac{1}{2}$ f. b. Carolina, Louisiana, Neuspanien.
- macrocarpa Mchx., grofsfrüchtige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- maritima W. (*Phellos* *maritima* Mchx.), Meerstrands-E., $\frac{1}{2}$ f. b. k. Carolina.
- mexicana Humb., mexicanische, $\frac{1}{2}$ k. t. Mexico.
- montana W. (*Prinus monticola* Mchx.), Berg-E., $\frac{1}{2}$ f. Virginien, Carolina.
- myrtifolia W., myrtenblätterige, $\frac{1}{2}$ k. f. b. Carolina.
- nana W. (*aquatica* γ . Ait.), Zwerg-E., $\frac{1}{2}$ f. b. Carolina.
- nigra L. (*marylandica* Ray., *ferruginea* Mchx., *aquatica* Lodd.), schwarze, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- olivaeformis Mchx., olivenfrüchtige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- palustris du Roi (*montana* et *Banisteri* Lodd.), Sumpfe., $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- pedunculata Ehrh. (*Robur* Sm., *Robur* a L., *foemina* Mill., *racemosa* Lam., *navalis* Burnet), Stiel-E., $\frac{1}{2}$ f. Europa.
- b) *pubescens* Lodd. c) *fastigiata* Lam. (*pyramidalis* Hort., *viminalis* Bosc.). d) *pendula* Lodd.

Quercus

- e) heterophylla Loud. (*salicifolia*, *flicifolia* et *Fennesii* Hort., *laciniata* Lodd.). f) fol. variegatis Lodd. g) *purpurea* Lodd. h) *Hodginsii* Lodd. i) *dulcis* Loud. β) *rosea* Bechst.
- Phellos* L. (*Phellos sylvatica* Mchx.), weidenblättrige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- prinoides* W. (*Prinus pumila* Mchx., *Chinquapin* Pursh), kastanienähnliche, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- Prinos* L. (*Prinus palustris* Mchx.), kastanienblättrige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- Pseudo-Suber* Santi, unächte Kork-E., $\frac{1}{2}$ k. f. b. Südspanien, Italien, Nordafrika.
- pubescens* W. (*lanuginosa* Thuill., *collina* Schlchr., *Robur* δ . Lam., *Frainetto* Tenor., *faginea* Spgl.), weichhaarige, $\frac{1}{2}$ f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.
- pyrenaica* W. (*Tauzin* P., *nigra* Thor., *Toza* Bosc, *stonifera* Lapeyr., *humilis* Lam., *castellana* Bosc), pyrenäische, $\frac{1}{2}$ f. Westeuropa.
- Robur* L. suec. (*sessiliflora* Sm., *sessilis* Ehrh., *regalis* Burnet), Stein-E., $\frac{1}{2}$ f. Europa.
- a) *microcarpa*. b) *truncata*. c) *collina*. d) *nigrescens*.
- rubra* L., rothe, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- b) *latifolia*. c) *montana*.
- sericea* W. (*pumila* Mchx., *Phellos sericea* Ait.), seidenhaarige, $\frac{1}{2}$ k. f. b. Carolina, Florida.
- spicata* Humb., ährige, $\frac{1}{2}$ t. Mexico.
- stellata* Wangenh. (*obtusiloba* Mchx.), sternförmige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- Suber* L., Kork-E., $\frac{1}{2}$ k. f. b. Südeuropa, Nordafrika.
- b) *latifolia*. c) *angustifolia*. d) *dentata* (*Pseudo-suber* Auctor.).
- Thomasii* Tenor., Thomas's, $\frac{1}{2}$ f. Neapel.
- tinctoria* W. (*velutina* Lam., *tinctoria angulosa* Mchx., *nigra* du Roi, *rubra* Walt.), Quercitron-E., $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- triloba* Mchx. (*cuneata* Wangenh.), dreilappige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- Turneri* W. (*hybrida* Hort.), Turner'sche, $\frac{1}{2}$ f. b. k. Tibet.
- virens* Ait. (*Phellos* β . L., *sempervirens* Walt., Banist.), immergrüne, $\frac{1}{2}$ k. f. b. Nordamerika.
- Queria** Löffl. (Don J. Quer y Martínez, spanischer Wundarzt und Botaniker), III. III. (X. I.), Portulacaceae-Paronychieae.
- hispanica* L., spanische, $\odot$ f. Spanien.
- canadensis* L. vid. *Anychia dichotoma*. *capillaris* Nutt. v. *Anychia capillaris* Nachtr.
- Quisqualis** L., Röhrenkelch, X. I., Onagrariae-Combretaceae.
- glabra* Burm. (*indica* Lour.), kahler, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien, Cochinchina, Südchina.
- indica* L., ostindischer, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.
- pubescens* Burm., weichhaariger, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.
- Quivisia** Commers. (Quivi-Holz), (mascarenischer Name), XVI. VI. (X. I.), Hesperideae-Meliaceae.
- heterophylla* Cav., verschiedenblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Mascarenas.

Rademachia Thbg. v. *Artocarpus*.

Radiola Dill., Strahlenkraut, IV. III., Hypericineae-Lineae.
linoides Gmel. (*Millegrana* Sm.), leinähnliches, ☉. f.
Europa.

Rafnia Thbg. (C. G. Rafn, dänischer Botaniker), XVII.
IV. (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

cuneifolia Thbg., keilblättrige, ♀. t. Cap der gut. H.
elliptica Thbg., elliptische, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
lancea DC., lanzettblättrige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.
opposita Thbg., gegenblättrige, ♀. t. Cap der gut. H.
triflora Thbg. (*Borbonia cordata* Andr.), dreiblumige,
♂. t. Cap der guten Hoffnung.

amplexicaulis Thbg. v. *Vascoa amplexicaulis*. *re-*
tusa Vent. v. *Templetonia retusa*.

Rajania L. (J. Ray oder Rajus, berühmter englischer
Naturforscher), XXII. VI. (VI. III.), Sarmenaceae-
Dioscoreae.

cordata L., herzblättrige, 4. Sch. w. Westind., Südam.

hastata L., spontonblättrige, 4. Sch. w. Hispaniola.

quinquefolia L., fünfblättrige, 4. Sch. w. Westindien.

Ramondia Rich. (M. L. Ramond, französischer Bota-
niker), V. I., ? Personatae-Verbasceae (? *Solanaceae*).

pyrenaica Rich., pyrenäische, 4. f. b. k. Pyrenäen, Piemont.

Randia L. (J. Rand, englischer Botaniker), V. I.,
Rubiaceae.

aculeata L., stachelige, ♀. w. Westindien, Mexico.

Bowieana Cunn., Hook., Bowie's, ♀. w. Brasilien.

longiflora Lam., langblumige, ♀. w. Ostindien.

macrantha R. et S. (*longiflora* Salisb.), großblumige, ♀.
w. Sierra Leone.

obovata R. et S. (*pubescens* R. et P.), verkehrteiblät-
terige, ♀. w. Südamerika.

parviflora Lam. (*Gardenia Sonneratii* Spgl.), kleinblumige,
♀. w. Ostindien.

racemosa Roxb., traubige, ♀. w. Ostindien.

rotundifolia R. et P., rundblättrige, ♀. w. Peru.

sinensis R. et S., chinesische, ♀. w. China.

Ranunculus Bauh., T., Ranunkel, Hahnenfuß, XIII. VI.,
Ranunculaceae.

abortivus L., verkümmerter, 4. f. Nordamerika.

aconitifolius L., sturmhutblättriger, 4. f. Mitteleuro-
päische Voralpen.

a) *humilis* DC. β) *crassicaulis* DC. γ) *medius*
Bernh. δ) *platanifolius* L. b) *flore pleno*.

acris L. (*napellifolius* Crtz), scharfer, 4. f. Europa,
Asien, Nordamerika.

b) *flore pleno*. c) *sylvaticus* Thuill. d) *multi-*
fidus DC. (*polyanthemos* Lobel). e) *albus* Hort.
β) *Stevenii* Andrzy., Bess.

affinis RB., ähnelnder, 4. f. Melvilleinsel.

alpestris L., Voralpen-R., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

amplexicaulis L., stengelumfassender, 4. f. Südeuro-
päische Alpen.

anemonoides Zahlbr. (*Callianthemum rutaefolium* Rchb.),
anemonenähnlicher, 4. f. Oest erreich, steyermärk. Alpen.

angulatus Presl, kantiger, 4. Kn. f. Sicilien.

angustifolius DC., schmalblättriger, 4. f. Pyrenäen.

apiifolius P., sellerieblättriger, ♂. f. k. Buenos-Ayres.

aquatilis L., Wasser-R., 4. Wa. f. Europa, Asien,
Afrika, Amerika.

Ranunculus

- a) *peltatus* Schrk. β) *truncatus* K. γ) *quinque-lobus* K. δ) *tripartitus* Nolt. ϵ) *pantothrix* Brot. ζ) *succulentus* K.
- arcticus* Richards., Polar-R., 4. f. Nördl. Amerika.
- arvensis* L., Acker-R., $\odot$. f. Europa.
- β) *tuberculatus* Kit. γ) *inermis* K.
- asiaticus* L., asiatischer (Garten-R.), 4. Kn. f. b. Griechenland, Kleinasien, Nordafrika.
- β) *sanguineus* Mill. γ) *tenuilobus* DC.
- auricomus* L. (*polymorphus* All., *vernus* Spenn.), goldschopfiger, 4. f. Europa, Nordamerika.
- β) *fallax* Wimm. et Grab. (*cassubicus* Auctor.).
- bonariensis* Poir., bonarischer, $\odot$. f. Buenos-Ayres.
- brevicaulis* Hook., kurzstengeliger, 4. f. Nordamerika.
- brevifolius* Tenore., kurzblättriger, 4. Kn. f. Neapel.
- brutius* Tenore., calabrischer, 4. f. Calabrien.
- bulbosus* L., zwiebelknolliger, 4. Kn. f. Europa, Nordamerika.
- b) *flore pleno*. c) *bracteatus* Schl. d) *ochroleucus*.
- bullatus* L., bauchiger, 4. Kn. f. b. Portugal, Sicilien, Griechenland, Nordafrika.
- b) *grandiflorus*. c) *flore pleno*.
- bupleuroides* Brot., bupleurumblättriger, 4. f. b. k. Portugal.
- cardiophyllus* Hook., herzblättriger, 4. f. Nordamerika.
- cassubicus* L., cassubischer, 4. f. Schlesien, Pommern, Preussen, Galicien.
- caucasicus* MB., caucasischer, 4. f. Caucasus.
- chaerophyllus* L. (*flabellatus* Dsf.), kerbelblättriger, 4. Kn. f. b. Südeuropa, Nordafrika.
- chius* DC., griechischer, $\odot$. f. Griechenland.
- cicutarius* Schltld., cicutablättriger, 4. Kn. f. Ostsibir.
- coronatus* Ehrb., gekrönter, $\odot$. f. Aegypten.
- cortusaefolius* W., cortusablättriger, 4. Kn. k. Canarische Inseln.
- crassicaulis* Hornem., dickstengeliger, 4. f. ?
- crenatus* WK., gekerbter, 4. f. b. Steyermark, ungarische Alpen.
- creticus* L., cretischer, 4. Kn. f. b. k. Creta, Nordafrika.
- β) *macrophyllus* Dsf.
- Cymbalaria* Pursh, cymbelkrautblättriger, 4. f. Sibirien, Nordamerika.
- dissectus* MB., schlitzblättriger, 4. f. Caucasus, Sibir.
- divaricatus* Schrk. (*circinatus* Sibth., *rigidus* Host., *stagnatilis* Wallr., *aquatilis* β . L., *pantothrix* a DC.), ausgesperter, 4. Wa. f. Europa.
- Eschscholtzii* Schltld., Eschscholtz's, 4. f. b. Aleutische Inseln.
- fascicularis* Mühlbg., büschelförmiger, 4. f. Nordamer.
- Flammula* L., beißender, 4. f. Europa, Asien, Afrika, Amerika.
- β) *ovatus* P. γ) *serratus* DC. δ) *reptans* L. ϵ) *filiformis* Mchx.
- fluitans* Lam. (*fluvialis* Wigg., *peucedanifolius* All., *aquatilis* δ . L., *pantothrix* γ . DC., *peucedanoides* Dsf.), Fluß-R., 4. Wa. f. Europa, Afrika, Nordamerika.
- frigidus* W. (*altaicus* Laxm.), kalter, 4. f. b. Sibirien.
- fumariaefolius* Dsf., erdrauchblättriger, 4. Kn. f. ?
- glaberrimus* Hook., kahlster, 4. f. Nordamerika.

Ranunculus

glacialis L., Gletscher-R., 4. f. b. Europäische Alpen.

β) *aconitoides* DC.

Gouani W. (*pyrenaeus* Gouan), Gouan's, 4. f. b. Pyren.

gracilis DC., schlanker, 4. Kn. f. b. k. Griechenland.

gramineus L., grasblättriger, 4. f. b. k. Südeuropa.

b) *flore pleno*. β) *phoenicifolius* DC.

grandiflorus L., großblumiger, 4. f. b. Kleinasien.

gregarius Brot. (*Thomasii* Tenor), gesellschaftlicher, 4.

Kn. f. b. Portugal, Neapel.

hederaceus L., epheuähnlicher, 4. Wa. f. Nord- und

Westeuropa, Sibirien.

hirtus Banks, kurzhaariger, 4. k. Neuzeeland.

hispidus Mchx., steifhaariger, 4. f. Virginien, Carolina.

Hornemanni Schltdl., Hornemann's, 4. Kn. f. Nordam.

hybridus Biria (*Thora* Jacq., *Pseudo-Thora* Host, *Pthora* Crantz), Bastard-R., 4. Kn. f. Mitteleurop. Alpen.

hyperboreus Rottb., nördlicher, 4. f. Norwegen, Island, Grönland.

illyricus L. (*sericeus* W.), illyrischer, 4. Kn. f. Oeland, österreichisches Litorale, Deutschland, Ungarn,

Taurien, Caucasus.

isopyroides DC., dolstockenähnlicher, 4. f. Sibirien.

lacerus Bell. (? *frigidus* Schrk.), zeretzter, 4. f. Oberitalien, Schweiz, Frankreich.

b) *pallidus* DC.

laciniatus Baumg., geschlitzter, ☉. f. Siebenbürgen.

lanuginosus L., wolliger, 4. f. Europa.

lappaceus Sm., klettenfrüchtiger, 4. k. Neuholland.

lapponicus L., lappländischer, 4. f. Lappland, Island.

Lingua L., zungenblättriger (großer), 4. f. Europa, Sibirien, Nordamerika.

lomatocarpus Fisch. et Mey., saumfrüchtiger, ☉. f. ?

marylandicus Poir., maryländischer, 4. f. Nordamerika.

millefoliatus Vahl, garbenblättriger, 4. Kn. f. b. Sicilien, Griechenland, Nordafrika.

β) *grandiflorus* D. Don (*garganicus* Tenor.).

monspeliacus L. (*illyricus* W. E.), südfranzösischer, 4.

Kn. f. Südfrankreich, Nordafrika.

β) *cuneatus* DC. (*apiifolius* Dsf.). γ) *rotundifolius* DC.

montanus W. (*nivalis* Jacq.), Berg-R., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

muricatus L., weichstacheliger, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika, Nord- und Südamerika.

β) *creticus* DC. γ) *carolinus* DC. (*echinatus* Vent.).

nemorosus DC. (*Breyninus* Crtz, *aureus* Schlchr.), Hain-R., 4. f. Mitteleuropa.

β) *pauciflorus* DC. (*villosus* St. Am.).

nivalis L., Schnee-R., 4. f. Nördliches Europa.

nodiflorus L., knotenblumiger, ☉. f. Südeuropa, Ungarn.

β) *dentatus* DC.

obtusifolius Horn., stumpfblättriger, 4. f. Sibirien.

ophioglossifolius DC. (*cordifolius* Bast., *fistulosus* Brign.), natterzungenblättriger, ☉. Wa. f. Südeuropa.

ovalis Rafin., eiförmiger, 4. f. Nordamerika.

oxyspermus MB., grannenfrüchtiger, 4. Kn. f. Taurien, Caucasus, Syrien.

paludosus Poir., Morast-R., 4. Kn. f. b. Nordafrika.

Ranunculus

- parnassifolius L., parnassiablätteriger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
 parviflorus L., Gouan, kleinblumiger, ☉. f. Südeuropa, England.
 pedatifidus Sm., fußspaltiger, 4. f. Sibirien.
 pedatus W. K., fußförmiger, 4. Kn. f. Ungarn, Siebenb.
 pensylvanicus L., pensylvanischer, 4. f. Nordamerika.
 Philonotis Ehrh. (*hirsutus* Curt., Ait., *sardous* Crtz., *pallidior* Vill., *agrarius* All.), rauher, ☉. f. Europa.
 β) parvulus L. γ) intermedius Poir. (*pumilus* Thuill.).
 plebejus RB., gemeiner neuholländischer, 4. k. Neuholl.
 polyanthemus L., vielblumiger, 4. f. Europa.
 polyphyllus W. K. (*minimus* W.), vielblätteriger, ☉. Wa. f. Ungarn.
 propinquus Ledeb., verwandter, ☉. f. Rußland.
 Purshii Richards., Pursh's, 4. f. Nördliches Amerika.
 pygmaeus Wahlbg., zwergiger, 4. f. Nördliches Europa und Amerika.
 pyrenaeus L., pyrenäischer, 4. f. b. Mitteleurop. Alpen.
 β) bupleurifolius Lapeyr. γ) plantagineus All.
 recurvatus Poir. (*saniculaeformis* Mühlb.), zurückgekrümmt, 4. f. Nordamerika.
 repens L., kriechender, 4. f. Europa, Asien, Nordam.
 b) flore pleno.
 rhomboidalis Hook., rautenförmiger, 4. f. Nordamer.
 rufulus Brot., fuchsröthlicher, 4. f. Portugal.
 rutaefolius L. (*Callianthemum rutaefol.* C. A. Mey., *coriandrifolium* Rchb.), rautenblätteriger, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.
 Sabini RB., Sabine's, 4. f. Melville-Insel.
 salsuginosus Pall. (*ruthenicus* Jacq.), Salinen-R., 4. f. Sibir.
 sceleratus L., blasenziehender, ☉. f. Europa, Asien, Nordamerika.
 Schlechtendalii Hook., Schlechtendal's, 4. f. Nordamer.
 Schraderianus Fisch. et Mey., Schrader's, ☉. f. ?
 Seguierii Vill. (*Columnae* All.), Seguier's, 4. f. b. Dauphiné, Piemont, krainer und tyroler Alpen.
 sessiliflorus Poir., stiellosblumiger, ☉. f. Neuholland.
 Thora L. (*scutatus* W. K.), giftiger, 4. Kn. f. Mitteleuropäische Alpen, Kroatien.
 tomentosus Poir., filziger, 4. f. Carolina.
 trachycarpus Fisch. et Mey., rauhfrüchtiger, ☉. f. Taurien.
 Traunfellneri Hoppe, Traunfellner's, 4. f. Kärnthen, Krain.
 trifolius Dsf., dreiblätteriger, 4. f. Sibirien.
 trilobus Dsf., dreilappiger, ☉. f. Nordafrika, Sicilien, Griechenland.
 tripartitus DC., dreitheiliger, 4. Wa. f. Frankreich, England etc.
 a) micranthus DC. β) obtusiflorus DC.
 tuberosus Lapey., knolliger, 4. Kn. f. Pyrenäen.
 uliginosus W. (*cochlearifolius* Hornem.), sumpfliebender, ☉. Wa. f. Teneriffa.
 ventricosus Vent. (*muricatus* γ. *brasiliensis* DC.), bauchiger, ☉. f. Südamerika.
 Villarsii DC. (*lupponicus* Vill., *oreophilus* MB., *Hornschuchii* Hoppe, *Gouani* Hegetschw.), Villars's, 4. f. b. Krain, Schweiz, Dauphiné, Taurien, Caucasus, Sibirien.
 villosus DC., zottiger, 4. f. Persien.

Ranunculus

falcatus L. et *falcatus* MB. v. *Ceratocephalus falcatus* et *orthoceras*. *Ficaria* L. v. *Ficaria verna*.

Raphanistrum T., Hederich, XV. 1., Cruciferae.

arvense Wallr. (*Lampsana* G., *innocuum* Medik.), Acker-H., ☉. f. Europa.

a) album. β) ochroleucum. γ) sulphureum. δ) purpureum.

Gayanum Fisch. et Mey. (*Landra* Hort.), Gay's, ☉. f. ?Südeuropa.

Landra (Morett.), *Landra*-H., ♂. f. Italien.

maritimum Rchb. (Sm.), Meerstrands-H., ♂. 4. f. Engl.

odessanum Andrzej., Bess., Odessa'scher, ☉. f. Odessa.

rostratum Fisch., schnabelförmiger, ☉. f. Nordpersien.

Raphanus T., Rettig, XV. 1., Cruciferae.

caudatus L., geschwänzter, ☉. f. m. Java.

sativus L., gebauter, ☉. ♂. f. China.

β) *radicula* DC. b) *rotundus* Mill. c) *oblongus* DC. d) *oleiferus* DC. (*chinensis* Mill.). γ) *niger* DC. b) *vulgaris* DC. c) *rotundus* DC. d) *griseus* DC. e) *albus* DC. (*orbicularis* Mill.).

cheiranthiflorus W. v. *Brassica Cheiranthus*. *ibericus* MB. etc. v. *Chorispora iberica* etc. *laevigatus*

MB. vid. *Goldbachia laevigata*. *pterocarpus* P. vid.

Enarthrocarpus pterocarpus.

Raphiolepis Lindl., Hagestrauch, XII. 11., Rosaceae-Pomaceae.

indica Lindl., indischer, ♂. t. Ostindien, China.

laevis Lodd., glatter, ♂. t. China.

latifolia Lodd., breitblättriger, ♂. t. China.

phaeostemon Lindl., braunfädiger, ♂. t. China.

rubra Lindl., rother, ♂. t. Südchina.

salicifolia Ker, weidenblättriger, ♂. t. China.

Rapistrum Boerh., Rapsdotter, XV. 1., Cruciferae.

glabrum Host, kahler, ♂. f. Oesterreichisches Litorale.

orientale DC. (*Bunias raphanifol.* Sm.), morgenländischer, ☉. f. Creta, Griechenland.

perenne All. (*diffusum* Crtz), ausdauernder, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

rugosum All., runzeliger, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.

aegyptiacum RB. v. *Ochthodium aegyptiacum*. *pa-*

niculatum G. v. *Neslia paniculata*.

Raspailia Brong. (Raspail, französischer Botaniker), V. 1., Corniculatae-Cunoniaceae.

microphylla Brong., kleinblättrige, ♂. t. k. C. d. g. H.

Ratabida columnaris Rafin. v. *Rudbeckia columnaris* etc.

Rauwolfia Plum. (L. Rauwolf, ein Arzt und Naturforscher zu Augsburg, welcher den Orient bereiste), V. 1. (11.), Contortae-Apocynae.

canescens L., weißgrauliche, ♂. w. Westindien.

nitida L., glänzende, ♂. w. Südamerika.

ternifolia H. B. K., dreiblättrige, ♂. w. Südamerika.

tomentosa Jacq., filzige, ♂. w. Südamerika.

Ravenala madagascariensis Sonner. v. *Urania speciosa*.

Reaumuria L. (A. F. de Réaumur, berühmter franz. Naturforscher), XIII. v., Aizoideae-Tamariscineae.

hypericoides W., johanniskrautähnliche, ♂. k. Syrien.

vermiculata L., wurmförmige, ♂. k. Sicilien, Aegypt., Syrien.

Redoutea Vent. (P. J. Redouté, berühmter französischer Pflanzenmaler), XVI. VIII., Malvaceae.

Redoutea

heterophylla Vent., verschiedenblättrige, ☉. w. Süd- am.

Reevesia Lindl. (John Reeves zu Canton), XVI. VIII.,
Malvaceae-Büttneriaceae.

thyrsoides Lindl., strauchsblumige, ♀. t. China.

Rehmanniana Libosch., Rehmannie, XIV. II., Perso-
natae-Bignoniaceae (*Gesneriaceae*).

chinensis Fisch. (*glutinosa* Libosch.), chinesische, 4. k.
f. b. China.

Reichardia Roth (J. J. Reichard, Arzt und Botaniker
zu Frankfurt a. M.), X. I., Leguminosae-Caesalpinieae.
hexapetala Roth, sechskronenblättrige, ♀. w. Ostindien.

Reichenbachia Spgl. (L. Reichenbach, Hofrath, Pro-
fessor etc. zu Dresden, einer der berühmtesten Bota-
niker), II. I., Nyctagineae.

hirsuta Spgl., rauhhaarige, ♀. w. Brasilien.

Reimaria Flügge (Reimarus, Naturforscher zu Hamburg),
III. II., Gramineae.

purpurascens Lk., purpurfarbige, 4. w. ? Südamerika.

Relhania L'Her. (Rich. Relhan, englischer Botaniker),
XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

I. Genuina.

paleacea L'Her. (*ericoides* Cass.), heideähnliche, ♀. k.
Cap der guten Hoffnung.

santolinoides L'Her., santolinaähnliche, ♀. k. C. d. g. H.
squarrosa L'Her., sparrige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

II. Eclopes G.

genistaefolia L'Her., ginsterblättrige, ♀. k. C. d. g. H.
pungens Ker (*lateriflora* Lk., *trinervis* et *quinquenervis*

Thbg.), stechende, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

lateriflora L'Her. v. *Rhynchopsidium sessiliflorum*.

Remirea Aubl. (guianischer Name), III. I., Gramineae.
maritima Aubl., Seestrands-R., 4. w. Südamerika.

Renanthera Lour., Strauchstendel, XX. I., Orchideae.
coccinea Lour., scharlachblumiger, 4. ♀. w. Südchina.

Renealmia L. suppl. (Paul Renealme, alter franz.
Arzt und Botaniker), I. I., Scitamineae (*Bananeae*).

exaltata L., hohe, 4. w. Westindien.

nutans Andr. v. *Alpinia nutans*. *Renealmia grandi-
flora* RB., *paniculata* RB. etc. v. *Libertia grandi-
flora* etc.

Requienia DC. (Requien zu Avignon, französischer
Botaniker), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae-
Papilionaceae.

obcordata DC., verkehrtherzförmige, ♀. w. Senegal.

Reseda T., Reseda, XI. III., Resedaceae.

abyssinica Fresen., abyssinische, ☉. f. Abyssinien.

alba L., weisse, ☉. f. Südeuropa.

bipinnata W., doppeltgefiederte, ♀. k. Spanien.

canescens L. (*hexagyna* Forsk.), weißgraue, 4. k. Spa-
nien, Aegypten.

chinensis Lour., chinesische, ☉. f. Südchina.

crispata Lk. (*lanceolata* Lag.), krausblättrige, ☉. f.
Portugal, Spanien.

dipetala Ait. (*capensis* Thhg.), zweikronenblättrige, ♂.
k. Cap der guten Hoffnung.

fruticulosa L., strauchige, 4. ♀. f. k. Spanien, Sicilien.

glaucula L., blaugrüne, 4. f. Spanien, Aegypten.

globulosa Fisch. et Mey., kugelige, ♂. f. Schirvan.

Reseda

inodora Rchb. (*mediterranea* Hort.), geruchlose, ☉ f. Südeuropa.

linifolia Hornem., flachsblättrige, ☉. f. Südeuropa.

lutea L., gelbe, ♂. 4. f. Europa.

Luteola L., Wau-R., ☉. ♂. f. Europa.

mediterranea ? L., Jacq. (*tetragyna* Forsk.), mittelländische, ☉. f. Palästina, Nordafrika.

myriophylla Tenor., vielblättrige, ☉. f. Süditalien.

odorata L., wohlriechende, ☉. ♂. f. Nordafrika.

b) *frutescens* Hort.

Phyteuma L., spatelblättrige, ☉. f. Unterösterreich, Südeuropa.

pruinosa Delil., bereifte, 4. k. Aegypten.

ramosissima Pourr. (*erecta* Lag.), ästige, 4. f. Spanien.

saxatilis Pourr. (*stricta* P.), steife, 4. f. Spanien.

scoparia Brouss., besenartige, ♂. k. Teneriffa.

sesamoides L. (*stellata* Lam., *Clusii* Spgl., *purpurascens* L.), sternsamige, ☉. f. Westeuropa.

truncata Fisch. et Mey., abgestutzte, ? ☉. f. Natolien.

undata L., wellenblättrige, ♂. f. Südeuropa.

virescens Hornem., grünliche, ☉. f. Spanien.

Restio L., Strickgras, III. 1. (XXII. III.), Restiaceae.

australis RB., südliches, 4. ♂. k. Van-Diemens-Land.

fastigiatus RB., gipfelständiges, 4. ♂. k. Neuholland.

gracilis RB., schlankes, 4. ♂. k. Neuholland.

lateriflorus RB., seitenblumiges, 4. ♂. k. Neuholland.

paniculatus Rottb., rispiges, 4. ♂. k. Cap der gut. H.

tectorum Thbg., Dach-S., 4. ♂. k. Cap der gut. H.

tetraphyllus La Bill., vierblättriges, 4. ♂. k. V.-D.-L.

vaginatus Thbg., scheidiges, 4. ♂. k. Cap d. gut. H.

virgatus Rottb., ruthenförmiges, 4. ♂. k. Cap d. g. H.

dichotomus Thbg. v, *Thamnochortus dichotomus*.

Retanilla Brogn. (peruvianischer Name), V. 1., Rhamneae.

Ephedra Brogn., ephedraähnliche, ♂. k. Chili.

obcordata Brogn., verkehrtherzblättrige, ♂. w. Peru.

Retzia Thbg. (A. J. Retzius, Professor der Naturgeschichte zu Lund), V. 1., Convolvulaceae.

spicata Thbg., ährige, ♂. k. Cap der guten Hoffnung.

Rhabdochloa *cruciata* P. B., *mucronata* P. B. vid. *Dactyloctenium aegyptiacum* et *mucronatum*. *domingensis*

P. B. et *virgata* P. B. v. *Leptochloa domingensis* etc.

Rhagadiolus T., Sichelsalat, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

edulis G., genießbarer, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

Hedypnois Fisch. et Mey., röhrleinartiger, ☉. f. Schirvan.

Kölpinia W., gleichbreitblättriger, ☉. f. Caucasus, Sibir.

stellatus W., sternförmiger, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

β) *intermedius* Tenor. (*lapsanoides* Dsf.).

Rhagodia RB., Beerenmelde, V. 1. (XXIII. II.), Aizoideae-Atripliceae.

Billardieri RB., La-Billardière's, ♂. k. Neuholland.

hastata RB., spontonblättrige, ♂. k. Neusüdwallis.

nutans RB., nickende, 4. k. Neuholland, V.-Diem.-L.

parabolica RB., parabolische, ♂. k. Neuholland.

Rhamnus T. L., Wegdorn, V. 1., Rhamneae.

Alaternus L., immergrüner, ♂. k. f. b. Süd- u. Westeuropa.

a) *balearica*. b) *hispanica*. c) *glabra*. d) *integrifolia*. e) *maculata*. f) *aurea*. g) *variegata*.

h) *argentea*. i) *laciniata*.

Rhamnus

alnifolius L'Her., erlenblättriger, *h. f.* Nordamerika.
 alpinus L., Alpen-W., *h. f.* Schweiz, Tyrol, Kärnthen etc.
 buxifolius Poir., buchsbaumblättriger, *h. k.* Nordafrika.
 carolinianus Walt., Mchx., carolinischer, *h. f.* Carolina.
 catharticus L., gemeiner (Kreuzbeere), *h. f.* Europa.

β) hydriensis Hacq.

celtifolius Thbg., celtisblättriger, *h. k.* Cap d. g. H.
 Clusii W. (*Alaternus angustifolia* A. B.), Clusius's, *h. k.*

Südfrankreich, Portugal.

crenulatus Ait., gekerbter, *h. k.* Teneriffa.

dahuricus Pall., dahurischer, *h. f.* Dahurien.

Erythroxylon Pall., Rothholz-W., *h. f.* Sibirien.

β) angustissimus Hort. Angl. (*lycioides* Pall.).

Frangula L. (*Frangula vulgaris* Rchb.), glatter (Faulbaum), *h. f.* Europa.

b) angustifolia Hort.

franguloides Mchx. (*alnifolius* var. DC.), faulbaumähnlicher, *h. f.* Nordamerika.

glandulosus Ait., drüsiger, *h. k.* Canarische Inseln.

hybridus L'Her. (*burgundicus* Hort., Par., *sempervirens* Hort.), Bastard-W., *h. f.* ?

infectorius L. (*longifolius* Mill.), färbender, *h. f.* Südeur.

integrifolius DC. (*coriaceus* N. E.), ganzblättriger, *h. k.* Teneriffa.

lanceolatus Pursh, lanzettblättriger, *h. f.* Nordamerika.

latifolius L'Her., breitblättriger, *h. k.* Azoren.

longifolius Dum. Cours., Dsf. (*Willdenowiana* R. et S.), langblättriger, *h. f.* ? Nordamerika.

lycioides L., bocksdornähnlicher, *h. k. f. b.* Spanien.

β) arragonensis Asso.

microphyllus W., H. B. K., kleinblättriger, *h. w.* Mexico.

oleoides L. (*oleifolius* Hort.), ölbaumähnlicher, *h. k.* Sicilien, Mauritien, Griechenland.

Pallasii Fisch. et Mey., Pallas's, *h. f.* Nordpersien.

prinoides L'Her., winterbeerenähnlicher, *h. k.* Cap der guten Hoffnung.

pubescens Poir. (*oleoides* Lam.), weichhaariger, *h. k. f. b.* Frankreich.

pumilus L., niedriger, *h. f.* Mittel- und Südeuropa.

Purshianus DC. (*alnifolius* Pursh), Pursh's, *h. f.* Nordam.

pusillus Tenor., zwergiger, *h. f.* Neapel.

rupestris Scop. (*pumilus* Wulf., *Wulfenii* Spgl., *Frangula* Wulfenii Rchb.), Felsen-W., *h. f.* Oesterreichisches Litorale.

saxatilis L., Gesteins-W., *h. f.* Mittel- und Südeuropa.

spathulaefolius Fisch. et Mey., spatelblättriger, *h. f.* Gegend des kaspischen Meeres.

surinamensis Scop., surinamischer, *h. w.* Surinam.

tetragonus L., vierkantiger, *h. k.* Cap der gut. Hoffn.

theezans L., theegebender, *h. k. t.* China.

tinctorius W. K. (*cardiospermus* W.), Färber-W., *h. f.* Oesterreich, Ungarn.

valentinus W. (*pumilus* var. DC.), valencianischer, *h. f.* Spanien.

virgatus Roxb. (*catharticus* Hamilt.), ruthenförmiger, *h. f. b.* Nepal.

capensis Thbg. (et *laevigatus* Vahl etc.) v. *Ceanothus capensis*, *laevigatus* etc. *colubrinus* L. et *cubensis* L. etc. v. *Colubrina ferruginosa* etc. *iguaneus*

Rhamnus

Cav., *Jujuba* L. (et *Zizyphus* L.) etc. v. *Zizyphus iguanea*, *Jujuba et vulgaris* etc. *lineatus* L. (et *volubilis* L.) vid. *Berchemia lineata* etc. *Paliurus* L. v. *Paliurus aculeatus*.

Rhapis L. fil., Fächerpalme, VI. III. (XXIII. I.), *Palmae arundinacea* Ait., rohrartige, 4. f. t. w. Carolina. *flabelliformis* Ait., gemeine, 4. f. t. w. China, Japan. *acaulis* W. v. *Sabal Adansoni*.

Rhaponticum DC., Flockendistel, XIX. III., *Compositae-Cynarocephalae*.

acaule DC. (*Cynara acaulis* L., *humilis* Juss.), stengellose, 4. k. Nordafrika, Cypern.

atriplicifolium DC., meldenblättrige, 4. f. Dahurien.

cynaroides Less., artischockenähnliche, 4. f. b. Pyren.

pulchrum Fisch. et Mey., schöne, 4. f. Caucasus.

scariosum DC. (? *Pallasii* G. Don), trockenhäutige, 4.

f. b. Schweiz, Savoyen, Piemont, Frankreich.

β) *lyratum* DC.

uniflorum DC., einblumige, 4. f. b. Sibirien, Dahurien.

Rheedia Plum., L. (Heinr. Adrian van Rhee de tot Drakenstein, Statthalter der holländisch-ostindischen Compagnie auf Malabar, großer Beförderer der Botanik), XII. III., *Guttiferae*.

lateriflora L., seitenblumige, f. w. Antillen.

Rheum L., Rhabarber, IX. I., *Portulacaceae-Polygonaceae*.

australe D. Don (*Emodii* Wall.), nepal'scher, 4. f. Nepal.

caspicum W., caspischer, 4. f. Gegend d. caspischen M.

compactum L., lederblättriger, 4. f. Tatarei, China.

crispum Ledeb., krauser, 4. f. Sibirien.

hybridum Ait., Bastard-R., 4. f. Nordasien.

leucorrhizum Pall., weifswurzeliger, 4. f. Sibirien.

nutans Fisch., nickender, 4. f. Sibirien.

palmatum L., handförmiger, 4. f. Mongolei, China.

Rhaponticum L., stumpfblättriger, 4. f. Thracien, Sibir.

Ribes L., rauhblättriger, 4. f. Syrien, Persien.

tataricum L. suppl., tatarischer, 4. f. Tatarei.

undulatum L., wellenblättriger, 4. f. China, Sibirien.

Gartenvarietäten oder Hybriden: *crassinervium* Hort.,

fenestratum Anders., *sibiricum* Hort., *tauricum* Hort.

austriacum H. C. v. *Rumex alpinus*. *digynum* Wahlbg.

v. *Oxyria reniformis*.

Rhexia P. Br., Rhexie, VIII. I. (X. I.), *Lythraeae-Melastomeae*.

angustifolia Nutt. (*mariana* γ. *exalbida* Mchx.), schmalblättrige, 4. k. f. b. Georgien, Carolina.

ciliolata Mchx., gefranzte, 4. k. t. Südcarolina.

diversifolia Domb., verschiedenblättrige, f. w. Peru.

Drummondii H. Angl., Drummond's, 4. k. Nordamerika.

hypericoides W. (*villosissima* Rich.), johanniskrautähnliche, ☉. w. Cayenne.

mariana L., maryländische, 4. k. f. b. Nordamerika.

β) *rubella* Pursh.

subtriplinervia H. Berol. (*elegans* et *floribunda* Hort.), weifsbäumige, f. w. ?

virginica L., virginische, 4. k. f. b. Nordamerika.

Acisanthera L. vid. *Acisanthera quadrata*, *aquatica*

L. vid. *Aciotis aquatica*. *Fontanesii* H. B. K. (et

holosericea Bonpl. et *viminea* Bot. reg. vid. *Ple-*

roma granulosa etc. *glomerata* Lodd. v. *Osbeckia*

Rhexia

glomerata. lanceolata Bonpl. v. Chaetogastra lanceolata. versicolor Lindl. v. Arthrostemma versicolor.

Rhinanthus L., MB., Nasenblume, XIV. II., Personatae-Rhinantheae.

Elephas L., rüsselförmige, ☉. f. Calabrien, Kleinasien. Alectorolophus Poll. etc. v. Alectorolophus hirsutus etc. Trixago W. v. Trixago rhinanthina.

Rhinopetalum Fisch., Nasenlilie, VI. I., Coronariae Karelini Fisch., Karelin's, 4. Zw. f. Ural.**Rhipidodendron dichotomum** W. et distichum W. vid Aloe dichotoma et plicatilis.**Rhipsalis** G. (Hariota Adans), Peitschencactus, XII. I., Cactaeae.

Cassytha G. (pendula Hort., Cassytha baccifera Mill.), hängender, ♀. w. Jamaica, Hispaniola, Mexico.

a) Swartziana DC. β) Hookeriana DC. γ) Moeniana DC. δ) dichotoma DC. ε) mauritiana DC. ζ) pendula Salm.

Cereuscula Haw., kleiner, ♀. w. Brasilien.

fasciculata Haw. (parasitica Haw.), büschelförmiger, ♀. w. Caribäen.

floccosa Salm (Cassytha β. major H. Dyck.), flockiger, ♀. w. ?

funalis Salm (grandiflorus Haw., calamiformis Hort.), riemenförmiger, ♀. w. Südamerika.

β) minor (Cassytha δ. pilosiuscula Salm.).

mesembrianthoides Haw. (salicornioides β. Haw., echinata Hort.), zaserblumenähnlicher, ♀. w. Südamerika.

micrantha DC., kleinblumiger, ♀. w. Quito.

pentaptera Pfr., fünfflügeliger, ♀. w. Brasilien.

trigona Pfr., dreikantiger, ♀. w. Brasilien.

undulata Pfr. (parasitica DC.), wellenförmiger, ♀. w. Caribäen.

salicornioides Haw. v. Hariota s. Nchtr.

Rhizophora L., Wurzelträger, XI. I. (VIII. I.), Rhizophoreae.

Mangle L., keulfrüchtiger, ♀. w. Ost- und Westindien.

Rhodanthe Lindl., Rosenimmortelle, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

Manglesii Lindl., Mangles's, ☉. t. Neuholl. (Schwanenfl.).

Rhodiola L., Rosenwurz, XXII. VII., Corniculatae-Crassulaceae.

rosea L., gemeine, 4. f. Mitteleurop. Alpen, England.

sibirica Hort., sibirische, 4. f. Sibirien.

Rhodochiton volubile Zuccar. vid. Lophospermum atrosanguineum.**Rhododendron** L., Alpenrose (Alpenbalsam), X. I., Ericaceae.

I. Buramia DC. (Booram G. Don).

arboreum Sm., baumartige, ♀. k. t. Nepal.

a) puniceum Roxb. (sanguineum Lindl.). β) roseum Lindl., Swt. γ) album Wall. (niveum Swt.).

δ) cinnamomeum Lindl. ε) strictum Lodd. ζ) zeylanicum Lodd. b) Loddigesii H. Angl. c)

Duncaster H. Angl. d) King Alfred H. Angl. etc.

Hybriden: venustum D. Don, Altaclerense Lindl.,

Smithii Swt., undulatum D. Don, Hook., Russe-

lianum Swt., Drummondii H. Angl., Manglesii H.

Anglor., Neillii H. Angl., augustum, blandum, Chel-

soniae, coccineum, nepalense, elegans, Waeheri H.

Rhododendron

Dresd., Liebigii Seidel, Lehmanni Liebig, Seidelianum Liebig, Terscheckianum Liebig etc.

barbatum G. Don, Wall., bärtige, $\frac{1}{2}$ k. t. Nepal.

Noch nicht eingeführte:

formosum Wall., schöne, $\frac{1}{2}$ t. Silhet.

linearifolium Poir., gleichbreitblättrige, $\frac{1}{2}$ t. Ostindien.

II. Hymenanthus Blum.

Metternichii Sieb. et Zucc. (*maximum* Thbg., ?*scabrum*

G. Don, *Hymenanthus japonica* Blum.), Metternich's, $\frac{1}{2}$ k. Nordjapan (noch nicht eingeführt).

III. Eurhododendron DC. (*Brachycalyx* Swt., *Ponticum* et *Lephipherum* G. Don).

campanulatum D. Don, Wallich, glockenblumige, $\frac{1}{2}$ t. Ostindien.

catawbiense Mchx., Catawba-A., $\frac{1}{2}$ f. b. Nordamerika.

b) Russelianum H. Angl. c) tigrinum H. Anglor. caucasicum Pall., caucasische, $\frac{1}{2}$ f. b. Caucasus.

β) stramineum Hook. γ) pulcherrimum Lindl.

δ) Nobleanum Lindl.

chrysanthum Pall. (*aureum* Georg., *officinale* Salisb.), goldblumige, $\frac{1}{2}$ f. b. Sibirien, Kamtschatka.

dahuricum L., dahurische, $\frac{1}{2}$ f. Sibirien, Mongolei.

a) sempervirens Hook. β) roseum DC. γ) altaicum Fisch. (*atrovirens* Ker).

Farrerae Tate, Swt., Farrera's, $\frac{1}{2}$ k. t. China.

ferrugineum L., rostfarbige, $\frac{1}{2}$ f. b. Mitteleurop. Alpen.

β) albiflorum DC. (*album* Swt.).

hirsutum L., behaarte, $\frac{1}{2}$ f. b. Mitteleuropäische Alpen.

b) variegatum.

lapponicum Wahlenb., lappländische, $\frac{1}{2}$ f. b. Nördlichstes Europa und Amerika.

lepidotum Wall., schülferige, $\frac{1}{2}$ t. Ostindien.

macrophyllum G. Don, großblättrige, $\frac{1}{2}$ f. b. Nordam.

maximum L. (*procerum* Salisb.), größte, $\frac{1}{2}$ f. b. Nordam.

β) bigener DC. (*fragrans* Hort., *hybridum bigener* Lindl.). γ) hybridum Hook. (?*latifolium* Hffg.).

ponticum L., pontische, $\frac{1}{2}$ f. b. Kleinasien, Südspan.

β) Lowei Loud. γ) hyacinthiflorum DC. δ)

myrtifolium Lodd. ϵ) azaleoides Dsf. (*subdeciduum* Andr.). b) odoratum Lodd. ζ) obtusum

Wats. (?*ellipticum* Hoffmsg.).

Gartenvarietäten: album, angustifolium, angustissimum, arbutifolium, bromeliaefolium, bullatum, casinefolium, coerulescens, contortum, crispum, flore pleno, fol. argenteis, fol. aureis, fol. marginatis, frondosum, grandiflorum, incarnatum, intermedium, kalmiaefolium, macrophyllum, nivaticum, obtusum, ovatum, pygmaeum, roseum, salicifolium, spectabile, violaceum etc.

punctatum Andr. (*minus* Mchx., *parviflorum* Hort.), punktirte, $\frac{1}{2}$ f. b. k. Nordamerika.

purpureum G. Don (*maximum* γ . *purpureum* Pursh), purpurfarbige, $\frac{1}{2}$ f. b. Virginien, Carolina.

Purshii G. Don (*maximum* β . *album* Pursh), Pursh's, $\frac{1}{2}$ f. b. Nordamerika.

β) majus Ker.

setosum D. Don, borstige, $\frac{1}{2}$ k. t. Nepal.

Noch nicht eingeführte: album Blum. (Java), brachycarpum G. Don (Japan), celebicum DC. (Ost-

Rhododendron

indien), javanicum Benn., Blum. (Java), malayanum Jack (Sumatra), palustre Turcz. (Südsibirien), retusum Benn. (Sumatra), tubiflorum DC. (Blum.) (Java).

IV. Pogonanthum G. Don.

anthopogon D. Don, Wall. (*aromaticum* Wall.), dichtblumige, f. t. Ostindien.

V. Tsutsusi G. Don (*Beverinckia* Salisb., *Loiseleuria* Rchb.).

albiflorum Hook., weißblumige, f. f. b. Nordamerika.
indicum Swt., indische, f. f. t. k. Java, Japan, China.

a) puniceum Swt. β) purpureum Sims. γ) ignescens Swt. δ) lateritium Lindl. ε) variegatum (Lindl.). ζ) incarnatum DC. (*Azalea indica plena* Sims).

ledifolium G. Don, DC., borstblätterige, f. t. k. China.

a) leucanthum Bunge (? *mucronatum* G. Don).

β) phoeniceum G. Don. b) speciosum Swt. (*indicum speciosum* Swt.).

pulchrum Swt. (*R. indicum Smithii* Swt., *indicum pulchrum* G. Don), schöne, f. t. Ostindien.

Hybriden und Varietäten: angustifolium Blum., aurantiacum G. Don, Danielsianum Paxt., elatum plenum H. Angl., floribundum Blum., grandiflorum Blum., luteum Swt., Rawsonii Paxt., spathulatum Blum. etc.

Noch nicht eingeführt: Burmanni G. Don (Japan). Unbekanntere: decumbens D. Don, molle G. Don, micranthum Turcz., mucronulatum Turcz., reticulatum D. Don.

Hybriden, von Rhododendrons und Azaleen gezogen: Cartonianum Lindl., enneandrum DC., Govenianum Swt., Seymouri (Lindl.) etc.

arborescens Torr. etc. vid. *Azalea arborescens*.

Rhodora G. Don (*pulchellum* Salisb.) vid. *Rhodora canadensis*.

Chamaecistus L. etc. v. *Rhodothamnus* Cham. etc.

Rhodora Duham., Sumpfrosee, X. 1., Ericaceae.

canadensis L., canadische, f. f. b. Nordamerika.

Rhodothamnus Rchb., Röschenstrauch, X. 1., Ericaceae.

Chamaecistus Rchb., drüsiger, f. f. b. Oesterreich., kärnthn., tyroler, salzburger etc. Alpen.

kamtschaticum (Pall.), kamtschatkaiser, f. f. b. Kamtschatka, westliches Nordamerika.

Rhopala Aubl. (guianischer Name), IV. 1., Proteaceae.

dentata RB., zahnblätterige, f. t. Guiana.

media RB. (*montana* Aubl.), mittlere, f. t. Guiana.

sessilifolia Rich., stiellosblätterige, f. t. Guiana.

Rhus T., Sumach, V. 111., Amyrideae-Terebinthaceae.

acuminata DC., zugespitzter, f. t. k. Nepal.

alata Thbg., flügelstieliger, f. k. Cap der gut. Hoffn.

albida Schousb. (*albicans* W.), weißlicher, f. k. Marocco.

angustifolia L., schmalblätteriger, f. k. Cap d. gut. H.

aromatica Ait., wohlriechender, f. f. Nordamerika.

Bucku-Amela Roxb. (*Amela* D. Don), Bucku-S., f. t. k. Nepal.

Burmanni DC. (*lucida* H. Kew.), Burmann's, f. k. Cap der guten Hoffnung.

caustica Hook., ätzender, f. t. Chili.

Cavanillesii DC. (*lucida* Cav.), Cavanilles's, f. t. Mexico.

Rhus

chinensis Mill., chinesischer, *h. k.* China.
 ciliata Lichtstn., gefranzter, *h. k.* Cap der gut. Hoffn.
 Commersonii Poir., Commerson's, *h. w.* Südamerika.
 concinna Burch., netter, *h. k.* Cap der gut. Hoffnung.
 copallina L., Copal-S., *h. f.* Nordamerika.

β) leucantha Jacq.

Coriaria L., Gerber-S., *h. f.* Südeuropa, Syrien, Palästina.
 Cotinus L., Perrücken-S., *h. f.* Südeuropa.
 crenata Thbg., gekerbter, *h. k.* Cap der gut. Hoffn.
 cuneifolia L. (? *grandidentata* Burch.), keilblättriger, *h. k.* Cap der guten Hoffnung.
 dentata Thbg. (? *spicata* Thbg.), gezahnter, *h. k.* Cap der guten Hoffnung.
 digitata L., fingerförmiger, *h. k.* Cap der gut. Hoffn.
 dioica Brouss., zweihäusiger, *h. k.* Mogadore.
 dissecta Thbg., zerschnittener, *h. k.* Cap der gut. H.
 elegans Ait. (*glabra coccinea* Loud., *caroliniana* Mill.), schöner, *h. f.* Nordamerika.
 elliptica Thbg., elliptischer, *h. k.* Cap der gut. Hoffn.
 excisa Thbg., ausgeschnittener, *h. k.* Cap d. gut. H.
 fragrans W., wohlriechender, *h. k.* Cap der gut. H.
 fraxinifolia D. Don, eschenblättriger, *h. t. k.* Nepal.
 glabra L., kahler, *h. f.* Nordamerika.

a) hermaphrodita. β) dioica Lam.

glauca Thbg., blaugrüner, *h. k.* Cap der gut. Hoffn.
 heterophylla DC., verschiedenblättriger, *h. k.* Cap der guten Hoffnung.
 javanica L., javaischer, *h. t.* Japan, China, Ostindien.
 incisa Thbg., schlitzenblättriger, *h. k.* Cap der gut. H.
 laevigata W. (*trifoliata* W., *elongata* Jacq.), glatter, *h. k.* Cap der guten Hoffnung.
 lineata P. (*lineatifolia* Orteg. Lag.), linirter, *h. w.* Cuba.
 lobata Poir., gelappter, *h. k.* Teneriffa.
 lucida L., spiegelnder, *h. k.* Cap der guten Hoffnung.
 Metopium L., Corallen-S., *h. w.* Westindien.
 micrantha Thbg., kleinblumiger, *h. k.* Cap der gut. H.
 mucronata Thbg., stachelspitziger, *h. k.* Cap d. gut. H.
 nervosa Poir., nerviger, *h. k.* Cap der guten Hoffn.
 obliqua Thbg., schiefblättriger, *h. k.* Cap der gut. H.
 oxyacantha Schousb. (*crataegifolium* P.), weifsdornähnlicher, *h. k.* Marocco.
 paniculata Wall., rispiger, *h. t.* Nepal.
 pauciflora L., wenigblumiger, *h. k.* Cap der gut. H.
 pendulina Jacq., herabhängender, *h. k.* Cap d. g. H.
 pentaphylla Dsf., fünfblättriger, *h. k.* Nordafrika, Sicilien.

β) Thezera P.

pubescens L., Thbg., weichhaariger, *h. k.* Cap d. g. H.
 pumila Mchx., zwergiger, *h. f.* Carolina.
 pyroides Burch., birnenähnlicher, *h. k.* Cap d. gut. H.
 radicans L., starkwurzelter, *h. f.* Nordamerika.

β) volubilis Mill., Sch. γ) microcarpa Loud., Sch.

rigida Mill., starrer, *h. k.* Cap der guten Hoffnung.
 rosmarinifolia Vahl, rosmarinblättriger, *h. k.* C. d. g. H.
 schinoides W., schinusähnlicher, *h. w.* Brasilien.
 semialata Murr., halbgeflügelter, *h. t. w.* Ostind., China.
 serraefolia Burch., sägeblättriger, *h. k.* Cap d. g. H.
 sinuata Thbg., buchtiger, *h. k.* Cap der gut. Hoffn.
 suaveolens Ait. (*Myrica trifoliata* Hort.), wohlriechender, *h. f.* Nordamerika.

Rhus

- succedanea L., japanischer, $\frac{1}{2}$ k. Japan.
 Sumae Targ. Tozzet., italienischer, $\frac{1}{2}$ f. Mittelitalien.
 Thunbergiana R. et S., Thunberg's, $\frac{1}{2}$ k. C. d. g. H.
 tomentosa L., filziger, $\frac{1}{2}$ k. Cap der guten Hoffnung.
 Toxicodendron L. (*T. quercifolium* Mchx., *T. pubescens*
 et *serratum* Mill.), Gift-S., $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
 tridactyla Burch., dreifingeriger, $\frac{1}{2}$ k. Cap d. gut. H.
 tridentata L., dreizähniger, $\frac{1}{2}$ Sch. k. Cap d. gut. H.
 trijuga Poir., dreijochiger, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.
 typhina L., virginischer, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
 a) arborescens W. b) fol. variegatis Hort. β)
 frutescens W.
 undulata Jacq., wellenblättriger, $\frac{1}{2}$ k. Cap d. gut. H.
 vernicifera DC. (*Vernix* Thbg., *juglandifolium* Wall.),
 firnisgebender, $\frac{1}{2}$ k. f. b. Japan.
 Vernix L. (*venenata* DC.), amerikanischer Firniss-S., $\frac{1}{2}$
 f. Nordamerika.
 villosa L. (*atomaria* Jacq.), zottiger, $\frac{1}{2}$ k. C. d. g. H.
 viminalis Vahl (*lanceum* Thbg.), weidenblättriger, $\frac{1}{2}$ k.
 Cap der guten Hoffnung.
 viridiflora Poir (*canadensis* Mill.), grünblumiger, $\frac{1}{2}$ f.
 Nordamerika.
 zizyphina Tineo (*oxyacanthoides* P., *dioica* G. Don,
Rhamnus tripartita Ucria), zizyphusähnlicher, $\frac{1}{2}$ k.
 Sicilien, Nordafrika.
 obscurum MB. v. *Pterocarya caucasica*. *zeylunicum*
 Burm. v. *Omphalobium indicum*.

Rhynchosidium Cass., DC., Schnabelkraut, XIX. II.,
Compositae-Corymbiferae.

sessiliflorum DC., stiellosblumiges, $\odot$ f. Cap d. g. H.

Rhynchosia Lour., Schnabelschiffchen, XVII. IV. (VI.),
Leguminosae-Papilionaceae.

angustifolia DC., schmalblättriges, $\frac{1}{2}$ Sch. k. t. Cap
 der guten Hoffnung.

biflora DC., zweiblumiges, $\odot$ Sch. m. w. Ostindien.

caribaea DC., caribäisches, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Westindien.

difformis DC., ungestaltetes, $\frac{1}{2}$ Sch. f. Nordamerika.

erecta DC., aufrechtes, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.

Fredericiana DC., Frederic's, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Südamerika.

minima DC., kleinstes, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Jamaica.

mollis DC., weiches, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Guinea.

phaseoloides DC., bohnenähnliches, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Jamaica.

precatoria DC., scharlachsamiges, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Mexico.

reniformis DC., nierenförmiges, $\frac{1}{2}$ Sch. k. Carolina.

reticulata DC., netzblättriges, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Jamaica.

rhombifolia DC., rautenblättriges, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostind.

scarabaeoides DC., käferähnliches, $\odot$ Sch. w. Ostind.

suaveolens DC., wohlriechendes, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.

violacea DC., veilchenähnliches, $\frac{1}{2}$ w. Guiana.

viscida DC., schmieriges, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.

viscosa DC., klebriges, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.

volubilis Lour., windendes, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.

Rhynchospora Vahl, Schnabelriet, III. I., Cyperaceae.

alba Vahl, weisses, $\frac{1}{2}$ f. Europa, Nordamerika.

aurea Vahl, goldfarbiges, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.

fusca Vahl, braunes, $\frac{1}{2}$ f. Europa.

polyphylla Vahl (*comata* Lk.), vielblättriges, $\frac{1}{2}$ w.
 Westindien, Brasilien.

Ribes T. L., Johannisbeere (Stachelbeere), V. 1., Grossularieae (*Ribesiae*).

I. *Grossularia* T., Stachelbeere.

aciculare Sm. (*Uva crispa* Siever's), nadelstachelige, ♀. f. Sibirien.

Cynosbati L., stachelfrüchtige, ♀. f. Nordamerika.

divaricatum Dougl. (*triflorum* variet. Auct.), ausgesperrte, ♀. f. Nordamerika.

gracile Mchx., schlanke, ♀. f. Nordamerika.

Grossularia L. (*Uva crispa* var. *sativa* DC., *Grossularia hirsuta* Mill.), haarige (Stachelbeere), ♀. f. Europa, Sibirien.

β) *Uva crispa* L. γ) *spinosissima* Berland. δ) *reclinata* Berl. (*reclinatum* L.). ε) *Besseriana* Berland. (*hybridum* Bess.). ζ) *subinermis* Berl. η) *macrocarpa* Berl. θ) *bracteata* Berl.

Gartenvarietäten: the red Champagne, Horseman's green Gage, the red Rose etc.

hirtellum Mchx., kurzhaarige, ♀. f. Nordamerika.

irriguum Dougl. (? *triflorum* var. Auct.), Bach-St., ♀. f. Nordamerika.

Menziesianum Pursh (*Menziesii* Sm.), Menzies's, ♀. k. f. b. Nordwestliches Amerika.

niveum DC., Lindl., schneeweiße, ♀. f. Nordwestl. Amerika.

oxyacanthoides L., weißdornähnliche, ♀. f. Nordamer.

rotundifolium Mchx., rundblättrige, ♀. f. b. Carolina.

setosum Lindl., borstige, ♀. f. Nordamerika.

speciosum Pursh (*stamineum* Sm., *fuchsoides* Flor. Mexic., *triacanthum* Menzies), prächtige, ♀. k. f. b. Californ.

II. *Botryocarpum* Rich. DC.

Diacantha L. fil., zweistachelige, ♀. f. Sibirien.

lacustre Poir. (*echinatum* Dougl., ? *oxyacanthoides* Mchx.), Teich-S., ♀. f. Nordamerika.

orientale Dsf., morgenländische, ♀. f. Syrien.

saxatile Pall. (? *alpinum* Sievers), Gesteins-St., ♀. f. Sibir.

III. *Ribesia* Berl. DC. (Johannisbeere).

albinerve Mchx., weißnervige, ♀. f. Canada.

alpinum L., Alpen-J., ♀. f. Europa.

b) fol. variegat. Hort. a) sterile Wallr. β) *bacciferum* Wallr. γ) *pumilum* Lindl.

atropurpureum C. A. Mey., schwarzpurpurrothe, ♀. f. Sibir.

Biebersteinii Berl. (*caucasicum* MB.), Bieberstein's, ♀. f. Caucasus.

carpathicum Kit. (*acerrimum* Roch.), carpathische, ♀. f. Carpathen.

cereum Dougl., wachsfarbige, ♀. f. Nordwestamerika.

floridum L' Her. (*nigrum* β. L., *pensylvanicum* Lam., *recurvatum* Mchx.), blüthenreiche, ♀. f. Nordamer.

b) *grandiflorum* Hort. c) *parviflorum* Hort.

fragrans Pall., wohlriechende, ♀. k. Ostsibirien.

glaciale Wall., Gletscher-J., ♀. f. b. Nepal.

glandulosum R. et P., drüsige, ♀. k. f. b. Chili.

hudsonianum Richards. (*petiolare* Dougl.), Hudsonsbai-J., ♀. f. Hudsonsbai.

inebrians Lindl., trunkenmachende, ♀. f. Nordamerika.

laxiflorum Pursh (*affine* Dougl., *prostratum laxiflor.* Loud.), lockerblumige, ♀. f. Nordwestliches Amerika.

multiflorum Kit. (*spicatum* Schult.), vielblumige, ♀. f. Croatien.

nigrum L. (*olidum* Mch), schwarze, ♀. f. Europa, Sibir.

Ribes

- b) bacca flava Hort. c) bacca viridi Hort. d)
fol. variegatis Vilmorin.
petraeum Wulf., Felsen-J., ♀. f. Mitteleurop. Voralpen.
procumbens Pall. (*polycarpon* Gmel.), niederliegende,
♀. f. Dahurien.
prostratum L. (*glandulosum* Ait.), hingestreckte, ♀. f.
Nordamerika.
punctatum R. et P., punktirte, ♀. k. Chili.
resinosum Pursh, harzige, ♀. f. Nordamerika.
rigens Mchx., starre, ♀. f. Nordamerika.
rubrum L., gemeine J., ♀. f. Europa, Sibirien.
a) sylvestre DC. β) hortense DC. γ) carneum
Berland. δ) variegatum DC. ε) album DC.
b) foliis albo variegat. Duham, c) foliis luteo
variegat. Duham.
sanguineum Pursh (*Calobotrya sanguinea* Spach), blut-
rothe, ♀. f. b. Nordamerika.
β) glutinosum Benth. (*augustum* Dougl.). γ)
malvaceum Benth. δ) atrorubens Hort. ? ε) opu-
lifolium Hort.
spicatum Robs., ährige, ♀. f. England.
trifidum Mchx., dreispaltige, ♀. f. Nordamerika.
triste Pall. (*altaicum* Pall.), traurige, ♀. f. Sibirien.
viscosissimum Pursh (*Coreosma viscosissima* Spach),
schmierige, ♀. f. Nordamerika.
IV. *Symphocalyx* Berland. (*Chrysobotrya* Spach).
aureum Pursh (*Chrysobotrya revoluta* Spach), gold-
farbige, ♀. f. Nordamerika.
a) praecox Lindl. β) villosum DC. (*longiflorum*
Fras.). γ) serotinum Lindl.
flavum Colla (*aureum sanguineum* Lindl., *palmatum* Dsf.,
aureum Ker, *C. intermedia* Spach.), hellgelbe, ♀. f.
Nordamerika.
tenuiflorum Lindl. (*aureum* Colla, *flavum* Berl., *missou-
riense* Hort., *C. Lindleyana* Spach), dünnblumige, ♀.
f. Nordamerika.

a) fructu nigro. b) fructu luteo.

Richardia Kunth (L. C. Richard, berühmter franzö-
sischer Botaniker), VII. 1. (XXI. 1.), Aroideae.

aethiopica Kunth, aethiopische, 4. Wa. k. t. Südafrika.

R. pilosa R. et P. et *scabra* L. vid. *Richardsonia pilosa*
et *scabra*.

Richardsonia H. B. K. (J. Richardson, ein englischer
Botaniker und Begleiter des Capitain Franklin nach
dem Nordpol), VI. 1., Rubiaceae.

pilosa H. B. K., haarige, ☉. m. f. Südamerika.

scabra H. B. K., scharfe, ♂. ♀. m. Neuspanien.

stellaris Cham., sternförmige, ☉. m. f. Brasilien.

Ricinus T., Wunderbaum, XXI. x., Tricoccae-Euphor-
biaceae.

I. Genuin.

africanus W. (*communis* Dsf.), afrikanischer, ♂. ♀. t.
Nordafrika.

armatus Andr., bewaffneter, ☉. m. f. Malta.

communis L., gemeiner, ☉. m. f. Ostindien.

inermis Jacq., unbewehrter, ☉. ♂. ♀. m. f. t. Ostind.

lividus Jacq. (*communis* Thbg.), bleifarbener, ☉. ♀. m.
f. t. Cap der guten Hoffnung.

speciosus N. L. Burm., prächtiger, ☉. ♀. m. f. t. Ostind.

Ricinus

viridis W., grüner, ☉. m. f. Ostindien.

Gartenvarietäten oder Hybriden: *macrophyllus*,
undulatus.

II. Mappa Adr. Juss.

globosus W., kugelkapseliger, ☿. w. Jamaica.

tanarius L., tanarischer, ☉. ☿. w. Molucken.

Ricotia L., Ricotie, XV. II., Cruciferae.

Lunaria L. (*aegyptiaca* L.), mondviolenähnliche, ☉. f. Syrien.

Riedlea Vent. (*Riedleia* DC.), (M. Riedle, Begleiter des
Capitain Baudin auf der Reise um die Welt), XVI.
II., Malvaceae-Hermannieae.

borbonica DC., borbonische, ☿. w. Mascarenas.

caracasana DC., caracasische, ☿. w. Südamerika.

concatenata DC., kettenförmige, ☿. w. Ostind., Westafrika.

corchorifolia DC., corchorusblättrige, ☉. w. m. f. Ostind.

depressa DC., niedergedrückte, ☿. w. Westindien.

nodiflora DC., knotenblumige, ☿. w. Westind., Mascaren.

supina DC., liegende, ☿. w. Ostindien.

truncata DC., abgestutzte, ☿. w. Ostindien.

velutina DC., sammethaarige, ☿. w. Ostindien.

Rindera Pall. (Rinder, Arzt in Moskau, Entdecker der
Pflanze), V. I., Asperifoliaceae.

laevigata R. et S. (*tetraspis* Pall.), glatte, 4. f. Sibirien.

Ripidium Trin. v. Erianthus.**Ripogonum** Forst., Rohrsmilacine, VI. I., Sarmentaceae
(*Asparagineae*).

album RB., weisse, 4. Sch. k. Neuholland.

parviflorum RB., kleinblumige, 4. Sch. k. Neuholland.

Ritchiea R. B. (M. Ritchie, ein englischer Reisender,
welcher 1820 zu Tripolis ermordet wurde), XI. I.,
Capparideae.

fragrans RB., wohlriechende, ☿. Sch. w. Sierra Leone.

Rivinia Plum. (A. Q. Rivinus, Professor zu Leipzig,
einer der ausgezeichnetsten Botaniker), IV. I., Aizo-
ideae-Phytolacceae.

brasiliensis Nocca (*glabrata* Humb.), brasilianische, ☿.
w. Brasilien.

humilis L., niedrige, ☿. w. Westindien.

β) *canescens* W.

laevis L., glatte, ☿. w. Westindien.

lanceolata W., lanzettblättrige, ☿. w. Brasilien.

octandra L., achtmännige, ☿. w. Südamerika.

purpurascens Schrad. (*puberula* Humb.), purpurfarbige,
☿. w. Westindien.

tinctoria Hamilt., färbende, ☿. w. Caracas.

Robergia Schreb. (Laurent. Roberg, Professor der Me-
dicin zu Upsala), X. IV., Amyrideae-Connaraceae.

frutescens W., strauchige, ☿. ☿. w. Guiana.

Robertia DC. (M. Robert, corsicanischer Botaniker),
XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

pinnatifida Spgl., fiederspaltige. ♂. f. Neapel.

taraxacoides DC., löwenzahnähnliche, 4. f. b. k. Corsica.

Robertsonia Haw. v. Saxifraga.**Robinia** L. (Jean Robin, Gartenintendant zu Paris
unter Heinrich IV.), Schotendorn, XVII. IV. (VI.),
Leguminosae-Papilionaceae.

guineensis W., guineischer, ☿. w. Sierra Leone.

hispida L. (*rosea* Du Ham., *montana* Bartr.), steifhaariger,
☿. f. b. Nordamerika.

Robinia

- β) nana DC. γ) rosea Pursh. δ) macrophylla Schrad. (*grandiflora* Hort.).
 hybrida Audib. (*dubia* Fauc., *ambigua* Poir., ?*echinata* Mill., *intermedia* Soul. Bod.), Bastard-R., ♀. f. Nordam.
 Pseudacacia L., gemeiner (unächter Akazienbaum), ♀. f. Nordamerika.

- β) flore luteo Dum. C. γ) inermis DC. δ) crispa DC. ε) umbraculifera DC. (*inermis* Dum. C.).
 ζ) tortuosa DC. η) sophoraefolia Lodd. θ) amorphaeifolia Lk. υ) stricta Lk. χ) procera Lodd. λ) pendula Ort. μ) monstrosa Lodd. ν) macrophylla Lodd. ξ) microphylla Lodd. (*angustifolia* Hort.). ο) spectabilis Dum. C. π) latisiliqua Prince's Cat.

purpurea Lk., purpurfarbige, ♀. t. ? Peru.

viscosa Vent. (*glutinosa* Curt., *montana* Bartr.), klebrige ♀. f. Nordamerika.

Altagana L'Her. (et *Caragana* L. etc.) v. *Caragana* Altagana, arborescens etc. *candida* Roxb. (et *suberosa* Roxb.) vid. *Tephrosia candida* et *suberosa capensis* Burm. vid. *Virgilia robinoides coccinea* Aubl. v. *Ormosia coccinea*. *Halodendron* Pall. (et *triflora* L'Her.) v. *Halodendron argenteum* et *subvirescens*. *mitis* L. (et *uliginosa* W.) v. *Pongamia glabra* et *uliginosa*. *sericea* Poir. (et *violacea* L. Jacq.) v. *Lonchocarpus sericeus* et *violaceus*. *squamata* Vahl v. *Pictetia squamata*.

Roechia DC. v. *Laroechia*.

Rodigia Spgl. (Rodig, K. S. pens. Amtmann, Freund der Botanik), XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

alliata G. Don, knoblauchduftende, ♂. f. Sicilien.

commutata Spgl., verwechselte, ♂. f. Sicilien, Griechenl.

laevigata Spgl., glatte, ♂. f. Nordafrika, Candia.

Rodriguezia R. et P. (Emanuel Rodriguez, ein spanischer Arzt und Botaniker), XX. 1., Orchideae.

Barkeri Hook., Barker's, 4. w. Brasilien.

laxiflora Lindl., lockerblumige, 4. w. Brasilien.

planifolia Lindl., flachblättrige, 4. w. ? Brasilien.

secunda H. B. K., einseitigblumige, 4. w. Südamerika.

Roella L. (G. Roelle, Professor der Anatomie zu Amsterdam), V. 1., Campanulaceae.

ciliata L., gefranzte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

decurrens L'Her., herablaufende, ♂. m. f. Cap d. g. H.

elegans Paxt., schöne, ? ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

filiformis Lam., fadenförmige, ♀. t. Cap der gut. H.

muscosa Thbg., moosartige, ♂. m. f. Cap der gut. H.

squarrosa L., sparrige, 4. t. Cap der guten Hoffnung.

cernua Brouss., *decumbens* Bot. reg. vid. *Wahlenbergia capensis* et *lobelioides*.

Roemeria Med. (J. J. Roemer, Professor der Botanik zu Zürich), XIII. 1., Papaveraceae.

hybrida DC. (*violacea* Medic.), violette, ♂. f. Südeuropa, England.

refracta DC., zurückgeknickte, ♂. f. Nordpers., Taur.

Roeperia Adr. Juss. (J. Roeper, Professor der Botanik zu Rostock), X. 1., Zygophylleae.

aurantiaca Lindl., orangefarbige, ♀. t. Neuholland.

Rohdea Roth (Dr. Rohde, Botaniker aus Bremen), VI. 1., Aroideae-Orontiaceae.

Rohdea

japonica Roth, japanische, 4. Wa. k. Japan.

Rolandra Rottb. (D. Rolander, ein schwedischer Naturforscher, welcher Surinam bereiste), XIX. v., Compositae-Echinopeae.

argentea Rottb., silberfarbige, f. w. Westind., Süd-am.

Rolingia G. B. K. (?) ? ?

ovalifolia G. B. K., eiblätterige. f. k. ?

Roncela Erinus Dumort. v. Campanula Erinus.**Rondeletia** Plum. (W. Rondelet, alter berühmter französischer Arzt und Zoolog), V. 1., Rubiaceae.

americana L., amerikanische, f. w. Südamerika.

hirsuta Sw., rauhhaarige, f. w. Jamaica.

hirta Sw., kurzhaarige, f. w. Jamaica.

laevigata Ait. fil., glatte, f. w. Westindien.

laurifolia Sw., lorbeerblättrige, f. w. Jamaica.

odorata Jacq., wohlriechende, f. w. Cuba.

paniculata Roxb., rispige, f. w. Molucken.

racemosa L., Sw., traubige, f. w. Jamaica.

speciosa Lodd., prächtige, f. w. Havannah.

thyrsoides Sw., straufsblumige, f. w. Jamaica.

tomentosa Sw., filzige, f. w. Westindien.

Rosa T., Rose, XII. III., Rosaceae.

acicularis Lindl., nadelstachelige, f. f. Sibirien.

β) pauciflora Lindl.

adenophylla W., drüsenblättrige, f. f. ?

Afzeliana Fries., Afzelius's, f. f. Schweden.

agrestis Sw., Acker-R., f. f. Schweden.

alba L., gemeine weiße, f. f. Europa, Caucasus.

*Gartenvarietäten: Agate, Belle Aurore, Blanche à coeur vert, Blanche de belgique, Blush double white, Bouquet blanc, Celestial, Duc d'Yorck, Eliza, Feuille fermée, Grand cuisse de Nympe, Henriette belle, Joanne d'Arc, Maiden's blush cluster, Maiden's blush great, Maiden's blush small, Moraga la favorite, Muscat rouge, Nova celestis, Nova plena, Petite cuisse de Nympe, Rosea, Simonville, Spineless Virgin, Thornless double, Triangularis, White double, White semidouble.

alpina L. (*rupestris* Crtz., *monspeliaca* Gouan, *inermis* Mill., *hybrida* Vill., *lagenaria* Vill., *biflora* Krock.), Alpen-R., f. f. Mitteleuropa, Taurien.

b) *pyrenaica* Gouan, Lindl. (*hispidula* Krock., *turbinata* Vill., *alpina coronata* Desv.). c) *pendulina* Ait. (*a. latifolia* Sering.). d) *pimpinellifolia* Vill., Lindl., (*pyrenaica* β. Sm.). e) *lagenaria* Sering. f) *sorbinella* Sering. g) *hispidella* Sering. h) *laevis* Sering. (*a. glabra* Desv.). i) *pyriformis* Sering. k) *setosa* Sering. (*a. hircina* Desv.). l) *globosa* Desv. (*canina ambigua* Desv.). m) *helleborina* Sering. n) *pilosula* Sering. o) *turbinata* Desv. (*inermis* Delaun, *a. flore pleno* Godefroy, *multiplex* Sering., *mixta* Tratt.). p) *speciosa* Hort. (*Drummondii* Hort.).

altaica W., Redout. (*spinosissima* γ. *Pallasii* Lindl.), altaische, f. f. Altai.

ambigua Waiz, zweifelhafte, f. f. ?

americana Waiz, amerikanische, f. f. b. ? Nordamerika.

Rosa

- Andrzejovii Stev., Andrzejowski's, *h.* f. Volhynien.
 Armidae P. B. Webb., Armida's, *h.* k. Teneriffa.
 arvensis Huds. (*scandens* Mch., Wallr., ? *Herporrhodon* Ehrh., *Halleri* Krock., *fusca* Mch., *serpens* Ehrh., *sylvestris* Herrm., *sempervirens* Rössig, *repens* Gmel. Wib.), Feld-R., *h.* Sch. f. Europa.
 β) ayreshirea Sering. (*capreolata* Neill.). *γ*) *hybrida* Lindl.
 balsamica W., balsamische, *h.* f. ?
 baltica Roth, baltische, *h.* f. Ufer der Ostsee.
 Banksiae RB., Banks's, *h.* Sch. k. China.
 b) flore luteo. *c*) multiplex.
 Biebersteinii Lindl. (*ferox* MB.), Bieberstein's, *h.* f. Caucasus.
 blanda Ait., liebliche, *h.* f. Westliches Nordamerika.
 Borreri Woods. (*dumetorum* Sm., *rubiginosa* *β*. Lindl., *rubiginosa inodora* Hook., ? *sepium* Borkh., *affinis* Rau, *uncinella* *β*. Bess.), Borrer's, *h.* f. England, Deutschland.
 bracteata Roxb., Wendl. (*Macartney's* R.), deckblätterige. *h.* k. Ostindien, China.
 β) *scabricaulis* Lindl. (*b.* fl. pleno Lodd.).
 Brunonii Lindl. (*Brownii* Spgl.), Brown's, *h.* k. Nepal.
 caesia Sm., hechtblaue, *h.* f. England.
 canina L. (*dumalis* Bechst., *glauca* Lois., *arvensis* Schrk., *glaucescens* et *nitens* Merat., *teneriffensis* Donn, *sentiosa* Achar.), gemeine Hecken-R. (Hagebutte), *h.* f. Europa, Asien.
 b) *surculosa* Woods. *c*) *nuda* Woods. *d*) *aciphylla* Rau. *e*) *aegyptiaca* Lindl. (*indica* Forsk.). *f*) *bourboniana* Desv. *g*) *nitens* Desv. *h*) *obtusifolia* Desv. (*leucantha* Lois.). *i*) *glaucescens* Desv. *k*) *Schottiana* Sering. (*glauca* Schott.). *l*) *pilosiuscula* Desv. (? *humilis* et *nitidula* Bess., *Friedlaenderiana* Bess., *collina* Rau). *m*) *fastigiata* Desv. *n*) *hispida* Desv. (*andegaviensis* Bast., *sempervirens* Bast., *canin. lanceolata*, *grandidentata* et *ovoidalis* Desv.). *o*) *microcarpa* Desv. *p*) *Meratiana* Sering. (? *biserrata* Merat.). *q*) *ambigua* Desv. (*malmundariensis* Lej.). *r*) *squarrosa* Hort. *s*) *rubiflora* Sering.
 carolina L. (*virginiana* du Roi, *palustris* Marsh., *corymbosa* Ehrh., *pennsylvanica* Mchx., *Hudsoniana* Red., *evratina* Bosc.), carolinische, *h.* f. Carolina.
 caryophyllacea Bess. (*iberica* Stev.), nelkenduftende, *h.* f. Volhynien, Podolien, Iberien.
 caucasica MB., caucasische, *h.* f. Caucasus.
 centifolia L. (*provincialis* Mill., *polyanthos* Rössig, *caryophyllea* Poir., *unguiculata* Dsf., *varians* Pohl.), hundertblätterige (Garten-R.), *h.* f. Caucasus, Macedonien.
 a) *provincialis* Mill.
 Gartenvarietäten: Aurora, Belgic red, Blandford or Kingston, Blush royal, Belle d'Aunay, Bourbon, Bright crumpled, Cabbage blush, Cabbage single, Carmine superb, Cent feuilles Anemone, Cent feuilles de Bruxelles, Cent feuilles de Hesse, Cent feuilles Gaufree, Chamois, Cluster, Constance,

Rosa

Cramoisi grand, Cumberland, Dragon, Duchesse d'Angoulême, Duchesse de Berry, Elysian, Emperor, Juno, Louis XVIII., Malta, Mère Gryone, Mottled purple, Neapolitan, Oeillet, One-sided, Pencilled, Petite Hollande, Persian, Pompon gros, Pourprée aimable, Pourprée favorite, Pourprée violette, Prolifio, Provins blush, Provins cabbage, Provins childings, Provins common, Provins damask, Provins dutch, Provins early, Provins grand, Provins imperial, Provins invincible, Provins royal, Provins scarlet, Provins semidouble, Provins Shailier's, Provins single, Provins white, Rouge superbe, Sans petales, Souchet, Sponges, Striped nosegay, Surpassante, Syren, Trianon (belle de), Versailles, Vilmorin.

β) muscosa Mill. b) cristata Hook.

Gartenvarietäten: Moos blush, Moos commun, Moos dark, Moos prolific, Moos single, Moos striped, Moos white.

γ) pomponia DC.

Gartenvarietäten: De Meaux, Dwarf Bagshot, Mossy de Meaux, Mignonne charmante, Pomponne, Pomponne proliferos, Provins dwarf, Provins small, Rheims de St. Francis.

δ) bipinnata Red.

cinnamomea Besl., L. (*foecundissima* du Roi, *majulis* Hermann.), Zimmt-R., h. f. Europa, Caucasus, Sibir.

b) flore pleno. c) flore semipleno.

clinophylla Redout., geneigtblättrige, h. f. b. ?

collina Jacq. (*campestris* Sw.), Hügel-R., h. f. Europa, Caucasus.

Varietäten oder Hybriden: b) bractescens Woods.

c) taurica MB. d) psilophylla Rau. e) trachyphylla Rau. f) flexuosa Rau.

coriifolia Fr. (*crassifolia* Liljbl., *sepium* Sw.), lederblättrige, h. f. Schweden, Dänemark.

coruscans Waiz, schimmernde, h. f. b. ?

cuspidata MB., feingespitzte, h. f. Caucasus.

damascena Mill. (*belgica* Mill., *bifera* Poir., *calendarum* Sering.), Damascener-R. (Monats-R.), h. f. Syrien.

Gartenvarietäten: Agathe rouge, Argentea, Auguste belle, Aurora, Belgic blush, Belgique carnée, Belgique violette, Bifera carnea, Bifera de Naples, Bifera grandiflora, Blush early, Blush imperial, Blush monthly, Blush Watsons, Brunswick, Cluster pale, Couronnée belle, Couronnée petite, Damas argenté, Damas pourpré, Damask blush, Damask red, Damask white, Egyptian, Emperor, Felicite, Goliath, Gracieuse, Hundred-leaved petite, Incomparable, Mignonne, Favorite, Monarque grande, Monthly white, Paestana, Paragon, Parnassus, Perpetual, Prolific, Quatre saisons, Quatre saisons blanche, Quatre saisons flesh colored, Quatre saisons français, Quatre saisons panaché, Quatre saisons pompona, Quatre saisons sans épines, Quatre saisons semidouble, Royal great, Swifts, Vaillant, Versailles, York and Lancaster, Zeeland, etc.

Rosa

dahurica Pall., dahurische, *h.* f. Sibirien.
 Dicksoni Lindl., Dickson's, *h.* f. Irland.
 dimorpha Bess., zweigestaltige, *h.* f. Podolien.
 Doniana Woods. (*Sabini* *h.* Lindl.), Don's, *h.* f. Schottl.
 b) horrida Hort.

dumetorum Thuill. (*collina* DC., *corymbifera* Borkh.,
sepium Auct., *solstitialis* Bess., *leucantha* *h.* *acutifolia*
 Bast.), Hecken-R., *h.* f. Europa.

ferox Lawr. (*kamtschatika* Red., *echinata* Dupont., *pro-*
vincialis MB.), dichtstachelige, *h.* f. Taurien.

h. nitens Lindl.

flava Wikstr., hellgelbe, *h.* f. ?

floribunda Bess., blüthenreiche, *h.* f. Südrufsland.

Forsteri Sm. (*collina* *h.* et *h.* Woods.), Forster's, *h.* f.
 England.

Fraseriana Hort., Fraser's, *h.* f. Hybride.

fraxinifolia Borkh. (*virginiana* Mill., *blanda* Jacq., *corym-*
bosa Bosc., *alpina laevis* Redout.), eschenblättrige,
h. f. Neufundland.

frondosa Stev., belaubte, *h.* f. Südpodolien.

frutetorum Bess., Strauch-R., *h.* f. Volhynien.

gallica L. (*rubra* Lam., *holosericea* Rössig, *Chamaerho-*
don Wallr.), französische, *h.* f. Mitteleuropa, Caucasus.

h. pumila L. suppl. (*Polliniana* Spgl., *repens*
 Münchh., *hispida* Münchh., *austriaca* Crtz., *olym-*
pica Donn). *h.* arvena Rau (*germanica* Märklin.

h. geminata Rau. (*Czackiana* Bess., *hybrida* K.
 et Z. *h.* *hybrida* Schlchr. *h.* Axmanni Gmel.

h. basilica Röss. (*gallica plena* Hort.). *h.* in-
 aperta Sering. *h.* inermis Sering. *h.* parvifolia

Ehrh. (*burgundica* Röss., *remensis* Dsf., *Ehrhar-*
tiana Hort.).

Gartenvarietäten: Admirable, Aigle noir, Albanian, Amaranth, Antwerp, Atlas, Belle Aurore, Beauté aimable, Beauté rouge, Beauté suprême, Bijou, Bishop, Black Frizzled, Blue, Bouquet rouge royale, Brunette, Brussels, Buonaparte, Burning coal, Cardinal, Carmine, Carmine brillante, Carmine proliferous, Carnation, Catalonian, Champion, Chancellor, Changeable, Cherry, Clementine, Coquette, Couleur de feu, Cramoisie belle, Cramoisie grande, Crimson dutch, Crimson purple, Crimson royal, Crown, Cupid, Damask black, Delicious, Dingg, Duc de Guiche, Duchesse d'Orleans, Dwarf proliferous, Enchanter, Enfant de France, Eucharis, Fanny Byas, Fiery, Flander's, Flemish, Formidable, Fringed, Garnet, Gay, Giant, Gloria Mundi, Granatappel, Grand Monarque, Grand Sultan, Henry IV., Herminie belle, Hervi, Hollande noir de, Hundred-leaved blush, Hundred-leaved dutch, Hundred-leaved Singletons, Imperatrice, Incomparable, Infernal, Invincible, Italian, Josephine, Junon, King, La Dauphine, L'ombre agréable, L'ombre superbe, Leyden, Lisbon, Lively, Lurid, Maiden, Majorca, Malabar, Malta, Manteau royal, Marbled, Marbled dark, Marbled double, Marbled grand, Margaret, Matchless, Mauve, Mignonne, Mignonne blush, Mignonne dark, Mignonne favorite, Mignonne red. Mignonne semidouble, Mignonne striped, Mirabelles,

Rosa

Mogul, Montauban, Morocco, Mottledblack, Natalie, Negrette, Negro, Ninon de l'Enclos, Nonpareil, Nonsuch, Normandy, Officinal, Officinal blush, Officinal carmine, Orleans, Ornement de Parade, Paestana, Panachée petite, Paradise, Paragon, Pavot, Perruque, Phoenix, Plicate, Pluto, Pomona, Pompadour, Pompon Bazard, Poniatowsky, Poppy, Porcelaine, Portland, Pourprée belle, Pourpre bouquet, Pourpre charmante, Pourpre de Tyr, Pourprée grand belle, Pourprée point, Pourpres Roi de, Pourpre Velours, Prince, Prince William V., Princess, Prolific, Pronville, Proserpine, Provins, Pulmonaire, Purple blue, Purple bright, Purple favorite, Purple grand, Purple light, Purple royal, Pyramid, Queen, Ranunculus, Ranunculus early, Red and violet, Roi de France, Rosa mundi, Rose de Parade, Royal red, Royal virgin, Sable, St. John's, Sanspareil, Sceptre, Shell, Spanish, Stadtholder, Stepney, Striped Nosegay, Sultana, Superb red, Trafalgar, Triumphant, Tuscany, Two colored, Velvet double, Velvet semidouble, Velvet single, Velvet striped, Venetian, Victory, Violet dark, Violette belle, Violette et rouge etc.

gemella W., gepaarthlumige, *h. f.* Nordamerika.

gentilis Stbg. (*rubella* Auct.), scharlachfrüchtige, *h. f.* Südeuropa.

glandulosa Bell. (*Raynieri* Hall. fil., *glabrata* Vest, *montana* Murrith non Vill., *rubrifolia* *β. montana* Gaud., *rubrifolia* et *glandulosa* Sering.), drüsige, *h. f.* Steyermark, Schweiz, Italien, Frankreich.

glutinosa Sm. (*rubiginosa cretica* Red., *rubiginosa sphaerocarpa* Desv.), klebrige, *h. f.* Creta, Sicilien.

gorinkensis Fisch., gorinkaische, *h. f.* Südrussland.

gracilis Woods (*villosa* Sm.), schlanke, *h. f.* England.

grandiflora Lindl. (*pimpinellifolia* MB.), großblumige, *h. f.* Sibirien.

hibernica Sm., irländische, *h. f.* Irland.

hyacinthina Hort., Hyacinthen-R., *h. Sch. k.* Hybride.

Hystrix Lindl., igelstachelige, *h. Sch. k.* China, Japan.

iberica Stev., iberische, *h. f.* Iberien.

indica L. (*sinica* L., *semperflorens carnea* Rössig, *reclinata flore submultiplici* Red.), indische, *h. k. f. b.* China.

β) Noisettiana Sering. *a*) purpurea Red. *b*) nivea Hort. *c*) Smithii Hort. *γ*) odoratissima Swt. (*indica fragrans* Red, *Thea* Hort.). *δ*) longifolia W. (*salicifolia* Hort., *semperflorens* var. Du Ham.). *ε*) pumila Lindl. *ζ*) caryophyllea Red. *η*) pannosa Red. *θ*) cruenta Red. *ι*) Fraseriana H. Angl. *χ*) ruga Lindl. *λ*) ochroleuca Lindl. *μ*) Blairii D. Don. *ν*) Smithii Swt. *ξ*) nivea D. Don (*Aimé Vibert* Dennis).

involucrata Roxb. (*Lindleyana* Tratt., *palustris* Buchanan), großschüllige, *h. k. f. b.* Bengalen, Nepal, China.

involuta Sm. (*nivalis* Donn), eingerollte, *h. f.* Schottland, Hebriden.

Jundzilliana Bess., Jundzill's, *h. f.* Volhynien, Taurien, Caucasus.

β) glandulosa Bess. *γ*) nitidula Bess.

Rosa

- kamtschatka Vent., kamtschatkalische, *h. f.* Kamtschatka.
 Klukii Bess. (*floribunda* Stev., ? *balsamica* Bess., *rubiginosa* MB.), Kluk's, *h. f.* Volhynien, Taurien.
 Kosinsciana Bess., Kosinsk's, *h. f.* Podolien.
 laevigata Mchx., glattblättrige, *h. Sch. f. b.* Nordam.
 Lawrenceana Swt., Lawrence's, *h. k.* China.
 laxa Retz, lockere, *h. f.* Sibirien.
 Ledebourii Spgl. (*mollis* Ledeb.), Ledebour's, *h. f.* Caucasus.
 leucantha MB., weißblumige, *h. f.* Taurien.
 Lindleyi Spgl. (*carolina* *ε.* Ait., *laxa* Lindl., *carolina pimpinellifolia* Andr.), Lindley's, *h. f.* Nordamerika.
 livescens Bess. (*livida* Host, *guttensteinensis* Jacq., *arguta* Muss. Puschk.), schlagbläuliche, *h. f.* Caucasus, Podolien, Oesterreich.
 Longii Swt., Long's, *h. Sch. f.* Hybride.
 lucida Ehrh., spiegelnde, *h. f.* Nordamerika.
 b) *candicans*.
 lutea Dalech., Mill. (*Eglanteria* L., *foetida* Herm., *chlorophylla* Ehrh., *cerea* Rössig, *vulpina* Wallr.), gemeine gelbe, *h. f.* Europa.
 b) *punicea* Mill. (*bicolor* W.). *c)* *subrubra* Redout. *d)* *flore pleno* (*Williams dble-flnd*). *e)* *Hoggii* D. Don.
 lutescens Pursh (*hispida* Curt.), gelbliche, *h. f.* Nordam.
 Lyellii Lindl., Lyell's, *h. k.* Nepal.
 Lyonii Pursh, Lyon's, *h. f.* Nordamerika.
 macrophylla Lindl., großblättrige, *h. k. f. b.* Nepal.
 marginata Wallr. (? *trachyphylla* Rau), berandete, *h. f.* Deutschland.
 melanocarpa Lk. (*microcarpa* Bess.), schwarzfrüchtige, *h. f.* Podolien, Volhynien.
 micrantha Sm. (*rubiginosa* *β.* *micrantha* Lindl., *nemorosa* Libert, *Libertiana* Tratt.), kleinblumige, *h. f.* England, Deutschland.
 microcarpa Lindl. (*cymosa* Tratt.), kleinfrüchtige, *h. Sch. k. f. b.* China.
 microphylla Roxb., kleinblättrige, *h. k. f. b.* China.
 b) *alba*.
 montana Steven, Berg-R., *h. f.* Taurien, Südpodolien.
 Montezumae H. B. K. (*mexicana* W.), Montezuma's, *h. k.* Mexico.
 moschata Mill. (*opsostemma* Ehrh., *glandulifera* Roxb.), Bisam-R. (weißspanische Büschel-R.), *h. k. f. b.* Nordafrika, Madeira, Nepal.
 b) *flore pleno*. *c)* *nepalensis* Lindl. ? *d)* *arborea* P. *e)* *nivea* Lindl. *f)* *evratina* Bosc.
 mosquensis Spgl., moskwaische, *h. f.* Südrussland.
 multiflora Thbg. (*florida* Poir., *diffusa* Roxb.), vielblumige, *h. Sch. k. f. b.* Japan, China.
 b) *multiplex*. *c)* *alba*. *d)* *Grevillei* Hort. (*Roxburghii* Hort., *platyphylla* Redout. *e)* *Russeliana* Hort. *f)* *Boursaultii* G. Don.
 muricata Waitz., weichstachelige, *h. f.* ?
 myriacantha DC., vielstachelige, *h. f.* Frankr., Taurien.
 myrtifolia Hall. fil. (*sepium* Thuill., *rubiginosa sepium* DC.), myrtenblättrige, *h. f.* Mittel- und Südeuropa.
 nitida W. (*blanda* Pursh, *rubescens* Red.), glänzende, *h. f.* Neufundland.

Rosa

ochroleuca Sw., weißgelbe, ♀. f. Sibirien.
 oxyacantha MB., weißdornähnliche, ♀. f. Sibirien.
 parviflora Ehrh. (*humilis* Marsh., *caroliniana* Mchx., *carolina* du Roi, *pensylvanica* Wangenh.), kleinblumige, Nordamerika.

b) flore pleno.

pensylvanica Mchx., Lk., pensylvanische, ♀. f. Nordam.
pruinosa Lindl., bereifte, ♀. f. Sibirien.
pulchella W., schöne, ♀. f. Frankreich.
pulverulenta MB., bestäubte, ♀. f. Caucasus.
purpurea Hort., purpurfarbige, ♀. k. Hybride.
pygmaea MB. (*pimpinellifolia* Vill.), zwergige, ♀. f. Taurien, Dauphiné.

Rapa Bosc. (*turgida* P., *fraxinifolia* Dum. Cours.), rübenfrüchtige, ♀. f. b. Florida.

reversa W. K., zurückgebogene, ♀. f. Ungarn, österreichisches Litorale.

rubella Sm. (*polyphylla* W.), röthliche, ♀. f. England, Mittelasien.

β) *melanocarpa* Lindl.

rubifolia RB., rubusblättrige, ♀. f. Nordamerika.

β) *fenestralis* Lindl.

rubiginosa L. (*Eglanteria* Mill., *suavifolia* Lightf., *Seraphini* Viv., *agrestis* Savi, *glutinosa* Auctor.), rostfarbige (Wein-R.), ♀. f. Europa, Mittelasien, Nordam.

b) *Vaillantiana* Red. c) *rotundifolia* Lindl. d) *aculeatissima* Dup. e) *nemoralis* Redout. f) *umbellata* Leers. (*tenuiglandulosa* Merat, *rubigi. cymosa* Woods, *sempervirens* Roth). g) *pubera* Ser. h) *grandiflora* Lindl. i) *major* Ser. k) *spinulosa* Ser. l) *flexuosa* Lindl. m) *parvifolia* W. n) *resinosa* Lej.

Gartenvarietäten: Americana single, Blush, Clementine, Cluster, Double, Dwarf semidouble, Maiden, Mannings, Monstrous, Mossy, Petite Hessoise, Royal, Scarlet, Tree double, White semidouble, Zabeth.

rubrifolia Vill. (*glaucescens* Wulf., *glauca* Dsf., *multiflora* Reyn., *rubicunda* Hall. fil., *livida* Andr., *cinnamomea* γ. *rubrifolia* Redout.), ♀. f. Mitteleuropa.

b) *hispidula* Sering. c) *Redoutea* Sering. d) *inermis* Sering. e) *pinnatifida* Sering.

Sabini Woods, *Sabine's*, ♀. f. Schottland.

b) *gracilis* Hort.

sarmentacea Sw., Woods. (*glaucophylla* W.), starkwurzelnende, ♀. f. Europa.

saxatilis Stev., Gesteins-R., ♀. f. Podolien, Taurien.

sempervlorens Curt. (*indica* Redout., *diversifolia* Vent., *chinensis* Jacq., *bengalensis* P.), immerblühende, ♀. k. f. b. China.

Varietäten oder Hybriden mit *indica*: Alba, Animate, Atro-nigra, Bengale à bouquet, Bengale à fl. panaché, Bengale blanche, Bichonia, Camellia rosea et purpurea, Carnescens, Centifolia, Cérise éclatante, Chiffonnée, Cucullata, elegans, Florida, Gigantea, hybrida, Lie de vin, Lucida, major, minor, monstrosa, Moonshine, nigra, ochroleuca, purpurea, sanguinea, sans épines, subalba, Terneaux, Thisbe, Veloulée etc.

Rosa

sempervirens L. (*scandens* Mill., *balearica* Dsf., *atrovirens* Viv.), immergrüne, ♀. Sch. f. Süd- u. Westeuropa.

b) *Russeliana* A. B. c) *Clarei* Lindl. d) *Leschenaultiana* Redout.

sericea Lindl., seidenhaarige, ♀. k. f. b. Nepal.

setigera Mchx., borstentragende, ♀. Sch. f. Virginien, Carolina.

Sherardi Dav., *Sherard's*, ♀. f. England.

sinica RB. (*ternata* Poir., *nivea* DC., Redout., *trifoliata* Bosc., *cherokeeensis* Don), chinesische, ♀. Sch. k. f. b. China.

spinosissima L. (*pimpinellifolia* L. DC., *campestris* Wallr.).
hibernellblättrige, ♀. f. Europa, Mittelasien.

a) *pimpinellifolia* L. β) *spinosissima* L. γ) *mitissima* Gmel. δ) *sanguisorbifolia* Donn. ε) *poterifolia* Bess. ζ) *rosea* K. b) *ciphiana* Sm.
η) *affinis* Sternb.

Gartenvarietäten: (schottische Rosen), Blush Andersons double Ladys, Blush double Lady's, Blush double pink, Blush double Provins, Blush double Rose, Blush dutch double, Blush Princess double, Crimson double, Marbled double crimson, Marbled double dark, Marbled double light, Red double dark, Red double light, Red true double, Two colored large double, Two colored small double, White large double, White large semidouble, White small double, White Whitley's double, Yellow globe double, Yellow large double, Yellow pale double, Yellow small double etc.

stricta Mühlenb., Lindl., steife, ♀. f. Nordamerika.

suaveolens Pursh, feinriechende, ♀. f. Nordamerika.

suavis W., lieblichriechende, ♀. f. ?

sulphurea Ait. (*hemisphaerica* Herm., *glaucophylla* Ehrh., *lutea flore pleno* Ray.), schwefelgelbe, ♀. f. Levante.

sylvestris Lindl. (*tomentosa sylvestris* Woods), Wald-R., ♀. f. Europa.

systyla Bastard, verbundengriffelige, ♀. f. England, Frankreich, Steyermark.

a) *Devauxiana* Sering. (*stylosa* Desv., *collina* Sm., *bibracteata* DC.). β) *leucochroa* Desv. (*brevistyla* DC.). γ) *Monsoniae* Lindl.

taurica MB., taurische, ♀. f. Taurien.

terebinthacea Bess., terpeninriechende, ♀. f. Podolien, Volhynien.

tomentosa Sm. (*villosa* Ehrh., Poll., *mollissima* Bork., *dubia* Wib., *subglobosa* Sm.), filzige, ♀. f. Europa.

β) *dimorpha* Bess. ? γ) *pseudorubiginosa* Lejeun. δ) *farinosa* Bechst. (*mollissima* W.). ε) *scabriuscula* Sm. (*foetida* Bastard, *hispida* Borkh., *Borkhausenii* Tratt.).

turbinata Ait. (*campanulata* Ehrh., *francofurtana* Münchh.),
Tapeten-R., ♀. f. Mittel- und Südeuropa.

a) *francofurtana* Sering. (*francofurtensis* Dsf., *Rosenbergiana* Redout.). β) *orbessanea* Redout.

uncinella Bess., hakige, ♀. f. Volhynien, Taurien,

verecunda H. Berol., schamhafte, ♀. f. Asien.

villosa L. (*ciliato petala* Bess., *cretica* Vest, *mollis* Sm., *pomifera* Herrm.), zottige, ♀. f. Europa, Mittelasien.

b) *pulchella* Woods. c) *heterophylla* Woods.

Rosa

- viminea* Lindl. (*horrida* Spgl.), gertenartige, ♀. f. ?
Willdenowii Spgl. (*microphylla* W., *arenaria* MB.), Willdenow's, ♀. f. Sibirien.
Woodsii Lindl. (*lutea nigra* Hort.), Woods's, ♀. f. Nordamerika.
berberifolia Pall. (*simplicifolia* Salisb.) vid. *Lowea berberifolia*.

Roscoeia Sm. (W. Roscoe, englischer Botaniker), I. 1., Scitamineae-Amomeae.

- capitata* Sm., kopfförmige, 4. w. Nepal.
elatio Sm., höhere, 4. w. Nepal.
gracilis Sm., schlanke, 4. w. Nepal.
purpurea Sm., purpurfarbige, 4. w. Nepal.
spicata Sm., ährige, 4. w. Nepal.

Rosmarinus T., Rosmarin, II. 1., Labiatae.

- chilensis* Molin., chilesischer, ♀. k. Chili.
officinalis L., gemeiner, ♀. k. f. b. Südeuropa.
 b) *latifolius*. c) *fol. argenteis*. d) *fol. aureis*.

Rostraria Trin., Schnabelgras, III. 11., Gramineae.

- pubescens* Trin., weichhaariges, ☉. f. ?

Rothia P. (*Götzea* Rchb.), (A. W. Roth, berühmter deutscher Botaniker), XVII. 1v. (vi.) (XVI. vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

- trifoliata* P., dreiblättrige, ☉. m. f. w. ?

Rothia andryaloides G. etc. v. *Andryala* *Rothia* etc.**Rottboellia** L. fil. (C. Rottboell, Professor der Botanik zu Copenhagen, III. 11., Gramineae.

- dimidiata* L. fil., halbseitige, 4. w. Südasien, Afrika, Südamerika.
exaltata L., hohe, 4. w. Ostindien, Neuholland.
perforata Roxb., durchbohrte, 4. w. Bengalen.

biflora Roth vid. *Lepturus pannonicus*. *cylindrica* W. (*subulata* Savi) etc. v. *Lepturus cylindricus* etc. *monandra* Schrad. v. *Psilurus nardoides*. *setacea* Roxb. v. *Microchloa setacea*. *spathacea* Tenor. v. *Spartina stricta*.

Rottlera Roxb. (Dr. Rottler, ein dänischer Missionair und Botaniker, welcher Ostindien bereiste), XXII. xi., Tricoccae-Euphorbiaceae.

- brasiliensis* Spgl., brasilianische, ♀. w. Brasilien.
paniculata Adr. Juss., rispige, ♀. w. Java, Ceylon.
tinctoria Rxb., färbende, ♀. w. Ostindien.

Roxburghia Jones (W. Roxburgh, M. D., berühmter englischer Botaniker, welcher Ostindien durchforschte), VIII. 1., ? Aroideae, ? Asparagineae.

- gloriosoides* Roxb., prachtlilienähnliche, 4. Sch. Kn. w. Ostindien.

Royena L. (Adrian v. Royen, Professor der Botanik zu Leyden), X. 11., Sapotaceae-Ebenaceae.

- angustifolia* W., schmalblättrige, ♀. k. Cap d. g. H.
glabra L., kahlblättrige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
hirsuta L., rauhhaarige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
latifolia W., breitblättrige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
lucida L., starglänzende, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
pallens Thbg., bleiche, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
polyandra L. suppl., vielmännige, ♀. k. Cap d. g. H.
 β) *ambigua* Vent.
pubescens W., weichhaarige, ♀. k. Cap der gut. H.

Royena

villosa L., zottige, ♂. k. Cap der guten Hoffnung.
Unbestimmt: *myrtifolia* Hort.

Roylea Wall. (Dr. Royle, Vorsteher des botanischen Gartens zu Saharumpoor), XIV. 1., Labiatae.

elegans Wall., zierliche, 4. f. b. k. Nepal.

Rubentia olivina Juss. v. *Elaeodendron orientale*.

Rubia T., Röthe, IV. 1., Rubiaceae.

angustifolia L., schmalblättrige, ♂. k. Spanien.

Bocconi Petagn., *Boccone's*, 4. f. Neapel.

canariensis Poir., canarische, ♂. k. Canarische Inseln.

cordifolia L., herzblättrige, 4. f. Nordasien, Japan, China, Cap der guten Hoffnung.

fruticosa Ait., Jacq., strauchige, ♂. k. Teneriffa.

galioides Poir., labkrautähnliche, ♂. k. Canar. Inseln.

lucida L., spiegelnde, 4. f. England, Südfrankreich, Griechenland.

peregrina L. (*anglica* Huds.), fremde, 4. f. England, Südeuropa, Creta, Griechenland, Ostrufsländ.

splendens L. (*sylvestris* Brot.), schimmernde, ♂. k. Portugal.

tinctorum L., Färber-R. (Krapp), 4. f. Südeuropa, Kleinasien.

Rubus T., Brombeere, XII. 111. (v.), Rosaceae.

abruptus Weihe, abgebrochene, ♂. f. Norddeutshl., Engl.

acuminatus Sm., zugespitzte, ♂. Sch. k. f. b. Nepal.

aegopodioides Sering., gierschähnliche, 4. f. Nordam.

affinis Weihe, ähnelnde, ♂. f. Europa.

b) *bracteosus*.

agrestis Kit., Acker-B., ♂. f. Ungarn.

amoenus Portensch. (*fruticosus dalmaticus* Tratt., *discolor* Weihe), schöne, ♂. f. West- und Südeuropa.

apetalus Poir. (*tomentosus* Bory, *borbonicus* P.), kronenlose, ♂. w. Mascarenas.

arcticus L., nördlichste, 4. f. Nordeuropa, Sibirien, Nordamerika.

argutus Lk., spitzzähnige, ♂. f. Nordamerika.

asper D. Don, rauhe, ♂. f. b. k. Nepal.

caesius L., kriechende (Kratzbeere), ♂. f. Europa, Japan.

b) *arvensis* Wallr. c) *grandiflorus* Sering. d)

parvifolius Wallr. e) *fol. variegatis* Hort.

canadensis L., canadische, ♂. f. Nordamerika.

canescens DC., weißgraue, ♂. f. Südeuropa.

carpinifolius Weihe, hainbuchenblättrige, ♂. f. Deutschland, England.

Chamaemorus L., Zwerg-B., 4. f. Nordeuropa, Sibirien, Nordamerika.

collinus DC., Hügel-B., ♂. f. Süd- und Westeuropa.

corylifolius Sm. (*nemorosus* Hayne, *dumetorum a vulgaris* Weihe, *bifrons* et *nutans* Vest, *Aschoffii* Weihe),

haselnufsblättrige, ♂. f. Europa.

β) *pilosus* Rchb. (*tiliaefolius* Auctor.)

cuneifolius Pursh (*parvifolius* Walt.), keilblättrige, ♂. f. Nordamerika.

deliciosus Torrey., gutschmeckende, ♂. f. Nordamerika.

distans D. Don, entferntblumige, ♂. f. b. k. Nepal.

diversifolius Weihe, verschiedenblättrige, ♂. f. Deutschland, England.

echinatus Lindl. (*rudis* Weihe et N. E.), igelstachelige, ♂. f. Deutschland, England.

Rubus

Eglanteria Tratt., Eglantinen-B., *h. k.* Neuholland.
 ellipticus Sm. (*flavus* Hamilt.), elliptische, *h. b.* Nepal.
 fissus Lindl. (*fastigiatus* Lindl. non Weihe), gespaltene,
h. f. England.

flagellaris W., ausläufertreibende, *h. f.* Nordamerika.

foliolosus D. Don, blattreiche, *h. f. b.* Nepal.

fruticosus L. suec. (*plicatus* Weihe), strauchige, *h. f.*
 Europa, Nordasien.

Varietäten oder Hybriden: *b)* pomponius Sering.

c) tauricus Hort. ? *d)* flore roseo pleno. *e)* fol.

variegat. A. B. *f)* leucocarpus Sering. (*albus*

Hort.). *g)* inermis Sering. *h)* concolor Wallr.

? *β)* Wiegmanni Weihe.

fuscoater Weihe, braunschwarze, *h. f.* Deutschl., Engl.

glandulosus Bellard. (*hybridus* Vill., *Güntheri* Weihe),
 drüsige, *h. f.* Ost-, Mittel- und Südeuropa.

β) hirtus W. K.

heterophyllus W. (*villosus* Torr.), verschiedenblättrige,
h. f. Nordamerika.

hispidus L., steifhaarige, *h. f.* Nordamerika.

horridus Weih. (*ferox* Vest), starkstachelige, *h. f.* Deutschl.

jamaicensis L., jamaicaische, *h. t. w.* Jamaica.

Idaeus L., gemeine Himbeere, *h. f.* Europa, Asien,
 Nordamerika.

b) fructu albo (*leucocarpus* Auct.). *c)* fructu luteo.

d) fol. variegat. *e)* glaber Mill. (*inermis* Auct.).

β) microphyllus Wallr.

inermis W., unbewehrte, *h. f.* Pennsylvanien.

Köhleri Weihe et N. E. (*sylvestris*, *infestus* et *spinossissimus* Weihe), Köhler's, *h. f.* Deutschland.

laciniatus W., schlitzblättrige, *h. f.* ?

lanuginosus Stev., wollige, *h. f.* Sibirien, Caucasus.

leucostachys Sm., weifsährige, *h. f.* Deutschland, Engl.

Linkianus Sering. (*paniculatus* Schldtl., *fruticosus fl. pleno* Hort.), Link's, *h.* Sch. *f.* ? Südeuropa.

macropetalus Dougl., großkronige, *h. f.* Westl. Nordam.

macrophyllus Weihe et N. E., großblättrige, *h. f.*
 Deutschland, England.

Menkii Weihe et N. E., (*velutinus* Vest.), Menke's, *h.*
f. Deutschland.

micranthus D. Don (*pauciflorus* Wallich, Lindl.), klein-
 blumige, *h. f. b. k.* Nepal.

moluccanus L., moluccaische, *h. w. t.* Molucken, ? Japan.

nitidus Weihe (*corylifolius* Hayne, *glaber*, *corymbosus* et
praecox Weihe), glänzende, *h. f.* Deutschland etc.

nutkanus Moc. (*odoratus* Hort.), Nutka-Sund-B., *h. f.*
 Californien.

occidentalis L., westliche, *h. f.* Nordamerika.

odoratus L., wohlriechende, *h. f.* Nordamerika.

pallidus Weihe, bleiche, *h. f.* Deutschland, England.

parvifolius L. (*triphyllus* Thbg.), kleinblättrige, *h. k.*
 China, Japan.

pedunculatus D. Don, langstielige, *h. f. b.* Nepal.

pinnatus W., gefiederte, *h. k.* Cap der guten Hoffnung,
 Madeira, St. Helena.

pistillatus Sm. (*acaulis* Mchx.), dichtgriffelige, *h. f.*
 Nordamerika.

reflexus Ker (*moluccanus* Ait.), zurückgebogene, *h. t.*
 Südchina.

R u b u s

Reichenbachii Koehl., Weihe, Reichenbach's, ♀. f. Deutschland.

rhamnifolius Weihe et N. E. (*fruticosus* Auctor), wegdornblätterige, ♀. f. Deutschland, England.

β) cordifolius Weihe. γ) rubricaulis Weihe. δ) candicans Weihe.

rigidus Sm., starre, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

roridus Lindl., bethaute, ♀. t. w. Madagascar.

rosaefolius Sm., rosenblätterige, ♀. k. Mascarenas.

b) coronarius Sims.

rugosus Sm., runzelige, ♀. t. w. Südamerika.

sanctus Schreb. (*fruticosus* β. MB., *obtusifolius* W.), orientalische, ♀. f. Orient.

sanguinolentus Lk., blutfarbige, ♀. w. Mascarenas.

saxatilis L., Gesteins-H., 4. f. Europa, Asien, Nordam.

Schlechtendalii Weihe, N. E., Schlechtendal's, ♀. f. Deutschland.

Schleicheri Weihe et N. E., Schleicher's, ♀. f. Deutschland, Schweiz.

setosus Bigel., borstige, ♀. f. Nordamerika.

spectabilis Pursh (*stenopetalus* Choris.), ansehnliche, ♀. ♀. f. Westliches Nordamerika, aleutische Inseln.

Sprengelii Weihe et N. E., Sprengel's, ♀. f. Deutschl.

stellatus Sm., sternförmige, 4. f. Westl. Nordamerika.

strigosus Mchx. (*pensylvanicus* Poir.), striegelige, ♀. f. Nordamerika.

suberectus Anders. (*nessensis* Hall., *fastigiatus* Weihe, *sulcatus* Vest, *nemorosus* Auctor.), aufrechte, ♀. f. Deutschland, England.

tetraphyllus Ait., vierblättrige, ♀. f. Nordamerika.

tiliaceus Sm., lindenähnliche, ♀. f. b. k. Nepal.

tiliaefolius Weihe et N. E., lindenblättrige, ♀. f. Deutschl.

tomentosus Borkh., W. (*argenteus* C. G. Gmel., *triphyllus* Bell., *hypoleucus* Vest.), filzige, ♀. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

triflorus Rich., dreiblumige, 4. f. Nordamerika.

trivialis Mchx. (*procumbens* Mühlbg.), pensylvanische, ♀. ♀. f. Pennsylvanien, Carolina.

ulmifolius Schott., ulmenblättrige, ♀. f. Spanien.

villicaulis Köhl., zottigstengelige, ♀. f. Deutschland.

villosus Ait., zottige, ♀. f. Nordamerika.

vulgaris Weihe et N. E. (*fruticosus* Auctor.), gemeine, ♀. f. Deutschland etc.

japonicus L. v. *Keria japonica*.

Rudbeckia L. (Olaus Rudbeck, Professor der Botanik zu Upsala), XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

I. Genuina (*Centrocarrha* D. Don).

asperrina Horn., rauhste, 4. f. Nordamerika.

chrysomelaena Mchx. (*acutifolia* Swt., *Newmanni* Hort.). goldblumige, 4. f. Nordamerika.

b) chrysantha Dens.

digitata Mill., Ait. (*laevis* Hoffmsg.), fingerförmige, 4. f. Nordamerika.

discolor Pursh, verschiedenfarbige, ♂. 4. f. b. Florida.

fulgida Ait., leuchtende, 4. f. Nordamerika.

gracilis Nutt., schlanke, 4. f. Nordamerika.

grandiflora Gmel. (*nudicaulis* Nutt.), großblumige, 4. f. Nordamerika.

hirta L., rauhhaarige, ♂. 4. f. b. Nordamerika.

Rudbeckia

laciniata L., schlitzblättrige, 4. f. Nordamerika.
 laevigata Pursh, glatte, 4. k. Carolina, Georgia.
 moschata Lodd., moschusduftende, 4. f. Nordamerika.
 Radula Pursh (? *aspera* P.), raspelförmige, ♂. 4. f. b. Nordamerika.

spathulata Mchx., spatelblättrige, 4. k. Carolina.
 speciosa Wender., Schrad., prächtige, 4. f. ?
 subtomentosa Pursh, wenigfilzige, 4. f. Nordamerika.
 triloba L., dreilappige, ♂. f. Nordamerika.

II. Dracopis Cass.

amplexifolia Jacq. (*amplexicaulis* Vahl, *perfoliata* Cav.),
 stengelumfassende, ☉. f. Louisiana.

III. Obeliscaria Cass. (Ratabida Rafin.).

columnaris Pursh (*columnifera* Fras., *Tagetes* James),
 säulenförmige, 4. f. Nordamerika.

pinnata Vent. (*odorata* et *cinerea* Hort., *digitata* W.),
 fiederblättrige, 4. f. Nordamerika.

pulcherrima DC., schönste, 4. f. b. k. Texas.

hispidula Hffmsg. (*speciosa* Lk. et *purpurea* L.) etc.
 vid. Echinacea serotina, purpurea etc. *intermedia*
 Hort. v. Echinacea intermed. Nachtr.

Rudolphia W. (J. H. Rudolph, Botaniker zu Petersburg, K. A. Rudolphi, Geheim. Rath und Professor zu Berlin, berühmt als Anatom, Zoolog etc.), XVII.
 IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

dubia H. B. K., zweifelhafte, ♀. Sch. w. Neugranada.

rosea Tuss., rosafarbige, ♀. Sch. w. Westindien.

Ruellia Plum. (J. Ruelle von Soissons, Botaniker und Arzt, Franz d. I. v. Frankr.), XIV. II., Acanthaceae.

australis Cav., neuholländische, 4. w. Neuholland.

cernua Roxb., übergebogene, 4. w. Ostindien.

ciliata Hornem., gefranzte, ♀. w. Ostindien.

ciliosa Pursh, gewimperte, 4. t. Georgien.

clandestina L., heimlichblühende, 4. w. Westindien.

coccinea Vahl, scharlachfarbige, ♀. w. Westindien.

dependens Roxb., herabhängende, 4. w. Ostindien.

elegans Hook., zierliche, ? ☉. w. Ostindien.

foetida H. B. K. (*pulchella* Schott.), stinkende, ♀. w. Südamerika.

formosa Andr. (*elegans* Poir.), schöne, 4. w. Brasilien.

fulgida Andr., feuerfarbige, 4. w. Westindien.

hirta Vahl, haarige, 4. w. Ostindien.

lactea Cav., milchweisse, 4. t. w. Mexico.

longifolia Roth, langblättrige, 4. w. Ostindien.

macrophylla Vahl, großblättrige, 4. w. Südamerika.

oblongifolia Lodd., länglichblättrige, ♀. w. Brasilien.

ocymoides Cav. (*concavifolia* Ortega), basilicumähnliche,
 ♀. w. t. Mexico.

ovata Cav., eiförmige, 4. w. Mexico.

paniculata L., rispige, 4. ♀. w. Westind., Neugranada.

patula Jacq., absteigende, ♀. w. Ostindien.

picta Lodd., bemalte, ♀. w. St. Domingo.

pilosa L. (*pubescens* P., *ovata* Thbg.), weichhaarige, 4.
 ♀. w. k. Cap der guten Hoffnung.

rubricaulis Cav., rothstengelige, 4. w. Mexico.

salicifolia Vahl, weidenblättrige, 4. w. Ostindien.

strepens L., rauschende, 4. k. Virginien, Carolina,
 Westindien.

tetragona Lk., vierkantige, 4. w. Brasilien.

Ruellia

tuberosa L., knollige, 2. Kn. w. Jamaica.
 undulata Vahl, wellenblättrige, 4. w. Ostindien.
 violacea Aubl., violette, 4. w. Guiana.

anisophylla Wall. (*persicifolia* Lindl., *amygdalaeifolia* Hort.) vid. *Goldfussia anisophylla*. *biflora* L. (*oblongifolia* Mchx.) v. *Calophanes oblongifolia*. *Blechnum* L. et *blechioides* Sw. vid. *Blechnum Brownii* et *laxiflorum*. *cristata* Andr. v. *Aphelandra cristata*. *infundibuliformis* Andr. v. *Crossandra undulifolia*. *ringens* L. v. *Hygrophila ringens*. *Sabiniana* Wall. v. *Strobilanthes Sabiniana*. *varians* Vent. v. *Eranthemum nervosum*.

Ruizia Cav. (Hippolito Ruiz, spanischer Botaniker und Reisender), XVI VIII., Malvaceae-Dombeyaceae.

lobata Cav., gelappte, 5. w. Mascarenas.
variabilis Jacq. (*palmata* et *laciniata* Cav.), veränderliche, 5. w. Mascarenas.

Rulingia *corylifolia* Cunn., *pannosa* RB. etc. v. *Büttneria corylifolia pannosa* etc. *R. Anasampseros* Ehrh. Haw., *polyphylla* Haw. et *varians* Haw. vid. *Anacampseros rotundifolia* etc.

Rumex L. (*Acetosa* T. et *Lapathum* T.). Ampfer, VI. III., Portulacaceae-Polygonaceae.

abyssinicus Jacq. (*arifolius* Ait.), abyssinischer, 5. k. Südeuropa, Nordafrika.

Acetosa L., gemeiner Sauer-A., 4. f. Europa, Mittelas.
 β) *auriculatus* Wallr. γ) *intermedius* DC.

Acetosella L., kleiner, 4. f. Europa, Mittelasien, Nordamerika.

β) *multifidus* L. ?γ) *pyrenaicus* Lapeyr.

aculeatus L., stacheliger, 4. f. Creta, Spanien.

acutus L. (*pratensis* M. et K., *cristatus* Wallr.), spitzblättriger, 4. f. Europa.

aegyptiacus L., ägyptischer, ☉. f. Aegypten, Sardinien, Südrufsland.

alpinus L., Alpen-A., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

amplexicaulis Lapeyr. (? *oblongus* et *rugosus* Campd.), stengelumfassender, 4. f. Pyrenäen.

aquaticus L. (*latifolius* Mey.), Wasser-A., 4. Wa. f. Europa.

β) *ochotensis* Fisch.

arifolius All. (*montanus* Poir., *hispanic* Gmel.), arumblättriger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

brasiliensis Lk. (? *litoralis* H. B. K.), brasilianischer, 4. w. Brasilien.

Britannica L. (*xanthoriza* P., *bienne* Mch.), virginischer, ♂. 4. f. Virginien.

Brownii Campd. (*fimbriatus* RB.), Brown's, 4. Kn. k. Neuholland.

bucephalophorus L., oxsenkopffrüchtiger, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

Burchellii Campd. (? *sagittatus* Thbg.), Burchell's, 4. 5. k. Cap der guten Hoffnung.

campestris Savi, Feld-A., ?☉. f. Italien.

condylodes MB., knorriger, 4. f. Caucasus.

confertus W., gedrängter, 4. f. ?

conglomeratus Murr. (*glomeratus* Schreb., *divaricatus* Thuill., *Nemolapathum* Ehrh., *acutus* Sm., *paludosus* Wither., *crispus* β. Poll., *undulatus* Schrk.), knaulförmiger, 4. f. Europa, China.

Rumex

- conspersus Hartm., überstreuter, 4. f. Schweden.
 cordifolius Horn., herzblättriger, 4. f. ?
 crispatus Mchx., krauser, ☉. f. Nordamerika.
 crispus L., krausblättriger, 4. f. Europa.
 cristatus DC., kammförmiger, 4. f. ?
 cuneifolius Campd. (? *spathulatus* Thbg.), keilblättriger,
 4. k. Cap der guten Hoffnung.
 dentatus Murr., gezahnter, ☉. f. Aegypten.
 domesticus Hartm., Haus-A., 4. f. Schweden.
 fimbriatus Poir. (*repandus* Bosc.), gefranzter, 4. Kn. k.
 Cap der guten Hoffnung.
 frutescens Thouars, strauchiger, ♀. k. Tristan d'Acunha.
 giganteus Ait., riesenhafter, 4. k. Sandwichinseln.
 graminifolius Lamb. (*augustissimus* Ledeb.), grasblät-
 teriger, 4. f. Ostrufsland, Kamtschatka.
 hastifolius MB., spontonblättriger, 4. f. Caucasus.
 hastulatus Sm., Lamb., spontonförmiger, ♀. k. Chili.
 Hydrolapathum Huds. (*aquaticus* Auct., *longifolius* DC.),
 Flus-A., 4. f. Europa.
 lacerus Balb. (*roseus* Delil.), schlitzbilättriger, ☉. f.
 Aegypten.
 laevigatus W., glatter, 4. f. ?
 ?lancifolius Lk., lanzettblättriger, 4. f. ?
 longifolius H. B. K., langblättriger, ☉. f. Südamerika.
 Lunaria L., baumartiger, ♀. k. Canarische Inseln.
 luxurians L. suppl., wuchernder, 4. Kn. f. Italien,
 Frankreich, England.
 macrophyllus Campd. (*arifolius* L. suppl.), großblät-
 teriger, 4. f. ?
 maritimus L. (*Anthoxanthum* Murr., *aureus* With., *acu-
 tus* Poll), Meerstrands-A., ♂. Wa. f. Europa.
 maximus Schreb. (*heterophyllus* Schultz, *acutus* Hartm.),
 größter, 4. f. Europa.
 montevidensis Spgl., mondevidensischer, 4. k. Montevideo.
 nepalensis Spgl. (*hamatus* Trevir., *tuberosus* Roxb.), ne-
 pal'scher, 4. Kn. f. Nepal.
 obtusifolius L., stumpfblättriger, 4. f. Europa.
 β) *purpureus* Poir. (*sanguineus latifolius* H. Par.).
 γ) *sylvestris* Wallr.
 palustris Sm. (*maritimus* Hoffm., *limosus* Thuill.), Sumpf-
 A., ♂. Wa. f. Mitteleuropa.
 Patientia L., Gemüse-A., 4. f. Südeuropa.
 β) *orientalis* Bernh.
 persicarioides L., flöhkrautähnlicher, 4. f. Nordamer.
 polygonifolius ? Fisch. et Mey., knöterichblättriger, ? ☉. f. ?
 pulcher L., schöner, ♂. f. England, Südeuropa, Nord-
 afrika, Caucasus.
 β) *pauciflorus* Campd. (*auratus* Sm.). γ) *diva-
 ricatus* L.
 roseus L., rosafarbiger, ☉. f. Aegypten, Cypern.
 salicifolius Weinm., weidenblättriger, ☉. f. Californien.
 sanguineus L. (*Nemolapathum* Wallr., *nemorosus* Mey.),
 blutfarbiger, 4. f. Europa.
 a) *viridis* K. Sm. (*nemorosus* Schrad.). β) *ge-
 nuinus* K.
 sarcorrhizus Lk. (*cordatus* Dsf.), dickwurzeliger, 4. ♀.
 Kn. k. Cap der guten Hoffnung.
 scutatus L., schildförmiger, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.
 β) *glaucus* Jacq.

Rumex

- Steinii Beck., Stein's, 4. f. Westdeutschland.
 strictus Lk. (*dentatus* Sbr.), steifer, ♂. 4. f. Aegypten.
 tingitanus L., tanger'scher, 4. f. Nordafrika, Spanien.
 triangularis Poir., DC. (*tuberosus* Hort.), dreieckiger,
 4. Kn. f. ?
 tuberosus L., knolliger, 4. Kn. f. Italien.
 ucranicus Hornem. (*reticulatus* Bess.), ukrainischer, ☉.
 f. Ukraine.
 uncinulatus Schrad. (? *uncatus* Trevir.), hackiger,
 ♂. f. Nepal.
 venosus Pursh, aderiger, 4. k. Louisiana.
 verticillatus L., wirtelförmiger, 4. f. Nordamerika.
 vesicarius L., blasenfrüchtiger, ☉. f. Afrika.
digynus L. v. *Oxyria reniformis*. *spinosus* L. vid.
Emex spinosus.

Rumia Hoffm., Rumie, V. II., Umbelliferae.

- taurica Hoffm. (*Cachrys taurica* Pall.), taurische, 4.
 f. Taurien.

capensis Lk. v. *Capnophyllum africanum*.

Ruppia L. (H. B. Rupp, berühmter deutscher Botaniker), IV. III., Alismaceae-Patamophileae.

- maritima L., Meerstrands-R., 4. Wa. f. Europa, Amer.
 rostellata K., geschnäbelte, 4. Wa. f. Ostsee, Mannsfeld.

Ruscus T., Mäusedorn, XXII. XIII. (XVI. I.), Sarmen-
taceae (*Asparagineae*).

- aculeatus L., stacheliger, ♂. f. b. England, Südeuropa.
 β) rotundifolius Barr. γ) laxus Sm. (? *flexuosus* Mill.).

- androgynus T., zwittherblüthiger, ♂. Sch. k. Canar. Inseln.
 Hypoglossum L., Zungen-M., ♂. f. k. Italien, Griechenl.
 Hypophyllum L., breitblättriger, ♂. f. b. k. Italien,
 Macedonien, Caucasus.

β) trifoliatum Mill.

- racemosus L., traubiger, ♂. f. b. k. ? Portugal, Griechenl.
 reticulatus Thbg., netzblättriger, ♂. Sch. k. C. d. g. H.

? *volubilis* Thbg. v. *Myrsiphyllum asparagoides*.

Russelia Jacq. (Dr. Russel, englischer Naturforscher und Reisender), XIV. II., Personatae-Antirrhoneae.

- floribunda H. B. K., blüthenreiche, ♂. w. Mexico.
 juncea Zuccar. (*scoparia* H. Berol.), simsenförmige, ♂.
 w. Mexico.

multiflora Sims, vielblumige, ♂. w. Mexico.

ternifolia H. B. K., dreiblättrige, ♂. w. Mexico.

Ruta T., Raute, X. I., Tricoccae-Rutaceae.

- angustifolia P. (*chalepensis* β. L.), schmalblättrige, ♂.
 k. f. b. Südeuropa, Kleinasien.

bracteosa DC., deckblättrige, ♂. f. b. k. Griechenland,
 Sicilien, Dalmatien, Istrien.

chalepensis L. (*macrophylla* Ker), aleppische, ♂. k. f. b.
 Nordafrika, Syrien.

corsica DC. (*divaricata* Salzmann), corsicanische, ♂. k.
 f. b. Corsica.

divaricata Tenor. (*montana* Auct.), ausgespernte, ♂. f.
 b. k. Oesterreichisches Litorale, Italien, Griechen-
 land, Taurien.

β) *crithmifolia* Moric.

graveolens L. (*hortensis* Mill.), gemeine, ♂. f. Südeuropa.
 montana L. (*legitima* Jacq., *sylvestris* Mill., *tenuifolia*
 Desf.), Berg-R., ♂. f. b. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.

Ruta

- pinnata L., gefiederte, ♀. k. Canarische Inseln.
albiflora Hook. vid. Boenninghausenia albiflora.
Buxbaumii Poir. etc. vid. Haplophyllum Bux-
 baumii etc.

Ruyschia Jacq. (F. Ruysch, berühmter holländischer Anatom), V. 1., Guttiferae-Marcgraviaeae.

- clusiaefolia Jacq., clusiablätterige, ♀. w. Westindien.

Ryanea Vahl (John Ryan, welcher in Westindien Pflanzen sammelte und dieselben an Vahl sendete), XIII. 1., Capparideae-Flacourtieae.

- speciosa Vahl, prächtige, ♀. w. Trinidad.

Rytidophyllum Mart., Grübchenblatt, XIV. 11., Personatae-Bignoniaceae (*Gesnerieae*).

- auriculatum Hook., gehörtes, ♀. w. Brasilien.

Sabal Adans., Sabalpalme, VI. 111., Palmae.

- Blackburniana Lodd., Blackburn's, ♀. w. Südamerika.
 graminifolia Lodd., grasblätterige, ♀. w. Südamerika.
 minor P. (*Adansoni* Bot. mag.), kleine, 4. ♀. w. t.
 Carolina, Georgia.

- umbraculifera Lodd., schirmförmige, ♀. w. Jamaica.

Palmetto Lodd. v. Chamaerops Palmetto.

Sabbatia Adans. (L. Sabbati, italienischer Botaniker), V. 1., Contortae-Gentianeae.

- angularis Pursh, kantige, ♂. f. Nordamerika.
 calycosa Pursh, großkelchige, ♂. f. Nordamerika.
 chloroides Pursh, chloraähnliche, ♂. f. Nordamerika.
 gracilis Salisb., schlanke, ♂. f. Nordamerika.
 paniculata Pursh, rispige, 4. f. Nordamerika.

Sabulina Rchb. v. Alsine.**Saccharum** L., Zuckerrohr, III. 11., Gramineae.

- caudatum Mey., schweif förmiges, 4. w. Essequibo.
 chinense Roxb., chinesisches, 4. w. China.
 contractum Poir., schmalrispiges, 4. w. Westindien,
 Südamerika.

- dubium H. B. K. (*Anatherum Berterianum* Schult., *A.*
portoricense Sogl.), zweifelhaftes, 4. w. Südamerika.
 mexicanum Brouss., mexicanisches, 4. w. Mexico.

- Munja Roxb., Munja-Z., 4. w. Ostindien.

- officinarum L., gemeines, 4. w. Ost- und Westindien.
 polystachyon Sw., vielähriges, 4. w. Westindien, Südamer.
 procerum Roxb. (*Thunbergii* Retz), hohes, 4. w. Bengalen.
 violaceum Tussac, violettes, 4. w. Ost- und Westind.
appressum Kit. (*strictum* Sogl.) et *giganteum* P. et
Ravennae Murr. v. *Erianthus strictus*, saccharoides
 etc. *cylindricum* Lam. etc. v. *Imperata cylindrica*
 etc. *spicatum* L. vid. *Perotis latifolia*. *Teneriffae*
 L. v. *Tricholaena micrantha*.

Saccolobium Blume, Sackstendel, XX. 1., Orchideae.

- bifidum Lindl., weispaltiger, 4. w. Manilla.
 papillosum Lindl., weichwarziger, 4. w. Ostindien.

Sagina L., Mastkraut, IV. 11., Caryophyllaceae-Alsineae.

- apetala L., kronenloses, ♂. f. Europa.
 ciliata Fr., gefranztes, ♂. f. Nord- und Westeuropa.
 β) *depressa* Schultz.

- filiformis Pourr., fadenförmiges, ♂. f. Pyrenäen, Calabrien.
 maritima Don (*stricta* Fries), Meerstrands-M., ♂. f. Ir-
 land, Schottland, Schweden, Deutschland.

- muscoides Fröl., moosähnliches, ♂. f. Tyrol.

Sagina

procumbens L., niederliegendes, ☉. f. Europa, Asien.

β) *pluripetala* Dens.

urceolata Viv., becherförmiges, ☉. f. Corsica.

cerastoides Sm. et *erecta* L. v. *Moenchia cerastoides* et *erecta*.

Sagittaria L., Pfeilkraut, XXI. ix. (XIII. iv.), Alismaceae.

acutifolia L., spitzblättriges, 4. Wa. w. Surinam, Pennsylvanien.

angustifolia Bot. Reg., schmalblättriges, 4. Wa. w. Essequibo.

chinensis Sims, chinesisches, 4. Wa. w. China.

Doniana Swt. (*hastata* D. Don), Don's, 4. k. Nepal.

falcata Pursh, sichelförmiges, 4. Wa. k. Carolina.

graminea Mchx., grasblättriges, 4. Wa. k. Nordamer.

hastata Pursh, spontonförmiges, 4. Wa. k. Pensylvan.

heterophylla Pursh, verschiedenblättriges, 4. k. Pensylv.

lancifolia L., lanzettblättriges, 4. Wa. f. Nordamer.

b) *flore pleno*.

natans Mchx., schwimmendes, 4. Wa. k. Südcarolina.

obtusifolia W., stumpfes, 4. Wa. k. Nordamerika.

obtusifolia L., stumpfblättriges, 4. Wa. w. Ostindien.

rigida Pursh, starrblättriges, 4. Wa. f. Nordamerika.

sagittifolia L., gemeines, 4. Wa. f. Europa, Asien, Nordamerika.

b) *flore pleno*.

Sagus Rumph, G., Sagopalme, XXI. vi. (VI. iii.), Palmae.

pedunculata Poir. (*Ruffia* Jacq.), langstielige, 5. w. Madagascar.

Rumphii W., Rumph's, 5. w. Molucken.

vinifera P. (*Palma Pinus* G.), weingebende, 5. w. Guinea.

Salaxis Salish., *Salaxis*, VIII. i., Ericaceae.

axillaris Salish. (*Erica axill.* Thbg.), achselblumige, 5. t. Cap der guten Hoffnung.

Salicornia T., Glasschmalz, I. i., Aizoideae-Chenopodeae.

arabica Pall., L. suppl., arabisches, 5. k. Arabien.

fruticosa L., strauchiges, 5. k. Südeuropa.

β) *macrostachya* Moric.

herbacea L. (*acetaria* Pall., *annua* Engl. Bot.), krautartiges, ☉. f. Europa, Amerika.

β) *procumbens* Sm.

perennans W., ausdauerndes, 4. f. m. Sibirien.

radicans Sm., starkwurzelndes, 4. f. England, Norddeutschland.

Salisburia adiantifolia Sm. v. *Ginkgo biloba*.**Salix** T., Weide, XXII. ii. (II. i.), Amentaceae.

acuminata Sm. (*longifolia* Host), zugespitzte, 5. f. Nord-, Mittel- und Osteuropa.

β) *virescens* Mey.

acutifolia W. (*caspica* Hort., *violacea* Ander. Sm.), spitzblättrige, 5. f. Schlesien, Mark Brandeb., Podolien.

aegyptiaca L., ägyptische, 5. f. b. Aegypten.

alba L., weisse, 5. f. Europa.

β) *coerulea* Sm. γ) *vitellina* L. ? b) *rosea* Lodd.

ambigua Ehrh. (*plicata* Fr., *incubacea* ? L., *versifolia* Sering), zweifelhafte, 5. f. Nord- und Mitteleuropa.

b) *spatulata* W. c) *prostrata* Sm. d) *undulata* Borr. β) *glabrata* K. (*finmarchica* W. non Fries.).

Salix

- amygdalina* L. (*amygdalina* L. Vill., *sempervirens*, *speciosa* et *tenuiflora* Host), mandelblätterige, $\S$. f. Europa.
 b) *Hoppeana* W.
 β) *concolor* K. (*triandra* L., *ligustrina* Host, *alopecuroides* Tausch.).
- angustifolia* Wulf. (*incubacea* W., *laeta* Schultz, *pratensis* Host, *rosmarinifolia* β . *incubacea* K., *fusca* et *longifolia* Mey.), schmalblätterige, $\S$. f. Nord- und Osteuropa.
- Arbuscula* L., Strauch-W., $\S$. f. Europäische Alpen.
 a) *Waldsteiniana* W. (*Arbuscula* Jacq., *ovata* Sering.). β) *foetida* Schlchr. (*alpina* Swt., *prunifolia* Sering., *vaccinifolia* Engl. Bot., *formosa* Auct.). γ) *prunifolia* Sm. (*venulosa* Sm. et *carinata* Sm.).
- aurita* L. (*rugosa* Sering.), Salbei-W., $\S$. f. Europa.
 β) *microphylla* Lodd. (*heterophylla* Host). γ) *uliginosa* W. δ) *cladostemma* Hayne.
- babylonica* L. (*propendens* Ser.), babylonische, Trauer-W., $\S$. f. Griechenland, Kleinasien.
 b) *crispa* s. (*annularis* Hort.). c) *Napoleona* Hort.
- berberifolia* Pall., berberitzenblätterige, $\S$. f. Dahurien.
bicolor Ehrh. (*Arbuscula* Wahlbg., *phylicifolia* Sm., *Weigeliiana* W.), zweifarbige, $\S$. f. Mittel- u. Nordeuropa.
 β) *radicans* Sm. γ) *Dicksoniana* S.
- Bonplandiana* Humb., Bonpland's, $\S$. k. Mexico.
caesia Vill. (*prostrata* Ehrh., *myrtilloides* W.), hechtblaue, $\S$. f. Südfrankreich, Schweiz.
- candida* W., reinweißse, $\S$. f. Nordamerika.
- Caprea* L. (*tomentosa* Sering., *ulmifolia* Thuill., *aurigerana* Lapeyr.), Sohl-W. (Palm-W.), $\S$. f. Europa.
 β) *sphacelata* W.
- cinerea* L. (*acuminata* Hoffm., *polymorpha* Host, *Hoffmanniana* Bluff et Fing.), Werft-W., $\S$. f. Europa.
 β) *aquatica* Sm.
- conformis* Forb., einförmige, $\S$. f. Nordamerika.
- conifera* Wangenh. (*conica* W.), zapfenförmige, $\S$. f. Nordamerika.
- cordata* Mühlenb., herzförmige, $\S$. f. Virginien, Pensylv.
cordifolia Pursh, herzblätterige, $\S$. f. Labrador.
- Croweana* Sm., Crowe's, $\S$. f. England.
- cuspidata* Schultz (*tetrandra* L.), feinspitzige, $\S$. f. Nordeuropa.
 β) *Meyeriana* W.
- daphnoides* Vill. (*praecox* Hoppe, *bigemmis* Hoffm.), kellerhalsähnliche, $\S$. f. Europa.
 β) *cinerea* W. γ) *pomeranica* W.
- Davalliana* Sm., Davall's, $\S$. f. Schottland.
- depressa* L. (*livida* Wahlenb.), niedergedrückte, $\S$. $\S$. f. Nord- und Osteuropa.
 a) *velutina* K. (*sphacelata* Sm., *livida* β . *cinerascens* Wahlbg. β) *foliolosa* Afz. γ) *bicolor* Fries.
- discolor* Mühlenb., verschiedenfarbige, $\S$. f. Nordamer.
divaricata Pall., ausgespernte, $\S$. f. Dahurien.
- Doniana* Sm., Don's, $\S$. $\S$. f. England, Westphalen.
- finmarchica* Fr. (*campestris* Fr.), finmärkische, $\S$. f. Schweden.
- fragilis* L. (*fragilior*, *fragilissima*, *excelsior* et *palustris* Host, *Trevirani* Sgpl.), Bruch-W., $\S$. f. Europa.

Salix

- a) *decipiens* Hoffm. β) *excelsa* Tausch. (*Wargiana* Lej., *fragilis* Sm.). γ) *Russeliana* Sm.
fuscata Pursh, bräunliche, $\S$. f. Nordamerika.
glabra Scop. (*coruscans* W., *Wulfeniana* W.), kahle, $\S$. f. Baierische, salzburg., kärnthn. u. krainer Alpen.
glauca L. (*sericea* Vill.), blaugrüne, $\S$. f. Europ. Alpen.
 β) *albida* Schlchr. (*elaeagnoides* Schlchr.). γ) *appendiculata* Vahl.
grandifolia Sering (*stipularis* Sering, ?*cinerascens* W.), großblättrige, $\S$. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa.
grisea W. (*sericea* Mühlbg.), graublättrige, $\S$. f. Nordam.
hastata L. (*Ludwigii* Schk., *malifolia* W., *serrulata* W., *elegans* Host.), spontonförmige, $\S$. f. Europäische Alpen.
herbacea L., krautartige, $\S$. f. Europäische Alpen.
hippophaeolia Thuill. (*violacea* Hollandr.), sanddornblättrige, $\S$. f. Deutschland, Frankreich.
 β) *undulaefolia* K. (*undulata* H. Gött.). γ) *leiocarpa* K.
holosericea W. (*velutina* Schrad.), sammethaarige, $\S$. f. Norddeutschland.
Houstoniana Pursh (*tristis* Lodd.), Houston's, $\S$. f. Virginien, Carolina.
Humboldtiana W., Humboldt's, $\S$. w. Südamerika.
humilis W., niedrige, $\S$. f. ?
Jacquiniana Host (*fusca* Jacq., *alpina* Scop.), Jacquin's, $\S$. f. Oesterreichische, steyerländische, kärnthner etc. Alpen.
incana Schrk. (*riparia* W., *lavandulaefolia* Lapeyr., *angustifolia* Poir., *rosmarinifolia* Gouan, *Elaeagnos* Scop.), weisgraue, $\S$. f. Europa.
lanata L. (*chrysantha* Flor. Dan.), wollige, $\S$. f. Lappl.
 β) *glandulosa* Wahlenb. γ) *depolita* Koch.
lapponum L. (*limosa* Wahlbg., *helvetica* Vill., *nivea* Sering, *lactea* Bray, *arenaria* W. Sm., *glaucophylla* W., *Stuartiana* Sm.), lappländische, $\S$. f. Europäische Alpen.
 β) *glauca* Sm. (*arenaria denudata* Tausch.).
laurina Sm. (*tenuior* Borrer), lorbeerblättrige, $\S$. f. Engl.
 b) *bicolor* Sm.
laxiflora Borrer, lockerblumige, $\S$. f. England.
leucophylla W., weisblättrige, $\S$. f. ?
longifolia Mühlbg., langblättrige, $\S$. f. Pennsylvanien.
lucida Mühlbg. (*Forbesii* Swt.), starglänzende, $\S$. f. Virginien, Pennsylvanien.
mollissima Ehrh. (*pubera* Koch), weichblättrige, $\S$. f. Norddeutschland, Schlesien.
Mühlenbergiana W. (*tristis* Mühlbg., *alpina* Walt.), Mühlenberg's, $\S$. f. Nordamerika.
myricoides Mühlbg., wachsmyrtenähnliche, $\S$. f. Virginien, Pennsylvanien.
Myrsinites L. (*arbuscula* W., *dubia* Sut.), myrsinenartige, $\S$. f. Europäische Alpen.
 β) *lanata* K. γ) *leiocarpa* K.
myrtilloides L. (*elegans* Bess.), heidelbeerähnliche, $\S$. f. Lappland, Schlesien, Baiern.
nigra Marsh. (*caroliniana* Mchx.), schwarze, $\S$. f. Virginien, Pennsylvanien.

Salix

nigricans Sm., Fr., schwärzliche, ♀. f. Europäische Voralpen und Alpen.

a) *phylicifolia* K., Wahlbg., ? L. (*stylaris* Sering., *hastata* Hoppe, *Ammanniana* W., *Andersoniana* Sm., *menthaefolia* Host, *prunifolia* et *parietariaefolia* et *nivalis* Host. β) *eriocarpa* K. (*nigricans* Wahlbg., *rupestris* Forst., *hirta* et *cotiniifolia* Sm., *Halleri* Sering).

obovata Pursh, verkehrteiförmige, ♀. f. Nordamerika.

obtusifolia W., stumpfblättrige, ♀. f. Lappland.

oleaefolia Sm., ölbaumblättrige, ♀. f. England.

pedicellaris Pursh, langstielige, ♀. f. Nordamerika.

pentandra L. (*tinctoria* Sm.), fünfmännige, ♀. f. Europa.

β) *latifolia* K. (*polyandra* Bray). γ) *hermaphrodita* L.

petiolaris Sm., stielblättrige, ♀. f. England, Nordam.

? β) *pensylvanica* Forb.

phlomoides MB., wollkrautähnliche, ♀. f. Südrussland.

plagiophylla * (*Purshiana* Speg., *falcata* Pursh non Humb.), schieflättrige, ♀. f. Virginien, Pennsylvanien.

planifolia Pursh, flachblättrige, ♀. f. Labrador.

polaris Wahlenb., Polar-W., ♀. f. Nordnorwegen, Spitzbergen.

Pontederana Schlchr., W. (*discolor* et *austriaca* Host),

Pontederas, ♀. f. Böhmen, Oesterreich, Krain, Schweiz.

prinoides Pursh, winterbeerenähnliche, ♀. f. Nordamer.

purpurea L. (*monandra* Arduin. Hoffm., *mutabilis*, *oppositifolia*, *carniolica* et *mirabilis* Host), purpurfarbige, ♀. f. Europa.

β) *Lambertiana* Sm. γ) *Helix* L. δ) *monadelphica* K. ε) *sericea* Sering.

Purshiana Borrer (*ambigua* Pursh, Sm., Forb., Hook.), Pursh's, ♀. f. Nordamerika.

pyrenaica Gouan, pyrenäische, ♀. f. Pyrenäen.

recurvata Pursh, zurückgekrümmte, ♀. f. Nordamerika.

reflexa W., zurückgebogene, ♀. f. ?

repens L. (*depressa* Hoffm., *fusca* Auct., *incubacea* et *rostrata* Thuill., *parvifolia* Sm.), kriechende, ♀. f. Europa.

β) *fusca* Sm. γ) *argentea* Sm. (*arenaria* L. suec., *lanata* Thuill.). δ) *leiocarpa* Mey.

reticulata L., netzförmige, ♀. f. Europäische Alpen, Nordamerika.

retusa L., abgestutzte, ♀. f. Mitteleuropäische Alpen.

β) *major* K. (*Kitaibeliana* W.). γ) *minor* K. (*serpyllifolia* Scop.).

rigida Mühlbg. (*cordata* Mchx.), starrblättrige, ♀. f. Nordamerika.

rosmarinifolia L. (*tenuis* et *parviflora* Host), rosmarinblättrige, ♀. f. Nord- und Osteuropa.

rubra Huds. (*fissa* Ehrh., Hoffm., *virescens* Vill., *membranacea* Thuill., *concolor* Host, *olivacea* Thuill., *linnearis* Walker), rothe, ♀. f. Europa.

β) *Forbyana* Sm. γ) *sericea* K. (*elaeagnifolia* Tausch.).

salviaefolia Lk. (*patula* et *oleifolia* Sering, *Flüggeana* W.), salbeiblättrige, ♀. f. Schweiz, Portugal.

Schraderiana W. (*discolor* Schrad.), Schrader's, ♀. f. Deutschland.

Salix

Seringeana Gaud. (*lanceolata*, *holosericea* et *Kanderiana* Sering, *longifolia* Schlchr.), Seringe's, *h. f.* Schweiz, Tyrol, Krain.

serotina Pall., späte, *h. f.* Südrufsland.

silesiaca W., schlesische, *h. f.* Sudeten, Carpathen.

β) *fagifolia* W.

Smithiana W. (*mollissima* Sm., ? *rufinervis* DC.), Smith's, *h. f.* England, Nord- u. Westdeutschland, Schlesien.

stipularis Sm. (*longifolia* Host), zwischenblättrige, *h. f.* England, Norddeutschland, Unterösterreich, Schlesien.

tetrapla Sm., vierseitigästige, *h. f.* Schottland.

β) *Davalliana* Sm.

tetrasperma Roxb., viersamige, *h. w.* Ostind., Aegypten, tristis Ait., trauernde, *h. f.* Nordamerika.

undulata Ehrh., wellenblättrige, *h. f.* Norddeutschland, England.

β) *lanceolata* Sm.

Uva ursi Pursh, beerentraubenähnliche, *h. f.* Labrador. versifolia Wahlenb. (*fusca* L.), wechselblättrige, *h. f.* Lappland.

viminalis L., Korb-W. (Bind-W.), *h. f.* Europa.

violacea W., violette, *h. f.* ?

viridis Fries, grüne, *h. f.* Schweden.

Wilhelmsia MB., Wilhelm's, *h. f.* Iberien.

Unbestimmtere oder Varietäten: *adscendens* Donald's, *australis* Forbes (Schweiz), *Ansoniana* Forb. (Schweiz), *atrovirens* Forb. (Schweiz), *atropurpurea* Forb. (Schweiz), *alpina* Forbes, *albescens* Schlchr. (Schweiz), *alnifolia* Host, *alaternoides* Forb. (Schweiz), *betulina* ? Host, *candidula* ? Host, *carpinifolia* Schlchr., *cerasifolia* Schlchr. (Schweiz), *cinnamomea* Schlchr. (Schweiz), *clethraefolia* Schlchr. (Schweiz), *coluteoides* H. Angl., *cydoniaefolia* Schlchr. (Schweiz), *crassifolia* Forb., *coriacea* Forb. (Schweiz), *crispa* Forb., *dubia* Hort., *decumbens* Forb., *damascena* Forb. (*damascenifolia* Anders.), *dura* Forb., *eriantha* Schlchr., *Ehrhartiana* Mey. (*hexandra* Ehrh.), *feruginea* Anders. (Schottland), *firma* Forbes, *Forbesiana* H. Angl. (*Weigelia* Forbes), *glabrata* Schlchr. (Schweiz), *geminata* Forbes (England), *grisophylla* Forbes (Schweiz), *grisonensis* Forb., *helvetica* Forb., *Hoffmanniana* Sm. (*triandra* Hoffm.), *incanescens* Schlchr. (Schweiz), *latifolia* Forbes, *lacustris* Forb., *Lyoni* Schlchr. (Schweiz), *mespilifolia* Schlchr. (Schweiz), *Micheliana* Forb. (Schweiz), *murina* Schlchr. (Schweiz), *montana* Forb. (Schweiz), *monspeliensis* Forb. (*fragilis* var. Borrer), *macrostipulacea* Forb. (Schweiz), *mutabilis* Forb. (Schweiz), *nervosa* Schlchr. (Schweiz), *nitens* Anders. (Engl.), *obtusa* Lk. (Schweiz), *obtusoserrata* Schlchr. (Schweiz), *proteaefolia* Schl. (Schweiz), *pallida* Forb. (Schweiz), *pannosa* Forb. (Schweiz), *patens* Forb., *pallescens* Schlchr. (Schweiz), *persicaefolia* Hort., *petraea* Anders. (England), *procumbens* Forb. (Schottland), *propinqua* Borr. (Engl.), *pyrifolia* Schlchr. (Schweiz), *rivularis* Forbes (Schweiz), *rotundata* Forbes (Schweiz), *ramifusca* Forbes (England), *septentrionalis* Host, *semperflorens* Host, *sitchensis* Hort., *subserrata* W., *subalpina* Forb. (Schweiz), *strepida*

Salix

Forb. (Schweiz), Schleicheriana Forb. (Schweiz), tenuifolia Lodd., virgata Forb. (Nordamerika), versicolor Forb. (Schweiz), vaudensis Forb. (Schweiz), villosa Forb. (Schweiz), vaccinioides Host, Willdenowiana Forbes, Woolgariana Borrer. etc.

Salmea DC. (C. Fürst von Salm-Dyck), XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

Eupatoria DC., dostenähnliche, ♀. w. Caribäen.

hirsuta DC., rauhaarige, ♀. Sch. w. Jamaica.

scandens DC., klimmende, ♀. Sch. w. Vera-Cruz, Jamaica.

Salmia angustifolia W. etc. v. *Carludovicia angustifolia* etc.

Salpianthus arenarius H. B. K. v. *Boldoa lanceolata*.

Salpiglossis R. et P., Zungenröhre, XIV. 11., Solanaceae. atropurpurea Grah., schwarzpurpurrothe, ☉. ♂. f. t. Cordilleren.

Barclayana Penny (*intermedia* Swt.), Barclay's, ☉. ♂. f. t. Englische Hybride.

parviflora G. Don, kleinblumige, ♂. t. Chili.

picta Swt., bemalte, ☉. ♂. f. t. Chili.

sinuata R. et P., buchtigblättrige, ☉. ♂. f. t. Chili.

straminea Hook., strohfarbige, ☉. f. t. Chili.

integrifolia Hook. vid. *Petunia Mirabilis linearis* Hook. v. *Petunia intermedia*.

Salsola L., Salzkraut, V. 11., Aizoideae-Atripliceae.

brachiata Pall., kreuzästiges, ☉. f. Mittelasien.

crassa MB., dickes, ☉. f. Caucasus etc.

erubescens Schrad., röthliches, ☉. f. Sibirien,

foliosa Schrad., blattreiches, ☉. f. Sibirien.

glauca MB. (*spicata* Pall.), blaugrünes, ♀. k. Mittelasien.

Kali L., gemeines, ☉. f. Europa, Asien, Amerika.

laniflora L. (*lanata* Pall.), wollblumiges, ☉. f. Mittelasien.

microphylla Cav., kleinblättriges, ☉. f. Spanien.

oppositifolia Dsf., gegenblättriges, ♀. k. Sicilien, Nordafrika,

rigida Pall., starres, ♀. k. Sibirien.

rosacea L., rosafarbiges, ☉. f. Mittelasien.

sativa L., gebautes, ☉. f. Spanien.

Soda L., Soda-S., ☉. f. Südeuropa, Nordafrika, Taurien, Caucasus.

tamariscina Pall., tamariskenähnliches, ☉. ♀. f. k. Taurien, Mittelasien.

Tragus L., glattes, ☉. f. Südeuropa, Mittelas., Nordafrika.

vermiculata L., wurmförmiges, ☉. ♀. f. k. Sibirien.

verrucosa MB., warziges, ☉. ♀. f. Caucasus.

altissima L. v. *Schaginia altissima*. *arenaria* WK. (et *dasyantha* Pall. etc.) vid. *Kochia arenaria* etc.

radiata Dsf. v. *Kochia dentata*. *articulata* Forsk.

v. *Anabasis aphylla*. *divergens* Poir., *fruticosa* L.,

salsa L. etc. v. *Suaeda hortensis*, *Schoberia fruticosa* etc.

trigyna W. (*altissima* Cav.) vid. *Schaginia trigyna*.

Salvia T. L., Salbei, II. 1., Labiatae.

abyssinica Jacq., abyssinische, 4. ♀. k. Afrika.

aegyptiaca L., aegyptische, ♀. k. Aegypten, Canarische Inseln.

Aethiopis L., ungarische, ♂. f. Oesterreich, Ungarn, Siebenbürgen.

?affinis Spgl., ähnelnde, 4. f. ?

africana L., afrikanische, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

Salvia

- algeriensis Dsf., algier'sche, 4. f. Nordafrika.
 amarissima Orteg. (*amara* Jacq., *acuminata* R. et P., *circinnata* Cav.), bittere, ♀. k. Mexico.
 amethystina Sm., amethystfarbige, ♀. w. Neugranada.
 amplexicaulis Lam. (*valentina* Vahl), stengelumfassende, 4. f. Spanien.
 angustifolia Cav. (*reptans* Jacq.), schmalblättrige, 4. k. Mexico.
 applanata W., flachgedrückte, ♂. f. k. ? Aegypten, Creta.
 argentea L., silberfarbige, ♂. 4. f. k. Creta.
 aurea L., goldfarbige, ♀. ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
 aurita Thbg., geöhrt, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
 austriaca L., österreichische, 4. f. Oesterreich, Siebenb.
 azurea Lam., azurblaue, 4. f. k. Südcarolina.
 Barrelieri Etl., Barrelier's, 4. f. Calabrien, Spanien.
 Bauhini Fisch., Bauhin's, 4. f. ? Rußland.
 betonicaefolia Etl. (*pendula* Vahl, *cremenecensis* Bess., *betonienblättrige*. 4. f. Galicien, Podolien, Siebenb.
 b) *grandiflora*.
 bicolor Lam., zweifarbig, 4. f. Nordafrika.
 biflora R. et P., zweiblumige, 4. k. w. Peru.
 Boosiana Jacq. fil. (*amoena* Curt. Lindl., *thymiflora* W.), Boos's, 4. w. Peru.
 bracteata Russ., deckblättrige, 4. ♀. f. b. k. Syrien.
 byzantina Russ., türkische, ♂. f. Türkei.
 caesia Humb. (*polystachya* Orteg., *lineatifolia* Lag., *lamiifolia* Jacq.), hechtblaue, ♀. k. Mexico.
 calycina Sibth., großkelchige, ♀. f. b. k. Griechenland.
 campestris MB. (*caduca* Hornem., *hypanica* Bess.), Feld-S., 4. f. Taurien.
 canariensis L., canarische, ♀. k. Canarische Inseln.
 candidissima Vahl (*crassifolia* Sibth.), weißswollige, 4. f. b. k. Cypern.
 canescens C. A. Mey., weißgraue, 4. f. Caucasus.
 ceratophylla L. (*exasperata* Cav.), hornblättrige, ♂. f. k. Nordafrika, Kleinasien.
 ceratophylloides Arduin, L., halbgefiederte, ♂. f. k. Aegypten, Sicilien.
 chamaedryoides Cav. (*Chamaedrys* W.), gamanderartige, ♀. k. Mexico.
 clandestina L. (*ceratophylloides* W.), heimlichblumige, 4. f. Süd- und Osteuropa.
 β) *controversa* Tenor. (*lanigera* Poir., *clandestina* Sibth.).
 coarctata Vahl, gedrungene, 4. f. Kleinasien.
 coccinea L. Murr., scharlachrothe, ♂. ♀. k. Südcarolina, Florida, Mexico.
 colorata L. (*barbata* Lam.), buntkelchige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
 comutata Benth. (*dominica* L.), verwechselte, 4. f. Syrien.
 compressa Vahl, platte, 4. f. ?
 confusa Benth. (*aurita* Schult.), verkannte, ♀. f. Südeuropa.
 cretica L. (*tenuifolia* Riv.), cretische, ♀. k. Creta, Spanien.
 cyaniflora H. Berol. (? *cyanea* Benth.). kornblumenblaue, ♀. k. Mexico.
 dentata Ait., gezahnte, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
 desertorum Schang., Wüsten-S., 4. f. Sibirien.
 disermas L., zottige, 4. f. b. k. Syrien.

Salvia

- dolichostachya Lagasc., langähhrige, ♀. k. t. Mexico.
 ?erosa Dsf., benagte, ☉. f. ?
 foliosa Benth., blattrreiche, ☉. ♂. f. k. Mexico.
 Forskolei L., Forskol's, 4. k. Orient.
 fulgens Cav. (*cardinalis* Humb.), feuerfarbige, ♀. k. Mexico.
 gigantea Dsf., riesenhafte, ♂. f. ?
 glutinosa L., klebrige, 4. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.
 Grahmi Benth., Graham's, ♀. k. Mexico.
 grandiflora Etl., großblumige, 4. f. Taurien.
 haematodes L. (*virgata* Sav.), blutfarbige, 4. Kn. f. Italien, Spanien.
 hastata Etl., spontanblättrige, 4. f. Rußland.
 hirsuta Jacq. (*ciliata* Hort.), rauhhaarige, ☉. f. Mexico.
 hispanica L., spanische, ☉. f. Spanien, Frankreich.
 Horminum L., Scharlach-S., ☉. f. Italien, Südfrankreich, Griechenland.
 b) violacea. c) rubra.
 indica L., indische, 4. k. Ostindien.
 interrupta Schousb., unterbrochenblättrige, ♀. k. Mauritanien.
 involucrata Cav., eingehüllte, 4. ♀. k. t. Mexico.
 lanceolata Cav., Brouss. (*reflexa* Hornem.), lanzettblättrige, ☉. f. Neuspanien.
 lavandulaefolia Vahl (*hispanorum* Lag., *rosmarinifolia* Hort., *tenuior* Dsf.), lavendelblättrige, ♀. k. Spanien.
 leonuroides Glox. (*formosa* L'Her., *nodosa* R. et P.), löwenschwanzähnliche, ♀. t. Peru.
 leucantha Cav., weißblumige, 4. k. t. Mexico.
 limbata C. A. Mey., gesäumte, 4. f. Caucasus.
 lusitana Poir. (*sclareoides* Brot., *bullata* Schousb., *elongata* Spgl.), portugiesische, 4. f. Spanien, ?Portug.
 lyrata L., leierförmige, 4. f. Virginien.
 mexicana L. (*melissaefolia* Dsf., ?*papilionacea* Cav.), mexicanische, ♀. k. t. Mexico.
 micrantha Vahl (*bullata* Orteg.), kleinblumige, 4. t. w. Westindien.
 mollis Jacq., weiche, 4. f. ?
 napifolia Jacq., rübenblättrige, 4. f. Südeuropa.
 nemorosa L., Hain-S., 4. f. Mittel- und Osteuropa.
 ?nepetifolia Dsf., katzenmünzenblättrige, ☉. f. ?
 nilotica Murr., nilotische, 4. k. Aegypten.
 nubia Murr., nubische, 4. k. Afrika.
 nubicola Wall., Swt., wolkige, 4. k. Nepal, Ostindien.
 nutans WK., nickende, 4. f. Ungarn, Galicien.
 occidentalis Sw., westindische, 4. w. Jamaica.
 odorata W., wohlriechende, ♀. k. Bagdad.
 officinalis L., officinelle, ♀. f. Süd- und Westeuropa.
 b) variegata. β) crassifolia Dsf. (*latifolia* Hort., ?*chromatica* Hoffmsg.).
 paniculata L., rispige, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
 patens Cav., Benth. (*macrantha* Hort.), abstehende, 4. ♀. k. Neuspanien.
 patula Dsf. (*Aethiopis* Brot., *atlantica* P.), ausgebreitete, ♂. k. Portugal, Mauritanien.
 phlomoides Asso, wollkrautähnliche, ♂. 4. f. Spanien.
 pilantha Lk. (*Linkiana* R. et S., *rosaefolia* Hort.), haarblumige, ♀. k. ?
 pinnata L., gefiederte, ♂. k. Kleinasien.

Salvia

pomifera L. (*fragifera* Etl.), äpfeltragende, ♀. k. Griechenland, Syrien.

pratensis L. (*agrestis* L.), Wiesen-S., 4. f. Europa.

b) alba. c) rubra. d) rostrata Schm. β) dumetorum Andr., Bess.

prismatica Cav., prismatische, ☉. f. Mexico.

pseudococcinea Jacq., leuchtendrothe, ☉. ♀. f. k. Süd- und Osteuropa.

pulchella DC., hübsche, ♀. t. w. Südamerika.

purpurea Cav., purpurfarbige, 4. t. k. Mexico.

pyramidalis Petagn., pyramidale, 4. f. Calabrien.

pyrenaica L., pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.

rosaefolia Sm., rosenblättrige, ♀. k. f. b. Armenien.

rosea Vahl, rosafarbige, ♀. w. Ostindien.

rubra Spgl., rothe, 4. f. b. ? Aegypten.

rugosa Thbg., runzelige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

runcinata L., schrotsägenförmige, ♀. k. Cap d. g. H.

scabiosaefolia Lam. (*Hablitziana* Pall. W.), scabiosenblättrige, 4. ♀. f. b. Taurien.

scabra Thbg., scharfe, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

Sclarea L., Muscateller-S., ♂. f. Süd- und Osteuropa.

Scorodonia Poir. (*melissodora* Lag., *hirta* Auctor.), Scorodonien-S., ♀. k. t. Mexico.

serotina L. (*dominica* Vahl), spätblühende, ♀. k. Griechenland, ? Westindien.

Simsiana Schult. (*bracteata* Sims), Sims's, 4. f. Rußland.

Spielmanni Scop. (*truncata* Donn), Spielmann's, 4. f. Italien.

β) pinnatifida Lk. (*Verbenaca* W.).

spinosa L. Jacq. (*praecox* Vahl), dornige, ☉. ♂. f. k. Aegypten.

splendens Ker, Sellow (*brasiliensis* Spgl., *colorans* Hortul.), prächtige, ♀. w. Brasilien.

strictiflora Hook., steifblumige, ♀. w. Peru.

sylvestris L., wilde, 4. f. Mittel- und Osteuropa.

syriaca L., syrische, ♀. k. Syrien.

Tenorii Spgl. (*Barrelieri* Schrk.), Tenore's, 4. f. Calabrien.

tiliaefolia Vahl (*fimbriata* H. B. K.), lindenblättrige, ♀. k. t. Peru.

tingitana Etl. (*foetida* Lam.), färbende, ♀. k. Nordafrika.

trichostemmoides Pursh, trichostemmaähnliche, ☉. f. Nordamerika.

triloba L. suppl. (*Clusii* Jacq., *baccifera* Etl.), dreilappige, ♀. k. Syrien, Griechenland.

tubifera Cav., röhrige, 4. w. Mexico.

tubiflora Sm., röhrenblumige, ♀. k. Lima.

urticaefolia L., nesselblättrige, 4. f. Nordamerika.

variegata WK., bunte, 4. f. Ungarn.

verbascifolia MB. (*candidissima* MB.), königskerzenblättrige, 4. f. Iberien, Caucasus.

Verbenaca L. (*polymorpha* Lk. Hfmsg., *clandestina* W., *praecox* Savi), eisenkrautähnliche, 4. f. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Nordafrika.

β) multifida Sibth. γ) oblongata Vahl.

versicolor Lag., verschiedenfarbige, 4. f. Spanien.

verticillata L., wirtelförmige, 4. f. Ost- u. Südeuropa.

β) auriculata. γ) macrophylla.

virgata Ait., ruthenförmige, 4. f. Kleinasien.

viridis L., grüne, ☉. f. Italien, Griechenl., Nordafrika.

viscosa Jacq., schmierige, 4. f. Italien.

Salvia

vulnerariaefolia W., wundkrautblättrige, ♀. k. Armen.
carnosa Dougl. v. *Audibertia incana*.

Salvinia Michel. Guett. (Antonio Maria Salvini, Professor zu Florenz), XXIV. IV., Rhizocarpace (*Marsiaceae*)-Salvinieae.

natans All., schwimmende, 4. Wa. f. Europa, Nordam.

Samara coriacea Sw. et *pentandra* Sw. v. *Myrsine coriacea* et *Samara*.

Sambucus T., Hollunder, V. III., Dipsaceae-Viburneae.
canadensis L., canadischer, ♀. f. Nordamerika.

chinensis Lindl., chinesischer, 4. f. China.

Ebulus L. (*herbacea* Hall.), Zwerg-H., 4. f. Europa, Caucasus.

β) *humilis* Mill.

nigra L. gemeiner (Flieder), ♀. f. Europa, Nord- und Mittelasien.

b) *virescens* Dsf. c) *leucocarpa* DC. (*albida* Hort.).

d) *rotundifolia* Hort. e) *monstrosa* Hort.

f) *fol. argenteis* Hort. (*variegata* Hort.). g) *foliis*

luteis Hort. (*aurea* Hort.). β) *laciniata* Mill. Retz.

pubens Mchx. (*racemosa* Hook., *pubescens* Lodd.), weichhaariger, ♀. f. Nordamerika.

racemosa L., traubiger, ♀. f. Mittel- und Südeuropa.

β) *laciniata* K.

Samolus L., Pungen, V. I., ?Sapotaceae-Myrsineae (*Ardisiaceae*).

campanuloides RB., glockenblumenähnliche, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

litoralis RB., Strand-P., 4. k. Neuzeeland, Neuholland.

Valerandi L., Salz-P., ♂. 4. k. Europa, Asien, Südafrika, Amerika.

Samyda L. (griechischer Name für Birke), X. I., Samydeae.

decurrens Spgl., herablaufende, ♀. w. Brasilien.

glabrata Sw., glatte, ♀. w. Jamaica.

macrophylla W. (*viridiflora* Poir.), großblättrige, ♀. w. Ost- und Westindien.

nitida L., glänzende, ♀. w. Jamaica.

pubescens L., weichhaarige, ♀. w. Hispaniola.

rosea Ait., rosafarbige, ♀. w. Westindien.

serrulata L., sägezahnige, ♀. w. Westindien.

villosa Sw., zottige, ♀. w. Jamaica.

Sandoricum Rumph (Santoor, ostindischer Name), XVI. VI. (X. I.), Hesperideae-Meliaceae.

indicum Cav., indisches, ♀. w. Philippinen, Molucken.

Sanguinaria Dill., Blutkraut, XIII. I., Papaveraceae.

canadensis L., canadisches, 4. Kn. f. b. Nordamerika.

grandiflora Rosc., großblumiges, 4. Kn. f. b. Nordamer.

Sanguisorba R. L., Wiesenknopf, IV. I., Rosaceae-Sanguisorbeae.

bracteosa Fisch., deckblättriger, 4. f. ?Podolien.

canadensis L., canadischer, 4. f. Canada.

carnea Fisch. (*rubra* Schrk.), fleischfarbiger, 4. f. ?

mauritanica Dsf., mauritanischer, 4. f. Nordafrika.

media L., mittlerer, 4. f. Canada.

officinalis L., gemeiner, 4. f. Europa.

β) *auriculata* Scop.

neglecta G. Don, übersehener, 4. f. ?

tenuifolia Fisch., feinblättriger, 4. f. ?

Sanicula T., Sanikel, V. II., Umbelliferae.

canadensis L., canadischer, 4. f. Nordamerika.

europaea L., gemeiner, 4. f. Europa.

marylandica L., maryländischer, 4. f. Nordamerika.

Sanseviella Rchb., Sansevielle, VI. I., Aroideae-Tacceae.

carnea Rchb., fleischfarbige, 4. f. b. k. China.

Sansevieria Thbg. (Sansevier, schwedischer Botaniker),

VI. I., Corönariae-Hemerocallideae.

ensifolia Haw., schwertblättrige, 4. w. Ostindien.

fulvo-cincta Haw., rothgelbrandige, 4. w. Brasilien.

glauca Haw., blaugrüne, 4. w. ?

grandicuspis Haw., großspitzige, 4. w. ?

guineensis W. (*thyrsiflora* Thbg.), guineische, 4. w. Guinea.

laete virens Haw., freudiggrüne, 4. w. Cochinchina.

lanuginosa W., wollige, 4. w. Ostindien.

longiflora Sims, langblumige, 4. w. Afrika.

polyphylla Haw., vielblättrige, 4. w. ?

pumila Haw., kleine, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

spicata Haw., ährige, 4. w. Ostindien.

stenophylla Lk., schmalblättrige, 4. ?

zeylanica W., zeylonische, 4. w. Ceylon.

carnea Andr. (*sessiliflora* Bot. mag.) vid. *Sanseviella carnea*.

Santalum L. (*Sandalum* Anct.), Sandelholz, IV. I., Sandalaceae.

album L., weisses, 5. w. Ostindien.

myrtifolium Spgl. (*Sirium myrtifol.* L. mant.), myrtenblättriges, 5. w. Ostindien.

obtusifolium RB., stumpfblättriges, 5. 5. t. Neuholland.

Santolina T., Heiligenpflanze, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.

Chamaecyparissus L. (*incana* Lam.), cypressenartige, 5. k. f. b. Südeuropa.

leucantha Bertol. (*pinnata* Viv.), weißblumige, 5. k. f. b. Italien.

pectinata Lag., kammförmige, 5. k. Spanien.

rosmarinifolia L. (*minor* Mill.), rosmarinblättrige, 5. k. Spanien.

squarrosa W. (*villosa* Mill.), sparrige, 5. k. Südfrankreich, Spanien.

viridis W. (*virens* Mill., *cupressiformis* Lam.), grüne, 5. k. f. b. Südfrankreich, Spanien.

anthemoides L. vid. *Lyonetia abrotanifolia*.

Murr. (*alpina* Bertol., *pinnata* Donn), *crithmifolia*

Hornem., *eriosperma* P. v. *Lasiospermum crithmi-*

folium etc. Nachtr. (*rigida* Sm. v. *Lyonetia rigida*

Nachtr. *maritima* Huds. Sm. v. *Otanthus maritimus*.

Sanvitalia Cav., Sanvitalie, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

procumbens W. (*villosa* Cav.), niederliegende, 5. f. m. Mexico.

Sapindus T., Seifenbaum, VIII. III., Sapindacei.

emarginatus Vahl, ausgerandeter, 5. w. Ostindien.

Forsythii DC., Forsyth's, 5. w. Caribäen.

frutescens Aubl. (*surinamensis* Poir.), strauchiger, 5. w. Guiana.

indicus Poir., indischer, 5. w. Ostindien.

laurifolius Vahl, lorbeerblättriger, 5. w. Malabar.

longifolius Vahl, langblättriger, 5. w. Ostindien.

marginatus W. (*Saponaria* Mchx.), randstieliger, 5. t. Carol.

Sapindus

rigidus Ait., starrer, ♀. w. Westindien.

rubiginosus Roxb., rostfarbiger, ♀. w. Ostindien.

Saponaria L., gemeiner S., ♀. w. Caribäen, Südamer.

senegalensis Poir., senegal'scher, ♀. w. Senegal.

Sapium Jacq., Saftbaum, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

aucuparium Jacq. (*Hippomane biglandulosa* Aubl.), zweidrüsiger, ♀. w. Surinam, Westindien.

Hippomane Meyer (*aucuparium* W.; *Hippom. biglandul.* L.), Mancinellen-S., ♀. w. Westindien.

ilicifolium W., stechhülsenblättriger, ♀. w. Westindien.

indicum W., indischer, ♀. w. Ostindien.

Saponaria L., Seifenkraut, X. ii., Caryophyllaceae.

bellidifolia Sm., maßliebenblättriges, 4. f. b. Calabrien.

caespitosa Sm., rasenartiges, 4. k. Griechenland.

calabrica Guss., calabrisches, ☉. f. Calabrien.

cerastoides Fisch. et Mey., hornkrautähnliches, ☉. f. Nordpersien.

depressa Bivon. (*sicula* Rafin.), niedergedrücktes, 4. f. b. k. Sicilien.

elegans Lapeyr. (*caespitosa* DC.), zierliches, 4. f. Pyren.

glutinosa MB., klebriges, ♂. f. Caucasus.

lutea L., gelbes, 4. f. b. k. Südliche Schweiz, italienische Alpen.

ocymoides L., basilicumähnliches, 4. f. b. k. Süd- und westeuropäische Alpen.

officinalis L., gemeines, 4. f. Europa.

b) fl. pleno. c) fl. pleno purpureo.

orientalis L., morgenländisches, ☉. f. Kleinasien.

porrigens L., ausgestrecktes, ☉. f. Kleinasien.

viscosa Fisch. et Mey., schmieriges, ☉. f. ? Persien.

perfoliata Roxb. et *Vaccaria* L. v. *Vaccaria perfoliata* et *pyramidata*.

Saracha R. et P. (Isidore Saracha, ein spanischer Benedictinermönch und Botaniker), V. i., Solanaceae.

procumbens R. et P. (*Atropa plicata* Roth, *Bellinia procumb.* R. et S.), niederliegende, ☉. 4. f. k. Peru.

umbellata DC. (*Bellinia umbell.* R. et S.), doldige, 4. ♀. t. w. Peru.

viscosa Swt., schmierige, ♀. t. w. ? Peru.

Sarcanthus Lindl., Fleischblume, XX. i., Orchideae.

guttatus Lindl. (*Aerides guttat.* Roxb.), tropfenfleckige, 4. w. Ostindien.

paniculatus Lindl., rispige, 4. w. China.

praemorsus Lindl., abgebissene, 4. w. Ostindien.

rostratus Lindl., schnabelförmige, 4. w. China.

succisus Lindl., abgeschnittene, 4. w. China.

teretifolius Lindl., rundblättrige, 4. w. China.

Sarcocapnos DC., Fleischrauch, XVII. ii., Fumariaceae.

enneaphylla DC., neunblättriger, 4. f. Südfrankreich, Spanien.

Sarcocaulon DC., Fleischstämmchen, XVI. vii., Geraniaceae.

Burmanni DC., Burmann's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

L'Heritieri DC., L'Heritier's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

Patersonii DC., Paterson's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

Sarcocephalus Afz., Fleischkopf, V. i., Rubiaceae.

esculentus Afz., genießbarer, ♀. ♀. w. Sierra Leone.

Sarcochilus RB., Fleischlippe, XX. i., Orchideae.

Sarcochilus

falcatum RB., sichelförmige, 4. w. Neuholland.

praemorsum Spgl. v. *Sarcanthus praemorsus*.

Sarcococca Lindl., Fleischknopf, XX. 1v., Tricoccae-Euphorbiaceae.

pruniformis Lindl., pflaumenförmiger, 5. t. Nepal.

Sarcolobus RB., Fleischwende, V. 11., Asclepiadeae.

carinatus RB., Wall., nachenförmige, 5. Sch. w. Bengalen.

globosus RB., Wall., kugelfrüchtige, 5. Sch. w. Bengalen.

Sarcophyllum Thbg., Fleischblatt, XVII. 1v. (vi.) (XVI. vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

carnosum Thbg., capisches, 5. k. t. Cap der gut. H.

Sarcostemma RB., Fleischkrönchen, V. 11., Asclepiadeae.

Swartzianum R. et S., Swartz's, 5. Sch. w. Westind.

viminale RB., gertenartiges, 5. Sch. w. Afrika, Ostind.

Sarracenia T. (Dr. Sarrazin, französischer Arzt), XIII. 1., Sarracenieae.

flava L., hellgelbe, 4. k. Nordamerika.

minor Nutt., kleine, 4. h. Nordamerika.

purpurea L., purpurfarbige, 4. k. Nordamerika.

rubra Walt., rothe, 4. k. Nordamerika.

variolaris Mchx. (*adunca* Sm.), schorfige, 4. k. Carolina.

Satureja T., Saturey (Pfefferkraut), XIV. 1., Labiatae. I. Genuina.

hirsuta Presl, rauhhaariges, 4. k. Sicilien.

hortensis L., gemeines Pfeffer- oder Bohnenkraut, ☉. f. Taurien, Caucasus.

montana L., Berg-P., 5. k. f. b. Südeuropa.

mutica Fisch. et Mey., spitzenloses, 4. 5. k. f. b. Talüsch.

obovata Lag., verkehrteiförmiges, 5. k. f. b. Südspanien.

pygmaea Sieb. (*subspicata* Bernh., *illyrica* Host), zwergiges, 5. k. f. b. Illyrien, Dalmatien.

Thymbra L., griechisches, 5. k. Nordafrika, Griechenland, Kleinasien.

variegata Host, buntes, 5. k. f. b. Oesterr. Litorale.

II. *Micromeria* Benth.

approximata Bivon. (*fascicularis* Rafin.), büschelförmiges, 5. k. Sicilien.

canescens Guss., grauliches, 5. k. Sicilien.

congesta Hornem., gedrängtblumiges, 5. k. ?

filiformis Benth. (*Thymus* f. Ait.), fadenförmiges, 5. k. Balearische Inseln.

graeca L. (? *micrantha* Hoffm., Lk.), griechisches, 5. k. Griechenland, ? Portugal.

β) *consentina* Tenor.

Juliana L., julianisches, 5. k. Italien, Dalmatien, Griechenl.

microphylla Guss. (? *filiformis* Dsf., *Teneriffae* W.), kleinblättriges, 5. k. Sicilien, Nordafrika.

nervosa Dsf. (*capitata* Dsf., *filiformis* Tenor.), nerviges, 5. k. Südeuropa, Nordafrika.

parviflora Visian. (*inodora* Hort.), kleinblumiges, 5. k. Dalmatien.

Piperella Benth., quendelblättriges, 5. k. Süd- und Westeuropa, Croatien.

subcordata Vis., fastherzblättriges, 5. k. Dalmatien.

Teneriffae Benth. (*Thymus terebinthinaceus* W.), Teneriffa-P., 4. 5. k. Teneriffa.

tenuifolia Tenor., dünnblättriges, 5. k. Apulien.

Satureja

varia Benth. (*thymoides* Lowe, *Thymus ericaefolius* Roth),
veränderliches, ♀. k. Canarische Inseln.

marifolia Benth., *Pulegium* Benth. et *rupestris*
Wulf. (*thymifolia* Scop.) vid. *Calamintha marifolia*,
subnuda et *thymifolia*.

Satyrium L., Faunstendel, XX. 1., Orchideae.

candidum Lindl., reinweißer, 4. Kn. w. Cap d. g. H.
carneum RB., fleischfarbiger, 4. Kn. w. Cap d. g. H.
coriifolium Sw. (*erectum* Sw.), lederblättriger, 4. Kn.
w. Cap der guten Hoffnung.

cucullatum Sw., kappenförmiger, 4. Kn. w. C. d. g. H.
foliosum Sw., blattreicher, 4. Kn. w. Cap d. gut. H.
membranaceum Sw., hautblättriger, 4. Kn. w. Cap
der guten Hoffnung.

parviflorum Sw., kleinblumiger, 4. Kn. w. C. d. g. H.
albidum L. etc. v. *Gymnadenia albida* etc. *hirci-*
num L. v. *Himantoglossum hircinum* Nachtr. *nigrum*
L. vid. *Nigritella angustifolia* etc. *repens* L. vid.
Goodyera repens.

Saurauja W. (?Sauraujo, spanischer Botaniker), XIII.
v., Evonymaceae-Ternstroemiaceae.

excelsa W., hohe, ♀. w. Neu-Granada.

nepalensis DC., nepal'sche, ♀. w. Nepal.

Sauroglossum Lindl., Eidechsenzüngel, XX. 1.,
Orchideae.

elatum Lindl., erhöhtes, 4. w. Brasilien.

Saururus L., Eidechsenchwanz, VII. III., ?Aroideae,
?Piperaceae.

cernuus L., übergebogener, 4. Wa. k. Virginien.

chinensis Hort., chinesischer, 4. Wa. k. China.

lucidus Donn., spiegelnder, 4. Wa. k. f. Nordamerika.

Saussurea DC. (H. B. de Saussure, schweizerischer
Naturforscher), XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

acuminata Turcz., zugespitzte, 4. f. Dahurien.

alata DC. (*decurrens* Ledeb.), geflügelte, 4. f. Sibirien.

alpina DC., Alpen-S., 4. f. b. Europäische Alpen.

amara DC., bittere, 4. f. Sibirien.

angustifolia DC., schmalblättrige, 4. f. Sibirien.

cana Ledeb., graue, 4. f. Sibirien.

crassifolia DC., dickblättrige, 4. f. Sibirien.

discolor DC., verschiedenfarbige, 4. f. b. Mitteleuro-
päische Alpen.

elata Ledeb., hohe, 4. f. Sibirien.

elegans Ledeb., zierliche, 4. f. Sibirien.

elongata DC., verlängerte, 4. f. Sibirien.

latifolia Ledeb., breitblättrige, 4. f. Sibirien.

lyrata Fisch., leierblättrige, 4. f. Sibirien.

pulchella Fisch., schöne, 4. f. Sibirien.

pygmaea Spgl., zwergige, 4. f. b. Oesterreich, Ungarn.

runcinata DC., schrotsägenförmige, 4. f. Sibirien.

salicifolia DC., weidenblättrige, 4. f. Sibirien.

salsa Spgl., Salinen-S., 4. f. Caucasus.

tenuis Ledeb., dünne, 4. f. Sibirien.

Sauvagesia Jacq. (F. B. de Sauvage, französischer
Botaniker), V. 1., Violaceae.

erecta L., aufrechte, ☉. ♀. w. Südamerika.

geminiflora DC., paarblumige, ☉. ♀. w. Mexico.

nutans P., nickende, ☉. ♀. w. Madagascar.

Saxifraga T. L., Steinbrech, X. II., Corniculatae-Saxifrageae.

I. *Bergenia* Mch. (*Geryonia* Schrk., *Megasea* Haw.).

cordifolia Haw., herzblättriger, 4. f. Sibirien.

crassifolia L., dickblättriger, 4. f. Sibirien.

ligulata Wall. (*M. ciliata* Haw.), zungenförmiger, 4. k. Nepal.

II. *Diptera* Borkh. Lk.

cuscutaeformis Lodd. (*grandiflora* Hort.), cuscutaähnlicher, 4. k. China.

sarmentosa L. suppl. (*chinensis* Lour., *stolonifera* Jacq.), wuchernder, 4. k. China, Japan.

III. *Gymnopera* D. Don (*Robertsonia* Haw.).

aestivalis Fisch. et Mey. (*punctata* Stbg., *semidodecandra* Wormsk.), Sommer-S., 4. f. Kamtschatka.

arguta D. Don, spitzsägiger, 4. f. Nordamerika.

cuneifolia L., keilblättriger, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

β) *davurica* D. Don.

dissimilis G. Don, unähnlicher, 4. f. Nordamerika.

erosa Pursh, genagter, 4. f. b. k. Virginien, Carolina,

β) *hirsuta* D. Don.

Geum L., nierenblättriger, 4. f. Irland, Schweiz, Sibirien.

hirsuta L. (*punctata* Hort.), rauhhaariger, 4. f. Irland, Pyrenäen.

? β) *sphaeroidea* Haw.

hybrida Vill. Stbg., Bastard-St., 4. f. Dauphiné.

leucanthemifolia Lapeyr. (*Clusii* Gouan), wucherblumenblättriger, 4. f. Pyrenäen, Tyrol, Krain, Carolina.

media Haw., mittlerer, 4. f. England.

polita Haw., geschmückter, 4. f. Schottland.

punctata L. (*dentata* Haw.), punktirter, 4. f. Irland, Sibirien.

? β) *crenata* Haw. γ) *elegans* Mack.

serrata Haw. (*serratifolia* Mack.), sägeblättriger, 4. k. f. b. Irland.

spicata D. Don (*Geum* Pursh), ährenförmiger, 4. f. Westliches Nordamerika.

stellaris L., sternförmiger, 4. f. Europ. Alpen, Asien.

β) *Schleicheri* D. Don.

umbrosa L., schattenliebender, 4. f. Irland, Pyrenäen, Sudeten, Salzburg.

IV. *Leiogyne* D. Don.

aizoides L. (*autumnalis* L.), Herbst-S., 4. f. Europäische Alpen.

b) *atrorubens* Bertol.

altifida Haw., tiefspaltiger, 4. f. ?

arachnoidea Stbg., spinnewebenartiger, 4. f. Südl. Tyrol.

aspera L., rauher, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

bronchialis L., halbstrauchiger, 4. f. Nördliches Asien und Amerika.

bryoides L. (*aspera* β. DC.), moosartiger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

bulbifera L., zwiebeltragender, 4. f. Oesterreich, Schweiz, Italien, Spanien.

β) *veronicaefolia* Bertol. (*Russi* Presl).

cernua L. (*vivipara* Vest., *penduliflora* Bastard.), übergebogener, 4. f. Lappland, Schottland, schweizer Alpen, Pyrenäen, Steyermark.

flagellaris Stbg. (*setigera* Pursh, *aspera* MB., *prorepens* Fisch.), peitschenförmiger, 4. f. Nordasien und Amerika, Caucasus.

Saxifraga

granulata L., körnertragender (gemeiner), 4. f. Europa,
b) flore pleno.

hederacea L., epheuähnlicher, ☉. f. Creta.

Hirculus L., cistenblüthiger, 4. f. Europa, Nordasien.

laevis MB., glatter, 4. f. Caucasus.

nudicaulis D. Don, nacktstengeliger, 4. f. Westliches
Nordamerika.

rivularis L., Bach-S., 4. f. Nordeuropa, Nordamerika.

rotundifolia L., rundblättriger, 4. f. Europäische
Alpen, Asien.

β) repanda Stbg.

sibirica L. (? *grandiflora* Stbg.), sibirischer, 4. f. Sibirien.

V. Micranthes D. Don.

congesta Haw. (*nivalis* Pursh), gedrängtblumiger, 4. k.
Nordamerika.

ferruginea Grah, rostfarbiger, 4. k. f. k. Nordamerika.

hieracifolia WK., habichtskrautblättriger, 4. f. Car-
pathen, dinarische Alpen, Steyermark.

nivalis L., Schnee-St., 4. f. Sudeten, nördlichstes
Europa, Spitzbergen, Sibirien.

β) longiscapa D. Don.

pennsylvanica L., pennsylvanischer, 4. f. Nordamerika.

b) glabra.

pyrolaefolia D. Don, pyrolenblättriger, 4. f. Kamt-
schatka, aleutische Inseln.

semipubescens Swt. (*marylandica* Hort., *palustris* Lk.),
halbhaariger, 4. f. Nordamerika.

virginiensis Mchx. (*vernalis* W., *elongata* Stbg.), virgi-
nischer, 4. k. f. b. Nordamerika.

V. Saxifraga genuina.

adscendens L. (*controversa* Stbg., *petraea* Gun.), auf-
steigender, ☉. 4. f. Europäische Alpen.

β) Bellardi All.

affinis D. Don (*laevis* Donn), ähnelnder, 4. f. ?

ajugaefolia L., günselblättriger, 4. f. Süd- und west-
europäische Alpen.

Aizoon Jacq., traubenblüthiger, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

a) intacta W. β) recta Lap. (*major* K.). γ)
minor brevifolia Stbg. (*parviflora* Haw.).

androsacea L., mannsschildähnlicher, 4. f. Mitteleuro-
päische Alpen.

aquatica Lapeyr. (*petraea* Gouan, *adscendens* Vahl),
Wasser-St., 4. f. Pyrenäen.

aretioides Lapeyr., aretiaähnlicher, 4. f. Pyrenäen.

atropurpurea Stbg., dunkelpurpurrother, 4. f. Tyrol etc.

biflora All. (*oppositifolia* β. W.), zweiblumiger, 4. f.
Schweiz, Tyrol, Piemont, Pyrenäen etc.

Burseriana L., Burser's, 4. f. Tyrol, Steyermark, Krain,
Apenninen, Pyrenäen.

caesia L. (*recurvifolia* Láp.), hechtblauer, 4. f. Mittel-
europäische Alpen.

caespitosa L. (*decipiens* Ehrh., *palmata* Sm., *petraea*
Roth), rasenartiger, 4. f. Mittel- und Nordeuropa.

a) groenlandica L. β) Sternbergii W. (*palmata*
Panz., *tridentata* D. Don). b) media Tausch.

c) Steinmanni Tausch. γ) villosa W. δ) uni-
flora Stbg.

ceratophylla Dryand. (*trifurcata* Schrad.), hornblättriger,
4. f. Spanien.

Saxifraga

- Cotyledon L. (*pyramidalis* Lapeyr., Stbg.), nabelkraut-artiger, 4. f. Schweiz, Pyrenäen, Lappland.
- crocea Gaud., safranfarbiger, 4. f. b. Südsavoyen.
- crustata Vest (*longifolia* γ. *minor* Stbg.), crustirter, 4. f. Tyrol, Kärnthen, Krain.
- denudata D. Don, nackter, 4. f. Schottland, Irland.
- diapensioides Bell., diapensiaähnlicher, 4. f. b. Südliche Schweiz, italienische Alpen.
- elator M. et K. (*longifolia* β. *media* Stbg., *longifolia* Host., ? *Hostii* Tausch), höherer, 4. f. Schweiz, krainer Alpen etc.
- elongella Sm., verlängerter, 4. f. Schottland.
- exarata Vill. (*caespitosa* Wahlbg., *hypnoides* All., *nervosa major* Stbg.), ausgefurchter, 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Caucasus.
- b) *intricata* Lapeyr. (*nervosa minor* Stbg.). c) *striata* Hall. fil. β) *nervosa* Lapeyr. (*intermedia* Gaud.). ? b) *pubescens* Pourr. (*mixta* Lapeyr.).
- geranioides L. (*quinquefida* Lam.), storchschnabelähnlicher, 4. f. Pyrenäen.
- hirta Donn, kurzhaariger, 4. f. Schottland.
- Hohenwartii Stbg, Hohenwart's, 4. f. Krain, Kärnthen, Steyermark.
- hypnoides L. (*aggregata* Lej., *sponhemica* Panz.), liegender, 4. f. Europa.
- b) *viscosa* Hort. c) *angustifolia* Hort. d) *muscosa* D. Don. e) *pulchella* D. Don.
- incurvifolia D. Don, einwärtsgekrümmter, 4. f. Irland.
- irrigua Fisch. (*aquatica* MB., *petraea* Pall.), wasserliebender, ♂. 4. f. Taurien, Sibirien.
- Kochii Hornung, Koch's, 4. f. Schweiz.
- laete-virens D. Don, freudiggrüner, 4. f. Schottland.
- lanceolata Haw., lanzettblättriger, 4. f. ?
- b) *obtusa* Haw.
- leptophylla P., schlankblättriger, 4. f. ? Schweiz.
- b) *angustifolia* D. Don.
- longifolia Lapeyr. (*lingulata* Bell.), langblättriger, 4. f. Pyrenäen, oberitalienische Alpen.
- b) *media* D. Don.
- media Gouan (*calyciflora* Lapeyr., *porophylla* Bertol., *ambigua* DC.), mittlerer, 4. f. Pyrenäen, Apenninen, Kleinasien.
- moschata Wulf., moschusduftender, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
- muscoides Wulf. (*caespitosa* Scop., *pyrenaica* Vill.), lebermoosähnlicher, 4. f. Europäische Alpen.
- β) *pygmaea* Haw.
- mutata L., veränderlicher, 4. f. Schweiz, Baiern, salzburger und steyermärker Alpen, Pyrenäen.
- oppositifolia L. (*coerulea* P., *retusa* Stbg.), gegenblättriger, 4. f. Europäische Alpen, Nordamerika.
- ? *paniculata* Loud., rispiger, 4. f. ?
- patens Gaud., abstehender, 4. f. Schweiz, Tyrol.
- pedatifida Sm., fußspaltiger, 4. f. Schottland.
- pedemontana All. (*heterophylla* Stbg., *Allionii* Baumg., *cymosa* WK.), piemontesischer, 4. f. Südl. Schweiz, oberitalienische und dinarische Alpen.
- pentadactylis Lapeyr., fünfteiliger, 4. f. Pyrenäen.

Saxifraga

petraea L. (*Ponae* Stbg., *rupestris* W., *geranioides* Host),

⊙. f. Krain, österreichisches Litorale.

planifolia Lapeyr. (*tenera* Sut., *muscoides* All.), plattblättriger, 4. f. Tyrol, Schweiz, Salzburg, Pyrenäen.

β) *atropurpurea* K.

platypetala Sm., breitkroniger, 4. f. Schottland, Engl.

quinquefida Haw., fünfspaltiger, 4. f. England.

retusa Gouan (*purpurea* All., *oppositifol.* γ. W.), abgestutzter, 4. f. Oberitalienische Alpen, Pyrenäen.

Rudolphiana Hornsch., Rudolphi's, 4. f. Kärnthen.

Schraderi Stbg., Schrader's, 4. f. ?

sedoides L. (*trichodes* Scop.), sedumähnlicher, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

Seguierii Stbg., Spgl., Seguier's, 4. f. Schweiz, Tyrol.

spanhemica Gmel. (*condensata* Gmel., *palmata* et *confusa* Lej., *bohemica* Panz., *hypnoides* β. DC.), Spanheimischer, 4. f. Westdeutschland.

b) *flavescens* Stbg.

squarrosa Shr., sparriger, 4. f. Tyrol.

stenopetala Gaud. (*aphylla* Stbg.), schmalkroniger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

tenella Wulf., zarter, 4. f. Kärnthner, krainer und steyernmärker Alpen.

tricuspidata Rotth., dreispitziger, 4. f. Grönland.

tridactylites L., dreitheiliger, ⊙. f. Europa.

b) *minuta* Poll.

Vandelli Stbg., Vandelli's, 4. f. Julische Alpen.

? *viscosa* Haw., schmieriger, 4. f. ?

paradoxa Stbg. v. *Zahlbruckneria paradoxa*.

Scabiosa T. L., R. et S. (*Asterocephalus* Vaill., *Sclerostemma* et *Cyrtostemma* K. et *Spongostemma* Rchb.),

Scabiose, IV. 1., Dipsaceae.

acutiflora Rchb., spitzblumige, 4. f. Südeuropa.

africana L., afrikanische, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung, ionische Inseln.

altissima Jacq. (*laciniata* Lichtstein), höchste, ⚥. k. Südaf.

ambigua Tenor., zweifelhafte, 4. f. Neapel.

amoena Jacq. (*nitida* Bernh.), liebliche, 4. f. Rußland.

atropurpurea L., schwarzpurpurrothe, ⊙. f. Ostindien.

b) *carnea*. c) *rosea*. d) *variegata*. e) *alba*. f) *prolifera*.

bannatica WK., bannatische, 4. f. Banat.

b) *flore albo*.

caucasica MB., caucasische, 4. f. b. Caucasus.

β) *elegans* Spgl. (*connata* Hornem.).

ceratophylla Tenor. (*Ast.* ? *pilosus* Lagasc.), hornblättriger, ♂. f. Calabrien, Spanien.

Columbaria L., Tauben-S. (Berg-S.), ♂. 4. f. Europa.

b) *alba*.

Columnae Tenor., Columna's, 4. f. Neapel.

commutata R. et S., verwechselte, 4. f. Sibirien.

coronopifolia Sm., Bivon. (*crenata* Cyril.), krähenfußblättrige, 4. f. Sicilien, Capri.

cretica L., cretische, ⚥. k. Creta, Apulien.

daucoides Dsf., möhrenähnliche, ⊙. ♂. f. b. k. Nordafrika.

dichotoma Ucr. (*parviflora* Dsf.), zweizinkige, ⊙. f. Sicilien, Nordafrika.

diffusa Rchb., weitschweifige, 4. k. Teneriffa.

Fischeri DC., Fischer's, 4. f. Dahurien.

Scabiosa

- graminifolia L., grasblättrige, 4. f. b. Krain, südliches Tyrol, Ungarn, Siebenbürgen, Nordafrika.
 gramuntia L., feinblättrige, 4. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.
 a) agrestis WK. (*leiocephala* Hoppe, *styriaca* Vest).
 β) mollis W. (*capillata* R. et S.). γ) tomentosa K. (*mollissima* DC., *pyrenaica* Bertol.).
 grandiflora Scop., großblumige, ☉. ♂. f. Nordafrika.
 Hladnikiana Host, Hladnik's, 4. f. Krain, Istrien.
 holosericea Bertol. (*laxiflora* W., *pyrenaica* All.), sammethaarige, 4. f. Italien, Dalmatien, Pyrenäen.
 incana R. et S. (*ucranica* MB.), weißgraue, 4. f. Taurien.
 intermedia R. et S., mittlere, 4. f. Südeuropa.
 isetensis L. (*rupestris* MB.), sibirische, 4. f. Sibirien, Caucasus.
 legionensis Lagasc., leonische, ☉. f. Spanien.
 lucida Vill. (*norica* Wulf., Vest., *stricta* WK.), glänzende, ♂. 2. f. Mitteleuropäische Alpen etc.
 lutea Fisch., gelbe, 4. f. Rußland.
 lyrata Forsk., leierförmige, ♂. f. Türkei.
 maritima L., Meerstrands-S., ☉. ♂. f. Südeuropa.
 micrantha Dsf. (*sicula* MB., *Biebersteinii* R. et S.), kleinblumige, ☉. f. Kleinasien, Taurien.
 multiseta Vis., vielborstige, ♂. f. Dalmatien.
 neglecta Hornem., übersehene, ☉. f. Italien.
 nitens R. et S. (*lucida* Ait.), schimmernde, 4. k. Azoren.
 ochroleuca L. (*tenuifolia* Roth), weißgelbe, ♂. f. Europa.
 palaestina L. (*VahlII* Coult.), morgenländische, ☉. f. Paläst.
 pauciseta DC. (*uniseta* Savi, *Saviana* Rchb.), wenigborstige, 4. f. Ober- und Mittelitalien.
 pectinata Lag., kammförmige, ☉. f. Arabien.
 prolifera L., sprossende, ☉. f. Cypern, Nordafrika.
 reversa Ledeb., rückwärtshaarige, 4. f. ?
 rotata MB., radförmige, ☉. f. Iberien.
 saxatilis Cav., Gesteins-S., ☉. f. Spanien.
 Scopolii Lk., Scopol's, 4. f. Südeuropa.
 setifera Lam., langborstige, 4. f. Südfrankreich.
 sicula L. (*divaricata* Jacq.), sicilische, ☉. f. Sicilien, Griechenland.
 silenifolia WK., silenblättrige, 4. f. Croatien.
 simplex Dsf. (*monspeliensis* Jacq.), einfache, ☉. f. Frankreich, Spanien, Nordafrika.
 stellata L., sternförmige, ☉. f. Südfrankreich, Spanien.
 suaveolens Dsf. (*canescens* WK.), feinriechende, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.
 tomentosa Cav. (*pyrenaica* All., *mollissima* Vis., *maritima* Vill.), filzige, 4. f. Süd- und Westeuropa.
 ucranica L. (*argentea* L., *alba* Scop., *maritima* Wulf.), ukrainische, ♂. f. Südeuropa, Kleinasien, Ukraine, Nordafrika.
 urceolata Dsf. (*rutaefolia* Vahl), becherförmige, 4. f. b. k. Nordafrika, Sicilien, Corsica, Portugal.
 Webbiana Ker, Webb's, 4. f. b. k. Kleinasien.
 alpina L., *Succisa* L. etc. v. *Succisa alpina*, *pratensis* etc. *arvensis* L. etc. vid. *Knautia arvensis*.
 brachiata Sm., *plumosa* Sm. (*Willichii* Lk.) etc. v. *Pterocephalus brachiatus*, *plumosus* etc.
 Scaevola L., Spaltglocke, V. 1., Campanulaceae-
 Goodenovieae.

Scaevola

crassifolia La Bill., dickblättrige, ♀. t. Neuholland.
cuneiformis La Bill., keilblättrige, ♀. t. Neuholland.
hispida Cav., steifhaarige, ♀. t. Neuholland.
Königii Vahl (*Taccada* Lk.), König's, ♀. w. Ostindien,
 Molucken.

microcarpa Cav., kleinfrüchtige, 4. t. Neusüdwallis.
Plumierii Vahl., Plumier's, ♀. w. Westindien.
suaveolens RB., feinriechende, 4. t. Neusüdwallis.

Scalia jaceoides Sims v. *Podolepis acuminata*.

Scandix T., Kerbel, V. II., Umbelliferae.

australis L., südlicher, ☉. f. Südeuropa.
brachycarpa Guss., kurzfrüchtiger, ☉. f. Sicilien.
falcata Londe, sichelförmiger, ☉. f. Kleinasien.
grandiflora L., großblumiger, ☉. f. Griechenl., Taurien.
iberica MB., iberischer, ☉. f. Iberien.
Pecten L., nadelförmiger, ☉. f. Mitteleuropa.
persica Mart., persischer, ☉. f. Persien.
pinnatifida Vent., fiederspaltiger, ☉. f. Taurien, Persien.
Anthriscus L., *Cerfolium* L., *fumarioides* WK.
 etc. v. *Anthriscus vulgaris*, *Cerfolium* etc.

Scaphyglottis Pöpp., Nachenlippe, XXI. I., Orchideae.

reflexa Lindl., zurückgebogene, 4. w. Demerara.
violacea Lindl., violette, 4. w. Demerara.

Sceptranthes Grah., Scepterschwertel, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.

Drummondii D. Don, Drummond's, 4. Zw. t. k. Texas.

Schaefferia Jacq. (J. C. Schaeffer, Superintendent zu Regensburg, berühmt als Naturforscher), XXII. IV. (IV. I.), Rhamneae.

completa Sw., vollkommene, ♀. w. Jamaica, Hispaniola.
lateriflora Sw. v. *Drypetes crocea*.

Schanginia Ledeb. (P. Schangin, russischer Botaniker), V. II., Aizoideae-Atripliceae.

altissima N. E., höchste, ☉. f. Südrussland, Spanien.
*trigyna**, dreiweibige, ☉. f. Spanien.

Schaueria calycotricha N. E. v. *Justicia calycotricha*.**Schedonorus pratensis** R. et S. etc. v. *Festuca elatior* etc.**Schelhammeria** RB. (C. C. Schelhammer, Professor zu Jena), VI. I., Coronariae-Asphodeleae-Methoniceae.

multiflora RB., vielblumige, 4. t. Neuholland.
undulata RB., wellenblättrige, 4. t. Neuholland.

S. capitata Mch. v. *Carex cyperoides*.**Scheuchleria** * (Scheuchler, K. S. geh. Finanzrath etc., Freund und Kenner der Naturwissenschaften), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

*patula**, ausgebreitete, ☉. f. China.

Scheuchzeria L. (J. et J. J. Scheuchzer, schweizerischer Botaniker), VI. III., Alismaceae.

palustris L., Sumpf-S., 4. f. Wa. Europa, Nordamer.

Schinus L., Mastixbaum, XXII. IX. (X. III.), Amyrideae-Terebinthaceae.

Molle L., hängender, ♀. t. Brasilien, Peru.
terebinthifolia Radd., terpentinblättriger, ♀. t. Brasilien.
virgata Swt., ruthenförmiger, ♀. t. Lima.

dentata Andr. v. *Duvaua dentata*.

Schisanthes Haw. v. *Narcissus*.**Schismus** P. B., Schlitzspelze, III. II., Gramineae.

marginatus P. B. (*Festuca barbata* L., *calycina* Lam.),
 herandete, ☉. f. Spanien, Südfrankreich, Sicilien.

Schismus

minutus R. et S. (*hirsutus* Trin., *Festuca m.* Stev. M. B.), kleinste, ☉. f. Taurien.

Schivereckia Andr. (A. Schivereck, russischer Botaniker), XV. II., Cruciferae.

podolica Andr., DC., podolische, 4. f. b. Podolien, Volhynien.

Schizaea Sm., Spaltfarn, XXIV. I., Osmundaceae.

bifida Sw. (*incurvata* Schk.), zweispaltiger, 4. w. Neuholl.
elegans Sw., zierlicher, 4. w. Trinidad.

pectinata Sm., kammförmiger, 4. w. Cap der gut. H.

penicillata H. B. K., pinselförmiger, 4. w. Neugranada.

pusilla Sw. (*tortuosa* Mühlbg.), kleiner, 4. k. Nordamer.

rupestris RB., Felsen-S., 4. w. Neuholland.

Schizandra Mchx., Schlitzbeutel, XXI. x. (V. VI.), Menispermaceae.

coccinea Mchx., scharlachrother, ♀. Sch. k. Carolina.

Schizanthus R. et P., Schlitzblume, II. I., Solanaceae (? *Personatae-Antirrhineae*).

Grahami Hook., Graham's, ☉. f. m. Chili.

Hookeri Gill., Hooker's, ☉. f. m. Chili.

pinnatus R. et P., gefiederte, ☉. f. m. Chili.

β). *humilis* Lindl.

porrigens Hook., ausgestreckte, ☉. f. m. Chili.

retusus Hook., abgestutzte, ☉. f. m. k. Chili.

Schizomeria D. Don, Spaltblatt, X. II., Araliaceae.

ovata D. Don, eiblätteriges, ♀. t. k. Neuholland.

Schizopetalon Sims, Schlitzblatt, XV. III., Cruciferae.

Walkeri Sims, Walker's, ☉. f. Chili.

Schkuhria Roth (C. Schkuhr, berühmter deutscher Botaniker), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

abrotanoides Roth, stabwurzähnliche, ☉. f. Mexico.

Schmidelia L. (K. C. Schmidel, Professor der Naturgeschichte zu Erlangen), VIII. I., Sapindaceae.

Cominia Sw., zottige, ♀. w. Westindien.

occidentalis Sw., westindische, ♀. w. Westindien.

racemosa L., traubige, ♀. w. Ostindien.

serrata DC., sägeblättrige, ♀. w. Ostindien.

Schmidtia Tratt. (W. Schmidt, böhmischer Botaniker), II. II., Gramineae.

subtilis Tratt. (*utriculosa* Stbg.), zarte, ☉. f. Böhmen.

Schmidtia Mch. v. Tolpis.**Schoberia** Ledeb., C. A. Mey. (Gottlob Schober, ein Arzt und Botaniker, welcher unter Peter I. Südrussland und Nordpersien bereiste), V. II., Aizoideae-Atripliceae.

Biebersteiniana C. A. Mey. (*Chenopod. Bieberst.* p. 189.), Bieberstein's, ☉. f. Caucasus.

fruticosa C. A. Mey., strauchige, ♀. k. f. b. England, Südeuropa, Nordafrika.

maritima C. A. Mey., Seestrands-S., ☉. f. Europa, Sibirien.

microphylla C. A. Mey. (*Chenopod. parvifolium* Schult.), kleinblättrige, ☉. f. Caucasus.

Pallasiana C. A. Mey., Pallas's, ☉. f. Persien.

salsa C. A. Mey., Salinen-S., ☉. f. Astrachan.

setigera *, horstige, ☉. f. Südfrankreich, Spanien.

spicata C. A. Mey., ährenförmige, ☉. f. Spanien.

Schoenodum tenax LaBill. v. *Leptocarpus tenax*.**Schoenus** L., Knopfgras, III. I., Cyperaceae.

I. *Genuinus*.

Schoenus

- imberbis RB., unbärtiges, 4. k. Neuholland.
 melanostachys RB., schwarzähliges, 4. k. Neuholland.
 mucronatus L. (*Mariscus mucronat.* Presl.), weichspelziges, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.
 nigricans L., schwärzliches, 4. f. Europa.
 stellatus ? Sw., sternförmiges, 4. w. Westindien.

II. Streblidia Lk.

- ferrugineus L., rostfarbiges, 4. f. Europa.
 albus L., comatus Lk, et fuscus L. vid. *Rhynchospora alba*, polyphylla et fusca. *compressus* L. etc. vid. *Blysmus compressus* etc. *Mariscus* L. vid. *Cladium Mariscus. monoicus* Sm. v. *Kobresia caricina. turbinatus* Poir. v. *Chaetosporea turbinata.*
Schollera Oxycoccus Roth v. *Oxycoccus palustris.*
Schollia crassifolia Jacq. v. *Hoya carnosa.*
Schomburgkia Lindl. (R. J. H. Schomburgk, ein Deutscher, welcher Guiana bereiste), XX. 1., Orchideae.
 marginata Lindl., berandete, 4. w. Surinam.
Schotia Jacq. (R. van der Schot, Begleiter des Baron Jacquin in Westindien), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.
 alata Thbg., geflügelte, 5. w. t. Cap der gut. Hoffn.
 latifolia Jacq., breitblättrige, 5. w. Cap der gut. H.
 speciosa Jacq., prächtige, 5. w. Cap der gut. Hoffn.
 stipulata RB., zwischenblättrige, 5. w. Cap d. g. H.
 tamarindifolia Afzel., tamarindenblättrige, 5. w. Südafrika.
Schradera Vahl (H. A. Schrader, berühmter deutscher Botaniker), VI. 1., Caprifoliaceae.
 cephalotes W., rundköpfige, 5. w. Jamaica.
Schrankia W. (Franz v. Paula Schrank, Professor der Botanik zu München), VIII. 1. (XXIII. 1.), Leguminosae-Mimosaceae.
 aculeata W., stachelige, 4. Kn. w. Vera-Cruz.
 uncinata W. (*Mimosa horridula* Mchx.), hackige, 5. t. Virginien, Florida.
Schrebera albens Retz v. *Elaeodendrum glaucum*.
Schubertia capensis Speg. et *disticha* Mirb. vid. *Taxodium juniperoides* et *distichum.*
Schultzia Speg. (C. F. Schultz, Arzt zu Neubrandenburg, Bearbeiter der mecklenburgischen Flora), V. II., Umbelliferae.
 crinita Speg., bemähnte, 5. f. Altai.
Schwägrichenia flavida et *rufa* Speg. vid. *Anigozanthos flavida* et *rufa.*
Schwenckia L. (J. T. Schwenck, Professor der Medicin zu Jena), II. 1., ?Personatae-Antirrhineae.
 americana L., amerikanische, 5. w. Südamerika.
Scilla L., Meerzwiebel, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.
 I. Genuina.
 amoena L., schöne (Sternhyacinthe), 4. Zw. f. Mitteleuropa.
 autumnalis L., Herbst-M., 4. Zw. f. England, Süd- und Westeuropa.
 b) major. c) alba.
 bifolia L., zweiblättrige, 4. Zw. f. Mitteleuropa.
 b) alba.
 Cupaniana Guss., Cupani's, 4. Zw. f. Sicilien.
 esculenta Sims, genießbare, 4. Zw. f. Nordamerika.
 hyacinthoides L., hyacinthenähnliche, 4. Zw. k. Madeira.
 italica L., italienische, 4. Zw. f. Italien, Südfrankreich.

Scilla

Lilio-Hyacinthus L., lilienartige, 4. Zw. f. Spanien, Südfrankreich.

lusitanica L., portugiesische, 4. Zw. f. Portugal.

obtusifolia Poir., stumpfblättrige, 4. Zw. f. b. Nordafrika, Sardinien.

odorata Brot., gutriechende, 4. Zw. f. Portugal.

peruviana L., peruvianische, 4. Zw. k. f. b. Portugal, Nordafrika,

b) *alba*.

plumbea Lindl., bleifarbig, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

praebracteata Haw. (*peruviana* Hort.), langdeckblättrige, 4. Zw. f. b. Südeuropa.

praecox W., frühe, 4. Zw. f. ?

pratensis W. K., Wiesen-M., 4. Zw. f. Croatien.

pumila Brot. (*monophyllos* Lk.), niedrige, 4. Zw. f. b. k. Portugal.

rosea Lehm. (*bifolia rubra* Bot. mag., *carnea* Swt.), rosafarbige, 4. Zw. f. b. Nordafrika.

umbellata Ram., doldige, 4. Zw. f. Pyrenäen.

verna L. (*fastigiata* Viv.), Frühlings-M., 4. Zw. f. England, Spanien, Süddeutschland.

b) *alba*. c) *rosea*.

villosa Dsf., zottige, 4. Zw. f. b. k. Nordafrika.

II. *Limonanthe* Lk.

azurea Goldb. (*amoena* MB., *cernua* Red., *amoenula* Hornem., *sibirica* Andr.), azurblaue, 4. Zw. f. Mittelrussland.

brevifolia Ker, kurzblättrige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

campanulata Ait. (*hyacinthoides* Jacq.), glockige, 4. Zw. f. Spanien, Portugal.

cernua Lk., übergebogene, 4. Zw. f. Spanien.

corymbosa Sims, traubendoldige, 4. Zw. k. C. d. g. H.

indica Roxb., indische, 4. Zw. w. Ostindien.

mauritanica Schousb., mauritanische, 4. Zw. f. b. k. Mauritien.

nutans Sm. (*non scripta* Lk.), nickende, 4. Zw. f. England, Südeuropa.

b) *carnea*. c) *alba*.

sibirica Sims, sibirische, 4. Zw. f. Sibirien.

unifolia L., einblättrige, 4. Zw. f. b. k. Portugal.

maritima L. vid. *Ornithogalum maritimum*. *paradoxa* MB. v. *Allium paradoxum*. *pomeridiana* DC. vid. *Anthericum pomeridianum*. *romana* L. vid. *Bellevallia romana*. *serotina* Curt. vid. *Uropetalum serotinum*.

Sciodaphyllum P. Br., Schattenblatt, V. v., Araliaceae.

acuminatum Poir., zugespitztes, 5. Sch. w. Peru.

anomalum G. Don, abweichendes, 5. w. Trinidad.

Brownii Sogl., Brown's, 5. w. Jamaica.

conicum Poir., kegelblumiges, 5. Sch. w. Peru.

digitatum G. Don, fingerförmiges, 5. w. Ostindien.

pedicellatum Poir., langstieliges, 5. Sch. w. Peru.

pentandrum Poir., fünfmänniges, 5. w. Peru.

Sciophila convallarioides Wib. v. *Smilacina bifolia*.

Scirpidium aciculare N. E. v. *Heleocharis acicularis*.

Scirpus T. L. (et *Heleogiton* Lestib., Rchb.), Binse, III. r., Cyperaceae.

articulatus L., gegliederte, 4. w. Ost- und Westindien.

Scirpus

brunneus Mühlbg. (*exaltatus* Pursh), dunkelbraune, 4. f. Nordamerika.

carinatus Sm. (*trigonus* Roth, *Duvalii* Hoppe), nachenförmige, 4. f. England, Nord- und Süddeutschland, Schweiz.

elongatus D. Don, Hamilt., verlängerte, 4. k: f. b, Nepal.

lacustris L., Teich-B., 4. Wa. f. Europa, Asien, Amer.

litoralis Schrad. (*mucronatus* Scop., *fimbrisetus* Delil., *Malacochaete litoralis* N. E.), Ufer-S., 4. Wa. f. Südeuropa, Aegypten.

maritimus L., Meerstrands-S., 4. f. Europa, Asien, Afrika, Amerika.

β) *tuberosus* Dsf.

mucronatus L. (*glomeratus* Scop.), weichspitzige, 4. Wa. f. Mittel- und Südeuropa, Afrika, Ostindien, Neuholland.

pungens Vahl (*Rothii* Hoppe, *tenuifolius* DC., *triqueter* Auct.), stechende, 4. f. Norddeutshl., Schweiz etc.

quinquangularis Vahl (*pentagonus* Roxb.), fünfkantige, 4. w. Ostindien.

radicans Schk., wurzelnde, 4. f. Mittel- u. Nordeuropa.

sylvaticus L., Wald-B., 4. f. Europa.

Tabernaemontani C. C. Gmel. (*glaucus* Sm.), *Tabernaemontan's*, 4. Wa. f. Europa.

triqueter L., dreikantige, 4. Wa. f. Europa, Amerika.

β) *Hoppii* Weihe. γ) *Lejeunii* Weihe.

acicularis L. etc. vid. *Heleocharis acicularis* etc.

annuus All. etc. v. *Fimbristylis annua* etc. *atro-*

virens W., Mühlbg. etc. v. *Isolepis atrovirens* etc.

Baeothryon Ehrh. etc. vid. *Limnochloa Baeothryon*

etc. *caricinus* Schrad. (*compressus* P.) etc. vid.

Blysmus compressus etc. *Luzulae* L. v. *Cyperus*

Luzulae. Michelianus L. v. *Dichostylis Michelianus.*

thyrsiflorus W. (*Eriophorum* Mchx.) v. *Eriophorum*

cyperinum.

Scleranthus L., Knaul, X. II., Portulaceae-Paronychieae.

annuus L., jähriger, ☉. f. Europa, Nordamerika.

β) *verticillatus* Tausch.

perennis L., ausdauernder, 4. f. Europa.

β) *fallax* Bönningh. γ) *fastigiatus* Hochst.

pungens RB., stechender, ☉. f. Neuholland.

Scleria Berg., Geißelgras, XXI. III., Cyperaceae.

Flagellum Sw., Peitschen-G., 4. w. Jamaica, Guiana.

Sclerocarpus Jacq., Knorpelfrucht, XIX. III., Com-

positae-Corymbiferae.

africanus Jacq., afrikanische, ☉. m. f. Guinea.

Sclerochloa P. B., Knorpelgras, III. II., Gramineae.

I. *Catapodium* Lk.

loliacea Lk. (*Festuca rottboellioides* Kunth, *Brachypod.*

lol. R. et S.), lolchähnliches, ☉. f. Südeuropa, Engl.

II. *Genuina.*

articulata Lk. (*Festuca divaricata* Dsf., *F. lanceolata*

Forsk., *Dactylis memphitica* Spgl.), gegliedertes, ☉. f.

Nordafrika, Südeuropa.

dichotoma Lk. (*Festuca d. Forsk.*, *Brachyp. maritimum*

R. et S.), zweizinkiges, ☉. f. England, Frankreich.

dura P. B. (*Festuca d. Vill.*, *Sesleria d. Kunth*), hartes,

☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

procumbens P. B., niederliegendes, ☉. f. Engl., Frankr.

Sclerochloa

rigida Lk., Panz. (*Festuca rigid.* Kunth), starres, ☉. f. England, Frankreich, Mittel- und Südeuropa.

III. Sphenopus Trin.

divaricata P. B., ausgesperartes, ☉. f. Südfrankreich, Oberitalien, Sicilien.

Sclerophyllum pulchrum Gaud. v. *Crepis pulchra*.

Scleropus Schrad., Knorpelfufs, XXI. III., Aizoideae-Amaranthaceae.

amaranthoides Schrad. (*Amaranthus crassipes* Schltdl.), amaranthähnlicher, ☉. f. m. Südamerika.

Sclerothamnus RB., Knorpelstrauch, X. I., Leguminosae-Papilionaceae.

microphyllus RB., kleinblättriger, ♀. t. Neuholland.

Scolochloa Lk., Rohrschwengel, III. II., Gramineae.

festucea Lk. (*Festuca arundinacea* Liljeb., *F. donacina* Wahlbg., *F. borealis* M. et K.), nördlicher, 4. f. Nordeuropa.

Scolopendrium Sm., Hirschzunge, XXIV. I., Pteridoideae.

Hemionitis Cav., netzfarnähnliche, 4. k. Spanien, Italien.

officinatum Sm., officinelle, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

a) *angustifolium*. b) *crispum*. c) *undulatum*.

d) *multifidum*. e) *ramosum*.

Scolymus T., Golddistel, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

grandiflorus Dsf., großblumige, ♂. 4. f. b. k. Nordafrika.

hispanicus L. (*maculatus* Scop.), spanische, ♂. f. Südeuropa, Nordafrika.

maculatus L., gefleckte, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

Scoparia L., Besenkraut, IV. III., Personatae-Antirrhineae.

dulcis L., süßes, ☉. ♀. f. m. w. Ost- u. Westindien, Südamerika etc.

Scopolia Jacq. (J. A. Scopoli, berühmter österreichischer Naturforscher), V. I., Solanaceae.

carniolica Jacq. (*Scopolina atropoides* Schult.), krainerische, 4. f. Krain, Ungarn, Galicien.

S. aculeata Sm., *inermis* W. Sm. v. *Toddalia aculeata* et *paniculata*.

Scorodonia heteromalla Mch. v. *Teucrium Scorodonia*.

Scorpiurus L., Scorpionkraut, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

acutifolia Viv., spitzblättriges, ☉. f. Nordafrika, Corsica.

laevigata Sm., glattes, ☉. f. Griechenland.

muricata L., weichstacheliges, ☉. f. Südeuropa.

subvillosa L., zottiges, ☉. f. Südeuropa.

sulcata L., gefurchtes, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

vermiculata L., wurmförmiges, ☉. f. Südeuropa.

Scorzonera T., Scorzonere (Haferwurz), XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

I. Genuina.

austriaca W. (*humilis* Jacq.), österreichische, 4. f. Ost- und Südeuropa.

β) *angustifolia* Rchb.

caricifolia Pall., riedgrasähnliche, 4. f. Sibirien.

chondrilloides Pourr., knorpelsalatähnliche, 4. f. Spanien.

crispa MB., krausblättrige, 4. f. Taurien.

fistulosa Brot., röhrenblättrige, 4. f. Portugal.

graminifolia L., grasblättrige, 4. f. Sibirien, Kleinasien.

Scorzonera

grandiflora Lapeyr. (*aristata* Ram., *Hoppeana* Sbr., *alpina* Hoppe), großblumige, 4. f. Illyrien, Kärnthen, Südtirol, Pyrenäen.

hispanica L., spanische, ♂. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa, Nordasien.

a) *latifolia* K. (*edulis* Mch., *denticulata* Lam.).

β) *glastifolia* W. (*graminifolia* Roth). γ) *asphodeloides* Wallr. (*montana* Mutel, *angustifolia* Auctor.). δ) *rumicifolia* Balb.

humilis L. (*lanata* Schrk., *nervosa* Lam., *plantaginea* Schlchr.), niedrige, 4. f. Europa.

β) *macrorrhiza* Schlchr.

lanata MB., wollige, 4. Kn. f. b. Griechenland, Armenien, Syrien etc.

parviflora Jacq., kleinblumige, ♂. f. Osteuropa.

pinifolia Gouan (*subulata* Lam.), kieferblättrige, 4. f. Südfrankreich, Spanien.

purpurea L., purpurfarbige, 4. f. Europa.

β) *rosea* W. K.

radiata Fisch., strahlige, 4. f. Sibirien.

stricta Hornem. (*villosa* MB.), steife, 4. f. Taurien.

taurica MB., taurische, 4. f. Taurien, Podolien.

trachysperma Günth. (*serrulata* Viv.), rauhsamige, ♂. 4. f. Calabrien.

tuberosa Pall., knollige, 4. Kn. f. Syrien, Südrussland.

undulata Vahl (*mollis* MB.), wellenblättrige, 4. f. Nordafrika, Griechenland, Taurien.

II. Galasia Cass.

villosa Scop., zottige, 4. f. Krain, österr. Litorale.

III. Lasiospora H. Cass. (*Lasiospermum* Fisch.).

ensifolia MB., schwertblättrige, 4. f. Caucasus.

eriosperma MB. (*L. angustifolia* H. Cass.), wollsamige, 4. f. Caucasus.

hirsuta L., rauhhaarige, 4. f. Süd- und Osteuropa.

nervosa Trevir. (*Lasiosp. latifolia* Fisch. et Mey.), nervige, 4. f. Armenien.

asperrima W. (*hispidula* M. B.) v. *Asterothrix asperima*. *calcitrapifolia* Vahl etc. vid. *Podospermum calcitrapifolium* etc.

Scottia RB. (Robert Scott, Professor der Botanik zu Dublin, XVII. IV. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

angustifolia Lindl., schmalblättrige, ♂. t. Neuholland.

dentata RB., gezähnte, ♂. t. Neuholland.

laevis Lindl. (? *trapeziformis* Hort.), glatte, ♂. t. Neuholland.

Scrofularia T., Braunwurz, XIV. II., Personatae-Antirrhineae (*Scrofularineae*).

adscendens W., aufsteigende, 4. k. ?

altaica Murr., altaische, 4. f. Sibirien.

appendiculata Jacq., beblättrte, 4. k. Nordafrika.

aquatica L., Wasser-B., 4. f. Europa.

arguta Ait., spitzzahnige, ♂. f. Canarische Inseln.

auriculata L., geöhrte, 4. k. Spanien.

Balbisi Hornem. (*auriculata* All.), Balbis's, 4. f. Oberitalien, Westdeutschland.

betonicaefolia L., betonienblättrige, 4. f. Portugal, Italien.

biserrata W., doppeltgesägte, 4. k. ?

Scrofularia

canina L. (*atropurpurea* Morett.), Hunds-B., 4. f. Süd-europa, Taurien, Kleinasien.

β) *chrysanthemifolia* MB. W. (*bicolor* Sibth. Sm.).

cretacea Fisch., kriedeliebende, 4. f. Sibirien.

ebulifolia MB., attichblättrige, 4. f. Caucasus.

elongata P. B. Webb., verlängerte, 4. k. Teneriffa.

filicifolia Mill., farnnblättrige, 4. k. Creta.

frutescens L., strauchige, 4. k. Portugal, Nordafrika.

glabrata Ait., kahle, ♂. k. Canarische Inseln.

grandiflora DC., großblumige, 4. k. ?Südamerika.

hirsuta Hornem., rauhhaarige, 4. f. Südeuropa.

hispida Dsf., steifhaarige, 4. k. Atlasgebirge.

Hoppii K. (*canina* Hoppe), Hoppe's, ♂. f. Krain, Kärnthen, Tyrol, Schweiz.

laciniata WK. (*verbenaeifolia* Poir.), schlitzblättrige, 4. f. Croatien.

lanata Fisch., wollige, 4. f. Sibirien.

lanceolata Pursh, lanzettblättrige, 4. f. Pensylvanien.

lucida L., spiegelnde, 4. k. f. b. Italien, Griechenland, Taurien, Kleinasien.

luridiflora Fisch. et Mey., schlagblaublühende, ♂. 4. f. b. Natolien.

lyrata W., leierförmige, 4. k. ?

marylandica L., maryländische, 4. f. Nordamerika.

melissaefolia Urv., melissenblättrige, 4. k. f. b. Kleinasien.

mellifera Ait. (*viridiflora* Poir.), honiggebende, 4. k. Nordafrika, Corsica.

multifida W. (*silaifolia* Clark.), vieltheilige, 4. k. Sicilien, Kleinasien.

nodosa L., gemeine, 4. f. Europa.

orientalis L., morgenländische, 4. f. Kleinasien, Sibir.

peregrina L., fremde, ♂. f. Istrien, Italien.

pinnatifida Brot., fiederspaltige, 4. k. Portugal.

ramosissima Lois. (*frutescens* DC.), ästige, 4. k. Corsica, Südfrankreich.

rupestris MB., Felsen-B., 4. f. Taurien.

sambucifolia L., hollunderblättrige, 4. k. Spanien, Portugal, Orient.

Scopolii Hoppe (*auriculata* Scop., *Scorodonia* Host, *glandulosa* W. K.), Scopolii's, ♂. 4. f. Osteuropa, Kärnthen, Krain etc.

β) *rugosa* W.

Scorodonia L., melissenblättrige, 4. f. Engl., Italien.

β) *grandidentata* Tenor.

Smithii Hornem., Smith's, 4. k. Canarische Inseln.

tanacetifolia W., rainfarnnblättrige, 4. f. b. k. Taurien, ?Nordamerika.

trifoliata L., dreiblättrige, 4. k. Corsica, Nordafrika.

variegata MB., bunte, 4. f. b. k. Caucasus.

vernalis L., Frühlings-B., 4. f. Europa.

β) *cordata* P. (?*latifolia* Host).

Scutellaria R. L., Helmkraut (Schildkraut), XIV. 1., Labiatae.

albida L., weißliches, 4. f. Griechenland, Kleinasien.

alpina L., Alpen-H., 4. f. Schweiz, Croatien etc.

b) *variegata* Hort. c) *sanguinea* D. Don.

altaica Ledeb., altaisches, 4. f. Sibirien.

altissima L., höchstes, 4. f. Taurien, Caucasus, Sibir.

ambigua Nutt., zweifelhaftes, 4. f. Nordamerika.

Scutellaria

- caroliniana* Lam., carolinisches, 4. f. Carolina.
Columnae All., Columna's, 4. f. Ungarn, Italien.
galericulata L., gemeines, 4. f. Europa, Asien.
grandiflora Sims, großblumiges, 4. f. Sibirien.
hastifolia L., spontonblättriges, 4. f. Europa.
havanensis Jacq., Havanna-H., 4. w. Cuba.
hirta Sm. (*decumbens* Sbr., *utriculata* La Bill.), kurzhaariges, 4. f. b. k. Creta, Syrien.
humilis RB., niedriges, 4. k. Neuholland, V.-D.-L.
incarnata Vent., fleischfarbiges, 4. w. Südamerika.
integrifolia L. (*hyssopifolia* L.), ganzblättriges, 4. f. Nordamerika.
lateriflora L., seitenblumiges, 4. f. Nordamerika.
lupulina L., hopfenartiges, 4. f. Sibirien.
macrantha Fisch., großblumiges, 4. f. Sibirien.
minor L., kleines, 4. f. Europa.
nervosa Pursh, nerviges, 4. f. Virginien.
nigrescens Spgl. (*hirta* Sbr.), schwärzliches, 4. f. b. Creta.
orientalis L., morgenländisches, 4. f. Kleinasien.
pallida MB. (*verna* Bess.), bleiches, 4. f. Taurien, Galicien, Ungarn.
parvula Mchx., kleines, 4. f. Nordamerika.
peregrina L., fremdes, 4. f. Italien, Ungarn, Sibirien.
pilosa Mchx. (*elliptica* Mühlbg., *ovalifolia* P., *caroliniana* Walt.), haariges, 4. f. Nordamerika.
polybotrya Bernh., vieltraubiges, 4. f. ?
purpurascens Sw., purpurfarbiges, 4. w. Westindien.
rubicunda Hornem., rötliches, 4. f. ?
scordifolia Fisch., scordiumblättriges, 4. f. Sibirien.
serrata Andr. (*pubescens* Mühlbg.), sägeblättriges, 4. f. Nordamerika.
Tournefortii Benth., Tournefort's, 4. f. Persien.
cretica L. v. *Teucrium* Arduini.

Scyphanthus Swt., Tassenblume, XVIII. II. (XIII. I.), Loasaceae.

grandiflorus Swt., großblumige, ☉. Sch. m. f. Chili.

Scytalia chinensis G. et *Rambootan* Roxb. vid. *Euphoria* Litchi et *Nephelium*. *trijuga* Roxb. vid. *Melicocca* *trijuga*.

Seaforthia RB. (Lord Seaforth, ein Gönner der Botanik), XIII. III. (XXIII. I.), Palmae.

elegans RB., zierliche, 5. w. Neuholland.

Sebaea RB. (A. Seba, Apotheker und Naturforscher zu Amsterdam), IV. I., Contortae-Gentianeae.

albans RB., weißliche, ☉. f. m. Cap der gut. Hoffn.

aurea RB., goldfarbige, ☉. f. m. Cap der gut. Hoffn.

congesta Schrad., gedrängte, ☉. f. m. Cap d. gut. H.

cordata RB., herzblättrige, ☉. f. m. Cap der gut. H.

guianensis Spgl., guianische, ☉. m. f. w. Guiana.

ovata RB., eiförmige, ☉. f. m. Neuholland.

Sebastiana heterophylla Bertol. vid. *Chrysanthellum procumbens*.**Sebifera glutinosa** Lour. v. *Tetranthera laurifolia*.**Secale** T., Roggen (Korn), III, II., Gramineae.

cereale L., gemeiner, ☉. ♂. f. Caucasus.

a) *hybernum* R. et S. b) *vernum* R. et S. c)

compositum R. et S.

fragile MB. (*sylvestre* Host), spröder, ☉. f. Podolien, Taurien.

prostratum Pall. etc. v. *Triticum prostratum* etc.

- Secamone** RB. (Squamouna, arabischer Name), V. II.,
Asclepiadeae,
Alpini R. et S. (*aegyptiaca* H. Kew.), Alpini's, ♀. Sch.
t. w. Aegypten, Cap der guten Hoffnung.
elliptica RB., elliptische, ♀. Sch. t. Neuholland.
emetica RB., brechenenerregende, ♀. Sch. w. Ostindien.
- Sechium** P. Br., Chochokürbis, XXI. x. (XVI. III.),
Cucurbitaceae.
edule Sw., genießbarer, ☉. Sch. m. f. Westindien.
- Securidaca** L., Beilstrauch, XVII. III., Polygalaceae.
erecta L., aufrechter, ♀. w. Westindien.
virgata Sw., ruthenförmiger, ♀. Sch. w. Westindien.
volubilis L., windender, ♀. Sch. w. Westindien.
- S. lutea* Mill. v. *Securigera Coronilla*.
- Securigera** DC., Beilhülse, XVII. IV. (VI.), Legumi-
nosae-Papilionaceae.
Coronilla DC., kronenwickenähnliche, ☉. f. Südeuropa.
- Securinea** Juss., Axtspott (Otaheiti-Myrte), XXI. v.,
Tricoccae-Euphorbiaceae.
Commersonii Ait., Commerson's, ♀. w. Mascarenas.
nitida W., glänzende, ♀. w. Mascarenas.
- Sedum** T. L., Mauerpfeffer, X. IV., Corniculatae-
Crassulaceae.
acre L. (? *glaciale* Clarion), scharfer, 4. f. Europa.
b) *diminutum* Haw. c) *elongatum* Haw.
Aizoon L., sägeblättriger, 4. f. Sibirien, Creta.
albescens Haw., weißblättriger, 4. f. England.
albicans Haw., weißgrüner, 4. f. ?
album L., weißblumiger (Tripmadam), 4. f. Europa.
β) *micranthum* Haw.
altaicum Fisch., altaischer, 4. f. Altai.
altissimum Poir. (*Jacquini* Haw.), höchster, 4. f. Py-
renäen, Piemont, Griechenland.
β) *ochroleucum* Sm.
- Anacampseros* L., rundblättriger, 4. ♀. f. Südfrankr.
andegavense DC., anderscher, ☉. f. Frankreich.
anglicum Huds., englischer, 4. f. Engl., Schottl., Irland.
b) *microphyllum*. c) *hibernicum*.
annuum L. (*saxatile* Wigg., *rupestre* Oed., *Oederi* Retz,
aestivum All.), jähriger, ☉. ♂. f. Europa.
anopetalum DC. (*rufescens* Tenor., *rupestre* Vill.), blaß-
gelber, 4. f. Süd- und Westeuropa.
β) *aurantiacum* Sal.
- argutum* Haw., spitzzahniger, 4. f. Carpathen.
atratum L., schwärzlicher, ☉. f. Mitteleurop. Alpen.
calabricum Tenor., calabrischer, ☉. f. Calabrien.
Cepaea L. (*galioides* Pourr. All., *spatulatum* W. K.,
paniculatum Lam., *tetraphyllum* Sm.), portulakblät-
teriger, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.
coerulescens Haw., bläulicher, ☉. f. ?
coeruleum Vahl (*azureum* Dsf.), himmelblauer, ☉. f.
Nordafrika, Sicilien.
Cotyledon Jacq., nabelkrautähnlicher, 4. k. ?
cruciatum DC. (*monregalense* Balb.), kreuzblättriger,
4. f. k. Französische und oberitalienische Alpen.
dasyphyllum L., bereifter, 4. f. England, Mittel- und
Südeuropa.
dentatum Haw., gezahnter, 4. f. ?
divaricatum Ait., ausgesperrter, ♀. k. Madeira.

Sedum

- elegans* Lej. (*rupestre* Sm.), zierlicher, 4. f. England, Belgien.
- Eversii* Ledeb., Ever's, 4. f. Sibirien.
- Fabaria* K. (*purpureum* Tausch), Bruchwurz-M., 4. f. Mittel- und Südeuropa, England.
- Forsterianum* Sm. (*cristatum* Schrad.), Forster's, 4. f. Engl.
- fruticosum* Brot., strauchiger, ♀. k. Portugal.
- glaucum* WK. (*Andersonii* G. Don, *sexfidum* MB.), blaugrüner, ☉. ♂. f. Illyrien, Ungarn, Siebenbürgen, Caucasus.
- Guettardi* Vill., Guettard's, 4. f. Dauphiné.
- hexapetalum* Haw., sechskroniger, 4. f. ?
- hirsutum* All., rauhhaariger, ♂. f. Oberitalien. Alpen.
- hispanicum* L., spanischer, ♂. 4. f. Südeuropa.
- hybridum* L., Bastard-M., 4. f. Sibirien, Creta.
- involucratum* MB., hüllblättriger, 4. f. Caucasus.
- lividum* W., schlagblauer, 4. f. ?
- maximum* Sut. Lk. (*latifolium* Bertol., *Telephium* ε. L.), größter, 4. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa.
- minus* Haw. (*reflexum* Auct.), kleiner, 4. f. Südeuropa.
- miserum* Lindl., kümmerlicher, ☉. f. Mexico.
- neglectum* Tenor., übersehener, 4. f. Neapel.
- nudum* Ait., nackter, ♀. k. Madeira.
- oblongum* Haw., länglicher, 4. f. England.
- oppositifolium* Sims, gegenblättriger, 4. f. Caucasus.
- ? *pallens* Vent., bleichgrüner, ♂. f. Südeuropa.
- pallidum* MB., bleichblumiger, 4. f. Caucasus.
- paucident* Haw., wenigzahniger, 4. f. ?
- pectinatum* Haw., kammförmiger, 4. f. ?
- pilosum* MB., behaarter, 4. f. Caucasus.
- populifolium* L., pappelblättriger, ♀. f. b. k. Sibirien.
- quadrifidum* Pall., vierspaltiger, 4. f. Nordasien.
- reflexum* L., zurückgebogener (Garten-Tripmadam), 4. f. Europa.
- a) *viride* K. (*reflexum* L., *crassicaule* Lk.). b) *virens* Ait. β) *glaucum* K. (*rupestre* L.)- b) *collinum* W. c) *recurvatum* W. (*reflexum* Lk., *glaucum* Sm.).
- repens* Schlchr., DC. (*rubens* Haenk., *alpestre* Vill., *saxatile* All.), kriechender, 4. f. Mitteleuropäische Voralpen und Alpen.
- roseum* Stev., rosafarbiger, 4. f. Caucasus.
- sempervivoides* Fisch., MB. (*Sempervivum* Ledeb.), hausaubähnlicher, ♂. f. b. k. Iberien.
- septangulare* Haw., siebenkantiger, 4. f. ?
- sexangulare* L. (*schistosum* Lej.), sechseckiger, 4. f. Europa.
- Sieboldii* Loud., Siebold's, 4. f. b. k. Japan.
- spirale* Haw. (*sexangulare* Auct.), spiralförmiger, 4. f. ?
- spurius* MB. (*ibericum* Stev.), unächter, 4. f. Caucasus.
- stellatum* L., sternförmiger, ☉. f. Schweiz, Italien, Frankreich.
- subclavatum* Haw., keilförmiger, 4. f. Nordamerika.
- telephioides* Mchx., wundkrautähnlicher, 4. f. Nordam.
- Telephium* L., Wundkraut-M. (fette Henne), ☉. f. Europa.
- β) *purpureum* Lk. (*Anacampseros triphylla* Haw.).
- ? *teretifolium* Lam., rundblättriger, 4. f. England.
- ternatum* Mchx. (*portulacoides* Mühlbg., *deficiens* Donn), dreiblättriger, 4. f. Nordamerika.

Sedum

- turgidum DC., aufgeschwollener, ♂. f. Südfrankreich.
 verticillatum L., wirtelblättriger, 4. f. Sibirien.
 villosum L., zottiger, ♂. f. Europa.
 virescens W. (? *viridulum* Haw.), grünlicher, 4. f. Sibirien.
 Unbestimmt: quinquefidum W. Loud.
 spinosum W. v. Umbilicus spinos.

Selago L., Grufskraut, XIV. II., Globulariaceae.

- angustifolia Thbg., Ait., schmalblättriges, ♀. k. Cap
 der guten Hoffnung.
 bracteata Thbg. (*lucida* Vent.), deckblättriges, ♀. k.
 Cap der guten Hoffnung.
 canescens Thbg., grauliches, ♀. k. Cap d. gut. Hoffn.
 corymbosa L., traubendoldiges, ♀. k. Cap d. gut. H.
 dentata Poir. (*teretifolia* Lk.), gezahntes, ♀. k. Cap
 der guten Hoffnung.
 diffusa Thbg. (*spinea* Lk.), weitschweifiges, ♀. k. Cap
 der guten Hoffnung.
 fasciculata L., büschelförmiges, ♀. k. Südafrika.
 heterophylla Thbg., verschiedenblättriges, ♀. k. Cap
 der guten Hoffnung.
 myrtifolia Rchb. (*Gillii* Hook.), myrtenblättriges, ♀. k.
 Cap der guten Hoffnung.
 ovata Thbg., eiförmiges, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
 polygaloides Thbg., polygalaähuliches, ♀. k. Cap
 der guten Hoffnung.
 ramulosa Lk., ästiges, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
 rapunculoides L. (*fulvo-maculata* Lk.), rapunzelähn-
 liches, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
 rotundifolia Thbg., rundblättriges, ♀. k. C. d. g. H.
 spicata Lk., ähriges, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
 spuria L., unächt, ♂. k. Cap der guten Hoffnung.
Selas lanceolatum Spgl. v. *Cyminosma pedunculata*.

Selinum L., Silge, V. II., Umbelliferae.

- Angelicastrum Lk. (*Angelica lancifolia* Spgl.), angelica-
 ähnliche, 4. f. ?
 Carvisfolia L. (*Angelica Carvisfolia* Spgl., *S. membranaceum*
 Vill.), kümmelblättrige, 4. f. Europa.
 caasicum MB., caucasische, 4. f. Caucasus.
 latifolium MB., breitblättrige, 4. f. Caucasus.
 scabrum Lapeyr., scharfe, 4. f. Pyrenäen.
 sibiricum Retz, sibirische, 4. f. Sibirien.
 terebinthaceum Fisch., Terpentin-S., 4. f. Sibirien.
austriacum Jacq. (*argenteum* Crtz, *nigrum* Lam.,
nigricans Gaud., *montanum* Schlchr., *polymorphum*
 Spgl.), *elegans* Balb. (*lineare* R. et S., *rablense*
 Spgl., ? *Bellardi* Balb.) etc. vid. *Peucedanum au-*
striacum, *rablense* etc. *decipiens* Wendl. v. *Mela-*
noselinum *decipiens* Nachtr. *Galbanum* L. etc. v.
Bubon Galbanum. *Gmelini* Bray. (*livonicum* Ledeb.)
 vid. *Conioselinum Fischeri* Nachtr. *intermedium*
 Bess. (et *palustre* L. et *Schivereckii* Bess.) vid.
Thysselinum palustre etc. *lineare* Schum. (*pra-*
tense Spgl.) et *Monnieri* L. (*peregrinum* W.) v. *Cni-*
dium venosum et *Monnieri*. *podolicum* Bess. vid.
Peucedanum Chabraei. *pubescens* Mch. (*sylvestre*
 Crtz), *pyrenaeum* Gouan (*Lachenalii* Gmel.) v. *An-*
gelica sylvestris et *pyrenaea*. *rigidulum* Vivian. (*appia-*
num P.) v. *Carum rigidum* Nachtr. *Seguieri* L. fil. v.

Selinum

Ligusticum Seguieri. *sylvestre* Jacq. vid. *Thysse-*
linum palustre.

Selloa Sogl. (Friedrich Sellow aus Potsdam, welcher
als Botaniker Brasilien bereiste), XIX. II., Compo-
sitae-Corymbiferae.

glutinosa Sogl., klebrige, ⚥. w. Brasilien.

Semecarpus L. fil., Markfrucht, V. III. (XXIII. II.),
Amyrideae-Terebinthaceae.

Anacardium L. (*Anacardium longifol.* Lam.), ostindische,
⚥. w. Ostindien.

β) *cuneifolium* DC.

Sempervivum R. L., Hauswurz (Hauslaub), XI. VII.,
Corniculatae-Crassulaceae.

?*africanum* Haw., afrikanisches, 4. k. Cap d. gut. H.
arachnoideum L., spinnewebenartiges, 4. f. Mittel-
europäische Alpen.

b) *majus.* c) *minus.*

arboreum L. (*africanum* Mll.), baumartiges, ⚥. k. t.
Griechenland, Portugal, Cap der guten Hoffnung.

b) *fol. variegat.* c) *fol. atropurpur.*

arenarium K., Sand-H., 4. f. Tyrol.

aureum C. Sm. (*calyciforme* Haw.), goldfarbiges, ⚥.
k. t. Canarische Inseln.

barbatum Chr. Sm. (*lineolare* Haw., *spathulatum* Hornem.),
bärtiges, ⚥. k. t. Canarische Inseln.

bifurcum Loud., zweigabeliges, ⚥. k. t. Madeira.

Braunii Funk., K., Braun's, 4. f. Kärnthen.

caespitosum C. Sm. (*barbatum* Hornem., *ciliatum* Sims),
rasenartiges, ⚥. k. t. Canarische Inseln.

canariense L., canarisches, ⚥. k. t. Canarische Inseln.

ciliatum Brouss., gefranztes, ⚥. k. t. Canarische Inseln.

b) *hybridum* Haw.

dodrantale W., spannenlanges, ☉. ♂. f. k. Teneriffa.

flagelliforme Fisch., peitschenförmiges, 4. f. Sibirien.

frutescens Haw., strauchiges, ⚥. k. t. Teneriffa.

Funkii Braun, K., Funk's, 4. f. Tyrol, Salzburg.

glandulosum Ait., drüsiges, ⚥. k. t. Madeira.

globiferum L. K. (?*cuspidatum* Haw.), kugelförmiges,
4. f. Südrussland.

glutinosa Ait., klebriges, ⚥. k. t. Madeira.

grandiflorum Haw. (*globuliferum* Bot. mag.), groß-
blumiges, 4. f. ?

hirtum L., haarblumiges, 4. f. Oesterreich, Ungarn.¹

hispanicum W., spanisches, 4. k. Spanien.

laxum Haw., lockeres, ⚥. k. t. ?

micranthes P. B. Webb. (*Monanthes spathulata* J. C.),
kleinblumiges, 4. k. t. Madeira.

monanthum Ait., einblüthiges, 4. k. t. Canar. Inseln.

pumilum MB., niedriges, 4. f. Caucasus.

retusum Haw., abgestutztes, ⚥. k. t. Teneriffa.

Smithii Sim's, Smith's, ⚥. k. t. Teneriffa.

soboliferum Sims (*globiferum* Auct.), sprossendes, 4. f.
Deutschland etc.

stellatum Sm. (*villosum* Bot. mag.), sternförmiges, ☉. f.
Baldgebirge.

tabulaeforme Haw., tafelförmiges, ⚥. k. t. Madeira.

tectorum L., gemeines, 4. f. Europa.

tortuosum Ait., gedrehtes, ⚥. k. t. Canarische Inseln.

urbicum C. Sm., städtisches, ⚥. k. t. Teneriffa.

Sempervivum

uviferum P. B., Webb., traubiges, $\frac{1}{2}$ k. t. Teneriffa.

villosum Ait., zottiges, $\frac{1}{2}$ k. t. Madeira.

Wulfeni Hoppe (*globiferum* Wulf.), Wulfen's, 4. f. Tyrol, Kärnthen.

sediforme Jacq. v. *Sedum altissimum*.

Senecia Commers. (Senac, ein französischer Arzt), V. 1., Pittosporeae.

nepalensis DC., nepal'sche, $\frac{1}{2}$ t. k. Nepal.

undulata Lam., wellenblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Mascarenas, Madagascar.

glauca Lam. v. *Elaeodendron glaucum*.

Senebiera Poir. (J. Senebier, Bibliothekar in Genf, berühmt als Pflanzenphysiolog), XV. 1., Cruciferae.

Coronopus Poir., P., Krähenfuß-S., $\odot$ f. Europa, Nordamerika.

nilotica DC., Nil-S., $\odot$ f. Unteraegypten.

pinnatifida DC. (*didyma* P.), fiederspaltige, $\odot$ f. England, Norddeutschland. Südeuropa, Amerika.

β) *incisa* W.

Senecillis G., Kreuzwurz, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

glauca G., blaugrüne, 4. f. Sibirien, Podolien,

purpurata G. (? *Cineraria purp.* L.), purpurfarbige, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

glauca Ledeb. v. *Ligularia altaica*.

Senecio T. (et *Jacobaea* T.), Kreuzkraut, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

1. Cinerariae (*Cineraria* Auct.).

alpestris DC. (Hoppe), (*C. integrifolia* W.), Voralpen-K., 4. f. Oesterreich, Steyermark, Kärnthen, Krain.

β) *leiocarpus* (K.).

arachnoideus Sbr. (*Scopolii* Hoppe, *C. arachnoidea* Rchb.), spinnewebiges, 4. f. b. Krain, österreichisches Littorale, Italien.

aurantiacus DC. (Hoppe), orangefarbiges, 4. f. Kärnthen, Frankreich, Sibirien, Volhynien etc.

β) *flosculosus* Bess. γ) *tomentosus* DC. (*C. aurant. flocculosa* Rchb.).

Balbisianus DC. (*C. longifolia* All.), Balbis's, 4. f. Piemont.

brachychaetus DC. (*C. longifolia* Jacq.), kurzhaariges, 4. f. Oesterreichische, kärnthner und tyroler Alpen, Apenninen, Caucasus.

campestris DC. (Retz), Feld-K., 4. f. Europa, Nordas.

a) *humilis* DC. (*C. alpina* Huds., *C. integrifolia* Sm., ? *C. papposa* Rchb.). β) *vulgaris* DC. (*C. lanceolatu* Lam.). γ) *capitatus* DC. (Ledeb.),

δ) *glabratus* DC. ϵ) *dentatus* Rchb.

capitatus (Wahlbg.), (*C. fulva* Stev.), kopfförmiges, 4. f. Carpathen, Caucasus, Schweiz, Tyrol, Frankreich.

β) *discoideus* (Rchb.).

croceus DC. (Tratt.), safranfarbiges, 4. f. Oesterreich, Carpathen.

crispatus DC. (*C. crispa* L. fil., Jacq.), krausblättriges, 4. f. Salzburg, Oesterreich.

Doronicum L. (*Doronicum helveticum* Mill.), gemenwurzähnliches, 4. f. Mitteleurop. Alpen, Italien.

β) *polycephalus* DC. (*apenninus* Tausch., *orientalis*

Senecio

- Tenor., *Barrelieri* Gouan). γ) *rotundifolius* Lapeyr. δ *tomentosus* DC.
- flammeus* DC. (Turcz.), feuerfarbiges, 4. f. Dahurien.
- ovirens* DC. (K.), (*C. crassifolia* Kit., *C. Clusiana* Host), ovirisches, 4. f. Kärnthen, Illyrien, Krain.
- palustris* L., sumpfliebendes, $\odot$ δ . f. Europa, Nordasien.
- papposus* Less. (Rchb.), langfederiges, 4. f. Böhmen, Kärnthen, Galicien.
- pratensis* DC. (Hoppe). Wiesen-K., 4. f. Galicien, Salzburg.
- racemosus* DC. (*C. racemosa* MB., *C. glabrata et auriculata* Ledeb.), traubiges, 4. f. Caucasus, Armenien.
- rivularis* DC. (WK.), Bach-K., 4. f. Ungarn, Salzburg, Böhmen.
- Schkuhrrii* DC. (Rchb.), (*C. integrifolia* Schk.), Schkuhr's, 4. f. Sudeten, sächsisches Erzgebirge.
- spathulaefolius* DC. (Gmel.), (*C. longifolia* Sturm., *integrifolia* Roth, Wallr.), spatheblättriges, 4. f. Pfalz, Schweiz, Thüringen.
- sudeticus* DC. (K.), Sudeten-K., 4. f. Sudeten, Oberlausitz.
- Tournefortii* Lapeyr. (*persicaefolius* Ram. non Thbg.), Tournefort's, 4. f. Pyrenäen.
- II. Genuini.
- abrotanifolius* L., stabwurzähnliches, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
- aegyptius* L. (*Jacobaea sinuata* Mch.), ägyptisches, $\odot$ f. Aegypten.
- alpinus* ? Scop. (*cordatus* K., *C. alpina* L.), Alpen-K., 4. f. Mittel- und südeuropäische Alpen.
- a) *cordifolius* Rchb. (*C. cordifol.* Jacq. L. fil., ? *C. baldensis* Poir. β) *auriculatus* Rchb. (*subalpinus* K., *C. cordifolia auriculata* Jcq., *C. alliarifolia* Dsf.).
- aetnensis* Jan. (*Jacobaea carnosae* Presl.), Aetna-K., δ f. Sicilien.
- β) *incisus* DC. (*chrysanthemifolius* Biv.).
- ambiguus* DC. (*C. ambigua* Biv., *C. bicolor* W.), zweifelhaftes, $\S$ k. Sicilien.
- β) *Schouwii* DC. (*C. ceratophylla* Tenor.).
- ambraceus* Turcz. (*C. ambracea* Hornem.), ambraduftendes, 4. f. Mongolei.
- ampullaceus* Hook., blasenförmiges, δ 4. f. Texas.
- aquaticus* Huds., Wasser-K., δ 4. f. Europa.
- β) *barbareaefolius* Krock. (*pratensis* Richt.).
- arabicus* L. (*intactus* Mch.), arabisches, $\odot$ δ f. Aegypt.
- argutus* H. B. K., spitzzahniges, 4. $\S$ k. t. Mexico.
- artemisiaefolius* P. (*adonidifolius* Lois., *tenuifolius* DC.), beifußblättriges, 4. f. Südfrankreich, Spanien.
- aureus* L. (*fastigiatus* Schweinig), goldfarbiges, 4. f. Nordamerika.
- auritus* W. (*auriculatus* Dsf.), geöhrtes, $\odot$ f. Nordafrika.
- Balsamitae* Mühlbg. (*lyratus* Mchx., *carolinianus* Spgl., *lobatus* P., *glabellus* Poir.), frauenmünzenähnliches, 4. f. Nordamerika.
- Cacaliaster* Lam. (*croaticus* WK.), cacaliablättriges, 4. f. Frankreich, Croatien, Salzburg.
- calcarius* H. B. K., kalkiges, $\S$ k. t. Mexico.
- canadensis* L., canadisches, 4. f. Nordamerika.

Senecio

candidus DC. (Presl.), reinweißes, ⚥. k. Sicilien.
 caucasicus DC. (MB.), caucasisches, 4. f. Caucasus.
 carniolicus W. (*incanus* Scop.), krainerisches, 4. f.
 Tyroler, salzburger, krainer und schweizer Alpen.
 chrysanthemifolius Poir., wucherblumenblättriges, ♂. 4.
 f. Sicilien, Taurien, Ostindien.

β) *microglossus* DC. γ) *latilobus* DC. (*squalidus* Sm., *dentatus* Hort.).

Cineraria DC. (*maritimus* Rchb., *C. maritima* L.), aschgrau, 4. ⚥. k. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Nordafrika.

cinerarioides H. B. K., cinerariaähnliches, ⚥. k. t. Mexico.
 cinerascens Ait., grauliches, ⚥. k. Cap der gut. Hoffn.
 coriaceus Ait. (*orientalis* Mill.), lederblättriges, 4. f.
 Kleinasien.

coronopifolius Dsf., krähensfußblättriges, ☉. f. Nordafrika.

?β) *hispanicus* P.

crassifolius W. (*Jacobaea carnosa* Presl), dickblättriges,
 ☉. f. Frankreich, Italien, Nordafrika.

delphinifolius Vahl, ritterspornblättriges, ♂. 4. f.
 Nordafrika, Sardinien.

β) *laxus* DC. γ) *Badaroi* DC. (*flabellatus* Viv.).

dentatus Jacq., gezahntes, ☉. ♂. f. k. Cap d. g. H.
 Doria L. (*altissimus* Mill.), hohes, 4. f. Süd- und
 Osteuropa.

elegans L., zierliches, ☉. f. m. Cap der gut. Hoffn.
 erraticus Bertol. (*aquaticus* Lois.), herumschweifendes,
 ♂. 4. f. Schlesien, Tyrol, Krain, Italien, Griechenl.

erubescens Ait., röthliches, ♂. k. Cap der gut. Hoffn.

erucaefolius L., Huds. (*siculus* Jan., *neglectus* Desv.,
lycopifolius Dsf.), raukenblättriges, 4. f. Europa.

β) *tenuifolius* Jacq. γ) *napifolius* Schrad. δ)
breviligulatus DC. ε) *discoideus* DC.

Eudorus DC. (*Cacalia senecioides* Dsf., *Chrysocoma*
senecioides H. Par., *Eudorus senecioides* Cass.), mon-
 ströses, 4. f. ?

foeniculaceus Ten., fenchelähnliches, ☉. f. Süditalien.

Fuchsii C. C. Gmel. (*ovatus* W., *salicifolius* Wallr.,
alpestris Gaud., *saracenicus* Poll.), Fuchs's, 4. f.
 Mittel- und Osteuropa, Frankreich.

gallicus Vill. (*squalidus* W., ? L.), französisches, ☉. f.
 Süd- und Westeuropa.

a) *laxiflorus* Viv. β) *difficilis* Duf. γ) *desqua-*
matus Lk. (*exsquameus* Brot.).

gibbosus DC. (Guss.), (? *Cin. litoralis* Vest), höckeriges,
 4. ⚥. k. Sicilien.

giganteus Dsf., riesenhaftes, 4. f. k. Nordafrika.

glastifolius L. fil. (*lilacinus* Schrad., *serratifolius* Weinm.),
 waidblättriges, ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

glaucescens Spgl., bläulichgrünes, 4. f. ?

glaucus L., meergrünes, ☉. ♂. f. Nordafrika.

grandiflorus Berg. (*venustus* Ait., Schrad.), großblumiges,
 ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

a) *tenuifolius* Schrad. β) *iatifolius* Schrad.

halimifolius L. (*sessilis* Thbg.), meerneldenblättriges,
 ⚥. k. Cap der guten Hoffnung.

hastulatus L. (*hastatus* W.), spontonförmiges, 4. k. Cap
 der guten Hoffnung.

Senecio

Jacobaea L., *Jacobs-K.*, 4. f. Europa, Mittelasien.

β) *flosculosus* DC.

ilicifolius L., stechhülsenblättriges, 5. k. C. d. g. H.

incanus L., weißgrau, 4. f. Süd- u. westeurop. Alpen.

Kaempferi DC., *Kaempfer's*, 4. k. Japan.

lanceus Ait. (*oporinus* W., *litoreus* Thbg.), lanzettblättriges, 5. k. Cap der guten Hoffnung.

lanuginosus Spgl., wolliges, 0. f. ?

leucophyllus DC. (*tomentosus* Rhod. non Mchx., *incanus*

et *palmatus* Lapeyr.), weißblättriges, 5. k. Pyren.

linifolius L., flachsblättriges, 4. f. b. k. Südspanien, Balearische Inseln, Italien.

lividus L., bleifarbiges, 0. f. Westeuropa, Madeira, Corsica, Dänemark.

?β) *denticulatus* Müll.

longifolius L., langblättriges, 5. k. Cap der gut. H.

lyratifolius Rchb. (*alpinus* L. fil., *Ciner. senecifolia*

Poir.), leierblättriges, 4. f. Mitteleurop. Voralpen.

lyratus L. fil., Thbg. (*ilicifolius* Berg.), leierförmiges, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

macrophyllus MB., großblättriges, 4. f. Caucasus.

nebrodensis L. (*Jacobaea lanuginosa* Presl), sizilianisches, 0. f. Italien, Sicilien.

nemorensis L. Jacq. (*Jacquinianus* Rchb., *frondosus* Tausch., *germanicus* Wallr.), Hain-K., 4. f. Mittel-, Süd-, West- und Osteuropa, Caucasus, Sibirien.

?β) *octoglossus* DC.

obovatus Mühlbg., verkehrteiförmiges, 4. f. Nordamer.

Othonnae MB. (*Ciner. anomala* Sibth., *Cacalia pinnata* W.), othonnaähnliches, 4. f. Caucasus.

paludosus L., Sumpf-K., 4. f. Europa.

β) *riparius* Wallr. γ) *Sadleri* Lang. (*tomentosus* Host).

parviflorus All., kleinblumiges, 4. f. Piemont.

persicifolius L., pfirsichblättriges, 5. k. Cap d. g. H.

peucedanifolius L. fil. (*Cacalia peuced.* Jacq.), haarstrangblättriges, 5. k. Cap der guten Hoffnung.

platyphyllus DC. (*Cacalia macrophylla* MB., *Cineraria macrophylla* Ledeb.), breitblättriges, 4. f. Caucasus.

praealtus Bertol. (*anthoraefolius* Rchb., *grenarius* MB., *chrysanthemifolius* Morett.), hohes, 4. f. Oberitalien, Podolien, Taurien.

β) *borysthenticus* Andr.

pseudo-elegans Less. (*elegans* Auct. et Hort.), Garten-K., 0. f. Cap der guten Hoffnung.

b) flore pleno purpureo. c) flore albo. d) fl.

albo pleno. e) flore lilacino. f) fl. lilacino pleno.

pubigerus L. (?*squamosus* Thbg., *Prenanthes glomerata* Rchb.), feinhaariges, 0. f. Cap der guten Hoffnung.

purpureus L. (*Cacalia villosa* Jacq.), purpurfarbiges, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

reclinatus L. suppl. (*graminifolius* Jacq., Balb.), rückwärtsgeneigtes, 5. k. Cap der guten Hoffnung.

β) *serratus* DC.

rigescens Jacq., starrliches, 5. k. Cap der gut. Hoffn.

rigidus L. (*Sclerobasis rigida* Cass.), starres, 5. k. Cap der guten Hoffnung.

Senecio

rosmarinifolius L. fil., rosmarinblättriges, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

a) Jacquini DC. (*rosmarinifol.* Jacq.). β) asper Ait. rupestris WK. (*laciniatus* Bertol.), Felsen-K., ☉. f. Süd- und Osteuropa.

β) montanus W. (*paradoxus* Hoppe).

saracenicus Jacq., heidnisches, 4. f. Europa, Sibirien. scaber W., scharfes, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

sinuatus H. B. K., buchtiges, 4. k. Mexico.

solidagineus Berg., goldruthenähnliches, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

speciosus W. (*Pseudochina* Andr.), prächtiges, 4. k. China.

squamosus Thbg., schuppiges, 4. ♀. k. Cap d. g. H.

sylvaticus L., Wald-K., ☉. f. Europa.

telephifolius Jacq., telephiumblättriges, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

triflorus L., dreiblumiges, ☉. f. Aegypten.

trilobus L. (*leucanthemifolius* Poir., *vernus* Biv.), dreilappiges, ☉. f. Nordafrika, Italien.

umbrosus WK., schattenliebendes, ☉. f. Ungarn.

uniflorus All., einblumiges, 4. f. Schweiz, Piemont.

verbenaefolius Jacq., eisenkrautblättriges, ☉. f. Aegypt.

vernalis WK., Frühlings-K., ☉. f. Ungarn, Griechenland, Caucasus, Schlesien.

β) caucasicus DC.

viscosus L., schmieriges, ☉. f. Europa.

vulgaris L., gemeines, ☉. f. Europa, Nordafrika, Mittel- und Nordasien.

III. *Cremocephalum* Cass. (*Crassocephalum* Mch.).

cernuus L. fil. (*uniflorus* Retz), übergebogenes, ☉. f. Ostindien, Mascarenas, Madagascar.

IV. *Erechtites* Rafin.

cacalioides Fisch., cacaliaähnliches, ☉. w. Jamaica.

glomeratus Dsf., knaulförmiges, ☉. f. Neuholland.

hieracifolius L. (*Sonchus agrestis* et *occidentalis* Spgl., *Neoceis hieracifolia* Cass., *E. praealta* Rafin.), habichtkrautblättriges, ☉. f. Nord- u. Südamer., Westind.

valerianaefolius Wolf, Lk., baldrianblättriges, ☉. f. m. Südamerika.

V. *Gynura* Cass.

bicolor DC. (*Cacalia bicolor* Roxb. p. 114.), zweifarbiges, 4. ♀. w. Molucken.

haematophyllus W. (*cruentus* Roth, *discolor* Dsf., *bicolor* Balb., *africanus* Hortul.), blutfarbiges, ♀. w. ?

japonicus Thbg. (*Porophyllum japonicum* DC.), japanisches, 4. k. Japan.

Pseudo-China L., dickwurzelliges, 4. t. w. China, Ostind.

adenotrichius DC. vid. *Adenotrichia amplexicaulis*.

cruentus DC. etc. vid. *Cineraria cruenta*. *Tussilagin* Lindl. v. *Pericallis Tussilaginis*.

Septas L., Siebenling, VII. iv., Corniculatae-Crassulaceae.

capensis L., capischer, 4. k. t. Cap der guten Hoffn.

globiflora Sims, kugelblumiger, 4. k. t. Cap d. g. H.

umbella Haw., doldiger, 4. k. t. Cap der gut. Hoffn.

Serapias L., Stendelwurz, XX. i., Orchideae.

cordigera L. (*ovalis* Rich.), herzförmiger, 4. Kn. k. Südeuropa, Caucasus, Nordafrika.

Lingua L., Zungen-St., 4. Kn. k. Südeuropa, Nordafrika,

Serapias

longipetala Poll., langkronige, 4. Kn. k. Italien.

Hinsichtlich der übrigen siehe *Cephalanthera* et *Epipactis*.

Serjania Plum. (P. Serjeant, französischer Botaniker), VIII. III., Sapindaceae.

caracasana W., Caracas-S., ♂. Sch. w. Cuba, Südamer.

divaricata Schum., ausgesperrte, ♂. Sch. w. Jamaica.

mexicana W., mexicanische, ♂. Sch. w. Mexico.

sinuata Schum., buchtige, ♂. Sch. w. Hispaniola.

tritermata W., dreifachdreizählige, ♂. w. Westindien.

Seringia Gay. (N. C. Seringe, Professor der Botanik zu Lyon), V. I., Malvaceae-Büttneriaceae.

platypylla Gay., breitblättrige, ♂. t. Neuholland.

S. ovata Sogl. v. *Ptelidium ovatum*.**Seriola** L., Nesselsalat, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

aethnensis L., sicilianisches, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

albicans Tin., weiflicher, ♂. f. Sicilien.

apargioides Rchb. (*Robertia taraxacoides* Hort., *S. taraxacifolia* Salzm.), löwenzahnblättriger, 4. f. Sicilien, Nordafrika.

cretensis L., cretischer, ☉. f. Sicilien, Creta.

glauca Tin., blaugrüner, ☉. f. Sicilien.

rubescens Tin., röthlicher, 4. f. Sicilien.

urens L., brennender, ☉. f. Sicilien, Griechenland.

alliata Bivon. etc. v. *Rodigia alliata* etc. *taraxacoides* Loisel. (*uniflora* Bivon.) vid. *Robertia taraxacoides*.

Seriphium alopecuroides Lam., *juniperifolium* Lam. etc. v. *Stoebe reflexa aethiopica* etc.**Serissa** Commers., Juss., Serisse, V. I., Rubiaceae.

foetida W. (*Lycium japonicum* Thbg., *foetidum* L.), stinkende, ♂. k. Japan. China, Cap der gut. Hoffn.

b) flore pleno.

Serpicula L., Kriechleinkraut, XXI. IV. (XXII. IV.), Halorageae.

repens L., afrikanisches, 4. k. Südafrika, Mascarenas.

verticillata L. Mühlbg. v. *Udora verticillata*.

Serratula Dill., Scharte, XIX. I., Compositae-Cynarcephalae.

arguta Fisch., spitzzahnige, 4. f. Südrussland.

caspica Pall., caspische, 4. f. Caspisches Meer.

centauroides L. (*heterophylla* et *pulchella* Hort.), kornblumenähnliche, 4. f. Sibirien.

cichoracea DC., cichorienähnliche, 4. f. Italien, Cauc.

coronata L., gekrönte, 4. f. Sibirien.

divaricata Fisch. et Mey., ausgesperrte, ☉. f. Nordpers.

glauca Ledeb., blaugrüne, 4. f. Sibirien.

Gmelini Ledeb. (*centauroides* MB.), Gmelin's, 4. f. Cauc.

heterophylla Dsf. (*Carduus lycopifolius* Vill.), verschiedenblättrige, 4. f. Frankreich.

Kitaibelii G. Don (*nitida* Bess., *Carduus nitidus* WK.).

Kitaibel's, 4. f. Ungarn, Vohynien.

nitida Fisch., glänzende, 4. f. Ostsibirien.

nudicaulis L. (*Carduus cerinthifolius* Vill., *cerinthoides* W., *glauca* Cav., *cirsiioides* Ten.), nacktstengelige, 4. f. Süd- und Westeuropa.

Picris MB., picrisähnliche, 4. f. Caucasus.

quinquefolia MB., fünfblättrige, 4. f. Caucasus.

Serratula

radiata MB. (*centauroides* MB., *pinnatifida* Dsf., *Carduus radiatus* WK.), strahlige, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen, Caucasus.

tinctoria L., Färber-S., 4. f. Europa.

b) *alba*.

xeranthemoides MB., strohblumenähnliche, 4. f. Caucasus, Bessarabien.

acaulis etc. v. *Rhaponticum acaule*. *alata* Dsf. etc. v. *Jurinea alata*. *alpina* L. etc. v. *Saulesurea alpina*. *arvensis* L. v. *Cirsium arvense*. *blanda* MB. (*simplex* DC.) vid. *Jurinea mollis*. *elegans* Ait. etc. v. *Liatris elegans*. *multiflora* L. v. *Jurinea linearifolia*. *praealta* L. etc. v. *Vernonia praealta*.

Serruria RB. (J. Serrurier, Professor der Botanik zu Utrecht), IV. 1., Proteaceae.

abrotanifolia Kn., stabwurzblättrige, ♀. t. C. d. g. H.

adscendens RB., aufsteigende, ♀. t. Cap der gut. H.

aemula RB., ähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Aitoni RB., Aiton's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

arenaria RB., Sand-S., ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

artemisiaefolia Kn., beifußblättrige, ♀. t. C. d. g. H.

Burmanni RB., Burmann's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

candicans RB., weißliche, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

ciliata RB., gefranzte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

congesta RB., gedrängtblumige, ♀. t. Cap d. gut. H.

crithmifolia RB., meerfenchelblättrige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

cyanoides RB., flockenblumenähnliche, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

decipiens RB., täuschende, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

decumbens RB., niederliegende, ♀. t. Cap der gut. H.

diffusa RB., weitschweifige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

elongata RB., verlängerte, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

emarginata Swt. (*arenaria* Kn.), ausgerandete, ♀. t.

Cap der guten Hoffnung.

flagellaris RB., ausläuferartige, ♀. t. Cap der gut. H.

florida RB., blüthenreiche, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

foeniculacea RB., fenchelblättrige, ♀. t. Cap d. g. H.

glaberrima RB., glatte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

glomerata RB., knaulförmige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

millefolia Kn., vielblättrige, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

nitida RB., glänzende, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Nivenii RB., Niven's, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

odorata Swt., wohlriechende, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

parilis Kn., gleichmäßige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

pedunculata RB., stielblumige, ♀. t. Cap der gut. H.

phylicoides RB., phylicaähnliche, ♀. t. Cap d. gut. H.

pinnata RB., gefiederte, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Roxburghii RB., Roxburgh's, ♀. t. Cap der gut. Hoffn.

rubricaulis RB., rothstengelige, ♀. t. Cap der gut. H.

scoparia RB., besenartige, ♀. t. Cap der guten Hoff

squarrosa RB., sparrige, ♀. t. Cap der guten Hoffn.

triternata RB., dreinaldreizählige, ♀. t. Cap d. g. H.

villosa RB., zottige, ♀. t. Cap der guten Hoffnung.

Sersalisia RB. (J. B. Sersalis, ein neapolitanischer Geistlicher), V. 1., Sapotaceae.

sericea RB., seidenhaarige, ♀. t. k. Neuholland.

Sesamum L., Sesam, XIV. 11., Personatae-Sesameae.

indicum L., indischer, ☉. w. m. Ostindien.

Sesamum

orientale L. (*edule* Hort.), morgenländischer, ☉. w. m. Ostindien.

Sesbania P. Br., P. (arabischer Name), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

aculeata P., stachelige, ☉. w. Ostindien.

aegyptiaca P., ägyptische, ☿. w. Aegypten.

affinis Schrad., ähnelnde, ☉. w. Ostindien.

cannabina P., hanfblättrige, ☉. w. Ostindien.

gracilis Schrad., schlanke, ☉. w. ?

macrocarpa Elliot, großfrüchtige, ☉. w. m. f. Louisiana.

occidentalis Poir., westliche, ☿. w. Westindien,

paludosa Jacq. fil. (? *uliginosa* Roxb.), sumpfliebende, ☉. w. Ostindien.

picta P., bemalte, ♂. w. Neuspanien, Westindien.

punctata DC., punktirte, ☉. w. Guinea.

sericea L., seidenhaarige, ☉. w. Ostindien.

stricta Schrad., steife, ☉. w. Ostindien.

coccinea P. etc. vid. *Agati coccinea* etc. *disperma* Pursh v. *Glottidium floridanum*.

Seseli Boerh. L., Sesel, V. II., Umbelliferae.

annuum L. (*bienne* Crtz, *coloratum* Ehrh., *tortuosum* Poll.), jähriger, ♂. f. Europa, Sibirien.

Bocconi Spgl. (*Bubon siculus* Spgl.), Boccone's, ♂. f. Sicilien.

buchtormense (Fisch.), buchtormischer, ♂. f. Sibirien.

campestre Bess., Feld-S., ♂. f. Galicien.

cervariaefolium DC., hirschwurzblättriger, ☿. k. Teneriffa.

chaerophylloides Thbg., kerbelähnlicher, ♂. k. Cap der guten Hoffnung.

cuneifolium MB., keilblättriger, ♂. 4. f. Caucasus.

crassifolium Schrad., dickblättriger, ♂. f. ? Südeuropa.

dichotomum MB., zweizinkiger, ♂. 4. f. Caucasus.

elatum L., hoher, 4. f. Südeuropa.

fragile Gouan, brüchiger, ♂. f. ?

glaucum Jacq. (? *elatum* L., *junceum* Sm.), blaugrüner, 4. f. Süd- und Osteuropa.

Gouani K. (*elatum* Gouan), Gouan's, ♂. f. Süd- und Westeuropa.

gracile W. K., schlanker, 4. f. Ungarn.

Hippomarathrum L. (*articulatum* Crtz, *Hippomarathrum pelviforme* G. M. S.), Pferde-S., 4. f. Mitteleuropa.

leucospermum WK., weißsamiger, 4. f. Ungarn.

Lobelianum Bess., Lobel's, ♂. f. ? Südeuropa.

macedonicum (L.), (*Athamanta macedonica* Spgl.), macedonischer, ♂. k. f. b. Macedonien, Italien, Nordafrika.

montanum L. (*multicaule* Jacq.), Berg-S., 4. f. Südeuropa.

Pallasii Bess., Pallas's, ♂. f. Sibirien.

petraeum MB. (*Bubon glaucus* Spgl.), Felsen-S., 4. f. Taurien, Caucasus.

peucedanifolium Bess. (*rigidum* WK.), haarstrangblättriger, 4. f. Podolien, Bannat.

pimpinelloides Will., bibernellähnlicher, 4. f. Podolien, Griechenland, Kleinasien.

proliferum Spgl., sprossender, 4. f. ?

striatum Thbg., gestreifter, ♂. k. Cap der gut. Hoffn.

strictum Ledeb., steifer, ♂. f. Sibirien.

tauricum Lk., taurischer, ♂. f. Taurien.

tortuosum L., gedrehter, 4. f. Südeuropa.

triterdatum Pursh, dreifachdreizähliger, 4. f. Nordamer.

Seseli

varium Trevir., hunter, ♂. f. Unterösterreich.

ammoides Gouan (*corsicum* Lk., *pusillum* Brot., *verticillatum* Dsf.), (et *Saxifragum* L., *Bunius* Vill.)

v. *Ptychotis ammoides* et *heterophylla*. *pyrenaicum* L. v. *Angelica pyrenaica*.

Sesleria Arduin. (Leonard Sesler, Arzt und Botaniker, Freund des Vitaliano Donati), III. II., Gramineae.

I. *Genuina*.

alba Sibth., weisse, 4. f. Griechenland.

albicans Kit., weifslische, 4. f. Carpathen.

coerulea Ard., blaue, 4. f. Europa.

cylindrica DC. (*argentea* Savi), cylinderförmige, 4. f. Frankreich, Italien, Dalmatien.

elongata Host, langährige, 4. f. Oesterreich. Litorale.

filifolia Heuff., fadenblättrige, 4. f. Banat.

nitida Tenor., glänzende, 4. f. Calabrien, Sicilien.

phleoides Stev., lieschgrasähnliche, 4. f. Ostcaucasus.

rigida Heuffel, starrblättrige, 4. f. Banat.

sphaerocephala Arduin. (*leucocephala* DC.), rundköpfige, 4. f. Norische Alpen, Schweiz etc.

tenuifolia Schrad. (*juncifolia* Suffr. Host), feinblättrige, 4. f. Oesterreichisches Litorale.

II. *Psilathera* Lk.

microcephala DC. (*tenella* Host), kleinköpfige, 4. f. Norische Alpen etc.

dura Kunth vid. *Sclerochloa dura*. *echinata* Host vid. *Echinaria capitata*. *echinata* Lam. v. *Dactylis pungens*.

Sesuvium L., Gliederkraut, XII. II., Aizoideae-Ficoideae.

longifolium W., langblättriges, ☉. w. m. f. Südamer.

Portulacastrum L. (*pedunculatum* P.), portulakähnliches, 4. w. t. Südamerika.

repens W., kriechendes, ☉. w. m. f. Ostindien.

revolutifolium Vahl, eingerolltblättriges, 4. w. Südamer.

sessile P. (*Portulacastrum* DC.), stiellosblumiges, 4. w. Westindien.

Setaria P. B., Borstenfennich, III. II., Gramineae.

composita H. B. K. (*polystachya* Schrad.), vielähriger, ☉. ♂. f. m. w. Südamerika.

compressa Kunth, flachhalmiger, ☉. f. Neuholland.

corrugata R. et S., runzeliger, ☉. f. Nordamerika.

erythrosperma Spgl., rothsamiger, ☉. f. Virginien.

geniculata R. et S., gliederiger, ☉. 4. w. Antillen.

glauca P. B., blaugrüner, ☉. f. Europa, Amerika, Ostindien, Neuholland etc.

glauescens Lk., grünlichblauer, ☉. f. ?

helvola R. et S., graulichgelber, ☉. f. m. Ostindien.

intermedia R. et S., mittlerer, ☉. f. m. Ostindien.

italica P. B., italienischer, ☉. f. Südeuropa, Ostindien, Nordamerika.

b) *germanica* P. B. c) *sibirica* Hort.

longifolia Lk., langblättriger, 4. w. ?

macrochaeta Spgl., großhaariger, ☉. f. m. Ostindien.

macrostachya H. B. K. (*setosa* P. B., ? *cylindrica* R. et S., *Panicum tenax* Rich.), großähriger, ☉. f. m. Südamerika.

muricata Lk., weichstacheliger, ☉. f. Nordamerika.

nubica Thbg., Lk., nubischer, ☉. f. Dongola.

pumila Lk., kleiner, ☉. f. ?

Setaria

purpurascens H. B. K., purpurfarbiger, ☉. f. Mexico, Peru etc.

scandens Schrad. (*Panic tenacissimum* N. E.), kletternder, ☉. w. m. f. Brasilien.

sericea R. et S., seidenhaariger, ☉. f. m. Ostindien.

tenacissima Schrad., zäher, ☉. w. f. m. Brasilien.

verticillata P. B., wirtelblüthiger, ☉. f. Europa, Asien, Nordamerika.

viridis P. B., grünes, ☉. f. Europa, Asien, Nordamer.

β) *Weinmanni* R. et S. γ) *majus* Gaud.

Hinsichtlich der übrigen s. *Pennisetum*.

Sethia H. B. K. (S. Sethi, Verfasser eines Werkes über Küchengewächse), X. III., Caryophyllaceae-Erythroxyleae.

indica DC., indische, ♀. w. Ostindien.

Seymeria Pursh (Henry Seymer, ein englischer Naturforscher), XIV. II., Personatae-Antirrhoneae.

pectinata Pursh, kammlätterige, ☉. f. Nordamerika.

tenuifolia Pursh, feinblätterige, ☉. f. Nordamerika.

Sheffieldia repens Forst (*incana* La Bill.) vid. *Samolus litoralis*.

Shepherdia Nutt. (W. Shepherd, Vorsteher des botanischen Gartens zu Liverpool), XXII. IV., Elaeagneae.

argentea Nutt., silberfarbige, ♀. f. Nordamerika.

canadensis Nutt., canadische, ♀. f. Nordamerika.

Sherardia L. (W. Sherard, berühmter englischer Botaniker), IV. I., Rubiaceae.

arvensis L., Acker-S., ☉. ♂. f. Europa.

muralis L. v. *Galium murale*.

Sibbaldia L. (Robert Sibbald, Professor der Physik zu Edinburgh), V. v., Rosaceae.

erecta L., aufrechte, ♀. f. Sibirien.

parviflora W., kleinblumige, ♀. f. b. Kleinasien.

polygyna W., vielgriffelige, ♀. f. Sibirien.

procumbens L., niederliegende, ♀. f. Mittel- und nord-europäische Alpen, Sibirien, Nordamerika.

Sibthorpia L. (H. Sibthorp, Professor der Botanik zu Oxford), XIV. II., Personatae-Antirrhoneae.

europaea L., europäische, ♀. f. England, Portugal.

peregrina L. v. *Disandra prostrata*.

Sicyos L., Haargurke, XXI. x. (XVI. III.), Cucurbitaceae.

angulatus L., kantenblätterige, ☉. Sch. f. Nordamerika.

laciniatus L., schlitzblätterige, ☉. Sch. f. m. Westind.

microphyllus H. B. K., kleinblätterige, ☉. Sch. f. m. Mexico.

parviflorus W., kleinblumige, ☉. Sch. f. m. Quito.

vitifolius W., weinblätterige, ☉. Sch. f. ?

edulis Jacq. vid. *Sechium edule*. *Garcini* L. vid. *Bryonia Garcini*.

Sida L., Sammetpappel, XVI. VIII., Malvaceae.

abutiloides Jacq., halbstrauchige, ☉. ♀. m. f. w. Jamaica.

Abutilon L., gemeine, ☉. f. Südeuropa, Mittelasien.

acerifolia Cav., ahornblätterige, ♀. w. Neuspanien.

acrantha Lk., spitzblumige, ♀. w. Brasilien.

acuminata DC., zugespitzte, ♀. w. Hispaniola.

acuta N. L. Burm., spitze, ♀. w. Ostindien.

alba L., weisse, ☉. m. f. w. Ostindien.

albida W., weifliche, ♀. k. Canarische Inseln.

alnifolia L., erlenblätterige, ☉. m. f. w. Ostindien.

Sida

- althaeaefolia* Sw., eibischblättrige, ♀. w. Westindien, Südamerika.
americana L., amerikanische, ☉. m. f. Jamaica.
angustifolia Juss. Murr. (*ulmifolia* Retz), schmalblättrige, ♀. 4. w. Westindien, Brasilien, Mascarenas.
arborea L. suppl. (*peruviana* Cav.), baumartige, ♀. w. Peru.
arguta Sw., zpitzzähnige, ♀. w. Jamaica.
asiatica L., asiatische, ☉. m. f. w. Ostindien.
atrosanguinea Jacq. (*capillaris* Cav.), dunkelblutrothe, ♀. w. Südamerika.
aurea Lodd., goldfarbige, ♀. w. Ostindien.
aurita Wall., geöhrt, ♀. w. Ostindien.
betulina Horn., birkenblättrige, 4. w. Südamerika.
borbonica Cav., borbonische, ♀. w. Mascarenas.
bracteolata DC., deckblättrige, ♀. w. Südamerika.
brasiliensis Cav., brasilianische, ♂. w. Brasilien.
brevipes DC., kurzstielige, ☉. m. f. w. Neugranada.
calyxhymenia Gay, hautkelchige, ♀. k. t. Neuholland.
canariensis W. (*alba* Cav.), canarische, ♂. ♀. k. Canarische Inseln.
carpinifolia L. fil. (*betulina* Lag., *planicaulis* Cav.), hainbuchenblättrige, ♀. k. t. Canarische Inseln, Ostindien.
ciliaris L., gefranzte, ♂. ♀. w. Westindien.
compressa DC., platte, ☉. ♀. m. f. k. Nepal.
conferta Lk., gedrängtblumige, ♀. w. Brasilien.
contracta Lk., engrispige, ♀. w. Madagascar.
cordifolia L., herzblättrige, ☉. m. f. Ostindien, Cap der guten Hoffnung.
cornuta Humb., W., gehörnte, ♀. w. Südamerika.
crassifolia L'Her. (*tricuspidata et tomentosa* Cav.), dickblättrige, ♀. w. Hispaniola.
crispa L. (*amplexicaulis* Lam., *amplexifolia* Sess.), krause, ☉. m. f. Carolina, Südamerika.
dioica Cav., zweihäusige, 4. f. Virginien.
dumosa Sw., Hecken-S., ♀. w. Jamaica.
erosa Lk., genagte, 4. w. Brasilien.
ferruginea DC., rostfarbige, ♀. w. Peru.
Fischeriana * (*arguta* Fisch. Lk.), Fischer's, ♀. w. Brasilien.
foetida Cav. (*viscosa* L'Her.), stinkende, ☉. ♀. m. f. w. Peru.
frutescens Cav., strauchige, ♀. w. Westindien, Brasilien.
fulva Hoffg. (? *atropurpurea* Blum., *vitellina* Hoffg.), rothgelbe, ♀. w. Java.
gigantea Jacq., riesenhafte, ♀. w. Caracas.
glauca Cav., blaugrüne, ♀. w. Guinea.
globiflora Hook., kugelblumige, ♀. w. Mauritius.
grandifolia W. (*mollis* Orteg.), großblättrige, ♀. w. Peru.
graveolens Roxb., starkkriechende, ♂. w. Ostindien.
hernandioides L'Her., hernandiaähnliche, ♀. w. Hispaniola.
hirta Lam. (*pilosa* L'Her.), kurzhaarige, ♂. w. Ostind.
humilis Cav. (*pilosa* Retz, *unilocularis* L'Her.), niedrige, ☉. m. f. Ostindien.
jamaicensis L. (*glomerata* Cav.), jamaicaische, ♀. w. Jamaica.
jatrophaoides L'Her. (*palmata* Jacq.), jatrophaähnliche, ☉. m. f. Südamerika.

Sida

- inaequalis Lk. (*inaequalifolia* Hort.), ungleichblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.
 incana Lk., weißgraue, $\frac{1}{2}$ w. Sandwichinseln.
 indica L., indische, $\odot$ m. f. Ostindien.
 lasiostega Lk., wollige, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.
 Lechenaultiana DC., Lechenault's, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
 linifolia Cav., flachblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.
 Luciana DC., St. Lucia-S., $\frac{1}{2}$ w. St. Lucia.
 maculata Cav. (*suberosa* L'Her.), gefleckte, $\frac{1}{2}$ w. Hispaniola.
 mauritiana L'Her. (*planiflora* Cav.), mascarenische, $\odot$ $\frac{1}{2}$ m. f. w. Mascarenas.
 micans Cav., schimmernde, $\frac{1}{4}$ w. Ostindien.
 Milleri DC., Miller's, $\odot$ m. f. ?
 mollicoma W., weichschopfige, $\frac{1}{2}$ w. ?
 mollissima Cav. (*cistiflora* L'Her.), weichhaarige, $\frac{1}{2}$ w. Peru.
 multiflora Cav., vielblumige, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.
 Napaea Cav., virginische, $\frac{1}{4}$ f. Nordamerika.
 nudiflora L'Her. (*stellata* Cav.), nacktblumige, $\frac{1}{2}$ w. Hispaniola, Peru.
 ?obtusa Vogel, stumpfblättrige, $\odot$ m. f. ?
 occidentalis L., westliche, $\odot$ m. f. Neugranada.
 orbiculata DC., kreisblättrige, $\frac{1}{2}$ t. China.
 paniculata L. (*nervosa* DC.), rispige, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
 patens Andr., abstehende, $\frac{1}{2}$ w. Abyssinien.
 pentacarpa Roxb., fünfkapselige, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
 periplocaefolia L., periplocablättrige, $\frac{1}{2}$ w. Ost- und Westindien.
 β) ceylanica. γ) caribaea.
 permollis W., weiche, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.
 pilosa Cav., haarige, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
 polyantha Schltdl., vielblumige, $\frac{1}{2}$ w. ?
 populifolia Lam., pappelblättrige, $\odot$ m. f. Ostindien.
 pulchella W., hübsche, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.
 pulchra Coll., schöne, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
 purpurascens Lk., purpurfarbige, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.
 recisa Lk., stutzblättrige, $\frac{1}{4}$ w. ? Brasilien.
 reflexa Cav. (*retrorsa* L'Her.), zurückgebogene, $\frac{1}{2}$ w. Peru.
 repanda Roth, ausgeschweifte, $\odot$ $\frac{1}{2}$ m. f. w. ?
 retusa L. (*philippica* Cav.), eingedrückte, $\odot$ $\frac{1}{2}$ w. Ostindien, Molucken, Mascarenas.
 rhombifolia L., rautenblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Ost- und Westindien.
 rhomboidea Roxb., rautenförmige, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
 ricinoides L'Her. (*Ricini* Spgl., *palmata* Cav.), ricinus-ähnliche, $\odot$ m. f. Peru.
 rotundifolia Cav., rundblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Mascarenas.
 semicrenata Lk., halbkerbige, $\frac{1}{4}$ w. Manila.
 sericea Ait., seidenhaarige, ? $\frac{1}{2}$ w. ?
 sessiliflora Hook., stiellosblumige, $\frac{1}{2}$ w. Südamerika.
 Schrankii DC. (*brasila* Schrk.), Schrank's, $\frac{1}{4}$ w. Brasil.
 Sonneratiana W. Cav., Sonnerat's, $\frac{1}{2}$ w. t. k. Cap der guten Hoffnung.
 spinosa L., stachelige, $\odot$ f. Ostindien etc.
 spiraeaefolia Lk. (*ulmifolia* W., *carpinoides* DC.), spiräenblättrige, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien.
 speciosa W. (*rosea* Lk.), prächtige, $\frac{1}{2}$ w. Brasilien, Cumana.

Sida

stipulata Cav. (*lanceolata* Retz), zwischenblättrige, ♀. w. Mascarenas.

supina L'Her. (*procumbens* Sw., *ovata* Cav.), niederliegende, 4. w. Westindien.

tiliaefolia Fisch., lindenblättrige, ☉. m. f. Tibet.

triloba Cav., dreilappige, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

triquetra L. (*trisulcata* Jacq.), ♀. w. Westindien, Südamerika.

umbellata L., doldige, ♂. ♀. w. Westindien.

urens L., brennende, ♀. w. Westindien.

venosa H. Berol., aderige, ♀. ♀. w. Brasilien.

verruculata DC., kleinwarzige, ♀. w. Brasilien.

verticillata Cav., wirtelblumige, ♀. w. Brasilien.

vesicaria Cav., blasige, ♀. t. Mexico.

villosa Mill., zottige, ♀. w. Südamerika.

viminea Fisch., gartenartige, 4. w. Brasilien.

virgata Cav., ruthenförmige, ♀. w. Peru.

vitifolia Cav., weinblättrige, ♀. w. Chili.

coccinea DC. vid. *Cristaria coccinea*. *crenatiflora* P., *cristata* L., *deltioidea* Hornem., *Dilleniana* W., *hastata* W. etc. v. *Anoda parviflora*, *cristata*, *triangularis*, *Dilleniana* etc. *malacophylla* Lk. v. *Lopinia malacophylla*. *periptera* Sims vid. *Periptera punicea*.

Sideranthus spinulosus Swt. vid. *Aplopappus spinulosus*.
villosus Swt. v. *Chrysopsis villosa*.

Sideritis T., Magnetkraut (Gliederkraut), XIV. 1., Labiatae.

alpina Vill. (*pyrenaica* Auct.), Alpen-M., 4. f. Dauphiné.

angustifolia Lag., schmalblättriges, 4. f. Spanien.

brutia Tenor., neapolitanisches, 4. f. Neapel.

canariensis L., canarisches, ♀. k. Canarische Inseln.

candicans Ait., weisfilziges, ♀. k. Madeira.

chamaedryfolia Cav. (*hirtula* Brot.), gamanderblättriges, ♀. f. Spanien, Portugal.

cretica L., cretisches, ♀. k. Creta.

crispata W. (*Cavanillesii* Lag.), krausblättriges, ♀. k. Südspanien.

decumbens Thbg., niederliegendes, ☉. f. Cap d. g. H.

elegans Murr. (*nigricans* Lam.), zierliches, ☉. f. ?

foetida Dsf., Poir., stinkendes, 4. f. Spanien.

hirsuta L., rauhhaariges, 4. f. Südeuropa.

hyssopifolia L., ysopblättriges, 4. f. Süd- u. Westeuropa.

ilicifolia W., stechhülsenblättriges, 4. f. k. Kleinasien.

incana L., weisgraues, ♀. k. Spanien.

lanata L., wolliges, ☉. f. Kleinasien, Aegypten.

leucantha Cav., weisblumiges, ♀. k. Spanien.

montana L., Berg-M., ☉. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.

perfoliata L., durchwachsenes, 4. f. k. Kleinasien.

romana L. (*Burgsdorfia rigida* Mch., *romana* Rchb.), römisches, ☉. f. Istrien, Italien.

scordioides L., scordiumähnliches, 4. ♀. f. Südeuropa.
β) *hirta* Roth. γ) *fruticulosa* Pourr.

serrata Lag., sägeblättriges, 4. f. k. Spanien.

spinoza L., (*subspinoza* Cav.), stacheliges, 4. f. k. Spanien, Nordafrika.

syriaca L., syrisches, 4. ♀. k. Griechenland, Syrien.

taurica W., taurisches, 4. ♀. f. k. Taurien.

calycantha MB. v. *Zietenia orientalis*. *linearifolia* Lnm. v. *Stachys stenophylla*.

Siderodendron Schreb., Eisenbaum, IV. 1., Rubiaceae, triflorum Vahl, dreiblumiger, f. w. Westindien.

Sideroxylon Dill., Eisenholz, V. 1., Sapotaceae.

inermis L., unbewehrtes, f. k. Cap der guten Hoffn.
tomentosum Roxb., filziges, f. w. Ostindien.

lycioides L. etc. vid. *Bumelia lycioides* etc. *mite* L. (et *canariensis* L.) v. *Manglilla Milleriana* et *canariensis*. *melanophleum* L. (et *venulosum* W.) v. *Myrsine melanophlea* et *venulosa*. *sericeum* Ait. v. *Sersalisia sericea*. *spinosa* L. v. *Argania Sideroxylon*.

Siebertia chertlerioides Hoppe v. *Alsine aretioides*.

Siegesbeckia L. (J. C. Siegesbeck, Botaniker und Akademiker zu Petersburg), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

cordifolia H. B. K., herzblättrige, ☉. f. Mexico.

droseroides Swt. (? *jorullensis* H. B. K.), droseraähnliche, ☉. f. Mexico.

flosculosa L'Her., dreifädige, ☉. f. Peru.

orientalis L. (*iberica* W.), morgenländische, ☉. f. Ostindien, Japan, Taurien.

triangularis Cav., dreikantige, ☉. f. Mexico.

laciniata Poir. et *occidentalis* L. vid. *Verbena laciniata* et *Siegesbeckia*.

Sieversia W. (J. Sievers, russischer Botaniker), XII. 11., Rosaceae.

anemonoides W., anemonenähnliche, 4. f. Kamtschatka.
glacialis Spgl. (*Adamsia glacialis* Fisch.), Eis-S., 4. f. Nördliches Sibirien.

montana Spgl., Berg-S., 4. f. Mitteleurop. Alpen.

Peckii RB. (*Geum* P. Pursh), Peck's, 4. f. Nordamer.

reptans Spgl., kriechende, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.

rosea Grah., rosafarbige, 4. f. Nordamerika.

triflora Spgl., RB., dreiblumige, 4. f. Louisiana.

Silau Bess., K. Silau (Rofskümmel), V. 11., Umbelliferae.

pratensis Bess., K. Wiesen-S., 4. f. Europa, Sibirien.

Silene L. (et *Viscago* Hall. et *Otites* Otth.), Leimkraut, X. 11., Caryophyllaceae-Sileneae.

acaulis L., stengelloses, 4. f. Europäische Alpen.

b) *alba*. β) *exscapa* All.

adscendens Lagasc., aufsteigendes, ☉. f. Spanien.

aegyptiaca L., aegyptisches, ☉. f. Aegypten.

alpestris Jacq. (*viscida* Spgl.), Voralpen-L., 4. f. Oesterreich, Krain, Tyrol etc.

altaica P. (*graminifolia* Otth., *jeniseensis* W., *Cucub. fruticosus* Pall.), altaisches, 4. f. Sibirien.

amoena L., liebliches, 4. f. Tatarei.

angustifolia MB., schmalblättriges, 4. f. Caucasus.

annulata Thor., beringtes, ☉. f. Frankreich.

antirrhina L., löwenmaulähnliches, ☉. f. Nordamerika.

apetala W. (*aspera* Hort.), kronenloses, ☉. f. ?

aprica Turcz., dürres, ☉. f. Baical.

Armeria L., Garten-S., ☉. f. Mittel-, Süd- u. Westeuropa.
b) *alba*.

Atocion Jacq. (*orchidea* L. suppl.), knabenkrautblumiges, ☉. f. Cypern, Kleinasien.

Behen L., blasenkelchiges, ☉. f. Griechenland, Kleinas.

bellidifolia Jacq., malsliebenblättriges, ☉. f. ? Griechenland, Südeuropa.

Silene

- bicolor Thore (*picta* P., *reticulata* Hort.), zweifarbiges,
 ☉. f. Frankreich.
 brachypetala DC., kurzkröniges, ☉. f. Südfrankreich.
 bupleuroides L., hasenöhrchenähnliches, ♂. 4. f. b. k.
 Persien, Armenien.
 caespitosa Stev., rasenartiges, 4. f. Caucasus.
 Campanula P., glockenblumiges, 4. f. Piemont.
 cana Otth, weißgraues, 4. f. ?
 canariensis W., canarisches, ☉. f. Teneriffa.
 canescens Tenor., weißgrauliches, ☉. f. Neapel.
 carnosa Mch., fleischiges, ☉. f. ?
 caspica P. (*fruticulosa* MB.), caspisches, 4. ♂. f. b. k.
 Südrussland.
 Catesbaei Walt., Catesbai's, 4. f. Nordamerika.
 catholica Otth. (*Mussini* Hornem., *Cucubalus glutinosus* Retz.), catholisches, 4. f. Sicilien.
 ♂) bessanensis Lk.
 cerastoides L. (? *coarctata* Lagasc.), hornkrautähnliches,
 ☉. f. Süd- und Westeuropa.
 cernua Thbg., übergebogenes, ♂. f. k. Cap d. gut. H.
 cheiranthifolia Schott., lackblättriges, ☉. f. San-Rocco.
 chloraefolia Sm., chlorablättriges, 4. f. b. k. Armenien, Caucasus.
 chlorantha Ehrh., grünblumiges, 4. f. Odergebiete, Krain.
 ? chlorophis Wall., grünliches, ♂. k. f. Nepal.
 cinerea Dsf., aschfarbiges, ☉. f. Nordafrika.
 clandestina Jacq., heimlichblühendes, ☉. f. C. d. g. H.
 colorata Schousb., farbiges, ☉. f. Mauritanien.
 compacta Fisch., Hornem., MB. (*purpurea* K. et W.),
 dichtblumiges, ☉. ♂. f. Caucasus, Siebenbürgen.
 commutata Guss., verwechseltes, ☉. f. Sicilien.
 congesta Sm., gedrängtblumiges, ☉. f. Griechenland.
 conica L., kegelförmiges, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.
 conoidea L., kegelnähnliches, ☉. f. Westeuropa.
 cordifolia All., herzblättriges, 4. ♂. f. b. k. Oberitalienische Alpen.
 corsica DC., corsisches, 4. ♂. k. Corsica.
 ? Csereii Baum., Csereii's, ☉. f. ?
 crassifolia L., dickblättriges, ♂. f. k. Cap d. gut. H.
 cretica L., cretisches, ☉. f. Creta.
 cylindriflora Otth, cylinderblumiges, ♂. f. Südeuropa.
 dahurica Fisch., dahurisches, ♂. f. Dahurien.
 decumbens Bivon., niederliegendes, ☉. f. Sicilien.
 depressa MB., niedergedrücktes, 4. f. Armen., Caucas.
 dichotoma Ehrh. (*membranacea* Poir., *trinervis* Soland.),
 zweizinkiges, ♂. f. Osteuropa, Kleinasien.
 Dilleniana Schott., Dillen's, ☉. f. ?
 dinarica Spgl. (*depressa* Baumg.), dinarisches, 4. f.
 Dinarische Alpen.
 discolor Sm., verschiedenfarbiges, ☉. f. Cypern.
 divaricata Clem., sparriges, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.
 diversifolia Otth, verschiedenblättriges, ☉. f. ?
 effusa Otth (Fisch.), ergossenes, 4. f. Südrussl., Illyrien.
 elata Otth (*chlorantha* Auct.), hohes, 4. f. Taurien.
 elegans Brot., zierliches, ☉. f. Portugal.
 Fabaria Sm., fabariablättriges, 4. k. Creta, Sicilien.
 fimbriata Sims, gefranztes, 4. f. Caucasus.
 flavescens W. Kit., gelbliches, 4. f. Banat.
 fruticosa L., strauchiges, ♂. k. Sicilien.

Silene

gallica L., französisches, ☉. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa.

β) sylvestris Schott. γ) anglica L. δ) lusitanica L.

geminiflora W., paarblumiges, ☉. f. ?

gigantea L., hohes, ♂, k. Afrika.

glaucifolia Lagasc., blaugrünblättriges, ♂. f. Spanien.

gracilis DC., schlankes, ☉. f. ?

Gypsophila Dsf., gypskrautähnliches, 4. f. ?

halophila W. (*hispanica* Otth, *parviflora* Zea), Salinen-L., ♂. f. Spanien.

hirsuta Lag. (*sabuletorum* Lk., *hirsutissima* Otth), rauhaariges, ☉. f. Spanien.

hispida Dsf. (*disticha* W.), steifhaariges, ☉. f. Nordafrika, Italien.

iberica MB. (*divaricata* Sm.), iberisches, ☉. f. Iberien. Kleinasien.

imbricata Dsf., ziegeldachförmiges, ☉. f. Nordafrika.

inaperta L., ungeöffnetes, ☉. f. Südeuropa.

inclusa Hornem., eingeschlossenes, ☉. f. ?

indica Roxb., indisches, 4. k. Nepal.

inflata Sm. (*oleracea* Fic., *S. Cucubalus* Wib.), aufgeblasenes, 4. f. Europa.

β) alpina (Lam.). γ) Antelopum (Vest). δ) angustifolia (Tenor.). ε) glauca (W.) (? *saponariaefolia* Schott.).

italica P. (*silenoides* Vill., *Viscago clavata* Mch.), italienisches, 4. f. Südeuropa.

β) insubrica Gaud. (*viscosa* Schlchr.).

juvenalis Delil., jugendliches, ☉. f. Aegypten.

lacera Sims, schlitzblumiges, ♂. f. Caucasus.

laciniata Cav., geschlitztes, 4. k. Mexico.

laevigata Sm., kahles, ☉. f. Griechenland.

latifolia Hornem., breitblättriges, 4. f. ?

laxiflora Broter., lockerblumiges, ☉. f. Spanien, Portug.

Lerchenfeldiana Baumg., Lerchenfeld's, 4. f. Dinarische Alpen.

linicola Gmel. (*linaceola* Wib.), Lein-L., ☉. f. Süddeutschland.

linifolia W., flachslättriges, ☉. f. Spanien.

livida W. (*rubra* Vest), bläulichgraues, 4. f. Steyermark, Krain, österreichisches Litorale.

Loefflingiana H. Dresd., Loeffling's, ☉. f. ? Spanien.

longicaulis Pourr., langstengeliges, ☉. f. Spanien.

longiflora Ehrh. (*juncea* Roth), langblumiges, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen.

longipetala Vent. (*macropetala* Spgl.), langkroniges, ☉. f. Syrien.

marginata Schott, berandetes, ☉. f. ?

maritima W. (*uniflora* Roth, *amoena* Huds., Spgl.), Meerstrand's, ☉. f. England.

b) flore pleno Penny.

micrantha Lk., kleinblumiges, ☉. f. Portugal.

micropetala DC., kleinkroniges, ☉. f. ?

Mociniana DC., Mocini's, 4. k. Mexico.

mollissima Sm., weichblättriges, 4. f. Kleinasien.

multiflora P., vielblumiges, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen.

muricata H. Petrop., weichstacheliges, ☉. f. ? Südrussl.

Muscipula L., Fliegen-L., ☉. f. Italien, Spanien, Nordafrika.

Silene

- mutica Stev., unbespitztes, ☉. f. Caucasus.
 nemoralis W. Kit., Hain-L., 4. f. Deutschl., Ungarn.
 nicaeensis All. (*arenaria* Dsf., *villosa* Mch.), nizzaisches,
 ☉. f. Italien, Spanien, Nordafrika.
 β) viscosissima Tenor. γ) Psammitis Lk.
 noctiflora L., nachtblühendes, ☉. f. Mitteleuropa.
 nocturna L. (*setacea* Otth), nächtliches, ☉. f. Südeuropa,
 Nordamerika.
 nutans L., nickendes, 4. f. Europa.
 β) infracta W. K.
 nyctantha W., abendblumiges, ☉. f. ?
 obtusifolia W. (*colorata* Fisch.), stumpfblättriges, ☉.
 f. Nepal.
 ocymoides Dsf., basilicumbblätteriges, ☉. f. ?
 ornata Ait., zierendes, ☉. ♂. f. k. Cap der gut. Hoffn.
 Otites Sm., P., Hügel-L., 4. f. Europa.
 ovata Pursh, eiförmiges, 4. f. b. k. Carolina.
 paradoxa L., wunderbares, 4. f. Italien.
 parvifolia Otth, kleinblättriges, ♂. f. ?
 parviflora P. (Ehrh.), kleinblumiges, 4. f. Ungarn,
 Siebenbürgen, Illyrien.
 patula Dsf., abstehendes, 4. f. b. Nordafrika.
 pelidna Rchb., bleifarbiges, 4. f. ? Caucasus.
 pendula L. (*crispa* Mch., *Agrostemma humilis* Hort.),
 überhängendes, ☉. f. Südeuropa.
 pensylvanica Mchx., pensylvanisches, 4. f. Nordamer.
 perfoliata Otth (*Cucubalus chloraefolius* Poir.), durch-
 wachsenes, ♂. f. Südeuropa.
 pernoctans Lk., Nacht-L., ☉. f. ? Portugal.
 petraea W. K., Stein-L., 4. f. Ungarn.
 pilosa Spgl. (*Cucubalus mollissimus* WK.), weichhaariges,
 4. f. Italien, Ungarn, Siebenbürgen.
 pinguis Hornem., fettes, ☉. f. Südeuropa.
 polyphylla L., vielblättriges, ♂. 4. f. Siebenbürgen.
 portensis L., portoisches, ☉. f. Portugal.
 Pourretii Poir. (*ciliata* Pour., *arvatica* et *legionensis*
 Lagasc.). Pourret's, ☉. f. Spanien.
 procumbens Murr. (*Cucubalus polyphyllus* Fisch.), lie-
 gendes, 4. f. Sibirien.
 Pseudatocion Dsf., stendelblumiges, ☉. f. Sicilien,
 Nordafrika.
 pubescens Lois, feinhaariges, ☉. f. Corsica.
 Pumilio Wulf., niedriges, 4. f. b. Carnische, norische
 und rhätische Alpen.
 quadridentata DC. (*quadrifida* L.), vierzähniges, 4. f.
 Mittel- und osteuropäische Alpen.
 β) pusilla W. K. γ) pudibunda Hffmssgg.
 quinquevulnera L., fünffleckiges, ☉. f. England, Mittel-
 und Südeuropa.
 ramosa Otth (*ramosissima* Sm.), ästiges, ☉. f. Creta.
 ramosissima Dsf., starkästiges, ♂. f. k. Nordafrika.
 regia Sins, königliches, 4. f. Nordamerika.
 repens Patr., kriechendes, 4. f. Sibirien.
 Requierii Otth, Requier's, 4. f. b. Corsica.
 reticulata Dsf., genetztes, ☉. ♂. f. k. Nordafrika.
 rubella L., röthliches, ☉. f. Aegypten, Portugal.
 rupestris L. (*Kaulfussii* Spgl.), felsenliebendes, 4. f.
 Mittel- und nordeuropäische Alpen.
 ruthenica Otth, russisches, 4. f. Rußland.

Silene

sardoa Moris, sardinisches, ☉. f. Sardinien.

saxatilis MB., Gesteins-L., 4. f. Caucasus, Sibirien.

β) tenuis W.

Saxifraga L., steinbrechartiges, 4. f. Mitteleuropäische Voralpen.

Schafta Gmel., Schafta-L., 4. f. Sibirien.

secundiflora Otth, einseitsblumiges, 4. f. Syrien.

sedoides Jacq., sedumähnliches, ☉. f. Frankr., Italien.

sericea All., seidenhaariges, ☉. f. Italien.

?serotina Hort., spätblumiges, ☉. f. ?

sibirica P., sibirisches, 4. f. Caucasus.

spathulata MB., spathelblättriges, ♂. f. Caucasus.

spergulifolia MB., sparkblättriges, 4. f. Caucasus, Armenien.

Steveni ?Spgl., Steven's, 4. f. Caucasus.

stricta L., steifes, ☉. f. Südfrankreich.

stylosa Loud., langgriffeliges, 4. f. ?

suavis Schrad., feinriechendes, ?☉. f. ?

subvinosa H. Monspel. (?narbonensis Hort.), Wein-L., ☉. f. Südfrankreich.

supina MB., niedergestrecktes, 4. f. k. f. b, Taurien, Caucasus.

tatarica P., tatarisches, 4. f. Neumark, Rußl., Sibirien.

tenuifolia Otth, feinblättriges, ☉. f. Dahurien.

tridentata Dsf., dreizähniges, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

trinervia Sebast., dreinerviges, ☉. f. Mittelitalien.

undulata Ait., wellenblättriges, ♂. k. Cap der gut. H.

Urvillei Schott., Urville's, f. k. Griechenland.

vallesia L., Walliser-L., 4. f. Schweiz, Piemont.

vesicaria Schrad., blasiges, ?♂. f. ?

vespertina Retz (*bipartita* Dsf., *colorata* Poir.), vesperblumiges, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nordafrika.

viridiflora L., grünblumiges, ♂. f. k. Taurien.

viscaginoides Hornem., viscagoähnliches, 4. f. Dahurien.

viscosa P., schmieriges, ♂. f. Nord- u. Osteuropa, Cauc.

volgensis Spgl., wolgaisches, 4. f. Rußland.

Zawadzki Herbach, Zawadzki's, 4. f. Galicien.

baccifera Roth v. *Cucubalus bacciferus*.

Siler Scop., Silerkraut, V. II., Umbelliferae.

trilobum Scop. (*aquilegifolium* G.), dreilappiges, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa, Sibirien.

caucasicum Spgl. vid. *Agasyllis caucasica* Nachtr.

montanum Crtz v. *Laserpitium Siler. salsum* Spgl. v. *Palimbria salsa* Nachtr.

Silphium L., Silphie, XIX. IV., Compositae-Corymbiferae.

Asteriscus L. (*scabrum* Walt.), sternblumenartige, 4. f. Nordamerika.

atropurpureum Retz, dunkelpurpurrothe, 4. f. Nordam.

compositum Mchx. (*laciniatum* Walt.), kleinblumige, 4. f. Nordamerika.

conjunctum W., verbundene, 4. f. Nordamerika.

connatum L., verwachsene, 4. f. Nordamerika.

erythrocaulon Bernh., rothstengelige, 4. f. Nordamer.

glaucum Weinm. (*Coreopsis latifolia* Mchx.), blaugrüne, 4. f. Nordamerika.

Hornemanni DC. (*Asteriscus* Hornem., *connatum* Dsf.), Horneimann's, 4. f. Nordamerika.

laciniatum L. (*dissectum* Poir.), schlitzbblätterige, 4. f. Nordamerika.

Silphium

- perfoliatum L., durchwachsene, 4. f. Nordamerika.
 pumilum Mchx. (*tomentosum* Pursh.), kleine, 4. f. Nordamerika.
 quercifolium DC., eichenblättrige, 4. f. ?
 terebinthinaceum L. supp., terpeninriechende, 4. f. Nordamerika.
 ternatum Retz, dreizählige, 4. f. Nordamerika.
 trifoliatum L. (*ternifolium* Mchx.), dreiblättrige, 4. f. Virginien, Carolina.

Silybum Vaill. G., Mariendistel, XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

I. *Alfredia* Cass.

- cernuum G., übergebogene, 4. f. Sibirien.

II. *Genuin*.

- marianum G., officinelle, ♂. f. Mitteleuropa.

a) flore albo. b) flore purpureo.

atriplicifolium Fisch. v. *Rhaponticum atriplicifolium*.

Simaba Aubl. (guianischer Name), X. I., Tricoccae-Simarubeae.

- guianensis Aubl., guianische, ♀. Guiana.
 orinocensis H. B. K., Orinoco-S., ♀. Südamerika.

Simaruba Aubl. (guianischer Name), X. I., Tricoccae-Simarubeae.

- excelsa DC., hohe, ♀. w. Jamaica.
 officinalis DC. (*amara* Aubl.), officinelle, ♀. w. Guiana, Caribäen.

Simsia P. (J. Sims, berühmter englischer Botaniker), XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

- amplexicaulis P., stengelumfassende, 4. f. ?

ficifolia P. v. *Ximenesia foetida*.

Sinapis T., Senf, XV. III., Cruciferae.

- alba L., weißer, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.
 Allionii Jacq., Allione's, ☉. f. Aegypten.
 amplexicaulis DC., stengelumfassender, ☉. f. Sicilien, Numidien.
 apula Tenor., apulischer, ☉. f. Süditalien.
 arvensis L., Acker-S., ☉. f. Europa.
 auriculata DC., geöhrt, ☉. f. ?
 brassicata L., kohlblättriger, ☉. f. China.
 cernua Thbg., übergebogener, ☉. f. Cap der gut. H.
 chinensis L., chinesischer, ☉. f. China.
 dissecta Lag., schlitzblättriger, ☉. f. Spanien.
 foliosa W., blattreicher, ☉. f. Levante.
 frutescens Ait. (*Hesperis diffusa* Banks), strauchiger, ♀. k. Madeira.
 geniculata Dsf., gegliederter, ☉. f. Nordafrika.
 hastata Dsf., spontonförmiger, ☉. f. Neuholland.
 hispida Schousb. (*flexuosa* Lam.), steifhaariger, ☉. f. Marocco.
 integrifolia W., ganzblättriger, ☉. f. Ostindien.
 juncea L., binsenförmiger, ☉. f. China.
 Kaber DC., Kaber-S., ☉. f. Persien.
 laevigata L. (*campestris* Jacq. fil.), glatter, ☉. f. Spanien, Portugal.
 nigra L., schwarzer, ☉. f. Europa, Mittelasien.
 β) turgida P. γ) torulosa P. δ) villosa Murr.
 ε) laevigata Burm.
 nudicaulis Lagasc., nacktstengeliger, 4. f. Spanien.

Sinapis

orientalis L., morgenländischer, ☉. f. Südeuropa, Spanien, Levante.

pekinensis Lour., pekin'scher, ☉. f. China.

pubescens L., weichhaariger, 4. ♀. k. Spanien, Süditalien, Griechenland.

ramosa Roxb., ästiger, ☉. f. Ostindien.

retrohirsuta Bess., rückwärtshaariger, ☉. f. ?Volhynien.

subbipinnatifida Lag., fiederspaltiger, ☉. f. Spanien.

turgida Delil. (*Raphanus turg.* P.), aufgeschwollener, ☉. f. Aegypten.

bipinnata Dsf. v. *Didesmus bipinnatus*. *crassifolia* Raf. (et *tenuifolia* RB.) vid. *Diplotaxis crassifolia* etc. *Cheiranthus* K. (*recurvata* All., *Tournefortii* All.) vid. *Brassica Cheiranthus*. *Eruca* Röhl vid. *Eruca sativa*. *hispanica* L. v. *Erucaria tenuifolia*. *heterophylla* Lagasc. v. *Erucastrium heterophyllum* Nachtr. *incana* L. (*taurica* MB., *persica* Fisch.) v. *Erucastrium incanum*. *pyrenaica* L. vid. *Sisymbrium acutangulum*.

Sinningia Helleri N. E. etc. v. *Gloxinia Helleri* etc.

Siphocampylus D. et G. Don v. *Lobelia*.

Siphonanthus indica L. v. *Clerodendron Siphonanthus*.

Siphonia Rich., Kautschuckbaum, XXI. x. (XVI. vi.)
Tricoccae-Euphorbiaceae.

elastica P. (*Cahuchu* Rich.), elastischer, ♀. w. Guiana, Brasilien.

Sison L. K., Süßdolde, V. II., Umbelliferae.

Amomum L., gewürzhafte, ♂. f. England, Südeuropa.
capillaceus Spgl., haarförmige, ☉. f. Carolina, Hispaniola.
flexuosus Tenor., gebogene, ♂. 4. f. Neapel.

Ammi L. etc. v. *Helosciadium Ammi* etc. *Anisum* Spgl. v. *Tragium Anisum*. *arvensis* Brot. (*segetum* L.) etc. vid. *Petroselinum segetum* etc. *aureus* Spgl. v. *Zizia aurea*. *canadense* L. v. *Conopodium canadense*. *crinitum* Pall. vid. *Schultzia crinita*.
Podagraria Spgl. v. *Aegopodium Podagraria*. *verticillatum* L. v. *Carum verticillatum*.

Sisymbrium T., Rauke, XV. III., Cruciferae.

1. Genuin.

acutangulum DC. (*sinapoides* RB.), spitzkantige, ♂. f. Schweiz, Frankreich, Italien.

asperum L., rauhe, ☉. f. Westeuropa.

atrovirens Hornem., schwarzgrüne, ☉. f. China.

austriacum Jacq., österreichische, ♂. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

β) *eckartsbergense* W. (*multisiliquosum* Hoffm.).

γ) *Tillieri* Bell. (*erysimifolium* Pourr.).

brachycarpum Richards., kurzschotige, ☉. f. Nordamer.

bursifolium L., täschelkrautblättrige, ☉. f. Sicilien, Pyren.

canescens Nutt., grauliche, ☉. f. Nordamerika.

Columnae Jacq., Columna's, ♂. f. Süd- u. Osteuropa.

β) *altissimum* L.

contortum Lag., gedrehte, ♂. f. Spanien.

contortuplicatum DC., ineinandergefaltete, ☉. f. Südrußland, Albanien.

crassifolium Cav., dickblättrige, ♂. f. Spanien.

Cummingianum Fisch. et Mey., Cumming's, ☉. f. Chili.

erysimoides Dsf. (*rigidulum* Lag.), hederichähnliche, ☉. f. Nordafrika.

Sisymbrium

fugax Lagasc., hinfällige, ☉. ♂. f. Spanien.
gallicum W., französische, ☉. f. Frankreich.
hirsutum Lag., rauhhaarige, ☉. f. Spanien.
hispanicum Jacq., spanische, ♂. f. Westeuropa.
incanum Bernh. (*canescens* Hook.), weißgraue, ☉. f. Nordamerika.

Irio L. (*glabrum* W.), langblättrige, ♂. f. England, Süd- und Osteuropa.

junceum MB., simsenförmige, ♂. f. Osteuropa, Sibirien.

Millefolium Ait., garbenblättrige, ♀. k. Teneriffa.

nitidum Zea (*Zea* Spgl.), glänzende, ☉. f. Spanien.

pannonicum Jacq. (*Sinapeos* Retz, *Sinapistrum* Crtz) ungarische, ♂. f. Süd-, Ost- und Westeuropa.

β) affine W.

persicum Spgl., Bernh., persische, ☉. f. Persien.

pinnatifidum DC. (*bursifolium* Gouan, *dentatum* All.), fiederspaltige, 4. f. Südeuropa.

pumilum Steph., kleine, ☉. f. Nordpersien, Caucasus.

Sophia L. (*parviflorum* Lam.), feinblättrige, ☉. f. Europa.

strictissimum L., steifste, ☉. f. Mitteleuropa.

subhastatum W., spontonblättrige, ☉. f. Griechenland.

taraxacifolium DC., löwenzahnblättrige, ♂. f. Südfrankreich, Spanien.

torulosum Dsf., holperige, ☉. f. Nordafrika, Griechenl.

tripinnatum DC., dreifiederige, ☉. f. Cap d. gut. H.

II. *Arabidopsis* DC. K.

Thalianum Monn., Gay., Gaud. (*Conringia Thaliana* Rchb.), Thal's, ☉. f. Europa, Mittelasien, Nordamer.

III. *Huegeninia* Rchb.

tanacetifolium L., rainfarnblättrige, 4. f. Schweiz, Italien, Frankreich.

IV. *Velarum* DC.

corniculatum Cav., kleinhörnige, ☉. f. Spanien.

officinale Scop., officinelle, ☉. f. Europa, Nordamerika, Nordafrika.

polyceraton L., vielhörnige, ☉. f. Südeuropa.

rigidum MB. (*cornutum* Pall.), starre, ☉. f. Taurien, Sibirien.

runcinatum Lag., schrotsägenförmige, ☉. f. Spanien.

supinum L., niedrige, ☉. f. Oeland, Frankreich.

amphibium L. (et *Nasturtium* L.) etc. vid. *Nasturtium*

amphibium, officinale etc. *Barbarea* L. vid.

Barbarea plantaginea. *catholicum* L. etc. v. *Diplo-*

taxis catholica. *Erucastrum* Poll. (et *obtusangulum*

Schlchr.) vid. *Erucastrum* Pollichii et *obtusang.*

filifolium W. vid. *Leptaleum filifolium*. *integrifo-*

lium L. (et *pectinatum* Fisch. et *Sieversianum* Re-

dowsk.) v. *Andreoskia integ.*, *pectin.* et *eglandulosa*.

monense Gmel. vid. *Brassica Cheiranthus*. *Loeselii*

L. vid. *Leptocarpaea Loeselii*. *valentinum* L. vid.

Brassica valentina. *Tilesii* Ledeb. vid. *Arabis*

ambigua.

Sisyrinchium L., Schweinsrüssel, III. 1. (XVI. 1.), Irideae

anceps L. (*gramineum* Curt.), flügelstengeliger, 4. f. k. Virginien, Canada.

aphyllum Spgl., blattloser, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

bermudianum Mill., L., bermudischer, 4. k. Bermud. Ins.

californicum Spgl., californischer, 4. k. Californien.

chilense Hook., chilesischer, 4. k. Chili.

Sisyrinchium

convolutum Nocc., zusammengerollter, 4. k. Cap der guten Hoffnung, Südamerika.

Cummingii Penny, Cumming's, 4. k. Südamerika.

Douglasii Alb. Diet. (*grandiflorum* Dougl. non Cav.), Douglas's, 4. k. f. Nordamerika.

elegans W., zierlicher, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

flexuosum Spgl., gebogener, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

glaucophyllum Penny, blaugrünblättriger, 4. f. Nordam.

graminifolium Lindl., grasblättriger, 4. k. Chili.

β) pumilum Lindl.

guttatum Moris (? *maculatum* Hook.), getüpfelter, 4. k. Chili.

hirtellum Penny, kurzhaariger, 4. f. k. Nordamerika.

iridifolium H. B. K., grasblättriger, 4. k. t. Südamer.

laxum Lk., lockerer, 4. k. t. Südamerika.

lutescens Lodd., gelblicher, 4. k. ?

luteum Fisch., gelber, 4. k. t. ? Südamerika.

macrocephalum Hort., grofsköpfiger, 4. k. ?

maculatum Hook., gefleckter, 4. k. Chili.

micranthum Cav., kleinblumiger, 4. t. Südamerika.

mucronatum Mchx., weichspitziger, 4. k. t. Nordamer.

Nuttalli Swt. (*bermudianum* Nutt.), Nuttall's, 4. k. f. Nordamerika.

odoratissimum Lindl., wohlriechendster, 4. k. Chili.

palmifolium L. (*racemosum* P.), palmenblättriger, 4. w. Brasilien, Peru.

pedunculatum Gill., langstieliger, 4. k. Chili.

plicatum Spgl. (*latifolium* Sm., *palmifol.* Cav.), gefalteter, 4. Kn. w. Westindien.

speciosum Hook., prächtiger, 4. w. Chili.

striatum Sm. (*spicatum* Cav.), gestreifter, 4. k. f. b. Mexico.

tenuifolium H. B. K., feinblättriger, . k. Mexico.

collinum Cav. v. *Homeria collina*. *gladiatum* Spgl. v. *Bobartia gladiata*. *ixioides* Forst. vid. *Libertia ixioides*.

Sium T., Merk, V. II., Umbelliferae.I. *Berula* K.

angustifolium L. (*erectum* Huds.), schmalblättriger, 4. Wa. f. Europa, Caucasus.

II. *Genuin*.

ferulaefolium Spgl., steckenkrauthblättriger, 4. Kn. f. b. k. Cypern, Creta, Nordafrika.

lancifolium MB., lanzettblättriger, 4. Wa. f. Volhynien, Ukraine.

latifolium L., breitblättriger, 4. Wa. f. Europa.

lineare Mchx. (*longifolium* Pursh), gleichbreitblättriger, 4. f. Nordamerika.

peucedanoides Spgl., haarstrangblättriger, 4. f. Cauc.

Sisarum L., Zuckerwurz-M., 4. Kn. f. Ostasien.

Bulbocastanum L. etc. vid. *Carum Bulbocastanum* etc. *Falcaria* L. vid. *Falcaria Rivini*. *inundatum* Roth etc. v. *Helosciadium inundatum* etc. *rigidius* L. v. *Pastinaca rigida*. *Saxifragum* Roth v. *Ptychotis heterophylla*. *siculum* L. v. *Brignolia panicifolia*. *Silaus* Roth v. *Silaus pratensis*.

Skinnera excorticata Forst. v. *Fuchsia excorticata*.

Sloanea Plum. (Hans Sloane, berühmter englischer Naturforscher), XIII. I., Tiliaceae.

dentata L. (*Plumierii* Aubl.), gezahnte, f. w. Südamer.

Sloanea

sinemariensis Aubl. (*Aubleti* Sw.), Aublet's, ♂. w. Caribäen, Guiana.

Smeathmannia Soland. (Smeathmann, ein Engländer, welcher Afrika bereiste), XIII. VI., Passifloreae.

laevigata Sol., glatthlätterige, ♂. w. Sierra Leone.

Smilacina Dsf., Maieblümlein, VI. I., Asparagineae.

I. *Genuina*.

borealis Sims (*Dracaena boreal.* Ait.), nördliche, 4. f. Nordamerika.

ciliata Dsf., gefranzte, 4. f. Nordamerika.

dahurica Turcz., dahurische, 4. f. Dahurien.

racemosa Dsf., traubige, 4. f. Nordamerika.

ramosa G. Don, ästige, 4. f. Sibirien.

stellata Dsf., sternförmige, 4. f. Nordamerika.

trifolia Dsf., dreiblätterige, 4. f. Nordamerika.

umbellata Dsf., doldige, 4. f. Nordamerika.

II. *Majanthemum* Wigg.

bifolia Dsf., zweiblätterige, 4. f. Europa, Asien.

canadensis Pursh, canadische, 4. f. Nordamerika.

Smilax T., Stechwinde, XXII. VI. (VI. I.), Asparagineae-Smilaceae.

acuminata W., zugespitzte, ♂. Sch. w. Westindien.

Alpini W., Alpin's, ♂. Sch. k. Griechenland.

aspera L., rauhe, ♂. Sch. k. f. b. Südeuropa, Syrien.

b) *auriculata*.

australis RB., neuholländische, ♂. Sch. t. k. Neuholland.

Bona nox L. (*variegata* Walt.), bunte, ♂. Sch. k. Carolina.

brasiliensis Spgl., brasilianische, ♂. Sch. w. Brasilien.

caduca L., hinfällige, ♂. Sch. f. Nordamerika.

canariensis W., canarische, ♂. Sch. k. Teneriffa.

catalonica Poir. (*bermudensis* Duham.), catalonische, ♂.

Sch. k. f. b. Spanien.

China L., China-S., ♂. Sch. k. China, Japan.

cumanensis H. B. K., cumanische, ♂. Sch. w. Cumana, Jamaica.

excelsa L., hohe, ♂. Sch. k. Caucasus, Kleinasien.

glabra Roxb., kahle, ♂. Sch. w. Ostindien.

glauca Walt., blaugrüne, ♂. Sch. k. Carolina.

glycyphylla Sw., süßblätterige, ♂. Sch. k. t. Neuholl.

hastata W. (*bona nox* Mchx.), spontanblätterige, ♂. Sch. k. Südcarolina, Florida.

havanensis Jacq., havanaische, ♂. Sch. w. Cuba.

herbacea L., krautartige, 4. Sch. f. b. k. Nordamer.

horrida Dsf., dichtstachelige, ♂. Sch. f. b. k. Nordamer.

lanceolata Walt., lanzettblätterige, ♂. Sch. k. f. b. Nordamerika.

latifolia RB., breitblätterige, ♂. Sch. k. t. Neuholland.

laurifolia L., lorbeerblätterige, ♂. Sch. k. Virgin., Carol.

longifolia Rich., langblätterige, ♂. Sch. w. Cayenne.

maculata Roxb., gefleckte, ♂. Sch. t. Nepal.

mauritanica Poir. (*excelsa* Duh.), mauritanische, ♂. Sch. k. Nordafrika.

nigra W., schwarze, ♂. Sch. k. Spanien, Portugal.

ovalifolia Roxb., eiblätterige, ♂. Sch. w. Ostindien.

peduncularis Mühlbg. (*humilis* Mill., *pulverulenta* Mchx.), langstielige, 4. Sch. k. f. b. Nordamerika.

prolifera Roxb., sprossende, ♂. Sch. w. Ostindien.

Pseudochina L., unächte S., ♂. Sch. k. Virgin., Jamaica.

puber Mchx., weichhaarige, ♂. Sch. k. Carolina, Georgia.

Smilax

quadrangularis Mühlbg., vierkantige, ♀. Sch. k. f. b. Nordamerika.

sagittaeifolia Lodd., pfeilblättrige, ♀. Sch. k. China.

rotundifolia L., rundblättrige, ♀. Sch. k. f. b. Nordamer.

Roxburghiana DC., Roxburgh's, ♀. Sch. w. Ostindien.

rubens Wats., röthliche, ♀. Sch. k. f. b. Nordamer.

Sarsaparilla L., Sassaparillen-S., ♀. Sch. k. Virginien.

syphilitica H. B. K., antisiphilitische, ♀. Sch. w. Südamer.

tamnoides L. (*tamniifolia* Mchx.), schmeerwurzähnliche, 4. Sch. f. Nordamerika.

virginiana Mill., virginische, ♀. Sch. k. Virginien.

Walteri Pursh, Walter's, ♀. Sch. k. Virginien, Carolina.

Watsoni Swt. (*longifolia* Wats.), Watson's, ♀. Sch. k. f. b. Nordamerika.

zeylanica L., ceylonische, ♀. Sch. w. Ostindien.

Smithia Ait. (J. E. Smith, berühmter englischer Botaniker), XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

conferta Sm., gedrängte, ☉. f. Neuholland.

geminiflora Roth, paarblumige, ☉. w. Ostindien.

sensitiva Ait., empfindsame, ☉. w. Ostindien.

Smyrnia T., Myrrhendolde, V. ii., Umbelliferae.

apiifolium L., sellerieblättrige, 4. f. b. k. Creta.

cicutarium MB., cicutaähnliche, 4. f. Caucasus.

cordatum Walt. (*trifoliatum* Bartr.), herzblättrige, 4. f. Nordamerika.

Dodonaei Spgl. (*perfoliatum* L., *ramosum* Urv.), Dodonaeus's, ♂. f. Spanien, Italien, Griechenland.

integerrimum L. (*Sison integ.* Spgl.), einfache, 4. f. Nordamerika.

nudicaule MB., nacktstängelige, 4. f. Caucasus.

Olusatrum L., schottische, ♂. f. England, Frankreich, Italien, Griechenland.

perfoliatum Mill. (*Dioscoridis* Spgl.), durchwachsene, ♂. f. Süd- und Osteuropa.

aureum L. vid. *Zizia aurea*. *atropurpureum* Lam.

vid. *Cnidium atropurpureum*. *nodiflorum* All. vid.

Trochiscanthes nodiflora. *nudiflora* Pursh v. *Pastinaca nudicaulis*.

Sobolewskia MB. (Gregor Sobolewski, russischer Botaniker), XV. i., Cruciferae.

lithophila MB., steinliebende, ♂. f. Taurien, Mittelasien.

Soja Mch. (japanischer Name), XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

hispida Mch., steifhaarige, ☉. Sch. w. Ostindien.

Solandra Sw. (Solander, englischer Botaniker), V. i., Solanaceae.

grandiflora Sw., großblumige, ♀. ♀. Sch. w. Jamaica.

guttata D. Don, betropfte, ♀. w. Mexico.

nitida Zucc., glänzende, ♀. ♀. Sch. w. Ostindien.

oppositifolia Hort., gegenblättrige, ♀. w. Ceylon.

viridiflora Ker, grünblumige, ♀. w. Brasilien.

Solanum T., Nachtschatten, V. i., Solanaceae.

acetosaefolium Lam. (*trilobatum* Burm.), sauerampferblättrige, ♀. w. Ostindien.

aculeatissimum Jacq., starkstacheliger, ♀. w. Südamer.

aethiopicum L. (*torulosum* Mch.), aethiopischer, ☉. f. Afrika, Südasien.

aggregatum Jacq. (*Atropa solanacea* L.), angehäufter, ♀. k. t. Westindien, Cap der guten Hoffnung.

Solanum

- Anguivi Lam., madagascarischer, 4. $\frac{1}{2}$. Kn. w. Madagascar.
 angulatum R. et P. (*quitense* Lam.), kantiger, $\frac{1}{2}$. w. Peru.
 appendiculatum H.B.K., Dun., anhängseliger, $\frac{1}{2}$. w. Mexico.
 arboreum H.B.K., Dun., baumartiger, $\frac{1}{2}$. w. Neugranada.
 argenteum Dun., silberfarbiger, $\frac{1}{2}$. w. Brasilien.
 armatum RB., bewaffneter, $\frac{1}{2}$. k. t. Neuholland.
 astroides Jacq., sternblumiger, $\frac{1}{2}$. w. ?
 auriculatum Ait., geöhrt, $\frac{1}{2}$. w. Madagascar, Mascaren.
 bahamense L., bahamischer, $\frac{1}{2}$. k. t. Bahamische Inseln.
 Balbisii Dun. (*decurrens* Balb., *viscosum* Lag., *inflatum* Hort., *brancaefolium* Jacq.), Balbis's, $\frac{1}{2}$. w. Südamer.
 Besseri Weinm., Besser's, $\odot$. f. Amerika.
 betaceum Cav. (*crassifolium* Ortega.), dickblättriger, $\frac{1}{2}$. w. Südamerika.
 bombense Jacq., bomba'scher, $\frac{1}{2}$. k. Mexico, Südamerika.
 bonariense L., bonarischer, $\frac{1}{2}$. k. Buenos-Ayres.
 brasiliense Dnn., brasilianischer, $\frac{1}{2}$. w. Brasilien.
 Brownii Dun. (*violaceum* RB.), Brown's, $\frac{1}{2}$. k. t. Neuholl.
 calycinum Sess., großkelchiger, $\frac{1}{2}$. w. Mexico.
 campanulatum RB., glockiger, $\odot$. 4. f. m. k. Neuholland.
 campechiense L. (*acanthifolium* Mill.), rothstacheliger, $\frac{1}{2}$. w. Neuspanien.
 carolinense L., carolinischer, $\odot$. f. m. Carolina.
 Cervantesii Lag., Cervantes's, $\frac{1}{2}$. k. t. Mexico.
 cestrifolium Jacq., hammerstrauchblättriger, $\frac{1}{2}$. w. ?
 chenopodioides Lam., gänsefußähnlicher, $\odot$. f. Chili.
 ciliatum Lam. (*ciliare* W., *pentapetaloides* Hort.), gefranzter, $\frac{1}{2}$. w. ?
 cinereum RB., aschfarbiger, 4. $\frac{1}{2}$. k. Neuholland.
 coagulans Forsk., gerinnendmachender, $\frac{1}{2}$. t. w. Oberägypten, Arabien.
 coccineum Jacq., scharlachfarbiger, $\frac{1}{2}$. w. Westindien.
 congense Lk., Congo-N., $\frac{1}{2}$. w. Congo.
 corymbosum Jacq., doldentraubiger, 4. $\frac{1}{2}$. w. Peru.
 crispum R. et P., krauser, $\frac{1}{2}$. k. Chili.
 cuneifolium Dun., keilblättriger, $\frac{1}{2}$. w. Hispaniola, Cayenne.
 dealbatum Lindl., weißlicher, $\frac{1}{2}$. t. Chili.
 Dillenii Schult. (*patulum* P.), Dillens, $\odot$. f. Ungarn.
 diphyllum L., zweiblättriger, $\frac{1}{2}$. w. Westindien.
 diversifolium Bonpl., verschiedenblättriger, $\frac{1}{2}$. w. Caracas.
 Dulcamara L., Bittersüßs-N., 4. $\frac{1}{2}$. Sch. f. Europa.
 b) fl. albo. c) fol. argenteo-variegat. d) fol. aureo-variegat.
 elaeagnifolium Cav., oleasterblättriger, $\frac{1}{2}$. k. Chili.
 elatum Lk. (*laurifolium* Hort.), hoher, $\frac{1}{2}$. w. ?
 esculentum Dun. (*insanum* et *Melongena* L., ? *longum* Roxb.), genießbarer, $\odot$. f. m. Südasien und Afrika.
 etuberosum Lindl., knollenloser, 4. f. b. Chili.
 fastigiatum W., gipfelständiger, $\frac{1}{2}$. k. Mexico.
 ferox L., kelchstacheliger, 4. w. Ostindien.
 ferrugineum Jacq., rostfarbiger, $\frac{1}{2}$. t. k. Südamerika.
 flavescens Dun., gelblicher, $\frac{1}{2}$. w. Trinidad.
 flavum Kit. (*ochroleucum* Dun.), gelbbeeriger, $\odot$. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.
 fragrans Hook., wohlriechender, $\frac{1}{2}$. w. Brasilien.
 fugax Jacq., vergänglichlicher, $\frac{1}{2}$. w. Südamerika.
 fuscum L., braunstieler, $\odot$. f. m. Südamerika.
 giganteum Jacq., riesenhafter, $\frac{1}{2}$. k. Cap der gut. H.
 glutinosum Dun., klebriger, $\frac{1}{2}$. w. ?

Solanum

- gracile Otto, schlanker, f. t. ? Südamerika.
 guineense Lam., afrikanischer, O. f. Guinea.
 havanense Jacq., Havanna-N., f. w. Westindien, Südamer.
 Herbertianum Paxt., Herbert's, f. w. ?
 heterotrichum Dun., verschiedenhaariger, f. w. Südamer.
 hirtum Vahl, haariger, f. w. Trinidad.
 Hookerianum Spgl. (*coriaceum* Hook.), Hooker's, f. t.
 w. Mexico.
 humile Bernh., niedriger, O. f. Mittel- und Südeuropa.
 hybridum Jacq., Bastard-N., f. w. Guinea.
 Jacquinii W., Jacquin's, O. f. m. w. Ostindien.
 jamaicense Sw., jamaicaischer, f. w. Jamaica.
 igneum L. (*cuneatum* Mch.), feuerfarbiger, f. w. Westind.
 incanum L. (*zeylanicum* Lam.), weißgrauer, f. w.
 Mascarenas, Ceylon.
 indicum L., indischer, f. w. Ostindien, Mascarenas.
 Kitaibelii Schult., Kitaibel's, O. f. Ungarn.
 laciniatum Ait. (*pinnatifidum* Lam., *reclinatum* L'Her.,
aviculare Forst), schlitzblättriger, 4. f. k. Neuhol-
 land, Neuzeeland.
 b) herbaceum.
 lanceaefolium Jacq., lanzettblättriger, f. w. Westind.
 lanceolatum Cav. (*mexicanum* Sess.), lanzettlicher, f.
 k. Mexico.
 laurifolium L., lorbeerblättriger, f. w. Südamerika.
 lentum Cav., zäher, f. Sch. w. Südamerika.
 Lichtensteinii W., Lichtenstein's, f. Sch. k. C. d. g. H.
 ligustrinum Lodd., ligusterähnlicher, f. k. Chili.
 litorale Lk., Seestrand-N., 4. f. Sch. f. Europa.
 lividum W., schlagblauer, f. w. Madagascar.
 longiflorum Vahl (*longifolium* Dun.), langblumiger, f.
 w. Guiana.
 lycioides L. (*candicans* Dun.), bocksdornähnlicher, 4. f.
 w. Peru.
 macrocarpum L., großfrüchtiger, f. w. Südamerika.
 mammosum L. (*villosissimum* Zuccag.), zitzenfrüchtiger,
 O. m. f. Carolina, Westindien.
 marginatum L., berandeter, f. k. Südafrika.
 melanoxylon Lk., schwarzholziger, O. m. f. w. ?
 Milleri Jacq. (*capense* Spgl.), Miller's, f. k. C. d. g. H.
 miniatum Bernh. (*alatum* Mch., *puniceum* Gmel.), men-
 nigrother, O. f. Mittel- und Südeuropa.
 molle Bonpl., weicher, f. w. Neugranada.
 monanthum R. et S. (*uniflorum* Lag.), krummstiel-
 blumiger, 4. w. Neuspanien.
 muricatum Ait. (*variegatum* R. et P., *scabrum* Lam.),
 weichstacheliger, f. w. Peru, Chili.
 myriacanthum Dun., tausendstacheliger, f. w. ?
 myrtifolium Lodd., myrtenblättriger, f. t. ?
 neglectum Dun., übersehener, f. w. Westindien, Südamer.
 nigrum L., gemeiner, O. f. Europa, Asien, Afrika etc.
 nodiflorum Jacq., knotenblumiger, f. w. Westindien,
 Mascarenas.
 obtusifolium Bonpl., stumpfblättriger, f. k. t. Mexico.
 ochroneuron Lk., braunwolliger, f. w. Brasilien.
 β) macracanthum.
 oleraceum Rich., Gemüse-N., O. f. Südeuropa, Brasil.
 oliganthum Lk., ? Humb. (*laurifolium* Hort.), wenig-
 blumiger, f. w. Südamerika.

Solanum

- oporinum W. (*macrophyllum* Dun., *cymosum* Orteg.),
 netzartiger, ♀. k. t. Mexico.
 ovigerum Dun. (*Melongena* Murr.), eiertragender, ☉.
 m. f. Arabien.
 a) violaceum. b) album. c) luteum. d) rubrum.
 pentadactylum G. Don, fünffingeriger, ♀. w. Trinidad.
 platanifolium Sims, platanusblättriger, ♀. w. Südamer.
 polyacanthum Lam. (*parviflorum* Cav.), vielstacheliger,
 ♀. w. Westindien.
 Pseudocapsicum L., beisbeerenartiger, ♀. k. Madeira.
 pterocaulon Dun. (*melanocerasum* W., *judaicum* Bess.),
 flügelstengeliger, ☉. f. England, Süd- u. Osteuropa etc.
 pubescens W., weichhaariger, ♀. w. Ostindien.
 pubigerum Dun., zarthaariger, ♀. k. t. Mexico.
 pungentium RB., stechender, ☉. m. f. Neuholland.
 pygmaeum Cav., zwergiger, ☉. f. Buenos-Ayres.
 pyracanthum Lam. (*Pyracantha* Sm., *runcinatum* Wendl.),
 feuerrothstacheliger, ♀. w. Madagascar.
 β) inerme.
 quadrangulare Thbg., vierkantiger, ♀. k. Cap d. g. H.
 quercifolium L. (*runcinatum* R. et P.), eichenblättriger,
 ♀. k. Peru, Chili.
 racemiflorum Dun. (*scabrum* Jacq.), traubenblumiger,
 ♂. w. Südamerika.
 racemosum L., traubiger, ♀. w. Westindien.
 radicans L. (*quercifolium* R. et P.), starkwurzelnder,
 4. k. t. Neugranada.
 reticulatum Dun. (*crotonoides* Lam.), netzförmiger, ♀.
 w. Caribäen.
 rigescens Jacq. (*humile* Lam.), starrer, ♀. k. Cap
 der guten Hoffnung.
 rubiginosum Vahl, braunrother, ♀. w. Cayenne.
 rubrum Mill., rothbeeriger, ☉. f. Südamerika.
 sanctum L. (*incanum* Forsk.), heiliger, ♀. w. Pa-
 lästina, Aegypten.
 saponaceum Dun., seifenartiger, ♀. k. t. Chili.
 scandens L., klimmender, 4. ♀. Sch. w. Surinam.
 Seaforthianum Andr., Seaforth's, ♀. Sch. w. Südamer.
 sinuatum W., buchtiger, ☉. f. m. ?
 sisymbriifolium Lam., raukenblättriger, ?☉. f. Bue-
 nos-Ayres.
 sodomeum L. (*Hermanni* Lam.), Sodoms-N., ♀. k. Ca-
 labrien, Sicilien, Afrika.
 spinosissimum Lodd., dorniger, ♀. w. ?
 stellatum Jacq., sternförmiger, ♀. w. Südamerika.
 stelligerum Sm. (*discolor* RB.), sterntragender, ♀. k.
 Neuholland.
 stramonifolium Jacq., stechapfelblättriger, ♀. w. Süd-
 amerika, Ostafrika, Ostindien.
 subarmatum W., schwachbewaffneter, ♀. w. ?
 subinerme Jacq., fast unbewehrter, ♀. w. Westindien.
 suffruticosum Schousb., halbstrauchiger, ♀. k. Nordafrika.
 tectum P., verdeckter, ♀. k. t. Mexico.
 Tegore Aubl., Tegore-N., ♀. w. Guiana.
 tomentosum L., filziger, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
 torvum Sw. (*stramonifol.* Lam., *ficiifolium* Orteg.), häß-
 licher, ♀. k. t. Westindien.
 triangulare Lam., dreikantiger, ☉. f. m. Ostindien.
 trilobatum L., dreilappiger, ♀. w. Jamaika.

Solanum

triquetrum Cav., dreiseitiger, ♀. w. Neuspanien.

triste Jacq. (*oblongum* R. et P.), trauriger, ♀. w. Westindien, Südamerika.

Trongum Poir., moluckischer, ☉. m. f. w. Molucken.

tuberosum L., Kartoffel-N., 4. f. b. Chili.

β) Commersonii Poir.

Tweedianum Hook., Tweedie's, 4. ♀. k. t. Buenos-Ayres.

umbrosum Bonpl., schattenliebender, 4. ♀. w. Südamer.

undatum Lam., welliger, ♀. w. Mascarenas.

uniflorum Dun., einblumiger, ♀. w. Hispaniola.

verbascifolium L., königskerzenblättriger, ♀. k. t.

Westindien, Südamerika, Neuholland, Cochinchina.

vernucatum Lindl., Firnifs-N., ? ☉. ♀. f. k. Buenos-Ayres.

villosum Lam. (*hirsutum* et *Rumphii* Dun.), zottiger,

☉. f. Südeuropa, Asien, Afrika.

virgatum Lam., ruthenförmiger, 4. ♀. w. Westindien.

virginianum L., virginischer, ☉. f. Virginien.

viridiflorum R. et P., grünblumiger, ♀. k. t. Peru.

volubile Sw., windender, ♀. Sch. w. Westindien.

xanthocarpum Schrad., gelbfrüchtiger, ☉. f. m. Aethiopien.

Zuccagnianum Dun. (*obtusifolium* W., *Willdenowii* R.

et S.), Zuccagni's, ☉. f. ?

heterandrum Pursh (et *Vespertilio* Ait.) etc. vid.

Nycterium heterandrum, *cordifolium* etc. *Hum-*

boldtii W. (et *Lycopersicum* L.) etc. v. *Lycoper-*

sicum Humboldti, esculentum etc.

Soldanella T., Alpenglöckchen (Trottelblume), V. I.,
Primulaceae.

alpina L. (*Clusii* Schm.), gemeines, 4. f. Mitteleuro-
päische Alpen.

minima Hoppe, kleinstes, 4. f. Mitteleurop. Alpen.

b) alba J. C.

montana W., Berg-A., 4. f. Salzburg, Oesterreich, Böhmen.

pusilla Baumg. (*Clusii* Gaud.), Zwerg-A., 4. f. Mittel-
und osteuropäische Alpen.

Gartenvarietäten oder Hybriden: *affinis* J. C.,
crenata Penny.

Soldevilla Lag. (Soldevilla, ein Freund Lagasca's),
XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

setosa Lagasc. (*Hispidella hispanica* Barnades), borstige,
4. f. k. Spanien.

Solea Spgl., Ging. (W. Sole, englischer Botaniker), V.
I., Violaceae.

concolor Ging. (*Hybanthus concolor* Spgl.), einfarbige,
4. f. Nordamerika.

stricta Spgl. et *verticillata* Spgl. v. *Jonidium* Sprengel-
gelianum et *polygalaeifolium*.

Solena gracilis Rudg. et *longiflora* W. v. *Posoqueria* gra-
cilis et *longiflora*.

Solenandra cordifolia Vent. v. *Galax* aphylla.

Solenostemma Hayne, Röhrenkrönchen, V. II.,
Asclepiadeae.

Argel Hayne, ägyptisches, ♀. k. t. Oberägypten.

Solidago L., Goldrute, XIX. II., Compositae-Corym-
biferae.

altissima L. (*rigidula* Bosc.), höchste, 4. f. Nordamer.

β) recurvata Mill. γ) virginiana Mill. δ) pi-
losa Mill.

ambigua Ait., zweifelhafte, 4. f. ? Nordamerika.

Solidago

- angulata Mühlbg., kantige, 4. f. Nordamerika.
 angustifolia Ell., schmalblättrige, 4. f. Nordamerika.
 anisata Lodd., anisduftende, 4. f. Nordamerika.
 arguta Ait. (*argentea* Hornem.), spitzzahnige, 4. f. Nordamerika.
 aspera Ait., rauhe, 4. f. Nordamerika.
 asperata Pursh, rauhlättrige, 4. f. Nordamerika.
 axillaris Pursh, achselblumige, 4. f. Nordamerika.
 bicolor L. (*Aster b. N. E.*), zweifarbige, 4. f. Nordamer.
 caesia Ait., blaustielige, 4. f. Nordamerika.
 canadensis L., canadische, 4. f. Nordamerika.
 carinata Schrad., kielförmige, 4. f. Nordamerika.
 ciliaris Mühlbg. (*glabra* H. Par.), gefranzte, 4. f. Nordamerika.
 Cleliae DC. (*dubia* Scop.), Clelia's, 4. f. ?
 decurrens Lour., herablaufende, 4. f. China.
 elata Pursh, aufgerichtete, 4. f. Nordamerika.
 elliptica Ait. (*latissimifolia* Mill., *plantaginea* Dsf.), elliptische, 4. f. Nordamerika.
 erecta Pursh, aufrechte, 4. f. Nordamerika.
 flabelliformis Wendl. (*flabellata* Schrad.), fächerförmige, 4. f. ?
 flexicaulis L. (*scrophulariaefolia* Mill.), gebogene, 4. f. Nordamerika.
 fragrans W., wohlriechende, 4. f. Nordamerika.
 fuscata Dsf., bräunliche, 4. f. Nordamerika.
 gigantea Ait., riesenhafte, 4. f. Nordamerika.
 glabra Dsf., kahle, 4. f. Nordamerika.
 glomerata Mchx., knaulförmige, 4. f. Nordamerika.
 β) macrophylla Pursh.
 gracilis Poir., schlanke, 4. f. Nordamerika.
 graminifolia Ell. (*lanceolata* W.), grasblättrige, 4. f. Nordamerika.
 grandiflora Dsf., großblumige, 4. f. Nordamerika.
 hirta W., kurzhaarige, 4. f. Nordamerika.
 hispida Mühlbg., steifhaarige, 4. f. Nordamerika.
 humilis Dsf., niedrige, 4. f. Nordamerika.
 integrifolia Dsf. (? *speciosa* Nutt.), ganzblättrige, 4. f. Nordamerika.
 juncea Ait., simsenförmige, 4. f. Nordamerika.
 laevigata Ait., glatte, 4. f. Nordamerika.
 lateriflora L., seitenblumige, 4. f. Nordamerika.
 latifolia L., breitblättrige, 4. f. Nordamerika.
 ? leucanthemifolia Loud., wucherblumenähnliche, 4. f. ?
 lithospermifolia W., steinsamenblättrige, 4. f. Nordamer.
 leiocarpa DC. (? *humilis* Pursh), glattsamige, 4. f. Nordamerika.
 limonifolia P. (*mexicana* L., *obliqua* Mch.), ineernelkenblättrige, 4. f. Nordamerika.
 livida W., bleigraue, 4. f. Nordamerika.
 longifolia Schrad., langblättrige, 4. f. Nordamerika.
 minuta L., kleine, 4. f. b. Pyrenäen.
 mollis Bartl., weiche, 4. f. Nordamerika.
 multiradiata Ait., vielstrahlige, 4. f. Nordamerika.
 nemoralis Ait., Hain-G., 4. f. Nordamerika.
 nepalensis D. Don (*Amphirhapis pubescens* DC.), nepalischer, 4. f. Nepal.
 noveboracensis L., neuyorkische, 4. f. Nordamerika.
 nutans Dsf., nickende, 4. f. Nordamerika.

Solidago

- odora Ait., riechende, 4. f. Nordamerika.
 patula Mühlbg., abstehende, 4. f. Nordamerika.
 pauciflosculosa Mchx. (*Bigelowia uniligulata* DC.), wenig-
 blüthige, 4. f. Nordamerika.
 petiolaris Ait., stielblättrige, 4. f. Nordamerika.
 polifolia Lodd., poleiblättrige, 4. f. Nordamerika.
 procera Ait., hohe, 4. f. Nordamerika.
 puberula Nutt., feinhaarige, 4. f. Nordamerika.
 pulverulenta Nutt. (*argentea* Lodd.), bestäubte, 4. f.
 Nordamerika.

- pyramidata Pursh, pyramidale, 4. f. Nordamerika.
 recurvata W., zurückgekrümmte, 4. f. Nordamerika.
 reflexa Ait., zurückgebogene, 4. f. Nordamerika.
 rigida L., starre, 4. f. Nordamerika.

β) *microcephala* DC. (*asperula* Hort.).

- rugosa Mill. (*altissima* Ait.), runzelige, 4. f. Nordamer.
 scabra Mühlbg., scharfblättrige, 4. f. Nordamerika.
 Schraderi DC. (*gracilis* Schrad.), Schrader's, 4. f.
 Nordamerika.

- sempervirens L. (*noveboracensis* et *carnosa* Mill., *tardi-
 flora* Mch.), immergrüne, 4. f. Nordamerika.

- serotina Ait., spätblumige, 4. f. Nordamerika.

- simplex H. B. K., einfache, 4. k. f. b. Mexico.

- squarrosa Mühlbg., Nutt., sparrige, 4. f. Nordamerika.

- stricta Ait., steife, 4. f. Nordamerika.

- tenuifolia Pursh, dünnblättrige, 4. f. Nordamerika.

- ulmifolia Mühlbg., ulmenblättrige, 4. f. Nordamerika.

- verrucosa Schrad., warzige, 4. f. Nordamerika.

- villosa Pursh (*Bosciana* Moret.), zottige, 4. f. Nordam.

- viminea Ait., gertenförmige, 4. f. Nordamerika.

- virgata Mchx., ruthenförmige, 4. f. Nordamerika.

- Virgaurea L., gemeine, 4. f. Europa, Nordasien.

β) *alpestris* WK. γ) *cambrica* Ait. δ) *litoralis*
 Savi. ε) *arenaria* Hornem. ζ) *nudiflora* Viv.

spuria Forst. v. *Conyza rugosa*. *urticaefolia* Mill.

v. *Caleacte urticaefolia*. *viscosa* Schrad. v. *Psiadia
 glutinosa*.

- Soliva** R. et P. (Salvator Soliva, ein spanischer Arzt
 und Botaniker), XIX. iv., Compositae-Corymbiferae.
anthemifolia RB., kamillenblättrige, ☉. f. Neuholland.
stolonifera RB. (*lusitanica* Less.), sprossende, ☉. f.
 Portugal.

- Sollya** Lindl. (Richard Horsman Solly, englischer Pflan-
 zenphysiolog), V. i., Pittosporae.

- angustifolia* Lindl., schmalblättrige, ♀. Sch. t. Van-
 Diemens-Land.

- heterophylla* Lindl., verschiedenblättrige, ♀. Sch. t.
 Neuholland.

- Sommerauera quadrifida** Hoppe v. *Alsine aretioides*.

- Sonchus** Vaill., Gänsedistel, XIX. i., Compositae-
 Cichoriaceae.

- abbreviatus* Lk., abgekürzte, ♀. k. Teneriffa.

- arvensis* L., Acker-G., 4. f. Europa, Nordamerika.

- asper* Fuchs (*fallax* Wallr.), rauhe, ☉. f. Europa,
 Neuholland.

- chondrilloides* Dsf., chondrillähnliche, ♂. f. Sicilien,
 Nordafrika.

- dentatus* Ledeb., gezahnte, 4. f. Sibirien.

- divaricatus* Hornem., ausgesperrte, ♂. ♀. k. ?

Sonchus

hyoserifolius Hornem., hyoserisblätterige, f. k. Madeira.
Jacquini DC. (*fruticosus* Jacq., *congestus* W.), Jacquin's,
 f. k. Teneriffa.

lacerus W., schlitzbblätterige, $\odot. f. ?$

laevigatus W., glatte, f. k. Canarische Inseln.

β) lyratus W.

longifolius Trevir., langblätterige, $\odot. f. ?$

maritimus L., Meerstrands-G., $4. f.$ Südeuropa, Canarische Inseln.

β) aquatilis Pourr. γ) litoralis Rchb.

palustris L., Sumpf-G., $4. f.$ Europa.

pinnatus Ait., gefiederte, f. k. Madeira.

radicatus Ait., langwurzelige, f. k. Madeira.

roseus Bess., rosafarbige, f. f. Podolien.

squarrosus DC. (*fruticosus* L. suppl.), sparrige, f. k. Madeira.

taraxacifolius W. (*goraeensis* Lam.), löwenzahnblätterige, $\odot. f.$ Guinea, Westindien.

tenerrimus L., zarte, $\odot. f.$ Südfrankreich.

uliginosus MB., Morast-G., $4. f.$ Caucasus, Sibirien.

alpinus L. (*coeruleus* Sm.) etc. v. *Mulgedium alpinum* etc. *caucasicus* Fisch. vid. ? *Mulgedium sibiricum*. *pallidus* W. v. *Lactuca canadensis*, *picroides* Lam. etc. v. *Picridium vulgare* etc.

Sophora L. (arabischer Name), X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

alopecuroides L., fuchsschwanzähnliche, $4. f.$ Caucasus, Kleinasien.

crassifolia J. S. Hill., dickblätterige, f. w. Guinea.

flavescens Ait., gelbliche, $4. f.$ Sibirien.

galeoides Pall., galeaähnliche, $4. f.$ Sibirien.

glauca Lesch., blaugrüne, f. f. w. Ostindien.

japonica L., japanische, f. f. Japan, China.

b) fol. variegatis. c) pendula. d) chinensis Lodd.

litoralis Schrad. (*arenicola* N. E.), Strand-S., f. w. Brasilien.

macrocarpa Sm., großfrüchtige, f. k. Chili.

sericea Nutt., seidenhaarige, $4. f.$ Nordamerika.

tomentosa L., filzige, f. w. Ost- und Westindien.

β) occidentalis L. (*havanensis* Jacq.).

velutina Lindl., sammethaarige, f. k. t. Nepal.

alpina Pall., *fabacea* Pall. et *lupinoides* Pall. vid.

Thermopsis corgonensis etc. *aurea* Ait. etc. vid.

Virgilia aurea etc. *buxifolia* Burm. (et *galioides*

Berg. etc.) vid. *Cyclopia latifolia*, *galioides* etc.

sericea J. S. Hil. (et *tetraptera* Ait.) v. *Edwardsia*

nitida et *grandiflora*.

Sophronitis Lindl., Zierstendel, XX. 1., Orchideae.

cernua Lindl., übergebogener, $4. w.$ Brasilien.

grandiflora Lindl., großblumiger, $4. w.$ Südamerika.

Sorbus T., Eberesche, XII. III., Rosaceae-Pomaceae.

1. *Adenorachis* DC. (*Aronia* P.).

arbutifolia * (*Pyrus arb.* L. fil., *A. pyrifol.* P.), erdbeerbaumblätterige, f. f. f. Nordamerika.

β) intermedia (Lindl.).

Chamaemespilus Crtz., mispelähnliche, f. f. f. Mitteleuropäische Alpen.

depressa * (*Pyrus d.* Lindl.), niedergedrückte, f. f. f. Nordamerika.

Sorbus

floribunda * (*Pyrus f.* Lindl.), blüthenreiche, $\S$. $\S$. f. Nordamerika.

grandifolia * (*Pyrus g.* Lindl.), großblättrige, $\S$. $\S$. f. Nordamerika.

melanocarpa * (*Pyrus m.* W.), schwarzfrüchtige, $\S$. $\S$. f. Nordamerika.

β) *subpubescens* (Lindl.).

pubens * (*Pyrus p.* Lindl.), feinhaarige, $\S$. f. Nordam. II. Genuin.

americana W., amerikanische, $\S$. f. Canada.

Aria Crtz, Mehlbeer-E., $\S$. f. Europa.

a) *obtusifolia* (DC.) (*ovalis* Hort.). b) *acutifolia* (DC.) (*Crataeg. longifolia* Duham.). c) *undulata* (Lindl.). d) *angustifolia* (Lindl.). e) *rugosa* (Lindl.). f) *cretica* (Lindl.) (*rotundifolia et graeca* Hort.). g) *bullata* (Lindl.) (*acuminata* Hort.).

aucuparia L., gemeine, $\S$. f. Europa, Asien.

b) *fructu luteo*. c) *fol. variegat.* d) *fastigiata*.

auriculata P., geöhrt, $\S$. f. Aegypten.

domestica L. (*Pyrus Sorbus* G.), Speierlings-E., $\S$. f. Mittel- und Südeuropa.

b) *maliformis* Lodd. c) *pyriformis* Lodd.

hybrida L. (*Pyrus pinnatifida* Ehrh.), Bastard-E., $\S$. f. England, Schweden, Mitteldeutschland.

b) *pendula* Lodd. c) *arbuscula* DC.

latifolia P. (*Crataegus dentata* Thuill.), breitblättrige, $\S$. f. Süddeutschland, Frankreich.

β) *edulis* (W.) (*Crataegus e.* Hort.).

lanuginosa Kit. (*hybrida lanuginosa* Hort.), wollige, $\S$. f. Ungarn.

microcarpa Pursh (*micrantha* Dum. C.), kleinfrüchtige, $\S$. f. Nordamerika.

rivularis * (*Pyrus r.* Dougl.), Bach-E., $\S$. f. Nordamer.

scandiac Fries. (*Pyrus intermedia* Ehrh.), schwedische, $\S$. f. Schweden.

spuria P. (*Pyrus hybrida* Mch., *Mespilus sorbifolia* Poir.), unächte, $\S$. f. Kamtschatka.

b) *sambucifolia* Hort. c) *pendula* Hort.

torminalis Crtz, Elzbeer-E., $\S$. f. Deutschland.

trilobata * (*Pyrus t.* DC., *Crataegus* La Bill.), dreilappige, $\S$. f. Libanon.

vestita Lodd. (Wall.) (*Pyrus nepalensis* Hort.), bekleidete, $\S$. f. b. Nepal.

Sorghum P. (indianischer Name), Durrgras, III. II. (XXIII. I.), Gramineae.

avenaceum P. B., haferähnliches, $\odot$. f. Cap d. g. H.

bicolor W., zweifarbiges, $\odot$. f. Persien, Ostindien.

Caffrorum R. et S. (*Arduini* Jacq.), Caffern-D., $\odot$. f. Cap der guten Hoffnung.

cernuum W., übergebogenes, $\odot$. f. Ostindien.

elongatum R. et S., verlängertes, $\mathcal{A}$. k. Neuholland.

halepense P., aleppisches, $\mathcal{A}$. f. b. k. Südeuropa, Asien etc.

nigrum R. et S., schwarzes, $\odot$. f. ?

rubens W., röthliches, $\odot$. f. ?

saccharatum P., zuckerrohrähnliches, $\odot$. f. Ostind., Arab.

vulgare P., gemeines, $\odot$. f. Ostindien.

Sorindeia Thou. (?madagascarischer Name), II. I. (XXIII. II.), Terebinthaceae.

Sorindeia

madagascariensis Thou., madagascarisches, f. w. Madagasc.

Sorocephalus RB., Häufchenkopf, IV. 1., Proteaceae.

diversifolius RB., verschiedenblättriger, f. t. Cap der guten Hoffnung.

imberbis RB., unbärtiger, f. t. Cap der gut. Hoffn.

imbricatus RB., ziegeldachblättriger, f. t. C. d. g. H.

lanatus RB., wolliger, f. t. Cap der guten Hoffnung.

setaceus RB., borstenblättriger, f. t. Cap der gut. H.

spatalloides RB., spatallähnlicher, f. t. Cap d. g. H.

tenuifolius RB., feinblättriger, f. t. Cap der gut. H.

Soulangia Brog. v. Phylica.**Southwellia nobilis** Salisb. v. Sterculia nobilis.**Soyeria montana** Monni. etc. v. Crepis montana etc.**Sowerbaea** Sm. (J. Sowerby, berühmter englischer Blumenmaler), VI. 1., ? Xyrideae.

junceae Sm., simsensförmige, 4. t. Neusüdwallis.

Soja Mch. (japanischer Name), XVII. 1v. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

hispidula Mch., steifhaarige, ☉. Sch. w. Ostindien.

Spananthe Jacq., Magerdolde, V. 11., Umbelliferae.

paniculata Jacq., rispige, ♂. w. Südamerika.

Sparaxis Ker, Schlitzschwertel, III. 1., Irideae.

anemonaeflora Ker, anemonenblumiger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

bicolor Ker, zweifarbiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

blanda Hort., Berol., lieblicher, 4. Zw. k. C. d. g. H.

bulbifera Ker, zwiebeltragender, 4. Zw. k. C. d. g. H.

fragrans Ker, wohlriechender, 4. Zw. k. C. d. g. H.

galeata Ker, helmiger, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

grandiflora Ker, großblumiger, 4. Zw. k. C. d. g. H.

b) striata. c) Liliago.

Griffini Hort., Griffin's, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

lineata Swt., linirter, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.

pendula Ker, überhängender, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

stellaris D. Don, sternförmiger, 4. Zw. k. C. d. g. H.

tricolor Ker, dreifarbiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

b) sanguineo-purpurea. c) violaceo-purpurea.

d) roseo-alba.

Sparganium T., Igelskopf, XXI. 111., Typhaceae.

alpinum D. Don, Alpen-J., 4. Wa. f. England.

natans L., schwimmender, 4. Wa. f. Mittel- und Nordeuropa.

simplex Huds. (erectum β . L.), einfacher, 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.

ramosum Huds. (erectum L.), ästiger, 4. Wa. f. Europa, Sibirien, Nordamerika.

Sparganophorus Vaill., G., Spargträger, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

Struchium Sw., westindischer, ☉. m. f. Jamaica.

Vaillantii G., Vaillant's, ☉. m. f. Westindien.

verticillatus Mchx., wirtelblättriger, ☉. f. Carolina.

Sparmannia Thbg. (A. Sparrmann, ein Schwede, welcher das Vorgebirge der guten Hoffnung bereiste), XIII. 1., Tiliaceae.

africana Thbg., afrikanische, f. t. k. Cap der gut. H.

palmata H. Berol., handförmige, f. t. k. Cap d. g. H.

Spartianthus junceus Lk. v. Spartium junceum.**Spartina** Schreb. (Limnetis P.), Ginstergras, III. 1., Gramineae.

Spartina

- alterniflora Lois., wechselblumiges, 4. f. Frankreich.
 cynosuroides Roth, cynosurusähnliches, 4. f. Nordamer.
 geniculata P. B., geknietes, 4. w. Java.
 juncea Mühlbg., simsensförmiges, 4. f. Nordamerika.
 patens Mühlbg., abstehendes, 4. f. Nordamerika.
 polystachya Mühlbg., vielähriges, 4. f. Nordamerika.
 pumila Roth, kleines, 4. f. Nordamerika.
 stricta Roth, steifes, 4. f. Süd- und Westeuropa.

Spartium L., Pfriemen, XVII. IV. (VI.) (XVI. VI.),
Leguminosae-Papilionaceae.

- junceum L., simsensförmiger, 5. k. f. b. Südeuropa.
 b) flore pleno.

odoratissimum D. Don (? *acutifolium* Lindl.), wohl-
 riechender, 5. k. f. b. Türkei, Persien.

complicatum Gouan et Lois. v. *Adenocarpus telonensis* et *parvifolius*. *multiflorum* Ait. et *nubigenum* Ait. v. *Cytisus albus* et *nubigenus*. *scoparium* L. v. *Sarothamnus scoparius* Nachtr. Hinsichtlich der übrigen s. Genista.

Spartothamnus Cunn., Pfriemenstrauch, XIV. II.,
Globulariaceae-Myoporineae.

- junceus Cunn., simsensförmiger, 5. t. Neuholland.

Spatalanthus Swt., Zartschwertel, XIV. I., Irideae.

- speciosus Swt., prächtiger, 4. k. t. Cap d. gut. H.

Spatalla RB., Salish., Spatalle, IV. I., Proteaceae.

- bracteata RB., deckblättrige, 5. t. Cap der gut. H.
 brevifolia RB., kurzblättrige, 5. t. Cap der gut. H.
 caudata RB., geschweifte, 5. t. Cap der gut. Hoffn.
 incurva RB., einwärtsgekrümmte, 5. t. Cap d. g. H.
 mollis RB., weiche, 5. t. Cap der guten Hoffnung.
 nivea RB., schneeweisse, 5. t. Cap der guten Hoffn.
 pedunculata RB., stielährige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.
 prolifera RB., sprossende, 5. t. Cap der gut. Hoffn.
 pyramidalis RB., pyramidale, 5. t. Cap der gut. H.
 ramulosa RB., ästige, 5. t. Cap der guten Hoffnung.
 sericea RB., seidenhaarige, 5. t. Cap der gut. Hoffn.
 Thunbergii RB., Thunberg's, 5. t. Cap der gut. H.

Spathelia L., Spathelie, V. III., Terebinthaceae.

- simplex L., einfache, 5. w. Jamaica.

Spathodea P. B., Scheidenbignonie, XIV. II., Perso-
natae-Bignoniaceae.

- corymbosa Vent., traubendoldige, 5. w. Trinidad.
 fraxinifolia H. B. K., eschenblättrige, 5. Sch. w. Caracas.
 laevis P. B., glatte, 5. w. Guinea.
 longiflora Vent., langblumige, 5. w. Ostindien.
 pentandra Hook., fünfinännige, 5. w. Ostindien.
 Rheedii Spgl., Rheede's, 5. w. Ostindien.
 Roxburghii Spgl., Roxburgh's, 5. w. Ostindien.
 uncata Spgl., hackige, 5. Sch. w. Westindien.

Specklinia Lindl. (Specklin, ein Deutscher, berühmt
als Xylograph), XX. I., Orchideae.

- atropurpurea Lindl., schwarzpurpurrothe, 4. w. Jamaica.
 ciliaris Lindl., gefranzte, 4. w. Mexico.
 elegans Lindl., zierliche, 4. w. Südamerika.
 orbicularis Lindl., kreisförmige, 4. w. Demerara.
 retusa Lindl., abgestutzte, 4. w. Mexico.

Specularia Heist., Venusspiegel, V. I., Campanulaceae.

- biflora Fisch. et Mey., zweiblumiger, 6. f. Californien.
 falcata A. DC., sichelförmiger, 6. f. Südeuropa.

Specularia

hybrida A. DC. (*Prismatocarpus confertus* Mch.), Bastard-K., ☉. f. Mittel- und Osteuropa.

pentagona A. DC., fünfkantiger, ☉. f. Creta, Syrien.

perfoliata A. DC., durchwachsener, ☉. f. Nord- und Südamerika.

Speculum A. DC., gemeiner, ☉. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa, Taurien.

b) flore albo. β) calycina A. DC. γ) pubescens A. DC. (*Campanula hirta* R. et S.).

Spergula L., Spark, X. iv., Portulacaceae-Paronychieae, ? Caryophyllaceae.

I. Genuina.

arvensis L., Acker-S., ☉. f. Europa, Nord- u. Südamer.

a) sativa v. Bönningh. β) vulgaris v. Bönn. γ)

maxima Weihe.

pentandra L., fünfmänniger, ☉. f. Europa.

II. Spergella Rchb.

glabra W. (*sagmoides* All.), kahler, 4. f. Cottische Alpen.

laricina L., lärchenblättriger, 4. f. Sibirien.

nodosa L., knotiger, 4. f. Europa.

β) glandulosa Bess.

pallida Salisb., bleicher, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

sagmoides L., saginaähnlicher, 4. f. Mittel- und nord-europäische Alpen, Sibirien, Carolina.

subulata Sw., pfriemenblättriger, 4. f. Nordeuropa, Deutschland.

Spergulastrum Mchx., Sparklein, X. iii., Caryophyllaceae-Alsineae.

lanuginosum Mchx., wolliges, 4. f. Nordamerika.

Spermacoe Dill., Zahnwirbel, IV. i., Rubiaceae.

aspera Aubl., rauher, ☉. w. m. f. Westindien.

Fischeri Lk. (*adscendens* Fisch.), Fischer's, ☉. w. m. f. Jamaica.

glabra Mchx., kahler, ☉. f. Nordamerika.

hirta L., kurzhaariger, ☉. f. m. Westindien.

hispida L., steifhaariger, ☉. w. m. f. Ceylon.

laevis Lam., glatter, ☉. w. m. f. Antillen.

lanceolata Lk., lanzettblättriger, ☉. w. m. f. Jamaica.

latifolia Aubl., breitblättriger, ♂. w. Guiana.

linifolia Vahl, flachsblättriger, ☉. w. m. f. Cayenne.

mucronata N. E., weichstacheliger, 4. w. Südamerika.

radicans Aubl., starkwurzelnder, 4. w. Guiana.

Roxburghii W. A. (*laevis* Roxb.), Roxburgh's, ♂. w. Ostind.

scabra W., scharfer, ☉. w. m. f. Coromandel.

suffruticosa Jacq., halbstrauchiger, ♂. w. ?

tenuior L., dünnerer, ☉. m. f. Westindien, Carolina.

villosa Sw., zottiger, ☉. m. f. Westindien.

biflora Hort. v. Hedyotis biflora. *sumatrensis* Retz

etc. v. *Knoxia corymbosa* etc. *rubra* Jacq. (*strigosa*

Sims, *longiflora* Humb.) etc. v. *Crusea rubra* etc.

verticillata Hort. et L. etc. v. *Bigelovia commutata*,

verticillata etc.

Spermadictyon Roxb., Netzsame, V. i., Rubiaceae.

azureum Lindl., azurblauer, ♂. w. Nepal.

suaveolens Roxb., wohlriechender, ♂. w. Ostindien.

Spermaxyrum La Bill., Spitzsame, III. i., Sapotaceae-Olacineae.

strictum DC., steifer, ♂. t. Neuholland.

Sphacele Benth., Ziestsalbei, XIV. i., Labiatae.

Sphacele

campanulata Benth., glockenblumige, $\frac{1}{2}$ t. Chili.

Lindleyi Benth., Lindley's, $\frac{1}{2}$ t. Chili.

Sphaeralcea angustifolia S. Hil. v. *Malva angustifolia*.

Sphaeranthus L., Klumpenblümchen, XIX. v., Compositae-Echinopeae.

africanus L., afrikanisches, $\odot$ f. m. Cap der gut. H.

hirtus W., haariges, $\frac{1}{2}$ w. Manila.

indicus L., indisches, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien, Aegypten.

Sphaerolobium Sm., Kugelfüßchen, X. i., Leguminosae-Papilionaceae.

medium RB., mittleres, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.

vineum Sm. (*minus* La Bill.), gertenartiges, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.

Sphaerophysa DC., Kugelhülse, XVII. iv. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

caspica DC., caspische, $\frac{1}{2}$ f. Gegend d. caspisch. Meeres.

Sphaerostemma Blume, Kugelfädler, XXII. xiii. (XVI. iv.), Anonaceae.

propinquum Blum., verwandter, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Nepal.

Sphaerostigma Sering., Kugelnärbchen, VIII. i., Onagrariae.

Chamissonis Fisch. et Mey., Chamisso's, $\odot$ f. Chili.

cheiranthifolium Fisch. et Mey., lackblättriges, $\odot$ f. Chili.

β) viridescens Hook.

hirtum Fisch. et Mey., kurzhaariges, $\odot$ f. Californien.

minimum *, kleinstes, $\odot$ f. Nordamerika.

minutiflorum Fisch. et Mey., kleinblumiges, $\odot$ f. Chili.

spirale Fisch. et Mey., spiralförmiges, $\odot$ f. Chili.

strigulosum Fisch. et Mey., striegeliges, $\odot$ f. Neucaliforn.

Sphenodesma Jack, Schlingblume, V. i., Verbenaceae.

pentandra Jack, fünfmännige, $\frac{1}{2}$ Sch. w. Ostindien.

Sphenogyne RB., Schleudernarbe, XIX. iii., Compositae-Corymbiferae.

abrotanifolia RB., stabwurzblättrige, $\frac{1}{2}$ k. C. d. g. H.

anthemoides RB., kamillenähnliche, $\odot$ f. C. d. g. H.

crithmifolia RB., meerfenchelblättrige, $\frac{1}{2}$ k. C. d. g. H.

dentata RB., gezahnte, $\frac{1}{2}$ k. Cap der guten Hoffnung.

foeniculacea Swt., fenchelähnliche, $\odot$ f. Cap d. g. H.

odorata RB., riechende, $\frac{1}{2}$ k. Cap der guten Hoffn.

pilifera Ker, haartragende, $\frac{1}{2}$ k. Cap der gut. Hoffn.

scariosa RB., trockenhäutige, $\frac{1}{2}$ k. Cap der gut. H.

speciosa Maund, schöne, $\odot$ f. Südamerika.

leucanthemoides RB. v. *Arctotis leucanthemoides*.

Sphenopus Trin. v. *Sclerochloa*.

Sphenotoma Swt., Schleuderstrauch, V. i., Epacrideae.

capitatum Lindl. (*Dracophyll* cap. p. 275), kopfförmiger, $\frac{1}{2}$ t. Neusüdwallis.

gracile Swt., schlanker, $\frac{1}{2}$ t. Neuholland.

Spielmannia Medik. (J. R. Spielmann, Professor der Medicin zu Straßburg), XIV. ii., Verbenaceae.

africana W., afrikanische, $\frac{1}{2}$ k. Cap der gut. Hoffn.

Spigelia L. (A. Spigel, Professor der Anatomie zu Padua), V. i., Contortae-Gentianeae.

Anthelmia L., wurmtreibende, $\odot$ w. Westindien.

marylandica L., maryländische, $\frac{1}{2}$ f. b. k. Nordamer.

Spilanthes Jcq., Fleckblume, XIX. i., Compositae-Corymbiferae.

Acmella L., wahre, $\odot$ m. f. Ostindien.

alba L'Her. (*Salivaria* Murr.), weiße, $\odot$ m. f. Peru.

Spilanthes

- debilis H. B. K., schwache, ☉. m. f. Südamerika.
 exasperata Jacq., rauhe, ♂. w. Caracas.
 oleracea L., Gemüse-F., ☉. m. f. Ostindien, Mascarenas.
 Pseudacmella L., unächte, ☉. m. f. Ostindien.
 uliginosa Sw. (*Jügeria ulig.* Spgl.), Sumpf-F., ☉. m. f. Jamaica.

arborescens Forst. v. *Petrobium arborescens*. *crocatum* Sims v. *Platypterus crocata*. *repens* Mchx. v. *Ac-mella repens*.

Spinacia T., Spinat, XXII. v., Aizoideae-Atripliceae.

oleracea L., Gemüse-S., ☉. f. Arabien, Spanien.

a) *inermis* Mch. (*glabra* Mill.). β) *spinosa* Mch.

Spiraea T., Spierstaude, XII. II, Rosaceae-Spiraeaceae.

acutifolia W. (*sibirica* Hort., *ambigua* Pall.), spitzblät-
 terige, ♂. f. Sibirien.

alpina Pall., Alpen-S., ♂. f. Ostsibirien.

ariaefolia Sm., mehlbeerbaumbblätterige, ♂. f. b. Nordam.

Aruncus L., Geisbart-S., 4. f. Mitteleuropa, Nord-
 asien, Nordamerika.

b) *flore pleno*. β) *americana* Mchx.

barbata Wall., bärtige, 4. k. f. b. Nepal.

bella Sims, hübsche, ♂. f. b. Nepal.

betulifolia Pall., birkenblätterige, ♂. f. Sibirien.

cana W. K., graue, ♂. f. Croatien.

capitata Pursh (*opulifolia* var. Hook.), kopfblumige, ♂. f.
 Westliches Nordamerika.

ceanothifolia Hornem., ceanothusblätterige, ♂. f. ?

chamaedryfolia L., gamanderblätterige, ♂. f. Ungarn,
 Sibirien, Nordamerika.

a) *vulgaris* Cambd. β) *media* Pursh. γ) *ob-
 longifolia* W. K. δ) *subracemosa* Sering. ε)
incisa Hort.

corymbosa Rafn., traubendoldige, ♂. f. Nordamerika.

β) *sororia* Penny.

crataegifolia Lk., weisssdornblätterige, ♂. f. ?

crenata L., gekerbte, ♂. f. Ungarn, Podolien, Sibirien.

β) *obovata* W. K. γ) *savranica* Bess. δ) *Besse-
 riana* Sering.

decumbens K. (*flexuosa* Rchb.), niederliegende, ♂. f. Friaul.

digitata W. (*palmata* Pall.), fingerförmige, 4. f. Sibirien.

Filipendula L., knollige, 4. Kn. f. Europa.

b) *flore pleno*.

flexuosa Fisch. (*alpina* Hort.), gebogene, ♂. f. Sibirien.

hypericifolia L., johanniskrautblätterige, ♂. f. Ural, Canada.

a) *uralensis* Sering. β) *Pluknetiana* Sering.

japonica Siebold, japanische, 4. ♂. f. b. k. Japan.

laevigata L. (*altaica* Pall.), glatte, ♂. f. Sibirien.

lanceolata Poir., lanzettblätterige, ♂. w. Mascarenas.

lobata Jacq., gelappte, ♂. f. Virginien, Carolina.

monogyna Torrey, einweibige, ♂. f. Nordamerika.

nepalensis Lodd., nepal'sche, ♂. f. b. Nepal.

nutans Royle (*argentea* Loud.), nickende, ♂. f. b. Nepal.

opulifolia L., schneeballblätterige, ♂. f. Nordamerika.

β) *tomentella* Sering.

palmata Thbg., L. suppl., handförmige, 4. f. Japan.

picoviensis Bess., picovische, ♂. f. Podolien.

salicifolia L., weidenblätterige, ♂. f. Mittel- und Süd-
 europa, Sibirien, Nordamerika.

a) *carnea* Ait. β) *alpestris* Pall. γ) *paniculata*

Spiraea

Ait. (*alba* Ehrh.). δ) *carpinifolia* W. (*obovata* Rafin.). ε) *grandiflora* Swt.

sorbifolia L., ebereschenblättrige, ♀. f. Sibirien, Nordamerika.

β) *alpina* Pall. (*grandiflora* Loud., *Pallasii* G. Don). *thalictroides* L. (*aquilegaefolia* Pall.), wiesenrautenblättrige, ♀. f. Sibirien.

tobolskia Lodd., tobolskische, ♀. f. Sibirien.

tomentosa L., filzige, ♀. f. Nordamerika.

triloba L., dreilappige, ♀. f. Sibirien.

Ulmaria L., Sumpf-S., 4. f. Europa.

b) *flore pleno*. β) *denudata* Presl.

ulmifolia Scop. (*chamaedryfolia* Jacq.), ulmenblättrige, ♀. f. Krain, Friaul.

β) *phyllantha* Sering.

vaccinifolia D. Don, heidelbeerblättrige, ♀. f. b. k. Nepal.

trifoliata L. etc. v. *Gillenia trifoliata* etc.

Spiralepis D. Don v. *Leontonix*.

Spiranthera A. St. Hil., Spiralbeutel, V. I., Tricoccae-Rutaceae.

odoratissima A. St. Hil., wohlriechendster, ♀. w. Brasilien.

Spiranthes Rich., Wendelähre, XX. II., Orchideae.

aestivalis Rich., Sommer-W., 4. Kn. f. Südeuropa.

amoena MB. (*congesta* Lindl.), liebliche, 4. Kn. k.

Ostsibirien, China, Nepal.

australis Lindl., neuholländische, 4. w. Neuholland.

autumnalis Rich., herbstliche, 4. Kn. f. Europa.

bicolor Lindl., zweifarbige, 4. w. Caribäen.

bracteosa Lindl., deckblättrige, 4. w. Brasilien.

cernua Rich., übergebogene, 4. Kn. f. b. Nordamerika.

diuretica Lindl., harntreibende, 4. w. Chili.

elata Lindl., hohe, 4. w. Westindien.

picta Lindl., bemalte, 4. w. Trinidad.

plantaginea Spgl., wegetrittähnliche, 4. k. w. Nepal.

pudica Lindl., schamhafte, 4. Kn. k. w. China, Nepal, Dahurien.

tortilis Rich., gedrehte, 4. w. Westindien, Nordamerika.

Spondias L., Mombinpflaume, X. IV., Terebinthaceae.

dulcis Forst. (*cytherea* Sonne.), süsse, ♀. w. Mascarenas.

mangifera W. (*amara* Lam., *Amra* Hamilt.), bittere, ♀. w. Ostindien.

Mombin L. (*purpurea* L.), purpurfarbige, ♀. w. Westind.

Myrobalanus L. (*lutea* L., Mombin Jacq.), gelbe, ♀. w. Westindien.

axillaris H. Beng. v. *Buchanania angustifolia*.

Spongostemma atropurpurea Rchb. etc. vid. *Scabiosa atropurpurea* etc.

Sporobolus RB., Straufshalm, III. II., Gramineae.

I. *Phippsia* RB.

algidus Lk., kalter, 4. f. Grönland, Melville Insel etc.

II. *Vilfa* Trin. Adans.

coromandelianus Lk., Kunth., coromandelischer, ♂. 4. w. Ostindien, Arabien.

diandrus P. B., zweimänniger, ♂. m. f. Ostindien.

indicus RB., indischer, ♂. f. Westindien, Nordamerika, Neuholland.

minutiflorus Lk. (*Panicum tenuissimum* Schrk., *Agrosticula muralis* Radd., *V. tenuiflora* Trin.), kleinblumiger, 4. w. ? Brasilien.

Sporobolus

minutus Lk., kleinster, ☉. w. ?

pungens Trin. (Schreb.), stechender, 4. f. Süd- und Westeuropa.

tenacissimus P. B., zäher, 4. w. Westindien, Südamer.

virginicus Trin., virginischer, 4. f. Nordamerika.

Sprekelia formosissima Herb. v. *Amaryllis formosissima*.

Sprengelia Sm. (C. C. Sprengel, ehemaliger Rector zu Spandau, Curt Sprengel, Professor der Botanik zu Halle, einer der ausgezeichnetsten Gelehrten), V. 1., Epacrideae.

incarnata Sm., fleischfarbige, ♀. t. Neusüdwallis.

Staavia Thbg. (Martin Staav, ein Correspondent des Linné), V. 1., Corniculatae-Bruniaceae.

ciliata Brogn., gefranzte, ♀. t. k. Cap der gut. Hoffn.

glutinosa Thbg., klebrige, ♀. t. k. Cap d. gut. Hoffn.

radiata Thbg., strahlige, ♀. t. k. Cap der gut. Hoffn.

Stachys L., Ziest (Rosspolei), XIV. 1., Labiatae.

aethiopica L., aethiopischer, 4. k. Cap d. gut. Hoffn.

albicaulis Lindl., weisstengeliger, 4. k. Chili.

alpina L., Alpen-Z., 4. f. Mitteleuropäische Alpen und Voralpen.

ambigua Sm., zweifelhafter, 4. f. Schottland, Deutschl.

angustifolia MB. (*tenuifolia* Pall.), schmalblättriger, 4. f. Taurien.

annua L., jähriger, ☉. f. Europa.

arabica Hornem., arabischer, ☉. f. Arabien.

arenaria Vahl, Sand-Z., 4. f. Calabrien, Nordafrika, Kleinasien.

arvensis L., Acker-Z., ☉. f. Europa.

aspera Mchx. (*arvensis* Walt.), rauher, 4. f. Nordam.

betonicaefolia Dsf., betonienblättriger, 4. f. k. Creta.

circinata L'Her. (*velutina* W., *canariensis* Jacq.), kreiselförmiger, 4. k. Nordafrika, Spanien.

coccinea Jacq., scharlachfarbiger, 4. ♀. k. t. Mexico.

corsica P., corsischer, 4. f. b. Corsica.

b) *alba*.

cretica L. (*dasyantha* Raf.), cretischer, 4. f. Sicilien, Creta.

debilis H. B. K., schwacher, 4. k. Quito.

decumbens Dsf. (*pubescens* Tenor.), niederliegender, 4. ♀. k. f. Neapel.

diffusa Schwaeg. (*arenaria* Sims), weitschweifiger, 4. f. Südeuropa.

fruticulosa MB., strauchiger, 4. ♀. f. Caucasus.

germanica L. (*biennis* Roth), deutscher, ♂. f. Europa.

β) *pubescens* Lindl.

glaucescens Muss., blaugrünlicher, 4. f. Caucasus.

glutinosa L., klebriger, ♀. k. Creta, Corsica.

grandidentata Lindl., grofszähniger, 4. k. Chili.

heraclea All. (*phlomoide* W., *intermedia* Tenor.), italienischer, 4. f. Italien, Südfrankreich.

hirsuta H. B. K., rauhhaariger, 4. k. Mexico.

hirta L., kurzhaariger, 4. f. Süd- und Westeuropa, Kleinasien, Nordafrika.

β) *inscripta* Rchb.

hispida Pursh, steifhaariger, 4. f. Nordamerika.

hyssopifolia Mchx., ysoptblättriger, 4. f. Nordamerika.

iberica MB., iberischer, 4. f. Caucasus.

inflata Benth., aufgeblasener, 4. f. Nordafrika.

intermedia Ait., mittlerer, 4. f. Sibirien.

Stachys

lanata Jacq., wolliger, 4. f. Taurien, Griechenland, Kleinasien.

latifolia Ait., breitblättriger, 4. f. ?

lusitanica Swt., portugiesischer, 4. f. Portugal.

maritima L., Meerstrands-Z., 4. f. Südeuropa.

mollissima W., weicher, 4. f. k. Ionische Inseln.

nepetaefolia Dsf., katzenmünzenblättriger, 4. f. Kleinasien.

obliqua W. K., schiefblättriger, 4. f. Croatien.

orientalis L., morgenländischer, 4. k. f. b. Palästina, Kleinasien.

palaestina L., palästinischer, 4. k. Griechenland, Syrien.

palustris L., sumpfliebender, 4. f. Europa.

b) *alba*. c) *variegata*. β) *austriaca* *.

polystachya Tenor., vielähriger, ♂. 4. f. Neapel.

recta L. (*St. Sideritis* Vill., *bufonia* Thuill.), weißgelber, 4. f. Europa.

rugosa Ait., runzeliger, 4. k. Cap der guten Hoffn.

salviaefolia Tenor., salbeiblättriger, 4. f. Italien, Istrien.

scordifolia W., scordiumblättriger, 4. f. ? Nordamer.

scordioides Poir., scordiumähnlicher, 4. k. Nordafrika.

sericea Swt., seidenhaariger, 4. f. k. Nepal.

setifera C. A. Mey., borstentragender, 4. f. Caucasus.

sibirica Lk., sibirischer, 4. f. Sibirien.

spinosa L., dorniger, 4. k. Creta.

spinulosa Sm., stechender, ♂. 4. f. Creta, Istrien.

stenophylla Spgl., schmalblättriger, 4. 4. f. Südspan.

sylvatica L., Wald-Z., 4. f. Europa.

Foeniculum Pursh v. *Lophanthus anisatus*. *lavan-
dulaefolia* Vahl vid. *Zietenia orientalis*. *Salviae*

Lindl. v. *Sphacele* Lindleyi.

Stachytarpheta Vahl, Dichtähre, II, 1., Verbenaceae.

angustifolia Vahl, schmalblättrige, ♂. w. Südamerika.

cayennensis Vahl, cayennische, 4. w. Südamerika.

hirsutissima Lk., starkhaarige, 4. w. Brasilien.

jamaicensis Vahl, jamaikaische, ♂. w. Westind., Südamer.

indica Vahl, indische, 4. w. Ceylon, Guinea.

marginata Vahl, berandete, ♂. w. Westindien.

mutabilis Vahl, veränderliche, 4. w. Caracas.

orubica Vahl, orubische, 4. w. Neu-Granada.

prismatica Vahl, prismatische. ♂. w. Südamerika.

umbrosa H. B. K. (*urticaefolia* Sims), schattenliebende, ♂. w. Südamerika.

Stackhousia Sm. (John Stackhouse, englischer Botaniker), V. III., Tricoccae-Stackhouseae.

linariifolia Cunn., gleichbreitblättrige, 4. t. k. Neuholl.

monogyna La Bill., einweibige, 4. t. k. Nördl. Neuholl.

Stadmannia Lam. (Stadmann, Botaniker und Reisender), VIII. 1., Sapindaceae.

australis RB., neuholländische, 4. t. Neuholland.

Staehelina L. (Benedict Staehelin, ein schweizer Botaniker), XIX. 1., Compositae-Cynarocephalae.

arborescens L., baumartige, 4. k. Creta, Südfrankreich.

dubia L., zweifelhafte, 4. k. Südeuropa.

Chamaepeuce L. v. *Chamaepeuce mutica*. *gnaphalodes* L. v. *Helipterum gnaphal.*

Stanhopea Hook. (Graf Stanhope, Präsident der medicin. botan. Gesellschaft in London), XX. 1., Orchideae.

Cavendishii Lindl., Cavendish's, 4. w. Peru.

eburnea Lindl., elfenbeinweißse, 4. w. Brasilien.

Stanhopea

grandiflora Lindl., großblumige, 4. w. Trinidad.

insignis Hook., ausgezeichnete, 4. w. Trinidad.

Lindleyi Zuccar., Lindley's, 4. w. Mexico.

oculata Lindl., geäugelte, 4. w. Mexico.

quadricornis Lindl., vierhörnige, 4. w. Südamerika.

tigrina Batem., getigerte, 4. w. Mexico.

Stanleya Nutt. (Lord Stanley, Vicepräsident der Linnéischen Gesellschaft zu London), XV. III., Cruciferae.
pinnatifida Nutt., fiederspaltige, 4. k. Louisiana.

Stapelia L. (J. B. van Stapel, holländischer Gelehrter), V. II., Asclepiadeae.

I. Caruncularia Haw.

pedunculata Mass., langstielige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

II. Duvalia Haw.

caespitosa Mass., rasenartige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

compacta Haw., dichte, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

elegans Mass., zierliche, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

glomerata Haw., knaulförmige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

hirtella Jacq., feinhaarige, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

Jacquini R. et S. (*radiata* Jacq.), Jacquin's, 4. f. t.

w. Cap der guten Hoffnung.

laevigata Haw., glatte, 4. f. t. w. Cap der guten H.

mastodes Jacq., breitwarzige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

radiata Sims, strahlige, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

reclinata Mass., rückwärtsgeneigte, 4. f. t. w. Cap

der guten Hoffnung.

replicata Jacq., umgeschlagene, 4. f. t. w. C. d. g. H.

tuberculata Haw., höckerige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

III. Genuina.

acuminata Mass., zugespitzte, 4. f. t. w. C. d. g. H.

ambigua Mass., zweifelhafte, 4. f. t. w. C. d. g. H.

aperta Mass., offene, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

arida Mass., dürre, 4. f. t. w. Cap der guten Hoffn.

Asterias Mass., sternförmige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

brevirostris W., kurzschnabelige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

canescens Haw., weißgrauliche, 4. f. t. w. C. d. g. H.

comata Jacq., schopfige, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

concinna Mass., nette, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

cordata Haw., herzförmige, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

deflexa Jacq. (*reflexa* Haw.), herabgebogene, 4. f. t. w.

Cap der guten Hoffnung.

fissirostris Jacq., spaltschnabelige, 4. f. t. w. Cap

der guten Hoffnung.

flavicomata Haw., gelbschopfige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

glandulifera Haw., drüsige, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

glanduliflora Mass., drüsenblumige, 4. f. t. w. Cap

der guten Hoffnung.

Gordoni Mass., Gordon's, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

grandiflora Mass., großblumige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

Gussoneana Jacq. fil. (*europaea* Guss.), Gussone's, 4.

f. t. Sicilien.

hamata Jacq., hakenförmige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

hirsuta L., rauhhaarige, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

β) *atra* Jacq.

hispidula Hornem., steifhaarige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

incarnata Mass., fleischfarbige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

juvencula Jacq., junge, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

lanigera Haw., wollige, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

Stapelia

lucida DC., spiegelnde, 4. f. t. w. Cap der gut. H.
mamillaris Thbg., W., zitzenförmige, 4. f. t. w. Cap
 der guten Hoffnung.

Massoni Haw., Masson's, 4. f. t. w. Cap der gut. H.
multiflora DC., vielblumige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.
ophiuncula Haw., schlangenförmige, 4. f. t. w. Cap
 der guten Hoffnung.

patula W. (*sororia* Jcq.), absteheude, 4. f. t. w. Cap
 der guten Hoffnung.

pilifera Mass., haartragende, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

pulvinata Mass., polsterförmige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

ramosa Mass., ästige, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

rufa Mass., fuchsrothe, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

sororia Mass., verschwisterte, 4. f. t. w. C. d. g. H.

spectabilis Haw. (*grandiflora* Sims), ansehnliche, 4. f.

t. w. Cap der guten Hoffnung.

stellaris Jacq., Haw., sternblumige, 4. f. t. w. Cap
 der guten Hoffnung.

IV. Gonostemon Haw.

divaricata Mass., ausgespreizte, 4. f. t. w. C. d. g. H.

pallida Haw., bleiche, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

stricta Ker, steife, 4. f. t. w. Cap der guten Hoffn.

V. Obesia Haw.

decora Mass., zierliche, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

geminata Mass., paarblumige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

serrulata Jacq., feinsägige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

VI. Orbea Haw.

anguinea Jacq., schlangenähnliche, 4. f. t. w. Cap
 der guten Hoffnung.

bisulca Donn, Haw., zweifurchige, 4. f. t. w. Cap
 der guten Hoffnung.

bufonia Jacq., krötenartige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

clypeata Jacq., schildförmige, 4. f. t. w. Cap d. g. H.

conspurcata W., getüpfte, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

Curtisii Haw. (*variegata* Curt.), Curtis's, 4. f. t. w.

Cap der guten Hoffnung.

inodora Haw., geruchlose, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

lepida Jacq., schülferige, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

maculosa Jacq., gefleckte, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

marginata W., berandete, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

marmorata Jacq., marmorirte, 4. f. t. w. C. d. g. H.

mixta Haw., gemischte, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

mutabilis Jacq., veränderliche, 4. f. t. w. C. d. g. H.

normalis Jacq., normale, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

orbicularis Haw., kreisförmige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

picta Haw., bemalte, 4. f. t. w. Cap der gut. Hoffn.

planiflora Jacq., flachblumige, 4. f. t. w. C. d. g. H.

quinquenervis Haw., fünfnervige, 4. f. t. w. Cap
 der guten Hoffnung.

retusa Haw., abgestutzte, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

rugosa Jacq., runzelige, 4. f. t. w. Cap der gut. H.

trisulca Jacq., dreifurchige, 4. f. t. w. Cap d. gut. H.

variegata L., bunte, 4. f. t. w. Cap der guten Hoffn.

Wendlandiana R. et S. (*rugosa* Wendl.), Wendland's, 4.
 t. w. Cap der guten Hoffnung.

Woodfordiana Haw., Woodford's, 4. f. t. w. C. d. g. H.

VII. Pectinaria Haw.

articulata Mass., gegliederte, 4. f. t. w. C. d. g. H.

Stapelia

VIII. Piaranthus RB.

parviflora Mass., kleinblumige, 4. ♂ t. w. C. d. g. H.
pulla Mass. (*fasciculata* Thbg.), dunkelbraune, 4. ♂ t.
 w. Cap der guten Hoffnung.

punctata Mass., punktirte, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.

IX. Podanthes Haw.

ciliata Thbg., gefranzte, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.
irrorata Mass., getüpfelte, 4. ♂ t. w. Cap d. gut. H.
pulchella Mass., hübsche, 4. ♂ t. w. Cap d. gut. H.
pulchra Haw. (*verrucosa* Bot. mag.), schöne, 4. ♂ t.
 w. Cap der guten Hoffnung.

roriflua Jacq., bethaute, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.
verrucosa Mass., warzige, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.

X. Tridentea Haw.

depressa Jacq., niedergedrückte, 4. ♂ t. w. C. d. g. H.
gemmiflora Mass., knospenblumige, 4. ♂ t. w. Cap
 der guten Hoffnung.

hircosa Jacq. (*moschata* Haw.), bockige, 4. ♂ t. w.
 Cap der guten Hoffnung.

paniculata Jacq., rispige, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.
Simsii Haw. (*vetula* Sims), Sims's, 4. ♂ t. w. Cap
 der guten Hoffnung.

stygia Haw., dunkelfarbige, 4. ♂ t. w. Cap d. g. H.
vetula Haw., ältliche, 4. ♂ t. w. Cap der gut. Hoffn.

XI. Tromotriche Haw.

fuscata Jacq., bräunliche, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.
glauca Haw., blaugrüne, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.
obliqua W., schiefe, 4. ♂ t. w. Cap der gut. Hoffn.
pruinosa Mass., bereifte, 4. ♂ t. w. Cap der gut. H.
revoluta Mass., zurückgerollte, 4. ♂ t. w. C. d. g. H.
adscendens Roxb. v. *Caralluma adscendens*. *barbata*
 Mass. etc. v. *Huernia barbata* etc.

Staphylea L., Pimpernuß, V. III., Sapindaceae- Staphyleaceae.

occidentalis Sw., westliche, ♂ w. Jamaika.

pinnata L., gefiederte, ♂ f. Mittel- und Südeuropa.

trifolia L., dreiblättrige, ♂ f. Nordamerika.

Bumalda DC. v. *Bumalda trifolia*.

Starkea umbellata v. *Liabum Brownii*. *spinulosa* Nutt. v.
Aplopappus spinulosus.

Statice L. (et *Taxanthema* RB.), Wegerichnelke, V. v., Plumbagineae.

I. Genuina.

acerosa W. (*Echinus* Sm.), nadelblättrige, ♂ k. Grie-
 chenland, Caucasus.

acutifolia Rchb., spitzblättrige, 4. f. Oberitalien.

altaica Hort., altaische, 4. f. Sibirien.

arborea Brouss., baumartige, ♂ k. Canarische Inseln.

articulata Lois. (*rorida* Sm., *echioides* R. et S.), ge-
 gliederte, 4. k. f. b. Südeuropa.

aurea L., goldfarbige, 4. ♂ f. k. Ostsibirien.

auriculaefolia Vahl, aurikelblättrige, 4. k. Spanien,
 Portugal, Nordafrika.

auriculata Bess., geöhrt, 4. f. Podolien.

australis Spgl., neuholländische, 4. k. Neuholland.

bellidifolia Sm., maßliebenblättrige, 4. k. Griechenl.

Besseriana Andrz., Besser's, 4. f. Südrußland.

binervosa G. E. Sm., zweinervige, 4. f. England.

caroliniana Walt., carolinische, 4. f. k. Carolina.

Statice

caspia W. (*reticulata* MB.), caspische, 4. f. Caucasus, Sibirien.

cinerea Poir., aschgraue, 4. k. Cap der guten Hoffn. *conspicua* Sims, ansehnliche, 4. f. Sibirien.

cordata L., herzblättrige, 4. k. Sicilien, Griechenland. *cuneata* Hort., keilblättrige, 4. f. Sibirien.

dichotoma Cav., zweizinkige, 4. k. Spanien, Griechenl. *Echinus* L., stechende, 4. k. Griechenland, Kleinasien,

Aegypten, Caucasus.

echioides L. (*aristata* Sm.), rauhblättrige, 4. k. Südeuropa, Griechenland.

elata Fisch., hohe, 4. f. Sibirien.

emarginata W., ausgerandete, 4. k. Spanien.

ferulacea L., steckenkrautähnliche, 4. k. Süd- und Westeuropa.

flexuosa W., gebogene, 4. f. Sibirien.

foliosa Penny, blattreiche, 4. k. Griechenland.

globulariaefolia Dsf., kugelblumenblättrige, 4. k. Nordafrika.

Gmelini W., Gmelin's, 4. f. Taurien, Caucasus, Sibir. *graeca* Poir., griechische, 4. k. Griechenland.

graminifolia Ait., grasblättrige, 4. f. Südrussland.

grandiflora Loud., großblumige, 4. k. ?

imbricata P. B. Webb., ziegeldachartige, 4. k. Teneriffa.

incana L., weißgraue, 4. f. Taurien, Sibirien.

latifolia Sm. (*coriaria* Pall.), breitblättrige, 4. f. Caucasus, Mittelasien.

Limonium L., gemeine, 4. f. Europa.

β) *Pseudo-Limonium* Rchb.

macrophylla W., großblättrige, 4. k. Canar. Inseln.

minuta L., kleine, 4. k. f. Südeuropa.

monopetala L., einkronige, 4. k. Südeuropa.

mucronata L. (*crispa* P.), krause, 4. k. Nordafrika.

nana Penny, zwergige, 4. f. England.

oleaefolia Scop., Pourr., ölbaumblättrige, 4. f. Südeuropa.

ovalifolia Poir., eiblättrige, 4. k. Canarische Inseln.

pectinata Ait., kammförmige, 4. k. Canarische Inseln.

pruinosa L., bereifte, 4. k. Nordafrika.

puberula Webb. (*furfuracea* Lag.), feinhaarige, 4. k. Canarische Inseln.

pubescens DC., weichhaarige, 4. f. Süd- u. Westeuropa.

β) *furfuracea* Rchb.

purpurata L., purpurfarbige, 4. k. Cap der gut. H.

reticulata L., netzförmige, 4. k. f. b. England, Südeuropa.

scabra Thbg., scharfe, 4. k. Cap der guten Hoffn.

scoparia Pall., besenartige, 4. f. Caucasus, Sibirien.

serotina Rchb., spätblumige, 4. f. Südeuropa.

sinuata L., buchtige, 4. k. Sicilien, Griechenland.

spathulata Dsf., spatelblättrige, 4. k. Nordafrika, Creta.

speciosa L., prächtige, 4. f. Sibirien.

spicata W. (*lyrata* MB.), ährenförmige, 4. f. Caucasus.

suffruticosa L., halbstrauchige, 4. k. Taurien.

tatarica L., tatarische, 4. f. Tatarei.

tetragona Thbg., vierkantige, 4. k. Cap d. gut. H.

Thouini Vivian. (*aegyptiaca* P., *alata* W., *cuneata* Sm.), Thouin's, 4. k. Aegypten.

viminea Schrad., gartenartige, 4. f. ?

virgata W., ruthenförmige, 4. k. f. b. Spanien.

Statice

Willdenowiana Poir., Willdenow's, 4. f. b. k. Südfrankreich.

Armeria L. etc. v. *Armeria vulgaris* etc.

Stauracanthus Lk., Stachelginster, XVII. IV. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

aphyllus Lk., blattloser, 5. k. Portugal.

Steenhammera maritima Rchb. v. *Platynema marit.*

Stegania falcata RB. etc. v. *Lomaria falcata* etc.

Stelis Sw., Stelis, XX. I., Orchideae.

micrantha Sw., kleinblumige, 4. w. Jamaica.

ophioglossoides Sw., natterzungenähnliche, 4. w. Westind.

tristyla Lindl., dreigriffelige, 4. w. Brasilien.

tubata Lodd. v. *Physosiphon Loddigesii*.

Stellaria L., Sternmiere, X. III., Caryophyllaceae-
Alsineae.

Arenaria L. (*Arenaria hispanica* Spgl.), arenarienähnliche, 0. f. Spanien.

bulbosa Wulf. (*dichotoma* Scop.), knollige, 4. Kn. f. Krain.

cerastoides L. (*multicaulis* W.), hornkrautähnliche, 4. f. Nord- und mitteleuropäische Alpen, England.

crassifolia Ehrh., dickblättrige, ♂. 4. f. Nordeuropa.

dahurica W., dahurische, ♂. f. Dahurien.

dichotoma L., zweizinkige, 0. ♂. f. Sibirien.

elegans Seringe, zierliche, ♂. f. Sibirien.

Friesiana Sering. (*longifolia* Fr.), Fries's, 4. f. Sudeten, Nordeuropa.

glauca Wither. (*palustris* Retz), blaugrüne, 4. f. Europa.
b) *Dilleniana* Mch.

graminea L., grasartige, 4. f. Europa.

holostea L., großblumige, 4. f. Europa.

humifusa Sw. (*Arenaria humif.* Wahlbg., *A. norwegica* Gun.), niedergestreckte, 0. f. Norwegen.

Laxmanni Fisch., Laxmann's, 0. f. Ostsibirien.

longipes Goldie, langstielige, ♂. f. Nordamerika.

muralis Lk. (*Arenaria m.* Sbr.), Mauer-S., 0. f. Creta.

nemorum L., Hain-St., 4. f. Europa.

b) *latifolia* P.

scapigera Ait., schafttragende, 4. f. Schottland.

uliginosa Murray (*aquatica* Poll., *Alsine* Reich., *fontana* Wulf., *hypericifolia* Wigg.), Sumpf-S., 0. f. Europa.

velutina Seringe, sammethaarige, 4. f. Sibirien.

viscida MB. (*Cerastium anomalum* W. K.), schmierige, 0. f. Osteuropa, Taurien, Persien.

Stellera Chamaejasme L. et **Passerina** L. vid. *Passerina* Stelleri et annua.

Stemodia L., Spaltfädler, XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

chilensis Benth., chilesischer, 4. k. Chili.

durantifolia Sw., durantablättriger, ♂. w. Westindien.

lobelioides Lehm., lobelienähnlicher, 4. k. Chili.

maritima L., Meerstrands-S., ♂. w. Westindien.

parviflora RB., kleinblumiger, 0. f. Südamerika.

suffruticosa Bonpl. (*trifoliata* Rchb.), halbstrauchiger, 5. w. Brasilien.

verticillaris Lk. (*Conobea verticillaris* Spgl.), wirtelblättriger, 0. w. Brasilien.

viscosa Roxb., schmieriger, ♂. w. Ostindien.

Stenactis Cass., Schmalstrahl, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

annua Cass., jähriger, 0. f. Europa, Nordamerika.

Stenactis

glauca N. E. et *speciosa* Lindl. v. *Erigeron glaucus* et *speciosus*.

Stenanthera RB., Schmalbeutler, V. 1., Epacrideae.

pinifolia RB., fichtenblättriger, f. t. Neusüdwallis.

Stenia Lindl., Schmalstendel, XX. 1., Orchideae.

pallida Lindl., bleicher, 4. w. Demerara.

Stenocarpus RB., Schmalbalgkapsler, IV. 1., Proteaceae.

salignus RB., weidenblättriger, f. f. k. Neuholland.

Stenochilus RB., Dünnlippler, XIV. 11., Globulariaceae-Myoporineae.

glaber RB., kahler, f. t. Neuholland.

longifolius RB., langblättriger, f. t. Neuholland.

maculatus Ker., gefleckter, f. t. Neuholland.

viscosus Grah., schmieriger, f. t. Neuholland.

Stenomesson Herb., Dünnschwertel, VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

croceum Red., safranfarbiger, 4. Zw. w. Peru.

flavum Herb. v. *Chrysiphiala flava*.

Stenorhynchus Rich., Schmalschnabel, XX. 1., Orchideae.

calcaratum Rich., gespornter, 4. w. Hispaniola.

orchoides Rich., knabenkrautähnlicher, 4. w. Jamaica.

speciosum Rich., prächtiger, 4. w. Südamerika.

Stenospermum Swt. (*Kunzea* Rehb.), Dünnsame, XII. 1., Myrtaceae.

capitatum Swt., kopfförmiger, f. f. k. t. Neuholland.

ciliatum *, gefranzter, f. f. k. t. Neucaledonien.

corifolium Swt., corisblättriger, f. f. k. t. Neuholl.

ericaefolium *, heideblättriger, f. f. k. t. Neuholland.

Stephania W. (F. Stephan, Professor zu Moskau), VI. 1., Capparideae.

cleomoides W., cleomenähnliche, f. w. Caracas.

Sterculia L., Stinkmalve(baum), XXI. x. (XVI. vii.), Malvaceae-Sterculiaceae.

acerifolia Cunn., ahornblättrige, f. w. Neuholland.

acuminata P. B., zugespitzte, f. w. Guinea.

angustifolia Roxb., schmalblättrige, f. w. Malacka.

Balanghas L., eiförmige, f. w. Ostindien.

coccinea Roxb., scharlachfarbige, f. w. Malacka.

colorata Roxb., gefärbte, f. w. Ostindien.

diversifolia G. Don (*heterophylla* Cunn.), verschiedenblättrige, f. t. Neuholland.

foetida L., ächte, f. w. Ostindien, Molucken.

grandiflora Vent., großblumige, f. w. Ostind., Mascar.

guttata Roxb., betropfte, f. w. Ostindien.

Helicteres P., schraubenbaumähnliche, f. w. Neugranada.

Ivira Sw. (*crinita* Cav.), mähenfrüchtige, f. w. Westindien, Südamerika.

lanceolata Cav., lanzettblättrige, f. w. China, Java.

nobilis Sm., edle, f. w. Ostindien.

platanifolia L., platanenblättrige, f. t. Japan, China, Arabien.

b) flore rubro pleno.

pubescens G. Don (*Tragacantha* Lindl.), weichhaarige, f. w. Sierra Leone.

urens Roxb., brennende, f. w. Ostindien.

villosa Roxb., zottige, f. w. Ostindien.

Sterigma DC. (*Sterigmotemon* MB.), Sterigma, XV. 1., Cruciferae.

Sterigma

acanthocarpum Fisch. et Mey., stachelfrüchtiges, ☉. f. Nakitschivan.

tomentosum DC., filziges, ♂. f. Caucasus, Sibirien.

torulosum DC., knorriges, ♂. f. Caucasus.

Sternbergia W. K. (Graf Caspar von Sternberg, berühmter böhmischer Botaniker), VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.

Clusiana Ker, Clusius's, 4. Zw. f. Thracien.

colchiciflora W. K., zeitlosenblumige, 4. Zw. f. Ungarn, Taurien.

exigua Ker, kleine, 4. Zw. k. f. b. Nordafrika.

lutea Ker, gelbe, 4. Zw. f. Südeuropa, Caucasus, Griechenland.

b) *angustifolia*.

Stevenia Adams (C. v. Steven, berühmter russischer Botaniker), XV. III., Cruciferae.

alyssoides Adams, Fisch., alyssumähnliche, ☉. f. Sibirien.

cheiranthoides DC., lackähnliche, ♂. f. Sibirien.

Stevia Cav. (P. J. Esteve, Professor der Botanik zu Valencia), XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

adenophora Lag., drüsentragende, 4. k. Chili.

angustifolia H. B. K., schmalblättrige, ♀. k. t. Mexico.

callosa Cerv., schwielige, 4. k. Mexico.

connata Lag., verwachsene, ♀. k. Neuspanien.

Eupatoria W., dostenähnliche, 4. k. Mexico.

fascicularis DC., büschelförmige, ♀. k. Mexico.

fastigiata H. B. K., gipfelständige, 4. k. Neuspanien.

hyssopifolia Cav., ysopblättrige, 4. k. Neuspanien.

incanescens Lag., weißgrauliche, 4. k. Neuspanien.

ivaefolia W., ivablättrige, 4. k. Neu-Granada.

lanceolata Lag., lanzettblättrige, 4. k. Mexico.

laxiflora DC., lockerblumige, 4. k. Mexico.

lucida Lag., spiegelnde, 4. ♀. k. Neuspanien.

micrantha Lagasc., kleinblumige, 4. k. Neuspanien.

monardaefolia H. B. K., monardenblättrige, 4. k. Mexico.

nepetaefolia H. B. K., nepetablättrige, 4. k. Mexico.

ovata Lag., eiförmige, 4. k. Neuspanien.

paniculata Lag., rispige, 4. k. Neuspanien.

pilosa Lag., haarige, 4. k. Neuspanien.

pubescens Lag., feinhaarige, 4. k. Neuspanien.

purpurea Lag., purpurfarbige, 4. k. Mexico.

rhombifolia H. B. K., rautenblättrige, 4. k. Mexico.

salicifolia Cav., weidenblättrige, ♀. k. Mexico.

salviaefolia Hort., salbeiblättrige, 4. k. Mexico.

serrata Cav., sägeblättrige, 4. k. Mexico.

suaveolens Lag., feinriechende, 4. k. Neuspanien.

subpubescens Lag., wenighaarige, 4. ♀. k. Neuspanien.

ternifolia H. B. K., dreiblättrige, 4. k. Neuspanien.

tomentosa H. B. K., filzige, 4. k. Mexico.

trifida Lag., dreispaltige, 4. k. Neuspanien.

viminea Schrad., gertenförmige, 4. k. Mexico.

violacea Cervant., violette, 4. k. Mexico.

viscida H. B. K., schmierige, 4. k. Mexico.

pedata Cav. vid. *Hymenopappus pedatus*. *linearis*

W. (*lavandulaefolia* W.) v. *Palafoxia linearis*.

Stiffitia Mikan (Stift, kais. österr. Leibarzt und Protomedicus), XIX. 1., Compositae-Eupatorineae.

insignis Fisch., ausgezeichnete, 4. w. Brasilien.

Stigmaphyllon St. Hil., Narbenblatt, X. III., Malpighiaceae.

aristatum Lindl., begranntes, ♀. Sch. w. Brasilien.

auriculatum Lindl. (*Banisteria auricul.* Cav.), geöhrt, ♀. Sch. w. Brasilien.

Stilago L., Salamanderbaum, XXII. III., Tricoccae-Euphorbiaceae.

Bunius L., dreifädiger, ♀. w. Ostindien.

diandra Roxb., zweifädiger, ♀. w. Ostindien.

Stillingia Garden (B. Stillingfleet, englischer Botaniker), XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

ligustrina W., ligusterähnliche, ♀. k. f. b. Nordamer.

populnea Vahl, pappelähnliche, ♀. w. Ceylon.

sebifera Mchx., talgebende, ♀. w. China, Carolina, Cuba.

sylvatica L., Wald-St., 4. k. Carolina, Florida.

Stipa L., Pfriemengras, III. II., Gramineae.

I. *Genuina*.

Aristella L., kurzgranniges, 4. f. Südeuropa, Kleinasien.

avenacea L. (*bicolor* Trin.), haferähnliches, 4. f. Nordamerika.

bicolor Vahl, zweifarbiges, 4. k. Chili, Brasilien.

capillata L., haarförmiges, 4. f. Europa, Sibirien.

conferta Poir (*Redowskii* Trin.), gedrängtes, 4. f. Sibirien.

erecta Hort., Madrit., aufrechtes, 4. f. ?

gigantea Lagasc., riesenhaftes, 4. f. Spanien.

humilis Cav., niedriges, ☉. f. Südamerika.

juncea L., simsensförmiges, ☉. 4. f. Westeuropa, Creta, Nordamerika.

Lagascæ R. et S., Lagasca's, 4. f. Spanien, Nordafrika.

pennata L., federiges, 4. f. Europa, Sibirien.

sibirica Lam., sibirisches, 4. f. Sibirien.

striata Lk., gestreiftes, 4. k. Neuholland.

tortilis Dsf. (*paleacea* Sm., *seminuda* Hornem.), gedrehtes, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika, Cap d. g. H.

II. *Lasiagrostis* Lk.

Calamagrostis Wahlbg., rohrähnliches, 4. f. Mittel- und Südeuropa.

splendens Trin., schimmerndes, 4. f. Sibirien.

III. *Macrochloa* Kunth.

arenaria Brot., Sand-P., 4. f. b. Portugal.

tenacissima L., zähes, 4. k. Spanien, Griechenland, Nordafrika.

Stipularia Haw. v. Alsine.

Stizolobium altissimum P. etc. v. *Mucuna altissima* etc.

Stobaea Thbg. (D. Stobaeus, ein Schwede, Gönner des Linné), XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

glomerata Spgl. (*Cynara glomera* Thbg.), knaulförmige, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

pinnata L., gefiederte, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

Stoebe L., Stoebe, XIX. v., Compositae-Corymbiferae.

aethiopica L., aethiopische, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

cinerea Thbg., aschgraue, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

ericoides L., heideähnliche, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

reflexa Thbg., zurückgebogene, ♀. k. Cap d. gut. H.

Stokesia L'Her. (J. Stokes, englischer Botaniker), XIX. I., Compositae-Cynarocephalae.

cyanea L'Her., kornblumenblaue, 4. k. Südcarolina.

Stranvaesia Lindl. (W. Fox Strangways, englischer Botaniker), XII. II., Rosaceae-Pomaceae.

glauescens Lindl., blaugrünliche, ♀. f. b. Nepal.

Stratiotes L., Siggel (Wasserfeder), XXII. IX. (XI. VI.), Hydrocharideae.

aloides L., aloeähnliche, 4. Wa. f. Europa.

Stravadium Juss. (*Stravadia* P.), (malabarischer Name), XVI. VIII., Myrtaceae.

acutangulum Juss., spitzkantiges, 5. w. Ostindien.

racemosum Swt., traubiges, 5. w. Ostindien.

Streblidia Lk. v. Schoenus.

Strelitzia Ait. (Gemahlin Georg des III., Königs von England, geborene Prinzessin von Mecklenburg Strelitz), V. I., Musaceae.

angustifolia Dryand., schmalblättrige, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

augusta Thbg (*Heliconia alba* L.), herrliche, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

farinosa Dryand., mehlig, 4. w. Cap der gut. Hoffn.

humilis Lk., niedrige, 4. w. Cap der guten Hoffn.

junceae Andr., simsensförmige, 4. w. Cap der gut. H.

ovata Dryand. (*Reginae* Curt.), eiblättrige, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

parvifolia Dryand. (*Principis* Andr.), kleinblättrige, 4. w. Cap der guten Hoffnung.

Reginae Ait., königliche, 4. w. Cap der guten Hoffn.

Unbestimmtere: flava Hort., pumila Hort., spathulata Hort., stolonifera Hort.

Streptachne RB., Doppelgranne, III. II., Gramineae.

capensis N. E., capische, ☉. 4. f. k. Cap d. gut. H.

Streptanthera Swt., Drehschwertel, III. I., Irideae.

cuprea Swt., kupferfarbiger, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

elegans Swt., zierlicher, 4. k. Cap der guten Hoffn.

Streptanthus Nutt., Drehblume, XV. III., Cruciferae.

hyacinthoides Hook., hyacinthenblumige, ☉. f. Texas.

obtusifolius Hook., stumpfblättrige, ☉. f. Arkansa.

Streptium Roxb., Drehröhre, XIV. II., Verbenaceae.

asperum Roxb., rauhe, 4. w. Ostindien.

Streptocarpus Rexii Lindl. v. Henckelia Rexii.

Streptopus Mchx., Drehfuß, VI. I., Sarmentaceae (*Asparugineae*).

amplexifolius DC. (*distortus* Mchx.), stengelumfassender, 4. f. Mitteleuropäische Voralpen, Ungarn, Nordamerika, Grönland.

lanuginosus Mchx., wolliger, 4. f. Nordamerika.

roseus Mchx., rosafarbiger, 4. f. Nordamerika.

simplex D. Don, einfacher, 4. k. Nepal.

Strobilanthes N. E., Zapfenblümchen, XIV. II., Acanthaceae.

Sabiniana N. E., Sabine's, 5. w. Nepal.

Strophanthus DC., Drehblüthler, V. I., Contortae-Apocynae.

dichotomus DC., zweizinkiger, 5. w. Ostindien.

divergens Grah. (*dichotomus* Bot. reg.), divergirender, 5. w. China.

sarmentosus DC., starkwurzelnder, 5. w. Sierra Leone.

Strumaria Jacq., Kropflilie, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.

angustifolia Jacq., schmalblättrige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

crispa Ker, krause, 4. Zw. k. t. Cap der gut. Hoffn.

filifolia Jacq., fadenblättrige, 4. Zw. k. t. C. d. g. H.

gemmata Sims, knospige, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

Strumaria

linguaeifolia Jacq., zungenblättrige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

rubella Jacq., röthliche, 4. Zw. k. t. Cap der gut. H.

spiralis Ker, spiralförmige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

stellaris Ker, sternförmige, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

truncata Jacq., abgestutzte, 4. Zw. k. t. Cap d. g. H.

undulata Jacq., wellenblumige, 4. Zw. k. t. Cap der guten Hoffnung.

Struthiola L., Strauftsstrauch, IV. 1., Thymelaeaceae.

angustifolia Lam., schmalblättriger, 5. t. k. Cap der guten Hoffnung.

glabra L. (*erecta* Thbg., *stricta* Donn, *tetragona* Retz, *tuberculosa* Lam.), kahler, 5. t. k. Cap der gut. H.

imbricata Andr. (*striata* Lam.), ziegeldachblättriger, 5. t. k. Cap der guten Hoffnung.

incana Lodd., weißgrauer, 5. t. k. Cap der gut. H.

juniperina Retz. (*lucens* Poir.), wachholderähnlicher, 5. t. k. Cap der guten Hoffnung.

ovata Thbg. (*lanceolata* Retz, *myrsinites* Lam.), eiförmiger, 5. t. k. Cap der guten Hoffnung.

pubescens Retz (*virgata* Sm.), weichhaariger, 5. t. k. Cap der guten Hoffnung.

tomentosa Andr. (*chrysantha* Lichtstn.), filziger, 5. t. k. Cap der guten Hoffnung.

virgata L. (*ciliata* Andr., *longiflora* Lam., *lateriflora* Hornem.), ruthenförmiger, 5. t. k. Cap der gut. H.
β) *rubra* Andr.

Struthiopteris W., Strauhsfarren, XXIV. 1., Pterioideae.

germanica W., deutscher, 4. f. Europa, Asien.

pennsylvanica W., pennsylvanischer, 4. f. Nordamerika.

Strychnos L., Krähenaugenbaum, V. 1., Contortae-Apocynae.

axillaris Colebr., achselblumiger, 5. w. Bengalen.

coubrina L., Schlangen-K., 5. w. Molucken.

madagascariensis Thouars, madagascarischer, 5. w. Madagascar.

Nux vomica L., ächter, 5. w. Ostindien.

potatorum L., trunkenmachender, 5. w. Ostindien.

spinosa Lam., dorniger, 5. w. Madagascar.

Stuartia Cav. (*Stewartia* Auct.), (J. Stuart, Marquis von Bute, englischer Botaniker), XVI. VIII., Ternstroemiaceae.

virginica Cav. (*Malachodendron* L.), virginische, 5. f. b. k. Virginien, Carolina.

Sturmia Rchb. (*Liparis* Rich., Lindl.), (J. Sturm, deutscher Botaniker und Künstler), XX. 1., Orchideae.

bituberculata (Lindl.), zweihöckerige, 4. w. Nepal.

Correana (Spgl., Nutt.), Correa's, 4. f. b. k. Nordam.
elata (Lindl.), hohe, 4. w. Brasilien.

foliosa (Lindl.), blattreiche, 4. w. Mascarenas.

guineensis (Lindl.), guineische, 4. w. Sierra Leone.

liliifolia (Rich.), lilienblättrige, 4. f. b. k. Nordamer.

Loeselii Rchb., Loesel's, 4. f. Europa.

pendula (Lindl.), überhängende, 4. w. Ostindien.

reflexa (Lindl.), zurückgebogene, 4. w. Neuholland.

Walkeriae (Lindl., Grah.), Walker's, 4. w. Ceylon.

Stylandra Nutt., Säulenbeutel, V. 11., Asclepiadeae.

pumila Nutt., niedriger, 4. k. Carolina.

Stylidium Sw., Säulenblümchen, XX. II., Campanulaceae-Stylideae.

adnatum RB., angewachsenes, ♂. ♀. t. Südl. Neuholl.
fasciculatum RB. (*Knighthii* Hort.), büschelförmiges, ♀. t. Südliches Neuholland.

fruticosum RB., strauchiges, ♀. t. Neuholland.

graminifolium Sw. (*lineare* Sbr.), grasblättriges, 4. t. Neuholland, Van-Diemens-Land.

hirsutum RB., rauhhaariges, ♀. t. Neuholland.

junceum RB., simsensförmiges, 4. t. Neuholland.

laricifolium Rich. (*tenuifolium* RB.), lerchenblättriges, ♀. t. Neuholland.

lineare Sw., gleichbreitblättriges, 4. t. Neuholland.

scandens RB., klimmendes, 4. Sch. t. Südl. Neuholl.

Stylolepis gracilis Lehm. v. *Podolepis gracilis*.

Stylosanthes Sw., Griffelblume, XVII. IV. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

elator Sw. (*hispida* Pursh), aufgerichtete, 4. t. Nordamerika, Westindien.

erecta P. B., aufrechte, ♀. w. Guinea.

guianensis Sw., guianische, ☉. w. Guiana, Brasilien.

mucronata W., weichspitzige, 4. ♀. w. Ostindien.

procumbens Sw., niederliegende, 4. w. Westindien.

viscosa Sw., schmierige, ♀. w. Jamaica, Brasilien.

Stypandra RB., Stielaffodile, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

caespitosa RB., rasenartige, 4. k. t. Neuholland.

frutescens K. et W., strauchige, ♀. k. t. Neuholland.

glauca RB., blaugrüne, 4. k. t. Neuholland.

propinqua Cunn., verwandte, 4. k. t. Neusüdwallis.

umbellata RB., doldige, 4. k. t. Neuholland.

Styphelia Sm., Starrstrauch, V. I., Epacrideae.

adscendens RB., aufsteigender, ♀. t. Neuholland.

epacrioides Loud., epacrisähnlicher, ♀. t. Neuholland.

laeta RB., freudiger, ♀. t. Neuholland.

latifolia RB., breitblättriger, ♀. t. Neuholland.

longifolia RB., langblättriger, ♀. t. Neusüdwallis.

triflora Andr. (*glaucescens* Sbr.), dreiblumiger, ♀. t. Neusüdwallis.

tubiflora Sm., röhrenblumiger, ♀. t. Neusüdwallis.

viridiflora RB. (*viridis* Andr.), grünblumiger, ♀. t. Neusüdwallis.

cornifolia Rudg. vid. *Trochocarpa laurina*. *glauca*

La Bill. etc. vid. *Monotoca lineata* etc. *Gnidium*

Vent. (*parviflora* Andr.) v. *Leucopogon parviflorus*.

obovata La Bill. etc. vid. *Leucopogon obovatus* etc.

Oxycedrus La Bill. v. *Cyathodes Oxycedrus*. Hin-

sichtlich der übrigen s. die Gattungen *Acrotriche*, *Astroloma*, *Lissanthe* und *Stenanthera*.

Styrax T., Storax, X. I., Sapotaceae-Styracineae.

grandifolius Ait. (*officinal*. Walt.), großblättriger, ♀. k. f. b. Nordamerika.

laevigatus Ait. (*glabrum* Cav., *laeve* Walt.), glatter, ♀. k. f. b. Carolina.

officinalis L., officineller, ♀. k. f. b. Kleinasien, Syrien, Griechenland.

pulverulentus Mchx. (*laevigatus* Sims), bestäubter, ♀. k. f. b. Carolina.

Suaeda Pall., Vielkelch, V. II., Aizoideae-Atripliceae.

hortensis Forsk., Garten-V., ♀. k. Aegypten.

Suaeda

Hinsichtl. der Uebrigen s. die Gattungen Kochia, Schaninia und Schoberia.

Suardia picta Schr. v. *Melinis minutiflora*, Nachtr.

Subularia Raj., Pfriemenblatt., XV. II., Cruciferae.

aquatica L., Wasser-P., ☉. Wa. f. Mittel- u. Nordeuropa.
alpina W. v. *Arabis vochinensis*.

Succisa Vaill., Schuppenkopf, IV. I., Dipsaceae.

I. *Cephalaria* Schrad. (*Lepicephalus* Lag., *Cerionanthus* Schott).

alpina Spgl., Alpen-S., 4. f. Schweiz u. franz. Alpen.

amplexicaulis Spgl., stengelumfassender, ☉. f. Orient.

attenuata (R. et S.) (*trifida* Spgl.), verdünnter, 4. f. k.

Cap der guten Hoffnung.

centauroides Spgl. (*Scabiosa laevigata* W.), kornblumen-ähnlicher, 4. f. Südeuropa, Taurien.

corniculata (W. K.), gehörnter, 4. f. Banat.

graeca (R. et S.) (*decurrens* Sibth. Sm.), griechischer, 4. f. Griechenland.

joppica Spgl., joppischer, ☉. f. Syrien.

laevigata Spgl. (*Scabiosa coriacea* W., *cretacea* MB.), glatter, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen, Taurien.

leucantha Spgl. (*Scubiosa albescens* W.), weifsblumiger, 4. f. Südeuropa, Griechenland.

β) *rigida* Mill. γ) *Trenta* Hacq.

rigida Spgl., starrer, f. k. Cap. der gut. Hoffn.

scabra Spgl., scharfblättriger, 4. f. k. Cap d. g. H.

syriaca Spgl., syrischer, ☉. f. Syrien.

tatarica Spgl. (*Scabiosa altissima* Mill., *elata* Hornem., *atrata* Lag., *gigantea* Ledeb.), tatarischer, 4. Sibirien, Caucasus.

transylvanica Spgl., siebenbürgischer, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

uralensis Spgl., uralischer, 4. f. Rußland.

Vaillantii (M. B.) (*Sc. lancifolia* Mchx.), Vaillant's, ☉. f. Taurien, Syrien, Spanien.

II. *Genuina*.

australis Rchb. (*Scabiosa repens* Brignol.), südliche, 4. f. Oesterreich, Friaul.

β) *pseudoaustralis* (R. et S.)

pratensis Mch., Wiesen-S., 4. f. Europa.

b) *alba*. β) *glabrata* Schott.

Succowia Medik. (Suckow, Professor der Medicin zu Heidelberg), XV. I., Cruciferae.

balearica Medik., balearische, ☉. f. Balearen, Teneriffa.

Suffrenia Bell. (v. Suffren, oberital. Botaniker), II. I., Lythraeae.

filiformis Bell., fadenförmige, ☉. f. Italien.

Sutherlandia RB. (J. Sutherland, engl. Botaniker), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

frutescens RB., strauchige, f. k. Cap der gut. Hoffn.

Swainsonia Salisb. (Isaac Swainson, engl. Botaniker), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

coronillaefolia Salisb., kronenwickenblättrige, f. t. Neusüdwallis.

galegifolia RB., geifsrautenblättrige, f. t. Neusüdwallis.

b) *albiflora* RB.

lessertiaefolia DC. (*astragalifolia* Hort.), lessertienblättrige, f. t. Neusüdwallis.

- Swartzia** W. (O. Swartz, berühmter schwed. Botaniker), XIII. I., Leguminosae-Swartzieae.
grandiflora W., großblumige, ♀ w. Trinidad.
pinnata W., gefiederte, ♀ w. Trinidad.
simplicifolia W. (*simplex* Speg.), einfachblättrige, ♀ w. Caribäen.
- Sweetia** DC. (Robert Sweet, berühmter engl. Gärtner und Botaniker), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
filiformis DC., fadenförmige, ♀. Sch. w. Südamerika.
lignosa DC., holzige, ♀. Sch. w. St. Domingo.
longifolia DC., langblättrige, ♀. Sch. w. Südamerika.
- Swertia** L. (E. Swert, berühmter holländischer Gärtner), V. II., Contortae Gentianeae.
corniculata Gmel., gehörnte, ♂. f. Ostsibirien.
Michauxiana R. et S. (*americana* Speg., *corniculata* Pursh.), Michaux's, ♂. f. Canada.
perennis L., ausdauernde, 4. f. Europa, Sibirien.
carinthiaca Wulf., vid. *Lomatogonium carinthiacum* Nachtr.
- Swietenia** L., Mahagonibaum (Baron v. Swieten, berühmter Arzt zu Wien), X. I. (XVI. VI.), Hesperideae-Cedreleae.
febrifuga Roxb., fiebertreibender, ♀ w. Ostindien.
Mahagony L., echter, ♀ w. Westindien.
Chloroxylon Roxb., vid. *Chloroxylon Swietenia*.
- Syagrus** Mart., Flaschenpalme, XXI. VI. (VI. III.), Palmae.
cocoides Mart., cocosähnliche, ♀ w. Brasilien.
- Symphoricarpos** Dill. (*Symphoria* P. Pursh.), Ballbeere, V. I., Caprifoliaceae.
montanus H. B. K., Berg-B., ♀. k. Mexico.
racemosus Mchx. (*Lonicera leucocarpa* Hort.), traubige, ♀. f. Nordamerika.
 b) *puniceus* Sims.
vulgaris Mchx. (*Symphoria glomerata* Pursh.), gemeine, ♀. f. Nordamerika.
 b) *foliis variegatis*.
- Symphyandra** A. DC., Bandglocke, V. I., Campanulaceae.
armena A. DC., armenische, 4. f. h. k. Caucasus, Armenien.
pendula A. DC., überhängende, 4. f. h. k. Caucasus.
- Symphotrichum unctuosum** N. E., vid. *Aster tardiflorus* β.
- Symphytum** T. Schwarzwurz (Beinwell), V. I., Asperifoliaceae.
asperimum MB. (*asperum* Lepech., *echinatum* Ledeb.), rauhe, 4. f. Caucasus.
 b) *hybridum*.
bulbosum Schimp. (*macrolepis* Gay, *filipendulum* Bischoff, *Clusii* Gmel., *punctatum* Gaud.), zwiebelwurzige, 4. Kn. f. Südeuropa.
bullatum Jacq. (*tauricum* W.), hauchige, 4. f. Podolien.
caucasicum MB., caucasische, 4. f. Caucasus.
cordatum W. K. (*cordifolium* Baumg., *pannonicum* P.), herzblättrige, 4. f. Ungarn, Siebenb., Caucasus.
officinale L., gebräuchliche, 4. f. Europa.
 a) *patens* Sibth. (*violaceum*), β) *bohemicum* Sm. (*album*), γ) *coccineum* Hort.
orientale L., morgenländische, 4. f. Taurien, Thracien.

Symphytum

peregrinum Ledeb., fremde, 4. f. Podolien.

tuberosum L., knollige, 4. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.

Sympieza Lichtstn., Zwergheide, IV. 1., Ericaceae.

capitellata Lichtstn., kopfförmige, 5. t. Cap d. gut. H.

Symplocarpus Salisb., Kugelkolben, IV. 1., Aroideae.

foetidus Salisb. Nutt., stinkender, 4. Wa. k. Nordamerika.

Symplocos L., Rechenblume, XVIII. 11., Sapotaceae
Styraceae.

coccinea H. B. K., scharlachfarbige, 5. t. w. Mexico.

crataegoides Hamilt. D. Don, weifsdornähnliche, 5. t. Nepal.

sinica Ker., chinesische, 5. 5. t. k. China.

tinctoria L'Her., färbende, 5. k. China.

Syncarpha gnaphaloides DC., vid. *Helipterum gnaphaloides*.

Syncephalanthia Bartl., Bandköpfchen, XIX. 11.,
Compositae - Corymbiferae.

decipiens Bartl., täuschendes, 6. f. Mexico.

Syndesmanthus Klotzsch, Benth., Bandheide, IV. 1.,
Ericaceae.

articulatus Kl., *fasciculatus* Kl. et *scaber* Kl. sind
synonym mit *Blairia* gleiches Namens p. 124.

Syndesmon tuberosum Hoffmsg., v. *Thalictrum tuberosum*.

Synedrella G., Synedrelle, XIX. 11., Compositae-
Corymbiferae.

nodiflora G., knotenblumige, 6. m. f. w. Westindien.

Synnotia Swt. (W. Synnot, der auf dem Vorgebirge
der gut. Hoffn. Pflanzen sammelte), III. 1., Irideae.

bicolor Swt., zweifarbig, 4. Zw. k. t. Cap d. gut. H.

galeata Swt., helmartige, 4. Zw. k. t. Cap der g. H.

variegata Swt., bunte, 4. Zw. k. t. Cap der gut. H.

Syntherisma ciliare Schrad. etc., vid. *Digitaria ciliaris* etc.

Syrenia Andr., vid. *Erysimum*.

Syringa L., Flieder, Lilac, II. 1., Sapotaceae-Oleinae.

chinensis W., (*media* Dum. Cour., *sibirica* Hort., *dubia*

P., *rothomagensis* Renault), chinesischer, 5. f. China.

b) Lilac royal, c) sanguinea Hort. (*coccinea* Lodd.,
chinensis rubra Angl.)

Josikaea Jacq., fil. Josika's, 5. f. Siebenbürgen.

persica L., persischer, 5. 5. f. Persien.

b) alba Hort., c) laciniata Mill. (*capitata* Gmel.)

d) salvifolia Lodd.

vulgaris L., gemeiner, 5. f. Ungarn, Moldau, Persien etc.

a) coerulea Clus., b) violacea Curt. (*tatarica*

Hort.), c) alba d) alba major Lodd., e) alba plena

Lodd., f) rubra Lodd., g) rubra major Lodd.,

h) pumila Hort.

Syringodea D. et G. Don, vid. *Erica*.

Syzygium caryophyllifolium DC. etc. vid. *Calyptanthus ca-*
ryophyllifolia etc.

Szovitsia Fisch. et Mey. (J. Szovits, russischer Bota-
niker), V. 11., Umbelliferae.

callicarpa Fisch. et Mey., schönfrüchtige, 6. f. Armenien.

Tabernaemontana Plum. (J. T. Tabernaemontanus,

alter deutscher Botaniker), V. 1., Contortae Apocynae.

alba Mill. (*citrifolia* Jacq.), weisse, 5. w. Westindien.

amygdalifolia Jacq., mandelblättrige, 5. w. Südamerika.

arcuata R. et P., bogenförmige, 5. w. Peru.

Tabernaemontana

citrifolia L., citronenblättrige, f. w. Westindien.

coronaria W., gekrönte, f. w. Ostindien.

b) flore pleno.

crispa Loud., krause, f. w. Ostindien.

cymosa Jacq. (*multiflora* Lk.), afterdoldige, f. w. Neu-Granada.

densiflora Wall., dichtblumige, f. w. Ostindien.

discolor Sw., verschiedenfarbige, f. w. Jamaika.

grandiflora L., großblumige, f. w. Neu-Granada.

gratissima Lindl., angenehmste, f. w. Ostindien.

laurifolia L., lorberblättrige, f. w. Westindien, Brasilien.

muricata Lk., weichstachelige, f. w. Brasilien.

odorata Vahl, wohlriechende, f. w. Südamerika.

persicariaefolia Jacq., knöterichblättrige, f. w. Mascarenas.

undulata Vahl, wellenblättrige, f. w. Trinidad.

Amsonia Ait., vid. *Amsonia latifolia*.

Tacca Forst. (malayischer Name), VI. 1., Aroideae.

aspera Roxb., rauhe, 4. Zw. w. Ostindien.

integrifolia Ker, ganzblättrige, 4. w. Ostindien.

guineensis G. Don, guineische, 4. Zw. w. Guinea.

laevis Roxb., glatte, 4. Zw. w. Ostindien.

phalifera Boj., mascarenische, 4. Zw. w. Mascarenas.

pinnatifida Forst. (*Leontice Leontopetaloides* L.), fiederspaltige, 4. Kn. w. Molukken.

phalifera Rumph., vid. *Arum campanulatum*.

Tachigalia Aubl. (*Tachia* P.) (guianischer Name), X. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

bijuga DC. Steud. (*Leptolobium bijugum* Vogel), zweijochige, f. w. Brasilien

Tacsonia Juss. (Tacso, peruanischer Name), XVI. 11., Passifloreae.

peduncularis P., langstielige, f. Sch. w. Peru.

pinnatistipula Juss., fiederasterblättrige, f. Sch. w. Chili.

Taenitis Sw., Fadenfarren, XXIV. 1., Pteroideae.

angustifolia Spgl., schmalblättriger, 4. w. Westindien.

graminifolia Hock., grasblättriger, 4. w. Caribäen.

lanceolata Kaulf., lanzettblättriger, 4. w. Westindien.

Tagetes T., Studentenblume (Sammetblume), XIX. 11., Compositae - Corymbiferae.

angustifolia H. B. K., schmalblättrige, ©. f. m. Mexico.

caracasana Humb., caracasische, ©. f. m. Caracas.

coronopifolia W. (*clandestina* Lagasc., *Enalcida pilifera* Cass.), krähenfußblättrige, ©. f. m. Mexico.

corymbosa Swt. (*tenuifolia* H. B. K.), traubendoldige, ©. f. m. Mexico.

b) lutea.

daucoides Schrad., möhrenähnliche, ©. f. m. Chili.

erecta L., aufrechte, ©. f. m. Mexico.

b) flore pleno, c) flore fistuloso, d) flore sulfureo.

Feuillaei Bert. (*Lasthenia chilensis* DC.), Feuilléés, ©. f. m. Chili.

filifolia Lag., fadenblättrige, ©. f. m. Mexico.

florida Swt., blüthenreiche, 4. k. f. b. Mexico.

foetidissima Hort. (*tanacetifolia* Hort.), starkstinkende, ©. f. m. Mexico.

lucida Cav. (*integrifolia* Orteg.), schimmernde, 4. k. f. b. Mexico.

micrantha Cav., kleinblumige, ©. f. m. Mexico.

Tagetes

minuta L. (*glandulifera* Schrk., *glandulosa* Lk., *bonariensis* P., *montana* Hort.), drüsige, ☉. f. m. Südamer.
patula L., ausgebreitete, ☉. f. m. Mexico.

b) flore pleno, c) flore striato, d) nana, e) ranunculoides.

signata Bartl., gezeichnete, ☉. f. m. Mexico.

subvillosa Lag., wenigzottige, ☉. f. m. Mexico.

tenuifolia Cav., feinblättrige, ☉. f. m. Peru.

papposa Vent. (*pumila* Hort.), vid. *Dyssodia chrysanthemoides*.

Talauma Juss. (westind. Name), XIII. VI., Magnoliaceae.

Candollii Blum. (*T. odoratissima* et *Magnolia odoratissima* Reinwardt), de Candolles, ♀. ♀. w. Java.

Plumieri DC., Plumier's, ♀. ♀. w. Antillen.

pumila Blume, vergl. *Magnolia pumila* p. 488.

Taliera Mart. (einheimischer Name), VI. I., Palmae.

bengalensis Spgl., bengalische, ♀. w. Ostindien.

Taligalea campestris Aubl., vid. *Amasonia erecta*.**Talinum** Adans., *Talinum*, XI. I., Portulacae.

Andrewsii Swt. (*patens* Andr.), Andrew's, 4. ♀. w. Westindien.

ciliatum R et P., gefranztes, ☉. w. Peru.

crassifolium W., dickblättriges, ♀. w. ?

crenatum R. et P., gekerbtes, ☉. w. m. f. Peru.

cuneifolium W., keilblättriges, ♀. w. Arabien.

fruticosum W., strauchiges, ♀. w. Westindien.

patens W. (*reflexum* Cav.), abstehendes, ♂. w. Westind.

Anacampseros W. etc., vid. *Anacampseros rotundifolia* etc., *paniculatum* R. et P. etc., vid. *Calandrinia paniculata* etc.

Talisia Aubl. (Toulichy, guianischer Name), VIII. I., Sapindaceae.

guianensis Aubl. (*rosea* Vahl), guianische, ♀. w. Guiana.

Tamarindus T., Tamarindenbaum, XVII. II. (XVI. VI.), Leguminosae-Caesalpinieae.

indica L., indischer, ♀. w. Ostindien.

occidentalis DC., westindischer, ♀. w. Westindien.

Tamarix L., Tamariske, V. III., Aizoideae-Tamariscineae.

africana Dsf. Poir., afrikanische, ♀. ♀. f. b. k. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.

articulata Vahl, gegliederte, ♀. w. Aegypten, Ostindien.

dioica Roxb., zweihäusige, ♀. w. Ostindien.

gallica L., französische, ♀. ♀. f. b. k. Südfrankreich, Nordafrika.

α) *subtilis* Ehrenb., β) *narbonnensis* Ehbg., γ) *nilotica* Ehbg., δ) *arborea* Sbr., ε) *mannifera* Ehbg., ζ) *heterophylla* Ehbg., η) *libanotica* Lodd.

hispida W. (*pentandra* var. Pall., *tomentosa* Sm., *canescens* Desv.), steifhaarige, ♀. ♀. f. b. Am Casp. Meere.

indica W., indische, ♀. ♀. w. Ostindien.

Pallasii Desv. (*pentandra* Pall., *gallica* MB., *paniculata* Stev.), Pallas's, ♀. f. b. Caucasus.

tetrandra Pall., viermännige, ♀. ♀. f. b. Taurien.

dahurica W., *germanica* L. etc., vid. *Myricaria dahurica* etc.

Tamonea Aubl. (guianischer N.), XIV. II., Verbenaceae.

curassavica P. (*verbenacea* Sw.), curassavische, ♂. w. Westindien.

mutica P., unbewehrte, ♂. w. Guiana.

Tamus L., Schmeerwurz, XXII. VI., Sarmientaceae-Dioscoreae.

communis L., gemeine Sch., 4. f. England, Südeuropa, Mittelasien.

cretica L., cretische Sch., 4. f. k. Creta.

Elephantipes L'Her., vid. *Testudinaria Elephantipes*.

Tanacetum T., Wurmkraut (Rainfarn), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

argenteum W., silberfarbiges, 4. f. Armenien.

Barclayanum DC. (*incanum* H. Angl.), Barclay's, 4. f. Sibirien.

boreale Fisch., nördliches, 4. f. Sibirien.

canariense DC. (*fruticosum* C. Sm.), canarisches, 5. k. canarische Inseln.

Douglasii DC. (*boreale* Hort. Angl.), Douglas's, 4. f. Nordamerika.

fruticulosum Ledeb., strauchiges, 4. 5. f. Sibirien.

globiferum DC. (*obtusum* Thbg.), kugelblumiges, 4. f. k. Cap der gut. Hoffn.

grandiflorum Thbg., großblumiges, 4. h. Cap d. g. H.

linifolium Thbg., flachsblättriges, 5. k. Cap. d. g. H.

myriophyllum W., vielblättriges, 4. f. Kleinasien.

pauciflorum Richards., wenigblumiges, 4. f. Nordamer.

praecox Fisch., frühes, 4. f. Sibirien.

purpureum D. Don, purpurfarbiges, 4. f. Nepal.

sibiricum L., sibirisches, 4. f. Sibirien.

suffruticosum L., halbstrauchiges, 5. k. Cap der g. H.

Vahlia DC. (*Achillea pauciflora* W.), Vahl's, 5. k. Span.

vestitum Thbg., bekleidetes, 5. k. Cap der gut. Hoffn.

vulgare L., gemeines, 4. f. Europa, Mittelasien.

b) *variegatum*, β) *crispum*.

angulatum W., vid. *Achillea filipendulina*, *annuum*

L., vid. *Balsamita annua*, *millefoliatum* Fisch. et

Mey. v. *Achillea myriophylla*, *incanum* Dsf. (et *orientale* Hort.), vid. *Artemisia fasciculata*, *flabelliforme*

L'Her., vid. *Pentzia flabelliformis*.

Tanaecium Sw., *Tanaecium*, XIV. II., ? Solanaceae.

pinnatum W., gefiedertes, 5. w. Mascarenas, Mozambique.

Tanghinia A. P. Th. (madagascarischer Name) V. I., Contortae-Apocynae.

veneniflua A. P. Th. Poir., giftige, 5. w. Madagascar.

Tapagomea purpurea Aubl. etc., v. *Cephaelis purpurea* etc.

Taraxacum Hall. (*Leontodon* Auct.), Löwenzahn, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

bicolor DC. (*L. leucanthum* Ledeb.), zweifarbiges, 4. f. Rußland.

caucasicum DC. (M. B.), caucasischer, 4. f. Caucasus.

ceratophorum DC. (Ledeb.), hörnertragender, 4. f. Rußl.

eriopodum (D. Don), wollfüßiger, 4. f. Nepal.

erythrospermum Andr. (*L. bessarabicus* Fisch., *L. obliquus* Fr.), rothsamiger, 4. f. Bessarabien etc.

glauanthum DC. (Ledeb.), grünlichblumiger, 4. f. Rußl.

glaucescens Rchb. (M. B.) (*L. salsus* Bess.), blaugrünl. licher, 4. f. Mittel- und Osteuropa.

laevigatum DC. (*L. arcuatus* Tausch, *L. praecox* Kit., *L. cichoriaceus* Schlchr., *L. taraxacoides* Hoppe), kahler, 4. f. Europa.

β) *alpinum* (Hoppe), γ) *corniculatum* (Kit.).

leptocephalum Rchb., schlankköpfiger, 4. f. Mähren.

Taraxacum

- lyratum (Ledeb.), leierförmiger, 4. f. Rußland.
 montanum DC. (C. A. Mey.), Berg-L., 4. f. Rußland.
 nigricans (Kit.), schwärzlicher, 4. f. Ungarn.
 obovatum DC. (W.), verkehrt-eiförmiger, 4. f. Spanien.
 officinale Wigg. (*vulgare* Schrk., *Dens leonis* Dsf.), gemeiner, 4. f. Europa, Mittelasien, Nordafr. u. Amer.
 palustre DC. (*L. lividus* W. K., *L. salinus* Poll., *L. erectus* Hoppe), sumpfliebender, 4. f. Europa.

b) tenuifolius Hoppe.

- Scorzonera (Roth), haferwurzähnlicher, 4. f. Europa.
 serotinum Poir. (W. K.) spätblumiger, 4. f. Osteuropa.

Tarchonanthus L., Pelzsame, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

- camforatus L., kampferduftender, 5. k. Cap der g. H.
 ellipticus Thbg., elliptischer, 5. k. Cap der gut. Hoffn.
 dentatus Thbg., vid. Brachylaena nereifolia.

Tauscheria Fisch. (D. Tauscher zu Dresden, welcher Südrußland bereiste), XV. 1., Cruciferae.

- gymnocarpa Fisch., kahlschotige, 6. f. Sibirien.
 lasiocarpa Fisch., haarschotige, 6. f. Sibirien.

Taverniera DC. (J. B. Tavernier, ein Franzose, der den Orient bereiste), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

- lappacea DC., klettenähnliche, 5. k. t. Aegypten.
 nummularia DC., pfennigkrautblättrige, 5. k. t. Arabien.

Taxanthema australis RB., vid. Statice australis.**Taxodium** Rich., Eibencypresse, XXI. x., Coniferae-Cupressineae.

- distichum Rich., zweizeilige, 5. f. Nordamerika.
 a) patens Ait., b) nutans A. B., c) excelsum Booth,
 d) sinense Nois., e) pendulum A. B.
 juniperoides* (*capense* Loud.), wachholderähnliche, 5. k.
 Cap der guten Hoffnung.

- sempervirens Lamb., immergrüne, 5. k. f. b. Nordam.

Taxus T., Eibenbaum, XXII. XIII. (XVI. IX.), Coniferae-Taxineae.

- baccata L., gemeiner, 5. f. Europa, Mittel- u. Nordasien.
 b) fastigiata Lindl. (*hibernica* Hook), c) procumbens Lodd., d) erecta A. B., e) foliis variegatis Lodd., f) fructu luteo A. B.

- canadensis W. (*baccata*, β . *minor* Mchx.), canadischer, 5. f. Canada.

- Harringtonia Knight., Harrington's, 5. k. Penang.

- Makoya Low, Makoy's, 5. k. f. b. Japan.

- chinensis* Roxb., *elongata* Thbg., *nucifera* Kämpf.,
 vid. Podocarpus chinensis etc.

Tecoma Juss. (*Tecomaxochitl*, mexicanischer Name), XIV. II., Personatae-Bignoniaceae.

- australis RB., neuholländische, 5. Sch. k. Neuholland.
 capensis Bot. reg. (*Bign. capensis* Ait.), capische, 5. Sch. k. Cap der guten Hoffnung.

- incisa Swt. (*Bignonia inc.* Colv.), schlitzblättrige, 5. w. Südamerika.

- meonantha Swt., schmalblumige, 5. Sch. k. Neusüdwallis.
 mollis H. B. K., weiche, 5. t. Mexico.

- pentaphylla Juss. (*digitata* Bonpl.), fünfblättrige, 5. w. Westindien, Brasilien.

- radicans Juss., starkwurzeln, 5. Sch. f. b. Nordamer.
 b) minor.

Tecoma

- rosaefolia H. B. K., rosenblättrige, ♀. w. Peru.
 sambucifolia H. B. K., hollunderblättrige, ♀. w. Peru.
 sorbifolia H. B. K., ebereschenblättrige, ♀. w. Quito.
 splendida Spgl. (*Esterhazia splendida* Mikan), ansehnliche, ♀. ♀. w. Brasilien.

stans Juss., eschenblättrige, ♀. w. Westindien.

grandiflora Swt. vid. *Incarvillea grandiflora*.

Tectonia L. (Tekka, malabarischer Name), Tekkabaum, V. I., Verbenaceae.

grandis L., großer, ♀. w. Ostindien.

Teedia Rudolph. (*Borkhausenia* Roth.), Teedie, XIV. II., Personatae - Antirrhineae.

lucida Rudolph., schimmernde, ♂. k. Cap d. g. Hoffn.

pubescens Burch., weichhaarige, ♂. k. Cap der g. H.

Teesdalia RB. (R. Teesdale, ein engl. Botaniker), XV. II., Cruciferae.

nudicaulis RB. (*Iberis* DC.), nacktstengelige, ☉. f. Europa.

regularis Sm. (*Lepidium* DC.), gleichkronige, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

Telekia Baumg., vid. *Bupthalmum*.

Telephium L., Wundkraut, V. III., Portulacaceae.

Imperati L., Imperatis, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.

Telfairia pedata Hook., vid. *Joliffia africana*.

Tellima RB. (Anagramm v. Mitella), X. II., Sazifrageae.

grandiflora Dougl., großblumige, 4. f. Nordamerika.

Telopea RB., *Telopea*, IV. I., Proteaceae.

speciosissima RB., schönste, ♀. t. Neusüdwallis.

Teloxis aristata Moq. Tand., vid. *Chenopodium aristat.*

Templetonia RB. (J. Templeton, irländischer Botaniker), XVII. IV. (VI.) (XVI. VI.), Leguminosae - Papilionaceae.

glauca Sims, blaugrüne, ♀. t. Neuholland.

retusa RB., abgestutzte, ♀. t. Neuholland.

Tenoria arborescens Spgl. etc., v. *Bupleurum arboresc.* etc.

Tephrosia P., Aschenwicke, XVII. IV. (VI.), Leguminosae - Papilionaceae.

Apollinea Spgl., apollinische, ♀. w. Oberägypten.

biflora DC., zweiblumige, ♀. w. ?

candida DC., weißblättrige, ♀. w. Ostindien.

capitulata Lk., kleinköpfige, 4. w. Sandwichinseln.

caribaea P. caribäische, ♀. w. Westindien.

chilensis Trev., chilesische, 4. k. t. Chili.

chinensis Lindl., chinesische, ♀. w. China.

colonila Loud., gebaute, ♀. w. Ostindien.

fruticosa DC., strauchige, ♀. w. Ostindien.

grandiflora P., großblumige, ♀. k. Cap der guten H.

Heyniana Roxb., Heyne's, ♀. w. Ostindien.

hypargyra DC., silberweißliche, ♀. w. Ostindien.

lanceaefolia Lk., lanzettblättrige, ♀. t. ?

linearis P., gleichbreitblättrige, ♀. w. Guinea.

litoralis P., uferliebende, 4. w. Südamerika.

mucronata DC., stachelspitzige, ♀. t. Cap der gut. H.

ochroleuca P., weißgelbe, ♀. w. Westindien.

pallens P., bleiche, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

piscatoria P., Fischer-A., ♂. w. Ostindien.

purpurea P., purpurfarbige, 4. w. Ceylon.

sericea P., seidenhaarige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

stricta P., steife, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.

suberosa DC., korkige, ♀. w. Ostindien.

Tephrosia

toxicaria P., giftige, ♀. w. Südamerika.

villosa P., zottige, ♀. w. Ostindien.

virginiana P., virginische, 4. f. Nordamerika.

longifolia P., vid. *Sweetia longifolia*.

Teramnus P. Br., Laubenbohne, XVII. iv. (vi.) (Xvi. vi.) Leguminosae-Papilionaceae.

uncinatus Sw., hakige, ♀. Sch. w. Jamaica.

volubilis Sw., windende, ♀. Sch. w. Jamaica.

Terminalia L., Catappenbaum, X. i. (XXIII. i.), Combretaceae.

arbuscula Sw., strauchiger, ♀. w. Südamerika.

Bellirica Roxb., Bellirica-C., ♀. w., Ostindien.

Benzoin L. suppl. (*angustifolia* Jacq.), schmalblättriger, ♀. w. Ostindien.

Biticaria Roxb., Biticaria-C., ♀. w. Ostindien.

Catappa L., gemeiner, ♀. w. Ostindien.

Chebula Roxb., drüsiger, ♀. w. Ostindien.

citrina Roxb., citronengelber, ♀. w. Ostindien.

disticha Lodd., zweizeiliger, ♀. w. ? Ostindien.

gangetica Roxb., Ganges-C., ♀. w. Ostindien.

latifolia Sw., breitblättriger, ♀. w. Westindien.

madagascariensis Spgl. (*Fatraea* Boj.), madagascarischer, ♀. w. Madagascar.

molluccana Lam. (*glabrata* Forst.), molukkscher, ♀. w. Molukken, Societätsinseln.

procera Roxb., hoher, ♀. w. Ostindien.

rotundifolia Lodd., rundblättriger, ♀. w. ? Ostindien.

subcordata H. B. K., herzblättriger, ♀. w. Südamerika.

Ternstroemia L. (M. Ternstroem, schwedischer Naturforscher), XIII. i., Ternstroemiaceae.

brevipes DC., kurzstielige, ♀. ♀. w. Südamerika.

dentata Sw., gezahnte, ♀. ♀. w. Guiana.

peduncularis DC., langstielige, ♀. ♀. w. Caribäen.

punctata Sw., punctirte, ♀. ♀. w. Guiana.

venosa Spgl., aderige, ♀. ♀. w. Brasilien.

Terpnanthus jasminiodorus Mart. v. *Spiranthera odoratissima*.**Testudinaria** Salisb., Schildkrötenpflanze, XXII. vi., Sarmantaceae-Dioscoreae.

Elephantipes Burch., elefantenfußförmige, 4. Sch. Kn. t. Cap der guten Hoffnung.

montana Burch., Berg-S., 4. Sch. Kn. t. Cap d. g. H.

rupicola Ecklon, Felsen-S., 4. Sch. Kn. t. C. d. g. H.

sylvatica Ecklon, Wald-S., 4. Sch. Kn. t. C. d. g. H.

Tetracera L., Vierhorn, XIII. iv., Dilleniaceae.

alnifolia W. (*potatoria* Afzel.), erlenblättriges, ♀. Sch. w. Guinea.

volubilis L. (*Dillenia scandens* Hort.), windendes, ♀. Sch. w. Südamerika.

Calinea W. vid. *Doliocarpus Calinea*, *sarmentosa* Vahl, vid. *Delima sarmentosa*.

Tetracme quadricornis Bunge, vid. *Notoceras quadricorne*.**Tetradium** Lour., Vierling, XXII. iv., Amyrideae-Connaraceae.

trichotomum Lour., dreizinkiger, ♀. w. Cochinchina.

Tetragonia L., Vierecksfrucht, XII. ii., Aizoideae-Ficoideae.

crystallina L'Her., krystallartige, ☉. f. m. Peru.

decumbens Mill., niederliegende, ♀. k. Cap der g. H.

echinata Ait., igelstachelige, ♂. k. Cap der guten H.

Tetragonia

expansa Murr. (*halimifolia* Forst., *japonica* Thbg.), ausgebreitete (Neuzeeländ. Spinat), ☉. f. m. Neuzeeländ, Japan.

fruticosa L., strauchige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

herbacea L., krautartige, 4. k. Cap der gut. Hoffn.

linearis Haw., gleichbreitblättrige, ♀. k. Cap d. g. H.

obovata Haw., verkehrteiförmige, ♀. k. Cap der g. H.

spicata L., ährenförmige, ♀. k. Cap der guten Hoffn.

Tetrapteris Haw., geflügelte, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.

Tetragonolobus Riv. Scop., Spargelerbse, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

biflorus Spgl., zweiblumige, ☉. f. Sicilien, Numidien.

conjugatus Lk., gepaarte, ☉. f. Südfrankreich.

purpureus Mch., purpurfarbige, ☉. f. Italien, Südfrankr.

b) flore luteo.

siliquosus Roth, Wiesen-S., 4. f. Europa.

β) maritimus Roth.

Tetragonotheca L'Her., Würfelkelch, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

helianthoides L'Her., sonnenblumenähnlicher, 4. f. Nordamerika.

abyssinica Ledeb., vid. *Guizotia oleifera*.

Tetramerium G. fil., Viersäumler, IV. I., Rubiaceae.

odoratissimum G. fil., wohlriechendster, ♀. w. Westind.

paniculatum Spgl., rispenblumiger, ♀. ♀. w. Guiana.

Tetramicra Lindl., Vierorche, XX. I., Orchideae.

rigida Lindl. (*Brassavola elegans* Bot. mag.), starre, 4. w. Westindien.

Tetranthera Jacq., Vierfächerbeutel, IX. I., Laurineae.

Cervantesii Loud. (H. B. K.), Cervantes's, ♀. w. Mexico.

citrifolia Spgl. (*apetala* Roxb.), citronenblättriger, ♀. t. w. Coromandel, Neuholland.

dealbata RB., weisblättriger, ♀. t. Neuholland.

ferruginea RB., rostfarbiger, ♀. t. Neuholland.

glaucescens Spgl., blaugrünlicher, ♀. w. Mexico.

laurifolia Jacq., lorbeerblättriger, ♀. w. t. Japan, China.

sebifera Spgl., talggebender, ♀. w. Ostindien.

trinervia Spgl. (*Litsaea zeylanica* N. E.), dreinerviger, ♀. w. Ostindien, China.

Tetranthus Sw., Vierblümmler, XIX. II., Compositae-Eupatorineae.

litoralis Sw., uferliebender, 4. w. Hispaniola.

Tetrapeltis Wall., Vierschildchen, XX. I., Orchideae.

fragrans Wall., wohlriechendes, 4. w. Nepal.

Tetrapogon Dsf., Vierbart, III. II., Gramineae.

villosus Dsf., zottiger, ☉. f. Nordafrika.

Tetrapoma Turcz., Vierklappler, XV. II., Cruciferae.

barbareaefolium Turcz. (*Camelina b.* DC.), barbareablätteriger. ♂. f. Dahurien.

Tetrapteris Cav., Vierflügel, X. III., Malpighiaceae.

buxifolia Cav., buxusblättriger, ♀. w. Westindien.

citrifolia P., (*inaequalis* Cav.), citronenblättriger, ♀. w. Jamaica.

Tetrapterygium Fisch. et Mey., Vierflügelschote, XV. III., Cruciferae.

glatifolium Fisch. et Mey., waidblättriger, ☉. f. Armenien.

Tetratheca Sm., Vierbüchse, VIII. I., Polygalaceae-Tremandreae.

ericaefolia Sm., heideblättriger, ♀. t. Neuholland.

Tetradlea

- glandulosa La Bill., drüsige, ♀. t. Van-Diemensland.
 juncea Sm., simsienförmige, ♀. t. Neusüdwallis.
 pilosa La Bill. (*glandulosa* Sm.), haarige, ♀. t. Van-Diemensland.
 rubioides Cunn., rötheähnliche, ♀. t. Neuholland.
 thymifolia Sm., thymianblättrige, ♀. t. Neuholland.
- Teucrium** T. L., Gamander XIV. 1., Labiatae.
 abutiloides L'Her., (*macrophyllum* Lam.), großblättriger, ♀. k. Madeira.
 angustissimum Schreb. (*Chulilia* Cav.), schmälster, ♀. k. Spanien.
 Arduini Schreb., Arduin's, ♀. k. Griechenl., Kleinasien.
 asiaticum L., asiatischer, ♀. k. ? Ostindien.
 aureum Schreb. (*flavicans* Lam.), goldfarbiger, ♀. k. Westeuropa, Sicilien, Griechenland, Syrien.
 betonicum L'Her. (*betonicaefolium* Jacq., *maderense* Lam.), betonienblättriger, ♀. k. Madeira.
 Botrys L., halbquirtblüthiger, ☉. f. Europa, Mittelasien.
 bracteatum Dsf., deckblättriger, 4. k. Nordafrika.
 brevifolium Schreb., kurzblättriger, ♀. k. Creta.
 buxifolium Schreb. (*saxatile* Cav.), buxusblättriger, ♀. k. Südspanien.
 campanulatum L., glockenkelchiger, 4. k. f. b. Italien, Griechenland.
 canadense L., canadischer, 4. f. Nordamerika.
 canum Fisch. et Mey., weifsgrauer, ♀. k. Armenien.
 capitatum L., kopfförmiger, ♀. k. Westeuropa, ionische Inseln etc.
 Chamaedrys L., gemeiner, 4. f. Europa, Mittelasien.
 creticum L. (*hyssopifolium* Schreb., *rosmarinifolium* Hort.), cretischer, ♀. k. Creta.
 cubense L., cubaischer, ☉. ♂. w. Cuba.
 flavescens Schreb., gelblicher, ♀. k. Südfrankreich.
 flavum L., hellgelber, ♀. k. Südeuropa, Nordafrika.
 fruticans L., strauchiger, ♀. k. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.
- β) *latifolium* W.
 gnaphalodes L'Her., ruhrkrautähnlicher, ♀. k. Spanien.
 heterophyllum L'Her. (*canariense* Lam.), verschiedenblättriger, ♀. k. Canarische Inseln.
 hyrcanicum L., hyrcanischer, 4. f. b. k. Nordpersien, Caucasus.
 inflatum Sw., aufgeblasener, 4. w. Jamaika.
 laevigatum Vahl., glatter, 4. t. Südamerika.
 Laxmanni Murr., Laxmann's, 4. f. Osteuropa, Sibirien.
 lucidum L., starkglänzender, 4. f. k. Italien, Griechenl.
 lusitanicum Schreb., portugiesischer, ♀. k. Portugal.
 Marum L. (*Marum verum* Hort.), Katzen-G., ♀. k. Spanien.
 massiliense L., französischer, ♀. k. Südfrankr., Creta.
 montanum L., Berg-G., ♀. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa, Asien.
- β) *supinum* L.
 multiflorum L., vielblumiger, ♀. k. Spanien.
 Nissolianum L., Nissolle's, ☉. f. Spanien, Portugal.
 orchideum Lindl. (*heterophyllum* Cav.), orchisähnlicher, ♀. k. Chili.
 orientale L., morgenländischer, 4. k. f. Kleinas., Caucas.
 Polium L., Polei-G., ♀. k. Südeuropa, Asien.
 Pseudohyssopus Schreb., ysopähnlicher, ♀. k. Italien.

Teucrium

- Pseudo-Chamaepitys* L., feinblättriger, $\frac{1}{2}$ k. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.
- Pseudo-Scorodonia* Dsf., scorodonienähnlicher, $\frac{1}{2}$ k. Nordafrika.
- pumilum* L., kleiner, $\frac{1}{2}$ k. Spanien.
- pynophyllum* Schreb., dichtblättriger, $\frac{1}{2}$ k. Spanien.
- pyrenaicum* L., pyrenäischer, $\frac{1}{2}$ f. b. k. Pyrenäen.
- regium* L., königlicher, $\frac{1}{2}$ k. Spanien.
- resupinatum*, Dsf., umgekehrtkroniger, $\odot$ f. Nordafrika.
- saxatile* Lam. (*rotundifolium* P.), Gesteins-G., $\frac{1}{2}$ k. Südspanien.
- scordioides* Schreb., wasserlauchähnlicher, $\frac{1}{2}$ f. b. k. Creta, Portugal.
- Scordium* L., knoblauchduftiger (Wasserlauch), $\frac{1}{2}$ f. Europa.
- Scorodonia* L., Scorodonien-G., $\frac{1}{2}$ f. Mittel- u. Südeuropa.
- spinosum* L., dorniger, $\odot$ f. Spanien, Portug., Kleinas.
- subspinosum* Pour., wenigdorniger, $\frac{1}{2}$ k. Balearen.
- thymifolium* Schreb., thymianblättriger, $\frac{1}{2}$ k. Spanien.
- trifidum* Retz (*capense* Thbg.), dreispaltiger, $\frac{1}{2}$ k. Cap der guten Hoffnung.
- virginicum* L., virginischer, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- rhombifolium* W., vid. *Hyptis canescens*, *sibiricum* L., vid. *Nepeta sibirica*.
- Thalamia asplenifolia* Spgl., vid. *Phyllocladus rhomboidalis*, *cupressina* Spgl. vid. *Dacrydium cupressinum*.
- Thalia** L. (Joh. Thal, alter deutscher Arzt und Botaniker), I. 1., Scitamineae-Cannaceae.
- dealbata* Fras., weißliche, $\frac{1}{2}$, Wa. t. w. Südcarolina.
- geniculata* L., gegliederte, $\frac{1}{2}$ w. Westindien.
- Thalictrum** T., Wiesenraute, XIII. VI., Ranunculaceae.
- I. Genuin.
- acutilobum* DC., spitzlappige, $\frac{1}{2}$ f. Sibirien.
- alpinum* L., Alpen-W., $\frac{1}{2}$ f. Europäische Alpen, Sibirien, Nordamerika.
- ambiguum* H. Berol. (non Schlchr.), zweifelhafte, $\frac{1}{2}$ f. ? Sibirien.
- angustifolium* Jacq. (*Bauhini* Spgl., *nigricans* Gaud.), schmalblättrige, $\frac{1}{2}$ f. Europa.
- β) *heterophyllum* Wimm. et Grab. (*nigricans* DC., *Morisoni* Gmel.)
- apiculatum* Tausch., kurzspitzige, $\frac{1}{2}$ f. ?
- appendiculatum* C. A. Mey., anhängselige, $\frac{1}{2}$ f. Altai.
- aquilegifolium* L., akeleiblättrige, $\frac{1}{2}$ f. Europa, Sibirien.
- β) *atropurpureum* Jacq., γ) *formosum* Sims.
- calabricum* Spgl., calabrische, $\frac{1}{2}$ f. Calabrien, Sicilien.
- capillare* Rchb., haarförmige, $\frac{1}{2}$ f. Südeuropa.
- carolinianum* Bosc. (*rugosum* Pursh.), carolinische, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- Chelidonii* DC., Schöllkraut-W., $\frac{1}{2}$ f. k. Nepal.
- cinereum* Dsf., aschfarbige, $\frac{1}{2}$ f. ?
- clavatum* DC., keulförmige, $\frac{1}{2}$ f. Nordamerika.
- collinum* Wallr. (*minus* Jacq., *stipulaceum* Hort., *flexuosum* Rchb.), Hügel-W., $\frac{1}{2}$ f. Europa.
- concinnum* W., nette, $\frac{1}{2}$ f. ?
- contortum* L., gedrehte, $\frac{1}{2}$ f. Ostsibirien.
- Cornuti* L. (*corynellum* DC.), Cornut's, $\frac{1}{2}$ f. Nordamer.
- crenatum* DC., gekerbte, $\frac{1}{2}$ f. Südeuropa.
- cynapiifolium* Fisch., gleifseblättrige, $\frac{1}{2}$ f. Sibirien.

Thalictrum

diffusum Schrad., weitschweifige, 4. f. ?
 dioicum L., zweihäusige, 4. f. Nordamerika.
 divaricatum W., ausgesperrte, 4. f. ?
 divergens Lk. (*divaricatum* Spgl.), divergierende, 4. f. Sibirien.

elatum Jacq., hohe, 4. f. Süd- und Osteuropa.

exaltatum C. A. Mey., höchste, 4. f. Sibirien.

falcatum H. P., sichelförmige, 4. f. ?

flavum L. (*nigricans* Jacq., *anonymon* Wallr., *heterophyllum* Lej.), hellgelbe, 4. f. Europa, Sibirien.

foetidum L. (*saxatile* Vill.), stinkende, 4. f. Südeuropa, Böhmen.

β) alpestre Gaud.

galioides Nestl. (*Bauhini* Crtz.), labkrautähnliche, 4. f. Ost-, Süd- und Westdeutschland, Frankreich.

glaucescens DC., blaugrünliche, 4. f. ? Rußland.

glaucum Dsf. (*speciosum* Poir.), blaugüne, 4. f. Südeur.

laserpitiifolium W. (*lucidum* DC.), laserkrautblättrige, 4. Süd- und Westeuropa.

lucidum L. (*medium* Jacq.), starkglänzende 4. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.

mexicanum DC., mexicanische, 4. k. Mexico.

microcarpum C. A. Mey., kleinfrüchtige, 4. f. Altai.

minus L. (*majus* Jacq.; *montanum* Wallr.), kleine, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa, England.

β) pubescens Schlchr. DC. (*mont. glandulosum* Wallr.), γ) roridum Wallr. (*glaucescens* W.),

δ) dumosum K. (*majus* Sm., *elatum* Gaud., *ambiguum* Schlchr.)

nutans Dsf. (*acuminatum* Spgl.), nickende, 4. f. Südeuropa.

oligospermum Fisch., wenigsamige, 4. f. Sibirien.

palmatum Walt. Mühlbg. (*ranunculinum* W.), handförmige, 4. f. Carolina.

petaloideum L. (*stamineum* L. suppl.), grofskronige, 4. f. Südsibirien, Mongolei.

polygamum Mühlbg., vielehige, 4. f. Pennsylvanien.

purpurascens L., purpurfarbige, 4. f. Nordamerika.

repens, C. A. Mey., kriechende, 4. f. Altai.

revolutum DC. (*pubescens* Pursh.), zurückgerollte, 4. f. Nordamerika.

rosmarinifolium Nocc. Polli., rosmarinblätt., 4. f. Italien.

rufinerve Lej. et Court., rothgelbnervige, 4. f. Westdeutschland, Belgien.

rugosum Ait. (*discolor* W.), runzelige, 4. f. Nordamer.

saxatile DC. (*minus* Poll. Sm.), Gesteins-W., 4. f. Deutschland, Frankreich, England.

Schweiggerii Spgl., Schweigger's 4. f. ?

sibiricum L. (? *flexuosum* Bernh.), sibirische, 4. f. Sibir.

b) ruthenicum Hort.

simplex L. (*tenuifolium* Sw.), einfache, 4. f. Scandina-
 vien, Schweiz, Oberitalien, Dauphinée.

sparsiflorum Turcz., zerstreutblumige, 4. f. Dahurien.

squarrosus Steph., sparrige, 4. f. Sibirien.

trigynum Fisch., dreieibige, 4. f. Sibirien.

vaginatum Dsf., scheidige, 4. f. Sibirien.

II. *Syndesmon* Hffg.

anemonoides Mchx. (*S. thalictroides* *), anemonenähnliche, 4. Kn. f. Nordamerika.

Thalictrum

b) flore pleno.

tuberosum L., knollige, 4. Kn. f. Spanien.

Thamnochortus Berg., Strauchgras, XXII. III. (III. 1.), Restiaceae.

dichotomus RB., zweizinkiges, 5. k. t. Cap der g. H.

Thapsia L., Thapsie, V. II., Umbelliferae.

Asclepium L., schwalbenwurzähnliche, 4. k. f. b. Süditalien, Griechenland.

foetida L., stinkende, 4. k. f. b. Span., Italien, Griechenl.

garganica L. (*Ferula neapolitana* Tenor.), garganische, 4. k. f. b. Süditalien, Creta, Nordafrika.gummifera Spgl. (*tenuifolia* Barr., *praealta* Urv.), gum-migebende, 4. k. Griechenl., Span., Portug., Nordafr.

Laserpitii Spgl., laserkrautähnliche, 4. k. Apulien, Atlas.

trifoliata Mill. (*Ligusticum barbinode* Mchx., *Smyrniium* b. Bart., *Thaspium* Nutt.), dreiblättrige, 4. f. Nordam.

villosa L., zottige, 4. f. Südeuropa, Nordafrika.

Thea L., Theestrauch, XIII. 1. (XVI. VIII.), Ternstroemiaceae (*Camelliaceae*.)Bohea L. (*chinensis* β . *Bohea* Sims DC.), brauner, 5. 5. k. China, Japan. α) laxa Ait., β) stricta Ait.viridis L. (*chinensis* α . *viridis* Sims DC.), grüner, 5. 5. k. China, Japan.

b) latifolia Lodd.

Thelygonum L., Hundskohl, XXI. IX., Azioideae-Atripliceae.

Cynocrambe L., gemeiner, 6. f. Südeuropa, Griechenland, Ostindien.

Thelymithra Forst., Frauenmütze, XX. 1., Orchideae.

angustifolia RB., schmalblättrige, 4. Kn. t. w. Neuholl.

carnea RB., fleischfarbige, 4. Kn. t. w. Neuholland.

ixioides Sw., ixienähnliche, 4. Kn. t. w. Neuholland.

longifolia J. R. Forst. (*Forsteri* Sw.), langblättrige, 4. Kn. t. w. Neuzeeland, Van-Diemensland.

media RB., mittlere, 4. Kn. t. w. Neuholland.

pauciflora RB., wenigblumige, 4. Kn. t. w. Neuholland.

venosa RB., aderige, 4. Kn. t. w. Neuholland.

Thenardia H. B. K. (M. Thenard, berühmter franz. Chemiker), V. 1., Contortae-Apocynae.

floribunda H. B. K., blüthenreiche, 5. Sch. w. Mexico.

Theobroma L., Cacaobaum, XVIII. 1., Malvaceae-Büttneriaceae.

bicolor Humb., zweifarbiger, 5. w. Neugranada.

Cacao L., ächter, 5. w., Südamerika.

guianense W., guianischer, 5. w. Guiana.

Guazuma L., vid. *Guazuma ulmifolia*.**Theophrasta** L. (Theophrastos Eresios, griechischer Philosoph u. Naturforsch.), VI., Sapotaceae-Myrsineae.

americana L., amerikanische, 5. w. Südamerika.

Jussieui Lindl., Jussieu's, 5. w. Westindien.

longifolia L. Jacq. etc., v. *Clavija ornata* etc., *ser-**ratifolia* Hort., vid. *Brexia spinosa*.**Thermopsis** RB. (*Thermia* Nutt.), Fuchsbohne, X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.corgonensis DC. (*Thermia alpina* Spgl.), corgonische, 4. f. Altai.fabacea DC. (*rhombifolia* Rich. Nutt.), rautenblättrige, 4. f. Louisiana.

Thermopsis

lanceolata RB. (*lupinoides* Lk.), lanzettblättrige, 4. f. Sibirien, Kamschatka.

laburnifolia D. Don vid. *Piptanthus nepalensis*.

Thesium L., Leinblatt, V. 1., Sandalaceae.

alpinum L., Alpen-L., 4. f. Europa.

amplexicaule L., stengelumfassendes, 5. k. C. d. g. H.

divaricatum Jan., ausgesperartes, 4. f. Oesterreich. Litorale.

ebracteatum Hayne, deckblattloses, 4. f. Norddeutschl.

elegans Roch., zierliches, 5. k. Banat.

Linophyllum ? L. et Auct. (*intermedium* Schrad.), gemeines, 4. f. Europa, Mittelasien, Nordafrika.

montanum Ehrh., Berg-L., 4. f. Europa.

pratense Ehrh., Wiesen-L., 4. f. Europa.

ramosum Hayne (*palatinum* Roth.), ästiges, 4. f. Unterösterreich.

rostratum M. et K., schnabelförmiges, 4. f. Schweiz, Baiern, Tyrol, Salzburg.

drupaceum La Bill., vid. *Leptomeria* Billardieri,

umbellatum L., vid. *Comandra umbellata*.

Thespesia Corr., Göttermalve, XXI. VIII., Malvaceae.

grandiflora DC., großblumige, 5. w. Porto-Rico.

populnea Corr., pappelblättrige, 5. w. Ost- u. Westind. β) *guadalupensis* DC.

Thisantha glomerata Eckl. et Zeyh., v. *Crassula glomerata*.**Thlaspi** T., Täschelkraut, XV. II., Cruciferae.

alliaceum L., knoblauchduftendes, ☉. ♂. f. Mittel- u. Südeuropa, Holstein.

alpestre L. (*caerulescens* Presl, *calaminare* Lej.), Vor-alpen-T., ♂. 4. f. Mitteleuropa.

alpinum Jacq. (*sylvium* Gaud.), Alpen-T., 4. f. Schweiz, österreichische etc. Alpen.

arvense L., Acker-T., ☉. f. Europa, Nordamerika.

cepeaefolium K., fettblättriges, 4. f. b. Kärnthen, Apenninen.

ceratocarpum Murr., hörnerschotiges, ☉. f. Sibirien.

collinum MB., Hügel-T., ☉. f. Caucasus.

latifolium MB. (*Lepia latif.* Desv.), breitblättriges, 4. f. Caucasus

montanum L., Berg-T., 4. f. Mitteleuropa.

perfoliatum L. (*alpestre* Huds. Gmel.), durchwachsblättriges, ☉. ♂. f. Mitteleuropa, Mittelasien.

platycarpum Fisch. et Mey., breitschotiges, ☉. ♂. f. Natolien.

praecox Wulf., frühes, 4. f. Oesterreich. Litorale.

rotundifolium K., rundblättriges, 4. f. b. Mittel- und südeuropäische Alpen.

stylosum *, langgriffeliges, ♂. k. f. b. Neapel.

umbellatum Stev. Gmel. jun., doldiges, ☉. f. Nordpersien.

arabicum MB. (et *saxatile* L.), v. *Aethionema Buxbaumii* et *saxatile*, *bursa pastoris* L., v. *Capsella* b., *campestre* L. etc., v. *Lepidium campestre* etc.,

luteum Biv., v. *Bivonaea lutea*, *nudicaule* Dsf., v. *Teesdalia regularis*, *Psychine* W., vid. *Psychine*

stylosa.

Thomasia Gay. (M. Thomas, schweizer. Botaniker), V. 1., Malvaceae-Büttneriaceae.

dumosa Cunn., heckige, 5. t. k. Neuholland.

foliosa Gay, blattreiche, 5. t. k. Neuholland.

purpurea Gay, purpurfarbige, 5. t. k. Neuholland.

quercifolia Gay, eichenblättrige, 5. t. k. Neuholland.

Thomasia

solanacea Gay, nachtschattenähnliche, $\S$. t. k. Neuholl.
triphylla Gay, dreiblättrige, $\S$. t. k. Neuholland.

Thouinia Poir. (And. Thouin, Intendant des botanisch.
Gartens zu Paris), VIII. 1., Sapindaceae.

pinnata Turp., gefiederte, $\S$. w. Hispaniola.

Thrinax L. fil., Schilfpalme, VI. 1., Palmae.

parviflora Sw., kleinblumige, $\S$. w. Jamaika.

Thrinicia Roth., Thrinicie, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

hirta Roth., kurzhaarige, 4. f. Europa.

β) nudicalyx Lag., γ) Leysseri Wallr.

hispida Roth. (*taraxacoides* Gaud.), steifhaarige, $\odot$. f. Süd- und Westeuropa.

maroccana P. (*mauritanica* Spgl.), marokkanische, $\odot$. f. Mauritanien.

tuberosa DC., knollige, 4. Kn. f. Südeuropa.

Thryallis L., Thryallis, X. III., Malpighiaceae.

brachystachys Lindl., kurzährige, $\S$. Sch. w. Brasilien.

Thuja L., Lebensbaum, XXI. x., Coniferae-Cupressineae.

chilensis Lamb., chilesischer, $\S$. k. Chili.

cupressoides L. (*aphylla* Auct.), cypressenähnlicher, $\S$. k. Cap der guten Hoffnung.

occidentalis L., gemeiner, $\S$. f. Nordamerika, Sibirien.

b) variegata Lodd., c) odorata Marsh.

orientalis L., morgenländischer, $\S$. k. f. b. China, Japan.

b) stricta Hort., (*pyramidalis* Bauh.), c) tatarica Lodd. ?, d) nepalensis Lodd.

pendula Lamb. (*filiformis* H. Angl.), überhängender, $\S$. f. Tatarei.

pensilis Lamb., hängender, $\S$. k. China.

plicata Donn, Lamb., gefalteter, $\S$. f. Nordamerika.

sphaeroidea Rich., kugelzapfiger, 4. f. Nordamerika.

Unbestimmtere: australis Bosc., inaequalis Dsf., lineata Poir.

aphylla L., v. *Tamarix articulata*, *articulata* Vahl., vid. *Callitris quadrivalvis*.

Thunbergia L. (C. P. Thunberg, berühmter schwedischer Botaniker u. Reisender), XIV. 11., Acanthaceae.

alata Hook., geflügelte, $\S$. Sch. w. Westafrika.

b) albiflora Hook. (*leucantha* Hort.), c) flava Hffsg.

angulata Boj. Hook., kantige, $\S$. Sch. w. Madagascar.

capensis Retz., capische, $\S$. Sch. t. Cap der guten H.

coccinea Wall., scharlachfarbige, $\S$. Sch. w. Bengalen.

cordata Coll., herzblättrige, $\S$. Sch. w. Trinidad.

fragrans Roxb., wohlriechende, $\S$. Sch. w. Ostindien.

grandiflora Roxb., großblumige, $\S$. Sch. w. Ostindien.

Hawtayneana Wall., Hawtayne's, $\S$. Sch. w. Ostind. Nepal.

Thymbra L., Thymbra, XIV. 1., Labiatae.

ciliata Dsf., gefranzte, $\S$. k. Nordafrika.

spicata L., ährenförmige, $\S$. k. Levante.

verticillata L., wirtelförmige, $\S$. k. Griechenland.

Thymus T., Thymian, XIV. 1., Labiatae.

angustifolius P., (*Serpyllum* Fr., *exserens* Ehrh.), schmalblättriger, $\S$. f. Europa.

b) flore albo. β) acicularis W. K.

azoricus Ait., azorischer, $\S$. k. Azoren.

azureus Maund., azurblauer, $\S$. f. Südeuropa.

cephalotus L., großköpfiger, $\S$. k. Spanien, Portugal.

Thymus

Chamaedrys Fr. (*Serpyllum* Auct., *includens* Ehrh.),
Gamander-T., $\S$. f. Europa.

b) citriodorus Schreb., b) subcitratus Schreb.,
d) sylvestris Schreb.

citriodorus Gmel. Lk., citronenduftender, $\S$. k. f. b.
Südeuropa.

collinus MB., Hügel-T., $\S$. f. Podol., Taurien, Caucas.

corsicus P., corsischer, $\S$. k. Corsica.

creticus Brot. (*capitatus* Lk., *Satureja capitata* L.),
cretischer, $\S$. k. Süd- und Westeuropa.

elongatus Schrad., verlängerter, $\S$. k. ?

glabrescens Lk. (*adscendens* Bernh.), kahler, $\S$. f. Süd-
und Westeuropa.

hirsutus MB. (*hirtus* W.), rauhhariger, $\S$. f. Caucasus,
Croatien, ? Spanien.

humifusus Bernh. (*lanuginosus* Lk.), niedergestreckter,
 $\S$. Südeuropa.

lanceolatus Dsf., lanzettblättriger, $\S$. k. Nordafrika,
Griechenland.

lanuginosus Schk., wolliger, $\S$. f. Deutschland.

lucidus Ehrh., starkglänzender, $\S$. k. ?

Marinosci Tenor., Marinosci's, $\S$. k. Neapel.

Mastichina L., Mastix-T., $\S$. k. Spanien.

montanus W. K., Berg-T., $\S$. f. Ungarn, Siebenbürg.

numidicus Poir., numidischer, $\S$. k. Nordafrika.

nummularius MB. (*majoranaefolius* Dsf.), rundblättriger,
 $\S$. f. Caucasus, südl. Schweiz.

odoratissimus MB., wohlriechendster, $\S$. f. Südpodolien,
Taurien.

pannonicus All. (*austriacus* Bernh.), ungarischer, $\S$. f.
Mittel-, Süd- und Osteuropa.

β) Marschallianus W.

Serpyllum Rchb. ? L. (*sylvestris* Fic. et Heynh.), Quen-
del-T., $\S$. f. Europa.

b) flore albo (*inodorus* Lej.), c) fol. variegat.,
 β) reflexus Lej.

spicatus Loud., ährenförmiger, $\S$. k. Pyrenäen.

tomentosus W., filziger, $\S$. k. Spanien.

Tragoriganum L., Bocks-T., $\S$. k. Griechenland.

villosus L., zottiger, $\S$. k. Portugal.

vulgaris L., gemeiner, $\S$. f. Südeuropa, Sibirien.

b) latifolius, c) variegatus.

Zygis L., spanischer, $\S$. k. f. b. Spanien, Portugal,
acynoides Tenor., *Acynos* L. etc., v. *Calamintha*
heterophylla, *Acynos* etc., *Brauneanus* Hopp. (*Calamintha*
Scop.), *Calamintha* DC. etc., v. *Calamintha*
Nepeta, *officinalis* etc., *croaticus* P. (*marginatus*
Sm., *Piperella* L.), *ericaefolius* Roth., *filiformis* Ait.
etc., vid. *Satureja Piperella*, *varia*, *filiformis* etc.,
parviflorus Req., vid. *Mentha Requiensi*, *virgatus*
Tenor., vid. *Satureja graeca*, *virginicus* Murr., vid.
Pycnanthemum linifolium.

Thysanthus palustris Schrk., vid. *Lysimachia thysiflora*,
frutescens Ell., vid. *Wistaria frutescens*.

Thysanocarpus Hook., Franzennütschen, XV. 1., Cru-
ciferae.

curvipes Hook., krummstieliges, $\odot$. f. Californien.

elegans Fisch. et Mey., zierliches, $\odot$. f. Californien.

pulchellus Fisch. et Mey., schönes, $\odot$. f. Californien.

Thysanotus RB., Wimperkrone, VI. 1., Coronariae-Asphodeleae.

elator RB., hohe, 4. Kn. k. t. Neuholland.

intricatus Lindl., verwebte, 4. k. t. Neuholland (Schwanenflufs).

isantherus RB., gleichbeutelige, 4. Kn. k. t. Neusüdwall.

junceus RB., simsenförmige, 4. k. t. Neusüdwallis.

proliferus Lindl., sprossende, 4. k. t. Neusüdwallis.

tenuis Lindl., dünne, 4. k. t. Neuholl. (Schwanenflufs).

tuberosus RB., knollige, 4. Kn. k. t. Neuholland.

Thysselinum Riv. Hoffm., Sumpfsilge, V. 11., Umbelliferae.

palustre Hoffm. (*Plinii* Spgl., *sylvestre* et *angustifolium* Rchb.), gemeine, ♂. 4. f. Europa.

β) *intermedium* (Bess.), γ) *Schivereckii* (Bess.)

davuricum Spgl., v. *Callisace dahurica*.

Tiarella L., Spitzhütchen, X. 11., Saxifrageae.

colorans Grah., farbiges, 4. f. Nordamerika.

cordifolia L., herzblättriges, 4. f. Nordamerika.

Menziesii Pursh., Menzies's, 4. f. Nordamerika.

polyphylla D. Don, Wall., vielblättriges, 4. f. b. Nepal.

bitermata Vent., vid. *Astilbe decandra*.

Tiaridium Lehm., Tiaridium, V. 1., Asperifoliaceae.

indicum Lehm., indisches, ☉. m. f. Ostindien, Nordam.

velutinum Lehm., sammethaariges, ☉. m. f. Ostindien.

Tigarea tridentata Pursh., vid. *Purshia tridentata*.

Tigridia Juss., Tigerblume (Pfauenschwertel), XVI. 1., Irideae.

conchiflora Swt., gelbblühende, 4. Zw. k. Mexico.

pavonia Juss., rothe, 4. Zw. k. Mexico.

b) *leona* Hort.

violacea Schiede, violette, 4. Zw. k. Mexico.

Herberti Bot. mag., vid. *Cypella Herberti*.

Tilia T., Linde, XIII. 1., Tiliaceae.

alba W. Kit. (*argentea* DC., *tomentosa* Mch., *rotundifolia* Duham.), weisse, ♀. f. Ungarn.

? β) *petiolaris* DC.

americana L. (*glabra* Vent., *canadensis* Mchx.), amerikanische, ♀. f. Nordamerika.

dasystyla Stev., haargriffelige, ♀. f. Taurien.

grandifolia Ehrh. (*platyphyllos* Scop., *cordifolia* Bess., *pauciflora* Hayne, *europaea* L.), großblättrige, ♀. f. Europa.

b) *laciniata* Mill., c) *aurea* Hort.

heterophylla Vent. (*alba* Ait., *americana* du Roi), verschiedenblättrige, ♀. f. Nordamerika.

intermedia DC. (*vulgaris* Hayn., *europaea* Sm.), mittlere ♀. f. Europa.

laxiflora Mchx., lockerblumige, ♀. f. Nordamerika.

parvifolia Ehrh. (*microphylla* Vent. W., *cordata* Mill., *ulmifolia* Scop., *europaea* γ. L.), kleinblättrige, ♀. f. Europa.

b) *aurea*, c) *cucullata*.

pubescens Ait. (*caroliniana* Mill., *americana* Walt.) weichhaarige, ♀. f. Nordamerika.

β) *leptophylla* Vent. (*missisippensis* Dsf.),

rubra DC. (*triflora* Hornem., *corinthiaca* Bosc., *corallina* H. Kew.), rothe, ♀. f. Taurien, England.

Hybriden und Varietäten: *asplenifolia nova* Hort., *aurea nova* Hort., *rubricaulis* Hort., *corylifolia* Host,

Tilia

latebracteata Host, mutabilis Host, obliqua Host,
praecox Host, pyramidata Host, tenuifolia Host,
vitifolia Host.

Tiliacora Colebr. (bengalischer Name) XXII. VI. (VI. III.), Menispermaceae.

racemosa Colebr., traubige, 5. Sch. w. Ostindien.

Tillaea Michel. (M. A. Tilli, italienischer Botaniker), IV. III., Corniculatae-Crassulaceae.

muscosa L., moosähnliche, ☉. f. Mittel- und nördliches Europa.

rubescens H. B. K., röthliche, ☉. f. Chili.

aquatica L. etc., vid. *Bulliardia aquatica* etc.

Tillandsia L. (Elias Tillandsius, Prof. der Physik zu Abo), VI. I, Bromeliaceae.

acaulis Lindl., stengellose, 4. w. Brasilien.

aloefolia Hook., aloebblätterige, 4. w. Caribäen.

anceps Lodd., zweischneidige, 4. w. Westindien.

angustifolia Sw., schmalblättrige, 4. w. Westindien.

Bartramii Ell., Bartram's, 4. w. Carolina.

bracteata Hook., deckblättrige, 4. w. Westindien.

bulbosa Hook., zwiebelige, 4. Kn. Caribäen.

canescens Sw., weifsgrauliche, 4. w. Jamaika.

coarctata Gill., gedrungene, 4. w. Chili.

compressa Gill., platte, 4. w. Chili.

fasciculata Sw., büschelförmige, 4. w. Jamaika.

flexuosa Sw., gebogene, 4. w. Westindien.

b) pallida.

gracilis Gill., schlanke, 4. w. Chili.

nitida Hook., glänzende, 4. w. Jamaika.

nutans Sw., nickende, 4. w. Westindien.

obscura Lodd., dunkle, 4. w., Südamerika.

paniculata L., rispige, 4. w. Westindien.

polystachya L., vielährige, 4. w. Westindien.

psittacina Hook., papageifarbig, 4. w. Brasilien.

pulchra Hook., schöne, 4. w. Caribäen.

ramosa Gill., ästige, 4. w. Chili.

recurvata L., zurückgekrümmte, 4. w. Südamerika.

rigida Gill., starre, 4. w. Chili.

rosea Lindl., rosafarbige, 4. w. Brasilien.

serrata L., sägezahnige, 4. w. Westindien.

setacea Sw., borstenblättrige, 4. w. Jamaika.

stricta Sims, steife, 4. w. Brasilien.

tenuifolia L., dünnblättrige, 4. w. Westindien.

usneoides L., haarflechtenähnliche, 4. w. Carolina, Westindien.

utriculata L., schlauchförmige, 4. w. Westindien.

xiphioides Ker, schwertelblättrige, 4. w. Buenos Ayres.

amoena Lk., v. *Billbergia amoena*, *lingulata* L. Jacq.

vid. *Caraguata lingulata*.

Tithonia Dsf., Aurorablume, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

excelsa DC., hohe, 4. k. Mexico.

tagetiflora Dsf., tagetesblumige, ☉. m. f. Vera-Cruz.

tubaeformis Cass. (*helianthoides* Hort.), röhrenförmige, ☉. m. f. Südamerika.

Tithymalus pendulus Haw. etc., v. *Euphorbia pendula* etc.**Tittmannia** Rchb. (Dr. Tittmann, Arzt und Botaniker zu Dresden) XIV. II., Personatae-Antirrhineae.

ovata Rchb., eiförmige, ☉. f. Societätsinseln. Philippinen.

Tittmannia

viscosa Rchb., schmierige, ☉. f. m. Ostindien.

scabra Spgl., vid. *Artanema fimbriatum*.

Tococa Aubl. (Tococo, guianischer Name), X. 1., Melastomaceae.

Aubletii D. Don (*guianensis* Aubl.), Aublet's, ☿. w. Guiana.

lanata D. Don, wollige, ☿. w. Trinidad.

Tocoyena Aubl. (guianischer Name), V. 1., Rubiaceae.

longiflora Aubl., langblumige, ☿. w. Guiana.

Toddalia Juss. (Kaka Toddali, malabarischer Name), V. 1., Zanthoxyleae.

aculeata P., stachelige, ☿. w. Ostindien.

angustifolia Lam., schmalblättrige, ☿. w. Ostindien.

paniculata Lam., rispige, ☿. w. Mascarenas.

Todea W. (H. J. Tode, Bearbeiter der mecklenburgischen Flora), XXIV. 1., Osmundaceae.

africana W., afrikanische, 4. t. w. Cap der guten H.

australis RB., neuholländische, 4. t. w. Cap d. g. H.

Tofieldia Huds. (M. Tofield, engl. Botaniker), VI. III., Coronariae-Colchicaceae.

alpina Stbg. Hoppe (*borealis* Wahlbg., *pusilla* Pursh.), Alpen-T., 4. f. Mittel- u. Nordeuropa, Asien und Nordamerika.

calyculata Wahlbg. (*palustris* Huds.), Sumpf-T., 4. f. Mittel- und Nordeuropa.

glacialis Gaud., Gletscher-T., 4. f. Schweiz.

glutinosa Pursh., klebrige, 4. f. Nordamerika.

pubescens Dryand., weichhaarige, 4. f. Nordamerika.

stenopetala Sm., schmalkronige, 4. f. Nordamerika.

Tolpis Adans. G., Tolpis, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

I. *Drepania* Juss.

barbata G., bärtige, ☉. f. m. Südeuropa, Griechenland, Kleinasien.

umbellata Bertol., doldige, ☉. f. Italien, Kleinasien.

II. *Polychaetia* Tausch. (*Schmidtia* Mch.).

altissima P. (*virgata* Bertol., *Drepania ambigua* DC.), höchste, ☉. f. Frankreich, Italien.

anethifolia (Rchb.), dillblättrige, ☉. f. Madeira.

coronopifolia Bivon., krähensfußblättrige, ♂. f. k. Canarische Inseln, Sicilien.

crinita Low., bemähnte, ☉. f. Madeira.

crithmifolia DC., meerfenchelblättrige, ☉. f. Teneriffa.

filiformis DC., fadenförmige, ♂. k. Madeira.

fruticosa DC. (Mch.), strauchige, ☿. k. Madeira.

macrorrhiza DC., großwurzelige, 4. k. Madeira.

Tomea sebifera W. et *tetranthera* W., vid. *Tetranthera sebifera* et *laurifolia*.

Tontelea Aubl. (*Tonsella* Schreb.) (Ravoua-tontelle, caribäischer Name), III. 1., Evonymaceae-Hippocrateaceae.

pyriformis H. Taur., birnförmige, ☿. Sch. w. Guiana.

scandens Aubl., klimmende, ☿. Sch. w. Guiana.

Tordylium T., Zirmet (Drehkraut), V. II., Umbelliferae.

apulum Riv. (*grandiflorum* Mch.), apulischer, ☉. ♂. f. Südeuropa, Nordafrika.

β) *humile* Dsf.

maximum L., größter, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa, Mittelasien.

Tordylium

β) lusitanicum Lk. et Hffg.

officinale L., officineller, ☉. f. England, Südeuropa.

syriacum Riv., syrischer, ☉. f. Griechenland, Syrien.

Anthriscus L. etc., vid. *Torilis Anthriscus* etc., *la-*

tifolium L., vid. *Turgenia latifolia*, *siifolium* Scop.,

vid. *Heracleum austriacum* β.

Torenia L. (Olof Toren, schwedischer Botaniker), XIV.

II., Personatae-Antirrhineae.

asiatica L., asiatische, 4. w. Ostindien.

cordifolia Roxb., herzblättrige, ☉. w. Ostindien.

diffusa D. Don, weitschweifige, 4. w. Nepal.

scabra RB. Grah., vid. *Artanema fimbriatum*.

Torilis Adans. G., Heckenkörbel, V. II., Umbelliferae.

Anthriscus G. Gmel., gemeiner, ☉. f. Europa.

helvetica Gmel. (*infesta* Auct., *Scandix infesta* L.),

schweizerischer, ♂. f. Mitteleuropa.

heterophylla Guss., verschiedenblättriger, ☉. f. Istrien, Italien.

neglecta R. et S. (*infesta* Rchb.), übersehener, ☉. f. Unterösterreich.

nodosa G., knotiger, ☉. f. Südeuropa.

trichosperma Spgl., haarsamiger, ☉. f. Aegypten.

tuberculata Spgl., kleinhöckeriger, ☉. f. Syrien.

Tormentilla T., Tormentille, XII. III., Rosaceae.

erecta L., aufrechte, 4. f. Europa, Nordasien.

b) flore pleno.

reptans L., kriechende, 4. f. Europa.

Tournefortia L. (J. P. v. Tournefort, berühmter französischer Botaniker), V. I., Asperifoliaceae.

angustifolia R. et S., schmalblättrige, ♀. k. Canarische Inseln.

argentea L., silberfarbige, ♀. t. w. Ostindien, Neuhol- land, Mascarenas.

Arguzia RB., sibirische, 4. k. Taurien, Sibirien.

bicolor Sw., zweifarbige, ♀. w. Jamaika.

cymosa L. (*macrophylla* Lam.), afterdoldige, ♀. w. Jamaica.

foetidissima L., stinkende, ♀. w. Jamaica, Mexico.

fruticosa RB., strauchige, ♀. k. Teneriffa.

gnaphalioides RB., ruhrkrautähnliche, ♀. w. Westindien.

heliotropioides Hook., heliotropiumähnlicher, ♀. t. w. Buenos Ayres.

Messerschmidia RB., Messerschmid's, ♀. k. Canar. Ins.

mutabilis Vent., veränderliche, ♀. w. Java.

scabra Lam., scharfe, ♀. w. Hispaniola.

suffruticosa RB., halbstrauchige, ♀. w. Westindien.

laurifolia Vent. etc., v. *Messerschmidia laurifolia* etc.

Tourrettia Domb. (M. A. de la Tourrette, ein Freund Rousseau's), XIV. II., Personatae-Sesameae.

lappacea W., klettenähnliche, ☉. Sch. f. Peru.

Toxicodendron capense Thbg., vid. *Hyaenanche globosa*.

Trachelium L., Halskraut, V. I., Campanulaceae.

coeruleum L., blaues, ♂. ♀. k. Sardinien, Nordafrika.

diffusum L., vid. *Prismatocarpus diffusus*.

Trachymene Rudg., Runzeldolde, V. II., Umbelliferae.

gigantea Ait., riesenhafte, ♀. t. ? Neuhollland.

incisa Rudg., schlitzbilättrige, ♀. t. Neuhollland.

lanceolata Spgl., lanzettbilättrige, ♀. t. Neuhollland.

linearis Spgl., gleichbreitbilättrige, ♀. t. Neuhollland.

coerulea Grah., vid., *Huegelia cyanea*.

Trachynia distachya Lk. et *rigida* Lk. vid. *Brachypodium distachyum* etc.

Trachynotia cynosuroides Mchx. etc., vid. *Spartina cynosuroides* etc.

Trachyspermum Lk., Rausame, V. II., Umbelliferae.
copticum Lk., coptischer, ☉. f. Aegypten.
rigens G. Don, starrer, ☿. k. Cap der guten Hoffn.

Trachytella DC., Rauhblättchen, XIII. v., Dilleniaceae.
Actaea DC., windendes, ☿. Sch. t. China.

Tradescantia L. (John Tradescant, Gärtner König Carl's I. von England), VI. I., Commelinaceae.

congesta Penny, gedrängtblumige, 4. f. Nordamerika.

cordifolia Sw., herzblättrige, 4. w. Jamaika.

crassifolia Cav., dickblättrige, 4. w. t. Neuspanien.

crassiuscula Lk. (*Sellowii* Pohl.), dickliche, 4. w. Brasil.

discolor Ait., verschiedenfarbige, 4. w. Südamerika.

diuretica Mart. (*hirsuta* H. B. K.), harntreibende, 4. w.

Brasilien, Neugranada.

divaricata Vahl, ausgespernte, 4. w. Guiana, Trinidad.

erecta Cav. (*bifida* Roth.), aufrechte, ☉. f. m. Mexico.

fusca Ker, braunrothe, 4. w. Brasilien.

geniculata L., gekniete, 4. w. Westindien.

iridescens Lindl., schwertelähnliche, 4. k. t. Mexico.

latifolia R. et P., breitblättrige, ☉. f. m. Peru.

Lyonii Hort., Lyon's, 4. f. Nordamerika.

malabarica L., malabarische, 4. w. Malabar.

multiflora Sw., vielblumige, 4. w. Jamaika.

paniculata Roxb., rispige, ♂. w. Ostindien.

parviflora R. et P. kleinblumige, 4. w. Peru.

procumbens W. (*multiflora* Jacq.), niederliegende, 4. w.

Trinidad, Caracas.

pulchella H. B. K., hübsche, 4. t. w. Mexico.

rosea Mchx., rosafarbige, 4. f. b. Carolina.

speciosa L. suppl., prächtige, 4. w. Mexico, C. d. g. H.

subaspera Ker, rauhliche, 4. f. Nordamerika.

tuberosa Roxb., knollige, 4. Kn. w. Ostindien.

undata H. B. K., wellenblättrige, 4. w. Cumana.

virginica L., virginische, 4. f. Virginien, Carolina.

b) alba, c) rubra, d) plena, e) coerulea albida,

f) pilosa.

cristata L., vid. *Cyanotis cristata*.

Zanonia L., vid. *Campella Zanonia*.

Tragia Plum. (J. Bock, genannt Tragus, alter deutscher Botaniker), XXI. III., Tricoccae-Euphorbiaceae.

cannabina L. suppl., hanfähnliche, 4. w. Ostindien.

corniculata Vahl (*Vahlia* Sogl.), gehörnte, ☉. w. m.

Guiana, Trinidad.

infesta Mart., schädliche, ☉. w. m. Brasilien.

involucrata L., hüllblättrige, ☉. Sch. w. m. Ostindien.

Mercurialis L., bingelkrautähnliche, ☉. w. m. f. Ostindien, Cap der guten Hoffnung.

pedunculata P. B., stielblumige, ☿. Sch. w. Guinea.

urens L., brennende, ☉. f. Nordamerika, Westindien.

urticaefolia Mchx., nesselblättrige, ☉. f. Nordamerika.

volubilis L., windende, ☿. Sch. w. Westindien.

Tragium Sogl., Ziegendolde V. II., Umbelliferae.

Anisum Lk., Anis-Z., ☉. f. Aegypten.

apulium (Bernh.) apulische, ☉. f. Apulien.

Tragium

aromaticum Spgl. (*Gussoni* Presl., *anisoides* Brigant. *Pimpinella villosa* Schousb.), aromatische, 4. f. Ostcaucasus, Sicilien, Nordafrika.

Broteri Spgl., Brotero's, 4. k. Portugal.

Columnae Spgl., Columna's, 4. f. Südeuropa, Creta.

β) depressum Sbr. (*glaucum* Presl.)

peregrinum Spgl., fremde, 4. f. Südeuropa.

tauricum Ledeb., taurische, 4. f. Taurien.

tenuifolium Spgl. (? *tenue* Sbr.), feinblättrige, 4. k. Creta.

Tragopogon T., Bocksbart, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.

angustifolius Bell. (*parviflorus* Hornem.), schmalblättriger, ♂. f. Ligurien.

brevirostris DC., kurzschnabeliger, ♂. f. Rußland.

β) intermedius Bess., γ) podolicus Bess., δ) lithuanicus Bess.

campestris Bess., Feld-B., ♂. f. Bessarabien, Podolien.

collinus DC. (*roseus* C. A. Mey.), Hügel-B., ♂. f. Caucasus.

crocifolius L., safranblättriger, ♂. f. Südeuropa, Kleinasien.

eriospermus Tenor., wollsamiger, ♂. f. Neapel.

floccosus W. K. (*canus* W.), flockiger, ♂. f. Süd-, Nord- und Osteuropa.

livescens Bess. (*dubius* Hornem.), schlagbläulicher, ♂. f. Podolien.

major Jacq., großer, ♂. f. Deutschland.

minor Fries, kleiner, ♂. f. Schweden.

mutabilis Jacq., veränderlicher, ♂. f. Sibirien.

orientalis L. (*villosus* Habl., *undulatus* Auct.), morgenländischer, ♂. f. Sibirien, Deutschland.

phaeopappus Fisch. et Mey., braunfederiger, ♂. f. Südrußland.

porrifolius L., porreiblättriger, ♂. f. Thracien, Deutschl.

pratensis L., Wiesen-B., ♂. f. Europa.

β) tortilis K. (*revolutus* Schweig., *undulatus* Auct.).

pusillus MB., zwergiger, ♂. f. Armenien, Iberien.

roseus Trevir. (*ruber* S. G. Gmel.), rosafarbiger, ♂. f. Sibirien.

undulatus Jacq. (*orientalis* Wahlg.), wellenblättriger, ♂. Osteuropa, Kleinasien.

villosus L., zottiger, ♂. f. ? Spanien, Sibirien.

capense Jacq. etc., vid. *Urospermum capense* etc.

Tragopyrum MB., Bockweizen, VIII. 1., Polygoneae.

buxifolium MB., buxusblättriger, ♂. f. Caucas., Sibir.

lanceolatum MB., lanzettblättriger, ♂. f. Sibirien.

polygamum Spgl., vielehiger, ♂. k. f. b. Carolina.

Tragus racemosus Hall. (*muricatus* Mch.), vid. *Lappago vacemosa*.

Trapa L., Wassernuß, IV. 1., Onagrariae-Trapeae.

bicornis L., zweihörnige, 4. Wa. k. t. China.

bispinosa Roxb., zweidornige, ♂. Wa. w. Ostindien.

natans L., gemeine, ☉. Wa. f. Europa.

quadrispinosa Roxb., vierdornige, ♂. Wa. w. Ostindien.

Trautvetteria Fisch. et Mey. (E. R. v. Trautvetter, Directorgehülfe am k. botanischen Garten zu Petersburg), XIII. VI., Ranunculaceae.

Trautvetteria

palmata Fisch. et Mey., handförmige, 4. f. Virginien Carolina.

Treisia clava Haw., *Hystrix* Haw. etc., vid. *Euphorbia Haworthii* etc.

Trevirania W. (G. R. Treviranus zu Bremen und L. Ch. Treviranus, Professor der Botanik zu Bonn, ausgezeichnete Naturforscher), XIV. II., Personatae-Gesnerieae.

coccinea W., scharlachfarbige, 4. w. Jamaika.

Trevoa Cav., *Trevoa*, V. I., Rhamneae.

quinquenervis Hook., fünfnervige, 5. k. t. Chili.

triplinervis Gill., dreinervige, 5. k. t. Chili.

Trewia L. (C. J. Trew, Arzt und Botaniker zu Nürnberg), XXII. XII., ? Tricoccae-Euphorbiaceae.

nudiflora L. (*macrophylla* Roth.), nacktblumige, 5. w. Ostindien.

Trianthema Sauv., Dreiblümchen, X. II., Portulacaeae.

decandrum L., zehnfädiges, 6. w. m. f. Ostindien.

monogynum L., einweibiges, 6. w. m. f. Aegypten, Westindien.

obcordatum Roxb., verkehrtherzförmiges, 6. w. m. f. Ostindien.

Trias Lindl., Triangelorche, XX. I., Orchideae.

oblonga Lindl., längliche, 4. 5. w. Ostindien.

Tribrachia Lindl., Dreiähre, XX. I., Orchideae.

pendula Lindl., überhängende, 4. w. Sierra Leone.

Tribulus T., Bürzeldorn, X. I., Zygophylleae.

albus Poir., weißer, 6. w. m. f. Guinea.

cistoides L., cistusähnlicher, 4. w. Südamerika.

lanuginosus L., wolliger, 6. w. m. Ostindien.

litoralis Ait., Ufer-B., 4. t. w. Neuholland.

maximus L., größter, 6. w. m. Westindien.

subinermis, Fisch., thibetanischer, 6. m. f. Thibet.

terrestris L., gemeiner, 6. f. Südeuropa, Mittelasien, Afrika.

trijugatus Nutt., dreipaariger, 6. m. f. Georgien (Nordam.).

Trichaeta P. B., Dreiborste, III. II., Gramineae.

ovata P. B., eiförmige, 6. ♂. f. Spanien.

Trichera *arvensis* R. et S., et *ciliata* R. et S. etc., vid. *Knautia arvensis* etc.

Trichilia L., Trichilie, X. I. (XVI. VI.), Hesperideae-Meliaceae.

glandulosa Sm., drüsige, 5. w. t. Neuholland.

havanensis Jacq. (*glabra* Murr.), kahle, 5. Cuba, Mexico.

hirta L., kurzhaarige, 5. w. Jamaika.

odorata Andr., riechende, 5. w. Westindien.

spondioides Jacq., mombinpflaumenähnliche, 5. w. Westindien.

Trichocentrum Pöpp., Haarstendel XX. I., Orchideae.

fuscum Lindl., braunblumiger, 4. w. Mexico.

iridifolium G. Lodd., schwertelblättriger, 4. w. Südamer.

Trichochloa *capillaris* R. et S. etc., vid. *Mühlenbergia capillaris* etc., *foliosa* Trin. etc., v. *Cinna filiformis* etc.

Trichocephalus Brogn., vid. *Phylica*.

Trichocladus P. (*Dahlia* Thbg.), Haarast, XXII. II., ? Cunoniaceae.

crinitus P., bemähter, 5. f. Cap der guten Hoffn.

Trichocrepis *bifida* Visian vid. *Lagoseris bifida*.

- Trichodesma** RB., Haarboretsch, V. I., Asperifoliaceae.
africanum Lehm., afrikanischer, ☉. f. Cap d. g. Hoffn.
indicum Lehm., indischer, ☉. m. f. Ostindien.
zeylanicum RB., zeylonischer, ☉. m. f. Ostind., Neuhol.
- Trichodium** *alpinum* Schrad. etc., v. *Agrostis rupestris* etc.
- Tricholaena** Schrad., Haarfennich, III. II., Gramineae.
arenaria N. E., Sand-H., 4. k. Cap der guten Hoffn.
capensis, N. E., capischer, 4. k. Cap der gut. Hoffn.
micrantha Schrad. (*Agrostis ptumosa* Tenor., *Panicum villosum* Presl.), kleinblumiger, 4. k. Sicilien, Teneriffa.
rosea N. E., rosafarbiger, 4. k. Cap der guten Hoffn.
tonsa N. E., beschorener, 4. k. Cap der guten Hoffn.
- Trichomanes** L., Haarfarn, XXIV. I., Pterioideae.
brevisetum H. Kew., kurzborstiger, 4. k. England.
membranaceum L., häutiger, 4. w. Westindien.
- Trichonema** Ker., Haarschwertel, III. I., Irideae.
Bulbocodium Ker, rinnenblättriger, 4. Zw. f. b. k. Südeuropa.
caulescens Bot. mag., stengeliger, 4. Zw. k. C. d. g. H.
chloroleucum Ker, gelblichweißser, 4. Zw. k. C. d. g. H.
coelestinum Swt., himmelblauer, 4. Zw. k. Carolina.
Columnae Tenor., Columna's, 4. Zw. k. Neapel.
cruciatum Jacq., kreuzförmiger, 4. Zw. k. C. d. g. H.
filifolium Ker, fadenblättriger, 4. Zw. k. C. d. g. H.
longifolium Salisb. (*cruciatum* Ker), langblättriger, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.
pudicum Ker, schamrother, 4. Zw. k. Cap der g. H.
purpurascens Swt., purpurfarbiger, 4. Zw. k. Neapel.
quadrangulum Swt., vierkantiger, 4. Zw. k. C. d. g. H.
ramiflorum Swt., astblumiger, 4. Zw. f. b. k. Neapel.
recurvum Spgl., zurückgekrümmter, 4. Zw. k. C. d. g. H.
roseum Ker, rosafarbiger, 4. Zw. k. Cap der guten H.
speciosum Ker, prächtiger, 4. Zw. k. Cap der gut. H.
tortuosum Ker, gewundener, 4. Zw. k. Cap der g. H.
monadelphum Swt., vid. *Spatanthus speciosus*.
- Trichopetalum** Lindl., Haaraffodile, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.
gracile Lindl., schlanke, 4. k. Chili.
stellatum Lindl., sternförmige, 4. k. Chili.
- Trichophorum** Rich. P., vid. *Eriophorum*.
- Trichophyllum** *lanatum* Nutt., *oppositifolium* Nutt. (*Bahia lanata* DC., *oppositifolia* DC., *Helenium oppositifol.* Spgl.), v. *Eriophyllum caespitosum et oppositifolium*.
- Trichopilia** Lindl., Haarhütchen, XX. I., Orchideae.
tortilis Lindl., gedrehtes, 4. w. Mexico.
- Trichorrhiza** *teretifolia* Lindl., v. *Vanda trichorrhiza*.
- Trichosanthes** L., Haarblume, XXI. x. (XVI. I.), Cucurbitaceae.
Anguina L., schlangenfrüchtige, ☉. m. w. Südchina.
colubrina Jacq., natterähnliche, ☉. m. w. ?
cucumerina L., gurkenähnliche, ☉. m. w. Ostindien.
cordata Roxb., herzförmige, ☉. m. w. Ostindien.
lobata Roxb., gelappte, ☉. m. w. Ostindien.
foetidissima Jacq., vid. *Melothria foetida*, *tuberosa* W. (*corniculata* Lam.), vid. *Ceratosanthes tuberosa*.
- Trichostemma** L., Haarfädler, XIV. I., Labiatae.
dichotomum L., zweizinkiger, ☉. f. Nordamerika.
lineare Mühlbg., gleichbreiter, ☉. f. Nordamerika.
brachiatum L., vid. *Isanthus coeruleus*.
- Tricondylus** *myricoides* Salisb., v. *Lomatia longifolia*.

- Tricoryne** RB., Tricoryne, VI. 1., Coronariae.
 elatior RB., aufgerichtete, 4. k. t. Neuholland.
 scabra RB., scharfblättrige, 4. k. t. Neuholland.
 simplex RB., einfache, ♂. k. t. Neuholland.
- Tricratus** L'Her., Hüllennymtagine, V. 1., Nyctagineae.
 admirabilis L'Her., wunderbare, 4. k. f. b. Californien.
- Tricuspis** P. B. (*Tridens* R. et S.), Dreispitzgras, III. II., Gramineae.
 quinquefida P. B., fünfspaltiges, 4. f. Nordamerika.
- Tridax** L., Dreizinke, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
 procumbens L., langstielige, ☉. f. m. Mexico, Neuspan.
- Tridentea** Haw., vid. Stapella.
- Trientalis** Rupp., Schirmkraut, VII. 1., Primulaceae.
 americana Pursh., amerikanisches, 4. f. Nordamerika.
 europaea L., europäisches, 4. f. Europa.
- Trifolium** T., Klee, Dreiblatt, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
 agrarium L. (*aureum* Poll.), Hopfen-K., ☉. ♂. f. Europa.
 alatum Bivon. (*Cupani* Tin., *physodes* MB.), geflügelter, 4. f. Sicilien, Caucasus.
 albens Fisch. (*Lupinaster*, *β albiflor.* Sering.), weißer, 4. f. Sibirien.
 albidum Retz., weißlicher, ☉. f. ?
 alexandrinum L., alexandrinischer, ☉. f. Aegypten.
 alpestre L., Voralpen-K., 4. f. Europa.
 b) flore albo.
 alpinum L., Alpen-K., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
 angulatum W. K., eckiger, ☉. f. Ungarn.
 angustifolium L., schmalblättriger, ☉. f. Südeuropa,
 Cap der guten Hoffnung.
 anomalum Schrk, ungewöhnlicher, 4. f. ?
 armenium W., armenischer, 4. f. Armenien.
 arvense L., Acker- (Hasen-)K., ☉. f. Europa, Mittelasiens.
 β) gracile Thuill.
 badium Schrb., kastanienbrauner, ♂. f. Mitteleuropäische Alpen.
 Bocconi Sav. (*semigladium* Brot.), Boccone's, ☉. f. Italien, Frankreich, Portugal.
 β) collinum Bat.
 bracteatum Schousb., deckblättriger, ♂. f. Nordafrika.
 caespitosum Reyn. (*Thalii* Vill.), rasenartiger, 4. f. Tyrol, Schweiz.
 campestre Schrb. (*procumbens* Sm.), Feld-K., ☉. f. Europa.
 canescens W., graulicher, 4. f. Kleinasien.
 cernuum Brot., übergebogener, ☉. f. Spanien, Portugal.
 Cherleri L., Cherler's, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.
 cinctum DC., ungürteter, ☉. f. Südfrankreich.
 clandestinum Lagasc., heimlichblumiger, ☉. f. Spanien.
 clypeatum L., schildförmiger, ☉. f. Griechenl., Kleinas.
 coerulescens MB., bläulicher, ☉. f. Caucasus.
 comosum L. (*carolinianum* Mchx., *arvense* Walt.), schopfger, 4. ♂. f. Carolina.
 congestum Guss., gedrängtblumiger, ☉. f. Sicilien.
 constantinopolitanum Sering., Konstantinopolitanischer, ☉. f. Türkei.
 cyathiforme Lindl., becherförmiger, 4. f. Columbia.
 dalmaticum Vis., dalmatischer, ☉. f. Dalmatien.
 decipiens Hornem., täuschender, ☉. f. ?
 diffusum Ehrh. (*ciliolum* Thuill.), weitschweifiger, ♂. f. Ungarn, Taurien, Frankreich.

Trifolium

divaricatum Hornem., ausgesperrter, ☉. f. Südeuropa.
echinatum MB., igelköpfiger, ☉. f. Caucasus.
elegans Sav. (*Vaillantii* Poir.), zierlicher, 4. f. Süd- und Westeuropa.

erinaceum MB., pfriemenstacheliger, ☉. f. Caucasus.
expansum W. K., ausgestreckter, 4. f. Ungarn.
filiforme L. (*minus* Sm. Relh.), fadenförmiger, ☉. f. Europa.

fimbriatum Lindl., gefranzter, 4. f. Columbia.
flavescens Tin., gelblicher, ☉. f. Sicilien.
fragiferum L., erdbeerköpfiger, 4. f. Europa, Kleinasien.
fuscum Lindl., bräunlicher, ☉. f. Californien.
gemellum Pourr., paarähriger, ☉. f. Spanien.
globosum L., kugelförmiger, ☉. f. Kleinasien, Arabien, Südchina.

glomeratum L., knaulförmiger, ☉. f. England, Westeur.
grandiflorum Ledeb. (*eximium* Fisch.), großblumiger, 4. f. Sibirien.

b) *albiflorum*.

Gussoni Tin., Gussone's, ☉. f. Sicilien.
hispidum Dsf. (*hirtum* All., *laguroides* Pourr.), steifhaariger, ☉. f. Südeuropa, Nordafrika.

β) *pictum* Roth.

hybridum L., Bastard-K., 4. f. Europa, Mittelasien.
incarnatum L., fleischfarbiger, ☉. f. Südeuropa.

b) *flore albo*, β) *Molinieri* Balb.

intermedium Guss., mittlerer, ☉. f. Sicilien.
involucratum W. (*Wildenowii* Spgl.), eingehüllter, ☉. f. Mexico.

Kitaibelianum Ser. (*conicum* Hornem.), Kitaibel's, ☉. f. Ungarn.

Lagascanum Sering. (*conicum* Lag.), Lagasca's, ☉. f. Spanien.

Lagopus Pourr., Hasenpfötchen-K., ☉. f. Spanien, Pyrenäen.
lappaceum L., klettenartiger, ☉. f. Südeuropa, Taurien, Caucasus.

lasiocephalum Lk. (*hirsutum* Hort.), wollköpfiger, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

latinum Sebast., römischer, 4. f. Mittelitalien.

leucanthum MB., weißblumiger, ☉. f. Taurien.

libanoticum Ehbg., libanotischer, ☉. f. Syrien.

ligusticum Balb. (*arrectisetum* Brot., *aristatum* W., *Broteri* Lk. Hffg.), granniger, ☉. f. Portugal, Frankreich, Italien.

Lupinaster L., wolfsbohnenähnlicher, 4. f. Sibirien.

malacanthum Lk. (*echinatum* Hort.), weichblumiger, ☉. f. ?

maritimum Sm. (*irregulare* Pourr., *dipsaceum* Thuill., *stellatum* Huds.), Meerstrands-K., ☉. ♂. f. England, Frankreich, Italien.

medium L. (*flexuosum* Jacq.), mittlerer, 4. f. Europa.

megacephalum Nutt., großköpfiger, 4. f. Nordamerika.

Michelianum Sav. (*Vaillantii* Lois.), Micheli's, ☉. f. Italien, Frankreich, Kleinasien.

micranthum Viv., kleinkroniger, ☉. f. Nordafrika.

montanum L., Berg-K., 4. f. Europa.

nigrescens Viv. (*hybridum* Sav., *polyanthemum* Tenor.), schwärzlicher, ☉. f. Illyrien, Italien.

noricum Wulf., norischer, 4. f. Kärnthen, Krain, Tyrol.

obscurum Guss., dunkler, ☉. f. Sicilien.

Trifolium

- ochroleucum L., weißgelber, 4. f. Mittel- und Osteuropa, England, Kleinasien.
- olympicum Hook., olympischer, 4. f. Griechenland.
- oxypetalum Fisch. et Mey., schmalkroniger, 4. f. Louisiana.
- pallescens Schreb., bleichblumiger, 4. f. Kärnthen, Krain, Tyrol etc.
- pallidum W. K., bleicher, ♂. f. Banat, Italien, Dalmatien.
- pannonicum L., ungarischer, 4. f. Ungarn, Siebenbürgen, Caucasus, Kleinasien, Frankreich.
- parviflorum Ehrh. (*strictum* Schreb.), kleinblumiger, ☉. f. Mitteldeutschland, Ungarn, Caucasus.
- patens Schreb. (*parisiense* DC., *aureum* Thuill., *chrysanthum* Gaud.), abstehtender, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.
- phleoides Pourr., lieschgrasähnlicher, ☉. f. Spanien, Sibirien.
- physopetalum Fisch. et Mey., blasenkroniger, ☉. f. Neu-Californien.
- pratense L., Wiesen-K. (spanischer), ♂. f. Europa, Nordam.
 β) heterophyllum Lej., γ) sativum Mill. (*pensylvanicum* W.), δ) nivale Sieb. (? *vaginatum* Schlchr., *P. alpinum* Hoppe, *P. flavicans* Sering.).
- procumbens L. (*pseudoprocumbens* Gmel.), niederliegender, ☉. f. Europa.
- purpurascens Fisch. (*Lupinaster*, γ) *oblongifolium* Ser.), purpurfarbiger, 4. f. Sibirien.
- purpureum Loisel., purpurblumiger, ☉. f. Frankreich.
 β) *sylvaticum* Gerard.
- reclinatum W. K., zurückgelegter, ☉. f. Ungarn.
- reflexum L., zurückgebogener, 4. f. Virginien, Texas.
- repens L., kriechender, 4. f. Europa, Mittelas., Nordam.
 b) pentaphyllum, c) maculatum, β) prostratum Biasol. (*Biasolettianum* Steud. et Hochst.).
- resupinatum L., verkehrtblumiger, ☉. f. Südeuropa.
- rigidum Sav., starrer, ☉. f. Italien.
- rubens L., rother, 4. f. Mittel-, Ost- und Südeuropa.
- rubescens, H. Hall., rothwerdender, ☉. f. ?
- rubicundum Schousb., röthlicher, ☉. f. Mauritanien.
- rupestre Tenor., Felsen-K., 4. f. Neapel.
- Russelianum Lindl., Russel's, 4. f. ?
- saxatile All. (*thymiflorum* Vill.), Gesteins-K., ♂. 4. f. Schweiz, Oberitalien. Alpen, Dauphinée.
- scabrum L., scharfer, ☉. f. Europa.
- Sebastianum Sav., Sebastiani's, ☉. f. Mittelitalien.
- spadiceum L., glänzendbrauner, ☉. f. Europa.
- speciosum W., prächtiger, ☉. f. Sicilien, Griechenland.
- sphaerocephalum Dsf. (*arachnoideum* Presl.), kugelhöpfiger, ☉. f. Nordafrika, Sicilien.
- spumosum L., schäumiger, ☉. f. Frankreich, Italien.
- squarrosus L., sparriger, ☉. f. Süd-u. Westeur., Caucas.
 β) *flavicans* Sering.
- stellatum L., sternförmiger, ☉. f. Krain, Italien, Griechenl.
- striatum L., gestreifter, ☉. f. Europa.
 a) *tenuiflorum* Tenor., β) Schreberi * (*scabrum* Schreb.)
- strictum L. (*laevigatum* Dsf.), steifer, ☉. f. Südeuropa, Ungarn, Nordafrika.
- suaveolens W., wohlriechender, ☉. f. Persien.
- subterraneum L., unterirdischer, ☉. f. Südeuropa.

Trifolium

suffocatum L., Sand-K., ☉. f. England, Südeuropa, Griechenland.

supinum Sav. (? *malacanthum* Lk.), niedriger, ☉. f. Italien, Südfrankreich.

tenuifolium Tenor., feinblättriger, ☉. f. Italien.

tomentosum L., filziger, ☉. f. Südeuropa.

trichocephalum M. B., haarköpfiger, 4. f. Caucasus.

tridentatum Lindl., dreizähniger, 4. f. Columbien.

uniflorum L. (*Buxbaumii* Sav.), einblumiger, ☉. f. Frankreich, Italien, Griechenland, Syrien etc.

β) Sternbergianum Sering.

vesiculosum Santi (*recurvum* W. K., *turgidum* MB.), blasiger, ♂. f. Süd- und Osteuropa.

Wormskioldii Lehm., Wormskiold's, 4. f. Grönland.

guianense Aubl. vid. *Stylosanthes guianensis*, *Melilotus coerulea* L. etc. vid. *Melilotus coerulea* etc.,

Melilotus cretica L. vid. *Pocockia cretica*, *ornithopodioides* L. vid. *Trigonella ornithopodioides*.

Triglochin L., Salzsims (Dreizack), VI. III., Alismaceae.

Barrelieri Lois., Barrelier's, 4. f. Süd- u. Westeuropa, Nordafrika.

bulbosum L., knollige, 4. Kn. k. Cap der guten H.

decipiens RB., trügerische, 4. k. Neuholland, Van-Diemensland.

elatum Nutt., hohe, 4. k. f. b. Nordamerika.

maritimum L., Meer-S., 4. f. Europa, Nordamerika.

palustre, gemeine, 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.

Triglossum bambusinum Fisch. vid. *Ludolfia glaucescens*.

Trigonella L., Kuhhornklee, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

arcuata Fisch. et Mey., bogenförmiger, ☉. f. Astrachan.

astroites Turcz., sternförmiger, ☉. f. Armenien.

Calliceras MB. Fisch. (*ornithorhynchos* Fisch. Hornem.), schöner, ☉. f. Caucasus.

cancellata Dsf. (*aegyptiaca* Poir.), gegitterter, ☉. f. Aegypten.

corniculata W., gekrümmter, ☉. f. Südfrankreich, Italien, österreichisches Litorale.

elongata Ledeb. Lk., verlängerter, ☉. f. ?

esculenta W., genießbarer, ☉. m. f. Ostindien.

flexuosa Del. Poir., gebogener, ☉. f. Aegypten.

Fischeriana DC. (*flexuosa* Fisch.), Fischer's, ☉. f. Caucas.

Foenum graecum L., gemeiner, ☉. f. Mittel- und Südeuropa.

gladiata Stev. (*prostrata* DC.), schwertförmiger, ☉. f. Taurien, Caucasus, Süd- und Westeuropa.

hamosa L., hakenförmiger, ☉. f. Aegypten.

hybrida Pourr., Bastard-H., ☉. f. Südfrankreich.

litoralis Guss., Ufer-H., ☉. f. Sicilien.

maritima Delil., Meerstrands-H., ☉. f. Aegypten.

monspeliaca L., französischer, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Taurien, Caucasus.

monantha C. A. Mey., einblumiger, ☉. f. Südrussland.

ornithopodioides DC., vogelfußsähnlicher, ☉. f. Schleswig, England, Frankreich, Portugal.

pinatifida Cav. (*media* Del.), fiederspaltiger, ☉. f. Spanien.

platycarpa L., breithülsiger, ☉. f. Sibirien.

Trigonella

polycerata L., vielhülsiger, ☉. f. Südeuropa.

ruthenica L., russischer, ☉. f. Sibirien.

spinosa L., stechender, ☉. f. Griechenland.

striata L. suppl., gestreifter, ☉. f. Caucasus.

tenuis Fisch. MB., dünner, ☉. f. Caucasus.

uralensis Hort., ural'scher, ☉. f. Ural.

brachycarpa Rehb. vid. *Medicago brachycarpa* etc.,

coerulea Sering etc. vid. *Melilotus coerulea*, *indica*

L. vid. *Lotus indicus*.

Trigonion Aubl., Trigonie, XXI. II., Evonymaceae - Hippocrateaceae.

mollis DC., weiche, ♀. w. Brasilien.

villosa Aubl., zottige, ♀. w. Guiana, Brasilien.

Trigonidium Lindl., Triangelstendel, XX. I., Orchideae.

acuminatum Batem., zugespitzter, 4. w. Demerara.

Egertonianum Batem., Egerton's, 4. w. Honduras.

obtusum Lindl., stumpfer, 4. w. Demerara.

Trillium L., Dreiblatt, VI. III., Sarmenaceae-Smilaceae.

Catesbaei Ell., Catesbaie's, 4. Kn. k. f. b. Südcarolina.

cernuum L., übergebogenes, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

discolor Wray, verschiedenfarbiges, 4. Kn. k. f. b.

Georgien (Nordamerika).

erythrocarpum Mchx. (*pictum* Pursh.) rothbeeriges, 4.

Kn. f. b. k. Nordamerika.

grandiflorum Salisb. (*erythrocarpum* Bot. mag.), groß-

blumiges, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

nervosum Ell., nerviges, 4. Kn. k. f. b. Carolina, Georgia.

obovatum Pursh., verkehrteiförmiges, 4. Kn. f. b. Ca-

nada, Kamschatka.

ovatum Pursh., eiförmiges, 4. Kn. f. b. k. Westliches

Nordamerika.

pendulum W. (*erectum viridiflorum* Hook.), hängendes, 4.

Kn. f. b. k. Pennsylvanien.

petiolatum Pursh., stielblättriges, 4. Kn. f. b. k. West-

liches Nordamerika.

pusillum Mchx. (*pumilum* Pursh.), niedriges, 4. Kn. k.

f. b. Südcarolina.

rhomboideum Mchx. (*erectum* L.), rautenblättriges, 4.

Kn. f. b. k. Nordamerika.

sessile L., sitzendes, 4. Kn. f. b. k. Nordamerika.

undulatum W., wellenkroniges, 4. Kn. f. b. k. Nordam.

Trinia Hoffm. (Trinius zu Petersburg, kais. russischer

Staatsrath, einer der ausgezeichnetsten Botaniker), V.

II., Umbelliferae.

*elatio*r Gaud., höhere, ♂. f. Schweiz.

Hoffmanni MB., Hoffmann's, ♂. f. Caucasus.

Kitaibelli MB. (*glauca* [W. K.]), Kitaibel's, ♂. f. Ungarn.

vulgaris DC. (*pumila* Rehb., *Henningii* MB.), niedrige,

♂. f. Süd- und Osteuropa.

Triodia RB., Dreizahngras, III. II., Gramineae.

decumbens P. B. (*Danthonia* d. DC.), 4. f. Europa.

cuprea Jacq. v. *Tricuspidis quinquefida*.

Triopteris L., Dreiflügler, X. III., Malpighiaceae.

jamaicensis L., jamaikaischer, ♀. Sch. w. Jamaika.

sericea Lodd., seidenhaariger, ♀. Sch. w. Südamerika.

buxifolia W. etc. vid. *Tetrapteris buxifolia* etc.

Triosteum L., Dreistein, V. I., Caprifoliaceae.

angustifolium L., schmalblättriger, 4. f. b. Virginien.

perfoliatum L., durchwachsener, 4. f. b. Carolina.

- Triphasia** Lour., Triphasie, VI. 1. (V. 1.), Hesperideae-Aurantiaceae.
trifoliata DC. (*aurantiola* Lour.), dreiblättrige, $\frac{5}{8}$ t. China, Cochinchina.
- Triphysaria** Fisch. et Mey., Dreirodelkraut, XIV. II., Personatae-Rhinantheae.
versicolor Fisch. et Mey., buntfarbiges, $\odot$. f. Neucaliforn.
- Tripinnaria africana** Spgl. v. *Tanaecium pinnatum*.
- Triplaris** L., Baumknöterich, XXII. VIII. (IX. III.), Polygoneae.
americana L. (*pyramidalis* Jacq.), amerikanischer, $\frac{5}{8}$ w. Südamerika.
- Tripolium** N. E. vid. Aster.
- Tripsacum** L., Löchergras, XXI. III. (III. II.), Gramineae.
dactyloides L., dreiähriges, $\frac{4}{8}$ f. k. Nordamerika.
monostachyum W., einähriges, $\frac{4}{8}$ k. Südcarolina.
hermaphroditum L. v. *Antephora elegans*.
- Tripteris arborescens** Less. etc. v. *Calendula arborescens* etc.
- Triptilion** R. et P., Dreispreuler, XIX. 1., Compositae-Eupatorineae — Perdicieae.
cordifolium R. et P., herzblättriger, $\odot$. f. Chili.
spinosum R. et P., stacheliger, $\odot$. f. Chili.
- Trisetum** v. Avena, *Trisetum longifolium* N. E. v. Avena *longifolia* Nachtr., *ovatum* P. v. *Trichaeta ovata*.
- Tristania** RB., Tristanie, XVIII. II., Myrtaceae.
albicans Cunn., weißliche, $\frac{5}{8}$ t. Neuholland.
arborescens Hort. Angl., baumartige, $\frac{5}{8}$ t. Neuholland.
conferta RB. (*laurina* Sbr.), gedrängte, $\frac{5}{8}$ t. Neusüdwall.
depressa Lodd., niedergedrückte, $\frac{5}{8}$ t. Neuholland.
laurina RB. (*macrophylla* Cunn.), lorbeerähnliche, $\frac{5}{8}$ $\frac{5}{8}$ t. Neusüdwallis.
myrtifolia Ait., myrtenblättrige, $\frac{5}{8}$ t. Neuholland.
neriifolia RB., oleanderblättrige, $\frac{5}{8}$ t. Neusüdwallis.
persicifolia Cunn., pfirsichblättrige, $\frac{5}{8}$ t. Neuholland.
- Tristegis glutinosa** N. E. v. *Melinis minutiflora* Nachtr.
- Triteleia** Lindl., Narbenaffodile, III. 1., Coronariae-Asphodeleae.
grandiflora Lindl., großblumige, $\frac{4}{8}$ Zw. k. Nordwestamer.
laxa Benth., lockere, $\frac{4}{8}$ Zw. k. Californien.
uniflora Lindl., einblumige, $\frac{4}{8}$ Zw. k. t. Buenos Ayres.
- Triticum** T., Weizen, III. II., Gramineae.
 1. *Agropyrum* G.
acutum DC., spitzer, $\frac{4}{8}$ f. Süd-, West- u. Nordeuropa.
angustifolium Lk., schmalblättriger, $\frac{4}{8}$ f. Sibirien.
caninum Schreb., queckenartiger, $\frac{4}{8}$ f. Europa.
 β) Gmelini Ledeb.
cristatum Schreb., kamniger, $\frac{4}{8}$ f. Süd- u. Osteuropa.
crinitum Lk., mähniger, $\odot$. k. ?
dasyanthum Ledeb., wollblumiger, $\frac{4}{8}$ f. Südrussland.
densiflorum W., dichtblumiger, $\frac{4}{8}$ f. Sibirien.
desertorum Fisch., Wüsten-W., $\frac{4}{8}$ f. Sibirien.
distichum Tbg., zweizeiliger, $\frac{4}{8}$ k. Cap der guten H.
fragile Roth., brüchiger, $\frac{4}{8}$ f. ?
geniculatum Trin., geknieter, $\frac{4}{8}$ f. Sibirien.
glaucum Dsf. (*intermedium* Host), blaugrüner, $\frac{4}{8}$ f. Ostdeutschland, Schweiz.
imbricatum MB. Stev. (*causasicum* Spgl.), ziegeldachförmiger, $\frac{4}{8}$ f. Caucasus, Taurien, Sibirien.

Triticum

- junceum* L. (*farctum* Viv.), sinsenförmiger, 4. f. Europa, Caucasus.
muricatum Fisch. Lk., weichstacheliger, 4. f. Sibirien.
obtusiflorum DC., stumpfblumiger, 4. f. Nord- und Westeuropa.
orientale MB., morgenländischer, ☉ ♂. Griechenland, Taurien, Sibirien.
pectinatum RB., kammiger, 4. k. Van-Diemensland.
pectiniforme R. et S. (*pectinatum* MB.), kammförmiger. 4. f. Taurien.
prostratum L. (*A. triticeum* G.), hingestreckter, ☉. f. Südeuropa, Sibirien, Orient.
pungens P., stechender, 4. f. Südeuropa.
ramosum Trin., aestiger, 4. f. Sibirien, Astrachan.
repens L., kriechender (Quecke), 4. f. Europa, Asien, Amerika.

α) *arvense* Schreb., β) *subulatum* Schreb., γ) *dumetorum* Honck., δ) *Vaillantianum* Wulf., ε) *Leersianum* Wulf., ζ) *capillare* R. et S., η) *maritimum* K. et Ziz., θ) *litorale* Host, ι) *firmum* Presl., κ) *caesium* Presl., λ) *flavescens* H. Dresd.

- Richardsonii* Hort., Richardson's, 4. f. Nordamerika.
rigidum Schrad. (*elongatum* Host, *junceum* β. *giganteum* Roth.), starrer, 4. f. Böhmen, österr. Litorale.
rupestre Lk., Felsen-Q. 4. f. ?
sibiricum W., sibirischer, 4. f. Sibirien
squarrosus, Roth. (*patulum* W., *Buonapartii* Spgl., *planum* Dsf.), sparriger, ☉. f. Aegypten.
variegatum Fisch., bunter, 4. f. Sibirien.

II. Genuin. (Cerealialia).

- dicoccum* Schrk. (*Spelta* Host, *amyleum* Sering. *Zea* Oecon.), Emmerkorn-W., ☉ ♂. Mittel- u. Südeuropa.
 Variet.: *andalusaceum* Hort., *atratum* Host, *Bauhini* Lag., *Cienfuegos* Lag., *rufum* Hort. Oeconom.
durum Dsf. (*hordeiforme* Host.), harter, ☉ ♂. f. Nordafrika.
 Variet.: *brachystachyum* Hort., *cochleare* Clem., *fastuosum* Clem., *Gaertnerianum* Lag., *Hosteanum* Clem., *platystachyum* Lag., *pyramidale* Delil., *sardinicum* Koel. (*siculum* R. et S.), *villosum* Host, *pruinatum* Hornem. etc.

- monococcum* L., einkörniger, ☉ ♂. f. Taurien.

b) *Hornemanni* Clem.

- polonicum* L., polnischer, ☉ ♂. f. ?

b) *Cevallos* Lagasc.

- Spelta* L. (*Zea* Host), Dunkel-W., ☉ ♂. f. Südeuropa.
 Var.: *Arias* Clem., *Forskolei* Clem., *album*, *aristatum*, *muticum*, *rufum* etc.

- Tumonia* Schrad., *Tumonia*-W., ☉. f. ?

- turgidum* L., aufgeschwollener, ☉ ♂. f. ?

Var.: *album*, *compositum* L., *glabrum*, *nigrum*, *rufum*.

- venulosum* Sering., aderiger, ☉. f. Aegypten.

- villosum* MB., zottiger, ♂. f. Süd- und Osteuropa.

- vulgare* Vill. (*cereale* Schrk.), gemeiner, ☉ ♂. f. ?

α) *aestivum*, β) *hybernum*. Andere Variet.: *siculum* Hornem., *glaucum* Hornem., *compactum* Host, *nigrum*, *velutinum*, *pubescens* etc. — *chilense*, *hispanicum*, *Humboldtii*, *mongolicum*, *odesanum* etc.

Triticum

biunciale All. vid. *Vulpia* (*Nardurus*) *tenuiflora* β .
brizoides Lam. (*unioloides* Ait.) vid. *Brizopyrum*
siculum, *ciliatum* DC. etc. v. *Brachypodium dista-*
chyum etc., *creticum* R. et S. v. *Secale creticum*
 Nachtr., *festucoides* Bertol. (*hispanicum* Vivian., *te-*
nuiculum Lois.) et *Festuca* DC. vid. *Vulpia* (*Nar-*
durus) *Lachenalii* γ . et β ., *Halleri* Vivian (*Lache-*
nenalii Gmel., *Poa* DC., *tenellum* L.), vid. *Vulpia*
Lachenalii, *loliaceum* Sm. (*Rottboella* DC.) v. *Scle-*
rochloa loliacea, *Nardus* DC. (*tenellum* a. Lam.) v.
Vulpia (*Nardurus*) *tenuiflora*, *patens* Brot. v. *Lo-*
lium festucaceum.

Tritomanthe Hffing. Lk. (*Tritoma* Ker), Hyacinthaloe,
 VI. 1., Coronariae-Hemerocallideae.

Burchellii (Herb.), Burchell's, 4. Zw. k. C. d. g. H.
media Lk. (Ker), mittlere, 4. k. Cap der gut. Hoffn.
pumila Lk. (Ker), niedrige, 4. k. Cap der gut. Hoffn.
Uvaria Lk. (Ker), grofse, 4. k. Cap der guten Hoffn.

Tritonia crispa Ker etc. vid. *Waitzia crispa* etc.

Triumfetta Plum. (G. B. Triumfetti, Prof. der Bota-
 nik zu Bologna), XI. 1., Tiliaceae.

angulata Lam. (*Bartramia* L.), kantige, ☉. w. Ostindien.
annua L. (*indica* Lam.), jährige, ☉. w. Java.

glandulosa Forsk. (*Vahlia* Poir.), drüsige, ☿. w. Ara-
 bien, Mascarenas, Ostindien.

grandiflora Vahl, grofsblumige, ☿. w. Caribäen.

havanensis, H. B. K., Havana-T., ☿. w. Westindien.

heterophylla Lam., verschiedenblättrige, ☿. w. Hispaniola.

Lappula L., rauhkelchige, ☿. w. Westindien.

macrophylla Vahl (*althaeoides* Lam.), grofsblättrige, ☿.
 w. Westindien.

micropetala Bot. reg., kleinkronige, ☿. w. Ostindien.

pilosa Roth., haarige, ☿. w. Ostindien.

rhomboidea Jacq., rautenförmige, ☿. W. Westindien.

rotundifolia Lam., rundblättrige, ☿. w. Ostindien.

semitriloba L., halbdreilappige, ☿. w. Westindien.

suborbiculata DC., fastkreisförmige, ☿. w. Ostindien.

trichoclada DC., haarästige, ☉. w. m. f. Nepal.

α) *triclada* Lk., β) *oblongata* Lk.

trilocularis Roxb., dreifächerige, ☿. w. Ostindien.

Trixago Lk., Glitscher, XIV. 11., Personatae-Rhinantheae.
latifolia Rchb. (*purpurea* Stev.), breitblättriger, ☉. f.
 Süd-, West- und Osteuropa.

rhinanthina Lk. (*apula* Coll.), klafferähnlicher, ☉. f.
 Süd-, West- und Osteuropa, Syrien.

β) *maxima* (W.), γ) *versicolor* (Lam.).

scordifolia Rchb., scordiumblättriger, ☉. f. Portugal.

viscosa Rchb., schmieriger, ☉. f. England, Frankreich,
 Italien, Griechenland.

Trixis P. Br., Trixis, XIX. 1v., Compositae-Eupatori-
 neae — Perdiciceae.

auriculata Hook., geöhrte, ☿. w. Brasilien.

senecioides Hook., kreuzkrautähnliche, ☉. f. m. Chili.

Trizeuxis Lindl., Lippenorche, XX. 1., Orchideae.

falcata Lindl., sichelförmige, 4. w. Trinidad.

Trochiscanthes Koch, Nageldolde, V. 11., Umbelli-
 ferae.

nodiflorus K., knotenblumige, 4. f. Wallis, Oberital.,
 Dauphinée.

- Trochocarpa** RB., Radfrucht, V. 1., Epacrideae.
laurina RB., lorbeerähnliche, $\frac{5}{8}$ f. t. Neuholland.
glauca Spgl. vid. *Cyathodes glauca*.
- Trollius** L., Trollblume (Engelblume), XIII. 1v., Ranunculaceae.
americanus Mühlbg. (*laxus* Salisb. Pursh.), amerikanische, 4. f. Nordamerika.
asiaticus L., asiatische, 4. f. Sibirien.
 b) *intermedius*, c) *hybridus*.
caucasicus Stev., (*minimus* Wender., *parviflorus* Lk., *tauricus* Hort.), caucasische, 4. f. Caucasus.
europaeus L., gemeine, 4. f. Europa.
 a) *altissimus* Crtz. Wender., β) *humilis* Crtz.
 γ) *albus*.
Ledebourii Rchb., Ledebour's, 4. f. Sibirien.
napellifolius Röpert (*medius* Wender), sturmhutblättriger, 4. f. ? Caucasus.
patulus Salisb., abstehende, 4. f. Sibirien, Kleinasien.
Riederianus Fisch. et Mey., Rieder's, 4. f. Kamschatka.
- Tromotriche* Haw. vid. *Stapelia*.
- Tropaeolum** L., Capuzinerkresse, VIII. 1., Tropaeoleae.
aduncum Sm. (*peregrinum* L.), hakenförmige, $\odot$. Sch. m. f. Peru, Mexico.
hybridum L., Bastard-C., σ . k. ?
majus L., gemeine (spanische), $\odot$. σ . f. k. Peru.
 a) *atrosanguineum* (*atropurpureum* Hort.) D. Don,
 b) *atrosang. fl. pleno*, c) *maculatum*, d) *fl. luteo pleno*, e) *fl. croceo pleno*.
minus L., kleine, $\odot$. σ . f. k. Peru.
 b) *flore pleno*.
Moritzianum H. Berol., Moritz's, $\odot$. Sch. m. f. Südamer.
pinnatum Andr., gefiederte, 4. t. k. Peru.
brachyceras Hook. etc. v. *Chymocarpus brachyc.* etc.
- Trophis** L. Futterbaum, XXII. 1v., Urticaceae.
americana L., amerikanischer, $\frac{5}{8}$ w. Westindien.
aspera Retz., rauhlättriger, $\frac{5}{8}$ w. Ostind., Cochinchina.
- Tros* Haw. vid. *Narcissus*.
- Troximon** G., Bocksalat, XIX. 1., Compositae-Cichoriaceae.
cuspidatum Pursh. (*marginatum* Nutt.), feinspitziger, 4. f. b. Louisiana.
glaucum Pursh., blaugrüner, 4. f. b. Louisiana.
Dandelion P. v. *Cynthia Dandelion* Nachtr., *virginicum* P. v. *Cynthia virginica*.
- Trymalium** Fenzl., Trymalium, ? V. 1., Rhamneae.
odoratissimum Fenzl., wohlriechendes, $\frac{5}{8}$ t. Neuholland.
- Tubilium siculum* Chois. v. *Jasonia sicula*.
- Tulbaghia** L. (Tulbagh, holländischer Gouverneur des Vorgeb. der gut. Hoffn.), VI. 1., Coronariae-Hemerocallideae.
affinis Lk., ähnelnde, 4. Zw. k. t. Cap der guten H.
alliacea L., knoblauchduftende, 4. Zw. k. t. C. d. g. H.
cepacea L., zwiebelduftende, 4. Zw. k. t. C. d. g. H.
violacea Harv., violette, 4. Zw. k. t. Cap der gut. H.
- Tulipa** Gesn. T., Tulpe. VI. 1., Coronariae.
acuminata Vahl. (*cornuta* Redout.), zugespitzte, 4. Zw. f. Levante.
altaica Pall., altaische, 4. Zw. f. Altai.
Biebersteiniana R. et S., Bieberstein's, 4. Zw. f. Caucasus, Sibirien.

Tulipa

- biflora Pall., zweiblumige, 4. Zw. f. Ural, Sibirien.
 Bonarotiana Reboul, Bonarota's 4. Zw. f. Italien.
 Celsiana Redout., Cels's (*transtagana* Brot.), 4. Zw. f.
 b. k. Frankreich, Portugal, Taurien.
 Clusiana Redout., Clusius's, 4. Zw. f. Persien.
 Gesneriana L., gemeine Garten-T., 4. Zw. f. Kleinasien, Thracien.

b) versicolor, c) plena, d) laciniata, e) lutea.
 maleolens Bertol., übelriechende, 4. Zw. f. Italien.

- b) variegata Swt.
 media Ag., mittlere, 4. Zw. f. ?
 montana Bot. reg., Berg-T., 4. Zw. f. Persien.
 Oculus solis S. Amans, Sonnenaugen-T., 4. Zw. f. Frankreich.

- patens Ag., abstehende, 4. Zw. f. Sibirien.
 praecox, Tenor., frühe, 4. Zw. f. Neapel.
 pubescens W., weichhaarige, 4. Zw. f. Kleinasien.
 repens Fisch., kriechende, 4. Zw. f. Rußland.
 saxatilis Sbr., Gesteins, 4. Zw. f. b. k. Creta.
 scabriscapa Str., scharfschaftige, 4. Zw. f. Italien.
 stellata Bot. mag., sternförmige, 4. Zw. k. Cumana.
 strangulata Reboul., schlagblaufarbige, 4. Zw. f. ?
 suaveolens Roth. (Duc van Thol), feinriechende, 4. Zw. f. Südeuropa.

b) flore pleno.

- sylvestris L., wilde, 4. Zw. f. Europa, Mittelasien.
 tricolor Fisch., dreifarbig, 4. Zw. f. Rußland.
 turcica Roth., türkische (Papagaien-T.), 4. Zw. f. Türkei.

Breyniana L. vid. *Kolbea Breyniana*.

Tunica Scop., Steinnelke, X. II., Caryophyllaceae-Sileneae.

- compressa Fisch. et Mey., platte, 4. k. Nordafrika.
 cretica Fisch. et Mey., cretische, 4. k. Creta.
 dianthoides Fisch. et Mey., einfachstengelige, 4. f. k. Creta.
 illyrica Fisch. et Mey., illyrische, ♂. 4. k. Dalmatien, Sicilien, Griechenland.

- ochroleuca Fisch. et Mey., weißgelbe, ♂. 4. k. Griechenl.
 pachygonia Fisch. et Mey., dickkantige, ♂. f. Natolien.
 Saxifraga L., gemeine, 4. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa.
 stricta Fisch. et Mey., steife, ♂. f. Nordpersien, Altai.

Tupa G. Don vid. *Lobelia*.

Tupistra Ker, Tupistra, VI. I., Aroideae.

- nutans Lindl., nickende, 4. w. Ostindien.
 squalida Ker, braune, 4. w. Ostindien.

Turgenia Hoffm., Dickdolde, V. II., Umbelliferae.

- latifolia Hoffm., breitblättrige, ♂. f. England, Mittel-, Süd- und Osteuropa.

Turgosia Haw., vid. *Crassula*.

Turnera L. (W. Turner, alter englischer Botaniker), V. III., Turneraceae.

- brasiliensis W., brasilianische, f. w. Brasilien.
 cistoides L., cistusähnliche, ♂. m. f. Südamerika.
 cuneiformis Juss., keilblättrige, 4. f. w. Südamerika.

β) trioniflora Ker.

- elegans Otto, zierliche, f. w. Brasilien.
 guianensis Aubl., guianische, ♂. f. w. m. f. Guiana.
 hirta W., haarige, ♂. w. m. f. Brasilien.
 Pumilea L., zwergige, ♂. w. m. f. Westindien.
 racemosa Jacq., traubige, ♂. m. f. Westindien.
 rupestris Aubl., Felsen-T., f. w. Guiana.

Turpinia punctata P. v. *Poiretia scandens*.

Turraea L. (A. Turra, Professor zu Vicenza, G. Turra, Professor der Botanik zu Padua), X. 1. (XVI. vi.), Hesperideae-Meliaceae.

pinnata Wall., gefiederte, f. w. Silhet.

rigida Vent., starre, f. w. Mascarenas.

virens L., grünliche, f. w. Ostindien.

Turritis T., Thurmkraut, XV. iii., Cruciferae.

glabra L., kahles, ♂. f. Europa, Sibirien.

Grahami Lehm., Graham's, ♂. f. ? Nordamerika.

patula Grah., abstehendes, ☉. f. Nordamerika.

salsuginosa DC., sibirisches, ☉. f. Sibirien.

stricta Grah., steifes, ☉. f. Nordamerika.

ciliata W., *hirsuta* L. etc. vid. *Arabis ciliata*, *hirsuta* etc., *Loeselii* RB. v. *Leptocarpaea Loeselii*.

Tussilago T., Huflattig, XIX. ii., Compositae-Eupatorineae.

I. Genuina.

Farfara L., gemeiner, 4. f. Europa.

b) *foliis variegatis*.

II. Homogyne Cass.

alpina L., Alpen-H., 4. f. Mitteleuropäische Alp. und Voralpen.

discolor Jacq., verschiedenfarbiger, 4. f. Tyrol, Kärnten, Steyermark, Oesterreich.

sylvestris Scop., Wald-H., 4. f. Kärnten, Krain, Steyermark.

Anandria L. v. *Anandria Bellidiasstrum*, *fragrans*

Vill., *frigida* L. etc. v. *Petasites fragrans* etc., *japonica* L. Thbg. v. *Senecio Kaempferi*, *integrifolia*

Mchx. v. *Chaptalia tomentosa*, *nutans* L. v. *Leria*

nutans.

Tweedia Hook. (M. Tweedie, engl. Botaniker u. Reisender), XIV. ii., Personatae-Antirrhineae.

coerulea D. Don, blaue, 4. Sch. t. Buenos-Ayres.

versicolor Hook., buntfarbige, 4. Sch. t. Buenos-Ayres.

Tylophora RB., Schwielenträger, V. ii., Asclepiadeae.

barbata RB., bärtiger, f. Sch. w. Neuholland.

exilis Colebr., zarter, f. Sch. w. Ostindien.

grandiflora RB., großblumiger, f. Sch. w. Neuholland.

Typha T., Rohrkolbe, XXI. iii., Typhaceae.

angustifolia L., schmalblättrige, 4. Wa. f. Europa.

β) *elatio* v. Bönningh.

latifolia L., breitblättrige, 4. Wa. f. Europa, Nordam.

minima Hoppe, kleinste, 4. Wa. f. Süddeutschland, Salzburg, Schweiz.

minor Sm. (*media* DC.), kleine, 4. Wa. f. England, Frankreich, Schweiz, Westdeutschland.

Tyrimnus Cass., Fleckdistel, XIX. i., Compositae-Cynarocephalae.

leucographus Cass., weißliche, ☉. f. Südfrankreich, Italien, Dalmatien, Griechenland.

Uciana speciosa W. vid. *Tocoyena longiflora*.

Udora Nutt., Udora, XXII. iv. (IV. i.), Hydrocharideae.

lithuanica Bess., lithauische, 4. Wa. f. Lithauen.

verticillata Spgl., wirtelförmige, 4. Wa. f. Ostindien, Nordamerika, Pommern.

Ulex L., Hecksame (Stechginster), XVII. iv. (vi.) (XVI. vi.), Leguminosae Papilionaceae.

Ulex

europaeus L., gemeiner, f. f. b. England, Nord-, Mittel- und Westdeutschland, Frankreich.

b) *flore pleno*.

hibernicus G. Don, irländischer, f. k. f. b. Irland.

nanus Sm., zwergiger, f. k. f. b. England, Frankreich.

provincialis Lois., südfranzösischer, f. k. Südfrankreich.

genistoides Brot. (*mitis* Hort.) vid. *Stauracanthus aphyllus*.

Ulloa P. (Anton Ulloa, spanischer Naturforscher u. Reisender), V. I., Solanaceae.

parasitica P., schmarozende, f. w. Peru.

Ulmus T., Ulme, V. II., Urticaceae-Ulmaceae.

alba Kit., weisse, f. f. Ungarn.

alata Mchx. (*pumila* Walt.), geflügelte, f. f. Nordamer.

americana L., amerikanische, f. f. Nordamerika.

a) *rubra* Ait., b) *alba* Ait. (*mollifolia* R. et S.),

c) *pendula* Pursh., d) *incisa* H. S.

campestris L., gemeine, f. f. Europa, Caucasus.

a) *vulgaris*, b) *latifolia* Hort., c) *alba* Masters,

d) *acutifolia* Masters, e) *stricta* Hort., f) *virens*

Hort., g) *cornubiensis* Hort. (*stricta* Lindl.), h)

parvifolia Lindl. (*microphylla* Lodd., *aspera* Lodd.,

crispa Lodd.), i) *sarniensis* Lodd., k) *tortuosa*

Lodd., l) *foliis variegatis* Lodd., m) *betulaefolia*

Lodd., n) *planifolia* Hort., o) *cucullata* Hort.,

p) *concavaefolia* Hort., q) *foliis aureis* Hort.,

r) *nana* Lodd., s) *foliis maculatis* Lodd., t) *du-*

bia Lodd., u) *viscosa* Lodd.

carpinifolia Lindl., hainbuchenblättrige, f. f. England.

chinensis P. (*pumila* Hort., *peregrina* Hort.), chinesische, f. f. b. k. China.

effusa W. (*ciliata* Ehrh., *octandra* Schkr., *pedunculata* Lam., *laevis* Pall., *racemosa* Borkh.), langstielige, f. f. Europa, Caucasus.

fulva Mchx. (*rubra* Hort.), rothgelbe, f. f. Nordamerika.

glabra Mill., kahle, f. f. England, Deutschland etc.

a) *vulgaris*, b) *vegeta* Hort., c) *scampstoniana*,

d) *major* Hort., e) *glandulosa* Lindl., f) *latifolia*

Lindl., g) *microphylla* H. S. (*parvifolia* Hort.),

h) *pendula* Hort. Dur., i) *variegata* H. S., k) *ra-*

mulosa Booth.

integrifolia Roxb., ganzblättrige, f. w. Ostindien.

major Sm. (*hollandica* Mill., *latifolia* Mchx.), grofse, f. f. England, Holland, Nordamerika.

montana Bauh. Sm. (*glabra* Huds., *effusa* Sibth., *scabra* Mill., *nuda* Ehrh.), Berg-U., f. f. Europa.

a) *vulgaris*, b) *rugosa* Lodd., c) *major* Masters,

d) *minor* Masters, e) *cebennensis* Hort., f) *nigra*

Lodd., g) *australis* Hort., h) *pendula* Lodd. (*glabra*

decumbens Hort. Dur., *horizontalis* et *rubra*

Hort.), i) *fastigiata* Hort. (*glabra replicata* Hort.

Dur., *Fordii* et *exoniensis* Hort.), k) *crispa* W.

parvifolia Jacq. (*microphylla* P., *pumila transbaicalensis* Pall., *humilis* Hort.), kleinblättrige, f. f. Gegend des caspischen Meeres.

pumila Pall. (*humilis* Amm.), zwergige, f. f. Sibirien.

suberosa Mch. Ehrh. (*campestris* Woods.), Kork-U., f. k. Europa, Caucasus.

Ulmus

- a) vulgaris, b) foliis variegatis Lodd., c) alba Masters, d) erecta Lodd., e) Hertfordshireana Angl. *Abelicea* Sm., *nemoralis* Ait., *polygama* Rich. vid. *Planera Abelicea* et Richardi.

Ulospermum Lk., Krausdolde, V. II., Umbelliferae.

- dichotomum Lk., zweizinkige, ☉. f. Südeuropa, Nordafr.

Umbilicus DC., Nabelkraut, X. IV., Corniculatae-Crasulaceae.

- erectus DC. (*Cotyled. lutea* Huds.), aufrechtes, 4. k. f.

- b. England, Süd- u. Westeuropa.

- Lievenii G. Don, Lieven's, 4. k. Altai.

- hispidus DC. (*Cotyled. Mucizonia* Orteg.), steifhaariges, 4. k. Spanien, Portugal.

- Malacophyllum DC., weichblättriges, ♂. k. Dahurien.

- pendulinus DC. (*Cotyled. Umbilicus* L.), hängendes, 4. k. f. b. England, Süd- und Westeuropa.

- Sempervivum DC., hauslaubähnliches, 4. k. Caucasus.

- serratus DC., sägeblättriges, 4. k. Creta.

- spinosus DC., stacheliges, 4. k. Sibirien.

Uncaria Schreb. G., Hakenstiel, V. I., Rubiaceae.

- Gambir Wall., Gambir-H., ♀. Sch. w. Ostindien.

- sessilifructus Roxb., stiellosfrüchtiger, ♀. Sch. w. Ostindien.

Uncinia P., Hakengras, XXI. III., Cyperaceae.

- jamaicensis P., jamaikaisches, 4. w. Jamaika.

- phleoides P., lieschgrasähnliches, 4. w. Chili.

Uniola L., Spitzgras, III. II., Gramineae.

- I. Chasmanthium Lk.

- gracilis Mchx., schlankes, 4. f. Nordamerika.

- II. Genuina.

- latifolia Mchx., breitblättriges, 4. f. Nordamerika.

- paniculata L. (*maritima* Mchx.), rispiges, 4. f. Nordamer.

- distichophylla* R. et S. (*spicata* L. *Poa Michauxii*

- Kunth.), vid. *Brizopyrum americanum*.

Unona L., Unona, XIII. VI., Anonaceae.

- acuminata DC., zugespitzte, ♀. w. Guiana.

- aromatica Dun. (*concolor* W.), gewürzhafte, ♀. w. Guiana.

- fasciculata Wall., büschelförmige, ♀. w. Ostindien.

- fuscata DC., bräunliche, ♀. w. Guiana.

- longiflora Roxb. Wall., langblumige, ♀. w. Ostindien.

- longifolia Dun., langblättrige, ♀. w. Ostindien, Java.

- Narum Dun., starkwurzeln, ♀. Sch. w. Malabar.

- odorata Dun., wohlriechende, ♀. w. Molukken, China.

- esculenta* Dun. (*uncinata* Dun. DC.), vid. *Artabotrys odoratissimus*.

Urachne asperifolia Trin. et racemosa Trin. etc. vid. Ory-

- zopsis asperifolia α. et β. etc., *coerulescens* Lk. etc. v.

- Piptatherum coerulescens* etc.

Urania Schreb., Uranie, VI. I., Scitamineae.

- speciosa Schreb., prächtige, 4. w. Madagascar.

Uraria Dsv., Uraie, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

- comosa DC., schopfige, ♀. w. Ostindien.

- crinita DC., mähnige, ♀. w. Ostindien.

- lagocephala DC., haarköpfige, 4. w. Brasilien.

- lagopodioides DC., haarkelchige, ♀. t. China.

- Lagopus DC., hasenfüßige, ♀. t. Nepal.

- picta Dsv., buntblättrige, ♀. w. Guinea.

Urceolina Rchb., Becherschwertel, VI. I., Narcisseae-Amaryllideae.

Urceolina

- pendula* Herb., überhängender, 4. Zw. w. Südamerika.
Urena L. (malabarischer Name), XVI. VIII., Malvaceae.
heterophylla Sm., verschiedenblättrige, ♀. w. Ostindien.
lobata L., gelappte, ♀. w. t. China.
multifida Cav., vielspaltige, ♀. w. Mascarenas.
muricata DC., weichstachelige, ☉. w. m. Ostindien.
repanda Sm. (*Pavonia* r. Spgl.), ausgeschweifte, ☉. w. m. Ostindien.
reticulata Cav. (*americana* L. suppl.), netzförmige, ♀. w. Hispaniola, Guiana.
scabriuscula L. (*lobata* Cav.), schärfliche, ☉. w. m. Ostindien.
Sieberi Coll. (*mauritiana* Sbr.), Sieber's, ☉. w. m. Mascarenas.
sinuata L., buchtige, ♀. w. Ostindien.
speciosa Wall., prächtige, ♀. w. Ostindien.
subtriloba Schrk., fastdreilappige, ☉. w. m. Brasilien.
Swartzii DC. (*sinuata* Sw.), Schwartz's, ♀. w. Westind.
tricuspis Cav., dreispitzige, ♀. w. Mascarenas.

Typhalea L. vid. *Paphonia* *Typhalea*.

Uropetalum Ker, Schweifkrönchen, VI. I., Coronariae-Asphodeleae.

- crispum* Burch., krauses, 4. Zw. k. Cap der guten H.
fulvum Swt., fahlgelbes, 4. Zw. k. Mogadore.
glaucum Burch., blaugrünes, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
longifolium Lindl., langblättriges, 4. Zw. w. Ostafrika.
serotinum Ker, spätblumiges, 4. Zw. k. Spanien, Nordafrika.

viride Ker, grünes, 4. Zw. k. Cap der guten H.

Urospermum Scop., Schweifsame, XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

- capense* Spgl., capischer, ☉. ♂. f. k. Cap der gut. H.
Dalechampii Dsf., Dalechamp's, 4. k. Süd- und Westeuropa, Griechenland, Nordafrika.
picroides Dsf., picrisähnlicher, ☉. f. Südeuropa, Griechenl.
β) asperum (L.).

Ursinia G., Ursinie, XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

paradoxa G., wunderbare, ♀. k. Cap d. guten Hoffn.

abrotanifolia Spgl. etc. v. *Sphenogyne* *abrot.* etc.

Urtica T., Nessel, XXI. IV., Urticaceae.

- aestuans* L., hitzige, ♂. w. Surinam.
angustifolia Fisch., schmalblättrige, 4. f. Sibirien.
arborescens Lk., baumartige, ♀. w. Manila.
ardens Lk., feurige, ☉. m. f. Nepal.
baccifera L., beerentragende, ♀. w. Neugranada.
balearica L., balearische, ☉. f. Balearen.
canadensis L., canadische, 4. f. Nordamerika.
cannabina L., hanfähnliche, 4. f. Sibirien.
capitellata Poir. (*melastomoides* Hort.), kleinköpfige, ♀. w. Java.
caracasana Jacq., caracasansische, ♀. ♀. w. Caracas.
caravellana Schrk., caravellansische, ☉. w. m. f. Südamerika.
chamaedryoides Pursh., gamanderähnliche, ☉. f. Georgia.
ciliata Sw., gefranzte, ♀. w. Jamaika.
convexa Hornem., convexe, ☉. f. ?
crassifolia W., dickblättrige, ♀. w. Südamerika.
depressa Sw., niedergedrückte, 4. w. Jamaika.
diffusa Sw., weitschweifige, ♀. w. Jamaika.

Urtica

- dioica* L., gemeine grofse Brenn-N., 4. f. Europa, Asien, Nordamerika.
divaricata L., ausgespernte, 4. f. Nordamerika.
Dodartii L. (*integrifolia* Poir.), Dodart's, ☉. f. Südeurop.
elongata Lk., verlängerte, ☉. m. f. Philippinen.
ferox Forst., wilde, ♀. k. Neuzeeland.
gigas Cunn., grofse, ♀. k. t. Neuholland.
gracilis Ait., schlanke, 4. f. Hudsonsbai.
grandifolia L., grofsblättrige, ♀. w. Jamaika.
heterophylla Wall. (*diversifolia* Lk.), verschiedenblättrige, ♀. w. Ostindien, Nepal.
horrida H. B. K., schreckliche, ♀. w. Südamerika.
involucrata Sims., gehüllte, ♀. w. Caribäen.
Linkiana * (*horrida* Lk.), Link's, ☉. m. f. Nepal.
macrostachya Wall., grofsährrige, ♀. w. Ostindien.
membranacea Poir. (*caudata* Vahl.), häutige, 4. f. Südfrankreich, Italien, Nordafrika.
microphylla Sw., kleinblättrige, 4. w. Westindien.
moroides Cunn., maulbeerbaumähnliche, ♀. k. t. Neuholland.
nivea L., schneeweisse, 4. ♀. f. k. Mongolei, China etc.
nudicaulis Sw., nacktstengelige, ♀. w. Jamaika.
nummularifolia Sw. (*hederacea* Poir.), pfennigkrautblättrige, ☉. m. f. Westindien.
Parietaria L., glaskrautähnliche, ♀. w. Jamaika.
pentandra Roxb., fünfmännige, 4. w. Ostindien.
photeinophylla Cunn., glänzendblättrige, ♀. k. t. Neuholland.
pilulifera L., pillentragende, ☉. f. Mittel- und Südeuropa, Mittelasien, Ostindien.
pulchella Lk., schöne, ♀. w. Ostindien.
pumila L. kleine, ☉. f. Nordamerika.
reticulata Sw., netzförmige, ♀. w. Jamaika.
rufa Sw., fuchsrothe, ♀. w. Jamaika.
rugosa Sw., runzelige, ♂. w. Jamaika.
scabrella Roxb., schärfliche, ♀. w. Ostindien.
scripta Hamilt., schwarzaderige, 4. k. Nepal.
urens L., gemeine kleine Brenn-N., ☉. f. Europa, Asien, Nordamerika.
arborea L. suppl. v. *Boehmeria rubescens*, *naucleiflora* Roxb. vid. *Conocephalus naucleiflorus*.
- Urvillaea** H. B. K. (J. Dumont d'Urville, französischer Seefahrer u. Botanik.), VIII. III., Sapindaceae.
ferruginea Bot. reg., rostfarbige, ♀. Sch. w. Brasilien.
ulmacea H. B. K. (*Koelreutera triphylla* P.), ulmenähnliche, ♀. Sch. w. Südamerika.
- Usteria scandens* Cav. Andr. v. *Maurandia semperflorens*.
- Utricularia** L., Wasserschlauch, II. I., Personatae-Lentibulariae.
intermedia Hayn., mittlerer, 4. Wa. f. Europa.
minor L., kleiner, 4. Wa. f. Europa.
neglecta Lehm., übersehener, 4. Wa. f. Norddeutschl.
vulgaris L., gemeiner, 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.
- Uvaria** L., Zapfenbeere, XIII. VI., Anonaceae.
ceylanica L., ceylonische, ♀. Sch. w. Ceylon.
Gaertneri DC., Gärtner's, ♀. w. Ostindien.
lucida Boj., schimmernde, ♀. w. Malabar.
lutea Roxb. (*coriacea* Vahl.), gelbe, ♀. w. Coromandel.
tomentosa Roxb., filzige, ♀. w. Coromandel.

U varia

velutina DC., sammethaarige, ♀. w. Ostindien.

villosa H. C., zottige, ♀. w. Ostindien.

lanceolata Sw. etc. v. *Guatteria virgata* etc.

Uvularia L., Zäpfchenkraut, VI. 1., Coronariae.

flava Sm., hellgelbes, 4. f. Nordamerika.

grandiflora Sm. (*lanceolata* Ait.), großblumiges, 4. f. Nordamerika.

perfoliata L., stengelumfassendes, 4. f. Nordamerika.

puberula Mchx., feinhaariges, 4. f. b. Carolina.

sessilifolia L., stiellosblättriges, 4. f. Nordamerika.

amplexifolia W. vid. *Streptopus amplexifolius*, chi-

nensis Ker vid. *Disporum fulvum*.

Vaccaria Dod., Kuhkraut, X. 11., Caryophyllaceae-Sileneae.

perfoliata (Roxb.), durchwachsenblättriges, ☉. f. Ostind.

pyramidata G. M. S. (*vulgaris* Host), pyramidales, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

Vaccinium L., Heidelbeere, VIII. 1., Ericaceae-Vaccineae.

albiflorum Hook., weißblumige, ♀. f. b. Nordamerika.

arborescens Mchx., baumartige, ♀. k. f. b. Nordcarolina, Florida.

Arctostaphylos L., bäentraubenähnliche, ♀. k. f. b. Cappadocien.

buxifolium Salisb. (*brachycerum* Mchx.), buxusblättrige, ♀. k. f. b. Virginien.

caespitosum Mchx., rasenartige, ♀. f. b. k. Nordamerika.

canadense Richards., canadische, ♀. f. b. Canada.

caracasense H. B. K., caracasische, ♀. w. Caracas.

corymbosum L., traubendoldige, ♀. f. b. Nordamerika.

α) *disomorphum* Mchx. (*album* Lam., *corymbosum* Wats.), β) *amoenum* Ait.

crassifolium Andr. (*carnosum* P.), dickblättrige, ♀. k. f. b. Südcarolina.

diffusum Ait., weitschweifige, ♀. k. f. b. Südcarolina.

dumosum Andr. (*frondosum* Mchx.), heckige, ♀. f. b. k. Nordamerika.

β) *humile* Wats.

elevatum Banks et Soland. (*stamineum* Andr. *album* Pursh.), erhabene, ♀. k. f. b. Nordamerika.

elongatum Wats., verlängerte, ♀. f. b. Nordamerika.

frondosum L. W. (*glaucum* Mchx.), belaubte, ♀. k. f. b. Nordamerika.

β) *venustum* Ait.

fuscum Ait. (*formosum* Andr., *virgatum* Wats.), braunkelchige, ♀. k. f. b. Carolina.

galezans Mchx., gabelblättrige, ♀. k. f. b. Virginien, Carolina.

glabrum Wats., kahle, ♀. f. b. Nordamerika.

grandiflorum Wats., großblumige, ♀. f. b. Nordamerika.

halleriaefolium Lodd., halleriablättrige, ♀. f. b. Nordam.

hirtellum Ait., kurzhaarige, ♀. k. Carolina.

humifusum Grah., niedergestreckte, ♀. f. b. k. Nordam.

intermedium Ruthe, mittlere, ♀. f. Mark Brandenburg.

ligustrinum Mchx., ligusterähnliche, ♀. f. b. k. Virginien, Pennsylvania.

maderense Lk. (*padifolium* Sm., *caucasicum*, *canariense* Hort.), canarische, ♀. k. Canarische Inseln.

Vaccinium

- marianum* Wats. (*marylandicum* Lodd.), marianische $\S$. f. b. Nordamerika.
- meridionale* Sw., mittägliche, $\S$. w. Jamaika.
- minutiflorum* Wats., kleinblumige, $\S$. f. b. Nordamerika.
- mucronatum* L., stachelspitzige, $\S$. f. b. Nordamerika.
- Myrsinites* Mchx., kleinblättrige, $\S$. k. f. b. Carolina, Florida.
- β) *lanceolatum* Pursh., γ) *obtusum* Pursh.
- myrtifolium* Mchx., myrtenblättrige, $\S$. k. Carolina.
- myrtilloides* Mchx., flaschenblumige, $\S$. f. b. Nordamer.
- α) *angustifolium* Ait., β) *macrophyllum* DC. (*membranaceum* Dougl.).
- Myrtillus* L., gemeine, $\S$. f. Europa.
- β) *baccis albis*, γ) *baccis albis pyriformibus*.
- nitidum* Andr., glänzende, $\S$. k. f. b. Carolina.
- β) *decumbens* Bot. mag.
- ovatum* Pursh., eiförmige, $\S$. k. f. b. Nordwestamerika.
- pallidum* Ait. bleiche, $\S$. f. b. Nordamerika.
- pensylvanicum* Lam. (*tenellum* Pursh., *virgatum* Ait., *ramulosum* et *humile* W.), pensylvanische, $\S$. f. b. k. Nordamerika.
- resinosum* Ait., harzige, $\S$. f. b. k. Nordamerika.
- α) *lutescens* Pursh., β) *rubescens* Sims., γ) *parviflorum* Andr.
- salicinum* Chamis., weidenähnliche, $\S$. k. f. b. Nordwestamerika.
- stamineum* L., langbeutelige, $\S$. f. b. k. Nordamerika.
- tenellum* Ait., zarte, $\S$. k. f. b. Pennsylvanien, Neu jersey.
- uliginosum* L. (*gualteroides* Bigel., *pubescens* Wormsk., *sedense* P.), Rausch-H. (Trunkelbeere), $\S$. f. Europa, Nord- und Südamerika.
- virgatum* Ait. (*corymbosum* var. G. Don), ruthenförmige, $\S$. f. b. k. Virginien, Carolina.
- α) *latifolium* Wats., β) *angustifolium* Wats. (*fuscatum angustifolium* Pursh.).
- Vitis idaea* L., rothe (Preufselbeere), $\S$. f. Europa, Nordamerika.
- album* L. vid. *Lonicera ciliata* b., *erythrocarpum* Mchx. (et *hispidulum* Wangenh., *macrocarpum* Ait., *oblongifolium* Hort. et *Oxycoccus* L.) vid. *Oxycoccus*, *erythrocarp.*, *macrocarp.* et *palustris*, *hispidulum* L. v. *Phalerocarpus hispidulus* (*serpyllifolius*), *ligustrinum* L. v. *Lyonia ligustrina*.
- Valantia** T. (Sebastian Vaillant, berühmter französischer Botaniker), IV. 1, Rubiaceae.
- hispidula* L., steifhaarige, $\odot$. f. Südeuropa.
- muralis* L., Mauer-V., $\odot$. f. Italien, Südfrankreich.
- filiformis* Ait., fadenförmige, $\odot$. f. Teneriffa.
- articulata* L. etc. v. *Galium articulatum*.
- Valeriana** T., Baldrian, III. 1, Valerianeae.
- allariaefolia* Vahl. (*macrophylla* MB.), lauchkrautblättriger, $\mathcal{A}$. f. Cappadocien, Iberien.
- capensis* Thbg., capischer, $\mathcal{A}$. k. Cap der guten Hoffn.
- Cardamines* MB., kressenblättriger, $\mathcal{A}$. f. Caucasus.
- celtica* L., celtischer, $\mathcal{A}$. f. Kärnthen, Steyermark, Tyrol, Salzburg.
- dioica* L., zweihäusiger, $\mathcal{A}$. f. Europa.
- elongata* Jacq., verlängerter, $\mathcal{A}$. f. Oesterreich, Tyrol, Kärnthen, Krain.

Valeriana

globulariaefolia Ramond (*heterophylla* Lois., *glauca* Lapeyr., *rupicola* Lag.), kugelblumenblättriger, 4. f. b. Südfrankreich, Spanien.

italica Lam., italienischer, 4. Kn. f. Italien.

montana L., Berg-B., 4. f. Mitteleuropäische Alpen und Voralpen.

officinalis L., gebräuchlicher, 4. f. Europa.

α) *altissima* Mik., β) *media* K., γ) *angustifolia* Vahl.

Phu L., großer (Garten-B.), 4. f. Süd- und Westdeutschland, Italien.

pyrenaica L., pyrenäischer, 4. f. Schottland, Pyrenäen.

Saliunca All., fettblättriger, 4. f. Wallis, oberital. Alpen.

sambucifolia Mik., hollunderblättriger, 4. f. Böhmen, Schlesien, Oesterreich, Steyermark.

β) *exaltata* Mik. (*repens* Host, *altissima* Hornem.)

saxatilis L., Gesteins-B., 4. f. Mittel- und südeuropäische Alpen.

sisymbriifolia Vahl., rankenblättriger, ♂. f. Kleinasien.

supina L., niedriger, 4. f. Kärnten, Tyrol.

Tripteris L., dreiflügeliger, 4. f. Mitteleuropäische Alpen und Voralpen.

β) *intermedia* Vahl.

tuberosa L., knolliger, 4. Kn. f. Südeuropa.

angustifolia Cav. etc. *rubra* L. vid. *Centhranthus angustifolius* etc., *ruthenica* W, (*sibirica* L.) vid.

Patrinia sibirica.

Valerianella T., Rapunzel, III. 1., Valerianeae.

Auricula DC., katzenöhrige, ☉. f. Europa.

β) *laxiflora* Dufr., γ) *dasycarpa* Rehb.

brachystephana Tenor., kurzchronige, ☉. f. Neapel.

carinata Lois., kielförmige, ☉. f. Deutschland, Frankreich, Taurien.

congesta Lindl., gedrängte, ☉. f. Columbia.

coronata DC. (*campanulata* Biv.), gekrönte, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

costata DC., gerippte, ☉. f. Caucasus.

cymbaearpa C. A. Mey., cymbelfrüchtige, ☉. f. Südrussland.

dentata DC. (*rimosa* Bast., *tridentata* Rehb.), gezahnte, ☉. f. Europa.

discoidea Lois., scheibenförmige, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

echinata DC., stachelige, ☉. f. Süd- u. Westeuropa, Taurien.

eriocarpa Dsv. (*Fedia campanulata* Presl., *rugulosa* Stev. *muricata* R. et S.), wollfrüchtige, ☉. f. Süd-, West- und Osteuropa.

exscapa (Stev.), schaftlose, ☉. f. Caucasus.

gibbosa Guss., höckerige, ☉. f. Sicilien.

gracilis Haberl., schlanke, ☉. f. Taurien.

hamata Bast., hakige, ☉. f. Mittel-, Süd- u. Westeur.

Morisonii DC., Morison's, ☉. f. Europa, Taurien.

α) *leiocarpa* K. (*dentata* Auct.), β) *lasiocarpa* K. (*dasycarpa* Stev., *mixta* Dufr., *microcarpa* Lois.)

olitoria Mch. (*Fedia striata* Stev.), gemeine, ☉. f. Europa,

oxyrhyncha Fisch. et Mey., spitzschnabelige, ☉. f. Südrussland.

Valerianella

- plagiostephana Fisch. et Mey., schiefkronige, ☉. f. Nordpersien.
 platyloba DC. (*discoidea* Rchb.), breitlappige, ☉. f. Südeuropa.
 pteroloba Stev., flügelappige, ☉. f. Taurien.
 puberula DC. (*F. microcarpa* Rchb.), feinhaarige, ☉. f. Sicilien, Calabrien.
 pumila DC. (*tridentata* Stev., *membranacea* Lois.), kleine, ☉. f. Süd-, West- und Osteuropa.
 punctata H. Patav., punctirte, ☉. f. ?
 radiata DC., strahlige, ☉. f. Pennsylvania.
 sclerocarpa Fisch. et Mey., knorpelfrüchtige, ☉. f. Nordpersien.
 sphaerocarpa Guss., kugelfrüchtige, ☉. f. Sicilien.
 Szovitsiana Fisch. et Mey., Szovits's, ☉. f. Persien.
 trichocarpa DC., haarfrüchtige, ☉. f. Konstantinopel.
 truncata DC. Rchb., abgestutzte, ☉. f. Creta.
 turgida DC., aufgeschwollene, ☉. f. Taurien.
 uncinata DC. (MB.), hakenförmige, ☉. f. Taurien.
 vesicaria Mch., aufgeblasene, ☉. f. Süd- u. Westeuropa.
Vallaris RB., Schanzenstrauch, V. 1., Contortae Apocynaeae.
 Pergulanus Burm., zeylonischer, ♀. Sch. w. Ostindien.
Vallesia R. et P. (F. Vallesio, Arzt Philipp's II. von Spanien), V. 1., Contortae-Apocynaeae.
 cymbaefolia Orteg., cymbelblättrige, ♀. w. Neuspanien.
 dichotoma R. et P., zweizinkige, ♀. w. Peru.
Vallisneria L. (A. Vallisneri, ital. Botaniker), XXII. 11., Hydrocharideae.
 Jacquiniana Spgl. (*spiralis* L. Poll., *americana* Mchx.), Jacquin's, ☉. Wa. k. Oberitalien, Südfrankr., Nordamerika, Neuholland.
 Micheliana Spgl. (*spiralis* L.), Micheli's, 4. Wa. k. Mittelitalien.
Vallota Herb. Salisb. (P. Vallot, französ. Botaniker), VI. 1., Narcisseae-Amaryllideae.
 purpurea Herb., purpurfarbige, 4. Zw. t. w. C. d. g. H. β) minor Herb.
Vanda RB. (ostindischer Name), XX. 1., Orchideae.
 cruenta Lindl., blutfarbige, 4. w. China.
 lamellata Lindl., plättchenförmige, 4. w. Manila.
 multiflora Lindl., vielblumige, 4. w. China.
 Roxburghii RB., Roxburgh's, 4. w. Ostindien.
 α) tessellata Hook., β) unicolor Hook.
 teres Lindl., rundliche, 4. w. Silhet.
 trichorhiza Hook., haarwurzelige, 4. w. Ostindien.
 recurva Hook. vid. *Sarcanthus rostratus*.
Vandellia P. Br. (L. Vandelli, Professor der Botanik zu Coimbra in Portugal), XIV. 11., Personatae-An-tirrhoneae.
 diffusa L., weitschweifige, ☉. w. m. f. Caribäen, Brasil.
Vangueria Juss. (Voa-Vanguier, madagascarischer Name), V. 1., Rubiaceae.
 edulis Vahl., genießbare, ♀. w. China, Ostindien.
 spinosa Roxb., dornige, ♀. w. Ostindien.
 velutina Hook., sammtthaarige, ♀. w. Madagascar.
Vanilla Sw., Vanille, XX. 1., Orchideae.
 aromatica Sw., gewürzhafte, ♀. Sch. w. Südamerika.
 bicolor Lindl., zweifarbige, 4. w. Guiana.

Vanilla

planifolia Andr. (*Myrobroma fragrans* Salisb.) plattblät-
terige, ♀. Sch. w. Westindien.

Varronia L. (Varro, alter römischer Schriftsteller über Landwirthschaft), V. 1., Asperifoliaceae.

alba Jacq., weisse, ♀. w. Westindien.

alnifolia Hornem., erlenblättrige, ♀. w. ? Mexico.

angustifolia Desv. (*curassavica* Lam.), schmalblättrige,
♀. w. Caribäen.

bullata L., bauschige, ♀. w. Westindien.

dichotoma R. et P. (*Cordia bifurcata* R. et S.), zwei-
zinkige, ♀. w. Peru.

globosa L. kugelblumige, ♀. w. Westindien.

lineata L., (*humilis* Jacq.), linirte, ♀. w. Jamaika.

martinicensis Jacq., martiniquische, ♀. w. Martinique.

mirabiloides Jacq., wunderblumenähnliche, ♀. w. Hispaniola.

mollis Desv., weiche, ♀. w. Westindien.

monosperma Jacq. (*corymbosa* Desv., *ulmifolia* Spgl.),
einsamige, ♀. w. Antillen.

Vascoa DC. (Vasco de Gama, berühmter portugiesischer Seefahrer), XVI. VI., Leguminosae-Papilionaceae.

amplexicaulis DC., stengelumfassende, ♀. t. C. d. g. H.

perfoliata DC., durchwachsenblättrige, ♀. t. C. d. g. H.

Vauanthes chloraeflora Haw. v. *Grammanthes dichotoma*.

Velezia L. (C. Velez, Arzt und Botaniker zu Madrid), V. II., Caryophyllaceae.

rigida W., starre, ♂. f. Spanien.

Vella L., Felsenkresse, XV. II., Cruciferae.

Pseudo-Cytisus L., strauchige, ♀. k. Spanien.

annua L. v. *Carrichtera Vellae*, *aspera* P. v. *Bo-*

leum asperum, *tenuissima* Pall. v. *Euclidium ta-*
taricum.

Velleya Sm. (Major Velley, englischer Botaniker), V. I., Campanulaceae - Goodenovieae.

lyrata RB., leyerblättrige, 4. k. t. Neuholland.

paradoxa RB., wunderbare, 4. k. t. Neuholland.

β) *humilis* A. DC. (*paradoxa* Lindl.).

spathulata RB., spatelblättrige, 4. k. t. Neuholland.

Vellosia squamata H. Angl. v. *Xerophyllum Sabadilla*.

Veltheimia Gled. (v. Veltheim zu Harbke im Herzog- thume Braunschweig, Besitzer eines berühmt gewor- denen Gartens), VI. I., Coronariae-Hemerocallideae.

glauca Jacq., blaugrüne, 4. Zw. t. Cap der guten H.

intermedia Hort. Angl., mittlere, 4. Zw. t. C. d. g. H.

viridifolia Jacq., grünblättrige, Zw. t. Cap der gut. H.

pumila W., *sarmentosa* W. etc. vid. *Tritomanthe*

pumila, *media* etc.

Venidium Less., Venidie, XIX. IV., Compositae-Co- rymbiferae.

angustifolium Less., schmalblättrige, ♀. k. t. C. d. g. H.

Ventenatia major Sm. et *minor* Sm. v. *Stylidium grami-*
nifolium et *lineare*.

Veratrum T., Germer (Wedewurz), VI. III. (XXIII. I.), Coronariae Colchicaceae.

album L., weisser, 4. f. Mittel- u. Osteuropa, Voralpen.

angustifolium Pursh., schmalblättriger, 4. f. b. Vir-
ginien, Carolina.

caricifolium Schldtl., riedgrasblättriger, 4. k. f. b. Mexico.

Lobelianum Bernh., *Lobel's*, 4. f. Mittel- und ost-
europäische Voralpen.

Veratrum

nigrum L., schwarzer, 4. f. Oesterreich, Steyermark, Krain, Ungarn, Sibirien etc.

parviflorum Mchx., kleinblumiger, 4. f. Nordamerika.

viride Ait., grünblumiger, 4. f. Nordamerika.

luteum L. v. Chamaelirium carolinianum, *Sabadilla*

Retz. v. Xerophyllum Sabadilla, *virginicum* Ait. v.

Leimanthium virginicum.

Verbascum T., Königskerze, V. 1., Personatae-Verbaceae.

adulterinum K. (*thapsiformi nigrum* Schied.), falsche, ♂. f. Europa.

angustifolium, Tenor., schmalblättrige, ♂. f. Calabrien.

banaticum Schrad., banatische, ♂. f. Banat.

Bastardii R. et S., Bastard's, ♂. f. Frankreich.

betonicaefolium Dsf., betonienblättrige, ♂. 4. f. Armenien.

Blattaria L., veränderliche (Mottenkraut), ♂. f. Europa.

b) album (*glabrum* Mill.)

Boerhaavii L., Boerhaave's, ☉. f. Südeuropa.

candidissimum DC., reinweiß, ♂. f. Südfrankreich.

ceratophyllum Schrad., hornkrautblättrige, ♂. f. Kleinas.

collinum Schrad. (*Thapso-nigrum* Schied., *ambiguum*

Lej.), Hügel-K., ♂. f. Nord-, West- und Mitteldeutschland, Schweden.

β) seminigrum Fr.

compactum MB. (*ovalifolium* Sins., *formosum* Bess.,

strictum Clark), dichtblumige, ♂. Taurien, Caucasus, Podolien.

ferrugineum Ait., rostfarbige, 4. f. Südeuropa.

β) triste Sibth.

floccosum W. K. (*pulverulentum* Sm., *mixtum* DC., *laxiflorum* Presl.), flockige, ♂. f. Süd-, Ost- u. Westeur.

glabrum W., kahle, ♂. k. ?

gnaphalodes MB., ruhrkrautähnliche, ♂. f. Taurien.

gossypinum MB., baumwollenähnliche, ♂. Iberien.

grandiflorum Schrad., großblumige, ♂. f. ?

haemorrhoidale Ait., canarische, ♂. k. Madeira.

Hohenackeri Fisch. et Mey., Hohenacker's, ♂. f. Nordpersien.

Hornemanni Bess., Hornemann's ♂. f. ? Podolien.

Lagurus Fisch. et Mey., wollährlige, ♂. f. Byzans.

lanatum Schrad., wollige, ♂. f. Krain, Kärnthen, Italien.

leptostachyum DC., schlankährlige, ♂. f. Südfrankreich.

longifolium Tenor., langblättrige, ♂. f. Neapel.

Lychnitis L., lychnisartige, ♂. f. Europa.

b) album Mch.

lyratum Lam., leyerförmige, ♂. f. Spanien.

macranthum Lk., großkronige, ♂. f. Portugal.

majale DC., maiblumige, ♂. f. Südfrankreich.

monspessulanum P., französische, ♂. f. Südfrankreich.

montanum Schrad. (*crassifolium* Schlchr.), Berg-K., ♂. Wallis.

mucronatum Lam., stachelspitzige, ♂. f. Griechenland.

nigrum L., schwärzliche, ♂. f. Europa.

β) thyrsiodeum Host (*alopecurus* Thuill., *parisiense* Thuill.), γ) ovatum K. (*nigro-Lychnitis* Schiede.)

niveum Tenor., schneeweiße, ♂. f. Italien.

nothum K. (? *nigro pulverulentum* Sm.), unächte, ♂. f. Deutschland, ? England.

Verbascum

orientale MB. (*austriacum* Schrad.), morgenländische, ♂. f. Ost-, Süd- und Westeuropa.

β) *Chaixii* Vill. (*gallicum* W.)

Osbekii L., Osbek's, ♂. f. b. k. Spanien, Türkei.

ovatum Schrad., eiförmige, ♂. f. Spanien.

phlomoides L. (*rugulosum* W.), phlomisähnliche, ♂. f. Europa, Taurien.

β) album, γ) australe Schrad., δ) nemorosum Schrad., ε) condensatum Schrad.

phoeniceum L., violettrothe, ♂. f. Mittel- u. Osteuropa.

pinnatifidum Vahl. (*bipinnatifidum* Sims.), fiederspaltige, ♂. f. Taurien, Griechenland.

pulverulentum Vill., bestäubte, ♂. f. Westdeutschland, Frankreich.

puniceum Schrad., hochrothe, ♂. f. Südeuropa.

pyramidatum MB., pyramidale, ♂. f. Taurien, Caucasus.

ramigerum Schrad. (? *ramosissimum* DC., *thapsiformi-Lychnitis* Schied.), ästige, ♂. f. Europa.

repandum W., ausgeschweifte, ♂. k. ?

rotundifolium Tenor., rundblättrige, ♂. f. Neapel.

rubiginosum W. Kit. (*blattarioides* Gaud., *Pseudo-Blattaria* Schlchr.), rostfarbige, ♂. f. Ungarn, Baiern, Schweiz.

Schottianum Schrad., Schott's, ♂. f. Ost- u. Westdeutschl.

Schraderi Mey. (*Thapsus* Schrad., ? *thapsoides* L.), Schrader's, ♂. f. Europa.

β) pallidum N. E., γ) elongatum W.

sinuatum L. (*undulatum* MB.), buchtige, ♂. f. k. Süd- und Osteuropa.

speciosum Schrad. (*longifolium* DC.), prächtige, ♂. f. Oesterreich, Frankreich.

spectabile MB., ansehnliche, ♂. f. Taurien.

spurium K. (*Thapso-Lychnitis* M. et K.), Bastard-K., ♂. f. Westdeutschland.

spinosum L., dornige, ♀. k. Creta.

Steveni Fisch., Steven's, ♂. f. Sibirien.

Thapsus L. (*thapsiforme* Schrad.), ? gemeine, ♂. f. Europa.

β) cuspidatum Schrad.

undulatum Lam. (*plicatum* Sm.), wellenförmige, ♂. f. Griechenland, Kleinasien.

versiflorum Schrad., wechselblumige, ♂. f. Böhmen.

virgatum Wither. (*blattarioides* Lam.), ruthenförmige, ♂. f. England, Taurien.

Wiedemannianum Fisch. et Mey., Wiedemann's, ♂. f. Natolien.

Myconi L. v. *Ramondia pyrenaica*.

Verbena T. L., Eisenkraut, XIV. II., Verbenaceae.

alata Lk. et Otto, geflügeltes, 4. t. Montevideo.

angustifolia Mchx., schmalblättriges, 4. f. Nordamerika.

Aubletia Jacq., Aublet's, ♂. m. f. k. Carolina, Georgien.

barbata Grah., bärtiges, 4. k. t. Mexico.

bonariensis L., bonarisches, ♂. 4. k. Buenos-Ayres.

bracteosa Mchx., deckblättriges, ♂. 4. f. Nordamerika.

canescens H. B. K., weißgraues, ♂. m. f. Mexico.

caroliniana L., carolinisches, 4. f. Carolina.

chamaedryfolia Juss. (*Melindres* Gill.), gamanderblättriges, 4. k. t. Buenos-Ayres.

b) latifolia, c) major.

diffusa Desf., weitschweifiges, 4. ♀. k. Nordamerika.

Verbena

- Drummondii* Lindl., Drummond's, 4. k. t. Texas.
elegans H. B. K., zierliches, ☉. ♂. m. f. k. Mexico.
erinoides W. (*multifida* R. et P.), erinusähnliches, ☉.
 m. f. Peru.

β) Sabini D. Don (*contracta* Lindl.).

- glandulosa* Morr., drüsiges, 4. k. t. ?
hastata L., spontonförmiges, 4. f. Nordamerika.
hispida R. et P., steifhaariges, ☉. m. f. Peru.
incisa Hook., schlitzblättriges, 4. k. t. Panama.
Lamberti Ker (? *prostrata* RB.), Lambert's, 4. f. b. k.
 Carolina, westl. Nordamerika.

b) rosea D. Don.

- lasioslachys* Lk., wollähriges, ♂. f. Californien.
litoralis H. B. K., Ufer-E. ♂. k. t. Peru.
officinalis L., gemeines, ☉. f. Europa, Asien etc.
paniculata Lam., rispiges, 4. f. Nordamerika.
pinnatifida Pursh., fiederspaltiges, 4. f. Nordamerika.
polystachya H. B. K., vielähriges, 4. k. Mexico, Westind.
prostrata RB., gestrecktes, 4. f. b. k. Nordamerika.
pulchella Swt., schönes, ☉. ♂. m. f. k. Buenos-Ayres.

b) flore albo.

- radicans* Hook., starkwurzelndes, 4. k. t. Chili.
rugosa D. Don, runzeliges, 4. k. Buenos-Ayres.
scabra Vahl., scharfes, 4. k. Mexico.
sororia D. Don, verschwistertes, 4. f. b. k. Nepal.
spuria L., unächt, ♂. f. Nordamerika.
stricta Vent. (*rigens* Mchx.), steifes, 4. f. Nordamerika.
sulphurea D. Don, schwefelgelbes, 4. k. t. Chili.
supina L., niedriges, ☉. f. Südeuropa, Kleinas., Aegypt.
teucroides Gill. et Hook. (*Nivenii* Hort.), teucriumähn-
 liches, 4. k. t. Südamerika.
trifida H. B. K., dreispaltiges, ☉. m. f. Mexico.
Tweediana Hook., Tweedie's, 4. t. Brasilien.
urticaefolia L., nesselblättriges, 4. f. Nordamerika.
venosa Gill et Hook., aderiges, 4. k. Buenos-Ayres.
veronicaefolia H. B. K., ehrenpreisblättriges, ☉. m. f.
 Mexico.

- xutha* Lehm., ergossenes, 4. f. Nordamerika.

Hybriden: *Arraniana* H. Angl. 4. k. t. *intermedia*
Penny, ♂. k. t. — *Fergusonii*, *Hylandsii*, *Neillii*,
speciosa etc.

lappulacea L. Jacq. et *mexicana* L. v. *Priva lappu-*
lacea et *mexicana*, *nodiflora* L. v. *Zapania nodi-*
flora, *triphylla* L'Her. v. *Aloysia citriodora*.

Verbesina L., Verbesine, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- alata* L., geflügelte, 4. t. w. Surinam, Cuba.
atriplicifolia P. (*Clerodendron phlomoides*, *Hortul. ital.*),
 meldenblättrige, ♂. t. ? Südamerika.
aurea DC., goldfarbige, 4. Kn. k. t. Mexico.
buphthalmoides Lk., buphthalmumähnliche, ♂. t. Mondevideo.
dichotoma Murr., zweizinkige, ☉. w. m. f. Ostindien.
fruticosa W. (*tridentata* Spgl.), strauchige, ♂. w. Süd-
 amerika, Westindien.
gigantea Jacq., riesenhafte, ♂. w. Westindien.
laciniata Nutt., schlitzblättrige, 4. k. Carolina.
pinnatifida Cav., fiederspaltige, 4. k. t. Mexico.
salicifolia H. B. K., weidenblättrige, 4. k. t. Mexico.
sativa Sims., gebaute, ☉. m. f. Ostindien.

Verbesina

serrata Cav., sägezahnige, 4. k. t. Mexico.
Siegesbeckia Mchx., Siegesbeck's, 4. f. Virginien, Carolina.
virginica L. (*paniculata* Poir.) virginische, 4. f. Nordam.
biflora L. v. *Wollastonia biflora*, *calendulacea* L. v.
Wedelia c., *Coreopsis* Mchx. (et *helianthoides* Mchx.)
v. *Actinomeris squarrosa* (*alternifolia*) etc., *fruticosa*
H. Par. v. *Zexmenia monocephala*, *mutica* L. v.
Chrysanthellum procumbens, *nodiflora* L. v. *Synedrella nodiflora*.

Verea acutiflora Andr. etc. v. *Kalanchoe acutiflora* etc.,
pinnata Spgl. v. *Bryophyllum calycinum*.

Vernonia Schreb. (William Vernon, botanischer Reisender in Nordamerika) XIX. 1., Compositae Cynarcephalae.

acutifolia Hook., spitzblättrige, 4. w. Brasilien.
angustifolia Mchx., schmalblättrige, 4. f. b. Carolina.
anthelmintica W., wurmabtreibende, ☉. w. m. f. Ostindien.
arborescens Sw. (*Lepidaploa arboresc. phyllostachya* Cass.), baumartige, 5. w. Westindien.

axilliflora Mart., achselblumige, 5. w. Brasilien.
cinerea Less. (*Chrysocoma purpurea* Forst.), aschfarbige,
☉. m. f. Ostindien.

flexuosa Sims., gebogene, 4. Kn. w. Brasilien.

b) flore albo.

fruticosa Sw., strauchige, 5. w. Westindien.
linearis Spgl., gleichbreitblättrige, ☉. w. m. f. Südamer.
noveboracensis W. (*praealta* W.), neuyorkische, 4. f. Nordamerika.

β) *glauca* W. (*tomentosa* Ell.)

odoratissima H. B. K., wohlriechendste, 5. w. Caracas.
pandurata Lk., geigenförmige, 4. w. Congo.

pauciflora Less. (*senegalensis* Dsf., *galamensis* Less., *coelestina* Schrad.), wenigblumige, ☉. w. m. Senegal.
pedunculata DC., langstielige, 4. w. Brasilien.

persicifolia Dsf., pfirsichblättrige, 5. w. Westindien.
praealta Ell. DC. (*altissima* Nutt.), hohe, 4. f. Nordam.
scaberrima Nutt. (*pilosa* Bosc.), scharfe, 4. f. b. Carolina, Florida.

scorpioides P. (*Tournefortioides* Less., *centriflora* Lk. et Otto), scorpionartige, 5. w. Brasilien, Guiana.

sericea Rich., seidenhaarige, 4. w. Cayenne.

triplinerva Spgl., dreinervige, ☉. w. m. f. Brasilien.
senegalensis Less. v. *Decaneuron senegalense*.

Veronica T., Ehrenpreis, II. 1., Personatae-Veroniceae.

acinifolia L. (? *romana* All.), feldthymianblättriger,
☉. f. Mittel-, Süd- und Westeuropa.

abrotanifolia Lk., stabwurzblättriger, 4. f. Sibirien.

acutiflora Lapeir., spitzblumiger, 4. f. Pyrenäen.

agrestis L. (*pulchella* Bast., *versicolor* Fr.), Acker-E.,
☉. f. Europa.

alpina L., Alpen-E., 4. f. b. Europäische Alpen.

β) *integrifolia* Schrk. (*Gebhardiana* Vest.), γ) *rotundifolia* Schrk., δ) *pumila* All., ε) *obtusifolia* R. et S., ζ) *heterophylla* R. et S.

amoena Stev., lieblicher, ☉. f. Iberien.

anagalloides Guss., gauchheilähnlicher, 4. Wa. f. Sicilien.

Angallis L., Wasser-E., 4. Wa. f. Europa.

β) *tenella* Schm., γ) *rosea* K. (*aquatica* Bernh.)

Veronica

angustifolia Fisch. (*linariaefolia* Pall.), schmalblättriger, 4. f. Sibirien.

aphylla L., blattloser, 4. f. Europäische Alpen.

β) *depauperata* W. K.

arguta Schrad., spitzzahniger, 4. f. Mittel- u. Südeuropa.

arvensis L., Feld-E., ☉. f. Europa, Nordamerika.

β) *polyanthos* Thuill., γ) *nana* Lam. (*romana* Schm.)

australis Schrad. (*hybrida* L., *paludosa* Lej.), südlicher, 4. f. Süd- und Westeuropa.

austriaca L. (*polymorpha* W., *Jacquini* Schott), österreichischer, 4. f. Süd- u. Osteuropa, Taurien, Kleinasien, Sibirien.

β) *multifida* L., b) *pilocarpa* Lk. (*trichocarpa* R. et S.), γ) *tenuifolia* Stev. MB.

azurea H. Vindob., azurblauer, 4. f. ?

Bachhoffenii Häuff., Bachhoff's, 4. f. Banat.

Baumgartenii R. et S. (*petraea* Baumg.), Baumgarten's, 4. f. b. Dinarische Alpen.

Beccabunga L., Bachbungen-E., 4. Wa. f. Europa.

β) *limosa* Lej.

bellidioides L., maßliebenblättriger, 4. f. b. Mitteleuropäische Alpen.

biloba L., zweilappiger, ☉. f. Kleinasien, Caucasus.

Buxbaumii Tenor. (*hospita* M. et K., *persica* Poir., *Tournefortii* Gmel., *filiformis* DC.), Buxbaum's, ☉. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

callistachya Ledeb., schönähriger, 4. f. Podolien.

canescens Schrad. (*neglecta* Vahl.), weißgraulicher, 4. f. Ungarn, Sibirien.

caroliniana Poir., carolinischer, 4. Wa. f. Nordamerika.

cartilaginea Ledeb., knorpeliger, 4. f. Dahurien.

caucasica MB. (*ossetica* Stev.), caucasischer, 4. f. Caucasus, Iberien.

b) *latifolia*.

Chaixii Lapeyr., Chaix's, 4. f. Frankreich.

Chamaedrys L. (*lamiifolia* Heyne, *melissaeifolia* Poir.), Wiesen-E., 4. f. Europa.

b) *variegata*, β) *pilosa* Schm. (*plicata* Pohl.)

? *corymbosa* Loud., traubendoldiger 4. f. ?

crenulata Hoffm. (*villosa* Schrad.), gekerbter, 4. f. ?

cretica Pall., cretischer, 4. k. Creta.

crispa Lodd., krauser, 4. f. ?

Cymbalaria Bertol. (*cymbalariaefolia* Vahl., *panormitana* Guss.), Cymbelkraut-E., ☉. f. Süd- und Osteuropa.

decussata Ait. (*elliptica* Forst.), kreuzblättriger, ⚥. k. Neuzeeland, Patagonien.

dianthifolia Cunn. (*pulchra* G. Don), nelkenblättriger, 4. k. Neuholland.

didyma Tenor. (*polita* Fr.), zwillingsartiger, ☉. f. Europa.

digitata Vahl, fingerförmiger, ☉. f. Südfrankr., Spanien.

distans RB., entferntblumiger, 4. k. Neusüdwallis.

elegans DC. (? *incarnata* G. Don), zierlicher, 4. f. Belgien.

formosa RB., schöner, ⚥. k. Neuholland.

fruticulosa L. (*frutescens* Scop.), strauchiger, 4 ⚥. f. Europäische Alpen.

β) *Arbustulosa* Hoffm.

gentianoides Vahl. (*gentianaefolia* Swt.), enzianblättriger, 4. f. Taurien, Caucasus, Kleinasien.

β) *pallida* Hornem.

Veronica

- glabra Ehrh., kahler, 4. f. Südeuropa.
 b) flore albo.
 gracilis RB., schlanker, 4. k. Neusüdwallis.
 grandis Fisch., grofszähniger, 4. f. Sibirien.
 hederæfolia L. (*Lappago* Schrk.), epheublätteriger, ☉. f. Europa.
 incana L., greisgrauer, 4. f. Podolien.
 incisa Ait., schlitzblätteriger, 4. f. Sibirien.
 labiata RB. (*Derwentia* Andr.), langtraubiger, 4. k. Neuholland.
 laciniata Ait., geschlitzter, 4. f. Sibirien.
 latifolia L. (*Pseudochamaedrys* Jacq.), breitblätteriger, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.
 β) minor Schrad. (*Teucrium* Vahl., ? L., γ) crinita Kit.
 leucantha Fisch., weifsblumiger, 4. f. Sibirien.
 longebracteata Lk., langdeckblätteriger, 4. f. ?
 a) angustifolia Lk. (*media* W.), β) latifolia Lk., (*hybrida* W.), γ) brevifolia Lk. (*brachyphylla* R. et S.)
 longifolia L., langblätteriger, 4. f. Mitteleuropa.
 b) alba, c) incarnata, β) acuta Mart., γ) complicata Hoffm., δ) elatior Ehrh. (et *exaltata* Hort.), ε) Hostii R. et S. (*elatior* Host), ζ) ambigua Mart., η) persicifolia Schott., θ) rigens Mart., ι) praealta H. C.
 luxurians Ledeb., üppiger, 4. f. Sibirien.
 maritima L. (*oxyphylla* Stev.), Meerstrands-E., 4. f. Nordeuropa.
 β) grossa Mart.
 maxima Stev., grofser, ☉. f. Iberien.
 media Schrad. (*alternifolia* Lej.), mittlerer, 4. f. Westdeutschland, Belgien.
 melancolica Dsf., dunkelfarbiger, 4. f. ?
 Michauxii Lam., Michaux's, 4. f. Kleinasien.
 microphylla Kit., kleinblätteriger, 4. t. Ungarn.
 mollis Zea (*micrantha* Lk.), weicher, 4. k. f. b. Spanien Portugal.
 montana L., Berg-E., 4. f. Mitteleuropa.
 Mülleriana R. et S., Müller's, 4. f. Syrien.
 nitida Lk. (*arguta* W.), glänzender, 4. f. ? Südeuropa.
 β) falcata Mart. (*mesotypa* Lk.)
 Nummularia Gouan (*irregularis* Lapeyr.), kreisblätteriger, 4. h. k. b. f. Pyrenäen.
 officinalis L., gebräuchlicher, 4. f. Europa, Nordamer.
 β) Tournefortii Vill., γ) spadana Lej.
 opaca Fr., dunkler, ☉. f. Europa.
 orchidea Crtz. (*cristata* Bernh., *hybrida* MB., *crassifolia* Kit.), orchisblumiger, 4. f. Osteuropa.
 β) longiflora R. et S.
 orientalis Ait. (*heterophylla* Salish.), morgenländischer, 4. f. Kleinasien.
 paniculata L., rispiger, 4. f. Böhmen, Tatarei.
 parviflora Vahl., kleinblumiger, h. k. Neuzeeland.
 pectinata L., kamnblätteriger, 4. h. f. b. Konstantinopel.
 peduncularis MB., haarstielliger, 4. f. Caucasus.
 peregrina L. (? *romana* L., *carnosula* Lam.), fremder, ☉. f. Südeuropa, Nordamerika.
 perfoliata RB., durchwachsenblätteriger, 4. h. k. Neuholl.
 petraea Stev., Felsen-E., 4. f. Caucasus.

Veronica

- pinnata L., gefiederter, 4. f. Sibirien.
 plebeja RB., gemeiner neuholländischer, 4. k. Neusüdwallis.
 polystachya Lk., vielähriger, 4. f. ?
 Ponae Gouan (*pumila* All. *sempervirens* Lam.), Pona's,
 4. f. k. Oberitalien, Südfrankreich.
 praecox All. (*romana* Scop., *ocymifolia* Thuill.), früher,
 ☉. f. Mittel-, Süd-, Ost- und Westeuropa.
 prostrata L., gestreckter, 4. f. Europa.
 β) *saturejaefolia* Poit. et Turp.
 pyrenaica All. (*Allionii* Vill.), pyrenäischer, 4. f. Ober-
 italien, Pyrenäen.
 repens All., kriechender, 4. f. Italien.
 rubicunda Ledeb., röthlicher, 4. f. Dahurien.
 ruthenica Jacq., russischer, 4. f. Rußland.
 saxatilis Jacq. (*suffruticosa* Lodd.), Gesteins-E., 4. f. f.
 Mitteleuropäische Alpen und Voralpen.
 scutellata L., schildförmiger, 4. Wa. f. Europa.
 β) *pubescens* K. (*parvularia* Poit. et Turp.)
 serpyllifolia L., quendelblättriger, 4. f. Europa, Amerika.
 β) *tenella* All., γ) *neglecta* Schm., δ) *quader-*
nata Loud., ϵ) *nummularifolia* Loud., ζ) *humifusa* Dicks.
 setigera D. Don. (*hirsuta* Hopk.), borstiger, 4. f.
 Schottland.
 sibirica L., sibirischer, 4. f. Sibirien.
 speciosa Cunn., prächtiger, f. k. t. Van-Diemensland.
 spicata L. (*confusa* R. et S., *Waldsteiniana* Schott.,
menthaefolia Schott.), ährenblumiger, 4. f. Europa.
 α) *Clusii* Schott., β) *spumosa* Presl., γ) *arguta*
 Morett., δ) *Barrelieri* Schott., ϵ) *nitens* Host
 (*Sternbergiana* Bernh.)
 spuria L., unächter, 4. f. Mittel-, West- und Ost-
 deutschland, Ungarn, Siebenbürgen.
 α) *amethystina* W. (*Schraderi* K.), β) *laxiflora*
 Lej., γ) *foliosa* WK. (*nitida* Ehrh.), δ) *brevi-*
folia MB.
 Stephaniana R. et S. (*mollis* Lk.), Stephan's, 4. f.
 Persien.
 stolonifera Lehm., wurzelrankiger, 4. f. Nordamerika.
 tenuis Ledeb., dünner, ☉. f. Nordpersien.
 Teucrium L. (*dentata* Schm. Schrad., *Schmidtii* R. et
 S.), Gamander, 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.
 triphyllus L., dreiblättriger, ☉. f. Europa.
 b) *romana* All.
 tubiflora Fisch. et Mey., röhrenblumiger, 4. f. Dahurien.
 urticaefolia L. (*latifolia* Scop.), nesselblättriger, 4. f.
 Mittel- und Osteuropäische Voralpen.
 β) *circaeoides* G. Don.
 verna L. (*pinnatifida* Lam., *Dillenii* Crtz., *succulenta*
 All.), Frühlings-E., ☉. f. Europa.
 β) *Bellardi* All. Wulf.
 virginica L., virginischer, 4. f. Virginien.
 b) *incarnata*.
 Wormskioldii R. et S., Wormskiold's, 4. f. Aleutische Ins.
 Crista Galli Stev. v. *Diplophyllum veronicaeforme*.
 Vesicaria Lam., Blasenschötchen, XV. II., Cruciferae.
 arctica Richards., nördlichstes, 4. k. Nördlichst. Amer.
 arenosa Richards., Sand-B., 4. k. Nördliches Amerika.
 cretica Poir. (*fruticulosa* Desv.), cretisches, f. k. Creta.

Vesicaria

gracilis Hook., schlankes, ☉. f. Texas.

grandiflora Hook., großblumiges, ☉. f. Texas.

reticulata Lam., netzförmiges, 4. k. f. b. Armenien, Syrien.

sinuata Poir., buchtiges, 4. f. Oesterreichisches Litorale, Italien, Spanien.

utriculata Lam., schlauchförmiges, 4. f. Süd- u. Westeuropa, Ungarn.

deltoidea Poir. v. *Aubrietia deltoidea*, *edentula* Poir.

(*microcarpa* Vis.) etc. v. Koniga *edentula* etc.

Vestia W. (Vest, Prof. der Botanik zu Grätz), V. I., Solanaceae.

lycioides W., bocksdornähnliche, 5. k. Chili.

Vetiveria A. P. Th., Vetiverie, III. II., Gramineae.

Iwarancusa A. P. Th., officinelle, 4. w. Ostindien.

Viborgia *obcordata* Thbg. et *sericea* Thbg. v. *Löthainia obcordata* et *sericea*, Nachtr.

Viburnum T. (et *Opulus* T. et *Tinus* T.), Schneeball, V. III., Dipsaceae Viburneae.

acerifolium L., ahornblättriger, 5. f. Nordamerika.

cassinoides L. (*punctatum* Rafn., *obovatum* Walt.), dickblättriger, 5. 5. k. f. b. Carolina.

cotinifolium D. Don, cotinusblättriger, 5. k. f. b. Nepal.

dahuricum Pall., dahurischer, 5. f. Sibirien.

dentatum L., gezahnter, 5. f. Nordamerika.

b) *pubescens* Lodd., c) *fol. variegatis* Lodd.,

d) *acuminatum* Lodd., e) *longifolium* Lodd.,

f) *montanum* Lodd.

edule Pursh., genießbarer, 5. f. Nordamerika.

laevigatum Ait. (*lanceolatum* Hill), glatter, 5. k. f. b. Carolina.

Lantana L., wolliger (Schlingbaum, 5. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

b) *foliis variegatis* Lodd.

lantanoides Mchx. (*Lantana grandifolium* Ait. L. *canadense* P.), schlingbaumähnlicher, 5. f. Nordamerika.

Lentago L., canadischer (baumartiger), 5. f. Nordamer.

molle Mchx., (*alnifolium* Marsh.), weicher, 5. f. Nordam.

monogynum Blum. einweibiger, 5. w. Ostindien.

nitidum Ait., glänzender, 5. k. f. b. Nordamerika.

nudum L., nackter, 5. f. Nordamerika.

odoratissimum Ker, wohlriechender, 5. k. China.

Opulus L., gemeiner (Wasserholder), 5. f. Europa, Mittelasien, Nordamerika.

b) *sterile* Dsf. (*roseum* Bauh.), c) *foliis variegatis* Lodd.

orientale Pall., morgenländischer, 5. f. Armenien, Caucas.

Oxycoccus Pursh. (*opuloides* Mühlbg., *trilobum* Marsh., *americanum* Mill.), amerikanischer, 5. f. Nordamerika.

β) *subintegrifolium* Hook.

prunifolium L. (*Lentago du Roi*), pflaumenblättriger, 5. f. Nordamerika.

pubescens Pursh. (*tomentosum* et *villosum* Rafn., *Rafinesquianum* Schult., *dentatum* β. *pubescens* Ait., *dentatum semitomentosum* Mchx.), weichhaariger, 5. f. Nordamerika.

pyrifolium Lam., birnblättriger, 5. f. Nordamerika.

rugosum P. (*rigidum* Vent.), runzeliger, 5. 5. k. Canarische Inseln.

squamatum Mühlbg., schuppiger, 5. f. Nordamerika.

Viburnum

tinoides Mutis. (*ayavacense* H. B. K.), lorbeerblättriger, $\frac{1}{2}$. w. Südamerika.

Tinus L., Lorbeer-S. (*Laurus-Tinus*), $\frac{1}{2}$. k. f. b. Südeuropa Nordafrika.

β) hirtum Ait. (*lucidum* Mill.), γ) lucidum Ait.,

δ) virgatum Ait., ϵ) strictum Hort.

tomentosum Thbg., filziger, $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. k. Japan.

villosum Sw., zottiger, $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. w. Jamaika.

Vicia T., Wicke, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

altissima Dsf., höchste, 4. Sch. f. Nordafrika.

americana Mühlbg., amerikanische, 4. Sch. f. Nordamer.

amoena Fisch., liebliche, 4. Sch. f. Sibirien.

amphicarpa Dorthes, verschiedenhülsige, $\odot$. Sch. f. Südfrankreich.

angustifolia Roth (*Bobartii* Forst., *lughanensis* Schlchr.), schmalblättrige, $\odot$. f. Deutschl., Schweiz, England.

atropurpurea Dsf., dunkelpurpurrothe, $\odot$. Sch. f. Nordafrika, Südfrankreich.

bacla Mch., olivenfarbige, $\odot$. f. ?

baetica Fisch., spanische, $\odot$. Sch. f. Spanien.

benghalensis L., bengalische, $\odot$. Sch. f. Griechenland, Ostindien.

bicolor Bernh., zweifarbig, $\odot$. σ . Sch. f. Armenien.

α) annua, β) armenia, γ) biennis.

Biebersteinii Bess. (*sordida* MB.), Bieberstein's, $\odot$. Sch. f. Podolien, Taurien, Caucasus, österr. Litorale.

biennis L., zweijährige, σ . Sch. f. Sibirien.

biflora Dsf., zweiblumige, $\odot$. Sch. f. Nordafrika.

bipartita Mch., zweitheilige, $\odot$. f. ?

calcarata Dsf. (*monantha* Retz.), gespornte, $\odot$. Sch. f. Spanien, Nordafrika.

canescens La Bill., grauliche, $\odot$. Sch. f. Griechenland, Syrien.

capensis Berg. Thbg. (*Orobus c.* Spgl.), capische, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

caroliniana W. (*parviflora* Mchx.), carolinische, 4. Sch. f. Carolina.

cassubica L. (*multiflora* Poll., *Gerardi* Jacq., *milicans* Crtz.), cassubische, 4. f. Sch. Deutschland.

cordifolia Wulf, herzblättrige, $\odot$. f. Krain.

Cracca L., Vogel-W., 4. Sch. f. Europa.

b) alba, c) rubra, β) Kitaibeliana Rchb., γ) Gerardi Gaud.

dasycarpa Tenör., wollschotige, $\odot$. Sch. f. Neapel.

dentata Fisch., gezahnte, σ . Sch. f. Sibirien.

disperma DC. (*parviflora* Lois.), zweisamige, $\odot$. Sch. f. Frankreich.

dubia Schultz, zweifelhafte, $\odot$. Sch. f. ?

dumetorum L., Hecken-W., 4. Sch. f. Deutschl., Frankr.

ferruginea Bess., rostfarbige, $\odot$. Sch. f. ?

galloprovincialis Poir., südfranzösische, 4. Sch. f. Südfrankr.

glabra Schlr., kahle, $\odot$. Sch. f. Schweiz.

globosa Retz, kugelfrüchtige, $\odot$. Sch. f. ?

graminea Sm., grasartige, $\odot$. Sch. f. Buenos Ayres.

grandiflora Scop., großblumige, $\odot$. f. Krain, Oberitalien.

hirsuta Fisch., rauhaarige, $\odot$. Sch. f. Sibirien.

hirsutissima Cyril., vielhaarige, $\odot$. Sch. f. Neapel.

hirta Balb., rauhhülsige, $\odot$. Sch. f. Südfrankr., Italien.

Vicia

- hybrida L., Bastard-W., ☉. Sch. f. England, Süd- und Osteuropa.
- hyrcanica Fisch. et Mey. (*Biebersteinii* C. A. Mey.), hyrcanische, ☉. Sch. f. Persien.
- incisa MB., schlitzbblätterige, ☉. Sch. f. Taurien.
- intermedia Viv., mittlere, ☉. Sch. f. Nordafrika.
- laevigata Sm., glatte, 4. Sch. f. England.
- lathyroides L., platterbsenähnliche, ☉. f. Europa.
- longifolia Poir., langblättrige, ☉. Sch. f. Syrien.
- lutea L., gelbe, ☉. Sch. f. Mittel-, Süd- u. Osteuropa, Engl.
- megalosperma MB., grofssamige, ☉. Sch. f. Taurien, Cauc.
- β) Michauxii Spgl.
- monadelpha Roth, einbrüderige, ☉. f. Nordamerika.
- multicaulis Ledeb., vielstengelige, 4. Sch. f. Sibirien.
- Musquinez Bosc., Musquinez's, ☉. Sch. f. ?
- narbonensis L., narbonische, ☉. Sch. f. Südfrankreich, Mittelasien.
- Nissoliana L. (*atropurpurea* Lindl.), Nissolle's, ☉. Sch. f. Kleinasien.
- nodosa Fisch., knotige, ☉. Sch. f. ?
- ochroleuca Tenor., gelblichweisse, 4. Sch. f. Süditalien.
- onobrychioides L., esparcettenähnliche, ♂. Sch. f. Südeuropa.
- Orob. DC., Walderven. W., 4. Sch. f. Süddeutschland, Frankreich, Dänemark.
- pannonica Jacq., ungarische, ☉. Sch. f. Oesterreich, Ungarn, Siebenbürgen.
- pellucida Jacq. (*Orob. p.* Spgl.), durchschimmernde, 4. Sch. k. Cap der guten Hoffnung.
- peregrina L., fremde, ☉. Sch. f. Süd- u. Westeuropa, Kleinasien.
- perennis DC. (*atropurpurea* Tenor.), 4. Sch. f. Südfrankreich, Calabrien.
- pectinata Fisch. et Mey., bemalte, ☉. Sch. f. Armenien.
- pilosa MB., haarige, ☉. Sch. f. Taurien.
- pimpinelloides Mauri, bibernellähnliche, ☉. f. Mittelital.
- pisiformis L., erbsenförmige, 4. Sch. f. Europa.
- platycarpa Roth., breithülsige, ☉. f. ?
- polyphylla Dsf., vielblättrige, 4. Sch. f. Südeuropa.
- polysperma Tenor., vielsamige, 4. Sch. f. Neapel.
- Pseudo-Cracca Bertol., unächte Vogel-W., 4. Sch. f. Ital.
- Pseudo-Orob. Fisch. et Mey., waldervenähnliche, 4. Sch. f. Dahurien.
- pyrenaica Pourr. (*Fagonii* Lapeyr.), pyrenäische, 4. f. Pyrenäen.
- rosea Müll., rosafarbige, ☉. Sch. f. ?
- sativa L., gebaute, ☉. Sch. f. Europa, Nordamerika.
- b) intermedia Hort. c) leucosperma Mch. d) alba Mch. e) macrosperma Hort. f) semine pallido Hort. g) semine punctato Hort. β) nemoralis P.
- segetalis Thuill., Saat-W., ☉. Sch. f. Mittel- u. Südeuropa.
- sepium L., Zaun-W., 4. Sch. f. Europa.
- β) montana Froel.
- serratifolia Jacq., sägeblättrige, ☉. Sch. f. Ungarn, Italien, Griechenland.
- sordida WK., schmuziggelbe, ☉. Sch. f. Süd- u. Osteuropa.
- striata MB. (*purpurascens* DC., *uncinata* Rchb.), gestreifte, ☉. Sch. f. Süd- u. Westeuropa, Taurien.

Vicia

- sylvatica* L., Wald-W., 4. Sch. f. Europa, Nordamer.
syriaca Weinm., syrische, ☉. Sch. f. Syrien.
tenuifolia Roth, dünnblättrige, 4. Sch. f. Deutschland, Taurien, Dahurien.
tenuissima H. Berol., zarte, ☉. Sch. f. ?
Thouini Mart., Thouin's, ☉. Sch. f.
torulosa Dsf., aufgeschwollene, ☉. Sch. f.
tricolor Sebast. (*triflora* Tenor. Sbr.), dreifarbige, ☉. Sch. f. Mittel- und Unteritalien.
truncata MB., abgestutzte, ☉. Sch. f. Caucasus.
variegata Dsf. W. (*consentina* Spgl., *argentea* Lapeyr.), bunte, 4. Sch. f. Süd-, West- u. Osteuropa.
villosa Roth (*polyphylla* W. K.), zottige, ♂. Sch. f. Deutschland, Ungarn.
abbreviata Fisch. (et *oroboides* Wulf.) vid. *Orob. caucasicus* et *Clusii*, *bithynica* L., v. *Lathyrus bithynicus*, *Faba* L., v. *Faba vulgaris*, *gracilis* Loisel. (et *hirsuta* K. et *monantha* K., (*articulata* W., *multifida* Wallr.) etc., vid. *Ervum gracile*, *hirsutum*, *monanthos* etc.

Vicioides lutea Mch. etc. v. *Vicia lutea* etc.

Vieusseuxia la Roche (*Vieusseux*, Arzt zu Genf), III. I., Irideae.

Bellendeni Swt. (*Moraea tricuspidis* γ *lutea* Bot. mag.),

Bellenden's, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

fugax La Roche, flüchtige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

glaucois DC., blaugrünliche, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

iridioides Red. (*Moraea Candolleana* Spgl., *Iris curtis-petala* DC.), schwertelähnliche, 4. k. ?

lurida Swt., braungraue, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

pavonia DC., Pfauen-V., 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

spiralis La Roche (*unguicularis* R. et S.), spiralförmige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

tenuis R. et S., dünne, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoffn.

tricuspidis Fisch. (*aristata* (Hort.)), dreispitzige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

villosa Spgl., zottige, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

edulis Lk., v. *Moraea edulis*, *martinicensis* DC., v. *Cipura martinicensis*.

Vigna Savi (Dominicus Vigna, ein Commentator des Theophrastus Eresios, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.

glabra Savi, kahle, ☉. Sch. f. Nordamerika.

Viguiera H. B. K. (L. G. A. Viguier, Botaniker zu Montpellier), XIX. III., Compositae-Corymbiferae.

dentata Spgl., gezahnte, 4. w. t. Mexico.

helianthoides H. B. K., sonnenrosenähnliche, 4. w. Cuba.

Villarsia Vent. (Villars, berühmter franz. Botaniker), V. I., Contortae Gentianeae.

chilensis Lodd., chilesische, 4. Wa. t. k. Chili.

geminata RB., paarblumige, 4. Wa. t. Neuholland.

Humboldtiana Kunth. (*cordata* Ell.), Humboldt's, 4. Wa. t. k. Neugranada, Westindien, Südcarolina.

indica Vent., indische, 4. Wa. w. Ostind., Mascarenas.

lacunosa Vent. (*Menyanthes brachysperma* Mchx.), sumpfliebende, 4. Wa. k. Nordamerika.

nymphoides Vent., seerosenähnliche, 4. Wa. f. Europa.

ovata Vent., eiförmige, 4. Wa. t. Cap d. gut. Hoffn.

parnassifolia RB., parnassienblättrige, 4. t. Neusüdwall.

Villarsia

- reniformis RB., nierenförmige, 4. t. Neuholland.
sarmentosa Bot. mag., starkwurzelnende, 4. t. Neuholl.

Vilmorinia DC. (M. Vilmorin, franz. Agronom), XVII.
iv., Leguminosae-Papilionaceae.

- multiflora DC. vielblumige, 5. w. Westindien.

Viminaria Sm., Gertenstrauch, X. i., Leguminosae-Papilionaceae.

- denudata Sm., entblößter, 5. Neuholl., Van-Diemensld.
lateriflora Lk. v. *Daviesia alata*.

Vinca L., Sinngrün, V. i., Contortae Apocynae.

- herbacea W. K. (*pumila* Clarke), krautartiges, 4. f.
Oesterreich, Ungarn, Siebenbürgen, Thracien.

- major L., großes, 4. 5. k. f. b. England, Südeuropa.
b) variegata., c) flore pleno., β) intermedia Delil.
(*media* Hort.).

- minor L., kleines, 4. 5. f. Europa.

- b) alba, c) argenteo-variegata, d) aureo-variegata,
e) flore pleno, f) flore puniceo.

- pusilla L. (*parviflora* Retz.), zwergiges, 6. w. Ostindien.

- rosea L., rosafarbiges, 5. w. Ostindien.

- b) alba, c) ocellata, d) fol. variegatis.

Viola T., Veilchen, V. i., Violaceae.

- allegghanensis R. et S., alleghanisches, 4. f. Nordamer.

- alpina Jacq., Alpen-V., 4. f., Karpathen, österreich. u.
franz. Alpen.

- altaica Pall. (*grandiflora* L.), altaisches, 4. f. Ostruß-
land, Sibirien.

- b) purpurea.

- ambigua W. K., zweifelhaftes, 4. f. Südeuropa, Ungarn.

- amoena Symons (*oreudes* MB.), angenehmes, 4. f. Schott-
land, Taurien.

- arborescens L. (*suberosa* Dsf.), baumartiges, 5. k. Süd-
europa, Nordafrika.

- arenaria DC. (*Allionii* Pio, *aprica* Spgl., *glauca* MB.),
Sand-V., 4. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.

- β) livida Kit. (*Krockeri* R. et S.), γ) rupestris
Schm. Rchb. (*purpurascens* Schm.).

- asarifolia Pursh., haselwurzblätteriges, 4. f. Nordamer.

- aspera Wall., rauhes, 4. k. Nepal.

- attenuata Swt. (*lanceolata* Pursh. et Nutt.), verdünntes,
4. f. Nordamerika.

- betonicaefolia Sm., betonienblätteriges, 4. k. Neuholl.

- bicolor Pursh., zweifarbiges, 4. f. Nordamerika.

- biflora L., zweiblumiges, 4. f. Europäische Alpen, Vor-
alpen, Asien.

- blanda W., liebliches, 4. f. Nordamerika.

- Broussonetiana R. et S. (*cordata* W.), Broussonet's, 4.
k. Teneriffa.

- caespitosa D. Don. (*Patrinii* γ . DC.), rasenförmiges, 4.
k. f. b. Nepal.

- calcarata L., gesporntes, 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
 β) Zoysii Wulf. γ) Villarsiana R. et S.

- campestris MB., Feld-V., 4. f. Taurien, Caucasus.

- canadensis L. (*albiflora* Lk.), canadisches, 4. f. Nordamer.
 β) discolor Swt.

- canina L., Hunde-V., 4. f. Europa, Asien, Nordamer.
b) alba A. P. c) rubra A. P. β) ericetorum

- Schrad. (*pumila ericetorum* DC.), γ) lucorum Rchb.

Viola

cenisia L., cenisiches, 4. f. Tyrol, Schweiz, oberitalienische Alpen, Dauphiné.

β) Valderia All.

collina Bess. (*umbrosa* Hoppe), Hügel-V., 4. f. Podolien, Ungarn, Deutschland.

chrysantha Schrad., goldblumiges, 4. f. Schweiz.

conspersa Rchb. (*uliginosa* Mühlbg.), punctirtblättriges, 4. f. Nordamerika.

cornuta L., gehörntes, 4. f. Pyrenäen.

cucullata Ait., kappenförmiges, 4. f. Nordamerika.

dactylotes R. et S. (*digitata* W.), fingerförmiges, 4. f. Sibir.

declinata W. K., niedergebogenes, ♂. 4. f. Ungarn, Schweiz, Italien.

decumbens L., niederliegendes, 4. f. f. Cap d. g. H. epipsila Ledeb., livländisches, 4. f. Livland.

elator Fr. (*persicifolia* M. et K., *montana* Roth.), hohes, 4. f. Nord-, Mittel- und Osteuropa.

eriocarpa Lewis, wollfrüchtiges, 4. f. Carolina.

flavicornis Sm., gelbsporniges, 4. f. f. England.

Gmeliniana R. et S. (*sibirica* Gmel.), Gmelin's, 4. f. Sibir.

gracilis Sm. (*heterophylla* Bertol., *Bertolinii* Pio), schlankes, ♂. 4. f. Italien, Sicilien, Kleinasien.

hastata Mchx., spontanblättriges, 4. f. Nordamerika.

hirta L. (? *hirsuta* R. et S.), rauhhaariges, 4. f. Europa.

humilis H. B. K., niedriges, 4. k. Mexico.

japonica Langsd., japanisches, 4. k. Japan.

lactea Sm. (*stagnina* Kit., *montana* Auct.), milchweißes, 4. f. England, Mittel-, West- und Osteuropa.

lanceolata L., lanzettliches, 4. f. Sibirien, Nordamerika.

lancifolia Bess., lanzettblättriges, 4. f. Podolien, Galicien.

Langsdorffii Fisch., Langsdorff's, 4. f. Aleutische Inseln.

lutea Huds. Sm., gelbes, 4. f. England, mitteleuropäische Alpen und Voralpen.

β) grandiflora Vill. γ) sudetica W. δ) angustifolia Schlecht.

mirabilis L., wunderbares, 4. f. Europa, Caucasus.

montana L., Berg-V., 4. f. Nordeuropa.

multifida W. (*pinnata* Gmel.), vieltheiliges, 4. f. Sibir.

nummularifolia All., pfennigkrautblättriges, 4. f. Oberitalien, Corsica.

Nuttallii Pursh., Nuttall's, 4. f. Nordamerika.

obliqua Ait., schiefes, 4. f. Nordamerika.

ochroleuca Lewis (*striata* Pursh.), gelblichweißes, 4. f. Nordamerika.

occulta Lehm. (*appendiculata* DC.), verborgenblumiges, ♂. f. Nordpersien.

odorata L., wohlriechendes, 4. f. Europa, Mittelasien, Nordafrika.

a) lilacina (*purpurea*), b) alba Bess.. c) coerulea,

d) lilacina (*purpurea*) plena, e) alba plena, f)

coerulea plena, g) pallida plena, h) semper-

florens Hort. (*italica* Hort.).

ovata Nutt. (*primulaefolia* Pursh.), eiförmiges, 4. f. Nordamerika.

Pallasii Fisch., Pallas's, 4. f. Sibirien.

palmensis P. B. Webb., palma'sches, f. k. Balearen.

palmaris Hamilt., handhohes, 4. k. Nepal.

palmata L., handförmiges, 4. f. Nordamerika.

b) variegata.

Viola

palustris L., Sumpf-V., 4. f. Europa, Sibir., Nordamer.

β) uliginosa Fr., γ) pensylvanica Loud.

papilionacea Pursh., schmetterlingsblumiges, 4. f. Pensylv.

pedata L., fufsförmiges, 4. f. Nordamerika.

β) digitata Pursh. (*flabellata* D. Don *ranunculifolia* Poir.).

pedatifida G. Don, fufsspaltiges, 4. f. Nordamerika.

persicifolia Roth. (*pratensis* Mert. et K. *lactea* K. et Ziz.

Ruppii Presl.), pfirsichblättriges, 4. f. Mitteleuropa.

pinnata L., gefiedertes, 4. f. b. k. Kärnthen, Krain, Tyrol, penninische, cottsche Alpen.

praemorsa Dougl., stumpfwurzeliges, 4. f. Columbia.

primulaefolia L., primelblättriges, 4. f. Nordamerika.

prionantha Bunge, kerbblumiges, 4. f. Asiat. Rußland.

prunellaefolia Fisch. (*Patrinii* DC.), braunheilblättriges, 4. f. Sibirien.

pubescens Ait. (*pensylvanica* Mchx.), weichhaariges, 4. f. Nordamerika.

pumila Vill. (*lancifolia* Thore), kleines, 4. f. Frankreich, Belgien.

pygmaea Juss., zwergiges, 4. t. Peru.

pyrenaica Ram., pyrenäisches, 4. f. Pyrenäen.

radicans DC., starkwurzelndes, 4. f. k. Carolina.

Riviniana Rchb. (*neglecta* M. B.), Rivin's, 4. f. Europa.

rothomagensis Dsf., normandisches. ♂. 4. f. Frankreich, Belgien, Westdeutschland.

rotundifolia Mchx. (*calthaefolia* Poir. *clandestina* Pursh), rundblättriges. 4. f. Nordamerika.

Ruppii All. (*nemoralis* Kützing, *stricta* Hornem., *Hornemanniana* R. et S.), Rupp's, 4. f. Nord-, Mittel- und Südeuropa.

sagittata Ait. (*dentata* Pursh.), pfeilblättriges, 4. f. Nordamerika.

sarmentosa MB., wurzelrankiges, 4. f. Caucasus.

saxicola R. et S. (*saxatilis* Hffg., Gesteins-V., 4. f. Portug.

Selkirkii Gold., Selkirk's, 4. f. Nordamerika.

striata Ait. (*debilis* Mchx.), gestreiftes, 4. f. Nordamer.

suavis M. B., feinriechendes (Königs-V.), 4. f. Oesterreich, Ungarn, Taurien.

b) flore pleno.

sylvestris Lam. (*canina* DC., *canina* β. *sylvatica* Fr.), *neglecta* Auct. *flexuosa* Morett.), Wald-V., 4. f. Europa.

tricolor L., dreifarbiges (Stiefmütterchen), ☉. 4. f.

a) vulgaris, β) arvensis Murray., γ) saxatilis

Schm., δ) banatica Kit. (*Kitaibeliana* R. et S.),

syrtica Flörke), ε) hybrida (*elegans*), b) episcopa-

lis Hffg., c) maxima Hffg., d) multicolor Hffg. etc.

tripartita Ell. (*trifida* Spgl.), dreitheiliges, 4. f. b. k. Nordamerika.

uliginosa Schrad. (*nitens* Host., *scaturiginosa* Wallr.),

Quellen-V., 4. f. Deutschland, Krain, Galicien.

uniflora L., einblumiges, 4. f. Sibirien.

variegata Fisch., buntblumiges, 4. f. Dahurien.

Unbestimmtere: *litoralis* Spgl., 4. f. Nordeuropa

Schmidtiana Schult., 4. f. Böhmen.

capensis Thbg., v. *Jonidium capense*, *concolor* Forst v. *Solea concolor*, *hederacea* La Bill, vid. *Erpetion*

Viola

hederaceum, *Hybanthus* Aubl., vid. *Corynostyles Hybanthus*, *longifolia* Poir., vid. *Noisettia longifolia*.

Virgilia Lam. (Publius Virgilius Maro, berühmter römischer Dichter), X. 1., Leguminosae-Papilionaceae.

aurea Lam., goldfarbige, f. t. Abyssinien.

capensis Lam., capische, f. k. Cap d. guten Hoffn.

lutea Mchx., gelbblumige, f. k. f. b. Nordamerika.

robinoides DC., robinienähnliche, f. k. Cap d. g. H.

secundiflora Cav., einseitigblumige, f. t. Neuspanien.

sylvatica DC., Wald-V., f. k. t. Cap der gut. Hoffn.

? *intrusa* RB., v. *Hypocalyptus obcordatus*.

Viscago Hall. vid. *Silene*.

Viscaria vulgaris Röhl., vid. *Lychnis Viscaria*.

Viscum T., Mistel, XXII. IV. 14., Caprifoliaceae-Loranthaceae.

album L., weißer, f. f. Europa, Nordamerika, Japan.

β) *polycoccon* Gaud.

Oxycedri DC. (*Arceuthobium Oxycedri* MB., *Razumowskia caucasica* Hoffm.), Wachholder-M., f. f. Südfrankreich, Dalmatien, Caucasus, Taurien.

Visenia umbellata Houtt. etc. v. *Riedlea velutina* etc.

Vismea Vandell. (M. de Visme, ein Kaufmann zu Lisabon), XVIII. 11., Guttiferae-Hypericineae.

brasiliensis Choix., brasilianische, f. f. w. Brasilien.

glabra R. et P., kahle, f. f. w. Peru.

guianensis P., guianische, f. f. w. Guiana, Brasil, Peru.

Visnea Mocanera L. fil. vid. *Mocanera canariensis* Nachtr.

Vitex T., Keuschbaum (Müllen), XIV. 11., Verbenaceae.

Agnus Castus L., gemeiner, f. k. f. b. Südeuropa.

alata Roth., geflügelter, f. w. Ostindien.

altissima L., höchster, f. w. Ceylon.

arborea Roxb., baumartiger, f. w. Ostindien.

bicolor W., zweifarbiger, f. w. Ostindien.

incisa Lam., schlitzblättriger, f. f. k. China.

Negundo L. (*paniculata* Lam.), rispiger, f. w. Ostind.

ovata Thbg. (*rotundifolia* L. suppl.), eiförmiger, f. k.

Japan, China, Neuholland.

triflora Vahl., dreiblumiger, f. w. Cayenne.

trifolia L., dreiblättriger, f. w. Ostindien.

umbrosa Sw., schattenliebender, f. w. Westindien.

Leucoxylon L., vid. *Wallrothia Leucoxylon*.

Vitis T., Weinstock, V. 1., Viniferae (Ampelideae).

aestivalis Mchx. (*vulpina* W.), Sommer-W., f. Sch. f. Nordamerika.

caribaea DC. (*indica* Sw.), caribäischer, f. Sch. w. Caribäen.

dentata Lk., gezahnter, f. Sch. t. ?

glabrata Roth. (*latifolia* Roxb. D. Don), glatter, f. Sch. w. Ostindien.

indica L., indischer, f. Sch. w. Ostindien.

Labrusca L., filziger, f. Sch. f. Nordamerika.

b) *baccis albis*.

laciniosa L. (*apiifolia* Bauh.), schlitzblättriger, f. Sch. f. ?

palmata Vahl, handförmiger, f. Sch. f. Nordamerika.

Purani Hamilt., Puran's, f. Sch. f. b. k. Nepal.

riparia Mchx. (*incisa* Jacq., *odoratissima* Donn), uferliebender, f. Sch. f. Nordamerika.

rotundifolia Mchx., rundblättriger, f. Sch. f. Nordamer.

Vitis

sinuata G. Don. (*aestivalis sinuata* Pursh, ? *labruscoides* Mühlbg.), buchtiger, ♀. Sch. f. Nordamerika.

vinifera L., ächter, ♀. Sch. f. Armenien, Taurien, Caucasus.

b) *foliis incanis*, c) *foliis rubescentibus* etc.

vulpina L. (*cordifolia* Mchx.), Fuchs-W., ♀. Sch. f. Nordamerika.

arborea Mill. et *indivisa* W. v. *Ampelopsis bipinnata* et *cordata*, *quinquefolia* Lam. v. *Ampelopsis hederacea*.

Vitmannia Vahl. (F. Vitmann, Professor zu Mailand) (*Samadera* G.), VIII. 1., Tricoccae Simarubeae.

elliptica Vahl., elliptische, ♀. w. Ceylon.

Vittaria Sm., Bandfarn, XXIV. 1., Pterioideae.

graminifolia Kaulf., grasblättriger, 4. w. Brasilien.

lineata Sw. (*angustifolia* Mchx.), schmalblättriger, 4. w. Florida, Westindien.

Voandzeja A. P. Th. (madagascarischer Name), XVII. 1v. (vi.), Leguminosae-Papilionaceae.

subterranea A. P. Th., unterirdische, ♂. w. m. Südafrika.

Vochysia Juss. (caribäischer Name) (*Cucullaria* Schrbr.), I. 1., Lythraeae Vochysieae.

excelsa Lam., hohe, ♀. w. Trinidad, Guiana.

Vohiria Lam. (*Voyra* Aubl., guianischer Name), V. 1., Contortae Gentianeae.

rosea Aubl. (*Lita rosea* rosafarbige, 4. w. Guiana.

Volckameria L. (J. G. Volckamer, Kaufmann u. Botaniker zu Nürnberg), XIV. 11., Verbenaceae.

aculeata L., stachelige, ♀. w. Westindien.

japonica Thbg., japanische, ♀. t. k. Japan.

angustifolia Andr. et *buxifolia* W. et *fragrans* Vent. (*japonica* Hort.), etc. v. *Clerodendron heterophyllum buxifolium* et *fragrans* etc.

Volkmannia japonica Jacq. v. *Clerodendron fragrans*.

Vouapa Aubl. (caribäischer Name), III. 1., Leguminosae-Caesalpinieae.

bifolia Aubl. (*Macrolobium hymenaeoides* Vahl.), zweiblättrige, ♀. w. Guiana.

Vulpia C. C. Gmel. (Vulpus, Apotheker zu Carlsruhe), III. 11., Gramineae.

I. *Mygalurus* Lk.

Alopecurus Lk. (*Festuca* A. Schousb.), fuchsschwanzähnliche, ♂. f. Südspanien, Nordafrika.

bromoides Rchb., trespenähnliche, ♂. f. Süd- und Westeuropa.

delicatula Lk. (*Festuca d. Lagas.*), feine ♂. f. Spanien.

geniculata Lk. (*Bromus g. L. et stipoides* L. *Festuca g. W.*, *F. stipoides* DC.), gekniete, ♂. f. Süd- und Westeuropa.

ligustica Lk. (*Bromus l. All.*), ligurische, ♂. f. Oberitalien.

Myuros Rchb. (*ciliata* Lk., *Festuca ciliata* Danth. DC., *Myuros* L.), gefranzte, ♂. f. Süd- und Westeuropa.

Pseudo Myuros Rchb. (*Mygalurus caudatus* Lk., *Vulpia Myuros* Gmel., *Festuca Myuros* Auct.), gemeine, ♂. f. Mittel-, Süd- und Osteuropa, Südamerika.

β) *sciuroides* Rchb. (*bromoides* Lk., *Festuca s. Roth.*)

uniglumis Rchb. (*membranacea* Lk., *Festuca uniglumis* Soland.), einspelzige, ♂. f. England, Südeuropa.

II. *Nardurus* Rchb.

Lachenalii * (*Brachypodium Poa* et *Halleri* R. et S.,

Vulpia

Festuca Poa Kunth.), Lachenal's, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

β) *ramosa* * γ) *festucoides* *.

tenella * (*Brachypod. festucoides* Lk., *Festuca tenella* W., *F. bromoides* Mchx., *Diarrhena setacea* R. et S.), zarte, ☉. f. Nordamerika.

tenuiflora * (*Festuca t.* Schrad.), dünnblumige, ☉. f. Süd- und Westeuropa.

β) *biuncialis* * γ) *tenuicula* * (*Brachypodium tenellum et tenuiflorum* R. et S., *Nardus* Lk., *F. tenuiflora* γ. *aristata* K.).

Wachendorfia L. (E. J. Wachendorf, holländischer Botaniker), III. 1., Narcisseae-Haemodoraceae.

brevifolia Soland., kurzblättrige, 4. k. C. der gut. H.
Breyniana R. et S., Breyn's, 4. k. Cap der guten H.
graminea Thbg., grasartige, 4. k. Cap der guten H.
Hibberti Swt. (*paniculata* β. Bot. mag.), Hibbert's, 4. k. Cap der guten Hoffnung.

hirsuta Thbg., rauhhaarige, 4. k. Cap der guten H.
paniculata Thbg., rispige, 4. k. Cap der guten Hoffn.
tenella Thbg., zarte, 4. k. Cap der guten Hoffnung.
thyrsiflora L., strauchblumige, 4. k. Cap der guten H.

umbellata L. v. *Dilatris corymbosa*.

Wahlenbergia Schrad. (G. Wahlenberg, berühmter schwedischer Botaniker), V. 1., Campanulaceae.

capensis A. DC. (*elongata* Schrad.), capische, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

cernua A. DC. (*gracilis* E. Mey.), übergebogene, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

divergens A. DC., divergirende, ☉. f. Cap der gut. H.
gracilis A. DC., schlanke, ☉. ♂. f. k. Neuholl., Van-Diemensland.

β) *litoralis* La Bill.

hederacea Rchb., epheuähnliche, 4. f. Dänemark, England, Westeuropa.

lobelioides A. DC. (*pendula* Schrad.), lobelienähnliche, ☉. f. Canarische Inseln.

repens Schrad., kriechende, ♂. 4. k. Cap. d. g. Hoffn.
Erinus Lk. vid. *Campanula Erinus*, *grandiflora* Schrad. vid. *Platycodon grandiflorus*.

Waldtschmidtia nymphoides Wigg. v. Villarsia nymphoides.

Waitzia Rchb. (Waitz, Kammerrath und Gartendirector zu Altenburg), III. 1. Irideae.

aequimaculata Rchb., gleichfleckige, 4. Zw. k. C. d. g. H.
anigozanthaeiflora (Swt.), anigozanthusblumige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

concolor (Swt.), einfarbige, 4. Zw. k. Cap der g. H.
crispa Rchb., krause, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.
crocata Rchb., safranfarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
deusta Rchb., brandfarbige, 4. Zw. k. Cap d. gut. H.
fenestrata Rchb., durchsichtige, 4. Zw. k. C. d. g. H.

b) *purpurea*.

flava Rchb., hellgelbe, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.
fucata (Lindl.), geschminkte, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
lineata Rchb., schmalblättrige, 4. Zw. k. C. d. g. H.
longiflora Rchb., langblumige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
miniata Rchb., mennigrothe, 4. Zw. k. Cap der g. H.
odorata (Lodd.), wohlriechende, 4. Zw. k. C. d. g. H.

Waitzia

pallida Rchb., bleichblumige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
pectinata Rchb., kammförmige, 4. Zw. k. C. d. g. H.
refracta Rchb., zurückgeknickte, 4. Zw. k. C. d. g. H.
Rochensis Rchb., la Roche's, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
rosea Rchb. (*Tritonia capensis* Ker), rosafarbige, 4. Zw.

k. Cap der guten Hoffnung,

squalida Rchb., schmuzigrothe, 4. Zw. k. C. d. g. H.
striata Rchb., gestreifte, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffg.
tenuiflora (Loud.), dünnblumige, 4. Zw. k. C. d. g. H.
viridis Rchb., grüne, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.
xanthospila Rchb., gelbährige, 4. Zw. k. C. d. g. H.
securigera Hort. v. *Montbretia securigera*.

Waldsteinia W. (Graf von Waldstein, Mitherausgeber der Flora Ungarns), XII. II., Rosaceae.

geoides W., nelkenwurzähnliche, 4. f. Ungarn, Siebenbürg.
trifolia Roch., dreiblättrige, 4. f. Siebenbürgen.

Doniana Tratt. v. *Comaropsis Doniana*.

Walkeria Schrb. (R. Walker, Gründer des botanischen Gartens zu Cambridge), V. I., Tricoccae-Ochnaceae.

integrifolia DC., ganzblättrige, 5. w. Guiana.

serrata W., sägeblättrige, 5. w. Ostindien.

Wallichia Roxb. (N. Wallich, Vorsteher des botanisch. Gartens zu Calcutta), XXI. VI. (VI. III.), Palmae.

caryotoides Roxb., brennpalmenähnliche, 5. w. Ostindien.

spectabilis, H. C. ansehnliche, 5. w. Ostindien.

Wallrothia Roth. (Dr. Wallroth, berühmter deutscher Botaniker), XIV. II., Verbenaceae.

Leucoxylon Roth., weißholzige, 5. w. Ostindien.

Wallrothia tuberosa et *splendens* Spgl. v. *Ligusticum alpinum* et *splendens*.

Wallsura Roxb. (ostindischer Name), X. I., Hesperideae-Meliaceae.

robusta Roxb., ansehnliche, 5. w. Ostindien.

Waltheria L. (A. F. Walther, Prof. der Medicin zu Leipzig), XVI. II., Malvaceae-Hermanniaceae.

americana L. (*indica* Jacq., *arborescens* Cav.), amerikanische, ♂. 5. w. Westindien, Südamerika.

elliptica Cav., elliptische, 5. 5. w. Ost- und Westindien.

glabra Poir. (*laevis* Schrk., *cordata* Sm.), kahle, 5. 5. w. Westindien.

indica L., indische, 5. 5. w. Ostindien.

microphylla Cav., kleinblättrige, 5. 5. w. Ostindien.

Wangenheimia Mch. (F. A. J. v. Wangenheim, preussischer Oberforstmeister, der in Nordamerika botanisirte), III. II., Gramineae.

Lima Trin. (*disticha* Mch.), spanische, ♂. f. Südspanien.

Watsonia Ker (W. Watson, Apotheker zu London), III. I., Irideae.

aletroides Ker, aletrisähnliche, 4. Zw. k. Cap d. g. H.
 b) *variegata*.

angusta Ker, schmale, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

brevifolia Ker, kurzblättrige, 4. Zw. k. C. d. g. H.

compacta Lodd., dichtblumige, 4. Zw. k. C. d. g. H.

fulgida Salisb., feuerfarbige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

humilis Ker, niedrige, 4. Zw. k. Cap der gut. Hoffn.

iridifolia Ker, schwertelblättrige, 4. Zw. k. C. d. g. H.

marginata Ker, berandete, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

b) *minor*.

Meriana Ker, Merian's, 4. Zw. k. Cap d. gut. Hoffn.

Watsonia

plantaginea Ker, wegrittähnliche, 4. Zw. k. C. d. g. H.
 punctata RB., punctirte, 4. Zw. k. Cap d. gut. Hoffn.
 rosea Ker, rosafarbige, 4. Zw. k. Cap. d. gut. Hoffn.
 roseo-alba Ker, rosaweißliche, 4. Zw. k. C. d. g. H.

b) variegata.

rubens Ker (*amoena* Hort.), röthliche, 4. Zw. k. C. d. g. H.
 spicata Ker, ährige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.
 strictiflora Ker, steifblumige, 4. Zw. k. Cap d. g. H.

Webera Schreb. (G. H. Weber et F. Weber, Vater u. Sohn, Professoren zu Kiel), V. 1., Rubiaceae.

coriacea Wall., lederblättrige, f. w. Ostindien.
 corymbosa W., traubendoldige, f. w. Ostindien.
 cymosa W., afterdoldige, f. w. Ostindien.

Wedelia Jacq. (G. W. Wedel, Professor zu Jena), XIX. 1v., Compositae-Corymbiferae.

acapulcensis H. B. K., Acapulco-W., 4. f. w. Mexico.
 calendulacea Less. (*benghalensis* Rich.), ringelrosenähnliche, ☉. m. f. Ostindien.

carnosa Rich., fleischige, 4. w. Westindien.

β) triloba Rich., γ) aspera Rich.

helianthoides H. B. K., sonnenrosenähnliche, ♂. 4. w. Südamerika.

hispida H. B. K. (*calendulacea* Rich., *Buphthalmum asperum* Hornem.), steifhaarige, 4. k. Mexico.

paludosa DC., sumpfliebende, ☉. m. f. Brasilien.

radiosa Ker, strahlige, f. w. Brasilien.

aurea D. Don Hook., vid. *Verbesina aurea*, minor Spgl. (*ovatifolia* W.) et *perfoliata* W., vid. *Melampodium divaricatum* et *perfoliatum*.

Weinmannia L. (J. W. Weinmann, Apotheker zu Regensburg), J. A. Weinmann, Garteninspector zu Pawlowsk, ausgezeichneter Botaniker), VIII. 11., Saxifrageae-Cunoniaceae.

australis Loud., neuholländische, f. f. k. t. Neuholl.

elliptica H. B. K., elliptische, f. f. w. Südamerika.

glabra L. fil. (*pinnata* L.), kable, f. f. w. Westindien.

hirta Sw., kurzhaarige, f. f. w. Jamaika.

ovata Cav., eiförmige, f. f. w. Peru.

trifoliata L. fil., dreiblättrige, f. f. k. Cap d. g. H.

venosa K. et W. (*Acrophyllum venosum* Benth.), aderige, f. k. t. Neuholland.

Welwitschia Rchb. (Dr. Welwitsch, österreichischer Botaniker, welcher jetzt Portugal bereist), V. 1., Polemoniaceae.

densifolia Rchb. (Benth.), dichtblättrige, ☉. f. Californien.

elongata Rchb. (Benth.), verlängerte, ☉. f. Californien.

lutea Rchb. (Benth.), gelbe, ☉. f. Californien.

virgata Rchb. (Benth.), ruthenförmige, ☉. f. Californien.

Wendlandia populifolia W. v. *Cocculus carolinus*.

Werneria H. B. K. (A. G. Werner zu Freiberg, berühmter Mineralog), XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.

rigida H. B. K., starre, 4. t. Quito.

Westringia Sm. (F. P. Westring, Leibarzt des Königs von Schweden), XIV. 1., Labiatae.

angustifolia RB., schmalblättrige, f. k. t. Van-Diemensland, Neuholland.

cinerea RB., aschfarbige, f. k. t. Neuholland.

Dampieri RB., Dampier's, f. k. t. Neuholland.

Westringia

eremicola Cunn. (*longifolia* Lindl.), Einöden-W., f. k. t.

Neusüdwallis.

glabra RB., kahle, f. k. t. Neuholland.

longifolia RB., langblättrige, f. k. t. Neuholland.

rigida RB., starre, f. k. t. Neuholland.

rosmariniformis Sm., rosmarinähnliche, f. k. t. Neuholl.

rubiaefolia RB., rötheblättrige, f. k. t. Van-Diemensl.

triphylla Ait., dreiblättrige, f. k. t. Neuholland.

Whitleya stramonifolia Swt. v. *Anisodus stramonifolius*.

Wibelia apargioides Röhl. v. *Willemetia apargioides*, *chondrilloides* Hoppe, Hornsch. v. *Crepis chondrilloides*, *taraxacifolia* Röhl. v. *Barkhausia taraxacifolia*.

Wiborgia Roth (Wiborg, Professor zu Kopenhagen), XIX. II., Compositae Corymbiferae.

Acmella Roth (*parviflora* H. B. K.), kleinblumige, ☉. f. Peru, Deutschland.

Wiedemannia Fisch. et Mey. (Wiedemann, russischer Botaniker), XIV. I., Labiatae.

orientalis F. et Mey., morgenländische, ☉. f. Natolien.

Wigandia H. B. K. (J. Wigand, Bischof in Ostpreußen im 16. Jahrhunderte), V. II., Convolvulaceae Hydroleae.

caracasana H. B. K., caracasatische, 4. f. w. Caracas.

urens H. B. K. (*Hydrolea urens* R. et P.), brennende, f. w. Mexico, Peru.

Wiggersia lutea G. M. S. etc. v. *Vicia lutea* etc.

Willdenowia Thbg. (C. L. Willdenow, Professor zu Berlin, einer der ausgezeichnetsten Botaniker), XXII. III. (III. I.), Restiaceae.

striata Thbg., gestreifte, 4. f. k. Cap der guten Hoffn.

teres Thbg., rundliche, 4. f. k. Cap der guten Hoffn.

Willemetia Neck. (*Peltidium* Zollik.), R. Willemet et P. R. Willemet, Vater und Sohn, französische Botaniker), XIX. I., Compositae-Cichoriaceae.

apargioides Cass. (*hieracioides* Monn.), apargienähnliche, 4. f. Mitteleuropäische Alpen, Voralpen.

Willemetia africana Brong. v. *Hollia africana* Nachtrag.

Willughbeia Scop. (F. Willughby, alter englischer Naturforscher), V. I., Contortae Apocynae.

edulis Roxb., genießbare, f. w. Ostindien.

zeylanica Spgl. v. *Fagraea zeylanica*.

Wintera aromatica Murr. v. *Drimys Winteri*.

Wistaria Nutt. (Caspar Wistar, Professor in Pennsylvania), XVII. IV. (VI.), Leguminosae Papilionaceae. *chinensis* DC. (*sinensis* Ker, *Consequana* Loud.), chinesische, f. Sch. k. f. b. China.

floribunda DC., blüthenreiche, f. k. China.

frutescens DC. (*speciosa* Nutt.), strauchige, f. Sch. k. f. b. Carolina.

Witheringia L'Her. (D. Withering, englischer Botaniker), V. I. (IV. I.), Solanaceae.

crassifolia Dun., dickblättrige, f. k. Cap der gut. H. *montana* Dun., Berg-W., 4. t. k. Peru.

phyllantha Dun., blattblumige, ☉. m. f. Peru.

pinnatifida Dun., fiederspaltige, 4. t. k. Peru.

purpurea Lodd., purpurfarbige 4. Kn. k. t. Chili.

solanacea L'Her., nachtschattenähnliche, 4. f. w. Südamer.

stramonifolia Bonpl., stechapfelblättrige, f. f. w. t. Mexico.

Witsenia L. (Dr. Witsen, ein Holländer, Gönner der Botanik), III. I., Irideae.

corymbosa Sm., traubendoldige, ♀. t. k. Cap d. g. H.
maura L., maurische, ♀. k. t. Cap der guten Hoffn.
partita Ker (*Sophronia caespitosa* Schlecht.), getheilte,
 ♀. t. k. Cap der guten Hoffnung.

ramosa Vahl, ästige, ♀. t. k. Cap der guten Hoffnung.

Wollastonia DC. (Wollaston, berühmter englischer Chemiker), XIX. II., Compositae Corymbiferae.

biflora DC., zweiblumige, ☉. w. m. f. Ostindien.

Woodfordia *floribunda* Salish. v. *Grislea tomentosa*.

Woodsia RB. (Joseph Woods, englischer Botaniker), XXIV. I., Pterioideae.

hyperborea RB., nördliche, 4. f. k. Mittel- und nord-europäische Alpen, Nordamerika.

ilvensis RB. (*vestita* Speg., *rupicola* Hoffg.), Felsen-W., 4. f. Europa, Nordamerika.

Perriniana Torrey, Perrin's, 4. f. k. Nordamerika.

pubescens Speg. v. *Physomatium pubescens*.

Woodwardia Sm. (T. J. Woodward, englischer Botaniker), XXIV. I., Pterioideae.

angustifolia Sm. (*onocleoides* W., *floridana* Schk.), schmal-blättrige, 4. k. Nordamerika.

radicans Sw., wurzelnde, 4. k. Süd- und Westeuropa, Nepal, Canarische Inseln etc.

virginica Sw., virginische, 4. k. Virginien, Carolina.

caudata Cav. v. *Doodia caudata*.

Wormia Rotth. (Olaus Worm, dänischer Arzt und Naturforscher), XIII. v., Dilleniaceae.

dentata DC., gezahnte, ♀. w. Ceylon.

Wrightia RB. (D. W. Wright, schottischer Arzt), V. I., Contortae Apocynae.

antidysenterica RB., ruhrstillende, ♀. w. Ostindien.

coccinea Bot. mag., scharlachfarbige, ♀. ♀. w. Ostindien.

pubescens Lodd., weichhaarige, ♀. ♀. t. Neuholland.

tinctoria RB., färbende, ♀. w. Ostindien.

zeylanica RB., zeylonische, ♀. w. Zeylon.

dubia Speg. v. *Cameraria dubia*.

Wulfenia Jacq. (F. X. v. Wulfen, Abt zu Klagenfurt in Kärnthen, ein ausgezeichnete Botaniker), II. I., Personatae Veroniceae.

carinthiaca Jacq., kärnthensche, 4. f. Kärnthen.

Ageria Sm. etc. v. *Paederota Ageria* etc.

Wurmbea Thbg. (F. van Wurmbe, Kaufmann in Batavia, der Thunberg unterstützte), VI. III., Coronariae-Colchicaceae.

campanulata W., glockenblumige, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffnung.

longiflora W., langblumige, 4. Zw. k. Cap der gut. H.

pumila W., kleine, 4. Zw. k. Cap der guten Hoffn.

purpurea Dryand., purpurfarbige, 4. Zw. k. C. d. g. H.

Wyllia *australis* Hoffm., *radians* Hoffm. etc. v. *Scandix australis*, *falcata* etc.

Xanthium T., Spitzklette, XXI. v., Compositae-Ambrosiaceae.

canadense Mill. (*americanum* Walt.), canadische, ☉. f. Nordamerika.

catharticum H. B. K., purgirende, ☉. m. f. Quito, Chili.

humile N. E., niedrige, ☉. m. f. ? Südamerika.

Xanthium

- macrocarpum DC. (*echinatum* Murr., *italicum* Morett., *maculatum* Rafin., *brasilicum* Arrab.), großfrüchtige, ☉. f. Süd- und Westeuropa, Nord- und Südamerika.
 orientale L. fil. (*indicum* Roxb., *chinense* Mill.), morgenländische, ☉. f. Aegypten, Ostindien.
 spinosum L., stachelige, ☉. f. Süd-, West- u. Osteuropa.
 strumarium L. (*vulgare* Lam.), gemeine, ☉. f. Europa, Sibirien, Nordafrika.
fruticosum L. v. *Franseria artemisioides*.

Xanthochymus Roxb., Farbenbaum, XVIII. II., Gut-tiferae.

- dulcis Roxb., süßler, ♀. w. Ostindien.
 guineensis G. Don, guineischer, ♀. w. Guinea.
 luteus Lodd., gelber, ♀. w. ? Ostindien.
 macrophyllus Lodd., großblättriger, ♀. w. ? Ostindien.
 ovalifolius Roxb., eiblättriger, ♀. w. Ostindien.
 pictorius Roxb., Maler-G., ♀. w. Ostindien.
 purpureus Lodd., purpurfarbiger, ♀. w. ? Ostindien.
 tinctorius Roxb., ächter, ♀. w. Ostindien.

Xanthorrhiza L'Her., Gelbwurzel, V. VI., Ranunculaceae.
apiifolia L'Her., sellerieblättrige, ♀. f. Virginien.**Xanthorrhoea** Sm.; Harzaffodile, VI. I., Coronariae Asphodeleae.

- australis RB., baumartige, ♀. t. Neuholland.
 bracteata RB., deckblättrige, 4. t. k. Neuholland.
 hastilis RB., spontonförmige, ♀. t. Neuholland.
 media RB., mittlere, ♀. t. Neuholland.
 minor RB., kleine, 4. t. k. Neuholland.
 Pumilio RB. (*humilis* RB.), niedrige, 4. k. Neuholland.

Xanthosia Rudg., Gelbfilzdolde, V. II., Umbelliferae.
rotundifolia DC., rundblättrige, ♀. t. k. Neuholland.**Xanthoxylon** Sm. (*Zanthoxylum* L.), Zahnwehholz, XXII. v. (V. III.), Tricoccae Xanthoxyleae.

- acuminatum Sw., zugespitztes, ♀. w. Jamaika.
 argenteum Lodd., silberfarbiges, ♀. w. ?
 armatum Roxb., bewaffnetes, ♀. w. Ostindien.
 australe G. Don, neuholländisches, ♀. t. Neuholland.
 Avicennae DC., Avicenna's, ♀. w. Ostafrika, China.
 Budrunga DC., Budrunga-Z., ♀. w. Ostindien.
 Clava Herculis L., Keulen-Z., ♀. w. Caribäen.
 emarginatum Sw., ausgerandetes, ♀. w. Jamaika.
 fraxineum W. (*ramiflorum* Mchx., *Clava Herculis* var. L., *americanum* Mill.), eschenblättriges, ♀. f. Nordam.

b) *virginicum* Lodd.

- mite W., unbewehrtes, ♀. f. Nordamerika.
 nitidum DC., schimmerndes, ♀. w. China.
 piperitum DC., pfefferiges, ♀. k. t. Japan.
 Pterota H. B. K., flügelstieliges, ♀. w. Antillen.
 sapindoides DC., seifenbaumähnliches, ♀. w. Jamaika.
 tragodes DC., gliederstieliges, ♀. w. Hispaniola.
 tricarpum Mchx., dreifrüchtiges, ♀. f. b. Carolina.

Xenopoma W., Theethymian, XIV. II., Labiatae.

- obovatum W. (*Thea imperialis* Hort., *Micromeria obovata* Benth., ? *Satureja incana* Spgl.), verkehrteiförmiger, ♀. k. ? China, Jamaika.

Xeranthemum L., Papierblume (Strohblume), XIX. II., Compositae Helichryseae.

Xeranthemum

annuum L. Jacq. (*radiatum* Lam.), jährige, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

b) flore albo, c) flore pleno.

cylindricum Sibth. et Sm. (*inapertum* Auct.), cylinderförmige, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

erectum Presl. (*incomptum* Cass.), aufrechte, ☉. f. Südeuropa.

inapertum W. (*annuum* β. L.), ungeöffnete, ☉. f. Südeur.

longepapposum Fisch. et Mey., langfederige, ☉. f. Persien.

annuum γ. L. (*orientale* W., *speciosum* L'Her.)

v. *Chardinia xeranthemoides*, *fasciculatum* Andr.

etc. v. *Helipterum fasciculatum*, *proliferum* L. v.

Phoenocoma prolifera, *vestitum* L. etc. v. *Helichrysum vestitum* etc.

Xerophyllum Mchx., Hartblatt, VI. III., Coronariae-Colchicaceae.

asphodeloides Nutt. (*setifolium* Mchx.), affodilähnliches, 4. f. Nordamerika.

gramineum Nutt., grasblättriges, 4. f. Nordamerika.

Sabadilla D. Don, *Sabadilla-H.*, 4. w. Veracruz.

Xerotes RB., Hartzauke, XXIII. VI. (VI. I.), Samentaceae.

arenaria RB., Sand-H., 4. k. t. Neuholland.

denticulata RB., gezähnelte, 4. k. t. Neuholland.

echinata Mack. C., stachelige, 4. k. t. Neuholland.

filiformis RB., fadenförmige, 4. k. t. Neuholland.

flexifolia RB., gebogenblättrige, 4. k. t. Neuholland.

gracilis RB., schlanke, 4. k. t. Neuholland.

Hystrix RB., langdeckblättrige, 4. k. t. Neuholland.

laxa RB., lockere, 4. k. t. Neuholland.

longifolia RB., langblättrige, 4. k. t. Neuholl., Van-Diemensland.

montana RB., Berg-H., 4. k. t. Neuholland.

mucronata RB., stachelspitzige, 4. k. t. Neuholland.

rigida RB., starre, 4. k. t. Neuholland.

Ximenesia Cav. (Joseph Ximenes, ein spanischer Apotheker) XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

encelioides Cav., geöhrt, ☉. f. Mexico.

Cavanillesii Spgl. v. *Echinacea heterophylla*, *cordata* H. B. K., *foetida* Spgl. et *heterophylla* H.

B. K. v. *Simsia cordata*, *ficifolia* et *heterophylla*

Nachtrag.

Ximения Plum. (F. Ximenes, ein spanischer Naturforscher, der über die Medicinalgewächse und Thiere Neuspaniens schrieb), VIII. I., Sapotaceae-Olacineae.

americana L. (*multiflora* Jacq.), amerikanische, 5. w. Westindien.

inerinis L. unbewehrte, 5. w. Westindien.

? *lanceolata* DC. v. *Cymnosma oblongifolia*.

Xiphidium Loeffl., Schwertelsimse, III. I., Commelinaceae.

albidum Lam. (*floribundum* Sw.), weifsliche, 4. w. Westindien.

coeruleum Aubl., blaue, 4. w. Südamerika.

Xiphopteris Kaulf., Schwertfarn, XXIV. I., Pteridoideae.

heterophylla Spgl., verschiedenblättriger, 4. w. Neuholl.

serrulata Kaulf., sägeblättriger, 4. w. Westind., Peru.

- Xylobium** Lindl., Holzorche, XX. 1., Orchideae.
longifolium Lindl., langblättrige, 4. w. Neugranada.
squalens Lindl., dunkelfarbige, 4. w. Brasilien.
- Xylomelum** Sm., Holzkapsel, IV. 1., Proteaceae.
pyriforme Sm., birnförmige, 5. t. Neuholland.
- Xylophylla** *Arbuscula* W., *falcata* Ait. etc. v. *Phyllanthus*
speciosus, *falcatus* etc., *ramiflora* Ait. v. *Geblera*
suffruticosa.
- Xylopia** L., Bitterholz, XIII. VI., Anonaceae.
frutescens Aubl., strauchiges, 5. w. Guiana, Brasilien.
glabra L., kahles, 5. w. Jamaika.
muricata L., weichstacheliges, 5. w. Jamaika.
- Xylosteum** T. v. *Lonicera*.
- Xyris** L., Schwertelgras, III. 1., Juncaceae Xyrideae.
altissima Lodd., hohes, 4. t. k. Neuholland.
americana Vahl., amerikanisches, 4. w. Guiana.
brevifolia Mchx., kurzblättriges, 4. k. Carolina.
gracilis RB., schlankes, 4. k. t. Neuholland, Van-
 Diemensland.
junceae RB., sinnsenförmiges, 4. k. t. Neuholland.
laevis RB., glattes, 4. k. t. Neuholland.
operculata La Bill., bedeckeltes, 4. k. t. Neuholland,
 Van-Diemensland.
- Xysmalobium** RB., Glockenkrönchen, V. II., Ascle-
 piadeae.
undulatum RB., wellenblättriges, 5. t. k. Cap d. g. H.
- Youngia** Cass., Youngie, XIX. 1., Compositae - Ci-
 choriaceae.
japonica Cass., japanische, ? 6. f. Japan.
mauritiana DC. (*Prenanthes japonica* Hort.), mascare-
 nische, 6. m. f. Mascarenas.
- Yucca** L., Palmenlilie, VI. 1., Coronariae.
acuminata Swt., zugespitztblättrige, 5. k. ?
aloifolia L., aloebblätterige, 5. t. Neuspanien.
 b) *variegata*, c) *pendula* H. Par.
aletriformis Haw., aletrisähnliche, 4. t. Cap der g. H.
angustifolia Nutt., schmalblättrige, 4. k. f. b. Nordamer.
arcuata Haw., bogenblättrige, 5. k. t. ?
concava Haw., concave, 4. k. f. b. ?
conspicua Haw. Salisb., ansehnliche, 5. t. ?
crenulata Haw., gekerbte, 5. k. ?
Draconis L., drachenbaumähnliche, 5. k. Carolina.
 b) *foliis variegatis*, c) *fol. tricoloribus*.
filamentosa L., fadige, 4. k. f. b. Virginien.
 b) *variegata*.
flaccida Haw., schlaffe, 4. k. f. b. ?
glauca Nois., blaugrüne, 5. k. Carolina.
glaucescens Haw., grünbläuliche, 5. k. ?
gloriosa L., stolze, 5. k. f. b. Carolina.
 b) *fol. variegatis*.
gracilis Lk., schlänke, 4. w. t. Mexico.
obliqua Haw., schieflättrige, 5. 4. k. f. b. ?
 b) *major*.
puberula Haw., feinhaarige, 4. k. ?
recurva Salisb., zurückgekrümmte, 5. k. f. b. Georgia.
rufocincta Haw., röthlichrandige, 4. k. f. b. ?
serrulata Haw., feingesägte, 5. k. Carolina.
stricta Ker., steife, 4. 5. k. f. b. Carolina.

Yucca

superba Haw. (*gloriosa* Andr.), prächtige, f. k. ?

tenuifolia Haw., dünnblättrige, f. k. Malta.

Boscai Dsf. v. Agave geminiflora.

Zacyntha T., Warzensalat, XIX. I., Compositae Cichoriaceae.

verrucosa G., zweizinkiger, ☉. f. Italien, Griechenl., Taurien.

Zahlbruckneria Rchb. (Zahlbruckner, österreichischer Botaniker), X. II., Saxifrageae.

paradoxa Rchb., wunderbare, 4. f. Kärnthen, Steyermark.

Zaluziania P. (Zaluziansky v. Zaluzian, alter böhmischer Botaniker), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

trilobata P., dreilappige, 4. k. Mexico.

Zamia L., Keulpalme, XXII. XII., Cycadeae.

I. *Arthrozamia* Rchb. (*Encephalartus* Lehm.)

Altensteinii Lehm., Altenstein's, f. w. Südafrika.

caffa Thbg., caffer'sche, f. w. Südafrika.

β) *Cycadis* L. fil.

cycadifolia Jacq. (*villosa* G.), cycasblättrige, f. w. Südafrika.

elongata Miquel, verlängerte, f. w. Südafrika.

Friderici Guilelmi Lehm., Friedrich Wilhelm's, f. w. Südafrika.

horrida Jacq., stachelige, f. w. Südafrika.

lanuginosa Jacq., wollige, f. w. Südafrika.

latifolia Lodd., breitblättrige, f. w. ?

Lehmanniana Eckl. et Zeyh., Lehmann's, f. w. Südafrika.

longifolia Jacq., langblättrige, f. w. Südafrika.

prunifera Lodd., pflaumentragende, f. w. ?

repanda Lodd., ausgeschweifte, f. w. ?

pungens Ait., stechende, f. w. Südafrika.

spinulosa Lehm. (? *spinosa* Lodd.), feinstachelige, f. w. Südafrika.

spiralis Salisb., spiralförmige, f. w. Neusüdwallis.

tridentata W., dreizählige, f. w. Südafrika.

II. *Genuina*.

angustifolia Jacq., schmalblättrige, f. w. Bahamische Inseln.

debilis Ait., schwache, f. w. Westindien.

furfuracea Ait., kleiige, f. w. Westindien.

integrifolia Ait., ganzblättrige, f. w. Hispaniola, Florida.

media Jacq., mittlere, f. w. Westindien.

pumila L., kleine, f. w. Bahamische Inseln.

pygmaea Sims., zwergige, f. w. Westindien.

tenuis W., dünne, f. w. Bahamische Inseln.

Zannichellia L. (G. J. Zannichelli, Apotheker zu Venedig, und dessen Sohn G. G. Zanichelli, beide Botaniker), XXI. I., Alismaceae-Potomaphileae.

palustris L., Sumpf-Z., 4. Wa. f. Europa, Nordamerika.

α) *major* Bönningh., β) *repens* Bönningh.

pedunculata Rchb. (*maritima* Nolte), stielfrüchtige, 4. Wa. f. Europa.

β) *gibberosa* Rchb.

polycarpa Nolte, vielfrüchtige, 4. Wa. f. Norddeutschl.

Zanthoxylum L. v. *Xanthoxylum*.

Zantedeschia aethiopica Spgl. v. *Richardia aethiopica*.

- Zappania** Scop. Juss. (P. A. Zappa, italienischer Botaniker), XIV. II., Verbenaceae.
nodiflora Lam., knotenblumige, 4. k. Nordamerika, Ost- und Westindien, Chili, Neuholland etc.
 b) *rosea* D. Don.
repens Bertol., kriechende, 4. Wa. f. Italien.
stoechadifolia Juss. P., stoechasblättrige, 5. w. Ostind.
- Zea** L., Mais, XXI. III. (III. I.), Gramineae.
Curagua L. Mol., kleiner, 6. f. Chili.
Mays L., gemeiner (türkischer Weizen), 6. f. Amerika.
 b) *altissima*.
- Zenobia** D. Don, Zenobie, X. I., Ericaceae.
floribunda DC., blüthenreiche, 5. k. f. b. Nordamerika.
racemosa DC., traubige, 5. f. b. Nordamerika.
 ? *spicata* (Wats.)
speciosa D. Don, prächtige, 5. f. b. Nordamerika.
 β) *nitida* (Pursh.), γ) *pulverulenta* (Bartr.).
- Zephyranthes** Herb., Zephyrblume, VI. I., Narcis-seae-Amaryllideae.
Atamasco Herb., Atamaso-Z., 4. Zw. k. Carolina, Virgin.
candida Ker, reinweißse, 4. Zw. k. Peru.
chloroleuca Herb., grünlichweißse, 4. Zw. k. ?
grandiflora Lindl., großblumige, 4. Zw. k. Mexico.
mesochloa Herb., bonarische, 4. Zw. k. Buenos Ayres.
rosea Lindl., rosafarbige, 4. Zw. t. w. Cuba.
Spofforthiana Herb., Spofforth's, 4. Zw. k. t. Hybride.
striata Herb., gestreifte, 4. Zw. k. Mexico.
tubispatha Herb., röhrenscheidige, 4. Zw. w. Südamerika.
verecunda Herb., schamhafte, 4. Zw. k. Mexico.
Drummondii D. Don v. *Sceptranthes Drummondii*.
- Zerumbet speciosum** Jacq. Wendl. v. *Alpinia nutans*.
- Zexmenia** Lallav. (Anagramm von Ximenesia), XIX. IV., Compositae-Corymbiferae.
monocephala (DC.), einköpfige, 5. t. w. ? Caribäen.
tagetiflora D. Don, tagetesblumige, 4. k. Mexico.
- Zichya** Hügel, vid. Kennedy.
- Zieria** Sm. (John Zier, englischer Botaniker), IV. I., Tricoccae-Rutaceae.
hirsuta DC., rauhaarige, 5. k. t. Neuholland.
laevigata Sm., glatte, 5. k. t. Neuholland.
lanceolata RB. (*Smithii* Andr.), lanzettliche, 5. k. t. Neuh.
macrophylla Bonpl., großblättrige, 5. k. t. Neuholland.
microphylla Bonpl., kleinblättrige, 5. k. t. Neuholland.
obcordata Cunn., verkehrtherzblättrige, 5. k. k. Neuh.
octandra Swt., achtmännige, 5. k. t. Neuholland.
pilosa Rudg., haarige, 5. k. t. Neuholland.
revoluta Cunn., zurückgerollte, 5. k. t. Neuholland.
- Zietenia** Gled. (v. Zieten, berühmter preuß. General, dessen Garten Gleditsch vorstand), XIV. I., Labiatae.
orientalis Gled., morgenländische, 4. f. b. k. Grusien.
- Zigadenus** Mchx., Jochblümchen, VI. III., Coronariae-Colchicaceae.
bracteatus Swt., deckblättriges, 4. f. Nordamerika.
elegans Pursh. (*glauca* Nutt.), zierliches, 4. f. Nordamer.
glaberrimus Mchx., kahles, 4. f. b. Carolina.
- Zilla** Forsk. (ägyptischer Name), XV. I., Cruciferae.
myagroides Forsk., dotterkrautähnliche, 5. 5. Aegypten.
 b) *macrocarpa*.
- Zingiber** G., Ingwer, I. I., Scitamineae-Amomeae.
capitatum Roxb., kopfförmiger, 4. w. Ostindien.

Zingiber

Cassumunar Roxb. (*Cliffordiae* Andr.), Cassumunar-L., 4. w. Ostindien.

chrysanthum Rosc., goldblumiger, 4. w. Nepal.

elatum Roxb., hoher, 4. w. Bengalen.

ligulatum Roxb., bandförmiger, 4. w. Ostindien.

Mioga Rosc., Mioga, 4. w. Südjapan.

officinale Rosc., officineller, 4. w. Ostindien.

panduratum Roxb., geigenförmiger, 4. w. Pegu.

purpureum Rosc., purpurfarbiger, 4. w. Ostindien.

roseum Rosc., rosafarbiger, 4. w. Coromandel.

rubens Roxb., röthlicher, 4. w. Ostindien.

squarrosus Roxb., sparriger, 4. w. Pegu.

Zerumbet Rosc., dichtblättriger, 4. w. Ostindien.

Zinnia L. (J. G. Zinn, Professor der Medicin zu Göttingen), XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

angustifolia H. B. K., schmalblättrige, ©. m. f. Mexico.

discolor H. Hal., verschiedenfarbige, ©. m. f. ? Hybride.

elegans Jacq. (*violacea* Cav.), zierliche, ©. m. f. Mexico.

a) violacea, b) alba, c) purpurascens, d) coccinea, e) miniata, f) lutescens, g) striata etc.
β) squarrosa DC.

hybrida Sims. (*grandiflora* Hort.), Bastard-Z., ©. m. f. Südamerika.

multiflora L., vielblumige, ©. m. f. Mexico, Louisiana, Brasil.

b) flava H. B. K.

pauciflora L. (*lutea* G.), wenigblumige, ©. m. f. Peru.

tenuiflora Jacq. (*revoluta* Cav.), dünnblumige, ©. m. f. Mexico.

verticillata Andr., wirtelblättrige, ©. m. f. Mexico.

b) flava.

Zizania L., Wasserreis, XXI. VI. (VI. II.), Gramineae.

aquatica L. (*miliacca* Mchx.), fennichähnlicher, ©. Wa. w. Südcarolina, Jamaika.

aquatica Lamb. (*palustris* L. *clavulosa* Mchx. et *fluitans* Mchx. v. *Hydropyrum esculentum* et *fluitans*.)

Zizia Koch (D. Ziz, deutscher Botaniker), V. II., Umbelliferae.

aurea K., goldfarbige, 4. f. Nordamerika.

Ziziphora L., Zizikraut, II. I., Labiatae.

acynoides W., acynusähnliches, ©. f. Sibirien.

capitata L., kopfförmiges, ©. f. Taurien, Cypern.

clinopodioides Lam. (*acynoides* L., *serpyllacea* Ait.), wirbelborstenähnliches, ©. f. Armenien, Sibirien.

dasyantha MB. (*Puschkini* Ait.), wollblumiges, 4. f. b. k. Caucasus.

hispanica L. (*spicata* Cav.), spanisches, ©. f. Spanien.

media Lk., mittleres, 4. f. b. k. ? Caucasus.

serpyllacea MB., quendelähnliches, 4. f. b. k. Iberien, Caucasus.

taurica MB., taurisches, ©. f. Taurien.

tenuior L., dünneres, ©. f. Syrien.

Mariana R. et S., vid. *Cunila Mariana*.

Zizyphus T., Judendorn, V. I., Rhamneae.

albus Roxb., weißfrüchtiger, f. k. t. China.

Caracutta Hamilt., Caracutta-J., f. w. Ostindien.

chinensis Lam., chinesischer, f. k. China.

flexuosa Wall., gebogener, f. f. b. k. Nepal.

iguanea, westindischer, f. w. Antillen.

incurva Roxb., einwärtsgekrümmter, f. w. Ostindien.

Zizyphus

- Jujuba Lam., Jujuben-I., $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
 Lotus Lam., genießbarer, $\frac{1}{2}$ k. Nord- u. Mittelfrika, Südeuropa.
 mauritiana Lam., mascarenischer, $\frac{1}{2}$ w. Mascarenas.
 melastomoides Cunn., schwarzschlundähnlicher, $\frac{1}{2}$ k. t. Neuholland.
 mucronata W. (*bubalina* Lichtstn.), stachelspitziger, $\frac{1}{2}$ k. Cap der guten Hoffnung.
 Napeca Lam., Napeca-I., $\frac{1}{2}$ w. Ceylon, Molukken.
 nitida Roxb., glänzender, $\frac{1}{2}$ k. China.
 Oenoplia Mill., Oenoplia-I., $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
 rotundifolia Lam., rundblättriger, $\frac{1}{2}$ w. Ceylon.
 sororia R. et S. (*trinervis* Roth.), verschwisterter, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
 Spina Christi Lam., Christkronen-I., $\frac{1}{2}$ k. Aegypt., Paläst. β) *inermis* DC.
 vulgaris Lam., gemeiner, $\frac{1}{2}$ k. f. b. Südeuropa, Nordafrika, Syrien.
myrtoides Orteg., vid. *Condalia microphylla*, *volubilis* W., vid. *Berchemia volubilis*.
Zoegea L. (J. Zoega, welcher Island in botanischer Hinsicht bereis'te), XIX. III., Compositae-Cynarocephalae.
Leptaura L. (*aleppica* Jacq.), gelbblumige, $\odot$ m. f. Syrien.
Zornia J. F. Gmel. (J. Zorn, Apotheker u. Botaniker zu Kempten in Schwaben), XVII. IV. (VI.), (XVI. VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
angustifolia Sm. (*diphylla* P.), schmalblättrige, $\odot$ w. m. Ostindien.
capensis P., capische, $\odot$ 4. k. Cap der gut. Hoffn.
ceylanica P., ceylonische, $\odot$ w. m. Ceylon.
dictyocarpa DC., netzfrüchtige, $\odot$ m. f. Neuholland.
glochidiata Rchb., widerhakige, $\odot$ w. m., Guiana.
reticulata Sm. (*diphylla ciliata* P.), netzförmige, $\odot$ w. m. f. Westindien.
tetraphylla Mchx., vierblättrige, 4. k. t. Südcarolina, Jamaika.
elegans P. etc. vid. *Dicerma elegans* etc.
Zosimia Hoffm. (A. N. et Z. Zosima, Herausgeber griechischer Classiker), V. II., Umbelliferae.
absinthifolia Hoffm. (*orientalis* MB.), wermuthblättrige, σ . 4. f. Iberien, Caucasus.
Zostera L., Seegras, I. II., Alismaceae - Potamo-
 phileae.
marina L., gemeines, 4. Wa. f. Europa.
nana Roth. (*Noltei* Hornem., *uninervis* Rchb.), kleines, 4. Wa. f. Nordeuropa.
Zuccagnia viridis Thbg., vid. *Uropetalum viride* etc.
Zwingera amara W., vid. *Simaba guianensis* etc.
Zygoglossum umbellatum Reinw., v. *Cirrhopetalum Thouarsii*.
Zygopetalum Hook., Jochstendel, XX. I., Orchideae.
cochleare Lindl., löffelförmiger, 4. w. Trinidad.
crinitum Lindl., mähniger, 4. w. Brasilien.
intermedium Hook., mittlerer, 4. w. Südamerika.
Mackai Hook, Mackay's, 4. w. Brasilien.
maxillare Paxt., kerfenähnlicher, 4. w. Südamerika.
Murrayanum Gard., Murray's, 4. w. Brasilien.
rostratum Hook., schnabelförmiger, 4. w. Demerara.
stenochilum Lodd., schmallippiger, 4. w. Brasilien.
Zygophyllum L., Doppelblatt, X. I., Zygophylleae.

Zygophyllum

album L. (*proliferum* Forsk.), weißes, h. k. Nordafrika, canarische Inseln.

atriplicoides Fisch. et Mey., meldenähnliches, h. k. Armen.

coccineum L., scharlachfarbiges, h. k. Nordafrika.

cordifolium L. suppl., herzblättriges, h. k. Cap d. g. H.

foetidum Wendl., stinkendes, h. k. Cap d. gut. Hoffn.

b) *insuave* Bot. mag.

maculatum Ait., geflecktes, h. k. Cap der gut. Hoffn.

microphyllum Thbg. (*capense* Lam.), kleinblättriges, h. k. Cap der guten Hoffnung.

Morgsana L., kurzgestieltes, h. k. Cap d. gut. Hoffn.

prostratum Thbg., gestrecktes, 4. h. k. Cap d. gut. H.

sessilifolium L., stiellosblättriges, h. k. Cap d. g. H.

simplex L. (*portulacoides* Forsk.), einfaches, 4. h. w. Aegypten, Arabien.

spinosum L., dorniges, h. k. Cap der guten Hoffn.

Zygophyllum arboreum Jacq., vid. *Guajacum arboreum*.

Fabago L. vid. *Fabago major*, *fruticulosum* DC., vid. *Roeperia ?aurantiaca*.

N a c h t r a g.

Acacia. *alata* RB., geflügelte. Westl. Neuholl. — *adstringens* Ait., knappe. Neusüdwall. — *balsamea* Rchb., balsamische. Neuholl. — *brevipes* Cunn., kurzstielige, Neusüdwall. — *cultrata* Ait., messerblättrige. Neuholl. — *capensis* Burch., capische. C. d. g. H. — *Cunninghami* Ait., Cunningham's. Neuholl. — *decipiens* β . *praemorsa* Grah., abgeissene Neuholl. — *delibrata* Ait., ermessene. Neuholl. — *dependens* Ait., herabhängende. Neuholl. — *Dolabella* Rchb., hobelblättrige. Neuholl. — *holosericea* G. Don, Ait. (? *leucophylla* Swt.), sammetartige. Neuholl. — *humifusa* Ait., niedergestreckte. Neuholl. — *intermedia* Cunn., mittlere. Neuholl. — *Lawsonii* Ait., Lawson's. Neuholl. — *leptocarpa* Ait., schlankschotige. Neuholl. — *ligulata* Ait., bandförmige. Neusüdwall. — *neurocarpa* Ait., nervenhülsige. Neuholl. — *persoonioides* Ait., persoonienähnliche. Neuholl. — *plumosa* Lowe, federige, Sch. k. Madeira. — *prensans* Lowe, entferntstachelige, Sch. k. Madeira. — *sericata* Ait., seidenhaarige. Neuholl. — *Simsii* Ait., Sims's. Neuholl. — *stenophylla* Ait., schmale. Neuholl. — *tristis* Grah., dunkelgrüne. Neuholl. — *umbellata* Ait., doldige. Neuholl. — *viminalis* Ait., gertenartige. Neuholl. — *vomeriformis* Ait., pflugschaarförmige. Neuholl. Sämmtlich $\frac{5}{2}$. $\frac{5}{2}$. t.

virgata Lodd. = *verniciflua* Cunn.

Acaena *Berteriana* Bernh. (*argentea* Berter., *pinnatifida* Hort., *trifida* Steud.), Bertero's, 4. t. k. Chili.

splendens Hook. Arn., schimmernde, 4. k. t. Chili.

Acanthophippium Lindl., Stachelorche, XX. 1., Orchideae.

bicolor Lindl., zweifarbige, 4. w. Ceylon.

striatum Lindl., gestreifte, 4. w. Nepal.

syhetense Lindl., sylhetische, 4. w. Sylhet.

Acanthophyllum C. A. Mey., Stachelnelke, X. III., Caryophyllaceae - Sileneae.

mucronatum C. A. Mey., weichspitzige, 4. $\frac{5}{2}$. f. b. k. Caucas.

spinosum C. A. Mey. (*Dianthus spinosus* Dsf. p. 260).

versicolor Fisch. et Mey., buntfarbige, 4. $\frac{5}{2}$. k. Persien.

verticillatum C. A. Mey. (*Arenaria verticillata* W. p. 76).

Acer *barbatum* Mchx. (*carolinum* Bolt., *trilobatum* Hort.), *dasycarpum* Ehrh. (*eriocarpum* Mchx., *tomentosum* H. Par., *glaucum* Marsh., *virginianum* Duh.), *montanum* Ait. (*parviflorum* Ehrh., *pensylvanicum* du Roi), *rubrum* L. γ . *intermedium* Loud.

hyrcanum Fisch et Mey., hyrcanischer, $\frac{5}{2}$. f. Caucasus.

Negundo L. v. *Negundo fraxinifolium*.

Achyrachaena Schauer, Spreukern, XIX. 1., Compositae-Corymbiferae.

mollis Schauer, weicher, $\odot$. f. Californien.

Achyranthes *uncinulata* Schrad. (*Paronychia capensis* Eckl.), kurzhakige, 4. $\frac{5}{2}$. k. Cap der guten Hoffn.

- Aconitum chinense* Sieboldt (*Sieboldti* Hort.) p. 14.
Acropera Lindl., Spitzstendel, XX. 1., Orchideae.
Loddigesii Lindl. (*Maxillaria galeata* Lodd. p. 500),
 Loddiges's, 4. w. Mexico.
Acrophyllum venosum Benth. v. *Weinmannia venosa*.
Actinospora Turcz. Strahlenkraut XIII. 1., Ranunculaceae.
dahurica Turcz. (*Actaea pterosperma* Turcz.), dahurisches, 4. f. Dahurien.
Adenandra uniflora W. (*Eriostemon capense* P., *Diosma uniflora* Schrad. et Wendl.), einblumiges, 5. t. C. d. g. H.
Adenocarpus DC., Leguminosae-Papilionaceae, p. 18.
cebennensis DC., Cevennen-D., 5. k. Südfrankreich.
Adenotrichia senecioides Fisch. et Mey. (*Senecio sinuatilobus* DC.), kreuzkrautähnliches, ♂. 4. f. k. Chili.
Adiantum aethiopicum L., äthiopisches, 4. w. Cap der guten Hoffnung, Acunna.
Moritzianum Loud., Moritz's, 4. t. w. ? Südamerika.
obliquum W., schiefes, 4. w. Westindien.
Aegochloa Benth., Stinkpolemonie, V. 1., Polemoniaceae.
atractyloides Benth., atractylisähnliche, ☉. f. Californien.
cotulaefolia Benth., cotulablätterige, ☉. f. Californien.
eryngioides Benth. (*Gilia mucronata* Lehm.), mannstreu-ähnliche, ☉. f. Chili.
intertexta Benth., verwebte, ☉. f. Californien.
pubescens Benth., feinhaarige, ☉. f. Californien.
pungens Benth. (Dougl.), stechende, ☉. f. Californien.
Aerides affine Wall., ähnlicher, 4. w. Ostindien.
multiflorum Roxb., vielblumiger, 4. w. Sylhet.
 (Soll mit Vorigem = sein.)
Aeschynanthus Jack. (*Aescynanthus* Wall.), Schammaske XIX. 11., Personatae-Bignoniaceae-Cyrtandreae.
grandiflorus Spgl. G. Don, großblumige, 5. w. Bengalen.
Aetheria Blum., Luftorche, XX. 1., Orchideae.
occulta Lindl. (*Goodyera occulta* A. P. Th., *Platylepis goodyeroides* Rich.), verborgene, 4. w. Mascarenas.
Agasyllis Spgl., Kappendolde, V. 11., Umbelliferae.
caucasica Spgl. (*Cachrys latifolia* MB.), caucas., ♂. f. Caucas.
Agathaea amelloides DC. = *A. coelestis*.
Agrostemma Bungeana D. Don, *pyrenaica* G. Don, *suecica* Maund v. *Lychnis Bungeana* etc.
Agrostis capensis Lam., capisches, 4. k. C. d. g. H.
dulcis Sibth. (*Sibthorpii* Hort.), süßes, ☉. f. Mexico.
Juressi Lk., Juress's, 4. f. Spanien, Portugal.
debilis Poir. (*retrofracta* W.), *Forsteri* Rich., *plebeja* RB. etc. v. *Lachnagrostis retrofracta* etc.,
laxiflora Richards. = *A. laxa* p. 25.
Aiopsis agrostidea DC. = *Aiopsis Candollei*.
Alfredia cernua Cass. v. *Silybum cernuum*.
Amblirion album Swt. etc. v. *Fritillaria alba* etc.
Amblyocarpum Fisch. et Mey., Mückenkraut, XIX. 11., Compositae-Corymbiferae.
inuloides Fisch. et Mey., alantähnliches, 4. f. Gegend des caspischen Meeres.
Ameletia indica DC. v. *Ammannia peploides* p. 47.
Ammodendron Fisch., Sandstrauch, X. 1. (XVII. 1v.), Leguminosae-Papilionaceae.
Sieversii Fisch. DC. (*Podaliria argentea* W., *Hallia argentea* Spgl., *Rolinia argentea* Sievers, *Sophora argentea* et *bifolia* Pall.), Sievers's, 5. f. b. k. Songarei.

- Ammogeton* Schrad., Sandlattich, XIX. I., Compositae Cichoriaceae.
scorzoneraefolius Schrad., haferwurzblättriger, 4. f. Nördliches Amerika.
- Ammysine buxifolia* Pursh. v. *Leiophyllum thymifol.* Pursh.
- Anagallis indica* Wight (*arvensis* Wall., *latifolia* Hamilt.), indischer, ☉. f. Ostindien.
- Anchusa tenella* Hornem. = *Bothriospermum tenellum* p. 129.
- Anda* Pis. Mart., Andenwolfsmilch, XXI. VI. (XVI. v.), Tricoccae - Euphorbiaceae.
- Gomesii* Juss., Gomes's, 5. w. Brasilien.
- Anemiopsis* Hook., Aronvegerich, ? VII. III., ? Aroidae Saurureae.
californica Hook., californischer, 4. f. k. Californien.
- Angelica Archangelica* etc. v. *Archangelica officinalis* etc., *Carvifolia* Spgl. v. *Selinum Carvifolia*, *Fischeri* R. et S. v. *Cnidium Fischeri*, *chaerophyllea* Lotterm. v. *Conioselinum* Gmelini, *pratensis* MB. v. *Ostericum palustre*, *verticillaris* L. v. *Peucedanum verticillare*.
- Angelonia* H. B. K. (westindischer Name), XIV. II., Personatae Antirrhineae.
minor Fisch. et May., kleine, 4. 5. w. Brasilien.
salicariaefolia H. B. K., weiderichblättrige, 5. w. Caracas, Hispaniola.
- Angianthus* Wendl., Gefäßblümchen, XIX. v., Compositae Eupatorineae.
tomentosus Wendl., filziges, ☉. f. m. Neuholland.
- Angophora* Cav., Gefäßmyrte(träger), XII. I., Myrtaceae.
cordifolia Cav., herzblättrige, 5. 5. t. k. Neuholland.
intermedia DC., mittlere, 5. 5. t. k. Neuholland.
lanceolata Cav., lanzettblättrige, 5. 5. t. k. Neuholl.
- Angraecum* A. P. Thou. (malayischer Name), XX. I., Orchideae.
caudatum Lindl., geschweiftes, 4. w. Sierra Leone.
distichum Lindl., zweizeiliges, 4. w. Sierra Leone.
eburneum A. P. Thou. (*Limodorum eburn.*), elfenbeinweißes, 4. w. Madagascar.
falcatum Lindl., sichelförmiges, 4. w. China.
luridum Lindl., schmuzigbraunes, 4. w. Sierra Leone.
maculatum Lindl., geflecktes, 4. w. Brasilien.
micranthum Lindl., kleinblumiges, 4. w. Sierra Leone.
- Anguillaria* RB., Aalgermer, VI. III., Colchicaceae.
biglandulosa RB., zweidrüsiger, 4. k. Neuholland.
dioica RB., zweihäusiger, 4. k. Neusüdwallis.
indica RB., indischer, 4. w. t. Neuholland, Malabar.
- Anguloa lurida* Lk. = *Catasetum luridum*.
- Anisochilus glaber* Schrad., kahler, 4. 5. w. Ostindien.
- Anisolotus* Bernh., Hornklee, XVII. IV. (VI.), Leguminosae Papilionaceae.
anthylloides Bernh. (*Anthyllis chilensis* DC., *Hosackia subpinnata* G. Don, *Lotus subpinnatus* Lag.), wollblumenähnlicher, ☉. f. Chili.
- Wrangeliana* Bernh. (*Lotus Wrang.* Fisch. et Mey. p. 478).
- Anoda brachyantha* Rehb. = *A. triangularis* (non incarnata) p. 61.
- Anthemis chrysoleuca* Gay., weißgelbe, ☉. f. ? Nordafrika.
- Anthriscus Cicutaria* Duby., schierlingblättriger, 4. f. Frankreich.
- Antirrhinum rytidospermum* Fisch. et Mey., grubig-samiges, ☉. f. Caucasus.

- Anychia capillacea* DC., haarförmige, ☉. f. Nordamer.
Apalochlamys DC., Zartdosten, XIX. v., Compositae
 Eupatorineae.
Billardieri DC., Billardiere's, 4. ♀. t. k. Van-Diemensl.
Kerii DC., Ker's, 4. ♀. t. k. Neuholland.
Aplotaxis Frolovii DC. v. *Frolovia lyrata*.
Aponogeton juncus Lehm., simsenförmiges, 4. Wa.
 w. Cap der guten Hoffnung.
Aposeris Neck v. *Lapsana*.
Apuleja G., *Apuleja*, XIX. i., Compositae Cynarocephalae.
fruticosa Bartl., strauchige, ♀. k. Cap der guten Hffg.
Aquilegia juncunda, Fisch. et Lall., liebliche 4. f. Sibir.
atropurpurea β. *dahurica* Fisch. = *atropurpurea*
 β. *Fischeriana* p. 69.
Arabis borealis Andrzy., nördliches, ♂. 4. f. Kamtschatka.
stenopetala W. p. 71 = *sagittata* a. *Gerardiana* DC.,
longisiliqua Wallr., *Gerardi* K. (Bess.), *nemorensis*
 Rchb., *glastifolia* Rchb.
lilacina Schrad. p. 70 nördliches Amerika.
Hollboelliana H. Hafn. = *Turritis* Grahmi.
Arachnospermum heterospermum Berg. = *Hypochaeris* Salz-
 manniana.
Aracium paludosum Monni. v. *Crepis paludosa*.
Aspidium elongatum Sw., verlängerter, 4. t. Canar. Ins.
obscurum Fisch. et Mey., dunkler, 4. w. Rio Janeiro.
 S. 100 Zeile 9 v. u. muß es heißen: *Astilbe* st. *Astible*.
Attalea hispida Hffg., steifhaarige, ♀. w. Surinam.
Avena Sect. IV. *longifolia* N. E., langblättriger, 4. k.
 Cap der guten Hoffnung.
Avena bipartita Lk. v. *Danthonia Linkii*.
 S. 108 Zeile 3 v. u. lies: *Osmothamnus* statt *Osmanthus*.
Baccharis alata Hort. = *sagittalis* DC. (*genistelloides* Poepp.
Pluchea sagittalis Less.).
Bahia lanata DC. etc. v. *Eriophyllum caespitosum*.
Baldingera colorata Flor. Wett. v. *Phalaris arundinacea*.
 S. 112 *Barbarea arcuata* Rchb. statt RB.
Barkhausia albida Cass., weifsliche, 4. f. b. k. Pie-
 mont, Dauphiné.
alpina ist ☉., nicht 4.
glandulosa Presl. (Guss.), drüsige, ☉. f. Sicilien.
Marschallii C. A. Mey. (*Crepis biennis* et *taurinensis*
 MB.), *Marschall's*, ☉. f. Taurien, Iberien.
rubra Mch. p. 113 ☉., nicht 4.
scariosa Rchb., trockenhäutige, ☉. f. Italien.
taraxacoides DC., löwenzahnähnliche, ♂. f. Ital., Nordafr.
Boursea nervosa Hffmsg. v. *Philodendron crassinervium*,
ventricosum Hffmsg. v. *Arum ventricosum*.
Begonia brasiliana Schrk. DC., brasilianische, ♀. w. Bras.
Belemcanda punctata Mch. = *Pardanthus chinensis*.
Bellardia Trixago All. v. *Trixago rhinanthina*.
Betula oycoviensis Bess. (*Soccolovii* Jacq. fil.), galizische,
 ♀. f. Galizien.
Biasoletia K. (*Biasoletto*, Apotheker und Botaniker
 zu Triest), V. II., Umbelliferae.
tuberosa K., knollige, 4. Kn. f. Istrien.
Biotia DC. v. *Aster*.
Bletia Woodfordii Hook. — *Phajus maculatus*.
Blumea amplexans DC., umfassende, ☉. f. m. Ostindien.
aurita DC., geöhrt, ☉. f. m. Ostindien.

Bonjeania Rchb. (Bonjean, Botaniker zu Chambéry), XVII. IV. (VI.), Leguminosae - Papilionaceae.

hirsuta Rchb. rauhhaarige, ♀. f. Süd- und Westeuropa.

microphylla Rchb. v. *Lotus microphyllus* Hook. p. 478.

recta Rchb. v. *Dorycnium rectum* Sering. p. 272.

Botrophis actaeoides Rafin. = *Cimicifuga Serpentaria*.

Brachyramphus intybaceus DC. = *Lactuca intybacea*.

Brachyrhynchus Less., Kurzschnäbler, XIX. II., Compositae - Corymbiferae.

albicaulis DC., weisstengeliger, 4. k. Cap der g. H.

cymbalarifolius DC., cymbelblättriger, 4. k. C. d. g. H.

elongatus Less., verlängerter, 4. k. Cap der guten H.

Brachyris Nutt. (*Brachyachyris* Spgl.) *Brachyris*, XIX. II., Compositae - Corymbiferae.

dracunculoides DC., dragunähnliche, 4. f. Nordamerika.

ramosissima DC., ästige, ☉. f. Texas.

Brachystelma spathulatum RB. Lindl., spatelblättrige, 4. Kn. t. Cap der guten Hoffnung.

Brachystemon lanceolatum W. etc. v. *Pycnanthemum lanceolatum* etc.

Bromus arvensis L. (*versicolor* Poll.), Acker-T., ☉. f. Europa, Asien, Amerika.

multiflorus Mart., vielblumige, ☉. f. ?

pilosus Dietr. ? = *murorum* Bernh.

Bruckenthalia Rchb., Bruckenthalie, VIII. I., Ericaceae.

spiculifolia Rchb., fadenblättrige, ♀. f. b. k. Siebenbürgen, Griechenland.

Bryanthus S. G. Gmel. DC., Sprossenheide, VIII. I., Ericaceae.

Gmelini G. Don, Gmelin's, ♀. f. b. k. Sibir., Kamtsch.

Bunias macroptera Rchb., großflügelige, ☉. f. Istrien.

Burrielia DC. (J. M. Burriel, Herausgeber der californischen Reise des Venegas), XIX. II., Compositae - Corymbiferae.

gracilis DC., schlanke, ☉. f. Neucalifornien.

microglossa DC., kleinzüngige, ☉. f. Neucalifornien.

tenerrima DC., zarte, ☉. f. Neucalifornien.

Cacalia p. 141.

I. *Genuina atriplicifolia* L., *cordifolia* H. B. K., *hastata* L., *radulaefolia* H. B. K., *reniformis* Mühlbg., *reticulata* Vahl. (*asarifolia* Steud.), *runcinata* H. B. K., *suaveolens* L., *tuberosa* Nutt.

II. *Adenostyles* Cass., *glabra* DC. (*C. alpina* Jacq. L., *A. viridis* Cass.), *leucophylla* Rchb. (*candidissima* Cass.), *Petasites* Bluff et Fing. (*albida* Cass., *albifrons* Rchb.).

III. *Emilia* Cass., *sagittata* DC. (Vahl.), (*E. flammea* Cass., *C. sonchifolia* Hort.), *β. coccinea* Swt. (Curt.), *sonchifolia* DC. (L.) (*E. purpurea* Cass., *Crassocephalum sonchifolium* Less.).

IV. *Kleinia* L. Haw., *Anteuphorbium* DC. (L.), *articulata* Haw. (L.), *breviscapsa* DC. (*C. carnosa* Ait.), *ficoides* Haw. (L.), *Haworthii* DC. (*tomentosa* Haw., *C. canescens* W., *C. Haworthii* Swt.), *neriifolia* Haw. (*C. Kleinia* L.), *papillaris* Haw. (L.), *pugioniformis* DC. (Salm.) (*C. longifolia* Haw.), *radicans* Haw. (L.), *repens* Haw. (L.).

V. *Psacalium* Cass., *peltatum* Cass. (*C. peltata* H. B. K.), *C. bicolor* Roxb. v. *Senecio* Sect. V., *cylindrica* Lam. v. *Othonna cylindrica* Nachtr., *macrophylla* MB.

v. *Senecio phatyphyllus* p. 745, *ovalis* Ker v. *Senecio-Gynura ovalis* Nachtr., *scandens* Thbg. v. *Senecio deltoideus* Nachtr., *tomentosa* Thbg. v. *Senecio oliganthus* Nachtr.

Cacteae *).

I. *Melocactus Hystrix* Haag. jun. etc., die übrigen s. p. 508.

II. *Ariocarpus* Scheidw. (*Anhalonium prismaticum* Lehm.), *retusus* Scheidw.

III. *Mammillaria*. A) *Microthelae acanthophlegma* Lehm., *bicolor* Lehm., *crucigera* Mart., *elegans* DC., *Haageana* Pfr., *Humboldtii* Ehbg., *nivea* Wendl., *nobilis* Pfr., *Parkinsonii* Ehbg., *sulcata* Schelh., *super-texta* Mart., *tecta* Miq. B) *Tenues. densa* Lk. et Ott., *echinata* DC., *elongata* DC., *gracilis* Prfr., *intertexta* DC., *minima* H. Dresd., *sphacelata* Mart., *subcrocea* DC., *tenuis* DC. C) *Stylothelae. candida* Scheidw. (*sphaerotricha* Lem.), *crinita* DC., *decipiens* Scheidw. (*inunciata* Lem.), *glochidiata* Mart. b. *flore roseo*, *pusilla* DC. b. *pusilla minor*, *Scheidweileriana* Schelh., *Schelhasii* Pfr., *Schiedeana* Ehbg., *Wildiana* Otto b. *major* Haag. jun. D) *Conothelae. aciculata* Otto, *albida* Haag. jun., *ancistrata* Pfr., *ancistrina* Pfr., *ancistroides* Lem., *caracasana* Otto, *Celsiana* Lem., *chrysacantha* Otto, *citrina* Scheidw., *columnaris* Mart., *crassispina* Pfr., *deflexispina* Lem., *discolor* Haw. b. *prolifera* Haag. jun., *Ehrenbergii* Pfr., *eriacantha* Lk. et Otto, *Eugenia* Scheidw., *flavescens* DC., *formosa* Scheidw., *fulvispina* Haw., *fuscata* Lk. et Otto, *Galeotti* Scheidw., *hexacantha* Salm, *nivosa* Lk., *obconella* Scheidw. (*dolichocent.* Lem.), *obscura* Scheidw., *Parmentieri* Otto (*prolifera* Haw.), *parvimanma* Haw., *Pfeifferi* Booth (*auriceps* Lem.), *phaeacantha* Lem. (*radula* Scheidw.), *polythele* Mart., *pyramidalis* Otto, *quadrispina* Mart., *rhodantha* Lk. et Otto b. *Andreae* Pfr., c. *pyramidalis* Schelh., *rosea* Scheidw. (*rhodeocentra* Lem.), *ruficeps* Lem., *rutila* Zucc., *setosa* Pfr., *simplex* Haw., b. *affinis* Otto, *tentaculata* Lk. et Otto, b. *spinis rubris* Scheidw., *tetracentra* Otto, *vetula* Mart., *vivipara* Haw. E) *Polyedrae. aeruginosa* Scheidw., *Caput Medusae* Lk. et Otto, *carnea* Zucc., *centrispina* Pfr., *crocidata* Lem. b. *quadrispina*, *Fischeri* Pfr., *Hystrix* Mart., *Karwinskiana* Mart. b. *flavescens* Zucc., *leucocarpa* Scheidw., *leucotricha* Scheidw., *macracantha* DC., *Mystax* Mart., *polyedra* Mart. b. *Mystax* Hort., *Seitziana* Zucc. Mart., *subpolyedra* Salm, *tetracantha* Salm, *versicolor* Scheidw. (*centricirrha* Lem.), *villifera* Otto, *xanthotricha* Scheidw., *Zuccariniana* Mart. F) *Dolichothelae* s. *Longi-*

*) Da die größere Zahl der Gärtner die Gattungen und Arten dieser Familie nicht alphabetisch, sondern in wissenschaftlicher Reihe auführen, und da während des Druckes dieses Buches einige neue Gattungen und Arten bekannt wurden, auch Manches anders abgetheilt worden ist, so folgt hier noch eine Uebersicht dieser in der neuern Zeit mit so viel Eifer und Liebe bearbeiteten und cultivirten Familie. Vaterland (verschiedene Provinzen Südamerikas), Dauer und Cultur konnte, der Raumersparniss wegen, übergangen werden, da es bei allen gleichförmig und im Buche angegeben ist.

Cacteae

mammae. longimamma DC., uberiformis Zucc. G) Aulacothelae. aulacothele Lem., biglandulosa Pfr., clava Pfr. b. var., clavata Scheidw. (*rhapidacantha* Lem.), deficiens Schelh., erecta Lem., Lehmanni Otto, macrothele Mart., Plaschnickii Otto, Schlechtendalii Ehrenb., stipitata Scheidw. (*ancistracantha* Lem.), sulcimamma Pfr. H) Brachythelae acanthostephes Lehm., angularis Otto, arietina Lem., bihamata Pfr., brevimamma Zucc. (*depressa* Scheidw.), cirrhifera Mart., conoidea DC. (*inconspicua* Scheidw., *diaphanacantha* Lem.), conopsea Scheidw., cornifera DC. (*daimonoceras* Lem.), coronaria Haw., echinocactoides Pfr., Echinops Scheidw. (*oothele* Lem.), exsudans Zucc., gladiata Mart., grandiflora Otto ?, loricata Mart., Ludwigii Ehrenb., magnimamma Mart., Ottonis Pfr., pentacantha Pfr., pycnacantha Mart., radicans DC. (*impexicoma* Lem.), recurva Lehm., retusa Scheidw. (*sulcolanata* Lem.), scepontocentra Lem., subangularis DC., triacantha DC., uncinata Zucc. (*adunca* Hort.), b. iunciata. Darnach zu berichtigen S. 492 seq.

IV. Discocactus Pfr., insignis Pfr. (*Melocactus placetiformis* Lehm. S. 508.)

V. Echinocactus (S. 278 Sect. II.) caespiticius Pfr. (*Mammill. caespitic.* DC. Ech., *horripilus* Lem.), campulacanthus Scheidw., concinnus Schelh., coptonogonus Lem. (*interruptus* Scheidw.), Courantii Lem., denudatus Lk. et Otto, dolichacanthus Lem., Ehrenbergii Pfr., equitans Scheidw., erinaceus Lem., gibbosus DC., grandicornis Lem., horizontalis Scheidw. ? Hystrix DC. (*oxypterus* Zucc., *electracanthus* Lem., *lancifer* Rchb.), Jenischianus Pfr., mamulosus Lem., (*hypocrateriformis* Otto), micracanthus Schelh., minax Lem., Monvillii Lem., ornatus DC. (*holopterus* Miq., *Mirbelii* Lem.), pectinatus Scheidw. (*pectiniferus* Lem.), pentacanthus Lem., phyllacanthoides Lem., pumilus Lem. Scopa Lk. et Otto (*Cereus* Scopa S. 184) b. candidus, c. cristatus, suberinaceus Lem., subporrectus Lem., stellatus Scheidw., tenuiflorus Lk. Otto, tenuispinus Lk. et Otto, tetracanthus Lem. (*sessiliflorus* Hort.), tetraxiphus Otto, theionacanthus Lem., turbiniformis Pfr., Vanderaeyi Lem. etc.

VI. Astrophytum Lem. myriostigma Lem. (*Cereus Callicoe* Gal.).

VII. Echinopsis Zucc. (*Echinonyctanthus* Lem.), *Cerei globosi* Auct.), Echinocactus Sect. I. S. 278. campylacantha Pfr. (*Cer. leucanthus* Pfr., *Echinoc. leucanth.* Gill.), Zuccarini Pfr. (*Cer. tubiflorus* Pfr., die übrigen s. S. 278) (*denudatus* Lk. et Otto et *gibbosus* DC. gehören zu Echinocactus).

VIII. Pilocereus Lem., senilis Lem. (*Cer. senilis* DC.) S. 184.

IX. Cereus. A) Cereastri. alacriportanus Mart., albispinus Salm, aureus Salm, azureus Parm., candicans Gill. b. tenuispinus Pfr., chalybeus Otto (*polychaetus* Rchb.), chilensis Colla, clavatus Otto, coerulescens Salm, conicus Otto, Coryne Lk., crenulatus Salm, Curtisii Otto, deficiens Otto, dichroacanthus Mart., divaricatus Lam., Dyckii Mart., eburneus Salm

Cacteae

b. griseus, erectus Karw., eriophorus Otto, flavescens Otto, floccosus Otto, Forbesii H. Angl., fulvibarbis Otto, gemmatus Zucc., geometrizaus Mart., Gladiator Otto, (*pugioniferus* Lem.), gladiatus Lem., Haworthii DC., horridus Otto, Hystrix Salm, Jamacaru Salm (*laetevirens*, *glaucus*, *caesius* Hort.), lanuginosus Mill., lividus Pfr., lutescens Salm, marginatus DC., Moritzianus Otto, multangularis Haw., niger Salm, Olfersii Otto, peruvianus DC. b. monstrosus, Pfeifferi Parment., platygonus Otto, polychaëtus Rchb., polylophus DC., reductus Lk., repandus Haw., resupinatus Salm, Royeni Haw. b. armatus Otto, Russelianus Forb., Schomburgkii H. Berol., Seidelii Rchb., spinibarbis Otto, strictus Haw., strigosus Gill., subrepandus Haw., Terscheckii Parm., tenuis Pfr., tetragonus Haw., thalassinus Otto, tilophorus Pfr., undatus Lk. et Otto, virens DC., xanthochaetus Rchb. B) Polylophi. cinerascens DC. (*Deppei*), Ehrenbergii Pfr., leptacanthus DC., Maelenii Pfr., pentalophus DC., tuberosus Pfr. III. Opuntiacei. articulatus Pfr., ovatus Pfr., syringacanthus Pfr. IV. Protracti. acutangulus Otto, baxaniensis Karw., Bonplandii Parm., colubrinus Otto, laetus Salm, obtusus Haw., pellucidus Otto, pentagonus Haw., princeps H. Herbiopol., ramosus Karw., serpentinus Lag., tenellus Salm, tortuosus Forb., variabilis Pfr. E) Repentes. coccineus Salm, extensus Salm, flagelliformis Mill., flagriformis Zucc., grandiflorus Mill., humilis DC., inermis Otto, inversus Lk., leptophis DC., Mallisoni Hort. (Hybrid.), Martianus Zucc., Napoleonis Grah., nycticalus Lk., prismaticus Salm, pterogonus Lem., radicans DC., rostratus Lem. (*hamatus* Scheidw.), Schrankii Zucc., setaceus Salm, Smithii (Hybrid.), speciosissimus DC. b. Guillardieri, c. ignescens, d. Jenkinsonii, e. lateritius, f. Lothii, g. Makoyi, k. Roydii, i. Vandesii, spinulosus DC., triangularis Haw. b. pictus, triqueter Haw. Darnach zu berichtigen und zu ergänzen S. 182 etc.

X. *Phyllocactus* Lk. (*Cerei alati*, *Epiphyllum* Hort.) S. 294. Ackermanni Otto, Hookeri Otto, latifrons Zucc., oxypetalus DC., phyllanthoides Lk. (*Cactus alatus* W., *C. elegans* Lk., *Epiphyllum speciosum* Haw.), *Phyllanthus* Lk.

XI. *Epiphyllum* Herm. Haw. Pfr. Altensteinii Pfr., Russelianum Gard., truncatum Haw. b. coccineum.

XII. *Rhipsalis* G. Pfr. A) *Alatae*. crispata Pfr., pachyptera Pfr. b. crassior Salm, platycarpa Pfr., ramulosa Pfr., rhombea Pfr., Swartziana Pfr. (*Cactus alatus* Sw., *Epiphyllum alatum* Haw.). B) *Ramosae*. *Cassytha* G. etc. s. S. 684.

XIII. *Lepismium* Pfr. commune Pfr. etc. S. 455.

XIV. *Hariota* DC., *Hariote*, XII. 1., Cacteae, salicornioides DC., glasschmalzähnliche, f. w. Brasilien.

XV. *Opuntia leucosticta* Wendl. = megacantha, Parmentieri Pfr., phyllacantha Salm, pruinosa Mühlenpf., pulverulenta Pfr. Alle übrigen sind S. 563 aufgeführt.

XVI. *Pereskia* Plum. calandrinifolia Otto, lanceolata Otto. Die übrigen S. 607.

Caesalpinia macrantha H. Monspel., großblumige, ♀. w. Chili.

Cajophora lateritia Kl. = *Loasa lateritia*.

Caladium Baursea Rchb. v. *Philodendron crassinervium*.

Calliglossa Hook., Schönzügel, XIX. II., Compositae Corymbiferae.

Douglasii Hook. (*Oxyura chrysanthemoides* Hort., non DC.), Douglas's, ☉. f. Californien.

Callipeltis Cucullaria Stev. v. *Galium Cucullaria*.

Calomeria amaranthoides Vent. v. *Humea elegans*.

Camelina laxa C. A. Mey., lockerblumige, ☉. f. Caucas.

Camellia japonica Victoria o. Presley's Queen Victoria.

Caperonia Hilar., Caperonie, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.

castanaefolia Hilar., kastanienblättrige, ☉. w. m. f. Java.

palustris Hilar., sumpfliebende, ☉. w. m. f. Westind. Mex.

Caralluma crenulata Wall. (*Buclosia crenulata* Wighth. Arn.), gekerbte, ♀. 4. w. Ostindien.

Cassia schinifolia A. DC. = *Barclayana* Swt.

Cassinia Cunninghami DC. (*aculeata* et *patens* Cunn.), Cunningham's, ♀. t. Neuholland.

Catapodium Lk. v. *Sclerochloa*.

Cenia discoidea Less. = *Cotula nudicaulis* Thbg. S. 223.

Chaixia Myconi Lapeyr. v. *Ramonda pyrenaica*.

Chasmanthium Lk. v. *Uniola*.

Chelone barbata c. antwerpensis Hort.

Chorizema Baueri Benth., Bauer's, ♀. t. Neuholland.

diversifolium A. DC., verschiedenblättrige, ♀. t. Neuholl.

Manglesii Hügel, Mangles's, ♀. t. Neuholland.

varium H. Hügel, veränderliche, ♀. t. Neuholland.

angustifolium Benth. v. *Dillwynia glycinifolia*, *Baxteri* Grah. v. *Podolobium scandens*.

Chrysanthemum. I. Genuini.

caespitosum Weinm., rasenartige, 4. f. ?

lacerum Hort., schlitzblättrige, ♀. k. Canarische Ins.

mexicanum H. B. K., mexicanische, 4. k. Mexico.

pumilum W. (*Matricaria pyrethrifolia* Poir.), kleine, ☉. f. ?

umbrosum W., schattenliebende, ☉. f. Griechenland.

Unbestimmt: *daucifolium* P.

II. *Leucanthemum* T.

anomalum Lagasc., ungewöhnliche, 4. ♀. k. Spanien.

perpusillum Loisel. v. *Nananthe perpusilla*, *tingitanum* Bernh. (*praecox* Hort.) v. *Phalacrodiscus arvensis*.

Cineraria pulchella Swt., schöne, ♀. k. Canarische Ins.

pumila Thbg. (*humifusa* L'Her.), kleine, 4. ♀. k. C. d. g. H.

scapiflora L'Her., schaftblumige, 4. ♀. k. Cap d. g. H.

tussilaginoides Webb., huflattigähnliche, 4. ♀. k. Teneriffa.

β) *Waterhousiana* Paxt.

viscosa L'Her. (? *pandurata* Thbg.), schmierige, ♀. k.

Cap der guten Hoffnung.

Von vorstehenden existiren noch folgende Hybriden:

King, *Hendersonii*, *Hoffmannseggii* Rchb. etc.

Cipura Tigridia * (*Marica Tigridia* Lehm.), tigerblumenähnliche, 4. Zw. k. ?

Cirsium leucopsis DC., weißliche, 4. f. Olymp.

Wiedemannii Fisch. et Mey., *Wiedemann's*, ♂. f. ? Natolien.

Cladochaeta candidissima DC. v. *Helichrysum candidissimum*.

Clarkia Pursh. S. 202 *Onagrariae*.

Claytonia perfoliata, β) *californica* Fisch. et Mey.

Cleome fugax Schrad., hinfällige, ☉. ♀. w. ?

- Cnidium Petroselinum** DC. (*Peucedanum Petroselinum* Dsf.), silgenähnliches, 4. f. ?
- Codiaeum** Rumpf. Blum., *Codiaeum*, XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.
chrysostictum Sogl. (*pictum* Hook., *variegatum* Blum., *Croton pictum* Hort.), buntes, 5. w. Ostindien, China.
- Coelestina** ageratoides Cass., ageratumähnl. 4. k. Mexico.
coerulea Cass. (*corymbosa* DC., *Eupatorium coelestinum* L.), blaue, 4. f. Nordamerika.
micrantha Sogl. (*Ageratum coelestinum* Bot. mag., *Eupat. micranth.* Lagasc.), kleinblumige, 5. k. Neuspan.
- Coenolophium** K., Epperlein, V. II., Umbelliferae.
Fischeri K. (*Silaus longifolius* Fisch.), Fischer's, 5. 4. f. Sibirien.
- Colliguaja** Molin. (chilesischer Name), XXI. x., Tricoccae-Euphorbiaceae.
integerrima Gill. Hook., ganzblättrige, 5. k. t. Chili.
odorifera Molin. (*Croton Colliguaja* Sogl.), wohlriechende, 5. k. t. Chili.
- Conioselinum** Fisch., Bergsilge, V. II., Umbelliferae.
coenolophioides Turcz., epperleinähnliche, 5. f. Dahurien.
Czernaevia Fisch. et Mey. (vel *Czerniajevica*, *Czernaevia laevigata* Turcz.), glatte, 5. f. Dahurien.
dubium Turcz., zweifelhafte, 5. f. Dahurien.
Fischeri Wimm. et Grab. (*tataricum* Fisch., *Gmelini* Steud.), Fischer's, 4. f. Sibirien, Tatarei, Schlesien.
univittatum Turcz., einschleierige, 4. f. Dahurien.
- Conyza densiflora* Heyn. v. *Blumea longifolia*.
- Corethrostylis** Endl., Besengriffel, V. I., Malvaceae Büttneriaceae.
bracteata Endl., deckblättriger, 5. t. Neuholland.
- Cotula** microcephala DC. (*Cenia microcephala* E. Mey.), kleinköpfige, 5. 4. f. k. Cap der guten Hoffnung.
villosa DC., zottige, 5. f. Cap der guten Hoffnung.
- Courtoisia** daucifolia Rchb. v. *Collomia heterophylla*.
- Corraea** bicolor Hort., Grewillei, Harrisii, Milleri, longiflora, speciosa b. major, Stockwelliana et turgida Hort., sämmtlich Hybriden.
ferruginea Bot. mag., rostfarbige, 5. t. Neuholland.
- Cremocephalum** Cass. (*Crassocephalum* Mch.) v. *Senecio* Sect. III.
- Crepis rigens* Ait. v. *Microderis rigens*.
- Crotalaria** Sieberi Roem. v. Löth. (*C. spartioides* Tausch. non DC.), Sieber's, 5. k. t. Aegypten.
elegans Hort. v. *purpurea*.
- Crinum** Binsii Hffg. (? *Crinum submersum* Herb.), 4. w. Brasilien.
- Cupressus triquetra** Lodd. = *Callitris triquetra*.
- Cyclamen** aestivum Rchb. (*Clusii* W. Sm.), Sommer-E., 4. Kn. k. Oberitalien.
aleppicum Fisch., syrisches, 4. Kn. k. Syrien.
corniculatum H. Hügel, gehörntes, 4. Kn. k. Nordafrika.
ficariaefolium Rchb. (*hederaefolium* Hornem.), schöllkrautblättriges, 4. Kn. k. Schweiz, Dalmatien.
intermedium Wender., mittleres, 4. Kn. k. ? Südeuropa.
- Cyclosia maculata** Kl. v. *Mormodes pardina*.
- Cynthia** Dandelion DC. = *Krigia Dandelion* S. 440.
- Cyrtopera Woodfordii** Lindl. = *Cyrtopodium Woodfordii*.
- Cystopteris** Bernh., Blasenfarn, XXIV. I., Pterioideae.
aemula (Ait. Sw.), lieblicher, 4. t. w. Madeira.

- Cystopteris alpina** (Jacq. Sw.), Alpen-B., 4. f. Mitteleuropäische Alpen.
bulbifera Bernh., knollentragender, 4. f. Nordamerika.
dentata (Sm. Dicks.), gezahnter, 4. f. Schottland.
fragilis Bernh. (*Asp. regium, rhaeticum et dentatum* Hort.), gemeiner, 4. f. Europa, Nord- u. Südamer., Canar. Ins.
 β) *atomarium* W.
montana (Hänk. Sw.), Berg-B., 4. f. Nord- und mitteleuropäische Alpen.
regia (Sw.), königlicher, 4. f. England.
- Daboecia polifolia** D. Don, c) *nana*, d) *longifolia*, e) *latifolia*, f) *pallida*, g) *atropurpurea*.
- Dahlia acutiflora** Moc. et Sess. etc. s. *Georgina Cervantesii* etc., *Daucus pulcherrimus* Koch v. *Platyspermum pulcherrimum*.
- Deyeuxia aemula** Kunth v. *Agrostis aemula*.
- Dicrypta Baueri** Lindl. v. *Heterotaxis crassifolia*.
- Dimorphanthes aegyptiaca** Cass. etc. v. *Conyza aegyptiaca* etc.
- Dinema** Lindl., *Dinema*, XX. 1., Orchideae.
polybulbon Lindl. (*Epidendron polybulbon* Sw., *Bulbophyllum occidentale* Sogl.), vielzwiebelige, 4. Kn. w. Westindien.
- Diodia dasycephala** Cham. Schldl. (*Boreria advena* H. Petrop.), wolköpfige, 4. w. Brasilien.
- Diphyes pendula** H. Hügel v. *Bulbophyllum pendulum*.
- Diplochita** DC., Doppelweiderich, X. 1., Lythraeae.
Melastomeae.
albicans * (*Miconia albic.* Steud.), weißlicher, 5. w. Mexico.
Fothergilla DC., Fothergill's, 5. w. Südamerika.
macrophylla DC., großblättriger, 5. w. Mexico, Trinidad.
pyramidalis * (*Miconia pyram.* DC., *Chitonias pyram.* G. Don), pyramidal, 5. w. Westindien.
Swartziana DC. (*Chitonias Tamonea* G. Don), Swartz's, 5. w. Westindien.
- Dipteracanthus** p. 269. Zu dieser Gattung gehören noch: *ciliatus* N. E. = *Ruellia ciliata* Hornem. p. 705, *patulus* N. E. = *Ruellia patula* Jacq. (*aromatica* Roxb.), *pilosus* N. E., haariger, 4. k. t. Cap der guten Hoffnung.
- Diptera** Borkh. v. *Saxifraga*.
- Discopleura** DC., capillacea DC. = *Sison capillaceus* Sogl., S. 761, *costata* Steud. (*Ammi costatum* Ell., *D. capill.* DC.), 6. f. Nordamerika.
- Draba lasiopoda** Turcz., wollfüßiges, ♂. f. Baical.
rivularis Bernh. = *D. Liljebladii* S. 273.
B. Erophiola minima C. A. Mey., kleinstes, 6. f. Caucas.
- Dracopis** Cass. v. *Rudbeckia*.
- Drymaria ciliata** H. Berol., gefranzter, 4. w. Südamer.
gracilis Lk., 6. S. 270.
villosa Cham. Schldl., zottiger, 4. w. k. Mexico.
- Dysosmia foetida** DC. v. *Passiflora foet.*
- Ecballion** Rich., Spritzgurke, XXI. x., Cucurbitaceae.
Elaterium Rich. (*Ecbalium agreste* Rehb.), gemeine, S. 6. et 4. f. Griechenland, Taurien, Südeuropa.
- Echinacea intermedia** Penny, Hybride von *E. purpurea* et *serotina*.
- Eclopes** G. DC. v. *Relbania*.
- Emilia coccinea** Swt., *flammea* Cass. (*sagittata* DC.), etc. v. *Cacalia sagittata* etc.

- Epacris diosmaefolia** H. Angl., göttergeruchblättriger, $\S$. t. Neuholland.
incarnata Hffg., fleischfarbiger, $\S$. t. Neuholland.
Epidendron uniflorum Lindl. v. *Hormidium uniflorum*.
Eragrostis elegans N. E., (*brasiliensis* N. E.), zierliches, $\odot$. f. Brasilien.
purpurascens Lk. (*chinensis* Hort., *megapotamica* Schult.), $\odot$. f. Brasilien. S. 292.
spectabilis Steud. (Pursh.), ansehnliches, $\odot$. f. Nordamer.
Eremogone Fenzl., Wüstenmiere, X. III., Caryophyllaceae-Alsineae.
cucubaloides (Sm.), taubenkropffähnlich, 4. f. b. k. Armenien.
dahurica Fenzl., dahurische, 4. f. Dahurien.
dianthoides (Sm.), nelkenähnliche, 4. f. b. k. Armenien.
formosa Fenzl., schöne, 4. f. Ostsibirien.
holostea (MB.), spurrenähnliche, 4. f. Caucasus.
graminifolia Fenzl., grasblättrige, 4. f. Sibirien, Ungarn, Siebenbürgen.
gypsophiloides Fenzl., gypskrautähnliche, 4. f. b. k. Kleinasien.
juncea Fenzl., simsensförmige, 4. f. Sibirien.
longifolia Fenzl., langblättrige, 4. f. Sibirien.
nardifolia Fenzl., borstengrasblättrige, 4. f. Altai.
otitoides Fenzl., kleinblumige, 4. f. Sibirien.
rigida Fenzl., starre, 4. f. Podolien, Ukraine.
subulata Fenzl. (*Arenaria pungens* Steph., *subulata* Sering., *A. viscosa* Fisch.), pfriemenförmige, 4. f. Sibirien.
Erica Sect. IV. *gracilis* Wendl. (*neglecta* Don, *tenuissima* Wendl.), schlanke, $\S$. t. Cap der guten Hoffn.
 b) *autumnalis*.
imbecilla Swt. (*gracilis* Salisb. non Wendl.), schwächliche, $\S$. t. Cap der guten Hoffnung.
Erigeron maximus Otto = *Leptostelma maximum*.
Erucastrum heterophyllum *, verschiedenblättrige, $\S$. f. Spanien.
Euryops linifolius DC. = *Agathaea linifolia*.
Eugenia disticha DC. v. *Olynthia disticha*.
Euphorbia macrorrhiza C. A. Mey., grofswurzelige, 4. f. Altai.
trapezoidalis Viv. (*cyrenaica* Auct.), trapezenförmige, ? $\odot$. f. Nordafrika.
trigonocarpa Fisch. et Mey., 4. (nicht $\odot$).
splendens Boj. = *Breonii* Hort, *Milii* H. Par.
Faba porphyrea H. Dresd., porphyrfarbige, $\odot$. f. ?
Gaya Gaud. (J. Gay, französischer Botaniker), V. II., Umbelliferae.
simplex Gaud., einfache, 4. f. Schweizer, französische und italienische Alpen.
Geracium Rchb. v. *Crepis*.
Gnaphalium Candelabrum Hornem., armleuchterförmiges, $\odot$. f. ?
paniculatum Colla, rispiges, 4. k. Chili.
resedaefolium Trevir., resedenblättriges, $\odot$. f. Chili.
spicatum β . *Cruickshanksii* H. Petrop.
Vira-Vira Molin. (? *chilense* Spgl., *Piravira* Less., *Sprengelii* H. Arn.), chilesisches, $\odot$. f. Chili.
Gnaphalium cynoglossoides Trevir. v. *Antenaria triplinervia*.
Gomeza densiflora Hffg., dichtblumige, 4. w. Brasilien.
Gomphrena aggregata W. et *brasiliensis* Jacq., v. *Philoxeras aggregatus* et *brasiliensis*.

- Gymnandra** Pall, Kletschblume, XIV. II., Personatae Rhinanthaeae.
 Gmelini Cham. (*borealis* Pall., *ovata* W., *reniformis* W., *Bartsia Gymnandra* Pursh, *Lagotis glauca* G.), Gmelin's, 4. f. Nördliches Amerika, Kamtschatka.
integrifolia W. (*altaica* W., *borealis* Pall., *Pallasii* Cham. Schldl.), ganzblättrige, 4. f. Dahurien.
- Guadua** Kunth (südamerikanischer Name), VI. I. Gramineae.
latifolia Kunth, breitblättrige, 5. w. Südamerika.
- Gwillimia** Rottl. v. Talauma.
- Gymnocline leucocephala** Cass. (*macrophylla* Bl. et Fingerh.) v. *Pyrethrum macrophyllum*.
- Gymnosperma glutinosum** Less. v. *Selloa glutinosa*.
- Gypsophila effusa** Tausch. (*paniculata* Jacq.), haarstielige, 4. f. Ungarn, Mähren.
- Hacquetia** Neck. (B. Hacquet, der die krainerischen Alpen bereiste), V. II., Umbelliferae.
Epipactis DC., grünblumige, 4. f. Kärnten, Krain, Oberitalien, Mähren, Schlesien.
- Hariota** DC. v. Cactee des Nachtrags.
- Hedypnois persica** MB., persisches, ☉. f. Pers., Caucas.
- Hedysarum neglectum** Ledeb. v. *H. lasiocarpum* S. 379.
- Heleocharis Lereschii** Schuttleworth, Leresch's, ☉. f. Südliche Schweiz.
- Helianthemum lasiocarpum** H. Par. = *ledifolium*.
- Helichrysum viscosum** Sieb., schmierige, ☉. f. m. Neuholland.
- Helosciadium lateriflorum** K. (*leptophyllum* DC., *Pimpinella capillacea* Poit., *lateriflora* Lk. S. 624), ☉. f. Südamerika.
laciniatum DC., schlitzblättrige, ☉. f. Peru.
- Hemistephia** S. 389 satt *Hemistepia* = *Aplotaxis Bungei* DC.
- Heracleum barbatum** Ledeb. (? *Panaces* Ls.), bärtiges, ♂. f. Altai.
chorodanum DC. (*longifolium* MB., *austriacum* var. Stev.), caucasischer, ♂. f. Caucasus.
dissectum Ledeb. var. *camtschaticum*.
persicum H. Par., persisches, 4t f. Nordpersien.
Wilhelmsii Fisch. Lallem., Wilhelms's, 4. f. Iberien.
- Hermannia arabica** Steud. et Hochst., arabische, ☉. f. m. Arabien.
- Hernandia leucomphala** Hffg. (*Guettarda speciosa* van Eeden), weißliche, 5. w. ?
- Hertia crassifolia** Less. v. *Othonna crassifolia*.
- Heterothalamus** Less., Verschiedenbödler, XIX. II., Compositae Corymbiferae.
brunioides Less. (*Marshallia aliena* Spgl.), brunienähnlicher, 5. w. Brasilien.
- Hexacentris coccinea** N. E. v. *Thunbergia coccinea*.
- Hibiscus** Trionum, δ) *hispidus* H. Petrop., ε) *cordifolius* H. Petrop.
- Hieracium** S. II., Gronovii L., Gronov's, 4. f. Nordamerika.
marianum W. (*foliosum* Mchx.), maryländisches, 4. f. Nordamerika.
venosum L., aderiges, 4. f. Nordamerika.
- Himantoglossum** Spgl., Riemenzunge, XX. I., Orchideae.

- Himantoglossum hircinum** Spgl., Bocks-R., 4. Kn.
f. Mittel-, Süd- und Osteuropa.
antropophorum Spgl. v. *Aceras antropophora*, *cucullatum* Rchb. etc. v. *Gymnadenia cucullata* etc.
- Hippomarathrum crispum** K. (*Cachrys crispa* P., *longiloba* DC., *microcarpa* Stev. MB.?), krauser, 4. f. Caucasus, Palästina.
- Hladnikia** K. (Hladnik, Professor zu Laybach), V. II., Umbelliferae.
golacensis K. (*Athamanta Golaka* Hacq.), krainerische, 4. f. Krain.
pastinacifolia Rchb. v. *Falcaria latifolia*.
- Hollia** * (D. F. Holl, Lehrer der Pharmacie zu Dresden, welcher Portugal und Madeira in botanischer Hinsicht bereiste), V. I., Rhamneae.
africana *, afrikanische, ♀. k. Cap der guten Hoffn.
- Holophyllum** Less., Ganzblatt, XIX. I., Compositae-Corymbiferae.
capitatum Less., kopfförmiges, ♀. k. Cap der guten H. β) *punctatum* Less.
lanuginosum DC., wolliges, ♀. k. Cap der gut. Hoffn.
scabrum DC., scharfes, ♀. k. Cap der guten Hoffnung.
- Holosteum glutinosum** Fisch. et Mey., klebrige, ☉. f. Rußland.
- Homogyne** Cass. v. *Tussilago*.
- Hormidium** Lindl., Hormidie, XX. I., Orchideae.
uniflorum Lindl., einblumige, 4. w. Mexico.
- Hovea** Celsii β. *latifolia* H. Huegel.
trifoliata H. Hügel., dreiblättrige, ♀. t. Neuholland.
trisperma Benth. Hueg., dreisamige, ♀. t. Neuholland.
- Hyacinthus paradoxus** Fisch. et Mey., wunderbare, 4. Zw. f. Südrußland.
- Hyoscyamus varians** Vis., veränderlicher, ☉. f. Dalmatien.
- Hypochaeris Salzmanniana**, DC. (*dimorpha* Salzm.), Salzmann's, ☉. f. Nordafrika.
- Iberis neglecta** Tenor., übersehene, ☉. f. Neapel.
taurica DC. (*ciliata* W., *simplex* DC.), taurische, ☉. ♂. f. Taurien.
umbellata var., *speciosa* H. Petrop.
- Indigofera macrostachya** Vent., großblättriger, ♀. t. China.
- Isatis intermedia** Turcz., mittlerer, ☉. f. Südrußland.
microcarpa Gay, kleinfrüchtiger, ☉. f. Arabien.
- Ismelia frutescens** Less. v. *Chrysanthemum carnosulum*,
I. maderensis D. Don v. *Chrysanthemum pinnatifidum*,
I. versicolor Cass. v. *Chrysanthemum carinatum*.
- Isolepis hamulosa** Kunth (*Dichelostylis hamulosa* N. E.), feinhakiges, ☉. f. Südrußland.
Hystrix Kunth, sparrigspeliges, ☉. f. Cap der gut. H.
- Isotoma Brownii** G. Don, Brown's, ☉. ♂. f. k. Neuholl.
senecioides A. DC. = *axillaris*.
- Jasonia dichotoma** DC., zweizinkige, ♀. k. Canarische Inseln.
- Juncus pallidus** RB., bleiche, 4. k. Neuholland.
- Jurinea** Cass. *depressa* C. A. Mey., niedergedrückte, 4. f. Caucasus.
moschata DC., moschusduftende, 4. f. Neapel.
stoechadifolia DC., stoechasblättrige, 4. f. Taurien.

- Jussieuia longifolia** DC., langblättrige, ☉. f. f. m. w. Brasilien.
- Justitia speciosa** Roxb. S. 435 ist unter IX. Peristrophe zu stellen.
- Kalbfuscia** Schultz (Kalbfuß, Freund des Herrn Schultz), XIX. 1., Compositae - Cichoriaceae.
 Mülleri Schultz, Müller's, ☉. f. Sardinien.
 Salzmanni Schultz, Salzmann's, ☉. f. Nordafrika.
- Kennedyia Comptoniana** Lk. muß unter Hardenbergia gestellt werden, S. 436.
cordata Lindl. (*Hardenbergia cordata* Benth.), herzblättrige, f. Sch. t. Neuholland.
dilatata Cunn. muß unter Zichya gestellt werden.
inophylla Cunn. desgl.
heterophylla Mack. et parviflora Mack. unter I. Genuinae.
 ? *inconspicua* Hort., unansehnliche, f. t. Neuholland.
lucida Hügel, schimmernde, f. Sch. t. Neuholland.
tomentosa Hügel, filzige, f. Sch. t. Neuholland.
trilobata Hügel, dreilappige, f. Sch. t. Neuholland.
Sieberiana Hort. vid. *Leptolobium microphyllum*,
Stirlingii Lindl. v. *Physolobium Stirlingii*.
- Kentrophyllum leucocaulon** DC. (*album* Cass.), weisstengeliger, ☉. f. Griechenland.
- Knautia collina** Coult. (Req.) (*Scabiosa collina* Req., S. *hirsuta* Lapeyr.), Hügel-K., ♂. f. Südfrankreich.
- Kirschlegeria lycioides** Hffg. v. *Fuchsia lycioides*.
- Kotschyia** Endl. (Kotschy, österreichischer Botaniker u. Reisender), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
africana Endl., afrikanische, f. k. Nordafrika.
- Kreysigia multiflora** Rchb. = *Schelhammeria undulata* RB. (non S. multiflora RB.).
- Kruberia leptophylla** Hoffm. v. *Ulospermum dichotomum*.
- Krynitzkia** Fisch. et Mey. (Krynitzki, ehemaliger Professor an der Universität zu Charkow), V. 1., Asperifoliaceae.
leiocarpa Fisch. et Mey. (*Echinosperrum leiocarpum* Fisch. et Mey. S. 280) glattfrüchtige, ☉. f. Neucaliforn.
- Ktenospermum** Lehm., Kammsame, V. 1., Asperifoliaceae.
linifolium Lehm. (*Cynoglossum lateriflorum* Hort.), gleichbreitblättriger, ☉. f. ?
- Kunzea** Rchb. v. *Stenospermum*.
- Kunzia tridentata** Spgl. v. *Purshia tridentata*.
- Lachnagrostis** Trin., Straußrohr, III. II., Gramineae.
aemula Trin. = *Agrostis aemula* S. 25.
Billardieri Trin., Billardiere's, 4. k. Neuholland.
Forsteri Trin. (*Ag. novae hollandiae* RB.), Forster's, 4. k. Neuzeeland.
plebeja Trin. (*retrofracta* Trin.), zurückgeknicktes, 4. k. Neuholland.
- Lactuca undulata** Ledeb., wellenblättriger, ☉. f. Altai.
- Lasiagrostis** Lk. v. *Stipa*.
- Lasiandra argentea** DC., *coerulea* Rchb. v. *Pleroma holosericea* et *heteromalla*.
- Lallemantia** Fisch. et Mey. (J. L. E. Avé Lallemant, Mitdirector am kaiserlichen botanischen Garten zu Petersburg), XIV. 1., Labiatae.
canescens Fisch. et Mey., *iberica* Fisch. et Mey., *peltata* Fisch. et Mey. = *Dracocephalum canescens* L. etc. S. 274.

- Lasiochloa** Kunth., Wollspelze, III. II., Gramineae.
adscendens Kunth, aufsteigende, ☉. f. Cap der g. H.
ciliaris Kunth, gefranzte, ☉. f. Cap der guten Hoffn.
hirta Kunth, rauhe, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.
hispida Kunth, steifhaarige, ☉. 4. f. k. Cap d. g. H.
villosa Kunth, zottige, ☉. ? 4. f. k. Cap der gut. H.
- Lasiopetalum** *corylifolium* H. Kew., haselnufsblät-
 terige, ♀. t. Neuholland.
leucanthum Hügel, weifsblumige, ♀. t. Neuholland.
- Lasiospermum** *crithmifolium* G. Don, meerfenchel-
 blätteriger, 4. k. Macedonien.
eriospermum G. Don, wollsamiger, Italien.
alpinum Rchb. = *L. pedunculare*.
- Lavandula** *pubescens* Decaisn. Fresen., weichhaariger,
 ♀. k. Sinai.
- Leontopodium** *sibiricum* Cass. DC., sibirisches, 4.
 f. b. Dahurien, Mongolei.
- Lepidium** *Bonannianum* Tenor., Bonanni's, ☉. f. Neapel.
decumbens Desv. = ? *micranthum* Ledeb.
Ecklonii Schrad., Ecklon's, 4. ♀. k. Cap d. gut. Hoff.
- Lepidium** *vesicarium* L. (*angulosum* Urvill.), blasige,
 ☉. f. Mittelasien.
sibiricum Schweig. v. affine.
- Lepigonum** *canadense* Fisch. et Mey. etc. v. *Alsine* ca-
 nadensis etc.
- Leptochloa** *arabica* Kunth v. *Dineba aegyptiaca*.
- Leptolobium** Benth. (*Kennedynella* Steud.), Schlank-
 bohne, XVII. IV. (VI.), Leguminosae Papilionaceae.
microphyllum Benth., kleinblätterige, ♀. Sch. t. Neuholl.
tomentosum Benth., filzige, ♀. Sch. t. Neuholland.
- Lepyrodia** *elongata* Spgl. v. *Restio lateriflorus*.
- Leucopsidium** DC., Weiskräutel, XIX. II., Compo-
 sitae Corymbiferae.
arkansanum DC., arkansanisches, ☉. f. Nordamerika.
Leucostemma vestitum Benth. v. *Helichrysum vestitum*.
- Libanotis** *buchtormensis* DC. = *Seseli buchtormense*
 S. 749.
daucifolia Rchb. (*vulgaris* γ. DC.), möhrenblätterige,
 4. f. Krain.
- Ligularia** *geifolia* DC. (*reniformis* DC.), nelkenwurz-
 blätterige, 4. f. Caucasus, Nepal.
Reichenbachii Steud. (*Hoppea speciosa* Rchb.), Reichen-
 bach's, 4. f. ?
speciosa Fisch. et Mey. (*L. sibirica* δ. *speciosa* DC.,
Cineraria Fischeri Ledeb., *C. speciosa* Fisch. Schrad.),
 prächtige, 4. f. Sibirien.
thyrsoidea DC. (Ledeb.), straufsblumige, 4. f. Altai.
- Lilium** *Szovitsianum* Fisch. et Lallemand, Szovits's, 4. Zw.
 f. Colchis.
- Linaria** *albifrons* Spgl., weifsblätteriger, ☉. f. Rhodus.
aparinoides Chaub., aparinenähnlicher, ☉. f. Orient.
armeniaca Chaub., armenischer, ? ☉. ♂. f. Armenien.
corifolia Dsf., corisblätterige, 4. f. Orient.
Perezii Gay., Perez's, ☉. f. ?
- Lindenbergia** Lehm. (*Brachycoria* Schrad.) (J. B.
 W. Lindenberg, Amtsverwalter zu Bergedorf, Bearbei-
 ter der europäischen Lebermoose), XIV. II., Perso-
 natae Antirrhineae.
urticaefolia Lehm., nesselblätterige, ☉. f. Nepal.

Lithosciadium Turcz., Steinepperlein, V. II., Umbelliferae.

multicaule Turcz., vielstengeliges, ♂. f. Sibirien.

Lobelia I. **Centropogon** Doniana * (*Siphocampylus bicolor* D et G. Don), Don's, 4. h. w. Georgia.

Sect. VI. *L. ignea* Hort. = Schiedeana.

Loethainia * (R. B. von Römer auf Löthain und Neumark in Sachsen, Mitglied der königl. sächsischen Ständekammer, einer unserer ausgezeichnetsten Botaniker), XVII. IV. (XVI. VI.), Leguminosae Papilionaceae.

obcordata * verkehrtherzblättrige, h. k. t. Cap der guten Hoffnung.

sericea * seidenhaarige, h. k. t. Cap der guten Hoffn.

Lomatocarpum Fisch. et Mey., Saumdoide, V. II., Umbelliferae.

alpinum Fisch. et Mey. (*Seseli alpinum* MB.), Alpen-S., ♂. f. Caucasus.

Lomatogonium v. Braune, Saumnarbe, V. I., Contortae-Gentianeae.

carinthiacum v. Braune, kärnthnische, ☉. f. Kärnthen, Tyrol, Schweiz etc.

Lophanthus chinensis Benth. = obtusifolius S. 477.

Lotus glinoides Delil., glinusähnlicher, ☉. f. Aegypten.

Lowea berberifolia, a) glabra Sering., b) velutina Sering., c) Redoutéana Sering. (*Rosa simplicifolia* Salish.)

Lychnanthus volubilis Gmel. v. Cucubalus baccifer.

Lychnis I. Genuina, decumbens Steud. (*Agrostemma decumbens* Dens.), niederliegende, 4. f. ?

Densoni Steud. (*Agrostemma perennans* Dens.), Denson's, 4. f. ?

Sect. III.

divaricata Rehb., ausgespreizte, ♂. f. Sicilien.

nemoralis Heuff., Hain-L., 4. Ungarn, Banat.

Lyonetia rigida DC., starre, ☉. f. Griechenland.

Malachium Fr. Weichmeier, X. v., Caryophyllaceae Alsineae.

aquaticum Fr., wasserliebender, 4. f. Europa.

manticum Rehb., mantischer, ☉. f. Süd- und Osteuropa.

Matricaria disciformis DC., scheibige, 4. f. Caucasus. nigellaefolia DC., schwarzkümmelblättrige, ☉. f. Cap der guten Hoffnung.

Medicusia Mch. (C. Medicus, churpfälz. Rath, Botanicus u. Gartendir.), XIX. I., Compositae Cichoriaceae.

aspera Mch. = *M. Sprengeriana* Rehb. = *Picris altissima* Ledeb. *Picris Sprengeriana* Lam. *M. lapacea* Rehb. = *Picris pauciflora* W. (*strigosa* Hort. *Crepis Sprengeriana* All.)

Melaleuca foliosa Hort. = diosmaefolia.

Melanoselinum Hoffm., Schwarzsilge, V. II., Umbelliferae.

decipiens Hoffm. (*Bubon Galbanum* Hort.), täuschende, 4. k. Madeira.

Seguieri Swt. vid. *Ligusticum Seguieri*.

Melhania ovata Spgl. vid. *Pentapetes ovata*.

Melinis P. B., Drüsengras, III. II., Gramineae.

minutiflora P. B. (*Agrostis glutinosa* Fisch.), kleinblüthiges, 4. w. Brasilien.

Microglossa DC., Kleinzunge, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.

- Microglossa volubilis* DC. (*Microglossum proliferum* DC. Vol. v. p. 396), §. Sch. w. Java.
- Miegia maritima* W., vid. *Remirea maritima*.
- Mimulus moschatus* Dougl., moschusduftende, 4. k. f. b. Columbia.
- zonatus Rchb., umgürtete, 4. k. ?Hybride.
- Mocanera* Juss., *Mocanera* XI. iv., Sopotaceae - Ebenaceae.
- canariensis, * canarische, §, k. Canarische Inseln.
- Mogiphanes brasiliensis* Mart. = *Philoxeros brasiliensis*.
- Monochilus* Fisch. et Mey., statt *Menochilus* S. 510.
- Moraea chinensis* Thbg. vid. *Pardanthus chinensis*.
- Mulgedium multiflorum* DC., vielblumiges, ?⊙. 4. f. Nordamerika.
- Myogalum* Lk. vid. *Ornithogalum*.
- Nananthea* DC., Zwergmaßliebe, XIX. ii., Compositae Corymbiferae.
- perpusilla DC. (*Chrysanthem. perpusillum* Lois.), kleinste, ⊙. f. Corsica, Sardinien.
- Nardurus* Rchb. vid. *Vulpia*.
- Nemaconia graminifolia* Knowl. et Westc. vid. *Ponera graminifolia*, s. *juncifolia* Lindl.
- Nepeta madagascariensis* Lam. v. *Plectranthus rotundifolius*.
- Nycterinia gracilis* (Lehm.), schlanke, §, k. t. Cap der guten Hoffnung.
- Ornithogalum* S. I. arcuatum Stev., bogenförmige, 4. Zw. Caucasus.
- Ecklonii Fisch. et Mey, Ecklon's, 4. Zw. k. Cap d. g. H. spirale Hffg., spiralförmige, 4. Zw. k. Cap d. g. Hoff.
- Othonna cylindrica* DC., cylinderförmige, §. k. Cap der guten Hoffnung.
- Pachypleurum simplex* Rchb. v. *Gaya simplex*.
- Palicourea apicata* H. B. K., spitze, §. W. Caracas.
- Palimbia Chabraei* DC., *salsa* Bess. vid. *Peucedanum Chabraei* S. 610. et *salsum* Nacht.
- Papaver aculeatum* Thbg. = *P. garepinum*.
- Pentameris* P. B. Pentamerie III. ii., Gramineae.
- airoides N. E., schmielenähnliche, ⊙. f. Cap d. g. Hoff.
- curvifolia N. E., krummblättrige, 4. k. Cap. d. g. Hoff.
- glandulosa N. E., drüsige, 4. k. Cap. der gut. Hoff.
- macrantha N. E., großblumige, 4. k. Cap. d. g. Hoff.
- micrantha N. E., kleinblumige, 4. k. Cap d. g. Hoff.
- papillosa N. E., warzige, 4. k. Cap der guten Hoff.
- stricta N. E., steife, 4. k. Cap der guten Hoff.
- Thouarsi P. B., Thouar's, 4. k. Cap der guten Hoff.
- Peristylus albidus* Lindl. etc. v. *Gymnadenia albida*.
- Pentapera* Kl., Pentapere, VIII. i., Ericaceae.
- sicula Kl., sicilianische, §. k. Sicilien.
- Peucedanum salsum* Steud., Salinen - H. 4. f. Süd- und Ostrufsland.
- Phalerocarpus serpyllifolius* G. Don. statt *hispidulus* S. 612.
- Phleum ambiguum* Tenor. = *Phleum Michelii*.
- Phoenixopus* Cass. (*Phaenopus* DC. *Lygodesmia* Don.), Ruthensalat, XIX. i., Cichoriaceae.
- Phoenixopus vimineus* Rchb. (*decurrens* Cass.), kleberiger, ♂. f. Mittel- und Südeuropa.
- β) *ramosissimus* Rchb.

- Sogalgina balbisioides* Cass. et *triloba* Cass. v. *Galinsogea balbisioides* et *trilobata*.
- Physalobium** Benth., Blasenbohne, XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
Stirlingii Benth., Stirling's-B., Sch. t. Neuholland.
- Pinardia anisocephala* Cass. etc. v. *Chrysanthemum viscosum* etc.
- Pluchea** Cass., *Pluchea*, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
balsamifera Lef. (*Blumea balsam.* DC.), balsamische, 4. $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
bifrons DC., zweiflügelige, 4. k. Carolina.
camphorata DC., campherduftende, ☉. f. Nordamerik.
sagittalis Less., pfeilförmige, $\frac{1}{2}$ t. Monte Video.
subdecurrens Cass. = *Baccharis adnata* S. 109.
- Pterocaulon** Ell., Flügelstengel, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
virgatum DC., ruthenförmiger, $\frac{1}{2}$ w. Caribaen.
- Pyrethrum** Clusii Fisch., Clusius's P., 4. f. Ungarn, Oesterreich.
- Pyrhopappus** carolinianus DC. = *Barkhausia caroliniana*.
- Rhododendron** arboreum hybridum: *Emma belgica*, triumphans *Gandavensis* nov. *bicolor*, resplendens, rubescens *grandiflorum*, *atrorubens* *superbum*, *rubrum elegans*, *flammeolum* Hort. belg., *Reichenbachianum* Hort. bot. Dresd.
- Sabulina* Rchb. v. *Arenaria*.
- Sarothamnus** Wimm. et Grab., Besenstrauch (ginster), XVII. IV. (VI.), Leguminosae-Papilionaceae.
scoparius Wimm. et Grab., *vulgaris* Wimm. (*Genista scoparia* Lam., *Sp. scoparium* L.), gemeiner, $\frac{1}{2}$ f. Europa.
- Schizogyne** Cass., Spaltstiel, XIX. II., Compositae-Corymbiferae.
glaberrima Cass., kahler, $\frac{1}{2}$ k. Canarische Inseln.
sericea DC. (*obtusifolia* Cass.), seidenhaariger, $\frac{1}{2}$ k. Canarische Inseln.
- Scilla** Sect. II. *patula* Redout. (*campanulata* β . minor Ker.), ausgebreitete, 4. Zw. f. Süd- u. Westeuropa.
- Secale** creticum L. (*Triticum* c. R. et S., *Hordeum Sieberianum* Bess.), cretischer, ☉. ♂. f. Creta, Corsica.
- Senecio** Sect. I. *auratus* DC. (*Cineraria aurea* L.), goldfarbiges, 4. f. Sibirien.
lampsanoides DC. (*Cinerar. parviflora* MB.), rainkohlähnliches, 4. f. Caucasus.
 Sect. II.
deltoideus DC., deltaförmiges, 4. Sch. k. Cap. d. g. Hoff.
oliganthus, wenigblumiges, $\frac{1}{2}$ k. Cap der guten Hoff.
 Sect. V. *Gynura*.
ovalis DC., eiförmiges, $\frac{1}{2}$ w. Ostindien.
- Serratula pulchella** Sims. v. *Saussurea pulchella*.
- Simocheilus** Benth. Genst., VIII. I. (IV. I.) Ericaceae.
bicolor Benth., zweifarbiges, $\frac{1}{2}$ t. Cap der gut. Hoff.
depressus Benth. = *Blairia depressa* S. 124.
glabellus Benth. = *B. glabella* S. 124.
- Simsia** cordata Cass., herzblättrige, 4. k. Mexico.
ficifolia P., feigenblättrige, ☉. t. Mexico.
heterophylla DC., verschiedenblättrige, 4. w. Mexico.
heterophylla P. v. *Echinacea heterophylla*.

Succisa L. *Cephalaria*.

procera (Fisch. Lallemand.), hohe, 4. f. Natolien.

Talauma Rumphii Blume (*Magnolia Rumphii* Speg.
Sampacca montana Rumph. *Liriodendron liliifera* L.
Gwillimia Rottb.), Rumph's T., 5. w. Molucken.

Tetrapoma Krusianum Fisch. et Mey., Kruse's, 3. ♂.
f. Ostsibirien.

Verbena biserrata H. B. K., doppelsägiges, 4. f. k.
Mexico.

Vernonia montevidensis Hort., montevideische, 5. k.
t. Montevideo.

rigida Sw., starre, 5. w. Jamaika.

tournefortioides H. B. K., tournefortiaähnliche, 3. w.
m. Südamerika.

Veronica ceratocarpa C. A. Mey, hornfrüchtige, 3. f.
Südrussland.

Nachschrift.

Indem ich dem verehrten Publicum den Schluss dieses Werkes in der Hoffnung übergebe, daß dasselbe einem längst gefühlten Bedürfnis im praktischen Gartenleben theils seiner Einrichtung, theils seines Preises wegen genügen möge, sei es mir erlaubt, noch Einiges über die Einrichtung des Buches zu bemerken. Da während der Arbeit der Stoff (wie es bei den jetzigen Bestrebungen der Zeit nicht anders möglich sein kann) sich mehrte, so konnte mit Aufführung der Synonyme in angefangener Weise nicht fortgefahen werden; es wurde daher der Raumersparnis wegen gewöhnlich nur eine Art (z. B. *Marrubium acetabulosum* etc.) als Synonym aufgeführt und durch etc. darauf hingewiesen, daß die übrigen, zu derselben anderen Gattung gebrachten Arten denselben Trivialnamen wie bei der alten Gattung fortführten; Ausnahmen sind jedesmal angegeben, zuweilen jedoch bei den wenig in Gärten circulirenden Synonymen ist nur auf die Gattung selbst verwiesen. Der Autor, in Parenthese beigefügt, gilt gewöhnlich für Bestimmung der Art, nicht der Gattung; da aber stets Arten zu anderen Gattungen gebracht werden, je nach Ansichten oder wissenschaftlichen Untersuchungen, so sucht man durch diese Einrichtung das Andenken des Entdeckers oder Bestimmers der Species zu bewahren. Da so manche neue Gattungen im praktischen Gartenverkehr noch nicht recht Eingang finden wollen, so habe ich es vorgezogen, sie als Untergattungen oder Sectionen aufzuführen, wo der Name des alten Autors unbeschadet bei der Art stehen bleiben und man sich den anderen, sowie er bei der neuen Gattung genannt ist, bei jeder Art noch hinzudenken kann, man vergl. z. B. *Lobelia*, *Erica* und dergl.; ich wünschte, ich hätte das noch bei mehreren Gattungen, wie z. B. *Andromeda* und dergl., gethan. Einiges hin und wieder zu ändern habe ich mir erlauben müssen, und dieß mit einem * bezeichnet, denn bei der Menge der vorkommenden, sich täglich mehrenden Gegenstände, bei den öfteren Verwechslungen, ja bei dem regen Schaffen in dieser Wissenschaft überhaupt, wird jeder Botaniker und gebildete Gärtner in die unausbleibliche Nothwendigkeit versetzt werden (d. h. einem nothwendigen Uebel nicht entgehen können), hier und da einen anderen Namen geben oder wählen zu müssen, eine Art oder Gattung anders zu stellen u. s. w. *Willemetia* und *Wiborgia* waren als Gattungen in den beiden klassischen Floren Koch's

und Reichenbach's schon vergeben und sind gleichsam eingebürgert, *Cyanopsis* DC. kann zu leicht mit *Cyamopsis* verwechselt werden, *Visnea* konnte nicht bleiben, es ist ein verhunzter Name, wir haben dafür schon *Vismea* (nach Herrn von Visme, nicht *Visne* in Lissabon); ich wählte daher den Namen Jussieu's *Mocanera*, und durch die vorher genannten, dann von mir veränderten Namen habe ich gesucht das Andenken einiger würdigen sächsischen Botaniker zu verewigen. Ich hoffe, daß man dieß entschuldigen wird. Da das Buch die anfänglich bestimmte Bogenzahl ohnedieß schon weit überschritten hat, und die vierte Lieferung bei Weitem stärker als die übrigen geworden ist, so konnte im Nachtrage doch nicht alles Neue, was in diesem Jahre oder während des Druckes mir bekannt geworden, mit aufgenommen werden, doch werde ich das Fehlende in einem zweiten Nachtrage baldigst nachliefern. Schließlich sage ich noch allen denjenigen Herren, die mich mit literarischen Hilfsmitteln oder sonstigen Nachweisen unterstützt haben, meinen innigsten, herzlichsten Dank und bitte, diese Arbeit nachsichtsvoll aufzunehmen und zu beurtheilen.

Dresden, den 6. Juli 1841.

Gustav Heynhold.