1841

FIGURES

De

Champignons

Servant de Supplément

aux planches de Bulliard

Esquintes d'après nature & lithographiques

Par J. B. L. Letellier D.M.D.

ex naturaliste voyageur au Muséum, membre
correspondant de la Société d'Histoire Naturelle
de Paris.

SECONDE ÉDITION

8 Livraison Prix { En Noir 1.^s "
Fig coloriées 2.^s 75^c

à Paris chez Meilhac, Libraire, Rue du Cloître St Benoît, 10.
1841

Imp. J. B. de Cesson

AGARIC RUTILE. *Agaricus Rutilus*. Fries. — *Gomphus*. Deesoon.

Imp. 1578 de Coulon.
BOLET GRANULÉ. *Boletus Granulatus*. Linné, Fries.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC PHYLLOPHILE *Agaricus Phyllophile* Persoon. Fries.

Lith. de Coulon

BOLET A TUBES COURTS. *Boletus Brachyporus*, Persoon.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Dess. lith. de Rostk.

Fig. 1 THÉLÉPHORE COULEUR DE CHAIR *Thelophora Incarnata* Pers. FriesFig. 2. THÉLÉPHORE DU SUREAU. *Thelophora Sambucina* Pers. Cretacea var. b FriesFig. 3 THÉLÉPHORE SÉBACÉE. *Thelophora Sebacea* Pers. Incrustans. Fries

Imp. libr. de Coulon.

AGARIC PRÉCOCE. *Agaricus Præcox*. DeCusson. Fries.

Fig. 1

Fig. 2

Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1. PÉZIZE ÉLÉGANTE. *Peziza Concinna*.Fig. 2. PÉZIZE FASCICULÉE. *Peziza Fascicularis*, Fries. *Populnea*, Persoon.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC EXCORIÉ. *Agaricus Excoriatius* Fries.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC DES CAVES. *Agaricus Cyprarum*. Setellier.

Imp. lith. De Coulon

BOLET A PIED ROUGE. *Boletus Lucidus Erythropus*, Persoon. Fries.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1. CÉNANGIE DU PIN. *Cenangium pinastri*. Fries. *Pexiza pinastri*. Desoon
 Fig. 2. CÉNANGIE EN CALICE. *Cenangium caliciforme* Fries. *Triblidium caliciforme*. Desoon
 Fig. 3. CÉNANGIE FERRUGINEUSE. *Cenangium ferruginosum*. Fries. *Triblidium pineum*. Desoon

Imp. lith. de Coulon.

BOLET DOUX. *Boletus dulcis*. Pezom.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1. PÉSISE TROMPEUSE. *Tezixa Fallax* Desj. *Albo-violascens* Fries.Fig. 2. PÉSISE DE LA ROSE. *Tezixa Rosæ* Desj. *Fries*.Fig. 3. PÉSISE BRUNE. *Tezixa Fusca* Desj. *Fusca b* Fries.Fig. 4. PÉSISE EN ÉCUELLE. *Tezixa Scutula* Desj. *Fries*.

Les espèces 1, 3, m'ont été données par M. Desj.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC RUSSULE. *Agaricus Russula*. Fried.

Imp. lith. de Coulon

AGARIC BICOLLETÉ. *Agaricus arachnospilus*. Letellier.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC CANNELLE variété a. *Agaricus cinnamomeus* var. *Semi-Tarquinia*. Fries.

Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1 UREDO À POINTE *Uredo Apiculata* Chevallier. *Thaëseolorum* Decandolle. *Appendiculata* Persoon.

Fig. 2 UREDO À APPENDICE *Uredo Appendiculata* Persoon. *Pisi* Decandolle.

Fig. 3 UREDO DES LÉGUMINEUSES *Uredo Leguminosarum* Chevallier *Fabæ* Persoon.

Fig. 4 UREDO DES ROSIERS *Uredo Rosæ* Dec. a, var. α. b var. β *Uredo miniata* Persoon.

Imp. lib. de Coulon.

Fig. 1. ÉCIDIE ÉPAISSE. *Acidium Crassum* Persoon.Fig. 2. ÉCIDIE DE LA BOURGÈNE. *Acidium Rhamni*. Persoon.Fig. 3. ÉCIDIE DU CHÈVREFEUILLE DES BOIS. *Acidium Toxicum* Chevallier. *Xylostei* Decandolle.Fig. 4. ÉCIDIE À QUATRE DENTS. *Acidium Quadrifidum*. Decandolle. Donné par M. Persoon.

Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1. UREDO BLANCHE *Uredo candida*, Persoon. *cruciferarum*, Decandolle.Fig. 2. UREDO VIOLETTE *Uredo Violacea*, Persoon. *antherarum*, Decandolle.Fig. 3. UREDO DES OMBELLIFÈRES. *Uredo umbellatarum*, Chevallier. *cicute* Decandolle.Fig. 4. UREDO DE LA JOUBARBE. *Uredo sempervivi*, Chevallier. *fedi* Decandolle.

Imp. lith. de Coulon.

- Fig. 1. ÉRINÉE DES PEUPLIERS. *Cineum populinum*, Persoon.
 Fig. 2. ÉRINÉE DU PEUPLIER NOIR. *Cineum populi nigra*, Letellier.
 Fig. 3. ÉRINÉE POURPRE. *Cineum purpureum*, Decandolle.
 Fig. 4. ÉRINÉE DORÉE. *Cineum aureum* Persoon.

Insp. Lill. de Coulon.

AGARIC VOLVACÉ, 1^{re} Edition. { a. AGARIC GLUANT. *Agaricus gloiocephalus* Decandolle Fries.
 { b. d. AGARIC À TÊTE SOYEUSE. *Agaricus Texicocephalus* Setellier.

Imp lith de Coulon.

AGARIC PAUME . *Agaricus volemus*. Fries.

Imp. lith de Coulon.

AGARIC COLOMBETTE. *Agaricus colymbetta*. Fries. *albus* Persoon. (sed Sapor non virosus.)

A

B

Imp. M. de Coulon.

POLYPORE RAMEUX. *Polyporus ramosus* Persoon. *Boletus ramosus* Bulliard Pl. 418
 Sur des poiriers vivants

Imp. lith de Coulon.

Fig. 1. ÉRINÉE DU NOYER. *Eriophyes Juglandinum*. Persoon.

Fig. 2. ÉRINÉE DE LA VIGNE. *Eriophyes Vitis*. Persoon.

Fig. 3. ÉRINÉE DU TILLEUL. *Eriophyes Tiliaceum*. Persoon.

Insp. D.B. de Coulon.

POLYPORE MIE DE PAIN. *Polyporus Medulla panis*. Tensho, Fries

Fig. 1. RHYTISME EN POINTS. *Rhytisma punctatum*. Fries.

Fig. 2. RHYTISME DES ÉRABLES. *Rhytisma acerinum*. Fries.

Fig. 3. RHYTISME DES SAULES. *Rhytisma salicinum*. Fries. α var. *umbonata*.

Fig. 4. RHYTISME EN RICCIE. *Rhytisma riccioides* Letellier. Donné par M. Steinheil

Imp. Lib. de Coulon.

Fig. 1. ATHÉLIE LISSE. *Athelia lavis*. *Thelephora lavis* FriesFig. 2. ATHÉLIE BLEUE. *Athelia caerulea* Chevallier. *Thelephora caerulea*, Decandolle, Fries.Fig. 3. ATHÉLIE ROSE. *Athelia rosea* Chevallier. *Thelephora rosea*, Persoon, Fries.Fig. 4. ATHÉLIE CITRINE. *Athelia citrina* Persoon. *Thelephora sulphurea* Fries.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC INSIDIEUX *Agaricus Insidiosus*, Tschellier.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC ATTÉNUÉ *Agaricus Attenuatus* Decandolle

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC DÉLICIEUX. *Agaricus deliciosus*. Linné. Fries.

Imp. lith. de Coulon

AGARIC ANOMALE COURBÉ. *Agaricus anomalus incurvus*. Frés

Imp. lith. de Coulon.

SPOROTRIC SPORULEUX: *Sporotrichum sporulosum*. Persoon

Fig. 1. Variété blanche. Fig. 2. var. jaune, *Sporotrichum vitellinum*. Link. Fries

Fig. 3 passage des var. précédentes aux suivantes, *Sporotrichum flavissimum*. Link. Fries.

Fig. 4 variété rose, *Aleurisma crubescens*, Nees, Fries. Fig. 5. var. rouge. *Sporotrichum ruberrimum*. Fries.

Ampl. lib. de Coulon.

Fig. 1 SCLÉROTE DU PEUPLIER. *Sclerotium populinum*. Terson. Fries.

Fig. 2 SCLÉROTE DU BOULEAU. *Sclerotium betulinum*. Fries.

Fig. 3 SCLÉROTE DU SAULE. *Sclerotium salicinum*. Decandolle. Fries.

Fig. 4 SCLÉROTE PUSTULE. *Sclerotium pustula*. Decandolle. Fries.

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART
1000 MUSEUM AVENUE
NEW YORK, N. Y. 10028

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Imp. lith. De Rigo

Fig. 1. DERMATITE VULGAIRE. *Dematium vulgare*, Desj. *Cladosporium herbarum*, Nees, Fries.Fig. 2. DERMATITE DES FEUILLES. *Dematium epiphyllum*, Desj. *Cladosporium epiphyllum*, Fries.Fig. 3. DERMATITE NOIRE. *Dematium atrum*, Desj. *Cladosporium atrum*, Fries.Fig. 4. DERMATITE VERDÂTRE. *Dematium virescens*, Desj. *Cladosporium virescens*, Fries.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Imp. Lith. De Ruyg

Fig. 1. MONILIE DES GRAMENS. *Monilia graminum* Setellier. *Oidium moniloides*, FriesFig. 2. MONILIE DES FRUITS. *Monilia fructigena* Desoon. *Oidium fructigenum*, FriesFig. 3. MONILIE HYALINE. *Monilia hyalina*, Setellier. *Oidium leuconium* Desmazière, Fries.Fig. 4. ACROTAMNIUM VIOLET *Acrotamnium violaceum*, Pers. Desoon.

Impr. lith. de Coulon

AGARIC PANTHÈRE *Agaricus pantherinus* Fries.

Imp. Lth. de Coulon-

AGARIC ÉLEVÉ *Agaricus excelsus*. Fries.

Imp. lith. de Coulon

BOLET GROS PIED. *Boletus pachypus*. Persoon, Fries.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1. ASPERGILLE TRÈS GRAND. *Aspergillus maximus*. Nees, FriesFig. 2. ASPERGILLE BLANC *Aspergillus candidus*. Link. Fries. *Monilia candida* Persoon.Fig. 3. ASPERGILLE VERDÂTRE. *Aspergillus virens*. Link. *Monilia virens*. Persoon.Fig. 4. ASPERGILLE ROSE. *Aspergillus roseus*. Link, Fries. *Acladium roseum*. Persoon.

AGARIC GROSSISSANT *Agaricus anapactus* Lecellier.

Agaric vigoureux. *Agaricus romuleus* Lethier.

Engr. lith. de Courant.

Imp. lib. de Bogar
 AGARIC GLUANT. *Agaricus glaucus*. Dec. fl. fr. Kios

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC ÉCLATANT. *Agaricus fulgens* Dessoin. *bisetus* B. Fries.

Impr. Lit. de Coulon.

AGARIC COLLANT. *Agaricus viscidus*, Persoon. *Glutinosus* Fries.

Imp. lith. de Coulon

SISTOTRÈME ROUSSISSANT. *Sistotrema rufescens* Persoon. *Polyporus rufescens* Fries.

Imp. de Coulon.

Fig. 1 SPHÉRIE ÉCARLATE. *Sphaeria coccinea*. Persoon. Fries.Fig. 2 SPHÉRIE DU FAUX ÉBÉNIER. *Sphaeria laburni*. Persoon, Fries.Fig. 3 SPHÉRIE DE L'OLIVIER. *Sphaeria oleae*. Decandolle, Fries. (donnée par l'infirmité Steinheil)Fig. 4 SPHÉRIE DES HERBES. *Sphaeria herbarum*. Persoon. Fries.

Fig. 1. HYSTÉRIE PUCE. *Pisterium pulicace*. Persoon. Fries.

Fig. 2. HYSTÉRIE DU FRÊNE. *Pisterium fraxini*. Persoon. Fries.

Fig. 3. HYSTÉRIE DE LA RONCE. *Pisterium rubi*. Persoon. Fries.

Fig. 4. HYSTÉRIE DU PIN. *Pisterium pinastri*. Fries.

Fig. 5. HYSTÉRIE COMMUNE. *Pisterium commune*. Fries.

AGARIC À BELLE PEAU. *Agaricus Callochrous* Fries. Persoon.

AGARIC CANNELLE *Agaricus Cinnamomeus*, Persoon, Fries

Imp. LIX d.

AGARIC DES FOURS *Agaricus Furnaceus* Desh.

Joy. 1866

BOLET INDIGOTIER *Boletus cyanescens* Bulliard Pl. 369.

Lith. Desailles

- Fig 1. ÉRYSHIPHÉ COMMUNE *Erysiphe communis* Fries
 Fig 2. ÉRYSHIPHÉ DÉPRIMÉE *Erysiphe depressa*, communis E Fries
 Fig 3. ÉRYSHIPHÉ DIVARIQUÉE *Erysiphe divaricata*, penicillata B Fries
 Fig 4. ÉRYSHIPHÉ POMMELÉE *Erysiphe guttata* Fries

Fig. 1 DOTHIDÉE DU GROSEILLER *Dothidea ribesii* Friess *Sphaeria ribesii* Nees

Fig. 2 DOTHIDÉE DU SUREAU *Dothidea sambuci* Friess *Sphaeria sambuci* Persoon

Fig. 3 DOTHIDÉE DE L'ORME *Dothidea ulmi* Friess *Sphaeria xylomoides* Decandolle

Fig. 4 DOTHIDÉE ROUGE *Dothidea rubra* Friess *Polystigma rubrum* Decandolle

AGARIC PALOMET *Agaricus palomet* *transversus*

(H. de Saillie)

AGARIC LES CAMPAGNES. *Agaricus campestris* Desoon. edulis Bulliard pl. 134, 514. variété rose

Fig 1 HIMANTIE EN PLUME. *Himantia plumosa* Temm. *Byssa candida* Descaudolle

Fig 2 HIMANTIE BRILLANTE *Himantia nitens* B.

Fig 3 HIMANTIE FRANGÉE *Himantia frangiata* Temm.

Fig 4 HIMANTIE À DEUX RANGS *Himantia d'Alcock* Des Har.

Fig. 1 PUCCINIE DU ROSIER *Puccinia roseae* Desm. *Phragmidium* or *rassatum* Link.
 Fig. 2 PUCCINIE DE LA RÖNCE *Puccinia rubi* DuRoi *Phragma bulbosa* Fres.
 Fig. 3 PUCCINIE DES MENTHES *Puccinia menthae* Desm.
 Fig. 4 PUCCINIE DES GRAMINÉES *Puccinia graminum* Desm.

Fig. 1 CONOPLÉE NOIRE *Conopsea atra* Persoon.

Fig. 2 BOTRYTE OLIVE *Botrytis olivacea* Link, Persoon.

Fig. 3 BOTRYTE À AGGRÉGATS *Botrytis aggregata* Saccardo.

Fig. 4 BOTRYTE FARINEUSE *Botrytis farinulenta* Saccardo.

AGARIC MULOT *Agaricus Myomyces* Persoon Fries.

AGARIC PUDDIQUE *Agaricus pudicus* Bulliard 1597 *caperatus* Variétés blanches Fries

AGARIC À FEUILLETS SAFRANÉS *Agaricus crocoterrellatus*

Agaricus crocoterrellatus

Agaricus crocoterrellatus

BOLET À PIED RÂPEUX *Boletus crokiodius*

Fig 1.

Fig 2.

Fig 3.

Fig 1 MYCOGÈNE COULEUR DE CHAIR *Mycogone incarnata* Pers. *Sepedonium roseum* Trés

Fig 2 MYCOGÈNE BLANCHE *Mycogone alba* Pers.

Fig 3 MYCOGÈNE CHAMOIS *Mycogone cervina* Ditt (ex Dillmarl 53) *Sepedonium cervinum* Trés

Fig 4 SÉPÉDONIE À AGGLUMÉRATS *Sepedonium Agglomeriferum*.

Fig 1 POLYACTIS VULGAIRE *Polyactis vulgaris* Link *Botrytis vulgaris* Fries

Fig 2 PENCILLIE ÉTALÉE *Penicillium expansum* Link *crustaceum* Fries (non glaucum Reichen)

Fig 3 MONILIGÈRE BLANCHE *Moniliger candidus* *Monilia candida* Fries?

Fig 4 MONILIGÈRE EN BROUSSE *Moniliger paniculatus* (ajoutez à ce genre les *Monilia* de Reichen et de Fries) Bullard & Sacc.

AGARIC ENFUME *Agaricus fumosus* Pers.

AGARIC GRISÂTRE *Agaricus gilvus* Perdon.

AGARIC SULFURIN *Agaricus Sulfureus* Bull. t. 168, 545 fig 2 albo-bunneus Persoon?

GEOGLOSSE OXONIOÏDE *Geoglossum oxonioides* A-F individus parfaits *ox.* - altérés par les couleurs imitant
 une closerie. I un merisme. JK une oxonie (*Oxonium fulvum* Penn.) tous observés 5-6 ans autour d'une fontaine de cuisine

Fig 1 TORULE ENFUMÉE *Torula flammula* Fr. *Tumago vagans* Persoon.
 Fig 2 TORULE FULIGINEUSE *Torula fuliginosa* a Persoon. *Antorraria pinophilæ* Fries
 Fig 3 TORULE TENDRE *Torula tenera* Fr. (ex Nees)
 Fig 4 TORULE EN ANTENNE *Torula antennata* Nees. Fries.

Fig. 1 HYPHE EN COQUE *Hyphe combeyana* Pers. on

Fig. 2 HYPHE ARGENTÉE *Hyphe argentea* Pers. on

Fig. 3 RACODIE DES CELLIERS *Racodium cellare* Pers. on *Stemmaria cellaris* Fries

Fig. 4 RACODIE DES MINES *Racodium foetidum* Pers. on

imp. lith. de la Cour

AGARIC DES CHAMPS *Agaricus arvalis* Fr.

AGARIC DES PENTES *Agaricus clivularum* Setellier.

Lith. Seignier a. s. sen

AGARIC VERRUQUEUX *Agaricus verrucosus* ^{per Edm} *rubescens* Fries *epicrisis*

imp. lith. de l'Ét. de l'Ét. de l'Ét.

BOLET À PORES VERMILLONS *Boletus luridus*. Schaeffer.

Fig 1 SPOROTRIC DES CHAMPIGNONS *Sporotrichum fungorum* Persoon

Fig 2 SPOROTRIC VERDATRE *Sporotrichum viride æruginosum* Persoon?

Fig 3 SPOROTRIC BRUN *Sporotrichum fuscum* Persoon

Fig 4 SPOROTRIC DES PAPIERS *Sporotrichum chartaceum* Pers *Xyotrichum chartarum* Kunz

Fig 1 CERATONÈME CAPILLAIRE *Ceratoneura capillare* Persoon

Fig 2 CERATONÈME EN CRIN *Ceratoneura hippotrichodes* Persoon *Rhizomorpha setiformis* Decand.

Fig 3 RHIZOMORPHE DES ÉCORCES *Rhizomorpha subcorticalis* Infragilis B Decandolle

Fig 4 RHIZOMORPHE GRIMPANTE *Rhizomorpha scandens* Pers. *fragilis* a Decandolle

Agaricus rutilus A. Schaeff.

AGARIC ARDENT. *Agaricus Rutilus*. Schaeff.

Imp. H. de Koning

AGARIC GÉANT. *Agaricus Giganteus, minor. Fr.*

Imp. G. H. D'Arno

AGARIC JAUNE D'ŒUF. *Agaricus olivaceus* Fris. A. *olivaceus* Pers. I. *olivaceus* Fris.
E. *olivaceus* Fris. F. *olivaceus* Pers.

Imp. lith. d'Adrien

CHANTERELLE SINUEUSE. *Cantharellus sinuosus*. α Fries

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Imp. lith. d'Adrien

Fig. 1. DACTYLIE BLANCHE *Dactylium candidum* nees (ex. nees)

Fig. 2. DACTYLIE VARIÉE *Dactylium varium* Fri. *Cladobotryum varium* nees c.d. *Dactylium macrosporum* Fri.

Fig. 3. TRICHOTHÈCE ROSE *Trichothecium roseum* Fri. A-C Superficiel. D-F Sortant de l'épiderme.

Fig. 4. TRICHOTHÈCE MASSUE *Trichothecium clavatum*.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Impr. lith. D. Adrien.

Fig. 1 SPHÈRIE BEC-COURBE *Sphaeria curvirostra* Fr.Fig. 2 SPHÈRIE AIGUE *Sphaeria acuta* Fr.Fig. 3 SPHÈRIE APPLATIE *Sphaeria complanata* Fr.Fig. 4 SPHÈRIE BARIL *Sphaeria dolioolum* Fr.

Imp. lit. J. Adrien.

AGARIC DE SAULE *Agaricus salignus* Pers.

Imp. lith. d'Adrien.

AGARIC BLANCHÂTRE - *Agaricus Carensens* Bab. *Mollis* Sow. non Bull.

Imp. lith. J. Adrien
 AGARIC À DEUX VOILES. *Agaricus Bivelus*. Fries.

Fig. 1

Fig. 2

Am. l'yn. J. Adrien

Fig. 1. POLYPORE BUVEUR. *Pori porus Bibulus*. Sw.
Fig. 2. POLYPORE VULGAIRE. *Polyporus Vulgaris*. Fries

Imp. coll. de Regier

Fig. 1. FUSARIE BRIQUE. *Fusarium bricatum* Née. Fr.

Fig. 2. FUSARIE TREMELLOÏDE. *Fusarium tremelloides* Fr. Tremella mitee Don.

Fig. 3. TUBERULAIRE CONFLUENTE. *Tuberularia conflens* L. Fr. *T. mitee* Don.

Fig. 4. TUBERULAIRE GRANULÉE. *Tuberularia granulata* Pers. Fr.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Im. J. de Roger.

Fig. 1 SPHÉRIE ÉLÉGANTE. *Sphæria pulchella*. Des. Fries

Fig. 2 SPHÉRIE À BOUCHE BLANCHE. *Sphæria Leucostoma*. Des. Fries

Fig. 3 SPHÉRIE ALLONGÉE *Sphæria elongata*. Fries, *scabra*. Schm.

Fig. 4 SPHÉRIE DU GENÈT À BALAIS *Sphæria spartii*. Fries

Agaric du PANICAUD. *Agaricus cyngii*. DeCandolle, Fries.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC TROMPEUR. *Agaricus decipiens*. Persoon. Fries.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC DIMIDIÉ. *Agaricus dimidiatus* Bull. t. 508. *Ostreatus* Fries. *corrucopiae* Persoon.

Imp. lith. de Coulon.

MORILLE À MOITIÉ LIBRE. *Morchella semi-libera* Decandolle, Fries. *hybrida* Peckdon.

Imp. Wm. de Coulon

Fig. 1 BOTRYTE CROUTEUSE. *Botrytis crustosa*. Fries.Fig. 2 BOTRYTE PARASITE. *Botrytis parasitica*. Fries.Fig. 3 BOTRYTE. LÂCHE. *Botrytis laxa*. Fries.Fig. 4 BOTRYTE EN TÊTE. *Botrytis capitata*. Fries?

Imp. lith. de Coulon.

Fig. 1. ISARIE FARINEUSE. *Isaria farinosa* α Fries. *velutipes* Link (ex Dittmar)Fig. 2. ISARIE DES ARAIGNÉES. *Isaria arachnophila* Fries.Fig. 3. ISARIE EN MONILIE *Isaria monilioides* FriesFig. 4. ISARIE DES FEUILLES. *Isaria epiphylla* Persoon. Fries

Imp. Lill de Coulon.

AGARIC ENFLAMMÉ *Agaricus destians* Fries.

Imp. lith. de Coulon.

AGARIC BONDON. *Agaricus obtusatus* Fries.

Imp. lith de Coulon

AGARIC VIOLET-SOMBRE. *Agaricus violaceo-ater*. Setollier.

Imp. G. de Coulon.

TUBULAIRE RÉTICULARIOÏDE. *Tubularia reticularioides*. Retellier.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Insp. litt. de Coulon.

Fig. 1. SPHÈRIE DU CHÈNE. *Sphæria quercina* Fries. Persoon.

Fig. 2. SPHÈRIE LANCIFORME. *Sphæria lanciformis* Fries 'betulæ Schum.

Fig. 3. SPHÈRIE FERRUGINEUSE. *Sphæria ferruginea* Fries. Persoon.

Fig. 4. SPHÈRIE A GRAINES NOIRES. *Sphæria melaspeuma* Fries?

Fig. 1. DIDYMOSPORE ÉLEVÉ. *Didymosporium elevatum*. Fries. *Melanconium betulinum* Schmidt.
 Fig. 2. DIDYMOSPORE APPLATI *Didymosporium complanatum*. Fries. *Pilobospora didyma* Lück.
 Fig. 3. MÉLANCONE À DEUX COULEURS *Melanconium bicolor*. Fries
 Fig. 4. MÉLANCONE SPHÉROÏDE. *Melanconium sphaeroideum*. Fries

J. B. Sowerby del.

AGARIC ROUGISSANT. *Agaricus exubescens*. Sowerby. Fries.

Fig. 1

Fig. 2

Imp. lith. de Riga.

Fig. 1. AGARIC SEPTIQUE. *Agaricus septicus*. Fries. *chioneus* Persoon.

Fig. 2. AGARIC TRÈS-PETIT. *Agaricus perpusillus*. Fries. *hyprophilus*. Persoon.

Imp. 4th August

AGARIC JAUNE-BRUN. *Agaricus flavo-brunneus*. Fries, Perdon.

Fig. 1

Fig. 2

Impr. de Auguel

Fig. 1. CLAVARE CENDRÉE. *Clavaria cinerea*. Bulliard. Fries. *fuliginosa*. Persoon.

Fig. 2. CLAVARE EN CRÊTE. *Clavaria cristata* Fries. B Varietas *Ornithopoïdes*

Imp. lith. August

Fig. 1. BOTRYTE GÉANTE. *Botrytis gigantea*. Letellier.

Fig. 2. BOTRYTE OCRE. *Botrytis ochracea*. Letellier.

Fig. 3. BOTRYTE VRAIE. *Botrytis vera* Fries. *Spicularia gemina* Tredonn.

Fig. 4. BOTRYTE GRISE. *Botrytis grisea*. Fries. *haplaria grisea* Link.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Imp. lith. d'Auguste.

Fig. 1. DIDYMIE PHYSAROÏDE. *Didymium physaroides* Fries. *Spumaria physaroides* Persoon.Fig. 2. DIDYMIE CENDRÉE. *Didymium cinereum* Fries. *Physarum cinereum* Persoon.Fig. 3. PHYSARUM CONGLOBÉ. *Physarum conglobatum* Dittmar. Fries.Fig. 4. PHYSARUM BLANC. *Physarum album* Fries. *Licea alba* Kunze.

La rapidité avec laquelle s'est épuisée notre première édition nous a prouvé que nous ne nous étions pas trompés en croyant être utiles par la publication d'une suite d'un superbe ouvrage de Billiard, et en comptant sur l'encouragement des Botanistes; bien qu'un ouvrage scientifique sur les Champignons ne peut servir qu'à un nombre fort limité d'ouvrages. La plupart des observations qui nous ont été adressées sur notre travail n'ayant porté que sur la forme, nous en avons profité pour mettre plus de soins dans nos dessins; mais nous n'avons eu aucune correction essentielle à faire. On trouvera donc cette nouvelle édition tout à fait conforme à la première. Nous prions de renvoyer les additions que nos recherches continuelles nous ont fournies pour les planches à publier. — Bien que nos matériaux soient considérables nous prions, dans l'intérêt de la science, les botanistes qui auraient trouvé des espèces rares ou nouvelles de nous les communiquer; nous nous empresserions de reconnaître leurs dans et de leur offrir des échanges.

On trouve à la même adresse et par le même.

Histoire et Description des Champignons alimentaires et vénéneux.
1 Vol. in 8°, 120 Figures. Prix en noir 6 Fr. Coloriés 8 Fr. 50.

L'Auteur s'est proposé dans cet ouvrage de faire connaître au public, comme au Médecin-Légiste, les espèces agréables, ce qui les distingue de celles qui seules doivent être regardées comme vénéneuses, la manière d'agir de ces dernières, le traitement à y opposer. Par de nombreuses expériences, il a détruit une foule de vœux accablés par les compilateurs et répétés par les derniers auteurs qui n'ont pas su profiter de ses travaux.

Genres de Champignons séchés, par cahier de 24 feuilles, prix 4 Fr.
Par cette collection nous facilitons la route à ceux qui veulent étudier la Mycologie. Ils y trouveront, pour chaque genre, un exemple sur lequel ils pourront étudier ses caractères, et se familiariser avec le faciès si rare de ces singuliers végétaux.

Fig. 1 CONOPLÉE NOIRE *Conopsea atra* Persoon.

Fig. 2 BOTRYTE OLIVE *Botrytis olivacea* Link, Persoon.

Fig. 3 BOTRYTE À AGGRÉGATS *Botrytis aggregata* Saccardo.

Fig. 4 BOTRYTE FARINEUSE *Botrytis farinulenta* Saccardo.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Imp. lith. de Coulon.

SPOROTRIC SPORULEUX : *Sporotrichum sporulosum* . PersoonFig. 1. Variété blanche. ↓ Fig. 2. var. jaune, *Sporotrichum vitellinum* . Link. FriesFig. 3 passage des var. précédentes aux suivantes, *Sporotrichum flavissimum* . Link. Fries.Fig. 4 variété rose, *Aleurisma crubescens*, nees, Fries. ↓ Fig. 5. var. rouge. *Sporotrichum ruberrimum*. Fries.

New York Botanical Garden Library
QK608.F7 B8 Suppl. 1839 livr. 1/18 gen
Letellier, J. B. L./Figures des champignons

3 5185 00041 2740