Qh
535
B39
v. 4
c. 2
Ent.

Vol. 11
Binding 3.50
Postage 1.
Total 2.75
\$4.

KATALOG

DER

PALÄARKTISCHEN DIPTEREN

BEARBEITET VON

codor
TH. BECKER, Dr. M. BEZZI, Dr. K. KERTÉSZ
und P. STEIN.

BAND IV.

CYCLORRHAPHA SCHIZOPHORA : HOLOMETOPA

VON TH. BECKER.

CYCLORRHAPHA SCHIZOPHORA : PUPIPARA

VON Dr. M. BEZZI.

BUDAPEST.

1905.

Abgeschlossen den 1. December 1904.

DIV. INS.
U.S. NATL. MUS.

VORWORT.

Der vorliegende vierte und letzte Band in der von uns in der Vorrede Band I zu Grunde gelegten systematischen Reihenfolge erscheint *vor* dem dritten. Dieser ungewöhnliche Vorgang hat seine unfreiwilligen Gründe gehabt, welche wir anzugeben uns für verpflichtet erachten.

Der Band III sollte umfassen:

die Cyclorrhapha schizometopa: Anthomyidae von P. Stein.
„ Cyclorrhapha schizometopa: Tachinidae } von J. Bischof.
„ Cyclorrhapha aschiza }

Herr P. Stein hatte dem Abkommen gemäss rechtzeitig sein Manuscript zur Verfügung gestellt. Von Herrn Bischof war jedoch leider nichts zu erhalten. Trotz vielfacher zeitraubender Vorstellungen unsererseits und trotz aller Zusagen seinerseits hat Herr Bischof sein gegebenes Versprechen einzulösen nicht für gut befunden. Wir wurden schliesslich zu unserem Bedauern dahin gedrängt, das Abkommen mit ihm zu lösen und uns nach einem anderen Mitarbeiter umzuthun. In die dadurch herbeigeführte Lücke ist nun zu unserer Genugthuung Dr. M. Bezzi freiwillig eingetreten; wir dürfen zu ihm das berechtigte Vertrauen hegen, dass er sein Möglichstes thun wird, um das Erscheinen des Bandes III zu beschleunigen und so unser gemeinsam begonnenes Werk trotz der unangenehmen Unterbrechung und Verzögerung zum gedeihlichen Abschluss zu bringen.

TH. BECKER.
DR. K. KERTÉSZ.

HOLOMETOPA.

Acalyptera.

SCATOMYZIDAE.

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. (1894).

Cordylurinae.

Cordylura

FALL., Nov. Dipter. dispon. Method., 15. 45. (1810).

Mosina p. p., ROB.-DESV., Myod., 670. 5. (1830).

- aberrans** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 91. 4. (1894). Lapponia.
rufimana ZETT., Ins. Lapp., 726. 4. (1838) et Dipt. Scand., V. 2001. 6. (1846).
albo-fasciata GIMMERTH., Bull. de Moscou, IV. 190. 6. (1847). Rossia.
aricina ZETT., Dipt. Scand., V. 2034. 33. (1846). Dania.
aricioides ZETT., Dipt. Scand., XII. 4765. 33—34. (1855). Suecia.
atrata ZETT., Dipt. Scand., V. 2002. 7. (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 91. 7. t. IV. f. 2, 3. (1894) et Acta Soc. scient. Fenn., 48. 82. (1900). Europa centr. et sept., Sibiria.
picipes MEIG., S. B., V. 232. 4. [♀, nec ♂]. (1826); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 213. 4. (1902).
X **biseta** LW., Wien. entom. Monatschr., VIII. 21. 5. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 93. 13. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 172. 7. (1899). Europa centr.
picipes MEIG., S. B., V. 232. 4. [♂, nec ♀]. (1826); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 213. 4. (1902).
brevipennis CURT., Brit. Entom., 485. (1832). Britannia.
ciliata MEIG., S. B., V. 231. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 381. 3. (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 1999. 4. (1846); SCHIN., F. A., II. 3. (1864); ROND., Prodr., VII. Scatoph. 13. 1. (1866); BECK., Berlin. Europa centr. et sept.

- entom. Zeitschr., XXXIX. 91. 6. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 172. 6. (1899).
- cavallariae* KALTENB., Pflanzenf., 724. 6. (1872) et Verh. naturf. Ver. Germania.
d. Preuss. Rheinl., XVI. 273.
- Dejeanii* ROB.-DESV., Myod., 671. 3. [*Mosina*] (1830); MACQ., Suit. à Gallia.
Buff., II. 382. 4. (1835); MEIG., S. B., VII. 340. 34. (1838).
- erythrocephala* MEIG., S. B., VII. 340. 39. (1838). Germania.
- flava* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 446. 2. (1830). Aegyptus.
- flavovenosa* BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIX. 92. 9. (1894). Rossia.
- fulvipes* MEIG., S. B., VII. 341. 40. (1838). Germania.
- fuscipennis* GIMMERTH., Bull. de Moscou, IV. 190. 5. (1847). Rossia.
- geniculata* ZETT., var. c. = *pudica* MEIG.
- impudica* ROND., Prodr., VII. Scatophag. 13. 3. (1866). Italia.
- incerta* ZETT. = *rufimana* MEIG.
- incisa* MEIG., S. B., VII. 340. 37. (1838). Germania.
- Latreillii* ROB.-DESV., Myod., 671. 4. [*Mosina*] (1830). Gallia.
- marginipennis* GIMMERTH., Bull. de Moscou, II. 189. (1847). Rossia.
- nigra* ROB.-DESV., Myod., 671. 2. [*Mosina*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., Gallia.
II. 381. 2. (1835); MEIG., S. B., VII. 340. 36. (1838).
- nigripila* ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6328. 22—23. (1860). Suecia.
- nigriventris* LW., Wien. entom. Monatschr., VIII. 19. 4. (1864). Germania.
- picipes* MEIG. ♂ = *biseta* LW.
- picipes* MEIG. ♀ = *atrata* ZETT.
- picticornis* LW., Wien. entom. Monatschr., VIII. 22. 6. (1864); BECK., Sibiria.
Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 93. 11. (1894) et Acta Soc. scient.
Fenn., XXVI. 48. 81. (1900).
- proboscidea* ZETT., Ins. Lapp., 728. 12. (1838) et Dipt. Scand., V. Lapponia.
2027. 27. (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 92.
10. (1894) et Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 48. 80. No. 9. (1900).
- × *pubera* L., F. Suec., 1855. [*Musca*] (1761); FABR., Spec. Ins., II. 446. Europa,
55. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2850. 95. [*Musca*] (1788); Sibiria.
FABR., Syst. Antl., 315. 10. [*Ocyptera*] (1805); FALL., Dipt. Suec.
Scatomyz., 6. 1. (1819); MEIG., S. B., V. 230. 1. (1826); ROB.-DESV.,
Myod., 671. [*Mosina*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 381. 1. t.
XVIII. f. 7. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 725. 1. var. a. (1838) et
Dipt. Scand., V. 1995. 1. (1846); SCHIN., F. A., II. 2. (1864);
ROND., Prodr., VII. Scatophag. 13. 2. (1866); BEZZI, Contribuz. alla
F. ditt. di Pavia, II. 50. 560. (1892); BECK., Berlin. entom. Zeitschr.,
XXXIX. 91. 5. t. IV. f. 1, 6. (1894); MEADE, Entom. Monthly
Mag., 171. (1899); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 48. 83.
(1900).
- rufipes* MEIG., S. B., V. 232. 5. (1826); BECK., Zeitschr. f. Hyme-
nopt. u. Dipt., II. 213. 5. (1902).
- × *pudica* MEIG., S. B., V. 231. 3. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 382. Europa centr.
5. (1835); SCHIN., F. A., II. 2. (1864); BECK., Berlin. entom. et sept.
Zeitschr., XXXIX. 90. 1. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag.,
171. 3. (1899).

geniculata ZETT., Ins. Lapp., 725. 1. *var. c.* (1838) et Dipt. Scand., V. 1997. 2. (1846).

pudica ZETT., ROND. = **socialis** BECK.

rubifrontata BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 91. 8. (1894). Asia.

rufimana MEIG., S. B., V. 232. 6. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 382. Europa centr
7. (1835); SCHIN., F. A., II. 3. (1864); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., et sept.,
XXXIX. 91. 3. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 171. 5. Sibiria.
(1899); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 48. 84. (1900).

incerta ZETT., Ins. Lapp., 690. 128. *var. [Anthomyza]* (1838).

tibialis ZETT., Ins. Lapp., 725. 3. (1838) et Dipt. Scand., V. 2000.
5. (1846); SCHIN., F. A., II. 3. (1864).

rufimana ZETT. = **aberrans** BECK.

rufipes MEIG. = **pubera** L.

similis SIEBKE, Nyt Mag., 54. 333. (1842) et Catal. Dipt. Norveg., 140. Norvegia.
35. (1877).

socialis BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 90. 2. (1894). Suecia.

pudica ZETT., Dipt. Scand., V. 1998. 3. (1846); ROND., Prodr.,
VII. Scatophag. 14. 4. (1866).

tibialis ZETT. = **rufimana** MEIG.

umbrosa LW., Europ. Dipt., III. 246. 159. (1873); BECK., Berlin. entom. Hungaria,
Zeitschr., XXXIX. 93. 12. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., Silesia,
171. 2. (1899). Britannia.

unicolor LW., Wien. entom. Monatschr., VIII. 17. 1. (1864); BECK., Hispania.
Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 93. 14. (1894).

Zetterstedti GIMMERTH., Bull. de Moscou, IV. 190. 4. (1847). Russia.

Parallelomma

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 94. II. (1894).

Mosina p. p., ROB-DESV., Myod. (1830).

X **albipes** FALL., Dipt. Succ. Scatomyz., 9. 8. [*Cordylura*] (1819); MEIG., Europa,
S. B., V. 233. 8. [*Cordylura*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 383. 10. Sibiria.
[*Cordylura*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 726. 5. [*Cordylura*] (1838)
et Dipt. Scand., V. 2004. 9. [*Cordylura*] (1846); WALK., Ins. Brit.,
II. 150. 2. [*Cordylura*] (1853); SCHIN., F. A., II. 4. [*Cordylura*]
(1864); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 4. [*Cordylura*] (1866);
KALTENB., Pflanzenf., 714. 1 et 724. 5. [*Cordylura*] (1872); BECK.,
Berlin. ent. Zeitschr., XXXIX. 95. 16. t. IX. f. 11. [*Cordylura*]
(1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 172. 8. [*Cordylura*] (1899);
BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 48. 85. (1900).

filipes ROB-DESV., Myod., 673. 7. [*Mosina*] (1830).

bilineata MEIG., S. B., VII. 340. 38. [*Cordylura*] (1838); BECK.,
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 216. 38. (1902).

bilineata MEIG. = **albipes** FALL.

dispar ZETT., Dipt. Scand., V. 2012. 15. [*Cordylura*] (1846); BECK., Suecia.
Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 95. 15. (1894).

- fuscipes* ZETT., Ins. Lapp., 726. 6. var. a. [*Cordylura*] (1838) et
Dipt. Scand., V. 2006. 10. [*Cordylura*] (1846).
- filipes* ROB.-DESV. = *albipes* FALL.
- fulva* ROB.-DESV., Myod. 672. 6. [*Mosina*] (1830). Gallia.
- fuscipes* ZETT. = *dispar* ZETT.
- fuscitibia* ROND., Prodr., VII. Scatophag. 14. 7. [*Cordylura*] (1866) Italia.
et Atti Soc. Ital. Nat., X. 99. Milano, [*Cordylura*] (1867); BECK.,
Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 95. 17. (1894).
- media* BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 96. 19. (1894). Silesia.
- nigriseta* ROND., Prodr., VII. Scatophag. 14. 6. [*Cordylura*] (1866). Italia.
- vittata* MEIG., S. B., V. 236. 14. [*Cordylura*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., Europa centr.
729. 20. [*Cordylura*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., V. 2019. 20. et sept.
[*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 96.
18. t. IV. f. 10, 11. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 5.
[*Cleigastra*] (1899).

Phrosia

ROB.-DESV., Essai sur les Myod., 669. (1830).

Ocyptera p. p., FABR., Syst. Antl., (1805).

- X *albilabris* FABR., Syst. Antl., 315. 11. [*Ocyptera*] (1805); MEIG., S. Europa centr.
B., V. 233. 7. [*Cordylura*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 282. 8. et sept.
[*Cordylura*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2003. 8. [*Cordylura*]
(1846); SCHIN., F. A., II. 4. [*Cordylura*] (1864); ROND., Prodr., VII.
Scatophag. 14. 5. [*Cordylura*] (1866); BECK., Berlin. entom.
Zeitschr., XXXIX. 97. 20. t. IV. f. 4, 5. (1894).
- scirpi* ROB.-DESV., Myod., 669. 1. (1830).
- scirpi* ROB.-DESV. = *albilabris* FABR.

Scoliaphleps

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 98. IV. (1894).

- melaneura* LW., Europ. Dipt., III. 247. 160. [*Cordylura*] (1873); BECK., Silesia.
Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 99. 22. (1894).
- ustulata* ZETT., Ins. Lapp., 727. 11. var. a. [*Cordylura*] (1838) et Europa centr.
Dipt. Scand., V. 2013. 16. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. et sept.
Zeitschr., XXXIX. 98. 21. t. IV. f. 7, 8, 9. (1894).

Cnemopogon

ROND., Prodr., I. 99. (1856) et Prodr., VII. 3. (1866).

- X *apicalis* WIED., apud MEIG., S. B., V. 236. 15. [*Cordylura*] (1826); MACQ., Europa centr.
Suit. à Buff., II. 334. 1. t. XVIII. f. 8. [*Cleigastra*] (1835); BORÉ, et sept.
Kröjers Tidskr., [*Cordylura*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., V. 2023.
24. [*Cordylura*] (1846); SCHIN., F. A., II. 10. [*Cleigastra*] (1864);

ROND., Prodr., VII. Scatophag. 3. (1866); KALTENB., Pflanz. Feinde, 348. 47. [*Cordylura*] (1872); GERCKE, Verh. d. Ver. f. naturw. Unterh. Hamburg, VI. 46. [*Cordylura*] (1880); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 100. 23. t. V. f. 6. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 174. 1. (1899).

Orthocheta

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 101. VI. (1894).

pilosa ZETT., Ins. Lapp., 732. 33. var. *a* et *b*. [*Cordylura*] (1838); Suecia, ZETT., Dipt. Scand., V. 2064. 55. [*Cordylura*] (1846); SCHIN., F. Germania, A., II. 12. [*Cleigastra*] (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 101. 24. t. V. f. 5. (1894).

Gonatherus

ROND., Prodr., I. 99. (1856) et VII. 9. IV. (1866).

Friesi ZETT., SCHIN. = **planiceps** FALL.

planiceps FALL., Dipt. Suec. Scatomyz. Suppl., 2. pag. 12. 11. [*Cordylura*] (1819); ZETT., Ins. Lapp., 732. 30. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Scand., V. 2058. 51. [*Cordylura*] (1846); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 10. (1866); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIX. 102. 25. t. V. f. 2., t. IX. f. 13. (1894).

Friesi ZETT., Ins. Lapp., 729. 21. [*Cordylura*] (1838), Dipt. Scand., V. 2057. 50. (1846) et VIII. 3337. 50. 51. [*Cordylura*] (1849); SCHIN., F. A., II. 11. [*Cleigastra*] (1864).

Gonarticus

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 103. VIII. (1894).

abdominalis ZETT., Dipt. Scand., V. 2080. 68. [*Cordylura*] (1846); Suecia.

BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIX. 104. 27. (1894).

antennatus ZETT., Ins. Lapp., 724. 18. [*Scatomyza*] (1838) et Dipt. Scand., V. 1981. 17. [*Scatomyza*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 103. 26. t. V. f. 7. (1894).

validicornis ZETT., Dipt. Scand., V. 2065. 56. [*Cordylura*] (1846).

validicornis ZETT. = **antennatus** ZETT.

Leptopa

ZETT., Ins. Lapp., 698. (1838).

filiformis ZETT., Ins. Lapp., 698. 1. (1838) et Dipt. Scand., V. 1794. 1. (1846); SCHIN., F. A., II. 1. (1864); v. RÖD., Wien. entom. Zeitschr., XII. 81. (1893); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. Europa centr. et sept.

105. 28. t. VI. f. 1. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 170. (1899).

pallida var. β . *minor* FALL., Dipt. Suec. Scatomyz., 8. 4. [*Cordylura*] (1819).

flaveola ZETT., Ins. Lapp., 735. 45. [*Cordylura*] (1838).

flava HALID., Entom. Mag., IV. 150. [*Cordylura*] (1837).

flava HALID. = *filiformis* ZETT.

flaveola ZETT. = *filiformis* ZETT.

pallida var. β . *minor* FALL. = *filiformis* ZETT.

Megaphthalma

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 105. X. (1894).

× *pallida* FALL., Dipt. Suec. Scatomyz., 8. 4. [*Cordylura*] (1819); MEIG., Europa centr.
S. B., V. 242. 28. [*Cordylura*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 720. 8. et sept.
var. *a*. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Scand., V. 2008. 12. [*Cordylura*]
(1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 106. 29. t. VI. f.
3. (1894).

unilineata ZETT., Ins. Lapp., 727. 9. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Europa centr.
Scand., V. 2010. 13. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. et sept.
Zeitschr., XXXIX. 107. 30. (1894).

Hexamitocera

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 107. XI. (1894).

loxocerata FALL., Dipt. Suec. Scatomyz. Suppl., II. 12. 10. [*Cordylura*] Europa centr.
(1819); ZETT., Dipt. Scand., V. 2029. 29. [*Cordylura*] (1846); et sept.
BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 108. 31. t. V. f. 4. (1894).
longifrons ZETT., Ins. Lapp., 729. 18. [*Cordylura*] (1838).
longifrons ZETT. = *loxocerata* FALL.

Micropselapha

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 108. XII. (1894).

filiformis ZETT., Dipt. Scand., V. 2025. 25. [*Cordylura*] (1846); BECK., Europa centr.
Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 109. 32. t. V. f. 2, 3. (1894). et sept.

Amaurosoma

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 109. XIII. (1894).

armillatum ZETT., Dipt. Scand., V. 2069. 59. [*Cordylura*] (1846); BECK., Europa centr.
Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 120. 47. (1894). et sept.
articulatum BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 117. 39. (1894). Silesia.

brevifrons ZETT., Ins. Lapp., 729. 19. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Scand., V. 2062. 53. [*Cordylura*] (1846); SCHIN., F. A., II. 11. [*Cleigastra*] (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 115. 35. (1894). Europa centr. et sept.

brevipenne CURT. = **fasciatum** MEIG. *

cinerellum ZETT., Dipt. Scand., V. 2070. 60. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 119. 43. (1894). Europa sept.

X **fasciatum** MEIG., S. B., V. 238. 18. [*Cordylura*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 387. 11. [*Cleigastra*] (1835); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 118. 42. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 217. 1. (1899). Europa centr. et sept.

brevipenne CURT., VERRAL, List of Brit. Dipt., 29—36. (1901).

obscurum MEIG. (nec FALL.), S. B., V. 240. 24. [*Cordylura*] (1826);

BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 215. 24. (1902).

flavipes FALL., Dipt. Suec. Scatomyz., 9. 7. [*Cordylura*] (1819); MEIG., S. B., V. 239. 21. [*Cordylura*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 730. 24. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Scand., V. 2059. 52. [*Cordylura*] (1846); SCHIN., F. A., II. 11. [*Cleigastra*] (1864); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 20. 1. [*Cleigastra*] (1866); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 114. 33. t. V. f. 1. (1894) et Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 48. 86. (1900). Europa, Sibiria.

frontale MACQ., Suit. à Buff., II. 387. 14. [*Cordylura*] (1835);

MEIG., S. B., VII. 341. 42. [*Cordylura*] (1838); BECK., Zeitschr.

f. Hymenopt. u. Dipt., II. 216. 42. (1902).

frontale MACQ. = **flavipes** FALL.

X **inermis** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 119. 45. (1894). Rossia, Siles.

leucostoma ZETT., Dipt. Scand., V. 2063. 54. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 117. 40. (1894) et Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 48. 87. (1900). Lapponia, Sibir., Siles.

longicornis v. Ros., Württemb. Corrbibl., 59. [*Cordylura*] (1840); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 115. 36. (1894). Europa centr.

mensuratum BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 119. 44. (1894). Silesia.

minutum BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 116. 38. (1894). Rossia.

nigrifrontatum BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 120. 46. (1894). Tirolis merid.

nigripes ZETT., Dipt. Scand., V. 2026. 26. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 117. 41. (1894). Suecia.

nigriventris Lw., Wien. entom. Monatsschr., VIII. 19. 4. [*Cordylura*] (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 116. 36. (1894). Germania.

nutans BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 120. 48. (1894). Silesia,

obscurum MEIG. (nec FALL.) = **fasciatum** MEIG. Karinthia.

puberulum BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 114. 34. (1894). Bohemia.

tibiellum ZETT., Ins. Lapp., 731. 25. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Scand.,

V. 2068. 58. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr.,

XXXIX. 121. 49. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 218. 2.

(1899).

Spathephilus

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 121. XIV. (1894).

breviventris LW., Europ. Dipt., III. 250. 161. [*Cordylura*] (1873); Sarepta.
BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 122. 50. t. V. f. 8. (1894).

Pselaphephila

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 122. XV. (1894).

Loewi BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 123. 51. t. VI. f. 4. Silesia.
(1894).

Scatophaginae.

Scatophaga

MEIG., Illig. Mag., II. 277. 95. (1803).

Scatomyza FALL., Scatomyz. (1819); ZETT., Ins. Lapp. (1838) et Dipt. Scand., V. (1846).

Scatina ROB.-DESV., Myod. (1830); ROND., Prodr., VII. (1866).

Amina ROB.-DESV., Myod., 629. VII. (1830).

- amplipennis** PORTSCH., Horae Soc. ent. Ross., XXI. 24. (1887). Asia centr.
- analys** MEIG., S. B., V. 251. 7. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 393. 3. Europa centr.
(1835); SCHIN., F. A., II. 16. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 169. 99. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 221. 5. (1899).
- arctica** BECK., Mémoires de l'Acad. Imp. des sc. St Petersburg., p. 398. Now.-Semlja.
(3). 3. (1897).
- arrogans** HALID., Curt. Brit. Entom., 405. (1832); MEADE, Entom. Britannia.
Monthly Mag., 223. 15. (1899).
- bipunctata** MACQ., Suit. à Buff., II. 395. 14. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
343. 20. (1838); MEADE, Entom. Monthly Mag., 222. 11. (1899).
- calida** HALID., Curt. Brit. Entom., 405. (1832); MEADE, Entom. Monthly Britannia.
Mag., 223. 13. (1899).
- X **cineraria** MEIG., S. B., V. 251. 8. (1826); BECK., Berlin. entom. Alpes.
Zeitschr., XXXIX. 171. 105. (1894); MEADE, Entom. Monthly
Mag., 221. 3. (1899).
- claripennis** ROB.-DESV., Myod., 628. 10. (1830) et ? Myod., 629. 1. Gallia.
[*Scatina*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 394. 8. (1835); MEIG.,
S. B., VII. 342. 17. (1838).
- cordylurina** HOLMGR., Entom. Tidskr., 173. 34. [*Scatomyza*] (1880). I. Waigatsch.
dalmatica BECK. = **decipiens** HALID.
- dasythrix** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 173. 111. (1894). Fret. Behring.
- decipiens** HALID., Curt. Brit. Entom., 405. (1832). Britannia,
Aegyptus.

dalmatica BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 176. 113.

(1894); VERRAL, List of Brit. Dipt., 29—36. (1901).

erythrostoma HOLMGR., Entom. Tidskr., 176. 39. [*Scatomyza*] (1880). Now-Semlja.

eximia HALID., Curt. Brit. Entom., 405. (1832). Britannia.

fluvialis ROND., Prodr., VII. Scatophag. 29. 3. [*Scatina*] (1866). Italia.

fontanalis ROND., Prodr., VII. Scatophag. 30. 4. [*Scatina*] (1866); Italia.

MEADE, Entom. Monthly Mag., 222. 10. (1899).

fuscicornis MEIG., S. B., VII. 343. 4. [*Dryomyza*] (1838); BECK., Germania.

Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipterolog., 220. (1902).

fuscinervis ZETT. = *squalida* MEIG.

glabrata ZETT. = *suilla* FABR.

humilis ROB-DESV., Myod., 628. 9. (1830). Gallia.

incisa MACQ., MEIG. = *suilla* FABR.

incola BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 54. 104. (1900). Sibiria.

✕ *inquinata* MEIG., S. B., V. 250. 5. (1826); ZETT., Dipt. Scand., V. 1963. Europa.

3. [*Scatomyza*] (1846); SCHIN., F. A., II. 17. (1864); ROND., Prodr.,

VII. Scatophag. 26. 4. (1866); BECK., Berlin. entom. Zeitschr.,

XXXIX. 168. 96. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 222. 8.

(1899).

? *thoracica* ROB-DESV., Myod., 626. 5. (1830).

islandica BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 175. 112. (1894) Now-Semlja,

et Mém. de l'Acad. Imp. des sc. St. Petersburg., p. 396. 1. (1). (1897). Islandia.

lanata LUNDB., Vidensk. Medd., p. 294. 135. (1900). Groenlandia.

lateralis MEIG., S. B., V. 251. 9. (1826); SCHIN., F. A., II. 18. (1864); Germania.

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 172. 108. (1894).

limbata v. ROS., Württemb. Corubl., 59. (1840).

litorea FALL., Dipt. Suec. Scatomyz., 4. 4. [*Scatomyza*] (1819); MEIG., Europa,

S. B., V. 254. 15. (1826); ZETT., Ins. Lapp., 722. 8. [*Scatomyza*] Groenlandia,

(1838); STAEG., Naturh. Tidskr., ser. 2. I. 360. 46. (1845); ZETT., Dipt. Now-Semlj.

Scand., V. 1975. 12. [*Scatomyza*] (1846); SCHIN., F. A., II. 18.

(1864); WALK., Ins. Brit. Dipt., II. 155. 6. (1853); ROND., Prodr.,

VII. Scatophag. 29. 2. [*Scatina*] (1866); BECK., Berlin. entom.

Zeitschr., XXXIX. 172. 109. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag.,

223. 16. (1899); LUNDB., Vidensk. Medd., 296. 137. (1900).

nigripes HOLMGR., Kgl. Vet. Akad. Handl., VIII. 5. 34. [*Scato-*

myza] (1869) et Entomol. Tidskr., 172. 32. (1880).

✕ *lurida* SCHIN., F. A., II. 4. [*Cordylura*] (1864); BECK., Berlin. entom. Alpes,

Zeitschr., XXXIX. 170. 104. t. IX. f. 4. (1894). Germania.

✕ *lutaria* FABR., Entom. syst., IV. 344. 134. [*Musca*] (1794) et Syst. Europa.

Antl., 306. 115. [*Musca*] (1805); MEIG., S. B., V. 249. 4. (1826);

MACQ., Suit. à Buff., II. 393. 2. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 720. 2.

var. a. [*Scatomyza*] (1838) et Dipt. Scand., V. 1962. 2. (1846);

WALK., Ins. Brit. Dipt., II. 154. 4. (1853); SCHIN., F. A., II. 17.

(1864); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 26. 3. (1866); BECK., Ber-

lin. entom. Zeitschr., XXXIX. 169. 100. (1894); MEADE, Entom.

Monthly Mag., 222. 7. (1894).

suilla var. a. FALL., Dipt. Suec. Scatomyz., 3. 2. (1819).

- maculipes** ZETT., Dipt. Scand., V. 1964. 4. [*Scatomyza*] (1846); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 27. 5. (1866); HOLMGR., Entom. Tidskr. 172. 31. (1880); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 168. 97. t. IX. f. 10. (1894). Europa, Now-Semlja.
- suilla** var. **b.** ZETT., Ins. Lapp., 720. 2. [*Scatomyza*] (1838).
- magnipennis** PORTSCH., Horae Soc. ent. Ross., XXI. 23. (1887). Asia centr.
- X **merdaria** FABR., Ent. syst., IV. 344. 133. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 306. 114. [*Musca*] (1805); MEIG., S. B., V. 249. 3. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 294. 6. (1835); BOUCHÉ, Naturgesch., I. 93. 94. (1834); ZETT., Dipt. Scand., V. 1970. 8. [*Scatomyza*] (1846); LUCAS, Explor. scientif. de l'Algérie, III. 495. 248. (1849); WALK., Ins. Brit. Dipt., II. 154. 3. (1853); SCHIN., F. A., II. 18. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 169. 102. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 221. 2. (1899). Europa, Africa sept., Ins. Canar.
- mollis** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 171. 106. (1894). Sibiria.
- multisetosa** HOLMGR., Entom. Tidskr., 174. 37. [*Scatomyza*] (1880). I. Waigatsch.
- nemorosa** ROB-DESV. = **suilla** FABR.
- nigricans** MACQ., MEIG. = **squalida** MEIG.
- nigricornis** ROB-DESV., Myod., 627. 6. (1830). Gallia.
- nigripes** HOLMGR. = **litorea** FALL.
- obscurinervis** BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 55. 105. (1900). Sibiria.
- ochrocephala** BRULLÉ, Exped. de Morée, III. 320. 701. t. XLVII. f. 10. (1832). Graecia.
- ordinata** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 168. 98. (1894). Helvetia.
- parisiensis** ROB-DESV., Myod., 629. 1. [*Amina*] (1830). Gallia.
- parisiensis** MACQ., Suit. à Buff., II. 394. 7. (1835); MEIG., S. B., VII. 342. 16. (1838). Gallia.
- rudis** HALID., Cult. Brit. Entom., 405. (1832); MEADE, Entom. Monthly Mag., 224. 18. (1899). Britannia.
- rufipes** MEIG., S. B., V. 253. 13. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 395. 13. (1835). Germania.
- scatomyzoides** ZETT., Ins. Lapp., 727. 10. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Scand., V. 2011. 14. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 167. 95. (1894). Lapponia.
- scybalaria** L., Fauna Suec., 1860. [*Musca*] (1761); FABR., Spec. Ins., II. 449. 72. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2853. 104. [*Musca*] (1788); FABR., Syst. Antl., 307. 118. [*Musca*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Scatomyz., 3. 1. [*Scatomyza*] (1819); LATR., Gen. Crust., IV. 358. (1809); MEIG., S. B., V. 247. 1. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 392. 1. (1835); ROB-DESV., Myod., 624. 1. (1830); ZETT., Ins. Lapp., 720. 1. [*Scatomyza*] (1838) et Dipt. Scand., V. 1960. 1. [*Scatomyza*] (1846); WALK., Ins. Brit. Dipt., II. 153. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 17. (1864); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 25. 2. (1866); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 166. 92. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 221. 4. (1899). Europa.
- scybalaria** SCHRANK = **stercoraria** L.
- septentrionalis** BECK. = **varipes** HOLMGR.

serotina PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., I. 8. 48. t. V. f. 2. (1832); Gallia.

BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, p. 87. (1883).

spurca MEIG., MACQ., ZETT., SCHIN. = **suilla** FABR.

× **squalida** MEIG., S. B., V. 252. 10. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa,
394. 9. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 721. 6. [*Scatomyza*] (1838); Groenlandia.

STAEG., Naturhist. Tidskr., II. I. 366. 45. (1845); ZETT., Dipt. Scand.,
V. 1972. 10. [*Scatomyza*] (1846); WALK., Ins. Brit. Dipt., II. 155.
5. (1835); SCHIN., F. A., II. 18. (1864); ROND., Prodr., VII. Scatoph.
29. 1. [*Scatina*] (1866); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX.
172. 107. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 223. 14. (1899);
LUNDB., Vidensk. Medd., 295. 136. (1900).

fuscinervis ZETT., Ins. Lapp., 733. 38. [*Cordylura*] (1838), Ins.
Lapp., 722. 7. [*Scatomyza*] (1838) et Dipt. Scand., V. 1974.
11. [*Scatomyza*] (1846).

nigricans MEIG., S. B., VII., 342. 19 (1838); MACQ., Suit. à Buff.,
II. 395. 11. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II.
219. 19. (1902).

× **stercoraria** L., F. Suec., 1861. [*Musca*] (1763); RÉAUMUR, Ins. IV. Sibiria,
Mém., 9. 118. t. XXVI. (1738); DE GEER, Ins., 6. 88. 17. [*Musca*] Now-Seml.,
(1776); GMEL., Syst. Nat., V. 2853. 105. [*Musca*] (1788); FABR., Africa sept.,
Ent. syst., IV. 345. 133. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 307. 119. Ins. Canar.,
[*Musca*] (1805); LATR., Gen. Crust., IV. 358. [*Musca*] (1809); Asia min.
FALL., Dipt. Suec. Scatomyz., 4. 3. [*Scatomyza*] (1819); MEIG., S.
B., V. 248. 2. (1826); ROB.-DESV., Myod., 627. 7. (1830); MACQ.,
Suit. à Buff., II. 393. 5. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 721. 3. [*Scato-*
myza] (1838) et Dipt. Scand., V. 1968. 7. [*Scatomyza*] (1846);
WALK., Ins. Brit. Dipt., II. 153. 2. (1853); SCHIN., F. A., II. 18.
(1864); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 25. 1. (1866); HOLMGR.,
Entom. Tidskr., 173. 351. (1880); BECK., Berlin. entom. Zeitschr.,
XXXIX. 169. 100. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 220.
1. (1899); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 53. 102. (1900);
SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Bresl., I—III. pag. 10. Biol.; BOUCHÉ,
Naturg., I. 93. 94. Biol. (1834); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien,
87. Metamorph., (1883).

scybalaria SCHRANK, Ins. Austr., 468. 950. (1781) et F. Boica,
III. 2499. (1802).

Stuxbergi HOLMGR., Entom. Tidskr., 174. 36. [*Scatomyza*] (1880). Now-Semlja.

× **suilla** FABR., Ent. syst., IV. 343. 129. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., Europa centr.
206. 14. [*Musca*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Scatomyz., 3. 2. et sept.,
var. 8. [*Scatomyza*] (1819); ZETT., Dipt. Scand., V., 1965. 5. [*Scato-* Sibiria.
myza] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 167. 94.
(1894) et Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 53. 103. (1900).

nemorosa ROB.-DESV., Myod., 625. 3. (1830).

spurca MEIG., S. B., V. 250. 6. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 393.
4. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 720. 2. *var. b. c.* [*Scatomyza*]
(1838) et Dipt. Scand., V. 1967. 6. [*Scatomyza*] (1846);
SCHIN., F. A., II. 17. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u.
Dipt., II. 217. 6. (1902).

- glabrata* ZETT., Ins. Lapp., 721. 5. [*Scatomyza*] (1838).
incisa MACQ., Suit. à Buff., II. 394. 10. (1835); MEIG., S. B., VII. 342. 18. (1838); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 219. 18. (1902).
suilla var. *b.* ZETT. = *maculipes* ZETT.
suilla var. *a.* FALL. = *lutaria* FABR.
taeniopa ROND., Prodr., VII. Scatophag. 27. 6. (1866); BECK., Berlin. Italia.
 ent. Zeitschr., XXXIX. 166. 93. (1894).
tesselata MACQ., Ann. Soc. entom. de Fr., I. 7. 424. (1822). Gallia.
thoracica ROB.-DESV. = *inquinata* MEIG.
turpis HALID., Curt. Brit. Entom., 405. (1832). Britannia.
umbrarum ROB.-DESV., Myod. 626. 4. (1830). Gallia.
varipes HOLMGR., Entom. Tidskr., 175. 38. [*Scatomyza*] (1830). Now.-Semlja.
septentrionalis BECK., Mém. de l'Acad. Imp. des se. St. Petersburg., 2. 2. (1897).
villipes ZETT., Ins. Lapp., 722. 8. [*Scatomyza*] (1838) et Dipt. Scand., V. 1977. 13. [*Scatomyza*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 173. 110. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 224. 17. (1899); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 55. 106. (1900). Norvegia, Sibiria.

Ceratinostoma

MEADE, Entom. Monthly Mag., XXII. 152. (1885—86).

Lispa p. p. BIGOT.

- boreale* ZETT. = *ostiorum* HALID.
lestremense BIG. = *ostiorum* HALID.
maritimum MEADE = *ostiorum* HALID.
oceanum MACQ. = *ostiorum* HALID.
ostiorum HALID., Curt. Brit. Entom., 405. [*Scatophaga*] (1832); MEADE, Europa sept.
 Entom. Monthly Mag., 218. 1. (1899).
boreale ZETT., Ins. lapp., 721. 4. [*Scatomyza*] (1838) et Dipt. Scand., V. 1971. 9. [*Scatomyza*] (1846).
lestremense BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., sér. 6. IV. 292. [*Lispa*] (1884).
maritimum MEADE, Entom. Monthly Mag., XXII. 152—154. (1885) et 178. (1885); v. RÖD., Wien. entom. Zeitg., III. 290. (1884); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 170. 103. [*Scatophaga*] (1894).
oceanum MACQ., Ann. Soc. entom. Fr., VII. 423. [*Scatophaga*] (1838).

Coniosternum

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 176. XXXII. (1894).

- obscurum* FALL., Dipt. Suec. Scatomyz., 9. 6. [*Cordylura*] (1819); Europa centr.
 MACQ., Suit. à Buff., II. 385. 3. [*Cleigastra*] (1835); ZETT., Dipt. et sept.

Scand., V. 2066. 57. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 177. 114. t. IX. f. 3. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 177. 2. [*Cleigastra*] (1899).

Norellinae.

Norellia = *Norellisoma* Hand. 1910

Rob.-Desv., Myod, 673. (1830).

- alpestris** SCHIN., F. A., II. 6. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 127. 55. t. IX. f. 6. (1894). Austria, Italia.
- Bertei* ROND., Prodr., VII. Scatophag. 17. 4. (1866).
- armipes** MEIG., S. B., V. 234. 10. [*Cordylura*] (1826); SCHIN., F. A., II. 6. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 127. 54. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 173. (1899). Europa, Algeria, Sibiria.
- flavicaula* MEIG., S. B., V. 235. 12. [*Cordylura*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 384. [*Cordylura*] (1835); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 495. 247. [*Cordylura*] (1849); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 127. 57. (1894), Acta Soc. scient. Fenn., 53. 100. (1900) et Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 213. 10. (1902).
- ruficauda* ZETT., Ins. Lapp., 733. 35. [*Cordylura*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., V. 2055. 49. [*Cordylura*] (1846).
- flava* v. Ros., Württemb. Corrb., 59. [*Cordylura*] (1840).
- Roseri* ROND., Prodr., VII. Scatophag. 17. 3. (1866).
- Bertei* ROND. = **alpestris** SCHIN.
- femoralis** LW., Wien. entom. Monatschr., VIII. 18. 2. [*Cordylura*] (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 129. 60. t. IX. f. 12. (1894). Austria, Helvetia.
- flava* v. Ros. = **armipes** MEIG.
- flavicauda* MEIG., MACQ., LUCAS, BECK. = **armipes** MEIG.
- flavicornis** MEIG., S. B., V. 239. 22. [*Cordylura*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 387. 13. [*Cleigastra*] (1835). Europa centr. et sept.
- spinigera* ZETT., Ins. Lapp., 733. 34. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Scand., V. 2054. 48. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 128. 59. (1894) et Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 214. 22. (1902).
- Lesgiae** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 129. 61. (1894). Caucasus.
- X **litorata** MEIG., S. B., V. 238. 19. [*Cordylura*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 387. 12. [*Cleigastra*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2056. 49—50. [*Cordylura*] (1846); SCHIN., F. A., II. 7. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 128. 58. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 173. 4. (1899); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 53. 101. (1900). Europa, Sibiria.
- opaca* LW., Wien. ent. Monatschr., VIII. 19. 3. [*Cordylura*] (1864).
- X **nervosa** MEIG., S. B., V. 234. 9. t. XLV. f. 21. [*Cordylura*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 383. 12. [*Cordylura*] (1835); SCHIN., F.

A., II. 5. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 126.
52. (1894); MEADE, Entomol. Monthly Mag., 173. 2. (1899).

opaca LW. = *litorata* MEIG.

Roseri ROND. = *armipes* MEIG.

ruficauda ZETT. = *armipes* MEIG.

semiflava PANZ. = *spinimana* FALL.

spinigera ZETT. = *flavicornis* MEIG.

X *spinimana* FALL., Dipt. Suec. Scatom., 7. 3. [*Cordylura*] (1819); MEIG., Europa.

S. B., V. 235. 13. [*Cordylura*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 383.

11. [*Cordylura*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2007. 11. [*Cordylura*]

(1846); SCHIN., F. A., II. 7. (1864); ROND., Prodr., VII. Scatophag.

17. 2. (1866); GERCKE, Verh. d. Vereins. f. naturw. Unterh.

Hamburg, VI. 46. t. II. 20. Metamorph. (1880); BRAUER, Zweifl.

d. Kais. Mus. Wien, 93. Metamorph. (1883); BECK., Berlin. entom.

Zeitschr., XXXIX. 127. 56. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag.,

173. 1. (1899).

semiflava PANZ., Fauna Germ., LIX. 19. [*Musca*] (1798).

striata MACQ. = *striolata* MEIG.

X *striolata* MEIG., S. B., V. 235. 11. [*Cordylura*] (1826); SCHIN., F. A., Europa centr.

II. 6. (1864); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 16. 1. (1866); BECK., et mer.

Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 127. 53. (1894).

striata MACQ., Suit. à Buff., II. 383. 13. (1835).

Zetterstedti GIMMERTH., Corresp. v. Riga, I. 104. (1846).

Rossia.

Achantholena = *Norellia* Desv.

ROND., Prodr., I. 101. 10. (1856).

maculipennis ROND. = *spinipes* MEIG.

melaleuca LW. = *spinipes* MEIG.

pseudonarcissi ROB.-DESV. = *spinipes* MEIG.

spinipes MEIG., S. B., V. 237. 16. [*Cordylura*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., Europa centr.

II. 386. 8. [*Cleigastra*] (1835); SCHIN., F. A., II. 7. [*Norellia*] (1864); et mer.

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 131. 62. t. IX. f. 5. (1894).

pseudonarcissi ROB.-DESV., Myod., 673. 1. [*Norellia*] (1830).

maculipennis ROND., Prodr., VII. Scatophag. 18. 1. (1866).

melaleuca LW., Europ. Dipt., III. 245. 158. [*Cordylura*] (1873).

Hydromyzinae.

Hydromyza

FALL., Dipt. Suec. Hydromyz., I. 1. (1823).

Nupharia ROB.-DESV., Myod., 78. 5. 1. (1830).

X *livens* FABR., Ent. syst., IV. 345. 135. [*Musca*] (1794); FALL., Dipt. Europa centr.

Suec. Hydromyz., I. 1. (1823); CURTIS, Brit. Entom., 485. (1832); et sept.

MEIG., S. B., V. 243. 31. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 386. 7.

(1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2035. 34. [*Cordylura*] (1846); SCHIN., F. A., II. 14. (1864); GERCKE, Verh. d. Vereins f. nat. Unterh. Hamburg, V. 229. Verwandl. (1878); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 135. 63. t. VI. f. 7. 8. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 175. 1. (1899).

rivularis ROB.-DESV., Myod., 785. I. 1. [*Nupharia*] (1830).

rivularis ROB.-DESV. = *livens* FABR.

Ernoneura

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 135. XIX. (1894).

Argus ZETT., Ins. Lapp., 727. 16. [*Scatomyza*] (1838) et Dipt. Scand., Lapponia, V. 1980. 16. [*Scatomyza*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., Germania, XXXIX. 136. 64. (1894); RIEDEL, Allgem. Zeitschr. f. Entom., VI. 152. (1901).

Acanthocnema

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 136. XX. (1894).

glaucescens LW., Wien. entom. Monatschr., VIII. 23. 7. [*Cordylura*] Europa centr. (1873); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 138. 66. t. VII. f. 8. 9. (1894).

latipenne BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 138. 67. (1894). Silesia.

nigrimanum ZETT., Dipt. Scand., V. 2040. 37. [*Cordylura*] (1846); Europa centr. BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 137. 65. (1894). et sept.

Tifi MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 252. 2. [*Hydromyza*] (1883).

Tifi MIK = **nigrimanum** ZETT.

Pogonota

ZETT., Ins. Lapp., 735. (1838).

barbata ZETT., Ins. Lapp., 734. 42. (1838) et Dipt. Scand., V. 2074. Europa sept. 63. (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 140. 69. t. VIII. f. 1. 2. (1894).

hircus ZETT., Ins. Lapp., 735. 43. (1838) et Dipt. Scand., V. 2072. 62. Europa sept. (1846); SCHIN., F. A., II. 8. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 139. 68. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 175. 1. (1899).

sponsa ZETT., Ins. Lapp., 735. 44. [*Cordylura*] (1838).

sponsa ZETT. = **hircus** ZETT.

Okenia = *Okeniella* Hms.

ZETT., Ins. Lapp., 734. (1838).

caudata ZETT., Ins. Lapp., 734. 40. (1838) et Dipt. Scand., V. 2075. Lapponia, 64. (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 141. 70. t. Sibiria. VIII. f. 3, 4. (1894) et Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 51. 92. (1900).

melanura ZETT., Ins. Lapp., 731. 28. [*Cordylura*] (1838).

dasyprocta Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 25. 8. [*Cordylura*] (1864); Sibiria,
BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 142. 71. (1894) et Acta Lapponia.
Soc. scient. Fenn., XXVI. 51. 93. (1900).

melanura ZETT. = **caudata** ZETT.

Bostrichopyga

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 142. XXIII. (1894).

borealis HEND., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 7. p. 385. (1903). Norvegia.

crassipes ZETT., Ins. Lapp., 734. 41. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Scand., Suecia.

V. 2077. 65. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr.,
XXXIX. 143. 72. t. VIII. f. 7. (1894).

Lasioscelus

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 143. XXIV. (1894).

clavatus ZETT., Dipt. Scand., V. 2041. 38. [*Corlylura*] (1846); BECK., Sibiria,
Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 144. 73. t. VII. f. 1, 2. (1894) et Suecia.

Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 51. 94. (1900).

immunda ZETT. Dipt. Scand., V. 2071. 61. [*Cordylura*] (1894).

immundus ZETT. = **clavatus** ZETT.

nigricans Lw., ? Europ. Dipt., III. 251. 162. [*Cordylura*] (1873). Rossia asiat.

Sahlbergi BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 51. 95. (1900). Sibiria.

Staegeria

ROND., Prodr., I. 99. (1856) et VII. 3. II. (1866).

Kuntzei ZETT., Iter Lapp., p. 1. 263. [*Cordylura*] (1821), Ins. Lapp., Suecia.

728. 13. [*Cordylura*] (1838), Iter Jemtland., 518. [*Cordylura*] (1840)

et Dipt. Scand., V. 2016. 17. [*Cordylura*] (1840); ROND., Prodr.,

VII. Scatophag. 3. (1866); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX.

145. 74. t. VI. f. 5, 6. (1894).

Cosmetopus

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 146. XXVI. (1894).

Bergrothi BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 48. 88. (1900). Sibir., Fennia.

dentimanus ZETT., Ins. Lapp., 730. 22. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Suecia,

Scand., V. 2033. 32. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. Lapponia.

Zeitschr., XXXIX. 147. 75. t. VII. f. 5, 6. (1894).

simplicipes BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 50. 89. (1900). Sibiria.

Acerocnema

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 154. XXVIII. (1894).

breviseta ZETT., BECK. = **macrocera** MEIG.

breviseta MIK = **Tieff** BECK.

fulvipes MEIG. = ? **Tieff** BECK.

latipalpis MEIG., MACQ. = **macrocera** MEIG.

macrocera MEIG., S. B., V. 241. 25. ♂. [*Cordylura*] (1826); MACQ., Europa centr. et sept.

Suit. à Buff., II. 385. 4. [*Cleigastra*] (1835).

latipalpis MEIG., S. B., V. 241. 26. ♀. [*Cordylura*] (1826); MACQ.,

Suit. à Buff., II. 385. 5. [*Cleigastra*] (1835).

breviseta ZETT., Dipt. Scand., V. 2022. 23. [*Cordylura*] (1846);
BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 154. 85. t. VIII. f.
10. t. IX. f. 9. (1894) et Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II.
215. 25. (1902).

magnicornis ZETT., Dipt. Scand., V. 2032. 31. ♂. [*Cordylura*]
(1846).

macrocera SCHIN. (nec MEIG.) = **Pokorny** BECK.

magnicornis ZETT. = **macrocera** MEIG.

Pokorny BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 157. 87. (1894). Karinthia.

macrocera SCHIN. (nec MEIG.), F. A., II. 10. [*Cleigastra*] (1864).

Tieff BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 155. 86. (1894). Europa centr.

breviseta MIK. (nec ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 186. t. IV. et sept.
f. 16. [*Clidogastra*] (1887).

? *fulvipes* MEIG., S. B., VII. 341. 40. [*Cordylura*] (1838).

Tricopalpus

ROND., Prodr., I. 100. (1856) et VII. 22. XI. (1866).

flavipes MEIG. (nec FALL.) = **punctipes** MEIG.

fraternus MEIG., S. B., V. 243. 30. [*Cordylura*] (1826); ZETT., Dipt. Europa.

Scand., V. 2038. 36. [*Cordylura*] (1846); SCHIN., F. A., II. 14.

[*Hydromyza*] (1864); ROND., Prodr., I. Scatophag. 22. 2. (1866);

BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIX. 157. 88. (1894); MEADE,

Entom. Monthly Mag., 176. 1. (1899).

X **punctipes** MEIG., S. B., V. 239. 20. [*Cordylura*] (1826); MACQ., Suit. Europa,
à Buff., II. 386. 9. [*Cleigastra*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 731. 26. Sibiria.

[*Cordylura*] (1838) et Dipt. Scand., V. 2046. 42. [*Cordylura*] (1846);

SCHIN., F. A., II. 10. [*Cleigastra*] (1804); ROND., Prodr., VII. Sea-

tophag., 23. 1. (1866); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX.

158. 89. t. VII. f. 7. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 217.

[*Cleigastra*] (1899); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 51. 91.

(1900).

flavipes MEIG. (nec FALL.), S. B., V. 239. 21. [*Cordylura*] (1826);

BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 214. 21. (1902).

Spathiophora

ROND., Prodr., I. 99. (1856) et VII. 7. I. (1866).

albitarsis ZETT. = *hydromyzina* FALL.

Falleni SCHIN. = *hydromyzina* FALL.

X *fascipes* BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 160. 91. (1894).

Germania.

hydromyzina var. *b.* ZETT., Dipt. Scand., V. 2037. 35. [*Cordylura*] (1846); MACQ., Suit. à Buff., II. 385. 6. [*Cleigastra*] (1835).

hydromyzina FALL., Dipt. Suec. Scatomyz., 7. 2. [*Cordylura*] (1819); MEIG., S. B., V. 242. 29. [*Cordylura*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 385. 6. [*Cleigastra*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2037. 35. var. *a.* [*Cordylura*] (1846); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 2. 1. (1866); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 160. 90. t. VII. f. 3, 4 et t. IX. f. 7. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 223. 12. [*Scatophaga*] (1899); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 51. 90. (1900).

Europa centr.
et sept.,
Sibiria.

albitarsis ZETT., Ins. Lapp., 728. 14. [*Cordylura*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., V. 2017. 18. [*Cordylura*] (1846).

Falleni SCHIN., F. A., II. 14. [*Hydromyza*] (1864).

hydromyzina var. *b.* ZETT. = *fascipes* BECK.

Microprosopa

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 147. XXVII. (1894).

albipennis ZETT., Ins. Lapp., 729. 17. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Scand., V. 2017. 19. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 151. 78. (1894) et Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 53. 96. (1900).

Europa sept.,
Sibiria.

niveipalpis ZETT., Dipt. Scand., V. 2044. 41. [*Cordylura*] (1846).

frigida HOLMGR., Entom. Tidskr., 176. 40. [*Cordylura*] (1880).

Now.-Semlja.

frontata ZETT., Ins. Lapp., 724. 15. [*Scatomyza*] (1840) et Dipt. Scand., V. 1979. 15. [*Scatomyza*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 153. 84. (1894).

Suecia.

fulvipes ZETT., Ins. Lapp., 732. 32. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Scand., V. 2052. 46. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 152. 82. (1894).

Suecia.

haemorrhoidalis MEIG., S. B., V. 237. 17. [*Cordylura*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 731. 27. var. *a.* et *b.* [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Scand., V. 2047. 43. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 149. 76. (1894) et Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 53. 98. (1900).

Europa centr.
et sept.,
Sibiria.

lividipes ZETT., Dipt. Scand., V. 2042. 39. [*Cordylura*] (1846).

melanura ZETT., Ins. Lapp., 731. 28. [*Cordylura*] (1838).

pallipes ZETT., Ins. Lapp., 732. 29. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Scand., V. 2049. 44. [*Cordylura*] (1846).

heteromyzina ZETT., Ins. Lapp., 723. 14. [*Scatomyza*] (1838) et Dipt. Lapponia.

- Scand., V. 1978. 14. [*Scatomyza*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 152. 80. (1894).
- lineata** ZETT., Ins. Lapp., 732. 31. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Scand., Lapponia. V. 2051. 45. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIX. 152. 79. (1894).
- lividipes** ZETT. = **haemorrhoidalis** MEIG.
- lucida** BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 53. 99. (1900). Sibiria.
- melanura** ZETT. = **haemorrhoidalis** MEIG.
- niveipalpis** ZETT. = **albipennis** ZETT.
- obscura** ZETT., Dipt. Scand., V. 2043. 40. [*Cordylura*] (1846); BECK., Suecia. Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 153. 83. (1894).
- pallicauda** ZETT., Ins. Lapp., 733. 36. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Suecia, Scand., V. 2053. 47. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. Sibiria. Zeitschr., XXXIX. 150. 77. t. VIII. f. 9. (1894) et Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 53. 97. (1900).
- pallipes** ZETT. = **haemorrhoidalis** MEIG.
- strigifrons** ZETT., Ins. Lapp., 728. 15. [*Cordylura*] (1838) et Dipt. Lapponia. Scand., V. 2028. 28. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 152. 81. (1894).
- varitibia** BECK., Mém. de l'Acad. Imp. des sc. St. Petersb., 400. (5). Now.-Semlja. 4. (1897).

Clidogastrinae.

Clidogastra

MACQ., Suit. à Buff., II. 384. 6. [*Cleigastra*] (1835).

Delina ROB.-DESV., Myod., 670. (1830).

- × **anthrax** SCHIN., F. A., II. 12. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., Alpes centr. XXXIX. 181. 118. (1894).
- bicolor** MACQ., Suit. à Buff., II. 387. 15. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia. 342. 43. [*Cordylura*] (1838).
- carbonaria** POKORNY, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 411. t. Alpes. VII. f. 7. (1887); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 180. 117. (1894).
- Dejeanii** ROB.-DESV., Myod., 670. 2. [*Delina*] (1830). Gallia.
- erythrocephala** MEIG., S. B., VII. 340. 39. [*Cordylura*] (1838). Germania.
- frontalis** MACQ., Suit. à Buff., II. 387. 14. (1835). Gallia.
- fulvipes** MEIG. S. B., VII. 341. 40. [*Cordylura*] (1838). Germania.
- nigriceps** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 181. 119. (1894) Helvetia, et Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 56. 107. (1900). Sibiria.
- nigripila** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6328. 22—23. [*Cordylura*] (1860). Suecia.
- nigrita** FALL., Dipt. Suec. Scatom., 10. 9. [*Cordylura*] (1819); MEIG., Europa centr. S. B., V. 240. 23. [*Cordylura*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 384. et sept, 2. [*Cleigastra*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 728. 16. [*Cordylura*] (1838) Sibiria. et Dipt. Scand., V. 2031. 30. [*Cordylura*] (1846); ROND., Prodr.,

VII. Scatophag., 20. 2. (1866); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 180. 116. t. IX. f. 1. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 176. 1. (1899); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 57. 108. (1900).

nitida WULF, Tijdschr. v. Entomol., XIV. (1871).

Hollandia.

tibialis ROB.-DESV., Myod., 669. 1. [*Delina*] (1830).

Gallia.

Cochliarium

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 183. XXXV. (1894).

albipila ZETT., Dipt. Scand., V. 2021. 22. [*Cordylura*] (1846); BECK., Suecia. Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 185. 125. (1894).

castanipes BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 185. 124. (1894). Helvetia.

cuneiventris ZETT., Dipt. Scand., V. 2020. 21. [*Cordylura*] (1846); Suecia.

BECK., Berlin. ent. Zeitschr., 184. 122. (1894).

lasiostoma BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 184. 123. t. VIII. Helvetia. f. 8. t. IX. f. 8. (1894).

Gimnomera

ROND., Prodr., VII. Scatoph. 21. X. (1866).

dorsata ZETT., Ins. Lapp., 735. 46. *var. a et b.* [*Cordylura*] (1838) Suecia, et Dipt. Scand., V. 2079. 67. [*Cordylura*] (1846); BECK., Berlin. Tyrolis. entom. Zeitschr., XXXIX. 182. 120. t. IX. f. 2. (1894); MEADE, Entom. Monthly Mag., 177. 4. (1899).

pectoralis ZETT., Ins. Lapp., 734. 39. [*Cordylura*] (1838).

mellina BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 57. 109. (1900).

Sibiria.

pectoralis ZETT. = *dorsata* ZETT.

tarsea FALL., Dipt. Suec. Scatom., 8. 5. [*Cordylura*] (1819); MEIG., Europa centr. S. B., V. 242. 27. [*Cordylura*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 735. 47. et sept.

[*Cordylura*] (1838) et Dipt. Scand., V. 2078. 66. [*Cordylura*] (1846);

ROND., Prodr., VII. Scatoph. 21. 1. (1866); BECK., Berlin. entom.

Zeitschr., XXXIX. 183. 121. (1894); MEADE, Entom. Monthly

Mag., 177. 3. (1899).

Genera incerta

Orthostylum

MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 272. (1850).

rufipes MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 273. (1850).

Aegyptus.

Sargella

ROB.-DESV., Myod., 674. VIII. (1830).

cylindrica ROB.-DESV., Myod., 675. 1. (1830).

Gallia.

Volusia = *Tanyptera*

Rob.-Desv., Myod., 674. VII. (1830).

nitida Rob.-Desv., Myod., 674. 1. (1830).

Gallia.

Thyreophorinae.

Thyreophora

Meig., Illig. Mag., II. 276. (1830).

anthropophaga Rob.-Desv., Myod. 623. 3. (1830); Macq., Suit. à Buff., Gallia.

II. 498. 3. (1835); Meig., S. B., VII. 362. 2. (1838); Rond., Chylizin., 5. 5. (1876); Beck., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 218. (1902).

cynocephala Panz., F. Germ., XXIV. 22. [*Musca*] (1794); Latr., Gen. Crust., IV. 358. (1809) et Considérat., 444.; Meig., S. B., V. Germania, Gallia.

401. 1. t. LIV. f. 10—15. (1826); Rob.-Desv., Myod., 622. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 497. 1. (1835); Rob.-Desv., Ann. Soc. ent. Fr., 1 série tom. X. 273. (1841); Schin., F. A., II. 20. (1864); Rond., Chyliz., 5. 2. (1876); Brauer, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, p. 87. (1883); Beck., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 218. (1902).

Centrophlebomyia

Hend., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., III. 216. (1903).

furcata Fabr., Ent. syst., IV. 343. 131. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 306. 112. [*Musca*] (1805); Latr., Gen. Crust., IV. 359. (1809); Coqueb., Icon., t. XXIV. fig. 9.; Meig., S. B., V. 252. 12. [*Scatophaga*] (1826); Rob.-Desv., Myod., 623. 2. [*Thyreophora*] (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 498. 2. [*Thyreophora*] (1835); Rob.-Desv., Ann. Soc. ent. Fr., 2 série, tom. 7. V., VII. [*Thyreophora*] (1848); Lucas, Expl. scient. de l'Alger., III. 499. 264. [*Thyreophora*] (1849); Schin., F. A., II. 20. [*Thyreophora*] (1864); Rond., Chyliz., 5. 2. [*Thyreophora*] (1876); Meade, Entom. Monthly Mag., 224. 1. [*Thyreophora*] (1899); Beck., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 217. 12. [*Thyreophora*] (1902).

Gallia, Africa sept.

PHYCODROMIDAE.

Phycodromia = *Malacomyza* Hal. 1839

Stenl., Copromyz. Scand., 12. (1855).

Coelopa p. p., Zett., Dipt. Scand., VI. 2474. 3. (1847).*Malacomyia* Halid., Ann. of nat. hist., II. 186. (1839). *not Desv. 1830.*

* *fucorum* Zett., Dipt. Scand., VI. 2474. 3. [*Coelopa*] (1847); Stenl., Europa centr. et sept.

Coprom. Scand., 12. 1. (1855); Schin., F. A., II. 21. (1864).

- meridionalis** ROND., Prodr., VII. Scatoph. 48. 2. (1866); STROBL, Wien. Entom. Zeitg., XIX. 67. 341. (1900) et Wissensch. Mitth. a. Bosnien. Wien, 67. (1900). Europa mer.
- sciomyzina** HALID., Entom. Mag., I. 167. [*Coelopa*] (1833) et Ann. of nat. hist., II. 186. 4. [*Malacomysia*] (1839). Britannia.

Oedoparea = *Heteromyza* Fall.

Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 10. (1859).

- Actora* HALID., Ent. Mag., I. (1833).
- Exocheila* ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 72. XIV. (1866) et Atti d. soc. Ital. d. sc. nat. Milano, XI. (1868).
- Heterocheila* ROND., Prodr., II. pag. 13. (1857).
- Heteromyza* p. p., FALL., Dipt. Suec. Heteromyz., 2. 2. (1820).
- Heterostoma* ROND., Prodr., I. 104. (1856).
- buccata** FALL., Dipt. Suec. Heteromyz., 2. 2. [*Heteromyza*] (1820); MEIG., S. B., VI. 47. 4. [*Heteromyza*] (1830); HALID., Ent. Mag., I. 168. [*Actora*] (1833); ZETT., Ins. Lapp., 763. 1. [*Heteromyza*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2464. 2. [*Heteromyza*] (1847); SCHIN., F. A., II. 34. [*Heteromyza*] (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 72. 5. [*Exocheila*] (1868). Europa centr. et sept.

Coelopa

MEIG., S. B., VI. 8. 194. t. LVI. f. 1—5. (1830).

- Copromyza* p. p., FALL., Heteromyz., 5. (1820).
- Fucomysia* HALID., Ann. of nat. hist., II. 186. (1839).
- eximia** STENH., Copromyz. Scand., 318. (60). 1. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6388. 1. (1860). Scandinavia, Britannia.
- frigida* HALID., Ent. Mag., I. 167. (1833) et Ann. of nat. hist., II. 2. (1839); WALK., Dipt. Brit., II. 156. 1. (1853); HOLMGR., Entom. Tidskr., 178. 45. (1883).
- frigida** FABR., Syst. Antl., 307. 116. [*Musca*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Heterom., 6. 1. [*Copromyza*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., II. 502. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 769. 1. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2472. 1. (1847); STENH., Copromyz. Scand., 320. (62). 2. (1855); ROND., Prodr., VII. Scatoph. 49. 1. (1866); SCHIN., F. A., II. 319. (1864); HOLMGR., Entom. Tidskr., 178. 46. (1883). Europa, Now.-Semi.
- gravis* HALID., Entom. Mag., I. 167. (1833).
- simplex* HALID., Entom. Mag., I. 167. (1833) et Ann. of nat. hist., II. 186. 3. [*Fucomysia*] (1839).
- frigida* MEIG. = **pilipes** HALID.
- fucorum** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2474. 3. (1847) et XIV. 6389. 3. (1860). Suecia.

- glabra** WALK., List of Diptera, IV. 1134. (1849). Britannia.
- gravis** HALID. = **frigida** FABR.
- nitidula** ZETT., STENH., LW., HOLMGR. = **parvula** HALID.
- parvula** HALID., Entom. Mag., I. 167. (1833) et Ann. of nat. hist., II. 186. 4. [*Fucomyia*] (1839). Europa sept., Now-Seml., Turcia.
- nitidula** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2473. 2. (1847); STENH., Coprom. Scand., 321. (63). 3. (1855); LW., Wien. entom. Monatschr., VI. 174. 70. (1862); HOLMGR., Entom. Tidskr., 178. 47. (1883).
- pilipes** HALID., Ann. of nat. hist., II. 186. (1839); WALK., Dipt. Brit., II. 156. 2. (1853); STENH., Coprom. Scand., 322. (64). 4. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6390. 4. (1860); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XIX. 68. 342. (1900). Europa.
- frigida** MEIG., S. B., VI. 8. 1. t. LVI. f. 1—5. (1838).
- simplex** HALID. = **frigida** FABR.

Orygma

MEIG., S. B., VI. 6. (1830).

Psolidomyia DOUMERIL, Ann. Soc. entom. Fr., II. 89. t. VI. f. 1—8. (1833).

fucicola DOUMER. = **luctuosa** MEIG.

- × **luctuosa** MEIG., S. B., VI. 6. 1. t. LV. f. 17. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 419. 1. t. XVIII. f. 18. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 768. 1. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2471. 1. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 157. 1. (1853); STENH., Copromyz. Scand., 181. 1. (1855); SCHIN., F. A., II. 21. (1864); ROND., Prodr., VII. Scatoph. 50. (1866); KIEFFER, Ann. Soc. entom. Fr., LXVII. 102. (1898). Europa sept.
- fucicola* DOUMER., Ann. Soc. entom. Fr., II. 93. t. VI. f. 1—8. [*Psolidomyia*] (1833).

BORBORIDAE.

Borborus

Cypella meig. 1800 MEIG., Illig. Mag., II. 276. (1803).

Copromyza p. p., FALL., Dipt. Suec. Heterom., 5. (1820); ZETT., Dipt. Scand., VI. (1847); STENH., Copromyz. Scand. (1855).

Mycelia ROB.-DESV., Myod., 805. VI. (1830).

Nerea ROB.-DESV., Myod., 802. IV. (1830).

Sphaerocera p. p., ROB.-DESV., Myod., 807. VII. (1830).

- aeneus** MACQ., in Lucas, Explor. scientif. de l'Algérie, III. 500. 270. Algeria. (1849).
- ater** MEIG., S. B., VI. 203. 11. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 568. 12. (1835). Germania.
- aterrimus** HALID., Entom. Mag., I. 178. (1833). Britannia.

- borealis** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2481. 5. [*Copromyza*] (1847); STENH., Lapponia.
Coprom. Scand., 338. (80). 6. [*Copromyza*] (1855).
- caprivor** ROB.-DESV. = **equinus** FALL.
- communis** ROB.-DESV. = **equinus** FALL.
- costalis** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2483. 8. [*Copromyza*] (1847); STENH., Europa centr.
Coprom. Scand., 354. (96). 13. [*Copromyza*] (1855); SCHIN., F. A., et sept.
II. 324. (1864).
- costatus** MEIG., S. B., VII. 408. 32. (1838). Germania.
- × **equinus** FALL., Dipt. Suec. Heterom., 6. 2. [*Copromyza*] (1820); Europa.
AHRENS, Faun. Ins. Europ., 15. t. XXV.; MEIG., S. B., VI. 201. 5.
(1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 566. 2. (1835); HALID., Entom.
Mag., III. 323. 4. (1836); ZETT., Ins. Lapp., 769. var. a. [*Copromyza*]
(1838); WESTW., Introduct., II. 574. (1840); ZETT., Dipt. Scand.,
VI. 2478. 3. [*Copromyza*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 175. 4.
(1853); STENH., Coprom. Scand., 340. (82). 7. [*Copromyza*] (1855);
SCHIN., F. A., II. 323. (1864); ROND., Coprom., 11. 9. (1880); BEZZI,
Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 16. 15. (1891); STROBL, Wien.
entom. Zeitg., XIX. 68. 345. (1900).
caprivor ROB.-DESV., Myod., 807. 3. [*Sphaerocera*] (1830).
communis ROB.-DESV., Myod., 807. 1. [*Sphaerocera*] (1830).
fuliginosus ROB.-DESV., Myod., 807. 2. [*Sphaerocera*] (1830).
infuscatus v. ROS., Württemb. Corrb., 64. (1840); BECK., Jahres-
ber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. i. Württemb., No. 64. pag. 66.
(1902).
vulgaris ROB.-DESV., Myod., 806. 4. [*Mycetia*] (1830).
- equinus* var. γ . FALL. = **vitripennis** MEIG.
- × **fimetarius** MEIG., S. B., VI. 202. 8. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa centr.
567. 7. (1835); ROND., Coprom., 9. 4. (1880); BECK., Zeitschr. f. et merid.
Hymenopt. u. Dipt., II. p. 346. 8. (1902).
- flavipennis** HALID., Entom. Mag., III. 324. 6. (1836); WALK., Ins. Brit., Britannia.
II. 176. 6. (1853).
- fuliginosus* ROB.-DESV. = **equinus** FALL.
- fumipennis** STENH., Coprom. Scand., 352. (94). 12. [*Copromyza*] (1855); Europa centr.
ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6392. 8—9. [*Copromyza*] (1860); SCHIN., et sept.,
F. A., II. 324. (1864); HOLMGR., Entom. Tidskr., 178. 48. [*Copromyza*] N.-Semlja.
(1883).
- fuscipennis* ZETT. = **glabrifrons** MEIG.
- **glabrifrons** MEIG., S. B., VI. 202. 9. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa centr.
568. 8. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. p. 346. et sept.
9. (1902).
fuscipennis ZETT., Dipt. Scand., VI. 2481. 6. [*Copromyza*] (1847).
suillorum HALID., Entom. Mag., III. 322. 2. (1836); WALK., Ins.
Brit., II. 175. 2. (1853); STENH., Coprom. Scand., 327. (69). 2.
[*Copromyza*] (1855); SCHIN., F. A., II. 322. (1864); ROND.,
Coprom., 10. 7. (1880).
tibialis ROB.-DESV., Myod., 806. 2. [*Mycetia*] (1830).
hamatus HALID., CURTIS = **nitidus** MEIG.

- incanus** MEIG., S. B., VI. 206. 21. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Gallia.
569. 18. (1835).
- infuscatus** v. Ros. = **equinus** FALL.
- limbinervis** ROND., Coprom., 10. 6. (1880); v. RÖD., Entom. Nachr., Hispania.
XVII. 346. (1891); STROBL, Wien. entom. Zeitschr., XIX. 68. 344.
(1900).
- longipennis** HALID., Entom. Mag., III. 324. 7. (1836); WALK., Ins. Britannia.
Brit., II. 176. 7. (1853).
- longipes** MACQ., Suit. à Buff., II. 568. 11. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
408. 31. (1838).
- lugens** MEIG., S. B., VI. 205. 18. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 569. Gallia.
16. (1835).
- luridus** MEIG., S. B., VI. 203. 13. (1830). Germania.
- modestus** MEIG., S. B., VI. 203. 12. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Gallia.
568. 13. (1835).
- nervosus** MEIG., S. B., VII. 407. 27. (1838); ROND., Coprom., 8. 3. Bavaria,
(1880). Italia.
- niger** MEIG., S. B., VI. 201. 6. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 566. Europa centr.
3. (1835); HALID., Entom. Mag., III. 322. 3. (1836); ZETT., Dipt. et sept.,
Scand., VI. 2477. 2. [*Copromyza*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. Italia.
175. 3. (1853); ROND., Coprom., 9. 5. (1880); BEZZI, Contrib. alla
F. diff. di Pavia, 16. 14. (1891).
- niger* ? **rufiventris** A. COSTA. Ann. scientif., I. 88. 11. [*Copromyza*] (1854).
- nigriceps** ROND., Coprom., 8. 1. (1880). Europa.
- nitidus** ROB.-DESV., Myod., 803. 3. [*Nerea*] (1830); MACQ., Suit.
à Buff., II. 566. 1. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2476. 1.
[*Copromyza*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 174. 1. (1853);
STENH., Coprom. Scand., 325. (67). 1. [*Copromyza*] (1855);
SCHIN., F. A., II. 323. (1864).
- nigrifemoratus** MACQ., Suit. à Buff., II. 567. 5. (1835); MEIG., S. B., Gallia.
VII. 407. 28. (1838); HALID., Entom. Mag., III. 323. 5. (1836); WALK.,
Ins. Brit., II. 175. 5. (1853).
- nigrinus** GIMMERTH., Bull. de Moscou, II. 206. 5. (1845). Rossia.
- niloticus** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, 124. 186. (1903). Aegyptus.
- nitidus** ROB.-DESV., MACQ., ZETT., WALK., STENH., SCHIN. = **nigriceps** ROND.
- nitidus** MEIG., S. B., VI. 201. 4. t. LXII. f. 18. (1830); MACQ., Suit. à Germania,
Buff., II. 566. (1835); ROND., Coprom., 8. 2. (1880); BRAUER, Zweifl. Italia,
d. Kais. Mus. Wien, p. 87. (1883). Britannia.
- hamatus** HALID., Entom. Mag., I. 177. (1833) et III. 321. 1.
(1836); CURTIS, Brit. Entom., 469. (1832).
- notabilis** COLLIN, Entom. Monthly Mag., 2. série XIII. 55. fig. 1. (1901). Britannia.
- pallidifrons** WALK. = **pallifrons** FALL.
- pallifrons** FALL., Dipt. Suec. Heterom., 7. 4. [*Copromyza*] (1820); Europa centr.
MEIG., S. B., VI. 205. 19. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2485. et sept.
10. [*Copromyza*] (1847); STENH., Coprom. Scand., 330. (72). 3.
[*Copromyza*] (1855); SCHIN., F. A., II. 324. (1864).
- pallidifrons** MACQ., Suit. à Buff., II. 569. 17. (1835).

- **pallipes** STENH., Coprom. Scand., 346. (88). 9. [*Copromyza*] (1855); Suecia.
ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6393. 10—11. [*Copromyza*] (1860).
- pallipes** MEIG., S. B., VI. 204. 16. (1830). Germania.
- pallipes** ROB.-DESV., Myod., 806. 5. (1830). Gallia.
- pilosiventris** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6395. 11—12. [*Copromyza*] Suecia.
(1860).
- punctipennis** MACQ., Suit. à Buff., II. 568. 9. (1835); MEIG., S. B., Gallia.
VII. 408. 30. (1838).
- Roserii** ROND., Coprom., 10. 8. (1880). Germania.
- rufipes** MEIG., S. B., VI. 205. 17. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 569. Alpes.
15. (1835).
- rufiventris* A. COSTA. = **niger** MEIG.
- saniosus* WESTRING = **vitripennis** MEIG.
- sordidus** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2484. 9. [*Copromyza*] (1847); STENH., Suecia.
Coprom. Scand., 351. (93). 11. [*Copromyza*] (1855).
- stercorarius** MEIG., S. B., VI. 202. 7. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Germania.
567. 4. (1835); BREMI, Isis, (1846); SCHIN., F. A., II. 324. (1864).
- suillorum* HALID., WALK., STENH., SCHIN. = **glabrifrons** MEIG.
- **tibialis** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2482. 7. [*Copromyza*] (1847); STENH., Suecia.
Coprom., 343. (85). 8. [*Copromyza*] (1855).
- tibialis* ROB.-DESV. = **glabrifrons** MEIG.
- varipes** MEIG., S. B., VI. 202. 10. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 568. Germania.
10. (1835); SCHIN., F. A., II. 324. (1864).
- **vitripennis** MEIG., S. B., 206. 20. (1830); HALID., Entom. Mag., III. Europa.
325. 8. (1836); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2485. 11. [*Copromyza*]
(1847); WALK., Ins. Brit., II. 176. 8. (1853); STENH., Coprom.
Scand., 348. (90). 10. [*Copromyza*] (1855); ROND., Coprom., 11.
11. (1880); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 68. 346. (1900);
BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 347. 20. (1902).
equina var. ? FALL., Heterom., 7. [*Copromyza*] (1820).
- *saniosus* WESTRING, Act. Holm, p. 51. t. IV. f. a—f.
- vitripennis** SCHIN. (nec MEIG.), F. A., II. 324. (1864); BECK., Zeitschr. Austria.
f. Hymenopt. u. Dipt., II. 347. 20. (1902).
- vulgaris* ROB.-DESV. = **equinus** FALL.

Therina

MEIG., S. B., VI. 197. 223. (1830).

- femoralis** MEIG., S. B., VI. 197. 1. t. LXII. f. 9. (1830); SCHIN., F. A., Europa centr.
II. 320. (1864); ROND., Prodr., VII. Agrom. 6. 1. (1875).
femorata MACQ., Suit. à Buff., II. 588. 1. (1835).
- femorata* MACQ. = **femoralis** MEIG.
- nigra** GIMMERTH., Bull. de Moseou, VII. 115. (1834). Rossia.

Olinia

ROB.-DESV., Myod., 812. XII. (1830).

analys v. ROS. = **geniculata** MACQ.*ater* HALID., WALK. = **geniculata** MACQ.*equina* var. β . FALL. = **geniculata** MACQ.

- X **geniculata** MACQ., Suit. à Buff., II. 567. 6. [*Borborus*] (1835); MEIG., Europa,
S. B., VII. 408. 29. [*Borborus*] (1838); MACQ., Barker, Webb, Ins. Canar.
Berthelot. Histoire nat. d. îles Canaries, 118. 104. [*Borborus*]
(1839); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2479. 4. [*Copromyza*] (1847); STENH.,
Coprom. Scand., 98. 14. [*Copromyza*] (1855); SCHIN., F. A., II.
322. [*Borborus*] (1864); ROND., Coprom., 11. 10. [*Borborus*] (1880).
analys v. ROS., Württemb. Corbl., 64. [*Borborus*] (1840); BECK.,
Jahresb. d. Ver. f. vaterl. Naturk. i. Württemb., No. 63. p.
66. (1902).
ater HALID., Ent. Mag., III. 325. 9. [*Borborus*] (1836); WALK.,
Dipt. Brit., II. 176. 9. [*Borborus*] (1853).
equina β . FALL., Dipt. Suec. Hydrom., 6. 2. [*Copromyza*] (1820).
hirtipes ROB.-DESV., Myod., 812. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Gallia.
571. 1. (1835).
nudipes ROB.-DESV., Myod., 813. 5. (1830). Gallia.
pallipes ROB.-DESV., Myod., 813. 4. (1830). Gallia.

Ceroptera

MACQ., Suit. à Buff., II. 564. (1835).

- ruftarsis** MEIG., S. B., VI. 199. 1. [*Borborus*] (1830); MACQ., Suit. à Europa centr.
Buff., II. 564. 1. (1835); ROND., Coprom., 15. 1. (1880); BECK., et mer.
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 345. 1. (1902).

Crumomyia

MACQ., Suit. à Buff., II. 569. IV. (1835).

- glacialis** MEIG., S. B., VI. 204. 15. [*Borborus*] (1830); MACQ., Suit. à Europa centr.
Buff., II. 570. 1. [*Borborus*] (1835); ROND., Coprom., 6. (1880); et mer.
BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 347. 15. (1902).

Aptilotus

Mik, Wien. entom. Zeitg., XVII. 206. (1898).

- paradoxus** Mik, Wien. entom. Zeitg., XVII. 208. t. III. f. 1—7. (1898); Styria, Bosn.,
STROBL, Dipt. v. Steyerm., IV. 276. (1898). Silesia.

Apterina

Macq., Suit. à Buff., II. 573. 8. (1835).

- pedestris** MEIG., S. B., VI. 209. 30. [*Borborus*] (1830); HALID., Entom. Mag., I. 177. [*Borborus*] (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 574. 1. (1835); HALID., Entom. Mag., III. 326. 1. (1836); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2506. 16. [*Limosina*] (1847); LW., Über einige b. Danzig. gef. Dipt. mit verküm. Flüg., 4. II. (1850); WALK., Ins. Brit., II. 177. 10. (1853); STENH., Coprom. Scand., 77. 5. [*Copromyza*] (1855); SCHIN., F. A., II. 321. (1864); ROND., Coprom., 41. (1880); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 65. 137. [*Borborus*] (1900).
Europa centr. et sept., Sibiria.

Sphaerocera

LATR., Hist. nat. d. Ins. et Crust., XIV. 394. (1804).

Calobata p. p., FABR., Syst. Antl. (1805).

Coprina ROB.-DESV., Myod., (1830).

Lordatia ROB.-DESV., Myod. (1830).

Heteroptera MACQ., Suit. à Buff., 570. (1835); ROND., Prodr., I. 124. 4. (1856). *Limosina*

bovina ROB.-DESV. = **denticulata** MEIG.

cadaverina ROB.-DESV. = **subsultans** FABR.

coprina ROB.-DESV., Myod., 809. 4. [*Lordatia*] (1830).

vaparariorum HALID., Entom. Mag., III. 319. 3. (1836); WALK., Ins. Brit., II. 173. 4. (1853).
Gallia, Britannia.

coprivora ROB.-DESV., Myod., 807. 3. (1830).

coronata ZETT., Ins. Lapp., 770. 4. [*Crpomomyza*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2489. 14. [*Copromyza*] (1847); STENH., Coprom. Scand., 174. 2. (1855).
Gallia, Lapponia.

crenatus MEIG. = **pusilla** FABR.

curvina ROND., Coprom., 14. 4. (1880).

curvipes LATR. = **subsultans** FABR.

denticulata MEIG., S. B., VI. 200. 3. [*Borborus*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 565. 2. (1835); HALID., Entom. Mag., III. 320. 4. (1836); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2488. 13. [*Copromyza*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 173. 3. (1853); STENH., Coprom. Scand., 175. 3. (1855); SCHIN., F. A., II. 326. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 345. 3. (1902).
Europa centr. et sept.

bovina ROB.-DESV., Myod., 810. 1. [*Coprina*] (1830).

eximia COLLIN, Entom. Monthly Mag., 2 ser. XIII. 56. f. 2. (1901).
Britannia.

hyalipennis MEIG., S. B., VII. 407. 25. [*Borborus*] (1838); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 349. 25. (1902).
Bavaria.

merdarum ROB.-DESV. = **subsultans** FABR.

monilis HALID., Entom. Mag., III. 319. 2. (1836); WALK., Ins. Brit., II. 173. 2. (1853).
Britannia.

necephaga ROB.-DESV. = **subsultans** FABR.

- obtusa* MEIG., S. B., VII. 406. 23. [*Borborus*] (1838). Bavaria.
- opaca* MEIG., S. B., VII. 406. 24. [*Borborus*] (1833); BECK., Zeitschr., f. Hymenopt. u. Dipt., II. 348. 24. (1902). Bavaria.
- pallidimana* ROND., Coprom., 15. 5. (1880). Italia.
- pallidiventris* MEIG., S. B., VI. 204. 14. [*Borborus*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 568. 14. [*Borborus*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 346. 14. (1902). Gallia.
- pusilla* FALL., Dipt. Suec. Heterom., 8. 5. [*Copromyza*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., II. 570. 1. [*Heteroptera*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 770. 3. [*Copromyza*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2490. 16. [*Copromyza*] (1847); STENH., Coprom. Scand., 177. 4. (1855); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1—3. p. 10—19.; SCHIN., F. A., II. 326. (1864); ROND., Coprom., 14. 3. (1880); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 68. 348. (1900). Europa.
- crenata* MEIG., S. B., VII. 407. 26. [*Borborus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2489. 15. [*Copromyza*] (1847); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 349. 26. (1902).
- scabricula* HALID., Entom. Mag., III. 320. 5. (1836) et Ann. of nat. hist., II. 188. (1839); WALK., Ins. Brit., II. 174. 5. (1853).
- scabricula* HALID., WALK. = *pusilla* FALL.
- stercoraria* ROB.-DESV. = *subsultans* FABR.
- subcinerea* BRULLÉ, Exped. en Morée, 319. 699. (1836). Graecia.
- ✕ *subsultans* FABR., Spec. insect., II. 444. 41. [*Musca*] (1781); SCHRANK, Ins. austr., 940. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat., I. 5. 2847. 84. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 329. 72. [*Musca*] (1794); SCHRANK, F. Boica, III. 2402. [*Rhagio*] (1803); FABR., Syst. Antl., 264. 17. [*Calobata*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Heteromyz., 7. 3. (1820); MEIG., S. B., VI. 200. 2. t. LXII. f. 17. [*Borborus*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 565. 1. t. XXII. f. 17. (1835); HALID., Entom. Mag., III. 318. 1. (1836); ZETT., Ins. Lapp., 770. 2. *var. a.* [*Copromyza*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2487. 12. [*Copromyza*] (1847); BREMI, Isis, (1846); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1—3. pag. 10.; WALK., Ins. Brit., II. 173. 1. (1853); STENH., Coprom. Scand., 171. 1. (1855); SCHIN., F. A., II. 326. (1864); V. SIGNORET, Ann. Soc. ent. Fr., 358. (1875); ROND., Coprom., 13. (1880); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, p. 87. (1883); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 68. 347. (1900).
- cadaverina* ROB.-DESV., Myod., 809. 3. [*Lordatia*] (1830).
- curvipes* LATR., Gen. Crust., IV. 359. [*Musca*] (1809).
- merdarum* ROB.-DESV., Myod., 808. 1. [*Lordatia*] (1830).
- necrophaga* ROB.-DESV., Myod., 809. 5. [*Lordatia*] (1830).
- stercoraria* ROB.-DESV., Myod., 809. 2. [*Lordatia*] (1830).
- vaporariorum* HALID., WALK. = *coprina* ROB.-DESV.

Pseudosphaerocera

STROBL, Balkan. Dipt. 46. Sarajevo, (1902).

luteipennis STROBL, Balkan. Dipt. 46. Sarajevo, (1902).

Turcia europ.

Limosina

MACQ., Suit. à Buff., II. 571. 8. (1835).

Agromyza p. p., FALL., Dipt. Suec. Agromyzides (1823).

Bachis ROB.-DESV., Myod., 803. V. (1830).

Coproica ROND., Coprom., 3. IX. p. 40. (1880 et 1861).

Elachisoma ROND., Coprom., 16. VII. et Bull. d. soc. entom. Ital., XII. (1880).

Gonioneura ROND., Coprom., 16. VI. et Bull. d. soc. entom. Ital., XII. (1880).

Leptocera OLIVIER, Mém. soc. agricult. (1813).

Mycetia p. p., ROB.-DESV., Myod., 805. VI. (1830).

Nerea p. p., ROB.-DESV., Myod., 802. IV. (1830).

abbreviata FALL. = *ochripes* MEIG.

• *acrosticalis* BECK., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, p. 126. 190. (1903). Aegyptus.

acutangula ZETT., STENH., SCHIN. = *pusilla* MEIG.

aeneiventris STENH., Coprom. Scand., 370. (112). 6. (1855); ZETT., Suecia. Dipt. Scand., XIV. 6414. 9—12. (1860).

akka ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 23. 3. (1880). Italia.

• *albipennis* ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 39. 33. Hispania, (1880); BEZZI, Contrib. alla F. di Parma, 15. 9. (1891); STROBL, Aegyptus. Wien. entom. Zeitg., XIX. 69. 354. (1900).

anceps STENH., Coprom. Scand., 372. (114). 8. (1855); ZETT., Dipt. Suecia. Scand., XIV. 6399. 2—4. (1860).

• *andalusiaca* STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 69. 357. (1900). Hispania.

arcuata MACQ., MEIG., HALID., ZETT., WALK. = *fontinalis* FALL.

atoma ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 17. 1. [*Elachisoma*] (1880). Italia.

bifrons STENH., Coprom. Scand., 401. (143). 24. (1855); ZETT., Dipt. Europa. Scand., XIV. 6406. 5—6. (1860); SCHIN., F. A., II. 332. (1864); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 33. 23. (1880).

bisangula ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 16. 1. [*Gonioneura*] (1880). Italia.

brachystoma STENH., Coprom. Scand., 393. (135). 19. (1855); ZETT., Suec., Holland., Dipt. Scand., XIV. 6403. 4—7. (1860). Aegyptus.

breviceps STENH., Coprom. Scand., 374. (116). 9. (1855); ZETT., Dipt. Suecia. Scand., XIV. 6400. 2—5. (1860).

caenosa ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 36. 27. (1880). Italia.

cellarum ROB.-DESV., Myod., 804. 1. [*Bachis*] (1830). Gallia.

• *cilifera* ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 29. 15. (1880). Italia, Aegypt.

ciliosa ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 27. 12. (1880). Italia.

claripennis ROB.-DESV. = *sylvatica* MEIG.

clunipes MEIG., S. B., VI. 208. 26. [*Borborus*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 573. 7. (1835); HALID., Entom. Mag., III. 331. 13. (1836); Europa centr.

- SCHOLTZ., Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. 32. (1850); WALK., Ins. Brit., II. 181. 13. (1853); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, pag. 87. (1883); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 348. 26. (1902).
- coxata** STENH., Coprom. Scand., 396. (138). 21. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6404. 4—8. (1860); SCHIN., F. A., II. 332. (1864). Europa centr. et sept.
- crassimana** HALID., Entom. Mag., III. 328. 6. (1836); DUF., Ann. d. Sc. nat., (1838); WALK., Ins. Brit., II. 179. 6. (1853); STENH., Coprom. Scand., 376. (18). 10. (1855); SCHIN., F. A., II. 330. (1864); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 30. 17. (1880); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, p. 87. (1883); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 70. 363. (1900). Europa.
- lugubris* DUF., Ann. Soc. entom. Fr. (1839).
- pygmaea* ZETT. Ins. Lapp., 771. 8. [*Copromyza*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2503. 12. (1847) et XIV. 6415. [*Copromyza*] (1860).
- ? *stercoria* ROB.-DESV., Myod., 803. 2. (1830).
- curtiventris** STENH., Coprom. Scand., 365. (107). 3. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6412. 9—10. (1860). Suecia.
- curvinervis** STENH., Coprom. Scand., 406. (148). 27. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6408. (6—8). (1860). Suecia.
- diadema** STENH., Coprom. Scand., 394. (136). 20. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6404. 4—8. (1860). Suecia, Hollandia.
- erratica** HALID., Entom. Mag., III. 330. 12. (1836); WALK., Ins. Brit., II. 180. 12. (1853). Britannia.
- exigua** ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 24. 6. (1880). Italia.
- fenestralis** FALL., Dipt. Suec. Heteromyz., 8. 7. [*Copromyza*] (1820); MEIG., S. B., VI. 207. 25. [*Borborus*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 573. 6. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2504. 13. (1847); STENH., Coprom. Scand., 404. (146). 26. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6415. 13. (1860); SCHIN., F. A., II. 333. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 348. 25. (1902). Europa centr. et sept.
- ferruginata** STENH., Coprom. Scand., 397. (139). 22. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6405. 4—10. (1860); SCHIN., F. A., II. 331. (1864); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 40. 24. (1880); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 69. 353. (1900). Europa.
- flaviceps** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2501. 9. (1847); STENH., Coprom. Scand., 360. (102). 1. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6412. 9. (1860). Suecia.
- flavipes** MEIG., S. B., VI. 208. 28. [*Borborus*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 348. 28. (1902). Germania.
- fontinalis** FALL., Dipt. Suec. Suppl., 2. 16. (1826); ZETT., Ins. Lapp., 770. 5. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2493. 1. (1847); STENH., Coprom. Scand., 371. (113). 7. (1855); SCHIN., F. A., II. 329. (1864); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 37. 29. (1880). Europa.
- arcuata* MACQ., Suit. à Buff., II. 572. 4. (1835); HALID., Entom. Mag., III. 328. 4. (1836); MEIG., S. B., VII. 410. 13. (1838); HALID., Ann. of. nat. Hist., II. 189. (1839); WALK., Ins. Brit. II. 179. 4. (1853); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6398. 1. (1860).
- fontinalis* var. *minor* ZETT. = *roralis* ROND.

- fucata* ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 31. 19. (1880). Italia.
- fulviceps* ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 34. 25. (1880). Italia.
- fulvipes* MEIG., S. B., VII. 411. 16. [*Borborus*] (1838). Germania.
- fungicola* HALID., Entom. Mag., III. 330. 11. (1836); WALK., Ins. Brit., II. 180. 11. (1853); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 23. 4. (1880). Britannia, Italia.
- ✕ *fuscipennis* HALID., Entom. Mag., I. 178. (1833) et III. 332. 16. (1836); WALK., Ins. Brit., II. 181. 16. (1853); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 29. 14. (1880); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 70. 361. (1900). Britannia, Hispania, Italia.
- geniculata* MACQ., Suit. à Buff., II. 572. 3. (1835); HALID., Entom. Mag., III. 328. 5. (1836); MEIG., S. B., VII. 411. 15. [*Borborus*] (1838); WALK., Ins. Brit., II. 179. 5. (1853); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, I. 16. 13. (1891); ? STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 68. 343. [*Borborus*] (1900). Europa centr. et mer.
- geniculata* ROB.-DESV., Myod., 805. 5. [*Bachis*] (1830). Gallia.
- glabra* MEIG., S. B., VII. 409. 10. [*Borborus*] (1838). Germania.
- Halidayi* COLLIN, Entom. Monthly Mag., 2 ser. XIII. 58. fig. 3. 4. (1901). Britannia.
- ✕ *heteroneura* HALID., Entom. Mag., III. 331. 15. (1836); WALK., Ins. Brit., II. 181. 15. (1853); STENH., Coprom. Scand., 410. (152). 30. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6408. 6—9. (1860); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 22. 2. (1880); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 70. 359. (1900). Europa.
- hirtula* ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 38. 32. (1880). Italia.
- humida* HALID., ZETT., WALK., ROND. = *pumilio* MEIG.
- impressa* MEIG., S. B., VII. 410. 12. [*Borborus*] (1838). Germania.
- leucoptera* HALID., Entom. Mag., III. 333. 20. (1836); WALK., Ins. Brit., II. 183. 20. (1853); STENH., Coprom. Scand., 423. (165). 38. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6418. 18. (1860). Britannia, Suecia.
- leucoptera* ROB.-DESV., Myod., 804. 3. [*Bachis*] (1830). Gallia.
- liliputana* ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 26. 9. (1880). Italia.
- ✕ *limosa* FALL., Dipt. Suec. Heterom., 8. 6. [*Copromyza*] (1820); ? MEIG., S. B., VI. 207. 23. [*Borborus*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 572. 2. (1835); HALID., Entom. Mag., III. 327. 2. (1836); ZETT., Ins. Lapp., 771. 6. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2494. 2. [*Compromyza*] (1847); LUCAS, Explor. scientif. de l'Algérie, III. 501. 271. (1849); SCHIN., F. A., II. 329. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 454. 22. [*Borborus*] (1872); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 36. 28. (1880); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 347. 23. (1902). Europa, Africa sept.
- lugubrina* ZETT., Dipt. Scand., VI. 2502. 11. (1847).
- riparia* ROB.-DESV., Myod., 802. 1. [*Nerea*] (1830).
- limosa* STENH., Coprom. Scand., 379. (121). 11. (1855). Suecia,
- limosa* WALK. = *lutosa* STENH. Aegyptus.
- litoralis* STENH., Coprom. Scand., 417. (159). 33. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6409. 7—8. (1860); SCHIN., F. A., II. 331. (1864). Europa centr. et sept.

- ludibunda** ROB-DESV., Myod., 804. 2. [*Bachis*] (1830). Gallia.
- lugubrina** ZETT. = **limosa** FALL.
- lugubris** HALID., Entom. Mag., III. 332. 18. (1836); WALK., Ins. Brit., II. 182. 18. (1853); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, p. 87. (1883). Europa centr.
- lugubris** DUF. = **crassimana** HALID.
- luteilabris** ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 32. 20. (1880). Italia.
- lutosa** STENH., Coprom. Scand., 380. (122). 12. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4335. 1—2. (nomen in litteris) (1852); SCHIN., F. A., II. 329. (1864). Europa.
- limosa** BREMI, Isis (1846); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1—3. p. 20. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 178. (1853); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 87. (1883); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 69. 350. (1900).
- varicornis** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 69. 350. var. (1900).
- melania** HALID., Entom. Mag., III. 334. 22. (1836); WALK., Ins. Brit., II. 183. 22. (1853); STENH., Coprom. Scand., 427. (169). 40. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6410. 7—9. (1860); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 22. 1. (1880). Europa centr.
- minima** MACQ. = **nigerrima** HALID.
- minutissima** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2505. 15. (1847); STENH., Coprom. Scand., 420. (162). 35. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6417. 15. (1860). Suecia.
- mirabilis** COLLIN, Entom. Monthly Mag., 2 ser. XIII. 59. f. 5, 6. (1901). Britannia.
- nana** ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 24. 5. (1880). Italia.
- nigerrima** HALID., Entom. Mag., I. 178. [*Borborus*] (1833) et III. 334. 21. (1836). Europa.
- minima** MACQ., Suit. à Buff., II. 573. 9. (1835); WALK., Ins. Brit., II. 183. 21. (1853); STENH., Coprom. Scand., 426. (168). 39. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6411. 7—10. (1860); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 17. 2. [*Elachisoma*] (1880).
- nigra** OLLIVIER, Mém. Soc. agric. d. Dep. d. la Seine, p. 16. f. 6. Gallia. [*Leptocera*] (1813).
- nitens** STENH., Coprom. Scand., 368. (110). 5. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6413. 9—11. (1860). Hollandia.
- obtusipennis** STENH., Coprom. Scand., 422. (164). 36. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6417. 16. (1860). Suecia.
- ochripes** MEIG., S. B., VI. 209. 29. [*Borborus*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 572. 5. (1835); HALID., Entom. Mag., III. 329. 7. (1836); ZETT., Ins. Lapp., 771. 10. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2497. 5. (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1—3. p. 19. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 179. 7. (1853); STENH., Coprom. Scand., 400. (142). 23. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6403. 5. (1860); SCHIN., F. A., II. 332. (1864); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital.,

- XII. 35. 26. (1880); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, p. 87. (1883); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 69. 356. (1900).
abbreviata FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 5. 8. [*Agromyza*] (1823).
octiesetosa BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, p. 127. 195. (1903). Aegyptus.
oelandica STENH., Coprom. Scand., 391. (133). 18. (1855); ZETT., Europa,
Dipt. Scand., XIV. 6403. 4—6. (1860); SCHIN., F. A., II. 330. (1864); Aegyptus.
ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 38. 31. (1880).
opacula STENH., Coprom. Scand., 389. (131). 17. (1855); ZETT., Dipt. Suecia.
Scand., XIV. 6402. 4—5. (1860).
parvula STENH., Coprom. Scand., 422. (164). 37. (1855); ZETT., Dipt. Suecia.
Scand., XIV. 6418. 18. (1860).
piligera STENH., Coprom. Scand., 386. (128). 15. (1855); ZETT., Dipt. Lapponia.
Scand., XIV. 6401. 3—5. (1860).
X *plumosula* ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 27. 11. Hispania.
(1880); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 70. 360. (1900).
plurisetosa STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 69. 352. (1900). Hisp., Aegypt.
puerula ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 34. 24. Italia,
(1880); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 69. 355. (1900). Hispania.
pullula ZETT., Dipt. Scand., VI. 2498. 6. (1847); STENH., Coprom. Suecia,
Scand., 402. (144). 25. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6407. 6. Germania.
(1860); SCHIN., F. A., II. 332. (1864).
pumilio MEIG., S. B., VI. 208. 27. [*Borborus*] (1830); MACQ., Suit. à Europa.
Buff., II. 573. 8. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 771. 9. (1838) et Dipt.
Scand., VI. 2495. 3. [*Copromyza*] (1847); STENH., Coprom. Scand.,
382. (124). 13. (1855); SCHIN., F. A., II. 330. (1864); BECK.,
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 348. 27. (1902).
X *humida* HALID., Entom. Mag., III. 328. 3. (1836); WALK., Ins.
Brit., II. 178. 3. (1853); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6400. 3. (1860);
ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 30. 16. (1880).
pusilla MEIG., S. B., VI. 206. 22. t. LXII. f. 19. [*Borborus*] (1830); Europa centr.
HALID., Entom. Mag., III. 335. 1. [*Heteroptera*] (1836); WALK., Ins. et sept.
Brit., II. 184. 1. [*Heteroptera*] (1853); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt.
u. Dipt., II. 347. 22. (1902).
acutangula ZETT., Dipt. Scand., VI. 2499. 7. (1847); STENH.,
Coprom. Scand., 414. (156). 32. (1855); SCHIN., F. A., II. 328.
(1864); TIEF, Seltene Dipterenf. Jahrb. d. naturh. Mus. Villach.,
11. (1886); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 40.
[*Coproica*] (1880); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, p. 87.
(1883); GERCKE, Wien. entom. Zeitg., VIII. 225. t. XIV. f. 10a.
[*Heteroptera*] (1889); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 69.
349. [*Heteroptera*] (1900).
pusio ZETT., Dipt. Scand., VI. 2496. 4. (1847); STENH., Coprom. Scand., Europa,
412. (154). 31. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6402. 4. (1860); Aegyptus.
SCHIN., F. A., II. 331. (1864); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom.
Ital., XII. 33. 29. (1880); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 70.
358. (1900).
putris ROB.-DESV., Myod., 804. 4. [*Bachis*] (1830). Gallia.

- pygmaea** MEIG., S. B., VII., 410. 11. [*Borborus* (1838); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 26. 10. (1880). Germania, Italia.
- pygmaea** ZETT. = **crassimana** HALID.
- quisquilia** HALID., Entom. Mag., III. 330. 10. (1836); WALK., Ins. Brit., II. 180. 10. (1853). Britannia.
- retracta** ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 25. 7. (1880). Italia.
- riparia** ROB.-DESV. = **limosa** FALL.
- roralis** ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 37. 30. (1880); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 69. 351. (1900). Italia, Hisp., Suecia.
- fontinalis** var. **minor** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2493. 1. (1847).
- rufilabris** STENH., Coprom. Scand., 408. (150). 29. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6416. 13—14. (1860); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. Entom. Ital., XII. 25. 8. (1880). Suecia, Italia.
- rufipes** MEIG., S. B., VII. 411. 17. [*Borborus*] (1838). Germania.
- sacra** MEIG., S. B., VII. 409. 9. [*Borborus*] (1838); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, I. 8. (1847); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, p. 87. (1883); LESNE, Bull. Soc. entom. de Fr., 162. (1896); EATON, Flies riding on beetle back. Monthly Mag., p. 139. (1896); WALK., Monthly Mag., p. 161. (1896); OST-SACK., Monthly Mag., p. 181. (1896). Hispania, Africa sept.
- salina***) v. HEYDEN, Stettin. Entom. Zeitg., V. 203. Anmerk. (1844). Germania.
- scutellaris** HALID., Entom. Mag., III. 329. 8. (1836); WALK., Ins. Brit., II. 180. 8. (1853); STENH., Coprom. Scand., 407. (149). 28. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6407. 6—7. (1860); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 32. 21. (1880); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 70. 364. (1900). Europa.
- scutellata** MEIG., S. B., VII. 409. 8. (1838); SCHIN., F. A., II. 328. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 349. 8. (1902). Bavaria.
- septentrionalis** STENH., Coprom. Scand., 384. 126. 14. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6401. 3—4. (1860). Suecia.
- setulosa** ZETT. = **zosteræ** HALID.
- simplicimana** ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 31. 18. (1880). Italia.
- spinipennis** HALID., Entom. Mag., III. 331. 13. (1836); WALK., Ins. Brit., II. 181. 14. (1853). Britannia.
- Stenhammari** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6400. 2—6. (1860). Suecia.
- stercoraria** ROB.-DESV. = **crassimana** HALID.
- sylvatica** MEIG., S. B., VI. 207. 24. [*Borborus*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 572. 1. (1835); HALID., Entom. Mag., III. 326. 1. (1836); ZETT., Ins. Lapp., 771. 7. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2500. 8. [*Copromyza*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 178. 1. (1853); STENH., Coprom. Scand., 362. (104). 2. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6411. 8. (1860); SCHIN., F. A., II. 328. (1864); ROND., Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 28. 13. (1880); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 347. 24. (1902). Europa.
- claripennis** ROB.-DESV., Myod., 806. 3. [*Mycetia*] (1830).

*) Nomen sine descriptione.

- tarsata* ZETT., Dipt. Scand., XII. 4796. 2—3. (1855). Suecia.
Thalhammeri STROBL., Dipt. v. Steierm., IV. 276. (1894). Styria.
tristis MEIG., S. B., VII. 410. 14. [*Rorborus*] (1838). Germania.
vagans HALID., Entom. Mag., I. 178. (1833) et III. 332. 17. (1836); Britannia.
WALK., Ins. Brit., II. 182. 17. (1853).
varicornis STROBL. = *lutosa* STENH.
verticella STENH., Coprom. Scand., 366. (108). 4. (1855); ZETT., Dipt. Suecia.
Scand., XIV. 6405. 4—11. (1860).
vitripennis ZETT., Dipt. Scand., VI. 2505. 14. (1847); STENH., Coprom. Suecia.
Scand., 418. (160). 34. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6416. 14.
(1860).
zosteræ HALID., Entom. Mag., I. 178. (1833) et III. 333. 19. (1836); Britannia,
WALK., Ins. Brit., II. 182. 19. (1853); STENH., Coprom. Scand., Suecia.
387. (129). 16. (1855).
setulosa ZETT., Dipt. Scand., VI. 2502. 10. (1847).

Pteremis

- ROND., Prodr., I. 124. 7. (1856) et Coprom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. p. 41. X. (1880).
nivalis HALID., Entom. Mag., I. 178. [*Limosina*] (1833); CURTIS, Brit. Europa,
Entom., 469. 29d. (1832); HALID., Entom. Mag., III. 330. 9. [*Limo-* Amer. mer.
sina] (1836); WALK., Ins. Brit., II. 180. 9. [*Limosina*] (1853);
STENH., Coprom. Scand., 399. (141). [*Limosina*] (1855); ROND., Co-
prom. Bull. d. Soc. entom. Ital., XII. 41. (1880); BIGOT, Mission.
scientif. du Cap Horn., t. IV. f. 7. (1888); BEZZI, Sulle Riduzione
delle Ali nei Ditteri, p. 11. (1900).

Cenchridobia

SCHIN., Wien. entom. Monatschr., VI. 435. (1862).

Carnus EGGER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1854).

- Eggeri* SCHIN., F. A., II. 335. (1864). Austria.
hemapterus Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IV. 3. t. II. f. 7—11.
[*Carnus*] (1854); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, p. 87.
(1883).
hemapterus Egg., BRAUER = *Eggeri* SCHIN.

Genera incerta.

Fimetia

ROB.-DESV., Myod., 810. X. (1830).

- atrata* ROB.-DESV., Myod., 811. 3. (1830). Gallia.
cadaverina ROB.-DESV., Myod., 810. 2. (1830). Gallia.
limpidipennis ROB.-DESV., Myod., 810. 1. (1830). Gallia.

Scatophora

ROB.-DESV., Myod., 811. XI. (1830).

merdaria ROB.-DESV., Myod., 811. 1. (1830).

Gallia.

DRYOMYZIDAE.

Dryomyza

FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 15. (1820).

Dryope ROB.-DESV., Myod., 618. I. (1830).*Neuroctena* ROND., Atti Soc. Ital. di Sc. nat. Vol. XI. 56. (1868). = valid genus. (H)

- ✕ *anilis* FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 16. 2. (1820); MEIG., S. B., V. 257. Europa.
 2. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 396. 2. (1835); ZETT., Ins. Lapp.,
 736. 2. (1838) et Dipt. Scand., V. 2033. 1. (1846); SCHOLTZ, Zeitschr.
 f. Entomol. Breslau, IV. 32. (1850); WALK., Ins. Brit., II. 164. 3.
 (1853); SCHIN., F. A., II. 39. (1864); ROND., Atti Soc. Ital. di
 Scienc. nat. Vol., XI. 56. [*Neuroctena*] (1868).

liturata ROB.-DESV., Myod., 619. 2. [*Dryope*] (1830).*communis* ROB.-DESV. = *flaveola* FABR.*decrepita* ZETT., Ins. Lapp., 737. 3. (1838) et Dipt. Scand., V. 2085. Lapponia,
 3. (1846). Silosia.

- ✕ *flaveola* FABR., Ent. syst., IV. 343. 130. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl.,
 306. 111. [*Musca*] (1805); MEIG., S. B., V. 256. 1. (1826); MACQ.,
 Suit. à Buff., II. 396. 1. t. XVIII. f. 11. (1835); ZETT., Ins. Lapp.,
 736. 1. (1838) et Dipt. Scand., V. 2084. 2. (1846); WALK., Ins.
 Brit., II. 164. 1. (1853); SCHIN. F. A., II. 40. (1864); ROND., Prodr.,
 VII. Sciomyz., VII. 74. 1. (1868); HENSEL, Berlin. entom. Zeitschr.,
 XIV. 133. (1870); GIRSCHN., Dipterol. Studien. Katt. entom. Nachr.,
 IX. 201—204. (1883).

communis ROB.-DESV., Myod., 619. 1. [*Dryope*] (1830).*fuscicornis* MEIG., S. B., VII. 343. 4. (1838); BECK., Zeitschr. f.

Hymenopt. u. Dipt., II. 219. 4. (1902).

mollis HALID., Entom. Mag., I. 167. (1833).*vetula* FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 16. 1. (1820).*Zawadskii* SCHUM., Jahresber. deutsch. Naturf. Breslau, (1833);

SCHUM., Ok. Isis, 741. (1834); SCHIN., F. A., II. 40. (1864).

flaveola var. ZETT. = *senilis* ZETT.

- ✕ *formosa* WIED., Zweifl., II. 447. [*Scatophaga*] (1830); LW., Wien. ent. Japonia.
 Monatschr., II. 112. 27. (1858).

fuscicornis MEIG. = *flaveola* FABR.*liturata* ROB.-DESV. = *anilis* FALL.*mollis* HALID. = *flaveola* FABR.*senilis* ZETT., Dipt. Scand., V. 2087. 4. (1846).

Lapponia.

flaveola var. ZETT., Ins. Lapp., 736. 1. (1838).*vetula* FALL. = *flaveola* FABR.*Zawadskii* SCHUM., SCHIN. = *flaveola* FABR.

Neottiophilum

FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 895. (1868).

Blephariptera BIGOT, Ann. Soc. ent. Fr., 370. (1881).

Dryomyza p. p., MEIG., S. B., V. 257. (1826).

Carteraui BIGOT = *praeustum* MEIG.

fringillarum FRFLD. = *praeustum* MEIG.

praeustum MEIG., S. B., V. 257. [*Dryomyza*] (1826); MIK, Wien. entom. Zeitg., I. 194. (1882), VI. 34. 21. (1887) et XIII. 166. 31. (1894); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 86. (1883); v. RÖD., Wien. entom. Zeitg., XIV. 270. (1895); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 219. 3. (1902).

Carteraui BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., ser. VI. Tom. 1. p. 370.

[*Blephariptera*] (1881).

fringillarum FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 895. (1868).

Actora

MEIG., S. B., V. 403. CLXXXVIII. t. LIV. f. 16—20. (1826).

Helcomyza CURTIS, Brit. Entom., 68. (1828). *Pr5*

aestuum MEIG., S. B., V., 403. 1. (1826); CARUS, Zoolog. Anz., III. Europa centr. 250—252.; MACQ., Suit. à Buff., II., 500. 1. (1835); WALK., Ins. Brit., II. 158. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 41. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciom. 78. 1. (1868); JOSEPH., Schles. Ges. f. vaterl. Cultur., 114. (1880); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 86. (1883).

ustulata CURTIS, Brit. entom., 68. [*Helcomyza*] (1828). *1825*

extrema WALK., List of diptera, IV. 1066. (1849).

mediterranea Lw., N. Beitr., II. 22. 51. (1854).

ustulata CURTIS = *aestuum* MEIG.

Fennia.

Graecia.

HETERONEURIDAE.

Heteroneura = *Chusiodia* Coq.

FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 2. (1823). *1828* (*new fall 1810*)

Agromyza p. p., ZETT., Ins. Lapp. (1838). *which is Callomyza*

albimana MEIG., S. B., VI. 128. 2. (1838); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa centr. 588. 2. (1835); BOIE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 331. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2790. 3. (1848) et XII. 4817. *var. b.* (1855); Lw., Wien. entom. Monatschr., I. 51. (1857) et Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 339. 4. (1864); SCHIN., F. A., II. 38. (1864); PERRIS, Ann. Soc. ent. Fr., X. 344. (1870); BRAUER, Zweifl. d. Kais.

et sept.

Mus. Wien, 92. (1883); GIRSCHN., Entom. Nachr., XIV. 2. XII. fig. 5, 6. (1888); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 313. 2. (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 81. 7. t. I. f. 5. (1903).

geomyzina var. *b.* FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 3. (1823).

geomyzina var. *c.* ZETT., Ins. Lapp., 790. 17. [*Agromyza*] (1838).

pictipes SCHIN., F. A., II. 37. (1864); HANDL., Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, XXXIV. t. V. f. 12. (1884).

alpina LW. = *geomyzina* FALL.

apicalis ZETT., Dipt. Scand., VII. 2189. [*var. geomyzina*] (1848); Europa centr.
CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 79. 5. t. I. f. 3, 6. (1903). et sept.

geomyzina p. p., MEIG., S. B., VI. 129. 4. (♀). (1830).

geomyzina LW., Wien. entom. Monatschr., I. 54. (1857) et Berlin.
entom. Zeitschr., VIII. 345. (1864).

geomyzina FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 2. 2. (*excl. var. b.*) (1823); Europa centr.
MEIG., S. B., VI. 129. 4. (1830); ZETT., Ins. Lapp., 790. 17. (*var. b.*) et sept.

[*Agromyza*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2788. 1. (1848);
SCHIN., F. A., II. 38. (1864); LW., Berlin. entom. Zeitschr., VIII.
345. 7. (1864); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 77. 4. t. I. f.
1, 2, 4. (1903).

alpina LW., Wien. entom. Monatschr., I. 53. (1857) et Berlin.
entom. Zeitschr., VIII. 344. 6. (1864); GIRSCHN., Entom. Nachr.,
XIV. 98. fig. 7, 8. (1888).

geomyzina var. *b.* FALL. = *albimana* MEIG.

geomyzina var. *c.* ZETT. = *albimana* MEIG.

geomyzina p. p. MEIG. = *apicalis* ZETT.

geomyzina LW. = *apicalis* ZETT.

laterella ZETT. = *ruficollis* MEIG.

nubila MEIG., S. B., VI., 127. 1. (1830); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., Europa centr.
XXII. 76. 2. (1903).

pictipes ZETT., Dipt. Scand., XII. 4816. 1—2. (1855); CZERNY, Wien. Suecia.
entom. Zeitg., XXII. 80. 6. (1903).

pictipes SCHIN. = *albimana* MEIG.

ruficollis MEIG., S. B., VI. 128. 3. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. Europa centr.
2789. 2. (1848); LW., Wien. entom. Monatschr., I. 53. (1857) et et sept.
Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 343. 5. (1864); SCHIN., F. A., II.
38. (1864); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 75. 1. (1903).

laterella ZETT., Dipt. Scand., VII. 2791. 4. (1848).

Hendelia

CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XII. 83. (1903).

Beckori CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 84. 1. t. II. f. 1, 2. ♂, Alpes austr.
f. 3. ♀. (1903).

Clusia

HALID., Ann. nat. hist., II. 188. (1838).

Heteromyza p. p., MEIG., S. B., VI. 45. (1830); WALK., Ins. Brit., II. 163. (1853).

Macrochira ZETT., Ins. Lapp., 784. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2681. (1848).

Peratochaetus ROND., Prodr., I. 119. (1856) et Bull. d. soc. entom. Ital. Firenze, VI. 250. (1874).

Stomphastica LW., p. p., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 336. (1864).

flava MEIG., S. B., VI. 46. 2. [*Heteromyza*] (1830); ZETT., Ins. Lapp., 784. 1. (♂, nec ♀) [*Macrochira*] (1838); HALID., Entom. Mag., I. 171. (1838) et Ann. nat. Hist., II. 188. (1839); BOIÉ, Stett. entom. Zeitg., VIII. 331. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2683. 1. [*Macrochira*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 163. 1. [*Heteromyza*] (1853); LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, 11. (1859) et Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 337. 2. [*Stomphastica*] (1864); SCHIN., F. A., II. 36. (1864); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 92. (1883); MIK, Wien. entom. Zeitg., V. 101. 2. (1886); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 88. 1. (1903).

lutescens ROND., Bull. d. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 250. (8). [*Peratochaetus*] (1874).

spurca HALID., Entom. Mag., I. 171. (1838) et Ann. nat. Hist., II. 188. [*Heteroneura*] (1839); LW., Wien. entom. Monatschr., I. 51. (1857).

lutescens ROND. = **flava** MEIG.

spurca HALID. = **flava** MEIG.

Paraclusia

CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 90. (1903).

Stomphastica VERRAL, Entom. Monthly Mag., XXX. 144. (1894).

decora LW., VERRAL, MIK = **tigrina** FALL.

Miki HANDL. = **tigrina** FALL.

tigrina FALL, Dipt. Suec. Heteromyz., 4. 3. [*Helomyza*] (1820); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2466. 5. [*Heteromyza*] (1847); MIK, Entom. Nachr., XXIII. 130. [*Clusia*] (1897); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 90. (1903).

Europa centr.
et sept.

decora LW., Wien. entom. Monatschr., VII. 39. [*Heteroneura*] (1863) et Berlin. entom. Zeitg., VIII. 337. 1. [*Heteroneura*] (1864); VERRAL, Entom. Monthly Mag., XXX. 144. [*Stomphastica*] (1894); MIK, Entom. Nachr., XXIII. 133. [*Clusia*] (1897) et Wien. entom. Zeitg., VII. 167. [*Clusia*] (1898).

Miki HANDL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIV. 137. t. V. f. 9. [*Clusia*] (1884).

Heteromeriugia

CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 72. (1903).

nigrimana Lw., Berlin. entom. Zeitg., VIII. 338. [*Heteroneura*] (1864); Germania.
CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 73. 1. t. I. f. 7, 8. t. III. f. 1,
2. (1903).

Acarthophthalmus

CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 256. (1902).

Anthophilinae p. p., ZETT., Dipt. Scand., VII. 2697. 5. (1848).

X **nigrinus** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2697. 5. [*Anthophilinae*] (1848); Suecia.
CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 256. (1902) et XXII. 71. (1903).

Trigonometopinae.

Trigonometopus

MACQ., Suit. à Buff., II. 419. (1835).

Oxyrhina MEIG. S., VII. 366. (1838); ZETT., Dipt. Scand., V.
1953. (1846); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. (1868).

frontalis MEIG., S. B., VI. 44. 20. [*Tetanocera*] (1820); MACQ., Suit. Europa.
à Buff., II. 419. 1. (1835); MEIG., S. B., VII. 366. t. LXXIV. f. 36—38.
(1838); CURTIS, Brit. Dipt., Tab. 689. (1832); ZETT., Dipt. Scand.,
V. 1955. 2. [*Oxyrhina*] (1846); SCHIN., F. A., II. 66. (1864); ROND.,
Prodr., VII. Sciomyz. 9. 1. [*Oxyrhina*] (1868); STEIN, Wien. entom.
Zeitg., VII. 202. II. (1888).

vittatus Lw., Berlin. entom. Zeitg., XIII. 51. 98. (1869). Georgia.

HELOMYZIDAE.

Helomyza

FALL., Dipt. Suec. Heteromyz., 3. (1820).

Suillia ROB-DESV., Myod., 642. V. (1830).

Herbina ROB-DESV., Myod., 698. XXIV. (1830).

Opomyza MACQ., Suit. à Buff., II. 558. 15. p. p. (1835).

Heteromyza ZETT., Ins. Lapp., 764. 4. p. p. (1838).

Blephariptera MACQ., Suit. à Buff., II. 412. p. p. (1835).

affinis MEIG., MACQ., ZETT., Lw., SCHIN. = **rufa** FALL.

agaracina ROND. = **univittata** v. Ros.

agnata ROND., Prodr., VII. Scatoph., 39. 12. (1866).

Italia.

apicalis SCHIN. = **variegata** Lw.

- arcuata** ROB.-DESV., Myod., 645. 12. [*Suillia*] (1830). Gallia.
- arenaria** HALID., in Curtis Brit. Entom., 1328. 34. et Ann. of. nat. Hist., II. 187. (1839). Gallia, Britannia.
- maculata* MACQ., Suit. à Buff., II. 558. 15. (*Opomyza*] (1835).
- bicolor* ZETT. = **Zetterstedti** LW.
- bistrigata** MEIG., S. B., VI. 52. 8. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 411. 7. (1835); LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom., XIII. 30. 11. (1859); ROND., Prodr., VII. Scatoph. 36. 4. (1866). Europa mer.
- cinerea** ROB.-DESV., Myod., 644. 8. [*Suillia*] (1830). Gallia.
- cingulata** POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 573. (1889). Tirolis.
- claripennis** ROB.-DESV., Myod., 643. 3. [*Suillia*] (1830). Gallia.
- communis* ROB.-DESV. = **similis** MEIG.
- femoralis** LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom., XIII. 42. 22. (1859) et Wien. entom. Monatschr., VI. 127. 12. (1862). Silesia.
- ferruginea** MEIG., S. B., VII. 371. 46. (1838). Gallia.
- rufa* MACQ., Suit. à Buff., II. 414. 11. [*Blephariptera*] (1835).
- flava** MEIG., S. B., VI. 50. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 411. 3. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2442. 8. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 161. 2. (1853); SCHOLTZ., Zeitschr. f. Entom., 1—3. p. 19.; LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entomol., XIII. 28. 9. (1859); SCHIN., F. A., II. 25. (1864); ROND., Prodr., VII. Scatophag., 36. 5. (1866); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, p. 86. (1883). Europa.
- praeusta* MEIG., S. B., VI. 52. 10. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2443. 9. (1847); SCHIN., F. A., II. 26. (1864); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 37. 7. (1866); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 291. 10. (1902).
- rufa* ZETT., Ins. Lapp., 765. 3. (1838).
- flava* ZETT. = **laevifrons** LW.
- flaveola** ROB.-DESV., Myod., 644. 9. [*Suillia*] (1830). Gallia.
- ~~X~~ **flavifrons** ZETT., Ins. Lapp., 766. 6. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2448. 15. (1847). Europa centr. et sept.
- parva* LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom., XIII. 41. 21. (1859) et Wien. entom. Monatschr., VI. 127. 11. (1862).
- flavitarsis** ROND., Prodr., VII. Scatophag. 40. 15. (1866). Italia.
- foeda* LW. = **notata** MEIG.
- fragilis** ROB.-DESV., Myod., 644. 7. [*Suillia*] (1830). Gallia.
- fungorum* ROB.-DESV. = **rufa** FALL.
- fuscana** MEIG., S. B., VII. 369. 38. (1838). Bavaria.
- gigantea** MEIG., S. B., VI. 49. 1. (1830); LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 24. (1859); SCHIN., F. A., II. 24. (1864); LW., Berlin. entom. Zeitschr., XII. 386. 17. (1868); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 290. 1. (1902). Europa mer., Asia min.
- ?tuberivora* ROB.-DESV., Myod., 642. 1. [*Suillia*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 410. 1. (1835); AL. LABOULB., Ann. Soc. entom. Fr., 72. (1864).
- griseola** MEIG., SCHIN. = **similis** MEIG.
- hilaris** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2440. 6. (1847). Scandinavia.

- hispanica** Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 27. 8. (1859); Lw., Wien. entom. Monatschr., VI. 126. 5. (1862); AL. LABOULB., Ann. Soc. entom. Fr., 81. (1864). Europa mer.
- tuberiperda** ROND., Prodr., VII. Scatophag. 38. 10. (1866) et Atti d. Soc. Ital. di Sc. nat., X. 122. 10. (1867); Mxk, Dipt. Misc. Wien. entom. Zeitschr., XV. 107. 46. (1896).
- humilis** MEIG., S. B., VI. 59. 27. (1830); Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 20. 1. (1859). Germania.
- ✕ **inornata** Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 20. 1. (1859) et Wien. entom. Monatschr., VI. 126. 1. (1862). Europa.
- memorum** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2439. 4. (1847); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 39. 13. (1866).
- ✕ **laevifrons** Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 32. 13. (1859) et Lw., Wien. entom. Monatschr., VI. 126. 6. (1862). Europa centr. et sept.
- flava** ZETT., Ins. Lapp., 765. 4. (1838).
- tigrina** MACQ., Suit. à Buff., II. 412. 8. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2444. 10. (1847).
- liliorum** ROB.-DESV., Ann. Soc. entom. Fr., II. 10. 267. (1833). Gallia.
- lineata** ROB.-DESV., Myod., 645. 10. [*Suillia*] (1830); DJF., Ann. Soc. entom. Fr., III. 1. 384. (1853); AL. LABOULB., Ann. Soc. entom. Fr., 4. série, Tom. IV. 71. t. II. (1864). Gallia.
- litturata** ROB.-DESV., Myod., 643. 5. [*Suillia*] (1830). Gallia.
- ✕ **lurida** MEIG., S. B., VI. 60. 29. (1830); SCHIN., F. A., II. 28. (1864). Austria.
- maculata** MACQ. = **arenaria** HALID.
- maxima** SCHIN., F. A., II. 24. (1864); ROND., Prodr., VII. Scatoph. 37. 9. (1866); FRAUENF., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 971. (1866); RÉAUM., Mém. Tom., IV. t. XXVII. f. 13—16; BRAUER, Zweif. d. Kais. Mus. Wien, p. 86. (1883). Austria.
- Miki** POKORNY., Wien. entom. Zeitg., V. 193. 2. (1886). Tirolis merid.
- ✕ **montana** Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 38. 18. (1859) et Wien. entom. Monatschr., VI. 127. 9. (1862). Germania.
- memorum** MEIG., S. B., VI. 52. 9. (1830); Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 22. 3. (1859); SCHIN., F. A., II. 28. (1864). Europa centr.
- memorum** ZETT., ROND. = **inornata** Lw.
- nigricornis** MEIG., S. B., VII. 369. 37. (1838). Germania.
- nigriventris** MACQ., Suit. à Buff., II. 411. 5. (1835); MEIG., S. B., VII. 368. 35. (1838). Gallia.
- ✕ **notata** MEIG., S. B., VI. 51. 7. (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 291. 7. (1902). Rhodus, Lusitania.
- foeda** Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 24. 5. (1859) et Wien. entom. Monatschr., VI. 126. 3. (1862).
- ✕ **olens** MEIG., S. B., VI. 50. 4. (1830); Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 39. 19. (1859); SCHIN., F. A., II. 27. (1864). Europa.
- ✕ **? pallida** FALL., p. p., Dipt. Suec. Heteromyz., 3. 1. (1820); MEIG., S. B., VI. 50. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 411. 4. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2434. 1. var. d. (1847); LUCAS, Ann.

Soc. entom. Fr., L. (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1—3. 33. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 162. 3. (1853); SCHIN., F. A., II. 27. (1864); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 40. 16. (1866); AL. LABOULE., Ann. Soc. entom. Fr., 83. (1864); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 86. (1883); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 17. 23. (1891); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 291. 5. (1902).

testacea ZETT., Ins. Lapp., 765. 2. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2438. 3. (1847).

oxyphora MÜK. Wien. entom. Zeitg., IX. 128. (1900).

Austria.

pallida FALL., MEIG., MACQ., ZETT., WALK., SCHIN., BEZZI. = *olens* MEIG.

pallida ZETT., Dipt. Scand., VI. 2434. var. *a* + *c* = *Zetterstedti* Lw.

pallida ZETT. var. *b*. = *vaginata* Lw.

pallida ZETT. var. *d*. = *olens* MEIG.

parva Lw. = *flavifrons* ZETT.

pectoralis Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 25. 6. (1859) et Wien. entom. Monatschr., VI. 126. 4. (1862). Germania, Sicilia.

penicillata L. DUF., Ann. d. Sc. nat., XII. 48. (1839); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 86. (1883). Gallia.

✕ *pilimana* Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 36. 16. (1859) et Wien. entom. Monatschr., VI. 126. 7. (1862). Germania.

pilimana ROND., Prodr., VII. Scatophag. 39. 14. (1866).

Italia.

praeusta MEIG., ZETT., ROND. = *flava* MEIG.

quinque-vittata MACQ., Hist. nat. d. Iles Canaries, 117. 99. (1839). Ins. Canariae.

rubetra ROB.-DESV., Myod., 699. 2. [*Herbina*] (1830).

Gallia.

rufa FALL., Dipt. Succ. Heteromyz., 4. 2. (1820); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2441. 7. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 161. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 25. (1864); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 38. 11. (1866); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 17. 24. (1891). Europa.

✕ *affinis* MEIG., S. B., VI. 29. 10. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 411. 6. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2439. 5. (1847); Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 29. 10. (1859); SCHIN., F. A., II. 25. (1864); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 38. 11. (1866).

fungorum ROB.-DESV., Myod., 642. 2. [*Suillia*] (1830); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 38. 11. (1866).

rufa MEIG. = *variegata* Lw.

rufa MACQ. = *ferruginea* MEIG.

rufa ZETT. = *flava* MEIG.

sexnotata ROB.-DESV., Myod., 644. 6. [*Suillia*] (1830).

Gallia.

✕ *similis* MEIG., S. B., VII. 368. 11. (1838); Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 31. 12. (1859); SCHIN., F. A., II. 27. (1864). Europa centr. et mer.,

communis ROB.-DESV., Myod., 643. 4. [*Suillia*] (1830).

Africa sept.

griseola MEIG., S. B., VI. 53. 12. (1830); SCHIN., F. A., II. 28. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 292. 12. (1902).

tigrina MEIG., S. B., VI. 53. 11. (1830); LUCAS, Explor. de l'Algérie, III. 496. 251. (1849); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 291. 11. (1902).

simplex MEIG., S. B., VII. 368. 36. (1838).

suillioidea ROB.-DESV., Myod., 698. 1. [*Herbina*] (1830); HALID., Entom. Mag., IV. 149.

testacea ZETT. = *olens* MEIG.

tigrina MEIG. = *similis* MEIG.

tigrina ZETT. = *laevifrons* LW.

trifasciata CURTIS., Brit. Entom., 545. 11. (1832).

tuberiperda ROND., Mik = *hispanica* LW.

tuberivora ROB.-DESV., MACQ., AL. LABOULB. = *gigantea* MEIG.

umbratica MEIG., S. B., 368. 34. (1833); SCHIN., F. A., II. 28. (1864); BAVARIA.

BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., 294. 34. (1902).

X *univittata* v. ROS., Württemb. Corrb., I. 61. (1840); LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 33. 14. (1859); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. i. Württemb., No. 23. (1902).

agaricina ROND., Prodr., VII. Scatophag., 35. 1. (1866) Atti Soc. Ital. Sc. nat. Milano, X. 119. (1867); MIK, Wien. entom. Zeitg., V. 278. (1886).

ustulata MEIG., S. B., VI. 54. 14. t. LVII. f. 30. (1830); MACQ., Suit. Europa centr.

à Buff., II. 412. 1. [*Blephariptera*] (1835); HALID., Entom. Mag., I. 168. (1833); DUF., Ann. des Sc. nat., XII. (1839); LUCAS, Ann. Soc. entom. Fr., L. (1848); LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 34. 15. (1859); SCHIN., F. A., II. 26. (1864); AL. LABOULB., Ann. Soc. entom. Fr., 83. (1864); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, p. 86. (1883).

vaginata LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 41. 20. (1859) et Wien. entom. Monatschr., VI. 127. 10. (1862).

pallida ZETT., var. b. Dipt. Scand., VI. 2434. 1. (1847).

X *variegata* LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 23. 4. (1859) et Wien. entom. Monatschr., VI. 126. 2. (1862).

apicalis SCHIN., F. A., II. 25. (1864).

rufa MEIG., S. B., VI. 49. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 410. 2. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 291. 2. (1902).

violascens ROB.-DESV., Myod., 645. 11. [*Suillia*] (1830).

X *Zetterstedti* LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 37. 17. (1859) et Wien. entom. Monatschr., VI. 127. 8. (1862).

bicolor ZETT., Ins. Lapp., 764. 4. var. c. *pallida* [*Heteromyza*] (1838).

pallida ZETT., Dipt. Scand., 2434. 1. var. a + c. (1847).

Allophyla

LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 43. 1. (1859).

X *atricornis* MEIG., S. B., VI. 54. 13. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2437. 2. [*Helomyza*] (1847); LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 43. 1. (1859); SCHIN., F. A., II. 27. [*Helomyza*] (1864).

Germania.
Gallia,
Britannia.

Britannia.

Europa centr.
et mer.

Europa centr.
et sept.

Europa mer.,
Asia min.

Gallia.

Europa centr.
et sept.

Europa centr.
et sept.

Scoliocentra

Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 43. 2. (1859).

scutellaris ZETT. = *villosa* MEIG.

villosa MEIG., S. B., VI. 55. 16. [*Helomyza*] (1830); Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 44. 1. (1859); SCHIN., F. A., II. 31. [*Leria*] (1864). Europa centr. et sept.

scutellaris ZETT., Dipt. Scand., VI. 2458. 26. [*Helomyza*] (1847).

Crymobia

Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 45. 3. (1859).

hiemalis Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 46. 1. (1859) Germania. et Wien. entom. Monatschr., VI. 127. 13. (1862).

Eccoptomera

Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 47. 6. (1859).

emarginata Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 54. 7. Alpes. (1859) et Wien. entom. Monatschr., VI. 128. 17. (1862).

excisa Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 52. 6. (1859) Germania. et Wien. entom. Monatschr., VI. 128. 16. (1862).

obscura MEIG., S. B., VI. 57. 20. [*Helomyza*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 292. 20. (1902).

fenestralis ZETT. = *microps* MEIG.

filata Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 50. 3. (1859) Silesia. et Wien. entom. Monatschr., VI. 127. 15. (1862).

flavo-testacea ZETT., Ins. Lapp., 765. 5. [*Helomyza*] (1838). Europa centr. *longiseta* ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., VI. 2445. 11. [*Helomyza*] et sept. (1847); SCHIN., F. A., II. 31. [*Leria*] (1864); STROBL, Dipt. v. Steierm., II. 83. (1894).

longiseta MEIG., S. B., VI. 60. 31. [*Helomyza*] (1830); Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 49. 2. (1859). Europa centr. et sept.

microphthalma ZETT., Dipt. Scand., VI. 2447. 13. [*Helomyza*] (1847); SCHIN., F. A., II. 29. [*Leria*] (1864).

longiseta ZETT. = **flavo-testacea** ZETT.

microphthalma SCHIN. [*Seria*] = **longiseta** MEIG.

microps MEIG., S. B., VI. 61. 33. [*Helomyza*] (1830); Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 51. 4. (1859); SCHIN., F. A., II. 32. [*Leria*] (1864). Europa centr. et sept.

fenestralis ZETT., Dipt. Scand., VI. 2460. 28. [*Helomyza*] (1847).

myopina ZETT., Dipt. Scand., VI. 2459. 27. [*Helomyza*] (1847).

myopina ZETT. = **microps** MEIG.

obscura MEIG. = **excisa** Lw.

ornata Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 48. 1. (1859) Germania. et Wien. entom. Monatschr., VI. 127. 14. (1862).

- ✕ **pallescens** MEIG., S. B., VI. 58. 23. [*Helomyza*] (1830); Lw., *Helomyz.* Germania.
Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 52. 5. (1859); BECK., *Zeitschr.*
f. Hymenopt. u. Dipt., II. 293. 23. (1902).
silvatica MEIG., S. B., VI. 60. 32. [*Helomyza*] (1830); ZETT., *Dipt.* Europa centr.
Scand., VI. 2446. 12. [*Helomyza*] (1847); BECK., *Zeitschr. f. Hy-* et sept.
menopt. u. Dipt., II. 294. 32. (1902).

Oecothoa

HALID., *Ann. of. nat. Hist.*, II. 187. (1839).

- fenestralis** FALL., *Dipt. Suec. Heteromyz.*, 5. 5. [*Helomyza*] (1820); Europa.
 MEIG., S. B., VI. 56. 18. [*Helomyza*] (1830); Macq., *Suit. à Buff.*,
 II. 414. 9. [*Blepharoptera*] (1835); HALID., *Westw. Introd.* II. App.,
 145. (1840) et *Ann. of nat. Hist.*, II. 187. (1839); ZETT., *Dipt.*
Scand., VI. 2460. 28. [*Helomyza*] (1847); SCHIN., F. A., II. 30.
 [*Leria*] (1864); ROND., *Prodr.*, VII. *Scatoph.* 42. 1. [*Leria*] (1866);
 BEZZI, *Contrib. alla F. ditt. di Pavia*, 17. 21. [*Leria*] (1891).
fuscipennis MEIG., S. B., VI. 59. 28. [*Helomyza*] (1830); BECK.,
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 293. 28. (1902).
fuscipennis MEIG. = **fenestralis** FALL.
praecox Lw., *Helomyz. Zeitschr. f. Entomol. Breslau*, XIII. 56. 2. Germania.
 (1859) et *Wien. entom. Monatschr.*, VI. 128. 18. (1862).
virgata CURTIS, *Brit. Ins.*, 1321. 1. bis App. 280. HALID., *Ann. of nat.* Hibernia.
Hist., II. 187. (1839).

Blepharoptera > *Helomyza* Gell. 1810. *serena* is type.

Macq., *Suit. à Buff.*, II. 412. 8. (1835).

Orbellia ROB.-DESV., *Myod.*, 656. IV. p. p. (1830).

- alpina** Lw., *Wien. entom. Monatschr.*, VI. 299. 5. (1862). Helvetia.
barbigera MİK = **cineraria** Lw.
biseta Lw., *Helomyz. Zeitschr. f. Entomol. Breslau*, XIII. 62. 5. (1859). Austria.
borealis HOLMGR. = **modesta** MEIG.
bracata ROND., *Prodr.*, VII. *Scatoph.* 43. 3. [*Leria*] (1866). Italia.
brachyptera Lw., *Berlin. entom. Zeitschr.*, XVII. 49. 57. (1873). Hungaria.
caesia MEIG., S. B., VI. 56. 17. [*Helomyza*] (1830); Macq., *Suit. à* Europa centr.
Buff., II. 414. 8. (1835); Lw., *Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau*,
 XIII. 59. 2. (1859); SCHIN., F. A., II. 30. [*Leria*] (1864); ROND.,
Prodr., VII. *Scatophag.* 43. 4. [*Leria*] (1866); BECK., *Zeitschr. f.*
Hymenopt. u. Dipt., II. 292. 17. (1902).
Cartereaui BIGOT, *Ann. Soc. entom. Fr.*, 370. (1881). Gallia.
chetomera ROND. = **cineraria** Lw.
cineraria Lw., *Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau*, XIII. 67. 11. Europa centr.
 (1859) et *Wien. entom. Monatschr.*, VI. 128. 22. (1862). et mer.
barbigera MİK, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, XIX. 31. [*Leria*]
 (1869) et *Wien. entom. Zeitg.*, V. 102. 3. (1886).

- chetomera* ROND., Prodr., VII. Scatophag., 43. 5. [*Leria*] (1866 et Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Milano, X. 127. [*Leria*] (1867); MIK, Wien. entom. Zeitg., V. 101. 3. (1886).
- X *crassipes* LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Bresl., XIII. 68. 12. (1859). Silesia.
- cuniculorum* ROB.-DESV., Myod., 655. 5. [*Leria*] (1830); MACQ., Suit. Europa centr.
à Buff., II. 413. 4. (1835); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau,
1—3. 10. (1847); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, p. 86. (1883).
- domestica* ROB.-DESV., Myod., 654. 3. [*Leria*] (1830); MACQ., Suit. à Gallia.
Buff., II. 413. 3. (1835).
- dupliciseta* STROBL, Dipt. v. Steierm., II. 84. (1894). Styria.
- fenestralis* PERRIS = *serrata* L.
- fenestrarum* ROB.-DESV. = *serrata* L.
- ferruginea* MEIG. = *rufa* MACQ.
- flavicornis* LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 64. 7. Germania.
(1859) et Wien. entom. Monatschr., VI. 128. 20. (1862).
- fungivora* ROB.-DESV., Myod., 653. 1. [*Leria*] (1830); MACQ., Suit. à Gallia.
Buff., II. 413. 7. (1835); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 177. (1877).
- fuscana* MEIG., SCHIN. = *serrata* L.
- geniculata* ZETT., p. p. = *serrata* L.
- geniculata* ZETT., p. p. = *modesta* MEIG.
- halterata* MEIG., S. B., VI. 56. 19. [*Helomyza*] (1830); BECK., Zeitschr. Berolina.
f. Hymenopt. u. Dipt., II. 292. 19. (1902).
- humeralis* ZETT., LUNDB. = *inscripta* MEIG.
- humida* ROB.-DESV., Myod., 654. 2. [*Leria*] (1830). Gallia.
- iners* MEIG., S. B., VI. 57. 22. [*Helomyza*] (1830); LW., Helomyz. Sibiria,
Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 63. 6. (1859); BECK., Acta Soc. Europa centr.
scient. Fenn., XXVI. 57. 110. (1900).
- inscripta* MEIG., S. B., VI. 59. 26. [*Helomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Europa centr.
Buff., II. 414. 10. (1835); LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, et sept.
XIII. 66. 9. (1859). Groenlandia.
- humeralis* ZETT., Ins. Lapp., 767. 10. [*Helomyza*] (1838) et Dipt.
Scand., VI. 2455. 21. [*Helomyza*] (1847).
- latrinarum* DEG. = *serrata* L.
- longipennis* SCHIN., F. A., II. 30. [*Leria*] (1864). Austria.
- lurida* LW. = *variabilis* LW.
- macrostyla* MACQ., Suit. à Buff., II. 414. 12. (1835). Gallia.
- maculipennis* BECK., Mém. de l'Acad. Imp. des sc. St Petersburg, 401. Now.-Semlja.
(6). 5. (1897).
- melina* ROB.-DESV., Ann. Soc. entom. Fr., I. 10. 261. [*Leria*] (1841). Gallia.
- minuta* ZETT., Ins. Lapp., 768. 14. [*Helomyza*] (1838) et Dipt. Scand., Now.-Semlja.
VI. 2457. 24. [*Helomyza*] (1847); HOLMGR., Entom. Tidskr., 177.
42. (1883).
- ruficauda* ZETT. ♀ (nec ♂), Dipt. Scand., VI. 2456. 22. [*Helomyza*]
(1847).
- modesta* MEIG., S. B., VII. 369. 39. [*Helomyza*] (1838); LW., Helomyz. Europa centr.
Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 60. 3. (1859); SCHIN., F. A., II. et sept.
31. [*Leria*] (1864).

- borealis* HOLMGR., Öfers. Kgl. Vet. Acad. Förh., XXIX. 104. (1872).
geniculata STAEG., Kröjer's Tidskr., 366. 50. (1845); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2451. 18. p. p. [*Helomyza*] (1847); HOLMGR., Öfers. Kgl. Vetensk. Akad. Förh., XXIX. 6. 104. [*Helomyza*] (1872); LUNDB., Dipt. Grönl., 298. 140. (1900).
myopiformis ROB.-DESV., Myod., 657. 1. [*Orbellia*] (1830).
ruficauda ZETT., Dipt. Scand., VI. 2456. 22. ♂ (*nec* ♀) [*Helomyza*] (1847); SCHIN., F. A., II. 31. (1864).
serrata var. *b. minor* ZETT., Ins. Lapp., 766. 7. (1838).
mustelina ROB.-DESV., Ann. Soc. entom. Fr., I. 10. 262. [*Leria*] (1841). Gallia.
myopiformis ROB.-DESV. = *modesta* MEIG.
nigricans MACQ., Suit. à Buff., II. 413. 6. (1835). Gallia.
nigricornis MEIG. = *serrata* L.
obscuriventris ZETT., Dipt. Scand., VI. 2447. 14. [*Helomyza*] (1847). Lapponia.
ornithivora ROB.-DESV., Myod., 657. 2. [*Orbellia*] (1830). Gallia.
Peleterii ROB.-DESV., Myod., 655. 7. [*Leria*] (1830). Gallia.
puerula ROND., Prodr., VII. Scatoph. 44. 7. [*Leria*] (1866). Italia.
pusilla LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 69. 13. (1859) Asia min.,
et Wien. entom. Monatschr., VI. 128. 24. (1862). Graecia.
rufa MACQ., Suit. à Buff., II. 414. 11. (1830). Gallia.
ferruginea MEIG., S. B., VII. 371. 46. [*Helomyza*] (1838).
ruficauda ZETT. ♀ (*nec* ♂) = *minuta* ZETT.
ruficauda ZETT. ♂ (*nec* ♀) = *modesta* MEIG.
ruficeps ZETT. = *serrata* L.
ruficornis MEIG., S. B., VI. 60. 30. [*Helomyza*] (1830); LW., Helomyz. Germania.
Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 65. 8. (1859); SCHIN., F. A., II. 32. [*Leria*] (1864).
X *serrata* L., Fauna Suec., II. 1847. [*Musca*] (1761); SCHRANK, Ins. Europa,
Austr., 942. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat., I. 5. 2848. 86. Groenlandia,
[*Musca*] (1790); SCHRANK, Fauna Boica, III. 2451. [*Musca*] (1802); Now-Seml.
FABR., Syst. Antl., 103. [*Musca*] (1805); MACQ., Suit. à Buff., II. 413. 2. (1835); DUF., Ann. des Sc. nat., 2 Ser. Tom. XI. et XII. t. III. f. 80. pag. 40. (1838, 1839); BOUCHÉ, Naturgesch., I. 100. (1834); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2450. 17. [*Helomyza*] (1847); LW., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 61. 4. (1859); SCHIN., F. A., II. 29. [*Leria*] (1864); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 42. 2. [*Leria*] (1866); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., X. p. 341. (1870); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, p. 86. (1883); MIK, Wien. entom. Zeitg., XVII. 65. 78 et 167. 81. (1898); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., 57. 111. (1900).
fenestralis PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 177. (1877).
fenestrarum ROB.-DESV., Myod., 654. 4. [*Leria*] (1830).
fuscana MEIG., S. B., VII. 369. 38. [*Helomyza*] (1830); SCHIN., F. A., II. 32. [*Leria*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 294. 38. (1902).
geniculata ZETT., p. p., Dipt. Scand., VI. 2451. 18. [*Helomyza*] (1847).
latrinarum DEG., Ins., VI. 16. 10. t. I. f. 15—18. [*Musca*] (1776).

nigricornis MEIG., S. B., VII. 369. 37. [*Helomyza*] (1838).

ruficeps ZETT., Ins. Lapp., 767. 9. [*Helomyza*] (1830) et Dipt. Scand., VI. 2454. 20. [*Helomyza*] (1847).

tibialis ZETT., Ins. Lapp., 767. 12. [*Helomyza*] (1833) et Dipt. Scand., VI. 2456. 23. [*Helomyza*] (1847); HOLMGR., Öfvers. Kgl. Vet. Akad. Förh., XXIX. 6. 104. [*Helomyza*] (1872) et Entom. Tidskr., 177. 41. [*Helomyza*] (1883); LUNDB., Dipt. Grönl., 297. 139. (1900).

serrata var. *b. minor* ZETT. = *modesta* MEIG.

spectabilis Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau., XIII. 58. 1. Austria, (1859) et Wien. entom. Monatschr., VI. 128. 19. (1862); MUK, Wien. Dalmatia, entom. Zeitg., XI. 120 et 181. II. (1892). Gallia.

subterranea ROB-DESV., Myod., 655. 6. [*Leria*] (1830); MACQ., Suit. à Gallia, Buff., II. 413. 5. (1835); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, Germania. 1—3. 10. (1847); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, p. 86. (1883).

tibialis ZETT., HOLMGR., LUNDB. = *serrata* L.

ustulata ZETT., Dipt. Scand., VI. 2449. 16. [*Helomyza*] (1847); ROND., Dania, Italia. Prodr., VII. Scatophag. 35. 2. [*Helomyza*] (1866).

X *variabilis* Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 66. 10. Germania. (1859) et Wien. entom. Monatschr., VI. 128. 21. (1862).

lurida Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 24. 7. [*Geomyza*] (1865); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 126. (1903).

Heteromyza > Heteromyzella Hnd. 1910

FALL., Dipt. Suec. Heteromyz., 2. 1. (1820).

Thelida p. p., ROB-DESV., Ann. Soc. entom. Fr. (1841); SCHIN., F. A., II. 34. (1864); ROND., Prodr., VII. Scatophag. (1866).

X *atricornis* MEIG., S. B., VI. 46. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa centr. 415. 1. (1835); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 487. 220. et mer., (1849); WOLLASTON, List of Dipt. of Madeira. Ann. Mag. of nat. I. Madeira, Hist., 231. (1858); Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, Algeria, XIII. 71. 1. (1859); ROND., Prodr., VII. Scatophag., 40. 17. (1866); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 195. (1876); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 17. 22. (1891); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 223. 211. (1899).

Delarouzei BIG., Ann. Soc. entom. Fr., Bullet CCL. (1858).

diversa ROND., Prodr., VII. Scatophag. 45. 1. [*Thelida*] (1866).

oculata SCHIN. (nec FALL.), F. A., II. 35. [*Thelida*] (1864).

vespertilionae ROB-DESV., Ann. Soc. entom. Fr., II. 10. 232. 3. [*Thelida*] (1841).

cinerella MACQ., Suit. à Buff., II. 415. 3. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia. 367. 7. (1838).

commixta COLLIN, Entom. Monthly Mag., 2 Ser. XII. 293. 2. (1901). Britannia.

Delarouzei BIGOT = *atricornis* MEIG.

diversa ROND. = *atricornis* MEIG.

flaveola MACQ., Suit. à Buff., II. 416. 5. (1835); MEIG., S. B., VII. 367. 9. (1838). Gallia.

nigricornis MEIG., S. B., VII. 366. 6. (1838). Belgia.

oculata SCHIN. = *atricornis* MEIG.

opomyzina ZETT., Dipt. Scand., XII. 4793. 2—3. (1855). Suecia. = *Eurygrak*

pygmaea ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6386. 3—4. (1860). Suecia.

scutellata MACQ., Suit. à Buff., II. 415. 3. (1835); MEIG., S. B., VII. 367. 8. (1838). Gallia.

vespertileonea ROB.-DESV. = *atricornis* MEIG.

Tephrochlamis > *Lentiphora*

Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 72. 10. (1859).

Lentiphora p. p., ROB.-DESV., Myod., 656. III. (1830); ROND., Prodr., VII. Scatophag. (1866).

canescens MEIG., S. B., VI. 57. 21. [*Helomyza*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 293. 21. (1902). Europa centr. et sept.

laeta ZETT., Ins. Lapp., 766. 8. [*Helomyza*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2452. 19. [*Helomyza*] (1847); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 44. 6. [*Leria*] (1866).

nigricornis MEIG., S. B., VII. 369. 37. [*Helomyza*] (1838); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 294. 37. (1902).

rufipes ZETT., Ins. Lapp., 764. 3. [*Heteromyza*] (1838).

× *rufiventris* MEIG., S. B., VI. 58. 24. [*Helomyza*] (1830); Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 77. 4. (1859).

flaveola ROB.-DESV., Myod., 656. 1. [*Lentiphora*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 416. 5. [*Heteromyza*] (1835). Gallia.

× *flavipes* ZETT., Ins. Lapp., 763. 2. [*Heteromyza*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2465. 3. [*Heteromyza*] (1847); Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 76. 3. (1859); ROND., Prodr., VII. Scatophag. 47. 1. [*Heteromyza*] (1866). Europa centr. et sept.

serrata MEIG., (nec L.), S. B., VI. 55. 15. [*Helomyza*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 292. 15. (1902).

fuscinervis ZETT., Dipt. Scand., VI. 2457. 25. [*Helomyza*] (1847). Suecia.

Kaltenbachi MEIG., S. B., VII. 370. 40. [*Helomyza*] (1838). Germania.

laeta ZETT., ROND. = *canescens* MEIG.

laeta MEIG., S. B., VI. 58. 25. [*Helomyza*] (1830); Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 78. 5. (1859). Germania.

× *magnicornis* Lw., Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 73. 1. (1859) et Wien. entom. Monatschr., VI. 128. 25. (1862). Germania.

nigricornis MEIG. = *canescens* MEIG.

opomyzina ZETT., Dipt. Scand., XII. 4793. [*Heteromyza*] (1855). Suecia.

prominens BECK., Mém. de l'Acad. des sc. St Pétersb., 402. (7). 6. (1897). Now.-Semlja.

pygmaea ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6386. 3—4. [*Heteromyza*] (1860). Suecia.

rufipes ZETT. = *canescens* MEIG.

rufiventris MEIG., Lw. = *canescens* MEIG.

serrata MEIG. (nec L.) = *flavipes* ZETT.

- tarsalis** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2466. 4. [*Heteromyza*] (1847); Lw., Europa. Helomyz. Zeitschr. f. Entom. Breslau, XIII. 75. 2. (1859); Rond., Prodr., VII. Scatophag. 47. 2. [*Heteromyza*] (1866).

Gymnomyza *> actinoptera* Gern. 1904

STROBL, Dipt. v. Steierr., II. 85. (1894).

- hilarella** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2467. 6. [*Heteromyza*] (1847); STROBL, Suecia, Dipt. v. Steierr., II. 85. (1894). Styria.

Gymnomus

Lw., Wien. entom. Monatschr., VII. 36. (1863).

- troglydites** Lw., Wien. entom. Monatschr., VII. 37. (1863); JOSEPH., Austria. Berlin. entom. Zeitg., XXVI. 49. (1882); Mlk, Wien. entom. Zeitg., I. 203. (1882); v. Röd., Festschr. d. Ver. f. Schles. Insektenk. Breslau, 1—5. (1897).

Thelida

Rob.-Desv., Myod., 655. (1830).

filiformis ROB.-DESV. = **oculata** FALL.

- oculata** FALL., Dipt. Suec. Heteromyz., 2. 1. [*Heteromyza*] (1820); Europa centr. MEIG., S. B., VI. 46. 3. [*Heteromyza*] (1830); HALID., Entom. Mag., et sept. I. 168. [*Heteromyza*] (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 415. 2. [*Heteromyza*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2463. 1. [*Heteromyza*] (1847).

filiformis ROB.-DESV., Myod., 656. 1. (1830).

Borboropsis

CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 256. (1902).

Anthomyza p. p., STROBL, Dipt. v. Steierr., IV. 269. (1898).

- fulviceps** STROBL, Dipt. v. Steierr., IV. 269. [*Anthomyza*] (1898); Styria. CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 256. (1902).

SCIOMYZIDAE.

Sciomyzinae.

Pelidnoptera

ROND., Prodr., I. 107. 40. (1856).

Oscinis p. p., LATR., Encyclop. méthod., VIII. 566.

Otites p. p., MACQ., Suit. à Buff., II. 426. (1835).

Phaeomyia p. p. SCHIN., Wien. entom. Monatschr., VI. 148. (1862).

melanoptera LATR. = **nigripennis** FABR.

nigripennis FABR., Entom. syst., IV. 346. 141. [*Musca*] (1794) et Europa.

Syst. Antl., 205. 6. [*Scatophaga*] (1805); MEIG., S. B., VI. 16. 14.

[*Sciomyza*] (1830); FALL. Dipt. Suec. Sciomyz., 13. 5. [*Sciomyza*]

(1820); MACQ., Suit. à Buff., II. 426. 6. [*Otites*] (1835); ZETT., Dipt.

Scand., V. 2104. 14. [*Sciomyza*] (1846); SCHIN., F. A., II. 43.

[*Phaeomyia*] (1864); ROND., Prodr., I. 107. (1856), Prodr., VII.

Sciomyz., 8. 1. (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 12. (1877);

GIRSCHN., Entom. Nachr., XI. 1—6. fig. 3. [*Phaeomyia*] (1885)

et XII. 20. (1886); MIK, Entom. Nachr., 341. (1885); HENDEL, Verh.

zool.-bot. Ges. Wien, 21. 1. (1902).

melanoptera LATR., Encycl. méth., VIII. 566. [*Oscinis*] (1811).

Phaeomyia

SCHIN., Wien. entom. Monatschr., VI. 148. (1862).

Lignodesia ROND., Prodr., VII. Ortalid. 10. II. (1869).

Otites p. p., MACQ., Suit. à Buff., II. 426. (1835).

Bellardii ROND. = **fumipennis** ZETT.

fumipennis ZETT., Dipt. Scand., V. 2110. 19. [*Sciomyza*] (1846). Europa.

Bellardii ROND., Prodr., VII. Ortalid., 11. 3. [*Lignodesia*] (1869).

fuscipennis GIRSCHN., Entom. Nachr., 1. t. I. f. 2. (1855).

leptiformis SCHIN., F. A., II. 43. (1864); HENDEL, Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, 23. 2. (1902).

fumipennis ROND. = **fuscipennis** MEIG.

fuscipennis MEIG., S. B., VI. 16. 15. [*Sciomyza*] (1830); MACQ., Suit. Europa centr.

à Buff., II. 426. 7. [*Otites*] (1835); WALK., Ins. Brit., II. 159. 2. et mer.

[*Sciomyza*] (1835); SCHIN., F. A., II. 43. (1864); HENDEL, Verh.

zool.-bot. Ges. Wien, 23. 1. (1902).

fumipennis ROND., Prodr., VII. Ortalid. 11. 2. [*Lignodesia*] (1869).

umbripennis GIRSCHN., Entom. Nachr., 1. t. I. fig. 1a, 1b (1885)

et 20. (1886); MIK, Entom. Nachr., 341—343. (1885), 213—218

et 343. (1886).

fuscipennis ROND. = *pictifrons* BECK.

fuscipennis GIRSCHN. = *fumipennis* ZETT.

leptiformis SCHIN. = *fumipennis* ZETT.

pictifrons BECK., Nomen novum.

Italia.

fuscipennis ROND., Prodr., VII. Ortolid. 11. 1. [*Lignodesia*] (1869).

umbripennis GIRSCHN. = *fuscipennis* MEIG.

Sciomyza > Melina. Drav.

FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 11. (1820).

Arina ROB-DESV., Myod., 696. XXII. (1830).

Chetocera ROB-DESV., Myod., 697. XXIII. (1830).

Dyctia ROB-DESV., Myod., 692. XIX. (1830).

Helomyza p. p., v. Ros., Württemb. Corrb. (1840).

Melina ROB-DESV., Myod., 695. XX. (1830).

albicarpa ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 47. 17. (1868).

Italia.

albiceps MEIG., S. B., VI. 20. 27. (1830) = *Schänomyia littorella* FALL.

X *albo-costata* FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 12. 3. (1820); MEIG., S. B., VI. 12. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 405. 4. t. XVIII. f. 13. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 738. 5. (1838) et Dipt. Scand., V. 2098. 9. (1846); WALK., Ins. Brit., II. 159. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 47. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 39. 1. (18'8) et Ann. Soc. nat. Modena, 43. 1. (1877); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 29. 3. (1902).

Europa.

claripennis ROB-DESV., Myod., 697. 1. [*Chetocera*] (1830).

X *annulipes* ZETT., Dipt. Scand., V. 2113. 22. (1846); SCHIN., F. A., II. 49. (1864); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 26. 1. (1902).

Europa centr.
et sept.

appendiculata HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 35. 7. (1902).

Hungaria?

atripedella BOHEM., Öfvers. af Kongl. Vetensk. Akad. Förh., 84. (1863).

Suecia.

austera MEIG., S. B., VI. 11. 3. (1830); HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XX. 198. (1901); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 251. 3. (1902); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 31. 4. (1902).

Europa centr.
et mer.

dorsata ZETT., var. in nota Dipt. Scand., V. 2097. (1846).

lata SCHIN., F. A., II. 45. (1864).

majuscula ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 40. 3. (1868) et Ann. Soc. nat. Modena. 44. 3. (1877).

Bezzii HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 46. 15. (1902).

Italia.

? *bicolor* ZETT., Ins. Lapp., 739. 13. (1838) et Dipt. Scand., V. 2105. 15. (1846).

Suecia.

claripennis ROB-DESV., Myod., 693. 2. [*Dyctia*] (1830).

Gallia.

claripennis ROB-DESV., [*Chetocera*] = *albo-costata* FALL.

clathrata LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XI/III. 418. 16. (1874).

Persia, Ross.
Austria.

Czernyi HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 36. 8. (1902).

defecta MEIG., S. B., VI. 19. 22. (1830) = *Schänomyia littorella* FALL.

- X***dorsata* ZETT., Dipt. Scand., V. 2096. 7. *excl. var.* (1846); SCHIN., F. A., II. 46. (1864); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 58. 115. (1900); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 32. 5. (1902). Sibiria, Europa centr. et sept.
fuscipes MACQ., Suit. à Buff., II. 407. 10. (1835); MEIG., S. B., VII. 363. 32. (1838); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 44. 11. (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 48. 11. (1877).
notata SCHIN. (*nec* MEIG.), F. A., II. 48. (1864).
ruficeps ZETT., Dipt. Scand., V. 2097. 8. (1846); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 41. 4. (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 45. 6. (1877).
dorsata ZETT. *var.* = *austera* MEIG.
- X***dubia* FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 13. 6. (1820); MEIG., S. B., VI. 21. 28. (1830); ZETT., Ins. Lapp., 738. 9. (1838) et Dipt. Scand., V. 2117. 27. (1846); SCHIN., F. A., II. 49. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz., 45. 13. (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 49. 13. (1877); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 48. 17. (1902). Europa.
- flaviceps* MEIG., S. B., VI. 14. 9. (1830). Germania.
- fuscimana* v. Ros. = *ventralis* FALL.
- fuscinervis* ZETT., Ins. Lapp., 737. 2. (1838) et Dipt. Scand., V. 2095. 5. (1846). Suecia.
- fuscipes* MACQ., ROND., MEIG. = *dorsata* ZETT.
- griseicollis* BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 58. 118. (1900); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 40. 11. (1902). Sibiria.
- X***griseola* FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 14. 10. (1820); MEIG., S. B., VI. 13. 8. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 406. 8. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 738. 6. (1838) et Dipt. Scand., V. 2100. 11. (1846); SCHIN., F. A., II. 47. (1864); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 34. 6. (1902). Europa centr. et sept.
- notata* MEIG., S. B., VI. 14. 10. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 407. 9. (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2103. (1846); HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XX. 199. (1901); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 251. 10. (1902).
- Guerini* ROB.-DESV., Myod., 695. 7. [*Dyctia*] (1830). Gallia.
- lata* SCHIN. = *austera* MEIG.
- majuscula* ROND. = *austera* MEIG.
- X***nana* FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 15. 12. (1820); MEIG., S. B., VI. 18. 19. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 408. 14. (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2109. 18. (1846); WALK., Ins. Brit., II. 160. 5. (1853); LW., Monogr. Dipt. N. Amer., I. 104. (1862); SCHIN., F. A., II. 50. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 46. 15. (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 50. 15. (1877); GIRSCHN., Berlin. entom. Zeitg., t. III. f. 13. (1887); WULP, Bibl. Centr. Amer. Dipt., II. t. IX. f. 8. (?) ; BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 58. 116. (1900); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 27. 2. (1902). Europa, Sibiria, Americaspt.
- nebulosa* ROB.-DESV., Myod., 694. 3. [*Dyctia*] (1830). Gallia.
- nigricornis* ROB.-DESV., Myod., 694. 5. [*Dyctia*] (1830). Gallia.
- ? *nigrifrons* BIGOT, Ann. Soc. ent. Fr., 371. (1881). Gallia.

notata MEIG., MACQ., ZETT. = **griseola** FALL.

notata SCHIN. = **dorsata** ZETT.

obscura ROB.-DESV., Myod., 696. 1. [*Arina*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 407. 13. (1835); MEIG., S. B., VII. 364. 35. (1838). Europa centr.

obsoleta MEIG., S. B., VI. 19. 23. (1830). Gallia.

X **obtusa** FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 13. 4. (1820); MEIG., S. B., VI. 12. 6. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 406. 8. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 737. 4. *var. a.* (1838) et Dipt. Scand., V. 2099. 10. (1846); WALK., Ins. Brit., II. 159. 3. (1853); LW., Monogr. Dipt. N. Amer., I. 105. (1862); SCHIN., F. A., II. 47. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 41. 5. (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 45. 5. (1877); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 18. 25. (1891); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 38. 10. (1902). Europa.

pallidicarpa ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 48. 19. (1868). Italia.

X **pallidiventris** FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 14. 7. (1820); ZETT., Dipt. Scand., V. 2111. 20. (1846); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 49. 20. (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 53. 20. (1877); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 41. 12. (1902). Europa.

ventralis MEIG., S. B., VI. 21. 29. (1830).

virgata CURTIS, Guide 1321. 1bis App., 280. (1829); HALID., Ann. nat. Hist., II. 187. (1839).

paludosa ROB.-DESV., Myod., 694. 6. [*Dyctia*] (1830). Gallia.

palustris ROB.-DESV., Myod., 694. 4. [*Dyctia*] (1830). Gallia.

pilosa HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 37. 9. (1902). Austria.

plumbella MEIG., S. B., VII. 363. 30. (1838). Belgia.

propinqua THOMS., Eug. Resa, 570. 234. China.

reticulata THOMS, Eug. Resa, 570. 233. (1868).

reticulata THOMS. = **propinqua** THOMS.

riparia ROB.-DESV., Myod., 695. 1. [*Melina*] (1830) = *dulia* fll. Gallia.

rufa ZETT., Dipt. Scand., V. 2116. 25. (1846). Suecia.

ruficeps ZETT., ROND. = **dorsata** ZETT.

rufiventris MEIG., MACQ. = **ventralis** FALL.

rufiventris SCHIN. = **sordida** HENDEL.

scutellaris v. Ros., Württemb. Corbl., 61. (1840); ROND., Prodr., VII. Sciomyz., 43. 18. (1868); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 47. 16. (1902). Europa centr. et mer.

sordida HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 43. 13. (1902). Europa.

rufiventris SCHIN. (*nec* MEIG.), F. A., II. 48. (1864).

thoracica ZETT., Dipt. Scand., V. 2117. 26. (1846). Lapponia.

X **ventralis** FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 14. 9. (1820); ZETT., Dipt. Scand., V. 2112. 21. (1846); SCHIN., F. A., II. 50. (1864); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. No. 9. p. 58. (1900); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 44. 14. (1902). Sibiria, Europa centr. et sept.

fuscimana v. Ros., Württemb. Corbl., 61. [*Helomyza*] (1840);

BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemb., No. 25. pag. 58. (1902).

rufiventris MEIG., S. B., VI. 20. 24. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 408. 17. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 253. 24. (1902).

ventralis MEIG. = **pallidiventris** FALL.

virgata CURTIS, HALID. = **pallidiventris** FALL.

vittata HALID., Verral List of Brit. Dipt., 29—36. (1901).

Britannia.

Calobaea

ZETT., Ins. Lapp., 762. (1838).

bifasciella FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 12. 3. [*Opomyza*] (1820); MEIG., S. B., VI. 103. 3. [*Opomyza*] (1830); ZETT., Ins. Lapp., 762. 1. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2429. 1. (1847); SCHIN., F. A., II. 46. [*Sciomyza*] (1864); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 50. (1902). Europa centr. et sept.

concentrica MEIG., S. B., VI. 12. 4. [*Sciomyza*] (1830); MACQ.,

Suit. à Buff., II. 405. 3. [*Sciomyza*] (1835).

concentrica MEIG., MACQ. = **bifasciella** FALL.

Graphomyzina

MACQ., Suit. à Buff., II. 558. (1835).

Cormoptera SCHIN., Wien. entom. Monatschr., VI. 149. (1862).

elegans MACQ. = **limbata** MEIG.

limbata MEIG., S. B., VI. 17. 17. [*Sciomyza*] (1830); SCHIN., F. A., II. 51. [*Cormoptera*] (1864); ROND., Prodr., VII. *Sciomyz.* 46. 16. Europa centr. et mer.
[*Cormoptera*] (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 50. (1877); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 51. (1902).

elegans MACQ., Suit. à Buff., II. 559. 1. (1835).

Bischofia

> *Sciomyza* Fall.

HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 52. 6. (1902).

atrimana ZETT. = **dryomyzina** ZETT.

dryomyzina ZETT., Dipt. Scand., V. 2094. 4. [*Sciomyza*] (1846); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 58. 114. [*Sciomyza*] (1900); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 55. 3. (1902). Europa centr. et sept.

atrimana ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6335. 1—2. ♀. [*Sciomyza*] (1860).

lucida HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 56. 4. (1902).

Livonia.

simplex FALL., Dipt. Suec. *Sciomyz.*, 12. 1. [*Sciomyza*] (1820); MEIG., S. B., VI. 10. 1. [*Sciomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 405. 1. [*Sciomyza*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 737. 1. (1838) et Dipt. Scand., V. 2090. 1. [*Sciomyza*] (1846); SCHIN., F. A., II. 46. [*Sci-*

Europa.

myza] (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 39. 2. (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 43. 2. [*Sciomyza*] (1877); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 53. 1. (1902).

testacea MACQ., Suit. à Buff., II. 400. 6. [*Sciomyza*] (1835); MEIG., S. B., VII. 363. 31. [*Sciomyza*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6337. 6—7. [*Sciomyza*] (1860); SCHIN., F. A., II. 45. [*Sciomyza*] (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 42. 8. (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 46. 8. [*Sciomyza*] (1877); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 54. 2. (1902). Europa.

Dichrochira

HENDEL, Sciomyz. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 57. 7. (1902).

albitarsis ZETT. = **nigrimana** MEIG.

angustipennis STAEG. = **glabricula** FALL.

? **atrimana** MEIG., S. B., VI. 106. 11. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 557. 10. [*Opomyza*] (1835); SCHIN., F. A., II. 285. [*Opomyza*] (1864). Europa centr.

glabricula FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 15. 11. ♂ (*nec* ♀) [*Sciomyza*] (1820); MEIG., S. B., VI. 13. 7. [*Sciomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 406. 7. [*Sciomyza*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 738. 7. (1838) et Dipt. Scand., V. 2091. 2. [*Sciomyza*] (1846); Lw., Stettin. entom. Zeitg., X. 339. 1. [*Sciomyza*] (1849); SCHIN., F. A., II. 44. [*Sciomyza*] (1864); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 58. 113. [*Sciomyza*] (1900) et Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 251. 7. (1902); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 61. 5. (1902). Sibiria, Europa centr. et sept.

angustipennis STAEG., Kröjer's Tidskr., I. 40. 2. [*Sciomyza*] (1844).

piliseta v. Ros., Württemb. Corrb., 61. p. p. [*Piophila*] (1840).

glabricula p. p. FALL., ZETT., STAEG. = **nigrimana** MEIG.

leucopeza MEIG., S. B., VII. 380. 29. [*Opomyza*] (1838); SCHIN., F. A., II. 286. [*Opomyza*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 308. 29. (1902); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 60. 2. (1902). Europa centr. et sept.

✓ **nigrimana** MEIG., S. B., VI. 14. 11. [*Sciomyza*] (1830); SCHIN., F. A., II. 45. [*Sciomyza*] (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz., 42. 7. [*Sciomyza*] (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 46. 7. [*Sciomyza*] (1877); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 58. 1. (1902). Europa centr. et sept.

albitarsis ZETT., Dipt. Scand., V. 2093. 3. (1846) et VIII. 3338. 3. [*Sciomyza*] (1849).

glabricula p. p., FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 15. 11. ♀. [*Sciomyza*] (1820); p. p., ZETT., Ins. Lapp., 738. 7. [*Sciomyza*] (1838); STAEG., Kröjer's Tidskr., I. 40. 1. [*Sciomyza*] (1844).

piliseta p. p., v. Ros., Württemb. Corrb., 61. [*Piophila*] (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemb. No. 16. pag. 56. (1902).

sororcula MEIG., S. B., VI. 106. 10. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 557. 9. [*Opomyza*] (1835); SCHIN., F. A., II. 285. [*Opomyza*] (1864); GIRSCHN., Berlin. entom. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 14. (1887).

ventralis MEIG., S. B., VI. 105. 8. [*Opomyza*] (1830).

Oldenbergi HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 61. 4. (1902).

Berolina.

pectorosa HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 61. 3. (1902).

Europa centr.

piliseta v. ROS., p. p. = **glabricula** FALL.

piliseta v. ROS., p. p. = **nigrimana** MEIG.

? **rufipes** MEIG., S. B., VI. 107. 14. [*Opomyza*] (1830); SCHIN., F. A., Europa centr.

II. 286. [*Opomyza*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt.,

II. 307. 14. (1902).

sororcula MEIG., MACQ., SCHIN., GIRSCHN. = **nigrimana** MEIG.

ventralis MEIG. = **nigrimana** MEIG.

Tetanura

FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 10. (1820).

pallidiventris FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 10. 1. (1820); MEIG., S. B., Europa centr.

V. 372. 1. t. LII. f. 5—8. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 379. 1. et sept.

(1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2412. 1. (1847); SCHIN., F. A., II.

190. (1864); v. RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXIX. 131. (1885); *>Opomyzinae.*

HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 65. fig. 3, 4, 30. (1902).

Ditaenia

> subgen. of Melina Desv.

HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 66. 9. fig. 6, 7, 10, 11. (1902).

Dyetia ROB.-DESV., Myod., 693. 1. (1830).

? *Pherbellia* ROB.-DESV., Myod., 696. 1. (1830).

brevipes LW. = **griseus** MEIG.

✓ **brunnipes** MEIG., S. B., VII. 364. 34. [*Sciomyza*] (1838); SCHIN., F. Europa centr.

A., II. 50. [*Sciomyza*] (1864); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, et sept.

71. 5. (1902); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 253. 34.

(1902).

coxata ZETT., Ins. Lapp., 739. 12. ♀. [*Sciomyza*] (1838).

pusilla ZETT., Ins. Lapp., 739. 11. [*Sciomyza*] (1838) et Dipt.

Scand., V. 2115. 24. [*Sciomyza*] (1846).

✗ **cinerella** FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 14. 8. [*Sciomyza*] (1820); MEIG., Europa,

S. B., VI. 16. 16. [*Sciomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 407. Africa sept.,

11. [*Sciomyza*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 739. 10. (1838) et Dipt. Ins. Canar.

Scand., V. 2118. 28. [*Sciomyza*] (1846); LUCAS, Explor. scient. de

l'Algérie, III. 495. 250. [*Sciomyza*] (1849); WALK., Ins. Brit., II.

160. 4. [*Sciomyza*] (1853); SCHIN., F. A., II. 49. [*Sciomyza*] (1864);

ROND., Prodr., VII. Sciomyz., 44. 12. (1868) et Ann. Soc. nat. Mo-

dena, 48. 12. [*Sciomyza*] (1877); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 72. 6. (1902).

herbarum ROB.-DESV., Myod., 693. 1. [*Dyctia*] (1830).

coxata ZETT. = **brunnipes** MEIG.

✓ **griseus** MEIG., S. B., VI. 20. 25. [*Sciomyza*] (1830); MACQ., Suit. Europa,
à Buff., II. 408. 18. [*Sciomyza*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymen- Africa sept.,
opt. u. Dipt., II. 253. 25. (1902); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. America spt.
Wien, 66. 1. (1902).

brevipes LW., N. Beitr., IV. 54. 57. [*Sciomyza*] (1856).

humilis LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., 330. [*Sciomyza*]
(1876); HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XX. 199. [*Sciomyza*]
(1901).

nasuta ZETT., Dipt. Scand., V. 2114. 23. [*Sciomyza*] (1846).

herbarum ROB.-DESV. = **cinerella** FALL.

humilis LW. = **griseus** MEIG.

Lichtwardti HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 68. 3. (1902). Europa centr.

Mikiana HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 89. [*Sciomyza*] (1900) Austria.

et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 68. 2. fig. 10, 11. (1902).

monilis MEIG., MACQ., WALK. = **Schönherri** FALL.

nasuta ZETT. = **griseus** MEIG.

pusilla ZETT. = **brunnipes** MEIG.

✗ **Schönherri** FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., Suppl. 2a. 13. 13. [*Sciomyza*] Europa,
(1826); ZETT., Ins. Lapp., 738. 8. [*Sciomyza*] (1838) et Dipt. Scand., Sibiria.
V. 2107. 16. [*Sciomyza*] (1846); SCHIN., F. A., II. 50. [*Sciomyza*]
(1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz., 45. 14. (1868) et Ann. Soc.
nat. Modena, 49. 14. [*Sciomyza*] (1877); BECK., Acta Soc. scient.
Fenn., XXVI. 58. 112. [*Sciomyza*] (1900); HENDEL, Verh. zool.-
bot. Ges. Wien, 70. 4. (1902).

monilis MEIG., S. B., VI. 17. 18. [*Sciomyza*] (1830); MACQ., Suit.
à Buff., II. 407. 12. [*Sciomyza*] (1835); WALK., Ins. Brit., II.
160. 6. [*Sciomyza*] (1853); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u.
Dipt., II. 252. 18. (1902).

vernalis ROB.-DESV., Myod., 696. 1. [*Pherbellia*] (1830).

vernalis ROB.-DESV. = **Schönherri** FALL.

TETANOCERINAE.

Renocera

HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, L. 333. 1. (1900).

affinis ZETT. = **striata** MEIG.

arrogans STROBL (nec MEIG.) = **Strobli** HENDEL.

dorsata STROBL (nec ZETT.) = **Strobli** HENDEL.

obtusa var. *b.* ZETT. = **striata** MEIG.

pallida FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 12. 2. [*Sciomyza*] (1820); MEIG., Europa.
S. B., VI. 11. 2. [*Sciomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 405.

2. [*Sciomyza*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 737. 3. (1838) et Dipt. Scand., V. 2096. 6. [*Sciomyza*] (1846); SCHIN., F. A., II. 46. [*Sciomyza*] (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 43. 9. [*Sciomyza*] (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 47. 9. [*Sciomyza*] (1877); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 76. 2. (1902).

Sintenisiana HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, L. 334. 2. (1900) et Wien. ent. Zeitg., XX. 199. (1901).

Sintenisiana HENDEL = *pallida* FALL.

striata MEIG., S. B., VI. 20. 26. [*Sciomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Europa centr. Buff., II. 409. 19. [*Sciomyza*] (1835); HENDEL, Verh. zool.-bot. et sept. Ges. Wien, 76. 3. (1902).

affinis ZETT., Dipt. Scand., V. 2101. 12. [*Sciomyza*] (1846).

obtusa var. *b.* ♂ ZETT., Ins. Lapp., 737. 4. [*Sciomyza*] (1838).

Strobli HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, L. 333. 1. (1900) et 75. Europa centr. 1. (1902). et sept.

arrogans STROBL, Dipt. Steyer., II. 89. [*Tetanocera*] (1893).

dorsata STROBL, Dipt. Funde Seitenst., [*Sciomyza*] (1880).

Heteropteryx

HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 81. 12. (1902).

brevipennis ZETT., Dipt. Scand., V. 2102. 13. [*Sciomyza*] (1846) et Europa centr. Dipt. Scand., VIII. 3338. 13. [*Sciomyza*] (1849); LW., Stettin. entom. et sept. Zeitg., 339. 3. [*Sciomyza*] (1849); ROND., Prodr., VII. Sciomyz., 41. 6. [*Sciomyza*] (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 45. 6. [*Sciomyza*] (1877); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 82. (1902).

Antichaeta

HALID., Ann. nat. Hist., II. 187. (1839).

analis MEIG., S. B., VI. 15. 12. [*Sciomyza*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., Europa centr. V. 2104. [*Sciomyza*] (1846); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., et sept. II. 252. 12. (1902); HENDEL, Wien. ent. Zeitg., XX. 199. (1901) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 79. 2. (1902).

vittata HALID., Ent. Magaz., I. 168. [*Sciomyza*] (1833) et Ann. nat. Hist., II. 187. (1839); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 43. 10. [*Sciomyza*] (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 47. 10. [*Sciomyza*] (1877); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 358. (1900).

atriseta LW., Stettin. ent. Zeitg., 340. 4. [*Sciomyza*] (1849); BOHEM., Europa centr. Entom. Arsberätt., 215. [*Sciomyza*] (1849, 1850); ZETT., Dipt. et sept. Scand., XII. 4770. (*observ. sub brevipennis*) [*Sciomyza*] (1855) et XIV. 6336. 2—3. [*Sciomyza*] (1860); SCHIN., F. A., II. 48. [*Sciomyza*] (1864); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 80. 3. (1902).

? *crassiseta* KALTENB., Pflanzenf., 770. [*Sciomyza*] (1872).

bisetosa HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 78. 1. (1902). Austria.

crassiseta KALTENB. = *atriseta* LW.

vittata HALID. = *analis* MEIG.

Ctenulus

ROND., Prodr., I. 107. VII. (1856).

Melanochira SCHIN., F. A., II. 283. * Anmerk. (1864).

Beckeri HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 85. 3. (1902). Europa centr.

distinctus HENDEL (*nec* MEIG.), Wien. entom. Zeitg., XX. 91. t.

II. f. 1, 2, 3. (1901).

distinctus MEIG., S. B., VI. 106. 9. [*Opomyza*] (1830); ZETT., Dipt. Europa centr.
Scand., VI. 2420. 5. [*Opomyza*] (1847); LW., Berlin. entom. Zeitg., et sept.

IX. 27. (1865); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 306. 9.

(1902); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 84. 1. (1902).

distinctus HENDEL (*nec* MEIG.) = **Beckeri** HENDEL.

distinctus SCHIN. (*nec* MEIG.) = **pectoralis** ZETT.

pectoralis ZETT., Dipt. Scand., VI. 2420. 6. [*Opomyza*] (1847); ROND., Europa,
Prodr., VII. Sciomyz. 50. (1868); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Aegyptus.
Wien, 85. 2. (1902).

distinctus SCHIN. (*nec* MEIG.), F. A., II. 285. [*Opomyza*] (1864).

Ectinocera

ZETT., Dipt. Scand., V. 2147. 151. (1846).

borealis ZETT., Ins. Lapp., 743. 1. (1838) et Dipt. Scand., V. 2148. 1. Europa centr.
(1846); SCHIN., F. A., II. 52. (1864); SIEBKE, Katal. Dipt. Norw. et sept.

Christiania, 145. (1877); HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XX. 94.
fig. (1901).

vicaria POKORNYI, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 418. t.

VII. f. 4a, 4b (1887).

vicaria POKORNYI = **borealis** ZETT.

Tetanocera

DUMÉRIL, Zoologie analytique, (1806).

Volucella p. p. SCHRANK, F. Boica, (1803).

albipennis GIMMERTH., Bull. de Moscou, XX. 2. 193. (1847). Russia.

albitarsis GIMMERTH., Bull. de Moscou, XX. 4. 197. (1847). Russia.

alpestris HENDEL, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., III. 36. (1903). Alpes austr.

arrogans MEIG., p. p. = **silvatica** MEIG.

arrogans MEIG., p. p. MACQ., ZETT., SCHUMM., LW. = **ferruginea** FALL.

claripennis ROB.-DESV., Myod., 682. 4. (1830).

elata FABR., Spec. Ins., II. 441. 27. (1781), Ent. syst., 322. 44. (1794) Gallia.
et Syst. Antl., 297. 69. [*Musca*] (1805); GMEL., Syst. Nat., I. 5. Europa.

2842. 188. [*Musca*] (1788); SCHRANK, F. Boica, III. 2493. [*Volucella*]

(1803); FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 9. 10. (1820); MEIG., S. B.,

VI. 41. 14. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 370. 17. (1835); ZETT.,

Ins. Lapp., 741. 9. (1838) et Dipt. Scand., V. 2139. 13. (1846);
Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 200. 6. (1847); SCHUMM., Arb. u.
Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Breslau, 81. 12. (1850);
SCHIN., F. A., II. 53. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 34. 14.
(1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 38. 14. (1877); HENDEL, Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, L. 342. 5. (1900).

nigricosta ROND., Atti Soc. entom. Ital. Milano, 223. 12. (1868),
Prodr., VII. Sciomyz. 23. 13. (1868) et Ann. Soc. nat. Modena,
37. 13. (1877).

× *ferruginea* FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 9. 9. (1820); MEIG., S. B.,
VI. 40. 12. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 370. 15. (1835); ZETT.,
Ins. Lapp., 741. 7. (1838) et Dipt. Scand., V. 2137. 11. (1846);
Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 197. 2. (1847); DUF., Ann. Soc.
entom. Fr., 2 série Tom., 7. p. 67. t. III. No III. (1849); SCHUM., Arb.
u. Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Breslau, 81. 10. (1850);
WALK., Ins. Brit., II. 168. 9. (1853); DUF., Ann. Soc. entom. Fr.,
48. (1857); SCHIN., F. A., II. 54. (1864); ROND., Atti Soc. entom.
Ital. Milano, 223. 12. (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 40. 17.
(1877); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 84. (1883); BEZZI,
Contrib. alla Fauna ditt. di Pavia, 19. 31. (1891); BECK., Acta
Soc. scient. Fenn., XXVI. 59. 119. (1900); HENDEL, Verh. zool.-bot.
Ges. Wien, L. 339. 4. (1900).

arrogans MEIG., S. B., VI. 41. 13. (1830); MACQ., Suit. à Buff.,
II. 370. 16. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 741. 8. (1838) et Dipt.
Scand., V. 2138. 12. (1846); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII.
198. 3. (1847); SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl.
Cult. Breslau, 81. 11. (1850); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt.
u. Dipt., II. 289. (1902).

paludosa ROB.-DESV., Myod., 682. 2. (1830).

quadrivittata v. Ros., Württemb. Corrb., 49. Nachtrag. (1840).

quinquemaculata v. Ros., Württemb. Corrb., 61. (1840); BECK.,
Jahresber. d. Ver. vaterl. Naturk. in Württemb., No 22. pag.
57. (1902).

robusta Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 197. 1. (1847); SCHIN.,
F. A., II. 54. (1864).

strictica ROB.-DESV., Myod., 682. 1. (1830); MACQ., Hist. nat. d.
Iles Canaries, 117. 96. (1839).

foveolata ROND., Prodr., VII. Sciomyz., 32. 12. (1868) et Atti Soc. Italia.
entom. Ital. Milano, 221. 10. (1868).

hyalipennis v. Ros. = *laevifrons* Lw.

inclusa WOLLASTON, Ann. and Magaz. of nat. Hist., Vol. I. p. 116. I. Madeira.
t. V. fig. 5. (1858).

Kertész HENDEL, Természetr. Füzetek, XXIV. 138. (1901).

laevifrons Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 201. 8. (1847); SCHIN.,
F. A., II. 53. (1864); ROND., Atti Soc. entom. Ital. Milano, 223.
14. (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 39. 15. (1877); BEZZI, Contrib.
alla F. ditt. di Pavia, 18. 30. (1891); HENDEL, Verh. zool.-bot.
Ges. Wien, L. 338. 3. (1900).

Europa,
Ins. Canar.,
Sibiria.

Transbaikal.
Europa centr.

hyalipennis v. Ros., Württemb. Corrb., 61. (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No 21. pag. 57. (1902).

? *praeusta* v. Ros., Württemb. Corrb., 61. (1840).

silvatica p. p., MEIG., S. B., VI. 41. 15. (1830).

marginella ROB.-DESV., Myod., 682. 3. (1830).

Gallia.

maritima ROB.-DESV., Myod., 683. 5. (1830).

Gallia.

media HALID., Entom. Mag., I. 150. [Nomen sine descriptione.] (1833). Britannia.

nigricosta ROND. = *elata* FABR.

paludosa ROB.-DESV. = *ferruginea* FALL.

plumosa LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 201. 7. (1847).

Sitka.

praeusta p. p., v. Ros. = *laevifrons* LW.

punctifrons ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 33. 12. (1868).

Italia.

quadrivittata v. Ros. = *ferruginea* FALL.

quinquemaculata v. Ros. = *ferruginea* FALL.

robusta LW. = *ferruginea* FALL.

sciomyzina ZETT., Dipt. Scand., V. 2145. 19. (1846); SCHUMM., Arb. u.

Suecia,

Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Breslau, 83. 17. (1850).

Silesia.

X **silvatica** MEIG., S. B., VI. 41. 15. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 371.

Europa centr.

18. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 742. 10. (1838) et Dipt. Scand., V.

et mer.

2139. 14. (1846); LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 199. 4. (1847);

WALK., Ins. Brit., II. 169. 11. (1853); SCHIN., F. A., II. 53. (1864);

SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Breslau,

82. 13. (1850); ROND., Atti Soc. entom. Ital. Milano, 224. 15. (1868)

et Ann. Soc. nat. Modena, 39. 16. (1877); HENDEL, Verh. zool-

bot. Ges. Wien, L. 336. 1. (1900).

arrogans p. p. MEIG., S. B., VI. 41. 13. (1830).

silvatica p. p., MEIG. = *laevifrons* LW.

stictica ROB.-DESV. = *ferruginea* FALL.

X **unicolor** LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 199. 5. (1847); SCHIN., F.

Europa centr.

A., II. 57. (1864); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 58. 117.

et sept.,

[*Sciomyza*] (1900); HENDEL, Verh. zool-bot. Ges. Wien, L. 337. 2.

Siberia.

(1900).

Walkeri*) WOLLASTON, Ann. and Mag. of nat. Hist., Vol. I. p. 116.

I. Madeira.

t. V. f. 6. (1858).

Lunigera

HENDEL, Verh. zool-bot. Ges. Wien, L. 344. 3. (1900).

? *Pherbina* p. p., ROB.-DESV., Myod., 688. 2. (1830).

X **chaerophylli** FABR., Entom. syst. Suppl., 565. 145. [*Musca*] (1798) et

Europa.

Syst. Anth., 207. 16. [*Scatophaga*] (1805); MEIG., S. B., VI. 35. 4.

[*Tetanocera*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 367. 6. [*Tetanocera*]

(1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2124. 1. [*Tetanocera*] (1846);

*) Ad Trypetidarum familiam pertinet.

SCHUMM., Arb. u. Veränd. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Breslau, 79. 1. (1850); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, L. 344. (1900); BECK, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 256. 4. (1902).

coryleti SCHIN. (nec SCOP.), F. A., II. 57. [*Tetanocera*] (1864).

flavescens ROB.-DESV., Myod., 688. 2. [*Pherbina*] (1830).

irrorata MACQ., Suit. à Buff., II. 368. 9. [*Tetanocera*] (1835).

variiegata FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 4. 1. [*Tetanocera*] (1820);

? DE GEER, Ins., 6. 96. t. VI. f. 1. [*Musca*] (1776); ROND., Prodr.,

VII. Sciomyz. 29. 7. [*Tetanocera*] (1868); Atti Soc. entom.

Ital. Sc. Nat. Milano, 220. 6. [*Tetanocera*] (1868) et Ann. Soc.

Nat. Modena, 33. 7. [*Tetanocera*] (1877); Bezzi, Contrib. alla

F. ditt. di Pavia, 18. 29. (1891).

coryleti SCHIN. = **chaerophylli** FABR.

flavescens ROB.-DESV. = **chaerophylli** FABR.

irrorata MACQ. = **chaerophylli** FABR.

variiegata FALL., DE GEER, ROND., BEZZI = **chaerophylli** FABR.

Dictya

MEIG., Illig. Magaz., II. 277. 92. (1803).

Monochaetophora HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, L. 335. (1900).

Pherbina p. p., ROB.-DESV., Myod., 691. 11. (1830).

paludosa ROB.-DESV. = **umbrarum** L.

pictipes LW. = **umbrarum** L.

✓ **umbrarum** L., Fauna Suec., 1864. (1761) et Syst. nat., XII. 2. 996. Europa, 108. [*Musca*] (1766); MEIG., Illig. Magaz., II. 277. 92. [*Dictya*] Amer. sept. (1803); FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 7. 7. [*Tetanocera*] (1820); LATR., Diet. d'Hist. nat., 24. 196. 580. (1804); MEIG., S. B., VI. 39. 10. [*Tetanocera*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 369. 12. [*Tetanocera*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 741. 5. [*Tetanocera*] (1838) et Dipt. Scand., V. 2136. 10. [*Tetanocera*] (1846); LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 250. [*Tetanocera*] (1847); SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Breslau, 81. 9. [*Tetanocera*] (1850); WALK., Ins. Brit., II. 168. 8. [*Tetanocera*] (1853); SCHIN., F. A., II. 56. [*Tetanocera*] (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 28. 5. [*Tetanocera*] (1868); Atti Soc. entom. Ital. Milano, 219. 4. [*Tetanocera*] (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 32. 5. [*Tetanocera*] (1877); BEZZI, Contrib. alla Fauna ditt. di Pavia, 18. 27. [*Tetanocera*] (1891); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, L. 335. [*Monochaetophora*] (1900).

paludosa ROB.-DESV., Myod., 691. 11. [*Pherbina*] (1830).

pictipes LW., Wien. entom. Monatschr., III. 292. [*Tetanocera*] (1859) et Monogr. Dipt. N. America, I. 112. [*Tetanocera*] (1862).

Trypetoptera

HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, L. 352. (1900).

Dictya p. p., FABR., Syst. Antl., 325. 69. (1805).

argus FABR. = **punctulata** SCOP.

formosa LW., Berlin. entom. Zeitschr., VI. 85. [*Tetanocera*] (1862); Graecia.

HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, L. 354. 2. (1900).

gentilis ROB.-DESV. = **punctulata** SCOP.

hieracii FABR., MEIG., MACQ., WALK., LW. = **punctulata** SCOP.

nemorum FALL., ZETT., SCHUMM. = **punctulata** SCOP.

X **punctulata** SCOP., Entom. carn., 338. 906. [*Musca*] (1763); SCHIN., Europa.

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 41. [*Tetanocera*] (1858) et F. A.,

II. 56. [*Tetanocera*] (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 29. 6.

[*Tetanocera*] (1868); Atti Soc. entom. Ital. Milano, 223. 12. [*Teta-*

nocera] (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 40. 17. [*Tetanocera*]

(1877); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, L. 352. 1. (1900).

argus FABR., Syst. Antl., 216. 7. [*Oscinis*] (1805).

gentilis ROB.-DESV., Myod., 688. 1. [*Pherbina*] (1830).

hieracii FABR., Ent. syst., IV. 361. 201. [*Musca*] (1794); MEIG.,

S. B., VI. 39. 11. [*Tetanocera*] (1830); MACQ., Suit. à Buff.,

II. 369. 13. [*Tetanocera*] (1835); LW., Stettin. entom. Zeitg.,

VIII. 250. [*Tetanocera*] (1847); WALK., Dipt. Brit., II. 169. 10.

[*Tetanocera*] (1853); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt.,

II. 256. 11. (1902).

nemorum FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 8. 8. [*Tetanocera*] (1820);

ZETT., Ins. Lapp., 741. 6. (1838) et Dipt. Scand., V. 2134. 9.

[*Tetanocera*] (1846); SCHUM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges.

f. vaterl. Cultur. Breslau, 81. 8. [*Tetanocera*] (1850).

umbrarum FABR., Syst. Antl., 325. 69. 1. (1805).

umbrarum FABR. = **punctulata** SCOP.

Pherbina

ROB.-DESV., Myod., 687. XVII. (1830).

chaerophylli MEIG. (nec FABR.) = **coryleti** SCOP.

communis ROB.-DESV. = **punctata** FABR.

X **coryleti** SCOP., Ent. carn., 336. 901. [*Musca*] (1763); ROND., Prodr., Europa.

VII. Sciomyz. 30. 8. [*Tetanocera*] (1868); Atti Soc. entom. Ital.

Milano, 226. 7. [*Tetanocera*] (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 34.

8. [*Tetanocera*] (1877); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, L.

347. 1. (1900).

chaerophylli MEIG., S. B., VI. 35. 4. [*Tetanocera*] (1830).

obsoleta FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 5. 2. [*Tetanocera*] (1820).

X *reticulata* FABR., Spec. Ins., II. 450. 77. [*Musca*] (1781); Ent.

syst., IV. 347. 145. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 206. 12.

[*Scatophaga*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Insect., IV. 351.

[*Musca*] (1809); MEIG., S. B., VI. 35. 5. [*Tetanocera*] (1830); ROB.-DESV., Myod., 688. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 368. 7. [*Tetanocera*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 740. 2. [*Tetanocera*] (1838) et Dipt. Scand., V. 2126. 2. [*Tetanocera*] (1846); LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 250. [*Tetanocera*] (1847); SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Breslau, 79. 2. [*Tetanocera*] (1850); WALK., Ins. Brit., II. 167. 6. [*Tetanocera*] (1853); SCHIN., F. A., II. 55. [*Tetanocera*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 256. 5. (1902).

germana ROB.-DESV., Myod., 690. 10. (1830).

Gallia.

limbata ROB.-DESV. = **vittigera** SCHIN.

obsoleta FALL. = **coryleti** SCOP.

punctata FABR., Ent. syst., IV. 347. 147. [*Musca*] (1794) et Syst. Europa.

Antl., 207. 17. [*Scatophaga*] (1805); MEIG., S. B., VI. 38. 9. t. LVII. f. 15. [*Tetanocera*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 369. 11. [*Tetanocera*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 740. 3. (1838) et Dipt. Scand., V. 2127. 3. [*Tetanocera*] (1846); LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 250. [*Tetanocera*] (1847); SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Breslau, 79. 3. [*Tetanocera*] (1850); SCHIN., F. A., II. 55. [*Tetanocera*] (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 31. 10. [*Tetanocera*] (1868); Atti Soc. entom. Ital. Milano, 221. 8. [*Tetanocera*] (1868) et Ann. Soc. nat. Modena, 33. 7. [*Tetanocera*] (1877); HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, L. 349. 2. (1900).

communis ROB.-DESV., Myod., 689. 5. (1830).

reticulata FABR., LATR., ROB.-DESV., MEIG., MACQ., ZETT., LW., SCHUMM., SCHIN. = **coryleti** SCOP.

soror ROB.-DESV., Myod., 690. 9. (1830).

Gallia.

vicina ROB.-DESV., Myod., 689. 6. (1830).

Gallia.

✕ **vittigera** SCHIN., F. A., II. 55. [*Tetanocera*] (1864); ROND., Prodr., VII. Europa centr.
Sciomyz. 31. 9. (1868); Atti Soc. ent. Ital. Milano, 221. 9. (1868)
et Ann. Soc. nat. Modena, 35. 9. [*Tetanocera*] (1877); HENDEL,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, L. 350. 3. (1900).

? **limbata** ROB.-DESV., Myod., 690. 7. (1830).

Hedroneura

HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXI. 265. (1902).

Elgiva MEIG., S. B., VII. 365. t. LXXIV. f. 32—35. p. p. (1838).

cucularia L., Syst. Nat., XII. 2. 995. 103. [*Musca*] (1766); MEIG., S. Europa.

B., VI. 44. 19. [*Tetanocera*] (1830) et VII. 366. 4. [*Elgiva*] (1838);
LW., Dipt. Beitr., I. 44. 8. [*Tetanocera*] (1845); ZETT., Dipt. Scand.,
V. 2142. 16. [*Tetanocera*] (1846); WALK., Ins. Brit., II. 166. 3.
[*Tetanocera*] (1853); SCHIN., F. A., II. 64. [*Elgiva*] (1864); ROND.,
Prodr., VII. Sciomyz. 15. 2. [*Elgiva*] (1868); HENDEL, Wien. entom.
Zeitg., XXI. 265. (1902).

- ? *punctithorax* v. Ros., Württemb. Corbl., 61. [*Tetanocera*] (1840).
cucularia var. β . HALID. = *rufa* PANZ.
cucularia FABR., FALL., MACQ., ZETT. = *rufa* PANZ.
divisa LW., Dipt. Beitr., I. 43. 7. [*Tetanocera*] (1845). Germania.
punctithorax v. Ros. = *cucularia* L.
rufa PANZ., F. Germ., 54. 17. [*Musca*] (1798); LW., Dipt. Beitr., I. 42. 6. [*Tetanocera*] (1845); ZETT., Dipt. Scand., V. 2141. 15. [*Tetanocera*] (1846); SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Breslau, 82. 14. [*Tetanocera*] (1850); SCHIN., F. A., II. 63. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 15. 1. (1868). Europa.
cucularia FABR., Spec. Ins., II. 449. 71. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat., I. 5. 2853. 103. [*Musca*] (1793); FABR., Ent. syst., IV. 345. 136. [*Musca*] (1798) et Syst. Antl., 204. 2. [*Scatophaga*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 9. 11. [*Tetanocera*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., II. 366. 2. [*Tetanocera*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 742. 11. [*Tetanocera*] (1838); SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Breslau, 82. 15. [*Tetanocera*] (1850); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 15. 2. (1868).
cucularia var. β . HALID., Entom. Magaz., I. 169. [*Tetanocera*] (1833).
Sundewalli FRIES, Monogr. Tanypez. Suec. Lund., 17. (1823).
Sundewalli FRIES = *rufa* PANZ.
unipunctata MACQ., Lucas Explor. de l'Algérie, III. 494. 245. t. VI. Africa sept. f. 10. [*Tetanocera*] (1849).

Elgiva

MEGERLE, MEIG., S. B., VII. 366. (1838).

Chione ROB.-DESV., Myod., 679. XII. (1830).*)

Ilione HALID., Westwood's Introduct. Med. Class. Ins., p. 146. (1840).

- ✕ *albiseta* SCOP., Ent. carn., 341. 918. [*Musca*] (1763); SCHIN., F. A., II. 62. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 16. 4. (1868); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 19. 33. (1891). Europa.
aratoria FABR., Entom. syst., IV. 344. 132. [*Musca*] (1794); MEIG., S. B., VI. 42. 16. t. LVII. f. 17. [*Tetanocera*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 371. 19. [*Tetanocera*] (1835); MEIG., S. B., VII. 366. 1. (1838); ZETT., Ins. Lapp., 742. 12. [*Tetanocera*] (1838); LW., Dipt. Beitr., I. 46. [*Tetanocera*] (1845); ZETT., Dipt. Scand., V. 2143. 17. [*Tetanocera*] (1846); SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Breslau, 82. 16. [*Tetanocera*] (1850); WALK., Ins. Brit., II. 167. 5. [*Tetanocera*] (1853).

*) Nomen „Chione“ jam a Megerle anno 1811 molluscorum generi praeditum est.

communis ROB.-DESV., Myod., 680. 2. [*Chione*] (1830).

interstincta FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 10. 12. [*Tetanocera*] (1820).

rufifrons PANZ., Fauna Germ., 44. 24. [*Musca*] (1797).

aratoria FABR., MEIG., MACQ., ZETT., LW., SCHUMM., WALK. = *albiseta* MEIG.

communis ROB.-DESV. = *albiseta* MEIG.

ichneumonea ROB.-DESV., Myod., 680. 3. [*Chione*] (1830).

Gallia.

interstincta FALL. = *albiseta* MEIG.

lateritia ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 17. 5. (1868).

Italia.

lineata FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 11. 14. [*Tetanocera*] (1820);

Europa centr.

MEIG., S. B., VI. 43. 18. [*Tetanocera*] (1830) et VII. 366. 3. (1838);

et sept.

HALID., Westwood's Introd. Med. Class. Ins., p. 146. [*Ilione*]

(1840); LW., Dipt. Beitr., I. 46. 9. [*Tetanocera*] (1845); ZETT.,

Dipt. Scand., V. 2144. 18. [*Tetanocera*] (1846); WALK., Ins. Brit.,

II. 167. 4. [*Tetanocera*] (1853); SCHIN., F. A., II. 63. (1864).

rufifrons PANZ. = *albiseta* MEIG.

sepedonoïdes ROB.-DESV., Myod., 680. 1. [*Chione*] (1830).

Gallia.

✕ *trifaria* LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 246. [*Tetanocera*] (1847).

Sicilia.

trivittata STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 224. 220. (1899).

trivittata STROBL = *trifaria* LW.

Truquii ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 18. 6. (1868).

Italia.

turcestanica HERDEL, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., III. 215. 2. (1903).

Turkestan.

Hydromyia

ROB.-DESV., Myod., 691. XVIII. (1830).

Dictya p. p., FABR., Syst. Antl., 329. 14. (1805).

Elgiva p. p., MEIG. (1838), SCHIN. (1864), ROND. (1868).

caeruleipennis ROB.-DESV. = *dorsalis* FABR.

✕ *dorsalis* FABR., Entom. syst., IV. 354. 173. [*Musca*] (1798) et Syst.

Europa,

Antl., 329. 14. [*Dictya*] (1805); MEIG., S. B., VI. 43. 17. [*Tetano-*

Sibiria.

cera] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 371. 20. [*Tetanocera*] (1835);

MEIG., S. B., VII. 366. 2. [*Elgiva*] (1838); ZETT., Ins. Lapp., 742.

12. var. a, b. [*Tetanocera*] (1838); LW., Dipt. Beitr., I. 46. 11.

[*Tetanocera*] (1845); ZETT., Dipt. Scand., V. 2146. 20. [*Tetanocera*]

(1846); SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult.

Breslau, 83. 18. [*Tetanocera*] (1850); SCHIN., F. A., II. 63. [*Elgiva*]

(1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 16. 3. [*Elgiva*] (1868); BECK.,

Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 59. 121. [*Elgiva*] (1900).

caeruleipennis ROB.-DESV., Myod., 691. 1. (1830).

punctipennis FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 10. 13. [*Tetanocera*] (1820).

punctipennis FALL. = *dorsalis* FABR.

rubicunda ROB.-DESV., Myod., 692. 2. (1830).

Gallia.

Limnia

ROB.-DESV., Myod., 684. XVI. (1830).

Oregocera ROND., Prodr., I. 106. (1856) et VII. Sciomyz. 23. (1868).

- albitarsis** GIMMERTH., Corrbibl. Riga, I. 105. [*Elgiva*] (1846). Rossia.
- algira** MACQ., Lucas Explor. scient. de l'Algérie, III. 493. 244. t. VI. f. 9. [*Tetanocera*] (1849). Algeria.
- claripennis** ROB.-DESV., Myod., 685. 2. (1830). Gallia.
- cribrata** ROND., Prodr., VII. Sciomyz., 26. [*Oregocera*] (1868). Italia.
- fenestrata** MACQ., Suit. à Buff., II. 370. 14. [*Tetanocera*] (1835); MEIG., S. B., VII. 365. 18. [*Tetanocera*] (1838). Gallia.
- flavifrons* PANZ. = **unguicornis** SCOP.
- fumigata** SCOP., Entom. carn., 900. [*Musca*] (1763); FABR., Spec. Ins., II. 449. 76. (1781); GMEL., Syst. Nat., I. 5. 2854. 234. [*Musca*] (1793); FABR., Entom. syst., IV. 346. 142. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 205. 7. [*Scatophaga*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 351. [*Musca*] (1809); MEIG., S. B., VI. 36. 6. [*Tetanocera*] (1830); MACQ. Suit. à Buff., II. 368. 8. [*Tetanocera*] (1835); LW., Dipt. Beitr., I. 41. 5. [*Tetanocera*] (1845); WALK., Ins. Brit., II. 166. 2. [*Tetanocera*] (1853); LW., Wien. entom. Monatschr., VI. 172. 61. [*Tetanocera*] (1862); SCHIN., F. A., II. 60. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 26. 2. [*Oregocera*] (1868).
- rufifrons* FABR., Spec. insect., II. 449. 76. (1781); SCHIN., F. A., II. 60. (1864).
- irrorata** MACQ., Suit. à Buff., II. 368. 9. [*Tetanocera*] (1835); MEIG., S. B., VII. 365. 17. [*Tetanocera*] (1838); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 27. 3. (1868). Europa centr. et mer.
- limbata* ROB.-DESV. = **unguicornis** SCOP.
- marginalis** ROB.-DESV., Myod., 685. 3. (1830). Gallia.
- nubila** LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 119. [*Tetanocera*] (1847). Sicilia.
- pratorum* FALL., MEIG., MACQ., ZETT., WALK., SCHIN. = **unguicornis** SCOP.
- prominens** LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 120. [*Tetanocera*] (1847). Rhodus.
- recta** LW., Dipt. Beitr., I. 40. 4. [*Tetanocera*] (1845). Europa sept.
- reticulata* FALL. (nec FABR.), Dipt. Suec. Sciomyz., 6. 4. [*Tetanocera*] (1820).
- rufifrons* ZETT., Dipt. Scand., V. 2130. 6. [*Tetanocera*] (1846).
- reticulata* FALL. = **recta** LW.
- rufifrons* FABR., SCHIN. = **fumigata** SCOP.
- rufifrons* ZETT. (nec FABR.) = **recta** LW.
- stictica** FABR., Syst. Antl., 206. 13. [*Scatophaga*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 350. [*Musca*] (1809); MEIG., S. B., VI. 34. 3. [*Tetanocera*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 367. 5. [*Tetanocera*] (1835); LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 114. [*Tetanocera*] (1847); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 20. 2. [*Oregocera*] (1868); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 255. 3. (1902). Europa.

- ~~X~~ **unguicornis** SCOP., Entom. carn., 335. 899. [*Musca*] (1763); SCHIN., F. A., II. 60. [*Tetanocera*] (1864); ROND., Prodr., VII. 27. 4. [*Ore-gocera*] (1868); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 18. 26. [*Tetanocera*] (1891).
flavifrons PANZ., Fauna Germ., 60. t. XXII. [*Musca*] (1798).
limbata ROB.-DESV., Myod., 685. 1. (1830).
pratorum FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 6. 5. [*Tetanocera*] (1820);
 MEIG., S. B., VI. 37. 7. [*Tetanocera*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 368. 10. [*Tetanocera*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 740. 4. (1838) et Dipt. Scand., V. 2131. 7. [*Tetanocera*] (1846);
 SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Breslau, 80. 6. [*Tetanocera*] (1850); WALK., Ins. Brit., II. 168. 8. [*Tetanocera*] (1853).
Zelleri LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 117. [*Tetanocera*] (1847). Neapolis.

Coremacera

ROND., Prodr., I. 106. (1856) et Prodr., VII. Sciomyz., 18. VII. (1868).

Limnia p. p., ROB.-DESV., 684. (1830); SCHIN., F. A., II. 387. (1864).

- amoena** LW., N. Boitr., I. 38. [*Tetanocera*] (1853). Turcia.
bivittata MACQ., Suit. à Buff., II. 367. 4. [*Tetanocera*] (1835); MEIG., S. B., VII. 365. 16. [*Tetanocera*] (1838); ROND., Prodr. Sciomyz., 21. 3. (1868). Europa centr. et mer.
catenata LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 122. [*Tetanocera*] (1847). Germ., Hung.
cincta FABR., Entom. syst., IV. 347. 144. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 206. 11. [*Scatophaga*] (1805); MEIG., S. B., VI. 33. 2. [*Tetanocera*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., V. 2129. 5. [*Tetanocera*] (1846);
 SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Breslau, 79. 5. (1850); SCHIN., F. A., II. 59. [*Limnia*] (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz., 20. 1. (1868); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 254. 2. (1902). Europa.
confluens ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 22. 5. (1868). Italia.
crinicornis FALL. = **marginata** FABR.
Dejeanii ROB.-DESV., Myod., 687. 1. [*Limnia*] (1830). Gallia.
halensis LW., Zeitschr. ges. Naturw., 391. 129. [*Tetanocera*] (1864); Mlk, Wien. entom. Zeitg., III. 203. 2. (1884). Germania.
Manni SCHIN., F. A., II. 59. [*Limnia*] (1864). Europa centr.
trivittata LW. Wien. entom. Monatschr., IV. 22. 2. [*Tetanocera*] (1860).
~~X~~ **marginata** FABR., Spec. Ins., II. 449. 74. [*Musca*] (1781); PANZ., Fauna Germ., XXXII. 22. [*Musca*] (1796); FABR., Entom. syst., IV. 345. 139. [*Musca*] (1798) et Syst. Antl., 203. 1. [*Scatophaga*] (1805); MEIG., S. B., VI. 33. [*Tetanocera*] (1830); ROB.-DESV., Myod., 686. [*Limnia*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 366. 3. [*Tetanocera*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2128. 4. [*Tetanocera*] (1846); SCHUMM., Arb. u.

Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Breslau, 79. 4. (1850);
WALK., Ins. Brit., II. 166. 1. [*Tetanocera*] (1853); SCHIN., F. A.,
II. 58. [*Tetanocera*] (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 21. 4.
(1868); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 19. 32. (1891); MIK,
Wien. entom. Zeitg., XVII. 166. (1898).

crinicornis FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 5. 3. [*Tetanocera*] (1820).

obscuripennis LW., Dipt. Beitr., I. 38. 1. [*Tetanocera*] (1845) et Rhodus,
Stettin. entom. Zeitg., VIII. 250. (1847). Asia min.

trivittata LW. = **Manni** SCHIN.

Sepedon

LATR., Hist. nat. Ins. et Crust., XIV. 305. (1804).

Bacha p. p., FABR., Syst. Antl., 199. 1. (1805).

Mulio p. p., FABR., Entom. syst. Suppl., 5. 59. 9. (1798); PANZ.,
Fauna Germ., 77. (1801).

aquaticus ROB.-DESV., Myod., 678. 4. (1830).

Gallia.

ferrugineus DUF. = **spinipes** SCOP.

flavipes SCHRANK = **sphegeus** FABR.

Haefneri FALL., MEIG., MACQ., ZETT., WALK. = **spinipes** SCOP.

hispanicus LW., Wien. entom. Monatschr., VI. 300. 6. (1862).

Hispania.

palustris LATR. = **sphegeus** FABR.

Peleterii ROB.-DESV., Myod., 678. 3. (1830).

Gallia.

pseudo-acori ROB.-DESV. = **sphegeus** FABR.

rufipes PANZ., FABR. = **sphegeus** FABR.

✕ **sphegeus** FABR., Spec. Ins., II. 429. 40. [*Syrphus*] (1781); GMEL.,
Syst. Nat., I. 5. 2873. 351. [*Musca*] (1790); FABR., Ent. syst., IV.
298. 72. [*Syrphus*] (1794) et Suppl., 559. 9. [*Mulio*] (1798); PANZ.,
Fauna Germ., LXXVII. 21. [*Mulio*] (1801); FABR., Syst. Antl., 199.
1. [*Bacha*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 2. 1. (1820);
MEIG., S. B., VI. 28. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 363. 1.
(1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2120. 1. (1846); DUF., Ann. Soc.
ent. Fr., II. série Tom. I. (1849); WALK., Ins. Brit., II. 170. 1.
(1853); SCHIN., F. A., II. 65. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz.
12. 1. (1868); GERCKE, Verh. d. Ver. f. naturw. Unterh. Hamb.,
III. t. III. (1876); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 84. (1883);
BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 19. 34. (1891).

flavipes SCHRANK, Fauna Boica, III. 2458. [*Musca*] (1803).

palustris LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 350. (1809).

pseudo-acori ROB.-DESV., Myod., 677. 1. (1830).

rufipes PANZ., Fauna Germ., LX. 23. [*Musca*] (1798); FABR.,
Syst. Antl., 207. 18. [*Scatophaga*] (1805).

✕ **spinipes** SCOP., Entom. carn., 342. 919. (1763); SCHIN., F. A., II. 65. Europa.
(1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 13. 2. (1868); GERCKE, Verh.
d. Ver. f. naturw. Unterh. Hamburg, III. 145. Taf. III. (1876);
BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 19. 35. (1891).

ferrugineus DUF., Ann. Soc. nat. Tom., 30. p. 10, 12. t. XVII. f. 7. (1833).

Haefffneri FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 3. 2. (1820); MEIG., S. B., VI. 29. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 363. 2. (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2121. 2. (1846); WALK., Ins. Brit., II. 170. 2. (1853).

Dichetophora

ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 11. IV. (1868).

? *Cylidria* ROB.-DESV., Myod., 678. XI. (1830).

Cylindria HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 18. (1902).

Limnia p. p., SCHIN., F. A., II. (1864).

gracilis LW., Dipt. Beitr., I. 47. 13. [*Tetanocera*] (1845).

Rhodus.

× *obliterata* FABR., Syst. Antl., 205. 9. [*Scatophaga*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 351. [*Musca*] (1809); FALL., Dipt. Suec. Sciomyz., 7. 6. [*Tetanocera*] (1820); MEIG., S. B., VI. 38. 8. [*Tetanocera*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 366. 1. [*Tetanocera*] (1835); LW., Dipt. Beitr., I. 46. 12. [*Tetanocera*] (1845); ZETT., Dipt. Scand., V. 2133. 8. [*Tetanocera*] (1846); SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges. vaterl. Cult. Breslau, 80. 7. [*Tetanocera*] (1850); SCHIN., F. A., II. 61. [*Limnia*] (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 11. (1868).

Europa.

Salticella

ROB.-DESV., Myod., 683. XV. (1830).

Eggizoneura ROND., Prodr., IV. pag. 10. (1861) et Prodr., VII. Sciomyz. 9. 3. (1868).

*Lucina**) MEIG., S. B., VI. 3. CXC. (1830).

× *fasciata* MEIG., S. B., VI. 3. 1. t. LV. f. 6—8. [*Lucina*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 409. 1. [*Lucina*] (1835); PERRIS, Mém. Soc. scient. agricult. et arts de Lille, [*Lucina*] (1853); ROND., Prodr., I. 105. [*Lucina*] (1856); SCHIN., F. A., II. 42. [*Lucina*] (1864); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 86. [*Lucina*] (1883).

Europa centr.

saltatrix ROB.-DESV., Myod., 684. 1. (1830).

hispanica MEIG., S. B., VII. 362. 2. [*Lucina*] (1838).

Hispania.

maculipes ROND., Prodr., VII. Sciomyz. III. 10. 1. [*Eggizoneura*] (1868).

Italia.

saltatrix ROB.-DESV. = *fasciata* MEIG.

*) Nomen „Lucina“ jam anno 1791 molluscorum generi prae-ditum est.

SAPROMYZIDAE.

Sapromyza

FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 29. (1820).

Agromyza p. p., MEIG., S. B., VI. 173. 17. (1830).*Cnemacantha* MACQ., Suit. à Buff., II. 586. (1835).*Heteroneura* FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 2. 1. (1823).*Lauxania* p. p., FALL., MEIG., MACQ., ZETT., LW.*Lycia* ROB.-DESV., Myod., 637. III. (1830).*Minettia* ROB.-DESV., Myod., 646. VI. (1830).*Palloptera* p. p., FALL., WALK.*Polionoma* ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 51. (1868).*Scyphella* p. p., SCHIN., F. A., II. 283. (1864).*Sylvia* ROB.-DESV., Myod., 636. II. (1830).*Terenia* ROB.-DESV., Myod., 640. IV. (1830).*abbreviata* BECK., Berlin. entom. Zeitg., XL. 220. 55. (1895). Bohemia.*acuticornis* ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 67. 26. (1868); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 223. 62. (1895). Italia.*adumbrata* LW., Europ. Dipt., III. 299. 202. (1873); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 200. 16. (1895). Hispania.*marginata* MEIG., S. B., V. 265. 18. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 400. 19. (1835); SCHIN., F. A., II. 103. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 222. 18. (1902).X *affinis* ZETT., Dipt. Scand., 2316. 6. (1847); BECK., Berlin. entom. Zeitg., XL. 193. 3. (1895). Europa centr. et sept.*praeusta* ZETT., Ins. Lapp., 751. 3. (1838).*albiceps* FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 33. 11. (1820); MEIG., S. B., V. 261. 6. (1826); LW., Dipt. Beitr., III. 32. 14. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2338. 29. (1847); SCHIN., F. A., II. 103. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 226. 68. (1895) et Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 220. 6. (1902). Europa centr. et sept.*albifrons* MACQ., Suit. à Buff., II. 399. 13. (1835); MEIG., S. B., VII. 345. 41. (1838); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 67. 28. (1868).*albifrons* MACQ., MEIG., ROND. = *albiceps* FALL.*albitarsis* MEIG., S. B., V. 301. 12. [*Lauxania*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 510. 11 [*Lauxania*] (1835). Germania.*andalusiaca* STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 226. 225. (1899). Hispania.*anisodactyla* LW., Dipt. Beitr., I. 24. (1845) u. III. 34. 20. (1847); SCHIN., F. A., II. 101. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitg., XL. 228. 74. (1895). Europa.

- fuscicornis* MACQ., Suit. à Buff., II. 398. 5. (1835); MEIG., S. B., VII. 344. 36. (1838); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 66. 24. (1868).
- rorida* WALK., Ins. Brit., II. 188. [*Palloptera*] (1853).
- spinitarsis* ZETT., Dipt. Scand., VI. 2322. 12. (1847).
- antennata** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 221. 58. (1895). Sarepta.
- × **apicalis** LW., Dipt. Beitr., III. 36. 23. (1847); SCHIN., F. A., II. 102. Germania,
(1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 223. 61. (1895). Russia.
- obsoleta* MEIG., S. B., V. 260. 2. (1826); BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 145. 16. (1847); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 220. 2. (1902).
- obsoletoïdes* SCHNABL, Berlin. entom. Zeitschr., XX. 215. (1876).
- apicalis** ROB.-DESV., Myod., 636. 1. [*Sylvia*] (1830). Gallia.
- atechna** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 211. 36. (1895). Russia.
- basalis** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2344. 35. (1847); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 224. 63. (1895). Europa centr. et sept.
- nana* LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XX. 111. 214. (1857); STROBL, Dipt. v. Steyerm., 98. (1894).
- basalis* ZETT. [*Lauzanina*] = **dimidiata** LW.
- bicolor** MACQ., Suit. à Buff., II. 403. 33. (1835); MEIG., S. B., VII. 345. 44. (1838); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 196. 9. (1895). Gallia.
- bicolor* LW. = **Loewi** SCHIN.
- binotata** MACQ., Suit. à Buff., II. 399. 9. (1835); MEIG., S. B., VII. 344. 39. (1838). Gallia.
- × **bipunctata** MEIG., S. B., VI. 378. 32. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 398. 8. (1835); LW., Dipt. Beitr., III. 30. 11. (1847); SCHIN., F. A., II. 100. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz., 69. 32. (1868); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 212. 38. (1895) et Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 223. 32. (1902). Europa centr. et sept.
- bisbinotata* ROND. = **quadripunctata** L.
- × **biseriata** LW., Dipt. Beitr., III. 29. 9. (1847); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 217. 50. (1895). Turcia.
- bisigillata** ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 70. 34. (1868); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 212. 39. (1895). Italia sept.
- biumbrata** LW., Dipt. Beitr., III. 38. 26. (1847); SCHIN., F. A., II. 104. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 194. 5. (1895). Europa centr.
- bivittata* MEIG., MACQ. = **longipennis** FABR.
- blepharipteroides** DUF., Ann. Sc. nat., XI, XII. 42. (1827); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, p. 90. (1883). Gallia.
- brunnescens** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 225. 66. (1895). Silesia.
- brunnitarsis** MACQ., Suit. à Buff., II. 398. 4. (1835); MEIG., S. B., VII. 344. 38. (1838). Gallia.
- chlorophthalma** ZETT., Ins. Lapp., 752. 7. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2326. 17. (1847); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 229. 75. (1895). Europa sept.
- fuscostacea* ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3352. 17—18. (1849).
- Christophi** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 197. 11. (1895). Dalmatia, Russia mer.

- cinerea* ROB.-DESV., Myod., 637. 4. [*Sylvia*] (1830). Gallia.
- citrina* MEIG., S. B., V. 264. 13. (1826); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. Austria.
u. Dipt., II. 221. 13. (1902).
- claripennis* ROB.-DESV., Myod., 646. 2. [*Minettia*] (1830). ?
- compsella* HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 7. p. 385. (1903). Norvegia.
- conjugata* BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 225. 67. (1895). Dalinat., Siles.
- consobrina* ZETT., Dipt. Scand., VI. 2340. 31. (1847); ROND., Prodr., Europa.
VII. Sciomyz., 68. 30. (1868); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL.
238. 90. (1895).
- costata* MEIG., S. B., V. 266. 19. (1826) = *Orchisia costata* [*Coenosia*] =
pictipennis LW., BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 222.
19. (1902).
- decaspila* LW., Zeitschr. f. d. Ges. Naturw., XX. 8. 110. 208. (1857); Europa centr.
SCHIN., F. A., II. 103. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL.
207. 30. (1895).
- ✕ *decempunctata* FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 30. 1. (1820); MEIG., S. Europa.
B., V. 270. 29. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 401. 20. (1835);
ZETT., Ins. Lapp., 751. 1. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2313. 2. (1847);
LW., Dipt. Beitr., III. 39. 28. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 191. 11.
(1853); SCHIN., F. A., II. 99. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz.
63. 18. (1868); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 203. 22. (1895).
- ✕ *decipiens* LW., Dipt. Beitr., III. 34. 18. (1847); SCHIN., F. A., II. 102. Europa.
(1864); LW., Jahresber. d. K. K. gel. Ges. Krakau, XLI. 15. 19.
(1870); BEZZI, I. ditteri del Trentino (1893); BECK., Berlin. entom.
Zeitschr., XL. 227. 69. (1895).
- palpella* ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 68. 29. (1868).
- sordida* HALID., Entom. Mag., I. 171. (1833); WALK., Ins. Brit.,
III. Addenda et Corrigenda, XIII. (1856).
- dedecor* LW., Europ. Dipt., III. 299. 202. (1873); BECK., Berlin. entom. Dalmatia,
Zeitschr., XL. 196. 10. (1895). Hispania.
- delicatula* ROB.-DESV., Myod., 641. 4. [*Terenia*] (1830). Gallia.
- ✕ *difformis* LW., Wien. entom. Monatschr., II. 11. (1858); SCHIN., F. A., Europa centr.
II. 104. (1864); GIRSCHN., Katt. entom. Nachr., IX. 203. (1883) et et sept.
Wien. entom. Zeitg., III. 158. (1884) et VII. 181. (1888); MİK,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 183. t. IV. f. 11. (1887);
BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 233. 82. (1895).
- platycephala* LW., Dipt. Beitr., III. 33. 17. (1847); SCHIN., F. A.,
II. 102. (1864).
- dilecta* ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 63. 17. (1868); BECK., Berlin. Italia.
entom. Zeitschr., XL. 195. 6. (1895).
- dimidiata* LW., Dipt. Beitr., III. 27. 4. (1847); BECK., Berlin. entom. Asia min.,
Zeitschr., XL. 214. 45. (1895). Norvegia.
- basalis* ZETT., Dipt. Scand., VI. 2367. 8. [*Lauzanina*] (1847).
- pallida* MEIG., S. B., VI. 381. 14. [*Lauzanina*] (1830); MACQ.,
Suit. à Buff., II. 510. 13. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt.
u. Dipt., II. 232. 14. (1902).
- dorsalis* MACQ., Suit. à Buff., II. 402. 26. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.

345. 45. (1835); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 201. 18. (1895).
- dubia** GIMMERTH., Bull. de Moscou, IV. 192. 3. (1847). Rossia.
- duodecimpunctata** MACQ., MEIG. = **notata** FALL.
- emarginata** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 238. 91. (1895); BEZZI, Italia.
Ditteri della Calabria, 65. (27). (1895).
- × **fasciata** FALL., Dipt. Suec. Suppl., III. 15. 1. [*Lauxania*] (1826); MACQ., Europa.
Suit. à Buff., II. 403. 31. (1835); LW., Dipt. Beitr., III. 27. 5. (1847);
SCHIN., F. A., II. 98. (1864); ROND., Prodr. VII. Sciomyz. 60. 9.
(1868); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 215. 46. (1895).
nemorosa ROB.-DESV., Myod., 647. 3. [*Minettia*] (1830).
rivosa MEIG., S. B., V. 265. 17. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II.
403. 31. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2335. 26. (1847);
BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 221. 17. (1902).
- femoralis** ROB.-DESV., Myod., 639. 5. [*Lycia*] (1830). Gallia.
- filia** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 237. 88. (1895). Dalmatia.
- flava** ROB.-DESV., Myod., 648. 7. [*Minettia*] (1830). Gallia.
- flava** ROB.-DESV., [*Lycia*] = **rorida** FALL.
- flavipalpis** LW., Dipt. Beitr., III. 29. 8. (1847); BECK., Berlin. entom. Europa mer.
Zeitschr., XL. 216. 49. (1895).
- flavipes** ROB.-DESV., Myod., 648. 6. [*Minettia*] (1830). Gallia.
- × **flaviventris** A. COSTA, Ann. d. Acad. aspir. nat. di Napoli, II. Serie Europa mer.
I. 129. (1843); SCHIN., F. A., II. 98. (1864); ROND., Prodr., VII.
Sciomyz. 58. 6. (1868); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 217.
51. (1895).
luteiventris ROND., Prodr. VII. Sciomyz. 59. 7. (1868).
- frontalis** LW., OST.-SACK., BECK. = **hyalinata** MEIG.
- fuliginea** ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 57. 3. (1868). Italia.
- fuscicornis** MEIG., MACQ., ROND. = **anisodactyla** LW.
- fuscotestacea** ZETT. = **chlorophthalma** ZETT.
- grisea** MEIG. MACQ., SCHIN. = **pallidiventris** FALL.
- grossipes** ROB.-DESV., Myod., 641. 3. [*Terenia*] (1830); MACQ., Suit. à Gallia.
Buff., II. 400. 15. (1835); MEIG., S. B., VII. 345. 43. (1838).
- helvola** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 220. 56. (1895). Hungaria,
- hilarella** ZETT. = **laeta** ZETT. Rossia.
- hyalinata** MEIG., S. B., V. 300. 9. [*Lauxania*] (1826); MACQ., Suit. à Europa centr.,
Buff., II. 509. 8. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., Amer. sept.
II. 232. 9. (1902).
frontalis LW., Wien. entom. Monatschr., II. 14. 9. [*Lauxania*]
(1858) et Sillim Journ. N. série, XXXVII. 318.; OST.-SACK.,
Catal. Dipt. N. Amer., 197. (1878); BECK., Berlin. entom.
Zeitschr., XL. 240. 94. (1895).
leucostoma ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6369. 3—4. [*Lauxania*]
(1860).
nigripes MACQ., Suit. à Buff., II. 510. 10. [*Lauxania*] (1835);
MEIG., S. B., VII. 352. 18. [*Lauxania*] (1838); BECK., Zeitschr.
f. Hymenopt. u. Dipt., II. 232. 18. (1902).

pusilla MEIG., S. B., V. 305. 3. [*Lonchaea*] (1826); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 233. 3. (1902).

✕ *illota* LW., Dipt. Beitr., III. 37. 24. (1847); SCHIN., F. A., II. 102. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 192. 1. (1895). Europa centr. et sept.

obsoleta p. p., ZETT., Dipt. Scand., VI. 2323. 14. (1847).

pallida MEIG., S. B., V. 260. 3. (1826); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 220. 3. (1902).

praeusta var. FALL., Dipt. Suec. Ortal., 31. 4. (1820).

impunctata ROB.-DESV., Myod., 639. 4. [*Lycia*] (1830).

interstincta FALL., Dipt. Suec. Ortal., 33. 12. (1820); MEIG., S. B., V. 261. 5. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 399. 11. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2339. 30. (1847) et VIII. 3353. 30. (1849); SCHIN., F. A., II. 283. [*Scyphella*] (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 65. 23. (1868); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 195. 7. (1895). Gallia. Europa centr. et sept.

liturella ROB.-DESV., Myod., 640. 9. [*Lycia*] (1830).

intonsa LW., Dipt. Beitr., III. 34. 19. (1847); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 228. 72. (1895). Europa mer.

inusta MEIG., S. B., V. 267. 21. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 401. 21. (1835); WALK., Ins. Brit., II. 188. 3. (1853); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 222. 21. (1902). Europa centr.

spectabilis LW., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, 8. (1858); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 200. 17. (1895).

labiosa BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 227. 71. (1895).

✕ *laeta* ZETT., Ins. Lapp., 752. 5. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2318. 8. (1847); STROBL, Dipt. v. Steyerim., 97. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 239. 92. (1895). Siles., Posnia. Europa centr. et sept.

hilarella ZETT., Ins. Lapp., 752. 6. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2319. 9. (1847).

melanogaster ZETT., (♀ nec ♂) Ins. Lapp., 752. 10. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2323. 13. (1847).

lamellata BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 204. 25. (1895).

laticrus ROB.-DESV., Myod., 641. 2. [*Terenia*] (1830).

leucostoma ZETT. = *hyalinata* MEIG.

limnea BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 196. 8. (1895).

liturata ROB.-DESV. = *praeusta* FALL.

liturella ROB.-DESV. = *interstincta* FALL.

Loewi SCHIN., F. A., II. 104. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 224. 65. (1895). Silesia.

bicolor LW., Wien. entom. Monatschr., II. 12. (1858).

✕ *longipennis* FABR., Ent. syst., IV. 323. 47. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 299. 75. [*Musca*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Ortal., 28. 4. [*Lauzania*] (1820); MEIG., S. B., V. 300. 10. [*Lauzania*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 509. 9. [*Lauzania*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2365. 6. [*Lauzania*] (1847); LW., Dipt. Beitr., III. 26. 1. (1847); SCHIN., F. A., II. 97. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 58. 4. (1868); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 213. 41. (1895). Europa, Amer. sept.

bivittata MEIG., S. B., VI. 331. 15. [*Lauzania*] (1830); MACQ.,

Suit. à Buff., II. 509. 5. [*Lauzania*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 232. 15. (1902).

luctuosa ROB.-DESV., Myod., 646. 1. [*Minettia*] (1830).

longiseta LW., Dipt. Beitr., III. 26. 3. (1847); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 214. 43. (1895). Sicilia.

luctuosa ROB.-DESV. = *longipennis* FABR.

X *lupulina* FABR., Mantissa Ins., II. 344. 32. [*Musca*] (1787), Ent. syst., IV. 323. 45. (1794) et Syst. Antl., 298. 72. [*Musca*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Ortal., 29. 5. [*Lauzania*] (1820); MEIG., S. B., V. 301. 11. [*Lauzania*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 510. 12. [*Lauzania*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 755. 3. [*Lauzania*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2366. 7. [*Lauzania*] (1847); LW., Dipt. Beitr., III. 26. 2. (1847); SCHIN., F. A., II. 97. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz., 58. 5. (1868); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, 196. (1878); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 213. 42. (1895). Europa, Amer. sept.

testacea ROB.-DESV., Myod., 647. 5. [*Minettia*] (1830).

luteiventris ROND. = *flaviventris* A. COSTA.

luteo-frontata BECK., Berlin. entom. Zeitg., XL. 218. 52. (1895). Posnia,

marginata MEIG., MACQ., SCHIN. = *adumbrata* LW. Silesia.

melanogaster ZETT. ♂ (nec ♀) = *rorida* FALL.

melanogaster ZETT. ♂ (nec ♂) = *laeta* ZETT.

melanura ZETT., Dipt. Scand., VI. 2332. 23. (1847); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 208. 31. (1895). Scandinavia.

Miki STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 155. (1892); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 222. 59. (1895). Styria.

minor BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 236. 86. (1895). Sarepta.

modesta LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., III. 214. (1857); SCHIN., F. A., II. 104. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 198. 13. (1895). Europa centr.

mollis ROB.-DESV., Myod., 637. 5. [*Sylvia*] (1830). Gallia.

multipunctata FALL., Dipt. Suec. Ortal., 30. 2. (1820); MEIG., S. B., V. 271. 31. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 401. 24. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2312. 1. (1847); LW., Dipt. Beitr., III. 41. 32. (1847); SCHIN., F. A., II. 99. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 202. 21. (1895). Europa.

> *Eusapromyza* mal
P. & S. Wash. 25-51

muricata BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 208. 32. (1895). Dalmatia.

X *muscaria* FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 2. 1. [*Heteroneura*] (1823); MEIG., S. B., VI. 173. 17. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 586. 9. [*Cnemacantha*] (1835); SCHIN., F. A., II. 93. [*Cnemacantha*] (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 205. 26. (1895). Europa centr. et sept.

nana LW., STROBL = *basalis* ZETT.

nemerosa ROB.-DESV. = *fasciata* FALL.

nigricornis ROB.-DESV., Myod., 639. 7. [*Lycia*] (1830). Gallia.

nigripes MACQ. = *hyalinata* MEIG.

nitidifrons BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 227. 70. (1895). Germania.

notata FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 30. 3. (1820); MEIG., S. B., V. 271. 30. (1826); ZETT., Ins. Lapp., 751. 2. (1838) et Dipt. Scand., VI. Europa, Amer. sept.

2313. 2. (1847); Lw., Dipt. Beitr., III. 40. 30. (1847); GIMMERTH, Bull. de Moscou, IV. 191. 1. (1847); SCHIN., F. A., II. 99. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 64. 19. (1868); OST-SACK., Catal. Dipt. N. Amer., 196. (1878); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 203. 24. (1895).

duodecimpunctata MACQ., Suit. à Buff., II. 402. 29. (1835); MEIG., S. B., VII. 346. 47. (1838).

notata MACQ. = *sexnotata* ZETT.

obesa ZETT., Dipt. Scand., VI. 2320. (1847); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 235. 85. (1895). Suecia, Germania.

rorida MEIG. ♂ (*nec* ♀), S. B., V. 295. 1. (1826); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 220. 1. (1902).

obseuripennis Lw., Dipt. Beitr., III. 39. (1847); SCHIN., F. A., II. 103. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 199. (1895). Germania, Alpes, Hung.

obsoleta FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 31. 6. (1820); MACQ., Suit. à Buff., II. 397. 1. (1835); Lw., Dipt. Beitr., III. 35. 22. (1847) et Stettin. entom. Zeitg., VIII. 145. (1847); BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 145. (1847); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 66. 25. (1868); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 90. (1883); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 222. 60. (1895). Europa.

obsoleta ZETT. = *illota* Lw.

obsoleta MEIG. = *apicalis* Lw.

obsoleta WALK. = *pallidiventris* FALL.

obsoletoides SCHNABL = *apicalis* Lw.

octopunctata v. ROS., Württemb. Corrbll., 59. (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., 53. 4. (1902). Würtemb.

✕ *opaca* BECK., Berlin. entom. Zeitg., XL. 207. 29. (1895). Europa.

serpunctata Lw., Dipt. Beitr., III. 32. 13. (1847).

pallida FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 32. 8. (1820); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2328. 19. (1847); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 230. 76. (1895). Europa sept.

pallida MEIG. [*Sapromyza*] = *illota* Lw.

pallida MEIG. [*Lauxania*] = *dimidiata* Lw.

pallidicornis Lw. = *pallidiventris* FALL.

pallidiventris FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 31. 5. (1820); MEIG., S. B., Europa.

V. 265. 16. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 403. 32. (1835); Lw., Dipt. Beitr., III. 30. 10. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2334. 25. (1847); SCHIN., F. A., II. 100. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 67. 27. (1868); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 232. 80. (1895).

grisea MEIG., S. B., VI. 382. 16. [*Lauxania*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 510. 16. [*Lauxania*] (1835); SCHIN., F. A., II. 104. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 232. 16. (1902).

obsoleta WALK., Ins. Brit., II. 188. 1. [*Palloptera*] (1853).

pallidicornis Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., VIII. 209. (1857).

pallustris ROB.-DESV., Myod., 647. 4. [*Minettia*] (1830).

palpella ROND. = *decipiens* Lw.

pallustris ROB.-DESV. = *pallidiventris* FALL.

- patelliformis** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 237. 89. (1895). Rossia, Styria.
- pellucida** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 234. 84. (1895). Alpes,
? *rectinervis* ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 62. 16. (1868). Polonia.
- placida** MEIG., S. B., VI. 378. 33. (1830); SCHIN., F. A., II. 103. (1864); Germania.
BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 223. 33. (1902).
- platycephala** LW., SCHIN. = **difformis** LW.
- plumicheta** ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 62. 15. (1868); BECK., Berlin. Italia.
entom. Zeitschr., XL. 219. 54. (1895).
- ✕ **plumicornis** FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 33. 10. (1820); MEIG., S. B., Europa.
V. 263. 10. (1826); LW., Dipt. Beitr., III. 29. 7. (1847); ZETT.,
Dipt. Scand., VI. 2333. 24. (1847); SCHIN., F. A., II. 99. (1864);
ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 62. 14. (1868); BECK., Berlin. entom.
Zeitschr., XL. 216. 48. (1895).
- poeciloptera** LW., Europ. Dipt., III. 300. 203. (1873); BECK., Berlin. Silesia,
entom. Zeitschr., XL. 202. 20. (1895). Galicia.
- ✕ **praeusta** FALL., Dipt. Suec. Ortal., 31. 4. (1820); MEIG., S. B., V. 264. Europa centr.
Buff., II. 397. 2. (1835); Suit. à Buff., II. 399. 10. (1835); LW., Dipt. et sept.
Beitr., III. 38. 25. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2315. 5. (1847);
WALK., Ins. Brit., II. 190. 10. [*Palloptera*] (1853); SCHIN., F. A., II.
102. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 65. 22. (1866); BECK.,
Berlin. entom. Zeitschr., XL. 193. 2. (1895).
- liturata* ROB.-DESV., Myod., 640. 10. [*Lycia*] (1830).
- praeusta** ZETT. [Ins. Lapp.] = **affinis** ZETT.
- praeusta** var. FALL. = **illota** LW.
- punctata** ROB.-DESV., Myod., 636. 2. [*Sylvia*] (1830); MACQ., Suit. à Gallia.
Buff., II. 397. 2. (1835); MEIG., S. B., VII. 344. 37. (1838).
- punctifrons** ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 64. 20. (1868); BECK., Ber- Italia.
lin. entom. Zeitschr., XL. 194. 4. (1895).
- punctiventris** ROND., Prodr., VII. 61. 12. (1868); BECK., Berlin. entom. Italia.
Zeitschr., XL. 211. 37. (1895).
- pusilla** MEIG. = **hyalinata** MEIG.
- quadricincta** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 234. 83. (1895). Hungaria.
- quadrilineata** STROBL = **quadrivittata** LW.
- quadrinotata** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2331. 22. (1847); BECK., Berlin. Suecia,
entom. Zeitschr., XL. 210. 35. (1895). Rossia.
- ✕ **quadripunctata** L., Syst. nat., XII. 997. 116. [*Musca*] (1766); FABR., Europa.
Syst. Entom., 786. 72. [*Musca*] (1775); Spec. Ins., II. 453. 93.
[*Musca*] (1781); Entom. Syst., IV. 356. 178. [*Musca*] (1794) et Syst.
Antl., 318. 7. [*Lophritis*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2856. 116.
[*Musca*] (1793); FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 32. 9. (1820); AHRENS,
Fauna europ., 10. 22. (1822); MEIG., S. B., V. 262. 7. (1826); MACQ.,
Suit. à Buff., II. 398. 6. (1835); LW., Dipt. Beitr., III. 31. 12. (1847);
ZETT., Dipt. Scand., VI. 2329. 20. (1847); PERRIS, Ann. Soc. entom.
Fr., II. ser. 10. 594. (1852); WALK., Ins. Brit., II. 190. 8. (1853);
SCHIN., F. A., II. 100. (1864); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien,
90. (1883); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 209. 34. (1895).
- bisbinotata* ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 70. 36. (1868).

- quatuor punctata* ROB.-DESV., Myod., 638. 2. [*Lycia*] (1830); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 69. 33. (1868).
- senilis* MEIG., S. B., V. 263. 9. (1826); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 221. 9. (1902).
- tibialis* MACQ., Suit. à Buff., II. 399. 12. (1835); MEIG., S. B., VII. 345. 40. (1838); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2321. 11. (1847).
- quadrivittata** LW., Wien. entom. Monatschr., V. 350. (1861); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 224. 64. (1895). Germania, Austria.
- quadrilineata* STROBL, Dipt. Funde um Seitenst. 29. (1880); MIK, Wien. entom. Zeitg., VII. 221. XII. (1888).
- quatuor punctata** ROB.-DESV., Myod., 637. 3. [*Sylvia*] (1830). Gallia.
- quatuor punctata* ROB.-DESV., [*Lycia*], ROND. = **quadripunctata** L.
- rabdota** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 212. 40. (1895). Austria.
- rectinervis** ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 62. 16. (1868). Italia.
- rivosa* MEIG., MACQ., ZETT. = **fasciata** FALL.
- Roberti** MEIG., S. B., VII. 343. 34. (1838); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 233. 81. (1895). Belgia.
- ✕ **rorida** FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 32. 7. (1820); MEIG., S. B., V. 259. 1. [♀, nec ♂] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 398. 3. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 751. 4. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2317. 7. (1847); LW., Dipt. Beitr., III. 33. 16. (1847); SCHIN., F. A., II. 102. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 68. 31. (1868); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 240. 93. (1895) et Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 220. 1. (1902). Europa.
- flava* ROB.-DESV., Myod., 638. 1. [*Lycia*] (1830).
- melanogaster* ZETT., ♂ (nec ♀) Dipt. Scand., VI. 2323. 13. (1847).
- rorida* MEIG. ♂ (nec ♀) = **obesa** ZETT.
- rorida* WALK. = **anisodactyla** LW.
- senilis* MEIG. = **quadripunctata** L.
- septentrionalis** LW., Dipt. Beitr., III. 32. 15. (1847); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 197. 12. (1895). Sibiria.
- setiventris** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2325. 16. (1847); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 231. 78. (1895). Suec., Polon., Germania.
- sexmaculata** GIMMERTH, Bull. de Moscou, II. 191. (1847). Rossia.
- sexnotata** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2314. 4. (1847); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 202. 19. (1895). Dania, Gallia.
- notata* MACQ., Suit. à Buff., II. 401. 23. (1835).
- sexpunctata** MEIG., S. B., V. 262. 8. (1826); ROB.-DESV., Myod., 638. 3. [*Lycia*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 398. 7. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2331. 21. (1847); ROND., Prodr., VII. 70. 35. (1868); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 206. 28. (1895). Europa centr. et sept.
- sexpunctata* LW. = **opaca** BECK.
- simplex** LW., Dipt. Beitr., III. 35. 21. (1847); SCHIN., F. A., II. 101. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 230. 77. (1895). Germania, Austria.
- sordida* HALID., WALK. = **decipiens** LW.
- spectabilis* LW., BECK. = **inusta** MEIG.
- spinitarsis* ZETT. = **anisodactyla** LW.

- styriaca** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XI. 156. (1892); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 199. 14. (1895). Styria.
- subfasciata** ZETT., Ins. Lapp., 752. 9. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2327. Suecia. 18. (1847); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 221. 57. (1895).
- ✕ **subvittata** LW., Dipt. Beitr., III. 28. 6. (1847); SCHIN., F. A., II. 98. Europa mer. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz., 60. 10. (1868); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XL. 215. 47. (1895).
- tabidiventris* ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 61. 11. (1868).
- suillorum** ROB.-DESV., Myod., 641. 1. [*Terenia*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 399. 14. (1835); MEIG., S. B., VII. 345. 42. (1838); LUCAS, Gallia, Explor. scientif. de l'Algérie, III. 495. 249. (1849). Algeria.
- tabidiventris* ROND. = **subvittata** LW.
- ✕ **tarsella** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2325. 15. (1847); SCHIN., F. A., II. Suecia. 101. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 232. 79. (1895).
- tenera** LW., Stettin. entom. Zeitg., VII. 366. (1846) et Dipt. Beitr., Germania. III. 40. 29. (1847); SCHIN., F. A., II. 103. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 203. 23. (1895).
- tesquae** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 205. 27. (1895). Sarepta.
- testacea* ROB.-DESV. = **lupulina** FABR.
- tetrachaeta** LW., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 50. (1873); LW., Hungaria. Europ. Dipt., III. 297. 200. (1873); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 214. 44. (1895).
- thoracica** ROB.-DESV., Myod., 639. 8. [*Lycia*] (1830). Gallia.
- thoracica** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 228. 73. (1895). Polonia.
- tibialis* MACQ., MEIG., ZETT. = **quadripunctata** L.
- tinctiventris** ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 61. 13. (1868); BECK., Ber- Italia. lin. entom. Zeitschr., XL. 209. 33. (1895).
- transversa** WIED., Zweifl., II. 455. 10. (1830). Marocco.
- trispina** ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 59. 8. (1868); BECK., Berlin. Italia, entom. Zeitschr., XL. 219. 53. (1895). Dalmatia.
- tuberculosa** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 236. 87. (1895). Gallia.
- tubifer** MEIG., S. B., V. 264. 15. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 406. Gallia. 16. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 221. 15. (1902).
- umbraculata** ROB.-DESV., Myod., 639. 6. [*Lycia*] (1830). Gallia.
- vittata** WALK., List of dipt., IV. 988. (1849). Suecia.

Peplomyza

HALID., Entom. Magaz., IV. (1836).

- Baumhaueri* LW., SCHIN., BECK. = **discoidea** MEIG.
- discoidea** MEIG., S. B., VI. 104. 5. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Europa centr. Buff., II. 556. 4. [*Opomyza*] (1835).
- Baumhaueri* LW., Dipt. Beitr., I. 21. 2. (1845) et III. 42. 34. (1847); SCHIN., F. A., II. 106. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 245. 2. (1895) et Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 306. 5. (1902).

litura MEIG., S. B., V. 266. 20. [*Sapromyza*] (1826); HALID., Entom. Mag., I. 171. [*Phyllomyza*] (1833); ROND., Prodr., VII. 64. 21. [*Sapromyza*] (1868); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 222. 20. (1902). Europa centr. et mer.

Wiedemanni Lw., Dipt. Beitr., I. 21. 1. (1845) et III. 42. 33. (1847); SCHIN., F. A., II. 106. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 245. 1. (1895).

Wiedemanni Lw., SCHIN., BECK. = **litura** MEIG.

Lauxania

LATR., Hist. nat. Crust. et Ins., XIV. 390. (1804).

× **aenea** FALL., Dipt. Suec. Ortol., 28. 3. (1820); MEIG., S. B., V. 297. 3. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 508. 4. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 755. 2. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2362. 3. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 185. 3. (1853); SCHIN., F. A., II. 95. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 57. 1. (1868); KALTENE., Pflanzenf., 46. 26. (1872); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 248. 3. (1895); MARCHAL, Bull. Soc. entom. Fr., 216. (1897).

? *glabrata* FABR., Ent. syst., IV. 341. 121. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 269. 11. [*Dolichopus*] (1805); MACQ., Suit. à Buff., II. 509. 7. (1835).

hyalinata ZETT., Dipt. Scand., VI. 2363. 4. (1847).

scutellata MEIG., S. B., V. 299. 7. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 509. 5. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 231. 7. (1902).

amica HALID., Entom. Mag., I. 171. (1833). Britannia.

atrimana MEIG., S. B., V. 299. 6. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 511. 16. (1835); SCHIN., F. A., II. 95. (1864). Germania.

atripes MEIG., S. B., VII. 352. 17. (1838); SCHIN., F. A., II. 96. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 248. 5. (1895) et Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 232. 17. (1902). Germania, Galicia.

atrocoerulea BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 249. 8. (1895). Germania.
glabrata MEIG., S. B., V. 299. 8. (1826); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 231. 8. (1902).

brunnipes BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 249. 9. (1895). Germania.
chrysoptera SCHRANK = **cylindricornis** FABR.

× **cylindricornis** FABR., Ent. syst., IV. 332. 86. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 212. 1. (1805); PANZ., Fauna Germ., CV. II. [*Musca*] (1806); FALL., Dipt. Suec. Ortol., 27. 1. (1820); MEIG., S. B., V. 296. 1. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 508. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 755. 1. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2360. 1. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 185. (1835); Lw., Sillim. Journ. N. série, XXXVII. 318.; SCHIN., F. A., II. 95. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 51. 1. (1868); OST-SACK., Catal. Dipt. N. Amer., 197. (1878); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 247. 1. (1895). Europa, Amer. sept.

chrysoptera SCHRANK, Fauna Boica, III. 2470. [*Musca*] (1803).

rufitarsis LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 357. (1804).

Elisae MEIG., S. B., V. 297. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 508. Europa,
2. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2361. 2. (1847); WALK., Nova Amer. sept.
Scotia, IV. 100. 3. et Ins. Brit., II. 185. 4. (1853); SCHIN., F. A., II.
95. (1864); ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 57. 2. (1863); OST-SACK.,
Catal. Dipt. N. Amer., 197. (1878); BECK., Berlin. entom. Zeitschr.,
XL. 248. 2. (1895).

geniculata FABR., Syst. Antl., 257. 9. [*Sargus*] (1805); MEIG., S. B., Europa centr.
V. 298. 4. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 508. 3. (1835); BECK., et sept.
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 231. 4. (1902).

glabrata MEIG. = **atrocoerulea** BECK.

glabrata FABR. = **aenea** FALL.

hispanica MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 597. t. XVII. f. 6, Hispania.
7. (1880); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 249. 6. (1895).

hyalinata ZETT. = **aenea** FALL.

inamoena BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 249. 7. (1895). Silesia.

nitens LW., Wien. entom. Monatschr., II. 14. 10. (1858); SCHIN., F. Germania.
A., II. 95. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 248. 4.
(1895).

rufitarsis LATR. = **cylindricornis** FABR.

scutellata MEIG., MACQ. = **aenea** FALL.

vitripennis MEIG., S. B., V. 298. 5. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. Germania.
511. 15. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 231. 5.
(1902).

Pachy cerina

MACQ., Suit. à Buff., II. 511. 2. (1835).

calliopsis MIK = **pulchra** LW.

longicornis LW. = **seticornis** FALL.

pulchra LW., Stettin. entom. Zeitschr., XI. 382. [*Lauzanina*] (1850). Germania,
calliopsis MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 176. 2. Austria.
(1887); NOW., Beitr. z. Kenntz. d. Dipt. Fauna Galiz. Krakau,

32. (1873); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 251. 2. (1895).

× **seticornis** FALL., Dipt. Suec. Ortal., 27. 2. [*Lauzanina*] (1820); MEIG., Europa centr.,
S. B., V. 301. 13. [*Lauzanina*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 511. Suecia.
1. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2364. 5. [*Lauzanina*] (1847);

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 251. 1. t. I. f. 9, 10. (1895).

longicornis LW., N. Beitr., IV. 54. 55. (1856).

tripunctata STROBL, Funde um Seitenst. 29. (1880).

tripunctata STROBL = **seticornis** FALL.

Paroecus

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 252. V. (1895).

Pachycerina p. p., Lw., N. Beitr., IV. (1856); SCHIN., F. A., II. (1864).

signatipes Lw., N. Beitr., IV. 54. 55. [*Pachycerina*] (1856); SCHIN., F. A., II. 94. [*Pachycerina*] (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 252. 1. t. I. f. 1, 2. (1895). Hungaria.

Prosopomyia

Lw., N. Beitr., IV. 55. (1856).

pallida Lw., N. Beitr., IV. 55. 58. (1856); SCHIN., F. A., II. 22. (1864); Aegyptus,
ROND., Prodr., VII. Sciomyz. 71. (1868); BECK., Berlin. entom. Sicilia.
Zeitschr., XL. 253. t. I. f. 3. (1895).

LONCHAEIDAE.

Lonchaea

FALL., Dipt. Suec. Ortol., 25. (1820).

Anthomyia p. p., MEIG., S. B., V. 154. 124. (1826).

Chortophila p. p., MACQ., Suit. à Buff., II. 323. 10. (1835).

Dasiops ROND., Prodr., I. 120. 8. (1856).

Earomyia ZETT., Dipt. Scand., VII. 2690. (1848).

Lasiops MEIG., S. B., VII. 323. 3. (1838).

Teremyia MACQ., Suit. à Buff., II. 514. (1835).

adriatica BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 340. 38. (1895).

Austria.

? *parvicornis* SCHIN., F. A., II. 92. (1864).

aenea MEIG., S. B., V. 306. 6. (1826).

Austria.

aenea ZETT. = **nigra** MEIG.

aenescens MEIG. = *lasiophthalma* MACQ.

albitalis ZETT., BECK. = **laticornis** MEIG.

aristella BECK., Mitthell. Zool. Mus. Berlin, p. 129. 201. (1903).

Aegyptus.

carbonaria MEIG., S. B., V. 154. 124. [*Anthomyia*] (1826).

Germania.

nigella MEIG., S. B., V. 156. 129. [*Anthomyia*] (1826) teste SCHIN.

chorea FABR., Spec. Ins., II. 444. 43. [*Musca*] (1781), Ent. syst., IV. Europa.

329. 73. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 304. 99. [*Musca*] (1805);

GMEL., Syst. Nat., V. 2848. 313. [*Musca*] (1790); MEIG., S. B., V.

304. 1. (1826); BOUCHÉ, Naturgesch., I. 94. 84. (1834); SCHOLTZ,

Zeitschr. f. Entom. Breslau, I—III. 10. (1855); FARSKY, Verh. zool.

bot. Ges. Wien, XXIX. 101. t. III. (1879); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 90. (1883); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 232. 1. (1902).

flavidipennis ZETT., Dipt. Scand., VI. 2349. 4. (1847); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 27. 1. (1874).

× *vaginalis* FALL., Dipt. Succ. Ortal., 26. 2. (1820); MEIG., S. B., V. 307. 8. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 513. 6. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 753. 1. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2347. 1. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 186. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 91. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 28. 2. (1874); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 332. 22. (1895).

chorca FALL. = **nigra** MEIG.

corsicana BECK. = **parvicornis** MEIG.

crassinervis ZETT., Dipt. Scand., XI. 4333. 2—3. (1852).

Suecia.

crepidaria MEIG., MACQ. = **parvicornis** MEIG.

crystallophila BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 330. 19. (1895).

Helvetia.

dasyops MEIG., S. B., V. 308. 12. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 514.

Europa centr.

12. (1835) ZETT., Dipt. Scand., VI. 2356. 11. (1847); SCHIN., F. A.,

et sept.

II. 90. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 328. 15. (1895).

Deutschi ZETT., Ins. Lapp., 753. 2. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2348.

Suecia.

2. (1847); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 333. 24. (1895).

Deutschi SCHIN. = **lucidiventris** BECK.

ensifer MEIG., S. B., V. 307. 10. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 513.

Germania.

8. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 234. 10.

(1902).

flavidipennis ZETT., ROND. = **chorea** FABR.

frontata BECK. = **lonchaeoïdes** ZETT.

fugax BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 338. 34. (1895).

Germania.

fulvicornis BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., 370. (1881).

Gallia.

fumosa Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 777. (1862); SCHIN.,

Austria.

F. A., II. 90. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 333. 23.

(1895).

hirticeps ZETT., Ins. Lapp., 754. 7. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2357. 12.

Europa centr.

(1847); SCHIN., F. A., II. 89. (1864); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr.,

et sept.

XL. 329. 16. (1895).

hyalipennis ZETT., Dipt. Scand., VI. 2350. 5. (1847).

Suecia.

inaequalis LW. = **nigra** MEIG.

× **lasiophthalma** MACQ., Suit. à Buff., II. 329. 22. [*Chortophila*] (1835);

Europa centr.

GIRAUD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 486. (1861); SCHIN., F.

et mer.,

A., II. 90. (1864); KALTENB., Pflanzenfeinde, 765. 1. (1872); VAL-

Aegyptus.

LISNIERI, Bull. d. Soc. Ital. Firenze, XV. 187—188. (1883); BRAUER,

Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 90. (1883); BEZZI, Contrib. alla F.

ditt. di Pavia, Firenze, 30. 94. (1891); BECK., Berlin. entom.

Zeitschr., XL. 329. 17. (1895).

aenescens MEIG., S. B., VII. 324. 5. [*Lasiops*] (1838).

latifrons MEIG., S. B., V. 308. 11. (1826); BECK., Zeitschr. f.

Hymenopt. u. Dipt., II. 234. 11. (1902).

lonchea ROND., Bull. d. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 30. 1. [Dasiops] (1874).

laticornis MEIG., S. B., V. 308. 13. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 514. [Tcremyia] (1835); SCHIN., F. A., II. 92. (1864); ROND., Bull. d. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 29. 6. (1874); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., I. Serie. Tom. 8. 29. t. III. f. 5, 6, 8, 10, 12. (1850); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 90. (1883); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 234. 13. (1902).

albitarsis ZETT., Ins. Lapp., 754. 4. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2351. 6. (1847); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 339. 36. (1895).

laticornis ZETT., BECK. = **Zetterstedti** BECK.

latifrons MEIG., MACQ., SCHIN. = **lasiphthalma** MACQ.

leucostoma MEIG., S. B., VII. 353. 15. (1838); SCHIN., F. A., II. 92. (1864). Germania.

lonchaeoïdes ZETT., Dipt. Scand., VII. 2690. 1. [Eaomyia] (1848). Europa centr. et sept.

? *aenea* MEIG., S. B., V. 306. 6. (1826).

frontata BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 333. 25. (1895).

lonchea ROND. = **lasiphthalma** MACQ.

lucidiventris BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 334. 27. (1895); WULP., Nieuwe Naamlijst van Nederl. Dipt., 123. (1898). Germania. Austria, Hollandia.

Deutschi SCHIN. (nec ZETT.), F. A., II. 90. (1864).

metallica ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3354. 13—14. (1849). Suecia.

nigella MEIG. = **carbonaria** MEIG.

nigra MEIG., S. B., V. 305. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 512. 2. (1835); PERRIS, Ann. Soc. Entom. Fr., 62. (1849); KALTENB., Pflanzenfeinde, 378. 48 et 461. 44. (1872); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 90. (1883); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 233. 2. (1902). Europa centr. et sept.

chorea FALL., Dipt. Suec. Ortolid., 26. 1. (1820).

? *aenea* ZETT., Ins. Lapp., 754. 8. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2357. (1847).

inaequalis Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 50. (1873); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 331. 20. (1895).

nigrimana MEIG., S. B., V. 306. 7. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 513. 5. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 233. 7. (1902). Germania.

nigritarsis MACQ., Suit. à Buff., II. 513. 10. (1835). Gallia.

pallipennis ZETT., Dipt. Scand., XII. 4786. 4—5. (1855); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., 331. 21. (1895). Suecia.

palposa ZETT., Dipt. Scand., VI. 2355. 10. (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, (1850); SCHIN., F. A., II. 91. (1864); ROND., Bull. d. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 28. 5. (1874); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 277. 13. (1882); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 90. (1883); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 336. 29. (1895). Europa centr. et sept.

✕ **parvicornis** MEIG., S. B., V. 307. 9. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa centr. et mer.

513. 7. (1835); BOUCHÉ, Naturgesch., I. 94. t. VI. f. 1—2. (1833);
 PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 29. (1839); KALTENB., Pflanzenfeinde,
 742. 40. (1872); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 90. (1883);
 BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 234. 9. (1902).

corsicana BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 330. 18. (1895).

crepidaria MEIG., S. B., V. 309. 14. (1826); BECK., Zeitschr. f.

Hymenopt. u. Dipt., II. 235. 14. (1902).

parvicornis SCHIN. = *adriatica* BECK.

parvicornis ZETT., Dipt. Scand., VI. 2353. 8. (1847); BECK., Berlin. Suecia.
 entom. Zeitschr., XL. 339. 37. (1895).

parvula ZETT., Dipt. Scand., XII. 4785. 3—4. (1855). Suecia.

peregrina BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 336. 31. (1895). Gallia.

pumila MEIG., S. B., VII. 353. 16. (1838). Germania.

pusilla MEIG., S. B., V. 305. 3. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 512. Germania.
 3. (1835).

ruficornis BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., 370. (1881). Gallia.

scutellaris ROND., Bull. d. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 29. 7. (1874); Suecia.
 BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 336. 30. (1895).

sericans BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 335. 28. (1895). Hungaria.

spatiosa BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 334. 26. (1895). Silesia.

splendida LW., Europ. Dipt. III. 292. 196. (1873); BECK., Berlin. entom. Aegyptus.
 Zeitschr., XL. 338. 33. (1895).

sylvatica BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 549. 2. (1873). Austria.

tarsata FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 26. 3. (1820); MEIG., S. B., V. 305. Europa.
 4. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 512. 4. (1835); ZETT., Ins. Lapp.,

754. 5. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2352. 7. (1847); WALK., Ins.

Brit., II. 187. 2. (1853); SCHIN., F. A., II. 92. (1864); ROND., Bull.

d. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 28. 4. (1874); WEIJENBERGH,

Tijdschr. v. Entom., XVII. 149. (1874); WACHTL, Wien. entom.

Zeitg., I. 277. 14. (1882); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien,

90. (1883); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 338. 35. (1895).

vaginalis FALL. = *chorea* FABR.

viridana MEIG., S. B., V. 306. 5. (1826); ROND., Bull. d. Soc. entom. Europa centr.
 Ital. Firenze, VI. 29. 8. (1874); BECK., Berlin. entom. Zeitschr.,

340. 39. (1895) et Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 233. 5.

(1902).

Zetterstedti BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 235. 13. (1902). Europa centr.

laticornis ZETT., Ins. Lapp., 754. 6. (1838) et Dipt. Scand., VI. et sept.

2354. 9. (1847); BECK., Berlin. entom. Zettg., XL. 337. 32.

(1895).

Palloptera

FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 23. (1820).

Dacus p. p., FABR., Syst. Antl. (1805).

Ocneros G. A. COSTA, Atti Acad. Sc. Napoli (1844).

Suillia p. p., ROB.-DESV., Myod. (1830).

Toxoneura MACQ., Suit. à Buff., II. (1835).

Trupanea p. p., SCHRANK, Fauna Boica, III. 2521. (1803).

✕ *ambusta* MEIG., S. B., V. 268. 23. [*Sapromyza*] (1826); MACQ., Suit. Europa.
à Buff., II. 402. 25. [*Sapromyza*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 750.
3. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2277. 6. (1847); LW., Zeitschr. f.
Entom., XI. 16. 7. (1859, nec 1857); SCHIN., F. A., II. 109. (1864);
ROND., Bull. Soc. entom. Ital., Firenze, VI. 16. 5. (1874); BECK.,
Berlin. Entom. Zeitschr., XL. 319. 7. (1895).

Angelicae v. ROS., LW., BECK. = *trimacula* MEIG.

✕ *arcuata* FABR., Spec. Ins., II. 451. 86. [*Musca*] (1781); Entom. Syst., Europa.
IV. 353. 170. [*Musca*] (1798) et Syst. Antl., 277. 19. [*Dacus*]
(1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2856. 242. [*Musca*] (1788); FALL.,
Dipt. Suec. Ortalid., 25. 3. (1820); MEIG., S. B., V. 269. 27. [*Sapro-*
myza] (1826); LW., Zeitschr. f. Entom., XI. 18—19. (1859, nec 1857);
WALK., Ins. Brit., II. 189. 4. (1853); SCHIN., F. A., II. 108. (1864);
BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 319. 9. (1895).

quinquemaculata MACQ., Suit. à Buff., II. 402. 28. [*Sapromyza*]
(1835); MEIG., S. B., VII. 345. 46. [*Sapromyza*] (1838).

trimaculata ZETT., Dipt. Scand., VI. 2276. 5. (1847).

arcuata ZETT. = *trimacula* MEIG.

arcuata ROND. = *pallens* LW.

costalis LW., Europ. Dipt., III. 295. 198. (1873); BECK., Berlin. entom. Germania,
Zeitschr., XL. 318. 4. (1895). Austr., Brit.

ephippium ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6357. 2—3. (1860); BECK., Ber- Europa.
lin. entom. Zeitschr., XL. 321. 14. (1895).

? *limbata* ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 15. 3. (1874).

fusciata MACQ., MEIG., HALID., PERRIS, BRAUER = *pulchella* ROSSI.

gangraenosa PANZ., FALL. = *umbellatarum* FABR.

laetabilis LW., Europ. Dipt., III. 293. 197. (1873); BECK., Berlin. en- Alpes.
tom. Zeitschr., XL. 320. 10. (1895).

limbata ROND. = *ephippium* ZETT.

lobata FABR. = *pulchella* ROSSI.

marginella FALL. = *saltuum* L.

modesta MEIG., S. B., VI. 108. 16. [*Opomyza*] (1830); BECK., Zeitschr. Germania.
f. Hymenopt. u. Dipt., II. 307. 16. (1902).

muliebris HARRIS = *pulchella* ROSSI.

pallens LW., Europ. Dipt., III. 296. 199. (1873); BECK., Berlin. entom. Italia,
Zeitschr., XL. 318. 3. (1895). Asia min.

arcuata ROND., Bull. Soc. entom. Ital., Firenze, VI. 15. 2. (1874).

- parallela** Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, 13. 4. XI. (1859, nec 1857); Europa centr.
 BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 319. 6. (1895).
umbellatarum MEIG., S. B., V. 296. 26. [*Sapromyza*] (1826);
 BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 222. 26. (1902).
- pulchella** ROSSI, Fauna Etrusca, 314. 1528. [*Musca*] (1796); O. G. Europa centr.
 COSTA, Atti Accad. Sc. Napoli, V. 102. [*Ocneros*] (1844); WALK.,
 Ins. Brit., II. 191. 12. (1853); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Firenze,
 VI. 13. 1. [*Toxoneura*] (1874); BECK., Berlin. entom. Zeitschr.,
 LX. 321. 13. Fig. (1895); MIK, Wien. entom. Zeitg., XIV. 96. 41.
 (1895).
fasciata MACQ., Suit. à Buff., II. 404. [*Toxoneura*] (1835); HALID.,
 Entom. Mag., IV. 148. [*Toxoneura*] (1837); MEIG., S. B.,
 VII. 346. 49. [*Toxoneura*] (1838); PERRIS, Ann. Soc. entom.
 Fr., 337. t. II. f. 125—129. [*Toxoneura*] (1870); BRAUER,
 Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 90. (1883).
lobata FABR., Syst. Antl., 208. 22. [*Scatophaga*] (1805).
muliebris HARR., Verrall List of Brit. Diptera, 26—36. (1901).
- quinquemaculata* MACQ., MEIG. = **arcuata** FABR.
- saltuum** L., Fauna Suec., 1866. [*Musca*] (1761); Lw., Zeitschr. f. Europa.
 Entom. Breslau, XI. 11. 1. var. 1, 2, 3. (1859, nec 1857); SCHIN.,
 F. A., II. 108. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI.
 16. 7. (1874); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 317. 1. (1895).
marginella FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 25. 4. (1820).
unicolor FABR., Syst. Antl., 307. 120. [*Musca*] (1805); MEIG.,
 S. B., V. 268. 24. [*Sapromyza*] (1826); MACQ., Suit. à Buff.,
 II. 400. 18. [*Sapromyza*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2278.
 7. (1847) BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 222. 24.
 (1902).
- scutellata* MACQ., MEIG. = **usta** MEIG.
- trimacula** MEIG., S. B., V. 267. 22. (1826); ROND., Bull. Soc. entom. Europa.
 Ital. Firenze, VI. 15. 1. (1874); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u.
 Dipt., II. 222. 22. (1902).
Angelicae v. Ros., Württemb. Corrbibl., 60. [*Sapromyza*] (1840);
 Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XI. 16. 8. (1859, nec 1857);
 BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 319. 8. (1895).
arcuata ZETT., Dipt. Scand., VI. 2275. 4. (1847).
- trimaculata* ZETT. = **arcuata** FABR.
- ✕ **umbellatarum** FABR., Entom. Syst., IV. 354. 171. [*Musca*] (1794); Europa.
 ROSSI, Fauna Etrusca, 481. 1534. [*Musca*] (1794); FABR., Syst. Antl.,
 277. 20. [*Dacus*] (1805); SCHRANK, Fauna Boica, III. 2521. [*Tru-*
panea] (1803); MACQ., Suit. à Buff., II. 402. 27. (1835); ZETT., Ins.
 Lapp., 750. 1. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2270. 1. (1847); WALK.,
 Ins. Brit., II. 189. 6. (1853); Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau,
 XI. 12. 3. (1859, nec 1857); SCHIN., F. A., II. 107. (1864); ROND.,
 Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 16. 4. (1874); GERCKE, Wien.
 entom. Zeitg., V. 167. 4. t. II. f. 13. (1886); BECK., Berlin. entom.
 Zeitschr., XL. 318. 5. (1895).

gangraenosa PANZ., Fauna Germ., 59. fig. 22. [*Musca*] (1798);

FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 24. 1. (1820).

umbellatarum MEIG. = *parallela* Lw.

unicolor FABR., MEIG., MACQ., ZETT. = *saluum* L.

usta MEIG., S. B., V. 270. 28. [*Sapromyza*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., Europa.

750. 2. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2272. 2. (1847); Lw., Zeitschr.

f. Entom. Breslau, XI. 14. 5. (1859, *nec* 1857); SCHIN., F. A.,

II. 108. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 16. 6.

(1874); GERCKE, Wien. entom. Zeitg., VIII. 226. 8b. t. II. f. 13.

(1889); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 320. 11. Fig. (1895).

scutellata MACQ., Suit. à Buff., II. 403. 30. (1835); MEIG., S. B.,

VII. 346. 48. (1838).

× *ustulata* FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 24. 2. (1820); MEIG., S. B., V. Europa.

268. 25. [*Sapromyza*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 400. 17.

(1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2273. 3. (1847); WALK., Ins. Brit.,

II. 189. 7. (1853); Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XI. 11. 2.

(1859, *nec* 1857); SCHIN., F. A., II. 107. (1864); ROND., Bull. Soc.

entom. Ital. Firenze, VI. 16. 8. (1874); GERCKE, Wien. entom.

Zeitg., V. 168. 9. (1886); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 318.

2. Fig. (1895).

venusta Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XI. 15. 6. (1859, *nec* 1857); Europa centr.

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XL. 320. 12. (1895).

ORTALIDAE.

Ortalinae.

Pyrgotina.

Adapsilia

WAGA., Ann. Soc. entom. Fr., I. 11. (1842).

Pyrgota SCHIN. (*nec* WIED.), F. A., II. 66. 391. (1864); PORTSCH.,

Horae Soc. entom. Ross., (1891).

× *coarctata* WAGA., Ann. Soc. entom. Fr., I. série, 11. 280. t. XI. f. Austria,
13—17. (1842); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 18. [*Pyrgota*] Polonia,
(1857) et F. A., II. 67. [*Pyrgota*] (1864); ROND., Prodr., VII. Italia.

Ortal., 46. 1. (1871); HANDL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVI.

Sitzungsber. p. 34. (1886); MIK, Wien. entom. Zeitg., V. 277. 10.

(1886) et IX. 251. (1890).

microcera PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XXVI. VII. 212. [*Pyrgota*] Asia sept.
(1891).

picta PORTSCH. = *Wagae* BIGOT.

Wagae BIGOT., Ann. Soc. entom. Fr., LIX. 152. [*Pyrgota*] (1880).

Caucasus.

picta PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XVI. 144. (1882).

*Ortalina.***Dorycera**

MEIG., S. B., VI. 29. 199. (1830); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 3. (1868).

brevis Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 9. (1868) et Europ. Graecia.
Dipt., III. 263. 169. (1873).

✕ **graminum** FABR., Entom. syst., IV. 346. 143. [*Musca*] (1794); COQUEB., Europa centr.
Illustr., Tab. 24. fig. 11. (1804); FABR., Syst. Antl., 205. 8. [*Sca-* et mer.
tophaga] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 351. [*Tetanocera*]
(1809); MEIG., S. B., VI. 30. 1. t. LVII. f. 1—5. (1830); WESTW.,
Introd., II. 572. (1840); WALK., Ins. Brit., II. 171. 1. (1853); SCHIN.,
F. A., II. 68. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid., 14. 1. (1869);
BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien. 84. (1883).

thamnicola ROB.-DESV., Myod., 712. 1. [*Oscinis*] (1830).

herbarum ROB.-DESV., Myod., 712. 2. [*Oscinis*] (1830).

hybrida Lw., Wien. entom. Monatschr., VI. 172. 64. (1862).

maculipennis MACQ., Dipt. exot., II. III. 195. (1843); DUF., Ann. Soc. Europa mer.,
entom. Fr., 145. (1850) et Wien. entom. Monatschr., VI. 172. 63. Asia min.
(1862).

nobilis ROB.-DESV., Myod., 713. 3. [*Oscinis*] (1830).

scalaris Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 9. (1868) et Europ. Hispania.

Dipt., III. 260. 168. (1873); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII.
225. 221. (1899).

thamnicola ROB.-DESV. = **graminum** FABR.

Percnomatia

Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 3. (1868).

Dorycera Lw., Wien. entom. Monatschr., VIII. 8. 1. (1864).

inornata Lw., Wien. entom. Monatschr., VIII. 8. 1. [*Dorycera*] (1864). Corsica.

Macheirocera

ROND., Prodr., VII. Ortal., 13. IV. (1889).

Dorycera p. p., MACQ. (nec MEIG.), Suit. à Buff., II. 428. 9. (1835).

graminum MACQ. (nec MEIG.) = **grandis** ROND.

grandis ROND., Prodr., VII. Ortalid., 13. 1. (1869).

graminum MACQ., Suit. à Buff., II. 428. 1. (1835).

Italia,
Gallia.

Tetanops

FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 2. (1820).

Terelliosoma p. p., ROND., Prodr., I. 109. 4. (1856).

- contarinii** ROND., Prodr., VII. Ortalid., 16. 3. (1869). Italia.
- flavescens** MACQ., Suit. à Buff., II. 423. 2. (1835). Gallia.
- heryngii* ROND. = **impunctata** LW.
- impunctata** LW., N. Beitr., II. 20. 44. (1854); ROND., Prodr., VII. Ortalid., 16. 2. [*Terelliosoma*] (1869). Helvetia.
- heryngii* ROND., Prodr., I. 109. 4. (1856).
- laticeps** LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXII. 192. (1868) et Europ. Dipt., III. 264. 170. (1873). Rossia mer.
- myopina** FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 2. 1. (1820); MEIG., S. B., V. 353. 1. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 423. 1. (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2149. 1. (1846); SCHIN., F. A., II. 73. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortal., 15. 1. (1869); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 59. 122. (1900). Europa, Sibiria.
- nasuta** BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 242. (1902); WIED., nasuta (nom. i. litt.) in collectione Winthem. Germania ?
- pictipennis** LW., Europ. Dipt., III. 265. 171. (1873). Asia min.
- psammophila** LW., Wien. entom. Monatschr., VI. 173. (1862). Rossia mer.
- trimaculata** LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 375. (1847). Sibiria.

Heramyia

ROB.-DESV., Myod., 709. IV. (1830).

Carmocaris LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 4. 3. (1868).

- bivittata** MACQ., Suit. à Buff., II. 426. 8. [*Otites*] (1835); MEIG., S. B., VII. 348. 38. [*Ortalis*] (1838). Sicilia.
- bucephala** MEIG., S. B., VI. 15. 13. [*Sciomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 425. 4. [*Otites*] (1835); SCHIN., F. A., II. 69. [*Otites*] (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid., 12. 1. [*Otites*] (1869). Europa centr. et mer.
- nebulosa* ROB.-DESV., Myod., 710. 1. (1830); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. [*Oscinis*] (1809), teste ROB.-DESV.
- nubila* ROND., Prodr., I. 109. (1856).
- nebulosa* ROB.-DESV. = **bucephala** MEIG.
- nubila* ROND. = **bucephala** MEIG.
- populicola** ROB.-DESV., Myod., 710. 2. (1830). Gallia.

Pteropoecila

LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 4. 4. (1868).

- lamed** SCHRANK, Enum. Insect. austr., 475. 967. (1781); SCHIN., F. A., II. 69. [*Otites*] (1864). Europa centr.

pulchella FABR., Ent. syst., IV. 352. 167. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 275. 10. [*Dacus*] (1805); MEIG., S. B., VI. 379. 23. [*Ortalis*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 425. 3. [*Ortites*] (1835).
pulchella FABR., MEIG., MACQ. = **lamed** SCHRANK.

Ptilonota

Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 4. 5. (1868).

? *Myoris* ROB.-DESV., Myod., 711. V. (1830).

Ptilona MIK, Wien. entom. Zeitg., XI. 88. [*Ptilona*] (1892).

amurensis PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XXVI. VII. 214. (1831); Asia sept.
 MIK, Wien. entom. Zeitg., XI. 88. [*Ptilona*] (1892).

centralis FABR., Syst. Antl., 319. 14. [*Tephritis*] (1805); MEIG., S. B., Europa.
 VI. 380. 24. [*Ortalis*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., V. 2155. 4.
 [*Ortalis*] (1846); SCHIN., F. A., II. 72. [*Ortalis*] (1864); ROND., Prodr.,
 VII. Ortalid., 31. 5. [*Ortalis*] (1869); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt.
 u. Dipt., II. 227. 24. (1902).

Friesi FALL., Ortal. Suppl., 2. 14. 3—4. [*Tephritis*] (1825).

Friesi FALL. = **centralis** FABR.

guttata MEIG., S. B., VI. 380. 25. [*Ortalis*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., Europa centr.
 II. 426. 5. [*Ortalis*] (1835); SCHIN., F. A., II. 71. [*Ortalis*] (1864);
 BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 227. 25. (1902).

silvatica ROB.-DESV., Myod., 711. 1. [*Myoris*] (1830).

murina Lw., Wien. entom. Monatschr., VIII. 10. 2. [*Ortalis*] (1864). Karinthia.
silvatica ROB.-DESV. = **guttata** MEIG.

Ortalis > Ortites Latr. 1805.

FALL., Specimen entom. (1810).

Blainvillia p. p., ROB.-DESV., Myod., 713. 1. (1830).

Dietya p. p., FABR., Syst. Antl., 329. 13. (1805).

angustata Lw., Wien. entom. Monatschr., III. 156. 1. (1859). Hispania.

aspersa Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 10. 5. (1868) et Hispania.
 Europ. Dipt., III. 269. 174. (1873).

atripes Lw., Berlin. entom. Zeitschr., II. 375. 2. (1858); ROND., Prodr., Sicilia.
 VII. Ortalid., 31. 4. (1869).

caph Lw., N. Beitr., II. 20. 45. (1854). Asia min.

dominula Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 10. 4. (1868) et Hispania.
 Europ. Dipt., III. 268. 173. (1873).

elegans LATR., ROND. = **formosa** PANZ.

fastuosa ROND., Prodr., VII. Ortalid., 30. 2. (1869). Italia.

fenestrata MACQ., Suit. à Buff., II. 436. 7. (1835). Gallia.

~~**formosa**~~ PANZ., Fauna Germ., LIX. 21. [*Musca*] (1798); LATB., Hist. Europa.

- nat. d. Crust. et Ins., XIV. [*Otites*] (1805); ROB.-DESV., Myod., 713.
 1. [*Blainvillia*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 425. 1. [*Otites*]
 (1835); SCHIN., F. A., II. 70. (1864).
elegans LATR., Hist. nat. d. Crust. et Ins., XIV. [*Otites*] (1805)
 et Gen. Crust. et Ins., IV. 351. [*Oscinis*] (1809).
gangraenosa FABR., Syst. Antl., 329. 13. [*Dictya*] (1805); MEIG.,
 S. B., VI. 378. 22. (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u.
 Dipt., II. 226. 22. (1902).
ornata MEIG., S. B., V. 277. 8. t. XLVI. f. 25. (1826); MACQ.,
 Suit. à Buff., II. 434. 1. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt.
 u. Dipt., II. 224. 8. (1902).
fulminans MEIG., S. B., V. 275. 5. t. XLVI. f. 20. (1826). Berolina.
gangraenosa FABR. = **formosa** PANZ.
genualis LW., Zeitschr. f. d. Ges. Naturw., XXXII. 9. 3. (1868) et Rossia mer.
 Europ. Dipt., III. 267. 172. (1873).
grata LW., N. Beitr., IV. 50. 47. (1856); SCHIN., F. A., II. 71. (1864). Dalmatia.
immaculata ROND., Prodr., VII. Ortalid., 31. 3. (1869). Italia.
jucunda ROB.-DESV., Myod., 714. 2. [*Blainvillia*] (1830); MACQ., Suit. Gallia.
 à Buff., II. 425. 2. [*Otites*] (1835); MEIG., S. B., VII. 348. 37. [*Or-*
talis] (1838).
Kowarzi LW., Europ. Dipt., III. 272. 177. (1873). Hungaria.
laticeps LW. = **latifrons** LW.
laticornis LW., Europ. Dipt., III. 269. 175. (1873). Asia min.
latifrons LW., Wien. entom. Monatschr., VIII. 16. 6. (1864). Hispania.
laticeps LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 5. (1868).
picipes LW., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 242. (1865).
levigata LW., Europ. Dipt., III. 271. 176. (1873). Hungaria.
longicornis MACQ., Suit. à Buff., II. 435. 6. (1835). Gallia.
nebulosa MEIG., S. B., VI. 381. 26. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Gallia.
 426. 9. (1835).
ornata MEIG., MACQ. = **formosa** PANZ.
picipes LW. = **latifrons** LW.
quinquemaculata MACQ., Suit. à Buff., II. 435. 5. (1835); MEIG., S. Gallia.
 B., VII. 347. 30. (1838).
ruficeps FABR., Syst. Antl., 209. 24. [*Scatophaga*] (1805); SCHIN., F. Europa centr.
 A., II. 71. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid., 30. 1. (1869). et mer.
trimaculata LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 375. 1. (1847). Sibiria.
Zetterstedti FALL. = **connexa** FABR.

Systata

Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 5. 7. (1868).

Myennis p. p., SCHIN., F. A., II. 76. (1864).

rivularis FABR., Syst. Antl., 321. 22. [*Tephritis*] (1805); MEIG., S. B., Europa centr.
 V. 278. 11. t. XLVI. f. 24. [*Ortalis*] (1826); SCHIN., F. A., II. 77.

[*Myennis*] (1864); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 5. 7. (1868).

obliqua Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 192. (1868) et Europ. Ins. Coreyra. Dipt. III. 273. 178. (1873).

Loxodesma

Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 5. 8. (1868).

lacustris MEIG., S. B., V. 280. 15. [*Ortalis*] (1826); Macq., Suit. à Europa centr. Buff., II. 432. 2. [*Herina*] (1835); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 5. 8. (1868); Beck., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 226. 15. (1902).

Herina

Rob.-Desv., Myod., 724. XVIII. (1830).

Pteropaectria Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 6. (1868).

Tryphila Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 6. (1868).

afflicta MEIG., S. B., VI. 378. 33. Berichtigung. (1830); SCHIN., F. A., Europa centr. II. 79. (1864); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 6. [*Pteropaectria*] (1868); Rond., Prodr., VII. Ortalid. 25. 3. (1869). et mer.

lugens MEIG., S. B., V. 278. 10. t. XLVI. f. 27. [*Ortalis*] (1826).

apicalis ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3342. 10. [*Ortalis*] (1849). Suecia,

cerasi L., Fabr., Meig., Rond. = **frondescentiae** L.

fasciata Rob.-Desv., Myod., 727. 9. (1830). Gallia.

frondescentiae L., Fauna Suec., 1881. [*Musca*] (1761); SCHIN., F. A., Europa. II. 79. (1864); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 6. [*Tryphila*] (1868).

cerasi L., Fauna Suec., 1878. [*Musca*] (1761); Fabr., Spec. Ins.,

II. 453. 99. [*Musca*] (1781); Entom. Syst., IV. 358. 188.

[*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 320. 17. [*Tephritis*] (1805);

DEG., Ins., VI. 25. 19. [*Musca*] (1776); GMEL., Syst. Nat.,

V. 2858. 124. [*Musca*] (1788); SCHRANK, Fauna Boica, III. 2526.

[*Trupanea*] (1803); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 355. [*Tephritis*] (1809); MEIG., S. B., V. 282. 19. t. XLVI. f. 26. [*Ortalis*] (1826); Macq., Suit. à Buff., II. 436. 10. [*Ortalis*] (1835); ZETT.,

Dipt. Scand., V. 2157. 5. [*Ortalis*] (1846); WALK., Ins. Brit.,

II. 196. 5. [*Ortalis*] (1853); Rond., Prodr., VII. Ortalid. 25. 4.

(1869).

mali Fabr., Syst. Antl., 320. 18. [*Tephritis*] (1805).

morio Fabr., Syst. Antl., 322. 27. [*Tephritis*] (1805).

uliginosa FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 19. 4. [*Ortalis*] (1830).

germinationis ROSSI = **nigrina** MEIG.

Ghilianii Rond., Prodr., VII. Ortalid. 24. 2. (1869). Italia.

helvipes Rond., Prodr., VII. Ortalid. 24. 1. (1869). Italia.

- limbata* ROB.-DESV. = **nigrina** MEIG.
- liturata* ROB.-DESV. = **nigrina** MEIG.
- longicornis* ROB.-DESV., MEIG., MACQ., GIMMERTH = **paludum** FALL.
- luctuosa** MEIG., S. B., VI. 378. 33. Anmerkung. (1830); MACQ., Suit. Britannia.
à Buff., II. 431. 1. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 225. 14. (1902).
- moerens* MEIG., S. B., V. 280. 14. (1826).
- lugens* MEIG. = **afflicta** MEIG.
- lugubris** MEIG., S. B., V. 279. 13. [*Ortalis*] (1826); BECK., Zeitschr. f. Germania.
Hymenopt. u. Dipt., II. 225. 13. (1902).
- mali* FABR. = **frondescientiae** L.
- moerens* MEIG. = **luctuosa** MEIG.
- morio* FABR. = **frondescientiae** L.
- × **nigrina** MEIG., S. B., V. 279. 12. [*Ortalis*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., Europa centr.
II. 435. 3. [*Ortalis*] (1835); SCHIN., F. A., II. 78. (1864); LW.,
Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 6. [*Pteropaectria*] (1868).
—? *germinationis* ROSSI, teste ROND., Fauna Etrusca, II. (1790).
- limbata* ROB.-DESV., Myod., 726. 6. (1830).
- liturata* ROB.-DESV., Myod., 725. 5. (1830).
- oscillans** MEIG., S. B., V. 281. 17. (1826); SCHIN., F. A., II. 79. (1864); Europa centr.
ROND., Prodr., VII. Ortalid. 27. 9. (1869); MIK, Dipt. v. Hernstein, et mer.
(71). 31. (1885).
- × **paludum** FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 20. 7. [*Ortalis*] (1820); MEIG., Europa,
S. B., V. 282. 18. [*Ortalis*] (1826); ZETT., Ins. Lapp., 747. 4. (1838)
et Dipt. Scand., V. 2161. 8. [*Ortalis*] (1846); SCHIN., F. A., II. 78.
(1864); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 6. 1. [*Pteropaectria*]
(1868).
- longicornis* ROB.-DESV., Myod., 726. 8. (1830); MACQ., Suit. à Buff.,
II. 432. 5. (1835); MEIG., S. B., VII. 347. 28. [*Ortalis*] (1838);
GIMMERTH., Bull. de Moscou, IV. 192. 1. (1847).
- × **palustris** MEIG., S. B., V. 281. 16. [*Ortalis*] (1826); MACQ., Suit. à Europa.
Buff., II. 432. 3. (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2162. 9. [*Ortalis*]
(1846); SCHIN., F. A., II. 78. (1864); LW., Zeitschr. f. d. ges. Na-
turw., XXXII. 6. [*Pteropaectria*] (1868); ROND., Prodr., VII. Orta-
lid. 27. 8. (1869).
- × **parva** LW., Wien. entom. Monatschr., VIII. 14. [*Pteropaectria*] (1864). Austria.
pusilla ROND., Prodr., VII. Ortalid. 27. 11. (1869). Italia.
- rufipes** ROB.-DESV., Myod., 727. 11. (1830). Gallia.
- rufitarsis** MACQ., Suit. à Buff., II. 433. 6. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
347. 29. [*Ortalis*] (1838).
- scutellaris** ROB.-DESV., Myod., 726. 7. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Gallia.
432. 4. (1835); MEIG., S. B., VII. 347. 27. [*Ortalis*] (1838).
- strigulosa** WALK., List of Dipt. in Egypt. and Arabia. The Entomol., Aegyptus.
No 92. 345. 86. (1871).
- uliginosa* FALL. = **frondescientiae** L.
- violascens** ROB.-DESV., Myod., 727. 10. (1830). Gallia.

Tephronota

Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 6. 10. (1868).

- bifasciata** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., II. 375. 3. [*Ortalis*] (1858) Sicilia.
et Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 6. 10. (1868); ROND., Prodr.,
VII. Ortalid. 26. 7. [*Herina*] (1869); Lw., Europ. Dipt., III. 262.
(1873).
 hilaris ROND., Prodr. VII. Ortalid. 26. 7. [Nomen in litt.] (1869).
- gyrans** Lw., Wien. entom. Monatschr., VIII. 12. 4. [*Ortalis*] (1864); Dalmatia.
Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 6. 10. (1868) et Europ. Dipt.,
III. 262. (1873).
- hilaris* ROND. = **bifasciata** Lw.
- rufipes** MACQ., Suit. à Buff., II. 436. 9. [*Ortalis*] (1835); MEIG., S. B., Europa centr.
VII. 347. 32. [*Ortalis*] (1838); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw.,
XXXII. 6. 10. (1868) et Europ. Dipt., III. 262. (1873); BECK.,
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 227. 32. (1902).
- tristis** MEIG., S. B., V. 277. 9. [*Ortalis*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., Europa centr.
II. 434. 2. [*Ortalis*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt.,
II. 224. 9. (1902).

Meliera *(Ceroxys)*

ROB.-DESV., Myod., 715. IX. (1830).

- acuticornis** Lw., N. Beitr., II. 21. 46. [*Ortalis*] (1854); SCHIN., F. A., Hungaria.
II. 75. [*Ceroxys*] (1864); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII.
No VII. 6. 11. [*Ceroxys*] (1868) et Europ. Dipt., III. 262. [*Ceroxys*]
(1873).
- cana** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., II. 374. IV. 1. [*Ortalis*] (1858) et Europa mer.
Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 20. 5. [*Ceroxys*] (1868);
ROND., Prodr., VII. Ortalid. 20. 5. (1869); Lw., Europ. Dipt., III.
262. [*Ceroxys*] (1873).
- × **crassipennis** FABR., Entom. syst., IV. 357. 185. [*Musca*] (1794) et Europa.
Syst. Antl., 209. 26. [*Scatophaga*] (1805); MEIG., S. B., V. 273.
1. t. XLVI. f. 23. [*Ortalis*] (1826); FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 18.
2. [*Ortalis*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 438. 3. [*Ceroxys*] (1835);
ZETT., Dipt. Scand., V. 2153. 2. [*Ortalis*] (1846); WALK., Ins. Brit.,
II. 195. 1. [*Ortalis*] (1853); SCHIN., F. A., II. 74. [*Ceroxys*] (1864);
Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 6. 11. [*Ceroxys*] (1868);
ROND., Prodr., VII. Ortalid. 19. 4. (1869).
 gangraenosa ROB.-DESV., Myod., 716. 1. (1830).
- etrusca** ROND., Prodr., VII. Ortalid. 18. 2. (1869). Italia.
- flavoscutellata* MEIG. = **scutellata** MACQ.
- gangraenosa* ROB.-DESV. = **crassipennis** FABR.
- nana** Lw., Europ. Dipt., III. 275. 179. [*Ceroxys*] (1873). Hispania.
- nigritarsis** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, p. 130. 203. (1903). Aegyptus.
- obscura** ROB.-DESV., Myod., 716. 3. (1830). Gallia.

- obscuripes** Lw., Europ. Dipt., III. 276. 180. [*Ceroxys*] (1873). Sarawshan.
omissa MEIG., S. B., V. 274. 2. [*Ortalis*] (1826); Macq., Suit. à Buff., Europa centr.
 II. 438. 3. (1835); SCHIN., F. A., II. 75. [*Ceroxys*] (1864); Lw.,
 Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 6. 11. [*Ceroxys*] (1868).
pallipes ROB.-DESV., Myod., 717. 4. (1830). Gallia.
picta MEIG., S. B., V. 276. 6. t. XLVI. f. 28. [*Ortalis*] (1826); WALK., Germania,
 Ins. Brit., II. 196. 4. (1853); SCHIN., F. A., II. 74. [*Ceroxys*] (1864); Britannia,
 Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 6. 11. [*Ceroxys*] (1868); Africa occid.
 BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., 383. 36. (1891).
pulicaria ROB.-DESV., Myod., 717. 5. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. Gallia.
 439. 7. [*Ceroxys*] (1835); MEIG., S. B., VII. 348. 35. [*Ortalis*]
 (1838).
quinquemaculata Macq., Suit. à Buff., II. 439. 5. [*Ceroxys*] (1835). Gallia.
quinquenotata MEIG., S. B., VII. 348. 34. [*Ortalis*] (1838).
quinquenotata MEIG. = **quinquemaculata** Macq.
rubella ROB.-DESV., Myod., 716. 2. (1830). Gallia?
scutellata Macq., Suit. à Buff., II. 439. 8. [*Ceroxys*] (1835). Gallia.
flavoscutellata MEIG., S. B., VII. 348. 36. [*Ortalis*] (1838).
unicolor Lw., N. Beitr., II. 21. 47. [*Ortalis*] (1854); SCHIN., F. A., II. Sibiria,
 75. [*Ceroxys*] (1864); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. Europa centr.
 6. 11. [*Ceroxys*] (1868) et Europ. Dipt., III. 262. [*Ceroxys*] (1873);
 BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 60. 124. [*Ortalis*] (1900).

Hypochra

Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 7. 12. (1868).

Meliera p. p., ROND., Prodr., VII. Ortalid. (1869).

- albipennis** Lw., Stettin. entom. Zeitschr., VII. 93. [*Ortalis*] (1846); Graecia.
 Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 7. 12. (1868) et Europ. Dipt.,
 III. 262. (1873); MIK, Wien. entom. Zeitg., IV. 278. 1. (1885).
atricornis MIK, Wien. entom. Zeitg., IV. 281. 3. (1885). Austria.
parmensis ROND., Prodr., VII. Ortalid. 19. 3. [*Meliera*] (1869); MIK, Italia,
 Wien. entom. Zeitg., IV. 279. 2. (1885). Austria.
subapennina ROND., Prodr., VII. Ortalid. 18. 1. [*Meliera*] (1869); Italia.
 MIK, Wien. entom. Zeitg., IV. 278 et 282. 4. (1885).

Meckelia > *Ortalis* f. 1810.

ROB.-DESV., Myod., 714. VIII. (1830).

Anacampta Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 7. 13. (1868).

- cinifera** Lw., Stettin. entom. Zeitg., VII. 92. [*Ortalis*] (1846) et Zeitschr. Rossia sept.
 f. d. ges. Naturw., XXXII. No. VII. 7. (1868).
elegans ROB.-DESV. = **hortulana** ROSSI.
hortulana ROSSI, Fauna Etrusca [*Musca*] (1790); ROND., Prodr., VII. Europa centr.
 Ortalid. 21. 2. [*Ceroxys*] (1869). et mer.

- elegans* ROB-DESV., Myod., 715. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 438. 1. [*Ceroxys*] (1835); MEIG., S. B., VII. 348. 33. [*Ortalis*] (1838).
- hyalinata* PANZ., Fauna Germ., LX. 24. [*Musca*] (1798); SCHIN., F. A., II. 76. [*Ceroxys*] (1864); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 7. 13. [*Anacampta*] (1868).
- marmorea* FABR., Syst. Antl., 209. 27. [*Scatophaga*] (1805); MEIG., S. B., V. 274. 3. t. XLVI. f. 21. [*Ortalis*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 439. 6. [*Ceroxys*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 223. 3. (1902).
- hyalinata* PANZ., SCHIN., Lw. = *hortulana* ROSSI.
- marmorea* FABR., MEIG., MACQ. = *hortulana* ROSSI.
- morosa* Lw., Europ. Dipt., III. 278. 182. [*Anacampta*] (1873). Russia mer.
- munda* Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XXXII. No VII. 10. (1868) et Europ. Dipt., III. 277. 181. [*Anacampta*] (1873). Russia mer.
- pomariana* ROND., Prodr., VII. Ortalid. 22. 3. [*Ceroxys*] (1869). Italia.
- robusta* Lw., Europ. Dipt., III. 279. 183. [*Anacampta*] (1873). Sarawschan.
- urticae* L., Fauna Suec., 1875. [*Musca*] (1761); FABR., Spec. Ins., II. 453. 98. [*Musca*] (1781); Entom. syst., IV. 357. 184. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 209. 25. [*Scatophaga*] (1805); GMEL., Syst. Nat., V. 2857. 123. [*Musca*] (1790); FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 17. 1. [*Ortalis*] (1820); MEIG., S. B., V. 275. 4. t. XLVI. f. 19. [*Ortalis*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 438. 2. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 747. 1. (1838) et Dipt. Scand., V. 2152. 1. [*Ortalis*] (1846); WALK., Ins. Brit., II. 195. 3. [*Ortalis*] (1853); SCHIN., F. A., II. 75. [*Ceroxys*] (1864); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 7. 13. [*Anacampta*] (1868); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 21. 1. (1869); Lw., Europ. Dipt. III. 262. [*Anacampta*] (1873). Aegyptus.

Holodasia

- Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 7. 14. (1868).
- fraudulosa* Lw., Wien. entom. Monatschr., VIII. 11. 3. (1864). Balkan.

Cephalina.

Myrmecomylia

ROB-DESV., Myod., 721. XV. (1830).

*Cephalia**) MEIG., S. B., V. 293. 169. t. XLVII. f. 10—16. (1826).

- coloptera* BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., 384. [*Cephalia*] (1886); MİK, Gallia. Wien. entom. Zeitg., VI. 159. [*Cephalia*] (1887).

*) Nomen „Cephalia“ jam a PANZER Ins. Germ. VIII. 86. t. IX. anno 1805 hymenopterorum generi praeditum et a JURINE anno 1807 copiose confirmatum est.

flavoscutellata BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 60. 123. Sibiria.

[*Cephalia*] (1900).

formicaria ROB.-DESV. = **rufipes** MEIG.

nigripes MEIG., MACQ., SCHIN., ROND. = **rufipes** MEIG.

quadripunctata GIMMERTH., Bull. de Moscou, XV. 684. [*Cephalia*] Rossia. (1843).

rufipes MEIG., S. B., V. 294. 1. t. XLVII. f. 15. [*Cephalia*] (1826); Europa centr.
MACQ., Suit. à Buff., II. 483. 1. [*Cephalia*] (1835); SCHIN., F. A., et mer.
II. 177. [*Cephalia*] (1864); Lw., Zeitschr. gesamt. Naturw.,
XXXII. 7. 1. [*Cephalia*] (1868).

formicaria ROB.-DESV., Myod., 722. 1. (1830).

nigripes MEIG., S. B., V. 294. 2. t. XLVII. f. 16. [*Cephalia*]
(1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 483. 2. [*Cephalia*] (1835);
SCHIN., F. A., II. 177. [*Cephalia*] (1864); ROND., Tanypez.
Bull. Soc. entom. Ital., 6. V. 1. [*Cephalia*] (1874); BECK.,
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 230. 2. [*Cephalia*] (1902).

Tanypeza

FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 4. (1820).

longimana FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 5. 1. (1820); MEIG., S. B., V. Europa.
374. 1. t. LII. f. 13, 14. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 488. 1.
t. XX. f. 7. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2422. 1. (1847); SCHIN.,
F. A., II. 191. (1864); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital.,
VI. 6. (1874); HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXII. 201. (1903).

Platystomina.

Platystoma

MEIG., Illig. Magaz., II. 277. (1803).

Hesychiella ROB.-DESV., Myod., 709. 2. (1830).

Megaglossa ROND., Prodr., VII. Ortalid. 36. 8. (1869).

Dichya fabr. 1805. p
aenescens Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 10. 10. (1868) Rossia mer.
et Europ. Dipt., III. 285. 189. (1873).

angustipenne Lw., N. Beitr., II. 21. 48. (1854). Rossia.

arcuatum Lw., N. Beitr., IV. 50. 48. (1856). Syria.

bifasciatum BRULLÉ, Expéd. de Morée, III. 323. 713. (1836). Graecia.

bipilosum PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XI. 32. t. II. f. 2. (1875). Caucasus.

biseta Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 10. 9. (1868) et Europ. Hungaria.
Dipt., III. 283. 187. (1873).

canum PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XI. 31. t. II. f. 4. (1875). Caucasus.

corticarum ROND., Prodr. VII. Ortalid. 34. 2. [*Megaglossa*] (1869). Italia.

Frauenfeldi NOWICKY, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 352. t. XI. Galicia.
f. 2. (1867).

fulviventre SCHRAOK, GMEL. = **umbrarum** FABR.

- gemmationis** ROND., Prodr., VII. Ortalid. 35. 5. [*Megaglossa*] (1869). Italia.
- gilvipes** LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 10. 11. (1868) et Europa mer.
Europ. Dipt., III. 286. 190. (1873).
- insularum** ROND., Prodr., VII. Ortalid. 33. 1. [*Megaglossa*] (1869). Sardinia.
- lativentre** LW., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 241. 21. (1865). Kutais.
- lugubre** ROB.-DESV. = **umbrarum** FABR.
- plantationis** ROND., Prodr., VII. Ortalid. 35. 6. [*Megaglossa*] (1869). Italia.
- provinciale** LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 10. 8. (1868) Gallia.
et Europ. Dipt., III. 282. 186. (1873).
- pubescens** LW., Dipt. Beitr., I. 36. 4. (1845); MIK, Wien. entom. Rhodus.
Zeitg., III. 204. 3. (1884).
- punctiventre** PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XI. 33. t. II. f. 5. Caucasus.
(1875).
- rufimanum** LW., Europ. Dipt., III. 284. 188. (1873). Caucasus.
- rufipes** MEIG., S. B., V. 393. 3. (1826); SCHIN., F. A., II. 84. (1864). Germania.
- X **seminationis** L., Fauna Suec., 1874. [*Musca*] (1766); FABR., Syst. Europa centr.
entom., 786. 70. [*Musca*] (1775); Spec. Ins., II. 452. 90. [*Musca*]
(1781) et Entom. syst., IV. 355. 174. [*Musca*] (1794); GMEL., Syst.
Nat., V. 2857. 246. [*Musca*] (1788); SCHRANK, Fauna Boica, III.
146. No 2516. [*Trupanea*] (1803); FABR., Syst. Antl., 329. 16.
[*Dictya*] (1805); LATR., Gen. crust. et ins., IV. 354. (1809); MEIG.,
S. B., V. 392. 2. (1826); ROB.-DESV., Myod., 709. 2. [*Hesychilla*]
(1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 444. 3. (1835); LW., Dipt. Beitr.,
I. 35. 3. (1845); WALK., Ins. Brit., II. 193. 1. (1853); SCHIN., F. A.,
II. 83. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 36. 8. [*Megaglossa*]
(1869).
- sororculum** PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XI. 32. t. II. f. 1. Caucasus.
(1875).
- strix** PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XI. 30. t. II. f. 3. (1875). Caucasus.
- suave** LW., Europ. Dipt., III. 281. 184. (1873). Sarawshan.
- subfasciatum** LW., Wien. entom. Monatschr., VI. 173. 68. (1862). Tureia.
- subtile** LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 10. 7. (1868); ROND.,
Prodr., VII. Ortalid. 36. 9. [*Megaglossa*] (1869); LW., Europ. Dipt.,
III. 281. 185. (1873). Sicilia.
- tegularia** LW., Wien. entom. Monatschr., III. 157. 2. (1859) et Berlin. Europa mer.
entom. Zeitschr., VI. 87. 81. (1862); SCHIN., F. A., II. 83. (1864);
ROND., Prodr., VII. Ortalid., 34. 3. [*Megaglossa*] (1869).
- transversum** LATR. = **umbrarum** FABR.
- X **umbrarum** FABR., Syst. entom., 784. 60. [*Musca*] (1775) et Spec ins., Europa centr.
II. 450. 80. [*Musca*] (1781); SCHRANK., Enumer. Ins. Austr., 469. et mer.
953. [*Musca*] (1781); FABR., Entom. syst., IV. 350. 157. [*Musca*]
(1794) et Syst. Antl., 325. 1. [*Dictya*] (1805); MEIG., S. B., V. 391.
1. t. LIII. f. 22. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 444. 1. (1835);
PERRIS, Mémoires de la Soc. de Liège, X. (1855); SCHIN., F. A.,
II. 84. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 35. 4. (1869); BRAUER,
Zweilf. d. Kais. Mus. Wien, 85. (1883).
- fulviventre** GMEL., Syst. Nat., V. 2862. 298. [*Musca*] (1788).

lugubre ROB.-DESV., Myod., 709. 1. [*Hesyquillia*] (1830).

transversum LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 355. (1809).

vegetationis ROND., Prodr., VII. Ortalid. 36. 8. [*Megaglossa*] (1869). Italia.

Rivellia

ROB.-DESV., Myod., 729. XXI. (1830).

herbarum ROB.-DESV. = **syngenesiae** FABR.

juncorum FALL. = **syngenesiae** FABR.

× **syngenesiae** FABR., Spec. ins., II. 454. 101. [*Musca*] (1781); GMEL., Europa. Syst. Nat., V. 2858. 249. [*Musca*] (1788); FABR., Entom. syst., IV. 359. 192. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 321. 23. [*Tephritis*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 355. [*Tephritis*] (1809); MEIG., S. B., V. 283. 20. t. XLVI. f. 29. [*Ortalis*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 433. 7. (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2158. 6. [*Ortalis*] (1846); WALK., Ins. Brit., II. 197. 6. [*Ortalis*] (1853); SCHIN., F. A., II. 80. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 28. 1. (1869).

herbarum ROB.-DESV., Myod., 729. 1. (1830).

juncorum FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 19. 5. [*Ortalis*] (1820).

urticae SCHRANK, Enumer. Ins. Austr., 969. [*Musca*] (1781) et

Fauna Boica, III. 2460. (1803).

urticae SCHRANK. = **syngenesiae** FABR.

Pterocallina.

Myennis

ROB.-DESV., Myod., 717. 1. (1830).

fasciata FABR., Syst. Antl., 210. 19. [*Scatophaga*] (1805); MEIG., S. B., Europa centr. V. 322. 18. [*Trypeta*] (1826); ROB.-DESV., Myod., 717. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 436. 8. [*Ortalis*] (1835); MEIG., S. B., VII. 347. 31. [*Ortalis*] (1838); LW., Germ. Zeitschr., V. 345. 21. t. I. f. 18. [*Trypeta*] (1844); SCHIN., Verh. zool.-bot. ges. Wien, VIII. 653. 25. (1858) et F. A., II. 77. (1864).

? *octopunctata* ROND., Prodr., VII. Ortalid. 29. 1. (1869).

octopunctata ROND. = **fasciata** FABR.

sibirica PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XXVI. VII. 213. (1891). Sibiria.

Psairoptera > Homalocephala ZTT

WAHLBG., Acta Holm. Kgl. Vetensk. Akad. Handl., (1838). 1839

Homalocephala ZETT., Ins. Lapp., 749. (1838).

albitarsis ZETT., Ins. Lapp., 749. 1. [*Homalocephala*] (1838); SCHIN., Suecia sept. F. A., II. 81. (1864).

- biumbrata* WAHLBG., Acta Holm. Kgl. Vetensk. Akad. Handl., 1838. 2. (1838).
angustata WAHLBG., Kgl. Vetensk. Akad. Handl., 4. (1838); ZETT., Suecia. Dipt. Scand., VI. 2268. 4. (1847).
apicalis WAHLBG., Kgl. Vetensk. Akad. Handl., 3. (1838); ZETT., Dipt. Suecia. Scand., VI. 2267. 3. (1847).
bimaculata WAHLBG., Kgl. Vetensk. Akad. Handl., 1. (1838); ZETT., Suecia. Dipt. Scand., VI. 2266. 2. (1847).
bipunctata Lw., N. Beitr., II. 22. 49. (1854); SCHIN., F. A., II. 81. (1864). Germania.
biumbrata WAHLBG. = *albitarsis* ZETT.

Ulidiinae.

Myodina > *Scoptera* Kirby 1817

ROB.-DESV., Myod., 727. XIX. (1830).

Scoptera (*Scioptera*) KIRBY, Westw. Introd. Classif. Ins. (1840).

urticae ROB.-DESV. = *vibrans* L.

- X *vibrans* L., Fauna Suec., 1867. [*Musca*] (1761); GEOFFR., Ins., II. 494. Europa.
 4. [*Musca*] (1764); FABR., Spec. ins., II. 450. 81. [*Musca*] (1781);
 SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 955. [*Musca*] (1781); DE GEER, Ins.,
 VI. 17. 11. t. I. f. 19, 20. [*Musca*] (1782); GMEL., Syst. Nat., V.
 2855. 112. [*Musca*] (1788); FABR., Ent. syst., IV. 350. 158. [*Musca*]
 (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 2459. [*Musca*] (1803); FABR.,
 Syst. Antl., 324. 39. [*Tephritis*] (1805); LIATR., Gen. Crust. et Ins.,
 IV. 355. [*Tephritis*] (1809); MEIG., S. B., V. 284. 21. [*Ortalis*] (1826);
 FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 20. 6. [*Ortalis*] (1830); MACQ., Suit. à
 Buff., II. 437. 11. [*Ortalis*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 747. 3. (1838)
 et Dipt. Scand., V. 2159. 7. [*Ortalis*] (1846); SCHOLTZ, Zeitschr.
 f. Entomol. Breslau, I—III. 10. (1855); WALK., Ins. Brit., II. 197.
 7. [*Ortalis*] (1853); SCHIN., F. A., II. 85. (1864); ROND., Tanypez.
 Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 2. (1874); v. RÖD., Berlin. entom.
 Zeitschr., XXV. 209. (1881); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien,
 85. (1883); KARSCH., Sitzungsber. d. Berlin. entom. Ver., pag.
 XXVIII. (1887); MIK, Wien. entom. Zeitg., VII. 111. et pag. 94. 50.
 (1888).

urticae ROB.-DESV., Myod., 728. 1. (1830).

Ulidia

MEIG., S. B., V. 385. 182. (1826).

Timia p. p., MEIG. (1826).

- albidipennis* Lw., Dipt. Beitr., I. 32. 5. (1845); v. RÖD., Berlin. Europa mer.
 entom. Zeitschr., XXV. 210. (1881).

- ✕ **apicalis** MEIG., S. B., V. 388. 1. [*Timia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., Europa mer.
 II. 505. 6. (1835); SCHIN., F. A., II. 86. [*Timia*] (1864); ROND.,
 Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 5. III. 1. [*Timia*]
 (1874); v. RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXV. 210. (1881).
atrata Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 11—13. (1868) et Graecia.
 Europ. Dipt., III. 287. 192. (1873); v. RÖD., Berlin. entom. Zeitschr.,
 XXV. 210. (1881).
atro-virens Lw., Dipt. Beitr., I. 32. 6. (1845); v. RÖD., Berlin. entom. Asia min.
 Zeitschr., XXV. 210. (1881).
 ✕ **erythrophthalma** MEIG., S. B., V. 387. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buff., Europa centr.
 II. 505. 2. (1835); SCHIN., F. A., II. 88. (1864); ROND., Tanypez.
 Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 5. III. 3. [*Timia*] (1874); v.
 RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXV. 210. (1881).
nitens Lw., Dipt. Beitr., I. 32. Anmerk. 4. (1845).
nitida MEIG., S. B., V. 387. 3. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II.
 505. 3. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 247.
 3. (1902).
megacephala Lw., Dipt. Beitr., I. 33. 7. (1845); v. RÖD., Berlin. entom. Asia min.,
 Zeitschr., XXV. 210. (1881). Rhodus.
melampodia Lw., Europ. Dipt., III. 287. 191. (1873); v. RÖD., Berlin. Persia,
 entom. Zeitschr., XXV. 210. (1881). Sarawschan.
nigripennis Lw., Dipt. Beitr., I. 29. 2. (1845); SCHIN., F. A., II. 88. Silesia,
 (1864); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 5. 2. Hungaria.
 [*Timia*] (1874); v. RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXV. 210. (1881).
nitens Lw. = **erythrophthalma** MEIG.
nitida MEIG., MACQ. = **erythrophthalma** MEIG.
parallela Lw., Dipt. Beitr., I. 30. 3. (1845); SCHIN., F. A., II. 88. (1864); Europa mer.
 v. RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXV. 210. 3. (1881).
ruffrons WALK., The Entomolog., 345. 84. (1871). Kairo.
semiopaca Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXII. 10. 12. (1868) Gallia.
 et Europ. Dipt., III. 288. 193. (1873); v. RÖD., Berlin. Zeitschr.,
 XXV. 210. (1881).

Empyelocera = *Timia* Wied

- Lw., Berlin. entom. Zeitschr., X. 238. (1866).
abstersa Lw., Europ. Dipt., III. 289. 194. (1873); v. RÖD., Berlin. Rossia mer.
 entom. Zeitschr., XXV. 210. (1881); MUK, Wien. entom. Zeitg.,
 VIII. 189. 1. (1889).
amoena Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XLIII. 419. 18. (1874); v. Persia.
 RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXV. 211. (1881); MUK, Wien.
 entom. Zeitg., VIII. 194. 5. (1889).
camillae MUK, Wien. entom. Zeitg., VIII. 195. 7. (1889). Turemenia.
melanorrhina Lw., Berlin. entom. Zeitschr., X. 239. 1. (1866); v. RÖD., Rossia centr.
 Berlin. entom. Zeitschr., XXV. 210. (1881); MUK, Wien. entom. et mer.
 Zeitschr., VIII. 190. 2. (1889).
nasuta MUK, Wien. entom. Zeitg., VIII. 191. 3. (1889). Turemenia.

- nigrimana** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., X. 240. 2. (1866); v. RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXV. 210. (1881); MIK, Wien. entom. Zeitg., VIII. 192. 4. (1889). Rossia centr. et mer.
- xanthaspis** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XII. 175. (1868); v. RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXV. 210. (1881); MIK, Wien. entom. Zeitg., VIII. 194. 6. (1889). Rossia mer., Turemenia.

Chrysomyza

FALL., Scenop., 1. (1817).

Chloria SCHIN., Wien. entom. Monatschr., VI. 151. (1862).

bicolor MACQ. = **demandata** FABR.

- × **demandata** FABR., Entom. syst. Suppl., 564. [*Musca*] (1798) et Syst. Antl., 324. 37. [*Tephritis*] (1805); MEIG., S. B., V. 386. 1. [*Ulidia*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 504. 1. [*Ulidia*] (1835); BOUCHÉ, Naturg., I. 98. (1837); WESTW., Introduct., II. (1840); Lw., Dipt. Beitr., I. 28. 1. [*Ulidia*] (1845); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2369. 1. [*Ulidia*] (1847); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 499. 265. (1849); WALK., Ins. Brit., II. 194. 1. [*Ulidia*] (1853); SCHIN., F. A., II. 86. [*Chloria*] (1864); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, 2. (1874); v. RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXV. 210. (1881); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 85. (1883); MIK, Wien. entom. Zeitg., XV. 241. 55. (1896). Europa, Africa sept., Ins. Canar.

bicolor MACQ., Suit. à Buff., II. 504. 1. [*Ulidia*] (1835).

splendida FALL., Dipt. Suec. Scenopid., 4. 1. (1817).

splendida FALL. = **demandata** FABR.

Timia

WIED., Analecta entom., 15. fig. 6. (1824).

- erythrocephala** WIED., Anal. entom., 15. fig. 6. (1824) et Ausseurop. zweifl. Ins., II. 564. (1830); SCHIN., F. A., II. 88. [*Ulidia*] (1864); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 2. (1874); v. RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXV. 210. (1881); MIK, Wien. entom. Zeitg., VIII. 199. 2. (1889). Rossia mer.
- Komarowii** MIK, Wien. entom. Zeitg., VIII. 200. 3. (1889). Turemenia.
- nigripes** MIK, Wien. entom. Zeitg., VIII. 201. 4. (1889). Turemenia.
- pulchra** v. RÖD., Wien. entom. Zeitg., VIII. 186. (1889); MIK, Wien. entom. Zeitg., VIII. 198. 1. (1889). Persia.
- testacea** PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XXVI. pars VII. t. 1. p. 211. (1891). Rossia sept.

Coniceps

Lw., Europ. Dipt., III. 292. (1873).

- carbonarius** Lw., Europ. Dipt., III. 290. 195. (1873); v. RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXV. 209. (1881). Rossia mer.

= Acrometopia in Ochthophilinae

TRYPETIDAE.

Trypetinae.

✓ Platyparea

Lw., Trypetidae, 25. I. Wien. (1862).

Aciura p. p., WALK., Ent. Mag., III. (1836).

Poeciloptera Lw. (1846).

✕ *discoidea* FABR., Mantissa, II. 351. 97. [*Musca*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2854. 239. [*Musca*] (1793); FABR., Entom. syst., IV. 350. 155. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 326. 3. [*Dictya*] (1805); MACQ., Suit. à Buff., II. 455. 1. [*Urophora*] (1835); Lw., Germ. Zeitschr., V. 348. 24. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2192. 16. [*Tephritis*] (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 649. 15. (1858); Lw., Trypet., 27. 3. t. I. f. 2. (1862); SCHIN., F. A., II. 111. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 34. 1. (1871).
lychnides MEIG., S. B., V. 324. 21. t. XLVI. f. 6. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 456. 3. [*Urophora*] (1835); WALK., Entom. Mag., III. 72. 1. f. 15. [*Aciura*] (1836).

fulminans MEIG. = *poeciloptera* SCHRANK.

lychnidis MEIG., MACQ., WALK. = *discoidea* FABR.

poeciloptera SCHRANK, Beitr., 95. t. III. f. 22. [*Musca*] (1776) et Enum. Ins. Austr., 474. 964. [*Musca*] (1781); BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 145. 15. [*Ortalis*] (1847); Lw., Trypetid., 25. 1. t. I. f. 1. (1862); SCHIN., F. A., II. 110. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 722. 10. [*Ortalis*] (1872); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 89. (1883).

fulminans MEIG., S. B., V. 275. 5. t. XLVI. f. 20. [*Ortalis*] (1826);

BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 223. 5. (1902).

terebratula PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XXVI. 216. (1891). Asia sept.

✓ Euphranta

Lw., Trypetid., 28. (1862).

Cephalia p. p., BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., (1886).

Dictya p. p., FABR., Syst. Antl., (1805).

Mosina p. p., ROB-DESV., Myod., (1830); ROND., Prodr., VII. Ortalid. (1871).

caloptera BIGOT. = *connexa* FABR.

connexa FABR., Entom. syst., IV. 350. 156. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 326. 2. [*Dictya*] (1805); MEIG., S. B., V. 276. 7. t. XLVI. f. 22. [*Ortalis*] (1826); ROB-DESV., Myod., 672. 5. [*Mosina*] (1830);

MACQ., Suit. à Buff., II. 383. 9. [*Cordylura*] et Suit. à Buff., II. 435. 4. [*Ortalis*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2154. 3. [*Ortalis*] (1847); LW., Trypetid., 28. 1. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 213. (1863); SCHIN., F. A., II. 112. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 45. 1. [*Mosina*] (1871); KALTENB., Pflanzenf., 438. 3. [*Ortalis*] (1872); BRAUER., Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 89. (1883); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 224. 7. (1902).
caloptera BIGOT., Ann. Soc. entom. Fr., 384. [*Cephalia*] (1886).
dorsalis MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 292. t. XXVII. f. 5. [*Tephritis*] (1850).

Zetterstedti FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 13. 3. [*Ortalis*] (1820).
dorsalis MACQ. = **connexa** FABR.
Zetterstedti FALL. = **connexa** FABR.

✓ Aciura

ROB.-DESV., Myod., 773. 13. (1830).

Platyparea p. p., LW., Trypetid., 26. (1862).

alacris LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. 24. 19. Rossia mer. (1869).

caloptera LW., Stettin. entom. Zeitg., XI. 54. t. I. f. 3. [*Trypeta*] Sibiria. (1850); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 651. 19. [*Platyparea*] (1858); LW., Trypetid., 26. 2. [*Platyparea*] (1862) et Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. 2. (1869).

coryli ROSSI ♂ (nec ♀) = **tibialis** ROB.-DESV.

coryli ROSSI ♀ (nec ♂), ROND. = **femoralis** ROB.-DESV.

femoralis ROB.-DESV., Myod., 773. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 458. 12. [*Urophora*] (1835); MEIG., S. B., VII. 355. 71. [*Trypeta*] (1838); LW., Germ. Zeitschr., V. 350. t. I. f. 23. [*Trypeta*] (1844); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 17. (1855); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 652. 23. (1858); LW., Trypetid., 29. 1. t. I. f. 4. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 213. (1863); SCHIN., F. A., II. 113. (1864); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. 2. (1869); BRAUER., Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 89. (1883).

? *coryli* ROSSI, Fauna Etrusca, [*Musca*] (1790) et Mantissa Ins., 72. No. 557. [*Musca*] (1792—94); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 37. 1. (1871).

rotundiventris var. MEIG., S. B., V. 325. 22. t. XLIX. f. 7. [*Trypeta*] (1826).

filiola LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. 12. 1. Hispania. (1869).

gagatea LW. = **tibialis** ROB.-DESV.

✕ **rotundiventris** FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 16. 27. [*Tephritis*] (1820); Europa centr.
 MEIG., S. B., V. 325. 22. t. XLIX. f. 24. [*Trypeta*] (1826); MACQ., et sept.
 Suit. à Buff., II. 456. 4. t. XIX. f. 16. [*Urophora*] (1835); LW.,

Germ. Zeitschr., V. 351. 26. t. I. f. 24. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2197. 19. [*Tephritis*] (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 650. 16. (1858); Lw., Trypet. 31. 3. t. II. f. 2. (1862); SCHIN., F. A., II. 113. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 38. 3. (1871).

rotundiventris var. MEIG. = **femoralis** ROB.-DESV.

tibialis ROB.-DESV., Myod., 773. 2. (1830); Lw., Trypet., 30. 2. t. II. Europa mer.

f. 1. (1862); SCHIN., F. A., II. 113. (1864); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. 2. (1869); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 37. 2. (1871).

coryli ROSSI, Fauna Etrusca (1790) et Mantissa Ins., 72. No 557.

♂ (*nec* ♂). [*Musca*] (1792—1794).

gagates Lw., Linn. entom. I. 505. t. III. f. 16. [*Trypeta*] (1846);

SCHIN., Verh. d. zool.-bot. Ges. VIII. 653. 24. (1858).

Winnertzi FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 149. t. V. f. 4. Rossia mer. (1864).

Hemilea

Lw., Trypet., 32. IV, (1862).

Ocnerus p. p., O. COSTA, Atti Accad. Sc. Napoli, V. p. 102. (1844).

dimidiata O. COSTA, Atti Accad. Sc. Napoli, IV. 12. t. I. f. 7. [*Trypeta*] Europa centr. (1837); Lw., Trypetid., 32. 1. t. II. f. 3. (1862); SCHIN., F. A., II. et mer.

114. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 43. 4. [*Acidia*] (1871);

SAHLB., Meddel. Fauna et Flora Fenn., 95. (1902).

Novakii STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 124. (1893); MIK, Wien. Dalmatia. entom. Zeitg., XVII. 166. 23. (1898).

Hypenidium

Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VI. 87. (1882).

graecum Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VI. 88. (1882).

Graecia.

sibiricum PORTSCH, Horae Soc. entom. Ross., XXVI. 216. (1891).

Sibiria.

Anomoea

WALK., Entom. Mag., III. (1835).

Phagocarpus ROND., Prodr., VII. Ortalid. (1871).

antica WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 511. 57. [*Trypeta*] (1830); Lw., Europa.

Germ. Zeitschr., V. 327. 10. t. I. f. 8. [*Trypeta*] (1844) et Linn.

entom., I. 498. 10. [*Trypeta*] (1846); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges.

Wien, VIII. 651. 20. (1858); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI.

166. (1861); Lw., Trypetid., 33. 1. t. II. f. 4. (1862); SCHIN., F. A.,

II. 173. (1864); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 89. (1883).

Gaedi MEIG., S. B., VI. 382. [*Trypeta*] (1830); WALK., Entom.

Mag., III. 81. [*Trypeta*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2195.

18. [*Tephritis*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 198. 1. [*Trypeta*] (1853).
permunda HARR., Exposit., 74. t. XXI. f. 6. [*Musca*] (1776);
 ROND., Prodr., VII. Ortalid. 35. [*Phagocarpus*] (1871).
Zetterstedti ZETT., Ins. Lapp., 746. 9. [*Tephritis*] (1838).
Gaedii MEIG., WALK., ZETT. = **antica** WIED.
permunda HARR., ROND. = **antica** WIED.
Zetterstedti ZETT. = **antica** WIED.

Acidia

ROB.-DESV., Myod., 720. 14. (1830).

- Epidesmia* ROND., Prodr., I. 112. 18. (1856).
Euleia WALK., Entom. Mag., III. (1836).
Myioleja ROND., Prodr., VII. Ortalid. 41. (1871).
Myoleja ROND., Prodr., I. 112. 19. (1856).
Philophylla ROND., Prodr., VII. Ortalid. (1870).
berberidis SCHRANK = **herculei** L.
caesio HARR., Exposit., 75. t. XXI. f. 8. [*Musca*] (1776); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 43. 3. (1871). Europa centr.
 et sept.
centaureae FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 16. 26. [*Tephritis*] (1820).
discoidea MEIG., S. B., V. 323. 19. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit.
 à Buff., II. 455. 1. [*Urophora*] (1835); WALK., Entom. Mag.,
 III. 72. 2. f. 16. [*Aciura*] (1836).
lychnidis FABR., Mantissa Ins., II. 353. 124. [*Musca*] (1787);
 Entom. syst., IV. 360. 197. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 322.
 26. [*Tephritis*] (1805); LW., Germ. Zeitschr., V. 347. 23. t. I.
 f. 22. [*Trypeta*] (1844) et Linn. entom. I. 504. 23, 24.
 [*Trypeta*] (1846); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2199. 20. [*Tephritis*]
 (1847); LW., Trypetid., 38. 4. t. III. f. 4. (1862); SCHIN., Verh.
 zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 649. 14. (1858) et F. A., II. 117. (1864).
centaureae FALL. = **caesio** HARR.
centaureae FABR., MEIG., MACQ., LW., ZETT., ROND. = **heraclei** L.
cognata WIED., Zool. Mag., I. 76. [*Tephitis*] (1817); MEIG., S. B., V. 315. t. XLVIII. f. 18. ♂ [*Trypeta*] (1826); ROB.-DESV., Myod., 721. 2. (1830); WALK., Entom. Mag., III. 83. t. IX. f. 31. (1836); LW., Germ. Zeitschr., V. 320. 6. t. I. f. 5. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 2176. 6. [*Tephritis*] (1847); BOIE, Stettin. entom. Zeitg., IX. 82. 5. [*Trypeta*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 199. 3. [*Trypeta*] (1853); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 647. 10. (1858); LW., Trypetid., 35. 1. t. III. f. 1. (1862); SCHIN., F. A., II. 117. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 42. 2. (1871). Europa centr.
 et sept.
cognata MEIG. ♀ = **lucida** FALL.
connexa MACQ., Suit. à Buff., II. 463. 8. [*Tephritis*] (1835). Sicilia.
discoidea MEIG., MACQ., WALK. = **caesio** HARR.

- ~~X~~ **heraclei** L., Syst. Nat., X. 600. 96. (1758); Fauna Suec., II. 461. Europa,
 1877. (1761) et Syst. Nat., XII. 998. 125. [*Musca*] (1766); Lw., Asia min.
 Germ. Zeitschr., V. 323. t. I. f. 7. [*Trypeta*] (1844) et Linn. entom.,
 I. 497. 9. [*Trypeta*] (1846); WALK., Ins. Brit., II. 199. 2. [*Trypeta*]
 (1853); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 648. 12. (1858);
 Lw., Trypetid., 37. 3. t. III. f. 3. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot.
 Ges. Wien, XIII. 214. (1863); SCHIN., F. A., II. 116. (1864); KALTENB.,
 Pflanzenf., 278. 2 et 285. 16. [*Trypeta*] (1872); BRAUER, Zweifl.
 d. Kais. Mus. Wien, 89. (1883).
berberidis SCHRANK, Fauna Boica, III. 144. 2513. [*Trupanea*] (1803).
centaureae var. *atra* FABR., Ent. syst., IV. 360. 199. [*Musca*]
 (1794) et Syst. Antl., 322. 28. [*Tephritis*] (1805); MEIG., S. B.,
 V. 324. 20. t. XLIX. f. 8. [*Trypeta*] (1826); ROB.-DESV., Myod.,
 772. 7. [*Urophora*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 455. 2.
 [*Urophora*] (1835); WESTW., Gard. Mag. (1839) et Introd.,
 II. 573. (1840); Lw., Germ. Zeitschr., V. 346. t. I. f. 19. (1844);
 ZETT., Dipt. Scand., VI. 2194. 17. [*Tephritis*] (1847); BOJE,
 Stettin. entom. Zeitg., VIII. 326. 4. (1847); SCHOLTZ, Entom.
 Zeitschr. Breslau, (1848); CURTIS, Journ. of the agricult. Soc.
 of Engl., IX. (1850); ROND., Prodr., VII. Ortalid., 40. 2. [*Philo-
 phylla*] (1871); KALTENB., Pflanzenf., 238. 95. [*Trypeta*] (1872);
 PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 71. (1873); BRISCHKE, Schrift.
 d. naturf. Ver. Danzig, V. 254. (1881).
onopordinis FABR., Spec. Ins., II. 455. 104. (1781); Mantissa Ins.,
 II. 353. 125. (1787); Ent. syst., IV. 360. 198. [*Musca*] (1794)
 et Syst. Antl., 210. 31. [*Scatophaga*] (1805); FALL., Dipt. Suec.
 Ortalid., 15. 25. [*Tephritis*] (1820); MEIG., S. B., V. 316. t.
 XLVIII. f. 24. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 464.
 11. [*Tephritis*] (1835); WALK., Entom. Mag., III. 82. [*Euleia*]
 (1836); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2178. 8. [*Tephritis*] (1847);
 ROND., Prodr., VII. Ortalid., 39. 1. [*Philophylla*] (1871).
varipennis MACQ., Dipt. exot., II. 226. 9. t. XXXI. f. 1. (1843).
lucida FALL., Dipt. Suec. Suppl., II. 12. 2—3. [*Tephritis*] (1826); Europa centr.
 ZETT., Dipt. Scand., VI. 2177. 7. [*Tephritis*] (1847); SCHIN., Verh. et sept.
 zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 647. 11. (1858) et F. A., II. 116. (1864);
 ROND., Prodr., VII. Ortalid. 42. 1. (1871).
cognata MEIG., S. B., V. 315. ♀ (*nec* ♂) 6. [*Trypeta*] (1826);
 MACQ., Suit. à Buff., II. 463. 7. [*Tephritis*] (1835); KALTENB.,
 Pflanzenf., 305. 56; 323. 6; 370. 26. [*Trypeta*] (1872).
speciosa Lw., Germ. Zeitschr., V. 321. t. I. f. 6. [*Trypeta*] (1844);
 Linn. entom., I. 497. 7. (1846) et Trypetid., 36. 2. t. III. f. 2.
 (1862); MIK, Wien. entom. Zeitg., XVII. 284. (1898).
lychnidis FABR., Lw., ZETT., SCHIN. = **caesio** HARR.
onopordinis FABR., FALL., MEIG., MACQ., WALK., ZETT., ROND. = **heraclei** L.
speciosa Lw. = **lucida** FALL.
varipennis MACQ. = **heraclei** L.

Spilographa > forellia

Lw., Trypetid., 39. VII. (1862).

Acidia p. p., WALK., Entom. Mag., III. (1836).

Forellia ROB.-DESV., Myod. (1830).

Phorellia ROND., Prodr., VII. Ortalid. (1870).

apicalis ZETT. = Zoë MEIG.

armifrons PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XXVI. 221. (1891).

Sibiria.

artemisiae FABR., Entom. syst., IV. 351. 162. [*Musca*] (1794) et Syst.

Europa centr.
et sept.

Antl., 317. 5. [*Tephritis*] (1805); MEIG., S. B., V. 314. t. XLVIII. f. 20. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 462. 1. [*Tephritis*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 744. 4. [*Tephritis*] (1838); WESTW., Introd., II. 573. (1840); Lw., Germ. Zeitschr., V. 319. 5. t. I. f. 4. [*Trypeta*] (1844) et Linn. entom., I. 497. 5. (1846); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2168. 1. [*Tephritis*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 199. 4. (1853); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 646. 9. (1858); Lw., Trypetid., 41. 3. t. V. f. 1. (1862); SCHIN., F. A., II. 121. (1864); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., LII. (1867); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 28. 1. [*Phorellia*] (1870); KALTENB., Pflanzenf., 339. 19 et 358. 77 et 364. 32. [*Trypeta*] (1872); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, V. 262. (1881).

interrupta FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 5. 4. [*Tephritis*] (1820).

operdi ROB.-DESV., Myod., 761. 1. [*Forellia*] (1830).

artemisiae WALK. = Zoë MEIG.

bipunctata PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XXVI. 222. (1891).

Sibiria.

caucasica BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., 153. (1880).

Caucasus.

dauci ROB.-DESV., Myod., 761. 2. [*Forellia*] (1830).

Gallia.

hamifera Lw., Linn. entom., I. 496. t. III. f. 12. [*Trypeta*] (1846); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2171. 3. [*Tephritis*] (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 645. 7. (1858); Lw., Trypetid., 40. 2. t. IV. f. 2. (1862); SCHIN., F. A., II. 120. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 28. 3. [*Phorellia*] (1870).

Europa centr.
et sept.

intermissa MEIG., S. B., V. 313. 3. t. XLVIII. f. 22. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 462. 5. [*Tephritis*] (1835); SCHIN., F. A., II. p. 119. et 122. Anmerk. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 235. 3. (1902).

Germania.

interrupta FALL. = *artemisiae* FABR.

operdi ROB.-DESV. = *artemisiae* FABR.

Zoë MEIG., S. B., V. 315. 7. t. XLVIII. f. 14, 15. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 463. 9. [*Tephritis*] (1835); WALK., Entom. Mag., III. 84. [*Acidia*] (1836); ZETT., Ins. Lapp., 744. 2. [*Tephritis*] (1838); Lw., Germ. Zeitschr., V. 317. 3. t. I. f. 3. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2172. 4. [*Tephritis*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 200. 5. (1853); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 645. 8. (1858); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 166. (1861); SCHIN., F. A., II. 119. (1864); GOUREAU, Ann. Soc. entom.

Europa centr.
et sept.

Fr., CXV. (1868); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 28. 2. [*Phorellia*] (1870); KALTENB., Pflanzenf., 321. 14 et 339. 20 et 364. 30 et 370. 24. [*Trypeta*] (1872); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien. 89. (1883).

artemisiae WALK., Entom. Mag., III. 84. f. 32, 33. [*Acidia*] (1836).
apicalis ZETT., Ins. Lapp., 744. 3. var. [*Tephritis*] (1838).

Stemonocera

ROND., Prodr., VII. Ortalid. 30. IX. (1870).

abrotani MEIG., S. B., V. 314. 5. t. XLVIII. f. 21. [*Trypeta*] (1826); Europa.

MACQ., Suit. à Buff., II. 462. [*Tephritis*] (1835); LW., Germ. Zeitschr., V. 319. 4. [*Trypeta*] (1844); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 644. 4. (1858); LW., Trypetid., 39. 1. t. IV. f. 1. [*Spilographa*] (1862); SCHIN., F. A., II. 120. [*Spilographa*] (1864); GERCKE, Wien. entom. Zeitg., V. 161. 1. (1886) et VIII. 226. 8a (1889); MIK, Wien. entom. Zeitg., VII. 140. (1888).

cornuta SCOP., 1. (1772) teste ROND.; ROND., Prodr., VII. Ortalid. 30. 1. (1870).

cornuta SCOP., ROND. = **abrotani** MEIG.

Chetostoma

ROND., Prodr., I. 112. (1856) et Prodr., VII. Ortalid. 26. VI. (1870).

curvinervis ROND., Prodr., VII. Ortalid. 26. 1. (1870).

Italia.

princeps A. COSTA, Atti Accad. Napoli Mém., III. 63. (1864).

Italia.

Zonosema

LW., Trypetid., 43. VIII. (1862).

alternata FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 5. 3. [*Tephritis*] (1820); DAHLB., Europa.

Scand. Ins., p. 320. 219.; LW., Germ. Zeitschr., V. 315. 1. t. I. f. 1. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2174. 5. [*Tephritis*] (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 644. 5. (1858) et F. A., II. 122. [*Spilographa*] (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 25. 1. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 224. 89. [*Spilographa*] et 305. 58. [*Trypeta*] (1872).

continua MEIG., S. B., V. 312. t. 1. XLVIII. f. 16. [*Trypeta*] (1826);

BOUCHÉ, Naturg., I. 97. 87. [*Trypeta*] (1837).

alternata MEIG. (1826); MACQ. (1835); LW. (1846); ROND. (1870) =

Meigeni LW.

continua MEIG. = **alternata** FALL.

Meigeni LW., Germ. Zeitschr., V. 316. 2. t. I. f. 2. [*Trypeta*] (1844) Europa centr.

et Linn. entom., I. 497. 2. [*Trypeta*] (1846); ZETT., Dipt. Scand., et sept.

VI. 2170. 2. [*Tephritis*] (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 645. 6. (1858); LW., Trypetid., 44. 2. t. V. f. 3. (1862); SCHIN.,

F. A., II. 122. [*Spilographa*] (1864); KALTENB., Pflanzenf., 18. 19. [*Trypeta*] (1872); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 238. (1876); MIK, Wien. entom. Zeitg., VI. 293. t. V. f. 1—9. (1887) et XVII. 287. (1898).

alternata MEIG. (nec FALL.), S. B., V. 313. 2. t. XLVIII. f. 17. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 462. 2. [*Tephritis*] (1835); BOJE, Krøjer's Tidskr., III. 324. [*Trypeta*] (1847); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 25. (1870).

Rhagoletis

Lw., Trypetid., 44. IX. (1862).

Carpomyia ROND., Prodr., VII. Ortalid. (1870).

cerasi L., Syst. Nat., X. 600. 95. [*Musca*] (1758) et Fauna Suec., 1878. Europa centr. et sept.

[*Musca*] (1761); TITICUS, Wittenb. Wochenbl., III. 277—278. (1795); SCHRANK, Fauna Boica, III. 151. 2526. [*Trupanea*] (1803); WESTW., Introduct., II. 572. (1840); Lw., Germ. Zeitschr., V. 361. 32. [*Trypeta*] (1844) et Linn. entom., I. 508. 32. [*Trypeta*] (1846); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2208. 25. [*Tephritis*] (1847); BOIE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 336. (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. f. entom. Breslau, No. 9. p. 17. (1849); KAWALL, Stettin. entom. Zeitg., XVI. 129. (1855); A. COSTA, Degli Insetti che attaccano l'albero ed il frutto dell'olivo, del ciliegio etc. Napoli (1857); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 650. 17. [*Spilographa*] (1858); Lw., Trypetid., 45. 1. t. V. f. 4. (1862); SCHIN., F. A., II. 121. [*Spilographa*] (1864); BACH, Corresp. Bl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westph., XXV. 58—60. (1868); KÜNSTLER, Die uns. Culturph. schäd. Ins. Wien, 83—84. (1871); FRAUENF., Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss., XXII. 540. (1872); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 89. (1883); KARSCH., Entom. Nachr., 334. (1889).

ccrasorum DUF., Mém. Soc. Lille, 209—214. [*Urophora*] (1845). ? *Hebe* NEWM., Entom. Mag., I. 508. [*Tephritis*] (1833).

liturata ROB.-DESV., Myod., 771. 5. [*Urophora*] (1830).

signata MEIG., S. B., V. 332. 30. t. XLIX. f. 4. [*Trypeta*] (1826); WALK., Entom. Mag., III. 73. 1. [*Sphenella*] (1836); MACQ., Suit. à Buff., II. 453. 11. [*Urophora*] (1835); v. ROS., Württemb. Corrbl., 2. [*Trypeta*] (1836); BACH., Stettin. entom. Zeitg., III. 263—64. [*Trypeta*] (1842); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 23. 2. [*Carpomyia*] (1870); KALTENB., Pflanzenf., 175. 209. [*Trypeta*] (1872); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 238. (1876).

solstitialis SULZER., Ins., 216. t. XXVIII. f. 11. [*Musca*] (1761).

ccrasorum DUF. = *cerasi* L.

Hebe NEWM. = *cerasi* L.

liturata ROB.-DESV. = *cerasi* L.

signata MEIG., MACQ., WALK., v. ROS., ROND. = *cerasi* L.

solstitialis SULZER = *cerasi* L.

Orellia

ROB.-DESV., Myod., 765. X. (1830).

Carpomyia ROND., p. p., Prodr., VII. Ortalid. 22. IV. (1870).

Goniglossum ROND., Prodr., I. (1856).

Oedaspis LW., Trypetid. (1862).

Bucchichi FRFLD., KALTENB., v. RÖD., BRAUER = *vesuviana* COSTA.

dichotoma LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7—8. 12. Russia mer.

2. [*Oedaspis*] (1869).

fissa LW., Trypetid., 46. 1. (1862).

Hispaniamer.

flavicans ROB.-DESV. = *Wiedemanni* MEIG.

multifasciata LW., Stettin. entom. Zeitg., XI. 52. [*Trypeta*] (1850); Europa.

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 644. 3. [*Trypeta*] (1858);

LW., Trypetid., 47. 2. t. VI. f. 1. [*Oedaspis*] (1862); SCHIN., F. A.,

II. 123. [*Oedaspis*] (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 38. [*Oedaspis*]

(1871); ? RADDATZ, Archiv. d. Ver. d. Freunde d. Nat. i. Meckl.,

XXVII. 94. (1873).

Schineri LW., N. Beitr., IV. 52. 50. [*Trypeta*] (1856); SCHIN., Verh. Austria.

zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 644. 2. [*Trypeta*] (1858); LW., Trypetid.,

48. 3. [*Oedaspis*] (1862); SCHIN., F. A., II. 125. [*Oedaspis*] (1864);

PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., série 5. Tom., VI. 238. (1878);

BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 89. (1883); v. RÖD., Entom.

Nachr., XVII. 209. (1891).

vesuviana A. COSTA, Opusculi scient. Napoli [*Carpomyia*] (1854); Dalmatia.

ROND., Prodr., VII. Tephrit. 23. 1. [*Carpomyia*] (1870).

[*Bucchichi* FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 500. t. XII.

f. 23. (1867) et XVIII. 154. 5. (1868); KALTENB., Pflanzenf.,

776. 1. (1872); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 89. (1883);

v. RÖD., Entom. Nachr., XVII. 209. 210. (1891).

Wiedemanni MEIG., S. B., V. 320. t. XLIX. f. 2. [*Trypeta*] (1826); Europa centr.

WALK., Entom. Mag., III. 66. f. 7. (1835); MACQ., Suit. à Buff., II.

466. 22. [*Tephritis*] (1835); LW., Germ. Zeitschr., V. 342. t. I. f.

16. [*Trypeta*] (1844); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII.

643. 1. (1858); LW., Trypetid., 49. 4. t. VI. f. 2. [*Oedaspis*] (1862);

SCHIN., F. A., II. 125. [*Oedaspis*] (1864); ROND., Prodr., VII. Tephrit.

22. 1. [*Goniglossum*] (1870); KALTENB., Pflanzenf., 255. 5. [*Trypeta*]

(1872); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 89. (1883).

flavicans ROB.-DESV., Myod., 765. 1. (1830).

Rhacochlaena

LW., Trypetid., 50. XI. (1862).

toxoneura LW., Stettin. entom. Zeitg., VII. 364. t. I. f. 22. [*Trypeta*] Europa centr.

(1846); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 652. 22. (1858);

LW., Trypetid., 50. 1. (1862); SCHIN., F. A., II. 144. (1864).

Trypeta > Terellia Desv.

Carpomyia p. p., ROND., Prodr., VII. Tephrit. 22. IV. (1870).

Cerajocera ROND., Prodr., I. 111. 16. (1856).

Ceriocera ROND., Prodr., VII. Tephrit. 31. X. (1870).

Sitarea ROB.-DESV., Myod., 764. (1830).

Terellia ROB.-DESV., Myod., 758. (1830).

abdominalis ROB.-DESV., Myod., 768. 7. [*Tephritis*] (1830).

Gallia.

abrotani MACQ. = **colon** MEIG.

acanthi SCHRANK = **tussilaginis** FABR.

acuticornis LW., Linn. entom., I. 520. (1846); FRFLD., Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss., XXII. 541. (1856); LW., Trypetid., 62. 14. t. IX. f. 4. (1862); SCHIN., F. A., II. 133. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 380. 65. (1872).

Germania,

Sibiria.

laticauda KALTENB., Pflanzenf., 386. 46. (1872).

longicauda MEIG., S. B., VII. 356. 80. (1838); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 43. 17. (1870).

alciphron NEWM., WALK. = **colon** MEIG.

algira MACQ., Dipt. exot., II. 3 part. 223. 1. (1843).

Algeria.

arctii MEIG., MACQ. = **jaceae** ROB.-DESV.

arctii WALK., LW., ZETT. = **cylindrica** ROB.-DESV.

arctii DEG., ROB.-DESV., LW., WALK., ROND. = **tussilaginis** FABR.

atilia WALK., List of dipt., IV. 1021. (1849).

China.

✕ **colon** MEIG., S. B., V. 346. 52. (1826); LW., Germ. Zeitschr., V. 416. t. II. f. 65, 66. (1844) et Trypetid., 60. 12. t. IX. f. 3. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 216. (1863); SCHIN., F. A., II. 131. (1864); FR.-LÖW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 949. (1866); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 42. 14. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 386. 49. (1872); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 226. 227. (1899).

Europa,

Asia min.

abrotani MACQ., Suit. à Buff., II. 460. 5. [*Terellia*] (1835).

alciphron NEWM., Entom. Mag., I. 505. [*Tephritis*] (1833); WALK., Entom. Mag., III. 63. f. 4. [*Terellia*] (1836).

dispar ZETT., Dipt. Scand., VI. 2259. 54. (1847).

nebulosa MACQ., Suit. à Buff., II. 460. 3. [*Terellia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 356. 79. (1838).

nigricoma LW., Germ. Zeitschr., V. 422. t. II. f. 69. (1844); FRFLD., Sitzungsber. d. K. akad. d. Wiss., XXII. 551. (1856); KALTENB., Pflanzenf., 387. 57. (1872).

picta MEIG., S. B., VI. 18. 20. [*Sciomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 408. 15. [*Sciomyza*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 2108. 17. [*Sciomyza*] (1846); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. 5. (1869); MÜK, Wien. entom. Zeitg., VI. 33. 19. (1887).

Wenigeri MEIG., S. B., V. 345. 51. t. L. f. 4. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 460. 4. [*Terellia*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2258. 53. [*Tephritis*] (1847).

- cornuta** FABR., Entom. syst., IV. 357. 186. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 209. 28. [*Scatophaga*] (1805); FALL., Dipt. Succ. Ortalid., 4. Europa centr. et sept.
1. [*Tephritis*] (1820); MEIG., S. B., V. 318. 12. (1826); CURTIS, Brit. Entom., No. 241. [*Tephritis*] (1823—40); MACQ., Suit. à Buff., II. 468. 30. [*Tephritis*] (1835); WALK., Entom. Mag., III. 67. f. 8. [*Tephritis*] (1836); LW., Germ. Zeitschr., V. 338. 16. (1844) et Linn. entom., I. 499. 16. (1846); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2188. 14. (1847); BOIE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 327. 10. (1847) et IX. 81. 2. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 205. 18. (1853); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 660. 42. (1858); LW., Trypetid., 57. 9. t. VIII. f. 4. (1862); SCHIN., F. A., II. 129. (1864); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 31. 1. [*Ceriocera*] (1870); KALTENB., Pflanzenf., 386. 51. (1872).
- X **cylindrica** ROB.-DESV., Myod., 767. 4. [*Tephritis*] (1830); LW., Trypetid., 53. 3. t. VII. f. 2. (1862); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 36. 2. (1870).
? **arctii** WALK., Entom. Mag., III. 68. [*Tephritis*] (1836); LW., Germ. Zeitschr., V. 330. t. I. f. 10. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2182. 10. [*Tephritis*] (1847); INCHBALD, The Entom. London, 217—222. (1882).
dorsalis MACQ., Suit. à Buff., II. 407. 27. [*Tephritis*] (1835); MEIG., S. B., VII. 354. 70. (1838).
onotrophes BOUCHÉ, LW., Germ. Zeitschr., V. 331. (1844) et Linn. entom., I. 498. 12. (1846); BOIE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 327. 8. (1847) et IX. 82. 4. (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 13. (1848); FRFLD., Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss., XXII. 539, 551. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 663. 52. (1858); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 163, 164. (1861) et XII. 214. (1863); SCHIN., F. A., II. 128. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 370. 23 et 372. 14 et 380. 60, 387. 60. (1872); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 89. (1883); MTK, Wien. entom. Zeitg., XV. 108. 48. (1896).
solstitialis PANZ., Fauna Germ., CIII. 22. (1809).
- cynarac** ROND., Prodr., VII. Tephrit. 41. 12. (1870).
Dejeannii ROB.-DESV., Myod., 764. 2. [*Sitarea*] (1830).
dentata LW., Germ. Zeitschr., V. 425. 78. (1844) et Trypetid., 63. 16. (1862); SCHIN., F. A., II. 134. (1864).
serratulae MEIG., S. B., V. 346. 53. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 459. 1. [*Terellia*] (1835).
dispar ZETT. = **colon** MEIG.
- X **distans** LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 373. t. I. f. 10. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 661. 46. (1858); LW., Trypetid., 55. 6. t. VIII. f. 1. (1862).
dorsalis ROB.-DESV. = **jaceae** ROB.-DESV.
dorsalis MACQ., MEIG. = **cylindrica** ROB.-DESV.
exacheta ROND. = **hexacheta** LW.
- X **falcata** SCOP., Entom. carn., 330. 886. [*Musca*] (1763); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 660. 43. (1858) et F. A., II. 127. (1864); Europa centr. et mer.

Lw., Trypetid., 54. 5. t. VII. f. 4. (1862); ROND., Prodr., VII. Tephritid. 39. 9. (1870).

intermedia FRFLD., Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss., XXII. 547. f. 7. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 661. 44. (1858); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 215. (1863); KALTENB., Pflanzenf., 388. 8. (1872).

lappae MEIG., S. B., VI. 318. 11. (1826); WALK., Entom. Mag., III. 67. f. 9. [*Tephritis*] (1836).

octopunctata MACQ., Suit. à Buff., II. 466. 3. (1835); MEIG., S. B., VII. 354. 68. (1838); Lw., Germ. Zeitschr., V. 338. t. I. f. 13. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2187. 13. [*Tephritis*] (1847); KALTENB., Pflanzenf., 388. 6. (1872).

punctata var. SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 474. 963. [*Musca*] (1781) et Fauna Boica, III. 2510. [*Trupanea*] (1803); MEIG., S. B., V. 347. 55. (1826); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 39. 8. (1870). *succinea* O. COSTA, Act. accad. Napoli, 13. t. II. f. 5. (1837); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 38. 7. (1870).

flavescens FABR., Entom. syst. Suppl., 565. 156. [*Musca*] (1798); Africa sept. Syst. Anth., 319. 15. [*Tephritis*] (1805) et 276. 18. [*Dacus*] (1805); WIED., Ausserereurop. zweifl. Ins., II. 492. 25. (1805).

✕ *florescentiae* L., Syst. Nat., X. 601. 99. (1758); Fauna Suec., II. 462. 1880. (1761) et Syst. Nat., XII. 999. 128. [*Musca*] (1767); FALL., Dipt. Suec. Ortolid., 7. 9. [*Tephritis*] (1820); MEIG., S. B., 321. 16. t. XLVIII. f. 25. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 468. 29. [*Tephritis*] (1835); WALK., Entom. Mag., III. 63. 3. fig. 5. [*Terellia*] (1836); Lw., Germ. Zeitschr., V. 338. t. I. f. 15. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2210. 26. [*Tephritis*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 201. 8. (1853); Lw., Trypetid., 59. 11. t. IX. f. 2. (1862); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 41. 13. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 381. 70. (1872); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 65. (1873).

punctata FALL., Acta Holm., 157. 12. [*Tephritis*] (1814).

ruficauda FABR., Entom. syst., IV. 353. 169. [*Musca*] (1794) et Syst. Anth., 276. 17. [*Dacus*] (1805); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 664. 54. (1858); FRFLD., Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss., XXII. 546. (1858) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 163. (1861) et XIII. 216. (1863); SCHIN., F. A., II. 132. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 379. 57. (1872).

↓ *fuscicornis* Lw., Germ. Zeitschr., V. 420. (1844); Linn. entom., I. 528. 76. (1846) et Trypetid., 61. 13. (1862); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 43. 16. (1870). Europa mer., Africa sept.

gallens MACQ., Suit. à Buff., II. 460. 2. [*Terellia*] (1835).

gracilipes Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VI. 90. (1862).

Hebe NEWM., Entom. Mag., I. 506. (1833).

hexachaeta Lw., Trypetid., 53. 2. (1862).

evacheta ROND., Prodr., VII. Tephrit. 36. 3. (1870).

immacilata MACQ., Suit. à Buff., II. 467. 24. (1835); MEIG., S. B., VII. 354. 69. (1838). Aegyptus. Britannia. Italia, Silesia. Gallia.

- impunctata** ROB.-DESV., 767. 5. [*Tephritis*] (1830). Gallia.
- incompleta** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, p. 135. 219. (1903). Aegyptus.
- intermedia** FRFLD., SCHIN., KALTENB. = **falcata** SCOP.
- jaceae** ROB.-DESV., Myod., 766. 1. [*Tephritis*] (1830); DUF., Ann. Soc. Entom. Fr., 48. (1857); LW., Trypetid., 52. 1. t. VII. f. 1. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 215. (1863); SCHIN., F. A., II. 126. (1864); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 38. 6. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 387. 59. (1872). Europa.
- arctii** MEIG., S. B., V. 317. 10. t. XLVIII. f. 28. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 467. 25. [*Tephritis*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 236. 10. (1902).
- dorsalis** ROB.-DESV., Myod., 766. 2. [*Tephritis*] (1830).
- punctata** LW., Germ. Zeitschr., V. 328. t. I. f. 9. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2186. 12. [*Tephritis*] (1847).
- pusilla** ROB.-DESV., Myod., 766. 3. [*Tephritis*] (1830).
- japonica** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 485. 14. (1830). Japonia.
- lappae** CEDERH., Prodr., 319. t. III. K. [*Musca*] (1798); LW., Germ. Zeitschr., V. 334. t. I. f. 12. (1844) et Linn. entom., I. 499. 14. (1846); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 663. 51. (1858); LW., Trypetid., 56. 7. t. VIII. f. 2. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 167. (1861) et XIII. 214. (1863); SCHIN., F. A., II. 130. (1864); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 40. 10. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 382. 12. (1872); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 64. (1873). Europa centr.
- tussilaginis** WALK., Entom. Mag., III. 68. f. 10. (1836).
- lappae** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2184. 11. [*Tephritis*] (1847). Europa sept.
- lappae** MEIG., WALK. = **falcata** SCOP.
- laticauda** KALTENB. = **acuticornis** LW.
- longicauda** MEIG., ROND. = **acuticornis** LW.
- loricata** ROND., Prodr., VII. Tephrit. 37. 4. (1870). Italia.
- lurida** LW., Germ. Zeitschr., V. 331. (1844) et Linn. entom., I. 498. t. III. f. 13. (1846); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 661. 47. (1858); LW., Trypetid., 54. 4. t. VII. f. 3. (1862). Sicilia.
- luteola** ROB.-DESV., WIED. = **serratulae** L. Asia min.
- meridionalis** A. COSTA, Ann. scientif., I. 85. 9. (1854). Italia.
- nebrodesia** ROND., Prodr., VII. Tephrit. 42. 15. (1870). Italia.
- nebulosa** MACQ., MEIG. = **colon** MEIG.
- nigricoma** LW., FRFLD., KALTENB. = **colon** MEIG.
- nigrofemorata** MEIG., S. B., VII. 355. 74. (1838). Gallia.
- octopunctata** MACQ., LW., ZETT., MEIG., KALTENB. = **falcata** SCOP.
- onotrophes** LW., SCHOLTZ, BOUCHÉ, FRFLD, BRAUER, MİK = **cylindrica** R.-D.
- pallens** WIED., MEIG. = **serratulae** L.
- pallens** MACQ. = **fuscicornis** LW.
- palpata** ROB.-DESV. = **serratulae** L.
- picta** MEIG., MACQ., ZETT., LW., MİK = **colon** MEIG.
- plicata** SCHRANK, Fauna Boica, III. 2518. [*Trupanea*] (1803); MEIG., S. B., V. 349. 58. (1826). Bavaria.
- plagiata** DAHLBG., Kgl. Vetensk. Akad. Handl., 162. (1851); ZETT., Europa sept.

Dipt. Scand., XI. 4329. 11—12. (1852); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 661. 48. (1858).

planiscutellata BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, p. 136. 220. (1903). Aegyptus.

punctatu LW. = **jaceae** ROB.-DESV.

punctata SCHRANK, MEIG., ROND. = **falcata** SCOP.

punctata FALL. = **florescentiae** L.

pusilla ROB.-DESV. = **jaceae** ROB.-DESV.

quadratula LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. Russia. 13. 3. (1869).

ruficauda FABR., SCHIN., FRFLD. = **florescentiae** L.

scorzonerae ROB.-DESV., Myod., 764. 1. [*Sitarea*] (1830).

Gallia.

✕ **serratulae** L., Syst. Nat., X. 1. 600. 90. [*Musca*] (1758); L., Fauna Suec., II. 461. 1871. (1761) et Syst. Nat., XII. 997. 118. [*Musca*] (1766); FABR., Spec. ins., II. 453. 96. [*Musca*] (1781); Entom. syst., IV. 356. 182. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 278. 27. [*Dacus*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Orthalid., 14. 22. [*Tephritis*] (1820); WALK., Entom. Mag., III. 62. f. 1. [*Terellia*] (1836); LW., Germ. Zeitschr., V. 419. t. II. f. 70. (1844) et Linn. entom., I. 522. 75. (1846); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2256. 52. [*Tephritis*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 201. 7. (1853); LW., Trypetid., 62. 15. t. X. f. 1. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 216. (1863); SCHIN., F. A., II. 134. (1864); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 44. 18. (1870); WALK., The Entom., No. 92. 345. 88. (1871); KALTENB., Pflanzenf., 265. 10 et 379. 54. (1872).

Aegyptus,
Europa centr.
et mer.

luteola ROB.-DESV., Myod., 759. 2. [*Terellia*] (1830); ? WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 491. 22. (1830).

pallens WIED., Analect. entom., 54. 120. (1824); MEIG., S. B., V. 347. t. L. f. 5. (1826); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 502. 40. (1830).

palpata ROB.-DESV., Myod., 759. 1. [*Terellia*] (1830).

serratulae MEIG., MACQ. = **dentata** LW.

solstitialis PANZ. = **cylindrica** ROB.-DESV.

sphondylii SCHRANK, Fauna Boica, III. 2523. [*Trupanea*] (1803); MEIG., S. B., V. 351. 63. (1826). Germania.

steropea ROND., Prodr., VII. Tephrit. 35. 1. (1870).

Italia.

stigmataspis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 478. 3. (1830); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 661. 45. (1858). Russia mer.

succinea O. COSTA, ROND. = **falcata** SCOP.

syllibi ROND., Prodr., VII. Tephrit. 44. 19. (1870).

Italia.

tanacetii SCHRANK, Fauna Boica, III. 2511. [*Trupanea*] (1803); MEIG., S. B., V. 348. 56. (1826). Germania.

tussilaginis FABR., Syst. entom., II. 787. 78. [*Musca*] (1775); Spec. Ins., II. 454. 10. (1781); Mantissa Ins., II. 353. 122. [*Musca*] (1787); Entom. Syst., IV. 359. 193. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 277. 24. [*Dacus*] (1805); MEIG., S. B., V. 319. t. XLVIII. f. 27. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 464. 13. [*Tephritis*] (1835); LW., Germ. Zeitschr., V. 332. t. I. f. 11. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2180.

Europa centr.
et mer.

2. [*Tephritis*] (1847); BOIE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 328. 26. (1847) et IX. 83. 7. (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 13. (1848); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 662. 50. (1858); FRFLD., Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss., XXII. 538 et 543. (1856); Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 167. (1861) et XIII. 214. (1863); SCHIN., F. A., II. 130. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 370. 20 et 381. 73. (1872).

acanthi SCHRANK, Fauna Boica, III. 142. [*Trupanea*] (1803).

arctii DEG., Ins., VI. 21. t. II. f. 6—14. [*Musca*] (1776); ROB.-DESV., Myod., 767. 6. [*Tephritis*] (1830); LW., Linn. entom., I. 490. (1846); WALK., Ins. Brit., II. 205. 19. (1853); LW., Trypetid., 56. 8. t. VIII. f. 3. (1862); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 40. 11. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 380. 60. (1872); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 64. (1873).

vicina MACQ., Suit. à Buff., II. 465. 20. [*Tephritis*] (1835); MEIG., S. B., VII. 354. 67. (1838).

tussilaginis WALK. = *lappae* CEDERHJELM.

varia LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. 13. 4. (1869).

Rhodus.

vicina MACQ., MEIG. = *tussilaginis* FABR.

virens LW., Linn. entom., I. 523. (1846); FRFLD., Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss., XXII. 554. (1856); LW., Trypetid., 63. 17. (1862); SCHIN., F. A., II. 134. (1864); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 45. 20. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 387. 58. (1872).

Germania,

Italia,

Aegyptus.

vittata ROND., Prodr., VII. Tephrit. 37. 5. (1870).

Italia.

Wenigeri MEIG., MACQ., ZETT. = *colon* MEIG.

Winthemi MEIG., S. B., V. 320. t. XLVIII. f. 26. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 468. 28. [*Tephritis*] (1835); LW., Germ. Zeitschr., V. 341. t. I. f. 14. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2212. 27. [*Tephritis*] (1847); BOIE, Stettin. entom. Zeitg., IX. 83. 8. (1848); SCHIN., Verh. zool.-bot. ges. Wien, VIII. 664. 53. (1858); LW., Trypetid., 58. 10. t. IX. f. 1. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 216. (1863); SCHIN., F. A., II. 133. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 379. 55. (1872).

Europa centr.

et sept.

Ensina

ROB.-DESV., Myod., 751. (1830).

asteris HALID. = *sonchi* L.

chrysanthemi ROB.-DESV. = *sonchi* L.

decisa WOLLAST., List of dipt. of Maderia, Ann. Mag. of nat. Hist., I. Madeira. I. p. 261. (1858).

doronici ROB.-DESV. = *sonchi* L.

herbarum ROB.-DESV. = *sonchi* L.

linariae ROB.-DESV. = *sonchi* L.

obsoleta MEIG. = *sonchi* L.

pratensis ROB.-DESV. = *sonchi* L.

scorzonerae ROB.-DESV. = *sonchi* L.

X *sonchi* L., Syst. Nat., XII. 998. 121. [*Musca*] (1766); FALL., Act. Europa. Holm., 23. [*Tephritis*] (1814) et Dipt. Suec. Ortalid., 14. 23. [*Tephritis*] (1820); MEIG., S. B., V. 345. 50. [*Tephritis*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 474. 4. (1835); WALK., Entom. Mag., III. 60. f. 1. (1836); ZETT., Ins. Lapp., 746. 10. [*Tephritis*] (1838); Lw., Germ. Zeitschr., V. 426. t. II. f. 71. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2260. 55. [*Tephritis*] (1847); BOIE, Stettin. entom. Zeig., VIII. 328. 25. (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 13. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 200. 6. [*Trypeta*] (1853); FRFLD., Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss., XXII. 553. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 665. 58. (1858); Lw., Trypetid., 46. 1. t. X. f. 2. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 167. (1861) et XIII. 217. (1863); SCHIN., F. A., II. 144. (1864); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 46. 1. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 322. 2 et 388. 7 et 400. 4. [*Trypeta*] (1872); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 89. (1883).

asteris HALID., Ann. nat. Hist., II. 186. [*Tephritis*] (1858).

chrysanthemi ROB.-DESV., Myod., 751. 1. (1830).

doronici ROB.-DESV., Myod., 753. 6. (1830).

herbarum ROB.-DESV., Myod., 752. 2. (1830).

linariae ROB.-DESV., Myod., 753. 4. (1830).

obsoleta MEIG., S. B., V. 345. 50. [*Trypeta*] (1826).

pratensis ROB.-DESV., Myod., 752. 3. (1830).

scorzonerae ROB.-DESV., Myod., 753. 5. (1830).

vacillans WOLLAST., List of dipt. of Madeira, Ann. Mag. of nat. Hist., I. Madeira. Vol. I. p. 117. (1858).

Macrotrypeta

PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXVI. (1891).

ortalidina PORTSCH., Horae Soc. Entom. Ross., XXVI. 224. (1891). Sibiria.

Myopites

BRÉBISSE, Mém. de la Soc. Linn. de Normand., 1826—27.

Stylia p. p., ROB.-DESV., Myod., 755. (1830).

bidentis ROB.-DESV., Myod., 755. 3. [*Stylia*] (1830). Gallia.

Blotii BRÉBISSE, Mém. Soc. Linn. de Normand., (1826); MACQ., Suit. Gallia.

à Buff., II. 474. 7. [*Ensina*] (1835); MEIG., S. B., VII. 356. 18.

[*Trypeta*] (1838); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 665. 57.

(1858); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 69. (1873).

Blotii ROND. = *longirostris* Lw.

Frauenfeldi SCHIN., F. A., II. 142. (1864). Dalmatia.

Blotii FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 384. (1861); ROND.,

Prodr., VII. Tephrit., 11. 2. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 334.

23. [*Trypeta*] (1872).

- inulae** v. Ros., Württemb. Corrb., I. 60. [*Trypeta*] (1840); Lw., Linn. entom., I. 500. t. III. f. 14. [*Trypeta*] (1846); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 665. 55. (1858); Lw., Trypetid., 65. 1. t. VI. f. 3, 4. (1862); SCHIN., F. A., II. 141. (1864); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 12. 3. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 335. 31. [*Trypeta*] (1872); FITCH., The Entom. London, XV. 138. (1882).
 ? *stylata* FABR., Entom. syst., IV. 396. 11. (1794) et Syst. Antl., 282. 14. [*Stomoxys*] (1805); FRFLD., Sitzungsber. d. K. akad. d. Wiss., XXII. 548. (1856).
- jasoniae** DUF. = **limbardae** SCHIN.
- limbardae** SCHIN., F. A., II. 142. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 335. 24. [*Trypeta*] (1872).
jasoniae DUF., Ann. Soc. entom. Fr., 4. série II. p. 143. t. II. f. 4. (1864)²; Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. 5. (1869); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 89. (1883).
stylata ROND., Prodr., VII. Tephrit. 11. 1. (1870).
- longirostris** Lw., Linn. entom., I. 502. t. III. f. 15. [*Trypeta*] (1846); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 548. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 665. 56. (1858); Lw., Trypetid., 66. 2. (1862); KALTENB., Pflanzenf., 335. 26. [*Trypeta*] (1872).
Blotii ROND., Prodr., VII. Tephrit. 11. 2. (1870).
- maculata** ROB.-DESV., Myod., 754. 1. [*Stylia*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 474. 5. [*Ensina*] (1835); MEIG., S. B., VII. 355. 76. [*Trypeta*] (1838).
mentharum ROB.-DESV., Myod., 754. 2. [*Stylia*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 474. 6. [*Ensina*] (1835); MEIG., S. B., VII. 356. 77. [*Trypeta*] (1838); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 208. (1876).
- sardoa** A. COSTA, Atti accad. Napoli. Mém., I. 40. (1882).
- stylata* FABR. = **inulae** v. Ros.?
- stylata* ROND. = **limbardae** SCHIN.
- tenella** FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 220. (1863); KALTENB., Pflanzenf., 335. 28. [*Trypeta*] (1872).
- variofasciata** BECK., Mittl. Zool. Mus. Berlin, p. 132. 206. (1903).

Europa centr.
 et mer.

Sicilia.
 Gallia.
 Italia.

Europa centr.
 Aegyptus.

Urophora > Tephritis Lat. 1805

ROB.-DESV., Myod., 769. 12. (1830).

- affinis** FRFLD., Berlin. k. k. Akad., XXII. 541. f. 8. [*Trypeta*] (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 656. 32. (1858); Lw., Trypetid., 72. 9. (1862); SCHIN., F. A., II. 138. (1864); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 16. 3. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 387. 54. (1872).
- algira** MACQ., Dipt. exot., II. 3 part. 221. 1. (1843); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 497. 254. [*Tephritis*] (1849).
- aprica** FALL., Dipt. Suec. Ortolid., 7. 7. [*Tephritis*] (1820); MEIG., S. Europa.

B., V. 329. t. XLIX. f. 13. [*Trypeta*] (1826); Lw., Germ. Zeitschr., V. 350. 30. [*Trypeta*] (1844) et Linn. entom., I. 508. 30. [*Trypeta*] (1846); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2206. 24. [*Tephritis*] (1847); FRFLD., Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss., XXII. 543. (1856); WALK., Ins. Brit., II. 206. 21. (1853); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 655. 30. (1858); Lw., Trypetid., 73. 10. t. XII. f. 1. (1862); SCHIN., F. A., II. 140. (1864).

pugionata WALK., Entom. Mag., III. 70. fig. 13. (1836).

solstitialis FABR., Spec. ins., II. 454. 103. (1781); Ent. syst., IV. 359. 195. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 321. 25. [*Tephritis*] (1805).

cardui L., Syst. Nat., X. 600. 97. (1758); Fauna Suec., II. 461. 1876. Europa.

(1761) et Syst. Nat., XII. 998. 126. [*Musca*] (1766); FABR., Spec. ins., II. 454. 100. (1781) et Entom. syst., IV. 359. 191. [*Musca*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 145. 2514. [*Trupanea*] (1803); FABR., Syst. Antl., 321. 21. [*Tephritis*] (1805); MEIG., S. B., V. 326. 23. t. XLIX. f. 9. [*Trypeta*] (1826); HAMMERSCHMIDT, Isis, 378. (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 456. 2. (1835); WALK., Entom. Mag., III. 69. fig. 12. (1836); Lw., Germ. Zeitschr., V. 352. 27. [*Trypeta*] (1844); GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., II. 3. 86. (1845); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2201. 21. [*Tephritis*] (1847); WESTW., Gard. chronicle, No. 50. p. 315, 318. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 206. 22. [*Trypeta*] (1853); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 543. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 653. 26. (1858); Lw., Trypetid., 74. 12. t. XII. f. 3. (1862); SCHIN., F. A., II. 139. (1864); GIRAUD, Ann. Soc. entom. Fr., 477. (1869); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 20. 12. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 379. 59. [*Trypeta*] (1872); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 89. (1883); MIK, Wien. entom. Zeitg., XVI. 155. (1897).

flexuosa GERMAR, Fauna, II. 25. [*Scatophaga*] (1817).

sonchi ROB.-DESV., Myod., 771. 6. (1830).

cardui ROB.-DESV. = **venabulata** ROND.

centaureae ROND. = **eriolepidis** Lw.

Christophi Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7. 8. 14. Rossia mer. 5. (1869).

cirsii SCHRANK = **stylata** FABR.

congrua Lw., Trypetid., 74. 11. t. XII. f. 2. (1862); SCHIN., F. A., II. 138. (1864); FR.-LÖW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 949. (1866); KALTENB., Pflanzenf., 380. 66. [*Trypeta*] (1872).

cuspidata MEIG., S. B., V. 328. 25. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 457. 8. (1835); GOUREAU, Metamorp. Ann. Soc. entom. Fr., 83. (1845); KALTENB., Pflanzenf., 379. 52. [*Trypeta*] (1872); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 209. (1876); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 238. 25. (1902).

dauci FABR. = **solstitialis** L.

Dejeanii ROB.-DESV., Myod., 772. 8. (1830).

Gallia ?

- Dzieduszyckii** FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 498. 4. t. XII. f. 21. (1867). Galicia.
- X **eriolepidis** LW., N. Beitr., IV. 52. [*Trypeta*] (1856); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 545. (1856); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 654. 29. (1858); LW., Trypetid., 70. 6. t. XI. f. 2. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 166. (1861) et XIII. 216. (1863); SCHN., F. A., II. 140. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 380. 64 et 387. 55. (1872). Europa centr. et mer.
- X ^{*fasciata* MEIG.}
femorialis ROB.-DESV., Myod., 770. 3. (1830). Gallia.
- flexuosa** GERMAR = **cardui** L.
- hastata** FABR. = **solstitialis** L.
- Jacobeae** PANZ., FALL. = **stylata** FABR.
- jaculata** ROND., Prodr., VII. Tephrit. 18. 7. (1870). Italia.
- lejura** ROND. = **macrura** LW.
- leucacanthi** SCHRANK = **solstitialis** L.
- X **macrura** LW., Stettin. entom. Zeitg., XVI. 40. [*Trypeta*] (1855); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 549. (1856); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 654. 28. (1858); LW., Trypetid., 69. 4. t. XI. f. 1. (1862); SCHN., F. A., II. 137. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 380. 69 et 382. 13 et 387. 61. [*Trypeta*] (1872); FITCH., The Entom., XV. 138. (1882). Europa centr. et mer., Aegyptus.
- lejura** ROND., Prodr., VII. Tephrit. 19. 10. (1870).
- maura** FRFLD., Berl. k. k. Akad., XXII. 550. fig. 4. [*Trypeta*] (1856) et Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 551. (1856); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 657. 35. (1858); LW., Trypetid., 69. 3. t. X. f. 4. (1862); SCHN., F. A., II. 135. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 335. 25. (1872). Germania.
- mauritanica** MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 286. 8. (1850). Algeria.
- placida** MÜLLER, Prodr., 2074. (?). Bavaria.
- pugionata** MEIG. = **solstitialis** L.
- pugionata** WALK. = **aprica** FALL.
- X **quadrifasciata** MEIG., S. B., V. 331. 29. t. XLIX. f. 3. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 457. 10. (1835); LW., Germ. Zeitschr., V. 360. t. I. f. 28. [*Trypeta*] (1844); GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., II. 3. 86. (1845); LW., Linn. entom., I. 508. 31. [*Trypeta*] (1846); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 14. (1848); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 552. (1856); DUF., Ann. Soc. entom. Fr., 53. (1857); SCHN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 657. 34. (1858); LW., Trypetid., 75. 13. t. XII. f. 4. (1862); SCHN., F. A., II. 139. (1864); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 20. 13. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 386. 50. [*Trypeta*] (1872). Europa centr. et mer., Aegyptus.
- Reaumurii** ROB.-DESV., Myod., 770. 4. (1830). Gallia.
- scutellata** ROND., Prodr., VII. Tephrit. 21. 14. (1870); BEZZI, J. ditteri del Trentino, 126. 8. (1892). Italia.
- sibynata** ROND., Prodr., VII. Tephrit. 18. 8. (1870). Italia.
- X **solstitialis** L., Syst. Nat., X. 601. 98. (1758); Fauna Suec., II. 1879. Europa centr. et mer.

(1761) et Syst. Nat., XII. 999. 127. [*Musca*] (1766); CEDERHJELM, Prodr., 318. 1006. [*Musca*] (1798); FALL., Dipt. Suec. Ortolid., 6. 5. [*Tephritis*] (1820); MEIG., S. B., V. 324. t. XLIX. f. 10. [*Trypeta*] (1826); ROB.-DESV., Myod., 769. 2. (1830); HAMMERSCHMIDT, Isis, 378. (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 457. 9. (1835); LW., Germ. Zeitschr., V. 355. t. I. f. 25, 26. [*Trypeta*] (1844); GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., II. 3, 83. (1845); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2204. 23. [*Tephritis*] (1847); BOIE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 327. 17. (1847) et IX. 83. 10. (1848); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 540. 553. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 655. 31. (1858); LW., Trypet., 72. 8. t. XI. f. 4. (1862); SCHIN., F. A., II. 136. (1864); FR.-LÖW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 949. (1866); ROND., Prodr., VII. Tephrit., 17. 6. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 379. 52. [*Trypeta*] (1872).

dauci FABR., Mantissa Ins., II. 353. 118. [*Musca*] (1787); Entom. Syst., IV. 358. 187. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 227. 22. [*Dacus*] (1805).

hastata FABR., Syst. Antl., 276. 15. [*Dacus*] (1805).

leucacanthi SCHRANK, Fauna Boica, III. 141. 2507. [*Trupanca*] (1803).

pugionata MEIG., S. B., V. 330. 28. t. XLIX. f. 11. [*Trypeta*] (1826).

solstitialis FABR. = *aprica* FALL.

solstitialis SCHRANK, WALK. = *stylata* FABR.

sonchi ROB.-DESV. = *cardui* L.

spoliata HALD., Ann. nat. Hist., II. 186. [*Trypeta*] (1839); LW., Trypetid., 68. 2. (1862). Britannia.

stigma LW., Stettin. entom. Zeitg., I. 156. 1. [*Trypeta*] (1840); Germ. Zeitschr., V. 438. 80. t. II. f. 72. [*Trypeta*] (1844) et Linn. entom., I. 524. t. III. f. 19. [*Trypeta*] (1846); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2262. 56. [*Trypeta*] (1847); BOIE, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 15. (1848); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 651. 18. (1858); LW., Trypetid., 67. 1. t. X. f. 3. (1862); SCHIN., F. A., II. 135. (1864); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 153. 4. (1868); KALTENB., Pflanzenf. 339. 15., 348. 46 et 379. 53. [*Trypeta*] (1872). Europa centr. et sept.

unimaculata v. Ros., Württemb. Corbl., I. 60. [*Trypeta*] (1840); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 13. 1. (1870); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 9. pag. 55. (1902).

stylata FABR., Syst. entom., 785. 66. (1775); Entom. Syst., IV. 353. 168. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 275. 13. [*Dacus*] (1805); MEIG., S. B., V. 327. t. XLIX. f. 12. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 457. 7. (1835); LW., Germ. Zeitschr., V. 353. t. I. f. 21. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2202. 22. [*Tephritis*] (1847); BOIE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 327. 16. (1847) et IX. 83. 11. (1848); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 553. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 656. 33. (1858); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 167. (1861) et XIII. Europa centr. et sept.

217. (1863); LW., Trypetid., 71. 7. t. XI. f. 3. (1862); SCHIN., F. A., II. 137. (1864); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 16. 4. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 380. 61. [*Trypeta*] (1872); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 65. (1873).
- cirsii* SCHRANK, Fauna Boica, III. 140. 2505. [*Trupanea*] (1803).
- Jacobeae* PANZ., Fauna Germ., XCVII. 22. [*Musca*] (1806); FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 6. 6. [*Tephritis*] (1820).
- solstitialis* SCHRANK, Fauna Boica, III. 2506. (1803); WALK., Entom. Mag., III. 71. fig. 14. (1836) et II. 205. 20. (1853).
- terebrans** LW., Stettin. entom. Zeitg., XI. 53. t. I. f. 2. [*Trypeta*] Gallia mer. (1850); FRFLD., Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss., XXII. 554. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 654. 27. (1858); LW., Trypetid., 70. 5. (1862); KALTENB., Pflanzenf., 380. 68. [*Trypeta*] (1872).
- unimaculata* v. ROS., ROND. = **stigma** LW.
- variabilis** LW., Zeitschr. f. d. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. 15. 6. Rossia. (1869).
- venabulata** ROND., Prodr., VII. Tephrit. 17. 5. (1870). Italia.
- cardui* ROB.-DESV. (nec FALL.), Myod., 757. [*Oxyphora*] (1830).
- veruata** ROND., Prodr., VII. Tephrit. 18. 9. (1870). Italia.
- vulcanica** ROND., Prodr., VII. Tephrit. 15. 2. (1870). Italia.

Sphenella

ROB.-DESV., Myod., 774. (1830)♦

arcuata SCHRANK, ROND. = **marginata** FALL.

linariae ROB.-DESV. = **marginata** FALL.

- ✕ **marginata** FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 7. 8. [*Tephritis*] (1820); MEIG., S. B., V. 323. t. XLIX. f. 15. [*Trypeta*] (1826); WALK., Entom. Mag., III. 73. fig. 18. (1836); MACQ., Suit. à Buff., II. 465. 18. [*Tephritis*] (1835); LW., Germ. Zeitschr., V. 344. t. I. f. 17. [*Trypeta*] (1844) et Linn. entom., I. 499. 20. (1846); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2190. 15. [*Tephritis*] (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 13. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 202. 10. [*Trypeta*] (1853); FRFLD., Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss., XXII. 539. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 667. 59. (1858); LW., Trypetid., 76. 1. t. XIII. f. 5. (1862); SCHIN., F. A., II. 152. [*Tephritis*] (1864); KALTENB., Pflanzenf., 364. 31 et 387. 56. [*Trypeta*] (1872).
- arcuata* SCHRANK, Fauna Boica, III. 142. 2508. [*Trupanea*] (1803); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 47. 1. (1870).
- linariae* ROB.-DESV., Myod., 774. 1. (1830).

Carpotricha > Noeeta Grav.

Lw., Trypetid., 77. XVII. (1862).

Acinia MACQ., p. p., (1835).

Ditricha ROND., Prodr., VII. Ortalid. 26. (1871).

Ditryca ROND., Prodr., I. 113. (1856).

Hoplocheta ROND., Prodr., VII. Tephrit. (1870).

Noeeta ROB.-DESV., Myod., 778. (1830).

Oplocheta ROND., Prodr., I. 113. (1856).

alpestris POKORNY, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 33. t. VII. Tirolis.
f. 5. (1887).

brunnica ROB.-DESV. = **guttularis** MEIG.

capitata FALL. = **guttularis** MEIG.

flavipes ROB.-DESV. = **guttularis** MEIG.

guttularis MEIG., S. B., V. 341. 44. [*Trypeta*] (1826); CURTIS, Trans. Europa centr.
of entom. Soc., III. série, II. 46. (1829); MACQ., Suit. à Buff., II. et sept.

471. 8. [*Acinia*] (1835); WALK., Entom. Mag., III. 80. 1. f. 28.

[*Noeeta*] (1836); LW., Germ. Zeitschr., V. 404. t. II. f. 56. [*Trypeta*]

(1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2248. 48. [*Tephritis*] (1847); WALK.,

Ins. Brit., II. 202. 11. (1853); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,

VIII. 684. 121. (1858); LW., Trypetid., 77. 1. t. XIII. f. 2. (1862);

SCHIN., F. A., II. 145. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 33. 8.

[*Ditricha*] (1871); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 89. (1883).

? *brunnica* ROB.-DESV., Myod., 778. 2. [*Noeeta*] (1830).

capitata FALL., Dipt. Suec. Suppl., 14. 16—17. [*Tephritis*] (1826).

? *flavipes* ROB.-DESV., Myod., 778. 1. [*Noeeta*] (1830).

guttulosa LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. 15. Hispania.
7. (1869) et Berlin. entom. Zeitschr., XIV. 143. (1870).

lineata MACQ., MEIG. = **pupillata** FALL.

pardalina MEIG. = **pupillata** FALL.

pavonia PORTSCH., Fauna Dipt. d. la Russie, 34. t. II. f. 6—7. (1875). Rossia.

pseudoradiata BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 61. 127. t. I. Sibiria sept.
f. 39. (1900). et occid.

pupillata FALL., Act. Holm., 171. 18. [*Tephritis*] (1814) et Dipt. Suec. Europa centr.
Ortalid., 11. 17. [*Tephritis*] (1820); MEIG., S. B., V. 341. 45. [*Try-* et sept.

peta] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 471. 9. [*Acinia*] (1835);

ZETT., Ins. Lapp., 745. 8. [*Tephritis*] (1838) et Dipt. Scand., VI.

2246. 47. [*Tephritis*] (1847); BOIE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 327.

22. (1847) et IX. 83. 9. (1848); FRIED., Sitzungsber. d. Kais. Akad.

d. Wiss., XXII. 552. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,

VIII. 684. 119. (1858); FRIED., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 165.

t. II. D. f. 1—4. (1861) et XIII. 217. (1863); LW., Trypetid., 78. 2.

t. XIII. f. 3. (1862); SCHIN., F. A., II. 147. (1864).

lineata MACQ., Suit. à Buff., II. 472. 12. [*Acinia*] (1835); MEIG.,

S. B., VII. 355. 72. [*Trypeta*] (1838).

- pardalina* MEIG., S. B., V. 342. 46. [*Trypeta*] (1826).
reticulata SCHRANK, Fauna Boica, III. 148. 2522. [*Trupanea*] (1803); LW., Germ. Zeitschr., V. 401. 63. t. II. f. 53. [*Trypeta*] (1844); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 59. 1. [*Hoplocheta*] (1870); KALTENB., Pflanzenf., 403. 35. [*Trypeta*] (1872).
reticulata SCHRANK, LW., ROND. = **pupillata** FALL.
strigilata LW., Stettin. entom. Zeitg., XVI. 40. [*Trypeta*] (1855); Graecia. SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 684. 120. (1858); LW., Trypetid., 79. 3. (1862); MIK, Wien. entom. Zeitg., XV. 241. 56. (1896).

Oxyphora

ROB.-DESV., Myod., 757. IV. (1830).

Acinia p. p., ROB.-DESV., Myod. (1830).

Forellia p. p., WALK., Entom. Mag., III. (1836).

Xyphosia ROB.-DESV., Myod. (1830).

- annulata** ROB.-DESV., Myod., 777. 4. [*Acinia*] (1830). Gallia.
arctii ROB.-DESV., Myod., 777. 3. [*Acinia*] (1830). Gallia.
arcuata FABR., PANZ. = **flava** GEOFFR.
arnicae FALL., MEIG., MACQ., WALK., ZETT. = **flava** GEOFFR.
arvensis ROB.-DESV., Myod., 763. 3. [*Xyphosia*] (1830). Gallia.
biflexa LW., Germ. Zeitschr., V. 403. t. II. f. 55. [*Trypeta*] (1844) et Linn. entom., I. 518. (1846); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 674. 81. (1858); LW., Trypetid., 84. 6. t. XV. f. 2, 3. (1862); SCHIN., F. A., II. 150. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 335. 29. [*Trypeta*] (1872). Germania.
cardui ROB.-DESV. = **Westermanni** MEIG.
cirsiorum ROB.-DESV. = **flava** GEOFFR.
claripennis ROB.-DESV., Myod., 778. 7. [*Acinia*] (1830). Gallia.
conspicua LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. 16. 8. (1869). Russia.
corniculata ZETT., Act. Holm., 84. 39. [*Tephritis*] (1819); FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 8. 11. [*Tephritis*] (1820); MEIG., S. B., V. 335. 34. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 469. 1. [*Acinia*] (1835); WALK., Entom. Mag., III. 75. 1. fig. 20. [*Acinia*] (1836); LW., Germ. Zeitschr., V. 373. t. 1. f. 31. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2216. 29. [*Tephritis*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 203. 14. [*Tephritis*] (1853); LW., Trypetid., 83. 5. t. XV. f. 1. (1862); SCHIN., F. A., II. 150. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid., 4. 1. [*Acinia*] (1871). Europa centr. et sept.
jaceae ROB.-DESV., Myod., 776. 1. [*Acinia*] (1830).
flava GEOFFR., Ins., II. 498. 12. [*Musca*] (1764); LW., Germ. Zeitschr., V. 363. 33. [*Trypeta*] (1844); BOIE, Stettin. entom. Zeitg., IX. 82. 6. (1848); FRFLD., Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss., XXII. 546. (1856); LW., Trypetid., 81. 3. t. XIV. f. 2, 3. (1862). Europa centr. et sept.

- arcuata* FABR., Spec. ins., II. 451. 86. (1781); Mantissa Ins., II. 352. 105. (1787); Entom. Syst., IV. 353. 170. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 277. 19. [*Dacus*] (1805); PANZ., Fauna Germ., XCVIII. 22. [*Musca*] (1806).
- arnicae* FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 8. 10. [*Tephritis*] (1820); MEIG., S. B., V. 333. 31. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 461. 1. [*Tephritis*] (1835); WALK., Entom. Mag., III. 64. [*Forellia*] (1836); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2213. 38. [*Tephritis*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 201. 9. [*Trypeta*] (1853).
- cirsiorum* ROB.-DESV., Myod., 762. 1. [*Xyphosia*] (1830).
- miliaria* SCHRANK, Enumer. Ins. Austr., 476. 968. [*Musca*] (1781); FRFLD., Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss., XXII. 673. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 672. 77. (1858) et F. A., II. 149. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 6. 3. [*Xyphosia*] (1871); KALTENB., Pflanzenf., 380. 62. [*Trypeta*] (1872).
- sphaerocephali* SCHRANK, Fauna Boica, III. 145. 2515. [*Trupanea*] (1803).
- insularis** WOLLASTON, Ann. Mag. of nat. Hist., I. 261. [*Acinia*] (1858). I. Madeira.
- jaccae* ROB.-DESV. = **corniculata** ZETT.
- lappae** ROB.-DESV., Myod., 763. 2. [*Xyphosia*] (1830). Gallia.
- miliaria* SCRANK, SCHIN., ROND. = **flava** GEOFFR.
- millefolii** ROB.-DESV., Myod., 777. 5. [*Acynia*] (1830). Gallia.
- miranda** WOLLAST., Ann. Mag. of nat. Hist., 261. [*Acinia*] (1858). I. Madeira.
- pediculariarum** ROB.-DESV., Myod., 776. 2. [*Acinia*] (1830). Gallia.
- plantaris** ROB.-DESV., Myod., 778. 6. [*Acinia*] (1830). Gallia.
- pyrethri** ROB.-DESV., Myod., 757. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 473. 3. [*Ensina*] (1835); MEIG., S. B., VII. 355. 75. [*Trypeta*] (1838). Gallia.
- Schefferi** FRFLD., Bericht. k. K. Akad., XXII. 552. f. 5. [*Trypeta*] (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 679. 107. (1858); LW., Trypetid., 80. 1. t. XIII. f. 4. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 217. (1863); SCHIN., F. A., II. 148. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 366. 3. [*Trypeta*] (1872). Austria.
- Schneideri** LW., N. Beitr., IV. 51. [*Trypeta*] (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 673. 78. (1858); LW., Trypetid., 82. 4. t. XIV. f. 4. (1862); SCHIN., F. A., II. 150. (1864). Silesia.
- sphaerocephali* SCHRANK = **flava** GEOFFR.
- valida** WOLLASTON, Ann. Mag. of nat. Hist., I. 261. [*Acinia*] (1858). I. Madeira.
- Westermanni** MEIG., S. B., V. 333. t. L. f. 6. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 461. 2. [*Tephritis*] (1835); WALK., Entom. Mag., III. 61. f. 2. (1836); LW., Germ. Zeitschr., V. 35. 34. [*Trypeta*] (1844) et Linn. entom., I. 503. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 672. 76. (1858); LW., Trypetid., 80. 2. t. XIV. f. 1. (1862); SCHIN., F. A., II. 150. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 5. 2. [*Acinia*] (1871); KALTENB., Pflanzenf., 364. 34. [*Trypeta*] (1872).
- cardui* ROB.-DESV., Myod., 757. 2. (1830).

Oxyna

ROB.-DESV., Myod., 755. III. (1830).

Campiglossa ROND., Prodr., VII. Ortalid. 49. (1870).

Euleia WALK., List of Dipt., IV. (1849).

absinthii FABR., Syst. Antl., 322. 30. [*Tephritis*] (1805); MACQ., Suit. Europa.

à Buff., II. 470. 6. [*Acinia*] (1835); WALK., Entom. Mag., III. 70.

[excl. fig.] [*Acinia*] (1836); LW., Germ. Zeitschr., V. 394. t. II. f.

47. [*Trypeta*] (1844) et Lin. entom., I. 517. 57. [*Trypeta*] (1846);

ZETT., Dipt. Scand., VI. 2241. 43. [*Tephritis*] (1847); WALK., Ins.

Brit., II. 202. 12. (1853); FRFLD., Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss.,

XXII. 538. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 670. 68.

(1858); LW., Trypetid., 93. 12. t. XVIII. f. 1. (1862); FRFLD., Verh.

zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 220. (1863); SCHIN., F. A., II. 155.

[*Tephritis*] (1864); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 47. 2. (1870);

KALTENB., Pflanzenf., 389. 2. [*Trypeta*] (1872).

? *alethe* NEWM., Entom. Mag., I. 506. [*Tephritis*] (1833); SCHIN.,

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 671. 70. (1858).

dracunculi ROND., Prodr., VII. Tephrit. 50. 3. (1870).

punctella FALL., p. p., Dipt. Suec. Ortalid., 13. 21. [*Tephritis*/

(1820); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 51. 4. (1870).

absinthii MEIG. = **elongata** LW.

albipila LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. 17. Rossia mer.
9. (1869).

alethe NEWM. = **absinthii** FABR.

argyrocephala LW., Germ. Zeitschr., V. 372. t. I. f. 30. [*Trypeta*] Germania,
(1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2238. 41. [*Tephritis*] (1847); FRFLD., Aegyptus.

Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. (1856); SCHIN., Verh.

zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 669. 65. (1858); LW., Trypetid., 91.

10. t. XVII. f. 3. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII.

220. (1863); SCHIN., F. A., II. 155. [*Tephritis*] (1864); KALTENB.,

Pflanzenf., 326. 13. [*Trypeta*] (1872).

borealis PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XI. 35. t. II. f. 6. (1875). Rossia.

✗ **bullans** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 506. 46. (1830). Europa mer.,
Brasilia.

tenera LW., Stettin. entom. Zeitg., XI. 58. t. I. f. 6. [*Trypeta*/

(1850); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 672. 75. (1856);

LW., Trypetid., 95. 16. t. XVIII. f. 4. (1862); Giebels Zeitschr.

Heft 7 et 8. (1869) et Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV.

8. (1869); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 942. (1869);

ROND., Prodr., VII. Ortalid. 23. 24. (1871).

cinerea ROB.-DESV., ROND. = **parietina** L.

corticina ROND., Prodr., VII. Tephrit. 54. 6. (1870). Italia.

cribrina ROND., Prodr., VII. Tephrit. 54. 8. (1870). Italia.

✗ **doronici** LW., N. Beitr., IV. 53. 53. [*Trypeta*] (1856); FRFLD., Sitzungs-
ber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII 544. (1856); SCHIN., Verh. zool.-
bot. Ges. Wien, VIII. 669. 66. (1858); LW., Trypetid., 92. 11. t. Silesia.

XVII. f. 4. (1862); FRULD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 164. (1861) et XIII. 218. (1863); SCHIN., F. A., II. 157. [*Tephritis*] (1864); KALTENB., Pflanzenf., 366. 5. [*Trypeta*] (1872).

dracunculi ROND. = *absinthii* FABR.

elongatula LW., Germ. Zeitschr., V. 397. t. II. f. 50. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2239. 42. [*Trypeta*] (1847); BOIE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 327. 7. (1847) et IX. 81. 1. (1848); LW., Trypetid., 95. 15. t. XVIII. f. 3. (1862); SCHIN., F. A., II. 154. [*Tephritis*] (1864); KALTENB., Pflanzenf., 357. 1. [*Trypeta*] (1872). Europa, Africa sept., Asia min., Ins. Canar.

absinthii MEIG., S. B., V. 340. 42. t. L. f. 12. [*Trypeta*] (1826); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 14. (1848); FRULD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 544. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 671. 74. (1858); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 239. 42. (1902).

femorialis ROB.-DESV. ROND. = *obesa* LW.

flavescens FABR., Entom. syst. Suppl., 565. 156—157. [*Musca*] (1798) et Syst. Antl., 319. 15. [*Tephritis*] (1805); MEIG., S. B., V. 316. 8. [*Trypeta*] (1826); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 492. 25. (1830); MACQ., Sult. à Buff., II. 463. 10. [*Tephritis*] (1835); LW., Germ. Zeitschr., V. 392. 8. (1844); WALK., List of Dipt., IV. 1036. [*Euleia*] (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 649. 13. (1858). Tanger.

marmorea FABR., Syst. Antl., 276. 18. [*Dacus*] (1805).

flavescens ROB.-DESV., ROND., BEZZI = *flavipennis* LW.

✕ *flavipennis* LW., Germ. Zeitschr., V. 368. 36. [*Trypeta*] (1844) et Linn. entom., I. 508. 35—37. [*Trypeta*] (1846); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 669. 62. (1858); LW., Trypetid., 86. 2. t. XVI. f. 1 et 2. (1862); SCHIN., F. A., II. 154. [*Tephritis*] (1864); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 276. 11. (1882). Europa.

flavescens ROB.-DESV., Myod., 756. 2. (1830); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 55. 9. (1870); BEZZI, J. Ditteri del Trentino, 128. 3. (1892).

laticauda WALK., Entom. Mag., III. 76. 3. fig. 22. [*Acinia*] (1836).

parietina ZETT., Dipt. Scand., VI. 2218. 30. var. b. [*Tephritis*] (1847).

grandinata ROND., Prodr., VII. Tephrit. 57. 13. [*Campiglossa*] (1870). Italia.

✕ *guttella* ROND., Prodr., VII. Tephrit. 53. 5. (1870). Italia.

guttatofasciata LW., Stettin. entom. Zeitg., XI. 55. t. I. f. 4. (1850); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 667. 60. (1858); LW., Trypetid., 88. 5. t. XVI. f. 4. (1862). Sibiria.

laticauda WALK. = *flavipennis* LW.

lauta LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. 18. 11. (1869). Rhodus.

leontodontis ZETT. = *tessellata* LW.

lingens LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. 20. 13. (1869). Carinthia.

lutulenta LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. 17. 10. (1869). Rossia mer.

- maculata** ROB.-DESV., Myod., 756. 4. (1830). Gallia.
marmorea FABR. = **flavescens** FABR.
- misella** LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. 19. 12. (1869). Rossia mer.
- nigrofemorata* MEIG., SCHIN. = **obesa** LW.
- obesa** LW., Trypetid., 87. 4. (1862). Europa mer.
femoralis ROB.-DESV., Myod., 756. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 473. 2. [*Ensina*] (1835); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 56. 11. (1870).
? nigrofemorata MEIG., S. B., VII. 355. 74. [*Trypeta*] (1838); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 669. 63. (1858).
- obscuripennis** LW., Stettin. entom. Zeitg., XI. 56. t. I. f. 5. [*Trypeta*] (1850); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 671. 72. (1858); LW., Trypetid., 91. 9. (1862). Sibiria.
- pantherina* FALL., ZETT., WALK., SCHIN. = **parietina** L.
- parceguttata** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, p. 134. 216. (1903). Aegyptus.
- parietina** L., Syst. Nat., X. 599. 82. (1758); Fauna Suec., II. 458. Europa.
 1836. (1761) et Syst. Nat., XII. 996. 107. [*Musca*] (1766); FABR., Spec. Ins., II. 450. 79. (1781); Entom. syst., IV. 350. 154. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 319. 13. [*Tephritis*] (1805); MEIG., S. B., V. 334. t. L. f. 7. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 473. 1. [*Ensina*] (1835); WALK., Entom. Mag., III. 76. 2. fig. 21. [*Acinia*] (1836); LW., Germ. Zeitschr., V. 366. 35. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2218. 30. [*Tephritis*] (1847); BOIE, Stettin. entom. Zeitg., IX. 80. [*Trypeta*] (1848); LW., Trypetid., 85. 1. t. XV. f. 4. (1862); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 55. 10. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 358. 72. [*Trypeta*] (1872).
cinerea ROB.-DESV., Myod., 755. (1830); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 54. 7. (1870).
pantherina FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 10. 14. [*Tephritis*] (1820); SCHILLING, Entom. Beitr. Breslau, 69. (1829); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 16. (1848); WISSM., Stettin. entom. Zeitg., 80. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 203. 13. [*Acinia*] (1853); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 668. 61. (1858) et F. A., II. 153. [*Tephritis*] (1864); KALTENB., Pflanzenf., 358. 74. [*Trypeta*] (1872).
- parietina* ZETT. = **flavipennis** LW.
- parvula** LW., Trypetid., 89. 7. (1862). Europa sept.
- plantaginis** HALID., Entom. Mag., I. 170. [*Tephritis*] (1833); LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 374. t. I. f. 23. [*Tephritis*] (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 11. (1848); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 671. 73. (1858); LW., Trypetid., 88. 6. (1862); KALTENB., Pflanzenf., 501. 78. [*Trypeta*] (1872). Britannia.
- proboscidae** LW., Germ. Zeitschr., V. 371. 37. [*Trypeta*] (1844); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 551. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 669. 64. (1858); LW.,

Trypetid., 87. 3. t. XVI. f. 3. (1862); SCHIN., F. A., II. 154. [*Tephritis*] (1864); KALTENB., Pflanzenf., 339. 18. [*Trypeta*] (1872).

- ✕ *producta* Lw., Germ. Zeitschr., V. 399. t. II. f. 51. [*Trypeta*] (1844); Europa mer., SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 14. (1848); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 551. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 670. 67. (1858); Lw., Trypetid., 94. 14. t. XVIII. f. 2. (1862); SCHIN., F. A., II. 157. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 391. 6. [*Trypeta*] (1872). Asia min.

punctella FALL. = *absinthii* FABR.

punctella FALL. var. β . = *tessellata* Lw.

sororecula WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 509. 52. (1830).

stenoptera Lw., Trypetid., 94. 13. (1862); ROND., Prodr., VII. Tephrit. Tener., Aegy. Sicilia, Hispania.

tenera Lw., ROND., SCHIN. = *bullans* WIED.

- ✕ *tessellata* Lw., Germ. Zeitschr., V. 396. t. II. f. 49. [*Trypeta*] (1844) Europa, et Linn. entom., I. 518. 59. [*Trypeta*] (1846); ZETT., Dipt. Scand., Sibiria, VI. 2236. 50. [*Tephritis*] (1847); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. Aegyptus. d. Wiss., XXII. 554. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 671. 71. (1858); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 164. (1861); Lw., Trypetid., 90. 8. t. XVII. f. 1—2. (1862); SCHIN., F. A., II. 156. [*Tephritis*] (1864); KALTENB., Pflanzenf., 396. 16 et 399. 45. [*Trypeta*] (1872); WACHTL, Wien. ent. Zeitg., I. 277. 12. (1882); BECK, Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 61. 126. (1900).
- leontodontis* ZETT., Ins. Lapp., 745. 5. var. *b. c.* [*Tephritis*] (1847).
- punctella* var. β . FALL., Dipt. Suec. Ortolid., 13. 21. [*Tephritis*] (1820).

Tephritis > Trypeta Meig. 1803.

LATR., Hist. nat. d. Crust et Ins. XIV. 389. (1804).

Campiglossa ROND., Prodr., VII. Ortolid. 49. (1870).

Ditricha p. p., ROND., Prodr., VII. Ortolid. 25. (1871).

Spathulina ROND., Prodr., I. 113. (1856).

- angulatofasciata* PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XXVI. 220. (1891). Persia.
- angustipennis* Lw., Germ. Zeitschr., V. 382. t. II. f. 41. [*Trypeta*] Europa sept. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2229. 35. (1847); Lw., Trypetid., 113. 24. (1862).

hyoscyami FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 546. (1856).

leontodontis p. p., ZETT., Ins. Lapp., 745. 6. var. *a.* (1838); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 678. 99. (1858).

segregata FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 147. t. V. f. 3. (1864); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. 9. (1869); KALTENB., Pflanzenf., 348. 45. [*Trypeta*] (1872).

arnicae L., Act. Upsala, 33. 46. (1736); Syst. Nat., XI. 600. 91. (1758); Europa centr. Fauna Suec., II. 1872. (1761) et Syst. Nat., XII. 997. 119. [*Musca*] et sept.

= type of *Trypeta* *elimination*

(1766); WALK., Entom. Mag., III. 64. (1836) et Ins. Brit., II. 201. 9. (1853); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 679. 105. (1858); LW., Trypetid., 99. 5. t. XX. f. 2. (1862); SCHIN., F. A., II. 165. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 15. 8. (1871); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 65. (1873).

arnicivora LW., Germ. Zeitschr., V. 384. 48. t. I. f. 34. (1844) et Linn. entom. I. 517. 48. [*Trypeta*] (1846); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2232. 37. [*Tephritis*] (1847); ROSENHAUER, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 323. 2. (1847); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 543. (1856); KALTENB., Pflanzenf., 367. 5. (1872).

flavicauda MEIG., S. B., V. 336. 36. [*Trypeta*] (1826); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 239. 36. (1902).

leontodontis FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 9. 13. var. β . (1820).

arnicae FRFLD., SCHIN., LW. = **Eggeri** FRFLD.

arnicivora LW., ZETT., ROSENH., FRFLD. = **arnicae** L.

asteris CURTIS, Brit. Ins., 1300. 35b. (1829); HALID., Ann. of nat. Hist., Britannia. II. 187. (1839).

bardanae SCHRANK, Fauna Boica, III. 2524. [*Musca*] (1803); MEIG., S. B., V. 349. 59. [*Trypeta*] (1826); LW., Germ. Zeitschr., V. 376. t. II. f. 37. [*Trypeta*] (1844); ZETT., p. p., Dipt. Scand., VI. 2223. 32. (1847) et VIII. 3345. 32. (1849); WALK., Ins. Brit., II. 204. 15. [*Trypeta*] (1853); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 675. 88. (1858); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 543. (1856); LW., Trypetid., 108. 17. t. XXII. f. 3. (1862); SCHIN., F. A., II. 161. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 14. 5. (1871); KALTENB., Pflanzenf., 367. 6 et 370. 22. [*Trypeta*] (1872).

confusa MEIG., S. B., V. 337. t. L. f. 9. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 470. 3. [*Acinia*] (1835).
heraclei WALK., Entom. Mag., III. 77. f. 23. [*Acinia*] (1836).
leontodontis DE GEER., Mém. Hist. Ins., VI. 24. 17. ex parte incl. t. II. f. 18. [*Musca*] (1776).

Europa centr. et sept.

bardanae ZETT. = **dilacerata** LW.

brachyura LW., Zeitschr. f. d. Ges. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. 22. 17. (1869). Rossia mer.

canariensis MACQ., BARKER, WEBB., BERTHLOT, Hist. d'îles Canaries, 117. 100. (1839); MACQ., Dipt. exot., II. 3-part 224. 2. (1843). Ins. Canariae.

cincta LW., Germ. Zeitschr., V. 395. t. II. f. 48. [*Trypeta*] (1844); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 674. 84. (1858); LW., Trypetid., 105. 13. (1862); SCHIN., F. A., II. 171. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 23. 23. (1871). Germania.

confusa ROND. = **dilacerata** LW.

confusa MEIG., MACQ. = **bardanae** SCHRANK.

conjuncta LW., Germ. Zeitschr., V. 407. t. II. f. 59. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2227. 34. (1847); LW., Trypetid., 114. 25. t. XXIV. f. 1. (1862); SCHIN., F. A., II. 168. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 17. 12. (1871); KALTEB., Pflanzenf., 391. 7. [*Trypeta*] (1872). Europa.

leontodontis ZETT., Ins. Lapp., 745. 6. var. a. (1838); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 680. 110. (1858); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 164. (1861).

✕ *conura* Lw., Germ. Zeitschr., V. 378. t. I. f. 29. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2234. 38. (1847); Lw., Trypetid., 101. 6. t. XIX. f. 4. (1862); SCHIN., F. A., II. 166. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 19. 16. (1871); KALTENB., Pflanzenf., 380. 67. [*Trypeta*] (1872). Europa centr. et sept.

flavicauda ZETT., Ins. Lapp., 745. 7. (1838); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 543. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 678. 104. (1858); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 164. (1861).

conyzae FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 555. fig. 11. (1856); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., V. 285. t. II. f. 18. (1861). Aegyptus.

cribrata BIGOT, Voyage Alluaud aux îles Canaries (1890). Ins. Canariae.

✕ *dilacerata* Lw., Linn. entom., I. 509. t. III. f. 17. [*Trypeta*] (1846) et Allgem. Naturh. Zeitg., II. 293. t. II. f. 13 et 14a [*Trypeta*] (1847); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3346. 32—33. (1849); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 543. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 476. 93. (1858); Lw., Trypetid., 107. 16. t. XXII. f. 2. (1862); SCHIN., F. A., 160. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 396. 15. [*Trypeta*] (1872). Europa centr. et sept.

bardanae ZETT., Dipt. Scand., VI. 2223. 32. p. p. (1847).

confusa ROND., Prodr., VII. Ortalid. 14. 6. (1871).

hyoscyami FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 9. 12. var. (1820); ZETT., Ins. Lapp., 745. 5. var. b. ♀. (1838).

✕ *dioscurea* Lw., N. Beitr., IV. 53. [*Trypeta*] (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 678. 98. (1858); Lw., Trypetid., 105. 14. t. XXI. f. 4. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 220. (1863); SCHIN., F. A., II. 162. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 22. 21. (1871). Europa mer.

diotidis ROND. = *stictica* Lw.

Eggeri FRFLD., Ber. d. K. K. Akad., XXII. 544. (1856); SCHIN., F. A., II. 165. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 337. 3. [*Trypeta*] (1872). Austria.

arnicae FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 543. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 679. 106. (1858); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 164. (1861); Lw., Trypetid., 99. 5. (1862).

✕ *fallax* Lw., Germ. Zeitschr., V. 383. t. II. f. 40. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2231. 36. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 678. 96. (1858); Lw., Trypetid., 104. 11. t. XXI. f. 2. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 219. (1863); SCHIN., F. A., II. 164. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 16. 9. (1871). Europa centr. et sept.

Nesi v. Ros., Württemb. Corubl., 60. [*Trypeta*] (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., p. 54. No. 8. (1902).

fenestrata ZETT., Dipt. Scand., VI. 2242. 44. (1847); SCHIN., Verh. Dania. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 671. 69. (1858).

flavicauda MEIG. = **arnicae** L.

flavicauda ZETT. = **conura** LW.

✕ **formosa** LW., Germ. Zeitschr., V. 388. t. II. f. 42. [*Trypeta*] (1844); Europa centr. SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 675. 87. (1858); LW., Trypetid., 99. 4. t. XIX. f. 3. (1862); SCHIN., F. A., II. 161. (1864); et mer. ROND., Prodr., VII. Ortalid. 15. 7. (1871).

gemmata MEIG. = **guttata** FALL.

guttata FALL., Act. Holm., 170. 17. (1814) et Dipt. Suec. Ortalid., 11. Europa centr. 16. (1820); ? MEIG., S. B., V. 350. 61. [*Trypeta*] (1826); LW., Germ. et sept. Zeitschr., V. 400. t. II. f. 52. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2245. 46. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 680. 111. (1858); LW., Trypetid., 109. 18. t. XXII. f. 4. (1862); SCHIN., F. A., II. 167. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid., 19. 15. (1871); KALTENB., Pflanzenf., 333. 17 et 343. 14. [*Trypeta*] (1872); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 241. 61. (1902).

gemmata MEIG., S. B., V. 339. 40. [*Trypeta*] (1826); BOIE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 328. 28. (1847).

Heiseri FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 262. (1865); KALTENB., Austria. Pflanzenf., 381. 74. [*Trypeta*] (1872).

heraclei WALK. = **bardanae** SCHRANK.

heraclei FABR., MEIG., MACQ. = **postica** LW.

hordei OLIVIER, Mém. de la Soc. d'Agricult. du Départ. de la Seine, Gallia. XVI. 12. fig. 1. (1813). *head 21 segs Ephyridae*

✕ **hyoscyami** L., Syst. Nat., X. 600. 92. (1758); Fauna Suec., II. 460. Europa. 1873. (1761) et Syst. Nat., XII. 998. 120. [*Musca*] (1766); FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 9. 12. *var. a.* (1820); MEIG., S. B., V. 337. t. L. f. 2. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 470. 4. [*Acinia*] (1835); WALK., Entom. Mag., III. 78. fig. 25. [*Acinia*] (1836); ZETT., Ins. Lapp., 745. 5. *var. a.* (1838); LW., Germ. Zeitschr., V. 392. t. II. f. 45. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2221. 31. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. (1858); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 167. (1861) et XIII. 218. (1863); LW., Trypetid., 110. 20. t. XXIII. f. 2. (1862); SCHIN., F. A., II. 160. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 13. 3. (1871); KALTENB., Pflanzenf., 381. 71. [*Trypeta*] (1872).

hyoscyami p. p., FRFLD. = **angustipennis** LW.

hyoscyami FALL., ZETT., Ins. Lapp., 745. 5. *var. b.* ♀ = **dilacerata** LW.

irrorata FALL., Act. Holm., 170. 16. (1814) et Dipt. Suec. Ortalid., Europa centr. 11. 15. (1820); MEIG., S. B., V. 340. 43. [*Trypeta*] (1826); MACQ., et sept. Suit. à Buff., II. 421. 7. [*Acinia*] (1835); LW., Germ. Zeitschr., V. 402. t. II. f. 54. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2243. 45. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. ges. Wien, VIII. 680. 112. (1858); LW., Trypetid., 97. 2. t. XIX. f. 2. (1862); SCHIN., F. A., II. 167. (1864); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 58. 14. [*Campiglossa*] (1870).

laticauda MEIG., S. B., V. 339. 41. t. L. f. 11. [*Trypeta*] (1826); Austria, Britannia.

WALK., Entom. Mag., III. 76. 3. (1836); LW., Germ. Zeitschr., V. 303. (1844); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 675. 86. (1856) et F. A., II. 163. (1864).

nigra DUF., Ann. Soc. entom. Fr., II. 5. 49. (1849).

~~X~~ **leontodontis** DE GEER, Mém. Hist. Ins., VI. 24. 17. t. II. f. 16—17. Europa, Algeria.
[Musca] (1776); FALL., Dipt. Succ. Ortalid., 9. 13. *var. a.* (1820); MEIG., S. B., V. 335. t. L. f. 8. *[Trypeta]* (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 469. 2. *[Acinia]* (1835); WALK., Entom. Mag., III. 77. fig. 24. *[Acinia]* (1836); ZETT., Ins. Lapp., 745. 6. *var. a et d.* (1838); LW., Germ. Zeitschr., V. 380. 63. t. II. f. 39. *[Trypeta]* (1844) et Linn. entom., I. 513. 45—47. *[Trypeta]* (1846); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2225. 33. (1847); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 497. 255. *[Acinia]* (1849); WALK., Ins. Brit., II. 204. 16. (1853); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 548. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 677. 94. (1858); LW., Trypetid., 106. 15. t. XXII. f. 1. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 165. (1861) et XIII. 219. (1863); SCHIN., F. A., II. 164. (1864); FR.-LÖW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 949. (1866); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 20. 17. (1871); KALTENB., Pflanzenf., 339. 14; 370. 21; 379. 58; 390. 4 et 403. 37. *[Trypeta]* (1872); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 184. 3. t. IV. f. 12—15. (1887).

leontodontis DE GEER, p. p. = **bardanae** SCHRANK.

leontodontis FALL. = **arnicae** L.

leontodontis p. p., ZETT. = **conjuncta** LW.

leontodontis var. a. ZETT. = **angustipennis** LW.

matricariae LW., Germ. Zeitschr., V. 389. t. II. f. 43. *[Trypeta]* (1844); Europa mer.,
 FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 556. (1856); Africa sept.
 SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 674. 82. (1858); FRFLD., Asia min.
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 167. (1861); LW., Trypetid., 102.
 7. t. XX. f. 3. (1862); KALTENB., Pflanzenf., 343. 16. *[Trypeta]*
 (1872).

matutina ROND., Prodr., VII. Ortalid., 22. 20. (1871). Sicilia.

megacephala LW., Linn. entom., I. 512. t. III. f. 18. *[Trypeta]* (1846) Sicilia.
 et Trypetid., 116. 27. (1862); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 32. 7.
[Ditricha] (1871).

malanotrichota HENDEL, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 7. p. 383. Norvegia.
 (1903).

myodes SCHRANK = **Zelleri** LW.

nebulosa WIED., Zool. Mag., I. 76. (1817); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Holsatia.
 Wien, VIII. 676. 90. (1858).

Nesi v. Ros. = **fallax** LW.

nigra DUF. = **laticauda** MEIG.

nigricauda LW., N. Beitr., IV. 53. *[Trypeta]* (1856); SCHIN., Verh. Germania,
 zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 678. 97. (1858); LW., Trypetid., 112. Hungaria.
 23. t. XXIII. f. 4. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII.
 218. (1863); SCHIN., F. A., II. 162. (1864); KALTENB., Pflanzenf.,
 339. 21. *[Trypeta]* (1872).

- obscura** BRULLÉ, Expéd. en Morée, 323. 712. t. XLVII. f. 11. (1832). Graecia.
- obscuricornis** ROND., Prodr., VII. Ortalid. 21. 19. (1871). Sicilia.
- pallida** OLIVIER, Mém. de la Soc. d'Agricult. du Départ. de la Seine, Gallia.
XVI. 15. fig. 5. (1813). *Rond 27 = sp. of Hydrellia*
- pini** CURTIS, Brit. Ins., 1300. 25b. (1829); HALID., Ann. of nat. Hist., Britannia.
II. 187. (1839).
- poecilura** LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. Hispania.
21. 14. (1869) et Berlin. entom. Zeitschr., XIV. 144. (1870).
- postica** LW., Germ. Zeitschr., V. 393. t. II. f. 46. [*Trypeta*] (1844); Europa centr.
FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 551. (1856); et mer.
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 676. 91. (1858); FRFLD.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 166. (1861); LW., Trypetid., 111.
21. t. XXIII. f. 3. (1862); SCHIN., F. A., II. 159. (1864); KALTENB.,
Pflanzenf., 382. 11. [*Trypeta*] (1872).
heraclei FABR., Entom. Syst., 354. 172. [*Musca*] (1798) et Syst.
Antl., 277. 21. (1805); MEIG., S. B., V. 388. t. L. f. 1. [*Trypeta*]
(1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 470. 5. [*Acinia*] (1835); ROND.,
Prodr., VII. Ortalid., 13. 4. (1871).
- praecox** LW., Germ. Zeitschr., V. 391. t. II. f. 44. [*Trypeta*] (1844); Europa mer.,
SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 674. 83. (1858); LW., Asia min.
Trypetid., 102. 9. t. XX. f. 4. (1862); ROND., Prodr., VII. Ortalid.
23. 22. (1871).
- procera** LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. 21. Rossia.
15. (1869).
- pulchra** LW., Germ. Zeitschr., V. 406. 67. t. II. f. 57. [*Trypeta*] (1844) Europa mer.
et Linn. entom., I. 519. 66. [*Trypeta*] (1846); FRFLD., Sitzungsber.
d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 552. (1856); SCHIN., Verh. zool.-
bot. Ges. Wien, VIII. 680. 109. (1858); FRFLD., Verh. zool.-bot.
Ges. Wien, XI. 166. (1861); LW., Trypetid., 115. 26. t. XXIV. f.
2. (1862); SCHIN., F. A., II. 168. (1864); ROND., Prodr., VII. Orta-
lid. 19. 14. (1871); KALTENB., Pflanzenf., 389. 1. [*Trypeta*] (1872).
- recurrens** LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. Graecia.
22. 16. (1869).
- rufina** ROND., Prodr., VII. Ortalid. 17. 11. (1871). Italia.
- ruralis** LW., Germ. Zeitschr., V. 386. t. I. f. 35. [*Trypeta*] (1844); Europa centr.
ZETT., Dipt. Scand., VI. 2235. 39. (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot. et sept.
Ges. Wien, VIII. 678. 100. (1858); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XI. 168. (1861); LW., Trypetid., 103. 10. t. XXI. f. 1. (1862);
SCHIN., F. A., II. 166. (1864); KALTENB., Pflanzenf. 403. 34. [*Try-
peta*] (1872).
- segregata* FRFLD., KALTENB. = **angustipennis** LW.
- sejunota** ROND., Prodr., VII. Ortalid. 18. 13. (1871). Italia.
- septemmaculata** MACQ., Suit. à Buff., II. 465. 19. (1835); MEIG., S. Gallia.
B., VII. 354. 66. (1838).
- sicula** ROND., Prodr., VII. Ortalid. 31. 6. [*Ditricha*, *Spathulina*] (1871); Sicilia,
STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 227. 238. [*Ditricha*] (1899). Hispania.
- simplex** LW., Germ. Zeitschr., V. 379. t. II. f. 38. [*Trypeta*] (1844); Asia min.

- SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 678. 102. (1858); Lw., Trypetid., 101. 7. (1862).
- spoliata* CURTIS, Brit. Ins., 1300. 15c. 280. (1829); HALID., Ann. of Britannia. nat. Hist., II. 186. (1839).
- spretia* Lw., Berlin. entom. Zeitschr., V. 297. t. II. f. 26. (1861). Aegyptus.
- stictica* Lw., Trypetid., 109. 19. t. XXIII. f. 1. (1862). Hispania.
- diotidis* ROND., Prodr., VII. Ortalid. 12. 2. (1871).
- subvalida* PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., XI. 36. t. II. (1875). Caucasus.
- tenerifensis* BIGOT, Voyage Alluand aux Iles Canaries (1890). Ins. Canariae.
- Theora* NEWM., Entom. Mag., I. 506. (1833); SCHIN., Verh., zool.-bot. Britannia.
- Ges. Wien, VIII. 677. 95. (1858).
- tristis* Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXXIV. Heft 7 et 8. 23. 18. Hispania.
- (1869).
- truncata* Lw., Germ. Zeitschr., V. 379. t. I. f. 33. [*Trypeta*] (1844); Austria.
- FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 678. 103. (1858); Lw., Trypetid., 98. 3. t. XX. f. 1. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 218. 218. (1863); SCHIN., F. A., II. 158. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 390. 5 et 399. 46. [*Trypeta*] (1872).
- valida* Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 13. [*Trypeta*] (1858); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 675. 89. (1858); Lw., Trypetid., 112. 22. (1862); SCHIN., F. A., II. 162. (1864). Hungaria.
- vespertina* Lw., Germ. Zeitschr., V. 387. t. I. f. 36. [*Trypeta*] (1844); Europa centr.
- Lw., Linn. entom. I. 517. 50. [*Trypeta*] (1846); SCHOLTZ, Zeitschr. et mer.
- f. Entom. Breslau, 14. (1848); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 678. 101. (1858); Lw., Trypetid., 104. 12. t. XXI. f. 3. (1862); SCHIN., F. A., II. 171. (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 21. 18. (1871); KALTENB., Pflanzenf., 391. 3. [*Trypeta*] (1872).
- Zelleri* Lw., Germ. Zeitschr., V. 374. t. I. f. 32. [*Trypeta*] (1844) et Hungaria,
- Linn. entom., I. 509. 40. [*Trypeta*] (1846); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 674. 80. (1858); Lw., Trypetid., 96. 1. t. XIX. f. 1. (1862); SCHIN., F. A., II. 158. (1864). Germania.
- myodes* SCHRANK, Fauna Boica, II. 148. 2250. 1856. [*Trupanea*] (1803).

Urellia > Trypanaea Schrank 1795.

ROB.-DESV., Myod., 775. (1830).

Actinoptera ROND., Prodr., VII. Ortalid. (1871).

Ditricha p. p., ROND., Prodr., VII. Ortalid. (1871).

aestiva MEIG., ROND. = *gnaphalii* Lw.

- amoena* FRFLD., Ber. d. K. K. Akad., XXII. 542. f. 2. [*Trypeta*] Europa,
- (1856); WOLLASTON, Ann. Mag. of nat. Hist., I. 269. [*Tephritis*] I. Madeira,
- (1858); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 682. 116. (1858); Africa sept.
- FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 165. (1861); Lw., Trypetid., 120. 5. t. XXV. f. 2. (1862); SCHIN., F. A., II. 170. [*Tephritis*] (1864); KALTENB., Pflanzenf., 390. 6 et 394. 34 [*Tephritis*] (1872).

- parisiensis* ROND., Prodr., VII. Ortalid. 29. 2. [*Ditricha*] (1871).
radiata p. p., WALK., Entom. Mag., III. 74. [incl. f. 19.] (1836).
stellata LW., Germ. Zeitschr., V. 411. 71. var. 1. [*Trypeta*] (1844).
- augur** FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 557. fig. Aegyptus.
 10. (1856); LW., Berlin. entom. Zeitg., V. 304. t. II. f. 30. (1861).
calcitrapae ROB.-DESV. = *stellata* FUESSLY.
- cometa** LW., Stettin. entom. Zeitg., I. 157. [*Trypeta*] (1840); LW., Europa,
 Germ. Zeitschr., V. 408. t. II. f. 60. [*Trypeta*] (1844); ZETT., Dipt. Asia min.
 Scand., VI. 2252. 50. [*Tephritis*] (1847); SCHIN., Verh. zool.-bot.
 Ges. Wien, VIII. 681. (1858); LW., Trypetid., 117. 2. t. XXIV. f.
 4. (1862); SCHIN., F. A., II. 170. [*Tephritis*] (1864).
radiata FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 12. 19. [*Tephritis*] (1820);
 ROND., Prodr., VII. Ortalid. 24. 25. [*Tephritis*] (1871).
- cosmia** WOLLAST., List of Dipt. of Madeira. Ann. and Mag. of nat. I. Madeira.
 Hist., I. 269. [*Tephritis*] (1858).
- discoidea* FALL. = *gnaphalii* LW.
- ✕ **eluta** MEIG., S. B., V. 344. t. L. f. 13. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. Europa,
 à Buff., II. 472. 14. [*Acinia*] (1835); LW., Germ. Zeitschr., V. 416. Africa sept.
 t. II. f. 67. [*Trypeta*] (1844); DUF., Ann. Soc. entom. Fr., II. série
 5. 49. (1849); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII.
 544. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 674. 85.
 (1858); LW., Trypetid., 117. 1. t. XXIV. f. 3. (1862); FRFLD., Verh.
 zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 218. (1863); SCHIN., F. A., II. 171.
 (1864); FR-LÖW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 949. (1836);
 KALTENB., Pflanzenf., 386. 45. [*Trypeta*] (1872).
helianthi ROND., Prodr., VII. Ortalid. 12. 1. (1871).
- fliginis** LW., Trypetid., 122. 8. (1862); SCHIN., F. A., II. 171. [*Te-* Germania.
phritis] (1864).
- terminata* ROND., Prodr., VII. Ortalid. 30. 5. [*Actinoptera*] (1871).
- ✕ **gnaphalii** LW., Germ. Zeitschr., V. 415. t. II. f. 68. [*Trypeta*] (1844); Europa centr.
 ZETT., Dipt. Scand., VI. 2250. 49. [*Tephritis*] (1847); BOIE, Stettin. et sept.
 entom. Zeitg., VIII. 328. 24. (1847) et IX. 81. 3. (1848); SCHOLTZ,
 Zeitschr. f. Entom. Breslau, 14. (1848); SCHIN., Verh. zool.-bot.
 Ges. Wien, VIII. 683. 117. (1858); LW., Trypetid., 121. 6. t. XXV.
 f. 3. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 219. (1863);
 SCHIN., F. A., II. 172. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 361. 19. [*Try-*
peta] (1872).
aestiva MEIG., S. B., V. 351. 62. [*Trypeta*] (1826); ROND., Prodr.,
 VII. Ortalid. 30. 4. [*Actinoptera*] (1871).
discoidea FALL., Act. Holm., 171. 19. (1814) et Dipt. Suec. Or-
 talid., 12. 18. [*Tephritis*] (1820).
- helianthi* ROND. = *eluta* MEIG.
- ✕ **helichrysi** ROND., Prodr., VII. Ortalid. 27. 3. [*Ditricha*, *Actinoptera*] Italia.
 (1871).
- mamulae** FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 15. [*Trypeta*] (1855) Europa centr.
 et Ber. d. k. k. Akad., XXII. 549. fig. 6. [*Trypeta*] (1856); SCHIN.,
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 683. 118. (1858); LW., Trypetid.,

122. 7. t. XXV. f. 4. (1862); SCHIN., F. A., II. 168. [*Tephritis*] (1864).

pallida MACQ., Suit. à Buff., II. 472. 13. [*Tephritis*] (1835); MEIG., S. Gallia. B., VII. 355. 73. [*Trypeta*] (1838).

parisiensis ROND. = **amoena** FRFLD.

parisiensis ROB. DESV. = **stellata** FUESSLY.

radiata MACQ., LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 496. 253. t. VI. Algeria. f. 11. [*Urophora*] (1849).

radiata FALL., ROND. = **cometa** LW.

radiata WALK. = **amoena** FRFLD.

radiata FABR., PANZ., SCHRANK, MEIG., WALK., MACQ., ZETT., = **stellata** FUESSLY.

ramulosa LW., Germ. Zeitschr., V. 407. t. II. f. 58. [*Trypeta*] (1844); Dalmatia. SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 681. 113. (1858); LW., Trypetid., 118. 3. (1862).

× **stellata** FUESSLY, Verz., 1125. [*Musca*] (1775); SULZER, Ins., 216. t. Europa, XXVIII. f. 12. [*Musca*] (1761); CURTIS, Trans. entom. Soc., II. Bd. Africa sept., III. 43. (1823—40); LW., Germ. Zeitschr., V. 411. 71. t. II. f. 62, Asia min. 63. (excl. var. 1.) [*Trypeta*] (1844); BOIE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 328. 23. (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 14. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 204. [*Trypeta*] (1853); FRFLD., Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss., XXII. 553. f. 3. (1856); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 681. 115. (1858); LW., Trypetid., 119. 4. t. XXV. f. 1. (1862); FRFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 165. (1861) et XIII. 218. (1863); SCHIN., F. A., II. 169. [*Tephritis*] (1864); ROND., Prodr., VII. Ortalid. 28. 1. [*Ditricha*] (1871); KALTENB., Pflanzenf., 326. 14.; 339. 6.; 388. 5 et 403. 36. [*Trypeta*] (1872).

calcitrapae ROB.-DESV., Myod., 775. 1. (1830).

parisiensis ROB.-DESV., Myod., 775. 2. (1830).

radiata FABR., Entom. syst. Suppl., 565. 157. [*Musca*] (1798) et Syst. Antl., 319. 16. [*Tephritis*] (1805); PANZ., Fauna Germ., CIII. 21. [*Tephritis*] (1806); SCHRANK, Fauna Boica, III. 2525. [*Trupanca*] (1803); MEIG., S. B., V. 343. 48. t. L. f. 3. [*Trypeta*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 472. 11. [*Acinia*] (1835); WALK., p. p., Entom. Mag., III. 74. (excl. fig.) 19. (1836); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2254. 51. [*Tephritis*] (1847); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 497. 256. [*Acinia*] (1849); WALK., The Entom., No. 92. 345. 87. (1871); KALTENB., Pflanzenf., 335. 27 et 341. 13. [*Trypeta*] (1872).

terminata FALL., Dipt. Succ. Ortalid., 13. 20. [*Tephritis*] (1820); MACQ., Suit. à Buff., II. 471. 10. [*Tephritis*] (1835); KALTENB., Pflanzenf., 361. 18. [*Trypeta*] (1872).

stellata LW. var. 1. = **amoena** FRFLD.

terminata MEIG., S. B., V. 343. 47. t. L. f. 10. [*Trypeta*] (1826); Europa centr. BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 240. 47. (1902). et sept.

terminata ROND. = **filaginis** LW.

terminata FALL. = **stellata** FUESSLY.

Schistopterum

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin (1903).

Moebinsi BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 137. 222. t. IVd. f. Aegyptus. 49. (1903).

Dacinae.

Ceratitis

MAC LEAY, Zool. Journ., XVI. (1829).

Halterophora ROND., Prodr., VII. Ortalid. 29. (1870).

Petalophora MACQ., Suit. à Buff., II. 454. (1835) et Dipt. exot., II. 3 part. 218. (1843).

capitata WIED., Anal. entom., 55. [*Trypeta*] (1824) et Aussereurop. Zweifl. Ins., II. 496. 29. [*Trypeta*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 454. 1. [*Petalophora*] (1835) et Dipt. exot., 3 part. 219. (1843); WOLLASTON, Ann. Mag. of nat. Hist., 123. t. XXIV. f. 1. (1858); LW., Trypetid., 123. t. XXVI. f. 1. (1862); v. RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXIX. 132. 1. (1885); A. GIARD, Comp. rend. d. Séanc. de l'Acad. d. Sc. Paris, CXXXI. 436—439. (1900); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 275. (1900).

Europa mer.,
Africa sept.,
Ins. Canar.

citriperda MAC LEAY, Zool. Journ., XVI. (1829); MACQ., Dipt. exot., II. 3 part., 219. t. XIX. f. 10. (1843); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 89. (1883).

corsyra WALK., List of Dipt. Brit. Mus., 1042. (1855).

flexuosa WALK., Dipt. Saund., 382. [*Trypeta*] (1856); v. RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXIX. 132. 1. [*flexuosa*] (1885).

hispanica DE BRÈME, Ann. Soc. entom. Fr., XI. 188. t. VII. f. 1—4. (1842); SCHIN., F. A., II. 174. (1864); ROND., Prodr., VII. Tephrit. 29. 1. [*Petalophora*] (1870); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 439. (1871).

citriperda MAC LEAY, MACQ. = **capitata** WIED.

corsyra WALK. = **capitata** WIED.

flexuosa v. RÖD. = **capitata** WIED.

flexuosa WALK. = **capitata** WIED.

hispanica DE BRÈME, SCHIN., ROND. = **capitata** WIED.

Dacus

MEIG., S. B., VI. 22. 1. (1830).

annulatus BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 138. 224. (1903).

longistylus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 522. 14. (1830).

oleae ROSSI, Fauna Etrusca, II. 317. 1538. [*Musca*] (1780); FABR., Entom. syst., IV. 349. 152. [*Musca*] (1794); COQUEB., Illustr., 110.

Aegyptus.

Aegyptus.

Europa mer.,
Africa sept.,
Ins. Canar.

- t. XXIV. f. 16. (1799—1804); LATR., Gen. crust. ins., IV. 351. (1796); FABR., Syst. Antl., 215. 3. (1805); LATR., Dict. d'Hist. nat., 24. 196. 577. (1805); MEIG., S. B., VI. 22. t. LVI. f. 11—13. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 451. 1. (1835); GUÉRIN-MÈNEVILLE, Biolog. Ann. Soc. entom. Fr., XIV. (1845); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 496. 252. (1849); LW., Trypetid., 124. 1. t. XXVI. f. 2. (1862); SCHIN., F. A., II. 175. (1864); ROND., Prodr., VII. Dacoidi. 48. 1. (1871); KALTENB., Pflanzenf., 437. 6. (1872); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 88. (1883).
- semisphaereus** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, p. 139. 225. (1903). Aegyptus.
- sexmaculatus** WALK., The Entom., 344. 83. (1871). Aegyptus.

SEPSIDAE.

Sepsis

FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 20. (1820).

- ✕ **atripes** ROB.-DESV., Myod., 743. 6. [*Micropeza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 478. 6. (1835); MEIG., S. B., VII. 349. 13. (17). (1838); STAEG., Monogr. Seps., 29. 6. (1844); PEERIS, Ann. Soc. entom. Fr., 230. (1876). Europa centr. et sept.
- barbipes** MEIG., S. B., V. 289. 8. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 479. 11. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 229. 8. (1902). Germania.
- biflexuosa** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XXII. 225. 1. (1893). Austria.
- concinna** WALK., Entom. Mag., I. 249. 6. (1833). Britannia.
- cornuta** MEIG., S. B., V. 288. 6. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 479. 12. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2286. 2. (1847); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 228. 6. (1902). Europa centr. et sept.
- ✕ **cynipsea** L., Fauna Suec., 1668. [*Musca*] (1761); Scop., Entom. carn., 947. [*Musca*] (1763); FABR., Spec. Ins., II. 451. 82. [*Musca*] (1781); SCHRANK, Enumer. Ins. Austr., 956. [*Musca*] (1781); DE GEER, Ins., VI. 18. 12. [*Musca*] (1782); FABR., Entom. syst., IV. 351. 160. [*Musca*] (1794); GMEL., Syst. Nat., V. 2855. 113. [*Musca*] (1788); SCHRANK, Fauna Boica, III. 2461. [*Musca*] (1803); FABR., Syst. Antl., 324. 41. [*Tephritis*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 355. [*Micropeza*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 23. 5. (1820); MEIG., S. B., V. 287. 1. (1826); WALK., Entom. Mag., I. 247. 1. (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 477. 1. (1835); WESTW., Introduct., II. 572. (1840); STAEG., Monogr. Seps., 27. 3. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2284. 1. (1847); LUCAS, Explor. de l'Algérie, III. 498. 258. (1849); WALK., Ins. Brit., II. 208. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 179. (1864); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 8. 2. (1874); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 84. (1883).
- fulgens** MEIG., S. B., V. 287. 2. (1826); WALK., Entom. Mag., I.

248. 2. (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 477. 2. (1835); BECK.,
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 228. 2. (1902).

fulgida ROB.-DESV., Myod., 742. 3. [*Micropeza*] (1830).

hilaris MEIG., S. B., V. 288. 3. (1826); WALK., Entom. Mag., I.
248. 3. (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 477. 3. (1835); BECK.,
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 228. 3. (1902).

vivida ROB.-DESV., Myod., 742. 4. [*Micropeza*] (1830).

cynipsea ROB.-DESV. = **punctum** FABR.

duplicata HALID., Ann. of nat. Hist., II. 186. (1838); CURTIS, Brit. Ins., 1297. 4d. App. 280. (1839). Britannia.

fissa BECK., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. p. 143. 228. (1903). Aegyptus.

flavimana SCHIN. (nec MEIG.), F. A., II. 180. (1864). Germania.

flavimana MEIG., S. B., V. 288. 4. (1826); WALK., Entom. Mag., I. 248. Europa, *non*
4. (1833); STAEG., Monogr. Seps., 27. 4. (1843); ZETT., Dipt. Scand., Africa sept.
VI. 2287. 5. (1847); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 498.
261. (1849); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 126. (1893).

ruficornis MEIG., S. B., V. 288. 5. (1826); WALK., Entom. Mag.,
I. 249. (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 477. 4. (1835); BECK.,
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 228. 5. (1902).

fragilis BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 145. 231. (1903). Aegyptus.

fulgens MEIG. = **cynipsea** FALL.

fulgida ROB.-DESV. = **cynipsea** FALL.

fuscipes v. ROS., Württemb. Corrb., 60. (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb. No. 6. p. 54. (1902). Germania.

geniculata BIGOT, Voyage Alluaud aux îles Canaries (1890). Ins. Canariae.

hilaris MEIG. = **cynipsea** FALL.

hirtipes BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 142. 227. (1903). Aegyptus.

hyalipennis MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 296. 3. (1850). Aegyptus.

inpunctata MACQ., Hist. nat. d. îles Canaries, 118. 101. (1839) Ins. Canariae.
et Dipt. exot., II. 3 part. 233. (1843).

Loewi HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXI. 265. (1902). Hungaria.

pilipes LW., Europ. Dipt., III. 304. 207. (1873).

maculipes WALK., Entom. Mag., I. 248. (1833). Britannia.

minima STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 225. 2. (1893). Austria.

nigripes MEIG., S. B., V. 289. 7. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 478. Europa centr.
5. (1835); WALK., Entom. Mag., I. 249. (1833); STAEG., Monogr. et sept.
Seps. 28. 5. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2286. 3. (1847); ROND.,

Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 8. 1. (1874); BECK.,
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 229. 7. (1902).

nitida ROB.-DESV., Myod., 743. 5. [*Micropeza*] (1830).

nitida ROB.-DESV. = **nigripes** MEIG.

niveipennis BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 143. 229. (1903). Aegyptus.

ornata MEIG., MACQ., WALK. = **punctum** FABR.

pectoralis MACQ., Suit. à Buff., II. 478. 10. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
349. 14. (1838); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Fi-
renze, VI. 9. 5. (1874).

pilipes WULP, Tijdschr. v. Entom., XIV. 189. (1871).

Hollandia.

pilipes LW. = **Loewi** HENDEL.

X **punctum** FABR., Entom. syst., 351. 159. [*Musca*] (1794); SCHELLENB., Genr. d. Mouch., t. IV. f. 2. (1803); FABR., Syst. Antl., 22. 4. [*Tephritis*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 355. [*Micropeza*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 22. 4. (1820); MEIG., S. B., V. 289. (1826); WALK., Entom. Mag., I. 250. (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 478. 8. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 749. 5. (1838); STAEG., Monogr. Seps., 25. 1. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2288. 6. (1847); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 498. 259. (1849); WALK., Ins. Brit., II. 209. 2. (1853); WOLLASTON, Ann. and Mag. of nat. Hist., I. p. 261. (1858); SCHIN., F. A., II. 179. (1864); ROND., Tanypez. Bu". Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 9. 4. (1874); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 230. (1876); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 126. (1893).

cynipsea ROB.-DESV., Myod., 741. 1. [*Micropeza*] (1830).

ornata MEIG., S. B., V. 290. 11. (1826); WALK., Entom. Mag., I. 250. 11. (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 478. 9. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 229. 71. (1902).

stigma PANZ., Fauna Germ., LX. 21. (1798).

pygmaea ROB.-DESV. = **violacea** MEIG.

rufa MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 296. 3. (1850); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 144. 230. (1903). Aegyptus.

ruficornis MEIG., MACQ., WALK. = **flavimana** MEIG.

rufipes MEIG., S. B., VII. 349. 12. (16). ♀ (*nee* ♂). (1838).

Germania.

stigma PANZ. = **punctum** FABR.

thoracica ROB.-DESV., Myod., 742. 2. [*Micropeza*] (1830).

Gallia.

tridens BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 145. 233. (1903).

Aegyptus.

X **violacea** MEIG., S. B., V. 289. 9. (1826); WALK., Entom. Mag., I. 249. 9. (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 478. 7. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 749. 6. (1838); STAEG., Monogr. d. Seps., 26. 2. (1844); ZETT., Dipt. Scand., 2289. 7. (1847); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 498. 260. (1849); SCHIN., F. A., II. 179. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 8. 3. (1874).

Europa,
Africa sept.,
Ins. Canar.

pygmaea ROB.-DESV., Myod., 743. 7. [*Micropeza*] (1830).

vivida ROB.-DESV. = **cynipsea** FALL.

Enicita

WESTWOOD, Class. Ins., I. 148. (1839).

Enicopus WALK., Entom. Mag., I. 253. (1833).

X **annulipes** MEIG., S. B., V. 292. 16. [*Sepsis*] (1826) et VII. 350. 6. [*Nemopoda*] (1838); CURTIS, Brit. Entom., 245. (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 482. 8. [*Nemopoda*] (1835); WALK., Entom. Mag., I. 253. (1833); WESTW., Class. Ins., I. 148. (1839); STAEG., Monogr. Seps., 35. 14. [*Sepsis*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2304. 19. Europa.

[*Sepsis*] (1846); SCHIN., F. A., II. 178. [*Sepsis*] (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 11. (1874).

varipes MEIG., S. B., VII. 351. 7. [*Nemopoda*] (1838); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 230. 7. (1902).

varipes MEIG. = *annulipes* MEIG.

Themira

ROB-DESV., Myod., 746. 6. (1830).

Cheligaster MACQ. (1835).

Halidaya ROND., Prodr., I. (1856).

Meroplus ROND., p. p., Tanypez. (1874).

- albitarsis* ZETT., Dipt. Scand., VI. 2297. 13. [*Sepsis*] (1847). Europa sept.
- ciliata* STAEG., Sepsid. Kröjer's Tidskr., I. 1. 30. 8. [*Sepsis*] (1844); Europa centr.
ZETT., Dipt. Scand., VI. 2292. 9. [*Sepsis*] (1847); SCHIN., F. A., II. et sept.
182. (1864); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI.
11. [*Halidaya*] (1874).
- consobrina* WULP., Tijdschr. v. Entom., XIV. 192. (1871). Hollandia.
- coxarum* ZETT. = *Leachi* MEIG.
- curvipes* WULP., Tijdschr. v. Entom., XIV. 192. (1871). Hollandia.
- cylindrica* FALL. = *nigricornis* MEIG.
- Falleni* STAEG., ZETT., SCHIN., ROND. = *nigricornis* MEIG.
- fimeti* SCHRANK = *putris* L.
- gracilis* ZETT., Dipt. Scand., VI. 2300. [*Sepsis*] (1847). Europa sept.
- Leachi* MEIG., S. B., V. 291. 14. (1826); WALK., Entom. Mag., I. 255. Europa centr.
4. (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 480. 3. [*Cheligaster*] (1835); et sept.
BOUCHÉ, Naturgesch., I. 95. t. VI. f. 8—11. (1837); WESTW., In-
troduct., II. 572. (1840); STAEG., Sepsid. Kröjer's Tidskr., I. 31.
9. [*Sepsis*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2293. 10. [*Sepsis*] (1847);
WALK., Ins. Brit., II. 212. 4. (1853); SCHIN., F. A., II. 182. (1864);
BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 84. (1883); BECK., Zeitschr.
f. Hymenopt. u. Dipt., II. 230. 14. (1902).
- coxarum* ZETT., Ins. Lapp., 748. 4. ♀ [excl. ♂] [*Sepsis*] (1838).
- Leachi* ZETT., p. p. = *nigricornis* MEIG.
- lucida* STAEG., ZETT., SCHIN., ROND. = *minor* HALID.
- melitensis* ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 10. 1. [*Mero-* Italia.
plus] (1874).
- X *minor* HALID., Entom. Mag., I. 170. et 255. 3. (1833); SCHIN., F. A., Europa. 11 sept.
II. 183. (1864).
- lucida* STAEG., Sepsid. Kröjer's Tidskr., I. 32. 11. [*Sepsis*] (1844);
ZETT., Dipt. Scand., VI. 2299. [*Sepsis*] (1847); SCHIN., F. A.,
II. 183. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 11.
5. (1874).
- nigricornis* MEIG., S. B., V. 291. 13. [*Sepsis*] (1826); WALK., Entom. Europa centr.
Mag., I. 252. 3. [*Nemopoda*] (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 481. et sept.

2. [*Nemopoda*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 229. 13. (1902).
- ? *cylindrica* FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 22. 3. (excl. synonym. FABR.) [*Sepsis*] (1830).
- Falleri* STAEG., Sepsid. Kröjer's Tidskr., I. 32. 10. [*Sepsis*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2296. 12. [*Sepsis*] (1847); SCHIN., F. A., II. 183. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 11. 4. [*Meroplus*] (1874).
- Leachi* ZETT., Ins. Lapp., 748. 2. (excl. syn. MEIG.) (1838).
- phantasma** ROB.-DESV., Myod., 746. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buff., Gallia. II. 480. 2. [*Cheligaster*] (1835).
- pilosa** ROB.-DESV., Myod., 746. 1. (1830); WALK., Entom. Mag., I. 254. 2. (1853). Gallia, Britannia.
- superba* HALID., Entom. Mag., I. 170. 2. (1833).
- pusilla** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2295. 11. [*Sepsis*] (1847). Europa sept.
- putris* var. *b.* ZETT., Ins. Lapp., 748. 1. (1838).
- putris** L., Fauna Suec., 1850. var. *fimeti* [*Musca*] (1761); SCOP., Entom. carn., 904. [*Musca*] (1763); FABR., Spec. Ins., II. 445. 51. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2849. 89. [*Musca*] (1793); FARR., Entom. syst., IV. 334. 92. [*Musca*] (1794); SCHRANK, Fauna Boica, III. 2471. [*Musca*] (1803); FABR., Syst. Antl., 323. 34. [*Tephritis*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Ortalid., 21. 1. [*Sepsis*] (1820); MEIG., S. B., V. 292. 15. [*Sepsis*] (1826); HALID., Entom. Mag., I. 170. [*Sepsis*] (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 479. 1. [*Cheligaster*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 748. 1. [*Sepsis*] (1838); STAEG., Sepsid. Kröjer's Tidskr., I. 29. 7. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2290. 8. [*Sepsis*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 212. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 182. (1864); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 12. 1. (1874).
- fimeti* SCHRANK, Fauna Boica, III. 2471. (1803).
- putris* var. *b.* ZETT. = **pusilla** ZETT.
- Schembrii** ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 10. Italia. 2. [*Meroplus*] (1874).
- spinosa** VERRAL, Entom. Monthly Mag., XXII. 233. (1885). Britannia.
- superba* HALID. = **pilosa** ROB.-DESV.

Nemopoda

ROB.-DESV., Myod., 743. 5. (1830).

Calobata p. p., FABR., Syst. Antl. (1805).

Meroplus ROND., p. p., Tanypez. (1874).

algira MACQ., Dipt. exot., II. 3 part. 232. (1843); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 499. 263. (1849). Algeria.

bruniceosa ROB.-DESV., Myod., 745. 4. (1830). Gallia.

X **cylindrica** FABR., Entom. syst., IV. 336. 164. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 263. 11. [*Calobata*] (1805); MEIG. S. B., V. 290. 12. [*Sepsis*] Europa, Africa sept.

(1826); WALK., Entom. Mag., I. 251. (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 480. 1. [*Sepsis*] (1835); BOUCHÉ, Naturg. d. Insekt., 95. 85. t. VI. f. 8, 9. [*Sepsis*] (1837); ZETT., Ins. Lapp., 748. 3. (1838); STAEG., Sepsid. Kröjer's Tidskr., I. 33. 12. [*Sepsis*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2301. 17. [*Sepsis*] (1847); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 499. 262. (1849); WALK., Ins. Brit., II. 211. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 181. (1864); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 12. 1. (1874); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 84. (1883).

nitidula FALL., Dipt. Suec. Ortolid., 21. 2. [*Sepsis*] (1820).

putris ROB.-DESV., Myod., 744. 1. (1830).

fumipennis WALK., Entom. Mag., I. 253. (1833).

Britannia.

gagatea ROB.-DESV., Myod., 745. 5. (1830).

Gallia.

nigrilatera MACQ., Suit. à Buff., II. 481. 5. (1835); MEIG., S. B., VII. 351. 10. (1838); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 12. 2. (1874).

Gallia, Italia.

nitidula FALL. = *cylindrica* FABR.

X *pectinulata* Lw., Europ. Dipt., III. 305. 208. (1873).

Silesia.

putris ROB.-DESV. = *cylindrica* FABR.

rufipes MEIG. ♀ (*nec* ♂) = *stercoraria* ROB.-DESV.

stercoraria ROB.-DESV., Myod., 745. 3. (1830); WALK., Entom. Mag., I. 251. 2. (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 482. 7. (1835); MEIG., S. B., VII. 351. 12. (1838); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2298. 14. [*Sepsis*] (1847); SCHIN., F. A., II. 181. (1864); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 10. 3. [*Meroplus*] (1874).

Europa centr.
et sept.

rufipes MEIG., S. B., VII. 349. 12. (16). ♂ (*nec* ♂) [*Sepsis*] (1838); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 230. 12. (1902).

tarsalis WALK., Entom. Mag., I. 252. (1833).

Britannia,
Hollandia.

umbripennis WULP., Tijdschr. f. Entom., XIV. 190. (1871).

varipes STAEG. (*nec* MEIG.), Kröjer's Tidskr., I. 34. 13. [*Sepsis*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2303. 18. [*Sepsis*] (1847); WALK., The Entom., No. 92. 345. 89. (1871).

Europa centr.
et sept.,
Aegyptus.
Gallia.

viridis MACQ., Suit. à Buff., II. 481. 6. (1835); MEIG., S. B., VII. 351. 11. (1838).

Saltella > Pandora Hal. 1833

ROB.-DESV., Myod., 746. 7. (1830).

Anisophysa MACQ., Suit. à Buff., II. (1835).

Ochthera p. p., DRAPIEZ, Annal. génér. des Sciences phys. (1820).

Pandora HALID., The entom. Mag., I. (1833).

albipennis MACQ., Suit. à Buff., II. 545. 2. [*Anisophysa*] (1835).

Gallia.

basalis HALID., Entom. Mag., I. 170. [*Pandora*] (1833).

Britannia.

distincta MEIG. = *scutellaris* FALL.

ferruginea ROB.-DESV., MACQ., MEIG. = *scutellaris* FALL.

humeralis v. Ros. = *scutellaris* FALL.

Saltella Das. 1833 is unknown to Hendel 1910.

- longipes** ROB.-DESV., *Myod.*, 747. 1. (1830). Gallia.
melanocephala var. **scutellaris** FALL.
nana ROB.-DESV. *Myod.*, 747. 3. (1830). Gallia.
nigerrima ROND., *Tanypez.*, 13. 3. (1874). Italia.
nigripes ROB.-DESV., MACQ., WALK., MEIG. = **scutellaris** FALL.
parmensis ROND., *Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze*, VI. 13. 1. (1874). Italia.
pectoralis ZETT. = **scutellaris** FALL.
ruficoxa MACQ., MEIG. = **scutellaris** FALL.
X **scutellaris** FALL., *Heterom.*, 10. 3. [*Piophila*] (1820); MEIG., S. B., Europa.
V. 397. 7. [*Piophila*] (1826); HALID., *Entom. Mag.*, I. 169. [*Pandora*]
(1833); MACQ., *Suit. à Buff.*, II. 544. 1. [*Anisophysa*] (1835); LW.,
Stettin. Entom. Zeitg., 182. (1841); ZETT., *Dipt. Scand.*, VI. 2520.
15. (1847); WALK., *Ins. Brit.*, II. 213. 2. (1853); SCHIN., F. A., II.
184. (1864); ROND., *Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze*, VI.
13. 2. (1874).
distincta MEIG., S. B., VII. 360. 12. [*Piophila*] (1838); BECK.,
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 249. 12. (1902).
ferruginea ROB.-DESV., *Myod.*, 744. 2. [*Nemopoda*] (1830); MACQ.,
Suit. à Buff., II. 482. 9. [*Nemopoda*] (1835); MEIG., S. B., VII.
352. 13. [*Nemopoda*] (1838).
humeralis v. Ros., *Württemb. Corrbll.*, 61. [*Piophila*] (1840);
BECK., *Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. i. Württemb.*, No.
15. pag. 56. (1902).
melanocephala var. *DRAPIEZ*, *Ann. génér. des Sciences phys.*
[*Ochthera*] (1820).
nigripes ROB.-DESV., *Myod.*, 747. 2. (1830); MACQ., *Suit. à Buff.*,
II. 665. 1. (1835); MEIG., S. B., VII. 352. 1. (1838); WALK.,
Entom. Mag., I. 255. [*Sepsis*] (1833) et *Ins. Brit.*, II. 213. 1. (1853).
pectoralis ZETT., *Dipt. Scand.*, VI. 2515. 8. (1847).
ruficoxa MACQ., *Suit. à Buff.*, II. 481. 4. [*Nemopoda*] (1835);
MEIG., S. B., VII. 351. 9. [*Nemopoda*] (1838).
scutellata MACQ., *Suit. à Buff.*, II. 481. 3. [*Nemopoda*] (1835);
MEIG., S. B., VII. 351. 8. [*Nemopoda*] (1838).
sellata CURTIS, *Guide*, 1297. 19. (1829); HALID., *Entom. Mag.*,
II. 186. (1834).
scutellata MACQ. = **scutellaris** FALL.
sellata HALID., CURTIS = **scutellaris** FALL.
sphondylii SCHRANK = **scutellaris** FALL.

Piophila

FALL., *Dipt. Suec. Heteromyz.*, 8. (1820).

Tyrophaga KIRBY.

- X **affinis** MEIG., S. B., VI. 383. 9. (1830); ZETT., *Dipt. Scand.*, VI. 2511. Grönlandia,
3. (1847); SCHIN., F. A., II. 186. (1864); LUNDB., *Vidensk. Medd.*, Europa centr.
299. 142. (1900). et sept.

- casei* STAEG., Grönl. Antl. Kröjer's Tidskr., I. 368. 51. (1845).
pilosa HOLMGR., Öfvers. Kgl. Vetensk. Akad. Förh., XXIX. 6. 104. (1872).
pygmaea ZETT., Ins. Lapp., 772. 4. (1838).
vulgaris FALL., Dipt. Suec. Heteromyz., 9. 2. (1820).
- analís** v. Ros., Württemb. Corrb., 61. (1840); BECK., Jahresber. d. Germania. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 14. pag. 56. (1902).
- apii** WESTW., Garden Chron., 21. 332. (1848); SCHAUM., Bericht. f. Britannia, Entom., 186. 291. (1848); KALTENB., Pflanzenf., 267. 8. (1872); Germania.
 BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 84. (1883).
- arctica** HOLMGR., Entom. Tidskr., 177. 43. (1883). Europa sept.
- aterrima** BECK., Mém. de l'Acad. Imp. des Sc. St. Petersb., 402. 7. Now-Semlja. (1897).
- atrata* FABR., MEIG., MACQ., ZETT. = *casei* L.
- caerulescens** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2517. 11. (1847). Scandinavia.
- casei** L., Fauna Suec., var. 1850. [*Musca*] (1761); FALL., Dipt. Suec. Europa, Heteromyz., 9. 1. (1820); MEIG., S. B., V. 395. 1. (1826); MACQ., Grönlandia, Suit. à Buff., II. 541. 1. (1835); BOUCHÉ, Naturg. d. Ins., 99. 90. Aegyptus, (1837); ZETT., Ins. Lapp., 772. 1. (1838); GERMAR, Stettin. entom. I. Madeira. Zeitg., 126. (1841); DUF., Ann. Sc. natur., 365. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2510. 1. (1847); DAHLB., Skand. Ins., 323. 221. t. II. f. 24. (1837); WALK., Ins. Brit., II. 222. 1. (1853); WOLLASTON, Ann. and Mag. of nat. Hist., 261. (1858); SCHIN., F. A., II. 186. (1864); WALK., The entom., No. 92. 346. 91. (1871); ROND., Lonchein. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 7. 1. (1874); KESSLER, Ber. d. Ver. f. Naturk. Cassel, XXIX. et XXX. 58—60. (1883); LUNDB., Vidensk. Medd., 299. 141. (1890); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 247. (1902).
- atrata* FABR., Spec. ins., II. 333. [*Musca*] (1781) et Syst. Antl., 323. 34. [*Tephritis*] (1805); MEIG., S. B., V. 396. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 542. 2. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 772. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2511. 2. (1847).
- petasionis* DUF., Ann. Sc. nat., 369. t. XVI. f. 7. (1844).
- putris* KESSLER, Ber. d. Ver. f. Naturk. Cassel, XXIX. et XXX. 58—60. [*Tephritis*] (1883).
- vulgaris* p. p., FALL., Dipt. Suec. Heteromyz., 9. 2. (1820).
- casei* STAEG. = *affinis* MEIG.
- confinis** MEIG., S. B., VI. 383. 10. (1830); SCHIN., F. A., II. 186. (1864). Germania.
- flaviceps** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2518. 12. (1847). Suecia.
- flavitarsis** MEIG., S. B., VI. 383. 8. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa centr. 543. 6. (1835); SCHIN., F. A., II. 186. (1864); BECK., Zeitschr. f. et sept. Hymenopt. u. Dipt., II. 248. 8. (1902).
- foveolata** MEIG., S. B., V. 396. 4. t. LIV. fig. 3. (1826); MACQ., Suit. Europa centr. à Buff., II. 542. 4. (1835); SCHIN., F. A., II. 185. (1864); ROND., et sept. Lonchein. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 7. 4. (1874); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 248. 4. (1902).
- fulvipes** HOLMGR., Entom. Tidskr., 177. 44. (1883). Now-Semlja.

picea BECK., Mém. de l'Acad. Imp. des Sc. St. Petersb., 404. (9.)
8. (1897).

laevigata MEIG., S. B., VII. 361. 18. (1838); SCHIN., F. A., II. 186. (1864). Germania.

latipes MEIG., S. B., VII. 360. 14. (1838); SCHIN., F. A., II. 186. (1864); Germania.
ROND., Lonchein. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 8. 6. (1874).

lonchaeoides ZETT., Ins. Lapp., 773. 5. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2519. 14. (1847). Suecia sept.

luteata HALID., Entom. Mag., I. 169. (1833); WALK., Ins. Brit., II. 222. (1853). Hibernia.

melanocera ROND., Lonchein. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 7. (1874). Italia.

metallica BRULLÉ, Expéd. sc. en Morée, 324. 716. (1832). Graecia.

nigerrima LUNDB., Vidensk. Medd., 301. 144. (1900). Grönlandia.

nigra BRULLÉ, Expéd. scient. en Morée, 325. 717. (1832). Graecia.

nigriceps MEIG., S. B., V. 397. 5. (1826); v. Ros., Württemb. Corubl., 60. [*Psila*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2516. 10. (1847); SCHIN., F. A., II. 185. (1864); ROND., Lonchein. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 8. 5. (1874); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 126. (1893); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 248. 5. (1902). Europa centr.

vulgaris p. p., FALL., Dipt. Suec. Heteromyz., 9. 2. (1820). et sept.

vulgaris var. ZETT., Ins. Lapp., 772. 3. (1838).

nigricornis MEIG., S. B., V. 397. 6. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 542. 5. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2518. 13. (1847); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 248. 6. (1902). Europa centr.

nigrimana MEIG., S. B., V. 396. 3. t. LIV. f. 5. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 542. 3. (1835) et Hist. nat. d. îles Canaries, 118. 103. et sept., (1839); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2513. 5. (1847); BECK., Zeitschr. Ins. Canar.

f. Hymenopt. u. Dipt., II. 248. 3. (1902).

nitida BRULLÉ, Expéd. scient. en Morée, 325. 718. (1832). Graecia.

petasionis DUF. = *casei* L.

picea BECK. = *fulviceps* HOLMGR.

pilosa STAEG., Grönl. Antl. Kröjer's Tidskr., I. et IV. 368. 52. (1845); Grönlandia.
ZETT., Dipt. Scand., VI. 2514. 7. (1847); LUNDB., Vidensk. Medd., 301. 143. (1900).

pilosa HOLMGR. = *affinis* MEIG.

pusilla MEIG., S. B., VII. 360. 13. (1838); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2514. 6. (1847); SCHIN., F. A., II. 186. (1864); ROND., Lonchein. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 7. 3. (1874). Europa centr.

et sept.

putris KESSLER = *casei* L.

pygmaea ZETT. = *affinis* MEIG.

ruficoxa MACQ., Suit. à Buff., II. 543. 8. (1835); MEIG., S. B., VII. 361. 15. (1838). Gallia.

varipes MEIG., S. B., VI. 384. 11. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 543. 7. (1835); v. Ros., Württemb. Corubl., 60. [*Psila*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2512. 4. (1847); SCHIN., F. A., II. 186. (1864). Europa centr.

et sept.

vicina MEIG., S. B., VII. 362. 19. (1838); SCHIN., F. A., II. 186. (1864). Germania.

viridis MACQ., Suit. à Buff., II. 543. 9. (1835); MEIG., S. B., VII. 361. Gallia. 16. (1838).

vulgaris FALL. = *affinis* MEIG.

vulgaris p. p., FALL. = *casei* L. et *nigriceps* MEIG.

vulgaris var. ZETT. = *nigriceps* MEIG.

Pseudoseps

BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 244. (1902).

latipalpis ZETT. = *signata* FALL.

punctipennis ZETT. = *signata* FALL.

signata FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 9. 5. [*Scatophaga*] (1820); MEIG., Europa sept. S. B., V. 360. 13. [*Psila*] (1826); ZETT., Ann. Soc. entom. Fr., IV. 186. 15. [*Scatophaga*] (1835) et Dipt. Scand., VI. 2409. 20. ♂ (nec ♀) [*Scatophaga*] (1847); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 243. 13. (1902).

latipalpis ZETT., Dipt. Scand., VI. 2411. 21. ♀. [*Scatophaga*] (1847).

punctipennis ZETT., Dipt. Scand., VI. 2516. 9. [*Piophila*] (1847).

Lissa → *meganeurina* Rond.

MEIG., S. B., V. 370. 177. (1826). *nec. Reich 1815 (Crustae)*

Meganeurina ROND., Tanypez., 6. (1874).

dolium FABR., WALK., ROND. = *loxocerina* FALL.

loxocerina FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 6. 1. [*Chyliza*] (1820); MEIG., Europa centr. S. B., V. 370. 1. t. LII. f. 1—4. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. et sept. 377. 1. (1835); SCHIN., F. A., II. 190. (1864).

dolium FABR., Syst. Antl., 315. 12. [*Ocyptera*] (1805); WALK., Ins. Brit., II. 218. 1. (1853); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 6. 1. [*Meganeurina*] (1874).

rufipes GIMMERTH., Bull. de Moscou, VII. 116. (1834).

Livonia.

Mycetaulus

Lw., Dipt. Beitr., I. 37. 1. (1845).

analisis MEIG. = *varius* MEIG.

✓ *bipunctatus* FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 3. 3. [*Geomyza*] (1823); Europa centr. MEIG., S. B., VI. 110. 22. [*Opomyza*] (1830); ZETT., Ins. Lapp., et sept. 773. 6. [*Piophila*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2522. 16. (1847); SCHIN., F. A., II. 187. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 308. 22. (1902).

Hoffmeisteri Lw., Dipt. Beitr., I. 37. 1. (1845).

Hoffmeisteri Lw. = *bipunctatus* FALL.

varius MEIG., ♂ S. B., V. 245. 33. [*Cordylura*] (1826) et VII. 339. [*Chyliza*] Germania, (1838); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 215. 33. (1902).

analisis MEIG., ♀ S. B., V. 244. 32. [*Cordylura*] (1826).

Rhynchaea

ZETT., Dipt. Scand., VI. 2524. 180. (1847).

lonchaeoides ZETT., Dipt. Scand., VI. 2524. 1. (1847); SCHIN., F. A., Suecia. II. 189. (1864).

Amphipogon

WAHLB., Öfvers. af Kongl. Vetensk. Akad. Förh., X. 217. (1844).

Macrochira ZETT., Ins. Lapp. (1838).

flava ZETT. = *spectrum* WAHLB.

spectrum WAHLB., Öfvers. af Kongl. Vet. Akad. Förh., X. 217. 7. t. Europa sept., IV. f. (1844); BOHEM., Entom. Arsber., 198. (1844); ZETT., Dipt. Alpes. Scand., VII. 2685. 1. (1848); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 473. (1878).

flava ZETT., Ins. Lapp., 784. 1. ♀ (*nec* ♂) [*Macrochira*] (1838).

Toxopoda

MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. (1850).

nitida MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 299. 1. (1850).

Aegyptus.

Scotimyza

MACQ., Suit. à Buff., II. 540. 3. (1835).

fuscipennis MACQ., Suit. à Buff., II. 541. 1. (1835).

Gallia.

Amydrosoma

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 140. (1903).

discedens BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 141. 226. t. IVe. f. Aegyptus. 69. (1903).

MICROPEZIDAE.**Calobata**

MEIG., Illig. Mag., II. 276. (1803).

Neria ROB.-DESV., Myod., 736. 1. (1830).

Rainieria ROND., N. Ann. d. Sc. Bologna, X. 44. (1843).

Tanyпода ROND., Prodr., I. 116. (1856).

adusta LW., Berlin. entom. Zeitschr., XIV. 212. 4. (1870); LW., Europ. Germania. Dipt., III. 259. 167. (1873).

- calceata** FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 2. 1. (1820); MEIG., S. B., V. 380. 7. (1826); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2372. 1. (1847); ROND., Prodr., I. 116. [*Tanyponda*] (1856); SCHIN., F. A., II. 192. (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XIV. 211. (1870); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 1. (1874). Europa centr. et sept.
- ✕ **cibaria** L., Fauna Suec., 1859. [*Musca*] (1761); GMEL., Syst. Nat., V. 3853. 102. [*Musca*] (1793); SCHRANK, Fauna Boica, III. 2497. [*Musca*] (1803); MEIG., S. B., V. 378. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 490. 1. t. XX. f. 8. (1835); ZETT., p. p., Ins. Lapp., 756. 1. (1838) et Dipt. Scand., V. 2373. 2. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 214. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 194. (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XIV. 211. (1870); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital., VI. 7. 1. (1874). Europa centr. et sept.
- cothurnata* FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 2. 2. (1820).
- sellata* MEIG., S. B., V. 380. 5. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 490. 5. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 246. 5. (1902).
- solidaginis* ROB.-DESV., Myod., 739. 1. (1830).
- soror* ROB.-DESV., Myod., 739. 2. (1830).
- cibaria* var. *b.* ZETT. = **cothurnata** PANZ.
- corrigiolata* FALL. = **petronella** L.
- cothurnata** PANZ., Fauna Germ., LIV. 20. (1798); MEIG., S. B., V. 379. 3. t. LII. f. 18, 19. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 490. 3. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2375. 3. (1847); SCHIN., F. A., II. 194. (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XIV. 211. (1870); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 63. 129. (1900). Sibiria, Europa centr. et sept.
- cibaria* var. *b.* ZETT., Ins. Lapp., 756. 1. (1838).
- nigricornis* ZETT., Ins. Lapp., 756. 3. (1838).
- cothurnata* FALL. = **cibaria** L.
- dentigera** Lw., N. Beitr., II. 24. 55. (1854). Sibiria.
- ✕ **ephippinm** FABR., Entom. syst., IV. 338. 108. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 263. 13. (1805); PANZ., Fauna Germ., XXVII. [*Musca*] (1796); FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 4. 5. (1820); MEIG., S. B., V. 380. 6. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 491. 6. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2378. 5. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 215. 3. (1853); SCHIN., F. A., II. 193. (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XIV. 211. (1870); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital., VI. 7. 2. (1874). Europa centr. et sept.
- inulae* ROB.-DESV., Myod., 738. 8. [*Neria*] (1830).
- femoralis** WIED., MEIG., S. B., V. 379. 4. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 490. 4. (1835); SCHIN., F. A., II. 194. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 246. 4. (1902). Germania.
- inulae* ROB.-DESV. = **ephippium** FABR.
- latifrons** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XIV. 212. 1. (1870) et Europ. Kultuk.
- Dipt., III. 253. 163. (1873).
- mammillata** Lw., N. Beitr., II. 24. 56. (1854). Sibiria.
- nigricornis* ZETT. = **cothurnata** PANZ.

- nitens** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XIV. 212. 3. (1870) et Europ. Kultuk.
Dipt., III. 256. 165. (1873).
- octoannulata** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 228. 247. (1898). Hispania.
- palustris** MEIG., S. B., VII. 359. 8. (1838). Germania.
- X **petronella** L., Fauna Suec., 1856. (1761) et Syst. Nat., XII. 994. 96. Europa centr.
[Musca] (1766); FABR., Spec. Ins., II. 447. 57. (1781) et Entom. et sept.,
Syst., IV. 336. 103. [Musca] (1794); GMEL., Syst. Nat., V. 2850. N.-Semlja.
96. (1793); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 646. [Musca] (1798);
SCHELLENB., Genr. d. Mouch., t. VI. f. 2. (1803); FABR., Syst.
Antl., 262. 10. (1805); MEIG., S. B., V. 377. 1. (1826); MACQ., Suit.
à Buff., II. 490. 2. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 756. 2. (1838) et Dipt.
Scand., VI. 2376. 4. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 214. 2. (1853);
SCHIN., F. A., II. 193. (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XIV.
211. (1870); BECK., Mém. de l'Acad. Imp. des sc. St Petersburg., 404.
9. (9). (1897).
- corrigiolata* FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 3. 3. (1820).
- sellata* MEIG., MACQ. = **cibaria** L.
- solidaginis* ROB.-DESV. = **cibaria** L.
- soror* ROB.-DESV. = **cibaria** L.
- stylifera** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XIV. 212. 5. (1870) et Europ. Kultuk,
Dipt., III. 255. 164. (1873); BECK., Acta Soc. Scient. Fenn., XXVI. Sibiria.
63. 128. (1900).
- trivialis** Lw., N. Beitr., II. 23. 54. (1854). Germania.

Calobatella

MIK, Wien. entom. Zeitg., XVII. 197. 1. (1898).

- longiceps** Lw., Berlin. entom. Zeitg., XIV. 212. 2. (1870); Lw., Europ. Germania,
Dipt., III. 257. 166. (1877); MIK, Wien. entom. Zeitg., XVII. 196. Hungaria.
1. t. II. f. 1—3. (1898).

Micropeza

MEIG., Illig. Mag., II. 276. (1803).

Phantasma ROB.-DESV., Myod., 740. 1. (1830).

Rhagio p. p., SCHRANK, Fauna Boica, (1803).

- angustipennis** Lw., Berlin. entom. Zeitg., XII. 164. 6. (1868). Rossia mer.
- atripes** BEZZI, Ditt. d. Calabria, 65. (27). (1895). Italia.
- brevipennis** v. Ros., Württemb. Corubl., 60. (1840); Lw., Berlin. Germania.
entom. Zeitschr., XII. 163. 4. (1868); BECK., Jahresber. d. Ver. f.
vaterl. Naturk. in Württemb., No. 13. pag. 56. (1902).
- cingulata** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XII. 165. 7. (1868). Rossia mer.
- X **corrigiolata** L., Syst. Nat., XII. 955. [Musca] (1766); FABR., Spec. Europa centr.
Ins., 447. 59. [Musca] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2852. 100. et sept.
[Musca] (1793); FABR., Entom. syst., IV. 339. 113. [Musca] (1794);

- SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 949. [*Musca*] (1798); SCHELLENB., Genr. d. Mouch., t. VI. f. 1. [*Musca*] (1803); SCHRANK, Fauna Boica, III. 2400. [*Rhagio*] (1803); FABR., Syst. Antl., 263. 15. [*Calobata*] (1805); MEIG., S. B., V. 384. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 492. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 757. 1. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2381. 1. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 216. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 195. (1864); LW., Berlin. entom. Zeitschr., XII. 161. (1868); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 7. 1. (1874).
- filiformis* FABR., Ent. syst., IV. 337. 105. (1794) et Syst. Antl., 263. 14. [*Calobata*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 352. [*Calobata*] (1805); ROB-DESV., Myod., 740. 1. [*Phantasma*] (1830).
- filiformis* FABR., LATR., ROB-DESV. = *corrigiolata* L.
- grallatrix* LW., Berlin. entom. Zeitschr., XII. 393. (1868). Europa mer.
- hispanica* BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., 387. (1886). Hispania.
- Kawalli* GIMMERTH., Bull. d. Moscou, III. Beitr. 196. (1847); LW., Berlin. entom. Zeitschr., XII. 164. 5. (1868). Russia.
- lateralis* MEIG., S. B., V. 383. 1. t. LIII. f. 5. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 492. 2. (1835); SCHIN., F. A., II. 195. (1864); LW., Berlin. entom. Zeitschr., XII. 161 et 393. (1868); ROND., Tanypez. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VI. 8. 2. (1874); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 246. 1. (1902). Germania.
- nigra* LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XLIII. 418. 17. (1874). Persia.
- thoracica* ROB-DESV., Myod., 740. 2. [*Phantasma*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 492. 3. (1835); MEIG., S. B., VII. 359. 3. (1838); Ew., Berlin. entom. Zeitschr., XII. 163. 3. (1868). Europa centr.

PSILIDAE.

Psila

MEIG., Illig. Mag., II. 278. (1803).

Herbina p. p., ROB-DESV., Myod., 699. (1830).

Oblicia ROB-DESV., Myod., 620. II. (1830).

Psilomyia p. p. MACQ., Suit. à Buff., (1835).

abdominalis SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges., 186. (1843); SCHIN., F. A., II. 204. (1864). Silesia.

X *atra* MEIG., S. B., V. 359. 10. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 422. 6. Europa centr.
[*Psilomyia*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2407. 17. [*Scatophaga*] et sept.
(1847); SCHIN., F. A., II. 206. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 243. 10. (1902).

nigra MEIG. (nec FALL.), S. B., V. 359. 8. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 422. 7. [*Psilomyia*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 243. 8. (1902).

- atrimana** MEIG., S. B., V. 360. 12. (1826); SCHIN., F. A., II. 205. (1864). Europa centr.
- Bertolini** ROND., Chyliz. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VIII. 4. 2. Italia.
(1876).
- bicolor** MEIG., S. B., V. 358. 4. t. 51. f. 13. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 421. 3. [*Psilomyia*] (1835); ZETT., Ann. Soc. entom. Fr., IV. 178. 4. [*Scatophaga*] (1835); HALID., Entom. Mag., IV. 148. (1837); ZETT., Ins. Lapp., 759. 4. [*Scatophaga*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2394. 4. [*Scatophaga*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 221. 4. (1853); SCHIN., F. A., II. 204. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 242. 4. (1902).
pallida var. β . FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 9. (1820).
- buccata** FALL., Dipt. Suec. Opomyz. Suppl., 9. 6. [*Scatophaga*] (1826); Suecia.
ZETT., Dipt. Scand., VI. 2404. 14. [*Scatophaga*] (1847).
- caucasica** MIK, Wien. entom. Zeitg., 164. 6. (1887). Caucasus.
- debilis** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 767. (1862); SCHIN., F. Austria.
A., II. 204. (1864).
- dubia** Macq., Suit. à Buff., II. 422. 9. [*Psilomyia*] (1835); MEIG., S. Gallia.
B., VII. 357. 15. (1838).
? rubetra ROB.-DESV., Myod., 699. 2. [*Herbina*] (1830).
- ephippium** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2395. 5. [*Scatophaga*] (1847). Europa sept.
- ✕ **fmietaria** L., Fauna Suec., 1862. [*Musca*] (1761); FABR., Spec. Ins., II. 449. 75. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2853. 106. Europa centr.
[*Musca*] (1793); FABR., Entom. syst., IV. 346. 140. [*Musca*] (1794); et sept.
SCHRANK, Enum. Ins. Austr. [*Musca*] (1798) et Fauna Boica, III. 2498. [*Volucella*] (1803); FABR., Syst. Antl., 204. 5. [*Scatophaga*] (1805); MEIG., S. B., V. 356. 1. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 421. 1. [*Psilomyia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 759. 1. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2391. 1. [*Scatophaga*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 220. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 203. (1864); ROND., Chyliz. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VIII. 4. 1. (1876).
flava PANZ., Fauna Germ., XX. 22. [*Musca*] (1794); SCHELLENB., Genr. d. Mouch., t. V. [*Musca*] (1803).
immaculata v. Ros., Württemb. Corrb., 61. [*Helomyza*] (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No 24. pag. 58. (1902).
rufa Scop., Entom. carn., 335. 897. [*Musca*] (1763).
testacea ROB.-DESV., Myod., 620. 1. [*Oblicia*] (1830).
- flava* PANZ., SCHELLENB. = **fmietaria** L.
- fuscinervis* ZETT., SCHIN. = **gracilis** MEIG.
- ✕ **gracilis** MEIG., S. B., V. 359. 9. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 422. Europa centr.
8. [*Psilomyia*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 760. 9. (1838) et Dipt. et sept.
Scand., VI. 2406. 16. [*Scatophaga*] (1847); SCHIN., F. A., II. 205. (1864); ROND., Chyliz. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VIII. 5. 6. (1876); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 243. 9. (1902).
fuscinervis ZETT., Ann. Soc. entom. Fr., I. 4. 183. 11. (1835); Ins. Lapp., 761. 10. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2405. 15. [*Scatophaga*] (1847); SCHIN., F. A., II. 205. (1864).

villosula MEIG., S. B., V. 360. 11. (1826); SCHIN., F. A., II. 206. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 243. 11. (1902).

humeralis ZETT., SCHIN. = *rosae* FABR.

immaculata v. ROS. = *finetaria* L.

intermedia MACQ., Suit. à Buff., II. 421. 5. [*Psilomyia*] (1835); MEIG., Gallia. S. B., VII. 357. 14. (1838).

limbatella ZETT., Dipt. Scand., VI. 2401. 11. [*Scatophaga*] (1847). Suecia.

✕ *morio* ZETT., Ann. Soc. entom. Fr., IV. 185. 14. (1835); Ins. Lapp., Europa sept. 761. 12. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2409. 19. [*Scatophaga*] (1847); SCHIN., F. A., II. 205. (1864).

✕ *nigra* FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 9. 4. [*Scatophaga*] (1820); ZETT., Ann. Soc. entom. Fr., IV. 185. 13. var. *a.* (1835); Ins. Lapp., Europa centr. et sept. 761. 11. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2408. 18. [*Scatophaga*] (1847); SCHIN., F. A., II. 206. (1864); ROND., Chyliz. Bull. soc. entom. Ital. Firenze, VIII. 6. 8. (1876).

nigra MEIG. (nec FALL.), MACQ. = *atra* MEIG.

nigricornis MEIG., ZETT., SCHIN., CURTIS, ROND., STROBL = *rosae* FABR.

nigrotaeniata STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 229. 251. (1899). Hispania. Austria.

obscuritarsis LW., N. Beitr., IV. 54. 56. (1856).

pallida FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 9. 2. [*Scatophaga*] (1820); MEIG., S. B., V. 357. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 421. 2. [*Psilomyia*] (1835); ZETT., Ann. Soc. entom. Fr., IV. 178. 3. (1835); Ins. Lapp., 759. 3. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2394. 3. [*Scatophaga*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 221. 3. (1853); SCHIN., F. A., II. 203. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt. II. 242. 2. (1902).

pallida var. β . FALL. = *bicolor* MEIG.

pectoralis MEIG., ZETT., SCHIN., ROND. = *rosae* FABR.

quadrilineata STROBL, Dipt. v. Steierm., IV. 260. (1898).

✕ *rosae* FABR., Entom. syst., IV. 356. 181. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 319. 12. [*Tephritis*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 9. 3. var. β . et 8. [*Scatophaga*] (1820); MEIG., S. B., V. 358. 6. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 421. 4. [*Psilomyia*] (1835); ZETT., Ann. Soc. entom. Fr., IV. 181. 8. [*Scatophaga*] (1835); KOLLAR, Naturg. d. schäd. Ins., 168. (1837); BOUCHÉ, Naturg., I. 322. 220. (1837); ZETT., Ins. Lapp., 760. 7. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2402. 12. [*Scatophaga*] (1847); CURTIS, Journ. of the roy. Soc. of Agricult., IX. (1850); WALK., Ins. Brit., II. 221. 5. (1853); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, I—III. 17. (1855); CURTIS, Farm Ins., 404. (1860); SCHIN., F. A., II. 206. (1864); ROND., Chyliz. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VIII. 5. 3. (1876); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien. 88. (1883).

✕ *humeralis* ZETT., Dipt. Scand., VI. 2401. 10. [*Scatophaga*] (1847); SCHIN., F. A., II. 205. (1864).

✕ *nigricornis* MEIG., S. B., V. 359. 7. (1826); ZETT., Ann. Soc. entom. Fr., IV. 182. 9. (1835); Ins. Lapp., 760. 8. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2403. 13. [*Scatophaga*] (1847); SCHIN., F.

A., II. 206. (1864); ROND., Chyliz. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VIII. 5. 5. (1876); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 229. 249. (1899); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 243. 7. (1902).

X *pectoralis* MEIG., S. B., V. 358. 5. (1826); ZETT., Ann. Soc. entom. Fr., IV. 181. 7. (1835) et Dipt. Scand., VI. 2400. 9. [*Scatophaga*] (1847); SCHIN., F. A., II. 205. (1864); ROND., Chyliz. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VIII. 5. 3. (1876); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 242. 5. (1902).

rubetra ROB.-DESV. = *dubia* MACQ.

rufa MEIG., S. B., V. 357. 3. (1826); ZETT., Bnn. Soc. entom. Fr., IV. 177. 2. (1835); Ins. Lapp., 759. 2. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2393. 2. [*Scatophaga*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 220. 2. (1853); SCHIN., F. A., II. 203. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 242. 3. (1902). Europa centr. et sept.

rufa SCOP. = *finetaria* L.

sardoa ROND., Chyliz. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VIII. 6. 7. (1876). Italia.

tarsella ZETT., Dipt. Scand., XII. 4790. 18—19. [*Scatophaga*] (1855). Oelandia.

testacea ROB.-DESV. = *finetaria* L.

unilineata ZETT., Dipt. Scand., V. 2396. [*Scatophaga*] (1847). Scandinavia.

villosula MEIG., SCHIN. = *gracilis* MEIG.

Psilosoma

ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6377. 1. (1860).

Pachylomera ROND., Chyliz. Bull. Soc. entom. Ital., 2. (1876).

Audouini ZETT., Ann. Soc. entom. Fr., IV. 179. 5. var. a. t. IVB. f. 1. (1835); Ins. Lapp., 759. 5. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2397. 7. [*Scatophaga*] (1847) et XIV. 6378. 1. (1860); SCHIN., F. A., II. 207. (1864); ROND., Chyliz. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VIII. 3. 1. [*Pachylomera*] (1876). Europa centr. et sept.

dispar SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. Breslau, 186. (1843). Silesia.

X *Lefebvrei* ZETT., Ann. Soc. entom. Fr., 180. 6. (1835); Ins. Lapp., 760. 6. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2398. 8. [*Scatophaga*] (1847) et XIV. 6378. 2. (1860); SCHIN., F. A., II. 207. (1864); ROND., Chyliz. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VIII. 3. 2. [*Pachylomera*] (1876). Europa centr. et sept.

Platystyla

MACQ., Suit. à Buff., II. 374. (1835).

Hoffmannsegg MEIG., S. B., V. 366. 5. [*Loxocera*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 375. 1. (1835); BOIE, Kröjer's Naturh. Tidskr., 248. (1838); MEIG., S. B., VII. 358. t. LXXIV. f. 28—31. (1838); Europa centr. et mer.

v. Ros., Württemb. Corrbibl., 60. (1840); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2385. Observ. [*Loxocera*] (1847); Rossi, Zweifl. Ins. d. Erzherzogsth. Östr. 71. (1855); SCHIN., F. A., II. 199. (1864); ROND., Chyliz. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VIII. 9. (1876); v. RÖD., Berlin. entom. Zeitschr., XXVI. 384. (1882); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 26. 72. (1891).

paradoxa ROB.-DESV., Myod., 666. 1. [*Loxocera*] (1830).

paradoxa ROB.-DESV. = **Hoffmannsegg** MEIG.

Chyliza

FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 6. (1820).

Dasyna ROB.-DESV., Myod., 667. II. (1830).

analisis MEIG., S. B., V. 244. 32. (1826) s. **Mycetaulus** gen.

annulipes MACQ., Suit. à Buff., II. 380. 2. (1835); MEIG., S. B., VII. 359. 5. (1838); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2426. 2. (1847). Gallia.

fuscipennis ROB.-DESV., Myod., 668. 1. [*Dasyna*] (1830).

fuscipennis ROB.-DESV. = *annulipes* MEIG.

gracilis LW., N. Beitr., II. 23. 53. (1854). Turcia.

leptogaster MEIG., MACQ., SCHIN., BEZZI = **permixta** ROND.

leptogaster PANZ., FALL., ZETT. = **scutellata** FABR.

obscuripennis LW., Wien. entom. Monatschr., II. 11. (1858); SCHIN., F. A., II. 201. (1864). Austria.

obscuripennis var. LW. = **scutellata** FABR.

Peleterii ROB.-DESV. = **scutellata** FABR.

permixta ROND., Chyliz. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VIII. 11. 2. (1876). Europa centr. et mer.

leptogaster MEIG., S. B., V. 368. 1. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 379. 1. (1835); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 494. 246. (1849); SCHIN., F. A., II. 201. (1864); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 26. 70. (1891).

pumila MACQ., Suit. à Buff., II. 380. 6. (1835); MEIG., S. B., VII. 359. 6. (1838). Gallia.

scutellata FABR., Entom. syst. Suppl., 567. 5. (1798) et Syst. Antl., 257. 8. [*Sargus*] (1805); WALK., Ins. Brit., II. 219. 1. (1853); KALTENB., Pflanzenf., 242. 15. (1872); ROND., Chyliz. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VIII. 10. 1. (1876); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 63. 130. (1900). Europa, Sibiria.

leptogaster PANZ., Fauna Germ., LIV. 19. [*Musca*] (1798); FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 7. 2. (1820); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2425. (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. f. entom. Breslau, I—III. 13. (1855); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 88. (1883).

obscuripennis var. LW., Wien. entom. Monatschr., II. 11. (1858).

Peleterii ROB.-DESV., Myod., 668. 2. (1830).

varia MEIG., S. B., V. 244. 33. (1826) s. **Mycetaulus** gen.

- ✕ *vittata* MEIG., S. B., V. 369. 3. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 380. Europa centr.
5. (1835); SCHIN., F. A., II. 202. (1864); ROND., Chyliz. Bull. Soc.
entom. Ital. Firenze, VIII. 11. 3. (1876).

Megachetum

ROND., Prodr., I. 123. (1856).

- atriseta* MEIG., S. B., V. 369. 2. t. LI. f. 26. [*Chyliza*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 380. 2. [*Chyliza*] (1835); PERRIS, Mém. Soc. et mer.
d'Agricult. et des Arts de Lille, [*Chyliza*] (1853); ROND., Prodr.,
I. 123. (1856); SCHIN., F. A., II. 200. [*Chyliza*] (1864); KALTENB.,
Pflanzenf., 457. 1. (1872); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien,
88. (1883).

extenuatum ROSSI, Fauna Etrusca, [*Musca*] (1790); ROND., Chyliz.

Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, 9. (1876); STROBL, Wien. entom.
Zeitg., XVIII. 229. 248. (1899).

extenuatum ROSSI, ROND., STROBL = *atriseta* MEIG.

Strongylophthalmyia

HELLER, Wien. entom. Zeitg., XXI. 226. (1902).

Strongylophthalmus HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXI. 179.
(1902).

- ustulata* ZETT., Dipt. Scand., VI. 2427. 3. [*Chyliza*] (1847); HENDEL, Europa sept.
Wien. entom. Zeitg., XXI. 180. Fig. (1902).

filata ZETT. (nomen in collectione LUND.), Dipt. Scand., VI.
2428. (1847).

filata ZETT. = *ustulata* ZETT.

Loxocera

MEIG., Illig. Mag., II. 275. (1803).

albiseta SCHRANK, LW. = *ichneumonea* L.

aristata PANZ. = *ichneumonea* L.

aristata LW. = *elongata* MEIG.

atriceps BIGOT = *elongata* MEIG.

confusa ZETT. = *ichneumonea* L.

dimidiata v. ROS. = *elongata* MEIG.

dorsalis LW. = *nigrifrons* MACQ.

- elongata* MEIG., S. B., V. 364. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 373. Europa centr.
2. (1835); SCHIN., F. A., II. 197. (1864); ROND., Chyliz. Bull. Soc.
entom. Ital. Firenze, VIII. 7. 1. (1876).

aristata LW., Zeitschr. f. entom. Breslau, 202. (1859, nec 1857).

? *atriceps* BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., Bull., LXXXV. (1886).

dimidiata v. ROS., Württemb. Corbl., 60. (1840); BECK., Jahres-

ber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb.. No. 12. pag. 55. (1902).

ichneumonea FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 7. 1. (1820); ZETT.,

Ins. Lapp., 757. 1. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2383. 1. (1847).

fulviventris MEIG., S. B., V. 365. 4. t. LI. f. 21. (1826); MACQ., Suit. Europa centr.
à Buff., II. 374. 4. (1835); MEIG., S. B., VII. 357. 4. (1838); ZETT., et sept.

Dipt. Scand., VI. 2388. 4. (1847); SCHIN., F. A., II. 197. (1864);

Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XI. 22. 4. (1859, nec 1857);

BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 244. 5. (1902).

hortoniensis CURTIS = **nigrifrons** MACQ.

ichneumonea L., Fauna Suec., 1809. [*Musca*] (1761); FABR., Spec. Europa centr.
Spec. ins., II. 429. 39. [*Syrphus*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. et sept.

2873. 42. [*Musca*] (1793); FABR., Entom. syst., IV. 297. 70. [*Syr-*

phus] (1794) et Entom. syst. Suppl., 559. 7. [*Mulio*] (1798);

SCHELLENB., Genre d. Mouch., t. VII. [*Musca*] (1803); FABR., Syst.

Antl., 202. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 356. (1809);

MEIG., S. B., V. 363. 1. (1826); ROB-DESV., Myod., 667. 2. (1830);

MACQ., Suit. à Buff., II. 373. 1. (1835); WALK., Ins. Brit., II. 217.

1. (1853); SCHIN., F. A., II. 198. (1864); ROND., Chyliz. Bull. Soc.

entom. Ital. Firenze, VIII. 8. 4. (1876); BEZZI, Contrib. alla F. ditt.

di Pavia, 26. 71. (1891).

✕ *albiseta* SCHRANK, Fauna Boica, III. 2406. [*Nemotelus*] (1803);

Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XI. 23. 6. (1859, nec 1857).

✕ *aristata* PANZ., Fauna Germ., LXXIII. 24. [*Musca*] (1801).

confusa ZETT., Ins. Lapp., 758. 2. (1838) et Dipt. Scand., VI.

2386. (1847).

ichneumonea FALL., ZETT. = **elongata** MEIG.

intermedia ROB-DESV., Myod., 667. 3. (1830); Lw., Zeitschr. f. entom. Gallia.
Breslau, XI. 19. (1859, nec 1857).

maculata ROND., Chyliz. Bull. Soc. entom. Ital. Firenze, VIII. 7. 2. Italia.
(1876).

marginata ROND., Chyliz. Bull. Soc. entom. Ital., VIII. 8. 3. (1876). Italia.

nigrifrons MACQ., Suit. à Buff., II. 374. 5. (1835); ZETT., Dipt. Scand., Europa centr.
XIV. 6373. 5. (1860); SCHIN., F. A., II. 198. (1864). et sept.

dorsalis Lw., N. Beitr., II. 22. 52. (1854) et Zeitschr. f. Entom.

Breslau, XI. 23. 5. (1859, nec 1857).

hortoniensis CURTIS, Guide (1829).

sylvatica MEIG., S. B., V. 365. 3. t. LI. f. 22. (1826); MACQ., Suit. à Europa centr.
Buff., II. 374. 3. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 758. 3. (1838) et Dipt. et sept.

Scand., VI. 2387. 3. (1838); WALK., Ins. Brit., 217. 2. (1853);

Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XI. 21. 3. (1859, nec 1857); SCHIN.,

F. A., II. 198. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II.

244. 3. (1902).

Lamprophthalma

PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross. (1891).

metallica PORTSCH., Horae Soc. entom. Ross., 226. (1891).

Persia.

CHLOROPIDAE.

Chloropinae.

Centor

Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XV. 7. I. (1866, *nec* 1861).

- agnata** HALID., Entom. Mag., I. 173. [*Chlorops*] (1833). Britannia.
 X **cereris** FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 5. 3. [*Oscinis*] (1820); MEIG., S. Europa.
 B., VI. 150. 23. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 596.
 28. [*Chlorops*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 779. 5. (1838) et Dipt.
 Scand., VII. 2633. 28. [*Oscinis*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 229.
 9. [*Chlorops*] (1853); SCHIN., F. A., II. 216. [*Chlorops*] (1864); Lw.,
 Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 8. 1. (1866); BEZZI, Contrib. alla
 F. ditt. di Pavia, 24. 62. [*Chlorops*] (1891); BECK., Zeitschr. f.
 Hymenopt. u. Dipt., II. 317. 23. (1902).
scutellatus PANZ., Fauna Germ., CIV. 21. (1806).
cereris p. p. ZETT. = **nudipes** Lw.
elongatus MEIG., S. B., VI. 151. 26. [*Chlorops*] (1830); BECK., Zeitschr. Germania.
 f. Hymenopt. u. Dipt., II. 317. 26. (1902).
 X **myopinus** Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 9. 2. (1866). Germania.
nudipes Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 10. 3. (1866). Germania,
cereris p. p., ZETT., Dipt. Scand., VII. 2633. 28. [*Oscinis*] (1844). Suecia.
scutellatus PANZ. = **cereris** FALL.

Capnoptera

Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 11. II. (1866).

- ? **fumipennis** Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 14. 4. (1866). Sibiria.
 X ? **hyalipennis** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 246. 253. (1899). Hispania.
melanota Lw. = **phaeoptera** MEIG.
phaeoptera MEIG., S. B., VI. 153. 30. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. Europa mer.
 à Buff., II. 598. 3. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt.,
 II. 318. 30. (1902).
melanota Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 11. 1. (1866);
 STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 246. 252. (1899).
pilosa Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 12. 2. (1866). Sicilia,
scutata ROSSI, Fauna Etrusca, Vol. II. 314. 1530. [*Musca*] (1790); Italia mer.
 Bezzi, Ditt. d. Calabria, 70. (32). (1895).
sicula Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 13. 3. (1866). Sicilia.

Anthracophaga

Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 15. III. (1866).

- ✕ **andalusciaca** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 47. 254. (1899). Hispania.
cingulata MEIG., v. ROS., SCHIN. = **strigula** FABR.
frontosa MEIG., S. B., VI. 148. 18. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 595. 21. [*Chlorops*] (1835); Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 18. 2. (1866). Europa centr.
Scholtzi EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 778. [*Chlorops*] (1862); SCHIN., F. A., II. 216. [*Chlorops*] (1864); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 84. (1883).
lineata var. *b. longicornis* FALL. = **longicornis** ZETT.
longicornis ZETT., Dipt. Scand., VII. 2605. 7. [*Oscinis*] (1848); Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 20. 3. (1866). Europa centr. et sept.
lineata var. *b.* FALL., Dipt. Suec. Oseimid., 4. 2. [*Oscinis*] (1820).
Scholtzi EGG., SCHIN. — **frontosa** MEIG.
strigula FABR., Ent. syst., IV. 334. 95. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 324. 38. [*Tephritis*] (1805); Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 16. 1. (1866). Europa centr. et sept.
cingulata MEIG., S. B., VI. 146. 15. [*Chlorops*] (1830); v. ROS., Württemb. Corrb., 63. (1840); SCHIN., F. A., II. 212. [*Chlorops*] (1864); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 43. p. 62. (1902).
taeniata MACQ., Suit. à Buff., II. 594. 19. [*Chlorops*] (1835); MEIG., S. B., VII. 386. 70. [*Chlorops*] (1838).
taeniata MACQ., MEIG. = **strigula** FABR.

Metopostigma

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin (1903).

- polonica** SCHNABL, Pam. Fizyogr., 2. (1884). Polonia.
tenuiseta Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XLIV. 203. 8. (1874); Africa sept. et mer.
 BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 147. 235. t. IVd. f. 66, 67, 68. (1903).

Haplegis

Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 22. IV. (1866).

- albitarsis* MEIG. = **tarsata** FALL.
diadema MEIG., S. B., VI. 158. 47. [*Chlorops*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 319. 47. (1902). Silesia.
rufifrons Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 23. 1. (1866).
 ✕ **divergens** Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 24. 3. (1866). Germania.
tarsata MEIG., S. B., VI. 151. 25. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 597. 31. [*Chlorops*] (1835); SCHIN., F. A., II. 217. [*Chlorops*] (1864) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 67.

- (1872); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 317. 25.
(1902).
- flavitarsis** MEIG., S. B., VI. 161. 56. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Germania.
Buff., II. 604. 33. (1833); SCHIN., F. A., II. 224. [*Oscinis*] (1864);
BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 320. 56. (1902).
- obscuripennis** LW., Zeitschr. f. Naturw., XLIII. 420. 21. (1874). Rossia mer.
rufifrons LW. = **diadema** MEIG.
- tarsata** FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 5. 5. [*Oscinis*] (1820); ZETT., Dipt. Europa centr.
Scand., VII. 2638. 32. [*Oscinis*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 229. et sept.
11. [*Chlorops*] (1853); GIRAUD, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII.
1251. (1863); LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 23. 2. (1866);
BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 85. (1883).
- albitarsis* MEIG., S. B., VII. 384. 61. [*Chlorops*] (1838); SCHIN.,
F. A., II. 217. [*Chlorops*] (1864).
- tarsata* MEIG., MACQ., SCHIN. = **divergens** LW.

Eutropha

- LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 26. V. (1866).
- albiceps** MEIG., S. B., VI. 153. 32. [*Chlorops*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 318. 31. (1902). Germania.
- erythrocephala* ZETT. = **fulvifrons** HALID.
- fulvifrons** HALID., Entom. Mag., I. 173. [*Chlorops*] (1833); LW., Hibernia,
Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 27. 2. (1866). Suecia.
- erythrocephala* ZETT., Dipt. Scand., 2639. 33. [*Oscinis*] (1848).
- ruficeps* ZETT., Ins. Lapp., 780. 7. var. a. [*Oscinis*] (1838).
- ingrata** LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 26. 1. (1866). Silesia.
- maculata** LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 29. 4. (1866). Rossia mer.
- ruficeps* ZETT. = **fulvifrons** HALID.
- ✕ **Thalhammeri** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 226. 3. (1893) et Hungaria,
XVIII. 248. 255. (1899). Hispania.
- variegata** LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 28. 3. (1866). Silesia.

Diplotoxa

- LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 31. VI. (1866).
- ✕ **albipila** LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 37. 4. (1866). Germania.
- approximatonervis** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2622. 19. [*Oscinis*] Europa centr.
(1848); LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 33. 2. (1866). et sept.
- ? *curvinervis* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2620. 17. [*Oscinis*] (1848).
- curvinervis* ZETT. = **approximatonervis** ZETT.
- dalmatina** STROBL, Wiss. Mitth. aus Bosn. u. d. Herzegov. Wien, Dalmatia.
VII. 78. (1900).
- ✕ **inconstans** LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 35. 3. (1866). Germania.
- ✕ **messoria** FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 5. 4. [*Oscinis*] (1820); MEIG., Europa centr.
et sept.

S. B., VI. 151. 24. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 596. 29. [*Chlorops*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 780. 6. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2637. 31. [*Oscinis*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 229. 10. [*Chlorops*] (1835); SCHIN., F. A., II. 217. [*Chlorops*] (1864); Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 32. 1. (1866).

Novakii STROBL, Balkan Dipt. Sarajevo, 41. (1902).

Turcia.

pachycera STROBL, Balkan Dipt. Sarajevo, 40. (1902).

Turcia.

Meromyza

MEIG., S. B., VI. 163. 220. (1830).

basalis v. ROS. = **nigriventris** MACQ.

clavicus GMEL., SCHRANK = **saltatrix** L.

femorata MACQ., Suit. à Buff., II. 589. 4. (1835); MEIG., S. B., VII. 395. 6. (1838).

laeta MEIG., SCHIN. = **variegata** MEIG.

minuta GMEL., FABR. = **saltatrix** L.

✕ **nigriventris** MACQ., Suit. à Buff., II. 590. 5. (1835); MEIG., S. B., VII. 395. 5. (1838); ZETT., Dipt. Scand., 2591. 4. (1848); SCHIN., F. A., II. 210. (1864). Europa centr. et sept.

basalis v. ROS., Württemb. Corrbibl., 63. (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 54. p. 64. (1902).

saltatrix var. *c.* ZETT., Ins. Lapp., 778. 2. (1838).

pratorum MEIG., S. B., VI. 165. 1. t. LXI. f. 25. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 589. 3. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2586. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 225. 2. (1853); SCHIN., F. A., II. 209. (1864); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 64. 132. (1900). Europa centr. et sept., Sibiria.

rufescens v. ROS. = **variegata** MEIG.

✕ **saltatrix** L., Fauna Suec., 2319. (1761) et Syst. Nat., II. 988. 60. [Musca] (1766); FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 3. 1. [*Oscinis*] (1820); MEIG., S. B., VI. 165. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 589. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 778. 2. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2589.

3. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 225. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 210. (1864); BEZZI, Contrib. alla Fauna ditt. di Pavia, 24. 55. (1891).

clavicus GMEL., Syst. Nat., I. 5. 2862. 299. [Musca] (1793); SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 958. [Musca] (1798).

minuta GMEL., Syst. Nat., I. 5. 2859. 254. [Musca] (1793); FABR., Entom. syst., IV. 361. 202. [Musca] (1794) et Syst. Antl., 303. 21. [*Tephritis*] (1805).

saltatrix var. *c.* FALL. = **variegata** MEIG.

saltatrix var. *c.* ZETT. = **nigriventris** MACQ.

✕ **variegata** MEIG., S. B., VI. 165. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 225. 3. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 778. 1. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2587. 2. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 225. 3. (1853); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 24. 56. (1891); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 337. 2. (1902). Europa.

- laeta* MEIG., S. B., VII. 395. 4. (1838); SCHIN., F. A., II. 210. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 338. 4. (1902).
rufescens v. Ros., Württemb. Corrbibl., 63. (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 52. p. 63. (1902).
saltatrix var. FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 3. 1. [*Oscinis*] (1820).
variegata HALID. (nec MEIG.), Entom. Mag., I. 172. (1833). Britannia.
variegata SCHIN. (nec MEIG.), F. A., II. 210. (1864). Europa centr.
virescens v. Ros., Württemb. Corrbibl., 63. (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 53. p. 63. (1902). Germania.
viridula HALID., Entom. Mag., I. 172. (1833). Britannia.
- ### Chlorops
- MEIG., Illig. Mag., II. 278. (1803).
agnata HALID., Entom. Mag., I. 173. (1833). Hibernia.
albiseta MACQ., Suit. à Buff., II. 596. 26. (1835); MEIG., S. B., VII. 387. 72. (1838). Gallia.
annulipes BRULLÉ, Expéd. en Morée, 320. 702. (1832). Graecia.
annulipes MACQ., Suit. à Buff., II. 597. 32. (1835); MEIG., S. B., VII. 387. 75. (1838). Gallia.
bilineata BIGOT, Voyage Alluaud aux îles Canaries (1890). Ins. Canariae.
binotata LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 74. 19. (1866). Silesia.
brevifrons LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 51. 6. (1866). Germania.
brevimana LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 48. 4. (1866). Silesia.
brunnicornis MACQ., Suit. à Buff., II. 591. 3. (1835); MEIG., S. B., VII. 385. 65. (1838). Gallia.
brunnipes ZETT., Dipt. Scand., VII. 2626. 22. [*Oscinis*] (1848). Suecia.
calceata MEIG., S. B., VI. 146. 13. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 594. 16. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2603. 3. [*Oscinis*] (1848). Europa centr. et sept.
cinctipes MEIG., S. B., VI. 148. 19. (1830); WALK., Ins. Brit., II. 228. 6. (1853); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 317. 19. (1902). Britannia.
citrinella ZETT., Dipt. Scand., VII. 2630. 25. [*Oscinis*] (1848). Suecia.
confluens MEIG., S. B., VI. 141. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 592. 5. (1853); SCHIN., F. A., II. 217. (1864). Germania.
copiosa SCHIN., Verh. zool.-bot. ges. Wien, XXII. 70. (1872). Europa.
dasycera LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XI. 46. 3. (1866). Germania.
didyma SCHIN. = *serena* LW.
didyma ZETT., Dipt. Scand., VII. 2606. 6. [*Oscinis*] (1848); LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 67. 15. (1866); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 24. 57. (1891). Italia, Suecia.
discicornis LW. = *laeta* MEIG.
divisa LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 70. 16. (1866). Silesia.
ephippium ZETT., Dipt. Scand., VII. 2664. 54. [*Oscinis*] (1848). Suecia.

- fasciata* MEIG., S. B., VI. 143. 7. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 593. 10. (1835); SCHIN., F. A., II. 217. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 316. 7. (1902). Germania.
- figurata* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2631. 26. [*Oscinis*] (1848); MIK, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 208. 87. (1899). Suecia, Austria.
- flavifrons* MACQ., Suit. à Buff., II. 591. 4. (1835); MEIG., S. B., VII. 386. 66. (1838). Gallia.
- fulviceps* v. Ros., Württemb. Corrbll., 62. (1840); BECK., Jahresber. d. Verh. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 42. pag. 62. (1902). Germania.
- fuscipennis* A. COSTA, Atti Accad. Napoli, Mem. II. 105. (1883). Italia.
- geminata* MEIG., S. B., VI. 140. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 592. 6. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2629. 24. [*Oscinis*] (1848); SCHIN., F. A., II. 212. (1864); Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 75. 20. (1866); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 316. 4. (1902). Europa centr. et sept.
- gentilis* MEIG., S. B., VI. 144. 8. (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 316. 8. (1902). Germania.
- gracilis* MEIG., S. B., VI. 140. 1. t. LXI. f. 17. (1830); MACQ., Suit. à Buff., 590. 1. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2632. 27. [*Oscinis*] (1848); SCHIN., F. A., II. 211. (1864); Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 73. 18. (1866); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 315. 1. (1902). Germania.
- ✕ *hirsuta* Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 76. 21. (1866). Europae. et m.
- ✕ *humilis* Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 59. 10. (1866). Silesia.
- ✕ *hypostigma* MEIG., S. B., VI. 141. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 591. 2. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2617. 15. [*Oscinis*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 227. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 214. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 315. 2. (1902). Europa centr. et sept.
- minuta* Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 57. 9. (1866).
- incisuralis* MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 205. 2. (1850). Aegyptus.
- interrupta* MEIG., S. B., VI. 145. 11. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 593. 14. (1835). Germania.
- ✕ *laeta* MEIG., S. B., VI. 143. 6. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 592. 9. (1835); ZETT., p. p., Ins. Lapp., 779. 2. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2604. 4. [*Oscinis*] (1848); SCHIN., F. A., II. 214. (1864); WEJENB., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXI. 1205. (1871); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 61. (1872); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., CCVI. (1875); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 316. 6. (1902). Europa centr. et sept.
- discicornis* Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 66. 14. (1866).
- lateralis* HALID., Entom. Mag., I. 172. (1833). Suecia,
- scutellaris* ZETT., Ins. Lapp., 779. 4. (1838); Dipt. Scand., VII. 2634. 29. [*Oscinis*] (1848). Hibernia.
- lateralis* MACQ., Suit. à Buff., II. 597. 30. (1835); MEIG., S. B., VII. 387. 74. (1838). Gallia.
- limbata* MEIG., S. B., VI. 150. 22. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 596. 25. (1835); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 386. (1871); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 317. 22. (1902). Germania.

- lineata** FABR., Entom. syst., IV. 356. 180. (1794) et Syst. Antl., 215. Europa.
4. [*Musca*] (1805); SCHRANK, Fauna Boica, III. 2462. [*Musca*] (1803); FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 4. 2. [*Oscinis*] (1820); WESTW., Garden chronicle, 48. 780. 796. (1848); WEJENB., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXI. 1207. (1871); WESTW., The oat fly. Gard. chron. new, série XVI. 505. f. 95. (1881); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 85. (1883); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 24. 60. (1891).
- lineata** var. FALL. = **taeniopa** MEIG.
- lineola** BRULLÉ, Expéd. en Morée, 321. 703. (1832). Graecia.
- lineola** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2605. 5. [*Oscinis*] (1848). Dania.
- longicornis** THOMS., Eugenes Resa, p. 604. 302. (1868). China.
- longula** MEIG., S. B., VII. 389. 83. (1838); SCHIN., F. A., II. 225. [*Oscinis*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 337. 83. (1902). Bavaria.
- lucida** PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 193. (1876). Gallia.
- maculipennis** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2665. 55. [*Oscinis*] (1848). Suecia.
- Meigeni** LW. = **nasuta** SCHRANK.
- minuta** LW. = **hypostigma** MEIG.
- X **nasuta** SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 966. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat., I. 5. 2863. 304. [*Musca*] (1793); GEOFFR., Ins., II. 537. 87. Europa centr.
[*Musca*] (1799); SCHELLENB., Genr. d. Mouch., t. IV. f. 1. (1803); MEIG., S. B., VI. 142. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 592. 6. et sept.
(1835); WALK., Ins. Brit., II. 227. 4. (1853); SCHIN., F. A., II. 213. (1864); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 24. 58. (1891); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 316. 5. (1902).
- **Meigeni** LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 43. 2. (1866).
- umbelliferarum** SCHRANK, Fauna Boica, 2463. (1803).
- nasuta** ZETT. = **speciosa** MEIG.
- nigrimana** MACQ., Suit. à Buff., II. 592. 8. (1835); MEIG., S. B., VII. 386. 67. (1838). Gallia.
- nigrithorax** STROBL, Dipt. v. Steierm., II. 114. (1894). Styria.
- nigriventris** MACQ., Suit. à Buff., II. 596. 27. (1835); MEIG., S. B., VII. 387. 73. (1838). Gallia.
- notata** MEIG., S. B., VI. 144. 10. (1830); WALK., Ins. Brit., II. 227. 2. Europa centr.
(1853); SCHIN., F. A., II. 214. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 316. 10. (1902).
- X **ornata** MEIG., S. B., VI. 152. 27. (1830). Germania.
- pallens** LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 71. 17. (1866). Germania.
- pannonica** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 228. 4. (1893). Hungaria.
- X **planifrons** LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 55. 8. (1866). Silesia.
- pulchra** SCHIN., F. A., II. 212. (1864); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 24. 61. (1891). Italia,
Austria.
- pumilionis** OLIVIER, Mém. de la Soc. d'Agricult. du Départ. de la Seine, XVI. 12. fig. 12. (1813). Gallia.
- puncticollis** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2636. 30. [*Oscinis*] (1848); LW., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 42. 1. (1866). Europa centr.
et sept.

- puncticornis** Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 64. 13. (1866). Gallia mer.
pygmaea MEIG., S. B., VII. 385. 63. (1838); SCHIN., F. A., II. 217. Bavaria.
 (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 320. 63. (1902).
ringens Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. p. 46. 2a et p. 60. 11. Europa centr.
 (1866). et or.
ruficeps Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. 305. 1. (1850). Aegyptus.
rufina ZETT., Dipt. Scand., VII. 2628. 23. [*Oscinis*] (1848); Lw., Zeit- Europa centr.
 schr. f. Entom. Breslau, XV. 78. 22. (1866). et sept.
rufiventris Macq., Suit. à Buff., II. 593. 11. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
 386. 68. (1838).
scalaris MEIG., S. B., VI. 145. 12. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 593. Europa.
 15. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2602. 2. [*Oscinis*] (1848);
 WALK., Ins. Brit., II. 227. 3. (1853); SCHIN., F. A., II. 213. (1864);
 FRFELD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 895. (1868); BEZZI,
 Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 24. 59. (1891).
scutellaris ZETT. = *lateralis* HALID.
serena Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 62. 12. (1866). Germania.
didyma SCHIN., F. A., II. 213. (1864).
speciosa MEIG., S. B., VI. 146. 14. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. Europa centr.
 594. 17. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2610. 9. [*Oscinis*] (1848); et sept.
 Lw., Zeitschr. allgem. Naturw., XXIV. 394. 173. (1864) et Zeitschr.
 f. Entom. Breslau, XV. 52. 7. (1866).
nasuta ZETT., Ins. Lapp., 779. 1. (1838) et Dipt. Scand., VII.
 2599. 1. [*Oscinis*] (1848); WEJENB., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
 XXI. 1206. (1871).
strigula MEIG. (nec FABR.), S. B., VI. 147. 16. (1830); CoQUEB., Icon. Germania,
 Illustr., t. XXIV. f. 6. (1804); LATR., Gen. Crust., IV. 351. [*Os-* Gallia.
cinis] (1809); Macq., Suit. à Buff., II. 594. 20. (1835); BECK., Zeit-
 schr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 316. 16. (1902).
sulcata WULP, Tijdschr. v. Entom., XIV. 202. (1871). Hollandia.
taeniopa MEIG., S. B., VI. 144. 9. (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 593. Europa centr.
 13. (1835); GUÉR., Mém. de la Soc. d'Agric. de Fr. (1842); et sept.
 ZETT., Dipt. Scand., VII. 2623. 20. [*Oscinis*] (1848); CURTIS, Gard.
 chronicl. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 228. 5. (1853); Lw., Zeitschr.
 Naturw., XXIV. 395. 174. (1864) et Zeitschr. f. Entom. Breslau,
 XV. 50. 5. (1866); KALTENB., Pflanzenf., 734. 14. (1872); BRAUER,
 Zweif. d. Kais. Mus. Wien, 85. (1883); BECK., Zeitschr. f. Hyme-
 nopt. u. Dipt., II. 316. 9. (1902).
lineata var. FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 4. 2. [*Oscinis*] (1820).
taeniopa SCHIN. (nec MEIG.), F. A., II. 215. (1864); BECK., Zeitschr. f. Austria.
 Hymenopt. u. Dipt., II. 316. 9. (1902).
trogodytes ZETT., Dipt. Scand., VII. 2626. 21. [*Oscinis*] (1848). Suecia.
umbelliferarum SCHRANK = *nasuta* SCHRANK.
viridis v. Ros., Württemb. Corrb., 63. (1840); BECK., Jahresber. d. Germania.
 Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No 47. p. 63. (1902).

Chloropisca

Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 79. VIII. (1866).

abbreviata ZETT. = *rufa* MACQ.

analis MEIG. = *glabra* MEIG.

× *circumdata* MEIG., S. B., VI. 147. 17. [*Chlorops*] (1830); ZETT., Dipt. Europa.
Scand., VII. 2612. 10. [*Oscinis*] (1848); SCHIN., F. A., II. 215.
[*Chlorops*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 317.
17. (1902).

notata ZETT., Dipt. Scand., VII. 2617. 14. [*Oscinis*] (1848).

ornata LW. (nec MEIG.), Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 80. 1.
(1866); MIK, Dipt. v. Hernstein, (69). 29. (1885).

quadrinaculata v. Ros., Württemb. Corbl., 62. [*Chlorops*] (1840);
BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb.,
No. 37. pag. 60. (1902).

geniculata MEIG., S. B., VII. 390. 84. [*Chlorops*] (1838); BECK., Zeit- Bavaria.
schr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 337. 84. (1902).

glabra MEIG., S. B., VI. 149. 20. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Europa,
Buff., II. 595. 22. [*Chlorops*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2614. Africa sept.
12. [*Oscinis*] (1848); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 501.
272. (1849); WALK., Ins. Brit., II. 228. 7. [*Chlorops*] (1853); SCHIN.,
F. A., II. 214. [*Chlorops*] (1864); Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau,
XV. 85. 3. (1866); WESTW., Gard. chron., XIII. 289. (1878);
BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 84. (1883); KÜHN, Sitzgsber. d.
Berlin. entom. Ver., 11. (1887); MIK, Wien. entom. Zeitg., VII.
111. (1888); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 317. 20.
(1902).

analis MEIG., S. B., VII. 387. 71. [*Chlorops*] (1838).

lineata MEIG., S. B., VI. 149. 21. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit.
à Buff., II. 595. 23. [*Chlorops*] (1835).

? *lineata* FABR., Spec. Ins., II. 453. 95. (1781); Ent. syst., IV.
356. 180. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 215. 4. [*Oscinis*]
(1805).

nigrimana MACQ., Suit. à Buff., II. 595. 24. [*Chlorops*] (1835).

lacta ZETT. = *trifasciata* ZETT.

lineata MEIG., WALK., FABR. (?) = *glabra* MEIG.

lineata ZETT., Dipt. Scand., VII. 2615. 13. [*Oscinis*] (1848). Suecia.

lucida MEIG., S. B., VII. 384. 62. [*Chlorops*] (1838); SCHIN., F. A., II. Bavaria.
217. [*Chlorops*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II.
320. 62. (1902).

lucidifrons BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 146. 235. (1903). Aegyptus.

nigrimana MACQ. = *glabra* MEIG.

notata ZETT. = *circumdata* MEIG.

obscorella ZETT., Ins. Lapp., 779. 3. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2619. Europa.
16. [*Oscinis*] (1848); Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 83. 2.
(1866).

ornata LW. = *circumdata* MEIG.

- parvula** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2620. 17. [*Oscinis*] (1848). Suecia.
quadrimaculata v. Ros. = **circumdata** MEIG.
 X **rufa** MACQ., Suit. à Buff., II. 593. 12. [*Chlorops*] (1835); MEIG., S. B., VII. 386. 69. [*Chlorops*] (1838); Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 88. 5. (1866); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 249. 258. (1899). Europa centr. et mer.
 ? *abbreviata* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2612. 10. [*Oscinis*] (1848).
simplex MEIG., S. B., VII. 385. 64. [*Chlorops*] (1838); SCHIN., F. A., II. 217. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 320. 64. (1902). Bavaria.
trifasciata ZETT., Dipt. Scand., VII. 2609. 8. [*Oscinis*] (1848); Lw., Zeitschr. f. Entom. Breslau, XV. 87. 4. (1866). Europa centr. et sept.
 ? *laeta* ZETT., Ins. Lapp., 779. 2. [*Oscinis*] (1838).

Camarota

MEIG., S. B., VI. 7. 193. (1830).

aurifrons HALID. = **flavitarsis** MEIG.

cerealis ROND., STROBL = **flavitarsis** MEIG.

- X **flavitarsis** MEIG., S. B., VI. 7. 1. t. LV. f. 15—21. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 560. 1. (1885); SCHIN., F. A., II. 223. (1864); MÜK, Wien. entom. Zeitg., XV. 247. 58. (1896) et XVI. 61. (1897); OST.-SACK., Monthly Mag., 257. (1896). Europa.

aurifrons HALID., Entom. Mag., I. 172. (1833).

cerealis ROND., Bull. Com. Agr. Ann., VI. 103—105. con fig. (1873); MARCHAL, Monthly Mag., 30. (1897); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 249. 259. (1899).

rufimana v. Ros., Württemb. Corbl., 61. (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 17. p. 56. (1902).

rufimana v. Ros. = **flavitarsis** MEIG.

Platycephala

FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 2. (1820).

agrorum FALL. = **umbraculata** FABR.

culmorum FALL. = **planifrons** FABR.

nigra MEIG., S. B., VI. 26. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 428. 3. (1835). Gallia.

planifrons FABR., Entom. syst. Suppl., 565. [*Musca*] (1798); COQUEB., Illustr., 105. t. XXIV. f. 1. (1798—1804); FABR., Syst. Antl., 214. 1. [*Oscinis*] (1805); LATR., Hist. nat., XIV. 385. [*Tetunocera*] (1805); MEIG., S. B., VI. 25. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 427. 1. (1835); CURTIS, Brit. Entom., 725. (1823—40); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2582. 25. (1848); SCHIN., F. A., II. 208. (1864). Europa centr. et sept.

culmorum FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 2. 1. (1820).

- umbraculata* FABR., Entom. syst., IV. 348. 148. [*Musca*] (1794) et Europa centr.
 Syst. Antl., 215. 2. [*Oscinis*] (1805); MEIG., S. B., VI. 26. t. LVI. et sept.
 f. 16. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 427. 2. 1835); BOIE, Kröjer's
 Tidskr. (1838); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2583. 2. (1848); WALK.,
 Ins. Brit., II. 224. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 209. (1864); BRAUER,
 Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 84. (1883).
agrorum FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 2. 2. [*Oscinis*] (1820).

Eurina

MEIG., S. B., VI. 3. 191. (1830).

- ✕ *calva* EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 778. (1862); SCHIN., F. A., Hungaria.
 II. 222. (1864).
clypeata MEIG. = *lurida* MEIG.
dalmatina STROBL = *ducalis* A. COSTA.
ducalis A. COSTA, Rendiconti Accad. Napoli. Decemb. (1885) et Atti Italia,
 Accad. Napoli, Mem. V. 24. (1856). Dalmatia.
dalmatina STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 127. (1893).
lurida MEIG., S. B., VI. 5. 2. t. LV. f. 12. (1830); MACQ., Suit. à Buff., Lusitania,
 II. 420. 2. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 250. Aegyptus,
 2. (1902). Hungaria.
clypeata MEIG., S. B., VI. 5. 3. (1830).
nuda LW., Wien. entom. Monatschr., II. 75. 14, (1858); BECK.,
 Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 150. 241. (1903).
nuda LW. = *lurida* MEIG.
 ✕ *pubescens* MEIG., S. B., VI. 4. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 420. Europa centr.
 1. (1835); SCHIN., F. A., II. 221. (1864).
quadristriata SCHUMM., Arb. u. Veränd. d. Schles. Ges. f. vaterl.
 Cult. Breslau, 166. 3. (1846).
quadristriata SCHUMM. = *pubescens* MEIG.
triangularis BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 150. 142. (1903). Aegyptus.

Homalura

MEIG., S. B., V. 399. 186. (1826).

- flava* BRULLÉ, Expéd. scient. de Morée, III. 324. 714. (1832). Graecia.
tarsata MEIG., S. B., V. 399. 1. t. LIV. f. 6—9. (1826); MACQ., Suit. Europa centr.
 à Buff., II. 586. 1. (1835); SCHIN., F. A., II. 220. (1864).

Dicraeus

Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 51. 65. (1873).

- obscurus* LW., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 51. 65. (1873); STROBL, Europa centr.
 Tief's Nachl., 64. (1900). et mer.

Scoliophthalmus

BECK., Mittheil. Zool. Mus. Berlin, II. p. 147. (1903).

trapezoides BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 147. 237. t. IVd. f. Aegyptus.
f. 58, 59, 60, 61. (1903).

Stenophthalmus

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 148. (1903).

ocellatus BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 148. 238. t. IVd. f. Aegyptus.
54, 55, 56, 57. (1903).

Lagaroceras

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 149. (1903).

megalops BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 149. 239. t. IVd. f. Aegyptus.
62, 63, 64, 65. (1903).

Assuania

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 150. (1903).

glabra BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 150. 240. t. IVe. f. 73. Aegyptus.
74, 75, 76. (1903).

Oscininae.**Siphonella**

MACQ., Suit. à Buff., II. 584. 7. (1835).

Eurinella MEUNIER, Ann. Soc. entom. Fr., Bullet. CXCI. (1893).

Siphunculina ROND., Prodr., I. 128. (1856). *microneurum* BK.

- X **aenea** MACQ., Suit. à Buff., II. 585. 3. (1835). Gallia.
angustifrons MEIG., S. B., VI. 157. 44. [*Chlorops*] (1830); BECK., Zeit- Germania.
 schr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 319. 44. (1902).
aprica MEIG., S. B., VI. 158. 46. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., Germania.
 II. 601. 18. (1835); SCHIN., F. A., II. 231. (1864).
basalis v. ROS., Württemb. Corrb., 62. [*Chlorops*] (1840); BECK., Jah- Germania.
 resber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 41. pag. 61.
 (1902).
brevinervis STROBL, Tief's Nachl., 62. (1900). Carinthia.
brevinervis*) ROND., Prodr., I. 128. [*Siphunculina*] (1856).
capreola HALID., VERRAL, List of Brit. Dipt., 29—36. (1901). Britannia.
dasyprocta LW., Wien. entom. Monatsehr., II. 66. 6. [*Oscinis*] (1858); Sicilia,
 STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 249. 265. (1899). Hispania.

*) Nomen sine descriptione.

- diptotoxoides** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 250. 9. (1893). Styria.
- × **flavella** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2666. 56. [*Oscinis*] (1848); SCHIN., Suecia,
F. A., II. 229. (1864). Austria.
- × **laevigata** FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 9. 1. [*Madiza*] (1820); SCHIN., Europa centr.
F. A., II. 229. (1864). et sept.
- ? *oscinina* MACQ., Suit. à Buff., II. 585. 1. (1835); ZETT., Ins.
Lapp., 782. 1. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2668. 1. [*Madiza*]
(1848).
- laevigata** ZETT. (*nec* FALL.), Dipt. Scand., VII. 2672. 3. [*Madiza*] Suecia.
(1848).
- longirostris** LW., Wien. entom. Monatschr., II. 61. 4. [*Oscinis*] (1858). Rhodus.
- marginata** LW., Wien. entom. Monatschr., II. 69. 9. [*Oscinis*] (1858). Sicil., Turcia.
- minutissima** STROBL, Wiss. Mitth. a. Bosn. u. d. Herzegov. Wien, VII. Dalmatia.
81. (631). (1900).
- nigricornis** v. Ros. = **tristis** LW.
- nitida** MEIG. = **oscinina** FALL.
- niveipennis** STROBL, Wiss. Mitth. a. Bosn. u. d. Herzegov. Wien, Dalmatia.
VII. 81. (631). (1900).
- Novakii** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 131. (1893). Austria mer.
- × **nucis** PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., I. 8. 45. t. IV. f. 1—8. (1839); Europa.
ZETT., Dipt. Scand., VII. 2670. Observ. 2. [*Madiza*] (1848); FRFLD.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 1230. III. (1863); KALTENB.,
Pflanzenf., 637. 86. (1872); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII.
249. (1899).
- obscurifrons** LW., Wien. entom. Monatschr., II. 68. 8. [*Oscinis*] (1858). Italia mer.
- ornatifrons** LW., Wien. entom. Monatschr., II. 65. 5. [*Oscinis*] (1858). Sicilia.
- oscinina** FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 9. 2. [*Oscinis*] (1820); SCHIN., Europa centr.
F. A., II. 231. (1864); MEUNIER, Ann. Soc. entom. Fr., Bulet.
CXIII. [*Eurinella*] (1893). et sept.
- nitida* MEIG., S. B., VI. 161. 55. [*Chlorops*] (1830).
- oscinina* MACQ., ZETT. = **laevigata** FALL.
- palposa** FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 6. 7. [*Oscinis*] (1820); ZETT., Europa centr.
Dipt. Scand., VII. 2670. 2. [*Madiza*] (1848); FRFLD., Verh. zool.-
bot. Ges. Wien, XIII. 1231. (1863); SCHIN., F. A., II. 230. (1864); et sept.
BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 85. (1883).
- pseudolaevigata** STROBL, Progt. v. Seitenst., 33. (1880) et Wien. Styria.
entom. Zeitg., 252. 10. (1893).
- × **pumilionis** BJERK., K. Vetensk. Akad. Handl., 240—241. [*Musca*] (1778); Europa centr.
FABR., Syst. Antl., 216. 6. [*Oscinis*] (1805); DAHLB., Scand. Ins., 325. et sept.
223. (1837); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2662. 53. [*Oscinis*] (1848);
SCHIN., F. A., II. 229. (1864); WESTW., Garden. chron. new. serie
XVI. 505. (1881); MARCKWICK, Linn. Soc. Transact., II. et Ann.
Soc. entom. Fr., 1 série Tom. 8. XIII. (1893); BRAUER, Zweifl.
d. Kais. Mus. Wien, 85. (1883).
- quinquangula** LW., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 51. 66. (1873). Hungaria.
- ruficeps** MACQ., Suit. à Buff., II. 586. 4. (1835). Gallia.
- ruficornis** MACQ., Suit. à Buff., II. 585. 2. (1835). Gallia.

- sordidissima** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 252. 11. (1893). Hungaria.
sulcicollis MEIG., S. B., VII. 387. 76. [*Chlorops*] (1838); SCHIN., F. A., Germania.
 II. 226. [*Oscinis*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt.,
 II. 320. 76. (1902).
tristis LW., Wien. entom. Monatschr., II. 67. 7. [*Oscinis*] (1858); Germania.
 SCHIN., F. A., II. 231. (1864).
nigricornis v. Ros., Württemb. Corrbibl., 62. [*Chlorops*] (1840);
 BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb.,
 No. 40. pag. 61.

Oscinis > *osciniella* Beck.

LATR., Hist. nat. des Ins. et Crust., XIV. 382. (1804).

- abdominalis** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2661. 52. (1848). Gotlandia,
aenea v. Ros. = **pusilla** MEIG. Suecia.
albidipennis STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 129. (1893). Austria mer.
albipalpis MEIG., S. B., VI. 163. 60. [*Chlorops*] (1830); ZETT., Ins. Europa centr.
 Lapp., 781. 14. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2651. 42. (1848); et sept.
 SCHIN., F. A., II. 226. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u.
 Dipt., II. 320. 60. (1902).
 X **albiseta** MEIG., S. B., VI. 153. 29. [*Chlorops*] (1830); Macq., Suit. à Europa centr.
 Buff., II. 598. 2. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2644. 37. (1838); et sept.
 SCHIN., F. A., II. 224. (1864).
alpicola STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 230. 6. (1893). Alpes.
amoena MEIG., S. B., VI. 394. 107. [*Chlorops*] (1838); BECK., Zeitschr. Germania.
 f. Hymenopt. u. Dipt., II. 337. 107. (1902).
annulata MEIG. = **annulipes** Macq.
annulipes Macq. Suit. à Buff., II. 599. 5. (1835). Gallia.
annulata MEIG., S. B., VII. 391. 90. [*Chlorops*] (1838).
anthracina MEIG., S. B., VI. 156. 40. [*Chlorops*] (1838). Germania.
atra MEIG., S. B., VII. 388. 77. [*Chlorops*] (1838); SCHIN., F. A., II. Bavaria.
 226. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 320. 77.
 (1902).
atricilla ZETT., Ins. Lapp., 781. 11. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2645. Suecia.
 38. (1848); WESTW., Gard. chron., new. serie XVI. 505. fig. 94.
 (1881).
atricornis ZETT., Ins. Lapp., 780. 9. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2642. Suecia.
 (1848).
avenae BJERK., Acta Stockholm., Vol. II. p. 172. [*Musca*] (1781 et Europa centr.
 1784); WESTW., Notae dipt., No 6. Transact. entom. Soc. London, et sept.
 605—626. t. XXII. (1881); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien,
 85. (1883).
basalis ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6441. 42. 43. (1860). Suecia.
bicingulata STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 250. 8. (1893). Austria.
fasciella STROBL, Progr. v. Seitenst., 33. (1880).
bicolor Macq., Suit. à Buff., II. 601. 14. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
 392. 95. (1838).

- bipunctata** MACQ., Suit. à Buff., II. 601. 15. (1835); MEIG., S. B., VII. 392. 94. (1838). Gallia.
- brachyptera** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2660. 51. (1848). Suecia.
- brevirostris** LW., Wien. entom. Monatschr., II. 60. 3. (1858). Turcia.
- brunnitarsis** MACQ., Suit. à Buff., II. 602. 21. (1835); MEIG., S. B., VII. 393. 99. [*Chlorops*] (1838). Gallia.
- capreola** CURTIS, Guide Brit. Ins., 1345. 41b. App. 282. (1829); HALID., Ann. nat. Hist., II. 187. (1839). Britannia.
- cinctella** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2659. 50. (1848). Suecia.
- cognata** MEIG., S. B., VI. 154. 35. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 599. 8. (1835); SCHIN., F. A., II. 226. (1864). Germania.
- coxalis** v. ROS., Württemb. Corrbll., 62. [*Chlorops*] (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in. Württemb., No 39. p. 60. (1902). Germania.
- distincta* v. ROS. = **maura** FALL.
- dubia** MACQ., Suit. à Buff., II. 604. 36. (1835); MEIG., S. B., VII. 394. 106 [*Chlorops*] (1838); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 25. 67. (1891). Europa mer.
- ensifer** THOMS., Eugenes Resa, p. 605. 305. (1868). China.
- fasciella** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4808. 50—51. (1855). Suecia.
- fasciella* STROBL = **bicingulata** STROBL.
- fasciola** MEIG., S. B., VI. 154. 33. [*Chlorops*] (1830). Germania.
- fascipes** MEIG., S. B., VII. 388. 79. [*Chlorops*] (1838); SCHIN., F. A., 227. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 320. 79. (1902). Bavaria.
- flava** MACQ., Suit. à Buff., II. 599. 4. (1835); MEIG., S. B., VII. 391. 89. (1838). Gallia.
- flaviceps** OLIVIER, Mém. de la Soc. d'Agricult. du Départ. de la Seine, XVI. 14. f. 3. (1813). Gallia.
- flavimana** MACQ., Suit. à Buff., II. 603. 27. (1835); MEIG., S. B., VII. 393. 101. [*Chlorops*] (1838). Gallia.
- flavofemorata** MACQ., Suit. à Buff., II. 600. 10. (1835); MEIG., S. B., VII. 392. 91. [*Chlorops*] (1838). Gallia.
- ✕ **frit** L., Fauna Suec., 1851. (1761) et Syst. Nat., II. 994. 90. [*Musca*] (1766); BJERK., Verh. d. Schwed. Akad., 34. (1777); FABR., Spec. Ins., II. 445. 50. (1781) et Entom. syst., IV. 333. 90. [*Musca*] (1794); GMEL., Syst. Nat., I. 5. 2849. 90. [*Musca*] (1793); FABR., Syst. Antl., 216. 5. (1805); FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 7. 9. (1820); MEIG., S. B., VI. 160. 52. [*Chlorops*] (1830); DAHLE., Scand. Ins., 324. 222. (1837); MACQ., Suit. à Buff., II. 603. 28. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 781. 12. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2646. 39. (1848); SCHIN., F. A., II. 224. (1864); F. COHN, Stettin. entom. Zeitg., XXX. 290. (1869); KALTENB., Pflanzenf., 742. [*Chlorops*] (1872); WESTW., Gard. chron., new serie, XVI. 505. (1881); BRISCHKE, Insekt. Feinde, Schrift. naturf. Ges. Danzig, N. Folge V. 97. 125. (1883); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 25. 63. (1891); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 249. 261. (1899). Europa.
- hordei* BJERK., K. Vetensk. Akad. Handl., 34. [*Musca*] (1777).
- frit* var. 3. FALL. = **pusilla** MEIG.

- frontella** FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 7. 10. (1820); MEIG., S. B., VI. Europa.
155. 36. [*Chlorops*] (1830); ZETT., Dipt. Sand., VII. 2653. 44. (1848);
SCHIN., F. A., II. 225. (1864); FR. WACHTL, Wien. entom. Zeitg.,
I. 276. 10. (1882); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 25. 65.
(1891).
- fulvifrons** HALID., Entom. Mag., I. 173. (1833). Britannia.
- fulviventr**is MEIG. = **rufiventr**is MACQ.
- fumipennis** MEIG., S. B., VI. 161. 54. [*Chlorops*] (1830); BECK., Zeit- Germania.
schr. f. Hymenopt. u. Dipt., 320. 54. (1902).
- fuscipes** MACQ., Suit. à Buff., II. 600. 12. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
392. 92. [*Chlorops*] (1838).
- gilvipes** LW., Wien. entom. Monatschr., II. 71. 11. (1858); SCHIN., Germania.
F. A., II. 227. (1864).
- glaberrima** MEIG., S. B., VII. 389. 80. [*Chlorops*] (1838); SCHIN., F. Bavaria.
A., II. 227. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 320.
80. (1902).
- haplegoides** STROBL, Dipt. v. Steyerm., IV. 262. (1894). Styria.
- hordei** BJERKANDER = **frit** L.
- × **humeralis** LW., Wien. entom. Monatschr., II. 59. 2. (1858). Sicilia.
- hyalipennis** MEIG., S. B., VII. 389. 82. [*Chlorops*] (1838); SCHIN., F. Bavaria.
A., II. 227. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 327.
82. (1902).
- insignis** THOMS., Eugenes Resa, p. 605. 304. (1868). China.
- laevifrons** LW., Wien. entom. Monatschr., II. 70. 10. (1858); SCHIN., Germania.
F. A., II. 227. (1864).
- laevigata** MEIG., S. B., VI. 156. 41. [*Chlorops*] (1830). Germania.
- lepida** MEIG. = **plumiger** MEIG.
- longepilosa** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 231. 7. (1893). Styria.
- × **maura** FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 6. 8. (1820); MEIG., S. B., VI. 159. Europa centr.
50. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 602. 24. (1835); et sept.
ZETT., Dipt. Scand., VII. 2643. 36. (1848); WALK., Ins. Brit., II.
231. 3. (1853); SCHIN., F. A., II. 224. (1864).
- distincta** v. ROS., Württemb. Corrb., 62. [*Chlorops*] (1840);
BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No.
38. p. 60. (1902).
- nigrimana** v. ROS., Württemb. Corrb., 63. [*Chlorops*] (1840);
BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb.,
No. 46. p. 63. (1902).
- rufitarsis** MEIG., S. B., VII. 374. 26. [*Hydrellia*] (1838); BECK.,
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 300. 26. (1902).
- nana** ZETT., Ins. Lapp., 782. 15. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2650. 41. Lapponia.
(1848).
- nigerrima** MACQ., Suit. à Buff., II. 603. 29. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
393. 102. [*Chlorops*] (1838); GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., IV.
(1847); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 85. (1883).
- nigra** OLIVIER, Mém. de la Soc. d'Agricult. du Départ. de la Seine, Gallia.
XVI. p. 15. f. 4. (1813).

- nigricornis** v. Ros., Württemb. Corrbibl., 62. [*Chlorops*] (1840). Germania.
- nigrimana** v. Ros. = **maura** FALL.
- nigripes** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2652. 43. (1848). Suecia.
- nigrita** MEIG., S. B., VII. 391. 87. [*Chlorops*] (1838); SCHIN., F. A., II. 227. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 337. 87. (1902). Germania.
- × **nitidissima** MEIG., S. B., VII. 388. 78. [*Chlorops*] (1838); SCHIN., F. A., II. 226. (1864); STROBL, Dipt. v. Steyererm., II. 118. (1894); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 320. 78. (1902). Europa centr.
- obliqua** MACQ., Suit. à Buff., II. 601. 16. (1835); MEIG., S. B., VII. 392. 96. [*Chlorops*] (1838). Gallia.
- pallidiventris** MACQ., Suit. à Buff., II. 600. 13. (1835); MEIG., S. B., VII. 392. 93. [*Chlorops*] (1838). Gallia.
- palposa** MEIG., S. B., VI. 152. 28. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 598. 1. (1835); WALK., Ins. Brit., II. 230. 1. (1853); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 318. 28. (1902). Europa centr. et sept.
- pieta** MEIG., S. B., VII. 391. 88. [*Chlorops*] (1838); SCHIN., F. A., II. 227. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 337. 88. (1902). Bavaria.
- plumiger** MEIG., S. B., VI. 153. 32. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 599. 6. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2655. 45. b. (1848); SCHIN., F. A., II. 225. (1864). Europa centr. et sept.
- lepida* MEIG., S. B., VI. 157. 43. [*Chlorops*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 319. 43. (1902).
- polita* MACQ., MEIG. = **Ephygrobia polita**.
- × **pratensis** MEIG., S. B., VI. 156. 39. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 600. 11. (1835); SCHIN., F. A., II. 225. (1864). Germania.
- × **pusilla** MEIG., S. B., VI. 157. 42. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 602. 22. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 781. 10. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2648. 40. (1848); GIRAUD, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 1251. (1863); SCHIN., F. A., II. 225. (1864); F. COHN, Stettin. entom. Zeitg., XXX. 290. (1869); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 352. (1870); KALTENB., Pflanzenf., 756. 8. (1872); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 85. (1883); W. HUGO, Die Haferfliege Teschen, 14. fig. (1889); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 25. 64. (1891). Europa centr. et sept.
- aenea* v. Ros., Württemb. Corrbibl., 63. [*Chlorops*] (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 48. p. 63. (1902).
- frit* var. 3. FALL., Dipt. Suec. Oseimid., 7. 9. (1820).
- rapta** CURTIS, Guide, 1345. 41d App. 282. (1829); HALID., Ann. nat. Hist., I. XXII. 187. (1838); v. RÖD., Entom. Nachr., XV. 53. (1889). Britannia.
- Rondanii** A. COSTA, Ann. scient., I. 90. 13. (1854). Italia.
- rufescens** WALK., The Entom., No. 92. 345. 90. (1871). Kairo.
- ruficeps** MEIG., S. B., VI. 157. 45. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 602. 23. (1835); SCHIN., F. A., II. 224. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 319. 45. (1902). Germania.
- rufimana** MACQ., Suit. à Buff., II. 601. 19. (1835); MEIG., S. B., VII. 393. 98. [*Chlorops*] (1838). Gallia.

- rufipes** MEIG., S. B., VI. 154. 34. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 599. 7. (1835); SCHIN., F. A., II. 226. (1864); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 25. 66. (1891). Europa centr. et mer.
- rufitarsis** MACQ., Suit. à Buff., II. 604. 32. (1835); MEIG., S. B., VII. 394. 105. [*Chlorops*] (1838). Gallia.
- rufitarsis** MEIG. [*Hydrellia*] = **maura** FALL.
- rufiventris** MACQ., Suit. à Buff., II. 601. 16. (1835). Gallia.
fulviventris MEIG., S. B., VII. 392. 97. [*Chlorops*] (1838).
- sobriculata** STROBL, Tief's dipt. Nachl. Klagenfurt, 63. (1900). Carinthia.
- signata** WOLLASTON, Ann. nat. Hist., 113—117. f. 8. (1858). I. Madeira.
- socia** MEIG., S. B., VI. 155. 38. [*Chlorops*] (1830). Germania.
- styriaca** STROBL, Dipt. v. Steyerm., IV. 263. (1898). Styria.
- tibialis** MACQ., Suit. à Buff., II. 602. 25. (1835); MEIG., S. B., VII. 393. 100. [*Chlorops*] (1838); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XVIII. 249. 263. (1899) et Wiss. Mitth. aus. Bosn. u. d. Herzegov. Wien, VII. 80. (1900). Europa centr. et mer.
- vagans** MEIG., S. B., VII. 389. 81. [*Chlorops*] (1838); SCHIN., F. A., II. 227. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 320. 81. (1902). Bavaria.
- varipes** MEIG., S. B., VII. 390. 86. [*Chlorops*] (1838). Germania.
- × **vindicata** MEIG., S. B., VI. 160. 51. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 603. 26. (1835); SCHIN., F. A., II. 226. (1864). Germania.
- viridescens** MACQ., Suit. à Buff., II. 603. 30. (1835); MEIG., S. B., VII. 393. 103. [*Chlorops*] (1838). Gallia.
- vitripennis** MEIG., S. B., VI. 155. 37. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 600. 9. (1835); SCHIN., F. A., II. 226. (1864). Germania.

Notonaulax

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, p. 153. (1903).

- annulifera** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2658. 48. [*Oscinis*] (1848). Suecia.
- apicalis** v. ROS., Württemb. Corbl., 63. [*Oscinis*] (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemb., No. 45. [*Oscinis*] (1900). Europa centr. et sept.
- sulcella* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2657. 47. [*Oscinis*] (1848).
- cincta** MEIG., S. B., VI. 162. 59. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 604. 35. [*Oscinis*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 781. 13. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2654. 45. [*Oscinis*] (1848); SCHIN., F. A., II. 225. [*Oscinis*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 320. 59. [*Oscinis*] (1902). Europa centr. et sept.
- × **favillacea** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, p. 155. 251. (1903). Aegyptus.
- × **lineella** FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 8. 12. [*Oscinis*] (1820); MEIG., S. B., VI. 162. 58. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 604. 34. [*Oscinis*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 782. 16. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2656. 46. [*Oscinis*] (1848); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 320. 58. [*Oscinis*] (1902). Europa centr. et sept.
- lineola* SCHIN., F. A., II. 225. [*Oscinis*] (1864).

scutellata v. Ros., Württemb. Corrb., 63. [*Oscinis*] (1840); BECK.,
Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württerb., No. 44.
p. 62. [*Oscinis*] (1902).

lineola SCHIN. = *lineella* FALL.

maculifrons BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, p. 154. 249. (1903). Aegyptus.

× *multicingulata* STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 130. [*Siphonella*] Austria.
(1893).

quadrivittata MEIG., S. B., VI. 161. 53. [*Chlorops*] (1830); BECK., Germania.
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 319. 53. [*Oscinis*] (1902).

scutellata v. Ros. = *lineella* FALL.

setulosa BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, p. 154. 250. (1903). Aegyptus.

sordidella ZETT., Dipt. Scand., VII. 2659. 49. [*Oscinis*] (1848). Suecia.

sulcella ZETT. = *apicalis* v. Ros.

trilineata MEIG., S. B., VII. 162. 57. [*Chlorops*] (1830); BECK., Zeit- Germania.
schr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 320. 57. [*Oscinis*] (1902).

Lipara

MEIG., S. B., VI. 1. 189. (1830).

Gymnopoda MACQ., Suit. à Buff., II. 503. (1835).

Homalura WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 573. (1830).

grisea WIED. = *lucens* MEIG.

lucens MEIG., S. B., VI. 1. 1. t. LV. f. 1—5. (1830); MACQ., Suit. à Europa centr.
Buff., II. 503. 1. (1835); SCHIN., F. A., II. 219. (1864); KALTENB., et mer.
Pflanzenf., 765. 38. (1872); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt.,
II. 249. 1. (1902).

grisea WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 573. 1. [*Homalura*]
(1830).

tomentosa MACQ., Suit. à Buff., II. 503. 1. [*Gymnopoda*] (1835);
PERRIS, Mém. de la Soc. des Sc. d'Agricult. et Arts de Lille,
(1853); HEEGER, Sitzgsber. d. Kais. Akad. d. Wiss. Wien,
XX. 342. (1856); LW., Wien. entom. Monatschr., II. 58. (1858);
BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 85. (1883).

minima STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 229. 5. (1893). Styria.

ruftarsis LW., Wien. entom. Monatschr., II. 57. (1858); SCHIN., F. Austria.
A., II. 219. (1864).

similis SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IV. 172. (1854); HEEGER,
Sitzgsber. d. Kais. Akad. d. Wiss. Wien, XX. 342. (1856); LW.,
Wien. entom. Monatschr., II. 57. (1858); GIRAUD, Verh. zool.-bot.
Ges. Wien, XIII. 1251. (1863); KALTENB., Pflanzenf., 765. 40. (1872);
BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 85. (1883).

tomentosa MACQ., LW. = *lucens* MEIG.

Pachycheta

BEZZI, Ditteri d. Calabria, 72. (34). (1895).

aterrima STROBL, Dipt. Feinde um Seitenst., 34. [*Elachiptera*] (1880); Styria, Italia.
BEZZI, Ditteri d. Calabria, 72. (34). (1895).

× **pubescens** THALHAM., Természetr. Füzetek XXI. Budapest, (1898); Hungaria,
STROBL, Wiss. Mitth. Bosnien u. Herzegov., VII. 82. (632). (1900) Dalmatia.
et Wien. entom. Zeitg., XVIII. 250. 268. [*Elachiptera*] (1899).

Gampsocera

SCHIN., Wien. entom. Monatschr., VI. 431. (1862).

numerata HERG., Sitzgsber. Kais. Akad. d. Wiss., XXXI. 302. t. 4. Fennia,
[*Chlorops*] (1858); SCHIN., F. A., II. 233. (1864); PALMÉN, Sitzgsber. Austria.
d. Ges. p. Fauna et Flora fenn. (1870); MİK, Wien. entom. Zeitg.,
VI. 189. 31. (1887) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 180.
1. t. IV. f. 9, 10. (1887); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 85.
(1883).

Elachiptera

MAOQ., Suit. à Buff., II. 621. 21. (1835).

Myrmemorpha DUF., Ann. d. Sc. nat., XXX. 218. (1833).

brachyptera DUF. = **brevipennis** MEIG.

brevipennis MEIG., S. B., VI. 159. 49. t. LXI. f. 19, 20. [*Chlorops*] Europa centr.
(1830); MAOQ., Suit. à Buff., II. 621. 1. (1835); LW., Ueb. bei Danzig
gefang. Dipt. mit verkümm. Flüg. Meseritz, 3. [*Crassiseta*] (1850);
WALK., Ins. Brit., II. 231. 4. [*Oscinis*] (1853); SMITH, Proceed. of
the entom. Soc., III. N. Serie 108. (1855); SCHIN., F. A., II. 232.
(1864); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 85. (1883).

brachyptera DUF., Ann. Soc. nat., XXX. 218. [*Myrmemorpha*]
(1833).

Crassiseta

v. Ros., Württemb. Corrb., 63. (1840).

Macrochetum ROND., Prodr., I. 127. (1856).

annulipes v. Ros. = **cornuta** FALL.

bimaculata LW., Dipt. Beitr., I. 49. (1845).

× **cornuta** FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 6. 6. [*Oscinis*] (1820); MEIG., S. Rhodus.
B., VI. 158. 48. t. LXI. f. 18. [*Chlorops*] (1830); MACQ., Suit. à Africa sept.
Buff., II. 602. 20. [*Oscinis*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 780. 8. (1838)
et Dipt. Scand., VII. 2641. 34. [*Oscinis*] (1848); WALK., Ins. Brit.,
II. 230. 2. [*Oscinis*] (1853); SCHIN., F. A., II. 233. [*Elachiptera*]
(1864); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 75. (1873) et 194. (1886);
BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 25. 68. (1891); STROBL, Wien.
entom. Zeitg., XVIII. 250. 267. [*Elachiptera*] (1899).

- annulipes* v. Ros., Württemb. Corrbbl., 63. (1840).
 ✕ *femoralis* MEIG., S. B., VII. 390. 85. [*Chlorops*] (1838); BECK.,
 Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 337. 85. (1902).
flaviventris v. Ros., Württemb. Corrbbl., 63. (1840).
fuscipes v. Ros., Württemb. Corrbbl., 63. (1840).
femoralis MEIG. = **cornuta** FALL.
flaviventris v. Ros. = **cornuta** FALL.
flavo-frontata BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 151. 243. (1903). Aegyptus.
furcata PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 194. (1876). Gallia.
fuscipes v. Ros. = **cornuta** FALL.
megaspis LW., Wien. entom. Monatschr., II. 74. 13. (1858); BEZZI, Italia,
 Ditt. d. Calabria, 71. (33). (1895). Asia min.
pectoralis BEZZI, Ditt. d. Calabria, 35. (1895). Italia mer.
sibirica LW., Wien. entom. Monatschr., II. 73. 12. (1858). Sibiria.
trisulcata BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 152. 244. (1903). Aegyptus.

Microneurum > *siphunculina* Rond. 1856

- BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 152. (1903).
maculifrons BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 153. 246. t. IVe. Aegyptus.
 f. 77, 78, 79. (1903).

Anacamptoneurum

- BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 155. (1903).
obliquum BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 155. 252. t. IVe. f. Aegyptus.
 80, 81, 82. (1903).

Anatrichus

- LW., Bidrag til Känned. om Afr. Dipt., 97. 7. (1860).
erinaceus LW., Bidrag til Känned. om Afr. Dipt., 97. 13. (1860) et Africa mer.,
 Zeitschr. f. d. gesam. Naturw., XLIV. 210. 15. (1874); BECK., Aegyptus.
 Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 152. 245. t. IVe. f. 70, 71, 72. (1903).

EPHYDRIDAE.

Notiphilinae.

Notiphila

- FALL., Act. Holm. Kgl. Vetensk. Akad. Handl., 250. (1813)
Keratocera ROB.-DESV., Myod., 788. 4. (1830).
annulipes STENH., Ephydr., 203. 8. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. Europa centr.
 1846. 7. (1846); LW., Neue Beitr., VII. 7. 11. (1860); SCHIN., F. et sept.

A., II. 238. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 113. 14. (1896).

aquatica BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 114. 15. (1896).

Silesia,
Polonia.

australis LW., N. Beitr., VII. 7. 8. (1860); SCHIN., F. A., II. 239. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 110. 6. (1896).

brunnipes ROB.-DESV., Myod., 789. 5. [*Keratocera*] (1830).

Europa mer.
Italia.

chamaeleon BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 114. 16. (1896).

X **cinerea** FALL., Kgl. Vetensk. Akad. Handl., 250. 2. (1813) et Dipt. Suec. Hydromyz., 8. 2. (1823); MEIG., S. B., VI. 64. 1. (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 521. 1. (1835); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 222. 1. (1839); ZETT., Ins. Lapp., 717. 1a. (1838); STENH., Ephydr., 200. 5. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1855. 2. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 251. 1. (1853); ROND., Prodr., I. 129. (1856); LW., N. Beitr., VII. 7. 9. (1860); SCHIN., F. A., II. 239. (1864); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 22. 46. (1891); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 112. 12. (1896); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 1. 269. (1900); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 167. 279. (1903).

fulvicornis ROB.-DESV., Myod., 789. 4. [*Keratocera*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 522. 4. (1835).

palustris ROB.-DESV., Myod., 788. 1. [*Keratocera*] (1830).

trapae ROB.-DESV., Myod., 789. 3. [*Keratocera*] (1830).

cinerea var. *b.* ZETT. = **major** STENH.

coeruleifrons v. Ros., Württemb. Corrbll., 62. (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 28. p. 58. (1902).

Germania.

dorsata STENH., Ephydr., 198. 4. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1858. 5. (1846); LW., N. Beitr., VII. 7. 10. (1860); SCHIN., F. A., II. 239. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 113. 13. (1896).

Europa centr.
et sept.

flaveola MEIG., S. B., VI. 66. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 524. 6. (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 1890. 28. (1846).

Europa centr.
et sept.

fulvicornis ROB.-DESV., MACQ. = **cinerea** FALL.

guttiventris STENH., Ephydr., 206. 10. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1860. (1846); LW., N. Beitr., VII. 7. 4. (1860); SCHIN., F. A., II. 239. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitg., XLI. 111. 7. (1896).

Europa centr.
et sept.

maculata STENH., Ephydr., 201. 5. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1862. 8. (1846); LW., N. Beitr., VII. 7. 5. (1860); SCHIN., F. A., II. 239. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitg., XLI. 111. 9. (1896).

Europa centr.
et sept.

major STENH., Ephydr., 196. 2. (1844) et Dipt. Scand., V. 1857. 4. (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitg., XLI. 111. 8. (1896).

Suecia.

cinerea var. *b.* ZETT., Ins. Lapp., 717. 1. (1838).

nigra ROB.-DESV., Myod., 790. 6. [*Keratocera*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 522. 5. (1835).

Gallia.

X **nigricornis** STENH., Ephydr., 202. 7. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1865. 10. (1846); LW., N. Beitr., VII. 6. 2. (1860); SCHIN., F. A., II. 237. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitg., XLI. 109. 4. (1896).

Europa centr.
et sept.

nigripes MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 302. 2. (1850).

Aegyptus.

palustris ROB.-DESV. = **cinerea** FALL.

- posticata* MEIG., S. B., VI. 66. 4. (1830). Germania.
- radiatula* THOMS., Eug. Resa, p. 595. 283. (1868). China.
- riparia* MEIG., S. B., VI. 65. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 522. 2. (1835); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 222. 2. (1839); STENH., Ephydr., 204. 9. (1844); ZETT., Dipt. Scand., 1856. 3. (1846); WALK., Ins. Brit., II. 251. 2. (1853); LW., N. Beitr., VII. 7. 7. (1860); SCHIN., F. A., II. 238. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitg., XLI. 112. 11. (1896). Europa.
- ruficeps* MEIG., S. B., VI. 75. 36. (1830) = **Phytomyza gen.**
- rustarsis* MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 302. 3. (1850). Aegyptus.
- setigera* BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 167. 280. (1900). Aegyptus.
- splendens* MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 302. 1. (1850). Aegyptus.
- stagnicola* ROB.-DESV., Myod., 789. 2. [*Keratocera*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 522. 3. (1835); STENH., Ephydr., 197. 3. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1866. 11. (1846); LW., N. Beitr., VII. 6. 3. (1860); SCHIN., F. A., II. 239. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitg., XLI. 109. 5. (1896). Europa centr. et sept.
- tarsata* STENH., ZETT. = **uliginosa** HALID.
- trapae* ROB.-DESV. = **cinerea** FALL.
- uliginosa** HALID., Ann. of nat. Hist., III. 222. 3. (1839); LW., N. Beitr., VII. 6. 1. (1860); SCHIN., F. A., II. 237. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 109. 3. (1896). Europa centr. et sept.
- tarsata* STENH., Ephydr., 207. 11. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1863. 9. (1846); WALK., Ins. Brit., II. 251. 3. (1853).
- venusta** LW., N. Beitr., IV. 56. 60. (1856) et VII. 7. 6. (1860); SCHIN., F. A., II. 238. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 112. 10. (1896). Europa centr. et sept.
- viridescens** ROB.-DESV., Myod., 790. 7. [*Keratocera*] (1830). Gallia.

Cyclocephala

.STROBL, Balkan. Dipt. Sarajevo, 42. (1902).

- margininervis** STROBL, Balkan. Dipt. Sarajevo, 42. (1902). Turcia Europ.

Actocetor

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 169. (1903).

Ephydra p. p., WIED., Aussereurop. zweif. Ins., II. 594. 4. (1830).

- margaritatus** WIED., Aussereurop. zweif. Ins., II. 594. 4. [*Ephydra*] (1830); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 170. 282. t. IVc. f. 27, 28, 29. (1903). Aegyptus.

Pegophila

ROND., Prodr., I. 129. (1856).

- meridionalis** ROND., Prodr., I. 129. (1856); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 104. (1896). Italia.

Dichaëta

MEIG., S. B., VI. 61. (1830).

- brevicauda** LW., N. Beitr., VII. 5. 2. (1860); SCHIN., F. A., II. 236. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 103. 2. t. VI. f. 19. (1896). Germania, Austria.
- ✕ **caudata** FALL., Act. Holm., 249. 1. (1813) et Dipt. Suec. Hydromyz., 8. 1. [*Notiphila*] (1823); MEIG., S. B., VI. 62. 1. t. LVIII. f. 1—6. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 521. 1. t. XXI. f. 8. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 717. 2. (1838); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 222. 4. (1839); STENH., Svensk. Ephydr., 194. 1. (1844); BREMI, Isis v. Oken, (1846); ZETT., Dipt. Scand., V. 1853. 1. [*Notiphila*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 251. 4. (1853); ROND., Prodr., I. 129. (1856); LW., N. Beitr., VII. 5. 1. (1860); SCHIN., F. A., II. 236. (1864); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 85. (1883); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 103. 1. t. IV. f. 1. (1896). Europa.
- tibialis** BRULLÉ, Exped. scient. en Morée, III. 318. 697. (1832); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 104. (1896). Graecia.

Paralimna

Lw., Monogr. of the dipt. of N. Amer., I. 138. (1862).

- decipiens** LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., 195. (1878); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 168. 281. (1903). Texas, Aegyptus.

Trimerina

MACQ., Suit. à Buff., II. 528. (1835).

lepida MEIG. = **madizans** FALL.

- madizans** FALL., Act. Holm., 252. (1813) et Dipt. Suec. Hydromyz., 7. 2. [*Psilopa*] (1823); MEIG., S. B., VI. 74. 32. [*Notiphila*] (1830); HALID., Ann. Mag., I. 178. (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 529. 2. (1835); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 223. 6. (1839); STENH., Svensk. Ephydr., 263. 11. [*Psilopa*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1937. 5. [*Psilopa*] (1846); SCHIN., F. A., II. 240. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 117. 17. t. V. f. 3. (1896). Europa centr. et sept.

lepida MEIG., S. B., VII. 375. 27. [*Hydrellia*] (1838); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 300. 27. (1902).

nigella MEIG., S. B., VI. 72. 26. [*Notiphila*] (1830); LW., N. Beitr., VII. 8. (1860).

rufipes MEIG., S. B., VI. 71. 26. [*Notiphila*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 297. 21. (1902).

nigella MEIG., LW. = **madizans** FALL.

rufipes MEIG. = **madizans** FALL.

- tibialis** MACQ., Suit. à Buff., II. 528. 1. (1835); MEIG., S. B., VII. 377. 1. (1833); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 117. 18. (1896). Gallia.

Cnestrum

BECK., Ephydr. Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 117. VII. (1896).

lepidopes BECK., Ephydr. Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 118. 19. t. Silesia.
IV. f. 11, 12. t. V. f. 16. (1896).

Hecamede

HALID., Ann. of nat. Hist., III. 224. (1839).

✕ **albicans** MEIG., S. B., VI. 65. 3. [*Notiphila*] (1830); MACQ., Suit. à Europa,
Buff., II. 522. 6. [*Noliphila*] (1835); HALID., Ann. of nat. Hist., Africa sept.,
III. 224. 13. (1839); BOHEM., Act. Holm., 204. (1853); WALK., Ins. Ins. Canar.
Brit., II. 254. 13. (1853) et III. 344. 1. (1856); ROND., Prodr., I.
131. (1856); LW., N. Beitr., VII. 13. (1860); BECK., Berlin. entom.
Zeitschr., XLI. 121. 20. t. IV. f. 4. 5. (1896).

globifera BOHEM., Eug. Resa, 204. [*Clasiopa*] (1851); ZETT., Dipt.
Scand., XII. 4760. 23—24. [*Notiphila*] (1855).

globifera BOHEM. = **albicans** MEIG.

grisescens BECK., Mitth. Zool. Mus., II. 3. p. 166. 277. (1903). Aegyptus.

Allotrichoma

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 121. IX. (1896).

Hecamede p. p., LW., N. Beitr., VII. 13. (1860).

Bezii BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 123. 23. t. V. f. 8. (1896). Italia.

filiforme BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 123. 22. t. IV. f. 8. (1896). Rossia mer.

✕ **laterale** LW., N. Beitr., VII. 13. 2. (1860); BECK., Berlin. entom. Zeit- Europa centr.
schr., XLI. 122. 21. t. IV. f. 6, 7. t. V. f. 6. (1896). et mer.

trispinum BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 124. 24. t. V. f. 7. (1896). Silesia.

Gymnopa > *Mosillus*

FALL., Dipt. Suec. Oscinid. (1820).

Glabinus ROND., Prodr., I. 132. X. (1856).

Mosillus LATR., Hist. nat. d. Crust. et Ins., XIV. 389. (1804).

aenea FALL. = **subsultans** FABR.

albipennis LW., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 14. (1848); BECK., Berlin. Europa mer.,
entom. Zeitschr., XLI. 127. 26. (1896) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, Aegyptus.
II. 3. p. 166. 275. (1903).

arcuata LATR. = **subsultans** FABR.

? **clara** WOLLASTON, Ann. and Mag. of nat. Hist., I. 261. f. 9. t. V. I. Madeira.
(1858).

frontina A. COSTA, Ann. scientif., I. 89. 12. (1854).

Italia.

murorum ROND. = **subsultans** FABR.

nigra MEIG. = **subsultans** FABR.

subsultans FABR., Entom. syst., IV. 304. 96. [*Syrphus*] (1798) et Syst. Antl., 246. 68. [*Eristalis*] (1805); MEIG., S. B., VI. 137. 1. (1830); Lw., Stettin. entom. Zeitg., VIII. 13. (1848); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 25. 69. [*Mosillus*] (1891); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 127. 25. t. V. f. 2. t. IV. f. 17. (1896) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 166. 274. (1903).

Europa,

Aegyptus.

aenea FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 10. 1. (1820); MEIG., S. B., VI. 137. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 584. 2. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2679. 1. (1848); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 314. 2. (1902).

arcuata LATR., Hist. nat. Crust. et Ins., XIV. 389. [*Mosillus*] (1804); MACQ., Suit. à Buff., II. 505. 4. [*Ulidia*] (1835); SCHIN., F. A., II. 234. [*Mosillus*] (1864).

murorum ROND., Prodr., I. 132. 10. [*Glabrinus*] (1856).

nigra MEIG., S. B., VI. 137. 3. (1830).

Discomyza

MEIG., S. B., VI. 76. CCV. (1830).

incurva FALL., Dipt. Suec. Hydromyz., 6. 1. [*Psilopa*] (1823); MEIG., S. B., VI. 76. 1. t. LVIII. f. 14—17. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 529. 1. t. XXI. f. 13. (1835); HALID., Ann. nat. Hist., III. 223. 5. (1839); STENH., Ephydr., 265. 1. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1941. 7. [*Psilopa*] (1846); Lw., N. Beitr., VII. 8. (1860); SCHIN., F. A., II. 240. (1864); v. BERGENST., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 713. (1864); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 85. (1883); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 22. 47. (1891); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 129. 28. t. IV. f. 13. t. V. f. 4. (1896); STROBL, Wien. entom. Zeitschr., XIX. 1. 270. (1900).

Europa.

vorticis BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 164. 272. t. IVb. f. 24. 25. (1903).

Aegyptus.

Clanoneurum

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 165. (1903).

Discomyza HALID., Nat. Hist. Rev. II. Proceed., 124. (1855).

cimiciformis HALID., Nat. Hist. Rev. II. Proceed., 124. [*Discomyza*] (1855); Lw., N. Beitr., VII. 8. Anmerk. [*Discomyza*] (1860); GIRSCHN., Entom. Nachr., XIV. 99. XIII. t. f. 9. [*Discomyza*] (1888); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 129. 28. [*Discomyza*] (1896).

Germania,

Britannia.

infumatum BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 165. 273. t. IVc. f. 26. (1903).

Aegyptus.

Atissa

HALID., Ann. nat. Hist., III. 404. (1839).

- acrosticalis** BECK., Mitth. Zool. Mus., II. 3. p. 163. 271. (1903). Aegyptus.
durrenbergensis LW., Zeitschr. f. gesamt. Naturw., 346. (1864) et Germania,
Europ. Dipt., III. 307. 211. (1873); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., Aegyptus.
XLI. 131. 30. (1896) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 162.
268. (1903).
hepaticoloris BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 163. 270. Aegyptus.
(1903).
Kairensis BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 162. 269. (1903). Aegyptus.
limosina BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 132. 31. t. IV. f. 20, Scandinavia,
21. t. V. f. 8. (1896); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 2. 282. Hispania.
(1900).
X **pygmaea** HALID., Entom. Mag., I. 174. [*Ephydra*] (1833) et Ann. nat. Europa centr.
Hist., III. 404. (1839); WALK., Ins. Brit. Dipt., II. 258. (1853); et mer.
LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., 344. (1864); SCHIN., F. A., II.
251. (1864); GERCKE, Wien. entom. Zeitg., VIII. 223. (1889); BECK.,
Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 131. 29. (1896) et Mitth. Zool. Mus.
Berlin, II. 3. p. 162. 267. (1903).
ripicola LW., N. Beitr., VII. 24. 1. (1860).
ripicola LW. = **pygmaea** HALID.

Ilythea

HALID., Ann. of nat. Hist., III. 408. (1839).

Epipela STENH., Ephydr., 185. (1844).

- nigricauda** BIGOT, Voyage Alluaud aux îles Canaries (1890). Ins. Canariae.
notata STENH. = **spilota** CURTIS.
spilota CURTIS, Brit. Entom., 413. (1832); HALID., Ann. of nat. Hist., Europa centr.
III. 408. 18. (1839); WALK., Ins. Brit., II. 264. 6. 18. (1853); LW., et sept.
N. Beitr., VII. 37. (1860); SCHIN., F. A., II. 263. (1864); BECK.,
Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 133. 32. t. IV. f. 27. t. V. f. 15.
(1896).
notata STENH., Ephydr., 186. 13. [*Epipela*] (1844); ZETT., Dipt.
Scand., V. 1816. 5. [*Ephydra*] (1846).

Athyroglossa

LW., N. Beitr., VII. 12. (1860).

Discocerina p. p., MACQ., Suit. à Buff., II. (1835); HALID., Ann.
of nat. Hist., III. 224. (1839).

flaviventris MEIG. = **glabra** MEIG.

- X **glabra** MEIG., S. B., VI. 69. 15. [*Notiphila*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., Europa centr.
II. 528. 4. [*Discocerina*] (1835); HALID., Ann. of nat. Hist., III. et mer.

224. [*Discocerina*] (1839); WALK., Ins. Brit., II. 254. 12. (1853); Lw., N. Beitr., VII. 12. (1860); SCHIN., F. A., II. 245. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 134. 33. t. IV. f. 14. t. V. f. 5. (1896); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 1. 274. (1900).

flaviventris MEIG., S. B., VI. 70. 20. [*Notiphila*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 297. 20. (1902).

nudiuscula Lw., Europ. Dipt., III. 307. 210. (1873) et Berlin. entom. Hungaria.

Zeitschr., XXII. 50. 62. (1873); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 134. 34. (1896).

X *ordinata* BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 135. 35. (1896). Hungaria.

Ephygrobia > *Psilopa* Fall. 1823

SCHIN., Wien. entom. Monatschr., VI. 432. (1862).

Diasemocera BEZZI, Wien, entom. Zeitschr., XIV. 137. (1895).

Hygrella HALID., Ann. Nat. Hist., III. 223. (1839).

Keratocera p. p. ROB.-DESV., Myod., 790. (1830).

Psilopa p. p. FALL., Dipt. Suec. Hydromyz., 7. (1823).

apicalis PERRIS, Mém. de l'Acad. de Lyon, II. 494. [*Hydrellia*] (1847); Europa centr.
Lw., N. Beitr., VII. 9. 3. [*Psilopa*] (1860); SCHIN., F. A., II. 242.
(1864); v. RÖD., Entom. Nachr., XV. 56. [*Psilopa*] (1889); BECK.,
Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 138. 36. (1896).

composita BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 157. 259. t. IVb. Aegyptus.
f. 22. (1903).

compta MEIG. = *nitidula* FALL.

electa BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 159. 262. t. IVb. f. 23. Aegyptus.
(1903).

fratella BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 159. 261. (1903). Aegyptus.

Girschneri v. RÖD., Entom. Nachr., XV. 56. [*Psilopa*] (1889); BECK., Europa centr.
Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 141. 40. (1896).

X *leucostoma* MEIG., S. B., VI. 68. 12. [*Notiphila*] (1830); Macq., Suit. Europa centr.
à Buff., II. 524. 7. [*Hydrellia*] (1835); HALID., Ann. nat. Hist., et sept.
III. 223. 8. [*Hygrella*] (1839); STENH., Ephydr., 263. 10. [*Psilopa*]
(1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1936. 4. [*Psilopa*] (1846); Lw., N.
Beitr., VII. 9. 1. [*Psilopa*] (1860); SCHIN., F. A., II. 243. (1864);
v. RÖD., Entom. Nachr., XV. 56. [*Psilopa*] (1889); BECK., Berlin.
Entom. Zeitschr., XLI. 142. 4. (1896).

marginella FALL., Dipt. Suec. Hydromyz., 7. 3. [*Psilopa*] (1823); Europa centr.
MEIG., S. B., VI. 74. 33. [*Notiphila*] (1830); STENH., Ephydr., 266. et sept.
2. [*Discomyza*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1939. 6. [*Psilopa*]
(1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 139. 38. t. VII. f.
27. (1896).

maritima PERRIS, Mém. de l'Acad. de Lyon, II. 494. [*Hydrellia*] (1847); Europa centr.
Lw., Europ. Dipt., III. 306. 209. (1873); v. RÖD., Entom. Nachr., et mer.
XV. 56. [*Psilopa*] (1889); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI.
139. 37. t. VII. f. 26. (1896).

- X nana** Lw., N. Beitr., VII. 9. 2. [*Psilopa*] (1860); v. Röd., Entom. Nachr., XV. 56. [*Psilopa*] (1889); BECK., Ephydr. Berlin. Entom. Zeitschr., XLI. 142. 42. (1896); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 1. 272. (1900); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 156. 255. (1903). Europa, Aegyptus.
nigrifacies BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 157. 257. (1903). Aegyptus.
nigrimana v. Ros. = **nitidula** FALL.
nigritella STENH., Ephydr., 262. 9. [*Psilopa*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1935. 3. [*Psilopa*] (1846); Lw., N. Beitr., VII. 10. 8. [*Psilopa*] (1860); SCHIN., F. A., II. 242. (1864); v. Röd., Entom. Nachr., XV. 56. [*Psilopa*] (1889); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 144. 47. (1896) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. 156. 254. (1903). Europa centr. et sept., Aegyptus.
nigrotaeniata BEZZI = **Röderi** GIRSCHN.
nilotica BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 157. 258. (1903). Aegyptus.
X nitidula FALL., Act. Holm., 252. [*Notiphila*] (1813); FALL., Dipt. Suec. Hydromyz., 7. 4. [*Psilopa*] (1823); MEIG. S. B., VI. 75. 34. [*Notiphila*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 524. [*Hydrellia*] (1835); HALID., Ann. Nat. Hist., III. 223. 8. [*Hygrella*] (1839); STENH., Ephydr., 261. 8. var. *a* et *β*. [*Psilopa*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1932. var. *a* et *b*. [*Psilopa*] (1846); Lw., N. Beitr., VII. 10. 5. [*Psilopa*] (1860); SCHIN., F. A., II. 242. (1864); v. Röd., Entom. Nachr., XV. 56. [*Psilopa*] (1889); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 143. 44. t. IV. f. 2, 3. (1896). Europa, Aegyptus, Ins canar.
X compta MEIG., S. B., VI. 68. 13. [*Notiphila*] (1830); HALID., Entom. Mag., I. 176. [*Ephydra*] (1833); MACQ., Suit. à Buff., II. 524. 8. [*Hydrellia*] (1835); Lw., N. Beitr., VII. 56. 4. [*Psilopa*] (1860); SCHIN., F. A., II. 243. (1864); v. Röd., Entom. Nachr., XV. 56. [*Psilopa*] (1889); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 143. 43. (1896); Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. p. 156. 253. (1903).
nigrimana v. Ros., Württemb. Corbl., 61. [*Notiphila*] (1840); BECK., Jahresber. Ver. vaterl. Naturk. Württemb., No. 26. p. 58. (1902).
? viridescens ROB.-DESV., Myod., 790. [*Keratocera*] (1830).
obscuripes Lw., N. Beitr., VII. 10. 6. [*Psilopa*] (1860); v. Röd., Entom. Nachr., XV. 56. [*Psilopa*] (1889); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 144. 45. (1896). Europa, Ins canar.
X polita MACQ., Suit. à Buff., II. 524. 5. [*Hydrellia*] (1835) et II. 603. 31. [*Oscinis*] (1835); MEIG., S. B., VII. 375. 29. [*Hydrellia*] (1838) et VII. 394. 104. [*Chlorops*] (1838); Lw., N. Beitr., VII. 10. 7. [*Psilopa*] (1860); SCHIN., F. A., II. 243. (1864); v. Röd., Entom. Nachr., XV. 56. [*Psilopa*] (1889); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 22. 48. (1891); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 144. 46. (1896); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 1. 271. (1900); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 337. 104. (1902). Europa.
tarsella ZETT., Dipt. Scand., V. 1934. 2. [*Psilopa*] (1846).
radiolata BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. 156. 256. (1903). Aegyptus.
Röderi GIRSCHN., Entom. Nachr., XV. 373. [*Psilopa*] (1889); BECK., Berlin. Entom. Zeitschr., XLI. 140. 39. t. VII. f. 28. (1896). Germania, Italia, Gallia.

nigrotaeniata BEZZI, Wien. entom. Zeitg., XIV. 137. [*Diascrocera*] (1895).

rufithorax BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 158. 260. (1903). Aegyptus.
tarsella ZETT. = *polita* MACQ.

viridescens ROB.-DESV. = *nitidula* FALL.

Clasiopa > *Discocerina* Meq. 1835

STENH., Svensk. Ephydr., 251. (1844).

albifrons MEIG., S. B., VI. 70. 18. [*Notiphila*] (1830); MACQ., Suit. á Germania.

Buff., II. 524. 4. [*Hydrellia*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt.

u. Dipt., II. 296. 18. (1902).

palliditarsis BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 155. 58. (1896).

aurella STROBL = *xanthocera* LW.

X *aurifacies* STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 255. 14. (1893); BECK., Styria,
Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 157. 61. (1896). Silesia.

Aurivillii BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 158. 64. (1896).

Europa c. ets.

Bohemanni BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 159. 65. (1896).

Suecia.

brevipectinata BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 149. 49. (1896).

Scandinavia.

X *calceata* MEIG., S. B., VI. 69. 16. [*Notiphila*] (1830); LW., N. Beitr.,
VII. 11. 2. [*Discocerina*] (1860); SCHIN., F. A., II. 244. (1864);
BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 157. 60. (1896).

Europa.

nigrina STENH. (nec MEIG.), Ephydr., 258. 6. (1844). HALID., Ann.

of. nat. Hist., III. 224. 10. [*Discocerina*] (1839); ZETT., Dipt.

Scand., V. 1887. 26. [*Notiphila*] (1846).

cinerella MEIG. = *plunusa* FALL.

X *cinerella* STENH., Ephydr., 251. 1. (1844); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., Suecia.
XLI. 158. 63. (1896).

costata LW., Beitr., VII. 14. 4. [*Discocerina*] (1860); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 160. 67. (1896).

Turcia,

Asia min.

X *coxalis* STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 253. 12. (1893); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 157. 62. (1896).

Styria.

X *dimidiatipennis* STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 255. 15. (1893);
BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 150. 50. t. IV. f. 9. t. VI. f.
28. (1896).

Styria.

duplosetosa BECK., Berlin. entom. Zeitschr. XLI. 162. 69. (1896).

Silesia,

fulgida BECK. = *pulchella* MEIG.

Hungaria.

fulcella STENH., ZETT. = *pulicaria* HALID.

galactoptera BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 161. 266. (1903).

Aegyptus.

glabricula FALL., Vetensk. Akad. Handl. 251. 6. (1813); FALL. Dipt.

Europa centr.

Suec. Hydromyz., 10. 7. [*Notiphila*] (1823); MEIG., S. B., VI. 73.

et sept.

28. [*Notiphila*] (1830); STENH., Ephydr., 256. 5. (1844); ZETT., Dipt.

Scand., V. 1893. 30. (1846); LW. N. Beitr., VII. 12. 4. (1860);

SCHIN., F. A., II. 244. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI.

152. 55. (1896).

- ~~X~~ **glaucella** STENH., Ephydr., 253. 2. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1883. Europa centr.
 23. [*Notiphila*] (1846); LW., N. Beitr., VII. 14. 3. [*Hecamede*] (1860); et sept.
 SCHIN., F. A., II. 245. [*Hecamede*] (1864); STROBL, Dipt. v. Steyerm.,
 126. [*Hecamede*] (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 160.
 66. t. IV. f. 10. (1896).
longula STENH. = **plumosa** FALL.
luctuosa MEIG. = **obscura** FALL.
- ~~X~~ **nigerrima** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 254. 13. (1893); BECK., Styria.
 Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 151. 54. (1896).
nigrina MEIG. = **obscura** FALL.
nigrina STENH. (nec MEIG.), ZETT. = **calceata** MEIG.
nivea BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 151. 53. (1896). Silesia.
niveipennis BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 162. 70. (1896). Silesia.
- ~~X~~ **obscura** FALL., K. Vetensk. Akad. Handl., 251. 7. (1813); FALL., Europa centr.
 Dipt. Suec. Hydromyz., 10. 8. [*Notiphila*] (1823); MEIG. S. B., VI. et sept.
 73. 29. [*Notiphila*] (1830); HALID., Ann. of. nat. Hist., III. 224. 9.
 [*Discocerina*] (1839); STENH., Ephydr., 254. 3. (1844); ZETT., Dipt.
 Scand., V. 1884. 24. [*Notiphila*] (1846); LW., N. Beitr., VII. 11. 1.
 [*Discocerina*] (1860); SCHIN., F. A., II. 244. (1864); BECK., Berlin.
 entom. Zeitschr., XLI. 148. 48. (1896).
luctuosa MEIG., S. B., VI. 97. 7. [*Diastata*] (1830).
nigrina MEIG., S. B., VI. 69. 17. [*Notiphila*] (1830); BECK.,
 Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 296. 17. (1902.)
pusilla MEIG., S. B., VI. 71. 23. [*Notiphila*] (1830); MACQ., Suit.
 à Buff., II. 527. 1. [*Discocerina*] (1835); BECK., Zeitschr. f.
 Hymenopt. u. Dipt., II. 297. 23. (1902).
tristis MEIG., S. B., VI. 72. 25. [*Notiphila*] (1830); BECK., Zeitschr.
 f. Hymenopt. u. Dipt., II. 297. 25. (1902).
olivacea BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 155. 57. (1896). Hungaria.
orbitalis LW., Monogr. of the dipt. of N. Amer., 147. 3. (1862); Amer. sept.,
 BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 160. 264. (1903). Aegyptus.
- palliditarsis* BECK. = **albifrons** MEIG.
pallidula STENH., Ephydr., 257. 6. (1844); BECK., Berlin. entom. Europa sept.
 Zeitschr., XLI. 150. 51. (1896).
- ~~X~~ **plumosa** FALL., Dipt. Suec. Hydrom., 9. 4. [*Notiphila*] (1823); MEIG., Europa.
 S. B., VI. 73. 27. [*Notiphila*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., V. 1888.
 27. [*Notiphila*] (1846); LW., N. Beitr., VII. 10. 9. [*Discocerina*]
 (1860); SCHIN., F. A., II. 242. [*Ephygobria*] (1864); BEZZI, Contrib.
 alla F. ditt. di Pavia, 22. 49. [*Ephygrobria*] (1891); STROBL, Dipt.
 v. Steyerm., 125. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI.
 150. 52. (1896).
cinerella MEIG., S. B., VI. 88. 19. [*Drosophila*] (1830); BECK.,
 Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 302. 19. (1902).
longula STENH., Ephydr., 259. 7. (1844).
- ~~X~~ **pulchella** MEIG., S. B., VI. 70. 19. [*Notiphila*] (1830); MACQ., Suit. à Europa centr.
 Buff., II. 525. 9. [*Notiphila*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt.
 u. Dipt., II. 297. 19. (1902).

fulgida BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 156. 59. (1893).

pulicaria HALID., Ann. of nat. Hist., III. 224. 11. [*Discocerina*] (1839); Europa centr.

WALK., Ins. Brit., II. 254. 11. [*Discocerina*] (1853); LW., N. Beitr., et sept.

VII. 12. 3. [*Discocerina*] (1860); SCHIN., F. A., II. 244. (1864);

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 155. 56. (1898).

fuscella STENH., Ephydr., 255. 4. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V.

1892. 29. [*Notiphila*] (1846).

pusilla MEIG., MACQ. = **obscorella** FALL.

quadripectinata BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 161. 265. Aegyptus.
(1903).

tristis MEIG. = **obscorella** FALL.

× **xanthocera** LW., Ueber Dipt. d. Augsburger Gegend., 58. 6. [*Hecamede*] Europa centr.
BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 161. 68. t. V. f. 1.
(1896).

aurella STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 250. 16. [*Hecamede*]
(1893).

Philotelma

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 163. XVII. (1896).

Pseudoscatella BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 298.
et Corrigenda (1902).

anomalum BECK. = **nigripennis** MEIG.

nigripennis MEIG., S. B., VI. 75. 35. [*Notiphila*] (1830); MACQ., Suit. Germania.

à Buff., II. 525. 10. [*Hydrellia*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 298. 35. (1902).

anomalum BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 164. 71. (1896).

Hydrellinae

Glenanthe

HALID., Ann. of nat. Hist., III. 404. (1839).

fasciventris BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 170. 283. (1903). Aegyptus.

fuscinervis BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 165. 73. t. V. f. 7. Scandinavia.
(1896).

× **ripicola** HALID., Ann. of nat. Hist., III. 404. 15. (1839); WALK., Ins. Europa centr.
Brit., II. 258. (1853); LW., N. Beitr., VII. 16. 1. (1860); SCHIN.,
F. A., II. 246. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 165.
72. t. IV. f. 19. (1896).

Hydrellia

Rob.-Desv., Myod., 790. V. (1830).

- affinis** MEIG., S. B., VII. 374. 5. (1838). Bavaria.
- albiceps** MEIG., S. B., VI. 68. 11. [*Notiphila*] (1830); Macq., Suit. à Europa.
Buff., II. 526. 15. (1835); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 403. 10.
(1839); WALK., Ins. Brit., II. 257. 10. (1853); HALID., in WALK.,
Ins. Brit., III. 345. (1856); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt.,
II. 296. 11. (1902).
- ? **albifrons** FALL., Dipt. Suec. Hydromyz., 10. [*Notiphila*] (1823);
 STENH., Ephydr., 223. 22. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1875.
 16. [*Notiphila*] (1846); PERRIS, Ann. Soc. entom. de Fr., 236.
 (1876).
- nigrina** LW., N. Beitr., VII. 24. 19. (1860).
- nigricans** STENH., Ephydr., 234. 30. (1844); ZETT., Dipt. Scand.,
 V. 1904. 39. [*Notiphila*] (1846); SCHIN., F. A., II. 250. (1864);
 BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 183. 94. (1896); STROBL,
 Wien. entom. Zeitg., XIX. 1. 280. (1900).
- albiceps** MEIG. [*Medeterus*] = **ranunculi** HALID.
- albifrons** FALL., STENH., ZETT., PERRIS = **albiceps** MEIG.
- albilabris** MEIG., S. B., VI. 71. 22. [*Notiphila*] (1830); Macq., Suit. à Europa.
Buff., II. 528. 3. [*Discocerina*] (1835); HALID., Ins. Brit., II. 258.
13. (1853) et III. Errata 345. (1856); LW., N. Beitr., VII. 18. 3.
(1860); SCHIN., F. A., II. 248. (1864); FRFELD., Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, XVI. 972. (1866); KALTENB., Pflanzenf., 708. 7. (1872);
BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 85. (1883); BECK., Berlin.
entom. Zeitschr., XLI. 183. 96. (1896).
- argyria** ROB.-DESV., Myod., 793. 11. (1830).
- argyrostoma** STENH., Ephydr., 236. 32. (1844); ZETT., Dipt. Scand.,
 V. 1895. 31. [*Notiphila*] (1846).
- alboguttata** LW., Stettin. entom. Zeitg., VI. 398. 3. (1845); SCHOLTZ, Germania.
Zeitschr. f. Entom. Breslau, Band 1—3. p. 18. BRAUER, Zweifl.
d. K. Mus. Wien, 85. (1883).
- amoena** MEIG., S. B., VII. 374. 25. (1838) = **Scaptomyza** gen.
- annulata** LW., Stettin. entom. Zeitg., VI. 401. 4. (1845). Germania.
- approximata** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 172. 287. (1903). Aegyptus.
- argyria** ROB.-DESV. = **albilabris** MEIG.
- argyrogenis** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 185. 100. (1896). Italia sept.
- argyrostoma** STENH., ZETT. = **albilabris** MEIG.
- aurifacies** ROB.-DESV. = **flaviceps** MEIG.
- bicolor** MEIG., S. B., VII. 376. 37. (1838). Germania.
- brunifacies** ROB.-DESV., Myod., 792. 7. (1830). Gallia.
- caesia** STENH., Ephydr., 214. 15. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1880. Europa centr.
20. [*Notiphila*] (1846); LW., N. Beitr., VII. 18. 2. (1860); SCHIN.,
F. A., II. 249. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 176.
82. (1896). et sept.

- cardamines* HALID. (*major*) = **flaviceps** MEIG.
- cardamines* HALID. var. β . = **flavilabris** STENH.
- chrysella** ROB.-DESV., Myod., 792. 5. (1830). Gallia.
- chrysina** ROB.-DESV., Myod., 792. 4. (1830). Gallia.
- chryostoma** MEIG., S. B., VI. 67. 8. (1830); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 403. 8. (1839); ZETT., Dipt. Scand., V. 1872. 14. [*Notiphila*] (1846); WALK., Ins. Brit., II. 257. 8. (1853); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 295. 8. (1902). Europa centr. et sept.
- fulviceps* STENH., Ephydr., 231. 28. [*Notiphila*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1901. 37. (1846); LW., N. Beitr., VII. 21. 10. (1860); SCHIN., F. A., II. 248. (1864); GERCKE, Metamorph. Verh. d. Ver. f. naturw. Unterh. Hamb., VI. 52. t. II. f. 28—30. (1880); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 86. (1883); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 173. 77. (1896).
- viridescens* ROB.-DESV., Myod., 793. 10. (1830).
- cinerascens* MACQ., MEIG. = **concolor** STENH.
- cochleariae** HALID., Ann. of nat. Hist., III. 403. 12. (1839); WALK., Ins. Brit. II. 258. 12. (1853). Britannia.
- communis** ROB.-DESV., Myod., 791. 1. (1830). Gallia.
- concolor** STENH., Ephydr., 216. 16. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1877. 18. [*Notiphila*] (1846); LW., N. Beitr., VII. 20. 7. (1860); SCHIN., F. A., II. 247. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 178. 85. (1896). Europa centr. et sept.
- cinerascens* MACQ., Suit. à Buff., II. 526. 17. (1835); MEIG., S. B., VII. 376. 34. (1838).
- discolor* STENH., ZETT., LW., SCHIN., BECK. = **obscura** MEIG.
- erythrostoma* MEIG., MACQ., HALID., WALK. = **flavicornis** FALL.
- fascitibia** v. Ros., Württemb. Corrb., 62. [*Notiphila*] (1840). Europa centr. et sept.
- grisea* STENH., Ephydr., 227. 25. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1898. 34. [*Notiphila*] (1846); LW., N. Beitr., VII. 21. 11. (1860); SCHIN., F. A., II. 249. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 179. 87. (1896) et Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 27. p. 58. (1902).
- flaviceps** MEIG., S. B., VI. 72. 24. [*Notiphila*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 527. 2. [*Discocerina*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 297. 24. (1902). Europa centr. et sept.
- aurifacies* ROB.-DESV., Myod., 791. 2. (1830).
- cardamines* HALID., (*major*) Ann. of nat. Hist., III. 402. 1. (1839).
- laticeps* STENH., Ephydr., 229. 26. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1899. 35. [*Notiphila*] (1846); LW., N. Beitr., VII. 20. 9. (1860); SCHIN., F. A., II. 248. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 172. 75. (1896).
- flaviceps* HALID. = **obscura** MEIG.
- flavicornis** FALL., Dipt. Suec. Hydromyz., 10. 9. [*Notiphila*] (1823); MEIG., S. B., VI. 74. 30. [*Notiphila*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., V. 1873. 15. [*Notiphila*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 177. 84. (1896). Europa centr. et sept.

erythrostroma MEIG., S. B., VI. 69. 14. [*Notiphila*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 526. 16. (1835); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 403. 11. (1839); WALK., Ins. Brit., II. 257. 11. (1853); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 296. 14. (1902).

flavicornis STENH. = **nigripes** ZETT.

flavilabris STENH., Ephydr., 235. 31. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1905. 40. [*Notiphila*] (1846); STROBL, Dipt. v. Steyerf., 126. et sept. (1894); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 173. 78. (1896).

cardamines var. β . HALID., Ann. of nat. Hist., III. 402. 1. (1839).

flavipes MACQ., Suit. à Buff., II. 525. 11. (1835); MEIG., S. B., VII. 375. 30. (1838). Gallia.

frontalis LW., N. Beitr., VII. 19. 5. (1860); SCHIN., F. A., 249. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 183. 95. (1896). Silesia.

fuliginosa ROB. DESV., Myod., 793. 8. (1830). Gallia.

fulviceps STENH., ZETT., LW., SCHIN., GERCKE, BRAUER, BECK. = **chrysostoma** MEIG.

fulvipes MACQ., Suit. à Buff., II. 525. 13. (1835); MEIG., S. B., VII. 376. 32. (1838). Gallia.

fusca STENH., Ephydr., 225. 24. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1896. 32. (1846); LW., N. Beitr., VII. 24. 18. (1860); SCHIN., F. A., II. 250. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 178. 86. (1896). Europa centr. et sept.

geniculata STENH., Ephydr., 224. 23. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1878. 19. [*Notiphila*] (1846); LW., N. Beitr., VII. 18. 1. (1860); SCHIN., F. A., II. 248. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 174. 79. (1896). Europa centr. et sept.

grisea STENH., ZETT., LW., SCHIN., BECK. = **fascitibia** v. ROS.

✕ **griseola** FALL., Act. Holm. (1813) et Dipt. Suec. Hydromyz., 9. 5. ♂ (*nec* ♀). [*Notiphila*] (1823); MEIG., S. B., VI. 66. 6. [*Notiphila*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 523. 1. t. XXI. f. 10. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 717. 3. (1838); STENH., Ephydr., 220. 20. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1869. 12. [*Notiphila*] (1846); WALK., Ins. Brit., II. 256. 7. (1853); LW., N. Beitr., VII. 22. 13. (1860); SCHIN., F. A., II. 247. (1864); STEIN., Berlin. entom. Zeitschr., XI. 395. (1867); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig, V. 287. (1881); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 180. 89. t. IV. f. 15. (1896) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 171. 284. (1903). Europa, Aegyptus.

obscura MEIG., S. B., VI. 115. 3. [*Ephydra*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 530. 2. [*Caenia*] (1835); WALK., Ins. Brit., II. 265. 21. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., 309. 3. (1902).

griseola FALL., ♀ (*nec* ♂) = **ranunculi** HALID.

hydrocotyles HALID., Ann. of nat. Hist., III. 402. 3. (1839); WALK., Ins. Brit., II. 256. 3. (1853). Britannia.

incana STENH., ZETT. = **ranunculi** HALID.

lamina BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 184. 98. (1896). Silesia.

lapponica STENH., Ephydr., 237. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1906. 41. [*Notiphila*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 174. 80. (1896). Italia, Lapponia.

- laticeps* STENH., ZETT., LW., SCHIN., BECK. = **flaviceps** MEIG.
lepida MEIG., S. B., VII. 375. 27. (1838) = **Trimerina rufipes** MEIG.
limosina BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 172. 288. (1903). Aegyptus.
lineata MACQ., Suit. à Buff., II. 526. 14. (1835); MEIG., S. B., VII. 376. Gallia.
 33. (1838).
litorella MEIG., S. B., VII. 374. 6. (1838) = **Drosophila gen.**
lucida MACQ., Suit. à Buff., II. 525. 12. (1835); MEIG., S. B., VII. 375. Gallia.
 31. (1838).
maculiventris BECK., Ephydr., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 175. 81. Silesia.
 (1896).
maura MEIG., S. B., VII. 374. 24. (1838); BECK., Zeitschr. f. Hymen- Germania.
 opt. u. Dipt., II. 299. 24. (1902).
modesta LW., N. Beitr., VII. 23. 15. (1860); SCHIN., F. A., II. 250. Germania,
 (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 1. 277. (1900); BECK., Austria,
 Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 181. 90. (1896) et Mitth. Zool. Mus. Aegyptus.
 Berlin, II. 3. p. 171. 285. (1903).
mutata ZETT., Dipt. Scand., V. 1876. 17. [*Notiphila*] (1846); LW., N. Europa centr.
 Beitr., VII. 19. 6. (1860); SCHIN., F. A., II. 247. (1864); GERCKE, et sept.
 Verh. d. Ver. f. naturw. Unterh. Hamb., IV. 222. BRAUER, Zweifl.
 d. K. Mus. Wien, 85. (1883); STROBL, Dipt. v. Steyerm., 126. (1894);
 BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 176. 83. (1896).
plumosa STENH., Ephydr., 218. 18. (1844).
nigricans STENH., ZETT., SCHIN., BECK. = **albiceps** MEIG.
nigriceps MEIG., S. B., VI. 67. 7. [*Notiphila*] (1830); MACQ., Suit. à Germania.
 Buff., II. 523. 2. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt.,
 II. 295. 7. (1902).
nigrina LW. = **albiceps** MEIG.
nigripes ZETT., Ins. Lapp., 717. 4. [*Notiphila*] (1838); STENH., Ephydr., Europa centr.
 217. 17. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1903. 38. [*Notiphila*] et sept.
 (1846); LW., N. Beitr., VII. 22. 14. (1860); SCHIN., F. A., II. 248.
 (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 181. 91. (1896).
flavicornis STENH., Ephydr., 232. 29. (1844).
nigripes ROB.-DESV., Myod., 793. 9. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Gallia.
 523. 18. (1835); MEIG., S. B., VII. 376. 35. (1838).
nitida ROB.-DESV., Myod., 791. 3. (1830). Gallia.
nymphaeae STENH., Ephydr., 227. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1897. Suecia.
 33. [*Notiphila*] (1846); LW., N. Beitr., VII. 23. 17. (1860); BECK.,
 Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 182. 92. (1896).
obscura MEIG., S. B., VI. 67. 9. [*Notiphila*] (1830); BECK., Zeitschr. Europa centr.
 f. Hymenopt. u. Dipt., II. 296. 9. (1902). et sept.
discolor STENH., Ephydr., 230. 27. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V.
 1900. 36. [*Notiphila*] (1846); LW., N. Beitr., VII. 22. 12. (1860);
 SCHIN., F. A., II. 250. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr.,
 XII. 179. 88. t. V. f. 11. (1896).
flaviceps HALID., Ins. Brit., III. Errata, 345. (1856).
obscura MEIG. [*Ephydra*] = **griseola** FALL.
opaca MEIG., S. B., VII. 376. 38. (1838). Germania.

- pallipes** MEIG., S. B., VI. 67. 10. (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. Germania.
u. Dipt., II. 296. 10. (1902).
- pilitarsis** STENH., Ephydr., 219. 19. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. Europa centr.
1881. 21. [*Notiphila*] (1846); LW., N. Beitr., VII. 20. 8. (1860); et sept.
SCHIN., F. A., II. 249. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI.
173. 76. (1896).
- plumosa** STENH. = **mutata** ZETT.
- poecilogastra** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 171. 286. (1903). Aegyptus.
- porphyrops** HALID., Ann. of nat. Hist., III. 402. 4. (1839); WALK., Ins. Britannia.
Brit., II. 256. 4. (1853).
- pulchella** MEIG., S. B., VI. 70. 19. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Gallia.
525. 9. (1835).
- ✕ **ranunculi** HALID., Ann. of nat. Hist., III. 402. 6. (1839); WALK., Ins. Europa.
Brit., II. 256. 6. (1853); LW., N. Beitr., VII. 23. 16. (1860); SCHIN.,
F. A., II. 247. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 182.
93. (1896).
albiceps MEIG., S. B., IV. 68. 17. [*Medeterus*] (1824).
albifrons FALL., Dipt. Succ. Hydromyz., 10. 6. [*Notiphila*] (1823).
griseola FALL., ♀ (nec ♂) Dipt. Succ. Hydromyz., 9. 5. [*Noti-*
phila] (1823).
incana STENH., Ephydr., 222. 21. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V.
1871. 13. [*Notiphila*] (1846).
- ruficornis** MEIG., S. B., VII. 375. 28. (1838) = **Drosophila grami-**
num FALL.
- rufitarsis** MEIG., S. B., VII. 374. 26. (1838). = **Oscinis maura** FALL.
- tarsata** HALID., Ann. of nat. Hist., III. 403. 9. (1839); WALK., Ins. Britannia.
Brit., II. 257. 9. (1853).
- thoracica** HALID., Ann. of nat. Hist., III. 402. 5. (1839); WALK., Ins. Europa centr.
Brit., II. 256. 5. (1853); LW., N. Beitr., VII. 18. 4. (1860); SCHIN.,
F. A., II. 249. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 183.
97. (1896).
- transsylvana** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 184. 99. (1896). Alpes,
viridescens ROB-DESV. = **chrysostoma** MEIG. Transsylv.
- viridis** MACQ., Suit. à Buff., II. 527. 19. (1835); MEIG., S. B., VII. 376. Gallia.
36. (1838).
- viridula** ROB-DESV., Myod. 792. 6. (1830). Gallia.

Axysta

HALID., Ann. of nat. Hist., III. 406. (1839).

- cesta** HALID., Entom. Mag., I. 177. [*Ephydra*] (1833); LW., N. Beitr., Europa centr.
VII. 28. 1. (1860); SCHIN., F. A., II. 255. (1864); BECK., Berlin. et sept.
entom. Zeitschr., XLI. 167. 74. t. IV. f. 25. t. V. f. 10. (1896).
coeruleiventris MACQ., Suit. à Buff., II. 529. 3. t. XXI. f. 12.
[*Trimerina*] (1835); MEIG., S. B., VII. 377. 3. [*Trimerina*] (1838).

punctulata STENH., Ephydr., 241. 35. [*Philygria*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1909. 43. [*Notiphila*] (1846).

viridula HALID., Ann. of nat. Hist., III. 406. 10. (1839); WALK., Ins. Brit., II. 262. 10. (1853).

coeruleiventris MACQ., MEIG. = **cesta** HALID.

punctulata STENH., ZETT. = **cesta** HALID.

viridula HALID., WALK. = **cesta** HALID.

Philygria

STENH., Ephydr., 238. (1844).

albidipennis STENH., Ephydr., 179. 9. [*Ephydra*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1817. 6. [*Ephydra*] (1846). Suecia.

aurata ROB.-DESV., Myod., 794. 2. [*Hydrina*] (1830). Gallia.

basilaris MEIG., S. B., VII. 383. 38. [*Ephydra*] (1838); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 313. 38. (1902). Germania.

cardami is ROB.-DESV., Myod., 796. 7. [*Hydrina*] (1830). Gallia.

femorata STENH., ZETT., BECK. = **posticata** MEIG.

flavipes FALL., Dipt. Suec. Hydromyz., 12. 15. [*Notiphila*] (1823); MEIG., S. B., VI. 123. 25. [*Ephydra*] (1830); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 405. 3. [*Hydrina*] (1839); STENH., Ephydr., 244. 38. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1916. 48. [*Notiphila*] (1846); LW., N. B., VII. 26. 6. (1860); SCHN., F. A., II. 252. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 191. 107. (1896); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 2. 284. (1900). Europa.

melanostoma MEIG., S. B., VI. 123. 26. [*Ephydra*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 312. 26. (1902).

flavipes FALL., var β . = **posticata** MEIG.

interrupta HALID., Entom. Mag., I. 176. [*Ephydra*] (1833); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 406. 6. [*Hydrina*] (1839); WALK., Ins. Brit., II. 261. 6. [*Hydrina*] (1853); LW., N. B., VII. 26. 4. (1860); SCHN., F. A., II. 253. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 189. 103. (1896). Europa centr.

interstincta FALL., Act. Holm., 254. 14. (1813); et Dipt. Suec. Hydrom., 12. 16. [*Notiphila*] (1823); MACQ., Snit. à Buff., II. 539. 16. [*Ephydra*] (1835); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 405. 5. [*Hydrina*] (1839); STENH., Ephydr., 246. 40. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1919. 50. [*Notiphila*] (1846); WALK., Ins. Brit., II. 261. 5. [*Hydrina*] (1853); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 190. 105. (1896). Europa centr. et sept.

maculipennis ROB.-DESV., Myod., 795. 5. [*Hydrina*] (1830).

interstincta MEIG. (nec FALL.) = **sexmaculata** BECK.

maculipennis ROB.-DESV. = **interstincta** FALL.

melanostoma MEIG. = **flavipes** FALL.

minuta MEIG., S. B., VI. 124. 28. [*Ephydra*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 312. 28. (1902). Germania.

nigricauda STENH., Ephydr., 248. 42. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. Europa c.ets.

1923. 52. [*Notiphila*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 192. 108. (1896).
- nigricurris** ROB.-DESV., Myod., 795. 4. [*Hydrina*] (1830). Gallia.
- nitida** ROB.-DESV., 794. 1. [*Hydrina*] (1830). Gallia.
- obtecta** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 192. 109. (1896). Europa centr.
- pallipes** MEIG., S. B., VII. 383. 39. [*Ephydra*] (1838); BECK., Zeitschr. Germania.
f. Hymenopt. u. Dipt., II. 313. 39. (1902).
- X **pieta** FALL., Act. Holm., 254. 12. (1813) et Dipt. Suec. Hydrom., 11. Europa centr.
13. [*Notiphila*] (1823); MEIG., S. B., VI. 125. 30. [*Ephydra*] (1830); et sept.,
HALID., Ann. of nat. Hist., III. 405. 1. [*Hydrina*] (1829); STENH., Aegyptus.
Ephydr., 243. 37. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1913. 46. [*Notiphila*] (1846); WALK., Ins. Brit., II. 260. 1. [*Hydrina*] (1853); LW.,
N. B., VII. 25. 1. (1860); SCHIN., F. A., II. 253. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 192. 110. (1896) et Mitth. Zool. Mus.
Berlin, II. 3. p. 173. 290. (1903).
- X **pullula** FALL., Dipt. Suec. Hydrom., 11. 10. [*Notiphila*] (1823).
pictipennis MEIG., MACQ. = **stictica** MEIG.
- posticata** MEIG., S. B., VI. 124. 27. [*Ephydra*] (1830); MACQ., Suit. à Europa centr.
Buff., II. 539. 17. [*Ephydra*] (1835); HALID., Ann. of nat. Hist., et sept.
III. 406. 7. [*Hydrina*] (1839); WALK., Ins. Brit., II. 261. 7. [*Hydrina*] (1853); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 312. 27.
(1902).
- femorata* STENH., Ephydr., 245. 39. (1844); ZETT., Dipt. Scand.,
V. 1918. 49. [*Notiphila*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr.,
XLI. 190. 104. (1896).
- flavipes* var. β . FALL., Dipt. Suec. Hydrom., 12. 15. [*Notiphila*]
(1823).
- psilopina** ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3331. 6—7. [*Ephydra*] (1849). Suecia.
- pullula* FALL. = **pieta** FALL.
- punctatonervosa** FALL., K. Vetensk. Akad. Handl., 254. 13. (1813) Europa centr.
et Dipt. Suec. Hydrom., 12. 14. [*Notiphila*] (1823); MEIG., S. B., et sept.
VI. 123. 24. [*Ephydra*] (1830); HALID., Ann. of nat. Hist., 405. 2.
[*Hydrina*] (1839); STENH., Ephydr., 247. 41. (1844); ZETT., Dipt.
Scand., V. 1921. 51. [*Notiphila*] (1846); WALK., Ins. Brit., II. 260.
2. [*Hydrina*] (1853); LW., N. B., VII. 25. 2. (1860); SCHIN., F. A.,
II. 252. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 188. 101. t.
VI. f. 30. (1896).
- sexmaculata** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 191. 106. (1896). Germania.
- interstincta* MEIG., (nec FALL.) S. B., VI. 122. 23. [*Ephydra*]
(1830); MACQ. Suit. à Buff., II. 539. 16. [*Ephydra*] (1835);
BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 312. 23. (1902).
- stictica** MEIG., S. B., VI. 121. 21. [*Ephydra*] (1830); MACQ., Suit. à Europa centr.
Buff., II. 539. 14. [*Ephydra*] (1835); HALID., Ann. of nat. Hist., III. et mer.
405. 4. [*Hydrina*] (1839); WALK., Ins. Brit., II. 260. 4. [*Hydrina*]
(1853); LW., N. B., VII. 25. 3. (1860); SCHIN., F. A., II. 253. (1864);
BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 189. 102. (1896).
- pictipennis* MEIG., S. B., VI. 122. 22. [*Ephydra*] (1830); MACQ.,

- Suit à Buff., II. 539. 15. [*Ephydra*] (1835); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 2. 283. (1900); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 311. 22. (1902).
- trinervis** STENH., Ephydr., 242. 36. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. Suecia. 1911. 44. [*Notiphila*] (1846).
- viridula** ROB.-DESV., Myod., 795. 6. [*Hydrina*] (1830). Gallia.
- vittipennis** ZETT., Ins. Lapp., 718. 6. (1838); STENH., Ephydr., 250. Groenlandia, 43. (1844); STAEG., Grönl. Antl. Krøyer's Tidskr., I. 369. 54. (1845); ZETT., Dipt. Scand., V. 1924. 53. [*Notiphila*] (1846); LW., N. B., Europa centr. VII. 26. 7. (1860); SCHIN., F. A., II. 253. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 193. 111. t. IV. f. 22. (1896); LUNDB., Vidensk. Medd., 302. 145. (1900). et sept.

Hyadina ^{> Hydrina}

HALID., Ann. of Nat. Hist., III. 406. (1839).

Hydrina ROB.-DESV., Myod., 795. (1830).

brevicornis ZETT., STENH. = **nitida** MACQ.

fenestrata BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 173. 289. (1903). Aegyptus.

guttata FALL., Act. Holm., 253. 11. 12. (1813) et Dipt. Suec. Hydrom., Europa. 11. 12. [*Notiphila*] (1823); MEIG., S. B., VI. 125. 31. [*Ephydra*] (1830); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 406. 8. (1839); ZETT., Ins. Lapp., 718. 7. (1838); STENH., Ephydr., 239. 34. [*Philygria*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1914. 47. [*Notiphila*] (1846); WALK., Ins. Brit., II. 261. 8. (1853); LW., N. Beitr., VII. 27. 2. (1860); SCHIN., F. A., II. 245. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 194. 112. t. V. f. 13. (1896); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 2. 285. (1900).

rufipes p. p. MEIG., S. B., VI. 126. 32. [*Ephydra*] (1830).

vernalis ROB.-DESV., Myod., 795. 3. [*Hydrina*] (1830).

virens MACQ., Suit. à Buff., II. 527. 19. [*Hydrellia*] (1835); MEIG., S. B., VII. 376. 36. [*Hydrellia*] (1838).

guttata var. *b. brevicornis* STENH. = **nitida** MACQ.

humeralis BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 195. 115. (1896). Germania.

nitida MACQ., Suit. à Buff., II. 539. 18. [*Ephydra*] (1835); LW., N. Beitr., VII. 28. 3. (1860); SCHIN., F. A., II. 254. (1864); BECK., Europa centr. Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 194. 113. t. IV. f. 23. (1896). et sept.

brevicornis ZETT., Dipt. Scand., V. 1912. 45. [*Notiphila*] (1846).

guttata var. *b. brevicornis* STENH., Ephydr., 240. [*Philygria*] (1844).

rufipes p. p. MEIG., S. B., VI. 126. 32. [*Ephydra*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 313. 32. (1902).

rufipes p. p. MEIG. = **guttata** FALL.

rufipes p. p. MEIG. = **nitida** MACQ.

scutellata HALID., Ann. of nat. Hist., III. 406. 9. (1839); WALK., Ins. Brit., II. 262. 9. (1853); LW., N. Beitr., VII. 27. 1. (1864); BECK., Hibernia, Silesia. Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 195. 114. (1896).

- trinervis* STENH., Ephydr., 242. 36. [*Notiphila*] (1844); ZETT., Dipt. Suecia. Scand., V. 1911. 44. [*Notiphila*] (1846).
vernalis ROB-DESV. = *guttata* FALL.
viridis MACQ., MEIG. = *guttata* FALL.

Scoliocephalus

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. 173. (1903).

- pallidiseta* BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 174. 291. t. IVc. Aegyptus. f. 30, 31. (1903).

Asmeringa

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 174. (1903).

- inermis* BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 174. 292. t. IVc. f. Aegyptus. 32, 33, 34. (1903).

Homalometopus

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 175. (1903).

- albiditinctus* BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 175. 293. t. Aegyptus. IVc. f. 35, 36. (1903).

Ephydrinae.

Ochthera

LATR., Hist. nat. d. Ins., XIV. 391. (1803).

Macrochira MEIG., Illig. Mag., II. (1803).

- angustitarsis* BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 181. 307. t. Aegyptus. IVc. f. 44. (1903).

manicata FARR. = *mantis* DEG.

- X *mantis* DEG., Ins., IV. 61. t. VIII. f. 15, 16. [*Musca*] (1782); LATR., Europa, Gen. Crust. et Ins., IV. 348. t. XV. f. 10. [*Musca*] (1803); MEIG., Africa sept., S. B., VI. 78. 1. t. LVIII. f. 18—21. (1830); MACQ., Suit. à Buff., Ins. Canar., II. 519. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 715. 1. (1838); STENH., Ephydr., Amer. sept., 166. 1. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1804. 1. (1846); WALK., Ins. Brit., II. 250. 1. (1853); ROND., Prodr., I. 132. (1856); LW., N. Beitr., VII. 30. 1. (1860) et Dipt. of N. America, 161. 2. (1862); SCHIN., F. A., II. 256. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 204. 122. t. V. f. 3. t. VI. f. 20. (1896).

manicata FABR., Entom. syst., IV. 334. 94. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 323. 36. [*Tephritis*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Hydromyz., 2. 1. (1823); ROB-DESV., Myod., 787. 1. (1830).

- mantispa* LW., Stettin. entom. Zeitschr., VIII. 372. (1847); LW., N. Europa mer., Beitr., VII. 30. 2. (1860); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. Afr. sept.

205. 123. (1896) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 181. 305.
t. IVc. f. 45. (1903).

Schembrii ROND., Ann. Soc. entom. de Fr., II. 5. (1847).

pilimana BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 181. 306. t. IVd. Aegyptus.
f. 46. (1903).

Schembrii ROND. = *mantispa* LW.

Pelina

HALID., Ann. of nat. Hist., III. 407. (1839).

Telmatobia STENH., Ephydr., 208. (1844).

✕ *aenea* FALL., K. Vetensk. Akad. Handl., 253. 10. (1813) et Dipt. Suec. Europa.
Hydrom., 11. 11. [*Notiphila*] (1823); MEIG., S. B., VI. 124. 29.
[*Ephydra*] (1830); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 407. 11. (1839);
STENH., Ephydr., 209. 12. [*Telmatobia*] (1844); ZETT., Dipt. Scand.,
V. 1926. 54. [*Notiphila*] (1846); WALK., Ins. Brit., II. 262. 11.
(1853); LW., N. Beitr., VII. 30. 1. (1860); SCHIN., F. A., II. 255.
(1864); WEYENBERGH, Tijdschr. v. Entom., XVII. 157. t. X. f. 22.
(1874); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 86. (1883); BECK., Ber-
lin. entom. Zeitschr., XLI. 197. 116. t. V. f. 14. (1896); STROBL,
Wien. entom. Zeitg., XIX. 3. 286. (1900).

glabricula MEIG., S. B., VI. 121. 19. [*Ephydra*] (1830); MACQ.,
Suit. à Buff., II. 538. 11. [*Ephydra*] (1835); BECK., Zeitschr.
f. Hymenopt. u. Dipt., II. 311. 19. (1902).

aenea ZETT. (nec FALL.) [Ins. Lapp.] = *aenescens* STENH.

aenescens STENH., Ephydr., 210. 13. [*Telmatobia*] (1844); ZETT., Europa centr.
Dipt. Scand., V. 1928. 55. [*Notiphila*] (1846); LW., N. Beitr., VII. et sept.
30. 2. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 198. 118. t.
IV. f. 30. (1896).

aenea ZETT., Ins. Lapp., 718. 5. [*Notiphila*] (1838).

Mikii STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 280. 18. (1893).

glabricula MEIG., MACQ. = *aenea* FALL.

guttipennis STENH., Ephydr., 212. 14. [*Telmatobia*] (1844); ZETT., Suecia.
Dipt. Scand., V. 1929. 56. [*Notiphila*] (1846).

Mikii STROBL. = *aenescens* STENH.

nitens LW., Europ. Dipt., III. 309. 212. (1873); BECK., Berlin. entom. Italia mer.
Zeitschr., XLI. 199. 119. (1896).

subpunctata BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 198. 117. (1896). Dalmatia.

Lytogaster

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 202. XXVI. (1896).

Pelina p. p. LW., Europ. Dipt., III. 310. (1873).

abdominalis STENH., Ephydr., 238. 33. [*Philygria*] (1844); ZETT., Dipt. Europa centr.
Scand., V. 1908. 42. [*Notiphila*] (1846); BECK., Berlin. entom. et sept.
Zeitschr., XLI. 203. 121. t. V. f. 9. t. VII. f. 16. (1896).

ventruosa LW., Europ. Dipt., III. 310. 313. [*Pelina*] (1873).

ventruosa LW. = *abdominalis* STENH.

Brachydeutera

Lw., Monogr. of the Dipt. of N. America, I. 162. (1862).

argentata WALK., Ins. Dipt. Saunders., 407. (1856); Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 201. t. IV. f. 28. t. VII. 29. (1896) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 178. 301. (1903). Aegyptus, Ins. Canar., Amer. sept.

dimidiata Lw., Dipt. of N. Amer., I. 163. (1862).

dimidiata Lw. = **argentata** WALK.

Halmapota

HALID., in WALK. Ins. Brit., III., 346. Errata, XXI. (1856).

mediterranea Lw., N. Beitr., VII. 34. 2. (1860); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 206. 125. (1896) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 183. 311. (1903). Europa mer., Aegyptus.

salinarum BOUCHÉ, Naturg., I. 99. t. VI. f. 13, 14. [*Ephydra*] (1834); WESTWOOD., Introduct., II. 574. t. 132. f. 11. (1840); SCHIN., F. A., II. 260. (1864). Europa centr.

salinaria HALID., WALK. Ins. Brit., III. 346. XXI. (1856); Lw., N. Beitr., VII. 34. 1. (1860); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 205. 124. t. V. f. 4. t. VI. f. 25. (1896).

salinaria HALID., Lw., BECK. = **salinarum** BOUCHÉ.

Parydra *> Napaea*

STENH., Ephydr., 187. (1844).

Napaea ROB-DESV., Myod., 799. (1830); HALID., Ann. of Nat. Hist., III. (1839); WALK., Ins. Brit., II. (1853).

affinis STENH., ZETT. = **fossarum** HALID.

✕ **aquila** FALL., Act. Holm., 247. (1813) et Dipt. Succ. Hydrom., 4. 3. [*Ephydra*] (1823); MEIG., S. B., VI. 117. 10. [*Ephydra*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 537. 6. [*Ephydra*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 716. 3. [*Ephydra*] (1838); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 407. 14. [*Napaea*] (1839); STENH., Ephydr., 187. 14. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1819. 7. (1846); WALK., Ins. Brit., II. 263. 14. [*Napaea*] (1853); Lw., N. Beitr., VII. 32. 4. (1860); SCHIN., F. A., II. 259. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 211. 133. (1896) et Acta Soc. scient. Fenn., 65. 136. (1900). Sibiria, Europa centr. et sept.

coarctata FALL., Act. Holm., 274. (1813) et Dipt. Succ. Hydromyz., 4. 4. [*Ephydra*] (1823); MEIG., S. B., VI. 116. 7. [*Ephydra*] (1830); STENH., Ephydr., 189. 16. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1821. 8. (1846); WALK., Ins. Brit., II. 263. 12. [*Napaea*] (1853); Lw., N. Beitr., VII. 33. 6. (1860); SCHIN., F. A., II. 258. (1864); BEZZI., Contrib. F. ditt. di Pavia, 22. 50., (1891); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 214. 138. (1896); STROUW., Wien. entom. Zeitg., XIX. 3. 287. (1900). Europa.

- fuscipennis* MACQ., Suit. à Buff., II. 540. 20. [*Ephydra*] (1835).
hecate HALID., Entom. Mag., I. 175. (1833) et Ann. of nat. Hist., III. 407. 12. [*Napaea*] (1839); WALK., Ins. Brit., II. 264. 16. [*Napaea*] (1853).
rufitarsis MACQ., Suit. à Buff., II. 536. 3. [*Ephydra*] (1835).
stagnicola var. *major* ROB.-DESV., Myod. 799. 1. [*Napaea*] (1830).
cognata LW., N. Beitr., VII. 32. 5. (1860); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 212. 134. (1896); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 3. 290. (1900). Europa mer.
X **fossarum** HALID., Entom. Mag., I. 175. (1833) et Ann. of nat. Hist., III. 407. 15. [*Napaea*] (1839); LW., N. Beitr., VII. 32. 3. (1860); SCHIN., F. A., II. 260. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 211. 132. (1896). Europa centr. et sept.
affinis STENH., Ephydr., 192. 18. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1824. 11. [*Ephydra*] (1846).
stagnicola var. *minor* ROB.-DESV., Myod., 900. [*Napaea*] (1830).
furcata STENH., ZETT. = **quadripunctata** MEIG.
fuscipennis MACQ. = **coarctata** FALL.
hecate HALID. = **coarctata** FALL.
infecta HALID. = **pusilla** MEIG.
X **littoralis** MEIG., S. B., VI. 116. 6. t. LX. f. 8. [*Ephydra*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 536. 2. [*Ephydra*] (1835); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 407. 13. [*Napaea*] (1839); ZETT., Dipt. Scand., V. 1823. 10. [*Ephydra*] (1846); WALK., Ins. Brit., II. 263. 13. [*Napaea*] (1853); LW., N. Beitr., VII. 33. 8. (1860); SCHIN., F. A., II. 259. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 214. 140. (1896); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 3. 289. (1900). Europa.
nasuta STENH., ZETT. = **pusilla** MEIG.
nigritarsis STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 280. 17. (1893); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 215. 141. (1896). Styria.
nubecula BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 212. 135. t. VI. f. 21. (1896). Germania.
obliqua BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 215. 142. (1896). Kroatia.
X **pubera** LW., N. Beitr., VII. 32. 1. (1860); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 210. 130. (1896). Sicilia.
pusilla MEIG., S. B., VI. 126. 33. [*Ephydra*] (1830); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 408. 17. [*Napaea*] (1839); LW., N. Beitr., VII. 32. 2. (1860); SCHIN., F. A., II. 259. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 211. 131. (1896). Europa centr. et sept.
infecta HALID., Entom. Mag., I. 175. [*Ephydra*] (1833).
nasuta STENH., Ephydr., 192. 19. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1825. 12. [*Ephydra*] (1846).
pygmaea ROB.-DESV., Myod., 800. 2. [*Napaea*] (1830). Gallia.
quadripunctata MEIG., S. B., VI. 117. 8. [*Ephydra*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 536. 4. [*Ephydra*] (1835); LW., N. Beitr., VII. 33. 7. (1860); SCHIN., F. A., II. 258. (1864); BEZZI., Contrib. F. ditt. di Pavia., 23. 51. (1891); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 214.

139. t. VI. f. 23. (1896); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 3. 288. (1900).
furcata ZETT., Ins. Lapp., 716. 6. (1838); STENH., Ephydr., 190. 17. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1822. 9. [*Ephydra*] (1846).
quinquemaculata BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 213. 137. Silesia. (1896).
rufipes MEIG., S. B., VI. 126. 32. [*Ephydra*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., Germania. II. 540. 19. [*Ephydra*] (1835).
rustitarsis MACQ. = *coarctata* FALL.
stagnicola var. *minor*. ROB.-DESV. = *fossarum* HALID.
stagnicola var. *major*. ROB.-DESV. = *coarctata* FALL.
undulata BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 213. 136. t. VI. f. 22. Germania. (1896).

Ephydra

FALL., Dipt. Suec. Hydromyz., 3. (1823).

- albula* MEIG. = *riparia* FALL.
attica BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 222. 152. (1896). Graecia.
aurata STENH., ZETT. = *micans* HALID.
bicolor MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 303. 2. (1850). Aegyptus.
bivittata LW., N. Beitr., VII. 35. 1. (1860); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 219. 146. (1896) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. Aegyptus. p. 183. 309. (1903).
breviventris LW., N. Beitr., VII. 37. 5. (1860); GERCKE, Metam. Verh. d. Ver. f. naturw. Unterh. Hamb., VI. 53. t. II. f. 31, 32. (1880); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 86. (1883); BEZZI, Contrib. F. ditt. di Pavia, 23. 52. (1891); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 219. 144. (1896) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 183. 310. (1903).
glauca MEIG. = *riparia* FALL.
halophila v. HEYD. = *riparia* FALL.
macellaria EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 779. (1862); SCHIN., F. A., II. 262. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. Europa mer., Aegyptus. 220. 147. t. VI. f. 27. (1893); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 3. 291. (1900); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 183. 308. (1903).
maculipennis GIMMERTH., Bull. de Moscou, IV. 201. 5. (1847). Rossia.
micans HALID., Entom. Mag., I. 175. (1833) et Ann. of nat. Hist., III. Europa centr. et sept. 411. 34. (1839); WALK., Ins. Brit., II. 268. 35. (1853); LW., N. Beitr., VII. 36. 4. (1860); SCHIN., F. A., II. 261. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 218. 143. (1896).
aurata STENH., Ephydr., 167. 1. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1810. 2. (1846).
riparia var. *b*. FALL., Dipt. Suec. Hydrom., 4. (1823).
obscuripes BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 222. 150. (1896). Rossia mer.
ochrostoma BRULLE, Exped. scientif. de Morée, 698. (1832); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 224. 153. (1896). Graecia.

- opaca** LW., N. Beitr., VII. 55. 59. (1860); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 222. 151. (1896). Aegyptus.
- orichalcea** GIMMERTH., Bull. de Moscou, IV. 202. 7. (1847). Rössia.
- riparia** FALL., K. Vetensk. Akad. Handl., 246. (1813) et Act. Holm., 255. (1813) et Dipt. Suec. Hydrom., 3. 1. *var. a.* (1823); MEIG., S. B., VI. 117. 9. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 537. 5. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 715. *var. b.* (1838); STENH., Ephyr., 169. 2. (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1807. 1. (1846); DIRUF., Stettin. entom. Zeitschr., 285. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 268. 34. (1853); LW., N. Beitr., VII. 35. 2. (1860); SCHIN., F. A. II. 262. (1864); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 86. (1883); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 221. 149. (1896). Europa.
- albula* MEIG., S. B., VI. 115. 4. (1830); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 408. 19. (1839); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 310. 4. (1902).
- glauca* MEIG., S. B., VI. 120. 18. (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 311. 18. (1902).
- halophila* v. HEYD., Stettin. entom. Zeitschr., V. 203. (1844).
- salina* v. HEYD., Stettin. entom. Zeitschr., IV. 228. (1843).
- riparia var. b.* FALL. = **micans** HALID.
- salina* v. HEYD. = **riparia** FALL.
- salinae** ZETT., Dipt. Scand., V. 1812. 2—3. (1846); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 3330. (1849); LW., N. Beitr., VII. 36. 3. (1860); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 220. 148. (1896). Suecia.
- Scholtzi** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 220. 148. (1896). Silesia.

Scatella

ROB.-DESV., Myod., III. 801. (1830).

Trixostomus ROND., Prodr., I. 130. 5. (1856).

- aeneiventris** MACQ., Suit. à Buff., II. 538. 12. [*Ephydra*] (1835); MEIG., S. B., VII. 382. 36. [*Ephydra*] (1838). Gallia.
- aestuans** HALID., LW., SCHIN., BECK. = **subguttata** MEIG.
- argyrostoma** STENH., ZETT. = **paludum** MEIG.
- buccata** ROB.-DESV., WALK. = **stagnalis** FALL.
- callosicosta** BEZZI, Ditt. della Calabria, 70. (1895); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 232. 162. t. V. f. 18. (1896). Europa centr. et mer.
- cinerea** ROB.-DESV., Myod., 801. 2. (1830). Gallia.
- crassicosta** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 234. 165. t. VI. f. 32. (1896). Ora mar. sept.
- defecta** HALID., Entom. Mag., I. 174. (1833) et Ann. of nat. Hist., III. 408. 21. [*Caenia*] (1839); WALK., Ins. Brit., II. 265. 22. [*Caenia*] (1853); LW., N. Beitr., VII. 38. 1. (1860); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 236. 168. (1896). Europa centr.
- dichaeta** LW., N. Beitr., VII. 40. 4. (1860); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 228. 154. (1896) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 176. 298. (1903). Germania, Suecia, Aegyptus.

- fallax** CZERNY, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LIII. 239. (1903). Austria.
- flavescens* STENH., ZETT. = **lutosa** HALID.
- flavipennis* STENH., ZETT. = **subguttata** MEIG.
- gilva* LW. = **subguttata** MEIG.
- graminum* HALID. = **quadrata** FALL.
- indistincta** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 231. 161. (1896). Hungaria.
- irrorata** MACQ., Suit. à Buff., II. 538. 13. [*Ephydra*] (1835); MEIG., S. Gallia.
B., VIII. 382. 37. [*Ephydra*] (1838).
- acustris* MEIG. = **stagnalis** FALL.
- leucostoma* MEIG., MACQ., HALID. = **paludum** MEIG.
- X **lutosa** HALID., Entom. Mag., I. 176. [*Ephydra*] (1833) et Ann. of nat. Europa centr.
Hist., III. 408. 21. (1839); WALK., Ins. Brit., II. 266. 28. (1853); et sept.,
LW., N. Beitr., VII. 42. 10. (1860); SCHIN., F. A., II. 266. (1864); Aegyptus.
LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXIV. 394. 169. (1864); BECK.,
Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 176. 295. (1903).
flavescens STENH., Ephydr., 175. 6. [*Ephydra*] (1844); ZETT., Dipt.
Scand., V. 1830. 15. [*Ephydra*] (1846).
- megastoma** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4754. 14—15. [*Ephydra*] (1855). Suecia.
- nubilipennis* STENH., ZETT. = **sibilans** HALID.
- X **paludum** MEIG., S. B., VI. 118. 3. [*Ephydra*] (1830); BECK., Zeitschr. Europa,
f. Hymenopt. u. Dipt., II. 310. 13. (1902) et Mitth. Zool. Mus. Ber- Aegyptus.
lin, II. 3. p. 176. 297. (1903).
argyrostoma STENH., Ephydr., 176. 7. [*Ephydra*] (1844); ZETT.,
Dipt. Scand., V. 1831. 16. [*Ephydra*] (1846).
leucostoma MEIG., S. B., VI. 121. 20. [*Ephydra*] (1830); MACQ., Suit.
à Buff., II. 266. 24. (1835); HALID., Ann. of nat. Hist., III. 409. 23.
(1839); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 311. 20. (1902).
- X *sorbillans* HALID., Entom. Mag., I. 176. (1833) et Ann. of nat. Hist., III. 409. 24. (1839); WALK., Ins. Brit., II. 266. 25. (1853);
LW., N. Beitr., VII. 41. 5. (1860); SCHIN., F. A., II. 265. (1864);
BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 231. 160. (1896); STROBL,
Wien. entom. Zeitg., XIX. 4. 292. (1900).
- pictipennis** MEIG., S. B., VI. 122. 22. [*Ephydra*] (1830). Gallia.
- pilosigenis** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 229. 157. (1896). Germania.
- quadrata** FALL., Aeta Holm., 255. (1813) et Dipt. Suec. Hydrom., 5. Europa.
6. [*Ephydra*] (1823); MACQ., Suit. à Buff., II. 538. 9. (1835); ZETT.,
Ins. Lapp., 716. 5. [*Ephydra*] (1838); HALID., Ann. of nat. Hist.,
III. 410. 31. (1839); STENH., Ephydr., 182. 12. [*Ephydra*] (1844);
ZETT., Dipt. Scand., V. 1840. 23. [*Ephydra*] (1846); WALK., Ins.
Brit., II. 267. 32. (1853); LW., N. Beitr., VII. 40. 1. (1860); SCHIN.,
F. A., II. 265. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 230.
159. t. VI. f. 53. (1896).
graminum HALID., Entom. Mag., I. 176. [*Ephydra*] (1833).
quadrata MEIG., = **Stenhammari** ZETT.
quadrata var. β . STENH. = **Stenhammari** ZETT.
quadriguttata MEIG., S. B., VI. 120. 16. [*Ephydra*] (1830); MACQ., Germania.
Suit. à Buff., II. 538. 10. [*Ephydra*] (1835).

- quadrissetosa** BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 229. 156. t. IV. f. 26. (1896). Scandinavia.
- sibilans** HALID., Entom. Mag., I. 175. [*Ephydra*] (1833); WALK., Ins. Brit., II. 265. 23. (1853); LW., N. Beitr., VII. 40. 3. (1860); SCHIN., F. A., II. 265. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 228. 155. (1896); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 4. 293. (1900).
nubilipennis STENH., Ephydr., 180. 10. [*Ephydra*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1832. 17. [*Ephydra*] (1846).
- silacea** LW., N. Beitr., VII. 41. 8. (1860); SCHIN., F. A., II. 266. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 233. 163. t. VI. f. 31. (1896). Silesia.
- sorbillans** HALID., LW., SCHIN., BECK., STROBL = **paludum** MEIG.
- stagnalis** FALL., Act. Holm., 248. (1813) et Dipt. Suec. Hydrom., 5. 5. [*Ephydra*] (1823); MEIG., S. B., VI. 118. 12. [*Ephydra*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 537. 7. [*Ephydra*] (1835); STENH., Ephydr., 178. 8. [*Ephydra*] (1844); STAEG., Grönl. Antl. Kröjer's Tidskr., I. 369. 53. (1845); ZETT., Dipt. Scand., V. 1827. 13. [*Ephydra*] (1846); ROND., Prodr., I. 130. [*Tricostomus*] (1856); LW., N. Beitr., VII. 42. 9. (1860); SCHIN., F. A., II. 266. (1864); HOLMGR., Öfvers. Kgl. Vet. Akad. Förh., XXIX. 103. 6. (1872); GERCKE, Wien. entom. Zeitg., V. 162. (1886); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 235. 166. (1896); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 4. 294. (1900); LUNDB., Vidensk. Medd., 303. 146. (1900); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 176. 294. (1903). Europa, Groenlandia, Aegyptus.
- buccata* ROB.-DESV., Myod., 801. 1. (1830); WALK., Ins. Brit., II. 266. (1853).
lacustris MEIG., S. B., VI. 118. 11. [*Ephydra*] (1830).
- Stenhammari** ZETT., Dipt. Scand., V. 1842. 24. [*Ephydra*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 230. 158. t. VI. f. 34. (1896). Europa.
- quadrata* MEIG., S. B., VI. 119. 15. [*Ephydra*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 311. 15. (1902).
quadrata var. β . STENH., Ephydr., 183. [*Ephydra*] (1844).
- subguttata** MEIG., S. B., VI. 120. 17. [*Ephydra*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 311. 17. (1902) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 176. 296. (1903). Europa.
- aestuans* HALID., Entom. Mag., I. 176. [*Ephydra*] (1833); WALK., Ins. Brit., II. 266. 26. (1853); LW., N. Beitr., VII. 41. 7. (1860); SCHIN., F. A., II. 266. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 233. 164. (1896).
- flavipennis* STENH., Ephydr., 173. 5. [*Ephydra*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1828. 14. [*Ephydra*] (1846).
- gilva* LW., N. Beitr., VII. 41. 6. (1860).
- variofemorata** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 176. 299. (1903). Aegyptus.

Scatophila

BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 237. XXXIV. (1896).

caviceps STENH., Ephydr., 270. 11—12. [*Ephydra*] (1844); ZETT., Dipt., Europa centr.

Scand., V. 1837. 20. [*Ephydra*] (1846); Lw., N. Beitr., 42. 12. et sept.
[*Scatella*] (1860); SCHIN., F. A., II. 267. [*Scatella*] (1864); BECK.,
Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 241. 171. t. VI. f. 35. (1896).

quadriguttata MEIG., S. B., VI. 120. 16. [*Ephydra*] (1830); BECK.,
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 311. 16. (1902).

cinerera ROB.-DESV. = *comta* HALID.

comta HALID., Entom. Mag., I. 176. [*Scatella*] (1833); WALK., Ins. Britannia,
Brit., II. 267. 31. [*Scatella*] (1853). Gallia.

cinerea ROB.-DESV., Myod., 801. 2. [*Scatella*] (1830).

contaminata STENH., Ephydr., 185. [*Ephydra*] (1844); ZETT., Dipt. Suecia.
Scand., V. 1839. 22. [*Ephydra*] (1846); BECK., Berlin. entom. Zeit- Silesia.
schr., XLI. 240. 170. (1896).

cribrata STENH., Ephydr., 269. 11—12. [*Ephydra*] (1844); ZETT., Dipt. Europa centr.
Scand., V. 1835. 19. [*Ephydra*] (1846); Lw., N. Beitr., VII. 42. et sept.,
11. [*Scatella*] (1860); SCHIN., F. A., II. 265. [*Scatella*] (1864); BECK., Groenlandia.
Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 240. 169. (1896); LUNDB., Vidensk.
Medd., 303. 147. (1900).

X *despecta* HALID., Ann. of nat. Hist., III. 409. 28. [*Scatella*] (1839); Europa centr.
WALK., Ins. Brit., II. 266. 29. [*Scatella*] (1853); Lw., N. Beitr., VII. et sept.
43. 13. [*Scatella*] (1860); SCHIN., F. A., II. 267. [*Scatella*] (1864);
BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 241. 172. t. V. f. 12. (1896).

fenestrata STENH., Ephydr., 181. 11. [*Ephydra*] (1844); ZETT.,
Dipt. Scand., V. 1834. 18. [*Ephydra*] (1846).

stagnalis var. *b.* FALL., Dipt. Suec. Hydromyz., 5. 5. [*Ephydra*]
(1823).

farinae BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 177. 300. (1903). Aegyptus.

fenestrata STENH., ZETT. = *despecta* HALID.

flavitaris ZETT., Dipt. Scand., V. 1838. 21. [*Ephydra*] (1846). Suecia sept.

stagnalis var. *c.* ZETT. (nec FALL.), Ins. Lapp., 716. 4. [*Ephydra*]
(1838).

halterata BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 245. 179. (1896). Silesia.

hamifera BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 242. 174. (1896). Scandinavia.

laevigata Lw., N. Beitr., VII. 44. 16. [*Scatella*] (1860); BECK., Berlin. Europa centr.
entom. Zeitschr., XLI. 243. 176. (1896). et sept.

? *noctula* MEIG., S. B., VI. 119. 14. [*Ephydra*] (1830); HALID.,
Ann. of nat. Hist., III. 409. 29. (1839); MACQ., Suit. à Buff., II.
537. 8. [*Ephydra*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 1844. 25.
[*Ephydra*] (1846); WALK., Ins. Brit., II. 266. 30. (1853); BECK.,
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 310. 14. (1902).

noctula MEIG., MACQ., HALID., ZETT., WALK. = *laevigata* Lw.

planiceps BOHEM., Resa, 204. [*Ephydra*] (1851); ZETT., Dipt. Scand., Suecia sept.
XII. 4757. 20—21. [*Ephydra*] (1855).

vittigera ZETT., Dipt. Scand., XII. 4756. 18—19. [*Ephydra*] (1855).

pumilio Lw., N. Beitr., VII. 44. 17. [*Scatella*] (1860); BECK., Berlin. Silesia.
entom. Zeitschr., XLI. 244. 177. (1896).

quadriguttata MEIG. = *caviceps* STENH.

quadrilineata STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 4. 295. (1900). Hispania.

- quinquepunctata** GIMMERTH., Bull. de Moscou, IV. 201. 6. (1847). Russia.
signata LW., N. Beitr., VII. 43. 14. [*Scatella*] (1860); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 241. 173. t. V. f. 10. (1896). Hungaria, Sicilia.
stagnalis var. *b.* FALL. = **despecta** HALID.
stagnalis var. *c.* ZETT. (nec FALL.) = **flavitarsis** ZETT.
tetra LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., 419. 19. [*Scatella*] (1874); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 244. 178. (1896). Rossia mer.
unicornis CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XIX. 205. (1900). Austria.
variegata LW., N. Beitr., VII. 43. 15. [*Scatella*] (1860); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 243. 175. t. V. f. 9. (1896). Europa centr.
vittigera ZETT. = **planiceps** BOHEM.

Caenia

ROB.-DESV., Myod., 800. II. (1830).

- Beckeri** KUNTZE, Deutsche entom. Zeitschr., 154. (1897). Roma.
caricicola ROB.-DESV. = **palustris** FALL.
curvicauda MEIG. = **palustris** FALL.
fumosa STENH., Ephydr., 171. 3. [*Ephydra*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1813. 3. [*Ephydra*] (1846); LW., N. Beitr., VII. 38. 4. (1860); SCHIN., F. A., II. 264. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 207. 128. (1896). Europa centr. et sept.
riparia var. *c.* FALL., Dipt. Suec. Hydrom., 3. 1. [*Ephydra*] (1823).
palustris FALL., Dipt. Suec. Hydrom., 4. 2. [*Ephydra*] (1823); MEIG., S. B., VI. 115. 2. [*Ephydra*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 530. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 716. 2. [*Ephydra*] (1838); MACQ., Hist. nat. d. Iles Canaries, 118. 103. (1839); STENH., Ephydr., 172. 4. [*Ephydra*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., V. 1815. 4. [*Ephydra*] (1846); WALK., Ins. Brit., II. 265. 20. (1853); LW., N. Beitr., VII. 38. 3. (1860); SCHIN., F. A., II. 264. (1864); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 207. 127. t. VI. f. 24. (1896). Europa, Ins. Canar.
caricicola ROB.-DESV., Myod., 800. 1. (1830).
curvicauda MEIG., S. B., VI. 116. 5. [*Ephydra*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 310. 5. (1902).

Tichomyza

MACQ., Suit. à Buff., II. 534. (1835).

- fusca** MACQ., Suit. à Buff., II. 535. 1. (1835); HALID., Entom. Mag., IV. 148. (1837); LW., N. Beitr., VII. 45. (1860); LABOULE, Ann. Soc. entom. Fr., VII. XLV. (1862); SCHIN., F. A., II. 268. (1864); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 86. (1883); GERCKE, Wien. entom. Zeitg., V. 161. (1886); BEZZI, Contrib. F. ditt. di Pavia, 23. 53. (1891); BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XLI. 206. 126. t. VI. f. 26. (1896). Europa.

longipennis MEIG., S. B., VII. 382. 35. [*Ephydra*] (1838); BECK.,
Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 313. 35. (1902).

urinaria ROB.-DESV., Ann. Soc. entom. de Fr., II. 6. [*Scatella*] (1847).

longipennis MEIG. = **fusca** MACQ.

urinaria ROB.-DESV. = **fusca** MACQ.

Oedenops

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 178. (1903).

Isis BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 178. 302. t. IVc. f. 37, Aegyptus.
38, 39, 40. (1903).

Elephantinosoma

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 179. (1903).

Chnumi BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 180. 303. t. IVc. f. Aegyptus.
41, 42. (1903).

perspiciendum BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 180. 304. t. Aegyptus.
IVc. f. 43. (1903).

Canace

HALID., Ann. of nat. Hist., III. 411. (1839).

nasica HALID., Ann. of nat. Hist., III. 411. (1839); WALK., Ins. Brit., Europa centr.
II. 269. 36. (1853); Lw., N. Beitr., VII. 29. 1. (1860); SCHIN., F. et mer.,
A., II. 269. (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVIII. 80. 1. Ins. Canar.
(1874); ROND., Prodr., VII. Agromyz., 5: (1875); BECK., Berlin.
entom. Zeitschr., XLII. 247. 180. t. IV. f. 29. (1896) et Mitth. Zool.
Mus. Berlin, II. 3. p. 183. 312. (1903).

nasica HALID. (1855). = **ranula** Lw.

ranula Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XVIII. 81. 2. (1874); GERCKE, Europa centr.
Wien. entom. Zeitg., VI. 1—4. (1887); BECK., Berlin. Entom. Zeit. et sept.
schr., XLII. 247. 181. t. V. f. 1, 2, 17. (1896).

nasica HALID., Nat. Hist. Rev. Proc., 64. t. II. f. 12. (1855).

salonitana STROBL, Dipt. v. Bosn. u. Herzegow., 635. (1900); BECK., Europa mer.,
Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 184. 313. (1903). Ins. Canar.,
Aegyptus.

Saphaea*)

ROB.-DESV., Myod., 796. VII. (1830).

proboscidea ROB.-DESV., Myod., 796. 1. (1830).

Gallia.

*) genus incertum.

Drosophilinae.

Aulacigaster

MACQ., Suit. à Buff., II. 579. (1835).

Ampycophora WAHLB., Öfers. af Vetensk. Akad. Förh., 9. (1847).

Apotomella DUF., Ann. Soc. entom. Fr., II. 4. (1846).

Diastata p. p. MEIG., S. B., VI. 379. (1830).

aenea var. β . FALL. = **rufitarsis** MACQ.

diadema MEIG. = **rufitarsis** MACQ.

impressifrons DUF. = **rufitarsis** MACQ.

leucopeza MEIG. = **rufitarsis** MACQ.

rufitarsis MACQ., Suit. à Buff., II. 580. 1. t. XXIII. f. 2. (1835); DUF., Europa.

Metamorph. Ann. Soc. entom. Fr., IV. 455. (1846); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2707. 1. (1848); SCHIN., F. A., II. 270. (1864); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 88. (1883); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. Pavia, 21. 45. (1891).

aenea var. β . FALL., Dipt. Suec. Hydromyz., 11. 11. [*Notiphila*] (1823).

diadema MEIG., S. B., VII. 379. 21. [*Diastata*] (1838); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 305. 21. (1902).

impressifrons DUF., Ann. Soc. entom. Fr., II. 4. 460. t. XI. f. 1—14. [*Apotomella*] (1846).

leucopeza MEIG., S. B., VI. 100. 15. [*Diastata*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 305. 15. (1902).

tarsata WAHLB., Öfers. af Vetensk. Akad. Förh., 9. 261. t. VII. f. 2. [*Ampycophora*] (1847).

tarsata WAHLB. = **rufitarsis** MACQ.

Uranucha

CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 127. (1903).

spuria THOMS., Eugen. Resa, 599. 291. (1868); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 127. (1903). China.

Liomyza

MACQ., Suit. à Buff., II. 605. 15. (1830).

Anthophilina ZETT., Ins. Lapp., 785. (1838).

aenea ZETT. olim = **scatophagina** FALL.

curvipennis ZETT. = **scatophagina** FALL.

flavipes FALL. = **scatophagina** FALL.

glabricula MEIG., S. B., VI. 179. 39. t. LXI. f. 37. [*Agromyza*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 605. 1. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. Europa centr. et sept.

2678. Observ. 1. (1847); SCHIN., F. A., II. 310. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 340. 39. (1902).
- laevigata** MEIG., S. B., VI. 179. 40. [*Agromyza*] (1826); MACQ., Suit. à Buff., II. 605. 2. (1835); SCHIN., F. A., II. 310. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 340. 40. (1902). Europa centr.
- scatophagina** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 3. 3. [*Heteroneura*] (1823); MEIG., S. B., VI. 181. 46. [*Agromyza*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2676. 1. (1848) et XIV. 6444. 1. (1860); TIEF., Jahresber. d. naturhist. Mus., XVIII. 10.; CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 127. (1903). Europa centr. et sept.
- aenea* ZETT., olim. vide Dipt. Scand., VII. 2677. (1847).
- curvipennis* ZETT., Ins. Lapp., 785. 2. [*Anthophilina*] (1838).
- flavipes* FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 5. 6. [*Agromyza*] (1823).

Periscelis

Lw., Berlin. entom. Zeitschr., II. 113. (1858).

- annulata** FALL., K. Vetensk. Akad. Handl., 250. 3. [*Notiphila*] (1813) Europa. et Dipt. Suec. Hydromyz., 9. 3. [*Notiphila*] (1823); MEIG., S. B., VI. 114. 1. [*Ephydra*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 536. 1. [*Ephydra*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2546. 2. [*Drosophila*] (1847); SCHIN., F. A., II. 272. (1864); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 20. 40. (1891); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 309. 1. (1902).
- annulipes** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., II. 118. t. I. f. 31—33. (1858); Silesia. SCHIN., F. A., II. 272. (1864).
- Winnertzi** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 720. (1862); SCHIN., Austria. F. A., II. 272. (1864).

Gitona

MEIG., S. B., VI. 129. (1830).

Acletoxenus FRULD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 152. (1868).

- distigma** MEIG., S. B., VI. 130. t. LX. f. 16—19. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 548. 1. (1835); Lw., Allgem. deutsche naturh. Zeitschr., II. 295. t. II. f. 11, 12. (1847); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, 1—3. 15. (1855); SCHIN., F. A., II. 274. (1864); KALTENB., Pflanzenf. 396. 19. (1872); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 88. (1883). Europa centr.
- formosa* Lw. = **ornata** MEIG.
- ornata** MEIG., S. B., VI. 176. 29. [*Agromyza*] (1830); WALK., Ins. Brit., II. 243. 3. [*Agromyza*] (1853). Europa centr. et mer. Ins. Canar.
- formosa* Lw., Wien. entom. Monatschr., VIII. 366. (1846).
- syphoides* FRULD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 152. et 897. [*Acletoxenus*] (1868); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. (1883); STROBL, Wiss. Mitth. aus Bosn. u. d. Herzegov. Wien,

VII. 87. (637). (1900); COLLIN, Entom. Monthl. Mag. 2. Série,
XIII. 1—3. t. 1. (1902).

pruinosa BIGOT., Explor. scient. de la Tunisie, 10. (1888).

Tunisia.

symphoides FRFLD. = **ornata** MEIG.

Phortica > *Amiota*

SCHIN., Wien. entom. Monatschr., VI. 433. (1862). *Mac.*

Amiota LW., Berlin. entom. Zeitschr., VI. 93. Cent. II. (1862). *may*

alboguttata WAHLB., Acta Acad. Sc. Holm., 22. 11. (1838); ZETT., Suecia,
Dipt. Scand., VI. 2547. 3. [*Drosophila*] (1847); OST-SACK., Catal. Amer. sept.
Dipt. N. Amer., 205. (1878).

poecilogastra LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XLIII. 419. 20. Russia mer.
[*Amiota*] (1874).

variegata FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 5. 2. [*Drosophila*] (1823); Europa.
MEIG., S. B., VI. 82. 1. [*Drosophila*] (1830); MACQ., Suit. à Buff.,
II. 548. 1. [*Drosophila*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2544. 1.
[*Drosophila*] (1847); HEEGER, Sitzgsber. d. K. Akad. d. Wiss., IX.
(1852); SCHIN., F. A., II. 274. (1864); WACHTL, Wien. entom.
Zeitg., I. 276. 8. (1882); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 88.
(1883); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 21. 41. (1891).

Stegana

MEIG., S. B., VI. 79. 207. (1830).

annulata HALID., WALK., Mik = **coleoptrata** SCOP.

coleoptrata SCOP., Entom. carn., 338. 907. [*Musca*] (1763); SCHIN., Europa centr.
F. A., II. 271. (1864); STROBL, Dipt. v. Steyer., IV. 266. (1894).

annulata HALID., Entom. Mag., I. 172. (1833). WALK., Ins. Brit.,
III. Nachtrag pag. XIV. (1856); MIK, Wien. entom. Zeitg.,
219. (1898).

hypoleuca MEIG., S. B., VI. 80. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buff.,
II. 551. 2. (1835); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 385. (1877).

× **curvipennis** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 4. 1. [*Drosophila*] (1823); Europa centr.
SCHIN., F. A., II. 271. (1864).

furta WALK., Ins. Brit., III. XIV. (1856).

nigra MEIG., S. B., VI. 79. 1. t. LVIII. f. 24, 25. (1830); MACQ.,
Suit. à Buff., II. 551. 1. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2579.
2. (1847).

furta WALK. = **curvipennis** FALL.

hypoleuca MEIG., MACQ. = **coleoptrata** SCOP.

hypoleuca ZETT. = **Strobli** MIK.

nigra MEIG., MACQ., ZETT. = **curvipennis** FALL.

Strobli MIK, Wien. entom. Zeitg., XVII. 216. VI. (1898).

hypoleuca ZETT., Dipt. Scand., VI. 2577. 1. (1847).

Transsylv.,
Suecia.

Asteia

MEIG., S. B., V. 88. 209. (1830).

- × *amoena* MEIG., S. B., VI. 89. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 620. Europa centr.
1. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2574. 2. (1847); WALK., Ins. et sept.,
Brit., II. 240. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 280. (1864); BECK., Mitth. Aegyptus.
Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 184. 314. (1903).
- concinna* MEIG., S. B., VI. 90. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 621. Europa centr.
2. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2573. 1. (1847); WALK., Ins. et sept.
Brit., II. 240. (1853); SCHIN., F. A., II. 280. (1864).
- elegantula* ZETT., Dipt. Scand., VI. 2575. 3. (1847); SCHIN., F. A., II. Suecia.
281. (1864).
- nigra* ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6430. 4. (1860). Suecia.

Leucophenga

Mik, Wien. entom. Zeitg., V. 317. (1886).

- × *maculata* DUF., Ann. Soc. nat., 49. 14. t. 3. f. 85. (1839); ZETT., Europa.
Dipt. Scand., XIV. 6423. 19—20. [*Drosophila*] (1860); SCHIN., F.
A., II. 276. [*Drosophila*] (1864); Mik, Wien. entom. Zeitg., V.
317. (1886).
- quinquemaculata* STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 283. 21. (1893). Styria.

Drosophila

FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 4. (1823).

- aceti* KOLLAR, Heeger Sitzgsber. d. K. Akad. d. Wiss. Wien, VII. Austria.
(1851); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 87. (1883).
- adspersa* Mik = *repleta* WOLLASTON.
- albilabris* ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6425. 3—4. (1860). Suecia.
- albopunctata* BECK., Acta Soc. scient. Fenn., 64. 135. (1900). Sibiria.
- × *ampelophila* LW., Berlin. entom. Zeitschr., VI. 231. II. Centuria (1862). Italia, Afr.
uvarum ROND., Bull. Comiz. Agr. Parma, (1875) et Bull. Soc. Amer. sept.
entom. Ital. Firenze, 86. (1876); BIGOT, Ann. Soc. entom.
Fr., XXIII. (1881); COMSTOCK, Report on Ins. (1881);
WASHINGTON, Sep. p. 6—9. Plat. XV. (1882); Mik, Verh. zool-
bot. Ges. Wien. XXXIII. 188. (1883) et Wien. entom. Zeitg.,
V. 331. Anmerk. (1886); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia
Firenze, 21. 42. (1891). BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3.
p. 184. 315. (1903).
- analis* MACQ., Dipt. exot., II. 3^{iem} part, 258. 2. (1843); LUCAS, Explor. Algeria.
scient. de l'Algérie, III. 500. 269. (1849).
- approximata* ZETT., Dipt. Scand., VI. 2557. 12. (1847); SCHIN., F. A., Suecia.
II. 277. (1864).
- cameraria* HALID., Entom. Mag., I. 174. (1833). Britannia.

- cellaris** FABR., Entom. syst., IV. 332. 85. (1794) et Syst. Antl., 305. Europa centr.
108. [*Musca*] (1805); GEOFFR., Ins., II. 536. 85. Mouche du vinaigre
[*Musca*] (1799); ? WALK., Ins. Dipt., II. 237. 1. (1835).
- cellaris** MACQ. = **funebis** FABR.
- cinerella** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 7. 9. (1823); ZETT., Dipt. Scand., Suecia.
VI. 2551. 6. (1847).
- confusa** STAEG., Kröyer's Tidsskr., I. 1. 18. 2. (1844); ZETT., Dipt. Europa,
Scand., VI. 2565. 18. (1847); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. Africa sept.
276. 9. (1882).
- fenestrarum** MEIG., S. B., VI. 83. 4 (1830); MACQ., Suit. à Buff.,
II. 549. 4. (1835); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III.
500. 267. (1849); WALK., Ins. Brit., II. 237. 4. (1853); SCHIN.,
F. A., II. 279. (1864).
- congesta** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2558. 13. (1847). Suecia.
- distincta** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 780. (1862); SCHIN., Austria.
F. A., II. 277. (1864).
- erythrophthalma** PANZ. = **funebis** FABR.
- × **fasciata** MEIG., S. B., VI. 84. 7. (1830); DUF., Ann. Soc. sc. nat., 2. Germania.
Série, XI, XII. 49. (1838); SCHIN., F. A., II. 278. (1864); BRAUER,
Zweifl. d. K. Mus. Wien, 88. (1883).
- fenestrarum** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 6. 4. (1823); ZETT., Ins. Europa centr.
Lapp., 775. 2. et 776. 2. *var. b.* (1838); STAEG., Kröyer's Tidsskr., et sept.
I. 1. 18. (1844); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2568. 21. (1847); SCHIN.,
F. A., II. 278. (1864); HENNEBERG, Die deutsche Essigindustrie,
No. 41—42. p. 2, 3. fig. 1, 3. (1902).
- nitidiventris** MACQ., Suit. à Buff., II. 551. 12. (1835); MEIG., S.
B., VII. 377. 22. (1838).
- fenestrarum** MEIG., MACQ., WALK., SCHIN., LUCAS = **confusa** STAEG.
- flava** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 7. 10. (1823); ZETT., Dipt. Scand., Europa centr.
VI. 2570. 22. (1847). et sept.
- testacea** v. Ros., Württemb. Corbl., 62. (1840); BECK., Jahresber.
d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 30. p. 58. (1902).
- flavipes** MEIG., S. B., VI. 108. 15. [*Opomyza*] (1830). Germania.
- × **funebis** FABR., Mantissa Ins., II. 345. 33. (1787) et Ent. syst., IV. 323. Europa,
48. [*Musca*] (1794); GMEL., Syst. Nat., I. 5. 2842. 190. [*Musca*] Africa sept.,
(1793); FABR., Syst. Antl., 299. 76. [*Musca*] (1805); FALL., Dipt.
Suec. Geomyz., 5. 3. (1823); MEIG., S. B., VI. 82. 2. (1830);
HALD., Curtis Brit. Entom., 473. (1823—40); ZETT., Ins. Lapp.,
775. 1. (1838); WESTW., Introduct., II. 574. (1840); ZETT., Dipt.
Scand., VI. 2563. 17. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 237. 2. (1853);
SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, 1—3. p. 19. et 4. p. 32. (1855);
HEEGER, Sitzgsber. d. K. Akad. d. Wiss. Wien, XXXI. 297. (1874);
BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 88. (1883); BEZZI, Contrib. alla
F. d. Pavia, 21, 43. (1891); HENNEBERG, Die deutsche Essig-
industrie, No. 41—42. p. 3. fig. 2. (1902).
- cellaris** MACQ., Suit. à Buff., II. 549. 2. (1835); LUCAS, Explor.
scient. de l'Algérie, III. 500. 266. (1849).

- erythrophthalma* PANZ., Fauna Germ., XVII. 24. [*Musca*] (1794).
oenopota SCOP., Entom. carn., 337. 905. [*Musca*] (1763).
fuscus MEIG. (*nec* FALL.), S. B., VI. 87. 18. (1830). Suecia.
histrion MEIG., S. B., VI. 85. 8. t. LIX. f. 4. (1830); MACQ., Suit. à Europa centr.
 Buff., II. 550. 6. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2566. 19. (1847); et sept.
 SCHIN., F. A., II. 278. (1864).
ingrata HALID., Entom. Mag., I. 174. (1833). Britannia.
Johni POKORNY, Mitth. d. naturwiss. Ver. Troppau, No. 4. 63—64. Austria.
 (1896); MIK, Wien. entom. Zeitg., XV. 231. (1896).
lacteguttata PORTSCH., Hor. Soc. Entom. Ross., XXVI. 226. (1891). Russia.
limbata v. ROS., Württemb. Corrb., 62. (1840); BECK., Jahresber. d. Germania.
 Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 29. p. 58. (1902).
litorella MEIG., S. B., VII. 374. 6. [*Hydrellia*] (1838). Bavaria.
littoralis MEIG., S. B., VI. 87. 16. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Germania,
 550. 10. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 302. Gallia.
 16. (1902).
maculipennis GIMMERTH., Corresp. Bl. Riga, I. 106. 5. et Bull. de Russia.
 Moseou, IV. 199. 3. (1847).
melanogaster MEIG., S. B., VI. 85. 9. (1830); HALID., Entom. Mag., Europa centr.
 I. 174. (1833); MACQ., Dipt. exot., II. 3. part. 258. (1843); LUCAS, et mer., Afr.
 Explor. scient. de l'Algérie, III. 500. 268. (1849); SCHIN., F. A., sept.
 II. 277. (1864); FRELD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 45. 2.
 (1867); BECK, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 301. 9. (1902).
nigriventris ZETT., Dipt. Scand., VI. 2557. 11. (1847).
nigriceps MEIG., S. B., VII. 378. 23. (1838). Germania.
nigricolor STROBL, Dipt. v. Steyer., IV. 266. (1898). Styria.
nigrimana MEIG., S. B., VI. 87. 17. (1830). Europa centr.
nigrita HALID., Entom. Mag., I. 174. (1833); VERRAL, List of Brit. et sept.
 Dipt., 29. 36. (1901).
nigriventris ZETT. = **melanogaster** MEIG.
nigrosparsa STROBL, Dipt. v. Steyer., IV. 267. (1898). Styria.
nitidapax BIGOT, Voyage Alluand aux îles Canaries (1890). Ins. Canariae.
nitidiventris MACQ., MEIG. = **fenestrarum** FALL.
niveo-punctata DUF., Compt. rend., XXII. 318. et Ann. Soc. entom. Gallia.
 Fr., 2. Série Tom., 4. 323. p. IX. (1846).
obscura FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 6. 6. (1823); ZETT., Ins. Lapp., Europa.
 776. 4. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2549. 4. (1847); SCHIN., F. A.,
 II. 277. (1864); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 21. 42. (1891).
obscura MEIG. (*nec* FALL.), S. B., VI. 85. 11. (1830); MACQ., Suit. à Europa centr.
 Buff., II. 550. 7. (1835); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 194. (1876); et mer.
 STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 133. (1893) et Wien. entom.
 Zeitg., XIX. 5. 297. (1900).
oenopota SCOP. = **funebri** FABR.
pallipes DUF., Ann. Soc. entom. Fr., II. 4. 321. t. IX. f. 1—11. (1846); Gallia.
 BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 87. (1883).

- ✕ **phalerata** MEIG., S. B., VI. 83. 3. t. LIX. f. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 549. 3. (1835); SCHIN., F. A., II. 276. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 720. 2. (1872); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 300. 3. (1902). Europa centr.
- picta** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2567. 20. (1847). Suecia.
- punctulata** LW. = **repleta** WOLLASTON.
- ✓ **repleta** WOLLASTON, Ann. Nat. Hist., I. 117. f. 7. t. V. (1858). I. Madeira,
Africa occid.,
adspersa MIK, Wien. entom. Zeitg., V. 328. (1886). Cuba, Austr.
punctulata LW., Berlin. entom. Zeitschr., VI. 232. 100. (1862). Germania.
- ruficeps** v. ROS., Württemb. Corubl., 62. (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 31. p. 59. (1902). Hungaria.
- ruffrons** LW., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 50. 63. (1873). Fennia.
- spurca** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2550. 5. (1847).
testacea v. ROS. = **flava** FALL.
- ✕ **transversa** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 6. 5. (1823); MEIG., S. B., VI. 84. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 549. 5. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 776. 3. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2553. 8. (1847); WALK., Ins. Brit., II. 237. 3. (1853); SCHIN., F. A., II. 276. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 301. 5. (1902). Europa centr.
et sept.
- ✕ **fristis** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 7. 7. (1823); MEIG., S. B., VI. 86. 12. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 550. 8. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2555. 9. (1847); HALID., Entom. Mag., I. 174. (1833); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 301. 12. (1902). Europa centr.
et sept.
- trivittata** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 282. 20. (1893). Styria.
- unimaculata** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 281. 19. (1893). Styria.
- unistriata** STROBL, Wiss. Mitth. aus Bosnien u. d. Herzegov. Wien, VII. 86. (636). (1900). Dalmatia.
- urarum* ROND., BIGOT. = **ampelophila** LW.
- variegata** HEEGER, Sitzber. d. k. Akad. d. Wiss. Wien, IX. p. 774—781. Austria.
4. Pl. (1852).
- varipes** MACQ., Suit. à Buff., II. 550. 11. (1835); MEIG., S. B., VI. 377. Gallia.
21. (1838).
- virginea** MEIG., S. B., VI. 84. 6. (1830). Germania.

Chymomyza

CZERNY, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., III. 3. 199. (1903)

Drosophila p. p. ZETT., Ins. Lapp., 776. (1838).

- costata** ZETT., Ins. Lapp., 776. 5. [*Drosophila*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2552. 7. [*Drosophila*] (1847); STROBL, Dipt. v. Steyerm., II. 130. [*Drosophila*] (1894); CZERNY, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., III. 3. 200. 1. (1903). Europa centr.
et sept.
- fuscimana** ZETT., Ins. Lapp., 776. 6. [*Drosophila*] (1838); Dipt. Scand., VI. 2556. 10. [*Drosophila*] (1847) et Dipt. Scand., XI. 4336. var. Europa centr.
et sept.
b. [*Drosophila*] (1852); CZERNY, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., III. 3. 200. 2. (1903).

Scaptomyza

HARDY, Proc. Berw. nat. Club., 362. 2. (1849).

amoena MEIG., S. B., VII. 374. 25. [*Hydrellia*] (1838); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. p. 300. 25. (1902). Bavaria.

apicalis HARDY, WALK. = **flaveola** MEIG.

flava MEIG. (nec FALL.), S. B., VI. 88. 20. [*Drosophila*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 302. 20. (1902). Germania.

flaveola MEIG., S. B., VI. 66. 5. [*Notiphila*] (1830); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., IX. (1850); HEEGER, Sitzgsber. d. K. Akad. d. Wiss. Wien, IX. (1852); SCHIN., F. A., II. 279. [*Drosophila*] (1864); GERCKE, Verh. d. Ver. f. naturwiss. Unterhalt. Hamburg, VI. 56. (1880); BRAUER, Zweifl. d. k. Mus. Wien, 88. (1883). Europa centr.

apicalis HARDY, Proc. Berw. nat. Club., 362. 2. (1849); WALK., Ins. Brit., II. 238. 6. [*Drosophila*] (1853).

graminum var. d. FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 8. 11. [*Drosophila*] (1823).

pallida ZETT., Dipt. Scand., VI. 2571. 23. [*Drosophila*] (1847).

flavipennis ZETT. = **graminum** FALL.

gracilis WALK., Ins. Brit., II. 239. 7. (1853). Britannia.

✕ **graminum** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 8. 11. var. a. [*Drosophila*] (1823); MEIG., S. B., VI. 86. 13. [*Drosophila*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 550. 9. [*Drosophila*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 777. 9. (1838) et Dipt. Sc., VI. 2560. 15. [*Drosophila*] (1847); HARDY., Proceed. of Berwickshire nat. Club., (1849); WALK., Ins. Brit., II. 238. 5. [*Drosophila*] (1853); SCHIN., F. A., II. 279. [*Drosophila*] (1864); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, V. 238--242. 245--246. (1881); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 88. (1883); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 21. 44. (1891); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 5. 298. (1900); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 187. 325. (1903). Europa, Ins. Canar., Aegyptus.

flavipennis ZETT., Ins. Lapp., 777. 8. [*Drosophila*] (1838).

incana MEIG., S. B., VI. 86. 14. [*Drosophila*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 302. 14. (1902).

ruficornis MEIG., S. B., VII. 375. 28. [*Hydrellia*] (1838); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 300. 28. (1902).

sordida ZETT., Ins. Lapp., 777. 7. [*Drosophila*] (1838).

graminum var. d. FALL. = **flaveola** MEIG.

✕ **griseola** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2562. 16. [*Drosophila*] (1847); SCHIN., F. A., II. 279. (1864). Suecia.

incana MEIG. = **graminum** FALL.

pallida ZETT. = **flaveola** MEIG.

ruficornis MEIG. = **graminum** FALL.

✕ **rufipes** MEIG., S. B., VI. 87. 15. [*Drosophila*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 302. 15. (1902). Germania.

sordida ZETT. = **graminum** FALL.

Camilla

HALID., Ann. of Nat. Hist., II. 188. (1838).

Noterophila ROND., Prodr. I. 133. (1856).

acutipennis LW., Berlin. entom. Zeitschr. IX. 269. [*Notiphila*] (1865); Europa mer.

STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 5. 296. [*Noterophila*] (1900).

aerata HALID. = *glabra* FALL.

× *glabra* FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 8. 12. [*Drosophila*] (1823); MEIG., Europa.

S. B., VI. 85. 10. [*Drosophila*] (1830); HALID., Ann. of Nat. Hist.,

II. 188. (1839); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2559. 14. [*Drosophila*]

(1847); SCHIN., F. A., II. 276. [*Drosophila*] (1864); STROBL, Wien.

entom. Zeitg., XII. 132. var. *rufipes* [*Notiphila*] (1893).

aerata HALID., CURTIS, Brit. Ins. App., 281. 1337b. [*Diastata*] (1838).

Geomyzinae.

Cyrtotonotum

MACQ., Dipt. exot., II. 3. 193. (1843).

Diastata p. p. MEIG., S. B., VI. 95. (1830).

Diplocentra LW., Zeitschr. Entom. Breslau, XIII. 13. (1859).

× *anus* MEIG., S. B., VI. 95. 1. [*Diastata*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., Europa centr.

II. 552. 1. [*Diastata*] (1835); KERTÉSZ, Természetr. Füzetek, 241— et mer.,

244. f. [*Diplocentra*] (1898); MIK, Wien. entom. Zeitg., XVII. 167. Amer. mer.

82. (1898); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 303. 1. (1902).

gibbum PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., I. 8. 30. Pl. VI. f. 1. [*Helomyza*] (1839); MACQ., Dipt. exot., II. 3 part. 193. f. 25. f. 6. 7. (1843).

Perrisii SCHIN., F. A., II. 23. (1864); NOWICKY, Beitr. z. Kentn.

Galiz. Dipt., 33. [*Diplocentra*] (1873); GRZEG., Verh. zool-

bot. Ges. Wien, XXIII. 34. [*Diplocentra*] (1873); POKORNY,

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 419. [*Cyrtotonotum*] (1887);

BEZZI, Ditt. d. Calabria, 28. [*Diplocentra*] (1895).

gibbum PERRIS, MACQ. = *anus* MEIG.

Perrisii SCHIN., GRZEGORZEK, POKORNY, BEZZI. = *anus* MEIG.

Diastata > Calopteryella > Diastata

MEIG., S. B., VI. 94. 211. (1830).

^{optera Lw.}
^{in Ven. 3) 18. 1109.} *adusta* MEIG., S. B., VI. 96. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 552. 2. Germania,
(1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 302. 2. (1902). Gallia.

albinervis v. Ros., Württemb. Corbl., 62. (1840). Germania.

Type of *Diastata* = *obscurella* fll. ∴ > *Trixoscelis*
in nature like *psora* by Meig. > *Psychoda*

- ap calis** ROBERT, Ann. Soc. entom. Fr., 459. 461. (1834); MEIG., S. B., VII. 378. 17. (1838). Belgium.
- capitata** ROBERT, Ann. Soc. entom. Fr., I. 3. 460. (1834). Belgium.
frontalis MEIG., S. B., VII. 378. 18. (1838).
- claripennis** MACQ., Suit. à Buff., II. 554. 10. (1835); MEIG., S. B., VII. 379. 19. (1838). Gallia.
- costata** MEIG., S. B., VI. 96. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 553. 4. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2539. 4. (1847); SCHIN., F. A., II. 289. (1864); LW., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 363. 4. (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 304. 4. (1902). Europa centr. et sept.
fuscus FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 7. 8. [*Drosophila*] (1823).
marginella ZETT., Ins. Lapp., 777. 10. [*Drosophila*] (1838).
- costata* var. *b.* ZETT. = **vagans** LW.
- frontalis* MEIG. = **capitata** ROBERT.
- fulvifrons** HALID., Entom. Mag., IV. 151. (1837). Britannia.
- fuscus* FALL. = **costata** MEIG.
- gracilipes** MEIG., S. B., VI. 100. 16. (1830). = *Campoicnemus* ♀ sp.? Germania.
 BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 305. 16. (1902); vide: *Leptopezina* MACQ.
- inornata** LW., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 364. 5. (1864). Silesia.
- marginalis** MEIG., S. B., VI. 97. 8. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 553. 6. (1835). Germania, Gallia.
- marginella* ZETT. = **costata** MEIG.
- nebulosa** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 3. 4. [*Geomyza*] (1823); MEIG., S. B., VI. 99. 12. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 554. 9. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 774. 4. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2536. 1. (1847); SCHIN., F. A., II. 289. (1864); LW., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 359. 1. (1864). Europa centr. et sept.
ornata MEIG., S. B., 98. 11. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 553. 8. (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 305. 11. (1902).
- nitida* MEIG. = **striata** ROBERT.
- ornata* MEIG. = **nebulosa** FALL.
- rufipes** MEIG., S. B., VI. 99. 13. (1830). Germania?
- rufitarsis** MEIG., S. B., VI. 99. 14. (1830). Germania.
- striata** ROBERT, Ann. Soc. entom. Fr., I. 3. 460. (1834). Belgium.
nitida MEIG., S. B., VII. 379. 20. (1838).
- unipunctata** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2537. 2. (1847); LW., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 361. 2. (1864). Europa centr. et sept.
- vagans** LW., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 362. 3. (1864). Europa sept., Asia, Amer.
costata var. *b.* ZETT., Dipt. Scand., VI. 2539. 4. (1847).

Geomyza *> Diastata* *mg* *> Trixoscelis*
(not 1810 = see p. 129)

FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 3. 5. (1823); S. str. Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 14. (1865).

Anthophilina ZETT., Dipt. Scand., VII. 2698. (1848); ROND., Agromyz. Bull. Soc. entom. Ital. (1875).

Diastata
Leptomyza p. p. Macq., Suit. à Buff., II. 581. (1835).

Trixoscelis ROND., Prodr., I. 134. (1856). *obscurella* FALL. = type, only sp.

× *approximata* Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 20. 3. (1865); CZERNY, Sicilia, Wien. entom. Zeitg., XXII. 123. (1903). Italia mer.

arenaria HALID. = *obscurella* FALL.

bilineata Macq., Suit. à Buff., II. 556. 7. [*Opomyza*] (1835); MEIG., Gallia. S. B., VII. 381. 32. [*Opomyza*] (1838).

canescens Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 21. 4. (1865); CZERNY, Silesia. Wien. entom. Zeitg., XXII. 123. (1903).

frontalis FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 7. 1. [*Anthomyza*] (1823); MEIG., Europa, S. B., VI. 111. 24. [*Opomyza*] (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 581. Aegyptus. 1. [*Leptomyza*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2698. 6. [*Anthophilina*] (1848); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 22. 5. (1865); ROND., Agromyz., 22. 3. [*Anthophilina*] (1875); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 123. [*Leptomyza*] (1893); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 308. 24. (1902) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 187. 323. (1903); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 125. (1903).

nigrimana MEIG., S. B., VI. 92. 2. [*Ochthiphila*] (1830) et S. B., VI. 105. 7. [*Opomyza*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 306. 7. (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 124. (1903).

maculata Macq. = *obscurella* FALL.

marginella FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 3. 5. (1823); MEIG., S. B., Europa centr. VI. 104. 6. [*Opomyza*] (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 556. 6. [*Opomyza*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 774. 3. (1838) et Dipt. Suec., VI. 2532. 6. (1847); SCHIN., F. A., II. 287. (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 16. 1. (1865); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 306. 6. (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 124. (1903). et sept.

nigrimana MEIG. = *frontalis* FALL.

× *obscurella* FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 4. 6. (1823); MEIG., S. B., VI. Europa centr. 96. 3. t. 59. f. 15. [*Diastata*] (1830); Macq., Suit. à Buff., II. 552. et sept. 3. [*Diastata*] (1838); ZETT., Ins. Lapp., 774. 5. p. p. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2540. 5. [*Diastata*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 235. 1. [*Diastata*] (1853); SCHIN., F. A., II. 288. [*Diastata*] (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 18. 2. (1865); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 20. 38. [*Diastata*] (1891); BECK., Zeitschr. f. Hy-

> type of Diastata
undetermined 18

× *balicogaster* Cz.

menopt. u. Dipt., II. 304. 3. (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 124. (1903).

arenaria HALID., Ann. of nat. Hist., II. 187. [*Helomyza*] (1839).

maculata MACQ., Suit. à Buff., II. 558. 15. [*Opomyza*] (1835);

MEIG., S. B., VII. 381. 34. [*Opomyza*] (1838).

X *pedestris* LW., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 23. 6. (1865); STROBL, Rhodus, Wien. entom. Zeitg., XIX. 5. 300. (1900); BECK., Mitth. Zool. Hispania. Mus. Berlin, II. 3. p. 187. 324. (1903); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 124. (1903).

posticata MEIG., S. B., VI. 66. 4. [*Notiphila*] (1830).

Germania.

puberula ZETT., Ins. Lapp., 785. 2. [*Anthophilina*] (1838) et Dipt. Scand., VII. 2697. 4. [*Anthophilina*] (1848); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 256. (1902); XXII. 125. (1903).

Laponia,

Tryptochaeta

ROND., Prodr., I. 134. 7. (1856).

? *Campicheta* MACQ., Suit. à Buff., II. 547. (1835).

basalis MEIG. = *punctum* MEIG.

circumdata MEIG. = *punctum* MEIG.

fumipennis MEIG. = *obscuripennis* MEIG.

griseola ZETT. = *punctum* MEIG.

luctuosa MEIG., S. B., VI. 97. 7. [*Diastata*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 553. 5. [*Diastata*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt. II. 304. 7. (1902).

Germania.

nigricornis LW. = *obscuripennis* MEIG.

obscuripennis MEIG., S. B., VI. 97. 5. [*Diastata*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 304. 5. (1902).

Germania.

fumipennis MEIG., S. B., VI. 97. 6. [*Diastata*] (1830); SCHIN., F. A., II. 289. [*Diastata*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt. 304. 6. (1902).

nigricornis LW., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 367. 8. (1864).

X *punctum* MEIG., S. B., VI. 98. 10. [*Diastata*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 553. 7. [*Diastata*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VI. 2538. 3. [*Diastata*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 236. 2. [*Diastata*] (1853); ROND., Prodr., I. 134. (1856); SCHIN., F. A., II. 289. [*Diastata*] (1864); LW., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 366. 7. (1864); BEZZI., Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 20. 39. (1891).

Europa.

basalis MEIG., S. B., VI. 98. 9. [*Diastata*] (1830); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 304. 9. (1902).

circumdata MEIG., S. B., VI. 103. 4. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 555. 3. [*Opomyza*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 306. 4. (1902).

griseola ZETT., Dipt. Scand., XII. 4799. 7—8. [*Geomyza*] (1855); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXII. 125. (1903).

rufipes MACQ., Suit. à Buff., II. 547. 1. [*Campicheta*] (1835).

Gallia.

Opomyza

FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 10. (1820).

- asteia** HALID., Entom. Mag., I. 177. (1833). Hibernia.
- fasciata** MACQ., Suit. à Buff., II. 556. 5. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
381. 31. (1838).
- ✕ **florum** FABR., Entom. syst., IV. 352. 164. [*Musca*] (1794) et Syst. Europa.
Antl., 317. 3. [*Tephritis*] (1805); MEIG., S. B., VI. 102. 2. t. LIX.
f. 22. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 555. 2. (1835); ZETT., Ins.
Lapp., 762. 3. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2416. 2. (1847); WALK.,
Ins. Brit., II. 234. 2. (1853); SCHIN., F. A., II. 285. (1864); Lw.,
Berlin. entom. Zeitschr., IX. 29. 2. (1865); KALTENB., Pflanzenf.,
743. 46. (1872); ROND., Lonchein., 12. 1. (1874); BEZZI, Contrib.
alla F. ditt. di Pavia, 20. 37. (1891); SINTENIS, Wien. entom.
Zeitg., XI. 180. (1892).
Nataliae EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 781. (1862);
SCHIN., F. A., II. 285. (1864).
novempunctata GIMMERTH., Bull. de Moscou, XV. 683. [*Sapro-*
myza] (1842).
trinotata O. G. COSTA, Atti Acad. Soc. Napoli, V. 91. 9. [*Sapro-*
myza] (1844).
- fuscipennis** MACQ., Suit. à Buff., II. 557. 8. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
381. 33. (1838).
- ✕ **germinationis** L., Fauna Suec., 1874. [*Musca*] (1761); SCHRANK, Europa.
Enum. Ins. Austr., 473. 961. [*Musca*] (1781); GMEL., Syst. Nat.,
I. 5. 2857. 122. [*Musca*] (1793); FABR., Ent. syst., IV. 356. 183.
[*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 278. 28. [*Dacus*] (1805); FALL.,
Dipt. Suec. Opomyz., 11. 1. (1820); MEIG., S. B., VI. 102. 1. (1830);
MACQ., Suit. à Buff., II. 555. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 761. 1.
(1838) et Dipt. Scand., VI. 2415. 1. (1847); WALK., Ins. Brit., II.
234. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 284. (1864); Lw., Berlin. entom.
Zeitschr., 28. 1. (1865); ROND., Lonchein., 12. 2. (1874); BEZZI,
Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 20. 36. (1891); SINTENIS, Wien.
entom. Zeitg., XI. 180. (1892).
- guttipennis** ZETT., Ins. Lapp., 762. 4. (1838) et Dipt. Scand., VI. 2419. Sibiria,
4. (1847); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 64. 133. (1900). Lapponia.
- Henselli** SINTENIS = **lineatopunctata** v. Ros.
- lineatopunctata** v. Ros., Württemb. Corbl., I. 62. (1840). Europa centr.
Henselli SINTENIS, Festschr. d. naturf. Ver. Riga, 3—6. (1895); et sept.
MIK, Wien. entom. Zeitg., XII. 46. (1893); BECK., Jahresber.
d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 34. pag. 59.
(1902).
punctatonervosa Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 30. 3. (1865).
Nataliae EGG., SCHIN. = **florum** FABR.
- nigriceps** MEIG., S. B., VII. 380. 28. (1838). Bavaria.
- nigriventris** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 32. 5. (1865). Rossia.

novempunctata GIMMERTH. = **florum** FABR.

punctatonervosa LW. = **lineatopunctata** v. ROS.

punctella FALL., Dipt. Suec. Opomyz., 11. 2. (1820); ZETT., Dipt. Suecia, Scand., VI. 2418. 3. (1847); LW., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 32. 4. (1865); SINTENIS, Sitzgsber. d. Dorpat. naturf. Ges., 481. (1891) et Wien. entom. Zeitg., XI. 177—180. (1892).

scutellata ROB., Ann. Soc. entom. Fr., I. 3. 461. (1834). Belgium.

Thalhammeri STROBL, Wiss. Mitth. a. Bosn. u. d. Herzegov. Wien, VII. 87. (637). (1900). Dalmatia.

trinotata COSTA = **florum** FABR.

Balioptera > *Geomyza* fll. 1910. 15 combinata = f

Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 347. (1864).

adusta LW., Europ. Dipt., III. 303. 206. (1873).

Bavaria.

angustipennis ZETT., Dipt. Scand., VI. 2529. 2. [*Geomyza*] (1847).

Suecia.

apicalis MEIG., S. B., VI. 109. 19. [*Opomyza*] (1830); LW., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 353. 3. (1864).

Europa centr.
et sept.

? **maculata** AHRENS, Fauna Ins. Europ., III. 22. t. XXII. f. 3. [*Tephritis*] (1817).

terminalis ZETT., Dipt. Scand., VI. 2533. 8. [*Geomyza*] (1847).

bimaculata MEIG., S. B., VI. 108. 17. [*Opomyza*] (1830); SCHIN., F. Austria.

A., II. 287. [*Geomyza*] (1864).

bracata ROND., Lonchein., 11. 6. [*Geomyza*] (1874).

Italia.

calceata ROND., Lonchein., 11. 5. [*Geomyza*] (1874).

Italia.

X **combinata** L., Syst. Nat., XII. 997. 114. [*Musca*] (1766); FABR., Syst. entom., 785. 65. (1775) et Spec. Ins., II. 451. 84. [*Musca*] (1781);

Europa.

GMEL., Syst. Nat., I. 5. 2355. 114. [*Musca*] (1793); FABR., Ent.

syst., IV. 352. 163. [*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 317. 2. [*Tephritis*] (1805); FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 2. 1. [*Geomyza*] (1823); MEIG., S. B., VI. 109. 18. t. LIX. f. 23. [*Opomyza*] (1830);

= type of *Geomyza*.

MACQ., Suit. à Buff., II. 558. 12. [*Opomyza*] (1835); ZETT., Ins.

Lapp., 773. 1. [*Geomyza*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2527. 1.

[*Geomyza*] (1847); WALK., Ins. Brit., II. 234. 3. [*Opomyza*] (1853);

SCHIN., F. A., II. 287. [*Geomyza*] (1864); LW., Berlin. entom.

Zeitschr., VIII. 351. 1. (1864); ROND., Lonchein., 10. 2. [*Geomyza*]

(1874).

consobrina ZETT., Ins. Lapp., 762. 2. [*Opomyza*] (1838) et Dipt.

Scand., VI. 2529. 3. [*Geomyza*] (1847).

germinationis SCHRANK, Enum. Ins. Austr., 961. [*Musca*] (1781).

combinata var. c. ZETT. = **venusta** MEIG.

consobrina ZETT. = **combinata** L.

costata v. ROS. = **venusta** MEIG.

divergens LW., Europ. Dipt., III. 302. 205. (1873).

Bavaria.

germinationis SCHRANK = **combinata** L.

maculata AHRENS = **apicalis** MEIG.

- majuscula** Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 356. 5. (1864). Europa mer.
- X **pictipennis** ROND., Lonchein., 10. 3. [*Geomyza*] (1874); BEZZI, Ditt. Italia.
d. Calabria, 66. (28). (1895).
- terminalis** ZETT. = **apicalis** MEIG.
- tremula** HALID. = **venusta** MEIG.
- X **tripunctata** FALL., Dipt. Suec. Geomyz., 2. 2. [*Geomyza*] (1823); Europa,
MEIG., S. B., VI. 110. 21. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., Sibiria.
II. 558. 14. [*Opomyza*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 774. 2. (1838) et
Dipt. Scand., VI. 2531. 5. [*Geomyza*] (1847); WALK., Ins. Brit.,
II. 234. 4. [*Opomyza*] (1853); SCHIN., F. A., II. 287. [*Geomyza*]
(1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 355. 4. (1864); ROND.,
Lonchein., 11. 4. [*Geomyza*] (1874); STROBL, Wien. entom. Zeitschr.,
XIX. 5. 299. (1900); BECK., Acta Soc. scient. Fenn., XXVI. 64.
134. (1900).
- unipunctum** ZETT., Dipt. Scand., 2533. 7. [*Geomyza*] (1847); CZERNY, Suecia.
Wien. entom. Zeitg., XXII. 126. (1903).
- 521 **venusta** MEIG., S. B., VI. 110. 20. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Europa.
Buff., II. 558. 13. [*Opomyza*] (1835); SCHIN., F. A., II. 287. [*Geo-*
myza] (1864); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., VIII. 352. 2. (1864);
ROND., Lonchein., 10. 1. [*Geomyza*] (1874).
- combinata** var. c. ZETT., Dipt. Scand., VI. 2527. 1. [*Geomyza*]
(1847).
- costa'a** v. Ros., Württemb. Corbl., 62. [*Opomyza*] (1840); BECK.,
Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 36. p.
59. (1902).
- tremula** HALID., Entom. Mag., I. 177. [*Opomyza*] (1833).

Anthomyza

FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 7. (1823).

Anthophilina ZETT., Dipt. Scand., VII. (1848); ROND., Prodr.,
VII., Agromyz., (1875).

Leptomyza p. p., MACQ., Suit. à Buff., II. (1835).

albimana MEIG., S. B., VI. 107. 12. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. Europa centr.
à Buff., II. 557. 11. [*Opomyza*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymen- et sept.
opt. u. Dipt., II. 307. 12. (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg.,
XXI. 251. 4. (1902).

armillaris ROND., Agromyz., 23. 4. [*Anthophilina*] (1875).

glabra MEIG., S. B., VII. 380. 13. [*Opomyza*] (1838); SCHIN., F.
A., II. 286. [*Opomyza*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt.
u. Dipt., II. 308. 13. (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg.,
XXI. 251. 4. (1902).

nigrimana MEIG., S. B., VII. 400. 90. [*Agromyza*] (1838).

armillaris ROND. = **albimana** MEIG.

Bezzii CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 252. 9. (1902).

Italia.

brevipennis ZETT. = **sabolusa** HALID.

- cingulata** HALID., Nat. hist. rev. II. Proceed., 64. t. II. f. 10. [*Geomyza*] (1855); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 253. 11. (1902).
- flavella** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2704. 11. [*Anthophilina*] (1848). Suecia.
- glabra** MEIG. = **albimana** MEIG.
- X **gracilis** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 8. 3. (1823); MEIG., S. B., VI. 112. 25. [*Opomyza*] (1830); MAOQ., Suit. à Buff., II. 581. 3. [*Leptomyza*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 785. 1. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2693. [*Anthophilina*] (1848); PERRIS, Mém. Soc. sc. Agricult. et Arts de Lille, (1853); GIRAUD, Verh. zool.-bot. Ver. Wien, XIII. 1251. (1863); LW., Zeitschr. gesam. Naturw., XXIV. 394. 171. (1864); SCHIN., F. A., II. 282. [*Leptomyza*] (1864); KALTENB., Pflanzenf., 764. 35. (1872); ROND., Agromyz., 23. 6. [*Anthophilina*] (1875); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 386. (1877); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 87. (1883); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 308. 25. (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 251. 3. (1902).
- socculata** ZETT., Dipt. Scand., VI. 2534. 9. [*Geomyza*] (1847).
- laeta** MEIG., S. B., 111. 23. [*Opomyza*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2703. 10. [*Anthophilina*] (1848); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 308. 23. (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 253. 10. (1902). Europa centr. et sept.
- nigrimana** MEIG. = **albimana** MEIG.
- pallida** ZETT., Ins. Lapp., 785. 4. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2702. 9. Europa. [*Anthophilina*] (1848); SCHIN., F. A., II. 281. (1864); ROND., Agromyz., 24. 7. [*Anthophilina*] (1875); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 251. 2. (1902).
- sabulosa** HALID., The Entom. Mag., IV. 151. [*Geomyza*] (1837); LW., Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XXIV. 394. 172. (1864); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 251. 1. (1902). Europa centr. et sept.
- brevipennis** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4335. 9. [*Geomyza*] (1852).
- salien** LW., Schrift. d. naturf. G. Danzig, 5. (1850).
- salien** LW. = **sabulosa** HALID.
- socculata** ZETT. = **gracilis** FALL.
- sordidella** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2695. 2. [*Anthophilina*] (1848); SCHIN., F. A., II. 282. [*Leptomyza*] (1864). Europa centr. et sept.
- unguicella** ZETT., Ins. Lapp., 753. 12. [*Sapromyza*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2530. 4. [*Geomyza*] (1847); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 252. 6. (1902). Lapponia.
- ungulata** LW., Europ. Dipt., III. 301. 204. (1873); CZERNY, Wien. Entom. Zeitg., XXI. 252. 5. (1902). Rossia asiat

Paranthomyza

CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 254. II. (1902).

flavipes ZETT., ROND. = **nitida** MEIG.

nitida MEIG., S. B., VII. 380. 27. [*Opomyza*] (1838); SCHIN., F. A., II. 288. [*Geomyza*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., Europa.

- II. 308. 27. (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 254. (1902).
flavipes ZETT., Dipt. Scand., VII. 2696. 3. [*Anthophilina*] (1848);
 ROND., Agron. myz., 23. 5. [*Anthophilina*] (1875); CZERNY, Wien.
 entom. Zeitg., XXI. 254. (1902).

Euthycheta

Lw., Berlin. entom. Zeitg., VIII. 365. 6. (1864).

spectabilis Lw., Berlin. entom. Zeitg., VIII. 365. 6. (1864).

Silesia.

Anagnota

BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 309. 30. (1902).

- bicolor* MEIG., S. B., VII. 380. 30. [*Opomyza*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2701. 8. [*Anthophilina*] (1848); SCHN., F. A., II. 286. [*Opomyza*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 309. 30. (1902); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 255. (1902).

Europa centr.
et sept.

Chiromyia

ROB.-DESV., Myod., 621. (1830).

Lisella ROB.-DESV., Myod., 649. (1830).

Scyphella ROB.-DESV., Myod., 650. (1830).

Thyrimyza ZETT., Dipt. Scand., VI. 2336. (1847).

bipunctella ZETT. = *flava* L.

chrysophthalma ZETT. = *oppidana* SCOP.

femorella FALL., ZETT., BECK. = *flava* L.

fenestrarum ROB.-DESV. = *flava* L.

- flava* L., Fauna Suec., 1869. [*Musca*] (1761); GEOFFR., Hist. abreg. Ins., II. 537. 86. [*Musca*] (1762); MÜLLER, Fauna Friedrichsd., 749. [*Musca*] (1764); L., Syst. nat. ed., XII. 2. 997. 115. [*Musca*] (1766); DEG., Ins., VI. 34. 13. [*Musca*] (1733); MÜLLER, Zool. dan. Prodr., 2059. [*Musca*] (1776); DEG., Ins. ed. Goeze, VI. 18. 13. [*Musca*] (1780); SCHRANK, Enum. ins. Austr., 171. 957. [*Musca*] (1781); FOURCROY, Entom. Paris, II. 496. 8. [*Musca*] (1785); VILLERS, Entom. linn., III. 502. [*Musca*] (1789); SCHRANK, Fauna boica, III. 125. 2464. [*Musca*] (1803); FALL., Dipt. Suec. Ortol., 33. 13. [*Sapromyza*] (1820); HAGENB., Symb. faun. helv., I. 47. t. XV. f. 29. [*Sapromyza*] (1822); MEIG., S. B., V. 260. 4. [*Sapromyza*] (1826); ROB.-DESV., Myod., 649. 1. [*Lisella*] (1830); MEIG., S. B., VI. 177. 31. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 609. 18. [*Agromyza*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 753. 11. [*Sapromyza*] (1838) et Dipt. Scand., VI. 2336. 27. [*Sapromyza*] (1847); WALK.,

Europa,
Africa sept.,
Amer. sept.

List Dipt. Brit. Mus., IV. 985. [*Sapromyza*] (1849); SCHIN., F. A., II. 283. [*Scyphella*] (1864); ROND., Bull. Soc. entom. ital., VI. 247. 2. [*Thyrimyza*] (1874); BEZZI, Riv. ital. speleolog., I. 13. 13. [*Peletophila*] (1903); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., IV. 133. 5. [*Peletophila*] (1904); BEZZI, Atti Soc. Ital. di scienze nat., XLIII. 178. (1904).

bipunctella ZETT., Dipt. Scand., VI. 2341. 32. [*Sapromyza*] (1847).

femorella FALL., Dipt. Succ. Orthalid., 34. 15. [*Sapromyza*] (1820);

ZETT., Dipt. Scand., VI. 2338. 28. [*Sapromyza*] (1847); BECK.,

Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., IV. 132. 2. [*Peletophila*] (1904).

fenestrarum ROB.-DESV., Myod., 621. 1. [*Chyromyia*] (1830).

flavicornis ROB.-DESV., Myod., 650. 1. [*Scyphella*] (1830).

? *luteola* SCOP., Entom. carn., 349. 943. [*Musca*] (1763); VILLERS, Entom. linn., III. 523. 289. [*Musca*] (1789).

macrura ROND., Bull. Soc. entom. ital., VI. 247. 1. [*Thyrimyza*] (1874).

flava FABR., ROSSI = **oppidana** SCOP.

flavicornis ROB.-DESV. = **flava** L.

latifrons LW., Berlin. entom. Zeitschr., XVII. 50. 64. [*Scyphella*] Hungaria,
(1873). Ins. Canar.

lutea FALL., MEIG., ZETT., SCHIN., BECK. = **oppidana** SCOP.

luteola SCOP., VILLERS = **flava** L.

macrura ROND. = **flava** L.

✕ *minima* BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., IV. 133. 6. [*Peletophila*] Livonia.
(1904).

nigricornis ROB.-DESV. = **oppidana** SCOP.

oppidana SCOP., Entom. carn., 349. 944. [*Musca*] (1763); VILLERS, Europa.

Entom. Linn., III. 523. 290. [*Musca*] (1789); ROND., Bull. Soc.

entom. ital., VI. 247. 3. [*Thyrimyza*] (1874); BEZZI, Atti Soc. Ital.

di Scienze nat., XLIII. 180. (1904).

chrysophthalma ZETT., Dipt. Scand., VI. 2343. 34. [*Sapromyza*]
(1847) et XIV. 6366. 34. [*Sapromyza*] (1860).

flava FABR., Syst. entom., 786. 71. [*Musca*] (1775) et Spec. Ins.,

II. 452. 92. [*Musca*] (1781); ROSSI, Fauna etrusc., II. 316.

1535. [*Musca*] (1790); FABR., Entom. syst., IV. 355. 177.

[*Musca*] (1794) et Syst. Antl., 317. 6. [*Tephritis*] (1805).

lutea FALL., Dipt. Succ. Orthal., 34. 14. [*Sapromyza*] (1820);

MEIG., S. B., V. 263. 11. [*Sapromyza*] (1826); ZETT., Dipt.

Scand., VI. 2342. 33. [*Sapromyza*] (1847); SCHIN., F. A., II.

283. [*Scyphella*] (1864); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u.

Dipt., IV. 131. 1. [*Peletophila*] (1904).

nigricornis ROB.-DESV., Myod., 650. 2. [*Scyphella*] (1830).

puncticornis HAGENB., Symb. faun. helv., I. 48. t. XV. f. 30.

[*Sapromyza*] (1822).

puncticornis HAGENB. = **oppidana** SCOP.

quadrinotata BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., IV. 132. 4. Ins. Canariae.
[*Peletophila*] (1904).

Tethina

HALID., Ann. nat. Hist., II. 188. (1839).

illota CURTIS, Brit. Ins., 1338. 27. App., 281. [*Opomyza*] (1829); Europa centr.

HALID., Ann. nat. Hist., II. 188. (1839).

Leptopezina*)

MACQ., Suit. à Buff., II. 554. (1835).

gracilipes MEIG., S. B., VI. 100. 16. [*Diastata*] (1830); MACQ., Suit. Germania.
à Buff., II. 554. (1835); vide: *Diastata gracilipes*. MEIG.

Ochthiphilinae.

Ochthiphila

FALL., Dipt. Suec. Ochthid., 9. (1823).

? *Chamaemyia* PANZ., Fauna Germ., CV. 12. (1806).

Estelia ROB.-DESV., Myod., 635. 1. (1830).

? *albiceps* MEIG., S. B., VI. 94. 7. (1830).

Germania.

× *aridella* FALL., Dipt. Suec. Ochthid., 10. 2. (1823); MEIG., S. B., VI. 92. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 545. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 620. 4. (1838) et Dipt. Scand., V. 1950. 6. (1846); WALK., Ins. Brit., II. 192. 1. (1853); SCHIN., F. A., II. 293. (1864); ROND., Lonchein., 18. 5. (1874).
Europa centr. et sept.

cinerea ROB.-DESV., Myod., 635. 1. [*Estelia*] (1830).

Gallia.

× *coronata* LW., Wien. entom. Monatschr., II. 221. 2. (1858); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 9. 305. (1900).
Europa centr. et mer.

elegans PANZ., Fauna Germ., CV. 12. [*Chamaemyia*] (1806); MEIG., S. B., VI. 93. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 546. 4. (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 1949. 5. (1846); SCHIN., F. A., II. 292. (1864).
Europa centr. et sept.

fasciata LW., Wien. entom. Monatschr., II. 222. 3. (1858).

Germania.

flavipalpis HALID., CURTIS = *maritima* ZETT.

flavipes MACQ., Suit. à Buff., II. 546. 6. (1835); MEIG., S. B., VII. 378. 9. (1838).
Gallia.

frontella ROND., Lonchein., 18. 3. (1874).

Italia.

geniculata ZETT., Ins. Lapp., 720. 3. (1838) et Dipt. Scand., V. 1949. 4. (1846); SCHIN., F. A., II. 293. (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 9. 308. (1900).
Europa.

geniculata HALID., Curtis Brit. Ins., 1336. 5. App. 281. (1829) et Ann. nat. Hist., II. 188. (1839); WALK., Ins. Brit., II. 192. (1853).
Britannia.

herbarum ROB.-DESV. = *juncorum* FALL.

*) genus dubium.

- impunctata** ROB-DESV., Myod., 636. 3. [*Estelia*] (1830). Gallia.
- inconstans** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 187. 326. (1903). Aegyptus.
- × **juncorum** FALL., Dipt. Suec. Oehthid., 9. 1. (1823); MEIG., S. B., VI. Europa.
92. 3. t. LIX. f. 11. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 545. 2. (1835);
ZETT., Ins. Lapp., 719. 1. (1838) et Dipt. Scand., V. 1945. 1. (1846);
WALK., Ins. Brit., II. 192. 2. (1853); SCHIN., F. A., II. 293. (1864);
ROND., Lonchein., 18. 4. (1874).
- herbarum* ROB-DESV., Myod., 635. 2. [*Estelia*] (1830).
- juncorum* var. *b.* FALL. = **maritima** ZETT.
- maritima** ZETT., Dipt. Scand., V. 1946. 2. (1846); SCHIN., F. A., II. Europa.
293. (1864); ROND., Lonchein., 17. 1. (1874); STROBL, Wien. entom.
Zeitg., XIX. 9. 306. (1900).
- flavipalpis* HALID., Curtis Brit. Ins., 1336. 6. App. 281. (1829);
HALID., Ann. of nat. Hist., II. 187. (1839).
- juncorum* var. *b.* FALL., Dipt. Suec. Oehthid., 9. 1. (1823).
- nigripes** MACQ., Suit. à Buff., II. 546. 7. (1835); MEIG., S. B., VII. 378. Gallia.
8. (1838).
- obscuripes** ROND., Lonchein., 19. 6. (1874); BEZZI, Contrib. alla F. Italia.
ditt. di Pavia, 33. 111. (1891).
- pallipes** BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., 154. (1880). Cauc., Persia.
- × **polystigma** MEIG., S. B., VI. 92. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa.
546. 3. (1835); ZETT., Ins. Brit., V. 1948. 3. (1846); GIRAUD, Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 1289. t. XXII. f. 2. (1863); SCHIN.,
F. A., II. 293. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 742. 41. (1872); ROND.,
Lonchein., 18. 2. (1874).
- pulchra** v. Ros., Württemb. Corbl., 62. (1840); BECK., Jahresber. d. Germania.
Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 32. p. 59. (1902).
- spectabilis** Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 220. 1. (1858). Germania,
Austria.

Leucopis

MEIG., S. B., VI. 133. 217. (1830).

- alpipennis** MEIG., S. B., VI. 135. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa centr.
582. 2. (1835); BREMI, Isis, (1846); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2713.
4. (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, I—III. 9. (1855). et sept.
- griseola* ZETT., Ins. Lapp., 786. 1. (1838).
- nudiceps* ZETT., Ins. Lapp., 789. 9. [*Agromyza*] (1838).
- albipuncta** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4810. 3—4. (1855). Succia.
- annulipes** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2712. 2. (1848); BOHEM., Öfvers. Europa centr.
af Kgl. vetensk. Akad. Förh., IX. 195. (1848); GOUREAU, Ann. Soc.
entom., France, III. (1863); SCHIN., F. A., II. 295. (1864); BRAUER,
Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. (1883). et sept.
- grisea* BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 144. 11. (1847).
- griseola* MEIG., S. B., VI. 134. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff.,
II. 582. 1. (1835).
- aphidiperda** ROND., Lonchein., 22. 3. (1874). Italia.
- aphidivora** ROND., Lonchein., 21. 2. (1874). Italia.

- argentata** HEEGER, Isis, 998. t. IX. f. 1—16. (1848); SCHIN., F. A., II. Germania, 295. (1864); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 187. 328. Aegyptus. (1903).
- argenticollis** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2714. 5. (1848) et XII. 4811. Suecia. (1855).
- armillata** ROND., Lonchein., 24. 10. (1874). Italia.
- Ballestrerii** ROND., Lonchein., 25. 12. (1874). Italia.
- bursaria** ROND., Lonchein., 24. 9. (1874). Italia.
- cinerella** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2715. 6. (1848). Suecia.
- geniculata** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4810. 1—2. (1855). Suecia.
- grisea** BOUCHÉ = **annulipes** ZETT.
- ✕ **griseola** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 8. 4. [*Anthomyza*] (1823); Europa, ZETT., Ins. Lapp., 786. 1. (1838); RATZEB., Forstins., III. 170. 5. Aegyptus. (1844). BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 144. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2710. 1. (1848); SCHIN., F. A., II. 294. (1864); — FR. LÖW, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 949. (1866); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 348. (1870); ROND., Lonchein., 23. 6. (1874); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. (1883); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 9. 309. (1900); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 187. 327. (1903).
- punctella** ZETT., Ins. Lapp., 789. 8. (1838).
- griseola** MEIG., MACQ. = **annulipes** ZETT.
- griseola** p. p. ZETT. = **albipennis** MEIG.
- griseola** HARTIG, BRAUER = **obscura** HALID.
- hirta** WALK., List of Dipt., IV. 1116. (1849). Suecia sept.
- hyalipennis** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2715. (1848). Suecia.
- impunctata** v. ROS., Württemb. Corbl., 62. (1840); BECK., Jahresber. Germania. d. Ver. f. vaterl. Naturk. Württemb., No. 36. p. 59. (1902).
- lusoria** MEIG., S. B., VI. 135. 3. (1830); ROND., Lonchein., 22. 5. Germania. (1874); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 314. 3. (1902). Italia.
- magnicornis** LW., Thiere Andalus. Rosenh., 386. (1856). Hispania.
- minuscula** ROND., Lonchein., 23. 7. (1874). Italia.
- misaphida** ROND., Lonchein., 25. 13. (1874). Italia.
- nigricornis** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 782. (1862); SCHIN., Austria. F. A., II. 295. (1864).
- nudiceps** ZETT. = **albipennis** MEIG.
- obscura** HALID., Entom. Mag., I. 173. (1833); HARDY, Scotl. Natural., Hibernia. I. 256. Record. 388. (1872); ROND., Lonchein., 21. 1. (1874).
- griseola** HARTIG, Jahrb. f. Forstkunde, II. (1838); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. (1883).
- palliditarsis** ROND., Lonchein., 24. 8. (1874); STROBL, Wiss. Mitth. Italia, a. Bosn. u. d. Herzegov. Wien, VII. 89. (639). (1900). Bosnia.
- Palumbii** ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Lonchein., 25. 11. (1874); Sicilia, STROBL, Wiss. Mitth. a. Bosnien u. d. Herzegov. Wien, VII. 89. Bosnia. (639). (1900).
- punctella** ZETT. = **griseola** FALL.
- punticornis** MEIG., S. B., VI. 134. 2. (1830); BOUCHÉ, Stettin. entom. Europa e. et s.

Zeitg., VIII. 143. 10. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2712. 3. (1848); SCHIN., F. A., II. 294. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 540. 96. (1872); DEWITZ, Sitzgsber. d. Ges. d. Freunde d. Naturf. Berlin, 7. 103. (1881); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. (1883); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 314. 2. (1902).

silesiaca EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 782. (1862); SCHIN., F. A., II. 295. (1864); FR. WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 277. 18. (1882). Silesia.

✕ **talaria** ROND., Lonchein., 22. 4. (1874). Italia.

tibialis ZETT., Observat. entom. (1834) et Dipt. Scand., VII. 2716. (1848). Suecia.

Acrometopia

SCHIN., Wien. entom. Monatschr., VI. 434. (1862).

Oxyrhina p. p. ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., V. 1953. 143. (1846).

Wahlbergi ZETT., Dipt. Scand., V. 1954. 1. [*Oxyrhina*] (1846); SCHIN., F. A., II. 291. (1864); TIEF, Jahrb. d. naturh. Mus., XVIII. Klagenf. 10. Europa centr. et sept.

Sephanilla

ROND., Bull. Soc. entom. Ital., VI. 25. X. (1874).

sertulata ROND., Bull. Soc. entom. Ital., VI. 26²⁴. (1874). Italia.

Milichinae.

Milichia

MEIG., S. B., VI. 131. (1830).

Argyrites p. p. LATR. (1829).

Lobioptera WAHLB., Kgl. Vetensk. Akad. Förh., 259. (1847).

albomaculata STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 9. 310. [*Lobioptera*] (1900). Hispania.

decora LW., Zeitschr. ges. Naturw., 9. [*Lobioptera*] (1870); ROND., Agromyz., 4. 2. (1875). Corsica.

ludens WAHLB., K. Vetensk. Akad. Förh., 259—61. No. 9. t. VII. f. 1. [*Lobioptera*] (1847); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2727. 1. [*Lobioptera*] (1848); SCHIN., F. A., II. 297. [*Lobioptera*] (1864); RADD., Archiv f. Freunde d. Naturg., XXVII. 102. [*Lobioptera*] (1873); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 187. 329. [*Lobioptera*] (1903). Europa centr. et sept., Aegyptus.

margaritata MIK = **marginata** MIK.

marginata MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 796. [*Lobioptera*] (1864). Austria.

margaritata MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. t. XXI. f.

5. [*Lobioptera*] (1864).

palposa ZETT., Dipt. Scand., VII. 2722. 4. (1848); ROND., Agromyz., Suecia, Italia.

4. [*Lobioptera*] (1875).

speciosa MEIG., S. B., VI. 132. t. LX. f. 23, 24. (1830); MACQ., Suit. Europa centr.

à Buff., II. 583. 1. [*Lobioptera*] (1835); SCHIN., F. A., II. 297. et mer.

[*Lobioptera*] (1864); LW., Zeitschr. ges. Naturw., 9—14. [*Lo-*

bioptera] (1870); ROND., Agromyz., 4. 1. (1875); HENDEL, Wien.

entom. Zeitg., XXII. 250. (1903).

Stenoporomyia > milichiella Tas.

HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXII. 250. (1903).

(*Ophthalmomyia* Wlk.)

Tiefi MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 178. 3. [*Lobioptera*] Carinthia.

(1887) et Wien. entom. Zeitg., VI. 238. [*Lobioptera*] (1887); HEN-

DEL, Wien. entom. Zeitschr., XXII. 250. (1903).

Phyllomyza

FALL., Dipt. Suec. Ochthid., 8. 1. (1823).

flavitorsis MEIG., MACQ., SCHIN., GERCKE = **securicornis** FALL.

morosa MEIG., MACQ. = **securicornis** FALL.

× **securicornis** FALL., Dipt. Suec. Ochthid., 8. 1. (1823); MEIG., S. B., Europa.

VI. 171. 13. t. LXI. f. 27. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff.,

II. 614. 1. (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 1956. 1. (1846); SCHIN.,

F. A., II. 312. (1864); STRÖBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 61. 313.

(1900).

× *flavitorsis* MEIG., S. B., VI. 197. 13. [*Opomyza*] (1830); MACQ.,

Suit. à Buff., II. 614. 2. (1835); SCHIN., F. A., II. 312. (1864);

GERCKE, Wien. entom. Zeitg., VIII. 226. 7. t. II. f. 11. (1889).

morosa MEIG., S. B., VI. 170. 8. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff.,

II. 607. 9. [*Agromyza*] (1835); BECK., Zeitschr. f.

Hymenopt. u. Dipt., II. 338. 8. (1902).

> *Dizygomyza* He
Arch. Natg. 34 A. 7.

Desmometopa

Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 185. VI. Centuria (1865).

annulimanum v. Ros. = **annulitarse** v. Ros.

annulitarse v. Ros., Württemb. Corrb., 63. [*Agromyza*] (1840).

Germania.

annulimanum v. Ros., Württemb. Corrb., 63. [*Agromyza*]

(1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Wür-

temb., No. 56, 57. p. 64, 65. (1902).

annulitarse ZETT. = **latipes** MEIG.

flavipes MEIG., S. B., VI. 108. 15. [*Opomyza*] (1830); BECK., Zeitschr. Germania.

f. Hymenopt. u. Dipt., II. 307. 15. (1902).

- griseolum** WULP, Tijdschr. v. Entom., XIV. 198. (13). (1871). Hollandia.
- latipes** MEIG., S. B., VI. 177. 34. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 609. 20. [*Agromyza*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2746. 12. [*Agromyza*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 242. 2. [*Agromyza*] (1853); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6452. 12. [*Agromyza*] (1860); SCHIN., F. A., II. 308. [*Agromyza*] (1864); WULP, Tijdschr. v. Entom., XIV. t. VIII. f. 2—7. p. 195. (10). [*Madiza*] (1871); GERCKE, Wien. entom. Zeitg., VIII. 222. 2. t. II. f. 5. (1887); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 61. 312. (1900).
- annulitarse* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2674. 5. [*Madiza*] (1848).
- M. atrum** MEIG., S. B., VI. 170. 6. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 607. 7. [*Agromyza*] (1835); SCHIN., F. A., II. 304. [*Agromyza*] (1864); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 277. 15. (1882); MIK, Wien. entom. Zeitg., XVII. 146. (1898). Europa centr.
- ✕ **M. nigrum** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2743. 10. [*Agromyza*] (1848); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 61. 311. (1900). Europa.
- niloticum** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 188. 330. (1903). Aegyptus.
- ✕ **sordidum** FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 10. 5. [*Madiza*] (1820); MEIG., S. B., VI. 173. 19. [*Agromyza*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2784. 46. (1848) et XIV. 6462. 46. [*Agromyza*] (1860); SCHIN., F. A., II. 305. [*Agromyza*] (1864); WULP, Tijdschr. v. Entom., XIV. 197. (12). [*Madiza*] (1871). Europa centr. et sept.

Meoneura

ROND., Prodr., I. 128. (1856).

Psalidotus BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 192. (1903).

lonicerae KALTENB. = **obscura** FALL.

obscura FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 6. 9. (1823); MEIG., S. B., VI. 184. 55. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 612. 36. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2770. 32. (1848); ROND., Prodr., I. 128. (1856); SCHIN., F. A., II. 300. (1864); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 91. (1883). Europa centr. et sept., Aegyptus.

lonicerae KALTENB., Pflanzenf., 306. 60. (1872); SCHRÖDER, Musc. id. Illustr. Zeitschr. f. Entom., 3. 3. (1898).

primus BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 192. 344. t. IVe f. 89, 90, 91. (1903).

primus BECK. = **obscura** FALL.

Madiza

FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 8. (1820).

✕ **glabra** FALL., Dipt. Suec. Oscinid., 9. 3. (1820); MEIG., S. B., VI. 137. 4. [*Gymnopa*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 584. 4. [*Gymnopa*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 782. 2. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2673. 4. (1848); SCHIN., F. A., II. 188. (1864). Europa centr. et sept.

- griseola** WULP, Tijdschr. v. Entom., XIV. 198. (1871). Hollandia.
rufitarsis MEIG., S. B., VII. 384. 5. [*Gymnopa*] (1838); SCHIN., F. A., Germania.
 II. 188. (1864).
sordida WEYENBERGH, Tijdschr. v. Entom., XVII. 157. (1873—74); Hollandia.
 BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 84. (1883).

Agromyzinae.

Odinia

ROB.-DESV., Myod., 648. 1. (1830).

Alticomerus ROND., Prodr., I. 121. (1856).

Milichia MEIG., p. p., S. B., VI. 131. (1830).

- boletina** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2721. 3. [*Milichia*] (1848); SCHIN., Europa.
 F. A., II. 298. [*Milichia*] (1864); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di
 Pavia, 32. 110. [*Milichia*] (1891).
maculata MEIG., S. B., VI. 132. 2. [*Milichia*] (1830); MACQ., Suit. à Europa.
 BUFF., II. 582. 2. [*Milichia*] (1835); SUFFRIAN, Stettin. entom. Zeitg.,
 II. 26. 9. [*Milichia*] (1841); LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 324.
 1. [*Milichia*] (1843); SCHIN., F. A., II. 298. [*Milichia*] (1864);
 BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. [*Milichia*] (1883).
ornata ZETT., Ins. Lapp., 787. 1. [*Milichia*] (1838) et Dipt.
 Scand., VII. 2718. 1. [*Milichia*] (1848).
trinotata ROB.-DESV., Myod., 648. 1. (1830); ROND., Agromyz.,
 5. [*Milichia*] (1875).
ornata ZETT. = **maculata** MEIG.
Peleterii ROB.-DESV., Myod., 649. 2. (1830). Gallia.
pulchra ZETT., Dipt. Scand., VII. 2724. (1848). Suecia.
tamaricis BIGOT, Dipt. recueillis en Tunesie, 10. (1884). Tunisia.
tarsata ZETT., Dipt. Scand., VII. 2723. 5. (1848). Suecia.
trinotata ROB.-DESV., ROND. = **maculata** MEIG.

Neoalticomerus

HENDEL, Wien. eutom. Zeitg., XXII. 252. (1903).

- formosa** LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 328. 2. [*Milichia*] (1843); Europa centr.
 ZETT., Dipt. Scand., VII. 2720. 2. [*Milichia*] (1848); SCHIN., F. A., et sept.
 II. 298. [*Milichia*] (1864).
litorella var. b. FALL., Dipt. Suec. Ochthid., 10. 3. [*Ochthiphila*]
 (1823).
litorella var. b. FALL. = **formosa** LW.

Cacoxenus

Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 217. (1858).

- indagator** Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 218. (1858); GIRAUD, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 488. (1861); SCHIN., F. A., II. 299. (1864); RADD., Archiv d. Ver. f. Naturk. Mecklenb., (1873); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 92. (1883); OST-SACK., Berlin. entom. Zeitg., XXXVI. 411. (1891); MİK, Wien. entom. Zeitg., XI. 182. 7. (1892) et XIII. 182. (1894). Europa centr.

Agromyza

FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 3. (1823).

- abbreviata** MEIG., S. B., VI. 176. 30. (1830). Suecia.
abiens ZETT., Dipt. Scand., VII. 2747. 13. (1848); SCHIN., F. A., II. 301. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 17. 12. (1875); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 263. 268. (1881). Europa.
reptans var. *b.* FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 4. (1823).
aenea MEIG., MACQ. = **aeneiventris** FALL.
aeneiventris FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 4. 2. (1823); NYLANDER, Notitia pro Fauna et Flora Fenn., (1847); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2777. 39. (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, I—III. 16. (1855); SCHIN., F. A., II. 304. (1864); ROND., Ann. Soc. entom. Fr., II. 3. XLVII. et Agromyz., 14. 1. (1875). Europa.
aenea MEIG., S. B., VI. 169. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 607. 5. (1835); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., XXXVII., CXIII. CXIV. (1868) et XLV. 240. (1876); KALTENB., Pflanzenf., 279. 11; 321. 13; 365. 37. (1872).
aenescens ZETT., Dipt. Scand., XII. 4814. 8—9. (1855). Suecia.
albicornis MEIG., S. B., VII. 401. 95. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. (1864). Bavaria.
albipennis MEIG., S. B., VI. 171. 12. (1830); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4813. 8—9. (1855). Germania, Suecia.
albitarsis MEIG., S. B., VI. 171. 11. (1830). Germania.
albitarsis ZETT., Dipt. Scand., VII. 2735. 2. (1848). Suecia.
albo-hyalinata ZETT., Dipt. Scand., VII. 2742. 9. (1848). Suecia.
alpicola STROBL, Dipt. v. Steyer., IV. 272. (1898). Styria.
ambigua FALL. (var. *d. reptans*), ZETT. = **nigripes** MEIG.
amoena MEIG., S. B., VI. 187. 68. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 613. 41. (1835); BOUCHE, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 142. 1. (1847); SCHIN., F. A., II. 306. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 298. 15. (1872). Europa centr.
anal ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 18. 15. (1875). Italia.
annulipes MEIG., S. B., VI. 185. 61. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 612. 38. (1835). Germania.
anthracina MEIG., S. B., VI. 173. 20. (1830); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig, V. 246. (1881). Germania.
arctica LUNDB., Vidensk. Medd., 304. 148. (1900). Groenlandia.

- artemisiae* KALTENB., Pflanzenf., 358. 77. (1872). Germania.
- atra* MEIG., S. B., VI. 178. 37. (1830); FRFLD., Zool. Misc. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 163. (1868); KALTENB., Pflanzenf., 717. 15. (1872) et Verh. d. nat. Ver. d. Pr. Rheinl., XIX. 61. (1862); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig, V. 285. (1881); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. (1883). Germania.
- graminis* KALTENB., Pflanzenf., 730. 42. -- 748. 9. — 750. 10. (1872). Gallia.
- nigra* MACQ., Suit. à Buff., II. 610. 24. (1835).
- atratala* RATZEB., Forstins., III. 170. 6. [*Leucopis*] (1844); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., VIII. 58. 2. (1889). Germania.
- atricornis* MEIG., S. B., VII. 399. 84. (1838). Belgium.
- atripes* ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6461. 34—35. (1860); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 62. 318. (1900). Suecia, Hispania.
- atripes* BRISCHKE Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 259. (1881). Germania.
- basilaris* MEIG., S. B., VII. 401. 94. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. (1864). Bavaria.
- bellidis* KALTENB., Pflanzenf., 336. 1. (1872). Germania.
- bicolor* MEIG., S. B., VII. 399. 83. (1838). Belgium.
- bicornis* KALTENB., Mik. = *curvipalpis* ZETT.
- bimaculata* MEIG., S. B., VI. 172. 15. (1830). Germania.
- blanda* MEIG., S. B., VI. 187. 69. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 613. 42. (1835). Germania.
- brevisetia* ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6451. 9—10. (1860). Suecia.
- bryoniae* KALTENB., Pflanzenf., 255. 6. (1872). Germania.
- calceata* MEIG., S. B., VII. 398. 78. (1838). Belgium.
- capitata* ZETT., SCHIN. = *geniculata* MEIG.
- carbonaria* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2739. 6. (1848); SCHIN., F. A., II. 303. (1864); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 249. 251. (1881); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 135. (1893) et XIX. 63. 323. (1900). Europa centr. et mer.
- nigra* ZETT., Ins. Lapp., 788. 5. (1838).
- carbonella* ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6455. 22—23. (1860). Suecia.
- cicerina* ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 19. 18. (1875). Italia.
- cinerascens* MACQ., Suit. à Buff., II. 610. 25. (1835); MEIG., S. B., VII. 400. 88. (1838). Gallia.
- cingulata* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2754. 18. (1848). Suecia.
- cirsii* ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 15. 2. (1875). Europa centr. et mer.
- pulicaria* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2778. 40. (1848); SCHIN., F. A., II. 304. (1864).
- confinis* MEIG., S. B., VI. 176. 28. (1830); SCHIN., F. A., II. 311. [*Ceratomyza*] (1864); KALTENB., Pflanzenf., 710. 2. (1872); BECK, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 340. 28. (1902). Germania.
- congesta* BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 190. 339. (1903). Aegyptus.
- coxata* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2737. 4. (1848). Suecia.
- crassiseta* STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 63. 325. d. (1900). Hispania.
- cunctans* MEIG., S. B., VI. 178. 36. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa c.et m.

610. 23. (1835); SCHIN., F. A., II. 304. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 778. 23. (1872); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 64. 327. (1900); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 190. 335. (1903).
- curvipalpis** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2782. 44. (1848); SCHIN., F. A., II. 305. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. VII. Agromyz., 16. 6. (1875); MIK, Wien. entom. Zeitg., V. 101. 1. (1886) et Fauna v. Hernst., 532. f. 11. (1886). Europa centr. et mer.
- bicornis* KALTENB., Pflanzenf., 330. 33. (1872); MIK, Wien. entom. Zeitg., V. 276. 7. (1886).
- discrepans** WULF., Tijdschr. v. Entom., XIV. 206. (1871). Hollandia.
- dorsata** SIEBKE, Nyt. Mag. f. Naturv., 169. (1864) et Enum. Ins. Norv., 179. 8. (1877). Scandinavia.
- echii** KALTENB., Pflanzenf., 449. 20. — 445. 3. — 451. 6. (1872). Germania.
- elegantula** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2749. 14. (1848). Suecia.
- elongula** ZETT., Ins. Lapp., 790. 15. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2780. 42. (1848). Lapponia. *= monera*
- errans** MEIG., S. B., VI. 178. 35. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 609. 21. (1835); SCHIN., F. A., II. 303. (1864). *type of Phytobia* Loey. 1864. p. 133 Germania.
- eupatorii* KALTENB. = **fasciola** MEIG.
- exigua** MEIG., S. B., VI. 184. 58. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2773. 35. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 243. 6. (1853); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 62. 319. (1900). Europa.
- exilis** MEIG., S. B., VI. 186. 64. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 612. 39. (1835). *> Agrophila* Loey. 1864. p. 133 Germania.
- fasciata* STROBL = **grossicornis** ZETT.
- fasciola** MEIG., S. B., VII. 402. 98. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. (1864); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 258. (1881). Germania.
- eupatorii* KALTENB., Pflanzenf., 330. 12. (1872).
- ferruginea** WULF., Tijdschr. v. Entom., XIV. 205. t. 8. f. 10. (1871). Hollandia.
- flaveola** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 6. 11. (1823); MEIG., S. B., VI. 180. 44. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 611. 30. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2764. 27. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 243. 4. (1853). Europa centr. et sept.
- flaveola* var. **scutellata** FALL.
- flaviceps** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 6. 12. (1823); MEIG., S. B., VI. 185. 59. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2762. 25. (1848). Europa centr. et sept.
- flavicornis** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4812. 2—3. (1855). Suecia.
- flavifrons** MEIG., S. B., VI. 184. 57. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 612. 37. (1835); SCHIN., F. A., II. 302. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 54. 26 et 57. 9. (1872) et Verh. nat. Ver. d. Preuss. Rheinl., XIX. 101. (1862). Germania.
- flavimana** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6458. 27—28. (1860). Suecia.
- flaviventris* STROBL = **grossicornis** ZETT.
- flavocincta* STROBL = **grossicornis** ZETT.
- flavogeniculata** v. ROS., Württemb. Corrb., 63. (1840). Germania.
- flavotata** HALID., Entom. Mag., I. 173. (1833). Britannia.
- flavo-scutellaris** ZETT., Ins. Lapp., 790. 13. (1838). Suecia.

- scutellata* var. FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 7. 13. (1823).
- frontalis** MEIG., S. B., VI. 175. 24. (1830); KALTENB., Pflanzenf., 533. Germania.
12. (1872); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, V. 277. (1881).
- fronticornis** ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 19. 16. (1875). Italia.
- fulvella** ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 18. 14. (1875). Italia.
- fuscipes** MACQ., Suit. à Buff., II. 606. 3. (1835); MEIG., S. B., VII. 396. Gallia.
70. (1838).
- fuscolimbata** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 62. 317. (1900). Hispania.
- gei** BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, V. 250. (1881). Germania.
- geniculata** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 6. 10. (1823); MEIG., S. B., Europa.
VI. 181. 45. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 611. 31. (1835); ZETT.,
Dipt. Scand., VII. 2761. 24. (1848); SCHIN., F. A., II. 302. (1864);
BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, V. 244. (1881); STROBL, *meconura*
Wien. entom. Zeitg., XIX. 62. 319. (1900).
- capitata* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2750. 15. (1848).
- graminis* KALTENB. = **atra** MEIG.
- grossicornis** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6456. 22—24. (1860); STROBL, Europa.
Wien. entom. Zeitg., 63. 325. (1900).
- X *fasciata* STROBL, Progr. Seitenst., 38. [*Phyllomyza*] (1880).
- X *flaviventris* STROBL, Dipt. v. Steyer., IV. 271. (1898).
- X *flavocincta* STROBL, Progr. Seitenst., 37. [*Phyllomyza*] (1880). *synotype* *Phytomyza* h. Arch. Nat., 84 A. 7.
- gyrans** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 4. 3. (1823); MEIG., S. B., VI. Europa.
182. 48. t. LXI. f. 35. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 611. 33. (1835); ZETT.,
Ins. Lapp., 789. 11. (1838) et Dipt. Scand., VII. > *Redia* Lioq. 1864.
2766. 28. (1848); SCHIN., F. A., II. 303. (1864); ROND., Bull. Soc.
entom. Ital. Agromyz., 16. 8. (1875); STROBL, Wien. entom. Zeitg.,
XIX. 63. 324. (1900).
- haemorrhoidalis** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2753. 17. (1848). Suecia.
- heraclei** BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 143. 9. (1847); KALTENB., Germania.
Pflanzenf., 284. 14. (1872).
- hieracii** KALTENB., Pflanzenf., 403. 40. (1872). Germania.
- hilarella** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2776. 38. (1848). Suecia.
- X **holosericea** BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 143. 8. (1847); Germania.
SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, I—III. 11. (1855); KALTENB.,
Pflanzenf., 461. 47. (1872).
- humeralis** v. Ros., Württemb. Corbl., 63. (1840); BECK., Jahresber. Germania.
d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 59. p. 65. (1902).
- hyalipennis** MEIG., S. B., VII. 397. 73. (1838); SCHIN., F. A., II. 306. Germania.
(1864).
- imbuta** MEIG., S. B., VII. 400. 86. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. (1864). Germania.
- impatientis** BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, V. 245. (1881). Germania.
- incisa** MEIG., S. B., VI. 182. 50. (1830); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Italia,
Agromyz., 16. 9. (1875). Germania.
- infuscata** MEIG., S. B., VI. 184. 56. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. Europa centr.
2771. 33. (1848); SCHIN., F. A., II. 300. (1864). *meconura* et sept.
- lacertella** ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 20. 21. (1875). Italia.
- lacteipennis** FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 4. 4. (1823); MEIG., S. B., — Europa.

VI. 183. 53. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 612. 35. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 789. 12. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2768. 30. (1848); SCHIN., F. A., II. 300. (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 61. 314. (1900) et Wiss. Mitth. a. Bosn. u. d. Herzegov. Wien, VII. 8. 9. (639). (1900). *≠ Anisoneura* Kioq. 1864. 13. 4.

lamii KALTENB., Pflanzenf., 488. 12. (1872). Germania.

laminata BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig, V. 255. (1881). Germania.

lappae LW., Stettin. entom. Zeitg., XI. 380. (1850); KALTENB., Pflanzenf., 370. 29. (1872). Germania.

lateralis MACQ., Suit. à Buff., II. 609. 17. (1835); MEIG., S. B., VII. 399. 81. (1838); BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 143. 4. (1847); SCHIN., F. A., II. 307. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 445. 14. (1872); LINDEM., Bull. Soc. Imp. de Nat. de Moscou, No. 3. (1886). Europa centr.

laterella ZETT., Ins. Lapp., 788. 7. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2744. 11. (1848). Suecia.

lateritia ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 17. 13. (1875). Italia.

leucocephala MEIG., S. B., VI. 174. 22. (1830); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 19. 17. (1875). Italia, Germania.

limbatella ZETT., Dipt. Scand., VII. 2755. 19. (1848). Suecia.

lineella ZETT., Ins. Lapp., 790. 16. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2752. 16. (1848). Suecia.

luctuosa MEIG., S. B., VI. 182. 49. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 612. 34. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2759. 22. (1848); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 16. 7. (1875); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 134. (1893). Europa centr. et mer.

≠ Redia Kioq. 1864. p. 1313.

lutea MEIG., S. B., VI. 177. 32. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 609. 19. (1835); SCHIN., F. A., II. 301. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 83. 9. (1872) et Verh. naturf. Ver. d. Preuss. Rheinl., XIX. 21. (1862); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 91. (1883); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 61. 316. (1900). Europa centr. et mer.

Macquarti GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., II. 9. p. 133. t. V. No. 1. f. 1—10. (1851). Gallia.

maura MEIG., S. B., VII. 399. 85. (1838); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2781. 43. (1848); SCHIN., F. A., II. 305. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 15. 5. (1875); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, V. 260. 273. (1881); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 64. 330. (1900). Europa.

pulicaria ZETT., Ins. Lapp., 788. 6. (1838).

reptans var. d. FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 3. 1. (1823).

Miki STROBL, Dipt. v. Steyerm., IV. 272. (1898). Styria.

minuta MEIG., S. B., VII. 401. 93. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 201. 158. (1872). Germania.

minutissima ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6459. 33—34. (1860). Suecia.

mobilis ROND. (nec MEIG.), Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 17. 10. (1875); BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 143. (1847); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, V. 277. 281. (1881). Europa centr. et mer.

≠ meaneura

- morio** BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 258. (1881). Germania.
- ✕ **morionella** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2783. 45. (1848); SCHIN., F. A., Suecia.
II. 305. (1864).
- muscaria** GERCKE = **vagans** FALL.
- muscina** MEIG., S. B., VI. 177. 33. (1860). Germania.
- myosetidis** KALTENB., Pflanzenf., 452. 6. (1872). Germania.
- nana** MEIG., S. B., VI. 170. 9. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2736. Europa centr.
3. (1848); GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., IX. 135. t. V. No. 2. f.
1—9. (1851).
- nigra** ZETT. = **carbonaria** ZETT.
- nigra** MACQ. = **atra** MEIG.
- nigrimana** MEIG., S. B., VII. 400. 90. (1838). Belgium.
- ✕ **nigripes** MEIG., S. B., VI. 170. 7. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 607. Europa centr.
8. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 788. 2. (1838); GOUREAU, Ann. Soc. et sept.
entom. Fr., IV. 227. t. 8. III. No. 2. f. 10—17. (1846); ZETT., Dipt.
Scand., VII. 2738. 5. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 242. 1. (1853);
KALTENB., Pflanzenf., 123. 28. — 764. 30. (1872); BRISCHKE, Schrift.
naturf. Ges. Danzig., V. 243. (1881); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt.
u. Dipt., II. 338. 7. (1902).
- ambigua** ZETT., Ins. Lapp., 788. 4. (1838).
- ambigua** FALL., (var. *d. reptans*) Dipt. Succ. Agromyz., 4. (1823).
- nigritarsis** MEIG., S. B., VI. 174. 21. (1830); SCHIN., F. A., II. 306. Germania.
(1864).
- niveipennis** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2741. 8. (1848). Suecia.
- Novakii** STROBL, Balkan. Dipt. Serajevo., 45. (1902). Europa.
- obscuripennis** MACQ., Suit. à Buff., II. 609. 22. (1835); MEIG., S. B., Gallia.
VII. 400. 87. (1838).
- ✕ **orbona** MEIG., S. B., VI. 186. 65. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 613. Europa centr.
40. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2774. 36. (1848); ROND., Bull. et sept.,
Soc. entom. Ital. Agromyz., 19. 19. (1875); KALTENB., Pflanzenf., Aegyptus.
118. 21. (1872) et Verh. naturf. Ver. d. Preuss. Rheinl., XXI. 228
etc. (1864); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 190. 337.
(1903). *Agrophila* Kioy. 1864. p. 1313.
- ornata** MEIG., S. B., VI. 176. 29. (1830). Germania.
- pallida** MEIG., S. B., VII. 399. 82. (1838); SCHIN., F. A., II. 306. (1864). Germania.
- pallipes** MACQ., Suit. à Buff., II. 610. 26. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
400. 89. (1838). = Type of *Phyllophila* Kioy. 1864. p. 1313.
- ✕ **pallitarsis** MACQ., Suit. à Buff., II. 608. 12. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
396. 72. (1838); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., XLVI. 386. (1877).
- ✕ **pascuum** MEIG., S. B., VII. 402. 96. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. Germania.
(1864).
- pectinata** MEIG., S. B., VI. 179. 41. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Gallia. *nemen*
610. 27. (1835); SCHIN., F. A., II. 300. (1864). Type of *Agrobia* Kioy. 1864. p. 1313.
- ✕ **perpusilla** MEIG., S. B., VI. 181. 47. (1830). Germania.
- piliseta** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 190. 338. (1903). Aegyptus.
- pinguis** FALL., Dipt. Succ. Oscinid., 10. 4. [*Madiza*] (1820); MEIG., Europa.
S. B., VI. 173. 18. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2779. 41.

(1848); SCHIN., F. A., II. 305. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 15. 4. (1875).

pistaciae CURTIS, Trans. entom. Soc., III. 3. 45.

Britannia.

populi KALTENB., Verh. naturf. Ver. d. Press. Rheinal., XXI. 350. (1864).

Germania.

posticata MEIG., S. B., VI. 172. 16. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 608. 13. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 788. 3. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2740. 7. (1848); SCHIN., F. A., II. 303. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 331. 34. (1872); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 260. (1881).

Europa centr.
et sept.

virgaureae KALTENB., Pflanzenf., 331. 34. (1872).

potentillae KALTENB., Pflanzenf., 227. 15. (1872).

Germania.

proboscidea STROBL, Wiss. Mitth. a. Bosn. u. d. Herzegov. Wien, VII. 91. (641). (1900).

Bosnia.

pseudocunctans STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 64. 328. (1900).

Hispania.

puella MEIG., S. B., VI. 187. 67. (1830); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 20. 20. (1875).

Italia,
Germania.

pulicaria MEIG., S. B., VI. 170. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 607. 6. (1835); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, IV. 29. (1856); KALTENB., Pflanzenf., 54. 24. — 487. 11. (1872); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 15. 3. (1875).

Europa centr.
et mer.

pulicaria ZETT. (Ins. Lapp.) = **maura** MEIG.

pulicaria ZETT. (Dipt. Scand.), SCHIN. = **cirsii** ROND.

pulicarioides STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 63. 326. (1900).

Hispania.

pumila MEIG., S. B., VI. 185. 62. (1830).

Germania.

pusilla MEIG., S. B., VI. 185. 60. (1830); GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., IX. t. V. No. 3. f. 1—6. (1851); WALK., Ins. Brit., II. 243. 5. (1853); SCHIN., F. A., II. 301. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 525. 31. (1872); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 249. 270—273. (1881); BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 91. (1883); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 32. 108. (1891); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 342. 60. (1902) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 190. 336. (1903).

Europa centr.
et mer.,
Aegyptus.

pusio MEIG., S. B., VI. 187. 66. (1830); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 20. 22. (1875).

Germania,
Italia.

pygmaea MEIG., S. B., VI. 183. 51. (1830).

Germania.

remotinervis STROBL, Balkan-Dipt. Serajevo, 44. (1902).

Turcia.

reptans FALL., Dipt. Succ. Agromyz., 3. 1. (1823); MEIG., S. B., VI. 168. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 606. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 787. 1. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2734. 4. (1848); SCHIN., F. A., II. 302. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 17. 11. (1875); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 262. (1881).

Europa.

reptans var. *d.* FALL. = **maura** MEIG.

reptans var. *b.* FALL. = **abiens** ZETT.

riparia WULP, Tijdschr. v. Entom., XIV. 205. (1871).

Hollandia.

rubi BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 250. (1881).

Germania.

- ruficeps* MACQ., Suit. à Buff., II. 608. 16. (1835); MEIG., S. B., VII. 398. 80. (1838). Gallia.
- ruficornis* MACQ., Suit. à Buff., II. 608. 14. (1835); MEIG., S. B., VII. 397. 74. (1838). Gallia.
- ruffrons* MACQ., Suit. à Buff., II. 610. 28. (1835); MEIG., S. B., VII. 401. 91. (1838). Gallia.
- rufimana* MACQ., Suit. à Buff., II. 611. 29. (1835); MEIG., S. B., VII. 401. 92. (1838). Gallia.
- rufipes* MEIG., S. B., VI. 169. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 606. 4. (1835); SCHIN., F. A., II. 302. (1864). Germania.
- Schineri** GIRAUD, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XI. 484. (1861); KALTENB., Pflanzenf., 560. 241. (1872); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 277. 16. (1882); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 189. 332. (1903). Austria, Aegyptus.
- scutellaris* v. ROS., Württemb. Corrb., 63. (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 58. p. 65. (1902). Germania.
- X *scutellata* FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 7. 13. (1823); MEIG., S. B., VI. 183. 54. (1830); ZETT., Ins. Lapp., 790. 14. *var. b.* (1838) et Dipt. Scand., VII. 2772. 34. (1848); SCHIN., F. A., II. 306. (1864); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 248. (1881); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 277. 17. (1882); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 62. 317. (1900). Europa.
- flaveola* *var.* FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 6. 11. (1823).
- scutellata* *var.* FALL. = **flavo-scutellaris** ZETT.
- signata* MEIG., S. B., VII. 398. 79. (1838); SCHIN., F. A., II. 306. (1864). Germania.
- simplex* LW., Berlin. entom. Zeitschr., XIII. 46. No. 84. (1869); GIARD, Bull. Soc. entom. Fr., No. 11. p. 179. (1904). Gallia, Amer. sept.
- solidaginis* KALTENB., Pflanzenf., 331. 35. (1872). Germania.
- sordida* BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 272. (1881). Germania.
- spiraeeae* KALTENB., Pflanzenf., 238. 94. (1872). Germania.
- squamata* BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 189. 333. (1903). Aegyptus.
- strigata* MEIG., S. B., VI. 186. 63. (1830); BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 142. 2. (1847); SCHIN., F. A., II. 306. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 408. 12. (1872); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 259. 260. 266. (1881). Europa centr.
- sulfuriceps* STROBL, Dipt. v. Steyerm., IV. 270. (1898). Styria.
- X *supercilliosa* ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6455. 21—22. (1860); STROBL, Dipt. v. Steyerm., II. 138. (1894). Styria, Suecia.
- tarsella* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2763. 26. (1848). Suecia.
- thapsi* BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 143. 7. (1847); KALTENB., Pflanzenf., 461. 46. (1872). Germania.
- thoracica* MACQ., Suit. à Buff., II. 611. 32. (1835); MEIG., S. B., VII. 403. 100. (1838). Gallia.
- tibialis* FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 5. 5. (1823); MEIG., S. B., VI. 179. 38. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2758. 21. (1848). Europa centr. et sept.
- trebinjensis* STROBL, Wiss. Mitth. a. Bosn. u. d. Herzegov. Wien, VII. 90. (640). (1900). Hercegovina.

- trifolii** KALTENB., Pflanzenf., 129. 66. (1872). Germania.
- tristella** THOMS., Eugen. Resa, p. 609. 314. (1868). China.
- trivittata** LW., Berlin. entom. Zeitg., XVII. 52. 67. (1873). Hungaria.
- tuberculata** BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 189. 334. (1903). Aegyptus.
- vagans** FALL., Dipt. Succ. Agromyz., 5. 7. (1823); MEIG., S. B., VI. 183. 52. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2767. 29. (1848); SCHIN., F. A., II. 300. (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 61. 315. (1900). Europa.
- muscaria* GERCKE, CnemaCantha muscaria Hamburg, (1890); Mik, Wien. entom. Zeitg., X. 189. XIX. (1891). = *meoneura*
- variceps** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6453. 15—16. (1860). Suecia.
- X **variegata** MEIG., S. B., VI. 180. 43. (1830); BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 143. 5. (1847); KALTENB., Pflanzenf., 134. 5. — 136. 20. — 139. 22. (1872); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig, V. 247. (1881). Germania.
- variegata** MEIG., S. B., VII. 402. 97. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. (1864). Germania.
- varipes** MACQ., Suit. à Buff., II. 607. 10. (1835); MEIG., S. B., VII. 396. 71. (1838). Gallia.
- verbasci** BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitg., VIII. 143. 6. (1847); KALTENB., Pflanzenf., 463. 16. (1872); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, V. 270. (1881). Germania.
- viciae** KALTENB., Pflanzenf., 143. 49. (1872). Germania.
- violae** CURTIS, Gardeners chronicle (1844). Britannia.
- virgaureae* KALTENB. = **posticata** MEIG.
- X **virgo** ZETT., Ins. Lapp., 789. 10. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2775. 37. (1848); STROBL, Dipt. v. Steyerm., II. 138. (1894). Suecia, *Riomomyza*
Styria.
- vittata** MEIG., S. B., VII. 403. 101. (1838); SCHIN., F. A., II. 307. (1864). Germania.
- vittigera** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2760. 23. (1848). Suecia.
- xanthocephala** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6457. 25—26. (1860); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, V. 242. 243. (1881). Europa centr. et sept.
- xylostei** KALTENB., Verh. naturf. Ver. d. Preuss. Rheinl., XIX. 93. (1862); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. (1883). Germania.

Domomyza

ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 7. VIII. (1875).

- anthracipes** ROND., Agromyz., 11. 7. (1875). Italia.
- articulata** ROND., Agromyz., 10. 4. (1875). Italia.
- brevinervis** ROND., Agromyz., 11. 10. (1875). Italia.
- cineta** ROND., Agromyz., 10. 5. (1875). Italia.
- cinerascens* STROBL = **nigripes** SCHIN.
- frontella** ROND., Agromyz., 9. 1. (1875); STROBL, Dipt. v. Steyerm., II. 139. (1894) et Wien. entom. Zeitg., XIX. 62. 321. (1900). Europa centr. et mer.
- gracilis** MEIG., S. B., VI. 171. 10. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 607. 11. [*Agromyza*] (1835); SCHIN., F. A., II. 306. [*Agromyza*] (1864). Europa centr.
- luteitarsis** ROND., Agromyz., 10. 3. (1875). Italia.

mobilis MEIG., S. B., VI. 169. 2. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 606. 2. [*Agromyza*] (1835); BOUCHÉ, Stettin. entom. Zeitschr., VIII. 143. 3. [*Agromyza*] (1847); SCHIN., F. A., II. 306. [*Agromyza*] (1864); KALTENB., Pflanzenf., 530. 56., 544. 13. [*Agromyza*] (1872).

nigrella ROND., *Agromyz.*, 11. 8. (1875).

✓ **nigripes** SCHIN. (*nec* MEIG.), F. A., II. 303. [*Agromyza*] (1864); ROND., *Agromyz.*, 10. 6. (1875); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 62. 322. [*Agromyza*] (1900); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 191. 340. (1903).

✓ *cinerascens* STROBL, Dipt. v. Steyerm., II. 140. (1894).

rondensis STROBL, Wien. entom. Zeitschr., XIX. 62. 322. *var. nigripes* (1900).

✗ **obscuritarsis** ROND., *Agromyz.*, 9. 2. (1875); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 191. 341. (1903).

parva ROND., *Agromyz.*, 11. 9. (1875).

pulla MEIG., S. B., VI. 180. 42. [*Agromyza*] (1830).

rondensis STROBL = **nigripes** SCHIN.

Liriomyza

MIK, Wien. entom. Zeitg., XIII. 284. (1894).

urophorina MIK, Wien. entom. Zeitg., XIII. 290. t. III. (1894).

Ceratomyza > *Cerodonta* Rond. 1861

SCHIN., Wien. entom. Monatschr., VI. 434. (1862).

Odontocera MACQ., Suit. à Buff., II. 615. (1835).

acuticornis MEIG., S. B., VI. 175. 26. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 615. 2. [*Odontocera*] (1835); SCHIN., F. A., II. 311. (1864).

occulta MEIG., S. B., VII. 403. 99. [*Agromyza*] (1838); SCHIN., F. A., II. 307. [*Agromyza*] (1864).

affinis FALL., Dipt. Suec. *Agromyz.*, 9. 2. [*Chlorops*] (1823); MEIG., S. B., VI. 176. 27. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 615. 4. [*Odontocera*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2798. 3. [*Chlorops*] (1848); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, IV. 29. (1856); KALTENB., Pflanzenf., 396. 17. [*Agromyza*] (1872).

✗ **denticornis** PANZ., Fauna Germ., CIV. 22. [*Chlorops*] (1806); MEIG., S. B., VI. 175. 25. t. LXI. f. 33, 34. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 614. 1. [*Odontocera*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 791. 1. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2796. 1. [*Chlorops*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 243. 7. [*Agromyza*] (1853); SCHIN., F. A., II. 311. (1864); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 32. 109. (1891); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 64. 332. (1900).

denticulata PANZ., Fauna Germ., CIV. 22. (1806) teste FALL.

Meigeni FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 9. 1. [*Chlorops*] (1823).

× *nigriventris* STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 64. 332. (1900).

nigroscutellata STROBL, l. c. (1900).

denticulata PANZ. = **denticornis** PANZ.

× *femorialis* MEIG., S. B., VII. 297. 76. [*Agromyza*] (1838); SCHIN., F. Europa centr.
A., II. 311. (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 64. 331. et mer.
(1900).

flavicornis EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 782. (1862); SCHIN., Austria.
F. A., II. 311. (1864).

fulvipes MEIG., S. B., VI. 174. 23. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Europa centr.
Buff., II. 608. 15. [*Agromyza*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt.
u. Dipt., II. 339. 23. (1902).

lateralis ZETT., Dipt. Scand., VII. 2799. 4. [*Chlorops*] (1848). Suecia.

Meigeni FALL. = **denticornis** PANZ.

nigriventris STROBL = **denticornis** PANZ.

nigroscutellata STROBL = **denticornis** PANZ.

occulta MEIG. = **acuticornis** MEIG.

spinicornis MACQ., Suit. à Buff., II. 615. 5. [*Odontocera*] (1835); MEIG., Europa centr.
S. B., VII. 398. 77. [*Agromyza*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., VI. et sept.
2798. 2. [*Chlorops*] (1848).

tarsata MEIG., S. B., VII. 397. 75. [*Agromyza*] (1838). Germania.

Cryptochetum

ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 7. VII. (1875).

grandicorne ROND., Bull. Soc. entom. Ital. Agromyz., 7. (1875). Italia.

Aphaniosoma

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 186. (1903).

approximatum BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 186. 321. t. Aegyptus.
IVe f. 86, 87, 88. (1903).

× *Sex lineatum* Beckl. (*Chloromyia*) Spain

Leptometopa

BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 188. (1903).

rufifrons BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 188. 331. t. IVe f. Aegyptus.
83, 84, 85. (1903).

Pseudopomyza

STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 284. 22. (1893).

nitidissima STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 284. 22. (1893); THALH., Austria.
Fauna dipt. transsilv. Colocza, 24. (1902); HENDEL, Wien. entom.
Zeitg., XXI. 261. (1902).

Rhicnoëssa

Lw., Wien. entom. Monatschr., VI. 174. 71. (1862).

- X **alboguttata** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 6. 302. (1900). Hispania.
 X **albosetulosa** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 7. 303. (1900); BECK., Hispania,
 Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 184. 316. (1903). Aegyptus.
 X **cinerea** Lw., Wien. entom. Monatschr., VI. 175. (1862) et Berlin. Turcia,
 entom. Zeitschr., IX. 35. 1. (1865); STROBL, Wien. entom. Zeitg., Hispania,
 XIX. 6. 301. (1900); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 185. Aegyptus.
 320. (1903).
cinerella HALID., Entom. Mag., IV. 151. [*Leptomyza*] (1837); WALK., Europa.
 Ins. Brit., II. 235. 3. [*Opomgza*] (1853); Lw., Berlin. entom. = *Tetina*
 Zeitschr., IX. 38. 4. (1865); ROND., Agromyz., 22. 1. [*Anthophilina*]
 (1875); CZERNY, Wien. entom. Zeitg., XXI. 256. (1902).
grisea FALL., Dipt. Suec. Agromyz., 7. 2. [*Anthomyza*] (1823); MEIG., Europa.
 S. B., VI. 112. 26. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II.
 581. 2. [*Leptomyza*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2699. 7.
 [*Anthophilina*] (1848); ROND., Agromyz., 22. 2. [*Anthophilina*]
 (1875); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 8. 304. (1900); CZERNY,
 Wien. entom. Zeitg., XXI. 255. (1902).
longirostris Lw., Berlin. entom. Zeitg., IX. 36. 2. (1865); BECK., Sicilia,
 Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 185. 317. (1903). Aegyptus.
pallipes Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 37. 3. (1865); BECK., Mitth. Graecia,
 Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 185. 318. (1903). Aegyptus.
pictipes BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 185. 319. (1903). Aegyptus.

Selachops

WAHLB., (refer. BOHEM.) Arsberät. om zool. framst., 173. (1843).

Encoelocera Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 321. 1. (1844).

bicolor Lw. = **flavocincta** WAHLB.

- flavocincta** WAHLB., Arsberätt. om zool. framst., 173. (1843); ZETT., Europa.
 Dipt. Scand., VII. 2793. 1. (1848); SCHIN., F. A., II. 220. (1864);
 ROND., Prodr., VII. Agromyz., 6. 1. (1875); BEZZI, Contrib. alla
 F. ditt. di Pavia, 23. 54. (1891).
bicolor Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 321. 1. [*Encoelocera*]
 (1844).

Phytomyzinae.

Phytomyza

FALL., Dipt. Suec. Phytomyz., 2. (1823).

Chromatomyia HARDY, Ann. nat. Hist. Serie, II. 4. (1849).

Napomyza p. p. WULP (1871).

- abdominalis** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2819. 6. (1848); BRISCHKE, Europa centr.
 Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 237. (1881). et sept.

- acuticornis** Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 78. 19. (1858); STROBL, Silesia, Wiss. Mitth. a. Bosnien u. d. Herzegov. Wien, VII. 92. (642). Dalmatia. (1900).
- aeneonitens** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 308. 26. (1893). Austria.
- affinis** FALL., Dipt. Suec. Phytomyz., 3. 3. (1823); MEIG., S. B., VI. 192. 11. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 618. 9. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 793. 6. (1838); BOIE, Kröjer's Tidskr., 2. 3. 248. (1838); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2827. 15. (1848); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, III. 501. 272. (1849); WALK., Ins. Brit., II. 246. 6. (1853); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, I—III. 11. (1855); SCHIN., F. A., II. 316. (1864); HEEGER, Sitzgsber. d. K. Akad. d. Wiss. math. nat. cl., XXXI. 297. t.; KALTENB., Pflanzenf., 343. 17. (1872); INCHBALD, Plant. mining dipt. The Entomol. Lond., 217—222. (1882) et Observ. on Ins. live. The Entomol. Lond., 193—195. (1883); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 90. (1883); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, V. 260. (1881); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 31. 103. (1891); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 65. 335. (1900); LUNDB., Dipt. Groenland., 306. 151. (1900); BECK., Acta Soc. scientif. Fenn., XXVI. 63. 131. (1900) et Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 191. 342. (1903). *Strobl says Schin. var. of albiceps*
- flavicoxa** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 65. 335. *var. affinis* (1900).
- nigricornis** MACQ., Suit. à Buff., II. 618. 11. (1835); MEIG., S. B., VII. 404. 33. (1838); HARDY, Ann. nat. Hist. Serie, II. 4. 385—392. [*Chromatomyia*] (1849); KALTENB., Pflanzenf., 15. 7. (1872).
- agromyzina** MEIG., S. B., VI. 191. 9. (1830); KALTENB., Pflanzenf., 295. 12. (1872); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig, V. 272. (1881). Germania.
- albiceps** MEIG., S. B., VI. 194. 20. (1830); ZETT., Ins. Lapp., 793. 5. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2830. 17. (1848); HARDY, Ann. nat. Hist., II. 4. 385. [*Chromatomyia*] (1849); HEEGER, Sitzgsber. d. K. Akad. d. Wiss. Wien, IX. 774—781. (1852); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, I—III. 11. (1855); SCHIN., F. A., II. 317. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 21. 8. — 118. 22. — 272. 13. — 314. 2. — 320. 11. — 339. 23. — 364. 35. — 367. 2. — 381. 77. — 387. 63. — 399. 47. — 451. 5. — 483. 21. — 488. 13. — 492. 2. (1872); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig, V. 238. 263. (1881); INCHBALD, Plant. mining dipt. The Entom. London, 217—222. (1882); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 90. (1883); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 136. (1893) et XIX. 65. 336. (1900). *pisi* KALTENB., Pflanzenf., 118. 22. (1872) et Verh. naturf. Ver. d. Preuss. Rheinl., XXI. *syngenesiae* HARDY, Ann. nat. Hist., II. 4. 385. [*Chromatomyia*] (1849).
- albipennis** FALL., Dipt. Suec. Phytomyz., 4. 9. (1823); MEIG., S. B., VI. 191. 10. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 617. 7. (1835); ZETT., Europa centr. et sept.

- Dipt. Scand., VII. 2817. 4. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 245. 5. (1853); SCHIN., F. A., II. 315. (1864).
- albipes** MEIG., S. B., 195. 21. (1830). Germania.
- analisis* ZETT., SCHIN. = **terminalis** MEIG.
- ancholiae** ROB.-DESV., Ann. Soc. entom. Fr., II. Tom. IX. 153. t. VI. No. 12. f. 1—13. (1851). Gallia.
- minuscula* GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., II. 9. 153. (1851).
- angelicae** KALTENB., Pflanzenf., 279. 12. (1872); BRISCHKE, Schrift. naturf. Ges. Danzig., V. 255. (1881); SCHRÖDER, Muscid. Minirer. Illustr. Zeitschr. f. Entom., 3. (1898). Germania.
- annulipes** MEIG., S. B., VI. 190. 4. (1830); SCHIN., F. A., II. 314. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 358. 78. (1872); KARSCH, Entom. Nachr., XI. 344—45. (1885); MIK, Wien. entom. Zeitg., V. 31. (1886). Europa centr.
- anomala** STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 307. 25. (1893) et Dipt. v. Steyer., IV. 274. (1898). Styria.
- anteposita** STROBL, Dipt. v. Steyer., IV. 275. (1898). Styria.
- aprilima* GOUREAU = **xylostei** ROB.-DESV.
- aquifolii** GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., II. Tom. IX. 143. t. V. No. 6. f. 1—9. (1851); ROB.-DESV., Revue et Magaz. Guerin. (1851); KALTENB., Pflanzenf., 427. 3. (1872); AL. LABOULB., Ann. Soc. entom. Fr., 96. (1880); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 91. (1883). Europa centr.
- ilicis* KALTENB., Verh. naturf. Ver. d. Preuss. Rheinl., XIX. 56. (1862).
- aquilegiae** HARDY, Ann. nat. Hist., IV. 385. (1849); KALTENB., Pflanzenf., 13. 8. (1872). Britannia, Germania.
- arctii* KALTENB. = **nigra** MEIG.
- artemisiae** KALTENB., Verh. naturh. Ver. d. Preuss. Rheinl., XIII. 236. 22. (1856). Germania.
- atomaria** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2833. 21. (1848). Suecia.
- ✕ **atra** MEIG., S. B., 191. 8. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 617. 6. (1835); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4819. 5—6. (1855); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 247. 272. (1881). Europa centr.
- atricornis** MEIG., S. B., VII. 404. 32. (1838); KALTENB., Pflanzenf., 272. 12. (1872). Germania.
- balcanica** STROBL, Wiss. Mitth. a. Bosn. u. Herzegov. Wien, VII. 93. (643). (1900). Turcia.
- ✕ **bipunctata** Lw., Wien. entom. Monatsh., II. 77. 18. (1858). Germania.
- brunnea** BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 237. (1881). Germania.
- brunnipes** BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 253. (1881). Germania.
- bryoniae** KALTENB., Verh. naturf. Ver. d. Preuss. Rheinl., XV. 75. (1858). Germania.
- chacrophylli** KALTENB., Pflanzenf., 288. 13. — 291. 8. (1872). Germania.
- cinereifrons** HARDY, Ann. nat. Hist., IV. 385. (1849). Britannia.
- citisi** BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 246. (1881). Germania.
- citrina* v. ROS. = **flava** FALL.

- clematidis* KALTENB., Pflanzenf., 4. 19. (1872). Germania.
- confinis* MEIG., S. B., VII. 405. 36. (1838). Germania.
- corni* KALTENB., Pflanzenf., 295. 11. (1872). Germania.
- crassiset* ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6469. 23—24. (1860); STROBL, Europa centr.
Wien. entom. Zeitg., XII. 306. 24. *var. flavo-femorata* (1893). et sept.
- elegans* MEIG., S. B., VI. 189. 1. t. XXVI. f. 1. (1830); MACQ., Suit. Europa.
à Buff., II. 616. 1. (1835); ZETT., Ins. Lapp., 793. 2. (1838) et
Dipt. Scand., VII. 2839. 26. (1848); SCHIN., F. A., II. 313. (1864); > *Dineura* Lioy. 1864.
Bezzi, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 31. 99. (1891). 2 *transversalis*.
- festiva* MEIG., S. B., VI. 189. 2. (1830).
- elegans* GOUREAU = *scolopendri* ROB.-DESV.
- euphrasiae* KALTENB., Pflanzenf., 469. 8. (1872) et Verh. d. naturf. Germania.
Ver. Preuss. Rheinl., XVII. 237. (1860).
- facialis* KALTENB., Pflanzenf., 274. 10. (1872). Germania.
- fallaciosa* BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig, V. 238. 255. Germania.
265. 269. (1881).
- fasciata* MEIG., S. B., VI. 194. 19. (1830). Germania.
- fasciata* MACQ., Suit. à Buff., II. 618. 10. (1835); MEIG., S. B., VII. Gallia.
405. 37. (1838).
- femoralis* v. ROS., Württemb. Corrb., 63. (1840); BECK., Jahresber. Germania.
d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 60. p. 65. (1902).
- femoralis* BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig, V. 240. (1831). Germania.
- femoralis* ZETT. = *varipes* MACQ.
- festiva* MEIG. = *elegans* MEIG.
- ✕ *flava* FALL., Dipt. Suec. Phytomyz., 3. 5. (1823); MEIG., S. B., VI. 196. Europa centr.
26. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 620. 22. (1835); ZETT., Dipt. et sept.
Scand., VII. 2841. 27. (1848); HARDY, Ann. nat. Hist., IV. 385.
(1849); WALK., Ins. Brit., II. 247. 10. (1853); SCHIN., F. A., II.
314. (1864); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig, V. 237.
256. (1881); INCHBALD, The Entom. Lond., 217—222. (1882);
BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 90. (1883).
- citrina* v. ROS., Württemb. Corrb., 63. (1840); BECK., Jahresber.
d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 61. p. 65. (1902).
- ranunculi* ROB.-DESV., Ann. Soc. entom. Fr., II. 9. 146. t. VI. No.
8. f. 1—8. (1851); KALTENB., Pflanzenf., 9. 10. (1872); SCHRÖD.,
Illustr. Zeitschr. f. Entom., 1. (1898).
- flaveola* GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., 161. t. XV. f. 1—7. [Noti- Gallia.
phila] (1851).
- ✕ *flavicornis* FALL., Dipt. Suec. Phytomyz., 4. 6. (1823); MEIG., S. B., Europa centr.
VI. 192. 12. t. LXII. f. 6. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 618. 12. et sept.,
(1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2825. 12. (1848); SCHIN., F. A., Aegyptus.
II. 315. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 529. 55. (1872); BECK., Mitth.
Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 191. 343. (1903).
- flavicoxa* STROBL = *affinis* FALL.
- flavilabris* MACQ., Suit. à Buff., II. 617. 8. (1835). Gallia.
- flavipes* MACQ., Suit. à Buff., II. 616. 3. (1835); HALID., Entom. Mag., Europa centr.
IV. 147. (1837); MEIG., S. B., VII. 403. 29. (1838); ZETT., Dipt. et sept.

Scand., VII. 2838. 25. (1848); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 239 (1876) et 386. (1877).

flaviventris ZETT., Dipt. Scand., VII. 2829. 16. (1848).

Suecia.

flavitibialis STROBL, Balkan-Dipt. 46. Serajevo. (1902).

Turcia.

✕ **flavo-scutellata** FALL., Dipt. Suec. Phytomyz., 4. 7. (1823); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2820. 7. (1848); SCHIN., F. A., II. 315. (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 65. 337. (1900).

Europa.

scutellata MEIG., S. B., VI. 193. 15. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 619. 14. (1835); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 31. 102. (1891).

fuscula ZETT., Ins. Lapp., 794. 9. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2831. 19. (1848) Suecia.

nigritula ZETT., Ins. Lapp., 793. 4. (1835).

geniculata BRULLÉ, Expéd. en Morée, III. 322. 706. (1832); MIK, Wien. entom. Zeitg., VI. 188. 29. (1887). Graecia.

geniculata MACQ., Suit. à Buff., II. 619. 18. (1835); MEIG., S. B., VII. 405. 39. (1838); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2835. 23. (1848); SCHIN., F. A., II. 316. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 40. 1. (1872); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 225. (1876); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig, V. 239, 240, 241, 244, 246, 254. (1881); MIK, Wien. entom. Zeitg., VI. 188. 29. (1881). Europa.

Stoll says S.
= var. f. aff.

✕ **horticola** GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., II. 9. 148. t. VI. No. 10. f. 1—11. (1851).

lateralis p. p. FALL., Dipt. Suec. Phytomyz., 3. 2. (1823); ZETT., Ins. Lapp., 794. 8. (1838); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 31. 100. (1891); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 67. 340. (1900).

✕ **glechomae** KALTENB., Verh. d. naturf. Ver. d. Preuss. Rheinl., XIX. 21. (1862) et Pflanzenf., 489. 6. (1872); INCHEALD, Dipt. miner in the leaf. The Entom. Lond., XIV. 285—286. (1882). Germania, Britannia.

gymnostoma LW., Wien. entom. Monatschr., II. 76. 17. (1858). Germania.

harlemensis WEYENB. = **nigricans** MACQ.

hellebori KALTENB., Pflanzenf., 11. 1. (1872). Germania.

heliosciadi KALTENB., Verh. d. naturf. Ver. d. Preuss. Rheinl., XIX. 54. (1862) et Pflanzenf., 268. 2. (1872). Germania.

hepaticae FRELD., Verh. zool. bot. Ges. Wien, XXII. 396. (1872); KALTENB., Pflanzenf., 769. (1872). Europa centr.

heraclei HARDY = **nigra** MEIG.

heteroptera LW., Wien. entom. Monatschr., II. 75. 15. (1858). Germania.

horticola GOUREAU = **geniculata** MACQ.

ilicis KALTENB. = **aquifolii** DUF., GOUREAU.

incisa MACQ., Suit. à Buff., II. 619. 15. (1835); MEIG., S. B., VII. 405. 38. (1838). Gallia.

lappae GOUREAU = **lappina** ROB-DESV.

lappina ROB-DESV., Ann. Soc. entom. Fr., II. 9. 159. t. VII. f. 1—6. No. 14. (1851). Gallia.

lappae GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., II. 9. 159. (1851).

- ~~X~~ **lateralis** FALL., Dipt. Suec. Phytomyz., 3. 2. (1823); MEIG., S. B., VI. 190. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 616. 2. (1835); CURTIS, Brit. Entom., 393. (1823—40); ZETT., Ins. Lapp., 794. 8. *var. b.* (1838); WESTW., Introduct., II. 573. (1840); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2836. 24. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 245. 1. (1853); SCHOLTZ, Zeitschr. f. Entom. Breslau, I—III. 15. (1855); SCHIN., F. A., II. 314. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 339. 22. — 387. 64. (1872); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 90. (1883).
sonchi ROB.-DESV., Ann. Soc. entom. Fr., II. 9. 156. t. VII. No. 13. f. 1—8. (1851); GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., II. 9. 156. (1851).
lateralis FALL., p. p., ZETT., p. p. = **geniculata** MACQ.
linariae KALTENB., Verh. d. naturf. Ver. d. Preuss. Rheinl., XIX. 83. (1862) et Pflanzenf., 464. 2. (1872). Germania.
litrata BRULLÉ, Expéd. en Morée, III. 322. 705. (1832). Graecia.
loniceræ BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 257. (1881). Germania.
maculipes ZETT., Dipt. Scand., VII. 2821. 8. (1848). Europa,
~~X~~ *Zetterstedti* SCHIN., F. A., II. 315. (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 136. (1893) et XIX. 65. 337. *var.* (1900); LUNDB., Vidensk. Medd., 307. 152. (1900). Groenlandia.
maculipes BRULLÉ, Expéd. en Morée, III. 321. 704. (1832). Graecia.
marginella FALL., Dipt. Suec. Phytomyz., 3. 4. (1823); MEIG., S. B., VI. 196. 27. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2830. 18. (1848). Europa centr. et sept.
marginella var. FALL. = **abdominalis** ZETT.
milii KALTENB., Verh. d. nat. Ver. d. Preuss. Rheinl., XXI. 228. (1864); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 285. (1881). Germania.
minima MEIG., S. B., VI. 194. 17. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 619. 17. (1835). Germania, Gallia.
minuscula GOUREAU = **ancholiae** ROB.-DESV.
morenae STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 65. 338. (1900). Hispania.
morio ZETT., Dipt. Scand., VII. 2818. 5. (1848). Suecia.
nevadensis STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 66. 339. (1900). Hispania.
~~X~~ **nigra** MEIG., S. B., VI. 191. 7. (1830); WALK., Ins. Brit., II. 245. 4. (1835). Europa centr.
arcii KALTENB., Pflanzenf., 370. 28. (1872).
heraclei HARDY, Ann. nat. Hist., IV. (1850); KALTENB., Pflanzenf., Verh. nat. Ver. d. Preuss. Rheinl., XIX. 56. (1862) et Pflanzenf., 284. 15. (1872).
spondylii ROB.-DESV., Ann. Soc. entom. Fr., II. 9. 147. t. VI. No. 9. f. 1—4. (1851); GOUREAU, l. c. (1851);
nigricans MACQ., Suit. à Buff., II. 617. 4. (1835); MEIG., S. B., VII. 403. 30. (1838); INCHBALD, The Entom., 217—222. (1882). Europa centr.
harlemensis WEYENB., Tijdschr. v. Entom., XII. IV. 7. t. 7. (1869).
nigriceps WULP, Tijdschr. v. Entom., XIV. 207. [*Napomyza*] (1871). Hollandia.
nigricornis MACQ., MEIG., HARDY, KALTENB. = **affinis** FALL.
nigripennis FALL., Dipt. Suec. Phytomyz., 2. 1. (1823); MEIG., S. B., VI. 190. 5. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2814. 1. (1848); SCHIN., F. A., II. 314. (1864). Europa centr. et sept.

- ✕ **nigritella** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2816. 3. (1848); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 65. 333. (1900); LUNDB., Vidensk. Medd., 306. 150. (1900).
obscurella p. p. ZETT., Ins. Lapp., 792. 1. (1838).
nigritula ZETT. = **fuscula** ZETT.
nitidicollis MEIG., S. B., VII. 405. 40. (1838); SCHIN., F. A., II. 317. (1864). Germania.
notata MEIG., S. B., VI. 193. 16. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 619. 16. (1835); WALK., Ins. Brit., II. 246. 7. (1853); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 386. (1871). Europa centr.
 ✕ **obscurella** FALL., Dipt. Suec. Phytomyz., 4. 8. (1823); MEIG., S. B., VI. 191. 6. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 617. 5. (1835); HALID., Entom. Mag., IV. 147. 1. (1837); ZETT., Ins. Lapp., 792. 1. p. p. (1838); WESTW., Introduct., II. 573. (1840); STAEG., Kröyer's Tidskr., 369. 55. (1845); GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., 225. t. VIII. f. 1—9. (1846); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2815. 2. (1848); WALK., Ins. Brit., II. 245. 3. (1853); SCHIN., F. A., II. 315. (1864); WEYENB., Tijdschr. v. Entom., XII. 17. II. t. VI. (1869); WALK., The Entom., No. 92. 346. (1871); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 239, 253, 254, 256. (1881); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 90. (1883); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di Pavia, 31. 101. (1891); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 136. (1893) et XIX. 65. 334. (1900). Europa, Aegyptus.
 ? *xylostei* KALTENB., Pflanzenf., 306. 59. (1872).
obscurella p. p. ZETT. = **nigritella** ZETT.
orobanchiae KALTENB., Pflanzenf., 457. 2. (1872) et Verh. d. naturf. Ver. d. Preuss. Rheinl., XXI. (1864). Germania.
oscinina FALL., Dipt. Suec. Phytomyz., 4. 10. (1823); MEIG., S. B., VI. 196. 28. (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2843. 29. (1848). Europa centr. et mer.
pallicornis ZETT., Dipt. Scand., VII. 2827. 14. (1848). Suecia.
pallida MEIG., MACQ., PERRIS = **terminalis** MEIG.
piceipes WULP, Tijdschr. v. Entom., XIV. 207. [*Napomyza*] (1871). Hollandia.
pisi KALTENB. = **albiceps** MEIG.
 ✕ **plantaginis** ROB.-DESV., Ann. Soc. entom. Fr., II. 9. 142. t. V. No. V. f. 1—7. (1851). Gallia, Britannia.
 Robinaldi GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., 142. (1851); INCHBALD, The Entomol., 193—195. (1883).
populi KALTENB., BRISCHKE = **populicola** WALK.
populicola WALK., Ins. Brit., II. 247. 11. (1853). Britannia, Germania.
 populi KALTENB., Pflanzenf., 560. 240. (1872); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig., V. 281. (1881).
praecox MEIG., S. B., VI. 194. 18. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 619. 20. (1835); SCHIN., F. A., II. 316. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 335. 30. (1872); BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig, V. 238. (1881). Europa centr.
primulae ROB.-DESV., Ann. Soc. entom. Fr., II. 9. 151. t. VI. No. 11. f. 1—12. (1851); GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., 151. (1851). Gallia.

- ✕ *pullula* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2832. 20. (1848); SCHIN., F. A., II. Suecia.
 316. (1864).
pygmaea ZETT., Dipt. Scand., VII. 2822. 9. (1848). Suecia.
ranunculi ROB.-DESV., KALTENB. = *flava* FALL.
rhinanthi KALTENB., Pflanzenf., 467. 5. (1872). Germania.
Robinaldi GOUREAU = *plantaginis* ROB.-DESV.
rufescens v. ROS. = *terminalis* MEIG.
ruficeps MEIG., S. B., VI. 75. 36. [*Notiphila*] (1830). Germania.
ruficornis ZETT., Dipt. Scand., VII. 2825. 13. (1848); BRISCHKE, Schrift. Suecia,
 d. naturf. Ges. Danzig, V. 241. (1881). Germania.
rufipes MEIG., S. B., VI. 192. 13. (1830); WALK., Ins. Brit., II. 246. Europa centr.
 8. (1853).
scolopendri ROB.-DESV., Ann. Soc. entom. Fr., II. 9. 139. t. V. No. Gallia.
 4. f. 1--3. (1851).
elegans GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., 139. (1851).
scutellata MEIG., MACQ., BEZZI = *flavoscutellata* FALL.
sedi KALTENB., Pflanzenf., 258. 15. (1872). Germania.
senecionis KALTENB., Pflanzenf., 364. 36. (1872). Germania.
similis BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig, V. 256. 258. (1881). Germania.
simillima STROBL, Wien. entom. Zeitg., XII. 306. 23. (1893). Styria.
socia BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Ganzig, V. 237. (1881). Germania.
sonchi ROB.-DESV., GOUREAU = *lateralis* FALL.
spondylii ROB.-DESV. = *nigra* MEIG.
stylata MEIG., S. B., VII. 404. 34. (1838); ZETT., Dipt. Scand., VII. Germania.
 2824. 11. (1848); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 345.
 34. (1902).
sulphuripes MEIG., S. B., VI. 193. 14. (1830); SCHIN., F. A., II. 317. Europa centr.
 (1864).
syngenesiae HARDY = *albiceps* MEIG.
 ✕ *tenella* MEIG., S. B., VI. 195. 22. (1830). Germania.
terminalis MEIG., S. B., VI. 195. 24. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa centr.
 619. 19. (1835); WALK., Ins. Brit., II. 247. 9. (1853). et sept.
 analis ZETT., Dipt. Scand., VII. 2842. 28. (1848); SCHIN., F. A.,
 II. 314. (1864).
pallida MEIG., S. B., VI. 196. 25. (1830); MACQ., Suit. à Buff.,
 II. 620. 21. (1835); PERRIS, Ann. Soc. entom. Fr., 386. (1877).
rufescens v. ROS., Württemb. Corubl., 63. (1840); BECK., Jahresber.
 d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 62. p. 66. (1900).
Thalhammeri STROBL, Wiss. Mitth. a. Bosn. u. d. Herzegov. Wien, Bosnia.
 VII. 93. (643). (1900).
Tiefi STROBL, Tiefs dipt. Nachl. Klagenf., 73. (1900). Carinthia.
tridentata LW., Wien. entom. Monatschr., II. 76. 16. (1858). Germania.
tropaeoli DUF., Ann. Soc. entom. Fr. Ser. 3. Tom., 5. 39. t. 3. (1857). Gallia.
ursula SENTENIS, Wien. entom. Zeitg., IX. 103. (1890). Rossia.
 ✕ *varipes* MACQ., Suit. à Buff., II. 618. 13. (1835); MEIG., S. B., VII. Europa centr.
 405. 35. (1838); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2823. 10. (1848). et sept.
femoralis ZETT., Ins. Lapp., 794. 7. (1838).

✕ *Sicute* Hend,

- veronicae** KALTENB., Pflanzenf., 471. 33. (1872); BRISCHKE, Schrift. d. Germania.
naturf. Ges. Danzig, V. 271. (1881).
- viduata** MEIG., S. B., VII. 404. 31. (1838). Germania.
- vitalbae** KALTENB., Pflanzenf., 4. 20. (1872). Germania.
- vitripennis** MEIG., S. B., VI. 195. 23. (1830). Germania.
- xanthaspis** LW., Wien. entom. Monatschr., II. 79. 20. (1858); STROBL, Europa centr.
Dipt. v. Steyerm., II. 143. (1894).
- xylostei** ROB.-DESV., Ann. Soc. entom. Fr., II. 9. 145. t. V. No. 7. f. Gallia.
1—3. (1851).
- aprilina* GOUREAU, Ann. Soc. entom. Fr., 145. (1851).
- xylostei* KALTENB. = **obscorella** FALL.
- Zetterstedti* SCHIN., STROBL, LUNDB. = **maculipes** ZETT.
- zonata** ZETT., Dipt. Scand., VII. 2834. 22. (1848). Suecia.

CONOPIDAE.

Conopinae.

Conops

L., Fauna Suec., 1907. (1761).

Conopaeus ROND., Mag. de Zoolog., t. 153. f. 2. (1845).

Sphixosoma ROND., Prodr., II. 223. 2. (1857).

- aculeata* FABR., MEIG., p. p. LATR., ZETT., WALK. = **quadrifasciata** DEG.
- aculeata* GMEL., MEIG. p. p., MACQ. = **scutellata** MEIG.
- acuticornis** LW., Dipt. Beitr., III. 8. 9. (1847). Germania.
- algira** MACQ., Lucas Explor. scient. de l'Algérie, III. 473. 182. t. V. Algeria.
f. 3. (1849).
- antiqua** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 239. 8. (1830). Aegyptus.
- arabica** MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 161. 18. (1850). Arabia.
- aterrima* COUCKE = **flavipes** L.
- aurata** WALK., The Entom., No. 92. p. 339. (1871). Arabia.
- aureifasciata** ROND., Prodr., II. 225. 3. [*Sphixosoma*] (1857). Italia.
- auricincta* LW. = **strigata** WIED.
- aurulenta** BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., 31. (1887). Europa centr.
- bicincta* MEIG. = **flavipes** L.
- cylindrica* MEIG. = **vesicularis** L.
- elegans** MEIG., S. B., IV. 122. 2. ♂ (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. Europa mer.,
26. 12. (1835); LW., Dipt. Beitr., III. 12. 13. (1847) et N. Beitr., Guinea.
I. 21. 2. (1853).
- fuscanipennis* BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., 32. (1887); Mlk,
Wien. entom. Zeitg., VI. 268. (1887).
- ferruginea** MACQ., Ins. Dipt. du. N. de la Fr., 348. 9. (1834) et Suit. Gallia.
à Buff., II. 28. 15. (1835); MEIG., S. B., VII. 167. 28. (1838).

- flavifrons** MEIG., S. B., IV. 125. 6. (1824); ROND., Mag. de Zool. Ins., Europa mer. t. 153. 7. [*Conopaeus*] (1845); LW., Dipt. Beitr., III. 13. 14. (1847); ROND., Prodr., II. 226. 5. [*Sphixosoma*] (1857); SCHIN., F. A., I. 374. (1862).
- ✕ **flavipes** L., Fauna Suec., 1904. (1761) et Syst. Nat., XII. 1005. 7. Europa. (1767); FABR., Spec. Ins., II. 467. 5. (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2894. 7. (1793); FABR., Entom. syst., IV. 393. 8. (1794); PANZ., Fauna Germ., LXX. 21. 22. (1799); MEIG., Klass., I. 277. 5. (1804); FABR., Syst. Antl., 177. 10. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., 336. (1809); FALL., Dipt. Suec. Conop., 8. 4. (1817); MEIG., S. B., IV. 122. 3. (1824); MACQ., Ins. Dipt. du N. de la Fr., 346. 3. (1834) et Suit. à Buff., II. 24. 3. (1835); ZELL., Isis, 835. 2. (1842); ZETT., Dipt. Scand., III. 928. 5. *var. a.* (1844); ROND., Magas. de Zool. Ins., t. 153. 7. [*Conopaeus*] (1845); LW., Dipt. Beitr., III. 9. 10. (1847); WALK., Ins. Brit., I. 305. 2. (1851); ROND., Prodr., II. 226. 6. [*Sphixosoma*] (1857); GERST., Stettin. entom. Zeitg., XXI. 257. (1860); SCHIN., F. A., I. 375. (1862).
- aterrima* COUCKE, Ann. Soc. entom. Belg., 227. (1896).
- bicincta* MEIG., S. B., VI. 365. 22. (1830).
- melanocephala* MEIG., Klass., I. 278. 6. (1804).
- trifasciata* DEG., Ins., VI. 104. 2. (1776); HERBST, Gemeinn. Nat., VIII. 116. 4. t. 70. 4. (1799).
- fuscanipennis* BIGOT = **elegans** MEIG.
- fuscipennis** MACQ., Lucas Explor. scient. de l'Algérie, III. 472. 181. Africa sept. t. V. f. 2. (1849); BEZZI, Fauna Eritrea, 20. (18). 20. (1901).
- insignis** LW., Stettin. entom. Zeitg., IX. 300. (1848); SCHIN., F. A., Dalmatia. I. 373. (1862).
- interrupta** BEZZI, Fauna Eritrea, 17. (15). 18. (1901). Africa sept.
- macrocephala* L., DEG. = **vesicularis** L. ♂. et or.
- maculata** MACQ., Ins. Dipt. du N. de la Fr., 348. 8. (1834) et Suit. à Gallia. Buff., II. 27. 14. (1835); MEIG., S. B., VII. 166. 27. (1838).
- maculipes** BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., 6. Serie VII. 37. 8. (1887); Africa sept. BEZZI, Fauna Eritrea, 17. (15). (1901). et or.
- mediatipennis** SICHEL, Ann. Soc. entom. Fr., 121. f. (1862). Gallia.
- melanocephala* MEIG. = **flavipes** L.
- mucronata* ROND. = **vitellina** LW.
- nitidula** BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., LX. 375. No. 20. (1891); BEZZI, Abessynia. Fauna Eritrea, 21. (19). 21. (1901).
- nubeculipennis** BEZZI, Fauna Eritrea, 21. (19). 22. (1901). Africa s. et or.
- quadrifasciata** DEG., Ins., VI. 104. 1. t. XV. f. 1. (1776); SCHRANK, Europa. Fauna Boica, III. 2562. (1803); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 336. (1809); FALL., Dipt. Suec. Conopid., 9. 5. (1817); MEIG., S. B., IV. 123. 4. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 25. 5. (1835); ZELL., Isis, 835. (1842); ZETT., Dipt. Scand., III. 929. 6. (1844); ROND., Mag. de Zool. Ins., t. 153. p. 7. [*Conopaeus*] (1845); LW., Dipt. Beitr., III. 5. 6. (1847); WALK., Ins. Brit., I. 306. 3. (1851); ROND., Prodr., II. 224. 1. [*Sphixosoma*] (1857); SCHIN., F. A., I. 373. (1862); MIK, Wien. entom. Zeitg., III. 206. (1884).

- aculeata* FABR., Spec. Ins., II. 466. 2. (1781); Entom. syst., IV. 391. 2. (1794) et Syst. Antl., 174. 2. (1805); MEIG., Klass., I. 276. 4. (1804); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 336. (1809); ZETT., Dipt. Scand., III. 930. 7. (1844); WALK., Ins. Brit., I. 306. 4. (1851).
terminata MACQ., Ins. Dipt. du N. de la Fr., 346. 4. (1834) et Suit. à Buff., II. 25. 4. (1835); MEIG., S. B., VII. 166. 24. (1838).
Rondanii BEZZI, Fauna Eritrea, 19. (17). 19. (1901). Africa s. et or.
rufiventris MACQ., Lucas Explor. scient. de l'Algérie, III. 474. 183. Algeria.
 t. V. f. 4. (1849).
 ✕ **scutellata** MEIG., Klass., I. 267. 5. (1804); Lw., Dipt. Beitr., III. 6. 7. Europa centr.
 (1847); SCHIN., F. A., I. 372. (1862). et mer.
aculeata GMEL., Syst. Nat., V. 2893. 1. (1793); MEIG., S. B., IV. 124. 5. (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 25. 6. (1835).
silacea WIED., MEIG., S. B., IV. 136. 21. (1824); Lw., Dipt. Beitr., III. 4. 4. (1847); SCHIN., F. A., I. 372. (1862). Europa mer.
strigata WIED., MEIG., S. B., IV. 133. 18. (1824); Lw., N. Beitr., I. 26. 18. (1853); WALK., Ins. Brit., I. 307. 6. (1851); SCHIN., F. A., I. 375. (1862). Europa centr.
auricincta Lw., Dipt. Beitr., III. 10. 11. (1847).
trifasciata MEIG., S. B., VII. 165. 23. (1838).
superba v. RÖD., Wien. entom. Zeitg., VIII. 6. (1889). Asia min.
terminata MACQ., MEIG. = **quadrifasciata** DEG.
trifasciata DEG., HERBST = **flavipes** L.
trifasciata MEIG. = **strigata** WIED.
vesicularis L., Fauna Suec., 1903. ♂. (1761) et Syst. Nat., XII. 1005. Europa.
 4. (1767); GEOFFR., Ins., II. 472. 13. [*Asilus*] (1764) FABR., Spec. Ins., II. 466. 1. (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2893. 4. (1793); FABR., Entom. syst., IV. 390. 1. (1794); MEIG., Klass., I. 281. a. (1804); FABR., Syst. Antl., 174. 1. (1805); FALL., Dipt. Suec. Conop., 8. 3. (1817); MEIG., S. B., IV. 120. 1. (1824); MACQ., Dipt. du N. de la Fr., 345. 2. (1834) et Suit. à Buff., II. 24. 1. (1835); ZELL., Isis, 835. 1. (1842); ZETT., Dipt. Scand., III. 926. 4. (1844); Lw., Dipt. Beitr., III. 11. 12. (1847); WALK., Ins. Brit., I. 305. 1. (1851); ROND., Prodr., II. 226. 4. [*Sphixosoma*] (1857); SCHIN., F. A., I. 372. (1862).
cylindrica MEIG., Klass., I. 275. 2. ♀. (1804).
macrocephala L., ♀. Fauna Suec., II. 1902. (1740) et Syst. Nat., XII. 467. (1766); DEG., Ins., VI. 105. 3. (1776); MACQ., Dipt. du N. de la Fr., 345. 1. (1834).
vitellina Lw., Dipt. Beitr., III. 4. 5. (1847); SCHIN., F. A., I. 373. (1862). Europa mer.
mucronata ROND., Prodr., II. 225. 2. [*Sphixosoma*] (1857).

Physocephala

SCHIN., Wien. entom. Monatschr., V. 137. (1861).

annulipes MEIG. = **lacera** MEIG.

biguttata v. RÖD., Wien. entom. Zeitg., II. 94. (1883).

Ins. Canar.

- chrysorrhoea** MEGERLE, MEIG., S. B., IV. 128. 11. ♂. [*Conops*] (1824); Europa mer.
 ZELL., Isis, 836. var. b. [*Conops*] (1842); LW., Dipt. Beitr., III. et or.,
 19. 19. [*Conops*] (1847); SCHIN., F. A., I. 378. (1862); WALK., The Arabia.
 Entom., No. 92. 339. [*Conops*] (1871).
Pallasii MEIG., S. B., IV. 128. 10. ♀. [*Conops*] (1824); LW., N.
 Beitr., I. 22. 10. [*Conops*] (1857).
chrysorrhoea var. a. ZELL. = **vittata** FABR.
dorsalis WIED., MEIG., LW. = **fraterna** LW.
fraterna LW., Dipt. Beitr., III. 18. 18. [*Conops*] (1847); SCHIN., F. A., Europa mer.
 I. 380. (1862).
dorsalis WIED., MEIG., S. B., IV. 133. 17. [*Conops*] (1824); LW.,
 N. Beitr., I. 26. 17. [*Conops*] (1853).
lacera MEIG., S. B., IV. 130. 13. ♂. [*Conops*] (1824); ? Macq., Suit. Europa centr.
 à Buff., II. 28. 16. [*Conops*] (1835); LW., N. Beitr., I. 22. 13. et mer.
 [*Conops*] (1853); ROND., Prodr., II. 230. [*Conops*] (1857); SCHIN.,
 F. A., I. 377. (1862).
 ? *annulipes* MEIG., S. B., IV. 135. 20. ♀. [*Conops*] (1824).
laticincta BRULLE, Expéd. sc. de Morée, III. 312. 680. [*Conops*] Graecia.
 (1832).
macrocephala FABR., GMEL., FALL., COQUEB., MEIG., MACQ., ZETT., WALK.,
 ROND. = **nigra** DEG.
meridionalis MACQ., Suit. à Buff., II. 26. 8. [*Conops*] (1835); MEIG., Sicilia.
 S. B., VII. 166. 25. [*Conops*] (1838).
nigra DEG., Ins., VI. 105. 4. t. XV. f. 9. [*Conops*] (1776); HERBST, Europa.
 Gemeinn. Nat., VIII. 117. 5. t. LXX. f. 5. [*Conops*] (1794); MEIG.,
 S. B., IV. 126. 8. [*Conops*] (1824); LW., Dipt. Beitr., III. 14. 15.
 [*Conops*] (1847); WALK., Ins. Brit., I. 308. 8. [*Conops*] (1851);
 SCHIN., F. A., I. 376. (1862).
macrocephala FABR., Spec. Ins., II. 466. 4. [*Conops*] (1781);
 GMEL., Syst. Nat., V. 2893. 5. [*Conops*] (1793); FABR., Entom.
 syst., IV. 392. 7. [*Conops*] (1794); COQUEB., Icon, 120. t. XXVII.
 f. 5. [*Conops*] (1802); FABR., Syst. Antl., 176. 9. (1805); FALL.,
 Dipt. Suec. Conop., 7. 2. [*Conops*] (1817); MEIG., S. B., IV.
 125. 7. t. XXXVI. f. 27. [*Conops*] (1824); MACQ., Suit. à Buff.,
 II. 24. 2. [*Conops*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 926. 3.
 [*Conops*] (1844); ROND., Magas. de Zool. Ins., Pl. 153. p. 8.
 [*Conops*] (1845); WALK., Ins. Brit., I. 308. 7. [*Conops*] (1851);
 ROND., Prodr., II. 230. 2. [*Conops*] (1857).
Pallasii MEIG., LW. = **chrysorrhoea** MEIG.
pumila MACQ., MEIG., ROND. = **pusilla** MEIG.
pusilla MEIG., S. B., IV. 131. 14. [*Conops*] (1824); MACQ., Suit. à Buff., Europa mer.
 II. 28. 17. [*Conops*] (1835); LW., N. Beitr., I. 24. 14. [*Conops*]
 (1853); ROND., Prodr., II. 230. [*Conops*] (1857); SCHIN., F. A., I.
 377. (1862).
 ? *pumila* MACQ., Suit. à Buff., II. 26. 9. [*Conops*] (1835); MEIG.,
 S. B., VII. 166. 26. [*Conops*] (1838).
tener LW., Dipt. Beitr., III. 22. 21. [*Conops*] (1847).

- rufipes** FABR., Spec. Ins., II. 466. 3. [*Conops*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2893. 1. [*Conops*] (1793); FABR., Entom. syst., IV. 392. 5. [*Conops*] (1794); MEIG., Klass., I. 279. 9. [*Conops*] (1804); FABR., Syst. Antl., 176. 7. [*Conops*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 336. [*Conops*] (1809); FALL., Dipt. Suec. Conopid., 7. 1. [*Conops*] (1817); MEIG., S. B., IV. 126. 9. [*Conops*] (1824); MACQ., Dipt. du N. de la Fr., 347. 6. [*Conops*] (1834) et Suit. à Buff., II. 25. 7. [*Conops*] (1835); ZELL., Isis, 835. 4. [*Conops*] (1842); ZETT., Dipt. Scand., III. 924. 1. [*Conops*] (1844); LW., Dipt. Beitr., III. 15. 16. [*Conops*] (1847); WALK., Ins. Brit., I. 308. 9. [*Conops*] (1851); LW., N. Beitr., I. 22. 9. [*Conops*] (1853); ROND., Prodr., II. 231. 3. [*Conops*] (1857); GERST., Stettin. entom. Zeitg., XXI. 257. (1860); SCHIN., F. A., I. 376. (1862). Europa.
- semiatria* O. COSTA = **vittata** FABR.
- soleaformis* GIMMERTH = **vittata** FABR.
- tener* LW. = **pusilla** MEIG.
- truncata** LW., Dipt. Beitr., III. 21. 20. [*Conops*] (1847); SCHIN., F. A., I. 378. (1862). Sicilia.
- variegata** MEIG., S. B., IV. 132. 15. [*Conops*] (1824); LW., N. Beitr., I. 25. 15. [*Conops*] (1853); SCHIN., F. A., I. 379. (1862). Europa centr. et mer.
- vittata** FABR., Entom. syst., IV. 392. 4. [*Conops*] (1794); SCHELL., Genr. d. Monch., t. XIX. 1. [*Conops*] (1803); MEIG., Klass., I. 278. 7. t. XIV. f. 4. [*Conops*] (1804); FABR., Syst. Antl., 176. 6. [*Conops*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 336. [*Conops*] (1809); MEIG., S. B., IV. 129. 12. [*Conops*] (1824); MACQ., Dipt. du N. de la Fr., 347. 7. [*Conops*] (1834) et Suit. à Buff., II. 27. 13. [*Conops*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 925. 2. [*Conops*] (1844); LW., Dipt. Beitr., III. 16. 17. [*Conops*] (1847); ROND., Prodr., II. 231. 5. [*Conops*] (1857); GERST., Stettin. entom. Zeitg., XXI. 257. (1860); SCHIN., F. A., I. 380. (1862); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 192. 345. (1903). Europa centr. et mer., Aegyptus.
- chrysorrhoea* var. *a.* ZELL., Isis, 836. [*Conops*] (1842).
- semiatria* O. COSTA, Ann. Acad. dell. Sc. di Napoli, p. 9. t. I. f. 4. [*Conops*] (1857).
- soleaformis* GIMMERTH, Bull. de Moscou, XV. [*Conops*] (1842).

Brachyglossum

ROND., Prodr., I. 56. (1856).

Leopoldius ROND., Magas. de Zool., 4. t. 153. f. 1. (1845).

- brevirostris** GERM., Fauna, XIII. 24. [*Conops*] (1817); LW., Dipt. Beitr., III. 2—2. [*Conops*] (1847). Europa centr. et mer.
- erostatum* ROND., Diario Bononiensi. Nuov. Ann. d. Sc. nat. (1844); Magas. de Zool., 5. (1845) et Prodr., II. 221. 2. (1857).
- signatum* WIED., MEIG., S. B., IV. 134. 19. ♀. [*Conops*] (1824);

Lw., N. Beitr., I. 27. [*Conops*] (1853); SCHIN., F. A., I. 370.
[*Conops*] (1862).

calceatum ROND., Prodr., II. 221. 3. (1857). Italia.

✕**capitatum** Lw., Dipt. Beitr., III. 2. 1. [*Conops*] (1847); SCHIN., F. A., Europa centr.
371. [*Conops*] (1862).

coronatum ROND., Prodr., II. 220. Nota. (1857); SCHIN., F. A., I. 371. Italia.
[*Conops*] (1862).

diadematum ROND., Magas. de Zoolog., p. 6. t. 153. f. 1. [*Leopoldius*] Italia.
(1845); Lw., Dipt. Beitr., III. 3. 3. [*Conops*] (1847) et N. Beitr.,
I. 27. [*Conops*] (1853); ROND., Prodr., II. 220. 1. (1857); SCHIN.,
F. A., I. 371. [*Conops*] (1862).

crostratum ROND. = **brevirostris** GERM.

signatum WIED., Lw., SCHIN. = **brevirostris** GERM.

Conopilla

ROND., Prodr., I. 56. 3. (1856).

ceriaeformis MEIG., S. B., IV. 132. 16. t. XXXVI. f. 26. [*Conops*] Europa centr.
(1824); ROND., Magas. de Zool., 9. 1. t. 153. f. 5. (1845); Lw., et mer.
Dipt. Beitr., III. 7. 8. [*Conops*] (1847); WALK., Ins. Brit., I. 306.
5. [*Conops*] (1851); Lw., N. Beitr., I. 26. 16. [*Conops*] (1853);
SCHIN., F. A., I. 374. [*Conops*] (1862).

Brachyceraea

v. RÖD., Entom. Nachr., XVIII. 366. (1892).

brevicornis Lw., Jahresber. naturwiss. Ver. Posén, 23. 22. [*Conops*] Asia min.
(1846) et Dipt. Beitr., III. 23. 22. [*Conops*] (1847); v. RÖD., Entom.
Nachr., XVIII. 366. (1892).

Myopinae.

Myopa

FABR., Syst. entom., 798. (1775).

Fairmairia ROB.-DESV., Dipt. des env. de Paris. Myop., 31.
V. (1853).

Gonirhynchus ROND., Prodr., II. 241. (1857).

Haustellia ROB.-DESV., Dipt. des env. de Paris. Myop., 47. XI.
(1853).

Lonchopalpus ROB.-DESV., Dipt. des env. de Paris. Myop., 35.
VII. (1853).

Myopella ROB.-DESV., l. c. Myop., 19. I. (1853).

- Myopina* ROB.-DESV., l. c. Myop., 39. IX. (1853).
Phorosia ROB.-DESV., l. c. Myop., 29. IV. (1853).
Pictinia ROB.-DESV., l. c. Myop., 15. II. (1853).
Purplella ROB.-DESV., l. c. Myop., 37. VIII. (1853).
- annulata** FABR., Entom. syst., IV. 399. 10. (1794). Italia.
arabica MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 165. 2. (1850). Arabia.
argentea ROB.-DESV., Myod., 246. 14. (1830) et Dipt. des env. de Gallia.
 Paris. Myop., 9. (1853).
buccata L., Fauna Suec., 1905. [*Conops*] (1761); Scop., Entom. carn., Europa,
 1005. [*Sicus*] (1763); FABR., Syst. entom., 799. 4. (1775); Spec. Afr. sept.
 Ins., II. 469. 5. (1781) et Entom. syst., IV. 398. 5. (1794); PANZ.,
 Fauna Germ., XII. 24. (1794); FABR., Syst. Antl., 179. 5. (1805);
 FALL., Dipt. Suec. Conop., 10. 1. (1817); MEIG., S. B., IV. 142. 2.
 (1824); MACQ., Suit. à Buff., II. 31. 2. (1835); ZETT., Ins. Lapp.,
 619. 1. (1838) et Dipt. Scand., III. 934. 1. (1844); MACQ., Lucas
 Expl. sc. de l'Algérie, III. 474. 185. (1849); ROB.-DESV., Dipt. des
 Env. de Paris. Myop., 23. 5. [*Myopella*] (1853); ROND., Prodr., II.
 244. (1857); SCHIN., F. A., I. 386. (1862).
florea ROB.-DESV., Dipt. des env. de Paris. Myop., 20. 2. [*My-*
opella] (1853).
marginalis ROB.-DESV., Dipt. des env. de Paris. Myop., 22. 3.
 [*Myopella*] (1853).
puncticeps ROB.-DESV., Dipt. des env. de Paris. Myop., 19. 1.
 [*Myopella*] (1853).
punctigera ROB.-DESV., Dipt. des env. de Paris. Myop., 22. 4.
 [*Myopella*] (1853).
buccata ROB.-DESV., Myod. = **fulvipalpis** ROB.-DESV.
dispar ROND. = **occulta** WIED.
dorsalis FABR., Entom. syst., IV. 397. 1. (1794); SCHELL., Genr. d. Europa.
 Mouch., t. XX. f. 1, 2. (1803); MEIG., Klass., I. 290. a. (1804);
 FABR., Syst. Antl., 178. 1. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV.
 337. (1809); FALL., Dipt. Suec. Conop., 10. 2. (1817); MEIG., S. B.,
 IV. 143. 4. (1824); ROB.-DESV., Myod., 245. 11. (1830); MACQ.,
 Suit. à Buff., II. 32. 5. (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 936. 3.
 (1844); ROB.-DESV., Dipt. des Env. de Paris. Myop., 36. 1. [*Lon-*
chopalpus] (1853); ROND., Prodr., II. 243. 2. (1857); SCHIN., F. A.,
 I. 388. (1862).
ferruginea PANZ., Fauna Germ., XXII. 24. (1794).
grandis MEIG., Klass., I. 284. 1. (1804).
 ? *soleaformis* GIMMERTH., Uebers. d. Zweifl. Lief. u. Kurl., 34.
 [*Conops*] (1842).
testacea GMEL., Syst. Nat., V. 2894. 11. (1793).
ephippium FABR. = **fasciata** MEIG.
fasciata MEIG., Klass., I. 286. 4. (1804) et S. B., IV. 144. 6. (1824); Europa centr.
 ROB.-DESV., Myod., 244. 8. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 33. 7.
 (1835); SCHIN., F. A., I. 387. (1862).

ephippium FABR., Syst. Antl., 180. 8. (1805).

ferruginea PANZ. = **dorsalis** FABR.

flavipennis ROB.-DESV. = **stigma** MEIG.

florea ROB.-DESV. = **buccata** L.

fulvipalpis ROB.-DESV., Dipt. des Env. de Paris. Myop., 16. 1. [*Pictinia*] (1853). Gallia.

buccata ROB.-DESV. (*nec* L.), Myod., 242. 2. (1830).

grandis MEIG. = **dorsalis** FABR.

insignis JAENN., N. exot. Dipt., 404. 130. (1866). Arabia.

longirostris ROB.-DESV., Myod., 243. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buff., Gallia.

II. 32. 4. (1835); ROB.-DESV., Dipt. des Envir. de Paris. Paris.

Myop., 9. (1853).

maculata MACQ., Suit. à Buff., II. 34. 10. (1835) et Dipt. du N. de la Gallia.

Fr., 238. 8. (1834).

marginalis ROB.-DESV. = **buccata** L.

meridionalis MACQ., Suit. à Buff., II. 34. 11. (1835). Aegyptus ?

morio MEIG., S. B., IV. 148. 12. (1824); ROB.-DESV., Dipt. des Env. Europa centr.

de Paris. Myop., 31. 1. [*Fairmairia*] (1853).

nigrita WIED., Aussereurop. Zweifl. Ins., II. 246. 5. (1830). Marocco.

nigrodorsata ROB.-DESV. = **stigma** MEIG.

nitidula FARR. = **variegata** MEIG.

nobilis ROB.-DESV., Dipt. des Env. de Paris. Myop., 38. 1. [*Purpurella*] Gallia.
(1853).

X **occulta** WIED., MEIG., S. B., IV. 145. 7. (1824); ROB.-DESV., Myod., Europa centr.
245. 10. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 33. 8. (1835); ZETT.,
Dipt. Scand., III. 937. 4. (1844); ROB.-DESV., Dipt. des Envir. de
Paris. Myop., 48. 1. (1853); SCHIN., F. A., I. 387. (1862).

dispar ROND., Prodr., II. 241. 1. [*Gonirhynchus*] (1857).

pellucida ROB.-DESV. = **testacea** L.

picta PANZ., F. Germ., LIV. 22. (1798); MEIG., S. B., IV. 141. 1. (1824); Europa centr.

ROB.-DESV., Myod., 242. 1. (1830); MACQ., S. à Buff., II. 31. 1. et mer.

(1835); ROB.-DESV., Dipt. des Envir. de Paris, 14. 1. [*Sicus*] (1853);

ROND., Prodr., II. 244. 8. (1857); SCHIN., F. A., I. 386. (1862).

pictipennis ROB.-DESV. = **testacea** L.

polystigma ROND., Prodr., II. 247. 7. (1857); SCHIN., F. A., I. 387. Italia.

(1862).

puella ROND., Prodr., II. 245. 4. (1857). Italia.

punctipes ROB.-DESV. = **buccata** L.

punctigera ROB.-DESV. = **buccata** L.

scutellaris ROB.-DESV. = **stigma** MEIG.

soleaformis GIMMERTH = **dorsalis** FABR.

stigma MEIG., S. B., IV. 148. 11. (1824); ROND., Prodr., II. 246. 5. (1857); Europa centr.

SCHIN., F. A., I. 385. (1862). et mer.

flavipennis ROB.-DESV., Dipt. des Envir. de Paris. Myop., 27. 8.

[*Myopella*] (1853).

nigrodorsata ROB.-DESV., Dipt. des Envir. de Paris. Myop., 26.

7. [*Myopella*] (1853).

scutellaris ROB.-DESV., Dipt. des Envir. de Paris. Myop., 28. 9.
[*Myopella*] (1853).

✕ *testacea* L., Syst. Nat. Edit., XI. 2. 1006. [*Conops*] (1759); SCOP., Europa,
Entom. carn., 1004. [*Sicus*] (1763); FABR., Spec. Ins., II. 468. 2. Africa sept.
(1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2895. 12. [*Conops*] (1793); FABR.,
Entom. syst., IV. 398. 4. (1794) et Syst. Antl., 179. 4. (1805);
LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 337. (1809); FALL., Dipt. Suec.
Conop., 11. 3. (1817); MEIG., S. B., IV. 142. 3. (1824); ROB.-DESV.,
Myod., 243. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 32. 3. (1835); ZETT.,
Ins. Lapp., 619. 2. (1838) et Dipt. Scand., III. 935. 2. (1844);
MACQ., Lucas Expl. scient. de l'Algérie, III. 474. 184. (1849);
ROB.-DESV., Dipt. des Envir. de Paris. Myop., 29. 1. [*Phorosia*]
(1853); ROND., Prodr., II. 244. 6. (1857); SCHIN., F. A., I. 386.
(1862).

pellucida ROB.-DESV., Myod., 244. 7. (1830).

pictipennis ROB.-DESV., Myod., 243. 6. (1830) et Dipt. des Env.
de Paris. Myop., 25. 6. [*Myopella*] (1853).

umbripennis ROB.-DESV., Myod., 243. 4. (1830).

testacea GMEL. = *dorsalis* FABR.

umbripennis ROB.-DESV. = *testacea* L.

varia WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 242. (1830).

Aegyptus.

variegata MEIG., Klass., I. 286. 5. (1804); FALL., Dipt. Suec. Conop., Europa.
11. 4. (1817); MEIG., S. B., IV. 145. 8. t. XXXVII. f. 16. (1824);
ROB.-DESV., Myod., 244. 9. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 33. 9.
(1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 938. 5. (1844); ROB.-DESV., Dipt.
des Envir. de Paris. Myop., 40. 1. [*Myopina*] (1853); ROND.,
Prodr., II. 243. 3. (1857); SCHIN., F. A., I. 385. (1862).

nitidula FABR., Syst. Antl., 180. 6. (1805).

Occemyia

ROB.-DESV., Dipt. d. Envir. de Paris. Myop., 50. (1853).

Melanosoma p. p., ROB.-DESV., Dipt. des Envir. de Paris. Myop.,
44. 2. (1853).

Oncomyia Lw., Berlin. entom. Zeitschr., X. 41. 73. Nota (1866).

Thecophora ROND., Prodr., II. 235. (1857).

annulata FABR. = *atra* FABR.

✕ *atra* FABR., Spec. Ins., II. 469. 3. [*Myopa*] (1781) et Entom. syst., IV. Europa.
397. 3. [*Myopa*] (1794); PANZ., Fauna Germ., XII. 24. [*Myopa*]
(1794); SCHELL., Genr. d. Mouch., t. XX. f. 3. [*Myopa*] (1803);
MEIG., Klass., I. 289. [*Myopa*] (1804); FABR., Syst. Antl., 179. 3.
[*Myopa*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 337. [*Myopa*]
(1809); FALL., Dipt. Suec. Conop., 12. 6. [*Myopa*] (1817); MEIG.,
S. B., IV. 146. 9. [*Myopa*] (1824); ROB.-DESV., Myod., 247. 18.
(1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 35. 15. [*Myopa*] (1835); ZETT.,

Dipt. Scand., III. 940. 7. [*Myopa*] (1844); ROB.-DESV., Myop., 58. 9. (1853); ROND., Prodr., II. 237. 2. [*Thecophora*] (1857); SCHIN., F. A., I. 382. (1862).

annulata FABR., Entom. syst., IV. 399. 10. [*Myopa*] (1794) et Syst. Antl., 181. 13. [*Myopa*] (1805).

Bigoti ROB.-DESV., Myop., 62. 13. [*Myopa*] (1853).

brunipes ROB.-DESV., Myop., 63. 14. [*Myopa*] (1853).

cinerascens MEIG., Klass., I. 287. 6. [*Myopa*] (1805).

Dufouri ROB.-DESV., Myop., 56. 7. [*Myopa*] (1853).

femoralis ROB.-DESV., Myop., 52. 2. [*Myopa*] (1853).

femorata FABR., Syst. Antl., 181. 14. [*Myopa*] (1805).

fulvifrons ROB.-DESV., Myop., 54. 4. [*Myopa*] (1853).

grisea ROB.-DESV., Myop., 57. 8. [*Myopa*] (1853).

Guerini ROB.-DESV., Myop., 61. 12. [*Myopa*] (1853).

Lamarcki ROB.-DESV., Myop., 60. 10. [*Myopa*] (1853).

Lucasi ROB.-DESV., Myop., 64. 15. [*Myopa*] (1853).

Macquarti ROB.-DESV., Myop., 61. 11. [*Myopa*] (1853).

maculata MEIG., Klass., I. 287. 7. [*Myopa*] (1804).

Meigeni ROB.-DESV., Myop., 55. 5. [*Myopa*] (1853).

micans MEIG., Klass., I. 288. 8. [*Myopa*] (1804).

nana ROB.-DESV., Myop., 248. 20. [*Myopa*] (1830); MACQ., Ins. Dipt.

du N. de la Fr., 340. 13. [*Myopa*] (1834) et Suit. à Buff., II. 36.

18. [*Myopa*] (1835); ROB.-DESV., Myop., 65. 17. [*Myopa*] (1853).

nitidula ROB.-DESV., Myop., 53. 3. [*Myopa*] (1853).

pallipes ROB.-DESV., Myop., 56. 6. [*Myopa*] (1853).

pusilla ROB.-DESV., Myop., 64. 16. [*Myopa*] (1853).

atra var. β . FALL. = **Sundewalli** ZETT.

Bigoti ROB.-DESV. = **atra** FABR.

brunipes ROB.-DESV. = **atra** FABR.

cinerascens MEIG. = **atra** FABR.

distincta WIED., MEIG., S. B., IV. 149. 14. [*Myopa*] (1824); ZETT., Europa.

Dipt. Scand., III. 913. 9. [*Myopa*] (1844); ROB.-DESV., Dipt. des

Envir. de Paris. Myop., 44. 2. [*Melanosoma*] (1853); ROND., Prodr.,

II. 236. 1. [*Thecophora*] (1857); SCHIN., F. A., I. 382. (1862).

Dufouri ROB.-DESV. = **atra** FABR.

femoralis ROB.-DESV. = **atra** FABR.

femorata FABR. = **atra** FABR.

fulvifrons ROB.-DESV. = **atra** FABR.

fulvipes ROB.-DESV., Myod., 246. 15. [*Myopa*] (1830); MACQ., Suit. à Gallia.

Buff., II. 35. 17. [*Myopa*] (1835).

grisea ROB.-DESV. = **atra** FABR.

Guerini ROB.-DESV. = **atra** FABR.

Lamarcki ROB.-DESV. = **atra** FABR.

Lucasi ROB.-DESV. = **atra** FABR.

Macquarti ROB.-DESV. = **atra** FABR.

maculata MEIG. = **atra** FABR.

Meigeni ROB.-DESV. = **atra** FABR.

- melanopa** ROND., Prodr., II. 238. 4. [*Thecophora*] (1857). Italia.
micans MEIG. = **atra** FABR.
nana ROB.-DESV., MACQ. = **atra** FABR.
nitidula ROB.-DESV. = **atra** FABR.
pallipes ROB.-DESV. = **atra** FABR.
pusilla MEIG., S. B., IV. 150. 16. [*Myopa*] (1824); ROND., Prodr., II. 237. 3. [*Thecophora*] (1857); SCHIN., F. A., I. 382. (1862). Europa centr. et mer.
pusilla ROB.-DESV. = **atra** FABR.
Sundewalli ZETT., Dipt. Scand., III. 942. 8. [*Myopa*] (1844); ROB.-DESV., Myop., 51. 14. [*Myopa*] (1853); SCHIN., F. A., I. 383. (1862). Europa centr. et sept.
atra var. β ; FALL., Dipt. Suec. Conop., 12. 6. [*Myopa*] (1817).

Melanosoma

ROB.-DESV., Dipt. des Envir. de Paris. Myop., 42. (1853).

Glossigona ROND., Prodr., I. 58. 2. (1856) et II. 238. (1857); SCHIN. (1862).

- bicolor** MEIG., S. B., IV. 147. 10. ♂. [*Myopa*] (1824); ROB.-DESV., Myod., 247. 16. [*Myopa*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 34. 13. Europa centr. et mer.
 [*Myopa*] (1835); SCHIN., F. A., I. 383. [*Glossigona*] (1862).
nigra MEIG., S. B., IV. 149. 13. ♂♀. [*Myopa*] (1824); ROB.-DESV., Myod., 246. 13. [*Myopa*] (1830); MACQ., Ins. du N. de la Fr., 340. 12. [*Myopa*] (1834) et Suit. à Buff., II. 35. 16. [*Myopa*] (1835); ROB.-DESV., Myop., 43. 1. (1853).
nupta ROND., Prodr., II. 239. 1, [*Glossigona*] (1857).
brunipes ROB.-DESV., Dipt. des Envir. de Paris. Myop., 46. 4. (1853). Gallia.
nigra MEIG., MACQ., ROB.-DESV. = **bicolor** MEIG.
nigripes ROB.-DESV., Dipt. des Envir. de Paris. Myop., 45. 3. (1853). Gallia.
nupta ROND. = **bicolor** MEIG.
pallipes WIED., MEIG., S. B., IV. 149. 15. [*Myopa*] (1824); ROB.-DESV., Myod., 248. 19. [*Myopa*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 35. 14. Europa centr.
 [*Myopa*] (1835); ROB.-DESV., Myop., 56. 6. [*Occemyia*] (1853); SCHIN., F. A., I. 383. [*Glossigona*] (1862).
Zetterstedti ROB.-DESV., Dipt. des Envir. de Paris. Myop., 46. 5. Gallia. (1853).

Zodion

LATR., Précis des Caract. gén. d. Ins., (1796).

- Carceli** ROB.-DESV., Myod., 251. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 40. 3. (1835); ROB.-DESV., Dipt. des Envir. de Paris. Myop., 78. 6. (1853); LW., Berlin. entom. Zeitschr., XII. 385. (1868). Gallia.
cinereum EABR., Entom. syst., IV. 399. 9. [*Myopa*] (1794) et Syst. Antl., 181. 12. [*Myopa*] (1805); LATR., Diet. d. Hist. nat., 24. 193. 558. (1817); GERM., Fauna Ins. Europ., 14. 25. [*Myopa*] (1817); FALL., Dipt. Suec. Conop., 12. 7. [*Myopa*] (1817); MEIG., S. B., IV. 138. 1. (1824); ROB.-DESV., Myod., 251. 1. (1830); MACQ., Suit.

- à Buff., II. 39. 1. (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 931. 1. (1844);
 Rond., Prodr., II. 234. 1. (1857); SCHIN., F. A., I. 381. (1862).
conopsoïdes LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 336. (1809).
fuliginosum ROB.-DESV., Myop., 76. 2. (1853).
fulvicorne ROB.-DESV., Myop., 78. 5. (1853).
fulvipes ROB.-DESV., Myop., 77. 3. (1853).
notatum ROB.-DESV., Myod., 251. 2. (1830).
pedicellatum ROB.-DESV., Myod., 252. 4. (1830) et Myop., 79. 7. (1853).
tibialis FABR., Syst. Antl., 182. 16. [*Myopa*] (1805).
conopsoïdes LATR. = **cinereum** FABR.
erythrurum ROND., Atti Soc. Ital. Sc. nat. Milano, VIII. 146. (1865); Italia.
 Bezzi, Ditt. delle Marche e Abruzzi, 94. (1900).
frontalis FABR., Syst. Antl., 182. 15. [*Myopa*] (1805). Europa centr.
fuliginosum ROB.-DESV. = **cinereum** FABR.
fulvicorne ROB.-DESV. = **cinereum** FABR.
fulvipes ROB.-DESV. = **cinereum** FABR.
irroratum FABR. = **notatum** MEIG.
notatum MEIG., Klass., I. 288. (1804) et S. B., IV. 139. 2. (1824); Europa centr.
 Macq., Suit. à Buff., II. 40. 2. (1835); ZETT., Dipt. Scand., III. 932. 2. (1844); ROB.-DESV., Dipt. des Envir. de Paris. Myop., 77. 4. et sept.
 (1853); ROND., Prodr., II. 234. 2. (1857); SCHIN., F. A., I. 381. (1862).
irroratum FABR., Syst. Antl., 180. 7. [*Myopa*] (1805).
tessellatum FABR., Syst. Antl., 181. 11. [*Myopa*] (1805).
notatum ROB.-DESV. = **cinereum** FABR.
pedicellatum ROB.-DESV. = **cinereum** FABR.
pulchrum LW., Berlin. entom. Zeitschr., XII. 384. 15. (1868). Asia min.
tessellatum FABR. = **notatum** MEIG.
tibialis FABR. = **cinereum** FABR.

Sicus

Scop., Entom. carn., 1004. (1763).

- annulipes* ROB.-DESV., Macq. = **ferrugineus** L.
 X **ferrugineus** L., Fauna Suec., 1907. [*Conops*] (1761); Scop., Entom. Europa.
 carn., 1004. [*Conops*] (1763); SCHAEFF., Icon., t. 261. 3. [*Conops*]
 (1779); FABR., Spec. Ins., II. 468. 1. [*Myopa*] (1781); GMEL., Syst.
 Nat., V. 2894. 8. [*Conops*] (1793); FABR., Entom. syst., IV. 397.
 2. [*Myopa*] (1794); GEOFFR., Ins., II. 473. 14. [*Asilus*] (1799);
 FABR., Syst. Antl., 178. 2. [*Myopa*] (1805); LATR., Gen. Crust. et
 Ins., IV. 337. [*Myopa*] (1809); FALL., Dipt. Suec. Conop., 12. 5.
 [*Myopa*] (1817); MEIG., S. B., IV. 144. 5. [*Myopa*] (1824); Macq.,
 Suit. à Buff., II. 32. 6. [*Myopa*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 620. 3.
 (1838) et Dipt. Scand., III. 939. 6. [*Myopa*] (1844); ROND., Prodr.,
 II. 243. 1. [*Myopa*] (1857); SCHIN., F. A., I. 384. (1862).
annulipes ROB.-DESV., Myod., 246. 12. [*Myopa*] (1830); Macq.,
 Suit. à Buff., II. 34. 12. [*Myopa*] (1835); ROB.-DESV., Dipt.
 des Envir. de Paris. Myop., 9. 34. [*Myopa*] (1853).

Dalmannia

ROB.-DESV., Myod., 248. (1830).

Stachynia MACQ., Suit. à Buff., II. 36. (1835).

aculeata L., Fauna Suec., 1906. [*Conops*] (1761); SCHIN., F. A., I. Europa centr.
389. (1862). et mer.

australis MACQ., Suit. à Buff., II. 37. 3. [*Stachynia*] ♂. (1835).

desponsata ROND., Prodr., II. 250. 1. (1857).

gemina WIED., MEIG., S. B., IV. 153. 21. [*Myopa*] (1824); ROB.-
DESV., Myod., 249. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 36. 1.
[*Stachynia*] (1835).

meridionalis ROB.-DESV., Myod., 249. 2. (1830); MACQ., Suit. à
Buff., II. 37. 2 [*Stachynia*] (1835); ROB.-DESV., Dipt. des Envir.
de Paris. Myop., 68. 1. (1853).

australis MACQ. = **aculeata** L.

desponsata ROND. = **aculeata** L.

dorsalis FABR., Entom. syst., IV. 396. 12. [*Stomoxys*] (1794) et Syst. Europa centr.
Antl., 282. 15. [*Stomoxys*] (1805); ROB.-DESV., Myop., 71. 4. (1853).

dorsata LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 338. [*Myopa*] (1809);
MEIG., S. B., IV. 152. 20. [*Myopa*] (1824); MACQ., Suit. à
Buff., II. 38. 6. [*Stachynia*] (1835).

flavescens ROB.-DESV., Myod., 250. 4. (1830); Myop., 71. 4. (1853).

dorsata LATR., MEIG., MACQ. = **dorsalis** FABR.

flavescens MEIG., S. B., IV. 152. 19. [*Myopa*] (1824); MACQ., Suit. à Europa centr.
Buff., II. 28. 5. [*Stachynia*] (1835) et Lucas Explor. scient. de et mer.,
l'Algérie, III. 475. 186. (1849); ROND., Prodr., II. 251. 3. (1857); Africa sept.
SCHIN., F. A., I. 389. (1862).

flavescens = **dorsalis** FABR.

flavipes ROB.-DESV., MACQ. = **marginata** MEIG.

gemina WIED., ROB.-DESV. = **aculeata** L.

marginata MEIG., S. B., IV. 150. 17. [*Myopa*] (1824); ROB.-DESV., Europa.
Dipt. des Envir. de Paris. Myop., 72. 5. (1853); SCHIN., F. A., I.
390. (1862).

flavipes ROB.-DESV., Myod., 250. 6. (1830); MACQ., Suit. à Buff.,
II. 38. 7. [*Stachynia*] (1835) et Myop., 72. 5. (1853).

marginella ZETT., Dipt. Scand., III. 945. 2. [*Stachynia*] (1844).

parvula ROND., Prodr., II. 251. 4. (1857).

marginella ZETT. = **marginata** MEIG.

meridionalis ROB.-DESV. = **aculeata** L.

parvula ROND. = **marginata** MEIG.

punctata FABR., Entom. syst., IV. 398. 6. [*Myopa*] (1794) et Syst. Europa.

Antl., 181. 9. [*Myopa*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 338.
[*Myopa*] (1809); MEIG., S. B., IV. 151. 18. [*Myopa*] (1824); ROB.-
DESV., Myod., 249. 3. (1830); MACQ., Dipt. du N. de la Fr., 341.
1. [*Stachynia*] (1834) et Suit. à Buff., II. 37. 4. [*Stachynia*] (1835);
ZETT., Dipt. Scand., III. 944. 1. [*Stachynia*] (1844); ROB.-DESV.,

Myop., 69. 3. (1853); ROND., Prodr., II. 251. 2. (1857); SCHIN., F. A., I. 389. (1862).

virens MEIG., Klass., I. 289. 11. [*Myopa*] (1804); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 338. (1809); FALL., Dipt. Suec. Conop., 13. 8. [*Myopa*] (1817).

stigma ROB.-DESV., Myod., 250. 5. (1830).

Germania.

vernalis ROB.-DESV., Dipt. des Envir. de Paris. Myop., 69. 2. (1853). Gallia.

virens MEIG., FALL. = *punctata* FABR.

DIPTERA PUPIPARA.

Hippoboscidae.

Hippobosca

L., Fauna Suec., 471. (1761).

Nirmomyia NITZSCH, Germ. Magaz. entom., 309. (1818)

Zoomyia BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., (6.) V. 234. (1885).

aegyptiaca MACQ = *maculata* LEACH var.

bactriana ROND. = *camelina* LEACH.

calopsis BIGOT = *maculata* LEACH.

camelina LEACH,*) Eprobosc. Ins. Edinb., 10. 4. t. III. f. 11. (1817) Africa sept.

et Mem. Werner. Soc. Edinb., II. 556. 4. t. XXVII. f. 11—14.

(1818); WIED., Aussereurop. Zweifl., II. 602. 1. (1830); WALK.,

List Dipt. Brit. Mus., IV. 1140. (1849) et Entom., V. 346. 93.

(1871); DUF., Ann. Soc. entom. Fr. Bull., VI. 103. (1858); SPEISER,

Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 176. (1902); AUSTEN, Ann.

Magaz. nat. Hist., (7.) XII. 257. (1903).

bactriana ROND., Ann. Mus. civ. Genova, XII. 165. 4. (1878) et

Bull. Soc. entom. Ital., XI. 26. f. 3. (1879).

camelina ROND. = *dromedariina* SPEISER.

canina ROND. = *capensis* v. OLF.

capensis v. OLF.,**) Dissert., 101. 2. (1815); SPEISER, Zeitschr. f. Europa mer.,
Hymenopt. u. Dipt., II. 174. 1. (1902). Africa sept.

canina ROND., Ann. Mus. civ. Genova, XII. 164. 1. (1878) et

Bull. Soc. entom. Ital., XI. 24. 1. (1879).

Francilloni LEACH, Eprob. Ins. Edinb., 8. 2. t. II. f. 8—10. (1817)

et Mem. Werner. Soc. Edinb., II. 554. 2. t. XXVI. f. 8—10.

(1818); WIED., Aussereurop. Zweifl., II. 605. 4. (1830); SPEISER,

Ann. Mus. civ. Genova, (2.) XX. 554. 1. (1900); AUSTEN, Ann.

Magaz. nat. Hist., (7.) XII. 256. (1903).

cunicosa MAD. = *equina* L.

*) *Camelus bactrianus* L.

**) *Canis familiaris* L. et alia mammalia.

dromedariina SPEISER,*) Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 176. (1902). Africa sept.

camelina ROND. (nec LEACH), Ann. Mus. civ. Genova, XII. 165.

5. (1878) et Bull. Soc. entom. Ital., XI. 26. (1879).

egyptiaca MACQ. = **maculata** LEACH var.

equi MACQ. = **equina** L.

equina L.,**) Fauna Suec., 471. 1921. (1761); RÉAUM., Mém. Ins., VI. Europa,
t. XLVIII. [—] (1742); GEOFFR., Hist. Ins., 547. 1. (1762); SCOP., Africa, Asia.
Entom. carn., 316. 1022. (1763); MÜLL., Faun. Fridr., 791. (1764);
L., Syst. Nat., XII. 1010. 1. (1767); SCHAEFF., Icon., II. 2. t. CLXXIX.
f. 8—9. (1769); SULZ., Abg. Gesch. Ins., t. XXI. f. 141. (1776);
SCHRANK, Ins. Austr., 1007. (1781); FABR., Spec. ins., II. 474. 1.
(1781); DEG., Ins. ed. Goeze, VI. 110. 1. t. XVI. f. 1—20. (1782);
MODEER, Gotborg. Vetensk. Handl., III. 31. (1785); FOURCR., Entom.
paris., II. 504. 1. (1785); GMEL., Syst. Nat., V. 2904. 1. (1788);
VILL., Entom. linn., III. 610. 1. (1789); ROSSI, Fauna Etrusc., II.
337. 1591. (1790); OLIV., Encycl. méth. Ins., VII. 91. 1. (1791);
PANZ., Fauna Germ., VII. 23. (1793); FABR., Entom. syst., IV. 415.
1. (1794); DONOV., Brit. Ins., VIII. 21. t. CCLXI. f. 1. (1799);
SCHRANK, Fauna boica, III. 2583. (1803); SCHELL., Genr. Mouch.
t. XLII. f. 1. (1803); LATR., Dict. Hist. nat. de Détrev., XXIV.
197. 596. (1804); FABR., Syst. Antl., 337. 2. (1805); SHAW., Gen.
Zool. Ins., VI. 401. t. CXIV. (1806); ROSSI, Fauna Etrusc. Illiger.,
508. 1591. (1807); LATR., Gen. crust. ins., IV. 363. (1809); v. OLF.,
Dissert., 101. 1. (1816); OKEN, Lehrb. Naturg., III. 533. 1. t. XIV.
(1816); LEACH, Eprob. Ins. Edinb., 9. 3. t. II. f. 4—7. (1817) et
Mem. Werner. Soc. Edinb., II. 555. 3. t. XXVI. f. 4—7. (1818);
FALL., Haematomyz., 14. 1. (1818); NITZSCH, Germ. Magaz. entom.,
III. 309. [Nirmomyia] (1818); SAM., Compend., 302. t. IX. f. 11.
(1819); MEIG., S. B., VI. 2 8. 1. t. LXIII. f. 15—20. (1830); CURT.,
Brit. Entom., IX. 421. (1832); ZETT., Ins. Lapp., 624. 1. (1838) et
Dipt. Scand., VII. 2896. 1. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus.,
IV. 1140. (1849) et Ins. Brit., II. 285. 1. t. XX. f. 1. (1853); SCHIN.,
F. A., II. 645. (1864); JAENN., Bericht Offenbach. Ver. f. Naturk.,
IX. 43. nota. (1868); ROND., Ann. Mus. civ. Genova, XII. 164. 2.
(1878) et Bull. Soc. entom. Ital., XI. 25. 2. (1879); FROGG., Agric.
Gazette N. S. Wales, 1900. t. I. f. 5 6. (false 3—4) (1900);
SPEISER, Term. Füzet., XXV. 330. (1902); AUSTEN, Ann. Magaz.
nat. Hist., (7.) XII. 256. (1903).***)

cunicosa MAD. apud THALH., Fauna regni Hung. Dipt., 69. (1899).

equi MACQ., Suif. à Buff., II. 638. 1. t. XXIV. f. 8. (1835);

BLANCH., Hist. nat. ins., III. 631. t. V. f. 12. (1840).

*) *Camelus dromedarius* L.

**) *Equus caballus* L., *Bos taurus* L., *Lepus cuniculus* L., et alia
mammalia, homine ipso non excluso.

***) *H. bipartita* MACQ. et *orientalis* MACQ. forsan inter syno-
nyma hujus speciei accipienda.

taurina ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 25. 3. (1879).

Francilloni LEACH = *capensis* v. OLF.

maculata LEACH,¹⁾ Eprob. Ins. Edinb., 8. 1. t. II. f. 11—13. (1817) et India.

Mem. Werner. Soc. Edinb., II. 553. 1. t. XXVI. f. 11—13. (1818);

SPEISER, Ann. Mus. civ. Genova, (2.) XX. 560. 4. (1900) et Zeitschr.

f. Hymenopt. u. Dipt., II. 162. (1902); AUSTEN, Ann. Mag. nat.

Hist., (7.) XII. 259. (1903).²⁾

calopsis BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., (6.) V. 236. (1885).

variegata WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 603. 2. (1830).

var. aegyptiaca MACQ., Dipt. exot., III. 431. 1. t. XXXVI. f. Europa mer.,

5. [*egyptiaca*] (1843); ROND., Ann. Mus. civ. Genova, XII. 164. Africa sept.

3. (1878) et Bull. Soc. entom. Ital., XI. 25. f. 2. (1879);

SPEISER, Ann. Mus. civ. Genova, (2.) XX. 560. (1900) et

Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 162. 1. (1902).

sudanica BIGOT, Bull. Soc. entom. Fr., (6.) IV. 59. (1884).

sudanica BIGOT = *maculata* LEACH, *var. aegyptiaca* MACQ.

taurina ROND. = *equina* L.

variegata WIED. = *maculata* LEACH.

[*uralensis* GMEL., Syst. Nat., I. 5. 2904. (1789) ; OLIV., Encycl. méthod. Russia.

Ins., VII. 92. (1792); DONOVAN, Nat. Hist. Brit. Ins., VIII. 22.

(1799); v. OLFERS, Dissert., 103. [*Ornithomyia*] (1816); LEACH, Mem.

Werner. Soc. Edinb., II. 555. (*sine descr.*) (1818); SCHIN., F. A., II.

645. (*sine descr.*) (1864); SPEISER, Berlin. entom. Zeitschr., XLVIII.

71. 5. (1903).³⁾

atra LEPECHIN- (HASE), Tageb. Reise durch verschied. Prov. d.

Russ. Reiches, I. 311. t. XIX. f. 9. (1774).]

Pseudolfersia

COQUILL., Canad. Entom., XXXI. 333. (1899); SPEISER, Zeitschr. f.

Hymenopt. u. Dipt., II. 145. (1902).

Courtillieri FAIRM. = *spinifera* LEACH.

fumipennis SAHLB.,⁴⁾ Medd. Soc. Fauna Flor. Fenn., XIII. 149. fig. Europa sept.

[*Lynchia*] (1886); MIK, Wien. entom. Zeitg., V. 239. [*Olfersia*]

(1886); SPEISER, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 165. (1902).

nigra OSBEK = *spinifera* LEACH.

spinifera LEACH,⁵⁾ Eprob. Ins. Edinb., 14. 1. t. II. f. 1—3. [*Feronia*] Gallia.

¹⁾ *Camelus bactrianus* L. et *dromedarius* L.

²⁾ *H. maculata* MACQ. longe diversa species, *H. rufipedi* v. OLF. aequalis, Africa mer. incola. — *H. maculata* LEACH typica tantum in India habitare videtur.

³⁾ Haec species e familia Hippoboscidarum eliminanda est, vide Speiser Berlin. entom. Zeitschr., XLVIII. 71. (1903).

⁴⁾ *Pandion haliaetus* L.

⁵⁾ *Atagen aquila* L.; *Anous stolidus* L.; *Catharistes urubu* L.; *Sula fiber* L. et *Sula sula* L.

(1817) et Mem. Werner. Soc. Edinb., II. 557. 1. t. XXVI. f. 1—3. (1818); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 607. 2. [*Olfersia*] (1830); SCHIN., Novara Reise. Dipt., 373. 2. [*Olfersia*] (1868); BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., (6.) V. 229. [*Olfersia*] (1885); SPEISER, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 146. 1 et 179. 7. (1902); AUSTEN, Ann. Mag. nat. Hist., (7.) XII. 265. (1903).

Courtillieri FAIRM. apud COURT., Ann. Soc. Linn. Maine et Loire, I. 193. t. XV. [*Olfersia*] (1853); ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 23. (1879).

nigra OSBEK, Dagbok Ostind. Resa. 298. [*Hippobosca*] (*nomen nudum*) (1757).

unicolor WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1144. [*Ornithomyia*] (1849).

unicolor WALK. = *spinifera* LEACH.

Olfersia

WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 605. (1830).

Feronia LEACH (*nec* LATR.), Eprob. Ins. Edinb., 4. 2 et 11. II. (1817).

ardeae MACQ.,*) Suit. à Buff., II. 640. 1. t. XXIV. f. 10. (1835); MEIG., Europa centr. S. B., VII. 415. 1. (1838); SCHIN., F. A., II. 65. (1864); ROND., et mer. Bull. Soc. entom. Ital., XI. 22. 2. (1879); FIORI, Bull. Soc. entom. Ital., XII. 13. (1880).

? *metallica* SCHUMM., Arb. u. Veränd. Schles. Ges. 71. [*Hippobosca*] (1832).

botauri ROND.,**) Bull. Soc. entom. Ital., XI. 22. 1. (1879). Italia.

canariensis MACQ., Hist. nat. des îles Canar. Entom., 119. 106. (1839) Ins. Canariae. et Dipt. exot., III. 434. 1. (1843).

metallica SCHUMM. = ? **ardeae** MACQ.

minor BIGOT, Thoms. Arch. entom., II. 376. t. X. f. 10. (1858); SPEISER, Europa centr. Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 156. (1902) et IV. 180. (1904). et mer., Africa.

Lynchia

WEYENB., Ann. Socied. cientif. Argentina, XI. 195. (1881); SPEISER, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 154. 5. (1902).

exornata SPEISER, Ann. Mus. civ. Genova, (2.) XX. 562. [*Olfersia*] Rossia asiat. (1900) et (3.) I. 338. 13. (1904).

falcinelli DE STEF. = **maura** BIGOT.

falcinelli ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 23. 4. [*Olfersia*] (1879); Europa mer. SPEISER, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 155. (1902) et Ann. Mus. civ. Genova, (3.) I. 335. 11. (1904).

garzettæ ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 23. 3. [*Olfersia*] (1879); Europa mer. SPEISER, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 155. (1902).

maura BIGOT,***) Ann. Soc. entom. Fr., (6.) V. 237. 1. [*Olfersia*] (1885); Italia mer. Africa sept.

*) *Botaurus stellaris* L., *Ardea cinerea* L. et *purpurea* L.

**) *Ardea purpurea* L.

***) *Columba livia* L. (domestica).

SPEISER, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 162. 4. (1902) et Centralbl. Bakter., XXXIII. 609. (1903).

fulcinelli DE STEF. (*non* ROND.), Bullet. del Naturalista, Siena, XX. 7. [*Olfersia*] (1900).

Ornithomyia

LATH., Hist. nat. crust. ins., IV. (1802) et XIV. 402. [*Ornithomyia*] (803); SPEISER, Term. Füzet., XXV. 330. (1902).

Ornithomyza ZETT., Ins. Lapp., 624. 68. (1838).

avicularia L.,*) Fauna Suec., 1922. [*Hippobosca*] (1761) et Syst. Nat., Europa.

XII. 1010. 2. [*Hippobosca*] (1767); FABR., Spec. Ins., II. 275. 2.

[*Hippobosca*] (1781); DEG., Ins. ed. Goeze, VI. 114. 2. t. XVI. f.

21—27. [*Hippobosca*] (1782); MODEER, Goeteborg. Vetensk. Handl.,

III. 35. [*Hippobosca*] (1785); GMEL., Syst. Nat., V. 2904. 2. [*Hip-*

pobosca] (1788); VILL., Entom. linn., III. 610. 2. [*Hippobosca*]

(1789); ROSSI, Fauna Etr., II. 338. 1593. [*Hippobosca*] (1790); FABR.,

Entom. syst., IV. 415. 2. [*Hippobosca*] (1794); SCHRANK, Fauna

boica, III. 175. 2584. [*Hippobosca*] (1803); SCHELL., Genre Mouch.,

t. XIII. f. 3. [*Hippobosca*] (1803); FABR., Syst. Antl., 338. 3. [*Hip-*

pobosca] (1805); ROSSI, Fauna Etrusc. ed. Illiger, 508. 1593.

[*Hippobosca*] (1807); OKEN, Lehrb. Naturg., III. 533. 1. t. XIV.

(1816); LEACH, Eprob. Ins. Edinb., 15. 5. t. I. f. 4—5. (1817) et

Mem. Werner. Soc. Edinb., II. 561. 5. t. XXV. f. 4—5. (1818);

FALL., Haematomyz., 15. 2. [*Hippobosca*] (1818); MEIG., S. B., VI.

232. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 641. 1. t. XXIV. f. 11.

(1835); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 631. (1840); ZETT., Ins. Lapp.,

625. 1. [*Ornithomyza*] (1838) et Dipt. Scand., VII. 2904. 1. (1848);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1142. (1849) et Ins. Brit. Dipt.,

II. 287. 1. t. XX. f. 3. (1851); LW., Wien. entom. Monatschr., I.

10. (1857); SCHIN., F. A., II. 647. (1864); ROND., Bull. Soc. entom.

Ital., XI. 19. 3. (1879); v. RÖD., Entom. Nachr., XVI. 313. (1890);

SACK, III. Zeitschr. f. Entom., IV. 153. (1899); AUSTEN, Ann. Mag.

nat. Hist., (7.) XII. 260. (1903).

corvi Scop., Entom. carn., 377. 1024. [*Hippobosca*] (1763); VILL.,

Entom. Linn., III. 612. 5. [*Hippobosca*] (1789); OLIV., Encycl.

méthod. Ins., VII. 92. 4. [*Hippobosca*] (1791).

nigricornis ERICHs., Archiv. Naturg., VIII. 287. (1842); SPEISER,

Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., IV. 87. (1904).

nigrirostris v. Ros., Württemb. Corrbll, I. 64. (1840).

*) *Buteo vulgaris* LEACH, *Athene noctua* Scop., *Strix flammea* L., *Picus major* L., *Loxia curvirostra* L., *Alauda arvensis* L., *Passer domesticus* L., *Garrulus glandarius* L., *Pica rustica* Scop., *Corvus corax* L., *Pavo cristatus* L., *Perdix cinerea* LATH., *Ardea cinerea* L., etc.

- oculata* MOTSCH., Bull. Soc. nat. Moscou, XXXII. 2. 504. [*Hippobosca*] (1859).
- opposita* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1145. (1849).
- remota* WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1144. (1849).
- viridula* MEIG., S. B., VI. 232. 3. (1830); Rossi, Syst. Verzeichn., 85. (1848).
- var. *viridis* LATR., Hist. nat. crust. ins., XIV. 402. [*Ornithymia*] Europa. (1804) et Gen. crust. ins., IV. 362. (1809) et Encycl. méthod. Ins., VIII. 544. 2. [*Ornithymia*] (1811); LEACH, Eprob. Ins. Edinb., 14. 4. t. I. f. 1—2. (1817) et Mem. Werner. Soc. Edinb., II. 560. 4. t. XXV. f. 1—3. (1818); MEIG., S. B., VI. 232. 2. t. LXIV. f. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 642. 2. (1835); LASAULCE, Mém. Acad. de Metz, 20. (1844).
- biloba* DUF. = **fringillina** CURT.
- chloropus** BERGR.)* Medd. Fauna Flora Fenn., XXVII. 146. (1901). Europa sept.
- corvi* SCOP. = **avicularia** L.
- fringillina** CURT.,**) Brit. Entom., 585. (1824); ROND., Bull. Soc. entom. Italia, XI. 20. 4. (1879); v. RÖD., Entom. Nachr., XVI. 313. (1890); et mer. SPEISER, Zeitschr. f. Hymenopt. et Dipt., IV. 83 et 87. (1904).
- biloba* DUF., Ann. sc. nat., X. 243. t. XI. f. 1. (1827).
- ptenoletis* LW., Wien. entom. Monatssehr., I. 9. (1857); SCHIN., F. A., II. 647. (1864); ? ADOLPH, N. Acta Soc. Leop. car., XLVII. t. XXVII. f. 3. (1885).
- tenella* SCHIN., F. A., II. 646. (1864).
- nigricornis* ERICHs. = **avicularia** L.
- nigrirostris* v. Ros. = **avicularia** L.
- oculata* MOTSCH. = **avicularia** L.
- opposita* WALK. = **avicularia** L.
- ptenoletis* LW. = **fringillina** CURT.
- remota* WALK. = **avicularia** L.
- tenella* SCHIN. = **fringillina** CURT.
- viridis* LATR. = **avicularia** L. var.
- viridula* MEIG. = **avicularia** L. var.

Ornitheza

SPEISER, Term. Füzet., XXV. 329. (1902).

- Gestroi** ROND.,***) Ann. Mus. civ. Genova, XII. 156. 2. [*Ornithomyia*] Europa mer., (1878) et Bull. Soc. entom. Ital., XI. 18. 1. [*Ornithomyia*] (1879); Africa sept. SPEISER, Term. Füzet., XXV. 335. (1902).
- ? *strigis* SCOP., Ann. Hist. nat., V. 124. [*Hippobosca*] (1772); BERGR., Medd. Fauna Flora Fenn., XXVII. 149. [*Olfersia*] (1901).

*) *Asio accipitrinus* PALL.

**) *Hirundo rustica* L., *Regulus cristatus* VIELL.

***) *Hypotiorchis Eleonorae* GENÉ; *Bubo ignavus* FÖRST.

- metallica** SCHIN.,¹⁾ F. A., II. 646. [*Ornithomyia*] (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 19. 2. (1879); v. RÖD., Entom. Nachr., XVI. 313. (1890). Europa centr. et mer.
- odontoscelis** SPEISER,²⁾ Ann. Mus. nat. hung., II. 392. (1904). Europa mer.
- pallipes** SPEISER,³⁾ Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., IV. 177. 1. (1904). Europa centr. et mer.
- strigis** SCOP. = ? **Gestroi** ROND.

Ornithoeca

- ROND., Ann. Mus. civ. Genova, XII. 159. [*Ornithoeica*] (1878); v. RÖD., Entom. Nachr., XVI. 311. [*Ornithoeica*] (1890); MIK, Wien. entom. Zeitg., X. 250. (1891).

- turdi** LATR.,⁴⁾ Encycl. méthod. Ins., VIII. 544. [*Ornithomyia*] (1811); v. RÖD., Entom. Nachr., XVI. 311. [*Ornithoeica*] (1890) et Jahresber. Hamb. wissenschaft. Anst., X. 2. 4. (1893); SPEISER, Ann. Mus. civ. Genova, (2.) XX. 559. (1900). Europa mer.

Ornithophila

- ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 20. 5. (1879).⁵⁾

- vagans** ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 21. 1. (1879). Italia.

Stenopteryx

- LEACH, Eproboscoid. Ins. Edinb., 5. 4 et 16. IV. [*Stenepteryx*] (1817).

Cr. terina CURTIS, Brit. Entom., III. 122. (1816).

Chelidomyia BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., (6.) V. 234. (1885);

eypseli ROND. = *hirundinis* L. var.

- hirundinis** L.,⁶⁾ Fauna Suec., 1923. [*Hippobosca*] (1761); RÉAUM., Mém. Ins., VI. t. XI. f. 1—5. [—] (1742); GEOFFR., Ins., II. 547. 2. [*Hippobosca*] (1762); SCOP., Entom. carn., 376. 1023. [*Hippobosca*] (1763); SCHAEFF., Elem. entom., t. LXX. f. 1. [*Hippobosca*] (1766) et Icon. ins., I. t. LIII. f. 1—2. [—] (1766); L., Syst. Nat., XII. 1010. 2. [*Hippobosca*] (1767); FABR., Spec. ins., II. 475. 3. Europa.

¹⁾ *Garrulus glandarius* L.

²⁾ *Saxicola aurita* TEMM.

³⁾ *Athene noctua* L., *Strix flammea* L., *Scops giu* L., *Fregilus graculus* L.

⁴⁾ *Monticola cyaneus* L.

⁵⁾ Genus hocce, pro specimine unico vagante conditum, valde dubiosum manet.

⁶⁾ *Apus apus* L., *Hirundo rustica* L., *Chelidon urbica* L.

[*Hippobosca*] (1781); FOURCR., Entom. paris., II. 504. 2. [*Hippobosca*] (1785); GMEL., Syst. Nat., V. 2905. 3. [*Hippobosca*] (1788); VILL., Entom. linn., III. 611. 3. [*Hippobosca*] (1789); FABR., Entom. syst., IV. 415. 3. [*Hippobosca*] (1794); DONOV., Brit. Ins., VIII. 45. t. CCLXVIII. f. 1. [*Hippobosca*] (1799); WALCK., Faune paris., II. 416. [*Hippobosca*] (1802); SCHRANK, Fauna boica, III. 2585. [*Hippobosca*] (1803); FABR., Syst. Antl., 339. 5. [*Hippobosca*] LATR., Gen. crust. ins., IV. 362. [*Ornithymia*] (1805); ROSSI, Fauna Etrusc. ed. Illig., 508. 1592. [*Hippobosca*] (1807); LATR., Encycl. méthod. Ins., VIII. 544. 3. [*Ornithomyia*] (1811); CURT., Brit. Entom., III. 122. [*Craterina*] (1816); LEACH, Eprob. Ins. Edinb., 16. 1. t. I. f. 9—11. (1817) et Mem. Werner. Soc. Edinb., II. 562. 1. t. XXV. f. 9—11. [*Stenopteryx*] (1818); FALL., Haematomyz., 15. 3. [*Hippobosca*] (1818); NITZSCH, Germ. Magaz. entom., III. 309. [*Ornithomyia*] (1818); WOOD., Ill. Linn. gen. ins., II. 109. t. 72. [*Hippobosca*] (1821); MEIG., S. B., VI. 234. 1. t. LXIV. f. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 644. 1. t. XXIV. f. 13. (1835); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 631. (1840); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2908. 1. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1147. [*Craterina*] (1849) et Ins. Brit. Dipt., II. 289. 1. t. XX. f. 5. a. (1853); SCHIN., F. A., II. 648. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 16. 1. [*Chelidomyia*] (1879); SPEISER, Ann. Mus. civ. Genova, (2.) XX. 555. (1900).

hirundinum ROSSI, Fauna Etrusc., II. 337. 1592. [*Hippobosca*] (1799).

stenoptera v. OLF., Dissert., 103. [*Ornithomyia*] (1815).

var. *cypseli* ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 16. 2. [*Cheli-* Europa mer.
domyia] (1879).

hirundinum ROSSI = *hirundinis* L.

stenoptera v. OLF. = *hirundinis* L.

Crataerrhina

v. OLF., De veget. et animat. corp. etc. Dissert. Goettingae, 102. [*Crataerrhina*] (1805); SPEISER, Ann. Mus. civ. Genova, (2.) XX. 554. 2. [*Crataerrhina*] (1900).

Anapera MEIG., S. B., VI. 234. (1830).

Chelidomyia ROND., p. p., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 10. III. (1879).

Oxypterum LEACH, Eprob. Ins. Edinb., 5. 5 et 17. V. (1817).

hirundinis PANZ. = *pallida* LATR.

Kirbyana LEACH = *pallida* LATR.

lonchoptera v. OLF. = *pallida* LATR.

melbae ROND.,*) Bull. Soc. entom. Ital., XI. 17. 4. [*Chelidomyia*] (1879). Europa mer.

*) *Apus melba* L.

- pallida** LATR.**) Encycl. méthod. Ins., VIII. 544. 5. [*Ornithymia*] Europa.
 (1811); SCHAEFF., Element. entom., t. VII. [*Hippobosca*] (1766) et
 Icon. ins. Ratisb., t. LIII. f. 1—2. [*Hippobosca*] (1766); LEACH,
 Eprob. ins. Edinb., 17. 1. t. I. f. 12—14. [*Oxypterum*] (1817) et
 Mem. Werner. Soc. Edinb., II. 563. 1. t. XXV. f. 12—14. [*Oxypterum*]
 (1818); MEIG., S. B., VI. 235. 1. t. LXIV. f. 10. [*Anapera*]
 (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 643. 1. t. XXIV. f. 12. [*Anapera*]
 (1835); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 631. [*Anapera*] (1840); ZETT.,
 Dipt. Scand., VII. 2911. 1. [*Anapera*] (1848); WALK., List Dipt.
 Brit. Mus., IV. 1146. [*Oxypterum*] (1849) et Ins. Brit. Dipt., t.
 XX. f. 5. [*Stenopteryx*] (1853); SCHIN., F. A., II. 648. [*Oxypterum*]
 (1864); LUG., Bull. Soc. entom. Ital. Fr., (5.) I. t. XXIII. [*Anapera*]
 (1871); ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 16. 3. [*Chelidomyia*]
 (1879); SPEISER, Ann. Mus. nat. hung., II. 389. 14. [*Crataerhina*]
 (1904).
hirundinis PANZ. (nec L.), Fauna germ., VII. 24. [*Hippobosca*]
 (1793).
lonchoptera v. OLF., Dissert., 102. [*Crataerhina*] (1815); SPEISER,
 Illustr. Zeitschr. f. Entom., V. 278. nota 1. [*Crataerhina*]
 (1900) et Ann. Mus. civ. Genova, (2.) XX. 554. 2. [*Crataerhina*]
 (1900).
Tangerii GUER.-MÉN., Icon règne anim., III. 556. t. CIV. (1829).
 var. **Kirbyana** LEACH, Eprob. Ins. Edinb., 17. 2. t. I. f. 15—16. Europa sept.
 [*Oxypterum*] (1817) et Mem. Werner. Soc. Edinb., II. 563. 2. t.
 XXV. f. 15—16. [*Oxypterum*] (1818); MEIG., S. B., VI. 236. 2.
 [*Anapera*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 643. 2. [*Oxypterum*]
 (1835); SPEISER, Ann. Mus. civ. Genova, (2.) XX. 555. [*Crataerhina*]
 (1900).
sibiriana GIMM., Progr. Riga, 12. [*Anapera*] (1847) et Bull. Moscou, Sibiria.
 XX. 3. 208. 1. [*Anapera*] (1847).
sibirica SCHIN., Catal. Dipt. Europ., 114. [*Oxypterum*] (1864).
sibirica SCHIN. = **sibiriana** GIMM.
Tangerii GUER.-MÉN. = **pallida** LATR.**)

*) Apus apus L., Hirundo rustica L.

) Nota. Genus **Leptopteryx ZETT. (nec HORSE. 1820 Aves) Ins.
 Lapp., 625. 69. (1838), cum specie typica *L. nivalis* ZETT., Ins. Lapp.,
 625. 1. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2905. 1. (1848), observante clar.
 Bergtsson in Wien. entom. Zeitg., XXI. 150. (1902) nil aliud nisi
Aphis sp. *indeterm.* est, ideoque excludendum.

Lipoptena

NITZSCH, Germ. Magaz. entom., III. 310. (1818).

Alaphagus WALK. (1849).

Alcraphagus GIMM., Stettin. entom. Zeitg., VI. 151. (1845).

Alcophagus SCUDD. (1882).

Haemabora ZETT. (1855).

Haemobora CURT., Brit. Entom., I. 14. (1824).

Leptoptena WALK. (1849).

Leptotaena BLANCH. (1840).

Leptotaenia SCUDD. (1882).

Leptotena LATR. (1829).

Lipoptera SIEB. (1845)

Lipotena LATR. (1829).

Lipotepna LATR. (1829).

Ornithobia MEIG., S. B., VI. 229. (1830).

alcis SCHNABL = *cervi* L. var.

capreoli ROND. = *cervi* L. var.

cervi L.*) Fauna Suec., 476. 1944. [*Pediculus*] (1761); FRISCH., Besch. Europa. allerl. Ins., XII. 15. t. V. [—] (1736); L., Syst. Nat., XII. 1017. 7. [*Pediculus*] (1767); FABR., Spec. ins., II. 477. 5. [*Pediculus*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2916. 7. [*Pediculus*] (1788) et Entom. syst., IV. 418. 5. [*Pediculus*] (1794); PANZ., Fauna germ., LI. 15. [*Pediculus*] (1798); FABR., Syst. Antl., 341. 6. [*Pediculus*] (1805); MEIG., S. B., VI. 237. 2. [*Melophagus*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 645. 1. t. XXIV. f. 14. [*Leptotena*] (1835); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 631. [*Leptotaena*] (1840); SIEB., Stettin. entom. Zeitg., VI. 277. (1845) et XI. 407. [*Lipoptera*] (1850); SCHOLTZ, Breslau, entom. Zeitg., IV. 7. [*Melophagus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2913. 1. (184), XI. 4340. 1. (1852) et XIV. 6481. 1. [*Leptotena*] (1859); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1148. [*Leptoptena*] (1849); SCHAUM et LW., Stettin. entom. Zeitg., X. 294. [*Lipoptera*] (1849); SCHIN. et EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, III. 14. [*Lipoptera*] (1853); WALK., Ins. Brit. Dipt., III. 343. 1. (1856); SCHIN., F. A., II. 649. (1864); F. STEIN, Deutsch. entom. Zeitg., XXI. 297. (1877); BERTEK., Verh. Natur. Ver. preuss. Rheinl., XXXV. 178. (1878); ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 14. 1. (1879); AUSTEN, Ann. Magaz. Nat. Hist. (7.) XII. 260. (1902).

cervina NITZSCH, Germ. Mag. entom., III. 310. [*Leptotena*] (1818);

FALL., Dipt. Suec. Suppl., 2. ed. Dahlb., 11. 3—4 et nota.

[*Hippobosca*] (1826).

pallida MEIG., S. B., VI. 230. 1. t. LXIII. f. 21. [*Ornithobia*]

*) *Cervus elaphus* L., *C. capreolus* L., *C. dama* L., *C. alces* L.

(1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 639. 1. t. XXIV. f. 9. [*Ornithobia*] (1835); GIMM., Stettin. entom. Zeitg., VI. 152. [*Alcephagus*] (1845); ZETT., Dipt. Scand., XII. 2900. 1. (1848) et XII. 4827. 1. [*Ornithobia*] (1855); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1141. [*Ornithobia*] (1849) et Ins. Brit. Dipt., II. 286. 1. t. XXI. f. 2. [*Oonithobia*] (1853).

pallipes CURT., Brit. Entom., I. 14. [*Haemobora*] (1824); WAK., Ins. Brit. Dipt., II. 288. 1. t. XX. f. 4. [*Haemobora*] (1853).

var. *alcis* SCHNABL., Phys. Denkschr. Warschau, 34. (188'); Europa sept. Mik, Wien. entom. Zeitg., I. 46 et 64. 3. (1882); SCHNABL., Deutsch. entom. Zeit., XXVI. 13. (1882).

var. *capreoli* ROND., Ann. Mus. civ. Genova, XII. 152. 1. (1878) Europa mer. et Bull. Soc. entom. Ital., XI. 14. 2. (1879).

cervina NITZSCH = *cervi* L.

chalconelaena SPEISER,¹⁾ Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., IV. 178. Arabia. 2. (1904).

pallida MEIG. = *cervi* L.

pallipes CURT. = *cervi* L.

Melophagus

LATR., Hist. nat. crust. Ins., IV. (1802) et XIV. 402. (1804).

Melophaga WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 613. (1830).

Melophila NITZSCH, Germ. Magaz. entom., III. 311. (1818).

antilopes WIED.,²⁾ Aussereurop. zweifl. Ins., II. 614. 3. [*Melophaga*] Rossia mer. (1830).

moschi WIED.,³⁾ Aussereurop. zweifl. Ins., II. 613. 1. [*Melophaga*] Rossia asiat. (1830).

ovinus L.,⁴⁾ Fauna Suec., 472. 1924. [*Hippobosca*] (1761); FRISCH., Besch. allerl. Ins., V. 40. t. XVIII. [—] (1724); MÜLL., Fauna Fridr., 729. [*Hippobosca*] (1764); L., Syst. Nat., XII. 1011. 4. [*Hippobosca*] (1767); FABR., Spec. ins., II. 475. 4. [*Hippobosca*] (1781); SCHRANK, Ins. Austr., 1008. [*Hippobosca*] (1781); MODEER, Goeteb. Vetensk. Handl., III. 40. [*Hippobosca*] (1785); GMEL., Syst. Nat., V. 2905. 4. [*Hippobosca*] (1788); VILL., Entom. Linn., 611. 4. [*Hippobosca*] (1789); OLIV., Encycl. method. Ins., VII. 92. 5. [*Hippobosca*] (1791); FABR., Entom. syst., IV. 416. 4. [*Hippobosca*] (1794); PANZ., Fauna germ., LI. 14. [*Hippobosca*] (1798); DONOV., Brit. Ins., VIII. 46. t. CCLXVIII. f. 2. [*Hippobosca*] (1799); SCHRANK, Fauna boica, III. 175. 2586. [*Hippobosca*] (1803); LATR., Dict. Hist. nat. Détérv., XXIV. 197. 598. (1804) et Hist. nat.

¹⁾ *Capra aegagrus* GMEL. (*caucasica* GRAY).

²⁾ *Antilope gutturosa* PALL.

³⁾ *Moschus moschifer* L.

⁴⁾ *Ovis aries* L.

crust. Ins., XIV. 403. (1804); FABR., Syst. Antl., 339. 7. [*Hippobosca*] (1805); LATR., Gen. crust. Ins., IV. 363. (1809); LEACH, Eprob. Ins. Edinb., 18. 1. t. II. f. 14—15. (1817) et Mem. Werner. Soc. Edinb., II. 564. 1. t. XXVI. f. 14—15. (1818); FALL., Haematomyz., 15. 4. [*Hippobosca*] (1818); NITZSCH, Germ. Magaz. entom., III. 311. [*Melophila*] (1818); CURT., Brit. Entom., III. 142. (1824); MEIG., S. B., VI. 236. 1. t. LXIV. f. 16. (1830); MACQ., Snit. à Buff., II. 645. 1. t. XXIV. f. 15. (1835); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 632. (1840); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2916. 1. [*Melophaga*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1147. (1849) et Ins. Brit. Dipt., II. 290. 1. t. XX. f. 6. (1853); LEUCK., Abhandl. naturf. Ges. Halle, IV. 145. (1858); SCHIN., F. A., II. 650. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 12. 1. (1879); OST. SACK., Trans. entom. Soc. London, 360. (1881); PRATT, Beitr. z. Kenntn. d. Pupip. Berlin, 1. (1893); FROGG., Agricult. Gazette. N. S. Wales, t. I. f. 1—2. (1900).
rupicaprinus ROND.,¹⁾ Bull. Soc. entom. Ital., XI. 12. 2. (1879).²⁾ Alpes.

Streblidae.

Nycteribosca

SPEISER, Archiv. f. Naturg., 46. (1900).

- diversa** FRFLD.,³⁾ Sitzgsber. Wien. Akad., XXII. 478. [*Raymondia*] Aegyptus. (1856); KOL., Horae Soc. entom. Ross., II. 95. t. XV. f. 35. [*Brachytarsina*] (1862); SPEISER, Arch. f. Naturg., 48. 3. (1900).
Kollari FRFLD.,⁴⁾ Sitzgsber. Wien. Akad., XVIII. 329. t. I. [*Raymondia*] Europa mer., (1855); KOLEN., Parasit. d. Chiropt., 47. [*Strebla*] (1856) et Hor. Africa sept. Soc. entom. Ross., II. 94. t. XV. f. 34. [*Brachytarsina*] (1862); SPEISER, Arch. f. Naturg., 47. 2. f. 2. t. III. f. 5. t. IV. f. 4. (1900).

Brachytarsina

MACQ., Dipt. exot. Suppl., IV. 307. (1853).

- flavipennis** MACQ., Dipt. exot. Suppl., III. 308. 1. t. XXVIII. f. 13. Africa sept. (1853); FRFLD., Sitzgsber. Wien. Akad., XXII. 476. (1856); SPEISER, Arch. f. Naturg., 65. (1900).

¹⁾ *Rupicapra tragus* GRAY.

²⁾ *Nota*. Genera **Carnus** NITZSCH, Germ. Mag. entom., III. 305. (1818) et **Cenchridobia** SCHIN., Wien. entom. Monatschr., VI. 435. (1862) et F. A., II. 334, 516. (1864) [= **Carnus** EGGER (*nec* NITZSCH), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IV. 3. (1854)] in *Muscariis holometopis quaerenda*.

³⁾ *Cynonycteris aegyptiaca* GEOFFR.

⁴⁾ *Phyllorrhina tridens* GEOFFR., *Rhinopoma microphyllum* GEOFFR., *Rhinolophus euryale* BLAS., *Myotis murina* SCHREB.

Raymondia

FRFLD., Sitzgsber. Wien. Akad., XVIII. 328. (1855).

africana KOL. = **Huberi** FRFLD.

Huberi FRFLD.,¹⁾ Sitzgsber. Wien. Akad., XVIII. 331. t. II. (1855); Aegyptus.

KOL., Paras. d. Chiropt., 47. [*Strebla*] (1856) et Hor. Soc. entom.

ROSS., II. 91. t. XV. f. 32. p. p. [*Strebla*] (1862); SPEISER, Arch.

f. Naturg., 50. 1. f. 4. (1900).²⁾

africana KOL., Paras. d. Chiropt. Dresden, t. IV. [*Strebla*] (1857).

Nycteribiidae.

Penicillidia

KOL., Horae Soc. entom. Ross., II. 69. (1862).

Megistopoda KOL., Wien. entom. Monatschr., I. 62. (1857).

conspicua SPEISER,³⁾ Arch. f. Naturg., 36. 3. (1901).

Europa mer.,
Africa sept.

Westwoodi KOL., Paras. d. Chiropt., 34. [*Nycteribia*] (1856) et

Horae Soc. entom. Ross., II. 69. t. X—XI. f. 23. (1862);

SCHIN., F. A., II. 651. [*Nycteribia*] (1864); ROND., Bull. Soc.

entom. Ital., XI. 8. 4. [*Nycteribia*] (1879).

Dufouri WESTW.,⁴⁾ Trans. Zool. Soc. London, I. 290. t. XXXVI. f.

Europa,
Africa sept.

49—50. [*Nycteribia*] (1835); KOL., Horae Soc. entom. Ross., II.

72. t. XI—XII. f. 24. [*Nycteribia*] (1862); SCHIN., F. A., II. 654.

[*Nycteribia*] (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 9. [*Nycte-*

ribia] (1879); SPEISER, Arch. f. Naturg., 32. 1. (1901).

Frauenfeldi KOL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 189. t. I. f.

B. [*Nycteribia*] (1856) et Paras. d. Chiropt., 35. [*Nycteribia*]

(1856); PLATEAU, Bull. Acad. roy. Belg., (2.) XXXVI. 332.

t. [*Nycteribia*] (1873).

Leachi KOL., Wien. entom. Monatschr., I. 62. [*Megistopoda*]

(1857) et Hor. Soc. entom. Ross., II. 75. t. XII—XIII. f. 25.

[*Megistopoda*] (1862); SCHIN., F. A., II. 653. [*Nycteribia*]

(1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 8. 3. [*Nycteribia*]

(1879); FIORI, I. c., XII. 12. [*Nycteribia*] (1880).

¹⁾ Phyllorrhina tridens GEOFFR., Megaderma cor PETERS.

²⁾ Fortasse etiam *Trichobius molossus* Gigli. Quart. Journ. Microscop. Sci., IV. 24. (1864). Nyctinomi Cestonii Savi parasiticus, faunae palaearecticae incolis adnumerandus.

³⁾ Rhinolophus euryale BLAS., Rhinolophus Blasii PETERS, Myotis murina SCHREB., Miniopterus Schreibersii NATT.

⁴⁾ Rhinolophus Blasii PETERS, Rh. hipposideros BECHST., Rh. ferrug-equinum SCHREB., Myotis capaccinii BONAP., M. murina SCHREB., Miniopterus Schreibersii NATT.

vespertilionis DUF., Ann. Sc. Nat., XXII. 331. t. XIII. f. 4.
[*Nycteribia*] (1831).

Westwoodi GUER.-MÉN., Icon. regn. anim., III. 556. t. CIV. f. 9.
[*Nycteribia*] (1829).

Frauenfeldi KOL. = **Dufouri** WESTW.

Leachi KOL. = **Dufouri** WESTW.

monoceros SPEISER,¹⁾ Illustr. Zeitschr. f. Entom., V. 278. (1900) et Europa centr.
Arch. f. Naturg., 35. 2. (1901).

Nattereri KOL.,²⁾ Wien. entom. Monatschr., I. 62. [*Listropodia*] (1857) Europa centr.
et Hor. Soc. entom. Ross., II. 57. t. VII—VIII. f. 19. [*Listropodia*] et mer.
(1862); SCHIN., F. A., II. 655. [*Nycteribia*] (1864); ROND., Bull.
Soc. entom. Ital., XI. 9. [*Nycteribia*] (1878); SPEISER, Arch. f.
Naturg., 40. 9. (1901).

vespertilionis DUF. = **Dufouri** WESTW.

Westwoodi GUER.-MÉN. = **Dufouri** WESTW.

Westwoodi KOL. = **conspicua** SPEISER.

Nycteribia

LIATR., Précis. caract. gén., 176. (1795); Hist. nat. crust. Ins., IV.
(1802) et XIV. 403. (1804).

Celeripes MONTAG., Trans. linn. Soc., IX. 166. (1808).

Nycterobia SCUDD. (1822). *Nycterybia* NOW. (1873).

Phthiridium HERM., Mém. aptérolog., 120. (1804).

A. Acrocholidia

KOL., Wien. entom. Monatschr., I. 62. (1857).

Bechsteini KOL.,³⁾ Wien. entom. Monatschr., I. 62. (1857) et Hor. Europa centr.
Soc. entom. Ross., II. 63. t. IX. f. 21. (1862); SCHIN., F. A., II.
654. (1864); SPEISER, Arch. f. Naturg., 68. (1901).

Blainvillei LEACH,⁴⁾ Zoolog. Miscell., III. 55. [*Phthiridium*] (1817); Aegyptus.
WESTW., Trans. Zool. Soc. London, I. 289, t. XXXVI. f. 42. (1835);
KOL., Paras. d. Chiropt., 45. (1856) et Hor. Soc. entom. Ross., II.
87. t. XIV. f. 29. (1862); SPEISER, Arch. f. Naturg., 44. 5. (1901).

Montaguei KOL. = **vexata** WESTW.

pedicularia NITZSCH = **vexata** WESTW.

vespertilius AUCT. = ? **vexata** WESTW.

¹⁾ *Myotis* sp. indetermin.

²⁾ *Myotis* Daubentoni LEISL., M. *Nattereri* KÜHL, M. *Bechsteini* LEISL., M. *murina* SCHREB.

³⁾ *Myotis* *Bechsteini* LEISL.

⁴⁾ *Rhinolophus ferrum equinum* SCHREB., *Taphozous perforatus* GEOFFR.

vexata WESTW.,*) Trans. Zool. Soc. London, I. 275 et 291. 8. (1834); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2918. (1848); SCHIN., F. A., II. 652. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 9. (1879); OST-SACK., Trans. entom. Soc. London, 359. (1881); SPEISER, Arch. f. Naturg., 67. (1901).

Montaguæi KOL., Paras. d. Chiropt., 38. (1856) et Hor. Soc. entom. Ross., II. 61. t. VIII—IX. f. 20. (1862).

pedicularia NITZSCH, Germ. Mag. entom., III. 312. (1818).

? *vespertilionis* L., Fauna Suec., 1941. [*Acarus*] (1761); FRISCH., Besch. allerl. Ins., VII. t. VII. [—] (1728); SCOP., Entom. carn., 387. 1058. [*Acarus*] (1763); L., Syst. Nat., XII. 1023. 9. [*Acarus*] (1768); FABR., Syst. entom., 812. [*Acarus*] (1775), Spec. ins., II. 487. 15. [*Acarus*] (1781) et Mantissa, II. 373. [*Acarus*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2927. 9. [*Acarus*] (1788); VILL., Entom. Linn., IV. 47. 5. [*Acarus*] (1789); FABR., Entom. syst., IV. 429. 22. [*Acarus*] (1794); SCHRANK, Fauna boica, III. 175. 2587. [*Hippobosca*] (1803); HERM., Mém. aptérolog., 120. t. V. f. 1. [*Phthiridium*] (1804); FABR., Syst. Antl., 350. 1. (1805); LATR., Gen. crust. Ins., IV. 364. t. XV. f. 11. (1809); FALL., Haematomyz., 16. (1818); MEIG., S. B., VI. 238. 1. t. LXIV. f. 19. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 647. 1. t. XXIV. f. 16. (1835); BLANCH., Hist. nat. Ins., III. 632. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1149. (1849); ZETT., Dipt. Scand., VIII. 2917. (1848) et XIV. 6482. (1859).

B. *Stylidia*

WESTW., Introd. modern. Classif., II. 154. (1840).

biarticulata HERM.,**) Mém. aptérolog., 121. t. VI. f. 1. [*Phthiridium*] (1804); v. OLF., Dissert. 80. [*Phthiridium*] (1815); WESTW., Trans. Zool. Soc. London, I. 292. t. XXXVI. f. 37—41. (1835); MACQ., Suit. à Buff., II. 647. 2. (1835); MEIG., S. B., VII. 415. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1148. (1849) et Ins. Brit. Dipt., II. 291. 1. (1853); ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 8. 2. (1879); FIORI, Bull. Soc. entom. Ital., XII. 12. (1880); SPEISER, Arch. f. Naturg., 69. (1901).

Hermannæi LEACH, Zool. Miscell., III. 55. t. CXLIV. (1817); WALK., Ins. Brit. Dipt., II. t. XX. f. 7. *a—d*. (1853); KOL., Paras. d. Chiropt., 38. (1856) et Hor. Soc. entom. Ross., II. 66. t. IX—X. f. 22. (1862); SCHIN., F. A., II. 653. (1864).

*) *Rhinolophus euryale* BLAS., *Rh. hipposideros* BECHST., *Rh. ferrum-equinum* SCHREB., *Myotis murina* SCHREB., *Miniopterus Schreibersii* NATT.

**) *Rhinolophus euryale* BLAS., *Rh. Blasii* PETERS, *Rh. hipposideros* BECHST., *Rh. ferrum-equinum* SCHREB., *Plecotus auritus* L., *Myotis murina* SCHREB., *Miniopterus Schreibersii* NATT., ? *Crossopus fodiens* L.

vespertilionis NITZSCH, Voigt's Mag., VI. 365. t. X. 4—5. [*Hippobosca*] (1803); MONTAG., Trans. Linn. Soc. London, XI. 11. t. III. f. 5—7. (1815).

Ercolanii ROND.,¹⁾ Bull. Soc. entom. Ital., XI. 7. 1. (1879); SPEISER, Italia. Arch. f. Naturg., 68. (1901).

Hermannii LEACH = **biarticulata** HERM.

vespertilionis NITZSCH = **biarticulata** HERM.

C. *Listropodia*

KOL., Wien. entom. Monatschr., I. 62. (1857).

Blasii KOL.,²⁾ Paras. d. Chiopt., 41. (1856) et Hor. Soc. entom. Ross., Europa. II. 49. t. V. f. 16. (1862); SCHIN., F. A., II. 656. (1864); SPEISER, Arch. f. Naturg., 69. (1901) et Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 161. (1902).

Latreillei LEACH = **pedicularia** LATR.

pedicularia LATR.,³⁾ Hist. nat. crust. Ins., XIV. 403. t. CXII. f. 14. Europa. (1805); v. OLF., Dissert., 79. [*Phthiridium*] (1815); WESTW., Trans. Africa Sc. Zool. Soc. London, I. 290. 7. (1835); SPEISER, Arch. f. Naturg., 69. (1901).

Latreillei LEACH, Zool. Miscell., III. 56. (1817); CURT., Brit. Entom., VIII. 277. (1829); WESTW., Trans. Zool. Soc. London, I. 291. t. XXXVI. f. 43—48. (1835); KOL., Paras. d. Chiropt., 40. t. IV. (1856) et Hor. Soc. entom. Ross., II. 55. t. VI—VII. f. 18. (1862); SCHIN., F. A., II. 655. (1864); ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 6. 2. (1879).

? *vespertilionis* LATR., Diet. d'Hist. nat. Déterv., XXIV. 197. 599. (1804).

vespertilionis WALK., Ins. Brit. Dipt., II. 291. 2. t. XX. f. 7. c—f. (1853).

Schmidli SCHIN.,⁴⁾ Verh. zool.-bot. Ges. Wien, III. 151. (1853); KOL., Europa. Hor. Soc. entom. Ross., II. 52. t. IV. f. 17. (1862); SCHIN., F. A., II. 656. (1864); SPEISER, Arch. f. Naturg., 69. (1901).

Schmidli ROND., Bull. Soc. entom. Ital., XI. 6. 1. (1879).

Schmidli ROND. = **Schmidli** SCHIN.

vespertilionis LATR. = ? **pedicularia** LATR.

vespertilionis WALK. = **pedicularia** LATR.

¹⁾ *Myotis murina* SCHREB.

²⁾ *Rhinolophus euryale* BLAS., *Vesperugo pipistrellus* SCHREB., *Myotis Cappaccinii* BONAP., *M. Daubentoni* LEISL., *M. Nathusii* BLAS., *Miniopterus Schreibersi* NATT.

³⁾ *Rhinolophus hipposideros* BECHST., *Vespertilio serotinus* SCHREB., *V. noctula* SCHREB., *Myotis dasycnema* BOJE, *M. Daubentoni* LEISL., *M. murina* SCHREB., *Miniopterus Schreibersi* NATT.

⁴⁾ *Vesperugo pipistrellus* SCHREB., *Myotis Daubentoni* LEISL., *M. murina* SCHREB., *Miniopterus Schreibersi* NATT.

Eucampsipoda

KOL., Wien. entom. Monatschr., I. 62. (1857).

Eucampsipodia KOL. (1862).

aegyptia MACQ.,*) Dipt. exot. Suppl., IV. 309. t. XXVIII. f. 16. [*Nycteribia*] (1850); SPEISER, Arch. f. Naturg., 57. 1. (1901).

aegyptiaca KOL., Hor. Soc. entom. Ross., II. 80. (1862).

Fitzingeri KOL., Paras. d. Chiropt., 43. [*Nycteribia*] (1856).

aegyptiaca KOL. = **aegyptia** MACQ.

Fitzingeri KOL. = **aegyptia** MACQ.

Hyrkli KOL.,**) Paras. d. Chiropt., 42. [*Nycteribia*] (1856) et Hor. Soc. Aegyptus. entom. Ross., II. 78. t. XIV. f. 26. (1862); SPEISER, Arch. f. Naturg., 58. 2. (1901).

Braulidae

Braula

NITZSCH, Germ. Magaz. entom., III. 315. (1818).

Entomibia A. COSTA, Atti Istit. incoragg. Napoli, VIII. 18. (1845).

Melittomyia BIGOT, Ann. Soc. entom. Fr., (6.) V. 235. (1885).

apum A. COSTA = **coeca** NITZSCH.

coeca NITZSCH,**) Germ. Magaz. entom., III. 315. (1818); RÉAUM., Europa.

Mém. Ins., V. 711. t. XXXVIII. f. 1—3. [—] (1740); LUC., Bull.

Soc. entom. Fr., (2.) VIII. 67. (1850); EGG., Verh. zool.-bot. Ges.

Wien, III. 401. (1853); SOHN., F. A., II. 650. (1864); ROND., Bull.

Soc. entom. Ital., XI. 4. (1879); MEINERT, Entom. Medd., II. 216.

t. IV. f. 7—9. (1890).

apum A. COSTA, Atti Istit. incoragg. Napoli, VIII. 18. t. I.

[*Entomibia*] (1845).

*) *Phyllorrhina tridens* GEOFFR.

**) *Cynonycteris aegyptiaca* GEOFFR.

***) *Apis mellifica* L.

DIPTERA PUPIPARA

secundum hospites distributa.

A. *Mammalia*.

Antilope gutturosa PALL.

Melophagus antilopes WIED.

Bos taurus L.

Hippobosca equina L.

Camelus bactrianus L.

Hippobosca camelina LEACH.

Hippobosca maculata LEACH, var.
aegyptiaca MACQ.

Camelus dromedarius L.

Hippobosca dromedariina SPEISER.

Hippobosca maculata LEACH, var.
aegyptiaca MACQ.

Canis familiaris L.

Hippobosca capensis v. OLF.

Capra aegagrus GMEL.

Lipoptena chalcomelaena SPEISER.

Cervus alces L.

Lipoptena cervi L. var. alcis SCHNABL.

Cervus capreolus L.

Lipoptena cervi L.

Cervus dama L.

Lipoptena cervi L.

Cervus elaphus L.

Lipoptena cervi L.

Crossopus fodiens L.

? Nycteribia biarticulata HERM.

Cynonycteris aegyptiaca GEOFFR.

Eucampsipoda Hyrtli KOL.

Nycteribosca diversa FRFLD.

Equus caballus L.

Hippobosca equina L.

Lepus cuniculus L.

Hippobosca equina L.

Megaderma cor PETERS.

Raymondia Huberi FRFLD.

Miniopterus Schreibersii NATT.

Nycteribia biarticulata HERM.

Nycteribia Blasii KOL.

Nycteribia pedicularia LATR.

Nycteribia Schmidli SCHIN.

Nycteribia vexata WESTW.

Penicillidia conspicua SPEISER.

Penicillidia Dufourii WESTW.

Moschus moschifer L.

Melophagus moschi WIED.

Myotis Bechsteinii LEISL.

Nycteribia Bechsteinii KOL.

Penicillidia Nattereri KOL.

Myotis Capaccinii BONAP.

Nycteribia Blasii KOL.

Penicillidia Dufourii WESTW.

Myotis dasycnema BOJE.

Nycteribia pedicularia LATR.

Myotis Daubentoni LEISL.

Nycteribia Blasii KOL.

Nycteribia pedicularia LATR.

Nycteribia Schmidli SCHIN.

Penicillidia Nattereri KOL.

Myotis murina SCHREB.

- Nycteribia biarticulata* HERM.
Nycteribia Ercolanii ROND.
Nycteribia pedicularia LATR.
Nycteribia Schmidli SCHN.
Nycteribia vexata WESTW.
Nycteribosca Kollari FRFLD.
Penicillidia conspicua SPEISER.
Penicillidia Dufourii WESTW.
Penicillidia Nattereri KOL.

Myotis Nathusii BLAS.

- Nycteribia Blasii* KOL.

Myotis Nattereri KUHL.

- Penicillidia Nattereri* KOL.

Ovis aries L.

- Melophagus ovinus* L.

Phyllorrhina tridens GEOFFR.

- Eucampsipoda aegyptia* MACQ.
Nycteribosca Kollari FRFLD.
Raymondia Huberi FRFLD.

Plecotus auritus L.

- Nycteribia biarticulata* HERM.

Rhinolophus Blasii PETERS.*)

- Nycteribia biarticulata* HKRM.
Penicillidia conspicua SPEISER.
Penicillidia Dufourii WESTW.

Rhinolophus Euryale BLAS.

- Nycteribia biarticulata* HERM.

Nycteribia Blasii KOL.*Nycteribia vexata* WESTW.*Nycteribosca Kollari* FRFLD.*Penicillidia conspicua* SPEISER.**Rhinolophus ferrum-equinum**

SCHREB.

Nycteribia biarticulata HERM.*Nycteribia Blainvillei* LEACH.*Nycteribia vexata* WESTW.*Penicillidia Dufourii* WESTW.**Rhinolophus hipposideros** BECHST.*Nycteribia biarticulata* HERM.*Nycteribia pedicularia* LATR.*Nycteribia vexata* WESTW.*Penicillidia Dufourii* WESTW.**Rhinopoma microphyllum** GEOFFR.*Nycteribosca Kollari* FRFLD.**Rupicapra tragus** GRAY.*Melophagus rupicaprinus* ROND.**Taphozous perforatus** GEOFFR.*Nycteribia Blainvillei* LEACH.**Vespertilio noctula** SCHREB.*Nycteribia pedicularia* LATR.**Vespertilio serotinus** SCHREB.*Nycteribia pedicularia* LATR.**Vesperugo pipistrellus** SCHREB.*Nycteribia Blasii* KOL.*Nycteribia Schmidli* SCHN.B. *Aves*.**Alauda arvensis** L.

- Ornithomyia avicularia* L.

Anous stolidus L.

- Pseudolfersia spinifera* LEACH.

Apus apus L.

- Crataerrhina pallida* LATR.
Stenopteryx hirundinis L.

Apus melba L.

- Crataerrhina melbae* ROND.

Ardea cinerea L.

- Olfersia ardeae* MACQ.

- Ornithomyia avicularia* L.

Ardea purpurea L.

- Olfersia ardeae* MACQ.

- Olfersia botauri* ROND.

Asio accipitrinus PALL.

- Ornithomyia chloropus* BERGR.

Atagon aquila L.

- Pseudolfersia spinifera* LEACH.

*) *Ascodipteron lophotes* Montic., Ric. Lab. anat. Roma, VI. 203. t. IX. (1898), ex Abyssinia, *Rhinolophi clivosi* Rüpp. parasiticus, verisimiliter in Aegypto quoque inveniendus.

- Athene noctua** Scop.
Ornithomyia avicularia L.
Botaurus stellaris L.
Olfersia ardeae Macq.
Bubo ignavus Först.
Ornithoeza Gestroi Rond.
Buteo vulgaris Leach.
Ornithomyia avicularia L.
Catharistes urubu L.
Pseudolfersia spinifera Leach.
Chelidon urbica L.
Stenopteryx hirundinis L.
Columba livia L.
Lynchia maura Bigot.
Corvus corax L.
Ornithomyia avicularia L.
Ephialtes grammicus L.
Pseudolfersia spinifera Leach.
Fregilus graculus L.
Ornithoeza pallipes Speiser.
Garrulus glandarius L.
Ornithoeza metallica Schin.
Ornithomyia avicularia L.
Hirundo rustica L.
Crataerrhina pallida Latr.
Ornithomyia fringillina Curt.
Stenopteryx hirundinis L.
Hypotriorchis Eleonora Gené.
Ornithoeza Gestroi Rond.
- Loxia curvirostra** L.
Ornithomyia avicularia L.
Monticola cyanus L.
Ornithoeza turdi Latr.
Pandion haliaëtus L.
Pseudolfersia fumipennis Sahlb.
Passer domesticus L.
Ornithomyia avicularia L.
Pavo cristatus L.
Ornithomyia avicularia L.
Perdix cinerea Lath.
Ornithomyia avicularia L.
Pica rustica Scop.
Ornithomyia avicularia L.
Picus major L.
Ornithomyia avicularia L.
Regulus cristatus Vieill.
Ornithomyia fringillina Curt.
Saxicola aurita Temm.
Ornithoeza odontoscelis Speiser.
Scops giu Scop.
Ornithoeza pallipes Speiser.
Strix flammea L.
Ornithoeza pallipes Speiser.
Ornithomyia avicularia L.
Sula fiber L.
Pseudolfersia spinifera Leach.
Sula Sula L.
Pseudolfersia spinifera Leach.

C. *Insecta*.

- Apis mellifica** L.
Braula coeca Nitzsch.

INDEX FAMILIARUM ET GENERUM.

- Acanthoenema* BECK. 15.
Acarthophthalmus CZERNY. 41.
Acerocnema BECK. 17.
Achantholena ROND. 14.
Acidia ROB.-DESV. 111.
Acinia ROB.-DESV. 129.
Aciura ROB.-DESV. 109.
Acletoxenus FRIED. 217.
Aerocholidia KOLEN. subg. 286.
Aerometopia SCHIN. 237.
Actinoptera ROND. 141.
Actocetor BECK. 187.
Actora MEIG. 38.
Adapsilia WAGA. 92.
Agromyza FALL. 241.
Agromyzinae 240.
Alaphagus WALK. 282.
Alcephagus GIMM. 282.
Alcophagus SCUDD. 282.
Allophyla LW. 45.
Allotriehoma BECK. 189.
Alticomerus ROND. 240.
Amaurosoma BECK. 6.
Amina ROB.-DESV. 8.
Amiota LW. 218.
Amphipogon WAHLB. 155.
Ampycophora WAHLB. 216.
Amydrosoma BECK. 155.
Anacampta LW. 100.
Anacamptoneurum BECK. 185.
Anagnota BECK. 232.
Anapera MEIG. 280.
Anatriehus LW. 185.
Anisophysa MACQ. 150.
Anomoea WALK. 110.
Anthomyza FALL. 230.
Anthophilina ZETT. 216, 226.
Anthracophaga LW. 166.
Antichaeta HALID. 61.
Aphaniosoma BECK. 251.
Apotomella L. DUF. 216.
Apterina MACQ. 28.
Aptilotus MIK. 27.
Argyrites LATR. 237.
Arina ROB.-DESV. 54.
Asmeringa BECK. 205.
Assuania BECK. 176.
Asteia MEIG. 219.
Athyroglossa LW. 191.
Atissa HALID. 191.
Aulacigaster MACQ. 216.
Axysta HALID. 201.
Bachis ROB.-DESV. 30.
Balioptera LW. 229.
Bischofia HENDEL. 57.
Blainvillia ROB.-DESV. 95.
Blepharoptera MACQ. 47.
Borboridae 23.
Borboropsis CZERNY. 52.
Borborus MEIG. 23.
Bostrichopyga BECK. 16.
Brachyceraea v. RÖD. 265.
Brachydeutera LW. 207.
Brachyglossum ROND. 264.
Brachytarsina MACQ. 284.
Braula NITZSCH. 289.
Braulidae 289.
Cacoxenus LW. 241.
Caenia ROB.-DESV. 214.
Calobata MEIG. 155.
Calobatella MIK. 157.
Camarota MEIG. 174.
Camilla HALID. 224.
Campicheta MACQ. 227.
Campiglossa ROND. 132, 135.
Canace HALID. 215.
Capnoptera LW. 165.
Carmocaris LW. 94.
Carnus EGG. 36.
Carpotricha LW. 129.
Carpomyia ROND. 115.
Celeripes MONTAG. 286.
Cenchrudobia SCHIN. 36.
Centor LW. 165.
Centrophlebomyia HEND. 21.
Cephalia MEIG. 101.
Cephalina LW. subdiv. 101.
Cerajocera ROND. 117.
Ceratinostoma MEADE. 12.
Ceratitis MAC LEAY. 144.
Ceratomyza SCHIN. 250.
Ceriocera ROND. 117.
Ceroptera MACQ. 27.
Ceroxys MACQ. 99.*)
Chamaemyia PANZ. 234.
Chelidomyia ROND. 280.
Chelidomyia BIGOT. 279.
Cheligaster MACQ. 148.
Chetocera ROB.-DESV. 54.
Chetostoma ROND. 114.
Chione ROB.-DESV. 68.
Chiromyia ROB.-DESV. 232.
Chloria SCHIN. 107.
Chloropidae 165.

*) vide Addenda et Corrigenda.

- Chloropinae 165.
 Chloropisca Lw. 173.
 Chlorops MEIG. 169.
Chromatomyia HARDY. 252.
Chrysomyza FALL. 107.
Chyliza FALL. 162.
Chymomyza CZERNY. 222.
Chyromyia ROB.-DESV. 232.
Clanoneurum BECK. 190.
Clasiopa STENH. 194.
Cleigastra MACQ. 19.
Clidogastra MACQ. 19.
Clidogastrinae 19.
Clusia HALID. 40.
Cnemacantha MACQ. 74.
Cnemopogon ROND. 4.
Cnestrum BECK. 189.
Cochliarium BECK. 20.
Coelopa MEIG. 22.
Colobaca ZETT. 57.
Coniceps Lw. 107.
Coniosternum BECK. 12.
Conopaeus ROND. 260.
Conopidae 260.
Conopilla ROND. 265.
Conopinae 260.
Conops L. 260.
Coprina ROB.-DESV. 28.
Coproica ROND. 30.
Copromyza FALL. 22, 23.
Cordylura FALL. 1.
Cordylurinae 1.
Coremacera ROND. 71.
Cormoptera SCHIN. 57.
Cosmetopus BECK. 16.
Crassiseta v. ROS. 184.
Crataerhina v. OLFERS. 280.
Craterina CURTIS. 279.
Crumomyia MACQ. 27.
Crymobia Lw. 46.
Cryptochaetum ROND. 251.
Ctenulus ROND. 62.
Cyclocephala STROBL. 187.
Cylidria ROB.-DESV. 73.
Cylindria HENDEL. 73.
Cyrtonotum MACQ. 224.
Dacinae 144.
Dacus MEIG. 144.
Dalmannia ROB.-DESV. 272.
Dasiops ROND. 86.
Dasyna ROB.-DESV. 162.
Delina ROB.-DESV. 19.
Desmometopa Lw. 238.
Diasemocera BEZZI. 192.
Diastata MEIG. 224.
Dichaeta MEIG. 188.
Dichaetophora ROND. 73.
Dichrochira HENDEL. 58.
Dieraeus Lw. 175.
Dietya MEIG. 65.
Diplocentra Lw. 224.
Diplotoxa Lw. 167.
Discocerina MACQ. 191, 194.*)
Discomyza MEIG. 190.
Ditaenia Hendel 59.
Ditricha ROND. 129.
Ditryca ROND. 129.
Domomyza ROND. 249.
Dorycera MEIG. 93.
Drosophila FALL. 219.
Drosophilinae 216.
Dryomyza FALL. 37.
Dryomyzidae 37.
Dryope ROB.-DESV. 37.
Dyctia ROB.-DESV. 54.
Earomyia ZETT. 86.
Eceoptomera Lw. 46.
Ectinocera ZETT. 62.
Eggizoneura ROND. 73.
Elachiptera MACQ. 184.
Elachisoma ROND. 30.
Elephantinosoma BECK. 215.
Elgiva MEIG. 68.
Empylocera Lw. 106.
Encoelocera Lw. 252.
Enicita WESTW. 147.
Enicopus WALK. 147.
Eusina ROB.-DESV. 122.
Entomibia A. COSTA. 289.
Ephydra FALL. 209.
Ephyridae 185.
Ephydrinae 205.
Ephygrobia SCHIN. 192.
Epidemia ROND. 111.
Epipela STENH. 191.
Ernoneura BECK. 15.
Estelia ROB.-DESV. 234.
Eucampsipoda KOLENATI 289.
Eucampsipodia MACQ. 289.
Euleia WALK. 111, 132.
Euphranta Lw. 108.
Eurina MEIG. 175.
Eurinella MEUNIER. 176.
Euthycheta Lw. 232.
Eutropha Lw. 167.
Exocheila ROND. 22.
Fairmairia ROB.-DESV. 265.
Feronia LEACH. 267.
Fimetia ROB.-DESV. 36.
Forellia ROB.-DESV. 113.
Fucomyia HALID. 22.
Gampsocera SCHIN. 184.
Geomyza FALL. 226.
Geomyzinae 224.
Gimnomera ROND. 20.
Gitona MEIG. 217.
Glabrinus ROND. 189.
Glenanthe HALID. 196.
Glossigona ROND. 270.
Gonaretiens BECK. 5.
Gonatherus ROND. 5.
Goniglossum ROND. 116.
Gonioneura ROND. 30.
Gonirhynchus ROND. 265.
Graphomyzina MACQ. 57.
Gymnomus Lw. 52.
Gymnomyza STROBL. 52.
Gymnopa FALL. 189.
Gymnopoda MEIG. 183.
Haemabora ZETT. 282.
Haemobora CURT. 282.
Halidaya ROND. 148.
Halmapota HALID. 207.

*) vide Addenda et Corrigenda.

- Halterophora* ROND. 144.
Haplegis LW. 166.
Haustellia ROB.-DESV. 265.
Hecamede HALID. 189.
Hedroneura HENDEL. 67.
Helcomyza CURT. 38.
Helomyza FALL. 41.
Helomyzidae 41.
Hemilea LW. 110.
Hendelia CZERNY. 39.
Heramyia ROB.-DESV. 94.
Herbina ROB.-DESV. 41.
Herina ROB.-DESV. 97.
Hesychiella ROB.-DESV. 102.
Heterocheila ROND. 22.
Heteromeringia CZERNY. 41.
Heteromyza FALL. 50.
Heteroneura FALL. 38.
Heteroneuridae 38.
Heteroptera MACQ. 28.
Heteropteryx HENDEL. 61.
Heterostoma ROND. 22.
Hexamitoera BECK. 6.
Hippoboscæ L. 273.
Hippoboscidae 273.
Holodasia LW. 101.
Homalcephala ZETT. 104.
Homalometopus BECK. 205.
Homalura MEIG. 175.
Homalura WIED. 183.
Hoplocheta ROND. 129.
Hyadina HALID. 204.
Hydrellia ROB.-DESV. 197.
Hydrellinae 196.
Hydrina ROB.-DESV. 204.
Hydromyza ROB.-DESV. 69.
Hydromyza FALL. 14.
Hydromyzinae 14.
Hygrella HALID. 92.
Hypenidium LW. 110.
Hypoehra LW. 100.
Ilione HALID. 68.
Ilythea HALID. 191.
Keratocera ROB.-DESV.
 185, 192.
Lagaroceras BECK. 176.
Lamprophthalma PORTSCH.
 164.
Lastiops MEIG. 86.
Lasiocelus BECK. 16.
Lauxania LATR. 84.
Lentiphora ROB.-DESV. 51.
Leopoldius ROND. 264.
Leptocera OLIV. 30.
Leptomotopa BECK. 251.
Leptomyza MACQ. 226.
Leptopa ZETT. 5.
Leptopezina MACQ. 234.
Leptoptena WALK. 282.
Leptopteryx ZETT. 281. Nota.
Leptotaena BLANCH. 285.
Leptotenia SCUDD. 282.
Leptotena LATR. 282.
Leria ROB.-DESV. 47.*)
Leucophenga MIK. 219.
Leucopis MEIG. 235.
Lignodesia ROND. 53.
Limnia ROB.-DESV. 70.
Limosina MACQ. 30.
Liomyza MACQ. 216.
Lipara MEIG. 183.
Lipoptena NITZSCH. 282.
Lipoptera SIEB. 282.
Lipotena LATR. 282.
Lipotepna LATR. 282.
Liriomyza MIK. 250.
Lisella ROB.-DESV. 232.
Lispa BIGOT. 12.
Lissa MEIG. 154.
Listropodia KOL. subgen.
 288.
Lobioptera WAHLB. 237.
Lonchaea FALL. 86.
Lonchaeidae 86.
Lonchopalpus ROB.-DESV.
 265.
Lordatia ROB.-DESV. 28.
Lorocera MEIG. 163.
Loxodesma LW. 97.
Lucina MEIG. 73.
Lunigera HENDEL. 64.
Lycia ROB.-DESV. 74.
Lynchia WEYENBERGH. 276.
Lytogaster BECK. 206.
Machirocera ROND. 93.
Macrochetum ROND. 184.
Macrochira MEIG. 205.
Macrochira ZETT. 40. 155.
Macrotrypeta PORTSCH. 123.
Madiza FALL. 239.
Malacomyia HALID. 21.
Meckelia ROB.-DESV. 100.
Megachetum ROND. 163.
Megaglossa ROND. 102.
Megamerina ROND. 154.
Megaphthalma BECK. 6.
Megistopoda KOL. 285.
Melanochira SCHIN. 62.
Melanosoma ROB.-DESV.
 268, 270.
Meliera ROB.-DESV. 99.
Melina ROB.-DESV. 54.
Melittomyia BIGOT. 289.
Melophaga WIED. 283.
Melophagus LATR. 283.
Melophila NITZSCH. 283.
Meoneura ROND. 239.
Meromyza MEIG. 168.
Meroplus ROND. 148, 149.
Metopostigma BECK. 166.
Microneurum BECK. 185.
Micropesza MEIG. 157.
Micropesidae 155.
Microprosopa BECK. 18.
Micropselapha BECK. 6.
Milichia MEIG. 237.
Milichinae 237.
Minettia ROB.-DESV. 74.
Monochaetophora HEND. 65.
Mosillus LATR. 189.
Mosina ROB.-DESV. 3.
Mycetaulus LW. 154.
Mycetia ROB.-DESV. 23, 30.
Myennis ROB.-DESV. 104.
Myioleja ROND. 111.

*) vide Addenda et Corrigenda.

- Myodina* ROB.-DESV. 105.
Myoleja ROND. 111.
Myopa FABR. 265.
Myopella ROB.-DESV. 265.
Myopina ROB.-DESV. 266.
Myopinae 265.
Myopites BREISSON 123.
Myoris ROB.-DESV. 95.
Myrmecomyia ROB.-DESV. 101.
Myrmemorphia L. DUF. 184.
Napaea ROB.-DESV. 207.
Napomyza V. D. WULP. 252.
Nemopoda ROB.-DESV. 149.
Neoalticomerus HENDEL. 240.
Neottiophilum FRFLD. 38.
Nerea ROB.-DESV. 23.
Neria ROB.-DESV. 155.
Neuroctena ROND. 37.
Nirmomyia NITZSCH. 273.
Noeeta ROB.-DESV. 129.
Norellia ROB.-DESV. 13.
Norellinae 13.
Neterophila ROND. 224.
Notiphila FALL. 185.
Notiphilinae 185.
Notonaulax BECK. 182.
Nupharia ROB.-DESV. 14.
Nycteribia LATR. 286.
Nycteribiidae 285.
Nycteribosea SPEISER. 284.
Nycterobia SCUDD. 286.
Oblicia ROB.-DESV. 158.
Oecemyia ROB.-DESV. 268.
Oehlthera LATR. 205.
Oehlthiphila FALL. 234.
Oehlthiphilinae 234.
Oeneros A. COSTA. 90.
Oenerus O. COSTA. 110.
Ocyptera FABR. 4.
Odinia ROB.-DESV. 240.
Odontocera MACQ. 250.
Oecotheca HALID. 47.
Oedaspis LW. 116.
Oedenops BECK. 215.
Oedoparea LW. 22.
Okenia ZETT. 15.
Olfersia WIED. 276.
Olina ROB.-DESV. 27.
Oncomyia LW. 268.
Oplocheta ROND. 129.
Opomyza FALL. 228.
Orbellia ROB.-DESV. 47.
Oregocera ROND. 70.
Orellia ROB.-DESV. 116.
Ornithesza SPEISER. 278.
Ornithobia MEIG. 282.
Ornithoecca ROND. 279.
Ornithoica ROND. 279.
Ornithomyia LATR. 277.
Ornithomyza ZETT. 277.
Ornithophila ROND. 279.
Ornithymia LATR. 277.
Ortalidae 92.
Ortalina 93.
Ortalinae 92.
Ortalis FALL. 95.
Orthoeheta BECK. 5.
Orthostylum MACQ. 20.
Orygma MEIG. 23.
Oscininae 176.
Oscinis LATR. 178.
Otitus LATR. 94.*)
Oxyna ROB.-DESV. 132.
Oxyphora ROB.-DESV. 130.
Oxypterum LEACH. 280.
Oxyrhina MEIG. 41.
Oxyrhina ZETT. 237.
Pachyecerina MACQ. 85.
Pachycheta BEZZI. 184.
Pachylomera ROND. 161.
Palloptera FALL. 90.
Pandora HALID. 150.
Paraclusia CZERNY. 40.
Paralimna LW. 188.
Parallelomma BECK. 3.
Paranthomyza CZERNY. 231.
Paroecus BECK. 86.
Parydra STENH. 207.
Pegophila ROND. 187.
Peletophila HAGENBACH. 158.*)
Pelidnoptera ROND. 53.
Pelina HALID. 206.
Penicillidia KOLENATI. 285.
Peplomyza HALID. 83.
Peratochetus ROND. 40.
Perenomatia LW. 93.
Periseelis LW. 217.
Petalophora MACQ. 144.
Phaeomyia SCHIN. 53.
Phagocarpus ROND. 110.
Phantasma ROB.-DESV. 157.
Pherbellia ROB.-DESV. 59.
Pherbina ROB.-DESV. 66.
Philophylla ROND. 111.
Philotelma BECK. 196.
Philygria STENH. 202.
Phorellia ROND. 113.
Phorosia ROB.-DESV. 266.
Phortica SCHIN. 218.
Phrosia ROB.-DESV. 4.
Phthiridium HERM. 286.
Phycodromia STENH. 21.
Phycodromidae 21.
Phyllomyza FALL. 238.
Physocephala SCHIN. 262.
Phytomyza FALL. 252.
Phytomyzinae 252.
Pictinia ROB.-DESV. 266.
Piophila FALL. 151.
Platycephala FALL. 174.
Platyparea LW. 108.
Platystoma MEIG. 102.
Platystomina 102.
Platystyla MACQ. 161.
Pocilloptera LW. 108.
Pogonota ZETT. 15.
Polionoma ROND. 74.
Prosopomyia LW. 86.
Psairoptera WAHLB. 104.
Psalidomyia DOUMERIL. 23.
Psalidotus BECK. 239.

*) vide Addenda et Corrigenda.

- Pselaphephila* BECK. 8.
Pseudofersia COQUILLET. 275.
Pseudopomyza STROBL. 251.
Pseudoscatella BECK. 196.
Pseudoseps BECK. 154.
Pseudosphærocera STROBL. 29.
Psila MEIG. 158.
 Psilidae 158.
Psilomyia MACQ. 158.
Psilopa FALL. 192.
Psilosoma ZETT. 161.
Pteremis ROND. 36.
Pterocallina 104.
Pteropaectria LW. 97.
Pteropoeila LW. 94.
Ptilona MIK. 95.
Ptilonota LW. 95.
Purpurella ROB.-DESV. 266.
Pyrgota SCHIN. 92.
Pyrgotina 92.
Rainieria ROND. 155.
Raymondia FRFLD. 285.
Renocera HENDEL. 60.
Rhacochlaena LW. 116.
Rhagoletis LW. 115.
Rhienoëssa LW. 252.
Rhynchaea ZETT. 155.
Rivellia ROB.-DESV. 104.
Saltella ROB.-DESV. 150.
Salticella ROB.-DESV. 73.
Saphaea ROB.-DESV. 215.
Sapromyza FALL. 74.
Sapromyzidae 74.
Sargella ROB.-DESV. 20.
Scaptomyza HARDY. 223.
Scatella ROB.-DESV. 210.
Scatina ROB.-DESV. 8.
Scatomyza FALL. 8.
Scatomyzidae 1.
Scatophaga MEIG. 8.
Scatophaginae 8.
Scatophila BECK. 212.
Scatophora ROB.-DESV. 37.
Schistopterum BECK. 144.
Sciomyza FALL. 54.
Sciomyzidae 53.
Sciomyzinae 53.
Scioptera KIRBY. 105.
Scoliapheps BECK. 4.
Scoliocestra LW. 46.
Scoliocephalus BECK. 205.
Scoliophthalmus BECK. 176.
Scotimiza MACQ. 155.
Scyphella ROB.-DESV. 232.
Selachops WAHLB. 252.
Scoptera KIRBY. 105.
Sepedon LATR. 72.
Sephanilla ROND. 237.
Sepsidae 145.
Sepsis FALL. 145.
Sicus SCOP. 271.
Siphonella MACQ. 176.
Siphunculina ROND. 176.
Sitarea ROB.-DESV. 117.
Spathephilus BECK. 8.
Spathiophora ROND. 18.
Spathulina ROND. 135.
Sphaerocera LATR. 28.
Sphenella ROB.-DESV. 128.
Sphixosoma ROND. 260.
Stilographa LW. 113.
Stachynia MACQ. 272.
Staegeria ROND. 16.
Stegana MEIG. 218.
Stemonocera ROND. 114.
Stenopteryx LEACH. 279.
Stenophthalmus BECK. 176.
Stenoporomyia HENDEL. 238.
Stenopteryx LEACH. 279.
Stomphastica LW. 40.
Streblidae 284.
Strongylophthalmus HEND. 163.
Strongylophthalmyia HELL. 163.
Styilia ROB.-DESV. 123.
Stylidia WESTW. subgen. 287.
Suillia ROB.-DESV. 41.
Sylvia ROB.-DESV. 74.
Systata LW. 96.
Tanypeza FALL. 102.
Tanypoda ROND. 155.
Telmatobia STENH. 206.
Tephritis LATR. 135.
Tephrochlamis LW. 51.
Tephronota LW. 99.
Terellia ROB.-DESV. 117.
Terelliosoma ROND. 94.
Teremyia MACQ. 86.
Terenia ROB.-DESV. 74.
Tetanocera DUMERIL. 62.
Tetanocerinae 60.
Tetanops FALL. 94.
Tetanura FALL. 59.
Tethina HALID. 234.
Thecophora ROND. 268.
Thelida ROB.-DESV. 52.
Themira ROB.-DESV. 148.
Therina MEIG. 26.
Thyreophora MEIG. 21.
Thyreophorinae 21.
Thyrimyza ZETT. 232.
Tichomyza MACQ. 214.
Timia WIED. 107.
Toxoneura MACQ. 90.
Toxopoda MACQ. 155.
Tricopalpus ROND. 17.
Trigonometopinae 41.
Trigonometopus MACQ. 41.
Trimerina MACQ. 188.
Trixoscelis ROND. 226.
Trixostomus ROND. 210.
Trupanea p. p. SCHRANK. 90.
Tryphila LW. 97.
Trypeta MEIG. 117.
Trypetidae 108.
Trypetinae 108.
Trypetoptera HENDEL. 66.
Tryptochaëta ROND. 227.
Tyrophaga KIRBY 151.
Ulidia MEIG. 105.
Ulidiinae 105.
Uranucha CZERNY. 216.
Urellia ROB.-DESV. 141.
Urophora ROB.-DESV. 124.
Volusia ROB.-DESV. 21.
Xyphosia ROB.-DESV. 130.
Zodion LATR. 270.
Zonosema LW. 114.
Zoomyia BIGOT. 273.

INDEX SPECIERUM.

- abbreviata* MEIG. 241.
abbreviata FALL. 30.
abbreviata ZETT. 173.
abbreviata BECK. 74.
abdominalis R-D. 117.
abdominalis SCHUM. 158.
abdominalis STENH. 206.
abdominalis ZETT. (*Gon.*) 5.
abdominalis ZETT. (*Phyt.*) 252.
abdominalis ZETT. (*Osc.*) 178.
aberrans BECK. 1.
abiens ZETT. 241.
abrotani MEIG. 114.
abrotani MACQ. 117.
absinthii FABR. 132.
absinthii MEIG. 132.
abstersa LW. 106.
acanthi SCHRNK. 117.
acetii KOLLAR. 219.
acrosticalis BECK. (*Limosina.*) 30.
acrosticalis BECK. (*Atissa.*) 191.
aculeata L. 272.
aculeata FABR. 260.
aculeata GMEL. 260.
acutangula ZETT. 30.
acuticornis MEIG. 250.
acuticornis LW. (*Trypeta.*) 117.
acuticornis LW. (*Mel.*) 99.
acuticornis LW. (*Con.*) 260.
acuticornis LW. (*Phyt.*) 253.
acuticornis ROND. 74.
acutipennis LW. 224.
adriatica BECK. 86.
adspersa MIK. 219.
adumbrata LW. 74.
adusta MEIG. 224.
adusta LW. (*Calobata.*) 155.
adusta LW. (*Baliop.*) 229.
aegyptia MACQ. 289.
aegyptiaca KOL. 289.
aegyptiaca MACQ. 273.
aenea FALL. (*Lauran.*) 84.
aenea FALL. (*Pelina.*) 206.
aenea FALL. (*Gymn.*) 189.
aenea var β . FALL. (*Aulac.*) 216.
aenea MEIG. 86.
aenea MEIG., MACQ. 241.
aenea ZETT. (*Pelina.*) 206.
aenea ZETT. (*Lonch.*) 86.
aenea ZETT. (*Liom.*) 216.
aenea MACQ. 176.
aenea v. ROS. 178.
aeneiventris FALL. 241.
aeneiventris MACQ. 210.
aeneiventris STENH. 30.
aeneonitens STROBL. 253.
aenescens MEIG. 86.
aenescens STENH. 206.
aenescens ZETT. 241.
aenescens LW. 102.
aeneus MACQ. 23.
aerata HALID. 224.
aestiva MEIG. 141.
aestuans HALID. 210.
aestuum MEIG. 38.
affinis FALL. (*Phytom.*) 253.
affinis FALL. (*Cer.*) 250.
affinis MEIG. (*Pioph.*) 151.
affinis MEIG. (*Hydr.*) 197.
affinis MEIG. (*Helom.*) 41.
affinis ZETT. (*Saprom.*) 74.
affinis ZETT. (*Renoc.*) 60.
affinis STENH. 207.
affinis TRFLD. 124.
afflicta MEIG. 97.
africana KOLEN. 285.
agaracina ROND. 41.
agnata HALID. (*Chlor.*) 169.
agnata HALID. (*Cent.*) 165.
agnata ROND. 41.
agromyzina MEIG. 253.
agrorum FALL. 174.
akka ROND. 30.
alacris LW. 109.
albicans MEIG. 189.
albicarpa ROND. 54.
albiceps FALL. 74.
albiceps MEIG. (*Hydr.*) 197.
albiceps MEIG. (*Phyt.*) 253.
albiceps MEIG. (*Och.*) 234.

- albiceps* MEIG. (*Eutr.*) 167.
albiceps MEIG. (*Schän.*) 54.
albiceps MEIG. (*Hydr.*) 197.
albicornis MEIG. 241.
albidipennis STENH. 202.
albidipennis LW. 105.
albidipennis STROBL. 178.
albiditinctus BECK. 205.
albifrons FALL. 197.
albifrons MEIG. 194.
albifrons MACQ. 74.
albilabris FABR. 4.
albilabris MEIG. 197.
albilabris ZETT. 219.
albirmana MEIG. (*Heter.*) 38.
albirmana MEIG. (*Anth.*) 230.
albinervis v. ROS. 224.
albipalpis MEIG. 178.
albipennis FALL. 253.
albipennis MEIG. (*Leuc.*) 235.
albipennis MEIG. (*Agr.*) 241.
albipennis MACQ. 150.
albipennis ZETT. 18.
albipennis GIMM. 62.
albipennis LW. (*Gymn.*) 189.
albipennis LW. (*Hyp.*) 100.
albipennis ROND. 30.
albipes FALL. 3.
albipes MEIG. 254.
albipila ZETT. 20.
albipila LW. (*Dipl.*) 167.
albipila LW. (*Oxya.*) 132.
albipuncta ZETT. 235.
albiseta SCOP. 68.
albiseta SCHRNK. 163.
albiseta MEIG. 178.
albiseta MACQ. 169.
albitarsis MEIG. (*Sapr.*) 74.
albitarsis MEIG. (*Agr.*) 241.
albitarsis MEIG. (*Hap.*) 166.
albitarsis ZETT. (*Agr.*) 241.
albitarsis ZETT. (*Psairop.*) 104.
albitarsis ZETT. (*Dichr.*) 58.
albitarsis ZETT. (*Lonch.*) 86.
albitarsis ZETT. (*Spath.*) 18.
albitarsis ZETT. (*Them.*) 148.
albitarsis GIMM. (*Tetan.*) 62.
albitarsis GIMM. (*Limn.*) 70.
albocostata FALL. 54.
albofasciata GIMM. 1.
alboguttata LW. 197.
alboguttata WAHLB. 218.
alboguttata STROBL. 252.
albohyalinata ZETT. 241.
albomaculata STROBL. 237.
albo punctata BECK. 219.
albo setulosa STROBL. 252.
albula MEIG. 209.
alciphron NEWM. 117.
alcis SCHNABL. 282.
alethe NEWM. 132.
algira MACQ. (*Tryp.*) 117.
algira MACQ. (*Uroph.*) 124.
algira MACQ. (*Limn.*) 70.
algira MACQ. (*Nemop.*) 149.
algira MACQ. (*Conops.*) 260.
alpestris POKORNY. 129.
alpestris HENDEL. 62.
alpestris SCHIN. 13.
alpicola STROBL. (*Agr.*) 241.
alpicola STROBL. (*Osc.*) 178.
alpina LW. (*Heter.*) 39.
alpina LW. (*Bleph.*) 47.
alternata FALL. 114.
alternata MEIG. 114.
ambigua FALL. 241.
ambusta MEIG. 90.
amica HALID. 84.
amoena MEIG. (*Ast.*) 219.
amoena MEIG. (*Scapt.*) 223.
amoena MEIG. (*Hydr.*) 197.
amoena MEIG. (*Oscin.*) 178.
amoena MEIG. (*Agr.*) 241.
amoena LW. (*Corem.*) 71.
amoena LW. (*Emp.*) 106.
amoena FRELD. 141.
ampelophila LW. 219.
amplipennis PORTSCH. 8.
amurensis PORTSCH. 95.
analis MEIG. (*Antich.*) 61.
analis MEIG. (*Scat.*) 8.
analis MEIG. (*Chlor.*) 173.
analis MEIG. (*Chyl.*) 162.
analis MEIG. (*Mycet.*) 154.
analis MACQ. 219.
analis v. ROS. (*Pioph.*) 152.
analis v. ROS. (*Olina.*) 27.
analis ZETT. 254.
analis ROND. 241.
anceps STENH. 30.
ancholiae R.-D. 254.
andalusiaca STL. (*Anth.*) 166.
andalusiaca STL. (*Lim.*) 30.
andalusiaca STL. (*Sapr.*) 74.
angelicac v. ROS. 90.
angelicae KALTENB. 254.
angulato fasciata PRITS. 135.
angustata WAHLB. 105.
angustata LW. 95.
angustifrons MEIG. 176.
angustipenne LW. (*Platyst.*) 102.
angustipennis ZETT. 229.
angustipennis STAEG. 58.
angustipennis LW. (*Tephr.*) 135.
angustipennis LW. (*Mi.*) 157.
angustitarsis BECK. 205.
anilis FALL. 37.
anisodaetyla LW. 74.
annulata FABR. (*Myopa*) 266.
annulata FABR. (*Occ.*) 238.
annulata FALL. 217.
annulata MEIG. 178.
annulata R.-D. 130.
annulata HALID. 218.
annulata LW. 197.
annulatus BECK. 144.
annulifera ZETT. 182.
annulinanum v. ROS. 238.
annulipes MEIG. (*Phyt.*) 254.
annulipes MEIG. (*Agr.*) 241.
annulipes MEIG. (*Enic.*) 147.
annulipes MEIG. (*Phys.*) 262.
annulipes MACQ. (*Chlor.*) 169.
annulipes MACQ. (*Oscin.*) 172.
annulipes MACQ. (*Chyl.*) 162.
annulipes R.-D. 271.

- annulipes* v. Ros. 184.
annulipes ZETT. (*Sciom.*) 54.
annulipes ZETT. *Leuc.* 235.
annulipes STENH. 185.
annulipes BRULLÉ 169.
annulipes LW. 217.
annulitarse v. Ros. 238.
annulitarse ZETT. 238.
anomala STROBL. 254.
anomalum BECK. 196.
antennata BECK. 75.
antennatus ZETT. 5.
anteposita STROBL. 254.
anthracina MEIG. (*Osc.*) 178.
anthracina MG. (*Agr.*) 241.
anthracipes ROND. 249.
anthrax SCHIN. 19.
anthropophaga R.-D. 21.
antica WIED. 110.
antilopes WIED. 283.
antiqua WIED. (*Con.*) 260.
anus MEIG. 224.
aphidiperda ROND. 235.
aphidivora ROND. 235.
apicalis WIED. apud. MEIG. (*Cnemop.*) 4.
apicalis MEIG. (*Ulid.*) 106.
apicalis MEIG. (*Balioph.*) 229.
apicalis ROB. 225.
apicalis R.-D. 75.
apicalis v. Ros. 182.
apicalis WHLB. 105.
apicalis PERRIS. 192.
apicalis ZETT. (*Heteron.*) 39.
apicalis ZETT. (*Herina*) 97.
apicalis ZETT. (*Spilogr.*) 113.
apicalis SCHIN. 41.
apicalis LW. 75.
apicalis HARDY, WALK. 223.
apii WESTW. 152.
appendiculata HENDEL. 54.
approximata LW. 226.
approximata BECK. 197.
approximata ZETT. 219.
approximatonervis ZETT. 167.
approximatum BECK. 251.
aprica FALL. 124.
aprica MEIG. 176.
aprilina GOUR. 254.
apum A. COSTA. 289.
aquatica BECK. 186.
aquaticus R.-D. 72.
aquifolii GOUR. 254.
aquila FALL. 207.
aquilegiae HARDY. 254.
arabica MACQ. (*Conops.*) 260.
arabica MACQ. (*Myopa.*) 266.
aratoria FABR. MEIG. 69.
aretica HOLMGR. 152.
aretica LUNDB. 241.
aretica BECK. 8.
aretii R.-D. 130.
aretii MEIG. 117.
aretii LW. 117.
aretii DEG., R.-D. 117.
aretii KALTENB. 254.
arcuata LATR. 189.
arcuata FABR. (*Pallopt.*) 90.
arcuata FABR. (*Oxyph.*) 130.
arcuata SNK. (*Sphen.*) 128.
arcuata R.-D. 42.
arcuata MACQ. (*Lim.*) 30.
arcuata ZETT. (*Pallop.*) 90.
arcuata ROND. 90.
arenum LW. 102.
ardeae MACQ. 276.
arenaria HAL. (*Helom.*) 42.
arenaria HAL. (*Geom.*) 226.
argentata HEEG. 236.
argentata WALK. 207.
argentea R.-D. 266.
argenticollis ZETT. 236.
argus FABR. 66.
argus ZETT. 15.
argyria R.-D. 197.
argyrocephala LW. 132.
argyrogenis BECK. 197.
argyrostoma STENH. (*Hydr.*) 197.
argyrostoma STENH. (*Scat.*) 210.
arieina ZETT. 1.
aricioides ZETT. 1.
aridella FALL. 234.
aristata PANZ. 163.
aristata LW. 163.
aristella BECK. 86.
armifrons PORTSCH. 113.
armillaris ROND. 230.
armillata ROND. 236.
armillatum ZETT. 6.
armipes MEIG. 13.
arnicae L. 135.
arnicae FALL. 130.
arnicae FRFLD. 136.
arnicivora LW. 136.
arrogans MEIG. 62.
arrogans HALID. 8.
arrogans STROBL. 60.
artemisiae FABR. 113.
artemisiae WALK. 113.
artemisiae KLTB. (*Agr.*) 242.
artemisiae KLTB. (*Phyt.*) 254.
articulata ROND. 249.
articulatum BECK. 6.
arvensis R.-D. 130.
aspersa LW. 95.
asteia HALID. 228.
asteris HALID. 122.
asteris CURT. 136.
atechna BECK. 75.
ater MEIG. 23.
ater HALID. 27.
aterrima COUCKE. 260.
aterrima STROBL. 184.
aterrima BECK. 152.
aterrimus HALID. 23.
atilia WALK. 117.
atoma ROND. 30.
atomaria ZETT. 254.
atra FABR. 268.
atra var. β , FALL. 269.
atra MEIG. (*Psila.*) 158.
atra MEIG. (*Oscinis*) 178.
atra MEIG. (*Phyt.*) 254.
atra MEIG. (*Agr.*) 242.
atrata FABR. 152.
atrata R.-D. 36.
atrata ZETT. 1.
atrata LW. 106.

- atratala* RATZEB. 242.
atriceps BIG. 163.
atricilla ZETT. 178.
atricornis MG. (*Alloph.*) 45.
atricornis MEIG. (*Heter.*) 50.
atricornis MG. (*Phyt.*) 254.
atricornis MG. (*Agr.*) 242.
atricornis ZETT. 178.
atricornis MIK. 100.
atrimana MG. (*Psila*) 159.
atrimana MG. (*Lauæ.*) 84.
atrimana MG. (*Dicroch.*) 58.
atrimana ZETT. 57.
atripedella BOHEM. 54.
atripes MEIG. 84.
atripes R.-D. 145.
atripes LW. 95.
atripes ZETT. 242.
atripes BRISCHKE. 242.
atripes BEZZI 157.
atriseta MEIG. 163.
atriseta LW. 61.
atrocoerulea BECK. 84.
atrovirens LW. 106.
attica BECK. 209.
Audouini ZETT. 161.
augur FRFLD. 142.
aurata R.-D. 202.
aurata STENH. 209.
aurata WALK. 260.
aureifasciata ROND. 260.
aurella STROBL. 194.
auricincta LW. 260.
aurifacies R.-D. 197.
aurifacies STROBL. 194.
aurifrons HALID. 174.
Aurivillii BECK. 194.
aurulenta BIG. 260.
austera MEIG. 54.
australis MACQ. 272.
australis LW. 186.
avenae BJERK. 178.
avicularia L. 277.
bactriana ROND. 273.
balcanica STROBL. 254.
Ballestrerii ROND. 236.
barbata ZETT. 15.
barbigera MIK. 47.
barbipes MEIG. 145.
bardanae SCHRANK. 136.
bardanae ZETT. 136.
basalis HALID. 150.
basalis MEIG. 227.
basalis v. ROS. (*Siph.*) 176.
basalis v. ROS. (*Merom.*) 168.
basalis ZETT. (*Oscin.*) 178.
basalis ZETT. (*Sapr.*) 75.
basalis ZETT. 75.
basilaris MEIG. (*Phil.*) 202.
basilaris MEIG. (*Agr.*) 242.
Baunhaueri LW. 83.
Bechsteini KOLEN. 286.
Beckeri KUNTZE. 214.
Beckeri CZERNY. 39.
Beckeri HENDEL. 62.
Bellardii ROND. 53.
bellidis KALTENB. 242.
berberidis SCHRANK. 111.
Bergrothi BECK. 16.
Bertei ROND. 13.
Bertolini ROND. 159.
Bezzii BECK. 189.
Bezzii CZERNY. 230.
Bezzii HEND. 54.
biarticulata HERM. 287.
bicineta MEIG. 260.
bicingulata STROBL. 178.
bicolor MEIG. (*Psila*) 159.
bicolor MEIG. (*Hydr.*) 197.
bicolor MEIG. (*Agr.*) 242.
bicolor MEIG. (*Melan.*) 270.
bicolor MEIG. (*Anagn.*) 232.
bicolor MACQ. (*Osc.*) 178.
bicolor MACQ. (*Eph.*) 209.
bicolor MACQ. (*Clidog.*) 19.
bicolor MACQ. (*Sapr.*) 75.
bicolor MACQ. (*Chrys.*) 107.
bicolor ZETT. (*Sciom.*) 54.
bicolor ZETT. (*Helom.*) 42.
bicolor LW. (*Saprom.*) 75.
bicolor LW. (*Selach.*) 252.
bicornis KALTENB. 242.
bidentis R.-D. 123.
bifasciata LW. 99.
bifasciatum BRULLÉ. 102.
bifasciella FALL. 57.
biflexa LW. 130.
biflexuosa STROBL. 145.
bifrons STENH. 30.
Bigoti R.-D. 289.
biguttata v. RÖD. 262.
bilineata MEIG. 3.
bilineata BIG. 169.
bilineata MACQ. 226.
biloba DUF. 278.
bimaculata MEIG. (*Agr.*) 242.
bimaculata MG. (*Bal.*) 229.
bimaculata WHLB. 105.
bimaculata LW. 184.
binotata MACQ. 75.
binotata LW. 169.
bipilosum PORTSCH. 102.
bipunctata MEIG. 75.
bipunctata MACQ. (*Osc.*) 179.
bipunctata MACQ. (*Scat.*) 8.
bipunctata LW. (*Phyt.*) 254.
bipunctata PORTSCH. (*Spil.*) 113.
bipunctata LW. (*Psair.*) 105.
bipunctatus FALL. 154.
bipunctella ZETT. 232.
bisangula ROND. 30.
bisbinotata ROND. 75.
biseriata LW. 75.
biseta LW. (*Platyst.*) 102.
biseta LW. (*Bleph.*) 47.
biseta LW. (*Cord.*) 1.
bisetosa HEND. 61.
bisigillata ROND. 75.
bistrigata MEIG. 42.
biumbrata LW. 75.
biumbrata WHLB. 105.
bivittata MEIG. 75.
bivittata MACQ. (*Corem.*) 71.
bivittata MACQ. (*Heram.*) 94.
bivittata LW. 209.
Blainvillei LEACH. 286.
blanda MEIG. 242.
Blasii KOLEN. 288.
blepharipteroïdes L.-D. 75.
Blotii BREB. 123.

- Blotii* ROND. 123.
Bohemanni BECK. 194.
boletina ZETT. 240.
borealis ZETT. (*Borb.*) 24.
borealis ZETT. (*Ectin.*) 62.
boreale ZETT. (*Ceratin.*) 12.
borealis HOLMGR. 47.
borealis PORTSCH. 132.
borealis HENDEL. 16.
botauri ROND. 276.
bovina R.-D. 28.
bracata ROND. (*Baliop.*) 229.
bracata ROND. (*Bleph.*) 47.
brachyptera L. DUF. 184.
brachyptera ZETT. 179.
brachyptera LW. 47.
brachystoma STENH. 30.
brachyura LW. 136.
brevicauda LW. 188.
breviceps STENH. 30.
brevicornis ZETT. 204.
brevicornis LW. 265.
brevifrons ZETT. 7.
brevifrons LW. 169.
brevimana LW. 169.
brevinervis ROND. (*Siphon.*) 176.
brevinervis ROND. (*Agr.*) 249.
brevinervis STROBL. 176.
brevipectinata BECK. 194.
brevipennis MEIG. 184.
brevipennis v. ROS. 157.
brevipennis ZETT. (*Het.*) 61.
brevipennis ZETT. (*Anth.*) 230.
brevipennis CURT. (*Cord.*) 1.
brevipenne CURT. (*Am.*) 7.
brevipes LW. 59.
brevirostris GERM. 264.
brevirostris LW. 179.
brevis LW. 93.
breviseta ZETT. (*Agr.*) 242.
breviseta ZETT. (*Acer.*) 17.
breviseta MIK. 17.
breviventris LW. (*Eph.*) 209.
breviventris LW. (*Sp.*) 8.
brunicea R.-D. 149.
brunifacies R.-D. 197.
brunipes R.-D. (*Melan.*) 270.
brunipes R.-D. (*Occem.*) 269.
brunnea BRISCHKE. 254.
brunnescens BECK. 75.
brunnica R.-D. 129.
brunnicornis MACQ. 169.
brunnipes MEIG. 59.
brunnipes R.-D. 186.
brunnipes ZETT. 169.
brunnipes BRISCH. 254.
brunnipes BECK. 84.
brunnitarsis MACQ. (*Osc.*) 179.
brunnitarsis MQ. (*Sapr.*) 75.
bryoniae KALT. (*Phyt.*) 254.
bryoniae KALT. (*Agr.*) 242.
buccata L. 266.
buccata FALL. (*Oedop.*) 22.
buccata FALL. (*Psila*) 159.
buccata R.-D. (*Scat.*) 210.
buccata R.-D. (*Myopa.*) 266.
Bucchichi FRFLD. 116.
bucephala MEIG. 94.
bullans WIED. 132.
bursaria ROND. 236.
cadaverina R.-D. (*Fim.*) 36.
cadaverina R.-D. (*Sph.*) 28.
caenosa ROND. 30.
caeruleipennis R.-D. 69.
caerulescens ZETT. 152.
caesia MEIG. 47.
caesia STENH. 197.
caesio HARRIS. 111.
calceata FALL. 156.
calceata MEIG. (*Clas.*) 194.
calceata MEIG. (*Chlor.*) 169.
calceata MEIG. (*Agr.*) 242.
calceata ROND. 229.
calceatum ROND. 265.
calcitrapae R.-D. 142.
calida HALID. 8.
calliopsis MIK. 85.
callosicosta BEZZI. 210.
calopsis BIG. 273.
caloptera LW. 109.
caloptera BIG. (*Myrm.*) 101.
caloptera BIG. (*Euphr.*) 108.
calva EGG. 175.
camelina ROND. 273.
camelina LEACH. 273.
cameraria HALID. 219.
camillae MIK. 106.
cana LW. 99.
canariensis MACQ. (*Teph.*) 136.
canariensis MACQ. (*Olf.*) 276.
canescens MEIG. 51.
canescens LW. 226.
canina ROND. 273.
canum PORTSCH. 102.
capensis OLFERS. 273.
caph. LW. 95.
capitata WIED. 144.
capitata FALL. 129.
capitata ZETT. 242.
capitata ROBERT. 225.
capitatum LW. 265.
capreola CURT. 179.
capreola HALID. 176.
capreoli ROND. 282.
caprivorius R.-D. 24.
carbonaria MEIG. 86.
carbonaria ZETT. 242.
carbonaria POKOR. 19.
carbonarius LW. 107.
carbonella ZETT. 242.
Careli R.-D. 270.
cardamines HAL. (*Hydr.*) 198.
cardamines HALID VAR. β . (*Hydr.*) 198.
cardaminis R.-D. 202.
cardui LW. 125.
cardui R.-D. (*Oxyph.*) 130.
cardui R.-D. (*Uroph.*) 125.
caricicolu R.-D. 214.
Cartereani BIG. (*Bleph.*) 47.
Cartereani BIG. (*Neott.*) 38.
casei L. 152.
casei STAEG. 152.
castanipes BECK. 20.
catenata LW. 71.
caucasica BIG. 113.
caucasica MIK. 159.

- caudata FALL. 188.
 caudata ZETT. 15.
 cavallariae KALTENB. 2.
 caviceps STENH. 212.
 cellaris FABR. 220.
 cellaris MACQ. 220.
 cellarum R.-D. 30.
 centaureae FABR. 111.
 centaureae FALL. 111.
 centaureae ROND. 125.
 centralis FABR. 95.
 cerasi L. (*Rhagol.*) 115.
 cerasi L. (*Herina.*) 97.
 cerasorum L. DUF. 115.
 cerealis ROND. 174.
 cereris FALL. 165.
 cereris ZETT. 165.
 ceriaeformis MEIG. 265.
 cervi L. 282.
 cervina NITZSCH. 283.
 cæsta HALID. 201.
 chaerophylli FABR. 64.
 chaerophylli MEIG. 66.
 chaerophylli KALTENB. 254.
 chalcomelaena SPEISER. 283.
 chamaeleon BECK. 186.
 chetomera ROND. 47.
 chlorophthalma ZETT. 75.
 chloropus BERGER. 278.
 Chnuni BECK. 215.
 chorea FABR. 86.
 chorea FALL. 87.
 Christophi BECK. 75.
 Christophi LW. 125.
 chrysanthemi R.-D. 122.
 chrysella R.-D. 198.
 chrysina R.-D. 198.
 chrysophthalma ZETT. 232.
 chrysoptera SCHRANK 84.
 chrysorrhoea MEGERLE. 263.
 chrysorrhoea var. a ZEL. 263.
 chrysostoma MEIG. 198.
 cibaria L. 156.
 cibaria var. b. ZETT. 156.
 ciccrina ROND. 242.
 ciliata MEIG. 1.
 ciliata STAEG. 148.
 cilifera ROND. 30.
 ciliosa ROND. 30.
 cimiciformis HALID. 190.
 cineta FABR. 71.
 cineta MEIG. 182.
 cineta ROND. 249.
 cineta LW. 136.
 cinetella ZETT. 179.
 cinctipes MEIG. 169.
 cineraria MEIG. 8.
 cineraria LW. 47.
 cinerascens MEIG. 269.
 cinerascens MCQ. (*Agr.*) 242.
 cinerascens MCQ. (*Hydr.*) 198.
 cinerascens STROBL. 249.
 cinerea FALL. 186.
 cinerea R.-D. (*Scatella.*) 210.
 cinerea R.-D. (*Helom.*) 42.
 cinerea R.-D. (*Sapr.*) 76.
 cinerea R.-D. (*Ochth.*) 234.
 cinerea R.-D. (*Oxya.*) 132.
 cinerea R.-D. (*Scatoph.*) 213.
 cinerea var. b. ZETT. 186.
 cinerea LW. 252.
 cinereifrons HARDY 254.
 cinerella FALL. (*Dros.*) 220.
 cinerella FALL. (*Dit.*) 59.
 cinerella MEIG. 194.
 cinerella MACQ. 50.
 cinerella HALID. 252.
 cinerella ZETT. (*Leuc.*) 236.
 cinerella STENH. 194.
 cinerellum ZETT. (*Amaur.*) 7.
 cinereum FABR. 270.
 cingulata MEIG. 166.
 cingulata ZETT. 242.
 cingulata HALID. 231.
 cingulata LW. 157.
 cingulata POK. 42.
 cinifera LW. 100.
 circumdata MEIG. (*Chl.*) 173.
 circumdata MG. (*Trypt.*) 227.
 cirsii SCHRANK. 125.
 cirsii ROND. 242.
 cirsiorum R.-D. 130.
 citisi BRISCH. 254.
 citrina MEIG. 76.
 citrina v. ROS. 254.
 citrinella ZETT. 169.
 citriperda MAC LEAY. 144.
 clara WOLLAST. 189.
 claripennis R.-D. (*Scat.*) 8.
 claripennis R.-D. (*Oxyph.*) 130.
 claripennis R.-D. (*Sciom.*) 54.
 claripennis R.-D. (*Tetan.*) 62.
 claripennis R.-D. (*Limn.*) 70.
 claripennis R.-D. (*Sapr.*) 76.
 claripennis R.-D. (*Hel.*) 42.
 claripennis R.-D. (*Limos.*) 30.
 claripennis MACQ. 225.
 clathrata LW. 54.
 clavatus ZETT. 16.
 clavicus GMEL. 168.
 clematidis KALTENB. 255.
 clunipes MEIG. 30.
 clypeata MEIG. 175.
 coarctata FALL. 207.
 coarctata WAGA. 92.
 cochleariae HALID. 198.
 coeca NITZSCH. 289.
 coeruleifrons v. ROS. 186.
 coeruleiventris MACQ. 202.
 cognata WIED. 111.
 cognata MEIG. (*Oscin.*) 179.
 cognata MEIG. (*Acidia.*) 111.
 cognata LW. 208.
 coleoptrata SCOP. 218.
 colon MEIG. 117.
 combinata L. 229.
 combinata var. c. ZETT. 229.
 cometa LW. 142.
 commixta COLLIN. 50.
 communis R.-D. (*Hydr.*) 198.
 communis R.-D. (*Borb.*) 24.
 communis R.-D. (*Helom.*) 42.
 communis R.-D. (*Dryom.*) 37.
 communis R.-D. (*Elgiva.*) 69.
 communis R.-D. (*Pherb.*) 66.
 composita BECK. 192.
 compSELLA HENDEL. 76.
 compta MEIG. 192.
 comta HALID. 213.
 concentrica MEIG. 57.

- concinna* MEIG. 219.
concinna WALK. 145.
concolor STENH. 198.
confinis MEIG. (*Pioph.*) 152.
confinis MEIG. (*Phytom.*) 255.
confinis MEIG. (*Agrom.*) 242.
confluens MEIG. 169.
confluens ROND. 71.
confusa MEIG. 136.
confusa STAEG. 220.
confusa ZETT. 163.
confusa ROND. 136.
congesta ZETT. 220.
congesta BECK. 242.
congrua LW. 125.
conjugata BECK. 76.
conjuncta LW. 136.
connexa FABR. 108.
connexa MACQ. 111.
conopsoides LATR. 271.
consobrina ZETT. (*Sapr.*) 76.
consobrina ZETT. (*Bal.*) 229.
consobrina v. D. WULP. 148.
conspicua LW. 130.
conspicua SPEIS. 285.
contaminata STENH. 213.
contarinii ROND. 94.
continua MEIG. 114.
conura LW. 137.
conyzae FRULD. 137.
copiosa SCHIN. 169.
coprina R.-D. 28.
coprivora R.-D. 28.
cordylurina HOLMGR. 8.
corni KALTENB. 254.
corniculata ZETT. 130.
cornuta FABR. 118.
cornuta FALL. 184.
cornuta SCOP. 114.
cornuta MEIG. 145.
coronata ZETT. 28.
coronata LW. 234.
coronatum ROND. 265.
corrigiolata L. 157.
corrigiolata FALL. 156.
corsicana BECK., 87.
corsyra WALK. 144.
corticarum ROND. 102.
corticina ROND. 132.
corvi SCOP. 278.
coryleti SCOP. 66.
coryleti SCHIN. 65.
coryli ♂ ROS. (*Aciura*) 109.
coryli ♀ ROS. (*Aciura*) 109.
cosmia WOLLAST. 142.
costalis ZETT. 24.
costalis LW. 90.
costata MEIG. (*Orchisia*) 76.
costata MEIG. (*Diast.*) 225.
costata ZETT. (*Chym.*) 222.
costata var. *b.* ZETT. (*Diast.*) 225.
costata v. ROS. 229.
costata LW. 194.
costatus MEIG. 24.
cothurnata PANZ. 156.
cothurnata FALL. 156.
Courtilleri FAIRM. 275.
coxalis v. ROS. 179.
coxalis STROBL. 194.
coxarum ZETT. 148.
coxata ZETT. (*Agr.*) 242.
coxata ZETT. (*Ditacnia*) 60.
coxata STENH. 31.
crassicosta BECK. 210.
crassimana HALID. 31.
crassinervis ZETT. 87.
crassipennis FABR. 99.
crassipes ZETT. 16.
crassipes LW. 48.
crassiset ZETT. 254.
crassiset KALTENB. 61.
crassiset STROBL. 242.
crenatus MEIG. 28.
crepidaria MEIG. 87.
eribrata STENH. 213.
eribrata ROND. 70.
eribrata BIG. 137.
eribrina ROND. 132.
crinicornis FALL. 71.
crystallophila BECK. 87.
cucularia L. 67.
cucularia FABR. 68.
cucularia var. β HALID. 68.
culmorum FALL. 174.
cunctans MEIG. 242.
cuneiventris ZETT. 20.
cunisosa MAD. 273.
cuniculorum R.-D. 48.
curtiventris STENH. 31.
curvicanda MEIG. 214.
curvina ROND. 28.
curvinervis STENH. 31.
curvinervis ZETT. 167.
curvinervis ROND. 114.
curvipalpis ZETT. 243.
curvipennis FALL. 218.
curvipennis ZETT. 216.
curvipes v. D. WULP. 148.
curvipes LATR. 28.
cuspidata MEIG. 125.
cylindrica FABR. 149.
cylindrica FALL. 148.
cylindrica MEIG. 260.
cylindrica R.-D. (*Tryp.*) 118.
cylindrica R.-D. (*Sarg.*) 20.
cylindricornis FABR. 84.
cynaræ ROND. 118.
cynipsea L. 145.
cynipsea R.-D. 146.
cynophila PANZ. 21.
cypseli ROND. 279.
Czernyi HEND. 54.
dalmatica BECK. 8.
dalmatina STROBL. (*Dipt.*) 167.
dalmatina STROBL. (*Eur.*) 175.
dasycera LW. 169.
dasyops MEIG. 87.
dasyprocta LW. (*Siph.*) 176.
dasyprocta LW. (*Ok.*) 16.
dasythrix BECK. 8.
dauci R.-D. 113.
dauci FABR. 125.
debilis Egg. 159.
decaspila LW. 76.
decempunctata FALL. 76.
decipiens HALID. 8.
decipiens LW. (*Saprom.*) 76.
decipiens LW. (*Paral.*) 188.
decisa WOLLAST. 122.
decora LW. (*Lobiop.*) 237.

- decora* Lw. (*Clusia*). 40.
decrepita ZETT. 37.
dodecor Lw. 76.
defecta MEIG. 54.
defecta HALID. 210.
Dejeanii R.-D. (*Clidog*) 19.
Dejeanii R.-D. (*Cordyl.*) 2.
Dejeanii R.-D. (*Uroph.*) 125.
Dejeanii R.-D. (*Tryp.*) 118.
Dejeanii R.-D. (*Corem.*) 71.
Delarouzei BIG. 50.
delicatula R.-D. 76.
demandata FABR. 107.
dentata Lw. 118.
denticornis PANZ. 250.
denticulata PANZ. 251.
denticulata MEIG. 28.
dentigera Lw. 156.
dentimanus ZETT. 16.
despecta HALID. 213.
desponsata ROND. 272.
Deutschi ZETT. 87.
Deutschi SCHIN. 87.
diadema MEIG. (*Hapl.*) 166.
diadema MG. (*Aulacig.*) 216.
diadema STENH. 31.
diadematum ROND. 265.
dichaëta Lw. 210.
didotoma Lw. 116.
didyma ZETT. 169.
didyma SCHIN. 169.
difformis Lw. 76.
dilacerata Lw. 137.
dilecta ROND. 76.
dimidiata Lw. (*Saprom.*) 76.
dimidiata Lw. (*Brach.*) 207.
dimidiata v. Ros. 163.
dimidiata COSTA 110.
dimidiatipennis STROBL. 194.
dioseurea Lw. 137.
diotidis ROND. 137.
diplotoxoides STROBL. 177.
diseedens BECK. 155.
discicornis Lw. 169.
diseoidea FABR. 108.
diseoidea FALL. 142.
diseoidea MG. (*Acidia.*) 111.
diseoidea MG. (*Peplom.*) 83.
discolor STENH. 198.
discrepans v. D. WULF. 243.
dispar ZETT. (*Parall.*) 3.
dispar ZETT. (*Tryp.*) 118.
dispar SCHUM. 161.
dispar ROND. 266.
distans Lw. 118.
distigma MEIG. 217.
distincta WIED. 269.
distincta MEIG. 150.
distincta v. Ros. 179.
distincta Egg. 220.
distinctus MEIG. 62.
distinctus SCHIN. 62.
distinctus HEND. 62.
divergens Lw. (*Hapl.*) 166.
divergens Lw. (*Bal.*) 229.
diversa FRFLD. 284.
diversa ROND. 50.
divisa Lw. (*Chlor.*) 169.
divisa Lw. (*Hedron*) 68.
dolium FABR. 154.
domestica R.-D. 48.
dominula Lw. 95.
doronici Lw. 132.
doronici R.-D. 122.
dorsalis FABR. (*Hydr.*) 69.
dorsalis FABR. (*Dalm.*) 272.
dorsalis FABR. (*Myop.*) 266.
dorsalis WIED. 263.
dorsalis MACQ. (*Sapr.*) 76.
dorsalis MACQ. (*Euphr.*) 109.
dorsalis MACQ. (*Tryp.*) 118.
dorsalis R.-D. 118.
dorsalis Lw. 163.
dorsata LATR. 272.
dorsata ZETT. (*Sciom.*) 55.
dorsata ZETT. (*Gimm.*) 20.
dorsata var. ZETT. (*Sciom.*) 55.
dorsata STENH. 186.
dorsata SIEBKE. 243.
dorsata STROBL. 60.
dracunculi ROND. 133.
dromedariina SPEIS. 274.
dryomyzina ZETT. 57.
dubia FALL. 55.
dubia MACQ. (*Psila*) 159.
dubia MACQ. (*Oscin.*) 179.
dubia GIMMERTH. 77.
ducalis A. COSTA. 175.
Dufouri WESTW. 285.
Dufouri R.-D. 269.
duodecimpunctata MACQ. 77.
duplicata HALID. 146.
duploiseta STROBL. 48.
duplosetosa BECK. 194.
durrenbergensis Lw. 191.
Dzieduszyckii FRFLD. 126.
echii KALTENB. 143.
Eggeri FRFLD. 137.
Eggeri SCHIN. 36.
egyptiaca MACQ. 274.
elata FABR. 62.
electa BECK. 192.
elegans LATR. 95.
elegans PANZ. 234.
elegans MEIG. (*Conops*) 260.
elegans MEIG. (*Phyt.*) 255.
elegans GOUREAU. 255.
elegans R.-D. 100.
elegans MACQ. 57.
elegantula ZETT. (*Ast.*) 219.
elegantula ZETT. (*Agr.*) 243.
Elisae MEIG. 85.
elongata MEIG. 163.
elongatula Lw. 133.
elongatus MEIG. 165.
elongella ZETT. 243.
eluta MEIG. 142.
emarginata Lw. 46.
emarginata BECK. 77.
ensifer MEIG. 87.
ensifer THOMS. 179.
ephippium FABR. (*Cal.*) 156.
ephippium FABR. (*Myop.*) 266.
ephippium ZETT. (*Chlor.*) 169.
ephippium ZETT. (*Pallop.*) 90.
ephippium ZETT. (*Psila*) 159.
equi MACQ. 274.
equina L. 274.
equina var. β . FALL. 27.
equinus FALL. (*Borb.*) 24.
equinus var. β . FALL. (*Borb.*) 24.

- Ercolanii* ROND. 288.
erinaceus LW. 185.
erilepidis LW. 125.
erostatum ROND. 265.
errans MEIG. 243.
erratica HALID. 31.
erythrocephala WIED. 107.
erythrocephala ME. (*Cord.*) 2.
erythrocephala MEIG. (*Clid.*) 19.
erythrocephala ZETT. 167.
erythrophthalma PANZ. 220.
erythrophthalma MEIG. 106.
erythrostoma MEIG. 198.
erythrostoma HOLMGR. 9.
erythrurum ROND. 271.
etrusca ROND. 99.
eupatorii KALTENB. 243.
euphrasiae KALTENB. 255.
exacheta ROND. 118.
excisa LW. 46.
exigua MEIG. 243.
exigua ROND. 31.
exilis MEIG. 243.
eximia HALID. 9.
eximia STENH. 22.
eximia COLLIN. 28.
exornata SPEISER. 276.
extenuatum ROSSI. 163.
extrema WALK. 38.
facialis KALTENB. 255.
falcata SCOP. 118.
falcinelli ROND. 276.
falcinelli DE STEPH. 276.
fallaciosa BRISCHKE. 255.
fallax CZERNY. 211.
fallax LW. 137.
Fallenii STAEG. 148.
Fallenii SCHIN. 18.
farinae BECK. 213.
fasciata FABR. 104.
fasciata FALL. 77.
fasciata MG. (*Myopa*) 266.
fasciata MEIG. (*Phyt.*) 255.
fasciata MEIG. (*Chlor.*) 170.
fasciata MEIG. (*Dros.*) 220.
fasciata MEIG. (*Salic.*) 73.
fasciata R.-D. 97.
fasciata MACQ. (*Pallop.*) 90.
fasciata MACQ. (*Phyt.*) 255.
fasciata MACQ. (*Opom.*) 228.
fasciata LW. 234.
fasciata STROBL. 243.
fasciatum MEIG. (*Amaur.*) 7.
fasciella ZETT. 179.
fasciella STROBL. 179.
fasciola MEIG. (*Agr.*) 243.
fasciola MEIG. (*Oscin.*) 179.
fascipes MEIG. 179.
fascipes BECK. 18.
fascitibia v. ROS. 198.
fasciventris BECK. 196.
fastuosa ROND. 95.
favillacea BECK. 182.
femoralis WIED. 156.
femoralis MEIG. (*Cerat.*) 251.
femoralis MEIG. (*Ther.*) 26.
femoralis MEIG. (*Crass.*) 185.
femoralis R.-D. (*Oxyina*) 133.
femoralis R.-D. (*Aciura*) 109.
femoralis R.-D. (*Uroph.*) 126.
femoralis R.-D. (*Sapr.*) 77.
femoralis R.-D. (*Oecoth.*) 269.
femoralis v. ROS. 255.
femoralis ZETT. 255.
femoralis LW. (*Helom.*) 42.
femoralis LW. (*Norell.*) 13.
femoralis BRISCH. 255.
femorata FABR. 269.
femorata MACQ. (*Mer.*) 168.
femorata MACQ. (*Ther.*) 26.
femorata STENH. 202.
femorella FALL. 232.
fenestralis FALL. (*Limos.*) 31.
fenestralis FALL. (*Oecoth.*) 47.
fenestralis PERRIS. 48.
fenestralis ZETT. 46.
fenestrarum FALL. 220.
fenestrarum R.-D. (*Bleph.*) 48.
fenestrarum R.-D. (*Chir.*) 232.
fenestrarum MEIG. 220.
fenestrata MACQ. (*Limn.*) 70.
fenestrata MACQ. (*Ortal.*) 95.
fenestrata STENH. 213.
fenestrata ZETT. 138.
fenestrata BECK. 204.
ferruginata STENH. 31.
ferruginea PANZ. 267.
ferruginea FALL. 63.
ferruginea R.-D. 150.
ferruginea MG. (*Helom.*) 42.
ferruginea MEIG. (*Belph.*) 48.
ferruginea MACQ. 260.
ferrugineus L. 271.
ferrugineus L. DUF. 72.
ferruginosa v. D. WULP. 243.
festiva MEIG. 255.
figurata ZETT. 170.
flaginis LW. 142.
filata LW. 46.
filata ZETT. 163.
filia BECK. 77.
filiforme BECK. 189.
filiformis FABR. 158.
filiformis R.-D. 52.
filiformis ZETT. (*Leptopa*) 5.
filiformis ZETT. (*Micr.*) 6.
filiola LW. 109.
filipes R.-D. 4.
finetaria L. 159.
finetarius MEIG. 24.
fineti SCHRANK. 148.
fissa LW. 116.
fissa BECK. 146.
Fitzingeri KOL. 289.
flava L. 232.
flava GEOFFR. 130.
flava PANZ. 159.
flava p. p. FABR. (*Chir.*) 233.
flava FALL. (*Phyt.*) 255.
flava FALL. (*Dros.*) 220.
flava MEIG. (*Scapt.*) 223.
flava MEIG. (*Cuscia*) 40.
flava MEIG. (*Helom.*) 42.
flava WIED. 2.
flava R.-D. (*Saprom.*) 77.
flava R.-D. (*Saprom.*) 77.
flava HALID. 6.
flava MACQ. 179.
flava ZETT. (*Helom.*) 42.
flava ZETT. (*Amphip.*) 155.

- flava* BRULLÉ. 175.
flava v. ROS. 13.
flavella ZETT. (*Anth.*) 231.
flavella ZETT. (*Siphon.*) 177.
flaveola FABR. 37.
flaveola FALL. (*Agr.*) 243.
flaveola var. FALL. (*Agr.*) 243.
flaveola MEIG. (*Not.*) 186.
flaveola MEIG. (*Scapt.*) 223.
flaveola R.-D. (*Heloni.*) 42.
flaveola R.-D. (*Tephr.*) 51.
flaveola MACQ. 51.
flaveola ZETT. (*Leptopa.*) 6.
flaveola var. ZETT. (*Dryom.*) 37.
flaveola GOUR. 255.
flavescens FABR. (*Oxyn.*) 133.
flavescens FABR. (*Tryp.*) 119.
flavescens MEIG. 272.
flavescens MACQ. 94.
flavencens R.-D. (*Oxyn.*) 133.
flavescens R.-D. (*Lunig.*) 65.
flavescens R.-D. (*Dalm.*) 272.
flavescens STENH. 211.
flavicans R.-D. 116.
flavicauda MEIG. (*Norell.*) 13.
flavicauda MEIG. (*Tephr.*) 138.
flavicauda ZETT. 138.
flaviceps OLIV. 179.
flaviceps FALL. 243.
flaviceps MEIG. (*Hydr.*) 198.
flaviceps MEIG. (*Sciom.*) 55.
flaviceps ZETT. (*Lim.*) 31.
flaviceps ZETT. (*Pioph.*) 152.
flaviceps HALID. 198.
flavicornis FALL. (*Hydr.*) 198.
flavicornis FALL. (*Phyt.*) 255.
flavicornis MEIG. 13.
flavicornis R.-D. 233.
flavicornis STENH. 199.
flavicornis ZETT. 243.
flavicornis LW. 48.
flavicornis EGG. 251.
flavicoxa STROBL. 255.
flavidipennis ZETT. 87.
flavifrons PANZ. 70.
flavifrons MEIG. (*Con.*) 261.
flavifrons MEIG. (*Agr.*) 243.
flavifrons MACQ. 170.
flavifrons ZETT. 42.
flavilabris MACQ. 255.
flavilabris STENH. 199.
flavimana MEIG. 146.
flavimana MACQ. 179.
flavimana ZETT. 243.
flavimana SCHIN. 146.
flavipalpis HALID. 234.
flavipalpis LW. 77.
flavipennis HALID. 24.
flavipennis R.-D. 267.
flavipennis MACQ. 284.
flavipennis STENH. 211.
flavipennis ZETT. 223.
flavipennis LW. 133.
flavipes L. 261.
flavipes SCHRANK. 72.
flavipes FALL. (*Amour.*) 7.
flavipes FALL. (*Philyg.*) 202.
flavipes FALL. (*Lion.*) 216.
flavipes FALL. var. β . (*Phil.*) 202.
flavipes MEIG. (*Dros.*) 220.
flavipes MEIG. (*Limos.*) 31.
flavipes MEIG. (*Desm.*) 238.
flavipes MEIG. (*Tricop.*) 17.
flavipes R.-D. 272.
flavipes R.-D. (*Carph.*) 129.
flavipes R. D. (*Sapr.*) 77.
flavipes MACQ. (*Phyt.*) 255.
flavipes MACQ. (*Ochtip.*) 234.
flavipes MACQ. (*Hydr.*) 199.
flavipes ZETT. (*Tephr.*) 51.
flavipes ZETT. (*Pioph.*) 152*
flavipes ZETT. (*Paranth.*) 231.
flavitarsis MEIG. (*Hapl.*) 167.
flavitarsis MEIG. (*Cum.*) 174.
flavitarsis MEIG. (*Pioph.*) 152.
flavitarsis MEIG. (*Phyll.*) 238.
flavitarsis ZETT. 213.
flavitarsis ROND. 42.
flavitibialis STROBL. 256.
flaviventris MEIG. 191.
flaviventris ZETT. 256.
flaviventris v. ROS. 185.
flaviventris A. COSTA 77.
flaviventris STROBL. 243.
flavocincta WHLB. 252.
flavocincta STROBL. 243.
flavofemorata MACQ. 179.
flavofrontata BECK. 185.
flavogeniculata v. ROS. 243.
flavonotata HALID. 243.
flavoseutellaris ZETT. 243.
flavoseutellata FALL. 256.
flavoseutellata MEIG. 99.
flavoseutellata BECK. 102.
flavotestacea ZETT. 46.
flavovenosa BECK. 2.
flesuosa v. RÖD. 144.
fleuxosa GERM. 126.
fleuxosa WALK. 144.
florea R.-D. 267.
florescentiae L. 119.
florum FABR. 228.
fluvialis ROND. 9.
foeda LW. 42.
fontanalis ROND. 9.
fontinalis FALL. 31.
fontinalis var. *min.* ZETT. 31.
formicaria R. D. 102.
formosa PANZ. 95.
formosa WIED. 37.
formosa LW. (*Tephr.*) 138.
formosa LW. (*Trypt.*) 66.
formosa LW. (*Neoalt.*) 240.
formosa LW. (*Gitona.*) 217.
fossarum HALID. 208.
foveolata MEIG. 152.
foveolata ROND. 63.
fragilis R.-D. 42.
fragilis BECK. 146.
Francilloni LEACH. 275.
fratella BECK. 192.
fraterna LW. 263.
fraternus MEIG. 17.
fraudulosa LW. 101.

*) vide Addenda et Corrigenda.

- Frauenfeldi NOW. 102.
 Fraunfeldi SCHN. 123.
 Frauenfeldi KOLEN. 286.
 Friesi FALL. 95.
 Friesi ZETT. 5.
 frigida FABR. 22.
 frigida HOLMGR. 18.
 frigida MEIG. 22.
 fringillarum FRFLD. 38.
 fringillina CURT. 278.
 frit L. 179.
 frit var. 3. FALL. 179.
 frondescens L. 97.
 frontalis FABR. 271.
 frontalis FALL. 226.
 frontalis MEIG. (Agr.) 244.
 frontalis MEIG. (Trigon.) 41.
 frontalis MEIG. (Diast.) 225.
 frontalis MACQ. (Clidog.) 19.
 frontale MACQ. (Amaur.) 7.
 frontalis LW. (Hydr.) 199.
 frontalis LW. (Saprom.) 77.
 frontata ZETT. 18.
 frontata BECK. 87.
 frontella FALL. 180.
 frontella ROND. (Dom.) 249.
 frontella ROND. (Ochth.) 234.
 fronticornis ROND. 244.
 frontina A. COSTA. 190.
 frontosa MEIG. 166.
 fucata ROND. 32.
 fucicola DOUMER. 23.
 fucorum ZETT. (Coelopa.) 22.
 fucorum ZETT. (Phyc.) 21.
 fugax BECK. 87.
 fulgens MEIG. 146.
 fulgida R.-D. 146.
 fulgida BECK. 194.
 fuliginea ROND. 77.
 fuliginosa R.-D. (Hydr.) 199.
 fuliginosum R.-D. (Zod.) 271.
 fuliginosus R.-D. (Borb.) 24.
 fulminans MEIG. (Plat.) 108.
 fulva R.-D. 4.
 fulvella ROND. 244.
 fulviceps STENH. 199.
 fulviceps v. ROS. 170.
 fulviceps HOLMGR. 152.
 fulviceps ROND. 32.
 fulviceps STROBL. 52.
 fulvicorne R.-D. (Zod.) 271.
 fulvicornis R.-D. (Not.) 186.
 fulvicornis BIG. 87.
 fulvifrons R.-D. 269.
 fulvifrons HALID. (Diast.) 225.
 fulvifrons HALID. (Osc.) 180.
 fulvifrons HALID. (Eutr.) 167.
 fulvipalpis R.-D. 267.
 fulvipes MEIG. (Cer.) 251.
 fulvipes MEIG. (Clidog.) 19.
 fulvipes MEIG. (Limos.) 32.
 fulvipes MEIG. (Cord.) 2.
 fulvipes MEIG. (Accroc.) 17.
 fulvipes R.-D. (Occem.) 269.
 fulvipes R.-D. (Zodion.) 271.
 fulvipes MACQ. 199.
 fulvipes ZETT. 18.
 fulviventre SCHRNK. 102.
 fulviventris MEIG. (Lox.) 164.
 fulviventris MEIG. (Osc.) 180.
 fumigata (Scop.) 70.
 fumipennis MEIG. (Osc.) 180.
 fumipennis MEIG. (Tryp.) 227.
 fumipennis ZETT. 53.
 fumipennis STENH. 24.
 fumipennis WALK. 150.
 fumipennis LW. 165.
 fumipennis ROND. 53.
 fumipennis SAHLB. 275.
 fumosa STENH. 214.
 fumosa EGG. 87.
 funebris FABR. 220.
 fungicola HALID. 32.
 fungivora R.-D. 48.
 fungorum R.-D. 42.
 fureata FABR. 21.
 furcata ZETT. 208.
 furcata PERRIS. 185.
 furta WALK. 218.
 fusca MACQ. 214.
 fusca STENH. 199.
 fuscana MEIG. (Helom.) 42.
 fuscana MEIG. (Blephar.) 48.
 fuscipennis BIG. 261.
 fuscilla STENH. 194.
 fuscicornis MEIG. (Scat.) 9.
 fuscicornis MEIG. (Sapr.) 77.
 fuscicornis MG. (Dryom.) 37.
 fuscicornis LW. 119.
 fuscimana ZETT. 222.
 fuscimana v. ROS. 55.
 fuseinervis ZETT. (Sciom.) 55.
 fuseinervis ZETT. (Teph.) 51.
 fuseinervis ZETT. (Psila.) 159.
 fuseinervis ZETT. (Scat.) 9.
 fuseinervis BECK. 196.
 fuscipennis MEIG. (Phacom.) 53.
 fuscipennis MEIG. (Oec.) 47.
 fuscipennis MACQ. (Opm.) 228.
 fuscipennis MACQ. (Con.) 261.
 fuscipennis MACQ. (Scot.) 155.
 fuscipennis MACQ. (Par.) 208.
 fuscipennis R.-D. 162.
 fuscipennis HALID. 32.
 fuscipennis ZETT. 24.
 fuscipennis GIMMERTH. 2.
 fuscipennis A. COSTA. 170.
 fuscipennis ROND. 54.
 fuscipennis GIRSCHN. 54.
 fuscipes MACQ. (Oscin.) 180.
 fuscipes MACQ. (Agr.) 244.
 fuscipes MACQ. (Sciom.) 55.
 fuscipes v. ROS. (Sepsis.) 146.
 fuscipes v. ROS. 185.
 fuscipes ZETT. 4.
 fuseitibia ROND. 4.
 fuscolumbata STROBL. 244.
 fuscotestacea ZETT. 77.
 fuscula FALL. 225.
 fuscula MEIG. 221.
 fuscula ZETT. 256.
 Gaedii MEIG. 111.
 gagatea R.-D. 150.
 gagatea LW. 109.
 galactoptera BECK. 194.
 gangraenosa FABR. 96.
 gangraenosa PANZ. 90.
 gangraenosa R.-D. 99.
 garzettæ ROND. 276.
 gei BRISCHKE. 244.
 gemina WIED. 272.

- geminata* MEIG. 170.
geminata MEIG. 138.
geminatiois ROND. 103.
geniculata FABR. 85.
geniculata FALL. 244.
geniculata R.-D. 32.
geniculata MEIG. 173.
geniculata MACQ. (*Lim.*) 32.
geniculata MACQ. (*Olin.*) 27.
geniculata MACQ. (*Phyt.*) 256.
geniculata HALID. 234.
geniculata ZETT. (*Ochth.*) 234.
geniculata ZETT. (*Leuc.*) 236.
geniculata ZETT. var. *c.*
 (*Cord.*) 2.
geniculata ZETT. p. p. [*Blephar*]
 (*modesta*) 48.
geniculata ZETT. p. p. [*Blephar*]
 (*serrata*) 48.
geniculata STENH. 199.
geniculata BRULLE 256.
geniculata BIG. 146.
gentilis MEIG. 170.
gentilis R.-D. 66.
genualis LW. 96.
geomyzina FALL. 39.
geomyzina var. *b.* FALL. 39.
geomyzina p. p. MEIG. 39.
geomyzina var. *c.* ZETT. 39.
geomyzina LW. 39.
germana R.-D. 67.
germinationis L. 228.
germinationis ROSSI. 97.
germinationis SCHK. 229.
gestroi ROND. 278.
Ghilianii ROND. 97.
gibbum PERRIS. 224.
gigantea MEIG. 42.
gilva LW. 211.
gilvipes LW. (*Platyst.*) 103.
gilvipes LW. (*Oscin.*) 180.
Girschneri v. RÖD. 192.
glaberrima MEIG. 180.
glabra FALL. (*Camilla*) 124.
glabra FALL. (*Madiza*) 239.
glabra MEIG. (*Athyr.*) 191.
glabra MEIG. (*Chlor.*) 173.
glabra MEIG. (*Limos.*) 32.
glabra MEIG. (*Anth.*) 231.
glabra WALK. 23.
glabra BECK. 176.
glabra'a FABR. 85.
glabrata MEIG. 85.
glabrata ZETT. 9.
glabricula FALL. (*Dichr.*) 58.
glabricula FALL. (*Clas.*) 194.
glabricula p. p. FALL. 58.
glabricula MEIG. (*Lim.*) 216.
glabricula MG. (*Pelina*) 206.
glabrifrons MEIG. 24.
glacialis MEIG. 27.
glauca MEIG. 209.
glauca STENH. 195.
glaucescens LW. 15.
glechomae KALTENB. 56.
globifera BOHEM. 189.
gnaphalii LW. 142.
gracilipes MG. (*Diast.*) 225.
gracilipes MG. (*Lept.*) 234.
gracilis FALL. 231.
gracilis MG. (*Domom.*) 249.
gracilis MEIG. (*Chlor.*) 170.
gracilis MEIG. (*Psila*) 159.
gracilis ZETT. 148.
gracilis WALK. 223.
gracilis LW. (*Chyl.*) 162.
gracilis LW. (*Dich.*) 73.
gracilipes LW. 119.
gracum LW. 110.
grallatrix LW. 158.
graminis KALTENB. 244.
graminum FABR. 93.
graminum FALL. 223.
graminum var. *d.* FALL. 223.
graminum MACQ. 93.
graminum HALID. 211.
grandicorne ROND. 251.
grandinata ROND. 133.
grandis MEIG. 267.
grandis ROND. 93.
grata LW. 96.
gravis HALID. 23.
grisea FALL. 252.
grisea WIED. 183.
grisea MEIG. 77.
grisea STENH. 199.
grisea R.-D. 269.
grisea BOUCHÉ. 236.
griseicollis BECK. 55.
griseola FALL. (*Leucop.*) 236.
griseola FALL. (*Sciom.*) 55.
griseola FALL. (*Hydr.*) 199.
griseola FALL. p. p. ♀. 199.
griseola MEIG. (*Leucop.*) 236.
griseola MEIG. (*Helom.*) 42.
griseola ZETT. (*Trypt.*) 227.
griseola ZETT. (*Scapt.*) 223.
griseola ZETT. (*Leucop.*) 236.
griseola HARTIG. 236.
griseola WULP. (*Mad.*) 240.
griseolum WULP. (*Desmom.*)
 259.
griseocens MEIG. 60.
griseocens BECK. 189.
grossicornis ZETT. 244.
grossipes R.-D. 77.
Guerini R.-D. (*Sciom.*) 55.
Guerini R.-D. (*Occem.*) 269.
guttata FALL. (*Hyad.*) 204.
guttata FALL. (*Teph.*) 138.
guttata MEIG. 95.
guttata var. *b.* STENH. 204.
guttatofasciata LW. 133.
guttella ROND. 133.
guttipennis ZETT. 228.
guttipennis STENH. 206.
guttiventris STENH. 186.
guttularis MEIG. 129.
guttulosa LW. 129.
gymnostoma LW. 256.
gyrans FALL. 244.
gyrans LW. 99.
Haeffneri FALL. 72.
haemorrhoidalis MEIG. 18.
haemorrhoidalis ZETT. 244.
halensis LW. 71.
Halidayi COLLIN. 32.
halophila v. HEYD. 209.
halterata MEIG. 48.
halterata BECK. 213.
hamatus HALID. 24.

- hamifera LW. 113.
 hamifera BECK. 213.
 haplegoides STROBL. 180.
 harlemensis WEYENB. 256.
 hastata FABR. 126.
 Hebe NEWM. (*Tryp.*) 119.
 Hebe NEWM. (*Rhagol.*) 115.
 hecate HALID. 208.
 Heiseri FRFLD. 138.
 helianthi ROND. 142.
 helichrysi ROND. 142.
 heliosciadi KALTENB. 256.
 hellebori KALTENB. 256.
 helvipes ROND. 97.
 helvola BECK. 77.
 hemapterus EGG. 36.
 Henselli SINT. 228.
 hepaticae FRFLD. 256.
 hepaticoloris BECK. 191.
 heraclei L. 112.
 heraclei FABR. 138.
 heraclei BOUCHÉ. 244.
 heraclei WALK. 138.
 heraclei HARDY. 256.
 herbarum R.-D. (*Doryc.*) 93.
 herbarum R.-D. (*Ochthiph.*) 234.
 herbarum R.-D. (*Ditaen.*) 60.
 herbarum R.-D. (*Rivell.*) 104.
 herbarum R.-D. (*Ensina.*) 122.
 Hermannii LEACH. 288.
 heryngii ROND. 94.
 heteromyzina ZETT. 18.
 heteroneura HALID. 32.
 heteroptera LW. 256.
 hexachaeta LW. 119.
 hiemalis LW. 46.
 hieracii FABR. 66.
 hieracii KALTENB. 244.
 hilarella ZETT. (*Gymn.*) 52.
 hilarella ZETT. (*Agrom.*) 244.
 hilarella ZETT. (*Saprom.*) 77.
 hilaris MEIG. 146.
 hilaris ZETT. 42.
 hilaris ROND. 99.
 hircus ZETT. 15.
 hirsuta LW. 170.
 hirta WALK. 236.
 hirticeps ZETT. 87.
 hirtipes R.-D. 27.
 hirtipes BECK. 146.
 hirtula ROND. 32.
 hirundinis PANZ. 280.
 hirundinis L. 279.
 hirundinum ROSSI. 280.
 hispanica MEIG. 73.
 hispanica LW. 43.
 hispanica MIK. 85.
 hispanica DE BRÈME. 144.
 hispanica BIG. 158.
 hispanicus LW. 72.
 histrio MEIG. 221.
 Hoffmannseggi MEIG. 161.
 Hoffmeisteri LW. 154.
 holosericea BOUCHÉ. 244.
 hordei OLIV. 138.
 hordei BJERK. 180.
 horticola GOUREAU. 256.
 hortoniensis CURTIS. 164.
 hortulana ROSSI. 100.
 Huberi FRFLD. 285.
 humeralis ZETT. (*Bleph.*) 48.
 humeralis ZETT. (*Psila*) 160.
 humeralis v. ROS. (*Agr.*) 244.
 humeralis v. ROS. (*Salt.*) 150.
 humeralis LW. 180.
 humeralis BECK. 204.
 humida R.-D. 48.
 humida HALID. 32.
 humilis MEIG. 43.
 humilis R.-D. 9.
 humilis LW. (*Chlor.*) 170.
 humilis LW. (*Ditaen.*) 60.
 hyalinata PANZ. 101.
 hyalinata MEIG. 77.
 hyalinata ZETT. 85.
 hyalipennis MEIG. (*Osc.*) 180.
 hyalipennis MEIG. (*Agr.*) 244.
 hyalipennis MG. (*Sphaer.*) 28.
 hyalipennis MACQ. 146.
 hyalipennis ZETT. (*Leuc.*) 236.
 hyalipennis ZTT. (*Lonch.*) 87.
 hyalipennis v. ROS. 63.
 hyalipennis STROBL. 165.
 hybrida LW. 93.
 hydrocotyles HALID. 199.
 hydromyzina FALL. 18.
 hydromyzina var. b. ZETT. 18.
 hyoseyami L. 138.
 hyoseyami FALL. 138.
 hyoseyami FRFLD. 138.
 hypoleuca MEIG. 218.
 hypoleuca ZETT. 218.
 hypostigma MEIG. 170.
 Hyrtli KOLEN. 289.
 ichneumonea L. 164.
 ichneumonea FALL. 164.
 ichneumonea R.-D. 69.
 ilicis KALTENB. 256.
 illota CURTIS. 234.
 illota LW. 78.
 imbuta MEIG. 244.
 immaculata MACQ. 119.
 immaculata v. ROS. 160.
 immaculata ROND. 96.
 immundus ZETT. 16.
 impatientis BRISCHKE. 244.
 impressa MEIG. 32.
 impressifrons L.-DUF. 216.
 impudica ROND. 2.
 impunctata R.-D. (*Ocht.*) 235.
 impunctata R.-D. (*Tryp.*) 120.
 impunctata R.-D. (*Sap.*) 78.
 impunctata v. ROS. 236.
 impunctata LW. 94.
 inaequalis LW. 87.
 inamoena BECK. 85.
 incana MEIG. 223.
 incana STENH. 199.
 incanus MEIG. 25.
 incerta ZETT. 2.
 incisa MEIG. (*Cordyl.*) 2.
 incisa MEIG. (*Agrom.*) 244.
 incisa MACQ. (*Phyt.*) 256.
 incisa MACQ. (*Scatoph.*) 9.
 incisuralis MACQ. 170.
 inclusa WOLLAST. 63.
 incola BECK. 9.
 incompleta BECK. 120.
 inconstans LW. 167.
 inconstans BECK. 235.

- incurva* FALL. 190.
indagator LW. 241.
indistincta BECK. 211.
inermis BECK. 7.
inermis BECK. (*Asmer.*) 205.
iners MEIG. 48.
infecta HALID. 208.
infumatum BECK. 190.
infuscata MEIG. 244.
infuscata v. ROS. 25.
ingrata HALID. 221.
ingrata LW. 167.
inornata LW. (*Helom.*) 43.
inornata LW. (*Pern.*) 93.
inornata LW. (*Diast.*) 225.
inpunctata MACQ. 146.
inquinata MEIG. 9.
inscripta MEIG. 48.
insignis LW. 261.
insignis THOMS. 180.
insignis JAENN. 267.
insularis WOLLAST. 131.
insularum ROND. 103.
intermedia MACQ. 160.
intermedia R.-D. 164.
intermedia FRFLD. 120.
intermissa MEIG. 113.
interrupta FALL 113.
interrupta MEIG. 170.
interrupta HALID. 202.
interrupta BEZZI 261.
interstincta FALL. (*Sipr.*) 78.
interstincta FALL. (*Phil.*) 202.
interstincta FALL. (*Elg.*) 69.
interstincta MEIG. 202.
intonsa LW. 78.
inulae v. ROS. 124.
inulae R.-D. 156.
inusta MEIG. 78.
irrorata FALL. 138.
irrorata MACQ. (*Limn.*) 70.
irrorata MACQ. (*Scat.*) 211.
irrorata MACQ. (*Lunig.*) 65.
irroratum FABR. 271.
Isis BECK. 215.
islandica BECK. 9.
jaceae R.-D. (*Tryp.*) 120.
jaceae R.-D. (*Oxyph.*) 131.
Jacobaeae PANZ. 126.
jaeulata ROND. 126.
japonica WIED. 120.
jasoniae L. DUF. 124.
Jolani POK. 221.
jucunda R.-D. 96.
juncorum FALL. (*Ohth.*) 235.
juncorum var. *b.* FALL. 235.
juncorum FALL. (*Rivell.*) 104.
kairensis BECK. 191.
Kaltenbachi MEIG. 51.
Kawalli GIMMERTH. 158.
Kertészi HENDEL. 63.
kirbyana LEACH. 280.
Kollari FRFLD. 284.
Komarowii MIK. 107.
Kowarzi LW. 96.
Kunzei ZETT. 16.
labiosa BECK. 78.
lacera MEIG. 263.
laertella ROND. 244.
laeteipennis FALL. 244.
laetoguttata PORTSCH. 221.
laeustris MEIG. (*Lorod.*) 97.
lacustris MEIG. (*Scat.*) 211.
laeta MEIG. (*Teph.*) 51.
laeta MEIG. (*Chlor.*) 170.
laeta MEIG. (*Anthom.*) 231.
laeta MEIG. (*Merom.*) 168.
laeta ZETT. (*Sapr.*) 78.
laeta ZETT. (*Tephrochl.*) 51.
laeta ZETT. (*Chlor.*) 173.
laetabilis LW. 90.
laevifrons LW. (*Helom.*) 43.
laevifrons LW. (*Tetan.*) 63.
laevifrons LW. (*Oscin.*) 180.
laevigata FALL. 177.
laevigata MEIG. (*Pioph.*) 153.
laevigata MEIG. (*Liom.*) 217.
laevigata MEIG. (*Oscin.*) 180.
laevigata ZETT. 177.
laevigata LW. 213.
Lamarcki R.-D. 269.
lamed SCHRANK. 94.
lamellata BECK. 78.
lamii KALTENB. 245.
lamina BECK. 199.
laminata BRISCHKE. 245.
lanata LUNDB. 9.
lappae CEDERH. 120.
lappae R.-D. 131.
lappae MEIG. 120.
lappae ZETT. 120.
lappae GOUREAU. 256.
lappae LW. 245.
lappina R. D. 256.
lapponica STENH. 199.
lasiophthalma MACQ. 87.
lasiostoma BECK. 20.
lata SCHIN. 55.
laterale LW. 189.
lateralis FALL. (*Phyt.*) 257.
lateralis p.p. FALL. (*Phyt.*) 257.
lateralis MEIG. (*Scatoph.*) 9.
lateralis MEIG. (*Micr.*) 158.
lateralis MACQ. (*Agr.*) 245.
lateralis MACQ. (*Chlor.*) 170.
lateralis HALID. 170.
lateralis ZETT. 251.
laterella ZETT. (*Agr.*) 245.
laterella ZETT. (*Heter.*) 39.
lateritia ROND. (*Agr.*) 245.
lateritia ROND. (*Elgiva*) 69.
laticauda MEIG. 138.
laticauda KALTENB. 120.
laticauda WALK. 133.
laticeps LW. (*Ort.*) 96.
laticeps LW. (*Tetanops.*) 94.
laticeps STENH. 200.
laticincta BRULLÉ. 263.
laticornis MEIG. 88.
laticornis LW. 96.
laticornis ZETT. 88.
laticrus R.-D. 78.
latifrons LW. (*Ortal.*) 96.
latifrons LW. (*Chironom.*) 233.
latifrons LW. (*Calob.*) 156.
latifrons MEIG. 88.
latipalpis MEIG. 17.
la'ipalpis ZETT. 154.
latipenne BECK. 15.
latipes MEIG. (*Desm.*) 239.
latipes MEIG. (*Pioph.*) 153.

- lativentre LW. 103.
 Latreillei LEACH. 288.
 Latreillei R.-D. 2.
 latrinarum DEG. 48.
 lauta LW. 133.
 Leachi MEIG. 148.
 Leachi ZETT. 148.
 Leachi KOLEN. 286.
 Lefebvrei ZETT. 161.
 lejura ROND. 126.
 leontodontis DEG. 139.
 leontodontis p. p. DEG. 139.
 leontodontis FALL. 139.
 leontodontis ZTT.(Oryn.)133.
 leontodontis p. p. ZETT. 139.
 leontodontis var. a. ZETT. 139.
 lepida MEIG. (Hydr.) 200.
 lepida MEIG. (Trimer.) 188.
 lepida MEIG. (Osc.) 180.
 lepidopes BECK. 189.
 leptiformis SCHIN. 54.
 leptogaster PANZ. 162.
 leptogaster MEIG. 162.
 Lesgiae BECK. 13.
 lestremense BIG. 12.
 leucacanthi SCHRANK. 126.
 leucocephala MEIG. 245.
 leucopeza MEIG. (Dier.) 58.
 leucopeza MEIG. (Aulac.) 216.
 leucoptera R.-D. 32.
 leucoptera HALID. 32.
 leucostoma MEIG. (Eph.) 192.
 leucostoma MG. (Lonch.) 88.
 leucostoma MEIG. (Scat.) 211.
 leucostoma ZETT. (Am.) 7.
 leucostoma ZETT. (Sapr.) 78.
 levigata LW. 96.
 Lichtwardti HEND. 60.
 liliorum R.-D. 43.
 liliputana ROND. 32.
 limbardae SCHIN. 124.
 limbata MEIG. (Graph.) 57.
 limbata MEIG. (Chlor.) 170.
 limbata R.-D. (Herina.) 98.
 limbata R.-D. (Pherb.) 67.
 limbata R.-D. (Limn.) 70.
 limbata v. Ros. (Dros.) 221.
 limbata v. Ros. (Scat.) 9.
 limbata ROND. 90.
 limbatella ZETT. (Agr.) 245.
 limbatella ZETT. (Psila.) 160.
 limbinervis ROND. 25.
 limnea BECK. 78.
 limosa FALL. 32.
 limosa STENH. 32.
 limosa WALK. 32.
 limosina BECK. (Hydr.) 200.
 limosina BECK. (Atissa.) 191.
 limpidipennis R.-D. 36.
 linariae R.-D. (Ens.) 122.
 linariae R.-D. (Sphen.) 128.
 linariae KALTENB. 257.
 lineata FABR. 171.
 lineata FALL. (Elgiva.) 69.
 lineata var. FLL. (Chlor.) 171.
 lineata var. b. FALL. (Anthr.) 166.
 lineata MEIG. 173.
 lineata MACQ. (Carph.) 129.
 lineata MACQ. (Hydr.) 200.
 lineata R.-D. 43.
 lineata ZETT. (Micropr.) 49.
 lineata ZETT. (Chlor.) 173.
 lineatopunctata v. Ros. 228.
 lineella FALL. 182.
 lineella ZETT. (Agr.) 245.
 lineola ZETT. 171.
 lineola BRULLÉ. 171.
 lineola SCHIN. 183.
 lingens LW. 133.
 litoralis STENH. 32.
 litorea FALL. 9.
 litorella MEIG. (Hydr.) 200.
 litorella MEIG. (Dros.) 221.
 litorella var. b. FALL. 240.
 littoralis MEIG. (Parydr.) 208.
 littoralis MEIG. (Dros.) 221.
 litura MEIG. 84.
 liturata MEIG. 13.
 liturata R.-D. (Helom.) 43.
 liturata R.-D. (Rhagol.) 115.
 liturata R.-D. (Herina.) 98.
 liturata R.-D. (Sapr.) 78.
 liturata R.-D. (Dryom.) 37.
 liturata BRULLÉ. 257.
 liturella R.-D. 78.
 livens FABR. 14.
 lividipes ZETT. 19.
 lobata FABR. 90.
 Loewi SCHIN. 78.
 Loewi BECK. 8.
 Loewi HENDEL. 146.
 lonchaeoides ZTT. (Lonch.) 88.
 lonchaeoides ZTT. (Rhynch.) 155.
 lonchaeoides ZETT. (Pioph.) 153.
 lonchea ROND. 88.
 lonchoptera v. OLF. 280.
 longepilosa STROBL. 180.
 longicauda MEIG. 120.
 longiceps LW. 157.
 longicorne v. Ros. 7.
 longicornis R.-D. 98.
 longicornis MACQ. 96.
 longicornis ZETT. 166.
 longicornis LW. 85.
 longicornis THOMS. 171.
 longifrons ZETT. 6.
 longimana FALL. 102.
 longipennis FABR. 78.
 longipennis HALID. 25.
 longipennis MEIG. 215.
 longipennis SCHIN. 48.
 longipes R.-D. 151.
 longipes MACQ. 25.
 longirostris R.-D. 267.
 longirostris LW. (Myop.) 124.
 longirostris LW. (Rhynch.) 252.
 longirostris LW. (Siph.) 177.
 longiseta MEIG. 46.
 longiseta ZETT. 46.
 longiseta LW. 79.
 longistylus WIED. 144.
 longula MEIG. 171.
 longula STENH. 195.
 loniceræ KALTENB. 239.
 loniceræ BRISCHKE. 257.
 loricata ROND. 120.
 loxocerata FALL. 6.
 loxocerina FALL. 154.

- Lucasi* R.-D. 269.
lucens MEIG. 183.
lucida FALL. 112.
lucida MEIG. 173.
lucida MACQ. 200.
lucida STAEG. 148.
lucida PERRIS. 171.
lucida BECK. 19.
lucida HEND. 57.
lucidifrons BECK. 173.
lucdiventris BECK. 88.
luctuosa MG. (*Orygma*) 23.
luctuosa MG. (*Trypt.*) 227.
luctuosa MG. (*Herina*) 98.
luctuosa MG. (*Agrom.*) 245.
luctuosa MG. (*Clasiopa*) 195.
luctuosa R.-D. 79.
ludens WAHLB. 237.
ludibunda R.-D. 33.
lugens MEIG. (*Borb.*) 25.
lugens MEIG. (*Herina*) 98.
lugubre R.-D. 103.
lugubrina ZETT. 33.
lugubris MEIG. 98.
lugubris HALID. 33.
lugubris L. DUF. 33.
lupulina FABR. 79.
lurida MEIG. (*Helom.*) 43.
lurida MEIG. (*Eurina*) 175.
lurida SCHIN. 9.
lurida LW. (*Tryp.*) 120.
lurida LW. (*Blephar.*) 48.
luridus MEIG. 25.
lusoria MEIG. 236.
lutaria FABR. 9.
lutea FALL. (*Chirom.*) 233.
lutea MEIG. 245.
luteata HALID. 153.
luteilabris ROND. 33.
luteipennis STROBL. 29.
luteitarsis ROND. 249.
luteiventris ROND. 79.
luteofrontata BECK. 79.
luteola R.-D. 120.
luteola SCOP. 233.
lutescens ROND. 40.
lutosa HALID. 211.
lutosa STENH. 33.
lutulenta LW. 133.
lychnidis FABR. 112.
lychnidis MEIG. 108.
macellaria EGG. 209.
Macquarti GOUR. 245.
Macquarti R.-D. 269.
macrocephala FABR. 263.
macrocephala L. 261.
macrocera MEIG. 17.
macrocera SCHIN. 17.
macrostyla MACQ. 48.
maerura LW. 126.
macrura ROND. 233.
maculata LEACH. 275.
maculata MG. (*Odinia*) 240.
maculata MG. (*Occem.*) 269.
maculata R.-D. (*Oxyn.*) 134.
maculata R.-D. (*Myop.*) 124.
maculata MACQ. (*Myop.*) 267.
maculata MACQ. (*Con.*) 261.
maculata MACQ. (*Geom.*) 226.
maculata MACQ. (*Helom.*) 43.
maculata L. DUF. 219.
maculata STENH. 186.
maculata AHREUS. 229.
maculata LW. 167.
maculata ROND. 164.
maculifrons BECK. (*Noto-naulax*) 183.
maculifrons BECK. (*Micro-neurum*) 185.
maculipennis R.-D. 202.
maculipennis MACQ. 93.
maculipennis ZETT. 171.
maculipennis GIMMERTH. (*Eph.*) 209.
maculipennis GIMMERTH. (*Drosoph.*) 221.
maculipennis ROND. 14.
maculipennis BECK. 48.
maculipes WALK. 146.
maculipes BRULLE. 257.
maculipes ZETT. (*Scat.*) 10.
maculipes ZETT. (*Phyt.*) 257.
maculipes ROND. 73.
maculipes BIG. 261.
maculiventris BECK. 200.
madizans FALL. 188.
magnicornis ZETT. 17.
magnicornis LW. (*Teph.*) 51.
magnicornis LW. (*Leuc.*) 236.
magnipennis PORTSCH. 10.
major STENH. 186.
majusecula LW. 230.
majusecula ROND. 55.
mali FABR. 98.
mammillata LW. 156.
manulae FRULD. 142.
manicata FABR. 205.
Manni SCHIN. 71.
mantispa DEG. 205.
mantispa LW. 205.
margaritata MIK. 237.
margaritatus WIED. (*Acto-ceptor*) 187.
marginalis MEIG. 225.
marginalis R.-D. (*Limn.*) 70.
marginalis R.-D. (*Myop.*) 267.
marginata FABR. (*Corcm.*) 71.
marginata FLL. (*Sphen.*) 128.
marginata MG. (*Dalm.*) 272.
marginata MG. (*Sapr.*) 79.
marginata LW. 177.
marginata ROND. 164.
marginata MIK. 237.
marginella FLL. (*Eph.*) 192.
marginella FLL. (*Geom.*) 226.
marginella FLL. (*Phyt.*) 257.
marginella var. FLL. (*Phyt.*) 257.
marginella FLL. (*Pall.*) 90.
marginella R.-D. 64.
marginella ZTT. (*Diast.*) 225.
marginella ZTT. (*Dalm.*) 272.
margininervis STROBL. 187.
marginipennis GIMM. 2.
maritima PERRIS. 192.
maritima R.-D. 64.
maritima ZETT. 235.
maritimum MEADE. 12.
marmorea FABR. (*Oxyn.*) 134.
marmorea FABR. (*Meck.*) 101.
matricariae LW. 139.

- M. atrum* MEIG. 239.
matutina ROND. 139.
maura FALL. 180.
maura MEIG. (*Hydr.*) 200.
maura MEIG. (*Agrom.*) 245.
maura FRFLD. 126.
maura BIG. 276.
mauritanica MACQ. 126.
maxima SCHIN. 43.
media HALID. 64.
media BECK. 4.
mediatipennis SICHEL. 261.
mediterranea LW. (*Ac'*) 38.
mediterranea LW. (*Hal.*) 207.
megacephala LW. (*Tephr.*) 139.
megacephala LW. (*Ulid.*) 106.
megalops BECK. 176.
megaspis LW. 185.
megastoma ZETT. 211.
Meigeni LW. (*Zonos.*) 114.
Meigeni LW. (*Chlor.*) 171.
Meigeni FALL. 251.
Meigeni R.-D. 269.
melaleuca LW. 14.
melampodia LW. 106.
melanaera LW. 4.
melania HALID. 33.
melanocephala MEIG. 261.
melanocephala var. DRP. 151.
melanocera ROND. 153.
melanogaster MEIG. 221.
melanogaster ZETT. ♂ 79.
melanogaster ZETT. ♀ 79.
melanopa ROND. 270.
melanoptera LATR. 53.
melanorrhina LW. 106.
melanostoma MEIG. 202.
melanota LW. 165.
melanotrichota HEND. 139.
melanura ZETT. (*Sapr.*) 79.
melanura ZETT. (*Oken.*) 16.
melanura ZETT. (*Micr.*) 19.
melbae ROND. 280.
melina R.-D. 48.
melitensis ROND. 148.
mellina BECK. 20.
mensuratum BECK. 7.
mentharum R.-D. 124.
merdaria FABR. 10.
merdaria R.-D. 37.
merdarum R.-D. 28.
meridionalis R.-D. 272.
meridionalis MACQ. (*Phys.*) 263.
meridionalis MACQ. (*Myop.*) 267.
meridionalis A. COSTA. 120.
meridionalis ROND. (*Peg.*) 187.
meridionalis ROND. (*Phyc.*) 22.
messoria FALL. 167.
metallica BRULLÉ. 153.
metallica ZETT. 88.
metallica SCHUM. 276.
metallica SCHIN. 279.
metallica PORTSCH. 164.
micans HALID. 209.
micans MEIG. 270.
microceræ PORTSCH. 92.
microphthalma ZETT. 46.*)
microphthalma SCHIN. 46.
microps MEIG. 46.
Miki STROBL. (*Sapr.*) 79.
Miki STROBL. (*Pelina*) 206.
Miki STROBL. (*Ag.*) 245.
Miki HAND. 40.
Miki POKOR. 43.
mikiana HEND. 60.
miliaria SCHRNK. 131.
mili KALTENB. 257.
millefolii R.-D. 131.
minima MEIG. 257.
minima MACQ. 33.
minima STROBL. (*Lip.*) 183.
minima STROBL. (*Seps.*) 146.
minima BECK. 233.
minor HALID. 148.
minor BIGOT. 276.
minor BECK. 79.
minuscula GOUR. 257.
minuscula ROND. 236.
minuta MEIG. (*Ag.*) 245.
minuta MEIG. (*Phil.*) 202.
minuta GMEL. 168.
minuta ZETT. 48.
minuta LW. 171.
minutum BECK. 7.
minutissima ZTT. (*Ag.*) 245.
minutissima ZTT. (*Lim.*) 33.
minutissima STROBL. 177.
mirabilis COLLIN. 33.
miranda WOLL. 131.
misaphida ROND. 236.
misella LW. 134.
M. nigrum ZETT. 239.
mobilis MEIG. 250.
mobilis ROND. 245.
modesta MEIG. (*Bleph.*) 48.
modesta MEIG. (*Pallop.*) 90.
modesta LW. (*Hydr.*) 200.
modesta LW. (*Saprom.*) 79.
modestus MEIG. 25.
Moebiusi BECK. 144.
moerens MEIG. 98.
mollis HALID. 37.
mollis R.-D. 79.
mollis BECK. 10.
monilis HALID. 28.
monilis MEIG. 60.
monoceros SPEISER. 286.
Montaguei KOL. 286.
montana LW. 43.
morenae STROBL. 257.
morio FABR. 98.
morio MEIG. 267.
morio ZETT. (*Psila*) 160.
morio ZETT. (*Phyt.*) 257.
morio BRISCH. 246.
morionella ZETT. 246.
morosa MEIG. 238.
morosa LW. 101.
moschi WIED. 283.
mucronata ROND. 261.
muliebris HARRIS. 90.

*) vido Addenda et Corrigenda.

- multieingulata* STROBL. 183.
multifasciata LW. 116.
multipunctata FALL. 79.
multisetosa HOLMGR. 10.
munda LW. 101.
muricata BECK. 79.
murina LW. 95.
murorum ROND. 190.
muscaria FALL. 79.
muscaria GERCKE. 246.
muscina MEIG. 246.
mustelina R.-D. 49.
mutata ZETT. 200.
myodes SCHRNK. 139.
myopiformis R.-D. 49.
myopina FALL. 94.
myopina ZETT. 46.
myopinus LW. 165.
myosetidis KALTENB. 246.
nana FALL. 55.
nana MEIG. 246.
nana R.-D. (*Saltella*). 151.
nana R.-D. (*Occem.*) 270.
nana ZETT. 180.
nana LW. (*Ephygr.*) 193.
nana LW. (*Sapr.*) 79.
nana LW. (*Meliera*). 99.
nana ROND. 33.
nasica HALID. (1839). 215.
nasica HALID. (1855). 215.
nasuta SCHRNK. 171.
nasuta ZETT. (*Chlor.*) 171.
nasuta ZETT. (*Ditaen.*) 60.
nasuta STENH. 208.
nasuta MIK. 106.
nasuta BECK. 94.
Nataliae EGG. 228.
Nattereri KOL. 286.
nebrodesia ROND. 120.
nebulosa FALL. 225.
nebulosa MEIG. 96.
nebulosa WIED. 139.
nebulosa MACQ. 120.
nebulosa R.-D. (*Sciom.*) 55.
nebulosa R.-D. (*Heram.*) 94.
necrophaga R.-D. 28.
nemorosa R.-D. (*Sapr.*) 79.
nemorosa R.-D. (*Scatoph.*) 10.
nemorum FALL. 66.
nemorum MEIG. 43.
nemorum ZETT. 43.
nervosa MEIG. 13.
nervosus MEIG. (*Borb.*) 25.
Nesi v. ROS. 139.
nevadensis STROBL. 257.
nigella MEIG. (*Lonch.*) 88.
nigella MEIG. (*Trimer.*) 188.
niger MEIG. 25.
nigerrima HALID. 33.
nigerrima MACQ. 180.
nigerrima ROND. 151.
nigerrima STROBL. 195.
nigerrima LUNDB. 153.
nigra DEG. 263.
nigra OLIV. (*Oscin.*) 180.
nigra OLIV. (*Limos.*) 33.
nigra FALL. 160.
nigra MEIG. (*Lonch.*) 88.
nigra MEIG. (*Platyceph.*) 174.
nigra MEIG. (*Phyt.*) 257.
nigra MEIG. (*Gymnopa*) 190.
nigra MEIG. (*Melanos.*) 270.
nigra MEIG. (*Psila*). 160.
nigra MEIG. (*Steg.*) 218.
nigra MACQ. 246.
nigra R.-D. (*Notiph.*) 186.
nigra R.-D. (*Cord.*) 2.
nigra GIMM. 26.
nigra ZETT. (*Asteia*). 219.
nigra ZETT. (*Agrom.*) 246.
nigra L. DUF. 139.
nigra BRULLÉ. 153.
nigra LW. 158.
nigra OSBECK. 275.
nigrella ROND. 250.
nigricans Mq. (*Phytom.*) 257.
nigricans Mq. (*Bleph.*) 49.
nigricans Mq. (*Scatoph.*) 10.
nigricans STENH. 200.
nigricans LW. 16.
nigricauda STENH. 202.
nigricauda LW. 139.
nigricauda BIG. 191.
nigriceps MEIG. (*Pioph.*) 153.
nigriceps Mg. (*Drosoph.*) 221.
nigriceps MEIG. (*Opom.*) 228.
nigriceps MEIG. (*Hydr.*) 200.
nigriceps v. D. WULP. 257.
nigriceps ROND. 25.
nigriceps BECK. 19.
nigricolor STROBL. 221.
nigricoma LW. 120.
nigricornis MEIG. (*Themira*) 142.
nigricornis Mg. (*Pioph.*) 153.
nigricornis Mg. (*Hclom.*) 43.
nigricornis Mg. (*Heter.*) 51.
nigricornis MEIG. (*Psila*) 160.
nigricornis MEIG. (*Bleph.*) 49.
nigricornis Mg. (*Tephrochl.*) 51.
nigricornis R.-D. (*Scat.*) 10.
nigricornis R.-D. (*Sapr.*) 79.
nigricorns R.-D. (*Sciom.*) 55.
nigricornis R.-D. (*Chiromyia*) 233.
nigricornis MACQ. 257.
nigricornis v. ROS. (*Oscin.*) 181.
nigricornis v. ROS. (*Siphon.*) 177.
nigricornis STENH. 186.
nigricornis ZETT. 156.
nigricornis ERICHS. 278.
nigricornis LW. 227.
nigricornis EGG. 236.
nigricosta ROND. 64.
nigrieruris R.-D. 203.
nigrifacies BECK. 193.
nigrifemoratus MACQ. 25.
nigrifrons MACQ. 164.
nigrifrons BIG. 55.
nigrifrontatum BECK. 7.
nigrilatera MACQ. 150.
nigrimana MEIG. (*Pioph.*) 153.
nigrimana MEIG. (*Drosoph.*) 221.
nigrimana MEIG. (*Dichrochira*) 58.
nigrimana MEIG. (*Agrom.*) 246.

- nigrimana* MEIG. (*Geom.*) 226.
nigrimana MEIG. (*Lonch.*) 88.
nigrimana MEIG. (*Anth.*) 231.
nigrimana MACQ. (*Chlor.*) 171.
nigrimana MACQ. (*Chloropisca*) 173.
nigrimana v. Ros. (*Ephygr.*) 193.
nigrimana v. Ros. (*Oscin.*) 181.
nigrimana LW. (*Heter.*) 41.
nigrimana LW. (*Empyge*) 107.
nigrimanum ZETT. 15.
nigrina MEIG. (*Herina*) 98.
nigrina MEIG. (*Clasiopa*) 195.
nigrina STENH. 195.
nigrina LW. 200.
nigrinus GIMM. 25.
nigrinus ZETT. 41.
nigripennis FABR. 53.
nigripennis FALL. 257.
nigripennis MEIG. 196.
nigripennis LW. 106.
nigripes MEIG. (*Agrom.*) 246.
nigripes MEIG. (*Sepsis*) 146.
nigripes MEIG. (*Cephal.*) 102.
nigripes R.-D. (*Hydr.*) 200.
nigripes R.-D. (*Melanos.*) 270.
nigripes R.-D. (*Saltella*) 151.
nigripes MACQ. (*Ochth.*) 235.
nigripes MACQ. (*Notiph.*) 186.
nigripes MACQ. (*Saprom.*) 79.
nigripes ZETT. (*Hydr.*) 200.
nigripes ZETT. (*Oscin.*) 181.
nigripes ZETT. (*Amaur.*) 7.
nigripes HOLMGR. 10.
nigripes SCHIN. 250.
nigripes MIK. 107.
nigripila ZETT. (*Cord.*) 2.
nigripila ZETT. (*Clidog.*) 19.
nigrirostris v. Ros. 278.
nigriseta ROND. 4.
nigrita FALL. 19.
nigrita WIED. 267.
nigrita HALID. 221.
nigrita MEIG. 181.
nigritarsis MEIG. 246.
nigritarsis MACQ. 88.
nigritarsis STROBL. 208.
nigritarsis BECK. 99.
nigritella STENH. 193.
nigritella ZETT. 258.
nigritheorax STROBL. 171.
nigritula ZETT. 258.
nigriventre LW. (*Amaur.*) 7.
nigriventris MACQ. (*Merom.*) 168.
nigriventris MQ. (*Chlor.*) 171.
nigriventris MQ. (*Helom.*) 43.
nigriventris ZETT. 221.
nigriventris LW. (*Opom.*) 228.
nigriventris LW. (*Cord.*) 2.
nigriventris STROBL. 251.
nigrodorsata R.-D. 267.
nigrofemorata MEIG. (*Tryp.*) 120.
nigrofemorata MEIG. (*Oxyina*) 134.
nigroscutellata STROBL. 251.
nigrosparsa STROBL. 221.
nigrotaeniata STROBL. 160.
nigrotaeniata BEZZI. 193.
nilotea BECK. (*Ephygr.*) 193.
niloticum BECK. (*Desmanet.*) 239.
niloticus BECK. 25.
nitens STENH. 33.
nitens LW. (*Pelina*) 206.
nitens LW. (*Calob.*) 157.
nitens LW. (*Lau.x.*) 85.
nitens LW. (*Ulidia*) 106.
nitida MEIG. (*Paranth.*) 231.
nitida MEIG. (*Ulidia*) 106.
nitida MEIG. (*Siphon.*) 177.
nitida MEIG. (*Diast.*) 225.
nitida R.-D. (*Volusia*) 21.
nitida R.-D. (*Philygr.*) 203.
nitida R.-D. (*Hydr.*) 200.
nitida R.-D. (*Sepsis*) 146.
nitida MACQ. (*Hyad.*) 204.
nitida MACQ. (*Toxop.*) 155.
nitida BRULLÉ. 153.
nitida v. D. WULP. 20.
nitidapax BIG. 221.
nitidicollis MEIG. 258.
nitidifrons BECK. 79.
nitidissima MEIG. 181.
nitidissima STROBL. 251.
nitidiventris MACQ. 221.
nitidula FABR. 267.
nitidula FALL. (*Ephygr.*) 193.
nitidula FALL. (*Nemop.*) 150.
nitidula R.-D. 270.
nitidula ZETT. 23.
nitidula BIG. 261.
nitidus MEIG. 25.
nitidus R.-D. (*Borb.*) 25.
nivalis HALID. 36.
nivea BECK. 195.
niveipalpis ZETT. 19.
niveipennis ZETT. 246.
niveipennis STROBL. 177.
niveipennis BECK. (*Sepsis*) 146.
niveipennis BECK. (*Clasiopa*) 195.
niveopunctata L. DUF. 221.
nobilis R.-D. (*Doryc.*) 93.
nobilis R.-D. (*Myopa*) 267.
noctula MEIG. 213.
notabilis COLLIN. 25.
notata FALL. 79.
notata MEIG. (*Phytom.*) 258.
notata MEIG. (*Chlor.*) 171.
notata MEIG. (*Helom.*) 43.
notata MEIG. (*Sciom.*) 56.
notata MACQ. 80.
notata STENH. 191.
notata ZETT. 173.
notata SCHIN. 56.
notatum 171.
notatum R.-D. 271.
Novakii STROBL. (*Diptot.*) 168.
Novakii STR. (*Siphon.*) 117.
Novakii STR. (*Agrom.*) 246.
Novakii STR. (*Hemila*) 110.
novempunctata GIMM. 229.
nubecula BECK. 208.
nubeculipennis BEZZI. 261.
nubila MEIG. 39.

- nubila* Lw. 70.
nubila ROND. 94.
nubilipennis STENH. 211.
nucis PERRIS. 177.
nuda Lw. 175.
nudiceps ZETT. 236.
nudipes R.-D. 27.
nudipes Lw. 165.
nudiusecula Lw. 192.
numnerata HEEG. 184.
nupta ROND. 270.
nutans BECK. 7.
nymphaeae STENH. 200.
obesa ZETT. 80.
obesa Lw. 134.
obliqua MACQ. 181.
obliqua Lw. 97.
obliqua BECK. 208.
obliquum BECK. 185.
obliterata FABR. 73.
obscura FALL. 221.
obscura MEIG. (*Hydr.*) 290.
obscura MG. (*Drosoph.*) 221.
obscura MEIG. (*Hydr.*) 200.
obscura MEIG. (*Eccopt.*) 46.
obscura R.-D. (*Sciom.*) 56.
obscura R.-D. (*Meliera*) 99.
obscura HALID. 236.
obscura BRULLÉ. 140.
obscurella FALL. (*Meoncura*) 239.
obscurella FALL. (*Geom.*) 226.
obscurella FALL. (*Phytom.*) 258.
obscurella FALL. (*Clasiopa*) 195.
obscurella ZTT. (*Micropros.*) 19.
obscurella ZTT. (*Chloropisca*) 173.
obscurella p.p. ZTT. (*Phytom.*) 258.
obseuricornis ROND. 140.
obseurifrons Lw. 177.
obseurinervis BECK. 10.
obseuripennis MEIG. (*Trypt.*) 227.
obseuripennis MQ. (*Agrom.*) 246.
obseuripennis Lw. (*Oxyina*) 134.
obseuripennis Lw. (*Sapr.*) 80.
obseuripennis Lw. (*Chyliza*) 162.
obseuripennis Lw. (*Cor.*) 72.
obseuripennis Lw. (*Hap.*) 167.
obseuripennis var. Lw. (*Chyl.*) 162.
obseuripes Lw. (*Melier.*) 100.
obseuripes Lw. (*Eph.*) 193.
obseuripes ROND. 235.
obseuripes BECK. 209.
obseuritarsis Lw. 160.
obseuritarsis ROND. 250.
obseuriventris ZETT. 49.
obscurum MG. (*Amaur.*) 7.
obscurum FALL. 12.
obscurus Lw. 175.
obsoleta FALL. (*Sapr.*) 80.
obsoleta FALL. (*Pherb.*) 67.
obsoleta MEIG. (*Sciom.*) 56.
obsoleta MEIG. (*Sapr.*) 80.
obsoleta MG. (*Ensina*) 122.
obsoleta ZETT. 80.
obsoleta WALK. 80.
obsoletoides SCHNABL. 80.
obtecta BECK. 203.
obtusa FALL. 56.
obtusa MEIG. 29.
obtusa var. b. ZETT. 60.
obtusipennis STENH. 33.
occulta WIED. 267.
occulta MEIG. 251.
oceanum MACQ. 12.
ocellatus BECK. 176.
oehripes MEIG. 33.
ochrocephala BRULLÉ. 10.
ochrostoma BRULLÉ. 209.
octiesetosa BECK. 34.
octoannulata STROBL. 157.
octopunctata MACQ. 120.
octopunctata v. ROS. 80.
octopunctata ROND. 104.
oculata FALL. 52.
oculata SCHIN. 51.
oculata MOTCH. 278.
odontoscelis SPEISER. 279.
oelandica STENH. 34.
oenopota SCOP. 221.
Oldenbergi HEND. 29.
oleae ROSSI. 144.
olens MEIG. 43.
olivacea BECK. 195.
omissa MEIG. 100.
onoperdi R.-D. 113.
onopordinis FABR. 112.
onotrophes Lw. 120.
opaca MEIG. (*Sphaer.*) 29.
opaca MEIG. (*Hydr.*) 200.
opaca Lw. (*Ephydr.*) 210.
opaca Lw. (*Norell.*) 14.
opaca BECK. 80.
opacula STENH. 34.
opomyzina ZETT. (*Teph.*) 51.
opomyzina ZETT. (*Het.*) 51.
oppidana SCOP. 233.
opposita WALK. 278.
orbitalis Lw. 195.
orbona MEIG. 246.
ordinata BECK. (*Scatoph.*) 10.
ordinata BECK. (*Athy.*) 192.
orichalcea GIMMERT. 210.
ornata MEIG. (*Gitona*) 217.
ornata MEIG. (*Agr.*) 246.
ornata MEIG. (*Chlor.*) 171.
ornata MEIG. (*Ortal.*) 96.
ornata MEIG. (*Sepsis*) 146.
ornata MEIG. (*Diast.*) 225.
ornata ZETT. 240.
ornata Lw. (*Eccopt.*) 46.
ornata Lw. (*Chlor.*) 173.
ornatifrons Lw. 177.
ornithivora R.-D. 49.
orobanchiae KALTENB. 258.
ortalidina PORTSCH. 123.
oscillans MEIG. 98.
osecina FALL. (*Phyt.*) 258.
osecina FALL. (*Siphon.*) 177.
oscimina MACQ. 177.
ostiorum HALID. 12.
ovinus L. 283.

- oxyphora MIK. 44.
 pachycera STROBL. 168.
Pallasii MEIG. 263.
pallens WIED. 120.
pallens MACQ. 120.
pallens LW. (*Pallopt.*) 90.
pallens LW. (*Chlor.*) 171.
pallescens MEIG. 47.
pallicauda ZETT. 19.
pallicornis ZETT. 258.
pallida FALL. (*Sapr.*) 80.
pallida FALL. (*Renoc.*) 60.
pallida FALL. (*Psila*) 160.
pallida FALL. (*Megaphth.*) 6.
pallida var. β , FALL. (*Lept.*) 6.
pallida FALL. (*Helom.*) 44.
pallida var. β , FALL. (*Psila*) 160.
pallida LATR. 281.
pallida OLIV. 140.
pallida MEIG. (*Agr.*) 246.
pallida MEIG. (*Lipopt.*) 283.
pallida MEIG. (*Phyt.*) 258.
pallida MEIG. (*Sapr.*) 80.
pallida MACQ. 143.
pallida ZETT. (*Anthom.*) 231.
pallida ZETT. (*Scapt.*) 223.
pallida var. *b.* ZTT. (*Hel.*) 44.
pallida var. *d.* ZTT. (*Hel.*) 44.
pallida ZETT. (*Helom.*) 44.
pallida LW. 86.
pallidicarpa ROND. 56.
pallidicornis LW. 80.
pallidifrons WALK. 25.
pallidimana ROND. 29.
pallidiseta BECK. 205.
palliditarsis ROND. 236.
palliditarsis BECK. 195.
pallidiventris FALL. (*Sapr.*) 80.
pallidiventris FALL. (*Sciom.*) 56.
pallidiventris FALL. (*Tetan.*) 59.
pallidiventris MEIG. 29.
pallidiventris MACQ. 181.
pallidula STENH. 195.
pallifrons FALL. 25.
pallipennis ZETT. 88.
pallipes WIED. 270.
pallipes MEIG. (*Philygr.*) 203.
pallipes MEIG. (*Hydr.*) 201.
pallipes MEIG. (*Borb.*) 26.
pallipes R.-D. (*Meliera*) 100.
pallipes R.-D. (*Borb.*) 26.
pallipes R.-D. (*Olinia*) 27.
pallipes R.-D. (*Occem.*) 270.
pallipes CURTIS. 283.
pallipes MACQ. 246.
pallipes ZETT. 19.
pallipes L. DUF. 221.
pallipes STENH. 26.
pallipes LW. 252.
pallipes BIG. 235.
pallipes SPEISER. 279.
pallitarsis MACQ. 246.
palpata R.-D. 120.
palpella ROND. 80.
palposa FALL. 177.
palposa MEIG. 181.
palposa ZETT. (*Lobiop.*) 238.
palposa ZETT. (*Lonch.*) 88.
paludosa R.-D. (*Sciom.*) 56.
paludosa R.-D. (*Tetanoc.*) 64.
paludosa R.-D. (*Dictya*) 65.
paludum FALL. 98.
paludum MEIG. 211.
Palumbii ROND. 236.
palustris LATR. 72.
palustris FALL. 214.
palustris MEIG. (*Herina*) 98.
palustris MEIG. (*Calob.*) 157.
palustris R.-D. (*Sciom.*) 56.
palustris R.-D. (*Saprom.*) 80.
pulustris R.-D. (*Notiph.*) 186.
pannonica STROBL. 171.
pantherina FALL. 134.
paradoxa R.-D. 162.
paradoxus MIK. 27.
parallela LW. (*Ulidia*) 106.
parallela LW. (*Pallopt.*) 91.
parceguttata BECK. 134.
pardalina MEIG. 129.
parietina L. 134.
parietina ZETT. 134.
parisiensis MACQ. 10.
parisiensis R.-D. (*Scatoph.*) 10.
parisiensis R.-D. (*Urellia*) 143.
parisiensis ROND. 143.
parmensis ROND. (*Hypochra*) 100.
parmensis ROND. (*Saltella*) 151.
parva LW. (*Herina*) 98.
parva LW. (*Helom.*) 44.
parva ROND. 150.
parvicornis MEIG. 88.
parvicornis ZETT. 89.
parvicornis SCHIN. 89.
parvula HALID. 23.
parvula ZETT. (*Lonch.*) 89.
parvula ZETT. (*Chlorop.*) 174.
parvula STENH. 34.
parvula LW. 134.
parvula ROND. 272.
pascuum MEIG. 246.
patelliformis BECK. 81.
pavonina PORTSCH. 129.
pectinata MEIG. 246.
pectinulata LW. 150.
pectoralis MEIG. 160.
pectoralis MACQ. 146.
pectoralis ZTT. (*Ctenulus*) 62.
pectoralis ZTT. (*Gimnom.*) 20.
pectoralis ZETT. (*Salt.*) 151.
pectoralis LW. 44.
pectoralis BEZZI. 185.
pectorosa HENDEL. 59.
pedestris MEIG. 28.
pedestris LW. 227.
pedicellatum R.-D. 271.
pedicularia LATR. 288.
pedicularia NITZSCH. 286.
pediculariarum R.-D. 131.
Peleterii R.-D. (*Bleph.*) 49.
Peleterii R.-D. (*Sepedon*) 72.
Peleterii R.-D. (*Olinia*) 240.
Peleterii R.-D. (*Chyliza*) 162.
pellucida R.-D. 267.
pellucida BECK. 81.
penicillata L. DUF. 44.

- peregrina* BECK. 89.
permixta ROND. 162.
permunda HARRIS. 111.
perpusilla MEIG. 246.
Perrisi SCHIN. 224.
perspicendum BECK. 215.
petusionis L. DUF. 153.
petronella L. 157.
phaeoptera MEIG. 165.
phalerata MEIG. 222.
phantasma R.-D. 149.
picea BECK. 153.
piceipes v. d. WULF. 258.
picipes MEIG. ♂. 2.
picipes MEIG. ♀. 2.
picipes LW. 96.
picta PANZ. 267.
picta FALL. 203.
picta MEIG. (*Meliera*) 100.
picta MEIG. (*Oscin.*) 181.
picta MEIG. (*Tryp.*) 120.
picta ZETT. 222.
picta PORTSCH. 92.
picticornis LW. 2.
pictifrons BECK. 54.
pictipennis MEIG. (*Scatella*) 211.
pictipennis MEIG. (*Philygr.*) 203.
pictipennis R.-D. 267.
pictipennis LW. 94.
pictipennis ROND. 230.
pictipes ZETT. 39.
pictipes SCHIN. 39.
pictipes LW. 65.
pictipes BECK. 252.
piligera STENH. 34.
pilimana LW. 44.
pilimana ROND. 44.
pilimana BECK. 206.
pilipes HALID. 23.
pilipes LW. 147.
pilipes v. d. WULF. 147.
piliseta v. Ros. 59.
piliseta BECK. 246.
pilitarsis STENH. 201.
pilosa ZETT. 5.
pilosa HOLMB. 153.
pilosa STAG. 153.
pilosa R.-D. 149.
pilosa LW. 165.
pilosa HENDEL. 56.
ilosigenis BECK. 211.
ilosiventris ZETT. 26.
pinguis FALL. 246.
pini CURTIS. 140.
pisii KALTENB. 258.
pistaciae CURTIS. 247.
placida SCHRANK. 120.
placida MEIG. 81.
placida MÜLL. 126.
plagiata DAHLB. 120.
planiceps FALL. 5.
planiceps BOHEM. 213.
planifrons FABR. 174.
planifrons LW. 171.
planiscutellata BECK. 121.
plantaginis HALID. 134.
plantaginis R.-D. 258.
plantaris R.-D. 131.
plantationis ROND. 103.
platycephala LW. 81.
plumbella MEIG. 56.
plumicheta ROND. 81.
plumicornis FALL. 81.
plumiger MEIG. 181.
plumosa FALL. 195.
plumosa STENH. 201.
plumosa LW. 64.
plumosula ROND. 34.
plurisetosa STROBL. 34.
poecilogastra LW. 218.
poecilogastra BECK. 201.
poeciloptera SCHBANK. 108.
poeciloptera LW. 81.
poecilura LW. 140.
Pokorny BECK. 17.
polita MACQ. (*Ephygr.*) 193.
polita MACQ. (*Oscin.*) 181.
polonica SCHNABL. 166.
polystigma MEIG. 235.
polystigma ROND. 267.
pomariana ROND. 101.
populi KALTENB. (*Phyt.*) 258.
populi KALTENB. (*Agrom.*) 247.
populicola WALK. 258.
porphyrops HALID. 201.
postica LW. 140.
posticata MEIG. (*Agrom.*) 247.
posticata MG. (*Philygr.*) 203.
posticata MEIG. (*Notiph.*) 187.
posticata MEIG. (*Geom.*) 227.
potentillae KALTENB. 247.
praecox MEIG. 258.
praecox LW. (*Teph.*) 140.
praecox LW. (*Oecoth.*) 47.
praeusta FALL. (*Saprom.*) 81.
praeusta var. FALL. (*Saprom.*) 81.
praeusta MEIG. 44.
praeusta ZETT. 81.
praeusta p. p. v. Ros. 64.
praeustum MEIG. 38.
pratensis MEIG. 181.
pratensis R.-D. 122.
pratorum FALL. 70.
pratorum MEIG. 168.
primulae R.-D. 258.
primus BECK. 239.
princeps A. COSTA. 114.
proboscidea R.-D. 215.
proboscidea ZETT. 2.
proboscidea LW. 134.
proboscidea STROBL. 247.
procera LW. 140.
producta LW. 135.
prominens LW. 70.
prominens BECK. 51.
propinqua THOMS. 56.
provinciale LW. 103.
pruinosa BIG. 218.
psammophila LW. 94.
pseudo açori R.-D. 72.
pseudocunctans STROBL. 247.
pseudolaevigata STR. 177.
pseudonarcissi R.-D. 14.
pseudoradiata BECK. 129.
psilopina ZETT. 203.
ptenoleitis LW. 278.
pubera L. 2.
pubera LW. 208.

- puberula ZETT. 227.
 puberulum BECK. 7.
 pubescens MEIG. 175.
 pubescens LW. 103.
 pubescens THALH. 184.
 pudica MEIG. 2.
 pudica ZETT. 3.
 puella MEIG. 247.
 puella ROND. 267.
 puerula ROND. (*Lim.*) 34.
 puerula ROND. (*Bleph.*) 49.
 pugionata MEIG. 126.
 pugionata WALK. 126.
 pulchella ROSSI. 91.
 pulchella FABR. 95.
 pulchella MG. (*Hydr.*) 201.
 pulchella MG. (*Clas.*) 195.
 pulchra ZETT. 240.
 pulchra v. ROS. 235.
 pulchra SCHIN. 171.
 pulchra LW. (*Teph.*) 140.
 pulchra LW. (*Pachyc.*) 85.
 pulchra v. RÖD. 107.
 pulchrum LW. 271.
 pulicaria MEIG. 247.
 pulicaria HALID. 196.
 pulicaria R.-D. 100.
 pulicaria ZETT. 247.
 pulicarioides STROBL. 247.
 pulla MEIG. 250.
 pullula FALL. 203.
 pullula ZETT. (*Phyt.*) 259.
 pullula ZETT. (*Lim.*) 34.
 pumila MEIG. (*Lonch.*) 89.
 pumila MEIG. (*Agr.*) 247.
 pumila MACQ. (*Chyl.*) 162.
 pumila MACQ. (*Phys.*) 263.
 pumilio MEIG. 34.
 pumilio LW. 213.
 pumilionis OLIV. 171.
 pumilionis BJERK. 177.
 punctata FABR. (*Pherb.*) 67.
 punctata FABR. (*Dalm.*) 272.
 punctata FALL. 121.
 punctata SCHRANK. 121.
 punctata R.-D. 81.
 punctata LW. 121.
 punctatonervosa FALL. 203.
 punctatonervosa LW. 229.
 punctella FALL. (*Opom.*) 229.
 punctella FALL. (*Oxyn.*) 135.
 punctella FALL. var. β .
 (*Oxyna*) 135.
 punctella ZETT. 236.
 puncticollis ZETT. 171.
 puncticornis MEIG. 236.
 puncticornis HAGENB. 233.
 puncticornis LW. 172.
 punctifrons ROND. (*Γet.*) 64.
 punctifrons ROND. (*Sapr.*) 81.
 punctigera R.-D. 267.
 punctipennis FALL. 69.
 punctipennis MACQ. 26.
 punctipennis ZETT. 154.
 punctipes MEIG. 17.
 punctipes R.-D. 267.
 punctithorax v. ROS. 68.
 punctiventris PORTSCH. 103.
 punctiventris ROND. 81.
 punctulata SCOP. 66.
 punctulata STENH. 202.
 punctulata LW. 222.
 punctum FABR. 147.
 punctum MEIG. 227.
 pupillata FALL. 129.
 pusilla FALL. 29.
 pusilla MG. (*Occem.*) 270.
 pusilla MG. (*Physoc.*) 263.
 pusilla MEIG. (*Agr.*) 247.
 pusilla MG. (*Parydra*) 208.
 pusilla MEIG. (*Oscin.*) 181.
 pusilla MEIG. (*Pioph.*) 153.
 pusilla MEIG. (*Limos.*) 34.
 pusilla MEIG. (*Clas.*) 196.
 pusilla MEIG. (*Sapr.*) 81.
 pusilla MEIG. (*Lonch.*) 89.
 pusilla R.-D. (*Tryp.*) 121.
 pusilla R.-D. (*Occem.*) 270.
 pusilla ZETT. (*Them.*) 149.
 pusilla ZETT. (*Dilaen.*) 60.
 pusilla LW. 49.
 pusilla ROND. 98.
 pusio MEIG. 247.
 pusio ZETT. 34.
 putris L. 149.
 putris R.-D. (*Limos.*) 34.
 putris R.-D. (*Nemop.*) 150.
 putris var. *b.* ZETT. 149.
 putris KESSLER. 153.
 pygmaea HALID. 191.
 pygmaea MEIG. (*Chlor.*) 172.
 pygmaea MEIG. (*Lim.*) 35.
 pygmaea MEIG. (*Agr.*) 247.
 pygmaea R.-D. (*Par.*) 208.
 pygmaea R.-D. (*Sepsis*) 147.
 pygmaea ZETT. (*Teph.*) 51.
 pygmaea ZETT. (*Phyt.*) 259.
 pygmaea ZETT. (*Het.*) 51.
 pygmaea ZETT. (*Pioph.*) 153.
 pygmaea ZETT. (*Lim.*) 35.
 pyrethri R.-D. 131.
 quadrata FALL. 211.
 quadrata MEIG. 211.
 quadrata var. β . STENH. 211.
 quadratula LW. 121.
 quadricincta BECK. 81.
 quadrifasciata DEG. 261.
 quadrifasciata MEIG. 126.
 quadriguttata MG. (*Scat.*) 211.
 quadriguttata MG. (*Scatoph.*) 213.
 quadrilineata STROBL. (*Scatoph.*) 213.
 quadrilineata STROBL. (*Psil.*) 160.
 quadrilineata STROBL. (*Sapr.*) 81.
 quadrimaculata v. ROS. 174.
 quadrinotata BECK. 233.
 quadrinotata ZETT. 81.
 quadripectinata BECK. 196.
 quadripunctata L. 81.
 quadripunctata MEIG. 208.
 quadripunctata GIMM. 102.
 quadrisetosa BECK. 212.
 quadristriata SCHUMM. 175.
 quadrivittata MEIG. 183.
 quadrivittata v. ROS. 64.
 quadrivittata LW. 82.
 quatuorpunctata ROB.-DESV.
 (*Sapromyza*) 82.

- quatuorpunctata R.-D. 82.
 quinquangula Lw. 177.
 quinquemaculata Macq.
 (*Ortal.*) 96.
 quinquemaculata Macq.
 Pallop.) 91.
 quinquemaculata v. Ros. 64.
 quinquemaculata Strbl. 219.
 quinquemaculata Beck. 209.
 quinquemaculatus Macq.
 100.
 quinquenotata Meig. 100.
 quinquepunctata Gimm. 214.
 quinquevittata Macq. 44.
 quisquilia Halid. 35.
 rabdota Beck. 82.
radiata Fabr. 143.
radiata Fall. 143.
radiata Macq. 143.
radiata Walk. 143.
radiatula Thoms. 187.
radiolata Beck. 193.
ramulosa Lw. 143.
ranula Lw. 215.
ranunculi Halid. 201.
ranunculi R.-D. 259.
rapta Curtis. 181.
Reaumuri R.-D. 126.
recta Lw. 70.
rectinervis Rond. 82.
recurrens Lw. 140.
remota Walk. 278.
remotinervis Strobl. 247.
repleta Wollast. 222.
reptans Fall. (*Agr.*) 247.
reptans var. *b.* Fall. (*Agr.*)
 247.
reptans var. *d.* Fall. (*Agr.*)
 247.
reticulata Fabr. 67.
reticulata Fall. 70.
reticulata Schrank. 130.
reticulata Thoms. 56.
retracta Rond. 35.
rhinanthi Kaltenb. 259.
ringens Lw. 172.
riparia Fall. (*Ephydr.*) 210.
riparia var. *b.* Fall. (*Eph.*)
 210.
riparia Meig. 187.
riparia R.-D. (*Sciom.*) 56.
riparia R.-D. (*Limos.*) 35.
riparia v. D. Wulp. 247.
ripicola Halid. 196.
ripicola Lw. 191.
rivosa Meig. 82.
rivularis Fabr. 96.
rivularis R.-D. 15.
 Roberti Meig. 82.
Robinaldi Gour. 259.
robusta Lw. (*Meckelia*) 101.
robusta Lw. (*Tetan.*) 64.
 Röderi Girsch. 193.
 Rondanii Bezzi 262.
 Rondanii A. Costa. 181.
rondensis Strobl. 250.
roralis Rond. 35.
rorida Fall. 82.
rorida Meig. ♂ 82.
rorida Walk. 82.
rosae Fabr. 160.
 Roseri Rond. (*Borb.*) 27.
 Roseri Rond. (*Norell.*) 14.
rotundiventris Fall. 109.
rotundiventris var. Meig. 110.
rubella R.-D. 100.
rubetra R.-D. (*Helom.*) 44.
rubetra R.-D. (*Psila.*) 161.
rubi Brischke. 247.
rubicunda R.-D. 69.
rubifrontata Beck. 3.
rudis Halid. 10.
rufa Panz. 68.
rufa Fall. 44.
rufa Scop. 161.
rufa Meig. (*Psila*) 161.
rufa Meig. (*Helom.*) 44.
rufa Macq. (*Chlor.*) 174.
rufa Macq. (*Bleph.*) 49.
rufa Macq. (*Sepsis*) 147.
rufa Macq. (*Helom.*) 44.
rufa Zett. (*Sciom.*) 56.
rufa Zett. (*Helom.*) 44.
rufescens v. Ros. (*Phyt.*) 259.
rufescens v. Ros. (*Mer.*) 168.
rufescens Walk. 181.
ruficauda Fabr. 121.
ruficauda Zett. (*Nor.*) 14.
ruficauda Zett. ♂. (*Bleph.*)
 49.
ruficauda Zett. ♀. (*Bleph.*)
 49.
ruficeps Fabr. 96.
ruficeps Meig. (*Oscin.*) 181.
ruficeps Meig. (*Phyt.*) 259.
ruficeps Meig. (*Notiph.*) 187.
ruficeps Macq. (*Agr.*) 248.
ruficeps Macq. (*Chlor.*) 172.
ruficeps Macq. (*Siphon.*) 177.
ruficeps Zett. (*Bleph.*) 49.
ruficeps Zett. (*Eutr.*) 167.
ruficeps Zett. (*Sciom.*) 56.
ruficeps v. Ros. 222.
ruficollis Meig. 39.
ruficornis Meig. (*Bleph.*) 49.
ruficornis Mg. (*Hydr.*) 201.
ruficornis Mg. (*Scapt.*) 223.
ruficornis Mg. (*Sepsis*) 147.
ruficornis Macq. (*Siph.*) 177.
ruficornis Macq. (*Agr.*) 248.
ruficornis Zett. 259.
ruficornis Big. 89.
ruficoxa Macq. (*Pioph.*) 153.
ruficoxa Macq. (*Salt.*) 151.
rufifrons Fabr. 70.
rufifrons Panz. 69.
rufifrons Macq. 248.
rufifrons Zett. 70.
rufifrons Lw. (*Dros.*) 222.
rufifrons Lw. (*Hapl.*) 167.
rufifrons Walk. 106.
rufifrons Beck. 251.
rufilabris Stenh. 35.
rufimana Meig. 3.
rufimana Macq. (*Osc.*) 181.
rufimana Macq. (*Agr.*) 248.
rufimana Zett. 3.
rufimana v. Ros. 174.
rufimanum Lw. 103.
rufina Zett. 172.
rufina Rond. 140.

- rufipes* FABR. 264.
rufipes PANZ. 72.
rufipes MEIG. (*Limos.*) 35.
rufipes MEIG. (*Borb.*) 26.
rufipes MG. ♀. (*Sepsis*) 247.
rufipes MEIG. (*Phyt.*) 259.
rufipes MEIG. (*Parydra*) 209.
rufipes MEIG. (*Oscin.*) 182.
rufipes MEIG. (*Platyst.*) 103.
rufipes MEIG. (*Ceph.*) 102.
rufipes MEIG. (*Dichr.*) 59.
rufipes MEIG. (*Scapt.*) 223.
rufipes MEIG. (*Agr.*) 248.
rufipes MEIG. (*Diast.*) 225.
rufipes MEIG. (*Scat.*) 10.
rufipes MEIG. (*Trim.*) 188.
rufipes MEIG. (*Cordyl.*) 3.
rufipes MEIG. ♂. (*Nem.*) 150.
rufipes MEIG. (*Hyad.*) 204.
rufipes MACQ. (*Teph.*) 99.
rufipes MACQ. (*Orth.*) 20.
rufipes MACQ. (*Tryp.*) 227.
rufipes R.-D. 98.
rufipes ZETT. 51.
rufipes GIMMERT. 154.
rufitarsis LATR. 85.
rufitarsis MEIG. (*Mad.*) 240.
rufitarsis MEIG. (*Hydr.*) 201.
rufitarsis MEIG. (*Cer.*) 27.
rufitarsis MEIG. (*Oscin.*) 182.
rufitarsis MEIG. (*Diast.*) 225.
rufitarsis MACQ. (*Not.*) 187.
rufitarsis MACQ. (*Aul.*) 216.
rufitarsis MACQ. (*Oscin.*) 182.
rufitarsis MACQ. (*Her.*) 98.
rufitarsis MACQ. (*Par.*) 209.
rufitarsis LW. 183.
rufithorax BECK. 194.
rufiventris MG. (*Sciom.*) 56.
rufiventris MG. (*Teph.*) 51.
rufiventris MCQ. (*Oscin.*) 182.
rufiventris MCQ. (*Chlor.*) 172.
rufiventris MCQ. (*Con.*) 262.
rufiventris A. COSTA. 26.
rufiventris SCHIN. 56.
rupicaprinus ROND. 284.
ruralis LW. 140.
sabulosa HALID. 231.
sacra MEIG. 35.
Sahlbergi BECK. 16.
saliens LW. 231.
salina v. HEYDEN. (*Lim.*) 35.
salina v. HEYD. (*Ephyd.*) 210.
salinae ZETT. 210.
salinaria HALID. 207.
salinarum BOUCHÉ. 207.
salonitana STROBL. 215.
saltatrix L. 168.
saltatrix var. FALL. 168.
saltatrix var. ZETT. 168.
saltatriæ R.-D. 73.
saltuum L. 91.
saniosus WESTRING. 26.
sardoa ROND. 161.
sardoa A. COSTA. 124.
scabricola HALID. 29.
scalaris MEIG. 172.
scalaris LW. 93.
scatomyzoides ZETT. 10.
scatophagina FALL. 217.
Schefferi FRFLD. 131.
Schembrii ROND. (*Them.*) 149.
Schembrii ROND. (*Ochth.*) 206.
Schineri LW. 116.
Schineri GIRAUD. 247.
Schmidli SCHIN. 288.
Schmidti ROND. 288.
Schneideri LW. 131.
Schönherri FALL. 60.
Scholtzi BECK. 210.
Scholtzi EGG. 166.
sciomyzina ZETT. 64.
sciomyzina HALID. 22.
scirpi R.-D. 4.
scelopendri R.-D. 259.
scorzonerae R.-D. (*Tryp.*) 121.
scorzonerae R.-D. (*Ensina*) 122.
serobiculata STROBL. 182.
seutata ROSSI. 165.
scutellaris FALL. 151.
scutellaris R.-D. (*Her.*) 98.
scutellaris R. D. (*Myop.*) 267.
scutellaris HALID. 35.
scutellaris v. ROS. (*Agr.*) 248.
scutellaris v. ROR. (*Sciom.*) 56.
scutellaris ZETT. (*Scoli.*) 46.
scutellaris ZETT. (*Chlor.*) 172.
scutellaris ROND. 89.
scutellata FABR. 162.
scutellata FALL. (*Agr.*) 248.
scutellata var. FALL. (*Agr.*) 248.
scutellata MEIG. (*Lim.*) 35.
scutellata MEIG. (*Con.*) 262.
scutellata MEIG. (*Phyt.*) 259.
scutellata MEIG. (*Laux.*) 85.
scutellata MACQ. (*Het.*) 51.
scutellata MACQ. (*Meli.*) 100.
scutellata MACQ. (*Salt.*) 151.
scutellata MACQ. (*Pall.*) 91.
scutellata ROB. 229.
scutellata HALID. 204.
scutellata v. ROS. 183.
scutellata ROND. 126.
scutellatus PANZ. 165.
seybalaria L. 10.
seybalaria SCHRANK. 10.
securicornis FALL. 238.
sedi KALTENB. 259.
segregata FRFLD. 140.
sejuncta ROND. 140.
sellata HALID. 151.
sellata MEIG. 157.
semiatra O. COSTA. 264.
semiflava PANZ. 14.
seminationis L. 103.
semiopaca LW. 106.
semisphaereus BECK. 145.
senecionis KALTENB. 259.
senilis MEIG. 82.
senilis ZETT. 37.
sepedonoidea R.-D. 69.
septemmaculata MACQ. 140.
septentrionalis LW. 82.
septentrionalis STENH. 35.
septentrionalis BECK. 10.
serena LW. 172.
sericans BECK. 89.

- serotina PERRIS. 11.
 serrata L. 49.
 serrata MEIG. 51.
 serrata var. b. minor ZETT. 50.
 serratulae L. 121.
 serratulae MEIG. 121.
 sertulata ROND. 237.
 seticornis FALL. 85.
 setigera BECK. 187.
 setiventris ZETT. 82.
 setulosa ZETT. 35.
 setulosa BECK. 183.
 sexmaculata GIMM. 82.
 sexmaculata BECK. 203.
 sexmaculatus WALK. 145.
 sexnotata R.-D. 44.
 sexnotata ZETT. 82.
 sexpunctata MEIG. 82.
 sexpunctata Lw. 82.
 sibilans HALID. 212.
 sibiriana GIMM. 281.
 sibirica Lw. 185.
 sibirica PORTSCH. 104.
 sibiricum PORTSCH. 110.
 sibirica SCHIN. 281.
 sibynata ROND. 126.
 sicula Lw. 165.
 sicula ROND. 140.
 signata FALL. 154.
 signata MEIG. (Agr.) 248.
 signata MEIG. (Rhag.) 115.
 signata WOLLAST. 182.
 signata Lw. 213.
 signatipes Lw. 86.
 signatum WIED. 265.
 silacea WIED. 262.
 silacea Lw. 212.
 silesiaca EGG. 237.
 silvatica Mg. (Eccop.) 47.
 silvatica MEIG. (Tet.) 64.
 silvatica Mg. (p. p. Tet.) 64.
 silvatica R.-D. 95.
 similis MEIG. 44.
 similis SIEBKE. 3.
 similis SCHIN. 183.
 similis BRISCH. 259.
 simillima STROBL. 259.
 simplex FALL. 57.
 simplex MEIG. (Chlor.) 174.
 simplex MEIG. (Helom.) 45.
 simplex Lw. (Sapr.) 82.
 simplex Lw. (Teph.) 140.
 simplex Lw. (Agr.) 248.
 simplex HALID. 23.
 simplicimana ROND. 35.
 simplicipes BECK. 16.
 sintenisiana HEND. 61.
 socculata ZETT. 231.
 socia MEIG. 182.
 socia BRISCH. 259.
 socialis BECK. 3.
 soleaformis GIMM. (Myopa.) 267.
 soleaformis GIMM. (Phys.) 264.
 solidaginis R.-D. 157.
 solidaginis KALTENB. 248.
 solstitialis L. 126.
 solstitialis PANZ. 121.
 solstitialis FABR. 127.
 solstitialis WALK. 127.
 solstitialis SULZ. 115.
 sonchi L. 123.
 sonchi R.-D. (Phyt.) 259.
 sonchi R.-D. (Uroph.) 127.
 sorbillans HALID. 212.
 sordida ZETT. 223.
 sordida HALID. 82.
 sordida BRISCH. 248.
 sordida WEYENB. 240.
 sordida HEND. 56.
 sordidella ZETT. (Anth.) 231.
 sordidella ZETT. (Osc.) 183.
 sordidissima STROBL. 178.
 sordidum FALL. (Desm.) 239.
 sordidus ZETT. (Borb.) 26.
 soror R.-D. (Pherb.) 67.
 soror R.-D. (Calob.) 157.
 sororcula WIED. 135.
 sororcula MEIG. 59.
 sororculum PORTSCH. 103.
 spatiosa BECK. 89.
 speciosa MEIG. (Lob.) 238.
 speciosa MEIG. (Chlor.) 172.
 speciosa Lw. 112.
 spectabilis Lw. (Euth.) 232.
 spectabilis Lw. (Sapr.) 82.
 spectabilis Lw. (Bleph.) 50.
 spectabilis Lw. (Ochth.) 235.
 spectrum WAHLB. 155.
 sphegeus FABR. 72.
 sphaerocephali SCHRNK. 131.
 sphondylii SRK. (Tryp.) 121.
 sphondylii SRK. (Salt.) 151.
 spilota CURTIS. 191.
 spinicornis MACQ. 251.
 spinifera LEACH. 275.
 spinigera ZETT. 14.
 spinimana FALL. 14.
 spinipennis HALID. 35.
 spinipes SCOP. 72.
 spinipes MEIG. 14.
 spinitarsis ZETT. 82.
 spinosa VERRAL. 149.
 spiraeae KALTENB. 248.
 splendens MACQ. 187.
 splendida FALL. 107.
 splendida Lw. 89.
 spoliata CURTIS. 141.
 spoliata HALID. 127.
 spondylii R.-D. 259.
 sponsa ZETT. 15.
 spreta Lw. 141.
 spurca MEIG. 11.
 spurca HALID. 40.
 spurca ZETT. 222.
 spuria THOMS. 216.
 squalida MEIG. 11.
 squama'a BECK. 248.
 stagnalis FALL. (Scat.) 212.
 stagnalis var. b. FALL. (Scat.) 214.
 stagnalis var. c. ZETT. 214.
 atagnicola R.-D. (Not.) 187.
 stagnicola R.-D. var. minor. (Parydra) 209.
 stagnicola R.-D. var. major. (Parydra.) 209.
 stellata FUESSL. 143.
 stellata Lw. var. 1. 143.
 Stenhammari ZETT. Scat. 212.

- Stenhammari ZTT. (*Lim.*) 35.
 stenoptera Lw. 135.
 stenoptera v. OLF. 280.
 stercoraria L. 11.
 stercoraria R.-D. (*Nem.*) 150.
 stercoraria R.-D. (*Sphaer.*) 29.
 stercoraria R.-D. (*Lim.*) 35.
 stercorarius MEIG. 26.
 strophepe ROND. 121.
 stictica FABR. 70.
 stictica MEIG. 203.
 stictica R.-D. 64.
 stictica Lw. 141.
 stigma PANZ. 147.
 stigma MEIG. 267.
 stigma R.-D. 273.
 stigma Lw. 127.
 stigmataspis WIED. 121.
 striata MEIG. 61.
 striata ROBERT. 225.
 striata MACQ. 14.
 strigata WIED. 262.
 strigata MEIG. 248.
 strigifrons ZETT. 19.
 strigilata Lw. 130.
 strigis SCOP. 279.
 strigula FABR. (*Anthrachoph.*) 166.
 strigula FABR. (*Chlor.*) 172.
 strigula MEIG. 172.
 strigulosa WALK. 98.
 striolata MEIG. 14.
 strix PORTSCH. 103.
 Strobli MIK. 218.
 Strobli HENDEL. 61.
 Stuxbergi HOLMGR. 11.
 stylata FABR. (*Uroph.*) 127.
 stylata FABR. (*Myop.*) 124.
 stylata MEIG. 259.
 stylata ROND. 124.
 stylifera Lw. 157.
 styriaca STROBL. (*Sapr.*) 83.
 styriaca STROBL. (*Oscin.*) 182.
 suave Lw. 103.
 subappennina ROND. 100.
 subcinerea BRULLÉ. 29.
 subfasciata ZETT. 83.
 subfasciatum Lw. 103.
 subguttata MEIG. 212.
 subpunctata BECK. 206.
 subsultans FABR. (*Gymnopa*) 190.
 subsultans FABR. (*Sphaeroc.*) 29.
 subterranea R.-D. 50.
 subtile Lw. 103.
 subvalida PORTSCH. 141.
 subvittata Lw. 83.
 succinea COSTA. 121.
 sudanica BIG. 275.
 suilla FABR. 11.
 suilla var. a. FALL. 12.
 suilla var. b. ZETT. 12.
 suillioidea R.-D. 45.
 suillorum R.-D. 83.
 suillorum HALID. 26.
 sulcata v. D. WULP. 172.
 sulcella ZETT. 183.
 sulcicollis MEIG. 178.
 sulfuriceps STROBL. 248.
 sulphuripes MEIG. 259.
 Sundewalli ZETT. 270.
 Sundewalli FRIES. 68.
 superba HALID. 149.
 superba v. RÖD. 262.
 superciliosa ZETT. 248.
 syllibi ROND. 121.
 sylvatica MEIG. (*Limos.*) 35.
 sylvatica MEIG. (*Toxoc.*) 164.
 sylvatica BELING. 89.
 syngenesiae FABR. 104.
 syngenesiae HARDY. 259.
 syrphoides FRFLD. 218.
 tabidiventrif ROND. 83.
 taeniata MACQ. 166.
 taeniopa MEIG. 172.
 taeniopa SCHIN. 172.
 taeniopa ROND. 12.
 talaria ROND. 237.
 tamaricis BIG. 240.
 tanacetif SCHRANK. 121.
 tangerii GUÉR. MÉN. 281.
 tarsalis ZETT. 52.
 tarsalis WALK. 150.
 tarsata FALL. (*Hapl.*) 167.
 tarsata FALL. (*Lonch.*) 89.
 tarsata MEIG. (*Homal.*) 175.
 tarsata MEIG. (*Ceratom.*) 251.
 tarsata MEIG. (*Hapl.*) 167.
 tarsata HALID. 201.
 tarsata ZETT. (*Limos.*) 36.
 tarsata ZETT. (*Odinia*) 240.
 tarsata WAHLB. 216.
 tarsata STENH. 187.
 tarsea FALL. 20.
 tarsella ZETT. (*Agrom.*) 248.
 tarsella ZETT. (*Saprom.*) 83.
 tarsella ZETT. (*Psila*) 161.
 tarsella ZETT. (*Ephyr.*) 194.
 taurina ROND. 275.
 tegularia Lw. 103.
 tenella MEIG. 259.
 tenella SCHIN. 278.
 tenella FRFLD. 124.
 tener Lw. 264.
 tenera Lw. (*Saprom.*) 83.
 tenera Lw. (*Oxya*) 135.
 tenerifensis BIG. 141.
 tenuiseta Lw. 166.
 terebrans Lw. 128.
 terebratula PORTSCH. 108.
 terminalis MEIG. 259.
 terminalis ZETT. 230.
 terminata FALL. 143.
 terminata MEIG. 143.
 terminata MACQ. 262.
 terminata ROND. 143.
 tesquae BECK. 83.
 tessellata MACQ. 12.
 tessellata Lw. 135.
 tessellatum FABR. 271.
 testacea L. 268.
 testacea R.-D. (*Saprom.*) 83.
 testacea R.-D. (*Psila*) 161.
 testacea v. ROS. 222.
 testacea MACQ. 58.
 testacea ZETT. 45.
 testacea PORTSCH. 107.
 testacea GMEL. 268.
 tetra Lw. 214.
 tetrachaeta Lw. 83.

- Thalhammeri* STR. (*Limos.*) 36.
Thalhammeri STR. (*Eutr.*) 167.
Thalhammeri ST. (*Phyt.*) 259.
Thalhammeri STR. (*Opom.*) 229.
thamnicola R.-D. 93.
thapsi BOUCHÉ. 248.
Theora NEWM. 141.
thoracica R.-D. (*Micr.*) 158.
thoracica R.-D. (*Seps.*) 147.
thoracica R.-D. (*Sapr.*) 83.
thoracica R.-D. (*Scat.*) 12.
thoracica MACQ. 248.
thoracica HALID. 201.
thoracica ZETT. 56.
thoracica BECK. 83.
tibialis FABR. 271.
tibialis FALL. 248.
tibialis R.-D. (*Acicra*) 110.
tibialis R.-D. (*Clidog.*) 20.
tibialis R.-D. (*Borb.*) 26.
tibialis BRULLÉ. 188.
tibialis MACQ. (*Trim.*) 188.
tibialis MACQ. (*Oscin.*) 182.
tibialis MACQ. (*Sapr.*) 83.
tibialis ZETT. (*Leucop.*) 237.
tibialis ZETT. (*Borb.*) 26.
tibialis ZETT. (*Bleph.*) 50.
tibialis ZETT. (*Cordyl.*) 3.
tibiellum ZETT. 7.
Tiefl MIK. (*Acanthoen.*) 15.
Tiefl MIK. (*Lobiopt.*) 238.
Tiefl BECK. (*Acerocn.*) 17.
Tiefl STROBL. (*Phyt.*) 259.
tigrina FALL. 40.
tigrina MEIG. 45.
tigrina ZETT. 45.
tinclinerve BECK. 13.**)
tincliventris ROND. 83.
tomentosa MACQ. 183.
toxoneura LW. 116.
transsylvania BECK. 201.
transversa FALL. 222.
transversa WIED. 83.
transversum LATR. 103.
trapae R.-D. 187.
trapezoides BECK. 176.
trebinjensis STROBL. 248.
tremula HALID. 230.
triangularis BECK. 175.
tridens BECK. 147.
tridentata LW. 259.
trifaria LW. 69.
trifasciata DEG. 262.
trifasciata MEIG. 262.
trifasciata CURTIS. 45.
trifasciata ZETT. 174.
trifolii KALTENB. 249.
trilineata MEIG. 183.
trimacla MEIG. 91.
trimaculata ZETT. 91.
trimaculata LW. (*Tetan.*) 94.
trimaculata LW. (*Ort.*) 96.
trinervis STENH. (*Phil.*) 204.
trinervis STENH. (*Hyad.*) 205.
trinotata R.-D. 240.
trinotata COSTA. 229.
tripunctata FALL. 230.
tripunctata STROBL. 85.
trispina ROND. 83.
trispinum BECK. 189.
tristella THOMS. 249.
tristis FALL. 222.
tristis MEIG. (*Tephron.*) 99.
tristis MEIG. (*Limos.*) 36.
tristis MEIG. (*Clasiopa*) 196.
tristis LW. (*Siphon.*) 178.
tristis LW. (*Teph.*) 141.
trisulcata BECK. 185.
trivialis LW. 157.
trivittata LW. (*Corem.*) 72.
trivittata LW. (*Agr.*) 249.
trivittata STROBL. (*Dros.*) 222.
trivittata STROBL. (*Elgiva*) 69.
trogodytes ZETT. 172.
trogodytes LW. 52.
tropaeoli L. DUF. 259.
truncata LW. (*Teph.*) 141.
truncata LW. (*Phys.*) 264.
Truquii ROND. 69.
tuberculata BECK. 249.
tuberculosa BECK. 83.
tuberiperda ROND. 45.
tuberivora R.-D. 45.
tubifer MEIG. 83.
turcestanica HEND. 69.
turdi LATR. 279.
turpis HALID. 12.
tussilaginis FABR. 121.
tussilaginis WALK. 122.
uliginosa FALL. 98.
uliginosa HALID. 187.
umbellatarum FABR. 91.
umbellatarum MEIG. 92.
umbelliferarum SCHRK. 172.
umbraculata FABR. 175.
umbraculata R.-D. 83.
umbrarum L. 65.
umbrarum FABR. (*Plat.*) 103.
umbrarum FABR. (*Trypt.*) 66.
umbrarum R.-D. 12.
umbratica MEIG. 45.
umbripennis R.-D. 268.
umbripennis V. D. WULF. 159
umbripennis GIRSCHN. 54.
umbrosa LW. 3.
undulata BECK. 209.
unguicella ZETT. 231.
unguicornis SCOP. 71.
ungulata LW. 231.
unicolor FABR. 92.
unicolor WALK. 276.
unicolor LW. (*Cordyl.*) 3.
unicolor LW. (*Tetanoc.*) 64.
unicolor LW. (*Meliera*) 100.
unicornis CZERNY. 214.
unilineata ZETT. (*Meg.*) 6.
unilineata ZETT. (*Psila*) 161.
unimaculata V. ROS. 128.
unimaculata STROBL. 222.
unipunctata MACQ. 68.
unipunctata ZETT. 225.
unipunctum ZETT. 230.
unistriata STROBL. 222.
univittata V. ROS. 45.
uralensis GMEL. 275.
urinaria R.-D. 215.
urophorina MIK. 250.
ursula SINTEN. 259.

- urticae* L. 101.
urticae SCHRANK. 104.
urticae R.-D. 105.
usta MEIG. 92.
ustulata FALL. 92.
ustulata MEIG. 45.
ustulata ZETT. (*Strong.*) 163.
ustulata ZETT. (*Bleph.*) 50.
ustulata ZETT. (*Scolioph.*) 4.
ustulata CURTIS. 38.
uvarum ROND. 222.
vacillans WOLLAST. 123.
vagans FALL. 249.
vagans MEIG. 182.
vagans HALID. 36.
vagans LW. 225.
vagans ROND. 279.
vaginalis FALL. 89.
vaginata LW. 45.
valida LW. 141.
valida WOLLAST. 131.
validicornis ZETT. 5.
vaporariorum HALID. 29.
varia WIED. 268.
varia MEIG. 162.
varia LW. 122.
variabilis LW. (*Uroph.*) 128.
variabilis LW. (*Bleph.*) 50.
variceps ZETT. 249.
varicornis STROBL. 36.
variegata FALL. (*Phort.*) 218.
variegata FALL. (*Lunig.*) 65.
variegata MEIG. (*Agr.*) VI. 249.
variegata MEIG. (*Mer.*) 168.
variegata MG. (*Agr.*) VII. 249.
variegata MG. (*Phys.*) 264.
variegata MG. (*Myop.*) 268.
variegata WIED. 275.
variegata HALID. 169.
variegata LW. (*Eutr.*) 167.
variegata LW. (*Scat.*) 214.
variegata LW. (*Helom.*) 45.
variegata SCHIN. 169.
variegata HEEG. 222.
variofasciata BECK. 124.
variofemorata BECK. 212.
varipennis MACQ. 112.
varipes MEIG. (*Borb.*) 26.
varipes MEIG. (*Pioph.*) 153.
varipes MEIG. (*Oscin.*) 182.
varipes MEIG. (*Enicita*) 148.
varipes MACQ. (*Phyt.*) 259.
varipes MACQ. (*Agr.*) 249.
varipos MACQ. (*Dros.*) 222.
varipes STAEG. 150.
varipes HOLMGR. 12.
varitibia BECK. 19.
varius MEIG. 154.
vegetationis ROND. 104.
venabulata ROND. 128.
ventralis FALL. 56.
ventralis MEIG. (*Sciom.*) 57.
ventralis MEIG. (*Dichr.*) 59.
ventruosa LW. 106.
venusta MEIG. 230.
venusta LW. (*Pallopt.*) 92.
venusta LW. (*Notiph.*) 187.
verbasci BICHÉ. (*Agr.*) 249.
vernalis R.-D. (*Dalm.*) 273.
vernalis R.-D. (*Dit.*) 60.
vernalis R.-D. (*Hyad.*) 205.
veronicae KALTENB. 260.
verticella STENH. 36.
veruata ROND. 128.
vesicularis L. 262.
vespertilconea R.-D. 51.
vespertilionis LATR. 288.
vespertilionis NITZSCH 288.
vespertilionis WALK. 288.
vespertilionis L. 286.
vespertilionis L.-DUF. 286.
vespertina LW. 141.
vesuviana COSTA. 116.
vetula FALL. 37.
vexata WESTW. 287.
vibrans L. 105.
vicaria POK. 62.
viciae KALTENB. 249.
vicina MEIG. 153.
vicina R.-D. 67.
vicina MACQ. 122.
viduata MEIG. 260.
villipes ZETT. 12.
villosa MEIG. 46.
villosula MEIG. 161.
vindicata MEIG. 182.
violacea MEIG. 147.
violae CURTIS. 249.
violascens R.-D. (*Hel.*) 45.
violascens R.-D. (*Herina*) 98.
virens MEIG. 273.
virens LW. 122.
virescens v. Ros. 169.
virgata CURT. (*Oecoth.*) 47.
virgata CURT. (*Sciom.*) 57.
virgaureae KALTENB. 249.
virinea MEIG. 222.
virgo ZETT. 249.
viridana MEIG. 89.
viridescens R.-D. (*Not.*) 187.
viridescens R.-D. (*Hydr.*) 201.
viridescens R.-D. (*Ephyg.*) 194.
viridescens MACQ. 182.
viridis LATR. 278.
viridis MACQ. (*Hydr.*) 201.
viridis MACQ. (*Pioph.*) 154.
viridis MACQ. (*Nemop.*) 150.
viridis MACQ. (*Hyad.*) 205.
viridis v. Ros. 172.
viridula MEIG. 278.
viridula R.-D. (*Hydr.*) 201.
viridula R.-D. (*Philgr.*) 204.
viridula HALID. (*Mer.*) 169.
viridula HALID. (*Arxys.*) 202.
vitalbae KALTENB. 260.
vitellina LW. 262.
vitripennis MG. (*Oscin.*) 182.
vitripennis MG. (*Phyt.*) 260.
vitripennis MG. (*Laux.*) 85.
vitripennis MG. (*Borb.*) 26.
vitripennis ZETT. 36.
vitripennis SCHIN. 26.
vittata FABR. 264.
vittata MEIG. (*Agr.*) 249.
vittata MEIG. (*Parall.*) 4.
vittata MEIG. (*Chyl.*) 163.
vittata HALID. (*Sciom.*) 57.
vittata HALID. (*Antich.*) 61.
vittata WALK. 83.
vittata ROND. 122.
vittatus LW. 41.

- vittigera* ZETT. (*Agr.*) 249.
vittigera ZETT. (*Scat.*) 214.
vittigera SCHIN. 67.
vittipennis ZETT. 204.
vivida R.-D. 147.
vorticis BECK. 190.
vulcanica ROND. 128.
vulgaris FALL. (*Pioph.*) 154.
vulgaris FALL. *p. p.* (*Pioph.*) 154.
vulgaris R.-D. 26.
vulgaris var. ZETT. 154.
Wagae BIG. 92.
Wahlbergi ZETT. 237.
Walkeri WOLLAST. 64.
Wenigeri MEIG. 122.
Westermanni MEIG. 131.
Westwoodi GUER.-MÉN. 286.
Westwoodi KOLEN. 286.
Wiedemanni MEIG. 116.
Wiedemanni LW. 84.
Winthemi MEIG. 122.
Winnertzi EGG. 217.
Winnertzi FRFLD. 110.
xanthaspis LW. (*Phyt.*) 260.
xanthaspis LW. (*Emp.*) 107.
xanthocephala ZETT. 249.
xanthocera LW. 196.
xylostei R.-D. 260.
xylostei KLTNB. (*Agr.*) 249.
xylostei KLTNB. (*Phyt.*) 260.
Zawadskii SCHUM. 37.
Zelleri LW. (*Limnia*) 71.
Zelleri LW. (*Teph.*) 141.
Zetterstedti FALL. *p. p.* (*Ortalis*) 96.
Zetterstedti FALL. *p. p.* (*Euphr.*) 109.
Zetterstedti R.-D. 270.
Zetterstedti GIMM. (*Nor.*) 14.
Zetterstedti GIMM. (*Cerd.*) 3.
Zetterstedti ZETT. 111.
Zetterstedti SCHIN. 260.
Zetterstedti LW. 45.
Zetterstedti BECK. 89.
Zoë MEIG. 113.
zonata ZETT. 260.
zosteræ HALID. 36.
-

ADDENDA ET CORRIGENDA.

- Pag. 4. lin. 11. infra pro : **melaneura** lege : **melanacra**.
 „ 13. ad **Coniosternum** genus adde speciem :
 tinctinerve BECK., Berlin. entom. Zeitschr., XXXIX. 178. Europa centr.
 115. (1804).
 „ 16. lin. 12. infra pro : KUNTZEI lege : KUNZEI.
 „ 21. „ 10. supra pro : **cynocephala** lege : **cynophila**.
 „ 36. ad **Genera incerta** addendum est genus :

Carnus

NITSCH, Germ. Magaz. entom., III. 305. (1818).

hemapterus NITSCH, Germ. Magaz. entom., III. 305. (1818). Europa.

- „ 37. ad speciem : **flaveola** FABR. adde synonymam :
 flava PANZ., Fauna Germ., XX. 22. [*Musca*] (1794).
 „ 41. lin. 8 supra pro : **Anthophilinae** lege : **Anthophilina**.
 „ 41. in citatis omnibus : Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, XIII.
 etc pro : (1859) lege : (1862).
 „ 46. ad genus **Eccoptomera** adde :
 microphthalma ZETT. = **longiseta** MEIG.
 „ 47. ad genus : **Blepharoptera** MACQ. adde genus synonymum :
 Leria ROB.-DESV. p. p. Myod., 653. I. (1830).
 „ 54. in omnibus citatis ad **Sciomyzam** genus pertinentibus
 pro : HENDEL, Verhandl. zool.-bot. Ges. lege : HENDEL,
 Abhandl. etc.
 „ 57. lin. 7. supra pro : **Calobaea** lege : **Colobaea**.
 „ 69. „ 17. supra pro : **sepedonoïdes** lege : **sepedonoïdea**.
 „ 80. „ 1 et 3. infra pro : *pallustris* lege : *palustris*.
 „ 83. adde speciem :
 Sapromyza trinotata COSTA, Atti Acc. Sc. Napoli, V. Italia,
 91. t. I. f. 6. (1835). Germania.
 et pone synonymam speciem : *tenera* Lw.
 „ 96. omitte speciem : **fulminans** MEIG., cum est synonyma speciei :
 Platyparea poeciloptera SCHRANK, vide pag. 108.
 „ 99. adde ad **Melieram** genus synonymum :
 Ceroxys MAOQ., Suit. à Buff., II. 437. 3. (1835).

Pag. 101. lin. 2. infra pro: **coloptera** lege: **caloptera**.

„ 117. ad **Trypetam** genus addendum est citatum:
MEIG., Illig. magaz., II. 277. (1803).

„ 129. lin. 3. supra pro: **Acinia** MACQ., p. p. (1835) lege: **Acinia**
ROB.-DESV., Myod., 775. (1830).

„ 152. ad **Piophilam** genus adde speciem:

flavipes ZETT., Dipt. Scand., VI. 2518. 12. (1847).

Suecia.

„ 154. lin. 18. supra pro: **Meganeurina** lege: **Megamerina**

„ 158. ad **Psilam** adde genus synonymum:

Peletophila HAGENB., Symbol. faun. ins. Helv., I. 48. (1822).

„ 159. adde ad speciem: **fimetaria** L. citatum:

SHELLENB., Genres des mouches, Zürich p. 62. Tafeler-
klär. (1803).

„ 159. lin. 17. infra omitte post: *flava*: PANZ., Fauna Germ., XX.
22. [*Musca*] (1704), cum est synonyma speciei:

Dryomyza flaveola FABR., cfr. Addenda ad paginam 37.

„ 159. lin. 16. infra adde ad speciem: *flava* SHELLENB. citatum:

HAGENB., Symb. faun. ins. Helv., I. 48. [*Peletophila*] (1822).

„ 159. lin. 10. infra omitte nomen: PANZ.

„ 172. ad speciem: **strigula** MEIG. adde citatum: SCHIN., F. A., II.
215. (1864).

„ 178. lin. 23. supra lege: **amoena** MEIG., S. B., VII. nec: VI.

„ 182. lin. 9. supra pro: **sobriculata** lege: **scrobiculata**.

„ 185. post lineam 13. adde speciem:

pubescens THALH., Természetr. Füzetek, XXI. [*Elachiptera*] Europa mer.
(1898).

„ 189. lin. 18. infra pro: **BEZII** lege: **BEZZII**.

„ 194. ad **Clasiopam** STENH. adde genus synonymum:

Discocerina MACQ., p. p., Suit. à Buff., II. 527. (1835).

„ 194. lin. 20. infra pro: **plunusa** lege: **plumosa**.

„ 198. lin. 5. supra pro: **chryostoma** lege: **chrysostoma**.

„ 211. lin. 9. supra pro: **acustris** lege: **lacustris**.

„ 217. lin. 3. infra pro: **syphoides** lege: **syrphoides**.

„ 218. lin. 4. supra pro: **syphoides** lege: **syrphoides**.

„ 222. lin. 20. supra pro: **fristis** lege: **tristis**.

„ 222. lin. 17. infra pro: **urarum** lege: **uvarum**.

„ 232. ad **Chiromyiam** adde genus synonymum:

Peletophila VERRAL, BEZZI, BECKER (NON HAGENBACH).

„ 243. pro: **elongula** lege: **elongella**.

„ 243. pro: **ferrugineza** lege: **ferruginosa**.

„ 254. pro: **aprilima** lege: **aprilina**.

„ 304. pro: **curvicanda** lege: **curvicauda**.

Microformed by
Preservation
Services

mfm # 5028

2.17.93

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00882 9533