the 2 parts 581.948.9

p/t

[Redacted]

Sch 8

1

Columbia College
in the City of New York.
Library.

GIVEN BY

Prof. N. L. Britton

ENUMERATIO PLANTARUM

IN PARTIBUS

SÆLLANDIÆ SEPTENTRIONALIS

ET ORIENTALIS

QUAM EDIDIT

CHRIST. FRIEDER. SCHUMACHER,

*Professor tertius in Academia Chirurgorum Regia
Hafniensis, Chirurgus primarius Nosocomii Fridericiani,
Docens mineralogiam in Societate Historiæ naturalis
Hafniensis, hujus æque ac Linneanæ Londinensis
Societatis Sodalis, Societatum medicæ Londinensis
ac mineralogicæ Jenensis membrum
Correspondens.*

PARS PRIOR.

HAFNIÆ, 1801.

APUD FRIDERICUM BRUMMER,

TYPIS E. M. COHEN.

+QK 287

. 534

v. 1

APR 100

100 100

100 100 100

9 May 96 H 146
V I R O

NOMINIS IMMORTALIS BOTANICORUM

ILLUSTRISSIMO

MARTINO VAHL,

PROFESSORE REGIO AC PLURIMARUM QUIBUS PER
LITTERARUM ET ARTIUM JUVATUS SOCIETATUM
SODALI

AMICO SVAVISSIMO

HANC

COMMENTATIONEM

CONSECRAT

AUCTOR.

30 APR 1896 Prof. W. L. Britton 2009
220726

AUCTOR.

52232

I
Insulæ Sælandiæ tam ea pars, quæ in septentrionem, quam quæ in orientem vergit, planiciebus, campis, agris, ericetis, collibus, sylvis, fruticetis, rivulis, lacubus, stagnis & paludibus apparet varia distincta. Utramque partem Oceanus ambit. Quo efficitur, ut plantæ hic gignantur, quæ frustra quærantur in terris, quarum una eademque forma oculos fatigat. Equidem per annos viginti duos, varia anni tempestate, partim præeunte *Professore Magni nominis Vahl* pervagans, partim solus perlustrans loca Havniæ spatio sex milliarius circumjacentia, familiaritatem velut inivi cum horum locorum vegetabilibus. Ipse interfui, ac vidi plantarum plerasque, quas in hac commentatione adtuli,

exceptis iis, quas amici mihi sunt impertiti, quibus gratum animum hic testor, quorumque nomina, ubi solum plantæ natale expressum est, adjunxi. Silere non debeo, memorari a me plantarum paucas, quas in itineribus, quæ in insulam Monam & tractum Præstøensem suscepèram, inveni. Quod hæc accessere, tu lector, si in eo a me peccatum judices, veniam precanti des rogo. Existimavi Botanophilis non ingratum fore euchiridion, quod continet solum eas plantas, quæ in hoc tractu circum circa gignuntur. Studui consulere iis, qui alias laborabunt apud externos quærere, quæ nostra sunt, & operam dedi quantamcunque, ut, quod lector harum rerum curiosus, quærat, in minori numero reperiri facilius possit. Quo minus peram gravari possit libri, quam edidi, sarcina, quoque commodior, fieri possit hujus enchiridii usus, in duas partes totum librum sum partitus. Pars prior viginti tres classes priores continet. Pars

secunda classẽm viceſimam quartam explicabit. Habet hæc classis plantas, quæ cryptogamicæ vocantur, quarumque usus per æſtatem est minus communis, quam earum, quæ in parte prima explicantur.

Ordinẽm quod attinet, immortalem LINNEUM in prima præcipue hujus opusculi parte secutus sum, a quo in generibus ac speciebus finiendis nonnunquam disceſſi, & ad Botanicorum recentiores tranſii, ubi perſuaſum mihi fuit, ab iis factam mutationem præferri oportere, & characteres, quas indicavere, tam accuratius expreſſos, quam principiis magis ſolidis fundatos. Quæ characterum enumeratio cum ut Flora localis ſpectari debet, ego ſtudentium commodis ſimul conſulens, partim adjunxi, quæ de una alterave planta huic fini inſervire exiſtimavi. Quem ſucceſſum habuit hæc mea cura, intelligentium artificum judicium ſit. Specierum paucæ, quæ novæ mihi vilæ ſunt, comitantur in numero currenti,

nulla tamen nota distinctæ, id quod judicavi
adiaphoron fore tironibus, sed a proVectis in
Botanico studio facile observatum iri. Nolui
in autoribus laudandis longus esse. Figuras
lectorî representavi solum eas, quæ commo-
dissimæ visæ sunt.

Locum natalem primo generalius expressi
deinde specialius lingua *Danica*, ut obscuritas
& barbarismus evitari possent.

Nisi valetudo adversa impedimentum ob-
jecerit ingratum, spero, fore, ut libri hujus
pars posterior tempore mercatus autumnalis
post festum Michaelis prodeat.

CLASSIS I.
MONANDRIA.

MONOGYNIA.

Salicornia. Calyx ventriculosus, integer.

Corolla nulla. Semen unicum.

Hippuris. Calyx superus brevissimus minimus.

Corolla nulla. Stigma simplex. Semen unicum subrotundum.

DIGYNIA.

Callitriche. Calyx nullus. Corolla dipetala.

Filamentum incurvum. Styli duo. Capsula bilocularis tetrasperma.

Monandria Monogynia.

MONOGYNIA.

1. *Salicornia.*

Calyx monophyllus ventriculosus integer.

Corolla nulla. Semen unicum.

1. *S. herbacea.*

a. *patula*, articulis apice crassioribus, ramis decumbentibus patulis.

b. *erecta*, articulis fere cylindricis; caule stricto erecto, ramis erectiusculis. Flor. Dan. 303.

a. in littore maris Baltici Seelandiæ & Amagriæ & b. præsertim inter *Svane-Möllen* & *Constantia* inveniri. Flor. Aug.

2. *Hippuris.*

Calyx superus brevissimus minimus. Corolla nulla. Stigma simplex. Semen unicum subrotundum.

2. *H. vulgaris*, foliis octomis linearibus subulatis.

a. *palustris* foliis patentibus.

b. *fluvialis* foliis submersis reflexis, emergis in spiram contortis. Flor. Dan. 87.

b. in amne inter *Nye Möllen* & *Papiers-Möllen* & a. in palude; ved *Bernstorfs Veien*, *Wallbye*. Flor. Jun. Jul. & Aug.

DIGYNIA.

3. *Callitriche.*

Calyx nullus. Corolla dipetala. Filamentum longum incurvum. Styli duo. Capsula bicularis tetrasperma.

3. *C. androgyna*, floribus androgynis.

a. foliis omnibus ovalibus. Flor. Dan. 129.

b. foliis superioribus ovalibus, inferioribus linearibus, subbifidis.

c. foliis omnibus linearibus, inferioribus subbifidis.

in fossis rivulisque sed *b.* in amne ved *St. Hans Hospital.* Flor. May. Jun. & interdum Jul.

4. *C. hermaphrodita.* Floribus hermaphroditis, foliis omnibus linearibus apice bifidis.

In fundo sabuloso argillaceo *af Peblinge Söe, Em-drup-Söe, Birkeröd-Söe &c.* Flor. tempore æstivali usque ad autumnum.

CLASSIS II.
DIANDRIA.

MONOGYNIA.

* Flor. inferi, monopetali regulares.

Ligustrum. Corolla quadrifida. Calyx quadridentatus. Bacca tetrasperma.

** Flores inferi monopetali irregulares.

a. Fructus capsulares.

Veronica. Corolla limbo quadripartito: lacinia inferiore angustiore. Capsula obcordata bilocularis.

Pinguicula. Corolla ringens calcarata. Calyx bilabiatus quinquesidus. Capsula unilocularis.

Utricularia. Corolla ringens calcarata. Calyx diphyllus æqualis. Capsula unilocularis.

b. Fructus gymnospermi.

Lycopus. Corolla quadrifida: lacinia unica emarginata. Stamina distantia. Semina quatuor retusa.

*** Flores superi.

Circea. Corolla dipetala. Calyx diphyllus. Germen inferum. Capsula uncinato-hispida, bivalvis. Semina solitaria.

DIGYNIA.

Anthoxanthum. Calyx gluma bivalvis uniflora. Corolla gluma bivalvis longitudine valvulæ majoris calycinæ: valvulæ utraque aristam e dorso emittente.

MONOGYNIA.

4. *Ligustrum*.

Calyx quadridentatus. Corolla quadrifida.
Bacca tetrasperma. (*Bacca bilocularis: locula-*
mentis membrana tenui vestitis. Semina bina.)
Hoff.

5. *L. vulgare*, foliis ovato-lanceolatis acutis; thyrsi
pedicellis oppositis. Curt. Lond. 5. No. 51.

Ad sepēs sed rarius & solummodo *bag Lyngbye*
tæt ved Søen observari. Flor. Jul. & Aug.

4. *Circæa*.

Calyx diphyllus (foliolis calycinis reflexis).
Corolla dipetala. Capsula uncinata-hispida,
bivalvis. Semina solitaria.

6. *C. lutetiana*, foliis cordato-ovatis, repando-
ferrulatis, acutis cauleque erecto pubescente;
capsulis ovato-globosis. Curt. Lond. 3. no. 34.
&c. Flor. Dan. 210. haud bon.

In umbrosis fere ubique *Charlottenlund, Dyre-*
have &c. Flor. Jul. & Aug.

7. *C. intermedia*, foliis cordatis, repando-denti-
culatis, acuminatis cauleque erecto glabro;
capsulis ovato-globosis.

In umbrosis humidis & quidem in sylve inter
Friederichsdahl & Kollekolle vulgo *Hareskov* legi.
Flor Jul. & Aug.

8. *C. alpina*, foliis cordatis dentatis acutis, caule-
que prostrato vel erecto glabro; capsulis cla-
vatis &c. Flor. Dan. 256?

In umbrosis humidis, cryptis radicium arborum
haud frequens i *Dyrehave*, *Birkerød*, *Gjælskov*
&c. Flor. Jul. & Aug.

6. *Veronica.*

Calyx quadri- vel quinque partitus. Corolla
limbo quadripartito, lacinia infima angustiore.
Capsula bilocularis (obcordata).

* *Spicatae.*

9. *V. spicata*, spica terminali; foliis oppositis cre-
natis obtusis (ovato-oblongis); caule adscen-
dante simplicissimo. Flor. Dan. Tab. 52.

In littore ved *Frederiksfund*, *Dn. v. Holten* &
Markussen.

10. *V. officinalis*, spicis lateralibus pedunculatis;
foliis oppositis, caule procumbente. Flor.
Dan. Tab. 248.

In sylvis, ericetis & aliis locis. Flor. Jun. &
Jul.

** *Corymbofo-raumosa.*

11. *V. jerpillifolia*, racemo terminali subspicato;
foliis ovatis glabris crenulatis. Flor. Dan.
Tab. 192.

In pratis & alibi. Flor. May. Jun. & Jul.

12. *V. Beccabunga*, racemis lateralibus; foliis
ovatis crenulato-ferratis planis; caule repente.
Flor. Dan. Tab. 511.

In rivulis, ad fossas. Flor. æstate.

13. *V. Anagallis*, racemis lateralibus; foliis lanceolatis ferrulatis; caule erecto. Flor. Dan. Tab. 903. habitat & floret cum antecedente.

14. *V. scutellata*, racemis lateralibus alternis; pedicellis pendulis.

a. *villosa*, foliis lineari-lanceolatis subdentatis, cauleque villoso.

b. *glabra*, foliis subovato-lanceolatis denticulatis cauleque glabro. Flor. Danic. Tab. 209.

In locis inundatis & turfosis haud infrequens. Flor. æstate.

15. *V. montana*, racemis lateralibus paucifloris; calycibus hirsutis; foliis ovatis rugosis, crenatis petiolatis; caule debili. Flor. Dan. Tab. 1201.

Rarius in locis umbrosis, sylvis ved Kollekolle & gammel Friderichsdal i Næffet. Rafn Danm. og Holst. Flora.

16. *V. Chamædrys*, racemis lateralibus; foliis ovatis, sessilibus, rugosis, obtuse ferratis; caule debili, hisariam piloso. Flor. Dan. Tab. 448.

In pratis. Flor. May. & Jun.

*** Floribus lateralibus solitariis.

17. *V. agrestis*, floribus solitariis alternis, pedunculis plernmque foliis æqualibus; foliis cordato-ovatis crenato-ferratis rugosis. Flor. Danic. Tab. 449.

In cultis & ruderatis. Flor. a primo vere usque ad autumnum. (*Folia inferioria opposita, floralia alterna sunt.*)

18. *V. arvensis*, floribus solitariis alternis, pedunculis brevissimis; foliis inferioribus cordato-ovatis crenato-ferratis, rugosis, oppositis; floralibus ovato-lanceolatis vel lineari-lanceolatis subintegerrimis. Flor. Dan. 515.

In arvis & pratis ficcis. Flor. primo vere.

19. *V. hederifolia*. Floribus solitariis, pedunculis fructiferis foliis longioribus, deflexis; foliis infimis ovatis integris, inferioribus atque supremis cordatis, sublobatis. Flor. Danic. Tab. 428. haud bona. Buxb. Cent. 1. Tab. 39. f. 1. melior.

In agris & ruderatis frequens. Flor. Apr. May. & Jun.

20. *V. verna*. Floribus solitariis, pedunculis brevissimis; foliis digitato-partitis lacinia intermedia ovata; caule sub digitali. Flor. Dan. Tab. 252.

Haud frequens in arvis & pratis ficcis *ved Constantia, bag ved Stolpegaard, Brede-Mölle, Sorgenfrie Baker*. Flor. primo vere.

21. *V. peregrina*, floribus solitariis sessilibus, foliis lanceolato-linearibus glabris obtusis subserratis; caule erecto. Flor. Danic. Tab. 407.

In Insula Amagria? Müller. Flor. Jun. & Jul.

7. *Pinguicula.*

Calyx bilabiatus quinquesfidus. Corolla ringens calcarata. Capsula unilocularis.
(Stamina thalamo inserta).

22. *P. vulgaris*, nectario cylindraceo longitudine petali. Flor. Dan. Tab. 93.

(Folia ovata, carnosae; margine inflexo, depressa. Scapus uniflorus.)

In locis humidis turfosis fere ubique. Flor. May. & Jun.

8. *Utricularia.*

Calyx diphyllus, æqualis. Corolla ringens calcarata. Capsula unilocularis.

23. *U. vulgaris*, nectario subulato-conico incurvo; labio supremo compresso: scapo purpureo, (nostris regionibus.) quadri-fex octofloro. Flor. Dan. Tab. 138.

In fossis & paludibus turfosis valde profundis; *Lundehuus Mose*, *Lyngbye*, *Birkeröd* & alibi. Flor. Jun. Jul. & Aug.

24. *U. media*, nectario conico recto; labio supremo explanato; scapo bi-tri-quadrifloro, gracili. Flor. Dan.

Rarius in paludibus turfosis i *Lyngbye Mose* og i *Mosen i Skoven imellem Rudergaard og Birkeröd* solummodo observari. Flor. Jul. & Aug.

25. *U. minor*, nectario brevi carinato; labio supremo inferiore duplo minori; scapo filiformi tri-quadrifloro. Flor. Dan. Tab. 128.

Rarius in paludibus turfosis *Lyngbye Mose*, *Birkérød*, *Ordrup-Mose* & alibi. Flor. c. præcedente.

9. *Lycopus.*

Corolla quadrifida: lacinia unica emarginata.
Stamina distantia. Semina quatuor retusa.

16. *L. europæus*, foliis ovato-lanceolatis, sinuato-ferratis. Flor. Dan, Tab. 1081.

Satis frequens in fossis & aliis locis humidis & paludosis. Flor. Jul. Aug. Sept.

DICYNIA.

10. *Anthoxanthum.*

Calyx gluma bivalvis uniflora. Corolla gluma bivalvis longitudine valvulæ majoris calycinæ: valvula utraque aristam e dorso emittente.

17. *A. odoratum*, spica ovato-oblonga: flo. culis subpedunculatis arista longioribus. Flor. Dan. Tab. 666.

In pratis & pascuis. Flor. Maj. & Jun.

a. spica lineari; foliis caulinis linearibus subsetaceis.

Habitat & floret cum priori.

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

* Flores superi.

Valeriana. Corolla quinquefida, basi gibba.
Calyx nullus. Semen unicum.

Iris. Corolla monopetala, sexpartita, laciniis alternis deflexis vel patentibus. Calyx spathaceus. Stigmata petaliformia.

** Flores graminei valvulis glumæ calycinæ.

Schoenus. Corolla nulla. Calyx glumæ paleaceæ univalves fasciculatim congestæ. Semen unicum subrotundum inter glumas.

Cyperus. Corolla nulla. Calyx glumæ paleaceæ distiche imbricatæ. Semen unicum nudum.

Scirpus. Corolla nulla. Calyx glumæ paleaceæ imbricatæ. Semen unicum vel nudum vel villis cinctum.

Eriophorum. Corolla nulla. Calyx glumæ paleaceæ undique imbricatæ. Semen unicum lana longissima cinctum.

Nardus. Corolla bivalvis: valva exteriori lanceolata, carinata, aristata; interiori acuminata.

Semen unicum lanceolatum, corolla adnata tectum.

DIGYNIA.

* Calycibus trivalvibus unifloris.

Panicum. Calyx trivalvis: duæ majores muticæ aut aristatæ, tertia dorsalis, minima. Corolla bivalvis.

** Calycibus bivalvibus unifloris.

Phalaris. Calyx bivalvis, carinatus longitudine æqualis, corollam includens.

Phleum. Calyx bivalvis sessilis, linearis, truncatus apice bicuspidato. Corolla bivalvis perianthio minor, mutica, inclusa.

Alopecurus. Calyx bivalvis, æqualis, carinatus, lanceolatus. Corolla univalvis, apice arista longa terminante.

Milium. Calyx bivalvis; valvis subæqualibus verticosis. Corolla bivalvis, ovata, brevissima: valvula altera minore. Stigmata penicilliformia.

Agrostis. Calyx bivalvis æqualis; valvis lanceolatis acutis corolla longioribus. Corolla bivalvis; valvula exterior modo mutica, modo aristata. Stigma longitudinaliter hispida.

Arundo. Calyx bivalvis, oblongus acuminatus. Corolla basi tanuginosa. Semen lana cinctum.

*** Calycibus bivalvibus, bifloris.

Aira. Calyx bivalvis, æqualis acutus. Corolla

bivalvis: altera valvula sæpe ad basin aristata; absque interjecto rudimento tertii floris.

Melica. Calyx bivalvis, æqualis, obtusus. Corolla bivalvis mutica, cum rudimento secundi vel tertii floris.

**** Calycibus bivalvibus, multifloris.

Poa. Calyx bivalvis, muticus ovatus acuminatus. Corolla bivalvis: Valvulis acutiusculis margine scariosis.

Briza. Calyx bivalvis, cordatus, concavus, obtusus. Corolla bivalvis mutica æqualis.

Dactylis. Calyx bivalvis, compressus: Glumæ, lanceolatæ macronatæ; altera gluma majori carinata. Corolla bivalvis; altera valvula apice aristata.

Festuca. Calyx bivalvis, subulatus, acuminatus. Corolla oblonga; valvulis mucronatis; altera sæpe aristata ex apice.

Bromus. Calyx bivalvis, oblongus, acuminatus. Corolla bivalvis inæqualis, majore bifida, aristam infra apicem emittente.

Avena. Calyx bivalvis, lanceolatus, acutus. Corolla oblonga, altera valvula dorso vel basi aristata; arista tortili in medio geniculata.

Cynofurus. Calyx bivalvis, linearis, acuminatus. Receptaculum florum nnilaterale, foliaceum.

***** Spica distincta, receptaculo subulato, dentato.

Rottböllia. Calyx simplex vel bipartitus, ovato lanceolatus planus. Flosculi alterni in rachidi flexuosa.

Lolium. Calyx univalvis linearis, fixus, rachi oppositus multiflorus. Corolla inæqualis.

Elymus. Calyx bivalvis, aggregatus, multiflorus. Spiculæ geminæ.

Triticum. Calyx bivalvis ovatus subtriflorus sessilis. Corolla bivalvis, valvulis subæqualibus. Receptaculi basis callosa.

Hordeum. Calyx hexaphyllus, triflorus. Flosculi laterales sæpe masculi.

TRIGYNIA.

Montia. Calyx di-triphyllusque; foliola ovato, obtusa. Corolla monopetata irregularis. Capsula unilocularis trivalvis.

Holosteum. Calyx pentaphyllus. Petala quinque. Capsula unilocularis, subcylindracea, apice dehiscens.

MONOGYNIA.

II. *Valeriana.*

Calyx nullus. Corolla quinquefida, basi gibba.
Semen unicum.

28. *V. dioica*, floribus triandris dioicis; foliis radicalibus ovatis petiolatis, subintegris; caulinis inferioribus lyrato-pinnatifidis; superioribus pinnatifidis. Flor. Dan. Tab. 687.

In pratis udis. Flor. Maj. & Jun.

29. *V. officinalis*, floribus triandris; foliis pinnatis pinnis dentatis, alternis. Flor. Dan. 570.

In nemoribus paludosis & turfosis *Ordrup, Lundehus, Lyngbye* & alibi. Flor. Jun. & Jul.

30. *V. olitoria*, floribus triandris; caule dictotomo; foliis caulinis linearibus subdentatis; radicalibus ovato spatulatis integris. Flor. Dan. Tab. 738.

In locis ficcis, arvis, *Charlottenlund, Bellevue, Castellet.* Flor. vere.

31. *V. dentata*, caule dichotomo, foliis oblongis, dentatis, femine tridentato.

In locis humidis. Flor. Jun. & Jul. Rafn Dan. og Holst. Flora.

12. *Iris.*

Calyx spatha membranacea. Corolla monopetala, sexpartita; petalis alternis deflexis vel patentibus. Stigmata petaliformia, cucullato-
bilibiata.

32. *I. Pseud-Acorus*, corollis imberbibus; lacinii interioribus stigmate minoribus; foliis ensiformibus. Flor. Dan. Tab. 494.

In palustribus, fossis, frequens. Flor. Jun. & Jul.

33. *I. spuria*, corollis imberbibus; germinibus hexangularibus; caule tereti; foliis sublinearibus. Flor. Dan. Tab. 734.

Olim a *Kyllingio*, nuperime a *Dn. Colsmanno* in *Insula Saltholm* lecta. Flor. Jun.

13. *Schoenus*.

Calyx glumæ paleaceæ univalves fasciculatim congestæ. Corolla nulla. Semen unicum subrotundum inter glumas, vel nudum vel setis minimis, e receptaculo proprio enatis, cinctum.

34. *S. Mariscus*, culmo tereti; foliis margine dorsoque aculeatis. Flor. Dan. Tab. 1202.

In lacubus & amnis. *Lyngby-Søe*, *Orholm*, *Nye Mølle*. Flor. Jul.

35. *S. albus*, culmo subtriquetro folioso; floribus fasciculatis, subdiandris uti in præcedenti; foliis fetaceis. Flor. Dan. Tab. 320.

Rarius in paludibus turfosis; in *Tepri-Mose* solummodo vidi. Flor. Jul. & Aug.

14. *Cyperus*.

Calyx glumæ paleaceæ distichæ imbricatæ. Corolla nulla. Semen unicum nudum.

36. *C. fuscus*, culmo triquetro nudo, umbella trifida pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis linearibus. Flor. Dan. Tab. 179. Haud frequens in pratis paludosis i *Frue-Skov bag ved Bagsværd*. Flor. Jun.

15. *Scirpus*.

Calyx; glumæ paleaceæ, undique imbricatæ. Corollâ nulla. Semen unicum vel nudum vel villis cinctum.

* Spica unica, terminali, nuda.

37. *S. palustris*, culmo tereti, nudo; spica subovata terminali. Flor. Danic. Tab. 273.

In locis paludosis frequens. Flor. Maj. & Jun.

38. *S. Bæothrion*, culmo tereti, stricto, nudo, basi vaginato; vagina truncata; spica terminali, pauciflora, bivalvi; valvulis ovatis, spica brevioribus, margine scariosis: exteriore brevior. Flor. Danic. Tab. 167.

In locis inundatis. Flor. Jun. & Jul.

Præcedente similis sed parvior. Anne solummodo varietas?

39. *S. cæspitosus*, culmo nudo, stricto, basi vaginato; vagina subacuminata; spica bivalvi, terminali longitudine calycis; radicibus squamula interfluctis.

In locis humidis muscosis, ericetis. Inter *Lyngbyegaarden* & *Lyngbye*. Rafn l. c.

40. *S. acicularis*, culmo tereti, nudo, setiformi; spicula terminali ovata, bivalvi; seminibus nudis. Flor. Dan. Tab. 287.

In locis inundatis, ad ripas lacuum frequens
Peplinge-Söe, Fur-Söe, Lyngbye-Söe & alibi.
 Flor. æstate usque ad autumnum.

41. *S. fluitans*, culmis teretibus, nudis, alternis;
 spica terminali; caule folioso, flaccido. Flor.
 Dan. Tab. 1082.

In paludosis & inundatis locis. Piscino versus
Hareskov Dn. v. Holten rarissimam hanc plantam
 legit. Flor. Jul. & Aug.

** Spicis, lateralibus, nudis.

42. *S. setaceus*, culmo tereti, nudo, setaceo: spicis
 lateralibus, subgeminis, subsessilibus. Flor.
 Dan. Tab. 311.

In littoris lacuum haud frequens; *Langesöe ved Birkeröd; Lyngbye-Söe & alibi.* Flor. Jul. & Aug.

*** Culmo polytachio. Spicis involu-
 cratis.

a. Culmo tereti.

43. *S. lacustris*, culmo tereti, nudo; spicis ovatis,
 pluribus, pedunculatis involucribus; involu-
 cellis diphyllis. Flor. Dan. Tab. 1142.

In lacubus, piscinis, rivulis, & amnis frequens,
 Flor. Jun. Jul. & Aug.

b. Culmo triquetro.

44. *S. Caricis*, culmo subnudo, subtriquetro;
 spica terminali; spiculis distichis; involucrum
 monophyllum. Pollich. palat. no. 38. f. 2. sa-
 tis bona.

In pratis humidis nec non turfosis. Flor. Maj
Jun. & Jul.

45. *S. maritimus*, culmo triquetro, panicula con-
globata foliacea; spicularum squamis trifidis:
intermedia subulata. Flor. Dan. Tab. 937.

In littoris frequent. Flor. Jul. & Aug.

46. *S. sylvaticus*, culmo triquetro, folioso; um-
bella foliacea; pedunculis nudis supradecom-
positis, spicis confertis. Flor. Dan. Tab. 707.

In humidis præsertim sylvaticis: *bag ved Orrups-
Mose, Sorgenfrie* & aliis locis. Flor. Jun. & Jul.

16. *Erisphorum.*

Calyx glumæ paleaceæ, undique imbricatæ.
Corolla nulla. Semen unicnm, lana longissi-
ma cinctum.

* Spica unica, terminali, nuda.

47. *E. vaginatum*, culmis subteretibus vaginatis;
spica scariosa. Flor. Dan. Tab. 236.

In paludibus turfosis, præsertim in palude *ved
Stolpegaard*; circa *Birkeröd*. Flor. Apr. Maj.
& Jun.

48. *E. alpinum*, culmis nudis triquetris; spica
exigua, ovato lanceolata, subinvoluta.
Flor. Dan. Tab. 620. haud bona.

In palude vulgo *Lyngbye Mose* frequens. Flor.
Maj. & Jun.

** Spicis pluribus, terminalibus, inve-
lucratiss.

49. *E. polyslachion*, culmis teretibus; foliis planis (mucrone brevi triquetro; spicis pedunculatis involucro diphylo æqualibus vel longioribus. Leers Herborn. Tab. 1. Fig. 5.

In uliginosis turfosis fere ubique. Flor. primo vere.

50. *E. angustifolium* culmis foliosis, teretibus; foliis canaliculato triquetris; spicis pedunculatis; involucro subtriphylo: foliolo unico spicis triplo vel quadruplo longiori, reliquis brevioribus vel subæqualibus, vel haud longioribus. In uliginosis turfosis sylvaticis Birkeröd. Flor. primo vere.

17. *Nardus*.

Calyx nullus. Corolla bivalvis; valvula exterior lanceolata, carinata aristata; interior acuminata. Semen unicum lanceolatum, tectum.

51. *N. stricta*; spica setacea, recta, secunda. Flor. Dan. Tab. 1022.

In ericetis; Dronning-Gaard, Charlottenlund, Birkeröd & alibi. Flor. Jun.

DIGYNIA.

18. *Phalaris*.

Calyx bivalvis, carinatus, longitudine æqualis, corollam includens.

52. *P. canariensis*, panicula subovata spiciformi glumis carinatis. Schreb. Graes. Tab. X. Fig. 2.

In ruderatis nunc sponte crescit, *Österfelled*,
Ladegaarden & in aliis locis vicinis. Flor. Jun.
& Jul.

53. *P. phleoides*, panicula cylindrica, spiciformi,
glabra, passim vivipara. Flor. Dan. Tab. 531.
In locis arenosis siccis; *Nyemölle*. Flor. Jun. &
Jul.

54. *P. arundinacea*, panicula oblonga, ventricosa
& ampla. Flor. Dan. Tab. 259.
Ferè ubique in ripis rivulorum & lacuum. Flor.
Jul. & Aug.

19. *Panicum.*

Corolla bivalvis. Calyx trivalvis, duæ majores muticæ aut aristatæ, tertia dorsalis minima.

55. *Pan. viride*, spica tereti, involuclis bifloris
fasciculato-pilosis; seminibus nervosis. Flor.
Dan. Tab. 852.

In locis siccis, inter vias *Charlottenlund* & *Skovshoved*. Flor. Jul. & Aug.

20. *Phleum.*

Corolla bivalvis gluma minor, mutica inclusa.
Calyx bivalvis sessilis, linearis truncatus apice
bicuspidato.

56. *Phl. pratense*, spica cylindrica longissima, ciliata; culmo erecto. Schreb. Graes. Tab. 14.
In pratis subhumidis & inundatis. Flor. Jun. &
sequentibus mensibus.

57. *Phl. nodosum* spica cylindrica; culmo ascendente; foliis obliquis; radice bulbosa. Flor. Danic. Tab. 380.

In pratis paludosis nec non in locis ficcis. Flor. cum antecedente.

21. *Alopecurus.*

Corolla univalvis, apice arista longa terminata. Calyx gluma bivalvis: valvulis carinatis, lanceolatis æqualibus.

58. *A. pratensis*, culmo spicato erecto; glumis villosis; corollis muticis. Schreb. Graeser Tab. 19. Fig. 1.

In pratis & fossis. Flor. Maj. Jun. & Jul.

59. *A. geniculatus*, culmo spicato infracto; corollis muticis. Flor. Dan. Tab. 861.

In pratis humidis & fossis. Flor. Jun. & Jul.

22. *Milium.*

Corolla bivalvis, ovata, brevissima: valvula altera minore. Stigmata penicilliformia. Calyx bivalvis: valvis subæqualibus ventricosis.

60. *M. effusum*, floribus paniculatis, dispergis, muticis. Flor. Dan. Tab. 1143.

In nemoribus umbrosis. Flor. Jun. & Jul.

23. *Agrostis.*

Corolla bivalvis; valvula exterior modo mutica modo aristata. Stigma longitudinaliter

hispida. Calyx gluma bivalvis æqualis; valvis lanceolatis acutis, corolla longioribus.

* aristatæ.

61. *A. Spica venti*, petalo exteriori arista recta, stricta, longissima, panicula patula. Flor. Dan. Tab. 853. Flor. Jun. & Jul.

Inter segetes, ad vias: *Ordrup, paa Castelsveient*.

62. *A. rubra*, panicula parte inferiore prius florente patentissima, arista terminali, tortili recurva.

In pratis subhumidis, circa *Birkeröd, Rudersgaard, Frederiksborg* & alibi. Flor. Jun. & Jul.

63. *A. canina*, calycibus elongatis, petalorum arista dorsali, recurva; culmis prostratis subramosis.

In locis siccis & humidis. Flor. Jun. & Jul.

** muticæ.

64. *A. stolonifera* paniculæ ramulis patentibus; culmo repente; calycibus æqualibus; flosculis muticis.

In agris, ad vias. Flor. Jun & Jul.

65. *A. capillaris*, panicula capillari patenti; calycibus subulatis, æqualibus, hispidiusculis, coloratis; flosculis multicis. Fl. Dan. Tab. 163.

In pratis, versuris fere ubique.

a. pumila

in pratis valde siccioribus. Flor. Jul. & Aug.

66. *A. alba*, panicula coarctato-patula; culmo repente; calycibus æqualibus dorso ferratis.

flosculis muticis. Leers Herborn. Tab. 4.

Fig. 5.

In fossis, locis humidis ac inundatis. Flor. Jun.
& Jul.

67. *A. tenella*, panicula divaricata capillari pauciflora mutica; calyce flosculisque acutis subæqualibus. Hoffm. botanisch. Taschenb. 1800. pag. 36.

In sylvis, locis umbrosis. Flor. Jul. & Aug.

68. *A. coarctata*, panicula contracta; calycibus subæqualibus; corollis haud brevioribus, obtusiusculis, hispidulis; foliis angustis fere filiformibus setaceis. Hoffm. botanisch Taschenbuch 1800. pag. 37.

In locis cæspitosis, circa Birkeröd. Flor. Jun.
& Jul.

24. *A i r a*.

Calyx bivalvis, biflorus. Flosculi absque interjecto rudimento.

* Muticæ.

69. *Air. aquatica*, panicula patente; flosculis muticis lævibus, calyce longioribus; foliis planis. Flor. Dan. Tab. 381.

In pratis humidis, paludibus: *Lundehuus Mose*. Flor. Jun. & Jul.

** Aristatæ.

70. *Air. cæspitosa*, foliis planis, panicula patente (laxa subsæcunda; petalis basi villosis aristatisque: arista recta brevi. Flor. Dan. Tab. 240.

In locis humidis depresso, fossis. Flor. Jun. & Jul.

71. *Air. flexuosa*, foliis setaceis; culmis subnudis: panicula divaricata; pedunculis flexuosis. Flor. Dan. Tab. 157.

In pratis aridis, sylvis. Flor. Jun. & Jul.

72. *Air. canescens*, foliis setaceis; summo spathaceo paniculam inferne obvolvente; (panicula coarctata) aristis calycem non excedentibus. Flor. Dan. Tab. 1023.

In arvis arenosis præsertim arena mobili, *Vebek*. Flor. Jul.

73. *Air. præcox*, foliis setaceis: vaginis glabris fulcato-angulatis; floribus paniculato-spicatis; aristis calycem superantibus. Flor. Dan. Tab. 383.

In arenosis aridis; inter *Charlottenlund* & *Skovshoved*, *Brede-Baker* & aliis locis. Flor. Maj. & Jun.

74. *Air. caryophyllæa*; foliis setaceis: vaginis glabris, fulcatis; panicula divaricata; aristis calycem superantibus. Flor. Dan. Tab. 382.

In arvis & collinis arenosis; *Dyrehaven ved Eremitagen*, *Brede-Baker*, *Kollekolle Granskov* & alibi. Flor. Jun.

25. *Melica*.

Calyx bivalvis, æqualis obtusis. Corolla bivalvis, mutica, cum rudimento secundi vel tertii floris.

75. *M. nutans*, panicula nutante simplici; calycibus trifloris. Flor. Dan. Tab. 962.

In sylvis haud frequens; *Bagård, Dyrehave.*
Flor. Jun. & Jul.

76. *M. uniflora*, panicula rara, calycibus bifloris: flosculo altero hermaphrodito: altero sterili. Flor. Dan. Tab. 1141.

Præcedenti frequentior in sylvis; *Charlottenlund, Dyrehave, Birkeröd & alibi.* Flor. Jun.

77. *M. carulea*, panicula coarctata; floribus cylindricis. Flor. Dan. Tab. 239.

In paludosis turfosis frequens. Flor. Aug.

26. *P o a.*

Calyx bivalvis, muticus, ovatus acuminatus.

Corolla bivalvis: valvulis acutiusculis margine scariosis.

78. *P. aquatica*, panicula diffusa; spiculis sexfloris, linearibus. Flor. Dan. Tab. 920.

In fossis ad ripas piscinarum, lacuum frequens. Flor. Jul.

79. *P. trivialis*, panicula diffusa; spiculis trifloris, basi pubescentibus; foliis planis; vaginis scabriusculis: ligula aucta. *Curtis General Observations on the Advantage which may result from the Introduction of the Seeds of our best Grasses, Fig. 7.*

In pratis sat copiosa. Flor. Jun.

80. *P. angustifolia*, panicula primo contracta post floralcentiam autem maximæ divaricata; spi

culis quadrifloris pubescentibus; foliis radicalibus filiformibus; vaginis lævibus; ligula brevi truncata.

In agris & inter vias. Flor. Maj. & Jun.

81. *P. pratensis*, panicula diffusa; spiculis quinquefloris subpubescentibus; foliis planis, vaginis lævibus; ligula truncata. *Curt.* l. c. Fig. 3.

In pratis nec non inter vias publicas. Flor. cum præcedenti.

82. *P. annua*, paniculis diffusis angulis rectis; spiculis obtusis; culmo obliquo compresso.

In cultis ruderatisque. Flor. a primo vere ad serum autumnum.

83. *P. maritima*, panicula subdiffusa, deinde patente & demum retroflexa; spiculis quadri-quinque-septem-floris; culmo repente solorifero. Flor. Dan. Tab. 251.

In littore maris frequens. Flor. Jun. & Jul.

Eadem cum *Poa salina* Pollich. & Leyser.; *Poa arenaria* Retz. & Rafn.; *Poa retroflexa* Curtis; *Aira aquatica* Hudson.; *Poa cristata* Gunner. An eadem cum *Poa distante* Hostii?

84. *P. palustris*, panicula attenuata subdiffusa; spiculis subtrifloris subpubescentibus ovato-rotundatis; foliis subtus scabris; ligula obtusa. Flor. Dan. Tab. 749.

In fossis & pratis humidis; *Bagsværd, Lundehuus-Mose.* Flor. Maj. & Jun.

Culmus & panicula erectior & strictior est quam in sequente specie.

85. *P. nemoralis*, panicula attenuata, divaricata, laxa; spiculis subbifloris ovato-oblongis aristato-mucronatis scabris; culmo incurvo. Flor. Dan. Tab. 750. Vaill. botanic. parisiens. Tab. 17. f. 5. melior.

In sylvis gramen est frequentissimum. Flor. Jun. & Jul.

86. *P. compressa*, panicula coarctata secunda; spiculis ovatis sexfloris pubescentibus; culmo obliquo compresso. Flor. Dan. Tab. 742.

In muris, ruderatis, ad vias. Flor. Jul. & Aug.

87. *P. costata*, panicula, coarctata spicæformi; spiculis ovatis subtrifloris subpubescentibus; valvulis florum nervosis; culmo erecto vel ascendenti, tereti.

In monticulis arenosis littoris inter *Springforbie* & *Papirsmölle*. Flor. Jun.

Culmus pedalis & haud altior, erectus, teres, glabres, subnudus, versus basin geniculatus. Folia radicalia subpedalia erecta filiformia subscabriuscula; culmea subdua brevissima. Panicula coarctata spicæformis uncialis erecta. Spiculæ oblongæ acutiusculæ. Glumæ subæquales, lanceolatæ, acutæ, scabræ bi vel trifloræ. Valvulæ florum glumarum fere longitudine, submucronatæ, tri vel quinque nervosæ scabridæ.

27. *Briza*.

Calyx bivalvis, cordatus, concavus obtusus.
Corolla bivalvis mutica æqualis.

88. *B. media*, spiculis ovato cordatis; calyce flosculis brevior. Flor. Dan. Tab. 258.

Haud frequens in pratis præsentim sylvaticis;
Rudergaard, Dyrehave, &c. Flor. Jun.

28. *Dactylis*.

Calyx bivalvis, compressus. Glumæ lanceolata mucronatæ; altera gluma majori carinata.
Corolla bivalvis; altera valvula apice aristata.

89. *D. glomerata*, panicula secunda, glomerata.
Flor. Dan. Tab. 743.

In pratis, ruderatis, ad vias frequens. Flor. æstate.

a. sylvestris, culmo altiori; panicula diffusiori, patentiori, glomerata.

In locis umbrosis humidiusculis sylvarum ac nemorum. Flor. Jul. & Aug.

29. *Cynosurus*.

Calyx bivalvis, linearis, acuminatus. Receptaculum florum unilaterale, foliaceum.

90. *C. cristatus*, bracteis pinnatifidis. Flor. Dan. Tab. 238.

In pratis frequens. Flor. Jun. Jul. & Aug.

30. *Festuca*.

Calyx bivalvis, subulatus, acuminatus. Corolla oblonga; valvulis mucronatis: altera sæpe aristata ex apice.

91. *F. bromoides*, panicula secunda: spiculis erectis calycis valvula altera integra, altera acuminata; floribus aristatis.

In pratis ficcis *ved Frøken Brow's Gaard ved Bernstorf.* Flor. Jun. & Jul.

Culmi decumbentes. Folia setaceo-linearia.

92. *F. ovina*, panicula secunda, coarctata, aristata; culmo tetragono nudiusculo; foliis setaceis.

In pratis & collinis arenosis aridis frequens. Flor. Jun.

α. panicula multiflora; culmo subfoliaceo,

β. panicula submultiflora, amethystea; culmo subfoliaceo.

γ. panicula pauciflora; culmo nudo, altiori.

93. *F. rubra*, panicula secunda scabra; spiculis sexfloris aristatis: flosculo ultimo mutico; culmo semitereti. *Leers Herborn. Tab. 8. fig. 1.*

In locis ficcis & pascuis sterilibus. Flor. Jun. & Jul.

94. *F. duriuscula*, panicula secunda oblonga; spiculis sexfloris oblongis lævibus; foliis setaceis. *Flor. Dan. Tab. 848.*

In pratis ficcis. Flor. Jun.

95. *F. dumetorum*, panicula spicæformi, pubescente, foliis filiformibus. *Flor. Dan. Tab. 700.*

In aggere Hafniensi occidentem spectante. *Müller Fl. Dan. nomenclatur.*

96. *F. elatior*, panicula subsecunda erecta; spiculis subaristatis: exterioribus teretibus; pedunculis subadpressis.

Haud infrequens in pratis, fossis, advias. Flor. Jul.

97. *F. decumbens*, panicula rara, erecta, subsecunda; spiculis ovatis muticis; calyce flosculis majore; culmo decumbente. Flor. Danic. Tab. 162.

In pratis, pascuis, præsertim sylvaticis haud frequens. *Charlottenhuud, Gælskov, Hirschholm-skov.* Flor. Jul. & Aug.

98. *F. fluitans*, panicula ramosa erecta; spiculis subsessilibus muticis. Flor. Dau. Tab. 237.

In fossis, rivulis, & lacubus frequens. Flor. æstate.

31. *Bromus.*

Calyx bivalvis, oblongus, acuminatus. Corolla bivalvis inæqualis: majore bifida aristam infra apicem emittente.

99. *B. secalinus*, panicula patente; spiculis ovatis; valvulis externis corollarum apice bifidis aristatis; aristis rectis longitudine corollarum; seminibus distinctis. Leers Herborn. Tab. 11. fig. 2.

Inter segetes & quidem in agris secalinis. Flor. Jun & Jul.

a. integer, panicula patente; spiculis ovatis subscabridis; valvulis externis corollarum

apice truncatis, crenulatis, aristatis; foliis vaginisque subhirsutiusculis.

Inter segetes legi.

100. *B. asper*, panicula patente-nutante scabra; spiculis linearibus villosiusculis decemfloris; floribus aristatis; vaginis foliorum inferius deorsum hirsutis.

In agris & locis humidis umbrosis; *Amager* & *Krattet imellem Ordrup-Mose og Dyrehaven*. Flor. Jun. & Jul.

101. *B. mollis*, panicula erectiuscula spiculis ovatis pubescentibus: aristis rectis; foliis mollissime villosis. *Leers Herborn. Tab. 11. f. 1.*

Fere ubique. Flor. Jun. & Jul.

102. *B. sterilis*, panicula patula; spiculis oblongis distichis; glumis subulato-aristatis. *Leers Herborn. Tab. 11. fig. 4.*

Præcipue in aggere *Hafniensi* & aliis locis. Fl. Jun. & Jul.

103. *B. arvensis*, panicula subnutante; spiculis ovato-oblongis aristatis; foliis planis supra villosis; vaginis strictis; marginibus pilosis.

In arvis, ad vias passim. Flor. Jul.

α. *inermis*, panicula subnutante; spiculis ovato-oblongis muticis. *Flor. Danic. Tab. 293.*

Rarior inter segetes

104. *B. pauciflorus*, panicula subcoarctata erecta spiculis ovatis scabridis subaristatis quadrifloris;

aristis capillaribus brevibus; foliis supra subhirsutis, vaginis glabris; ligula ciliata.

Ad vias marginesque agrorum laud frequens.

Birkeröd, Bernstorfsveien & Bagsværd legi. Flor.

Jul.

Cum præcedenti habitu maxime convenit.

105. *B. tectorum*, panicula nutante; spiculis linearibus. Leers Hörborn. Tab. 10 f. 2.

In ruderatis, muris tectisque. Flor. Jun.

106. *B. giganteus*, panicula nutante; spiculis quadrifloris linearibus aristatis; aristis capillaribus corollis longioribus; foliis vaginisque glabris. Flor. Dan. Tab. 440.

In nemoribus locis humidis *Charlottenlund, Dyrehave & alibi.* Flor. Aug. & Septembr.

107. *B. sylvaticus*, culmo racemoso, spiculis sessilibus linearibus, teretibus; aristis corollæ gluma longioribus. Flor. Dan. Tab 164.

In locis fruticosis ficcis & humidis; *Brede-Bakker, i Krattet imellem Dyrehave og Ordrup-Mose.* Flor. Jun. & Jul.

108. *B. pinnatus*, culmo racemoso; spiculis linearibus sessilibus subcompressis; aristis corollæ gluma brevioribus. Leers Herb. Tab. 10. fig. 3.

In sylvaticis; *Bagsværd.* Flor. Jun. & Jul.

32. *Avena.*

Calyx bivalvis, lanceolatus acutus. Corolla oblonga, altera valvula dorso vel basi aristata; arista tortili in medio geniculata.

109. *A. elatior*, panicula subcoarctata; calycibus bifloris, flosculo hermaphrodito submutico, masculo aristato. Flor. Dan. Tab. 165.

Haud frequens in pratis; ad fossas. Flor. æstate.

110. *A. strigosa*, panicula oblonga, contracta, secundata; flosculis geminis apice biaristatis, dorso arista geniculata.

In agris avenaceis haud infrequens. Flor. Jul.

111. *A. fatua*, paniculata; calycibus trifloris; flosculis omnibus aristatis basi pilosis.

Inter segetes. Flor. Jul. *Rafn l. c.*

112. *A. flavescens*, panicula laxa; calycibus trifloris brevibus; flosculis omnibus aristatis. Leers Herborn. Tab 10. fig. 5.

In pratis ficcis; *Friderichsdal. Müller. Flor. Jun. & Jul.*

113. *A. pubescens*, panicula subspicata; calycibus subtrifloris, basi pilosis; foliis planis pubescentibus. Flor. Dan. Tab. 1203.

In pratis; circa *Jägersborg & Friderichsberg* legi. Flor. Jun. & Jul.

114. *A. pratensis*, subspicata; calycibus quinquefloris. Flor. Dan. Tab. 1083.

In pratis ficcis, nec non sylvaticis; *Charlottenlund, Jägersborg, Hirschholm Skov. Flor. Jun. & Jul.*

33. *A r u n d o.*

Calyx bivalvis, oblongus acuminatus. Corolla basi lanuginosa. Semen lana cinctum.

* *Muticæ.*

115. *Ar. Phragmites*, calycibus quinquefloris; floribus muticis; panicula laxa. Leers Herb. Tab. 7. f. 2.

In lacubus, piscinis fossis frequens. Flor. Jul. & Aug.

116. *Ar. gracilis*, calycibus unifloris; floribus muticis; valvula exteriori lanceolata subtruncata crenulata: panicula erecta subdiffusa; culmo ramoso, tenere. *An canescens Wigg.?*

In locis elevatis humidis; collinis maritimis inter *Torbeck & Springforbie*. Flor. Jun. & Jul.

117. *Ar. arenaria*, calycibus unifloris; floribus muticis valvula exteriori profunde bi vel trifida, laciniis acutis; panicula coarctata erecta; foliis involutis, mucronato-pungentibus. Fl. Dan. Tab. 917. *Viborg om Sandvæxt* Tab. 1.

In locis elevatis ficcis, præcipue arena mobili. fcl. in elevatis circa *Fuursfœ tæt ved Kaningaarden*. Flor. Jun. & Jul.

** *Aristatæ.*

118. *Ar. Calamagrostis*, calycibus unifloris; floribus aristatis: valvula exteriori bifida, arista haud infra fissuram gerente & valvulam haud superante; panicula erecta lævis; culmo ramoso; foliis linearibus. Flor. Dan. Tab. 280.

In locis humidisylvaticis, ad fossas; *Charlottenlund, Floskekroe*, inter *Kongshvile & Friderichsdal*. Flor. Jul & Aug.

119. *Ar. stricta*, calycibus unifloris; floribus aristatis: valvula exteriore lanceolata; arista capillari dorsali longitudine glumæ; panicula erecta glomerata scabra; culmo ramoso; foliis linearibus. *Scheuchz. Agrostograph. p. 122. Tab. 5.*

In locis arenosis & maritimis; *Gælskov*; inter *Papiers - Mölle & Eenrum*. Flor. Jul. & Aug.

120. *Ar. Epigeios*, calycibus unifloris; floribus aristatis; valvula exteriore lanceolata bi trifida arista dorsali brevissima; panicula erecta subdiffusa scabra; culmo erecto; foliis lanceolatis subtus scabris.

In locis alevatis aridis nudis. Flor. Jul. & Aug.

34. *E o l i u m*.

Calyx univalvis, linearis fixus rachi oppositus, multiflorus. Corolla inæqualis.

121. *L. perenne*, spica mutica; spiculis compressis muticis, glumis longioribus. Flor. Dan. Tab. 747.

Ad vias, in pratis, pascuis passim. Ffor. Jun. & Jul.

α. spicata, spiculis aristatis.

β. ramosa. spica ramosa; spiculis fere ovatis muticis.

122. *L. temulentum*, spica aristata; spiculis compressis muticis. Flor. Dan. Tab. 169.

In agris. Flor. Jul.

35. *Rottböllia.*

Calyx simplex vel bipartibus, ovato-lanceolatus planus uniflorus. Flosculi alterni in rachidi flexuosa.

123. *R. incurvata*, spica tereti subulata; gluma calycina subulata adpressa bipartita. Flor. Dan. Tab. 938.

In pratis depressis *Insulæ Amagriæ* annis 1779 & 1780 legi; circa *Lim-Fabriquen*.

36. *Elymus.*

Calyx bivalvis aggregatus, multiflorus. Spiculæ geminæ.

124. *E. arenarius*, spica erecta, arcta; calycibus tomentosis flosculo longioribus. *Viborg om Sandvæxt.* Tab. 2.

In arenosis maritimis. *Vebeek.* Flor. Jun. & Jul.

125. *E. caninæ*, spica subnutante; spiculis, cylindricis vel cylindrico-compressis, villosis, rectis aristatis; rachi glabro. *Leers* Tab. 12. fig. 4. II.

Rarius in littore maris; inter *Vebeck & Lederfabrike.* Flor. Jul. & Aug.

Spiculas unquam geminas nec quadrifloras sed omni tempore solitarias & multifloras observari.

37. *Triticum.*

Calyx bivalvis ovatus subtriflorus, (in nostris quadri-quinque vel multiflorus) sessilis. Corolla bivalvis valvulis subæqualibus. Receptaculi basis callosa.

126. *T. junceum*, calycibus truncatis quinquefloris; foliis involutis. Flor. Dan. Tab. 916.
Ad littorem maris; Amagria; inter *Papiers-Mölle & Vebeck*. Rachis glaber.

127. *T. repens*, calycibus subulatis subcompressis, mucronatis; foliis planis; radice repente; rachi villoso. Schreb. Græs. Tab. 26.

In agris, hortis & alibi. Flor. Jul. & Aug.

α. *aristatum*, aristis subulatis spicula haud brevioribus rachi villoso. Flor. Dan. Tab. 748.

Habitat & floret cum præcedente.

128. *T. littoreum*, spica bi vel subtridigitali erecta; spiculis lanceolatis compressis mucronatis multifloris; foliis subinvolutis acutis.

In littore maris; inter *Torbek & Vebek*. Amager. Flor. Jul. & Aug.

α. *aristatum*, spiculis aristatis aristis spicula brevioribus.

Strictitate culmi, foliorum, & spicæ nec non colore glanco cum *T. junceo*; forma spicularum, villositate rachidis vero & reliquis c. *T. repente*, converit. An hybrida est?

38. *Hordeum*.

Calyx hexaphyllus triflorus. Flosculi laterales sæpe masculi.

129. *H. murinum*, flosculis lateralibus masculis aristatis, dorso glabris; involucriis intermediis ciliatis. Flor. Dan. Tab. 629.

Inter frequentissimas plantas pertinet. Flor. Jun. & Jul.

130. *H. secalinum*, flosculis lateralibus sterilibus filiformibus aristatis, dorso glabris; involucris fetaceis scabris. Flor. Dan. Tab. 630.

In maritimis *Amagriæ* rarius; etiam inter *Hafniam* & *Vebek* legi. Flor. Jul.

TRIGYNIA.

39. *Montia*.

Calyx di-triphyllusque; foliola ovata obtusa. Corolla monopetala irregularis. Capsula unilocularis, trivalois.

131. *M. fontana*, foliis oblongo-ovatis, subcarnosis; pedunculis unifloris, fructiferis deflexis, interdum iterum ascendentibus. Flor. Dan. Tab. 131.

Ad rivulos; in pratis humidis; *Bagsværd* og *Friderichsdal*; *Österfelled*. Flor. æstate.

40. *Holosteum*.

Calyx pentaphyllus. Petala quinque. Capsula unilocularis, subcylindræa; apice dehiscentis.

132. *H. umbellatum*, floribus umbellatis. Flor. Dan. Tab. 1204.

In locis ficcis *Dronninggaard* paa *Næffet* lige for *Palaiet*, og *Frydenlund*, ubi Dn. Holbøll invenit.

 CLASSIS IV.

 TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

* Flores monopetali, monospermi, superi,
aggregati-

Dipsacus, Calyx communis polyphyllus. Re-
ceptaculum conicum paleaceum. Semina co-
lumnaria.

Scabiosa. Calyx communis polyphyllus; pro-
prius duplex, superus. Semina coronata.

** Flores monopetali, monocarpi, inferi.

Centunculus, Calyx quadrifidus. Corolla qua-
drifida patens. Capsula unilocularis circum-
scissa.

Plantago. Calyx quadrifidus. Corolla quadri-
fida, limbo reflexo. Stamina longissima. Cap-
sula bilocularis circumscissa.

*** Flores monopetali, dicocci, superi.

Stellatæ.

Rubia. Corolla campanulata. Fructus baccati
monospermi.

Galium. Corolla monopetala, plana. Semina
duo, subrotunda.

Asperula. Corolla monopetala, infundibuliformis. Semina duo globosa.

Sherardia. Corolla tubulosa, infundibuliformis. Semina duo tridentata.

**** Flores tetrapetali, superi.

Cornus. Involucrum tetraphyllum. Calyx quadridentatus. Drupa nucleo biloculari.

***** Flores incompleti, inferi.

Alchemilla. Calyx quadri-ocfidus. Corolla nulla. Semen unicum.

DIGYNIA.

Cuscuta. Calyx quadrifidus. Corolla quadrifida, ovata. Capsula carnosa, bilocularis circumscissa.

TETRAGYNIA.

Patamogeton. Calyx nullus. Corolla tetrapetala. Stylus nullus. Semina quatuor.

Ruppia. Calyx nullus. Corolla nulla. Semina quatuor pedicellata.

Sagina. Calyx tetraphyllum. Corolla tetrapetala vel nulla. Capsula unilocularis, quadrivalvis, polysperma.

MONOGYNIA.

41. *Dipfacus*.

Calyx communis polyphyllus. Receptaculum conicum qaleaceum. Semina columnaria.

133. *D. sylvestris*, foliis lanceolatis, sessilibus, apice ferrulatis; paleis rectis. Flor. Danic. Tab. 965.

Ad vias, sæpes haud frequens inter *Kiøge* & *Walløe*. Flor. Jul. & Aug.

42. *Scariosa*.

Calyx communis polyphyllus, proprius duplex, superus. Semina coronata.

* Corollulis quadrifidis.

134. *S. succisa*, corollulis quadrifidis æqualibus, caule simplici; ramis aproximatis; foliis lanceolato-ovatis. Flor. Dan. Tab. 279.

In pratis, pascuis humidis ac sylvaticis. Flor. Aug. Sept. & Octobr. Folia caulina interdum repando-dentata vel ferrulata.

135. *S. arvensis*, corollulis quadrifidis radiantibus; foliis pinnatifidis incisfis; caule hispido. Flor. Dan. Tab. 447.

Ad vias, in pratis, arvis, aggeribus frequens. Flor. æstate.

** Corollulis quinquefidis.

136. *S. columbaria*, corollulis quinquefidis radiantibus; foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis fetaceis. Flor. Dan. Tab. 314.

In locis aridis rarius; collinis herbidis *Charlottenluad*, *Brede-Bakker*, *Lyngbye*. Flor. Jul. Aug & Sept.

43. *Sherardia*.

Corolla tubulosa. infundibuliformis. Semina duo tridentata.

137. *Sh. arvensis*, foliis omnibus verticillatis; floribus terminalibus. Flor. Dan. Tab. 439.

Inter segetes. Flor. Jul. & Aug.

44. *Asperula*.

Corolla infundibuliformis. Semina duo, globosa.

138. *A. odorata*, foliis octonis lanceolatis; florum fasciculis pedunculatis. Flor. Dan. Tab. 562.

In sylvis ubique. Flor. Maj. & Jun.

45. *Galium*.

Corolla monopetala, rotata. Semina duo subglobosa.

* Fructu glabro.

139. *G. palustre*, foliis quaternis, obovatis, inæqualibus; caulibus diffusis. Flor. Dan. Tab.

423.

In palludosis frequens. Flor. Jun. & Jul.

α. foliis quaternis, oblongis, æqualibus, obtusis, caule erecto. Siccatum nigrescit.

140. *G. uliginosum*, foliis fenis retrorsum ferrato-aculeatis, mucronatis rigidis; corollis fructu majoribus.

In uliginosis. *Hirschholm-Skov; Birkerød.* Flor.
Jun. Jul. & Aug.

141. *G. verum*, foliis caulinis octonis, linearibus,
sulcatis; ramis floriferis brevibus. Flor. Dan.
Tab. 1146.

Vulgatissimum ad vias, aggeres. Flor. Jul. &
August.

142. *G. Mollugo*, foliis octomis ovato-linearibus,
subserratis, patentissimis mucronatis; caule
flaccido; ramis patentibus. Fl. Dan. Tab. 455.

Ad sepes & in fruticetis e. g. inter *Springforbie*
& *Papiers-Möllen.* Flor. Jun.

Variat caule inferne pubescente.

143. *G. sylvaticum*, foliis octonis lævibus, subtus
(marginibusque) scabris, floralibus binis, pe-
dunculis capillaribus; caule lævi. Flor. Dan.
Tab. 609.

Intylvis. Flor. Jun. Jul. & Aug.

** Fructu hispido.

144. *G. boreale*, foliis quaternis lanceolatis, tri-
nerviis, glabris; caule erecto; seminibus hi-
spidis. Flor. Dan. Tab. 1024.

In pratis humidis haud infrequens. Flor. Jun.
Jul. & Aug.

145. *G. Aparine*, foliis octonis lanceolatis, carinis
scabris, retrorsum aculeatis; geniculis villosis;
fructibus globosis hispidis. Flor. Dau. Tab.
465.

In ruderatis, cultis, ad sepes ubique. Flor. Jun. & Jul.

46. *Rubia*.

Corolla campanulata. Fructus baccati monospermi.

146. *R. tinctorum*, foliis quaternis, quinis vel senis ellipticis asperis, caule aculeato.

Ad sepes & fossas. *St. Jörgens - Söe* ubi per viginti annos observavi.

47. *Plantago*.

Calyx quadrifidus. Corolla quadrifida limbo reflexo. Stamina longissima. Capsula bicularis circumscissa.

147. *P. major*, foliis ovatis glabris; scapo tereti; spica flosculis imbricatis. Flor. Dan. Tab. 461.

Ad vias in pratis & pascuis frequens. Flor. Jul. & Aug.

148. *P. media*, foliis ovato-lanceolatis, pubescentibus, breve petiolatis; spica cylindrica; scapo tereti. Flor. Dan. Tab. 581.

In pratis, aggeribus, ad vias. Flor. Jun. Jul. & August.

149. *P. lanceolata*, foliis lanceolatis; spica subovata nuda; scapo angulato.

Ad vias & in pratis substerilibus. Flor. Jun. Jul. & Aug.

a. altissima, foliis quinquenerviis longissime petiolatis; scapo pedali bipedali-que; spica ovata. Flor. Dan. Tab. 437.

- β. *capitata* foliis tri vel quinquenerviis angustioribus, breve petiolatis, petiolisque magis pubescentibus, scapo pedali haud ultra; spica ovato-globosa.
- γ. *prolifera* spicis proliferis. *Rafn l. c. Anmærkning p. 642. In Amagria.*

150. *P. maritima*, foliis semicylindræis, integerrimis basi lanatis; scapo tereti. *Flor. Danic. Tab. 243.*

In maritimis frequens. Flor. Jun. Jul. & Aug.

151. *P. Coronopus*, foliis hirsutis linearibus dentatis; scapo tereti. *Flor. Dan. Tab. 272.*

In maritimis locis passim. Flor. Jul. & Aug.

- α. foliis linearibus dentatis vel subdentatis villosis; spica ovata.
- β. foliis lanceolatis subpinnatifidis, scapoque hirsutis; spica cylindrica elongata.

48. *Centunculus*.

Calyx quadrifidus. Corolla quadrifida patens. Capsula unilocularis, circumscissa.

152. *C. minimus*, foliis superioribus alternis, ovatis inferioribus oppositis; caule subunciali. *Flor. Dau. Tab. 177.*

In arenosis subhumidis rarius i Hirschholm-Skov; in ripis piscinum: Bagsværd-Skov & Langedam vulgo inter Birkerød & Eskemoße semel observavi.

49. *Cornus*.

Involucrum tetraphyllum. Calyx quadridentatus. Drupa nucleo biloculari.

153. *C. sanguinea*, ramis rectis; foliis ovatis concoloribus; cymis depressis aphyllis. Flor. Dan. Tab. 481.

Haud frequens inter frutices & sepes: *Lyngbye-Søe*; *Bernstorfs Fasan-Gaard*; inter *Springfarbie* & *Papiers-Mölle*: in littore maris fruticoso. Flor. Jun. & Jul.

154. *C. svecica*, herbacea; ramis binis; foliis ovalibus, obpositis, sessilibus, nervosis, interioribus rotundioribus. Flor. Dan. Tab. 5.

In sylvaticis turfosis: inter *Fredensborg* & *Helsingöer Dn. Holten.* & *Martenlyst ved Helsingöer Dn. Hollböll.* Flor. Jun.

50. *Alchemilla*.

Calyx quadri-octofidus. Corolla nulla. Semen unicum.

155. *A. vulgaris*, foliis reniformibus, radicalibus novemlobatis serrato-dentatis petiolatis villosis; cymis corymbosis terminalibus trifidis; caule glabro. Flor. Dan. Tab. 693.

In pascuis, pratis sylvaticis vulgaris. Flor. Maj. & Jun.

α. hybrida foliis lobatis sericeis acute serratis caule petiolisque dense pilosis.

Haud frequens: inter *Frederichsberg* & *Damhusk* a Dn. *Schousboe* lecta.

156. *A. Aphanes*, foliis tripartitis, laciniis tri-
vel quadri profunde dentatis, pubescentibus
floribus axillaribus glomeratis monandris; ca-
lycibus quadrifidis. *Aphanes arvensis* L. Flor.
Dan. Tab. 973.

Vulgatissima in arvis & agris. Flor. æstate.

D I G Y N I A.

51. *Cuscuta.*

Calyx quadrifidus. Corolla quadrifida ovata.
Capsula carnosa, bilocularis, circumscissa.

157. *C. europæa*, floribus subsessilibus confertis;
corollis quadrifidis, laciniis obtusis: caule
filiformi volubili aphylo parasitico. Flor.
Dan. Tab. 199.

In fruticetis, ad sepes rarius: *Papiers-Mölle*;
Birkeröd. Flor. Jun. Jul. & Aug.

T E T R A G Y N I A.

52. *Potamogeton.*

Calyx nullus. Corolla tetrapetala. Stylus nul-
lus. Semina quatuor.

158. *P. natans*, foliis oblongo-ovatis petiolatis
natantibus. Flor. Dan. Tab. 1025.

In stagnis frequentissimum. Flor. Jun. & Jul.

159. *P. fluitans*, foliis inferioribus lanceolatis vel
ovato lanceolatis brevissime petiolatis membra-
naceis, superioribus tribus quatuor, vel quin-
que ovalibus subspatulatis obtusis coriaceis.

In rivulo: *ſom gaaer ved Falkoneer-Gaard.*; atque in lacu *ved Uſerøe-Mølle.* Flor. Jun. Jul. & Aug.

160. *P. ſerratatum*, foliis inferioribus ovali-lanceolatis, ſubpetiolatis, obtuſiusculis, membranaceis, alternis; ſuperioribus oblongo-ovatis, attenuatis, longepetiolaris, ſubcoriaceis, oppoſitis.

In lacubus, piſcinis haud frequens: *Bagſværd; Peblingeſøe.* Flor. Jul. & Aug.

161. *P. lucens*, foliis oblongo-ovatis, ſerrulatis, ſubmucronatis, planis in petiolos deſinentibus, ſuperioribus oppoſitis, omnibus membranaceis. Flor. Dan. Tab. 195.

Haud infrequens in lacubus: *Peblinge-Søe, Lyngbye-Søe.* Flor. Jun. Jul. & Aug.

162. *P. acuminatum*, foliis ovato-lanceolatis, planis, in petiolos deſinentibus, acuminibus ſubulatis rigidis, fere pungentibus, ſuperioribus oppoſitis, omnibus membranaceis.

In lacubus: *Peblinge-Søe, Farum-Søe.* Flor. Jul. & Aug. Per plures annos plantam hanc in locis ſupradictis obſervavi, ſed tantum bis florendi vidi.

163. *P. heterophyllum*, foliis ſubmerſis lineari-lanceolatis ſeſſilibus, natantibus ovato lanceolatis petiolaris. Flor. Dan. Tab. 222.

Rarius in piſcinis, & quidem in piſcino tertio minore *Bagſværd-Skov.* Flor. Jun. & Jul.

164. *P. perfoliatum*, foliis cordatis & ovato-cordatis amplexicaulibus alternis, superioribus vel floralibus vel sub dichotomiam caulis oppositis. Flor. Dan. Tab. 196.

In lacubus; *Bagseard*, *Lyngbye*, & *Peblinge-Søehaud* in frequens. Flor. Jul. & Aug.

Variat foliis magis minusve remotis; nec non caule dichotomo.

165. *P. crispum*, foliis lanceolatis undulatis obtusis alternis oppositisve sessilibus. Flor. Dan. Tab. 927.

In rivulis, piscinis, lacubus. Flor. Jun. & Jul.

166. *P. gramineum*, foliis lauceolatis, acutis, submucronatis, oppositis & alternis sessilibus.

In piscinis rarior occurrit: *Hirschholm-Skov*.

Tam a *heterophyllo* quam maxime a *denso* diversa est. Icon Floræ Danicæ *P. heterophyllum* melior monstrat.

167. *P. compressum*, foliis linearibus obtusis mucrone brevi, sessilibus, alternis; caule compresso; spicis brevibus quatuor ad sexfloris. Flor. Dan. Tab. 203.

In rivulo *ved Peblingesøe*. Flor. Jul. & Aug.

168. *P. zosteræfolium*, foliis linearibus quatuor ad sexpollicaribus, obtusis, breve mucronatis alternis oppositisque sessilibus, caule compresso; spicis uncialibus multifloris.

In rivulo, piscinis, molendinisque: *fra Lyngbye til Papiersmølle*. Flor. Jun. & Jul.

169. *P. Pusillum*, foliis linearibus angustissimis planis, costis elevatis, oppositis alternisque, basi patentibus; caule tereti, spicis paucifloris brevibus Vahl Tab. 32. f. 4.

Haud frequens in rivulis & spiciis: *Ermelund*, & *Friderichsdals-Mölle*. Flor. Jun.

Folia fere bipollicaria gerit,

170. *P. setaceum*, foliis linearibus, marginibus involutis, setaceis; caule filiforme tereti; pedunculis filiformibus elongatis; spicis sæpe triglomeratis, glomerulis remotis bi vel trifloris. A P. setaceo L. diversa.

Frequens in lacubus vulgo *Lyngbye* & *Fuursföe*. Flor. Jun. Folia alterna & opposita.

171. *P. pectinatum*, foliis setaceis parallelis, approximatis, distichis, spicis glomeratis; glomerulis quinque vel ultra approximatis.

In fossis piscinis & lacubus: i *Mölle-Renden* i *Lyngbye* &c. Flor. Jun. & Jul.

172. *P. marinum*, foliis lineari-setaceis, alternis, distinctis, inferne vaginantibus; caule subflexuoso. Flor. Dan. Tab. 18.

In fossis & aquis stagnantibus: *Christianshavns-Gravene*; *Amager* &c. Flor. Jul. & Aug.

53. *Ruppia*.

Calyx nullus. Corolla nulla. Semina quatuor pedicellata.

173. *R. maritima*, pedunculis capillaribus vel erectis subspiralibus longissimis, vel brevissi-

mis subcernuis; pedicellis umbellatis. Foliis
fetaceis; caule filiformi tereti. Flor. Dan.
Tab. 384.

In aquis stagnantibus ac fossis in littore maris:
Amager; Tømmerpladsen; Charlottenlund &
alibi. Flor. Jun. & Jul.

54. *S a g i n a.*

Calyx tetraphyllus. Corolla tetrapetala vel
nulla. Capsula unilocularis quadrivalvis, po-
lyisperma.

147. *S. procumbens*, ramis procumbentibus; fo-
liis linearibus, connato-fessilibus glabris; pe-
dunculis solitariis. Flor. Dan. Tab. 845.

In pascuis & locis siccis sterilibus frequens.
Flor. Jun. & Jul.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

* Fores monopetali inferi tetragymnospermi.
Asperifoliæ.

Echium. Corolla campanulata, limbo irregulari
fauce nuda.

Pulmonaria. Corolla infundibuliformis, fauce
nuda. Calyx prismaticus.

Lithospermum. Corolla infundibuliformis,
fauce nuda. Calyx quinquepartitus. Semina
quatuor, dura.

Symphytum. Corolla tubuloso-ventricosa, fauce
radiis lanceolatis clausa.

Lycopsis. Corolla infundibuliformis, fauce
squamis convexis clausa, tubo incurvo.

Asperugo. Corolla infundibuliformis, fauce
squamis clausa, tubo brevi. Calyx fructus
compressus; lamellis plano-parallelis
sinuatis.

Cynoglossum. Corolla infundibuliformis, fauce
fornicibus clausa. Semina (arillata) depressa,
interiore tantum latere stylo affixa.

Anchusa. Corolla infundibuliformis, fauce fornicibus clausa. Semina gibba, basi insculpta.

Myosotis. Corolla hypocrateriformis, fauce fornicibus clausa, quinquefida; lobis emarginatis.

** Flores monopetali inferi angiospermi.

Anagallis. Corolla rotata. Stigma capitatum. Capsula globosa, unilocularis polyperma circumscissa.

Lysimachia. Corolla rotata. Filamenta basi connata. Stigma obtusum. Capsula globosa unilocularis, quinque ad decemvalvis.

Primula. Corolla tubulosa, limbo plano vel cavo, fauce pervia. Stigma globosum. Capsula oblonga unilocularis, apice decemdentata dehiscens.

Hottonia. Corolla hypocrateriformis. Filamenta tubo corollæ imposita. Stigma globosum. Capsula globosa unilocularis.

Menyanthes. Corolla infundibuliformis, laciniis interne bifurcis. Stigma bifidum. Capsula unilocularis bivalvis.

Convulvulus. Corolla campanulata quinqueplicata. Stigma bifidum. Capsula bi vel trilocularis loculamentis dispersis.

Centaureum. Corolla infundibuliformis. Stamina tubo corollæ imposita, antheris post pollinis dimissionem spiraliter tortis. Stigma bifidum. Capsula lineari-oblonga, bilocularis bivalvis, longitudinaliter dehiscens.

Datura. Corolla infundibuliformis plicata. Calyx tubulosus, angulatus, deciduus. Capsula bi-quadrilocularis, quadri-valvis.

Hyoscyamus. Corolla infundibuliformis, inæqualis. Stamina inclinata. Stigma capitatum. Capsula bilocularis operculata.

Verbascum. Corolla rotata, subinæqualis. Filamenta inæqualia basi lanuginosa. Stigma obtusum. Capsula bilocularis bivalvis.

Solanum. Corolla rotata. Antheræ subcoalitæ, apice poro gemino dehiscences. Bacca bilocularis.

*** Flores monopetali, superi.

Samolus. Corolla hypocrateriformis. Stamina munita squamulis corollæ. Stigma capitatum. Capsula unilocularis apice quinquevalvis.

Campanula. Corolla campanulata, fundo clauso valvis staminiferis. Stigma trifidum. Capsula tri f. quinquelocularis poris lateralibus dehiscens.

Lonicera. Corolla monopetala tubulosa irregularis. Stigma capitatum. Bacca subglobosa uni-bi-trilocularis.

Iasione. Calyx communis decaphyllus; proprius quinpuedentatus. Corolla quinquepartita regularis. Antheræ basi subcoalitæ. Capsula bilocularis, apice dehiscens.

**** Flores pentapetali, inferi.

Viola. Corolla pentapetala, irregularis, postice cornuta. Antheræ coalitæ vel connatæ. Capsula unilocularis, trivalvis.

Impatiens. Corolla pentapetala irregularis; nectario cucullato. Antheræ basi pilis junctæ. Capsula unilocularis, quinquevalvis, matura elastice e latere defiliens.

Rhamnus. Calyx tubulosus quadri f. quinquefidus. Corolla: squama stamina munientes calyci insertæ. Bacca bi-quadrilocularis.

Evonymus. Calyx quadri f. quinquefidus. Corolla tetra v. pentapetala. Antheræ sæpius quatuor. Capsula tetra f. pentagona, quadri-quinquelocularis. Semina arillata.

***** Flores pentapetali superi.

Ribes. Petala quinque staminaque calyci quinquefidi cavo inserta. Stylus bifidus. Bacca unilocularis polysperma.

Hedera. Calyx quinqueidentatus. Corolla pentapetala, decidua. Bacca quinquelocularis pentasperma calyce cincta.

***** Flores incompleti.

Glaux. Calyx monophyllus quinquepartitus. Corolla nulla. Capsula unilocularis, quinquevalvis, pentasperma, supera.

Thesium. Calyx monophyllus, quadri-quinquefidus, staminiferus. Corolla nulla. Nectaria filiformia calyci inserta. Semen unicum intra calycem subrotundum coronatum.

DIGYNIA.

* Flores monopetali, inferi.

Asclepias. Corolla contorta, quinquepartita. Nectaria quinque corniculum exferentia. Filamenta brevissima corpusculo conico obtuso coalescentia. Folliculi duo, oblongi. Semina pappo coronata.

Gentiana. Corolla campanulata plicata vel hypocrateriformis quadri-quinquefida. Stylus nullus. Stigmata ovata. Capsula unilocularis, bivalvis longitudinaliter dehiscens.

** Flores incompleti.

Herniaria. Calyx quinquepartitus. Stamina decem, quinque sterilia & quinque fertilia alternantia. Capsula calyce cincta monosperma.

Chenopodium. Calyx pentaphyllus, foliolis concavis. Corolla nulla. Semen unicum lenticulare intra calycem pentagonum.

Salsola. Calyx pentaphyllus persistens. Corolla nulla. Capsula monosperma. Semen cochleatum.

Ulmus. Calyx quadri vel quinquefidus. Samara compresso-membranacea.

*** Flores umbelliferi, pentapetali, superi dispermi. *Umbellatæ.*

a. Umbellis simplicibus.

Fryngium. Flores capitati. Involucrum universale polyphyllum. Semina duo, periantheo coronata. Receptaculum commune conicum paleaceum.

Hydrocotyle. Umbella parva, prolifera. Involucrum di tetraphyllum. Petala integra, ovata, acuminata. Fructus orbiculato-compressus glaber.

β. Umbellis compositis.

a. Fructu tecto aculeis, fetis aut lanugine.

Sanicula. Umbellæ confertæ, subcapitatæ. Flores disci abortientes. Fructus aculeatus.

Caucalis. Corollæ radiatæ vel subradiatæ. Fructus fetis aut aculeis obfusus.

Athamanta. Corollæ regulares. Fructus ovato-oblongus, striatus, lanuginosus.

b. Fructu nudo, sulcato, costato aut striato.
Scandix. Corollæ radiatæ. Fructus elongatus resstratus striatus.

Charophyllum. Corollæ subæquales. Fructus longus, lævis, nitens.

Oenathe. Corollæ radiatæ, disci steriles. Fructus oblongus, decemstriatus calyce, stylisque persistentibus rectis coronatus.

Phellandrium. Corollæ subæquales, fertiles. Fructus oblongus, subdecemstriatus, calyce coronatus.

Carum. Corollæ subæquales fertiles. Fructus ovalis subgibbosus subcomplanatus, octostriatus, stylis deflexis.

Ægopodium. Corollæ subæquales subfertiles. Fructus ovali oblongus; striis elevatis, pallidis. Involucra nulla.

Pimpinella. Corollæ æquales, fertiles. Fructus ovato-oblongus; striis elevatis. Styli erecti. Involucra nulla.

Sium. Corollæ æquales, fertiles. Fructus ovatus striatus vel sulcatus, absque costis.

Bupleurum. Corollæ æquales. Fructus subrotundus, subcompressus, striatus, haud rugosus.

Apium. Corollæ æquales, fertiles. Fructus minutus, gibbus striatus.

Aethusa. Corollæ radiatæ, fertiles. Fructus ovato globosus, costato-sulcatus. Involucrum universale nullum; parziale dimidiatum, triphyllum longum pendulum.

Conium. Corollæ æquales, fertiles. Fructus subglobosus, striatus; striis crenulatis. Involucrum universale penta-heptaphyllum; parziale tri-tetraphyllum dimidiatum breve.

Cicuta. Corollæ æquales, fertiles. Fructus cordato globosus, compressus, costatus, costis subcrenulatis. Involucrum universale nullum; parziale setiphyllum.

c. Fructu alato.

1. Ala marginali.

Anethum. Corollæ æquales, fertiles. Fructus lenticulari-compressus, striatus; striis elevatis; ala membranacea cinctus. Involucra nulla.

Partinaca. Corollæ æquales, disci fertiles. Fructus ovalis, plano compressus, striatus; striis elevatis; ala membranacea cinctus. In-

volucrum universale submonophyllum; partiale nullum.

Selinum. Corollæ æquales, fertiles. Fructus ovato-oblongus compressus, striatus, striis elevatis submembranaceis; ala membranacea cinctus. Involucrum tam partiale quam universale.

Heracleum. Corollæ radiatæ, fertiles. Fructus cordiformis planus, striatus; striis elevatis; ala membranacea cinctus. Involucrum universale plerumque nullum; partiale polyphyllum.

2. Ala marginali ac dorsali.

Angelica. Corollæ æquales, fertiles. Fructus alis marginalibus duris, dorsalibus quasi abscissis. Involucra partialia polyphylla.

Laserpitium. Corollæ subæquales fertiles. Fructus oblongus costis membranacea-alatis. Involucra polyphylla.

TRIGYNIA.

* Flores superi.

Viburnum. Calyx quinquepartitus. Corolla quinquefida. Bacca mansperma.

Sambucus. Calyx quinquepartitus. Corolla quinquefida. Bacca trisperma.

** Flores inferi.

Alfina. Calyx pentaphyllus. Corolla pentapetala. Stamina tres-decem. Capsula unilocularis trivalvis.

TETRAGYNIA.

Parnassia. Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala. Nectaria quinque cordata, ciliata; ciliis capitatis. Stylus nullus. Capsula unilocularis, quadrivalvis.

PENTAGYNIA.

Statice. Calyx monophyllus, plicatus, scariosus. Corolla pentapetala.

Linum. Calyx pentaphyllus. Corolla pentapetala. Capsula quinquevalvis, decemlocularis; loculamentis monospermis.

Drosera. Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala. Capsula unilocularis, tri-quinquevalvis apice dehiscens, polysperma.

POLYGYNIA.

Myofurus. Calyx pentaphyllus, supra basin adnatus. Nectaria quinque ligulata, petaliformia. Receptaculum elongatum, seminibus tectum.

MONOGYNIA.

55. *Myosotis*.

Calyx quinquefidus, persistens. Corollæ hypocrateriformis; quinquefida, lobis emarginatis, fauce fornicibus clausa.

175. *M. palustris*, perennis, laciniis calycinis ovalibus, obtusis, glabris, tubo corollæ æquantibus; foliis lanceolatis obtusis; caule subsimplici

In ratis humidis. Flor. æstate.

176. *M. sylvatica*, perennis; laciniis calycinis acutis, pilosis, tubo corollæ æquantibus; foliis lanceolatis hirsutis; caule ramoso. Rafn l. c. Flor. Dan. Tab. 583. fig. major?

In umbrosis. Flor. æstate.

177. *M. arvensis*, annua, laciniis calycinis ovalibus, acuminatis, hirsis, tubæ corollæ longioribus; seminibus maturis calyce inclusis; foliis ovato-lanceolatis caulæque ramoso hirsis. Flor. Dan. Tab. 583. fig. minor.

In agris, arvis & alibi. Flor. æstate.

178. *M. Lappula*, seminibus aculeis globulosis; foliis lanceolatis pilosis. Flor. Dan. Tab. 692.

In ruderalis rarissime inveni; uden for Amager Port.

56. *Lithospermum*.

Calyx quinquepartitus. Corollæ infundibuliformis, fauce nuda.

179. *L. officinale*, seminibus lævibus; corollis vix calycem superantibus; foliis lanceolatis, acuminatis, nervosis, scabris. Flor. Dan. Tab. 1084.

Rarius in ruderatis; *uden for Kiöbenhavns Österport; Bagsværd & aliis locis.* Flor. Maj. & Jun.

180. *L. arvense*, seminibus rugosis; corollis vix calycem superantibus; foliis lanceolatis subacutis scabris. Flor. Dan. Tab. 456.

Inter segetes frequens. Flor. Jun.

57. *Anchusa.*

Calyx quinquepartitus. Corolla infundibuliformis, fauce clausa fornicibus. Semina gibba, basi insculpta.

181. *A. officinalis*, foliis lanceolatis, strigosis; spicis imbricatis secundis. Flor. Dan. Tab. 572.

Ad vias, fossas, in agris. Flor. Jun. & Jul.

58. *Cynoglossum.*

Calyx quinquefidus. Corolla infundibuliformis, fauce fornicibus clausa. Semina arillata (*Nuces Gærtn.* depereffa, interiore tantum latere stylo affixa.

182. *C. officinale*, staminibus corolla brevioribus foliis radicalibus lato-lanceolatis petiolatis, caulinisque lanceolaris sessilibus tomentoso villosis, supremis subscabridis. Flor. Danic. Tab. 1047.

Ad vias, fepes & aliis locis ruderatis. Flor.
Jun. — Sept.

59. *P u l m o n a r i a.*

Calyx quinquedentatus, prismaticus pentagonus. Corolla infundibuliformis, fauce nuda.

183. *P. angustifolia*, foliis caulinis oblongo-lanceolatis semiamplexicaulibus, radicalibus ellipticis petiolatis. Flor. Dan. Tab. 483.

Haud frequens in nemore; *Charlottenlund nær ved Grønshoven*. Flor. Maj. & Jun.

184. *P. officinalis*, foliis caulinis ovato-oblongis sessilibus, radicalibus cordatis petiolatis. Flor. Dan. Tab. 482.

Frequens in sylvis; *Charlottenlund, Ordrup, Dyrehave &c.* Flor. Maj. & Jun.

60. *S y m p h y t u m.*

Calyx quinquepartitus. Corolla tubuloso-ventricosa, quinquedentata, fauce radiis lanceolatis clausa.

185. *S. officinale*, foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. Flor. Dan. Tab. 664.

Haud frequens in locis humidis; *ved forte Söe, Kastels-Gravene, Friderichsdal, Hirschholm*. Flor. Jun. Jul. & Aug.

61. *A s p e r u g o.*

Calyx fructus, compressus: lamellis plano-parallelis sinuatis. Corolla infundibuliformis, fauce squamis clausa, tubo brevi.

186. *A. procumbens*, calycibus florescentibus erectis, post florescentiam recurvis; caule dichotomo debili, prostrato. Flor. Dan. Tab. 552.
In ruderatis, ad sepes, vias. Flor. Maj. & Jun.

62. *Lycopsis.*

Calyx quinquefidus. Corolla infundibuliformis, fauce squamis convexis clausa, tubo incurvo.

187. *L. arvensis*, calycibus florescentibus erectis. Foliis lanceolatis hispidis; caule erecto. Flor. Dan. Tab. 435.
In arvis agris inter segetes. Flor. æstate.

63. *Echium.*

Calyx quinquepartitus. Corolla campanulata-tubulosa, limbo irregulari, fauce nuda.

188. *E. vulgare*, caule tuberculato, hispido; foliis hispidis, caulinis lanceolatis sessilibus, radicalibus ellipticis petiolatis. Flor. Dan. 445.
In aggeribus & pratis arenosis, ad vias. Flor. Jun. Jul. & Aug.

Primula.

Calyx tubulosus, quinquedentatus, persistens. Corolla tubulosa, limbo plano vel cavo, fauce pervia. Stigma globosum. Capsula oblonga, unilocularis, apice decedentata dehiscens.

189. *P. officinalis*, foliis rugosis dentatis; limbo corollarum concavo, tubi collo oblongo. Flor. Dan. Tab. 433.

In pratis & nemoribus. Flor. Maj. & initio Jun.
 190. *P. elatior*, foliis rugosis dentatis, limbo corollarum plano; tubi collo ventricoso. Flor. Dan. 434.

Habitat & floret cum præcedente.

191. *P. farinosa*, foliis crenatis glabris, subtus farinosis; limbo corollarum plano. Flor. Dan. Tab. 125.

In pratis humidis turfosis frequens. Flor. Maj. & Jun.

65. *Menyanthes.*

Calyx quinquefidus. Corolla infundibuliformis subcampanulata; laciniis interne hirsutis. Stigma bifidum. Capsula unilocularis bivalvis.

192. *M. trifoliata*, foliis ternatis. Flor. Danic. Tab. 541.

In aquis stagnantibus præprimis turfosis, paludibus. Flor. Maj. & Jun.

66. *Hottonia.*

Calyx quinquepartitus, persistens. Corolla hypocrateriformis. Filamenta tubo corollæ imposita. Stigma globosum. Capsula globosa unilocularis.

193. *H. palustris*, pedunculis verticillato-multifloris. Flor. Dan. Tab. 487.

In aquis stagnantibus haud infrequens. Flor. Jun.

67. *Samolus.*

Calyx quinquedentatus, persistens. Corolla hypocrateriformis. Stamina munita squamulis

corollæ. Capsula globosa unilocularis, apice quinquevalvis dehiscens

194. *S. Valerandi*, floribus corymboso-racemosis; foliis, obovatis, obtusis, caulinis alternis subpetiolatis, radicalibus in cespitem congestis longe petiolatis. Flor. Dan. Tab. 198.

In pratis humidis rarius; *red nye Køgevejen om-*
trent ved Corporal-Kroen. Flor. Jul.

68. *Lyfimachia.*

Calyx quinquefidus. Corolla rotata. Filamenta basi connata. Stigma obtusum. Capsula globosa unilocularis quinque ad decemvalvis.

195. *L. vulgaris*, paniculata, racemis terminalibus; foliis ovato-lanceolatis oppositis, ternis, rarius quaternis. Flor. Dan. Tab. 689.

Ad sepes humidæ, fossas; in pratis udis. Flor. æstate.

196. *L. thyrsiflora*, racemis lateralibus pedunculatis; foliis lanceolatis acuminatis oppositis sessilibus; caule simplicissimo. Flor. Danic. Tab. 517.

In paludosis, fossis turfosis. *Ordrup, Lyngbyesøe Birkerød & alibi.* Flor. Jun. & Jul.

197. *L. nemorum*, foliis ovatis acutis; floribus solitariis axillaribus; caule procumbente. Flor. Dan. Tab. 174.

In umbrosis rarissima. *Frederiksborg,* Flor. Jun. & Jul.

198. *L. Nummularia*, foliis orbiculato-cordatis; floribus solitariis axillaribus, caule repente. Flor. Dan. Tab. 493.

In humidis, nemorosis; i *Frederiksberg-Have*, i en Grøft ved *Flaskekroe*. Flor. Jun. Jul. & Aug.

69. *Anagallis*.

Calyx subquinquepartitus. Corolla rotata. Stigma capitatum. Capsula globosa, unilocularis monosperma circumscissa.

199. *A. arvensis*, foliis ovato-lanceolatis; caule procumbente; calycis segmentis lanceolatis. Flor. Dan. Tab. 88.

In arvis, agris, cultis & alibi frequens. Flor. æstate.

70. *Centaureum*. *Rafn*.

Calyx pentagonus quinquedentatus. Corolla infundibuliformis, plicata. Stamina tubo corollæ imposita; antheris post pollinis dimissionem spiraliter tortis. Stigma bifidum. Capsula lineari oblonga, bilocularis, bivalvis, longitudinaliter dehiscens.

200. *C. vulgare* (*Rafn*), caule simplici, floribus corymbofo-fasciculatis terminante; foliis ovato lanceolatis, trinerviis, obtusiusculis; corollarum limbo aperto. Flor. Dan. Tab. 617.

Gentiana Centaureum L.

Haud frequens in locis ac pratis humidis, inter *Torbek* & *Springforbie* marem versus inter *Kjöbenhavn* & *Constantia*, *Amager*. Flor. Jul. Aug. & Sept.

201. *C. inapertum* (R.), caule ramosissimo, dichotomo, foliis oblongis; corollarum limbo clauso. In pratis ac locis elevatis, circa *Kiöge*, *Dn. Schousboe.* Flor. Aug. & Sept.

70. *Convulvulus.*

Calyx quinquepartitus. Corolla campanulata quinqueplicata. Stigma bifidum. Capsula bi vel trilocularis, loculamentis dispermis.

202. *C. arvensis*, foliis sagittatis, utrinque acutis; pedunculis subunifloris; bracteis subulato-lanceolatis oppositis, remotis. Flor. Danic. Tab. 459.

Ad vias, in arvis, agris frequens. Flor. æstate.

203. *C. sepium*, foliis sagittatis, postice truncatis; pedunculis unifloris, bracteis oblongo-cordatis, calyce longioribus, approximatis. Flor. Dan. Tab. 458.

Ad sepes humidus; *tæt uden for Kastellet, Østerport; ved Valbye.* Flor. Jul. Aug. Sept. Oct.

72. *Campanula.*

Calyx quinquefidus. Corolla campanulata fundo clauso valvis staminiferis. Stigma trifidum. Capsula tri-quinquelocularis, poris lateralibus dehiscens.

* Foliis lævioribus.

204. *C. rotundifolia*, foliis radicalibus oblongo cordatis vel reniformibus, crenulato-dentatis, petiolatis; caulinis linearibus. Flor. Danic. Tab. 1086.

In aggeribus & locis siccis ac elevatis. Flor.
Jul. Aug. & Sept.

α. stricta, caule erecto stricto, subramoso,
ramis foliosis; foliis lineari setaceis.

Folia radicalia non vidi. Icon autem Floræ Dan.
855. huc maxime spectat.

205. *C. persicifolia*, foliis radicalibus obovato-lanceolatis, caulinis lanceolato linearibus sessilibus subcurrentibus remotis, omnibus ferrulatis glabris; pedunculis elongatis unifloris.
Flor. Dan. Tab. 1087.

In fruticosis & subhumidis locis; *ved Lyngbye-Søe, imelløm Torbek og Springforbie*. Flor. Jun.
Jul. & Aug.

α. acutangula, caule angulato; angulis acutiusculis; foliis caulinis lanceolato-linearibus, marginibus revolutis semiamplexicaulibus, subdecurrentibus sparsis; pedunculis brevioribus, geminibus angulatis.

Habit & floret cum præcedenti.

** Foliis scabris.

206. *C. latifolia*, foliis ovato lanceolatis duplicato ferratis; caule simplicissimo, tereti; floribus axillaribus inferioribus subgeminis superioribus solitariis; calycibus glabris; fructibus cernuis. Flor. Dan. 782 & 85.

In umbrosis rarius; *ved Papiers-Mølle*. Flor. Jul.
& Aug.

207. *C. rapunculoides*, foliis cordato-lanceolatis, duplicato ferratis; caule ramoso; floribus secundis, spais, calycibus scabris, laciniis reflexis.

In culis oleraceis, ad vias, i *Steengierdet imellem Sorgenfrie og Fugleavad Mølle Vej*, Flor. Jul. & Aug.

208. *C. Trachelium*, caule angulato; foliis inferioribus cordatis vel oblongo-cordatis superioribus lanceolatis, omnibus duplicato ferratis, petiolatis; pedunculis elongatis trifloro-racemosis. inferioribus subbifloris; calycibus ciliatis. Flor. Dan. Tab. 1026.

Ad sepes, vias, in fruticosis; ved *Lundehuset*. Flor. Jul. & Aug.

α. *parviflora*, floribus multo minoribus; pedunculis brevissimis, inferioribus unifloris, superioribus geminis, supremis sub glomeratis.

In pratis; ved *Springforbie*. Flor. Jul.

β. *uniflora*, pedunculis unifloris brevibus; calycibus ciliatis; foliis profunde ferratis, subacuminatis.

In nemore ved *Fahrumgaard*. Flor. Jul. & Aug.

γ. *glabrata*, pedunculis unifloris brevibus; germinibus hispidis; laciniis calycinis glabris, foliis inferioribus cordatis, superioribus cordato lanceolatis.

Habitat & floret cum præcedenti.

209. *C. glomerata*, caule angulato, simplicissimo; foliis crenulatis, radicalibus ovato-lanceolatis petiolatis, caulinis cordato lanceolatis, sub-amplexicaulibus; floribus sessilibus, axillaribus & terminalibus glomeratis, stylo corolla breviori.

In locis ficcis; ved gamle Kiøge Vel forbie Flaskekroe; imellem Bagsværd og Kollekolte. Flor. Jul.

73. *Lonicera.*

Calyx quinquedentatus. Corolla monopetala tubulosa irregularis. Stigma capitatum. Bacca subglobosa. uni-bi-trilocularis.

210. *L. Periclymenum*, capitulis ovatis terminalibus; foliis ovatis obtusis inferioribus breviter petiolatis, superioribus sessilibus; caule volubili. Flor. Dan. Tab. 908.

In sylvaticis, sepibus. Flor. Jul. Aug. Sept.

211. *L. Xylosteum*, pedunculis bifloris; baccis distinctis; foliis ovalibus integerrimis mucronatis; canle erecto. Flor. Dan. Tab. 808.

In sylvis, fruticosis; bag ved Ordrup.

74. *Iasione.*

Calyx communis decaphyllus; proprius quinquedentatus. Corolla quinquepartita regularis. Antheræ basi subcoalitæ. Capsula bilocularis, apice dehiscens.

213. *I. montana*, caule erecto ramoso inferne folioso ramisque piloso, ramis superne nudis glabris; foliis linearibus undulatis pilosis. Flor. Dan. Tab. 319.

In arvis & pratis ficcis. Flor. Jul. & Aug.

75. *V i o l a.*

Calyx pentaphyllus, supra basin corollæ adhærens. Corolla pentapetala, irregularis, postice cornuta. Antheræ coalitæ vel connatæ. Capsula unilocularis, trivalvis.

* Acaules.

213. *V. hirta*, foliis oblongo-cordatis, crenulatis petiolisque villosiusculo-hispidis; pedunculis infra medium bracteatis. Flor. Dan. Tab. 618.
In sylvaticis & fruticetis; *Charlottenlund, Friderichsdal, Fuglehyad Mølle*. Flor. April. Maj. & Jun.

214. *V. odorata*, foliis cordatis, crenatis; stipulis radicalibus ovatis, ciliatis, mucronatis; pedunculis apicem versus bracteatis; stolonibus reptantibus foliosis. Flor. Dan. Tab. 309.
Frequens in nemoribus, aggeribus. Flor. Apr. & Maj.

215. *V. palustris*, glabra; foliis reniformibus; pedunculis haud infra medium bracteatis. Flor. Dan. Tab. 83.

In paludibus; *Charlottenlund, Friderichsdal, Dronninggaard, Birkerød & alibi*. Flor. Apr. Maj. & Jun.

** Caulescentes.

216. *V. canina*, caule adultiori ascendente; foliis cordatis, crenulatis, petiolatis; stipulis lanceo

latis dentato-ciliatis acutis; pedunculis radicalibus vel caulinis supra medium bracteatis.

In sylvaticis, sepibus. Flor. Maj. & Jun.

217. *V. tricolor*, caule triquetro, diffuso; foliis ovato-oblongis, crenulato-dentatis petiolatis; stipulis pinnatifidis; pedunculis axillaribus elongatis apice bracteatis; corollis calyce glabro duplo majoribus. Flor. Dan. Tab. 623.

Inter segetes in agris, hortis. Flor. æstate.

β. corollis calyce glabro æqualibus.

218. *V. arvensis*, corollis calyce hirsuta æqualibus; cæteris habitu antecedentis.

In locis siccis, agris, pratis. Flor. æstate.

An distincta species?

76. *Impatiens.*

Calyx diphyllus. Corolla pentapetala irregularis; nectario cucullato. Antheræ basi pilis junctæ. Capsula unilocularis quinquevalvis, matura elastice e latere defiliens.

219. *I. Noli tangere*, pedunculis multifloris, solitariis; foliis ovatis, obtuse serrato-dentatis; geniculis caulinis tumescentibus. Flor. Dan. Tab. 582.

In locis umbrosis humidis; *Clausen's Have uden for Kastellet, Bagsværd-Skov, Dronninggaard, Dyrehave &c.* Flor. Jul. Aug.

77. *Verbascum.*

Calyx quinquepartitus. Corolla rotata subinæqualis. Filamenta inæqualia basi lanuginosa. Stigma obtusum. Capsula bilocularis, bivalvis

220. *V. Thapsus*, foliis ovato-lanceolatis, utrinque tomentosis decurrentibus; caule simplicissimo; floribus densissime spicatis sessilibus. Flor. Dan. Tab. 631.

In locis siccis, aggeribus, agris incultis glareosis. Flor. Jul. Aug. Sept.

221. *V. Lychnitis*, foliis radicalibus ovali-oblongis petiolatis, caulinis ovato lanceolatis sessilibus, omnibus obtuse crenatis supra rugosis, subtus incanis villosis; floribus paniculato-racemosis, racemis spicatis. Flor. Dan. Tab. 586.

Rarissimum; *gammel Friderichsdal tæt for man kommer til Möllen paa en Steengierde.* Flor. Jul. & Aug.

222. *V. nigrum*, caule simplici; foliis inferioribus cordato-oblongis petiolatis, superioribus ovato lanceolatis sessilibus, omnibus duplicato crenatis, villosis; spica composita terminali. Flor. Dan. Tab. 1088.

Haud infrequens ad vias, sepes. Flor. æstate.

78. *Datura*.

Calyx tubulosus angulatus deciduus. Corolla infundibuliformis plicata. Capsula bi-quadrilocularis, quadrivalvis.

223. *D. Stramonium*, foliis ovatis, lobato dentatis, glabris; capsulis spinosis, ovatis, erectis. Flor. Dan. Tab. 436.

In littore maris frequens *ved Papiers-Mølle.* Flor. Jul. & Aug.

79. *Hyoscyamus.*

Calyx campanulatus acute quinquedentatus. Corolla infundibuliformis, inæqualis. Stamina inclinata. Stigma capitatum. Capsula bilocularis, operculata. Semina reniformia.

224. *H. niger*, foliis radicalibus ovatis, petiolatis, caulinisque oblongis amplexicaulibus, finuatis; floribus sessilibus. *Plenck* Icon. Medic. No. 97.

In ruderatis, ad vias, pagos, frequens. Flor. æstate.

80. *Solanum.*

Calyx quinquedentatus. Corolla rotata. Antheræ subcoalitæ, apice poro gemino dehiscen-
tes. Bacca bilocularis.

225. *S. Dulcamara*, caule frutescente flexuoso; foliis superioribus hastatis; floribus racemoso-cymosis. Flor. Dan. Tab. 607.

In fruticosis, in locis humidis, ad sepes. Flor. æstate.

226. *S. nigrum*, caule herbaceo; foliis cordato-ovatis, dentato angulatis, racemis nutantibus. Flor. Dan. Tab. 460.

In ruderatis ad pagos, vias & alibi. Flor. æstate.

α. baccis aurantiaco-luteis

vid *Helsingör, Rafn* l. c.

81. *R h a m n u s.*

Calyx tubulosus quadri vel quinquefidus. *Corolla* squamæ stamina munientes calyci insertæ. *Bacca* bi vel quadrilocularis.

227. *R. catharticus*, spinis terminalibus; floribus quadrifidis dioicis, staminibus sæpius quatuor; foliis ovatis ferratis nervosis. Flor. Dan. Tab. 850.

Haud frequens in fruticetis, sepibus; imellem Ordrup Mose og Dyrehave; og Kongshvile og Friderichsdal nærmere til Broen.

228. *R. Frangula*, inermis; floribus monogynis hermaphroditis; foliis ovatis integerrimis, nervosis. Flor. Dan. 278.

In locis nemorosis, sylvaticis ac humidis; bag ved Ordrup, Friderichsdal, Birkerød &c. Flor. Maj. & Jun.

82. *E v o n y m u s.*

Calyx quadri-quinquefidus. *Corolla* tetrapentapetala. *Antheræ* sæpius quatuor. *Capfula* tetra-pentagona, quadri-quinquevalvis. *Semina* arillata.

229. *E. europæus*, pedunculis compressis, sæpius dichotomis, partialibus trifloris; foliis ovato oblongis, ferrulatis, subacuminatis, glabris. Flor. Dan. Tab. 1089.

In nemoribus, sylvis; i Charlottenlund mod Söen, imellem Ordrup Mose og Dyrehave. Flor. Jun.

83. *Ribes*.

Petala quinque staminaque calyci quinquefidi cavo inserta. Stylus bifidus. Bacca unilocularis, polysperma.

230. *R. nigrum*, foliis subtus glandulis rotundis, luteis, adspersis; racemis pilosis floribus oblongis; baccis nigris. Flor. Dan. Tab. 556.

In fruticetis humidis; *Ordrup-Mose, Örholm.* Flor. Maj. & Jun.

231. *R. Grossularia*, ramis aculeatis; petiolorum ciliis pilosis; baccis hirsutis.

Rarius in sepibus aggeribus, *Rudersdal, Birkeröd.* Flor. Apr. & Maj.

232. *R. Uva crispa*, ramis aculeatis; baccis glabris; bractea monophylla. Flor. Danic. Tab. 546.

Haud frequens in sylvaticis. *Birkeröd, Hirschholm.* Flor. Apr. & Maj.

84. *Hedera*.

Calyx quinqueidentatus. Corolla pentapetala decidua. Bacca quinquelocularis pentasperma calyce cincta.

233. *H. Helix*, foliis ovatis, quinquelobatisque; umbellis erectis. Flor. Dan. Tab. 1027.

Rarius in fruticeto, *ved Fuglehvads-Mölle; i Krattet imellem Ordrups-Mose og Dyrehave tæt ved et Led.* Flor.

85. *Glaux.*

Calyx monophyllus quinquepartitus. Corolla nulla. Capsula unilocularis, quinquevalvis, pentasperma supera.

234. *G. maritima*, caule erecto, digitali, ramoso; foliis inferioribus oppositis superioribus alternis ovato-oblongis; floribus axillaribus. Flor. Dan. Tab. 548.

In maritimis frequens. Flor. Jun.

86. *Thesium.*

Calyx monophyllus, quadri-quinquefidus, staminiferus. Corolla nulla. Nectaria filiformia calyci inserta. Semen unicum intra calycem coronatum.

235. *Th. pratense*, foliis linearibus, obsolete trinerviis; caule erecto; panicula foliacea. Flor. Dan. Tab. 1205.

Rarissimum in collinis aridis; *paa Bakkerne ved Brede-Mölle.* Flor. Jun.

D I G Y N I A.

87. *Asclepias.*

Corolla contorta, quinquepartita. Nectaria quinque corniculum exferentia. Filamenta brevissima corpusculo conico obtuso coalescentia. Folliculi duo, oblongi. Semina pappo coronata.

236. *A. Vincetoxicum*, foliis cordato-ovatis, basi subpilosis petiolatis; caule erecto simplicissimo

pedunculis axillaribus; floribus subumbellatis.
Flor. Dan, 849.

Haud frequens in fruticetis. *Brede Bakker.*
Flor. Jun..

88. *G e n t i a n a.*

Corolla campanulata, plicata, vel hypocrateriformis quadri-quinquefida. Stylus nullus. Stygmata ovata. Capsula unilocularis, bivalvis longitudinaliter dehiscens.

237. *G. Pneumonanthe*, corollis quinquefidis campanulatis, axillaribus. Foliis lanceolato-linearibus, obtusis. Flor. Dau. Tab. 269.

In pratis rarius; *ved Johnstrup; Ushold Overdrev paa Kionborg Amt.* Flor Jul & Aug.

238. *G. lancifolia*, (Rafn) corollis hypocrateriformibus quadri-quinquepartitis barbatis, laciniis lanceolatis acutis; laciniis calycinis lanceolatis æqualibus; foliis lanceolatis.

Rarissime in pratis; *ved Adlersburg, Dn. Markussen.* Flor. Aug. & Sept.

239. *G. pratensis*, (Frölich) corollis hypocrateriformibus, quadri-quinquefidis barbatis, laciniis calycinis inæqualibus; foliis lanceolatis. Flor. Dan. Tab. 328.

In pratis. Flor.

240. *G. campestris*, corollis hypocrateriformibus quadrifidis barbatis, laciniis obtusis; laciniis calycinis binis rhomboidalibus; foliis ovatis decurrentibus; caule argute angulato. Flor. Dan. Tab. 367.

Non infrequens in pratis subhumidis. Flor.
Aug. & Sept.

89. *Herniaria.*

Calyx quinquepartitus. (Stamina decem, quinque sterilia cum fertilibus quinque alternantia).
Capsula calyce cincta mosperma.

241. *H. glabra*, caulibus prostratis, cespitosi, ramosi; foliis ovatis oppositis; floribus glomeratis axillaribus. Flor. Dan. Tab. 529.

In arvis, pratis ficcis. Flor. æstate.

242. *H. hirsuta*, hirsuta, glomerulis paucifloris.
Rarius in arenosis ficcis. (*Rafn.*) Flor. æstate.

90. *Chenopodium.*

Calyx pentaphyllus, foliolis concavis. Corolla nulla. Semen unicum lenticulare calyce pentagono cincto.

* Foliis angulatis.

243. *C. Bonus Henricus*, foliis triangulari sagittatis integerrimis; spicis compositis aphyllis.
Flor. Dan. Tab. 579.

In ruderalis, ad vias, pagos, &c. Flor. Jun. Jul. & Aug.

244. *C. urbicum*, foliis caulinis inferioribus triangularibus inæqualiter subdentatis, superioribus lanceolatis integerrimis; racemis confertis strictissimis, cauli approximatis longissimis.
Flor. Dan. Tab. 1148.

In ruderalis ad pagos. Flor. Jul. & Aug.

245. *C. rubrum*, foliis rhombeo-triangularibus, erosis obtuse dentatis; racemis glomeratis, foliolis, axillaribus, foliis brevioribus. Flor. Dan. Tab. 1149.

In ruderatis, fimetis, ad pagos. Flor. Jul. Aug. & Sept.

246. *C. murale*, foliis ovatis, acute dentatis, nitidis; racemis ramosis subfoliaceis foliis longioribus.

Haud frequens; *paa Amager*. Flor. Jul. — Oct.

247. *C. album*, foliis rhomboideo-triangularibus, erosis, posice integris, summis oblongis; racemis erectis.

In ruderatis, hortis, agris & alibi. Flor. Jul. & Aug.

248. *C. viride*, foliis rhomboideis, dentato-sinuatis; racemis ramosis subfoliosis. Flor. Dan. Tab. 1150.

Habitat & floret cum præcedenti.

249. *C. hybridum*, foliis cordato-triangularibus angulato-dentatis, acuminatis, posice integerrimis; racemis ramosis nudis.

In cultis, ruderatis. *Amager*; *uden for Kastellet*. Flor. Aug.

250. *C. glaucum*, foliis ovato-oblongis, repando-dentatis, obtusis subtus glaucis; racemis nudis simplicibus glomeratis. Flor. Dab. 1151.

In cultis, ruderatis; ad fimeta, domos. Flor. Jul. & Aug.

** Foliis integerimis.

251. *C. Vulvaria*, foliis rhomboideo-ovatis, integerrimis, quasi farinaceis; floribus glomeratis axillaribus. Flor. Dan. Tab. 1152.

In ruderatis aggeribus haud frequens: for *Amager-Port*, for *Östre-Port ved Salpeterværket*. Flor. Aug. & Sept.

252. *C. polyspermum*, foliis ovatis integerrimis; caule erecto; cymis dichotomis, aphyllis, axillaribus; seminibus nudis. Flor. Dan. Tab.

Jul 1153.

In cultis, fossis rarius: ved *Flaskekroen*; *Hestkiøb ved Birkerød*. Flor. Jul. Aug. Sept.

253. *C. maritimum*, foliis subulatis, semicylindraceis; floribus glomeratis axillaribus. Flor. Dan. Tab. 489.

In littore: ved *Flaskekroen*; imellem *Kastellet og Charlottenlund*; *Amager*. Flor. Aug.

91. *Salsola*.

Calyx quinquepartitus; persistens. Corolla nulla. Capsula monosperma. Semen cochleatum.

254. *S. Kali*, caule herbaceo decumbente, foliis subulatis spinosis; cymis axillaribus. Flor. Dan. Tab. 818.

In littore haud infrequens. Flor. Jul. & Aug.

255. *S. hirsuta*, caule herbaceo diffuso, foliis teretibus, obtusis tomentosis. Flor. Dan. Tab.

1187.

Infrequens in littore maris: ved *Holbek Da. Prof. Vahl*. Flor. Jul. & Aug.

92. *Ulmus*.

Calyx quadri-quinquefidus, intus coloratus.
Samara compresso membranacea.

256. *U. campestris*, foliis duplicato-ferratis basi inæqualibus; floribus subsessilibus conglomeratis pentandris; fructibus glabris. Flor. Dan. Tab. 632.

Rarius spontanea: in luco ved *Fahrumgaard*.
Flor. Apr. Maj.

257. *U. suberosa*, foliis duplicato-ferratis, basi subæqualibus; floribus subsessilibus glomeratis tetrandris; ramis suberosis alatis.

Tantum vidi ved *Kaningsaarden ved Fuursöen*.
Flor. Apr. Maj.

UMBELLATÆ.

93. *Eryngium*.

Flores capitati. Involucrum universale polyphyllum. Semina duo perianthio coronata. Receptaculum commune conicum paleaceum.

258. *E. maritimum*, foliis radicalibus subrotundis, plicatis, spinosis; capitulis pedunculatis; paleis tricuspидatis. Flor. Dan. Tab. 875.

Rarissimum in littore maris: ved *Vebe*, *Helsingör*; *Kjöge*. Flor. Jul. Aug.

94. *Hydrocotyle*.

Umbella parva prolifera. Involucrum ditraphyllum. Petala integra ovato: acuminata. Fructus orbiculato-compressus glaber.

259. *H. vulgaris*, caule repente; foliis peltatis, orbiculatis, repando crenatis, umbellis quinquefloris. Flor. Dan. Tab. 90.

In locis humidis, fossis. Flor. Jul. Aug.

95. *Sanicula*.

Umbellæ confertæ subcapitatæ. Flores disci abortientes. Fructus aculeatus.

260. *S. europæa*, foliis quinquelobato-digitatis; lobis subtrifidis, denticulatis; caule subnudo; floribus sessilibus. Flor. Dan. Tab. 284.

In sylvis, nemoribus fere ubique. Floi. Jun. Jul.

96. *Coucalis*.

Corollæ radiatæ vel subradiatæ, subabortientes. Fructus fetis aut aculeis obfessus.

261. *C. Carota*, feminibus subrotundis: angulis quatuor distantibus, hispidis; petiolis subtus nervosis. (*Involucris polyphyllis pinnatifido trifidis; foliis subtripinnatis umbellis post florescentiam contractis.*) Flor. Dan. Tab. 723.

In aridis, aggeribus, ad vias frequens. Flor. Jul. Aug. Est daucus Carota Lin.

262. *C. Anthriscus*, feminibus ovalibus, dorso aculeis sparsis scabris. (*Involucris subheptaphyllis, lanceolatis, acutis; foliis bi-subtripinnatis.*) Flor. Dan. Tab. 919.

In fruticetis, ad vias, sepes. Flor. Jul. & Aug. Est Tordylium Anthriscus Linn.

c. humilis, feminibus ovatis dorso aculeis incurvis caule semipedali, ramisque divaricatis angulosis.

In arvis ficcis: imod *Flaskekroen*.

263. *C. Scandicina*, fructibus ovatis acutis, dorso aculeis vel setis incurvis. (*Involucro partiali subpentaphyllo: foliolis lanceolatis ciliatis: universali haud nullo: foliis tripinnatis.*) Flor. Dan. T. b. 863.

Ad sepes & aggeres copiosa. Flor. Maj. & Jun. Est *Scandix Anthriscus* Lin.

97. *Athamanta*.

Corollæ regulares fertiles. Fructus ovato-oblongus, striatus, lanuginosus.

264. *A. Libanotis*, fructibus ovatis incanis, villosis; involucris polyphyllis linearibus. (*Foliis bipinnatis glabris: caule angulato-canaliculato, basi setis aridis cincto.*) Flor. Dan. Tab. 754.

Rarissima, in arvis: ved *Fröken Browns Gaard* ved *Bernstorff*. Flor. Aug. & Sept.

98. *Scandix*.

Corollæ radiatæ. Fructus elongatus, subrotatus, striatus.

265. *S. temula*, fructibus ovato-lanceolatis, subacuminatis: immaturis lævibus: maturis striatis nigricantibus nitidis. (*Involucro universali plerumque nullo: partiali hexa-octo-*

*phyllo; foliis bi-tripinnatis, caule purpurascen-
te-maculato scabro.)* Flor. Dan. Tab. 918.
In sepibus, ad vias infrequens. Flor. Jun. Jul.
Est *Chærophyl-
lum temulum* Lin.

99. *Chærophyl-
lum.*

Corollæ subæquales. Fructus longus, lævis
nitens.

266. *C. Cerefolium*, fructibus oblongis subsubulatis;
involucro universali haud nullo: partiali mono-
di-triphyllō; umbellis lateralibus. (*Foliis
tripinnatis: pinnis pinnatifidis; caule genicu-
lis pubescentibus.*)

In ruderais, oleraceis, quasi indigenum. Flor.
Maj. Jun. Est *Scandix Cerefolium* Linn.

267. *C. sylvestre*, fructibus oplongis, stylis ap-
proximatis terminalibus; involucro universali
plerumque nullo: partiali pentaphyllo. (*Fo-
liis tripinnatis subpubescentibus; caule striato
sulcato, geniculis tumidiusculis pubescentibus.*)
In pratis; ad vias, sepes ubique. Flor. Maj.
& Jun.

100. *Oenanth-
e.*

Corollæ radiatæ: disci steriles. Fructus ob-
longus, decemstriatus, calyce stylisque per-
sistentibus, erectis, coronatus.

268. *Oen. fistulosa*, fructibus dense congestis; in-
volucro universali nullo: partiali polyphyllō.
(*Foliis radicalibus bi-tripinnatis: caulinis
pinnatis.*) Flor. Dan. Tab. 846.

In locis paludosis, ripis lacuum: *Giælskov*; *Papiers-Mölle*; *Lyngbye*- og *Bagsværd-Søe*. Flor. Jun & Jul.

101. *Phellandrium*.

Corollæ subæquales; fertiles. Fructus oblongus, subdeceim striatus, calyce stylisque coronatus.

269. *Ph. aquaticum*, involucrio universali nullo: partiali polyphylo. (Foliis bi- tripinnatis: pinnis divaricatis glabris; caule crasso fistuloso articulado, articulis infimis radicanibus.) Flor. Dan. Tab. 1154.

In piscinis & paludibus haud frequens: *Birkerød*, *Bagsværd*; *Hirschholm*. Flor. Jul. Aug.

102. *Carum*.

Corollæ subæquales, fertiles. Fructus ovatus, subgibbosus, subcomplanatus, octostriatus; stylis deflexis.

270. *C. Carvi*, involucriis plerumque nullis; foliis bi tripinnatis glabris: stipulis ad basin multifidis. Flor. Dan. Tab. 1091.

In pratis ad vias frequens. Flor. Jun.

103. *Ægopodium*.

Corollæ subæquales, subfertiles. Fructus ovali-oblongus; striis elevatis pallidis. Involucra nulla.

271. *Æ. Podagraria*, foliis radicalibus triternatis

summis ternatis; foliolis ovalibus inciso serratis. Flor. Dan. Tab. 670.

Ad sepes, in dumetis. Flor. Jun. Jul.

104. *Pimpinella.*

Corollæ æquales, fertiles. Fructus ovato-oblongus: striis elevatis. Styli erecti. Involucra nulla.

272. *P. Saxifraga*, foliis radicalibus pinnatis: pinnis ovatis, serratis vel profunde incis: caulinum pinnis profundo incis: seu pinnatifidis lanceolatis vel linearibu.. Flor. Danic. Tab. 669.

In locis ficcis glareosis frequens. Flor. Jul. — Septembr.

α. Foliis radicalibus pinnatis: pinnis cordatis inciso-lobatis dentatis; caulinis linearibus.

273. *P. magna*, foliis pinnatis uniformibus; pin-nulis ovalibus vel ovato-oblongis inciso serratis terminalibus trilobis. Flor. Dan. Tab. 1155.

In pratis humidis; locis umbrosis: *Lundehus-Moje, Friderichsberg-Have.* Flor. Jul. & Aug.

274. *P. dissecta*, foliis omnibus pinnatis; pinnis multipartitis: laciniis subfalcatis, acutis. Retz. Observat. botan. Fasc. 3. pag. 30. tab. 2.

In locis aridis elevatis: *Örholm.* Flor. Jul. & August.

105. *Sium*.

Corollæ æquales fertiles. Fructus ovatus, striatus seu sulcatus absque costis,

275. *S. latifolium*, fructibus ovato-oblongis, striis elevatis; involucris polyphyllis, reflexis. (Foliis submersis pinnis laciniatis laciniis incis linearibus; caulinum oblongo lanceolatis argute serratis acutis.) Flor. Dan. Tab. 246.

In rivulis, lacubus, fossis. Flor. Jul. — Sept.

276. *S. angustifolium*, fructibus ovatis; involucris plerumque pentaphyllis: foliolis universalis integris vel incis vel pinnatifidis: partialis inæqualibus bi-tridentatis. (Foliis pinnatis: pinnis ovatis, aegute serratis, acutis, basi auriculatis, extimis trilobatis.) Flor. Dan. Tab. 247.

In rivulis: ved Ræveskovs-Bakken; gammel Var-
tov. Flor Jul. Aug.

277. *S. inundatum*, fructibus ovatis, striatis; involucro universalis haud nullo: partiali di-triphylo dimidiato. (Foliis submersis pinnato-multifidis capillaribus: emergis pinnulis cuneiformibus tridentatis vel trifidis; umbellis lateralibus oppositifoliis subbifidis paucifloris.) Flor. Dan. Tab. 89.

In piscinis, locis inundatis. Nørre-Felled; ved Ermelundhuset i Skoven; Bagsværd. Flor. Jun. & Jul. Est Sison inundatum Linn.

α. Foliis omnibus capillaceis caule sub-
erecto.

106. *Bupleurum.*

Corollæ æquales. Fructus subrotundus, subcompressus, striatus, haud rugosus.

278. *B. tenuissimum*, um bellis axillaribus, alternis simplicibus bi-trifidisve, paucifloris; involucrio universali bi-triphylo: partiali pentaphyllo. (*Foliis linearibus mucronatis glabris.*) Flor. Dan. Tab. 1090.

In maritimis depressis haud frequens: *paar Amarger; imod Constantia lige for Browns Gaard tat ved Sjøkanten; ved Flaskekroen.* Flor. Jul.

107. *Apium.*

Corollæ æquales fertiles. Fructus minutus gibbus striatus.

279. *A. graveolens*, fructibus ovatis, basi subventricosus; involucriis plerumque nullis (*Umbellis axillaribus terminalibusque subeffilibus; foliis glabris nitidis radicalibus pinnatis: caulinis ternatis.*) Flor. Dan. Tab. 790.

In maritimis rarior: *ved Strandkanten imod Flaskekroen.* Flor. Jun. — Aug.

108. *Æthusa.*

Corollæ radiatæ fertiles. Fructus ovato-globosus, costato-fulcatus. Involucrum universale nullum, parziale dimidiatum, triphyllum, longum pendulum.

280. *Æ. Cynapium*, foliis glabris obscure viridibus tripinnatis, pinnulis ovato-lanceolatis,

profunde incis: laciniis sublinearibus acutis mucronatis. Curt. Flor. Lond. Tab. 36.

In cultis oleraceis, sepibus. Flor. Jul. Aug.

109. *Conium*.

Corollæ subæquales, fertiles. Fructus subglobosus, striatus; striis elevatis crenulatis. Involucrum universale penta-heptaphyllum: partiale tri-tetraphyllum, dimidiatum, breve.

281. *Con. maculatum*, foliis inferioribus tripinnatis, superioribus bipinnatis: pinnulis oblongo-lanceolatis inciso dentatis obtusiusculis; caule substriato maculis purpurascensibus basi picto. Curt. Flor. Lond. Tab. 41.

Haud frequens in sepibus ad vias: *uden for Kæstellet; ved Tuborg; Örholm &c.* Flor. Jul. Aug.

110. *Cicuta*.

Corollæ subæquales, fertiles. Fructus cordato globosus, compressus costatus; costis subcrenulatis. Involucrum universale nullum: partiale heptaphyllum.

282. *C. virosa*, foliis glabris: radicalibus tripinnatis, pinnis divaricatis: caulinis bi seu simpliciter pinnatis; pinnulis omnibus longis lanceolatis argute ferratis integris bi vel trilobisve; ramis divaricatis. Flor. Dan. Tab. 208.

In paludibus; ad margines lacuum: *i Stadsgraven ved Österport, Gjentofte-Søe; Lundehus Mose &c.* Flor. Jul. Aug.

111. *Aneithum.*

Corollæ æquales, fertiles. Fructus lenticulare-compressus, striatus; striis elevatis; ala membranacea cinctus. Involucra nulla.

283. *A. graveolens*, fructibus ovali-oblongis; foliis bipinnatis, erectis; foliolis setaceis ditrichotomis. Blackw. Herb. Tab. 545.

In cultis oleraceis, inter segetes: ved Kalkbrænderiet uden for Kastellet; paa Amager &c. Flor. Jul. Aug.

112. *Pastinaca.*

Corollæ æquales disci steriles. Fructus ovatus, plano-compressus, striatus: striis elevatis; ala membranacea cinctus. Involucrum universale submonophyllum: parziale nullum.

284. *P. sativa*, foliis pinnatis, glabris: foliolis ovato-oblongis, inciso-lobatis; exterioribus trilobis. Flor. Dan. Tab. 1206.

Frequens ad vias, fossas: Farimagss-Vejen; Ordrup-Vejen; Valbye Bakke. Flor. Jun. — Aug.

113. *Selinum.*

Corollæ æquales fertiles. Fructus striatus: striis elevatis submembranaceis; ala membranacea cinctus. Involucrum tam parziale quam universale.

- * Fructibus ovalibus, costis rotundatis; stylis fructu brevioribus deflexis involucri universalibus persistentibus lanceolato-setosis.

285. *S. sylvestre*, foliis glabris tripartitis: pinnulis ovato-lanceolatis incis: laciniis linearibus brevibus obtusiusculis; caule quadrinquipedali subfulcato-striato glabro tortili. Flor. Dan. Tab. 412.

Haud infrequens in paludosis sylvaticis, lacum: *Charlottenlund; Lyngbye-Søe &c.* Flor. Jul. Aug.

286. *S. palustre*, foliis glabris quadripinnatis: pinnulis ovato-lanceolatis, profunde incis vel partitis: laciniis linearibus, obtusis mucronatis; caule subbipedali subflexuoso angulato, ramis divaricatis. Flor. Dan. Tab. 257. male.

In paludibus turfosis: *Birkeröd; Tepri-Mose ved Ballerup.* Flor. Jul. — Sept.

α. caule humiliore umbellis minoribus.

In palude turfoso: *ved Hestkiøb ved Birkeröd.*

- ** Fructibus ovato-globosis, costis acutioribus styliis fructu æqualibus deflexis; involucriis universalibus subdeciduis.

287. *S. Carvifolia*, foliis subtripinnatis: pinnulis ovato-lanceolatis, incis, subacutis mucrone pallefcente; caule, angulis acutis submembranaceis; (umbellis confertis; involucriis lineari setaceis: universali haud nullo.) Flor. Dan. Tab. 667.

Haud frequens in pratis subhumidis: *ved Flaskekroen* marem versus. Flor. Jul. Aug.

a. pinnulis linearibus; caule humiliore;
ramis paucioribus adpressis.

288. *lineare*, pinnis pinnatifido-partitis, laciniis linearibus,

In aggeribus: imellem Tømmerpladsen og Flaske-
kroen reperi. Flor. Jul. Aug.

Caulis erectus, strictus, sulcato-friatus, bi-
tripedalis ramosus. Folia glabra; radicalia
subtripinnata; pinnis pinnatifido-partitis, la-
ciniis linearibus obtusiusculis; caulina infe-
riora bipinnata: superiora, pinnata; pinnulis
partitis; laciniis lanceolato-linearibus sub-
sesquipollicaribus, acutis, mucronulatis.
Vaginæ bi-tripollicares membranaceæ, stri-
atæ, glaucæ. Umbellæ confertæ. Involucra,
setaceo-capillacea: universale di-triphyllum;
partiale polyphyllum.

289. *Angelica.*

Corollæ æquales, fertiles. Fructus alis mar-
ginalibus, duris, dorsalibus quasi abscissis.
Involucra partialia polyphylla setacea.

289. *A. Archangelica*, foliis subsupradecompositis:
pinnulis ovatis, inciso ferratis: lateralibus
auriculatis seu bilobatis: impari trilobo, va-
ginis amplis membranaceis. Flor. Danic.
Tab. 206.

In paludibus haud frequens: ved Aaen fra Fugle-
kødd-Mølle til Papiers-Mølle. Flor. Jun. Jul.

290. *A. sylvestris*, foliis bipinnatis: pinnulis ovato-oblongis, acute & fere æqualiter ferratis, subtus pubescentibus.

In pratis & paludibus turfosis. Flor. Jul. Aug.

115. *Heracleum*.

Corollæ radiatæ fertiles. Fructus cordiformis planus striatus: striis elevatis: ala membranacea cinctus. Involucrum universale plerumque nullum: parziale polyphyllum.

291. *H. Sphondylium*, foliis pinnatis hirsutis scabris: pinnulis pinnatifidis, lobatis, subacutis ferratis; impari majore, tripartito, lobo intermedio trifido. Blackw. Herb. Tab. 540.

Ad vias, in locis umbrosis, dumetis: *Gjælskov ved Lundehuset &c.* Flor. Jun Jul. & Aug.

α- pinnis angustioribus ac magis incisfis.

Ved Brede, Örholm in collinis fruticosis.

116. *Laserpitium*.

Corollæ subæquales fertiles. Fructus oblongus: costis membranacea-alatis. Involucra polyphylla.

292. *L. latifolium*, foliis pinnatis: foliolis basi oblique cordatis inciso ferratis, impari non raro trilobo.

In locis umbrosis haud copiose: i *og ved Hareskoven imellem Ballerup og Johnstrup. Dn. Böye & Czekanovsky.* Flor. Jul.

TRIGYNIA.

117. *Viburnum.*

Calyx quinquepartitus. Corolla quinquefida.
Bacca monosperma.

293. *V. Opulus*, foliis oppositis, subcordatis, trilobatis argute dentatis: petiolis glandulosis; corymbis terminalibus; floribus radiatis. Flor. Dan. Tab. 66r.

In fruticetis, sepibus: *ved Fuglehvad-Mölle; ved Lyngbye-Søe &c.* Flor. Jun. Jul.

118. *Sambucus.*

Calyx quinquepartitus. Corolla quinquefida.
Bacca trisperma.

294. *S. nigra*, foliis oppositis pinnatis: pinnis ovatis acuminatis ferratis; cymis quinquepartitis; caule arboreo. Flor. Dan. Tab. 545.

In sepibus frequens. Flor. Jun. & Jul.

295. *S. Ebulus*, foliis oppositis pinnatis: pinnis ovato-lanceolatis, ferratis, stipulis foliaceis; cymis tripartitis; caule herbaceo. Flor. Dan. Tab. 1156.

Rarius *ved Jægerspriis.* Flor. Jul. & Aug.

119. *Alfina.*

Calyx pentaphyllus. Corolla pentapetala.
Stamina tres-decem. Capsula unilocularis trivalvis.

296. *A. media*, foliis ovato-cordatis; petalis bipartitis.

In cultis, ruderatis ubique. Flor. Apr. ad Oct.

α. *pentastemon*, floribus pentandris. Flor.

Dan. Tab. 325.

β. *decastemon*, floribus decandris. Flor.

Dan. Tab. 428.

TETRAGYNIA.

120. *Parmassia*.

Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala.

Nectaria quinque, cordata, ciliis capitatis.

Stylus nullus. Capsula unilocularis, quadrivalvis.

297. *P. palustris*, foliis cordatis, radicalibus petiolatis; caule folio unico sessile. Flor. Dan. Tab. 584.

In pratis humidis. Flor. Jul. Aug. Sept.

PENTAGYNIA.

121. *Statice*.

Calyx monophyllus, plicatus, scariosus. Corolla pentapetala.

298. *S. elongata*, scapo simplici elongato capitato glabro; foliis linearibus. Flor. Dan. Tab. 1092. Hoff. *Deutschl. Flor.* 2te *Ausg.* pag. 150.

In maritimis. Flor. Jun. Jul. Aug.

299. *S. Armeria*, scapo simplici capitato pubescente; foliis linearibus. Hoffm. l. c.

In maritimis. Flor. Jun. Jul. Aug.

300. *S. Limonium*, scapo paniculato tereti; foliis oblongis obtusis, subtus mucronatis. Flor. Dan. Tab. 315.

In maritimis rarius: *Saltholm*; *Jagerspriis*; *Dn. Holten*.

122. *Linum*.

Calyx pentaphyllus. Corolla pentapetala. Capsula quinquevalvis, decemlocularis: loculentis monospermis.

301. *L. catharticum*, foliis ovato-lanceolatis oppositis; caule dichotomo; corollis acutis. Flor. Dan. Tao. 851.

In locis humidis, turfosis ubique. Flor. Jun. — August.

302. *L. Radiola*, foliis cordato-ovatis oppositis; caule dichotomo; floribus tetrandris tetragynis. Flor. Dan. Tab. 178.

Haud copiose in ficcis arenosis ac inundatis: *Birkeröd*; *Hirschholm - Skov*; *Flaskekroen* &c. Flor. Jul. — Sept.

123. *Drosera*.

Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala. Capsula unilocularis, tri-quinquevalvis apice dehiscens, polysperma.

303. *D. rotundifolia*, foliis orbiculatis; scapo racemoso. Flor. Dan. Tab. 1028.

In paludibus turfosis frequens. Flor. Jul. Aug.

304. *D. longifolia*, foliis ovato-oblongis; scapo racemoso. Flor. Dan. Tab. 1093.

In paludibus turfosis rarior: *Ordrup-Mose*; *Lyngbye-Mose*; *Birkeröd*. Flor. Jul. Aug.

P O L Y G Y N I A.

144. *Myosurus*.

Calyx pentaphyllus, supra basin adnatus. Nectaria quinque ligulata, petaliformia. Receptaculum elongatum, seminibus tectum.

305. *M. minimus*, foliis linearibus crassiusculis, compressis, in orbem congestis; scapo unifloro. Flor. Dan. Tab. 406.

In aggeribus, cultis oleraceis, turfosis haud frequens: *Birkeröd*; *Ordrup-Mose* &c. Flor. primo vere.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

* Flores calyculati, calyce corollaque instructi.

Berberis. Corolla hexapetala, petalis basi glandulis nectariferis. Calyx hexaphyllus inferus. Stylus nullus. Bacca disperma.

** Flores spathacei seu glumacei.

Narcissus. Corolla supera, hexapetala. Nectarium monophyllum campanulatum, extra stamina.

Allium. Corolla infera hexapetala. Spatha multiflora. Umbella simplex.

*** Flores nudi, inferi.

Tulipa. Corolla hexapetala campanulata. Stylus nullus.

Ornithogalum. Corolla hexapetala, persistens, supra medium patens. Filamenta alterna basi dilatata.

Anthericum. Corolla hexapetala, patens. Capsula ovata.

Asparagus. Flores dioicæ. Corolla hexapetala campanulata: petalis tribus interioribus apice reflexis. Bacca trilocularis, disperma.

Convallaria. Corolla sex-vel quadrifida. Bacca bi-vel trilocularis, ante maturitatem maculosa.

**** Flores incompleti.

Acorus. Spadix cylindrico-conicus, tectus flosculis. Stylus nullus. Capsula trilocularis.

Juncus. Calyx hexaphyllus. Capsula ovata, triquetra, unilocularis monosperma-trisperma, vel trilocularis polysperma.

Peplis. Periantheum campanulatum, ore duodecem fido. Petala sex, calyci inserta. Capsula bilocularis supera.

TRIGYNIA.

Rumex. Calyx triphyllus. Petala tria persistencia conniventia. Semen unicum triquetrum.

Scheuchzeria. Calyx hexaphyllus. Corolla nulla. Styli nulli. Capsulæ apice dehiscentes.

Trichlochin. Calyx nullus. Petala sex: unguibus inflexis antheriferis. Stylus nullus. Stigmata plumosa. Capsula tri-vel sexlocularis, basi dehiscens. Semina solitaria.

POLYGYNIA.

Alisma. Calyx triphyllus. Corolla tripetala. Capsulæ sex vel plurimæ coriaceæ compressæ, uniloculares, polyspermæ.

MONOGYNIA.

125. *Berberis.*

Corolla hexapetala: petalis basi glandulis nectariferis. Calyx hexaphyllus inferus. Stylus nullus. Bacca disperma.

306. *B. vulgaris*, pedunculis racemosis; spinis triplicibus. Flor. Dan. Tab. 904.

In hortis & sepibus: *ved Hestkiøb ved Birkerød.*
Flor. Maj. & Jun.

126. *Narcissus.*

Corolla supera, hexapetala. Nectarium monophyllum, campanulatum, extra stamina.

307. *N. Pseudo-Narcissus*, spatha uniflora; nectario erecto, crispo æquante petala ovata.

In vallo rarius: *ved Batteriet Quintus.* Flor.
Mart. & Apr.

127. *Allium.*

Corolla infera hexapetala. Spatha multiflora. Umbella simplex.

308. *A. Scorodoprasum*, caule planiusculo bulbifero; foliis marginibus & carinis deorsum scabris; vaginis arcipitibus; staminibus tricuspidatis; spathis brevibus.

In aggeribus Hafniæ & Castelli frequens. Flor.
Jun. & Jul.

309. *A. oleraceum*, caule teretifolio bulbifero foliis scabris semiteretibus subtus sulcatis staminibus simplicibus; spathi longis.

In fruticetis; aggeribus Hafniæ: *imellem Torbek*
og Papiers-Mølle; Örholt & alibi. Flor. Jul.
 & Aug.

310. *A. urfinum*, scapo nudo triquetro, foliis
 ovato lanceolatis; umbellis fastigiatis; spatha
 monophylla decidua. Flor. Dan. Tab. 757.

Rarius in sylvaticis locis: *ved Klampenborg, Ö-*
holm; i Skoven tæt ved Roeskilde. Flor. Maj. Jun.

128. *T u l i p a.*

Corollæ hexapetala campanulata. Stylus nullus.

311. *T. sylv. stris*, flore mutante; petalis utrinque
 attenuatis, omnia apice & tria interiora etiam
 basi hirsutis; foliis lanceolatis. Flor. Dan.
 Tab. 375.

In mæniis Hafniæ & Castelli frequens. Flor.
 Maj. & Jun.

129. *Ornithogalum.*

Corollæ hexapetala persistens, supra medium
 patens. Filamenta (*alterna*) basi dilatata.

* Floribus luteis.

312. *O. luteum*, scapo anguloso, folio unico lato-
 lineari, basi vaginante; umbella simplici;
 pedunculis subæqualibus lævibus; involucri
 diphylo: foliolis inæqualibus lanceolatis ob-
 tusiusculis; petalis lanceolatis obtusis.

In nemoribus & sylvis frequens. Flor. Aprill.
 & Maj.

a. sylvaticum, major, spathis tri-tetraphyllis pedunculis subramosis. Flor. Dan. Tab. 378.

Habitat & floret cum præcedente.

313. *O. minimum*, scapo nudo filiforme, sursum incrassato; foliis ex eo ipse bulbo, angustissimis linearibus caulem superantibus; corymbo simplici; pedunculis ramosis; bracteis lineari capillaceis pedunculisque pubescentibus; involucri monophyllo lanceolato acutissimo; petalis lanceolatis acutissimis.

Rarius in nemorosis, fruticetis: *ved Jägersborg bag ved Høe-Magazinet imod Hunde-Søen*. Flor. Apr. & Maj.

314. *O. spathaceum*, scapo nudo subterete, sursum incrassato; foliis ex eo ipse bulbo, angustissimis linearibus erectis; umbella simplicei, subtriflora; involucri tri-pentaphyllo; foliolis inæqualibus subciliatis; stylo filamentis longiori. Flor. Dan. Tab. 612. *petalis obtusis*.

Haud infrequens in nemorosis: *Friderichsberg-Have, Dn. Rafn* invenit. Flor. Apr.

** Floribus albis.

315. *O. umbellatum*, scapo nudo; foliis linearibus; floribus corymbosis; pedunculis scapo altioribus simplicibus, bracteis spathaceo-membranaceis.

In vallis Hafniæ & Castelli haud frequens. Flor. Jun.

316. *O. nutans*, scapo pedali & altiori, nudo, in racemum secundum terminante; floribus magnis nutantibus; pedunculis unifloris; bracteis membranaceo spathaceis. Flor. Dan. Tab. 912. Habitat cum præcedente fatis frequens. Flor. Maj.

130. *Anthericum.*

- Corolla hexapetala patens. Capsula ovata.
317. *A. ramosum*, foliis planis subcanaliculatis; caule ramoso; corollis planis; pistillo recto. Flor. Dan. Tab. 1157.
- In collinis fracticosis: *imellem Sorgenfrie og Brede*; rarius in aliis locis. Flor. Jun. Jul.

131. *Asparagus.*

- Flores dioicæ. Corolla hexapetala campanulata, petalis tribus interioribus apice reflexis. Bacca trilocularis, disperma.
318. *A. officinalis*, caule herbaceo tereti erecto ramoso; foliis setaceis fasciculatis unifloris. Flor. Dan. Tab. 508.
- In maritimis interdum occurrit: *paa Amager; ved Tømmerpladsen*. Flor. Jun. Jul. & Aug.

132. *Convallaria.*

- Corolla sex vel quadrifida. Bacca bi vel trilocularis, ante maturitatem maculosa.
319. *C. majalis*, foliis plerumque duo, ovato-oblongis basi vaginantibus in petiolum decurrentibus; scapo erecto, nudo, racemo simplici,

secundo apice subnutante, terminato; flores nutantes; corollis campanulatis. Flor. Dan. Tab. 854.

In nemorosis atque humidis fere ubique. Flor. Maj. & Jun.

320. *C. verticillata*, caule erecto folioso; foliis lanceolatis quaternis quinisque verticillatis; pedunculis bi-tri-quadrifloris axillaribus; floribus oblongis viride-albescentibus. Flor. Dan. Tab. 86.

In fruticetis: circa Birkeröd, Kylling; sed frustra quæsi. Flor. Jun. & Jul.

321. *C. Polygonatum*, caule erecto, folioso, simplicissimo, ancipiti, anguloso; foliis ovalibus, amplexicaulibus alternis; pedunculis axillaribus unifloris. Flor. Dan. Tab. 377.

In fruticetis rarius, in elevatis ficcis: imellem Fuglehvad og Brede Bakker. Flor. Jun. & Jul.

322. *C. multiflora*, caule erecto, folioso, tereti; foliis ovalibus amplexicaulibus; pedunculis axillaribus tri-quadrifloris; filamentis pilosis. Flor. Dan. Tab. 152.

In fruticetis, sepibus haud infrequens: bag ved Ordrup; Dyrehave; Sorgenfrue; Birkeröd. Flor. Jun. & Jul.

323. *C. bifolia*, caule erecto folioso subflexuoso; racemo simplici erecto terminato; foliis cordatis; corollis quadrifidis laciniis revolutis; staminibus quatuor. Flor. Dan. Tab. 291.

In sylvis frequens. Flor. Jun.

133. *Acorus.*

Spadix cylindrico-conicus, tectus flosculis.
Stylus nullus. Capsula trilocularis.

324. *A. Calamus*, scapi mucrone longissima foliacea. Flor. Dan. Tab. 1158.

Frequens in fossis, rivulis, lacubus. Flor. Jun. & Jul.

134. *Juncus.*

Calyx hexaphyllus. Corolla nulla. Capsula ovata triquetra unilocularis monosperma-trisperma vel trilocularis polysperma.

* Culmis nudis.

325. *J. conglomeratus*, culmo nudo stricto; capitulo laterali; bracteis calyculatis duo minutis ovato lanceolatis. Flor. Dan. Tab. 1094.

Frequens in paludosis, turfosis, fossis. Flor. Jun. & Jul.

326. *J. effusus*, culmo nudo stricto; panicula laterali; floribus ovatis obtusiusculis: foliolis calycinis æqualibus, ovatis, brevi mucronatis. Flor. Dan. Tab. 1096.

Habitat & floret cum præcedenti.

327. *J. glaucus*, culmo nudo, laxo, glauco: apice membranaceo incurvo; panicula laterali; floribus ovato-lanceolatis: foliolis calycinis alterne minoribus lanceolato-subulatis; capsulis oblongis. Flor. Dan. Tab. 1159.

Haud frequens in fossis; ikke langt fra Flaskekroen; i den Grøvte ved Garnisonskirkegaard, som vender imod Kastelet. Flor. Jun.

328. *J. filiformis*, culmo nudo filiformi subnudente; panicula laterali pauciflora; foliis catynicinis tribus alternis minoribus obtusioribus. Flor. Dan. Tab. 1207.

In aquis paludosis stagnantibus, piscinis: *imellem Gladfaxe og Teprimose; i Hirschholm-Skov.* Flor. Jun.

329. *J. squarrosus*, culmo nudo; foliis setaceis; capitulis glomeratis, aphyllis; floribus ovato-lanceolatis obtusiusculis splendentibus rigidis, breviter pedicellatis. Flor. Dan. Tab. 430.

In pratis paludosis turfosis: *Ordrup, Bagsværd, Birkerød &c.* Flor. Jun. & Jul.

** Culmis foliosis, foliis teretibus.

330. *J. articulatus*, culmo folioso decumbenti; foliis articulato nodosis, subcompressis linearibus; panicula terminali composita; floribus fasciculatis sessilibus; foliolis calycinis obtusiusculis. Flor. Dan. Tab. 1097.

Frequens in paludibus. Flor. Jun. & Jul.

331. *J. sylvaticus*, culmo folioso erecto; foliis teretibus articulato nodosis; panicula terminali supra decomposita, diffusa; foliolis calycinis mucronatis angustioribus acutissimis tribus interioribus paulo brevioribus.

Rarius in paludibus turfosis: *imellem Ordrup-Skov og Dyrehave.* Flor. Jun. & Jul.

332. *J. retroflexus*, culmo folioso erecto; foliis teretibus articulatis; panicula terminali supra decomposita, diffusa; spiculis bi-trifloris pe-

dunculis partialibus patentissimis subretro flexis; foliolis calycinis ovatis obtusis, inæqualibus, margine membranaceo-scariose sublacero. *Rafn l. c. p. 485.*

In palude turfoso: *imellem Ordrup-Skov og Dyrehave. Flor. Jun. (culmus tri-quadripedalis.)*

333. *J. sabverticillatus*, culmo folioso repente, ad florum glomerulas prolifero; foliis fetaceis, subarticulato-nodosis; foliolis calycinis inæqualibus: exterioribus acutis: interioribus paulo majoribus, obtusis; conniventibus; floribus omnibus in glomerulos sessiles, fasciculum foliorum producentes, collectis. *Flor. Dan. Tab. 817.*

In paludibus & piscinis exsiccatis. *Hirschholms Skov; Lyngbye; Birkerød. Flor. Jun. & Jul.*

334. *J. supinus*, culmo folioso suberecto, vel subdecumbenti; foliis canaliculato-filiformibus; foliolis calycinis acutis lanceolatis; floribus glomerato-verticillatis interdum fasciculum foliorum producentibus. *Flor. Dan. Tab. 1099.*

In paludosis & in aquis stagnantibus: *Birkerød, Bagsværd & aliis locis. Flor. Jun. & Jul.*

335. *J. bulbosus*, culmo erecto subfolioso, subcompressio, simplici; foliis linearibus canaliculatis, basi vaginantibus, culmo brevioribus: floralibus duo inæqualibus, altero panicula subæquali; panicula erecta inæqualis fructu maturo corymbosa; capsulis oblongo-globosis

fuscis nitidis calyce longioribus. Flor. Dan. Tab. 431.

In pratis humidis frequens.

α. culmo folioso erecto striato; foliis radicalibus culmique lineari-canaliculatis rigidis subsubulatis; basi vaginantibus; floralibus duo panicula multo brevioribus, subulatis, vaginis subventricosis membranaceis; panicula magis coracata; foliolis calycinis ovatis margine scariosis obtusiusculis; capsulis subglobofis nitidis calyce æqualibus. An J. Sprengeli Wilden.?

336. *J. bufonius*, culmo folioso dichotomo; foliis subangulatis; floribus solitariis sessilibus remotis; foliolis calycinis inæqualibus, lanceolatis, subulatis, acutissimis; capsulis ovato oblongis obtusissimis subtrigonis calyce brevioribus. Flor. Dan. Tab. 1098.

In locis inundatis fere ubique. Flor. Jun. Jul. & Aug.

*** Caule folioso, foliis planis.

337. *J. pilosus*, culmo erecto, foliis planis pilosis; corymbo subsimplici: pedunculis subsimplicibus; foliolis calycinis ovato-acuminatis, capsula brevioribus. Flor. Lond. Tab. 345.

In umbrosis sylvaticis. Flor. Apr. & Maj.

338. *J. maximus*, culmo erecto; foliis planis pilosis; corymbo composito, pedunculis subtri-

floris; foliolis calycinis lanceolatis, mucronatis, capsula æqualibus. Flor. Dan. Tab. 441.

Haud infrequens in sylvis & elevatis nemorosis locis. Flor. Maj. & Jun.

339. *J. campestris*, foliis planis pilosis; spiculis pedunculatis subumbellatis, media sessili; foliolis calycinis lanceolatis acuminatis capsula longioribus. Flor. Lond. Tab. 140.

In pratis frequens. Flor. Apr. & Maj.

α. culmo pedali bipedali graciliori; foliis angustioribus longioribus & tenerioribus, spiculis sex, octo, novem; oblongis, pedunculis elongatis & divaricatis; floribus ante evolutionem argenteo-splendidis.

In paludibus: *i Langmosen ved Dronningaard, i Dyrehaven.* Flor. Jul.

135. *Peplis.*

Periantheum campanulatum, ore duodecemfido. Petala sex calyci inserta fugacissima. Capsula bilocularis supera.

340. *P. Portula*, caule ramofo repente subtetragono foliis oppositis obovatis obtusis in petiolum brevem decurrentibus; floribus axillaribus, parvis, solitariis, sessilibus. Flor. Dan. Tab. 64.

Haud frequens in locis inundatis: *i Gælskov; Bagsværd; Birkerød; Ermelundhuset.* Flor. Jun. Jul. Aug. & Sept.

TRIGYNIA.

136. *Rumex*.

Calyx triphyllus. Petala tria persistentia conniventia. Semen unicum triquetrum.

* Flores hermaphroditi, valvulis granulatis.

341. *R. Hydrolapathum*, valvulis integris omnibus graniferis; foliis lanceolatis, bipedalibus & ultra, subundulatis, acutis, in petiolum desinentibus; caule bi-tripedali & altiori sulcato ramoso.

In fossis, aquis stagnantibus, lacubus: *ved Kastels-Graven, Ordrup, Gjentofte-Søe* & aliis locis. Flor. Jul. & Aug.

342. *R. crispus*, valvulis integris graniferis reticulatis; foliis radicalibus cordato lanceolatis, caulinis lanceolatis, omnibus undulatis acutis; caule erecto bi-tripedali striato ramoso ramis adpressis. Flor. Lond. Tab. 104.

In ruderalis, agris ad vias frequens. Flor. Jul. & Aug.

343. *R. Nemolapathum*, floribus verticillatis: verticillis remotis paucifloris: valvulis integris graniferis: granulato unico maximo. Foliis infimis cordato lanceolatis, supremis lanceolatis acutis; caule erecto bi-tripedali ramoso: ramis divaricatis. Flor. Lond. Tab. 181.

In nemorosis humidis: *i Ordrup-Skov; Dyrehave; Bagsværd* & alibi. Flor. Jul. & Aug.

344. *R. maritimus*, verticillis approximatis, multifloris; valvulis graniferis, dentato ciliatis; foliis radicalibus oblongo-lanceolatis caulinis & floralibus magis linearibus, omnibus undulatis crenulatis, floralibus autem integerrimis; caule pedali & ultra ramoso; ramis subdivaricatis. Flor. Dan. Tab. 1208.

In maritimis nec non in piscinis; ad fossas: *i en Dam i Hirschholm-Skov; ved Birkerød; ved Flaskekroen.* Flor. Jul. & Aug.

345. *R. obtusifolius*, valvulis dentatis graniferis, acutis; foliis radicalibus cordato oblongis, caulinis ovato-oblongis omnibus undulatis obtusis; ramis adpressis. Flor. Lond. Tab. 168.

In ruderatis, humidis sylvaticis: *ved Bernstorfskov, Bagsværd-Skov &c.* Flor. Jul. & Aug.

346. *R. acutus*, valvulis dentatis, graniferis; granulo unico majori; foliis cordato oblongis acutis; ramis laxis divaricatis.

In ruderatis, sylvis: *i Bagsværd-Skov &c.* Flor. Jul. & Aug.

** Flores diclini.

347. *R. Acetosa*, foliis oblongis cordato sagittatis; caule simpliciusculo erecto. *Blackw.* Tab. 230.

In pratis, pascuis. Flor. Jun. & Jul.

348. *R. Acetosella*, foliis hastato-lanceolatis, basi lobis binis longius productis præditis. Flor. Dan. Tab. 1161.

In agris siccis & haud fertilibus. Flor. æstate.

137. *Scheuchzeria.*

Calyx hexaphyllus. Corolla nulla. Styli nulli.

Capfulæ apice dehiscentes.

349. *S. palustris*, culmo erecto, glabro, geniculato, flexuoso; foliis carnosissimis semiteretibus; bracteis monophyllis, spathaceis. Flor. Danic. Tab. 76.

In paludibus turfosis haud frequens: ved Dronninggaard i Langmosen; ved Lynby-Søe; i Skoven ved Rudergaard; ved Hestekiøb ved Birkerød. Flor. Jun. & Jul.

138. *Trichlochin.*

Calyx nullus. Petala sex, unguibus inflexis antheriferis. Stylus nullus. Stigmata plumosa. Capfula tri-sexlocularis, basi dehiscentis. Semina solitaria.

350. *T. palustre*, floribus inferioribus pedunculatis; capsulis sublinearibus trigonis trilocularibus. Flor. Dan. Tab. 490.

In pratis humidis & paludosis: i en Mose ved Bernstorff &c. Flor. Jun. Jul. & Aug.

351. *T. maritimum*, floribus omnibus sessilibus approximatis; capsulis ovatis, hexagonis sexlocularibus. Flor. Dan. Tab. 306.

In maritimis: ved Flaskekroen; imellem Kastellet og Constantia; Amager. Flor. Jun. Jul. & Aug.

P O L Y G Y N I A.

139. *Alisma*.

Calyx triphyllus. Corolla tripetala. Capsulæ sex vel plurimæ, coriaceæ, compressæ, uniloculares, polyfermæ.

352. *A. Plantago*, foliis ovatis acutis, petiolatis; caule erecto nudo: ramis verticillatis unifloris; capsulis obtuse-trigonis. Flor. Danic. Tab. 561.

In fossis, lacubus frequens. Flor. Jul. & Aug.

353. *A. ranunculoides*, foliis in orbem congestis lineari-lanceolatis in petiolum decurrentibus; caulibus nudis apice umbelliferis; capsulis globosis squarrosis. Flor. Dan. Tab. 122.

Rarius in pratis humidis & lacubus: *ved Peb-lingesöe*. Flor. Jul. & Aug.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

Trientalis. Calyx heptaphyllus. Corolla septempartita, plana. Bacca exsucca unilocularis, futuris variis dehiscens.

Æsculus. Calyx monophyllus quadri-quiue-
dentatus, ventricosus. Corolla tetra-penta-
petala calyce inserta. Capsula trilocularis,
trivalvis.

M O N O G Y N I A.

140. *Trientatis.*

Calyx heptaphyllus. Corolla septempartita, plana. Bacca exsucca, unilocularis, futuris variis dehiscens.

354. *T. europæa*, caule erecto digitali vel sub palmari apice folioso; foliis subverticillatis, ovato-lanceolatis; floribus solitariis rarius geminis pedunculatis; pedunculis erectis. Flor. Dan. Tab. 84.

In fruticetis & sylvis; i Krattet ved Fuglehvad Mølle; Bagsværd-Skov; Gialfskov; Rudergaard & alibi. Flor. Maj. & Jun.

141. *Æsculus.*

Calyx monophyllus quadri-quinquedentatus, ventricosus. Corolla tetra-pentapetala, calyce inserta. Capsula trilocularis trivalvis.

355. *Æ. Hippocastanum*, foliis digitatis septenis; corollis pentapetalis, patulis.

Passim in hortis, arboretis. Flor. Maj. & Jun.

CLASSIS VIII.
OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

Oenothera. Calyx tubulosus quadrifidus. Petala quatuor. Capsula cylindrica, infera. Semina nuda.

Epilobium. Calyx tubulosus quadripartitus. Petala quatuor. Capsula oblonga infera. Semina papposa.

Vaccinium. Calyx monophyllus superus. Corolla monopetala. Filamenta receptaculo inserta. Bacca quadrilocularis, polysperma.

Erica. Calyx tetraphyllus. Corolla subquadrida. Filamenta receptaculo inserta. Antherae bifidae. Capsula quadrilocularis.

DIGYNIA.

Chrysosplenium. Calyx quadripartitus, superus, coloratus. Corolla nulla. Capsula bifloris, bilocularis, polysperma.

T R I G Y N I A.

Polygonum. Calyx nullus. Corolla monopetala infera, partita. Stamina quinque vel octo. Stylus unicus vel tres. Semen unicum, angulatum.

T E T R A G Y N I A.

Paris. Calyx tetraphyllus. Petalaj quatuor linearia. Antheræ dorsales. Bacca globosa tetragona, quadrilocularis.

Adoxa. Calyx bi-tripartita infera. Corolla quadri-quinquefida. Stamina octo in flore capitulum terminante, in lateralibus vero decem. Bacca quadri-quinquelocularis.

Elatine. Calyx subtetraphyllus. Petala tres vel quatuor. Capsula subquadrilocularis, subquadrivalvis, depressa.

M O N O G Y N I A.

242. *Oenothera.*

Calyx tubulosus quadrifidus. Petala quatuor.
Capsula cylindrica infera. Semina nuda.

856. *Oe. biennis*, foliis ovato-lanceolatis, planis
caule muricato villoso. Flor. Dan. Tab. 446.
Ad vias nonnunquam vidi: ved Charlottenlund,
og Constantia. Flor. Jul. Aug. & Sept.

143. *Epilobium.*

Calyx tubulosus quadripartitus. Petala qua-
tuor. Capsula oblonga infera. Semina pap-
posa.

357. *E. angustifolia*, foliis sparsis, lineari-lanceo-
latis, integerrimis vel repando denticulatis,
venosis; floribus inæqualibus, spicatis: spicis
terminalibus. Flor. Dan. Tab. 289.

Haud frequens tam in locis paludosis quam in
sepibus ficcis: i Egnen omkring Birkerød, imel-
lem Hestkiøb-Gaard og Stavnshold; ikke langt fra
Dumpebøds Mølle paa en Bakke; ved Bernstorff-
Skoven; i Fredensborg-Have. Flor. Jul. Aug.
& Sept.

358. *E. hirsutum*, foliis oppositis alternisque se-
miamplexicaulibus, subdecurrentibus, ovato-
lanceolatis ferratis villoso-hirsutis; caule
erecto ramosissimo hirsuto. Floribus solitariis
axillaribus. Flor. Dan. Tab. 326.

In littoris lacuum, in rivulis, fossis: *ved Valbye; Bernstorf; Springforbie.*

α. floribus albis; foliis ferrato-dentatis villosioribus; caule hirsutiori.

Ved Springforbie.

359. *E. pubescens*, foliis lanceolatis plerumque oppositis, dentatis, utrinque pubescentibus; caule erecto simplicissimo villoso; floribus solitariis axillaribus. Flor. Dan. Tab. 347.

In locis humidis, fossis, ad rivulos: *Ordrup-Mose; Tepri-Mose; imellem St. Hans Hospital og Rolighed &c.* Flor. Jul. & Aug.

α. Foliis villoso-sericeis; caule subhirsuto-villoso.

360. *E. montanum*, foliis oppositis, summis alternis, ovato cordatis, dentatis, sessilibus vel brevissime petiolatis, glabris; caule simplice superne vix pubescente. Flor. Dan. Tab. 922.

In locis sylvaticis & sepibus siccis lapideis, rarius in humidis: *Bagsværd, Hirschholm; Charlottenlund; Sorgenfrie &c.* Flor. Jun. Jul. Aug.

α. caule ramosissimo.

360. *E. nudum*, foliis ovali-lanceolatis, ferrato dentatis acutis petiolatis: infimis oppositis: summis alternis, glabris; caule erecto ramossissimo, glabro, superne pubescente, terete.

In locis humidis, fossis: *bag ved Lundehuset; ved Frederichsberg.* Flor. Jul. & Aug.

361. *E. tetragonum*, foliis lanceolatis, denticulatis, sessilibus, subdecurrentibus, glabris; caule erecto superne ramoso subtetragono.

Flor. Dan. Tab. 1029.

In paludosis, fossis; *ved Flaskekroen; Bernstorfs-
Veien &c.* Flor. Jul. Aug.

362. *E. palustre*, foliis lineari-lanceolatis inferioribus oppositis superioribus alternis, integerrimis; caule erecto, simplicissimo, pubescente, rubicundo.

In paludosis haud infrequens. Flor. Jul. & Aug.

q. foliis ovato-lanceolatis obtusioribus;
infimis ovalibus.

In declivis inter *Thorbek & Springforbie.* Flor. Jul. & Aug.

144. *Vaccinium*.

Calyx monophyllus superus. Corolla monopetala. Filamenta receptaculo inserta.

363. *V. Myrtillus*, foliis ovatis, ferratis, acutis, subsessilibus, deciduis; caule palmari subpedali angulato; floribus solitariis; corollis globosis quadridentatis; calycibus truncatis. Flor. Danic. Tab. 974.

Frequens in ericetosis sylvaticis; *Gialskov; Birkerød; Hirschholm &c.* Flor. Maj. & Jun.

364. *V. uliginosum*, foliis obovatis, integerrimis, obtusis, glabris, subtus venosis, deciduis; caule pedali bipedalique ramosissimo; floribus

solitariis; corollis ovalibus, quadridentatis
calycibus quadrifidis. Flor. Dan. Tab. 231.

In paludosis ericetosis sylvaticis: *Bagsværd*;
Helsingör; *Hirschholm*; *Birkeröd* &c. Flor. Maj.
& Jun.

365. *V. Vitis idæa*, foliis obovatis, revolutis,
subintegerrimis, apice glandulosis, subtus
punctatis; caule procumbenti demum adscen-
denti palmari & haud ultra; racemis termi-
nalibus nutantibus; corollis ovatis quadrifidis.
Flor. Dan. Tab. 40.

In ericetis, turfosis: *Birkeröd*; *Hirschholm*;
Friderichsborg; *Helsingör*. Flor. Maj, & Jun.

366. *V. Oxyccoccus*, foliis ovatis, integerrimis re-
volutis; caule repente filiforme; floribus sub-
umbellatis terminalibus; corollis quadriparti-
tis, revolutis.

In paludibus turfosis obsoletis cum Sphagno pa-
lustre. Flor. Jun. & Jul.

145. *E r i c a*.

Calyx tetraphyllus. Corolla subquadrifida.
Filamenta receptaculo inserta. Antheræ bifi-
dæ. Capsula quadrilocularis.

367. *E. vulgaris*, floribus racemosis terminalibus;
corollis campanulatis subæqualibus; antheris
aristatis; stylis exsertis; calycibus duplicatis;
foliis oppositis sessilibus sagittatis. Flor. Dan.
Tab. 677.

Ubique, præsertim incultis locis. Flor. Jul. Aug. & Sept.

368. *E. Tetralix*, floribus capitatis, terminalibus; corollis ovatis; antheris aristatis; stylis inclusis; foliis verticillatis, quaternis, aristatis, ciliatis, subtus glabris. Flor. Dan. Tab. 81.
In ericetis rarius: ved *Friderichsværk*; *Odshæred* ubi Dn. *Markussen* invenit.

DIGYNIA.

146. *Chrysosplenium*.

Calyx quadripartitus, superus, coloratus.
Corolla nulla. Capsula birostris, bilocularis, polysperma.

369. *Ch. alternifolium*, foliis reniformibus, crenatis, caulinis alternis pilosis, petiolatis: floralibus sessilibus. Flor. Dan. Tab. 356.

In humidis umbrosis; *Charlottenlund*; *Dyrehave*; *Bagsværd*; *Birkerød* &c. Flor. Maj. Jun.

370. *Ch. oppositifolium*, habitu præcedentis; foliis caulinis oppositis. Flor. Dan. Tab. 365.

Rarius cum antecedente. *Rafn*. l. c. 2. p. 621.

TRIGYNIA.

147. *Polygonum*.

Calyx nullus. Corolla monopetala, infera, partita. Stamina quinque vel octo. Stylus unicus vel tres. Semen unicum, angulatum.

* Floribus pentandris.

371. *amphibium*, floribus pentandris semidigynis, spicis terminalibus ovatis; foliis cordato-lanceolatis petiolatis; vaginis hirsutis muticis. Flor. Dan. Tab. 282.

In piscinis, lacubus, fossis. Flor. Jun. Jul.

α. *terrestre*, foliis scabriusculis, subsessilibus; vaginis longioribus.

In locis inundatis; ad margines fossarum.

** Floribus hexandris.

372. *P. lapathifolium*, floribus hexandris, digynis spicis erectis demum nutantibus ovato-cylindricis, pedunculis scabris; foliis ovato-lanceolatis subtus punctatis; vaginis glabris muticis. Curt. Flor. Lond. Tab. 66.

In cultis, humidis, ad fimetos. Flor. Jul. Aug.

β. caule maculis purpureis. Curt. Flor. Lond. Tab. 67.

In humidis: uden for Kastels-Porten imod Stranden.

α. *incanum*, spicis oblongis; foliis oblongo-lanceolatis subtus incanis.

In locis humidis: ved Brønshøj og ved St. Ibs Kirkegaard i Roeskilde, & aliis locis a Dn. Rafn. observatum.

373. *P. Perficaria*, floribus hexandris. semidigynis; spicis ovato cylindricis; pedunculis glabris; foliis lanceolatis vel ovato lanceolatis, brevissime petiolatis vaginis ciliatis. Flor. Dan. Tab. 702.

Ad vias, rivulos, in agris humidis &c. Flor.
Jul. Aug. & Sept.

a. foliis maculatis.

374. *P. Hydropiper*, floribus hexandris semidigynis; spicis filiformibus subnutantibus; corollis extus glandulosis; foliis lanceolatis, subundulatis in petiolum desinentibus; vaginis nervosis subciliatis.

In fossis humidis & locis hyeme inundatis. Flor.
Aug. & Sept.

375. *P. minus*, floribus hexandris, subsemidigynis; spicis filiformibus; corollis quinquefidis; foliis lanceolatis; vaginis ciliatis; caule basi repente, subprocumbente. Fl. Lond. Tab. 65.

In locis & pratis hyeme inundatis: *paa Nørrefællede uden for Kiöbenhavn; ved Birkeröd.* Flor.
Jul. Aug. & Sept.

*** Floribus octandris,

376. *P. Bistorta*, floribus octandris, trigynis; caule simplicissimo monostachio; foliis ovatis in petiolum decurrentibus. Flor. Dan. Tab. 421.

In pratis humidis: *ved Vebek og Roeskilde, Kylling.* Nobis autem nunquam visum.

377. *P. aviculare*, floribus octandris, trigynis, axillaribus; foliis ovatis vel ovato lanceolatis; caule procumbente; vaginis dentato-ciliatis.

Ubique. Flor. æstete. Varietates notabiliore sunt.

α. *latifolium*, Retz.

β. *brevifolium*, Retz.

γ. *erectum*, Roth vel *aphyllum*, Retz.

**** Helxine, foliis cordatis.

378. *P. Convulvulus*, floribus octandris, trigynis; racemis axillaribus terminalibusque paucifloris; foliis cordatis, acuminatis, petiolatis; caule volubili angulato. Flor. Dan. Tab. 744. Inter segetes; in dumetis. Flor. Jul. Aug.

TETRAGYNIA.

148. *Paris*.

Calyx tetraphyllus. Petala quatuor linearia; Antheræ dorsales. Bacca globoso-tetragona, quadrilocularis.

379. *Par. quadrifolia*, foliis ad apicem caulis quatuor, ovalibus, sessilibus. Flor. Dan. Tab. 139.

In umbrosis sylvaticis, humidis: Charlottenlund; Friderichsdalsveien ved Kongshvile; i Skoven ved Hestkiøb ved Birkerød &c. Flor. ultimo Maj. & Jun.

149. *Adoxa*.

Calyx bipartita infera. Corolla quadri-vel quinquefida. Stamina octo in flore capitulum terminante, in lateralibus vero decem. Bacca quadri-quinquelocularis.

380. *A. Moschatellina*, foliis radicalibus biternatis foliolis trifidis: caulinis oppositis ternatis, laci-

niis bi-trilobisve: caule erecto simplicissimo;
radice squamata. Flor. Dan. Tab. 94.

In nemorosis: Charlottenlund; Jägersborg &c.
Flor. Apr. & Maj.

150. *Elatine.*

Calyx subtetraphyllus. Petala tres vel quatuor. Capsula subquadrilocularis, subquadri-valvis, depressa.

381. *E. Hydropiper*, foliis ovalibus in petiolum decurrentibus, oppositis, glabris, integris; caulibus sub aqua repentibus, ramosissimis, dichotomis. Flor. Dan. Tab. 156.

In fundo piscinum: i den mellemste Fiske-Dam i Frueskov bag ved Bagsværd, ubi Dn. Prof. Vahl invenit. Flor. Jun.

CLASSIS IX.
ENNEANDRIA.

HEXAGYNIA.

Butumus. Calyx nullus. Corolla hexapetala.
Capsulæ sex, polyspermæ.

HEXAGYNIA.

151. *Butumus*.

Calyx nullus. Corolla hexapetala. Capsulæ
sex, polyspermæ.

382. *B. umbellatus*, foliis ensiformibus, triquetris
bipedalibus & ultra; scapo erecto, tereti nu-
do foliis altiori, umbella speciosa terminato.
Flor. Dan. Tab. 604.

In fossis, lacubus: *i Stadens - Gravenes; i Lunde-
huus - Mose; Gientofte - Söe &c.* Flor. Jun. Jul.
& Aug.

 CLASSIS X.

 DECA N D R I A.

M O N O G Y N I A.

Monotropa. Calyx nullus. Petala octo-decem:
horum exteriora basi excavato-mellifera.
Capsula quadri-quinquelocularis, quadri-
quinquevalvis.

Andromeda. Calyx quinquepartitus, coloratus.
Corolla ovata, quinquedentata. Capsula
quinquelocularis.

Arbutus. Calyx quinquepartitus, coloratus.
Corolla ovata, quinquedentata, basi diaphana.
Bacca quinquelocularis, pentagona.

Ledum. Calyx quinquedentatus. Corolla pen-
tapetala, plana. Capsula quinquelocularis basi
dehiscens.

Pyrola. Calyx quinquepartitus. Petala quin-
que. Capsula quinquelocularis, quinqueval-
vis; angulis dehiscens.

D I G Y N I A.

Saxifraga. Calyx quinquepartitus. Corolla
pentapetala. Capsula birostris, unilocularis,
polyserma.

Scleranthus. Calyx monophyllus quinquefidus, persistens. Corolla nulla. Semen calyce inclusum.

Gypsophylla. Calyx campanulatus, monophyllus, angulatus. Petala quinque, ovata, sessilia. Capsula globosa unilocularis, quinquevalvis.

Saponaria. Calyx monophyllus basi nudus. Corolla pentapetala. Petala unguiculata. Capsula oblonga unilocularis.

Dianthus. Calyx cylindricus, monophyllus, basi squamis quatuor cinctus. Petala quinque unguiculata. Capsula cylindrica unilocularis.

TRIGYNIA.

Cucubalus. Calyx inflatus. Petala quinque unguiculata: fauce nuda. Capsula trilocularis.

Silene. Calyx ventricosus. Petala quinque unguiculata: fauce coronata. Capsula trilocularis.

Stellaria. Calyx pentaphyllus patens. Petala quinque bipartita. Capsula unilocularis polysperma.

Arenaria. Calyx pentaphyllus patens. Petala quinque integra. Capsula unilocularis.

P E N T A G Y N I A.

Sedum. Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala. Squamæ nectariferæ quinque ad basin germinis extrorsum insertæ. Capsulæ quinque.

Oxalis. Calyx quinquepartitus. Petala quinque basi cohærentia. Filamenta inæqualia, quorum quinque longiora, basi connata. Capsula quinquelocularis pentagona longitudinaliter dehiscens.

Agrostemma. Calyx monophyllus coriaceus. Petala quinque unguiculata; limbo obtuso indiviso. Capsula unilocularis.

Lychnis. Calyx monophyllus oblongus lævis. Petala quinque unguiculata: limbo sæpe fissio. Capsula quinquelocularis.

Cerastium. Calyx pentaphyllus. Petala bifida. Capsula unilocularis apice dehiscens.

Spergula. Calyx pentaphyllus. Petala quinque integra. Capsula ovata, unilocularis, quinquevalvis.

M O N O G Y N I A.

152. *Monotropa*.

Calyx nullus. Petala octo-decem, horum exteriora basi excavato-mellifera. Capsula quadri-quinquelocularis, quadri-quinquevalvis.

383. *M. Hypopithys*, scapo squamoso; spica terminali nutante; floribus lateralibus octandris; terminali decandro. Sowerby Engl. botan. Tab. 69.

In sylvis, parasitica fagorum & quercuum radicibus: i Hareskov ved Bagsværd; Gialskov; ved Rudergaard; Birkerød; Dronninggaard &c. Flor. Jul.

153. *Andromeda*.

Calyx quinquepartitus coloratus. Corolla ovata quinquedenta. Capsula quinquelocularis.

384. *A. polifolia*, pedunculis aggregatis; foliis alternis, lanceolatis, revolutis. Flor. Danic. Tab. 54.

In paludibus turfosis rarius: i Mosen ved Viintappergaarden; i den store Mose bag ved Stolpegaard; i Tepri-Mose. Flor. Maj. & Jun.

154. *Arbutus*.

Calyx quinquepartitus, coloratus. Corolla ovata quinquedentata basi diaphana. Bacca quinquelocularis, pentagona.

385. *A. Uva ursi*, caulibus procumbentibus; foliis integerrimis. Flor. Dan. Tab. 33.

In ericetis: ved *Thisvilde paa Flyvesandet*; ved *Frederiksborg af Kylling*. Flor. Jun.

155. *Ledum*.

Calyx quinquedentatus. Corolla pentapetala plana. Capsula quinquelocularis, basi dehiscens.

386. *L. palustre*, foliis linearibus, marginibus revolutis subtus ferugineo-tomentosis; staminibus corollis longioribus. Flor. Dan. Tab. 103r.

Ved *Ravnstrup, Löstrup, Steenlille; Kylling*.

156. *Pyrola*.

Calyx quinquepartitus. Petala quinque. Capsula quinquelocularis quinquevalvis angulis dehiscens.

387. *P. rotundifolia*, staminibus ascendentibus; pistillo declinato; foliis in orbem congestis rotundatis, petiolatis; scapo erecto, squamis foliosis, terminato in racemum simplicem. Flor. Dan. Tab. 110.

In palude: ved *Lyngbye-Søe imod Friderichsdal* tantum vidi.

388. *P. minor*, staminibus pistillisque erectis foliis in orbem congestis, rotundato-ovatis, petiolatis, duriusculis; scapo nudo, squama unica, terminato in racemum simplicem; corollis subcampanulato-globosis. Flor. Dan. Tab. 55.

In fylvis haud infrequens: *Bagsværd; Friderichsdal; Rudergaard &c.* Flor. Jun. & Jul.

389. *P. secunda*, pistillis erectis, corollis longioribus; foliis alternis & oppositis, rotundato-ovatis, acutis, ferratis, dumusculis; racemis secundis. Flor. Dan. Tab. 402.

Rarius in fylvis: *Gjælskov; Rudergaard; Hirschholm.* Flor. Jun.

DIGYNIA,

157. *Saxifraga.*

Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala. Capsula birostris unilocularis, polysperma.

390. *S. Hirculus*, foliis lanceolatis, sparsis, margine & præcipue basi ciliatis, sessilibus: inferioribus ovatis petiolatis; caule stolonifero, superne tomento ferrugineo, subbifloro. Flor. Dan. Tab. 200.

In paludibus turfosis haud frequens: *i Langmosen ved Dronninggaard; bag ved Dumpedals-Mølle imellem Rudergaard og Birkerød.* Flor. Aug. Sept. & Oct.

391. *S. granulata*, foliis hirsutis scabriusculis; caulinis subreniformibus vel trifidis, lobis incisis, supremis linearibus: radicalibus reniformibus lobatis crenatis petiolatis; radice granulata. Flor. Dan. Tab. 514.

In pratis frequens. Flor. Maj. & Jun.

392. *S. tridactylites*, foliis plerumque trifidis pilosis caulinis sessilibus, supremis linearibus integris; caule erecto pilis glandulosis. Flor. Lond. Tab. 129.

In locis arenosis haud vulgaris: *paa Amager paa Tuerne*.

158. *Scleranthus*.

Calyx monophyllus quinquefidus persistens. Corolla nulla. Semen calyce inclusum.

393. *Scl. annuus*, calycibus fructus patulis; caulibus diffusis suberectis dichotomis; foliis linearibus subulatis oppositis; floribus terminalibus fasciculatis, laciniis acutis vix albo marginatis. Flor. Dan. Tab. 504.

Ubique in pratis siccis & agris. Flor. æstate.

394. *Scl. perennis*, calycibus fructus clausis; caulibus decumbentibus; (foliis antecedenti crassioribus brevioribus; floribus fasciculatis, laciniis obtusis, margine lato albo membranaceo cinctis.) Flor. Dan. Tab. 563.

Haud frequens in pratis siccis: *imellem Fuglehvads-Mølle og Brede-Bakker*. Flor. Jun. Jul. & Aug.

159. *Gypsophylla*.

Calyx campanulatus, monophyllus angulatus. Petala quinque ovata sessilia. Capsula globosa, unilocularis, quinquevalvis.

395. *G. muralis*, caule erecto, digitali, subpalmaris ramoso dichotomo; foliis linearibus, pla-

nis, basi connatis; floribus axillaribus terminalibusque, longe pedunculatis, solitariis; calycibus subquinquepartitis: laciniis marginibus albido membranaceis cinctis, subconnatis; capsulis globofo-ovatis.

Rarius in agris, arvis, muris: *paa Murene omkring Kronborg; ved Hestekiøb Gaard ved Birkerød paa en Ager lige for Gaarden i Skoven.* Flor. Jul. usque ad Octobr.

160. *Saponaria.*

Calyx monophyllus basi nudus. Corolla pentapetala, petala unguiculata. Capsula oblonga unilocularis.

396. *S. officinalis*, foliis ovato-lanceolatis, trinerviis, connato-fessilibus, glabris; floribus fasciculatis. Flor. Dan. Tab. 543.

Haud frequens: *ved Lyngbye Kirkegaard; ved Rudersdal.* Flor. Jul. Aug. Sept.

161. *Dianthus.*

Calyx cylindricus monophyllus, basi squamis quatuor cinctus. Petala quinque unguiculata. Capsula cylindrica unilocularis.

* Flores fasciculati.

397. *D. Armeria*, squamis calycinis lanceolatis villosis tubum æquantibus; (caule erecto ramoso. pedali & altiori, tereti scabriusculo; foliis linearibus oppositis sessilibus pilosis: radicalibus obovato-oblongis obtusis.) Flor. Danic. Tab. 230.

Haud frequens in arenosis; maritimis: *ved Flaskekroen; Brede; ved Bernstorf; imellem Charlottenlund og Skovshoved paa Bakkerne.* Flor. Jul. & Aug.

** Flores solitarii plures in eodem caule.

398. *D. deltoides*, floribus solitariis, squamis calycinis lanceolatis binis; corollis crenatis; (caule digitali, palmari, decumbenti, superne ramoso, subpubescenti; foliis linearibus, subulatis, marginibus carinaque subscabridis.) Flor. Danic. Tab. 577.

In pratis sylvaticis; fruticetis: *Charlottenlund; Dyrehave; ved Lyngbye-Søe; Friderichsdal; Fugleavad-Mölle.* Flor. Jun. Jul. Aug.

399. *D. superbus*, floribus paniculato-corymbosis; squamis calycinis brevibus acuminatis; corollis multifido capillaribus, unguibus pilis flavis præditis. Flor. Dan. Tab. 578.

In pratis & aggeribus marem versus: *ved Flaskekroen; rarior in aliis locis: ved Nymölle; Örholm.* Flor. Jul. & Aug.

*** Caule unifloro.

400. *D. arenarius*, caulibus subunifloris, squamis calycinis ovatis obtusis; corollis multifidis foliis linearibus.

In locis ficcis arenosis. Flor. Jul.

α. caule erecto, subtrifloro; floribus erectis; squamis calycinis ovatis; petalis crenatis subglabris, crenulis inciso-dentatis, foliis angustissimis linearibus subulatis ad len-

tem subciliatis. An *Dianthus* sylvestris
Hoffm. Taschenb. p. 198?

In arenosis maritimis: imellem Charlottenlund
og Skovshoved, Flor. Jul.

TRIGYNIA.

162. *Cucubalus*.

Calyx inflatus. Petala quinque unguiculata:
fauce nuda. Capsula trilocularis.

401. *C. Behen*, calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis; capsulis subrotundis. Flor. Dan. Tab. 914.

In aggeribus, sepibus, ad vias. Flor. Jun. Jul.

402. *C. viscosus*, floribus lateralibus undique decumbentibus; caule indiviso; foliis basi reflexis. Flor. Dan. Tab. 1209. (*hirsuto-viscosus*.)

Rarius: paa Æen Oxholm i Isfjorden Dn. Holten.
Flor. Jun. Jul.

163. *Silene*.

Calyx ventricosus. Petala quinque unguiculata: fauce coronata. Capsula trilocularis.

403. *S. nutans*, petalis bifidis; floribus lateralibus secundis cernuis; panicula nutante. (*Caulibus subviscidis; foliis radicalibus ovatis in petiolum decurrentibus, caulinis lanceolatis.*) Flor. Dan. Tab. 242.

In locis elevatis ficcis: ved Brede; Charlottenlund; imellem Torbek og Papiers-Möllen. Flor. Jun. & Jul.

164. *Stellaria*.

Calyx pentaphyllus patens. Petala quinque, bipartita. Capsula unilocularis polysperma.

404. *S. nemorum*, foliis cordatis petiolatis; panicula pedunculis ramosis. Flor. Dan. Tab. 271.

In locis humidis præprimis nemorosis: *Lundehus-Mose*; *Charlottenlund*; *Hirschholm Slots-Have*. Flor. Jun.

406. *S. Holostea*, foliis lanceolatis ferrulatis petalis bifidis calyce duplo majoribus. Flor. Dan. Tab. 698.

Frequens in sepibus, fruticetis, nemoribus. Flor. Maj. Jun.

406. *S. graminea*, foliis linearibus integerrimis; petalis ultra medium bifidis vix calycem majoribus.

In locis nemorosis ficcis, sepibus, ericetis. Flor. Jun. & Jul.

α . foliis lineari lanceolatis basi subciliatis

β foliis linearibus angustissimis.

Varietas α . in sepibus β . in paludibus legi.

407. *S. palustris*, foliis lineari lanceolatis, integerrimis glaucis; petalis bifidis calyce majoribus.

In locis humidis, pratis, ad piscinas haud vulgaris: *Bagsværd*; *ved Fiskedammene i Hirschholm-Skov*. Flor. Jun. Jul.

408. *S. uliginosa*, foliis lanceolatis, basi subciliatis angustioribus; petalis bipartitis, calyce plerumque brevioribus. (pedunculis ternis lateralibus:

intermedio unifloro; lateralibus dichotomis paucifloris. Flor. Lond. No. 62.

In locis paludosis haud frequens: ved *Ermelundhuset* imod *Fortunen*; ved *Krattet* ved *Fuglehvad-Mølle*; *Dronninggaard*, *Ballerup*. Flor. Jun. Jul. 409. *S. brevifolia*, foliis lanceolatis haud trilinearibus; pedunculis solitariis axillaribus foliis longioribus; petalis ultra medium bifidis, calyce vix longioribus. Flor. Dan. Tab. 415?

In maritimis: ved *Flaskekroen*; imellem *Kiøbenhavn* og *Vebek*. Flor. Jun. Jul.

165. *Arenaria*.

Calyx pentaphyllus patens. Petala quinque integra. Capsula unilocularis polysperma.

410. *A. peploides*, foliis ovatis acutis apicibus recurvis carnosis; petalis calyce brevioribus vel æqualibus. Flor. Dan. Tab. 624.

In arenosis maritimis. Flor. Jun. Jul.

411. *A. trinervia*, foliis ovatis acutis, trinerviis, in petiolum decurrentibus; petalis calyce brevioribus. Flor. Dan. Tab. 429.

In sylvis, nemoribus frequens. Flor. Jun. Jul.

412. *A. serpyllifolia*, foliis subovatis acutis sessilibus (*mucronatis*); petalis integerrimis calyce brevioribus. Flor. Dan. Tab. 977.

In agris pratisque ficcis &c. Flor. Jun. Jul. Aug.

413. *A. rubra*, foliis filiformibus, subcompressis mucronatis internodiis brevioribus; stipulis membranaceis; calycibus capsulis æqualibus, viscosis.

In locis siccis, aggeribus: ved Bagsværd; Birkerød & alibi. Flor. Jun. Jul. Aug.

414. *A. marina*, foliis linearibus carnosiss, longitudine internodiorum; stipulis præcedenti multo minoribus; calycibus capsula dimidia brevioribus subpubescentibus. Flor. Dan. Tab. 740.

In arenosis maritimis nec non in aggeribus. Flor. Maj. Jun. Jul.

PENTAGYNIA.

166. *Sedum*.

Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala. Squamæ nectariferæ quinque ad basin germinis extrorsum insertæ. Capsulis quinque.

415. *S. Thelephium*, foliis planiusculis ferratis succulentis; corymbo folioso; caule erecto.

In locis siccis, dumetis, tectis. Flor. Jul. Aug. & Sept.

α. *purpureum*, foliis ovatis, carnosiss, dentatis, obtusis, planis floribus purpureis. Flor. Dan. Tab. 686.

β. *maximum*, corymbis confertioribus; floribus albido flavescenscentibus; foliis læviter dentatis. Plenk. icon. plant. medic. Tab. 350.

In declivis maritimis inter Springforbie og Papiers-Mølle..

416. *S. acre*, foliis subovatis, adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis; cyma trifida. Flor. Lond. Tab. 23.

In muris pratis fœcis, tectis fere ubique. Flor. medio Jun. Jul. Aug.

167. *Oxalis*.

Calyx quinquepartitus. Petala quinque basi cohærentia. Filamenta inæqualia quorum quinque longiora, basi connata. Capsula quinquelocularis, pentagona, longitudinaliter dehiscens.

417. *O. Acetosella*, scapo unifloro; foliis ternatis obcordatis; radice dentata. Flor. Dan. Tab. 980.

In nemorosis, umbrosis ubique. Flor. primo vere.

418. *O. stricta*, caule erecto ramoso; foliolis ternatis obcordatis, petiolis semiteretibus exstipulatis; petalis emarginatis integris. Flor. Dan. Tab. 873.

Rarius in oleraceis cultis: ved Frederiksborg i et lidet Krat og i Slotshaven sammesteds. Dn. Rafn. Flor. Jun. Jul. Aug.

168. *Agrostemma*.

Calyx monophyllus, coriaceus. Petala quinque unguiculata: limbo obtuso indiviso. Capsula unilocularis.

419. *A. Githago*, hirsuta, calycibus corollam æquantibus petalis integris nudis. Flor. Dan. Tab. 576.

Inter segetes. Flor. Jun. & Jul.

169. *Lychnis*.

Calyx monophyllus, oblongus lævis. Petala quinque unguiculata: limbo sæpe fisso. Capsula quinquelocularis.

420. *L. Flos cuculi*, petalis tri-quadrifidis; capsulis subrotundis; caule sulcato scabrido. Flor. Dan. Tab. 590.

In pratis humidis. Flor. Jun. & Jul.

421. *L. Viscaria*, petalis integris subundulatis, floribus glomerato racemosis terminalibus; caule erecto ad genicula viscido. Flor. Dan. Tab. 1032.

In pratis & elevatis ficcis: ved Fuglehvad Mölle; Charlottenlund &c. Flor. Jun. & Jul.

422. *L. sylvestris*, petalis bifidis sæpius supra faucem dentatis rubicundis; capsulis subrotundis apicibus recurvatis. Flor. Lond. Tab. 80.

In umbrosis, fruticetis, alnetis: Charlottenlund; Dyrehave; Ordrup-Møse; Bernfjorff-Møse. Flor. Jun. & Jul.

423. *L. pratensis*, petalis subbifidis, albis; capsulis conicis quinquedentatis, apicibus rectis. Flor. Dan. Tab. 792.

Ad vias, in arvis satis frequens. Flor. Jun. Jul.

170. *Cerastium*.

Calyx pentaphyllus. Petala bifida. Capsula unilocularis, apice dehiscens.

424. *C. vulgatum*, foliis ovato-oblongis; petalis calyce vix longioribus; caulibus diffusis undique pilosis. Flor. Lond. Tab. 130.

In pratis, ad vias fere ubique. Flor. æstate.

425. *C. viscosum*, foliis ovatis; caulibus erectis villoso-viscosis. Flor. Dan. Tab. 1211.

In arvis, arenosis aridis maritimis: *imellem Charlottenlund og Skovshoved*. Flor. Maj. & Jun.

426. *C. semidecandrum*, foliis ovatis obtusis; floribus pentandris; petalis calyce brevioribus emarginatis (*caule plerisque vix pollicari*). Flor. Dan. Tab. 1212.

In locis ficcis: *ved Charlottenlund imod Söen; imellem Gjentofte og Jägersborg paa de to smaa Bakker*. Flor. Apr. & Maj.

427. *C. arvense*, foliis lineari-lanceolatis obtusis glabris vel subpubescentibus; corollis calyce majoribus. Flor. Dan. Tab. 626.

In arvis, sepibus: *ved Lyngbye; Sorgenfrie &c.* Flor. Maj. & Jun.

428. *C. aquaticum*, foliis cordatis sessilibus floribus solitariis; fructibus pendulis, caule superne villoso-subviscido, inferne glabro; petalis ad basin usque partitis.

Ad sepes, in umbrosis: *Lundehus-Mose; ved Emdrup*. Flor. Jul. & Aug.

171. *Spergula*.

Calyx pentaphyllus. Petala quinque integra.
Capsula ovata unilocularis quinquevalvis.

429. *S. arvensis*, foliis verticillatis, linearibus
pubescentibus; floribus decandris paniculatis,
post florescentiam reclinatis. Flor. Dan. Tab.

1033.

In agris inter segetes ad vias. Flor. Jun. Jul.
& Aug.

430. *S. nodosa*, foliis oppositis, subulatis, lævi-
bus; caulibus simplicibus. Flor. Danic.
Tab. 96.

In pascuis subhumidis. Flor. Jul. Aug.

431. *S. subulata*, foliis oppositis subsecundis linea-
ri-subulatis carinatis ciliatis; floribus decan-
dris. Flor. Dan. Tab. 858.

In pratis & pascuis siccis. Flor. Jun. Jul. Aug.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

Lythrum. Calyx duodecim dentatus, alternis minoribus. Petala sex calyci inserta. Capsula bilocularis polysperma.

DIGYNIA.

Agrimonia. Calyx duplex: internus quinque-dentatus: externus diphyllus, foliolis trifidis. Petala quinque stellatim patentia. Semina duo, nuda in fundo calycis.

TRIGYNIA.

Reseda. Calyx monophyllus, partitus. Petala quinque laciniata, inæqualia, unico basin mellifero. Capsula ore dehiscens unilocularis.

Euphorbia. Calyx monophyllus ventricosus. Petala quatuor seu quinque, crassa gibba, calyce inserta. Stamina successive prorumpentia. Germen pedicellatum. Capsula tricocca.

DODECAGYNIA.

Sempervivum. Calyx duodecimpartitus, concavus acutus. Petala duodecim lanceolata concava acuta. Capsulæ duodecim, compressæ, breves, polyspermæ.

MONOGYNIA.

172. *Lythrum*.

Calyx duodecimdentatus, alternis minoribus.
 Petala sex calyci inserta. Capsula bilocularis,
 polysperma.

432. *L. Salicaria*, foliis oppositis cordato-lanceo-
 latis acutis pubescentibus; floribus spicatis
 dodecandris. Flor. Dan. Tab. 671.

In fossis humidis, ad rivulos. Flor. Jun. Jul.
 & Aug.

DIGYNIA.

172. *Agrimonia*.

Calyx duplex: internus quinquedentatus:
 externus diphyllus, foliolis trifidis. Petala
 quinque stellatim patentia. Semina duo nuda
 in fundo calycis.

433. *A. Eupatoria*, foliis caulinis pinnatis im-
 pari petiolato villosis: fructibus hispidis.
 (caule erecto simplicissimo hirsuto.) Flor. Dan.
 Tab. 588.

In dumetis, in nemoribus: *ved Bernstorff; Klam-*
penhurg & alibi. Flor. Jul. & Aug.

TRIGYNIA.

174. *Reseda*.

Calyx monophyllus, partitus. Petala quin-
 que laciniata inæqualia, unico ad basin mellif-
 fero. Capsula ore dehiscens, unilocularis.

434. *R. luteola*, foliis lanceolatis integris, basi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis; (caule erecto ramoso.) Flor. Dan. Tab. 864.
In ruderatis, ad vias; ved *Bernstorfsveien*; *Ordrup* &c. Flor. Jun. Jul. & Aug.

175. *Euphorbia*.

Calyx monophyllus ventricosus. Petala quatuor seu quinque, crassa, gibba, calyce inferta. Stamina successive prorumpentia. Germen pedicellatum. Capsula tricocca.

* Umbella trifida.

435. *E. Peplus*, umbella bifida: dichotoma, involuclis ovaris; foliis obovatis integerrimis petiolatis. Flor. Dan. Tab. 1100.
In cultis oleraceis, inter segetes. Flor. Jul. & Aug.

436. *E. exigua*, umbella tri-quadri-quinquefida, dichotoma; involuclis & involuclis ovato lanceolatis basi obliquatis; foliis linearibus sparsis. Flor. Dan. Tab. 592.

Inter segetes haud frequens: ved *Flaskekroen*; *Valbye*; ved *Lygten*. Flor. Jul. & Aug.

** Umbella quinquefida.

437. *E. helioscopia*, umbella quinquefida, trifida, dichotoma; involuclis obovatis; foliis cuneiformibus, ferratis. Flor. Dan. Tab. 725.
In oleraceis, inter segetes. Flor. Jul. Aug.

D O D E C A G Y N I A.

176. *Sempervivum.*

Calyx duodecim partitus, concavus acutus.
Petala duodecim, lanceolata, concava. Cap-
sulæ duodecim compressæ, breves, poly-
permæ.

438. *S. tectorum*, foliis ciliatis; propaginibus pa-
tulis; floribus dodecandris dodecagynis, nec-
tariis cuneiformibus carunculatis. Flor. Dan.
Tab. 60r.

Haud frequens in tectis: Valbye. Flor. Jun.
& Jul.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

Prunus. Calyx quinquefidus, inferus, laciniis concavis obtusiusculis. Corolla pentapetala. Drupa, nucleo compresso, bivalvi integro, futuris prominulis.

DIGYNIA.

Cratægus. Calyx quinquefidus, superus, concavus, patens. Petala quinque subrotunda concava. Bacca carnosa.

TRIGYNIA.

Sorbus. Calyx quinquefidus, superus. Petala quinque. Bacca trisperma.

PENTAGYNIA.

Pyrus. Calyx quinquefidus superus. Petala quinque. Pomum quinqueloculare: loculamentis di-trispermis.

Spiræa. Calyx quinquefidus, inferus. Petala quinque. Capsulæ plures, bivalves polyspermæ.

POLYGNIA.

Rosa. Calyx quinquefidus superus, urceolatus, coll. cœarctatus. Petala quinque. Semina plurima hispida, calycis interiori lateri affixa.

Rubus. Calyx quinquepartitus, inferus. Petala quinque. Bacca composita: acinis monospermis in capitulum collectis.

Fragaria. Calyx decemfidus: laciniis alternis angustioribus. Petala quinque. Receptaculum seminum ovatum pulposum deciduum.

Potentilla. Calyx decemfidus: laciniis alternis minoribus reflexis. Petala quinque. Semina subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsucco affixa.

Tormentilla. Calyx octofidus: laciniis alternis minoribus. Petala quatuor. Semina subrotunda, receptaculo parvo exsucco affixa.

Geum. Calyx decemfidus: laciniis alternis minimis acutis. Semina plurima: arista geniculata.

Comarum. Calyx decemfidus: laciniis alternis minoribus. Petala quinque calyce minora. Receptaculum seminum ovatum, spongiosum, persistens.

M O N O G Y N I A.

177. *Prunus.*

Calyx quinquefidus inferus. Corolla pentapetala. Drupa nucleo compresso bivalvi, integro, futuris prominulis.

439. *P. Padus*, floribus racemosis, racemis pendulis; foliis deciduis duplicato serratis, subrugosis; petiolis biglandulosis. Flor. Danic. Tab. 205.

Ad sepēs, in locis humidis rarius: i *Giærdet imod Dronninggaard's Iudkiørselen*. Flor. Maj. & Jun.

440. *P. Cerasus*, umbellis subpedunculatis; foliis ovato-lanceolatis, glabris, conduplicatis.

In sepibus: *ved Bernstorfsveien hvor Tegloennen har været*. Flor. Jun.

441. *P. avium*, umbellis sessilibus; foliis ovato-lanceolatis, subtus pubescentibus, conduplicatis. Blackw. Herb. Tab. 425.

In sylvis haud frequens: i *Dyrehaven ikke langt fra Klampenborg*.

442. *P. domestica*, pedunculis subsolitariis; foliis lanceolato-ovatis, convolutis, ramis muticis. Blackw. Herb. Tab. 305.

In sepibus: *ved Bernstorfsveien ved de første Gaarde fra Lundehuset*. Flor. Apr. & Maj.

443. *P. spinosa*, pedunculis solitariis; foliis ovato-lanceolatis glabris; ramis spinosis. Flor. Dan. Tab. 926.

In dumetis, sepibus. Flor. Apr. & Maj.

DIGYNIA.

178. *Cratægus*

Calyx quinquefidus, superus, concavus, patens. Petala quinque subrotunda. Bacca carnosa.

444. *C. Oxyacantha*, foliis obtusis subtrifidis serratis glabris; floribus digynis; pedunculis calycibusque subglabriusculis; calycinis segmentis lanceolatis acutis; baccis dispermis. Flor. Dan. Tab. 634.

In sylvis, sepibus frequens. Flor. Jun.

445. *C. monogynæ*, foliis ovatis, acutis, trifidis vel quinquefidis, inciso serratis, glabris; floribus monogynis; pedunculis calycibusque subpubescentibus; calycinis segmentis lanceolatis acuminatis; baccis monospermis. Flor. Dan. Tab. 1162.

In sepibus haud infrequens. Flor. Jun.

- α. *C. denudata*, foliis ovato-oblongis, inciso-serratis, subquinquelobatis, acutis, petiolisque pubescentibus; floribus monogynis; pedunculis calycibusque glabriusculis; ramis subinermibus.

In sepibus, sylvis. Flor. Jun.

TRIGYNIA.

179. *Sorbus*.

Calyx quinquefidus, superus. Petala quinque. Bacca trisperma.

447. *S. aucuparia*, foliis pinnatis utrinque glabris, corymbis terminalibus axillaribusque magnis. Flor. Dan. Tab. 1034.

Passim ad pagos, in nemoribus. Flor. Maj. Jun.

PENTAGYNIA.

180. *Pyrus*.

Calyx quinquefidus, superus. Petala quinque. Pomum quinqueloculare; loculamentis di-trispermis.

448. *P. communis*, foliis ovatis ferratis, pedunculis corymbosis.

In sylvis haud frequens: *i Ermelunds-Skoven*. Flor. Maj. & Jun.

449. *P. malus*, foliis rotundato ovatis ferratis, pubescentibus, umbellis sessilibus. Flor. Dan. Tab. 1101.

In nemore: *Charlottenlund*. Flor. Maj. Jun.

450. *P. Aria*, foliis ovalibus, duplicato ferratis albido-tomentosis; corymbis multifloris planis. Flor. Dan. Tab. 302.

In luo: *ved Fahrumsgaard*. Flor. Maj. Jun.

Est *Cratægus Aria* Lin.

181. *Spiræa*.

Calyx quinquefidus inferus. Petala quinque. Capsulæ plures, bivalves, polyspermæ.

451. *S. Filipendula*, foliis interrupte pinnatis: foliolis uniformibus ferratis; caule herbaceo, pedali; floribus corymbosis. Flor. Dan. Tab. 635.

In pratis graminosis, fruticetis: *Brede Bakker*; ved *Lyngbye-Soe*; *Bagsværd*. Flor. Jun. Jul.

452. *S. Ulmaria*. foliis interrupte pinnatis: foliis ovatis biferratis, subtus canis; caule bitripedali; floribus corymbofo cymosis. Flor. Dan. Tab. 547.

In fossis, pratis uliginosis. Flor. Jun. Jul.

POLYGYNIA.

182. *Rosa*.

Calyx quinquefidus, superus, urceolatus, collo coarctatus. Petala quinque. Semina plurima hispida, calycis interiori lateri affixa.

* Germinibus subglobosis.

453. *R. villosa*, germinibus ovato-globosis pedunculisque hispidis; caule aculeis sparsis; petiolis aculeatis; foliis tomentosis duplicato ferratis: ferraturis glandulosis.

In sepibus haud frequens: imellem *Tuborg* og *Slukefter*; imellem *Springforbie* og *Papiers-Möllen*. Flor. Jun. Jul.

α. *mollissima*, germinibus glabris, foliis villosis.

** Germinibus ovatis.

454. *R. rubiginosa*, germinibus ovatis pedunculisque hispidis, petiolis cauleque aculeatis: aculeis recurvis; foliolis ovatis subtus glanduloso-pilosis. Flor. Danic. Tab. 870.

In sepibus, sylvis: oven for *Haulveicn* imellem *Springforbie* og *Papiers-Möllen*. Flor. Jul.

455. *R. canina*, germinibus ovatis, pedunculisque glabris; caule petiolisque aculeatis. Flor. Dan. Tab. 555.

In sepibus, sylvis, ericetis. Flor. Jun. Jul.

183. *Rubus.*

Calyx quinquepartitus. Petala quinque. Baccæ compositæ: acinis monospermis in capitulum collectis.

* Fruticosi.

456. *R. idæus*, foliis quinato-pinnatis, ternatisque: subtus albido tomentosis; caule aculeato, erecto; petiolis canaliculatis. Flor. Dan. Tab. 788.

In nemoribus, sepibus frequens. Flor. Maj. & Jun.

457. *R. cæsius*, foliis ternatis subnudis: lateralibus bilobis; caule aculeato tereti procumbente. Flor. Danic. Tab. 1213.

Ad vias, in fossis ficcis: *gamle Kiøge Vei; ved Kongeveien til Lyngbye; paa Amager &c.* Flor. Jul. Aug. & Sept.

458. *R. fruticosus*, foliis quinato-digitatis, ternatisque subtus tomentosis; caule petiolisque aculeatis. Flor. Dan. Tab. 1163.

In dumetis, ericetis. Flor. Jun. Jul.

** Herbacei.

459. *R. saxatilis*, foliis ternatis nudis; flagellis reptantibus herbaceis. Flor. Dan. Tab. 134.

Haud frequens in sylvis, fruticetis: paa en Bakke imellem Englehvad-Mølle og Brede; i Hestekiøb-Skov ved Birkerød. Flor. Maj. Jun.

460. *R. Chamæmorus*, (dicicus) foliis simplicibus, lobatis; caule inermi uniflora. Flor. Danie. Tab. 1.

Rarissimus: imellem Ørne, Ørshold og Gorne ved Helsingør. Dn. Czekanowsky.

184. *Fragaria*.

Calyx decemfidus: laciniis alternis angustioribus. Petala quinque. Receptaculum seminum, ovatum, pulposum deciduum.

461. *F. vesca*, calyce fructus reflexo; pubescentia petiolorum patentissima, pedunculorum adpressa. Blackw. Herb. Tab. 77.
In ericetis, sylvaticis, aggeribus. Flor. Maj. Jun.

185. *Potentilla*.

Calyx decemfidus; aciniis alternis minoribus reflexis. Petala quinque. Semina subrotunda nuda; receptaculo parvo exsucco affixa.

* Foliis pinnatis.

462. *P. Anserina*, foliis interrupte pinnatis serratis sericeis; caule repente pedunculis unifloris. Flor. Dan. Tab. 544.

In pratis subhumidis, ad vias, in littore maris frequens. Flor. Maj. Jun. Jul.

** Foliis digitatis.

463. *P. argentea*, foliis quinato-incisis lobis cuneiformibus, supra villosis subtus albido tomentosis; caule suberecto. Flor. Dan. Tab. 865.

Ad vias, in pratis, aggeribus. Flor. Jun. Jul.

464. *P. verna*, foliis radicalibus quinatis, acute ferratis, retusis: caulinis ternatis; caule declinato. Flor. Dan. Tab. 114.

In apricis nemorosis: *Charlottenlund*. Flor. Maj. Jun.

465. *P. reptans*, foliis quinatis; caule repente; pedunculis elongatis unifloris. Flor. Danic. Tab. 1164.

In aggeribus, ad vias, fossas. Flor. æstate.

*** Foliis ternatis.

466. *P. norvegica*, foliis ternatis: foliolis ovato-lanceolatis profunde ferratis piloso hirsutis; caule dichotomo, erecto; pedunculis axillaribus terminalibusque subcorymbosis. Flor. Dan. Tab. 171.

In prate uliginoso: *ved Bernstorff*, in margine piscinæ exsiccatae i *Hirschholm-Skov*. Flor. Jun. Jul. & Aug.

186. *Tormentilla*.

Calyx octofidus, laciniis alternis minoribus. Petala quatuor. Semina subrotunda receptaculo parvo exsucco affixa.

467. *T. erecta*, caule decumbenti ac erectiusculo; foliis sessilibus. Flor. Dan. Tab. 589.

In pratis humidis uliginosis. Flor. Jun. Jul. Aug.

187. *Geum.*

Calyx decemfidus, laciniis alternis minimis acutis. Petala quinque. Semina plurima: arista geniculata.

168. *G. urbanum*, floribus erectis; aristis uncinatis nudis: foliis caulinis ternatis; radicalibus lyrato-pinnatis. Flor. Dan. Tab. 672.

In umbrosis, sylvis, ad sepes. Flor. Jun. Jul.

169. *G. rivale*, floribus nutantibus (petalis obcordatis cuneiformibus) fructu oblongo: aristis plumosis tortis. Flor. Dan. Tab. 722.

In humidis uliginosis turfosis. Flor. Jun. Jul.

a. hybridum, calyce folioso: laciniis dentato-incisis; corolla polypetala; caule humiliore subaphyllo. Jac. icon. rar. 1. tab. 94.

In turfosis: ved Christiansholm legi.

188. *Comarum.*

Calyx decemfidus, laciniis alternis minoribus. Petala quinque calyce minora. Receptaculum feminum ovatum, spongiosum, persistens.

170. *C. palustre*, foliis radicalibus pinnatis; floralibus ternatis vel simplicibus; laciniis calycinis coloratis. Flor. Dan. Tab. 636.

In uliginosis turfosis. Flor. Jun. Jul.

C L A S S I S XIII.
P O L Y A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

Papaver. Calyx diphyllus, caducus. Corolla tetrapetala. Capsula unilocularis sub stigmate persistente poris dehiscens.

Chelidonium. Calyx diphyllus caducus. Corolla tetrapetala. Siliqua unilocularis linearis.

Actæa. Calyx tetraphyllus, caducus. Corolla tetrapetala. Bacca unilocularis. Semina gemino ordine.

Cistus. Calyx pentaphyllus: foliolis duobus minoribus. Corolla pentapetala. Capsula subrotunda apice dehiscens.

Nymphæa. Calyx tetra seu pentaphyllus: foliolis concavis crassis. Corolla polypetala. Bacca multilocularis: loculis monospermis.

Tilia. Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala. Capsula coriacea, globosa, quadriquelocularis, quadri seu quinquevalvis basi dehiscens.

Delphinium. Calyx nullus. Petala quinque.
Nectarium monophyllum sessile postice cornu-
tum. Capsula unilocularis apice dehiscens.

POLYGYNIA.

Thalictrum. Calyx nullus. Petala quatuor
seu quinque. Semina plurima, ecaudata.

Caltha. Calyx nullus. Petala quinque decidua.
Nectaria nulla. Capsulæ plures, polyspermæ.

Trollius. Calyx nullus. Corolla polypetala.
Nectaria linearia. Capsulæ plurimæ.

Anemone. Corolla hexapetala, nuda vel caly-
culata vel involucrata. Semina plurima in
receptaculo elevato.

Ficaria. Calyx triphyllus. Petala octo novem
ungue nectarifero.

Ranunculus. Calyx pentaphyllus. Petala
quinque, ungue nectarifero.

M O N O G Y N I A.

189. *Actæa*.

Calyx tetraphyllus, caducus. Corolla tetrapetala decidua. Bacca unilocularis. Semina gemino ordine, semiorbiculata.

471. *A. spicata*, racemo ovato, fructibus baccatis foliis triternatis seu pinnatis pinnis divaricatis: pinnulis intermediis maximis trilobis trifidisve. Flor. Danic. Tab. 498.

In sylvis, nemoribus umbrosis: *Friderichsdal ved Slottet*; imellem *Ermelundshuus* og *Fortunen* paa høire *Haand*; omkring *Birkerød ved Hestkiøb* og *Eskemoße*. Flor. Maj. Jun.

190. *Chelidonium*.

Calyx caducus diphyllus. Corolla tetrapetala. Siliqua unilocularis, linearis.

472. *C. majus*, pedunculis umbellatis, foliis decursive pinnatis: pinnis incisis obtusis, petalis integris. Flor. Dan. Tab. 542.

In sepibus, ad vias. Flor. Maj. Jun. Jul.

a. laciniatum, pinnis sinuato-pinnatifido-incisis acutis; petalis laciniatis. Flor. Danic. Tab. 676.

I Rosenborg - Have tantum vidi.

191. *Papaver*.

Calyx diphyllus caducus. Corolla tetrapetala. Capsula unilocularis sub stigmate persistente poris dehiscens.

* Capsulis hispidis.

473. *P. Argemone*, capsulis clavatis hispidis, caule folioso multifloro. Flor. Dan. Tab. 867.

Ad vias, inter segetes in aggeribus. Flor. Jun. Jul. Aug.

** Capsulis glabris.

474. *P. Rhoëas*, capsulis subglobosis glabris; caule piloso pilis patentibus; foliis pinnatifido incis. Flor. Lond. Tab. 36.

Inter segetes haud copiose. Flor. Jun. Jul.

475. *P. dubium*, capsulis obovatis glabris; caule multifloro satis adpressis; foliis pinnatifidis incisis. Flor. Dan. Tab. 902.

In aggeribus ad vias intersegetes. Flor. Jun. Jul.

476. *P. somniferum*, capsulis ovato-globosis foliis amplexicaulibus incisis. Blackw. Herb. 482.

In hortis inter oleras, in ruderatis interdum sponte provenit. Flor. Jun. Jul.

192. *Nymphaea*.

Calyx tetra seu pentaphyllus; foliolis concavis crassis. Corolla polypetala. Bacca multilocularis: loculis monospermis.

477. *N. lutea*, foliis cordato-ovatis integerrimis; calyce petalis majore pentaphyllo. Flor. Dan. Tab. 603.

In aquis stagnantibus, lacubus. Flor. Jun. Jul.

478. *N. alba*, foliis cordato-orbiculatis integerrimis; calyce petalis brevioris tetraphyllo. Flor. Dan. Tab. 602.

In stagnantibus, lacubus. Flor. Jun. Jul.

193. *Tilia.*

Calyx quinquepartitus. **Corolla** pentapetala. **Capfula** coriacea, globosa, quadri seu quinquelocularis, quadri seu quinquevalvis, basi dehiscens.

479. *T. europæa*, floribus nectario destitutis. Passim. Flor. Jun. Jul.

α. *parvifolia*. Flor. Dan. Tab. 553.

Nunquam in Selandia, copiose autem in Ulvs-hale Insulæ Monæ vidi.

194. *Cistus.*

Calyx pentaphyllus: foliolis duobus minoribus. **Corolla** pentapetala. **Capfula** subrotunda apice dehiscens.

480. *C. Helianthemum*, suffruticosum procumbens, stipulis lanceolatis; foliis oblongis revolutis subpilosis. Flor. Dan. Tab. 101.

In apricis, dumetis, fruticetis: *Charlottenlund; ved Fuglehvad-Mölle; ved Lyngbye-Søe.* Flor. Jun. Jul. Aug.

195. *Delphinium.*

Calyx nullus. **Petala** quinque. (*Nectarium monophyllum sessile, cum petalo supremo cornutum*). (*Capfula unilocularis, apice dehiscens.*)

481. *D. Consolida*, foliis multifidis, trifidis bifisque, laciniis linearibus; racemis paucifloris. Flor. Dan. Tab. 683.

Inter segetes haud infrequens: *ved Vangehuset &c.* Flor. Jun. Jul. Aug.

POLYGYNIA.

196. *Thalictrum*.

Calyx nullus. Petala quatuor seu quinque.
Semina plurima ecaudata.

482. *T. flavum*, caule folioso fulcato panicula (corymbiformi) multiplici erecta. Flor. Danic.
Tab. 939.

Haud frequens in maritimis: ved *Flaskekroen*.
Flor. Jun. Jul.

483. *T. dubium*? caule erecto, simplici, pedali
haud ultra, fulcato-friato, folioso glabro;
foliis pinnatis; inferioribus subbipinnatis gla-
bris: foliolis cuneatis intermediis trifidis, ra-
rius quadriidis, lateralibus bifidis subtrifidis,
acutis, subtus venis reticulatis prominenti-
bus; panicula coarctata erecta; floribus parvis
subnutantibus; stigmatibus purpurascens; se-
minibus quatuor-quinque vel sex, ovato-
gibbosis costatis, sessilibus.

Rarius in pratis & arvis ficcis: forbie *Flaskekroen*
imod *Stranden*. Flor. Jun. Jul.

197. *Caltha*.

Calyx nullus. Petala quinque decidua. Nec-
taria nulla. Capsulæ plurimæ, polyspermæ.

484. *C. patulifris*, caule erecto, (subdecumbenti);
foliis cordato orbiculatis crenatis nitidis. Flor.
Dan. Tab. 668.

In pascuis humidis. Flor. Maj. Jun.

198. *Trollius*.

Calyx nullus. Corolla polypetala. Nectaria linearia. Capsulæ plurimæ.

485. *T. europæus*, corollis conniventibus; nectariis longitudine flaminum. Fl. Dan. Tab. 133.
In pratis & pascuis humidis, rarius collinis ficcis.
Flor. Jun.

199. *Anemone*.

Corolla hexapetala (*nuda vel calyculata vel involucrata*). Semina plurima in receptaculo elevato, (*caudata vel ecaudata*).

* Flore calyculato.

486. *A. Hepatica*, foliis trilobis integerrimis; (*involucro triphylo flori approximato*). Flor. Dan. Tab. 610.

In nemoribus: *Charlottenlund* & alibi. Flor. Apr. & Maj.

** *Pulsatillæ*. Flore pedunculo involucrato; petalis extus sericeis; seminibus caudatis.

487. *A. Pulsatilla*, petalis rectis; foliis bipinnatis hirsuto-pilosis. Flor. Dan. Tab. 153.

In apricis sylvaticis: *Charlottenlund* imod *Söen*. Flor. Maj. & Jun.

488. *A. pratensis*, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis rigidis hirsuto-sericeis. Flor. Dan. Tab. 611.

In pratis & collinis ficcis: *Fuglehvad-Mölle*; *Brede-Bakker*; *Bagsværd*; imellem *Friderichsdal* og *Kaninholmen*. Flor. Jun.

*** Anemoideæ. Flore nudo feminibus
e-caudatis.

489. *A. nemorosa*, feminibus acutis; foliis caulinis ternis incisfis petiolatis; caule unifloro. Flor. Dan. Tab. 549.

In nemoribus, sylvis, ericetis. Flor. Apr. Maj. & Jun.

490. *A. ranunculoides*, feminibus acutis; foliis caulinis ternis incisfis (laciniis præcedenti angustioribus) subsessilibus; caule subbifloro. Flor. Dan. Tab. 140.

In sylvis nemoribus haud vulgatissima: Charlottenlund. Flor. Maj. Jun.

200. *Ficaria*. Roth.

Calyx triphyllus. Petala octo-novem, ungue nectarifero.

491. *F. ranunculoides*, radice tuberosa; foliis cordatis, angulatis, petiolatis; caule unifloro. Flor. Dan. Tab. 499.

In umbrosis humidis. Flor. Apr. Maj. Jun.

201. *Ranunculus*.

Calyx pentaphyllus. Petala quinque ungue nectarifero.

* Foliis simplicibus.

492. *R. Flammula*, foliis ovato-lanceolatis (integerrimis vel dentatis) caule declinato subprostrato. Flor. Dan. Tab. 575.

In pratis humidis ac aliginosis. Flor. æstate.

493. *R. reptans*, foliis linearibus; caule repente, articulis radican- tibus, foliosis, floriferis; pedunculis solitariis. Flor. Dan. Tab. 108.

Ad ripas lacuum: *Endrup og Fuursøe*. Flor. Jun. Jul.

494. *R. Lingua*, foliis lanceolatis, pilis brevissimis adpressis; caule erecto pubescenti. Flor. Danic. Tab. 775.

Ad ripas lacuum, in aquis stagnantibus: i *Lundehuns-Mosen*; ved *Lyngbye-Søe* &c. Flor. Jul. & Aug.

** Foliis dissectis & divisis.

495. *R. auricomus*, foliis radicalibus reniformibus crenatis incis: caulinis digitatis linearibus; caule multifloro. Flor. Dan. Tab. 665.

In pratis & pascuis humidis, nemoribus. Flor. Maj. Jun.

496. *R. sceleratus*, foliis inferioribus palmatis, summis digitatis; fructibus oblongis. Flor. Dan. Tab. 571.

In paludibus, ad rivulos. Flor. Jun. Jul.

497. *R. bulbosus*, calycibus retroflexis acutis; pedunculis sulcatis; caule erecto multifloro (*radice globosa, bulbiformi*). Flor. Dan. Tab. 551.

In pascuis, pratis, aggeribus. Flor. Jun. Jul.

498. *R. Philonotis*, calycibus retroflexis, acumina- tis, papilloso hispida; foliis ternatis: foliolis trilobis, crenato incis hispida.

Rarius in pascuis humidis: ved *Flaskekroen*; *Uterslev*. Flor. Jun. & Jul. ved *Perslø* copiosior.

499. *R. repens*, calycibus patulis; pedunculis sulcatis; sarmentis repentibus; foliis compositis pubescentibus. Flor. Dan. Tab. 795.

Ad fossas, in cultis. Flor. æstate.

500. *R. acris*, calycibus patulis; pedunculis teretibus; foliis tripartito-multifidis: summis linearibus; caule erecto pilis adpressis.

In pratis, pascuis. Flor. æstate.

501. *R. arvensis*, feminibus aculeatis; foliis superioribus decompositis linearibus; caule erecto dichotomo. Flor. Dan. Tab. 219.

Inter segetes: in Selandia nunquam vidi, Insula Mona autem copiosissime. Flor. Jun. Jul.

502. *R. aquatilis*, foliis emerfis reniformibus; lobatis, lobis crenulatis; submersis capillaribus.

In lacubus, aquis stagnantibus. Flor. Jun. Jul.

& Aug.

α. orbiculatus, foliis omnibus capillaribus multifidis laciniis setaceis æqualibus circumscriptione rotunda, pedunculis elongatis bipollicaribus; petalis calyce majoribus.

β. phellandrifolius, foliis omnibus capillaribus multifidis laciniis setaceis inæqualibus; pedunculis semiuncialibus unifloris; petalis calyce haud æqualibus, vel brevioribus.

γ. peucedanifolius, foliis omnibus multipartito-multifidis; laciniis setaceis divaricatis inæqualibus longissimis; pedunculis pollicaribus haud ultra; petalis calyce majoribus.

CLASSIS XIV.
DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

* Calyces subquinquefidi.

Verbena. Calyx (*quadridentatus*) {quinquedentatus: dente unico truncato. Stigma obtusum, inferne dente præditum.

Leonurus. Corollæ labium superius integrum, fornicatum. Antheræ punctis nitidis adpersæ.

Glecoma. Corollæ labium superius bifidum. Antherarum paria cruciata.

Mentha. Corollæ subæquales. Filamenta distantia recta.

Ajuga. Corollæ labium superius minimum, emarginatum, flaminibus brevius.

Betonica. Corollæ labium superius adscendens, planum: tubus incurvus. Stamina longitudine faucis.

Lamium. Corollæ labium superius integrum: labium inferius ad faucem utrinque dente fetaceo.

Galeopsis. Corollæ labium superius subcrenatum: labium inferius, ad faucem utrinque denticulo obtusiusculo concavo.

Pollichia. Corollæ labium superius integrum: labium inferius absque dentibus ad faucem.

Stachys. Corollæ labium inferius lateribus reflexum. Stamina deflorata ad latera deflexa.

Nepeta. Corollæ labium inferius trifidum lacinia intermedia crenata. Faux margine reflexo.

Ballota. Calyx decemstriatus. Corollæ labium superius fornicatum: labii inferioris lacinia intermedia emarginata.

Marrubium. Calyx decemstriatus. Corollæ labium superius lineari bifidum.

** Calyces bilabiati.

Scutellaria. Calyx fructiferus operculatus.

Thymus. Calyx fauce villis clausus.

Prunella. Filamenta omnia apice bifurcata.

Origanum. Strobilus calyces colligens.

Clinopodium. Involucrum calyces colligens.

ANGIOSPERMIA.

* Calyces quadrifidi.

Lathræa. Capsula unilocularis. Corolla personata. Glandula sub germine.

Euphrasia. Capsula bilocularis. Corolla personata. Antheræ inferiores altero lobo basi spinosæ.

Rhinanthus. Capsula bilocularis, compressa.
Corolla personata.

Melampyrum. Capsula bilocularis. Corolla
personata. Semina bina gibbosa.

** Calyces quinquefidi.

Limosella. Capsula unilocularis. Corolla campanulata, regularis. Semina plurima.

Scrophularia. Capsula bilocularis. Corolla
resupinata.

Antirrhinum. Capsula bilocularis. Corolla
personata, subtus nectario prominente.

Pedicularis. Capsula bilocularis mucronata.
Corolla personata.

GYMNOSPERMIA.

202. *Verbena*.

Calyx (*quadidentatus tetragonus*) quinque-
dentatus: denticulo superiore intermedio
truncato. **Corolla** quinquefida; tubo incurvo.
Stamina intra tubum incurva. **Stigma** obtu-
rum inferne denticulo præditum.

503. *V. officinalis*, spicis filiformibus paniculatis;
foliis multifido laciniatis, caule solitario ra-
moso. Flor. Dan. Tab. 628.

Ad pagos haud frequens: *ved Friderichsdals-
Mølle; Fredensborg*. Flor. Jun. Jul. Aug.

203. *Leonurus*.

Calyx pentagonus quinqueidentatus. **Corollæ**
labium superius fornicatum, integrum. **An-**
theræ punctis nitidis adspersis.

504. *L. Cardiaca*, foliis caulinis lanceolatis trifidis.
Flor. Dan. Tab. 727.

In sepibus ad pagos. Flor. Jul. Aug.

204. *Glecoma*.

Calyx cylindricus quinquefidus. **Corollæ** la-
bium superius bifidum. **Antherarum** paria
cruciata.

505. *G. hederacea*, foliis reniformibus crenatis;
caule repente radicante. Flor. Dan. Tab. 789.

In pratis, dumetis, sepibus. Flor. Daj. Jun.

205. *Mentha.*

Corolla quadrifida subæqualis. Filamenta erecta distantia.

506. *M. aqualica*, floribus capitatis, foliis ovatis, ferratis, petiolatis; staminibus corolla longioribus, Icon 673. Fior. Dan. plantam hanc male monstrat.

In locis humidis, paludosis, ad rivulos. Flor. Jul. Aug.

a. foliis subsessilibus, staminibus corolla brevioribus; calycibus minus hirsutis.

507. *M. hirsuta*, floribus capitatis, foliis ovatis ferratis subsessilibus, pubescentibus, staminibus corolla longioribus.

In locis humidis: ved Birkeröd. Flor. Jul. Aug.

508. *M. sativa*, floribus verticillatis; foliis ovatis acutis ferratis, staminibus corollis longioribus. Flor. Dan. Tab. 794.

In pratis subhumidis, paludibus. Flor. Jul. Aug. Sept.

509. *M. arvensis*, floribus verticillatis; foliis ovatis acutis, ferratis; staminibus corollam æquantibus. Flor. Dan. Tab. 512.

In agris, pratis ficcis. Flor. Jul. Aug. Sept.

206. *Ajuga.*

Corollæ labium superius minimum, emarginatum, staminibus brevius.

510. *A. pyramidalis*, tetragono-pyramidalis villosa; foliis radicalibus maximis. Flor. Dan. Tab. 185.

Rarius: *imellem Örshold og Gorne ved Helsingör.*
Dn. Czekanovsky. Flor. Maj. Jul.

511. *A. reptans*, glabra, stolonibus reptantibus;
foliis obovatis crenatis inferioribus petiolatis
superioribus sessilibus. Flor. Dan. Tab. 925.

In nemorosis atque humidi locis: *ved Friderichs-*
dals-Slot; i Frideriehsberg's Have. Flor. Maj. Jun.

207. *Betonica.*

Corollæ labium superius adscendens, planum:
tubus cylindricus incurvus.

512. *B. officinalis*, spica interrupta: corollarum
labii lacinia intermedia emarginata. Flor. Dan.
Tab. 726.

In lylve: *ved Sophienberg Dn. Holten.* Flor.
Jun. Jul.

208. *Lamium.*

Corollæ labium superius integrum fornicatum:
labium inferius bilobum ad faucem utrinque
dente setaceo.

513. *L. album*, foliis cordatis, acuminatis, serratis,
petiolatis; verticillis multifloris. Flor.
Dan. Tab. 594.

In cultis & ruderatis, ad sæpes fere ubique.
Flor. Maj. Jun.

514. *L. purpureum*, foliis cordatis, crenatis, obtusis,
petiolatis; verticillis approximatis.
Flor. Dan. Tab. 523.

In cultis, aggeribus, ad vias. Flor. Maj. Jun. Jul.

- a. moluccellaefolium*, caulibus crassioribus simplicibus, inferne subramosis, subnudis: foliis cordatis inciso-lobatis, obtusiusculis, pubescentibus, in petiolum decurrentibus; floribus verticillatis: verticillo infimo valde remoto; calycibus campanulatis: laciniis acuminatis patulis.

In aggeribus rarior: *ved Joachimsdal paa Veier til Constantia.* Flor. Jun. Jul.

209. *Gallopsis.*

Corollæ labium superius, subcrenatum, fornicatum: labium inferius ad faucem utrinque denticulo obtusiusculo concavo.

515. *G. Ladanum*, internodiis caulinis æqualibus: verticillis omnibus remotis; calycibus inermibus; (*bracteis linearibus in spinam nitidam desinentibus.*)

In arvis, ad margines agrorum. Flor. Jul.

416. *G. Tetrakit*, internodiis caulinis superne in-crassatis; verticillis subcontiguis; calycibus pungentibus.

In ruderatis, arvis, agris. Flor. Jun. — Sept.

- a. lavigata*, caule ramisque superne pilis rigidis, inferne glabro; internodiis in-crassatis geniculis rarissime pilosis.

517. *G. canabira*, verticillis summis subcontiguis calycibus tubulosis, dentibus paulo brevioribus linearibus, inæqualibus tribus majoribus. Flor. Dan. Tab. 929.

Inter segetes, in arvis, cultis. Flor. Jun. — Sept.

210. *Pollichia.*

Corollæ labium superius integrum labium inferius absque dentibus ad faucem.

518. *P. Galeobdolon*, calycibus pungentibus, corollæ labio inferiore trifido; foliis omnibus dentatis cordatis petiolatis.

In nemorosis, sepibus: *ved Kongshvile paa Vejen til Friderichsdal; Odsherred. Dn. Markussen. Flor. Jul. Aug. Est Galeopsis Galeobdolon Lin.*

519. *P. amplexicaulis*, calycibus inermibus; corollæ labio inferiore bifido; foliis caulinis sessilibus, rotundatis, incisis: radicalibus petiolatis, cordato-lobatis. Flor. Dan. Tab. 752.

In ruderatis, aggeribus, agris, cultis. Flor. Maj. — Aug. Est *Lamium amplexicaule Lin.*

211. *Stachis.*

Corollæ labium superius fornicatum: labium inferius lateribus reflexum: lacinia intermedia majore emarginata. Stamina deflorata latera reflexa.

520. *S. sylvatica*, verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. Flor. Dan. Tab. 1102.

In nemoribus, sepibus humidis. Flor. Jun. Jul. & Aug.

521. *S. palustris*, verticillis sexfloris, foliis lineari-lanceolatis semiamplexicaulibus sessilibus. Fl. Dan. Tab. 1103.

In arvis ad fossas. Flor. Jul. Aug.

522. *S. arvensis*, verticillis tri- ex loris; folii cordato-ovatis obtusis utrinque villosis; corollis longitudine calycis; caule debili. Flor. Dan. Tab. 567.

In arvis & agris ficcis arenosis: imellem Charlottentlund og Skovshoved. Flor. Jul. Aug.

213. *Nepeta*.

Corollæ labium inferius trifidum, lacinia intermedia crenata: faux margine reflexo.

523. *N. Cataria*, floribus spicatis; verticillis subpendunculatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ferratis. Flor. Dan. Tab. 580.

In sepibus, ad pagos. Flor. Jul. Aug.

213. *Ballota*.

Corolla labium superius fornicatum: labii inferioris lacinia intermedia emarginata. Calyx decemstriatus.

524. *B. nigra*, foliis cordatis incisfis ferratis; calycibus acuminatis. Blackw. Herb. Tab. 136.

Ad pagos, vias. Flor. Jul. Aug.

214. *Marrubium*.

Corollæ labium superius bifidum, lineare rectum. Calyx decemstriatus.

525. *M. vulgare*, dentibus calycinis setaceis uncinatis; verticillis glöbuliferis; foliis rotundato-ovatis, incanis, rugosis. Flor. Dan. Tab. 1036.

Ad pagos, in ruderatis. Flor. Jul. Aug.

215. *Scutellaria.*

Calyx ore integro, post florescentiam clauso operculato.

526. *S. galericulata*, foliis cordato-lanceolatis, crenatis; floribus axillaribus plerumque geminis, secundis. Flor. Dan. Tab. 637.

In locis humidis, nemorosis, fossis. Flor. Jul. & Aug.

α. caule ramosissimo villosa.

216. *Thymus.*

Calyx fauce villis clausis.

527. *T. Serpillum*, floribus capitatis; caulibus repentibus; foliis planis obtusis, basi ciliatis. Flor. Dan. Tab. 1165.

In apricis aridis, collinis sylvis ericetosis. Flor. æstate.

α. *ciliatum*, foliis usque ad apicem ciliatis.

β. *majus*, caulibus erectis, basi decumbentibus, fere pedalibus; foliis oblongo-ovatis longe petiolatis; staminibus corollam superantibus.

γ. *hirsutum*, caule foliisque undique pilosis; spicis capitatis hirsutissimis.

528. *T. Acinos*, floribus verticillatis, pedunculis unifloris; caulibus erectis subramosis; foliis acutis serratis. Flor. Dan. Tab. 814.

In pratis siccis: imellem Fröken Browns Gaard og Ordrup. Flor. Jun. Jul. Aug.

217. *Prunella.*

Filamenta omnia apice bifurcata.

529. *P. vulgaris*, foliis omnibus ovato-oblongis, ferratis petiolatis. Flor. Dan. Tab. 910.

In fossis, pratis, pascuis. Flor. Jul. Aug. Sept.

218. *Origanum.*

Strobilus tetragmus, spicatus, calyces colligens.

530. *O. vulgare*, spicis subrotundis paniculatis, conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. Flor. Dan. Tab. 638.

In dumetis fruticetis: *Charlottenlund; ved Papiers-Mölle & aliis locis.* Flor. Jul. Aug.

219. *Clinopodium.*

Involucrum multifetum verticillo subjectum. Calyx superne contractum.

531. *C. vulgare*, capitulis subrotundis hispidis, bracteis setaceis. Flor. Dan. Tab. 930.

In dumetis, fruticetis: *ved Birkeröd &c.* Flor. Jul. Aug.

ANGIOSPERMIA.

220. *Lathræa.*

Corolla personata. Glandula depressa ad basin futuræ germinis. Stigma truncatum. Capsula unilocularis.

532. *L. squamaria*, caule simplicissimo; corollis pendulis: labio inferiore trifido. (*radice ramo-*

fissima, squamis carnosis dense tecta.) Flor.
Dan. Tab. 136.

In nemorosis coryletis præprimis: *Charlotten-*
lund; Jagersborg; Dyrehaven. Flor. Maj. &
initio Jun.

221. *Euphrasia.*

Corolla perfo- rata. Antheræ inferiores altero
 lobo basi spinosæ. Capsula bilocularis.

533. *E. officinalis*, foliis ovatis, lineatis, argute
 dentatis. *Flor. Dan. Tab. 1037.*

In pratis & pascuis humidis. *Flor. Jul. Aug.*

534. *E. Odonites*, foliis linearibus, omnibus ser-
 ratis. (*Spicis foliosis secundis*). *Flor. Dan. Tab.*
655.

In pratis humidiusculis; inter segetes. *Flor. Jul.*
& Aug.

222. *Rhinanthus.*

Calyx ventricosus. Corolla perforata. Cap-
 sula bilocularis compressa.

535. *R. Crista galli*, corollarum labio superiore
 compresso, brevior; calycibus glabris (*sub-*
pubescentibus). *Flor. Dan. Tab. 581.*

In pratis humidis, pascuis; inter segetes. *Flor.*
Jun. & Jul.

α. parviflorus, corollis parvioribus, corolla-
 rum labiis superioribus magis compressis,
 fusco vel violaceo striatis.

In pascuis humidis cum præcedente.

223. *Melampyrum.*

Corolla personata: labio superiore compresso, margine replicato. Capsula bilocularis obliqua hinc dehiscens. Semina bina gibbosa.

536. *M. cristatum*, spicis quadrangularibus: bracteis cordatis, compactis, denticulatis, imbricatis. Flor. Dan. Tab. 1104.

In fruticetis, dumetis: *paa Brede-Bakker; ved Flafkekroen.* Flor. Jun. Jul. Aug.

537. *M. arvense*, spicis conicis laxis: bracteis dentato setaceis coloratis. Flor. Dan. Tab. 911.

Inter segetes: *ved Ordrup, Friderichsberg; Birkeröd.* Flor. Jun. Jul.

538. *M. nemorosum*, floribus secundis lateralibus: bracteis dentatis, cordato-lanceolatis, summis coloratis sterilibus; calycibus lanatis. Flor. Dan. Tab. 305.

In nemorosis, fruticetis: *paa Brede-Bakker; ved Papiers-Möllen.* Flor. Jul. Aug.

539. *M. pratense*, floribus secundis, lateralibus foliorum conjugationibus remotis; corollis clausis.

In pratis, locis nemorosis, fruticetis. Flor. æstate.

224. *Pedicularis.*

Corolla personata: labio superiore compresso. Capsula bilocularis, obliqua, mucronata. Semina tunicata.

540. *P. polustris*, caule ramoso, erecto; calycibus cristatis, calloso-punctatis; corollis labio obliquis. Bull. Herb. Tab. 129.

In pratis & pascuis ubique. Flor. Jun. Jul.

541. *P. sylvatica*, caulibus cespitosis procumbentibus, subramosis; calycibus oblongis angulatis, lævibus; corollis labio cordato. Lobel. Icon. pag. 748.

In pratis sylvaticis rarior: i *Skoven imellem Rudergaard og Dumpedals Mølle*. Flor. Maj. Jun.

225. *Antirrhinum.*

Calyx pentaphyllus. Corolla personata subtus nectario prominente. Capsula bilocularis.

542. *A. Elatine*, foliis hastatis alternis; caulibus procumbentibus; floribus axillaribus; nectariis calcaratis subulatis rectis. Flor. Dan. Tab. 426.

In fossis, aggeribus rarius: ved *Flaskekroen*. Flor. Jul. Aug.

543. *A. minus*, foliis plerisque alternis lanceolatis obtusis; caule ramosissimo diffuso; floribus axillaribus; nectariis conicis obtusis rectis. Flor. Dan. Tab. 502.

In cultris, agris: i *Hirschholmshave ved Springvandet*; ved *Flaskekroen* haud frequens. Flor. Jul. & Aug.

544. *A. Linaria*, foliis lanceolato linearibus confertis caule erecto; spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis: nectariis conicis subulatis subcurvatis longis. Flor. Dan. Tab. 982.

In aggeribus, ad vias frequens. Flor. Jun. Jul. & Aug.

545. *A. Orontium*, foliis lanceolatis obtusis subpilosis; caule erecto subramoso; floribus axillaribus; nectariis scrotiformibus obtusis. Flor. Dan. Tab. 941.

In arvis, agris haud frequens: ved Flaskekroen; paa Amager; omkring Roeskilde Kroe. Flor. Jul. & Aug.

226. *Scrophularia*.

Corolla resupinata: tubo subgloboso labio inferiore intus squamula accessoria aucto: labii superioris lacini intermedia ad tubum reflexa. Capsula bilocularis.

546. *S. nodosa*, foliis cordatis trinervatis; caule obtusangulo. Flor. Dan. Tab. 1167.

Ad sepes, vias, in nemoribus, sylvis. Flor. Jun. & Jul.

547. *S. aquatica*, foliis cordatis petiolatis, decurrentibus obtusis; caule membranis angulato; racemis terminalibus. Flor. Dan. Tab. 507.

In fossis humidis, ad aquas rarior: uden for Kastellet ved Claffens Have. Flor. Jul. Aug.

227. *Limosella.*

Corolla campanulata, regularis. Capsula unilocularis. Semina plurima.

548. *L. aquatica*, caulibus repentibus, radican-
tibus; foliis lanceolatis in petiolum longum de-
currentibus. Flor. Dan. Tab. 69.

In locis inundatis, sabulosis: ved Charlotten-
lund; ved Birkeröd; ved Flaskekroe. Flor. Jul.
Aug. Sept. Octobr.

 CLASSIS XV.

 TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

* Silicula integra, non emarginata.

Crambe. Silicula unilocularis, monosperma, decidua: valvis nullis.

Myagrum. Silicula stylo terminata; valvis concavis: loculo submonospermo.

Draba. Silicula valvis planiusculis. Stylus nullus.

Cochlearia. Silicula turgida: loculis polyspermis.

** Silicula emarginata.

Iberis. Silicula: loculis monospermis. Petala duo, exteriora majora.

Lepidium. Silicula: valvis acute carinatis: loculis monospermis.

Thlaspi. Silicula: valvis marginato-carinatis: loculis polyspermis.

SILIQUOSA.

Cakile. Siliqua brevis, subtetraedra: loculis submonospermis.

Erysimum. Siliqua tetraedra.

Turritis. Siliqua teres angulosa: dissepimento
valvis subæqual.

Sisymbrium. Siliqua teres: valvis rectiusculis,
dissepimento æqualibus.

Rahpanus. Siliqua teres, articulata.

Brassica. Siliqua cylindracea: dissepimento
valvis longiore. Calyx connivens.

Sinapis. Siliqua rostrata, dissepimento valvis
longiore. Calyx patens.

Arabis. Siliqua linearis compressa, apice capi-
tato.

Hesperis. Siliqua compresso-plana. Stigma
basi bifurcatum.

Cardamine. Siliqua valvis revoluta-dehiscen-
tibus: dissepimento membranaceo.

Dentaria. Siliqua marginata, valvis revoluta-
dehiscen-
tibus: dissepimento fungoso.

SILICULOSA.

228. *Crambe.*

Silicula evalvis, ovata obtusa, unilocularis monosperma, decidua. Filamenta quatuor longiora apice bifurcata.

549. *C. maritima*, foliis cordato-ovatis, sinuatis inciso-ferratis, cauleque glabris. Flor. Dan. Tab. 316.

In maritimis: ved Helsingör; ved Ods-Herred. Dn. Markussen. Flor. Jun. Jul.

229. *Myagrum.*

Silicula stylo terminata: valvis concavis loculo submonospermo.

550. *M. fativum*, filiculis obovatis pedunculatis polyspermis. Flor. Dan. Tab. 1038.

Inter Linum in agris haud frequens. Flor. Jul. & Aug.

551. *M. paniculatum*, filiculis lentiformibus orbiculatis, punctato rugosis. Flor. Dan. Tab. 204.

In oleraceis, inter segetes passim. Flor. Jun. Jul. Aug.

230. *Draba.*

Silicula ovali-oblonga, stylo destituta: valvis planisculis dissepimento parallelis.

552. *D. verna*, scapis ramosis nudis; foliis subseratis ovali lanceolatis pubescentibus. Flor. Dan. Tab. 983.

In arvis, pratis, agris tempore vernali vulgatissima.

231. *Cochlearia.*

Silicula turgida, stylo coronata, glabra, vel muricata: valvis gibbis: loculis polyspermis.

553. *C. officinalis*, foliis radicalibus cordato-subrotundis; caulinis oblongis subsinuatis; filiculis ovatis subrugosis. Flor. Dan. Tab. 135.

In littore maris: imellem Kasketlet og Constantia. Flor. Jun.

554. *C. danica*, foliis hastato-angulatis: omnibus deltoidibus; filiculis ovato-rotundis, glabriusculis. Flor. Dan. Tab. 100.

Haud vulgatissima in maritimis: lige over for Charlottenlund paa Mulvarpe-Tuerne. Flor. Apr. & Maj.

555. *C. Coronopus*, foliis pinnatifidis; caule depresso; racemis lateralibus, floribus confertis; filiculis subcompressis muricatis. Flor. Dan. Tab. 202.

In fossis humidiusculis: uden for Amager-Port; i Grøfterne ved Øster og Nørre Alle &c. Flor. Jun. Jul.

232. *Iberis.*

Corolla irregularis: petalis duobus majoribus. Silicula compressa: septo contrario: loculis monospermis.

556. *I. nudicaulis*, herbacea, foliis sinuatis in orbem digestis, depressis; caule subnudo simpliciter. Flor. Dan. Tab. 323.

In apricis, arvis, arenosis locis: paa Veien til Charlottenlund hvor Grantræer staaer; imellem Fuglehvad Mølle og Brede Bakker. Flor. Jun. & Jul.

233. *Lepidium.*

Silicula: valvis acute carinatis: loculis monospermis.

557. *L. latifolium*, foliis ovato-lanceolatis integris, ferratis; filiculis ovatis vix emarginatis, Flor. Dan. Tab. 557.

In littore maris *Amagriæ* tantum vidi. Flor. Jun. Jul. & Aug.

558. *L. ruderale*, floribus diandris apetalis: foliis radicalibus dentato-pinnatis ramifris linearibus integerrimis; filiculis compressis emarginatis. Flor. Danic. Tab. 184.

In ruderatis, ad vias: uden for Byens Porte. Flor. Jun. Jul. & Aug.

234. *Thlaspi.*

Silicula: valvis emarginato-carinatis vel simpliciter carinatis; navicularibus: loculis polyspermis.

559. *T. arvense*, filiculis orbiculatis compressis glabris. Flor. Dan. Tab. 793.

In agris, ad vias, in cultis. Flor. Maj. Jun. Jul.

560. *T. campestre*, filiculis subrotundis, compressiusculis subpubescentibus; foliis sagittatis dentatis incanis. Flor. Dan. Tab. 1221.

In arvis & pratis haud frequens: *ved Bernstorf.*
Flor. Jun. Jul.

561. *T. Bursa pastoris*, filiculis obcordatis margine
membranaceo destitutis; foliis radicalibus pin-
natifidis dentatis: caulinis sagittatis. Flor.
Dan. Tab. 729.

In cultis, ruderalis, ad vias ubique. Flor. æstate.

SILIUOSA.

235. *Cakile*. Roth.

Siliqua brevis subtetraëdra: angulis duobus
eminentioribus: loculis submonospermis.

562. *C. maritima*, foliis carnosis dentatis obtusis
sessilibus; caule erecto ramis diffusis. Flor.
Dan. Tab. 1168.

Bunias Cakile filiculis ovatis lævibus ancipiti-
bus Lin.

In maritimis haud frequens: *paa Amager; imel-
lem Kastellet og Vebek.* Flor. Jul.

Variat foliis pinnatifidis laciniis linearibus
obtusis.

235. *Erysimum*.

Calyx clausus. Siliqua columnaris tetraëdra.

563. *E. officinale*, foliis runcinatis caule ramoso
divaricato; filiquis subtetraëdris subulatis ad-
pressis. Flor. Dan. Tab. 560.

In ruderalis, ap vias, pagos. Flor. Jul. Aug.

564. *E. Barbarea*, foliis lyratis, extimo subro-
tundo: caule erecto anguloso glabro; filiquis

linearibus, obsolete tetragonis strictis acuminatis. Flor. Dan. Tab. 985.

Haud frequens in humidis. Flor. Maj. Jun. Jul.

565. *E. Alliaria*, foliis cordatis; caule erecto sub-simpl. cissimo; filiquis tetraedris linearibus longis erecto-patentibus. Flor. Dan. Tab. 935.

In umbrosis, dumetis subhumidis; ved Grøften i Friderichsberg Allee; ved Jägersborg. Flor. Jun. & Jul.

566. *E. Cheyrantoides*, foliis lanceolatis integerrimis; caule erecto ramosissimo; filiquis patulis. Flor. Dan. Tab. 923.

In ruderatis rarior: paa Österfælled ved Salpeterværket. Flor. Jun. Jul.

237. *Turritis.*

Siliqua teres angulosa: dissepimento valvis subæquali.

567. *T. glabra*, foliis radicalibus dentatis hispidis, caulinis integerrimis, amplexicaulibus, glabris. Flor. Dan. Tab. 809.

In sepibus ad vias haud infrequens. Flor. Jun. & Jul.

568. *T. hirsuta*, foliis omnibus hispidis, caulinis amplexicaulibus; filiquis compressiusculis. Flor. Dan. Tab. 1040.

Rarior in pratis humidiusculis, nec non in collinis ficcis: ved Bernstorfs Mose; paa de smaa Bakker imellem Gientofte og Jägersborg. Flor. Maj. & Jun.

238. *Sisymbrium.*

Calyx patens. Corolla patens: unguibus minimis. Siliqua teres dehiscens: valvulis rectiusculis dissepimento fere æqualibus.

569. *S. Nasturtium*, filiquis declinatis; foliis pinnatis: foliolis subcordatis. Flor. Dan. Tab. 690.

Ad scaturigines, fossas. Flor. Jun.

570. *S. amphibium*, filiquis declinatis oblongo-ovatis; petalis calyce majoribus.

Ad fossas, in pratis humidis. Flor. Jun. Jul.

α. aquaticum, foliis omnibus dentatis vel inciso-ferratis. Flor. Dan. Tab. 984.

β. terrestre, foliis inferioribus simplicibus superioribus pinnatifidis vel lanceolatis.

γ. paludosum, foliis superioribus lanceolatis, mediis laciniatis vel incis, inferioribus denticulatis, acutis. Lobel Icon. p. 319.

571. *S. palustre*, filiquis declinatis oblongo-ovatis foliis pinnatifidis ferratis; petalis calyce minoribus vel æqualibus. Flor. Dan. Tab. 409.

Ad fossas in pratis humidis. Flor. Jun. Jul.

572. *S. Sophia*, petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis. Flor. Dan. Tab. 528.

In ruderatis fere ubique. Flor. Jun. Jul. Aug.

239. *Raphanus.*

Siliqua teres, torosa, subarticulata.

573. *R. Raphanistrum*, filiquis teretibus articulatis lævibus unilocularibus; foliis ovatis denticulatis

obtusis basi plerumque pinnatifidis, hispidis.

Flor. Dan. Tab. 678.

Inter segetes. Flor. æstate.

240. *Brassica.*

Siliqua cylindracea: dissepimento valvis longiore. Calyx connivens.

574. *B. campestris*, radice cauleque tenui; foliis caulinis uniformibus cordatis amplexicaulibus glaucis glabris; inferioribus lyratis rugosis piloso hispidis. Flor. Dan. Tab. 550. male.

Inter segetes ad vias. Flor. Maj. Jun. Jul.

α. caule foliisque omnibus glabris nec pilosis nec scabridis; radice cylindrico.

241. *Sinapis.*

Siliqua rostrata: dissepimento valvis longiore. Calyx patens.

575. *S. arvensis*, filiquis multangulis toroso-turgidis lævibus, rostro ancipiti longioribus. Flor. Dan. Tab. 753.

Inter segetes ad aggeres &c. Flor. æstate.

576. *S. alba*, filiquis hispidis: rostro longissimo ensiformi.

In hortis, cultis oleraceis *Amagriæ*. Flor. Jun. Jul. & Aug.

577. *S. nigra*, filiquis glabris, racemo adpressis; rostro brevissimo tetragono.

In ruderatis hinc inde. Flor. Jun. Jul.

242. *Arabis.*

Siliqua linearis, compressa, apice integro capitato.

578. *A. Thaliana*, foliis radicalibus petiolatis lanceolatis integerrimis in orbem dispositis.
Flor. Dan. Tab. 1106.

In agris, arvis, aggeribus: *ved Lyngbye; Birkerød &c.* Flor. Maj. Jun.

243. *Hesperis.*

Siliqua compresso-plana. Stigma basi bifurcatum, apice connivens.

579. *H. matronalis*, caule simplici erecto, foliis ovato lanceolatis denticulatis; petalis mucrone emarginatis. Flor. Dan. Tab. 921.

In declivis umbrosis *ved Springforbie.* Flor. Jul. & Aug.

244. *Cardamine.*

Siliqua cylindraceo-compressa, elastice dehiscent: valvis revolutis: dissepimento membranaceo. Stigma integrum capitatum.

580. *C. pratensis*, foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis. Flor. Dan. Tab. 1039.

In pascuis & pratis ubique. Flor. Maj. Jun.

Variat pinnulis omnibus linearibus.

581. *C. hirsuta*, foliis pinnatis floribus tetrandris; caule erecto flexuoso ramoso piloso supra glabro. Flor. Dan. Tab. 148.

In humidis ad rivulos: ved Rave-Bakken; i Mosen neden for Krattet bag ved Fuglehvad Mølle. Flor. Jun.

245. *Dentaria.*

Siliqua teres marginata elastice defiliens: valvis revolutis: dissepimento fungoso. Stigma emarginatum.

382. *D. bulbifera*, foliis inferioribus pinnatis summis simplicibus (mediis ternis trifidisve bulbillis in axillis foliorum sessilibus, demum atropurpureis deciduis.) Flor. Dan. Tab. 361.

In nemoribus montosis: ved Friderichsdal. Müller. Plantam hanc rarissimam nunquam in loco antedicto vidi & frustra quesivi; in sylve autem promontorii Insulæ Monæ vulgo Store Klint haud frequens legi.

CLASSIS XVI.
MONADELPHIA.

DECANDRIA.

Geranium. Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala. Stamina quinque ad decem. Stigmata quinque. Receptaculum commune rostratum. Cocculi quinque, cauda longissima tortili.

POLYANDRIA.

Malva. Calyx duplex: exterior bi-triphyllus acutus; interior femiquinquefidus major.

DECANDRIA.

246. *Geranium.*

Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala. Stamina quinque ad decem. Stigmata quinque. Receptaculum commune rostratum. Cocculi quinque, cauda longissima tortili. *Gærtn. de fructib. & seminib.*

* Staminibus quinque antheriferis.
Erodium l'Heret.

583. *G. cicutarium*, pedunculis multifloris (*tri seu quadrifloris*) radicalibus subaxillaribus; corollis vix calycem superantibus, foliis pinnatis læviter obtuse incisfis; aristis glabris. Løbel. icon. pag. 659.

In agris, arvis. Flor. æstate.

584. *G. chærophylloides*, pedunculis multifloris (*sex-septemfloris*) axillaribus; corollis calyce majoribus; foliis pinnatis profunde & acute incisfis; aristis villosis.

In agris & aggeribus. Flor. æstate.

585. *G. pedunculata*, pedunculis quadri-quinque-lexfloris radicalibus axillaribusque; foliis pinnatis: pinnulis læviter inciso-ferratis. Flor. Dan. Tab. 986.

** Staminibus decem antheriferis.

586. *G. phæum*, pedunculis solitariis (*bifloris*) oppositifoliis; calycibus subaristatis; caule erecto; (*foliis subseptemlobatis incisfis & obtuse dentatis*); petalis undulatis. Flor. Dan. Tab. 987.

In umbrosis: Rosenburge-Have. Flor. Jun.

587. *G. sylvaticum*, pedunculis bifloris; foliis subpeltatis quinquelobis, inciso-ferratis; caule erecto; petalis emarginatis. Flor. Dan. Tab. 124.

In fruticetis collinis: imellem Fuglehvad-Mølle og Brede-Bakke. Flor. Jun. Jul.

588. *G. palustre*, pedunculis bifloris longissimis declinatis; petalis integris; foliis quinquelobis incisfis. Flor. Dan. Tab. 596.

In paludibus: *ved Fuglehvad-Mölle; Dyrehave*
& aliis locis. Flor. æstate.

588. *G. pratense*, pedunculis bifloris; foliis sub-
peltatis multipartitis rugosis acutis; petalis
integris.

In pratis: *Müller*. Flor. Jun.

589. *G. robertianum*, pedunculis bifloris; calyci-
bus pilosis decemangulatis; foliis ternatis qui-
natisque incisis. Flor. Dan. Tab. 694.

In umbrosis, nemoribus in sepimentis. Flor.
Jun. Jul. Aug.

590. *G. molle*, pedunculis bifloris foliisque florali-
bus alternis; petalis bifidis; calycibus muti-
cis, caule erectiusculo, foliisque rotundatis
semiquinque sex-septemfidis pilosis, mollis-
simis; (*stipulis quatuor subulatis emarcidis*).
Flor. Dan. Tab. 679.

In aggeribus ad vias. Flor. Jun. Jul.

591. *G. columbinum*, pedunculis bifloris folio
longioribus; foliis quinquepartito multifidis;
arillis glabris; calycibus aristatis pentangulari-
bus magnis. Flor. Dan. Tab. 1222.

In arvis, aggeribus; *ved Sorgenfrie; imellem*
Valbye og Flaskekroen. Flor. Jun. Jul. Aug.

592. *G. dissectum*, pedunculis bifloris; foliis quin-
quepartito trifidis; petalis marginatis longi-
tudine calycis; arillis villosis. Flor. Danic.
Tab. 936.

In dumetis, fossis haud frequens. Flor. Jun. Jul.

593. *G. rotundifolium*, pedunculis bifloris; petalis integris longitudine calycis aristatis; caule prostrato, foliisque reniformibus semiquinquefidis incis, villosa subviscido. (foliis inferioribus oppositis: superioribus subcuneiformibus, trifidis, plerumque alternis.)

In agris, arvis, sepimentis. Flor. æstate.

- α. *malvasolium*, pedunculis bifloris; petalis emarginatis; calycibus acuminatis; caule subvillosiusculo crassiore ac ramosiore; foliis semi sex-septem-octofidis villosis; stipulis ovatis incis laciniis longe acuminatis. Vall. paris. Tab. 15. f. 1.?

594. *G. sanguineum*, pedunculis unifloris foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis. Flor. Dan. Tab. 1107.

In pratis, dumetis, ericetis. Flor. Jun. Jul. & Aug.

P O L Y A N D R I A.

247. *Malva*.

Calyx duplex: exterior bi-triphyllus acutus: interior semiquinquefidus major.

595. *M. rotundifolia*, caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis, obsolete quinquelobatis; pedunculis fructiferis declinatis. Flor. Danic. Tab. 721.

In ruderatis, ad vias, pagos. Flor. æstate.

596. *M. sylvestris*, caule erecto scabro; foliis quinque-septemlobatis crenato-ferratis; pedunculis petiolisque pilosis. Flor. Danic. Tab.

1223.

Ad vias, fepes; in ruderatis. Flor. Jun. Jul. & Aug.

597. *M. Alcea*, caule erecto; foliis radicalibus cordatis sublobatis crenatis: caulinis quinque-partitis, lobis profunde incis. Cavanill. tab. 17. f. 2.

In arenosis: imellem Charlottenlund og Skovshoved. Flor. Jul. Aug.

CLASSIS XVII. DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

Fumaria. Calyx diphyllus. Corolla tetrapetala, irregularis sæpe calcarata. Stamina duo antheris in singulo tribus. Ovarium superum. Stylus simplex. Capsula unilocularis evalvis, monosperma. Semen parieti affixum.

Capnoides. Calyx diphyllus. Corolla tetrapetala irregularis calcarata. Stamina duo, antheris in singulo tribus. Ovarium superum. Stylus simplex. Capsula filiquosa, bivalvis unilocularis polysperma. Semina futuris affixa.

OCTANDRIA.

Polygala. Calyces pentaphylli laciniae duæ alæformes. Stamina connexa. Capsula bilocularis.

DECANDRIA.

Spartium. Calyx bilabiatus, deorsum productus. Filamenta germini adhærentia. Stigma longitudinale supra villosum.

Ulex. Calyx diphyllus. Legumen inflatum vix calyce longius.

Ononis. Calyx quinquepartitus: laciniis linearibus. Vexillum striatum. Filamenta connata absque fissura. Legumen rhomboideum turgidum sessile.

Anthyllis. Calyx ventricosus quinquedentatus. Legumen subrotundum tectum.

Pisum. Calycis denticuli duo superiores breviores. Stylus triangularis supra carinatus pubescens.

Orob. Calycis denticuli duo superiores profundiores. Stylus linearis teretiusculus supra villosus.

Lathyrus. Calycis laciniae superiores duo breviores. Stylus planus, a medietate ad apicem antice villosus.

Vicia. Stylus sub stigmate barbatum.

Ervum. Calyx subæqualis longitudine fere. Corollæ.

Astragalus. Legumen biloculare gibbum vel inflatum.

Trifolium. Legumen vix calyce longius non dehiscens.

Lotus. Legumen strictum cylindricum. Corollæ alæ sursum longitudinaliter conniventes.

Medicago. Legumen compressum cochleatum. Carina corollæ a vexillo deflectens.

H E X A N D R I A.

248. *Fumaria*.

Calyx diphyllus. Corolla tetrapetala, irregularis sæpe calcarata. Stamina duo antheris in singulo tribus. Ovarium superum. Stylus simplex. Capsula unilocularis evalvis monosperma. Semen parieti affixum. Gærtn. de fructib. & seminib. pag. 162. Tab. 115. fig. 2.

598. *F. officinalis*, floribus spicato-racemosis; foliis supradecompositis: laciniis bi-trifidisve; caule diffuso. (*pericarpis obcordatis bivalvis*.)
Flor. Dan. Tab. 940.

In agris, aggeribus, cultis copiosissima. Flor. Maj. Jun. & Jul.

249. *Capnoides*.

Calyx diphyllus. Corolla tetrapetala irregularis calcarata. Stamina duo antheris singulo tribus. Ovarium superum. Stylus simplex. Capsula filiquosa bivalvis unilocularis polysperma. Semina futuris affixa, nitidissima atra, compressa. Gærtn. de fructib. & semin. pag. 163. Tab. 115. fig. 3.

500. *C. Halleri*, radice bulbosa, cauo lineari; bracteis digitatis; (*foliis biternatis: petiolis universalibus oppositis: partialibus subalternis, foliolis ovatis, subovatis, integerrimis vel emarginatis vel tricrenatis rarius bifidis; imo folio basi stipula membranacea vaginato; caule subimpli-*

cissimo trifolio). *Fumaria Hallerii Vahl* Flor. Dan. Tab. 1224.

Rarius in luco: *Charlottenlund*. Flor. Maj. Jun. 600. *C. major*, radice bulbosa inferne excavata; bracteis lanceolato-ovatis integerrimis; (foliis biternatis rarius pinnatis: petiolis, universalibus alternis: partialibus oppositis; foliolis bi tri quadrifidis; exstipulatis; caule simplicissimo; bifolio). *Fumaria bulbosa* Flor. Dan. Tab. 605. In luco: *Charlottenlund* haud infrequens. Flor. Maj. Jun.

α. foliis ternatis; foliolis ovatis obtusis profunde incisus alternis.

β. floribus albis.

601. *C. minor*, radice solida; bracteis ovatis integerrimis; (foliis biternatis ternatisque infimo stipulato: foliolis cuneatis bi trifidisve rarius partitis; petiolis oppositis; caule bifolio simplicissimo vel subramoso).

Haud frequens: *Charlottenlund*. Flor. Apr. Maj.

OCTANDRIA.

250. *Polygala*.

Calyces pentaphylli laciniæ duæ alæformes. Stamina connexa. Capsula bilocularis.

602. *P. vulgaris*, floribus aristatis racemosis; caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus; foliis lineari lanceolatis. Flor. Dan. Tab. 516.

In arvis, pratis. Flor. Maj. Jun. Jul.

Variat floribus violaceis; coeruleis, albis.

α. major.

In sylvaticis.

DECANDRIA.

251. *Spartium.*

Calyx bilabiatus deorsum productus. Filamenta germi adhaerentia. Stigma longitudinale supra villosum.

603. *S. scoparium*, foliis ternatis folitariisque ramis inermibus angulatis. Flor. Dan. Tab. 313.

Rarius in vicinis: *ved Vejen til Charlottenlund*; copiosior *ved Helsingør* Dn. Holten. Flor. Jun. & Jul.

252. *Ulex.*

Calyx diphyllus. Legumen inflatum vix calyce longius.

604. *U. europæus*, foliis villosis acutis; spinis sparsis. Flor. Dan. Tab. 608.

Habit cum præcedente: Flor. Maj. Jun.

253. *Ononis.*

Calyx quinquepartitus: laciniis linearibus. Vexillum striatum. Filamenta connata absque fissura. Legumen rhomboideum turgidum sessile.

605. *O. spinosa*, floribus racemosis folitariis subgeminisque; foliis obovatis, ternatis folitariis.

que, apicem versus ferratis, caule ramisque villosis.

α. glomerata, racemis brevibus spinisque conglomeratis; foliis minutis subglabris.

β. mitior, floribus spinisque solitariis foliis majoribus cauleque villosis. Flor. Dan.

Tab. 783.

In pascuis, pratis: *α. imod Stranden ved Flaskekroen* *β. fere ubique.* Flor. Jun. Jul.

606. *O. arvensis*, floribus racemose spicatis; foliis ternatis superioribus solitariis: foliolis ovatis ferratis acutis caule erectiusculo ramisque inermibus villoso-viscidis. Jacq. Hort. 1. T. 93.

O. arvensis & *hircina*. Syst. Vegetabil.

In pascuis & pratis, ad fossas circa *Flaskekroen*. Flor. Jul. Aug.

254. *Anthyllis*.

Calyx ventricosus, quinquedentatus. Legumen subrotundum tectum.

607. *A. vulneraria*, herbacea, foliis pinnatis: impari inferiorum majori; capitulo duplicato. Flor. Dan. Tab. 988.

In pratis, pascuis copiosa. Flor. Jun. Jul. Aug.

255. *Pisum*.

Calycis denticuli duo superiores breviores. Stylus triangularis supra carinatus pubescens.

608. *P. maritimum*, petiolis supra planiusculis; caule angulato; stipulis sagittatis; pedunculis multifloris. Flor. Dan. Tab. 338.

In litore maris: *Odsherred. Dn. Markusfen; Norfeld Inf. Monæ.* Flor. Jun. Jul.

256. *Orobis.*

Calycis denticuli duo superiores profundiores.
Stylus linearis teretiusculus supra villosus.

609. *O. vernus*, foliis pinnatis ovatis; stipulis semisagittatis integerrimis; caule simplici. Flor. Dan. Tab. 1226.

Rarissimus: i *Dyrehaven paa høire Side fra Fortunen til Kilden ikke langt fra Indhegningen.* Flor. Jun.

610. *O. tuberosus*, foliis pinnatis lanceolatis stipulis semisagittatis integerrimis; caule simplici. Flor. Dan. Tab. 781.

In sylvis, nemoribus, fruticetis, pratis. Flor. Maj. Jun.

611. *O. niger*, foliis sexjugis (*quadri-quinquejugis*) ovato oblongis; caule erecto ramoso. Flor. Dan. Tab. 1170.

Rarius in umbrosis, fruticetis: *paa Brede Bakker; imellem Dyrehavens Gierde og Ordrup-Mose ikke langt fra Jagdporten.* Flor. Jun. Jul.

257. *Lathyrus.*

Calycis lacinie superiores duo breviores.
Stylus planus, a medietate ad apicem antice villosus.

612. *L. tuberosus*, pedunculis multifloris; cirrhis diphyllis foliolis ovalibus; internodiis nudis.

Inter rarissimas: *paa Kastels-Volden ud til Söen.*
Flor. Jun. Jul.

613. *L. pratensis*, pedunculis multifloris; cirrhis
diphyllis simplicissimis: foliolis lanceolatis.
Flor. Dan. Tab. 527.

In pratis, dumetis; ad sepes. Flor. Jun. Jul.

614. *L. sylvestris*, pedunculis multifloris; cirrhis
diphyllis: foliolis ensiformibus; internodiis
membranaceis. Flor. Dan. Tab. 325.

In declivis fruticetis: *ved Springforbie*; ad vias
ibidem. *Ved Lyngbye-Söe.* Flor. Jun. Jul. Aug.

615. *L. palustris*, pedunculis multifloris; cirrhis
polyphyllis; stipulis lanceolatis. Flor. Dan.
Tab. 399.

In pascuis humidis rarius: *i Lundehuus-Mose ved*
Grövten. Flor. Jun. Jul.

258. *Vicia.*

Stylus sub stigmate barbatus.

616. *V. sylvatica*, pedunculis multifloris; foliolis
ovalibus; stipulis denticulatis. Flor. Danic.
Tab. 277.

Haud frequens in sylvis, fruticetis: *paa höire*
Haand ved Broen til Friderichsdal; i Gelskov.
Flor. Jun. Jul. Aug.

617. *V. cassubica*, pedunculis subsexflori; foliolis
denis (ac pluribus) ovatis acutis; stipulis in-
tegris. Flor. Dan. Tab. 98. *Vicia militans*
Crantz strip. Austr. Fasc. V. pag. 388. Tab. 1.
fig. 2. *Vicia Gerardi* Syst. Vegetab. Jacq. Flor.
Austr. III. Tab. 229.

In collinis fruticosis ficcis: *Brede Bakker.* Flor. Jun. & Jul.

618. *V. Cracca*, pedunculis multifloris, floribus imbricatis: foliolis lanceolatis pubescentibus integris. Flor. Dan. Tab. 804.

In sepibus, ad vias, inter segetes. Flor. Jun. & Jul.

Variat foliis latioribus & angustioribus caulibusque magis minusve pubescentibus.

619. *V. fativa*, leguminibus sessilibus subbinatis erectis; foliis retusis stipulis notatis. Flor. Dan. Tab. 522.

Inter segetes. Flor. æstate.

620. *V. angustifolia*, leguminibus sessilibus, subbinatis, patentibus; foliolis imis ovatis, retusis emarginatis: superioribus linearibus apice integerrimis (*mucrone setaceo*); stipulis dentatis; seminibus globosis nigerrimis. Joh. Banhin. histor. plantar. II. pag. 312.

Vicia fativa β. *nigra* Linn.

Inter segetes in arvis: *ved Brede Bakker.* Flor. Jun. Jul.

621. *V. lathyroides*, leguminibus sessilibus solitariis erectis glabris; foliolis senis, inferioribus obcordatis. Flor. Dan. Tab. 58.

In apricis haud frequens: *ved og i Charlottenlund.* Flor. Apr. Maj. Jun.

622. *V. sepium*, leguminibus pedicellatis subquaternis erectis; foliolis ovatis obtusis mucrona-

tis: exterioribus decrefcentibus. Flor. Dan.

Tab. 699.

In fepibus, nemoribus, pratis.

259. *Ervum.*

Calyx fubæqualis longitudine fere. Corollæ.

623. *E. tetraspermum*, pedunculis fubbifloris; leguminibus fubglabris tri-tetraspermis; feminibus globofis. Flor. Danic. Tab. 95.

In fepibus ad vias: ved *Veien til Papiers-Mølle*.
Flor. Jun. Jul.

624. *E. hirsutum*, pedunculis multifloris; leguminibus hirsuto-villofis difpermis; feminibus globofis. Flor. Dan. Tab. 639.

Inter fegetes, agris. Flor. Jun. Jul.

260. *Astragalus.*

Legumen biloculare gibbum vel inflatum.

625. *A. glycyphyllus*, caulefcens prostratus; leguminibus fubtriquetris arcuatis; foliis pedunculo longioribus: foliolis ovalibus. Flor. Danic. Tab. 1108.

In nemorofis, fruticetis, fepibus haud infrequens. Flor. Jun. Jul. Aug.

626. *A. Danicus*, caulefcens, decumbens, hirtus; capitulis longe pedunculatis; leguminibus brevibus inflatis pilofis. Flor. Dan. Tab. 674.

In pascuis ad margines agrorum haud frequentiffimus: paa *Kaftels-Volden*; paa *Stagter-Vangen*; ved *Veien til Conftantia*.

261. *Trifolium.*

Legumen vix calyce longius non dehiscens.

* Melioti. Leguminibus nudis.

- 627 *T. Melilotus officinalis*, leguminibus racemosis nudis, dispermis, rugosis, acutis; caule erecto. Flor. Dan. Tab. 934.

Ad vias, in aggeribus: ved Veien til Boddinge; Hiortespring; Rudergaard; in littore imellem Kiöbenhavn og Papiers-Mölle. Flor. Jun. Jul. Aug.

Variat floribus albis.

** Lotoidea. Leguminibus tectis polyspermis.

628. *T. repens*, capitulis umbellaribus; leguminibus tetraspermis; caule repente. Flor. Dan. Tab. 990.

In pratis, pascuis frequens. Flor. æstate.

*** Lagopoda. Calycibus villosis.

629. *T. pratense*, spicis globosis subvillosis; cinctis stipulis oppositis membranaceis; corollis monopetalis; foliis ex ovato subrotundis integerrimis; stipulis ovatis aristatis scariosis. Flor. Dan. Tab. 989.

In pratis, pascuis, ad vias &c. Flor. Jun. Jul. & Aug.

630. *T. alpestre*, spicis subglobosis villosis terminalibus subbinis; caule erecto; foliis lanceolatis ferratis; stipulis angustioribus acuminatis ciliatis viridibus. Flor. Dan. Tab. 662.

In nemorosis. Flor. æstate.

631. *T. flexuosum*, spicis subglobosis, villosis, terminalibus; caule abscedente flexuoso ramofissimo; foliolis ovato-lanceolatis serrulatis. Jacq. Flor. Austr. 4. tab. 386.

632. *T. arvense*, spicis villosis ovalibus; dentibus calycinis fetaceis villosis æqualibus. Flor. Dan. Tab. 724.

In agris, arvis sterilibus frequens. Flor. Jul. & Aug.

633. *T. striatum*, capitulis sessilibus sublateralibus ovatis; calycibus striatis rotundatis. Flor. Dan. Tab. 1171.

In arvis, ad margines agrorum: ved Bernstorfs Skov til Gientofte paa de smaa Bakker sammesteds; imellem Charlottenlund og Skovshoved; paa Amager. Flor. Jun. Jul.

**** Vesicaria. Calycibus inflatis ventricosus.

634. *T. fragiferum*, capitulis subrotundis; calycibus inflatis bidentatis; caulibus repentibus. Flor. Dan. Tab. 1042.

In pratis littoris maris frequens. Flor. Jul. Aug.

***** Lupulina. Vexillis corollæ inflexis.

635. *T. montanum*, spicis subimbricatis, subtribus; vexillis subulatis emarcescentibus; calycibus nudis; caule erecto. Flor. Dan. Tab. 1172.

Haud vulgatissimum in pratis aridis marem versus forbie Flaskekroen. Flor. Jul. Aug.

636. *T. agrarium*, spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus; calycibus nudis; caule erecto. Flor. Dan. Tab. 558. (foliolis oblongo-ovalibus antice ferrulatis, vix emarginatis; stipulis glabris.)

In arvis, ad margines fossarum, fruticetis: *ved Fuglehvad-Mölle & alibi.* Flor. Jul. Aug.

637. *T. procumbens*, spicis ovalibus imbricatis; vexillis deflexis persistentibus; caulibus procumbentibus. (Foliis obovatis antice ferrulatis, emarginatis cum mucrone; stipulis ciliatis). Flor. Dan. Tab. 796.

In arvis, pascuis. Flor. Jun. Jul.

638. *T. filiforme*, spicis subimbricatis; vexillis deflexis persistentibus; calycibus pedicellatis; caulibus procumbentibus. (Foliolis obcordatis antice ferrulatis emarginatis, potius retusis; stipulis ciliatis).

In pratis & pascuis, ad fossarum margines. Flor. Jul. Aug.

262. *Lotus*.

Legumen strictum cylindricum. Corollæ alæ sursum longitudinaliter conniventes.

639. *L. corniculatus*, capitulis depressis; caulibus decumbentibus; leguminibus cylindricis patentibus. Flor. Dan. Tab. 991.

In pratis, ad vias frequens. Flor. Jun. — Aug.

263. *Medicago.*

Legumen compressum cochleatum. Carina corollæ a vexillo deflectens.

640. *M. sativa*, pedunculis racemosis; leguminibus contortis; caule erecto glabro. Lobel.

Observat. pag. 498.

In pratis, ad vias: *paa Veien til Constantia; paa Bakken imellem Charlottenlund og Skovshoved.*
Flor. Jun. Jul.

641. *M. lupulina*, spicis ovalibus; leguminibus reniformibus monospermis; caulibus procumbentibus. Flor. Dan. Tab. 992.

In arvis, agris, aggeribus frequens. Flor. Jun. & Jul.

642. *M. polymorpha arabica*, pedunculis tri-quadri-quinquefloris; leguminibus echinatis foliolis obcordatis.

In ruderatis: *uden for Amager - Port.* Flor. Jul. & Aug.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

Hypericum. Calyx quinquepartitus inferus.
Corolla pentapetala. Capsula tri-quinquelocularis polysperma.

POLYANDRIA.

264. *Hypericum*.

Calyx quinquepartitus. Petala quinque. Filamenta in tres ad quinque phalanges basi coalita. Capsula loculis numero styliorum.

* Trigynæ.

643. *H. quadrangulare*, floribus trigynis; caule quadrato herbaceo. Flor. Dan. Tab. 640.

In locis humidis passim. Flor. Jul. Aug.

Variat corymbis coarctatioribus, floribus minoribus.

644. *H. perforatum*, floribus trigynis; caule angustiori; foliis obtusis pellucido-punctatis. Flor. Dan. Tab. 1043.

Ad vias, sepes, fruticetis. Flor. Jul. Aug.

645. *H. humifusum*, floribus trigynis axillaribus solitariis; caulibus ancipitibus prostratis filiformibus. Flor. Dan. Tab. 141.

In arvis ficcis: ved Bagsværd; Birkerød. Flor. Jun. Jul. Aug.

646. *H. pulchrum*, floribus trigynis; calycibus ferrato-glandulosis; caule tereti; foliis amplexicaulibus cordatis glabris. Flor. Danic. Tab. 75.

Rarissimum: ved Frederichsborg; imellem Fredensborg og Helsingør. Flor. Jul. Aug.

647. *H. montanam*, floribus trigynis; calycibus ferrato-glandulosis; caule tereti erecto foliis ovatis glabris. Flor. Dan. Tab. 173.

In dumetis, fruticetis, nemorosis: i Krattet ved Fuglehvad-Mølle; imellem Torbek og Papiers-Mølle; i Ermelunds-Skov. Flor. Jul. Aug.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

* Semiflosculosi. Corollis omnibus ligulatis.

Cichorium. Receptaculum subpaleaceum. Pappus subquinqüedentatus. Calyx calyculatus.

Hypochaeris. Receptaculum paleaceum. Pappus subplumosus. Calyx imbricatus.

Tragopogon. Receptaculum nudum. Pappus plumosus. Calyx simplex.

Picris. Receptaculum nudum. Pappus plumosus. Calyx calyculatus.

Leontodon. Receptaculum nudum. Pappus plumosus sessilis. Calyx imbricatus.

Taraxacum. Receptaculum nudum. Pappus plumosus stipitatus. Calyx calyculatus.

Scorzonera. Receptaculum nudum. Pappus plumosus. Calyx imbricatus: margine scariofo.

Crepis. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Calyx calyculatus: squamis difformibus.

Prenanthes. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Calyx calyculatus subquinqüeflorus.

Lactuca. Receptaculum nudum. Pappus pilosus stipitatus. Calyx imbricatus: margine membranaceo.

Hieracium. Receptaculum nudum. Pappus pilosus sessilis. Calyx imbricatus ovatus.

Sonchus. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Calyx imbricatus, basi gibbus.

Lapsana. Receptaculum nudum. Pappus nullus. Calyx calyculatus.

** Capitati.

Carlina. Calyx imbricatus radiatus: squamis interioribus coloratis.

Cnicus. Calyx ovatus imbricatus spinosus. Pappus sessilis plumosus.

Carduus. Calyx ovatus imbricatus spinosus. Pappus sessilis pilosus.

Serratula. Calyx subcylindricus imbricatus, muticus. Pappus sessilis.

Onopordon. Calyx ventricosus, imbricatus, spinosus. Receptaculum favosum.

Arctium. Calyx globosus: squamis apice incurvato-hamosis.

*** Discoidei.

Eupatorium. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Calyx imbricatus. Pistilla longissima.

Bidens. Receptaculum paleaceum. Pappus bibristatus. Calyx imbricatus.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

* Dilcoidei.

Artemisia. Receptaculum subnudum. Pappus nullus. Corollæ radii nullæ.

Tanacetum. Receptaculum nudum. Pappus subemarginatus. Corollulæ radii trifidæ aut nullæ.

Gnaphalium. Receptaculum nudum. Pappus plumosus. Calyx scariosus: squamis concavis.

** Radiati.

Bellis. Receptaculum nudum. Pappus nullus. Calyx simplex: squamis æqualibus.

Matricaria. Receptaculum nudum. Pappus nullus. Calyx imbricatus: squamis acutis.

Chrysanthemum. Receptaculum nudum. Pappus nullus. Calyx squamis intimis scariosis.

Arnica. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Stamina radii castrata.

Inula. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Antheræ basi bifetæ.

Erigeron. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Corollulæ radii capillares.

Senecio. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Calyx squamis apice sphacelatis.

Solidago. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Corollulæ radii subfeni remoti.

Cineraria. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Calyx simplex æqualis.

Tussilago. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Calyx squamis submembranaceis.

Aster. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Calyx subsquarrosus.

Anthemis. Receptaculum paleaceum. Pappus nullus. Calyx hæmiphæricus.

Achillæa. Receptaculum paleaceum. Pappus nullus. Radius subquinqueflorus.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

Gentaurea. Receptaculum setosum. Pappus pilosus. Radius corollæ tubulosus.

POLYGAMIA NECESSARIA.

Filago. Receptaculum nudum. Flosculi fœminei inter squamas calycis.

Calendula. Receptaculum nudum. Pappus nullus. Semina submembranacea.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

* Semiflosculosi: corollis omnibus ligulatis.

265. *Cichorium*.

Calyx calyculatus. Receptaculum subpaleaceum. Pappus subquinqüedentatus obsolete pilosus.

648. *C. Intybus*, floribus geminis sessilibus; foliis runcinatis. Flor. Dan. Tab. 907.

Ad vias frequentissimum: *Kongeveien*; *Bernstorfsveien* &c. Flor. Jun. Jul. Aug.

266. *Hypochaeris*.

Calyx subimbricatus. Receptaculum paleaceum. Pappus plumosus.

649. *H. maculata*, caule subnudo: ramo solitario; foliis ovato-oblongis integris dentatis. Flor. Dan. Tab. 149.

Haud frequens in pratis graminosis, dumetis: *Bagsværd*; *vcd Lyngbye-Søe*. Flor. Jun. Jul.

Variat caule ramosiori: ramis unifloris sub corymbosis; foliis longe dentatis.

650. *H. radicata*, foliis runcinatis, obtusis, scabris; caule (*scapo*) ramoso nudo lævi; pedunculis squamosis incrassatis. Flor. Dan. Tab. 150.

In pascuis, ad fossas. Flor. Jul. Aug.

651. *H. glabra*, glabra, calycibus oblongis imbricatis; caule (*scapo*) ramoso nudo (*plures ex uno radice*); foliis dentato-sinuatis. Flor. Dan. Tab. 424.

In agris, arvis, ad fossas. Flor. Jun. Jul.

α. Foliis pinnatifidis: laciniis linearibus ramis subdivaricatis.

β. Foliis pinnatifidis: laciniis linearibus; caule ramisque stricto erecto sub fastigiato.

β. Haud frequens in piscino exsiccatō i *Hirschholmskov* & in aggere marem versus imod *Flaskekroen*. α. Ad vias, fossas, passim legi.

367. *Tragopogon*.

Calyx simplex: laciniis basi coalitis. Receptaculum nudum. Pappus stipitatus plumosus.

652. *T. pratense*, calycibus corollæ radium æquantibus; foliis integris strictis. Flor. Dan. Tab. 609.

In aggeribus, ad vias frequens. Flor. Maj. Jun. & Jul.

Variat: foliis spiraliter contortis.

286. *Picris*.

Calyx calyculatus. Receptaculum nudum. Semina transversim sulcata. Pappus plumosus.

653. *P. Hieracioides*, perianthiis laxis; foliis integris; pedunculis squamatis in calycem.

In agris, pratis, rarior. Flor. Jul. Aug.

269. *Leontodon* Roth. (*Apargia*) Hoffm.

Calyx imbricatus. Receptaculum planiusculum. Pappus sessilis plumosus.

654. *L. autumnale*, caule ramoso; pedunculis squamosis; foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. J. Bauch. Hist. pl. II. p. 1031.

In pascuis pratis copiose. Flor. Jul. Aug. Sept.

655. *L. hispidum*, calyce hispido; foliis sinuato-dentatis hispidis; seminibus rugosis; scapo unifloro. Flor. Dan. Tab. 862.

In pratis, fruticetis frequens. Flor. Jun. Jul.

270. *Taraxacum. Roth.*

Calyx oblongus, calyculatus duplice foliorum serie. Receptaculum convexum nudum. Pappus stipitatus plumosus.

656. *T. officinale*, squamis calycinis exterioribus reflexis; foliis runcinatis acute dentatis glabris.

Ubique. Flor. Apr. Maj. Jun.

α. angustifolium.

β. latifolium. Flor. Dan. Tab. 574.

271. *Scozonera.*

Calyx imbricatus: squamis margine scariosis. Receptaculum nudum. Pappus plumosus,

657. *S. humilis*, caule subnudo unifloro; foliis lanceolatis vel linearibus nervosis planis. Flor. Danic. Tab. 816.

In pratis, pascuis: paa Brede Bakker; ved Bernstorff; Birkeröd. Flor. Maj. Jun.

Variat caule bi-trifloro pedunculis elongatis.

272. *Crepis.*

Calyx calyculatus: squamis difformibus deciduis. Receptaculum nudum. Pappus pilosus.

658. *C. tectorum*, foliis lanceolato-runcinatis, sessilibus lævibus: inferioribus dentatis. Flor. Dan. Tab. 501.

In muris, tectis, ad vias, inter segetes. Flor. æstate.

α. *segetalis*, foliis imis parum dentatis, superioribus linearibus integris; caule altiori ac ramosiori.

β. foliis cauleque scabriusculo-hispidis.

659. *C. biennis*, foliis runcinato-pinnatifidis scabris, basi superne dentatis; calycibus muricatis.

Haud frequens in aggeribus ad vias: *ved Bagsværd*. Flor. Jun. Jul.

Differt a *Crepide tectorum* caule altiore crassiore fulcato inferne ramis destituito sed folioso; foliis omnibus pinnatifido-dentatis laciniis lanceolatis scabrido-hispidis; floribus majoribus.

273. *Prenanthes.*

Calyx calyculatus. Flosculi simplici serie. Receptaculum nudum. Pappus substipitatus pilosus.

660. *P. muralis*, flosculis quinis; foliis runcinatis; *Setis pappi simplicissimis, articulatis, in capi-*

tulo subrotundo stipitis infidentibus). Flor. Dan.
Tab. 509.

In sylvis, nemoribus. Flor. Jun. Jul. Aug.

274. *Lactuca.*

Calyx cylindricus imbricatus: squamis marginem membranaceis. Receptaculum nudum. Pappus stipitatus pilosus. Semina lævia.

661. *L. Scariola*, foliis runcinatis, dentatis, verticalibus, carina aculeatis. Flor. Dan. Tab. 1227.

In aggeribus, ruderatis, ad vias frequens circa Hafniam. Flor. Jul. Aug.

275. *Hieracium.*

Calyx imbricatus ovatus. Receptaculum nudum. Pappus sessilis pilosus.

* Scapo nudo unifloro.

662. *H. Pilosella*, foliis integris ovatis subtus tomentosis; stolonibus repentibus. Flor. Dan. Tab. 1110.

Ad vias, in aggeribus frequens. Flor. Jun. Jul. & Aug.

** Scapo nudo multifloro.

663. *H. dubium*, foliis integris ovato-oblongis stolonibus repentibus; scapo glabro superne pubescente, squamis duabus vel tribus lanceolatis. Flor. Dan. Tab. 1044.

Raro dicit Müll. Flor. Maj. Jun. Jul.

664. *H. Auricula*, foliis integerrimis lanceolatis; stolonibus repentibus; scapo muricato, setis

nigris inferne confertioribus, supra basin folio aucto. Flor. Dan. Tab. 1111.

In aggeribus copiose. Flor. Maj. Jun. Jul.

665. *H. cymosum*, foliis lanceolatis, integris pilosis; stolonibus repentibus, apice ferrugineo-tomentoso hirsutis; scapo subnudo, muricato-hispido; umbellis cymosis multifloris. Flor. Dan. Tab. 810.

In declivis maritimis inter *Springforbie* & *Papiers-Mölle*. Flor. Jun. Jul.

666. *H. aurantiacum*, foliis ovato-oblongis integris; caule subnudo simplicissimo piloso corymbifero. Flor. Dan. Tab. 1112.

Charlottenlund: in loco umbroso arce valde remoto hæc planta excursionem publicam a Dn. Block detecta. An vera indigena?

667. *H. præmorsum*, foliis ovatis subdentatis; scapo nudo racemoso; floribus superioribus primoribus. Flor. Dan. Tab. 942.

In pratis paludosis: i *Lundehuus-Mosen*. Flor. Jun.

*** Caule folioso.

668. *H. murorum*, caule ramoso subnudo; foliis radicalibus ovatis, dentatis, caulino minore. Joh. Bauh. Histor. II. pag. 1033.

In sylvaticis, ad vias. Flor. æstat.

669. *H. sylvaticum*, caule ramoso folioso; foliis radicalibus ovatis petiolatis argute dentatis caulinis sessilibus; pedunculis multifloris. Flor. Dan. Tab. 1113.

In sylvis ubique. Flor. Jun. Jul.

670. *H. paludosum*, caule paniculato; foliis amplexicaulibus dentatis glabris; calycibus hispidis. Flor. Dan. Tab. 928.

In nemoribus, fruticetis paludosis. Flor. Jul. & Aug.

671. *H. sabaudum*, caule erecto multifloro (floribus umbellato-corymbosis); foliis ovato-lanceolatis (oblongo-lanceolatis) denticulatis, petiolatis, caulinis amplexicaulibus sessilibus. Flor. Dan. Tab. 872.

Ad vias, in aggeribus, in fruticetis: ved Lundehuset og Söeholm; i Krattet ved Fuglehvad-Mölle. Flor. Jun. Jul.

672. *H. umbellatum*, foliis linearibus subdentatis sparsis; floribus subumbellatis.

In aggeribus; locis ficcis elevatis sylvarum: Gelskov; Bagsværd-Skov; ved Veien til Constantia. Flor. Jul. Aug.

α. ramosissimum, foliis linearibus argute dentatis. Flor. Danic. Tab. 680.

β. humile, caule humiliori minus folioso bi-tri-quadri-quinquefloro; foliis linearibus subdenticulatis.

In pratis ficcis sylvaticis; ericetis: i Skoven imell. m Kollekolle og Fahrurum; omkring Bagsværd og Birkerød.

276. *Sonchus.*

Calyx imbricatus, basi ventricosus. Receptaculum nudum. Pappus pilosus, sessilis.

673. *S. arvensis*, pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis; foliis runcinatis basi cordatis. Flor. Dan. Tab. 606.

Inter segetes; ad fossas humidas; in littore maris. Flor. Jun. Jul. Aug.

674. *S. oleraceus*; pedunculis tomentosis; calycibus glabris.

In ruderalis, cultis, oleraceis. Flor. Jun. Jul. & Aug.

- α. lævis*, foliis tenerioribus glaucis; pedunculis lævibus calycibusque laxo tomento obfessis.

Variat 1. Foliis ovato spathulatis, vel ovatis basi angustioribus amplexicaulibus argute dentatis obtusis. *Sonchus lævis tenerior latifolia*. Lobel. observat. pag. 118.

2. Foliis pinnatifido-runcinatis laciniatis. *Sonchus lævis vulgaris*, foliis laciniosis. Lobel. observat. pag. 119.

3. Foliis lyrato-runcinatis. Flor. Dan. Tab. 682.

- β. asper*, foliis pinnatifidis, sinuato dentatis rigidioribus ac viridioribus. Flor. Dan. Tab. 843.

277. *Lapsana.*

Calyx calyculatus, angulatus; squamis interioribus canaliculatis. Receptaculum nudum.

675. *L. communis*, calycibus fructus angulatis; pedunculis brevibus ramosissimis. Flor. Dan. Tab. 500.

In sepibus, hortis, nemoribus, ad vias. Flor. Jun. Jul.

** Capitati.

278. *Carlina.*

Calyx imbricatus radiatus; squamis interioribus longis coloratis nitidis.

676. *C. vulgaris*, caule multifloro corymbofo; floribus terminalibus; calyce radio pallido. Flor. Danic. Tab. 1174.

In ericetis, collinis aridis: *imellem Charlottenlund og Papiers-Mølle; ved Bagsværd; Birkerød &c.* Flor. Jul. Aug.

278. *Cnicus.*

Calyx ovatus, imbricatus; squamis spinosis. Receptaculum pilosum. Pappus sessilis plumosus.

677. *C. oleraceus*, foliis pinnatifidis, carinatis nudis; bracteis concavis, integris, subcoloratis. Flor. Dan. Tab. 860.

In pratis humidis, fossis. Flor. Jun. Jul. Aug.

678. *C. lanceolatus*, foliis decurrentibus pinnatifidis; pinnis bilobis spinosis; calycibus nudis

oblongis spinosis villosis. Flor. Danic. Tab. 1173.

Carduus lanceolatus Lin.

In ruderalis ad vias ubique. Flor. Jul. Aug.

679. *C. palustris*, foliis decurrentibus pinnatifidis margine spinosis; floribus rectis fasciculatis; calycibus inermibus.

Carduus palustris Lin.

In pratis paludosis. Flor. Jul. Aug.

680. *C. heterophyllus*, foliis amplexicaulibus, lanceolatis ciliatis integris laciniatisque; caule subuniifloro; calyce inermi.

Carduus heterophyllus Lin.

In nemore Charlottenlund per plures annos observavi sed nunquam florendi vidi.

681. *C. acaulis*, foliis pinnatifidis; pinnis incisis margine spinosis; calyce conico glabro. Flor. Dan. Tab. 111.

Carduus acaulis Lin.

In apricis, pratis. Flor. Jul. Aug.

Variet caulescens.

280. *Carduus.*

Calyx ovatus, imbricatus; squamis spinosis. Receptaculum pilosum. Pappus sessilis pilosus.

682. *C. acanthoides*, foliis decurrentibus sinuatis margine spinosis; calycibus pedunculatis solitariis erectis villosis. Jacq. Flor. austric. 3. tab. 249.

In aggeribus ad vias. Flor. Jul. Aug.

683. *C. crispus*, foliis decurrentibus, sinuatis, margine spinosis, floribus aggregatis, terminalibus; squamis calycinis inermibus, subaristatis, patulis. Flor. Dan. Tab. 621.

In aggeribus; ad fossas; in ruderatis. Flor. Jul. Aug.

281. *Serratula*.

Calyx subcylindricus, imbricatus: squamis muticis, acutiusculis. Receptaculum setosum. Pappus sessilis.

684. *S. tinctoria*, foliis lyrato pinnatifidis: pinna terminali maxima; flosculis conformibus. Flor. Dan. Tab. 281.

In aggeribus & pratis circa *Flaskekroen*. Flor. Jul. Aug.

Variat α . caule altiori ramosiori, ac humiliori subsimplici.

β . foliis superioribus incisis inferioribus integris.

γ . foliis omnibus integris, inferioribus longissime petiolatis: petiolis basi laciniato-dentatis.

685. *S. arvensis*, foliis lanceolatis, pinnatifido-dentatis, spinosis: inferioribus subdecurrentibus. Flor. Dan. Tab. 644.

Ad vias, in agris & fere ubique. Flor. Jul. & Aug.

282. *Onopordon.*

Calyx ventricosus imbricatus: squamis mucronatis. Receptaculum nudum favosum. Pappus sessilis pilosus.

686. *O. Acanthium*, calycibus squamosis: squamis patentibus; foliis ovato-oblongis sinuatis, spinosis. Flor. Dan. Tab. 909.

In aggeribus ad vias copiose. Flor. Jul. Aug.

283. *Arctium.*

Calyx globosus: squamis apice inflexo-hamatis.

687. *A. Lappa*, foliis cordatis inermibus petiolatis.

In ruderalis, ad vias frequens. Flor. Jul. Aug.

α. calycibus glabris; squamis divaricatis longioribus.

1. globoso-depressis: squamis calycinis lineari lanceolatis albido virescentibus.

2. globoso-conoideis: squamis calycinis lanceolato fetaceis purpureis.

β. calycibus arachnoideis, squamis magis adpressis brevioribus.

1. globosis subdepressis: squamis lanceolato-fetaceis subarachnoideis, albido-virescentibus.

2. globosis: squamis lanceolato-fetaceis, arachnoideis, viride purpurascentibus.

Flor. Dan. Tab. 642.

γ minor, calycibus globosis quasi truncatis antecedentium minoribus tomentosioribus: squamis calycinis lanceolato-fetaceis adpressis viridibus; foliis radicalibus cordato oblongis sinuato dentatis, caulinis oblongis dentatis; caule tenuiori.

Varietatem hanc tantum vidi ad pagum *Thorbeck.*

*** *Discoidei.*

284. *Eupatorium.*

Calyx oblongus imbricatus. Styli longissimi ad flamina ulque bifidi. Receptaculum nudum. Pappus sessilis pilosus.

688. *E. cannabinum*, foliis oppositis, ternatis, quinatisque. Flor. Dan. Tab. 745.

Ad fossas haud infrequens. Flor. Jul. Aug.

285. *Bidens.*

Calyx imbricatus. Corollæ radius flosculo uno vel pluribus radiantibus. Receptaculum paleaceum. Pappus aristis duabus, rectis scabris.

689. *B. tripartita*, foliis trifidis; calycibus subfoliosis; seminibus erectis. Blackw. Tab. 519.

Ad fossas humidas. Flor. Jul. Aug. Sept.

α pumila, caule simplicissimo unifloro; bracteis pluribus; foliis ferratis; radice simplici.

690. *B. minima*, foliis lanceolatis subintegerrimis
flore recto solitario basi involucrato bracteis
duabus; radice repente. Flor. Dan. Tab. 312.

In inundatis ericetosis locis, *Birkeröd; Bagsværd.* Flor. Jul. Aug.

691. *B. cernua*, foliis lanceolatis amplexicaulibus
floribus cernuis; feminibus erectis. Flor. Dan.
Tab. 841.

Ad fossas, piscinas haud infrequens. Flor. Jul.
Aug. Sept.

β. *radiata*, flore cernuo radiato. *Coreopsis*
Bidens Linn.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

* *Discoidei.*

286. *Artemisia.*

Calyx imbricatus: squamis rotundatis conni-
ventibus. Corollulæ radii nulli. Recepta-
culum subnudum. Pappus nullus.

692. *A. campestris*, foliis multifidis linearibus;
caulibus procumbentibus virgatis. Flor. Dan.
Tab. 1175.

In aggeribus, ad vias frequens *ved Lyngbye;*
Bagsværd &c. Flor. Jul. Aug. Sept.

Variat caulibus albicantibus ac rubicundis.

693. *A. maritima*, foliis multipartitis tomentosis;
racemis cernuis; flosculis fœmineis ternis.

In littore maris: *ved Flaskekroen; imellem Tu-
borg og Constantia.* Flor. Aug. Sept.

694. *A. Absinthium*, foliis compositis multifidis; floribus subglobosis pendulis; receptaculo villoso. Blackw. Herb. tab. 17.

Ad pagos. Skovshoved; Torbek; omtrent lige for Tuborg ved Söekanten. Flor. Jul. Aug. Sept.

695. *A. vulgaris*, foliis pinnatifidis planis incis, subtus tomentosis; racemis simplicibus recurvis; florum radio quinquefloro. Flor. Dan. Tab. 1176.

Ad vias, in ruderatis frequentissima. Flor. Jul. Variat caule albo, & purpureo.

287. *Tanacetum*.

Calyx imbricatus hæmisphæricus: squamis acutis. Corollulæ radii obsoletæ trifidæ, (sæpe nullæ omnesque hermaphroditæ). Receptaculum convexum nudum. Pappus submarginatus.

696. *T. vulgare*, foliis bipinnatis incis ferratis. Flor. Dan. Tab. 871.

Ad sepes, pagos, margines agrorum. Flor. Jul. Aug. Sept.

288. *Gnaphalium*.

Calyx imbricatus: squamis marginalibus rotundatis, concavis scariosis, coloratis. Receptaculum nudum. Pappus pilosus aut plumosus.

* *Chrysocoma*.

697. *G. arenarium*, herbaceum, foliis lanceolatis: inferioribus obtusis; corymbo composito; caulibus simplicissimis. Flor. Dan. Tab. 641.

In aridis arenosis: imellem Charlottenlund og Skovshoved; ved Vebek et alibi. Flor. Jun. Jul. Aug.

698. *C. luteo-album*, foliis semiamplexicaulibus, ensiformibus, repandis, obtusis, utrinque pubescentibus; floribus conglomeratis.

Inter lapides areæ meridionalis Nosocomii Fridericiani per quinque annos hanc sponte proveniente observavi. Flor. Jul. Aug. Sept.

* * *Argyrocoma.*

699. *G. diœcum*, sarmentis procumbentibus; caule simplicissimo; corymbo simplici; floribus dioicis. Flor. Dan. Tab. 1228.

In ericetis, sylvis. Flor. Jun.

Mas, floribus subrotundis, plerumque sterilibus: germine abortiente.

Fœmina, floribus ovato oblongis, fertilibus; antheris destitutis.

*** *Filaginoidea.*

700. *C. sylvaticum*, caule herbaceo simplicissimo erecto; floribus sparsis subspicatis. Flor. Dan. Tab. 1229.

In pratis sylvaticis. Flor. Jul. Aug. Sept.

701. *G. uliginosum*, caule herbaceo ramoso diffuso; floribus terminalibus confertis. Flor. Dan. Tab. 859.

In locis humidis, inundatis, ad pagos. Flor.
Jul. Aug. Sept.

** Radiati.

289. *Bellis.*

Calyx hemisphæricus: foliolis æqualibus. Re-
ceptaculum conicum. Pappus nullus.

702. *B. perennis*, scapo nudo; foliis obovatis,
spatulatis, subcrenatis. Flor. Dan. Tab. 503.

In pratis pascuis ubique. Flor. toto anno.

290. *Matricaria.*

Calyx hæmisphæricus imbricatus: squamis li-
nearibus subinæqualibus. Receptaculum con-
vexum nudum. Pappus nullus.

703. *M. Parthenium*, foliis compositis planis: fo-
liolis ovatis incis; pedunculis ramosis. Flor.
Dan. Tab. 674.

Ad pagos; in declivis inter *Torbek* & *Papiers-
mölle*. Flor. Jul. Aug.

704. *M. maritima*, receptaculis hemisphæricis; fo-
liis bipinnatis subcarnosis, supra convexis,
subtus carinatis.

In littore maris haud infrequens. Flor. Jul.
Aug. Sept.

705. *M. officinalis*, receptaculis conicis; radiis de-
flexis squamis calycinis margine æqualibus.
M. suaveolans Lin.

β. radiis patulis. *M. Chamomilla* Lin.

Inter segetes haud infrequens. Flor. Jul. Aug.

291. *Chrysanthemum.*

Calyx hemisphæricus imbricatus: squamis margine scariosis: intimis apice membranaceis. Receptaculum convexum nudum. Pappus nullus.

706. *C. Leucanthemum*, foliis amplexicaulibus oblongis: superne ferratis: inferne dentatis. Flor. Dan. Tab. 994.

In aggeribus; ad vias; in arvis. Flor. Jun. Jul.

707. *C. inodorum*, foliis pinnatis multifidis; caule ramoso diffuso. Flor. Dan. Tab. 696.

In ruderatis, agris; ad vias. Flor. Jul. Aug.

708. *C. segetum*, foliis amplexicaulibus: superne sublaciniatis: inferne dentato-ferratis. Flor. Dan. Tab. 995.

Inter segetes, in cultis, aggeribus. Flor. Jun. Jul. Aug.

292. *Arnica.*

Calyx imbricatus, radio multo brevior. Stamina radii castrata. Receptaculum nudum. Pappus simplex.

709. *A. montana*, foliis ovatis integris: caulinis geminis oppositis. Flor. Dan. Tab. 63.

In ericetis aridis elevatis: ved Bagsværd imellem Skoven og Teprimose; ved Rudergaard i Skoven; imellem Fredensborg og Helsingör. Flor. Jun. Jul.

Variat caule unifloro, trifloro, rarior ramoso ramis unifloris.

293. *Inula.*

Antheræ basi in fetas duas desinentes. Receptaculum nudum. Pappus simplex.

710. *I. Helenium*, foliis amplexicaulibus ovatis rugosis, subtus tomentosis; calycum squamis ovatis. Flor. Dan. Tab. 728.

In sylve inter *Blowstrup* & *Friderichsborg*; ved *Sorgenfrie*. Flor. Jul. Aug.

711. *I. britannica*, foliis amplexicaulibus lanceolatis ferratis distinctis, subtus villosis; caule ramoso erecto corymbofo villoso. Flor. Dan. Tab. 413.

In aggeribus, fossis, pratis humidis maritimis: ved *Flaskekroen*. Flor. Jun. Jul. Aug.

712. *I. Pulicaria*, foliis amplexicaulibus undulatis; caule prostrato; floribus subglobosis: radio brevissimo. Flor. Dan. Tab. 613.

In locis humidis, ad pagos: paa *Amager*; ved *Bagvaard*. Flor. Jul. Aug.

713. *I. salicina*, foliis lanceolatis recurvis serrato-scabris; ramis angulatis; floribus inferioribus altioribus. Flor. Dan. Tab. 786.

In fossis, pascuis: ved *Flaskekroen*. Flor. Jul. Aug.

Variat caule unifloro bi-trifloro vel corymbofo multifloro.

294. *Erigeron.*

Calyx oblongus. Corollulæ radii lineares, angustissimæ. Receptaculum nudum. Pappus pilosus.

714. *E. acre*, caule erecto ramoso; pedunculis alternis unifloris.

In apricis, arvis, aggeribus. Flor. Jun. Jul. & Aug.

295. *Solidago*.

Calycis squamæ imbricatæ conniventes. Corollulæ radii pauciores, remotæ. Receptaculum nudum. Pappus pilosus.

715. *S. Virgaurea*, caule subflexuoso angulato; racemis paniculatis erectis confertis. Flor. Dan. Tab. 663.

In aggeribus pratis, sylvaticis haud infrequens: ved Veien til Bagsværd. Flor. Jul. Aug.

296. *Cineraria*.

Calyx simplex, æqualis, polyphyllus. Receptaculum nudum. Pappus simplex.

716. *C. palustris*, floribus corymbosis; foliis lato-lanceolatis, dentato-sinuatis; caule villosa. Flor. Dan. Tab. 573.

In paludibus turfosis; in littore lacuum. Flor. Jul. Aug.

Variat foliis superioribus integris; caule ramosiore crassiore.

297. *Senecio*.

Calyx cylindricus, calyculatus: squamis apice sphacclatis. Receptaculum nudum, Pappus simplex.

* Floribus flosculosis.

717. *S. vulgaris*, corollis nudis; foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus; floribus sparsis. Flor. Dan. Tab. 513.

Senec. denticulata Flor. Dan. Tab. 791. forte variatas hujus spec.

In ruderatis, cultis, tectis ubique. Flor. Apr. — Octobr.

** Floribus radiatis; radio revoluto.

718. *S. viscosus*, corollis revolutis; foliis pinnatifidis viscidis; squamis calycinis laxis longitudine perianthii. Flor. Dan. Tab. 1230.

In locis glareoso-argillofiso, aggeribus: ved Birkeröd. Flor. Jul. Aug.

719. *S. sylvaticus*, radio revoluto; foliis pinnatifidis denticulatis; caule corymbofo erecto. Flor. Dan. Tab. 869.

Ad vias, in sylvaticis: ved Veien til Charlottenlund: paa Grøvten ved Conflantia. Flor. Jul. Aug.

*** Floribus radiatis; radio patente; foliis pinnatifidis.

720. *S. Jacobæa*, corollis radiantibus; foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis; caule erecto. Flor. Dan. Tab. 944.

Ad vias, in sepibus, aggeribus. Flor. Jul. Aug. Sept.

a. aquaticus, foliis radicalibus imisque caulinis ovatis dentatis petiolatis: superioribus pinnatifidis. Flor. Dan. Tab. 784.

In pratis humidis: ved Flaskekroen.

β. foliis omnibus pinnatifidis nec lyratis.

γ. *laciniatus*, foliis inferioribus pinnatis: pinnis alternis pinnatifido-laciniatis: laciniis dentato incisus angustis divaricatis.

**** Floribus radiatis; radio patente; foliis indivisis.

721. *S. paludosus*, corollis radiantibus; foliis ensiformibus acute serratis, subtus subvillosis; caule stricto. Flor. Dan. Tab. 385.

In paludibus amnis: ved Beltringe i Nærheden af Preßtö observavi. Flor. Jun. Jul.

298. *Tussilago*.

Calycis squamæ discum æquantes, submembranaceæ. Receptaculum nudum. Pappus pilosus.

722. *T. Farfara*, scapo unifloro imbricato; foliis subcordatis angulatis denticulatis. Flor. Dan. Tab. 595.

In fossis; ad vias. Flor. Apr. Maj. Jun.

723. *T. Petasites*, thyrsis ovato; flosculis foemineis nudis paucis. Flor. Dan. Tab. 842.

In humidis: ved Rosenborg Slots-Graven. Flor. Apr. Maj.

299. *Aster*.

Calyx imbricatus: squamæ inferiores patulæ. Receptaculum nudum. Pappus simplex.

724. *A. Tripolium*, foliis lanceolatis integerrimis carnosis glabris; ramis inæquatis; floribus corymbosis. Flor. Dan. Tab. 615.

In maritimis vulgaris. Flor. Jul. Aug.

300. *Anthemis.*

Calyx hemispæricus: squamis subæqualibus.
Receptaculum paleaceum. **Pappus** nullus.

725. *A. arvensis*, receptaculis conicis, paleis setaceis: seminibus coronato-marginatis. Flor. Dan. Tab. 1178.

In agris, arvis; ad vias. Flor. Jun. Jul.

726. *A. Cotula*, receptaculis conicis; paleis setaceis; seminibus nudis. Flor. Dan. Tab. 1179.

In ruderatis, ad pagos, vias. Flor. Jul. Aug.

727. *A. tinctoria*, foliis bipinnatis, ferratis, subtus tomentosis; caule corymbofo. Flor. Danic. Tab. 741.

In aggeribus, ad vias: *ved Stolpegaard; Ruder-gaard.* Flor. Jul. Aug.

301. *Achillea.*

Calyx ovatus imbricatus. **Flosculi** radii quinque ad decem. **Receptaculum** nudum. **Pappus** nullus.

728. *A. Ptarmica*, foliis lanceolatis acuminatis, argute ferratis. Flor. Dan. Tab. 643.

In locis humidis, fossis, pratis. Flor. Jul. Aug.

629. *A. Millefolium*, foliis bipinnatis nudis: laciniiis linearibus dentatis; caulibus superne sulcatis. Flor. Dan. Tab. 737.

In pratis pascuis, ad vias aggeres &c. Flor. æstate.

Variat flore purpureo, & carneo.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

302. *Centaurea.*

Corollulæ radii infundibuliformes longiores irregulares. Receptaculum setosum. Pappus simplex.

* *Cyani*: calycinis squamis ferrato-ciliatis.

730. *C. Cyanus*, calycibus ferratis; foliis linearibus integerrimis, infimis dentatis. Flor. Dan. Tab. 993.

Inter segetes in arvis. Flor. Jun. Jul. Aug.

Variat flore purpureo & albedo.

781. *C. Scabiosa*, calycibus ciliatis; foliis pinnatifidis: pinnis lanceolatis. Flor. Dan. Tab. 1231.

Ad vias, in aggeribus, pratis. Flor. Jul. Aug. & Sept.

α. foliis radicalibus pinnatifidis; caulinis pinnatis: pinnis alternis pinnatifidis.

** *Rhapontica*: calycibus squamis aridis scariosis.

732. *C. Jacea*, calycibus scariosis laceris; foliis lanceolatis: radicalibus sinuato-dentatis; ramis angulatis. Flor. Dan. Tab. 519.

In arvis, pratis, pascuis, ad vias. Flor. Jun. Jul. Aug.

α. foliis inferioribus obovato-lanceolatis integerrimis, basi auriculato-dentatis; superioribus lanceolatis integris.

POLYGAMIA NECESSARIA.

303. *Calendula.*

Calyx polyphyllus æqualis. Receptaculum nudum. Semina disci membranacea. Pappus nullus.

733. *C. officinatis*, feminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus.

In cœmeteriis. Flor. Jul. Aug. Sept.

304. *Filago.*

Calyx imbricatus. Flosculi foeminei inter squamas calycis. Receptaculum nudum. Pappus pilosus aut nullus.

734. *F. germanica*, panicula dichotoma; floribus rotundatis axillaribus hirsutis; foliis acutis. Flor. Dan. Tab. 997. (*caule superne dichotomo, floribus glomeratis in dichotomiis sessilibus.*)

In arvis, aggeribus ficcis: ved Bagsværd. Flor. Jul. Aug.

735. *F. montana*, caule subdichotomo erecto; floribus conicis terminalibus axillaribusque. (*caulibus erectis subfiliformibus, foliisque subadpressis subimbricatis, tomentosis.*)

In apricis ficcis, aggeribus: ved Bagsværd; Lyngbye & aliis locis. Flor. Aug. Sept.

736. *F. arvensis*, caule paniculato; floribus conicis lateralibus

In aggeribus, arvis ficcis. Flor. Jul. Aug.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

Orchis. Nectarium corniforme pone florem.

Satyrrium. Nectarium scrotiforme seu inflato-
didymum pone florem.

Ophrys. Nectarium subtus carinatum.

Malaxis. Nectarium monophyllum concavum
cordatum, postice acuminatum, antice bifidum; genitalia in medio fovens.

Serapias. Nectarium ovatum, subtus gibbum:
labio ovato.

POLYANDRIA.

Calla. Spatha. Calyx nullus. Corolla nulla.
Stamina mixta pistillis.

Arum. Spatha. Calyx nullus. Corolla nulla.
Stamina supra pistilla.

Zostera. Folium seu spadix linearis. Calyx nullus. Corolla nulla. Semina alterna nuda.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

305. *Orchis*.

Nectarium corniforme pone florem.

* Bulbis indivisis.

737. *O. bifolia*, bulbis indivisis; nectarii lobo lanceolato integerrimo: cornu longissimo; petalis patentibus. Flor. Dan. Tab. 235.

In pascuis & pratis sylvaticis, ericetis. Flor. Jun. Jul.

738. *O. Morio*, bulbis indivisis; nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuso ascendente; petalis obtusis conniventibus. Flor. Danic. Tab. 253.

In pratis & pascuis subhumidis. Flor. Maj. Jun.

739. *O. mascula*, bulbis indivisis; nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuso; petalis dorsalibus reflexis. Flor. Dan. Tab. 457.

In pratis humidis. Flor. Maj. Jun. Jul.

740. *O. ustulata*, bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido punctis scabro, cornu obtuso; petalis distinctis. Flor. Dan. Tab. 103.

In pascuis sylvaticis: i Skoven paa den anden Side af Prestö over Vandet.

741. *O. militaris*, bulbis indivisis; nectarii labio quinquefido punctis scabro; cornu obtuso; petalis confluentibus. Haller, stirp. helv. Tab. 30.

Plantam hanc speciosissimam tantam vidi in promontorio Insulæ Monæ vulgo *lille Klint*. Flor. Maj. Jun.

** Bulbis palmatis.

742. *O. latifolia*, bulbis subpalmatis rectis; nectarii cornu conico, labio trilobo lateribus reflexo; bracteis flore longioribus. Flor. Dan. Tab. 266.

In humidis turfosis. Flor. Maj. Jun.

Variat foliis maculatis.

743. *O. maculata*, bulbis palmatis patentibus; nectarii cornu germinibus brevioribus: labio plano; petalis dorsalibus erectis. Flor. Dan. Tab. 933.

In pratis graminosis, nemorosis. Flor. Maj. Jun.

Variat foliis haud maculatis.

744. *O. conopsea*, bulbis palmatis; nectarii cornu setaceo germinibus longioribus: labio trifido; petalis duobus patentissimis. Flor. Danic. Tab. 224.

In prate turfofo: *Lundehuus - Mosen* dicto.

Flor. Jun.

Variat foliis latioribus & angustioribus.

306. *Satyrium*.

Nectarium scrotiforme seu inflato-didymum pone florem.

745. *S. albidum*, bulbis fasciculatis; foliis lanceolatis; nectarii labio trifido acuto: lacinia intermedia obtusa. Flor. Dan. Tab. 115.

In pratis elevatis ac collinis fruticosis: paa Bakkerne imellem Fuglehvad Krat og Brede. Flor. Jun. initio Jul.

307. *Ophrys.*

Nectarii labium dependens, supra rima longitudinali, subtus carina divisum.

* Bulbis ramosis.

746. *O. Nidus avis*, bulbis fibroso-fasciculatis; caule vaginato aphylo; nectarii labio bifido. Flor. Dan. Tab. 181.

In sylvis nemorosis: Bagsværd Skov; imellem Ordrup-Mose og Dyrehaven ved Jagdporten; i Hestkiøb Skov ved Birkerød haud frequens. Flor. Jun. Jul.

747. *O. ovata*, bulbo fibroso; caule bifolio; foliis ovatis; nectarii labio bifido. Flor. Dan. Tab. 137.

In pratis humidis, nemorosis: paa Kastelets Contreeslarpe ved Brönden; imellem Ordrupmose og Dyrehaven. Flor. Jun. Jul.

Variat 1. foliis ovalibus vel ovato-oblongis obtusis.

2. foliis rotundato-ovatis subcordatis obtusis mucronatis.

748. *O. cordata*, bulbo fibroso; caule bifolio (*antecedentis* multo *humiliori*) foliis cordatis.

Ophrys foliis cordatis. Hall. stirp. helv. Tab. 22.

Oph ydem hanc rarissimam *Dn. Prof. Vahl* in horto regii *Friderichsberg* legit.

** Bulbis rotundis.

749. *O. monorchis*, bulbo globoso; scapo nudo
nectarii labio trifido cruciato. Flor. Danic.
Tab. 102.

In turfosis: ved *Lundehuus*; *Bernstorff*; *Dron-*
ninggaard. Flor. Jun.

308. *Malaxis*. *Swartz Prodrum*.

Nectarium monophyllum concavum, postice
acuminatum antice bifidum, genitalia in me-
dio fovens.

750. *M. paludosa*, scapo pentagono; foliis spathu-
latis apice scabris. *Sw. Kongl. Vetenskabs Aca-*
demians nya Handlingar, Tom. X. pag. 127.
Tab. VI. fig. 2.

Ophrys paludosa L. Flor. Dan. Tab. 1234.

In paludibus: *Tepringe-* og *Lyngbye-Mose ved*
Söen. Flor. Jun.

751. *M. Loesellii*, scapo nudo trigono; foliis ovato
oblongis; petalis linearibus; nectario ovato
magno.

Ophrys Loesellii L. Flor. Dan. Tab. 877.

In paludibus: *Lyngbye-* og *Lundehuus-Mose*.
Flor. Jun.

Epidendri genere valde similis.

309. *Serapias*.

Nectarium ovatum gibbum: labio ovato.

752. *S. latifolia*, bulbis fibrosis; foliis ovatis am-
plexicaulibus; floribus pendulis. Flor. Dan.
Tab. 811.

Haud copiose in nemorosis: *Ordrup Skov imod Mosen; imellem denne Mose og Dyrehaven.* Flor. Jul. Aug.

753. *S. longifolia*, bulbis fibrosis, foliis ensiformibus sessilibus; floribus pendulis. Flor. Dan. Tab. 267.

In paludibus: *i Ordrup-Mose; ved Lyngbye-Søe.* Flor. Jun. Jul. Aug.

754. *S. ensifolia*, bulbis fibrosis; foliis ensiformibus distichis; bracteis minutissimis; floribus erectis; nectarii labio obtuso petalis brevioribus. Flor. Dan. Tab. 506.

Rarissime in sylvis: *Gelskov; Aldershvile ved Bagsværd.* Flor. Jun.

755. *S. grandiflora*, bulbis fibrosis; foliis ovato-lanceolatis; bracteis longitudine capsulæ; floribus erectis: nectario labio obtuso petalis brevioribus.

In sylve Insulæ Monæ: *paa store Klint solummodo legi.* Flor. Jun.

756. *S. rubra*, bulbis fibrosis; foliis ensiformibus; floribus erectis: nectarii labio acuto. Flor. Dan. Tab. 345.

Habitat cum præcedente. Flor. Jun. Jul.

POLYANDRIA.

310. *Arum.*

Calyx spatha monophylla cucullata. Spadix superne nudus, medio stamineus inferne pistilliferus.

757. *A. maculatum*, acaule, foliis sagittato-hastatis integerrimis; spadice clavato. Flor. Dan. Tab. 505.

In nemorosis: *Rosenborg-Have*. Flor. Jun. foliis non maculatis.

311. *Calla*.

Calyx Spatha plana. Spadix tectus flosculis. Stamina mixta pistillis. Baccæ polyspermæ.

758. *C. palustris*, foliis cordatis; spatha plana spadice undique hermaphrodito. Flor. Dan. Tab. 422.

In paludosis præprimis turfosis satis frequens. *Bagsvård; Birkeröd & alibi*. Flor. Jun. Jul.

312. *Zostera*.

Spadix linearis altero latere fructifero. Calyx nullus. Corolla nulla. Stamina alterna. Semina solitaria alterna.

759. *Z. marina*, pericarpis sessilibus. Flor. Dan. Tab. 15.

In mare & rejicitur in littore. Flor. Jun.

CLASSIS XXI.
MONOE CIA.

MONANDRIA.

- Chara. Masc.* Calyx nullus. Corolla nulla.
Fœm. Calyx tetraphyllus. Corolla nulla.
 Stigma trifidum. Semen unicum.
Zannichellia. Masc. Calyx nullus. Corolla nulla.
Fœm. Calyx monophyllus. Corolla nulla.
 Pistilla quatuor. Semina quatuor.

DIANDRIA.

- Lemna. Masc.* Calyx monophyllus. Corolla nulla.
Fœm. Calyx monophyllus. Corolla nulla.
 Stylus unicus. Capsula uni seu bilocularis.

TRIANDRIA.

- Carex. Masc.* Amentum spicatum. Calyx monophyllus uniflorus. Corolla nulla.
Fœm. Amentum spicatum. Calyx & Corolla ut in mare. Nectarium inflatum. Semen cingens.
Sparganium. Masc. Calyx triphyllus. Corolla nulla.
Fœm. Calyx triphyllus. Corolla nulla. Stigmata duo.

Typha. Masc. Amentum cylindricum. Calyx triphyllus. Corolla nulla.

Fœm. Amentum cylindricum infra masculos. Calyx capillaris. Corolla nulla. Stylus unicus. Semen pappigerum.

Amaranthus. Masc. Calyx triphyllus. Corolla nulla.

Fœm. Calyx & Corolla ut in mare. Styli tres. Capsula circumscissa, monosperma.

TETRANDRIA.

Urtica. Masc. Calyx tetraphyllus. Corolla nulla.

Fœm. Calyx bivalvis. Corolla nulla. Stigma villosum. Semen unicum.

Betula. Masc. Amentum triflorum. Corolla quadripartita.

Fœm. Amentum biflorum. Corolla nulla. Styli duo. Semen unicum.

Littorella. Masc. Calyx tetraphyllus. Corolla quadrifida. Filamenta longissima.

Fœm. Calyx nullus. Corolla quadrifida. Stylus longissimus. Semen nux.

POLYANDRIA.

Sagittaria. Masc. Calyx triphyllus. Corolla tripetala. Stamina circiter viginti quatuor.

Fœm. Calyx & Corolla ut in mare. Pistilla plurima. Semina numerosa.

Myriophyllum. *Masc.* Calyx exterior tetraphyllus. Corolla nulla. Stamina octo.

Fæm. Calyx & Corolla ut in mare. Pistilla quatuor. Semina quatuor.

Ceratophyllum. *Masc.* Calyx subseptempartitus. Corolla nulla. Stamina circiter octodecim.

Fæm. Calyx & Corolla ut in mare. Pistillum unicum. Semen unicum.

Fagus. *Masc.* Calyx quinquefidus. Corolla nulla. Stamina circiter duodecim.

Fæm. Calyx quadrifidus. Corolla nulla. Capsula quadrivalvis aculeato-hispida: valvis dehiscentibus. Semina duo.

Quercus. *Masc.* Calyx quinquefidus. Corolla nulla. Stamina circiter decem.

Fæm. Calyx integer. Corolla nulla. Styli quinque. Nux coriacea.

Corylus. *Masc.* Amentum imbricatum. Corolla nulla. Stamina octo.

Fæm. Calyx diphyllus. Corolla nulla. Styli duo. Nux nuda.

MONADELPHIA.

Xanthium. *Masc.* Calyx communis imbricatus. Corolla composita: propria monopetala. Receptaculum paleaceum.

Fæm. Calyx nullus. Corolla nulla. Styli duo. Drupa sicca bilocularis.

Pinus. Masc. Calyx tetraphyllus. Corolla nulla.
Stamina plurima.

Fœm. Amentum strobilaceum. Corolla nulla.
Pistillum unicum. Nux alata.

SYNGENESIA.

Bryonia. Masc. Calyx quinquedentatus. Co-
rolla quinquepartita. Filamenta tria.

Fœm. Calyx & Corolla ut in mare. Stylus
trifidus. Bacca.

MONANDRIA.

313. *Chara*.

Masc. Calyx nullus. Corolla nulla.

Fœm. Calyx tetraphyllus. Corolla nulla. Stigma bifidum. Semen unicum.

760. *C. tomentosa*, aculeis caulinis ovatis (caule albido tomentoso, tortili; foliis subinermibus longis.)

In fossis aquis stagnantibus. Flor. æstate.

761. *C. vulgaris*, caulibus lævibus, frondibus interne dentatis (foliis plerumque octonis brevibus, rigidis: foliolis secundis.)

In aquis stagnantibus. Flor. Jun. Jul.

762. *C. hispida*, caule aculeis capillaribus confertis. Flor. Dan. Tab. 134?

In mare inter Seelandia & Amager. Flor. Jul. & Aug.

α. microphylla, caule pollicari digitalique erecto ramoso: ramis alternis; foliis denis, brevissimis, capillaribus verticillatis (verticilliis approximatis) cauleque densissime hispida.

Varietatem hanc in fossis & stagnis aqua marina vel subsalsa repletis haud copiose observavi: ved Flaskekroen; paa Amager omtrent ved den første Krudttaarn.

763. *C. flexilis*, caule articulis inermibus diaphanis superne latioribus.

In stagnantibus, rivulis, nec non in maritimis. Flor. Maj.

314. *Zannichellia.*

Masc. Calyx nullus. Corolla nulla.

Fœm. Calyx monophyllus. Corolla nulla. Pistilla quatuor. Semina quatuor.

764. *Z. palustris*, caule debili ramosissimo; foliis binis ternis quaternisve capillaceo-linearibus floribus sessilibus subglomeratis in axillis foliorum. Flor. Dan. Tab. 67.

In stagnantibus; fossis; maris locis haud profundis: *paa Amager; ved Tømmerpladsen; ved Charlottenlund.* Flor. Jun. Jul.

D I A N D R I A.

315. *Lemna.*

Masc. Calyx monophyllus. Corolla nulla.

Fœm. Calyx monophyllus. Corolla nulla. Stylus unicus. Capsula uni seu bilocularis, mono seu disperma.

765. *L. trisulca*, foliis lanceolatis petiolatis.

In aquis stagnantibus, lacubus. Flor. Jun. Jul.

766. *L. minor*, foliis sessilibus utrinque planiusculis; radicibus solitariis.

In stagnis. Flor. Jun. Jul.

767. *L. gibba*, foliis sessilibus subtus hemisphaericis; radicibus solitariis.

In lacubus, fossis. Flor. Jul. Aug.

768. *L. polyrhiza*, foliis sessilibus; radicibus confertis.

In stagnantibus, piscinis. Flor. Jul. Aug.

T R I A N D R I A.

316. *Carex*.

Masc. Amentum spicatum imbricatum glumis.
Calyx monophyllus. Corolla nulla.

Fœm. Amentum imbricatum glumis. Calyx monophyllus. Corolla nulla. Nectarium inflatum bidentatum. Stigmata tria raro duo. Semen unicum intra nectarium.

* Spica unica simplici.

769. *C. dioica*, spica simplici dioica. Flor. Dan. Tab. 369.

In paludibus turfosis graminosis: *Ordrup-Mose*; *Bernstorf*; *Birkeröd*. Flor. Maj. Jun.

770. *C. pulicaris*, spica simplici androgyna: superne mascula; capsulis divaricatis retroflexis. Leers Flor. Herborn. Tab. 14. fig. 1.

In paludibus turfosis graminosis. Flor. Maj. Jun.

771. *C. Levcochlorin*, spica simplici androgyna, superne mascula; capsulis reflexis; seminibus triquetris.

C. pauciflora. Ligst. Flor. Scot. Tab. VI.

In paludibus: ved *Friderichsdal* og *Bagsværd* ubi Dn. Prof. Vahl legit.

** Spica composita androgyna.

772. *C. stellulata* Good., spiculis ternis subquaternis, ovatis, remotis; capsulis cordato-ovatis, bimarginatis, subachminatis, integris, divergentibus. Flor. Dan. Tab. 284.

C. muricata L. Leers Herb. Tab. 14. fig. 8.

In paludosis, pratis graminosis humidis. Flor. Maj. Jun.

Variat spicula terminali mascula, reliquis foemineis subandrogynis.

773. *C. curta*, Good., spiculis quinis subsenis, oblongiusculis, remotis, sessilibus; squamis ovatis, membranaceis, mucronatis, capsulis ovatis acutiusculis, brevioribus.

In uliginosis, graminosis humidis rarior: *Lyngbye-Mose; Bagsværd; Birkerød; Hirschholms-Skov.* Flor. Jun.

774. *C. canescens*, spiculis quinis subsenis, ovatis remotiusculis sessilibus; squamis ovatis subacutis membranaceis subferrugineis capsulis ovatis acutis, brevioribus. Flor. Dan. Tab. 285. Leers Herb. Tab. 14. f. 7.

In pratis uliginosis, graminosis cum antecedente. Flor. Jun.

Variat bracteis spiculis longioribus vel brevioribus, vel subnullis. An eadem cum *C. curta*?

775. *C. remota*, spiculis axillaribus solitariis remotis sessilibus, bracteis culmum subsupereantibus. Flor. Dan. Tab. 370.

In humidis sylvaticis: *Friderichsdal; Bagsværd; Gælskov & aliis locis.* Flor. Maj. Jun.

776. *C. muricata* Good., spica oblonga subdecomposita: spiculis subapproximatis sessilibus ovatis; squamis ovatis, acutis, marginibus membranaceis, pallide fuscis, carina virescente; capsulis oblongis apice bidentatis vel subbifi-

dis squamis longioribus. Michel. Gen. Tab. 33.

f. R. & f. 14. Leers Herb. Tab. 14. f. 3.

Haud frequens in pratis humidis: *ved Lyngbyemose imod Friderichsdal.* Flor. Maj. Jun.

777. *C. divulsa*, Good., spica decomposita elongata basi subramosa; spiculis inferioribus remotis superioribus contiguis; squamis ovatis membranaceis acutis carina virescente; capsulis suberectis ovatis squamis brevioribus. Mich. Gener. Tab. 33. f. 10.

In paludibus haud frequens: *ved Lyngbye-Søe.* Flor. Maj. Jun.

778. *C. ovalis* Good., spiculis subsenis ovalibus subglobularibus subapproximatis alternis; squamis lanceolatis mucronatis capsulam æquantibus. Leers Herb. Tab. 14. f. 6.

In graminosis uliginosis. Flor. Jun.

a. oblonga, spiculis subsenis ovali oblongis subapproximatis subdistichis omnibus androgynis; squamis lanceolatis mucronatis capsulam æquantibus arcte conniventibus. Flor. Dan. Tab. 1115. - Moris. Sect. 8. Tab. 12. fig. 29. & Michel. Gen. Tab. 33. fig. 18. An *C. disticha* Retz. Flor. scand. p. 217. synonymo Leerii excluso?

779. *C. brizoides*, spica composita disticha nuda; spiculis androgynis oblongis subcontiguis; culmo foliis longiori, tenui, triquetro, nudo. Michel. Gen. Tab. 33. f. 17. haud bene plantam nostram representat.

In paludibus Dn. Prof. Vahl & ego legimus, fed ubi, obliti sumus. Flor. Jun.

(*Squamæ magnæ ferruginæ lanceolatæ membranaceæ mucronatæ.*)

780. *C. elongata*, spica composita subdisticha nuda: spiculis oblongis remotiusculis; squamis ovatis acutis submucronatis ferrugineis, margine membranaceo albido; capsulis ovato oblongis, acuminatis, striatis, integris, squamis longioribus. Flor. Dan. Tab. 1236. An ne vera *C. canescens* L?

In pratis graminosis humidis, nemorosis: *Charlottenlund*. Flor. Maj. Jun.

Variat 1. spicis brevioribus & gracilioribus, spicularum numero sex ad octo.

2. spicis longioribus & crassioribus, spicularum numero quatuordecim ad sedecim.

781. *C. vulpina*, spica supradecomposita, inferne laxiore: spiculis ovatis androgynis glomeratis: superne masculis. Flor. Dan. Tab. 308. (*Capsulæ divergentes*).

Ad fossas, in pratis humidis, ericetis frequens

Variat 1. spiculis inferioribus pedunculatis ramosis. Leers. Herb. Tab. 14. f. 5.

2. spiculis inferioribus sessilibus.

783. *C. intermedia*, spica oblonga obtusa; spiculis plurimis; infimis terminalique scemineis; intermediis masculis; squamis lanceolatis ferrugi-

neis, carina pallida, subacuminatis. *Leerlii*
Herb. Tab. 14. f. 2. I.

In paludibus haud frequens. Flor. Jun.

783. *C. arenaria*, spica composita: spiculis androgynis (*superne masculis*) inferioribus remotioribus foliolo longiore instructis; culmo triquetro subincurvo. *Michel. Gen. Tab. 33. f. 4.*
(*Squamæ lanceolatæ ferrugineæ, margine pallido, subacuminatæ; capsulæ ovatæ acutæ striatæ squamis haud breviores.*)

In arenosis maritimis: *imellem Charlottenlund, og Skovshoved & alibi.* Flor. Jun.

784. *C. paniculata*, spica paniculato-racemosa; squamis lanceolatis ferrugineis margine apiceque albidis membranaceis, costa ferruginea mucrone deficiente; capsulis ovatis acutis glabris subpedunculatis. *Flor. Dan. Tab. 1116.*

In paludibus & fossis humidis: *imellem Wangehuset og Lundehuset; Ordrup-Mose &c.* Flor. Jun.

785. *C. appropinquata*, spica subdecomposita: spiculis elongatis sessilibus approximatis, omnibus androgynis, remotiusculis; squamis albidis, membranaceis, medio ferrugineis lanceolatis mucronatis; capsulis oblongis; bracteis lanceolato-subulatis spiculis brevioribus.

Ad margines lacuum, in paludibus: *ved Lyngbye Søe; Hirschholm-Skov.* Flor. Jun.

(*Culmus triquetus strictus fere crassitudine Caricis vulpinæ, pedalis vel brevior, haud ultra, foliosis: foliis lato-linearibus culmo subæquantibus.*)

786. *C. teretiuscula* Good., spica supra decomposita coarctato-ramosa acutiuscula; spiculis glomeratis superne masculis; squamis membranaceis acutis; capsulis ovatis patentibus acutis integris; culmo teretiusculo. Good. in Transact. Linnean. Societ. Vol. II. p. 163. Tab. 19. fig. 3.

In paludibus: *ved Lyngbye-Søe & alibi.* Flor. Maj. Jun.

(*Culmus debilis erectus foliosus. Folia angusta linearia.*)

*** Spicis sexu distinctis: foemineis sessilibus.

787. *C. præcox*, spicis approximatis; mascula terminali subclavata: foemineis ovatis adpressis; subrotundis pubescentibus. Jacq. flor. Austr. t. 46.

In apricis, pratis frequens. Flor. Maj. Jun.

788. *C. pilulifera*, spicis terminalibus subapproximatis subrotundis; mascula lineari oblonga; capsulis subglobosis obsolete trigonis subhirtis. Plukenet Almag. pag. 178. tab. 91. f. 8.

C. filiformis. Flor. Dan. Tab. 1048.

In ericetis apricis: *ved Brede Bakker; i Charlottenlund ved Granskoven.* Flor. Maj. Jun.

α. *androgyna*,

1. spicis binis, terminalibus, ovato-oblongis: suprema androgyna, infima foeminea.

2. spicis binis terminalibus masculis; tertia foeminea remota.

Bractea lanceolato-subulata in pilulifera monoica semper adest, *Icone Flor. Dan.* bene expressa; in varietate vero androgyna nobis dicta carens observavi.

Nullomodo a *C. montana* Lin. differt. confirmavit *Cel. Goodenough* l. c. pag. 191.

789. *C. flava*, spicis foemineis subrotundis: capsulis oblongis rostratis divaricatis; mascula lineari. *Flor. Dan. Tab. 1047.*

In paludosis. *Flor. Jun.*

Variat α . spicis foeminis binis & ternis remotis.

β . spicis subquaternis confertis subsessilibus; capsulis globosis acutis. *C. Oederi, Hoffm.*

Deutschl. Flor. pag 326. Flor. Dan. Tab.

371. Valde diversa est hac varietas a pilulifera; mihi autem videtur eadem esse cum *C. extensa* Gooden. l. c. pag. 175.

(Spica terminalis superne mascula, inferne foemina.)

Bractæ harum varietatum extensæ sunt, plus minusve reflexæ.

790. *C. filiformis*, spicis masculis subduabus linearibus: foemineis ovatis remotis; capsulis hirtis vel subtomentosis. *Good. l. c. pag. 172. tab. 20. f. 5. A C lasiocarpa Ehrh.* non diversa.

In paludosis valde humidis: *ved Lyngbye Söe.*

791. *C. tenuia*, spicis subquaternis, cylindrico-filiformibus, subandrogynis, erectis sessilibus; squamis ovato oblongis, obtusis, carinatis; ferugineis capsulis ovatis obtusis.

In paludibus, ad fossas: i Charlottenlund i den mellemste Mose ved Siden af Broen. Primo vere.

(Culmus erectus, subscaber, triqueter, Folia linearia, subscabrida, culmo breviora. Spicæ tres vel quatuor lineares, androgynæ, erectæ sessiles: infima bractea longa erecta subsetacea instructa, secunda bractea breviori. Squamæ ovato-oblongæ, obtusæ, acute carinatae capsulis haud breviores. Capsulæ ovatae, compressæ, gibbæ, obtusæ).

792. *C. cæspitosa*, spicis erectis: foemineis subsessilibus: mascula terminali; squamis ovatis capsulis ovatis submucronatis brevioribus. Gooden. l. c. pag. 195. Tab. 21. f. 8.

In paludosis, cæspitosis, nemorosis. Flor. Jun.

Variat. 1. numero spicarum foeminarum, tres quatuor ad quinque.

2. figura spicarum; ovatae, ovatae-oblongæ vel cylindricæ.

3. situ florum; summa spica floribus masculis; infimis foemineis omnibus; vel etiam infimis spicis superne masculis inferne foemineis instructis.

4. colore capsularum; viridibus vel atris capsulis.

æ. *pedunculata*, culmo triquetro altiori & laxiori; foliis haud angustioribus; spicis subquaternis; summis binis masculis linearibus terminali maximo; imis foemineis: suprema sessili; infima cylindrico-clavata

pedunculata floribus inferioribus remotis,
pedunculo filiformi palmari laxo incurvo
a basi culmi orto.

Varietatem hanc in sylve: *ved Rudergaard* inveni.

793. *C. subulata*, spicis ternis: mascula terminali subobovata: fœmineis ovatis sessilibus remotis; squamis ovato-oblongis mucrone subulata capsula longiori; capsulis obovato-oblongis.

In cœspitosis circa *Fahrum* ubi *Cel: Vahl* hanc invenit & benignissime mihi communicavit. Flor. Jun.

Culmus erectus triqueter subscaber. *Folia* linearia culmo breviora. *Spicæ* ternæ: mascula obovata vel ovata; squamæ oblongæ membranaceæ ferrugineæ, costa viridi, mucronæ subulata subtriquetra: fœmineæ duæ ovatæ, infima subpedunculata; squamæ oblongæ, membranaceæ, ferrugineæ, medio viridæ, mucrone quam in masculo longiori, tubulata. *Capsula* subobovatæ oblongæ submucronatæ: mucrone bifida brevi. *Bractææ* duæ foliaceæ, inferior longitudine culmi, superior brevior.

794. *C. digitata*, spicis linearibus erectis; vaginis aphyllis submucronatis; capsulis distantibus. (*Spica mascula fœminea terminali pedunculata adfixa*). *Leers. Herbornes. Tab. 16. f. 4.*

In sylvaticis haud frequens: i *Skoven imellem*

Friderichsdal og Kollekolle imod Fuurjøen. Flor.
May.

**** Spicis sexu distinctis: fœmineis peduncu-
 culatis.

795. *C. pallescens*, spicis ternis quaternisve: mas-
 cula terminali lineari erecta: fœmineis ovatis
 vel ovato oblongis pedunculatis remotis, flo-
 riferis erectis, fructiferis pendulis; bracteis
 foliaceis culmo longioribus erectis. *Flor. Dan.*
Tab. 1050.

In pratis & nemoribus humidis. Flor. May. Jun.

796. *C. panicea*, spicis binis, ternis, pedunculatis,
 erectis remotis oblongis; capsulis inflatis ob-
 tufiusculis subdistantibus; bracteis foliaceis spi-
 cis subæquantibus erectis. *Fl. Dan. Tab. 261.*
potius depauperata Good.: melior autem fig. 11.
Tab. 32 Michel. gen. huc quadrat.

In paludibus & locis humidis: i Lyngbye-Mose;
paa de skraa Bakker imellem Torbek og Springfor-
bie. Flor. May.

797. *C. limosa*, spicis fœmineis longe peduncula-
 tis, ovatis, pendulis: mascula longiore erec-
 tiore; capsulis ovatis compressis; bracteis li-
 nearibus subæquantibus, (*foliis angustissimis*).
Flor. Dan. Tab. 646. C. elegans. Wilden.
Prodr. pag. 34. Tab. 1. f. 4.

In paludibus & pratis humidis: Lyngbyemose &
alibi. Flor. May. & Jun.

Variat spicis fœmineis folitariis & geminis.

798. *C. distans*, spicis remotissimis subsessilibus bractea vaginali; capsulis angulatis mucronatis. Flor. Dan. Tab. 1049.

In pratis humidis. Flor. May. Jun.

Variat. 1. spica infima subpendula & interdum fere ad basin culmi exeunte.

2. Numerus spicarum multo variat, tres quatuor quinque.

3. spica fœminea suprema pauciflora vel ex solo flore pedunculato constat.

799. *C. sylvatica*, spicis pedunculatis pendulis: mascula erecta, fœmineis filiformibus laxis pedunculo brevioribus; capsulis ovatis aristatis furcatis. Flor. Dan. Tab. 404. Leers. Herborn. Tab. 15. f. 2. melior.

In sylvaticis: *Bagsværd*; *imellem Ordrupmose* og *Dyrehaven*. Flor. May. Jun.

800. *C. Pseud-Cyperus*, spicis fœmineis cylindricis pedunculatis pendulis subgeminatis; capsulis aristato-rostratis divaricatis. Flor. Dan. Tab. 1117.

In paludibus; lacubus; piscinis: *Lyngbye-Mose*; *Friderichsberg-Have*; *ved Ræveskovs-Bakke*. Flor. Maj. Jun.

801. *C. recurva*, spicis confertis pedunculatis cylindricis subpendulis: mascula terminali; capsulis imbricatis obtusiusculis. (*foliis culmoque glaucis*.) Flor. Dan. Tab. 1051.

In paludosis cœspitosis: *Ordrup-* og *Bernstorf-Mose*. Flor. Maj. Jun.

Variat 1. spicis masculis binis rarior ternis.

2. culmo humiliori & elatiori.

Obs. est *C. glauca* Roth. Scopol. An diversa a *C. humili* Retz.?

***** Spicis sexu distinctis: masculis pluribus.

802. *C. stricta*, spicis subsessilibus cylindricis acutis: masculis subduabus; foliis erectis strictis. Good. l. c. pag. 196. Tab. 21. f. 9.

(*Squamæ marum oblongæ acutiusculæ nigræ nervo dorsali viridi: feminearum oblongæ acutæ, capsulis octofariam imbricatis ovatis compressis acutis apice indiviso glabris citius deciduis, paulo breviores.*)

Ad margines lacuum. Flor. Maj.

803. *C. acuta*, spicis filiformibus; fœmineis inflorescentibus nutantibus: fructiferis erectis capsulis acutiusculis apice indiviso. Goon. l. c. p. *C. gracilis* Flor. Lond.

In paludibus ad lacos. Flor. Maj. 203.

(*Squamæ marum oblongæ, obtusæ, nigræ, nervo dorsali viridi: inferiores paulo breviores: fœminearum oblongæ acutæ nigræ nervo dorsali viridi capsula paulo breviores [paulo longiores].*)

804. *C. obtusata*, spicis cylindricis erectis; squamis ovato oblongis obtusissimis: marum ferrugineis: fœminearum nigris linea dorsali viridi apicem versus oblitterata; capsulis ovatis cum mucrone brevi indiviso.

Ad margines lacuum. Flor. Maj. Jun.

(*Culmus erectus triqueter scaber. Folia angusta linearia apice subulata. Spicæ masculinæ duæ, terminalis major: fœminæ duæ remotæ cylindrico filiformes, scissiles. Bractæ foliaceæ infima maxima spica haud longior.*)

An varietas *C. strictæ* vel *C. acutæ*?

805. *C. paludosa*, spicis oblongis subobtusis: masculinarum squamis obtusis: fœminearum lanceolatis; capsulis ovato-lanceolatis subbidentatis.

Good. l. c. pag. 202. *C. acuta* Flor. Lond.

In paludosis: ved Fuglehvad Mølle neden for Krattet. Flor. Maj. Jun.

(*Culmus erectus tripedalis & ultra, triqueter. Folia semunciam fere lata, longa culmo breviora, basin rubra. Spicæ masculinæ duæ vel tres approximate oblongæ obtusæ: fœminæ totidem oblongæ, cylindricæ, acutæ, si mares in apice, subremotissimæ. Bractæ foliaceæ: inferior culmo longior.*)

a. elongata, spicis fœmineis divaricatis recurvis subpendulis, longioribus; fœminearum squamis acutioribus vel mucronatis.

806. *C. riparia*, spicis oblongis acutis; masculinarum squamis lanceolatis: fœminearum aristato-acuminatis; capsulis ovato lanceolatis apice furcato dentatis. Good. l. c. pag. 200. Curt. Flor. Lond. Flor. Dan. Tab. 1118.

C. crassa. Retz.

Ad rivulos, lacos, in fossis paludosis. Flor.
Maj. Jun.

808. *C. vesicaria*, spicis masculis linearibus: foemineis oblongis patentibus; capsulis inflatis ovato oblongis acuminatis, apice subbifidis; squamis lanceolatis acutis. Flor. Dan. Tab. 647.

In fossis, paludibus. Flor. Maj. Jun.

Culmus triqueter angulis acutissimis. Styli tres villosiusculæ.

Variat 1. spicis foemineis subsessilibus cylindricis elongatis, suberectis.

2. spicis foemineis ovatis pedunculatis subpendulis.

3. spica foeminea suprema acuta, apice mascula.

808. *C. ampullacea*, Good. spicis filiformibus: masculis tenuioribus: foemineis teretibus erectis capsulis inflatis globosis aristato-rostratis divaricatis; squamis ovato lanceolatis acutis, margine scariosis.

In fossis paludosis: *bag ved Ordrup; ved Birkerød.*
Flor. Maj.

Culmus triqueter angulis acutis. *Folia* angusta culmo longiora. *Spicae* filiformes cylindricæ, remotæ. *Squamæ* ovato lanceolatæ, pallidæ: carina subviridi, margine scarioso, tenero albido: *mascularum* acutæ vel obtusiusculæ: *foeminearum* acutæ. *Capsulae* ovato-globosæ, rostratæ, rostro bifido divaricato. *Styli* tres villosiusculæ.

839. *C. obtusangula*, spicis masculis filiformibus binis remotis: foemineis tribus cylindricis pedunculatis subpendulis; squamis linearibus obtusis; capsulis globosis, inflatis divaricatis, rostro longo bifido.

In fossis paludosis: *Birkeröd; Ordrup-Mose & alibi.* Flor. Maj.

Culmus obsolete triqueter angulis obtusis. Styli duæ vel tres.

840. *C. hirta*, spicis foemineis remotis, subpedunculatis erectis; capsulis hirtis. Flor. Dan. Tab. 425.

Tam in ficcis quam humidis glareosis. Flor. Maj. Jun.

Variat. 1. spicis masculis binis tribusve, magis minusve remotis foemineisque ovato-cylindricis.

2. spicis masculis ovatis: foemineis filiformibus.

3. spicis omnibus filiformibus.

4. spicis foemineis subsessilibus aut longe pedunculatis.

5. spicis summis androgynis, imis foemineis.

6. squamis omnibus lanceolatis acutissimis vel masularum acutissimis, foeminearum mucrone longo fetaceo.

7. vaginis hirsutissimis; foliis pubescentibus.

8. vaginis subpubescentibus; foliis glabris.

9. culmo humiliori rigidiori crasso.

10. culmo elatiori filiformi laxo.

317. *Sparganium.*

Masc. Amentum subrotundum. Calyx triphyllus. Corolla nulla.

Fœm. Amentum subrotundum. Calyx triphyllus. Corolla nulla. Stigma bifidum. Drupa exsucca mono seu disperma.

§11. *S. ramosum*, foliis triquetris canaliculatis erectis; culmo ramoso. Flor. Lond.

Ad fossas; margines lacuum, piscinum. Flor. Jun. Jul.

§12. *S. simplex*, foliis ensiformibus, basi triangularibus, supra planis, erectis; culmo simplici. Flor. Dan. Tab. 932.

Ad fossas, in paludibus. Flor. Jun. Jul.

§13. *S. natans*, foliis planis, decumbentibus, subnatantibus; culmo erecto humili paucifloro. Flor. Dan. Tab. 260.

In fossis paludum: *Bernstorff-Ordrup og Tepri-Mose*. Flor. Jul. Aug.

318. *Typha.*

Masc. Amentum cylindricum. Calyx obsoletus triphyllus. Corolla nulla.

Fœm. Amentum cylindricum infra masculos. Calyx capillaris papposus. Corolla nulla. Stylus unicus. Semen unicum, infidens pappo capillari.

814. *T. latifolia*, foliis subensiformibus; spica mascula foemineaque approximatis. Flor. Dan. Tab. 645.

In paludibus turfosis, piscinis. Flor. Jun. Jul.

815. *T. angustifolia*, foliis semicylindricis; spica mascula foemineaque remotis. Flor. Danic. Tab. 815.

In paludibus; piscinis: ved Kastellet & alibi. Flor. Jun. Jul.

319. *Amaranthus*.

Masc. Calyx triphyllus. Corolla nulla Stamina tria.

Fœm. Calyx & Corolla ut in mare. Styli tres. Capsula unilocularis circumscissa. Semen unicum.

816. *A. Blitum*, glomerulis lateralibus; floribus trifidis; foliis ovatis retusis; caule difluso. Inter olera horti Dn. Kollin i Stege paa Möen tantum observavi.

T E T R A N D R I A.

320. *Urtica*.

Masc. Calyx tetraphyllus. Corolla nulla. Nectarium centrale, cyathiforme.

Fœm. Calyx tetraphyllus: foliis duobus oppositis exiguis. Corolla nulla. Stigma villosum. Semen unicum ovatum nitidum.

817. *U. urens*, monoica, foliis oppositis ovalibus. Flor. Danic. Tab. 739.

In cultis oleraceis, ubique. Flor. Jun. Jul.
Aug.

§18. *U. dioica*. dioica, foliis oppositis cordatis;
racemis geminis. Flor. Dan. Tab. 746.

In ruderatis ad sepes, vias. Flor. Jun. usque
ad Septembr.

321. *Betula*.

Masc. Calyx monophyllus tri seu quinquefidus,
triflorus. Corolla quadripartita.

Fœm. Calyx monophyllus tri seu quinquefidus
biflorus. Styli duo. Semina duo vel tria.

§19. *B. alba*. foliis ovato-spatulatis, acuminatis
inciso serratis, glabris. Joh. Bauh. Hist.
Plant. I. Libr. VIII. pag. 149.

In sylvis: *Birkeröd; Hirschholm, Friderichsborg*.
Flor. Maj.

Variat ramis erectis strictis atque flaccidis
pendulis.

§20. *B. alnus*, foliis subrotundis glutinosis glabris,
obtusè crenatis, petiolatis ramosis. Joh.
Bauh. Hist. Plant. I. Libr. VIII. pag. 151.

In paludibus; & sylvis humidis. Flor. Apr.
Maj.

§21. *B. incana*, foliis ovatis acutis biserratis inca-
nis; stipulis lanceolatis; amentis spicatis. Joh.
Bauh. l. c. pag. 154. fig. superior.

Haud frequens: *ved Bagsværd, Aldershvile; ved
Gels-Bakke*. Flor. Maj.

322. *Littorella*.

Masc. Calyx tetraphyllus. Corolla quadrifida. Stamina longa.

Fœm. Calyx nullus. Corolla subquadrifida. Stylus longus. Nucleus monospermus.

322. *L. lacustris*, foliis semicylindricis linearibus; scapis brevibus unifloris infra medium bracteatibus. Flor. Dan. Tab. 170.

In inundatis ericeti: *Odsherred ved Rörvig* ubi *Dr. Marcussen* plantam hanc rarissimam legit.

P O L Y A N D R I A.

323. *Sagittaria*.

Masc. Calyx triphyllus. Corolla tripetala. Filamenta fere viginti quatuor.

Fœm. Calyx & Corolla ut in mare. Pistilla plurima. Semina plurima, nuda.

323. *S. sagittifolia*, foliis sagittatis acutis. Flor. Dan. Tab. 172.

In piscinis molendinis: *imellem Lyngbye og Pæpiersmølle*. Flor. Jun. Jul.

Folia juniora linearia graminea.

324. *Myriophyllum*.

Masc. Calyx monophyllus quadridentatus. Petala quatuor, unguiculata caduca. Stamina octo.

Fœm. Calyx & Corolla ut in mare. Stigmata quatuor sessilia. Capsulæ quatuor, monospermæ, connatæ.

824. *M. spicatum*, caule ramoso spicis terminalibus interruptis nudis: floribus bracteatis, foliis pinnatis capillaribus. Flor. Dan. Tab. 68r. In fossis, piscinis, lacubus: ved *St. Hans Høspital*; *Lyngbye-Søe bag Lyngbye*. Flor. Jun. Jul. Aug.

825. *M. verticillatum*, caule simplici, floribus verticillatis, hermaphroditis; foliis pinnatis: pinnis linearibus carnosiss. Flor. Dan. Tab. 1046.

In fossis, piscinis, lacubus: ved *Papiersmølle*; *Bernstorfmose*; *Lundehusmose*. Flor. Jun. Jul. Aug.

Variat foliis vel pinnulis capillaceis longioribus ac brevioribus.

325. *Ceratophyllum*.

Masc. Calyx multipartitus. Corolla nulla. Stamina duplo plura quam segmenta calycis.

Fœm. Calyx & Corolla ut in mare. Pestillum unicum. Semen nnicum.

826. *C. demersum*, foliis dichotomis dentatis: inferioribus linearibus; superioribus inflato tubulosis densissimis; capsulis rostro longitudine æqualibus.

In fossis, stagnis. Flor. Jun. Jul.

827. *C. submersum*, foliis dichotomis dentatis: inferioribus subinflato — tubulosis; superioribus capillaribus approximatis; capsulis acumine brevi obtuso.

In stagnantibus, piscinis: *paa Nørre-Fælle* & alibi. Flor. Jun. Jul.

326. *Quercus*.

Masc. Calyx subseptemfidus. Corolla nulla. Stamina ad decem.

Fœm. Calyx monophyllus integer scaber. Corolla nulla. Styli duo ad quinque. Nux ovata coriacea.

§28. *Q. Robur*, foliis petiolatis oblongis superne latioribus: sinubus acutioribus, angulis obtusis, fructibus subsessilibus.

In sylvis haud frequens. Flor. Maj. Jun.

§29. *Q. fœmina*, foliis subpetiolatis oblongis obtusis, pinnato-sinuatis; fructibus subsolitariis longe pedunculatis. Flor. Dan. Tab. 1180.

In sylvis frequentior. Flor. Maj. Jun.

327. *Fagus*.

Masc. Calyx quadri-seu quinquesfidus, campanulatus. Corolla nulla. Stamina ad duodecim.

Fœm. Calyx & Corolla ut in mare. Calyx quadrifidus. Capsula aculeato-hispida quadri-valvis: Valvis dehiscentibus. Semina duo.

§30. *F. Castanea*, foliis lanceolatis acuminatis serratis subtus nudis.

In plantationibus: *ved, Bagsværd; i Dyrehave*. Flor. Jun.

831. *F. sylvatica*, foliis ovatis obsolete serratis.
Flor. Dan. Tab.

In sylvis ubique. Flor. Maj. Jun.

328. *Corylus*.

Masc. Calyx monophyllus, trifidus, squamiformis, uniflorus. Corolla nulla. Stamina plura.

Fæm. Calyx diphyllus, lacerus. Corolla nulla. Styli duo. Nux ovata.

832. *C. Avellana*, stipulis ovatis obtusis (foliis alternis rotundato-ovatis inciso-serratis acutis rugosis; amentis masculis in ramulis terminalibus pedunculatis pendulis; floribus scemineis in gemmis terminalibus.)

In sylvis, nemoribus. Flor. Mart. Apr. Maj.

MONADELPHIA.

329. *Xanthium*.

Masc. Calyx communis imbricatus. Corolla composita: propria monopetala infundibuliformis. Filamenta connata. Receptaculum paleaceum.

Fæm. Calyx. Involucrum diphyllum, biflorum. Corolla nulla. Styli duo. Drupa ficca, muricata, bifida: nucleo biloculari.

833. *X. strumarium*, caule inermi; foliis cordatis trinerviatis. Flor. Dan. Tab. 970.

In ruderatis inter rariores: uden for Amagerport; ved Salpeterværket paa Østerfelled. Flor. Jun. Jul. Aug.

330. *Pinus*.

Masc. Calyx tetraphyllus. Corolla nulla. Stamina plurima.

Fœm. Strobilus: squamis bifloris. Corolla nulla. Pistillum unicum. Nuxala membranacea.

* Foliis pluribus ex eadem basi vaginali.

834. *P. sylvestris*, foliis geminis: primordialis solitariis glabris.

835. *P. Larix*, foliis fasciculatis obtusis.

** Foliis solitariis & basi distinctis.

836. *P. Abies*, foliis solitariis, subulatis, mucronatis, lævibus, bifariam versis.

837. *P. Picea*, foliis solitariis emarginatis.

Species hæ enumeratæ minime indigenæ; sed in plantationibus diversis locis adordinatis inveniuntur. Florent primo vere.

SYNGENESIA.

331. *Bryonia*.

Masc. Calyx quinquedentatus. Corolla quinquepartita. Filamenta tria.

Fœm. Calyx & Corolla maris. Stylus tri seu quadrifidus. Bacca globosa polysperma.

838. *B. alba*, foliis palmatis utrinque calloso-scabris; floribus monoicis. Flor. Dan. Tab. 813.

In sepibus rarior: lige over for *Blaaegaard uden* for Nørreport. Flor. Jun.

 CLASSIS XXII.

 D I O E C I A.

DIANDRIA.

Salix. Masc. Amenti squamæ unifloræ. Corolla nulla. Nectarium baseos. Stamina plerumque duo.

Fœm. Amenti squamæ unifloræ. Corolla nulla. Stylus bifidus. Capsula bivalvis. Semina papposa.

TRIANDRIA.

Empetrum. Masc. Calyx tripartitus. Corolla tripetala. Stamina longa.

Fœm. Calyx & Corolla maris. Styli tres ad novem. Bacca tri-enneasperma.

TETRANDRIA.

Hipophae. Masc. Calyx bipartitus. Corolla nulla.

Fœm. Calyx bifidus. Corolla nulla. Pistillum unicum. Bacca monosperma: arillo truncato.

Myrica. Masc. Amentum imbricatum. Corolla nulla.

Fœm. Amentum & Corolla ut in mare. Styli duo. Pericarpia monosperma.

P E N T A N D R I A.

Canabis. Masc. Calyx quinquepartitus. Corolla nulla.

Fæm. Calyx monophyllus. Corolla nulla.
Styli duo. Nux.

Humulus. Masc. Calyx pentaphyllus. Corolla nulla.

Fæm. Calyx monophyllus. Corolla nulla
Styli tres. Semen unicum intra calycem foliatum.

O C T A N D R I A.

Populus. Masc. Amentum lacerum. Corolla nulla. Nectaria ovata. Stamina ad fedecim.

Fæm. Amentum & Corolla ut in mare- Stigma quadrifidum. Capsula bivalvis. Semina papposa.

E N N E A N D R I A.

Mercurialis. Masc. Calyx triphyllus. Corolla nulla. Stamina ad duodecim.

Fæm. Calyx & Corolla ut in mare. Styli duo. Capsula dicocca.

Hydrocharis. Masc. Calyx triphyllus. Corolla tripetala.

Fæm. Calyx & Corolla ut in mare. Styli sex. Capsula infera.

DODECANDRIA.

Stratiotes. Masc. Calyx spatha diphylla. Petala tria perianthio imposita. Nectaria plura antheræformia. Stamina plerumque duodecim.

Fœm. Calyx Petala & Nectaria ut in mare. Styli sex. Stigmata duodecim. Bacca ovalis sexlocularis.

MONADELPHIA.

Juniperus. Masc. Amentum. Corolla nulla. Stamina tria.

Fœm. Calyx tripartitus. Petala tria. Styli tres. Bacca trisperma.

D I A N D R I A.

232. *Salix*.

Masc. Amenti squamæ unifloræ. Corolla nulla.
Glandula baseos nectarifera.

Fæm. Amenti squamæ unifloræ. Corolla nulla.
Stylus bifidus. Capsula unilocularis, bi-
valvis. Semina papposa.

* Foliis glabris ferratis.

839. *S. pentandra*, foliis ovatis, acutis, ferratis
glabris; floribus pentandris heptandrisve.
Flor. Dan. Tab. 943.

Haud frequens in sepibus: ved Veien til Fride-
richsdal paa venstre Haand omtrent ved Kongs-
hvile; i Dyrehaven. Flor. Maj. Jun.

840. *S. fragilis*, foliis ovato-lanceolatis, ferratis;
petiolis dentato-glandulosis.

In sepibus ad pagos. Flor. Maj.

Variat 1. fruticis facie, ramis fragilissimis;
gemma duabus lateralibus. *S. bigemmis*
Hoffm.

2. Arboris facie, ramis fragilibus; foliis in-
ferioribus minoribus obovatis reflexis. *S.*
decipiens Hoffm. Hist. Salic. Tab. 31.

841. *S. monandra*, foliis ferratis, glabris, lineari-
lanceolatis, superioribus obliquis; floribus
monandris. Hoffm. l. c. Tab. fig. 1. 2. Tab. 5.
fig. 1.

Haud frequens in sepibus: ved Kongeveien til
Lyngbye, hvor Veien gaaer op til Bierg-Gaarden.
Flor. Maj.

** Foliis integerrimis villosis.

842. *S. incubacea*, foliis integerrimis lanceolatis subtus villosis nitidis; stipulis ovatis acutis.

In paludosis turfosis. Flor. Maj.

843. *S. repens*, foliis integerrimis lanceolatis utrinque nudiusculis; caule repente. An eadem cum *Salix depressa* Hoffm. l. c. p. 63. t. 15. 16?

In paludibus turfosis. Flor. Maj.

844. *S. rosmarinifolia*, foliis integerrimis, lanceolato-linearibus strictis sessilibus subtus tomentosis.

In paludibus turfosis: *Lyngbye-Mose: Lundehus-Mose; i Langmosen ved Dronninggaard.* Flor. Maj.

*** Foliis subserratis villosis.

845. *S. caprea*, foliis ovatis rugosis subtus tomentosis undatis superne denticulatis. Flor. Dan. Tab. 245.

In sepibus humidis. Flor. Apr. Maj.

846. *S. acuminata*, foliis ovato-oblongis (obovatis cum acumine) subtus tomentosis superioribus integris inferioribus crenatis.

In sylve: imellem *Rudergaard og Birkerød; ved en af Fiske Dammene.* Flor. Jun.

847. *S. cinerea*, foliis subserratis oblongo ovatis subtus subvillosis; stipulis dimidiato-cordatis.

In sepibus humidis, paludibus. Flor. Maj.

848. *S. viminalis*, foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus longissimis acuminatis, subtus sericeis ramis virgatis.

In sepibus: ved Veien til Charlottenlund; ved Bernstorff Veien; imellem Bagsværd og Kollekolle. Flor. Maj.

849. *S. alba*, foliis lanceolatis acuminato-ferratis, utrinque pubescentibus: ferraturis infimis glandulosis. Hoffm. l. c. Tab. 7. 8.

In sepibus. Flor. Maj.

TRIANDRIA.

333. *Empetrum*.

Masc. Calyx tripartitus. Corolla tripetala. Stamina longa.

Fæm. Calyx & Corolla ut in mare. Styli novem. Bacca enneasperma.

850. *E. nigrum*, procumbens, foliis linearibus, supra planiusculis, subtus convexis, sub verticillatis subquaternis; floribus axillaribus sessilibus. Flor. Dan. Tab. 975.

In paludibus, in sylvis: Lyngbye-Mose; i Skoven ved Rudersdal. Flor. Maj.

TETRANDRIA.

334. *Hipophae*.

Masc. Calyx bipartitus. Corolla nulla.

Fæm. Calyx bifidus. Corolla nulla. Stylus unicus. Bacca monosperma.

851. *H. Rhamnoides*, foliis lanceolatis supra e viridi canescentibus, subtus argenteo-sericeis

nervo elevato; floribus sessilibus lateralibus.

Flor. Dan. Tab. 265.

Tantum vidi in Inf. Monæ vulgo *lille Klint*.

335. *Myrica*.

Masc. Amentum imbricatum: squamis triangularibus. Corolla nulla. Stamina plerumque quatuor.

Fœm. Amentum imbricatum: squamis minoribus. Corolla nulla. Styli duo. Pericarpia in strobilum congesta, triloba monosperma coriacea.

852. *M. Gale*, foliis lanceolatis subserratis; caule fruticoso. Flor. Dan. Tab. 327.

In paludosis: *ved Helsingör, Dn. Holten*.

P E N T A N D R I A.

336. *Cânabis*.

Masc. Calyx quinquepartitus. Corolla nulla.

Fœm. Calyx monophyllus integer latere hians. Corolla nulla. Styli duo. Nux bivalvis, intra calycem clausum.

853. *C. sativa*, foliis digitatis; floribus masculinis racemoso-terminalibus: foemineis axillaribus subsolitariis.

In ruderatis quasi sponte provenit. Flor. Maj. Jun.

337. *Humulus*.

Masc. Calyx pentaphyllus. Corolla nulla.

Fœm. Calyx monophyllus, oblique patens, in-

teger. Corolla nulla. Styli duo. Semen unicum intra calycem foliosum.

854. *H. Lupulus*, caule longissimo volubili; foliis cordatis tri- quinquepartitis vel integris oppositis: floribus masculinis racemoso paniculatis, alaribus: foemineis in strobilos dispositis. Flor.

Dan. Tab. 1239.

In sepibus, sylvis; ad pagos frequens. Flor. Jun. Jul.

OCTANDRIA.

338. *Populus*.

Masc. Amentum laxè imbricatum: squamis lacris. Corolla turbinata, obliqua, integra.

Fœm. Amentum & Corolla ut in mare. Stigma quadrifidum. Capsula bilocularis. Semina multa, papposa.

855. *P. alba*, foliis subrotundis, dentato-angulatis subtus tomentosis.

Passim ad pagos, in sylvis. Flor. Apr.

856. *P. tremula*, foliis subrotundis, dentato-angulatis utrinque glabris.

Passim ad pagos. Flor. Mart.

857. *P. nigra*, foliis deltoidibus acuminatis serratis, utrinque glabris, coriaceis.

Passim. Flor. Apr. Maj.

ENNEANDRIA.

339. *Mercurialis*.

Masc. Calyx tripartitus. Corolla nulla. Stamina novem ad duodecim. Antheræ globosæ didymæ.

Fœm. Calyx & Corolla maris. Styli duo. Capsula dicocca, bilocularis, monosperma.

858. *M. pereanis*, caule simplicissimo; foliis ovatis, serratis, acuminatis, scabris. Flor. Danic. Tab. 400,

In nemoribus frequens. Flor. Maj. Jun.

859. *M. annua*, caule brachiato; foliis glabris; floribus spicatis. Bull. Tab. 159. 233.

In culcistris oleraceis, hortis: *Rosenborg-Have ubi rarius observavi.*

340. *Hydrocharis.*

Masc. Spatha diphylla. Calyx trifidus. Corolla tripetala. Filamenta tria interiora styli-fera.

Fœm. Calyx & Corolla ut in mare. Styli sex. Capsula sexlocularis, polysperma, infera.

860. *H. Morsus rance*. foliis orbiculatis, integerrimis, nitidis, glabris, natantibus. Flor. Dan. Tab. 878.

In lacubus, piscinis, fossis. Flor. Jul. Aug.

DODECANDRIA.

341. *Stratiotes.*

Masc. Spatha diphylla quadri seu sexflora. Perianthium monophyllum. Petala tria tubo perianthii imposita. Nectaria plura in peripheria floris. Stamina plerumque duodecim.

Fœm. Spatha diphylla uniflora. Perianthium
Corolla & Nectaria ut in mare. Styli sex,
bifidi. Bacca ovalis hexagona, sex locu-
laris.

861. *S. Aloides*, foliis ensiformi triangulis, acu-
leatis. Flor. Dan. Tab. 337.

In lacubus, piscinis, aquis stagnantibus: ved
Ordrup; imellem Lyngbye og Papiersmølle; ved
Friderichsdals Broe. Flor. Jun. Jul.

MONADELPHIA.

342. *Juniperus.*

Masc. Amentus squamis decem, unifloris. Co-
rolla nulla stamina tria.

Fœm. Calyx tripartitus. Petala tria. Styli tres.
Bacca trisperma, tribus tuberculis calycis
inæqualis.

862. *I. communis*, foliis ternis patentibus mucro-
natis bacca longioribus. Flor. Dan. Tab.
1119.

In sylvis; ericetis: ved Friderichsdal, imellem
Bløfstrup og Friderichsbor; ved Birkerød, Ru-
dergaard & alibi. Flor. April. Maj.

CLASSIS XXIII.
POLYGAMIA.

MONOECIA.

Holcus. Hermaphrod. Gluma uniflora. Corolla bivalvis. Stamina tria. Styli duo. Semen unicum.

Masc. Gluma uniflora. Corolla bivalvis. Stamina tria.

Parietaria. Hermaphrod. Calyx quadrifidus. Corolla nulla. Stamina quatuor. Stylus unicus. Semen unicum.

Fœm. Calyx quadrifidus. Corolla nulla. Stamina nulla.

Acer. Hermaphrod. Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala. Stamina octo. Styli duo. Samaræ duæ unialatæ.

Masc. Calyx, Corolla & Stamina ut in hermaphrodito.

Atriplex. Hermaphrod. Calyx pentaphyllus. Corolla nulla. Stamina quinque. Stylus bipartitus. Semen unicum depressum.

Fœm. Calyx diphyllus. Corolla nulla. Stamina nulla Semen unicum compressum.

DIOECIA.

Eraxinus. Hermaphrod. Calyx nullus seu quadripartitus. Corolla nulla seu tetrapetala. Stamina duo. Pistillum unicum.

Fœm. Calyx & Corolla ut in hermaphrodito. Pistillum & Semen unicum.

M O N O E C I A.

343. *Holcus.*

Hermaphrod. Calycis Gluma uni seu biflora.
Corolla aristata. Stamina tria. Styli duo.
Semen unicum.

Masc. Calycis Gluma bivalvis. Corolla nulla.
Stamina tria.

863. *H. mollis*, glumis bifloris nudiusculis; flosculo hermaphrodito mutico: masculo arista genicula. Flor. Dan. Tab. 1059.

Ad margines agrorum; in sylvis. Flor. Jul. Aug.

864. *H. lanatus*, glumis bifloris villosis; flosculo hermaphrodito mutico: mascula arista geniculata. Flor. Dan. Tab. 1181.

In pratis; pascuis. Flor. Jun. Jul.

865. *H. odoratus*, glumis trifloris muticis acuminatis; flosculo hermaphrodito diandro. Flor. Dan. Tab. 963.

In paludosis, pascuis. Flor. Maj. Jun.

344. *Parietaria.*

Hermaphrod. Calyx quadrifidus. Corolla nulla.
Stamina quatuor. Stylus unicus. Semen unicum superum ovatum.

Fœm. Calyx & Corolla hermaphroditi. Stamina nulla. Stylus & semen ut in hermaphrodito.

866. *P. officinalis*, foliis lanceolato-ovatis; pedunculis dichotomis; calycibus diphyllis
Flor. Dan. Tab. 521.

Haud frequens: *Kastels Ravelin ved den første Broe ved Vandet nedenfor Volden.* Flor. Jul. Aug.

345. *Acer.*

Hermaphrod. Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala. Stamina octo. Pistillum unicum
Samaræ duæ, rarior tres, unialatæ.
terminatæ.

Masc. Calyx Corolla & Stamina ut in hermaphrodito.

867. *A. Pseudo-platanus*, racemis pendulis; foliis quinquelobis obtusis inæqualiter ferratis.

Passim: *paa Volden; ved Kastellet &c.* Flor. Maj.

868. *A. platanoides*, corymbo simplici erecto; foliis quinquelobis dentatis: dentibus acumina-
tis.

Passim. *ved gamle Kongevej uden Vesterport; i Lunden ved Fahrumsgaard; i Plantagerne ved Bagsværd &c.* Fior. April. Maj.

869. *A. campestre*, corymbo tripartito erecto; foliis quinquelobis integerrimis lobis inferioribus emarginatis.

In sylvis, i Dyrehaven ikke langt fra Kilden.

346. *Atriplex*.

Hermaphrod. Calyx pentaphyllus. Corolla nulla.
Stamina quinque. Stylus bipartitus. Semen
unicum, depressum.

Ecem. Calyx diphyllus. Corolla nulla. Stamina
nulla. Stylus bipartitus. Semen unicum
compressum.

370. *A. hastata*, caule herbaceo; calycinis valvulis
foemineis magnis, deltoidibus sinuatis.

In maritimis paludosis. Flor. Jul. Aug.

α. microtheca, foliis triangularibus dentatis;
valvularum calycinum marginibus dorso-
que dentatis farinaceis. Rafn. l. c. pag.
239.

β. macrotheca, foliis hastatis, subintegerri-
mis, valvulis calycinis magnis, margini-
bus dentatis. Rafn. l. c.

γ. calotheca, foliis sagittatis laciniatis; val-
vulis calycinis duplo præcedentium ma-
joribus profunde laciniatis. Rafn. l. c.
pag. 240.

371. *A. patula*, caule herbaceo patulo; foliis sub-
deltoideo-lanceolatis; calycibus feminum
disco dentatis.

In maritimis, ad fossas. Flor. Jul. Aug.

372. *A. littoralis*, caule herbaceo erecto; foliis
omnibus linearibus integerrimis.

In maritimis ad fossas. Flor. Jul. Aug.

873. *A. pedunculata*, caule herbaceo divaricato;
foliis lanceolatis obtusis integris; calycibus
fœmineis pedunculatis.

In maritimis: *paa Amager ved Krudttaarnene*.
Flor. Jul. Aug.

DIOECIA.

347. *Fraxinus*.

Hemaphrodit. Calyx nullus. Corolla nulla.
Stamina duo. Pistillum unicum. Semen
unicum lanceolatum.

874. *F. excelsior*, foliis serratis; floribus apetalis
Flor. Dan. Tab. 969.
Passim. Flor. April. Maj.
-

INDEX GENERUM.

- Acer, pag. 297.
 Achillæa, 246.
 Acorus, 108.
 Actæa, 164.
 Adoxa, 128.
 Aegopodium, 88.
 Æsculus, 118.
 Aethusa, 91.
 Agrimonia, 149.
 Agrostemma, 144.
 Agrostis, 22.
 Aira, 24.
 Ajuga, 176.
 Alchemilla, 47.
 Alisma, 116.
 Allium, 103.
 Alopecurus, 22.
 Alfine, 97.
 Amaranthus, 278.
 Anagallis, 68.
 Anchusa, 63.
 Andromeda, 134.
 Anemone, 168.
 Anethum, 93.
 Angelica, 95.
 Anthemis, 246.
 Anthericum, 106.
 Anthoxanthum, 10.
 Anthyllis, 209.
 Antirrhinum, 185.
 Apium, 91.
 Arabis, 197.
 Arbutus, 134.
 Arctium, 235.
 Arenaria, 142.
 Arnica, 241.
 Artemisia, 237.
 Arum, 254.
 Arundo, 35.
 Asclepias, pag. 79.
 Asparagus, 106.
 Asperugo, 64.
 Asperula, 43.
 Aster, 245.
 Astragalus, 213.
 Athamanta, 86.
 Atroplex, 299.
 Ayena, 33.
 Ballota, 180.
 Bellis, 240.
 Berberis, 103.
 Betonica, 177.
 Betula, 279.
 Bidens, 236.
 Brassica, 196.
 Briza, 29.
 Bromus, 31.
 Bryonia, 284.
 Bupleurum, 91.
 Butomus, 130.
 Cakile, 193.
 Calendula, 248.
 Calla, 255.
 Callitriche, 2.
 Caltha, 167.
 Campanula, 69.
 Canabis, 291.
 Capnoides, 206.
 Cardamine, 197.
 Carduus, 233.
 Carex, 262.
 Carlina, 232.
 Carum, 88.
 Caucalis, 85.
 Centaurea, 247.
 Centaurium, 68.
 Centunculus, 46.
 Cerasium, 145.

Ceratophyllum, pag. 281.
 Chærophyllum, 87.
 Chara, 260.
 Chelidonium, 164.
 Chenopodium, 81.
 Chrysanthemum, 241.
 Chrysosplenium, 125.
 Cichorium, 224.
 Cicuta, 92.
 Cineraria, 243.
 Cirsæa, 5.
 Cistus, 166.
 Clinopodium, 182.
 Cnicus, 232.
 Cochlearia, 191.
 Comarum, 161.
 Conium, 92.
 Convallaria, 106.
 Convolvulus, 69.
 Cornus, 47.
 Corylus, 283.
 Cotula,
 Crambe, 190.
 Cratægus, 155.
 Crepis, 227.
 Cucubalus, 140.
 Cuscuta, 48.
 Cynoglossum, 63.
 Cynofurus, 29.
 Cyperus, 16.
 Dactylis, 29.
 Datura, 75.
 Delphinium, 166.
 Dentaria, 198.
 Dianthus, 138.
 Dipfacus, 42.
 Draba, 190.
 Drosera, 99.
 Echium, 65.
 Elatine, 129.
 Elymus, 37.
 Empetrum, 290.
 Epilobium, 121.
 Erica, 124.
 Erigeron, 242.
 Eriophorum, 19.
 Ervum, 213.

Eryngium, pag. 84.
 Erysimum, 193.
 Evonymus, 77.
 Eupatorium, 236.
 Euphorbia, 150.
 Euphrasia, 183.
 Fagus, 282.
 Festuca, 29.
 Ficaria, 169.
 Filago, 248.
 Fragaria, 159.
 Fraxinus, 300.
 Fumaria, 206.
 Galeobisis, 178.
 Galium, 43.
 Gentiana, 80.
 Geranium, 199.
 Geum, 161.
 Glaux, 79.
 Glecoma, 175.
 Gnaphalium, 238.
 Gypsophila, 137.
 Hedera, 78.
 Heracleum, 96.
 Herniaria, 81.
 Hesperis, 197.
 Hieracium, 228.
 Hippophaë, 290.
 Hippuris, 2.
 Holcus, 297.
 Holosteum, 39.
 Hordeum, 38.
 Hottonia, 66.
 Humulus, 291.
 Hydrocharis, 293.
 Hydrocotyle, 84.
 Hyosciamus, 76.
 Hyoseris,
 Hypericum, 218.
 Hypochaeris, 224.
 Iasione, 72.
 Iberis, 191.
 Impatiens, 74.
 Inula, 242.
 Iris, 15.
 Juncus, 108.
 Juniperus, 294.

Lactuca, pag. 228.
 Lamium, 177.
 Lapfana, 232.
 Laserpitium, 96.
 Lathræa, 182.
 Lathyrus, 210.
 Ledum, 135.
 Lemna, 261.
 Leontodon, 225.
 Leonurus, 175.
 Lepidium, 192.
 Ligustrum, 5.
 Limosella, 187.
 Linum, 99.
 Lithospermum, 62.
 Littorella, 280.
 Lolium, 36.
 Lonicera, 72.
 Lotus, 216.
 Lychnis, 145.
 Lycopus, 10.
 Lycopis, 65.
 Lyfimachia, 67.
 Lythrum, 149.
 Málaxis, 253.
 Malva, 202.
 Marubium, 180.
 Matricaria, 240.
 Medicago, 217.
 Melampyrum, 184.
 Melica, 25.
 Menthæ, 176.
 Menyanthes, 66.
 Mercurialis, 292.
 Milium, 22.
 Monotropa, 134.
 Montia, 39.
 Myagrum, 190.
 Myofotis, 62.
 Myofurus, 100.
 Myrica, 291.
 Myriophyllum, 280.
 Narcissus, 103.
 Nardus, 20.
 Nepeta, 180.
 Nymphæa, 165.
 Oenanthe, 87.

Oenothera, pag. 121.
 Ononis, 208.
 Onopordon, 235.
 Ophrys, 252.
 Orchis, 250.
 Origanum, 182.
 Ornithogalum, 104.
 Orobus, 210.
 Oxalis, 144.
 Panieum, 21.
 Papaver, 164.
 Parietaria, 297.
 Paris, 128.
 Parnassia, 98.
 Pastinaca, 93.
 Pedicularis, 184.
 Peplis, 112.
 Phalaris, 20.
 Phellandrium, 88.
 Phleum, 21.
 Picris, 225.
 Pimpinella, 89.
 Pinguicula, 9.
 Pinus, 284.
 Pisum, 209.
 Plantago, 45.
 Poa, 26.
 Pollichia, 179.
 Polygala, 207.
 Polygonum, 125.
 Populus, 292.
 Potamogeton, 48.
 Potentilla, 159.
 Prenanthes, 227.
 Primula, 65.
 Prunella, 182.
 Prunus, 154.
 Pulmouaria, 64.
 Pyrola, 135.
 Pyrus, 156.
 Quercus, 282.
 Ranunculus, 169.
 Raphanus, 195.
 Reseda, 149.
 Rhamnus, 77.
 Rhinanthus, 183.
 Ribes, 78.

- Rosa, pag. 157.
 Rotböllia, 37.
 Rubia, 45.
 Rubus, 158.
 Rumex, 113.
 Ruppia, 51.
 Sagina, 52.
 Sagittaria, 280.
 Salicornia, 2.
 Salix, 288.
 Salfola, 83.
 Sambucus, 97.
 Samolus, 66.
 Sanicula, 85.
 Saponaria, 138.
 Satyrium, 251.
 Saxifraga, 136.
 Scabiosa, 42.
 Scandix, 86.
 Scherardia, 43.
 Scheuchzeria, 115.
 Schoenus, 16.
 Scirpus, 17.
 Scleranthus, 137.
 Scorzonera, 226.
 Scrophularia, 186.
 Scutellaria, 181.
 Sedum, 143.
 Selinum, 93.
 Sempervivum, 151.
 Senecio, 243.
 Serapias, 253.
 Serratula, 234.
 Silene, 140.
 Sinapis, 196.
 Sisymbrium, 195.
 Sium, 90.
 Solanum, 76.
 Solidago, 243.
 Sonchus, 231.
 Sorbus, 155.
 Sparganium, 277.
 Spartium, pag. 208.
 Spergula, 147.
 Spiræa, 156.
 Stachys, 179.
 Statice, 98.
 Stellaria, 141.
 Stratiotes, 293.
 Symphitum, 64.
 Tanacetum, 238.
 Taraxacum, 226.
 Thalictrum, 167.
 Theflum, 79.
 Thlaspi, 191.
 Thymus, 181.
 Tilia, 166.
 Tormentilla, 160.
 Tragopogon, 225.
 Trientalls, 118.
 Trifolium, 214.
 Triglochin, 115.
 Tritieum, 37.
 Trollius, 168.
 Tulipa, 104.
 Turritis, 194.
 Tussilago, 245.
 Typha, 277.
 Ulex, 208.
 Ulmus, 84.
 Urtica, 278.
 Utricularia, 9.
 Vaccinium, 123.
 Valeriana, 15.
 Verbascum, 74.
 Verbena, 175.
 Veronica, 6.
 Viburnum, 97.
 Vicia, 211.
 Viola, 73.
 Xanthium, 283.
 Zannichellia, 261.
 Zosteria, 255.
-

New York Botanical Garden Library

QK 287 .S34 v.1

Schumacher, Christi/Enumeratio plantarum^{gen}

3 5185 00049 8418