QL

677.2

V98

1764

~~BIRDS~~

Unpublished Proof.
Section D.—South Africa, 1905.

Index No.	40
-----------	----

Adumbrationes

- no. 59
- no. 113.
- no. 114
- no. 142
- no. 145
- no. 358
- no. 32

FREDERIK MULDER & CO.
(ANT. W. M. MENSING).
Doelenstraat 10, AMSTERDAM.

Chas. W. Richmond, Esq.,

N. J. National Museum.

Washington, D.C.

Unpublished Proof.

Section D.—South Africa, 1905.

Index No.

40

Index Generum et Specierum Animalium.—Report of a Committee, consisting of Dr. HENRY WOODWARD (Chairman), Dr. F. A. BATHER (Secretary), Dr. P. L. SCLATER, REV. T. R. R. STEBBING, Dr. W. E. HOYLE, and the Hon. WALTER ROTHSCHILD.

7/ SATISFACTORY progress has been made by Mr. Davies Sherborn in the recording of literature from 1801 onwards. Among other works now indexed up to 1850 may be mentioned the 'Annals and Magazine of Natural History,' the 'Academia Cæsarea,' and the 'Neues Jahrbuch für Mineralogie.' Various tracts dealing with the collation of difficult books have been issued, and a reprint of the descriptions of new species of birds drawn up by Pallas for 'Vroeg's Catalogue,' 1764, has been published by the Smithsonian Institution, under Mr. Sherborn's care, from the unique copy in the Linnean Society's Library. The search for rare books still continues, and any such acquisitions are made available for public use by transference to one or other of the accessible libraries. Special thanks are due to the Italian Government, the University of Padua, and Professor Dante Pantanelli, for enabling the Committee to examine the 'Tavola alfabetica delle conchiglie adriatiche' of Stefano Andrea Renier (1804). Help of this nature, as well as valuable criticism, is continually forthcoming from home and abroad, and the general interest taken in the published volume (1758-1800) is highly gratifying to Mr. Sherborn and satisfactory to this Committee, which, in this connection, desires to thank especially Mr. L. B. Prout and Mr. C. W. Richmond.

The Committee desires to be reappointed, with the addition of Lord Walsingham, and trusts that the grant will be restored to the previous amount—namely, 100%.

FREDERIK MULLER & C^o.

(ANT. W. M. MENSING).

Doelenstraat 10, AMSTERDAM.

Chas. W. Richmond, Esq.,

U. S. National Museum.

Washington. D.C.
U.S.A.

Adumbrationes.

- no. 59* [= 57*] Certhia collaris. In Certhia Torque rubra on p. 8 of cat.
- no. 113. Loxia tricolor. In Loxia erythromelana on p. 13. of cat.
- no. 114+115. Lanius carbo. In Lanius purpureus on p. 13 of cat.
- no. 142. Fringilla citrinella. In Fringilla Canariæ subsimilis .. p. 15 ..
- no. 175 not named specifically. In Larus aureus on p. 18 of cat.
- no. 358 [= 258] Anas ferruginea. In Anser Tataricus ferrugineus on p. 25 of cat.
- no. 320. Tringa alba. In Tringa Leucophæa on p. 32 of cat.

In other cases the names in Adumbr. agree
with those in the Catalogue.

590.8

V984

BEREDENEERDE CATALOGUS,

*Van eene, by uitstek fraaye en weergaalooze
Verzameling, zoo van INLANDSCHE
als UITHEEMSCHE*

VOGELN,

VIERVOETIGE en GEKORVENE

DIERE N.

Zynde alle op het konstigste in derzelver Na-
tuurlykste Standen, Aart en Houding, Op-
gevuld, Opgezet, en, op eene byzondere
wyze, voor alle bederf beveiligt.

*Alles, met oneindige moeiten en kosten, in zeer veele jaa-
ren verzameld, en eigenhandig in order gebracht,*

D O O R

A.^{drian} V R O E G.

En welke geheele Verzameling den Liefhebberen
tot den 22ste September dezes jaars, ten billyke
pryze, in eens uit de hand te koop werd aange-
boden. Zullende anderszins (de onderhand-
sche verkoping niet geschiedende) deze
Verzameling op den 6de October 1764
worden geveild in s'Gravenhage,

Ten Huize van Mr. KOSTER, op de hoek van de
Veenestraat op de kleine Groenmarkt,

D O O R

PIETER VAN O S,

Boekverkoper op de Plaats in s'Gravenhage, 1764.

By wien de Catalogus te bekomen is.

Chas W. Richmond.
Aug. 31, 1905.

L
77.2
98
164
CHHRB

VOORREEDEN.

E kennnis der Vogelen, (als een gedeelte der Natuurkunde, welke ons zoo veele Schoonheeden, Vermaak en Voordeelen, als aangename spyzen, verschaft) is al lang het geliefde Voorwerp der betrachtungen van verscheide Geleerden van Europa geweest. Alle de naamen en verschillende oogmerken dezer Geleerden aan te haalen, zoude ons bestek te wyd uitbreiden: Dan het noemen alleen, van eenen *Bellonius*, *Gesnerus*, *Aldrovandus*, *Willoughby*, *Linnaeus*, *Klein*, *Friesch*, *Albin*, *Edwards*, *Briffon* en zoo veele anderen, kunnen als genoegzame blyken en getuigen verstreken, hoe groot een welbehaagen en verlustiging van hunnen geest, de betrachtungen van dit gedeelte der Natuur aan hun gegeven heeft.

De Reeden of het waare oogmerk, waar door de Beminnaaren der Natuur-Historie, aangespoort worden om Verzamelingen, zoo als deze, of wel van andere Natuurlyke voorwerpen te maaken, kan niet wel anders dan tweeledig aangemerkt worden. De eerste Reeden, welke den voorrang boven de nuttigheid der andere verdiend, bestaat voornamentlyk hier in: Dat men door het Verzamelen der Voorwerpen, waar in de oneindige en onbegrypelyke wysheid van den Alwyzen Schepper zoo heerlyk doorstraalt, het gemak en genoegen heeft, om dezelve, wanneer men wil, naauwkeurig te beschouwen, en door deze beschouwing, derzelve weezendlyke kenmerken kan bepaalen. Hier door is het dat wy dan ook eindelyk eens eene ware en regte kennis verkrygen kunnen, van alle die verwonderbaare weezens, welke het volmaakt Opperweezen, zeekerlyk en onbetwistbaar, zoo wel tot onze betrachtning ter zyner eer, als tot ons nuttig gebruik, geschaapen heeft. Dit zoo niet zynde, pronkt de Paauw, en zoo veel andere op 't luisterrykst versierde Vogelen immers te vergeefs met haaren schitterenden

terenden vederglans: En waar toe is toch anderszins, zulk eene oneindige verscheidenheid van sierlyke en wonderbaare maakzelen van veele duizenden Insecten, of Beenderlooze Diertjes; die, als in het verborgene, met eene oneindige verschillendheid van verwonderlyke kleuren en teekening versierd zyn? De tweede Reeden, en die, het is waar, wel de meeste Liefhebberen der Natuur, tot het verzamelen aanspoort, bestaat ook alleen in het genoegen, 't geen zy vinden, in de bloote beschouwinge, het welk zeer zekerlyk eene voltallige opvolging (voor zoo verre die mogelyk is) van eene wel voor het verderf bewaarde, en sierlyk geschikte Verzameling van Natuurlyke Weezens, verschaffen kan. Het wezendlykste nüt dat dezen uit hunnen arbeid haalen, is hun genoegen. En waarom is dit onschuldige genoegen, dikwils by zoo veele Waanwyzen, zoo zeer bespot, meerder te mispryzen, dan de neigingen door welken anderen aangezet worden, tot het maaken van verzamelingen van Schilderyen; van Natuur- of Werktuigkundige Instrumenten en dergelyke andere zaaken, welke laatste dikwils by veelen, als derzelver gebruik geheel onkundig, even gelyk den Kinderen het Poppenspel alleen ten Speeltuig dienen. By het wezendlyke genoegen, 't geen deze laatste Verzamelaaren in de beschouwing van de Werken der Natuur smaaken, en waar van de menschelyke kunsten allen hunnen roem en luister ontleenen, kan men ook noch deze nuttigheid voegen: Dat zy ongetwyffeld zeer veel toebrengen om de kennis der Natuurlyke weezens te vermeerderen, vermits men dagelyks ziet, dat elke verzameling het zyne daar toe bybrengt, en de onmogelykheid bekend is, dat al het onbekende en noch dagelyks ontdekt wordende, door een of weinige kan bezeeten of verzameld worden. Hoe sierlyker nu de voorwerpen van zoodanige Verzamelingen zyn geschikt en ingericht, hoe bevalliger en meer met de Natuur overeenkomstig zy behandelt zyn; hoe aan-

lok-

lokkender zy zig vertoonen : wat kan 'er by de Schoonheden der Natuur vergeleeken worden? By de ouden hebben een *Praxiteles*, by de laateren een *Rubbens*, van *Dyk* en andere, eenen onsterfelyken roem behaald, en waar door? om dat zy de Natuur in hunne werken zoo veel mogelyk gevolgd hebben; Het is dan immers niet te verwonderen dat 'er menschen zyn, die de Natuurlyke en dus volmaakste Kunst verre booven de naast by komende stellen?

Hier dan maar even en als met den vinger hebbende willen aanwyzen, het zwakke der verstandeloozen, welken de verschillende neigingen der Menschelyke hartstochten, aan hunne eigen geest en smaak ontbrekende denkbeelden, wel zouden willen kluisieren, staat ons noch alleen hier het een en andere by te voegen, het welk verstreken kan tot wegneeming van alle duisterheeden, en ten blyke dat wy den afweezenden Liefhebberen (gelyk anderszins in Naamlysten van Natuur als deze maar al te veel gebeurd) geenszins hebben tragten te misleiden.

Dat geene dan, 't welk wy hier noch ter neder stellen moeten, bestaat hier in.

Dat alle de Voorwerpen van deeze geheele Verzameling, zoo verwonderlyk en verrukkend schoon behandeld en geschikt zyn, als voor heen noch nimmer door eenig Liefhebber gedaan, of gezien is. Alle de vruchten van dezen veel jaarigen arbeid, moeilykheeden en kosten, zyn zelfs door eene Teekenkundige hand behandeld en geschikt. De Natuur, de bloote Natuur alleen, is zonder eenige andere dan eigene versierselen gevolgd; elk Dier of Diertje verwekt in den beschouwer die aandoeninge, welke de ziel altoos van waarheeden en de naby komst der Natuur gevoeld. Meest al is ieder Vogel op een sierlyk en natuurlyk met Mosch bewasschen Takje, in de een of andere houding, die 't best met deszelfs natuur over een komt, gesteld; en is het dat somwyl, gelyk zulks in deze Naamlyst gemakkelyk te ontdek-

ken is, twee, drie, of meer Vogelen by een geplaatst zyn, zal de beschouwing der zelve, heel ras doen zien de betrekking, welke de verschillende standen dier byeengevoegde Vogelen tot elkander hebben, en welke fraaye vertoofing zy hier door aan het oog verschaffen. De Vogels van verschillende Geslachten, welken hier door, somtyds by een gevoegd zyn; zal men gemakkelyk door het daar by gestelde NB., en Num. van 't Geslacht waar toe die behooren, ontdekken kunnen.

Het is zeker, dat de Liefhebberen hier eenige benamingen, aan Vogelen gegeven, vinden zullen, welken hun onbekend zyn; doch den Kenneren is het te gelyk bewust, hoe zeer die in verscheide Landen, niet alleen, maar zelfs in naby den anderen geleegene plaatsen verschillen. Wy hebben daarom ook de voorzorge gebruikt, dikwils de verschillende naamen daar by te voegen.

Tot meerder wegneeming van alle misverstand, hebben wy, meest al (daar geene misvattingen konde stand grypen) de benamingen der Hollandsche vertaaling van LINNÆUS, *Samenstelsel der Natuur*, te Amsterdam in groot Octavo door *F. Houttuyn* gedrukt wordende, by de Vogels die hier in deze Catalogus voorkoomen, gevoegd, of behouden; dus kunnen dezelve, voor die meerder licht begeeren, in dat werk gemakkelyk gevonden worden.

Wy hebben by elke Vogel geene aanhaaling van Auteurs bygebragt, om aan te wyzen waar die of afgebeeld, of beschreeven zynde, kan worden nagezien. Die dit begeeren, kunnen zulks vinden by de soorten, die by den Heer LINNÆUS bekend staan, en welk soort zy gemakkelyk, door het hier bygevoegde Num. der soort van LINNÆUS en zyne Latynsche benaming, ontdekken zullen.

By de Uitlandsche, zoo Oost- als Westindische Vogelen, hebben wy, wegens de fraaiheid van het Werk en de kleuren waar mede de Vogelen in het zelve

verfiert zyn, dikwils aanwyzinge gedaan tot de keurige beschryving van den Heer EDWARDS, zynde 7 deelen in Quarto te Londen gedrukt. Daar wy in deze Naamlyst achter de Hollandsche en Latynsche benaming der Vogelen zeggen, Lin. Sp, 1. of der gelyk Num. meenen wy de laatste Latynsche Editie van des Heeren LINNÆUS *Systema Naturæ* te Stockholm 1758. in groot Octavo gedrukt; of de voornoemde Hollandsche vertaaling daar van; welker Num. met de voorn. Latynsche uitgave overeenkomstig zyn. Die soorten waar agter geen getal, maar alleen een o, gevoegt is, zyn dus getekent, om dat deze soorten in het Systema van LINNÆUS ontbreken, en het is hierom dat wy derzelver kenteekens en gedaanten achter deze Naamlyst, voor den Beminnaars dezer Studie wat omstandiger beschreeven hebben.

De reeden, waarom wy omtrent de Rangschikkingen en de verdere verdeelingen der Geslachten van den beroemden Zweedschen Natuurkenner eenigszins zyn afgeweeken, is alleen, dat men het gevoeglyker heeft kunnen oordeelen, de Boom-, Land- en Water-Vogelen, van den anderen te scheiden, en in die orde, zoo als wy dezelve hier gebracht hebben, te laten volgen.

Ten opzicht der Vogelen hebben wy alleen hier noch by te voegen, dat deze volgende soorten als N^o. 56*. N^o. 114. N^o. 115. N^o. 145. N^o. 147. N^o. 175. N^o. 320. door eenig misverstand onder verkeerde Geslachten gebracht zyn; doch de naam van het Geslacht, waar onder zy eigentlyk behooren, die daar by gevoegt is, gelyk mede deze aanwyzing, zal genoeg zyn deze mistafling te verhelpen.

De viervoetige Dieren, zyn in getal gering, dan de zeldzaamheid der twee Aap-soorten, die zich hier by bevinden, vereischt eene oplettende beschouwing.

De verzameling der Gekorve of Beenderlooze Dierjes, daar achter volgende, is uitmuntende, voornamentlyk omtrend de Europische, of die, welken in ons Land vallen. Elk Beestje is om 't sierlykft en onbeschaf-

schadigt. Van elk soort zyn maar een of twee Dier-
tjes, en dus geene by een raaping van al wat voor-
komt, maar eene verzameling waar in oordeel, en het
oogmerk derzelve, doorstraald. Het getal dezer ver-
wonderbaare Schepzelen, zonder de Uitheemsche daar
by te tellen, loopt op 1969. En de verschillende
soorten daar van, maaken een getal van 1285. Dier-
jes uit. Onder dezelve zyn verscheide, die by de Lief-
hebbers noch niet bekend zyn, en zeer veele andere,
welke onbegrypelyk zeldzaam gevonden worden. De
Rangschikking waar in deze geplaatst zyn, is wil-
lèkeurig, doch, in eene natuurlyke order, en, voor
zoo verre zulks mogelyk was, zyn de benamingen der
Geslachten van den Heer LINNÆUS hier behouden en
bygevoegd.

Ten besluite dezer vooraffpraake, hebben wy noch
dit te zeggen. Dat deze geheele verzameling, zoo
van Vogelen, Insecten als Viervoetige Dieren, aan
den Beminnaaren der Natuurkunde (tot veertien da-
gen voor den bepaalden tyd der stukswyze verkoo-
ping, die op den 6. der maand Oëtober vastgesteld is)
alles by den anderen te koop word aangeboden; De
Liefhebberen hier toe genegen zynde, kunnen zig
deswegens ten Huize van den Heer VROEG, op de Vy-
verberg in s' Gravenhage, vervoegen.

By aldien, onverhoopt, deze onderhandsche te koop
aanbieding, geen voortgang hebben mogt, zullen de
Vogelen, Viervoetige Dieren en Uitlandsche Insec-
ten stukswyze, doch de verzameling der Inlandsche
Insecten alle by een, met het Kabinet daar toe be-
hoorende, geveild en verkogt worden.

Indien deze verzameling, in haar geheel uit de
hand mogt worden verkogt, zal men zorg draagen
dat zulks in de Haagfche en Haarlemsche Couranten
bekend gemaakt worde.

C A T A L O G U E
R A I S O N N É,
D'une Collection supérieurement belle
D' O I S E A U X,
Tant exotiques qu'EUROPE'ENS,
D E
Q U A D R U P E D E S
E T
D' I N S E C T E S.

Empaillés, & arrangés avec beaucoup d'art en situations & attitudes extrêmement naturelles, & garantis de la corruption d'une façon particulière.

Le tout rassemblé & arrangé, pendant une longue suite d'années, avec beaucoup de peines & à grand fraix,

P A R
A. V R O E G.

Collection qu'on offre aux Amateurs entière & à un prix raisonnable, jusqu'au 22 Septembre de cette année; après l'Echéance duquel terme, elle sera vendue aux plus offrands, le 6 Octobre 1764. à la Haye,

Dans la Maison de Mr. COSTER, au coin du Veene-straat sur le petit Marché aux Herbes,

P A R
P I E R R E V A N O S,

Libraire demeurant sur la Place à la Haye. 1764.

Où l'on distribue ce Catalogue.

10. 11. 1881 T. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

P R E F A C E.

A partie de l'Histoire Naturelle, qui traite des Oiseaux, classe d'Animaux qui nous fournit tant d'objets remarquables par leurs beauté, ou par les agrémens qu'ils nous procurent, a été depuis longtemps le sujet des recherches de nombre de Scavans. Ce seroit trop étendre les limites d'une Préface, que de vouloir rapporter les noms de tous ces Naturalistes, & les différents buts qu'ils se sont proposés. Les noms d'un *Bellon*, *Gesner*, *Aldrovandi*, *Willoughby*, *Linnaeus*, *Klein*, *Frisch*, *Albin*, *Edwards* & *Briffon*, parmi tant d'autres, suffisent pour nous convaincre de l'attention que cette Classe d'Animaux merite, & de l'amusement que l'Ornithologie est capable de donner.

Le but que les Curieux d'Histoire Naturelle se proposent, en faisant des Collections, comme celle donc nous donnent le Catalogue, ou dans une autre partie, consiste en deux points. Le premier & le plus important est, de se procurer, en rassemblant ces objets, qui nous offrent tant de marques de la sagesse infinie de leur Créateur, la commodité & la satisfaction de les pouvoir considérer à loisir & avec toute l'attention requise & tous les avantages nécessaires, pour fixer leurs caractères distinctifs & s'en former un système. Par là nous parvenons à la vraie connoissance de cette foule admirable d'Etres, que l'Auteur de la Nature sans doute a créé tant pour être contemplés & admirés, que pour leurs utilités respectives. Quiconque ne conviendrait pas de ceci, devroit soutenir, que le Paon par exemple & d'autres oiseaux ornés de la manière du monde la plus riche, sont parés en vain de ces beaux plumages. A quoi serviroit cette infinité de figures d'Insectes, les plus singulières & des plus

élégantes qu'on puisse imaginer ? Cette richesse de desseins & de couleurs que nous admirons dans ces petits Animaux, qui sans une recherche appliquée se soustrairoient à nos yeux.

Le second bût, qu'on envisage le plus communément en formant un Cabinet d'Histoire Naturelle, est le plaisir du spectacle, qu'une Collection nombreuse, bien arrangée & bien conservée nous donne. Les gens que cette seule raison engage, n'ont donc que leur plaisir en vuë. Mais pourquoi blameroit-on cet amusement aussi innocent, quoique méprisé de tant de petits esprits, plus, que le tic que d'autres ont, de former des Cabinets de Peintures, ou bien d'Instrumens de Physique & de Mécanique, plusieurs de ces derniers étant même parfaitement ignorants de l'usage de ces choses qu'ils rassemblent, & dont ils ne se servent que comme les enfans de poupées. Les faiseurs de Cabinets qui ne travaillent que pour leur plaisir, outre la satisfaction qu'ils ont de s'amuser des productions de la nature, qui donnent le sujet & le lustre à nos arts, contribuent essentiellement à enrichir l'Histoire Naturelle de nouvelles connoissances. L'on voit tous les jours de nouveaux objets, dans différents Cabinets; un petit nombre de Curieux ne pourroit jamais rassembler tant de productions qu'on parvient à decouvrir journellement, par le nombre des gens qui s'emploient à déterrer des Curiosités. D'ailleurs, quel Spectacle est comparable à celui des beautés de la Nature, surtout si les Cabinets, qui les contiennent, sont bien arrangés, si les objets mêmes y sont conservés & disposés le plus naturellement & le plus à leur avantage, qu'il est possible ? Des *Praxitèles* chés les anciens, & des *Rubens*, des *van Dyks* & autres parmis les modernes, se sont immortalisé; & par quel moyen ? en imitant la belle nature. Comment donc s'étonne-t-on, qu'il y ait des

des gens, qui se plaisent à préférer la nature même aux productions des Arts, qui la copient.

Ayant ainsi indiqué le foible de ces gens dépourvus d'esprit, qui se plaisent à fronder les différents goûts des hommes pour des objets, dont leur âme n'a pas pu sentir les attraits, & vers lesquels l' hazard na pas dirigé leur inclination ; Il nous reste à parler du Cabinet, qui fait le sujet de ce Catalogue, afin d'éclaircir & d'instruire les Amateurs absents & étrangers sur différens points essentiels. Voici de quoi nous croyons les devoir prévenir.

Tous les individus, qui composent ce Cabinet, qu'on offre au Public, sont si merveilleusement & supérieurement bien conservé, arrangé & menagé, que tout le monde avouera n'en avoir jamais vu les pareils, & conviendra que l'Auteur a surpassé tout ce qui s'est fait dans ce genre. Ces fruits des travaux de nombre d'années, ont l'avantage d'être le produit de mains exercées en Peinture. On n'y voit partout que la simple Nature, sans decorations artistiques ; mais chaque Animal doit causer cette admiration & mériter ces justes éloges à l'Artiste, qu'on ne sçauroit refuser à la vérité avec laquelle, par son génie pittoresque, il a sçu imiter la nature. Presque tous les Oiseaux sont placés sur des branches, couvertes de mousse, dans des attitudes, qui leurs conviennent. Le Catalogue apprendra au Lecteur, qu'en plusieurs endroits on en a placé plusieurs ensemble ; la vue de ces groupes seule suffit, pour faire entendre l'expression, qu'on a voulu rendre ou le dessein qu'on a eu en vue, en quoi l'on a réussi au delà de ce qu'on pourroit imaginer. Les Oiseaux de différents genres, qu'on a placés ensemble pour cet effet, pourront être rapportés à leurs genres relatifs, par le moyens des Nombres & NB. qu'on a eu soin d'y ajouter.

Les Amateurs trouveront peut-être dans ce Catalogue

talogue quelques noms d'Oiseaux , qui leurs seront inconnus. Mais tout Connoisseur n'ignore pas, que non seulement en différents Pays, mais même dans des endroits très voisins l'un de l'autre, l'on donne des dénominations très différentes, à un même Animal. C'est ce qui nous a fait rapporter, en beaucoup d'endroits, plusieurs noms, que nous avons crû appartenir à un même Oiseau.

Pour obvier à toute méprise, nous avons encore retenu ou cité les noms de LINNAEUS, selon le travestissement Hollandois de son Systême de Nature, qui a commencé à paroître chez *Houttuyn* à Amsterdam, en plusieurs volumes in Octavo, partout où il nous a point semblé douteux, que ces noms ne convinssent aux espèces que nous voulions indiquer; En sorte que ceux qui demandent à s'instruire, pourront facilement se satisfaire en ayant recour au dit Livre.

On n'a pas partout cité les Auteurs qui ont donné des figures des espèces indiquées. Ceux qui desireront cet éclaircissement, n'auront qu'à consulter les Synonymes de l'Edition originelle de l'Ouvrage de *Monsieur* LINNAEUS, ce qui leur sera facile par les noms Latins & les numeros du dit Ouvrage, qu'ils trouveront ajoutés à la plûs part des espèces.

Cependant, dans ces espèces d'Oiseaux qui sont originaires des grandes & des petites Indes, nous avons cité l'Ornithologie de *Monsieur* EDWARDS, (ouvrage publié en sept volumes à Londres.) à cause de sa beauté, & parce qu'on y trouve ces objets en couleurs naturelles.

Partout où l'on trouvera les mots de: Lin. Sp. I. ou avec autres numeros, après les noms spécifiques, c'est la dixième Edition du Systême de Nature de LINNAEUS, (Stockholm 1758, grand Octavo) que nous indiquons, avec lesquelles les numeros de l'ouvrage

Hollandois de *Houttuyn* conviennent exactement. Mais les espèces, ou l'on trouvera *Lin. Sp.* avec un Zero (0.) au lieu de numero, ne se trouvent pas dans le dit Systême ; Ce qui nous a engagé à en donner des descriptions détaillées à la fin du Catalogue, qui pourront servir à ceux qui se font une étude methodique de l'Histoire Naturelle.

Ce n'est qu'en fort peu d'égards que nous nous sommes écarté du Systême de ce célèbre Auteur, en arrangeant les ordres & les genres des Oiseaux ; La raison, qui nous a décidé à faire ces changements, est, qu'il nous a semblé convenable de separer les Oiseaux qui perchent sur les Arbres, d'avec les proprement terrestres ; & les aquatiques, & de faire succéder les uns aux autres dans l'ordre qu'on trouvera observé dans la suite.

Quant aux Oiseaux, nous avons encore à remarquer ici, que par meprise les Espèces, N°. 56*. N°. 114. N°. 115. N°. 145. N°. 147. N°. 175. N°. 323. ne se trouvent pas rangées sous leurs propres Genres ; mais comme le nom generique y est adjouté, on s'apercevra assez facilement de cette faute, pour la redresser.

Pour des Animaux Quadrupedes, la Collection n'en contient que fort peu ; mais la rareté des deux espèces de Singes, rapportées dans le Catalogue, demande quelque attention.

La Collection d'Insectes, dont on trouve la Liste à la fin du Catalogue, est très considérable, surtout pour les Insectes de l'Europe, & particulièrement de notre pays. On n'a placé dans ce Cabinet qu'un ou deux individus de chaque espèce, en sorte que ce n'est pas un tas d'Insectes ramassés sans distinction, mais une Collection judicieuse & utile. Le nombre d'individus, qui la composent, est, sans compter les exotiques, de 1969. parmi lesquels l'on trouve 1285 différentes espèces & variétés, donc plu-

plusieurs sont ou inconnuës ou prodigieusement rares. L'arrangement en est arbitraire, mais naturel, & l'on a ajouté partout les noms génériques de Monsieur LINNAEUS.

Pour conclure nôtre Préface, il ne nous reste qu'à informer le Public, que l'on offre toute cette Collection d'Oiseaux, Quadrupedes & Insectes en vente aux curieux, & que ceux qui voudront en faire l'achat *en entier*, n'auront qu'à s'adresser à *Monsieur VROEG, demeurant sur le Vivier à la Haye*, jusqu'à quinze jours avant le 6 du mois d'Octobre de cette année.

Si contre toute espérance il ne se trouveroit pas d'occasion pour vendre le Cabinet sous main, il sera vendu publiquement, aux plus offrans & en détail, le 6 d'Octobre & jours suivans, à l'exception pourtant des Insectes Européens qui ne se vendront qu'ensemble, avec le Cabinet qui les contient.

Mais s'il s'offre un Acheteur pour le tout, on aura soin d'en avertir le Public par la voye des Gazettes de la Haye & de Haarlem.

N A A M L Y S T D E R V O G E L E N.,

*Meestendeels , geschikt naar het stelsel van
den Heer LINNAEUS.*

B E N D E I I. V O G E L E N.

ACCIPITRES.

ROOFVOGELEN.

ORDO I.

RANG I.

FALCONES. }
VALKEN. } Genus XLI.

- ¹ **H**AAZEN of zoogenaamden ZWARTEN AREND.
(*Melanæus*.) *Linnaeus Systema Naturæ*, Spec.
I. Onthoud zig hier te lande. Zit op een gesne-
den blok.
- ² VALK, EEND-DOODER. (*Subbuteo*) Lin. Spec. 13.
Deze is hier zeldzaam en verspreid zig door ge-
heel Europa , alwaar hy 't meest by de Riet Bos-
schen woont.
- ³ GABEL HAVIK , KONINGLYKE KUIKEN-DIEF.
(*Milvus*) Lin. Spec. 10. Word hier zeer raar geacht.
Dezelve zit , als zyn roof dekkende , op een ge-
draaide kruk.
- ⁴ HOENDER HAVIK. (*Buteo*) Lin. Spec. 14. Heeft
een Veldhoen als een roof onder zig , valt hier
te lande.
- ⁵ SPERWER, VINKEVALK. (*Nisus*) Lin. Spec. 26.
Zit op een kruk , word hier gevonden.
- ⁶ MILJET, BOOMVALKJE. (*Palumbarius Mas.*) Lin. Spec. .

25. Deze is het Mannetje, en heeft een Boom Leeu-
rik ten roof.
- 7 *Idem*, 't *Wyfje*, (*Femina*) is iets grooter doch flau-
wer van kleur, wonen hier te lande.
- 8 BLAAUW VALKJE. (*Falco epicyanus*) Lin. o. Heeft
een witte en kaneel kleur geschulpte borst. Zit als
op roof loerende; woont hier.
- 9 STEENSMETSER. (*Tinnunculus Femina*) Lin. Spec. 15.
Het *Wyfje*, (*Femina*) word ook de *roode Sperwer met de*
blaauwe staart genaamd. Heeft een Haverkneu ten
prooy, woont hier.

STRYGES. }
UILEN. } Genus XLII.

- 10 RANTZ-UIL, OOR-UIL. (*Otus Femina*) Lin. Spec. 4.
Het *Wyfje*, de oorachtige veeren niet hebbende ge-
lyk 't Mannetje, woont hier.
- 11 KERK, KRANS, of LYK-UIL. (*Funerea Mas.*) Lin. Sp. 7.
Mannetje. Mogelyk is dit de 2de *varieteit* van *Bris-*
son welke in de Holl. vertaling van *Linnaeus* voor-
komt?
- 12 *Idem* 't *Wyfje*. (*Femina*) Onthouden zig hier.
- 13 STEEN-UIL, HEUPJE, of 't KLEINE KAT-UILTJE.
(*Passerina*) Lin. Sp. II. woont hier.

LANII. }
CLAAUWIEREN. } Genus XLIII.

- 14 { NEGEDOODER, HAAG AAKSTER of WAGTER.
& { (*Excubitor Mas.*) Lin. Spec. 2. Mannetje, de Borst is
15 { flauw blaauw geschulpt, heeft een Winterkoninkje
{ ten roof onder zig. NB. Tot sieraat is hier een PIM-
PELMEES. (*Parus Caeruleus*) Lin. Gen. 100. Sp. 4.
{ op het zelfde Takje bygevoegd.
- 16 { *Idem* 't *Wyfje*. (*Femina*) de Borst is wit en onge-
& { schulpt. Heeft een Zee-Putter of Sneeuw-Vogel
{ ten roof onder zig. NB. Op dezelfde Tak is hier,
even als by de voorgaande, een SYSFREITER
17 { (*Tringilla Flammea*) Lin. Gen. 98. Sp. 20. byge-
{ voegt, dezelve vallen hier te lande.
- 18 KLAUWIERTJE. (*Ruficeps*) Lin. o. Het hoofd is
licht kaneel kleurig, 't lyf donker graauw van on-
dere wit, woont hier, doch is zeldzaam.

19 BRUINE KLAAUWIER. (*Collurio*) Lin. Sp. 3. Het boven lyf is donker kaneel kleurig en zwartachtig geschulpt, van onderen is de kleur wat lichter. Volgens de Holl. vert. van *Linnæus*, is dit een Wyfje (*Femina*) en word deeze ook HANKWERK, of VINKENBYTER genaamt. Men vind dezelve hier te lande zeer zeldzaam.

20 { ZYDENSCHWANTZ, PESTVOGEL ook BEEMER of BOHEMER genaamd. (*Garrulus*) Lin. Sp. 10. Deze fraye Vogel word hier, doch zeldzaam, in de Lyftertrikken gevangen.

21 { *Idem* 't Wyfje. (*Femina*) Is flauwer van kleur, en mist ook de roode Lak vlakjes, waar mede de Mannetjes op de vleugels zoo fraay versiert zyn.

& { NB. Beide deze zitten op een sierlyke Tak, en tot meerderen schilderachtiger vertooning is hier een inlands YSVOGELTJE (*Ispida*) Lin. Gen. 56. (Sp. 1. bygevoegd.

P I C A E.
ORDO II.

A A K S T E R S.
RANG II.

PSITTACUS. }
PAPEGAAYEN. } Gen. XLIV.

23 GROOTE RAAF. (*Ararauna*) Lin. Sp. 2. Volgens dezen gewichtigen Natuurkenner is dit het Wyfje (*Femina*) en Zuid-America haar geboorte plaats. By ons is dezelve bekend onder de benaaming van de BLAAUWE WESTINDISCHE RAAF. De Borst is zeer schoon hoog geel. Zie dezelve by Edwards Tab. 159.

24 ROODBEK CACATOE, of GROEN PARKIETRAAFJE. (*Rufirostris*) Lin. Sp. 13. uit America. Zie Edwards Tab. 175.

25 HARDNEKKIGE CACATOE of GEEL-WANG PARKIET. Het Mannetje (*Pertinax Mas.*) Lin. Sp. 10. woont in America. Zie Edwards Tab. 234.

26 *Idem* 't Wyfje. (*Femina*) dezelve is wat vuilder van kleur.

27 ANGOLASCHE CACATOE. (*Solstitialis*) Lin. Sp. 7. Deze vald in Guine.

28 PERKIETJE. (*Caudacutus*) Lin. Sp. 0. Het is geheel groen en onthoud zig in Surinamen. Edwards Tab.

- 235 verbeeld een dergelyk, doch met een ronde Staart, en deze loopt puntig uit.
- 29 KAKATOE kleine. (*Cristatus*) Lin. Sp. 16. Deze komt van de Philipynsche Eylanden, heeft een fwavel geele kuif en is zeer zeldzaam. Zie Edwards Tab. 317. doch is kleinder.
- 30 HAVIKSKOP of BRUINKOP. (*Accipitrinus*) Lin. Sp. 32. Deze wonderlyke schoone Vogel woont in Oost-indien, doch word zeer zeldzaam gevonden. Zie de verbeelding by Edwards Tab. 165.
- 31 WITKOP of de PAPEGAAY VAN MARTINIQUE. (*Leucocephalus*) Lin. Sp. 26. Is zeer zeldzaam, zit in een ring op een gedraaide voet staande. Zie Edwards Tab. 166.
- & 32 ROOTSTAART PAPEGAAY. (*Eritbacus*) Lin. Sp. 20. In het algemeen is dezelve onder de benaaming van de GRAAUWE PAPEGAAY by ons bekend, en valt gemeen in onze Westindische Colonie. Deze zit by de voorgaande boven op den ring.
- 33 DUBBELDE AMAZOON. (*Varietas Aestivi Major. Femina*) Lin. Sp. 27. Het voorhoofd is geel, de schouders bloed root met roode vlakken op de vleugels, welker slag pennen blaauw zyn, verder is het lyf groen, word in America gevonden.
- 34 ENKELDE AMAZOON of ZOMER PAPEGAAY. (*Aestivus Mas.*) Lin. Sp. 27. Dezelve is groen, de kaaken of wangen zyn geel, 't voorhoofd is blaauw en geel, welk geel voorhoofd dit Mannetje van het Wyfje onderscheid. Deze Vogels leeven
- & 35 zeer lang vermits deze, volgens opgave, over de hondert jaaren in eene famillie geweest is. Valt in America.
- 35 ENKELDE AMAZOON, het Wyfje. (*Aestivus Femina*) Lin. Sp. 27. Beide deze Vogels zitten op en in een ring.
- 36 MOSCH PARKIET, Mannetje. (*Pullarius Mas.*) Lin. Sp. 35. Het hooft, de wangen en de keel is schoon root, 't geen dezelve van de Wyfjes onderscheid.
- & 37 De staart heeft een roode en zwarte kring. Valt in America.
- 37 Idem 't Wyfje. (*Femina*) Deze fraye Vogeltjes zitten mede, en als waaren zy leevend, op en in een ring.

CORVI. } Genus XLVIII.
RAAVEN. }

- 38 LANGSTAART AAKSTER. (*Pica*) Lin. Sp. 10. Ont-
houd zig hier.
- 39 NOOTEKRAAKER. (*Caryocatactes*) Lin. Sp. 9. Oos-
tenryk is deszelfs geboorte plaats. In 't Jaar 1753.
waaren dezelve hier zeer gemeen, ontrent de Lys-
tertyd, en als doen is deze hier ook gevangen,
daar na zyn dezelve hier niet meer vernoomen.

PARADISAEA. } Genus LI.
PARADYSVOGELN. }

- 40 BRUINE PARADYSVOGEL. (*Apoda*) Lin. Sp. 1. De-
ze Vogel welke deszelfs vleugels, pooten en staart
veeren geheel heeft, en in deszelfs natuurelyken
stand is opgezet, is van een uitmuntende fraayheid
en zonder weerga. Zyn geboorte plaats is Terna-
ten in Oostindien. Zie Edwards Tab. 110.
- 41 KLEINDER PARADYSVOGEL. (*Specimen minus Apo-
dæ*) Lin. Sp. utf. Deze heeft insgelyks pooten,
doch geen slag-pennen in de vleugels, de bek en
pooten zyn veel kleiner dan by de vorige.
- 42 PARADYSVOGEL. (*Apoda*) Lin. Sp. utf. Aan deze
Vogel ontbreeken de pooten en vleugels, en is in
dien staat zoo als zy meest overgebracht worden
om voor een pluim sieraat te kunnen dienen.

CUCULI. } Genus LII.
KOEKKOEKEN. }

- 43 KOEKKOEK, het Mannetje. (*Serratirostris Mas.*) Lin.
Sp. o. De onderbek van deze soort is aanmerke-
lyk, heeft vier tanden welke zaagsgewys naar voo-
ren overhellende geschikt zyn. Het hoofd en de
Borst zyn paarsglanzig, het lyf en de staart van bo-
ven is koper glanzig van kleur. Dit soort is den
Tragon van Brisson. Derzelver woonplaats is Suri-
namen.
- 44 Idem het Wyfje. (*Serratirostris Femina*) Deze heeft
de zaagsgewyze punten aan deszelfs bek niet.

JYNX.
DRAAYHALS. } Genus LIII.

- 45 DRAAYHALS, het Mannetje. (*Torquilla Mas.*) Lin. Sp. 1. Dit is een der fraayste Vogels die men zien kan. Men vind dezeive in de meeste deelen van Europa, doch hier te lande zeer zeldzaam.
- 46 *Idem* het Wyfje. (*Torquilla Femina*).

PICI.
SPECHTEN. } Genus LIV.

- 47 GROENE SPECHT, Mannetje. (*Viridis Mas.*) Lin. Sp. 7. Een kennelyk onderscheid der Mannetjes en Wyfjes deze soort Spechten is, dat de eerste een roode streep in de zwarte, en de andere alleen een zwarte streep ter zyden aan de wangen hebben.
- 48 *Idem* het Wyfje. (*Viridis Femina*) Zy onthouden zich door geheel Europa.
- 49 { GROOTE ZWART BONTE SPECHT, Mannetje. (*Variegatus Major Mas.*) Lin. Sp. 10. Deze heeft een schoon roode streep over het achter hoofd, 't geen, volgens de Hollandsche vertaaling van het systema van de Heer *Linnaeus*, 't kenteeken der Wyfjes zyn zoude.
- 50 { *Idem* het Wyfje. (*Variegatus Major Femina*) By deze vind men de roode streep niet, en is my voor het
- & { Wyfje gezonden, 't geen waarschynelyker is, doordien de Wyfjes Vogelen meest flauwer kleuren hebben. Men vind dezelve door geheel Europa. NB. Tot meerder sieraat is hier een fraay
- 51 { Inlands YSVOGELTJE (*Ispida*) Lin. Gen. 56. Sp. 1. by geplaatst. Deze heeft iets byzonders, namentlyk dat de onderbek langer is dan de bovenste.
- 52 KLEINDER BONTE SPECHT. (*Medius*) Lin. Sp. 11. Heeft een root hoofd en is root aan den aars, is zeldzamer dan de vorige; woont mede in Europa.

SITTA.
BLAAUW SPECHTEN. } Gen. LV.

- 53 BLAAUW SPECHT of KLADDER SPECHT. (*Europea*) Lin. Sp. 1. Dit aardige Vogeltje valt hier, doch zeer zeldzaam.

ALCEDINES. }
YSVOGELEN. } Genus LVI.

- 54 KLEINE YSVOGEL. (*Aenea*) Lin. Sp. o. Dit fraaye Vogeltje is extra raar, en uit Surinamen.
55 KLEINE GEKUIFDE YSVOGEL. (*Cristata*) Lin. Sp. o. Deze soort verschilt weinig in kleur met ons Inlandich, doch de sierlyke achter over hangende kuif, en ontrend de helft kleinder zynde, maakt een kennelyk onderscheid. Deszelfs woonplaats is Cabo de goede Hoop, hy is noch raarder dan de vorige.

MEROPES.
BYEN EETERS. } Genus LVII.

- 56 BYEN-EETER. (*Apiaster*) Lin. Sp. 1. Dit fraaye en raare Vogeltje is mede van Cabo de goede Hoop, en is een soort van dat welke by Edwards Tab. 183. verbeelt word.
56* LANGSTAARTIGE BYEN-EETER. (*Casfer*) Lin. Sp. 4. Deze zeldzame Vogel gelykt sterk naar de BOOMKRUIPERS, en daar hy zekerlyk onder behoord. De staart is meer dan elf duim lang. De kleur is meerendeels graauw, op de stuit groen, onder by de staart geel, de borst gemengeld roschachtig. Deszelfs geboorte plaats is de Kaap. (*Ad Certhias referenda avis*).

UPUPAE.
HOPVOGELEN. } Genus LVIII.

- 57 HOPVOGEL. (*Epops*) Lin. Sp. 1. Dit soort valt gemeen in Duitschland, en in verscheide deelen van Europa. Zie Edwards Tab. 345.

CERTHIAE.
BOOMKRUIPERS. } Genus LIX.

57* BOOMKRUIPER. (*Certhia torque rubra*) Lin. Sp. o.
Van booven is dit schoone Diertje groen goudglanzig, het keeltje verguld blaauwgroen met een carmynrood randje omgeeven. De borst is aschgrauw, de staart zwart, de vlerken vaal zwart, 't onthoudt zich aan de Kaap.

58 & BLAAUW BOOMKRUIPERTJE. (*Cærulea*) Lin. Sp. 3. Dit sierlyke Vogeltje woont in Surinamen. By Edwards Tab. 21. is het zeer wel afgebeeld.

59 GROEN BOOMKRUIPERTJE. (*Virescens*) Lin. Sp. o. Deszelfs woonplaats is mede in Surinamen; 't zelve zit by het bovenstaande op eene Tak.

TROCHILI.
BLOEMZUIGERS. } Genus LX.

60 BLOEMZUIGERTJE, RONKERTJE of KOLIBRIT. (*Guainumbi*) Lin. Sp. o. De kleur is groenagtig en als vergult. De veertjes van onderen het lyf, en de staart, zyn met witte randjes omzet, de vleugels zyn vaal blaauwachtig. Cabo de goede Hoop is deszelfs woonplaats.

61 < BLOEMZUIGERTJE. (*Tomineo*) Lin. Sp. 11. Het lyf is boven op groen goud glanzig en van onderen wit. De vlerken vaal bruin, de staart is rosch met een zwarten band omzet met witte toppen, de twee middel-veeren zyn groen goud glanzig.

62 NB. Tot meerder sieraat en aangenaamheid van het gezigt is hier een MOSJE of zoogenaamd KONINGSVOGELTJE (*Fringilla Erythrina Mas.*) Lin. Gen. 98. Spec. o. zynde een Mannetje bygeplaatst; deszelfs woonplaats is de Kaap. Deze vyf bovenstaande Vogeltjes zitten elk, in haar natuurlyke gestalte op een knoestige Tak; hier by is noch een sierlyk Colubri Nestje, met een klein Eitje daar in leggende, geplaatst, 't geen een schilderachtige verbeelding maakt. Zie Edwards Tab. 355. fig. 1.

63 GOUDKLEURIG BLOEMZUIGERTJE. *Mannetje*. (*Ouriffia Mas.*) Lin. Sp. 7. Is verder blaauwachtig zwart met een gegabelde staart, uit Oostindien.

64 *Idem*

- 64 { *Idem* het Wyfje. (*Ouriffia Femina*) De borst is wit,
en de staart, gelyk. Deze twee zyn op een sier-
lyk Takje by een geplaatst.
- 65 BLOEMZUIGERTJE, ROODSTAARTJE. *Mannetje*
(*Mosquitus Mas*) Lin. Sp. 8. Dit fraaye Diertje is bruin
verwig, het hoofd, dat gekuifd is, is rood paars glan-
zig, de keel heeft een rooden gouden weerschyn, de
staart is bruin rood met zwarte toppunten; het zel-
ven is uit Surinamen.
- 66 *Idem* het Wyfje. (*Mosquitus Femina*) Is groen goud-
kleurig, op den rug met een flauwen rooden weer-
schyn, de vlerken en staart zyn vaal zwart.
- 67 Zie N. 57*.
- 68 { BLOEMZUIGERTJE. *Mannetje*. (*Mosquitus Mas*) Lin.
Sp. 8. Dit Vogeltje, welks geboorte plaats Cura-
cao is, verschilt in kleuren weer eenigzints met
die van Surinamen.
- 69 { *Idem* het Wyfje. (*Mosquiti Femina*) Het zit met
het vorige op een sierlyk Takje, en tegens een
Nestje, waar in deze volgende jonge en zeer klei-
ne beestjes zitten.
- 70 { JONG KOLIBRIETJE of BLOEMZUIGERTJE. (*Mos-*
quiti Pullus) Zittende in het voornoemde Nestje,
en is veel kleiner dan 't volgende.
- 71 { JONG KOLIBRIETJE. (*Ut-sup.*) Dit zit uit het
Nestje gekroopen.
- 72 { BLOEMZUIGERTJE. *Wyfje* als vooren. (*Mosqui-*
tus Femina ut-sup.) vertoont zig vliegende.
- 73 { *Idem* 't *Mannetje*. (*Ut-sup. Mas*) vertoont zig zit-
tende.
- 74 { Een Jong in zyn Nestje. (*Mosquiti Pullus*) Deze drie
zyn op een sierlyk Takje.
- 75 { *Idem* BLOEMZUIGERTJE. *Mannetje* (*Uts. Mosq. Mas*)
- 76 { *Idem* 't *Wyfje*. (*Uts. Mosq. Femina*) Beide deze
zyn mede in een natuurlyke houding en van
Curacao.
- 77 Zie N. 56*.

PASSERES.
ORDO VI.

MUSSCHEN.
RANG VI.

COLUMBAE. } Genus XCII.
DUIVEN. }

78 KROON DUIF. *Mannetje*. (*Cristata Mas*) Lin. Sp. o.
B Deze

Deze wonderlyke schoone Vogel is door den Holl. vertaalter van *Linnæus* onder de Faifanten gebracht, doch hy fchynt ons meerder met de kenmerken der Duiven overeen te komen, waarom wy dezelve hier brengen. Doorgaans word deze, hoewel ten onregt, Kroon Vogel genaamd, dan die benaming reets lang aan een geheel ander geflacht van Vogelen gegeven zynde, hebben wy liever die van KROON DUIF aangenomen. De heerschende kleur is fchoon blaauw; op de fchoften en op het lyf, kaffanje bruin; de vleugels, het achter lyfen de ftaart, zyn rofchagtig ftaal kleur, de toppen der ftaart zyn blaauw; op de vleugels zyn twee witte vlakken. Het onderscheid tuffchen de verfchillende Sexe is genoegzaam niet kenbaar, dan alleen, dat by het Wyfje de vleugels aan de onderkant witachtig zyn. Het Mannetje maakt zig 't meest kennelyk door een foort van korrend onafgebrooken geluid. Zy leeven gepaard, en maaken hun nest van dunne takjes. Derzelve woonplaats is Banda. Zie Edwards Tab. 338.

79 BOSCH DUIF. (*Palumbus*) Lin. Sp. 11. Vertoond zig als te willen weg vliegen. Onthoud zig hier in de Boffchen en door geheel Europa.

80 TORTEL DUIF. (*Turtur*) Lin. Sp. 20. Tot onderscheiding van eene andere is deze de Wilde gebynaamd; dezelve word hier en in verfcheide Waereldsdeelen gevonden.

ALAUDAE.
LEEURIKKEN. } Genus XCIII.

81 VELD LEEURIK. (*Alauda arvensis*) Lin. Sp. 1. Deze is byna wit; valt door geheel Europa.

82 LEEURIK. (*Alauda albis passim pennis*) Lin. Sp. 1. Variet. Deeze heeft witte ftreepen by de oogen, witte flag-pennen en twee witte veeren in 't midden van de ftaart; is hier gevangen.

83 KUIF LEEURIK. (*Cristata*) Lin. Sp. 6. Deze is byna geheel zwart; valt door geheel Europa.

84 BOOM LEEURIK, of PIEPER. (*Trivialis*) Lin. Sp. 5. valt door geheel Europa.

85 HALF-VELD-LEEURIKJE, TUIMELIER, of GRAS LEEURIK. (*Pratensis*) Lin. Sp. 2. Deze heeft lange

ge witte streepen boven de oogen, en is omtrend een derde kleiner dan de andere; valt door geheel Europa.

86 NB. By de BOOM LEEURIK zit een TAPUIT (*Oenanthe*) Lin. Gen. 99. Sp. 17.

STURNIS.
SPREEUWEN. } Genus XCIV.

- 87 SPREEUW. Mannetje. (*Sturnus vulgaris Mas*) Lin. Sp. 1. Deze is zeer zeldzaam als geheel en al met witte veeren doormengt zynde; valt in Europa.
- 88 NB. Op deze zelfde Tak zit een PAAPJE. (*Fringilla Linaria*) Lin. Gen. 98. Sp. 23. Dit Diertje zit als zig klouwende; valt hier gemeen.
- 89 NB. Onder aan de Tak van 't voorgaande hangt een PIMPEL MEESJE. (*Parus caeruleus*) Lin. Gen. 100. Sp. 4. valt hier.
- 90 NB. Voor aan op dezelfde Tak zit het KLEINE PYLSTAART MEESJE. (*Parus caudatus*) Lin. Gen. 100. Sp. 7. valt hier. Alle deze zitten wonderlyk wel en sierlyk in haar natuurlyke houding.
- 91 SPREEUW. Mannetje. (*Sturnus vulgaris cauda alba Mas*) Lin. Sp. 1. Het zeldzaame van deeze is; dat dezelve een witte staart heeft; is hier gevangen.
- 92 NB. By deeze zit, als door de SPREEUW weggejaagt wordende, een PIMPEL MEESJE. (*Parus caeruleus*) Lin. Gen. 100. Sp. 4.

TURDI.
LYSTERS. } Genus XCV.

- 93 WEIN-DROSTEL, KOPERWIEKJE. Mannetje. (*Iliacus Mas*) Lin. Sp. 3. Deze zit by de vorige SPREEUW. Europa.
- 94 MEREL. Mannetje. (*Merula Mas*) Lin. Sp. 12. Deze is zeldzaam als met eenige witte veeren vermengd zynde. Europa.
- 95 RING-LYSTER. Mannetje. (*Torquatus Mas*) Lin. Sp. 13. Europa.
- 96 SCHULP-LYSTER. Mannetje. (*Viscivorus Mas*) Lin. Sp. 1. Deze, die sterk geschulpt is, is de grootste soort der Europische Lysters.

- 97 NB. By deze voorig zit een GROENLING (*Loxia Chloris*) Lin. Gen. 96. Sp. 20. Europa.
- 98 KRAMSVOGEL of VELD-JAKKER. Mannetje. (*Pilaris Mas*) Lin. Sp. 2. Europa.
- 99 PAARS VUURKLEURIGE LYSTER. 't Wyfje. (*Puniceus Femina*) Lin. Sp. o. Deze Vogel is schoon paars; de slag-pennen en staart zyn donker graauw met witagtige randen; de buik is aschgrauw. Woont in Zuyd America. Zie het Mannetje by Edwards Tab. 341. die noemt hem de Pompadour.
- 100 KARRA of KIRREKIEK. (*Minor.*) Lin. Sp. o. Onthoudt zig in 't Riet zoo wel hier als in verscheide deelen van Europa. De kleur is roschagtig olyfkleurig, en van onderen geelagtig aschgrauw. Boven de oogen heeft hy een geelagtig aschgrauwe streep. De grootte is als die van een Spreeuw.
- 101 { WILLEWAAL of GOUD AMSEL. Mannetje. (*Oriolus Mas*) Linnaeus brengt hem by zyn 49ste geslacht 3 soort onder de SCHARLAAREN (*Coracias*) doch ons bedunkens vleid hy zig Best by de LYSTERS. Europa.
- 102 { Idem 't Wyfje. (*Oriolus Femina*) Deeze zit op eene Tak by het Mannetje.
- 103 MEREL. 't Wyfje van N. 94. (*Merula Femina*) Is vaal zwart, van vooren roschagtig, de bek is zwart.

LOXIAE. } Genus XCVI.
KERNBYTERS. }

- 104 KRUISBEK of KRUISVOGEL. Mannetje. (*Curvirostra Mas*) Lin. Sp. 1. Deze is schoon rood en hier in een Lyfterstrik gevangen. Europa. Edwards Tab. 303. de bovenste.
- 105 Idem het Wyfje. (*Curvirostra Femina*) Deze in het voorjaar van een Duitscher gekogt zynde, was doen roodagtig, doch in 't najaar veranderde dezelve en wierd groenagtig, en bleef wel twee jaaren zoo als zy nu is dus schynt de menigvuldige verandering te vervallen welke men dezelve toeschryft. Edwards Tab. 303. de onderste.
- 106 APPELVINK, DIKBEK. (*Coccothraustes*) Lin. Spec. 2. Zie Edwards Tab. 188. Europa.

107 DUB-

- 107 { DUBBELDE GOUD of BLOEDVINK. *Mannetje*.
(*Pyrrhula Mas*) Lin. Sp. 4. Europa doch ge-
meen in Duitschland, deze is hier in een Lyfter-
108 { strik gevangen.
Idem het Wyfje. (*Pyrrhula Femina*) Zit by het bo-
venstaande Mannetje.
- 109 ENKELDE GOUD of BLOEDVINK. *Mannetje*. (*Pyrr-
hula minor varietas, mas*) Deze schynt maar eene
varieteit en in groote te verschillen, is byna de helft
kleinder.
- 110 KARDINAAL of VIRGINISCHE NACHTEGAAL.
(*Cardinalis*) Lin. Sp. 5. Woond in Virginie, en
is heel veel verschillende met eene zyns gelyken
die aan de Kaap gevonden word.
- 111 RYSTVOGEL. *Mannetje*. (*Oryzivora Mas*) Lin. Sp. 11.
Onthoud zig op Java, en, zoo sommige zeggen, ook
aan de Kaap. Zie Edwards Tab. 41.
- 112 *Idem 't Wyfje*. (*Oryzivora Femina*) Is wat flauwer
van kleur.
- 113 KERNBYSER. (*Loxia erythromelana*) Lin. Sp. o.
Het voorhoofd en de buik zyn zwart, de vleugels
en staart graauw, verder, sterk oranje kleurig. Ont-
houd zig aan de Kaap; is zeer raar.
- 114 PURPER VOGEL. *Mannetje*. (*Lanius purpureus Mas*)
Lin. Sp. o. Word in de Colonie van Surinamen
gevonden. Is vaal zwart, ter zyden het hoofd
en de borst, rood. Edwards Tab. 267. Behoord, ze-
kerlyk onder de KLAWIJEREN. (*Ad Lanios referen-
da avis, hic casu collocata*).
- 115 *Idem 't Wyfje*. (*Lanius purpureus Femina*) Het rood
zoo sterk niet hebbende.

EMBERIZAE. } Genus XCVII.
GEELGORSSEN. }

- 116 SNEEUW-VOGEL, ZEE-PUTTER. *Mannetje*. (*Niva-
lis Mas*) Lin. Sp. 1. Wat meer wit dan de Wyfjes
hebbende. Onthouden zig in Noorwegen en ko-
men, doch zeldzaam, hier.
- 117 *Idem 't Wyfje*. (*Nivalis Femina*).
- 118 WITTER-SNEEUW-VOGEL. (*Nivalis varietas albi-
cantior*) Dezelve is veel witter dan de vorige en
komt zeer naby die van Edwards Tab. 126.
- 119 HAVERKNEU, GEELVINK. *Mannetje*. (*Citrinella
Mas*)

- Mas) Lin. Sp. 4. Is zeer sterk van kleur. Valt hier en in Zweden.
- 120 GEELGORS, GERSTVOGEL. (*Calandrea affinis*) Lin. Sp. 2. Is zeer vreemd van kleur en mogelyk wel een Bastaard. Hier te land gevangen.
- 121 SWIEBÊL of DUBBELDE GRAAUWE HAVERKNEU. (*Emberiza Calandra major.*) Lin. S. 2. Is hier gevangen en extra raar.
- 122 NB. By de bovenstaande is geplaatst, als tegens het Takje opkruipende, een BOOMKRUIPERTJE. (*Certhia familiaris*) Lin. Gen. 59. Sp. 1. Europa.
- 123 { RIETVINK. Mannetje. (*Schœniclus Mas*) Linnæus brengt deze by zyn volgende 98ste geslacht 26ste soort by de VINKEN (*Fringillæ*), doch ons bedunkens schikt dezelve zig beter hier. Des Zomers hebben dezeive zwarte kopjes met een witte ring. Europa. (*Ad Emberizas nobis pertinere visa*).
- 124 { Idem 't Wyfje. *Schœniclus Femina*) Is iets flauwer van kleur, zit by het vorige.
- 125 { NB. By de twee bovenstaande is nog een Wyfjes WILLEWAAL. (*Oriolus Femina*) Lin. Gen. 49. Sp. 3. geplaatst.

FRINGILLAE. } Genus XCVIII.
VINKEN. }

- 126 VINK. Mannetje. (*Cœlebs Mas, varietas albicans*) Lin. Sp. 2. Deze is byna geheel wit, en dus zeer zeldzaam. Europa.
- 127 VINK. (*Cœlebs, varietas albomaculata*) Lin. Sp. 2. Deze is geheel bont gevinkt: zeldzaam. Europa.
- 128 SYSJE. Mannetje. (*Spinus Mas*) Lin. Sp. 19. Europa.
- 129 { VINK. Wyfje. (*Cœlebs Femina*) Lin. Sp. 2. Zeer bont met witte veeren: zeldzaam. Europa.
- 130 { NB. Hier by zit de NAGTEGAAL, 't Mannetje. (*Motacilla Luscinia Mas*) Lin. Gen. 99. Sp. 1. Europa. Zie 't Wyfje N. 155.
- 131 { KEEP, BERG-VINK. (*Montifringilla Mas*) Lin. Sp. 3. Europa.
- 132 { Idem 't Wyfje. (*Montifringilla Femina*) Deze zitten zeer fraay by een gevoegd.

- 133 { PUTTER DISTELVINK. *Mannetje. (Carduelis Mas)*
Lin. Sp. 9. Europa.
- 134 { NB. Hier by zit een BREM of WINTERKONINKJE
(*Motacilla Troglodytes*) Lin. Gen. 99. Sp. 29. Eu-
ropa.
- 135 { PUTTER, DISTELVINK. 't Wyfje. (*Carduelis Fe-*
mina) Lin. Sp. 9. Valt alleen wat kleinder dan
't Mannetje.
- 136 { NB. Hier is bygevoegt de GRAAUWE MEES,
KORSJE KAAS. (*Parus palustris*) Lin. Gen. 100.
Sp. 6. Europa.
- 137 KNEUTJE. *Mannetje. (Flavirostris Mas)* Lin. Sp. 21.
Europa.
- 138 *Idem 't Wyfje. (Flavirostris Femina).*
- 139 { KANARIE VOGEL. (*Canaria*) Lin. Sp. 18.
- 140 { *Idem 't Wyfje. (Canaria Femina)* Zit by de vo-
rige.
- 141 *Idem een Mannetje. (Canaria Mas).*
- 142 BÉRG KANARIE. (*Fringilla Canariae subsmilis*) Lin.
Sp. o. Deze is groen, achter op de stuit geel, en
hier in het Duin gevangen.
- 143 Wonderlyk fraay VINKJE, 't FAISANTJE geby-
naamd. (*Undulata*) Lin. Sp. o. Heeft roode veer-
tjes om de oogen, 't Lyf als met golfjes geteekend
en een lang staartje. Zie Edwards Tab. 179. het on-
derste en 354. fig. 2. onthoud zig aan de Kaap.
- 144 WEEUWTJE. (*Macroura*) Lin. Sp. o. By *Johnston*
Tab. 35. Word het zelve SPERLING genaamd.
't Heeft de grootte van een Canarie, boven op
de staart leggen vier veeren ter lengte van 10 duim.
Onthoud zig in Oostindien.
- 145 MANGO VOGELTJE. (*Parus cyanochlorus*) Lin. Sp.
o. Is blaauw glanzig zwart, heeft een geel voor-
hoofd en borst, valt in Surinamen. [Dit Vogeltje
behoorden zekerlyk onder de MEEZEN].
- 146 INDIAANSCH GROENLING of GEELVINK. *Man-*
netje. (Butyracea Mas) Lin. Sp. 17. Deze onthoud
zig op Madera. Zie Edwards Tab. 84.
- 147 GEKLEURDE VINK. *Mannetje. (Emberiza Ciris Mas)*
Lin. Sp. 3. Dit fraaye Vogeltje, 't geen van
Vera Cruz, levendig is overgebracht, was aller-
lieflykst en aangenaam van zang, en 't is uit dien
hoofde dat de Spanjaarden het zelve, even gelyk
wy den Goudvink, zeer beminnen, wordende dik-
wils

- wils door hun met 4 a 5 Ducaten betaald. Edwards Tab. 273. Het zelve behoord onder de *Geelgorfen*.
- 148 KANARIE. *Mannetje*. (*Canaria ferruginea Mas*) Lin. Sp. o. Is mede zeer aangenaam van zang. Het boven lyf is bruin rood, de borst en buik graauw, 't hoofd en de slag-pennen zwart, de hals heeft een witte kring. Onthoud zig op de Kaap.
- 149 ROODKOP VINK. (*Gyrola*) Lin. Sp. 12. Het lyf is groen, de borst blaauw, het hoofd bruin rood. Valt in Surinamen. Edwards Tab. 23.
- 150 GRAS MOSCH, BERG MOSCH, *Mannetje*. (*Montana Mas*) Lin. Sp. 28. Valt hier te land. Zie Edwards Tab. 269.
- 151 NB. By deze bovenstaande is nog gevoegt het LANGSTAART MEESJE, *Mannetje*. (*Parus caudatus Mas*) Lin. Gen. 100, Sp. 7. Valt hier.
- 152 Item een St. MAARTENS VOGELTJE, *Mannetje*. (*Motacilla Regulus Mas*) Lin. Gen. 99. Sp. 30. Valt mede hier.
- 153 HUIS MOSCH, *Mannetje*. (*Domestica Mas*) Lin. Sp. 27. Europa.
- 154 *Idem 't Wyfje*, (*Domesticæ Femina*).

MOTACILLAE.

KWIKSTAARTEN.}

Genus XCIX.

- 155 NAGTEGAAL, *Wyfje*. (*Luscinia Femina*) Lin. Sp. 1. Het Mannetje is by de Vinken onder N. 130. geplaatst.
- 156 HET BONTE MEYVOGELTJE, *Mannetje*. (*Hypoleuca Mas*) Lin. Sp. o. Dus genaamt om dat men het zelve maar weinige dagen in die maand ziet. Is byna zwart, alleen, het voorhoofd, de keel en borst is wit, gelyk mede de groote vlakken op de vleugels. Dat van Edwards Tab. 30. fig. 1. zweemt 'er veel na. Valt hier, doch zeldzaam.
- 157 *Idem het Wyfje*. (*Hypoleuca Femina*) Dit is wat vaalder van kleur dan 't Mannetje.
- 158 NB. By deze drie vorige zit, tegen het Takje opkruipende, een BOOMKRUIPERTJE, 't *Mannetje*. (*Certhia Familiaris Mas*) Lin. Gen. 59. Sp. 1. Is wat grooter en sterker van kleur dan 't Wyfje. Europa.

- 159 **BLAAUWE TAPUIT, WITSTAART.** *Mannetje.* (*Oenanthes Mas*) Lin. Sp. 17. Is wat grooter dan 't Wyfje, heeft de vleugels zwart, de keel en borst zyn geel. Europa.
- 160 *Idem 't Wyfje.* (*Oenanthes Femina*) Hier zyn de vleugels bruin, zy maaken haar nest in oude Konyns hooien. Zit by het vorige op een Takje.
- 161 **GRAAUWE TAPUIT.** *Mannetje.* (*Oenanthes variata, Mas*) Lin. Sp. 17. Heeft een ligt geele borst.
- 162 *Idem het Wyfje.* (*Præcedentis Femina*) Is wat kleiner en ligter van kleur. Vallen hier te lande.
- 163 **BLAAUWE KWIKSTAART.** *Mannetje.* (*Motacilla alba Mas.*) Lin. Sp. 12. Europa.
- 164 **GEELE KWIKSTAART.** *Mannetje.* (*Motacilla flava Mas*) Lin. Sp. 13. Europa.
- 165 *Idem 't Wyfje.* (*Motacillæ flavæ Femina*).
- 166 **AKKERMANNETJE, ROOTSTAARTJE.** *Mannetje.* (*Phœnicurus Mas*) Lin. Sp. 21. Dat van Edwards Tab. 29. heeft 'er veel overëenkomst mede. Europa.
- 167 *Idem 't Wyfje.* (*Phœnicuri Femina*).
- 168 **HOFZANGER, BASTERD NAGTEGAAL.** (*Striata*) Lin. Spec. o. Is vaal bruin, de borst gestreept, de buik witagtig. Zit by de twee vorige. Valt hier.
- 169 **BLAAUWE BOERE NAGTEGAAL.** (*Plumbea*) Lin. Sp. o. Valt hier.
- 170 **NB.** By deze zit een **SYSJE.** 't *Wyfje.* (*Fringilla Spinus Femina*) Lin. Gen. 98. Sp. 19. Europa.
- 171 **VLIEGE VANGER.** *Mannetje.* (*Ad hypoleucam accedens, forte junior avis, Mas*) Lin. Sp. o. Is donker graauw met een witte streep over de vlerken, de dek en buitenste staart-veeren zyn met een witte rand aan de buiten zyde, de keel en buik zyn witagtig, de borst is vaal geel, dezelve worden zeer zeldzaam gevonden. [Of zouw deze niet wel een jong van de **BONTE MEYVOGEL** zyn, hier voor by N. 156. beschreven?]
- 172 **PIEPER.** (*Turdio minori simillima sed dimidio minor avis*) Lin. Sp. o. Is boven veel ligter van kleur. Deszelfs kleinheid brengt dezelve hier, anders is deze in allen deelen overeenkomstig met de **KIRRE KIEK.** N. 100. Valt hier, doch zeer raar.

- 173 { HEI VINKJE. *Mannetje. (Rubetra Mas)* Lin. Sp. 18. Deze is geel, en boven op zwart geschulpt, de staart is aan de stuit half wit, 't verdere zwartagtig; onder de bek, en boven oogen, zyn twee witte streepen, daar tusschen twee zwarte knevels; op de schoften is een witte streep. In de Holl. vertaling van *Linnaeus* word dit PAAPJE genaamd, en Edwards Tab. 30. aangehaald, maar dit is geen Paapje. Het valt in Gelderland doch, zeer zeldzaam.
- 174 { *Idem 't Wyfje. (Femina præcedentis)* Is minder in kleur. Zy zitten beide op een Takje.
- 175 { UITLANDSE PIEPER. (*Parus aureus*) Lin. Sp. o. By de afbeelding in Edwards Tab. 263. word deze, Golden Tit Mousse genaamd. Valt in Surinamen. [Dit is ook zekerlyk een MEES.]
- 176 { GEELBORSTJE. (*Hippolais*) Lin. Sp. 7. Dit Vogeltje is my uit Italie gebragt.
- 177 { KLEINE BASTERD NAGTEGAAL. *Mannetje. (Cantillans Mas)* Lin. Sp. o. Uit Italie.
- 178 { *Idem 't Wyfje. (Femina præcedentis)* Zy zyn zeer raar. Deze drie zyn by elkander op een Takje gevoegt.
- 179 { BIES of RIET-NAGTEGAAL. (*Varietas belgica præcedentium*) Lin. Sp. o. Valt hier te land, doch zeer raar, is maar een verscheidenheid der twee vorige.
- 180 { MEY VOGELTJE of ZINGEND VAAL GEEL PAAPJE. *Mannetje. (Salicaria Mas)* Lin. Sp. 8. Valt hier.
- 181 { *Idem 't Wyfje. (Salicariæ. Femina)* Zit by het vorige.
- 182 { ROOTBORSTJE. *Mannetje. (Rubecula Mas)* Lin. Sp. 28. Europa.
- 183 { *Idem 't Wyfje. (Femina præcedentis)* Zitten by elkander op een sierlyk Takje.
- 184 { St. MAARTENS VOGELTJE, GOUDHAANTJE. (*Regulus*) Lin. Sp. 30. Dit is het kleinste Vogeltje van ons land. Edwards Tab. 254.
- 185 { *Idem 't Wyfje. (Reguli Femina)* Zyn by elkander op een Takje en ons uit Engeland toegekomen.

PARI.
MEEZEN. } Genus C.

- 186 GEMEENE MEES. *Mannetje*. (*Parus major Mas*) Lin. Sp. 2. By de Mannetjes is de zwarte streep sterker en gaat door tot aan de stuit. By gebrek van voedsel verslinden zy zig onderling. Europa.
- 187 RIET MEES. *Mannetje*, of by ons de EENZAAME MOS genaamd. *Linnæus* brengt hem by zyn vorige 99ste geslacht, onder de KWIKSTAARTEN, de 19de soort, daar hy (*Atricapilla*) en by deszelfs Vertaalter, ZWART KAPJE genaamd word. Europa &c.
- 188 *Idem* 't Wyfje. (*Femina præcedentis*).
- 189 NB. By N. 186. hier boven, is nog een Vogel op 't zelfde Takje gevoegt, die wy HEYKNAPPER noemen, en met regt door *Linnæus* onder 't vorige 99ste geslacht der KWIKSTAARTEN, (*Motacillæ*) Sp. 18. onder de benaming van *Rubetra* gebracht is.
- 190 BAARTMANNETJE. *Mannetje*. (*Biarmicus Mas*) Lin. Sp. 8. *Albin* noemt hem de Mees van Jutland. Zie dezelfde by Edwards Tab. 55. Valt hier te land in het Riet.
- 191 *Idem* 't Wyfje. (*Femina præcedentis*) De Vertaalter van *Linnæus* brengt het onder de 33ste soort van de KWIKSTAARTEN, die hy Hangnestje noemt, insgelyks Edwards Tab. 55.
- 192 ZWARTE MEES. (*Erythrocephalus*) Lin. Sp. 10. De kop en dyën zyn goudkleurig, de laatstgenoemde hebben een schoon root randje. Valt in Zuid America. Zie Edwards Tab. 21.
- 193 ZWARTE MEES. (*Aureola*) Lin. Sp. 11. Met een oranje hoofd, hals, borst en dyën. Valt in Amerika. Zie Edwards Tab. 83. fig. 2.

HIRUNDINES. } Genus CI.
ZWALUWEN.

- 194 HUIS ZWALUW. (*Rustica*) Lin. Sp. 1. Europa.
- 195 SLYK ZWALUW, BOERE ZWALUW of WITGATJE. (*Urbica*) Lin. Sp. 3. Europa.
- 196 GIER ZWALUW. (*Apus*) Lin. Spec. 5. Europa.
- 197 DAGSLAAP. 't Wyfje. (*Caprimulgus Femina*) Lin.

Genus 102. Sp. 1. De Heer Linnæus en anderen hebben van dit foort Vogelen een byzonder Geslacht gemaakt, gelyk dezeden de 1ste van zyn 102de Geslacht is, en door hem (*Europæus*) genaamd word. By de Mannetjes zyn de buitenste staartpennen de langste, en met ronde witte vlakken aan het einde geteekend. Zie Edwards Tab. 63.

GALLINAE.

ORDO V.

HOENDEREN.

RANG V.

PAVONES.

PAAUWEN.

} Genus LXXXVII.

198 PAAUW. Mannetje. (*Cristatus Mas*) Lin. Sp. 1. Deze is wonderlyk schoon van veeren, met een staart van vier voeten, zit in een rustende gestalte op een fraaye kruk. Hunne afkomst is van Ceylon, van waar zy door geheel Europa gebracht zyn.

199 BONTE PAAUW. (*Cristata albi varietas*) Lin. Sp. 1. Is niet minder dan de vorige, de staart vier een half voeten lang. Zit in een fraaye houding, even als de vorige op een kruk.

MELEAGRIS.

KALKOENEN.

} Genus LXXXVIII.

200 BOSCH KALKOEN. Mannetje. (*Cristata Mas*) Lin. Sp. 2. Deze wonderlyke schoone en zeldzame Vogel onthoud zig in Brasil. Tusschen het Mannetje en Wyfje is geen onderscheid. Zie Edwards Tab. 13.

CRAX.

PAAUWIESEN.

} Genus LXXXIX.

201 PAAUWIES. Mannetje. (*Crax nigra Mas*) Lin. Sp. 1. Deze is zwart, heeft onder aan de stuit een weinig wit; de bek, die zeer lang is, is geknobbelt, het hoofd sterk gekuift. Deze is de kleinste en zeldzaamste. Valt in Zuid America. [De Wyfjes van de gewoone zwarte Paauwies, hebben

ben de borst met witte dwarsstreepen. Het Manneje heeft boven de bek, een groote ronde gele knobbel.]

PHASIANI. }
FAISANTEN. } Genus XC.

- 202 KRIEL HOEN. (*Gallina*) Lin. Sp. 1. Dit Henne-
tje is mogelyk een der kleinst bekende, 't zelve is
geheel wit. Europa.
- 203 WILDE FAISANT. Mannetje. (*Colchicus Mas*) Lin.
Sp. 3. Deze is onze gemeene soort die wy door-
gaans de bruine noemen.
- 204 BONTE FAISANTE HAAN. (*Phasianus albovarius*
Mas) Deze zit op een Tak in een rustende
gestalte, en is maar, in veeren verschillend van
de vorigen.
- 205 NB. By de bovenstaande Faisant, is nog tot meer-
der sieraat bygevoegt, een PAAPJE, 't Mannetje
(*Fringilla rubetra Mas*) by Linnæus onder zyn 98ste
Geslacht der VINKEN behorende, hoewel de
Vertaalder van dezen Natuurkundigen Heer,
dit Diertje (zekerlyk door misvatting) onder
zyn 18de soort der KWIKSTAARTEN gebragt
heeft.
- 206 Idem 't Wyfje. (*Præcedentis Femina*) De roode
vlak, welke deze Vogeltjes voor op 't hoofd
hebben, onderscheid dezelve genoegzaam van
de KNEUTJES, in welker nabuurschap zy an-
ders behooren. Het Mannetjes Paapje heeft de
borst rood.
- 207 WITTE FAISANT, HAAN. (*Phasianus albus Mas*)
Lin. Sp. 3.
- 208 WITTE CHINEESCHE FAISANT. Mannetje. (*Nyct-
themerus Mas*) Lin. Sp. 5. Deze Vogel is zoo fraay
in de veeren als men zien kan, en op een Tak
zittende. Zie Edwards Tab. 66.
- 209 Idem 't Wyfje. (*Præcedentis Femina*) Is in een zoe-
kende gedaante opgezet. Edwards Tab. 66.
- 210 ROODE CHINEESCHE FAISANT. Mannetje. (*Pictus*
Mas) Lin. Sp. 4. Deze is mede zoo fraay als men
zien kan. Zie Edwards Tab. 68.
- 211 Idem 't Wyfje. (*Picti Femina*) Edwards Tab. 68.

- 212 POULEPEINTADE of PAARL HOEN. *Mannetje*. (*Meleagris galata Mas*) Lin. Sp. 2. De Mannetjes zyn niet van de Wyfjes te onderscheiden. Hunne oorspronk is uit Africa.
- 213 BONTE POULEPEINTADE. (*Albo variegata varietas*) Lin. utf. Is in een loopende gestalte, met de vlerken wat uitgespreid.
- 214 WITTE POULEPEINTADE. (*Varietas alba*) Lin. Sp. utf. Deze zyn zeldzamer, is alleen als een Klok-Hen verbeeld.
- 215 Het KIEKEN eener POULEPEINTADE. (*Pullus Meleagridis*) In een zoekende gestalte.
- 216 *Idem* in een loopende gestalte (*Pullus Meleagridis*).
- 217 't KIEKEN van de ZWARTE HEN met de WITTE KUIF. (*Pullus Gallinaceus*).
- 218 *Idem* 't KIEKEN van de gemeene BOERE HEN. (*Pullus Gallinaceus*) Verbeeld zig, lopende.
- 219 *Idem* 't KIEKEN van een KRIEL HEN. (*Pullus Gallinæ-nanæ*).
- 220 *Idem* een diergelyk KIEKEN van omtrent tien dagen oud. (*Pullus Gallinaceus junior*).
- 221 BLAAUWE POULEPEINTADE. (*Meleagridis varietas cœrulescens*) Lin. Sp. utf. De anders gemeene ronde paarlvlakjes zyn hier zeer flauw. Deze is zeer zeldzaam, en op een Pedestal zittende.
- 222 KLEINE SOORT VAN POULEPEINTADE. (*Meleagris mitrata*) Lin. Sp. o. Deze valt veel kleiner dan de gewoone; is veel donkerder met witte paarls; ter zyden van de kop zyn dun afhangende vleesige, van onder roode punten; de kop, met de zogenaamde hoorn, is schoon rood. Dit soort wil hier te land niet aarden en sterven gewoonlyk aan het water. Zy onthouden zig op Madagascar.
- 223 GEKUIFDE POULEPEINTADE. (*Meleagris cristata*) Lin. Sp. o. Het lyf is donker staalkleur met hemelsblauwe paarls; de kop is met een fraaye staalkleurige kuif, in plaats eener hoorn, versiert; heeft geen lellen of afhangfels aan de kop; heeft omtrent de halve groote der gewone soort en is zeer zeldzaam. Komt uit Oostindien.

TETRAONES.

VELDHOENDEREN. }

Genus XCI.

- 224 GEMEENE GRAAUWE PATRYS. *Mannetje.* (*Perdix Mas*) Lin. Sp. 9. Het Wyfje heeft geen kastanje bruine vlakken ter zyden van de borst. Vallen in verscheide deelen van Europa.
- 225 ROODE ITALIAANSCH PATRYS. *Mannetje.* (*Rufus Mas*) Lin. Sp. 8.
- 226 *Idem 't Wyfje.* (*Præcedentis Femina*) Heeft geen knobbels aan de pooten, als het Mannetje.
- 227 BARBARYSCHE PATRYS. *Wyfje.* (*Rufi varietas mauritanica Femina*) Lin. Sp. 8. Het verschil is even als de voorgaande. Zie Edwards Tab. 70.
- 228 ZWITSERSCH PATRYS. *Wyfje.* (*Rufi varietas Helvetica Femina*) Lin. Sp. 8. De knobbels aan de pooten, wyzen, als by 't vorige, 't verschil der Sexe.
- 229 AROEPISCHE, GEKUIFDE PATRYS. *Mannetje.* (*Tetrao cristata Mas*) Lin. Sp. 9. Deze is zeer klein en heeft een fraaye kuif van achter over hellende witagtige veeren. Het Wyfje heeft geen kuif, en gelykt dus veel aan onze gemeene kwartel. Volgens sommiger zeggen komt deze uit de Berbice. (*Briffon Sp. 21.*)
- 230 Een dito KUIF PATRYS. (*eadem*).
- 231 KWARTEL. *Mannetje.* (*Coturnix Mas*) Lin. Sp. 13. Het Mannetje heeft zwart onder de bek. Onthouden zig in verscheide Waereldsdeelen.
- 232 *Idem 't Wyfje.* (*Præcedentis Femina*) Hier by zyn de volgende jongen zeer aardig opgezet.
- 233 EEN KWARTEL KIEKEN. (*Coturnicis pullus*) Loopende.
- 234 Een dito. (*Ejusdem pullus*) Als zoekende verbeeld.
- 235 Een dito. (*Ejusdem pullus*) Als leggende verbeeld. Dezelve zyn maar twee dagen oud, en by de voorgaande ouden geplaatst.
- 236 KORHAAN, BERKHAAN. (*Tetrix Mas*) Lin. Sp. 2. De zylyngs zig ombuigende staartveeren, geven deze Vogel een fraay aanzien.
- 237 *Idem 't Wyfje.* (*Tetrix Femina*) Onthouden zig op afgezonderde en moerassige plaatsen, voornamentlyk in Drenthe.

ANSERES.
ORDO III.GANZEN.
RANG III.ANATES. }
EENDEN. } Genus LXI.

- 238 BERG EEND. *Mannetje. (Tadorna Mas)* Lin. Sp. 3. In een leggende gestalte. De Mannetjes zyn, en hebben de roode knobbel boven de bek, grooter dan de Wyfjes.
- 239 ZWARTE ZEE EEND. (*Nigra*) Lin. Sp. 6. Te Scheveningen aan 't strand gevangen.
- 240 STORM EEND. (*Fusca*) Lin. Sp. 5. Schynt toch eenigzins met deze aangehaalde van *Linnæus* te verschillen. Is mede van Scheveningen, daar zy met stormweder op het land komen.
- 241 *Idem 't Wyfje. (Præcedentis Femina)* Heeft de witte vlakken achter de oogen niet, gelyk het Mannetje.
- 242 MAKKOUSER of TURKSCH EEND. *Mannetje. (Moschata Mas)* Lin. Sp. 13. Deze is fierlyk bont met groene koperkleurige vlakken.
- 243 *Idem het KIEKEN. (Pullus Moschatae).*
- 244 ZEE EEND. *Mannetje. (Dorsata Mas)* Lin. Sp. o. Bek en poten zyn lootkleurig, de kop, hals en borst zwart, 't hoofd groen koper glanzig, het lyf is boven zwart, en wit grys, de stuit, staart en slagpennen zyn zwart, de buik wit. Valt, doch zeer zeldzaam, in de Noord Zee.
- 245 KOL EEND. (*Albifrons*) Lin. Sp. o. Bek en poten zyn lootkleurig, het hoofd is purper, heeft voor een witte halve maan, de borst is roschagtig, het lyf roschagtig en wit grys, de stuit, staart en slagpennen vaal zwart, de buik is wit. Deze is hier in het Westland gevangen en by niemand bekend. [Zou deze ook niet het Wyfje der vorige konnen zyn?]
- 246 SLOBBE of LEPEL EEND. *Mannetje. (Clypeata Mas)* Lin. Sp. 16. Europa.
- 247 TOPPER of ZWARTE KUIFDUIKER. *Mannetje. (Fuligula Mas)* Lin. Sp. 39. Valt, gelyk de vorige, aan de Zeeuften van Europa.

248 KROM-

- 248 KROMBEK EEND. *Mannetje. (Adunca Mas)* Lin. Sp. 35. Is zeldzaam van veeren. Valt aan verscheide Europische Rivieren. Waarschynelyk is dit de wilde soort waar uit de tammen ontstaan is.
- 249 GEMEENE EEND. *Wyfje. (Anas Boschas Femina)* Lin. Sp. 34. Ongemeen van veeren, is anders gemeen in onze waaters.
- 250 KRAK of ROEPER. (*Strepera*) Lin. Sp. 18. Valt in de Dordsche Waard, doch niet gemeen.
- 251 VALEKER, ROSSCHE EEND of DUIKER. *Mannetje. (Ferina Mas)* Lin. Sp. 27. Is niet gemeen. Valt mede in de Dordsche Waard.
- 252 *Idem 't Wyfje. (Ferinae Femina)* Legt zig als te pluizen.
- 253 KIEKEN van een KWAKERS EEND. (*Clangulae Pullus*).
- 254 ZOOMER of SCHYF-TAALING. *Mannetje. (Querquedula Mas)* Lin. Sp. 28. Vallen in de Europische Rivieren.
- 255 WINTER TALING. *Mannetje. (Circia Mas)* Lin. Sp. 32. Legt zig zeer natuurlyk te pluizen. Valt hier gemeen.
- 256 KOL of STEEN GANS. (*Anser*) Lin. Sp. 7. Zie Edwards Tab. 135. Doch deze is veel sierlyker geteekend. Valt hier.
- 257 GROENLANDSCHE BRAND GANS. *Mannetje. (Anser Bernicla s. Brenta Mas)* Lin. Sp. 11. Deze verschilt merkelyk met de Brandgans der vertaling van *Linnaeus* zyn *Systema*.
- 258 TARTARYSCHE GANS. *Mannetje. (Anser Tataricus ferrugineus Mas)* Lin. Sp. o. Heeft de groote van een Rotgans. De bek en poten zyn zwart, hoofd en hals blaauw, 't lichaam kaneel kleur, de schoften wit met koper groene schilden, de staart en slag-pennen zyn zwart. Is niet gemeen.
- 259 TURKSCH BERG EEND. *Mannetje. (Penelope cristata Mas)* Lin. Sp. 24. Het schynt my toe de *Penelope* of *Smient* van *Linnaeus* te zyn, doch by ons is dezelve onder de benaming van *Turksch Berg Waartje* bekend.
- 260 (BELDUIKER of BRIL EEND. *Mannetje. (Clangula Mas)* Lin. Sp. 20. De *Vertaalder* van *Linnaeus* noemd hem *Kwaker Eend. Europa*.

- 261 | *Idem 't Wyfje. (Præcedentis Femina)* Deze legt by
 | de vorige. Het zwart der Mannetjes is in de
 | Wyfjes muisvaal.
- 262 GANZE BEKJE of BRUINETJE. (*Glaucion*) Lin. Sp.
 23. Valt in Europa; doch zeer raar.

MERGI.

ZAAGBEKKEN. } Genus LXII.

- 263 ENKELDE ZAAGER. *Mannetje. (Merganser Mas)*
 Lin. Sp. 2. Zie Edwards Tab. 95. Valt hier, doch
 zeldzaam.
- 264 DUBBELDE GROENE ZAAGER. *Mannetje (Merganser*
major Mas) Lin. Sp. 2. Heeft een fraay groen goud-
 glanzig hoofd. Valt hier, doch niet gemeen. Zou
 deze niet maar eene enkele verscheidentheid in
 kleur zyn? (*Varietas præcedentis, longe major colori-*
busque valde abludens, nec tamen credo distincta.)
- 265 *Idem 't Wyfje. (Præcedentis Femina)* De kop is bruin
 rood, het lyf van boven blaauw met witte schil-
 den of vlakken, de buik en borst is ligt geel zeem-
 kleurig. Deze schynt my de 3de van de Holl. Lin.
 te zyn.
- 266 WEEUWTJE. (*Albellus*) Lin. Sp. 4. Valt hier.

PELECANI.

KROPGANZEN. } Genus LXVI.

- 267 SCHOLLEVAAR. *Mannetje. (Carbo Mas)* Lin. Sp. 3.
 Deze Watervogel, welke zoo wel hier, als in an-
 dere landen verscheide benaamingen draagt, word
 hier ook dikwils de WATER RAVE genaamt. Het
 schynt my dezelve Vogel te zyn, welke de Chi-
 nezen op de Vischvangst africhten. Hy word hier
 op onze Meiren dikwils gevangen.
- 268 *Idem 't Wyfje. (Præcedentis Femina)* Valt wat klein-
 der, vaalder van veeren, en heeft het wit aan de
 kop zoo veel niet.
- 269 JAN VAN GEND. (*Bassanus*) Lin. Sp. 4. Deze Vo-
 gel, welke vry zeldzaam is, word aan onze Zee-
 stranden gevonden.

LARI.
MEEUWEN. } Genus LXIX.

- 270 ZEE-NONNETJE of BRUINKOP. (*Atricilla*) Lin. Sp. 5. Deze word voor de zeldzaamste der Meeuwen gehouden en op onze stranden gevonden.

STERNAE.
STERN MEEUWEN. } Genus LXX.

- 271 ICKXSTAR of ZEE-ZWALUW. (*Albifrons*) Lin. Sp. 6. Dit is de allerkleinste van dit Geslacht, 't welk zeer na met dat der Meeuwen over een komt. Hy onthoudt zich hier in 't over Maasche Land.

ALCAE.
PAPEGAAY DUIKEREN. } Genus LXIII.

- 272 ZEE-PAPEGAAY. (*Torda*) Lin. Sp. 1. Valt in de Noord Zee. Zie Edwards Tab. 358.

- 273 ZEE-AAKSTER of ZEE-GOUDVINK. (*Alle*) Lin. Sp. 6. Deze, welke mede in de Noord Zee valt, is zeer raar. Zie Edwards Tab. 91. doch deze heeft de borst wit. Het is opmerkelyk, dat de bek van deze Vogel met die van alle de verdere soorten van Watervogelen verschilt, en heel naby met die van een PATRYS over een komt.

- 274 GROENLANDSCHE DUIF. (*Grylle*) Lin. Sp. 5. Zie Edwards Tab. 50. Verschilt doch in kleur van veeren. Valt in de Noord Zee.

- 275 LOM of ZEE KOET. Mannetje. (*Lomvia Mas*) Lin. Sp. 4. Zie Edwards Tab. 359. fig. 1. Noord Zee.

- 276 *Idem* 't Wyfje. (*Præcedentis Femina*) De keel is wit met twee gryze cirkels naar agteren over den hals zwart afloopende.

COLYMBI.
DUIKEREN. } Genus LXVIII.

- 277 STAR DUIKER. (*Arctico affinis*) Lin. Sp. 1. Deze is te Scheveningen op 't strand gevangen, is extra raar, en in de Holl. vertaling van *Linnaeus* Tab. 40. fig. 1. afgebeeld.

- 278 ENKELDE STARDUIKER. (*Minor varietas præcedentis*) Lin. Sp. 1. De Visschers van het Eiland Goeree geven hem den naam van DOOVE JAAP of SCHOL EETER. Is maar verschillende in groote.
- 279 YSDUIKER of FATS. (*Fuscus*) Lin. Sp. o. Deze worden in alle binne Wateren in Holland en elders gevonden.
- 280 KLEIN DUIKERTJE. (*Ruficollis*) Lin. Sp. o. Is zeer zeldzaam in onze Meiren.
- 281 *Idem* 't Wyfje. (*Præcedentis Femina*) Is nog kleiner en ligter van koleur.
- 282 KLEINE AARSVOET, PRONKVOGEL, FOET of FUUT, GREBE. 't Wyfje. (*Auritus Femina*) Lin. Sp. 2. Deze Vogels leveren het witte zilverglanzige fraaye vederbont, 't geen tot zeer hoogen prys, uit Zwitserland, daar zy gemeender dan elders zyn, word overgezonden. Zy vallen hier in onze Meiren en groote binne Wateren, doch zeldzaam van zulken fraayen bond, als deze die het Zwitfersche evenaard.
- 283 DUBBELDE PRONKVOGEL. Mannetje. (*Cristatus Mas*) Lin. Sp. 2. Vallen hier als vooren, en in de uitgevende plassen.
- 284 Noch grooter PRONKVOGEL. Mannetje. (*Cristatus major Mas*) Lin. Sp. utf. Deze is uit Zwitserland, en veel grooter dan die hier vallen [hoewel ik eene echte Zwitfersche gezien heb, die niet grooter dan onze gewoone was.] Zie de Holl. vert. van *Linneus* Tab. 40. fig. 2.
- 285 *Idem* 't Wyfje. (*Cristatus Femina*) Is altoos minder gekuifd of gekraagt en iets kleinder. Zie Edwards Tab. 360, fig. 2.

FULICAE.

WATERHOENDEREN. } Genus LXXXII.

- 286 MEER KOET. (*Fulica atra*) Lin. Sp. 1. Valt byna door geheel Europa in de binnen wateren.

RALLI.

RALLEN. }

Genus LXXXIII.

- 287 KWARTEL KONING. (*Crex*) Lin. Sp. 1. Valt hier en byna door geheel Europa.

- 288 SCHRIEK of WATER RALL. (*Carolinus*) Lin. Sp. 5. Die by Edwards Tab. 144. komt wel over een met deze, doch valt wat kleinder. Valt hier te lande.
- 289 KLEINE WATER RALL. (*Aquaticus*) Lin. Sp. 2. Valt hier, doch zeer zeldzaam. Zie Edwards Tab. 278.

GRALLAE.
ORDO IV.

STELTLOOPERS.
RANG IV.

PHOENICOPTERUS. } Genus LXXII.
FLAMINGOOS. }

- 290 FLAMINGO. (*Ruber*) Lin. Sp. 1. Deze heeft de hoogte van zes voeten, is uit de Westindien. Zie de afbeelding in de Holl. vert. van *Linnæus* Tab. 42. fig. 1.

RECURVIROSTRA. } Genus LXXX.
KLUITEN. }

- 291 KLUIT. (*Avosetta*) Lin. Sp. 1. Valt op de buiten Gorsen en Slikken in Zeeland. Zie de afbeelding in de Holl. vert. van *Linnæus* Tab. 45. fig. 1.

PLATELEA. } Genus LXXIII.
LEPELAAREN. }

- 292 LEPELAAR. (*Leucorodia*) Lin. Sp. 1. Valt hier by den hoek van Holland. Deze is de gewoone zonder kuif. In de talryke Natuurverzameling van zyne Doorluchtigste Hoogheid den Heere Prinse van Oranje, is eene met de kuif, dit kenmerk zal waarschy-nelyk; even gelyk by de Reigers, het onderscheid der kunne bepaalen.]

ARDEAE. } Genus LXXVI.
REIGEREN. }

- 293 NUMIDISCHE JUFFER. (*Virgo Numidica*) Lin. Sp. 2. Deze Vogel is zoo fraay als men 'er een zien kan. Zy onthouden zig in Barbaryen. Zie Edwards Tab. 134.

- 294 WITTE REIGER. (*Ardea alba*) Lin. Sp. 17. Deze Vogel, welke hier genoegzaam onbekend is, is in de Provintie van Over-Yssel gevangen. In de verzameling van zyne *Doorluchtigste Hoogheid*, is een dergelyke, welke by Rotterdam op de Rivier de Maas geschooten is.
- 295 BRUIN-ROODE REIGER. (*Ardea pectore ferrugineo*) Lin. ad Sp. 11. Hy word hier, doch niet gemeen, aan onze Rivieren gevonden, en is bekend onder de benaming van Roode Reiger, hoewel de kleur meer bruinachtig rosch dan rood is. Zie Holl. Lin. Tab. 43, fig. 2.
- 296 WOUDE AAPJE of KLEIN REIGERTJE. (*Blongios*) Lin. ad Sp. 15. De Holl. vert. brengt dit, als een by soort onder de 15de der Reigeren van *Linnaeus*, en geeft 'er eene, doch gebrekkige, afbeelding van in zyn 43 Tab. fig. 4. Zy onthouden zig by de uitgeveende plassen in Holland, hoewel zeer zeldzaam. Briffon. Sp. 46.
- 297 KWAK REIGER. (*Stellaris*) Lin. Sp. 16. Valt in onze Veenen. Zie voorn. vert. Tab. 43. fig. 1.

SCOLOPACES. }
SNEPPEN. } Genus LXXVII.

- 298 ROODE WULP. (*Rubra*) Lin. Sp. 1. Valt op Curaçao, en in geheel Westindien. [Doorgaans word deze Vogel, welke een waare soort van de Ibis der Egiptenaren is, Flamingo genaamd, daar die toch tot een geheel verschillend geslacht behoord.]
- 299 GEMEENE of HOENDER WULP. (*Arquata*) Lin. Sp. 5 Vallen hier.
- 300 KLEINE of REGEN WULP. (*Phæopus*) Lin. Sp. 6. Deze is maar half zoo groot als de vorige, en zeer zeldzaam. Is hier op 't Eyland Blankenburg gevangen.
- 301 DUILTJE. (*Testacea*) Lin. Sp. o. Is een zeer klein en zeldzaam Wulpje, de groote van een halve Poelsnep hebbende. De hals en borst is rood en witagtig bont; het lyf is rood, wit, bruin en zwart. Valt op voorn. Eyland.
- 302 GRUTTO of MAARL. (*Limosa*) Lin. Sp. 10. Vallen hier gemeen by het Riet op de Rivieren.
- 303 HOUT SNEP. (*Rusticola*) Lin. Sp. 7. Inlandsche.

- 304 POEL SNEP. (*Gallinago*) Lin. Sp. II. Inlandsche
 305 KLEINE POEL SNEP. (*Gallinaginis varietas minor*)
 Lin. Sp. o. Deze word door de Vertaalter van *Lin-*
næus, als een byfoort van de vorige opgegeeven.
 Valt hier, doch zeldzamer.
 306 GROOTE GRYSWIT - GESPIKKELDE POELSNEP.
Mannetje. (*Erythropus Mas*) Lin. Sp. o. De bee-
 nen van deze foort zyn oranje kleurig. Dezelve
 valt hier, doch zeer zelden.
 307 *Idem 't Wyfje.* (*Erythropus Femina*) Is veel ligter
 van kleur, en de borst byna wit. Beide deze heb-
 ben een witte streep boven de oogen.
 308 GRYZE WATER SNEP. *Mannetje.* (*Totanus Mas*)
 Lin. Sp. 4. De beenen van deze zyn geel. Vallen
 hier, doch zeer raar.
 309 *Idem 't Wyfje.* (*Totani Femina*) Is van boven wat lig-
 ter van kleur, van onder verschilt zy meer, zynde
 de keel en borst byna wit.

TRYNGAE.

STRAND OF MOERAS-LOPERS. } Gen. LXXVIII.

- 310 WITGATJE. (*Glareola*) Lin. Sp. II. Vallen hier,
 doch raar.
 311 LOOPERTJE. (*Ralloides*) Lin. Sp. o. Heeft de groo-
 te van een halve Poel Snep. De bek en pooten
 zwart, het lyf van boven grysbuig, van onder
 wit. Vallen hier op onze stranden.
 312 KLEIN LOOPERTJE, HAAIR SNEPJE. (*Hypoleucos*)
 Lin. Sp. 9. Dit kleinste Slyk-Vogeltje is niet veel
 grooter dan een Kneu. Valt hier op de Slyken.
 313 KEMPHAAN. (*Pugnax*) Lin. Sp. 1. Deze heeft zwar-
 te en witte veeren, en de kraag-veeren geheel
 wit; word voor de zeldzaamste gehouden. Vallen
 hier en elders.
 314 KEMPHAAN. *Mannetje.* (*Pugnax Mas*) Lin. ut sup.
 Is geelbont, tot een weergade van de vorige die-
 nende.
 315 *Idem 't Wyfje.* (*Pugnax Femina*) Is zonder kraag
 om den hals.
 316 KIEVIT. (*Vanellus*) Lin. Sp. 2. De bek en pooten
 zyn zwartagtig.
 317 STRAND-LOOPERTJE. (*Interpres*) Lin. Sp. 4. Heeft
 de gedaante van een KIEVIT, doch geen af-
 hangende

hangende hoofd veeren, is half zoo groot, de bek zwart, de pooten oranje kleurig. Valt op de Zeeuwsche stranden.

CHARADRII. } Genus LXXIX.
PLEVIEREN. }

- 318 KLEIN PLEVIERTJE ook KIEVIETJE en PIEPERT genaamd. 't *Mannetje*. (*Hiaticula Mas*) Lin. Sp. 2. Valt in de Brabandsche quartieren, is hier zeer raar.
- 319 *Idem* 't *Wyfje*. (*Hiaticula Femina*) Is zwart bruin-achtig.
- 320 ZAND PLEVIERTJE. (*Tringa Leucophæa*) Lin. Sp. o. Is wat grooter dan een Leeurik. Het lyf is boven aschgrauw, het voorste lid van de vlerken en de slagpennen zyn zwartagtig, de bek en pooten zyn zwart. Valt aan de Noordsche Zeekusten. [By nader nazien bevinden wy dat deeze eigentlyk een Strandloper is].
- 321 GOUD PLEVIER. (*Pluvialis*) Lin. Sp. 8.
- 322 SCHOLAAKSTER, ZEE SNEP of OESTERVANGER. (*Ostralegus*) Lin. Sp. 1. De Heer *Linnaeus* begrypt deze in zyn 81ste Geslacht, 't welk hy *Hæmatopus* noemt, doch ons bedunkens kan hy hier zyn plaats by de Plevieren inneemen. Valt op onze stranden.

VIERVOETIGE DIEREN.

- 323 ZEE KONYN. (*Lepus cauda nulla*) Lin. Ordo V. Genus XXIV. Sp. 4. Anderen noemen het zelve Rotkonyn, Indiaansch Varkentje, &c. Het zelve valt in de Westindien.
- 324 *Eerstgeboore* HAASJE. (*Lepus timidus*) Lin. Ordo V. Gen. XXIV. Sp. 5. Valt hier gemeen.
- 325 MARTER. (*Mustela martes*) Lin. Ordo III. Genus XIV. Sp. 5. Heeft een Vogeltje ten roof onder zig.
- 326 BOSCH DUIVEL. (*Belzebut*) Lin. Sp. o. Is geheel zwart en lang van haar, het aangezigt is naakt, op de achtervoeten staande heeft hy de lengte van $3\frac{1}{2}$ voet, de staart is $2\frac{1}{3}$ voet, en daar mede kan hy zig aan de takken der boomen en andere lichamen zeer vast houden en omslingeren. Valt in Oost-

Oostindien , is zeer raar. Briffon heeft deze in zyn 1ste Classe 13ste Order 29de Geslacht en 29ste foort , onder de benaming van *Belzebut*.

- 327 LEEUW-AAPJE. (*Simia aedipus*) Lin. Ordo I. Genus 2. Sp. 13. Dit is een der kleinste onder de zoogenaamde MEERKATTEN. Het hoofd is met witagtig lang hair even als een Leeuw versiert , de staart is 13 duim lang. Valt op Vera Crux in Nieuw Spanje , en is zeer zeldzaam. Zie het zelve by de Holl. Vert. van *Linnaeus* Tom. 1. Tab. 6. fig. 3. Edwards Tab. 195.
- 328 EEN STRUISVOGEL EY, zeer konstig met Beeldwerk en verdere sieraden uitwendig besneden.
- 329 Een dito waar op een Historie inwendig gesneden is.
- 330 Een dito natuurlyk glad, onbewerkt.

K A S T E N.

- 331 Een Kast, om de Vogelen in te plaatsen, met twee glaaze deuren, alles van Eykenhout, zeer proper gemaakt met Engelsche koperen charnieren en binnen en buiten knippen. De planken zyn sierlyk uitgesneden met uitgestooke lyfien of kraalen die verguld zyn. Deze Kast is hoog 7 voet en 10 duim. Breed 7 voet. Diep 15 duim.
- 332 Een dito Kast tot een weergade op de zelfde manier.
- 333 Een dito Kast, hoog 7 voet. Breed 5 voet. Diep 13 en een halve duim.
- 334 Een Kabinetje met 36 Laaden, en eenen zoo veel daar in passende Bakken, tot het insteeken der *Insecten* of *Gekorvene Diertjes*. Het zelve is hoog 4 voet en 9 duim. Breed 3 voet. Diep een en een halve voet. De voetmaat waar van wy spreken is de Rynlandsche.

G E K O R V E O F B E E N D E R L O O Z E D I E R E N.

L A D E I.

TWEE VLEUGELIGE VliegEN. De mond is voorzien met een zuiger, waar mede zy het voedsel tot zig haalen; deeze steeken niet maar byten.

I. WOLFLIEGEN, (<i>Afil</i>)
Deeze doen veele schade
aan de Vrucht-boomen en
zyn verslinders van kleine
Insecten.	16 soorten. 25 stuks.
II. LANGPOOTEN, (<i>Tipulae</i>)
waar onder de Muggen be-
grepen zyn.	5 ——— 9 ———
III. DAAZEN, (<i>Tabani</i>) deeze
byten zeer sterk, en bemin-
nen het bloed van men-
schen en beesten.	9 ——— 13 ———
IV. SNUIT VLIEGEN, (<i>Afil</i>)
met de eene meer de ande-
ren minder vooruitsteen-
de scherpe punt.	5 ——— 8 ———
V. LANGGATTEN, (<i>Muscae
tomentosae setariae</i>) welker lyf
langer is dan de vlerken.	13 ——— 21 ———
VI. SEKREET VLIEGEN, (<i>Mus-
cae pilosae setariae</i>) of Brom-
miers.	10 ——— 16 ———
VII. PLATTE HART LYVIGE
GATTEN, (<i>Muscae tomento-
sae plumatae & clavicornes</i>) be-
minnen de planten tot hun
voedsel.	17 ——— 22 ———

VIII. VUILNIS-VLIEGEN, (*Muscæ pilosæ*) deeze zoeken haar voedsel op alle verrottingen, waar op zy haar Eyeren leggen, daar de Maden uit voort komen. . . . 13 soorten. 18 stuks.

IX. RUIGE VLIEGEN, (*Muscæ hirsutissimæ*) zynde het lyf geheel en al met hair bezet. 7 ————— 11 —————

X. TWEE JAARIGE LINDWURM-VLIEGEN, (*Tenthredines clavicornes*) met vier vleugelen en geknopte sprieten de bek is voorzien met twee nypers. . . . 7 ————— 8 —————

XI. LANGWERPIGE VIER VLEUGELLEN, (*Tenthredines filicornes*) met lange fyne sprieten. . . . 13 ————— 19 —————

115

170

L A D E I I.

WESPEN. de mond is voorzien met een schaar, die zy over malkanderen slaan, van agteren aan het uiteinde hebben zy een angel, waar mede zy steeken, zy zyn Insecten-Roovers.

I. BASTAART WESPEN, (*Spheces*) zyn weekhuidig en lang van gat. . . . 21 soorten. 32 stuks.

II. STAART WESPEN, (*Ichneumones Siricesque*) zyn voorzien met een langen uitwendigen angel, welke in een schede rust. 14 ————— 20 —————

III. STEEKEL WESPEN, (*Vespæ Chrysidæque*) zyn voorzien met een vurigen angel die in 't lighaam rust; zy zyn hard huidig. . . . 65 ————— 92 —————

100

144

L A D E I I I.

BYEN, het gantsche lighaam is met hair bezet gelijk ook de poten, zy zyn allen met een verborgen angel voorzien, waar mede zy geweldig steken.

- I. HONING. BYEN, (*Apes*) de kop is byna zoo dik als het lighaam, en is kort. 24 soorten. 31 stuks.
- II. HOMMELS, (*Apes Bombinatorum*) de kop is half zoo dik als het lighaam en langwerpig, de tong is meer dan eens zoo lang als de kop, en gespleten. 41 ————— 52 —————
65 83

L A D E I V.

WATER NIMPHEN, dus genaamd, om dat zy oorspronkelyk uit het water opkomen.

- I. ROMBOUTEN, (*Libellæ alis patentibus majores*) de kop is voorzien met groote oogen, het lyf is rond, zy hebben vier gaaze vleugelen. 5 soorten. 8 stuks.
- II. KOORNBOUTEN, (*Libellæ alis patentibus minores*) zy zyn half zoo groot als de voorgaande, men vindze in de Koornlanden, de bek is voorzien met een nyper. 6 ————— 8 —————
- III. JUFFERTJES, (*Libellæ alis erectis*) de kop is plat en breed, het lyf goudglanzig en zeer dun; de vlerken zyn versiert met een veel kleurigen weerschyn. 9 ————— 13 —————
20 29

L A D E V.

- IV. SPARREN, (*Libellæ depressæ*)
zy zyn 2 duim lang, het lyf
is platagtig en breed, ver-
siert met eenige kleuren. . 5 soorten. 5 stuks.
NIMPHEN, (*Larvæ præce-*
dentium) van Sparren. . 4 ——— 6 ———
- V. GAASJES of GOUT
OOGJES, (*Hemerobii legiti-*
mi) het hoofd is voorzien
met sprieten, het lyf is half
zoo lang als de vlerken. . 5 ——— 10 ———
- VI. WATER MOTTEN, (*Pbry-*
ganæ) zy hebben lange
voor uitsteekende sprieten,
zy dekken, zittende, haar
onder vlerken met de bo-
venste. . 9 ——— 17 ———
- VII. WANDELËNDE BLA-
DEN, (*Grylli mantos*) de
boven vlerken hebben de
gedaante van een blad, de
voorstee beenen zyn van drie
leden behaiven de klaau-
wen, en zyn veel dikker dan
de andere beenen. . 2 ——— 3 ———
- VIII. SPRINKHAANEN, (*Grylli*
locustæ) de agterste beenen
zyn meer dan eens zoo lang
als de andere, en zyn ook
veel dikker, kunnende daar
mede geweldig springen. De
boven vlerken zyn wel de
helft smalder dan de onder-
ste, de bek is voorzien met
twee schaaren, waar mede
zy geweldig byten kunnen. 14 ——— 18 ———
- IX. KREEKELS, (*Grylli acridæ*)
de kop is dikker dan het lyf,
zy zyn kort gedrongen, de
springpooten zyn korter en

naarevenredigheid dik als de
voorgaande.

4 foorten. 7 stuks.

- X. WATER-SCHIETERS, (*Tipula aquatica*) zy zyn zeer smal, langwerpig met fyne pootjes, men noemtze ook Scherminkels.

2 ————— 3 —————

- XI. WATER-KREEFJES, (*Nepa*) zy zyn plat, en hebben vier vleugels, de voorste pooten zyn de dikste.

3 ————— 4 —————

L A D E V I.

- XII. WATER VLIEN, (*Notonecta*) met vier vleugelen.

6 ————— 11 —————

74

113

WATER-TORREN. zy zyn hard fchaalig, en voorzien van vlerken, de agterpooten zyn platagtig en met fnaafels, zonder klaauwtjes, waar mede zy roeien.

- I. GLADDE BOOGTOR, (*Dytiscus clavicornes*) zyn zwart.

6 foorten. 9 stuks.

- II. PLATTE GLADDE, (*Dytiscus filicornes*) zwart met geele ftreepen.

7 ————— 10 —————

- III. GERIBDE, (*Femina aliquot praecedentium*) halver weeg de boven fchaalen. Dit zyn de Wyfjes.

3 ————— 5 —————

16

24

TEKKEN of PLANT-LUIZEN, zyn weekfchaalig, voorzien met twee vlerken, breed van fchoften en klein van kop.

- I. TEKKEN, (*Cimices*) zy verfchillen alle in maakfel en kleur, en geeven een vieze reuk van zich als men ze aanraakt.

24 foorten. 34 stuks.

KEE-

KEEVERS, Boom en Plant minnaars. De kop is voorzien met twee sprieten, die van vooren gebladdert zyn; van de Mannetjes zyn die het grootste. De schaaen zyn zoo teer, dat het haar weinig moeite verschaft, om ziggezwint tot vliegen te begeeven.

- I. **MOLENAARS**, (*Scarabæi arborei*) haar lyf is langer dan de boven schaaen. . . . 10 soorten. 20 stuks.
- II. **GOUT GLANZIGE KEEVERS**, (*Scarabæi aurati*) van verscheide kleuren. . . . 15 ————— 24 ———
- III. **MOLLENGRAVERS**, (*Silphæ vespillones*) zwarte en root bonte, de voorste pooten zyn in het eerste lit aan weder zyden getand. . . . 6 ————— 11 ———
- IV. **BASTAARD MOLLENGRAVERS**. (*Attelabi*). . . . 5 ————— 10 ———
- V. **VARKENS**, (*Curculiones*) zy zyn hoog rond van rug, de kop is voorzien met een lange snuit. . . . 45 ————— 71 ———

L A D E V I I.

- VI. **SCHILDPADJES**, (*Silphæ depressæ & Cassidæ*) zyn voorzien met ongebladerde sprieten, die zy nevens de kop en pooten onder haare uitsteekende schaaen verbergen. . . . 20 ————— 33 ———
- VII. **HAANTJES**, (*Chrysomelæ*) zyn kort en dik, meest alle goudglanzig, zy hebben syne sprieten. . . . 35 ————— 62 ———
- VIII. **KNIPTORREN**, (*Elateres*) zy zyn langwerpig. . . . 15 ————— 27 ———
- IX. **MEELTORREN**, (*Tenebriones molitores*) deeze zyn ook

lang.

langwerpig , doch knippen.

niet.	.	.	.	3	—————	6	—————
				154		264	

HOUT-TORREN, de kop is versiert met twee lange hoorns of geleeedde sprieten, de bek is voorzien met twee nypers, zy zyn langwerpig en houden zig op in gescheurt Timmerhout of Boomen.

- I. BOKKEN, (*Cerambyces*) de kop is een drie hoek, waar op aan de twee bovenste uiteindens de hoorns geplaatst zyn, daar de oogen onder volgen. . 17 soorten. 23 stuks.
- II. GEMSEN, (*Lepturæ*) de hoorns staan tusschen onder de oogen. 36 ————— 60 —————
- III. BASTAART GEMSEN, (*Cantharides*) zyn weekfchaalig, de hoorns of sprieten zyn korter en teerder. . 23 ————— 40 —————
76	132

L A D E V I I I.

LAND of AARD-TORREN, de bek is voorzien met twee schaaren; haare schaalen zyn zeer hard en onbuigzaam; zy kruipen over den grond en schuilen in ruigtens, sommige kruipen in den grond.

- I. STAPHYLINOS, (*Melœdes & Staphylini*) zyn langwerpig en hebben halve dekschaalen, waar onder de vlerken verborgen zyn. . 14 soorten. 21 stuks.
- II. ZANT-LOOPERS, (*Cicindelæ*) de kop is grooter en dikker dan de middel schaal, met groote uitpuilende oogen; zy houden zig op in de sporen der ryweegen van de

Duinen, en zyn gezwinder in 't loopen dan in 't vliegen. 10 ————— 18

- III. SCHAAL BYTERS, (*Carabi*) zyn klein van kop lang van lyf, en dik, zy kruipen meest en vliegen zelden. 42 ————— 66

L A D E I X.

- IV. KELDER-TORREN, (*Tenebriones*) de dekschaalen zyn niet gescheiden, en zyn van onderen met een zoom om het lyf heen geslaagen, zy hebben geen vlerken. . 4 soorten. 5 stuks.

- V. VLIEGENDE HARTEN, (*Lucani*) de kop is voorzien met twee knypers, in de gedaante van getakte hoorns; de Wyfjes hebben die zeer klein, haare sprieten zyn van twee leeden en van vooren gebladert. 6 ————— 7

- VI. RUN-TORREN, (*Scarabæi cornuti*) sommige hebben voor op de kop een kromme hoorn, de middelste hals-schaal is gebuldt, zy zyn min of meer langwerpig. . 11 ————— 19

- VII. DOMME KRAGTEN, (*Scarabæi pilularii*) de voorste pooten zyn in het middelste lid sterk getandt, waar mede zy in de aarde vroeten, de agterste schaaalen zyn geribdt, of glad, van onderen zyn zy goutglanzig. . 10 ————— 15

- VIII. GEHOORNDE DOMME KRAGTEN, (*Scarabæi coprides*) de Wyfjes zyn zeer weinig geknobbelt, de agterste schaaalen zyn geribdt. 7 ————— 13

- IX. PLATSCHAALIGE DOMME
KRAFTEN, (*Histeres*) zy
zyn kort en breed van ge-
daante.

. 13 ————— 22 —————

117

186

L A D E X.

VLINDERS, de vlerken zyn zeer dun en fyn gevee-
dert, des avonds na zonnen ondergang is haar
grootste vlugt, zy zyn zeer klein van kop,
met scherpe uitlopende sprieten.

- I. MOTJES, (*Phalænæ Tineæ*)
deze houden zig by dag
schuil en vliegen niet dan
by gelegenheid dat zy ge-
stoort worden. 16 soorten. 25 stuks.

- II. BLADER ROLLERS, (*Pha-
lænæ Tortrices*) waar van de
Rups zig in bladeren spint,
die zy tot elkanderen rolt.

- III. ELEMENTJES, (*Phalænæ py-
ralides*) zyn glanzig met een
weerschyn. II ————— 16 —————

- IV. MANTELJES, (*Phalænæ
pseudonoctuæ*) zy sluiten haa-
re vlerken om het lighaam
toe. II ————— 17 —————

- V. BASTAARTBEEREN, (*Phalæ-
næ setariis affines*) zy vallen
niet zoo ruighairig als de
rechte Beeren. II ————— 16 —————

- VI. BASTAART ONRUSTEN,
(*Sphynges adscitæ*) zyn smal-
der van lighaam. 7 ————— 12 —————

- VII. KRAMMEN, (*Phalænæ geo-
metræ*) waar van de Rups
voor en agter pooten heeft,
en by het voortkruipen de
gedaante van een kram for-
meert. 5 ————— 9 —————

. 14 ————— 20 —————

voor op den kop gekuift,
die de gedaante van een
uitsteekende punt formeert.

8 ————— 12 —————

VI. GEVEERDE JUFFERS ,

(*Phalænæ noctuæ brevicornes*)

zy hebben lange en smalle vleugels , met veertjes ;
zyn kort van lighaam en
van sprietjes.

6 soorten. 7 stuks.

VII. SCHILT UILTJES ,

(*Phalænæ bombyces subocellatæ*)

aan de einden van derzelver vleugels , vertoonen zig
min of meer , als schilden.

10 ————— 12 —————

L A D E X V.

VIII. ZY-SPINDERS ,

(*Phalænæ bombyces minores*) derzelver

lighaam is kort , en dik ,
zyn klein van vleugels.

6 ————— 8 —————

IX. KANEEL-UILEN ,

(*Phalænæ bombyces majores*) De naam

is van derzelver kleur , ontleend , bestaande uit ligter en
donkerder verwen.

10 ————— 13 —————

X. PLAKKERS ,

(*Phalænæ bombyces albidæ*) onthouden zig

tegens de stammen der
boomen in een levenlooze
gedaante , zy maaken een
soort van dons , waar in zy
haar eyeren leggen.

13 ————— 22 —————

L A D E X V I.

XI. TYGER - UILEN ,

(*Phalænæ coffi & vinula*) zyn dik

van kop , het lighaam is wit
en zwart gebandeerd , de
vlerken zyn geplekt of ge-
vland.

6 ————— 9 —————

XII. RUIGE BEEREN ,

(*Phalænæ setariæ*) de kop is

zeer

zeer wollig en ruig, de Rups heeft het gansche lighaam met lang hair bezet.

9 ————— 12 ———

XIII. PAAU-OOG-UIL, (*Phalaenæ bombyces alis patentibus ocellatis*) ieder vlerk is versierd met een oog, gelyk de Paauwen in derzelver staart hebben.

4 ————— 5 ———

XIV. WEESKINDEREN, (*Phalaenæ noctuæ fasciatæ macroptera*) ook Band-Uil genaamd, zy zyn allen met zwart gebandeerd, zoo onder als boven.

6 ————— 9 ———

169

229

L A D E X V I I.

KAPELLEN, deze vliegen by dag; derzelver lighaam is zeer smal, de sprieten zyn aan het einde geknobbelt; als ze rusten slaan zy de vlerken om hoog tot elkander. De Rups spint zig niet in, maar hegt zig vast aan het een of ander, als hy zig schikt tot de verandering.

I. BLAAUWE ARGUSJES, (*Papiliones plebeji*, *Argi cærulei*) aldus genoemd, om dat ze vol kleine oogjes zyn.

13 soorten. 21 stuks.

II. GOUDLAKENSCHÉ dito, (*Papiliones argi aurati*).

10 ————— 16 ———

III. DIKKOPJES, (*Papiliones plebeji macrocephali*) zyn voorzien met een groot hooft.

10 ————— 18 ———

L A D E X V I I I.

IV. WITJES, (*Papiliones danai candidi*) aldus genaamd, om dat derzelver hooft - kleur

wit is, met eenige weinige
zwarte mouches.

II ——— 19 ———

V. PIETERCELI BEESTJES,

(*Papiliones danai candidi*,
viridi subtrus-nebulosi) de vler-
ken vertoonen zig, min of
meer, als of 'er gekapte
Pieterceli op verstroot ligt.

7 ——— II ———

VI. ROOM-KAPEL, (*Papiliones*
danai candidi subphalerati) zy
zyn min of meer hoog geel,
met een enkelde of dubbel-
de zwarte band.

6 ——— 10 ———

L A D E X I X.

VII. ATLAS-KAPELLEN, (*Pa-*
piliones nymphales gemmati,
subtrus marmorosi) zy zyn
eenigzins gefigureerd als
een Landkaart op derzelver
vlerken.

9 soorten. 16 stuks.

VIII. GRAS-KAPELLEN, (*Papilio-*
nes nymphales gemmati, *ignobi-*
liores) bruine en geele, met ge-
figureerde oogen op de vler-
ken.

16 ——— 31 ———

L A D E X X.

IX. PERLEMOER-KAPELLEN,
(*Papiliones nymphales phale-*
rati, *maculis argenteis*) haar
inmiddelfte vlerken zyn van
onderen geplekt met perle-
moeragtige plaatjes, min of
meer.

14 ——— 24 ———

X. BONTE MANTELS, (*Pa-*
piliones nymphales phalerati,
ignobiliores) zy zyn geel,
van onderen witagtig ge-
vlakt, met zwart omzet.

10 ——— 17 ———

XI. AURELIAAS, (*Papiliones*

nym-

nymphales phalerati, *pulchrior-
res*) de onderste vlerken zyn
rondagtig, de bovenste zyn
gehoekt met een hol uit-
gesneeden; hier toe behoo-
ren de **CHANGANTS**,
DISTEL VINKJES, **NOM-
MER KAPELLEN**. &c.

. 7 ——— II ———

L A D E X X I.

**XII. GEKAMPAANDE AURE-
LIAAS**, (*Papiliones nympha-
les phalerati*, *alis angulatis*) de-
zen zyn de onder en boven
vlerken met holtens uitge-
sneeden, het welk de eene
min de andere meer heeft, en
waar onder de **KONINGS
MANTELS**, **PAAU-OO-
GEN**, **CITROEN KAPEL-
LEN**, **SCHOENLAPPERS**,
AGAATJES, &c. behoren.

. 21 ——— 38 ———

L A D E X X I I.

**XIII. GROOTE en KLEINE PA-
GES**, (*Papiliones equites*, *atque
plebeji caudati*) zyn alle meer
en min sleepdragers, alzoo
zy voorzien zyn aan de on-
derste vlerk met afhangen-
de slippen.

. 15	————	25
148		257

L A D E X X I I I.

I. ONRUSTEN, (*Sphynxes*)
welke haar voedsel al vlie-
gende gebruiken, met een
tong die zy in elkander rol-
len, men vangt ze zelden
rustende.

. 18 soorten. 30 stuks.
L A-

L A D E X X I V.

Sequuntur in suis oculis fixa Insecta varia Papiliones,
Phalænæ, Coleoptera varia, Grylli, Vespæ, Ara-
nei, cet., Indicæ & Americanæ Originis, opti-
me pleraque servata & nitidissima.

Hier volgen eenige Doosen met Oostindische en
Westindische KAPELLEN, VLINDERS, UILEN,
TORREN, SPRINKHAANEN, WESPEN &c.
meest alle wel geconditioneert en waar onder
zeer zeldzaame.

- 1 Een Doos waar in een extra
groote Westindische SPIN, met
een KOLUBRIET onder zyn
pooten, en nog 9 andere Insekten.
- 2 ——— met een zwarte PA-
GE, gout groen en wit geban-
deert, en nog 9 stuks anderen.

L A D E X X V.

- 3 Een Doos met de aldergroot-
ste Kaapsche TAPYT UIL, met
glazen schilden in de vlerken,
en nog 14 andere Insekten.
- 4 ——— met een Surinaam-
sche TAPYT UIL, extra groot en 6 anderen.
- 5 ——— met een Surinaam-
sche TAPYT UIL, dito ver-
keert en 10 anderen.

L A D E X X V I.

- 6 Een Doos met een extra groo-
te SPRINKHAAN en SCOR-
PIOEN, dito zeer klein Kaapsch
en nog 3 anderen.
- 7 ——— met een Surinaam-
sche TAPYT UIL, en nog . . . 6 anderen.
- 8 ——— met verscheide KA-
PELLEN, een TAPYT UIL, KNIP-
TOR, zeer groot. 7 stuks.

L A D E X X V I I.

- 9 Een Doos met Surinaamsche
KAPELLEN, waar onder de al-
lergrootste UILENKOP. . . 6 stuks.
- 10 ————— met KAPELLEN,
waar in de groote UILENKOP
verkeert, zeer gaaf. . . 7 stuks.
- 11 ————— met KAPELLEN,
TORREN en andere Insecten,
waar in de kleine UILENKOP,
AIGRET-TOR, &c. . . 12 stuks.
- 12 ————— met KAPELLEN,
TORREN en een zeldzaame
groote SPIN, de voorste pooten
genagelt, de raare blaauwe
smalle ATLAS. &c. . . 9 stuks.

L A D E X X V I I I.

- 13 Een Doos met KAPELLEN, een
SPRINKHAAN, SCORPIOEN,
en een fraaye zwarte BOK met
roode bande. . . 5 stuks.
- 14 ————— met KAPELLEN,
VLINDERS, BOKKEN, &c. . . 8 stuks.
- 15 ————— met TORREN, een
KAPEL de blaauwe ATLAS, en
een SPIN. . . 7 stuks.
- 16 ————— met een zwarte blau-
we weerschyn KAPEL, en an-
dere Kaapsche SPRINKHAA-
NEN, een TOR, &c. . . 7 stuks.

L A D E X X I X.

- 17 Een Doos met KAPELLEN,
VLINDERS, TORREN, waar
onder een zeer mooye PAGE. . . 9 stuks.
- 18 ————— met KAPELLEN, en
een fraaye Kaapsche TOR. . . 7 stuks.
- 19 ————— met KAPELLEN,
LANTAARNDRAAGER en an-
deren. . . 9 stuks.
- 20 ————— met KAPELLEN, en
een Chineesche LANTAARN-
DRAAGER. . . 10 stuks.

ADUMBRATIUNCULÆ

Avium variarum præcedenti Elencho
 insertarum, sed quæ in Systemate
 Naturæ Illustr. LINNÆI
 nondum extant.

- N. 8 **FALCO** (*epicyanus*,) cera pedibusque flavis,
 corpore supra plumbeo, subtus albo ferrugineo-
 que squamato, cauda aequali fasciis obscuris.
 Magnitudo Tinnunculi.
- N. 18 **LANIUS** (*ruficeps*,) supra fuscus, vertice rufo,
 fronte fasciaque oculari nigris, subtus macula
 alarum, rectriceque utrinque extrema tota albis.
 Magnitudo Collurionis, cujus secundum *Briss-
 onium* mas est.
- N. 28 **PSITTACUS** (*caudacutus*,) totus viridis, sub-
 tus flavescens, remigibus introrsum fuscis, cau-
 da brevi cuneata acuta. Magnitudo Passeris;
 rostrum pedesque flavescunt.
- N. 43 **CUCULUS** (*ferratirostris*,) rostro ferrato. *Tro-
 gon* Briffon. Spec. 1—3. Edwards similem rostro
 avem in novissimo Volumine pinxit. Briffonii pri-
 ma species femina, tertia varietas secundæ
 suæ videtur esse.
- N. 54 **ALCEDO** (*ænea*) atroviridis, subtus ferru-
 ginea, fascia transversa jugulari viridi-atra, albo
 variegata, abdomine albo. Magn: vix Spinum
 æquat. Remiges omnes interiori margine albæ,
 secundariæ exteriori albo passim interruptæ.
- N. 55 **ALCEDO** (*cristata*.) Colores fere nostratis, qua
 longe minor; pennæ verticis elongatæ, trans-
 versim fusco variæ.
- N. 59 **CERTHIA** (*Virescens*) brachiura viridis, subtus
 flavescens, lineolis cœruleis longitudinalibus.
 7. Forte junior avis tertiæ speciei Linnæi.
- N. 59* **CERTHIA** (*collaris*) fusca, viridi inaurata,
 subtus cinerea, fascia pectorali transversa rubra.
 Ad speciem Briffonii 20. pertinere videtur.

- N. 60 **TROCHILUS** (*guainumbi*) curvirostris. viridis sericeus, remigibus atris, rectricibus laterali-bus apice albidis.
- N. 62 **FRINGILLA** (*erythrina*) variabilis, supra fuf-co-cinerea, punctis alarum miliaribus albis spar-sis, subtus rubro-variegata. Hæc innumeris co-lorum varietatibus ludit. Rostrum constanter rubrum & puncta miliaria alba, utut sæpe per-pauca, in alis semper adsunt. Ad *Amandavam* Linnæi forte referenda.
- N. 78 **COLUMBA** (*cristata*) cœrulescens, capitis crista maxima compressa diffusa cirrhosa. Magn. supra Phasianum. Rostrum columbinum. Corpus plumbeo cœrulescens antrorsum dilutius. Fascia nigra a rostro ducta, oculos includens. Irides fulvæ. Dorsum medium humerique tinctura transversa punicea, antice abrupte terminata, postice obsolescente. Tectrices secundariæ albæ, extremitate puniceonigræ. Cauda plumbeo-fusca, apicibus rectricum dilutioribus. *Phasia-nus cristatus* Brissonii Spec. 6.
- N. 99 **TURDUS** (*puniceus*) corpore purpureo, alis cau-daue discoloribus. Femina forte hæc est, alarum pennis fuscis, uti & cauda. In simillima alia ave, quæ mas videtur, alarum remiges primarias albas extimas apice nigricantes, tectricesque secundi ordinis elongatas, carinatasque observavimus. Brissonio utraque avis *Cotingis* annumeratur, quorum 5. & 6. speciem efficit. Quem hic marem inuimus Edwardi Tab. 341. exhibet.
- N. 100 **TURDUS** (*minor*) flavescente fuscus, subtus fordide albus, cauda rotundata. Minor turdis nostratibus reliquis, canorus, in arundinetis habitans. Rostrum nigricat, mandibula versus basin flava. Gula alba. Cetera subtus albus, lutescente fordidus. Supra cinereo fuscus, ver-sus caudam lutescens. Remiges fuscae, pedes-que. Nomen Belgicum a clamore sortitur.
- N. 113 **LOXIA** (*tricolor*) rubra, facie abdomineque atris, alis gryseis. Fringilla major. Præter fa-ciem, & abdomen a jugulo ad anum, atra, coccinea. Alæ vero gryseofuscescentes. Ros-trum nigrum. Pedes grysei.
- N. 114 & 115. **LANIUS** (*Carbo*) ater, capite rubente, maxil-

maxilla inferiore basi aucta. Hab. in America meridionali. Rostrum & habitus ferè Lanii; max. superior ad apicem viz emarginata, inferior basi tumescens & fere usque ad oculos cornea, convexiuscula. Corpus totum brunneo atrum, velut holosericeum. Caput vero & collum jugulumque, supra atrum, purpurascunt seu cupreorubent. Cauda longiuscula rotundata atra. Remiges fusciores. In *Femina* dorsum quoque rubro perfusum. Magn. infra Collurionem. Edwards tab. 267.

- N. 142 FRINGILLA (*Citrinella*) flava, supra cinerascens, artubus nigricantibus. Caput, cervix cinerea; dorsum & frons cinereo-flavescent. Subtus, urrhopygiumque flavissimus. Remiges tectricesque nigræ; remiges limbo exteriori, secundariæque tectrices apice flavæ. Cauda bifurca; rectrices flavæ, exteriori limbo flavescentes, interiori albidæ. Rara avis.
- N. 143 FRINGILLA (*undulata*) cauda cuneiformi, fascia oculari rostroque rubris, corpore undulato supra fusco, subtus cinereo rubescente. Edwards 179.
- N. 144 FRINGILLA (*macroura*) supra nigra, macula humerali subtusque alba, rectricibus quatuor intermediis longissimis, lateralibus intèrius oblique albis. Magnitudo Spini.
- N. 145 PARUS (*cyanochlorus*) supra cœruleo ater, subtus frontemque flavus, remigibus rectricibusque tribus lateralibus, interiori latere, partim albis. Hic-casu collocatus, ad Paros brachyuros pertinet, Manacos Brissonio dictos.
- N. 156 MOTACILLA (*hypoleuca*) fusca subtus alba, remigibus intimis, rectricibusque tribus lateralibus exterius albis. Magn. fere Luscinia. Supra nigro fusca femina, mas nigrior. Frons prima, subtusque tota alba. Remiges 2, tectricesque intimæ maximam partem albæ. Rectrices utrinque 3. exterius longitudinaliter versus basin albæ.
- N. 168 MOTACILLA (*striata*) supra cinerea, subtus alba, capite colloque fusco striatis, pennis fuscis. Magn. Phœnicuri. Rostrum nigricat. Cauda æqualis, cinerascens. Remiges interio-

res limbo exteriori pallido, omnes cauda nigriores. Caput antice, collumque subtus præter gulam, & pectoris pars lineolis longitudinalibus. Cantu excellit.

N. 169 MOTACILLA (*plumbea*) dorso fusco testaceoque vario, capite colloque canis, cauda cinerea. Magn. fere Phoenicuri. Caput, collum totum & pectus medium cano-plumbea, abdomen albidum; latera, dorsumque testaceorufa, plumis medio fuscis; remiges quoque exteriori margine rufescentes. Urrhopygium caudaque cinereofusca. Rostrum basi flavescens.

N. 175 PARUS proprie est, a num. 145. eo diversus, quod gula collique pars subtus quoque atra, remiges interius limbo tantum versus basin albæ, & ipse mole inferior sit.

N. 177 MOTACILLA (*cantillans*) supra plumbeocinerea, subtus testacea, pennis fuscis, rectrice utrinque extima exterius alba. Magnitudo Hippolaidis. Oculi circulo cincti rufo in utroque sexu. Supra obscure plumbeo cinerea; subtus rufa, abdomine albo. Linea maxillaris utrinque alba obsoleta mari. Alæ fuscae, limbis penarum gryfescentibus. Cauda rotundata alis nigrior, rectrice utrinque extima exterius alba. Pedes flavi. Rostrum basi flavum. Femina multo obscurior sordidiorque coloribus.

N. 179 Est Varietas *Cantillantis*, supra cinerea, in capite plumbeo cana; subtus alba, in pectore sordida & velut rufulo tincta. Alis tamen, rostro, pedibus, cauda simillima Italicis.

N. 222 MELEAGRIS (*mitrata*,) galea rubra, appendiculis rictus oris subulatis. Similis *Galeatæ* seu vulgaris, qua paulo minor. Capitis, cum colli initio subpiloso nudi, vertex totus & cera, in qua nares, rubra. Verticis tuber conoideum compressum reclinaturn. Appendiculæ ad oris angulos lineares, apice rubræ. Plica gulæ longitudinalis. Corpus nigricans; colli ima pars lineolis transversis, reliquæ plumæ guttis miliaribus, in remigibus caudaque seriatis, albis, variegata. Rostrum corneoflavescens, pedesque.

N. 223 MELEAGRIS (*cristata*,) capite nudo, crista verticis reflexa atra. Magn. Meleagridis *mitratæ*.

tratae. Caput collique prior pars cute-atra nuda. Gula subpilosa. Vertex topho plumarum reflexarum atro ornatus. Appendiculæ circa os nullæ. Cera flavescent. Ima colli pars plumis atris vestita. Corporis plumæ ubique punctis, quam in vulgari specie, minutioribus, cœruleo albis, sparsæ. Remiges primariæ fusco nigræ, secundariæ punctis, uti corpus, verum seriatis, in exteriori vexillo in continuas lineas coalitis; extima secundariarum margine exteriori alba. rectrices caudæ rotundatæ breves atræ. Pedes nigri.

N. 244 ANAS (*dorsata*) alba, prora, alis caudaque nigris, dorso undulato. Magn. Boschadis. Marina. Caput, collumque cum trunci initio atra; caput virore fulgidum. Alæ-nigræ, macula alba. Dorsum album, lineolis undulatis transversis. Urrhopygium & subcaudales atra; rectrices fusconigræ. Irides flavæ. Rostrum pedesque nigricant.

N. 245 ANAS (*albifrons*,) forte præcedentis femina, Irides flavæ. Caput ferrugineo-atrum, levi cupreo nitore, collum versus truncum sensim obsoletius ferrugineo-fuscum. Dorsum, subcaudales, lateraque fusca, albo-undulata. Urrhopygium caudaque fusca, alæ nigriores, macula alba; Synciput circa basin rostri album, quo maxime a præcedenti distinguitur. Rarissima hæc est, cum prior sæpius in vivariis & fera visatur.

N. 248 ANAS (*adunca*) Linn. sp. 35. Fera hæc est. Tota atra, subrus, pennasque fuscida, capite, collo, urhopygio viridi nitentibus. Remiges 5 extimæ albæ. Remigum secundariarum exteriores, apice, exterius albomarginatæ, longitudinaliterque nigriores & subchalybeæ. Macula ovalis gulæ alba. Irides fulvæ. Rectrices intermediæ apice recurvæ. Ab hac rarissima specie, in fluminibus passim habitante, varietas *Domestica*, quæ adunco rostro est, originem traxisse videtur.

N. 358 ANAS (*ferruginea*) ferruginea, remigibus caudaque atris, tectricibus secundariis albis. Magn. fere Anseris. Rostrum anatino minus & angustius, ut pedes, nigrum. Corpus totum ferrugi-

neum in pectore & sub cauda dilutius. Caput quibusdam, cum collo, cano cinereum plerumque concolorum. Remiges atræ; secundariarum pleræque exterius viridi sericeæ, intimæ ferrugineæ. Tectrices secundariæ albae, maculam magnam efficiunt. Urhopygium supra atrum, lateribus fuscum griseoque undulatum, utet femora. Cauda subæqualis atra.

N. 271 STERNA (*albifrons*) alba, cauda forcipata, vertice nigro, triangulo frontali albo; remigibus extimis nigris. Turdum mole æquat. Alba, in dorso cana. Vertex & cervix atra, sed triangulum album, apice rostro insistens, in fronte. Remiges 2 extimæ fusconigræ, interiori margine albæ; reliquæ exterius, loco nigri, canæ. Tectricum extimæ binæ fuscæ. Cauda hirundinacea, alba. Rostrum pedesque flavescent; apex rostri & ungues nigricant.

N. 281 COLYMBUS (*ruficollis*,) fuscus, collo subtus rufo. Magn. infra Alcam Allen. Totus fuscus, subtus albicante nebulosus. Collum totum subtus late ferrugineo-rufum in Mare; in femina obsoletius, eique gula albo fuscoque nebulosa, & truncus subtus medio albo argenteus. Rostrum nigrum, basi subtus oblique flavum.

N. 279 COLYMBUS (*fuscus*), fuscus, subtus albo-argenteus, iridibus fulvis. Magn. Alcæ Alle. Supra ferrugineo fuscus. Remiges secundariæ interius albæ. Subtus gula, mediumque trunci alba, reliqua fusco sordida. Rostrum flavescent, supra fuscum.

N. 301 SCOLOPAX (*testacea*) rostro subarcuato, corpore fusco gryseo vario, subtus testaceo albo, urhopygio albo. Magn. Canuti. Plumæ supra fuscæ, in dorso medio nigræ apice utrinque gryseo, in quibusdam, prope nigredinem, testaceo accedente. Subtus plumæ, usque ad alvum albam, testaceæ, extremo albæ; basis caudæ alba, punctis sagittatis nigris. Remiges fuscæ, secundariæ, tectricesque apice albicantes. Rectrices obsolete fuscæ marginibus albicantes. Rostrum subarcuatum laeve, pedesque alba.

N. 306 SCOLOPAX (*erythropus*) pedibus rubris, corpore supra fusco, subtus albo, alis caudaque variega-

variegatis. Magn. Pluvialis. Rostrum læve, extremoclementer arcuatum, nigrum. Mas supra fuscus, femina magis cano-plumbea; fascia utrinque a rostro supra oculos alba. Mas sub-
tus albus, cinereo nebulosus & versus postica fasciato undulatus; femina alba, collo substriato. Remiges & tectrices primariæ nigricant; reliquæ, tectricesque harum margine utroque fasciolis abbreviatis albis. Cauda subæqualis urrhopygiumque fasciolis albis transversis. Pedes rubri, unguibus nigris.

N. 311 TRYNGA (*ralloides*) supra fusca, subtus alba, remigibus secundariis aliquot albis. Magn. Hiaticulæ. Supra fuscocinerea, capite cerviceque obsoletioribus & substriatis. Subtus alba, sed collum prope pectus cinerascens. Remiges nigricantes, primariarum interiores secundariæque margine albæ, harumque binæ fere totæ. Cauda subacuta, rectricibus mediis nigricantibus, lateralibus cinereis, sensim albicantioribus. Rostrum apice crassiusculum, pedesque nigra.

N. 320 TRYNGA (*alba*) alba, supra canescens, remigibus nigricantibus, interius albis. Trynga proprie est, non Charadrius. Supra collique lateribus incana, rhachibus nigricantibus. Magn. Canuti. Remiges nigricant, interne albæ & primariarum aliquot interiores exterius quoque; tectrices secundariæ apice albæ. Humeri fusci. Cauda inæqualis, rectricibus 2. mediis longioribus, omnibus fusco canescentibus.

7

QL	Beredeneerde
677.2	catalogus van eene
.V98	...
1764	1764
SCNHRB	

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 01570 9785

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00698 8307