Erster Nachtrag
zum
neuen Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg 1857.

Von Dr. Lentz.

Seit dem Jahre 1857, in welchem der hiesige Faunaverein meine Zusammenstellung der Preuss. Käfer veröffentlichte, hat sich die Zahl der sicher hier einheimischen Species nicht unbeträchtlich vergrössert; allerdings nicht ganz in demselben Verhältnisse, als die Kenntniss der Europäischen Arten zugenommen (ich hatte aus dem Stettiner Katalog etwa 9800 angegeben, in dem Schaumschen Verzeichniss von 1859 ist die Zahl auf 10743 angewachsen), aber doch so, dass die Behauptung feststeht, unsere Provinz sei verhältnissmässig an Coleopteren sehr reich, und ebenso, dass fortgesetzte Forschung gewiss von gutem Erfolg begleitet sein werde. Ich allein habe bei vierwöchentlichem Aufenthalt in unsern Strandgegenden im vergangenen, der Entwicklung der Insekten sehr ungünstigen Sommer drei bisher überschene Species gefunden, und die mittlern und südlichen Gegenden unserer Provinz mit ihren so umfangreichen Waldungen sind so gut wie gar nicht durchforscht. Die Aufgabe dieser Zeilen soll es sein, mit dem, was mir bis jetzt neues bekannt geworden ist, das Verzeichniss zu erweitern, fehlerhafte Bestimmungen zu tilgen, Zweifel zu beseitigen, doch freilich auch begründete Zweifel nicht zu unterdrücken.

Was nun zuerst die von Hrn. Prof. v. Siebold verzeichneten 5 fraglichen Species betrifft, so hat mir die Anwesenheit des hochverehrten Mannes selbst bei der letzten Naturforscherversammlung Gelegenheit gegeben, damit ins Reine zu kommen: *Cryptophagus fuscus* Knoch. ist = *Atomaria fuscata* Schönh., *Athous pubescens* Koch. ist = *hirtus* Hbst. und var. *scrutator* Hbst., *Malthinus teres* Knoch. ist = *frontalis* Marsh., *Scymnus oblongopustulatus* Müll. ist = *frontalis* Fabr. var. *bisbignatus* Redt. und *Phytoecia punctum* Ziegl. ist der gleichnamige Käfer Mulsants. Ausserdem hatte ich die Freude, den bis 1847 unbekannten *Otiorhynchus rotundatus* Sie-

bold näher untersuchen zu können, von dem der Autor mir selbst erzählte, dass er und v. Frantzius ihn in der Danziger Gegend bei Heubude in Wagengeleisen herumkriechend gefunden habe. Er ist mit Recht von Schaum in den Katalog als besondere Species aufgenommen und in die Nähe des schon bekannten *ovatus* Linn. gestellt. Zu der Beschreibung, die der Autor selbst in den Preuss. Prov. Bl. 1847. I. p. 431. gegeben hat, möchte noch als ein wichtiges Merkmal hinzuzufügen sein, dass bei *rotundatus* das zweite Glied der Fühlergeissel doppelt so lang ist, als das erste, bei *ovatus* aber beide Glieder kaum an Länge verschieden sind, und dass die Streifen der Flügeldecken bei *rot.* etwas tiefer und viel breiter sind, als bei *ovatus*. Auffallend aber ist es, dass dem fleissigsten Sammler Danzigs, Hrn. Kumm, dieser Käfer bisher noch nicht vorgekommen ist.

Von den Carabiden sind aus meinem Verzeichnisse als falsch bestimmt zu streichen (p. 168.) *Cymindis scapularis* Schaum, *C. angularis* Gyll., *Dyschirius rotundipennis* Chaud. und *Pterostichus negligens* Sturm. Auch muss ich die Neuerung in der Schreibung des Namens *Homophron* zurücknehmen, da nicht *ὁμόφρων*, sondern *ὁμόφρον* *crudelis* zu der Benennung benutzt ist. Das Bedenken über *Pelophila borealis* Fabr. sucht Schaum in Erichs. Käfer D. I. p. 79. besonders dadurch zu begründen, dass der Käfer „unter Baumrinde“ gefangen sein soll, wo er in Schweden nie gefunden worden: er hat jedoch dabei übersehen, dass dies „im Frühjahr“ geschehen ist. Wer ein Preussisches Frühjahr kennt, der weiss es, dass in dieser Jahreszeit die Insekten ihre Winterquartiere, die sie im Waldmoose und unter Baumrinde haben, nur in seltenen Fällen verlassen können. Und dass von den „eifrigen Preuss. Entomologen“ *Pelophila* bis jetzt noch nicht wiedergefunden ist, will wenig beweisen, da es uns doch schon bei einer recht namhaften Anzahl von Käfern gelungen ist, Kugelanns Angaben als richtig zu constatiren. Aehnliches gilt wohl von dem Alpenbewohner *Pterostichus fasciatopunctatus* Fabr. Ausserdem bezweifelt Schaum (in einer brieflichen Mittheilung) *Pterost. puncticollis* Dej., der allerdings südlich ist und über den ich keinen Aufschluss geben kann. Endlich spricht er sich über *Amara torrida* Illig. und *alpina* Fabr. ähnlich aus, doch gehören diese Hyperboreer in dieselbe Kategorie mit *Pelophila*: zu warm dürfte es ihnen wohl in unserm Klima nicht sein. Unrichtig scheint ihm die Bestimmung von *Bembidium nigricorne* Gyll., *Schüppelii* Dej. und *saxatile* Gyll. zu sein: ich selbst kenne keine Preuss. Exemplare davon und mache die Sammler darauf aufmerksam. Diesem Deficit gegenüber kann ich nun als Accessit folgendes angeben: *Dyschirius intermedius* Putz. ist von mir bei Schwarzort auf der kurischen Nehrung im Juli 1858 gefangen.

Pterostichus picimanus Dft., als dessen nördlichsten Fundort Schaum den Harz angiebt, ist von Elditt und mir an unserm Seestrande in einzelnen Exemplaren erbeutet worden. Der Zweifel über *Amara strenua* Zimm. ist gehoben, ich habe sie im vorigen Sommer ebenfalls am Seestrande gefunden. Ausserdem mache ich aufmerksam auf *Pterost. maculatus* Dft., von dem ich einige deutsche Exemplare besitze, eines aber, welches ich, wenn mich die Erinnerung nicht täuscht, gleichfalls unsern Seegegenden verdanke. Endlich ist zu unserer Fauna *Trechus rivularis* Gyll. hinzugekommen (Schaum l. c. p. 657). Ueber den *Carabus dentellus* Thunb. (mein Verz. p. 19) giebt Schaum in der Berl. Entom. Zeitschrift 1860. p. 91 Aufschluss, und *Carabus rubens*, den ich unter *Anchom. oblongus* angeführt habe, gehört zu *Trechus paludosus* Gyll. — Die Zahl der Wasserkäfer ist nur um einen vermehrt, *Berosus aericeps* Curt., der mir von Kramer aus der Gegend von Gilgenburg zugeschiekt wurde. — Von den Silphiden ist *Catops fuliginosus* Er. von Kumm bei Danzig gefunden, ebenso *Anisotoma obesa* Schmidt. und *Cyrtusa minuta* Ahrens. — Von den Staphyliniden sind (von Kraatz bestimmt) als neu für unsere Provinz anzugeben: *Homalota nitidula* Kraatz, *debilis* Er. und *trinitata* Kraatz, *Placusa complanata* Er. und *Bolitobius trinitatus* Er., welche 5 Species ich unter Röhricht vom Pregeldamm im Frühjahr gefunden habe: *Xantholinus rufipennis* Er. und *Iathrobium scabricolle* Er. sind vom Staatsanwalt Pfeil bei Wilkie an Birkenstubben gefangen: *Philonthus quisquiliarius* Gyll. var. *rubidus* Er. habe ich aus Gilgenburg erhalten. Dem rüstigen Sammlerfleisse Kumm's in Danzig verdanken wir folgende Bereicherung: *Oxypoda abdominalis* Mannh., *Ischnoglossa prolixa* Grav., *Leptusa fumida* Er. und *Deleaster diehronus* Grav. var. *adustus* Küst. — Die Histeriden haben keinen Zuwachs erhalten: nur will ich bemerken, dass der sonst so seltene *Teretrus picipes* Fabr. jedes Jahr nicht eben selten in der ganzen Umgegend unserer Stadt an alten Weiden gesammelt werden kann, wo er in Bohrlöchern wohnt. — Von den Trichopterygien ist *Sphaerius acaroides* Waltl. von Kumm bei Danzig gefunden: ebenso der zu den Phalacriden gehörige *Olibrus corticalis* Schönh. — Der Zuwachs der Nitiduliden ist der Zahl nach gering, desto werthvoller ist der Fund des äusserst seltenen *Rhizophagus coerules* Waltl., den ich bei Moosbude unter einer Fichte erbeutet habe. — Die Zahl unserer Cucujiden ist durch einen sehr interessanten Fund des Hrn. Forstmeister Dossow vermehrt worden, der in einer der hiesigen Forsten *Dendrophagus crenatus* Payk. entdeckt hat: auch ist *Laemophloeus duplicatus* Waltl., den ich unter dem Kugelausschen *Cucujus minutus* vermuthete, von Kumm wirklich gefunden worden. — Die Cryptophagiden sind um 2 Species

vermehrt worden: *Cr. labilis* Er. und *quercinus* Kraatz, beide von mir bei Königsberg gefangen, und der Zweifel über *Atomaria nigripennis* Payk. ist durch Kumm gehoben, der dies niedliche Käferchen bei Danzig gefunden hat. — Unter den Dermestiden hat sich *D. Frischii* Kug. bei Danzig mehrfach vorgefunden (Kumm) und ist somit das Sternchen vor dem Namen zu tilgen. — Die Byrrhien sind nun eine Species reicher geworden: *Synelytra spinosa* Rossi, welche Kramer bei Gilgenburg im Mai an feuchten Stellen im Felde mehrfach gefunden hat. — Zu den Parniden ist durch Kumm der bei Danzig gefundene *Elmis eupreus* Müll. hinzugekommen. — Die Heteroceriden sind nun 2 Arten vermehrt, *H. obsoletus* Curt. und *fuscus* Kiesw., den ersteren habe ich bei Schwarzort am Seestrande, letzteren bei Königsberg gefangen. — Die reiche Familie der Scarabaeiden hat nur einen kleinen Zuwachs erhalten durch *Trox hispidus* Laich., den Pfeil an dem Sackheimer Thor bei Königsberg gefunden hat. Von *Aphodius scybalarius* Fabr., der nach Kugelnann bei Osterode sehr gemein sein soll, ist es mir sehr auffallend, dass weder ich, noch sonst ein Sammler ihn in der Gegend von Königsberg jemals hat finden können. — Unter den Buprestiden haben die Agrilen einen Zuwachs von 3 Species erhalten: *A. sinnatus* Oliv. hat Dossow in der Warnicker Forst in Ebereschen gefunden, *A. coryli* Lap. hat Pfeil bei Dammhof erbeutet, und ich habe *A. pratensis* Ratz. bei Löwenhagen von einer Eiche geklopft. — Was die Eucnemiden betrifft, so ist mir die Notiz v. Kiesenwitters in Erichson K. D. IV. p. 205 befremdend gewesen, dass *Microhagus clypeatus* Hampe. unter dem Namen *Eucn. gibbicollis* von Kugelnann in Preussen entdeckt sei: in den Manuscripten Kugelnanns habe ich keine Andeutung davon gefunden, auch ist er neuerlich nicht wieder gefunden: er muss also vorläufig als zweifelhaft zurückgestellt werden. — Unter den Throsciden dagegen ist der Zweifel über *Drapetes equestris* Fabr. durch Kramer gehoben, der ihn bei Gilgenburg gefangen hat. — Die Elateriden sind durch einen glücklichen Fund des Hrn. Förster Schindowsky in Pröbbernau (frische Nahrung) um eine Species vermehrt worden: *Corymbites aeruginosus* Fabr. — Unter den Cleriden war *Trichodes alvareus* Fabr. zweifelhaft, der Zweifel ist durch Kumm beseitigt, der ihn bei Danzig gefunden hat. Ueber den *Opilus mollis* L. und *domesticus* Sturm. sind die Coleopterologen verschiedener Ansicht: Redtenbacher will beide zusammenziehen, bei Schaum im Katalog sind sie getrennt die preuss. Exemplare, die ich gesehen, haben fast alle die Grösse, die von *mollis* angegeben wird, und die Sculptur von *domesticus*: es müsste also wenigstens die Grösse des letzteren nicht auf $3—3\frac{1}{2}'''$, sondern auf $3—5\frac{1}{2}'''$ angegeben werden: da nun

der Unterschied in der Sculptur der Flügeldecken unbedeutend ist, so möchte ich mich der Ansicht von Redtenbacher anschliessen. — In Betreff der Ptiniden freut es mich den alten Streit über *Dorcotoma dresdensis* Herbst. entscheiden zu können: ich habe nemlich im Juli 1859 dieses durch seine zierlichen Fühler ausgezeichnete Thierchen von den am Haffufer stehenden Eichen bei Schwarzort herabgeklopft: freilich war *Dorc. chrysomelina* Sturm. viel zahlreicher. Ebenso habe ich das in unsern Katalogen noch nicht verzeichnete *Anobium immarginatum* Müll. an den Eichen bei Moosbude gefunden, — Unsere Cioiden sind um 2 Species bereichert worden: *Cis nitidus* Herbst. haben Pfeil bei Böttchershöfchen und ich bei Warnicken, beide in Schwämmen an alten Eschen gefunden, und *Cis alni* Gyll. habe ich im Juli 1860 von einer Erle bei Warnicken herabgeklopft. — Die Tenebrionen sind um eine Art gewachsen: *Mycetochares morio* Redt. hat Pfeil bei Moosbude gefunden. Statt der von mir angeführten *Dircaca quadrimaculata* Payk. muss es *quadriguttata* Illig. heissen. — Zu den Mordelliden füge man *Tomoxia biguttata* Casteln., die bisher in unsern Sammlungen mit *Mordella fasciata* Fabr. vermengt gewesen ist. Mit Recht sagt Lacordaire, dass *T. biguttata* von Gyllenhal Fn. Suec. II. 606. unter dem Namen *Mordella fasciata* beschrieben worden sei: mit grösserem Rechte möchte man vielleicht sagen, dass Gyll. durch seine Beschreibung beide Käfer hat vereinigen wollen. Das letztere scheint mir aus seiner Bemerkung hervorzugehen, die Beschreibung der Pubescenz bei den verschiedenen Autoren sei verschieden, dies rühre vielleicht daher, weil sich dieselbe leicht abwische. Aber bei einer Reihe von Exemplaren sieht man den Unterschied deutlich. Die Behaarung des Thorax und der Flügeldecken bei *T. biguttata* ist genau so, wie sie Gyll. beschreibt, bis auf die Worte „paulo pone medium cuiusvis elytri macula solitaria lunata albidior.“ Bei allen mir vorliegenden Exemplaren ist aber dieser Fleck mit der übrigen Behaarung zusammenhängend und nicht mondförmig, sondern bindenartig; dagegen passt ersteres für *M. fasciata* Fabr. Auch dass er das Schildchen *obtusum* nennt, deutet mehr auf letzteren Käfer, als auf *T. biguttata*; der Unterschied ist aber hierin sehr bedeutend: bei *fasciata* F. ist das Scutellum fast abgerundet, hinten kaum abgestutzt: bei *biguttata* ist es stark queer, viereckig, der Vorderrand des Vierecks läuft mit der abgestutzten Mitte des Halsschildhinterrandes parallel, die Vorderwinkel sind nach der Seite verlängert, die Seitentränder sind mit der Naht gleichlaufend, der Hinterrand ist in der Mitte ausgebuchtet, da die Hinterwinkel als stumpfe Lappen vorgezogen sind. Bei der Beschreibung der Fühler ist es aber ganz offenbar, dass Gyll. die *biguttata* vor Augen gehabt hat: die Worte

„antennae tenues, ultimo articulo oblongo, ante apicem subtus emarginato, apice acuminato“ lassen keinen Zweifel zu: auf dieses Kennzeichen hat eben Costa sein Genus *Tomoxia* begründet. Was zuletzt die Grösse und Gestalt betrifft, so sind die Worte Gyllenhals: „statura omnino *M. aculeatae*, sed maximis ejus plerumque adhuc major“ auch auf unsere Exemplare von *biguttata* sehr wohl anwendbar, während bei Redtenbacher *Fn. Austr.* 754. 6. die Grösse auf $3\frac{1}{2}$ — 4““, also für unsere Exemplare um eine Linie zu gross angegeben ist. Die Beschreibung bei Redt. ist sehr dürftig, wie überhaupt der descriptive Theil für die Species in diesem Buche selbst mässige Anforderungen nicht befriedigt: der systematische Theil ist gut, die analytische Methode halte auch ich für die zur Bestimmung vorzüglich brauchbare: doch ist eben auf die Ausführung der letztern so geringe Sorgfalt verwandt, dass man beim Verfolgen der Merkmale oft geradezu auf Widersprüche stösst. — Die kleine Familie der Salpingiden hat einen Zuwachs erhalten durch *Salpingus cursor* Gyll., den ich im vergangenen Sommer bei Warnicken erbeutet habe. — Die Zahl der Preuss. Curculionen ist nicht unbeträchtlich vermehrt worden; zwar ist *Metallites mollis* Germ. zu streichen, dessen Bestimmung falsch war, doch wird dies vielfach aufgewogen durch folgende Entdeckungen: *Apion ochropus* Schönh. hat Schindowsky bei Braunsberg von jungen Buchen geklopft, *Strophosomus obesus* Marsh. ist ebenso gemein wie *coryli* Fabr., jedoch bisher mit ihm zusammengeworfen, *Sitones puncticollis* Steph. von Schindowsky im Braunsberger Stadtwalde gefangen, *Phytonomus Julini* Sahlb. habe ich in Samländischem Waldmoose gesammelt. *Otiorhynchus tenebricosus* Hbst. hat Schindowsky bei Pröbbernau gefangen: den *Ot. gemmatus* Fabr. habe ich aus dem Berliner Manuscript *Kugelannus* pag. 179 anzuführen vergessen: er ist aber, soviel ich weiss, noch nicht wiedergefunden worden. *Larinus sturnus* Schönh. hat Saunter bei Neuhausen, *L. planus* Fabr. Schindowsky bei Braunsberg gefangen; *Magdalinus asphaltinus* Steph. ist von mir im Juli 1860 in der Warnicker Forst erbeutet, ebenso *Erirhinus pilumnus* Schönh., und *Erirh. scirpi* Fabr. haben Pfeil und ich bei Damnhof gefunden. *Sibynes prinitus* Hbst. ist mir durch Kramer aus Gilgenburg zugeschickt worden, *Bagous rotundicollis* Schönh. hat Pfeil bei Damnhof gefunden; den schöngezeichneten *Centhorhynchus Andreae* Germ. habe ich im Juni bei Friedrichstein, dann im Juli bei Warnicken entdeckt, endlich *Phloeophagus uncipes* Schönh. ebenfalls bei Warnicken unter Seetang. — Den *Bostrychiden* sind 4 Species hinzuzufügen: *Bostrychus cryptographus* Ratz. hat Doszow in der Fritzenschen Forst gefunden, *Dendroctonus pilosus* Knoch. hat Schindowsky bei Braunsberg unter Fichtenrinde angetroffen und *Hylesinus rhododacty-*

lus Marsh. haben Pfeil und ich an demselben Tage Ende Mai, jener in Wilkie, ich in Palmburg an Tannen gefunden. Ausserdem hat mir eine Weissbuche in Königsberg selbst *Eccoptogaster carpini* Er. geliefert. — Unter den Cerambyciden ist *Gracilia pusilla* Fabr. noch immer nicht ganz gewiss, zwar hat Kunin diesen Käfer aus birkenen Tonnenbändern erzogen, doch ist die Herkunft dieses Holzes nicht zu bestimmen: dagegen *Anaesthetis testacea* Fabr. ist von demselben wirklich bei Danzig gefunden worden. — Zu der Zahl der Chrysomeliden kommen noch *Pachnephorus tessellatus* Dft., den ich durch Kramer aus Gilgenburg erhalten habe, ferner *Cryptocephalus fulcratus* Germ., den ich bei Warnicken im Juli 1860 fand. Mit den überall gemeinen Species *Haltica nemorum* Linn. und *flexuosa* Illig. sind bis jetzt vermengt gewesen 3 von Redtenbacher aufgestellte und begründete Arten, *sinuata*, *excisa* und *vittula*, die sich auch bei uns mit jenen beiden gemeinschaftlich finden. Der *Cryptocephalus bistrispunctatus* Germ., über den noch ein Zweifel sein konnte, ist von Seydler bei Heiligenbeil gefunden. — Unter den Erotyliden ist jetzt mit Sicherheit als preussisch zu nennen *Triplax rufipes* Panz., den Kunin aus Neustadt erhalten hat. — Zu den Coccinelliden ist hinzugekommen *Cocc. bothnica* Payk., die bisher mit *M-nigrum* Illig. vermengt gewesen. Beide klopft man hier nicht eben selten von Tannen.

Da nun nach den obigen Angaben aus unserer Fauna 5 Species gestrichen werden müssen, dagegen 66 hinzugekommen sind, wovon indess noch 3 der Bestätigung bedürfen, so ist die ganze Zahl der in unsern Verzeichnissen enthaltenen Käfer 2725, wovon 106 noch mehr oder weniger zweifelhaft sind.

Ehe ich diesen Bericht schliesse, möchte ich noch die Aufmerksamkeit der Sammler auf ein zwar kleines, aber recht ergiebiges Terrain lenken, auf ein Gebiet, das in neuester Zeit in geologischer Beziehung einen eben so rüstigen als kundigen Forscher in den Preuss. Provinzialblättern mehrfach beschäftigt hat, und in botanischer Hinsicht von Tilsit her durchforscht ist, ich meine Schwarzort auf der kurischen Nehrung. Auch der Coleopterolog wird gewiss nicht unbefriedigt von dieser Oase des Dünenlandes scheiden. Es findet sich dort *Masoreus Wetterhallii* Gyll., den ich freilich auch sonst an der ganzen Küste von Brusterort bis Memel zu finden Gelegenheit gehabt habe, ferner läuft eine grosse Zahl *Amara maritima* Schödte. unter den Dünengräsern herum, die ich an der ganzen Samländischen Küste bis jetzt nicht gefunden habe, die aber wieder bei Putzig von Steffahnny vielfach gefangen wird; ebenso *Anthicus bimaculatus* Illig., den ich an der eben bezeichneten Küste ebensowenig angetroffen habe, bei Danzig aber zu finden leicht ist. Am Haff-

nfer sind bei Schwarzort einige Anthiciden äusserst zahlreich, unter andern der sonst seltne *sellatus* Panz., auch findet man *Peryphus lustratus* Dft. nebst einigen Käfern der eigentlichen Bembidiengruppe: *impressum* Panz., *argenteolum* Ahl., *paludosum* Panz., die sich am Wasser herumtummeln, in den Conferven am Rande des Haffes trifft man den *Hydroporus elegans* Illig. Im Walde selbst ist, wie ich schon erwähnt habe, *Dorcatoma dresdensis* Herbst. von mir gefunden worden, ausserdem fliegt an den Fichtenstämmen in grosser Zahl *Melanophila cyanea* Fabr. und *Ancylochira punctata* Fabr., seltener *Anc. rustica* Linn. und sehr sparsam die prächtige *octoguttata* Linn. An gefällten Espen und Fichten habe ich nicht selten *Monochamus sutor* Linn., häufig in copula gefunden; dann ist auf den gelben Syngenesisten *Chrysanthia viridis* Illig. zahlreich zu treffen, und, jedoch selten, der von mir zuerst in Preussen gefundene *Hapalochrus femoralis* Er., der auch in dem Schaumischen Verzeichnisse noch fälschlich *Apalochrus* genannt wird. Auf den am Seestrande zerstreuten Weidengebüschen wohnt zahlreich *Anoncodes rufiventris* Scop. und endlich ist auf den an der von Schumann beschriebenen gefährlichen Düne nach der See- seite zu liegenden Torfweiden *Lina collaris* Linn. sehr verbreitet. Dagegen habe ich von *Lethrus cephalotes* Fabr., der nach einer alten von Kugelann mitgetheilten Ueberlieferung dort vorhanden gewesen sein soll, keine Spur entdecken können. Dass unsere Gegend auf einen so südlichen Käfer Ansprüche machen wolle, könnte befremdend erscheinen, doch würde es nicht an Analogien fehlen: wer sollte z. B. *Cicindela sinuata* Fabr. hier vermuthen, die doch in grosser Menge bei Pillan gefunden wird, oder das grosse Neuropteron, *Acanthaelisis occitanica*, welches man nicht gerade selten bei Kalilberg auf der frischen Nehrung antrifft? Ich habe Schwarzort nur zweimal, und nur im Juli zu besuchen Gelegenheit gehabt, bin aber überzeugt, dass auch in den andern Sommermonaten sich manches Interessante dort finden würde.

Königsberg, Januar 1861.

92
591
64
L57
Suppl. 2

Zweiter Nachtrag zum neuen Verzeichniss der Preussischen Käfer, Königsberg 1857.

Von Dr. Lentz.

Die bedeutende Erweiterung der Kenntniss unserer Käferfauna seit meinem ersten Nachtrage, der in diesen Schriften Jahrg. 1860 p. 139 erschienen ist, giebt ein sehr erfreuliches Zeugniss von der rüstigen Thätigkeit unserer Sammler, wenn ich es auch nicht ohne Bedauern aussprechen muss, dass ich von den in Westpreussen ansässigen Entomologen fast ganz im Stiche gelassen bin. Nur durch das erste Heft des recht verdienstlichen, die Lauf- und Wasserkäfer enthaltenden Werkes „Preussische Käfer von Rud. Fritzen, Neustadt in Westpreussen 1865“ habe ich Kunde von einigen in meinem Verzeichnisse nicht enthaltenen Käfern bekommen. Ein rascher Fortgang ist diesem Buche eben so sehr zu wünschen, als kaum zu erwarten. Aber auch ohne diese Hülfe ist die Anzahl der hinzukommenden Species eine sehr ansehnliche, und es hat ausser den schon in meinem ersten Nachtrage genannten Entomophilen in besonders anzuerkennender Weise Herr Oberlehrer Czwalina sich der Sache eifrigst angenommen, der namentlich das schwierige Genus *Meligethes* einer eingehenden Untersuchung unterworfen und viele hier vorkommende bis jetzt nicht verzeichnete Species mit Sicherheit nachgewiesen hat.

Ich beginne, wie in meiner vorigen Arbeit, mit den Irrthümern, die in meinem Verzeichnisse zu berichtigen sind.

Unter *Cymindis humeralis* Fabr. p. 6 hatte ich bemerkt, dass ich mehrere Exemplare bei Rauschen gefunden: diese haben sich indess als *macularis* Dej. herausgestellt: doch ist auch *humeralis* Fabr. neuerlich in ziemlich grosser Zahl bei Vierbrüderkrug wieder gefunden worden. — *Dromius fasciatus* Gyll. p. 7 ist als synonym mit *D. sigma* Rossi zu vereinigen. — Statt *Bembidium rufipes* Illig. p. 19 muss es heissen *rufipes* Gyll. = *nitidulum* Marsh., der Illigersche Käfer (Magaz. I. 63. 7—8) ist *B. ruficorne* Sturm, das bis jetzt meines Wissens noch nicht in Preussen gefunden ist, cf. Schaum Ins.

Dtschl. I. p. 692. — *Bolitobius trimaculatus* Pk. p. 45 ist zu streichen: das, was Kugelann gefunden hat, ist sicherlich alles *pygmaeus* Fabr. gewesen, der in der Grösse um eine ganze Linie variirt: auch führt Kraatz K. D. II p. 449 nur Stücke aus dem südlichen Deutschland an. — *Epuraea tripunctata* Kug. p. 68 ist als traditioneller Name zu streichen: es ist bei der mangelhaften Beschreibung bei Illiger schlechterdings unmöglich die Species zu bestimmen. — Die *Buprestis quadrisignata* p. 91 aus KM. ist offenbar die nur wenig gefleckte Var. von *Ancylochira flavomaculata* Fabr., und gehört nicht, wie ich angegeben, zu *octoguttata* L. — *Agrilus sinuatus* Oliv. (Erster Nachtr. p. 142) ist falsch bestimmt worden: es war *Agr. mendax* Mannh. — Das über *Adrastus limbatus* Fabr., *pallens* Fabr. und *limbatus* Pk. Gyll. Gesagte ist so zu modificiren: *Adrastus pallens* Fabr. KM. 95. 39 *Elater limbatus* Fabr. — S: *Adr. limbatus* Fabr. (die Citate sind irrig) und Var. *limbatus* Pk. Gyll. beide überall häufig. — *Dasytes cyaneus* Oliv. p. 103 ist zu streichen als Synonym mit *coeruleus* Fabr. — *Mycetophagus decempunctatus* Fabr. p. 77 ist zu streichen: die Bestimmung war falsch, alle meine Exempl. gehörten zu *variabilis* Hellw., dessen eine Var. dem *decempunctatus* täuschend ähnlich und fast nur durch die Kürze des letzten Fühlergliedes zu unterscheiden ist. — In der Bestimmung der *Heteroceriden* p. 82 hat bis auf v. Kiesenwitters Arbeit im IV. Bande der *Germarschen Zeitschrift* viel Confusion geherrscht; sowohl Gyllenhal als Illiger haben, wie aus der Beschreibung des *H. marginatus* hervorgeht (Gyll. Fn. Suec. I. 137. 1, Illiger Käf. Pr. 397. 1), verschiedene Species vermengt, und erst Kies. sah, dass die Zeichnung der Flügeldecken bei diesem Genus zuverlässige Merkmale lieferte. Ich besitze unter meinen *Heteroceren* 2 Exempl. von der Seeküste von Schwarzort, die ich nun nach der Abbildung in *Sturms Fauna* Bd. 23 tab. 418 A. als *marginatus* F. erkannt habe. Das charakteristische Merkmal des rothgelben mondförmigen Schulterflecks mit der nach der Basis der Flügeldecken zurückgebogenen Spitze ist deutlich vorhanden, so wie auch die übrige Zeichnung genau übereinstimmt; nur ist die Grösse, die von Sturm auf 2 Lin., von Redtenbacher auf $1\frac{3}{4}$ Lin. angegeben wird, bei meinen Exemplaren nur etwa $1\frac{1}{2}$ Lin. Doch, wenn ich auch auf Gyllenhals Worte kein Gewicht lege: *magnitudo variat, majores Dermesti Pellioni aequales, alii duplo minores et ultra*, weil er, wie oben bemerkt, verschiedene Species vermengt hat, so differirt auch bei *laevigatus* Fabr. nach Sturm l. c. p. 65 die Grösse um eine ganze Linie

($1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$), bei *obsoletus* Curt. und *femoralis* Ksw. nach Thomson Scand. Coleopt. II. 126 um eine halbe Linie, und sicher ist Aehnliches auch bei *marginatus* Fabr. der Fall. Daher ist das, was ich pag. 82 unter *H. laevigatus* geschrieben habe, so zu ändern: *H. marginatus* Fabr. KS. 533 u. s. w. — IK. 397. 1 (ex parte). — KM. 56. 1: Fabr. I. 355. 1. Payk. I. 357. 1. IK. l. c. Panz. 23. 11 (dies scheint freilich *H. hispidulus* Ksw. zu sein). — S. — *H. laevigatus* Panz. KM. 56. 2: Fabr. I. 356. 3. Panz. 23. 12: dem *marginatus* sehr ähnlich, aber noch einmal so gross. (Kugelann muss also, wenn ich richtig gedeutet habe, kleine Exemplare von *marginatus*, und grössere von *laevigatus* vor Augen gehabt haben). — D. an lehmigen Uferstellen selten. — Bei *Hoplia minuta* p. 84 und 85 ist der Autornamen Panzer beidemal zu verwandeln in Illiger. — Die p. 113 unter *Scryptia fuscula* angeführten 3 Citate gehören zu *Dircaea fuscula* Illig., welche p. 112 hinzuzufügen ist. *Scryptia* also bleibt stehen auf v. Dommers Autorität (Preuss. Prov.-Bl. 1850. I. p. 213), wenn nur nicht auch dieser in meinen Fehler verfallen ist. — Bei *Rhinosimus planirostris* Fabr. ist am Ende S. ausgelassen; denn schon v. Siebold erwähnt dieses Thier. — *Bruchus seminarius* L. p. 117 ist zusammenzuziehen mit *granarius* Schh. (nicht L.). Dies ist die von Gyll. Fn. Suec. III. 11 beschriebene Species, welche bei uns in *Vicia sepium* wohnt. — *Phyllobius pallipes* Schh. ist zu streichen: was v. Siebold unter *Phyll. flavicornis* Dej. gemeint hat, weiss ich nicht. — *Pachnophorus tessellatus* Dfz. (Erster Nachtr. p. 7) ist zu streichen, es war *arenarius* Fabr. — *Dyschirius nitidus* Dej. und *inermis* Curt. p. 8 sind zusammenzuziehen. — *Taphria vivalis* Illig. p. 12 muss heissen *ivalis*. — Bei *Melolontha albida* Lap. p. 83 muss als Autornamen Dejean stehen, wie v. Siebold richtig citirt hat. Dies ist aber *albida* Redt. gewesen, und zwar nur eine Varietät von *vulgaris* Fabr. (Kraatz Berl. Ent. Ztschr. 1864 p. 16). — Bei *Donacia hydrocharidis* Fabr. p. 150 ist die Bemerkung Kugelanns wegen der Schenkel des Männchens irrig: wahrscheinlich hat er die *Donacia cincta* Germ. dafür gehalten. — *Apoderus intermedius* Hellw. p. 118 lebt nicht, wie ich behauptet habe, auf *Spiraea ulmaria*, sondern auf *Comarum palustre*. — Pag. 116 ist so zu corrigiren: *Salpingus foveolatus* Ljungh. Lentz, 1 Exemplar unter einem Stein bei Moosbude, unter einer Eiche. (Das Dommersche Citat gehört zu *Rhinosimus aeneus* Oliv., wovon nachher.) — Pag. 130. Der bei Pillau so zahlreiche *Tychius* ist nicht

Schneideri Hbst., sondern *polylineatus* Germ. Eine genaue Vergleichung der Beschreibung bei Schönh. Curc. III p. 403, und ein von Kahr übersandtes Exemplar aus Görz zeigten mir meinen Irrthum. Die Schuppen der südlichen Exemplare sind metallisch (kupfer- oder gold-) glänzend; dies einzige fehlt den nordischen Exemplaren; charakteristisch aber und von allen nebenstehenden unterscheidend, ist: *interstitiis elytrorum alternis niveo-squamosis*. Die Schenkel sind nur sehr undeutlich (obsolete) gezähnt, der Rüssel aber an der Basis dick (*rostro basi crasso, apice acuminato*), während er bei *Schneideri* linear ist. Uebrigens variiren auch bei *polylin.* die Schenkel in der Farbe (röthlich), wie es von Schönh. bei *Schneideri* angemerkt ist. Ob nun der von Zebe als bei Danzig vorkommend angemerkte *Tychius* wirklich *Schneideri* ist, oder ob bei der Determination derselbe Irrthum gewaltet hat, in den ich verfallen bin, weiss ich nicht, fürchte aber, dass es sich so verhalte.

Ich will nun diejenigen Käfer nennen, deren Vorkommen in Preussen constatirt ist, während es bisher bezweifelt wurde. 1. *Pselaphus dresdensis* Hbst. zuerst von Elditt im Moose von Gr. Karschau bei Königsb., dann neuerlich (Juni 1863) von Mühl in Masuren in 3 Exempl. gefunden. — 2. *Hololepta plana* Füssly. Dossow, in der Fritzschenschen Forst, Anfangs Juni, unter Pappelrinde, sehr sparsam. — 3. *Paromalus complanatus* Illig. Mühl, bei Ortelsburg (Puppen), im September 1863 unter Espenrinde, mehrfach. — 4. *Thymalus limbatus* Fabr. Mühl, in Masuren, unter morscher Eichenrinde, Juni 1863, 3 Exempl. — 5. *Dircaea fagi* Lap. et Gory. Mühl, bei Ortelsburg, einige Exempl. 1862. — 6. *Malthodes misellus* Ksw., von mir gefunden, durch den Autor selbst recognoscirt. — 7. *Rhinosimus roboris* Fabr. Kumm, bei Danzig. — 8. *Bruchus loti* Pk. ist von Körnicke bei Waldau auf *Lathyrus pratensis* vielfach gefunden. — 9. *Balaninus cerasorum* Hbst. Lentz, in der Pillauer Plantage, Elditt bei Loppehnen, und überhaupt in den Strandgegenden auf Birken und Erlen nicht selten. — 10. *Notorhina muricata* Dalm. Lentz, 1 Exempl. Juli 1864 in Schwarzort von einer Espe geklopft. — 11. *Haltica eruciae* Fabr. Lentz, Juni 1861 am Trenker Waldhause mehrfach auf *Corylus*, später im Rastenburger Kreise zahlreich. — 12. *Mycetina cruciata* Schall. Mühl, in Masuren, Ende Juli, im Schwamm einer morschen Birke. — 13. *Platysoma lineare* Er. besitzt aus Preussen Dr. Schiefferdecker. — 14. *Pediacus dermestoides* Fabr. ebenso. — 15. *Parnus lutulentus* Er. ebenso. — 16. *Scymnus haemor-*

rhoidalis Hbst. ebenso. — Von diesen 16 Käfern sind demnach in meinem Verzeichnisse die Zeichen des Zweifels, Parenthesen, Sternchen und Fragezeichen zu entfernen.

Es folgen diejenigen Käferspecies, welche seit 1861 zu unserer Fauna hinzugekommen sind:

1. *Dromius nigriventris* Thoms. = *fasciatus* Dej. Lentz, bei Rastenburg unter Weidenrinde, einige Exempl. — 2. *D. obscuroguttatus* Dft. Kramer, bei Gilgenburg, mehrfach. — 3. *Chlaenius spoliatus* Rossi. Derselbe daselbst, 1 Exempl. — 4. *Calathus ochropterus* Dft. Fritzen Pr. Käf. p. 16. — 5. *Pterostichus ovalis* Dft. ibid. p. 21, bei Angerburg. — 6. *Pt. negligens* St. (in meinem ersten Nachtrage als „zu streichen“ bezeichnet) besitzt aus Preussen Dr. Schiefferdecker. — 7. *Amara contrusa* Schlödde. Fritzen l. c. p. 24. — 8. *Harpalus honestus* var. *ignavus* Dft. Czwalina, bei Danzig, mehrfach. — 9. *H. fuliginosus* Dft. Derselbe, in den Dünen bei Glettkau (Zoppot), Juli, 2 Exempl. — 10. *Bembidium gilvipes* St. Derselbe, bei Danzig, mehrfach. — 11. *Helophorus aeneipennis* Thoms. Fritzen l. c. p. 54. — 12. *Hydraena angustata* St. ibid. p. 56. — 13. *H. flavipes* St. ibid. p. 56. — 14. *Hydrous flavipes* Stev. Elditt, mit *caraboides* zusammen am Ostseestrande (Loppehnen) mehrfach, aber auch aus Belschwitz, Juli 1865. — 15. *Colon viennense* Hbst. Mühl, in Masuren, Juli, ein ♂. — 16. *C. serripes* Sahlb., derselbe daselbst, in Mehrzahl. — 17. *C. appendiculatum* Sahlb., derselbe ebenso, ein ♀. — 18. *C. brunneum* Latr. Czwalina, in einem Thal bei Grünhöfchen (Heiligenbeil), August 1864, ein Exempl. — 19. *Amphicyllis globiformis* Sahlb. Kramer, bei Gilgenburg, mehrfach. — 20. *Scydmaenus rutilipennis* Müll. et Kze., derselbe ebenda. — 21. *Batrisus Delaporti* Aub. Mühl, in Masuren, einzeln, unter Rinde morscher Eichen, Kiefern und Birken. — 22. *Euplectus Erichsonii* Aub. Lentz, bei Königsb. unter einem Steine. — 23. *Myrmedonia laticollis* Märk. Elditt, bei Loppehnen, Juli. — 24. *Thiasophila inquilina* Märk., derselbe daselbst, unter Ameisen. — 25. *Leptusa ruficollis* Er. Lentz, einige Exempl. aus Danzig erhalten. — 26. *Phloeopora corticalis* Grav. Derselbe, aus Röhricht, vom Pregeldamm. — 27. *Homalota labilis* Er. ebenso. — 28. *H. luridipennis* Mannh., ebenso. — 29. *H. incana* Er., ebenso. — 30. *H. linearis* Grav. ebenso. — 31. *H. gemina* Er. ebenso. — 32. *H. sublinearis* Kraatz., ebenso. — 33. *H. nigrifula* Grav., ebenso. — 34. *H. divisa* Märk.,

ebenso. — 35. *H. gagatina* Baudi., ebenso. — 36. *H. marcida* Er., ebenso.
 — 37. *H. celata* Er., ebenso. — 38. *H. inquinula* Er. Elditt, aus Moos
 von Zimmerbude. — 39. *H. plana* Gyll. Elditt, bei Loppehnen. — 40. *H.*
immersa Er., derselbe daselbst. — 41. *H. confusa* Märk. ebenso. — 42. *H.*
nigra Kraatz., ebenso. — 43. *H. validicornis* Märk., ebenso. — 44. *Oxy-*
poda ruficornis, und zwar var. *spectabilis* Märk. Kramer, bei Gilgenb.
 — 45. *Ox. umbrata* Gyll., ebenso. — 46. *Ox. funebris* Kraatz., ebenso. —
 47. *Aleochara nigripes* Mill. Lentz, wie Nro. 26. — 48. *Al. rufitarsis*
 Heer., ebenso. — 49. *Al. procera* Er. Elditt, bei Loppehnen. — 50. *Al. bi-*
notata Kraatz., ebenso. — 51. *Al. mycetophaga* Kraatz., ebenso, in einem
 Röhrenpilz. — 52. *Haploglossa rufipennis* Kraatz. Lentz, bei Gr. Blaustein
 (Rastenburg). — 53. *Encephalus complicans* Westw. Czwalina, bei Löwen-
 hagen, auf dem östlichen Abhange des nach Hohenhagen zu liegenden Waldes,
 mehrfach. Der Speciesname ist sehr bezeichnend, das Thierchen kann das Ab-
 domen so bis über den Kopf krümmen, dass es kugelförmig erscheint; von den
 Gyrophaenen durch seine Breite ausgezeichnet. — 54. *Gyrophaena gentilis*
 Er. Elditt, bei Loppehnen. — 55. *G. pulchella* Heer., ebenso. — 56. *G. manca*
 Er., ebenso. — 57. *G. strictula* Er. Lentz, im Schlossgarten zu Friedrich-
 stein; Elditt, bei Loppehnen. — 58. *G. boleti* L., ebenso. — 59. *Tachinus*
humeralis Grav. Elditt, bei Loppehnen. — 60. *T. laticollis* Grav. Czwa-
 lina, aus Moos, bei Königsb. — 61. *Baptolinus alternans* Grav. Elditt,
 bei Loppehnen, und Lentz, bei Schwarzort in einem Pilz an einer Weide, ein
 Exempl. — 62. *Xantholinus distans* Muls. Czwalina, bei Königsberg. —
 62b. *Staphylinus maxillosus* var. *ciliaris* Steph. Lentz, bei Rauschen. —
 63. *Philonthus montivagus* Heer. Derselbe, bei Königsberg (Kapkeim), zwei
 Exempl. — 64. *Ph. scybalarius* Nordm., ebenso. — 65. *Ph. agilis* Grav.
 ebenso, bei Rosenau, 1 Exempl., Juni, unterscheidet sich von *varians* Pk. be-
 sonders durch die nur an der Innenseite gelb gefärbten Vorderhüften. — 66. *Ph.*
fumarius Grav. Lentz, bei Königsb., aus dürrer Laube. — 67. *Ph. tros-*
sulus Nordm. Elditt, bei Loppehnen. — 68. *Heterothops binotatus* Er.
 Lentz, am Samländ. Seestrande, einige Exemplare. — 69. *Euryporus pici-*
pes Pk. Kramer, bei Gilgenb., sehr sparsam. — 70. *Quedius suturalis* Ksw.
 Derselbe daselbst, mehrfach. — 71. *Q. maurorufus* Grav. Elditt, bei Lop-
 pehnen. — 72. *Stenus aemulus* Er. Lentz, 1 Exempl., bei Gr. Blaustein. —
 73. *St. silvester* Er. Czwalina, in der Fritzenschen Forst, einzeln. — 74. *St.*

subimpressus Er. Lentz, ein ♀, wie Nro. 72. — 75. *St. bifoveolatus* Gyll. = *plancus* Er., derselbe, aus Röhricht vom Pregeldamm. — 76. *St. palustris* Er. Czwalina, bei Katznaze in Westpreussen, mehrfach. — 77. *Arpedium luridum* Gyll. Lentz, im Frühjahr unter trocknen Blättern und Röhricht vom Pregeldamm, ziemlich häufig. — 78. *Trogophloeus tenellus* Er. Elditt, bei Loppennen. — 79. *Tr. bilineatus* Steph., derselbe, in einem Garten in Königsb. — 80. *Tr. inquilinus* Er., derselbe, Wilkie. — 81. *Platystethus nitens* Sahlb. Lentz, bei Königsb. — 82. *Aerognathus mandibularis* Gyll. Kramer, bei Gilgenburg, mehrfach. — 83. *Syntomium aeneum* Müll. Dies kleine, durch seine sehr grobe Sculptur ausgezeichnete Thier hat Czwalina bei Katznaze (Marienburg) in einigen Exempl. an einem Grabenrande unter Blättern im Spätherbst gefunden. Im nordöstlichen Deutschland scheint es zu fehlen (Kraatz K. D. II. 891), aber in Schweden ist es vorhanden. — 84. *Homalium* (noch immer schreibt man falsch *Omalium*) *exiguum* Gyll. besitzt aus Preussen Dr. Schiefferdecker. — 84b. *H. florale* Pk. var. *ruficornis* Walzl. (Kraatz Käf. D. II. p. 997) Lentz, bei Königsb., mehrfach in Gärten auf *Spiraea salicifolia*. — 85. *Anthobium luteipenne* Er. Lentz, bei Gr. Blaustein, ein ♀. — 86. *Phloeocharis subtilissima* Mannh. Elditt, aus Moos von Zimmerbude. — 87. *Ptenidium formicetorum* Kraatz., derselbe bei Loppennen unter Ameisen. — 88. *Hetaerius Sartorii* Redt. Kramer, bei Gilgenburg, cf. Berl. Ent. Ztschr. 1863 p. 233. — 89. *Plegaderus dissectus* Er. Lentz, an einer Eiche in Schwarzort, 1 Exempl. — 90. *Ipidia quadrinotata* F. Mühl, in Masuren, unter morseher Birkenrinde, September, ziemlich zahlreich. — 91. *Meligethes pumilus* Er. Czwalina, bei Königsb. — 92. *M. subrugosus* Gyll., derselbe bei Danzig, August 1863, 2 Exempl. — 93. *M. ochropus* Sturm, derselbe bei Danzig und Lentz bei Königsb. auf *Lamium album*, häufig. — 94. *M. difficilis* Heer. Czwalina, bei Danzig. — 95. *M. memnonius* Er., ebenso. — 96. *M. morosus* Er., derselbe, bei Dirschau, vielfach auf *Lamium album*. — 97. *M. viduatus* St., derselbe bei Danzig. — 98. *M. assimilis* St., ebenso, 1 Exempl. — 99. *M. serripes* Gyll., ebenso, mehrfach. — 100. *M. maurus* St., derselbe bei Danzig und Heiligenbeil. — 101. *M. ineanus* St., derselbe bei Königsb. — 102. *M. picipes* St. derselbe bei Danzig. — 103. *M. gagatinus* Er. Lentz, bei Königsberg. — 104. *Cybocephalus exiguus* Sahlb., einem *Agathidium* sehr ähnlich, die Männchen mit breitem gelbem Kopfe; Kramer, bei Gilgenburg, mehrfach. —

105. *Rhizophagus eribratus* Gyll. Lentz, bei Dammhof, unter Tannenrinde, 2 Exempl. — 106. *Cerylon angustatum* Er., derselbe bei Gr. Blaustein, unter Eichenrinde. — 107. *C. impressum* Er. Czwalina, bei Heiligenbeil, unter Rinde von *Pinus silvestris*, Mai 1864, einzeln. — 108. *Laemophloeus ferrugineus* Steph. Lentz, ein Exempl. an Birkenholz in Königsb. — 109. *L. ater* Oliv., und zwar die rothe Var. Mühl, in Masuren am Harzausflusse einer Tanne, 2 Exempl., Juli 1863. — 110. *Silvanus similis* Er. Czwalina, 1 Exempl. in Holstein an der Pregelmündung. — 111. *Cryptophagus setulosus* St. Lentz, bei Königsb., 2 Exempl. — 112. *Cr. Schmidtii* St., ebenso, 1 Exempl. — 113. *Cr. vini* Pz., ebenso, von einer Tanne geklopft. — 114. *Atomaria linearis* Steph. Lentz, bei Königsb. — 115. *Attagenus pantherinus* Ahr. Kramer, am Gutshause von Ludwigsdorf bei Gilgenburg, an den Käsekasten mehrfach. — 116. *Limnichus sericens* Dft. Lentz, am Seeufer bei Tenkitten, 1 Exempl. — 117. *Heterocerus marginatus* F., wovon schon gesprochen ist. — 118. *Elmis Mülleri* Er. Sauter, bei Pohibels. — 119. *Limnius tuberculatus* Müll. Mühl, in Masuren, einige Exempl. — 120. *Lampra decipiens* Mannh. Es ist wohl nicht zweifelhaft, dass dieser so seltene Käfer auch unserer Provinz angehört, aber bis jetzt mit der sehr ähnlichen *rutilans* vermenget ist. Ich besitze ein männliches, von etwa 5 Lin., also kleines Exempl., welches ich vor längerer Zeit von einem meiner Schüler eintauschte, weil mir die grosse Menge dunkler glatter Flächen auf den Flügeldecken auffiel. Er gab an, das Exemplar am Landgraben gefunden zu haben. Die Unterschiede von *rutilans* sind folgende: *decipiens* ist namentlich auf der Unterseite flacher gebaut; die Spitze der Flügeldecken ist abgestutzt (*elytris apice subtruncatis* sagt v. Kiesenw. K. D. IV. p. 46); die Zähne daselbst sind viel stärker und schärfer, ebenso sind die Eckzähne des letzten Abdominal-segments bei weiterer Ausrandung desselben stärker; die Zahl der glatten, schwarzen Stellen auf den Flügeldecken ist bedeutend grösser, bei meinem Exemplar etwa 50 (freilich sagt Ksw. l. e. auch bei der var. a. von *rutilans*: *maculis nigris crebrioribus*), auch ihre Fläche bedeutender; die glatte, schwarze Linie auf der Mitte des Halsschildes ist breiter und hervortretender, bei *rutilans* bisweilen kaum sichtbar; Halsschild und Flügeldecken sind namentlich an den Seiten lange nicht so grob gerunzelt, als bei *rutilans*. Auch Mühl hat in Masuren ein ganz ähnliches Exemplar gefunden. — 121. *Chrysobothris Solieri* Lap. Mühl, in Masuren, auf Kiefernholz, 1 Exempl. — 122. *Agrilus olivicolor* Ksw., derselbe, bei Braunsberg und im Samlande; auch Strübing,

in Westpreussen zahlreich auf Rüstern (Berl. Ent. Ztschr. 1860 p. 322). — 122b. *A. viridis* var. Aubei Lap. besitzt Dossow aus einer Ostpreussischen Forst. — 123. *A. mendax* Mannh. tritt für den im ersten Nachtrage angegebenen *sinuatus* ein. — 124. *Corymbites quercus* Gyll. und zwar die Var. mit braungelben Flügeldecken, Lentz, bei Gr. Blaustein, 1 Exempl. von einer Eiche geklopft. — 125. *Adrastus pusillus* F. Kramer, bei Gilgenburg, mehrfach. — 126. *Malthodes mysticus* Ksw. Lentz, bei Königsb. auf Farnkräutern und *Vaccinium*, worauf man überhaupt die Species von *Malthinus* und *Malthodes* bei uns findet. — 127. *Ebaeus appendiculatus* Er. in Westpreussen von Strübing gefunden, ein ♂, Berl. Ent. Ztschr. 1860 p. 322. — 128. *Julistus memnonius* Ksw. Lentz, bei Schwarzort ziemlich zahlreich, namentlich auf der einzeln am Haffufer stehenden Linde an der Grikinnwiese zur Blüthezeit, aber auch auf Eichen und Espen der Umgegend, Juli. — 129. *Opilus domesticus* Sturm. hatte ich in meinem Verzeichniss übergangen, weil ich ihn für synonym mit *mollis* L. hielt, nach Redtenb. Fn Austr. II. p. 550. Ich besitze 2 in Landhäusern gefundene Exempl. Die Beschreibung bei Mulsant und Rey in den *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, Paris 1863 p. 305 und 310 hat mich eines bessern belehrt. Bei *domesticus* ist das Halsschild kürzer, die Ränder der Flügeldecken sind fast parallel, und die Punktreihen derselben verlaufen in gleicher Stärke regelmässig bis zu dem blassen Spitzenfleck, während sie bei *mollis* viel früher aufhören und der hintere Theil der Flügeldecken nur sehr seichte unregelmässig gestellte Punkte zeigt; vgl. die schöne Abbildung des *mollis* l. c. zu p. 380 fig. 6. — 130. *Dorcatoma affinis* St. Mühl, bei Wehlau ein Exempl. von einer Eiche geklopft, Juli 1864. — 131. *Ptinus pusillus* St. Lentz, an einer Eiche bei Königsb. unter der Rinde, im Frühjahr. — 132. *Oligomerus brunneus* Oliv. Lentz, an den alten Eichen bei Moosbude, mehrfach. — 133. *Hypophloeus suturalis* Pk. hat einer meiner Schüler (Heubach) in Tannenstubben bei Kapkeim, und Mühl in Masuren mehrfach gefunden. — 134. *Tenebrio obscurus* F. Mühl, in Masuren, Mai 1863. — 135. *T. transversalis* Dft., ebenso, unter morscher Eichenrinde, 4 Exempl., Ende Juni. — 136. *Hymenorus Doublieri* Muls. Mühl, ein Exemplar in Masuren in einer morschen Eiche, Juni 1862, höchst überraschend, da als Vaterland Süd-Frankreich angegeben wird und da er in Deutschland, wie es scheint, noch nicht gefunden ist. — 137. *Orchesia sepicola* Rosenh. Kramer, bei Gilgenburg, aus dürrem Laube gesiebt, einige Exempl. Mai 1864. — 138. *Dircaea fuscula* Illig. Lentz, bei Gr. Blaustein,

in einem Pilz, Juli 1864. — 139. *Xylophilus amabilis* Sahlb. Mühl. cf. Berl. Ent. Ztschr. 1863 p. 233. — 140. *Ditylus laevis* F. Dossow, zuerst Juni 1862, dann öfter in der Greibener Forst bei Postnicken an Erlenstubben: ebenso nach einer brieflichen Mittheilung Max Wahnschaffe bei Kupstinen, gleichfalls im Labiauer Kreise. — 141. *Rhinosimus acneus* Oliv. mit dem unter *Salpingus foveolatus* Ljungh. angegebenen Dommerschen Citat. cf. Schaum Berl. Ent. Ztschr. 1859 p. XXX. — 142. *Bruchus rufimanus* Schh. nach Gerstäckers und Schaums Bestimmung die grössere in *Vicia faba* vorkommende Art, bei der ausser der constanten bedeutenderen Grösse die Mittelschienen gewundener sind als bei *seminarius* L., namentlich beim ♂. Bis vor etwa 4 Jahren bei uns ziemlich zahlreich, seitdem aber, wie es scheint, in Folge eines harten Winters zur grossen Freude der Oeconomen spurlos verschwunden. — 143. *Bruchus orobi* Schmidt in lit. hat Körnicke aus den Samen von *Orobis vernus* zahlreich gezogen, bei Königsberg. Er ist kleiner als *seminarius* L., viel weniger gefleckt und glänzender, und die Seiten der Flügeldecken sind ziemlich parallel, so dass die Erweiterung in der Mitte und nach hinten sehr gering ist. — 144. *Spermophagus cardui* Schh. Kramer, bei Gilgenburg, mehrfach. — 145. *Choragus Sheppardi* Krb. Lentz, 1 Exemplar bei Gr. Blaustein von *Crataegus* herabgeklopft. Wahrscheinlich habe ich mehrere Exemplare übersehen, da das Verhalten des Thieres dem eines *Orchestes* täuschend ähnlich ist. Es springt genau ebenso, und ist an Farbe und Grösse einem kleinen schwarzen *Orchestes* nicht unähnlich; doch die gestreckten zierlichen Fühler unterscheiden es bei näherer Ansicht sofort. — 146. *Auletes basilaris* Schh. hat Strübing in 2 Exempl. in Westpreussen gefunden. (Berl. Ent. Ztschr. 1860 p. 323). — 147. *Diodyrhynchus austriacus* Schh. Lentz, 2 Exemplare bei Metgethen von einer Tanne geklopft, Juli 1864; dem *Rhinomacer attelaboides* Fabr. sehr ähnlich, aber die Fühler sind noch vor der Mitte des viel längeren und dünneren Rüssels eingefügt. — 148. *Apion confluens* Krb. Strübing, in Westpreussen (Berl. Ent. Ztschr. 1860 p. 322). — 149. *A. penetrans* Germ., ebenso. — 150. *A. simum* Germ. Lentz, bei Königsberg, 2 Exempl. — 151. *A. sanguineum* Deg., derselbe, bei Löwenhagen, 1 Exemplar. — 152. *A. cruentatum* Walton., derselbe daselbst, zwei Exempl. — 153. *Sitones regensteiniensis* Hbst. Lentz, bei Königsberg, 2 Exempl. — 154. *Polydrosus confluens* Steph. Kramer, bei Gilgenburg mehrfach. — 155. *Cleonus alternans* Oliv. Dossow, aus einer Ostpreuss. Forst. — 156. *Cl. varius* Hbst., ebenso. — 157. *Otiorhynchus irritans*

Hbst. Strübing, am Weichselufer in Westpreussen auf *Corylus* sehr zahlreich, cf. Berl. Ent. Zeitschr. 1860 p. 322. — 158. *Eriirhinus Steveni* Schh., ein Exempl. von Dossow gefunden; bis jctzt in Deutschland noch nicht bemerkt, aber aus Russland angeführt, Schönh. Curcul. III. p. 287. Er steht dem *aethiops* nahe, doch ist der Rüssel kürzer und dicker und das Halsschild ist dicht und fein punktirt; leider ist das mir vorliegende Exempl. ganz abgerieben. — 159. *Eraghnathus* Schh. Kramer, bei Gilgenburg, mehrfach. — 160. *Coryssomerus capucinus* Beck. Czwalina, ein Exempl. an der Sternwarte bei Königsberg. — 161. *Sibynes sodalis* Germ. Kramer, bei Gilgenburg, einzeln. — 162. *Baridius abrotani* Germ. Lentz, bei Königsb., 2 Exempl. — 163. *Acalles lemur* Germ. Kramer, bei Gilgenburg, mehrfach. — 164. *A. parvulus* Schh. ebenso, beide aus trockenem Laube gesiebt. — 165. *Ceuthorhynchus arator* Schh., ebenso. — 166. *Tychius polylineatus* Germ. Lentz, Pillau, wovon schon gesprochen ist. — 167. *Gymnetron rostellum* Hbst. Lentz, bei Palmburg, Kramer, bei Gilgenburg. — 168. *G. longirostris* Schh. Lentz, ein Exempl. am Samländ. Seestrände. — 169. *Rhyncolus porcatus* Germ. Schindowsky, bei Pröbbernau (frische Nehrung). — 170. *Cryphalus binodulus* Ratz. Dossow, im Greibenschen Forstrevier in Espenrinde. April 1863, mehrfach. — 171. *Eccoptogaster rugulosus* Ratz., derselbe, bei Braunsberg in der Rinde von Pflaumenbäumen. — 172. *Molorchus salicis* Muls. ist mit *major* L. bis jetzt vermenget; meine beiden Exempl., ♂ und ♀, die an den alten Weiden bei Patersort (bei Ludwigsort) gesammelt sind, gehören entschieden hieher, cf. v. Heyden in Berl. Ent. Ztschr. 1864 p. 331. — 173. *Phytoecia punctum* Muls. Lentz. Von 3 bei Heilsberg gesammelten Exempl. haben sich 2 als *punctum*, eines als *lineola* F. herausgestellt. — 174. *Pachyta sexmaculata* L. Mühl, in Masuren, ein Exemplar auf einer Umbellate. Dass dieser Käfer mit der schon im Verzeichnisse erwähnten *septemsignata* Küst. wahrscheinlich identisch ist, s. Berl. Ent. Ztschr. 1864 p. 142. — 175. *Grammoptera analis* Pz. Dossow, in einer Ostpreuss. Forst. — 176. *Haemonia equiseti* F. Lentz und Elditt, im Rauschener Teiche an den Wurzeln von *Myriophyllum verticillatum* und *Potamogeton perfoliatus* in allen Entwicklungszuständen. Juli 1863. Es ist demnach wahrscheinlich, dass auch *Kugelann* nicht *zosteræ* F., sondern *equiseti* vor Augen gehabt hat. — 177. *Cryptocephalus hypochoeridis* L. Lentz, bei Warnicken. — 178. *Cr. janthinus* Germ. Mühl, in Masuren, mehrfach von Weiden geklopft, Juni und Juli 1863. — 179. *Chrysomela menthastri* Suffr. ist von Strübing in Westpreussen

(Juli) zahlreich auf *Mentha silvestris* gefunden. — 180. *Galeruca crataegi* Forst. Dossow, in einer Ostpreussische Forst. — 181. *Calomicrus pini-cola* Dft., hat einer meiner Schüler (Patzke) im Frischingwalde (Tapiau) auf *Pinus silvestris* vielfach gefunden. — 182. *Haltica impressa* F. bis jetzt mit *ferruginea* Schrank. vermengt, aber bei Königsberg gar nicht selten. — 183. *H. undulata* Kutsch. Lentz, bei Königsb., häufig — 184. *H. cyanella* Redt. Kramer, bei Gilgenburg, mehrfach. — 185. *H. cyparissiae* Ent. Hft. Lentz, bei Königsberg, ein zwar kleines aber unzweifelhaft hierher gehöriges Exempl. — 186. *H. violacea* Ent. Hft. Lentz, ein Exempl. bei Gr. Blau-stein. — 186b. *Psylliodes dulcamarae* var. *chalconera* Illig. (cf. Redt. Fn. Austr. II p. 944 Anm.) Lentz, ein Exempl. bei Königsb. — 187. *Sphaeroderma cardui* Gyll. Elditt, bei Loppehnen auf *Carduus* in grosser Menge, Juli 1864. — 188. *Halyzia 10-guttata* L. Mühl, in Masuren 1863, dann Kramer, bei Gilgenburg. — 189. *Exochomus auritus* Scrib. Czwalina, bei Oliva auf *Erica vulgaris* mehrfach; offenbar war dieser Aufenthalt zufällig, da *Exochomus* auf Nadelhölzern lebt. — 190. *Lathridius angulatus* Mannh. Mühl, in Masuren mehrfach, 1863. — 191. *L. alternans* Mannh. Elditt, bei Loppehnen. — 192. *L. collaris* Mannh., ebenso. — 193. *L. assimilis* Mannh., ebenso. — 194. *Corticaria piligera* Mannh. Lentz, bei Königsb., einige Exempl. — 195. *Monotoma spinicollis* Aubé. Lentz, an Scheunenwänden in Liep bei Königsberg, Mai 1864. — 196. *M. brevipennis* Kunze. Elditt, bei Loppehnen.

Da nunmehr nach obigem Nachweise von den im Verzeichniss und im ersten Nachtrage angegebenen 2725 Species 12 zu streichen sind, entweder als Synonyme anderer oder wegen falscher Bestimmung, neu aber 196 hinzukommen, und da ausserdem von den daselbst angegebenen 106 zweifelhaften Arten 16 als preussisch constatirt sind, so haben wir in unserer Provinz 2909 Coleopteren-species, wovon noch 90 der Bestätigung bedürfen.

Nicht ohne Interesse dürfte es für unsere Sammler sein, wenn ich für seltene Käfer Fundorte angebe, die in neuerer Zeit entdeckt sind. *Hapalochrus femoralis* Er. (noch immer wird falsch *Apalochrus* geschrieben, das griech. Wort heisst *ἀπαλόχρους* und bedeutet: von zarter Haut, mit feinem Teint) habe ich von Schwarzort angegeben: im Juli 1865 habe ich ihn mehrfach auch bei Cranz gefunden auf Gräsern am nordwestlichen Rande der Plantage. — *Scleropterus serratus* Germ. ist merkwürdigerweise im Mai 1865 am Süd- und

Westrande der Fritzenschen Forst an sumpfigen Stellen (*Caltha*, *Geum rivale*, *Spiraea ulmaria*) von Czwalina und mir ziemlich zahlreich gefangen worden. — *Dorcatoma dresdensis* Hbst. habe ich in 8 Exempl. in einem auf *Carpinus* gewachsenen Pilz bei Gr. Blaustein gefunden, Juli 1865. — Von *Hypophloeus linearis* F. hat Kramer bei Gilgenburg am 17. Mai 1863 unter Fichtennadeln einige Exempl. gefunden. — *Melandrya canaliculata* F. hat Mühl in Masuren (Ortelsburg) in 3 Exemplaren unter morscher Pappel- und Birkenrinde gefunden. — *Larinus planus* F. ist auch von Kramer bei Gilgenburg gefangen. — Von *Tapinotus sellatus* F. habe ich einige Exemplare auf der Moorwiese am Teiche von Damnhof erbeutet. — *Cryptargus pityographus* Ratz. hat Mühl in Masuren und Dossow im Revier Gauleiden in absterbenden Tannenästen gefunden. — *Astynomus griseus* F. wurde im Sommer 1863 in ziemlicher Anzahl auf den hiesigen Holzwiesen gefangen, hat aber seitdem sehr abgenommen. — Von *Triplax rufipes* Pz. habe ich Anfangs Juni 1862 an einem mit Pilzen besetzten Stamme von *Sorbus aucuparia* bei Friedrichstein etwa ein Dutzend Exemplare gefangen, in Gesellschaft von einer Unzahl *Tr. aenea* Pk. — Dagegen scheint *Aphodius bipunctatus* F. aus der Braunsberger Gegend verschwunden zu sein; die eifrigsten Bemühungen des Herrn Inspector Seydler sind bisher ohne Erfolg geblieben.

Ich erlaube mir schliesslich noch eine Bemerkung über *Clerus rufipes* Brahm. Von *Clerus* (*Thanasimus*) *formicarius* L. und seinen früheren Zuständen, und von dem ihm nahestehenden *rufipes* Brahm. haben wir in neuerer Zeit sehr ausführliche Beschreibungen erhalten von Mulsant und Rey in den vorhin schon genannten *Annales* p. 296 und 301: nur findet sich in der Diagnose des *rufipes* ein arger Fehler in den Worten *poitrine d'un rouge pâle: ventre noir*, wofür es heissen muss: *ventre d'un rouge pâle: poitrine noire*. Viel kürzer ist die Beschreibung bei Kiesenw. Käf. Dtschl. IV p. 685. Dass aber diesen Entomologen nur südliche Stücke des *rufipes* vorgelegen und dass sie unsere nordische Form nicht gekannt haben, geht aus den Worten hervor bei Mulsant p. 302: „la première bande sur la partie rouge et non bordée de noir en devant, grêle, servant de bordure à la partie rouge“, und bei Kiesenw.: „die eine Binde vor der Mitte der Flügeldecken auf rothem Grunde“. Unter unsern Exemplaren, die namentlich in Masuren gar nicht selten an Tannentstubben und Kletterholz sich finden, giebt es nicht wenige, die vor der vorderen weissen Binde in ziemlicher Ausdehnung noch die schwarze Farbe zeigen, wie

es bei *formicarius* stets der Fall ist. Auch sind mitunter die Fühler, Taster und Beine des *rufipes* nur etwas weniger dunkel, als bei *formicarius*. Es giebt sogar Stücke des *rufipes*, die ganz dunkle Beine haben (hierher gehört Gyllenhal *Ins. Suec.* IV p. 334 var. c., *pectore pedibusque nigris, simillimus formicario, modo pectus nigrum*). Die Uebergänge finden sich nun so, dass die Spitze der Schienen, die Wurzel der Schenkel und die Füße roth werden, bis endlich bei den hellsten Exemplaren die Beine ganz roth erscheinen. Gleichzeitig mit dem Verschwinden der dunkeln Farbe bei den Beinen verschwindet auch die dunkle Stelle vor der ersten weissen Binde, indem sie zuerst nur noch gegen das Weisse hin schärfer absticht, später noch als etwas dunkler Fleck gegen den Aussenrand der Flügeldecken hin markirt bleibt, endlich ganz schwindet. Aber constant bleibt ein Merkmal: die Schwärze der Hinterbrust. Es ist nämlich ungenau, wenn man sagt, die Brust sei schwarz, bei unsern Exemplaren wenigstens ist das *prosternum* roth, sogar an der Stelle, welche mit dem schwarzen Vorderrande des Halsschildes *correspondirt*, das *mesosternum* entweder ganz schwarz, oder an den Seiten roth, und nur das *metasternum* constant ganz schwarz, auch bei den hellsten Stücken. Dies ist, was die Farbe betrifft, das einzige specifische, leicht in die Augen fallende Merkmal. Denn es widerspricht den Gesetzen der Veränderung einer Species, dass, wenn 2 Körpertheile eine hellere Farbe annehmen, ein dritter ohne Uebergang tief dunkel bleibt; und wenn Gyllenhal *Fn. Suec.* IV p. 334 von einer Varietät des *formicarius* spricht: „var. d. *pectore nigricante, tibiis tarsisque rufescentibus, differt tantum pectore nigro aut piceo et pedibus maxima parte rubris, femoribus tamen saltem versus apicem nigris*“, so hat er ohne Zweifel mehr und weniger ausgefärbte Stücke des *rufipes* vor Augen gehabt. Diese Varietät ist offenbar auf *rufipes* zu beziehen, ebenso die vorhin angeführte var. c., dass aber Mulsant l. c. p. 301 auch die im ersten Bande Gyll. p. 311 angeführte var. b. „*minor, pedibus rufescentibus, differt tantum pedibus rubris aut totis aut genibus nigris, et quod duplo minor*“, will mir nicht richtig erscheinen, da eben das specifische Merkmal der schwarzen Hinterbrust nicht angegeben ist.

Ein gutes Merkzeichen giebt noch Thomson an (*Schwed. Coleopt.* VI. 224. 2): *capite prothoraceque subnitidis, minus fortiter et crebre punctatis*; die Angabe Kiesw. bei *Clerus formicarius* (*Käf. Deutschl.* IV. 685. 2) „Kopf und Halsschild fein und mässig dicht punctirt“ scheint mir verfehlt: die Punkte sind recht grob und so dicht, dass sie an manchen Stellen zu Queerrunzeln zusammenfliessen.

QL
591
G4
L57
Suppl. 3

Dritter Nachtrag zum neuen Verzeichniss der Preussischen Käfer, Königsberg 1857.

Von Dr. Lentz.

Nachdem der erste Nachtrag in diesen Schriften I. pag. 139, der zweite VII. pag. 85 erschienen, ist bis zum Jahre 1871 unsere Kenntniss so bedeutend erweitert worden, dass die Ausarbeitung eines dritten Berichtes nothwendig erscheint: es ist dadurch der Beweis geliefert worden, dass unsere Provinz sehr reich an Käferspecies ist, und dass sie in dieser Beziehung die Schwedische Fauna, soweit sie durch Gyllenhal und Thomson bekannt geworden, weit übertrifft. Leider haben wir durch den Heimgang des Oberlehrer Elditt einen der eifrigsten und fähigsten Mitarbeiter verloren: der wahrhaft erstaunliche Fleiss dieses Mannes, seine technische Fertigkeit, dabei sein anspruchsloses Wesen haben ihm die allgemeine Liebe seiner Genossen erworben, und sein Name wird in den Annalen der gelehrten Gesellschaften, deren Mitglied er war, stets mit hoher Achtung genannt werden. Desto rüstiger hat, was ich mit Freuden anerkenne, mein College Czwalina sich der Sache angenommen, und seinem Eifer, der ihn einmal sogar in den Verdacht einer hochverrätherischen Spionage brachte — bei uns hat der gemeine Mann noch keinen Begriff davon, was man beim Sammeln von Insekten bezweckt — und seiner glücklichen Hand verdanken wir eine ganze Reihe schöner Entdeckungen. Meinen herzlichen Dank muss ich noch den Herren Forstmeister Dossow hier, Kramer in Ludwigsdorf bei Gilgenburg, Dr. Sanio in Lyck und Apotheker Helm, in Danzig aussprechen, die mich durch Entdeckungen und Sendungen unterstützt haben: endlich fühle ich mich noch Herrn Fuss in Cleve verpflichtet, der sich durch die Bestimmung einer bedeutenden Menge kleiner Staphylinen ein grosses Verdienst um meine Arbeit erworben hat.

Zuerst nun will ich einige Irrthümer berichtigen, die sich in meine vorigen Nachträge eingeschlichen haben. Aus dem ersten Nachtrage pag. 144 ist *Ceuthorhynchus Andreae* zu streichen, es war *litura*. Im zweiten pag. 88. 5. ist das hässliche Versehen *Dircaca* zu verbessern in *Dicerca*. Falsche Bestimmungen waren ferner Nr. 176 *Hacmonia equiseti* F.: es war die bisher schon bekannte *Curtisii*. Ganze Reihen von Stücken, die von Helm in einem salzhaltigen Teiche an der Danziger Küste auf *Potamogeton marinus* (die Pflanze wird bei Redt. Fn. Austr. Nr. 1020 irrthümlich *Equisetum marinum* genannt) in allen Stadien der Entwicklung gefunden worden, haben mich belehrt, dass die Grösse bedeutend variabler ist, als von Lacord. Monogr. des Phytophages I. pag. 214 angegeben wird ($2\frac{3}{4}$ — 3'''), nemlich $1\frac{1}{2}$ — 3'''. L. hat, wie er selbst sagt, sehr wenige Stücke vor Augen gehabt. Durch die Vergleichung der *Hacmonia equiseti* im Berl. Museum bin ich von meinem Irrthum vollends überzeugt worden. — Sodann Nr. 66 *Philonthus*

fumarius war nigrita Grav. — Zu streichen ist auch Nr. 164 *Acalles parvulus*, dafür aber *ptinoides* Marsh. einzusetzen, der bisher aus Preussen ebenfalls nicht bekannt war. Dabei ist zu erwähnen, dass die Beschreibung von *Acalles camelus* F. in den gebräuchtesten Handbüchern (entnommen aus der ebenso falschen bei Schönh. Cureul. IV. 347. 22.) so schlecht ist, dass ich, nachdem ich den Käfer mehrfach von Kramer zugeschiedt erhalten hatte, so lange im Zweifel war, bis ich durch Nachfragen bei entomologischen Autoritäten davon überzeugt wurde, dass nur die falsche Beschreibung mich irre geführt hatte. Der Käfer gehört gerade im Gegensatz zu der gewöhnlichen Annahme (Redt. Fn. Austr. Nr. 915) zu derjenigen Abtheilung von *Acalles*, die einen überall mit Borsten besetzten Körper zeigt, und deren Schienen, namentlich die vorderen, an der Spitze gekrümmt sind (Suffr. Stett. Ent. Zeit. 1856, p. 251). Dass *A. quercus* Bohem., von dem es Schönh. Cure. VIII, pag. 420 heisst: *tibiis anterioribus inflexis a congeneribus facile distinctus*, nur eine Varietät von *camelus* ist, steht fest. Sehr charakteristisch ist bei *camelus* (bei reinen Stücken), dass der erste und dritte Zwischenraum der Flügeldecken in der vorderen Hälfte mit einem Kamm von dichtstehenden schwarzen Borsten besetzt sind, deren Reihe hinten durch ein kleines Bündel weisslicher Borsten geschlossen ist. Auch die übrigen Zwischenräume sind nach hinten zu spärlich mit schwarzen Borsten besetzt: alle Zwischenräume sind erhaben und stumpf gehöckert, aber vorn mehr, als hinten, und die äusseren weniger, als die inneren. — Zu streichen ist sodann Nr. 25. *Leptusa ruficollis*, endlich *Clythra taxicornis* (Verz. p. 151), welche nur von Dommer als preussisch angegeben ist. Czwalina hat Gelegenheit gehabt, die Dommer'sche Sammlung in Danzig zu sehen und mir berichtet, dass von den 3 darin befindlichen Stücken 2 richtig als Südeuropäer bezeichnet sind, das angeblich preuss. Expl. aber nur *tridentata* L. ist.

Nachdem ich durch diese Beichte mein Gewissen erleichtert habe, gehe ich zu Bemerkungen über einzelne Käfer über, die als selten oder zweifelhaft erscheinen. Die Angabe Zebes, dass *Tychius Schneideri* Hbst. bei Danzig vorkomme (Verz. p. 130), ist gerechtfertigt, ich selbst habe ein Stück dort gefunden: meinen Irrthum wegen *Tych. polylineatus* habe ich im zweiten Nachtrage berichtigt. *T. Schneideri* ist kleiner, breiter und kürzer, und nur die Naht ist kreideweiss beschuppt, während bei *polylineatus* alle abwechselnde Zwischenräume diese Beschuppung zeigen. — Jedoch über *Clerus* (*Thanasimus*) *substriatus* Gebler und *rufipes* Brahm (II. Nachtr., p. 97) sind die Akten noch nicht geschlossen. Wenn die Unterscheidung beider (v. Heyden in der Berl. Ent. Ztschr. 1864, p. 322) richtig ist, woran ich mit Mühl zweifle (ibid. 1866, p. 292), so gehören unsere preuss. Stücke zu *substriatus*, und *rufipes* ist bei uns noch nicht gefunden. Auch Thomson würde aus Skandinavien dann nur den *substriatus* kennen, den er freilich unter dem Namen *rufipes* beschreibt (Skand. Col. VI. 224. 2.). Ein mir übersandtes Stück von *rufipes* aus Letzlingen zeigt mir ausser der bedeutenden Kleinheit keinen bemerkenswerthen Unterschied von *substriatus*. — An der Richtigkeit der Bestimmung von *Saprinus antiquulus* Illig. (Verz. p. 64) zweifle ich, doch ist sein Vorkommen bei uns nicht unmöglich, obwohl er nur aus Ungarn und Süd-Deutschland angeführt wird (Kraatz, Berl. Ent. Ztschr. 1868, p. 336). — Das bezweifelte Vorkommen von *Amara Quenselii* Seh. kann ich als gegründet constatiren, da ich selbst ein bei Danzig gefangenes Stück besitze: die Angabe von Siebold ist also richtig. Unrichtig dagegen ist die Angabe des *Colymbetes dolabratus* Payk. (Verz. p. 26). Was zuerst die Autorität Kugelanns betrifft, so bezeichnet sein Citat Payk. I. 204. 13 allerdings den richtigen *dolabratus*, aber die Beschreibung, die ich l. c. habe abdrucken lassen, zeigt deutlich, dass er den *dolabratus* nicht gekannt, sondern

das ♀ des *striatus* L. damit verwechselt hat. Denn weder hat *dolabratus* die Grösse (er ist bedeutend kleiner) und Gestalt (er ist schmaler und mehr gleich breit) des *striatus*, noch sind die Querstreifen auf den Flügeldecken viel gröber. Auch Siebold, der nach Gyllenhal meistens bestimmt hat, und Elditt im 7. Berichte des Fannavereins, p. 357 sind durch diese Verwechslung irre geleitet worden. Der Grund dieses Irrthums ist sehr wahrscheinlich der gewesen, dass Siebold den *Dytiscus striatus* bei Gyll. I. 476. 10 für den *striatus* Linn. gehalten hat, was allerdings bei den Citaten Gyllenhal's verzeihlich ist. Es ist aber, wie Thomson Skand. Col. II. 45. 4 richtig angiebt, damit *Colymbetes Paykulli* Er. gemeint, und nicht *striatus* Linn., vielmehr findet sich dieser bei Gyll. III. 687. 10—11 als *Dytiscus Bogemanni* beschrieben. Nun steht bei Gyll. I. 479 in der Beschreibung des *dolabratus*: *elytra strigis profundioribus quam in praecedentibus*, d. h. tiefer als bei *fuscus* Linn. und bei dem oben erwähnten *striatus*. Bezog man nun diesen *striatus* auf *striatus* Linn., so musste man eben auf den Gedanken kommen, dass die Streifen bei *dolabratus* tiefer seien: sie sind auch wirklich tiefer als bei *fuscus* Linn. und bei Paykulli Er., aber durchaus nicht tiefer als bei *striatus* Linn. Es sind aber bei *striatus* Linn. ♀ die Streifen sichtbar tiefer, als beim Männchen, also hielt man die Weibchen dieses Käfers für den *dolabratus*. Dies wichtige, weil leicht sichtbare Merkmal der sexuellen Verschiedenheit ist leider auch von Kiesenwetter Käf. Dtschl. I. 2. 83 nicht angegeben worden, während Gyll. III. 688. bei seinem Dyt. *Bogemanni*, d. h. *striatus* Linn. ganz richtig sagt: *strigis in mare tenuibus, in femina multo profundioribus*. Die Stücke von *dolabratus*, welche ich gesehen habe, stimmen genau mit den Beschreibungen von Gyll. und Thomson: mit Recht hat also weder v. Kiesenwetter noch Kraatz im Katalog der deutschen Käfer den *dolabratus* als deutschen Käfer genannt: er ist hoch nordisch (Schiödte in der Berl. entom. Ztschr. 1859, pag. 139). — Bedenklich sind auch die Angaben über *Anoplus*. Die Unterscheidung von *A. plantaris* Naezen und *A. roboris* Suffr. will mir nicht recht einleuchten: ich glaubte bei uns beide Species gefunden zu haben, konnte aber nur einen Unterschied in der Grösse entdecken. Ich meine, Thomson hat recht daran gethan, in seinen Skand. Col. VII. 319. 1 nur den *plantaris* anzuführen, dem er *interstitia setulis brevibus albidis erectis seriatis* beilegt: dies ist aber ein spezifisches Kennzeichen des Suffrianschen *roboris*. Dieser sagt nämlich: jeder Zwischenraum ist mit einer ziemlich regelmässigen Reihe feiner Punkte besetzt, deren jeder eine kurze, weisse, hinterwärts gerichtete, aber nicht angedrückte (angedrückte, aber nicht gereihte Härchen bemerkt er bei *plantaris*) Borste trägt. Ich habe nicht Material genug, um die Sache endgültig zu entscheiden, doch zweifle ich an der Haltbarkeit der Suffrianschen Species. Die Härchen und Borsten der Flügeldecken werden leicht abgerieben, und sind nur bei guten und reinen Stücken deutlich zu sehen. Auch der vortreffliche Gyllenhal III. 252. 152 *Rhynehaenus plantaris* hat seine Beschreibung nach abgeriebenen Exemplaren gemacht: er sagt *elytra pilis similibus, uti thorax, (nämlich minutissimus, depressis) parce adpersus*, ohne die Reihen weisser Börstchen zu erwähnen. Was aber Kirsch mit seinem *Anoplus setulosus* sagen will (Berl. Ent. Ztschr. XIV. p. 217), der von jenen beiden bekannten Species durch die weissen, steifaufrechten Börstchen, die auf den Zwischenräumen der Flügeldecken je eine Reihe bilden, auf den ersten Blick zu unterscheiden sein soll, ist mir unbegreiflich. Es dürfte als Resultat feststehen, dass nur *Anoplus plantaris* Naezen die allein gültige Species ist, mit der oben erwähnten Beschreibung Thomsons. — *Phaedon betulae* L. ist von Redt. Fn. Austr. p. 922 unter dem Namen *cochleariae* Fabr. beschrieben worden. Es ist aber *cochleariae* F. = *Chrysomela*

egena bei Gyll. IV. 649. 25 — 26 (siehe die Cataloge von Stein und Kraatz), wo beispielsweise angegeben wird: *ano concolore*, dann: *callus humeralis perparum elevatus, nec foveola intra illum perspicua*. Hiedurch charakterisirt sich *cochleariae* F. hinlänglich. *Phaedon betulae* L. ist aber = *Chrysomela cochleariae* Gyll. III. 479. 25: *ano testaceo, in medio baseos elytrorum 'ovea impressa et extra illam callus humeralis elevatus*. Beide Käfer sind auch in Preussen gefunden, namentlich von Sanio bei Lyck.

Von seltenen und nur einzeln gefundenen Käfern, so wie von Varietäten kann ich Folgendes anführen: *Parnus luteiventris* Er. Czwalina bei Neuebleiche (Königsberg) vielfach. — *Parnus prolifericornis* var. *bicolor* Curt. mit braunen Flügeldecken Kramer bei Gilgenburg. — *Dermestes lanarius* Illig. Von diesem freilich nicht seltenen Käfer hat Helm bei Danzig mehrere Stücke von eigenthümlicher Kleinheit, $2\frac{1}{2}''$, gefunden. — Der merkwürdige und viel gewünschte *Otiorhynchus rotundatus* Siebold ist endlich von Helm in einigen Stücken bei Danzig wiedergefunden: 2 davon sind mir gütigst überlassen worden. Das Thier ist an seinem fast kugelförmigen Körper leicht zu erkennen. — Was ich bei *Oedemera virescens* L. bemerkt habe (Verz. p. 116), dass die von Kugelann im Manuscript erwähnte Var. mit gelblichen Beinen *flavipes* F. gewesen sein müsse, ist hinfällig, da ich wirklich bei Helm eine Var. von *virescens* mit gelben Vorderbeinen gesehen habe. — Aus der Beschreibung von *Leptura spreta* Kug. (Verz. p. 147) vermuthet Kraatz (Berl. Ent. Ztschr. 1868. p. 303), dass dies eine Var. von *Pachyta marginata* Fabr. gewesen sein müsse, die nicht zu *strigilata* F. gehört, sondern eine ausgezeichnete Art ist: vergl. Kraatz Catalog der Käfer Dtschl. p. 63: *marginata* ist aber bis jetzt aus Preussen nicht bekannt. — *Anisotoma parvula* Sahlb. (Verz. p. 32) die als sehr selten angegeben wird, habe ich in Menge am Südrande der Fritzenschen Forst und bei Fuchshöfen an sonnigen Juniabenden von Gräsern geschöpft. — *Chlaenius tibialis* Dej. (Verz. p. 11) ist von Helm mehrfach an der Radaune gefunden, und ein Stück des hier sehr seltenen *Chl. spoliatus* Rossi von einem Gymnasialschüler bei Elbing. — *Platysoma lineare* Er. ist auch von Dossow gefunden. — *Phratora tibialis* St. kommt nach Sanio nur auf *Salix viminalis* vor, es ist die Frage, ob sich dies überall bestätigt. — Von *Lina lapponica* L. (Verz. p. 155) habe ich die einfarbig blaue Form ohne gelbrothe Zeichnungen (*L. bulgarensis* Fabr.) mehrfach bei Königsberg und Helm bei Danzig gefangen. — *Agabus nigroaeneus* Er. (Verz. p. 22) ein Stück durch Sanio aus Lyck (Milchbuder Forst unter Moos) erhalten. — *Dromius obscuroguttatus* (II. Nachtr. p. 89) hat auch Helm bei Danzig mehrfach erbeutet. — *Lathridius alternans* Mannh. (II. Nachtr. p. 96) habe auch ich im Juli 1870 in einem Eichenschwamm bei Neuhäuser gefunden. — *Colonus brunneum* Latr. (II. Nachtr. p. 89) ist von Czwalina und mir am Südrande der Fritzenschen Forst im Juni vielfach gefangen. — *Bruchus marginellus* F. (Verz. p. 117). Als Nährpflanze dieses Käfers hat Körnicke bei Graudenz *Astragalus pilosus* entdeckt, in dessen Samen er sich ausbildet. — *Zeugophora subspinosus* F. (Verz. p. 150). Eine merkwürdige Varietät mit gelben Flügeldecken und Fühlern hat Helm bei Danzig und mehrfach Kramer bei Gilgenburg gefunden: vielleicht ist es eine verschiedener Jahreszeit entsprechende Form, wie unter den Lepidopteren sicher *Vanessa prorsa* und *levana*, unter den Coleopteren vielleicht *Donacia fennica* und *Malinowskyi*. — Die Sternchen endlich sind bei 2 Käfern zu entfernen, deren Vorkommen jetzt gesichert ist, nämlich bei *Pedinus femoralis* L. (Verz. p. 107), wovon Helm 1 Stück auf dem Kirchhof von Weichselmünde gefangen hat, und bei *Monotoma picipes* Hbst. (Verz. p. 167), wovon

ich ein Stück, und zwar die röthliche Var. von Kramer erhalten habe: der Käfer ist an den reiheweise stehenden Börstchen auf den Flügeldecken zu erkennen, und liess sich bei uns vermuthen, da er in Schweden ziemlich häufig ist (Gyll. III. 418).

Ausserdem sind nach neueren Untersuchungen folgende Verbesserungen in meinem Verzeichnisse zu notiren: *Mycetochares humeralis* Fabr. (nicht Panz.) p. 110 gehört zu *flavipes* Fabr. — *Gyrinus opacus* Sahlb. (Gyll. IV. 280. 4—5) p. 26 ist = *marinus* Gyll. Ob *Gyr. opacus* Suffr. = *aeneus* Thoms. Skand. Col. II. 116. 4 (viel kleiner und schmaler als *marinus*, oben ganz erzfarbig) bei uns vorkommt, weiss ich nicht, dass es aber so ist, lässt sich erwarten. — *Monotoma conicicollis* Aubé. p. 167, ist zu verbinden mit *angusticollis* Gyll. Thoms. V. 213. 1. — *Anaspis flava* L. ist = *thoracica* L. (Kraatz Berl. ent. Z. 1868 p. 305). — *Blaps obtusa* St. p. 107 muss so verbessert werden: *Bl. fatidica* St. = *obtusa* Gyll.

Es folgen nun hundert und einige Species, deren Vorkommen bis jetzt in unseren Verzeichnissen nicht festgestellt war. Ich glaube hiebei etwas Verdienstliches zu thun, wenn ich, soweit meine Mittel reichen, über das Vorkommen dieser Käfer in Schweden und in Deutschland, in deren Mitte wir liegen, Angaben mache; ersteres habe ich mit Sch. letzteres mit D. bezeichnet. Ein Schweigen über Schweden bedeutet, dass der Käfer in den mir bekannten Werken nicht angeführt ist. — 1. *Dyschirius rufipes* Dej. (in Südd. ziemlich selten) Helm bei Danzig. — 2. *Amara convexiuscula* Marsh. (kleiner und schlanker als *aulica* Illig., am Nordseestrande und bei Stralsund gefunden, in Sch. nicht selten) ist mir von Helm aus Danzig in 3 Stücken mitgetheilt. — 3. *Bradycellus laeustris* Redt. (breiter als *pubescens* Pk., Halsschild hinten nur sehr wenig ausgeschweift, daher breiter, und die Zwischenräume der Flügeldecken sind ziemlich dicht und fein unregelmässig punktirt: Südd.) ebenfalls eine schöne Entdeckung von Helm. — 4. *Dromius* (*Blechnus*) *maurus* St. (kleiner als *glabratus*, mit kürzeren Flügeldecken, kleinerem Kopf und etwas mehr verengtem Halsschild, in Mitteld. nicht selten); 1 Stück habe ich aus dem Walde von Tharau durch Kuwert (Wernsdorf) erhalten. — 5) *Demetrias* (*Aëtrophorus*) *imperialis* Germ. 1 Stück hat Helm auf den Danziger Dünen unter einer enormen Menge von *unipunctatus* gefunden, von dem er sich durch die Zeichnung der Flügeldecken leicht unterscheidet: gewiss wird er auch bei uns häufiger gefunden werden bei sorgfältigerer Untersuchung der Rohrhalme (Prömmel Berl. Ent. Z. IV. 321). — 6. *Bembidium bruxellense* Wessm. (im nördlichen Europa selten) hat Helm in Mehrzahl am Ufer der Weichsel und Radaune gefunden. — 7. *B. fluviatile* Dej. (in Mitteld. selten, durch das schmal herzförmige Halsschild ausgezeichnet) hat Helm an den Karthauser Seen bei Danzig in Mehrzahl gefunden. — 8. *B. fumigatum* Dft. (doppelte Stirnkiele, die nach vorn convergiren, Punktstreifen der Flügeldecken hinten verschwindend, in Mitteld. selten). 1 Stück habe ich in einer mir von Sanio aus Lyck zugesickten Sammlung gesehen. — 9. *B. unicolor* Chaud. = *Mannerheimii* Sahlb. (Mitteld., untersch. sich von dem gemeinen *guttula* Fabr. durch den fehlenden rothen Fleck und durch breitere, mehr gerundete Flügeldecken) hat Czwalina in mehreren Stücken bei Kbg. gefangen. — 10. *Trechus limacodes* Dej. (zwar ein Alpenkäfer, doch glaube ich mich in der Bestimmung nicht geirrt zu haben). 1 Stück Kramer von Gilgenburg. — 11. *Ochthebius gibbosus* Germ. (Seitenrand des Halsschildes ohne häutige Einfassung, in D. selten) hat Czwalina in einigen Stücken bei Katznase (Westpreussen) gefangen. — 12. *O. foveolatus* Germ. (Halsschild sehr uneben durch viele Eindrücke, in D. nicht eben selten). 1 Stück bei Neuhäuser unter Sectang von mir gefunden. — 13. *Limnebius truncatellus* Thunb. (in Sch. nicht selten, in D. häufig)

von Czwalina mehrfach bei Kbg. gefunden. — 14. *Cercyon laterale* Marsh. (in Sch. selten, gut beschrieben bei Redt. Fn. Austr. p. 115). Kramer bei Gilgenburg in Mehrzahl. — 15. *Anisotoma ciliaris* Schmidt. Von diesem in D. sehr seltenen Käfer, der an den am Rande dicht gewimperten Flügeldecken kenntlich ist, habe ich durch einen meiner Schüler ein Stück erhalten. — 16. *A. calcarata* Er. (in D. und Sch. nicht selten). 1 ♂ habe ich im Juni 1869 in Fuchshöfen erbeutet. Der Zahn der zusammengedrückten Hinterschenkel ist gross und spitz. — 17. *A. Triepkii* Schmidt (in Sch. weniger selten, als in-D.) Sanio 1 St. bei Lyck. — 18. *Cyrtusa pauxilla* Schmidt (in D. selten). 1 Expl. hat Czwalina in der Fritzschschen Forst im Juni 1867 gefunden. — 19. *Liodes serricornis* Gyll. (in D. und Sch. selten) hat Mühl in der Födersdorfer Forst aus Eichen mehrfach gezogen. — 20. *Colon dentipes* (in Sch. und sonst selten) Kramer bei Gilgenburg 2 Stück ♂ u. ♀. — 21. *Necrophorus microcephalus*, eine von Thomson IV. 9. 16 aufgestellte und auch nach meiner Meinung (Kraatz Berl. Ent. Z. VIII. p. 47 und 378; dagegen Michow X. p. 411) gut begründete Art, durch kleinen Kopf und kaum geschwollene Wangen, die bei *ruspator* stark wulstig sind, ausgezeichnet. Ich habe beide bei Fischhausen zusammen gefangen. — 22. *Bryaxis juncorum* Leach! (in Sch. selten, in D. häufiger) Czwalina, 1 Stück bei Zoppot. — 23. *Claviger longicornis* Müll. Sanio 1 Stück mit *foveolatus* zusammen unter einem Stein auf den Schedlisker Bergen bei Lyck (in D. selten). — 24. *Alcochara brun-nipennis* Kraatz (in D. verbreitet, von Thomson für wahrsch. identisch mit der häufigen *A. modesta* gehalten) 1 Stück bei Kbg., vom Autor recognoscirt. — 25. *Homalota silvicola* Fuss. Berl. Ent. Ztschr. 1868. p. 353 habe ich in 2 Expl. unter Tang bei Rothenen (Samländ. Weststrand) gefunden. — 26. *H. coriaria* Kraatz (in D. nicht häufig), ich 1 Stück bei Kbg. — 27. *H. subterranea* Muls. (in D. selten), Kramer bei Gilgenburg mehrfach. — 28. *H. thinobioides* Kraatz (von Thomson frageweise mit *longula* Heer vereinigt, in Mitteld.), Elditt 2 Stück bei Lopphehn. — 29. *H. testudinea* Er. (in D. seltener, als in Sch.), Elditt 1 Stück ebenda. — 30. *H. nigerrima* Aubé (in Mitteld. häufig nach Scriba, Berl. Ent. Ztschr. 1862. p. 277 und Fuss ibid. p. 429), Elditt 2 Stück ebenda. — 31. *H. laevana* Muls. (in D. verbreitet), Kramer 2 Stück von Gilgenburg. — 32. *H. terminalis* Gyll. (bei Berlin häufig), Elditt und ich am Ostseestrande mehrfach. — 33. *H. volans* Scriba Berl. Ent. Ztschr. 1866. p. 292, Kramer 3 Stück aus Gilgenburg. — 34. *H. sericea* Muls. (in Sch. häufiger, als in D.), Kramer 1 Stück daselbst. — 35. *Ocalea badia* Er. = *prolixa* Gyll. (in Sch. seltener, als in D.), ich einige Stück bei Nodems (westl. Samland) unter Tang. — 36. *Calodera longitarsis* Er. (Mitteld. nicht selten), Czwalina 1 Stück bei Rastenburg. — 37. *Trichophya pilicornis* Gyll. (schwärmt am geschlagenen Nadelholz, in D. nicht eben selten, in Sch. selten), derselbe 1 Stück daselbst. — 38. *Tachyporus tersus* Er. (in D. selten, dem *humerosus* ähnlich, aber breiter und mit längeren Flügeldecken), Helm 1 Stück bei Danzig. — 39. *T. formosus* Matth. (in Südd. selten, dem sehr häufigen *obtus* ähnlich, aber Kopf und Halsschild roth, und die Flügeldecken vorn sehr schmal schwarz). Von diesem sehr hübschen Thiere hat Czwalina 1 Stück im Walde von Schrombehnen gefunden. — 40. *T. ruficeps* Kraatz (Mittel- und Südd.; Kopf, Halsschild und Flügeldecken durchans roth), hat Sanio im März 1870 bei Lyck aus Erlenlaub gesiebt. — 41. *Pronomaca rostrata* Er. (in D. selten, an den borstenförmig vorragenden Lippentastern leicht kenntlich), muss bei Gilgenburg gar nicht selten sein, da sie mir von Kramer in grösserer Anzahl zugeschiedt ist. — 42. *Scopacus cognatus* Muls. (nicht selten in D.), ich 2 Stück unter Röhricht bei Kbg. — 43. *Acylophorus glabricollis* Grav. (in D. sehr selten), Kramer 1 St. von Gilgen-

burg. — 44. *Compsochilus palpalis* (in Sch. selten, in D. häufig). Dies kleine, zierliche, durch die vorragenden Mandibeln kenntliche Thier habe ich unter einer Masse kleiner Staphylinen von Gilgenburg (Kramer) in 2 Expl. herausgefunden. — 45. *Oligota inflata* Mnh. (in D. selten, Körper breit, die 4 letzten Fühlerglieder dicker), Czwalina 1 Stück bei Danzig. — 46. *Myllaena forticornis* Kraatz (in D. selten, starke Fühler, sonst der *minuta* ähnlich), Czwalina 1 Stück bei Katznase in Westpr. — 47. *Tachyusa flavitarsis* Sahlb. (in Sch. und D. selten, durch bläulichen Schimmer bemerklich, daher von Er. *chalybea* benannt), Czwalina 1 Stück bei Rastenburg. — 48. *Leptusa piceata* Muls. (in D. sehr selten). 1 Stück dieses an der schmalen Gestalt und den sehr kurzen Flügeldecken kenntlichen Käfers fand Czwalina im Juli 1870 bei Glettkau (Danzig) am Strande unter Seetang. Er bemerkt dabei, dass dies Thier auch an den Mittelfüssen 5 Tarsenglieder hat, nicht 4, wie es von Kiesenwetter in Berl. Ent. Ztschr. 1861. p. 375 von *L. nubigena* und anderen Species angiebt. — 49. *Xantholinus longiventris* Heer, in Sch. und D. selten, bei uns mehrfach bei Kbg. und Danzig, aber mit dem sehr häufigen *linearis* Oliv. vermengt. Aus der Beschreibung von Kraatz (K. D. II. 641. 12) ist er schwer zu erkennen, besser aus Thomson Skand. Col. II. 191. 7. Die Hauptunterschiede sind: *longiventris* hat vollständige Flügel, *linearis* ist beinahe flügellos, die Flügeldecken sind bei *long.* dem Halsschild an Länge gleich und dunkelersfarbig, bei *lin.* kürzer und gelbbraun. Dass, wie Thomson sagt, der Kopf bei *long.* parallele Seiten habe, bei *lin.* hinter den Augen breiter werde, habe ich nicht gefunden; der Kopf scheint mir bei beiden Species hinten etwas breiter zu sein. — 50. *Philonthus varians* Grav. (nicht Payk. Er; in Sch. und D. nicht selten, von Kraatz mit dem sehr häufigen und variablen *ebeninus* vereinigt, von Thomson getrennt), ich einige Stücke bei Kbg. — 51. *Ph. procerulus* Grav. (vielfach punktirtes Halsschild, in Sch. und D. selten), ich 1 Stück bei Kbg. — 52. *Ph. puella* Nordm. = *parumpunctatus* Er. (in Sch. und D. selten), Czwalina 1 St. im Walde von Schrombehnen. — 53. *Quedius nigriceps* Kraatz (in D. selten), Elditt, bei Loppelmen. — 54. *Stenus calcaratus* Scriba Berl. Ent. Ztschr. VIII. p. 380 (bei Hamburg). Dies merkwürdige Thier hat bei uns Czwalina bei Glettkau (Danzig) und bei Schrombehnen (Kbg.) mehrfach entdeckt und mir mitgetheilt. Höchst charakteristisch und von dem gemeinen *St. Juno* unterscheidend ist beim ♂ der stumpfe Zahn in der Mitte der Hinter-schienen, etwa wie beim ♂ von *Strangalia armata*, und ausserdem die Doppelreihe langer gelber Haare an den Segmenten des Hinterleibes, die sich nach innen neigen. Auch sind bei beiden Geschlechtern die Stirnfurchen tiefer. — *Oxytelus*. Von diesem Genus hat Czwalina bei Kbg. drei Arten neu entdeckt, und eine vierte, die kürzlich nach französischen Stücken (in Grenier Catalogue des Coléoptères de France II) beschrieben und von Scriba auch in Hessen aufgefunden worden ist, als auch bei uns vorkommend erkannt. Die Beschreibungen der 3 neuen Arten erscheinen im letzten Hefte der Berl. Ent. Ztschr. 1870. Die Diagnosen derselben scheint es wohl zweckmässig, auch hier mitzutheilen, da die Käfer gewiss weiter verbreitet und nur wegen ihrer Aehnlichkeit mit *depressus* Grav. bisher übersehen sind. Auch zu den Diagnosen der nächst verwandten Arten möge es gestattet sein, hier einige Zusätze mitzutheilen, welche die sichere Scheidung erleichtern sollen. Zu der Diagnose des *Oxytelus depressus* bei Kraatz Ins. D. II. p. 862 ist hinzuzufügen: *tibiis anticis integris, antennis graevioribus*. Zur Diagnose der *O. pumilus* Er. (l. c. p. 861) füge man: *tibiis anticis extus ante apicem latius excisis*. Dieser ist in Preussen noch nicht gefunden. Bei diesen und den nun folgenden Arten ist in der Diagnose gemeinschaftlich: *c: pite, thorace elytris que omnium subtilissime confertissime que longitudi-*

naliter strigosis. Zwischen depressus und pumilus schiebt sich wohl am besten ein: 55. *Oxytelus transversalis* Czwal. niger, opacus, pedibus piceis, prothorace longitudine duplo fere latiore, coleopteris tertia parte brevior, tibiis anticis extus ante apicem latius excisis. Long. 1 lin. Mas: segmento ventrali sexto bituberculato, septimo bisinuato, lateribus calloso. Einige St. bei Kbg. (Polnischer Kirchhof), ein einzelnes ♂ auch Juli 1870 in Krain gefangen, also gewiss weiter verbreitet. — Zur Diagnose des hamatus Fairm. (Kraatz l. c. p. 863) setze man: tibiis anticis apice extus leviter sinuatis. Mas: segmento ventrali sexto apice unco longiore, leviter curvato. Bei uns noch nicht gefunden. Ihm sehr nahe steht 56. *O. affinis* Czwal. niger, opacus, pedibus testaceis, femoribus piceis, thorace coleopteris dimidia fere parte brevior, angulis anterioribus subrotundatis, tibiis anticis extus ante apicem latius excisis. Mas: segmento ventrali sexto apice unco basi latiore, fortius incurvato, septimo tuberculis duobus oblongis aureo-ciliatis. Long. $\frac{1}{2}$ lin. Etwa 20 Stück bei Kbg. gefangen. — Etwas weiter entfernt steht in mancher Hinsicht die dritte neue Art 57. *O. tetratoma* Czwal. minus parallelus, niger, opacus, pedibus testaceis, elytris minus obsolete punctatis, capite in utroque sexu thorace angustior, bisulcato, thorace elytris angustior et tertia parte brevior, abdomine apicem versus angustato, tibiis anticis extus ante apicem leviter sinuatis, antennis articulis quattuor ultimis majoribus. Long. $\frac{1}{2}$ lin. Mas: segmento ventrali septimo medio longius acute producto, capite profundius bisulcato. 1 ♂, 2 ♀ bei Kbg. gefunden. — Die vierte für Preussen neue Art ist 58. *O. Saulcyi* Fauvel, wovon Czwalina ein einzelnes ♂ in Gesellschaft der 3 vorigen Arten bei Kbg. gefunden hat. Die wesentlichsten Unterschiede von den verwandten Arten sind Berl. Ent. Ztschr. 1870 p. 415 von Scriba und Czwalina angegeben; hervorzuheben sind: abdomine fere impunctato, tibiis anticis extus ante apicem profundius sinuatis. Mas: segmento ventrali sexto medio tuberculo oblongo, margine medio leviter quadratim deflexo. Der Ausschnitt der Vorderschienen ist bei den 4 Arten pumilus, transversalis, affinis und Saulcyi ziemlich gleich gebildet, bogenförmig, bei den 3 erstgenannten stehen aber an seinem obern Rande drei Dörnchen so dicht an einander, dass bei nicht sehr starker Vergrößerung der Ausschnitt hier scharfwinklig erscheint; bei Saulcyi stehen die 3 Dörnchen weiter von einander und der Ausschnitt erscheint buchtig. Diese Verschiedenheit hat der Autor durch die Worte latius excisis und profundius sinuatis kurz anzudeuten versucht. — 59. *Thinobius longipennis* Heer. (in D. mehrfach; einem *Trogophloeus* ähnlich, aber durch die langen Flügeldecken ausgezeichnet), Czwalina 1 Stück bei Rastenburg. — 60. *Olophrum consimile* Gyll. (selten in Lappland, einzeln am Ostseestrande, Halsschild hinten gebuchtet), Kramer bei Gilgenburg. — 61. *Acritus sulcipennis* Fuss, nach 2 Stücken, die ich unter Mistbeetbrettern im Frühjahr 1867 im Gutsgarten zu Liep fand und an Fuss schickte, von diesem beschrieben in Berl. Ent. Ztschr. 1868. p. 312. Er macht durch die Streifen auf den Flügeldecken den Uebergang zu *Saprinus*. Leider habe ich ihn seitdem nicht wieder gesehen. — 62. *Hister succicola* Thoms. Skand. Col. IV. 224. 6 (in Sch. nicht selten) mehrere St. von Czwalina bei Schrombellen an Eichenstubben gefunden: er unterscheidet sich von *cadaverinus* besonders durch die doppelt gebogene Stirnlinie, die bei cad. ein Kreisausschnitt ist, und dadurch, dass die Mittelbrust vorn beinahe winkelig ausgeschnitten, bei cad. nur leicht ausgerandet ist. — 63. *Trichopteryx grandicollis* Mannh. = *fascicularis* Gillm. ist nirgends selten, wird aber oft verkannt, wenn, was leicht geschieht, die Seitenborsten des Halsschildes und der Flügeldecken abgebrochen sind. Czwalina. — 64. *Olibrus pygmaeus* St. (in Sch. selten, auch in D. nicht häufig; klein und blank wie *millefolii* Payk., aber besonders durch längliche Gestalt unterschieden und hierin dem viel

grösseren bicolor F. ähnlich. Ich habe 3 Stück im Juli 1870 bei Neuhäuser gefunden. — 65. *Epuraca borecella* (in Lappland selten; ebenso in D.), Dossow aus einer Ostpr. Forst. — 66. *Meligethes azureus* Heer (Schweiz, aus D. nirgends angegeben), 1 einzelnes Stück von Kbg. Czwalina sagt darüber: der Name könnte möglicher Weise auf eine sehr ähnliche andere Art bezogen werden, die ich aus den Alpen besitze; es passen aber die kurzen Angaben Heer's besser auf unser Exemplar, als auf die durch dünne weisse Behaarung ausgezeichneten alpinen Stücke, so dass es passender erscheint, letztere als eine Species anzusehen, bis etwa die Vergleichung von Typen das Gegentheil beweist. — 67. *M. coeruleovirens* Förster (in D. bei Aachen einmal zahlreich) einmal von Czwalina im ersten Frühjahr an Weidenblüthen in einiger Anzahl gefunden. Diesem äusserst nahe steht eine wohl noch unbeschriebene Art, von welcher derselbe einige Stück bei Kbg. gefunden hat. Umriss, Wölbung der Flügeldecken, Punktirung stimmen fast ganz mit jenem überein und lassen den Käfer leicht von *aeneus* und den verwandten unterscheiden; aber die Farbe ist dunkelgrünlich, nicht bläulich, die Hinterbrust zeigt über ihre ganze Länge einen ziemlich tiefeu dreieckigen Eindruck, der hinten fast die ganze Breite zwischen den Hinterhüften einnimmt und sich nach vorn verschmälert, und das Halsschild ist nur der Queere nach gewölbt, so dass von der Seite gesehen der obere Umriss fast geradlinig erscheint, während es bei *coeruleovirens* besonders auf der vorderen Hälfte auch der Länge nach gewölbt ist und der Umriss von der Seite gesehen, eine nach vorne heruntergebogene Linie darstellt. — 68. *M. Kunzei* Er. (Südd. selten), Czwalina 1 St. bei Kbg. — 69. *M. umbrus* St. (in D. seltener als in Sch.), Czwalina 1 St. bei Warnicken. — 70. *Atomaria elongatula* Er. (in D. seltener als in Sch., grösser als *linearis*, an den sehr dicken Fühlern, welche Thoms. allerdings *minus validae*, aber Gyll. *crassae* und Erichs. dick nennt, und der langen Form zu erkennen). Ich habe 1 Stück aus Gilgenburg (Kramer). — 71. *A. atricapilla* Steph. = *nigriceps* Er. (in Sch. und D. verbreitet), Czwalina 1 St. bei Danzig. Bei diesem Expl. zeigt sich auch um das Schildchen eine dunkle Stelle und auf den Flügeldecken die schwärzlichen Linien, von denen Erichson Ins. D. III. 397 spricht, so dass die Identität mit *A. rufa* Heer wohl nicht zu bezweifeln ist. — 72. *A. impressa* Märk. (in D. selten, durch den von Fältchen begrenzten Eindruck in der Mitte des Hinterandes vom Halsschild zu unterscheiden), Czwalina 1 St. bei Kbg. — 73. *Dermostes cadaverinus* F. (besonders in Sibirien, aus D. noch unbekannt), Kramer bei Gilgenburg (Berl. Ent. Z. 1868. p. 336). — 74. *D. bicolor* F. hat Dommer schon vor 1856 aus seinem Taubenschlage vielfach gezogen. Die Larven steckten zum Theil in dem Fleische lebender junger Tauben. Neuerlich hat Helm aus Danzig mir 2 St. zugeschickt, und Czwalina hat ihn in ziemlicher Menge in Katznase (Westpr.) unter dem Dünger eines Taubenschlages gefunden, so dass das Parasitenleben der Larven bei den Tauben ausser Zweifel ist, was zu Erichsons Zeit unbekannt war, der ihn Ins. D. III. 437 sehr selten nennt. Der Käfer ist augenblicklich an den ziemlich stark gestreiften Flügeldecken zu erkennen; vgl. Kraatz Berl. Ent. Z. IX. p. 410. — 75. *Byrrhus Dennii* Curt. (in Mitteld. selten, verkehrt eiförmig, goldgelb behaart), Sanio 1 Stück aus Lyck. — 76. *Anthaxia morio* F. (in D. selten; von *sepulchralis* F. sicher, namentlich durch längere Form und durch den winkligen Ausschnitt an den Seiten des Halsschildes verschieden), Dossow 1 St. aus einer Ostpr. Forst. — 77. *Trachys troglodytes* Schh. (in Sch. selten, in Südd. häufig), 1 St. fand ich in einer von Sanio aus Lyck mir zugeschickten Sammlung. — 78. *Cyphon pallidulus* Bohem. (in Sch. weniger selten als in D.) einige St. von mir bei Rauschen gefunden. — 79. *Malthodes fibulatus* Ksw. Ins. D. IV. 552. 17 (in Sch. und D. im Ganzen selten), Czwalina

im Juni 1867 bei Georgenswalde 2 ♂. — 80. *M. spathifer* Ksw. *ibid.* p. 558 (in Sch. und D. nicht eben selten), Czwalina Ende Juni am Westrande der Fritzenschen Forst 2 ♂. — 81. *M. trifurcatus* Ksw. *ibid.* p. 539 (in D. ein Alpenkäfer, in Sch. ziemlich selten), ich ein ♂ Juli 1867 ebendasselbst. Die Weibchen dieses Genus sind ausserordentlich schwer zu bestimmen und nur, wenn man sie in copula findet, hat man Sicherheit. — 82. *Haplocnemus basalis* Küst. (bisher weder aus Sch., noch aus D. angegeben; erzgrün, sehr grob punktirt, stark gewölbt), 1 St. ♀ Sanio bei Lyck. Ich besitze 4 St. aus Dalmatien. — Ueber *Haplocnemus virens* Snfr., welchen Dossov angiebt aus der Försterei Biberswalde, sind die Acten noch nicht geschlossen (Kraatz Berl. Ent. Z. 1868. p. 294), ich mache also nur auf ihn aufmerksam. — 83. *Anthicus luteicornis* Schmidt (in Südd. selten; schwarz, Flügeldecken an der Spitze zusammen abgerundet), ich 1 St. am Pregel bei Kbg. — 84. *Ptinus pallipes* Dft. = *pilosus* Müll. (in D. im Ganzen selten, stets unter Eichenrinde), 2 St. ♀ Helm bei Danzig. — 85. *Pt. bicinctus* St. (in Südd. selten), Kramer bei Gilgenburg mehrfach. — 86. *Pt. bidens* Oliv. (in Sch. verbreitet, nicht so in D.), ich 1 St. ♀ im Juli 1867 bei Löwenhagen an einer alten Weide. — 87. *Anobium longicorne* St. (in Südd. selten) ich 1 St. bei Kbg. — 88. *A. fulvicorne* St. (in Sch. und D. selten; durch hinten abgestutzte Flügeldecken kenntlich), ich einige St. und zwar die var. *rufipenne* Dft. bei Kbg. — 89. *Hypophloeus pini* Pz. = *longulus* Gyll. (in Sch. seltener als in D.), 1 St. habe ich durch Sanio aus Lyck erhalten, der es im März 1869 unter Tannennrinde gefunden. — 90. *Anaspis ruficollis* F. (viell. nur Var. von *thoracica*, Kraatz, Berl. Ent. Z. XII. p. 306, in Südd. sehr selten), ich habe davon 1 St. gesehen, welches Helm aus Danzig mir zuschickte. — 91. *Silaria phalerata* Germ. (in D. selten), Czwalina 1 St. in der Fritzenschen Forst; auch habe ich ein in Westpr. gefangenes Expl. gesehen. — 92. *Cryphthypnus sabulicola* Bohem. (in Sch. selten), halte ich für eine gute Art, obwohl Kraatz sie nicht aufgenommen hat. Die Beschreibung bei Thomson Skand. Col. VI. 114 unterscheidet sie deutlich von *pulchellus* L. An unserem Strande (Cranz-Schwarzort) ist namentlich die var. mit erweiterten gelben Flecken zu finden, besonders unter welchen auf dem Dünsande liegenden Blättern von *Tussilago farfara*. — 93. *Cr. elongatus* Redt. Fn. Aust. Nr. 547. 2 (sehr gut beschrieben, in Südd. selten), Helm 1 St. bei Danzig. — 94. *Cardiophorus asellus* (in Sch. und D. selten) hat Helm bei Danzig mehrfach gefunden; von dem sehr ähnlichen *cinereus* unterscheidet er sich durch einfache Fussklauen. — 95. *Limouins parvulus* Pz. (in D. häufig), ist von Janke bei Neumark in Westpr. gefunden und von Kramer mir zugeschickt. — 96. *Meloe scabriusculus* Brandt et Er. (in D. sehr häufig), Sanio bei Lyck, ich bei Kbg. nicht selten. — 97. *Rhynchites megacephalus* Germ. (nicht Schh.) = *constrictus* Gyll. (in Sch. und D. selten), ich einige St. bei Rauschen am Mühlenteiche von Buschwerk geklopft. Sehr gut beschrieben bei Thoms. Skand. Col. VII. 37. 9. Ich mache hierbei aufmerksam auf den dem *R. nanus* ähnlichen *uncinatus* Thoms., der sich durch an der Spitze gekrümmte Schienen auszeichnet, in Sch. selten, und bei uns noch gewiss vorhanden, obwohl noch nicht entdeckt. — 98. *Apion rubens* Steph. (in Sch. und D. sparsam, von den ähnlichen rothen Species unterschieden durch Kleinheit, $\frac{2}{3}$ ''', parallele Seiten der Flügeldecken und das kugelförmige zweite Fühlerglied), ich ein Stück bei Löwenhagen. — 99. *A. medianum* Thoms. = *sedi* Gyll. (in Sch. und D. selten), ich 1 St. bei Kbg. — 100. *A. ruficus* (in D. selten, durch dunkelrothe Schenkel zu unterscheiden), Helm bei Danzig mehrfach. — 101. *Strophosomus hispidus* Schh. (Seidlitz Berl. Ent. Z. XI. p. 181, dem *faber* ähnlich, aber durch weniger vorragende Augen, nicht aufgebogenen Vorderrand der Flügeldecken und die nicht

gerinnte Stirn unterschieden), Kramer einige St. von Gilgenburg. — 102. *Thylacites pilosus* Fabr. (um Wien häufig, an Gestalt einem *Phytonomus* täuschend ähnlich, auch mit 4 weisslichen Längsstreifen auf dem Halsschilde, aber der Rüssel wie bei *Strophosomus*; er ist durch sehr lange, abstehende, dunkle Haare ausgezeichnet), Helm 1 St. bei Danzig. — 103. *Sitones humeralis* Steph. (in Südd. häufig, ohne Borsten, durch einen weissen Längsstreifen über die Mitte jeder Flügeldecke zu unterscheiden), Sanio bei Lyck auf einer Feldwiese neben der Eisenbahn. — 104. *Sitones lateralis* Schh. (in Südd. sehr selten, gut beschrieben bei Redt. Fn. Austr. II. p. 704). Kramer 1 St. bei Gilgenburg. — 105. *Chlorophanus salicicola* Germ., Helm bei Danzig, mehrfach. — 106. *Polydrosus coruscus* Gyll. (in Oesterreich häufig, durch unbehaarten Körper unterschieden), Helm bei Danzig, ich bei Kbg. — 107. *Orchestes decoratus* Germ. (in Sch. selten, ebenso in D.), Czwalina im Juni 1867 mehrfach in der Fritzenschen Forst. — 108. *Erirhinus minutus* Schh. (in Südd. selten, gelbbraun, mit weissen Haaren scheekig besetzt), Helm bei Danzig. — 109. *Anthonomus spilotus* Redt. (in Sch. seltener als in D.), von blühendem *Crataegus* bei Schrombehnen von Czwalina und mir mehrfach herabgeklopft. — 110. *Acalles ptinoides* Marsh. (non Gyll., gut beschrieben bei Schh. Curc. VIII. 422. 9, in Südd. selten), Kramer aus trockenem Laube bei Gilgenburg gesiebt. — 111. *Omius mollicornis* Ahr. (in Südd. selten), von Helm in Jeschkenthal in grosser Menge gesammelt. — 112. *O. pruinosis* Schh. (in Südd. selten), ebenso, jedoch sparsam. — 113. *Ceuthorhynchus nanus* Schh. (Südd. selten) auf *Draba verna*, Kbg., Lyck, bisher mit *C. floralis* Pk. vermengt. — 114. *Ceuthorhynchus albosignatus* Schh. (in D. selten, Kraatz Berl. Ent. Z. XI. 386. 20), ich 2 St. bei Löwenhagen. — 115. *Gymnetron stimulosus* Germ. (in Südd. selten, Flügelspitze roth, graue Härchen reihenweise), Sanio 1 Stück aus Lyck. — 116. *Cryphalus fagi* Nördl. (in Sch. selten, ebenso in D.), Dossow aus einer Rothbuche bei Ludwigsort einige St. — 117. *Cryptocephalus pallifrons* Gyll. (in Sch. und D. selten), Kramer 1 St. von Gilgenburg. — 118. *Cr. Wasastjernae* Gyll. (in Sch. sehr selten, dann in Nordd., durch fein nadelrissiges Halsschild sehr ausgezeichnet), Sanio bei Lyck, Czwalina in der Fritzenschen Forst mehrfach. — 119. *Cr. digrammus* Suffr. (in Nordd.), von demselben erhalten. — 120. *Lema flavipes* Suffr. (in Südd. selten), ich habe ein in Königsthal bei Danzig von Helm gefangenes St. gesehen. — 121. *Dibolia rugulosa* Redt. (in Südd. sehr selten, Flügeldecken fein gerunzelt, daher matt), Czwalina 1 St. bei Kbg. — 122. *D. cynoglossi* Ent. II. (in Südd. selten, Halsschild stark und tief punktiert), Kramer 1 St. bei Gilgenburg. — 123. *Cassida stigmatica* Suffr. (in Südd. selten, durch Augenpunkte auf den Flügeldecken ausgezeichnet), ich 2 Stück bei Rauschen, Sanio vielfach bei Lyck. — 124. *Clambus punctulum* Gyll. *Agathidium punctulum* Fn. Succ. IV. 515. 24. (in Sch. und D. ziemlich selten), Czwalina 1 St. bei Rastenburg. Redtenb. ist in diesem Genus confus. Die Arten sind folgende: a. behaart: 1. *pubescens* Redt., 2. *armadillo* Deg. = *punctulum* Beck.; b. spiegelglatt: 3. *minutus* St. (von Redt. als *armadillus* Deg. und gleich darauf noch einmal als *minutus* St. beschrieben; Flügeldecken hinten zugespitzt, die grösste der Arten); 4. *punctulum* Gyll. Flügeldecken hinten abgerundet, die kleinste Art, Kraatz Berl. Ent. Z. XII. 293. 41. Von diesen 4 Arten steht Nr. 3 noch nicht in unserm Verzeichniss. — 125. *Corticaria denticulata* Gyll. (in Sch. und D. nicht häufig), ich einige St. bei Kbg. mit *crenulata* zusammen, von der sie sich durch stärkere Punktreihen der Flügeldecken und durch nicht geranzelte Zwischenräume derselben unterscheidet. Bei Gyll. IV. p. 126 muss es statt *interstitiis impunctatis* heissen *non rugosis*, das Richtige haben Thoms. V. p. 227 und Redt.

p. 387. 14. — 126. *Myrmecoxenus vaporariorum* Guér. (in D. selten), Kramer bei Gilgenburg mehrfach in einem Unkrauthaufen, der wahrscheinlich zufällig auf eine Ameisen-colonie aufgeworfen war. — 127. *Lathridius chathratus* Mannh. (in Südd. selten). Von diesem zierlich gebauten Käferchen habe ich im Walde bei Neuhäuser in einem Eichen-schwamm 4 St. erbeutet. Juli 1870. — 128. *Cryphalus asperatus* Gyll. Ins. Succ. III. 368. 13. (in Sch. und D. selten), hat Dossow mehrfach gefangen. Da Mühl, ein zuverlässiger Kenner der Bostrychiden, die Bestimmung gemacht hat, so ist an der Richtigkeit wohl nicht zu zweifeln; doch ist noch zu untersuchen, ob nicht *Cr. abictis* Ratz. dasselbe Thier ist. — 129. *Alphitophagus quadripustulatus* Steph. (in Sch. und D. selten), einmal zahlreich von Kramer bei Gilgenburg gefangen und mir in 4 St. mitgetheilt. — 130. *Apion cerdo* Gerst. (in D. seltener als in Sch.), leicht an der sackförmigen starken Erweiterung der Mitte des Rüssels zu unterscheiden. 1 St. Kramer bei Gilgenburg. Von den nächsten Verwandten *A. Marshami* Schh. und *subulatum* Kirb. ist noch zu untersuchen, ob Walton Recht behält, der beide vereinigt (Berl. Ent. Ztschr. 1858. p. 99, conced. Schaum), oder Thomson, der sie trennt (Skand. Col. VII. p. 88. 89). — Zuletzt mache ich noch auf einen *Byrrhus* aufmerksam, der in allen übrigen Stücken dem *fasciatus* Fabr. gleicht, aber auf der Stirn ein deutliches liegendes Kreuz, etwa von der Form des Multiplicationszeichens, eingedrückt zeigt. Meine Exemplare haben nur einen schwachen Quereindruck. Dossow hat mir 2 Stücke davon gezeigt; ich bitte meine entomol. Freunde ihre Sammlungen in dieser Beziehung zu revidiren.

Im zweiten Nachtrage wurde die Zahl der Coleopterenspecies unserer Provinz auf 2909 berechnet, wovon noch 90 der Bestätigung bedurften. Davon sind nun abzurechnen 8 unrichtige Bestimmungen und 4 Species, die sich als Synonyma anderer herausgestellt haben, der Rest ist also 2897. Wenn man nun die oben erwähnten 130 Nummern hinzuzählt, so ergibt sich die Summe von 3027 Species, wovon allerdings 88 noch nicht wiedergefunden sind. Die gleich Anfangs gehegte Erwartung also, dass unsere Fauna mehr als 3000 Arten aufweisen würde, hat sich glänzend bestätigt, und ich habe die Ueberzeugung, dass sich bei fortgesetztem Sammelfleisse noch weitere Resultate ergeben werden.

(Sonder-Abdruck aus den Schriften der Königl. phys.-ökon. Gesellschaft zu Königsberg Jahrgang XI.)

1870