Hellmayr, C. E. und Laubmann, A. Nomenclator der vögel Bayerns.

(1916)

A-H [ellmayr]
Bayerns
1916

HARVARD UNIVERSITY.

LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

55,125

GIFT OF

Authors.

August 30, 1920.

Ausgegeben am 30. Mai 1916.

55, 125.

LIBRARY
MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY
CAMBRIDGE, MASS.

Nomenclator der Vögel Bayerns.

Von

C. E. Hellmayr und A. Laubmann.

Im Auftrage der
Ornithologischen Gesellschaft in Bayern

herausgegeben

von

C. E. Hellmayr

Kustos der Ornithologischen Abteilung der Zoologischen Staatssammlung,
Generalsekretär der Gesellschaft

München 1916

Im Buchhandel zu beziehen durch die Verlagsbuchhandlung

Gustav Fischer in Jena.

AUG 20 1920

Nomenclator der Vögel Bayerns.

Von

C. E. Hellmayr und A. Laubmann.

Im Auftrage der
Ornithologischen Gesellschaft in Bayern

herausgegeben

von

C. E. Hellmayr

Kustos der Ornithologischen Abteilung der Zoologischen Staatssammlung,
Generalsekretär der Gesellschaft

Ausgegeben am 30. Mai 1916.

München 1916

Im Buchhandel zu beziehen durch die Verlagsbuchhandlung
Gustav Fischer in Jena.

K. B. Hof- und Univ.-Buchdruckerei von Junge & Sohn, Erlangen.

Einleitung.

Die Generalversammlung der „Ornithologischen Gesellschaft i. B.“ vom 9. Januar 1914 beschloß die Herausgabe einer „Avifauna Bavarica“. Mit den Vorarbeiten wurde eine Kommission betraut, die zunächst aus den Herren von Besserer, Dultz, Gengler, Hellmayr und Schwangart bestand, zu denen später durch Zuwahl noch Herr Laubmann trat. Als Vorläufer der zusammenfassenden Darstellung der Ornis Bayerns sollte eine Liste der für das Königreich nachgewiesenen Vogelarten unter gleichzeitiger Feststellung ihrer wissenschaftlichen Namen in Übereinstimmung mit den Internationalen Regeln für die Zoologische Nomenklatur verfaßt werden. Dieser Nomenclator der Vögel Bayerns wurde von den Unterzeichneten alsbald in Angriff genommen.

Da es sich bei der vorliegenden Arbeit, deren Schwergewicht auf der nomenclatorischen Seite liegt, lediglich um eine Aufzählung der in Bayern vorkommenden Arten handelt, wird auf die Art und Weise des Vorkommens der einzelnen Vertreter unserer Vogelwelt nicht eingegangen. Die faunistische Darstellung soll den Gegenstand der in Aussicht genommenen Avifauna Bayerns bilden, in welcher neben Beschreibungen der morphologischen Eigentümlichkeiten auch Biologie und Zugverhältnisse der verschiedenen Arten Berücksichtigung finden werden.

Der „Nomenclator“ gliedert sich in drei Abschnitte:

1. Das Verzeichnis der mit Sicherheit in Bayern festgestellten Arten.
2. Die Aufzählung jener Arten, deren Vorkommen innerhalb der Landesgrenzen wohl behauptet, aber nicht einwandfrei belegt ist.

3. Eine Liste der im „Nomenclator“ angewandten Gattungsnamen nebst Angabe der Methode, nach welcher die Genotype ermittelt wurde.

Für verschiedene Auskünfte sind die Unterzeichneten Herrn Dr. E. Hartert in Tring, für die leihweise Überlassung von Kaup's Skizzierter Entwicklungsgeschichte Herrn Prof. A. Jacobi in Dresden zu lebhaftem Danke verpflichtet.

Nomenklatur.

Die Richtlinien für die wissenschaftliche Namengebung der Tiere bilden die „Internationalen Regeln der Zoologischen Nomenklatur“¹⁾, welche nach langen Vorberatungen von dem Zoologenkongresse in Bern (1904) angenommen wurden. Die nachfolgenden Zusammenkünfte der Zoologen aller Länder haben einzelne der ursprünglichen Bestimmungen erweitert und präzisiert. Die Grundprinzipien, vor allem das Prioritätsgesetz, welches für jede Tierform nur den ältesten Gattungs- und Artnamen als gültig anerkennt, wurden indessen unverändert beibehalten. Der von einer Reihe Zoologen dem Kongreß in Monaco (1913) unterbreitete Antrag auf Aufhebung des Prioritätsgesetzes in gewissen Fällen erlangte nicht die Majorität. Dagegen wurde der Internationalen Nomenklaturkommission die Befugnis zugestanden, daraufhin abzielende Anträge entgegenzunehmen und nach Einholen des Gutachtens der für die einzelnen Tierklassen zu ernennenden Spezialkommissionen darüber zu entscheiden, ob dem Antrag stattzugeben ist oder nicht. Seit dem Zool. Kongreß in Boston (1907) gibt die Intern. Nomenklaturkommission über die Auslegung der Regeln und strittige Nomenklaturfragen eine Reihe von Gutachten²⁾ ab, die, sobald sie die Sanction des jeweils nächsten Kongresses erhalten, den Regeln gleichzuachten sind.

Das Ziel aller Nomenklaturbestrebungen ist auf Einheitlichkeit und Beständigkeit gerichtet, was natürlich nur durch striktes Fest-

¹⁾ Règles Internationales de la Nomenclature Zoologique adoptées par les Congrès Internationaux de Zoologie. Paris. 1905. 8°. 64 pp. (Französisch, englisch, deutsch).

²⁾ Opinions rendered by the International Commission on Zoological Nomenclature. Opinions 1 to 25, July 1910; 26 to 29, Oct. 1910; 30 to 37, July 1911; 38 to 51, Febr. 1912; 52 to 56, May 1913; 57 to 65, March 1914. Smithsonian Institution, Washington, Publ. 1938, 1989, 2013, 2060, 2169, 2256.

halten an den Internationalen Regeln erreicht werden kann. Als Ausgangspunkt für die wissenschaftliche Namengebung ist nunmehr allgemein die zehnte Ausgabe von Linné's *Systema Naturae* (1758) angenommen. Während die Nomenklatur der nordamerikanischen Vögel durch die American Ornithologists' Union¹⁾ längst geregelt ist, folgte in Europa bis vor kurzem jeder Autor vorwiegend seinem persönlichen Geschmack bei der Auswahl der wissenschaftlichen Namen. Erst neuerdings sind in England ernsthafte Schritte unternommen worden, die Nomenklatur der britischen Vögel einheitlich zu gestalten²⁾, wogegen von deutscher Seite bisher kein derartiger Versuch vorlag. Schon aus diesem Grunde geben wir uns der Hoffnung hin, daß der hiermit den ornithologischen Kreisen überreichte Nomenclator der bayerischen Vögel auch als Grundlage für die Benennung der Vögel unseres weiteren Heimatlandes dienen möchte.

Alle in dieser Zusammenstellung zitierten Bücherstellen, mit ganz wenigen Ausnahmen³⁾, wurden von den Unterzeichneten eingesehen und sorgfältig geprüft. Trotz aller Gewissenhaftigkeit und Kritik ist es immerhin nicht ausgeschlossen, daß die von den Verfassern ausgearbeitete Nomenklatur in einzelnen Fällen eine Korrektur erfahre. Über derartige notwendige Änderungen und andere Ergänzungen soll von Zeit zu Zeit in den „Verhandlungen“ berichtet werden. Fortab wird der Nomenclator in den offiziellen Veröffentlichungen der Gesellschaft allein maßgebend sein.

Gattungsnamen.

Die Feststellung des ältesten Gattungs(Genus)namens für die einzelnen Vogelarten erwies sich als der bei weitem mühsamste

¹⁾ Check-List of North American Birds prepared by a Committee of the American Ornithologists' Union. First edition. New York 1886; second edition, 1895; third edition, 1910.

²⁾ Hartert, E., F. C. R. Jourdain, N. F. Ticehurst & H. F. Witherby, A Hand-List of British Birds, with an Account of the Distribution of each Species in the British Isles and abroad. London. 1912. 8°. XII + 237 pp.

A List of British Birds compiled by a Committee of the British Ornithologists' Union. Second and revised edition. London. 1915. 8°. XXII + 430 pp.

³⁾ Diese betreffen u. a. Lacépède's „Tableaux méthodiques des Oiseaux“, die in der Originalausgabe von 1799 nicht zugänglich waren. Wir waren demzufolge auf die Benutzung der in Daudin's „Traité élémentaire et complet d'Ornithologie“ und der Didot-Ausgabe der „Oeuvres de Buffon“ enthaltenen Abdrücke dieser Schrift angewiesen.

und schwierigste Teil unserer Aufgabe. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß die Bedeutung eines Gattungsnamens ohne ausdrückliche Angabe der typischen Art (der sogenannten „Genotype“) nicht mit absoluter Sicherheit zu ermitteln ist. Die verschiedensten Methoden wurden früher angewandt, um die Genotype von ursprünglich polytypischen, d. h. aus mehreren Arten bestehenden Gattungen zu fixieren. Bald wählte man als Genotype die zuerst genannte Art, bald bediente man sich des Eliminationsverfahrens, um ein zuverlässiges Resultat zu erzielen. Erst der Zoologenkongreß in Boston (1907) legte die Richtlinien für die zu befolgende Methode nieder, welche in Kürze hier wiedergegeben seien.

Die Genotype¹⁾ wird festgestellt:

1. durch Monotypie,
2. durch Tautonomie,
3. durch ursprüngliche Bestimmung des Autors des Gattungsnamens,
4. durch nachträgliche Bestimmung.

Erwähnt ein Autor bei Aufstellung einer neuen Gattung nur eine einzige Art, so gilt diese eo ipso als Genotype (Monotypie).

Benutzt ein Autor bei Aufstellung eines neuen Gattungsnamens den Speziesnamen (gleichviel ob den gültigen oder eines der Synonyme) einer der in der Gattung enthaltenen Arten, so gilt diese als Genotype. Z. B. die Genotype des Genus *Pica* Brisson ist *Corvus Pica* Linn. (Tautonomie).

Bezeichnet ein Autor bei Neuaufstellung einer aus mehreren Arten bestehenden Gattung eine derselben ausdrücklich als „Type“ oder „Genotype“, so ist diese Fixierung als endgültig zu betrachten (ursprüngliche Bestimmung).

Unterläßt der Autor bei der Aufstellung der Gattung eine solche ausdrückliche Bezeichnung und kann die Genotype nicht auf dem unter 1. und 2. angegebenen Wege eruiert werden, so ist die Entscheidung des ersten späteren Schriftstellers, der eine der ursprünglich in der Gattung eingeschlossenen Arten als Genotype wählt, maßgebend (nachträgliche Bestimmung).

¹⁾ Wir geben dieser Bezeichnung schon wegen ihres Gleichlauts mit den entsprechenden englischen und französischen Fachausdrücken vor der von manchen Schriftstellern eingeführten männlichen Form (Genotypus) den Vorzug.

Im dritten Abschnitt des „Nomenclators“ ist bei den einzelnen Gattungsnamen der Modus, nach welchem die Bestimmung der Genotype erfolgte, ausführlich mitgeteilt, damit jedermann sich von der Richtigkeit des Verfahrens überzeugen kann.

Erhebliche Schwierigkeiten ergaben sich bei der Entscheidung der Frage, welche Gattungsnamen als gleichlautend zu betrachten sind, da die Internationalen Nomenklaturregeln in diesem Punkte leider der wünschenswerten Präzision entbehren und verschiedenen Auslegungen Raum geben. Nach reiflicher Erwägung haben wir uns dahin entschieden, in Übereinstimmung mit der Nomenklaturkommission der „American Ornithologists' Union“ jene aus der griechischen und lateinischen Kunstsprache gebildeten Namen, die nur durch die Geschlechtsendung (wie *Hydrobates*, *Hydrobata*; *Aegolius*, *Aegolia*; *Eremophilus*, *Eremophila*) oder durch die lateinische, bezw. griechische Form der Endung (wie *Apus*, *Apos*; *Athene*, *Athena*; *Dendrocopos*, *Dendrocopus*) unterschieden sind, als identisch anzusehen. Dagegen sind Namen, die, obgleich nur in der Geschlechtsendung abweichend, der alten lateinischen, bezw. griechischen Sprache entlehnt sind (wie *Picus* und *Pica*) als Hauptworte verschiedener Etymologie nebeneinander zulässig.

Speziesnamen.

Die ternäre Nomenklatur zur Bezeichnung geographischer Repräsentativformen eines zusammengehörigen Formenkreises ist heute so allgemein eingebürgert, daß ihre Anwendung im „Nomenclator“ keiner weiteren Erklärung bedarf. Konsequenterweise ist auch die Nominatform, d. h. die zuerst beschriebene, ternär zu benennen, z. B. *Corvus corax corax*. Kombinationen wie *Coccothraustes coccothraustes coccothraustes*, *Buteo buteo buteo*, *Ciconia ciconia ciconia* etc. sind ja gerade nicht schön, aber logisch und unanfechtbar.

Zur Erläuterung der ersten Abschnitte des „Nomenclators“ diene Folgendes. Wird eine Spezies heute in eine andere Gattung gestellt als jene, welcher der Beschreiber sie ursprünglich zugewiesen hatte, so wird der Name des Autors in Klammern gesetzt.

Beim Zitat der Originalbeschreibung gaben wir stets den Fundort, die „terra typica“, welche dem Beschreiber die Vorlagen (Typen) geliefert hatte. In vielen Fällen begründeten ältere Schrift-

steller, wie Linnaeus, Gmelin etc. ihre neuen Formen nicht auf von ihnen selbst untersuchte Exemplare, sondern schöpften aus anderen Quellen, die wir durch Vorsetzen eines „ex“ innerhalb der Klammer kenntlich gemacht haben.

Wenn in Bayern eine andere als die Nominatform (auch „typische“ Form genannt) heimisch ist, ließen wir der Vollständigkeit wegen das Zitat der letzteren in eckiger Klammer der Originalbeschreibung unserer Form vorangehen.

A. Laubmann.

C. E. Hellmayr.

I. Verzeichnis der mit Sicherheit im Königreich Bayern festgestellten Vogelarten.

Corvidae.

1. **Corvus corax corax** L. — Kolkrabe.
Corvus Corax Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 105 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
2. **Corvus cornix cornix** L. — Nebelkrähe.
Corvus Cornix Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 105 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
3. **Corvus corone corone** L. — Rabenkrähe.
Corvus Corone Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 105 (1758. — „Europa“; terra typica: England).
4. **Corvus frugilegus frugilegus** L. — Saatkrähe.
Corvus frugilegus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 105 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
5. **Coloeus monedula spermologus** (Vieill.). — Dohle.
[*Corvus Monedula* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 106 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden)].
Corvus spermologus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. 8, p. 40 (1817. — Südfrankreich).
6. **Pica pica pica** (L.). — Elster.
Corvus Pica Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 106 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
7. **Nucifraga caryocatactes caryocatactes** (L.). — Tannenhäher.
Corvus Caryocatactes Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 106 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
8. **Nucifraga caryocatactes macrorhynchos** Brehm. — Sibirischer Tannenhäher.
Nucifraga macrorhynchos Brehm, Lehrbuch Naturg. europ. Vögel 1, p. 103 (1823. — „Gebirgswälder des mittleren und nordöstlichen Europa und Nordasiens“).
9. **Garrulus glandarius glandarius** (L.). — Eichelhäher.
Corvus glandarius Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 106 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

10. **Pyrrhocorax graculus** (L.). — Alpendohle.

Corvus Graculus Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 158 (1766.
— Schweiz).¹⁾

Sturnidae.

11. **Sturnus vulgaris vulgaris** L. — Star.

Sturnus vulgaris Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 167 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).

12. **Pastor roseus** (L.). — Rosenstar.

Turdus roseus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 170 (1758. —
Lappland und Schweiz).

Oriolidae.

13. **Oriolus oriolus oriolus** (L.). — Pirol.

Coracias Oriolus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 107 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).

Fringillidae.

14. **Coccothraustes coccothraustes coccothraustes** (L.). — Kirsch-
kernbeißer.

Loxia Coccothraustes Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 171 (1758.
— „Südeuropa“; terra typica: Italien).

15. **Chloris chloris chloris** (L.). — Grünfink.

Loxia Chloris Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 174 (1758. —
„Europa“; terra typica: Schweden).

16. **Carduelis²⁾ carduelis carduelis** (L.). — Stieglitz.

Fringilla Carduelis Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 180 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).

17. **Acanthis cannabina cannabina** (L.). — Bluthänfling.

Fringilla cannabina Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 182 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).

18. **Acanthis flavirostris flavirostris** (L.). — Berghänfling.

Fringilla flavirostris Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 182 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).

¹⁾ Die in der Literatur hie und da gemachten Angaben über das Vorkommen der Alpenkrähe (*Pyrrhocorax pyrrhocorax* (L.) 1758) in Bayern sind ganz zweifelhafter Natur und beruhen wohl in allen Fällen auf einer Verwechslung mit der Alpendohle. Belegstücke existieren nicht.

²⁾ Wir können uns mit der von Hartert (Vögel pal. Fauna 1, p. 65, 66) vorgeschlagenen Vereinigung der Gattungen *Acanthis*, *Carduelis*, *Spinus* und *Chloroptila* nicht einverstanden erklären, sondern sehen uns auf Grund unserer sorgfältigen Untersuchungen veranlaßt, diese vier Gattungen auch weiterhin getrennt beizubehalten.

19. **Acanthis linaria linaria** (L.). — Leinfink.
Fringilla Linaria Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 182 (1758.
 „Europa“; terra typica: Schweden).
20. **Acanthis linaria holboellii** (Brehm). — Nordischer Leinfink.
Linaria Holboellii Brehm, Handbuch Naturg. Vögel Deutschl.
 p. 280 (1831. — Deutschland).
21. **Acanthis linaria cabaret** (P. L. S. Müller). — Alpenleinfink.
Fringilla Cabaret P. L. S. Müller, Natursystem, Suppl., p. 165
 (1776. — „Europa“; terra typica: Frankreich).
22. **Spinus spinus** (L.). — Erlenzeisig.
Fringilla Spinus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 181 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Schweden).
23. **Chloroptila citrinella citrinella** (L.). — Zitronenzeisig¹⁾.
Fringilla Citrinella Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 320 (1766.
 — „Südeuropa“; terra typica: Alpen).
24. **Serinus canarius germanicus** Laubm. — Girlitz.
 [*Fringilla Canaria* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 181 (1758.
 — Canarische Inseln)].
Serinus canarius germanicus Laubmann, Verh. Ornith. Ge-
 sellschaft Bayern 11, III, p. 194 (1913. — Weisenau bei
 Mainz).
25. **Pyrrhula pyrrhula pyrrhula** (L.). — Großer Gimpel.
Loxia Pyrrhula Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 171 (1758. —
 „Europa“; terra typica: Schweden).
26. **Pyrrhula pyrrhula europaea** Vieill. — Kleiner Gimpel.
Pyrrhula europaea Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. 4, p. 286
 (1816. — „Europa“; terra typica: Frankreich).
27. **Loxia curvirostra curvirostra** L. — Fichtenkreuzschnabel.
Loxia Curvirostra Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 171 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Schweden).
28. **Loxia pytyopsittacus** Borkh. — Kiefernkreuzschnabel.
Loxia Pytyopsittacus Borkhausen, Rheinisches Magazin 1,
 p. 139 (1793. — terra typica subst.: Schweden).
29. **Loxia leucoptera bifasciata** (Brehm). — Weißbindenkreuz-
 schnabel.
 [*Loxia leucoptera* Gmelin, Syst. Nat. 1, II, p. 844 (1789. — „in
 sinu Hudsonis et Noveboraco“.)].
Crucirostra bifasciata Brehm, Ornith., 3, p. 85 (1827. — Thüringen).

¹⁾ Der Zitronfink steht nach seinen Charakteren zwischen den Gattungen *Spinus* und *Acanthis* in der Mitte. Er nähert sich in der Schnabelform mehr den Leinfinken, mit denen er auch die Proportionen von Flügel und Schwanz

30. **Pinicola enucleator enucleator** (L.). — Hakengimpel.
Loxia Enucleator Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 171 (1758.
 — „Norden von Schweden und Amerika“; terra typica:
 Schweden).
31. **Fringilla coelebs coelebs** L. — Buchfink.
Fringilla coelebs Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 179 (1758. —
 „Europa“; terra typica: Schweden).
32. **Fringilla montifringilla** L. — Bergfink.
Fringilla Montifringilla Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 179
 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
33. **Montifringilla nivalis nivalis** (L.). — Schneefink.
Fringilla nivalis Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 321 (1766.
 — „Amerika“; errore!; terra typica subst.: Schweiz).
34. **Petronia petronia petronia** (L.). — Steinsperling.
Fringilla Petronia Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 322 (1766.
 — „Europa“; terra typica: Norditalien).
35. **Passer domesticus domesticus** (L.). — Haussperling.
Fringilla domestica Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 183 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Schweden).
36. **Passer montanus montanus** (L.). — Feldsperling.
Fringilla montana Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 183 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Norditalien).
37. **Emberiza calandra calandra** L. — Grauammer.
Emberiza Calandra Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 176 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Schweden).
38. **Emberiza citrinella sylvestris** Brehm¹⁾. — Goldammer.
 [*Emberiza Citrinella* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 177 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Schweden)].
Emberiza sylvestris Brehm, Handbuch Naturg. Vögel Deutschl.
 p. 294 (1831. — „Nur in Nadelwäldern“; terra typica:
 Thüringen).
39. **Emberiza hortulana** L. — Gartenammer.
Emberiza Hortulana Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 177
 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

teilt. Dagegen hat er die geringe Ausdehnung der polsterartigen Befiederung der Nasenlöcher sowie den allgemeinen Färbungscharakter mit dem Erlenzeisig gemein. Auch in biologischer Hinsicht steht er letzterer Art näher.

¹⁾ Vgl. hierzu die Arbeiten von Gengler in Ornith. Jahrbuch 24, 1913, p. 88—92; l. c. 25, 1914, p. 27—30.

40. **Emberiza cia cia** L. — Zippammer.
Emberiza Cia Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 310 (1766. — „Südeuropa“; terra typica: Oberösterreich).
41. **Emberiza cirrus** L. — Zaunammer.
Emberiza Cirrus Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 311 (1766. — „Südeuropa“).
42. **Emberiza schoeniclus schoeniclus** L. — Rohrammer.
Emberiza Schoeniclus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 182 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
43. **Plectrophenax nivalis nivalis** (L.). — Schneeammer.
Emberiza nivalis Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 176 (1758. — Lappland).
44. **Calcarius lapponicus lapponicus** (L.). — Spornammer.
Fringilla lapponica Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 180 (1758. — Lappland).

Alaudidae.

45. **Galerida cristata cristata** (L.). — Haubenlerche.
Alauda cristata Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 166 (1758. — „Europa“; terra typica: Wien).
46. **Lullula arborea arborea** (L.). — Heidelerche.
Alauda arborea Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 166 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
47. **Alauda arvensis arvensis** L. — Feldlerche.
Alauda arvensis Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 165 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
48. **Otocoris¹⁾ alpestris flava** (Gm.). — Alpenlerche.
[*Alauda alpestris* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 166 (1758. — Carolina)].
Alauda flava Gmelin, Syst. Nat. 1, II, p. 800 (1789. — Sibirien).

Motacillidae.

49. **Anthus campestris campestris** (L.). — Brachpieper.
Alauda campestris Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 166 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
50. **Anthus trivialis trivialis** (L.). — Baumpieper.
Alauda trivialis Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 166 (1758. — Schweden).

¹⁾ Die ursprüngliche Schreibweise bei Bonaparte ist *Otocoris* (nicht *Otocorys*).

51. **Anthus pratensis** (L.). — Wiesenpieper.
Alauda pratensis Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 166 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).
52. **Anthus spinoletta spinoletta** (L.). — Wasserpieper.
Alauda Spinoletta Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 166 (1758.
— Italien).
53. **Anthus cervinus** (Pall.). — Rotkehliger Pieper.
Motacilla Cervina Pallas, Zoogr. Rosso.-Asiat. 1, p. 511 (1827.
— Kolyma-Fluß, Sibirien).
54. **Anthus richardi richardi** Vieill. — Spornpieper.
Anthus Richardi Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. 26, p. 491
(1818. — Frankreich).
55. **Motacilla flava flava** L. — Schafstelze.
Motacilla flava Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 185 (1758. —
„Europa“; terra typica: Südschweden).
56. **Motacilla flava thunbergi** Billb.¹⁾ — Nordische Schafstelze.
Motacilla Thunbergi Billberg, Synopsis Faun. Scand. 1, II,
p. 50 (1828. — Lappland).
57. **Motacilla cinerea cinerea** Tunst.²⁾ — Gebirgsbachstelze.
Motacilla Cinerea Tunstall, Ornith. Brit. p. 2 (1771. — be-
gründet auf Pennant's „Grey Water Wagtail“ und Brisson's
„La Bergeronette jaune“; als terra typ. nehmen wir
England [ex Pennant] an)³⁾.
58. **Motacilla alba alba** L. — Weiße Bachstelze.
Motacilla alba Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 185 (1758. —
„Europa“; terra typica: Schweden).

Certhiidae.

59. **Certhia familiaris macrodactyla** Brehm⁴⁾. — Waldbaumläufer.
Certhia macrodactyla Brehm, Handbuch Naturg. Vögel Deutsch-
lands p. 208 (1831. — „Bewohnt die Nadelwälder, im

¹⁾ Billberg's Name hat um vierzehn Jahre die Priorität über die übliche Bezeichnung *Motacilla borealis* Sundevall, die erst 1842 veröffentlicht wurde.

²⁾ Für die Gebirgsstelze war bisher der Name *Motacilla boarula* gebräuchlich, der Linnaeus 1771 zugeschrieben wurde. Der erste Autor, der diese Bezeichnung einführte, war jedoch Scopoli (Ann. I. Hist. Nat., 1769, p. 154: ex Aldrovandi, Klein etc.), der als *M. boarula* zweifellos die Schafstelze beschrieb, wie in Brit. Birds IX, 1915 p. 3 ganz zutreffend ausgeführt ist. *M. boarula* Scop. 1769 wird somit ein Synonym von *M. f. flava* Linn. 1758, während für die Gebirgsbachstelze der nächstältere Speziesname in Kraft tritt.

³⁾ Nach Opinion 38 der Internat. Nomenclatur Commission sind die durch den Hinweis auf Pennant's und Brisson's Trivialnamen identifizierbaren Speziesbezeichnungen in Tunstall's Ornithologia Britannica nomenklatorisch gültig

⁴⁾ Die Waldbaumläufer der Rheinpfalz und der südbayerischen Gebirge sind noch sorgfältig zu untersuchen. Möglicherweise gehören die ersteren einer

Sommer selten im mittleren Deutschland, häufiger im Herbst und Winter“).

60. **Certhia brachydactyla brachydactyla** Brehm. — Gartenbaumläufer.

Certhia brachydactyla Brehm, Beitr. zur Vögelkunde 1, p. 570 (1820. — Rodatal, Thüringen).

61. **Tichodroma muraria** (L.). — Alpenmauerläufer.

Certhia muraria Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 184 (1766. — Südeuropa).

Sittidae.

62. **Sitta europaea caesia** Wolf. — Kleiber.

[*Sitta europaea* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 115 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden)].

Sitta caesia Wolf in: Meyer und Wolf, Taschenbuch deutscher Vögelkunde: I, p. 128 tab. (1810. — „in verschiedenen Gegenden Deutschlands, z. B. Thüringen, Franken, der Wetterau, Bayern u. s. w.“; wir fixiren als terra typica die Gegend von Nürnberg in Mittelfranken).

Paridae.

63. **Parus major major** L. — Kohlmeise.

Parus major Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 189 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

64. **Parus caeruleus caeruleus** L. — Blaumeise.

Parus caeruleus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 190 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

65. **Parus ater ater** L. — Tannenmeise.

Parus ater Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 190 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

66. **Parus cristatus mitratus** Brehm. — Haubenmeise.

[*Parus cristatus* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 189 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden)].

Parus mitratus Brehm, Handbuch Naturg. Vögel Deutschl. p. 467 (1831. — „Deutsche Schwarzwälder“).

67. **Parus palustris communis** Baldenst. — Nonnenmeise.

[*Parus palustris* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 190 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden)].

besonderen Form an, für welche der Name *Certhia rhenana* Kleinschmidt (Ornith. Monatsber. 8, 1900 p. 169: „Am Rhein“) zur Verfügung stünde, wogegen letztere zu *Certhia familiaris costa* Bailly 1847 gehören könnten, welche nach Ingram (Ibis, 1913, p. 548—550) nordwärts bis Vorarlberg verbreitet ist.

Parus cinereus communis Baldenstein, Neue Alpina 2, p. 31 (1827. — „Überall in unsern Tälern“; terra typica: Graubünden).

68. **Parus palustris longirostris** Kleinschmidt. — Rheinische Nonnenmeise.

Parus dresseri longirostris Kleinschmidt, Orn. Jahrbuch 8, p. 65 (1897. — „Frankreich und Rheingegend“; terra typica: Latour).

69. **Parus atricapillus submontanus** Kleinschmidt & Tschusi. — Süddeutsche Weidenmeise.

[*Parus atricapillus* Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 341 (1766. — Canada)].

Parus salicarius submontanus Kleinschmidt & Tschusi, Falco 9, p. 33 (1913. — Gmunden, Oberösterreich).

70. **Parus atricapillus rhenanus** Kleinschm. — Rheinische Weidenmeise.

Parus rhenanus Kleinschmidt, Ornith. Monatsber. 8, p. 168 (1900. — „Rhein“; terra typica: Rhein-Ufer zwischen Mainz und Worms).

71. **Aegithalos caudatus europaeus** (Herm.). — Schwanzmeise.

[*Parus caudatus* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 190 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden)].

Pipra? europaea J. Hermann, Observ. Zoolog. p. 214 (1804. — Basel).

72. **Panurus biarmicus biarmicus** (L.). — Bartmeise.

Parus biarmicus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 190 (1758. — „Europa“; terra typica: Dänemark).

Regulidae.

73. **Regulus regulus regulus** (L.). — Wintergoldhähnchen.

Motacilla Regulus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 188 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

74. **Regulus ignicapillus ignicapillus** (Temm.). — Sommergoldhähnchen.

Sylvia ignicapilla Temminck, Man. d'Orn., 2. ed., 1, p. 231 (1820. — Frankreich).

Laniidae.

75. **Lanius minor** Gm. — Schwarzstirn-Würger.

Lanius minor Gmelin, Syst. Nat. 1, I, p. 308 (1788. — Italien).

76. **Lanius excubitor excubitor** L. — Raubwürger.

Lanius Excubitor Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 94 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

77. **Lanius senator senator** L. — Rotkopfwürger.

Lanius Senator Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 94 (1758. — „Habitat in Indiis“; terra typica: Rhein)¹⁾.

78. **Lanius collurio collurio** L. — Rotrückiger Würger.

Lanius Collurio Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 94 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

Bombycillidae.

79. **Bombycilla garrulus garrulus** (L.). — Seidenschwanz.

Lanius Garrulus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 95 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

Muscicapidae.

80. **Muscicapa ficedula ficedula** (L.). — Grauer Fliegenschnäpper²⁾.

Motacilla Ficedula Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 185 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

81. **Muscicapa hypoleuca hypoleuca** (Pall.). — Trauerfliegenschnäpper.

Motacilla hypoleuca Pallas in: Vroeg, Cat. Coll. d'Ois., Adumbratiuncula p. 3 (1764. — Holland).

82. **Muscicapa collaris** Bechst. — Halsbandfliegenschnäpper.

Muscicapa collaris Bechstein, Latham's Allg. Übers. Vög. 2, I, p. 317 (1794. — Deutschland, Thüringer Wald).

83. **Erythroster³⁾na parva parva** (Bechst.). — Zwergfliegenschnäpper.

Muscicapa parva Bechstein, Latham's Allg. Übers. Vög. 2, I, p. 356 (1794. — Thüringer Wald).

Sylviidae.

84. **Phylloscopus collybita collybita** (Vieill.). — Weidenlaubsänger.

Sylvia collybita Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. 11, p. 235 (1817. — Frankreich).

¹⁾ Vgl. Hartert, Vögel pal. Fauna 1, p. 434.

²⁾ Der älteste Name für den grauen Fliegenschnäpper, der vielfach *M. striata* (Pall.) 1764 oder *M. grisola* Linn. 1766 genannt wird, ist, wie Lönnberg (Journ. f. Ornith. 1906, p. 529) ausgeführt hat, ohne Zweifel der oben angewandte.

³⁾ Die generische Trennung des Zwergfliegenschnäppers scheint aus morphologischen und biologischen Gründen vollkommen gerechtfertigt. Conf. Stresemann, Nov. Zool. 19, 1912 p. 325.

85. **Phylloscopus trochilus trochilus** (L.)¹⁾. — Fitis-Laubsänger.
Motacilla Trochilus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 188 (1758.
— England).
86. **Phylloscopus bonelli bonelli** (Vieill.). — Berglaubsänger.
Sylvia Bonelli Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. 28, p. 91 (1819.
— Piémont).
87. **Phylloscopus sibilatrix sibilatrix** (Bechst.). — Waldlaub-
sänger.
Motacilla Sibilatrix Bechstein, Naturforscher 27, p. 47 (1793.
— Berge Thüringens).
88. **Locustella naevia naevia** (Bodd.). — Heuschreckensänger.
Motacilla naevia Boddaert, Tabl. Pl. Enl. p. 35 (1783. —
Italien).
89. **Locustella fluviatilis** (Wolf). — Flußrohrsänger.
Sylvia fluviatilis Wolf in: Meyer und Wolf, Taschenbuch d.
deutschen Vögelkunde I, p. 299 (1810. — Ufer der Donau
in Österreich).
90. **Acrocephalus arundinaceus arundinaceus** (L.). — Drossel-
rohrsänger.
Turdus arundinaceus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 170 (1758.
— „Europa“; terra typica: Umgebung von Danzig).
91. **Acrocephalus streperus streperus** (Vieill.). — Teichrohrsänger.
Sylvia strepera Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. 11, p. 182
(1817. — Frankreich).
92. **Acrocephalus palustris** (Bechst.). — Sumpfrohrsänger.
Sylvia palustris Bechstein, Orn. Taschenbuch I, p. 186 (1802.
— Deutschland).
93. **Acrocephalus schoenobaenus** (L.). — Schilfrohrsänger.
Motacilla Schoenobaenus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 184
(1758. — „Europa“; terra typica: Südschweden).
94. **Acrocephalus aquaticus** (Gm.). — Wasserrohrsänger.
Motacilla aquatica Gmelin, Syst. Nat. 1, II, p. 953 (1789. —
Kärnten; Venetien).
95. **Hypolais icterina** (Vieill.). — Gartenspötter.
Sylvia icterina Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. 11, p. 194
(1817. — Nancy, Frankreich).

¹⁾ Kleinschmidt (Singvögel der Heimat, 1913, p. 69) verwirft obigen Namen zugunsten von *Motacilla Acredula* Linnaeus (Syst. Nat. 10, I, p. 189, 1758). Nach eingehender Untersuchung der Frage scheint uns die Beschreibung Willughbys, auf die sich Linnés *M. trochilus* hauptsächlich gründet, mit

96. **Sylvia nisoria nisoria** (Bechst.). — Sperbergrasmücke.
Motacilla nisoria Bechstein, Gem. Naturg. Deutschl. 4, p. 580
 (1795. — „Das mittlere und nördliche Deutschland“).
97. **Sylvia hippolais hippolais** (L.)¹⁾. — Gartengrasmücke.
Motacilla Hippolais Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 185 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Genua).
98. **Sylvia atricapilla atricapilla** (L.). — Schwarzplättchen.
Motacilla Atricapilla Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 187 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Schweden).
99. **Sylvia communis communis** Lath. — Dorngrasmücke.
Sylvia Communis Latham, Gen. Syn. Birds, Suppl. 1, p. 287
 (1787. — ex „White-throat“ Latham, Gen. Syn. Birds,
 2, II, p. 428: England).
100. **Sylvia curruca curruca** (L.). — Zaungrasmücke.
Motacilla Curruca Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 184 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Schweden).
101. **Turdus pilaris** L. — Wachholderdrossel.
Turdus pilaris Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 168 (1758. —
 „Europa“; terra typica: Schweden).
102. **Turdus viscivorus viscivorus** L. — Misteldrossel.
Turdus viscivorus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 168 (1758.
 — „Europa“; terra typica: England).
103. **Turdus philomelos philomelos** Brehm. — Singdrossel.
Turdus philomelos Brehm, Handbuch Naturg. Vögel Deutschl.
 p. 382 (1831. — Mitteldeutschland).
104. **Turdus musicus** L. — Weindrossel.
Turdus musicus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 169 (1758. —
 „Europa“; terra typica: Schweden).

ziemlicher Sicherheit den Fitislaubsänger erkennen zu lassen, so daß eine Änderung des allgemein eingebürgerten Namens nicht angebracht sein dürfte.

¹⁾ Kleinschmidt (Singvögel der Heimat, 1913, p. 57) nimmt für die Gartengrasmücke diesen Namen als die älteste Bezeichnung in Anspruch. Linnés Diagnose ist allerdings recht schlecht, der Autor scheint aber den Vogel selbst gar nicht gekannt, sondern lediglich aus Aldrovandi und Rajus geschöpft zu haben. Beschreibung und Abbildung bei Aldrovandi können ohne Schwierigkeit auf die Gartengrasmücke bezogen werden, und der von ihm erwähnte Genueser Trivialname „Beccafico“ ist die heute noch in Italien gebräuchliche Bezeichnung für unsere Art. Auch die Darstellung bei Rajus, die sich ebenfalls wieder auf Aldrovandi gründet, gehört augenscheinlich hierher, wenn auch der Ausdruck „ex fusco viridis“ für den olivenfarbigen Ton der Oberseite der Gartengrasmücke reichlich übertrieben erscheinen mag. Es ist daher unvermeidlich, den in neuerer Zeit gebrauchten Artnamen *Sylvia borin* Boddaert 1783 durch die ältere Bezeichnung *Sylvia hippolais* Linnaeus 1758 zu ersetzen.

105. **Turdus torquatus torquatus** L. — Nordische Ringdrossel.
Turdus torquatus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 170 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).
106. **Turdus torquatus alpestris** (Brehm). — Alpenringdrossel.
Merula alpestris Brehm, Handb. Naturg. Vögel Deutschl.
p. 377 (1831. — Alpen Tirols).
107. **Turdus naumanni** Temm. — Naumanns Drossel.
Turdus naumanni Temminck, Man. d'Orn., 2. ed., 1, p. 170
(1820. — „Les parties orientales; se montre en Silésie et
en Autriche; plus commun en Hongrie“).
108. **Turdus ruficollis atrogularis** Temm. — Schwarzkehlige
Drossel.
[*Turdus ruficollis* Pallas, Reise verschied. Prov. russ. Reichs 3,
p. 694 (1776. — „Hab. in summis jugis Daouriae larycete
obsitis“)].
Turdus atrogularis Temminck, Man. d'Orn., 2. ed., 1, p. 169
(1820. — Österreich; Schlesien).
109. **Planesticus merula merula** (L.). — Amsel.
Turdus Merula Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 170 (1758. —
„Europa“; terra typica: Schweden).
110. **Hylocichla guttata pallasii** (Cab.). — Pallas'sche Drossel.
[*Muscicapa guttata* Pallas, Zoogr. Rosso.-Asiat. 1, p. 465 (1826.
— Alaska)].
Turdus Pallasii Cabanis, Archiv Naturg. 13, 1, p. 205 (1847.
— Östliches Nordamerika).
111. **Monticola saxatilis** (L.). — Steinrötel.
Turdus saxatilis Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 294 (1766. —
Schweiz).
112. **Oenanthe oenanthe grisea** (Brehm)¹⁾. — Steinschmätzer.
[*Motacilla Oenanthe* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 186 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden)].
Vitiflora grisea Brehm, Handb. Naturg. Vögel Deutschl. p. 405
(1831. — Mittleres Deutschland).
113. **Saxicola rubetra rubetra** (L.). — Braunkehlchen.
Motacilla Rubetra Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 186 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).

¹⁾ Wie schon Kleinschmidt (Singvögel der Heimat, 1913, p. 39) ausführt, sind die nordeuropäischen Brutvögel konstant größer, weshalb die Sonderung der mittel- und südeuropäischen Vertreter als eigene Rasse geboten erscheint. Es ist nicht ausgeschlossen, daß *Oenanthe oenanthe oenanthe*, die in Skandinavien und in den Ostseeprovinzen brütet, auf dem Durchzug Bayern berührt.

114. **Saxicola torquata rubicola** (L.). — Schwarzkehlchen.
 [*Muscicapa torquata* Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 328 (1766.
 — Cap der guten Hoffnung)].
Motacilla Rubicola Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 332 (1766.
 — „Europa“; terra typica: Schweden).
115. **Phoenicurus phoenicurus phoenicurus** (L.). — Gartenrotschwanz.
Motacilla Phoenicurus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 187
 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
116. **Phoenicurus ochruros gibraltariensis** (Gm.). — Hausrotschwanz.
 [*Motacilla Ochruros* S. G. Gmelin, Reise d. Rußland, 3, p. 101
 (1774. — Persische Gebirge)].
Motacilla gibraltariensis Gmelin, Syst. Nat. 1, II, p. 987 (1789.
 — Gibraltar).
117. **Luscinia megarhynchos megarhynchos** Brehm. — Nachtigall.
Luscinia megarhynchos Brehm, Handb. Naturg. Vögel Deutschl.
 p. 356 (1831. — Deutschland).
118. **Luscinia luscinia** (L.). — Sprosser.
Motacilla Luscinia Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 184 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Schweden).
119. **Luscinia svecica cyanecula** (Wolf). — Blaukehlchen.
 [*Motacilla svecica* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 187 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Schweden)].
Sylvia cyanecula Wolf in: Meyer und Wolf, Taschenbuch
 deutsch. Vögelkunde, I, p. 240 (1810. — „Im Anhaltischen,
 in Thüringen, Franken, der Wetterau“).
120. **Erithacus rubecula rubecula** (L.). — Rotkehlchen.
Motacilla Rubecula Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 188 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Schweden).

Prunellidae.

121. **Prunella collaris collaris** (Scop.). — Alpenbraunelle.
Sturnus collaris Scopoli, Annus I. Hist. Nat. p. 131 (1769.
 — Kärnten).
122. **Prunella modularis modularis** (L.). — Heckenbraunelle.
Motacilla modularis Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 184 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Schweden).

Troglodytidae.

123. **Troglodytes troglodytes troglodytes** (L.). — Zaunkönig.
Motacilla Troglodytes Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 188 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Schweden).

124. **Cinclus cinclus medius** Brehm¹⁾. — Wasserschwätzer.
 [*Sturnus Cinclus* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 168 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Schweden)].
Cinclus medius Brehm, Handb. Naturg. Vögel Deutschl. p. 395
 (1831. — Thüringer Wald).
125. **Cinclus cinclus meridionalis** Brehm. — Südeuropäischer
 Wasserschwätzer.
Cinclus meridionalis Brehm, Naumannia 6, p. 186 (1856. —
 Kärnten).
126. **Cinclus cinclus tschusii** Kleinschm. & Hilgert²⁾. — Rheini-
 scher Wasserschwätzer.
Cinclus cinclus tschusii Kleinschmidt und Hilgert, Falco 3,
 p. 104 (1907. — Rheingegenden).

Hirundinidae.

127. **Hirundo rustica rustica** L. — Rauchschwalbe.
Hirundo rustica Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 191 (1758. —
 „Europa“; terra typica: Schweden).
128. **Delichon urbica urbica** (L.). — Mehlschwalbe.
Hirundo urbica Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 192 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Schweden).
129. **Riparia riparia riparia** (L.). — Uferschwalbe.
Hirundo riparia Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 192 (1758. —
 „Europa“; terra typica: Schweden).
130. **Riparia rupestris** (Scop.). — Felsenschwalbe.
Hirundo rupestris Scopoli, Annus I. Hist. Nat. p. 167 (1769.
 — Tirol).

¹⁾ Die mitteldeutsche Form der Wasseramsel war bisher unter dem Namen *Cinclus cinclus aquaticus* (Bechst.) geführt worden. Der Name wurde zuerst als *Accentor aquaticus* von Bechstein in den Getreuen Abbildungen naturhistorischer Gegenstände II, Heft 3, p. 47, tab. 30, 1797 eingeführt. Wie uns Einsichtnahme in dieses seltene Werk lehrt, beabsichtigte Bechstein keineswegs die thüringische Wasseramsel im Gegensatz zu anderen in Deutschland heimischen Formen abzutrennen, sondern sein *Accentor aquaticus* ist lediglich eine Neubenennung von *Sturnus cinclus* Gmelin (er zitiert dazu auch „Merle d'eau“ Buffon und „Water Ouzel“ Latham), welche Bechstein mit folgenden Worten begründet: „Ich möchte diesen Vogel nicht unter die Gattung der Staare setzen, da er in seiner Lebensart, auch in seiner Gestalt so natürlich von jenen Vögeln abweicht. Ich bilde daher eine eigene Gattung aus ihm unter dem lateinischen Namen *Accentor* oder deutschen Wassersänger.“ Infolgedessen ist *Accentor aquaticus* Bechstein als bloßes Synonym von *Cinclus cinclus cinclus* L. aus Nordeuropa zu betrachten, wogegen für die mitteldeutsche Brutform der nächstälteste Name *Cinclus medius* Brehm in Anwendung kommt. Auch *Cinclus hydrophilus* Borkh. 1797 ist lediglich eine Neubenennung des *Sturnus Cinclus* Linn.

²⁾ Untersuchung größeren Materials ist notwendig, um die Verschiedenheit dieser von manchen Autoren bestrittenen Form zu bestätigen.

Micropodidae.

131. **Micropus melba melba** (L.). — Alpensegler.

Hirundo Melba Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 192 (1758. — Gibraltar).

132. **Micropus apus apus** (L.). — Mauersegler.

Hirundo Apus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 192 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

Caprimulgidae.

133. **Caprimulgus europaeus europaeus** L. — Nachtschwalbe.

Caprimulgus europaeus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 193 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

Meropidae.

134. **Merops apiaster** L. — Bienenfresser.

Merops Apiaster Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 117 (1758. — „In Europa australi“).

Upupidae.

135. **Upupa epops epops** L. — Wiedehopf.

Upupa Epops Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 117 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

Coraciidae.

136. **Coracias garrulus garrulus** L. — Blaurake.

Coracias Garrulus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 107 (1758. — „Europa“; terra typica: Südschweden).

Alcedinidae.

137. **Alcedo atthis ispida** L. — Eisvogel.

[*Gracula Atthis* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 109 (1758. — ex *Corvus aegyptius*: Hasselquist, Iter Palaestinum, 1757, p. 240: Ägypten)].

Alcedo Ispida Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 115 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

Cuculidae.

138. **Cuculus canorus canorus** L. — Kuckuck.

Cuculus canorus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 110 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

Picidae.

139. ***Picus viridis pinetorum*** (Brehm). — Grünspecht.
[*Picus viridis* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 113 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden)].
Gecinus pinetorum Brehm, Handb. Naturg. Vögel Deutschl. p. 197 (1831. — „Bewohnt die deutschen Fichtenwälder“).
140. ***Picus canus canus*** Gm.¹⁾. — Grauspecht.
Picus canus Gmelin, Syst. Nat. 1, I, p. 434 (1788. — Norwegen).
141. ***Dryobates major pinetorum*** (Brehm). — Großer Buntspecht.
[*Picus major* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 114 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden)].
Picus pinetorum Brehm, Handb. Naturg. Vögel Deutschl. p. 187 (1831. — Deutschland).
142. ***Dryobates leucotos leucotos*** (Bechst.) — Weißrückenspecht.
Picus leucotos Bechstein, Orn. Taschenbuch, 1, p. 66 (1802. — Schlesien, im Winter).
143. ***Dryobates minor hortorum*** (Brehm). — Zwergspecht.
[*Picus minor* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 114 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden)].
Picus hortorum Brehm, Handb. Naturg. Vögel Deutschl. p. 192 (1831. — Deutschland; Gegend von Renthendorf, Thüringen).
144. ***Dryobates medius medius*** (L.). — Mittelspecht.
Picus medius Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 114 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
145. ***Picoides tridactylus alpinus*** Brehm. — Dreizehenspecht.
[*Picus tridactylus* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 114 (1758. — Schweden)].
Picoides alpinus Brehm, Handb. Naturg. Vögel Deutschl. p. 194 (1831. — Schweiz).
146. ***Dryocopus martius martius*** (L.). — Schwarzspecht.
Picus martius Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 112 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
147. ***Jynx torquilla torquilla*** L. — Wendehals.
Jynx Torquilla Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 112 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

¹⁾ Die Beziehungen zwischen den typischen, skandinavischen Bewohnern und den mitteleuropäischen Grauspechten sind noch nicht zur vollständigen Zufriedenheit klargestellt. Die Untersuchung umfangreichen Materiales muß erst zeigen, ob wir es in Europa nur mit einer oder mit mehreren Formen zu tun haben.

Strigidae.

148. **Bubo bubo bubo** (L.). — Uhu.
Strix Bubo Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 92 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
149. **Otus scops scops** (L.). — Zwergohreule.
Strix Scops Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 92 (1758. — „Europa“; terra typica: Italien).
150. **Asio otus otus** (L.). — Waldohreule.
Strix Otus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 92 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
151. **Asio flammeus flammeus** (Pontopp.). — Sumpfohreule.
Strix flammea Pontoppidan, Danske Atlas 1, p. 617 (1763. — Dänemark).
152. **Cryptoglaux funerea funerea** (L.)¹⁾. — Rauhfußkauz.
Strix funerea Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 93 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
153. **Carine noctua noctua** (Scop.). — Steinkauz.
Strix noctua Scopoli, Annus I. Hist. Nat. p. 22 (1769. — Krain).
154. **Glaucidium passerinum passerinum** (L.). — Sperlingskauz.
Strix passerina Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 93 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
155. **Surnia ulula ulula** (L.). — Sperbereule.
Strix Ulula Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 93 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
156. **Strix uralensis uralensis** Pall. — Uralkauz.
Strix uralensis Pallas, Reise d. versch. Prov. russ. Reiches I, p. 455 (1771. — Ural).
157. **Strix aluco aluco** L. — Waldkauz.
Strix Aluco Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 93 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
158. **Tyto alba guttata** (Brehm). — Schleiereule.
[*Strix alba* Scopoli, Annus I. Hist. Nat. p. 21 (1769. — Friaul, N.-Italien)].
Strix guttata Brehm, Handb. Naturg. Vögel Deutschl. p. 107 (1831. — Rügen).

¹⁾ Wie Lönnberg (Ibis, 1913, p. 398—400) ausgeführt hat, ist *S. funerea* Linn. ein älterer Name für *S. tengmalmi* Gm. 1788.

159. **Nyctea nyctea** (L.). — Schneeeule.

Strix Nyctea Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 93 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

Falconidae.

160. **Falco peregrinus peregrinus** Tunst. — Wanderfalke.

Falco Peregrinus Tunstall, Ornithologia Britannica, p. 1 (1771. — ex Pennant's „Peregrine Faulcon“: Wales).

161. **Falco peregrinus calidus** Lath. — Östlicher Wanderfalke.

Falco calidus Latham, Ind. Orn. I, p. 41 (1790. — Indien).

162. **Falco cherrug cherrug** J. E. Gray. — Würgfalke.

Falco cherrug J. E. Gray in: Hardwicke, Ill. Ind. Zool. 2, Taf. 25 (1833—1834. — Indien).

163. **Falco subbuteo subbuteo** L. — Baumfalke.

Falco Subbuteo Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 89 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

164. **Falco columbarius aesalon** Tunst.¹⁾ — Merlinfalke.

[*Falco columbarius* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 90 (1758. — Amerika)].

Falco Aesalon Tunstall, Ornith. Brit. p. 1 (1771. — ex „L'Emerillon“, Brisson, Ornith. I, 1760, p. 382: ohne Fundort. Als terra typ. ist Frankreich zu betrachten).

165. **Falco vespertinus vespertinus** L. — Abendfalke.

Falco vespertinus Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 129 (1766. — „Ingria“ = Prov. Petersburg).

166. **Falco naumanni naumanni** Fleisch. — Rötelfalke.

Falco Naumanni Fleischer in: Sylvan, ein Jahrbuch für Forstmänner, u. s. w. auf die Jahre 1817 und 1818, p. 174 (1818. — „spärlicher Gast im südl. Deutschland und Schweiz“).

167. **Falco tinnunculus tinnunculus** L. — Turmfalke.

Falco Tinnunculus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 90 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

168. **Aquila chrysaëtos chrysaëtos** (L.). — Steinadler.

Falco Chrysaëtos Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 88 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

¹⁾ Hartert (Handlist Brit. B. p. 112) verwirft den Namen *aesalon* Tunst. als angebliches nomen nudum. Nach dem Gutachten der Internat. Nomenclatur Commission (Opinion 38, letzter Absatz, p. 90) sind indessen jene Tunstall'schen Speziesnamen, die durch den Hinweis auf die bei Pennant und Brisson vorkommenden englischen, bezw. französischen Trivialnamen identifizierbar sind, als zulässig zu betrachten. Dieser Fall trifft bei *F. aesalon* zu.

169. **Aquila clanga** Pall.¹⁾. — Schelladler.

Aquila Clanga Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat. 1, p. 351 (1827.
— „in Rossia Sibiriaque universa, usque in Camtschatcam“).

170. **Aquila pomarina pomarina** Brehm. — Schreiadler.

Aquila Pomarina Brehm, Handb. Naturg. Vögel Deutschl. p. 27
(1831. — „er lebt in den großen pommerschen Wäldern“).

171. **Hieraaëtus pennatus** (Gm.). — Zwergadler.

Falco pennatus Gmelin, Syst. Nat. 1, I, p. 272 (1788. — ex
Brisson: ohne Fundortsangabe).

172. **Archibuteo lagopus lagopus** (Brünn.). — Rauhußbussard.

Falco lagopus Brünnich, Orn. Bor. p. 4 (1764. — Christiansöe
bei Bornholm, Dänemark).

173. **Buteo buteo buteo** (L.). — Mäusebussard.

Falco Buteo Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 90 (1758. — „in
Europa“; wir fixieren Schweden als terra typica).

174. **Buteo buteo zimmermannae** Ehmcke.

Buteo zimmermannae Ehmcke, Journ. f. Orn. 41, p. 117 (1893.
— Ostpreußen, Kr. Gumbinnen).

175. **Circus aeruginosus aeruginosus** (L.). — Rohrweihe.

Falco aeruginosus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 91 (1758. —
„Europa“; terra typica: Schweden).

176. **Circus cyaneus cyaneus** (L.). — Kornweihe.

Falco cyaneus Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 126 (1766. —
Gegend von London).

177. **Circus pygargus** (L.). — Wiesenweihe.

Falco Pygargus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 89 (1758. —
„Europa“; terra typica: England).

178. **Circus macrourus** (S.G.Gm.). — Steppenweihe.

Accipiter macrourus Gmelin, Nov. Comm. Acad. Petropol. 15,
pro 1770, p. 439 tab. VIII, IX (1771. — „A Woronez
abhinc ad omnem Tanain occurrit“).

¹⁾ *Falco maculatus* Gmelin (Syst. Nat. 1, I, 1788, p. 258), bisher als
Speziesname für den Schelladler verwendet, ist vorweggenommen durch *F. Macu-*
latus Tunstall (Orn. Brit. 1771, p. 1) = *Pernis apivorus* Linn. Deshalb brachte
die neue Ausgabe der List of Brit. Birds 1915 (p. 142, 379) die Bezeichnung
Aquila fusca Brehm 1823 in Vorschlag. Leider ist auch dieser Name durch
Aquila fusca Dumont 1804 präokkupiert, wie Iredale (Ibis, 1915, p. 388) aus-
geführt hat. Der nächste verfügbare ist der oben gebrauchte Name.

179. **Astur gentilis gentilis** (L.)¹⁾. — Habicht.

Falco gentilis Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 89 (1758. — „Habitat in Alpibus“; terra typica: Dalekarlische Alpen in Schweden).

180. **Accipiter nisus nisus** (L.). — Sperber.

Falco Nisus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 92 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

181. **Milvus milvus** (L.). — Roter Milan.

Falco Milvus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 89 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

182. **Milvus migrans migrans** (Bodd.). — Schwarzer Milan.

Falco migrans Boddaert, Tabl. Pl. Enl. p. 28 (1783. — Basiert auf Daubentons Taf. 472, Brisson und Latham. Verschiedene Länder Europas von Buffon angegeben, als terra typica ist Frankreich zu betrachten).

183. **Haliaeetus albicilla** (L.). — Seeadler.

Falco Albicilla Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 89 (1758. — „in Europa“; terra typica: Schweden).

184. **Pernis apivorus apivorus** (L.). — Wespenbussard.

Falco apivorus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 91 (1758. — „in Europa“; terra typica: Schweden).

185. **Circaëtus gallicus** (Gm.). — Schlangenadler.

Falco gallicus Gmelin, Syst. Nat. 1, I, p. 259 (1788. — „in Gallia“ = Frankreich).

186. **Pandion haliaetus haliaetus** (L.). — Fischadler.

Falco Haliaetus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 91 (1758. — „in Europa“; terra typica: Schweden).

*Vulturidae*²⁾.

187. **Gyps fulvus fulvus** (Habl.). — Gänsegeier.

Vultur fulvus Hablizl in: Pallas, Neue Nordische Beiträge 4, p. 58 (1783. — Nordpersien).

¹⁾ Nach den Untersuchungen L. Schiølers (Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 8, 1914, p. 93—112) scheint es nicht ausgeschlossen, daß die Habichte, die von Dänemark südwärts vorkommen, subspezifisch verschieden seien von *A. g. gentilis* aus Skandinavien. In diesem Falle müßten unsere Brutvögel den Namen *A. gentilis gallinarum* Brehm 1831 führen. Weitere Studien sind zur endgültigen Klärung der Frage erforderlich.

²⁾ Über das Vorkommen von *Neophron percnopterus percnopterus* (L.) in Bayern liegen sichere Nachweise bis heute noch nicht vor. (Vgl. hierzu Jäckel, Vögel Bayerns, 1891, p. 1).

188. **Aegypius monachus** (L.). — Kuttengeier.

Vultur Monachus Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 122 (1766. — Arabien).

Ciconiidae.

189. **Ciconia ciconia ciconia** (L.). — Weißer Storch.

Ardea Ciconia Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 142 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

190. **Ciconia nigra** (L.). — Schwarzer Storch.

Ardea nigra Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 142 (1758. — Nordeuropa; terra typica: Schweden).

Plegadidae.

191. **Plegadis falcinellus falcinellus** (L.)¹⁾. — Brauner Sichler.

Tantalus falcinellus Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 241 (1766. — Österreich, Italien).

Plataleidae.

192. **Platalea leucorodia leucorodia** L. — Löffelreiher.

Platalea Leucorodia Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 139 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

Ardeidae.

193. **Ardea cinerea cinerea** (L.). — Fischreiher.

Ardea cinerea Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 143 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

194. **Ardea purpurea purpurea** L. — Purpurreiher.

Ardea purpurea Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 236 (1766. — „Habitat in Oriente“; terra typica: Frankreich, ex Brisson).

195. **Casmerodius albus albus** (L.). — Edelreiher.

Ardea alba Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 144 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

196. **Egretta garzetta garzetta** (L.). — Seidenreiher.

Ardea garzetta Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 237 (1766. — „Habitat in Oriente“).

197. **Ardeola ralloides ralloides** (Scop.). — Rallenreiher.

Ardea ralloides Scopoli, Annus I. Hist. Nat. p. 88 (1769. — Kärnten).

¹⁾ Diese Art wurde neuerdings vielfach *P. autumnalis* Linn. ex Hasselqu. 1762 genannt. Nach Opinion 57 sind jedoch die in der von Gadebusch 1762 besorgten, deutschen Ausgabe des vorlinnéischen Iter Palaestinum Hasselquist's enthaltenen Namen nicht zulässig.

198. **Nycticorax nycticorax nycticorax** (L.). — Nachtreiher.
Ardea Nycticorax Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 142 (1758.
— „Südeuropa“).
199. **Ixobrychus minutus** (L.). — Zwergrohrdommel.
Ardea minuta Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 240 (1766. —
Schweiz).
200. **Botaurus stellaris stellaris** (L.). — Rohrdommel.
Ardea stellaris Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 144 (1758. —
„Europa“; terra typica: Schweden).

Phoenicopteridae.

201. **Phoenicopus antiquorum** Brehm¹⁾. — Flamingo.
Phoenicopus antiquorum Brehm, Lehrb. Naturg. europ.
Vög. 2, p. 652 (1824. — „die Meeresküsten des südlichen
Asien, die von Afrika und Südeuropa . . .“).

Anatidae.

202. **Cygnus cygnus** (L.). — Singschwan.
Anas Cygnus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 122 (1758. —
„Europa“; terra typica: Schweden).
203. **Cygnus bewickii bewickii** Yarr. — Zwergschwan.
Cygnus bewickii Yarrell, Trans. Linn. Soc. London 16, II,
p. 453 (1833. — England).
204. **Cygnus olor** (Gm.). — Höckerschwan.
Anas Olor Gmelin, Syst. Nat. 1, II, p. 501 (1789. — Ruß-
land).
205. **Anser anser** (L.). — Wildgans.
Anas Anser Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 123 (1758. —
„Europa“; terra typica: Schweden).
206. **Anser albifrons** (Scop.). — Bläßgans.
Branta albifrons Scopoli, Annus I. Hist. Nat. p. 69 (1769.
— Kärnten).
207. **Anser fabalis fabalis** (Lath.). — Saatgans.
Anas fabalis Latham, Gen. Syn. Birds, Suppl. 1, p. 297 (1787.
— Großbritannien).
208. **Anser brachyrhynchus** Baillon. — Kurzschnabelgans.
Anser brachyrhynchus Baillon, Mém. Soc. Roy. d'Em. Abbeville
1833, p. 74 (1834. — Frankreich).

¹⁾ Bei Temminck (Man. d'Ornith., 2. ed., II, 1820, p. 587) ist *P. antiquorum* ein nomen nudum. *P. roseus* Pall. (Zoogr. Rosso-Asiat., II, p. 207) wurde erst 1827 veröffentlicht, ist also um drei Jahre jünger als der Brehm'sche Speziesname.

209. **Branta bernicla bernicla** (L.). — Ringelgans.
Anas Bernicla Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 124 (1758. — Nordeuropa; terra typica: Schweden).
210. **Branta leucopsis** (Bechst.). — Nonnengans.
Anas leucopsis Bechstein, Orn. Taschenbuch 2, p. 424 (1803. — Deutschland).
211. **Tadorna tadorna** (L.). — Brandente.
Anas Tadorna Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 122 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
212. **Anas platyrhynchos platyrhynchos** L. — Wildente.
Anas platyrhynchos Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 125 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
213. **Chaulelasmus streperus** (L.). — Schnatterente.
Anas strepera Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 125 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
214. **Nettion crecca crecca** (L.). — Krickente.
Anas crecca Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 126 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
215. **Querquedula querquedula** (L.). — Knäckente.
Anas Querquedula Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 126 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
216. **Mareca penelope** (L.). — Pfeifente.
Anas penelope Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 126 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
217. **Spatula clypeata** (L.). — Löffelente.
Anas clypeata Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 124 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
218. **Dafila acuta** (L.). — Spießente.
Anas acuta Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 126 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
219. **Netta rufina** (Pall.). — Kolbenente.
Anas rufina Pallas, Reise d. versch. Prov. russ. Reiches 2, p. 713 (1773. — Südrußland).
220. **Nyroca ferina ferina** (L.). — Tafelente.
Anas ferina Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 126 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
221. **Nyroca nyroca** (Güld.). — Moorente.
Anas nyroca Güldenstedt, Nov. Comm. Acad. Petrop. 14, I, p. 403 (1770. — Südrußland).

222. **Nyroca fuligula** (L.). — Reiherente.
Anas Fuligula Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 128 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
223. **Nyroca marila marila** (L.). — Bergente.
Anas Marila Linnaeus, Fauna Suec., 2. ed, p. 39 (1761. — Lappland).
224. **Glaucionetta clangula clangula** (L.). — Schellente.
Anas Clangula Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 125 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
225. **Clangula hyemalis** (L.). — Eisente.
Anas hyemalis Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 126 (1758. — Nordeuropa; terra typica: Schweden).
226. **Histrionicus histrionicus** (L.). — Harlekinsente¹⁾.
Anas histrionica Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 127 (1758. — Neufundland).
227. **Marmaronetta angustirostris** Ménétr. — Schmalschnabel-
ente¹⁾.
Anas angustirostris Ménétriès, Cat. rais. Caucas. p. 58 (1832. — Lenkoran, Kasp. Meer).
228. **Erismatura leucocephala** (Scop.). — Ruderente.
Anas leucocephala Scopoli, Annus I. Hist. Nat. p. 65 (1769. — Fundort unbekannt).
229. **Somateria mollissima mollissima** (L.). — Eiderente.
Anas mollissima Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 124 (1758. — Nordeuropa; terra typica: Schweden).
230. **Oidemia nigra nigra** (L.). — Trauerente.
Anas nigra Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 123 (1758. — Lappland und England).
231. **Oidemia fusca fusca** (L.). — Samtente.
Anas fusca Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 123 (1758. — „Habitat in Oceano Europaeo“; terra typica: Schweden).

Mergidae.

232. **Mergus merganser merganser** L. — Gänsesäger.
Mergus Merganser Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 129 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
233. **Mergus serrator** L. — Mittelsäger.
Mergus Serrator Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 129 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden.)

¹⁾ Siehe Besserer in: „Deutscher Jäger“, 1894, p. 38.

234. **Mergellus albellus** (L.). — Zwergsäger.

Mergus Albellus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 129 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

Phalacrocoracidae.

235. **Phalacrocorax carbo carbo** (L.). — Kormoranscharbe.

Pelecanus Carbo Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 133 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

236. **Phalacrocorax pygmaeus** (Gm.). — Zwergscharbe.

Pelecanus pygmaeus Gmelin, Syst. Nat. 1, II, p. 574 (1789. — Kaspisches Meer).

Pelecanidae.

237. **Pelecanus onocrotalus** L. — Pelikan.

Pelecanus Onocrotalus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 132 (1758. — Afrika und Asien).

Procellariidae.

238. **Thalassidroma pelagica** (L.). — Kleine Sturmschwalbe.

Procellaria pelagica Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 131 (1758. — Weißes Meer).

Colymbidae.

239. **Podiceps cristatus cristatus** (L.). — Haubentaucher.

Colymbus cristatus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 135 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

240. **Podiceps auritus** (L.). — Ohrensteiβfuß.

Colymbus auritus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 135 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

241. **Podiceps grisegena grisegena** (Bodd.). — Rothalstaucher.

Colymbus grisegena Boddaert, Tabl. Pl. Enl. p. 55 (1783. — Frankreich).

242. **Podiceps nigricollis nigricollis** Brehm. — Schwarzhals-
taucher.

Podiceps nigricollis Brehm, Handb. Naturg. Vögel Deutschl. p. 963 (1831. — Deutschland).

243. **Podiceps ruficollis ruficollis** (Pall.). — Zwergsteiβfuß.

Colymbus ruficollis Pallas in: Vroegs Cat. Coll., Adumbratiuncula p. 6 (1764. — Holland).

244. **Colymbus arcticus** L. — Polartaucher.

Colymbus arcticus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 135 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

245. **Colymbus stellatus** Pontopp. — Nordseetaucher.
Colymbus stellatus Pontoppidan, Danske Atlas, 1, p. 621 (1763.
— Dänemark).
246. **Colymbus immer** Brünn. — Eisseetaucher.
Colymbus immer Brünnich, Orn. Bor. p. 38 (1764. — Faeroer-
Inseln).
- Charadriidae.**
247. **Haematopus ostralegus ostralegus** L. — Austernfischer.
Haematopus Ostralegus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 152
(1758. — „Europa“; terra typica: Oeland bei Schweden).
248. **Oedienemus oedienemus oedienemus** (L.). — Triel.
Charadrius Oedienemus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 155
(1758. — England).
249. **Cursorius gallicus gallicus** (Gm.). — Rennvogel.
Charadrius gallicus Gmelin, Syst. Nat. 1, I, p. 692 (1789. —
Frankreich).
250. **Eudromias morinellus** (L.). — Mornellregenpfeifer.
Charadrius Morinellus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 150
(1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).
251. **Charadrius hiaticula hiaticula** L. — Sandregenpfeifer.
Charadrius Hiaticula Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 150 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).
252. **Charadrius dubius curonicus** Gm. — Flußregenpfeifer.
[*Charadrius dubius* Scopoli, Del. Faun. Flor. Insubr. II,
p. 93 (1786. — Luzon, Philippinen)].
Charadrius curonicus Gmelin, Syst. Nat. 1, II, p. 692 (1789.
— ex Beseke, „ein Regenpfeifer“ in: Beob. & Entdeck.
Naturk. Ges. Naturf. Fr. Berlin 1, IV, 1787, p. 463:
Kurland)¹⁾.
253. **Charadrius alexandrinus alexandrinus** L. — Seeregenpfeifer.
Charadrius alexandrinus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 150
(1758. — Ägypten).
254. **Pluvialis apricarius** (L.). — Goldregenpfeifer.
Charadrius apricarius Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 150
(1758. — Oeland, Schweden).

¹⁾ Die paläarktische Form des Flußregenpfeifers unterscheidet sich vom wahren *C. dubius dubius* Scop., aus dem östlichen Asien, durch kleineren, schwächeren Schnabel, so daß ihre Trennung als Lokalrasse berechtigt erscheint. (Siehe „British Birds“, IX, 1915, p. 8 und Dansk Ornith. Foren. Tidsskr. 9, 1915, p. 161—181).

255. **Squatarola squatarola squatarola** (L.). — Kiebitzregenpfeifer.
Tringa Squatarola Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 149 (1758.
„Europa“; terra typica: Schweden).

256. **Vanellus vanellus** (L.). — Kiebitz.
Tringa Vanellus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 148 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).

257. **Arenaria interpres interpres** (L.). — Steinwälzer.
Tringa Interpres Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 148 (1758.
— „Europa“; terra typica: Gotland, Schweden).

Scolopacidae.

258. **Pavoncella pugnax** (L.). — Kampffläuer.
Tringa Pugnax Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 148 (1758. —
„Europa“; terra typica: Schweden).

259. **Canutus canutus canutus** (L.). — Isländischer Strandläufer.
Tringa Canutus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 149 (1758. —
„Europa“; terra typica: Schweden).

260. **Calidris alba alba** (Pall.)¹⁾. — Sanderling.
Tryngra alba Pallas in: Vroegs Cat. Coll., Adumbratiuncula
p. 7 (1764. — „de Noordsche Zeekusten“).

261. **Pelidna alpina alpina** (L.). — Alpenstrandläufer.
Tringa alpina Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 149 (1758. —
Lappland).

262. **Pisobia minuta minuta** (Leisl.). — Zwergstrandläufer.
Tringa minuta Leisler, Nachträge zu Bechstein, Naturg.
Deutschl. I, p. 74 (1812. — am Main bei Hanau).

263. **Pisobia temminckii** (Leisl.). — Temminck-Strandläufer.
Tringa Temminckii Leisler, Nachträge zu Bechstein, Naturg.
Deutschl. I, p. 64 (1812. — „an den Ufern des Mains“).

264. **Arquatella maritima maritima** (Brünn.). — Seestrandläufer.
Tringa maritima Brünnich, Orn. Bor. p. 54 (1764. — Nor-
wegen).

265. **Limicola falcinellus falcinellus** (Pontopp.). — Sumpfläuer.
Scolopax Falcinellus Pontoppidan, Danske Atlas I, p. 623
(1763. — Dänemark).

¹⁾ Die Handlist of Brit. Birds und die Checklist of North American Birds 1910 nennen den Sanderling *Calidris leucophaea* Pallas, bezw. Vroeg. Wie jedoch Stone, Auk 29, 1912, p. 206—208 ausgeführt hat, kann die im „Catalogue“ angewandte Nomenklatur nicht als binär betrachtet werden, weshalb der in den Adumbratiuncula p. 7 vorgeschlagene Name *alba* der allein zulässige ist.

266. **Actitis hypoleucos** (L.). — Flußuferläufer.
Tringa Hypoleucos Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 149 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).
267. **Tringa ocropus ocropus** L. — Waldwasserläufer.
*Tringa Ocropus*¹⁾ Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 149 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).
268. **Totanus glareola** (L.). — Bruchwasserläufer.
Tringa Glareola Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 149 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).
269. **Totanus totanus totanus** (L.). — Rotschenkel.
Scolopax Totanus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 145 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).
270. **Totanus erythropus** (Pall.). — Dunkler Wasserläufer.
Scolopax erythropus Pallas in: Vroegs Cat. Coll., Adumbratiuncula p. 6 (1764. — Holland).
271. **Totanus nebularius nebularius** (Gunner.). — Heller Wasserläufer.
Scolopax nebularia Gunnerus in: Leem, Beskr. Finm. Lapp. p. 251 (1767. — Norwegen).
272. **Totanus stagnatilis stagnatilis** Bechst. — Teichwasserläufer.
Totanus stagnatilis Bechstein, Orn. Taschenbuch, 2, p. 292 (1803. — Deutschland).
273. **Phalaropus fulicaria** (L.). — Breitschnabel-Wassertreter.
Tringa Fulicaria Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 148 (1758.
— Amerika; terra typica: Hudson-Bay).
274. **Phalaropus lobatus** (L.). — Schmalschnabel-Wassertreter.
*Tringa lobata*²⁾ Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 148 (1758.
— Nordamerika; terra typica: Hudson-Bay).
275. **Recurvirostra avosetta** L. — Avosette.
Recurvirostra Avosetta Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 151 (1758. — „Europa“; terra typica: Oeland, Schweden).
276. **Limosa lapponica lapponica** (L.). — Pfuhlschnepfe.
Scolopax lapponica Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 147 (1758.
— Lappland).
277. **Limosa limosa limosa** (L.). — Uferschnepfe.
Scolopax Limosa Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 147 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).

¹⁾ Von späteren Autoren willkürlich in *ochropus* „verbessert“, was indessen nicht statthaft ist.

²⁾ Druckfehler für *Tringa lobata*.

278. **Numenius arquata arquata** (L.). — Großer Brachvogel.
Scolopax Arquata Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 145 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).
279. **Numenius phaeopus phaeopus** (L.). — Regenbrachvogel.
Scolopax Phaeopus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 146 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).
280. **Gallinago media** (Lath.). — Große Sumpfschnepfe.
Scolopax media Latham, Gen. Syn. Birds, Suppl. 1, p. 292
(1787. — England).
281. **Gallinago gallinago gallinago** (L.). — Bekassine.
Scolopax Gallinago Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 147 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).
282. **Lymnocyptes gallinula** (L.). — Kleine Sumpfschnepfe.
Scolopax Gallinula Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 244 (1766.
— Europa; wir acceptiren Frankreich (ex Brisson) als
terra typica).
283. **Scolopax rusticola** L. — Waldschnepfe.
Scolopax Rusticola Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 146 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden).

Laridae.

284. **Hydrochelidon nigra nigra** (L.). — Trauerseeschwalbe.
Sterna nigra Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 137 (1758. —
„Europa“; terra typica: Upsala, Schweden).
285. **Hydrochelidon leucopareia leucopareia** (Temm.). — Weiß-
bärtige Seeschwalbe.
Sterna leucopareia Temminck, Man. d'Orn., 2. ed., II, p. 746
(1820. — Südungarn).
286. **Hydrochelidon leucoptera** (Temm.). — Weißflügelseeschwalbe.
Sterna leucoptera Temminck, Man. d'Orn. p. 483 (1815. —
Küsten des Mittelmeeres).
287. **Gelochelidon anglica anglica** (Mont.)¹⁾. — Lachseeschwalbe.
Sterna anglica Montagu, Orn. Dict., Suppl. [ohne Paginierung]
(1813. — England).
288. **Sterna sandvicensis sandvicensis** Lath. — Brandseeschwalbe.
Sterna sandvicensis Latham, Gen. Syn. Birds, Suppl. 1, p. 296
(1787. — Kent).

¹⁾ Die Lachseeschwalbe wurde bisher vielfach *G. nilotica* genannt. *Sterna nilotica* Gmelin (Syst. Nat. 1, II, 1789, p. 606: ex Hasselquist, Ägypten) kann aber schwerlich auf unsere Art bezogen werden; denn neben anderen Widersprüchen sind die Beine als „incarnati“ (fleischfarbig) beschrieben, während sie

289. **Sterna hirundo** L. — Flußseeschwalbe.
Sterna Hirundo Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 137 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden)¹⁾.
290. **Sterna paradisaea** Brünn. — Küstenseeschwalbe.
Sterna paradisaea Brünnich, Orn. Bor. p. 46 (1764. —
Christiansoe, Dänemark).
291. **Sterna minuta' minuta** L. — Zwergseeschwalbe.
Sterna minuta Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 228 (1766. —
Südeuropa).
292. **Larus minutus** Pall. — Zwergmöve.
Larus minutus Pallas, Reise d. versch. Prov. russ. Reiches 3,
p. 702 (1776. — Tobolsk, Sibirien).
293. **Larus ridibundus** L. — Lachmöve.
Larus ridibundus Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 225 (1766.
— „Europa“; terra typica: England).
294. **Larus canus canus** L. — Sturmmöve.
Larus canus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 136 (1758. —
„Europa“; terra typica: Schweden).
295. **Larus argentatus argentatus** Pontopp. — Silbermöve.
Larus Argentatus Pontoppidan, Danske Atlas 1, p. 622 (1763.
— Dänemark).
296. **Larus fuscus fuscus** L. — Heringsmöve.
Larus fuscus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 136 (1758. —
„Europa“; terra typica: Schweden).
297. **Larus marinus** L. — Mantelmöve.
Larus marinus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 136 (1758.
— „Europa“; terra typica: Gotland, Schweden).
298. **Rissa tridactyla tridactyla** (L.). — Dreizehenmöve.
Larus tridactylus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 136 (1758.
— „Nordeuropa“; terra typica: Großbritannien).
299. **Megalestris skua skua** (Brünn.). — Große Raubmöve.
Catharacta Skua Brünnich, Orn. Bor. p. 33 (1764. —
Faeroer und Island).
300. **Stercorarius pomarinus** (Temm.). — Mittlere Raubmöve.
Lestris pomarinus Temminck, Man. d'Orn. p. 514 (1815. —
Arktische Region, Holland und Frankreich).

bei der Lachseeschwalbe in allen Altersstadien schwarz sind. Wir müssen demnach auf die nächstjüngere verfügbare Bezeichnung *anglica* Mont. zurückgreifen.

¹⁾ Siehe Lönnberg, Ibis, 1913, p. 301–303.

301. **Stercorarius parasiticus** (L.). — Schmarotzerraubmöve.
Larus parasiticus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 136 (1758.
— „Europa“; terra typica: Schweden)¹⁾.
302. **Stercorarius longicaudus** Vieill. — Langschwanzraubmöve.
Stercorarius longicaudus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. 32,
p. 157 (1819. — Nördliche Gebiete)¹⁾.

Alcidae.

303. **Uria lomvia lomvia** (L.). — Dickschnabellumme.
Alca Lomvia Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 130 (1758. —
„Nordeuropa“; terra typica: Grönland).
304. **Fratercula arctica arctica** (L.). — Papageitaucher.
Alca arctica Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 130 (1758. —
„Nordeuropa“; terra typica: Schweden).

Otididae.

305. **Otis tarda tarda** L. — Trappe.
Otis Tarda Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 154 (1758. —
Polen).
306. **Otis tetrax** L. — Zwergtrappe.
Otis Tetrax Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 154 (1758. —
„Europa“; terra typica: Frankreich).

Megalornithidae.

307. **Megalornis grus grus** (L.). — Kranich.
Ardea Grus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 141 (1758. —
„Europa“; terra typica: Schweden).

Rallidae.

308. **Crex crex** (L.). — Wachtelkönig.
Rallus Crex Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 153 (1758. —
„Europa“; terra typica: Schweden).
309. **Porzana porzana** (L.). — Tüpfelsumpfhuhn.
Rallus Porzana Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 262 (1766.
— „Europa“; terra typica: Frankreich).
310. **Porzana parva** (Scop.). — Kleines Sumpfhuhn.
Rallus parvus Scopoli, Annus I. Hist. Nat. p. 108 (1769. —
Kärnten).
311. **Porzana pusilla intermedia** (Herm.). — Zwergsumpfhuhn.
[*Rallus pusillus* Pallas, Reise d. versch. Prov. russ. Reiches,
3, p. 700 (1776. — Dauria)].

¹⁾ Siehe Lönnberg, Zoologist (4) VII, 1903, p. 338—342.

Rallus intermedius Hermann, Obs. Zool. 1, p. 198 (1804. — Straßburg).

312. **Rallus aquaticus aquaticus** L. — Wasserralle.

Rallus aquaticus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 153 (1758. — „Europa“; terra typica: Großbritannien).

313. **Gallinula chloropus chloropus** (L.). — Grünfüßiges Teichhuhn.

Fulica Chloropus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 153 (1758. — „Europa“; terra typica: England).

314. **Fulica atra atra** L. — Bläßhuhn.

Fulica atra Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 152 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

Columbidae.

315. **Columba palumbus palumbus** L. — Ringeltaube.

Columba Palumbus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 163 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

316. **Columba oenas oenas** L. — Hohltaube.

Columba Oenas Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 162 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

317. **Streptopelia turtur turtur** (L.). — Turteltaube.

Columba Turtur Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 164 (1758. — „India“; terra typica: England).

Pteroclididae.

318. **Syrrhaptes paradoxus** (Pall.). — Steppenhuhn.

Tetrao paradoxa Pallas, Reise d. versch. Prov. russ. Reiches, 2, p. 712 (1773. — Tartarische Steppe).

Phasianidae.

319. **Phasianus colchicus** L. — Fasan.

Phasianus colchicus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 158 (1758. — „Afrika, Asia“; terra typica: Colchis).

320. **Perdix perdix perdix** (L.). — Rebhuhn.

Tetrao Perdix Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 160 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

321. **Coturnix coturnix coturnix** (L.). — Wachtel.

Tetrao Coturnix Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 161 (1758. — „Europa“; terra typica: Schweden).

322. **Caccabis saxatilis saxatilis** (Meyer). — Steinhuhn.

Perdix saxatilis Meyer in: Meyer und Wolf, Taschenbuch deutsch. Vögelk. 1, p. 305 (1810. — Südliche Alpen Deutschlands).

Tetraonidae.

323. ***Tetrao urogallus urogallus* L.** — Auerhuhn.
Tetrao Urogallus Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 159 (1758.
 — „Europa“; terra typica: Schweden).
324. ***Lyrurus tetrrix juniperorum* (Brehm).** — Birkhuhn¹⁾.
 [*Tetrao Tetrrix* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 159 (1758. —
 „Europa“; terra typica: Schweden)].
Tetrao juniperorum Brehm, Handb. Naturg. Vögel Deutschl.
 p. 509 (1831. — Thüringer Wald).
325. ***Bonasa bonasia bonasia* (L.).** — Häselhuhn.
Tetrao Bonasia Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 160 (1758. —
 „Europa“; terra typica: Schweiz).
326. ***Lagopus mutus mutus* (Montin).** — Schneehuhn.
Tetrao mutus Montin, Phys. Sölsk. Handl. I, p. 155 (1776—1781.
 — Schweden).

**II. Verzeichnis jener Vogelarten, deren Vorkommen
 im Königreich Bayern wohl behauptet, aber nicht
 einwandfrei belegt ist.**

1. ***Pyrrhocorax pyrrhocorax* (L.).** — Alpenkrähe.
Upupa Pyrrhocorax Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 118 (1758.
 — „Habitat in Angliae, Aegypti maritimis“).
2. ***Emberiza caesia* Cretzschm.** — Rostammer.
Emberiza caesia Cretzschmar, Atlas zur Reise E. Rüppell,
 Vögel, p. 17, tab. 10 (1826. — „im Winter bei der Insel
 Kurgos im Nil“).
3. ***Melanocorypha*²⁾ *calandra calandra* (L.).** — Kalandlerlerche.
Alauda Calandra Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 288 (1766.
 — Pyrenäen).
4. ***Melanocorypha yeltoniensis* (Forst.).** — Mohrenlerche.
Alauda yeltoniensis Forster, Philos. Transact. 57, p. 350
 („1767“. — Südrußland, untere Wolga beim See Yelton
 oder Elton).

¹⁾ Zu erwähnen sind hier noch zwei interessante Bastarde, die bei uns in freier Wildbahn angetroffen werden, nämlich das Rackelhuhn, *Tetrao medius* Meyer, ein Kreuzungsprodukt zwischen Auer- und Birkwild, und der Birkfasan, ein Mischling zwischen Birkwild und Fasan.

²⁾ Genus *Melanocorypha* Boie, Isis, 21, 1828, p. 322; Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, List Gen. Birds 1840, p. 48): *Melanocorypha tatarica* (Pall.) = *M. yeltoniensis* (Forst.).

5. **Calandrella**¹⁾ **brachydactyla brachydactyla** (Leisler). — Kurz-
zehige Lerche.
Alauda brachydactyla Leisler, Annalen der Wetterauischen
Gesellschaft III, p. 357, tab. 19 (1814. — „Frankreich
und Italien. Typischer Fundort Montpellier in Süd-Frank-
reich“) ²⁾).
6. **Parus atricapillus salicarius** Brehm. — Mitteldeutsche Weiden-
meise.
[*Parus atricapillus* Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 341 (1766.
— Canada)].
Parus salicarius Brehm, Handb. Naturg. Vögel Deutschl. p. 465
(1831. — „lebt in unsern Tälern, besonders an den mit
Weiden besetzten Bach-, Fluß- und Teichufern“; terra
typica: Renthendorf).
7. **Monticola solitaria solitaria** (L.). — Blandrossel.
Turdus solitarius Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 170 (1758.
— „Habitat in Oriente“; terra typica: Italien).
8. **Falco rusticolus candicans** Gm. — Grönländischer Jagd-
falke.
[*Falco rusticolus* Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 88 (1758. —
„Habitat in Suecia“)].
Falco candicans Gmelin, Syst. Nat. I, 1, p. 275 (1788. —
„Habitat in Islandia et Scotia“; errore! terra typica nach
Hartert: Grönland).
9. **Neophron**³⁾ **percnopterus percnopterus** (L.). — Aasgeier.
Vultur Perenopterus (err. typogr.) Linnaeus, Syst. Nat. 10,
I, p. 87 (1758. — Ägypten).
10. **Casarca**⁴⁾ **ferruginea** (Pall.). — Rostente.
Anas (ferruginea) Pallas: in Vroeg's Cat. Coll., Adumbratiuncula
(1764. — Tartarei).

¹⁾ Genus *Calandrella* Kaup, Skizz. Entwicklungsgeschichte & Natürl. System
Europ. Thierwelt, I, 1829, p. 39.

Type durch Monotypie: *Alauda brachydactyla* Leisler.

²⁾ Es war uns leider nicht möglich, Einsicht in diese Literaturstelle zu
nehmen. Wir folgen daher in der Angabe des Zitates Hartert, Vögel pal.
Fauna 1904 p. 214.

³⁾ Genus *Neophron* Savigny, Descr. de l'Egypte, Hist. Nat. I, 1, 1809, p. 75.

Type durch Monotypie: *Neophron percnopterus* (L.).

⁴⁾ Genus *Casarca* Bonaparte, Geogr. & Comp. List Birds Europe & N. America
1838, p. 56.

Type durch Monotypie: *Casarca rutila* = *Anas rutila* Pall. = *Anas
ferruginea* Pall.

11. **Phalacrocorax graculus graculus** (L.). — Krähenscharbe¹⁾.
Pelecanus Graculus Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, p. 217 (1766.
 — „Europa“; terra typica: Schweden).
12. **Puffinus**²⁾ **puffinus puffinus** (Brünn.). — Stormvogel³⁾.
Procellaria Puffinus Brünnich, Orn. Bor. p. 29 (1764. —
 „E Feroa et Norvegia“).
13. **Sterna tschegrava** Lep. — Kaspische Seeschwalbe.
Sterna Tschegrava Lepechin, Nov. Comm. Acad. Petrop. 14, 1,
 p. 500, pl. 13 (1770. — Südrußland).
14. **Alle**⁴⁾ **alle** (L.). — Krabbentaucher.
Alca Alle Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, p. 131 (1758. — Arktischer
 Ozean).

III. Nomenclator der Gattungsnamen nebst Angabe ihrer Genotypen.

Genus **Corvus** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 105.

Type durch Tautonomie: „*Corvus*“ = *Corvus Corax* Linn. (Opinion 16).

Genus **Coloeus** Kaup, Skizz. Entwicklungsgesch. & Natürl. Syst. Europ. Thierwelt I, 1829, p. 114⁵⁾.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Sharpe, Cat. B. Brit. Mus. III, 1877, p. 25): *Coloeus monedula* (Linn.) = *Corvus Monedula* Linn.

Genus **Pica** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 30; II, p. 35.

Type durch Tautonomie: „*Pica*“ = *Corvus Pica* Linn.

Genus **Nucifraga** Brisson, Ornith. I. 1760, p. 30; II, p. 58.

Type durch Monotypie: „*Nucifraga*“ = *Corvus Caryocatactes* Linn.

Genus **Garrulus** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 30; II, p. 46.

Type durch Tautonomie: „*Garrulus*“ = *Corvus glandarius* Linn.

¹⁾ Das angebliche Vorkommen der Krähenscharbe am Bodensee etc. bleibt zu bestätigen. Möglicherweise handelt es sich um die mediterrane Form *P. graculus desmarestii* Payr.

²⁾ Genus *Puffinus* Brisson, Ornith. I, 1760, p. 56; VI, p. 130.

Type durch Tautonomie: „*Puffinus*“ = *Procellaria Puffinus* Brünn.

³⁾ Im Jahre 1834 soll nach Jaekel ein Stormvogel bei Karlstadt am Main geschossen und dem Universitätsmuseum Würzburg einverleibt worden sein. Es ist heute nicht mehr festzustellen, ob es sich um die nördliche (*P. p. puffinus*) oder die mediterrane Form (*P. p. yelkouan* [Acerbi]) handelte.

⁴⁾ Genus *Alle* Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock I, 1806, p. 17.

Type durch Monotypie: *Alle nigricans* Link = *Alca alle* Linn.

⁵⁾ Kaup vereinigt in der Gattung die Arten *Corvus monedula* und *C. frugilegus*, ohne einen Typus zu fixieren. Erst Sharpe, 1877, scheint die Dohle als Genotype festgelegt zu haben.

Genus **Pyrhocorax** Vieillot, Analyse d'une nouv. Ornith., 1816, p. 36.

Type durch Monotypie: Buffon's „Choucas des Alpes“ = *Corvus graculus* Linn.

Genus **Sturnus** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 167.

Type durch Tautonomie: „*Sturnus*“ = *Sturnus vulgaris* Linn. (Opinion 16).

Genus **Pastor** Temminck, Man. d'Ornith. 1815, p. 82.

Type durch Monotypie: *Pastor roseus* (Linn.) = *Turdus roseus* Linn.

Genus **Oriolus** Linnaeus, Syst. Nat. 12, I, 1766, p. 160.

Type durch Tautonomie: *Coracias Oriolus* Linn.

Genus **Coccothraustes** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 36; III, p. 218.

Type durch Tautonomie: „*Coccothraustes*“ = *Loxia Coccothraustes* Linn.

Genus **Chloris** Cuvier, Leçons d'Anat. Comp. I, 1800, tab. II¹⁾.

Type durch Tautonomie und Monotypie: *Loxia chloris* Linn. apud Cuvier, Tableau élém. de l'hist. nat. Anim., 1798, p. 212. (Opinion 39).

Genus **Carduelis** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 36; III, p. 53.

Type durch Tautonomie: „*Carduelis*“ = *Fringilla Carduelis* Linn.

Genus **Acanthis** Borkhausen, Deutsche Fauna I, 1797, p. 248.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Stejneger, Auk I, 1884, p. 145): *Fringilla Linaria* Linn.

Genus **Spinus** Koch, Syst. Baier. Zool. I, 1816, p. 232.

Type durch Tautonomie: *Fringilla Spinus* Linn.

Genus **Chloroptila**²⁾ Salvadori, Atti Accad. Sci. Torino VII, Dec. 1871, p. 260³⁾.

Type durch ursprüngliche Bestimmung (und Monotypie): *Fringilla Citrinella* Linn.

¹⁾ Die von Cuvier in den Tableaux der „Leçons d'Anat. Comp.“ aufgestellten Gattungsnamen wären an sich *nomina nuda*, da keinerlei Kennzeichnung, sondern nur der französische Trivialname, zumeist im Plural (wie Verdiere, Bouvreuils etc.) beigelegt ist. Aus Cuvier's Bemerkung in der Einleitung der „Leçons“ (vol. I, p. XIX) geht jedoch hervor, daß sich diese Trivialnamen auf die in seinem Werke „Éléments de Zoologie“ [= Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des Animaux, Paris, 1798] gebrauchten Bezeichnungen beziehen. (Siehe Opinion 39.) Unter „Les Verdiere“ finden wir hier auf p. 212 nur „*Loxia chloris*“ verzeichnet, welche somit der Typus der Gattung *Chloris* Cuv. 1800 wird.

²⁾ Scr. *Chloroptyla*, was indessen zweifellos auf einem Druckfehler beruht, wie aus der vom Verf. beigelegten Ableitung (χλωρός = verde, πτερον = penna) hervorgeht.

³⁾ *Citrinella* Bonaparte (Geogr. Comp. List Birds Europe & N. America 1838, p. 34; Type durch Monotypie: *Citrinella Serinus* Bp. = *Fringilla Citri-*

Genus **Serinus** Koch, Syst. Baier. Zool. I, 1816, p. 228.

Type durch Monotypie: *Serinus hortulanus* Koch = *Fringilla Serinus* Linn., Syst. Nat., 12, I, 1766, p. 320¹⁾.

Genus **Pyrrhula** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 36; III, p. 308.

Type durch Tautonomie: „*Pyrrhula*“ = *Loxia Pyrrhula* Linn.

Genus **Loxia** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 171.

Type durch Tautonomie: „*Loxia*“ = *Loxia Curvirostra* Linn. (Opinion 16).

Genus **Pinicola** Vieillot, Hist. Nat. Ois. Amér. sept., I, „1807“, p. IV.

Type durch Monotypie: *Pinicola rubra* Vieill. = *Loxia Eucleator* Linn.

Genus **Fringilla** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 179.

Type durch Tautonomie: „*Fringilla*“ = *Fringilla coelebs* Linn. (Opinion 16).

Genus **Montifringilla** Brehm, Isis, 21, 1828, p. 1277.

Type durch Monotypie: *Montifringilla nivalis* Br. = *Fringilla nivalis* Linn.²⁾.

Genus **Petronia** Kaup, Skizz. Entwicklungsgesch. & Natürl. Syst. Europ. Thierwelt I, 1829, p. 158, 192.

Type durch Monotypie (p. 192): *Fringilla petronia* Linn.

Genus **Passer** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 36; III, p. 71.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, List Gen. Birds 1840, p. 46): *Fringilla domestica* Linn.

Genus **Emberiza** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 176.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, List Gen. Birds 1840, p. 47): *Emberiza Citrinella* Linn.³⁾.

nella Linn.) ist präokkupiert durch *Citrinella* Kaup (Skizz. Entwickl. & Natürl. Syst. Europ. Thierw. I, 1829, p. 142; Type durch Tautonomie: *Emberiza citrinella* Linn.).

¹⁾ *Serinus canarius serinus* (Linn.) vertritt unseren einheimischen Girlitz im südlichen Europa, Nordafrika und S.W.-Asien. Cfr. Laubmann, Verhandl. Orn. Ges. Bay. 11, Heft 3, 1913, p. 191—195.

²⁾ Brehm führt zwei „Arten“ auf: *M. nivalis* und *M. glacialis*, welche letztere als *nomen nudum* (eine Beschreibung erfolgte erst 1831) ohne nomenklatorische Bedeutung ist.

³⁾ Das in der neuen Ausgabe der „List of British Birds“ 1915, p. 358 angewandte Verfahren der Tautonomie ist nach Art. 30, d, der Internat. Nomenkl. Regeln in diesem Falle nicht angängig, da keine der Komponenten der Linné'schen Gattung den Namen *Emberiza*, sei es als gültige Speziesbezeichnung, sei es als Synonym führt.

Genus **Plectrophenax** Stejneger, Proc. U. S. Nat. Mus. 5, 1882, p. 33¹⁾.

Type durch ursprüngliche Bestimmung: *Emberiza nivalis* Linn.

Genus **Calcarius** Bechstein, Ornith. Taschenb. I, 1802, p. 130¹⁾.

Type durch Monotypie: *Fringilla Lapponica* Linn.

Genus **Galerida** Boie, Isis, 21, 1828, p. 321.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, List Gen. Birds 1840, p. 47): *Alauda cristata* Linn.

Genus **Lullula** Kaup, Skizz. Entwicklungsgesch. & Natürl. Syst. Europ. Thierw. I, 1829, p. 92, 192²⁾.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Sharpe, Proc. Zool. Soc. Lond. 1874, p. 635): *Alauda arborea* Linn.

Genus **Alauda** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 165.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Swainson, Zool. Journ. III, 1827, p. 344): *Alauda arvensis* Linn.

Genus **Otocoris** Bonaparte, Nuov. Ann. Sci. Nat. [Bologna], II, 1838, p. 407.

Type durch Monotypie: *Phileremos cornutus* Bonap. = *Alauda cornuta* Wils. = *Alauda alpestris* Linn.³⁾.

Genus **Anthus** Bechstein, Gemeinnütz. Naturg. Deutschl., edit. 2, II, 1805, p. 302, Fußnote⁴⁾.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Mathews, Austr. Avi. Rec. II, 1915, p. 123: *Alauda campestris* Linn.

Genus **Motacilla** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 184.

Type durch Tautonomie: „*Motacilla*“ = *Motacilla alba* Linn. (Opinion 16).

¹⁾ *Plectrophanes* Meyer, Kurze Beschr. Vög. Liv- und Esthlands 1815, p. XII (Type durch Monotypie: *Fringilla calcarata* Pall. = *Fr. lapponica* Linn.) ist ein bloßes Synonym von *Calcarius* Bechst. 1802 (mit derselben Genotype).

²⁾ Kaup (p. 192) vereinigte in der Gattung *Alauda arborea* und *A. cristata*. Sharpe (1874) fixierte die erstgenannte als Genotype von *Lullula*.

³⁾ Die typische *Otocoris alpestris alpestris* (Linn.) vertritt die europäische Ohrenlerche in der arktischen Zone des östlichen Nordamerika.

⁴⁾ *Anthus*, allgemein Bechstein 1807 (Gemeinn. Naturg. Deutschl., 2. edit., III, p. 704) zugeschrieben, wurde von diesem Schriftsteller, wie oben angegeben, im II. Bande desselben Werkes zwei Jahre vorher zum ersten Male in gültiger Weise eingeführt. Bechstein erwähnt (l. c.) als zu dieser Gattung gehörend *Alauda trivialis*, *A. campestris* und *A. pratensis*. Gray's Vorgehen (List Gen. Birds 1840, p. 25), der *Anthus aquaticus* Bechst. = *Alauda spinoletta* Linn. als Genotype fixierte, ist unzulässig, da diese Art bei der ursprünglichen Aufstellung von *Anthus* in dieser Gattung nicht enthalten war. Erst Mathews (1915) bestimmte *A. campestris* als Genotype.

Genus **Certhia** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 118.

Type durch Tautonomie: „*Certhia*“ = *Certhia familiaris* Linn.
(Opinion 16).

Genus **Tichodroma** Illiger, Prodr. Syst. Mamm. Av. 1811,
p. 210.

Type durch Monotypie: *Certhia muraria* Linn.

Genus **Sitta** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 115.

Type durch Monotypie: *Sitta europaea* Linn.

Genus **Parus** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 189.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, List Gen. Birds 1840,
p. 23): *Parus major* Linn.

Genus **Aegithalos** Hermann, Observ. Zool. 1804, p. 214.

Type durch Monotypie: *Pipra europaea* Linn.

Genus **Panurus** Koch, Syst. Baier. Zool. I, 1816, p. 201.

Type durch Monotypie: *Parus biarmicus* Linn.

Genus **Regulus** Cuvier, Leçons d'Anat. Comp. I, 1800, tab. II.

Type durch Tautonomie und Monotypie: „Le Roitelet“ = *Motacilla
Regulus* Linn. apud Cuvier, Tabl. élém. d'hist. nat. 1798,
p. 220. (Opinion 39)¹⁾.

Genus **Lanius** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 93.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Swainson, Zool. Journ. I,
1824, p. 294): *Lanius Excubitor* Linn.

Genus **Bombycilla** Vieillot, Hist. Nat. Ois. Amér. sept. I,
„1807“, p. 88²⁾.

Type durch Monotypie: *Bombycilla cedrorum* Vieill.

¹⁾ Siehe Fußnote 1 auf p. 36.

²⁾ Die Neuauflage der „List of British Birds“ (p. 362) verwendet für den Seidenschwanz den Gattungsnamen *Ampelis* Linn. (Syst. Nat. 12, I, 1766, p. 297), indem die Verf. als Genotype *Ampelis garrulus* Linn. durch Tautonomie festzulegen versuchen. Einsichtnahme in die 12. Ausgabe von Linné lehrt jedoch, daß das Verfahren in diesem Falle nicht zulässig ist. Keine der von Linné ursprünglich in der Gattung vereinigten Arten trägt den Namen *Ampelis* als gültige Bezeichnung oder als Synonym. Der Umstand, daß Linnaeus in der Synonymie der ersten Art (*A. garrulus*) sich auf die „*Ampelis remigibus quibusdam apice membranaceo terminatis*“ der Fauna Suecica bezieht, kann im Sinne des Art. 30, litt. d des Internat. Nomencl. Code nicht zur Fixierung des Typus durch Tautonomie herangezogen werden. Gray (List Gen. Birds 1840, p. 34) war daher durchaus berechtigt, *A. Cotinga* Linn. als Type von *Ampelis* Linn. 1766 festzulegen. *Ampelis* Linn. wird somit ein Synonym von *Cotinga* Briss. 1760.

Genus **Muscicapa** Brisson¹⁾, Ornith. I, 1760, p. 32; II, p. 357.
Type durch Tautonomie: „*Muscicapa*“ = *Motacilla Ficedula* Linn.
[= *Muscicapa grisola* auct.].

Genus **Erythrosterina** Bonaparte, Geogr. & Comp. List Birds
Europe & North America 1838, p. 25.
Type durch Monotypie: *Muscicapa parva* Bechst.

Genus **Phylloscopus** Boie, Isis, 1826, II, p. 972.
Type durch Monotypie: *Sylvia trochilus* Lath. = *Motacilla Trochilus*
Linn. (Opinion 46).

Genus **Locustella** Kaup, Skizz. Entwicklungsgesch. & Natürl.
Syst. Europ. Thierwelt I, 1829, p. 115, 191.
Type durch Tautonomie und Monotypie (p. 191): *Sylvia locustella*
= *Motacilla naevia* Linn.

Genus **Acrocephalus** J. A. Naumann, Naturg. Land- u.
Wasservögel nördl. Deutschl., Nachtrag, Heft 4, 1811,
p. 199.
Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, List Gen. Birds 1840,
p. 21): *Acrocephalus arundinaceus* (Linn.) = *Turdus arun-*
dinaceus Linn.

Genus **Hypolais** Kaup, Skizz. Entwicklungsgesch. & Natürl.
Syst. Europ. Thierwelt I, 1829, p. 96, 191²⁾.
Type durch Monotypie (p. 95, 191): „*Sylvia hypolais*“ Kaup = *Sylvia*
icterina Vieill.

Genus **Sylvia** Scopoli, Ann. I. Hist. Nat., 1769, p. 154.
Type durch nachträgliche Bestimmung (B. O. U. Committee 1915,
List of Brit. Birds, p. 362): *Sylvia curruca* (Linn.) = *Mota-*
cilla Curruca Linn.

Genus **Turdus** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 168.
Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, List Gen. Birds 1840,
p. 27): *Turdus viscivorus* Linn.

¹⁾ Alle neueren Autoren (so auch die Verf. der neuen „List of British Birds“) haben übersehen, daß die Gattung *Muscicapa* nicht erst von Linnaeus 1766, sondern bereits von Brisson 1760 aufgestellt worden ist.

²⁾ *Hippolais* Brehm (Isis 21, 1828, p. 1283) ist ein nomen nudum, da die drei dazu gestellten Arten: *H. alticeps*, *H. media* und *H. planiceps* damals unbeschrieben waren und erst 1831 im Handbuch Naturg. Vög. Deutschl. p. 434 gekennzeichnet wurden. Unterdessen hatte jedoch Kaup im Jahre 1829 die Gattung *Hypolais* für *Sylvia hypolais* auct. [nec *Motacilla hippolais* Linn.] in gültiger Weise aufgestellt. Bezüglich neuer Gattungsnamen, die lediglich in Begleitung von *Species nomina nuda* publiziert werden, vgl. man Opinion 48.

Genus **Planesticus** Bonaparte, Compt. Rend. Acad. Sci. Paris 38, 1854, p. 3¹⁾).

Type durch nachträgliche Bestimmung (Baird, Review Amer. Birds I, 1864, p. 12): *Turdus lereboulleti* Bonap. = *Turdus jamaicensis* Gm.

Genus **Hylocichla** Baird, Review Amer. Birds I, 1864, p. 12.

Type durch ursprüngliche Bestimmung: *Turdus mustelinus* Gm.

Genus **Monticola** Boie, Isis, 1822, I, p. 552.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Seebohm, Cat. B. Brit. Mus. V, 1881, p. 312): *M. saxatilis* L. = *Turdus saxatilis* Linn.²⁾).

Genus **Oenanthe** Vieillot, Analyse d'une nouv. Ornith. 1816, p. 43.

Type durch Tautonomie: „Le Motteux“ Buffon's = *Motacilla Oenanthe* Linn.

Genus **Saxicola** Bechstein, Ornith. Taschenb. Deutschl. I, 1802, p. 216.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Swainson, Zool. Journ. III, 1827, p. 172): *Motacilla rubecola* „Linn.“ = *M. rubicola* Linn.

Genus **Phoenicurus** Forster, Syn. Cat. Brit. Birds 1817, p. 16.

Type durch Tautonomie: *Phoenicurus ruficilla* Forst. (nom. nov. für *Sylvia phoenicurus* (L.)) = *Motacilla Phoenicurus* Linn.

Genus **Luscinia** Forster, Syn. Cat. Brit. Birds 1817, p. 14³⁾).

Type durch Monotypie: *Luscinia aedon* Forster (= *Sylvia luscinia* Forst. nec Linn.) = *Luscinia megarhynchos* Brehm.

Genus **Erithacus** Cuvier, Leçons d'Anat. Comp. I, 1800, tab. II.

Type durch Monotypie: „Le rouge-gorge“ = *Motacilla Rubecula* Linn. apud Cuvier, Tabl. élém. hist. nat. Anim. 1798, p. 218⁴⁾. (Siehe Opinion 39.)

¹⁾ *Merula* Koch, Syst. Baier. Zool. I, publ. vor Juli 1816, p. 242 (Type durch Monotypie: *Turdus roseus* Linn.) hat Priorität über *Merula* Leach, Syst. Cat. Spec. Mamm. & Birds, publ. nach August 1816, p. 20 (Type durch Monotypie: *Merula nigra* Leach = *Turdus merula* Linn.). Der nächste Gattungsname für die Amsel ist *Planesticus* 1854.

²⁾ Die Autoren der „List of Brit. Birds“, 2. edit., 1915. p. 366, behaupten, daß Gray (1840, p. 26) als Gattungstypus *M. saxatilis* bestimmt hätte. Diese Angabe ist irrtümlich. Gray hat in beiden Ausgaben seiner List of Genera, 1840 und 1841, die genannte Art als Typus von *Petrocossyphus* Boie 1826 fixiert, wogegen die Type von *Monticola* augenscheinlich erst durch Seebohm (1881) festgelegt worden ist.

³⁾ Siehe Oberholser, Auk, 23, 1906, p. 228—229.

⁴⁾ Cuvier (1800) kreierte den Gattungsnamen *Erithacus* für die „Rouge-gorges“. Nach Opinion 39 sind Cuvier's Genusnamen in den „Leçons d'Anat. Comp.“ durch den Hinweis auf das „Tableau élémentaire“ als gültig zu be-

Genus **Prunella** Vieillot, Analyse d'une nouv. Ornith. 1816, p. 43. (Siehe Fußnote 1.)

Type durch Monotypie: „Fauvette de haie, Buffon“ (= „Fauvette d'hiver“ bei Buffon) = *Motacilla modularis* Linn.

Genus **Troglodytes** Vieillot, Hist. Nat. Ois. Amér., sept. II, „1807“, p. 52.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Baird, Pacific R. R. Reports 9, 1858, p. 367): *Troglodytes aëdon* Vieill.

Genus **Cinclus** Borkhausen, Deutsche Fauna I, 1797, p. 300¹⁾.

Type durch Monotypie: *Cinclus hydrophilus* Borkh. = *Sturnus Cinclus* Linn.

Genus **Hirundo** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 191.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, List Gen. Birds 1840, p. 8): *Hirundo rustica* Linn.²⁾.

Genus **Delichon** Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. 22, „1854“, publ. April 1855, p. 104.

Type durch Monotypie: *Delichon nipalensis* Moore²⁾.

Genus **Riparia** Forster, Syn. Cat. Brit. Birds 1817, p. 17.

Type durch Monotypie: *Riparia europaea* Forst. = *Hirundo riparia* Linn.

Genus **Micropus** Wolf: in Meyer und Wolf, Taschenb. deutsch. Vögelk. I, 1810, p. 280³⁾.

Type durch nachträgliche Bestimmung (B. O. U. Committee, List of Brit. Birds, 2. edit., 1915, p. 120): *Micropus apus* (Linn.) = *Hirundo Apus* Linn.

trachten. Auf p. 218 des letzteren Werkes findet sich nur eine Art mit dem Trivialnamen „Le Rouge-gorge“, nämlich *Motacilla rubecula* Linn., welche somit durch Monotypie der Typus von *Erithacus* wird. *Dandalus* Boie 1826 bleibt als Synonym bei *Erithacus* Cuv. 1800.

¹⁾ Die Vorrede ist datiert: „April 1797“, das Werk dürfte demnach im Frühjahr oder Sommer dieses Jahres ausgegeben worden sein. *Accentor* Bechstein (Getreue Abbild. Naturhist. Gegenstände II, Heft 3, 1797, p. 47, tab. 30), type: *A. aquaticus* Bechst. [= *Sturnus Cinclus* Linn.] ist sicher später, laut Richmond (Proc. U. S. Mus. 35, 1908, p. 585) frühestens im September 1797 erschienen. *Accentor* ist somit ein Synonym von *Cinclus* Borkh., wogegen für die Braunellen der nächste Name, *Prunella* Vieill. in Anwendung gelangt.

²⁾ Die Rauchschwalbe war in neuester Zeit vielfach mit dem Namen *Chelidon* bezeichnet worden. Die von Forster 1817 vorgenommene Zerlegung der alten Linné'schen Gattung *Hirundo* kann jedoch nach den Bestimmungen der internationalen Nomenklaturregeln nicht als gültig angesehen werden. Vielmehr war es Gray, der 1840 zum erstenmal *Hirundo rustica* ausdrücklich als Typus der Gattung *Hirundo* L. fixierte, welche somit weiterhin für die Rauchschwalbe beizubehalten ist. Der nächste für die Mehlschwalbe verfügbare Gattungsname ist *Delichon* Moore (Proc. Zool. Soc. Lond. 1854, p. 104), welcher für die mit unserer einheimischen Art congenerische indische Schwalbe *Delichon nipalensis* Moore begründet worden ist.

³⁾ In Übereinstimmung mit den Nomenklatur-Kommissionen der Amer. Ornith. Union und Brit. Orn. Union betrachten wir *Apus* Scopoli (Introductio Hist.

Genus **Caprimulgus** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 193.

Type durch Tautonomie: „*Caprimulgus*“ = *Caprimulgus europaeus* Linn. (Opinion 16).

Genus **Merops** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 117.

Type durch Tautonomie: „*Merops*“ = *Merops Apiaster* Linn. (Opinion 16).

Genus **Upupa** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 117.

Type durch Tautonomie: „*Upupa*“ = *Upupa Epops* Linn. (Opinion 16).

Genus **Coracias** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 107.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, Cat. Gen. & Subgen. Birds, 1855, p. 13): *Coracias garrulus* Linn.

Genus **Alcedo** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 115.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Swainson, Zool. Illustr., I, 1820, tab. 26): *Alcedo ispida* Linn.

Genus **Cuculus** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 110.

Type durch Tautonomie: „*Cuculus*“ = *Cuculus canorus* Linn. (Opinion 16).

Genus **Picus** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 112.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Swainson, Zool. Ill., I, 1820, tab. 14): *Picus viridis* Linn.

Genus **Dryobates** Boie, Isis, 1826, II, p. 977¹⁾.

Type durch Monotypie: *Picus pubescens* Gm. = *Picus pubescens* Linn. 1766 (Opinion 46).

Genus **Picoïdes** Lacépède, Tableaux méthodiques des Oiseaux, 1799, p. 7 (gute Kennzeichnung der Gattungsmerkmale).

Type durch nachträgliche Bestimmung (Kaup, Skizz. Entwicklungsgesch. & Natürl. Syst. Europ. Thierw. I, 1829, p. 134): *Picus tridactylus* Linn.

Genus **Dryocopus** Boie, Isis, 1826, II, p. 977.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, List Gen. Birds, 1840, p. 54): *Picus martius* Linn.

Nat. 1777, p. 483) als präokkupiert durch *Apos* desselben Autors (cfr. Reichenow, Orn. Monatsber. 5, 1897, p. 26—27). Apsteins Behauptung (cfr. Orn. Monatsber. 23, 1915, p. 111), daß der Name *Apus* schon bei Schäffer (Abhandl. von Insekten II, 1764, p. 68, 188 [nicht 488]) in generischem Sinne vorkomme, ist unzutreffend. Der älteste verfügbare Name für die Segler ist *Micropus* Wolf 1810.

¹⁾ Der lange Zeit für die Buntspechte gebräuchliche Name *Dendrocopos* Koch [Syst. Baier. Zool. I, Juli 1816, p. 72: Type durch nachträgliche Bestimmung (Hargitt, Cat. B. Brit. Mus. 18, 1890, p. 201): *Picus major* Linn.] ist präokkupiert durch *Dendrocopus* Vieillot [Analyse d'une nouv. Ornith., April 1816, p. 45 (Spezies: „Picucule“ = *Dendrocolaptes certhia* Bodd., und „Talapiot“ = *Dendroplex picus* (Gm.). — Wir fixieren als Genotype von *Dendrocopus* Vieill. „Le Picucule“ Buffon's = *Dendrocolaptes certhia* Bodd.)].

Genus **Jynx** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 112.

Type durch Monotypie: *Jynx Torquilla* Linn.

Genus **Bubo** Duméril, Zool. Anal. 1806, p. 34.

Type durch Monotypie: „Les Ducs“ = *Strix bubo* Linn. (Vgl. Froriep, Analyt. Zoologie 1806, p. 35.) (Opinion 46.)

Genus **Otus** Pennant, Indian Zoology, 1769, p. 3.

Type durch Monotypie: *Otus bakkamoena* Penn.

Genus **Asio** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 28, 477.

Type durch Tautonomie: „*Asio*“ = *Strix otus* Linn.

Genus **Cryptoglaux** Richmond, Auk, 18, 1901, p. 193¹⁾.

Type durch ursprüngliche Bestimmung: *Strix tengmalmi* Gm. = *Strix funerea* Linn.

Genus **Carine** Kaup, Skizz. Entwicklungsgesch. & Natürl. Syst. Europ. Thierw. I, 1829, p. 29²⁾.

Type durch Monotypie: „*Strix passerina*“ = *Strix noctua* Scop.³⁾.

Genus **Glaucidium** Boie, 1826, II, p. 970 (irrtümlich „976“ paginiert).

Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, List Gen. Birds 1840, p. 6): *Glaucidium passerinum* (L.) = *Strix passerina* Linn.⁴⁾.

Genus **Surnia** Duméril, Zool. Analyt. 1806, p. 34.

Type durch Monotypie: „*Surnie*“ = *Strix hudsonia* Gm. = *S. caparoch* Müll. (Vgl. Froriep, Analyt. Zool., 1806, p. 35.)

Genus **Strix** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 92⁵⁾.

Type durch Tautonomie: „*Strix*“ = *Strix stridula* Linn. = *Strix Aluco* Linn. (Opinion 16).

¹⁾ Die vielfach in Gebrauch stehenden Gattungsnamen früheren Datums sind als präokkupiert zu betrachten: *Nyctale* Brehm 1831 durch *Nyctalus* Bowdich 1825, *Aegolius* Kaup 1829 durch *Aegolia* Billberg 1828.

²⁾ *Athene* Boie 1822 ist präokkupiert durch *Athena* Hübner 1820.

³⁾ Kaup zitiert als einzige Art „*St. passerina*“ ohne Autornamen, womit aber zweifellos *Strix noctua* Scop., der Steinkauz, gemeint ist, wie aus dem p. 30 angegebenen Merkmale „Eulen mit . . . fast nackten Zehen“ hervorgeht. Überdies hat Kaup selbst später, z. B. in seiner Übersicht der Eulen (Isis, 1848, p. 769), die Gattung *Carine* als Synonym von *Athene* Boie 1822 und *Noctua* Sav., die sich beide auf den Steinkauz beziehen, betrachtet, während er den Sperlingskauz, *S. passerina* Linn. (nec auct. vet.) zum Typus des Subgenus *Microptynx* Kaup (Isis, 1848, p. 768) erhob.

⁴⁾ Die Check-List of N. Amer. Birds, 3. edit., 1910, p. 177, erklärt die Genotype als durch Monotypie fixiert. Dies ist ein Irrtum. Boie (1826) schließt in der Gattung *Glaucidium* zwei Arten ein: *St. nana* Temm., *St. passerina* Lin. Erst Gray (1840) hat letztere als Typus festgelegt.

⁵⁾ Synonym ist *Syrnium* Savigny (Descr. de l’Egypte, Hist. Nat., I, 1809, p. 111; Type durch Monotypie: *Syrnium ululans* Savigny = *Strix aluco* Linn.).

Genus **Tyto** Billberg, Syn. Faun. Scand. I, Pars 2, 1828, tab. A (nom. nov. für *Strix* Savigny in: Description de l’Egypte, Hist. Nat., I, 1809 p. 113¹⁾).

Type durch Monotypie: *Strix flammea* auct. = *Strix alba* Scop.

Genus **Nyctea** Stephens in: Shaw, Gen. Zool. 13, II, 1826, p. 62.

Type durch Tautonomie: *Strix erminea* Shaw = *Strix Nyctea* Linn.

Genus **Falco** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 88.

Type durch nachträgliche Bestimmung (A. O. U. Committee in: Check-List N. Amer. Birds 1886, p. 193): *Falco subbuteo* Linn.

Genus **Aquila** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 28, 419.

Type durch Tautonomie: „*Aquila*“ = *Falco chrysaëtos* Linn.

Genus **Hieraaëtus** Kaup, Classif. Säugeth. Vög., 1844, p. 120.

Type durch ursprüngliche Bestimmung: *Aquila pennata* = *Falco pennatus* Gm.

Genus **Archibuteo** Brehm, Handb. Naturg. Vög. Deutschl. 1831, p. 38²⁾.

Type durch Monotypie: *Archibuteo planiceps* Brehm und *A. alticeps* Brehm, beide = *Falco lagopus* Linn. = *Falco Lagopus* Brünn.

Genus **Buteo** Lacépède, Tableaux méthod. Oiseaux, 1799, p. 4.

Type durch Tautonomie: „*Buteo*“ = *Falco Buteo* Linn.

Genus **Circus** Lacépède, Tableaux méthod. Oiseaux, 1799, p. 4.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Lesson, Manuel d’Ornith. I, 1828, p. 105): *Falco aeruginosus* Linn.

Genus **Astur** Lacépède, Tableaux méthod. Oiseaux, 1799, p. 4.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Vigors, Zool. Journ. I, 1824, p. 326): *Falco palumbarius* Linn. = *Falco gentilis* Linn.

Genus **Accipiter** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 28, 310.

Type durch Tautonomie: „*Accipiter*“ = *Falco Nisus* Linn.

¹⁾ Reichenow (Ornith. Monatsber. 21, 1913, p. 174) glaubt den Gattungsnamen *Strix* für die Schleiereule beibehalten zu dürfen, weil Schäffer (Elementa Ornith. 1774, Sect. III, n^o. 95) diese Art als Vertreter der Gattung *Strix* abgebildet habe. Da indessen Schäffer’s Vorgehen nicht als Fixierung einer Genotype im Sinne des § 30 der I. N., sondern lediglich als Zitierung eines Beispiels anzusehen ist (was übrigens aus der ‘Lectori benevolo’ betitelten Vorrede Schäffer’s klar erhellt), wird Reichenow’s Schlußfolgerung hinfällig.

²⁾ In der „Isis“ 1828, p. 1269, ist *Archibuteo* als nomen nudum zu betrachten, da die zwei darin eingeschlossenen Arten: *A. planiceps* Br. und *A. alticeps* Br. damals noch nicht beschrieben waren.

Genus **Milvus** Lacépède, Tabl. méthod. Oiseaux, 1799, p. 4.

Type durch Tautonomie: „*Milvus*“ = *Falco Milvus* Linn.

Genus **Haliaeetus** Savigny, Descr. de l’Egypte, Hist. Nat. I, livr. 1, 1809, p. 85.

Type durch Monotypie: *Haliaeetus Nisus* Savigny = *Falco Albicilla* Linn.

Genus **Pernis** Cuvier, Règne Animal I, 1817, p. 322.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, List Gen. Birds, 1840, p. 4): *Pernis apivorus* (L.) = *Falco apivorus* Linn.

Genus **Circaëtus** Vieillot, Analyse d’une nouv. Orn., 1816, p. 23.

Type durch Monotypie: Buffon’s „Jean-le-Blanc“ = *Falco gallicus* Gm.

Genus **Pandion** Savigny, Descr. de l’Egypte, Hist. Nat. I, livr. 1, 1809, p. 95.

Type durch Monotypie: *Pandion fluvialis* Savigny = *Falco haliaëtus* Linn.

Genus **Gyps** Savigny, Descr. de l’Egypte, Hist. Nat. I, livr. 1, 1809, p. 71.

Type durch Monotypie: *Gyps vulgaris* Savigny = *Vultur fulvus* Hablizl.

Genus **Aegypius** Savigny, Descr. de l’Egypte, Hist. Nat. I, livr. 1, 1809, p. 73¹⁾.

Type durch Monotypie: *Aegypius niger* = *Vultur Monachus* Linn.

Genus **Ciconia** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 48; V, p. 361.

Type durch Tautonomie: „*Ciconia*“ = *Ciconia alba* = *Ardea alba* Linn.

Genus **Plegadis** Kaup, Skizz. Entwicklungsgesch. & Natürl. Syst. Europ. Thierw. I, 1829, p. 82²⁾.

Type durch Monotypie: *Ibis falcinellus* = *Tantalus falcinellus* Linn.

Genus **Platalea** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 139.

Type durch spätere Bestimmung (Gray, List Gen. Birds, 1840, p. 67): *Platalea leucorodia* Linn.

Genus **Ardea** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 141.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, List Gen. Birds, 1840, p. 66): *Ardea cinerea* Linn.

¹⁾ Der Gattungsname *Vultur* Linn. [Syst. Nat. 10. I, 1758, p. 86], der lange Zeit für den Mönchsgeier in Gebrauch war, hat für den Kondor zu stehen (Type durch nachträgliche Bestimmung [Allen 1907]: *Vultur gryphus* Linn.). Siehe Zoolog. Anzeiger 42, 1913, p. 527.

²⁾ *Egatheus* Billberg 1828, erwies sich bei näherer Prüfung als Synonym von *Ibis* Lacépède 1799. Siehe Mathews, Auk, 30, 1913, p. 92—95.

Genus **Casmerodius** Gloger, Gemeinn. Hand- & Hilfsbuch Naturg. I, 1842, p. 412¹⁾.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Salvadori, Ornith. Papuas. III, 1882, p. 349): *Ardea egretta* Gm.

Genus **Egretta** Forster, Syn. Cat. Brit. B. 1817, p. 59.

Type durch Monotypie: *Ardea Garzetta* Linn.

Genus **Ardeola** Boie, Isis, 1822, I, p. 559.

Type durch Monotypie: *Ardeola ralloides* Boie = *Ardea ralloides* Scop.

Genus **Nycticorax** Forster, Syn. Cat. Brit. B. 1817, p. 59.

Type durch Monotypie: *Nycticorax infaustus* Forst. (nom. nov.) = *Ardea Nycticorax* Linn.

Genus **Ixobrychus** Billberg, Syn. Faun. Scand., 1, II, 1828, p. 166²⁾.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Stone, Auk, 24, 1907, p. 192): *Ixobrychus minutus* = *Ardea minuta* Linn.

Genus **Botaurus** Stephens in: Shaw, Gen. Zool., 11, II, 1819, p. 592.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, List Gen. Birds 1840, p. 66): *Botaurus stellaris* Steph. = *Ardea stellaris* Linn.

Genus **Phoenicopterus** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 139.

Type durch Monotypie: *Phoenicopterus ruber* Linn.

Genus **Cygnus** Bechstein, Orn. Taschenb. Deutschl. II, 1803, p. 404, Fußnote *.

Type durch Tautonomie: *Anas Cygnus* Linn.

Genus **Anser** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 58; VI, p. 261.

Type durch Tautonomie: „*Anser*“ = *Anas Anser* Linn.

Genus **Branta** Scopoli, Ann. I. Hist. Nat., 1769, p. 67.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Allen, Bull. Amer. Mus. N. H., 24, Dec. 1907, p. 32)³⁾: *Branta bernicla* (L.) = *Anas Bernicla* Linn.

¹⁾ Der bisher für den Silberreiher übliche Gattungsname *Herodias* Boie (Isis, 1822, I, p. 559; Type durch nachträgliche Bestimmung [Gray, List Gen. B., 2. ed., 1841, p. 86]: *Herodias garzetta* Boie = *Ardea Garzetta* Linn.) ist ein absolutes Synonym von *Egretta* Forster 1817 (mit derselben Genotype). Als nächst gültiger Name tritt somit *Casmerodius* Glog. 1842 in Kraft. Cfr. Mathews, Austr. Av. Rec. II, n^o. 5, Sept. 1914, p. 88—89.

²⁾ *Ixobrychus* Billberg 1828 hat um viele Jahre die Priorität vor *Ardetta* Gray 1842.

³⁾ Bannister (Proc. Acad. N. Sci. Philad. 1870, p. 131) sagt lediglich: „The Genus *Brante* (sic) was adopted from Klein by Scopoli in 1769, the first species being *Anas bernicla*, L.“, unterließ es aber, diese Art ausdrücklich als Genotype zu bestimmen, was erst durch Allen 1907 geschah.

Genus **Tadorna** Fleming, Philos. of Zool. II, 1822, p. 260.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Lesson, Manuel d'Orn. II, 1828, p. 416): *Anas Tadorna* Linn.

Genus **Anas** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 122.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Lesson, Manuel d'Orn. II, 1828, p. 417): *Anas boschas* L. = *Anas platyrhynchos* Linn.¹⁾.

Genus **Chaulelasmus** Bonaparte, Geogr. & Comp. List Birds Eur. & North America 1838, p. 56.

Type durch Monotypie: *Chaulelasmus streperus* „Gray“ = *Anas strepera* Linn.

Genus **Nettion** Kaup, Skizz. Entwicklungsgesch. & Nat. Syst. Europ. Thierw. I, 1829, p. 95, 196.

Type durch Monotypie (p. 196): *Anas crecca* Linn.

Genus **Querquedula** Stephens in: Shaw, Gen. Zool., 12, II, 1824, p. 142.

Type durch Tautonomie: *Querquedula circia* = *Anas Querquedula* Linn.

Genus **Mareca** Stephens in: Shaw, Gen. Zool., 12, II, 1824, p. 130.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Eyton, Monogr. Anat. 1838, p. 33): *Mareca fistularis* Steph. = *Anas penelope* Linn.

Genus **Spatula** Boie, Isis, 1822, I, p. 564²⁾.

Type durch Monotypie: *Spatula clypeata* = *Anas clypeata* Linn.

Genus **Dafila** Stephens in: Shaw, Gen. Zool., 12, II, 1824, p. 126.

Type durch Monotypie: *Dafila caudacuta* Steph. = *Anas acuta* Linn.

Genus **Netta** Kaup, Skizz. Entwicklungsgesch. & Natürl. Syst. Europ. Thierw. I, 1829, p. 102, 196.

Type durch Monotypie (p. 196): *A. rufina* Pall.

¹⁾ In Opinion 16 (p. 38) wird *Anas* irrtümlich jenen Fällen zugezählt, in denen die Genotype einer Linné'schen Gattung durch absolute Tautonomie ermittelt werden kann. Dieser Trugschluß entstand augenscheinlich durch falsches Zitieren des Gesner'schen Namens als „*Anas vera torquata minor*“, während es tatsächlich „*Anas fera torquata minor*“ lautet, was natürlich eine durchaus verschiedene Situation schafft. Das Prinzip der Tautonomie ist also hier nicht anwendbar. Die früheste Fixierung des Typus erfolgte augenscheinlich durch Lesson 1828. Siehe auch Zool. Anzeiger 42, 1913, p. 521.

²⁾ Siehe Opinion 46, und Canon XL des „Code of Nomenclature, Amer. Ornith. Union“ (revised edit., 1908).

Genus **Nyroca** Fleming, Philos. of Zool. II, 1822, p. 260.

Type durch Tautonomie: *Nyroca nyroca* (Güld.) = *Anas nyroca* Güld.

Genus **Glaucionetta** Stejneger, Proc. U. S. Mus., 8, n°. 26, Sept. 1885, p. 409¹⁾.

Type durch ursprüngliche Bestimmung: *Anas clangula* Linn.

Genus **Clangula** Leach in: Ross, Voyage Discovery Baffinsland etc., Appendix, 1819, p. XLVIII²⁾.

Type durch Monotypie: *Clangula glacialis* = *Anas hyemalis* Linn.

Genus **Histrionicus** Lesson, Manuel d'Orn. II, 1828, p. 415.

Type durch ursprüngliche Bestimmung: *Anas histrionica* Linn.

Genus **Marmaronetta** Reichenbach, Av. Syst. Nat., 1852, p. IX.

Type durch ursprüngliche Bestimmung: *Marmaronetta angustirostris* Rchb. = *Anas angustirostris* Ménétr.

Genus **Erismatura** Bonaparte, Giornale Arcadico (Roma) 52, 1832, p. 208³⁾.

Type durch Monotypie: *Anas rubidus* Wilson = *Anas jamaicensis* Gm.

Genus **Somateria** Leach, Annals of Philos. 13, Jan. 1819, p. 61⁴⁾.

Type durch Monotypie: „*Somateria Mollissima*“ = *Anas mollissima* Linn.

Genus **Oidemia** Fleming, Philos. of Zool. II, 1822, p. 260.

Type durch spätere Bestimmung (Gray, List Gen. Birds, 1840, p. 74): *Oidemia nigra* Flem. = *Anas nigra* Linn.

Genus **Mergus** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 129.

Type durch spätere Bestimmung (Gray, List Gen. Birds, 1840, p. 76): *Mergus Castor* Linn. = *Mergus Merganser* Linn.

Genus **Mergellus** Selby, Catal. Gen. Subgen. Types Birds 1840, p. 47.

Type durch Monotypie: *Mergus Albellus* Linn.

¹⁾ *Glaucion* Kaup (Skizz. Entwicklungsgesch. & Natürl. Syst. Europ. Thierw. I, 1829, p. 53, 196; Type durch Monotypie: *Anas clangula* Linn.) ist präokkupiert durch *Glaucion* Oken (Lehrb. Naturg. 3, I, 1815, p. IX) für eine Molluskengattung (siehe Iredale, Ibis 1915, p. 389).

²⁾ *Harelda* Stephens in: Shaw, Gen. Zool., 12, II, 1824, p. 174 (Type durch Monotypie: *Harelda glacialis* = *Anas hyemalis* Linn.) ist ein bloßes Synonym von *Clangula* Leach 1819.

³⁾ *Oxyura* Bonaparte 1828 ist präokkupiert durch *Oxyurus* Rafinesque 1810.

⁴⁾ Nach Canon XL des „Code of Nomenclature Amer. Ornith. Union“ (revised edition, 1908) ist Leach's Angabe „*Somateria mollissima*“ hinreichend, um dem Gattungsnamen *Somateria* Gültigkeit zu verleihen.

Genus **Phalacrocorax** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 60; VI, p. 511.

Type durch Tautonomie: „*Phalacrocorax*“ = *Pelecanus Carbo* Linn.

Genus **Pelecanus** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 132.

Type durch Tautonomie: „*Onocrotalus* s. *Pelecanus*“ = *Pelecanus Onocrotalus* Linn. (Opinion 16).

Genus **Thalassidroma** Vigors, Zool. Journ. II, 1825, p. 405, Fußnote¹⁾.

Type durch ursprüngliche Bestimmung: *Procellaria pelagica* Linn.

Genus **Podiceps** Latham, Gen. Syn. Birds, Suppl. I, 1787, p. 294²⁾.

Type durch spätere Bestimmung (Gray, List Gen. Birds, 1840, p. 76): *Podiceps cristatus* (Linn) = *Colymbus cristatus* Linn.

Genus **Colymbus** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 135²⁾.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, Cat. Gen. Subgen. Birds, 1855, p. 125): *Colymbus arcticus* Linn.

Genus **Haematopus** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 152.

Type durch Monotypie: *Haematopus ostralegus* Linn.

Genus **Oedicnemus** Temminck, Man. d'Ornith. 1815, p. 321.

Type durch Monotypie: *Oedicnemus crepitans* Temm. = *Charadrius Oedicnemus* Linn.

Genus **Cursorius** Latham, Ind. Orn. II, 1790, p. 751.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Swainson, Zool. Ill. II, 1822, Text zu tab. 106): *Cursorius Europaeus* Lath. = *Charadrius gallicus* Gm.

Genus **Eudromias** Brehm, Isis 23, 1830, p. 987.

Type durch Monotypie: *Eudromias morinella* „Boie“ = *Charadrius Morinellus* Linn.³⁾.

¹⁾ Den Gattungsnamen *Hydrobates* Boie (Isis, 1822, I, p. 562) betrachten wir als präokkupiert durch *Hydrobata* Vieillot (Analyse d'une nouv. Ornith., 1816, p. 42).

²⁾ Während der letzten 30 Jahre verwendeten die amerikanischen Ornithologen für die Steiße den Namen *Colymbus* und für die Seetaucher die Bezeichnung *Gavia*. Das Vorgehen von Baird, Brewer & Ridgway (1884), welche *Colymbus cristatus* als Genotype von *Colymbus* Linnaeus 1758 fixierten, ist jedoch nicht angängig, da bereits 1855 Gray (Cat. Gen. Subgen. Birds p. 125) als Typus der Gattung den Polartaucher *Colymbus arcticus* bestimmt hatte. Infolgedessen müssen die Seetaucher unter dem Gattungsnamen *Colymbus* zusammengefaßt werden, wogegen die Steiße *Podiceps* Latham 1787 (Genotype: *Podiceps cristatus*) zu heißen haben. Cf. Mathews and Iredale, Ibis, 1913, p. 217—218 und Stone, Auk 30, 1913, p. 458.

³⁾ *Charadrius morinellus* Linn. wird durch Monotypie die Genotype von *Eudromias*, da die zwei anderen, von Brehm genannten Arten: *Eudromias*

Genus **Charadrius** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 150¹⁾.

Type durch Tautonomie: „*Charadrios* s. *Hiaticula*“ Aldrovandi = *Charadrius Hiaticula* Linn. (Opinion 16 und Zool. Anzeiger 42, n°. 11, Sept. 1913, p. 523).

Genus **Pluvialis** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 46; V, p. 42.

Type durch Tautonomie: „*Pluvialis aurea*“ Brisson = *Charadrius pluvialis* Linn. = *Charadrius apricarius* Linn.

Genus **Squatarola** Cuvier, Règne Anim. I, 1817, p. 467²⁾.

Type durch Tautonomie: *Tringa squatarola* Linn.

Genus **Vanellus** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 48; V, p. 94.

Type durch Tautonomie: „*Vanellus*“ = *Tringa Vanellus* Linn.

Genus **Arenaria** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 48; V, p. 132.

Type durch Tautonomie: „*Arenaria*“ = *Tringa interpres* Linn.

Genus **Pavoncella** Leach, Syst. Cat. Spec. Indig. Mamm. & Birds Brit. Mus., 1816, p. 29³⁾.

Type durch Monotypie: *Pavoncella pugnax* = *Tringa Pugnax* Linn.

Genus **Canutus** Brehm, Handb. Naturg. Vög. Deutschl. 1831, p. 653.

Type durch Monotypie: *Canutus Islandicus* Brehm + *C. cinereus* Brehm = *Tringa Canutus* Linn.

Genus **Calidris** Illiger, Prodr. Syst. Mamm. & Av., 1811, p. 249.

Type durch Monotypie: *Charadrius Calidris* Linn. = *Trynga alba* Pall.

Genus **Pelidna** Cuvier, Règne Animal I, 1817, p. 490.

Type durch spätere Bestimmung (Gray, List Gen. Birds, 1840, p. 69): *Pelidna cinclus* L. = *Tringa cinclus* L. 1766 = *Tringa alpina* Linn. 1758.

montana Br. und *E. stolidus* Br. als *nomina nuda* aus der Betrachtung ausschneiden. Sie wurden erst 1831 im Handbuch beschrieben.

¹⁾ *Aegialitis* Boie, Isis, 1822, I, p. 558 (Type durch spätere Bestimmung (Gray, Cat. Gen. Subgen. Birds 1855, p. 111): *Aegialitis hiaticula* (L.) = *Charadrius Hiaticula* Linn.) ist ein reines Synonym von *Charadrius* Linn. 1758.

²⁾ Zum ersten Male in der Literatur tritt *Squatarola* bei Leach (Syst. Cat. Spec. Indig. Mamm. & Birds Brit. Mus., 1816, p. 29) auf. Da jedoch die einzige genannte Art *S. grisea* damals unbeschrieben war, ist der Name als *nomen nudum* zu verwerfen. Somit gilt Cuvier 1817 als Autor des Gattungsnamens.

³⁾ Der von Leach aufgestellte Gattungsname *Pavoncella* kann keineswegs als *nomen nudum* angesehen werden, da in seiner Begleitung eine bekannte Art, *P. pugnax* zitiert wird. Der Fall ist vollkommen analog dem von *Spatula* Boie. In beiden Fällen erwähnt der Autor des neuen Gattungsnamens eine Linné'sche Art ohne Hinzufügung des Autors der Speziesbezeichnung. [Siehe hierzu Opinion 46, und Code of Nomenclature A. O. U. 1908, p. LXIV, Canon XL.] *Paroncella* tritt also wieder an Stelle von *Machetes* Cuvier (Regne Animal I, 1817, p. 490; Type durch Monotypie: *Tringa pugnax* L.).

Genus **Pisobia** Billberg, Syn. Faun. Scand. 1, II, 1828, p. 136.
Type durch nachträgliche Bestimmung (A. O. U. Committee, Auk 25, 1908, p. 366): *Tringa minuta* Leisler.

Genus **Arquatella** Baird, Rep. Expl. & Surv. R. R. Pac., 9, 1858, p. 717.
Type durch Monotypie: *Tringa maritima* Brünn.

Genus **Limicola** Koch, Syst. baier. Zool., I, 1816, p. 316.
Type durch Monotypie: *Limicola pygmaea* (Gm.) = *Scolopax falci-
nellus* Pontoppidan.

Genus **Actitis** Illiger, Prodr. Syst. Mamm. Av., 1811, p. 262.
Type durch spätere Bestimmung (A. O. U. Committee, Check List N. Amer. Birds 1886, p. 158): *Tringa Hypoleucos* Linn.

Genus **Tringa** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 148.
Type durch Tautonomie: „*Tringa*“ Aldrovandi = *Tringa Ocropus* Linn. (Siehe Opinion 16, und Mathews, Nov. Zool. 18, 1911, p. 6).

Genus **Totanus** Bechstein, Orn. Taschenb. Deutschl. II, 1803, p. 282.
Type durch Tautonomie: *Totanus maculatus* Bechst. = *Scolopax Totanus* Linn.

Genus **Phalaropus** Brisson, Orn. I, 1760, p. 50; VI, p. 12.
Type durch Tautonomie: „*Phalaropus*“ = *Tringa fulicaria* Linn.

Genus **Recurvirostra** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 151.
Type durch Monotypie: *Recurvirostra Arosetta* Linn.

Genus **Limosa** Brisson, Orn. I, 1760, p. 48; V, p. 261.
Type durch Tautonomie: „*Limosa*“ = *Scolopax Limosa* Linn.

Genus **Numenius** Brisson, Orn. I, 1760, p. 48; V, p. 311.
Type durch Tautonomie: „*Numenius*“ = *Scolopax Arquata* Linn.

Genus **Gallinago** Koch, Syst. baier. Zool. I, 1816, p. 312.
Type durch Tautonomie: *Gallinago media* Koch = *Scolopax Gallinago* Linn.

Genus **Lymnocyptes** Kaup, Skizz. Entwickl. & Natürl. Syst. Europ. Thierw. I, 1829, p. 118, 194¹⁾.
Type durch Monotypie: *Scolopax gallinula* Linn.

Genus **Scolopax** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 145.
Type durch Tautonomie: „*Scolopax*“ Aldrovandi = *Scolopax Rusticola* Linn.

¹⁾ Kaup schreibt beide Male *Lymnocyptes*, nicht *Limnocyptes*. Die ursprüngliche Schreibweise ist beizubehalten.

Genus **Hydrochelidon** Boie, Isis, 1822, I, p. 563¹⁾.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, List Gen. Birds, 2. edit., 1841, p. 100): *Hydrochelidon niger* (Linn.) = *Sterna nigra* Linn.

Genus **Gelochelidon** Brehm, Isis, 23, 1830, p. 994.

Type durch Monotypie: „Die südliche Lachseeschwalbe, *G. meridionalis* Br.“ = *Sterna meridionalis* Brehm 1824 = *Sterna anglica* Montague²⁾.

Genus **Sterna** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 137.

Type durch Tautonomie: „*Sterna*“ = *Sterna Hirundo* Linn. (Opinion 16).

Genus **Larus** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 136.

Type durch spätere Bestimmung (Gray, List Gen. Subgen. Birds 1855, p. 130): *Larus canus* Linn.

Genus **Rissa** Stephens in: Shaw, Gen. Zool. 13, I, 1826, p. 180.

Type durch Monotypie: *Rissa Brunnichii* (ex Leach Ms.) Stephens = *Larus tridactylus* Linn.

Genus **Megalestris** Parzudaki (ex Bonaparte Ms.), Cat. d'Ois. d'Europe 1856, p. 11³⁾.

Type durch Monotypie: „*Megalestris catarrhactes* Bp. ex L.“ = *Catharacta Skua* Brünn.

Genus **Stercorarius** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 56; VI, p. 149.

Type durch Monotypie: „*Stercorarius*“ = *Larus parasiticus* Linn.

Genus **Uria** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 52; VI, p. 70.

Type durch Tautonomie: „*Uria*“ = *Colymbus Troille* Linn. 1761.

Genus **Fratercula** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 52; VI, p. 81.

Type durch Monotypie: „*Fratercula*“ = *Alca arctica* Linn.

¹⁾ Wie Rhoads (Auk, 29, 1912, p. 198) ausführte, hat *Chlidonias* Rafinesque (The Cosmonist, No. 4, Februar 1822, p. 3, Columne 5; Typus: *Sterna melanops* Raf. = *Hydrochelidon nigra surinamensis* [Gm.]) um einige Monate die Priorität über *Hydrochelidon* Boie, welcher Name erst im Mai 1822 veröffentlicht worden ist. Wir zögern indessen, diese Änderung in der Benennung der Trauerseeschwalben vorzunehmen, da es zweifelhaft erscheint, ob *Chlidonias* Raf. nicht durch *Chlidonia* Hübner 1816 (Lepidopt.) als vorweggenommen zu betrachten ist. Die Entscheidung hierüber bleibt am besten der Internationalen Nomenklaturkommission vorbehalten.

²⁾ Genotype wird durch Monotypie *G. meridionalis*, da die zwei anderen von Brehm genannten Arten: *G. balthica* Br. und *G. agraria* Br. in der „Isis“ 1830 nomina nuda sind und erst im „Handbuch“ 1831 beschrieben wurden.

³⁾ Den in der List of Brit. Birds 1915 angewandten Namen *Catharacta* Brünnich (Ornith. Bor. 1764, p. 32) betrachten wir als präokkupiert durch *Catarractes* Brisson (Ornith. VI, 1760, p. 102).

Genus **Otis** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 154.

Type durch Tautonomie: „*Otis* seu *Tarda avis*“ = *Otis tarda* Linn. (Opinion 16).

Genus **Megalornis** Gray, List Gen. Birds, 2. edit., 1841, p. 85¹⁾.

Type durch ursprüngliche Bestimmung und Monotypie: *Megalornis grus* (L.) = *Ardea Grus* Linn.

Genus **Crex** Bechstein, Orn. Taschenb. Deutschl. II, 1803, p. 336.

Type durch Monotypie: *Crex pratensis* Bechst. = *Rallus Crex* Linn.

Genus **Porzana** Vieillot, Analyse d'une nouv. Ornith. élém., 1816, p. 61.

Type durch Monotypie: „*Maronette*“ Buffon's = *Rallus Porzana* Linn.

Genus **Rallus** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 153.

Type durch spätere Bestimmung (Fleming, Mem. Wern. Soc. III, 1821, p. 176): *Rallus aquaticus* Linn.

Genus **Gallinula** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 50; VI, p. 2.

Type durch Tautonomie: „*Gallinula*“ = *Fulica Chloropus* Linn.

Genus **Fulica** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 152.

Type durch Tautonomie: „*Fulica*“ = *Fulica atra* Linn.

Genus **Columba** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 162.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Vigors, Trans. Linn. Soc. 14, 1825, p. 481): *Columba Oenas* Linn.

Genus **Streptopelia** Bonaparte, Consp. Av. II, 1854, p. 63²⁾.

Type durch spätere Bestimmung (Gray, List Gen. Subgen. Birds 1855, p. 150): *Columba risoria* Linn.

Genus **Syrrhaptes** Illiger, Prodr. Syst. Mamm. Av. 1811, p. 243.

Type durch Monotypie: „*Tetrao paradoxus* Lin. Gm.“ = *Tetrao paradoxa* Pall.

Genus **Phasianus** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 158.

Type durch Tautonomie: „*Phasianus*“ = *Phasianus colchicus* Linn. (Opinion 16).

¹⁾ Der lange Zeit verwendete Gattungsname *Grus* war ursprünglich von Pallas (Misc. Zool., 1766, p. 66) für *Psophia crepitans* Linn. aufgestellt worden (siehe Allen, Bull. Amer. Mus. N. H. 23, 1907, p. 313; Mathews, Nov. Zool. 17, 1910, p. 502), ist mithin ein Synonym von *Psophia* Linn. 1766. Der nächste verfügbare Genusname für die Kraniche ist *Megalornis* Gray 1841.

²⁾ Der bisher übliche Gattungsname der Turteltaube *Turtur* Selby (Nat. Libr. Ornith. V, 1835, p. 169) ist präokkupiert durch *Turtur* Boddaert (Tabl. Pl. enl. 1783, p. 10; Type durch Monotypie: *Turtur afra* Linn.). Siehe Mathews, Nov. Zool. 17, 1910, p. 503.

Genus **Perdix** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 26, 219.

Type durch Tautonomie: „*Perdix cinerea*“ = *Tetrao Perdix* Linn.

Genus **Coturnix** Bonnaterre, Tabl. enc. méth. I, livr. 47, 1791, p. LXXXVII; livr. 51, 1792, p. 216.

Type durch Tautonomie: *Coturnix Communis* Bonnat. = *Tetrao Coturnix* Linn.

Genus **Caccabis** Kaup, Skizz. Entwicklungsgesch. & Natürl. Syst. Europ. Thierw. I, 1829, p. 183.

Type durch Monotypie: *Perdix saxatilis* Meyer.

Genus **Tetrao** Linnaeus, Syst. Nat. 10, I, 1758, p. 159.

Type durch spätere Bestimmung (Gray, List Gen. Birds 1840, p. 62): *Tetrao Urogallus* Linn.

Genus **Lyrurus** Swainson in: Richardson & Swainson, Faun. Boreali-Americ., II, Febr. 1832¹⁾, p. 497.

Type durch ursprüngliche Bestimmung: *Lyrurus tetrrix* Swains. = *Tetrao tetrrix* Linn.

Genus **Bonasa** Stephens in: Shaw, Gen. Zool. 11, II, 1819, p. 298.

Type durch nachträgliche Bestimmung (Gray, List Gen. Birds 1840, p. 62): *Bonasa Umbellus* Steph. = *Tetrao Umbellus* Linn.

Genus **Lagopus** Brisson, Ornith. I, 1760, p. 26, 181.

Type durch Tautonomie: „*Lagopus*“ Brisson = *Tetrao Lagopus* Linn.

¹⁾ Siehe Richmond, Auk, 16, 1899, p. 327.

Erratum.

Bei Nr. 227, p. 24, ist der Autorname „Ménétr.“ in Klammern zu setzen.

Inhaltsübersicht.

	Seite		Seite
<i>Corvidae.</i>		<i>Fringillidae.</i>	
Genus Corvus	35	Genus Coccothraustes	36
Corvus corax corax L.	1	Coccothraustes coccothraustes	
Corvus cornix cornix L.	1	coccothraustes (L.)	2
Corvus corone corone L.	1	Genus Chloris	36
Corvus frugilegus frugilegus L.	1	Chloris chloris chloris (L.)	2
Genus Coloeus	35	Genus Carduelis	36
Coloeus monedula spermologus		Carduelis carduelis carduelis (L.)	2
(Vieill.)	1	Genus Acanthis	36
Genus Pica	35	Acanthis cannabina cannabina	
Pica pica pica (L.)	1	(L.)	2
Genus Nucifraga	35	Acanthis flavirostris flavirostris	
Nucifraga caryocatactes caryo-		(L.)	2
catactes (L.)	1	Acanthis linaria linaria (L.)	3
Nucifraga caryocatactes macro-		Acanthis linaria holboellii	
rhynchos Brehm	1	(Brehm)	3
Genus Garrulus	35	Acanthis linaria cabaret (P. L.	
Garrulus glandarius glandarius		S. Müller)	3
(L.)	1	Genus Spinus	36
Genus Pyrrhacorax	36	Spinus spinus (L.)	3
Pyrrhacorax graculus (L.)	2	Genus Chloroptila	36
Pyrrhacorax pyrrhacorax (L.)	33	Chloroptila citrinella citrinella (L.)	3
<i>Sturnidae.</i>		Genus Serinus	37
Genus Sturnus	36	Serinus canarius germanicus	
Sturnus vulgaris vulgaris L.	2	Laubm.	3
Genus Pastor	36	Genus Pyrrhula	37
Pastor roseus (L.)	2	Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (L.)	3
<i>Oriolidae.</i>		Pyrrhula pyrrhula europaea	
Genus Oriolus	36	Vieill.	3
Oriolus oriolus oriolus (L.)	2	Genus Loxia	37
		Loxia curvirostra curvirostra L.	3
		Loxia pytyopsittacus Borkh.	3

Loxia leucoptera bifasciata (Brehm)	Seite 3
Genus Pinicola	37
Pinicola enucleator enucleator (L.)	4
Genus Fringilla	37
Fringilla coelebs coelebs L.	4
Fringilla montifringilla L.	4
Genus Montifringilla	37
Montifringilla nivalis nivalis (L.)	4
Genus Petronia	37
Petronia petronia petronia (L.)	4
Genus Passer	37
Passer domesticus domesticus (L.)	4
Passer montanus montanus (L.)	4
Genus Emberiza	37
Emberiza calandra calandra L.	4
Emberiza citrinella sylvestris Brehm	4
Emberiza hortulana L.	4
Emberiza cia cia L.	5
Emberiza caesia Cretzschm.	33
Emberiza cirrus L.	5
Emberiza schoeniclus schoeni- clus L.	5
Genus Plectrophenax	38
Plectrophenax nivalis nivalis (L.)	5
Genus Calcarius	38
Calcarius lapponicus lapponicus (L.)	5

Alaudidae.

Genus Melanocorypha	33
Melanocorypha calandra calan- dra (L.)	33
Melanocorypha yeltoniensis (Forst.)	33
Genus Galerida	38
Galerida cristata cristata (L.)	5
Genus Lullula	38
Lullula arborea arborea (L.)	5
Genus Alauda	38
Alauda arvensis arvensis L.	5

Genus Calandrella	Seite 34
Calandrella brachydactyla brachydactyla (Leisler)	34
Genus Otocoris	38
Otocoris alpestris flava (Gm.)	5

Motacillidae.

Genus Anthus	38
Anthus campestris campestris (L.)	5
Anthus trivialis trivialis (L.)	5
Anthus pratensis (L.)	6
Anthus spinoletta spinoletta (L.)	6
Anthus cervinus (Pall.)	6
Anthus richardi richardi Vieill.	6
Genus Motacilla	38
Motacilla flava flava (L.)	6
Motacilla flava thunbergi Billb.	6
Motacilla cinerea cinerea Tunst.	6
Motacilla alba alba L.	6

Certhiidae.

Genus Certhia	39
Certhia familiaris macrodactyla Brehm	6
Certhia brachydactyla brachy- dactyla Brehm	7
Genus Tichodroma	39
Tichodroma muraria (L.)	7

Sittidae.

Genus Sitta	39
Sitta europaea caesia Wolf	7

Paridae.

Genus Parus	39
Parus major major L.	7
Parus caeruleus caeruleus L.	7
Parus ater ater L.	7
Parus cristatus mitratus Brehm	7
Parus palustris communis Bal- denstein	7
Parus palustris longirostris Kleinschm.	8
Parus atricapillus salicarius Brehm	34
Parus atricapillus submontanus Kleinschm. & Tschusi	8
Parus atricapillus rhenanus Kleinschm.	8

Genus Aegithalos	Seite 39
Aegithalos caudatus europaeus (Herm.)	8

Genus Panurus	39
Panurus biarmicus biarmicus (L.)	8

Regulidae.

Genus Regulus	39
Regulus regulus regulus (L.)	8
Regulus ignicapillus ignicapillus (Tem.)	8

Laniidae.

Genus Lanius	39
Lanius minor Gm.	8
Lanius excubitor excubitor L.	9
Lanius senator senator L.	9
Lanius collurio collurio L.	9

Bombycillidae.

Genus Bombycilla	39
Bombycilla garrulus garrulus (L.)	9

Muscicapidae.

Genus Muscicapa	40
Muscicapa ficedula ficedula (L.)	9
Muscicapa hypoleuca hypoleuca (Pall.)	9
Muscicapa collaris Bechst.	9
Genus Erythrosterina	40
Erythrosterina parva parva (Bechst.)	9

Sylviidae.

Genus Phylloscopus	40
Phylloscopus collybita collybita (Vieill.)	9
Phylloscopus trochilus trochilus (L.)	10
Phylloscopus bonelli bonelli (Vieill.)	10
Phylloscopus sibilatrix sibilatrix (Bechst.)	10
Genus Locustella	40
Locustella naevia naevia (Bodd.)	10
Locustella fluviatilis (Wolf)	10

Genus Acrocephalus	40
Acrocephalus arundinaceus arundinaceus (L.)	10
Acrocephalus streperus streperus (Vieill.)	10
Acrocephalus palustris (Bechst.)	10
Acrocephalus schoenobaenus (L.)	10
Acrocephalus aquaticus (Gm.)	10

Genus Hypolais	40
Hypolais icterina (Vieill.)	10

Genus Sylvia	40
Sylvia nisoria nisoria (Bechst.)	11
Sylvia hippolais hippolais (L.)	11
Sylvia atricapilla atricapilla (L.)	11
Sylvia communis communis Lath.	11
Sylvia curruca curruca (L.)	11

Genus Turdus	40
Turdus pilaris L.	11
Turdus viscivorus viscivorus L.	11
Turdus philomelos philomelos Brehm	11
Turdus musicus L.	11
Turdus torquatus torquatus L.	12
Turdus torquatus alpestris (Brehm)	12
Turdus naumanni Temm	12
Turdus ruficollis atrogularis Temm.	12

Genus Planesticus	41
Planesticus merula merula (L.)	12

Genus Hylocichla	41
Hylocichla guttata pallasii (Cab.)	12

Genus Monticola	41
Monticola saxatilis (L.)	12
Monticola solitaria solitaria (L.)	34

Genus Oenanthe	41
Oenanthe oenanthe grisea (Brehm)	12

Genus Saxicola	41
Saxicola rubetra rubetra (L.)	12
Saxicola torquata rubicola (L.)	13

Genus Phoenicurus	41
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (L.)	13
Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gm.)	13

	Seite
Genus Luscinia	41
Luscinia megarhynchos megarhynchos Brehm.	13
Luscinia luscinia (L.)	13
Luscinia svecica cyanecula (Wolf)	13

Genus Erithacus	41
Erithacus rubecula rubecula (L.)	13

Prunellidae.

Genus Prunella	42
Prunella collaris collaris (Scop.)	13
Prunella modularis modularis (L.)	13

Troglodytidae.

Genus Troglodytes	42
Troglodytes troglodytes troglodytes (L.)	13

Genus Cinclus	42
Cinclus cinclus medius Brehm.	14
Cinclus cinclus meridionalis Brehm.	14
Cinclus cinclus tschusii Klein-schmidt & Hilgert	14

Hirundinidae.

Genus Hirundo	42
Hirundo rustica rustica L.	14
Genus Delichon	42
Delichon urbica urbica (L.)	14
Genus Riparia	42
Riparia riparia riparia (L.)	14
Riparia rupestris (Scop.)	14

Micropodidae.

Genus Micropus	42
Micropus melba melba (L.)	15
Micropus apus apus (L.)	15

Caprimulgidae.

Genus Caprimulgus	43
Caprimulgus europaeus europaeus L.	15

Meropidae.

Genus Merops	43
Merops apiaster L.	15

Upupidae.

	Seite
Genus Upupa	43
Upupa epops epops L.	15

Coraciidae.

Genus Coracias	43
Coracias garrulus garrulus L.	15

Alcedinidae.

Genus Alcedo	43
Alcedo atthis ispida L.	15

Cuculidae.

Genus Cuculus	43
Cuculus canorus canorus L.	15

Picidae.

Genus Picus	43
Picus viridis pinetorum (Brehm)	16
Picus canus canus Gem.	16
Genus Dryobates	43
Dryobates major pinetorum (Brehm)	16
Dryobates leucotos leucotos (Bechst.)	16
Dryobates minor hortorum (Brehm)	16
Dryobates medius medius (L.)	16

Genus Picoides	43
Picoides tridactylus alpinus Brehm.	16

Genus Dryocopus	43
Dryocopus martius martius (L.)	16

Genus Jynx	44
Jynx torquilla torquilla L.	16

Strigidae.

Genus Bubo	44
Bubo bubo bubo (L.)	17

Genus Otus	44
Otus scops scops (L.)	17

Genus Asio	44
Asio otus otus (L.)	17
Asio flammeus flammeus (Pon-topp.)	17

Genus Cryptoglaux	Seite 44
Cryptoglaux funerea funerea (L.)	17
Genus Carine	44
Carine noctua noctua (Scop.)	17
Genus Glaucidium	44
Glaucidium passerinum passerinum (L.)	17
Genus Surnia	44
Surnia ulula ulula (L.)	17
Genus Strix	44
Strix uralensis uralensis Pall.	17
Strix aluco aluco L.	17
Genus Tyto	45
Tyto alba guttata (Brehm)	17
Genus Nyctea	45
Nyctea nyctea (L.)	18

Falconidae.

Genus Falco	45
Falco peregrinus peregrinus Tunst.	18
Falco peregrinus calidus Lath.	18
Falco rusticolus candicans Gm.	34
Falco cherrug cherrug Gray	18
Falco subbuteo subbuteo L.	18
Falco columbarius aesalon Tunst.	18
Falco vespertinus vespertinus L.	18
Falco naumanni naumanni Fleisch.	18
Falco tinnunculus tinnunculus L.	18
Genus Aquila	45
Aquila chrysaëtos chrysaëtos (L.)	18
Aquila clanga Pall.	19
Aquila pomarina pomarina Brehm.	19
Genus Hieraaëtus	45
Hieraaëtus pennatus (Gm.)	19
Genus Archibuteo	45
Archibuteo lagopus lagopus (Brünn.)	19
Genus Buteo	45
Buteo buteo buteo (L.)	19
Buteo buteo zimmermannae Ehmcke	19
Genus Circus	45
Circus aeruginosus aeruginosus (L.)	19

Circus cyaneus cyaneus (L.)	Seite 19
Circus pygargus (L.)	19
Circus macrourus (Gm.)	19
Genus Astur	45
Astur gentilis gentilis (L.)	20
Genus Accipiter	45
Accipiter nisus nisus (L.)	20
Genus Milvus	46
Milvus milvus (L.)	20
Milvus migrans migrans (Bodd.)	20
Genus Haliaeetus	46
Haliaeetus albicilla (L.)	20
Genus Pernis	46
Pernis apivorus apivorus (L.)	20
Genus Circaëtus Vieill.	46
Circaëtus gallicus (Gm.)	20
Genus Pandion	46
Pandion haliaetus haliaetus (L.)	20

Vulturidae.

Genus Neophron	34
Neophron percnopterus percnopterus (L.)	34
Genus Gyps	46
Gyps fulvus fulvus (Habl.)	20
Genus Aegypius	46
Aegypius monachus (L.)	21

Ciconiidae.

Genus Ciconia	46
Ciconia ciconia ciconia (L.)	21
Ciconia nigra (L.)	21

Plegadidae.

Genus Plegadis	46
Plegadis falcinellus falcinellus (L.)	21

Plataleidae.

Genus Platalea	46
Platalea leucorodia leucorodia L.	21

Ardeidae.

Genus Ardea	46
Ardea cinerea cinerea (L.)	21
Ardea purpurea purpurea L.	21

	Seite
Genus Casmerodius	47
Casmerodius albus albus (L.) .	21
Genus Egretta	47
Egretta garzetta garzetta (L.) .	21
Genus Ardeola	47
Ardeola ralloides ralloides (Scop.)	21
Genus Nycticorax	47
Nycticorax nycticorax nycticorax (L.)	22
Genus Ixobrychus	47
Ixobrychus minutus (L.) . . .	22
Genus Botaurus	47
Botaurus stellaris stellaris (L.)	22

Phoenicopteridae.

Genus Phoenicopterus	47
Phoenicopterus antiquorum Brehm	22

Anatidae.

Genus Cygnus	47
Cygnus cygnus (L.)	22
Cygnus bewickii bewickii Yarr.	22
Cygnus olor (Gm.)	22
Genus Anser	47
Anser anser (L.)	22
Anser albifrons (Scop.)	22
Anser fabalis fabalis (Lath.) .	22
Anser brachyrhynchus Baillon	22
Genus Branta	47
Branta bernicla bernicla (L.) .	23
Branta leucopsis (Bechst.) . .	23
Genus Tadorna	48
Tadorna tadorna (L.)	23
Genus Casarca	34
Casarca ferruginea (Pall.) . .	34
Genus Anas	48
Anas platyrhynchos platyrhynchos L.	23
Genus Chaulelasmus	48
Chaulelasmus streperus (L.) .	23
Genus Nettion	48
Nettion crecca crecca (L.) . .	23

	Seite
Genus Querquedula	48
Querquedula querquedula (L.) .	23
Genus Mareca	48
Mareca penelope (L.)	23
Genus Spatula	48
Spatula clypeata (L.)	23
Genus Dafila	48
Dafila acuta (L.)	23
Genus Netta	48
Netta rufina (Pall.)	23
Genus Nyroca	49
Nyroca ferina ferina (L.) . . .	23
Nyroca nyroca (Göld.)	23
Nyroca fuligula (L.)	24
Nyroca marila marila (L.) . .	24
Genus Glaucionetta	49
Glaucionetta clangula clangula (L.)	24
Genus Clangula	49
Clangula hyemalis (L.)	24
Genus Histrionicus	49
Histrionicus histrionicus (L.) .	24
Genus Marmaronetta	49
Marmaronetta angustirostris (Ménétr.)	24
Genus Erismatura	49
Erismatura leucocephala (Scop.)	24
Genus Somateria	49
Somateria mollissima mollissima (L.)	24
Genus Oidemia	49
Oidemia nigra nigra (L.)	24
Oidemia fusca fusca (L.) . . .	24

Mergidae.

Genus Mergus	49
Mergus merganser merganser L.	24
Mergus serrator L.	24
Genus Mergellus	49
Mergellus albellus (L.)	25

Phalacrocoracidae.

Genus Phalacrocorax	50
Phalacrocorax carbo carbo (L.)	25

	Seite
Phalacrocorax graculus graculus (L.)	35
Phalacrocorax graculus desma- restii Payr.	35
Phalacrocorax pygmaeus (Gm.)	25

Pelecanidae.

Genus Pelecanus	50
Pelecanus onocrotalus L. . .	25

Procellariidae.

Genus Thalassidroma	50
Thalassidroma pelagica (L.) .	25
Genus Puffinus	35
Puffinus puffinus puffinus (Brünn.)	35
Puffinus puffinus yelkouan (Acerbi)	35

Colymbidae.

Genus Podiceps	50
Podiceps cristatus cristatus (L.)	25
Podiceps auritus (L.)	25
Podiceps grisegena grisegena (Bodd)	25
Podiceps nigricollis nigricollis Brehm	25
Podiceps ruficollis ruficollis (Pall.)	25
Genus Colymbus	50
Colymbus arcticus L.	25
Colymbus stellatus Pontopp. .	26
Colymbus immer Brünn. . . .	26

Charadriidae.

Genus Haematopus	50
Haematopus ostralegus ostra- legus L.	26
Genus Oedienemus	50
Oedienemus oedienemus oedic- nemus (L.)	26
Genus Cursorius	50
Cursorius gallicus gallicus (Gm.)	26
Genus Eudromias	50
Eudromias morinellus (L.) .	26
Genus Charadrius	51
Charadrius hiaticula hiaticula L.	26

	Seite
Charadrius dubius curonicus Gm.	26
Charadrius alexandrinus alexan- drinus L.	26
Genus Pluvialis	51
Pluvialis apricarius (L.) . . .	26
Genus Squatarola	51
Squatarola squatarola squata- rola (L.)	27
Genus Vanellus	51
Vanellus vanellus (L.)	27
Genus Arenaria	51
Arenaria interpres interpres (L.)	27

Scolopacidae.

Genus Pavoncella	51
Pavoncella pugnax (L.)	27
Genus Canutus	51
Canutus canutus canutus (L.) .	27
Genus Calidris	51
Calidris alba alba (Pall.) . . .	27
Genus Pelidna	51
Pelidna alpina alpina (L.) . . .	27
Genus Pisobia	52
Pisobia minuta minuta (Leisl.)	27
Pisobia temminckii (Leisl.) . .	27
Genus Arquatella	52
Arquatella maritima maritima (Brünn.)	27
Genus Limicola	52
Limicola falcinellus falcinellus (Pontopp.)	27
Genus Actitis	52
Actitis hypoleucos (L.)	28
Genus Tringa	52
Tringa oerophus oerophus L. .	28
Genus Totanus	52
Totanus glareola (L.)	28
Totanus totanus totanus (L.) .	28
Totanus erythropus (Pall.) . . .	28
Totanus nebularius nebularius (Gunner.)	28
Totanus stagnatilis stagnatilis Bechst.	28

	Seite
Genus Phalaropus	52
Phalaropus fulicaria (L.)	28
Phalaropus lobatus (L.)	28
Genus Recurvirostra	52
Recurvirostra avosetta L. . . .	28
Genus Limosa	52
Limosa lapponica lapponica (L.)	28
Limosa limosa limosa (L.) . . .	28
Genus Numenius	52
Numenius arquata arquata (L.)	29
Numenius phaeopus phaeopus	
(L.)	29
Genus Gallinago	52
Gallinago media (Lath.)	29
Gallinago gallinago gallinago(L.)	29
Genus Lymnocryptes	52
Lymnocryptes gallinula (L.) . .	29
Genus Scolopax	52
Scolopax rusticola L.	29

Laridae.

Genus Hydrochelidon	53
Hydrochelidon nigra nigra (L.)	29
Hydrochelidon leucopareia leu-	
copareia (Temm.)	29
Hydrochelidon leucoptera	
(Temm.)	29
Genus Gelochelidon	53
Gelochelidon anglica anglica	
(Mont.)	29
Genus Sterna	53
Sterna sandvicensis sandvicensis	
Lath.	29
Sterna hirundo L.	30
Sterna paradisaea Brünn. . . .	30
Sterna tschegrava Lep.	35
Sterna minuta minuta L. . . .	30
Genus Larus	53
Larus minutus Pall.	30
Larus ridibundus L.	30
Larus canus canus L.	30
Larus argentatus argentatus	
Pontopp.	30
Larus fuscus fuscus L.	30
Larus marinus L.	30
Genus Rissa	53
Rissa tridactyla tridactyla (L.)	30

	Seite
Genus Megalestris	53
Megalestris skua skua (Brünn.)	30
Genus Stercorarius	53
Stercorarius pomarinus (Temm.)	30
Stercorarius parasiticus (L.) .	31
Stercorarius longicaudus Vieill.	31

Alcidae.

Genus Uria	53
Uria lomvia lomvia (L.)	31
Genus Fratercula	53
Fratercula arctica arctica (L.)	31
Genus Alle	35
Alle alle (L.)	35

Otididae.

Genus Otis	54
Otis tarda tarda L.	31
Otis tetrix L.	31

Megalornithidae.

Genus Megalornis	54
Megalornis grus grus (L.) . . .	31

Rallidae.

Genus Crex	54
Crex crex (L.)	31
Genus Porzana	54
Porzana porzana (L.)	31
Porzana parva (Scop.)	31
Porzana pusilla intermedia	
(Herm.)	31
Genus Rallus	54
Rallus aquaticus aquaticus L. .	32
Genus Gallinula	54
Gallinula chloropus chloropus	
(L.)	32
Genus Fulica	54
Fulica atra atra L.	32

Columbidae.

Genus Columba	54
Columba palumbus palumbus L.	32
Columba oenas oenas L.	32

Genus Streptopelia	Seite 54
Streptopelia turtur turtur (L.)	32

Pteroclididae.

Genus Syrrhaptēs	54
Syrrhaptēs paradoxus (Pall.)	32

Phasianidae.

Genus Phasianus	54
Phasianus colchicus	32
Genus Perdix	55
Perdix perdix perdix (L.) . . .	32
Genus Coturnix	55
Coturnix coturnix coturnix (L.)	32

Genus Caccabis	Seite 55
Caccabis saxatilis saxatilis (Meyer)	32

Tetraonidae.

Genus Tetrao	55
Tetrao urogallus urogallus L.	33
Genus Lyrurus	55
Lyrurus tetrix juniperorum (Brehm)	33
Genus Bonasa	55
Bonasa bonasia bonasia (L.)	33
Genus Lagopus	55
Lagopus mutus mutus (Montin)	33

Verzeichnis der deutschen Vogelnamen.

	Seite		Seite		Seite
Aasgeier	34	Dickschnabellumme	31	Gebirgsstelze	6
Abendfalke	18	Dohle	1	Gimpel, grosser	3
Alpenbraunelle	13	Dorngrasmücke	11	Gimpel, kleiner	3
Alpendohle	2	Dreizehenmöve	30	Girlitz	3
Alpenkrähe	33	Dreizehenspecht	16	Goldammer	4
Alpenleinfink	3	Drossel, schwarzkeh- lige	12	Goldregenpfeifer	26
Alpenlerche	5	Drossel, Pallas'sche	12	Grauammer	4
Alpenmauerläufer	7	Drosselrohrsänger	10	Grauspecht	16
Alpenringdrossel	12			Grünfink	2
Alpensegler	15	Edelreiher	21	Grünspecht	16
Alpenstrandläufer	27	Eichelhäher	1		
Amsel	12	Eiderente	24	Habicht	20
Auerhuhn	33	Eisente	24	Hakengimpel	4
Austernfischer	26	Eisseetaucher	26	Halsbandfliegen- schnäpper	9
Avosette	28	Eisvogel	15	Harlekinsente	24
		Elster	1	Haselhuhn	33
Bachstelze, weiße	6	Erlenzeisig	3	Haubenlerche	5
Bartmeise	8			Haubenmeise	7
Baumfalke	18	Fasan	32	Haubentaucher	25
Baumpieper	5	Feldlerche	5	Hausrotschwanz	13
Bekassine	29	Feldsperling	4	Haussperling	4
Bergente	24	Felsenschwalbe	14	Heckenbraunelle	13
Bergfink	4	Fichtenkreuzschnabel	3	Heidelerche	5
Berghänfling	2	Fischadler	20	Heringsmöve	30
Berglaubsänger	10	Fischreiher	21	Heuschreckensänger	10
Bienenfresser	15	Fitislaubsänger	10	Höckerschwan	22
Birkhuhn	33	Flamingo	22	Hohltaube	32
Bläßgans	22	Fliegenschnäpper, grauer	9	Jagdfalke, grönlän- discher	34
Bläßhuhn	32	Flußregenpfeifer	26		
Blaudrossel	34	Flußrohrsänger	10	Kalanderlerche	33
Blaukehlchen	13	Flußseeschwalbe	30	Kampfläufer	27
Blaumeise	7	Flußuferläufer	28	Kiebitz	27
Baurake	15			Kiebitzregenpfeifer	27
Bluthänfling	2	Gänsegeier	20	Kiefernkreuzschnabel	3
Brachpieper	5	Gänsesäger	24	Kirsch kernbeißer	2
Brachvogel, großer	29	Gartenammer	4	Kleiber	7
Brandente	23	Gartenbaumläufer	7	Knäckente	23
Brandseeschwalbe	29	Gartengrasmücke	11	Kohlmeise	2
Braunkehlchen	12	Gartenrotschwanz	13	Kolbenente	23
Bruchwasserläufer	28	Gartenspötter	10		
Buchfink	4				
Buntspecht, großer	16				

	Seite		Seite		Seite
Kolkrabe	1	Rabenkrähe	1	Seeschwalbe, weiß-	
Kormoranscharbe	25	Rallenreiher	21	bärtige	29
Kornweihe	19	Raubmöve, grosse	30	Seestrandläufer	27
Krabbentaucher	35	Raubmöve, mittlere	30	Seidenschwanz	9
Krähenscharbe	35	Raubwürger	9	Seidenreiher	21
Kranich	31	Rauchschwalbe	14	Siehler, brauner	21
Kriekente	23	Rauhfußbussard	19	Silbermöve	30
Kuckuck	15	Rauhfußkauz	17	Singdrossel	11
Küstenseeschwalbe	30	Rebhuhn	32	Singschwan	22
Kurzschnabelgans	22	Regenbraehvogel	29	Sperber	20
Kuttengeier	21	Reiherente	24	Sperbereule	17
		Rennvogel	26	Sperbergrasmücke	11
Lachmöve	30	Ringdrossel, nor-		Sperlingskauz	17
Lachseeschwalbe	29	dische	12	Spießente	23
Langschwanzraub-		Ringelgans	23	Spornammer	5
möve	31	Ringeltaube	32	Spornpieper	6
Leinfink	3	Rötelfalke	18	Sprosser	13
Leinfink, nordischer	3	Rohrammer	5	Sommergoldhähnchen	8
Lerche, kurzzehige	34	Rohrdommel, große	22	Star	2
Löffelente	23	Rohrweihe	19	Steinadler	18
Löffelreiher	21	Rosenstar	2	Steinhuhn	32
		Rostammer	33	Steinkauz	17
Mantelmöve	30	Rostente	34	Steinrötel	12
Mauersegler	15	Rothalstaucher	25	Steinschmätzer	12
Mäusebussard	19	Rotkehlchen	13	Steinsperling	4
Mehlschwalbe	14	Rotkopfwürger	9	Steinwälder	27
Merlinalke	18	Rotschenkel	28	Stieglitz	2
Milan, roter	20	Ruderente	24	Steppenhuhn	32
Milan, schwarzer	20			Steppenweihe	19
Misteldrossel	11	Saatgans	22	Storch, weißer	21
Mittelsäger	24	Saatkrähe	1	Storch, schwarzer	21
Mittelspecht	16	Samtente	24	Strandläufer, islän-	
Mohrenlerche	33	Sanderling	27	discher	27
Moorente	23	Sandregenpfeifer	26	Strandläufer, Tem-	
Mornellregenpfeifer	26	Schafstelze	6	minek	27
		Schafstelze, nordische	6	Sturmmöve	30
Nachtigall	13	Schelladler	19	Sturmschwalbe,	
Nachtreiher	22	Schellente	24	kleine	25
Nachtschwalbe	15	Schilfrohrsänger	10	Sturmvogel	35
Naumannsdrossel	12	Schlangenadler	20	Sumpfhuhn, kleines	31
Nebelkrähe	1	Schleiereule	17	Sumpfläufer	27
Nonnengans	23	Schmalschnabelente	24	Sumpfohreule	17
Nonnenmeise	7	Schmarotzerraubmöve	31	Sumpfrohrsänger	10
Nonnenmeise, rhei-		Schnatterente	23	Sumpfschnepfe, große	29
nische	8	Schneeammer	5	Sumpfschnepfe,	
Nordseetaucher	26	Schneeeule	18	kleine	29
		Schneefink	4		
Ohrensteißfuß	25	Schneehuhn	33	Tafelente	23
		Schreiadler	19	Tannenhäher	1
Papageitaucher	31	Schwanzmeise	8	Tannenhäher, sibi-	
Pelikan	25	Schwarzhalstaucher	25	rischer	1
Pfeifente	23	Schwarzkehlehen	13	Tannenmeise	7
Pfuhlschnepfe	28	Schwarzplättchen	11	Teichhuhn, grün-	
Pieper, rotkehliger	6	Schwarzspecht	16	füßiges	32
Pirol	2	Seeadler	20	Teichrohrsänger	10
Polartaucher	25	Seeregenpfeifer	26	Teichwasserläufer	28
Purpureiher	21	Seeschwalbe, kas-		Trappe	31
		pische	35	Trauerente	24

	Seite		Seite		Seite
Trauerfliegen-		Wasserpieper	6	Wildente	23
schnäpper	9	Wasserralle	32	Wildgans	22
Tranerseeschwalbe . .	29	Wasserrohrsänger . .	10	Wintergoldhähnchen .	8
Triel	26	Wasserschmätzer . .	14	Würger, rotrückiger .	9
Tüpfelsumpfhuhn . .	31	Wasserschmätzer,		Würger, schwarz-	
Turmfalke	18	südeuropäischer . .	14	stirniger	8
Turteltaube	32	Wasserschmätzer,		Würgfalke	18
		rheinischer	14		
Uferschnepfe	28	Wassertreter, Breit-		Zaunammer	5
Uferschwalbe	14	schnabel	28	Zaungrasmücke . . .	11
Uhu	17	Wassertreter,		Zaunkönig	13
Uralkauz	17	Schmalschnabel . .	28	Zippammer	5
		Weidenlaubsänger . .	9	Zitronenzeisig . . .	3
Wachholderdrossel . .	11	Weidenmeise, süd-		Zwergadler	19
Wachtel	32	deutsche	8	Zwergfliegen-	
Wachtelkönig	31	Weidenmeise, mittel-		schnäpper	9
Waldbaumläufer . . .	6	deutsche	34	Zwergmöve	30
Waldkauz	17	Weidenmeise, rhei-		Zwergohreule	17
Waldlaubsänger . . .	10	nische	8	Zwergrohrdommel . .	22
Waldohreule	17	Weindrossel	11	Zwergsäger	25
Waldschnepfe	29	Weißbindenkreuz-		Zwergscharbe	25
Waldwasserläufer . .	28	schnabel	3	Zwergschwan	22
Wanderfalke	18	Weißflügelseeschwalbe	29	Zwergseeschwalbe . .	30
Wanderfalke, öst-		Weißrückenspecht . .	16	Zwergspecht	16
licher	18	Wendehals	16	Zwergsteißfuß . . .	25
Wasserläufer, dunkler	28	Wespenbussard . . .	20	Zwergstrandläufer . .	27
Wasserläufer, hell-		Wiedehopf	15	Zwergsumpfhuhn . .	31
farbiger	28	Wiesenpieper	6	Zwergtrappe	31
		Wiesenweihe	19		

Gaylord Bros.
Makers
Syracuse N Y.
PAT. JAN. 21, 1908