JUN 24 1930

74,888.

Duméril A. M. C.

Dessent sur les
1812.

LIBRARY
MUSEUM OF ZOOLOGY
CAMBRIDGE, MASS.

HARVARD UNIVERSITY.

LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

74,888

LIBRARY OF

SAMUEL GARMAN

June 24, 1930.

2761

10

CONCOURS POUR LA CHAIRE DE PROFESSEUR ADJOINT
DE ZOOLOGIE.

DISSERTATION

SUR LES POISSONS

QUI SE RAPPROCHENT LE PLUS DES ANIMAUX SANS VERTÈBRES;

THÈSE

Soutenue publiquement dans l'amphithéâtre de la
Faculté des Sciences de Paris,

EN PRÉSENCE DES JUGES DU CONCOURS,

²⁸
le 28 mars 1812; *à 2 heures -*

PAR A.-M.-CONSTANT DUMÉRIL.

A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE DE DIDOT JEUNE,

Imprimeur de la Faculté de Médecine.

M DCCC XII.

— unspoke —

22

JUGES DU CONCOURS.

MM. LEFEVRE GINEAU, *Président*.

DESFONTAINES.

GEOFFROY SAINT-HILAIRE.

BRONGNIART.

MIRBEL.

DE LAMARCK.

LATREILLE.

qu'on avait peut-être classées à tort parmi les animaux vertébrés.

Enfin, dans un troisième mémoire, sur les rapports de structure qu'on peut observer entre les os et les muscles du tronc chez tous les animaux (lu à l'Institut les 15 et 22 février 1808), j'avais annoncé, d'après mes propres observations, et d'après celles de Rondelet, que les premiers rudimens de la colonne vertébrale se retrouvaient à la vérité dans les poissons Cyclostomes, mais à certaines époques de l'année seulement; que cette épine cartilagineuse était d'une seule pièce, etc.

Tel est l'état de la proposition que je crois avoir le premier énoncée, sur laquelle j'ai donné, d'une manière transitoire, mon opinion, qu'aucun naturaliste n'a jusqu'ici contredite, mais que je vais m'efforcer d'étayer de preuves et de raisonnemens suffisans pour établir la vérité du fait.

DISSERTATION

SUR LES POISSONS

QUI SE RAPPROCHENT LE PLUS DES ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

LA question que je vais examiner dans cette dissertation m'est échue par le sort. Je me félicite de pouvoir la traiter , avec quelques détails , devant un jury de savans recommandables , et d'avoir à défendre , en présence d'un auditoire éclairé , des opinions, des raisonnemens et des observations qui me sont propres , contre les argumens d'un compétiteur habile , dont les connaissances feront , je n'en doute pas , quelque honneur aux sources dans lesquelles il les a puisées.

La matière à discuter semble offrir peu d'intérêt au premier aperçu. Pour peu qu'on réfléchisse cependant à l'essence de la question , on reconnaîtra qu'elle peut devenir très-importante , et pour le naturaliste , qui verra se former , pour ainsi dire , sous ses yeux un anneau de la chaîne destinée à joindre la série des animaux dans un point où leur connexion était tout-à-fait rompue ; et pour le physiologiste , qui pourra trouver dans les organes de certaines espèces , intermédiaires aux deux grandes sections du règne animal , des modifications de structure et de fonctions auxquelles il ne s'était pas attendu.

Avant de rechercher comment quelques poissons se rapprochent des animaux sans vertèbres , je crois d'abord nécessaire de rappeler les principaux caractères d'après lesquels on a divisé le règne animal en deux groupes naturels.

Je présenterai ensuite quelques idées sur la structure des poissons , en comparant ces animaux avec ceux des autres classes , ce qui me fournira l'occasion de démontrer qu'ils doivent occuper le dernier rang parmi les vertébrés , et que même certaines espèces forment , avec les invertébrés , une véritable transition naturelle dans l'échelle de l'organisation animale , liaison que je ne sache pas qu'on ait encore indiquée.

Enfin , pour ne laisser aucun doute à cet égard , je terminerai par une description anatomique détaillée de quelques espèces en particulier.

La propriété , qu'ont certains êtres , de se mouvoir et de sentir , et par suite leur mode de nutrition et de reproduction , les a suffisamment séparés des végétaux. Ne pourrait-on pas de même emprunter de l'existence des organes appropriés à ces facultés le caractère naturel du règne animal , lequel comprendrait ainsi tous les êtres vivans , actifs , motiles , sensibles et digérans ?

En reconnaissant que la motilité ou la faculté de changer de lieu à volonté , en tout ou en partie , ainsi que la sensibilité ou la faculté de percevoir , d'éprouver les qualités et les propriétés des corps , distingue parfaitement en deux groupes les êtres organisés ; en admettant que ces deux facultés , constamment associées , *animent* et modifient l'action de la vie , pourquoi ne rechercherait-on pas encore dans les organes du mouvement et des sens leur plus ou moins grande perfection , afin de déterminer , par cette étude , l'ordre suivant lequel les animaux sembleraient s'éloigner davantage des végétaux ?

On a vérifié que les animaux les plus parfaits, parmi lesquels l'homme lui-même paraît tenir le premier rang, sont construits sur un même modèle. La charpente solide de leur corps, presque constamment cachée sous la fibre charnue, instrument de leurs mouvemens, en détermine les formes générales et celles de leurs principaux organes. Elle présente une tige centrale ou une échine articulée, composée de plusieurs os empilés, nommés *vertèbres*, destinés à recevoir, à communiquer le mouvement et à protéger les nerfs, organes de la sensibilité. Cette colonne vertébrale est toujours terminée en devant par la tête, boîte solide logeant le cerveau, et le plus souvent quatre organes des sens, et divisée transversalement pour former la bouche. Prolongée en arrière au-delà du tube digestif, cette échine se termine par une extrémité qu'on appelle queue. Les êtres ainsi construits n'offrent jamais plus de quatre membres ou appendices latéraux, destinés aux mouvemens. Tels sont les animaux qu'on a nommés VERTÉBRÉS.

Ceux qui ne présentent pas cette organisation ont été par opposition appelés INVERTÉBRÉS. Ce n'est pas qu'ils soient constamment privés de parties solides, articulées à l'intérieur; mais ils n'ont pas de véritables os. Ces parties dures, quand elles existent, sont le plus souvent apparentes ou placées au-dehors; et le corps de ceux qui sont forcés de vivre constamment dans l'eau ou dans les autres liquides peut rester tout-à-fait mou. Ils n'ont presque aucun caractère général et positif; leurs formes varient à l'infini, parce qu'elles ne sont pas déterminées par une base solide, primitive et commune. Leurs membres, quand ils en offrent, sont au nombre de six au moins; leurs nerfs principaux sont contenus dans une même cavité que les viscères; enfin le nombre et le siège de leurs sens varient.

Voilà donc les animaux partagés en deux sections bien dis-

tinctes, d'après leurs fonctions spéciales. Étudions maintenant plus particulièrement, sous le même rapport, les espèces à vertèbres, et recherchons quel rang doivent occuper, dans cette grande division, celles qui constituent la classe des poissons.

J'établis en principe, et j'essaierai de le prouver par des faits, que le milieu dans lequel les animaux sont forcés de vivre a modifié tout-à-fait leurs organes; ou, réciproquement, (ce qu'il est inutile de rechercher ici) que la nature de leur séjour est indiquée par leur structure; de sorte que celui qui aura des branchies, par exemple, sera forcé de vivre et de respirer dans l'eau, habitation qui aura imprimé des formes et des usages particuliers à la totalité des organes du mouvement; que les animaux très-mous ne pourront point exister dans l'air; que toute espèce constamment aveugle sera appelée à habiter dans de grandes profondeurs ou dans une obscurité parfaite; que tout animal qui respire l'eau sera privé de l'organe de l'odorat, ou de la sensation des odeurs, etc., etc.; d'où il résulte que toutes les facultés des animaux sont vraiment en rapport avec les propriétés des milieux dans lesquels ils séjournent.

Si l'on m'accorde cette assertion, j'indique à l'instant, et comme d'avance, les signes caractéristiques qui distingueront le poisson de tous les vertébrés; car c'est le séjour forcé de cet animal dans l'eau qui a nécessité les modifications de ses organes du mouvement, des sens, de la circulation, de la respiration et de la génération.

En effet, tout animal vertébré qui n'est point un poisson aura des poumons, ou en présentera au moins les rudimens; il pourra respirer l'air, s'élancer dans l'atmosphère, et vivre sur la terre, où ses membres serviront à sa progression; un fluide élastique s'introduira dans son oreille, dans ses narines, et y transportera

les vibrations et les molécules les plus ténues des corps. S'il vit dans l'air, son œil sera modifié dans ses humeurs, par la marche particulière de la lumière qui y pénètre en sortant d'un milieu moins dense ; son toucher, et surtout l'impression qu'il recevra des corps sapides, seront bien plus efficaces ; la circulation sera double ou partielle, c'est-à-dire, que le sang, poussé par le cœur, passera en totalité ou en partie dans ses poumons, et reviendra de là à l'agent d'impulsion chargé de le diriger vers les organes ; le fluide destiné à la respiration entrera dans les poumons, et en sortira par un seul et même orifice ; enfin la génération s'opérera par une véritable fécondation intérieure.

Or la plupart de ces modifications de fonctions, que nous venons de présenter ici d'une manière générale, et qui sont communes aux animaux vertébrés à poumons, n'existent pas dans ceux à branchies constantes : aussi, dans l'état actuel de la science zoologique, peut-on hasarder de donner du poisson la définition suivante : *Animal vertébré, sans mamelles, ne subissant pas de métamorphose ; vivant essentiellement dans l'eau, où il se meut le plus souvent à l'aide de nageoires ou de membranes soutenues par des rayons, où il respire par des branchies cachées ; offrant une circulation simple et un sang rouge et froid.*

Mais des êtres forcés de vivre dans l'eau, n'y manifestant qu'un seul mode de mouvement, privés de quelques organes des sens, n'étant pas forcés de développer ou de conserver une température plus élevée que celle du milieu dans lequel ils se trouvent plongés, dont les germes sont le plus souvent fécondés après la ponte, ou par l'intermède d'un véhicule, comme ceux des plantes, ne sont-ils pas réellement les derniers des animaux vertébrés ? Nous balancerons d'autant moins à assigner ce rang qu'ont donné à la classe des poissons la plupart des zoologistes

depuis Aristote, que nous étudierons l'organisation et les fonctions de ces animaux avec plus de détails.

Nous allons rappeler que, sous le rapport du mouvement, les poissons, par leur structure, sont bornés au seul mode du nager avec le corps constamment immergé. Leur forme allongée, la grosseur de leur tête, confondue avec le tronc, et articulée comme les autres vertèbres, qui sont peu mobiles dans le sens vertical, les oblige à conserver une position horizontale lorsqu'ils sont en repos. La progression s'opère constamment chez eux par l'impulsion que les muscles de l'échine communiquent en deux sens opposés au corps, qui, à l'aide des nageoires impaires, destinées à augmenter sa surface, s'appuie fortement et latéralement sur l'eau, que la queue tend à déplacer, comme pourrait le faire une rame. Les appendices, qui tiennent lieu des membres, ne sont destinés, chez le plus grand nombre, qu'à modifier le mouvement dans l'axe du corps. L'existence de ces nageoires paires est même inconstante, et leur position respective présente beaucoup de variations. Enfin, et c'est là ce qui semble indiquer la place de la classe des poissons dans la série naturelle des animaux vertébrés, les os qui composent leur échine et tout leur squelette n'offrent qu'une solidité médiocre. Chez quelques-uns même on ne trouve plus que de simples cartilages, auxquels la vieillesse seule de l'individu peut donner une certaine consistance.

En rassemblant également les particularités que présentent les organes de la sensibilité des poissons, en comparant leur structure avec celle des animaux qui les précèdent ou qui les suivent, nous verrons encore qu'ils se rapprochent des seconds ou s'éloignent des premiers. Nous noterons que déjà leur cerveau ne remplit plus la cavité du crâne, qu'il nage dans une humeur gélatineuse,

que ses lobes sont distincts, qu'il forme des nodosités ou des tubercules disposés par paires. Nous indiquerons que leurs yeux n'ont jamais de véritables paupières, que l'organe de l'ouïe n'a point de conduit interne ni externe, qu'il est placé immédiatement et à nu sous le cerveau. Nous remarquerons que leur organe de l'odorat, quoiqu'il existe constamment, n'est plus placé sur la route du fluide qui sert à la respiration ; que cet organe paraît donner une autre sensation, qui remplit peut-être le même but, comme on a vu des aveugles juger des couleurs par un toucher très-exercé, et des sourds apprécier les sons par la vue ; que le goût, chez les poissons, ne paraît pas exister, au moins dans la bouche, soit par suite du frottement habituel de l'eau et du mécanisme de la respiration, soit à cause du défaut de salive et de nerf hypoglosse, soit enfin en raison de la solidité et du peu de mobilité de la langue. Pour dernière observation, nous reconnâtrons que le toucher chez les poissons n'est jamais actif, et que par conséquent il est très-imparfait ; de sorte que la réunion de ces circonstances semble prouver le peu de développement de ces trois derniers sens.

Sous le rapport des organes de la nutrition, les poissons ne paraissent point, à la vérité, s'éloigner autant des autres animaux vertébrés ; cependant ne remarquerons-nous pas que les moyens qu'ils ont de saisir leur proie sont très-faibles, quoiqu'ils soient forcés de vivre de substances animales, ainsi que l'indique toute leur structure, et surtout le peu de longueur de leur canal intestinal ? N'observerons-nous pas que leur bouche se trouve située transversalement, il est vrai, mais à l'extrémité d'une tête qui n'a point de cou et qui est presque immobile ? Enfin ne devons-nous pas rappeler que la partie de leur corps où aboutit le tube digestif n'est pas aussi constamment déterminée que dans les trois autres classes, dont les espèces sont pourvues d'un bassin ?

La respiration n'offre pas une moindre anomalie dans les poissons, par deux circonstances très-remarquables. Premièrement, dans tous les animaux à poumons, le fluide respiratoire est porté dans l'intérieur même du viscère, qui en est pénétré; dans les poissons, au contraire, comme chez tous les animaux à branchies, le fluide n'exerce son action qu'à la surface de l'organe. Secondement, chez ceux des premiers qui ont des côtes ou un sternum libre et mobile, l'air est, pour ainsi dire, attiré par le vide qui s'opère à l'intérieur, et repoussé, en temps opportun, par la pression que l'animal lui fait éprouver; mais il sort et entre par une seule et même ouverture. Dans les poissons, cette dernière circonstance ne s'observe jamais: l'eau, qui doit servir à la respiration, est soumise, lorsqu'elle est entrée dans la bouche, à l'acte de la déglutition; et le gosier du poisson, percé de quatre, six ou sept glottes de chaque côté, laisse couler le fluide entre les lames des branchies. Ces organes sont situés et baignent au moins dans deux cavités distinctes, où l'eau, une fois parvenue, séjourne plus ou moins de temps avant de sortir par des ouvertures différentes de celles qui ont permis son introduction.

C'est surtout le mode suivant lequel s'opère la circulation des poissons qui montre combien ils se rapprochent de quelques invertébrés. En effet, dans les mammifères, les oiseaux et les reptiles, le sang poussé par le cœur pénètre, soit en totalité, soit en partie, dans les poumons, d'où il revient au cœur qui le chasse de nouveau dans toutes les régions du corps, pour y servir à la nutrition et aux sécrétions diverses. Dans les poissons, le cœur, situé sur le trajet du sang veineux, est spécialement destiné à diriger cette humeur dans les branchies. Le tronc unique de l'artère veineuse qu'il produit se divise et se subdivise à l'infini sur les lames respiratoires, et semble en renaître par des veines artérielles qui, se réunissant successivement, forment bientôt

un tronc commun , lequel fait l'office d'artère-aorte , sans avoir à sa base de ventricule intermédiaire ; à peu près comme le sang de la veine-porte se distribue dans le foie , à la manière des artères , après être provenu des veines mésentérique et splénique.

L'étude de la fonction génératrice ne nous montrera pas les poissons aussi différens des autres animaux vertébrés. Cependant, par la circonstance forcée de leur séjour dans l'eau , la plupart ne fécondent leurs œufs qu'après la ponte : mais déjà les batraciens offraient ce mode de génération, que nous voyons se reproduire dans quelques mollusques, et chez plusieurs insectes à larves aquatiques, comme les Éphémères.

Par la comparaison anatomique et physiologique à laquelle nous venons de nous livrer, nous avons acquis la conviction que les poissons doivent être placés au dernier rang parmi les animaux vertébrés. Recherchons maintenant si, parmi les poissons, il n'en est pas quelques-uns qui, par leur structure, leurs formes et leurs mœurs, offriraient la plus grande analogie avec les espèces d'autres classes, moins compliquées encore dans leur organisation.

Supposons qu'on ait rangé jusqu'ici parmi les poissons des animaux qui aient, au lieu de vertèbres, une tige cartilagineuse d'une seule pièce, laquelle se ramollirait même à certaines époques de l'année ; que ces êtres soient privés de membres articulés ; que plusieurs, toujours aveugles, s'accrochent aux animaux pour en sucer le sang, ou fouissent le sable, comme les Sangsues ou les Lombrics ; qu'on ne trouve chez aucun des mâchoires horizontales et mobiles ; que tous aient le tube intestinal simple, souvent sans mésentère ; que leur respiration s'opère par

un seul et même genre d'orifices ; enfin que leurs œufs , situés dans la même cavité que les intestins , réunis en une grappe unique , ne soient plus conduits au-dehors par des oviductes ; nous verrons certainement là des êtres qui se rapprocheront presque autant des Annelides que des Poissons. Or , il en est de semblables : ce sont les Lamproies , les Ammocètes et les Myxines , que nous réunissons en une Famille naturelle sous le nom de CYCLOSTOMES , et auxquels nous assignons les caractères qui suivent : Poissons cartilagineux , sans opercules ; à corps cylindrique , nu , visqueux , sans nageoires paires ; à bouche arrondie à l'extrémité du tronc , sans mâchoires horizontales.

Nous ne rapportons , jusqu'ici , que trois genres à cette Famille , et nous allons indiquer leurs caractères essentiels.

Le genre *Lamproie* (*Pétromyzon*) , établi par Artède : sept paires de branchies distinctes au-dehors comme au-dedans ; bouche conique , concave , garnie de dents non enchâssées ; un évent sur le front.

Le genre *Ammocète* (*Ammocætus*) , que j'ai cru nécessaire d'établir , et qui déjà avait été indiqué (1) : sept paires de branchies réunies dans une même cavité , à trous extérieurs distincts ; bouche concave , allongée , comme fendue et à deux lèvres en arrière ; point de dents ; un évent sur le front.

Le genre *Myxine* , Linné. (*Gastrobranchus*. Bloch , pl. 413) : deux trous branchiaux sous le ventre , correspondant chacun à six branchies distinctes : bouche arrondie , garnie de barbillons ; mâchoires dentées dans le gosier seulement ; un évent au bout du museau.

(1) Par M. Omalius d'HALLOIS , journal de physique , mai 1808. Exemple : Pétromyzon rouge. Lacépède. Hist. des Poiss. , t. II , in-4.° p. 100 , pl. 1 , n.° 2.

Au premier aperçu, ces poissons ressemblent assez aux anguilles par la forme allongée et arrondie de leur corps, qui paraît cependant comme tronqué en avant, à cause de la singulière conformation de la bouche. En général, ils sont très-vifs, gluans et visqueux; la plupart habitent la mer et les lacs, d'où ils remontent au printemps dans les fleuves.

Toutes les espèces de cette famille étant privées de vessie natatoire, tombent au fond de l'eau dès qu'elles cessent de s'y mouvoir; mais elles emploient divers moyens pour se fixer, afin de ne pas être entraînées par le courant des eaux. A l'aide du disque charnu et circulaire de leur bouche, qui fait l'office d'une ventouse, les Lamproies s'appliquent sur les corps solides, et s'y tiennent comme à l'ancre. Les Ammocètes forment, en recourbant et en pliant leurs lèvres, une sorte de boutoir mobile avec lequel elles fouissent très-rapidement le sable et la vase, au-dessous desquels elles demeurent ensevelies des journées entières. Quand elles ne peuvent ainsi s'enfouir, elles tombent et restent étendues sur le côté au fond de l'eau, où elles deviennent bientôt la proie des poissons voraces. Enfin les Myxines, au moyen du crochet ou du grappin mobile qui garnit leur lèvre supérieure, se cramponnent sur les parties les plus molles des poissons, qu'elles déchirent ensuite avec leurs mâchoires transversales pour en sucer le sang, dont elles se nourrissent. La plupart des espèces de ces deux derniers genres sont aveugles, et en général elles paraissent toutes forcées de se repaître de matières animales, vivantes ou mortes.

Tels sont les poissons qui composent la famille naturelle que nous regardons comme la plus rapprochée des animaux sans vertèbres par leur organisation. C'est particulièrement avec la classe des Annelides ou des vers analogues à la Sangsue, aux

lombrics, etc., que nous croyons avoir remarqué leurs très-grands rapports. Nous allons essayer de le démontrer, en comparant les espèces les unes aux autres dans leurs principales fonctions.

Nous observerons d'abord que, dans l'état actuel de la science, cette classe des Annelides se distingue uniquement, par le défaut de vertèbres, de la Famille des poissons Cyclostomes, dans lesquels cependant on ne retrouve que les premiers rudimens de l'échine.

Tous ces animaux ont également le corps allongé, mou, visqueux, sans écailles, présentant des rides transversales plus ou moins distinctes et contractiles, auxquelles les muscles adhèrent; leur tête est intimement unie au corps; jamais ils n'offrent de membres articulés; ils ont un sang rouge circulant dans des vaisseaux, des organes respiratoires, un canal intestinal très-simple, ne formant qu'un seul tube, des mâchoires mobiles en travers, lorsqu'elles existent, etc.

Quant aux mœurs, elles sont encore à peu près semblables: les uns sont libres dans les eaux, ils se fixent à l'aide de leur bouche; les autres se tiennent habituellement cachés sous le sable, où ils peuvent respirer, et ils sont privés d'yeux; d'autres s'accrochent aux animaux dont ils ouvrent les vaisseaux pour en sucer le sang.

Peut-on trouver plus d'analogie dans des caractères généraux? Cette conformité de rapports s'observe au surplus dans tous les autres organes dépendant des fonctions qui ne constituent pas la vie extérieure ou de relation, dont nous ne parlerons plus ici, ayant emprunté de leurs différences les caractères qui nous ont servi à réunir les espèces en genres ou groupes naturels.

Les instrumens destinés à la préhension des alimens ou à la mastication dans les Lamproies et les Myxines sont semblables à ceux de plusieurs Annelides. Ainsi on retrouve une assez grande

ressemblance de formes et de dispositions entre les bouches coniques et très-muscleuses, garnies de pièces calcaires, souvent dentelées en scie, qui se meuvent transversalement dans les Néréïdes, les Aphrodites et les Lamproies. Nous reconnaissons surtout les deux rangées transversales, pectinées, tranchantes et comme dorées de la bouche des Amphitrites, dans les pièces absolument semblables de la Myxine, déjà décrites par Bloch (1), et que nous avons eu occasion d'observer nous-mêmes. Enfin nous retrouvons l'absence absolue de dents des Ammocœtes, dans les Lombrics, les Arénicoles, les Serpules et les Térébelles.

Le canal alimentaire des Sangsues, de l'Arénicole, du Lombric, des Néréïdes, des Amphitrites et des Serpules, s'étend, sans circonvolutions, de la bouche à l'anus, comme dans les Cyclostomes. Chez les Lamproies et les Ammocœtes, il n'est pas retenu par le repli du péritoine, qui le plisse dans un sens, et qu'on nomme mésentère : on observe la même disposition dans les Lombrics et les Arénicoles. Chez la Myxine, au contraire, ce tube est fixé au cartilage qui tient lieu de vertèbres, depuis l'estomac jusqu'à l'anus ; il est de même attaché aux parties solides de la peau, par un grand nombre de brides, dans les Sangsues et dans l'Aphrodite. Ce canal offre, dans son intérieur, une valvule en spirale chez les Lombrics et chez les Lamproies. Rédi avait déjà observé cette particularité. Il en a parlé en donnant l'anatomie du ver de terre ; et ce passage est trop en faveur de notre opinion pour que nous nous dispensions de le placer ici (2).

(1) Pl. 413, fig. 4, lettres *bb*.

(2) E tanto basti intorno al canale degli alimenti : solamente soggiungerò, che nelle Lamprede si trova un quasi simil canale, che cammina, e scorre per tutta la lunghezza dell' interna cavità dell' intestino, etc. F. Rédi. Degli animali viventi negli animali viventi.

La circulation des Cyclostomes est presque la même que celle des Poissons ; cependant les premiers offrent ce caractère remarquable , que tous leurs vaisseaux sont liés au parenchyme des organes dans l'épaisseur desquels ils rampent ; ils se distribuent à peu près comme le font, chez les animaux vertébrés , les artères et les veines dans la dure-mère , dans le tissu des os et dans le foie. Or nous voyons une disposition semblable dans le système vasculaire de la Sangsue et du Lombric , car il pénètre dans l'épaisseur des muscles , et il s'y identifie de manière à ce qu'on rompt constamment les vaisseaux en voulant les en détacher.

Le mécanisme de la respiration chez les Lamproies et les Ammocètes est tout-à-fait différent de celui de la plupart des autres poissons , à l'exception de ceux qui appartiennent à la famille des Plagiostomes , avec lesquels nous les avons réunis , à cause de cette disposition , sous le nom commun de *Trématopnés* (1). Ce mode se rapproche de celui que nous offrent la plupart des autres animaux dont les poumons sont mis en expansion par les côtes. Ici , les parois cartilagineuses du thorax font l'effet de ressorts qui tendent continuellement à se porter en dehors , et par conséquent à donner plus d'ampliation à tous ses diamètres , en même temps qu'en raison de leur flexibilité , ils en permettent le resserrement. Ensuite la propriété qu'ont ces animaux de pouvoir faire entrer et sortir l'eau par les orifices extérieurs des branchies nous présente une particularité qui diffère totalement de ce qui a lieu dans la respiration des véritables poissons. Ce qui doit nous intéresser surtout dans la question que nous examinons , c'est l'analogie que ce mode de respiration nous offre avec ce qui s'opère dans les Annelides , chez lesquels il paraît qu'on a regardé le plus

(1) ZOOLOGIE ANALYT. , p. 100.

souvent les bourses branchiales comme des organes destinés à la génération.

Willis (1) avait déjà observé dans les Lombrics, sur les côtés du cœur, outre les ovaires, une double rangée de vésicules dont le nombre n'était pas constant dans les espèces; il avait indiqué les vaisseaux sanguins qui s'y rendent, et qui lui ont manifesté une oscillation ou battement décidé. Rédi (2), qui a vérifié l'observation de Willis, a reconnu que ces sacs sont au nombre de quatorze, sept de chaque côté, rangés en ligne droite.

M. Thomas (3) a aussi remarqué sur les deux côtés du corps de la Sangsue des sortes de sacs membraneux, transparens, en forme de vessie, placés d'une manière régulière sur les deux côtés de l'animal. Il y a injecté, avec le mercure, une quantité innombrable de vaisseaux capillaires qui communiquaient avec ceux des autres sacs analogues. Il regarde ces vessies comme de vrais organes de la respiration.

Les Arénicoles ont à la vérité des branchies flottantes au-dehors, sous forme de panaches, qui paraissent destinées à leur respiration, lorsque le sable sous lequel ils s'enfouissent est imbibé d'eau; mais comme ils se trouvent souvent à sec, il semble que la nature leur a donné une deuxième sorte d'organe respiratoire qui

(1) T. WILLIS, *de animâ brutorum*, lib. 1, cap. 3. Collect. academ. part. étrang., t. IV, p. 597.

(2) I Lombrichi, ne' quali si veggono quei globi bianci osservati dal Willis intorno al cuore, ne hanno quattordici, cioè sette per banda situati in linea retta, lungo il petto, e questi sonoi più piccoli, e non maggiori de' granelli di panico. F. RÉDI, *loco citato*.

(3) Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des Sangsues, 1806, pag. 70 et suivantes.

ne leur sert que dans ce cas. Ce sont cinq paires de bourses, situées sur les parties latérales de l'œsophage et du commencement du tube digestif, dans lesquelles on voit évidemment arriver un grand nombre de vaisseaux sanguins (1).

Nous croyons nécessaire de fixer particulièrement l'attention des naturalistes sur ces organes, que nous avons nous-mêmes reconnus, examinés et étudiés à cette occasion. Leur nombre, leur position, leur structure, tout s'accorde à nous montrer cette conformité qu'on aime à retrouver dans des parties destinées aux mêmes usages. Les ouvertures extérieures de ces sortes de bourses permettent très-probablement à l'eau d'y parvenir, comme elle en est repoussée après avoir été soumise à l'action de la respiration.

Les organes de la génération des Annelides nous montrent également une très-grande analogie avec ceux qui leur correspondent dans les Cyclostomes. Chez les Lombrics, par exemple, les œufs tombent dans la cavité du ventre, sans être conduits au dehors par des oviductes; ils s'échappent du cloaque par de petites ouvertures particulières, ainsi que l'ont observé Willis et Rédi (2); et comme M. Cuvier (3) l'a vu dans l'Arénicole et dans l'Aphrodite. J'ai reconnu la même disposition dans les Lamproies et les Ammocètes, qui n'ont qu'une seule grappe d'œufs attachée au péritoine sous l'aorte. Cet ovaire unique n'a point d'ovi-

(1) CUVIER, Bulletin des Sciences, 6.^e année, t. III, n.^o 64, p. 121, pl. 7, fig. 1, lettres E. E.

(2) Nella estremità della coda intorno a' fianchi dell' intestino, le quali uova escono poscia per forami aperti sull' orlo del podice, e sovente ve ne ho contate fino in dugento. RÉDI, loc. cit.

(3) CUVIER, Anat. comp., t. V, p. 186.

ducte : lorsque les œufs doivent être pondus , ils s'en détachent et tombent , probablement , dans la cavité du péritoine , laquelle communique avec le cloaque , par deux orifices en entonnoir , situés sur la marge de l'intestin rectum , à peu près comme dans les Raies. Il est à remarquer que la grappe des œufs se termine à une certaine distance de l'anus , et qu'elle est retenue assez fixement pour ne pouvoir se rapprocher de ces conduits , qui font communiquer la cavité du péritoine avec l'eau dans laquelle l'animal est plongé.

Il résulte évidemment de la comparaison que nous venons de faire de l'organisation des poissons Cyclostomes et des Annelides ou des vers externes , qu'aucune Classe d'animaux n'offre entre elles plus de rapprochemens , et que le passage est tel , qu'on peut le regarder comme analogue à celui qui unit les Batraciens urodèles avec les Poissons osseux.

Nous croyons donc avoir établi , comme nous nous l'étions proposé dans cette dissertation , qu'il y a une Famille entière de poissons qui se rapprochent beaucoup des animaux sans vertèbres.

D'ailleurs , afin de prouver aux naturalistes que cette analogie est le résultat des observations anatomiques , nous allons terminer cet écrit par une description générale de l'organisation des Lamproies en particulier ; mais nous aurons soin de faire connaître , en traitant de chacune des fonctions , les principales différences que peuvent offrir les espèces des genres *Ammocœte* et *Myxine*.

ANATOMIE DES LAMPROIES.

Description du squelette des Lamproies.

Nous distinguerons dans le squelette trois parties principales :
 Le cartilage qui correspond à l'échine ;
 Les parties qui forment le thorax ;
 Et enfin celles qui appartiennent à la tête.

L'échine s'étend de la tête à l'extrémité de la queue. Elle est formée d'une matière molle qui se durcit, à ce qu'il paraît, davantage à certaines époques de l'année. Sa masse principale présente, en dessous, une portion arrondie, qui semble correspondre aux corps des vertèbres. Liée à l'aorte, dont elle forme la paroi supérieure, et aux deux sinus veineux collatéraux, elle renferme à l'intérieur, dans un canal continu de la tête à l'extrémité de la queue, un cylindre aponévrotique, terminé en pointe à ses deux extrémités, et dans lequel on observe une humeur gélatineuse, analogue à celle qu'on retrouve dans les cartilages intervertébraux.

La moelle nerveuse est immédiatement appliquée sur toute la longueur de cette échine : elle s'y trouve protégée d'abord par de petites pièces cartilagineuses, plus blanches, plus denses, plus solides, qui souvent se bifurquent à leur extrémité libre, et qui semblent remplacer les apophyses épineuses; ensuite il y a constamment sur toute cette partie supérieure du dos, entre les muscles, un tissu serré, aponévrotique, imbibé d'une quantité considérable d'huile. Vues isolément, et sans la tête, toutes ces éminences de la partie supérieure de l'échine sembleraient correspondre aux côtes.

Voilà ce que nous ont montré les squelettes mous que nous avons préparés par la cuisson et par la macération.

Le thorax vient immédiatement après la tête, au-dessous de son articulation avec l'échine, à laquelle il est lié. C'est une cavité formée d'un grand nombre de cartilages renfermant le cœur et les branchies.

Cette cavité présente en dessous un sternum moyen, qui a, du côté de la tête, une pointe libre, et qui en bas se continue avec les parois du péricarde cartilagineux. Sur les parties latérales, on aperçoit une première série de trous arrondis, puis une autre série de trous ovales allongés, quatre fois plus grands et transversaux; puis encore sur les côtés, à droite et à gauche, sept autres trous, qui sont les ouvertures extérieures des branchies; enfin on voit tout-à-fait en arrière et en dessus, sept autres espaces ovales dont les cartilages intermédiaires unissent le thorax à l'échine.

En devant, ce thorax s'articule par deux pièces cartilagineuses aux prolongemens inférieurs du crâne, qui forment un anneau par lequel passent l'œsophage et le conduit aqueux, immédiatement à la hauteur de l'épiglotte. En arrière, le cartilage en forme de nid d'hirondelle, qui sert de péricarde, termine ce thorax; il est reçu dans la concavité du foie.

Toutes ces pièces sont mobiles les unes sur les autres; et tous les trous, à l'exception de ceux qui sont placés entre les ovales antérieurs et postérieurs, sont remplis par des fibres musculaires, qui en rapprochent les parties de manière à diminuer les trois diamètres longitudinal, vertical et transversal; tandis que les trous arrondis latéraux restent toujours béans pour la respiration.

La tête, qui offre les seules parties véritablement solides du squelette, est composée de quatre portions principales :

Le crâne proprement dit, qui loge le cerveau, et qui s'articule avec l'échine ;

Le cuilleron moyen ;

Le disque de la bouche ;

Deux pièces qui correspondent à l'os hyoïde.

La pièce du crâne présente latéralement et en arrière deux protubérances arrondies, qui paraissent renfermer l'organe de l'ouïe ; en devant, un enfoncement qui communique librement avec la cavité cérébrale, mais qui est rempli par une substance pulpeuse, solide et transparente, qu'on aperçoit, dans toutes les espèces, derrière l'évent ; plus deux cupules réunies en une petite masse cartilagineuse arrondie, pour renfermer les narines. C'est là aussi qu'on observe le trou fistuleux de l'évent, lequel traverse la paroi antérieure du crâne, comme nous le dirons. En devant, celui-ci se prolonge en un grand disque, ou cuilleron concave un peu échancré, qui s'applique immédiatement sur le cuilleron moyen.

En dessous, le crâne présente des deux côtés deux grosses éminences cartilagineuses, réunies entre elles, pour donner attache aux pièces de la bouche et au thorax.

Les éminences antérieures ou orbitaires naissent au-dessous du grand cuilleron, à sa jonction avec la fosse olfactive ; la large apophyse qu'elles forment là est destinée, 1.^o à soutenir l'œil et à recevoir en devant, mais de manière à permettre le mouvement, deux pièces qui servent à l'articulation du disque moyen. 2.^o Elle se prolonge en arrière et en bas, pour se joindre à l'apophyse pos-

térieure ou temporale , qui naît sous les bosses auditives , et qui se reporte inférieurement pour former l'espèce d'anneau au-dessus duquel passent l'œsophage et le conduit aqueux , et plus bas l'os hyoïde , prolongé ainsi que sa gaine musculaire , avant qu'elle passe sous le sternum. On voit au-dessous du crâne , entre les apophyses dont nous venons de parler , le trou de l'évent , qui communique là avec une poche que nous décrirons ailleurs.

Le cuilleron moyen est à peu près semblable à celui qui est formé par le crâne ; mais il est arrondi en devant , où il s'applique sur le disque cartilagineux de la bouche ; en arrière il donne naissance à l'œsophage ; vers la partie moyenne et en bas , il s'articule de l'un et de l'autre côté avec deux pièces cartilagineuses en croissant , correspondantes aux os carrés des oiseaux , et dont la convexité appuie , ainsi que nous l'avons dit , sur l'apophyse orbitaire.

Le disque de la bouche est tout-à-fait circulaire. Il supporte l'espèce de grande ventouse musculaire qui constitue cet organe chez la Lamproie. Dans la *Marine* , on remarque en devant deux tubercules logés dans les deux grosses dents réunies , et en bas , la ligne demi-circulaire dentelée qui supportait la grande pièce. Sur les côtés , on observe deux enfoncemens , où s'inséraient des muscles.

Dans la *Pricka* , le disque de la bouche , quoique essentiellement le même , offre en devant une échancrure sémi-lunaire correspondant à la grosse dent supérieure.

Des deux hyoïdes , l'inférieur est le plus petit. Il est uni , par des muscles et par des ligamens , au bas du disque de la bouche. Il se prolonge dans la direction du grand hyoïde par une pointe grêle , sur laquelle s'attachent de petits muscles , et il offre deux grandes cornes , qui sont très-mobiles , et qui peuvent surtout s'éloi-

gner et se rapprocher l'une de l'autre de manière à élargir et à rétrécir la gorge, dans l'épaisseur de laquelle elles sont placées. Le corps de cet os se réunit à la partie antérieure de la pièce triangulaire située au-devant des deux mâchoires mobiles.

Le second hyoïde est très-long; il se termine en bas dans l'épaisseur des muscles et sous le sternum, ainsi que nous le dirons ailleurs, par une pointe très-aiguë, qui ressemble un peu à l'os de la langue des oiseaux. En haut et dans la bouche, il s'articule avec les deux mâchoires mobiles, dont nous parlerons à l'article de la digestion.

Muscles des Lamproies.

Nous ne décrirons pas en détail les muscles du corps, qui ne nous offriraient rien de nouveau à indiquer. Lorsqu'on a dépouillé ces animaux, on remarque que les faisceaux charnus forment des demi-cerceaux de chaque côté du corps, présentant leur convexité en dehors et en arrière. Chacun d'eux s'attache en avant et en haut à la colonne vertébrale par une extrémité rétrécie, et se termine en bas, vers la ligne médiane, un peu moins en avant, de manière à se joindre à angle aigu avec le faisceau du côté opposé; ce qui est surtout remarquable dans la région du thorax.

Nous ne ferons connaître ici que les muscles de la tête et de la gorge, qui nous ont paru mériter le plus d'intérêt.

Le disque de la bouche est tout-à-fait charnu dans les deux tiers de son étendue. Les fibres les plus apparentes sont courtes, parallèles, et se portent de dehors en dedans, à peu près comme dans les cupules des Poulpes. Les principaux faisceaux destinés à le mouvoir sont :

1.^o Deux gros muscles pyriformes, comprimés, ayant leur grosse extrémité en arrière et leur sommet en avant, formés de

fibres courtes, disposées par tranches, successivement placées les unes derrière les autres. Ces muscles se confondent, du côté du tronc, avec les espèces de cerceaux charnus dont nous avons parlé; ils se fixent, par une aponévrose assez longue, dans un enfoncement que présente l'apophyse temporale vers sa réunion avec le crâne et avec l'extrémité postérieure de la pièce en croissant du disque moyen. Ils se terminent en arrière, et sur les côtés du disque de la bouche, par un tendon fort et court, lequel est recouvert par l'épanouissement réticulé du nerf sous-orbitaire.

2.^o Plus profondément sont deux autres muscles coniques, très-épais, placés immédiatement au-dessous de l'orbite, s'insérant en arrière au cerceau cartilagineux qui surmonte le sternum; en bas, à l'hyoïde supérieur; en haut, à l'apophyse temporale; en avant, au disque de la bouche, près de sa jonction avec les cornes du premier hyoïde. C'est dans l'épaisseur de ces corps charnus et postérieurement que se rencontre un réservoir membraneux, dont le conduit excréteur va s'ouvrir dans la cavité buccale.

Plus loin, et sous le cou même, entre le sternum et la bouche, il y a six petits muscles grêles, allongés, terminés par des tendons fort étendus: quatre sont placés sur la ligne moyenne, et deux sont latéraux. Tous s'attachent à l'hyoïde inférieur, au moment où il pénètre dans la poitrine; ceux des côtés gagnent le disque de la bouche, où ils s'insèrent auprès des précédents; deux des moyens se portent du même point au sommet du premier hyoïde, et les deux autres, tenant à la même partie par des aponévroses seulement, vont se rendre, en se fixant tout du long du premier os hyoïde, vers les parties latérales de chacune des couronnes dentaires supérieures, et semblent destinés à les écarter l'une de l'autre.

Au-dessus du sternum, entre les deux premiers cerceaux cartilagineux du thorax, sont deux plans de fibres qui brident le

second os hyoïde ; l'un est transversal , l'autre oblique. Plus profondément, se rencontrent encore d'autres fibres transversales qui forment un anneau autour de la même pièce , mais qui ne s'insèrent nullement au sternum. Une gaine charnue , conique , entoure aussi cette partie , s'attache en avant au sternum , et se fixe par son sommet sur le haut du péricarde cartilagineux. En outre, elle tient aux organes voisins par une foule de filamens analogues à ceux qui environnent l'artère carotide interne dans le sinus caveux de la dure-mère. Les faisceaux musculaires qui la forment se réunissent sur la ligne moyenne en avant et en arrière. Par sa face interne , et dans ce dernier sens , elle donne attache à un autre plan charnu , penniforme , terminé par un tendon grêle et fort long , renfermé lui-même dans une gaine musculaire , cylindrique , donnant naissance à deux muscles particuliers au niveau de la mâchoire supérieure , et se bifurquant pour s'épanouir sur les pièces qui la forment. En finissant ainsi , ce même tendon fournit encore de chaque côté des fibres obliques ; et tout cet appareil musculaire paraît bien propre à rapprocher l'une de l'autre les deux couronnes dentaires.

Le disque moyen de la tête est maintenu en rapport avec les cornes latérales du premier os hyoïde par un petit muscle , qui se confond avec un autre , par lequel cette corne elle-même est unie au disque de la bouche. Quelques fibres s'étendent aussi entre cette dernière partie et le corps de l'os hyoïde.

Organes de la digestion dans les Lamproies.

Dans la grande Lamproie marbrée , la ventouse qui forme la bouche se trouve garnie régulièrement de dents coniques , disposées en quinconce sur des lignes courbes , au nombre de seize , huit de chaque côté. Ces dents , d'abord très-grêles sur le bord de la bouche , augmentent en grosseur en arrivant vers la

gorge. Celles de la ligne interne correspondante au palais sont à deux pointes, et celle du milieu, qui est la plus grosse de toutes, fait partie du disque cartilagineux et circulaire antérieur. Elle paraît correspondre à une autre, beaucoup plus grosse encore, que supporte le bord inférieur du disque, et qui offre huit pointes disposées en croissant, se tenant toutes par leur base. Ces dents sont recouvertes d'une matière cornée très-solide, de couleur orangée, qui se détache, par la macération et par l'ébullition, des cartilages de même forme qu'elles recouvrent.

L'ouverture de la gorge se trouve au centre du grand disque antérieur; la membrane qui forme là le commencement de l'œsophage est lisse, muqueuse. Dans la partie inférieure, dans le lieu que pourrait occuper la langue, on voit une masse de dents de la même couleur que les précédentes, mais supportées par des cartilages mobiles qui font l'office d'hyoïdes. L'ensemble est analogue à peu près à un haut de larynx. Quoique les dentelures soient nombreuses, elles ne se rapportent qu'à trois pièces principales dont elles font partie. L'une d'elles, la plus près de la bouche, est impaire; elle présente douze dentelures régulières, six de chaque côté, courbées en croissant, et adossées de manière que l'angle résultant de leur réunion est dirigé en arrière, ou vers l'orifice de l'œsophage, et entre les deux autres pièces symétriques dont nous allons parler. Celles-ci sont aussi courbées en C allongé, mais de manière que leurs côtés concaves se regardent; elles portent neuf dentelures; elles sont garnies en dedans de petits muscles qui peuvent les rapprocher.

Au-dessus de ces deux pièces est une concavité offerte par la face inférieure du disque moyen, et qui les loge lorsque l'animal fait le vide pour s'attacher. En arrière, cette concavité, qui semble analogue à la voûte palatine, est terminée par un repli mem-

braneux ou véritable voile du palais, s'abaissant par la contraction de muscles spéciaux, qui viennent du haut de l'apophyse temporale, et offrant deux piliers prolongés assez loin dans la cavité du pharynx, au fond de laquelle se remarque l'épiglotte, avec l'ouverture du sinus aqueux des branchies en dessous, et l'entrée de l'œsophage en dessus. Cette dernière, très-rétrécie, arrondie, ne doit permettre l'introduction que de corps d'un petit volume.

Outre les organes que nous venons d'indiquer, le commencement du canal alimentaire, chez ces animaux, offre deux réservoirs, dont nous avons déjà dit quelques mots. Ils sont placés dans l'épaisseur des fibres charnues de deux muscles; leur surface est bosselée, à peu près comme celle des vésicules séminales; leur couleur est rosée dans la Lamproie marine, et noire dans la Pricka; leurs parois sont transparentes; et ils se terminent en avant par un conduit grêle, allongé, se rapprochant de celui du côté opposé vers la ligne moyenne, et s'ouvrant dans la bouche, à la partie inférieure, près de l'extrémité libre de la plus grande dent. Je les ai injectés avec le mercure; c'est le seul moyen de rendre apparent leur orifice. Sont-ce là les organes salivaires? Je le pense, mais je ne l'affirme point positivement.

L'œsophage est entièrement membraneux, placé au-dessus du canal commun des branchies; quelques muscles forment autour de lui des rubans charnus: deux sont en dessus, et proviennent des deux éminences temporales, qui donnent aussi attache à des bandes musculaires appartenant à l'épiglotte; sur les côtés il s'y en rencontre encore deux autres; et en bas il est fortifié par la gaine charnue cylindrique, qui environne le long tendon du second muscle conique; tout-à-fait en haut il correspond à l'échine.

Parvenu derrière le cœur, il s'engage entre le diaphragme et le rachis, s'étrangle manifestement, présente un bourrelet circulaire très-dur et très-épais, d'une consistance presque cartilagineuse, analogue à celui du pylore chez les Mammifères, et portant en dedans un repli valvulaire de la membrane muqueuse; ce repli semble devoir mettre obstacle au vomissement.

Au-dessous du péricarde, le tube alimentaire s'identifie avec le foie d'une manière intime, et reçoit plusieurs vaisseaux sanguins considérables de cet organe, qui est placé au-dessous de lui, et un peu plus à droite qu'à gauche; alors il se dilate, sa couleur passe au violet noir; sa membrane interne devient d'un rouge foncé; elle est éminemment villeuse. Il continue son trajet, situé au-dessous de l'ovaire, libre de toute espèce d'adhérence, présentant de distance en distance des vaisseaux sanguins, noirs, gros, peu ramifiés, transversaux, venant d'un tronc volumineux, né en bas vers l'anus, et remontant en spirale autour de l'intestin jusqu'au foie. La marche de ce vaisseau est marquée par une sorte de raphé blanchâtre à l'extérieur.

Cet intestin n'offre ni replis ni appendices quelconques; il est à peu près d'un égal volume partout; il renferme beaucoup de valvules conniventes, disposées en spirales, noirâtres et épaisses, plus abondantes en haut qu'en bas, et se rapprochant davantage de la direction longitudinale dans le dernier sens.

L'anus paraît dans le cloaque au-devant des deux orifices des uretères, et présente sur ses côtés les trous par lesquels le péritoine communique avec l'extérieur.

Le foie est d'une teinte jaune-rougeâtre, quoique le plus grand nombre des auteurs, tels que Belon, Gesner, Brunzerus, Rondelet l'aient regardé comme vert ou bleu. Il est allongé, unilobé,

évidemment recouvert par la membrane péritonéale , creusé en avant en forme de cône , pour loger le péricarde , qui y tient par une foule de petits filamens , et mince , tranchant , flottant du côté de l'abdomen. Un grand tronc vasculaire passe dans son épaisseur vers sa face convexe , et distribue beaucoup de rameaux , qui se fraient un passage à travers son parenchyme.

Nous avons indiqué les rapports du foie avec l'intestin ; nous devons ajouter que la vésicule du fiel manque absolument , et que , malgré des recherches minutieuses , il nous a été impossible de trouver aucune trace de conduits hépatiques.

Il n'y a pas de rate non plus.

Les reins , situés au-dessus des ovaires , à la région la plus profonde de l'abdomen , sont d'une longueur considérable , puisqu'elle égale celle de la moitié de cette cavité. Ils sont rougeâtres , comprimés , adhérens aux sinus veineux ; et ils présentent tout du long de leur bord libre un uretère membraneux , très-dilatable , venant s'ouvrir immédiatement au sommet d'un petit mamelon , derrière l'anus , dans le cloaque.

Dans toutes les espèces du genre *Pétromyzon* , les organes digestifs m'ont présenté la plus grande analogie : cependant leur bouche offre des différences assez prononcées. La plupart des ichthyologistes les ont indiquées : c'est pourquoi je crois inutile d'en faire une nouvelle description , qui sera mieux placée dans une histoire des espèces.

Organes de la respiration des Lamproies.

Les Lamproies peuvent faire entrer et sortir l'eau par les sept trous extérieurs des branchies. On en a souvent la preuve quand on examine ces animaux vivans. Comme ils ont l'habitude de se fixer par la bouche , lorsqu'ils sont tranquilles , on peut incliner le vase qui les contient , de manière que leur tête soit tout-à-fait

hors de l'eau jusqu'à l'avant dernier trou du côté du ventre. La respiration ne s'en opère pas moins, avec bruit, il est vrai, parce que l'air se mêle à l'eau et bouillonne avec elle; mais on reconnaît évidemment que celle-ci est attirée à chaque inspiration, et repoussée par le resserrement du thorax, dans le mouvement contraire.

Chacune des branchies est contenue dans un sac isolé ou dans une poche membraneuse solide, dont elle tapisse toute la cavité. Il y en a quatorze semblables: toutes, à leur face interne, communiquent par autant de trous dans un canal commun situé, d'une part entre le sinus veineux, qui renferme l'artère pulmonaire, et le muscle conique du grand hyoïde, et de l'autre au-dessous de l'œsophage.

Ce canal aqueux est une sorte de cul-de-sac qui se termine au-dessus du péricarde en bas, et qui s'ouvre en haut vers le gosier, à l'entrée du thorax, derrière une sorte d'épiglotte. Il y a encore vers cette entrée deux valvules ou bords membraneux flottans, qui descendent au-delà du premier trou branchial, et qui paraissent destinées à s'opposer au retour de l'eau dans la bouche.

L'eau contenue dans la gorge peut cependant passer dans le canal aqueux. Voici par quel mécanisme: il y a au-dessous des apophyses temporales une sorte d'anneau ou de pont cartilagineux que traverse l'œsophage. On voit là un petit cartilage libre, de forme variable suivant les espèces, à deux pointes dans la *Marine*, à cinq dans la *pricka*. C'est une sorte d'épiglotte, ayant ses muscles propres, pouvant s'élever et s'abaisser pour ouvrir ou fermer le sac membraneux qui mène l'eau aux branchies.

Il paraît que la respiration des Lamproies s'opère au moyen de l'élasticité des pièces qui composent le thorax. En augmentant tous les diamètres, elles appellent, par les trous extérieurs,

l'eau, qui se trouve bientôt expulsée par la contraction des nombreuses fibres charnues qui occupent tous les intervalles de ces pièces, et par une sorte de diaphragme charnu, qui termine en dedans le thorax pour former la paroi supérieure du péricarde.

Quant à l'évent, nous nous sommes tout-à-fait convaincus qu'il ne communique ni avec le pharynx, ni avec le canal aqueux; que son conduit se rend dans un sinus situé sous la tête au-dessous de l'œsophage; que ce sinus peut se remplir d'eau et se vider à chaque mouvement de déglutition, mais qu'il est indépendant de l'action respiratoire. Nous avons reconnu que cet évent s'abouche avec la cavité des nerfs olfactifs, laquelle est située au-devant et au-dessus du crâne, dans des capsules particulières: de sorte que, selon notre opinion, l'évent n'agirait que comme une éprouvette destinée à faire connaître à l'animal les qualités de l'eau dans laquelle il est plongé. C'est - là ce que nous ont appris nos recherches sur cet organe dans les Lamproies marine et fluviatile.

Dans l'Ammocète, quoiqu'il y ait sept trous extérieurs pour les branchies, ces organes sont renfermés dans une cavité commune; la poche qui les contient est cartilagineuse comme dans les Lamproies, mais beaucoup plus rapprochée de la bouche. Il y a vers cette extrémité deux valvules sémi-lunaires, dont le bord libre est flottant en dedans, et constitue une sorte d'épiglotte qui permet à l'eau contenue dans la bouche de passer dans la cavité des branchies, mais non réciproquement. Le milieu de cette cavité remplit la fonction de l'œsophage. Celui-ci ne commence qu'au bas de la cavité des branchies: il offre un orifice longitudinal; il est très-grêle, placé derrière le cœur, et traverse le foie. Toutes les branchies et le diaphragme forment huit demi-cloisons adhérentes, d'une part à l'échine, où leur réunion présente un petit tubercule comme charnu et flottant, et de l'autre elles se joignent derrière le sternum.

Dans la *Myxine*, la respiration paraît s'opérer d'une toute autre manière, comme semble l'indiquer la disposition des organes. D'abord, il n'y a que deux trous ou orifices extérieurs pour les branchies : ils sont situés sur les parties latérales du ventre, entre la tête et l'anus, ce qui a valu à la *Myxine* le nom de *Gastrobranche*. Ensuite, il n'y a que six branchies, en forme de plaques, situées un peu au-dessus du cœur et sur les parties latérales de l'œsophage. Bloch les a très-bien décrites et figurées. Nous renvoyons à son ouvrage et à sa planche 413 ; nous avons vérifié l'exactitude de l'anatomie qu'il en a publiée ; mais il n'a pas donné, à ce qu'il nous semble, une idée exacte du canal de la respiration et de l'œsophage. Nous allons y suppléer.

La bouche de la *Myxine* présente deux orifices ; un supérieur, arrondi, surmonté de quatre petits tentacules, c'est l'évent. L'autre, inférieur, plus grand, garni également de quatre tentacules plus longs, et présentant en dedans les mâchoires œsophagiennes, c'est la bouche.

L'évent mène d'abord à une petite cavité où sont placées sept lames verticales, un peu en arrière du crochet unique du palais ; ces lames paraissent être destinées à la membrane olfactive ; ensuite l'évent se continue, perce un corps charnu, qui est une véritable luvette ou voile du palais, qui peut s'abaisser sur l'œsophage, et empêcher ainsi la communication avec le conduit aqueux, qui fait suite à l'évent, et qui s'y présente alors comme un œsophage à parois charnues, tandis que le véritable m'a paru membraneux, situé au-dessous et en arrière du grand cône musculaire destiné à mouvoir l'hyoïde, et dont Bloch a parlé.

Le conduit charnu, destiné à porter l'eau aux branchies, arrivé à leur hauteur, présente six trous de chaque côté qui communiquent avec leurs cavités. A la hauteur du cœur, ce canal pénètre dans l'estomac par une sorte de cardia environné de fibres charnues

très-fortes ; où l'on voit , en même temps , le véritable orifice de l'œsophage situé plus en avant.

Nous croyons inutile d'entrer ici dans de plus longs détails , ceux que Bloch a donnés étant parfaitement exacts.

Organes de la circulation des Lamproies.

Le mode essentiel de la circulation des Lamproies est à peu près le même que dans les Poissons. Voici les particularités les plus notables que ces animaux nous ont offertes.

Le cœur est renfermé dans un péricarde cartilagineux , lequel est séparé du bas-ventre par une cloison charnue qui fait l'office de diaphragme. Il est reçu dans une concavité de la partie supérieure du foie ; il est très volumineux , ainsi que l'oreillette unique qui est renfermée avec lui. Il y a deux valvules à l'entrée de l'oreillette , et trois à l'origine de l'aorte. Cette aorte , qui présente un petit bulbe dans l'intérieur du péricarde , pénètre presque aussitôt sous le sternum , dans un sinus veineux , où est logé en même temps le long cône charnu du grand hyoïde , destiné à mouvoir les mâchoires gutturales. Le tronc de cette aorte est situé entre les branchies , au lieu où elles seraient adossées inférieurement , dans une sorte de médiastin. Il donne à droite et à gauche les artères branchiales , qui pénètrent dans les bourses respiratoires ; mais à la hauteur de la cinquième , dans la Lamproie marbrée , le tronc unique se bifurque pour fournir seulement les dernières artères branchiales de chaque côté. Ces deux troncs secondaires se terminent dans la septième bourse , ou dans la première du côté de la tête. Dans la Pricka , c'est à la troisième artère branchiale du côté du cœur que la bifurcation a lieu.

Les veines artérielles , qui proviennent des branchies , se rendent , au nombre de sept de chaque côté , dans une aorte , qui

commence sous l'échine, immédiatement au-dessus de l'épiglotte, derrière la terminaison du cul-de-sac de l'évent, et sur la première bourse branchiale.

Cette aorte règne sous le rachis dans toute la longueur du corps : elle est à peu près quadrangulaire, adhérente en dessus à l'échine, en dessous au péritoine et à la longue grappe des œufs, latéralement aux deux grands sinus veineux. Les artères collatérales qu'elle fournit ne naissent pas d'une manière régulière, ce qui paraît tenir à l'absence des vertèbres.

Toutes les artères du corps, à l'exception de la mésentérique, n'ont pas de parois isolées; elles percent les muscles et les organes : elles y adhèrent par un tissu fibreux et elles forment, lorsqu'on coupe ces parois, des sinuosités analogues à celles de l'artère sphéno-épineuse dans la dure-mère.

Les veines sont absolument dans le même cas : on ne voit de tronc distinct de ces vaisseaux qu'à l'endroit où elles percent le péricarde pour aboutir à l'oreillette et à la partie inférieure du tube intestinal. Partout ailleurs elles forment des sinus analogues également à ceux de la dure-mère et à ceux des veines de l'intérieur du corps des vertèbres dans les mammifères. Le plus souvent les artères baignent dans ces sinus et les traversent, comme nous l'avons dit pour l'artère branchiale, et, comme on le voit, surtout dans deux grands sinus qui règnent sous l'échine et qui accompagnent l'aorte.

Organes de la reproduction des Lamproies.

Nous ignorons complètement le mode de fécondation des Lamproies et des autres genres de cette famille. Les auteurs n'ont même point indiqué la disposition des organes de la génération dans les mâles, et nous n'avons pu observer que des femelles.

Lorsqu'on ouvre le ventre de celles-ci, on trouve une grappe d'œufs très-considérable, située sous le péritoine, dans la ligne médiane et adhérente à l'aorte, depuis l'extrémité libre du foie jusqu'à quelque distance de l'anus. Ces œufs sont très-petits, de la grosseur des graines de pavot dans la Lamproie marbrée, et beaucoup moins gros encore dans la fluviatile et dans l'Ammocœte (*Petromyzon branchialis*. LIN.). Leur raffe, ou support commun, constitue des sortes de feuillets transversaux recouverts par le mésentère. Ces organes occupent tout l'espace compris entre les reins et le tube intestinal, qui est libre dans la cavité du ventre.

Nous avons déjà dit que les Lamproies et les autres Cyclostômes n'offraient pas de trompes, ni d'oviductes, ou canaux de communication au-dehors, et qu'il paraissait que leurs œufs, après avoir acquis le développement nécessaire, tombaient dans la cavité du péritoine, d'où ils s'échappaient par deux orifices qui se remarquent sur les côtés du rectum, et qui aboutissent au support des uretères, lequel forme un petit appendice au-delà de l'anus. C'est là ce que Bloch a voulu dire par ces expressions : « L'ouverture de l'ovaire se trouve au nombril au-dessous de l'anus ; elle est cylindrique et saillante ».

Dans la Myxine, que nous avons étudiée, les œufs étaient disposés de la même manière que dans les Lamproies, et comme Bloch l'a représenté à la planche 413, fig. 3, *h*. Il reste encore des recherches à faire à cet égard ; Bloch ayant aussi trouvé, dans une autre femelle, une série d'œufs oblongs semblables, dit-il, à ceux des serpens, placés sur l'épine du dos, et étendus depuis le diaphragme jusqu'au près de l'anus. Ce qu'il a fait figurer même planche, fig. 4, sous les lettres *ggg*.