QK 99
A 42

FLORA LIPSIENSIS

PHARMACEUTICA.

SISTENS PLANTARVM AGRI LIPSIENSIS NVNC ET OLIM
OFFICINALIVM VENENATARVMQVE DIAGNOSES,
DESCRIPTIONES, SYNONYMA, LOCOS NATALES,
QUALITATES, VIRES ET VSVM.

A V C T O R E

HENRICO THEOPHILO LVDOVICO
REICHENBACH.

PHILOSOPH. MEDIC. ET CHIRVRG. IN LITTERAR. VNIVERSITATE
LIPSIENS. DOCT. SOCIETAT. LINNEAN. LIPS. VNIVERSAE
HISTOR. NATURAL. WETTERAV. ET MINERALOG.
LEIPZIGENSIS SODAL.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

L I P S I A E,

APVD CAROL. FRIEDERIC. FRANZ.

MDCCCXVII.

+QK99
.R42

LIBRARY OF THE

AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY

NEW YORK
1000
1000
1000
1000

Medicus notitia plantae destitutus, de viribus eius-
dem nunquam iuste iudicavit.

INN. mat. med.

LIBRARY OF THE
AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY
NEW YORK
1000
1000
1000
1000

COMMILITONIBUS

CARISSIMIS.

D. D. D.

AUCTOR.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1900

1900

LIBRI
MCM
1775

Quamquam intimam atque exactam rerum, quae nobis tractandae sunt cognitionem non modo utilem esse sed necessario requiri inter omnes constet: tamen eorum, qui principiis doctrinarum, quibus se totos dicere decreverant non tanta omnino incumberent diligentia et assiduitate, quanta ad rectam praeparationem opus est haud exiguum videmus numerum, imo et tales cognovimus qui plane inutilia ea et minime necessaria rati, alia et minus molesta via scopum attingere conarentur. At fallax est illa et periculosa, in re medica maximi momenti; quid enim, ut exemplo utar, ubi laminas imponendi, fasciasque adligandi cuidam ossium musculorumque formae situsque inscio sit cupido? quid ubi ad formulas praescribendas animum quis accingeret medicamentorum eorumque virium recta cognitione expers? —

Ut plantarum, medicinalium certe, notitia iis, qui arti medicae vel universae vel phar-

maciae solummodo studeant iucundior et facilior reddatur, hoc tentamine, quantum in me est, iuvare enixus sum. De plantis medicis scripturus, minime immemor eram laboriosi conatus, minime antecessorum celebritate, finibus itaque arctioribus circumscripsi periculum et eas nonnisi plantas describere suscepī, de quibus agro nostro indigenis ipse compertum habeo. Decem sunt et quod excurrit anni quod plantis indagandis, examinandis, exsiccandis, describendis pingendisque operam darem, et omne quod postea medicae artis et theoreticae et practicae cultura reliquit otium semper rei herbariae imprimis et zoologiae dedicarem. Antea αὐτοδίδακτος, difficultates omnino intelligens cum doctrina tam gravi coniunctas, tamen ab eius studio non abhorruī, et postea dulcissimorum, quos ex fautoris mei atque praeceptoris praeclarissimi Exp. SCHWAEGRICHENII institutionibus deportavi, fructuum nunquam immemor ero. Agrum nostrum sedulo percursitans Florae Lipsiensis non minus, quam Faunae divitias cognoscendi largissimam reperi occasionem, nec horum unquam nollem recordari iucun-

dissimorum, vitae annorum. Quae quum tractarem, permultos etiam academiae cives, nec non pharmacopaeos, ad idem studium animum appellentes, eorumque variam de rebus botanicis sententiam cognovi. Vidi enim per plures, quibus mox molesta videbatur atque omnino inutilis universa botanica scientia, qui nonnisi aliorum impulsu excursionum participes, harum finis plane immemores, res alienas tractantes plantarum quaerendarum vix rationem haberent; vidi multos, eosque melius de botanice sentientes, qui botanices pharmaceuticae ad medicinam faciendam permagnam utilitatem bene intelligentes hanc tamen ita coërcerent, ut plantam qualiscunque sit, quae hodie non in formulis medicis praescribatur, abiicerent; at vidi etiam, quamvis paucos, qui nec calore, nec frigore, nec fame nec siti deterriti, strenue in fine suo perseverantes nonnisi plantis investigandis operam darent.

His modo commemoratis non scribo; hi verae botanices cultores non mea egent institutione, his enim infinita patet celeberrimorum scriptorum series adeunda, his quoque

non opus est ad indagandas explorandasque plantas impulsu. Sed alter est botanices cultorum ordo, eorum quidem, qui necessitatem botanices ad medicinam addiscendam concedant, sed universae botanices non habeant rationem; his operam impendi. Paradoxon videtur, ubi contendat quis plantarum medicinalium solummodo cognitionem quemdam sibi comparare posse, quum tamen et reliquarum, ne confusio existat, notitia necessaria sit, at omnis huius rei cardo versatur in principiis i. e. in terminologia botanices, et eum, qui terminologia satis eruditus est, nil refert, num planta oblata sit medicinalis nec ne. Ita et illis, qui medicinae studiosum magis occupatum esse contendant, quam ut plantarum tam multarum notitiam sibi conciliandi otium ei supersit, oppugnatur, quum terminologiam addiscendi tempus unicuique concedat. Ne vero exploratione officinalium plantarum tam multum temporis teratur, has exhibui, hisque solis hoc tentamen dicavi. Defendat me summus ille amor, quo in universae historiae naturalis studium iam ex prima pueritia flagro, defendat me voluntas bo-

tanicen arctius apud commilitones meos cum arte medica iungendi, qui nunc post entomologicum nuper editum specimen et botanicum in lucem proferre audeam.

Plantas antea omnes in agro nostro occurrentes, vel nunc vel olim officinales adumbrare in animo erat, quum vero nimis voluminosum hoc factum esset opus, eo coërcui propositum meum, ut nonnisi illis, quibus hodie in officinis utimur, brevem adderem descriptionem illas vero quae nobis videntur obsoletae, nonnisi diagnosi certa atque perspicua exhiberem.

Systema secutus sum sexuale Linneanum et quidem emendatum, quum hoc notissimum, aptissimum quoque ad plantas medicinales indicandas mihi videatur, et ipse in libello tam parvo minime aliud systema sequi debere persuasum mihi habeam. Defectus classium Polyadelphiae et Polygamiae, quum difficilius a tirone eruantur PERSOONIO auctore ab omnibus fere probatus etiam mihi arrisit.

Genericos characteres a celeberrimi acvi nostri scriptoribus a WILLDENOWIO, PERSOONIO, SPRENGELIO mutuatus sum. Specificas definitiones complures comparavi, sin-

gulas examinavi, unam elegi; singulo interdum alius caractere addito. Auctores citavi nonnisi paucos, quum citatorum copia finem quem ego concepi minime responderet; eadem est synonymorum ratio; LINNEANUM nomen, ubi planta non ignota fuerit LINNEO, nunquam desideratur.

Icones eas quas ipse vidi BLACKWELLIANAS, SCHUHRII et optimas HAYNII religiose indicavi.

Descriptiones partium, quas multis adieci, cum natura congruas quisque deprehendet, quum vel in loco natali saepius, secundum viva specimina vel in herbario secundum exacte siccata atque praeparata eas confecerim.

Locum natalem indicavi nullum quem non ipse compertum habeam, itaque permagnum videtur discrimen inter locos a me indicatos et a BAUMGARTENIO laudatos, quem iam Exp. SCHWAEGRICHEN hac in re saepissime peccasse demonstrat. Plantae cultae e Flora omnino eiiciendae sunt, itaque harum nunquam nec definitiones nec descriptiones proposui, sed obiter tantummodo earum mentionem. Plantas a me lectas, a BAUMGARTENIO

vero non indicatas, nonnisi paucas officinales, quum non Floram scribam Lipsiensem, sed eius medicas tantum plantas recensere propositum habeam, commemoravi. Inter illas tamen Fritillariam Meleagridem me re vera sponte in prato magno silvae Rosenthal quo itur a nosocomio Jacobi vidisse memorabile videtur. Nonnullos a BAUMGARTENIO laudatos locos plantas, quas ibi inveniri affirmat, non praebere, sed frustra ibi quaeri patet, attamen non contenderem eum semper errasse, quum ipse plantas nonnullas in locis bene notatis non denuo legerim, inter quas rarum illud nominare sufficiat Trifolium striatum SCHREB. quod Exp. SCHWAEGRICHEN in colle St. Theclae, ego vero anno 1810ccccxii copiose in collibus prope Zschocher et eodem anno prope Pfaffendorf antequam nosocomium ibi extrueretur militare, nunquam vero postea inveni. Tempus florescentiae certum indicavi.

In viribus plantarum a me descriptarum recensendis pariter atque in earum usu laudando optimorum secutus sum scriptorum opera, etiam vires imaginatas quas veteres

nonnullis adscripserunt sicut praeparata obsoleta plerumque enarrare non dubitavi, nam difficillime exploratur an hodie sit officinalis planta quaedam nec ne; imo illas quas iam diu oblivioni fere omnes tradiderunt hodie laudibus eximiis audimus efferri; nolo *Anagallidis arvensis*, nolo *Calendulae officinalis* facere mentionem, quarum illa in hydrophobia, haec in ictero etc. multa efficisse fertur. Nonnulli etiam *Junci pizosi* in silva academica copiosi, radices, et nuperrime *Pyrolam umbellatam*, eamque inprimis diureticam, ibidem, rarius tamen obviam, laudarunt.

Permulae rationes in cuiuscunque plantae usu sunt habendae, inprimis vero sit iusto tempore collecta, rite siccata vel praeparata, sitque certa, ubi adhibeatur, indicatio.

Nomina, generica certe, germanica et francogallica, quum horum notitia medico nec non pharmacopaeo necessaria sit, in calce libelli quamquam in ipso non fuerant indicata latinis immixta leguntur.

Scripsi Lipsiae. Mense Jan. 1817.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

SALICORNIA. *Calyx* nullus. *Corolla* nulla.
Squamae amenti ternae partes fructificantes includunt. *Stylus* bipartitus. *Semen* unum.

S. herbacea, geniculis compressis emarginatis, internodiis obconicis, amentis pedunculatis. SPRENG. Fl. Hal. p. 2. — LINN. spec. pl. ed. WILLD. l. 1. p. 23. BAUMG. Fl. Lips. p. 1. — *Icon.* BLACKW. tab. 598. SCHKUHR. bot. Hand. tab. 1. PALL. haloph. tab. I. fig. 1.

Radix annua, fibrosa; caulis herbaceus, ramosus palmaris — pedalis, aphyllus, articulatus: articulis apice compressis, emarginato-bifidis; rami oppositi, patuli; amenta pedunculata, opposita vel terminalia; ante florescentiam vix ramis crassiora, squamis imbricatis, florescentia et post florescentiam ramis crassiora, clavata, carnosa. Color radice et caulis lutescens, rubicundus, ramorum amentorumque obscuro viridis, partium fructificationis flavescens.

Var. α) caule simplicissimo vel ramis simpliciusculis, virgatis. *Salic. virginica* SCHOLL. suppl. Fl. barb. n. 10. 16. LEYSS. Fl. Hal. p. 1. HOFFM. Fl. germ. ed. 1791. p. 1.

β) *acetaria*, annua strictim erecta subramosa rubra, amentis cylindricis oppositis terminalibus. SPRENG. PALL. haloph. Tab. I. fig. 2. II. Fig. 1.

γ) *prostrata* caule ramosissimo divaricato trifariam prostrato, articulis apice subsinuatis, amentis crebris oppositis terminalibus. SPRENG. PALL. haloph. Tab III.

Locus. Ad salinas prope Ketschau et Teuditz. Var. β . et γ . extra fines floras nostrae in Mansfeldia legi ad lacum salsum. *Floret* Aug. Septbr.

Pars offic. Herba Salicorniae. Praeparata. Soda. Qualitas inodora, sapore salso acri var β . acidulo. *Vis.* stimulans, antiscorbutica, resolvens, diuretica. *Usus.* Olim in scorbuto et hydrope, etiam in scabie, abscessibus, scelotyrbe et hypersarcosi adhibitam esse testantur. Ceterum ad sodam praeparandam nobis planta aptissima; ex Anglorum more cum aceto, oleo et pipere condita acetariae loco comedi potest.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

VERONICA. *Corolla* limbo quadripartito: lacinia infima augustiore. *Capsula* bilocularis, obcordata.

V. *officinalis*, spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis obovato subrotundis pilosis annuis caule procumbente hirtis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 59. n. 17. BAUMG. Fl. Lips. p. 7. n. 14. Icon. BLACKW. Herb. t. 145. SCHKUHR bot. Handb. t. 3. HAYNE. IV. 3.

Radix parennis, fibrosa; caulis procumbens, adscendens, teres, hirtus; folia opposita, brevipedunculata, obovata, serrata; racemi pedunculati, erecti, axillares; corollae subcoeruleae, rubro striatae.

Lec. nac. In silvaticis umbrosis v. c. inter Lindenau et Leutsch, prope Lindenthal, bei dem heitern Blick, im Wilwisch, am Bieniz, in silva academica. Fl. Jun. — Septb.

Pars offic. *Herba Veronicae*, collecta mense Maio et Junio caute siccatur ne mucore depravetur. *Qualit.* Inodora, sapore subamara, adstringens. *Vis.* adstringens, vulneraria, tonica. *Usus.* Planta iam antiquissimis temporibus nimis laudata, ita ut eius nomen e verbis: vera unica, compositum sit. Saepissime in variis pectoris morbis, in tussi, asthmate, phthisi pulmonali adhibebatur. Etiam in mictu cruento, in calculis renalibus et in scabie mul-

ta efficisse perhibent. Secundum Linneum ea in cachexia quoque utebantur. Decoctum cum vitriolo inspissatum atramentum exhibere testatur Baumgarten. Pecoribus salutaris dicitur. *Præparata* vix prostant in officinis nostris. *Olim pulvis, conserva, extractum, essentia et aqua destillata.*

- V. *Beccabunga*, racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 64. n. 30. BAUMG. Fl. Lips. p. 7. n. 16. *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 48. Fig. 1. HAYNE. IV. 2.

Radix perennis, repens, fibrosa; caulis repens, radicans, adscendens, teres, articulatus, glaber; folia opposita, brevipetiolata, ovalia, crenata, obtusa, plana, subcarnosa, viridissima; racemi laterales longe pedunculati, axillares; corollae coeruleae aut caesia.

Distinguenda a specie affini: V. *Anagallide*, racemis lateralibus, foliis lanceolatis serratis, caule erecto. LINN. WILLD. sp. pl. I. p. 65. n. 31. BAUMG. Fl. Lips. 8. n. 17. *Icon.* BLACKW. t. 48. Fig. 2, HAYNE. IV. 1.

Lac. natal. Ad scaturigines et fossas fere ubique, praeprimis am *Gesundbrunnen*, *Thonberg*, prope *Stötteritz*, inter prata ad viam qua itur pagum *Schönsfeld*, prope *Lindenau* et *Leutsch*, etc. Floret Maio — Septb.

Pars offic. *Herba Beccabungae* recens colligitur vere, *Qualit.* Inodora, sapore sub amaro, subacri. *Vis.* Inter, resolventia, diure-

tica, discutientia relata est. *Usus.* A veteribus in ictero, hydrope, scabie et scorbuto valde laudata, etiam hodie haud raro succo expresso cum aliarum plantarum commixto ad. s. d. curas vernaes utimur. Optima forma est ubi acetariae loco comeditur.

V. *Teucrium*, vacemis lateralibus longissimis, foliis ovatis rugosis dentatis obtusiusculis, caulibus procumbentibus. LINN. sp. pl. ed WILLD. I. p. 66. n. 33. BAUMG. Fl. Lips. p. 8. n. 19. *Icon. Iacq.* austr. t. 60.

Radix perennis, repens; Caulis adscendens, strictus, teres, villosus; racemi laterales longissimi, recti, oppositi, axillares; folia ovata nonnunquam ovato- et cordato-lanceolata, opposita, sessilia, serrata, obtusa, rugosa, subamplexicaulia, utrinque subvillosa; calyces plerumque quinquefidi, inaequales: lacinia infima minima, cum bracteis et pedicellis subvillosi: villis sub lente contortis; corollae laete coeruleae. Species similes sunt Veronica prostrata, latifolia, et vulgatissima Chamaedrys com montana.

Loc. natal. Ad margines agrorum, imprimis in collibus, v. c. am Bieniz. Jun. Jul.

Pars offic. *Herba Veronicae Teucrii foliae* colligitur apud nos rarius tempore floescentiae. *Qualit.* Inodora, sapore gaudet subamaro, adstringente. *Vis* adstringens, aperiens. *Usus.* Nonnisi ad species pectorales interdum collecta, etiam in cachexia olim praescripta.

Rosmarinus officinalis planta suaveolens, aromatica apud nos colitur in hortis.

SALVIA. *Corolla* ringens. *Filamenta* transverse pedicello affixa.

S. pratensis, foliis cordato-oblongis: summis amplexicaulibus, verticillis subnudis corollis galea glutinosis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 135 n. 24. BAUMG. Tl. Lips. pag. 12. n. 33. *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 258.

Radix perennis, fusiformis; caulis erectus, obtuse tetragonus, pilosus, 1 — 2 pedalis; folia opposita, petiolata, cordato-oblonga, duplicato-crenata, rugosa, supra glabra, subtus hirsuta; superiora amplexicaulia, sessilia; flores verticillati, verticilli subnudi, 6. flori; bracteae binae, cordatae, acuminatae, decolorae, calyce breviores; corollae subviolaceae.

Loc. natal. in locis calcareis, versus Thuringiam, iam inde ex Altranstaedt et am Bie-niz. *Pars offic.* *Folia* et *Semina* *Hormi-ni* olim colligebantur, nunc vero obsoleta. *Qualit.* graveolens, vix foetens; sodore adstringente, amaro. Continet oleum aethereum et partes gummosas. *Vis* adstringens. *Usus.* Vix hac planta in arte medendi utimur todie, tamen notatu digna quum commisceatur cum Humulo Lupulo ut cerevisia vim temulantem assumat.

S. officinalis planta omnino salutaris, non indigena, apud nos colitur in hortis; sponte crescit in Europa australi.

T R I A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

VALERIANA, *Calyx* nullus, aut margo minimus. *Corolla* monopetala, subinfundibuliformis, quinquefida, basi hinc gibba, supera. *Semen* unum.

V. *officinalis*, floribus triandris, foliis omnibus pinnatis, foliolis dentatis lanceolatis, caule sulcato. — LINN. sp. pl. ed WILLD. I. p. 177. n. 6. BAUMG. Fl. Lips. pag. 29. n. 74. *Icon* BLACKW. tab. t. 271. SCHK. bot. Handb. t. 5. HAYNE III. 32.

Radix fibrosa perennis; caulis erectus, teres, sulcatus, glaber, fistulosus, 2 — 4 pedalis; rami axillares; folia opposita, impari pinnata, caulina sessilia, radicalia longepetiolata; foliola lanceolata, dentata; terminale maius trilobum; flores triandri, cymosi; corollae albae vel incarnatae suaveolentes.

Distinguenda a V. *dioica*, florib. dioicis, fol. pinnatifidis subtus venosis, inferioribus ovatis integerimis. PERS. synopsis I. p. 37. n. 6. WILLD. LINN. sp. pl. I. p. 176. n. 4. *Icon*, BLACKW. t. 484. HAYNE III. 31.

Lac. natal. In locis palustribus, v. c. in pratis prope Connewitz, in alneto nec non ad fossas inter prata prope Schönfeld, Lindenau, Leutsch, Schleussig, Raschwitz etc. *Variet.* angustifolia in pratis am Bienitz. *Floret* Jun. Jul.

Pars offic. Radix Valerianæ silvestris s. minoris. Colliguntur radices verno tempore in locis elatioribus montanis, v. c. in Thuringia, planta in locis palustribus nata nimis luxurians usui medico inservire nequit itaque Lipsiae non colligenda.

Qualit. Radix graveolens, odore camphorato, penetrante, sapore amaro, acerrimo. Multum inest olei aetherici praeterea partes resinoso-gummosae. *Vis* magna est incitans, antispasmodica, nervina, diaphoretica, diuretica. *Usus.* Medicamentum celeberrimum adhibetur quotidie in morbis nervosis, acutis pariter atque chronicis, in vitiis digestionis, in rheumatismis. morbis verminosis. *Praeparata.* *Pulvis radiceis Valerianae, oleum aethereum, aqua destillata, tinctura simplex, ammoniata s. volatilis et Lentini, Extractum aquorum.*

GLADIOLVS. *Corolla* tubulosa, varia, erectiuscula; *lacinae* ovato-lanceolatae, undulatae. *Genitalia* adscendentia, pistillum pone stamina versus laciniam superiorem.

G. communis, cor. subringente, spathis tubo longioribus, floribus, secundis, foliis ensiformibus nervosis. WILLD. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 213. n. 20. BAUMG. Fl. Lips. p. 31. n. 78. *Icon.* SCHK. bot. Handb. t. 6.

Radix perennis, bulbosa, subglobosa, reticulato-tunicata; caulis simplicissimus erectus, teres, glaber, 1—2 pedalis; folia ensiformia,

alterna, elongata, glabra, striata, subviridia; flores racemosi 5 — 6, secundi, subremoti, corollae subringentes puniceae; spathae tubo longiores.

Loc. natal. Legitur passim nec quotannis in pratis humidiusculis ad pagum Kleindölzig am Bieniz

Pars offic. *Radix Victorialis rotundae.* *Qualit.* Ex amylo constat, inodora, insipida. *Usus* medicinalis obsoletus est, nonnisi superstitioni inserviens interdum in officiniis quaeritur.

IRIS. *Corolla* sexpetala: laciniis alternis reflexis. *Stylus* nullus. *Stigmata* petaliformia. *Stamina* incumbentia.

I. *Pseud-Acorus*, imberbis, foliis ensiformibus, petalis alternis stigmate minoribus. THUNBERG. diss. n. 18. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 232. n. 24. BAUMG. Fl. Lips. p. 52. n. 30. *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 261. SCHK. bot. Handb. tab. 5.

Radix perennis, articulata; fibrosa; scapus erectus, inflexus, glaber, ramosus; folia ensiformia, striata, glabra 3 — 4 pedalia, basi vaginantia; lacinae corollae alternatim reflexae stigmate minores, imberbes; germen trigonum, angulis sulcatis; corollae flavae inodorae,

Loc. natal. Crescit in omnibus fere stagnis et fossis v. c. prope Schönfeld, im Rosenthal, in partis den Gerberwiesen etc. *Floret* Maio Junio.

Pars offic. Radix Pseud-Acori, Acori palustris, Adulterini, Ireos palustris, Gladioli lutei. Colligitur vere ante scapi foliorumque explicationem, deinde siccata servatur. *Qualit.* Graveolens, foetens; sapore acri, adstringente. *Vis* adstringens. *Usus.* Olim saepius etiam medici hac radice in hydrope, dysenteria, epistaxi et mictu cruento usi sunt, externe etiam ad gargarismata adstringentia paranda, nec non ad tincturas antidontalgicas et antiscorbuticas adhibuerunt. Etiam succus recens expressus odontalgiam lenire fertur.

DIGYNIA.

MILIVM. *Calyx* bivalvis, uniflorus, ventricosus, *Corolla* bivalvis brevissima. *Stigmata* penicillata. *Semina* villosa.

M. *effusum* florib. verticillato-paniculatis dispersis muticis. LINN. WILLD. sp. pl. I. p. 360. n. 7. BAUMG. Fl. Lips. p. 41. n. 106. Icon. SCHK. bot. Handb. tab. 11.

FESTUCA, *Calyx* bivalvis, multiflorus. *Spicula* oblonga, teretiuscula aut divergens, mutica aut arista terminali instructa.

F. *fluitans*, culmo adscendente, panicula ramosa, ramis patentibus, spiculis subsessilibus adpressis teretibus muticis. SCHREB. gram. 37. tab. 3. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 426. n. 20.

BAUMG. Fl. Lips p. 56. n. 158. *Icon.* SCHREB. cit. SCHK. bot. Handb. tab. 15.

E graminum gente *Phalaris canariensis* L. et *Panicum miliaceum* L. Lipsiae passim coluntur, *Milium effusum* L. in silvaticis umbrosis Maio, Junio, *Festuca fluitans* L. eodem tempore et serius florens in fossis et stagnis fere ubique sponte crescunt; singulorum semina nutrimenta saluberrima praebent, tamen praeter *Panicum miliaceum* reliquis non utimur.

Avena sativa L. W. sp. pl. pag. 446. n. 13. *A. orientalis* no. 12. cultae occurrunt immixta passim *A. strigosa* n. 11. earumque semina excorticata ad potum coctione parandum et cataplasmata quam saepissime adhibentur.

TRITICVM. *Calyx* bivalvis, solitarius, multiflorus. *Flos* obtusiusculus, glumis muticis aut interrupte aristatis. *Spiculae* breviusculae e latere plano rachi approximatae.

T. repens, calycib. subulatis multinerviis quinquefloris, flosculis acuminatis, foliis planis radice repente nodosa. SMITH. LINN. spec. pl. ed. WILLD. I. p. 481. n. 13. BAUMG. Fl. Lips. p. 67. n. 191. *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 537. (Gramen caninum) SCHREB. gram. tab. 26. SCHKURH. bot. Handb. tab. 20.

Radix perennis, repens, longissima, filiformis, glabra, geniculata, geniculis fibrosis, albidis; culmus erectus, teres, glaber, radicans, 2—3 pedalis; folia plana, latiuscula, scabra; vaginae foliaceae striatae glabrae; calyces 4 —

multiflori, subulati {acuminati, spiculae compressae, muticae aristatae.

Loc. natal. Crescit ubique in hortis, agris, ad agrorum versuras, pratorumque margines, hortulanis agricolisque taedium, florens Jun. — Aug.

Pars offic. Radix graminis, s. graminis canini s. minoris. Effodere solent radices verno vel autumnali tempore, fibrillis mundatas siccare. Notis supra indicatis satis differt ab Elymi canini et Lolii perennis radicibus quae interdum his immieeri dicuntur. *Qualit.* Inodora, sapore subdulci. Continet mucilaginis multum et sacchari. Coctione in aqua optime extrahitur. *Vires* Nutriens, resolvens, demulcens. *Usus.* Ad vires reproductivas suffulciendas, saburras primarum viarum resolvendas educendasque et hodie saepe ordinamus. *Praeparata. Extractum s. Mel-lago Graminis.*

Triticum aestivum L. W. sp. pl. I. p. 476. n. 1. *hybernium* L. n. 2. *Secale cereale* L. WILLD. sp. pl. I. p. 471. n. 1. *Hordeum vulgare* L. W. p. 472. 1. *hexastichon* L. n. 2. *distichon* L. n. 3. inter gramina ubique in agro Lipsiensi culta sunt referenda, Farinam semina praebent vario modo usui quoque medico inservientem.

LOLIVM *Calyx* monophyllus, fixus, multiflorus.

Spica simplex.

L. temulentum spica aristata, spiculis compressis

multifloris. LINN. sp. pl. ed. WILLD, p. 462. n. 3. BAUMG. Fl. Lips. p. 66. n. 187. *Icon.* SCHREB. tab. 36. SCHK. bot. Hdb. t. 15.

Radix annua, fibrosa; spica aristata; spiculae compressae, multiflorae; semina oblonga, latere altero convexa, altero plana sulcata.

Loc. natal. In agris imprimis humidiusculis inter segetes, apud nos frequentissime inter Hordeum et Avenam. *Flor.* Jun. Jul.

Pars officinalis nulla, at planta venenata.

Qualit. Semen sapore dulci, hominibus animalibusque nocivum. Eius assimilationem sequitur temulentia, vertigo, anxietas, cephalalgia, sopor, vomitus, obscuratio oculorum adeo coecitas, tremor artuum, sudores, spasmi, paralyses, furor imo apoplexia. In homines adultos graciles magis vim nocivam exserit quam in infantes aut obesos. Morbi epidemici ex huius seminis in farinam immistione orti esse dicuntur. Malto ad cerevisiam parandam immixtum semen hanc temulentam reddit atque infestam. Antidota optima sunt ab initio emetica, imprimis usus nimius lactis quo praeterea involvitur venenum eiusque vis in viscera nociva imminuitur.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

SCABIOSA. *Calyx* communis, polyphyllus: proprius duplex superus. *Receptaculum* paleaceum aut nudum.

S. succisa, corollulis quadrifidis aequalibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis: caulinis subdentatis, floribus subglobosis. — LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 548. n. 9. BAUMG. Fl. Lips. p. 81. n. 232. Icon. BLANCH. Herb. t. 142.

Caulis erectus, simplex, teres, striatus, hirsutus, summitate trifidus, bipedalis et ultra; rami approximati; folia radicalia ovato-lanceolata, integra, indivisa; caulina inferiora opposita, lanceolata, superiora linearia; corollae quadrifidae aequales, coeruleae.

Variat foliis hirsutis, glabris, incis, flore prolifero; corollis carneis albisque.

Loc. natal. In pascuis pratisque silvaticis v. c. im Rosenthal, prope Leutsch et Lindenau, am Gesundbrunnen etc. Varietates foliis hirsutis prope Gundorf et am Bieniz, et altera floribus carneis albidisque passim occurrunt. *Floret* Aug. Septb.

Pars offic. *Radix* et *Herba Succisae* s. *Morsus diaboli*. Quotannis pars radices crassior emarcescit, unde videtur praemorsa, Mense Aprili extrahere solebant. *Qualit.* Vix odora,

sapore dulcamaro adstringente. *Vis.* Olim radix pariter atque folia resolventia, diaphoretica et mundificantia dicebantur. *Usus* in medicina humana obsoletus, a zoiatris adhuc praescribitur.

S. arvensis, corollulis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis incisitis, caule hispido. OED. — WILLD. LINN. sp. pl. I. p. 550. n. 15. BAUMG. Fl. Lips. p. 82. n. 253. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 185. SCHK. bot. Hdb. t. 22.

Lipsiae planta vulgaris ad agrorum versuras. Pracedente vix magis laudanda; *Radix*, *Herba* et *Flores scabiosae* hodie obsoleta eodem modo quo *Conserva*, *Aqua*, *Extractum* et *Syrupus* eiusdem.

ASPERULA. *Corolla* monopetala, infundibuliformis. *Semina* duo globosa.

A. odorata, foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis, fructu hispido. SMITH. — LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 576. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 91. n. 259. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 60. Fig. 1. 2. SCHK. bot. Hdb. tab. 23.

Loc. natal. In ericeto Dubenensi ad viam gregariam Vitebergensem crescit copiose.

Inter plantas medicinales obsoletas referenda sicut sequentes. *Offic. Matrisylvae Herba.*

GALIUM. *Corolla* monopetala, plana. *Semina* duo subrotunda.

G. verum foliis octonis linearibus sulcatis, floribus paniculatis, ramis floriferis brevibus. PERS. — LINN. spec. pl. ed. WILLD. I. p. 590. n. 22.

Icon. BLACKW. Herb. tab. 435. SCHK. bot. Handb. tab. 23.

In omnibus fere Lipsiae limitibus versutisque agrorum. *Offic. Galii lutei Herba et Flores.*

G. Molingo, nitidum, foliis octonis ovato-linearibus subserratis reflexis mucronatis, caule flacido, ramis patentibus. OED. — LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 590. n. 23. BAUMG. Fl. Lips. p. 89. n. 252. *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 163.

Crescit in pratis, dumetis, ad vias, passim.

Offic. Herba et Flores Galii albi.

PLANTAGO. *Calyx* quadrifidus. *Corolla* quadrifida: limbo reflexo. *Stamina* longissima. *Capsula* bilocularis, circumscissa.

P. maior, foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 641. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 84. n. 63. *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 35. a. SCHK. bot. Handb. tab. 23.

Pars offic. Plantaginis latifoliae Radix, Herba et Semina.

P. media, foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 642. n. 5. BAUMG. Fl. Lips. p. 85. n. 242.

P. lanceolata, foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 643. n. 8. BAUMG. Fl. Lips. p. 85. n. 243.

Plantae Lipsiae vulgares; prima et tertia in locis graminosis, pratensibus, secunda, ad

vias in pascuis locisque aridis copiose crescunt, a majoribus nostris nimium laudatae, nobis vero obsoletae, quamquam usui externo ad discutiendos tumores haud inepte inserviunt.

SANGUISORBA, *Calyx* diphyllus inferus. *Corolla* snpera *Germen* inter calycem corollamque.

S. officinalis spicis ovatis, staminibus corollam subaequantibus. PERS. Synops. I. 141. 1.

LINN sp. pl. ed WILLD. I. p. 653. n. 1. *Icon.*

SCHK. bot. Hdb. t. 24.

Planta vulgaris pratensis, floret Jul. — Septbr. *Radix* et *Herba Sanguisorbae s. pimpinellae italicae* medicamenta adstringentia obsoleta.

ALCHEMILLA. *Calyx* octofidus. *Corolla* nulla.

Semen unum, calyce vestitum

A. vulgaris foliis reniformibus novemlobis acute dentatis utrinque subnudis, corymbis terminalibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 698. n.

2. α . β . BAUMG. Fl. Lips. p. 95. n. 268. *Icon.*

BLACKW. Hb. tab. 72. SCHK. bot. Handb. t. 26.

Planta perennis Lipsiae haud rara in graminosis silvaticis in locis pinguioribus prope Leutsch et im Rosenthal, in der Leimengrube. Olim *Herba* et *Radix Alchemillae* remedium tonicum, adstringens, vulnerarium, a superstitiosis hominibus praeterea vario modo commendatum.

CORNUS. *Involucrum*, tetraphyllum saepius. *Petala* supera quatuor. *Drupa* nuce biloculari.

C. mascula, arborea, umbellis involucrum aequantibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 661. n. 4. BAUMG. Fl. Lips. p. 94. n. 265. *Icon.* BLACKW. Hrb. tab. 121. SCHK. bot. Hdb. t. 24.

In sepibus hortorum vulgaris, praeterea in montibus elatioribus versus Thuringiam. *Offic. Fructus Corni.* Exoleti.

TRAPA. *Corolla* tetrapetala. *Calyx* quadripartitus. *Nux* spinis quatuor, oppositis cincta, quae calycis folia fuere.

T. natans nucibus quadricornibus, spinis patentibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 681. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 93. n. 264. *Icon.* SCHK. bot. Hdb. tab. 25.

Planta aquatica, natat inprimis in piscinis in Gerlachs Garten ante portam St. Petri, in pago Lindenau etc.] *Offic. olim nuccs aquaticae s. Tribuli aquatici.*

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

LITHOSPERMUM. *Corolla* infundibuliformis, fauce perforata, nuda. *Calyx* quinquepartitus. *Semina* ossea, nitida. (Genitalia inclusa.)

L. officinale, seminib. laevibus, corollis vix calycem superantibus, foliis lanceolatis venosis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 751. n. 1.

BAUMG. Fl. Lips. p. 106. n. 292. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 436.

Raro occurrit in Flora Lipsiensi in locis silvaticis elatioribus v. c. prope Röglicz. Floret Maio, Junio.

L. arvense, seminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 751. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 106. n. 293.

Lipsiae copiosum inter segetes. Floret. Aprili — Jun. et iterum autumnio.

Utriusque plantae usus medicus obsoletus. Alterius s. *Milii solis seminibus* vires lithontripticas alterius illi antipleuriticis esse imaginati sunt, plantae vero tinctoriae.

ANCHUSA. Corolla infundibuliformis: fauce clausa fornicibus. Semina basi insculpta, superficie utplurimum venosa.

A. officinalis, foliis lanceolatis hispidis, spicis secundis imbricatis calycibus quinquepartitis longitudine tubi corollae. WALLR. ann. bot. p. 27. n. 42. foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis, bracteis ovatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 756. n. 3. BAUMG. Fl. L. p. 109. n. 301. *Icon.* BLACKW. Hrb. t. 500. SCHK. tab. 29. HAYNE. I. 25.

Planta passim in viis ad loca arida elatiora v. c. in via qua oppidum Wurzen itur frequens crescit. De eius viribus ipse Linneus haesitans interrogative eam inter remedia cordialia, exhilarantia refert, et *Radicem, Herbam* et *Flores Anchusae* s. *Buglossi* in

veterum medicorum libris in melancholia atque hypochondria commendatam invenimus. Mucilaginosum re vera est, at his non eget.

CYNOGLOSSUM. *Corolla* infundibuliformis; fauce clausa fornicibus. *Semina* depressa, latere interiore stylo affixa.

C. officinale, staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis basi attenuatis tomentosis sessilibus, laciniis calycinis oblongis. ART. Kew. I. p. 179. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 760, 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 108. n. 299. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 249. SCHK. bot. Hdb. 30. HAYNE I. 26.

Radix perennis, fusiformis, crassa, fibrosa, externe fusca, interne alba; caulis erectus, obesus, angulatus, ramosus 1 — 2 pedalis; folia alterna sessilia, lato-lanceolata, integra, acuta, undulata, pubescentia; radicalia petiolata, ovato-lanceolata; stamina corolla breviora; flores corollis atropurpureis in racemos unilaterales conferti.

Loc. nat. Planta biennis, crescit ad vias, dumeta, in incultis, v. c. prope Rögliz, Wurzen, in via qua Merseburgum itur, bei der Windmühle, am Bär. Floret Maio — Julio.

Offic. Radix Cynoglossi ejusdemque *Herba* olim celebrabantur, et recentes omnino medicamenta praebeant externa emollientia, anodyna, minime contemnenda. Usus internus plantae recentis nocivus est, radicis siccatae obsoletus. *Massa pilularum de Cynogloss*o solum adhuc prostat compositum quod ra-

dicem hanc continet, sed eius sin aliqua inest vis ab opio pendet. Vim nocivam negat cel. HAYNE l. c.

PULMONARIA. *Corolla* infundibuliformis, fauce pervia. *Calyx* prismatico pentagonus.

P. officinalis, foliis radicalibus | ovato cordatis scabris. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 768. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 105. n. 291. Icon. BLACKW. Herb. tab t. 376. SCHK. bot. Hdb. t. 30. HAYNE. II. 44.

Radix perennis, fibrosa; caulis angulatus, erectus, hirsutus, summitate subramosus, pedalis; folia radicalia longepetiolata, ovato-cordata, integra acuminata, in petiolum subdecurrentia; caulina sessilia, alterna, ovato-lanceolata, acuminata; omnia hirsuta, supra obscure viridia, subtus laete virescentia; calyx tubo corollae aequalis; flores terminales brevipetiolati fasciculati; corollae ante anthesin roseae post anthesin coeruleae.

Planta perennis in silvaticis umbrosis ubique floret inter primas mense Aprili et Maio. *Herbam Pulmonariae maculosae* nec non *Radicem* eiusdem in officinis nonnullis adhuc invenimus asservatas, alioquin medici earum virtutibus freti in morbis pectoralibus eas haud raro sumere iusserunt. Praeterca planta oleracea, nec non ad acetariam aptissima.

SYMPHITUM. *Corollae* limbus tubulato-ventricosus: fauce clausa radiis subulatis.

S. officinale foliis ovato-lanceolatis decurrenti.

bus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 770. n. 1.
BAUMG. Fl. Lips. p. 106. n. 294. *Icon.* BLACKW.
Herb. t. 252.

Var. β . Flore purpureo SCHK. bot. Hdb. t.
30. HAYNE. III. 57.

Radix fusiformis carnosae, externe nigro-
fuscae, interne albae; Caulis erectus, hirsutus,
angulatus, alatus, ramosus, 1—3 pedalis; fo-
lia alterna, sessilia, decurrentia, ovato-lanceo-
lata, integra, hirsuta, supra olivacea, subtus di-
lutiora; flores in racemis secundis terminalibus
dispositi.

Habitat in pratis fere ubique in agro nos-
tro, var. β . nonnisi in hortis suburbanis in lo-
cis incultis, ruderalis rarius occurrit. Ceterum
Radix Consolidae maioris edulis est,
et ob mucilaginis copiam vulneraria vi re vera
praedita, olim et in Dysenteria, Haematuria
et haemoptysi eam adhibuerunt.

Borago officinalis LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p.
776. n. 1. planta exotica apud nos quasi spon-
tanea in pluribus hortis occurrit; corollae coe-
ruleae antea etiam inter *cordiales flores*
relatae non amplius aestimantur a medicis;
planta praeterea oleracea et acetariam praebet
sapidam; fructibus cucumeris sativae haud ab-
similem

PRIMULA. *Involucrum* umbellulae. *Corollae* tu-
bus cylindricus: ore patulo; limbo emarginato.
Stigma globosum. *Capsula* uni-ocularis: ore
10-fido.

P. veris, foliis rugoso-dentatis, limbo corollarum concavo, tubi collo oblongo. LINN. WILLD. sp. pl. I. 800. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 113. n. 311. *Icon*. BLACKW. Herb. tab. 226. SCHK. bot. Handb. tab. 33. HAYNE III. 34.

Radix perennis, fibrosa; scapus multiflorus, simplex, erectus, teres, nudus, pubescens; folia ovata, crenata, obtusa, rugosa, in petiolum decurrentia, subtus pubescentia, supra glabra; flores cernui crocei; calyx pubescens, ventricosus, tubo corollae aequalis; limbus corollae concavus, tubus medio subinflatus.

Habitat in pratis et silvis v. c. am Gutthurm, inter Lindenau et Leutsch, am Bienitz etc. Floret Aprili et Maio. Corollae a rusticis interdum colliguntur ad iufusum parandum theiforme. Folia etiam acetarias praebent et pulmenti ad instar coquuntur. *Ussic.* olim *Radix, Herba. Flores Primulae veris.* Haud confuudenda est cum alia nobisque vulgariori specie, quae est:

P. elatior foliis rugosis dentatis limbo corollae plano, tubi collo hemisphaerico WILLD. sp. pl. I. p. 801. n. 3. *Primula inodora.* HOFFM. Fl. germ. ed. 1800. pag. 93. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. 113. n. 312. *Icon* HAYNE III. 35.

MENYANTHES. Corolla hirsuta. Stigma bifidum. Capsula unilocularis.

M. trifoliata corollis superne dense barbatis foliis ternatis. PERS. Synops. I. 171 n. 5. BAUMG. Fl. Lips. p. 115. n. 316. *Icon*. BLACKW. Herb.

tab. 474. SCHK. bot. Handb. tab. 35. HAYNE III. 14.

Radix perennis elongata, articulata, digitum crassa, externe ferruginea, fibrosa, interne albidu spongiosa; caulis articulatus, solidus, decumbens, radicans, 1 — 2 pedalis; folia longe petiolata, ternata; foliola sessilia, ovata, obtusa crenulata, glabra laete viridia; petioli teretes, basi vaginantes; flores racemosi, racemi axillares, erecti, simplices; corollae incarnatae laciniis integris.

Loc. natal. In paludosis turfosis v. c. ad fossas in pratis prope Schönfeld, prope Wurzzen etc. Floret Maio et Junio.

Par. offic. *Herba* et antea etiam *Radices* et *Semina Trifolii fibrini* s. *paludosi*. Apud nos nonnisi folia cum petiolis colliguntur mense Aprili et Maio. *Qualit.* Folia inodora, amara ut tota planta multum in se amari extracti continent, praeterea et principii acris paululum et kali vegetabilis. *Vis* resolvens, tonica, incitans, diaphoretica, antihelminctica. *Usus*, Medicamentum saluberrimum in reproductionis debilitate, in febribus intermittentibus, Hypochondria, Scorbuto etc. Succus expressus et herba recens vulneraria. Herbae siccatae decoctum, clysmatibus visceralibus addendum.

LYSIMACHIA. Corolla rotata. Capsula globosa, mucronata, decemvalvis.

L. vulgaris, foliis ternis ovatis lanceolatis, race-

mis terminalibus. PERS. Synops. I. p. 172 n. 1. LINN. W. Sp. pl. I. 816. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 111. n. 307. *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 278.

Planta in locis paludosis nec non ad ripas stagnorum rivulorumque vulgaris v. c. in pratis der Vogelwiese.

L. Nummularia foliis subcordatis, floribus solitariis; caule repente. LINN. WILLD. sp. pl. I. p. 821. n. 14. BAUMG. Fl. Lips. p. 112. n. 310, *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 542. SCHK. bot. Handb. t. 36.

Crescit ubique in locis humidiusculis silvaticis, humi repens. *Offic.* olim *Nummulariae Herba*.

Utramque plantam medici veteres magni aestimarunt, altera contra Haemorrhagias, altera externe saepissime utebantur.

ANAGALLIS *Corolla* rotata. *Filamenta* hirsuta, *Capsula* circumscissa.

A. arvensis, caule prostrato, foliis ovatis, laciniis calycinis integerrimis corolla glandulifera brevioribus. HAYNE II. 45. *Anagall. arvensis* β . phoeniceo flore BAUH. WILLD. LINN. sp. pl. I. p. 822. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 43. SCHK. bot. Handb. t. 36. HAYNE l. c.

Crēscit in agris inter segetse. Floret Jun. — Aug.

A. coerulea, caule suberecto, foliis oblongo-ovatis, laciniis calycinis corollam eglandulosam aequantibus. HAYNE II. 46. *A. coerulea* caule erectiusculo subalato: petalis dentatis denu-

reflexis. SCHREB. specileg. p. 5. n. 893. *A. femina*. VILL. *Anagall. arvensis* α . flore coeruleo WILLD. LINN. sp. pl. I. p. 821. n. 1. *Icon*. BLACKW. Herb. tab. 147. HAYNE l. c.

In pago Burghausen, agrisque am Bieniz et Markranstaedt interdum legitur, vulgatissima versus Thuringiam.

Utriusque plantae vires olim celebratae nostris temporibus non agnoscuntur, itaque inter obsoleta medicamenta referenda. cf. LEMKE de Anagallidis viribus. Rost. 1790. 4.

CONVOLVULUS, *Corolla* campanulata, plicata. *Stigmata* duo, simplicia. *Capsula* bi-trilocularis: loculis dispermis.

C. arvensis, foliis sagittatis utrinque acutis, pedunculis subunifloris. LINN. WILLD. sp. pl. I. p. 344. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 115. n. 317.

Ubique in agris. Floret Jun. Jul.

C. sepium foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris, bracteis cordatis maximis. PERS. Synops. I. p. 177. n. 4. BAUMG. Fl. Lips. p. 115. n. 318. *Icon*. BLACKW. Herb. t. 38.

Habitat in sepibus, hortorum dumetis, salicetis copiose. Floret Jun. — Aug.

Etiam nostratium harum specierum ut exoticarum complurium radices drastice purgantes, herba vulneraria dicitur, utraque plantae pars in officinis obsoleta.

PHYTEUMA. *Corolla* primo terete-conica, dein quinque-partita: laciniis linearibus laxis. *Stigma* bi-trifidum. *Capsula* bi-trilocularis infera.

Ph. spicata spica elongata, stylis pilosiusculis, trifidis, foliis radicalibus cordatis duplicato-dentatis. WILLD. LINN. sp. pl. I. p. 923. n. 9. BAUMG. Fl. Lips. p. 122. n. 534. *Icon.* SCHK. bot. Handb. 59.

Habitat in silvis umbrosis, prope Leutsch, am Bieniz in silva academica. Floret Maio — Jul.

Ph. orbicularis, capitulo subrotundo, foliis serratis; radicalibus cordatis. LINN. WILLD. spec. pl. I. p. 921. n. 6. BAUMG. Fl. Lips. p. 122. n. 534. *Icon.* JACQ. Fl. Austr. V. 5. tab. 437.

In pratis prope Gundorf, Leutsch et Ehrenberg, am Bieniz, in silva academica. Floret Maio — Jul.

Utriusque Radices — *Radix Rapunculi* — acetariae instar edules, praeterea hodie non officinales.

VERBASCUM. *Corolla* rotata, subinaequalis. *Filamenta* barbata. *Capsula* bilocularis: valvulis inflexis, polysperma.

V. *Thapsus*; foliis decurrentibus crenulatis tomentosius superioribus acutis racemo spicato denso, corollae subrotatae laciniis oblongis obtusis, antheris subaequalibus. SCHRAD. monogr. Verb. p. 17. LINN. WILLD. spec. pl. I. p. 1001, n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 118. n. 523. *Icon.* BLACKW. Hb. tab. 3. et 502. SCHK. bot. Hdb. 42.

Radix biennis, teres, crassiuscula, alba; caulis erectus, simplex, tomentosus, 4 — 6 pe-

dalis et ultra; folia alterna, sessilia, decurrentia, ovato-lanceolata, obtuse dentata, utrinque dense tomentosa; flores in spicam elongatam obtusam terminalem conferti; bracteae lanceolatae; pedunculi breves, tomentosi; calyx tomentosus; filamenta tria superiora flavobarbata, duo inferiora longiora glabra; stigma globosum; corollae sulphureae vel albae.

Loc. natal. In ruderatis, locis cultis et versuris agrorum passim, v. c. ante portam Gerberthor. Floret Jul. — Aug.

Pars offic. *Flores* et rarius *Herba Verbasci*. Herba Maio mense colligitur, flores caute siccandae sunt, temperie sicca ne mucore destruantur aut colorem amittant. *Qualit.* Planta recens odore ingrato praedita, corollae siccatae suaveolentes. Sapor corollarum est dulcis mucilaginosus, mucilaginem enim cum saccharo continent; herbae vero sapor est mucilaginosus, subamarno leniter adstringens, quum in iis mucilago cum parte quadam extractivi principii sit commixta. *Usus.* Flores speciebus pectoralibus adduntur, deinde et gargarisma praebent. Folia eodem modo adhiberi possunt verumtamen his potius ad cataplasmata et fomentationes parandas utimur. *Praeparata* sunt obsoleta, fuere *Oleum coctum* et *Conserva Verbasci*.

V. nigrum. foliis oblongo-cordatis petiolatis undulato-crenatis subpubescentibus. — WILLD.

LINN. sp. pl. I. p. 1004. n. 8. BAUMG. Fl. Lips. p. 118. n. 325.

Am Kickerlingsberg, praeterea ad vias in-
primis vero in pagorum coemeteriis. Facillime
primo adspectu a praecedenti dignoscitur. Flo-
res iisdem quibus illius viribus gaudent.

DATURA. *Corolla* infundibuliformis, plicata. *Ca-
lyx* tubulosus, angulatus: deciduus: basi orbi-
culo persistente. *Capsula* quadrivalvis, quadri-
locularis, laevis aut spinosa.

D. Stramonium, pericarpis spinosis erectis
ovatis, foliis ovatis sinuatis glabris basi in pe-
tiolum attenuatis. PERS. synopsis I. 216. n. 2.
BAUMG. Fl. Lips. p. 116. n. 319. *Icon.* BLACKW.
Hb. 313. SCHK. bot. Hdb. t. 43. HAYNE IV. 7.

Radix annua, lignosa, crassa; caulis erec-
tus ramosus, glaber, carnosus, teres, 1 — 3
pedalis; rami patenti-divergentes; folia magna,
petiolata ovata, sinuato-dentata, acuta, glabra,
obscurè virescentia, divaricata, axillaria; flores bre-
vipedunculati; capsula ovata, erecta, spinosa.

Loc. natal. Passim in rudiculis crescit, ad
pagos, in hortorum reiectamentis v. c. prope
Sellerhausen, Kripäne, sed magis magisque nu-
mero minutum occurrit. Prope Röglitz et in
Thuringiae vineis haud raro legitur. Floret
Jul. — Septbr.

Offic. Herba et Semina Stramonii
1. *Daturae.* Semina reniformia nigra rugo-
sa. *Qualit.* Planta recens odore ingrato tem-
lante praedita, semina inodora. Sapor herbae
recentis nauseosus, seminis viroso-narcoticus.
Principii narcotici permultum inest, acrimonia

quadam admixta. *Vires.* Planta virosa, venenata, temulenta, stupefaciens, inebrians, phantastica, antispastica, drastica, necans. *Usus.* Störkius est commendator extracti e succo plantae, quod in diris convulsionibus epilepticis et furore maniacorum felici successu exhibuit. Antidota optima praedicantur: olea expressa, lac, acetum et alia acida vegetabilia, vomitoria et clysmata. *Usus* externus ad discutiendos tumores in gangraena, ambustis, varice ani, iam veteribus innotuit. *Praeparata. Extractum et Oleum Stramonii.*

cf. Ant. v. STOERK libell. de Stramonio, Hyoscyamo et Aconito. Wien 1762. in lingu. vernac. translata: Zürich 1763.

HYOSCYAMUS. *Corolla* infundibuliformis, obtusa, irregularis. *Stamina* inclinata. *Capsula* operculata, bilocularis.

H. niger, foliis radicalibus pinnatifido-sinuatis, superioribus amplexicaulibus angulatis, floribus subsessilibus, corollis reticulatis WALLR. ann. bot. p. 30. n. 40. LINN. WILLD. sp. pl. I. p. 1010. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 116. n. 320. *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 550. SCHK. bot. Hand. t. 44. HAYNE I. 28.

Radix biennis, elongata, ramosa, tenax, rugosa, digiti crassitie fusca, intus albida; caulis erectus; simpliciusculus, villosus, viscosus, 1—4 pedalis; folia alterna, sessilia, ovato-lanceolata, amplexicaulia, sinuato-dentata vel sinuata, villosa, subviscosa; flores sessiles in

spica terminali, unilaterali, laxa; calyx monophyllus, tubulosus, basi ventricosus, quinquefidus, persistens, villosus-viscosus; Corolla sulphureo-lurida, violaceo-venosa; Semen parvum, subrotundo-reniforme, rugoso-reticulatum, subcompressum, cinereum.

Loc. natal. In ruderalis, coemeteriis, muris pagorum, ad vias, v. c. in dem Hohlgarten, ad patibulum, copiose in coemeteriis pagorum Zwochau et Sommerfeld etc. Floret Maio — Septbr. In scrobibus imprimis montanis plantam altissimam et magis obesam inveni.

Pars offic. *Herba* et *Semen Hyoscyami nigri*, antea et *Radix*. Herba ante florescentiam mense Maio decerpenda; leni calore ne volatiles particulae aufugiant, siccanda deinde in pulverem redacta in vitris bene clausis servanda. Herba recens *Extractum* praebet. Radicem mense Martio et Aprili colligunt olim. *Qualit.* Herba recens odorem ingratum virosum, caput gravescentem, semen eundem imprimis dum in carbones spargitur spirat; sapore herba recens praedita est valde nauseoso, ingrato, siccata sicuti semen subamaro; radix dulci nauseoso. Seminibus inest oleum unguinosum, principii narcotici multum totae plantae recenti, minus siccatae, aqua optime extrahendum. *Vires.* Planta virosa, temulenta, stupefaciens, anodyna, antispastica, resolvens. Nimia dosis vel abusus creat vertiginem, cephalalgiam, soporem, coecitatem, pa-

ralyses, asphyxias, convulsiones, furorem, haemorrhagias, haud raro necat. Antidota sunt emetica, deinde acetum vini. *Usus* est eximius in parva dosi ad solvendos spasmos tonicos et clonicos, in hysteria, tussi convulsiva, colica, deinde etiam in morbis pectoralibus ex nimia incitabilitate pulmonum, in melancholia, mania, epilepsia, rheumatismo. Externe saepe applicamus herbam ad tumores resolvendos. *Praeparata. Extractum, Oleum coctum, Unguentum et Emplastrum Hyoscyami.*

cf. STOERK libell. c. v. Stromonium.

Nicotiana rustica. LINN. WILLD. sp. pl. I. 1014. n. 3. sola Nicotianae species quae hodie Lipsiae inprimis ad pagos Stötteritz, Probsthaide, am Berge etc. colitur, etiam inter plantas narcoticas referenda.

Nicandra physaloides. GAERTN. PERS. synops. I. p. 219. n. 1. *Atropa physaloides* LINN. WILLD. sp. pl. I. 1017. n. 5. planta non minus narcotica quam quasi sponte crescentem passim in reiectamentis hortorum suburbanorum Lipsiae atque in pagis vicinis legi.

PHYSALIS. *Corolla* campanulato-rotata. *Stamina* conniventia. *Bacca* intra calycem inflatum, bilocularis.

Ph. *Alkekengi*, foliis geminis integris acutis, caule herbaceo inferne subramoso. LINN. WILLD. sp. pl. I. p. 1022. n. 9. In BAUMG. Fl. Lips. desideratur. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 161.

Haud raro in hortis suburbanis et copiose in vineis versus Thuringiam crescit; usus *Baccarum*, *Herbae* et *Seminis Alkekengi* s. *Solani vesicarii* obsoletus, quamquam vi diuretica pollet.

SOLANUM. *Calyx* persistens. *Corolla* rotata, aut campanulata quinqueloba, plicata. *Antherae* subcoalitae, apice progemino dehiscentes. *Bacca* bilocularis, polysperma.

S. Dulcamara, caule inermi fruticoso scandente, foliis cordatis glabris, superioribus auriculatis, corymbis oppositifoliis. LINN. WILLD. I. p. 1028. n. 15. BAUMG. Fl. Lips. p. 119. n. 328. Icon. BLACKW. Herb. 34. HAYNE II. 39.

Radix perennis, fibrosa; caulis suffrutescens, 10 — 15 pedalis, inermis, scandens vel decumbens, flexuosus, angulatus, ramosus; folia petiolata, alterna, glabra; inferiora cordata, integra; caulina hastata vel triloba, flores cymosi; cymae oppositi-foliae, cernuae: baccae oblongae, coccineae, corollae violaceae, antheris croceis.

Loc. natal. Habitat in sepibus, inprimis ad ripas fluviorum, locis paludosis, in salicetis, ad fossas, stagna, Lipsiae vulgare, v. c. in prato Vogelwiese, ad pontem im Rosenthal prope Gohlis etc. Floret Jun. — Aug.

Variat foliis omnibus uniformibus ovato-cordatis.

Pars offic. *Stipites Dulcamarae* s. *amarae dulcis* sunt caules iuniores s. turio-

nes plantae (rarius radices), epidermide sulphurea tecti, sub hac virides, verno tempore ante foliorum explicationem vel autumnno, post eorum delapsum collecti et siccati. *Qualit.* Odor recentium stipitum est nauseosus, siccatorum vero nullus, sapor amarus demum subdulcis. Principium extractivum saponaceum, in se cum partibus resinosis acribus ac volatilibus continent, optime aqua extrahenda. *Vires.* Medicamentum resolvens, stimulans, diureticum, diaphoreticum. *Usus.* Adhibendi sunt ad incitandas vires nervorum tum plexuum abdominalium tum pectoralium tum cutaneorum, itaque usus eximius in chronicis exanthematibus, scrophulis, morbo venerco. *Praeparata Extractum Dulcamarae.* Speciebus lignorum subest.

S. nigrum, caule inermi herbaceo, ramis compresso-teretibus glabris, foliis ovatis dentato-angulatis glabris, racemis subumbellatis intra foliaceis pedunculatis. HAYNE. II. 40. *S. nigrum* α . *vulgatum*. LINN. WILLD. sp. pl. I. p. 1035. n. 59. *S. vulgatum*. BAUMG. Fl. Lips. p. 120. n. 330. *Icon.* BAUMG. Herb. t. 107. SCHK. bot. Handb. 46. HAYNE. l. c.

S. villosum, caule inermi herbaceo, ramis teretibus hirtis, foliis ovatis dentato-angulatis villosio pubescentibus, racemis subumbellatis intra foliaceis pedunculatis. HAYNE II. 41. *S. nigrum* γ . *villosum*. LINN. WILLD. I. p. 1035.

PERS. synops. I. p. 224. 54. BAUMG. Fl. Lips. p. 121. n. 551. (baccis nigris; acinis luteis.)

Racca subglobosa, matura crocea, apice puncto notata. Observante WALLROTH (ann. bot. pag. 31.) non a *S. nigro* diversum.

Utraque planta Lipsiae in ruderatis inprimis ad pagos vicinos vulgaris narcotica. Olim anodyna refrigerans, repellens habebatur et in inflammationibus, Proctalgia, Scirrhus, Paronychia potius vero in exanthematibus chronicis adhibuerunt veteres. *Praeparata Extractum. Aqua, oleum coctum et emplastrum Solani vulgaris s. nigri* vix hodie prostant in officinis, quamvis altera certe species moschum spirans, vires haud vulgares prodero videtur.

S. tuberosum LINN. WILLD. sp. pl. I. 2055. n. 51. planta ubique apud nos culta notissima, cuius herba etiam principio narcotico non eget; inprimis vero baccis et tuberibus radicum immaturis inest.

RHAMNUS. *Calyx* tubulosus. *Corollae* squamae stamina munientes calyci insertae. *Bacca*.

Rh. *catharticus* spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioecis, foliis ovatis. LINN. WILLD. sp. pl. I. p. 1092. BAUMG. Fl. Lips. p. 129. n. 350. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 135.

Rh. *Frangula*, inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. LINN. WILLD. sp. pl. 1098. n. 20. BAUMG. Fl. Lips. p. 128. n. 342. *Icon.* BLACKW. t. 272.

Arbor utraque indigena communis in nemorosis humidiusculis. Rhamni cathartici s. *Spinæ Cervinae baccae* nec non *Cortex Frangulae* a veteribus nonnunquam adhibita sunt, illae purgantes in cachexia, arthritide, hic eodem fine in Hydrope ac scabie.

EVONYMUS, *Corolla* pentapetala. *Capsula* pentagona, trilocularis, trivalvis, colorata. *Semina* calyptrata.

E. europæus, floribus plerisque tetrandris, pedunculis compressis multifloris. stigmatibus subulatis foliis glabris. AIT. Kew. 1. p. 273. LINN. Willd. sp. pl. I. 1130. n. 3. BAUMG. Fl. Lips. p. 129. n. 109.

Folia et capsulae vomitum creant, in medicina iis non utimur.

Ribes rubrum. LINN. Willd. sp. pl. I. 1153. no. 1. *Grossularia* p. 1158. n. 13. *uva crispa* n. 14. et passim etiam *nigrum* p. 1156. n. 8. in hortis culta occurrunt iisque ad conservam, syrupum, vinum et condimenta paranda interdum opus est. *Ribes nigrum* præterea laudatur ab antiquis scriptoribus in rabie canina, dysenteria.

VIOLA, *Calyx* pentaphyllus. *Corolla* pentapetala, irregularis, postice cornuta (aut ecalcarata.) Antherae apice membranula cohaerentes, aut distinctae, *Capsula* supera, trivalvis, unilocularis.

V. odorata, acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus. LINN. Willd. sp. pl. 1163. n. 12. BAUMG. Fl. Lips. p. 439. n. 1168. Icon. BLACKW. Herb. 55. HAYNE III. 2.

Planta annua, notissima, in hortis ubique in silvis passim sponte crescit; variat haud raro petalis albis. Floret a Martio per totam aestatem. *Herba, Flores et Radix Violae* s. *Violariae* s. *Martiae* a veteribus ordinata sunt ad praeparandam conservam, oleum coctum, mel et Syrupum. Hodie non nisi Syrupus in officinis prostat. Radix emetica, folia vulneraria.

P. canina, caule adultiore adscendente caniculato, foliis oblongo-cordatis, calycibus lanceolatis acutis. WILLD. Enum. Horti Berol. p. 264. n. 7. sp. pl. I. p. 1164. n. 13. BAUMG. Fl. Lips. p. 490. n. 1169. *Icon.* HAYNE III. 3.

Vulgaris in silvis et pratis, per aestatem apetala saepius. Radix Ipecacuannae similem in humanum organismum vim exserere dicitur.

V. tricolor, caule angulato diffuso, foliisque oblongis dentato-crenatis glabris, stipulis lyrato-pinnatifidis. SMITH. brit. 1. p. 248. Cor. obscure violacea petalo inferiore flavo macula apicis violacea *Icon.* HAYNE III. 5.

Var. β. V. arvensis, caule angulato sulcato, foliis ovato-lanceolatis serratis, stipulis basi incisis, calyce pubescente corolla sublongiore. PERS. Synops. I. p. 255. n. 31. Petala albida macula basilari flava. *Icon.* HAYNE III. 4.

Utraque planta notissima crescit in agris prope Lipsiam frequens, in agris prope Zschocher transitus alterius varietatis in alteram apparet luculenter. Floret a Martio per aestatam.

Pars offic. Herba et Flores Jaceae
s. Violae tricoloris s. Trinitatis vere
 et aestate a herbipolis quaeruntur. *Qualit.*
 Planta nisi teritur ubi amygdalis similem odo-
 rem spargit, inodora; masticata sapore amari-
 cante subaromatico linguam acrimonia vellicat.
 Oleum athereum, principium extractivum et
 gummosae partes non desunt. Urina aegroto-
 rum qui hoc medicamento usi sunt foetore uri-
 nam felinam accumulante memorabilis. *Vires.*
 Stimulat ventriculum, abusus vomitum et alvum
 liquidam creat; imprimis vero vim exserit diu-
 reticam diaphoreticamve. *Usus.* In morbis cu-
 taneis chronicis remedium praestans, imprimis
 in crusta lactea infantum, serpigiosa, tinea
 capitis, achoribus. *Praeparata. Pulvis, Aqua*
destillata, Extractum et Syrupus Ja-
ceae. cf. STRACK de crusta lactea infantum
 Francof. 1779. 8. Aug. HAASE diss. Erl. 1782. 4.

IMPATIENS. *Calyx* diphyllus. *Corolla* penta-
 petala, irregularis, nectario cucullato. *Anth-*
erae connatae. *Capsula* supera. quinquevalvis.

- I. *Nolitangere*, pedunculis multifloris soli-
 tariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumen-
 tibus. LINN. WILLD. sp. pl. I. 1176. n. 12.
 BAUMG. Fl. Lips. p. 493. n. 1175.

Plantam ante paucos annos in umbrosis
 ad fossas pratenses prope Gohlis ipse vidi; co-
 piose crescit in Thuringiaca silva ad scaturigi-
 nes. Diuretica dicitur, in mammarum indura-

tionibus in infuso cum calamo aromatico vinum eius salubrem praedicat cel. Willdenow.

HEDERA. *Petala* quinque, oblonga. *Bacca* pentasperma, calyce cincta.

H. *Helix* foliis quinqueangularibus, quinquelobisque, floralibus ovatis, umbella erecta. WILLD. LINN. sp. pl. I. p. 1779. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 132. n. 357. Icon. BLACKW. Herb. t. 188. SCHK. bot. Handb. tab. 49. HAYNE IV. 14.

In silvaticis v. c. im Rosenthal in arborum corticem radicans; praeterea et hortorum muros et parietes elegantissime vestire videmus. *Lignum, Folia, Baccac* et *Gummi Hederac arboreac* obsoleta sunt medicamenta, vis iis adscribebatur vulneraria, sophisticans.

Vitis vinifera LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1180. n. 1. planta notissima culta officinalis.

VINCA, Contorta. *Folliculi* duo, erecti. *Semina* nuda.

V. *minor* caulibus procumbentibus; foliis oblongo lanceolatis margine glabris; floribus pedunculatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. 1232. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 119. n. 327. Icon. BLACKW. Herb. tab. 59. SCHK. bot. Hdb. tab. 51.

In silvaticis umbrosis, v. c. prope Lindenthal, in silva academica etc. Olim *Herba Vincac Pervincae* in hamorrhagiis et morbis pectoralibus ob vires adstringentes commendata, hodie efficacioribus remediis inventis superflua.

CYNANCHUM Contorta. *Corolla* rotata. *Nectarium* cylindricum, quinquedentatum, *corolla* faucem ambiens, simplex. *Folliculi* duo.

(** VINCETOXICUM. Corolla erecta. *Nectarium* squamulas s. callas quinque, carnosas re-tusas sistens.

C. vulgare, caule erecto, foliis ovatis acuminatis margine tenuissime ciliatis. PERS. synops. I. p. 274. n. 37. *Asclepias Vincetoxicum*. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1263. n. 23. *Vincetoxicum officinale* MOENCH. method. p. 717. BAUMG. Fl. Lips. p. 134. n. 361.

In locis montosis calcareis, collibusque silvaticis v. c. am Bieniz.

Radix Vincetoxici s. *Hirundinariae* inter sudorifera, diuretica, emmenagoga a veteribus relata, nunc obsoleta. Vis praeterea antarthritica ei inesse putabatur specifica. Facile vomitum excitat ob resinam et acre principium quod exhibet.

ERYTHRAEA. *Calyx* appressus, subpentagonus quinquedentatus. *Corolla* infundibuliformis: tubo longo. *Antherae* post anthesin spiraliter contortae. *Stigmata* duo approximata: rarius simplex. *Capsula* sublinearis, unilocularis. *Receptacula* duo distantia.

E. Centaurium, foliis oblongo-ovalibus basi rosaceis congestis, caule elongato, floribus fasciculato-paniculatis PERS. synops. I. p. 283. n. 1. *Gentiana Centaurium*. LINN. syst. veget. XV. ed. PERS. p. 283. n. 24. BAUMG. Fl. Lips. p. 135. n. 363. *Chironia Centaurium*. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1068. n. 9. *Icon*. BLACKW. Herb. t. 452. SCHK. bot. Hdb. t. 59. HAYNE I. 29.

Radix annua simplex, subfibrosa; caulis erectus, simplex summitate trichotomis, tetragonus, glaber semi — 1 pedalis. Folia opposita, sessilia, oblongo-ovata, obtusa, integerrima, glabra, trinervia; Calyx pentagonus, quinquefidus, laciniis subulatis erectis; corolla infundibuliformis, tubo basi subventricosso, fauce coarctata, limbo quinquefido, laciniis ovatis planis roseis; stylus simplex.

Loc. natal. Habitat in locis silvaticis humidiusculis, etiam in pascuis et collibus silvaticis v. c. prato Vogelwiese, prope Leutsch et Lindenau, am Gesundbrunnen, in silva academica copiose hinter der Försterwohnung. Floret Jun. — Aug.

Pars offic. *Herba et Flores s. Summitates Centaurii minoris* colliguntur tempore florescentiae. *Qualit.* Planta inodora, corollis exceptis sapore amarissimo insignis. Extractum suppeditat illi ex Gentianae luteae radice parato haud dissimile. *Vires.* Tonica, antifebrilis, diluens, diaphoretica, antiseptica. *Usus* in atonia viscerum abdominalium, inprimis tractus intestinorum pluribusque morbis inde ortis remedium aptissimum. *Praeparata.* *Pulvis, Extractum et Sal Centaurii minoris*, olim et *Aqua, Essentia, Conserva et Syrupus.*

E. ramosissima, PERS. caule ramosissimo divaricato dichotomo deliquescente, floribus ex dichotomia terminalibusque, calycibus ebractea-

tis; corollae tubo brevioribus, foliis inferioribus ovatis. WALLR. ann. bot. p. 45. n. 56. PERS. synopsis. I. p. 285. n. 5. *Chironia* EHRH. Herb. 124. *Chironia Gerardi* SCHMIDT boh. l. n. 131. *Ch. Centaurium* β . LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1068. n. 9. *Ch. pulchella* SPRENG. Fl. Hal. p. 74. BAUMG. Fl. Lips. p. 135. sub *Gent. Centaur.*

In pratis humidis, ad salinas pr. Koetschau et Teudiz, nuper etiam ad viam Merseburgensem inveni.

E. inaperta, pumila simplex ramosaque foliosa, foliis ovatis, floribus ternis limbo connivente acuto. PERS. synopsis. I. p. 283. *E. ramosissima*. β . *Chir. inaperta*. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1069. n. 10. *Icon.* HAYNE I. 30.

Passim in pascuis v. c. Vogelwiese, frequens ad salinas.

Viribus utraque haec species distincta non discrepat ab *E. Centaurio*, eodem certe amarissimo gaudet sapore.

D I G Y N I A.

GENTIANA *Corolla* monopetala. *Capsula* bivalvis, unilocularis, *Receptaculis* duobus, longitudinalibus.

G. cruciata, corollis quadrifidis imberhibus, floribus verticillatis sessilibus, foliis decussatis connato-vaginantibus PERS. synopsis. I. p. 284. n. 9. LINN. sp. pl. ed. WILLD. p. 1334. n. 8. SCHWAEGRICH. Topogr. Lips. IV. p. 5.

In collibus silvaticis et pascuis, apud nos

nonnisi in loco a Radloffio invento in pratis prope Dölzig am Bieniz ipse legi.

Radix et Folia Gentianae cruciatæ s. *Gentianae minoris*, quum planta non admodum vulgaris sit apud nos non prostant, iisdem verumtamen quibus Gentianae luteae viribus praedita.

G. Pneumonanthe, corollis quinquefidis campanulatis acuminatis axillaribus pedunculatis, foliis sub-linearibus obtusis. FROEL. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1556. n. 12. BAUMG. Fl. Lips. p. 135. n. 562.

Copiose legitur Jul. — Septb. florens in pratis uliginosis prope Rückmarsdorf et Kleindölzig, passim prope Leutzsch.

Radix et Flores Pneumonanthes et Herba Antirrhini coerulei olim servabatur in officinis; quum vero vis eorum expectorans non fuerit probata nunc obsoleta.

CUSCUTA. *Calyx* quadri-quinquefidus. *Corolla* quadri-quinquefida. *Capsula* bilocularis, basi circumscissa. *Semina* bina.

C. vulgaris, florib. subsessilib. corolla 4-5 andra fauce nuda, stigmatibus acutis. PERS. synops. I. p. 289. n. 1. LINN. sp. pl. ed WILLD. II. p. 702. n. 1. (*Cuscuta europaea* a.) BAUMG. Fl. Lips. p. 96. n. 270.

C. Epithymum, florib. sessilibus, staminibus basi squama crenata munitis. SPRENG. Fl. Hal. p. 33. n. 282. SCHWAEGRICH. topogr. IV. p. 4.

Crescit in humilibus plantis pratorum depres.

sorum Vogelwiese, alte Funkenburg et alibi, minor et tenerior quam. *C. Eur opaea*, nec facile in dumeta ascendens.

Cusutae Europaeae s. maioris s. Epithymi officinarum et *Cuscutae Epithymi* L. s. *Herbae Epithymi cretici* vires resolventes, laxantes et diaphoreticae non sufficiunt ad earum usum continuandum itaque iam diu obsoleta sunt.

HERNIARIA. *Calyx* quinquepartitus. *Corolla* nulla. *Stamina* quinque sterilia. *Capsula* monosperma.

H. glabra, glabra glomerulis multifloris. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1296. n. 1. BAUMG. Fl. Lips, p. 139. n. 376. *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 529. SCHK. bot. Handb. t. 53.

Etiam huius plantae quae in locis sabulosis haud infrequens occurrit vires sunt nullae, itaque iure meritoque aliis praevalentibus plantis locum cessit.

ULMUS. *Calyx* campanulatus quinquefidus. *Corolla* nulla. *Capsula* (Samara) compressa, membranaceo-alata.

U. campestris, foliis duplicato-serratis basi inaequalibus, floribus subsessilibus conglomeratis pentandris, fructibus glabris. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1324. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 140. n. 378. *Icon.* SCHK. bot. Hdb. t. 57. HAYNE III. 15.

U. effusa, foliis duplicato serratis basi inaequalibus. florib. octandris pedunculatis effusis, fructibus margine ciliatis. WILLD. arb. 393. SCHWAEGB.

RICH. Topogr. IV. p. 6. *Ulmus ciliata*. EHRH. Beitr. 6. p. 88. *Icon*. SCHK. bot. Hdb. t. 57. b* (*Ulmus octandra*). HAYNE III. 17.

Utraque arbor speciosa; altera crescit cum *U. suberosa* WILLD. n. 2. SCHWAEGRICH. p. 5. HAYNE III. n. 16. in silvis nostris nec non ad pagos, altera non rarior in ambulacris, ad sepes.

Pars offic. *Cortex Ulmi* interior ab utraque arbore delibratur tempore verno e ramis triennibus et quadriennibus aut arborum iuniorum stirpibus. *Qualit.* Inodora, amara, adstringens, subacris et mucilaginoso. Praebet principium extractivum, adstringens et partes mucilaginoso-gummosas, pauxillum resinae et natri muriatici. *Vires.* Tonica, adstringens. *Usus.* In morbis exanthematicis chronicis imprimis celebrandus, externe ad gangarismata, fotus, lotiones aptissimum remedium. cf. SCHREGER diss. Erlang.

CHENOPODIUM. *Calyx* pentaphyllus, pentagonus. *Corolla* nulla. *Semen* unum, lenticulare. superum.

Ch. bonus Henricus. foliis triangulari-sagittatis integerrimis, spicis compositis aphyllis axillaribus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1299. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 136. n. 364. *Icon*. BLACKW. Herb. t. 311. SCHK. bot. Hdb. t. 56.

Planta oleracea rustica vulgaris, virtutibus ad discutiendos tumores egregia, minoris quam meretur aestimata.

Ch. hybridum, foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis nudis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1303. n. 13. BAUMG. Fl. Lips. p. 157. n. 370.

Ch. *rubrum*, foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis. racemis erectis compositis subfoliosis caule brevioribus. LINN. sp. pl. ed. WILLD.

I. p. 1500. n. 6. BAUMG. Fl. Lips. p. 136. n. 366.

Ch. *album*, foliis rhomboideo-triangularibus erosissimè postice integris; summis oblongis, racemis erectis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. p. 1502. n. 11.

BAUMG. Fl. Lips. p. 137. n. 368.

Ch. *olidum*, foliis rhombeo-ovatis integerrimis, racemis conglomeratis. CURT. n. 60. *Chenopod.*

Vulvaria LINN. sp. pl. I. p. 1305. n. 19. BAUMG.

Fl. Lips. p. 158. n. 372.

Singulae species ex indigenis minus merentur commendationem, a veteribus vario modo usurpatae. Ch. hybridum suspectum est, adeo homines temulentes reddit.

Beta rubra. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1308. n. 1.

et *Beta Cicla*. LINN. p. 1309. n. 3. etiam Lipsiae ubique cultae usui medico porro non inserviunt.

Umbelliferae.

A. Fructus compressi plani.

HERACLEUM. § *Fructus* subrotundo-ovalis apice emarginatus plano-compressus marginatus, jugis tribus obsoletis valleculis ad dimidiam longitudinem maculatis, commissura plana bimaculata.

II. *Sphondylium*, foliis pinnatis, foliolis oblongis sinuato-dentatis, extimis biternatis confluentibus, subtus pedunculisque tomentosissimis. WALLR.

ann. bot. 39. 64. LINN. sp. pl. I. 1421. n. 1.

BAUMG. Fl. Lips. p. 149. n. 401. *Icon.* BLACKW.

Herb. t. 540. SCHK. bot. Handb. t. 67.

Speciosissima et sat vulgaris Florae nostrae umbellata pratensis, vix viribus dissolventibus, aperientibus, diureticis antea ei adscriptis insignis. *Offic.* olim *Herba Spondylii* s. *Brancae Ursi* s. *Ursinae*.

PEUCEDANUM. *Fructus* ovalis plano-compres-
sus marginatus, jugis quinque obtusiusculis, val-
leculis striatis, commissura plana. (Involucra
oligophylla.)

P. officinale, foliis quinquies tripartitis diva-
ricatis, foliolis lineari-setaceis acuminatis; radi-
ce paleacea. WALLR. ann. bot. 40. 66. LINN. sp.
pl. ed. WILLD. I. p. 1405. n. 1. BAUMG. Fl. Lips.
p. 145. n. 390.

Frequens floret mense Jun. — Aug. in pra-
tis am Bieniz, prope Dölzig, deinde prope Leutsch
et passim ad pagos Raschwitz et Schleussig. *Ra-
dix Peucedani* s. *Foeniculi porcini*
mense Aprilis collecta atque epidermide fusca deli-
brata diuretica, diaphoretica atque resolvens ha-
beatur.

FERULA. *Fructus* oblongo-lanceolatus plano com-
pressus marginatus, jugis tribus obtusiusculis,
valleculis striatis, commissura striata (Involu-
cra varia.)

F. graveoleus. SPRENG. foliis triplicato-pinna-
tis, foliolis lineari-filiformibus, vaginis ligulae-
formibus margine membranaceis. WALLR. ann.
bot. p. 40. n. 87. *Anethum graveoleus.* LINN. sp.
pl. ed. WILLD. I. 1469. n. 1. BAUMG. Fl. Lips.
p. 159. n. 426. *Icon.* SCHK. bot. Handb. t. 77.
BLACKW. Herb. t. 445.

Frequens occurrit in agris nostris cultum et quæsi sponte, iisdem propemodum quibus *Meum Foeniculum* Spr. viribus præditum, usui tamen culinari potius quam medicinali inservit.

PASTINACA. *Fructus* ovalis apice emarginatus plano - compressus marginatus, jugis quinque obsoletis, valleculis striatis, commissura bistriata. (Involucrum universale et partiale nullum.)

P. sativa, caule sulcato glabro, foliis pinnatis, foliolis ellipticis incisè-serratis decussatis semidecurrentibus, summis bi - trifidis glabriusculis. WALLER. ann. bot. p. 41. n. 68. LINN. sp. pl. ed. WILLD. p. 1466. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 158. n. 144. *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 379. SCHK. bot. Handb. t. 76.

In pratis nostris locisque elatis gramineis sponte, in agris hortisque culta communis radicem bene sapidam nutrientem nec non diureticam præbet.

B. *Fructus* solidiusculi alati.

SELINUM. *Fructus* subrotundus basi emarginatus margine alatus, jugis tribus dorsalibus obsoletis, valleculis plano-convexis. (Invol. universale et partiale polyphyllum.)

S. palustre, lactescens, caule striato ramoso, foliis subtripinnatis vaginantibus, foliolis cuneatis, laciniis linearilanceolatis cuspidatis discoloribus, involucris polyphyllis margine membranaceis involutis. WALLER. ann. bot. p. 41. n. 69. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1397. n. 2.

In locis paludosis ubique. Jun. Jul. florens. Olim officinis *Radice[m] Tyssselini* s. *Olsnitii* suppeditavit.

S. silvestre, caule laevi, radice fusiformi multiplici. LINN. sp. pl. ed. WILLD. p. 1396. n. 1. *Scelinum* corollulis explicatis, foliis ovato-lanceolatis, semine oblongo, plano. CRANTZ. I. p. 177. n. 11. *Icon*. BLACKW. Herb. t. 556. SCHK. bot. Hdb. 63.

Idem ac antecedens ex opinione cel. WALLR. In silvaticis: Rosenthal, Lindenthal, Schoenfeld. Succus radicis acerrimus. *Radix Oelsnitii* s. *Elsnitii* olim officinalis.

S. Oreoselinum. CRANTZ. caule petiolisque dichotomis, foliis triplicato-pinnatis divaricatis, foliolis inciso-serratis obtusiusculis oblongis basi cuneatis, involucris omnibus setaceis. WALLR. ann. bot. p. 41. n. 70. *Athamanta Oreoselinum*. LINN. spec. pl. ed. WILLD. I. p. 1403. n. 6. BAUMG. Fl. Lips. p. 142. n. 383. *Icon* SCHK. bot. Hdb. t. 64.

In pascuis montosis et agrorum versuris am Bieniz. et prope Kleinwetteritsch crescit. Jul. Aug. florens.

Herba, olim et *Radix* et *Semen Oreoselini* colligebantur, Foliorum infusum theiforme suaveolans, et bene sapidum.

ANGELICA. Fructus ellipticus compresso solidiusculus corticatus, jugis tribus dorsalibus acutis, valleculis sulcatis, margine alatus. (Involucrum nullum)

A. silvestris, foliis pinnatis, foliolis ovatis inaequaliter decurrentibus mucronato-serratis, va-

ginis laxis ochreatis, caule superiore pedunculisque incano-tomentosis. WALLR. ann. bot. p. 42. n. 72. LINN. sp. pl. I. 1429. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 152. n. 409. *Icon.* SCHK. bot. Hdb. t. 68.

Umbellata Heracleo vix minor nec minus frequens in pratis nostris, humidusque locis silvaticis, laudatur ob vim radicis stimulantem, tonicam illi Angelicae Archangelicae. LINN. sp. pl. ed. WILLD. sp. 1426. n. 1. vix indigenae similem sed debiliorem.

C. Fructus utriculati.

CICUTA. Fructus subglobosus, utriculo adpresso, jugis quinque obtusis, valleculis maculatis.

C. *virosa*, foliis biternatis, foliolis lanceolatis serratis acutis subdecurrentibus, vaginis in petiolos abeuntibus. WALLR. ann. bot. p. 43. n. 76. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1445. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 153. n. 423. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 574. SCHK. bot. Handb. t. 71. HAYNE I. 37.

Radix perennis, crassa, articulata, albida, undique fibris crassis fusciscentibus instructa; fistulosa, dissepimentis transversis; caulis erectus, crassus, teres, fistulosus, nudus, obsolete striatus, brachiatus, 3 — 6 pedalis; folia glabra; radicalia supradecomposita; caulina alterna, inferiora pinnato-decomposita, superiora pinnato-composita; foliola lanceolata, argute serrata, in petiolum subdecurrentia; extima profunde triloba; petioli teretes, fistulosi, nudi, basi vaginantes, membranaceo-marginati; umbellae terminales aut oppositi-foliae, subaequales, multifidae; um-

bellulae multi-florae, hemisphaericæ; involu-
crum universale subnullum; parziale polyphyl-
lum; phylla linearia, externa umbellulis longio-
ra, reliquis latiora, subserrata; corolla pentapeta-
la: petalis aequalibus emarginato cordatis; Fruc-
tus hemisphaericus geminus, costatus, stylo re-
flexo coronatus.

Loc. natal. Planta nimis virosa in paludibus,
inprimis in fossis aqua repletis inter prata prope
Schoenfeld et Schleussig nec non hinter dem
Brandvorwerk et alibi crescit. Floret Jul. Aug.

*Offic. Herba et Radix Cicutæ viro-
sæ s. aquaticæ*, rarius hodie prostant. *Qua-
lit.* Odor temulentus plantae recentis; sapor se-
minis illum Petroselini protinus aemulatur, dein
acerrimus. Herba et Semina siccata innoxia prope.
Vires. Facile virosarum nostrarum primaria, nar-
cotica, anodyna, dissolvens. *Usus* planta recens
eodem modo in corpus agit quo Conium macu-
latum, rarius vero adhibita, incerta, suspecta,
periculosa. Externe imposita dissolvit tumores
scrophulosos et arthriticos.

D. Fructus corticati.

Coriandrum sativum. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p.
1448. PERS. SPRENG. planta omnino salubris apud
nos nonnisi quasi sponte raro occurrit, colitur
versus oppida Brehna, Landsberg etc.

ÆTHUSA. *Fructus* ovatus solidiusculus, jugis
quinque acutis turgidis, valleculis acutangulis,
commissura plana striata. (Involucr. dimidiatum
aut nullum.)

Ae. Cynapium, foliis bipinnatis, foliolis subtrifidis, extremis in petiolos decurrentibus, subtus lucidis, involucris universalibus dimidiatis setaceis reflexis. WALLR. ann. bot. p. 44. n. 78. LINN. sp. pl. ed. WILLD. p. 1446. n. 1. BAUMG. Fl Lips. 153. n. 411. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 517. SCHK. bot. Handb. t. 72. HAYNE I. 35.

Radix annua, fusiformis, subramosa, fibrosa albida; caulis erectus, teres, striatus, glaber pruinosis, fistulosus, 1—5 pedalis, dichotomoramosus; folia alterna, glabra, nitida, conformia, inferiora pinnato-supradecomposita, superiora pinnato-decomposita; foliola incisa, laciniis lanceolato-linearibus; petioli semiteretes, canaliculati, solidi, basi vaginantes striati membranaceo-marginati; umbellae terminales vel axillares vel oppositifoliae, pedunculatae, inaequales, multifidae, planae, radiis mediis minimis; involucr. univ. nullum, parziale triphyllum, unilaterale, reflexum, phyllis umbellulas superantibus, linearibus; corolla pentapetala: petalis inaequalibus, emarginato-cordatis; flores omnes fertiles; Semen geminatum, subhemisphaericum, latere convexo quinque-costatum, latere plano subsulcatum.

Loc. natal. Habitat inter plantas oleraceas iusto frequentior. Floret. Jul. Aug. Pars officinalis nulla est at planta venenata mentione eget. Folia recentia digitis trita Allium spirant; vires sunt narcoticae acres, Cicutae haud absimiles, nec fonte inferiores. Apium Petroseli-

num, ubi characteris certioris ratio nulla habeatur, refert.

F. Fructus armati.

DAUCUS. Fructus oblongus solidiusculus, jugis primariis secundariisque aculeato-setosis. (Involucrum, pinnatifidum.)

D. *Carota*, caule petiolisque hirsutiusculis, foliis tripartitis, foliolis cuneiformi-ovatis profunde incisiss mucronatis, involucellis subciliatis. WALLR. ann. bot. p. 44. n. 79. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1389. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 143. n. 384. Icon. BLACKW. Herb. t. 546. SCHK. bot. Hdb. t. 61.

Var. β . *silvestris*, flosculo rubro centrali sterili.

Planta vulgatissima ubique spontanea et culta radice utilis. Radix recens nutriens, demulcens, resolvens, mundificans, anthelmintica; externe quoque adhibenda in ulceribus inveteratis, panaritio etc. *Roob Dauci* et *Saccharum* pectoralia, bechica.

TORILIS *Adans.* Fructus ovalis ccostatus undique hispidus. (Invol. univ. nullum; partiale polyphyllum)

T. *Anthriscus*, GMELIN. foliis bipinnatis, foliolis oppositis inciso-serratis mucronatis, extremo elongato, cauleque teretiusculo pilis adpressis scabris. WALLR. ann. bot. p. 45. n. 82. *Caucalis Anthriscus*. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1388. n. 11. *Tordylium Anthriscus*. BAUMG. Fl. Lips. p. 150. n. 404. Icon. HAYNE 1. 36.

In ruderatis, ad hortos, muros frequens, suspecta, Chaerophyllo temulo habitu similis, minus Conio.

SANICULA. *Fructus* lanceolatus ecostatus, undique setis uncinatis hispidus. Umbella capitata. (Inv. polyphyllum.)

S. europaëa, foliis inferioribus quinque-lobis, laciniis cunei-formibus trifidis mucronato-serratis marginatis, flosculis umbellulae trifidae sessilibus capitatis. WALLER. ann. bot. p. 46. n. 83. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1366. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 141. n. 381. *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 63. SCHK. bot. Hdb. t. 60.

ANTHRISCUS. *Fructus* oblongus teres apice attenuatus muricatus, commissura sulcata. (Inv. univ. nullum part. polyphyllum)

A. vulgaris. PERS. umbellis subternis oppositi foliis divergentibus, foliis brevioribus, umbellis subheptaspermis, foliolis ovatis subtrifidis petiolisque hirsutis, caule glaberrimo. WALLROTH. ann. bot. p. 46. n. 85. PERS. Synops. I. p. 320. *Scandix Anthriscus* LINN. sp. pl. ed. WILLD. BAUMG. Fl. Lips. p. 155. n. 415.

Passim in pagis ad sepes v. c. pagi Burghausen, Chaerophyllo sativo similis attamen fructu oblongo tereti apice muricato, commissura sulcata facile distinguenda. Planta ceterum non officinalis sed infesta.

F. Fructus solidi nudi.

CHAEROPHYLLUM. *Fructus* oblongo-linearis teres ecostatus glaber, apice stylo coronatus, commissura glabra constricta sulcata.

Ch. sativum LAM. umbella subtrifida, foliolis obovatis inciso-serratis, caule inferne glabro, pedunculis geniculisque pubescentibus, fructibus acuminatis. WALLR. ann. bot. p. 47. n. 87. *Scandix cerefolium*. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1450. n. 4. BAUMG. Fl. Lips. p. 154. n. 414. *Icon*. BLACKW. Herb. t. 236. SCHK. bot. Hdb. t. 73.

Ad sepes hortorum, in cultis sponte, cultum ubique. *Herba* et *Semen Chaerophylli* s. *Cerefolii* s. *Chaercofolii* olim magis officinalia quam hodie. Succus herbae recentis interdum ad curas vernaes consumitur.

Ch. silvestre, caule striato glabriusculo geniculis incrassato, foliolis ovato-lanceolatis inciso-serratis nitidis, subtus pubescentibus, involucellis ovatis ciliatis. WALLR. ann. bot. p. 48. n. 88. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1452. n. 1. *Icon*. SCHK. bot. Hdb. t. 73. HAYNE I. 33.

Offic. Cicutariae Herba, obsoleta.

Ch. bulbosum, caule basi strigoso maculato superna ramoso, geniculis tumido, foliorum superiorum laciniis nervo pilosis, involucellisque linearibus margine nudis radice bulbosa deliquescente. WALLR. ann. bot. p. 48. n. 89. LINN. sp. pl. ed. WILLD. n. 2. BAUMG. n. 417. *Icon*. HAYNE I. 32.

Umbellata Conio maculato ob caulem maculis rubris ut species sequentes adpersum primo intuitu similis.

Ch. temulum, caule hirsuto, geniculis clavato-incrassato, foliolis ovato-oblongis obtusis obtu-

seque serratis, fructibus striatis. WALLR. 91.
LINN. sp. pl. ed. WILLD. n. 4. BAUMG. n. 418.
Icon. HAYNE. I. 34.

Plantae apud nos vulgares in ruderatis ad
pagos, in silvaticis locis; singulae venenatae.

SIUM. *Fructus* lanceolato-linearis solidus subcor-
ticatus, angulatus, jugis quinque obtusis, valle-
culis convexiusculis. (Inv. univ. polyphyllum.)

S. latifolium, umbellis oppositifoliis axillaribus-
que, foliis pinnatis, pinnis radicalium subpinnati-
fidis, caulinarum lanceolatis aequaliter serratis ba-
si sessilibus inaequalibus, extremo cordato petio-
lato, caule striato, involucris oligophyllis. WALLR.
ann. bot. p. 49. n. 92. LINN. sp. pl. ed. WILLD.
I. p. 1451. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 148. n. 396.
Icon. HAYNE I. 38.

S. angustifolium, foliolis ovato-lanceolatis
inaequaliter lobatis serratis oppositis vaginis fo-
liosius, umbellis pedunculatis oppositifoliis axil-
laribusque, caule dichotomo, involucris poly-
phyllis incisiss. WALLR. n. 93. LINN. sp. pl. ed.
WILLD. n. 3. BAUMG. n. 397. *Icon.* HAYNE I. 39.

Utraque umbellata palustris vulgaris, prin-
cipio narcotico non minus quam acri venenata.

CARUM. *Fructus* lanceolato-linearis angulatus cor-
ticatus, jugis quinque obtusis, valleculeis conve-
xiusculis. (Inv. univ. monophyll.)

C. Carvi. Foliis tripinnatis. foliolis decussatis
decurrentibus lineari-filiformibus acutis trifidis,
vaginibus ventricosis. WALLR. n. 95. LINN. sp.
pl. ed. WILLD. I. p. 1470. n. 1. BAUMG. Fl. Lips.

p. 160. n. 228. *Icon. BLACKW. Herb.* 529. SCHK.
bot. Hdb. t. 77.

Umbellata caule ramoso, vaginis foliaceis, involucrio partiali nullo, foliorum fructuumque forma ab affinibus distinguenda, vulgaris in pratis siccioribus, locis elatis; prope Schkeudiz, Markranstaedt etc. diligenter colitur.

Qualitatibus, viribus, usu *M. Foeniculo* non dissimilis, at magis abdominis organis conducit.

MEUM. TOURN. *Fructus* lanceolatus, iugis quinque acutis, valleculis planiusculis. (Inv. univ. nullum.)

M. Foeniculum. SPRENG. *Anethum Foeniculum.* LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1469. 3. planta nobis culta habitat in rupibus calcareis Angliae et Madeirae, apud nos vero quasi sponte occurrit in agris in quibus antea colebatur, v. c. prope Markranstaedt. Ramificationibus patenti-divergentibus, vaginisque foliaceis longissimis canaliculatis iam e longinquo facile discernitur a *Ferula* (*Anetho*, LINN) *graveolente*. Floret. Jun. Jul. *Officinale est Semen*, olim et fuit *Radix* et *Herba Foeniculi*. Radicis plantaeque totius recentis odor fragrans, sapor foliorum seminisque blande aromaticus, dulcescens. Oleum pinque nec non aethereum invenimus in semine. Nervos pectoris abdominisque blande stimulans, promovet lactis secretionem, vim expectorantem, carminativam, diureticam exserit. *Pulvis, oleum aethereum et coctum, Aqua Semina confecta.*

APIUM. *Fructus* ovatus solidus quinquecordatus, jugis acutiusculis, commissura valleculisque planiusculis. Umbella subcomposita. (Inv. nulum.) SPRENG. prodr. p. 34. n. 53. (Nescio quo errore singulari cel. WALLR. ad hoc genus characterem praecedentis *Spananthes*, JACQ. refert.)

A. *graveolens*, caule sulcato, foliis ternatis, foliolis trifido-incisis petiolatis basi cuneiformibus, umbellis sessilibus axillaribus terminalibusque foliosis. WALLR. 97. LINN. spec. pl. ed. WILLD. I. p. 1475. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 162. n. 433.

Apio Petroselino LINN. plantae apud nos cultae culinaris vis inest diuretica, pariter atque Apio graveolenti ad salinas spontaneo quo minus in medicina utimur.

PIMPINELLA. *Fructus* ovatus solidus quinquecostatus, jugis acutiusculis, valleculis convexis commissura contracta. Umbella composita. Involucrum nullum.

P. *Saxifraga*, caule striato glabro, foliis pinatis glabris, radicalibus foliolis subrotundis argute dentatis, caulinis bipinnatis linearibus. LINN. spec. pl. ed. WILLD. I. p. 1471. BAUMG. Fl. Lips. p. 161. n. 429. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 472. SCHK. bot. Hdb. 78.

Planta secundum locum natalem admodum varians. *Pimpinella magna*, BAUMG. Fl. Lips. p. 161. n. 430, et plurium forte auctorum huius *P. Saxifragae* varietas est pratensis quod per multis speciminibus transitum egregie demonstrantibus doceor. Vera *Pimpinella magna*, LINN.

quam cel. WILLD. fusius descripsit longe discrepat a planta apud nos obvia eamque ipse siccam in herbario meo comparo. *Pimpinellae magnae* foliola lobata, latiora quam longa, quasi oleo inuncta, venosa, omnia petiolata facie Sisari. Petioli compressi. WILLD.

Radix Pimpinellae albae, olim et *Herba* et *Semen* ad officinalem usum a varietate minori in locis siccioribus, elatis obvia praestat. Floret Jun. Aug. *Qualit.* Oleum aethereum odor prodiit acerrimus, specificus, sapor non minus acer, subamarus. *Vires* stimulans, diuretica, diaphoretica, carminativa, adstringens. *Usus.* Aptissima in anorexia diuturna, colluvie pituitosa et dyspepsia. *Praep. Pulvis Essentia s. Tinctura*, olim et *Aqua* et *Conserva*.

SISON. *Fructus* ovatus solidus, dorso tricostato, valleculis convexis, latusculis contractis, commissura excavata. (Inv. oligophyll. aut nullum.)

S. *Podagraria*, SPRENG. foliis inferioribus biter-natis cordatis, caulinis ternatis basi attenuatis inaequalibus duplicato serratis, subtus glaucescentibus. WALLR. 101. *Aegopodium Podagraria* LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1476. BAUMG. Fl. Lips. p. 163. n. 435. *Icon.* SCHK. bot. Hdb. t. 79.

In pratis et hortis vulgare. Eius foliis iunioribus passim vescitur tempore verno. Planta graveolens, diuretica? —

Sison Anisum, SPRENG. *Pimpinella Anisum*. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1475. n. 8. passim sed

rarius colitur apud nos cum Coriandro, frequens in Thuringia.

OENANTHE. *Fructus* ovato-oblongus corticatus solidus apice denticulatus, stylo persistente coronatus, jugis tribus aut quinque obtusis. (Invol. univ. subnullum.)

Oe. fistulosa, stolonifera, foliis radicalibus bipinnatis, foliolis cuneatis lobatis, caulinis pinnatis linearibus petioloque longissimo fistulosis, involucrio universali nullo. WALLR. 105. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1440. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 145. n. 389. *Icon.* SCHK. bot. Hdb. t. 70.

Umbellata elegans venenata; occurrit passim in fossis, stagnis pratisque paludosis v. c. bei der Windmühle, Lindenau, Zschocher

Oe. Phellandrium, LINN. umbellulis oppositifoliis, foliis tripinnatis, foliolis ovali-oblongis incisis nuncronatis. WALLR. 106. *Phellandrium aquaticum*. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1444. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 157. n. 421. *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 570. SCHK. bot. Hdb. t. 71. HAYNE I. 40.

Radix biennis, subperpendicularis, fistulosa, articulata, articuli dissepimentis spongiosis albis distincti, externe verticillato-fibrosi; caulis erectus, teres, glaber, obsolete striatus, articulatus, fistuloso-spongiosus, 3 — 4 pedalis, ramificationibus divaricatis; folia glabra; inferiora pinnato-supradecomposita; superiora pinnato-decomposita, pinnis pinnulisque divaricatis; foliolis cuneatis, obtusis, integris — multifidis;

petioli teretes, obsolele striati, solidi basi vaginantes; umbellae terminales vel oppositifoliae, brevipetiolatae compositae; flores omnes fertiles discoidales minores; umb. univers. inaequalis multifida; part. densa; multiflora; Involucr. univ. nullum; part. oligophyll. phyllis linearibus; corollae pentapetalae, petala inaequalia emarginato-cordata alba; stamina corolla sublongiora; semina flavoviridia.

Loc. natal. Umbellata palustris, in profundioribus paludibus fossisque nobis vulgaris v. c. Vogeltwiese, Schleussig. Floret Jun. Aug.

Offic. Semen Phellandrii s. Foeniculi aquatici olim et *Herba. Qualit.* Semina ut tota planta odore penetrante aromatico ingrato perfusa, sapore protinus dulci dein aromatico oleoso, acerrimo. Semina mense Septbr. maturescunt. Oleo aethereo et resina non egent.

Vires. Stomachum roborant, flatus pellunt, pituitam solvunt, vasa pulmonalia cutaneaue stimulant eorumque excretiones accelerant. *Usus.* Remedium antiphtisicum habebatur tempore recenti, et omnino in phtisi inchoante ulcerosa prodest, inveteratam curare nequit. Praeterea stomachicum, antifebrile auctore Sprengelio.

cf. Phellandrologia phys. med. s. exercitat de medic. novo, vulgo Peersaat. Brunsw. 1739 8. LANGE von den heilsamen Wirkungen des Wasserfenchels. Leipz. 1771. et Helmst. 1802.

CONIUM. *Fructus* ovatus solidus subcorticatus, jugis quinque obtusiusculis immaturis, crenatis, val-

leculis planis. (Involucr. univers. et part. polyphyllum.)

- C. maculatum**, caule ramoso maculato, foliis tripinnatis, foliolis lanceolatis decurrentibus inciso - serratis, umbellis fastigiatis subternis. WALLR. 107. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1595. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 146. n. 392. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 451. 573. HAYNE I. 31.

Radix biennis, crassa, fusiformis, subfibrosa; caulis erectus, teres, obsolete striatus, glaberrimus, maculis purpureis v. puniceis inprimis basi adpersus; folia glabra, inferiora pinnato-supradecomposita, alterna; superiora pinnato-decomposita, opposita, foliola oblonga, dentata dentibus albo apiculatis; petioli teretes, subcarinati, fistulosi glabri, basi vaginantes, maculati; umbellae terminales et in dichotomia ramorum, compositae; universalis multifida, particularis multiflora, subconvexae; Involucr. univ. subpentaphyll. deciduum, phyllis linearibus reflexis; partial. unilaterale. di-triphyllum reflexum; phyllis ovato-lanceolatis, acuminatis; corolla pentapetala, petala subaequalia, emarginato-cordata.

Loc. natal. Habitat in ruderalis ad pagos, in locis incultis ad muros, aggeres, v. c. prope Gohlis, Schleussig, Plagwitz, Ziegelscheune etc. Floret Jul. — Septbr.

Pars offic. *Herba Conii maculati s. Cicutae maioris officinarum s. terrestris s. vulgaris*, antea et *Semen*. Carpun-

tur folia ante fructificationem, petiolis crassis destituta velocissimo calore siccata in vasis bene clausis asservantur. *Qualit.* Folia recentia inprimis digitis trita odorem ingratum qualem lotium felinum spargunt, sapor est amarus, acris, subdulcis. Praeter extractum gummosum et resinosum et spiritum volatilem et alcalinum, Schraderus etiam pigmentum gummosum et resinosum in planta detexit; attamen praeter narcoticam vim et acrimoniam quamvis huius ingenium nos lateat, inesse constat. *Vires.* Stimulat vasa absorbentia et glandulas motumque humorum accelerat, praeterea tamen vi sedante gandet in cute laxanda et sensibus obtundendis. Utimur eo in tumoribus scrophulosis, syphiliticis aliisque, inprimis in bubonibus et scirrho mammarum. Abusus Cicutae haec fere procreat symptomata: vertiginem, paralyses, artuum tremorem, tympanititem, linguae cunctationem, dolores et expansiones ventriculi vehementes, inflammationes, nauseam, et diarrhoeam, sitim insatiabilem, dolores arduentes in faucibus, deglutionem impeditam, mictum cruentum, anxietatem, debilitatem, inertiam totius corporis, sudores frigidos, pallorem aut livorem cutis inprimis faciei, caecitatem, soporem, stuporem, furores, trisnum atque saepissime mortem velocem. Ipsum usum externum plantae recentis eiusque vapores nonnunquam sequitur vertigo, animi absentia, tremor, paralyses. Antidota optima commendantur ab initio emetica, ubi iam emesis orta sit ea potu

subcalido oleisque sublevanda. Praeterea acida vegetabilia, mel atque coffeae tostae decoctum, concentratum virtutes suas praebuerunt egregias. *Praeparata. Pulvis Extractum s. succ. inspissatus, Emplastrum* et olim *Oleum coctum.*

cf. STOERK. Ant. v. libellus quo demonstratur, cicutam non solum usu interno tutissime exhiberi. etc. Wien 1760. Libell. II. de cicuta Wien. 1761. EHRHART diss. Aeg. c. t. 1863. *Ortega* de Cicuta Matriti 1763. 4.

BUPLEURUM, *Fructus* ovatus solidus, dorso trico-
stato, jugis obtusiusculis planis, latusculis bi-
costatis rotundatis, commissura excavata. (Inv.
oligophylla subcoadunata umbellam subaequantia.)

B. rotundifolium, foliis perfoliatis ovatis ob-
tusis mucronatis, involucro nullo, involucellis
obovatis, exterioribus maioribus. WALLR. 108.
LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1369. n. 1. BAUMG.
Fl. Lips. p. 147. n. 393.

Haec species et *B. falcatum*, LINN. p. 1372.
n. 8. altera in agris, altera potius in rupibus cal-
careis Thuringiam versus occurrentes adstringen-
tibus remediis olim adscriptae plantae non am-
plius servantur.

CNIDIUM. CUSSON. *Fructus* ovatus solidiusculus,
iugis quinque acutis subalatis, valleculis obtus-
angulis. Inv. universale caducum aut nullum.

C. Silaus. SPRENG. foliis pinnatifidis, laciniis
oppositis decurrentibus subtrifidis acuminatis.
WALLR. 111. *Peucedanum Silaus*. LINN. sp. pl.

ed. WILLD. I. p. 1406. n. 7. BAUMG. Fl. Lips. p. 145. n. 391.

Planta nobis vulgatissima pratensis a Junio ad Septembrem usque florida. *Radicem* et *Herbam Seselios pratensis* s. *Saxifragae Angelicae* nunc obsoleta suppeditabat.

LIGUSTICUM. *Fructus* oblongus solidus corticatus, jugis quinque acutis, valleculis sulcatis. (Involucr. univ. et part. polyphyll.)

L. Cervaria SPRENG. foliis duplicato-pinnatis, foliolis ovatis inciso-serratis, serraturis mucronatis cartilagineis, imis decussatis, extimo trifido decurrenti. WALLER. n. 112. *Athamanta Cervaria*. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1401. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 142. n. 382. *Selinum Cervaria*. PERS. synops. I. 309. n. 14. *Icon.* JACQ. Austr. t. 69.

Habitat in pratis montanis v. c. am Bieniz.

Radix et *Semina Cervariae nigrae* s. *Gentianae nigrae* antehac a herbipolis avide conducebantur, nunc obsoleta.

TRIGINIA.

SAMBUCUS, *Calyx* quinquepartitus. *Corolla* quinquefida. *Bacca* trisperma.

S. nigra, cymis quinquepartitis, stipulis duabus utrinque setaceis, foliis pinnatis, foliolis ovatis serratis, caule arboreo. PERS. synops I. p. 328. n. 2. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1495. 3. BAUMG. Fl. Lips. p. 165. n. 453. *Icon.* BLACKW.

Herb. t. 151. SCHK. bot. Handb. t. 83. HAYNE IV. 16.

Arbor notissima sat vulgaris, 15 — 20 pedalis, Maio et Junio florens.

Pars offic. Flores et Baccae olim et Cortex internus et Folia Sambuci. Qualit. Flores suaveolentes amygdalino prope odore, nec male sapidi, cortici foliisque odor ingratus, sapor acer amarus. Oleum aethereum continent Flores blandissimum, mucilaginem et pauxillum resinae, partes reliquae extractum cum acrimonia. *Vires.* Florum infusum vulgatissimum et sane laude dignissimum diaphoreticum. Baccae et Cortex vi emetica illae coctae et ad syrapi consistentiam inspissatae diaphoretica et diuretica gaudent. *Usus* ex viribus patet. Externe floribus siccatis ad discutiendos tumores, nec non ad gargarisma cum lacte in angina tonsillari opus est. *Praeparata. Aqua destillata et Roob.*

ALSINE. *Calyx* pentaphyllus. *Petala* quinque, aequalia. *Capsula* unilocularis, trivalvis.

A. media, petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 154. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 167. n. 442. *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 164. SCHK. bot. Hdb. t. 85. HAYNE II. 47.

Planta vulgaris agricolis hortulanisque molesta, inter obsoleta medicamenta collocanda.

T E T R A G Y N I A.

PARNASSIA. *Calyx* quinquepartitus. *Petala* quinque. *Nectaria* quinque, cordata, ciliata apicibus globosis, *Capsula* quadrivalvis.

P. palustris. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1516. BAUMG. Fl. Lips. p. 168. n. 443. *Icon. SCHK. bot. Handb. t. 86. HAYNE II. 42.*

In pratis uliginosis, v. c. Schoenfeldicis, floret Jul. — Septbr. *Herba et Flores Hepaticae albae* in morbis hepaticis a veteribus adhibita. Ipsi Linneo vis videbatur incerta.

P E N T A G Y N I A.

LINUM. *Calyx* pentaphyllus. *Petala* quinque. *Capsula* quinquevalvis, decemlocularis. *Semina* solitaria.

L. catharticum foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. 1541. n. 26. BAUMG. Fl. Lips. p. 169. n. 446,

Vulgare in graminosis. Eius vi purgante non eget, itaque obsoletum.

L. usitatissimum. LINN. sp. pl. ed. WILLD. p. 1533. n. 1. seminis triti s. farinae lini usus ad fomentations, gargarismata, potum demulcentem etc. notissimus. Planta apud nos culta.

DROSER A. *Calyx* quinquefidus. *Petala* quinque. *Capsula* unilocularis; apice quinquevalvis. *Semina* plurima.

D. rotundifolia, scapis radicatis, foliis orbi

culatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 1543
n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 170. n. 448. *Icon*.
BLACKW. Herb. t. 433. SCHK. bot. Hdb. t. 87.

In uliginosis locis v. c. prope oppid. Grim-
mam Flor. Jun. — Aug.

Rarius adhuc in officinis asservatam inveni-
mus. Principium continet acre purissimum, ita-
que venenata corrosiva, eiusque usus dubius est
et potius magicus. Offic. olim *Herba Rorel-
lae* s. *Roris Solis*.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

ALLIUM. *Corolla* sexpartita, patens. *Spatha*
multiflora. *Umbella* congesta. *Capsula* supera.

A. *Scorodoprasmum*, caule planifolio bulbife-
ro, foliis crenulatis: vaginis ancipitibus, stami-
nibus tricuspidatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II.
p. 69. n. 15. BAUMG. Fl. Lips. p. 180. n. 467.

Vulgare in pratis. Vogelwiese, Connewitz
etc. Floret Jun. Jul.

A. *vineale*, caule teretifolio bulbifero, stamini-
bus tricuspidatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p.
73. n. 26. BAUMG. Fl. Lips. p. 181. n. 469.

Non magis rarum in pratis silvisque humi-

diusculis, vulgare in pratis Vogelwiesc. Floret Jun. Jul.

A. angulosum, scapo nudo ancipiti, foliis linearibus canaliculatis subtus subangulatis, umbella fastigiata. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 76. n. 34. BAUMG. Fl. Lips. p. 183. n. 474.

Passim in pratis prope Lindenau, silvisque v. c. prope Connwitz et Zschocher. Floret Jun. — Aug.

A. ursinum, scapo nudo triquetro, foliis lanceolatis petiolatis, umbella fastigiata. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 79. n. 40. BAUMG. Fl. Lips. p. 183. n. 475.

Copiose in Rosenthal aliisque nemoribus. Fl. Maio Jun.

Huius generis species omnes graveolentes: odore specifico, acerrimo. Externe radix bulbosa adhibita incitat cutem, rubefacit; interne calefaciens, emmenagoga, diuretica, flatulenta, anthelmintica; raro autem usui medicinali inserviunt. Coluntur plures in hortis.

LILIUM. *Corolla* sexpetala, campanulata: linea longitudinali nectarifera, laciniis saepius reflexis. *Capsula* valvulis pilo cancellato connexis.

L. Martagon, foliis verticillatis ovato-lanceolatis, floribus reflexis, carollis nevolutis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 38. n. 12. BAUMG. Fl. Lips. p. 190. n. 494. *Icon.* JACQ. Austr. V. 4. t. 351.

Nunc raro occurrit am Bieniz, frequens ve-

ro in montibus Thuringiae calcareis v. c. prope Naumburg. Floret Jun. Jul.

Radix Asphodeli diuresin movere, emol-
lire, maturare dicebatur.

ASPARAGUS. *Corolla* Sexpartita, erecta: petalis tribus interioribus apice reflexis. *Bacca* trilocularis, disperma.

A. *officinalis*, caule herbaceo tereti erecto, foliis setaceis, stipulis paribus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 150. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 189. n. 490. *Icon.* BLACKW. 332.

In cultis. Floret Jul. Aug. Haec planta etiam inter diuretica, diluentia, aphrodisiaca a veteribus recepta.

CONVALLARIA. [*Corolla* sexfida. *Bacca* maculosa, trilocularis, supera.

C. *majalis*, scapo nudo semicylindrico, foliis ovatis LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. 160. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 185. n. 479. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 70. HAYNE III. 18.

Vulgaris in nemoribus, florens Maio Junio. Interdum ad *Acetum Lilii Convallii* parandum congeritur, sed *Pulvis*, *Aqua*, *Spiritus* et *Conserva* ejusdem obsoleta. *Extractum* continent practerea purgans.

C. *Polygonatum*; foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 161. n. 5. BAUMG. n. 480. *Icon.* HAYNE III. 19.

C. *multiflora*, foliis alternis amplexicaulibus caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris.

LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 162. n. 6. BAUMG. Fl. Lips. p. 186. n. 481. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 251. HAYNE III. 20.

Altera in collibus silvaticis v. c. am Bieniz, altera in humidis, vulgaris in pratis prope Schönfeld, in silvaticis Rosenthal etc, Fl. Maio — Jul.

Utriusque radix *Sigillum Salomonis* edulis ex amylo constat, aliis remediis vulnerariis detectis superflua videtur.

ACORUS. *Spadix* cylindricus, tectus flosculis *Corolla* sexpetala, nuda. *Stylus* nullus. *Capsula* trilocularis.

A. *Calamus*, scapi mucrone longissimo foliaceo. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 199. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 192. n. 497. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 466. SCHR. bot. Hdb. t. 97.

Radix perennis, geniculata, repens, subcompressa, carnosa; scapus mucrone longissimo foliaceo pungente, 2—3 pedalis; folia erecta, arundinacea, ensiformia, plana, longissima, glabra, undulata, margine acutissima, interne albedo spongiosa; spadix cylindricus, obtusos, flavescens. medio scapo foliaceo ad latus iusidens.

Loc. natal. In stagnis fossis fluviisque v. c. in der Parde. Floret Jun. Jul.

Pars offic. *Radix Calami aromaticis* s. *vulgaris* extrahitur vere vel autumnno, mundata siccatur. *Qualit.* Radix odore specifico balsamico suavi, sapore amaro, acri aromatico praedita. Oleum aethereum et acrimonia

cum resinoso-gummosis partibus dirigunt vires. *Vires*. Stimulans, stomachica, diuretica. *Usus*. Ad excitandam plexuum abdominalium activitatem in atonia organorum quibus inserviunt, remedium egregium. *Praeparata*. *Pulvis*, *Confectio*, *Essentia*, *Oleum*, *Aqua* et *Extractum*.

BERBERIS. *Calyx* hexaphyllus. *Petala* sex; ad ungues glandulis duabus. *Stylus* nullus. *Bacca* disperma.

B. vulgaris, racemis simplicibus pendulis, foliis obovatis ciliato-dentatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 227. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 177. n. 460. *Icon*. BLACKW. Herb. t. 163. HAYNE I. 41.

In dumetis, silvis siccioribus. et ubique culta. Floret Maio, Jun.

Offic. *Baccae Berberum*. Acidi malici multum continent. *Praep.* *Roob* et *Syrupus Berberum*.

TRI G Y N I A.

RUMFX. *Calyx* triphyllus. *Petala* tria, conniventia. *Semen* unum triquetrum.

R. acutus, floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 253. n. 14. BAUMG. Fl. Lips. p. 199. n. 517. *Icon*. BLACKW. Herb. t. 491.

In humidis, ad fossas. Floret Jun. Jul.

Offic. *Radix Lapathi acutis*. *Oxylapathi*.

R. aquaticus, florib. hermaphroditis: valvulis

integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis
 LINN. sp. pl. ed. WILLD. p. 355. n. 18. BAUMG.
 n. 520. BLACKW. Herb. t. 262. 8. 490.

Ad ripas, fossas. stagna. Floret Jun. Jul.

Offic. Radix Lapathi aquatici, Hydrolapathi, Herbae Britannicae s. Rhapontici, vi adstringente, austera et ex veterum opinione eccoprotica praeditae. In rha-
 chitide inprimis Sueci adhibuerunt.

R. *Acetosa*, floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 260. n. 31. BAUMG. p. 201. n. 522. *Icon.* BLACKW. 250.

In pratis, pomariis, pascuis. Floret Jun. Jul.

Offic. Acetosae Nostratis Herba, Radix etc.

cf. Sammlung für pract. Aerzte B. XVIII. St. I. p. 53.

A. *Acetosella*, floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 260. n. 52. BAUMG. 523. *Icon.* BLACKW. t. 307.

In agris, locis sterilibus apricis. Floret Mai. — Jun.

Huius herba etiam ad parandum acidum oxalicum consumitur. Haec inprimis ex indigenis speciebus officinales fuere.

COLCHICUM. *Spatha. Corolla* sexpartita: tubo radicato. *Antherae* incumbentes. *Capsulae* tres, connexae, inflatae.

C. *autumnale* foliis planis lanceolatis erectis, petalis ovatis. PERS. synops. I. 389. 1. LINN. sp.

pl. ed. WILLD. II. p. 272. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 196. n. 510. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 566. SCHK. bot. Hdb. tab. 101.

Plauta apud nos vulgatissima autumnalis pratensis. *Pars offic.* Bulbus s. *Radix Colchici*, ovata aut subglobosa, subcompressa, crassitie pollicari, carnosae, succulenta, externe flavescens, interne alba, duplicato-tunicata, effoditur mense Augusto. *Qualit.* Bulbus recens acrimonia abundat, siccus eget. Odor recentis nauseosus, ingratus; sapor acris: ex amylo constat cum acrimonia impraegnato. *Vires*, dissolvens, diuretica, drastica. *Usus.* Scillae radici substituitur a nonnullis, nec immerito, in hydropo, asthmate etc. *Praeparata.* *Oxymel.* *Acetum* et *Extractum Colchici*.

cf. STOERK libellus de Colchici autumnalis Radice. Wien 1763.

P O L Y G Y N I A.

ALISMA. *Calyx* triphyllus. *Petala* tria. *Capsulae* plures monospermae.

A. *Plantago*, foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 276. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 202. n. 525.

Vulgaris in fossis paludibusque, foliorum causa quae *Herbam plantaginis aquaticae* vocabant, in haemorrhoidali morbo salubrum a veteribus commendata. Floret Jun. Aug.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

Aesculus Hippocastanum LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 285. n. 1. arbor speciosissima, elegantissima ambulacrorum Lipsiae ornamentum eximium, corticem praebet satis adstringentem. cf. ZANICHELLI Commenc. litt. Noric. 1734. p. 75. — Lett. al. GUIL. PONTEDERA intorno alla faculta dell' Ippocastano. Venez. 1773. 4. — PEIPER Diss. de. cort. Hippocastani. Duisb. 1763. 4.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

Oenothera biennis LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 306. n. 1. e Virginia translata, nunc adsueta, radicem suppeditat edulem quae vero hodie tantummodo ad culinarem usum consumitur.

EPILOBIUM. *Calyx* quadrifidus, tubulosus. *Petalata* quatuor. *Capsula* oblonga, infera. *Semina* comosa.

E. spicatum caule elongato simplici, foliis alternis lanceolatis glabris venosis, pedunculis ebracteis, spica pyramidata LAM. enc. 2. p. 373.

E. angustifolium. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 313. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 208. n. 553. *Icon*. SCHUKR bot. Hdb. t. 106.

Silvae ad pagum Lindenthal nec non hortorum suburbanorum decus. Folia antehac ut adstringens, vulnerarium nomine *Herbae Lysimachiae Chamaenerii* decerpserunt. Floret Jul. Aug. Radix edulis.

OXYCOCCUS. *Calyx* superus, quadrifidus. *Corolla* quadripartita: laciniis sublinearibus revolutis. *Filam.* conviventia. *Antherae* tubulosae, bipartitae. *Bacca* polysperma.

O palustris, foliis ovatis integerrimis revolutis, caulibus filiformibus repentibus nudis PERS. synops. I. p. 419. 1. *Vaccinium Oxycoccus* LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 354. n. 25. *Schollera Oxicoccus*. BAUMG. Fl. Lips. p. 213. n. 544. *Icon*. BLACKW. Herb. t. 593. HAYNE. IV. 18.

Habitat in uliginosis, sphagnetis v. c. in ericeto Dubenensi. Floret Maio Jun.

Baccae Oxycocci veteribus antiscorbuticae, antipyreticae.

CALLUNA. *Calyx* duplex; tetraphyllus. *Corolla* companulata quadripartita. *Filamenta* receptaculo inserta. *Antherae* bifidae. *Capsula* quadrilobularis. *Dissepimenta* receptaculo centrali affixa. *C. vulgaris* WILLD. Enum. Hort. Berol. p. 415. *Erica vulgaris* LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 473. *Icon*. HAYNE IV. 17.

In silvaticis sterilibus. Floret Aug. Septbr.

Offic. Herba Ericae. Vis vix ulla.

DAPHNE. *Calyx* nullus. *Corolla* quadrifida, corollacea, marcescens, *Stamina* includens. *Drupa* monosperma.

D. *Mezereum*, floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 415. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 214. n. 546. Icon. BLACLW. t. 532. HAYNE III. 43.

Caulis fruticosus, erectus, ramosus 2—4 pedalis folia ramorum inferiora fasciculata, superiora alterna, brevipetiolata, lanceolata, integra, glabra, decidua; Corollae sessiles binae — ternae, roseae, suaveolentes; drupae maturae coccineae.

Loc. natal. In silvis collinis umbrosis, v. c. in silva academica, passim vidi am Bieniz, frequenter in montibus calcareis. Floret Febr. April.

Pars offic. *Cortex Mezerei* s. *Laureolae* et antea etiam *Baccae* s. semina *Cocci Gnidii* s. *Coccognidii*. Ille vere hae vero aestate colliguntur.

Qualit. Cortex acerrime sapit, linguam corrodit. *Vires.* Inflammatoria, corrosiva, vomitoria, cardialgica, febrilis, drastica. *Usus* Ad cutem rubefaciendam et ulcera excitanda communis; internum in morbo venereo felici successu experti sunt nonnulli.

TRIGYNIA.

POLYGONUM. *Calyx* nullus. *Corolla* quinquepartita, calycina. *Semen* unum, angulatum, tectum.

P. Bistorta caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 441. n. 3. BAUMG. Fl. Lips. p. 215. n. 547. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 254.

In pratis nostris vulgare floret Maio, Jun. radicem habet viribus adstringentibus omnino polentem. Decoctum externe adhibendum in feminarum, Leucorrhoea a torpore orta, nec non ad gargarisma etc. *Offic. Radix Bistortae.*

P. Hydropiper, floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 444. n. 9. BAUMG. p. 216. n. 549.

In inundatis, fossis. Floret. Aug. Septbr. *Offic.* olim *Herba Hydropiperis* s. *Perisicariae urentis*, rubefaciens, diuretica.

P. amphibium, floribus pentandris semidigynis, spica ovata. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 443. n. 7. BAUMG. Fl. Lips. p. 215. n. 548.

Varietates α . *natans* β . *terrestre* ex una radice natas saepius vidi. Vulgare in inundatis, stagnis, agris humidiusculis. Floret Jun. — Aug.

Offic. Radix Polygoni amphibii, adstringens, obsoleta.

P. aviculare, floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 449. n. 21. BAUMG. Fl. Lips. p. 217. n. 552. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 315.

Planta vulgaris polymorpha, In solo pinguiori

folia magna, corollae parvae; in sterili corollae
magnae, folia parva. Floret Jun. — Septbr.

*Herba Centumnodiae, Centino-
diae, s. Sanguinariae* obsoleta

T E T R A G Y N I A.

PARIS. *Calyx* tetraphyllus. *Petala* quatuor angu-
stiora. *Antherae* filamentis medio annexae. *Bac-
ca* quadrilocularis.

P. quadrifolia LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p.
471. BAUMG. Fl. Lips. p. 219. n. 557. *Icon.*
BLACKW. Herb. tab. 286. SCHRUHR b. Hdb. t. 109.
HAYNE. III. 7.

Offic. *Herba, Baccae Paridis; Fo-
lia Solani quadrifolii, Ulvae versae*
s. vulpinae obsoleta, venenata. In nemori-
bus subhumidis frequens floret Mai. Jun.

E N N E A N D R I A.

Nulla huius classis planta indigena officinalis.

D E C A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

Dictamnus albus LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 541.

D. Fraxinella PERS. synops I. p. 464. prope Naum-
burg inque variis Thuringiae montibus calcareis

frequens obvius, apud nos ob florum formositatem in hortis colitur. Radix Dictamni albi s. Fraxinellae olim nimis celebrata postea obsoleta, recenti vero tempore iterum a STOERKIO ut anthelminticum et emmenagogum et a WILDENOWIO ut permanenter incitans commendata.

VACCINIUM. *Calyx* superus. *Corolla* urceolata aut campanulata, quadri-quinquefida: laciniis reflexis. *Filamenta* germini inserta, *Bacca* quadri-quinquelocularis, polysperma.

V. *Myrtillus*, pedunculis unifloris, foliis serratis ovatis deciduis, caule angulato. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 348. BAUMG. Fl. Lips. p. 211. n. 542. Icon. BLACKW. Herb. t. 463. HAYNE II. 7.

Per silvas umbrosas, academicam etc. Floret Maio Jun.

Offic. Baccae Myrtilli.

V. *Vitis Idaea*, racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis sempervirentibus LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 354. n. 24. BAUMG. Fl. Lips. p. 212. n. 543. Icon. HAYNE IV. 19.

In silvis, v. c. academica. Floret Maio, Jun. *Baccae* utriusque speciei uunc nonnisi ad usum diaeteticum impenduntur. Refrigerantes et subadstringentes olim in diarrhoea, Scorbuto varia forma adhibebantur.

PYROLA. *Calyx* quinquepartitus. *Petala* quinque. *Capsula* quinquelocularis, angulis dehiscens.

* *P. rotundifolia*, staminibus adscendentibus,

pistillo declinato. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 621. I. BAUMG. Fl. Lips. p. 226. n. 569. *Icon.* HAYNE IV. 21.

In silva academica cum *P. minore*, *secunda* et rarius cum *umbellata* et *uniflora*, copiose am Gesundbrunnen. Floret Jun. Jul.

Vi adstringente, amara pollet et *Herba Pyrolae* in officinis inter herbas a maioribus nostris praedicatas conditur.

DIGYNIA.

CHRYSOSPLENIUM. *Calyx* quadri-quinquefidus, coloratus. *Corolla* nulla. *Capsula* birostris, unilocularis, polysperma.

Ch. alternifolium, foliis alternis LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 637. BAUMG. Fl. Lips. p. 230. no. 580.

Crescit in subhumidis silvaticis v. c. inter pagos Gohlis et Eutritsch. Floret Martio Aprili.

Chrysosplenii s. *Nasturtii petraei* *Herba* ob vires acres vomitum molientes inter suspectas plantas referenda videtur.

SAXIFRAGA. *Calyx* quinquepartitus. *Corolla* pentapetala. *Capsula* birostris, unilocularis, polysperma.

S. granulata, foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 631. no. 50. BAUMG. Fl. Lips. p. 230. n. 581. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 56. HAYNE III. 23.

Vulgaris in pratis siccis, versuris agrorum. Floret Maio, Jun.

Saxifragae albae *Herba, Flores,*
Radix olim colligebantur.

- S. tridactylites* foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 654. no. 38. BAUMG. Fl. Lips. p. 231. no. 582.

In muris pagorum v. c. pagi Möckern, nec non in saxis, nunquam vero in pratis uliginosis in quibus BAUMGARTEN legisse affirmat inveni, in ictero, glandularum indurationibus et ulceribus laudatur. Floret Mai — Aug.

SCLERANTHUS, *Calyx* monophyllus: *Corolla* nulla. *Semina* duo, calyce inclusa.

- S. perennis*, calycibus fructus clausis LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 661. n. 2. BAUMG. Fl. p. 229. n. 578. *Icon.* SCHRUHR b. H. t. 120.

In agris arenosis v. c. am Bieniz prope Rückmarsdorf. Floret Aug. Octobr. Nomine *Polygoni cocciferi* etiam huius vires in gangraena tentarunt.

SAPONARIA. *Calyx* tubulosus, monophyllus, nudus. *Petala* quinque unguiculata. *Capsula* oblonga, unilocularis.

- S. officinalis*, calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 667. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 231. n. 584. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 113. SCHRUHR b. H. t. 121. HAYNE II. 2.

Apud nos quasi sponte v. c. an den Straßenhäusern, in hortis culta. Floret Jun. — Aug.

Pars offic. Radix Saponariae s. Saponariae rubrae. Radix 2 — 3 pedalis, vix digiti minimi crassitie, filiformis geniculata, flexuosa, ramosa, fibrosa, brunnea, rugosa interne alba solida, densa. *Qualit.* Inodora, sapore subdulci amaricante, subacri. Inest fere tertia pars extracti saponacei, pars gummosa et paucillum resinae. *Vis* resolvens, blande stimulans. *Usus,* in morbis pituitosis, imprimis abdominalibus, in ictero, hepatitide, hydrope, hypochondriaco malo, exanthematibus chronicis, morbo venereo, laudanda. *Praep. Extractum.*

DIANTHUS *Calyx* cylindricus, monophyllus: basi squamis quatuor. *Petala* quinque, unguiculata. *Capsula* cylindrica, unilocularis.

D. carthusianorum, florib. subaggregatis, squamis calycinis ovatis aristatis tubo brevioribus, involucri oblongo aristato capitulo brevioris, foliis linearibus trinerviis LINN, sp. pl. ed. WILLD. II. p. 671. n. 2.

In versuris agrorum locis apricis, collibus. Floret Juni Jul. Varietatem caulibus prostratis numerosis legi in arenosis ad pagum Litschaene. *Florum Tunicae* planta materna, qui *Aquam*, *Spiritum*, *Syrupum* et *Conservam* habeditabant et cordialia, sudorifera et alexiteria habebantur; eodem modo *D. Caryophylli* plantae ubique vulgaris hortensis petata colligebantur.

TRIGYNIA.

CUCUBALUS. *Calyx* inflatus. *Petala* quinque, unguiculata, absque corona ad faucem. *Capsula* trilocularis.

C *Behen*, calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 684. n. 1. BAUNG. Fl. Lips. p. 235. n. 595. *Icon. SCHKUH* b. H. t. 121.

Passim ad vias, locos sicciore v. c. prope Gohlis, Sellerhausen, Paunsdorf, Döben, frequens versus Thuringiam in viis et agris. Floret Jul. Aug.

Radice *Behen albi* praebuit officinis.

C. *Otites*, petalis linearibus indivisis undulatis glabris floribus dioicis, pedunculis glabris, caule paniculato W. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. 687. n. 13. *Silene Otites* PERS. synops. I. p. 497. n. 20.

Haud raro am dörren Berg, prope Merseburg et Lauchstädt ad vias in siccis elatioribus. Floret Jun. Aug.

Herba Viscaginis ob vires adstringentes a veteribus laudatur.

PENTAGYNIA.

SEDUM. *Calyx* quinquefidus. *Corolla* pentapetala. *Squamae* nectariferae quinque, ad basin germinis. *Capsulae* quinque.

S. *Telephium*, foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, caule erecto. LINN. sp. pl. ed.

WILLD. II. p. 760. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 244. n. 626. *Icon.* BLANK. Herb. t. 191.

In collibus aridis am Bieniz, in muris pagorum haud raro. Floret Jul. Aug. *Radix et Folia Telephii, Fabariae, Crassulae maioris, Fabae crassae* olim officinalia.

S. album, foliis oblongis, obtusis, terectiusculis, sessilibus patentibus, cyma ramosa Ltnn. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 766. n. 21. BAUMG. Fl. Lips. p. 245. n. 629.

In muris rarius, v. c. Merseburgi in muro portae Lipsiensis. Floret Jun. Jul.

Sedi minoris albi herba a nonnullis ad inflammationes dissolvendas imposita fuit.

S. acre foliis subovatis circumscissis gibbis erectiusculis sparsis, cymis bipartitis, foliolis calycinis circumscissis gibbis. HAYNE I. 15. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 767. n. 22. BAUMG. Fl. Lips. p. 245. n. 630. *Icon.* HAYNE l. c.

Species vulgatissima in muris, domorum tectis, locis sabulosis. Floret Jun. Jul.

Herba Sedi minoris s. Illecebræ vermiculati. Planta inodora, acerimo sapore, perennis vulgaris. Vires ei antiscorbuticas, diureticas dum recens sit nonnulli adscripserunt. Nunc etiam pulverisatum in epilepsia commendatur ad dosin granorum quindecim crescendo. In Hydrophobia adhibuerunt in Westphalia. Cf. Duisburger Anzeigen 1775. 41 St. — Westphäl. Zeitung f. Naturforscher, Oeconomen etc. 1800.

No. 22. *Sedum sexangulare* LINN. sp. pl. ed. WILLD. n. 23. quod etiam in Flora nostra in locis aridis, sabulosis rupestribus haud raro legitur acrimonia expers est, sapore nonnisi aquoso praeditum. Cf. HAYNE I. 16.

OXALIS. *Calyx* pentaphyllus *Petala* unguibus connexa. *Stamina* inaequalia, quinque breviora, exteriora basi connata. *Capsula* angulo elastice dehiscens, pentagona. *Semina* subarillata.

O. *Acetosella*, acaulis, scapo unifloro foliis longiore, foliis ternatis obcordatis, stylis longitudine staminum interiorum, radice articulata W. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 780. n. 25. BAUMG. Fl. Lips. p. 243. n. 624. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 308.

Crescit in silvaticis umbrosis v. c. im Willwisch, Rosenthal. Floret April — Jun.

O. *stricta*, caule erecto ramoso, pedunculo umbellifloro petiolis breviora, foliis ternatis obcordatis, corollis obtusis, stylis longitudine staminum interiorum, W. LINN. sp. pl. ed. WILLD. p. 800. n. 80. *Oxalis corniculata* BAUMG. Fl. Lips. p. 244. n. 625. et plurimum auctorum.

Species nobis vulgatissima, antea cum sequente commixta. Floret Jun. Aug.

O. *corniculata*, caule ramoso decumbente radicante, pedunculo subumbellato petiolis breviora, foliis ternatis obcordatis, stylis longitudine staminum interiorum. W. LINN. sp. pl. ed. WILLD.

p. 800. n. 81. — petiolis stipulatis, foliis petalis emarginatis erosus HOFFM. Fl. germ. ed. 1800. p. 210.

In cultis hortorum suburbanorum passim, imprimis in Bosiano. Floret Aprili, Septbr. Planta rara quam ne Germaniae indigenam censuit cel. WILLDENOW. Florae Halensi deest; cel. HOFFMANN Austriam et Hanoviam in Germania patriam indicat.

Herba Acetosellae recens s. *Herba Lujulae* ad praeparandum acidum oxalicum quaeritur, ad conservam refrigerantem et acetariam planta aptissima.

AGROSTEMMA. *Calyx* monophyllus, coriaceus, *Petala* quinque, unguiculata: limbo obtuso, indiviso, *Capsula* unilocularis.

A. *Githago*, hirsuta, calycibus corollam aequantibus petalis integris nudis LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 805. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 240. n. 614,

Inter segetes. Floret Jun. Jul.

Herba Nigellastri s. *Githaginis* et *Semen Lolii officinarum* ab hac planta originem duxerunt.

LYCHNIS. *Calyx* monophyllus, oblongis, laevis. *Petala* quinque, unguiculata: limbo subbifido. *Capsula* quinquelocularis.

L. *silvestris*, calyce decemcostato enervi, petalis subbifidis, capsulae unilocularis apicibus recurvatis, foliis ovato-lanceolatis cauleque hirsutis. SPRENG. Fl. Hal. p. 138. n. 523. L. *diurna*.

HOFEM. Fl. Germ. III. p. 211. n. 3. *Icon.*
 SCHRUHR. b. H. t. 124. Flores rubelli. *L. dioica*
 flore rubro. LINN.

Habitat in silvaticis, fruticetis v. c. prope
 Lindenau ad viam, prope Leutsch, im verschlos-
 senen Holze. Floret Jun. Jul.

L. arvensis, calyce decemcostato, femineo nervo-
 so, petalis bifidis, capsulae unilocularis apicibus
 erectis, foliis lanceolatis cauleque molliter pubes-
 centibus. *L. pratensis*. SPRENG. Fl. Hal. p. 138. n.
 529. *L. vespertina*, HOFEM. Fl. Germ. III. p. 211.
 n. 4. *L. dioica*. Fl. albo. LINN.

Icon. SCHRUHR. b. H. t. 124. HAYNE. II. t. 3.

In agrorum versuris, arvis, apricis. v. c.
 prope Pfaffendorf ad sepes, Connewitz etc.
 Floret Jun. Jul.

Offic. Radices Saponariae albae
 olim colligebantur a *L. arvensi* quam cum *L.*
silvestri unam eandemque speciem esse puta-
 bant.

SPERGULA. *Calix* pentaphyllus. *Petala* quinque
 integra. *Capsula* ovata, unicularis, quinquevalvis.

S. pentandra, foliis verticillatis, floribus subpen-
 tandris, seminibus margine albo-membranaceis.
 PERS. Synops. I. p. 522. n. 2. LINN. sp. pl. ed.
 WILLD. II. p. 318. n. 2.

In agris, collibus aridis, prope Guldengossa,
 Düben etc. Floret Aprili, Maio.

Semen nuper commendatum ad oleum de-
 stillandum quod in phtisi laudatur.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

LYTHRUM. *Calyx* duodecim dentatus. *Petala* sex, calyci inferta. *Capsula* bilocularis, polysperma.

L. Salicaria, foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 855. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 247, n. 633. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 520. HAYNE. III. 39,

Planta riparia vulgaris, adstringens, roborans, in diarrhoeis, dysenteriis malo hypochondriaco salubrem arbitrati sunt. Nomen officinale est: *Herba* et *Radix Salicariae* s. *Lysimachiae purpureae*. Floret Jul. Aug.

DIGYNIA.

AGRIMONIA. *Calyx* quinquedentatus, altero obvallatus. *Petala* quinque. *Semina* duo, in fundo calycis.

A. Eupatoria, fructibus hispidis, foliis caulinis pinnatis, foliolis oblongo-ovatis, spicis elevatis, petalis calyce duplo longioribus. AIR. — LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 875. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 248. n. 635. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 21. SCHRUHR. bot. Hdb. t. 128. HAYNE. II. 19.

In graminosis, siccis, aridis, elatioribus. Floret Jun. Aug. Haec etiam inter adstringentia,

roborantia, vulneraria, pellentia; diaphoritica, locum obtinuit.

TRIGYNIA.

RESEDA. *Calyx* monophyllus, quadri — sex partitus. *Petala* laciniata. *Capsula* ore dehiscens, unilocularis. *Semina* reniformia.

R. Luteola, foliis lanceolatis integris basi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 876. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 249. n. 636. Icon. BLACKW. Herh. t. 283. SEBENPHER. b. H. t. 129.

In viis, ruderalis, v. c. prope Eutritsch, Connewitz, am Thonberg, Stoetteritz etc. Floret Jun. Jul. *Herba* et *Flores Resedae Luteolae* olim officinales nobis nonnisi tinctorii.

EUPHORBIA. *Calyx* monophyllus, ventricosus. *Corolla* tetra - penta petala, calyci insidens. *Capsula* trilocca.

Obs. Species omnes lacte acerrimo praeditae a nonnullis ad verrucas delendas adhibito. Crescunt in Flora nostra ex vastissimo hoc genere species haec:

E. Peplus, umbella trifida: dichotoma, involucri ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 903. n. 68. BAUMG. Fl. Lips. p. 250. n. 640.

Habitat in cultis, oleraceis. Flor. Aug. Sep. Venenata uti sequentes, saepius ejus radix cum

illa E. Esulae commixta occurrit. Succus lac-
tem roseo tingit colore.

E. exigua, umbella trifida: dichotoma, involu-
cellis lanceolatis, foliis linearibus. LINN. sp. pl.
ed. WILLD. II. p. 908. n. 70. BAUMG. Fl. Lips.
n. 641.

Var. α . acuta. β . retusa.

Occurrit in agris haud rara v. c. hinter
dem Bienitz, prope Connewitz etc. versus
Thuringiam frequentissima, viribus a praece-
dente non differt. Floret Jul. Aug.

E. dulcis, umbella quinquefida, bifida involu-
cellis subovatis denticulatis, foliis lanceolatis obtu-
sis apice denticulatis, foliis lanceolatis obtusis
apice denticulatis, capsulis verrucosis pilosis W.
— LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 909. n. 85.
BAUMG. Fl. Lips. p. 251. n. 643.

In nemorosis, iuprimis prope Leutsch. im
verschlossnen Holze, prope Connewitz et in sil-
va academica. Floret Maio — Junio.

Mitissima inter affines, sapore subdulci.

E. helioscopia. umbella quinquefida: bifida:
dichotoma, involucellis obovatis, foliis cunei-
formibus serratis glabris, capsulis laevibus LINN.
sp. pl. ed. WILLD. II. p. 914. n. 98. BAUMG. Fl.
Lips. p. 251. n. 644. *Icon.* HAYNE. II. t. 20.

In agris, hortisque copiosa. Floret Jul. Ang.
Radix, cortex Radicis, et Herba Esu-
lae s. Tithymali olim officinalia.

- E. platyphyllos*, umbella quinquedda: trifida: dichotoma, involucris carina pilosis, foliis serratis lanceolatis, capsulis verrucosis LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 918. n. 109. BAUMG. Fl. Lips. p. 252. n. 645.

In agris lapidosis pagisque am durren Berg, in Thuringia vulgaris. Floret Aug. Septbr.

- E. Esula*, umbella multifida: bifida, involucellis subcordatis, petalis subbicornibus, ramis sterilibus, foliis uniformibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 919. n. 111. BAUMG. Fl. Lips. p. 252. n. 646. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 163. HAYNE II. 21.

Rarior apud nos, ad coemeterium prope Taucha et in via qua oppidum Sckenditz intramus. Floret Jul. Aug.

Etiam haec species *Radicem*, *Corticem Radicis* et *Herbam Esulae* s. *Tithymali* praebuit.

- E. Cyparissias*, umbella multifida: dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus, foliis setaceis, caulinis lanceolatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 920 u. 113. *Icon.* HAYNE II. 22.

Vulgaris ad vias, inque locis elatis, pascuis ab urbe paulo remotioribus, v. c. prope Taucham, Merseburgum etc. etiam ad silvae marginem prope Raschwitz, et am Bieniz. Floret Mai — Jul.

Offic. Radix et Cortex Radicis Esulae minoris.

E. palustris, umbella multifida, subtrifida: bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis sterilibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 922. n. 116. BAUMG. Fl. Lips. p. 253. n. 648., petalis truncatis, subpeltatis HAYNE. *Icon.* HAYNE II. 23.

Planta rarior, v. c. am Bieniz in pratis prope Kleindölzig. Floret Maio, Jun.

Offic. Radix Esulae maioris, cortex Radicum et Herba Esulae.

Usus harum Euphorbiarum partium ad emensin drasticasque purgationes creandas iure meritoque obsolevit, interdum loco corrosivorum et vesicantium adhibentur.

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM *Calyx* novem-duodecimpartitus. *Petala* duodecim. *Capsulae* duodecim, polyspermae.

S. tectorum, foliis ciliatis, propaginibus patulis, floribus dodecandris dodecagynis: nectariis cuneiformibus carunculatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 932. n. 5. BAUMG. Fl. Lips. p. 253. n. 649. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 366.

In pagorum muris tectisque domorum imprimis stramineis natum, succo acido-austero, aquoso, acriusuclo repletum ob vires adstringentes, refrigerantes in febribus, dysenteria, aphitis, ambustis laudatur. Floret Jun. Jul.

S. globiferum, foliis ciliatis, propaginibus glo-

bosis. LINN. sp. pl. ad. WILLD. II. p. 932. n. 6.

In muro ad cauponem pagi Döliz. Floret Jul. Aug. Qualitatibus forte iisdem praeditum ac altera species. Primus invenit Past. FREGE.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

PRUNUS. *Calyx* quinquefidus, inferus. *Petala* quinque. *Drupae* nux suturis prominulis.

P. Padus, floribus racemosis, racemis pendulis, foliis deciduis duplicato-serratis subrugosis, petiolis biglandulosis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 984. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 256. n. 652.

Loc. natal. In omnibus fere Florae nostrae silvis sepibusque hortorum rusticanorum vulgaris. Floret Aprili, Maio.

Pars offic. *Cortex* olim et *Flores* et *Baccae Padi* s. *Cerasi racemosi silvestris*. *Qualit.* Cortex recens amygdalarum amararum odorem spirat, sapore est aromatico, amaro. Similia insunt ac Lauroceraso principia unde et vires patent. *Usus.* Ad spasmos doloresque e vis sensiferae irregulari distributione,

ortos in cardialgia commendant. Praeterea et in febribus intermittentibus morboque venereo adhibuerunt. Infusum spirituosum decocto iunctum roborans, sedans, antispasticum, itaque etiam in anthritide et rheumatismis diuturnis commendandum. *Praep. Aqua destillata. Extractum.*

P. avium, umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis subtus pubescentibus conduplicatis LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 991. n. 19. BAUMG. Fl. Lips. p. 258. n. 655. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 425.

In silvis nemoribusque. Floret Mai. Jun. Hujus, *Pr. Cerasi* et *Pr. domesticae*. LINN. speciosae varietatis apud nos cultae *Fructus* et *Nucleos* exhibuerunt officinales ad varia praeparata.

P. spinosa, pedunculis solitariis, foliis elliptico-lanceolatis subtus pubescentibus, fructibus rectis. ramis spinosis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 997. n. 32. BAUMG. p. 260. n. 658. *Icon.* SCHKUR. b. H. 132.

Frutex notissimus, vulgatissimus in agrorum versuris, ad margines silvarum. Floret Aprili Maio.

Corticem praebet, *Flores*, *Fructus* et *Nucleos*, *Acaciae nostratis* s. *germanicae* s. *vulgaris* s. *Prunoli silvestris*. Corticem delibrabant ob vires adstringentes, Flores ad infusum theiforme gratum, leniter diaphoreticum laxans et fructus refrigerandi causa collegerunt.

DIGYNIA.

CRATAEGUS. *Calyx* quinquefidus. *Petala* quinque. *Drupa* infera, di — pentasperma. *Semina* ossea.

G. *Oxyacantha*, foliis obtusis subtrifidis serratis glabris, floribus digynis. pedunculis calycibusque subglabriusculis calycinis segmentis lanceolatis acutis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1005. n. 16. BAUMG. Fl. Lips. p. 267. n. 660. *Icon.* BLACW. Herb. t. 149,

Sat vulgaris in silvis, sepibus pratorum marginibus. Floret Maio, Jun. *Offic. Oxyacanthae* s. *Spinæ albae Folia*, *Flores* et *Baccæ* absoleta.

C. *monogyna*, foliis acutis subtrifidis, serratis glabris, floribus monogynis, pedunculis calycibusque subpubescentibus, calycinis segmentis lanceolatis acuminatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1006, n. 17.

Praecedenti rarior occurrit in dumetis, locisque montanis, in serto cum varietate floribus rubris. Floret Mai. Jun. In officinis et huius partes collectae prostabant, baccas inprimis utraque suppeditat species farinosas, alimentosas, nuper etiam cum reliquarum specierum illis ad panem exinde conficiendam commendatas.

TRIGYNIA.

SORBUS. *Calyx* quinquefidus. *Petala* quinque. *Bacca* infera, trisperma.

S. aucuparia, foliis pinnatis utrinque glabris.

LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1003. n. 1.

BAUMG. Fl. Lips. p. 261, n. 661. Icon. BLACKW.

Herb. t. 173.

in silvis, ad pagos, in muris. Copiosa in
silva Lindenthalensi. Floret Mai. Jun.

Sorbi Aucupariae Baccæ olim of-
ficinales. Succus adstringens, purgans.

P E N T A G Y N I A.

MESPISUS. *Calyx* quinquefidus. *Petala* quin-
que, *Bacca* infera, pentasperma.

M. germanica, inermis foliis lanceolatis subtus
tomentosis, floribus sessilibus solitariis LINN. sp.
pl. ed. WILLD. II. p. 1010. n. 1. BAUMG. Fl.
Lips. p. 262. n. 663.

In silvis et fruticetis, v. c. in silva academi-
ca, prope Abtnaundorf etc. Floret Mai. Jun.

Mespili Fructus et *Semina* ob qua-
litatem austeram, farinosam, vimque refrige-
rantem adstringentem antea officinalia.

PYRUS. *Calyx* quinquefidus. *Petala* quinque.
Pomum inferum, quinqueloculare, polyspermum.

P. Malus, umbellulis sessilibus, foliis ovato-ob-
longis acuminatis serratis glabris, unguibus ca-
lyce brevioribus, stylis glabris. LINN. sp. pl. ed.
WILLD. II. p. 2017. n. 9. BAUMG. Fl. Lips.
p. 264. n. 667. Icon. BLACKW. Herb. t. 178.

In silvis Var. *silvestris* vulgaris. Floret Maio.

Fructus s. *Poma acidula* pauperes colligunt ad potum inde coquendum quem aegrotis porrigunt.

SPIRAEA. *Calyx* quinquefidus. *Petala* quinque. *Capsulae* polyspermae.

S. *Aruncus*, foliis supradecompositis, spicis paniculatis, florib. diocis LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1060. n. 15. SCHWAEGRICH. Topogr. Spec. IV. p. 8.

Ad ripam Muldae australem infra oppidum Grimmam. Floret Mai—Jul. *Radix, Folia et Flores Barbae Capri* olim officinalia.

S. *Filipendula*, foliis pinnatis, foliolis uniformibus serratis, caule herbaceo, florib. corymbosis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1061. n. 16. BAUMG. Fl. Lips. p. 267. n. 673. Icon. BLACKW. Herb. tab. 467.

In pratis siccis elatioribus am Bieniz, Gesundbrunnen etc. Floret Jun Jul. *Radix Filipendulae* s. *Saxifragae rubrae* in officinis dicta viribus nutrientibus, adstringentibus haud expers est, secundum veterum scripta vulneraria, lithonriptica dicitur.

S. *Ulmaria*, foliis pinnatis subtus tomentosis, impari maiore trilobo, lateralibus indivisis, corymbis proliferis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1061. n. 17. BAUMG. Fl. Lips. p. 268. n. 674. Icon. BLACKW. Herb. t. 465.

In pratis humidis, silvaticis umbrosis, fere ubique. Floret Jun. Jul.

Flores Caprinae s. Ulmariae infusum praebent theiſotme leniter diaphoreticum, bene ſapidum, ſicut folia iuniora. *Radix* adstringens.

P O L Y G Y N I A.

ROSA. *Petala* quinque. *Calyx* urceolatus, quinqueſſidus, carnosus, collo coarctatus. *Semina* plurima, hispida, calycis interiori lateri affixa.

R. villosa, tubo calycis globoso pedunculisque hispidis, caule aculeis magnis rectiusculis horrido, foliolis ellipticis duplicato-glanduloso-seratis petiolisque aculeatis, undique tomentosus. WALLR. ann. bot. p. 61. n. 129. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II p. 1069. n. 12. BAUMG. Fl. Lips. p. 271. n. 680.

Crescit verſus Thuringiam ubique in locis elatis, rupeſtribus, ad ſilvarum margines, prope Grätzſch et Pegaviam vulgaris, in ſilva academia hinter der Förſterwohnung praeterito anno reperi. Floret Jun. Jul.

Fructus Cynosbati in officiis proſtant.

R. canina, tubo calycis ovato pedunculisque ſubſolitariis glabris, aculeis caulinis aduncis, foliolis ovatis acuminatis glaberrimis. WALLR. ann. bot. p. 67. n. 154. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1077. n. 51. BAUMG. Fl. Lips. p. 274. n. 686. Icon. BLACKW. Herb. t. 8.

Inter Rosas Florae noſtrae ſpecies vulgaſiſſima, creſcit cum *R. rubiginosa* LINN. in

locis siccioribus, in viis ad sepes, agrorum ver-
suras, silvarum margines etc. Floret Jun. Jul.

*Flores Rosae silvestris s. rubrae
vulgaris et Fructus Cynosbati* ab hac
quoque specie originem duxerunt.

RUBUS. *Calyx* quinquefidus. *Petala* quinque.
Bacca composita acinis monospermis.

R. *Idaeus*, foliis quinato-pinnatis ternatisque,
caule aculeato petiolis canaliculatis. LINN. sp.
pl. ed. WILLD. II. p. 1081. n. 4. BAUMG. Fl. Lips.
p. 276. n. 689. R. caule tereti aculeato, aculeis
rectis, foliis quinato-pinnatis ternatisque subtus
tomentosis, petiolis canaliculatis. HAYNE III. 8.
Icon. BLACKW. Herb. t. 289. HAYNE l. c.

In silvaticis umbrosis v. c. prope Leutsch,
Lindenthal, in silva academica sponte obuius,
in hortis cultura emendatus frutex floret Maio.
Junio.

*Aquam, Syrupum, Acetum, Spiri-
tum, Gelatinam* praebet sapore et vi refrige-
rante aegrotis gratissima.

R. *caesius*, foliis ternatis subnudis: lateralibus
bilobis, caule aculeato tereti. LINN. sp. pl. ed.
WILLD. II. p. 1084. n. 12. BAUMG. Fl. Lips. p.
277. n. 690. R. caule tereti aculeato caesio-prui-
noso, aculeis recurviusculis, foliis ternatis pu-
bescentibus, calyce glanduloso-pubescente, pe-
talis obovatis emarginatis. HAYNE III. 9. *Icon.*
SCHKUHR. b. H. t. 135. HAYNE. l. c.

In agris, agrorum limitibus, locis silvaticis.
Floret. Jun. Jul.

R. nemorosus, caule tereti aculeato villosa, aculeis subrectis, foliis villosis, caulium sterilium quinatis fructificantium ternatis, calyce glanduloso-pubescente, petalis ovatis integris emarginatisque. HAYNE. III. 10.

In dumetis, fruticetis, silvarum humidarum marginibus. Haud raro ad silvam prope Lindenthal. Floret Jun. Jul.

R. corylifolius, caule quinquangulati aculeato subglabro, aculeis recurvis, foliis quinatis ternatis simplicibusque villosis, calyce subglabro fructifero inflexo, petalis obovatis integris. HAYNE. III. 11. WILLD. Enum. hort. Berol. p. 550. n. 12. *Rubus fruticosus* BOEM. Lips. n. 448. BAUMG. Fl. Eips. p. 277. n. 691. Icon. BLACKW. Herb. tab. 45.

In silvaticis prope Lindenthal. am Bienitz, in silva academica. In pratorum agrorumque marginibus v. c. am Berge, prope Abtnaundorf. Floret Mai — Jul. Plerumque hanc speciem habuerunt pro *R. fruticoso*, LINN. nondum a me certe in Flora nostra lectum, qui differt: caule quinquangulati aculeato leviter tomentoso, aculeis recurvis, foliis quinatis ternatis simplicibusque supra glabris subtus tomentosis, calyce leviter tomentoso reflexo, petalis obovatis integris. HAYNE. III. 12. Habitat in Germania australi, Helvetia, Anglia, ad sepes, in fruticosis,

Baccac fruticum horum vulgarium s. *Morae Rubi* olim etiam ad usum officinalem, interdum cum *Radibus* et *Foliis Rubi* colligebantur.
 FRAGARIA. *Calyx* decemfidus. *Petala* quinque. *Receptaculum* seminum ovatum, baccatum, deciduum,

F. vesca, calyce fructus reflexo, pubescentia petiolorum patentissima, pedunculorum adpressa. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1090, n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 279. n. 695. *F. laciniis* calycis fructiferi reflexis, pilis petiolorum divergentibus, pedunculorum patentibus, pedicellorum adpressis. HAYNE. IV. 26. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 77. HAYNE. l. c. Sporophorum (*Receptac.* aliis) subglobosum albidum aut puniceo - sanguineum deciduum carnosum baccatum.†

In silvaticis, pratis, versuris agrorum. Floret April, Mai.

F. semperflorens, laciniis calycis fructiferi pilisque petiolorum divergentibus, pedunculorum patentibus, pedicellorum adpressis. HAYNE. IV. 25. *F. vesca*. γ. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1091. (Sporophorum baccatum ovato-conicum, sanguineum seminibus maturis flavis.)

In montanis passim. Floret a Maio — Octbr.

F. collina, Ehrh. calyce fructus erecto conniventi, pubescentia foliorum erecta, petiolorum patentissima, foliis utrinque pubescentibus apice conniventi-serratis. WALLR. ann. bot. p. 70. n. 138. *F. laciniis* calycis fructiferi erectis, pi-

lis petiolorum divergentibus, pedunculorum plerumque divergentibus, pedicellorum plerumque patentibus. HAYNE. IV. 30. (Sporophorum oblongo-globosum carnosum, baccatum, duriusculum, subpersistens.)

Am Bieniz, in collib. apricis rarius. Floret Mai. Jun. Utraque species potius vero cultae Fr. *elatio* LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1091. n. 2. et sp. sequens: F. *virginiana* ob fructus grato sapore praeditos notissimae. Baccae ob vim diureticam, diaphoreticam in febribus, arthritide, melancholia, mania etiam a veteribus magni aestimatae sunt, nec non ad *Syrupum*, *Aquam* et *Acetum* parandum consumtae. Infusum theiforme gratum praebent folia iuniora.

POTENTILLA. *Calyx* decemfidus. *Petala* quinque. *Semina* subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsucco affixa.

P. *Anserina*, foliis interrupte pinnatis sericeis, foliolis argute serratis, caule repente, pedunculis unifloris, LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1095. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 280. n. 697. *Icon*. HAYNE. IV. 31,

In pascuis ad fossas viaticas frequens. Floret Jun. Jul. *Anserinae* s. *Potentillae* *Radix* et *Herba* veteribus officinalia, adstringentia.

P. *reptans*, foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1108. n. 34. BAUMG. Fl. Lips. p. 282. n. 705.

Icon. BLACKW. Herb. t. 454. SCHKUHR. b. H. t. 136, HAYNE. IV. 52.

In pascuis, ad vias in humidiusculis.

Radix et Herba Pentaphylli s. Quinquifolii. Ob adstringendi vim sicut praecedentis adhibuerunt in dysenteria, leucorrhoea.

TORMENTILLA. *Calyx* octofidus. *Petala* quatuor. *Semina* subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsucco affixa.

T. erecta, caule erectiusculo, foliis sessilibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1112. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 278. n. 694. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 445. HAYNE II. 48.

In pratis humidiusculis v. c. prope Schönfeld, im Rosenthale etc. *Radix* geniculata, superne squamosa, digitum fere crassa, externe fusca, interne rosea, sapore styptico, odore vix ullo; caules plures, debiles erecti, interdum adscendentes, rubramosi pedales; Folia radicalia petiolata; caulina sessilia, alterna quinata-septenata; foliola ovato-lanceolata, serrata s. incisodentata, subtus pubescentia; pedunculi elongati, filiformes, uniflori, axillares; corollae flavae.

Radix olim et *Herba Tormentillae* ubi adstrictione vasorum opus sit inprimis externe aptissime adhibenda, quum principio adstringente inter omnes fere indigenas exoticasque maxime abundaret. Praeparantur ex ea *Pulvis*, *Aqua*, *Essentia* et *Extractum*.

GEUM. *Calyx* decemfidus. *Petala* quinque. *Semen* arista geniculata.

G. urbanum, florib. erectis, aristis uncinatis nudis, foliis caulinis ternatis, radicalibus lyrato-pinnatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 115. n. 5. BAUNG. Fl. Lips. p. 282. n. 701. *Icon* BLACKW. Herb. t. 255. SCHRUBR b. H. t. 137. HAYNE IV. 53.

Radix perennis, vix digitum minimum crassa, fibris crassioribus subramosa, externe fusca, interne flavescens; caulis erectus, angulatus, hirsutus, villosus, supra ramosus viridis, basi simplex, fuscus, 1 — 3 pedalis; folia radicalia petiolata, impari pinnata; foliola basi decrescentia; terminalia maxima; singula ovata, subacuta, inciso-dentata, rugosa, subhirta; caulina alterna, ternata aut profunde triloba; suprema subsimplicia, lanceolata; stipulae magnae, ovata-rotundae, amplexicaules, profunde inciso-dentatae, sessiles, pedunculi terminales, elongati, filiformes, hirsuti; flores parvi, erecti petalis flavis; calyx laciniis reflexis; semen ovatum pubescens, aristatum, arista nuda uncinata; receptaculum ovale.

Loc. natal. In locis silvaticis umbrosis copiosissime im Rosenthal; deinde in pagis vicinis fere omnibus ad sepes hortorum et vias. Floret Maio — Jul.

Pars offic. *Radix Gei urbani* s. *Caryophyllatae*. *Qualit.* Graveolens, grata, caryophyllos redolens, sapore austero, amari-

cante aromatico, inprimis vernali tempore. Praeter extractum resinosum et gummosum etiam oleum aethereum inest cum principio adstringente.

Vires. Medicamentum egregium roborans, adstringens, sudoriferum, antifebrile. *Usus.*

Quotidie fere ordinatur aptissime in febribus intermittentibus aliisque ex atonia abdominali originem ducentibus morbis, corticis peruviani vires aemulans.

Præparata extant: *Pulvis*, *Essentia*, *Extractum*. Cf. BUCHHAVE observat,

circa Gei urbani s. Caryophyllatae vires. Hafniae 1781. 8. *Anjou* de rad. Carophyllat. Gött. 1783.

G. rivale, floribus nutantibus, petalis longitudine calycis, aristis plumosis medio tortis.

LINN. spec. pl. ed. WILLD. II. p. 1115. n. 5.

Geum nutans. BAUMG. Fl. Lips. p. 282

n. 705. *Icon.* HAYNE IV. 34.

Crescit copiose in silvaticis umbrosis prope Leutsch, Connewitz, Zschochier, im Rosenthal, et in pratis uliginosis et alnetis prope Schönfeld et Burghausen. Floret Jun. Jul.

Etiam huius radix nomine: *Radiciis Gei rivalis* s. *palustris*, *Caryophyllatae aquaticae* s. *Benedictae silvestris* febrifuga laudatur, apud nos non effoditur. Cf. KALM Resa til Norra-America. {Stockh. 1735.

T. I. p. 450.

COMARUM. *Calyx* decemfidus. *Petala* quinque, calyce minora. *Receptaculum* seminum ovatum, spongiosum, persistens.

C. palustre. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1119.
BAUMG. Fl. Lips. p. 283. n. 706.

Planta haud vulgaris elegans in pratis uliginosis prope Schoenfeld. Jun. Aug. florens, radicem habet adstringentem. *Herba Comari palustris s. Pentaphylli aquatici* obsoleta.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

Actaea spinata. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1159. n. 1. in montibus calcareis v. c. in Thuringia saepius, nunquam vero in silva academica BAUMG. Fl. Lips. p. 287. n. 713, a me lecta, planta acris venenata.

CHELIDONIUM. *Corolla* tetrapetala. *Calyx* diphyllus. *Siliqua* unilocularis, linearis. *Dissepimentum* nullum. *Semina* plurima cristata, *Ch. maius*, pedunculis umbellatis LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 114. n. 1. BAUMG Fl. Lips. p. 287. n. 712. *Icon*. BLACKW. Herb. t. 91. SCHKUHR b. H. t. 140. HAYNE IV. 6.

Planta vulgatissima in ruderatis, muribus, cultis. Floret Mai — Aug. *Pars offic. Radix*, *Herba et Flores chelidonii maioris*. *Qualit.* Radix digiti crassitie odore mucido,

gravi, sapore amaro acri; fusca, fibrosa, intus alba et sicuti tota planta succo acri, spisso, aurantio lactescens. *Vires.* Resolvens, diuretica, diaphoretica. *Usus.* In morbis abdominalibus remedium salubre, v. c. in ictero, hydrope, deinde in cutaneis inprimis in exanthematibus chronicis interdum ex atonia abdominali ortis aut per eam prolongatis, nec non in syphilide. Externe applicata herba dissolvens. *Praeparata. Extractum s. succus inspissatus.*

PAPAYER, *Corolla* tetrapetala, *Calyx* diphyllus
Capsula unilocularis, sub stigmate persistente
poris dehiscens.

P. Rhocas, capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II, p. 1146. n. 5. BAUMG. Fl. Lips. Icon. BLACKW. herb. t. 2.

In agris inter frumenta et legumina obvia planta vulgaris, Jun. — Aug. florens.

Pars offic. Flores et olim *Herba Papaveris Rhoeadis s. erratici.* *Qualit.* Narcoticum principium prodit odor, partibus resinosis inhaerens; Sapor mucilaginosus, amarus. *Syrupus, Aqua* destillata et *Conserva* passim adhuc praescripta vi subanodyna praedita, inprimis colore amoeno se commendant.

P. dubium, capsulis oblongis glabris, caule multifloro setis adpressis, foliis pinnatifidis incisis

LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1146. n. 6.
BAUMG. Fl. Lips. p. 285. n. 710.

In agris sterilioribus, nec raro cum praecedente cui et viribus simillimum videtur. Floret Jun. Jul.

P. somniferum LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1147. n. 7. Apud nos cultum. Opium inde conficere nobis insolitum, et forte ineptum, quum eius vis etiam a climate pendeat.

NYMPHAEA. *Calyx* tetra-pentaphyllus. *Corolla* polypetala: petala et Stamina receptaculo, germen circumdanti, subgloboso insidentia. *Nectarium* glandula in stigmatis centro. *Bacca* receptaculo cincta, multilocularis, loculis polyspermis.

N. alba, foliis cordatis integerrimis, lobis imbricatis rotundis LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1152. n. 3. BAUMG. Fl. Lips. n. 718. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 498. 499. SCHKUH. bot. H. t. 142. HAYNE IV. 35.

Cum *N. lutea* rarius, v. c. in piscina im Gauchschen Garten, prope Raschwitz in Plissa, etc.

Utriusque Radices et Flores inter officinalia remedia antea militantes nunc obsoleta. Inprimis huius *Radices* et *Flores Nymphaeae* s. *Nenupharis* colligebantur.

NENUPHAR. *Calyx* penta-hexaphyllus inferus. *Corolla* polypetala; petala et stamina receptaculo depresso germi substructo insidentia.

Nectarium petalorum densum glandulosum.

Bacca multilocularis, loculis polyspermis.

N. lutea, foliis cordatis integerrimis, lobis approximatis, calyce pentaphyllo petalis longiore.

Nymphaea lutea. LINN. sp. pl. ed. WILLD.

II. p. 1151. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 289. n. 717.

Icon. BLACKW. Herb. tab. 497. 499. et 500. *Nenuphar lutea*. HAYNE IV. 36. Calyx pentaphyllus, stigma repando 14 — 20. radiatum, bacca laevis.

In stagnis, paludibus floret Jun. Jul.

TILIA. *Corolla* pentapetala. *Calyx* quinquepartitus. *Capsula* coriacea globosa, quinquelocularis, quinquevalvis, basi dehiscens, monosperma.

T. parvifolia, foliis subdimidiato-cordatis glabris, subtus venarum alis barbatis, petiolis dimidiam folii longitudinem superantibus, floribus

nectariis destitutis, pedunculis multifloris, fructibus laevibus obliquis. HAYNE. III. 46. HOFFM.

Fl. Germ. III. p. 242. *T. microphylla*. WILLD.

Enum. hort. Berol. p. 565. n. 2. *T. europaea*. ?

sp. pl. p. 1161. *Icon.* HAYNE. I. c.

In silvis, ambulacris, ad pagos. Floret Julio.

T. vulgaris, foliis subdimidiato cordatis glabris venarum alis subtus barbatis, petiolis dimidia

folii longitudine brevioribus, floribus nectario destitutis, pedunculis multifloris, fructibus sublaevibus regularibus. HAYNE. III. 47. *Icon.* HAYNE. I. c.

In silvis, ad oppida, pagos. Floret Jun. Jul.

T. pauciflora, foliis subdimidiato-cordatis villosopubescentibus venarum alis subtus subbarbatis, floribus nectario destitutis, pedunculis plerumque trifloris, fructibus costatis. HAYNE. III. 48.

T. grandifolia, HOFFM. Fl. Germ. III. p. 242. Icon. HAYNE. I. c.

Apud nos quasi sponte in ambulacris, v. c. an der Wasserkunst etc. Sponte in Bohemia, Carniolia. Floret Julio. Hanc varietatem esse cultura ortem *T. europaeae* (*parvifoliae*) putat cel. PERSOON.

Arbores notissimae eximiae, in silvis fere omnibus obviae ibi plerumque non arborescentes sed fruticosae. A pluribus auctoribus commixtae et pro varietatibus speciei unius: *T. europaeae* LINN. habitae, sed nunc a cel. HAYNE. optime distinctae sunt.

Flores Tiliae infusum theiforme leniter diaphoreticum et *Aquam* destillatam suppeditant. *Cortex* interior aqua frigida maceratus exhibet copiam mucii puri ad leniendos tumores, imprimis haemorrhoidales aptissimi.

HELIANTHEMUM. *Calyx* laciniis saepius inaequalibus: duabus extimis minoribus. *Capsula* unilocularis trivalvis, medio septiferis.

H. vulgare, suffruticosum procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilosis, subtus incauis. PERS. Synops. II. p. 79. n. 69,

Cistus Halianthemum LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1209. n. 72. BAUMG. Fl. Lips. p. 288. n. 251.

In pratis elatioribus siccis v. c. am Bieniz et prope Rögliz. Floret Jun. — Aug. *Herba Helianthemum* s. *Chamaecisti vulgaris* inter officinalia olim remedia relata.

DIGYNIA.

Paeoniae officinalis LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1221. n. 1. plantae ob flores speciosos ubique cultae. *Radice*m vix adhuc in officinis asservatam invenimus. Petala viribus illis Papaveris Rhoeadis subsimilia.

TRIGYNIA.

DELPHINIUM. *Calyx* nullus. *Petala* quinque. *Nectarium* bifidum, postice cornutum. *Siliquae* tres s. una.

D. *Consolidā*, nectariis monophyllis, caule subdiviso. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 126. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 290. n. 720. *Icon.* BLACKW. Herb. tab, 26.

Planta arvensis, communis. Floret Jun. Jul. Etiam sponte flore pleno legi prope Dornburg in agro Jenensi. *Herbam* et *Flores Consolidae regalis* s. *Calcatrippae* suppeditabat hodie vix officinales.

Aconitum neomontanum. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1236. n. 9. in hortis vulgare. Prin-

cipio acri, viribus dissolventibus, diureticis, diaphoreticis praestans. Cf. STOERK. libell. de Stramonio, Hyoscyamo et Aconito. Wien. 1762. in lingu. vernac. transl. Zürich. 1763.

Annot. Hyperica trigyna v. Pentagynia.

P E N T A G Y N I A,

Aquilegia vulgaris. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1245. n. 2. apud nos nonnisi culta et quasi spontanea, in vicinis Thuringiae regionibus revera spontanea, suspecta, temulentata, obsoleta.

NIGELLA. *Calyx* nullus. *Petala* quinque. *Nectaria* quinque, trifida, intra corollam. *Capsulae* quinque, connexae.

N. arvensis, pistillis quinis, petalis integris, capsulis turbinatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1248. n. 3. BAUMG. Fl. Lips. p. 292. n. 725,

Passim inter segetes occurit. In Thuringia vulgaris. Floret Jul. Aug.

Semen acre aromaticum saepius cum illo *N. sativae* commixtum est.

HYPERICUM. *Calyx* quinquepartitus: laciniis subovatis aequalibus. *Petala* quinque. *Filamenta* multa, in quinque phalanges basi connata. *Capsula* subrotundata: loculis numero styliorum.

H. quadrangulare, florib trigynis, caule quadrangulo herbaceo, foliis pellucido-punctatis, foliolis calycinis lanceolatis. LINN. sp. pl. ed.

WILLD. III. p. 1459. n. 58. BAUMG. Fl. Lips. p. 425. n. 1016.

In nemoribus humidiusculis, alnetis. v. c. prope Barneck, am Bieniz, prope Schönfeld etc. Floret Julio. Aug.

H. perforatum, floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pallucedo. punctatis, foliolis calycinis lanceolatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1460. n. 60. Icon. BLACKW. Herb. t. 15.

In pratis, versuris agrorum, apricis. Floret Jun. — Aug.

Offic. Ab utraque specie colligitur: *Herba Hyperici*, interdum et *Flores* et *Semina*. Vires insunt leviter adstringentes. Laudantur in Haemoptysi, Haematuria, Phtisi. *Praeparata: Aqua, Oleum, Tinctura.*

P O L Y G Y N I A.

HEPATICA. *Calyx* triphyllus. *Corolla* sexpetala. *Semina* plura ecaudata.

H. triloba, DECAND, WILLD. Enum. hort. Berol. p. 580. *Anemone Hepatica*. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1272. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 294. n. 730. Icon. BLACKW. Herb. t. 207. HAYNE. I. 21.

In nemoribus lapidosis, montosis apud nos rarius, versus Thuringiam vulgaris. Nobis plante hortensis. Floret mense Aprili.

Herba et *Flores Hepaticae nobilis* olim nimis laudata vix laudibus digna.

PULSATILLA. *Calyx* uullus. *Corolla* sexpetala.

Semina plura caudata, cauda plumosa.

- P. pratensis*, pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis WILLD. enum. hort. Berol. p. 581. n. 5. *Anemone pratensis*. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II, p. 1274. n. 7. BAUMG. Fl. Lips. p. 295. n. 732. SCHWAEGRICH. Topograph. Lips. Spec. II. p. 12. *Icon*. SCHRUHR. b. H. t. 150. HAYNE I. 23.

Habitat copiosa in umbrosis et pratis silvaticis post oppidum Düben, ubi saepe caule bipedali multifloro gaudet; floret Maio.

Acri principio venenata. In paralyysi nervorum singulorum inprimis in amaurosi laudata. In ulceribus gangraenosis, syphiliticis, condylomatibus, herpete exedente etc. etiam salubris dicitur. *Praeparata. Extractum, Aqua destillata Pulsatillae nigricantis*. Cf. STOERKII libell. de usu medico Pulsatillae nigricantis. Wien. 1771. in lingu. vernac. trans. Nürnberg. 1771.

- P. vulgaris*, pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. WILLD. Enum. Hort. Berol. p. 537. n. 4. *Anemone Pulsatilla* LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1274. n. 6. BAUMG. Fl. Lips. p. 295. n. 731. *Icon*. HAYNE I. 22.

In campis aridis collibusque v. c. Sandberg am Bieniz. Floret Martio, Aprili. Planta succo acerrimo praedita *P. pratensi* rariori a nonnullis substituenda putatur.

ANEMONE. *Calyx* nullus. *Corolla* hexa-ennea petala. *Semina* plura ecaudata.

- A. nemorosa**, caule unifloro, foliis caulinis ternis ternatis, foliolis lanceolatis trifido-dentatis, corolla hexapetala. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1281. n. 23. BAUMG. Fl. Lips. p. 296. n. 734. *Icon.* HAYNE I. 24.

- A. ranunculoides**, caule subbifloro, foliis caulinis ternis ternatis, foliolis subtrifidis apice dentatis, petalis oblongis obtusis patentibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. p. 1282. n. 26. BAUMG. Fl. Lips p. 296. n. 235.

Utraque species in silvis nostris umbrosis mense Aprili et Maio florida vulgaris, principio acri venenata,

CLEMATIS. *Corolla* nulla. *Petala* quatuor rarius quinque. *Semina* compressa, stylo persistente caudata.

- C. Vitalba**, foliis pinnatis, foliolis scandentibus cordatis inciso-lobatis LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1292. n. 17. *Icon.* SCHKUH. b. H. t. 141.

Versus Thuringiam in montosis v. c. prope Leucopetram ascendit frutices arbores et muros floribus Julio et Augusto elegantissima, apud nos quasi sponie in ambulacro suburbano interdum reperitur. Speciem a BAUMGARTENIO in Flora nostra indicatam *C. erectam* apud nos nuquam vidi, in Thuringiae elatioribus montibus calcareis haud infrequens occurrit, unde solum pin-

que ad sepes hortorum obraceorum ei non conducere patet.

C. Vitalba inter plantas acres, venenatas iuste relata. Teste STOERNIO salubris in caphalaea, melancholia, herpete, ulceribus gangraenosis, indurationibus venereis etc. Aconito viribus haud dissimilis.

THALICTRUM. *Calyx* unllus. *Petala* quatuor s. quinque, *Filamenta* longissima. *Semina* ecaudata, striata, teretia.

Th. *flavum* caule folioso sulcato, panicula multiplici erecta. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1300. n. 15. BAUMG. Fl. Lips. p. 293. n. 728.

Passim in pratis nostris, v. c. prope Connewitz et Schönfeld occurrit, acris planta, venenata. Floret Jun. Jul.

Radix et *Herba Thalictri flavi* s. *magni* s. *Rhabbarbari pauperum* ante hac colligebatur.

FICARIA. *Calyx* triphyllus. *Petala* octo-novem, uugue nectarifero. *Semina* compressa, obtusa, nuda.

F. *ranunculoides*, Moench. meth. p. 215. (radice tuberibus fasciculata, caule decumbente, foliis cordatis angulatis petiolatis.) BAUMG, Fl. Lips. p. 301. n. 750. F. *verna* PERS. Synops. II. p. 102. *Ranunculus Ficaria* LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1312. n. 12. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 51.

In graminosis silvaticis, hortis humidiusculis vulgaris.

Herba Chelidonii minoris oleracea, ad acetariam quoque aptissima, bene sapida, re vera antiscorbutica. Olim etiam radix eiusdem, recens principii acris aliquid, sicca solum amyllum continens officinalis fuit.

RANUNCULUS. *Calyx* pentaphyllus. *Petala* quinque, intra ungues poro mellifero. *Semina* nuda.

Obs. Genus sat speciebus locupletatum. Singulae principio acri abundant, inaequaliter per herbas et radices distributo, semper volatili, siccatione et coctione anfigo. Herbae et radices recentes inflammant cutem atque adeo vesicas et ulcera graviora creant, interne omnes venenorum acrium molestias ciunt. Species Florae nostrae indigenae sunt:

* *foliis simplicibus.*

R. Flammula, foliis ovato lanceolatis petiolatis, caule declinato. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1307. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 297. n. 757.

Varietates occurrunt α . foliis integerrimis.

β . foliis serratis. Ran. Flammula minor PETIV. hort. brit. t. 39. f. 6.

γ . foliis radicalibus cordato-lanceolatis, longepetiolatis; pedunculis unifloris.

Crescit ubique in pratis paludosis, pascuis humidiusculis, uliginosis, var. α . et β . frequentes in prato Vogelwiese, prope Connewitz,

Schleussig etc. var. γ . in pascuis prope Lindenthal vidi copiosam. Floret-Jun. — Aug

Offic. Herba Flammulae Iovis obsoleta.

Cf. STÖRK lib. de Flammula Jovis Wien. 1769. in linguam venac. transl. Norimbg. 1769.

Huius sicut et aliarum specierum acriorum radice, vesicatorii instar re vera utuntur Galli, et mendici, Itali praeter omnes, ad ulcera excitanda, ut misericordiam eo commoverent manibus, pedibus nec raro faciei adeo infantum applicare solent.

R. *reptans*, foliis linearibus, caule repente articulato radicante, pedunculis unifloris. SPRENG. Fl. Hal. p. 159. n. 620. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1307. n. 2.

Species omnino distincta a R. Flammula. Caulis filiformis, folia linearia, integerrima, fasciculata, pedunculi uniflori solitarii erecti, flores parvuli.

Legi in paludosis am Gesundbrunnen. Floret Jun. Jul.

R. *Lingua*, foliis lanceolatis acuminatis, caule erecto multifloro. SPRENG. Fl. Hal. n. 629. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1308. n. 3. BAUMG. Fl. Lips. p. 297. n. 738,

In aquis limosis. v. c. in paludibus prope Connewitz, rarius prope Schoenfeld. Floret Jun. Jul. Indigenorum speciosissimus.

* * *Foliis dissectis et divisis.*

R. auricomus, foliis radicalibus reniformibus tripartitis crenatis, caulinis digitatis linearibus subintegerrimis, caule multifloro, calyce colorato erecto. SPRENG. Fl. Hal. p. 159. n. 622. LINN. sp. pl. ed. WILLD. p. 1514. BRUMG. Fl. Lips. p. 298. n. 739.

In hortis graminosis, pratis et pascuis. Floret Maio, Jun. interdum autumnio iterum.

Varietatem memoratu dignam: caule procerro, foliis radicalibus amplis reniformibus crenatis et inciso-lobatis, caulinis digitatis, inferiorum laciniis subovalibus, superiorum linearibus longissimis subdentatis et dentatis, transitum ad *R. cassubicum* LOES. luculenter demonstrantem legi in Thuringiae montosis humidiusculis silvatis mense Aug. anni praeteriti.

R. sceleratus, foliis inferioribus palmatis summis digitatis, lobis foliolisque omnibus obtusis, fructibus oblongis SPRENG. Fl. Hal. p. 159. n. 623. BAUMG. Fl. Lips. p. 298. n. 740. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 259.

Radix fibrosa, annua; caulis erectus, fistulosus, carnosus, crassus, angulatus, sulcatus, glaber, summitate ramosus, 1—2 pedalis et ultra; folia radicalia longepetiolata, subsemirotunda, aubcarnosa, nitida, glabra, triloba; lobis cuneiformibus, obtuse inciso-dentatis; caulina alterna, brevipetiolata s. sessilia, digitata, tri-multifida, glabra, lacinae linea-

ri-lanceolatae, obtusae, inciso-dentatae; petioli basi vaginantes, utrinque membranaceo-marginati, pedunculi laterales s. terminales filiformes, glabri, uniflori; Flores parvuli, sulphurei; petala integra, nitida, receptaculo breviora; Calyx reflexus, glaber, flavescens; fructus ovato-oblongus, obtusus, viridis; Semen praematurum deciduum. — Plantularum recens natarum folia earum R. hederacei formam aemulantur.

Crescit in humidis, paludosis ad fossas, stagna, in pratis uliginosis. Floret Maio — Jul.

Offic. olim *Herba Ranunculi palustris* s. *aquatici*. Maxima acrimoniae copia in floribus partibusque plantae superioribus latet, minor in radice. Usus internus inflammant intestinalem tractum, unde dolores atrocissimi, sphacelus, sudores frigidi spasmi tonici et clonici, inprimis risus Sardous, deliria hominem interimunt. Nonnulli plantam esse VIRGILII et PLINII Sardoam credidere. Cf. SALLUST. apud SERVIUM in VIRGIL. Eclog. 7. 41. PLIN. 20. 11. et 25. 13. Antidota praestant oleum et aqua subcalida. Inprimis et hac planta eodem modo quo R. Flammula utuntur Galli ad vesicans, et mendici ad ulcera graviora excitanda.

R. *bulbosus*, foliis ternatis trifidis, caule erecto multifloro, pedunculis sulcatis, calyce retroflexo, radice bulbosa. SPRENG. Fl. Hal. p. 160. n. 624.

LINN. sp. pl. ed. WILLD. p. 1324. n. 40. BAUMG. Fl. Lips. p. 299. n. 741.

In pascuis et pratis v. c. prope Möckern et Eutritsch, Floret Mai — Jul.

R. *hirsutus*, foliis ternatis, superioribus trifidis linearibus, caule erecto multifloro hirsuto, calycibus acuminatis demum retroflexis, radice fibrosa. SPRENG. Fl. Hal. p. 160. n. 625. R. *Philonotis*, radice fasciculata, herba pilosa, caule erecto ramoso, foliis ternatis, foliolis trilobis, lobis crenato-incisis, apicibus puncto albo terminatis, pedunculis sulcatis, calyce reflexo, fructu globoso, seminibus compressis acuminatis. EHRH. Beitr. II. p. 145. LINN. sp. pl. ed. WILLD II. p. 1324. n. 41.

In udis, pascuis ad margines agrorum, v. c. hinter dem Brandvorwerk, Vogelwiese. Floret Jun. Jul.

R. *repens*, calycibus patulis, pedunculis sulcatis, sarmentis repentibus, foliis compositis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1325. n. 43. BAUMG. Fl. Lips. p. 299. n. 743. Icon. BLACKW. Herb. t. 31.

In pratis, pascuis, hortis, agris vulgaris. Floret. Jun. Jul.

R. *polyanthemos*, calycibus patulis hirsutis, pedunculis sulcatis, foliis semiseptemlobis, laciniis tridentatis acutis, radice fibrosa. SPRENG. Fl. Hal. p. 160. n. 628. Calyce hirsuto, pedunculis sulcatis differt abunde a sequenti. W.

Passim ad vias in locis sterilioribus v. c. prope Lindenthal, in graminosis ad Connwitz, in silva academica. Floret Mai — Aug.

R. acris, calycib. patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito multifidis summis linearibus, radice tuberosa. SPRENG. Fl. Hal. p. 160. n. 627. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1326. n. 45. BAUMG. Fl. Lips. p. 299. n. 745.

Nobis vulgatissimus, in pratis, pascuis, hortis et silvis. Mense Maio et Junio ubi floret, saepius prata e longinquo colore flavissimo quasi tincta apparent.

R. lanuginosus, calycibus patulis, pedunculis teretibus, caule petiolisque hirsutis, foliis trifidis lobatis crenatis holosericeis. SPRENG. Fl. Hal. p. 260. n. 629. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1327. n. 47.

Maximus inter affines. In silvis umbrosis. Rosenthal, prope Connwitz etc. Floret Maio, Junio.

R. arvensis, foliis trifido-decompositis, laciniis linearibus, seminibus aculeatis. SPRENG. Fl. Hal. p. 160. n. 630. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1329. n. 52. BAUMG. Fl. Lips. p. 300. n. 746.

In agris frequens. v. c. am Bienitz, prope Zschocher, Schoenau etc. Floret Maio, Jun.

R. heterophyllus, foliis submersis capillaceis, emersis peltatis *R. aquatilis* LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1332. n. 60. *R. heterophyllus*

HOFFM. Fl. Germ. ed. 1791. p. 197. n. 25. PERS. Synops. II. p. 106. n. 74.

In aquis stagnantibus, in fossis. v. c. Vogelwiese. Floret Mai. Jun.

R. capillaceus, fol. omnibus capillaceis, laciniis divergentibus flaccidis, apice pilosis. PERS. Synops. II. p. 106. n. 75. HOFFM. Fl. germ. ed. 1800. p. 257. n. 24. sub aquatili. *R. aquatilis* β . LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1352.

In aquis quietis, passim. Floret Jun. Jul.

R. fluviatilis, foliis omnibus dichotomo capillaceis, laciniis parallelis longissimis, caule natante. — LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1333. BAUMG. Fl. Lips. p. 301. n. 749.

In fluviis, Plissa, Elystra, Luppä etc. Floret Jul. Aug.

TROLLIUS. *Corolla* nulla. *Petala* circiter quatuordecim. *Capsulae* plurimae, ovatae, polyspermae.

T. europaeus, corollis conniventibus, nectariis longitudine staminum. LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 1333. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 297. n. 736. *Icon.* SCHRUHR. b. H. t. 153. HAYNE. I. 12.

In montosis, pratis elatioribus humidiusculis v. c. prope Kleindölzig. Floret Jun. Jul.

Radix interdum cum illa Hellebori confusa a qua uti ab illa Adonidis vernalis colore brunneo et fibrillis fibrarum bene distinguitur.

CALTHA. *Calyx* nullus. *Petala* quinque-novem.

Nectarium nullum. *Capsulae* plures, polyspermae.

C. palustris, foliis cordato-reniformibus, caule erecto. PERS. Synops. II. p. 107. n. 2. LINN. sp. pl. ed. WILLD, II. p. 1338. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 294. n. 729.

Habitat in pratis humidiusculis, locis paludosis silvaticis ubique. Floret, Aprili, Maio. Planta acrimonia non expers.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

Obs. Huc referendae sunt plantae *Verticillatae* BATSCHII, calyce monophyllo, tubuloso s. bilabiato, corolla monopetala irregulari v. labiata, staminib. quatuor, duobus maioribus, corollae tubo adnatis, stylo simplici stigmate plerumque bifido. Flores in verticillos axillares dispositi, seminibus quatuor nudis, Ex Diandria huc pertinet *Salvia* ex plantis agri nostri officinalibus.

Plurimae huius Ordinis oleo aethereo abundant, unde inter graveolentia et suaveolentia remedia referendae sunt. Vires earum oleo aethereo in abdominales plexus et cutaneos ter-

minantur, itaque carminativa, stomachica, diuretica, diaphoretica praebent medicamenta. Multae in hortis occurrunt cultae, partim ob suavem odorem, partim ut usui culinari inserviant partim et plurimae quidem in pharmacopaeorum usum.

AIUGA. *Corollae* labium superius minimum, bidentatum. *Stamina* labio superiore longiora.

A. pyramidalis, tetragono-pyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 8. n. 3. BAUMG. Fl. Lips. p. 319. n. 787.

Haec reliquis rarior occurrit in arenosis elatioribus, anno superiori iterum legi in sabuleto am Kickerlingsberg. Floret Maio — Jul.

A. genevensis, foliis radicalibus caulinis minoribus LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 9. n. 5. Apud nos corollis coeruleis, in Thuringia etiam coroll. carneis occurrit.

Habitat in collibus arenosis v. c. ad St. Theclae, prope Holtzhausen etc. Floret Maio — Jul.

A. reptans, stolonibus reptantibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 10. n. 6. BAUMG. Fl. Lips. p. 320. n. 788. Icon. BLACKW. Herb. t. 64. f. 1. Variat corollis coeruleis et albis.

Vulgaris in pratorum marginibus elatis, lucidisque silvarum intervallis. Floret Maio — Jul.

A singulis his speciebus olim *Herbae Con-*

solidae mediae s. *Bugulae* cui vires vulnerarias tribuerunt, colligebatur.

A. chamaepytis, LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 10. n. 7. nobis vicina in vineis Thuringiae et agri Halensis, non caret principio balsamico, resinoso, acri.

TEUCRIUM. *Corollae* labium superius nullum sed fissura eius loco *Stamina* recipiens.

T. Scordium, foliis oblongis sessilibus dentatis nudiusculis, floribus axillaribus pedunculatis geminis, caule diffuso pubescente SCHREB. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 27. n. 34. BAUMG. Fl. Lips. p. 318. n. 785. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 475.

Radix repens, fibrosa; caulis stolonifer, adscendens, diffusus, pilosus, subtetragonus, palmatis; folia opposita, subfessilia, oblonga, basi angustiora, obtusa, serrato-dentata, subrugosa, hirsuta; corollae roseae, flores brevipedunculati, bini-quaterni, axillares; calyx villosus.

Passim legi in pratis silvaticis im Rosenthal ad paludes. Floret Jul. Aug. Olim maxime laudatum, hodie adhuc prostat in officinis. Inter antiputridinosa, alexiteria, antifebrilia, pellen-tia, diaphoretica, anthelminthica retulerunt veteres. *Offic. Herba Scordii. Praep. Aqua Essentia.*

T. Botrys, LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 14. n. 5.

T. scorodonia. p. 24. n. 27. *T. chamaedrys*. p. 28. n. 36.

T. montanum, p. 31. n. 42. proxima nobis in montibus prope Naumburg, aromatica, graveolentia, olim magis quam uunc officinalia.

SATUREIA. *Calyx* tubulosus, striatus. *Corollae* laciniae subaequales. *Stamina* distantia.

S. hortensis pedunculis axillaribus subcymosis, foliis lanceolatis, integerrimis, caule brachiato. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 45. n. 8. BAUMG. Fl. Lips. p. 327. n. 805.

Crescit quasi sponte in hortis nostris fere ubique, suaveolens Floret Jul. Aug. *Offic. Herba Saturejæ. Praep. Aqua, Oleum.*

HYSSOPUS. *Corollae* labium inferius tripartitum, lacinula intermedia subcrenata. *Stamina* recta, distantia.

H. officinalis, floribus verticillatis racemosis secundis, lacinia corollae intermedia biloba integerrima, foliis lanceolatis, LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 47. no. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 315. n. 271.

In cultis, ruderatis, nonnisi quasi sponte. Floret Jul. Aug. Viribus non differt a reliquis. *Offic. Herba Hyssopi. Praep. Aqua, Oleum.*

NEPETA. *Calyx* aridus, striatus. *Corolla* tubo longiusculo; labii inferioris lacinula intermedia crenata, faux margine reflexo. *Stamina* approximata.

N. Cataria, floribus spicatis, verticillis subpedicellatis cordatis dentato-serratis. LINN. sp.

pl. ed. WILLD. III. p. 49. no. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 326. no. 804. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 455. HAYNE IV. 3. Folia supra pubescentia, subtus holosericea.

Versus Thuringiam in viis, ruderatis, v. c. prope Leucopetram. Oleum aethereum continet odore ingrato praeditum, itaque in hysteria interdum adhibuerunt, praeterea in chlorosi. *Offic. Herba Nepetae.*

Lavandula Spica LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 60. n. 1. planta hortensis ob oleum aethereum notissima.

MENTHA. *Corolla* subaequalis, quadrifida: lacinia latiore emarginata. *Stamina* erecta, distantia.

Obs. Plures agros nostros silvasque incolunt species, quibus tamen ad usum officinalem vix egemus quum praestantior *M. piperita* LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 79. n. 13. et *crispa* p. 77. n. 9. ubique colantur. Indigenae sunt: *M. aquatica*, floribus capitatis verticillatisve, foliis petiolatis ovatis serratis, calyce undique hirsuto, pedicellis retrorsum hispidis. *M. hirsuta* SMITH. LINN. transact. 5. p. 193. *M. aquatica*. SNRENG. Fl. Hal. p. 163. n. 651. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 78. n. 11. BAUMG. Fl. Lips. p. 315. n. 776. *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 32.

In fossis aquosis, v. c. prope Barnek, am Gesundbrunnen etc. Floret Aug. Septbr. *Offic. Herba Menthae aquaticae.*

M. sativa, foliis ovatis petiolatis inciso - serratis supra lucidis subtus pubescentibus, caule erecto flexuoso, pedicellis calycibusque glaberrimis, dentibus hirsutis. *M. rubra* SMITH. Linnean. transact. 5. p. 205. SPRENG. Fl. Hal. p. 169. n. 652.

Habitat passim in fossis. Floret Aug.

M. gentilis, foliis ovatis petiolatis serratis utrinque subhirsutis, caule ramosissimo patulo, calycibus basi pedicellisque glabris SMITH. 208. SPRENG. Fl. Hal. p. 169. n. 653.

In humidiusculis agris, fossis passim. Floret Aug. Septbr.

M. acutifolia, florib. verticillatis, foliis ovato-lanceolatis utrinque attenuatis (medio serratis) calyce tubuloso oblongo hirsuto, pilis pedicellorum patentibus, caulium deflexis SMITH. p. 619. *M. verticillata*, HOFFM. Fl. germ. 1804. p. 6. n. 9.—10. Caulis bipedalis. Folia erectiuscula. Verticilli copiosi, distantes.

Habitat in fossis praesertim silvaticis. Legi am Gesundbrunnen et in stagno ad pagum Lindenau. Floret. Jul. — Septbr.

M. austriaca, florib. verticillatis, corollae laciniis omnibus obtusis, foliis subovatis villosis, staminibus corolla brevioribus JACQ. austr. V. p. 81. *M. florib. verticillat. fol. ovalibus petiolatis serratis hirtis, calycib. hirsutis, pedunculis glabris, caule erecto.* WALLR. ann. bot. p. 75.

n. 150. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 51.
n. 18.

A. *M. arvensi* specie simillima, distinguitur: caule simpliciusculo erecto, foliis utrinque attenuatis, inferiorib. ovatis brevi petiolatis, superioribus lanceolatis, serratis, nervo omni piloso, pedunculis elongatis glaberrimis, staminibus corolla brevioribus.

Occurrit in humidiusculis, in fossis, nemoribus. v. c. prope Schleussig. Floret Jul. Aug.

M. arvensis, caule adscendente villosa, floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, verticillis summis congestis, staminibus corollam aequantibus. PERS. Synops. II. p. 120. n. 22. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 80. n. 17. BAUMG. Fl. Lips. p. 316. n. 779.

Vulgaris in agris. Floret Jul. Aug.

M. Pulegium, foliis ovatis. caule prostrato, pedicellis calycibusque tomentosis, dentibus ciliatis. *M. florib. verticillatis*, foliis ovatis, obtusis, subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus LINN. sp. pl. ed. WILLD. p. 82. n. 20. BAUMG. Fl. Lips. p. 316. n. 780. *Icon. BLACKW. Herb.* t. 302. SOLE t. 23.

Apud nos non vulgaris, nonnisi prope Lindenau et Barnek in inundatis ante nonnullos annos a me visa. Floret Jul. Aug.

*Offic. Herba Pulegii. Praep. Aqua
Oleum.*

GLECHOMA. *Calyx* quinquefidus. *Antherarum* singulum par in formam crucis connivens.

G. hederacea, foliis reniformibus crenatis,
LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 85. n. 1.
BAUMG. Fl. Lips. p. 313. n. 270. *Icon.* BLACKW.
t. 225. HAYNE II. 8.

Vulgatissima in hortis, muris, ad sepes, domos. Floret per totam aestatem.

Offic. Herba Hederæ terrestris olim avide collecta, hodie nonnisi ad succos herbarum recentes parandos in curis, ubi haec institui solent, vernalibus, impenditur. Odor est gravis, ingratus sapor amarus.

LAMIUM. *Corollae* labium superius integrum, fornicatum; labium inferius bilobum; faux utrinque margine dentata.

L. album, foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis viginti floris. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 88. n. 6. BAUMG. Fl. Lips. p. 322. n. 791. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 33.

Vulgare in sepibus hortorum, locis cultis, ruderalis, silvaticis. Floret Aug. — Octbr.

Offic. Flores Galeopsidis s. Urticae mortuae s. Lamii albi. Inter indifferentia fortasse iure referendi videntur.

BETONICA. *Calyx* aristatus. *Corollae* labium superius, planiusculum; tubus cylindricus.

B. officinalis, calycibus glabris ciliatis, lobo medio labii inferioris emarginato, spica interrupta SPRENG. Pugill. *B. spica interrupta*, corollae galea integra, lacinia intermedia labii inferioris emarginata, calycibus glabriusculis AIT. — LINN. sp. pl. ed. WILLD. II. p. 93. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 321. n. 739. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 46. HAYNE. IV. 10.

In collibus nemorosis rarius. In Flora nostra solummodo am Bieniz legi. Floret Jun — Aug.

Offic. Flores et Herba Betonicae. Praep. olim *Aqua* destillata c. et s. vino, *Conserve*, *Syrupus*, *Emplastrum*. Nimis hanc veteres laudarunt, ita ut in omnibus fere morbis eam prodesse contenderent; vires inprimis ei tributae sunt nervinae, tonicae, resolventes, etc. at nil agere valet. Radix amara emetica, purgans.

B. stricta, AIT. calycibus hirsutis, lobo medio labii inferioris crenato undulato, spica oblonga. WALLR. ann. bot. p. 77. n. 153. SPRENG. pugill. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. 94. n. 2.

Haec fere semper cum praecedenti commixta est. Galeam quam omnes auctores integerrimam dicunt fere semper emarginatam vidi nec integram.

Habitat in pratis silvaticis fere ubique; copiose in pratis prope Leutsch et Schoenfeld. Etiam in pharmacopoeis hanc videmus fere semper verae *B. officinalis* loco collectam.

STACHYS. *Corollae* labium superius fornicatum, labium inferius lateribus reflexum, intermedia maiore emarginata. *Stamina* deflorata versus latera reflexa.

St. silvatica, verticillis sex floris, foliis rugosis cordatis petiolatis LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 97. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 324. n. 798. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 84. HAYNE. III. 40.

Habitat frequens in silvaticis, nemorosis. Rosenthal, Zschocher, Connewitz etc. Floret Jun. Jul.

Offic. Herba Galeopsidis s. Urticae inertis, s. Lamii silvatici maximi.

St. palustris, verticillis subsexfloris, foliis lineari-lanceolatis semiamplexicaulibus sessilibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 198. n. 4. BAUMG. Fl. Lips. p. 325. n. 799. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 275.

In agris humidiusculis, pratis paludosis, ad ripas fluviorum fossarumque vulgaris. Floret Jul. Aug.

Offic. Herba Stachidis palustris, s. Galeopsidis palustris foetidae. Usus ut herbae vulneariae, antifibrilis, obsoletus. Haud raro cum Lythro salicaria aut Betonica officinali comixta exstat.

St. recta, verticillis subspicatis, foliis cordato-ellipticis, crenatis, scabris, caulibus adscendentibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 104. n.

21. BAUNG. Fl. Lips. p. 325. n. 801. *Icon.* HAYNE. IV. 12.

In montosis, sterilibus, apricis, apud nos rarius; solummodo prope Roeglitz vidi, versus Thuringiam in locis calcareis frequentius occurrit. Floret Maio — Aug.

Offic. *Herba Sideritidis* falso dicta est huius herba siccata quum similis sit illi *Sideritidis hirsutae* LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 70. n. 18, minus *S. montanae*, LINN, p. 64. n. 4.

Vires huius plantae nonnisi in imaginatione imprimis rusticorum exstant, qui vario modo ea superstitiose utuntur. Re vera paulum adstringens est et forte roborans.

BALLOTA. *Calyx* hypocrateriformis, quinquedentatus, decem striatus. *Corollae* labium superius crenatum, concavum. *Semina* ovata, triquetra. **B. vulgaris**, LINK. foliis indivisis ovatis inaequaliter crenato-serratis calycibusque acuminatis, laciniiis calycinis setaceis aristatis rectis, tubo corollae brevioribus. WALLR. ann. bot. p. 79. n. 155. *Ballota nigra* LINN. sp. pl. ed. II. p. 814. et plurimorum auctorum post eum. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 136. SCHRUHR. bot. Hdb. II. 161.

Ad sepes, muros, vias in ruderatis, hortis ubique frequens, floret Jun. Jul. plerumque cum *Ballota nigra* LINN. sp. pl. ed. I. p. 582 commixta quae differt: B. foliis ovatis obtusis remote-crenatis basi subcuneiformibus, calycis dentibus

basi dilatatis brevissime acuminatis patentibus
tubum corollae superautibus WALLR.

Planta tota odore ingrata.

Offic. Herba Ballotaenigræ s. Marrubii nigri. Inutilis est ad medicinam internam, nonnisi externe applicata vulnerarium est remedium.

MARRUBIUM. *Calyx* hypocrateriformis, rigidus, decemstriatus. *Corollae* labium superius bifidum, lineare, rectum.

M. vulgare, foliis subrotundo-ovatis dentatis rugoso-venosis, calycinis dentibus setaceis uncinatis LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 111. n. 8. BAUMG. Fl. Lips. p. 328. n. 807. *Icon. Herb. BLACKW.* t. 479.

Radix perennis, fibrosa, nigra; caulis erectus, tetragonus, rigidus, subramosus. albotomentosus, 1 — 2 pedalis: rami oppositi; folia opposita, inferiora superioribus longius petiolata, subcarnosa, ovato-rotundata, dentata, rugoso-venosa, supra obscure viridia, utrinque albotomentosa; verticilli multiflori, densi, axillares; corolla alba; calyces decem-dentati, striati, tomentosi; faux pilis densis clausa, dentes setacei, uncinati, alternatim minores; patentissimi, bracteae setaceae, tomentosae, reflexae.

Loc. natal. In ruderatis, ad vias, in locis sterilibus. v. c. ante portam Grimmensem. Floret a Junio — Aug.

Par. affc. Herba Marrubii albi s. Prasti albi, ante florescentiam mense Maio collecta.

Qualit. Planta gravcolens, balsamica; sapore amaro, subacri. Principium extractivum, resinoso-gummosas partes nec non olei aetherici quid, siccatione anfigi, continet.

Vires Leniter stimulans, resolvens, diureticum, roborans.

Usus. Laudatur non immerito in morbis pectoralibus abdominalibusque variis, etiam in tabe pulmonum, in ictero pertinaci et hydropse incipiente.

Praeparata. Pulvis, Extractum, Oleum, Aqua destillata et Syrupus.

LEONURUS. *Calyx* pentagonus quinquedentatus. *Corollae* labium superius villosum, planum, integrum; inferius tripartitum, lacinia media indivisa, (Antherae punctis nitidis adpersae L. Folia sublobata.)

L. *Cardiaca*, foliis grosse serratis, inferioribus subcordatis trilobis, superioribus basi cuneiformibus trifidis vel integris, corollis calyce multo longioribus HAYNE. III. 41. LINN. sp. pl. ed. WILD. III. p. 144. n. 2, BAUMG. Fl. Lips. p. 312. n. 768. Icon. BLACKW. Herb. t. 171. HAYNE. III. 41.

In ruderatis, ad sepes, frequens in horto Bosiano. Floret Jul. Aug.

Offic. Herbae Cardiacae.

Vires. adstringens, roborans, resolvens, pellens; ei plures adhuc alias veteres ei adscripsere. Nobis remedium obsoletum ac inutile.

Usus. In morbis pituitosis, cardialgia, amenorrhoea etc. olim adhibuerunt, praeterea et superstitutioni videmus apud rusticos imprimis inservire, quippe qui huius herbae applicatione palpitacionem cordis diminuerent, infantibusque somnos creare quietos arbitrantur.

CLINOPODIUM. *Involucrum* multisetum, verticillo subiectum. *Calyx* bilabiatus. *Corollae* labium superius planum, obcordatum, rectum. *C. vulgare.* capitulis verticillatis, bracteis setaceis hispidis, foliis superne pilosis remote dentatis, caule subsimplici. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 131. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 333. n. 821.

In silvis v. c. prope Lindenthal, in gramineosis elatioribus am Gesundbrunnen, Bieniz. Flor. Jul. Aug.

Offic. *Herba Clinopodii arvensis* s. *Ocymi silvestris.* Infusum theiforme exinde paratum bene sapidum subdiaphoreticum, carminativum.

ORIGANUM. *Strobilus* tetragonus, spicatus, calyces colligans. *Corollae* labium superius erectum planum, inferius tripartitum, laciniis aequalibus.

O. vulgare. spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis LINN.

sp. pl. ed. WILLD. III. p. 135. n. 10. BAUMG. Fl. Lips. p. 332. n. 819. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 280.

Inprimis in Thuringiae montibus v. c. prope Leucopetram. etc. Floret Jul — Septbr.

Offic. *Herba et Flores Origani vulgaris.*

Planta aromatica, suaveolens, sapore acri, aromatico. Oleum aetherum, camphoram et partes resinoso-gummosas continet.

Vires. Calefaciens, nervina, resolvens, diaphoretica, externe dissolvens.

Usus. Inprimis in morbis pectoralibus hac herba utebantur praeterea in amenorrhoea. Olenm aethereum vim antidontalgicam exserere dicitur.

O. Maiorana, LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 137. et *O. Maioranoides*, n. 16. coluntur in hortis et usui medico pariter atque culinari inserviunt.

THYMUS. *Calycis* bilabiati faux villis clausa. *Corollae* labium superius planum, emarginatum.

Th. Serpyllum, floribus capitatis, caulibus decumbentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 138. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 329. n. 810. *Icon.* BLACKW. Herb. 211.

Variet. *α.* *Th. exserens*, staminib. corolla longioribus. *ERRH. β. includens*, staminib. co-

rolla brevioribus. EHRH. *γ. citriodorus*, foliis ovatis glabris odore melissae officinalis. PERS.

In apricis, collinis, limitibus agrorum. Flor.

Jul. Aug.

Th. *lanuginosus*. floribus capitatis, caulibus repentibus hirsutis, foliis obtusis villosis LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 138. n. 2.

In rupibus Thuringiae vulgaris. Floret Jul. Aug. Utraque planta salubris, floret a Junio ad Septbr. *Offic. Herba et Flores Serpylli.*

Qualit. Fragrans, aromatica, sapore aromatico amaro. Multum continet olei aetherici rubicundi, nonnihil camphorae.

Vircs. Incitans gravissimum, organa abdominalia egregie stimulans.

Usus. In atonia abdominali, externe quoque non sine fructu in clysmatibus, balneis, pediluviiis.

Praep. Oleum aethereum. Aqua destillata, Essentia Serpylli.

Th. *vulgaris*, LINN. sp. pl. ed. WILLD. III, p. 139. n. 4. planta notissima culta, culinari potius usui inservit quam medicinali.

ACINOS. *Calyx* bilabiatus sulcatus, piloso-hispidus, basi gibbus, fauce villosus. *Corolla* ringens; fauce subinflata, labio superiore erecto emarginato; inferiore tripartito patente: lacina intermedia concava. *Stamina* omnia fertilia.

A. *vulgaris*, caule erecto basi ramoso, foliis ovatis acutis antice serratis, verticillis 6-floris.

PERS. Synops. II. p. 131. n. 1, *A. thymoides*
MOENCH, Meth. p. 407. *Thymus Acinos* LINN.
sp. pl. ed. WILLD. III. p. 142. n. 10. BAUMG. Fl.
Lips. p. 350. n. 812.

In locis arenosis elatioribus, v. c. am Bieriz.
in coemeterio pagi Connewitz rarius. Floret
Junio, Julio.

Viribus non differt a Thymo Serpyllo. *Offic.*
olim *Herba Clinopodii s. Ocymi sil-*
vestris.

Melissa officinalis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III.
p. 146. n. 1. omnium mitissime suaveolens, co-
litur ubique in hortis ad arearum margines.

Dracocephalum Moldavica, LINN. sp. pl.
ed. WILLD, III. p. 155. n. 14. Huius s. *Melissae*
turcicae s. Moldavicae herba magis a nonnullis
laudatur praecedenti, tamen non differt.

MELITTIS. *Calyx* laevis; campanulatus, obtu-
sus, ore obliquus. *Corollae* labium superius pla-
num, inferius crenulatum. *Antherae* cruciatae.
M. grandiflora, calyce quadrilobo glabro, co-
rolla lutea-alba, laciniis labii inferioris medio
violacea. SMITH. brit. PERS. synops. II. p. 132.
n. 2.

In silvis et sepibus rarius v. c. prope Brandis.
Floret Maio. *Offic. Herba Melissophylli*
obsoleta.

SCUTELLARIA. *Calycis* ore integro: post flores-
centiam clauso, operculato. *Carolla* tubo
elongato.

S. galericulata, foliis cordati subsezzato-crenatis, floribus axillaribus secundis. HAYNE. III. 36. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 173. 6. BAUMG. Fl. Lips. p. 328. n. 808. *Leon.* HAYNE. l. c.

In humidis, ad fossas, rivulos, stagna, in ripis fluviorum et lacuum vulgaris. v. c. am Schoenfelder Teich, am Gesundbrunnen, im Rosenthal etc. Floret Julio, Augusto.

Offic. Herba Tertianariae s. Tricentalis a nemine hodie quaeritur in officinis; nomen pharmaceuticum inde ortum est quod contra febrem tertianam salubrem crediderint veteres.

PRUNELLA. *Calycis* labium superius dilatatum; *Filamenta* bifurca: altero apice antherifero. *Stigma* bifidum.

P. vulgaris, foliis petiolatis oblongo-ovatis basidentatis, calycis labio superiore truncato triaristato, caule adscendente. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 176. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 331. n. 815. — corollis calyce duplo maioribus SPRENG. Fl. Hal. p. 175. n. 687.

In pratis, hortis, pascuis, silvis ubique; v. c. in der Leimgrube, Vogelwiese, in silva prope Leutsch, Lindenau, Rosenthal etc. Floret Jun — Aug.

Offic. Herba Prunellae, Brunellae, Consolidae minoris fere obsoleta, perparum enim ei principii adstringentis roborantis inest. Antea ad gargarismata inprimis cum melle

in cynanche nec non faucium ulceribus externe et contra haemorrhagias, diarrhoeas usitata.

P. grandiflora, foliis oblongo-ovatis basi dentatis, calycis labio superiore trifido, caule adscendente. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 177. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 331. n. 816. — corollis calyce quadruplo maioribus SPRENG. Fl. Hal. p. 175. n. 738. *Icon.* SCHK. bot. Handb. t. 163.

In collibus, montibus, pratis elatis, v. c. am Bieniz, prope Rüglicz. Wurzen etc. Floret Jul. Aug.

Promiscue cum praecedenti collectae, easdem adscripsere veteres vires.

ANGIOSPERMIA.

VERBENA. *Calyx* quinquesfidus. *Corolla* infundibuliformis, tubo incurvo, limbo aequali, quinque-fido. *Stamina* quatuor fertilia. *Fructus*: tectus utriculis evanidis. *Semina* quatuor.

V. officinalis, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule subsolitario. LINN. sp. pl. ed. WILLD. I. p. 120. n. 20. BAUMG. Fl. Lips. p. 11, n. 31. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 41. SCHK. bot. Handb. t. 3.

In ruderatis, hortis, ad vias, v. c. ad pagum Wahren, Sellerhaussen, in den Kohlgärten, Lindenau etc. Floret Jul — Aug.

Offic. Herba Verbenae. Usus obsoletus in cephalalgia, diarrhoea, hydrope, febribus

intermittentibus, praeterea etiam magicus. Herba recens vulneraria. Inter adstringentia numeranda videtur.

EUPHRASIA. *Calyx* cylindricus, quadrifidus. *Corolla* bilabiata: labium superius bifidum; inferius trilobum: laciniis bifidis. *Antherae* inferiores lobis spinosis.

E. officinalis, foliis inferioribus ovatis oppositis crenato-serratis obtusis, superioribus alternis argute serratis, laciniis corollae inferioribus lobisque lateralibus emarginatis. WALLR. ann. bot. p. 81. n. 157. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III, p. 195. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 334. n. 823. Icon. BLACKW. Herb. t. 427. SCHK. bot. Handb. t. 169.

β. nemorosa, caule elongato ut plurimum ramosissimo, foliis glabris subnitidis ovatis argute serratis. PERS. Synops. II. p. 149. Caulis teretiusculus, purpurco-violacens, apud nos plerumque simpliciusculus, corollae subcoeruleae, minores quam in *E. officinali*.

Vulgaris in pratis, pascuis herbidis, *β.* in sterilioribus, collinis, v. c. am Gesundbrunnen, Bieniz, in silva academica, etc. Floret Jul. — Septbr.

Offic. Herba Euphrasiae imprimis in oculorum morbis a veteribus eximiis laudibus clata, nihil, experimentis repetitis in his efficere valet.

RHINANTHUS. *Calyx* quadri-fidus, ventricosus. *Corolla* ringens: labio superiore ut plurimum compresso. *Capsula* bilocularis, obtusa, compressa.

Rh. *Crista galli*, calyce glabro, corollae labio superiore compresso apice bidentato: dentibus pistilloque exserto coloratis (violaceis) caule maculato. PERS. Synops. II. p. 151. n. 3. Corollarum tubo incurvo, labio superiore compresso brevior. Rh. *maior* EHRH. Beitr. VI.

In silvis humidiusculis, pratis silvaticis, v. c. prope Zschocher, Etsch, Connewitz. Floret Jun. Jul.

Rh. *minor*, calyce glabro, corollae labio superiore compresso pistilloque incluso unicoloribus, caule immaculato PERS. Synops II. p. 151. n. 4. Corollarum tubo recto; labio superiori compresso, brevior. Rh. *minor* EHRH.

Vulgaris in pascuis, pratis, v. c. Vogelwiese. Floret Jul. Aug.

Offic. Ab utraque specie *Herba Cristae galli* antea collecta, adstringens, nobis obsoleta. Harum neutra inter frumentum crescit sed distinctissima haec est et saepius cum his modo definitis confusa: Rh. *villosus*, corollae labio superiore compresso, pistillo exserto, calyce cauleque villosis. PERS. Synops. II. p. 151. n. 5. Rh. *Alectorolophus* POLLICH. BOEM. n. 153. BAUMG. n. 850? Haec nonnisi extra Florae Lipsiensis fines certe mihi, in Thuringiae nempe

agris inter segetes occurrit, etiam e longinquo
luculenter a nostris speciebus discrepat, est enim
multo maior tota planta et ramosa, ramis bra-
chiatis, colore pallidissimo, calyces albido viri-
des hirsuti, valde reticulato-venosi, corollae al-
bido-flavescentes, caulis et folia villosa, bracteae
lato-cordatae.

MELAMPYRUM. *Calyx* quadrifidus. *Corollae*
labium superius compressum, margine replicato.
Capsula bilocularis, obliqua, hinc dehiscens.
Semina duo, gibba.

M. arvense, spicis conicis laxis, bracteis den-
tato-setaceis coloratis, calycum dentibus sca-
bris, corollis clausis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III.
p. 198. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 537. n. 832.

Varietas bracteis floribusque albis mihi oc-
currit.

Rarius in Flora nostra v. c. in agris prope
Markranstaedt, Leucopetram, copiose in Thuringia.
Floret Julio, Augusto,

Offic. olim *Farina Melampyri*.

Panis e farina secalina cum huius semine
commixta colore livido tinctus, sapore amarican-
te insignis, tamen innoxius.

M. nemorosum, floribus secundis lateralibus:
bracteis dentatis cordato-lanceolatis: summis
coloratis sterilibus, calycibus lanatis LINN. sp.
pl. ed. WILLD. III. p. 198. n. 4. BAUMG. n. 833.

In silvaticis, nemorosis, vulgare apud nos
v. c. in silva prope Connewitz, Leutsch, Bie-
niz etc. Floret Jun — Aug.

Officinalis quidem herba non est, attamen quum passim pro *Parietaria officinali* LINN. colligatur, notanda. Olim etiam cum praecedente inter herbas vulnerarias relata.

PEDICULARIS. *Calyx* quinquefidus. *Corolla* ringens. *Capsula* bilocularis, mucronata, obliqua. *Semina* tunicata.

P. palustris, caule ramoso, calyce bilabiato fimbriato crispo calloso-punctato, galea utrinque dentata SPRENG. Fl. Hal. p. 180. n. 715. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 202. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 343. n. 850. *Icon.* SCHKUH. bot. Handb. tab. 171.

In pratis humidis, uliginosis, praecipue prope Schönfeld et Rückmarsdorf. Floret Jun. Jul.

Huius et forte etiam sequentis *Herba Pedicularis aquaticae s. Fistulariae*, mense Maio collecta in officinis asservabatur, siccata viribus plane expers. Herba recens succo acerrimo praedita est.

P. silvatica, caule subsimplici, calyce inaequaliter quinquedentato glabro, galea utrinque nuda. SPRENG. Fl. Hal. p. 180. n. 716. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 203. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 344. n. 851. *Icon.* SCHKUH. b. H. t. 171. Caules ex una radice plures decumbentes.

In pratis humidiusculis, silvaticis, am heitern Blick, prope Leutsch, Zschocher, Connewitz. Floret Jun. Jul.

LINARIA. *Calyx* quinquepartitus. *Corolla* personata calcarata, palato bipartito. *Capsula* ovata bilocularis apice multivalvis polysperma.

L. Cymbalaria, foliis cordatis quinquelobis alternis, caulibus procumbentibus WILLD. Enum. hort. Berol. II. p. 639. n. 1. *Antirrhinum Cymbalaria* LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 232. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 341. n. 842.

Isdem in locis adhuc occurrit in quibus ante viginti et septem annos legit BAUMGARTEN, nempe ad muros in horto Bosiano et in muris horti antea medici Lipsiensis ad templum St. Pauli. Floret a Maio — Nov.

Offic. Herbam. s. folia Cymbalariae antea in haemorrhagiis laudaverunt.

L. Elatine, foliis hastatis alternis, caulibus procumbentibus. *Antirrhinum Elatine* LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 234. n. 6. BAUMG. Fl. Lips. p. 341. n. 843. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 170.

In agris humidiusculis am Bieniz prope Kleindölzig, praeterea prope Lauchstaedt et Krickstaedt. Floret Aug. — Octbr.

Offic. Olim Folia Elatines s. Herbam Elatines ad Balsamum praeparandum collegerunt.

L. vulgaris, foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. WILLD. Enum. Hort.

Berol. II. p. 641. n. 20. *Antirrhinum Linaria*
LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 253. n. 55.

In elatioribus, collinis, ad vias, prope
Gohlis et Eutritsch, Möckern, Burghausen, am
Bieniz, copiose in via qua itur oppidum Wur-
zen. Floret Jun. — Aug.

Offic. Herba et Flores Linariae s.
Antirrhini. Principio acri suspecta. Vires
esse dissolventes, anodynae, diureticae, purgan-
tes, dicuntur. Olim interne in ictero, hydropē,
et externe in fomentationibus et unguentis ordi-
naverunt. Prostat nobis adhuc *Unguentum*
Linariae quod passim desideratur, cui vero
Linaria vix ullam attribuit vim.

ANTIRRHINUM. *Calyx* quinque-partitus. *Co-*
rolla personata basi gibba, palato bipartito.
Capsula ovata basi gibba bilocularis poris tri-
bus apice dehiscens polysperma. (*Orontium*
hoc genus perperam vocat cel. PERSEON. quum
hoc nomen iam aliud genus Class. VI. Ord. I.
ipso LINNEO auctore gerat.)

A. *Orontium*, foliis lanceolatis, superioribus
alternis, floribus subsessilibus, calycibus corolla
longioribus. WILLD. Enum. Hort. Berol. II.
p. 642. n. 3. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III.
p. 258. n. 65. BAUMG. Fl. Lips. p. 345. n. 849.

Planta arvensis vulgaris inter segetes in-
primis post messem. Floret Jul. — Aug.

Offic. Herba Orontii s. Antirrhini
arvensis maioris. Sapore acri acrimonium

prodere videtur, itaque suspecta hodie non potius usitata. Diureticam habuerunt veteres.

- A. maius*, foliis lanceolatis oppositis, floribus racemosis calycinis segmentis glanduloso-pilosis ovatis obtusis LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 256. n. 62. BAUMG. Fl. Lips. p. 343. n. 848.

Crescit quasi sponte in muris urbem circumdantibus, imprimis ad pomoerium St. Petri. Floret Jul. Aug.

Offic. Herba cum Floribus Antirrhini maioris. Non amplius eius viribus dissolventibus opus est. Semen oleiferum.

SCROPHULARIA. *Calyx* quinquefidus. *Corolla* subglobosa, resupinata. *Capsula* bilocularis.

- S. nodosa*, foliis cordatis trinerviatis, caule obtus-angulo LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 270. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 339. n. 837. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 87.

Ad fossas, fluviorum ripas, ad sepes, fruticeta vulgaris. Floret Jul. Aug.

Offic. Radix Scrophulariae foetidae. Est illa viribus dissolventibus, resolventibus, carminativis quas veteres ei tribuerunt forte expers.

- S. aquatica*, foliis cordatis petiolatis decurrentibus obtusis, caule membranis angulato, racemis terminalibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 270. n. 3. BAUMG. Fl. Lips. p. 339. n. 838. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 16

In fossis v. c. prope Rückmarsdorf et Kleindölzig am Bieniz. Floret Jun. Septb.

Offic. Herba Betonicae aquaticae s. scrophulariae aquaticae. Hanc etiam inter res solventia, carminativa olim receperunt, nostris vero temporibus vix praescribitur.

Digitalis purpurea LINN. sp. pl. ed. WILLD.

III. p. 283. n. 1. planta narcotica, saluberrima, non indigena nobis nonnisi culta. Planta hortensis viribus eget, spontanea nobis proxima occurrit in montibus Thuringiacis v. c. Jencn-sibus et in illis propriae silvae Thuringiacae prope Eisenach, in monte Inselsberg, aliisque vidi copiosam, elegantissimum illarum regionum ornamentum. Cf. CARL DARWIN. Experiments, establishing a criterion between mucous and purulent matter. Lichtfield, 1730. p. 103. — G. A. HAASE de digitali purpurea in universum etc. Lipsiae, 1812. (cum auctorum reliquorum recensu.)

LATHRAEA, *Calyx* quadrifidus Glandula depressa, ad basin suturae germinis. *Capsula* unilocularis.

L. Squamaria, caule simplicissimo, corollis pendulis; labio inferiore trifido. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 201. n. 3. BAUMG. Fl. Lips. p. 334. n. 824. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 430. SCHKUH. b. H. t. 170.

In silvis humidiusculis, in alnetis ad alnorum radices parasita. Floret Mart. April.

Offic. Radix Squamariae s. *Dentariae* obsoleta, nil enim iuvat in epilepsia et exanthematibus chronicis quibus eam opponere veteres soliti sunt.

TETRADYNAMIA.

Obs. Plantae huius classis ob corollam tetrapetalam, petala in crucem disposita in universum plantae *cruciatae* s. *cruciferae*, et ob partium semina recondentium rationem *siliculosae* et *siliquosae* appellatae sunt. Quoad chemicam analysin imprimis acre continent principium externe cutem rubefaciens, inflammans, interne adhibitum antiscorbuticum, diureticum et ubi aucta dosi porrigatur itidem viscera inflammans. Multae sunt plantae culinares.

SILICULOSA.

Lepidium sativum. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 435. n. 10. planta hortensis, culinaris. antiscorbutica, ad acetarias parandas colitur.

THLASPI, *Silicula* emarginata, obcordata, polysperma: valvulis navicularibus, marginato-carinatis.

Th. *Bursa pastoris*, siliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. LINN. sp. pl. ed.

WILLD. III. p. 447. n. 13. BAUMG. Fl. Lips. p. 350. n. 867. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 5.

In ruderatis, agris, muris vulgatissimum. Floret a Maio ad Novbr. *Var.* fol. radic. integris.

Planta olim ob vires stipticas, adstringentes, quibus atrocissima narium haemorrhagia ubi herba humeris modo, nuchae vel arteriarum ramis superficialibus applicaretur cito finem imponere posse dicebatur. Experimenta repetita spem fefellerunt itaque obsoleta. Nomen officinale erat *Herba Bursae Pastoris*.

Th. arvense, siliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 442. n. 3. BAUMG. Fl. Lips. p. 349. n. 864. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 68.

Frequens in agris fere ubique, v. c. prope Connewitz, Lindenau. Floret Aprili—Jul.

Offic. Olim *Semina Thlaspios*.

COCHLEARIA, *Silicula* emarginata, turgida, scabra: valvulis gibbis, obtusis.

C. Armoracia, foliis radicalibus lanceolatis crenatis, canlinis incis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 451. n. 8. BAUMG. Fl. Lips. p. 349. n. 860. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 415.

Ad ripas fluminum, fossas; ad Plissam am Rosenthal, ad Elystram passim. Floret Jun. Jul.

Offic. *Radix Armoraciae recens*, ubi alia desint vesicantia eodem fine applicanda est, vel ad sinapismum parandum rasa cum sinapios seminibus tritis commiscenda.

CAMELINA, *Stamina* edentata. Stylus sublongus. *Silicula* membranacea (glabra) ovata, aut rotunda, bivalvis, polysperma. *Semina* oblonga laxè striata, nec membrana alata.

C. sativa, siliculis obovatis pedunculatis, foliis amplexicaulibus pilosis integerrimis PERS. Synops. II. p. 191. n. 1. *Myagrum sativum* LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 408. n. 7. BAUMG. Fl. Lips. p. 345. n. 853.

Habitat copiose inter linum, etiam colitur in agris. Floret Jun. Jul.

Offic. Oleum e seminibus expressum magis in oeconomia hodie quam in medicina consumitur.

SILIQUOSA.

CARDAMINE. *Siliqua* longa elastice dissiliens, valvulis revolutis, *Stigma* integrum. *Calyx* subhians. *Glandula* utrinque solitaria inter stamina breviora et calycem.

C. pratensis, foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis: caulinis lanceolatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 487. n. 19. BAUMG. Fl. Lips. p. 361. n. 889.

In pratis humidiusculis ubique. Floret Maio, Junio.

Antispasticum esse putaverunt. Cf. HAGEN. Dissertat. Regiomonti 1785. 4.

C. amara, foliis pinnatis, foliolis omnibus subrotundis, caule basi stolonifero LINN. sp. pl.

ed. WILLD. III. p. 488. n. 20. BAUMG. Fl. Lips. p. 361. n. 890.

Copiose crescit im Rosenthal in locis graminosis subhumidis, in pratis hinter dem Brandvorwerk, in nemorosis der Nonne et alibi passim.

Ad acetariam impenditur eodem modo quo *Sisymbrium Nasturtium* ubi hoc careant.

SISYMBRIUM. *Siliqua* rostro brevi tereti dehiscent, valvulis rectiusculis. *Calyx* patens. *Corolla* patens.

S. Nasturtium, siliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis subcordatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 489. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 362. n. 894. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 260.

In fossis, rivulis, in aqua limpida, prope Abtnaundorf, Rückmarsdorf, in via qua Merseburgum itur etc. Floret Jun. Aug.

Acetariam praebet bene sapidam, acrem, re vera antiscorbuticam. Nomine *Herbae Nasturtii aquatici* ad *conservam*, *Syrupum*, *aquam* et *spiritum* parandum antea a pharmacopoeis colligebatur. *Oleum* quoque *aethereum* acerrimum elici potest destillatione.

S. Sophia, petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 500. n. 29. BAUMG. Fl. Lips. p. 363. n. 898. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 440.

Ubique ruderatorum murorumque decus. Floret Mai — Jul.

Offic. Semina Sophiae s. Sophiae Chirurgorum in diarrhoeis morbisque verminosis nec non in calculo vesicae et ulceribus usurpata sunt.

ERYSIMUM. *Siliqua* columnaris, exacte tetraëdra. *Calyx* clausus.

E. officināle, siliquis spicae adpressis, foliis runcinatis LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 509. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 352. n. 870. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 28. HAYNE II. t. 13.

Ad vias, in ruderatis, pagis vulgare Floret Jun. — Aug.

Offic. Herba Erysimi olim in asthmate, raucedine, tussi, ischuria nonnihil valere arbitrati sunt.

Praep. Syrupus de Erysimo Lobelii.

E. Barbarea, foliis inferioribus lyratis, lobo terminali rotundato, superioribus obovatis dentatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 509. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 352. n. 871.

In locis palustribus vulgare. Floret Maio — Jul. Planta antiscorbutica etiam hieme folia praebet.

E. Alliaria, foliis cordatis LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 510. n. 4. BAUMG. Fl. Lips. p. 353. n. 872. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 372.

Sat vulgare ad sepes hortorum, in cultis, silvis. Floret Maio — Jul.

Allium exacte redolet. *Offic. Herba Al-*

liariae non amplius adhibetur in asthma, ulceribus gangraenosis ut a maioribus nostris.

BRASSICA. *Calyx* erectus, connivens. *Dissepimentum* prominens. *Semina* globosa. *Glandula* inter stamina breviora et pistillum, interque longiora et calycem. *Siliquae* teretes, compressae aut tetragonae, rostratae.

B. Napus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 547. n. 6. et

B. Rapa. p. 548. n. 7. coluntur in agris, altera praebet *Semina Napi*, altera *Radice*m et *semina Rapa*e quibus vel raro vel nunquam hoc tempore utimur in medicina.

SINAPIS. *Calyx* patens. *Corollae* ungues recti. *Glandula* inter stamina breviora et pistillum, interque longiora et calycem. *Dissepimentum* prominens, ensiforme.

S. alba, siliquis hispidis torosis rostro ancipiti brevioribus, foliis pinnatifidis. SPRENG. Fl. Hal. p. 191. n. 763. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 555. n. 4. BAUMG. Fl. Lips. p. 362. n. 892. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 29.

In agris inter plantas huius classis cultas. Floret Jun. Jul.

S. nigra, siliquis glabris tetragonis racemo appressis, foliis ramulorum deflexis, summis linearibus integerrimis glabris. SPRENG. Fl. Hal. n. 764. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 555. n. 5. BAUMG. Fl. Lips. p. 362. n. 893.

Ad vias, in agrorum marginibus, ruderatis, rarius. Floret Jun. Jul.

Utriusque semina ob acrimoniam officinalia, *Semina Sinapios nigra* superant *vi alba*, oritur illa ex olco aethereo in seminum cortice contento. Semina plerumque cum fermento panis et aceto trita commiscentur ad *sinapismum* conficiendum. Ad balnea usus, revulsiva et pediluvia inprimis, notissimus. Interne sumta stomacho ieiuno, ventriculum firmant et vertigines seniles repellunt.

Raphanus sativus, LINN. sp. ed. WILLD. III. p. 560. n. 1. apud nos colitur in hortis ob radicem quae iisdem quibus reliquae plures, diuretica, carminativa gaudet.

MONADELPHIA.

PENTANDRIA.

ERODIUM. *Calyx* pentaphyllus. *Corolla* pentapetala. *Nectarium* squamulae quinque, cum filamentis alternantes, et glandulae melliferae basi staminum insidentes. *Arilli* quinque, monospermi, aristiti, ad basin receptaculi rostrati; *Aristis* spiralibus, introrsum barbatis.

E. cicutarium, pedunculis multifloris, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis, incis, corollis calyce maioribus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. 629. n. 11. BAUMG. Fl. Lips. p. 366, n. 902.

In agris, collibus vulgare. Floret Mai — Sept.
Vis imaginata vulneraria.

DECANDRIA.

GERANIUM. *Calyx* pentaphyllus. *Corolla* pentapetata, regularis. *Nectarium* glandulae quinque melliferae, basi longiorum filamentorum adnatae. *Arilli* quinque monospermi, aristati, ad basin receptaculi rostrati; aristis nudis, rectis.

G. pratense, pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multipartitis rugosis acutis, petalis integris. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 705. n. 21. BAUMG. Fl. Lips. p. 767. n. 907. Pedunculi erecti, folia inciso-serrata, stamina deltoidea.

In Flora nostra rarius in pratis, v. c. Vogelwiese, hinter der Ziegelscheune, copiose versus Thuringiam.

Succo recens expresso veteres utebantur in gangraena et scirrho, herbamque *Gratiam Dei* vocarunt.

G. Robertianum, pedunculis bifloris, foliis ternatis quinatisque trifido-pinnatifidis, petalis integris calyce aristato duplo longioribus, arillis reticulatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 714. n. 38. Pedunculi erecti submultiflori, calyx

decagonus. BAUMG. Fl. Lips. p. 368. n. 908.
Icon. BLACKW. Herb. t. 480.

In alnetis, locis umbrosis humidiusculis, ad muros, sepes, v. c. prope Schoenfeld, Burg-hausen, in hortis suburbanis et rusticanis plurimis. Floret Mai. Jul.

Odore hircino foetet *Herba Geranii Robertiani*. Ob vim adstringentem vulneraria olim habebatur et in haematuria, hysteria, ulceribus cam commendarunt.

P O L Y A N D R I A.

Obs. Huc referendae sunt plantae *Malvaceae*, *Columniferae* a LINNEO ob filamenta in columnam connata dictae, calyce nunc simplici, nunc duplicato, petalis quinque distinctis, aut basi connatis, filamentis 10 — 12 aut pluribus, nunc omnibus in tubum coactis, basi corolliferum, nunc basi tantum connatis, in urceolum antheriferum, filamentis passim sterilibus intermixtis, fructu aut multiloculari, multivalvi, s. circa styli basin verticillato, perispermio nullo distinguuntur. Quoad analysin mucilaginis copiam continent, quam ob rem ad emollientia, lubricantia, demulcentia pertinent remedia.

Althaea rosea. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 773. n. 7. hortorum ornamentum eximium et notissimum *Flores Malvae orboreae* s. *altissimae* s. *hortensis* praebent quibus

decoctis ad inflammationes cutaneas dissolvendas utimur. Etiam *Malvae Alceae* semina ab eadem originem ducunt.

A. officinalis, p. 770. n. 1. quae proxima nobis spontanea crescit ad lacum salsum et pagos vicinos in Mansfeldia, omnes affinis species virium blanditiae superat. Praebet *Flores, Herbam, Radicem Altheae s. Bismalvae*.

MALVA. *Calyx* duplex: exterior triphyllus. *Capsulae* plurimae monospermae.

M. rotundifolia, caule subprostrato pubescente scabriusculo, foliis pubescentibus, inferioribus cordato-orbiculatis obsolete septemangularibus, superioribus subquinelobis, pedunculis pubescentibus fructiferis declinatis. HAYNE I. 27. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 786. n. 40. BAUMG. Fl. Lips. p. 371. n. 916. *Icon.* HAYNE l. c. SCHKUR b. H. t. 192.

Planta vulgaris, in omnibus pagis et rudetis, sed etiam in aggeribus et muris ad urbem obvia. Floret Jun. — Aug.

Offic. Flores, Herba, Radix et Semina Malvae rotundifoliae s. vulgaris.

Est re vera emolliens, obtundens, lubricans, relaxans, viribus Altheae pedisequa, ad cataplasmata emollientia, maturantia, ad gargarismata, collyria aptissima.

M. silvestris, caule suberecto piloso scabro, foliis septemlobis pubescentibus, petiolis pedunculisque pilosis, petalis emarginatis. HAYNE I. 28.

LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 787. n. 43. BAUMG.
Fl. Lips. p. 371. n. 918. *Icon.* BLACKW. Herb.
t. 22. HAYNE l. c.

In viis, ruderatis, graminosis, silvaticis. In
ambulacro, prope Lindenau etc. Jun. — Septr.

Flores, Herba, Radix et semina
Malvae silvestris iisdem ac praecedentis
viribus gaudent.

M. *Alcea*, caule erecto scabro, foliis scabriuscu-
lis, inferioribus angulatis, superioribus quinque-
partitis, calycis exterioribus foliolis oblongis.
HAYNE l. 30. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III.
p. 790. n. 50. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 309.
HAYNE l. c.

In montosis, aggeribus, graminosis passim,
v. c. prope Stameln, am Kickerlingsberg. Flo-
ret Jul. Aug.

Offic. Herba et Radix Alceae, iis-
dem viribus pollent.

DIADELPHIA.

Obs. Plantae *Papilionaceae*. Calyx mono-
phyllus; Corolla calyci inserta, constat plerum-
que vexillo; carina et alis; stamina in plurimis
in fasciculos duos connata; Pistillum unicum;

Fructus leguminosus. Analysi gummi ex iis elicitur inprimis, certe ex ordinis III. speciebus.

H E X A N D R I A.

CORYDALIS. *Calyx* diphyllus. *Corolla* ringens. *Filamenta* duo, inembranacea, singula *Antheris* tribus. *Capsula* siliquosa, polysperma.

C. bulbosa, caule simplici, racemo terminali, bracteis oblongis pedunculo longioribus, foliis biternatis oblongis acutiusculis, radice tuberosa cava. *Fumaria bulbosa* LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 860. n. 10. BAUMG. Fl. Lips. p. 380. n. 931. *F. cava* EHRH. *maior* ROTH. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 534.

In nemorosis, in horto Bosiano, Connewitz, Raschwitz passim. Floret Martio, Aprili.

Offic. olim *Aristolochiae cavae Radix*.

C. fabacea, caule simplici, racemo terminali, bracteis subrotundis longitudine florum, calcare corollae recto, foliis biternatis radice tuberosa. *Fumaria fabacea* LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 362. n. 12. SCHWAEGRICH. Topogr. IV. p. 8. *F. intermedia* EHRH.

Praecedenti similis, rarior. In aggeribus et marginibus silvarum et in nemoribus sicciusculis, Raschwitz, Connewitz, Stüntz etc. Floret Mart. Aprili.

Radix forte cum illa sequentis promiscue asservata. *Offic. Radix Aristolochiae fabaceae.*

C. Halleri, caule simplici, racemo terminali, bracteis cuneatis digitatis pedunculo longioribus. foliis biternatis, radice tuberosa. *Fumaria Halleri* LINN. spec. pl. ed. WILLD. III. p. 863. n. 14. BAUMG. Fl. Lips. p. 38. n. 932. *F. solida* EHRH. HOFFM. *bulbosa*. RETZ. *minor*. ROTH. *Corydalis digitata* PERS. Synops. p. 269. n. 16. *Icon*. BLACKW. Herb. t. 534.

In collinis, montosis, nemorosis. Am Bie-
nitz, prope Eutritsch. Floret Martio, Aprili.

*Offic. Radix Aristolochiae Rotun-
dae s. Fumariae Bulbosae.*

Omnibus his harum specierum radicibus vires pellentes, emmenagogas veteres adscripserunt.

FUMARIA, *Calyx* diphyllus, deciduus. *Corolla* irregularis, basi calcarata. *Filamenta* duo, singula antheris tribus. *Capsula* unilocularis, evalvis, monosperma. *Semen* parieti affixum.

F. officinalis, caule ramoso diffuso, siliquis globosis monospermis retusis, foliis supradecompositis, foliolis cuneiformi-lanceolatis incis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 867. n. 25. BAUMG. Fl. Lips. p. 381. n. 934. *Icon*. BLACKW. Herb. t. 237.

In cultis, inter olera et segetes, in agris et hortis, etiam in muris obvia. Floret a Maio ad autumnum.

Herba Fumariae s. tota planta cum floribus colligitur ad parandum *Extractum*.

Herba vix odora, sapore amaro, salino, quum praeter extractum, etiam Kali muriaticum insit.

Vires, resolvens, stomachica, roborans.

Usus, in atonia abdominis in morbis pituitosis et scrophulosis inprimis salubris. Etiam succo recens expresso utimur interdum in curis vernalibus.

OCTANDRIA.

POLYGALA. *Calyx* pentaphyllus: foliolis duobus alaeformibus, coloratis. *Capsula* obcordata, bilocularis, bivalvis.

P. vulgaris, floribus cristatis racemosis, alis calycinis trinerviis obtusis longitudine corollae, caulibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis acutiusculis LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 875. n. 6. BAUMG. Fl. Lips. p. 382. n. 337. Corolla variat colore coeruleo, carneo, albo.

In pratis siccis et collibus v. c. am Gesundbrunnen, im verschlossenen Holze, prope Schoenfeld etc. Floret Jun. Jul.

Radix et *Herba Polygalae vulgaris* hodie non colligitur sed haud raro commistae sunt cum *P. amara* quae differt; alis calycinis corolla longioribus caulibus erectiusculis, foliis obtusis, radicalibus obovatis. Crescit haec potius in montibus.

D E C A N D R I A.

SPARTIUM. *Calyx* deorsum productus. *Carina* (quibusdam) pendula. *Filamenta* germini adhaerentia. *Stigma* longitudinale, supra villosum. *Legumen* oblongum mono- aut polyspermum.

S. scoparium, foliis ternatis, solitariisque oblongis, floribus axillaribus, leguminibus margine pilosis, ramis angulatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 933. n. 19. BAUMG. Fl. Lips. Icon. SCHKUHR. b. H. t. 194.

In silvis siccioribus v. c. am heitern Blick, prope Lindenthal, Machern, Wurzen, Düben. Floret Jul. Aug.

Offic. olim *Herba*, *Flores* et *Semina Genistae* colligebantur, ex opinione veterum purgantia, pellentia, emmenagoga. *Praep. Sal Genista* obsoletum.

GENISTA. *Calyx* bilabiatus; $\frac{2}{3}$, dentibus binis superioribus brevissimis. *Vexillum* oblongum, a pistillo staminibusque deorsum reflexum.

G. tinctoria, foliis lanceolatis glabris, ramis teretibus striatis erectis, leguminibus glabris LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 939. n. 8. BAUMG. Fl. Lips. p. 383. n. 936.

In sterilibus silvarum locis, in collibus, in silva academica, am Bieniz, prope Leutsch etc. Floret Jun. — Aug.

Offic. *Herba*, *Flores* et *Semina Ge-*

nistae tinctoriae olim etiam ad medicinalem usum asservabantur. Nobis est planta tinctoria.

ONONIS. *Calyx* quinquepartitus: laciniis linearibus. *Vexillum* striatum. *Legumen* turgidum, sessile. *Filamenta* connata absque fissura.

O. spinosa, floribus subgeminatis axillaribus, foliis inferioribus ternatis lanceolatis serratis. ramisque spinosis villosis LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 989. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 387. n. 942. Icon. BLACKW. Herb. tab. 301. f. 1.

Ad vias, agrorum margines, in collibus, pratis. Am Gesundbrunnen, Vogelwiese, Gohlis, Stoetteritz, Connewitz etc. Floret Jun. Aug.

O. hircina, floribus geminatis, foliis inferioribus ternatis ellipticis serratis pubescentibus, caule inermi villos-viscoso. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 989. *O. arvensis*. BAUMG. Fl. Lips. p. 387. n. 945.

Non immixta prioris sed rarius legitur prope Stameln ad viam, prope Markranstaedt ad agrorum margines, frequens in Thuringia. Floret Jul. Aug.

Radix et Herba Ononidis a veteribus celebratae ut diureticae. LINNEUS etiam in febris Hungarica Radicem laudat.

ANTHYLLIS. *Calyx* ventricosus. *Legumen* subrotundum, tectum mono s. trispermum.

- A. *Vulneraria*, herbacea, foliis pinnatis aequalibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1058. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 386. n. 941.

In elatioribus, collinis am Bieniz, etc. Floret Jun — Aug.

Vim vulnerariam ei adscripserunt unde nomen: *Herba Vulnerariae*.

LATHYRUS. *Stylus* planus, supra villosus, superne latior. *Calycis* laciniae superiores duae breviores.

- L. *tuberosus*, pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ovalibus, internodiis nudis LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1088. n. 25. BAUMG. Fl. Lips. p. 395. n. 958.

In agris, inter segetes prope Connewitz, Schoenau etc. Floret Jul. Aug.

Radix tuberosa, tuberibus, ex amylo constantibus, nutrientibus.

MELILOTUS. *Calyx* tubulosus quinque-dantatus. *Corolla* decidua. *Carina* adpressa. *Legumen* oligospermum dehiscens calyce longius.

- M. *Officinalis*, leguminibus racemosis nudis dispermis subrugosis ovatis subcompressis acutis, stipulis subulatis, caule erecto. WILLD. Enum. Hort. Berol. II. p. 790. n. 8. *Trifolium officinale*. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1355. n. 8. *Trifolium Melilotus officinalis* BAUMG. Fl. Lips. p. 410. n. 987. *Corolla* flava. *Icon.* HAYNE. II. 31.

M. vulgaris, leguminibus racemosis nudis monospermis rugosis obovatis acutis, stipulis setaceis, caule erecto WILLD. Enum. Hort. Berol. II. p. 790. n. 9. *Trifolium officinale* β . flore albo. LINN. 1. c. BAUMG. 1. c. *Icon. BLACKW. Herb. t. 80. HAYNE. II. 32.*

Utraque species, *M. vulgari* rarior, crescit in agris lapidosis, ad vias in collibus arenosis v. c. prope Schkeudiz, Stameln, Wahren, Vogelwiese, Schleussig, copiose in via qua itur Merseburgum. Floret Aug. Septbr.

Offic. Herba, Flores et Semina Meliloti citrini et albi. Adhibemus ea externa ad cataplasmata emollientia. *Praep. Unguentum et Emplastrum de Meliloto.*

SYNGENESIA.

Obs. Compositae, plantarum naturalis familia vastissima. Flosculi plurimi in calyce uno dispositi et ita aggregati ut unum quasi florem simulent. Flosculi vel tubulosi, vel ligulati. Antherae connexae. Stylus unicus. — Plantae lactescentes plures, principium extractivum cum sapone aut oleo aethereo recondentes.

A E Q U A L I S.

TRAGOPOGON. *Calyx* simplex, polyphyllus. *Receptaculum* nudum. *Pappus* plumosus, stipitatus.

T. pratensis, calycibus corollae radium aequantibus, foliis integris strictis LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1492. n. 1. *Tr. pratense* BAUMG. Fl. Lips. p. 432. n. 1027. Radius inconstans in una eademque planta calycem aequat et superat, crescit enim usque anthesis sit perfecta. Pedunculi teretes, folia carinata subundulata.

Habitat in pratis, locis graminosis. Floret Jun. Aug. Radiis nonnisi horis matutinis coelo sereno explicatis.

Radix Tragopogonis diuretica dicta est atque lithontripica, sed forte immerito.

SCORZONERA. *Calyx* imbricatus, squamis margine scariosis, *Receptaculum* nudum. *Pappus* plumosus, substipitatus.

S. humilis, caule subsimplici unifloro, squamis calycinis arachnoideo-tomentosis, foliis radicalibus nervosis planis longe petiolatis oblongo lanceolatis, caulinis linearibus intermixtis integerrimis. WALLR. ann. bot. p. 92. n. 176. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1499. n. 3. BAUMG. Fl. Lips. p. 435. n. 1034.

In collibus silvaticis passim v. c. am Bieniz. Floret Jun. Jul.

S. laciniata, foliis inferioribus pinnatifidis linearibus, superioribus linearibus, calycibus glabris, squamis inferioribus patulis mucronatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1506. n. 24. BAUMG. Fl. Lips. p. 456. n. 1057.

Ad vias in locis apricis, v. c. in via qua itur Merseburgum versus, bei der Windmühle, etc. Floret Jun. — Aug.

Utriusque radix eodem modo adhibenda ac illa *Scorz. hispanicae*. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1499. n. 4. et *Scorz. glastifolia* n. 5. ad usum culinarem pariter ac pharmaceuticum, sed quum vires ei praeter nutrientem fere nullae sint obsoleta videtur. *Offic. olim Radix, Herba et Semina Scorzonerae.*

SONCHUS. *Calyx* imbricatus, ventricosus. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus, sessilis.

S. oleraceus, pedunculis subtomentosis umbellatis calycibus glabris, foliis lanceolatis amplexicaulibus denticulatis subsinuatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1514. n. 17. BAUMG. Fl. Lips. p. 446.

Varietates inprimis nobis occurrunt:

α. laevis, foliis amplexicaulibus dentatis integris, et semipinnatis, calycibus laevibus. HALL. helv. n. 21. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 150. HAYNE. I. 48.

Habitat in cultis ubique. Floret Jun. Aug.

β. asper, foliis amplexicaulibus, rigidis, integris et semipinnatis, dentatis, calycibus laevibus.

HALL. helv. n. 22. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 30.

In ruderatis, ad muros passim. Floret Jun. — Septb.

Secundum seminum formam inprimis, certiora fortasse momenta distinctionis invenit WALLROTH:

- a. *oleraceus*, pedunculis demum nudis, foliis runcinato-lyratis amplexicaulibus integrisve, seminibus margine dorsoque transversim scabris.
- b. *fallax*, WALLR. pedunculis calycibusque demum nudis, foliis amplexicaulibus ovato-oblongis laciniatis eroso-dentatis runcinatis, seminibus ntrinque glabris tristriatis. *ann. bot.* p. 98.

Planta ad acetariam apta, tempore verno, *succus* eodem tempore *recens expressus* in curis vernalibus adhibendus est, *Radix* loco illius Taraxaci.

LACTUCA. *Calyx* imbricatus, cylindricus, margine membranaceo. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex, stipitatus. *Semina* laevia.

- S. *Scariola*, foliis aversis runcinato-pinnatifidis denticulatis basi sagittatis carina aculeatis. HAYNE l. 46. LINN. sp. pl. ed. WILLD. p. 1526. n. 11. BAUMG. Fl. Lips. p. 441. n. 1046. *Icon.* HAYNE. l. s.

Differt L. *virosa*, foliis avensis oblongo-lanceolatis denticulatis basi sagittatis carina

aculeatis: infimis sinuatis. HAYNE. I. 47. in locis a BAUMGARTENIO indicatis non obvia.

In aggenibus circa urbem, ad muros in ruderatis. Floret Jun. — Aug.

Herba Scariolae colligitur ad usum officinalem inprimis, ad *Extractum Scariolae* inde parandum, cui vires potiores resolventes, diaphoreticae et diureticae, in Hydroke et Ictero inprimis laudatae, adscriptae sunt. Plerumque plantam cum *L. virosa* commiscuerunt, ita ut Scariolam nomine virosae adhiberent, et illa interdum pro hac specie uterentur. Utraque planta non commendanda est quum eius magna opus sit dosi, quam ob nauseosum saporem aegri respuunt.

LEONTODON. *Calyx* duplex. *Receptaculum* nudum. *Pappus* stipitatus, plumosus.

L. Taraxacum, calyce exteriori reflexo, scapo unifloro, foliis runcinatis glabris, laciniis lanceolatis dentatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1544. *Taraxacum officinale*. BAUMG. Fl. Lips. p. 433. n. 1050. *Icon*. BLACKW. Herb. t. 1. et 501. HAYNE. II. 4.

Radix subfusiformis, perpendicularis, fibrosa; scapus erectus, teres, glaber, lacvis, fistulosus, monanthos, semi — 1 pedalis et ultra; folia radicalia horizontalia aut patentia, runcinata, runcinato - dentata, dentata, glabra, iuniora subpilosa. Tota planta maxime lactescens.

Planta vulgaris, notissima, currit ad vios in cultis et pratis.

Offic. Radix Taraxaci olim et *Herba s. Folia*.

Est planta inodora, sapore amaro. Extractum continet saponaceum. Viribus gaudet resolventibus, stomachicis.

Utimur *Extracto* nec non *succo recens expresso* e herba et radice ubi functiones organorum abdominalium retardatae, vel ab infarctis vel vasorum debilitate et stagnationibus pendeant, sic v. c. in curis vernalibus, in exanthematibus chronicis etc. Radix sicca inter species lignorum recepta est.

HIERACIUM. *Calyx* imbricatus. *Receptaculum* nudum, aut passim subpilosum. *Pappus* simplex, sessilis.

H. Pilosella foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis, stolonibus repentibus, scapo unifloro. LINN. sp. pl, ed. WILLD. III. p. 1563. n. 10. BAUMG. Fl. Lips. p. 442. n. 1049. Icon. BLACKW. Herb. t. 365. HAYNE III. 42.

In aridis siccis, apricis ad vias, colles. Floret Mai — Aug.

Offic. Olim Radix et Herba pilosellae s. Auriculae muris. Principium extractivum continet amarum et subadstringens, laudatur a veteribus in diarrhoeis, haemorrhagiis, ulceribus, phtisi, externe in herniis, et pulverisatum in epistaxi.

H. murorum, caule erecto folioso piloso simplici, floribus paniculatis, foliis ovatis basi profunde dentatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1577. n. 41. BAUMG. Fl. Lips. p. 444. n. 1053. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 538.

In muris ad pomoria, in aggeribus, silvis. Floret Jun. Jul.

Offic. Herba Pulmonariae gallicae antea in morbis pectoralibus celebrata est.

H. sabaudum, caule erecto simplici, foliis ovato-oblongis subglabris acutis sessilibus subamplexi-caulibus basin versus dentatis, floribus corymbosis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1589. n. 65. BAUMG. Fl. Lips. p. 444. n. 1056.

Habitat in silvis, v. c. Leutsch, Lindenau, Lindenthal, Zschocher, Raschwitz, Connewitz, am Bieniz, in silva academica. Floret Jul. — Septbr.

H. umbellatum, caule erecto simplici, foliis linearibus subdentatis, floribus corymboso-umbellatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1591. n. 70.

In pascuis silvaticis, locis graminosis elatioribus v. c. am Gesundbrunnen, Bieniz, Lindenau, Leutsch, in silva academica. Floret Jul. — Sept.

Utriusque radix laudatur antifebrilis.

CICHORIUM. *Calyx* calyculatus. *Receptaculum* subpaleacum. *Pappus* polyphyllus, paleaceus.

C. Intybus, floribus axillaribus geminis subsessilibus, foliis runcinatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1628. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 429. n. 1022. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 177 et 183. HAYNE II. 24.

Ad vias, in locis apricis, sterilibus, ad agrorum margines planta vulgaris. Floret Jun. — Septbr.

Offic. Olim *Flores*, *Semina* et *Herba*, hodie nonnisi *Radix* interdum colligitur. Similes in se continet ac *Taraxacum* vires tamen gradu minori. Inter praeparata *Aqua* et *Conserve* plane obsoleta sunt, *Syrupus Cichorei* c. *Rheo* adhuc prostat in officinis.

ARCTIUM. *Calyx* globosus: squamis apice hamis inflexis. *Receptaculum* paleacum. *Pappus* setoso-paleaceus.

A. *Lappa*, foliis caulinis cordati petiolatis denticulatis, calycibus laevibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1631. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 454. n. 1079. var. α . *Arctium* capitulis glabris maioribus. BOEM. *Icon.* HAYNE II. 35.

var. α . *maior*, squamis calycinis margine paleaceis. SCHKUHR b. H. t. 227.

β . *minor*, squamis calycinis margine setosis. SCHKUHR b. H. t. 227.

In locis desertis, incultis, ad vias, sepes, in fruticetis et silvis, α . in humidiusculis β . in siccis. Floret Jul. Aug.]

A. *Bardana*, foliis caulinis cordatis petiolatis integerrimis, calycibus arachnoideo-tomentosis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1652. n. 2. A. *Lappa* var. β . capitulis tomentosis BOEM. BAUMG. Fl. Lips. p. 454. n. 1079. *Icon.* HAYNE II. t. 36. *Arctium tomentosum.* SCHKUHRE b. H. t. 227.

In ruderalis, ad vias. Floret Jul. Aug.

Offic. Radix Bardanae.

Radix crassa perpendicularis, subramosa, fibrosa, nigricans interne albido-flavescens, sapore subdulci, demum austero subamaro; ab utraque planta diligenter olim congerebatur. Vis radicibus inesse putatur resolvens, diaphoretica, diuretica. Mucilaginis inest copia. Utimur ea in morbis scrophulosis, syphiliticis, exanthematibus chronicis, nec frustra, unde et hodie speciebus s. d. lignorum immixtam deprehendimus.

CARDUUS. Calyx imbricatus ventricosus squamis spinosis. *Receptaculum* villosum. *Pappus* capillaris s. scaber.

C. *Marianus*, foliis amplexicaulibus hastato-pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis: spinis canaliculatis duplicato-spinosis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1659. n. 31. BAUMG. Fl. Lips. p. 451. n. 1073. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 79.

Rarius occurrit in cultis, aggeribus. Floret Jul. Aug.

Offic. Herba et Semina Cardui Ma-

riae in Pleuritide, Leucorrhoea, hydrophobia, cancro commendata exstant.

CNICUS *Calyx* imbricatus ventricosus, squamis spinosis *Receptaculum* villosum, Pappus plumosus.

C. oleraceus, foliis amplexicaulibus cordatis pinnatifidis ciliato-serratis, floribus terminalibus subracemosis bracteatis, bracteis subcoloratis ovatis, calycinis squamis lanceolatis spinosis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1778. n. 36. BAUMG. Fl. Lips. p. 448. n. 1065. *Icon.* SCHKUHR. b. H. t. 229.

In pratis nemorosis humidiusculis, uliginosis vulgaris, v. c. prope Gohlis, Eutritsch, Schönfeld etc. Floret Jul. Aug.

Planta tempore verno cocta omnino oleribus similis, ita quoque Brassicae loco Rossiae incolae eam adhibere solent.

ONOPORDON, *Calyx* imbricatus squamis mucronato-pungentibus. *Receptaculum* favosum. Pappus pilosus, caducus. *Semina* transverse sulcata.

O Acanthium, calycinis squamis patentissimis, foliis decurrentibus tomentosis sinuatis, dentatis spinosis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1686. n. I. BAUMG. Flor. Lips. p. 452. n. 1076. *Icon.* SCHKUHR b. H. t. 250.

In aggeribus circa urbem, in ruderalis ad pagos. Floret Jul, Aug.

Offic. Olim *Herba* et *Semina Acanthii vulgaris*. Succus recens expressus etiam in gangraena et ulceribus inveteratis laudatur.

CARLINA. *Calyx* radiatus squamis marginalibus longis, coloratis. *Corollae* flosculosae. *Re-*

ceptaculum paleaceo-setosum. *Pappus* paleaceo-plumosus.

- C. *vulgaris*, caule multifloro corymboso pubescente, foliis lanceolatis dentatis spinosis subtus pubescentibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1696. n. 9. BAUMG. Fl. Lips. p. 448. n. 1064.

In arenosis apricis, campestribus. v. c. am Bieniz, prope Maisdorf. Floret Jul. — Septb.

Offic. Radix Heracanthae nunc obsoleta.

- C. *acaulis* LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1693. n. 1. quam BAUMGARTEN etiam in Flora nostra enumerat et quae *Radice* *Carlinae* s. *Cardopatiæ* præbet, in locis ab illo indicatis nondum, in rupestribus vero Florae Erfurtensis vulgarem vidi.

BIDENS. *Calyx* subaequalis calyculatus. *Corollulae* rarius flosculo uno alterove instructae. *Receptaculum* paleaceum, planum. *Pappus* aristis 2. s. 4. reflexis et erectis scabris. *Semina* tetragona.

- B. *tripartita* floribus discoideis, calycibus exterioribus flore maioribus, seminibus erectis, foliis tripartitis lanceolatis dentatis LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1715. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 455. n. 1081. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 519.

In locis paludosis, ad fossas, stagna vulgaris. Floret Jul. Aug.

Offic. Radix et Herba Bidentis olim inter diuretica recepta est. Externe vulneraria.

EUPATORIUM. *Calyx* simplex aut imbricatus, oblongus. *Stylus* semibifidus, longus. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus s. scaber.

E. Cannabinum, foliis petiolatis tripartitis laciniis lanceolatis serratis intermedia longiora. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1756. n. 23. BAUMG. Fl. Lips. p. 454. n. 1080. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 110.

In locis aquosis, ad fossas v. c. prope Abt-naundorf, am Bienitz etc. Floret Jul. Aug.

Offic. Planta acris, amara. *Herba* et *Radix Eupatorii* antea ob vim purgantem in hydropo, ictero etc. laudata. Externe vulneraria.

SUPERFLUA.

TANACETUM. *Calyx* imbricatus, hemisphaericus, squamis acuminatis. *Corollae* radii obsoletae, trifidae. *Receptaculum* nudum. *Pappus* subemarginatus.

T. vulgare, foliis bipinnatifidis, laciniis serratis. HAYNE II. 6. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1814. n. 18. BAUMG. Fl. Lips. p. 457. n. 1083. *Icon.* BLACKW- Herb. t. 464. HAYNE II. t. 6.

In aggeribus, agrorum versuris, ad ripas fluviorum, v. c. Vogelwiese, Gesundbrunnen. Floret Jul. Aug.

Offic. *Herba Flores* et *Semina Tanacetii* amara, aromatica, fragrantia, oleo aethereo impraegnata, sapore amaro, aromatico prae-

data vim exercent anthelminthicam. In cardialgia huius infusum vinosum specificum praedicatur. Praeparata exstant *Pulvis*, *Oleum aethereum*.

ARTEMISIA. *Calyx* imbricatus squamis rotundatis, conniventibus. *Corollae* radii nullae. *Receptaculum* subvillosum, vel nudiusculum. *Pappus* nullus.

A. campestris, caulibus ramosis virgatis procumbentibus, floriferis adscendentibus, foliis setaceis glabris, radicalibus pinnatis, pinnis trifidis incanis, floribus oviformibus pedunculatis. HAYNE II. 9. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. 1827. n. 28. BAUMG. Fl. Lips. p. 456. n. 1084. *Icon*. SCHKUH. b. H. t. 240.

Ad vias in locis apricis v. c. prope Gohlis in via qua itur versus pagum Lindenthal.

Offic. Herba s. Summitates Artemisiae rubrae olim colligebantur.

A. Absinthium, foliis incanis, radicalibus triplicato-pinnatifidis, laciniis lanceolatis dentatis obtusis, caulinis bipinnatifidis, pinnatifidisve laciniis lanceolatis acutiusculis, floralibus indivisis lanceolatis, floribus globosis pedunculatis nutantibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1844. n. 63. BAUMG. Fl. Lips. p. 457. n. 1086. *Icon*. BLACKW. Herb. t. 17. HAYNE II. t. 11.

In ruderatis, hortis, ad pagos passim. Floret Jul. Aug.

Offic. Herba Absinthii. Etiam hoc tempore et merito saluberrimam hanc pharmacopoei herbam colligunt, quae inter amarissimas pertinet, aromaticas, fragrantas. Vis insignis stomachica, roborans, anthelminthica. Praeparatur ex ea: *Extractum, Essentia, Oleum destillatum et coctum*, olim et *conserva, Spiritus et Sal.*

Herba Absinthii siccata etiam externe haud raro adhibetur in clysmatibus visceralibus, balneis roberantibus etc.

A. vulgaris, foliis subtus tomentosis, caulinis pinnatifidis, laciniis lanceolatis subdentatis acutis, floralibus indivisis linearibus lanceolatis, floribus subsessilibus oblongis erectis, calycibus tomentosis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1845. n. 115. BAUMG. Fl. Lips. p. 457. n. 1078. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 431. HAYNE II. 12.

Var. *α. alba β. rubra.*

In aggeribus, ruderatis, in pagis ad muros, sepes vulgaris. Floret Jul. Aug.

Officinis praebuit olim *Herbam, Flores et Summitates Artemisiae albae*, E tomento in foliorum pagina inferiori foliolisque floralibus *Moxa* paratur, quam alii ab *A. vulgari* parari volunt.

A. Dracunculus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. p. 1848. n. 70. exotica, ad culinarem usum in hortis culta.

GNAPHALIUM. *Calyx* imbricatus squamis marginalibus rotundatis, scariosis nitidis, coloratis breviusculis. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus s. plumosus.

G. arenarium, herbaceum, foliis incanis tomentosis obtusis, radicalibus spathulato-lanceolatis, caulinis lineari-lanceolatis corymbo composito.

LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1867. n. 47.

BAUMG. Fl. Lips. p. 459. n. 1091. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 529.

β. aurantiacum, floribus dense approximatis. PERS. Synops. pl. II. p. 418.

In campis arenosis, versuris agrorum, in apricis, vulgare am Bieniz, ad pagum Stameln, Litschaene etc. Floret Jun. — Aug. var. *β.* passim occurrit, etiam prope Connewitz.

G. dioicum, sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, foliis radicalibus spathulatis, corymbo coarctato, floribus dioicis, calycinis squamis interioribus elongatis obtusis coloratis, LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1882. n. 87.

In arenosis, campestribus, pratis. Floret Maio, Jun.

Offic. Pes Catii s. Gnaphalii Floris hoc tempore plane obsoleti.

ERIGERON. *Calyx* fructus in quibusdam reflexus. *Corollae* radii lineares, angustissimae. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus.

E. acre, caule racemoso, pedunculis alternis plerumque unifloris. HAYNE. III. 30. LINN. sp. pl.

ed, WILLD. III. p. 1959. n. 22. BAUMG. Fl. Lips. p. 467. n. 1113. *Icon.* HAYNE. l. c. SCHKUHR. b. H. t. 241.

Ad vias, in sterilioribus locis, arenosis, elatis, in muris v. c. in pomorio ad portam Halensem, in via qua itur versus Lindenthal, in der Sandgrube etc. Floret Jul. Aug.

Offic. Herba Conyzae minoris ob acrimoniam olim in morbis pectoralibus ordinabatur.

TUSSILAGO. *Calyx* simplex, squamae aequales, discum aequantes, submembranaceae. *Corollae* femineae ligulatae s. edentulae. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex, sessilis.

T. Farfara, scapo unifloro subnudo bracteato, flore radiato, foliis cordatis angulatis dentatis subtus pubescentibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1967. n. 12. BAUMG. Fl. Lips. [p. 471. n. 1122. *Icon.* HAYNE. II. 16.

In agris argillosis humidiusculis v. c. prope Connewitz, am Thonberg, in fossis aquosis prope Rückmarsdorf, Markranstaedt etc. Floret Martio, Aprili, foliis praecox.

Offic. Radix, Folia s. Herba et Flores Farfarae.

Planta mucilaginis praebet multum cum extracto amaro, speciebus pectoralibus admiscere solent. Folia recentia vulneraria, siccata etiam resolventia. Radix vix amplius colligitur.

T. *Petasites*, scapo thyrsifero, floribus discoideis, pedicellis subsimplicibus. foliis oblongo-cordatis duplicato-dentatis subtus pubescentibus, denturis cartilagineis HAVNE. II. 7 17. et 7 18. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1971. n. 19. BAUMG. Fl. Lips. p. 472. n. 1123. et 1124.

7 thyrso ovato oblongo, [flosculis subomnibus hermaphroditis.

7 thyrso elongato-oblongo, flosculis subomnibus femineis. *Tussilago hybrida*. LINN. BAUMG. 1123.

Ad fossas im Poetengang, prope Eutritsch, Rückmarsdorf, Markranstaedt. Floret Aprili, Maio.

Offic. Radix Petasitidis omnino obsoleta.

Inprimis externe in ulceribus gravioribus adhibuerunt veteres, tamen etiam ob vires sudoriferas et alexiterias in Peste et Podagra laudant. Etiam ad acetum prophylacticum præparandum in usu fuit.

SENECIO. *Calyx* cylindricus, calyculatus: squamis apice sphacelatis. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex.

S. *vulgaris*, corollis nudis, foliis amplexicaulibus pinnatifidis dentatis, floribus corymboso-coarctatis LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1979. n. 20. BAUMG. Fl. Lips. p. 469. n. 1116. *Icon. Herb. BLACKW. t. 132.*

In cultis, ruderatis, agris, muris etc. Floret
Aprili — Octbr.

Inter plantas re vera vulnerarias salubres
retinendus, ulcera enim, contusiones et vulne-
ra parva herba contusa applicata sanantur.

- S. *Jacobaea*, radio patente, foliis lyrato-bipin-
natifidis dentatis glabris, caule erecto. LINN.
sp. pl. ed. WILLD. III. p. 1997. n. 76. BAUMG.
Fl. Lips. p. 470. n. 1120.

In pratis siccioribus, pascuis, ad vias in
locis aridis, elatioribus, copiose am Gesund-
brunnen, in pratis prope Leutsch, Lindenau,
Eutritsch. Floret Jun. Aug.

Offic. Flores et Herba Jacobaeae.

Usus eorum in angina et dysenteria obsolevit.

SOLIDAGO. *Calycis squamae imbricatae, clau-
sae. Corollae radii circiter quinque. Recepta-
culum nudum, punctis exaratum. Pappus sim-
plex.*

- S. *Virgaurea*, caule erecto tereti superne ramoso
pubescente, foliis caulinis lanceolatis utrinque,
attenuatis serratis, inferioribus ellipticis scabri-
usculis, racemis erectis, ligulis elongatis WALLR.
ann. bot. p. 103. n. 190. LINN. sp. pl. ed.
WILLD. III, p. 2065. n. 35. BAUMG. Fl. Lips.
p. 468. n. 1114. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 169.

In pascuis silvaticis siccioribus, in collibus,
v. c. am Bieniz, in silva academica. Floret Jul.
Aug.

Offic. Herba Virgae Aureae s. Consolidae Saracenicae Veterum.

In diarrhoea, infarctis, hydropē, ictero et externe in vulneribus et ulceribus adhibuere veteres.

INULA. *Calyx* squarrosus, aut imbricatus. *Corollae* radii numerosae. *Antherae* basi in setas duas desinentes. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex.

- I. *dysenterica*, foliis amplexicaulibus cordato-oblongis nudis serratis subtus pilosis, caule pubescente paniculato, ramis lateralibus apice longioribus patulis, calycinis squamis setaceis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2091. n. 5. BAUMG. Fl. Lips. p. 466. n. 1107.

In fossis profundioribus passim, v. c. ad Kundorf, am Bieniz. Floret Jul. Aug.

Offic. Arnicae Suedensis s. spuriae s. Conyzae mediae Herba.

In dysenteria antehac et in haemorrhagiis utilis putabatur, etiam in scabie laudant. Nobis obsoleta.

- I. *Pulicaria*, foliis amplexicaulibus oblongis undulatis villosis, caule erecto paniculato, pedunculis unifloris oppositifoliis, floribus subglobosis, radio minutissimo. LINN. sp. pl. ed. WILLD, III. p. 2093. n. 8. BAUMG. Fl. Lips. p. 466. n. 1108. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 103. Caule prostrato, quem cel. PERSOON. in diagno-

sin recepit, equidem non legi, sed semper erecto. Cf. PERS. Synops. II. p. 450, n. 11.

In inudatis, fossis, ad stagna, vulgaris, v. c. Vogelwiese, hinter dem Brandvorwerk etc. Floret Jul. Aug.

Offic. Herba Pulicariae eodem modo ac praecedentis olim usitata nunc obsoleta.

ARNICA. *Calyx* foliolis aequalibus. *Corollae* radiis saepius filamentis quinque absque antheris. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex.

A. montana, foliis ovatis integris: caulinis geminis oppositis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2016. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 464. n. 395. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 595. SCHKUH. b. H. t. 248.

Radix perennis, obliqua, fibrosa, nigrescens; caulis teres erectus, simpliciusculus, superne magis hirsutus pauciflorus; pedunculus terminalis solitarius, axillares oppositi uniflori; folia radicalia ovata obtusiuscula nervosa glabra, margine pubescentia, caulina lanceolata opposita hirsuta. Radii squamis calycinis longiores. — In montibus caulis simplex, in pratis depressis ramosus occurrit.

In montosis, collibus, passim legi am heitern Blick in betuleto, frequentius crescit in pratis montosis ad oppidum Grimmam et in montibus Thuringiae. Floret Jul. Aug.

Offic. Flores, Radix olim et *Herba Arnicae*.

Qualit. Est planta omnium affinium viribus praestantissima. Oleum continet aethereum, resinam acerrimam, substantiam saponaceam, pelucidam, rubicundam, acrimonia abundantem, et mucilaginosam partem. Folia minorem resinosi sed maiorem gummosi extracti, radices plus olei aetherei et praeter resinam et saponaceam substantiam principium coriario simile continent. Odor florum siccatarum nares vellicat aromaticus, sternutatorius.

Vires et usus. Est praestantissimum excitans in malis nervosis, omnibusque fere e torpore et inertia vasorum nervorumque ortis morbis. Praeterea ad morbos pulmonales debellendos, ubi inflammatio absit, aptissimum medicamentum. In amaurosi inchoante vis est probata.

Praeparata. Pulvis, Extractum.

Cf. JOH. MICH. FEHR Miscell. Natur. Curios. Dec. I. An. IX et X. Obs. II. p. 27. 1712.

BELLIS. *Calyx* hemisphaericus: squamis aequalibus. *Semina* obovata. *Receptaculum* nudum, conicum. *Pappus* nullus.

B. perennis, scapo nudo unifloro, foliis obovatis subtrinerviis HAYNE III. 24. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2121. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 460. n. 1095. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 200. HAYNE l. c. SCHKUHR t. 251.

In pascuis, campis, pomariis, cultis, apri-

cis ubique vulgatissima. Floret ab Aprili ad Novbr.

Offic. Olim *Herba* et *Flores Bellidis minoris*. Flores plerumque varietas hortensis plena flore sanguineo - purpureo praebeat. Veteres nimis hanc herbam laudibus extulerunt.

Praep. Tinctura Florum Bellidis.

CHRYSANthemum. *Calyx* hemisphaericus, imbricatus: squamis marginalibus membranaceis. *Receptaculum* nudum. *Pappus* nullus.

Ch. *Leucanthemum*, foliis amplexicaulibus lanceolatis serratis, basi inciso-dentatis, caule erecto ramoso. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2142. n. 5. BAUMG. Fl. Lips. p. 462. n. 1099. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 42.

In pratis, agrorum limitibus, agris, copiose, Floret Jun. Jul.

Offic. Bellidis maioris s. pratensis Herba et *Flores* veteribus diuretica, vulneraria.

Ch. *montanum*, foliis inferioribus in petiolum longum decurrentibus; spathulatis serratis superioribus lineari-lanceolatis inciso-serratis, amplexicaulibus, caule unifloro. — LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2143. n. 6.

Simile Ch. *Leucanthemo* sed totum hirsutum, planta videtur rara. Legi in silva prope Kleinwetteritsch mense Augusto.

Ch. *inodorum*, receptaculo inani conico v. hemisphaerico, foliis subtripinnatifidis: laciniis

linearibus. HAYNE I. 4. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2157. n. 17. (*Pyrethrum inodorum*.) — BAUMG. Fl. Lips. p. 462. n. 1100. *Icon*. HAYNE I. c.

In agris, ruderatis. Floret Jul. — Septb.

M. Chamomillae simillimum at facile notis supra indicatis et odoris absentia distinguendum.

PYRETHRUM. *Calyx* hemisphaericus imbricatus, squamis acutiusculis margine scariosis. *Receptaculum* nudum. *Pappus* marginatus.

P. Parthenium, foliis pinnatis, pinnis oblongis obtusis pinnatifidis dentatis, summis confluentibus, caule ramoso, floribus corymbosis, radio calyce fere duplo longiore, pappo dentato. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2155. n. 15. *Matricaria Parthenium* LINN. System. BAUMG. Fl. Lips. p. 461. n. 593.

In pagis ad sepes in ruderatis v. c. Burghausen, Connewitz etc. Floret Jul. Aug.

Offic. Herba et Flores Matricariae.

Viribus Matricariae Chamomillae similis at non praestans.

MATRICARIA. *Calyx* planus, imbricatus, squamis margine scariosis. *Receptaculum* nudum, cylindraceo-conicum. *Pappus* nullus.

M. Chamomilla, receptaculo cavo conico, foliis subbipinnatifidis; laciniis linearibus. HAYNE I. 3. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2161. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 461. n. 1098. *Icon*. BLACKW. Herb. t. 298. SCHKUHR. b. H. t. 253. b. HAYNE, I. c.

Radix fibrosa, annua; caulis, saepius plures ex una radice, $\frac{1}{2}$ — 1 pedalis, ramosissimus, obsolete sulcatus, medius aut solitarius erectus, reliqui adscendentes; rami alterni ramosi; folia sessilia, alterna, subcarnosa; inferiora bipinnatifida, superiora pinnatifida; laciniae lineares, subcarinatae; Flores compositi disco flavo, radiis albis; pedunculi terminales subsimplices; perianthium hemisphericum, squamis linearibus subimbricatis.

Planta arvensis in Flora nostra vulgatissima, in Thuringia non obvia.

Offic. Flores Chamomillae vulgaris s. nostratis, interdum et Herba.

Qualit. Graveolens, fragrans, sapore amaro oleoso. Multum continet olei unguinosi et aetherei cum extracto amaro.

Vires. Notissimum est stimulans, diaphoreticum, diureticum, carminativum sed etiam antifebrilis vis recenti tempore inventa est.

Usus. Pulvere utimur in febribus intermittentibus, spasmis, obstructionibus; *infuso* quod vulgatissima est forma in colicis affectionibus, ad ventriculum stimulandum et corroborandum, flatusque pellendos. *Oleo aethereo* insignis inest vis antihysterica, antihypochondriaca; *extractum* in dysenteria, diarrhoea, morbo haemorrhoidali laudibus floret. Usus externus florum ad tumores discutiendos, maturandos, ad rheumaticos dolores obtundendos, nec non ad

cataplasmata emollientia cum ejusdem emollientis indolis aliis remediis v. c. avena excorticata cocta commixti, ad clysmata, balnea, pediluvia notissimus.

ANTHEMIS. *Calyx* hemisphaericus, subaequalis. *Flosculi* radii plures quam quinque. *Receptaculum* paleaceum: paleis planis, apice acuminatis rigidis. *Pappus* nullus s. margo membranaceus.

A. arvensis, receptaculo inani conico, paleis cymbiformibus, foliis subpinnatifidis pubescentibus: laciniis lanceolatis. HAYNE. I. 5. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2180. n. 16. BAUMG. Fl. Lips. p. 477. n. 1138. *Icon.* HAYNE. I. 5.

In agris inter segetes et in locis incultis. Floret Jun. Aug.

Non quidem officinali usui inserviens attamen ob magnam cum M. Chamomilla similitudinem notanda.

A. Cotula, receptaculo inani conico, paleis setaceis, foliis subtripinnatifidis glabris: laciniis lanceolatis HAYNE. I. 6. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2181. n. 18. BAUMG. Fl. Lips. p. 477. n. 1039. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 67. HAYNE. I. t. 6. SCHRUHR. b. H. t. 254.

Passim in agris, rarius in Flora nostra v. c. vor dem Hinterthore, copiosam hanc vidi ad lacum salsum in Mansfeldia, forte *Pyrethrum maritimum* quod *Ruppius* ibi invenit.

Offic. Cotulae foetidae Herbam et

Flores antepileptica, anthysterica, anthydropica habuere veteres.

A. nobilis, LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2180. n. 15. praebet *Flores chamomillae Romanae* quibus vis eadem ac *M. chamomillae* sed maiori gradu inest.

ACHILLEA. *Calyx* ovatus, imbricatus. *Flosculi* radii circiter quatuor, dilatati. *Receptaculum* paleaceum. *Pappus* nullus.

A. Millefolium, foliis bipinnatis glabriusculis, pinnarum laciniis linearibus dentatis LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2208. n. 36. BAUMG. Fl. Lips. p. 479. n. 1142. *Icon.* BLACKW. Herb. tab. 18.

Var. β . flore puniceo.

Ad vias, agrorum versuras limitesque minime rara, β . passim v. c. prope Probsthaide, Maisdorf.

Offic. Herba, Flores s. Summitates Millefolii.

Simillimae ac *M. chamomilla* indolis herba saluberrima, graveolens est, spirans oleum aethereum, sapore praedita amaro, aromatico, paulum adstringente. Continet oleum aethereum in omnibus partibus, extractum spirituosum in floribus, -aquosum in foliis caulibusque.

Vires habet abdominis vasa insigni stimulo ad functiones accelerandas urgendi, flatus pellendi, digestionem restituendi; pectori non minus iuvat. Utimur ea saepissime in abdomina-

li atonia ubi fortius adstringentibus uti nocivum sit, summis laudibus in passivae indolis haemorrhagiis dignissima. In hysterico hypochondriacoque malo *Extractum* et *Oleum* utilissima, quae etiam in pectoralibus morbis, ubi imprimis ex abdominali atonia orti sint, multum valent. Vis narcotica a veteribus Herbae adscripta vix inest, at vulneraria haud contemnenda.

- A. *nobilis*, foliis caulinis bipinnatifidis, laciniis linearibus subdentatis, rachi alata dentata, radicalibus triplicato-pinnatifidis, corymbo composito fastigiato. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2211. n. 42. BAUMG. Fl. Lips. p. 479. n. 1143.

In locis a BAUMGARTENIO indicatis a me certe nondum, in Thuringiae vero muris pagorum oppidorumque saepius lecta vi superat nostratem.

- A. *Ptarmica*, foliis linearibus acuminatis aequaliter argute serratis glabris. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2191. n. 3. BAUMG. Fl. Lips. p. 478. n. 1141. Icon. BLACKW. Herb. t. 276.

In pratis silvaticis, locis humidiusculis v. c. am Gesundbrunnen, prope Leutsch et Lindenau. Floret Jun. Aug.

Offic. Flores, Herba et Radix Ptarmicae olim inter errhina, sternutatoria, vulneraria, sialagoga laudabantur.

FRUSTRANEA.

CENTAUREA. *Calyx* varius. Corollae radii infundibuliformes, longiores, irregulares. *Receptaculum* setosum. *Pappus* simplex, varius.

C. Cyanus, calycibus serratis, foliis linearibus sessilibus integerrimis, infimis basi pinnatifidis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2291. n. 35. BAUMG. Fl. Lips. p. 482. n. 1148. Icon. BLACKW. Herb. t. 270.

Inter segetes vulgarissima, Floret Jun. — Aug, interdum usque ad Octobr.

Offic. Cyani Flores nonnisi ob suavum colorem cyaneum ad tingendas species fumales, morsulas etc. colliguntur, Herba edulis.

C. Calcitrapa, calycibus subduplicato-spinosis sessilibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloso. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2317. n. 93. BAUMG. Fl. Lips. p. 484. p. 1155.

Hoc tempore rarior prope Lindenthal. Floret Jun. — Septbr.

Offic. Calcitrapae Radix antea inter antifebrilia et lithonriptica laudabatur.

NECESSARIA.

Calendula officinalis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. III. p. 2340. n. 4. apud nos nonnisi quasi sponte crescit in hortis, in Europa australi sponte in agris. *Calendulae Herba, Flores, Conserva, Aqua, Acetum, Se-*

mina, quum singula nil agant merito iureque
absoluta.

GYNANDRIA.

Obs. Orchidearum familia naturalis hisce
distinguitur notis: Calyx irregularis, supe-
rus, coloratus, tetra-heptaphyllus, foliola duo-
-quatuor petaloidea. Nectarium s. labellum
stylo insertum, saepius calcaratum. Genita-
lia in columnam connata. Filamentum, di-
stinctum nullum. Anthera una stylo adnata,
aut postica v. terminalis. Stylus crassus teres
s. angulatus. Stigma convexum aut concavum
maiusculum, stylo insidens. Capsula unilocu-
laris costata s. angulato-striata, trivalvis, sub
angulis dehiscens. Semina plurima, minutis-
sima. — Radix in plurimis bituberosa aut pal-
mata ex amylo constans. Caulis simplex vagi-
natus. Folia simplicia vaginantia.

MONANDRIA.

ORCHIS. *Calyx* ringens, foliolo superiore fornicato
Labellum dilatatum, basi subtus longe calcara-
tum. *Anthera* terminalis, adnata.

* Bulbis testiculatis.

O. Morio, labello lato trilobo, medio emargina-
to, lateribus crenulatis reflexis, calcare apice
bifido adscendente, foliolis calycinis ovalibus ob-
tusis conniventibus. *PERS. Synops. II. p. 505.*
n. 26. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 18. n. 24

BAUMG. Fl. Lips. p. 16. n. 41. *Icon.* SCHKUH. b. H. t. 271.

In pratis siccis, locis aridis elatioribus v. c. am Bienitz etc. Floret Maio.

O. Mascula, labello trifido crenulato, intermedio longiore bilobo, calcare subrecurvo obtuso, filiolis calycinis lateralibus exterioribus subfalcatis acutis reflexis PERS. Synops. II. p. 504. n. 29. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 18. n. 25. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 53.

In pratis silvaticis passim am Bieniz, prope Schönfeld. Floret Jun. Jul.

O. militaris, labello trifido punctis scabro, laciniiis linearibus, media biloba lata productiore denticulo interjecto, foliolis calycinis confluentibus impunctatis. PERS. synops. II. p. 504. n. 54. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 22. n. 23. BAUMG. Fl. Lips. p. 17. n. 43.

In pratis humidiusculis v. c. in silva academica, am Bieniz prope Kleindölzig. Floret Jun. Julio.

Offic. Radices Salep, Saleb s. *Salap* sunt harum Orchidearum bulbi apud nos et per Europam fere totam crescentium. Colliguntur raro in Europa, sed ex Oriente grandiores ab soli illius macietatem in fila alligatae, siccatae nobis adducuntur. Bulbi sunt ovaes, siccati fructus Avellanae magnitudine, glabri, subpellucidi. Cocti in pulmentum abeunt, quod

ptihisicis vel aliis aegrotis quibus nutritione efficaciori opus est porrigere solemus. Etiam *Pulvis* cum gummate arabico et saccharo contritus in tussi ordinatur interdum.

O. bifolia, labello lineari integerrimo obtuso, cornu germine duplo longiore, foliis caulinis vaginantibus brevissimis, radicalibus binis oblongis basi attenuatis LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 10. n. 6. BAUMG. Fl. Lips. p. 17. n. 44. Flos albedo-virescens. *Icon.* SCHKUH. b. H. t. 271.

In pratis silvaticis vulgaris v. c. prope Leutsch, am Bieniz, in silva academica etc. Floret Maio, Jun.

Offic. Huius bulbi eiusdem cuius descripti indolis ac formae nomine *Radici Satyrii* in officinis prostant, verum tamen nonnunquam et bulbos divisos s. palmatos *O. maculatae* et *latifoliae* hoc nomine asservatas inveni.

O. coriophora, labello trilobo, medio angustiore longiore, lateribus reflexis denticulatis, calcare brevi, foliolo calycino conniventibus. PERS. Synops. II. p. 503. n. 23. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 16. n. 21.

Nonnisi varietas minor apud nos occurrit, specimina ex Europa australi multo maiora. Flores odore cimicino foetidi.

In pratis am Bieniz. Floret Jun. Jul.

O. palustris, labello trilobo lato basi unidentato, lobis lateralibus rotundatis, integris, medio bifido, subrecurvo, foliolis calycinis lateralibus

exterioribus oblongis divaricato-patulis, foliis sublinearibus. PERS. Synops. II. p. 504. n. 30. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 26.

In prato magno humidiusculo in silva academica ad fossam. Floret Junio.

** Bulbis palmatis.

O. latifolia, labello trilobo, lateribus reflexo, conico, calcare foliolis calycinis exterioribus lateralibus patentibus, bracteis flore longioribus, caule fistuloso apice polygono, radicibus rectis. PERS. synops. II. p. 505. n. 51. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV, p. 28. n. 46. BAUMG. Fl. Lips. p. 16. n. 39. *Icon. BLACKW. Herb. t. 405.*

Var. β . Foliis cauleque nigro-maculatis.

γ . *Angustifolia*, foliis lineari-lanceolatis, spica conferta, labello subcuneato, lobulo intermedio absoleto, bulbo bipartito divaricato. LOISEL. PERS. Synops. *latifolia* β .

Est species nobis vulgatissima in pratis paludosis, humidiusculis, β . prope Schönfeld non rara, in siccioribus.

O maculata, labello trilobo plano crenulato, medio minore acuto integro, calcare germine brevior recto, foliolis calycinis erectis divaricatis, radicalibus patentibus. PERS. Synops. II. p. 505. n. 54. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 31. n. 51. BAUMG. Fl. Lips. p. 15. n. 38. Flores albido-incarnati, nigro maculati, caulis cubitalis, solidus.

In silvaticis passim. In silva academica.
Floret Jul. Aug.

Offic. Radix Palmatae.

- O. conopsea*, labello trifido subaequali subintegro, calcare setaceo germine longiore, foliolis calycinis lateralibus exterioribus patentissimis, spica cylindracea, floribus sparsis. PERS. Synops. II. p. 505. n. 55. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 32. n. 53. BAUMG. Fl. Lips. p. 18. n. 45.

In pratis silvaticis, collibus v. c. in silva academica, am Bieniz. Floret Mai. Jun.

- O. odoratissima*, labello trilobo integro, medio latiore, acutiore, calcare recurvo brevi, foliis linearibus. PERS. Synops. II. p. 505. n. 57. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 32. n. 52. Odore suavissimo violario praedita, praecedenti similis at minor.

In pratis siccioribus prope Kleindölzig, ante me legit amic. KUNZE. Floret jun. Jul.

- O. sambucina*, labello serrulato subrotundo subtrilobo, medio emarginato, calcare conico, foliolis calycinis exterioribus lateribus reflexis, bracteis longitudine florum. PERS. Synops. II. p. 505. n. 53. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 30. n. 50. BAUMG. Fl. Lips. p. 14. n. 37. Flores flavi, labello lato, odore sambuci. *Icon.* BAUMG. l. c. tab. II.

In montosis, a me quidem in Flora nostra nondum lecta. BAUMGARTENIUS eam am Bieniz

et prope Kriphaene se legisse affirmat. In Thuringiae montosis v. c. prope Naumburg crescunt cum hac et aliae elegantissimae huius generis species, v. c. *O pallens* WILLD. p. 27. n. 42. *O. variegata* p. 21. n. 31. *O fusca* p. 23. n. 34. et plures ex aliis Orchidearum generibus pulcherrimae plantae.

EPIPACTIS. *Calyx* erecto-patens. *Labellum* ecalcaratum, planum, pendulum apice bifidum.

E. ovata, caule bifolio, foliis ovatis, labello lineari. PERS. Synops II. p. 513 n. 2. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 87. n. 10. *Ophrys ovata*, BAUMG. Fl. Lips. p. 19. n. 48.

In pratis silvaticis, pomariis, v. c. prope Lindenau, am Bieniz, in silva academica, prope Connwitz, hinter dem Brandvorwerk. Floret Mai. Jun.

Offic. Herba Bifolii olim in medicina usitata.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA. *Calyx* nullus. *Corolla* monopetala, ligulata, basi ventricosa. *Capsula* sexlocularis, polysperma, infera.

A. Clematitis, foliis subrotundo-cordatis obtusiusculis petiolatis, caule erecto, pedunculis unifloris, aggregatis, corollis erectis, labio oblongo. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV p. 163. n. 37. BAUMG. Fl. Lips. p. 203. n. 526. *Icon. SCHKUHR. b. II. t. 276.*

In hortis nonnunquam quasi, in vineis vero in Thuringia et prope Roegiltz re vera sponte crescit. Planta sapore amarissimo, acri praedita, antea etiam interne exhibebatur, nunc nonnisi ad ulcera inveterata sananda a rusticis quaeritur. *Radix Aristolochiae vulgaris* interdum desideratur.

MONOECIA.

TRIANDRIA.

CAREX. *Amentum* imbricatum.

Mas. Calyx squama solitaria. Corolla nulla.

Femina. Calyx squama solitaria. Corolla ventricosa, monopetala, apice bidentata. *Stigmata* 2 — 3. Nux tripuctra, corolla persistente inclusa.

* spicis androgynis sessilibus alternis.

C. intermedia, spica androgyna composita, spiculis alternis confertis inferioribus remotiusculis, superioribus et inferioribus femineis, intermediis masculis, stigmatibus binis, fructibus ovatis marginatis bifidis ciliato-serratis, culmo

erecto. W. — LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 224. n. 35. *Icon.* SCHKUHR. Caric. tab. B. fig. 7.

In pratis paludosis copiose, v. c. prope Schoenfeld. Floret Maio, Jun.

Huc referenda est *C. arenaria*. BAUMG. Fl. Lips. p. 69. n. 198. huic simillima, quae vero in Flora nostra non crescit, nec, uti iam Cel. SCHWAEGRICHEN Topogr. II. p. 16. probat, crescere potest; habitat enim in arena mobili, radicibus late circumrepens, et nuper extra fines Florae nostrae in Mansfeldia vidi ad lacum salsum Florae Halensis civem.

In officinis etiam radicem *C. intermediae* haud raro loco illius *C. arenariae* vel saltem huic immixtam reperi. Differt *C. arenaria* spica androgyna composita, spiculis alternis confertis, superioribus masculis, inferioribus feminis, intermediis apice masculis, stigmatibus binis, capsulis ovatis marginatis, bifidis ciliato-serratis, culmo incurvo. WILLD. *Icon.* SCHK. Caric. t. B. D. d. fig. 6.

TETRANDRIA.

ALNUS. Mas. Amentum receptaculis cuneiformibus truncatis trifloris compositum. Calyx squama. Corolla quadripartita.

Femina. Amentum. Calyx squamae biflorae.

Corolla nulla. Semina compressa ovata nuda.

A. *glutinosa*, foliis subrotundo-cuneatis obtusis subretusis glutinosis, axillis venarum subtus

villosis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 334.
n. 1. *Betula Alnus*. LINN. Syst. BAUMG. Fl. Lips.
p. 101. n. 285.

In humidis, nemoribus, ad fossas, paludes
ubique. Floret Mart. Aprili.

Offic. Olim Cortex et Folia Alni.

Lactis secretionem augere dicuntur folia
infusa; externe in saccum linteum congesta
aegrotorum pedibus applicantur, ad horum su-
dores suppressos restituendos.

URTICA. Mas. *Calyx* tetraphyllus. *Corolla*
nulla. *Nectarium* centrale, cyathiforme.

Femina. Calyx bivalvis. *Corolla* nulla.
Semen nuum nitidum.

U. urens, foliis oppositis ellipticis subquinque-
nerviis argute serratis, spicis glomeratis gemi-
uatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 352.
n. 16. BAUMG. Fl. Lips. p. 99. n. 282.

Ad vias et sepes, in ruderalis. Floret
Jun. Jul.

Offic. Herba Urticae minoris.

U. dioica, foliis oppositis cordatis ovato-lanceo-
latis grosse serratis, floribus dioicis, spicis
paniculatis glomeratis geminatis petiolo longio-
ribus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 352.
n. 17. BAUMG. Fl. Lips. p. 100 n. 283.

Ad dumeta, sepes, in cultis, ruderalis in-
primis vero in silvis. Floret Jul. Aug.

*Offic. Herba, Radix et Semen Ur-
ticae maioris.*

Utriusque speciei herbae recentis externus ad urticationem usus haud ignotus est. Interne a veteribus herbae siccatae infusum, ubi diuresin aut diaphoresin excitare voluerunt, exhibitum esse narratur.

PARIETARIA. Flores polygami.

Hermaphrod. Calyx quadrifidus. Corolla nulla, Stamina elastica. Stylus unus, Semen unum, superum.

Femina. Calyx diphyllus. Semen calyci sicco elongata tecto.

P. officinalis, foliis oblongo-avatis utrinque acuminatis pellucido punctatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 953, BAUMG. Fl. Lips. Icon. BLACKW. Herb. t. 156.

Ad muros, sepes v. c. in pago Lindenau, ad meatum angustiores quo a stagno ad dextram patet aditus ad pagum. In locis a BAUMGARTENIO indicatis evanuit.

Offic. Herba Parietariae s. Helxines.

Olim etiam haec inter emollientia, obtundentia diuretica, recepta, in Hydrope, calculo, tabe, tussi, stranguria adhibebatur.

PENTANDRIA.

XANTHIUM. *Mas.* Calyx communis imbricatus. Corollae monopetala, quinquefida, infundibuliformis. Receptaculum paleaceum.

Femina. Calyx involucrum diphyllum, uniflorum. Corolla nulla. Drupa sicca, mucicata, bifida. Nux bilocularis.

- X. *Strumarium*, caule inermi, foliis cordatis trinerviatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 573. n. 1. Icon. SCHKUH. b. H. t. 291.

Passim in ruderatis, v. c. in der Sandgrube. Floret Jul. Jul.

Offic. Herba et Semen Xanthii s. Bardanae minoris adstringentibus olim adnumerata.

P O L Y A N D R I A.

POTERIUM, Mas. Calyx tetraphyllus. Corolla quadripartita. Stamina 30—50.

Femina. Calyx tetraphyllus. Corolla quadripartita Pistilla duo. Bacca e tubo corollae indurato.

- P. *Sanguisorba*, inerme, caulibus subangulosis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 421. n. 1.

In locis a Baumgartenio indicatis nunc non legitur et ibi unquam adfuisse miror, crescit enim in montibus calcareis, v. c. prope Leucopetram, et per omnem Thuringiam. Floret Julio. Aug. Colitur etiam in hortis ad usum culinarem.

Offic. Herba et Semen Pimpinellae Italicae, ob vim adstringentem olim in haemoptysi, dysenteria laudata, eorumque inprimis infusum vinosum tempore verno bibendum

commendatur. *Radix* eiusdem nominis ad *Sanguisorbau officinalem* Class. IV. Ord. I. pertinet.

Juglans regia, LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 455. n. 1. Persiae indigena colitur apud nos. Putamen nucis Juglandis inprimis ad Extractum parandum etiam hoc tempore officinale. Olim et Nuces, Dissepimenta, Cortex viridis, Oleum et Roob prostabant.

QUERCUS. *Mas.* Calyx quinquefidus fere. Corolla nulla. Stamina quinque — decem.

Femina. Calyx monophyllus, integerrimus scaber. Corolla nulla. Styli duo - quinque. Nux coriacea calyce persistente basi cincta.

Q. *Robur*, foliis oblongis petiolatis glabris sinuatis, lobis rotundatis, fructibus oblongis sessilibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 450. n. 64. BAUMG. Fl. Lips. p. 306. n. 761.

In silvis arbor primaria. Floret Maio.

Q. *pedunculata*, foliis oblongis subsessilibus glabris sinuatis, lobis rotundatis, fructibus oblongis pedunculatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 450. n. 65. *Quereus femina*. BAUMG. Fl. Lips. p. 306. n. 762 *Icon*. BLACKW. Herb. t. 487.

In silvis cum praecedenti specie. Floret Aprili, Maio.

Offic. Utraque, sed haec plerumque species officinis olim praebuit *Folia*, *Glandes*, *Cupulas* et *Corticem Quercus*. Hodie *Glandes* et *Cortex* in usu sunt. Cortex ramorum

stirpiumque iuniorum vi eximia adstringentē praeditus est; eius decoctum ad atonica ulcera inveterata sananda, laxitatem partium removen-
dam aptissimum. Glandes quercuum nostrarum bene maturatae, siccatae austero sapore, succo inhaerente, expertes ad panem conficiendum cum farina commixtae in Suecia certe, anno-
nae caritate impenduntur. Tostarum decoctum notum est remedium in tractus intestinorum laxitate ac inertia mesenterii glandularum, ita-
que utimur eo in scrophulis, atrophia et rachi-
tide infantum. Cf. SCHROETER von den Wir-
kungen der Eicheln. Götting. 1774.

BETULA. *Mas.* *Amentum* imbricatum, squamis peltatis trifloris. *Calyx* squama. *Corolla* nulla. *Stamina* decem — duodecim.

Femina. *Amentum* imbricatum. *Calyx* squama biflora. *Corolla* nulla. *Semen* unum alatum.

B. alba, foliis deltoidibus acutis duplicato-ser-
ratis glabris, strobilorum squamis lobis latera-
libus rotundatis, petiolis glabris pedunculo lon-
gioribus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 462.
n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 100. n. 284. *Icon.*
SCHKUR b. II. t. 288.

Var. *β. pendula*, foliis ovato-acumina-
tis inciso-serratis glabris, ramis flac-
cidis pendulis. ROTH.

Arbor in silvis copiosa v. c. am heitern

Blick. in silva academica, prope Machern etc.
Floret Aprili. Maio.

Offic. Folia, Epidermis, Cortex,
Succus s. Aqua s. Lympha Betulae.
Praep. Oleum Rusci.

E stirpibus verno tempore ante foliorum
explicationem, ubi foramini terebratione facto,
tubulus e penna anserina confectus immitatur,
sat magna copia effluit succi dulcis, incolis mōn-
tium potus iucundus, leniter purgans. Reliquae
partes ad medicinalem usum hoc tempore vix
colliguntur.

CORYLUS. *Mas.* Amentum imbricatum. *Calyx*
aquama, *Corolla* nulla. *Stamina* octo.

Femina. *Calyx* quinquepartitus, lacerus.
Corolla nulla. *Styli* duo. *Nux* ovata, calyce
persistenti cincta.

C. Avellana, stipulis oblongis obtusis, calyci-
bus fructus campanulatis apice patulis lacero-
dentatis, foliis subrotundis cordatis acuminatis
LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 420. n. 1. BAUMG.
Fl. Lips. p. 308. n. 764. *Icon.* SCHKUHRT. b. H.
t. 305.

In silvis nostris fere omnibus. Floret
Martio.

Offic. Olim *Lignum* et *Nuces Avellanae*
et *Sulphur Corylinum* (pollen).

ARUM. *Spatha* monophylla, cucullata. *Spadix*
supra nudus, inferne femineus, medio stami-

neus. Infra glandulae cirrhosae. *Bacca* utplurimum monosperma.

A. maculatum, acaule, foliis hastato-sagittatis, lobis deflexis, spadice clavato spatha brevior. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 483. n. 17. BAUMG. Fl. Lips. p. 302. n. 753. Icon. BLACKW. Herb. t. 228.

In silvaticis umbrosis v. c. im Rosenthale passim. Floret Maio.

Offic. Radix Ari s. Aronis olim et *Foeculi Aronis*. Constat radix ex amylo, nonnisi recens acris principii copia quadam impraegnato. Olim in morbis pituitosis laudata est, hodie vix adhibetur.

M O N A D E L P H I A.

PINUS. *Mas.* Calyx tetraphyllus. *Corolla* nulla. *Stamina* plurima. *Antherae* nudae.

Femina. Calyx strobili: squama biflora. *Corolla* nulla. Pistillum unum. *Nux* ala membranacea excepta.

P. silvestris, foliis geminis rigidis, canis ovato-conicis longitudine foliorum subgeminis basi rotundatis. LINN, sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 494. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 373. n. 923. Icon. BLACKW. Herb. t. 190.

In silvis v. c. in academica, am Bienitz, prope Lindenthal, Zschocher etc. Floret Maio.

Offic. Resina, Lignum et Turiones Pini.

Praeparantur ex pinorum hac et aliis speciebus: *Terebintina communis*, *cocta*, *Oleum terebintinae*, *pix*, *calophonium*, *pix liquida*.

Cucumis sativus LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 615. n. 13. colitur apud nos frequens in hortis. *Semina Cucumeris* olim officinalia cum illis *C. Melonis* p. 613. n. 8.

Cucurbitae Peponis p. 609. n. 8. et *C. Citrulli* p. 610. n. 12. dicebantur *Semina* IV. *frigida maiora*.

BRYONIA. *Mas*, *Calyx* quinquedentatus. *Corolla* quinquepartita. *Filamenta* tria.

Femina. *Calyx* quinquedentatus. *Corolla* quinquepartita. *Stylus* trifidus. *Bacca* subglobosa, polysperma.

B. alba, foliis cordatis quinquelobis dentatis calloso-punctatis scabris, floribus racemosis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 621. n. 19. BAUMG. Fl. Lips. p. 497. n. 1182. Flores monoici baccae nigrae. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 533.

In dumetis, ad sepes etiam in ambulacro, et horto Bosiano, frutices arboresque scandens. Floret Maio, Jun.

Offic. Radix, Baccae, Semina Bryoniae.

Radix amyli et acris principii multum continet, alba, fusiformis, carnosa, saepe in diametro sex pollicaris, inferne subfibrosa. Sapor est acerrimus, amarus, nauseosus. Vis ei ad.

scribebatur purgans, anthelmintica, emmenagoga; laudatur in hydrope, mania, epilepsia, rheumatismo, ganglio, sugillatione. Praeparatur exinde *Extractum*, *Faeculae* et *Cataplasma resolvers*. Novissimo tempore HAHNEMANNO auctore inter prophylactica in epidemiis nervosis praedicata.

B. dioica, foliis cordatis palmatis quinquelobis dentatis calloso-punctatis, floribus racemosis dioicis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 621. n. 20. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 37. Praecedenti similis, flores autem dioici, baccae rubrae.

In iisdem cum praecedente locis, *rarius*. Floret Jun. Jul.

Radix eiusdem fere ac illius indolis.

D I O E C I A.

D I A N D R I A.

SALIX. *Mas.* *Amentum* cylindraceum. *Calyx* squama. *Corolla* nulla. *Glandula* baseos nectarifera.

Femina. *Amentum* cylindraceum. *Calyx* squama. *Corolla* nulla. *Stylus* bifidus. *Cap-sula* unilocularis, bivalvis. *Semina* papposa.

- S. pentandra*, foliis ellipticis acuminatis serratis glabris, petiolis superne glandulosis, amentis serotinis pentandris, germinibus lanceolatis glabris. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 658. n. 11. *Icon.* SCHKUH. b. H. t. 317. b. n. 8.

Ad fluviorum ripas, in salicetis, Vogelwiese, prope Schleusig etc. Floret Aprili, Maio, et saepius iterum Julio et Augusto, Staminum numero variat.

Offic. Cortex Salicis Laureolae.

- S. fragilis*, foliis lanceolatis acuminatis concoloribus glabris glanduloso-serratis, amentis coaetaneis, nectario masculorum gemino, germinibus subsessilibus lanceolatis glabris. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 669. n. 31.

Arbor procera, nobis vulgatissima, ubique ad ripas, in pagorum salicetis. Floret Aprili.

Offic. Cortex Salicis fragilis.

- S. Helix*, monandra erecta, foliis lanceolatis acuminatis serrulatis glabris, stylo elongato filiformi, stigmatibus linearibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 672. n. 57. BAUMG. Fl. Lips: p. 24. n. 65.

In pratis paludosis, ad vias, rarius v. c. ad Barnek. Floret Aprili.

Offic. Cortex Salicis Helicis.

- S. alba*, foliis lanceolatis acuminatis serratis utrinque sericeis, serraturis infimis glandulosis, stigmatibus bifidis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 710. n. 116.

Ad ripas, vias passim. Arbor cum *S. fragili* inter *Salicum* species maxima, in Flora nostra rarior.

Offic. Cortex Salicis albae.

Harum imprimis specierum cortex in officinis consumitur. Haud raro promiscue ab his aliisque *Salicum* speciebus cortex delibratur. Optimus est quem ex arborum, triennium stirpibus et ramis eiusdem aetatis accipiunt. Vires insunt adstringentes, febrifugae, ad internum pariter atque externum usum impenditur, cortice Peruviano similis tamen inferior. *S. pentandrae* s. *Laureolae* cortex reliquis antecellit. Cf. STONE in *Philosophic. Transact.* Vol. LIII. p. 195. 1763.

T E T R A N D R I A.

VISCUM. *Mas.* Calyx quadripartitus. Corolla nulla. Filamenta nulla. Antherae calyci adnatae.

Femina. Calyx tetraphyllus, superus. Stylus nullus. Corolla nulla. Bacca monosperma. Semen cordatum.

V. album, foliis lanceolatis obtusis enerviis, caule dichotomo, floribus quinis terminalibus glomeratis sessilibus. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 737. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 101. n. 286 Icon. BLACKW. Herb. t. 184. SCHROHR. b. H. t. 520. HAYNE IV. 24.

In arboribus parasitica, sempervirens, in Quercu, Pyro silvestri et Salice imprimis. apud nos rarius occurrit. Floret Martio.

Offic. Viscus Quercinus s. quernus.
Lignum s. stipites Visci querni.

Ubi recens sit remedium antepilepticum est omnino commendandum, in epilepsia quidem nondum inveterata nec ab organicis vitiis orta, in qua iam ex antiquissimo tempore magnopere laudatus, etiam in hysterico malo laudibus non eget.

P E N T A N D R I A.

CANNABIS. *Mas. Calyx quinquepartitus. Corolla nulla.*

Femina. Calyx monophyllus, integer, latere hians. Corolla nulla. Styli duo. Nux bivalvis, intra calycem clausum.

C. sativa, foliis digitatis. LINN, sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 763. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 173. n. 161. Icon. BLACKW. Herb. t. 322. a ♀. b. ♂. SCHKUHR. b. H. t. 325.

Nonnisi quasi sponte apud non crescit in ruderalis, cultis; colitur passim in agris; sponte crescit in Persia. Floret Julio.

Offic. Semina Cannabis ad emulsiones aptissima, herba vi narcotica praedita succum opio non dissimilem praebet.

HUMULUS. *Mas. Calyx pentaphyllus. Corolla nulla.*

Femina. Calyx monophyllus, oblique patens, integer. Corolla nulla. Styli duo. Semen unum, intra calycem foliatum.

H. Lupulus, LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 769. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 173. n. 453. *Icon.* SCHKUH. b. H. t. 326.

Caulis volubilis aut scandens scaber, folia petiolata, serrata, scabra, cordata aut tri-quinqueloba.

In fruticetis ad sepes, ripas sponte, in hortis agrisque colitur. Floret Jul. Aug.

Offic. Olim *Coni* s. *Strobili* s. *Flores*, *Turiones* et *Radix Lupuli*.

OCTANDRIA.

POPULUS. Mas. Amentum cylindraceum. *Calyx* squama lacera. *Corolla* turbinata, obliqua, integra.

Femina. Amentum cylindraceum. *Calyx* et *Corolla* maris. *Stigma* quadrifidum. *Capsula* bilocularis. *Semina* multa, papposa.

P. nigra, foliis utrinque glabris acuminatis serratis deltoidibus diametro longitudinali longiore. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 804. n. 7. BAUMG. Fl. Lips. p. 221. n. 562. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 248. SCHKUH. b. H. t. 330. a.

Ad ripas fluviorum, stagnorum, in pagis, ad vias. Floret Martio, Aprili.

Offic. Oculi s. *Gemmae Populi*.

Balsamus e gemmis effluit ad *Unguentum populeum* usitatus.

E N N E A N D R I A.

MERCURIALIS. *Mas.* Calyx tripartitus. Corolla nulla. Stamina novem s. duodecim. Antherae globosae, didymae.

Femina. Calyx tripartitus. Corolla nulla. Styli duo. Capsula dicocca, bilocularis, monosperma.

M. perennis, caule simplicissimo, foliis scabris: LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 809. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 223. n. 565.

In locis montosis silvaticis umbrosis, am Bienitz. Floret Maio, Jun.

Planta venenata, emetica, drastica.

M. annua, caule herbaceo brachiato, foliis oblongis glabris, floribus masculis spicatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 810. n. 3. BAUMG. Fl. Lips. p. 224. n. 566. Icon. BLACKW. Herb. t 162. SCHKUH. b. H. t. 332.

In agris, cultis, ruderalis passim. v. c. in horto Bosiano, prope Sellerhausen, Stüntz etc. Floret Junio — Aug.

Offic. Olim *Herba* et *Semen Mercurialis*.

Inter eccoprotica, cosmetica, emollientia, subvenenata a veteribus relata. Venena expers videtur. Praeparaverunt e herba *Enemata*, *Species* pro *clysmatibus* et *Syrupum prophylacticum*.

MONADELPHIA.

JUNIPERUS. *Mas.* Amentum ovatum. Calyx squama. Corolla nulla. Stamina tria.

Femina. Calyx tripartitus. Petala tria. Styli tres. Bacca trisperma, tribus tuberculis calycis inaequalis.

J. communis, foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 853. n. 10. BAUMG. Fl. Lips. p. 577. n. 928. Icon. BLACKW. Herb. t. 187. SCHREUHR. b. H. t. 337.

In locis collinis, apricis, sterilibus sponte, in hortis passim culta occurrit.

Offic. Baccae, Lignum, Summitates Juniperi.

Multum in omnibus partibus arbor olei aetherici continet, adore specifico, sapore dulc-amaro, acerrimo praediti, quod eius vires in abdominis inprimis vasa nervorumque plexus dirigit, ita ut gravius excitet organa ad functiones accelerandas, eique peculiaris sit vis diuretica, unde plerumque in hydropibus felici cum successu exhibetur. Utimur vel baccarum infuso, vel *Elaeosacharo* vel *Roob*.

TAXUS. *Mas.* Calyx tetraphyllus gemmae. Corolla nulla. Stamina multa. Antherae peltatae octosidae.

Femina. Calyx tetraphyllus gemmae. Corolla nulla. Stylus nullus. Semen unum, calyculo baccato, integerrimo.

T. baccata, foliis linearibus distichis planis, receptaculis masculis globosis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. IV. p. 856. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 378. n. 930. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 512. SCHKUHR. b. H. t. 339.

In hortis nonnullis suburbanis et villis rusticanis quasi sponte. Floret Maio.

Offic. Folia et Baccae Taxi.

Arbor ob narcotici principii in foliis inprimis copiam haud exiguam ab antiquis iam venenata habita. In epilepsia antehac aliisque morbis nervosis laudatur, postea in febribus intermittentibus, inprimis nervosis et in hydrophobia, in menostasia cum chlorosi, in uteri scirrho. Remedium videtur anceps, non commendandum.

CRYPTOGAMIA.

GONOPTERIDES.

EQUISETUM. *Racemus* amentaceus, squamis peltatis. *Involucella* bivalvia. *Semina* nuda taeniis quatuor spathulatis polliniferis (?) circumplicata.

E. arvense, caulibus sterilibus simpliciter ramosis, ramis scabriusculis tetragonis; fructifi-

cantibus simplicibus, vaginis cylindraceis incisodentatis, dentibus acutis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. V. p. 1. n. 1. BAUMG. Fl. Lips. p. 498. n. 1184. *Icon*. BLACKW. Herb. t. 217.

In agris sterilibus ubique. Floret Martio. Aprili.

Offic. Herba Equiseti minoris laudabatur olim, ob adstringentem, diureticam vim in gonorrhoea benigna, haematuria, profluviiis alius indolis, phtisi. Non immerito obsoletum.

E. hiemale, caulibus simplicibus erectis scaberimis apice spiciferis, vaginis discoloribus basi apiceque sphacelatis, dentibus aristatis omnino caducis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. V. p. 8. n. 12.

In silvis asperis, uliginosis, am Bienitz, in ericeto Dübenensi. Floret Aprili, Maio.

Offic. Herba Equiseti maioris. Non magis praecedenti laudanda. Cf. J. Ch. Gli. AGKERMANN's Bemerkungen über die Kenntniss und Kur einiger Krankheiten. Nürnberg, 1800. St. VII.

STACHYOPTERIDES.

LYCOPODIUM. *Capsulae* reniformes, uniloculares bivalves polyspermae. *Semina* minutissima pulveriformia. *Antherae* bivalves bracteatae?

L. clavatum, caule repente, ramis adscendentibus, foliis sparsis enerviis incurvato setigeris, spicis geminatis cylindricis pedunculatis, squamis ovatis acuminatis eroso-denticulatis. LINN. sp.

pl. ed. WILLD. V. p. 16. n. 14. BAUMG. Fl. Lips. p. 502. n. 1193. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 535. DILL. t. 58. f. 1.

In silvarum locis siccis, in collinis v. c. am Bienitz, ericeto Dübenensi etc. Floret Jun. Jul.

Offic. *Herba Musci Clavati*, *Semen s. Farina s. Pulvis Lycopodii*, Nonnisi Seminibus hodie utimur ad pilulas conspergendas et cutem subinflammata infantum in intertrigine exsiccandam.

BOTRYCHIUM. *Capsulae* subglobosae, rachidi racemi compositi adnatae discretae nudaе uniloculares, valvulis binis postice connexis transverse dehiscentes.

B. Lunaria, scapo superne unifrondoso, fronde pinnata, pinnis lunatis integerrimis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. V. p. 61. n. 1. *Osmunda Lunaria* LINN. Syst. BAUMG. Fl. Lips. p. 500. n. 1190. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 420.

In collibus siccis. Rarius occurrit in Flora nostra, verumtamen per plures annos desideratam plantam aestate praeterlapsa in via proxima ad collem St. Theclae qua versus pagum Schönfeld itur, denuo vidi, et nisi manibus rapacibus deleatur, spero, fore, ut iterum increseat.

Offic. *Herba Lunariae*, adstringens, antea vulneraria et in herniis salubris habebatur.

OSMUNDA. *Capsulae* subglobosae pedicellatae striatae semibivales paniculatae. *Indusium* nullum.

O. regalis, frondibus bipinnatis, pinnulis lanceolatis subintegerrimis, basi inferiore subauriculatis, inferioribus oppositis, panicula bipinnata fructificante in apice frondis. LINN. spec. pl. ed. WILLD. V. p. 97. n. 3. BAUMG. Fl. Lips. p. 501. n. 1191. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 324.

In silvis humidiusculis der Dübenschon Haide. Floret Jun. Jul.

In rachitide nec non ad curandas hernias apud veteres in usu fuit. Vim omnem consistere in julis (fructificatione) et in radicis medulla contendit PAUL. HERMANNUS in *Cynosura materiae medicae*. Cf. edit. BECKLERI *Argentorat.* 1727.

FILICES.

POLYPODIUM. *Sori* subrotundi sparsi. *Indusia* nulla.

P. vulgare, frondibus profunde pinnatifidis, laciniiis lineari - lanceolatis obtusis crenulatis approximatis superioribus sensim minoribus, soris solitariis, caudice paleaceo. LINN. sp. pl. ed. WILLD. V. p. 172. n. 71. BAUMG. Fl. Lips. p. 503. n. 1197. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 215. SCHKUH. Krypt. t. 11 et 17.

In rupium fissuris, ad truncos arborum in silvis umbrosis v. c. ad oppidum Wurzen, Grimma, in silva academica, prope Gohlis, Möckern, Lindenthal etc. Floret Jul.

Offic. *Radix Polypodii*, elongata,

horizontalis, tuberculosa; inter thoracica, ec-coprotica a veteribus relata est. Infusum exhibetur interdum vel extractum ad mucum intesti-nalem leniter educendum et vermes enecandos.

ASPIDIUM. *Sori* subrotundi sparsi. *Indusium* umbilicatum vel uno latere dehiscens.

A. Filix mas, frondibus bipinnatis, pinnulis oblongis obtusis serratis, curvaturis muticis, so-ris costae mediae approximatis, stipite rachidi-busque paleaceis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. V. p. 259. n. 94. *Polypodium Filix mas*. LINN. Syst. BAUMG. Fl. Lips. p. 504. n. 1200. *Icon*. BLACKW. Herb. tab. 323. SCHRUHR krypt. t. 44.

In silvis nemoribusque vulgare. Floret Jul.

Aug.

Offic. Radix Filicis Maris.

Radix magna horizontalis, processibus su-perne cylindrico-papillosis imbricata, externe fusca, squamoso-spongiosa, interne albida, vix odorata, sapore austero, amaricante.

Usus. Tutissimum videtur remedium ad taeniam lumbricosque enecandos non vero eva-cuandos.

ASPLENIUM. *Sori* lineares transversales sparsi. *Indusia* e venis lateralibus orta costam versus dehiscentia.

A. Trichomanes, frondibus pinnatis, pinnis subro-

subrotundo - oblongis obtusis crenatis, basi truncato - cuneatis, stipite discolore. LINN. sp. pl. ed. WILLD. V. p. 331. n. 64. BAUMG. Fl. Lips. p. 507. n. 1208. A. *Trichomanoides*, LINN. Syst. veget. ed. XV. p. 974. n. 13. WEB. MOHR. p. 40. n. 3.

Icon. BLACKW. Herb. t. 370. WEB. MOHR t. III. f. 3. (pinna.)

In rupibus, muris, v. c. ad portam am Gutthurm, prope Wurzen, Grimma. Floret Jun. Jul.

Offic. Herba Trichomanis s. Adianthi rubri, subadstringens, obsoleta.

A. *Ruta muraria*, frondibus basi bipinnatis, apice simpliciter pinnatis, pinnulis rhombo - oblongis obtusis, apice obtuse denticulatis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. V. p. 341. n. 82. BAUMG. Fl. Lips. p. 507 u. 1209. *Icon.* BLACKW. Herb. t. 219.

In muris vetustis rupibusque cum praecedenti vulgare, v. c. in ipsa porta Ranstaedtensi, ad pontem am Gutthurm.

Offic. Herba Rutae Murariae s. Paronychia.

Utriusque herbae vires subadstringentes, quae iis insunt, olim in cachexia, scorbuto, rachitide laudatae sunt.

PTERIS. Sori continui lineares marginales. *Indusium* e margine frondis inflexum interius dehiscens.

P. aquilina, fronde tripartita, ramis bipinnatis, pinnis lineari-lanceolatis, superioribus indivisis, inferioribus pinnatifidis, laciniis oblongis obtusis. LINN. sp. pl. ed. WILLD. V. p. 402. n. 105. BAUMG. Fl. Lips. p. 508. n. 1210. Icon. BLACKW. Herb. t. 325.

In silvarum locis sterilioribus, in silva academica, prope Düben etc. Floret Julio, Aug.

Offic. Radix Pteridis s. Aquilariae.

Olim radice adversus taeniam bellare studuerunt.

M U S C I.

P O L Y T R I C H U M. Peristomium simplex dentibus 32 — 64, apice membranam prehendentibus. Flos masculus femineusque terminalis.

P. commune, subsimplex, foliis margine dorsoque serratis, apophysi orbiculata, theca tetragona, operculo mucronato. SCHWAEGRICH. Suppl. II. ad HEDWIG. spec. muscor. frondos. p. 314. n. 7. BAUMG. Fl. Lips. p. 518. n. 1235. *P. yuccaefolium* EHRH. WEB. et MOHR. p. 221. n. 3. Icon. DILLEN, t. 54. f. 1.

In silvis umbrosis humidiusculis ubique. Fructiferum mense Junio.

Offic. Herba Adianthi aurei.

Nonnisi a rusticis interdum ad superstitiosum usum desideratur, saepius cum aliis et affinis speciebus commixtum, quae sunt:

P. iuniperinum, subsimplex, foliis patulis margine inflexis integerrimis costa scabris, theca appendiculata parallelopipeda. SCHWAEGRICH. l. c. p. 309. BAUMG. p. 519. n. 1236. *P. iuniperifolium*, HOFFM. Fl. germ. Cryptog. p. 24. n. 2. WEB. et MOHR. p. 219. n. 2. *Icon.* DILLEN. t. 54. f. 2. HEDWIG. spec. musc. t. 18. f. 6 — 10.

In silvis siccioribus, ericetis passim. Theca maturat mense Junio.

Speciei praecedenti plerumque multo maius est.

P. piliferum, simplex, foliis lineari-subulatis margine inflexis integerrimis piliferis, theca tetragona. SCHWAEGRICH. l. c. p. 312. SCHREB. spicileg. p. 74. n. 1031. BAUMG. p. 519. n. 1237. WEB. et MOHR. p. 218. n. 1. *Icon.* DILLEN. t. 54. f. 5.

In siccis silvarum marginibus, ericetis, collibus, agrorum arenosarum limitibus atque versuris passim. Frequens am Bieniz. Maturat vere.

Minus *P. communis*; saepissime huius masculi flores leguntur.

FONTINALIS. *Peristomium* duplex: exterius dentibus 16. latiusculis: interius reticulatum. Flores masculi gemmacei axillares.

F. antipyretica, foliis trifariam imbricatis ovatis complicatis; perichaetii ovatis. SCHWAEGRICH. l. c. p. 307. BAUMG. p. 549. n. 1328. WEB. et MOHR p. 376. n. 1.

Icon. DILLEN. t. 33. f. 1. HEDWIG. fundamenta II, t. 1. f. 5. t. 4. f. 14 — 15. t. 9. f. 55 — 55.

In fossis aquosis, stagnis, lacunis v. c. in prato Vogelwiese.

Officinalis fuisse videtur in febribus s. d. ardentibus.

LICHENES.

(** Coenothalamia).

BAEOMYCES. *Cephalodium* non marginatum, membrana seminifera obductum, nucleo thallode, podetiis suffultum. *Thallus* foliaceus fruticosus.

B. cocciferus, podetiis brevibus cinereo-virentibus, scyphis digitatis integris clausis, cephalodiis marginalibus coccineis. SPRENG. Fl. Hal. p. 326. n. 1335. *Cladonia coccifera*. BAUMG. Fl. Lips. p. 572. n. 1388. *Icon. DILL.* t. 14 f. 7. SPRENG. Anleitung zur Kenntniss der Pflanzen. t. 9. f. 93.

In silvarum marginibus, in locis arenosis sterilibus. Bieniz, silva academica. Perfectus Mart. Aprili.

Offic. Herba Ignis.

Olim antifebrilis habita.

B. pyxidatus, podetiis brevibus, scyphis cyathiformibus clausis integris, cephalodiis marginalibus fuscis. SPRENG. Fl. Hal. p. 327. n. 1339. BAUMG. Fl. Lips. p. 573. n. 1391. *α. Icon. DILL.* t. 14. f. 6.

In locis sterilibus, apricis, ericetis vulgaris,

v. c. am Bieniz, in silva academica, prope Eutritsch, Lindenthal etc. Perfectus vere.

USNEA. *Orbillae* planae ambitu radiatae. *Thallus* loreus filamentosus fruticulosus.

U. plicata, thallo filamentoso-ramoso pendulo, ramulis elongatis fibrillosis implexis, orbillisque pubescentibus. SPRENG. Fl. Hal. p. 328. n. 1349. BAUMG. Fl. Lips. p. 590. n. 1446.

In silvis siccis a quercuum, fagorum, betularum truncis vetustis pendens.

Offic. Herba Musci Arborei s. Quercini.

Ob vim adstringentem laudatus in excoriationibus, haemorrhagiis; Hernia umbilicali. Alii et in tussi convulsiva adhibuerunt.

PARMELIA. *Apothecium* scutellae. *Semina* tubulis inclusa. *Thallus* crustaceus, foliaceus, filamentosus.

P. parietina, thallo stellato flavo subtus subfibrilloso, laciniis rotundato-lobatis crispis, scutellis concoloribus. SPRENG. Fl. Hal. p. 334. n. 1388. *Lichen parietinus*. BAUMG. Fl. Lips. p. 567. n. 1375. *Icon. DILL.* t. 24. f. 76.

In muris, arboribusque vulgatissima species.

Offic. Herba Lichenis parietini.

Nuper cortici peruviano substituta. Conf. G. C. H. SANDER, Dr., die Wandflechte ein Arzneimittel welches die peruv. Rinde nicht nur entbehrlich macht, sondern sie auch an gleich-

artigen Heilkräften übertrifft. Preisschrift. Sondershausen, Voigt. 1815. 4. mit 1 Kupf.

- P. *furfuracea***, thallo cinereo pulverulento subtus fusco nudo, scutellis lateralibus concavis rubris. SPRENG. Fl. Hal. p. 337. n. 1402. *Lichen furfuraceus* BAUMG. Fl. Lips. p. 567. n. 1377. *Icon.* HOFFM. Fl. Germ. III. t. 9. f. 2. DILL. t. 21. f. 52.

Ad ramos trancosque arborum inprimis conferrarum in silvaticis siccioribus.

Ob amaritiem non facile aufugam etiam hanc Peruviano cortici substituere nonnulli conati sunt,

- P. *Prunastri***, thallo molli rugoso - lacunoso exalbido, laciniis divaricatis attenuatis, scutellis concavis badiis. SPRENG. Fl. Hal. p. 337. n. 1404. *Lichen Prunastri.* BAUMG. Fl. Lips. p. 568. n. 1380. *Icon.* DILL. t. 21. f. 54.

In Pruni spinosae aliorumque arborum cortice vulgaris.

Offic. Muscus Acaciae.

Remedium adstringens. In prolapsu uteri et ani a Würtembergis ad balnea et fatus commendatus.

- PELTIDEA.** *Apothecium* peltae. *Semina* tubulis inclusa. *Thallus* foliaceus lobatus subtus fibrillosus.

- P. *canina***, thallo coriaceo expanso cinerascente, subtus albidiori, venis fibrillisque fuscescenti-

bus, lobis oblongis, peltis verticalibus anticis revolutis badio rufis. SPRENG. Fl. Hal. p. 338. n. 1411. *Peltigera canina*. BAUMG. Fl. Lips. p. 562. n. 1360.

In silvis umbrosis ad terram et putridos truncos.

Offic. Herba Musci canini.

Inter medicamenta insueta numerat LINNEUS. In Hydrophobia s. rabie canina laudarunt veteres unde forte nomen. Qualitates ei sunt hae quas BAUMGARTENIUS refert: sapor lichenis exsiccati est ingratus mucidusque. Extractum aquosum odorem balsamicum valde ingratum vetustioris halecis, mephitim referens, spirat. sapore primum dulci, deinde amariusculo subtiliterque acri fere piperito gaudet. Extractum spirituosum, quod in minori copia obtinetur, mellei est odoris minusque acre. *Praep. Pulvis antilyssus*, part. duae Lichenis, una piperis nigri.

P. aphthosa, thallo coriaceo expanso laete viridi sorediis sparsis glaucis fuscis, subius avenio nigro-fibrilloso, peltis anticis rotundis rubris. SPRENG. Fl. Hal. p. 338. n. 1412. BAUMG. Fl. Lips. p. 561. n. 1358. *Icon. HOFFM. Fl. Germ. III. t. 6. f. 1.*

In silvis umbrosis. Lindenthal, silva academica.

Offi. Herba Musci Cumatilis.

Vi drastica gaudere atque in aphtis et morbis verminosis salubrem praedicant veteres. Rusticos Upsalienses infusum huius Lichenis cum lacte praeparatum infantibus aphtis laborantibus praebere narrat LINNEUS.

F U N G I.

(Hymenothecii.)

AMANITA. *Volvata*; *Pileus* carnosus, ut plurimum verrucosus. *Lamellae* confertae, subintegrae. *Stipes* ut plurimum elongatus; annulatus aut nudus.

A. *Muscaria*, pileo aurantiaco - rubro planiusculo nitido subverrucoso, verrucis lamellis stipiteque candidis. PERS. Synops. Fung. p. 253. n. 11. SPRENG. Fl. Hal. p. 364. n. 1595. *Agaricus muscarius*. BAUMG. Fl. Lips. p. 608. n. 1512.

In silvis, imprimis Pinetis et betuletis, Lindenthal, am heitern Blick. etc. Autumno.

Ad ulcera inveterata sananda externe, etiam contra sphacelum interne et externe adhibuerunt interdum.

LYCOPERDON. *Peridium* caulescens, apice demum ruptum, verrucis squamulosis, aut spinulosis obsitum. (Pulvis seminalis viridis.)

L. *Bovista*, magnum obconicum molle pallescente-albidum, subtus plicatum, squamis latiusculis. PERS. Synops. Fung. p. 141. n. 2. BAUMG. Fl. Lips. p. 658. n. 1679.

In pascuis, collibus apricis, hortis, pomariis frequens legitur autumnò.

Offic. Crepitus Lupi, Fungus Chirurgorum.

Laudabatur obstipans, absorbens, incrassans in amputatione, haemorrhagia, ulceribus.

BOLETUS. Pileus varius. Tubuli et pori teretes integri.

*** pileo dimidiato acauli.

B. suaveolens, odoratus crassus subsuberosus, pileo subtomentoso albo, poris (maiusculis) fusciscentibus: nonnullis superficie inaequali prominulis acutis. **PERS.** synops. Fung. p. 530. n. 54. **BAUMG.** p. 633. *Icon.* **ENSLIN** dissert. Erlang. 1784. de boleto suaveolente c. icone.

Ad annosarum salicum truncos, eosque imprimis emortuos. Schönfeld, Rosenthal etc.

Offi. Boletus suaveolens s. Fungus Salicis. Leniter adstringens in morbis pulmonalibus nec non spasmodicis laudatus. Cf. Dissert. supra citat.

TREMELLA. *Effusa*, gelatinosa, plicato-gyrosa, Pileus (in pluribus) distinctus nullus.

F. Auricula Judae, cespitosa tenuis flexuosa concava nigrescens, subtus plicata subtomentosa olivaceo-cinerea. **PERS.** Synops. Fung. p. 624. n. 9. **T. Auricula** **BAUMG.** Fl. Lips. p. 667. n. 1711. *Peziza Auricula.* **LINN.** Syst. Veget. *Icon.* **BLACKW.** Herb. t. 334.

Ad truncos Sambuci nigrae frequens. Autumno.

Offic. Auricula Judae.

Laudant veteres refrigerantem, exsiccantem, adstringentem in inflammationibus, imprimis in ophthalmia, angina. Nobis inusitata.

Pag. 54. deest indicatio loci atque virium *Saniculae europæae*. adde:

Habitat in silvis umbrosis, v. c. ad pagum Lindenthal. in silva academica *hinter der Försterwohnung* Floret Maio, Junio.

Principium amarum, adstringens sapor prodere videtur.

Utebantur olim medici *Herba Saniculae* interne non minus quam externe ad discutiendos tumores, ad vulnera et ulcera sananda, praeterea etiam in leucorrhoea, haemorrhagiis eius vires laudibus extulerunt

AUCTORES BOTANICI CITATI.

J. Ch. G. BAUMGARTEN *Flora Lipsiensis sistens plantas in agris circuli Lipsici tam sponte crescentes quam frequentius cultas etc.* Lipsiae, 1790. 8.

BLACKWELLIANUM *Herbarium* emendatum et auctum c. praefat. Dr. Chr. J. TREW. Centur. I—VI. Norimberg, 1750—1772. Fol.

G. R. BOEHMERI *Flora Lipsiae indigena.* Lipsiae, 1750. 8.

DILLENII *historia muscorum.* Oxon, 1745. 4.

F. EHRHART'S *Beiträge zur Naturkunde und den damit verwandten Wissenschaften.* Bd. I—VII. Hanover und Osnabrück, 1787—1792. 8.

Flora danica ed. G. C. OEDER, O. F. MÜLLER et M. VAHL, Vol. I—VII. Hafn. 1764—1799. Fol.

A. HALLERI historia stirpium indigenarum Helvetiae. Tomi III. Bern, 1768. Fol.

F. G. HAYNE, getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneikunde gebräuchlichen Gewächse, wie auch solcher, welche mit ihnen verwechselt werden können. Vol. I—III. 1805—1813. Vol. IV. Fasc. 1—6. 1816.

J. HEDWIG theoria generationis plantarum cryptogamicarum. Lips. 1797. 4.

EJUSD. fundamentum historiae naturalis muscorum frondosorum; concern. eorum flores, fructus, seminalem propagationem; adj. generum disposit. method. Lipsiae, 1782. 4.

EJUSD. species muscorum frondosorum, Opus posthumum edit. a Fr. SCHWAEGRICHEN. Lipsiae, 1801. 4.

Fr. SCHWAEGRICHEN, supplementa ad J. HEDWIGII species muscorum frondosorum. Sectio posterior. Lipsiae, 1816.

G. F. HOFFMANN Deutschlands Flora, oder botanisches Taschenbuch. Jahrgang I. 1791. II. 1795. III. 1800. IV. 1804. 8. min.

F. W. LEYSSERI Flora Halensis. Halae, 1783. 8.

C. LINNEI systema vegetabilium. ed. XV. cura PERSSON. Götting., 1797.

EJUSD. species plantarum, ed. WILLDENOW. Tom. I—V. Berol. 1797—1810. 8. maj.

- P. S. PALLAS haloph. illustrationes plantarum imperfecte vel nondum cognitarum. Fasc. I—IV. Lipsiae, 1803—1805. Fol. maj.
- C. H. PERSEON synopsis methodica fungorum. Götting., 1801. 8.
- EJUSD. Synopsis plantarum s. enchiridium botanicum. Pars. I. II. Parisiis Lutet. 1805.—1807.
- A. W. ROTH. tentamen Florae germanicae. Vol. I.—III. Lipsiae, 1788—1808. 8.
- H. B. RUPPII Flora Jenensis. ed. A. HALLERI: Jenae, 1745. 8.
- C. SCHKUHRT's botanisches Handbuch. Th. I—III. Wittenberg, 1791—1803. 8.
- EJUSD. Kryptogamische Gewächse. H. 1. 2. Leipzig, 1803—1805. 4.
- J. C. D. SCHREBER's Beschreibung und Abbildung der Gräser. Leipzig, 1769. Fol.
- EJUSD. spicilegium Florae Lipsicae. Lipsiae, 1771. 8. maj.
- Fr. SCHWAEGRICHEN Topographiae naturalis Lipsiensis Spec. II. et IV. 1799. et 1806.
- C. SPRENGEL Anleitung zur Kenntniss der Gewächse. Th. 1—3. Halle, 1802—1804. 8.
- EJUSD. Florae Halensis tentamen novum. Halae, 1806. 8.
- EJUSD. plantarum umbelliferarum denuo disponendarum prodromus. Halae, 1813. 8.

EJUSD. plantarum minus cognitarum pugillus I. II.
Halae Kümmel, 1813. 8.

F. G. WALLROTH annus botanicus s. Suppl. III.
ad C. SPRENGELII Floram Halensem. Halae,
1815. 8.

C. L. WILLDENOW Anleitung zum Selbststudium
der Botanik. Berlin, 1809. 8.

EJUSD. Enumeratio plantarum horti Regii botanici
Berolinensis. Berolini, 1809. 8.

INDEX BOTANICUS.

Nomina germanica typo distante, francogallica literis cursivis, Synonyma et nomina in adnotationibus occurrentia typo usuali impressa sunt.

	pag.		pag.
<i>Ache</i> , v. <i>Apium</i> .	58	<i>AIUCA</i> , Günsel, <i>Bugle</i> .	126
<i>ACHILLEA</i> , Schafgarbe,		<i>Akeley</i> v. <i>Aquilegia</i> .	113
<i>Mille feuille</i> .	194	<i>Alant</i> v. <i>Inula</i> .	187
<i>ACINOS</i> .	140	<i>ALCHEMILLA</i> , <i>Sinau</i> ,	
<i>Aconitum</i> , Sturmhut,		<i>Frauenmantel</i> , <i>Pied</i>	
<i>Eisenhut</i> , <i>Aconit</i> .	112	<i>de Lion</i> .	17
<i>Acore</i> v. <i>Acorus</i> .	71	<i>Alisier</i> v. <i>Crataegus</i> .	96
<i>ACORUS</i> , Calmus, <i>Acore</i>		<i>ALISMA</i> , Froschkraut,	
<i>Actea</i> , Christophs-		<i>Fluteau</i> .	74
kraut.	107	<i>ALLIUM</i> , Lauch, <i>Ail</i> .	68
<i>Actée</i> v. <i>Actaea</i> .	—	<i>ALNUS</i> , Erle, Eller.	204
<i>Adlerkraut</i> v. <i>Pteris</i> .	225	<i>ALSINE</i> , Miere, Vogel-	
<i>Aegopodium</i> v. <i>Sison</i> .	59	<i>miere</i> , <i>Hühnerdarm</i> ,	
<i>Aesculus</i> , Roskastan-		<i>Morgeline</i> .	66
nienb., <i>Maronnier</i> .	75	<i>Althca</i> , Eibisch, <i>Gui-</i>	
<i>AETHUSA</i> , Gleise,		<i>mauve</i> .	160
<i>Kleinschierling</i> ,		<i>AMANITA</i> , <i>Fliegenpilz</i> .	252
<i>Hundspetersilie</i> ,		<i>Ampfer</i> v. <i>Rumex</i> ,	72
<i>Aethuse</i> .	51	<i>ANAGALLIS</i> , <i>Gauchheil</i> ,	
<i>AGRIMONIA</i> , <i>Odermennig</i> ,		<i>Mouron</i> .	25
<i>Aigremoine</i> .	89	<i>ANCHUSA</i> , <i>Ochsenzunge</i> ,	
<i>Agripaume</i> v. <i>Leonurus</i> .	137	<i>Buglosse</i> .	19
<i>ACROSTEMMA</i> , <i>Rade</i> , <i>Nielle</i>	87	<i>Ancolie</i> v. <i>Aquilegia</i> .	113
<i>Aigremoine</i> v. <i>Agrimonia</i> .	89	<i>Andorn</i> v. <i>Marrubium</i> .	136
<i>Ail</i> v. <i>Allium</i> .	68	<i>ANEMONE</i> , <i>Anemone</i> .	116
<i>Airelle</i> v. <i>Vaccinium</i> .	30		(114. 115.)

	pag.
Berufungskraut v. Erigeron.	183
Besenheide v. Calluna.	76
Beta, Runkelrube, bette poirée.	46
Betoine v. Betonica.	132
BETONICA, Betonie, Betoine.	ib.
BETULA, Birke, Bouleau.	209
Bibernell v. Pimpinella.	58
BIDENS, Zweizahn, Bident.	179
Bident v. Bidens.	ib.
Bienensaug v. Laminium.	132
Bilsenkraut v. Hyoscyamus.	50
Bingelkraut v. Mercurialis.	228
Birke v. Betula.	209
Birnbaum v. Pyrus.	97
Bittersüss v. Solanum Dulcam.	53
Bocksbart v. Tragopogon.	170
BOLETUS, L öcherpilz.	233
BORAGO, Boretsch, Bourrache.	22
Boretsch v. Borago.	ib.
BOTRYCHIUM, Mondfarn, Mordkraut.	222
Bouleau v. Betula.	209
Bourrache v. Borago.	22
Boucage v. Pimpinella.	58
Bouillon v. Verbascum.	27
Bovist v. Lycoperdon.	232
BRASSICA, Kohl, Chou.	157
Braunwurz v. Scrophularia.	150

	pag.
Brennnessel v. Urtica.	205
Brioine v. Bryonia.	212
Brombeere v. Rubus.	101
Bruchkraut v. Herniaria.	44
Bruncelle v. Prunella.	141
Bryere (Erica) v. Calluna.	76
BRYONIA, Zaurrube, Brioine.	212
Brunnenkresse v. Sis. Nasturtium.	155
Bugle v. Ajuga.	126
Buglosse v. Anchusa.	19
Bugrane v. Ononis.	167
BUPLEURUM, Hasenohr, Durchwachs, Bupleure.	64
Bupleure v. Buplenrum.	ib.
Burnet v. Poterium.	207

C.

Cailletait v. Galium.	15
CALENDULA, Ringelblume, Souci.	196
CALLUNA, Besenheide, gem. Heide.	76
Calmus v. Acorus.	171
CALTHA, Dotterblume, Populage.	124
CAMELINA, Dötter, Cameline.	154
Canariengras v. Phalaris canariensis.	12
Camomille v. Anthemis.	193
Cannabis, Hanf, Chanvre.	216
CARDAMINE, Schaumkraut, Cresson.	154
CARDUUS, Distel, Chardon.	177

Q.

	pag.		pag.
<i>Caret</i> v. <i>Carex</i> .	203	<i>CICHORIUM</i> , Cichorie,	175
<i>CAREX</i> , Riedgras, <i>Caret</i> .	ib.	<i>Cichorée</i> .	175
<i>CARLINA</i> , Eberwurz,		<i>Ciguë</i> v. <i>Conium</i> .	61
<i>Carlina</i> .	178	<i>Ciguë aquatique</i> v. <i>Cicuta</i> .	50
<i>Carlina</i> v. <i>Carlina</i> .	ib.	<i>CISTROSE</i> v. <i>Cistus</i> (He-	
<i>Carnillet</i> v. <i>Cucubalus</i> .	84	<i>lianthemum</i>).	112
<i>Carote</i> v. <i>Daucus</i> .	53	<i>Clandestine</i> v. <i>Lathraea</i> .	151
<i>CARUM</i> , Kümmel,		<i>CLEMATIS</i> , Waldrebe,	116
<i>Carvi</i> .	56	<i>Clematite</i> .	116
<i>Carvi</i> v. <i>Carum</i> .	ib.	<i>Clematite</i> v. <i>Clematis</i> .	ib.
<i>Cancalis</i> , Haftdolde,		<i>CLINOPODIUM</i> , Weich-	
<i>Caucalier</i> v. <i>Torilis</i> .	53	<i>borste</i> , <i>Clinopode</i> .	138
<i>Caucalier</i> v. <i>Caucalis</i> .	ib.	<i>CNICUS</i> , Kratzdistel,	
<i>CENTAUREA</i> , Flocken-		<i>Quenonville</i> .	178
<i>blume</i> , Kornblu-		<i>CNIDIUM</i> .	64
<i>me</i> , <i>Centaurée</i> .	196	<i>COCHLEARIA</i> , Löffel-	
<i>Cerfeuil</i> v. <i>Chaerophyl-</i>		<i>kraut</i> , <i>Cranson</i> .	153
<i>lum</i> .	54	<i>Cocrète</i> v. <i>Rhinanthus</i> .	145
<i>CHAEROPHYLLUM</i> , Käl-		<i>COLCHICUM</i> , Zeitlöse,	
<i>berkropf</i> , <i>Cerfeuil</i> .	ib.	<i>Colchique</i> .	73
<i>Chamille</i> v. <i>Matricaria</i> .	191	<i>COMARUM</i> , Siebenfin-	
<i>Chanvre</i> v. <i>Cannabis</i> .	216	<i>gerkraut</i> , <i>Comaret</i> .	106
<i>Chardon</i> v. <i>Carduus</i> .	177	<i>CONIUM</i> , grosser	
<i>Chataire</i> v. <i>Nepeta</i> .	128	<i>Schierling</i> , <i>Ciguë</i> .	61
<i>CHÉLIDONIUM</i> , Schöll-		<i>Consoude</i> v. <i>Symphytum</i> .	21
<i>kraut</i> , <i>Chelidoine</i> .	107	<i>CONVALLARIA</i> , Maiblum-	
<i>Chêne</i> v. <i>Quercus</i> .	208	<i>me</i> , <i>Muguet</i> .	70
<i>CHENOPOBIUM</i> , Gänse-		<i>CONVOLVULUS</i> , Winde,	
<i>fuss</i> , <i>patte d'oie</i> .	45	<i>Liseron</i> .	26
<i>Chicorée</i> v. <i>Cichorium</i> .	175	<i>Coqueret</i> v. <i>Physalis</i> .	32
<i>Chironia</i> v. <i>Erythraea</i> .	40	<i>Coriandrum</i> , Corian-	
<i>Chou</i> v. <i>Brassica</i> .	157	<i>der</i> , <i>Coriandre</i> .	51
<i>Christophskraut</i> v.		<i>CORNUS</i> , Kornelbaum,	
<i>Actaea</i> .	107	<i>Cornouiller</i> .	17
<i>CHRYSANTHEMUM</i> , Wu-		<i>Cornouiller</i> v. <i>Cornus</i> .	ib.
<i>cherblume</i> , <i>Chry-</i>		<i>CORYDALIS</i> .	163
<i>santhème</i> .	190	<i>CORYLUS</i> , Hasel, Cou-	
<i>CHRYSOSPLENIUM</i> , Milz-		<i>drier</i> .	210
<i>kraut</i> , <i>Dorine</i> .	81	<i>Cotton</i> v. <i>Onopordon</i> .	178
<i>CICUTA</i> , Wasser-		<i>Coudrier</i> v. <i>Corylus</i> .	110
<i>schierling</i> , <i>Ciguë</i> .		<i>Cranson</i> v. <i>Cochlearia</i> .	153
<i>aquatique</i> ,	50	<i>Crapaudine</i> v. <i>Sideritis</i> .	135
<i>Cicutaire</i> v. <i>Cicuta</i> .	ib.		

	pag.
CRATAEGUS, Weiss-	
dorn, <i>Alisier</i> .	96
Cresson v. Cardamine.	154
CUCUBALUS, Tauben-	
kropf, <i>Carnillet</i> .	84
CUSCUTA, Flachsseide,	
<i>Cuscute</i> .	43
Cyane v. Centaurea.	196
CYNANCHUM, Hunds-	
würger.	39
CYNOGLOSSUM, Hunds-	
zunge, <i>Cynoglosse</i> .	20

D.

DAPHNE, Seidelbast,	
Kellerhals, <i>Garon</i> .	77
DATURA, Stechapfel,	
<i>Pomme épineuse</i> .	29
DAUCUS, Möhre, Ca-	
rotte.	53
Dauphin v. Delphinium.	112
DELPHINIUM, Ritter-	
sporn, <i>Dauphin</i> .	ib.
DIANTHUS, Nelke, <i>Oeil-</i>	
<i>let</i> .	83
Dictamnus, Diptam,	
<i>Dictam</i> .	79
Digitalis, Fingerhut,	
Digitale.	151
Dill, Aneth. grav. v.	
<i>Ferula</i> .	47
Distel v. Carduus.	177
Dorine v. Chrysosple-	
nium.	81
Dosten v. Origanum.	153
Dotterblume v. Cal-	
tha.	124
Dotter, Myagrum v.	
Camelina.	154
DROSERA, Sonnen-	
thau, <i>Rossoli</i> .	67
Durchwachs v. Bu-	
pleurum.	64

E.

	pag.
Eberwurz v. Carlina.	178
Ehrenpreis v. <i>Vcro-</i>	
<i>nica</i> .	3
Eibisch v. Althaea.	160
Eibe v. Taxus.	219
Eibenbaum id.	ib.
Eiche v. Quercus.	208
Einbeere v. Paris.	79
Einblatt v. Parnassia.	67
Eisenhart v. Verbena.	143
Eisenhut v. <i>Aconi-</i>	
<i>um</i> .	112
Eller v. Alnus.	204
Engelsüss v. Polypo-	
dium.	223
Entzian v. Gentiana.	42
Epervière v. Hieracium.	174
Epiaire v. Stachys.	134
Ephen v. Hedera.	39
ERIOLOBIUM, Weidrich,	
<i>Epilobe</i> .	75
Epine vinette v. Berberis.	72
EPIFACTIS.	202
Eppich v. Apium.	58
EQUISETUM, Kannen-	
kraut, <i>Crele</i> .	226
Erdbeere v. Fragaria.	102
Erdrauch v. Fumaria.	
(163)	164
Erica, Heide, <i>Bruyere</i>	
v. <i>Calluna</i> .	76
ERIGERON, Berufungs-	
kraut, <i>Vergerète</i> .	183
Erle v. Alnus.	204
EROPH, Reih er-	
schnabel, <i>Bec de</i>	
<i>grue</i> .	153
ERYSIMUM, Hederich,	
<i>Roquette</i> .	156
ERYTHRAEA.	40
Eupatoire v. Eupatorium.	180

	pag.
EUPATORIUM, Wasserschamf, <i>Eupatoire</i> .	180
EUPHORBIA, Wolfsmilch, <i>Tithymale</i> .	90
EUPHRASIA, Augentrost, <i>Euphrase</i> .	144
EVONYMUS, Spindelbaum, <i>Fusain</i> .	36

F.

Fallkraut v. Arnica.	188
Faulbaum v. Rhamnus Frangula.	35
Feldkümmel v. Thymus Serpyllum.	139
Fenchel v. Meum Foenic.	57
Fennich v. Panicum.	11
FERULA, Steckenkraut, <i>Ferule</i> .	47
FESTUCA, Schwingel, <i>Festue</i> .	10
<i>Festue</i> v. Festuca.	ib.
Fetthenne v. Sedum Telephium.	84
FICARIA, Scharbockskraut, <i>Ficaire</i> .	117
Fieberklee v. Menyanthes.	23
Fingerhut v. Digitalis.	151
Fingerkraut v. Potentilla.	103
Flachsseide v. Cuscuta.	43
Fliegenpilz v. Amanita.	232
Flockenblume v. Centaurea.	196
Fluteau v. Alisma.	73
FONTINALIS, Hüllmoos.	227
FRAGARIA, Erdbeere, <i>Fraisier</i> .	102

	pag.
<i>Fraisier</i> v. Fragaria.	102
Frauenmantel v. Alchemilla.	17
Freisamkraut v. Viola tricolor.	37
Froment v. Triticum.	11
Froschkraut v. Alisma.	73
FUMARIA, Erdrauch, <i>Fumeterre</i> .	(163) 164
<i>Fumeterre</i> v. Fumaria.	ib.
<i>Fusain</i> v. Evonymus.	36

G.

GALIUM, Labkraut, <i>Caillelaire</i> .	15
Gallert v. Tremella.	233
Gamander v. Teucrium.	127
Gänseblume v. Bellis.	189
Gänsedistel v. Sonchus.	171
Gänsefuss v. Chenopodium.	45
Gauchheil v. Anagallis.	25
Garou v. Daphne.	77
Genet v. Genista.	166
Genet à balais v. Spartium.	ib.
Genevrier v. Juniperus.	219
GENISTA, Ginster, <i>Genet</i> .	166
GENTIANA, Enzian, <i>Gentiane</i> .	42
Geraine v. Geranium.	139
GERANIUM, Storchschnabel, <i>Geraine</i> .	159
Germandrée v. Teucrium.	127
Gerste v. Hordeum.	12
Gesse v. Lathyrus.	168
GEUM, Benedictwurz, <i>Benoite</i> .	105

	pag.
Gichtrose v. Paeonia.	112
Giersch v. Sison.	59
Ginster v. Genista.	166
GLADIOLUS, Siegwurz, <i>Glayeul.</i>	8
Glanzgras v. Phalaris.	11
Glaskraut v. Parieta- ria.	206
Glasschmalz v. Sali- cornia.	1
<i>Glayeul</i> v. Gladiolus.	8
GLECHOMA, Gunder- mann, Gundelrebe, <i>Glecome.</i>	132
<i>Glecome</i> v. Glechoma.	—
Gleisse v. Aethusa.	51
Gliedkraut v. Sideri- tis.	135
<i>Glouteron</i> v. Xanthium.	206
GNAPHALIUM, Rain- blume, <i>Perliere.</i>	183
<i>Gnavelle</i> v. Sceleranthus.	82
Goldruth v. Solidi- go.	186
<i>Grenil</i> v. Lithospermum.	18
<i>Grosseiller</i> v. Ribes.	36
<i>Gui</i> v. Viscum.	215
<i>Guimaue</i> v. Althaea.	160
Gundelrebe v. Gle- choma.	152
Gundermann v. id.	—
Günsel v. Ajuga.	126

II.

Haarflechte v. Us- nea.	229
Haarstrang v. Peuce- danum.	47
Habichtskraut v. Hi- eracium.	174
Hafer v. Avena.	11

	pag.
Haferwurzel v. Tra- gopogon.	170
Haftdolde v. Caulalis.	53
Hahnenfuss v. Ranun- culus.	118
Hahnenkamm v. Rhin- anthus.	145
Hanf v. Cannabis.	216
Hasel v. Corylus.	210
Hasenohr v. Bupleu- rum.	64
Hauhechel v. Ononis.	167
Hauswurz v. Semper- vivum.	93
HERDERA, Epheu, <i>Li- erre.</i>	39
Hederich v. Erysi- mum.	156
Heide v. Calluna.	76
Heidelbeere v. Vacci- nium.	80
HELIANTHEMUM, klei- ne Cistrose.	111
Helmkraut v. Scutel- laria.	141
HERACLEUM, Bären- klau, <i>Berce.</i>	46
HERNIARIA, Bruch- kraut, <i>Herniaire.</i>	44
<i>Herniaire</i> v. Herniaria.	—
HIERACIUM, Habichts- kraut, <i>Eperviere.</i>	174
Himbeere v. Rubus Idaens.	100
Hirsegras v. Milium.	10
Hirschwurz v. Atha- manta.	49
Hollunder v. Sambu- cus.	65
Hopfen v. Humulus.	216
Hordeum, Gerste, <i>Or- ge.</i>	12
Houblon v. Humulus.	216

	pag.		pag.
Hühnerdarm v. Al-		K.	
sine.	66	Kälberkropf v. Chaer-	
HUMULUS, <i>Houblon</i> , Ho-		rophyllum.	55
pfen.	216	Kalmus v. Acorus.	71
Hundswürger v. Cy-		Kamille v. Anthemis	193
nanchum.	139	et Matricaria.	191
Hundszunge v. Cyno-		Kannenkraut v. Equi-	
glossum.	20	setum.	220
Hundspetersilie v.		Katzennünze v. Ne-	
Aethusa.	51	peta.	128
HYOSCYAMUS, Bilsen-		Kellerhals v. Daphne.	77
kraut, <i>Tusquiane</i> .	30	Kerbel v. Scandix.	54
HYPERICUM, Johannis-		Kerzenkraut v. Ver-	
kraut, <i>Milcpertuis</i> .	113	bascum.	27
Hyssopus, Isop, Hys-		Kirsche v. Prunus ce-	
sope.	12	rasus.	95
I.		Klette v. Arctium.	176
Iacobsblume v. Senec.		Klettenkerbel v. An-	
Iacobaea.	185	thriscus.	54
If v. Taxus.	219	Knabenkraut v. Or-	
Immenblatt v. Melit-		chis.	197
is.	141	Knauel v. Scleranthus.	82
IMPATIENS, Balsami-		Knoblauch v. Allium	
ne, Springkraut,		ursinum.	69
<i>Impatiente</i> .	38	Knöterich v. Polygo-	
Impatiente v. Impatiens.	—	num.	77
INULA, Alant, <i>Inule</i> .	187	Königskerze v. Ver-	
Johannisbeere v. Ri-		bascum.	27
bis rubrum et nigrum.	36	Kohl v. Brassica.	157
Johanniskraut v. Hy-		Kohldistel v. Cnicus	
pericum.	113	oleraceus.	178
Johannisblume v. Ar-		Kornelbaum v. Cor-	
nica.	188	nus.	17
Joubarbe v. Sempervi-		Kornrade v. Agrostem-	
vum.	93	ma.	87
IRIS, Schwerdlilie,		Kratzdistel v. Cni-	
Schwertel, <i>Iris</i> .	9	cus.	178
Isop v. Hyssopus.	128	Krausbeere v. Ribes.	36
JUNIPERUS, Wachol-		Krebsdistel v. Ono-	
der, <i>Genevrier</i> .	219	pordon.	178
Jvroe v. Lolium.	12	Kresse v. Lepidium.	152
<i>Tusquiane</i> v. Hyoscyamus.	30	Kreuzblume v. Poly-	
		gala.	165

	pag.
Kreuzdorn v. Rhamnus.	35
Kreuzkraut v. Senecio.	185
Küchenschelle v. Pulsatilla.	115
Kuhweizen v. Melampyrum.	146
Kümmel v. Carum.	56

L.

Labkraut v. Galium.	15
LACTUCA, Lattich, Sallat, Laitue.	172
Laitier v. Polygala.	165
Laitron v. Sonchus.	171
Laituer v. Lactuca.	172
Lamier v. Lamium.	132
LAMIMUM, Taubnessel, Bienensaug, Lamiar.	—
Lampette v. Lychnis.	81
LATHRAEA, Schuppenwurz, Clandestine.	151
LATHYRUS, Platterbse, Gesse.	163
Lattich v. Lactuca.	172
Läusekraut v. Pedicularis.	147
Lauch v. Allium.	68
Leberblume, weisse, v. Parnassia.	67
Lein v. Linum.	—
Leindötter v. Camellina.	154
Leinkraut v. Linaria.	148
LEONTODON, Löwenzahn, Pissenlit.	173
LEONURUS, Wolfstrapp, Agripaume.	137
LEPIDIUM, Kresse, Passerage.	152

	pag.
Lichtröschen v. Lychnis.	87
Liebstöckel v. Ligusticum.	65
Lierre v. Hedera.	39
LIGUSTICUM, Liebstöckel, Lieveche.	65
Lilie v. Lilium.	69
LILIUM, Lilie, Lis.	—
Lin v. Linum.	67
LINARIA, Leinkraut.	148
Linde v. Tilia.	110
LINUM, Lein, Flachs, Lin.	67
Lis v. Lilium.	69
Liseron v. Convolvulus.	25
Lisimaque v. Lysimachia.	24
LITHOSPERMUM, Steinsäame, Grenil.	18
Löwenmaul v. Antirrhinum.	149
Löwenzahn v. Leontodon.	173
Löffelkraut v. Cochlearia.	153
Lolch v. Lolium.	12
LOLIUM, Lolch, Ivroie.	—
Lungenblume v. Pulmonaria.	21
LYCHNIS, Lichtröschen, Lampette.	87
LYCOPERDON, Bovist.	232
LYCOPODIUM, Bärlapp.	221
LYSIMACHIA, Lysimachie, Lisimaque.	24
Lysimachie.	—
LYTHRUM, Weiderich, Salicaire.	39

M.

Mâcre v. Trapa.	18
-----------------	----

	pag.		pag.
Maiblume v. Conoal- laria.	70	MERCURIALIS, Bingel- kraut, <i>Mercuriale</i> .	218
MALVA, Malve, <i>Mau- ve</i> .	161	Merk v. Sium.	56
Malve v. Malva.	—	MESPILUS, Mispel, <i>Ne- fler</i> .	97
Mannaschwingel v. Festuca fluitans.	10	MEUM (Fenchel).	57
Maronnier v. Aesculus.	75	Miere v. Alsine.	68
Marrube v. Marrubium.	136	Milchkraut v. Asple- nium.	224
MARRUBIUM, Audorn, <i>Marrube</i> .	—	MILIUM, Hirsegras, <i>Millet</i> .	10
Massliebe v. Bellis.	189	Millefeuille v. Achillea.	194
MATRICARIA, Mutter- kraut, Chamille, <i>Matricaire</i> .	191	Millet v. Milium.	10
<i>Matricaire</i> v. Matricaria.	—	Millepertuis v. Hyper- icum.	113
Mauerpfeffer v. Se- dum acre.	85	Milzkraut v. Chryso- splenium.	81
Mausöhrchen v. Hie- rac. Pilosella.	174	Mispel v. Mespilus.	97
Mauve v. Malva.	161	Mistel v. Viscum.	215
Meersalzkraut v. Sa- licornia.	1	Möhre v. Daucus.	55
Meerrettig v. Coch- learia Armoracea.	153	Mohn v. Papaver.	108
MELAMPYRUM, Kuh- weizen, <i>Melampyre</i> .	146	Mondfarn v. Botry- chium.	222
<i>Melampyre</i> v. Melampy- rum.	—	Mondkraut v. id.	—
MELILOTUS, Steinklee, <i>Melilote</i> .	168	Moosbeere v. Oxycoc- cos.	76
Melissa, Melisse, <i>Me- lisse</i> .	141	Morelles v. Solanum.	33
<i>Melissot</i> v. Melittis.	—	Morgeline v. Alsine.	68
MELITTIS, Immen- blatt, <i>Melissot</i> .	—	Mouron v. Anagallis.	25
MENTHA, Münze, <i>Men- the</i> .	109	Moutarde v. Sinapis.	157
<i>Menthe</i> v. Mentha.	—	Muffler v. Antirrhinum.	149
<i>Menianthe</i> v. Menyan- thes.	23	Muguet v. Convallaria.	70
MENYANTHES, Fieber- klee, Zottenblu- me, <i>Menianthe</i> .	—	Münze v. Mentha.	129
		Myagrum v. Camelina.	154

N.

Nachtkerze v. Verbas- cum.	75
Nachtschatten v. So- lanum.	33
<i>Nestler</i> v. Mespilus.	97
Nelke v. Dianthus.	83

	pag.
Nelkenwurz v. Geum urbanum.	105
NENUPHAR, Teichrose.	109
NEPETA, Katzenminze, Chataire.	128
Nerprun v. Rhamnus.	35
Nessel v. Urtica.	205
— taube v. Lamium.	132
Nicandra.	32
Nicotiana, Tabak, Tabac.	—
Nielle v. Agrostemma.	37
NIGELLA, Schwarzkümmel, Nigelle.	115
Nigelle v. Nigella.	—
NYMPHAEA, Seerose.	109

O.

Ochsenzunge v. Anchusa.	19
Odermennig v. Agrimonia.	39
Oeillet v. Dianthus.	83
OENANTHE, Rebendolde.	60
OENOTHERA, Nachtkerze, Onagre.	75
ONONIS, Hauhechel, Bugrane.	167
ONOPORDON, Krebsdistel, Cotton.	178
Ophrys v. Epipactis.	202
ORCHIS, Knabenkraut, Ragwurz, Orquis.	197
Orge v. Hordeum.	12
ORIGANUM, Dost, Origan.	138
Origan v. Origanum.	—
Orpin v. Sedum.	84
Orquis v. Orchis.	197

	pag.
Ortie v. Urtica.	205
Oseille v. Rumex.	72
OSMUNDA, Traubenfarn.	222
Osterluzci v. Aristolochia.	202
OXALIS, Sauerklee, Surelle.	36
ONYCOCOS, Moosbeere, Onyccos.	76

P.

Paeonia, Gichtrose, Paeonie.	112
Panais v. Pastinaca.	48
PANICUM, Hirse, Fennich, Panic.	11
PAPAVER, Mohn, Pavot.	108
Pappel v. Populus.	217
Paquerette v. Bellis.	189
PARIETARIA, Glasakraut, Parietaire.	216
PARIS, Einbeere, Parisette.	79
PARMELIA, Parmelie, Lederflechte.	229
PARNASSIA, weisse Leberblume, Einblatt.	67
Parnassie v. Parnassia.	—
PASTINACA, Pastinake, Panais.	48
Passerage v. Lepidium.	152
Patte d'oie v. Chenopodium.	45
Pavot v. Papaver.	108
PEDICULARIS, Läusekraut, Pediculaire.	147
PELTIDEA.	230
Perliere v. Graphalium.	185
Pervenche v. Vinca.	39

	pag.		pag.
Pestwurz v. Tussilago		POLYTRICHUM, Wieder-	
Petasites.	185	thon.	226
Petersilie v. Apium		Pomme épineuse v. Datu-	
Petros.	58	ra.	29
PEUCEDANUM, Hart-		Populage v. Caltha.	124
strang, Peucedan.	47 64	POPULUS, Pappel, Peu-	
Peuplier v. Populus.	217	plier.	217
Pfefferkraut v. Satu-		POTENTILLA, Finger-	
reja.	128	kraut, Potentille.	103
Pflaume v. Prunus.	94	POTERIUM, Becherblu-	
Pfriemen v. Spartium.	166	me, Pimprenelle.	207
PHALARIS, Glanzgras,		Prele v. Equisetum.	220
Phalaris.	11	Preusselsbeere v. Vac-	
Phellandrium, Rossfen-		cinium vitis Idaea.	80
chel v. Oenanthe.	60	Primel v. Primula.	22
PHYSALIS, Schlutte,		PRIMULA, Schlüssel-	
Coqueret.	32	blume, Primel,	
PHYTEUMA, Rapwur-		Primvere.	—
zel, Raiponce.	26	Primvere v. Primula.	—
Pied de veau v. Arum.	210	PRUNELLA, Brunelle,	
Pied de lion v. Alchemil-		Prunelle.	142
la.	17	PRUNUS, Pflaumenb.	
Pigamon v. Thalictrum.	117	Prunier.	94
PIMPINELLA, Biber-		Prunier v. Prunus.	—
nell, Boucage.	58	PTERIS, Adlerkraut,	
Pimprenelle v. Poterium.	207	Saunfarn.	225
PINUS, Fichte, Pin.	211	PULMONARIA, Lungen-	
Pin v. Pinus.	—	blume, Pulmonaire.	21
Pissenlit v. Leontodon.	173	PULSATILLA, Küchen-	
PLANTAGO, Wegerich,		schelle, Pulsatille.	115
Wegebreit, Plan-		PYRETHRUM, Bertramswur-	
tain.	16	wurz.	191
Plantain v. Plantago.	—	PYROLA, Wintergrün,	
Platterbse v. Lathy-		Pyrole.	80
rus.	168	PYRUS, (Apfel-) Birn-	
Podagraire v. Sison.	59	baum, Poirier.	97
Poirier v. Pyrus.*	97		
POLYGALA, Kreuzblu-			
me, Laitier.	165		
POLYGONUM, Knöte-			
rich, Renouée.	77		
POLYPODIUM, Engel-			
süss.	223		

Q.

Quendel v. Thymus	
Serpyllum.	139
Quenouille v. Cnicus.	178
QUERCUS, Eiche, Ché-	
ne.	208

	pag.
R.	
Rade v. Agrostemma.	87
Rainblume v. Gnaphalium.	183
Rainfarn v. Tanacetum.	80
Raiponce v. Phyteuma.	26
RANUNCULUS, Hahnenfuss, Ranunkel, Renoncule.	118
Ranunkel v. Ranunculus.	—
RAPHANUS, Rettig, Raifort.	158
Rapwurz v. Phyteuma.	26
Rauke v. Sisymbrium.	155
Rebendolde v. Oenanthe.	60
Reiherschnabel v. Erodium.	158
Renoncule v. Ranunculus.	118
Renouée v. Polygonum.	77
RESEDA, Waia, Resede.	—
Resede v. Reseda.	—
Rettig v. Raphanus.	158
RHAMNUS, Kreuzdorn, Wegdorn, Nerprun.	35
Reinfarn v. Tanacetum.	180
RHINANTHUS, Hahnenkamm, Cocrete.	145
RIBES, Krausbeere, Grosseiller.	36
Riedgras v. Carex.	203
Ringelblume v. Calendula.	198
Rittersporn v. Delphinium.	112
Ronce v. Rubus.	100
Rossfenchel, Phellandrium v. Oenanthe.	60
Roquette v. Erysimum.	156

	pag.
ROSA, Rose, Rosier.	99
Rose v. Rosa.	—
Rosier v. id.	—
Roskastanie v. Aesculus.	75
Rosshuf v. Tussilago.	184
Rossoli v. Drosera.	67
RUBUS, Himbeere, Ronce.	100
RUMEX, Ampfer, Oscille.	72
Rüster v. Ulmus.	44

S.

Salbey v. Salvia.	6
SALICORNIA, Glas-schmalz, Meersalz-kraut, Salicorne.	1
Salicorne v. Salicornia.	—
SALIX, Weide, Saule.	215
Salsifx v. Tragopogon.	170
SALVIA, Salbey, Saugge.	6
SAMBUCUS, Hollunder, Sureau.	65
SANGUISORBA, Wiesenknopf, Sanguisorbe.	17
Sanguisorbe v. Sanguisorba.	—
SANICULA, Sanikel, Sanicle.	54. 234
SAPONARIA, Seifenkraut, Savonaire.	82
SATUREIA, Saturei, Pfefferkraut, Sardedée, Savorée.	128
Sauerampfer v. Rumex Acetos.	73
Sauerklee v. Oxalis.	86
Sauerdorn v. Berberis.	72
Sauge v. Salvia.	6
Saule v. Salix.	215
Savonaire v. Saponaria.	82

	pag.		pag.
SAXIFRAGA, Stein-		SCUTELLARIA, Helm-	
brech, <i>Saxifrage</i> .	81	kraut, <i>Toque</i> .	141
SCABIOSA, Scabiose,		Secale, Roggen, Seigle.	12
<i>Scabieuse</i> .	14	SEDUM, Hauslaub, Or-	
Scabiose v. Scabiosa.	—	pin. — acre: Mauerpfeffer.	84
<i>Scabieuse</i> v. Scabiosa.	—	Seerose v. Nymphaea.	109
Scandix, Kerbel.	54	Seidelbast v. Daphne.	77
Schafgarbe v. Achillea		Seifenkraut v. Saponaria.	82
Millefolium.	194	SELINUM, Silge, <i>Selin</i> .	48. 65
Scharbockkraut v. Ficaria.	117	<i>Selin</i> v. Selinum.	—
Schaumkraut v. Cardamine.	154	Sellerie v. Apium graveol.	58
Schierling:		SEMPERVIVUM, Hauswurz, <i>Ioubarbe</i> .	93
— Wasser v. Cicuta.	50	SENECIO, Kreuzkraut, <i>Senecion</i> .	185
— grosser v. Conium.	61	<i>Senecion</i> v. Senecio.	—
— kleiner v. Aethusa.	51	Senf v. Sinapis.	157
Schlehe v. <i>Fragus spinosa</i> .	95	Sideritis, Gliedkraut, <i>Crapaudine</i> .	135
Schlüsselblume v. <i>Primula</i> .	22	Siegwurz v. Gladiolus.	8
Schlutze v. Physalis.	32	Silge v. Selinum.	48
Schöllkraut v. Chelidonium.	107	SINAPIS, Senf, <i>Moutarde</i> .	157
— kleines v. Ficaria.	117	Sinau v. Alchemilla.	17
Schollera v. Oxycoccus.	76	Sinngrün v. Vinca.	39
Schuppenwurz v. Lathraea.	151	SISYMBRIUM, Rauke, <i>Sisimbre</i> .	155
Schwalbenwurz v. Vincetoxicum.	40	SISON.	59
Schwarzkümmel v. Nigella.	113	Sium, Merk, Berle.	56
Schwarzwurz v. Symphytum.	21	SOLANUM, Nachtschatten, <i>Morelles</i> .	33
Schwerdlilie v. Iris.	9	SOLIDAGO, Goldrute, <i>Verge d'or</i> .	186
Schwertel v. id.	—	SONCHUS, Gänsedistel, <i>Laitron</i> .	171
Schwingel v. Festuca.	10	Sonnenthau v. Drosera.	67
SCLERANTHUS, Knaul, <i>Gnavelle</i> .	82		
SCORZONERA, Scorzoneré, <i>Scorzonère</i> .	170		
SCROPHULARIA, Braunwurz, <i>Scrophulaire</i> .	150		

	pag.
SORBUS, Speierling,	
<i>Vogelbeere.</i>	96
Sorbier v. Sorbus.	—
Souct v. Calendula.	196
Spargel v. Asparagus.	70
Spark v. Spargula.	88
Spargoute v. Spargula.	—
SPARTIUM, Pfriemen,	
<i>Genet à balais.</i>	166
Speierling v. Sorbus.	96
SPIERGULA, Spark,	
<i>Spargoute.</i>	88
Spierstaude v. Spiraea.	98
Spindelbaum v. Eonymus.	36
SPIRAEA, Spierstaude,	
<i>Ziegenbart, Spirée.</i>	98
Spirée v. Spiraea.	—
Spitzklette v. Xanthium.	206
Springkraut v. Impatiens.	38
Stachelbeere v. Ribes grossularia.	36
Stachelnuss v. Trapa.	18
STACHYS, Ziest, Epiaire.	134
Stechapfel v. Datura.	29
Steckenkraut v. Ferula.	47
Steinbrech v. Saxifraga.	81
Steinklee v. Melilotus.	168
Steinsaame v. Lithospermum.	18
Storchschnabel v. Geranium.	159
Streifenfarn v. Asplenium.	224
Sturmhut v. Aconitum.	112
Surcau v. Sambucus.	65
Surette v. Oxalis.	36

	pag.
SYMPHYTUM, Beinwell,	
<i>Schwarzwurzel,</i>	
<i>Consoude.</i>	21

T.

Tabouret v. Thlaspi.	152
TANACETUM, Rheinfarn, Tanaisie.	180
Tanaisie v. Tanacetum.	—
Täschelkraut v. Thlaspi.	152
Taubnessel v. Lamium.	152
Taubenkröpf v. Cucubalus.	84
TAXUS, Eibe, If.	219
TEUCRIUM, Gamander, Germandrée.	127
THALICTRUM, Wiesentraute, Pigamon.	117
THLASPI, Hirtentasche, Täschelkraut, Tabouret.	152
Thymian v. Thymus.	139
THYMUS, Thymian, Quendel, Feldkümmel, Thym.	—
TILIA, Linde, Tilleul.	110
Tilleul v. Tilia.	—
Tithymale v. Euphorbia.	90
Toque v. Scutellaria.	141
Tordyle (Tordylium) v. Torilis.	53
TORMENTILLA, Tormentill, Tormentille.	104
TRAGOPOGON, Bocksbart, Haferwurzel, Salsifx.	170
Traubenfarn v. Osmunda.	222
Traubenkirsche v. Prunus Padus.	94

	pag.		pag.
TRAPA, Wassernuss,		VIOLA, Veilchen, <i>Vio-</i>	
Stachelnuss, <i>Maëré.</i>	18	lette.	36
TREMELLA, Gallert.	233	Violette v. Viola.	—
Trifolium v. Melilotus.	168	VINCA, Sinngrün,	
TRITICUM, Weizen,		<i>Pervenche.</i>	39
<i>Froment.</i>	11	VINGETOXICUM, Schwal-	
TROLLIUS, Trollblu-		benwurz.	40
me, <i>Trolle.</i>	124	VISCUM, Mistel, <i>Gui.</i>	215
Türkenbund v. Lilium		Vitis, Weinrebe, <i>Vig-</i>	
Martagon.	69	ne.	39
TUSSILAGO, Huflattig,		Vogelbeere v. Sorbus.	96
Rosshuf, <i>Tussilage.</i>	184	Vogelkirsche v. Pru-	
		nus avium.	95
		Vogelmiere v. Alsine.	66
		Vogelknöterich v.	
		Polygonum aviculare.	78
		Vulnèraire v. Anthyllis.	167
		W.	
		Wachholder v. Juni-	
		perus.	219
		Waldmeister v. As-	
		perula.	15
		Waldrebe v. Clematis.	116
		Wasserfenchel (<i>Phel-</i>	
		landrium) v. Oenanthe.	60
		Wasserhanf v. Eupa-	
		torium.	180
		Wassernuss v. Trapa.	18
		Wasserpfeffer v. Po-	
		lygon. Hydropiper.	78
		Wasserschierling v.	
		Cicuta.	50
		Wegdorn v. Rhamnus.	35
		Wegehreut v. Plantago.	16
		Wegerich.	—
		Weichborste v. Cli-	
		nopodium.	138
		Weide v. Salix.	213
		Weiderich v. Lythrum.	89
		Weidrich v. Epilo-	
		bium.	75

	pag.
Weinrebe v. Vitis.	39
Weissdorn v. Crataegus.	96
Weizen v. Triticum.	11
Wiesenkropf v. San- guisorba.	17
Wiesenraute v. Thalictrum.	117
Winde v. Convolvulus.	25
Wintergrün v. Pyrola.	80
Wolfsmilch v. Euphorbia.	90
Wolfstrapp v. Leonurus.	137
Wolverley v. Arnica.	188
Wucherblume v. Chrysanthemum.	190
Wundklee v. Anthyllis.	167

	pag.
X.	
XANTHIUM, Spitzklette, Glouteron.	206
Z.	
Zaunrübe v. Bryonia.	212
Zehrwurz v. Arum.	210
Zeitlose v. Colchicum.	73
Ziest v. Stachis.	154
Zirne v. Torilis.	53
Zottenblume v. Menyanthes.	23
Zweiblatt v. Epipactis.	202
Zweizahn v. Bidens.	179
Zymbelkraut v. Antirrh. Cymbalaria.	188

INDEX PHARMACEUTICUS.

	pag.
Absinthii Hb.	182
Acaciae muscus.	230
Acaciae Nostratis s. germanicae s. vulg. Cort.	
Flor. Fruct. et Nuclei.	95
Acanthii vulg. Hb. Sem.	178
Acetosae nostrat. Hb. Rad.	73
Acetosellae Hb.	73. 87
Acori palustris Rad.	10
Adianthi aurei Hb.	226
— rubri Hb.	225
Adulterini Rad.	10
Agaricus muscarius.	223

	pag.
Agrimoniae Hb.	89
Alceae Hb. Rad.	162
Alchemillae Hb. Rad.	17
Alliariae Hb.	156
Allii Rad.	69
Alni Cort. Fol.	205
Alsines Hb.	66
Amarae dulcis Stipit.	33
Anagallidis Hb.	26
Anchusae Rd. Hb. Fl.	19
Angelicae silv. Rad.	50
Antirrhini Hb. Fl.	139
— arv. Hb.	—

	pag.
Antirrhini coerulei Hb. Fl.	43
— maioris Hb. Fl.	150
Anserinae Rad. Hb.	103
Aquilariae Rad.	226
Ari Rad.	211
Aristolochiae cauae Rad.	163
— fabaceae Rad.	—
— rotundae Rad.	164
— vulgaris Rad.	205
Armoraciae Rad.	153
Arnicae Fl. Rd. Hb.	188
— Suedensis s. spuriae Hb.	187
Aronis Rad. Foec.	211
Artemisiae Albae Hb. Fl. Summit.	182
— rubrae Hb. Summit.	181
Asphodeli Rad.	70
Aucupariae Bacc.	97
Auricula Iudae.	234
— muris Rad.	147
Avellanae Lign. Nuc.	210
Avenae Sem.	11

B.

Ballotae nigr. Hb.	156
Barbae Capri Rad. Fol. Fl.	98
Bardanae Rad.	177
— minoris Hb. Sem.	207
Beccabungae Hb.	4
Behen albi Rad.	84
Bellidis maioris s. prat. Hb. Fl.	190
— minoris Hb. Fl.	—
Benedictae silv. Rad.	106
Berberum Bacc.	72
Betonicae Fl. Hb.	133
— aquaticae Hb.	151
Betulae Fol. Epid. Cort. Succ.	210

	pag.
Bidentis Rad. Hb.	179
Bifolii Hb.	202
Bistortae Rad.	78
Boletus suaveolens.	233
Boni Henrici Hb.	45
Borraginis Fl.	22
Brancae ursi s. ursinae Hb.	47
Britannicae Rad.	73
Brunellae Hb.	142
Bryoniae Rad. Bacc.	212
Buglossi Rad. Hb. Fl.	19
Bursae pastoris Hb.	153
C.	
Calami aromatici s. vulg. Rad.	71
Calcatrippae Fl. Hb.	112
Calcitrapae Rad.	196
Cannabis Sem.	216
Caprinae Fl. Rad.	99
Cardiacae Hb.	137
Cardui Mariae Hb. Sem.	177
Caricis Rad.	204
Carotae Rad.	53
Caryophyllatae Rd.	105
— aquat. Rd.	106
Centaurii minoris Hb. Fl. Summit.	41
Centinodiae s. Centum-nodiae Hb.	79
Cerasi racemosi silvestr. Fl. Bacc. Cort.	94
Cerefolii Hb. Sem.	55
Cervariae nigrae Rad. Sem.	65
Chaerefolii Hb. Sem.	55
Chacrophylli Hb. Sem.	—
Chamaecisti vulg. Hb.	112
Chamomillae vulg. s. nostrat. Fl. Hb.	192

	pag.
Chelidonii maioris Rad.	107
Hb. Fl.	118
— minoris Hb.	81
Chrysosplenii Hb.	176
Cichorei Rad. Fl. Hb.	51
Cicutae aquaticae s. virosae Hb. Rad.	62
— maioris offic. s. ter-restr. s. vulg. Hb.	55
Cicutariae Hb.	138
Clinopodii arvensis Hb.	141
— silvestr. Hb.	77
Coccognidii s. Cocci Gnidii Bacc.	74
Colchici Rad.	107
Comari palustr. Hb.	62
Conii maculati Hb. Sem.	22
Consolidae maioris Rad.	127
— mediae Hb.	142
— minoris Hb.	112
— regalis Fl. Hb.	187
— sarracenicae veterum Hb.	70
Convallii Fl.	26
Convolvuli Rd. Hb.	187
Conyzae mediae Hb.	184
— minoris Hb.	18
Corni Fruct.	194
Cotulae foetidae Hb. Fl.	85
Crassulae maioris Fol.	233
Crepitus Lupi.	145
Cristae galli Hb.	44
Cuscutae europeae s. maioris Hb.	196
Cyani Fl.	148
Cymbalariae Hb. s. Fol.	99
Cynosbati Fruct.	100

D.

Daturae Hb. Sem.	29
Dauci Rad.	53
Dentariae Rad.	152
Dulcamarae Stipit.	33

E.

	pag.
Elatines Hb. s. Fol.	148
Elsnitii Rad.	49
Epithymi offic. s. cretici Hb.	44
Equiseti maioris Hb.	221
— minoris Hb.	—
Ericae Hb.	76
Erysimi Hb.	156
Esulae Rad. Cort. Hb.	91
— maioris.	93
— minoris.	92
Eupatorii Hb. Rad.	180
Euphrasiae Hb.	144

F.

Fabae crassae Fol.	85
Fabariae Fol.	—
Farfarae Rd. Fol. Hb.	184
Festucae fluitant. Sem.	11
Filicis maris Rad.	224
Filipendulae Rad.	98
Fistulariae Hb.	147
Flammulae Jovis Hb.	119
Foeniculi Rad. Hb. Sem.	57
— aquatici Sem. Hb.	61
— porcini Rad.	47
Fragariae Bacc.	103
Frangulae Cortex.	36
Fumariae Hb.	164
— bulbosae Rad.	—
Fungus Chirurgorum.	235
— salicis.	—

G.

Galeopsidis Fl.	132
— Hb.	134
— palustr. foetidae Hb.	—
Galii albi Hb. Fl.	16
— lutei Hb. Fl.	—

R

<i>Geirivalis s. palustr.</i> Rad.	pag. 106
— <i>urbani</i> Rad.	105
<i>Genistae</i> Hb. Fl. Sem.	166
— <i>tinctoriae</i> Hb. Fl. Sem.	—
<i>Gentianae cruciatae s. minoris</i> Rad. Fol.	43
— <i>nigrae</i> Rad. Sem.	65
<i>Geranii Robertiani</i> Hb.	160
<i>Githaginis</i> Hb.	87
<i>Gladioli lutei</i> Rad.	10
<i>Gnaphalii</i> Fl.	183
<i>Graminis canini s. minoris</i> Rad.	12
— <i>rubri s. majoris</i> Rad.	—
— <i>v. Caricis aren.</i> Rad.	204
<i>Gratia Dci.</i>	159

H.

<i>Hederæ</i> Lign. Fol. Bacc.	
— <i>Gummi.</i>	39
— <i>terrestris</i> Hb.	132
<i>Helianthemii</i> Hb.	112
<i>Helxines</i> Hb.	206
<i>Hepaticae albae</i> Hb. Fl.	67
— <i>nobilis</i> Hb. Fl.	114
<i>Heracanthæ</i> Rad.	179
<i>Herniariæ</i> Hb.	44
<i>Hirundinariæ</i> Rad.	40
<i>Hordei Semina.</i>	12
<i>Hormini</i> Fol. Sem.	6
<i>Hydrolapathi</i> Rad.	73
<i>Hydropiperis</i> Hb.	78
<i>Hyoseyami nigri</i> Hb. Rad.	—
— <i>Sem.</i>	31
<i>Hyperici</i> Hb. Fl. Sem.	114
<i>Hyssopi</i> Hb.	128

I.

<i>Iaccae</i> Hb. Fl.	38
<i>Iacobææ</i> Hb. Fl.	186
<i>Ignis Kb.</i>	228
<i>Illecebri vermiculati</i> Hb. Fl.	85
<i>Ireos palustr.</i> Rad.	10
<i>Juniperi</i> Bacc. Lign. Summitat.	219

L.

<i>Lamii albi</i> Fl.	132
— <i>silvatici maximi</i> , Hb.	134

<i>Lapathi acuti</i> Rad.	pag. 72
— <i>aquatici</i> Rad.	—
<i>Laureolæ</i> Cort. Bacc.	77
<i>Lichenis parietini</i> Hb.	229
<i>Lilii Convallii</i> Fl.	70
<i>Linariæ</i> Hb.	149
<i>Lini</i> Sem. Farin.	67
— <i>cathartici</i> Hb.	—
<i>Lolii offic.</i> Sem.	87
— <i>tenulenti</i> Sem.	13
<i>Luulæ</i> Hb.	87
<i>Lunariæ</i> Hb.	222
<i>Lupuli Coni s. Strobili s.</i>	—
— <i>Fl. Turion.</i> Rad.	217
<i>Lycoperdi</i> Pulv.	222
<i>Lysimachiae</i> Hb.	25
— <i>Chamaenerii</i> Hb.	76
— <i>purpuræ</i> Hb.	89

M.

<i>Malvæ rotundifoliae s. vulg.</i> Hb. Rad. Fl. Sem.	161
— <i>silvestr.</i> Hb. Rad. Fl. Sem.	162
<i>Marrubii albi</i> Hb.	137
— <i>nigri</i> Hb.	136
<i>Martiae</i> Hb. Fl. Rad.	37
<i>Matricariæ</i> Hb. Fl.	191
<i>Matrisylvæ</i> Hb.	15
<i>Melampyri</i> Farin.	146
<i>Meliloti albi et citrini</i> Hb. Fl. Sem.	169
<i>Melissophylli</i> Hb.	141
<i>Menthae aquaticæ</i> Hb.	129
<i>Mercurialis</i> Hb. Sem.	218
<i>Mespili</i> Fruct. Sem.	97
<i>Mezeræi</i> Cort. Bacc.	77
<i>Milii effusi</i> Sem.	11
— <i>Solis</i> Sem.	19
<i>Millefolii</i> Hb. Fl. Summit.	194
<i>Moræ Rubi.</i>	102
<i>Morsus Diaboli</i> Rad. Hb.	14
<i>Musci acaciæ</i> Hb.	230
— <i>arboræi s. quercini</i> Hb.	229
— <i>canini</i> Hb.	231
— <i>clavati</i> Hb. Sem. Farina.	222
— <i>cumatilis</i> Hb.	231

N.

	pag.
<i>Nasturtii aquatici</i> Hb.	155
— <i>petraei</i> Hb.	81
<i>Nenupharis</i> Fl. Rad.	109
<i>Nepetae</i> Hb.	129
<i>Nigellastri</i> Hb.	87
<i>Nolitangere</i> Hb.	38
<i>Nuces aquaticae</i> .	18
<i>Nummulariae</i> Hb.	25
<i>Nymphaeae</i> Rad. Fl.	109

O.

<i>Ocymi silvestr.</i> Hb. 141.	138
<i>Oelsnitii</i> Rad.	49
<i>Olsnitii</i> Rad.	—
<i>Ononidis</i> Rad. Hb.	167
<i>Oreosolini</i> Rad. Hb. Sem.	49
<i>Origani vulg.</i> Hb. Fl.	159
<i>Orontii</i> Hb.	149
<i>Oxyacanthiae</i> Fol. Fl. Bacc.	96
<i>Oxycocci</i> Bacc.	76
<i>Oxylapathi</i> Rad.	72

P.

<i>Padi</i> Cort. Fl. Bacc.	94
<i>Palmatae</i> Rad.	201
<i>Panici miliac.</i> Sem.	11
<i>Papaveris Rhoead. s. erratici</i> Fl. Hb.	108
<i>Paridis</i> Hb. Bacc.	79
<i>Parietariae</i> Hb.	206
<i>Paronychiae</i> Hb.	225
<i>Pedicularis aquaticae</i> Hb.	147
<i>Pentaphylli</i> Rad. Hb.	104
— <i>aquatici</i> Hb.	107
<i>Perfoliati</i> Hb. Sem. v. <i>Bupleurum</i> .	64
<i>Persicariae urentis</i> Hb.	78
<i>Pes Cati</i> .	183
<i>Petasitidis</i> Rad.	185
<i>Peucedani</i> Rad.	47
<i>Phalaridis canariensis</i> Sem.	11
<i>Phellandrii</i> Sem. Hb.	61
<i>Pilosellae</i> Rad.	174
<i>Pimpinellae albae</i> Rad. Fol. Sem.	59
— <i>italicae</i> Hb. Sem.	207
— <i>italicae</i> Rad. Hb.	17
<i>Plantaginis latifol.</i> Rad.	—
Hb. Sem.	16
— <i>aquaticae</i> Hb.	74

pag.

<i>Pneumonanthes</i> Hb. Fl.	pag. 34
<i>Polygalae vulg.</i> Rad. Hb.	165
<i>Polygoni amphibii</i> Rad.	78
— <i>cocciferi</i> Hb.	82
<i>Polypodii</i> Rad.	223
<i>Poma acidula</i> .	98
<i>Populi oculi s. gemmae</i> .	217
<i>Potentillae</i> Rad. Hb.	103
<i>Primulae veris</i> Rad. Hb.	—
Flor.	23
<i>Prunellae</i> Hb.	142
<i>Pruneoli silv.</i> Cort. Fl.	—
Fruct. Nucl.	95
<i>Pseud Acori</i> Rad.	10
<i>Ptarmicae</i> Rad. Hb. Fl.	195
<i>Pteridis</i> Rad.	226
<i>Pulegii</i> Hb.	132
<i>Pulicariae</i> Hb.	188
<i>Pulmonariae gallicae</i> Hb.	175
— <i>maculosae</i> Rad. Hb.	21
<i>Pulsatillae nigricantis</i> Hb.	115
<i>Pyrolae</i> Hb.	81

Q.

<i>Quercus</i> Cort. Fol. Gland.	—
Capul.	208
<i>Quinquefolii</i> Rad. Hb.	104

R.

<i>Ranunculi palustris s. aquatici</i> Hb.	121
<i>Rapunculi</i> Rad.	27
<i>Resedae Luteolae</i> Hb. Fl.	90
<i>Rhabarbari pauperum</i> Hb.	—
Rad.	117
<i>Rhapontici</i> Rad.	73
<i>Rorellae</i> Hb.	68
<i>Roris Solis</i> Hb.	—
<i>Rosae silv. s. rubrae vulg.</i>	—
Fl.	100
<i>Rubi Idaei</i> Bacc.	—
<i>Ruborum</i> Rad. Fol. Bacc.	102
<i>Rutae murariae</i> Hb.	225

S.

<i>Salap s. Salep.</i> Rad.	198
<i>Salep s. Saleb</i> Rad.	—
<i>Salicariae</i> Hb. Rad.	89
<i>Salicorniae</i> Hb.	2
<i>Salicis albae</i> Cort.	215
— <i>fragilis</i> Cort.	214

	pag.
Salicis Helicis Cort.	214
— Laureolae Cort.	—
Salviae offic. Hb.	6
Sambuci Fl. Cort.	66
Sanguinariae Rad.	79
Sanguisorbæ Rad. Hb.	17
Saniculae Hb.	54. 234
Saponariae alb. Rad.	88
— offic. Rad.	83
Saturejae Hb.	128
Satyræ Rad.	199
Saxifragæ albæ Hb. Fl.	82
— Angelicæ Rad. Hb.	65
— rubrae Rad.	98
Scabiosæ Rad. Hb. Fl.	15
Scariolæ Hb.	173
Scorzonæ Rad. Sem.	171
Scrophulariæ aquat. Hb.	151
— foetidae Rad.	150
Sedi minoris Hb.	85
— minoris albi Hb.	—
Serpylli Hb. Fl.	140
Sesclios pratensis Rd. Hb.	65
Sideritidis Hb.	135
Sigillum Salomonis.	71
Sinapios Sem.	158
Soda.	2
Solani nigri s. vulgar. Hb.	35
— quadrifolii Hb.	79
Sophia Chirurgorum.	156
Sophiæ Sem.	—
Sorbi Aucupar. Bacc.	97
Spergulæ Sem.	88
Sphondylii Hb.	47
Spinæ albæ Fol. Fl. Bacc.	96
— cervinae Cort. Bacc.	36
Squamariæ Rad.	152
Stachydis palustr. Hb.	134
Sulphur corylinum.	210

T.

Tanacetæ Hb. Fl. Sem.	180
Taraxaci Rad. Hb.	174
Taxi Fol. Bacc.	220
Telephii Folia.	85
Tertianariæ Hb.	142
Thalictri flavi Hb. Rad.	117
Tiliae Fl. Cort.	111
Tithymali Rad. Hb. Cort.	91. 92

	pag.
Tormentillæ Rad. Hb.	104
Tragopogonis Rad.	170
Tribuli aquatici.	18
Trichomanis Hb.	225
Trientalis Hb.	142
Trifolii fibrini Rad. Hb.	—
— Sem.	24
Trinitatis Hb. Fl.	38
Triticæ Sem. Rad. (gram. canini.)	12
Tunicae Fl.	83
Tyssellini Rad.	49

U.

Ulmariæ Rad. Fl.	99
Ullni Cort. int.	45
Ulvæ versæ s. vulpinæ Hb.	79
Urticæ inertis Fl.	154
— maioris Hb. Rad. Sem.	205
— minoris Hb.	—
— mortuæ Fl.	132

V.

Valerianæ silvestr. s. minoris Rad.	8
Verbasci Hb. Fl.	28
Verbenæ Hb.	145
Veronicae Beccabungæ Hb.	4
— offic. Hb.	3
— Teucriifoliae Hb.	5
Victorialis rotundæ Rad.	9
Vincae Pervincae Hb.	39
Vincetoxici Rad.	40
Violæ Rad. Hb. Fl.	37
— tricoloris Hb. Fl.	38
Violariæ Rad. Hb. Fl.	37
Virgæ aureæ Hb.	187
Viscaginis Hb.	84
Visci querni Lign. s. stipites.	216
Viscus quercinus s. quernus.	—
Vitalbæ Hb.	117
Vulnerariæ Rad. Fl.	99

X.

Xanthii Hb. Sem.	207
------------------	-----

New York Botanical Garden Library

QK 99 .R42

Reichenbach, Heinri/Flora lipsiensis pha

gen

3 5185 00058 4894